

Notes du mont Royal

www.notesdumontroyal.com

Cette œuvre est hébergée sur « *Notes du mont Royal* » dans le cadre d'un exposé gratuit sur la littérature.

SOURCE DES IMAGES
Google Livres

EVCLIDIS ELEMENTORVM

SEX
LIBRI PRIORES

DEMONSTRATI
ab
HENRICO COETSIO




HELEMENTARY FACTS

OF
THE
ELEMENTS

OF
THE
ELEMENTS

OF
THE
ELEMENTS



EUCLIDIS
ELEMENTORUM
SEX
LIBRI PRIORES
*Magnam partem novis demon-
strationibus*
ADORNATI
OPERA & STUDIO
HENRICI COETSII.



LUGDUNI BATAVORUM,
Apud DANIELEM & GAESBEEK,
M DC XCH.

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

ILLUSTRISSIMIS, NOBILIS-
SIMIS, AMPLISSIMISQUE

ACAD. LUGD. BAT.

Curatoribus,

D^o. JACOBO

BARONI de WASSENAER,

DOMINO DE OBDAM, HENS-
BROECK, WOCHMEER, SPIER-
DIJCK, ZUIDWIJCK, KERNHEM,
TUIKELO, LAGE; NOBILI HOL-
LANDIÆ; MILITIÆ EQUESTRI
BELGICÆ. SUB MAJORIS GENE-
RALIS NOMINE PRÆFECTO;
URBIS WILLEMSTADII, CLUN-
DER, SUBJECTARUMQUE AR-
CIUM GUBERNATORI.

†

Do.

D^o. CONRADO

V A N

BEVNINGEN, J. C.

REIPUBLICÆ AMSTELODAMENSIS
VIRO CONSULARI, ET APUD
POTENTISSIMOS REGES NON
UNA LEGATIONE FUNCTO.

D^o. CORNELIO

TERESTEIN^{van} HALEWIJN,

REIPUBLICÆ DORDRACENÆ CON-
SILIARIO: ET IN HOLLANDIÆ
FRISIÆQUE CURIA SENATORI
ORDINARIO.

Eorum.

Eorumque Collegis Amplissi-
mis Reipublicæ Leidenfis

CONSULIBUS

D. JOHANNI van BANCHEM.
Præfidi.

D. DANIELI van ALPHEN.
J. C.

D. JACOBO VROMAN.

D. CORNELIO WITTENS.
J. C.

Nec. non
Prudentissimo atque Consultis-
simo VIRO

D^o. JOHANNI
VAN DEN BERGH.

ILLUSTRISSIMORUM CU-
RATORUM COLLEGIO A
SECRETIS.

Salutem & Felicitatem
precatur

HENRICUS COETSIUS.

DE-

DEDICATIO.

Circumspicienti mihi ,
quos Patronos novæ
huic Euclidis editioni
eligerem , statim visum est recte
me facturum , si eam Vobis ,
VIRI ILLUSTRISSIMI,
offerrem , vestrumque nomen ve-
luti tutelam primæ pagina in-
scriberem. Cum enim Celeberrimo-
rum Professorum benevolen-
tiâ juventutem in alma , quæ
vestrâ tam præclarâ & plus
quam paternâ Curâ gloriatur ,
doceam Academia , jamque isti
labori per aliquot annos viribus

DEDICATIO.

*meis pari incubuerim vigilantia
ac sedulitate, peccaturum me in
Personas Vestras credidi, nisi
ad Vos, ea qua par est obser-
vantia deferrem, quæ illustrando
Mathematicorum facile Princi-
pi, uti equidem spero, inservi-
tura sunt; quæque Vobis vel ob
hanc solummodo causam deben-
tur, quod in Vestra nata sint
Academia, juxta Axioma, quod
a Jurisconsultorum filiis nobis
traditum, illa quæ alieno fundo
inedificata sunt, istius fundi
summo cum jure adjudicavit
domino.*

DEDICATIO.

domino. Fateor multos & præcipue eruditionis Viros sese in hoc stadio exercuisse, ut temeritatis redargui posse videar; atamen, Viri Illustrissimi, perspicietis me illorum vestigia sequutum, qualicunque hac mea diligentia effecisse, ut quam plurimæ horum Elementorum propositiones, quæ prolixis ac difficilioribus immersæ demonstrationibus, multorum Tyronum in ipso, ut ajunt, limine restinguebant ardorem, nunc facilius & nullo fere negotio intelligi possint.

DEDICATIO.

possint. Quod si felix adeo sim, ut hic meus conatus Vobis, Viri Illustrissimi, non displiceat, calcar mibi addetur ad meditanda sublimiora, quibus illorum, qui haustis jam Elementis ad altiora adspirant, conatus adjuvare, quantum in me est, adlaborabo. Vobis autem Viri Illustrissimi, me & studia mea commendare audeo, Deumque multum veneror, ut Vos Reipublicæ & Academiae bono diu salvos esse velis.

Præ.

PRÆFATIO

A D

LECTOREM.

Elementa demonstrare aggredior Euclidis, Illustris Mathematici, qui tum propriis inventis, tum ab aliis inventorum, quæ passim dispersa jacebant, collectione & iusta ordinatione Magni adeptus Geometræ nomen, de omni Matheseos optime meritus est studio: id quod abunde testatum faciunt tot doctissimorum virorum commentarii, quibus hæc Elementa, quorum utilitas paucos latet, per multa celebrata sunt secula.

Admirandæ sane sunt Theonum, Proclorum, Commandi-

A

no-

P R Æ F A T I O.

norum, Clauiorum, Bettinorum,
& aliorum nominis haud obscu-
ri Mathematicorum lucubratio-
nes, quæ adeo fertiles sunt ac
dilucidæ, ut universæ Matheſeos,
quantum imo plus quam ſufficit,
exinde depromi queant fundamen-
ta. Quare ego, ne actum agere
videar & aliorum ſolummodo re-
petere dicta, quod rem ipſam
ſpectat & hujus Opusculi, quem
intendo, ſcopum paucis eloquar.
Omnium Mathematicorum, qui
in horum Euclidis Elementorum
dilucidatione & demonstratione
poſteritati ſuam probare ſategerunt
induſtriam, non una eademque
obſervatur methodus; aliis qui-
dem veterem & ab Euclide tradi-
tum nobis ſervantibus ordinem;
aliis

P R Æ F A T I O.

aliis vero non mordicus isti ordini inhærentibus, sed veritatum iis comprehensarum maxime naturalem contemplanribus concatenationem. Ego neglecta posteriori hac demonstrandi via, illorum, qui Clarissimi Geometræ autoritate ducuntur & veneratione, castra sequor; in quorum partes me vel unica hæc trahit ratio, quod illis, qui horum Elementorum notitia jam quodammodo sunt imbuti, ad sublimiora Veterum Mathematicorum evolvenda opera faciliorem longe suppeditare mihi manuductionem videantur & aditum. Licet ab altera parte minime sua laude destituti sint, qui liberiores ineuntes viam & rerum ipsarum, quan-

P R Æ F A T I O.

tum fieri potest, naturalem sequentes ductum, proprio ingenio & ratiocinio litare maluerunt quam Veteris jurare in Verba Magistri.

In quo laborum genere haud postremo loco collocandi sunt clarissimus Christophorus Sturmius & Ignatius Gaston Pardies, quorum alter natione Germanus in sua Mathesi enucleata, alter ex Galliis ortum ducens in suis Elementis Geometriæ, non solum Euclidis omnibus, verum etiam præcipuis Apollonii & Archimedis demonstratis theorematibus, haud exiguam sibi apud posteros gratiam conciliabunt & laudem. Cum autem hæc Methodus, ut modo dixi, nos ab Antiquorum de-

P R Æ F A T I O.

demonstrandi fontibus alienos reddat nimium, præscriptum Euclidis potius quam alium sequi placuit ordinem; cui tamen me non ita mancipare in animum induxi meum, ut illum ullo in loco invertere nefas duxerim: Siquidem Benignus comperiet Lector me non raro in demonstranda aliqua propositione sequentem & nondum demonstratam vocare in auxilium; quam tamen transpositionem haud mediocrem afferre facilitatem non minori cum brevitate conjunctam videbit is, qui inspicere dignabitur nostram demonstrationem ad § Libri I propositionem, eamque conferre cum Clavio, aut aliis, qui huic Propositioni multo plus quam altero

P R Æ F A T I O.

tanto longiorem accommodarunt demonstrationem; cujus prolixitas multorum tyronum vel maximam in discendo frangit constantiam; præterquam quod suæ demonstrationi immisceant æqualitatem angulorum infra basin, cum duo æqualia producta sint latera: quæ tamen æqualitas istius Propositionis primarium minime facit scopum. Cui malo ab omni parte nostram demonstrationem remedium afferre putamus. Nec huic transponendi methodo scrupulum Mathematicorum figit rigor, qui Paralogismos, Principii petitiones & sic dictos Circuios evitandi studio omnem suam vim referens acceptam, priorum per posteriora haudquaquam admittit.

P R Æ F A T I O.

mittit demonstrationem. Sic enim nostris ordinatis demonstrationibus, ut propositiones præcedentes ope sequentium demonstratæ, harum demonstrationi vice versa non iterum inserviant, in istum scopulum impingendi ne minimo quidem laboramus periculo. Cæterum ipsis Demonstrationibus Methodum Algebraicam applicuimus quodammodo, ita tamen ut a tyrone debitam non relpuente attentionem facile intelligi possint; præsertim si paginam, quam signorum, quibus utimur, dabimus interpretem & huic præfationi immediate subjungemus inspicere non recusaverit: quo facto totius plurimarum propositionum demonstrationis cursum

P R Æ F A T I O.

cursum nullo negotio statim comprehendet.

Problematum quidem constructiones ita disponimus, ut singulæ illorum partes vel primo distinguantur intuitu ; Theorematum vero propositionem statim distincta, si quæ desideratur, excipit præparatio, quæ claram ac perspicuam comitem habet demonstrationem, ut sic omnibus & Problematum & Theorematum partibus satisfactum sit abunde. Quid autem porro in singulis Libris, præsertim quinto, præstitum sit, non meum sed æquum Benigni Lectoris esto judicium. Cujus tamen fiducia eam non postulo interpretationem, ac si mihi ipsi persuadere velim provectorum ad alteriora aspiranti

P R Æ F A T I O.

aspiranti nihil hic desiderari curiositati; cum non fercula doctorum palato grata virorum condire, sed Tyronum Mathematici studii cupidorum vota qualicunque hoc meo implere labore unice habeam in scopo; quem si mihi assequi datur, tum sub idonea forma editorum, quorum jam diu laboravi-
mus inopia, exemplarium defectum supplendo; tum quam plurimas horum Elementorum propositiones noxio prolixarum nimis demonstrationum nudatas involucro, in clariorem, ut spero producendo lucem; abunde futurum puto, quod mihi gratuler. Hisce vale, Benigne Lector, & si quid hoc opusculum contineat proficui, in tuum verte commodum.

*

Ex-

EXPLICATIO NOTARUM.

NE Tyronum in demonstrando ardori vel minimam injiciamus moram, datam in Præfatione liberamus fidem, illique notarum ac signorum, quæ demonstrationum brevitati inservire fecimus, significationem subjungimus.

1.

Nota $\propto$ *significat æqualitatem;*
ut $A \propto B$, *idem est ac si dicam* A .
est æqualis B .

2.

Nota $\angle$ *indica, majoritatem;*
quare si occurrat $A \angle B$, *intellige*
 A est major quam B .

3.

Signum $\triangleright$ *minoritatem expri-*
mit: quare $A \triangleright B$ *significabit* A
est minor quam B .

4. *Nota*

Explicatio Notarum.

4.

Nota $+$ vel plus significat Additionem; adeoq. $A + B$, idem sit ac A cum B , vel A & B simul; vel B ipsi A addendum esse.

5.

Nota $-$ seu minus subtractionem dicit: ut $A - B$ significet A minus B : vel A dempta B : vel B ab A subtrahendum esse.

6.

Si occurrat alicubi hæc formula.

$$\begin{array}{r} A \propto B \\ D \propto C \end{array} \bigg/ A.$$

$$A + D \propto B + C.$$

intelligendum est ab una parte, A & D debere addi, ut etiam ab altera parte C addendum esse ipsi B : & tum priorem summam $A + D$ esse equalem posteriori $B + C$. per Axioma scilicet primum.

Explicatio Notarum

7.

Si vero sese offerat talis designatio

$$\begin{array}{r} A \propto B. \\ D \propto C. \end{array} \Bigg) S$$

$$A \div D \propto B \div C.$$

illa significabit ab una parte D subtrahi debere ab A, ut & ab altera parte C a B, & tum primum residuum $A \div D$ posteriori $B \div C$ esse æquale.

8.

Eadem formula etiam non raro occurret applicata signis $\lessgtr$. hoc modo.

$$\begin{array}{r} A \lessgtr B. \\ D \propto C. \end{array} \Bigg) A.$$

$$A \div D \lessgtr B \div C.$$

Vel.

$$\begin{array}{r} A \gtrless B. \\ D \propto C. \end{array} \Bigg) A.$$

$$A \div D \gtrless B \div C.$$

&

Explicatio Notarum.

Et tum intelligendum est post factam additionem summam $A + D$ esse vel majorem in signo $<$ vel minorem in signo $>$ quam summa $B + C$.

Nec aliter si loco A occurrat S vel S (denotabitur residuum $A \div D$ esse majus in signo $<$ vel minus in signo $>$ quam residuum $B \div C$. id quod ex numero 7 sumit ducit fundamentum.

9.

Si in materia proportionum se offerat.

$$A - B = C / D.$$

Vel in numeris

$$4 - 8 = 3 / 6.$$

denotat quantitatem A sese habere ad B , sicut C se habet ad D : vel numeram 4. se habere ad numerum 8, sicut 3 ad 6: adeoque ista quatuor esse proportionalia.

Explicatio Notarum.

10.

Litera X cum duobus punctis utrinque notata hoc modo .x. significat multiplicationem : ut si occurrat $A \cdot x \cdot B$, designat A per B multiplicandum esse, ut ita fiat rectangulum AB. Eodem modo $4 \cdot x \cdot 8$ significat 4 debere multiplicari per 8 : quæ tamen multiplicatio non semper absolvitur, ut clarius pateat ex quamam multiplicatione aliquod productum sit generatum.

11.

Nota $\square$, cujus omnia latera sunt equalia, significat Quadratum : ut $\square AB$ idem est ac Quadratum AB.

12.

Nota $\square$, cujus latera sunt inequalia, denotat Parallelogrammum Rectangulum, vel simpliciter

Explicatio Notarum.

ter Rectangulum; ut si occurrat
 $\square CD$, idem erit ac Rectangu-
lum CD .

13.

Nota $\sqrt{}$ significat radicem ali-
cujus quantitatis; ut $\sqrt{AB}$, de-
notat ex AB extrahendum esse ra-
dicem: similiter $\sqrt[12]{}$ vult, ut ex
 12 extrahatur radix, quæ non a-
liter quam per $\sqrt[12]{}$ designatur.

14.

In demonstrationibus non pau-
cis quædam literæ occurrunt, in-
fra se invicem scriptæ, cum linea
intermedia; quod ubique in genere
significat inferiora superioribus es-
se æqualia; ac proinde inferiora
in locum superiorum esse substituen-
da ac usurpanda: quemadmodum
hoc in specie etiam notavimus ad
demonstrationem Casus 3. Pro-
posit. 35. III. Id quod etiam in
propos. 36. III. probe notandum.

Si.

Explicatio Notarum.

Similiter in Proportionibus hoc observandum est bene, quando una quantitas collocatur supra a. liam: tunc inferiorem legendam esse pro superiori, cum supponantur inter se æquales esse: Exemplo sit demonstratio propositionis 3, VI. quæ est pag. 4. quæ sic habet,

$$\text{Tri. Z} - \text{Tri X} = \text{AE} / \text{BC.}$$

seu Y.

dicendum est Triangulum Z se habet ad Triangulum X hoc est Triangulum Y: sicut basis AE se habet ad basin BC.

15.

Pro citationibus marginalibus notandum primum numerum minorem significare propositionem, secundum vero majorem denotare librum: ut 4. III. quantam propositionem Libri tertii dicit: & sic porro in omnibus aliis.

EU.

EUCLIDIS

ELEMENTORUM

LIBER PRIMUS.

CUm scientiæ nomen solummodo mereatur illa cognitio, quæ ex certis & indubitatis deducta principiis, omnem vel levissimæ dubitationis discutit nebulam; Mathematicæ procul dubio disciplinæ maximo cum jure hoc sibi vendicant nomen. Cum enim in aliis disciplinis tam sæpe de conclusionibus non aliam ob causam quam principiorum ambiguitatem contentionis ferra reciprocetur; Mathematicæ vel ob hoc solum illis palmam præripiunt, quod conclusiones offerant, non ex verisimilibus & assensum emendicantibus, sed ex simplicissimis & inconvulsis deductas principiis. Quid enim certi
A tu.

tudini & veritatis propagationi magis contrarium, quam in aliqujus materiæ pertractatione de varia & nunquam fere sibi simili vocum significatione sæpius repetita disputatio? Quid nos in maiorem circa conclusiones dejicit fluctuationem, quam si illas superstruamus assertionibus aut temere assumtis, aut non probatis? quorum unum si contingat a veritate recedentes in turpissimum incidimus errorem; quod si vero alterius semitæ prementes vestigia veritatem assequimur, non firmum nostrum ratiocinium sed calum nos eo deduxisse certo certius existimandum est.

A quo duplici vitio Mathematici sese omnino præstiterunt liberos, tum Definitionum suarum claritate omnem vocabulorum & terminorum, quos in demonstrationum progressu adhibent, ambiguitatem tollendo;
tum

LIBER PRIMUS. 3

tum præmissorum Axiomatum evidētia & naturali certitudine firmissimum demonstrationibus substruendo fundamentum.

Hinc est quod studia Mathematica, ex primis & simplicissimis emergentia principiis ad tam sublime perfectionis fastigium prosecta cernere licet. Hinc est quod illæ scientiæ, quæ in suo initio & quasi nativitatis momento humi repere & pulverem lambere videntur, relicta terra per aerem volitantes, ad ipsum Cœlum ascendant, illiusque aliis inaccessa arcana inconcussis calculi sui subijciant legibus.

Horum autem Principiorum, quibus tota Mathesis ortum, progressum, omnemque qua eminet evidentiā acceptam referre debet, genera sunt tria: Definitiones, Postulata, Axiomata.

DEFINITIONES.

I. *Punctum est, cujus pars nulla.*


Facile concipimus tale punctum in rerum natura minime dari. Quicquid enim est, aut ad Spiritum refertur aut ad corpus: nemo autem facile sibi persuadebit scientias Mathematicas Spiritum aut res spirituales & omni materia carentes pro suo subiecto assumere, cum agat de corpore quatenus mensuram & ad alia corpora proportionem aliquam admittit: unde patet omne punctum quantumvis parvum concipiatur, pertinere ad corpus, esse ipsum corpus & æque ac corpus trinam admittere dimensionem, sc. longitudinem latitudinem & profunditatem: licet enim puncta possint occurrere adeo minuta, ut harum dimensionum accurata distinctio vel intensissimam sensuum fallat aciem, longius tamen patentem vim nostrarum cogitationem non effugiunt, cum semper in illis distinguere liceat partem dextram a sinistra, superiorem ab inferiori.

Si vero ab illis punctis in nostra cogi-

LIBER PRIMUS. f

gitatione trinam istam dimensionem abstrahamus, eamque licet istis propriam & semper inhaerentem, in illis non consideremus, obtinemus puncta Mathematica; quæ ad sensum nostrum relata acutissimæ acus impresso vestigio aliquo modo designari possunt, in quo sensus dubium relinquunt, utrum longitudo latitudinem superet nec ne, an vero latitudo longitudinem excedat: & utrum quælibet ex his profunditate sit major.

2. *Linea vero longitudo latitudinis expers.*



Quemadmodum a parte rei non datur punctum omni prorsus dimensione carens, ita nec datur linea longitudinis tantum capax: quare etiam per abstractionem in linea unam tantum consideramus dimensionem secundum longitudinem, seposita latitudine cum profunditate. Ad cujus considerationis imitationem in communi vitæ ulu ulnam re-

A ;

bus

bus mensurandis solummodo applicamus secundum longitudinem, reliquis dimensionibus in latitudinem & profunditatem neglectis.

Cæterum lineæ generationem hoc modo concipere licet. Si consideremus punctum quoddam in aliquo loco constitutum inde moveri incipere; ita ut motus sui visibile relinquat vestigium; illud nobis exhibebit lineam hoc modo generatam.

Quia autem illud punctum ab uno loco ad alium moveri potest vel per viam rectam vel per curvam, uti videre est in lineis A B. C D, inde oritur lineæ divisio in Rectam vel Curvam.

3. *Lineæ autem termini sunt puncta.*

Hoc facile intelligitur ex lineæ jam allata generatione; quod nimirum idem illud punctum quod in principio sui motus erat in loco A vel C, in fine perveniat ac subsistat in loco B vel D.

4. *Linea recta est, quæ ex aequo sua interjacet puncta.*


Vel

Vel cujus puncta extrema obumbrant
omnia media,

Vel minima earum, quæ a puncto ad
punctum duci possunt. Juxta Archime-
dem.

Ex quibus per definitiones contrarias
facile innotescit quænam sit Linea curva.

5. *Superficies est quæ longitu-
dinem latitudinemque tantum ha-
bet.*



Sicut non datur punctum cum nulla,
nec linea cum una tantum dimensione,
sic etiam a parte rei non datur superficies
cum duabus, sc. longitudine & latitu-
dine tantum, seclusa profunditate, quæ
idcirco nostro tantum cogitandi modo a
reliquis separatur ac in corpore non con-
sideratur.

Su-

Superficiei autem generationem hac ratione concipere possumus.

Cogitemus punctum A versus partes inferiores motum descripsisse lineam rectam AB; deinde eandem lineam AB moveri incipere versus partes dextras, donec linea AB perveniat ad locum DC. Patet isto motu punctum A descripsisse lineam AD, & punctum B lineam BC; quemadmodum etiam omnia puncta intermedia lineæ AB suas lineas descripsisse concipiendum est: ut ex tali motu lineæ AB generata sit Superficies ABCD.

6. Superficiei autem extrema sunt lineæ.

Quod facile innotescit ex illis quæ circa superficiei generationem modo dicta sunt.

Quemadmodum autem antea pro diversa motus via vidimus lineam generari aut Rectam aut curvam; eodem etiam modo per diversum lineæ motum superficies describitur aut Recta seu Plana aut Curva.


7 Pla-

7. *Plana superficies est, quæ
en aquo suas interjacet rectas.*

Quæ antea de linea recta dicta sunt;
similiter hic applicari possunt.

Hinc nullo negotio intelligitur quæ
nam sit superficies curva.

8. *Planus autem angulus est
duarum linearum in plano se mu-
tuo tangentium & non indirectum
jacentium, alterius ad alteram in-
clinatio.*



Ad constituendum angulum planum
seu angulum in superficie, requiritur.

1. Ut duæ lineæ se mutuo tangent.

B

2. Ut

2. Ut non jaceant in directum, sed una ad alteram inclinet.

Quemadmodum utramque hanc conditionem cernere licet in angulo CAB, ubi duæ lineæ AC. AB, se invicem tangentes in puncto A, non jacent in directum, sed ad se mutuo inclinant.

Non autem pauciores nec plures duabus ad angulum planum exiguntur lineæ:

Non pauciores, quia si unica ista linea dividatur in duas, duæ illæ sibi jacebunt in directum; id quod repugnat secundæ conditioni.

Non plures, quia ex gr; tertia AD, si cum reliquis in eodem sit plano, non unum sed duos faciet angulos DAC. CAB; si vero sit extra planum reliquarum linearum, non angulum faciet planum, sed solidum, cujus Definitionem Euclides libro XI. tradit.

Quia jam natura anguli plani consistit in duarum linearum ad se invicem inclinatione, patet anguli alicujus quantitatem non consistere in majori vel minori longitudine linearum; sed tantum in illarum majori vel minori inclinatione; duæ enim lineæ majores eandem possunt habere inclinationem cum duabus minoribus,

LIBER PRIMUS. II

bus, minime mutata anguli quantitate.

Deinde notandum Geometras ad designandum aliquem angulum tres adhibere literas, quarum media punctum denotat ad quod lineæ angulum continentes concurrunt. Ut ad denominandum angulum qui ad punctum A, constituitur a duabus lineis AC. AB. scribitur angulus CAB: vel ab altera parte angulus DAC est qui in puncto A sit a lineis AD. AC.

Nos autem brevitatis & perspicuitatis gratia in sequentibus non semel locotrium literarum angulo designando adhibemus unam ipsi inscriptam.

Ut ad nominandum angulum DAC. efferemus angulum P. sic etiam loco anguli CAB scribemus angulum O.

9. Cum autem continentes angulum lineæ fuerint rectæ, rectilineus appellatur angulus.

Accedit Euclides ad anguli divisionem. Supra vidimus linearum duo esse genera, scilicet illas esse vel rectas, vel curvas.


Quia autem illæ tribus diversis modis possunt conjungi, sci vel recta cum re-

Sta: vel recta cum curva; vel curva cum curva; hinc etiam tria oriuntur angulorum genera.

Primus quippe casus suppeditat angulum rectilineum, cujus Definitionem hic tradit Euclides.

Secundus casus nobis dat angulum mixtilineum, cujus mentionem factam videmus in Libro III. Tertius denique casus constituit angulum curvilineum.


10. Cum vero recta AB recta CD insistens duos Angulos ABC , ABD aequales inter se facit; Rectus est uterque equalium angulorum: & insistens recta AB vocatur Perpendicularis lineæ CD , cui insistit.



Anguli ABC , ABD dicuntur recti, quia lineæ AB , ipsi CD ita directo situ

insistit, ut ab una parte non magis inclinet versus BC quam ab altera parte versus BD;

II. *Obtusus angulus EBC est, qui recto ABC major est.*



12. *Acutus vero EBD, qui recto ABD minor est.*

In tribus hisce definitionibus Euclides tradit anguli rectilinei subdivisionem petitam a triplici linearum inclinationis forma: quæ ab utraque parte vel est æqualis; vel ab una parte major altera; vel ab una parte minor altera: ut in Schemate videre est.

13. *Terminus est quod alicujus est extremum.*

Ut punctum lineæ: linea superficiei: superficies corporis.

14. Figura plana est superficies plana, una vel pluribus lineis undique terminata.

Cum lineæ sint vel rectæ vel curvæ, illæque tribus modis possint conjungi; figurarum planarum inde oriuntur tres species.

Curvilineæ, quæ vel una vel pluribus curvis terminantur. Una terminatur circulus, cujus definitionem statim tradit Euclides.


Mixtilineæ, quæ partim curvis partim rectis terminantur: huc pertinent semicirculus & segmentum Circuli.

Rectilineæ quæ solis rectis terminantur, quæ comprehendunt omnia polygonæ sive regularia sive irregularia.

15. Circulus est figura plana sub una linea curva DCF comprehensa, quæ vocatur Peripheria: adquam ab uno puncto A eorum quæ intra figuram sunt posita,

LIBER PRIMUS. 15

*ta, omnes cadentes rectæ AB.
AD. AE. AC inter se æquales
sunt.*



Proponit Euclides definitionem Circuli jam descripti, cujus delineationem & generationem hoc modo concipere possumus. Ducta sit quælibet recta linea AB, cujus una extremitas A ponatur immota & affixa plano; altera vero extremitas B cum tota linea moveatur circa punctum A, per loca AD. AE. AC. AF, donec tandem redeat ad locum AB, unde moveri cœperat: ista linea AB hæc circumductione describet circulum BDECF.

Ex qua descriptionis forma patet omnes Radios cujuslibet Circuli esse inter se æquales: cum linea AB, cujus circumvolutio circulo ortum dedit, per omnia

omnia loca, AD. AE. AC & similia transit, adeoque punctum B fuit aliquando in punctis D. E. C. &c. adeoque lineæ AD. AE. AC, sunt æquales eidem lineæ AB.

Hinc jam etiam immediate sequitur omnia puncta circumferentiæ DCFB æqualiter distare a puncto A.

16. Illud autem punctum A centrum circuli dicitur.

17. Diameter Circuli est recta quædam BC per Centrum A ducta, & utrinque in punctis B. C. peripheriâ terminata; quæ & Circulum bisariam facit.

Ut linea in Circulo ducta sit Diameter duæ requiruntur conditiones.

I. Ut transeat per centrum.

II. Ut ab utraque parte terminetur in peripheria.

Adeoque omnis linea, harum nullam aut tantum unam habens conditionum, Diameter dici nullo modo potest.

Cæterum Diametrum circulum divide-

re bifariam patet ex eo quod transeat per Circuli punctum, quod ex omnibus medium est: quia scilicet est medium omnium Diametrorum quæ in Circulo duci possunt.

Sequitur jam secunda species figurarum, nempe mixtilinearum.

18. *Semicirculus autem BDE CAB est figura, quæ continetur sub Diametro BC, & dimidia circumferentia BDEC.*

19. *Segmentum circuli est figura quæ continetur sub qualibet recta circulo inscripta & abscissa periphæria.*

Segmentum; excluso semicirculo, est duplex, vel majus Semicirculo, vel minus.

Segmentum majus est illud in quo reperitur centrum.

Segmentum minus est illud quod centrum non continet.

Nunc Euclides aggreditur tertiam speciem figurarum sc; rectilineararum.

20. *Rectilinae figurae sunt quae sub rectis lineis continentur.*

Distinguuntur autem rursus hae figurae rectilinae in tres species; vel enim sunt Trilaterae; vel Quadrilaterae; vel Multilaterae.

21. *Trilaterae quidem figurae sunt, quae sub tribus.*

22. *Quadrilaterae vero quae sub quatuor.*

23. *Multilaterae denique quae sub pluribus quam quatuor rectis comprehenduntur.*

Generali vocabulo hae dicuntur Multilaterae ad infinitam nominum evitandam multitudinem.


Jam cum figurarum rectilinearum primam speciem constituent figurae Trilaterae, seu vulgo sic dicta Triangula, illorum divisionem proponit Euclides, petitam ex consideratione tum laterum, tum angulorum, quorum numerus (ut & in omnibus figuris rectilineis) est
æqua-

LIBER PRIMUS. 19


æqualis: quippe triangulum tot continet angulos quot latera.

Triangulum respectu laterum est triplex; Æquilaterum, Isosceles, & Scalenum.

24. *Triangulum æquilaterum est, quod tria latera habet æqualia.*




25. *Isosceles autem, quod duo tantum habet æqualia AB. AC.*



C 2


26. Scal

26. *Scalenum denique quod tria inaequalia habet latera.*



Secunda Triangulorum divisio pro fundamento habet tres angulorum species ; sc: rectum, obtusum & acutum; hinc enim Triangulum dividitur in Rectangulum, Obtusangulum, & Acutangulum.

27. *Triangulum rectangulum est, quod unum habet angulum rectum ABC.*




28. Ob-

LIBER PRIMUS. 21

28. *Obtusangulum est, quod unum habet angulum CDE obtusum id est majorem recto.*

29. *Acutangulum denique quod tres angulos F.G.H. habet acutos, hoc est, minores recto.*



Sequitur jam secunda species figurarum rectilinearum: scilicet Figuræ Quadrilateræ. Hæ autem ab Euclide recensentur quinque: Quadratum: Figura altera parte longior; Rhombus; Rhomboides; & Trapezia.


30. *Quadratum est, quod æquilaterum est & rectangulum.*




C 3

31. Al


31. *Altera parte longior figura est, quæ rectangula quidem, at æquilatera non est.*



32. *Rhombus autem, quæ æquilatera quidem, sed rectangula non est.*




33. *Rhomboides est, quæ ad-versa & latera & angulos equalia inter se habens, neque æquilatera est, neque rectangula.*



34. Tra-

34. Trapezia denique dicuntur reliquæ figuræ quadrilateræ, quæ ad nullam ex quatuor præcedentibus referri possint.



35. Rectæ lineæ parallelæ seu æquidistantes AB , CD sunt, quæ in eodem plano existentes, & utrimque in infinitum productæ, ad eandem distantiam a se invicem manent remotæ; ideoque nunquam concurrent.

A ————— B


C ————— D

Non omnes lineæ, quæ nunquam concurrent, parallelæ dicendæ sunt;
cum

cum dentur lineæ, quæ licet simul in infinitum producantur, ita ut ad se mutuo in infinitum magis ac magis accedant, nunquam tamen concurrent; ut Hyperbolâ & recta linea; Conchois & recta linea; Duæ æquales Parabolæ circa eandem Diametrum: quæ idcirco nequaquam dicendæ sunt parallelæ.

Unde facile manifestum evadit ad naturam parallelismi necessario requiri æqualem ab omni parte distantiam: quam conditionem ab Euclide omissam nos cum celeberrimo Tacqueto adjecimus.

Cæterum linearum parallelarum, quas Euclides ut jam descriptas considerat, generationem & delineationem duobus modis concipere possumus.



PRIMUS MODUS.


Ponamus lineam CA perpendiculariter insistere lineæ AB, ut angulus CAB sit rectus; deinde cogitemus lineam CA una suâ extremitate moveri super lineam AB, ut semper ipsi maneat perpendicularis; si jam linea CA hoc suo motu pervenerit in DE, punctum C descriptam relinquet lineam CD, quæ nunquam potest magis recedere a linea AB, nec ad ipsam propius accedere, cum linea AC durante suo motu semper fuerit eadem & sibi æqualis: adeoque linea CD in omnibus suis punctis manet cum AB in eadem distantia, & si iste motus lineæ CA in infinitum duraret, etiam linea CD in infinitum ab AB distaret, adeoque nunquam cum illa concurreret: unde jam certo concludere licet lineam CD hoc modo generatam lineæ AB esse parallelam.

Deinde cum jam constet lineam CD non posse magis in uno puncto ad lineam AB accedere aut ab illa recedere, quam in alio, sequitur lineam CD ad lineas CF, CA habere æqualem inclinationem, adeoque per definitionem Per-

D

pen-

pendicularis angulum DCA esse rectum, & æqualem angulo CAB qui positus est rectus; adeoque duos angulos interiores ACD . CAB simul sumtos esse æquales duobus rectis. Id quod natura parallelarum AB . CD hac ratione descriptarum omnino requirit,



SECUNDUS MODUS.

Ad lineæ KL punctum A concipitur facta linea AC perpendicularis, quæ licet in infinitum producat, nunquam inclinationem quam ad AK , AL habet (illa autem utrimque æqualis est) mutabit.

cum

cum anguli quantitas non in maiori vel minori linearum longitudine, sed in maiori vel minori inclinatione consistat.


Deinde ex alio quovis puncto B cogitemus duci lineam perpendicularem BD, quæ etiam licet infinite protrahatur, nunquam aliam acquirere inclinationem ab illa quam jam habet ad lineas BK. BL.

Cum jam linea AC in infinitum producta non possit ascendere versus superiora nec descendere versus inferiora: similiter linea BD etiam in infinitum continuata nec altiora nec demissiora petere possit, necessario sequitur istas lineas AC. BD semper servaturas eandem a se invicem distantiam nec concurrere posse unquam; adeoque juxta hanc definitionem illas esse parallelas.

36. *Parallelogrammum est figura quadrilatera cujus bina opposita latera sunt parallela seu æquidistantia.*


37. *Cum vero in parallelogrammo Diameter BD ducta fuerit, duæque rectæ CF. HK lateribus parallele secantes Diametrum in u-*

no eodemque puncto G , ita ut parallelogrammum distributum sit in quatuor parallelogramma; illa per quæ Diameter non transit, scilicet AG . GE . appellantur complementa eorum quæ circa Diametrum consistunt, ut HF . CK .




POSTULATA.

1. Postuletur a quovis puncto A ad quodvis punctum B rectam lineam AB ducere.




2. Et

2. Et terminatam rectam AB
in continuum recta producere in C.



3. Et quovis centro A & quo-
libet radio AB. AC. AD. AE.
circulum describere.



AXIOMATA.

1. *Quae sunt eidem equalia, & inter se sunt equalia.*

2. *Si equalibus equalia addantur, tota erunt equalia.*

3. *Si ab equalibus equalia demantur, residua manebunt equalia.*

4. *Si inequalibus equalia adjecta sint, tota sunt inequalia.*

5. *Si ab inequalibus equalia ablata sint, reliqua sunt inequalia.*

6. *Et quae ejusdem sunt duplicia, inter se sunt equalia.*

Idem intelligendum de triplicibus, quadruplicibus, quintuplicibus & sic in infinitum.

7. Et


7. *Et quæ ejusdem sunt dimidia, inter se sunt equalia.*

Nec hoc axioma se tantum, restringit ad partes dimidias; sed etiam in tertiis, quartis, in quintis & sic porro in infinitum suam habet veritatem.

8. *Quæ congruunt sibi mutuo, inter se sunt equalia.*

Si primo concipiamus lineam DE superimponi lineæ AB, ita ut puncta extrema D. A. ut & E. B. coincidant; similiter omnia puncta intermedia lineæ DE respondeant omnibus mediis punctis lineæ AB, pro certo hinc asserere possumus lineam DE esse æqualem lineæ AB: quia omnes partes lineæ DE exactissimè conveniunt cum omnibus partibus lineæ AB.

Deinde



Deinde sub qualibet inclinatione ad lineæ AB punctum A ducatur lineæ AC: si jam ad lineæ DE punctum D ducatur lineæ DF, ita ut inclinatio lineæ DF ad lineam DE, sit æqualis vel similis inclinationi lineæ AC ad lineam AB: & lineæ DF sit æqualis lineæ AC: & tum angulus FDE superimponatur angulo CAB, omnia correspondebunt: scilicet lineæ DE cum AB, inclinatio cum inclinatione, & lineæ DF cum AC. Adeoque jam non tantum lineæ congruunt sed & anguli.

Si denique ducatur recta CB, ut & FE, & una figura DEF imponatur alteri ABC: jam etiam tertium latus FE congruet cum tertio latere CB; adeoque

que totum triangulum DEF congruet triangulo ABC: unde necessario sequitur unum alteri esse æquale.

9. Totum sua parte majus est.


10. Omnes anguli recti inter se sunt æquales.

11. Si in duas rectas AG. BD recta AB incidens interiores & ad easdem partes angulos ABD, BAG duobus rectis minores faciat; productæ duæ illæ rectæ tandem coincident inter se ad eas partes, ubi sunt isti anguli duobus rectis minores.

Cum in hoc Axiomate mentionem faciat Euclides duarum linearum coincidentiarum, & duorum interiorum angulorum, facili negotio patet illud aliquo modo respectum habere ad Definitionem linearum parallelarum superius traditam; cumque in ista definitione nec tertia li-

nea incidens, nec duo anguli interiores occurrant, fatendum ingenue erit, huius Axiomatis lucem in primo intuitu non apparere tantam, quanta in præcedentibus statim affulsit; imo quanta etiam in omnibus communibus sententiis requiritur.

Quod si vero in memoriam revoce-
mus supra allatos modos generationis pa-
rallelarum, putamus inde huic Axiomati
multum affundi posse claritatis. Sumamus
Ex; Gt: secundum.



Ibi quippe vidimus lineas parallelas AC;
BD ex sua natura & generationis modo re-
quirere ut duo anguli CAB. DBA sint re-
cti, hoc est istius parallelismi non aliud esse
fundamentum quam cum angulus unus
ABD

ABD sit rectus; (quod semper supponimus) ut alter BAC etiam sit rectus: adeoque ut linea AB perpendiculariter in lineam AC cadens etiam sit perpendicularis ad alteram BD.

Si jam ex puncto A infra lineam AC ducatur alia quælibet ut AE; ita ut angulus BAE, sit minor recto: illa necessario si producat magis ac magis debet recedere ab AC: quia alias deberet aut esse parallela ipsi AC, aut iterum in alio puncto cum ipsa concurrere: non prius, quia habet punctum A commune adeoque in illo concidunt; non posterius quia tum duæ rectæ spatium comprehenderent, quod repugnat Axiomi sequenti.

Cum manifestum nunc sit lineam AE magis ac magis recedere ab AC, etiam patet illud non posse fieri nisi illa magis ac magis appropinquet ad alteram parallelam BD; quod tamen in infinitum absque concursu fieri minime possibile est; si enim unius lineæ punctum A ab alterius lineæ puncto E ad quamlibet distantiam remotum esse concipiamus; & a puncto A versus E ducere incipiamus lineam aliquam brevem; illa si producat, adeoque ab AC magis ac magis recedat,

necessario ad punctum E magis ac magis accedet, donec tandem porro producta per illud punctum E transeat.

Si enim impossibile sit ut per E transeat, e duobus unum verum est; aut a puncto A. ad E. non posse duci lineam rectam, quod repugnat postulato primo: aut lineam AE, si quam proxime ad punctum E pervenerit, aliorsum se determinare adeoque se flectere; quod non potest esse nisi ex recta fiat curva: quod tum est contra Hypothesin.

Dux tamen adhuc discutiendæ restant difficultates, quæ linearum AE. BD necessarium vacillare faciant concursum.

Prima est, quod Hyperbola & recta, Conchois & recta, dux Parabolæ æquales circa eandem diametrum, simul in infinitum productæ nunquam concurrant.

Quæ tamen difficultas evanescit si consideremus illas lineas esse extra genus linearum, de quibus agit Euclides in hoc Axiomate; expresse enim tantum loquitur de lineis rectis; cum Assymptoti sint (saltem altera) ex lineis mixtis.

Altera difficultas oritur ex Clarissimi Bettini duabus rectis (in Apiar. 3. & Ærario Tom. I. pag. 354.) quæ licet inter-
ternos

ternos angulos duobus rectis minores efficiant, si producantur tamen nunquam coincident.

Sed nec hoc nostri Axiomatis evidentiæ & veritatem labefactare potest. Cum istæ lineæ non simpliciter seu tanquam a puncto ad punctum, sed cum certa quadam conditione, scilicet adjuncta proportionem producantur. Quæ proportionalis linearum productio hic nullum omnino habet locum.

12. *Duæ rectæ spatium non comprehendunt.*

13. *Omne totum est æquale omnibus suis partibus simul sumptis.*

Quoniam majoris perspicuitatis gratia Mathematicis in more positum est, ut veritates quas demonstrandas suscipiunt, distinctis a se invicem complectantur propositionibus; notandum est hasce propositiones dividi in Problemata & Theoremata,

Problema est propositio in qua aliquid

E 3

Pro-

proponitur efficiendum, & conclusionis formula semper talis est: Quod erat faciendum.


Theorema est propositio in qua proprietas quædam aut veritas de aliqua re jam facta & in figura jam constructa, proponitur demonstranda: & conclusionis formula semper est. Quod erat demonstrandum.

Corollarium est consecrarium quod ex facta jam demonstratione tanquam lucrum aliquod colligitur.

Lemma est demonstratio præmissæ aliqujus, ut quæsi demonstratio clarior evadat & brevior.

PROPOSITIO. I.

Probl. I. *Super data recta terminata AB triangulum aequalaterum constituere.*



CON-

CONSTRUCTIO.

I. Centro A radio AB, ^a describe circumulum BCE.

II. Centro B, eodem radio BA, ^a describe circumulum ACF.

3. Ex puncto intersectionis C ^b duce rectas CA. CB. b Post. 1.

Dico triangulum ABC esse æquilaterum.

DEMONSTRATIO.

$$\begin{array}{l} AB \propto AC. \\ BA \propto BC. \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} AB \\ BA \end{array}} \right\}^c \quad \text{c Def. 19.}$$

$$\text{Ergo } AC \propto BC. \quad d \quad \text{d Ax. I.}$$


Adeoque triangulum ABC est æquilaterum. Quod erat faciendum. e Def. 24.

Pro-

PROPOSITIO. II.

Prob. 2.

*Ad datum punctum A data
recta BC equalem rectam AF
ponere.*



CONSTRUCTIO.

1. Ducatur a C ad A recta
a Post. 1. CA.
2. Super CA^b fiat triangulum
b Post. 1. æquilaterum. CDA.
3. Centro C, radio CB de-
c Post. 3. scribe^c circulum.
4. Latus DC^d produc usque
d Post. 2. ad Circumferentiam in E.
5. Centro D radio DE^e de-
e Post. 3. scribe arcum circuli EF.

6. De-

LIBER PRIMUS. 41

6. Denique latus DA, productum postea ad istum arcum in F.

Dico lineam AF esse æqualem datæ BC.

DEMONSTRATIO.

$$S \begin{cases} DF \propto DE. g. \\ DA \propto DC. h. \end{cases}$$

g Def. 15

h Def. 24.

$$AF \propto CE. i.$$

i Ax. 2.

$$\text{Atqui } BC \propto CE. k.$$

k Def. 15.

$$\text{Ergo } AF \propto BC. l. \text{ Q. E. F. } l \text{ Ax. 1.}$$


F

PRO-

Probl. 31

PROPOSITIO. III.

Datis duabus rectis inaequalibus A & BC; de majori BC minori A æqualem rectam BE detrabere.



CONSTRUCTIO.

1. Ad lineæ CB extremitatem
2. 1. B, sub quolibet angulo ^a pono rectam BD æqualem minori A.
3. 2. Centro B radio BD ^b describo arcum circuli, secantem rectam CB in E.

Dico lineam BE esse æqualem ipsi A.


De-

DEMONSTRATIO.

^c Quia sunt
 $BE \propto BD^c$ radii ejus. ^c Def. 15.
 dem circuli.

Atqui $A \propto BD^d$ ^d Per constructionem.


Ergo $BE \propto A$. d. Q. E. F. ^d Ax. 15.



PROPOSITIO.

Theor. I.

Si in triangulis ABC. DE. unum latus AB, uni DE: & alterum AC alteri DF sit æquale; ut & anguli A. Distis lateribus contenti sint æquales: Erit quoque basis BC æqualis EF, angulus B angulo E: ut & C ipsi F; Et triangulum ABC æquale triangulo DEF.



DEMONSTRATIO.

Concipiamus Triangulum DEF superimponi triangulo ABC, ita ut punctum E cadat in

in B, & latus ED super BA;
quando punctum D præcise ca-
det in A, quia latera AB & DE
dantur æqualia. a

Deinde latus DF cadet super
AC, quia anguli BAC. EDF
ponuntur æquales. a

Denique punctum F necessa-
rio cadet in C, quia latera AC.
DF sunt æqualia. a

a Ax. 3.

Ergo punctum E idem erit
cum B, & F cum C. Ergo li-
nea EF congruet cum AC, a-
deoque ipsi erit æqualis: &
omnes anguli congruent, ut &
tota triangula: quare illa sunt æ-
qualia. a


Q. E. D.

C. P. A. M. H. E. S. I.

... ..
... ..
... ..

PROPOSITIO. V.

Theor. 2. *Iſoſcelis Trianguli A C qui ad
baſin ſunt anguli A B C. A C B in-
ter ſe ſunt æquales.*



PRÆPARATIO.

Per prop: 9 ſequentem (quæ
ab hac non dependet) angulum
BAC divide bifariam recta linea
AD.

D E

DEMONSTRATIO.

In Triangulis ADB. ADC.

Latus AB $\propto$ AC. per ipsum
triangulum.

Latus AD, utrique commune a-
deoque sibi ipsi æquale.

Angulus BAD $\propto$ CAD per con-
structionem.

Ergo angulus ABD $\propto$ ACD.

Q. E. D.

24. I.

COROLLARIUM I.

Omne triangulum æquilaterum
est æquiangulum.


COROLLARIUM II.

Si in triangulo Ifocele vel æquilatero,
ABC, linea AD bifecet angulum A, il-
la etiam oppositum latus BC bifariam di-
videt; ut & ipsi BC perpendicularis erit.

PRO-

PROPOSITIO. V.

Theor. 2. *Isoſcelis Trianguli A C qui ad
baſin ſunt anguli ABC. ACB in-
ter ſe ſunt æquales.*



PRÆPARATIO.

Per prop: 9 ſequentem (quæ
ab hac non dependet) angulum
BAC divide bifariam recta linea
AD.

D E

DEMONSTRATIO.

In Triangulis ADB. ADC.

Latus AB $\propto$ AC. per ipsum
triangulum.

Latus AD, utrique commune a-
deoque sibi ipsi æquale.

Angulus BAD $\propto$ CAD per con-
structionem.

Ergo angulus ABD $\propto$ ACD.

• Q. E. D.

24. I.

COROLLARIUM I.

Omne triangulum æquilaterum
est æquiangulum.


COROLLARIUM II.

Si in triangulo Isoscele vel æquilatero,
ABC, linea AD bifecet angulum A, il-
la etiam oppositum latus BC bifariam di-
videt; ut & ipsi BC perpendicularis erit.

PRO-

Theor. 3.

PROPOSITIO. VI:



*Si trianguli ABC,
duo anguli ABC. ACB.
inter se aequales fuerint;
latera aequalibus
opposita AB. AC. etiam
inter se erunt aequalia.*

DEMONSTRATIO.

Aut est $AB < AC$.Aut est $AB > AC$.Aut est $AB \cong AC$.Ponatur $AB < AC$.

Abscindatur $DB \cong AC$, tum ducta
DC. erit in $\triangle$ lis DBC, ACB.

Latus $DB \cong AC$. per construct: $BC \cong BC$. seu commune.* 4. I. Angulus DBC $\cong$ ACB.

Ergo erit $\triangle$ lum DBC. $\cong$ $\triangle$ lo
ACB, sc: pars & totum. Quod est ab-
surdum; adeoque non potest esse $AB <$
AC.

Po-

Ponatur deinde $AB > AC$.

Nec hoc posse esse eodem modo probatur ab AC abscindendo partem æqualem lateri AB .


Adeoquæ cum nequeat esse $AB < AC$.

Nec $AB > AC$.

Necessario erit $AB \propto AC$.

SCHOLIUM.

Non mius forsan quibusdam arridebit demonstratio quam inverso parumper propositionum ordine hoc modo proponemus.



PRÆPARATIO.

Angulum BAC , ut ante
divide bifariam recta AD .

DEMONSTRATIO.

Intriangulis ADB . ADC .
Latus AD utrique commune
sibi ipsi est æquale.
Angulus $B \approx C$. per propo-
sitionem.


Angulus $BAD \approx CAD$, per
constructionem.

Ergo

Ergo per 26 sequentem
 (quæ ab hac non dependet)
 Latus $AB \propto AC$. Q. E. D.

COROLLARIUM.


Omne Triangulum æqui-
 angulum est æquilaterum.



PROPOSITIO. VII.

Theor. 4.

Si a lineæ AB extremitatibus A. B. ad datum aliquod punctum C ductæ fuerint due lineæ AC. BC. extra illud punctum C nullum datur aliud punctum, ad quod ab A & B due lineæ possint duci, quæ jam ductis lineis AC. BC sint æquales.



De

DEMONSTRATIO.

Si tale punctum contendat Adversarius dari posse : dabitur vel extra vel intra triangulum ABC. vel in alterutro laterum.

Ponatur extra triangulum in D.
Ducta CD. erit in triangulo
ACD

Latus AC $\propto$ AD. juxta Adversarium.

Ergo angulus ACD $\propto$ ADC ; a 5. 1.
qui eadem litera O insigniantur.

Deinde in triangulo BCD.
Latus BC $\propto$ BD. iterum juxta
Adv.


Ergo angulus BCD $\propto$ BDC
qui eadem litera P notentur.

Jam angulus O, a parte sinistra est major angulo P, a dextra vero minor ; quod est absurdum.

At-

Atqui eadem demonstratio
obtinet in omnibus punctis extra
triangulum.

Ergo nullum omnino extra
triangulum datur tale punctum.
Ponatur intra triangulum in D.



A $\left\{ \begin{array}{l} \text{Latus } AC \propto AD \\ \text{Latus } BC \propto BD. \end{array} \right\}$ juxta Ad.
versarium.

Ergo $AC + CB \propto AD + DB$.
contra sequentem propos. 21. quæ ab
hac non dependet.

Cum jam eadem demonstra-
tionis

tionis forma applicari possit omnibus punctis intra triangulum ABC.

Sequitur nullum tale punctum intra illud dari.


Ponatur in alterutro laterum
AC. BC.

Nec ibi illud punctum potest inveniri, quia tum pars foret, æqualis suo toti contra AX. 9.

Ergo universim concludimus extra punctum C nullum omnino aliud dari posse, ad quod duæ lineæ æquales ipsis AC. BC duci queant. Q. E. D.

PROPOSITIO VIII.

Si duo triangula ABC. DEF
Theor. 5. *duo latera AB. AC. duobus lateribus DE. DF. equalia habeant, alterum alteri: ut & basin BC equalem basi EF. Illa etiam angulum A angulo D equalem habebunt, sub equalibus rectis contentum.*



DEMONSTRATIO.

Triangulum ABC superponatur ipsi DEF, ita ut basis BC congruat basi EF, tum
 pun-

LIBER PRIMUS. 57

punctum A cadet in D. & latera AB. AC congruent lateribus DE. EF. item angulus BAC congruet angulo EDF. Ergo ^aerunt anguli ^a Ax. 8. æquales.

Quod si vero Adversarius contendat punctum A cadere extra D; tum sequeretur extra punctum D, dari aliud punctum, ad quod ab extremitatibus E. F. lineæ duæ possent duci quæ ipsis ED. FD jam ductis essent æquales: quod est absurdum. ^b b7. I.

PROPOSITIO IX.

Prob. 4. Datum angulum rectilineum BAC bifariam secare.



CONSTRUCTIO.

1. Ex lateribus AB , AC abscinde ^a partes æquales AD , AE .
^b 3. I. ^b 1. I.
2. Super ducta DE constitue ^b triangulum æquilaterum DEF .
3. Duc rectam AF .
 Dico illam bifariam dividere angulum BAC .

DEMONSTRATIO.

In Triangulis ADF AEF .

Latus $AD \cong AE$ } per constructio-
 Latus $DF \cong EF$ } nem:
 Latus $AF \cong AF$, quia utrique commune.

^b 3. I. Ergo angulus $DAF \cong$ ^c EAF . Q. E. F
 CO-

COROLLARIUM.

Hinc patet methodus datum angulum
secandi in aequales angulos 4. 8. 16. etc.
singulas nimirum partes iterum bisariam
dividendo.


SCHOLIUM.

Potest autem propositionis constructio hoc
modo in compendium redigi.

I. In lateribus AB, AC, sume aequales
AD, AE.


II. Centris D & E, quolibetumque ra-
dio describe duos arcus se interfecantes in F.

Quo facto recta AF angulum BAC bisecabit.



PROPOSITIO X.

Probl. 5. *Datam rectam terminatam GH
bifariam secare.*



CONSTRUCTIO.

- a 1. I. 1. Super data GH constitue ^a triangulum æquilaterum GAH.
b 9. I. 2. Angulum A divide bifariam ^b recta AF.

Dico illam lineam GH dividere bifariam.

DEMONSTRATIO.

In Triangulis AIG. AIH.

Latus GA $\propto$ HA. per constructionem.

Latus


LIBER PRIMUS. 61

Latus $AI \propto AI$, seu utrique commune.

GH
Angulus $GAI \propto HAL$ per constructionem.

Ergo $\angle$ Basis $GI \propto IH$: adeoque linea $\angle 4. I$
GH secta est bifariam. Q. E. F.

S C O L I U M.



Hujus operationis etiam tale est compendium.

Centris $G \& H$, equali radio utrinque describantur arcus se intersectantes in $A \& F$.

Tam recta AF , bisecabit rectam GH in I .

Notandum etiam pro sequenti propositione rectam AF esse


perpendiculararem ipsi GH ex puncto dato I utrimque excitatam.

H 3

PRO-

PROPOSITIO XI.

Prop. 6. *Data recta DE a puncto I in ea
dato perpendicularem I A excitare.*



CONSTRUCTIO.

- a 3. I. 1. A puncto I utrinque sume ^a partes
inter se æquales ID. IE.
- b 1. I. 2. Super tota DE constitue ^b triangu-
lum æquilaterum DAE.
3. Duc rectam AI.
Dico illam esse perpendicularem
quæsitam.

DEMONSTRATIO.

In triangulis AID. AIE.


Latus AD $\propto$ AE. } per constructio-
Latus ID $\propto$ IE. } nem.
Latus AI $\propto$ AI.

a 8. I. Ergo Angulus AID $\propto$ AIE. Adeo-
que AI est quæsitæ ^b perpendicularis.

b Def. 10.

Q. E. D.
PRO-

LIBER PRIMUS. 63
PROPOSITIO XII.



Ex dato puncto A ^{Probl. 7.} *extra lineam DE, ad ipsam lineam perpendicularem ducere.*

CONSTRUCTIO.

1. Centro A tali radio describe ^a circulum ut rectam datam secet in duobus punctis D, E. ^{a Post. 3.}

2. Duc ^b rectas AD, AE. ^{b Post. 1.}

3. Lineam DE ^c divide bifariam in ^c puncto I. ^{io. I.}

Dico ductam AI esse quæsitam perpendicularem.

DEMONSTRATIO.

In Triangulis AID, AIE.

Latus AD $\cong$ AE. quia sunt radii ejusdem circuli.


Latus ID $\cong$ IE. per constructionem.

Latus AI $\cong$ AI.

Ergo angulus AID $\cong$ ^d AIE. Ergo AI est quæsitæ ^e perpendicularis. ^{Q. E. F.} ^{d 8. I.} ^{c Def. 10.}
PRO.

PROPOSITIO. XIII.

Theor. 6. *Cum recta linea EB supra rectam CD consistens, angulos facit: aut duos rectos aut duobus rectis æquales efficiet.*



DEMONSTRATIO.

Recta EB cum DC aut facit utrimque æquales, adeoque^a duos rectos; aut non facit.

Si

Si non facit, ex puncto B excitetur ^b perpendicularis BA: ^{b. II. I.}
eruntque duo anguli O & P
+ Q singuli recti adeoque
 $O + P + Q \propto 2 R.$

Atqui ang: S $\propto O + P.$


Ergo $S + Q \propto 2 \text{ Rectis.}$

Quod E. D.

PROPOSITIO. XIV.

Theor. 7.

Si ad alicujus rectæ AC punctum C duæ rectæ DC. CE non ad easdem partes ductæ angulos qui sunt deinceps O & S duobus rectis æquales fecerint, in directum erunt istæ rectæ, hoc est DCE erit una recta linea.



DEMONSTRATIO.

Si Adversarius contendat lineam CE cum CD non facere unam lineam rectam, utique aliam assignare nobis debet; illa autem assignabitur vel supra lineam CE vel infra illam.

Sit primo supra CE. ut CF.

Jam anguli O $\perp$ P $\propto$ 2 Rectis.

juxta

LIBER PRIMUS. 67

juxta Adversarium.

Atqui anguli $O \perp S \propto 2 R.$ per propositionem.

Ergo $a O \perp P \propto O \perp S.$ Et dem- a Ax. 12
to utrinque angulo O remanet $b P \propto S.$ b Ax. 11
Pars & totum quod est absurdum $c.$ c Ax. 9.

Et eadem demonstratio habet locum in omnibus lineis quæ possunt duci supra $CE.$ Ergo nulla potest duci linea supra $CE,$ quæ cum CD faciat lineam rectam.

Sit deinde infra $CE.$ ut $CG.$

Tum anguli $O \perp T \propto 2$ Rectis. juxta Adversarium.


Atqui $O \perp S \propto 2 R.$ per propositionem.

Ergo $d O \perp T \propto O \perp S.$ Et ablato d Ax. 1.
utrinque angulo O remanet $T \propto S.$ Totum & Pars. quod e est absurdum. e Ax. 9.

Et cum eadem demonstrationis forma obtineat in omnibus lineis quæ possint duci infra $CE:$ sequitur etiam nullam infra CE posse duci. quæ cum CD facit lineam rectam. Unde concludendum erit ipsam lineam CE cum CD facere rectam $DCE.$ Q. E. D.

PROPOSITIO. XV.

Theor. 8. *Si due recte AB. CD se invicem secant, angulos ad verticem & oppositos, scilicet E & P aequales inter se facient.*



DEMONSTRATIO.

$$\begin{array}{l} \text{Anguli } E + O \propto 2 R. \\ \text{Anguli } P + O \propto 2 R. \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{Anguli } E + O \propto 2 R. \\ \text{Anguli } P + O \propto 2 R. \end{array}} \right\}^a$$

$$\text{Ergo}^b E + O \propto P + O. \\ \text{ablato utrimque } O.$$

^c Ax. 3.

$$E^c \propto P.$$

Co-

COROLLARIUM. I.

*1. in vi-
em 6
qua-*


Duæ rectæ secantes se mu-
tuo ad punctum interseccio-
nis quatuor angulos faciunt
quatuor rectis æquales.

COROLLARIUM. II.

Omnes anguli circa idem
punctum constituti æquales
sunt quatuor rectis.

PROPOSITIO. XVI.

Theor. 9. *Trianguli ABC uno latere
BA producto in E, externus
angulus EAC utrolibet interno
& opposito C vel B major est.*



PRÆPARATIO.

1. Latus AC biseccetur in F. ^a
2. Ducta BF producat^r b in
G, ut BF sit $\propto$ FG. ^b
3. Ducatur AG.

DEMONSTRATIO.

Jam in triangulis BFC- AFG.

La-

LIBER PRIMUS. 71

Latus BF $\propto$ FG Per con-
 Latus CF $\propto$ AF)structio-
 nem.

Angulus BFC $\propto$ AFG. per 15. I.

Ergo ang. FCB $\propto$ FAG. per 4. I.

Atqui totalis EAC externus
 major FAG.

Ergo idem EAC etiam major
 FCB. I. C.

Eodem modo bisecando latus
 AB procedatur, & probabitur
 angulum externum DAB majorem
 esse angulo ABC.

Atqui angulus DAB $\propto$ EAC.
 15. I.


Ergo EAC etiam est major
 quam ABC. f. B.

Q. E. D.

PRO-

PROPOSITIO. XVII.

Theor. 10. *Trianguli ABC duo anguli B. T. vel alii quilibet, quocunque modo simul sumpti, duobus relictis sunt minores.*



DEMONSTRATIO.

Producto latere BC in D.

Duo anguli $O + T \approx 2 R.$ 13. I.

Atqui $O < B.$ 16. I.

Ergo $B + T > 2 R.$

Simili modo demonstratur
an.

angulos $A + T$ esse minores
seu $>$ duobus Rectis.

COROLLARIUM I.

In omni triangulo cujus u-
nus angulus fuerit rectus vel
obtusus, reliqui sunt acuti.


COROLLARIUM II.

Omnes anguli trianguli
æquilateri; & trianguli Iso-
scelis anguli supra basim sunt
acuti.

PROPOSITIO. XVIII.

Theor.
II.

*Omnis Trianguli ABC maxi-
mo lateri AC opponitur maxi-
mus angulus ABC.*



DEMONSTRATIO.

Angulus ABC est $\angle$ C.

A majori latere AC abscinda-
tur AD $\propto$ AB.

Ergo angulus ABD $\propto$ P. ^a

a 9. I.
b 16. I.

Atqui P $\angle$ C. ^b

Ergo ABD $\angle$ C.

Adco-

LIBER PRIMUS. 75

Adeoq̃ue totalis ABC erit
multo $\angle C$.

Angulus ABC est $\angle A$.

A maximo latere AC abscinda-
tur CE $\propto$ CB.

Eritque angulus EBC $\propto$ O. ^{c. 5. I.}

Atqui O $\angle$ A. ^{d. 16. I.}

Ergo EBC $\angle$ A.


Ergo totalis ABC erit multo
 $\angle A$.

Unde jam patet angulum ABC
esse omnium maximum. Q. E. D.

PROPOSITIO. XIX.

Theor.
12.

*In omni triangulo ABC maximo
angulo B opponitur latus maxi-
mum AC.*



DEMONSTRATIO.

Aut latus AC est $\propto$ AB.

Aut AC $>$ AB.

Aut AC $<$ AB.

a 5. I. Si Adversarius ponat AC $\propto$
AB, erit $\angle$ angulus B $\propto$ C. quod
est contra hypothesin.

Si

LIBER PRIMUS. 77

Si vero dicat esse $AC > AB$.
erit $\sphericalangle$ angulus $B > C$: quod ^{b18. l.}
iterum est contra hypothesin.

Ergo sequitur latus AC esse $<$
 AB .


Eodem modo demonstratur
 AC esse $<$ BC .

Ergo absolute latus AC est
maximum. Q.E.D.

PROPOSITIO. XX.

Theor.
13.

Trianguli ABC duo latera scilicet AB. AC. aut alio quocunque modo simul sumpta reliquo BC sunt maiora.



PRÆPARATIO.

1. Latus AC producatur in D ut sit $AD \cong AB$.
2. Ducatur DB.

DEMONSTRATIO.

In Triangulo DAB. latus $AD \cong AB$ per construct.

Ergo angulus ABD $\cong$ D.

Atqui angulus CBD $<$ ABD.

Ergo angulus CBD etiam $<$ D.

Adeo-

Adeoque latus DC hoc est duo la-
tera BA + AC. sunt α majora tertio α 19. 1.
latere BC. Q. E. D.

S C H O L I U M.

Propositionis hujus veritas immediate
fluit ex Archimedæa lineæ Rectæ defini-
tione; Ad oculum enim patet viam per
quam linea fracta BAC a B ad C ducta
est diversam esse, a via lineæ BC, quæ
statuitur recta.

Ergo linea recta BC est omnium mi-
nima, quæ a B ad C potest duci.

Adeoque etiam linea recta BC erit $>$
linea fracta BAC.


Q. E. D.

Pro-

PROPOSITIO XXI.

Theor.
14

Si a terminis unius lateris BC intra triangulum jungantur duæ rectæ BD. CE hæc lateribus trianguli BA. AC minores quidem erunt ; majorem vero angulum BDC. continebunt.



DEMONSTRATIO.

PARS I.

Producta BD in E. erit in triangulo BAE,

$$\begin{array}{l} \text{a 20. I.} \\ A \left\{ \begin{array}{l} BA + AE < BE. \\ EC \propto EC. \end{array} \right. \end{array}$$

$$\text{b Ax. 4.} \quad BA + AC < BE + EC.$$

Deinde in Triangulo DEC.

$$\begin{array}{l} \text{c 20. I.} \\ A \left\{ \begin{array}{l} DE + EC < DC. \\ BD \propto BD. \end{array} \right. \end{array}$$

BE

LIBER PRIMUS. 81

$BE + EC < BD + DC.$ ^d Ax. 4.

Atqui supra $BA + AC < BE + EC.$

Ergo $BA + AC$ multo $< BD + DC.$

PARS II.

Externus angulus $BDC < DEC.$ ^e 16. I.
interno.

Atqui angulus $DEC < A$ interno. ^f 16. I.

Ergo angulus BDC multo $< A.$
Q.E.D.

LIBER PRIMUS. 83

Ergo $S \text{ --- } T < P \text{ --- } Q.$
Hoc BDC < BAC.

Vel aliter hoc modo.

P A R S I.

Per Archimedæam rectæ lineæ definitionem linea BOC est omnium brevissima, quæ a B duci possunt ad C. Ergo si a B ad C per aliam viam ducatur linea sive incurvata sive fracta, ut BAC, vel BDC. necessario illa via erit major. Patet autem ad oculum quo punctum fractionis magis a linea BEC recedat, eo viam per quam ista linea procedet esse etiam longiorem, adeoque etiam lineam esse majorem.

Atqui punctum fractionis A magis a linea BOC recedit quam D. Ergo linea BAC erit major linea BDC.

P A R S II.


Per proposit 32. 1. (quæ ab hac non dependet.)

Omnes anguli triang. DBC ∞
omnibus ang. trian. ABC. }
Atqui ang. DBC --- DCB $>$ S
ang. ABC --- ACB. }

Remanebit angulus BDC < BAC.

PROPOSITIO XXII.

Probl. 8. *Ex datis tribus rectis A. B. C. quarum duæ qualibet tertia sunt majores, Triangulum constituere.*



CONSTRUCTIO.

1. In infinita linea DH, lineis datis A. B. C. sume æquales DE. FG. GH.

2. Centro F & radio FD describe Circulum DI, & centro G radio GH circulum HI.

3. Ex puncto intersectionis I, ducantur rectæ IF. IG.

Dico

LIBER PRIMUS. 85

Dico FIG esse triangulum
quæsitum.

DEMONSTRATIO.


FI $\propto$ ^a DF $\propto$ A. Per con- ^a Def. 15.
FG $\propto$ B. structio.
GI $\propto$ ^b GH $\propto$ C. nem. ^b Def. 15.

Q. E. F.

PROPOSITIO XXIII.

Probl. 9.

*Ad data rectæ AB punctum
C angulo rectilineo DEF æqua-
lem GCB efficere.*



1. In rectis *EH*. *EI* sume
duo puncta *D*. *F*. illaque jun-
ge recta linea *DF*.

22. I.

2. Tum ^a fiat ad punctum
C triangulum *GCB*, habens
latera æqualia lateribus trian-
guli *EDF*.

Dico angulum *GCB* ef-
se æqualem ipsi *DEF*.

De.

DEMONSTRATIO.

In triangulis GCB. DEF.

Latus GC $\propto$ DE Per con-

Latus CB $\propto$ EF str ratio-

Latus BG $\propto$ FD nem.

Ergo ^b angulus GCB $\propto$ DEF. ^{b s. l.}

Q. E. F.



Pro-

circulum, is transibit per D, cum
AC. AD ponuntur æquales: Et
BC cadit supra D.

2. Ducatur recta DC.

DEMONSTRATIO.

In Triangulo ADC. latus AD
ponitur æquale AC. ergo angu-
lus $S \propto Q$.

Atqui $S < O$.

Ergo $Q < O$.

Adeoque T multo $< O$.

Quare cum in triangulo BCD
angulus T sit $< O$ erit latus seu
Basis BC major a basi BD.


Q. E. D.

219. L.

PROPOSITIO XXV.

Theor.
16.

*Si duo triangula ABC. DEF
duo latera AB. AC duobus late-
ribus DE. DF aequalia habue-
rint alterum alteri; unum vero
triangulum habeat basin BC ma-
jorem altera EF: habebit quoque
angulum A majorem D.*



DEMONSTRATIO.

*Si angulus A non sit $\angle$ D.
Erit vel A ∞ D.
vel A $>$ D.*

Si

Si sit $A \propto D$, erit basis
 $^a BC \propto EF$. contra hypothe- 24. I.
 sin.

Si vero $A > D$ erit $^b ba$ - 24. I.
 sis $BC > EF$. iterum contra
 hyp.


Adeoque sequitur esse angu-
 lum $A < D$.

Q. E. D.

PROPOSITIO XXVI.

Theor.
17.

Si duo triangula duos angulos duobus angulis aequales habuerint, alterum alteri, & unum latus uni lateri aequale, sive quod adjacet aequalibus angulis, sive quod uni aequalium angulorum subtenditur; Illa & reliqua latera reliquis lateribus aequalia habebunt, alterum alteri, & reliquum angulum reliquo angulo.



DEMONSTRATIO,

In Triangulis ABC. DEF sint anguli B. E. ut & C. F. æquales.

Sitque primo BC $\parallel$ EF, sc: latera adjacentia.

si DE non sit $\parallel$ ipsi AB; sit DE $\angle$ AB, & abscindatur EG $\parallel$ AB, & ducatur GF.

Tum erit in Triangulis GEF, ABC.

Latus GE $\parallel$ AB per constructionem.

Angulus E $\parallel$ B

Latus EF $\parallel$ BC

Per propositionem.

a 4. I.

Ergo a angulus GFE $\parallel$ ACB.

Atqui angulus DFE $\parallel$ ACB per propositionem.

b Ax. I.

Ergo b angulus GFE $\parallel$ DFE, pars & totum, quod est absurdum.

c Ax. 9.

Ergo

Ergo non potest esse $DE < AB$,

Et eodem modo probatur DE non posse esse minus latere AB :

Ergo $DE \cong AB$, adeoque triacula ABC , DEF se habent juxta 4. Et omnia reliqua sunt æqualia.

Sit deinde $AB \cong DE$, scilicet latera opposita,

Si non sit $EF \cong BC$, sit $EF < BC$, & abscindatur $EG \cong BC$, ducaturque DG .

Tum erit in triangulis ABC , DEG .

Latus $AB \cong DE$ | per propositionem.

Angulus $B \cong E$ |

Latus $BC \cong EG$ per construct:

Ergo d Angulus $ACB \cong DGE$.

Atqui angulus $ACB \cong DFE$ per proposi- d 4. I.
tionem.

Ergo angulus $DGE \cong DFE$, quod est absurdum, cum DGE sit externus, qui interno DFE major est. e.

e 16. I.

Ergo non potest esse $EF < BC$.

Eodem modo probabitur non posse esse $EF > BC$.


Unde sequitur esse $EF \cong BC$: Adeoque in triangulis ABC , DEF omnia per 4 esse æqualia.

Q. E. D.

PROPOSITIO XXVII.

Theor.
18.

*Si in duas rectas AB. CD
recta EF incidens angulos alter-
nos P. R æquales faciat ; re-
ctæ erunt inter se parallelæ.*



DEMONSTRATIO.

*Si non sint parallelæ, coin-
dent*

cident puta in I , & fiet triangulum GIH .

Tum erit angulus externus $P < R$ interno. a 16. 1.

Atqui per propof. angulus $P > R$.


Quæ duo simul vera effe absurdum est. Ergo lineæ non concurrent; adeoque sunt parallelæ.

PROPOSITIO XXVIII.

Theor.

19.

Si in duas rectas AB. CD recta EF incidens faciat externum angulum O æqualem interno & ad easdem partes opposito Q: Aut si faciat duos internos & ad easdem partes P. Q. simul æquales duobus rectis: parallele erunt inter se rectæ AB. CD.



DE-

DEMONSTRATIO.

P A R S I.

Angulus $T \propto O$.^a

a 15. I.

Atqui $Q \propto O$ per propositionem.

Ergo $T \propto Q$.^b

b Ax. 1.

Adeoq̃ue lineæ AB. CD. sunt parallelæ.^c

c 27. I.

P A R S II.

Anguli $O \perp P \propto 2$ Rectis.^d

d 13. I.

Atqui $Q \perp P \propto 2$ Rectis per Prop.

Ergo $O \perp P \propto Q \perp P$. demto c Ax. 1.
utrinque P.

$O \propto Q$.

Ergo per partem primam hujus lineæ
AB. CD sunt parallelæ.

Q. E. D.

PROPOSITIO XXIX.


Theor.
29.

*Si in rectas parallelas AB.
CD recta EF incidat.*

1. *Alterni anguli T. Q inter se erunt equales.*

2. *Externus G erit equalis interno Q ad easdem partes opposito R.*

3. *Duo interni Q ad easdem partes T. R. simul erunt equales duobus rectis.*



De:

DEMONSTRATIO.

PARS I.

Si angulus T non sit $\propto Q$,
erit vel major vel minor.

Ponatur $T < Q$. } A
 P P .

Erit $T + P < Q + P$.

^a Ax. 4.

Atqui $T + P \propto$ ^b 2 Rectis.

^b 13. I.

Ergo $Q + P >$ 2 Rectis:
adeoque lineæ AB . CD non
sunt ^c parallelæ: quod est con-
tra hypothesin.

^c Ax. 11.

N 2

Dein-

LIBER PRIMUS. 101

non sunt parallelæ: quod iterum est contra Hypothesin.

Ergo est angulus $T \propto Q$:

Quod E. D.

P A R S II.

$G + T \propto 2 \text{ Rectis.}$
 $R + Q \propto 2 \text{ Rectis.}$ } f

f 13. I.]

S (Ergo $G + T \propto R + Q$ g Ax. I.
 Atqui $T \propto Q$ h

h per partem I.

Ergo $G \propto R$. i

i Ax. 3.

P A R S III.

$G + T \propto 2 \text{ Rectis.}$ k
 Atqui $G \propto R$. l

k 13. I.

l Per partem 2.

Ergo $R + T \propto 2 \text{ Rectis.}$

Q. D. E.


N 3

Pro-

PROPOSITIO. XXX.

Theor.
21.

*Si due rectæ AB. CD. sint
parallele ad eandem EF; illæ
erunt quoque inter se parallele.*



DEMONSTRATIO.

Ducatur per tres datas re-
ctas linea GK.

An.

Angulus $O \propto P.$ ^a propter ^a 29. I.
parallelas AB. EF.


Angulus $Q \propto P.$ ^a propter
parallelas CD. EF.

Ergo ang. $O \propto Q$ alterni.
Adeoque AB. CD sunt ^b inter ^b 27. I.
se parallelæ.

PROPOSITIO. XXXI.

Prob. 10.

Per datum punctum G ducere lineam AB, quæ datæ CD sit parallela.



CONSTRUCTIO.

1. Ex puncto G ad datam CD duc rectam GH sub quolibet angulo GHC .

2. Ad lineam GH punctum a 23. I. G fac ^a angulum HGB æqualem angulo GHC .

Dico

Dico BG productam esse
ipſi CD parallelam.

DEMONSTRATIO.


Anguli alterni $\angle GH\zeta$ HGB
sunt æquales per constructio-
nem. Ergo ^b lineæ AB. CD. ^{b 27. I.}
sunt parallelæ.

PROPOSITIO XXXII.

Theor. 22. *Trianguli ABC uno latere BC producto in E.*

1. *Externus angulus S duobus internis & oppositis A & B. equalis est.*

2. *Trianguli tres anguli A. B. C. simul sumpti duobus re-ctis aequales sunt.*



LIBER PRIMUS. 107

DEMONSTRATIO.

PARS I.

Ducta recta CD parallela lateri BA,
erit.

A { Angulus P $\propto$ A, alterno; propter a 29. l.
incidentem AC.
Angulus Q $\propto$ B. interno; propter b 29. l.
incidentem BE.

Ergo anguli P $+$ Q hoc est totius
S $\propto$ A $+$ B. Q. E. D.

PARS 2.

Duo anguli O $+$ S $\propto$ 2 Rectis. c c 13. l.
Atqui S $\propto$ A $+$ B. per partem I.

Ergo tres anguli A $+$ B $+$ O $\propto$
2 Rectis.

COROLLARIUM I.

Omnes anguli unius triauguli sunt
æquales tribus angulis cujuscunque alte-
rius triauguli simul sumtis; Et quando
duo sunt æquales duobus erit & tertius
æqualis tertio.

O 2

De

COROLLARIUM II.

In triangulo Iſoſcele re-
ctangulo anguli ad baſin ſunt
ſemirecti. Et quadrati dia-
meter illius anguloſ biſariam
ſecat.

COROLLARIUM III.


Angulus trianguli æquila-
teri eſt una tertia duorum re-
ctorum, vel duæ tertiæ unius
recti.

S C H O L I U M.

Omnis figura rectilinea
dividitur in tot triangula,
quot habet latera, demptis
duobus, & anguli triangulo-
rum conſtituunt anguloſ fi-
guræ.

DE-

DEMONSTRATIO.



Intra quodlibet polygonum ex: gr: pentagonum $ABCDE$, sumatur aliquod punctum F , ex quo ad singulos angulos ducantur rectæ; & obtinebuntur tot triangula quot figura habet latera, adeoque hic quinque triangula.

Cum autem unumquodque triangulum contineat duos angulos rectos (per 32. I.) quinque triangula continebunt 10 angulos rectos; a quibus si demantur anguli recti quatuor circa F positi (15. I.) qui ad figuram non pertinent, remanebunt pro angulis figuræ 6 anguli recti.

Cum jam duo anguli recti contineantur in uno triangulo, 4 erunt in duobus & 6 in tribus triangulis.

Un-

Unde jam concludimus pentagonum dividi posse in tria triangula: hoc est in tot triangula, quot figura habet latera demptis duobus.

Quæ demonstratio universalis est pro omnibus polygonis; & Tabellæ sequentis est fundamentum.


Latera	3	4	5	6	7
Trianguli	1	2	3	4	5
Anguli recti	2	4	6	8	10

Latera	8	9	10	11	12
Trianguli	6	7	8	9	10
Anguli recti	12	14	16	18	20

Cujus hic est Sensus. Figura Ex: Gr: 6 laterum, dividi potest in 4 triangula; & illius anguli omnes vident 8 rectos.

PROPOSITIO XXXIII.

*Rectæ AC. BD quæ æquales & Theor.
parallelae AB. CD ad easdem par- 23.
tes conjungunt, illæ & ipsæ æquales
sunt & parallelae.*



DEMONSTRATIO.

Ducta Diametro AD, in Tri-
angulis BAD. ADC.

Latus AB $\propto$ CD per propo-
sitionem.

Angulus $\angle O \propto T$ propter . 29. L
pa-

parallelas AB. CD.

Latus AD $\propto$ AD.


Ergo per 4. omnia sunt æqualia, nim.

Latus AC $\propto$ BD.

Angulus Q $\propto$ S, adeoque

b 27. 1. b AC & BD parallelæ.

PROPOSITIO XXXIV.

Theor.
24.

*Parallelogrammi,
ABCD
opposita latera & anguli
aequalia sunt;
ipsaeque a*

Diametro secatur bifariam.

DEMONSTRATIO.

In Triangulis BAD. ADC.

Angulus $\angle O \cong \angle T$ propter parallelas a 29. I
AB. CD.

Angulus $\angle S \cong \angle Q$ propter parallelas
AC. BD.

Latus AD $\cong$ AD.

Ergo per 26. omnia sunt aequalia; sc:

Latus AB $\cong$ CD.

Latus BD $\cong$ AC.

Angulus B $\cong$ C.

Adeoque per 4. Triangula BAD.

ADC inter se sunt aequalia.


P

PRO-

PROPOSITIO. XXXV.

Theor.
25.

*Parallelogramma AD. FD.
super eadem basi CD & inter
easdem parallelas AB. CD consti-
tuta sunt equalia.*



DEMONSTRATIO.

*Tres hic occurrunt casus, qui
totidem figuris exhibentur.

Ad Figuram I.

Latus AE $\propto$ CD
Latus EB $\propto$ CD } 34. I.
Ergo

LIBER PRIMUS. 115

Ergo $AE \propto EB$.

a Ax. 1.

Considerentur jam duo triangula EAC . BED , in quibus

Latus $EA \propto BE$.

Angulus $A \propto BED$ propter parallelas AC . ED .

Latus $AC \propto ED$ per 34. I.

Ergo Triang. $EAC \propto$
Triang. BED } Adde.
Triang. $ECD \propto ECD$

b 4. I.

Parallelogr. $EACD \propto$ Parall. $BECD$.

Ad Figuram. II.

Latus $AE \propto CD$.

Latus $FB \propto CD$. 34. I.

Ergo $AE \propto FB$.
 $FE \propto FE$. } S.

$AF \propto EB$.

Quare jam in Triangulis FAC .
 BED .

P 2

La-

Latus $FA \propto BE$.

Angulus $A \propto BED$. propter
parallelas $AC. ED$.

Latus $AC \propto ED$. per 34. I.

c 4. I.

Ergo Triang. $\triangle FAC \propto BED$.
Trap. $EFCD. \propto EFCD$ } A

Parallelog. $AD \propto Parall. FD$.

Ad Figuram III.

Latus $AE \propto CD$
Latus $FB \propto CD$. } 34. I.

Ergo $AE \propto FB$ } A
 $EF. EF.$

$AF \propto EB$.

Quare iterum in triangulis
 $FAC. BED$.

Latus $FA \propto BE$

Angulus $A \propto BED$. ob
parallelas $AC. ED$.

Latus $AC \propto ED$. per 34. I.

Ergo

LIBER PRIMUS. 117

Ergo ^dTriang FAC $\propto$ Triang BED. d 4 L
 ang. BED.
 Triang FEG $\propto$ Triang FEG. S
 ang. FEG.

Trapezium EACG $\propto$ Trapezio BFGD. A.
 Triang. GCD $\propto$ Triang. GCD


Parallelogr. AD $\propto$ Parallel. ED.
 Q. E. D.

Pro-

PROPOSITIO XXXVI.

Theor.
26.

Parallelogramma AE. HD super equalibus basibus CE. FD, & inter easdem parallelas AB CD constituta, inter se sunt equalia.



DEMONSTRATIO.

Ducantur rectæ CH. EB, quæ erunt
a 33. I. a æquales & parallelæ. Hoc facto erit.

Parallelogr. AE ∞ Parall. EH.
Atqui Parall. HD ∞ eidem } 5. I.
Parall. EH.

b Ax. I.


Ergo b Parall. AE ∞ Parall. HD.

Q. E. D.

Pro-

PROPOSITIO XXXVII.

Triangula ACD. FCD super eadem basi CD & inter easdem parallelas AB. CD. constituta, sunt inter se equalia. ^{Theor. 27.}



DEMONSTRATIO.

Ductis DE a parallela ipsi CA : ut & DB parallela CF, erit. ^{a 31. I.}
^{b 35. I.} Parallelogr. ^b EC $\propto$ Parallelogr. BC.

Atqui Parall. EC semissis est
 Triangulum ACD.
 Et Parallelogr. BC semissis est
 triangulum FCD. ^{34. I.}


Ergo triang. ACD $\propto$ triang. FCD. ^{c Ax. 7.}
 Q. E. D.

Pro-

PROPOSITIO XXXVIII.

Theor.
28.

Triangula ACE. HFD super equalibus basibus CE. FD. & inter easdem parallelas AB. CD constituta, inter se sunt equalia.



DEMONSTRATIO.

a 31. L. Ducatur ^a EG parallela
 ipsi AC & DB ipsi FH.
 b 24. L. Tum ^b Parall. CG ∝ Pa-
 rall. FB.

At-

Atqui dimidium CG
est Triang. ACE.


Et dimidium FB est 34. I.
Triang. HFD.

Ergo c triang. ACE $\propto$ c 24. 7.
triang. HFD.

PROPOSITIO XXXIX.

Theor.
29.

Si triangula AEC . DBC
sint equalia, & super eadem
basi BC & ad easdem partes
constituta: illa erunt quoque in-
ter easdem parallelas. Hoc est
 AD erit parallela BC .



DEMONSTRATIO.

Si Adversarius hoc neget. Sit AE
parallela ipsi BC : & producta BD in
E, ducatur recta EC.

a 37. I. Tum Triang. $\triangle ABC \propto \triangle EBC$.
Atqui Triang. $\triangle ABC \propto \triangle DBC$ per
propositionem.

Er-

Ergo Triang. ^b EBC $\propto$ DBC. To. ^b Ax. 1.
 um & pars quod est absurdum.

^c Ax. 9.

Et eadem demonstratio obtinet in omnibus lineis quæ possunt duci supra AD.

Quare concludendum est nullam lineam posse duci supra AD, quæ sit ipsi BC parallela.

Quod si adversarius contendat lineam AF esse parallelam BC, eadem demonstrationis forma ipsum ad absurdum deducimus; & probabimus nullam lineam infra AD posse duci quæ ipsi BC sit parallela.


Ergo recte hinc concludimus ipsam lineam AD esse parallelam BC.

Q. E. D.

PROPOSITIO XL.

Theor.
30.

*Si triangula ABC . DEF sint
equalia, & super equalibus ba-
sibus BC . EF , & ad easdem
partes constituta: Illa erunt quo-
que inter easdem parallelas AD .
 BF .*



DEMONSTRATIO.

Si AD juxta Adversarium non fit pa-
rallela BF ; fit AG supra AD ducta,
ipsi BF parallela: & producta ED in G ,
ducatur GF .

a 38. l. Tum erit triang. $ABC \propto$ triang.
 GEF .

Atqui idem triang. $ABC \propto$ triang.
 DEF . per prop.

Ergo


Ergo triang. GEF $\propto$ DEF. To- b Ax. I.
tum & pars; quod est absurdum. c Ax. 9.

Adeoque linea AG non est parallela
BF: nec ulla quæ supra AD posset duci.

Et eodem modo demonstratur nec
AH nec ullam aliam quæ infra AD pos-
sit duci, esse parallelam ipsi BF.

Ergo concludimus iterum ipsam lineam
AD esse parallelam BF. Q. E. D.

PROPOSITIO XLI.

Theor.
31.

*Si parallelogram-
mum AECD
communem cum
triangulo FCD
basin CD habue-
rit, & in iisdem parallelis AF.
CD fuerit: parallelogrammum e-
rit duplum trianguli.*

DEMONSTRATIO.

a 37. I. Ducta AD erit triang. ^a ACD $\propto$ tri-
ang. FCD.

b 34. I. Atqui ^b parallelogr. AECD est du-
plum triang. ACD.


Ergo etiam parall. AECD est duplum
triang. FCD.

SCHOLIUM.

Imo etiam si parallelogrammum
ABDC cum triangulo EFG æqua-
les bafes CD. FG. habuerit & in iisdem
fuerit parallelis, parallelog. trianguli
duplum erit.

De-

LIBER PRIMUS. 127
DEMONSTRATIO.



Ducta FK parallela GE, erit.

Parallelog. AD $\propto$ Parall. KG. 36. I.

Atqui Parall. KG est duplum Trianguli EFG. per 34. I.

Ergo etiam Parall. AD ejusdem trianguli duplum erit.


Præterea si Trianguli EFH cum Parallelogr. AD inter easdem parallelas existentis, basis FH fuerit dupla baseos CD erit triangulum EFH $\propto$ parallegr. AD.

DEMONSTRATIO.

Triang. EFG $\propto$ triang. EHG (38. I.)
Ergo totum triangulum EFH est duplum trianguli EFG : atqui modo demonstratum est esse parallegr. AD duplum ejusdem trianguli EFG. Ergo erit parall. AD $\propto$ triang. EFG. PRO

PROPOSITIO XLII.

Prob. II.



Dato triangulo
ABC aequale paral-
lelogrammum GC
construere, habens
angulum aequalem
angulo dato D.

CONSTRUCTIO.

- a 10. I. 1. Divide ^abasin BC bifariam in E,
& duc rectam AE.
b 31. I. 2. Duc lineam AH parallelam BC.
3. Ex E duc rectam EG ut angulus
GEC sit æqualis angulo dato D.
4. Age CH parallelam EG.
Dico GC esse parallelogrammum
quæsitum.

DEMONSTRATIO.


- a 38. I. Triang. AEB $\propto$ triang. AEC.
Ergo triang. ABC est duplum triang.
AEC
b 41. I.] Atqui Parall. GC ^best duplum ejusdem
triang. AEC.

- c Ax. 6. Ergo triang. ABC $\propto$ Parall. GC. c
Cum jam angulus GEC per constru-
tionem sit $\propto$ angulo dato D; patet fa-
ctum esse quod quæritur.

PRO

PROPOSITIO. XLIII.

Omnis parallelogrammi AC ^{Theor. 32.} complementa AG. GC. sunt inter se equalia.



DEMONSTRATIO.

$$S \left(\begin{array}{l} \text{Triang. BAD} \propto \text{Tri} \\ \text{ang. BCD.} \\ \text{Triang. BFG} + \text{GHD} \\ \propto \text{tri. BKG} + \text{GED} \end{array} \right) 34^{\text{a}} \text{ I.}$$

Remanet compl. AG $\propto$
compl. GC. Q. E. D.


a Ax. 32.

R

Pro-

PROPOSITIO XLIV.

Prob. 12.



*Ad datam
rectam Fda-
to triangulo
ABC aequale
parallelo-
grammum*

*CM applicare habens angulum aequalem an-
gulo dato D.*

CONSTRUCTIO.

- a 42. I. 1. Constitue ^a parallelogrammum CG
æquale triangulo ABC, & habens angu-
lum GEC ∞ angulo D.
- b 3. I. 2. Produc ^b BC in K, ut CK sit ∞
datæ F.
- c 31. I. 3. Age KI parallelam ^c CH, quæ
productæ AH occurrat in I.
4. Ex I per C ducatur IC. quæ pro-
ductæ GE occurrat in L.
- 5 Ducatur LM parallela BK, quæ
productæ IK occurrat in M.
6. Denique producat HC in N.

Dico CM esse parallelogrammum
quæsitum.

De-

DEMONSTRATIO.

Triang. ABC $\propto$ complemento GC.
per Constr.

Compl. CM^a $\propto$ eidem compl. GC. ^a 43. I.

Ergo triang. ABC ^b $\propto$ compl. CM. ^b Ax. I.

Angulum autem CNM esse $\propto$ angulo
dato D sic demonstratur.

Ang. CNM ^c $\propto$ HCK. propter pa- ^c 29. I.
rallelas CK. NM.

Ang. HCK $\propto$ ^c GEC. propter pa-
rallelas HC. GE.

Ang. GEC $\propto$ D. per constru-
tionem.


Ergo ang. CNM $\propto$ D. ^d ^d Ax. I.

Cum jam denique latus CK factum
sit æquale lineæ datæ F, patet parallelo-
grammum CM quæsito satisfacere.

PROPOSITIO XLV.

Prob. 13.

*Dato rectilineo AD aequale
parallelogrammum ED consti-
tuere habens angulum aequalem
angulo dato F.*



CONSTRUCTIO.

1. Ducta CB dividatur
rectilineum in triacula.

a 42. I.] 2. Fiat a parallelogram-
mum EI $\propto$ triangulo BCD,
habens angulum H $\propto$ dato F.

3. Su-

3. Supra latus GI^b fiat pa-^{b44} rallelogrammum $GD \propto$ triangulo ABC , habens angulum $GID \propto$ ipsi H .

Dico quæsito satisfactum esse.

DEMONSTRATIO.


A $\left\{ \begin{array}{l} \text{Parallelogr. } EI \propto \\ \text{triang. } BCD. \\ \text{Parallelogr. } GD \propto \\ \text{triang. } ABC. \end{array} \right\}$ per const.

Ergo Parall. $ED \propto$ Rectilineo AD .

Q. E. F.

PROPOSITIO. XLVI.

Prob. 14. *Super data recta AB quadratum ABCD describere.*



CONSTRUCTIO.

1. Ab extremitatibus A & B erige duas perpendiculares AC. BD. quæ sint æquales ipsi AB.

2. Ducatur recta CD.

Dico ABCD esse quadratum quæsitum.

DEMONSTRATIO.

Pro lateribus.

ax. I. Latus AC æ BD, quia utrim-

trumque est $\propto$ eidem AB.

Latus AC est parallelum
 b BD, propter angulos rectos. ^{b 28. L}
 A. B.

, Ergo ^c AB & CD sunt pa- ^{c 33. L}
 rallelae & æquales, adeoque
 omnia latera æqualia eidem
 AB, inter se sunt æqualia &
 parallela.

Pro angulis.

In parallelogrammo AD an-
 guli A. B. sunt recti. Ergo ^d e- ^{d 34. L}
 tiam oppositi D. C sunt recti.
 Ergo ABDC est quadratum.


Q. E. D.

Pro-

PROPOSITIO XLVII.

Theor.
33.

In omni triangulo rectangulo
 BAC quadratum lateris BC ,
 quod recto angulo opponitur, æ-
 quale est duobus simul reliquo-
 rum late in $BA. AC$. qua-
 dratis.



DEMONSTRATIO.

Ex A ducta AL parallela late-
 ri BE , lateris BC quadratum BD
 dividit

LIBER PRIMUS. 137

dividit in duo parallelogramma
 BL . KD :

Si jam demonstratum sit Paral-
 lelogr. KD esse $\propto$ quadrato AI ,
 ut & parallelogr. BL esse $\propto$ qua-
 drato AF , peracta res erit.

Pro Primo.

Ductis AD . BI ang. $BCD \propto ACI$. quia
 uterque rectus.
 A ang. $ACB \propto ACB$.

Ang. $ACD \propto BCI$.

Ergo in triangulis ACD . BCI .

Latus $AC \propto CI$. } quia sunt latera co-
 Latus $CD \propto BC$. } rundem quadratorum.
 Ang. $ACD \propto BCI$.

Ergo $\propto$ Triang. ACD triang. BCI . $\propto 4. L$

$\propto$ Atqui parallelogr. KD est Quia sunt
 duplum triang. ACD . } in iisdem ba- $\propto 4. L$
 $\propto$ Et parallelogr. AI duplum } sibus & pa-
 triang. BCI . } rallelis.

S

Ergo

b Ax. 6.] Ergo ^b parall. KD $\propto$ parall. seu quadrato AL.

Pro Secundo.

Ductis AE. CF. $\left\{ \begin{array}{l} \text{Ang. CBE} \propto \text{ABF.} \\ \text{quia uterque rectus.} \\ \text{A} \text{ Ang. ABC. ABC.} \end{array} \right.$

Ang. ABE. $\propto$ CBF.

Quare in triangulis ABE. CBF.

Latus AB $\propto$ BF. \ Utpote vera eorum-
Latus BE $\propto$ CB. / dem quadratorum.
Ang. ABE $\propto$ CBF.

d 4. l. Ergo Triang. ABE ^d $\propto$ Triang. CBF.

e Atqui parallelogr. BL est \ Quia sunt
e 4. l. duplum triang: ABE. \ in iisdem
e Et parallelogr. AF duplum \ basibus &
triang. CBF. \ parallelis.

Ergo

Ergo parall. BL $\propto$ parall. seu
quadrato AF.

f Ax. 6.


Atqui antea parall KD $\propto$ qua-
drato AI.

A

Ergo Quadratum BD $\propto$ duobus qua-
dratis. AF. AI.

Q. E. D.

Succinctior autem & clarior est Clarissimi Sturmii demonstratio, quam in sua Mathesi enucleata, pag. 30. hoc modo proponit.



Factis faciendis, quæ apposita Figura monstrat.

□ FDCG duplum est $\triangle$ li ACD.

Atqui □ AHIC etiam est duplum $\triangle$ li ACD. 41. I.

Ergo □ FDCG $\propto$ □ AHIC.

Eodem modo.

□ FEBG duplum est $\triangle$ li AEB.

Atqui □ ABLK etiam est duplum $\triangle$ li ACD. 41. I.

Ergo

Ergo $\square$ FEBG $\propto$ $\square$ ABLK. } Adde.
 Supra est $\square$ FDCG $\propto$ $\square$ AHIC.

Eritque $\square$ EDCB $\propto$ $\square$ ABLK $\perp$
 $\square$ AHIC. Q. E. D.


Nam quod latus BE occurrat lateri LK
 & latus BD continuato lateri IH sic patet,
 siquidem omnes anguli O, ut & P mani-
 festo æquales sunt, quia ubique O $\perp$ P
 constituunt unum rectum.

Adeoq; $\triangle$ lum ABC revolutum circa
 centrum B congruet cum triangulo BLE;
 revolutum autem circa centrum C, con-
 gruet cum triangulo CID.

SCHOLIUM I.

Pulcherrimum hoc Pythagoræ inven-
 tum insigne per totam Mathesin est
 Theorema, & non pauca utilissima sup-
 peditat Problemata, quorum cum alia
 apud Clavium & alios Autores abun-
 danti satis copia videri possint, nostra
 tantum afferemus.

PROBLEMA I.



Datis
quodli-
bet lineis
K. L. M.
N. O. in-
venire
Quadra-
tum
quod o-
mnium
linearum
quadratis
simul
sumtis sit
æquale.

Constructio & Demonstratio.

I. Duas lineas K & L, junge in an-
gu-

gulo recto ABC , erit ducta recta AC :

$\square AC \propto \square$ tis K , & L .


2. Facta $CD \propto M$ perpendiculari ad CA , erit $\square AD \propto \square$ tis. $K. L. M$.

3. Ad AD fiat perpendicularis $DE \propto N$, eritque $\square AE \propto \square$ tis $K. L. M. N$.

4. Ipsi AE fiat perpendicularis $EF \propto O$, eritque $\square AF \propto \square$ tis. $K. L. M. N. O$.

Quæ omnia sequuntur ex hac prop. 47. cum quatuor ista triangula $ABC. ACD. ADE. AEF$. per constructionem sint rectangula.

PROBLEMA II.



Datis duabus lineis inæqualibus
K. L. invenire quadratum, quo
 a se invicem quadrata ab illis facta
 differunt.

CONSTRUCTIO.

1. Fac rectam *DB* duplam datæ majoris *K*.
2. Super illa describe Semicirculum *DEB*.
3. Fiat ipsi *DB* perpendicularis *BC* $\propto$ datæ *L*.
4. Ducatur *CE* ad Semicirculum, parallela *BD*.
5. Ex

5. Ex puncto E demittatur perpendicularis EF.

Tum dico $\square AF$ esse differentiam $\square$ torum K . & L .

DEMONSTRATIO.

Ducta AE erit triangulum AEF per constructionem rectangulum; adeoque per 47. I.

$$\square AE \propto \square EF + \square AF$$


Atqui $\square AE \propto \square K$. Per constructionem.
Et $\square EF \propto \square L$. $\} \text{struct.}$

Ergo $\square K$ superat $\square L$ per $\square AF$; adeoque $\square AF$ est differentia $\square$ torum, K & L .

P R O B L E M A. III.

Cognitis trianguli rectanguli ABC duobus lateribus, invenire tertium.

P R A X I S.




Sint .cognita duo latera
 $AB\ 3.$ $BC\ 4.$ Quia triangulum
 est rectangulum : duo qua-
 drata AB & BC : seu 9 & 16
 addantur in unam summam :
 &

& obtinebitur 25: pro duobus $\square$ tis AB . BC . hoc est pro $\square$ to AC : cujus radix 5 dabit latus quæsitum AC .

Similiter cognita sint latera AC . 5 & BC 4: tum a $\square$ to AC 25 sublato $\square$ to BC , 16, restabit pro $\square$ to AB 9. cujus radix exhibebit latus quæsitum AB .

SCHOLIUM II.



Si triangulum rectangulum sit
simul Isosceles, facillime propo-
sitionis veritas demonstrabitur
hunc in modum.

PRÆPARATIO.

1. Super lateribus AB. AC. fiant $\square$ ta
AF. AG.

2. Ducantur rectæ CD. DE. EB.

Dico BCDE esse $\square$ tum a BC, &
 ∞ $\square$ tis AF. AG.

DEMONSTRATIO.

PARS I.

Per 32. I. illiusque Coroll. 2. tres angu-
li

li ad B sc. ABC. ABE. EBF. ut & tres
ad C scil. ACB. ACD. DCG : præterea
duo ad E sc: AEB. FEB, ut & ad D
duo ADC. GDC; sunt semirecti: un-
de jam facile deducitur angulos AED.
ADE etiam esse semirectos : adeoque
quatuor angulos quadrilateri BCDE esse
rectos : quare latera opposita sunt paralle-
la: sc. BC. ED & EB. DC.

Atqui $BC \propto CD$ (6. I.) quia triang.
BCD est rectangulum in C & habet duos
angulos supra Basin BD æquales : unde
etiam $BE \propto ED$.

Ergo quatuor latera BC. CD. DE.
EB sunt æqualia : adeoque BCDE □tum
lateris BC.

PARS II.


Sex triangula K. L. M. N. O. P. ha-
bent suas bases inter se æquales, (quia
sunt latera □ti) & duos angulos supra ba-
sin, quia omnes sunt semirecti.

Ergo per 26. I. triangula omnia inter
se sunt æqualia.

Adeoque 4 triangula K. M. L. N ∝ lia
4 triangulis. P. M. N. O.

Hoc est □tum. BCDE ∝ □tis AF.
AG. Q. E. D.

Cui demonstrationi aliam sic breviter adjungimus.



Descriptis quadratis *AF. AG. BE*, producantur latera *FB. GC.* quæ necessario debere cadere in *E* & *D* facile probari potest, ut *BE CD* sint Diametri, quæ ipsum quadratum & singulos illius angulos bifariam secant.

Unde jam nullo negotio deducitur lineæ *BK. CK. DK. EK* esse inter se & lateribus *AB. AC.*
æqua-

$\propto$ quales, adeoque trianguli DBC
 cum $\square$ to CI inter easdem parille-
 las IB GD existentis, basis DC ,
 dupla est Parallelogrammi baseos
 CG : ergo per Scholium pro. 41. I.
 Triang. $DBC \propto \square$ to AG .

Deinde triangulum $DEC \propto$
 triang. DBC . 34. I.

Et Triang. $DBC \propto \square$ to AG .

Et $\square$ tum $AG \propto \square$ to AF .

Ergo Triang. $DEC \propto \square$ to AF .

Quare sequitur duo Triangula
 DBC . DEC simul sumta, hoc est
 $\square$ tum $BCDE$ esse $\propto$ le quadratis
 duobus AF . AG simul sumtis.

Cæterum ex hac eadem demon-
 strationis forma, sequens haud
 inelegans deducimus

Theorema. I.

In Triangulo Isoscele rectan-
 gulo ABC , quadratum Hypote-
 nusæ BC quadruplum est triangu-
 li ejusdem propositi ABC .

De-

DEMONSTRATIO.

Ex superiori demonstratione patet singulos $\square$ ti BE angulos bisectos esse, & lineas BK . CK . DK EK lateribus AB . AC . æquales: Unde jam sequitur quatuor triangula BKC . CKE . EKD . DKB . & inter se & triangulo BAC esse æquiangula, & æquilatera: adeoque æqualia.

Cum autem quatuor ista triangula constituent $\square$ tum $BCDE$, patet illud $\square$ tum quadruplum esse Trianguli ABC . Q. E. D.

Quæ demonstratio præcedentis Theorematis, cum mihi occasionem præberet inquirendi, quomodo $\square$ tum hypotenusæ trianguli rectanguli inæqualium laterum se haberet ad ipsum Triangulum, sequens sese statim prodebat.


Theorema II.

In quolibet cunque Triangulo
Re-

Rectangulo inæqualium laterum,
 quadratum Hypotenusæ triangu-
 lum propositum quater sumtum
 superat $\square$ to quod fit a differentia
 reliquorum laterum : seu quod
 idem est ; $\square$ tum Hypotenu-
 sæ est ∞ le triangulo proposito
 quater sumpto una cum $\square$ to diffe-
 rentiæ reliquorum laterum.

Demonstrationem vide pagina
 sequente.

DEMONSTRATIO.



Super trianguli rectanguli ABC
 lateribus construantur $\square$ ta AF .
 AG . BE .

Deinde producantur latera FB
 GC : tum ex angulis E & D du-
 cantur EK parallela FB , & DN
 parallela GC : istæ lineæ ita se in-
 tersecabunt, ut constituent qua-
 tuor triangula BLC . CKE . END
 DMB ,

$\triangle DMB$, & in illorum medio quadratum $KLMN$.

Quibus constructis vel leviter in præcedentibus exercitatus facile omnes angulos O , ut & omnes P inter se æles esse perspiciet.

Unde sequitur per 26. I. quinque ista Triangula esse inter se æqualia; & habere latera æqualia lateribus: sc. BM . DN . EK . CL : ut etiam AC . CK . EN . DM . BL .

Quare si auferatur BL a BM : DM a DN : EN ab EK : & CK a CL , remanebunt KL . LM . MN . NK inter se æles, quæ sunt differentię laterum AB . AC .

Quia autem istæ æquales lineæ ad angulos rectos sunt junctæ, ut facile ex 26. I. patet, sequitur quadrilaterum $KLMN$ esse quadratum differentię laterum AB . AC .

Cum ergo quatuor triangula BMD . DNE . EKC . CLB . cum

□to $KLMN$ constituent totum $BCDE$; quod fit ab hypotenusa BC : patebit abunde propositi nostri Theorematis veritas.


Vix autem possum quin hic afferam plus quam elegantem Clarissimi Christophori Sturmii demonstrationem præsentis prop. 47, quam ex hac figura, alio ac diverso a nobis ex fundamento, constructâ, nobis suppeditat, in calculo Algebraico propositum: quæ tamen ab iis, qui vel a limine Analysin speciosam salutaverunt, intelligi potest.

Illa autem ita se habet. Trianguli Rectanguli ABC , latus BC seu hypotenusa dicatur a : AC vocetur b . AB c . Area Trianguli ABC erit $\frac{1}{2} bc$. adeoque quatuor triangula facient $2 bc$: Deinde differentia laterum AB . AC erit $c - b$, ejusque □tum $cc - 2bc + bb$: quod priori areæ quatuor triangulorum additum facit $cc + bb$,
quæ

quæ summa est æolis □to aa facto
ab hypotenusa.

Cum autem ista summa exhi-
beat duo □ta laterum *AB. AC.*
sequitur etiam duo illa □ta esse
æolia □to *BC.*

Q. E. D.



Cæterum illustris hujus propositionis aliam a præcedente generalem demonstrationem hoc modo damus.

Triangulum rectangulum datum sit ABC ; laterum AB . AC . quadrata sint AD . AL : & lateris BC quadratum BH : Jam patet ad oculum quadratum BH a reliquis quadratis AD , AL , abscindere triangulum AFB & trapezium $AIHC$. Si jam, producta
DE

DE in G, & ducta NR per F
parallela BM & GK parallela
EA, demonstratur esse triangu-
lum

$$X \propto Y.$$

$$S \propto T.$$

Parallelogr. P $\propto$ Q.

Triangulum GFR $\propto$ IHM.

Certi esse poterimus de pro-
positionis veritate.

DEMONSTRATIO.

Generaliter notandum facile
posse ex præcedentibus demon-
strari omnes angulos O ut &
omnes R esse inter se æquales.

Primum $X \propto Y$.

Duo triangula X & Y habent
duos angulos O & R ut & latera
BC. CH æqualia: Ergo (26. I.)
ipsa triangula sunt æqualia.

Secundum $S \propto T$.

Duo triangula S & T , habent duos angulos O & R , & ut & latera NF . GK æqualia : Ergo (26. I.) ipsa triangula sunt æqualia. Et latus $BF \propto GI$. quibus ab æqualibus BG , GH ablatis, remanet $FG \propto IH$.

Tertium $P \propto Q$.

Quia sunt complementa parallelogrammi DK . (43. I.)

Quartum Triang. $GFR \propto IHM$.

Duo triangula GFR & IHM , habent duos angulos O & R . ut & latera FG . IH æqualia. Ergo (26. I.) ipsa triangula sunt inter se æqualia.

Ex quibus patet lateris BC quadratum BH in se comprehendere duorum reliquorum laterum AB . AC quadrata AD . AI . Ergo quadratum BH etiam
per

per Axioma 13. duobus quadra-
tis AD. AI. æquale est.

Q. D. E.

Quod autem BG concurrat
cum DE in puncto G, & CH
cum ML in H, supra demon-
stratum est.

X


De

Trianguli rectanguli ABC, laterum quadrata sunt AD. AK. BT. demonstrandum est hoc tertium BT esse $\propto$ le duobus reliquis.

Fiat AX $\propto$ AE, erit super AX factum quadratum AF $\propto$ AD. Producat KH in G ut sit HG $\propto$ XF. Ducatur AG: & per I ducatur MIN parallela AH & tandem agatur EG. Eritque HE parallelogrammum, cujus complementa EI. IH. sunt $\propto$ qualia: si utrimque addatur commune parallelogrammum MX. erit quadratum AF hoc est AD $\propto$ parallelog. MH:

Ergo totum parallelogr. MK esse $\propto$ quale duobus quadratis AD. AK.

Deinde sumatur CL $\propto$ CM, & CR $\propto$ CK. & perfecto parallel. LR (quod erit $\propto$ ipsi MK) producantur LO & TQ ut sibi occurrant in P, tum ducatur Diagonalis CS, quæ productâ cadet in P. (ut mox demonstrabitur.) Hisce factis in parallelogr. LT duo complementa LS. ST erunt (43. I.) inter se $\propto$ qualia: quibus si addatur commune parallelogr. BR, erit parallelogr. LR (hoc est duo Quadrata AD. AK) $\propto$ quadrato BT.



Ultima Demonstratio.

Intra lateris BC quadratum BR, fit $\square$ CH $\propto$ lateris AC $\square$ to Y: Quo a $\square$ to BR sublato remanebunt duo parallelogramma BO. OK. seu factio parallelogr. OS $\propto$ OK, remanebit totum parallelogrammum BT, Quod si demonstratur esse $\propto$ $\square$ to X, peracta res erit.


Quare sumta BE $\propto$ BA, construatur $\square$ tum BG $\propto$ $\square$ to X. Tum productis lateribus EG. ST, ut concurrant in N; ex B per L ducatur BLN; quæ etiam cadet in idem punctum N.

Tum in parallelogrammo BN complementa EL. LS erunt æqualia & si ab utraque parte addas commune BL. erit parallelogr. BT (hoc est BO $\perp$ OK) $\propto$ $\square$ to BG seu X.

Unde jam patet duo $\square$ ta X & Y esse æqualia $\square$ to BR.

Q. D. E.

Quod autem Diameter BL producta
 cadat in punctum N, ubi latera EG,
 ST producta concurrunt, sic probatur.



Si

LIBER PRIMUS. 167

Sit non cadat in N, tum juxta adversarium cadat.

Vel supra N in X, ut BX sit linea recta.

Vel infra N in Y, ut BY sit recta.

In X supra N.

Angulus O ∞ Q. }
 Angulus O ∞ P. } 29. I.

Ergo P ∞ Q externus interno contra 16. I.

Quæ demonstratio obtinet in omnibus punctis supra N sitis.

In Y infra N.

Angulus O ∞ Q. }
 Angulus O ∞ T. } 22. I.

Ergo Q ∞ T. iterum externus interno contra 16. I.

Eademque demonstratio locum habet in omnibus punctis infra N positis.


Ergo cum linea BL producta non possit cadere supra nec etiam infra N, necessario cadet in ipsum punctum N.

PRO-

PROPOSITIO XLVIII.

Theor.

34.



*Si quadratum ab uno
Trianguli latere CB descri-
ptum sit aequale duobus reli-
quorum laterum CA, AB
quadratis : angulus CAB,
quem reliqua ista latera con-
tinent, rectus erit.*

DEMONSTRATIO.

a II. I. Ex A ipsi AB (a) excitetur perpendicularis AD
 $\propto$ AC. & ducatur recta DB

Tum in Triangulo DAB erit.

b 47. I. Quadr. DA (hoc est AC) $\propto$ quadr. AB (b) $\propto$
 quadr. DB.

Atqui quadr. AC $\propto$ quadr. AB etiam est
 $\propto$ quadr. CB per Prop.

c Ax. I.

Ergo (c) quadr. DB $\propto$ quadr. CB.

Adcoque latus DB $\propto$ lateri CB.

Quare in Triangulis ADB, ACB.

Latus AD $\propto$ AC per constructionem.

Latus DB $\propto$ CB.

Latus AB commune.

d 8. I.

Ergo (d) etiam omnes anguli sunt; æquales
 adeoque

Ang. DAB $\propto$ CAB.

Atqui DAB est rectus.

Ergo CAB etiam rectus erit.

Q. D. E.

FINIS LIBRI PRIMI.

Eu-

E U C L I D I S

E L E M E N T O R U M

L I B E R S E C U N D U S.

IN primo libro instituta triangulorum tum quoad angulos tum quoad latera varia comparatione, & parallelogrammum non una & inter se & cum triangulis collatione, in hoc libro secundo aggreditur Euclides linearum ad librum sectarum parallelogramma Rectangula & Quadrata; docendo quomodo se habeant Parallelogramma rectangula quæ fiunt a partibus alicujus lineæ tum inter se tum relata ad Quadrata totius lineæ: sicut ex ipsis propositionibus porro manifestum evadet.

Cum autem hujus libri propositiones; licet numero non adeo multæ, tales sint, ut sua difficultate tyronum progressui haud exiguum sæpe injiciant moram, nos
Y oleum


oleum & operam non perdidisse existimabimus, si illarum demonstrationes ita ordinemus, ut quilibet illas attento perlegens studio, illisque primum librum bene perceptum rite applicans, maximam difficultatem penitus disparere comperiat.

Cæterum ne occurrentes ignotæ voces demonstrationum abrum pant cursum, hic ut & in primo libro factum est, Definitiones præmittuntur terminorum adhibendorum tollentes dubiam significationem.

DEFINITIONES.

I.

Parallelogrammum rectangulum ABCD contineri dicitur sub duabus rectis CA. AB, rectum angulum A comprehendentibus.




Antea vidimus generationem alicujus superficiei. quæ in memoriam revocata parallelogrammi rectanguli formationem intellectu reddet faciliorem.

Rectæ lineæ AB perpendiculariter insistant lineæ CA, quæ concipiatur ferri supra lineam AB, ut ipsi semper maneat perpendicularis; cum ista lineæ CA pervenerit ad punctum B: tum extremum punctum C descriptam relinquet lineam CD æqualem ipsi AB; & cum lineæ BD sit quasi eadem cum lineæ AC ex puncto

A delata in punctum B, erit linea BB
etiam æqualis ipsi AB.

Unde patet ad inveniendam totam
quantitatem seu aream alicujus paralle-
logrammi requiri tantum notam longitu-
dinem duorum laterum angulum rectum
continentium.



Quod ut adhuc clarius evadat, sicut
& arctissimam inter linearum in se invi-
cem ductum & numerorum multiplica-
tionem esse affinitatem, ponamus lineam
CA divisam esse in quatuor partes æqua-
les CP. PX. XO. OA. similiter lineam
AB

LIBER SECUNDUS. 173

AB in quinque partes, quæ prioribus æquales sint. Si jam linea CA super AB mota pervenerit ad locum 1 Q punctum C. descriptum exhibebit lineam CQ. punctum P, lineam PR : X, lineam XS. O, lineam OT ; adeoque unico isto motu facta erunt quatuor ista minora quadrata CR. PS. XT. OI, quot nim. linea CA partes habet : si enim ex pluribus constaret partibus, etiam plura constituta essent quadrata.

Facile autem intelligimus illud idem esse ac si numerus 4 ducatur seu multiplicetur per 1 seu unitatem.

Similiter si linea QI (quæ eadem jam concipienda est cum AC) secundo motu pervenerit ad punctum 2, eodem modo quatuor alia quadrata efficientur quæ prioribus addita simul 8 dabunt : id quod iterum idem est, ac si numerus 4 bis multiplicetur per 1 seu semel per 2.

Non aliter si linea AC perget moveri ; tertius motus quatuor alia prioribus adjiciet quadrata ; quatuor alia quartus ; donec tandem quintus ultima quatuor adjungendo quadrata totum parallelogrammum rectangulum perficiat & compleat : quæ omnia quadrata sibi invicem addita,

20 exhibebunt; quod rursus idem est ac si numerus 4 quinquies per unitatem seu semel per 5 multiplicatus essent; quæ operatio similiter eundem producit numerum 20.

Cæterum notandum est in sequentibus ad multiplicandum lineam AB per lineam CD, seu ad ducendam lineam AB in lineam CD: vel tandem ad designandum rectangulum comprehensum sub lateribus AB, CD. me semper scripturum $\square$ AB. CD.

Unde jam existimo manifestam satis esse rationem ob quam ad inveniendam alicujus seu omnium parallelogrammorum rectangulorum aream solummodo duorum laterum rectum angulum comprehendentium requiratur notitia.

Hinc porro apparet, quomodo cognita area parallelogrammi rectanguli, & alterutro laterum alterum inveniri possit latus; dividendo scilicet datam aream per latus cognitum: id quod in parallelogrammo ABCD clare patet, quod 20 quadrata continet; qui numerus si dividatur per 4 seu cognitum latus CA. acquiramus 5 pro latere AB. & vicissim si 20 dividatur per 5 seu latus notum AB, invenietur 4 pro altero latere AC.

N O T A.

Primo. Parallelogrammum dicitur rectangulum quod habet unum angulum rectum. Nam si unus est rectus, ^a erunt ^a 29 & & reliqui recti. ^{34. I.}

Secundo. Parallelogrammum est vel oblongum vel quadratum.

Oblongium est quod latera contigua habet inæqualia, sive quod continetur sub duabus rectis inæqualibus; illud autem nos in sequentibus semper exprimemus hoc signo $\square$; adeoque ex: gr: $\square$ AC, semper significabit parallelogrammum rectangulum AC.

Quadratum est, quod sub duabus rectis æqualibus continetur: illud etiam exprimemus tali signo $\square$ ut $\square$ CD, semper denotet Quadratum CD.

Tertio. In sequentibus nomine rectanguli Euclides semper intelligit parallelogrammum rectangulum.

Quarto. Geometræ omne parallelogrammum exprimunt, duas tantum nominando literas per diametrum oppositas: ut ad designandum parallelogrammum appositum adhibent literas AD. vel BC,

II. Omnis

II.

Omnis parallelogrammi spatii unum quodlibet eorum quæ circa diametrum illius sunt, parallelogrammorum, cum duobus complementis, Gnomon vocatur.





Figura FGEH, composita ex duobus complementis FG. EH &, quod circa diametrum est parallelogrammo GE, dicitur Gnomon seu norma; ad imitationem illius instrumenti quo fabri utuntur, ad examinandum, utrum ex. gr: duo parietes, vel duo asseres ad angulum rectum conjuncti sint nec ne.

PROPOSITIO. I.



Si fuerint dua re. Theor. I.

cta G & AB, quarum altera secta sit in quocunque partes AE. EB altera vero infecta; erit re-ctangulum sub illis

duabus G & AB comprehensum aequale re-ctangulis, quae sub infecta G, & sub singulis segmentis AE. EB continentur.

DEMONSTRATIO.

Ex punctis A & B erige duas perpendiculares AC, BD aequales datae G: & juncta CD, ex E duc rectam EF parallelam AC vel BD. Tum lineae CA, FE inter (a) se aequales erunt $\propto$ les datae G. a 34. I.

Jam $\square$ AF continetur sub CA, hoc est G & segmento AE.

Et $\square$ ED continetur sub FE hoc G est & segmento ED.

Duo autem $\square$ la AF, ED simul sunt (b) $\propto$ lia b Ax. 16. toti $\square$ lo AD quod continetur sub data & tota AB.

Ergo patet veritas propositionis.

Sub calculi formula breviter sic demonstratur

$$\begin{array}{r} AB \propto AE + EB \\ G \quad G \quad G \end{array} \quad M$$

(c) $\square$ G, AB $\propto$ $\square$ G, AE + $\square$ G, EB. c Ax. 6.
Q. D. E.

Vel in Numeris.

Sit AB. 10.
AE. 7.
EC. 3.

$$\begin{array}{r} 10 \propto 7 + 3 \\ 4 \quad 4 \quad 4 \end{array} \quad M$$


G. 4

$$\begin{array}{r} 40 \propto 28 \quad 12 \propto 48 \\ 7 \quad 7 \quad 7 \end{array} \quad Pro.$$

PROPOSITIO. II.

Theor. 2.

Si recta AB secta sit utcumque in C & D tria rectangula sub tota AB, & singulis segmentis AC. CD. DB comprehensa æqualia sunt quadrato quod fit a tota AB.



DEMONSTRATIO.

Super AB fiat quadratum BE, ducantur CG. DH parallelæ AE: quæ sunt æquales a AE. hoc est AB.

□ EC fit ab EA hoc est AB & parte AC.

□ GD fit ab GC hoc est AB & parte CD. HB

LIBER SECUNDUS. 179

$\square$ HB fit ex HD hoc est AB
& parte DB.

Cum autem tria $\square$ la EC. GD.
HB simul sumta constituent $\square$ rum
EB, patet illa etiam ipsi esse æ-
qualia. ^b

b Ax. 13.

Sub calculo.

$$\begin{array}{r} AB \propto AC + CD + DB. \\ AB \quad AB \quad AB \quad AB. \end{array} \Big) M$$

$$\square AB \propto \square AB. AC + \square AB. \\ CD. + \square AB. DB.$$

Vel in numeris.


Sit AB 10. AC 2. CD 3. Ergo DB 5.

$$\begin{array}{r} 10 \propto 2 + 3 + 5 \\ 10 \quad 10 \quad 10 \quad 10 \end{array} \Big) M$$

$$100 \propto 20 + 30 + 50 \propto 100.$$

PROPOSITIO III.

Theor. 3. *Sit recta AB secta utcunque in E, rectangulum sub tota AB & partium alterutra AE comprehensum, æquale est ejusdem partis AE quadrato, una cum rectangulo sub partibus AE. EB comprehenso.*



DEMONSTRATIO.

Ex A & B erige perpendiculares AC. BD æquales segmento
 a 34. I. AE: tum juncta CD ducatur EF
 parallela AC, quæ ipsi AC etiam
 ærit æqualis

CE

- A $\square$ CE continetur sub CA hoc est AE & segmento AE, adeoque CE est quadratum factum ab AE.
- $\square$ FB continetur sub FE hoc AE & segmento EB.

$\square$ CE cum seu $+$ $\square$ FB est æquale $\square$ CB, comprehenso sub CA hoc est segmento AE & tota linea AB. Q. E. D.

Sub calculo.

$$\begin{array}{r} AB \propto AE + EB \\ AE \quad AE \quad AE \end{array} M$$

$$\square AE. AB. \propto \square AE + \square AE. EB.$$

Vel in numeris.

Sit AB. 10. AE. 6. Ergo EB. 4.


$$\begin{array}{r} 10 \propto 6 + 4 \\ 6 \quad 6 \quad 6 \end{array} M$$

$$60 \propto 36 + 24 \propto 60.$$

PROPOSITIO. IV.

Theor. 4.

Si recta linea AB utcumque secta sit in C. Quadratum totius AB erit æquale quadratis segmentorum AC. CB, una cum bis sumto rectangulo sub segmentis AC. CB comprehenso.



DEMONSTRATIO.

46. L. Super AB fiat^a $\square$ BD, & ducta diametro BD sumatur BK $\propto$ BC.
tum

LIBER SECUNDUS. 183

tum ducantur ^b CF. KH paralle- ^b 31. I.
læ lateribus BE BA.

Jam in triangulo DEB.

Angulus $O \propto P$. quia uterque
semirectus. ^c

^c 2 Cor.
32. I.
^d 29. I.

Atqui ang. $Q \propto P$. ^d

Ergo $O \propto Q$. adeoque $DF \propto FG$. ^e 6. I.

Eodem modo probatur quod sit

Ang. $R \propto S$. ac proinde latus
 $DH \propto GH$.

Atqui in parallelogrammo GD,
latera opposita DF. HG ut & DH,
FG sunt æqualia ^f ^f 34. I.

Ergo omnia illius latera sunt
inter se æqualia.

Atqui illorum unum HG $\propto$
AC. ^g

^g 34. I.

Ergo omnia sunt æqualia se-
gmento AC. Adeoque cum o-
mnes anguli sint recti, parallelo-
grammum DFGH est quadratum
factum ab uno segmento AC.

Eodem modo facile demon-
stra-

stratur parallelogrammum CK
esse quadratum alterius segmenti
CB.

Deinde $\square$ FK continetur sub FG
hoc est AC & sub GK hoc est CB.

Denique $\square$ AG continetur sub
uno segmento AC & sub CG hoc
est CB.

Quæ duo $\square$ la si ad duo reli-
quo $\square$ ta addantur exhibebunt to-
tum $\square$ quod fit ab AB; adeoque
ipsi æqualia erunt. Q. E. D.

Per calculum hoc modo de-
monstratur.

$$\begin{array}{r} AB \propto AC \perp CB \\ AB \propto AC \perp CB^M. \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \square AC \perp \square AC. CB. \\ \perp \square AC. CB \perp \square CB. \end{array}$$

$$\square AB \propto \square AC \perp 2 \square AC. CB \perp \square CB.$$

Seu in numeris.

$$\begin{array}{r} AB \propto 10. \quad AB 10 \\ AC \propto 6. \quad AB 10 \end{array}$$

$$\text{Ergo } CB \propto 4.$$

$$\begin{array}{r} 100 \\ \hline \end{array}$$

$$4 CB$$

LIBER SECUNDUS. 185

AC 6	4 CB	6 AC
AC 6	4 CB	4 CB
36	16	24
		2
		48
		36
		16
		100

COROLLARIUM I.


Parallelogramma circa diametrum quadrati sunt quadrata.

COROLLARIUM II.

Si recta linea bifariam secetur quadratum totius lineæ quadruplum est quadrati a dimidia facti.

PROPOSITIO V.

Theor. 5. Si recta linea AB secetur in equalia in C , & non equalia in D : rectangulum AG sub inequalibus segmentis AD . DB comprehensum, una cum quadrato HF ab intermedia sectione CD , aequale est quadrato CI , quod a dimidia CB describitur.



PRÆPARATIO.

- a 46. I. 1. Super dimidia CB fiat a quadratum CI , ducaturque diameter.
- b 31. I. 2. Ex D ducatur DF lateri BI ^b parallela.
3. Sumta $BK \propto BD$, ducatur KL ^b parallela AB , ut & AL parallela BK .

De-

LIBER SECUNDUS. 187

DEMONSTRATIO.

A $\left\{ \begin{array}{l} \square CG \propto \square GI. \text{ quia sunt com-}^c 43. I. \\ \text{plementa.} \\ \square DK \quad \square DK. \end{array} \right.$

$\square CK \propto \square DI.$
Atqui $\square CK \propto \square AH.$ quia sunt d 36. I.
in iisdem parallelis & æqualibus basibus.

Ergo $\square AH \propto \square DI.$
 $\square CG \quad \square CG.$ A.

$\square AG \propto$ Gnomoni $GHBFG.$
A $\square HF \square HF$, quod fit a $CD.$
4. II.

$\square AG \perp \square HF. \propto \square CI.$ a dimidia
CB. facto.

In numeris.

Sit tota AB 10. Ergo dimidia AC, CB 5.
 AD 8. Ergo DB 2. Et CD 3.

$$\begin{array}{r} CB \ 5 \\ CB \ 5 \\ \hline \square CB \ 25 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{r} CB \\ CB \end{array}} \right\} M.$$

$$\begin{array}{r} M \ AD \ 8 \\ \quad DB \ 2 \\ \hline \square AD. DB. \ 16. \end{array}$$

Tum.

$$\begin{array}{r} CD \ 3 \\ CD \ 3 \\ \hline \square CD \ 9. \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{r} CD \\ CD \end{array}} \right\} M.$$

$$\begin{array}{r} \square CD \ 9. \\ \square AD. DB. \ 16. \\ \hline \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{r} \square CD \\ \square AD. DB. \end{array}} \right\} A.$$


$$\square ADB. \perp \square CD \ 25. \text{ ut ante.}$$

Aa 2

PRO.

PROPOSITIO VI.

Theor. 6. *Si recta AB sit bifariam secta in C, eique recta quædam BD adjiciatur; Erit rectangulum sub tota composita AD & adjuncta BD contentum una cum quadrato dimidiæ CB, æquale quadrato ipsius CD compositæ ex dimidia & adjuncta.*



PRÆPARATIO.

1. Super CD fiat $\square$ CE.
2. Ducta Diametro FD, ex Bagatur BG parallela DE.
3. Sumpta DI $\propto$ DB, ducatur IL parallela DA, ut & AL parallela DI:

De-

DEMONSTRATIO.

$\square AK \propto^a \square CH$. quia in iisdem pa- a 36. L
ral els.

Atqui $\square HE \propto^b \square CH$, quia sunt b 43. L
complementa.

Ergo $\square AK \propto^c \square HE$. } A. c Ax. 1.
 $\square CI \quad \square CI$

A $\left\{ \begin{array}{l} \square AI \propto^d \text{Gnomoni GHKDG.} \\ \square KG \quad \square KG \text{ factum a dimi-} \\ \quad \text{dia CB.} \end{array} \right.$ d Ax. 2.

$\square AI + \square KG \propto \square CE$ quod fit a CD

In numeris.

Sit linea AB 10. BD 2. Ergo tota
 AD. 12. Dimidia AB. seu AC.
 seu CB 5. Ergo CD 7.

AD 12. } M.
 BC 2.


$\square AD. DB \frac{24}{25}$ } A.
 $\square CB. \quad \frac{25}{25}$

$\square AD. DB + \square CB \frac{49}{25} \propto \frac{49}{25} \square CD.$

PROPOSITIO VII.

Theor. 7.

Si recta AB utcumque secetur in C, erunt quadrata totius AB & utriusvis segmenti CB, æqualia bis sumto rectangulo contento sub tota AB & segmento dicto CB, una cum quadrato alterius segmenti AC.



PRÆPARATIO.

1. Super ^a AB fiat $\square$ AE.
2. Sume BM $\propto$ BC, & ducantur CL
MK ^b parallelæ lateribus BE, BA. Erit-
que LE $\propto$ ^c CB.
3. Super LE fiat $\square$ EG.

De-

DEMONSTRATIO.

Duo □ta AE. EF ∞ d duobus □lis d Ax. 13.
AM. MF cum □to KL.

Atqui □ AM continetur sub AB &
BM hoc est BC.

Et □ MF continetur sub MG (quæ fa-
cile probatur esse æqualis AB, cum sit ME
∞ AC & EG ∞ CB) & GF hoc est BC

Ut & □ KL sit a KH hoc est A C altero
segmento.

Ergo patet veritas propositionis.

In numeris.

Sit AB 10. □ AB 100 | A.
AC 8. □ CB 4

Ergo CB 2. □ AB + □ CB 104.

AB 10 |
BC 2 | M.

□ AB BC 20

2
2 □ AB. BC. 40 | A.
□ AC 64

2 □ AB BC + □ AC 104.


ut ante.

Pro-

PROPOSITIO VIII.

Theor. 8.

*Si recta linea AB secetur ut-
cunque in C; eique adjiciatur
BD $\propto$ BC; Rectangulum qua-
ter comprehensum, sub data AB
& alterutro segmento CB, una
cum quadrato alterius segmenti
AC, erit æquale quadrato AF quod
fit a composita AD.*



PRÆPARATIO.

R. 46. I.

1. Super tota AD a fiat quadratum AF
2. Sumtis DK. KM æqualibus ipsi
BC. ducantur KI. ML parallelæ DA; ut
& BG. CH parallelæ AE.
3. Ducatur Diameter ED.

De-

DEMONSTRATIO.

Facile patet quatuor $\square$ la IC. IS. GS
GM esse inter se ^a æqualia, & sub æqua- ^a 36. &
libus lineis contenta. 43. I.

Et circa R constituta sunt quatuor $\square$ ta
quorum latera omnia sunt ipsi BC æqua-
lia. b Ergo si addantur ^b 3 Cor.
4. hujus.

$$\begin{array}{l} \square \text{ la IC} \quad \text{IS} \quad \text{GS} \quad \text{GM.} \quad \{ \text{A.} \\ \square \text{ ta CR} \quad \text{SR} \quad \text{RD} \quad \text{MR.} \end{array}$$

Erunt $\square$ la AR. LR. GS $\perp$ RD:
GK. omnia inter se æqualia, & con-
tenta vel sub lineis AB. BC, vel sub li-
neis quæ illis æquales sunt.

Quibus si addatur $\square$ LH factum ab
LS hoc est altero segmento AC. Tota
ista summa seu quinque istæ figuræ ex-
æquabunt totum quadratum AF factum a
composita AD. Q. D. E.

In numeris.

Sit AB 10. AC 8. Ergo CB 2.

$$\begin{array}{r} \text{AC } 10 \\ \text{CB } 2 \end{array} \Bigg| \text{M.} \quad \begin{array}{r} \text{AD } 12 \\ \text{AD } 12 \end{array} \Bigg| \text{M.}$$

$$\begin{array}{r} \square \text{ AC. CB } 20 \\ \quad \quad \quad 4 \end{array} \Bigg| \text{M} \quad \begin{array}{r} \square \text{ AD } 144 \\ \text{ut ante.} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \square \text{ AC CB } 80 \\ \square \text{ AC } 64 \end{array} \Bigg| \text{A.}$$


144.

Bb

Pro-

PROPOSITIO IX.

Theor. 9. *Si recta linea AB secetur in equalia in C, & non equalia in D; quadrata inæqualium segmentorum AD. DB. dupla sunt quadratorum AC. CD. quæ a dimidia AC & ab intermedia CD fiunt.*



PRÆPARATIO.

- I. Ex C erigatur perpendicularis CE $\propto$ AC vel CB, & jungantur AE EB.
2. Ex D ducatur DF parallela CE.
3. Ex F agatur FG parallela AB: ut & denique FA.

De-

DEMONSTRATIO.

Triangulum ACE est rectangulum & Isosceles, ergo anguli A & E sunt semirecti; ut & in ^{a32. I.} triangulo ECB anguli E & B sunt semirecti; adeoque totus angulus EAB est rectus.

Deinde in triangulo EGF, G ($\propto^b$ ECB) est rectus: ang. E ^{b29. I.} semirectus: ergo F etiam semirectus: adeoque E G $\propto$ GF. ^c

Denique in triangulo FDB angulus D ($\propto$ ECB) rectus est. Angulus B semirectus: ergo & F semirectus; adeoque latus FD $\propto$ DB. ^{c6. I.}

Hiscæ prædemonstratis.

I. In Triangulo rectangulo ACE.

$\square AE \propto \square AC + \square CE$. seu ^{d47. I.} quia AC $\propto$ CE.

$\square AE$ duplum $\square$ ti AC.

Bb 2

2. In

2. In Triangulo rectangulo
EGF.

$\square EF \propto \square EG \perp \square GF$. seu
quia $EG \propto GF$.

$\square EF$ duplum $\square$ ti GF hoc est
CD.

Ergo duo $\square$ ta *AE*. *EF* sunt
dupla $\square$ torum *AC*. *CD*.

3. Atqui in triangulo rectan-
gulo *AEF*.

$\square AE \perp \square EF \propto \square AF$.

Ergo $\square AF$ etiam duplum $\square$ to-
rum *AC*. *CD*.

4. Atqui denique in triangu-
lo rectangulo *ADF*.

$\square AF \propto \square AD \perp \square DF$ hoc
 $\square DB$.

Ergo duo $\square$ ta *AD*. *DB* sunt du-
pla $\square$ torum *AC*. *CD*.

Q. E. D.

In

In numeris.

Sit AB 10. Ergo AC. CB. 5.

AD 7. Ergo DB 3.

Et CD 2.

$$\square AD \ 49 \bigg) A.$$

$$\square DB \ 9 \bigg) A.$$

$$\square ta AD. DB \ 58.$$

$$\square AC \ 25 \bigg) A.$$

$$\square CD \ 4 \bigg) A.$$


$$\square ta AC. CD. 29 \bigg) M.$$

$$bis \ \square ta AC. CD \ 58.$$

PROPOSITIO X.

Theor.
10.

Si recta AB secta sit bifariam in C, eique adjiciatur BO; Quadrata totius compositæ AO & adjunctæ BO erunt dupla quadratorum ACCO, quæ a dimidio AC fiunt, & a CB composita ex dimidia & adjuncta.



PRÆPARATIO.

1. Ex C erigatur perpendicularis CE $\propto$ CA vel CB, junganturque AE. EB.

2. Ex E ducatur EF $\propto$ CO & parallela AO.

2. Ex F ducatur per O recta FG

FG quæ productæ EB occurrat
in G.

4. Denique agatur AG.

DEMONSTRATIO.

Triangulum ACE est rectan-
gulum & Isosceles, ergo anguli A
& E sunt a semirecti; ut & in tri-
angulo ECB anguli E & B semi-
recti sunt. a 32. I.

Deinde in triangulo EFG an-
gulus F ($\propto$ opposito C) est re-
ctus: & angulus FEG semire-
ctus, (quia angulus BEC est se-
mirectus;) adeoque alter FGE
etiam est semirectus: Ergo latus
 $GF \propto FE \propto CO$.

Denique in triangulo rectan-
gulo BOG angulus ad G semire-
ctus est: ergo etiam B semirectus;
adeoque latus $BO \propto OG$.

Hif-

Hiscæ præmissis.

1. In triangulo rectangulo ACE.

^b 47. I. $\square AE \propto {}^b \square AC \perp \square CE$. seu quia $AC \propto CE$.

$\square AE$ est duplum $\square$ ti AC .

2. In Triangulo rectangulo EFG.

$\square {}^b EG \propto \square EF \perp \square FG$, seu quia $EF (\propto CO) \propto FG$.

$\square EG$ duplum $\square$ ti EF hoc CO .

Ergo duo $\square$ ta AE . EG sunt dupla $\square$ torum AC . CO .

3. Atqui in triangulo rectangulo AEG.

$\square$ ta AE . $EG \propto {}^b \square AG$.

Ergo $\square AG$ est duplum $\square$ torum AC . CO .

4. Atqui denique in triangulo rectangulo AOG

$\square AG \propto \square AO \perp \square OG$.

Ergo duo $\square$ ta AO . OG (hoc est OB) sunt dupla $\square$ torum AC . CO .

Q. D. E.

Vel

LIBER SECUNDUS. 201

Velin numeris.

Sit AB $\propto$ 10. Ergo AC. CB. 5.

Sit BO $\propto$ 2. Ergo AO $\propto$ 12.

Et CO $\propto$ 7.

$\square$ AO 144 } A.
 $\square$ OG 4 }

$\square$ AC 25 } M.
 $\square$ CO 49 }

$\square$ ta OA. OG 148 $\square$ ta AC. CO 74 } A.
 2

Bis $\square$ ta AC. CO 148


Et

Pro

PROPOSITIO. XI.

Probl. I.

Datam rectam AB ita secare in G, ut rectangulum comprehensum sub tota linea AB & uno segmentorum BG sit aequale alterius segmenti AG quadrato.



CONSTRUCTIO.

1. Ducatur AD perpendicularis & æqualis ipsi AB.
2. Divisa AD bifariam in E, junge EB
3. Sumatur EF = EB.
4. Fac AG = AF. Et dico factum esse quod quæritur.

DEMONSTRATIO.

Supra data AB compleatur $\square$ AC, ut & supra AG $\square$ AH & Recta HG producat in I.

□

$\square$ DF. FH (hoc est FA) $\perp$ $\square$ EA
 $\propto$ $\square$ EF. (hoc est $\square$ EB. a 6. 2.

Atqui $\square$ EB $\propto$ $\square$ AB. seu $\square$ AC b 47. 1.
 $\perp$ $\square$ EA.

Ergo $\square$ DF. FH $\perp$ $\square$ EA $\propto$ $\square$ EA
 $\perp$ $\square$ AC.

Et ablato utrimque $\square$ to EA.

$\square$ DF. FH $\propto$ $\square$ AC
 $\square$ DG $\square$ DG $\backslash$ S.

c Ax. 3.

$\square$ AG $\propto$ $\square$ CG.

Atqui $\square$ AH fit a segmento AG & $\square$
 CG continetur CB hoc est AB & altero
 segmento BG.

Ergo patet factum esse quod quærebatur?


SCHOLIUM.

In numeris hæc propositio nullo solvi
 potest modo, cum radicis quadatæ ex-
 tractio, quæ hic requiritur non semper
 rationales numeros admittat.

PROPOSITIO XII.

Theor.
II.

In triangulo obtusangulo
 ABC quadratum lateris AC ,
 quod obtuso angulo opponitur,
 superat reliquorum laterum AB .
 BC quadrata, bis sumpto re-
 ctangulo, quod continetur sub
 latere CB , & sub ipsa BD
 in directum ei addita usque ad
 perpendiculararem ab altero acu-
 to angulo A cadentem.



DEMONSTRATIO.

$$\square AC \propto^a \square AD + \square DC. \quad ^a 47. I.$$

$$\text{Atqui } \square DC \propto^b \square DB + \square BC + 2 \square DBC. \quad ^b 4. II.$$

Ergo hisce in locum $\square DC$
positis.


$$\square AC \propto \square AD + \square DB + \square BC + 2 \square DBC.$$

$$\text{Atqui rursus Duo } \square ta \ AD. \ DB \\ \propto \square AB.$$

Ergo hoc in illorum locum re-
posito.

$$\square AC \propto \square AB + \square BC + 2 \square DBC.$$

SCHOLIUM I.



Hoc modo paulo aliter eadem propositio demonstrari potest.

Ex B erigatur perpendicularis BE $\propto$ BA, & ducatur EC.

Hoc facto duo triangula ABC, EBC, habent duo latera AB, BC $\propto$ qualia ipsis EB, BC: at vero angulum ABC $<$ angulo EBC: Ergo per 24. I. basis AC erit $<$ EC. Adeoque $\square$ AC $<$ $\square$ EC hoc est $\square$ tis EB s. AB & BC.

Unde patet nihil aliud requiri, quam ut inveniatur differentia $\square$ torum AC, EC.

$\square$ DC

$$\square AC \propto \square AD + \square DC.$$

$$\text{Atqui } \square DC \propto \square DB + \square BC + \\ 2 \square DBC.$$

Ergo.

$$\square AC \propto \square AD + \square DB + \square BC \\ + 2 \square DBC.$$

$$\text{Atqui } \square ta AD. DB. \propto \square to AB f. EB.$$

Ergo.

$$\square AC \propto \square EB + \square BC + 2 \square DBC$$

$$\square EC \propto \square EB + \square BC.$$

Quæ si a se invicem subtrahantur, erit
 $2 \square DBC$ differentia $\square$ torum AG. EC
 seu excessus quo $\square AC$ superat $\square EC$,
 hoc est $\square ta EB BC.$ seu $AB. BC.$


SCHOLIUM II.

Ex hac propositione deducitur gene-
 ralis Regula Geometrarum, qua ex tri-
 bus trianguli obtusanguli lateribus cog-
 nitis inveniunt basin productam vel illius
 segmentum BD. quæ imperat, ut a $\square to$
 AC demta summa $\square$ torum AB. BC, re-
 liquum dividatur per duplum baseos BC;
 quæ operatio exhibebit quæritam DB.

PROPOSITIO XIII.

Theor.
12.

In acutangulo triangulo ABC quadratum lateris AB, quod acuto angulo C opponitur, superatur a quadratis reliquorum laterum AC. BC, bis sumto rectangulo sub latere CB & sub assumpta interius linea CD usque ad occursum perpendicularis ab altero angulo acuto A cadentis.



De-

DEMONSTRATIO.

$$\begin{array}{rcl} \square BC + \square DC \propto^2 \square BC & & \\ \square CD + \square BD & & \\ \square AD & & \square AD \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} \square BC + \square DC \propto^2 \square BC \\ \square CD + \square BD \\ \square AD \end{array}} \right\} A. \quad 27. II.$$

$$\square BC + \square AD + \square DC \propto \square AD \\ + \square DB + 2 \square BCD.$$

Atqui duo $\square$ ta AD. DC
 $\propto \square$ AC.


Et duo $\square$ ta AD. DB $\left. \vphantom{\begin{array}{l} \square BC + \square AD + \square DC \propto \square AD \\ + \square DB + 2 \square BCD \end{array}} \right\} 47. I.$
 $\propto \square$ AB.

Ergo his in illorum locum
 substitutis.

$$\square BC + \square AC \propto \square AB + 2 \square \\ BC. CD.$$

Q. E. D.

Alia demonstratio.



Triangulum acutangulum sit, FBC , demonstrandum est duo $\square$ ta FB . BC , superare $\square$ FC per duplum $\square$ CBG .

Ex B erigatur perpendicularis $BE \propto BF$, & ducatur EC , tum duo triangula EBC . FBC , habebunt duo latera EB . BC , $\propto$ lateribus FB . BC & angulum $EBC < FBC$: quare per 24. I. latus EC erit $< FC$. Adeoque EC hoc est duo $\square$ ta EB . seu FB . BC erunt $< \square$ FC .

Unde

nitur angulo obtuso ABC. alterum vero acuto FBC.

$$\left. \begin{array}{l} \square AC \propto \square AB + \square BC + 2 \square DB.BC. \quad 12. II. \\ \square CF \propto \square FB \text{ seu } \square AB + \square BC + 2 \square BG.BC. \quad 13. II. \end{array} \right\} S$$

$$\begin{array}{l} \square AC - \square CF \propto 2 \square DB.BC + \\ 2 \square BG.BC. \\ \text{seu } 2 \square DG.BC. \end{array}$$

Ex quo calculo sequitur hoc
Theorema.

Si triangulum obtusangulum ABC cum acutangulo FBC latera AB. BC lateribus FB. BC æqualia habeat ; quadratum lateris obtuso angulo oppositi AC, superabit quadratum lateris acuto angulo oppositi FC, per duplum rectangulum quod fit a basi BC, & DG inter duas perpendiculares AD. FG intercepta.

Scho -


SCHOLIUM II.

Hinc iterum fluit Geometrarum regula ad inveniendum baseos segmentum CD , ex tribus trianguli acutanguli lateribus cognitis: quod invenitur si a summa $\square$ torum $AC. CB.$ (circa angulum segmento adjacentem) subtrahatur $\square AC$, & reliquum per duplam basin BC dividatur.

PROPOSITIO XIV.

Prob. 2.

Dato rectilineo A. æquale quadratum constituere.



CONSTRUCTIO.

45. I. 1. Constituatur $\square$ BD $\propto$ rectilineo A: quod si habeat latera æqualia. obtinemus quadratum quæsitum. Si vero non tum.
2. Producaturlatus DC in F, ut CF sit $\propto$ CB.
3. Linea DF bisecta in G, centro G radio GD vel GF describe semicirculum DHF.
4. Latus BC producaturlatus ad semicirculum in H.

Dico $\square$ CH esse $\propto$ rectilineo A.

De.

DEMONSTRATIO.

$\square DC. CB$ (feu CF) $\perp$ $\square GC$ b ∞ b 5. II.
 $\square GF. f. \square GH.$

Atqui $\square GH$ ∞ $\square GC$ $\perp$ $\square CH.$ c 47. I.
 Ergo his in illius locum substitutis.

$\square DC. CB$ $\perp$ $\square GC$ ∞ $\square GC$ $\perp$
 $\square CH.$

Si auferatur utrimque $\square GC.$

$\square DCB$ ∞ $\square CH.$

Atqui $\square DCB$ ∞ rectilineo A
 per constr.

Ergo $\square CH$ etiam est ∞ eidem
 rectilineo A.

Q. E. D.

Elementorum Libi Secundi Finis.


EUCLIDIS

ELEMENTORUM

LIBER TERTIUS.


DEFINITIONES.

I.



Æquales circuli sunt, quorum diametri AB. BC. sunt æquales: vel quorum, quæ ex centris D. & E. rectæ lineæ DF. EG. sunt æquales.

II.




Recta circulum tangere dicitur, quæ cum circulum tangat puta in B. si producat in C. circulum non se-

cat.


III.

III.



Circuli se mutuo tangere dicuntur qui sese mutuo tangentes ut in A. sese mutuo non secant.

IV.



In circulo æqualiter distare à centro rectæ dicuntur, cum perpendiculares DE. DF. à centro D. ad ipsas AB. CK.


ductæ æquales sunt; longius autem abesse dicitur GH. in quam major perpendicularis DI. cadit.

V.




Segmentum circuli, est figura quæ sub recta AB. & circuli peripheria ACB. comprehenditur.

VI.




Segmenti autem
angulus est CAB.
qui sub recta linea
A B. & circuli
peripheria C A. comprehenditur.

VII.



In segmento au-
tem angulus est puta
ABC. cum in se-
gmenti circumfere-
ntia sumptum fuerit
punctum quodpiam B. & ab eo in
terminos rectæ AC. segmentum
terminantes, lineæ rectæ ut BA.
BC. fuerunt ductæ.


VIII.



Cum vero com-
prehendentes angu-
lum DAB. rectæ
AD. AB. aliquam
assumunt peripheri-
am ut BCD. illi
angulus dicitur insi-
stere.


IX.

IX.



Sector circuli est, cum ad ipsius circuli centrum A. angulus BAC. fuerit constitutus: comprehensa nimirum figura & à rectis AB. AC. angulum BAC. continentibus, & à peripheria BC. ab illis assumpta.


X.



Similia circuli segmenta sunt ABC. DEF. quæ angulos BAC. EDF. capiunt æquales, aut in quibus anguli CBA. FED. inter se sunt æquales.

PROPOSITIO I.

Probl. I.



*Dati circuli
ABC centrum F
reperire.*

CONSTRUCTIO.

- a 10. I. 1. Ducta quælibet AC, ^a dividatur
bifariam in E.
- b 11. I. 2. Ex E erigatur utrinque ^b perpen-
dicularis BD usque peripheriam.
3. Illa bifariam dividatur in F.
Dico punctum F esse centrum
circuli.

DEMONSTRATIO.

Centrum aut est in BD, aut extra
illam.

Si sit in BD, necessario est in puncto,
quod illam dividit bifariam; quia Circuli
radii sunt æquales; adeoque centrum est
in F.

Si juxta Adversarium sit extra BD,
ponatur illud ex: gr: in G: tum ductis
AG.

LIBER TERTIUS. 221

AG. EG. CG in triangulis GEA.
GEC.

Latus GA $\propto$ GC. quia ponuntur radii. ^{c Def. 15. I.}

Latus EA $\propto$ EC. per constructionem.

Latus GE commune.

Ergo omnes anguli sunt æquales ^{d 8. I.}
adeoque Ang. GEA $\propto$ GEC.

Ergo $\angle$ GEA est rectus.

Atqui BEA est rectus per constructio- ^{e Def. 10. I.}
nem.

Ergo ang. GEA $\propto$ BEA. totum &
pars, quod est absurdum.

Et eadem demonstratio obtinet in
omnibus punctis quæ possunt assignari ex-
tra lineam BD: unde concludendum est
illud extra BD non reperiri.

Ergo in BD. & quidem ejus puncto F
illud erit. Q. E. D.


COROLLARIUM.

Si linea recta in Circulo aliam lineam
rectam bifariam & ad angulos rectos se-
cat; in illa secante erit centrum.

PROPOSITIO. II.

Theor. I.

*Si in peripheria Circuli ADC
duo qualibet puncta A. C. su-
mantur, recta AC, que per il-
la ducitur, intra circulum ca-
dit.*



DEMONSTRATIO.

Ex invento Centro E. ductis radiis
EA. EC, ad rectam AC ducatur EB.

Tum in Triangulo. EAC.

Latus EA $\propto$ EC quia radii.

Ergo ang. A $\propto$ C. 5. I.

Atqui

Atqui externus EBA $\angle$ interno C . a 16. L.

Ergo EBA etiam $\angle$ A .

Adeoque in triangulo EBA latus EA oppositum angulo maximo erit b $\angle$ latere EB . b 19. L.

Atqui latus EA pertingit tantum ad peripheriam.

Ergo latus EB cadit intra circulum.

Et eadem demonstratio applicari potest ad omnia puncta lineæ AC .

Ergo tota linea AC cadit intra Circulum. Q. E. D.

COROLLARIUM.


Linea recta Circulum tantum in uno puncto tangit.

PROPOSITIO III.

Theor. 2.

P A R S I.

*Si in circulo recta quedam
CE per centrum A ducta, aliam
BD non per centrum ductam,
bifariam in F secet; etiam illam
ad angulos rectos secabit.*



P A R S II.

*Et si ad angulos rectos eam se-
cet; bifariam quoque secabit.*

DEMONSTRATIO.

Pars I. Ductis radiis AB. AD, in tri-
angulis AFB. AFD.

Latus

Latus AB $\propto$ AD quia radii.

Latus FB $\propto$ FD per propositionem.

Latus AF commune.

Ergo omnes anguli sunt inter se æquales, per 8. I. adeoque Ang. AFB $\propto$ AFD. qui propterea sunt a recti.

a Def.
10. I.

Pars 2. In iisdem triangulis AFB. AFD.

Ang. ABF $\propto$ ADF. qui triang. BAD est Ifofceles.

Ang. AFB $\propto$ AFD per propositionem.

Latus AF commune.

Ergo latus BF $\propto$ FD.

b 26. I.


Q. E. D.

COROLLARIUM.

In omni triangulo æquilatero, seu Ifofcele lineare recta basin bifariam secans, ad eandem perpendicularis est & contra.

Theor. 3.

PROPOSITIO. IV.



Si in circulo duæ rectæ AB. DC non ambe per centrum ductæ, se invicem secent: illæ sese non secabunt bifariam.

DEMONSTRATIO.

Duplex hic obtinet casus.

Casus I. Aut una tantum transit per centrum, ut ex: gr: FE, patet illam ab altera CB non secari bifariam: quia illa per hypothesein non transit per centrum.

Casus 2. Aut neutra transit per centrum.

Si jam Adversarius contendat duas lineas AB. DC se mutuo secare bifariam in E, ex centro F, ducatur recta FE.

Tum FE secat AB bifariam. Ergo ^{a 3. III.} ang. FEB est rectus.


Eadem FE secat DC bifariam. Ergo ^a ang. FEC est rectus.

Ergo erit ang. FEB $\propto$ FEC. Totum & pars: quod est absurdum.

PRO-

PROPOSITIO V.

Theor. 4.



*Si duo circuli BDCB.
BEC, sese mutuo secant
non habebunt idem cen-
trum.*

DEMONSTRATIO.

Si quis ponat A esse commune utrius-
que centrum, ducatur AB ab illo centro
A ad punctum intersectionis B, ut & AD.

Linea AB $\propto$ AD; quia radii circuli
BDC.

AB $\propto$ AE. quia radii circuli
BEC.

Ergo AD $\propto$ AE. Quod est absurdum. a Ax. I.


At eadem demonstratio obtinet in
omnibus punctis, quæ intra commune
utriusque circuli spatium sunt posita.

Ergo universim patet veritas propo-
sitionis. Q. D. E.

Theor. 5.

PROPOSITIO VI.

*Si duo circuli BA . BC se
mutuo interius tangant in B :
non erit illorum idem centrum.*



DEMONSTRATIO.

Si contendat aliquis punctum
ex: gr: D esse commune illorum
centrum; ductis DB . DC erit.

$DB \propto DC$. quia sunt radii cir-
culi BC .

$DB \propto DA$, quia sunt radii cir-
culi BA .

Ergo

Ergo $DC^a \propto DA$. Totum & Ax^a 1.
pars: quod est absurdum.

Adeoque cum eadem demon-
stratio omnibus punctis utriusque
circulo communibus possit appli-
cari, non habebunt isti circuli
unum & idem centrum.

Q. E. D.

Theor. 7.

PROPOSITIO VII.

Si in circulo quovis extra centrum F accipiatur punctum G , ex quo quædam rectæ GA . GC . GD . GE . GN . in circulum cadant.


Tum

1. *Maxima erit GA , quæ per centrum F transit.*

2. *Minima erit reliqua diametri pars GB .*

3. *Aliarum vero major est GC , quæ maximæ GA propter.*

4. *Neque plures quam duæ ab illo puncto G ad circumferentiam duci possunt æquales.*



De-

DEMONSTRATIO.

Pars 1. Du^{ct}a FC. in triangulo GFC
Duo latera GF. FC <^a GC.

a 20. I.

Atqui GF. FC $\propto$ GA. quia FC
 $\propto$ FA.

Ergo GA < GC.

Pars 2. Du^{ct}a GE. In Triangulo FGE
Duo latera FG. GE ^a < FE. hoc
est FB.

FG

FG/ S

GE ^b <

GB.

b Ax. 4.

Pars 3. Du^{ct}a GD, in triangulis
CFG. DFG.

Latus CF $\propto$ DF.

Latus FG utrique commune.

Sed Ang. CFG < DFG.

Ergo basis CG ^c < DG.

c 24. I.

Pars 4. Pater ex præcedentibus; nam
si tres possent æquales GD. GE. GN du-
ci; tum forent duæ GD. GE ad ean-
dem partem inter se æquales.

Quod repugnat parti 3.

PRO-

Theor. 7.

PROPOSITIO VIII.

Si a puncto A extra circulum accepto ad circulum ducantur quadam rectæ AH. AG. AF.

1. *Earum quæ in eam peripheriam incidunt maxima erit AH, quæ per centrum L transit.*


2. *Aliarum major est ea, AG, quæ maximæ AH propior.*

3. *Extra circulum minima est AB, quæ producta per centrum transit.*

4. *Quæ minime propior AC remotiore AE minor erit.*

5. *Non*

5. Non plures quam due ex dicto puncto A in peripheriam duci possunt aequales sive intra circulum sive extra.



DEMONSTRATIO.

Pars I. Ducta recta LG. in triangulo ALG.

Duo latera ^a AL. LG $\triangleleft$ AG. ^{a 20. I.}

Atqui AL. LG $\propto$ AH.
quia LG $\propto$ LH.

Ergo AH $\triangleleft$ AG.

Gg

Pars

Pars 2. Ducta linea LF, in triangulis
ALG. ALF.

Latus AL utrique commune.

Latus LG $\propto$ LF. quia sunt radii.

Atqui ang. ALG $<$ ALF.

b 24. I.

Ergo basis AG $b <$ basi AF.

Pars 3. Ducta LC. in triangulo ACL.

Duo latera AC. CL. $b <$ AL. } S
CL. $\propto$ BL. }

c Ax. 4.

Remanet AC $<$ c AB.

Pars 4. Ducta LE, in triangulis AEL
ACL,

Duo latera exteriora

d 21. I.


AE. EL $d <$ AC. CL. } S
LE $\propto$ LC. }

Remanet AE $<$ AC.

Pars 5. Patet ex præcedentibus; nam
ducta AI $\propto$ AE. quæ intra AI ducitur
erit illâ minor; quæ extra. illâ major:
adeoque ex A non possunt duci plures
quam duæ quæ sint æquales. Q. E. D.

PROPOSITIO IX.

Theor. 8.



*Si ab aliquo intra
Circulum puncto A plu-
res quam duæ rectæ aqua-
les AB. AC. AD ad pe-
ripheriam duci possint :
Illud punctum erit cen-
trum.*

DEMONSTRATIO.

Ductas rectas DC CB. divide bifariam
in F & E per rectas FA. EA.

Tum in triangulis AFD. AFC.

Latus AF utrique commune.

Latus AD $\propto$ AC. per propositionem.

Latus FD $\propto$ FC. per constructionem.

Ergo Ang. AFD a $\propto$ AFC, & uter-
que brectus: adeoque in perpendiculari
FA erit centrum. c

a 8. I.

b Def.

10. I.

c Coroll.

1. III.

Deinde eodem modo per triangula
AEC. AEB demonstratur centrum etiam
esse in perpendiculari EA.

Ergo necessario erit in puncto interse-
ctionis A. quia duæ lineæ FA. EA præ-
ter illud nullum habent commune.


Q. E. D.

G g 2

Tro-

PROPOSITIO X.

Theor. 9.



*Duo circuli
ADE. AFC se
mutuo non secant in
pluribus quam duo-
bus punctis.*

DEMONSTRATIO.

Juxta Adversarii opinionem
ponantur se invicem secare in
tribus punctis A. E. C. Tum ex
invento circuli ADE centro G.
ducantur rectæ. GA. GE. GC :
quæ sunt æquales: quia sunt ra-
dii circuli ADE.


Atqui tres istæ æquales GA. GE GC
etiam pertingunt ad peripheriam alterius
circuli AFC: ergo punctum G illius
quoque a erit centrum.

a 9. II. Adeoque duo circuli se invicem secan-
tes haberent idem centrum. b quod est
absurdum.

PROPOSITIO XI.

Theor.
10.

Si duo circuli se interius tangant in A, recta FG illorum centra F. G. conjungens, si producat, transibit per contactum A.



DEMONSTRATIO.

Si juxta Adversarium non cadat in A, cadat alioquin in D.

Gg 3

Tum

Tum

S { Recta $FGD \propto FGA$ quia sunt
radii majoris circuli.
FG FG

$GD \propto GA.$

Atqui $GB \propto GA.$ quia sunt radii minoris circuli.

Ergo $GD \propto GB.$ Totum & pars. quod est absurdum.


Atqui eadem demonstratio habet locum quandiu inter puncta D & B manet aliquod interstitium; seu quandiu illa puncta non coincidunt hoc est quandiu linea GD non transit per contactum.

Ergo FG producta cadit in contactum $A.$

Q. E. D.

Scho-

SCHOLIUM.



Potest hæc propositio sic converti.

Si duo circuli se mutuo interius tangant, & a puncto contactus B, ad centrum unius circuli ducatur Recta, tum in illa aut illius producta quoque erit centrum alterius circuli.

DEMONSTRATIO.

Duplex hic obtinet casus: Aut enim ducta est BA ex contactu ad

ad centrum majoris circuli: Aut ducta est BC ex contactu ad centrum minoris circuli C.

CASUS I.

Si centrum minoris circuli non sit in linea BA, sit extra illam in puncto G. ducantur lineæ BG & AD per G.

A. $\left\{ \begin{array}{l} GE \propto GB. \text{ quia sunt radii minoris} \\ \text{circuli.} \\ AG \propto AG. \text{ juxta Adv.} \end{array} \right.$


$$AE \propto AG \perp GB.$$

$$\text{Atqui } AG \perp GB < AB. \text{ f. AD. 20. I.}$$

Ergo $AE < AD$. pars major toto.

Et eadem demonstratio habet locum in omnibus punctis assignatis extra lineam BA. Ergo centrum minoris circuli reperitur in linea BA.

CASUS II.



Sit centrum majoris Circuli extra rectam BC, aut illius productam, in puncto F. Ducantur BF & DF per C.

Eritque

$\frac{A}{CE} \propto \frac{CB}{CF}$ quia radii minoris circuli.

$FE \propto FC \perp CB,$

Atque $FC \perp CB < FB$ s. $FD.$


Ergo $FE < FD.$ pars toto.

Q. E. A.

Theor.
II.

PROPOSITIO XII.

Si duo circuli se invicem exterius contingant in B. Recta quæ illorum centra conjungit, per contactum transibit.



DEMONSTRATIO.

Si Adversarius hoc neget; sint si fieri potest centra ita constituta, ut recta FG. illa conjungens non transeat per punctum contactus B, sed circulos secet in C & D. Tum ductis FB. GB, in triangulo FBG.

La-

Laterā FB. BG : < FG.

a 20. I.

Atqui FB. BG $\propto$ partibus FC.
GD.

Ergo FC. GD < tota FG.
quod est absurdum.


Eadem demonstratio vim habebit quandiu puncta C & D non coincidunt : quod solummodo fit in puncto contactus B. Ergo linea centra conjungens per illud transire debet.

Q. E. D.

Theor.
12.

PROPOSITIO XIII.

Circulus circulum non tangit in pluribus punctis quam uno; siue intus, siue extra tangat.



DEMONSTRATIO.

Casus I. Circulus ABC tangat (juxta Adversarium) in duobus punctis A & B: Tum recta FE, tendet a ad puncta contactus A & B; ducatur FB.

a. r. II. Tum recta FE, tendet a ad puncta contactus A & B; ducatur FB.

FE $\perp$ EB $\propto$ FA, quia sunt radii ejusdem circuli.


At-

Atqui $FB \propto FA$ propter eandem rationem.

Ergo $FE \perp EB \propto FB$. Quod est absurdum. ^{b 20. I.}

Casus II. Circulus ABC (si non in uno) in duobus punctis tangat circulum ABD. sc. in A & B, Recta FE quæ centra conjungit transit per contactum ^{c 12. II.} A:

Atqui (juxta adversum, qui etiam contactum in B ponit) illa etiam transit per B, ut linea FBE sit linea recta.



Ergo hinc sequeretur duas rectas FBE, FAE comprehendere spatium. Quod est absurdum.

^{d Ax. 12.}


PROPOSITIO. XIV.

Theor.

13.

1. *Æquales rectæ AB. DC in circulo æqualiter a centro distant.*

2. *Et æqualiter a centro distantes inter se æquales sunt.*



DEMONSTRATIO.

PARS I.

23. III. Ex centro E ductæ perpendiculares EF. EG, lineas^a AB. DC bisecabunt; & quia totæ sunt æquales erunt & semissæ AF. DG æquales: ducantur radii EA. ED.

In triangulis rectangulis AFE DGE.

$\square$ ta $AF.FE \propto \square AE$
 $\square$ ta $DG.GE \propto \square DE$ } 47. I.

Atqui $\square AE \propto \square DE$. quia fiunt
 a radiis.

Ergo $\square$ ta $AF.FE. \propto \square$ tis $DG.GE$
 $S \square AF \propto \square DG$.

Remanet $\square FE \propto \square GE$.

Ergo linea $FE \propto GE$ adeoque
 distantia æquales.

PARS II.

Supra erant

$\square$ ta $AF.FE \propto \square$ tis $DG.GE$ } S
 $\square FE \propto \square GE$.

$\square AF \propto \square DG$.

Ergo ipsa $AF \propto DG$. & ipsarum
 dupla.

$AB^b \propto DC$.


Q. D. E.

^b Ax. 6.

Pro-

Theor.
14.

PROPOSITIO XV.



I. In cir-
culo *ABCD*
rectarum in-
scriptarum
maxima est
Diameter
AF.

2. Reliquarum vero ea *BE* ma-
jor quæ centro propior.

DEMONSTRATIO.

Pars I. Ductis *GB*, *GE*. in triangulo
BGE.

a 20. I. Duo latera a *BG*, *GE* $<$ *BE*.
Atqui BG , *GE* $\propto$ *AF*. Diametro.

Ergo $AF < BE$.

Pars II. Ductis *GC*, *GD* : in triangulis
BGE, *CGD*.

Latus $BG \propto CG$ Quia sunt

Latus $GE \propto GD$ radii.


At ang. $BGE < CGD$.

b 24. I. Ergo basis BE $<$ *CD*.

Q. D. E.

Pro-

PROPOSITIO XVI.

Theor.
15.

Si per extremitatem diametri A ducatur perpendicularis FE.

1. Illa cadet extra circulum.

2. Neque inter ipsam & circulum

alia recta ad contactum A duci potest, quæ circulum non secet.

DEMONSTRATIO.

Pars I. Ex centro D ad quodlibet punctum F ducta DF, erit in triangulo DAF.

Angulus A $\angle$ F. quia angulus A rectus.

Ergo Latus (a) DF $\angle$ latere DA.

a 19. I.

Atqui DH ∞ DA. quia sunt radii.

Ergo DF $\angle$ DH. Adeoque quia punctum H est in circumferentia erit F extra.

Idem ratiocinium omnibus punctis lineæ FAE potest applicari: adeoque tota FE (excepto puncto A) erit extra circulum.

Pars 2. Ponat adversarius rectam AB posse duci inter AE. & circulum absque circuli sectione. Ex centro D ad AB ducatur perpendicularis DK. Eritque in triangulo DKA.

Ii

Ang.

b 19. I.

Ang. $\angle DKA < \angle DAK$.Ergo latus $DA^b < DK$.


Atqui DA pertingit ad peripheriam.
Ergo cadit DK intra Circulum; adeoque linea AK illum secat.

COROLLARIUM.

Hinc rursus paret rectam lineam Circulum tantum in uno puncto tangere : nam demonstratum est totam rectam FE cadere extra circulum excepto unico puncto A ; adeoque in illo se tantum contingunt.

PROPOSITIO XVII.

Probl. 2.



*A dato puncta
A rectam lineam
AC ducere quæ
circulum datum
BCD tangat.*

CONSTRUCTIO.

1. Ex puncto A ad centrum ducatur recta AD.
2. Centro D radio DA describatur circuli arcus AE.
3. Ex puncto B erigatur perpendicularis BE.
4. Juncta ED, ducatur AC.
Dico lineam AC tangere circulum.

DEMONSTRATIO.

In triangulis ADC, EDB.

Latus AD $\propto$ ED. Quia sunt radii eo-

Latus DC $\propto$ DB eundem circulorum.

Angulus D communis.

Ergo $\angle$ Ang. ACD $\propto$ EBD.

a 4. I.

Atqui Ang. EBD est rectus per const.


Ergo etiam ACD est rectus : adeoque
linea AC b tangit circulum.

b 16. III.

I i 2.

Pro-

PROPOSITIO XVIII.

Theor.
16.

*Si recta linea AB tangat circum-
lum, quæ ex cen-
tro D ad conta-
ctum C ducitur
DC; illa tangen-
genti AB perpendicularis erit.*

DEMONSTRATIO.

Si neget Adversarius; Sit alia quæ-
dam DB perpendicularis ad tangentem:
tum in triangulo DCB,

Angulus DBC $\angle$ DCB. juxta Ad-
versarium.

a 19. I.

Ergo latus DC $\angle$ DB. a


Atqui DC ∞ DE.

b Ax. 9.

Ergo DE $\angle$ DB. Pars major to-
to: quod est, b absurdum. Et eadem de-
monstratio habet locum in omnibus pun-
ctis lineæ CB.

PRO-

PROPOSITIO XIX.

Theor.
17.

*Si recta linea AB
tangat circulum, &
ex contactu C ducatur
perpendicularis
CE in illa erit cen-
trum.*

DEMONSTRATIO.

Si hoc ab Adversario negetur ; alibi
centrum assignare debet : Sit hoc in F :
tum ducta FC erit

Ang. ECB rectus. per proposit.

Atqui FCB ^a etiam rectus juxta posi- a 18. III.
tionem Adversarii.

Ergo ECB $\propto$ FCB. Totum & pars:
quod est absurdum.

Eadem autem demonstratio locum ha-
bet ubicunque ab adversario centrum po-
natur extra lineam CE.

Ergo in linea CE reperitur centrum.


Q. E. D.

Theor.
18.


PROPOSITIO XX.

Angulus ad Centrum GEB duplus est anguli GDB ad peripheriam, cum idem arcus GB est basis angulorum.

DEMONSTRATIO.




Casus I. In triangulo Iſoscele
 Angulus GEB $\propto$ ang. D + B. 16.I.
 Atqui D $\propto$ B. 5. I.
 Ergo GEB, duplus anguli D.



Casus 2. Ducta AF per centrum E;
 A } Ang. BEF duplus ang. BAF. } per ca-
 } Ang. CEF duplus ang. CAF } sum. I.

 Totus BEC duplus totius BAC.




Casus 3. Totus Ang. GEC est
 duplus totius GDC.
 Partialis GEB est duplus par- } S
 tialis GDB.

Remanet BEC duplus BDC, Q. E. D.
 PRO.

PROPOSITIO XXI.

Theor.
19.

*In circulo, qui eidem arcui BC
insistunt anguli BAC. BDC, seu
qui sunt in eodem segmento, sunt
inter se æquales.*



DEMONSTRATIO.

Angulus BEC est duplus BAC
Atqui id. BEC est duplus BDC } 20. III.


Ergo BAC æ BDC.

Ax. 7.

Pro

PROPOSITIO. XXII.

Theor.
20.



Quadrilateri
circulo
inscripti
ABCD
anguli op-
D. B. positi
duobus
rectis sunt
aequales.

DEMONSTRATIO.

Ductis diagonalibus AC. BD.

$\left. \begin{array}{l} \text{Ang. } O \propto Q. \text{ }^a \text{ quia insistant arcui } AB. \\ \text{Ang. } S \propto R. \text{ }^a \text{ quia insistant arcui } CB. \end{array} \right\} A.$

$\left. \begin{array}{l} \text{Totus angulus } ADC \propto Q + R. \\ \text{Angulus } ABC \propto ABC. \end{array} \right\} A.$

Duo anguli ADC. ABC $\propto$ tribus
 $Q + R + ABC.$

Atqui hi tres sunt $\propto 2$ Rectis.

Ergo & duo ADC + ABC


$\propto 2$ Rectis.

Q. E. D.

Theor.
21.

PROPOSITIO. XXIII.

Si super eadem recta DF constituta sint duo segmenta circulorum inæqualia; illa non sunt similia.



DEMONSTRATIO.

Si contendat Adversarius illa esse similia; ducantur rectæ FE. ED. DI.


Ang. DEF $\propto$ DIF juxta a Adversarium
a Def. 10. III. Atqui DEF $>$ DIF. per 16. I.

Quæ duo sunt contradictoria.

Pro-

PROPOSITIO XXIV. Theor.
22.

*Segmenta similia ACB. DEF,
super aequalibus rectis AB. DF
constituta, inter se sunt aequalia.*



DEMONSTRATIO.

Superponatur AB ipsi DF, aut congruent aut non.

Si non : tum peripheria ACD.


Vel cadet tota intra vel extra peripheriam DEF : contra præcedentem.

Vel interfecabit peripheriam DEF : tunc circulus circulum secabit in pluribus quam duobus punctis : contra 10. hujus.

Ergo congruent : adeoque sunt $\alpha \alpha$ a Ax. 8.
qualia. Q. E. D.

Probl. 3.

PROPOSITIO XXV.



*Circuli datum
arcum ABD
perficere.*

CONSTRUCTIO.

1. Tria puncta ad libitum sumpta
A. B. D. jungantur rectis AB. BD.
2. Dividantur bifariam per perpendicularares EC. FC.

Dico in illarum intersectionis puncto C esse arcus dati centrum quæsitum.

DEMONSTRATIO.

Centrum est in perpendiculari EC.
Ut & in perpendiculari a FC.

a Cor.
I. III.

Ergo est in puncto intersectionis;
quia illud tantum habent commune, &
circuli unicum tantum est centrum.


Adeoque ex centro C arcus perfici poterit. Q. E. F.

Pro-

PROPOSITIO XXVI.

Theor.
23.

*Si in circulis æqualibus anguli
sive ad centra. G. H, sive ad pe-
ripheriam B. E. sint æquales :
tunc etiam arcus AC. DF, qui-
bus insistant, erunt æquales.*



DEMONSTRATIO.

Ductis rectis AC. DF. in triangulis
AGC. DHF.

Latus AG $\propto$ DH } Quia sunt radii cir-
Latus GC $\propto$ HF } culorum æqualium.
Angulus G $\propto$ H. per propositionem.

Ergo Basis AC $\propto$ DF.

a 4. L.

Fiant jam anguli B. E. ad periphe-
riam ductis AB. BC. DE. EF.

b Def. 10.
III.

Quia autem angulorum ad centra G.H. æqualium semisses ad peripheriam B.E. etiam sunt æquales; segmenta ABC DEF erunt b similia: adeoque quia super æqualibus rectis sunt constituta, erunt æqualia: Quæ si a totis circulis æqualibus auferantur remanebunt arcus AC. DF inter se æquales.

Pars 2. Hæc eodem fere ratiocinio demonstratur.

Sed notandum in parte prima figuras debere considerari sine angulis ad peripheriam; qui in demonstratione demum construi debent.

Sic etiam in parte secunda spectari debent absque angulis ad centra, quos demonstratio demum requirit.


Adeoque utriusque partis demonstratione ambo anguli & ad centra & ad peripheriam exiguntur: cum per illos demonstraretur æqualitas rectarum; per hos vero similitudo segmentorum; quæ utraque necessaria sunt.

PROPOSITIO XXVII.

Theor.

24.

Si in aequalibus circulis arcus AI. DF. sint aequales, anguli illis insistentes sive ad centra G. H. sive ad peripherias. B. E. sunt inter se aequales.



DEMONSTRATIO.

Pars I. Si non sit angulus $G \cong H$.

Erit $G > H$.

Vel $G < H$.

Sit $G > H$. fiatque

Angulus $AGC \cong H$.

Ergo ^a Arcus $AC \cong DF$.

Atqui Arcus $AI \cong DF$ per-proposit. ^a 6. III.

Ergo Arcus $AC \cong AI$. Totum & pars: quod est absurdum. Ergo angulus G non est minor H .

Eodem modo probatur angulum G non esse majorem angulo H .

Ergo sequitur G esse æqualem A .


Pars 2. Hæc facile eadem formula demonstratur. Pro-

PROPOSITIO XXVIII.

Theor.

25.

Si in circulis æqualibus ductæ sint æquales rectæ AC. DF : erunt etiam, quos auferunt, arcus AC. DF inter se æquales.



DEMONSTRATIO.

Ductis rectis GA. GC : HD. HF, in triangulis AGC. DAF.

Latus AG $\propto$ DH. Quia radii æqua-

Latus GC $\propto$ HF. lium circularum.

Basis AC $\propto$ DF. per propositionem.

^a 8. I.
^b 26. III.

Ergo Ang. AGC ^a $\propto$ DHF.


Adeoque arcus AC ^b $\propto$ DF.

Q. E. D.

PROPOSITIO XXIX.

Theor.
26.

Si in æqualibus circulis arcus AC. DF sint æquales; erunt & subtendentes rectæ AC. DF inter se æquales.



DEMONSTRATIO.

Ductis GA. GC. HD. HF. erunt in triangulis AGC. DHF.

Latus GA $\propto$ HD } Quia sunt radii æ-
Latus GC $\propto$ HF } qualium circulorum.

Angulus C $\propto$ a H. quia arcus AC po- a 27. III.
nitur æqualis DF.


Ergo basis AC b $\propto$ DF.

b 4. I.

Q. D. E.

Probl. 4.

PROPOSITIO XXX.



*Datum cir-
culi arcum ABC
bifariam seca-
re.*

CONSTRUCTIO.

1. Ducatur recta AC, dati arcus ex-
tremities conjungens.
2. Illa per perpendicularem DB, bi-
secetur.

Dico Arcum bisectum esse in B.

DEMONSTRATIO.

Ductis rectis AB. CB. erunt in triangu-
lis BDA. BDC.

Latus BD utrique commune.

Latus AD $\propto$ DC | Per con-
Angulus BDA $\propto$ BDC. / struct.

a 4. I.
b 28. I.

Ergo Basis BA $\propto$ a BC.

Adeoque Arcus BA $\propto$ b BC.

Ergo Arcus ABC divisus est bifariam.

Q. E. D.

Pro-


PROPOSITIO XXXI.

Theor.
27.

1. *Angulus ABC in semicirculo rectus est.*

2. *In segmento majori angulus BAC recto minor.*

3. *In segmento vero minori angulus BEC recto major.*



DEMONSTRATIO.

Pars I. Ducta DB, erunt duo trian-
gula DAB. DBC. Isoscelia, adeoque
anguli supra bases æquales.

a 5. L

Ergo ang. DBA $\propto$ DAB. } A.
Et ang. DBC $\propto$ DCB. }

Totus Ang. ABC $\propto$ duobus BAC
+ BCA.

Atqui in triang. ABC omnes tres an-
guli sunt $\propto$ 2 Rectis.

L 1 2

Er. b 32. L.

Ergo ab una parte angulus ABC est rectus, & ab altera duo reliqui BAC. BCA etiam æquales uni recto.

Pars 2. Per partem I duo anguli BAC BCA simul constituunt unum rectum: ergo solus BAC est minor recto.

Pars 3. In quadrilatero ABEC.

c 22. III.

Duo anguli A $\perp$ E $\propto$ 2 Rectis.
Atqui ang. A $>$ uno recto per partem I.

Ergo ang. E $<$ uno recto.

SCHOLIUM I.

Si trianguli rectanguli hypotenusæ dividatur bifariam, erit punctum bisectionis centrum circuli per triapuncta angularia transeuntis: adeoque examen normæ.

SCHOLIUM II.


Ex hac propositione deducitur sequens

P R O B L E M A.

Minus quadratum Z a majore X subtrahere, seu exhibere differentiam quadratorum X & Z.

Con-

LIBER TERTIUS. 269
CONSTRUCTIO.



1. Super $AB \propto X$ fiat Semicirculus ACB .

2. In Diametro AB sumatur $AD \propto Z$.

3. Centro A radio AD describe arcum DC . erit recta AC etiam $\propto Z$.

Dico ducta CB illius $\square CB$ esse quæsitam differentiam quadratorum $AB. AC$.

DEMONSTRATIO.

Per propof. 31. III. angulus ACB est rectus, ergo in triangulo rectangulo ACB est

$$S \begin{cases} \square AB \propto \square AC + \square CB \text{ per 47. I.} \\ \square AC \quad \square AC, \end{cases}$$

$$\square AB - \square AC \propto \square CB.$$


LI 3

PRO-

Theor.
28.

PROPOSITIO XXXII.

Si recta linea AB circulum tangat in C, & a contactu ducatur alia circulum secans: erit angulus a tangente & secante factus æqualis angulo qui fit in alterno segmento.



DEMONSTRATIO.

Casus hic obtinent omnino duo:

Aut enim linea circulum secans ad tangentem est perpendicularis & transit per centrum O, ut CD.

Aut non transit: ut CE.

Ca-

CASUS I.

Demonstrari debet angulum $ACD \propto CFD$.

Ang. ACD est rectus : per hypoth.
 Ut & a CFD est rectus : quia est in Se-
 micirculo. a 31. III.

Ergo ang. $ACD \propto CFD$.

CASUS II.

Ab una parte probari debet esse ang.
 $ACE \propto CFE$.

Ang. $ACD \propto CFD$. per casum I.
 S { Ang. $Q \propto bR$. quia in eodem b 21. III.
 segmento.

Remanet ang. $ACE \propto CFE$.

Ab altera parte probari debet ang.
 $BCE \propto CHE$.

Ang. $BCD \propto CHD$ per casum I.
 A { Ang. $Q \propto S$. quia sunt eodem
 segmento.


Totus ang. $BCE \propto$ Toti CHE .

Q. E. D.

Pro-

Probl. 5. PROPOSITIO XXXIII.

Super data recta AB segmentum circuli construere, quod capiat angulum dato angulo equalem.



Est autem angulus datus vel rectus ut E, vel non rectus ut H. C.

CASUS I.

Constructio & Demonstratio.

31. III. Data AB bifariam divisa in D. Centro D radio DA fiat semicirculus ACB. hic capit a angulum rectum ACB, adeoque dato recto E æqualem.

CASUS II.

CONSTRUCTIO.

1. Ad datæ BA punctum A ducatur DK, ut angulus DAB sit æquales ^{b 31. I.} angulo dato C.

2. Ex A duc perpendicularem AF.

3. Fiat angulus ABE æqualis angulo BAE.

4. Centro E, radio EA vel EB (quæ per 6. I. sunt æquales) describe circumulum BIAG.

Dico segmentum AGB capere angulum dato acuto C æqualem.

Ut & segmentum AIB capere angulum data obtuso H æqualem.

Pars 1. Ang. DAB $\propto$ C AGB, in ^{c 32. III.} alterno segmento.

Et Ang. DAB $\propto$ C per construct.

Ergo Ang. AGB $\propto$ C.

Pars 2. In quadrilatero AIBG.

Duo anguli I $\perp$ G $\propto$ 2 Rectis. ^{d 22. III.}

Et duo anguli H $\perp$ C $\propto$ 2 Rectis.


Ergo I $\perp$ G $\propto$ H $\perp$ C.
 S { Atqui G $\propto$ C. per par- ^{c 32. III.}
 tem I.

Ergo I $\propto$ H.
 Mm

Q. D. E.
 Pro-

Probl. 6. PROPOSITIO XXXIV.

A dato circulo ABC segmentum CBA auferre, capiens angulum B, dato angulo D æqualem.



CONSTRUCTIO.

1. Ducatur recta tangens Circulum in A.
2. Ad A fiat angulus EAC æqualis angulo dato D.

Di-

Dico segmentum ABC
capere angulum æqualem D.

DEMONSTRATIO.

Ang. EAC $\propto$ a ABC in al-^{231. III}
terno segmento.

Atqui EAC $\propto$ D per con-
structionem.


Ergo ABC $\propto$ D.

Q. E. D.

Theor.
29.

PROPOSITIO XXXV.

Si in circulo duæ rectæ AB. CD se mutuo in E secuerint: Rectangulum comprehensum sub segmentis unius AE. EB: æquale est ei quod sub segmentis alterius CE. ED. comprehenditur rectangulo.



Quatuor diversi hic occurrere possunt casus.

DEMONSTRATIO.

CASUS I.

Si rectæ AB. CD se mutuo secent in Centro: tum $\square$ AEB erit $\propto$ $\square$ CED: quia quatuor illorum latera sint radii, adeoque inter se æqualia.

Ca-

CASUS II.

Si una CD per centrum F ducta alteram AB non per centrum transeuntem secet bifariam adeoque a perpendiculari- a 3. III. ter in E: ducatur FB.

DEMONSTRATIO.

$\square CED \perp \square FE \propto \square FD$ seu $\square FB$. b 5. III.

Atqui $\square FE \perp \square EB \propto \square FB$.

Ergo illis in hujus locum positis

$\square CED \perp \square FE \propto \square FE \perp \square EB$.

Adeoque dempto utrinque eodem $\square FE$.

$\square CED \propto \square EB$ hoc est $\square AEB$.

CASUS III.

Si recta CD per centrum F ducta altera non per centrum non dividit bifariam in E.

DEMONSTRATIO.

Ducta FG perpendiculari ad AB, ut & FB tum erit.



$$\square CED \text{ --- } \square FE \propto \square FD \quad \text{ho: est } \square FB.$$

$$\square FG \text{ --- } \square GE \text{ 47. I.} \quad \square FG \text{ --- } \square GB \text{ 47}$$

Sublato utimque $\square FG$. erit

$$\square CED \text{ --- } \square GE \propto \square GB$$

Sublato $\square GE$ $\square AEB \text{ --- } \square GE$. 5. II.

$$\square CED \propto \square AEB. \quad \text{Q. D. E.}$$

CASUS IV.

Si neutra transeat per centrum & se mutuo secent utcunque.

DEMONSTRATIO.

Ducatur GH. transiens per centrum F & per intersectionis punctum E. Tum.

$$\square AEB \propto \square GEH \text{ per ca.}$$

Et $\square CED \propto$ eidem $\square GEH$ sum 3.

$$\text{Ergo } \square AEB \propto \square CED.$$


Q. E. D.

N O T A.

In casu 3. Illa quæ sibi invicem subscribuntur inter se sunt æqualia & inferiora loco superiorum legi debent, ac si in una eadem linea essent substituta; id quod etiam in plerisque aliis demonstrationibus observandum.

Scho

LIBER TERTIUS. 279
SCHOLIUM.



Suppositis Libri V. Definitione I. & prop. 4 & 16. (quæ cum hac propositione nihil habent commune) hæc unica demonstratio facillime omnibus casibus inservire potest.

DEMONSTRATIO.

Ductis AD. CB, erit in triangulis AED. CEB.

Angulus A $\propto$ C
Ang. D $\propto$ B^{21. III.}
Ang. AED $\propto$ CEB. 15. I.

Ergo erit per 4. VI.

AE — ED $\propto$ CE — EB.


Et per nostrum Theor. I. Lib. V.
vel 16. VI.

$\square$ AE. ED $\propto$ $\square$ CE. EB. Q. D. E.

Pro-

Theor.
30.

PROPOSITIO XXXVI.



Si a puncto A extra circulum dato ducantur duae rectae, una tangens AF, altera secans AB. Erit rectangulum BAC, sub tota secante BA & illius parte AC inter punctum A & circulum interjecta comprehensum, aequale quadrato tangents AE.

Duo hic notandi sunt casus.

CASUS I.

Aut secans AB transit per centrum D.

DEMONSTRATIO.

Ducta DF, erit

$$\square BAC + \square DC = \square DA.$$

$$\text{S} \left\{ \begin{array}{l} \square BAC + \square DC = \square DA. \\ \square DF + \square FA = 47. \end{array} \right.$$

Atqui $\square DC = \square DF$. Quia sunt a radiis.

$$\square BAC = \square FA.$$

CASUS II.

Aut secans AE non transit per centrum.

De-

DEMONSTRATIO.

Ex centro D ducta perpendiculari
DG ut & DI: erit

$$\square EAI + \square GI \propto \square GA \} A.$$

$$\square DG \quad \square DG$$

$$\square EAI + \square DG + \square GI \propto \square DG + \square GA.$$

$$47. I. \square DI \text{ seu } \square DF \quad \square DA. 47. I.$$

Hoc est

$$\square FD + \square FA. 47. I.$$

$$\square EAI + \square DF \propto \square DF + \square FA.$$

Sublato utrinque $\square DF$.

$$\square EAI \propto \square FA.$$


Q. E. D.

COROLLARIUM. I.

Si a puncto quovis extra circulum sum-
pto, plures rectæ circulum secantes du-
cantur, rectangula comprehensa sub to-
tis secantibus & partibus exterioribus,
inter se sunt æqualia.

Nn

Scho



Suppositis iisdem quæ in Scholio præcedenti,
hanc damus Corollarii primi demonstrationem.
Demonstrandum est $\sphericalangle$ CAB esse æquale
 $\sphericalangle$ DAE.

DEMONSTRATIO.

Ductis CD & BE, erunt triangula CAD. EAB
inter se similia

Nam anguli O $\perp$ P $\propto$ 2 Rectis 22, 111.

Et anguli AEB $\perp$ P $\propto$ 2 Rectis 13, 1.

Ergo O $\perp$ P $\propto$ AEB $\perp$ P,

Et Sublato communi angulo P,

O $\propto$ AEB.

Deinde ang. A utrinque est communis,

Ergo R $\propto$ ABE, 32, 1.

Quare in triangulis CAD EAB erit per 4, VI.

CA $\perp$ AD = EA $\perp$ AB,

Et per 16, VI.

$\square$

$$\square CA AB \propto \square DA AE, \quad Q. E. D.$$

SCHOLIUM II.

Si jam ex puncto A supra lineam AC ducatur ALG, eodem modo ductis GD LE probatur esse $\square GAL \propto \square DAE$; notandumque est puncta peripheriæ G. L. concavæ & convexæ propius ad se invicem accedere, quam puncta C. & B; quæ punctorum distantia adhuc magis immittitur si ex A supra lineam AG ducatur alia Circulum secans: donec tandem ducatur recta AF, quæ Circulum tangit in unico puncto F, in quo puncta peripheriæ concavæ & convexæ coincidunt, adeoque cum antea designatæ essent duæ lineæ AB AC seu AL AG. inter se inæquales; jam ex A ducitur solummodo unica linea AF. quæ ergo in superiori proportionem bis sumenda est sc: semel pro linea GA, & semel pro LA. quo facto proportio sic stabit $FA - AD = EA \mid AF$:

Ergo per 16. VI.

$\square$ Tangentis AF $\propto \square DA. AE$.

Quæ æqualitas ipsius Propositionis 36 genuinum exhibet sensum, ut hinc pateat quam arcto nexu hæ veritates inter se cohæreant, quamque naturali una ex alia deducatur consequentiâ.

COROLLARIUM II.


Dux rectæ ab eodem puncto ductæ, quæ circum tangunt, inter se sunt æquales.

COROLLARIUM III.

Ab eodem puncto extra circum sumto, duci tantum possunt dux rectæ, quæ circum tangunt.

PROPOSITIO XXXVII.

Theor.
31.



Si a puncto A ex-
tra circulum posi-
to ductæ sint, duæ
rectæ AB. AF, ita
ut rectangulum
BAC sit æquale
quadrato alterius
AF. tum linea
AF circulum tan-
get in P.

DEMONSTRATIO.

Ducta linea tangente AH, ut & lineis
DF. DH.

$$\square BAC \propto \square AH.$$

Atqui $\square BAC \propto \square AF.$ per proposit.

a 36.
III.

Ergo $\square AH \propto \square AF.$ Ergo AH $\propto$ AF.

Quare in Triangulis AFD. AHD.

Latus AF $\propto$ AH.

Latus FD $\propto$ HD.

Latus DA commune.

Ergo Ang. AFD $\propto$ AHD. b

b 8. I.

Atqui c AHD est rectus.

c 18. III.

Ergo ergo AFD rectus est adeoque
a AF tangens.

Q. E. D.

d 16. III.

FINIS LIBRI TERTII.


EUCCLIDIS

ELEMENTORUM

LIBER QUARTUS.


DEFINITIONES.

1. *Figura rectilinea, in figura rectilinea inscribi dicitur, cum singuli ejus figuræ, quæ inscribitur, anguli, singula latera ejus cui inscribitur tangunt.*




2. *Similiter & figura circum figuram describi dicitur, cum singula ejus, quæ circumscribitur, latera singulos ejus figuræ angulos tetigerint, circum quam illa describitur.*

3. *Fi-*



3. *Figura autem rectilinea in circulo inscribi dicitur, cum singuli ejus figuræ, quæ inscribitur, anguli tetigerint circuli peripheriam.*

4. *Circulus autem circum figuram describi dicitur, cum circuli peripheria, singulos tangit ejus figuræ, quam circumscribit, angulos.*




5. *Figura vero rectilinea circa circulum describi dicitur, cum singula latera ejus, quæ circumscribitur, circuli peripheriam tangunt.*

6. Si.

6. *Similiter & circulus in figura inscribi dicitur, cum circuli peripheria singula latera tangit ejus figuræ in qua inscribitur.*


7. *Recta in circulo accommodari, seu coaptari dicitur, cum ejus extrema in circuli peripheria fuerint.*



Sic A B. dicitur in circulo accommodata non vero C D.

PROPOSITIO. I.

Probl. I.



In dato cir-
culo ABC ac.

commodare
rectam BA
aequalem da-

te rectæ D: quæ Circuli diame-
tro BC non sit major.

CONSTRUCTIO.

1. In dato circulo duc Diametrum
BC; cui si data recta D sit æqualis, pe-
tito satisfactum erit. Si vero minor.

2. Abscinde $\cdot BE \propto D$; & centro B a 3. l.
radio BE describe arcum circuli EA.

Dico rectam BA esse æqualem D
& coaptatam in Circulo.

DEMONSTRATIO.

Linea D $\propto$ BE per constructionem.
EA $\propto$ BE quia radii.


Ergo linea D $\propto$ BA, quæ est co-
aptata in circulo quia $\cdot$ utraque extremi-
tas terminatur in peripheria.

b Ax. I.
c Def.
7. IV.

Probl. 2.

PROPOSITIO II.

In dato circulo ABC triangulum ABC describere, quod dato triangulo DEF sit æquiangulum.



CONSTRUCTIO.

a 17. III. 1. Ad ductæ tangentis GH
b 23. I. punctum A^b constituatur angulus GAB. æqualis angulo F.

2. Ad idem punctum A ab altera parte fiat HAC æqualis angulo E.

Jungatur recta BC.

Dico

Dico triangulum ABC ipsi
DEF esse æquiangulum.

DEMONSTRATIO.

In triangulis ACB. DEF.

A Ang. C (c) $\propto$ GAB $\propto$ F per construct.
Ang. B (c) $\propto$ HAC $\propto$ E per construct.

c 32. III.


Duo anguli C + B $\propto$ duobus
F + E.

Ergo etiam tertius ^d A $\propto$ ter-
tio D. d 2 Cor.
32. I.

PROPOSITIO III.

Prebl. 3.

*Circa datum circulum BCE tri-
angulum LMO describere æquian-
gulum dato triangulo AFD.*



CONSTRUCTIO.

1. Trianguli DAF latus AF produca-
tur in G & H.

a 23. I. 2. In circulo ducto radio IB, a fiat
angulus BIE. æqualis trianguli externo
angulo DAG.

3. Fiat angulus BIC æqualis externo
D&H.

b 16. & 17. III. 4. Ad tria puncta B. C. E. ducantur
tres b tangentes OL. OE. LM.

Dico ex illarum concursu oriri triangu-
lum OLM. dato DAF æquiangulum.

DEMONSTRATIO.

Ex Scholio prop. 32. I. quadrilaterum
BIEL dividi potest in duo triangu-
la, cum

au-

LIBER TERTIUS. 293

autem unum triangulum contineat duos
angulos rectos, duo continebunt qua-
tuor; adeoque quatuor anguli in quadri-
lateralio dicta erunt æquales quatuor rectis:
a quibus si dematur duo recti LEI. ^{c 16. III.}
LBI. remanebunt.

Anguli BIE $\perp$ L $\propto$ 2 Rectis.

Atqui DAG $\perp$ DAF $\propto$ 2 Rectis.

Ergo BIE $\perp$ L $\propto$ DAG $\perp$ DAE $\backslash$ S
Atqui BIE $\propto$ DAG per const.

Remanet L $\propto$ DAF.

Eodem modo demonstratur quod sit
angulus M $\propto$ DFA, ergo tertius O erit
 $\propto$ d tertio D. <sup>d 2 Cor.
32. I.</sup>

NOTA.

Quod autem tangentes EL & BL in
puncto L concurrere debeant sic patet.
Ducta BE.


Duo anguli toti LBI. LEI. $\propto$ 2 R.
Ergo ang. partiales LEB. LBE $>$ 2 R.

^c Ergo rectæ EL. BL concurrent. ^{c Ax. 11.}

PROPOSITIO IV.

Probl. 4.

*Dato triangulo ABC circulum
inscribere.*



CONSTRUCTIO.

1. Duos quoslibet angulos B.
a 9. I. C. ^a divide bifariam per rectas
BD. CD.

2. Ex puncto concursus D duc
perpendiculares DE. DF. DG.

3. Centro D, radio DE. de-
scribe circulum.

Dico illum tangere omnia late-
ra trianguli in punctis D. E. F. a-
deoque ipsi inscriptum esse.

De-

DEMONSTRATIO.

In triangulis DGC. DFC.

Ang. G $\propto$ F. per constr.

Ang. DCG $\propto$ DCF. quia totus
C bisectus est.

Latus DC commune.

Ergo latus DG $\propto$ DF.

b 16. I.

Eodem modo demonstratur ef-
se DF $\propto$ DE.

Adeoq; tres lineæ DE. DF.
DG sunt inter se æquales.

Ergo circulus centro D ductus
transit per puncta E. F. G. & tan-
git c omnia latera; quia anguli c 16. III.
ad E. F. G. sunt recti; adeoque
d triangulo inscriptus est.


d Def. 6.

PRO-

Probl. 1.

PROPOSITIO V.

*Circa datum triangulum ABC
circulum describere.*



CONSTRUCTIO.

1. Quælibetunque duo latera AB.
a 10. L. BC a divide bifariam in E. & F.
2. Ex E & F erige b perpendiculares
b 11. L. ED. FD.
3. Ex puncto concursus, describe
radio DA circulum.

Dico illum quoque transire per puncta
B, C. adeoque triangulo circumscriptum
esse.

DEMONSTRATIO.

Ductis DA DB DC. In triangulis
DEA. DEB.

Latus DE commune.

Latus EA $\propto$ EB } Per con-

Angulus DEA $\propto$ DEB /struct.

Ergo basis DA $\propto$ DB.

c 4. I.

Eodem modo demonstratur esse DB $\propto$ DC, adeoque tres lineæ DA. DB. DC sunt inter se æquales.

Ergo Circulus centro D, radio DA descriptus, transit per omnia trianguli puncta angularia: adeoque ipsi est circumscriptus. d

d Def.
4. IV.

Eadem constructionis formula obtinet in omnibus trianguli speciebus; cum hac solummodo differentia, quod in Rectangulo centrum cadat in punctum medium hypotenusæ.

In Acutangulo centrum cadat intra triangulum.

In obtusangulo vero extra.


SCHOLIUM.

Ex hac propositione deducitur Methodus describendi circulum, per tria puncta non in linea recta disposita, transeuntem.

Probl. 6.

PROPOSITIO VI.

Dato Circulo quadratum inscribere.



CONSTRUCTIO.

1. Ducantur duæ Diametri AC BD in centro E se ad angulos rectos intersecantes.

2. Jungantur rectæ AB. BC. CD. DA.

Dico ABCD esse quadratum quæsitum.

DEMONSTRATIO.

Pro lateribus.

In triangulis AEB. AED.

Latus

Latus AE utrique commune.

Latus EB $\propto$ ED. quia radii.

Angulus AEB $\propto$ AED: quia uterque rectus.

Ergo basis AB $\propto$ AD.

24. I.

Eodem modo probatur AD $\propto$ DC: DC $\propto$ CB. CB $\propto$ BA.

Adeoque quatuor illa latera inter se erunt æqualia.

Pro angulis.

Quatuor anguli A. B. C. D. istis lateribus contenti sunt in Semicirculo. ergo recti. ^b

b 31. III.


Adeoque ABCD est quadratum circulo inscriptum.

Q. E. F.

Probl. 17.

PROPOSITIO VII.

*Circa datum Circulum quadra-
tum describere.*



CONSTRUCTIO.

1. Ducantur duæ diametri
AC. BD se mutuo ad angulos re-
ctos in E secantes.

2. Per illarum extremitates du-
cantur tangentes FG. GH. HI. IF.

Dico illas coeuntes consti-
tuere Quadratum quæsi-
tum FGH I.

De-

DEMONSTRATIO.

Pro angulis.

In quadrilatero AEBF.

4 Anguli A. E. B. F. ∞ 4 RectisAtqui 3 Ang. A. E. B. ∞ 3 Rectisa 32. L.
& Scho-
lium.Remanet ang F ∞ 1 Recto.Simuli ratiocinio probatur an-
gulos G. H. I esse rectos.


Pro lateribus.

In parallelogrammis FD. ID.
latera FG. IH sunt æqualia Dia-
metro BD. adeoque & inter se.In parallelogrammis IA. HA.
latera FI. GH sunt ^b æqualia Dia- ^{b 34. L.}
metro AC.Atqui Diametri AC. BD sunt
inter se æquales.Ergo 4 latera FG. GH. HI.
IF sunt inter se æqualia.Adeoque FGHI est quadra-
tum quæsitum. Q. E. E.

PROPOSITIO VIII.

Probl. 8.

In dato quadrato Circulum describere.



CONSTRUCTIO.

1. Ducantur duæ diagonales FH. GI se interfecantes in E.
2. Ex E demittatur ad latus FI perpendicularis EB.
3. Centro E radio EB, describatur Circulus.

Dico illum tangere latera in punctis A. B. C. D. adeoque quadrato inscriptum esse.

De-

DEMONSTRATIO.

Ex E. ductis perpendicularibus EA.
ED. EC.

In triangulis FAE. FBE. erunt.

Angulus A $\propto$ B per constr. quia recti.

Angulus a O $\propto$ P. quia semirecti.

Latus FE utrique commune.

a 2 Cor.
32. I.

Ergo Latus EA $\propto$ EB. b

b 26. I.

Sic etiam probatur EB $\propto$ EC. &
EC $\propto$ ED : ut & ED $\propto$ EA.


Ergo circulus centro E, radio EB
descriptus transibit per puncta A. D. C :
& quia anguli ad illa puncta sunt recti,
tanger omnia iatera ; adeoque circulus
quadrato erit inscriptus.

Q. E. D.

Probl. 9.

PROPOSITIO IX.

Circa datum quadratum circulum describere.



CONSTRUCTIO.

1. Ducantur diametri AC, BD secantes sese in puncto E.
2. Centro E, radio EB, describatur Circulus.

Dico illum transire per omnia quadrati puncta angularia; adeoque illi esse circumscriptum.

De-

DEMONSTRATIO.

Diametri AC . BD , quatuor
 angulos A . B . C . D . ^a bifariam se- ^{a 2 Coro.}
 cant, Ergo in triangulo EBA . ^{32. I.}

Angulus $EBA \propto EAB$.

Ergo latus EA ^b $\propto EB$.

Sic etiam probatur $EB \propto EC$. ^{b 6. I.}
 $\& EC \propto ED$: $\& ED \propto A$.

Adeoque quatuor lineæ EA .
 EB . EC . ED . sunt inter se æqua-
 les.

Ergo circulus centro E radio
 EB descriptus transit per omnia
 quadrati puncta angularia A . B .
 C . D . adeoque illi circumscri-
 ptus est.


Q. E. D.

Qq

Pro-

PROPOSITIO. X.

Probl. 10.



Triangulum Isoceles ABD construere, cujus singuli ad basin anguli B. & D dupli sint reliqui ad verticem A.

CONSTRUCTIO.

1. Quilibetunque lineam AB ita
a II. II. divide a in C, ut $\square ABC$ sit $\square AC$.
 2. Centro A radio AB describe circum-
lum.
 3. Ex B in isto circulo accommoda
b I. IV. rectam BD $\propto$ AC.
 4. Duc rectam AD.
- Dico ABD esse triangulum quæsitum.

DEMONSTRATIO.

Ducta recta CD, circa triangulum
ACD describatur circulus ACD.
 $\square ABC \propto \square AC$ hoc est $\square BD$ per
constr.

c37. III. Ergo BD tangit circuml^o: quem
BA, secat.

c32. III. A { Vnde ang. BDC $\propto$ A in alterno seg.
Ang. CDA CDA.

A

LIBER QUARTUS. 307

Totalis ang. ADB ($\propto$ ABD) $\propto$ A
 $\perp$ CDA.

Atqui etiam BCD $\propto$ A $\perp$ CDA. ^{d 32. I.}

Ergo

In triangulo BCD ang. BCD $\propto$ CBD.

Adeoque latus BD $\propto$ CD. ^{e 6. I.}

Atqui latus BD $\propto$ AC.

Ergo

In triangulo ACD latus CD $\propto$ CA.

Adeoque angulus A $\propto$ CDA.

Ergo angulus BCD (qui duobus A & CDA est æqualis probatus) est duplus anguli A.

Ergo etiam BDC, qui angulo ABD demonstratus est æqualis, duplus erit anguli A.

Adeoque & ADB, qui angulo ^f ABD est æqualis, ejusdem anguli A duplus erit. Q. E. F.


COROLLARIUM.

In triangulo Isoscele hoc modo constructo, angulus ad basin valet duas partes quintas seu $\frac{2}{5}$ duorum vel $\frac{4}{5}$ unius Recti : quare angulus A valebit $\frac{1}{5}$ duorum vel $\frac{2}{5}$ unius Recti.

PROPOSITIO XI.

Theor.
11.

Dato circulo Pentagonum æquilaterum & æquiangulum inscribere.



CONSTRUCTIO.

1. Quilibetunque triangulo Isosceli juxta præcedentem propositionem constituto, æquiangulum a inscribatur EFG in circulo dato.
2. Illius supra basin anguli EFG. EGF bisecentur per rectas FI. GH.
3. Puncta E. H. F. G. I. jungantur totidem rectis.

Dico factum esse quod petitur.

De-

DEMONSTRATIO.

Pro lateribus.

Quinque anguli EFI . IFG . EGH .
 HGF . PEG sunt inter se æquales per
 constructionem.

Ergo ^a arcus quibus insistant sunt æ. ^a 26. III.
 quales.

Ergo illis ^b subtensæ rectæ, quæ sunt ^b 29. III.
 Pentagoni latera, sunt æquales.

Pro angulis.

Arcus $HFGI$ $\propto$ Arcui $FGIE$. per
 partem I.


Ergo Angulus E ^c $\propto$ Angulo H . quia ^c 27. III.
 æqualibus arcibus insistant.

Simili modo de duobus aliis angulis
 &c. Q. E. F.

PROPOSITIO XII.

Theor.
12.

Circa datum circulum Pentagonum equilaterum & equiangulum describere.



CONSTRUCTIO.

1. Inscribatur Pentagonum regulare per præced: ABCDE.

2. Ad puncta A. B. C. D. E. ducantur totidem tangentes, quæ concurrant in punctis F. G. H. I. C.

Dico factum quod quæritur.

De-

DEMONSTRATIO.

Pro lateribus.

Ex centro O ductis perpendicularibus
OP. OQ, ut & radio OA in triangulis
OAP. OAQ.

Latus OP ^a $\propto$ OQ. quia æquales ^a 14. III.
AB. AE æquidistant a centro.

Latus PA ^b $\propto$ QA. quia æquales ^b 3. III.
AB. AC bisectæ sunt.

Latus OA utrique communes.

Ergo ang. ^c OAP $\propto$ OAQ. Qui si auferantur ab æqualibus Rectis angulis OAH
OAG : remanebit angulus HAB $\propto$
GAE. c 8. I.

Deinde Triangula BHA. EGA. sunt
Isoscelia, quia ex puncto H ductæ sunt
ductæ tangentes HA. AB : ut ex puncto
G duæ GA. GE : quæ sunt ^d æquales : d 2 Co-
rol. 36,
III.

Quare illa triangula habent bases AB.
AE æquales, & angulos ad basin HBA.
HAB. æquales GAE. GEA. non solum
alterum alteri, sed promiscue omnes ^e 5 &
quatuor inter se æquales. Adeoque ^e qua-
tuor latera BH. HA. AG. GE. sunt in-
ter se æqualia. 16. I.

Si-

Simili modo demonstratur omnes decem lineolas esse inter se æquales.

Si jam una sit æqualis uni etiam duæ erunt duabus æquales.

Adcoque quinque latera, quæ ex duabus lineolis constant, erunt æqualia.

Pro angulis.

Ex demonstratis patet triangula AHB
 § 8. I. AGE habere omnia latera æqualia.
 Adcoque angulum H $\propto$ G. Et eodem modo de reliquis.


COROLLARIUM.

Si in circulo quælibetunque figura regularis fuerit inscripta, lineæ tangentes circulum in punctis illius angularibus, suo concursu semper constituent figuram similem circulo circumscriptam.

PROPOSITIO XIII.

Prob. 13.

Dato Pentagono regulari circulum inscribere.



CONSTRUCTIO.

1. Quoslibet duos angulos A & E divide bifariam per rectas AF. EF.
2. Ex illarum puncto concursus F, ducantur ad omnia latera perpendicularares.
3. Ex F tanquam centro pro radio assumpta una ex istis perpendicularibus describatur circulus.

Dico illum Pentagono fore inscriptum.

R r

De-

DEMONSTRATIO.

In Triangulis AGF. AHF.

Angulus GAF $\propto$ HAF | Per con-
 Angulus AGF $\propto$ AHF | struct.
 Latus AF utrique commune.

a 26. I. Ergo a latus GF $\propto$ HF.

Eodem modo probatur HF $\propto$ IF.
 IF $\propto$ KF. KF $\propto$ LF & denique LF
 $\propto$ GF.

Adeoque omnes istæ perpendiculares
 erunt inter se æquales.

Quare, circulus radio FH descriptus
 transibit quoque per puncta I. K. L. G.
 b 16. III. in quibus ista latera tanget; quia anguli
 ad ista puncta sunt recti.

Q. E. D.

COROLLARIUM. I.

In quolibet polygono regula-
 ri

ti omnes lineæ bisecantes angulos in uno eodemque puncto conveniunt.

COROLLARIUM II.

In omni Polygono laterum imparem habente numerum linea aliquem ex angulis bisecans oppositum etiam bisecabit latus.


S C H O L I U M.

Eadem methodo in quacun-
que figura regulari circulus de-
scribi potest.

Prob. 14.

PROPOSITIO. XIV.

Circa datum Pentagonum regulare circulum describere.



CONSTRUCTIO.

1. Duos quoslibet angulos A & B divide bifariam per rectas
a Ax. II. $AF.BF$, quæ concurrent in F.
2. Centro F, radio AF , vel BF describe circulum.

Dico illum transiturum per reliqua puncta angularia.

De

DEMONSTRATIO.

In triangulo FAB .

Ang. $FAB \propto FBA$. quia illorum dupli sunt æquales.

Ergo latus $FA \propto FB$.

Eodem modo bisecto angulo C demonstrabitur $FB \propto FC$. & sic per orbem omnes lineæ bisecantes angulos erunt æquales.

Ergo circulus transibit per omnia puncta angularia, adeoque pentagono circumscriptus erit.

Q. F. E.


SCHOLIUM.

Eadem constructionis forma circa quamlibet figuram regularem circulum describere licet.

Probl. 15.

PROPOSITIO XV.

*In dato circulo Hexagonum
regulare describere.*



CONSTRUCTIO.

1. Centro quolibet puncto D, radio circuli DG, describe arcum CGE.
2. Ex punctis C. D. E. per centrum G describe tres diametros CF. DA. EB.
3. Duc sex rectas AB. BC. CD. DE. EF. FA.

Dico ABCDEF esse hexagonum
quæsitum. De-

DEMONSTRATIO.

Pro lateribus.

Lineæ DC. DE. singulæ sunt ∞ ;
Radio DG.

Lineæ GC. GE. GD. singuli sunt Radii.

Ergo quinque lineæ GC. GD. GE.
DC. DE sunt æquales.

Adeoquæ Triangula GCD. GDE
sunt æquilatera.

Ergo duo anguli G & O singuli sunt
una tertia pars duorum rectorum.

a 3 Cor.

Atqui tres anguli G. O. S. simul b va-
lent duos rectos, seu tres tertias duorum
rectorum.

32. I.
b 13. I.

Ergo tertius S. etiam est una tertia
duorum rectorum.

Adeoquæ tres G. O. S. sunt inter se
æquales.

Atqui illis æquales sunt tres c opposi- c 15. I.
ti X. Q. T.

Ergo sex anguli ad Centrum sunt æquales.

Ergo d sex arcus, quibus insistant, d 26. III.
sunt æquales.

Adeo-

29. III. Adeoque sex subtensa, quæ constituunt latera figuræ, inter se sunt æquales.

Pro angulis.

Hos esse æquales facile patet, quia
 31. III. f singuli insistant æqualibus arcubus, sc.
 quatuor sextis partibus totius peripheriæ:
 Ergo sunt inter se æquales.

COROLLARIUM.

Hexagoni latus æquale est radio.


SCHOLIUM.

Ductis tribus rectis AC. AE. CE.
 circumscriptum erit triangulum æquilaterum.

LIBER QUARTUS. 321

PROPOSITIO XVI.

Probl. 16.



*In dato Cir-
culo Quindecag-
onum regulare
describere.*

CONSTRUCTIO.

1. Circulo (a) inscribe pentagonum regulare a II. IV. AEFGB.

2. Itidem (b) triangulum regulare ABC.

Dico rectam BF, fore latus quindecago-
ni quæsit.

b Schol.
15. IV.

DEMONSTRATIO.

Pentagonum dividit totam peripheriam in quinque partes æquales; quare quælibet continet unam quintam seu tres decimas quintas totius peripheriæ: adcoque duæ AE, EF, sex decimas quintas continebunt.

Triangulum vero dividit totam peripheriam in tres partes æquales; quarum quælibet ut AB continet unam tertiam, seu quinque decimas quintas totius peripheriæ. Tum

Arcus AEF sex decimæ quintæ.

Arcus AEB quinque decimæ quintæ.) S.

Arcus BF una decima quinta.

Ergo sit ducatur recta BF, eique æquales quatuordecim in circulo coaptentur, descriptum erit quindecagonum, æquilaterum, cum omnes arcus sint æquales.

FINIS LIBRI QUARTI.

Sf

Pro-

E U C L I D I S

E L E M E N T O R U M

L I B E R Q U I N T U S .

D E F I N I T I O N E S .

1. *Pars est magnitudo magnitudinis, minor majoris, cum metitur majorem.*

CUM totum sit sua parte majus, patet partem contineri in suo toto. Hoc autem duplici modo fit.

Vel continetur ita ut aliquoties sumpta, præcise reddat suum totum seu ipsi æqualis sit; quemadmodum numerus quatuor seu 4, est minor toto 12, adeoque in illo continetur, & quidem ita, ut aliquot vicibus, scilicet tribus sumtus, accurate æqualis sit toti 12. Et inde hæc pars Mathematicis dicitur Aliquota, quæ suum totum absque residuo dividit, id quod idem est ac metiri: & hanc Partis speciem Euclides solummodo respexit, altera, quæ sequitur, neglecta.

Vel pars ita continetur in suo toto, ut aliquoties sumpta totum vel excedat vel ab illo

ORE. illo deficiat, adeoque non accurate ipsi
NTU. æqualis sit. Quemadmodum numerus 4,
ONES. cum minor sit toto 14, in illo continebitur;
itudo. sed quia ter sumtus toto minor est ac
ris, 10. quater toto major, hæc pars non potest
arans. dici Aliquota, ut altera pars notata:
iniale. quia tamen aliquam exhibet quantitatem
mediz. totius quantitatis, vocatur pars Ali-
quanti.

æterum cum Euclides adhibuerit
Magnitudinis vocabulum, suspicari licet
illum meminisse solunquantitatis conti-
nuæ, quæ vulgo magnitudinis nominae
Mathematicis venit; minime tamen ex-
cludenda est quantitas discreta & in nu-
meris posita, quæ suas etiam habet par-
tes: quibus illa omnia, quæ de rationibus
& proportionibus toto hoc libro demon-
strat, æque facile imo pro captu nostro
facilius accommodari possunt.

Quare & nos cum multis aliis omnes
hujus libri propositiones, neglectis li-
neis demonstrabimus in numeris; tum
quia illis magis sumus assueti & de illis
sæpius quam de lineis cogitavimus; tum
etiam quia illa quæ de numeris probantur,
si cui libet, ipsis lineis applicari possunt.

2. *Multiplex autem est major quantitas quam metitur minor.*

Quemadmodum pars suum totum dividit seu metitur absque residuo vel cum residuo; ita reciproce etiam totum a sua parte dividitur vel sine vel cum residuo. Prius illud totum idem est quod multiplex, cujus in hac definitione fit mentio, non intellecto altero. quod cum residuo dividitur, quodque adeo multiplex dici non meretur.

3. *Ratio est duarum quantitatum ejusdem generis, mutua quadam secundum communem mensuram habitudo.*

Cum proprie loquendo una eademque res ad se ipsam non possit comparari secundum quantitatem, quia se ipsa non est major nec minor, patet plures requiri inter quas legitima instituaturs comparatio; quæ etiam tantum possunt esse duæ.

Illæ autem necessario requiruntur ut sint res homogeneæ; ut quantitates ejusdem generis; quales sunt linea cum linea
com-

comparata; superficies cum superficie; corpus cum corpore: nullo ergo modo linea comparari potest cum superficie vel cum corpore, nec superficies cum corpore quia non sunt ejusdem generis.

Porro ulteriorem hujus homogeneitatis explicationem tradit Euclides in definitione 5.

Hæc autem intelligenda est in quantitatibus secundum magnitudinem, seu partium æqualium numerum, adeo ut una res altera sit vel major vel minor; hoc est ut una res plures vel pauciores similes seu æquales contineat partes quam altera.

Ex quibus patet rationem nihil aliud esse quam modum seu formulam continendi, qua una quantitas aliam quantitatem continet, vel in illa continetur; quæ capacitas cum per nullam aliam operationem quam per divisionem innotescat, liquet rationem seu comparisonem duarum quantitatum non clarius quam per fractionis formam posse exprimi.

Exempli gratia; ponantur duo numeri 16 & 4. qui saltem aliquam inter se habent rationem, quia numerus 16 major est numero 4, adeoque numerum 4 in

Si 3

se

se continet. Ut jam ulterius ista ratio examinetur videndum est quoties 16 continet 4, quod per divisionem innotescit; quia autem facta divisione acquiritur 4 pro quotiente pronuntiamus rationem 16 ad 4, esse quadruplam. hoc est 16 esse quadruplum numeri 4: vel 16 se habere ad 4 ut 4 ad 1: Id quod etiam commode hoc modo exprimitur per fractionem $\frac{16}{4}$ quæ innuit 16 per 4 esse dividendum vel jam supponit divisum.

Si jam sumantur duo alii numeri ex. gr. 8 & 2, & eorum rationem examinando comperiatur numerum 8 minorem etiam quater in se continere, quia per divisionem idem quotiens 4 obtinetur; quæ per modum fractionis exposita sic stabit $\frac{8}{2}$.

Inde patebit rationem quæ intercedit inter 16 & 4, esse eandem, vel similem vel æqualem rationi quæ est inter 8 & 2: quia nimirum 16 toties continet 4, quoties 8 continet 2.

Porro hinc fit manifestum æquimultiplicem esse nihil aliud significare quam habere eandem rationem: ut si dicatur 16 esse æquemultiplicem numeri 4, ac
8 est

8 est numeri 2, idem est ac si dicatur numerum 16 ad 4 habere eandem rationem, quam habet 8 ad numerum 2; cum utriusque sc. & æquemultiplicitas & ejusdem rationis idem quotiens 4 per ejusdem divisionis acquiritur operationem: quare ejusdem rationis notationem hoc modo exprimere licet $\frac{16}{4} \propto \frac{8}{2}$.

Quæ fractiones, ut iterum in aliam rationum formam reducantur, dicimus 16 esse ad 4 quemadmodum 8 est ad 4; vel secundum nostram qua utimur descriptionis methodum $16 : 4 = 8 : 2$.

Duorum autem cujuslibet rationis terminorum ille qui ad alterum refertur Antecedens dicitur; ad quem vero fit relatio Consequens rationis dicitur. Ut in ratione 16 ad 4 terminus Antecedens est numerus 16; consequens vero 4: quemadmodum ab altera parte, in ratione 4 ad 16, numerus 4 Antecedentis, 16 vero consequentis acquirit nomen.

Rationes autem non uno dividuntur modo: nos duas afferemus præcipuas.

I. Ratio dividitur in rationalem & irrationalem.

Rationalis est quæ veris numeris potest exprimi ut 6 ad 3: quæ est eadem

dem cum 2 ad 1. quæ dicitur dupla.

Irrationalis vero est quæ veris numeris exprimi nequit, ut in quadrato ratio lateris ad Diagonalem; quæ, licet aliquo modo exprimatur per numeros qui Surdi dicuntur, scilicet ut 1 ad $\sqrt{2}$, cum tamen $\sqrt{2}$ non sit verus numerus, sed tantum imaginarii cuiusdam numeri nota veris tamen numeris explicabilis non est.

II. Ratio dividitur in rationem æqualitatis vel inæqualitatis.

Ratio æqualitatis, est quando duo ad se comparata sunt æqualia: ut 4 ad 4: & 2 ad 2.

Inæqualitatis est, cum termini inter se comparati inæquales sint, ut 4 ad 3. & 2 ad 6.

Hæc autem iterum est.

Majoris inæqualitatis, cum terminus antecedens major est consequente: ut 4 ad 3. & 6 ad 2.

Minoris inæqualitatis, cum antecedens est minor suo consequente, ut 2 ad 6. & 4 ad 12.

Proportio est rationum similitudo.

Quem-

Quemadmodum in omni ratione requiruntur duo termini seu duæ quantitates, ita in omni proportionem requiruntur duæ rationes, cum una eademque ratio ad se ipsam proprie comparari nequeat.

Cum ergo duarum rationum una ita sit constituta, ut illius terminus antecedens suum consequentem toties contineat, vel in illo contineatur sive absolute & sine residuo sive cum annexa fractione, quoties alterius antecedens suum consequentem continet vel in illo continetur, vel sine vel cum fractione quæ præcedenti æqualis est, duæ istæ rationes constituent Proportionem.

Ex: Gr: quia numerorum 12 & 4, Antecedens 12 suum consequentem 4 toties (scilicet ter) continet quoties numerorum 9 & 3, antecedens 9 suum consequentem 3, videlicet etiam ter, duæ istæ rationes 12 ad 4 & 9 ad 3 erunt inter se similes seu æquales seu potius eadem scilicet triplæ; & hæc similitudo apud Mathematicos vocatur Proportio.

Est autem proportio triplex, Arithmetica, Geometrica, & Musica.

I. Proportio Arithmetica est æqualitas excessuum vel differentiarum inter tres,

T t

qua-

quatuor vel plures numeros; in qua notandum est quemlibet numerum posse recipi pro differentia.

Ut 1. 2. 3. 4. 5. 6. In quibus unitas est differentia.

Vel 1. 3. 5. 7. 9. 11. Qui binario se invicem excedunt.

Vel 1. 4. 7. 10. 13. 16. Qui ternario. Et sic in infinitum.

II. Proportio Geometrica est rationum similitudo inter tres, quatuor vel plures quantitates, seu numeros. Potest autem & hic quilibet numerus pro denominatore rationis assumi excepta unitate.

Ut 1. 2. 4. 8. 16. Qui sunt in ratione dupla adeoque 2 est rationis denominator.

Vel 1. 3. 9. 27. 81. Qui cum sint in ratione tripla numerum 3 pro denominatore habent.

Proportio Musica est qua tres quantitates ita ordinatae sunt, ut eadem sit ratio primae ad tertiam, quae differentiae inter primam & secundam ad differentiam inter secundam & tertiam. In qua proportionem sunt tres numeri 6. 8. 12. cum eadem sit ratio primi numeri 6 ad ter-

tium 12, quæ est numeri 2 (excessus primi) ad numerum 4. (excessum secundum.)

5. *Rationem habere inter se quantitates dicuntur, quæ possunt multiplicatæ se mutuo superare.*

Hic ulterius explicatur quænam sint quantitates ejusdem generis, inrer quas intercedit ratio, ut supra definit 3. vidimus; nim. quarum illa quæ antea erat minor, per multiplicationem sic potest augeri, ut majorem superet.

Unde patet inter illa, in quibus talis multiplicatio nullum habet locum, etiam nullam omnino dari rationem. Sic linea in infinitum multiplicata & sibi ipsi addita, nunquam fiet maior aliqua superficie: cum linea tali multiplicatione non degenerabit in superficiem; adeoque inter lineam & superficiem nulla intercedit ratio: quemadmodum etiam nulla reperitur inter lineam & corpus, nec inter superficiem & corpus; cum qualibet cunque multiplicatione nec linea, nec superficies relicta sua specie in corpus mu-

tabitur , adeoque nec ipso majus evadere possit.

Cum autem inter latus quadrati ejusque diagonalem multiplicatio obtineat , certo concludimus illa rationem inter se habere : latus enim ita multiplicari & sibi ipsi addi potest ut diagonalem superet ; cum per 20. I. pateat duo latera trianguli majora esse tertio latere quod est ipsa diagonalis : Hæc autem ratio , ut supra notavimus , est irrationalis , cum veris numeris illam exprimere non detur.

Præterea rectilinea & curvilinea inter se rationem habere possunt ; cum inter illa sit æqualitas & inæqualitas. Lunulæ crescentis quadraturam Hippocrates Chius , & Parabolæ Archimedes invenerunt. Anguli rectilinei cum curvilineo æqualitatem exhibuit Proclus.

6. In eadem ratione quantitates dicuntur esse prima ad secundam, & tertia ad quartam, cum prima suam secundam toties præse vel cum tali fractione continet vel in illa continetur , quoties præ-

*præcise vel cum quali fractione
tertia suam quartam continet vel
in illa continetur.*

Cum proportionalitatis indicium ab
Euclide datum non ex ipsis propositis nu-
meris sed qualicunque eorum multiplica-
tione sit deductum; nos illud nimis lon-
ge petitam aliquam proportionalium pro-
prietatem suppeditare putamus; quare
illo omisso aliud exhibemus indicium ex
ipsis numeris propositis derivatum, &
immediate ex rationis natura, antea ex-
plicata deductum,

Supra quippe vidimus rationem ni-
hil aliud esse quam certam quandam for-
mulam seu modum continendi, quo
una quantitas aliam continet, vel ab alia
continetur: quemadmodum positis duo-
bus numeris 16 & 4. modus ille quo 16
numerus 4 continet potest exprimi per
nomen quadrupli quia 16 ipsum 4 quatuor
vicibus continet.

Si jam ex duobus aliis numeris 8 & 2,
unus 8 alterum 2 etiam contineat eodem
modo qui quadruplus dicitur, patet u-
trinque modum continendi esse æqua-
tem vel potius eundem; cum autem;

T r 3 ut

ut supra notatum est, ratio & modus continendi sit unum & idem, facile concludimus, rationem etiam utrinque esse eandem : adeoque quatuor quantitates 16 & 4 ut & 8 & 2, binas ac binas sumptas esse in eadem ratione.

Eodem modo cum numerus 20 numerum 8 non absolute aliquot vicibus absque fractione contineat, sed modo continendi qui dicitur duplus cum dimidio; si ex numeris 10 & 4, primus 10 secundum 4 eodem modo duplo cum dimidio continet; utrinque modus continendi, seu quod jam pro eodem sumimus, ratio erit eadem adeoque quatuor quantitates 20.8 ut & 10.4. binæ ac binæ acceptæ, in eadem erunt ratione.

7. Eandem autem rationem habentes quantitates, vocantur proportionales.

Quæ proportionales in duplici constituta sunt genere.

Aut enim sunt continue proportionales.

Aut non continue, quæ simpliciter tantum proportionales dicuntur.

Con-

Continue proportionales dicuntur illæ quantitates quæ sunt in Progreſſione geometrica, inter quas a termino ad terminum eadem continuatur ratio, eundem terminum bis repetendo, ut ſemel primæ rationis ſit conſequens, antecedens vero ſecundæ.

Ex. gr. ex progreſſione gemetrica, cujus dominator eſt 2, ſcilicet 1. 2. 4. 8. 16. eligantur quatuor termini 1. 2. 4. 8. illi erunt continue proportionales; quia eadem ratio ſcilicet dupla a termino ad terminum continuo procedit: primus enim 1 ſe habet ad ſecundum 2, ſicut idem ſecundus 2 ad tertium 4. deinde ſecundus 2 ſe habet ad tertium 4. quemadmodum idem tertius 4 ſe habet ad quartum 8.

Non continue proportionales dicuntur quantitates. quando eadem ratio quæ eſt inter primum & ſecundum non continuatur inter ſecundum & tertium, ſed ibi interrupta demum inter tertium & quartum invenitur, ut in hiſce numeris 12. 6. 8. 4. Ratio quæ eſt inter 12 & 6 non continuatur 6 & 8, ſed ibi interrupta tranſit ad duos reliquos terminos 8 & 4, cum 8 numerum 4 toties contineat quoties 12 continet 6. Hæ autem
quan-

quantitates, ut supra notavimus, generali nomine dicuntur Proportionales.

8. *Cum vero prima quantitas secundam pluribus vel paucioribus vicibus contineat, quam tertia continet quartam, tunc prima ad secundam dicitur habere majorem vel minorem rationem quam tertia ad quartam.*

Ponantur quatuor numeri 8. 2. 6. 3. ex quibus primus 8 secundum numerum 2 pluribus vicibus (scilicet quatuor) contineat quam tertius 6 quartum 3. (quid-
lum bis continet), ratio quam 8 habet ad 2 erit major ratione 6 ad 3. Ex rationis enim natura supra vidimus rationem 8 ad 2 exprimi posse per fractionem $\frac{8}{2}$ (cujus valor est 4), ut & rationem 6 & 2, per fractionem $\frac{6}{3}$ (quæ tantum 2 valet) Cum autem fractio prima secunda major sit, patet etiam immediate ex rationis natura primam rationem secundam esse majorem.

Deinde ex quatuor numeris 12. 6. 8. 2. primus numerus 12 secundum 6 paucioribus

bus vicibus contineat (sc. bis) quam tertius 8 quantum 2 (utpote quater) : erit fractio $\frac{12}{6}$ minor fractione $\frac{8}{2}$ quippe prima valet tantum 2 secunda vero 4. Cum autem fractio & ratio unum idemque sonent, etiam primam rationem secunda minorem esse patebit.

9. *Proportio vero in tribus ad minimum terminus consistit.*

Quælibet ratio duos requirit terminos: unum antecedentem & unum consequentem : Proportio vero duas ad minimum exigit rationes : adeoque quatuor postulat terminos : qui expresse etiam requiruntur si proportio non sit continua : si vero proportio constituatur continua, tres termini sufficiunt, & tum medium bis sumendo idem est ac si quatuor essent positi. Quemadmodum in numeris 2. 4. 8. vel 16. 8. 4. vel aliis tribus quibuslibet, ratio primi ad secundum est prima ; ratio vero ejusdem secundi ad tertium est altera, quæ duæ unam constituunt proportionem.

10. *Cum tres quantitates proportionales fuerint, prima ad tertiam dicitur duplicatam habere rationem eam quam eadem prima habet ad secundam.*

At vero cum quatuor quantitates fuerint continue proportionales; prima ad quartam dicitur triplicatam habere eam rationem, quam eadem prima habet ad secundam.

Et sic porro uno amplius, quamdiu proportio exstiterit.

Quidam putant rationem duplam & rationem duplicatam, unam & eandem rem significare, quæ duotamen accurate a se invicem sunt distinguenda.

Ratio enim dupla intercedit inter duas quantitates seu numeros, quorum unus alterum præcise bis continet: quemadmodum numeri 8 ad 4. vel 6 a 3. sunt in ratione dupla: cujus correlarum ratio sub dupla est in rationibus 4 ad 8 vel 3 a 6.

Duplicata vero ratio etiam invenitur
in

in numeris, ubi rationis duplæ ne minimum apparet vestigium. Exemplo gratia in hisce tribus numeris continue proportionalibus 3. 9. 27. ratio quam primus 3 ad tertium 27 est duplicata rationis quam idem numerus primus 3 habet ad secundum 9; licet nulla inter illos inveniatur dupla; unde patet rationem duplam & duplicatam significare res toto cælo diversas.

Dicitur autem ista ratio duplicata, quia ratio quæ est inter primum numerum & secundum, inter secundum & tertium adhuc semel quasi repetitur. Notandum autem est hanc rationis repetitionem non aliter concipiendam esse quam per formam Multiplicationis; ita ut positis rationis terminus 3 ad 9, ad repetendam adhuc semel eandem rationem illius termini per se ipsos debere multiplicari, scilicet 3 per 3 & 9 per 9. ut obtineatur ratio terminorum 9 ad 81, quæ ratio erit duplicata rationis 3 ad 9.

Adeoque primus terminus 3 se habebit ad tertium 27 ut 9 ad 81. Illos quippe numeros esse proporaionales evidenter ex rationis & proportionalium natura antea tradita fit manifestum, cum nim. primus

3 in secundo 27 tot vicibus (scilicet novies) continetur, quot vicibus tertius 9 continetur in quarto 81.

Si jam porro ponantur quatuor continue proportionales 2. 4. 8. 16. ratio quæ est inter primum 2 & secundum 4, prima vice repetitur inter secundum 4 & tertium 8; & deinde secunda vice inter tertium 8 & quartum 16. Quæ repetitio cum per multiplicationem fiat, ut rationis 2 ad 4 inveniatur triplicata, termini 2 & 4 primo debent per se ipsos multiplicari; cujus multiplicationis productis 4 & 16 adhuc semel per eosdem terminos 2 & 4 multiplicatis obtinebuntur termini 8 & 64, constituentes quæsitam rationem triplicatam. Terminos enim 2. 16. 8. 64. esse inter se proportionales ex natura rationis facile probari potest.

Cæterum ex his omnibus notandum venit, rationem duplicatam nihil aliud esse quam rationem quadratorum, quæ a propositæ rationis terminis fiunt. Rationem autem triplicatam alicujus rationis unam eandemque esse cum ratione cuborum, qui a terminis fiunt.

II. *Homologæ quantitates (in quatuor proportionalibus) dicuntur*

vous (scā
vicibus z

tar esse antecedentes quidem antecedentibus, consequentes vero consequentibus.

in quatuor

S. 16. m

cundem

cundem

da vicat

Qua

em fin.

r triplicat

bona per

licat

percha

is con

uenit

emine

per

ri

ous

am

ar

s ha

icis

cum

is

ates

dit

Sint quatuor proportionales 2. 4. 3. 6. quantitas prima 2 & tertia 3 sunt utriusque rationis antecedentes, adeoque homologæ seu ejusdem naturæ rem significantes: duæ vero reliquæ sc. secunda 4 & quarta 6, quia utriusque rationes sunt consequentes, similiter sunt homologæ.

De modis argumentandi.

Cum Mathematici ex quatuor proportionalibus non unam tantum sed plures eliciant conclusiones, quas modos seu formulas argumentandi vocant; Euclides illos ad sex revocat, qui totidem sequentibus proponuntur definitionibus, & in hoc libro 5 totidem fere propositionibus demonstrantur.

12. Alterna ratio est sumptio antecedentis ad antecedentem, & consequentis ad consequentem.

Sint quatuor quantitates proportionales

$$12 - 6 = 8 \mid 4.$$

In quibus 12 & 8 sint antecedentes; reliqui vero 6 & 4 consequentes; alternando erit

$$12 - 8 = 6 \mid 4:$$

Hoc est Antecedens 12 est ad antecedentem 8, sicut consequens 6 ad consequentem 4. Id quod demonstratur prop. 16.

13. *Inversa ratio est sumptio consequentis instar antecedentis ad antecedentem velut consequentem.*

Si ponantur quatuor proportionales

$$12 - 6 = 8 \mid 4.$$

Ratione inversa fit erit.

$$6 - 12 = 4 \mid 8.$$

Seu ordine retrogrado priorem proportionem legendo

$$4 - 8 = 6 \mid 12.$$

14. *Compositio rationis est sumptis antecedentis cum consequente*

quente velut unus ad ipsum consequentem.

Sint iterum quatuor proportionales

$$12 - 6 = 8 \mid 4.$$

Per compositionem rationis dicimus,

$$\frac{12 \div 6}{\text{feu } 18} - 6 = \frac{8 \div 4}{\text{feu } 12} \mid 4.$$

Hoc est prima quantitas una cum secunda sese habet ad ipsam secundam sicut tertia cum quarta ad ipsam quartam. Hujus demonstrationem vide prop. 18.

15. Divisio rationis est sumtio excessus, quo antecedens superat consequentem, ad ipsum consequentem.

Sint quatuor proportionales.

$$18 - 6 = 12 \mid 4.$$

Per divisionem rationis proportio sic stabit.

$$\frac{18 \div 6}{\text{feu } 12} - 6 = \frac{12 \div 4}{\text{feu } 8} \mid 4.$$

Hoc est primus terminus minus sem dempto secundo se habet ad ipsum secundum

cundum, quemadmodum tertius minus seu dempto quarto ad ipsum quartum. Hic argumentandi modus demonstratur prop. 17.

15. Conversio rationis est sumptio antecedentis ad excessum, quo antecedens superat ipsum consequens.

Propositi sint quatuor proportionales.

$$18 - 6 = 12 \mid 4.$$

Per conversionem rationis hanc habemus proportionem.

$$18 - \frac{18 - 6}{\text{seu } 12} = 12 \mid \frac{12 - 4}{\text{seu } 8}.$$

Hoc est primus se habet ad ipsum primum minus seu dempto secundo, quemadmodum tertius se habet ad ipsum tertium minus seu dempto quarto. Hæc demonstratur in Coroll. prop. 17.

17. Ex æqualitate ratio est, si plures duabus sint quantitates, & his aliæ multitudine pares, quæ binæ sumantur in eadem ratio-

tionem; cum ut in primis quantitibus prima ad ultimam, sic & in secundis prima ad ultimam se habeat.

Sint tres quantitates. 12. 6. 4.

Et adhuc tres aliæ. 6. 3. 2.

Per rationem quæ est ex æqualitate concludimus

$$12 - 4 = 6 \mid 3.$$

Hoc est prima superiorum se habet ad suam ultimam, quemadmodum prima inferiorum ad suam tertiam.

Quia autem hæc conclusio duobus modis ex istis sex quantitatibus elicitur, duplex etiam se aperit ex æqualitate ratio; sc. Ordinata & Perturbata.

18. *Ordinata proportio est, cum fuerit (positis scilicet sex quantitatibus) ut prima superiorum ad suam secundam, ita prima inferiorum ad suam secundam; deinde ut secunda superiorum ad suam ultimam, ita secunda inferiorum ad suam ultimam: & con-*

XX

clu-

*cluditur quod prima superiorum
se habeat ad suam ultimam, quem-
admodum prima inferiorum ad
suam ultimam.*

Sint tres quantitates 12. 6. 4.

Et tres aliæ 6. 3. 2.

In quibus $12 - 6 = 6 \mid 3.$

Deinde $6 - 4 = 2 \mid 2.$

Proportio ex æquo ordinata sic stabit.

$$12 - 4 = 8 \mid 2.$$

Hujus modi demonstrationem vide
prop. 22.

Cæterum hæc proportio dicitur Ordi-
nata; quia & in superioribus & in infe-
rioribus eundem servat ordinem.

19. *Perturbata autem propor-
tio est, cum positis tribus quanti-
tatibus & aliis tribus; ut in supe-
rioribus prima se habeat ad suam
secundam, sic in inferioribus se-
cunda ad suam ultimam: & in su-
perioribus secunda ad suam ulti-
mam, ita in inferioribus prima
ad suam secundam: & concludi-
tur*

*tur : quod prima superiorum se-
ita habeat ad suam ultimam ;
quemadmodum prima inferiorum
ad suam ultimam.*

Sint tres quantitates 12. 6. 3.

Et alia totidem 16. 8. 4.

In quibus $12 - 6 = 8 \mid 4.$

Et $6 - 3 = 16 \mid 18.$

Proportio ex æquo perturbata sic erit

$12 - 3 = 16 \mid 4.$

Hujus demonstrationem vide pro. 23.

Perturbata dicitur hæc proportio,
quod in superioribus & inferioribus non
idem fervetur ordo, sed ille quasi pertur-
berur.

LEMMA I.

*Multiplicatio nihil est aliud
quam multiplex additio: sicut e-
tiam divisio nihil aliud quam mul-
tiplex & compendiosa subtractio.*

DEMONSTRATIO.

Pars I. Sit numerus 6 multiplicandus

X x 2

per

per numerum 4, nihil aliud imperatum est quam, ut numerus 6 toties sumatur, seu repetatur seu sibi ipsi addatur, quoties unitas continetur in 4, sc. quater: adeoque idem facimus sive numerum 6 multiplicemus per 4, sive eundem quater ponam & illos quatuor numeros 4 in unam summam colligam, cum utrobique obtineatur 24.

Pars 2. Si numerus 24 proponatur dividendus per numerum 4, idem est ac si examinandum esset, quoties numerus 4 a 24 possit subtrahi id quod in divisione unica subductione fit divisore prius per quotientem multiplicato cum subtractiones tot fieri possint, quot unitates divisionis contineat quotiens. Quare nulla est differentia sive 24 dividatur per 4 sive 4 a 24 subtrahatur quoties fieri potest cum utrobique idem obtineatur quotiens 6.

Notandum autem in multiplicatione non semper opus esse ut multiplicatio revera fiat, & numeri inter se commiscantur, ut productum unico numero exprimatur; cum eadem multiplicatio alia etiam forma designari possit, nimirum multiplicatores juxta se invicem scribendo

do interposito signo . x .

Ex. gr: sit 8 multiplicandus per 4 facta multiplicatione obtinetur productum 32, quod etiam hoc modo exprimi potest $8 \cdot x \cdot 4$. quod in pronuntiatione valet 8 multiplicata per 4.

Quæ exprimendi forma hoc habet commodum quod jam pateat ad oculum per quam operationem & ex quibus numeris illud productum sit ortum, quod in altero producto 32 non tam clare distinguere potest. cum illud etiam ex multis aliis additionibus & multiplicationibus generari potuisset.

Præterea si productam $8 \cdot x \cdot 4$ dividendum sit per 4, omisso numero 4 scribendum erit 8. vel scribendum est 4, si dividi debeat per 8.

Similiter in divisione non opus est ut semper vera fiat divisio; cum quotiens quæsitus etiam alia forma possit exprimi, si nim. numero dividendo subscribatur divisor inter utrumque ducta lineola.

Ex. gr. oporteat dividere numerum 32 per 8, facta reali divisione obtinetur quotiens 4, qui etiam designari posset per formam fractionis $\frac{32}{8}$, qui quo-

X x 3 tiens

tiens in elocutione idem valet 32 partes quartæ, seu 32 divisa per 4.

LEMMA II.

Si duo aequales numeri per eundem numerum multiplicentur, producta erunt inter se æqualia. Si vero per eundem numerum dividantur, quotientes erunt æquales.

DEMONSTRATIO.

1 Pars. Per Lemna 1 multiplicatio est multiplex & compendiosa additio: adeoque unus numerus multiplicandus toties sibi additur, quoties alter (qui priori ponitur æqualis) sibi ipsi additur: quia multiplicator utrimque ponitur idem: unde patet idem fieri ac si æqualibus æqualia addantur; quando nimirum summæ (quæ producto æquivalent) inter se sunt æquales:

• Ax. 2.

2. Pars. Per idem Lemna 1 divisio est multiplex ac compendiosa subtractio: ergo ab uno numero dividendo toties subtrahitur divisor quoties ab altero dividendo (qui per hypothesein priori æqualis est)

est) subtrahitur idem divisor : quare in ista divisione utrinque idem fit, ac si ab æqualibus æqualia demantur; quare residua (quæ quotientibus æquivalent) inter se sunt æqualia.

b Ax. 3.

L E M M A III.

Si duo in æquales numeri per eundem numerum multiplicentur producta erunt inter se inæqualia. Si vero per eundem divisorem dividantur, quotientes erunt inæ-
les.

D E M O N S T R A T I O.

1 Pars. Cum per Lemna 1 multiplicatio sit compendiosa Additio: si duo numeri inæquales per eundem numerum multiplicentur, idem est ac numerus major toties sibi addatur quoties minor minori. At vero si inæqualibus æqualia adjiciantur, a tota sunt inæqualia per Ax. a Ax. 4.]

4. Ergo etiam, si numero majori major toties adjiciatur quoties minori additur minori, prior summa, quæ hic producto æquivalet, erit maior altera.

2. Pars

2 Pars. Quia divisio nihil aliud est quam compendiosa subtractio, si duo numeri inæquales per eundem numerum dividantur, nihil aliud fit quam quod idem numerus ab una parte a majori subtrahitur, ab altera vero a minori.

Patet autem eundem numerum pluries subtrahi a majori posse quam a minori; cum major eundem numerum pluries contineat quam minor: & cum plures istæ subtractionis vices constituent majorem quotientem, sequitur ex divisione majoris numeri per alium quemlibet acquiri majorem quotientem, quam ex minoris numeri per eundem divisione.

LEMMA IV.

Si idem numerus vel duo numeri æquales per numeros inæquales multiplicentur, producta erunt inæqualia, & quidem productum majoris multiplicatoris erit majus producto minoris multiplicatoris.

Ut & si dividantur per numeros inæquales, quotientes erunt inæquales. Major quidem ille ubi di-

*divisor est minor; at vero minor,
ubi divisor est major.*

DEMONSTRATIO.

Hæc ex superioribus nullo negotio deduci potest.

Quatuor hisce Lemmatibus præmissis, & qualicunque Arithmeticarum in fractionibus operationum notitia præsupposita, quædam subjungimus Theoremata, quæ tanquam generale omnium fere totius libri quinti propositionum demonstrandarum fundamentum præstruimus.

THEOREMA I.

Si quatuor quantitates sint proportionales, productum quod oritur ex multiplicatione extremarum est æquale producto multiplicationis mediarum.

DEMONSTRATIO.

Sint quatuor proportionales.

$$8 : 4 :: 6 : 3.$$

Ratio 8 ad 4 eadem est cum fractione

Y y

&c

$\frac{8}{4}$ & ratio 6 ad 3 exprimitur per fractionem $\frac{6}{3}$: quia autem rationes sunt eadem seu æquales; erunt quoque fractiones inter se inter se æquales.

$$\text{Adcoque } \frac{8}{4} \propto \frac{6}{3}.$$

———— utrinque multipl. per 4.

$$8 \propto \frac{4 \cdot x \cdot 6}{3} \text{ Per Lemma 2.}$$

Et ——— utrimque multipl. per 3.

$$8 \cdot x \cdot 3 \propto 4 \cdot x \cdot 6 \text{ per Lem. 2.}$$

Hoc est productum extremorum 8 & 3 per se invicem multiplicatorum est æquale producto mediorum etiam multiplicatorum. Q. E. D.

THEOREMA II.

Si duo producta sint inter se æqualia, unus multiplicator primi producti se habet ad unum multiplicatorem secundi producti, quemadmodum reciproce alter multiplicator ejusdem secundi producti se habet ad alterum multiplicatorem primi producti.

De-

DEMONSTRATIO.

Sint duo producta inter se æqualia.

$$8 \cdot x \cdot 3 \propto 4 \cdot x \cdot 6. \text{ per Lemma 2.}$$

$$\text{utrinque divid. per 3.}$$

$$8 \propto 4 \cdot \frac{x \cdot 6}{3} \text{ per Lemma 2.}$$

utrinque divid. per 4.

$$\frac{8}{4} \propto \frac{6}{3} \text{ per Lemma 2.}$$

Quæ fractiones si revocentur ad rationes. erit

$$8 - 4 = 6 \mid 3.$$

Quod juxta tenorem Theorematis E. D.

COROLLARIUM I.

Eodem modo posset demonstrari esse.

$$8 - 6 = 4 \mid 3.$$

$$\text{Vel } 3 - 4 = 6 \mid 8.$$

$$\text{Vel } 3 - 6 = 4 \mid 3.$$

Quæ proportionales involvant tum Alternationem, tum inversam etiam rationem.

COROLLARIUM II.

Hinc evidenter patet, si quælibetunque quatuor quantitates eo ordine sint positæ, & productum extremarum producto mediarum fuerit æquale, certissime inde concludi posse, istas quatuor quantitates eo ordine proportionales esse.

SCHOLIUM.

Si quilibet datus numerus ex.gr. 24. resolvatur in duos per quorum multiplicationem potuerit generari (quod hic quater potest fieri vel per 1 in 24. vel per 2 in 12. vel per 3 in 8. vel per 4 in 6.) facile probatur esse.

	1	—	2	=	12	1	24.
Vel	2	—	3	=	8	1	12.
Vel	3	—	4	=	6	1	8.
Vel	1	—	3	=	8	1	24.
Vel	1	—	4	=	6	1	24.
Vel	2	—	4	=	6	1	12.

Et sic de quolibet alio numero dato.

Theore-

THEOREMA III.

Si ex quatuor quantitibus prima ad secundam majorem habeat rationem, quam tertia ad quartam: productum quod fit per multiplicationem extremarum majus erit producto mediarum.

DEMONSTRATIO.

Sit in quatuor hisce quantitibus

$$8 - 3 < 4 \mid 2.$$

Erit secundum ante dicta.

$$\frac{8}{3} < \frac{4}{2}.$$

utrinque multipl. per 3.

$$8 < \frac{3 \cdot x \cdot 4}{2} \text{ per Lemma 3.}$$

utrinque multipl. per 2.

$$8 \cdot x \cdot 2 < 3 \cdot x \cdot 4. \text{ per Lemma 3.}$$

Hoc est productum extremorum 8 & 2 majus producto mediorum 3 & 4.

Q. E. D.

Yy 3

Theore

THEOREMA IV.

*Si duo producta sint inæqualia,
prima quantitas multiplicans ma-
joris producti ad primam quanti-
tatem multiplicantem minoris pro-
ducti majorem habebit rationem,
quam reciproce secunda quantitas
ejusdem minoris producti ad se-
cundam quantitatem majoris pro-
ducti.*

DEMONSTRATIO.

Sit ex propositis hæc productis

$$8 \cdot x \cdot 2 < 3 \cdot x \cdot 4.$$

utrinque divid. per 2.

$$8 < \frac{3 \cdot x \cdot 4}{2} \text{ per Lemma 3.}$$

utrimque div. per 3.

$$\frac{8}{3} < \frac{4}{2}$$

Hoc est redigendo hæc fractiones ad
rationes

$$8 - 3 < 4 \mid 2.$$

Q. E. D.

Co-

COROLLARIUM I.

Eadem methodo facile posset demon-
strari esse

$$\begin{array}{l} 8 \text{ ————— } 4 < 3 \text{ l } 2. \\ \text{Vel } 2 \text{ ————— } 3 < 4 \text{ l } 8. \\ \text{Vel } 2 \text{ ————— } 4 < 3 \text{ l } 2. \end{array}$$

COROLLARIUM II.

Hinc sequitur, si quælibet cunque
quatuor quantitates ordine sint positæ, &
productum extremarum producto me-
diarum sit majus, firmiter concluden-
dum esse, primam ad secundam habere
majorem rationem, quam tertia habet
ad quartam.

S C H O L I U M.

Si duo quilibet numeri inæquales 24
& 16 resolvantur in suos multiplicationes

sc: 24

in

1. 24.

2. 12.

3. 8.

4. 6.

& 16.

in

1. 16.

2. 8.

4. 4.

ex hoc Theoremate patet esse

$$\text{Vel } 1 \text{ — } 1 < 16 \mid 24.$$

$$\text{Vel } 1 \text{ — } 2 < 8 \mid 24.$$

$$\text{Vel } 1 \text{ — } 4 < 4 \mid 24.$$

Deinde

$$\text{Vel } 2 \text{ — } 1 < 16 \mid 12.$$

$$\text{Vel } 2 \text{ — } 2 < 8 \mid 12.$$

$$\text{Vel } 2 \text{ — } 4 < 4 \mid 12.$$

Postea.

$$\text{Vel } 3 \text{ — } 1 < 16 \mid 8.$$

$$\text{Vel } 3 \text{ — } 2 < 8 \mid 8.$$

$$\text{Vel } 3 \text{ — } 4 < 4 \mid 8.$$

Denique

$$\text{Vel } 4 \text{ — } 1 < 16 \mid 6.$$

$$\text{Vel } 4 \text{ — } 2 < 8 \mid 6.$$

$$\text{Vel } 4 \text{ — } 4 < 4 \mid 8.$$

Præter alias 36 majoritatis proportion-
nes, quæ ex hisce numeris elici possunt.

THEOREMA 5.

Si ex quatuor quantitatibus prima ad secundam minorem habeat rationem, quam tertia ad quartam; productum quod fit per multiplicationem extremarum minus erit producto mediarum.

DEMONSTRATIO.

Sit in quatuor hęc quantitatibus

$$4 - 2 > 8 \mid 3.$$

$$\text{Erit } \frac{4}{2} > \frac{8}{3}$$

utrinque multipl. per 3.

$$\frac{4 \cdot x \cdot 3}{2} > 8. \text{ Per Lemma 3.}$$

utrinque multipl. per 2.

$$4 \cdot x \cdot 3 > 8 \cdot x \cdot 2: \text{ per Lemma 3,}$$

Hoc est productum extremarum 4 & 3 est minus producto mediarum 2, 8;

THEOREMA 6.

Si duo producta sint inæqualia, prima quantitas multiplicans minoris producti ad primam quantitatem multiplicantem majoris producti minorem habebit rationem, quam reciproce secunda quantitas ejusdem majoris producti ad secundam quantitatem minoris producti.

DEMONSTRATIO.

Sit ex duobus hisce productis.

$$4 \cdot x \cdot 3 > 8 \cdot x \cdot 2.$$

utrinque divid. per 2.

$$\frac{4 \cdot x \cdot 3}{2} > 8. \text{ Per Lemma 3.}$$

utrinque div. per per 3.

$$\frac{4}{2} > \frac{8}{3} \text{ per Lemma 3.}$$

Hoc est redigendo ad rationes

$$4 : 2 > 8 : 3.$$

Co.

COROLLARIUM I.

Eadem methodo facile posset demon-
strari. quod sit

$$\begin{array}{l} 4 \text{ --- } 8 > 2 \text{ } 1 \text{ } 3. \\ \text{Vel } 3 \text{ --- } 8 > 2 \text{ } 1 \text{ } 4. \\ \text{Vel } 3 \text{ --- } 2 > 8 \text{ } 1 \text{ } 4. \end{array}$$

COROLLARIUM. II.

Hinc patet, si quælibet cunque qua-
tuor quantitates ordine sint positæ, &
productum extremarum sit minus pro-
ducto mediarum, certissime concludi,
primam ad secundam habere minorem ra-
tionem, quam tertia ad quartam.

SCHOLIUM.

Si duo quilibet numeri inæquales 16 &
24 resolvantur in suos multiplicatores:

sc: 16.	24.
in	
1. 16.	1. 24.
2. 8.	2. 12.
4. 4.	3. 8.
	4. 6.

Ex hoc Theoremate patet esse

1	—	1	>	24		16.
Vel 1	—	2	>	12		16.
Vel 1	—	3	>	8		16.
Vel 1	—	4	>	6		16.

Præterea.

Vel 2	—	1	>	24		8.
Vel 2	—	2	>	12		8.
Vel 2	—	3	>	8		8.
Vel 2	—	4	>	6		8.

Denique

Vel 4	—	1	>	24		4.
Vel 4	—	2	>	12		4.
Vel 4	—	3	>	8		4.
Vel 4	—	4	>	6		4.

Præter alias 36 minoritatis proportionēs, quæ ex hisce numeris deduci possunt.

Jam sequuntur ipsæ Libri quinti Propositiones.

PROPOSITIO I.

*Si sunt quotcunque magnitudi-
nes seu quantitates proportionales
A. B. C. D. E. F. quemadmodum
se habuerit una antecedentium ad
suam consequentem, ita omnes
antecedentes G simul se habebunt
ad omnes consequentes etiam simul
sumptas H.*

DEMONSTRATIO.

Sint in eadem inter se ratione

$$\begin{array}{rcl} A & 3 & \text{---} 1 B \\ C & 6 & \text{---} 2 D \\ E & 9 & \text{---} 3 F \\ \hline G & 18 & \text{---} 6 H. \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{rcl} A & 3 & \text{---} 1 B \\ C & 6 & \text{---} 2 D \\ E & 9 & \text{---} 3 F \end{array}} \right\} A$$

Demonstrandum est esse summam ad
summam ut quælibet antecedens ad suam
consequentem.

Hoc est $18 \text{ --- } 6 = 3 \text{ l } 1.$

Deinde $18 \text{ --- } 6 = 6 \text{ l } 2.$

Denique $18 \text{ --- } 6 = 9 \text{ l } 3.$

Quia in qualibet proportionem produ-
ctum extremorum facta multiplicatione
est æquale producto mediorum, quatuor
illarum termini sunt ^a proportionales.

^a 2 Coroll.
Theor. 2.

PROPOSITIO II. & XXIV.

Si prima *A* ad secundam *B* eandem habuerit rationem, quam tertia *C* ad quartam *D*; habuerit autem & quinta *E* ad secundam *B* eandem rationem quam sexta *F* ad quartam *D*; Etiam *G*, composita prima cum quinta ad secundam *B*, eandem habebit rationem quam *H* tertia cum sexta ad quartam *D*.

DEMONSTRATIO.

$$\begin{array}{cccc} A & B & C & D \\ \text{Sit } 4 & 2 & 6 & 1 \\ E & 10 & 15 & 3 \cdot A, \\ G & 14 & H & 21 \end{array}$$

Si instituaturs multiplicatio, producta erunt aequalia, ergo (a) istae quantitates sunt proportionales.

a Theor.
2.

Aliter

$$\begin{array}{r} \frac{4}{2} \propto \frac{6}{3} \\ \frac{10}{2} \propto \frac{15}{3} \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{r} \frac{4}{2} \propto \frac{6}{3} \\ \frac{10}{2} \propto \frac{15}{3} \end{array}} \right\} A.$$

b Ax. 2.

$$\frac{14}{2} b \propto \frac{21}{3} \text{ vel in proportione.}$$

$$14 \propto 21. \quad 13. \quad Q. E. D.$$

Pro

PROPOSITIO III.

Si quatuor quantitates A. B. C. D. sint proportionales; & prima A & tertia C per eundem quemlibet numerum G multiplicentur: productum primum E se habebit ad secundam B, quemadmodum productum secundum F ad quartam D.

DEMONSTRATIO.

$$\begin{array}{rcl} \text{A} & \text{B} & \text{C} & \text{D} \\ 4 & \text{---} & 2 & \text{---} & 6 & 1 & 3 \\ \text{G } 2 & & \text{G } 2 & & & & \\ \hline \text{E } 8 & & \text{F } 12 & & & & \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{rcl} \text{A} & \text{B} & \text{C} & \text{D} \\ 4 & \text{---} & 2 & \text{---} & 6 & 1 & 3 \\ \text{G } 2 & & \text{G } 2 & & & & \\ \hline \text{E } 8 & & \text{F } 12 & & & & \end{array}} \right\} \text{M.}$$

Demonstrandum est

$$\begin{array}{rcl} \text{E} & \text{B} & \text{F} & \text{D} \\ 8 & \text{---} & 2 & \text{---} & 12 & 1 & 3 \end{array}$$

Id quod (a) exinde patet, quod producta extremorum & mediorum sunt æqualia, a. Theor. 2.

Aliter

$$\frac{4}{2} \propto \frac{6}{3}$$

utrimque multipl. per 2.

$$\frac{8}{2} \propto \frac{12}{3}$$

Lemna 2.

Hoc est in proportione

$$8 \text{ --- } 2 = 12 \text{ --- } 3$$

Pro-

PROPOSITIO. IV.

Si quatuor quantitates A. B. C. D. sint proportionales; prima vero A & tertia C. per quemlibet eundem numerum G multiplicentur; ut & secunda B & tertia D per alium numerum K. quatuor ista producta inter se proportionalia erunt.

DEMONSTRATIO.

Sint quatuor proportionales

$$\begin{array}{ccccccc} A & B & C & D & & & \\ 4 & 2 & 6 & 12 & & & \\ G & K & G & K & & & \\ \hline E & L & F & M & & & \end{array}$$

Demonstrandum est quatuor producta E. L. F. M. esse proportionalia seu

$$8 : 6 :: 12 : 9.$$

Quod ex Theor. 2 sequitur, quia facta multiplicatione producta extremorum & mediorum inter se sunt aequalia.

Aliter

$$\frac{4}{2} \propto \frac{6}{3}$$

multipl. per 2.

$$\frac{8}{2} \propto \frac{12}{3} \text{ Lemma 2.}$$

divide per 3,

$$\frac{8}{6} \propto \frac{12}{9} \text{ per idem Lemma 2.}$$

Hoc est in proportione

$$8 : 6 :: 12 : 9.$$

Pro-

PROPOSITIO V. XIX.

Si totum A ad totum B eandem habuerit rationem, quam ablata pars C ad partem ablatam D: etiam pars reliqua E ad partem reliquam F, eandem habebit rationem, quam totum A ad totum B.

DEMONSTRATIO.

$$\begin{array}{rcl} A & 8 & 4 \quad B \\ C & 6 & 3 \quad D/S \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccc} \text{Erit} & E & F & A & B. \\ & 2 & - & 1 & = & 8 \quad 1 \quad 4. \end{array}$$

Quia producta sunt æqualia.
per Theor. 2.

PROPOSITIO VI.

Si prima A ad secundam B eandem habuerit rationem, quam tertia C ad quartam D, habuerit autem & quinta E ad secundam B eandem rationem quam sexta F ad quartam D. Si quinta E subtrahatur à prima A, & sexta F à tertia C,

Vel residuum primum G erit æquale secundæ B & residuum secundum H æquale quartæ D.

Vel residuum primum G se habebit ad secundam B sicut residuum secundum H ad quartam D.

DEMONSTRATIO.

CASUS I.

A	B	C	D
12	2	18	1 3/5
E 10	—	F 15.	
G 2	=	H 3.	

CASUS II.

$$\begin{array}{ccccccc}
 A & B & C & D & & & \\
 12 & - & 2 & = & 18 & 1 & 3. \\
 E & 4 & & & F & 6 & \\
 \hline
 \text{Erit } G & B & H & D. & & & \\
 8 & - & 2 & = & 12 & & 3.
 \end{array}$$

Per Theor. 2

Alter.

CASUS I.

$$\begin{array}{ccc}
 \frac{12}{2} & \propto & \frac{18}{3} \\
 \hline
 \frac{10}{2} & \propto & \frac{15}{3}
 \end{array}
 \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} S$$

$$\frac{2}{2} \propto \frac{3}{3} \quad \text{per Axioma 3.}$$

Erit in proportione, quæ ex rationis æqualitatis

$$2 - 2 = 3 \quad 1 \quad 3.$$

CASUS II.

$$\begin{array}{ccc}
 \frac{12}{2} & \propto & \frac{18}{3} \\
 \hline
 \frac{4}{2} & \propto & \frac{6}{3}
 \end{array}
 \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} S.$$

$$\frac{8}{2} \propto \frac{12}{3}$$

Hoc est in proportione

$$8 - 2 = 12 \quad 1 \quad 3.$$

Aaa 2 Pro-

PROPOSITIO VII.

1. *Æquales A & A ad eandem C eandem habent rationem.*

2. *Et eadem C ad æquales A & A eandem habet rationem.*

DEMONSTRATIO.

PARS I.

$$\begin{array}{cccc} A & C & A & C. \\ 12 & \sim & 4 & = 12 \mid 4. \end{array}$$

PARS II.

$$\begin{array}{cccc} C & A & C & A. \\ 4 & \sim & 12 & = 4 \mid 12. \end{array}$$

Quia utrobique producta sunt æqualia. per Th: 2.

Pro.

PROPOSITIO VIII.

1. Inæqualium quantitatū *A.*
B. major *A* ad eandem *C* majorem
 rationem habet, quam minor *B.*

2. Et eadem *C* ad minorem *B*
 majorem habet rationem quam ad
 majorem *A.*

DEMONSTRATIO.

PARS I.

$$\begin{array}{ccc} A & & B \\ 16 & < & 8 \text{ ex hypoth.} \end{array}$$

utrinque divide per 5. *C.*

$$\frac{16}{5} < \frac{8}{5} \text{ per Lemma 3.}$$

Hoc est in proportione

$$16 - 5 < 8 \quad 1 \quad 5.$$

PARS II.

$$\frac{5}{8} > \frac{5}{16} \text{ D.}$$

$$\frac{5}{8} > \frac{5}{16} \text{ per Lemma 4.}$$

Hoc est in proportione.

$$5 - 8 < 5 \quad 1 \quad 16.$$

Aaa 3

Pro-

PROPOSITIO IX.

1. Si A & B eandem C habeant eandem rationem, illæ æquales inter se erunt.

2. Et si eadem C ad A & B habeat eandem rationem, illæ itidem æquales erunt.

DEMONSTRATIO.

PARS I.

$A \quad C \quad B \quad C$

$15 \quad - \quad 4 \quad = \quad 15 \quad | \quad 4.$

Ergo $\frac{15}{4} \propto \frac{15}{4}.$

$15 \propto 15.$ multipl. per 4.

PARS II.

$C \quad H \quad C \quad B$

$4 \quad - \quad 15 \quad = \quad 4 \quad | \quad 15.$

Ergo $\frac{4}{15} \propto \frac{4}{15}.$

$15 \cdot x \cdot 4 \propto 15 \cdot x \cdot 4.$ mult. per 15.
 per Lem. 2.

 div. per 4.
 $15 \propto 15.$ per idem Lemma 2.
 Pro-

PROPOSITIO. X.

1. Si A ad C majorem rationem habet quam B ad eandem C , erit A major quam C .

2. At si eadem C ad B majorem rationem habuerit quam ad A , erit B minor quam A .

DEMONSTRATIO.

PARS I:

$$\begin{array}{ccccccc} A & C & & B & C \\ 16 & \text{---} & 4 & < & 8 & 1 & 4. \\ \text{Ergo} & \frac{16}{4} & < & \frac{8}{4} \end{array}$$

$$16 < 8. \quad \begin{array}{l} \text{mult. per 4.} \\ \text{per Lemma 3.} \end{array}$$

PARS II.

$$\begin{array}{ccccccc} C & B & & C & A. \\ 4 & \text{---} & 8 & < & 4 & 1 & 16. \\ \frac{4}{8} & < & \frac{4}{16} \end{array}$$

$$4 < \frac{4 \cdot x \cdot 8}{16} \quad \begin{array}{l} \text{Multipl. per 8.} \\ \text{per Lemma.} \end{array}$$

Mul-

$$\begin{array}{r}
 \text{Multipl. per 16.} \\
 4 \cdot x \cdot 16 < 4 \cdot x \cdot 8. \text{ Lem. 3.} \\
 \hline
 16 < 8.
 \end{array}$$

div. per 4.

Alio modo.

$$\begin{array}{r}
 A \quad C \quad B \quad C \\
 16 - 4 < 8 \mid 4. \\
 \text{Ergo } 4 \cdot x \cdot 16 < 4 \cdot x \cdot 8. \text{ The. 3.} \\
 \hline
 16 < 8. \quad \text{Lemma 3.}
 \end{array}$$

div. per 4.

PARS II.

$$\begin{array}{r}
 C \quad B \quad C \quad A. \\
 4 - 8 < 4 \mid 16. \\
 \text{Ergo } 4 \cdot x \cdot 16 < 4 \cdot x \cdot 8. \text{ Theor. 4.} \\
 \hline
 16 < 8. \quad \text{Lemma 3.}
 \end{array}$$

div. per 4.

PROPOSITIO XI.

Rationes, quæ eidem rationi sunt eadem, vel similes vel æquales, inter se sunt eadem vel similes vel æquales.

DEMONSTRATIO.

Sit 8 — 4 = 6 l 3.

Et 10 — 5 = 6 l 3.

Erit 8 — 4 = 10 l 5.

Quia nimir. producta sunt æqualia. per Theor. 2. Vel sic.

$$\begin{array}{rcl} 8 & \propto & 6 \\ \hline 4 & & 3. \\ 10 & \propto & 6 \\ \hline 5 & & 3. \end{array}$$

Ergo $\frac{8}{4} \propto \frac{10}{5}$ Ax. I.

Hoc est in proportione.

8 — 4 = 10 l 5.

PROPOSITIO XII.

Hæc est eadem cum prima, quæ videri potest.

Bbb

Pro-

PROPOSITIO XIII.

Si prima ratio sit æqualis secundæ rationi; secunda vero sit maior tertiâ: similiter etiam prima tertia major erit.

DEMONSTRATIO.

Sit $16 \text{ — } 8 = 12 \text{ l } 6.$

At vero $12 \text{ — } 6 < 4 \text{ l } 3.$

Ergo $16 \text{ — } 8 < 4 \text{ l } 3.$

Quia productum extremorum est majus producto mediorum. per 2 Coroll. Theor: 4.

Vel hoc modo.

$$\frac{16}{8} \propto \frac{12}{6}$$

$$\text{Atqui } \frac{12}{6} < \frac{4}{3}.$$

$$\text{Ergo } \frac{16}{8} < \frac{4}{3}.$$

Et in proportionem

$$16 \text{ — } 8 < 4 \text{ l } 3.$$

PROPOSITIO XIV.

Si quatuor proportionalium A. B. C. D. prima A fuerit major tertia C, erit & secunda major quarta D.

Si A aequalis C erit B aequalis D.

Si A minor C, erit B minor D.

DEMONSTRATIO.

CASUS I.

A B C D

$$12 \text{ — } 8 = 6 \text{ 1 4.}$$

$$\text{Ergo } 12 \cdot x \cdot 4 \propto 8 \cdot x \cdot 6 \text{ Div.}$$

$$12 < 6$$

$$4 > 8. \text{ per Lemma 4.}$$

CASUS II.

A B C D.

$$12 \text{ — } 4 = 12 \text{ 1 4.}$$

$$\text{Ergo } 12 \cdot x \cdot 4 \propto 12 \cdot x \cdot 4 \text{ D.}$$

$$12 \propto 12$$

$$4 \propto 12. \text{ Per Lemma 2.}$$

CASUS III.

A B C D.

$$4 \text{ — } 6 = 8 \text{ 1 12.}$$

$$\text{Ergo } 4 \cdot x \cdot 12 \propto 6 \cdot x \cdot 8 \text{ D.}$$

$$4 > 8$$

$$12 < 6. \text{ Lemma 4.}$$

$$\text{Bbb 2}$$

$$\text{Proa}$$

PROPOSITIO XV.

Si duæ quantitates A & B aqualibus vicibus sumantur seu per eundem numerum multiplicentur, summæ seu producta habebunt inter se eandem rationem quam habent positæ quantitates A & B.

DEMONSTRATIO.

A	B	
4	12	
2	2	M.

$$\text{Erit } 8 \text{ — } 24 = 4 \mid 12.$$

Quia producta sunt æqualia. Theor: 2.

SCHOLIUM.

Si ædem quantitates A & B per eundem numerum dividantur, quotientes ipsis quantitatibus proportionales erunt.

A	B	
4	12	
2	2	D.

$$2 \text{ — } 6 = 14 \mid 12. \text{ per Th: 2.}$$

Pro-

PROPOSITIO XVI.

Si quatuor quantitates A. B. C. D. proportionales fuerint, illæ etiam vicissim proportionales erunt.

DEMONSTRATIO.

$$\begin{array}{cccc} A & B & C & D \\ 16 & - & 8 & = & 4 & 1 & 2. \end{array}$$

Erit etiam vicissim, seu permutando.

$$16 - 4 = 8 \ 1 \ 3.$$

Quia facta multiplicatione producta sunt æqualia, per Theor: 2.

SCHOLIUM.

Commode hic demonstratur ratio inversa. Sint Proportionales.

$$\begin{array}{cccc} A & B & C & D. \\ 16 & - & 8 & = & 4 & 1 & 2. \end{array}$$

Erit per Theor. I.

$$16 \cdot x \cdot 2 \propto 8 \cdot x \cdot 4.$$

Ergo per Theor: 2.

$$2 - 4 = 8 \ 1 \ 16.$$

Q. E. D.

PROPOSITIO XVII.

Si compositæ quantitates proportionales fuerint, illæ quoque divisæ proportionales erunt.

DEMONSTRATIO.

A B C D.

$$16 \text{ — } 12 = 8 \text{ l } 6.$$

Erit quoque dividendo.

$$\frac{16 \div 4}{\text{seu } 4} \text{ — } 12 = \frac{8 \div 2}{\text{seu } 2} \text{ l } 6.$$

Id quod multiplicatione probatur
per Theor. 2.

Vel alio modo per prop: 6 hujus

$$\begin{array}{r} 16 \text{ — } 12 = 8 \text{ l } 6. \\ 12 \qquad \qquad 6 \end{array} \Bigg| S$$

$$4 \text{ — } 12 = 2 \text{ l } 6. \text{ Q.D.E.}$$

SCHOLIUM.

Cum ratio conversâ commode hic inferi possit, sint proportionales.

$$16 \text{ — } 12 = 8 \text{ l } 6.$$

Erit convertendo

$$16 \text{ — } \frac{16 \div 4}{\text{f. } 4} = 8 \text{ l } \frac{8 \div 2}{\text{f. } 2}.$$

Quia nim: producta sunt æqualia:
per Theor: 2:

Pro.

PROPOSITIO XVIII.

Si divisæ quantitates proportionales fuerint, illæ quoque compositæ proportionales erunt.

DEMONSTRATIO.

A B C D.

$$4 \text{ — } 12 \text{ — } 2 \text{ l } 6.$$

Erit componendo.

$$\frac{4+12}{f. 16} - 12 = \frac{2+6}{f. 8} \text{ l } 6.$$

Per Theor: 2. cum producta sint æqualia.

Aliter per prop. 2. hujus.

$$\begin{array}{rcl} 4 \text{ — } 12 \text{ — } 2 \text{ l } 6 & & \\ 12 & 6 & \} A, \end{array}$$

$$16 \text{ — } 12 \text{ — } 8 \text{ l } 6.$$

PROPOSITIO XIX.

Vide propof. 5. quæ cum hac est eadem.

PROPOSITIO XX.

Hac demonstrabitur post pr. 22.

Pro-

PROPOSITIO XXI.

Et hæc post propos. 23.

PROPOSITIO XXII.

Si fuerint quotcunque quantitates A. B. C. & aliæ numero æquales D. E. F. fuerit autem ordinate ut A ad B. sic D ad E: & ut B. ad C ita E ad F: illæ ex æqualitate ordinatæ in eadem ratione erunt; hoc est A ad C. ut D ad F.

DEMONSTRATIO.

Positæ sint quantitates

A	B	C.
16	8	4.
D	E	F.
12	6	3.

Ita ut sit

A	B	D	E.
16	— 8	= 12	1 6.

Et

B	C	E	F.
8	— 4	= 6	1 3.

Erit

Erit ex æqualitate ordinata.

$$\begin{array}{cccc} A & C & D & F. \\ 16 & - & 4 & = 12 \quad 1 \quad 3. \end{array}$$

Per multiplicationem extremorum & mediorum juxta Theor: 2.

Alio modo

$$\begin{array}{ll} 16 - 8 = 12 \quad 1 \quad 6 & 8 - 4 = 6 \quad 1 \quad 3. \\ \text{vicissim } 16. V. & \text{vicissim } 16. V. \\ 16 - 12 = 8 \quad 1 \quad 6 & 8 - 6 = 4 \quad 1 \quad 3. \end{array}$$

Atqui etiam

$$4 - 3 = 8 \quad 1 \quad 6:$$

Ergo 11. V.

$$16 - 12 = 4 \quad 1 \quad 3.$$

Et vicissim 16. V.

$$\begin{array}{cccc} A & C & D & F. \\ 16 & - & 4 & = 12 \quad 1 \quad 3. \end{array}$$

Hisce sic demonstratis dicit propositio 20.

Si prima A fuerit < tertia C, etiam quartam D fore < sextam F.

Si A sit $\propto$ C. fore D $\propto$ F.

Si A sit > C. fore D > F.

Quæ omnia ex prop: 14 patent si ultima proportio permutetur ut sit

$$16 - 12 = 4 \quad 1 \quad 3.$$

Ccc

Pro-

PROPOSITIO XXIII.

Si fuerint tres quantitates A. B. C, & aliæ tres D. E. F, fuerit autem perturbate ut A ad B ita E ad F; & ut B ad C ita D ad E: illæ ex æqualitate perturbata in eadem ratione erunt sc. A erit ad C ut D ad F.

DEMONSTRATIO.

Positæ sint quantitates A B C.

16 8 2.

D E F.

24 6 3.

Ita ut sit

16 — 8 = 6 1 3.

Et

8 — 2 = 24 1 6.

Erit ex æquo

16 — 2 = 24 1 3.

Quia multiplicando acquiruntur producta æqualia. Ergo per Theor. 2. illæ quantitates proportionales.

Alio

Alio modo

$$16 - 8 = 6 \mid 3. \quad 8 - 2 = 24 \mid 6.$$

Ergo Theor. I.

Theor. I.

$$3 \cdot x \cdot 16 \propto 8 \cdot x \cdot 6. \quad 8 \cdot x \cdot 6 \propto 2 \cdot x \cdot 24$$

Ergo per Ax. I.

$$3 \cdot x \cdot 16 \propto 2 \cdot x \cdot 24.$$

Adeoque per Theor. 2.

A C D F.

$$16 - 2 = 24 \mid 3.$$

Quibus positis dicit propositio 21.

Si sit prima A < tertia C, etiam quartam D fore maiorem sexta F.

Si A sit $\propto$ C, fore D $\propto$ F.

Si A sit $>$ C, fore D $>$ F.

Quæ omnia rursus ex 14 V. patent, si ultima proportio permutetur, ut sit

$$16 - 24 = 2 \mid 3.$$

PROPOSITIO XXIV.

Hæc est eadem cum prop. 2, quæ videri potest.

PROPOSITIO XXV.

Si quatuor quantitates A. B. C. D. proportionales fuerint: maxima A simul cum minima D. reliquis duabus B. C. simul sumptis majores erunt.

DEMONSTRATIO.]

$$\begin{array}{cccc} A & B & C & D \\ 12 & - & 4 & = & 9 & 1 & 3. \end{array}$$

Permutando 16. V.

$$12 - 9 = 4 \mid 3. \\ \text{dividendo 17. V.}$$

$$\begin{array}{l} 12 < 4 \text{ ex hyp.} \\ \text{Ergo } 9 < 3. \text{ 14. V.} \end{array}$$

$$3 - 9 = 1 \mid 1 \mid 3.$$

$$\text{Atqui } 9 < 3.$$

$$\text{Ergo } 3 < 1. \quad \left. \begin{array}{l} \text{A. Duæ ultimæ.} \\ \text{C. D.} \end{array} \right\}$$

$$9 + 3 \infty 9 + 3.$$

$$12 + 3 < 4 + 9.$$

Hoc est A & B simul < B & C.

Q. E. D.

Reliquæ sequentes novem propositiones non sunt Euclidis; possunt tamen, eadem, quæ præcedentes Euclidis, facilitate demonstrari.

PRO-

PROPOSITIO XXVI.

Si prima A ad secundam B habuerit maiorem rationem quam tertia C ad quartam D, habebit invertendo quarta D ad tertiam C maiorem rationem quam secunda B ad primam A.

DEMONSTRATIO.

A B C D.

Sit $8 \div 4 < 5 \mid 3$.

Erit per Theor. 3.

$3 \cdot x \cdot 8 < 5 \cdot x \cdot 4$.

Ergo per Theor. 4.

$3 \div 5 < 4 \mid 8$.

Q. E. D.

PROPOSITIO XXVII.

Si prima A ad secundam B habuerit maiorem rationem, quam tertia C ad quartam D, habebit quoque vieiffim prima A ad tertiam C, maiorem rationem quam secunda B ad quartam D.

DEMONSTRATIO.

A B C D.

Sit 8 — 4 < 5 1 3.

Erit 8 · x · 3 < 5 · x · 4. Th:3.

Ergo per Theor: 4.

8 — 5 < 4 1 3.

Q. E. D.

PROPOSITIO. XXVIII.

Si prima A ad secundam B habuerit maiorem rationem quam tertia C ad quartam D. habebit quoque composita prima cum secunda ad ipsam secundam B maiorem rationem quam composita tertia cum quarta ad ipsam quartam D.

DEMONSTRATIO.

$$\begin{array}{cccc} A & B & C & D. \\ \text{Sit } 8 - & 4 & < 5 & 1 \quad 3. \end{array}$$

Erit quoque

$$\frac{8 \cancel{+} 4}{\text{feu } 12} - 4 < \frac{5 \cancel{+} 3}{\text{feu } 8} 1 \quad 3.$$

Quia productum extremorum est majus producto mediorum. per Theor: 4.

Aliter.

$$\left. \begin{array}{cc} \frac{8}{4} < \frac{5}{3} \\ \frac{4}{4} = \frac{3}{3} \end{array} \right\} A.$$

$$\frac{12}{4} < \frac{8}{3} \quad Ax: 4.$$

$$\text{Hoc est } 12 - 4 < 8 \quad 1 \quad 3.$$

Pro-

PROPOSITIO XXIX.

Si prima A ad secundam B habuerit maiorem rationem quam tertia C ad quartam D, habebit dividendo prima minus seu dempta secunda, ad ipsam secundam B maiorem rationem, quam tertia minus seu dempta quarta ad ipsam quartam D.

DEMONSTRATIO.

A B C D.
Sit 12 — 4 < 8 1 3.

Erit quoque

$$\frac{12 \div 4}{\text{seu } 8} - 4 < \frac{8 \div 3}{\text{seu } 5} 13.$$

Per Theor. 4. Quia productum extremorum est majus producto mediorum.

Vel etiam hoc modo,

$$\begin{array}{r} \frac{12}{4} < \frac{8}{3} \\ \frac{4}{4} \propto \frac{3}{3} \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{r} \frac{12}{4} \\ \frac{4}{4} \end{array}} \right\} 5$$

$$\frac{8}{4} < \frac{5}{3} \text{ per Ax: } 5$$

Hoc est 8 — 4 < 5 13. Q. E. D.

Pro-

PROPOSITIO XXX.

Si prima A ad secundam B majorem habuerit rationem, quam tertia C ad quartam D; habebit per rationis conversionem, prima ad ipsam primam minus seu dempta secunda majorem rationem quam tertia ad ipsam tertiam minus quarta.

DEMONSTRATIO.

$$\begin{array}{cccc} A & B & C & D. \\ 12 — & 4 & < & 8 \mid 3. \end{array}$$

Demonstrandum est quod sit

$$12 — \frac{12 \div 4}{\text{seu } 8} > 8 \mid \frac{8 \div 3}{\text{seu } 5}.$$

Id quod patet ex multiplicationem : quia nim. productum extremorum est minus producto mediorum, per Theorema 6.

D d d

Pro.

PROPOSITIO XXXI.

Si fuerint tres quantitates A. B. C. & aliæ tres D. E. F. sitque major ratio primæ priorum A ad secundam B, quam primæ posteriorum D ad suam secundam E: ut & major ratio secundæ priorum B ad suam tertiam C, quam secundæ posteriorum E ad suam tertiam F: Erit quoque ex æqualitate ordinata major ratio primæ priorum A ad suam tertiam C, quam primæ posteriorum D, ad suam tertiam F.

DEMONSTRATIO.

A	B	C.
16	8	4
D	E	F.
9	5	3.

Sit 16 — 8 < 9 | 5.

Et 8 — 4 < 5 | 3.

Erit ex æquo.

16 — 4 < 9 | 3.

Id

Id quod patet ex multiplicatione,
cum productum extremorum sit majus
producto mediorum, per Theor: 4.

Aliter.

$$16 - 8 < 9 \quad 1 \quad 5.$$

vicissim. 27. V.

$$16 - 9 < 8 \quad 1 \quad 5.$$

Et

$$8 - 4 < 5 \quad 1 \quad 3.$$

vicissim. 27. V.

$$8 - 5 < 4 \quad 1 \quad 3.$$

Ergo.

$$16 - 9 < 4 \quad 1 \quad 3.$$

Vicissim.

$$16 - 4 < 9 \quad 1 \quad 3.$$

Q. E. D.

PROPOSITIO. XXXII.

*Si sint tres quantitates A. B. C.
& alie tres D. E. F. sitque ma-
jor ratio primæ priorum A ad suam
secundam B quam secundæ poste-
riorum E ad suam tertiam F: ut &
ratio secundæ priorum B ad suam
tertiam C major quam primæ po-
steriorum D ad suam secundam E.
Erit quoque ex æqualitate pertur-
bata major ratio primæ priorum A
ad suam tertiam C, quam primæ
posteriorum D ad suam tertiam F.*

DEMONSTRATIO.

A	B	C
16	8	5
D	E	F.
9	6	4
Sit 16	— 8	< 6 4.
Ut & 8	— 5	< 9 6.

Erit ex æquo.

$$16 — 5 < 9 | 4.$$

Per

XXI

Per Theor: 4. Quia scilicet productum extremorum est majus producto mediorum.

Alio modo.

$$16 \text{ — } 8 < 6 \text{ } 1 \text{ } 4.$$

$$\text{Ergo } 16 \cdot x \cdot 4 < 8 \cdot x \cdot 6.$$

Et

$$8 \text{ — } 5 < 9 \text{ } 1 \text{ } 6.$$

$$8 \cdot x \cdot 6 < 5 \cdot x \cdot 9.$$

Ergo.

$$16 \cdot x \cdot 4 < 5 \cdot x \cdot 9.$$

$$\text{Adeoque } 16 \text{ — } 5 < 9 \text{ } 1 \text{ } 4.$$

per Theor: 4.

PROPOSITIO XXXIII.

*Si fuerit major ratio totius
A ad totum B, quam ablati C
ad ablatum D, erit & reliqui
E ad reliquum F major ratio
quam totius A ad totum B.*

DEMONSTRATIO.

Sint in majori ratione tota

	A.	B.	
	12	6	} S
quam partes	4	3	

Erit $8 - 3 < 12 \mid 6$.

Per Theor: 4. quia productum
extremorum est majus producto
mediorum.

PROPOSITIO XXXIV.

XXXV

ratio

am

it

mai

tum

RATIO

ione

B.

6

3

3

pro

prie

P.

Si sunt quotcunque quantitates, A. B. C. & aliae aequales numero D. E. F. sitque major ratio primae priorum A ad primam posteriorum D, quam secundae B ad secundam E: ut & secundae B ad secundam E major, quam tertiae C ad tertiam F, & sic deinceps.

1. Habebunt omnes priores, simul A. B. C. ad omnes posteriores simul D. E. F. maiorem rationem, quam omnes priores B. C. relicta prima A, ad omnes posteriores E. F. relicta quoque prima D.

2. Minorem autem quam prima priorum A ad primam posteriorum D.

3. Ma-

3. *Majorem denique quam ultima priorum C ad ultimam posteriorum F.*

DEMONSTRATIO.

Positæ sint quantitates

Priores	Posteriores.
A 12	D 6
B 8	E 5
C 4	F 3.

Summæ 24. 14.

PARS I. $B \div C \quad E \div F$
 24 — 14 < 12 1 8.

PARS II. $A \quad D$
 24 — 14 > 12 1 6.

PARS III. $C \quad F$
 24 — 14 < 4 3.

Partis 1 & 3 demonstratio pendet ex Theoremate 4. quia producta extremorum sunt majora productis mediorum.

Pars vero 2 demonstratur per The. 6, quia productum extremorum est minus producto mediorum.

FINIS LIBRI QUINTI.

Eu-


EUCLIDIS

ELEMENTORUM

LIBER SEXTUS.

DEFINITIONES.

1. *Similes figuræ rectilineæ sunt, quæ & angulos singulos singulis æquales habent, atque etiam latera, quæ circum angulos æquales sunt, proportionalia.*



AD constituendam figurarum rectilinearum similitudinem requiruntur duæ conditiones.

1. Ut singuli singulis inter se sint æquales anguli A & D: B. & E: C & F.
2. Ut latera circum istos æquales angulos sint proportionalia, scil.

E e e

Circa


Circa A. D $BA \text{ — } AC = FD \text{ I } DF.$

Circa B. E $CB \text{ — } BA = FE \text{ I } ED.$

Circa C. F $BC \text{ — } CA = EF \text{ I } FD.$

Ergo si una ex hisce conditionibus deficiat, figuræ nullo modo erunt similes: quemadmodum quadratum & altera parte longior figura, licet habeant omnes angulos æquales, utpote rectos, quia vero latera non habent proportionalia, similia dicenda non sunt.


2. Reciprocae figuræ sunt, cum in utraque figura antecedentes & consequentes rationum termini fuerint.



Quemadmodum in parallelogrammis AC. BF. & ductis diagonalibus in trian-

gulis ABC. BEF. si sit AB in prima figura ad BG secundæ, sicut reciproce EB secundæ ad BC primæ, illæ dicuntur reciprocæ.


3. *Recta AB dicitur secta esse secundum extremam & mediam rationem, cum fuerit ut tota AB ad majus segmentum AC. ita idem majus segmentum AC ad minus segmentum CB.*



In propositione 11. Libri II. Euclides docuit secare lineam ita ut $\square$ sub tota linea AB & minori segmento CB comprehensum sit æquale $\square$ majoris segmenti AC: quod unum & idem esse cum hac Definitione videri potest ex prop: 30. VI Unde patet 11. II. hic inter Definitiones reponi.

Cæterum ob multiplicem illius usum Geometris hæc proportio divina dicitur.

4. *Altitudo cujusque figurae est linea perpendicularis AD; ab illius vertice ad ipsam basin vel illius productam demissa.*



Cum mensura cujusque rei debeat esse certa determinata, non vero vaga & incerta, & distantia puncti alicujus verticalis a linea opposita per certam, & sibi semper æqualem ac minimam mensurari debet lineam. Sic distantia puncti verticalis A a linea seu basi DB, non mensuranda est juxta lineas oblique ductas AD, AB, quia illæ quasi infinitæ duci possunt, nec inter se æquales sunt; sed solummodo per lineam perpendiculariter ductam AC, quæ est certa, unica & minima: quæ hõc in casu semper quæritur. Et hæc perpendicularis AC. dicitur altitudo trianguli ADB, sumpta DB pro basi: quemadmodum sumpta AD pro basi:

que fig.
AD.
n basia
ssa.

basī, perpendicularis ex B ad AD ducta
altitudinem exhibebit: ut & sumtā AB
pro basī faciet perpendicularis ex D ad
AB demissa.

Quia vero per punctum A duci potest
linea parallela ipsi DB, illa altitudo di-
citur esse in iisdem parallelis; unde si duo
triangula sint in eadem altitudine idem est
ac si dicantur esse in iisdem parallelis. ut
loquitur Euclides Lib. I.

B

ue rei de
n vero
sti alia
certam.

imam
ia p
, non
ue d
nir d
funt
endat

inica
per q
dicat
a DB
AD
be

*5. Ratio ex rationibus componi
dicitur, cum rationum quantitates
inter se multiplicatæ, aliquam ef-
fecerint rationem.*

Supra notavimus rationem nihil aliud
revera esse quam modum continendi quo
una quantitas aliam quantitatem continet
vel ab alia continetur; quique non clarius,
quam per fractionem exprimat.

Si ergo datæ sint duæ rationes 2 ad 3,
& 4 ad 5, illæ ad fractiones reductæ sic
stabunt $\frac{2}{3}$ & $\frac{4}{5}$, quæ si inter se multipli-

cantur, obtinebitur $\frac{8}{15}$ seu ratio 8 ad 15,
pro quæsita ratione quæ ex duabus datis

E e e 3 com-

composita est. Sic ratio quæ ex dupla & tripla, seu ex duabus rationibus 2 ad 1 & 3 ad 1, hoc est ex duabus fractionibus $\frac{2}{1}$ & $\frac{3}{1}$ composita est, habebitur $\frac{6}{1}$ seu ratio 6 ad 1 seu sextupla. Et sic porro de aliis.

Notandum autem est rationum ab Euclide sic dictas quantitates Geometris vulgo dici Denominatores, quæ in fractionum consideratione quotientum nomine venire solent.

Sed minime omittendum putamus rationem $\frac{8}{15}$ seu 8 ad 5 (quæ ex rationibus $\frac{2}{3}$ & $\frac{4}{5}$ seu 2 ad 3 & 4 ad 5 componitur) etiam hoc modo posse inveniri.

Fiat 2 — 3 = quilibet numerus 6 | 9.

Tum 4 — 5 = 9 $\frac{45}{4}$.

Dico rationem 6 ad $\frac{45}{4}$ seu utrinque per eundem numerum 4 multiplicando 24 ad 45 esse eandem cum ratione 8 ad 15. Si enim fractio $\frac{24}{45}$ per 3 reducatur ad minimam, obtinebitur $\frac{8}{15}$ ut requiritur; unde

patet

patet rationem 6 ad $\frac{4}{3}$ esse compositam ex.
duabus rationibus 2 ad 3 & 4 ad 5.

A —————

B ———

C —————

D ———

H —————

I ———

K —

Quæ omnia lineis hac ratione applicari
possunt. Datae sint duæ rationes A ad B.
& C ad D, rationem ex istis duabus
compositam hoc modo inveniemus.

Fiat A — B = H I I.

Ut & CD — D = I I K.

Ratio H ad K exhibebit rationem com-
positam quæsitam.


Pro H assumere licet quamlibet cunque
lineam.

Pro

Theor. I.

PROPOSITIO I.

Triangula ABC. DEF. & parallelogramma BK. EL, in eadem altitudine sive inter easdem parallelas constituta, sunt inter se ut bases BC EF. hoc est si bases sint æquales figuræ erunt æquales: si bases inæquales figuræ erunt inæquales & quidem juxta rationem basium.



DEMONSTRATIO.

1. Sit basis $BC \propto EF$. Tum triangula ABC. DEF, inter easdem parallelas & super basibus æqualibus constituta inter se sunt æqualia.

1. 8. 1.

2. Po-

2. Ponatur EG dupla ipsius EF, seu BC. Tum erunt duo DEF. DFG, æqualia: adeoque torum DEG duplum ipsius DEF hoc est ABC: quia nim. basis EG est dupla ipsius BC.

3. Ponatur EH dimidia baseos EF seu BC. adeoque $\frac{1}{4}$ EG. Erunt duo triangu-
la DEH. DHF^a æqualia: ergo DEH erit semissis ipsius DEH, hoc est ABC: & quarta pars ipsius DEG.

4. Ponatur EI $\propto \frac{1}{2}$ EH, seu $\frac{1}{4}$ EF. seu $\frac{1}{8}$ EG. similiter erit triangulum
• DEI $\propto$ DIH. adeoque DEI erit $\propto \frac{1}{2}$
DEH. seu $\frac{1}{4}$ DEF hoc est ABC. seu
 $\frac{1}{8}$ DEG.

Et sic potro in infinitum.

Ergo absolute triangu-
lorum bases.

Similiter etiam parallelogramma, cum
dupla^b sunt triangulorum.


b 39. I.

Theor. 2.

PROPOSITIO II.

1. Si in triangulo uni lateri CB parallela ducatur ED, hæc proportionaliter secabit latera AC. AB. (hoc est ut sit $AE : EC = AD : DB$.)

2. Et si recta ED secuerit latera AC. AB proportionaliter, erit illa reliquo lateri CB parallela.



DEMONSTRATIO.

I Pars. Ducantur rectæ CD. BE. eruntque triangula X & Y in iisdem parallelis DE. CB & eadem basi ED, ergo inter se æqualia. Triang.

$$\text{Tri. Z} - \text{Tri. X}^b = \text{bas: AE} / \text{bas: EC. } b_1. VI$$

feu Y

Atqui etiam

$$\text{Tr: Z} - \text{Tr: Y}^b = \text{bas: AD} / \text{bas: DB.}$$

$$\text{Ergo } c \text{ AE} - \text{EC} = \text{AD} / \text{DB. } c_{11}. V.$$

2 Pars. Est ex hypothesi.

$$\text{AE} - \text{EC} = \text{AD} / \text{DB.}$$

Atqui

$$\begin{array}{l} \text{AE} - \text{EC} = Z / . X . \\ \text{Et AD} - \text{DB} = Z / . Y . \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{AE} - \text{EC} \\ \text{Et AD} - \text{DB} \end{array}} \right\} I. VI.$$

Ergo hisce rationibus substitutis.

$$\text{Erit } Z - X = Z / . Y .$$

Adeoque a triang. X $\propto$ Y & quia ^{d14. V.}
sunt in eadem basi ED, erunt inter e pa. ^{c 39. I.}
parallelas ED. CB.


Q. E. D.

Theor. 3.

PROPOSITIO III.

1. Si in triangulo ABC , recta AD angulum A bisariam secans, etiam secet basin BC , habebunt basis segmenta BD . DC eandem rationem, quam reliqua latera BA . AC .

2. Et si basis segmenta BD . DC eandem habeant rationem quam reliqua latera BA . AC , recta AD basin secans, etiam angulum oppositum A secabit bisariam.



De.

DEMONSTRATIO.

Pars I. Ex B ducatur BE parallela ^{a 31. I.}
DA, & producat CA, usque ad oc-
cursum perpendicularis in E: eruntque
propter parallelas EB. DA.

Ang. O $\propto$ R. quia sunt alterni.
Ang. P $\propto$ Q. externus interno ^{29. I.}

Atqui O $\propto$ P ex hypothesi.

Ergo R $\propto$ Q. Et latus EA ^{b 6. I.} $\propto$ BA.

Quare erit EA — AC = BD / DC. ^{c 2. VI.}
BA

PARS II.

Est BA — AC = BD / DC. ex h. ^{d 2. VI.}

Atqui ^d EA — AC = BD / DC.

Ergo II. V.

BA — AC = EA / AC. <sup>e 14. V.
f 5. I.</sup>

Adeoque ^e BA $\propto$ AE & ang. R ^f $\propto$ Q.

Atqui ang. R $\propto$ O ^{29. I.}

Ut & Q $\propto$ P

Ergo O $\propto$ P.


Q. E. D.

Theor. 4.

PROPOSITIO IV.

a Def.
I. VI.

*Triangula sibi mutuo equi-
angula, sunt similia; hoc est
etiam latera circa equales an-
gulos habent proportionalia.*



DEMONSTRATIO.

Bases CB, BE colloca in di-
rectum: quia jam angulus ACB
 $\propto$ DBE, ex hypothesis, erunt ^b
^{b 28. I.} CA & BD parallelæ, ut & AB
DE. quia ang. ABC etiam po-
nitur $\propto$ E.

Pro-

LIBER SEXTUS. 415

Producantur CA & ED in F,
eritque AFDB parallelogram-
mum, adeoque $FA^c \propto DB$ & $c34. I.$
 $FD \propto AB.$

Quia in triangulo FCE latus
AB est parallelum FE erit ^d d2. VI.

$$AC - \frac{AF}{DB} = CB / BE.$$

Et permutando. 16. V.

$$AC - CB = DB / BE.$$

Deinde

Quia in triangulo EFC latus
DB est parallelum FC,

$$\text{Erit } \frac{FD^d}{AB} - DE = CB / BE.$$

Et vicissim. 16. V.


$$AB - BC = DE / EB.$$

Pro-

Theor. 5.

PROPOSITIO V.

Si duo triangula ABC. DEF, latera circa omnes angulos habeant proportionalia, erunt æquiangularia, eosdem angulos A & D, B & E, F & C habebunt æquales, quibus homologa latera subtienduntur.



DEMONSTRATIO.

Ad punctum E fiat $\angle$ angulus FEG $\propto$ B. ut & ad punctum F angulus EFG $\propto$ C. eritque tertius G æqualis tertio A.

Quare in triangulis similibus ABC. GEF.

AB

$$AB - BC = GE / EF.$$

Atqui etiam per propositionem.

$$AB - BC = DE / EF.$$

$$\text{Ergo}^b GE - EF = DE / EF.$$

b II. V.

$$\text{Adeoque}^c GE \propto DE.$$

c 14. V.

Eodem modo ab altera parte
etiam probatur esse.

$$GF \propto DF.$$

Adeoque triangula DEF. GEF
habent omnia latera æqualia, sin-
gula singulis. ergo per 8. I.

$$\text{Ang. } DEF \propto GEF \propto B.$$

$$\text{Ang. } DFE \propto GFE \propto C.$$

$$\text{Ang. } D \propto G \propto A.$$

Q. E. D.


Ggg

Pro

Theor. 6.

PROPOSITIO VI.

Si duo triangula ABC. DEF, habeant unum angulum B, æqualem uni E, & latera circum eum proportionalia, (hoc est AB ad BC ut DE. ad EF) erunt triangula sibi mutuo equiangula.



De-

DEMONSTRATIO.

Ad puncta E, & F fiant anguli FEG.
 EFG æquales angulis B. (hoc est DEF)
 & C. eritque tertius G æqualis tertio

^a A: Et triangula ABC. GEF similia, ^{a 32. I.}
^b, adeoque ^{b 4. VI.}

$$AB - BC = GE / EF.$$

Atqui etiam per propositionem.

$$AB - BC = DE / EF.$$

$$\text{Ergo } ^c GE - EF = DE / EF. \quad ^c 11. V.$$

$$\text{Adeoque } ^d GE \propto DE. \quad ^d 14. V.$$

Ergo duo triangula DEF. GEF se
 habent juxta quartam I. adeoque

$$\text{Ang. DEF} \propto \text{GEF} \propto B.$$


$$\text{Ang. DFE} \propto \text{GFE} \propto C.$$

$$\text{Ang. D} \propto G \propto A.$$

Q. E. D.

EUCLIDIS

Alia Demonstratio.



Datur hic angulus $A \propto D$. & latera
circa eos proportionalia : & tum.
Est vel angulus $B < E$.

Vel $B > E$.

Vel $B \propto E$.

Ponatur I. Angulus $B < E$.

Ducatur BG, ut fiat angulus $O \propto DEF$
eritque $P \propto R$.

Ergo $BA - AG = ED / DF$. 4. VI.

Atqui $BA - AC = ED / DF$ per pro.

Ergo $AG \propto AC$. per 11 & 14. V.
pars & totum.

Eodem modo ducta EH. demonstra-
tur angulum B non esse posse minorem
angulo E. Ergo $B \propto E$ & per 32. I.
 $C \propto F$. Q. E. D.

Pro-

PROPOSITIO VII.


Theor. 7.

Vix ullius est usus.

PROPOSITIO VIII.

Theor. 8.

*In triangulo rectangulo ABC, perpendicularis AD ab angulorecto in basin ducta, secat triangulum in duo triangu-
la ADB. ADC quæ erunt & toti & inter se similia.*



DEMONSTRATIO.

Pars I. In Triangulis BAC. ADB.

Ang. B est communis.

Ang. BAC $\propto$ ADB quia uterque rectus

^b Ergo C $\propto$ BAD.

Ggg 3

A.

a 4. VI. Adeoque, triang. BAC ADB. similia.
 Deinde in triangulis BAC. ADC.
 Ang. C est communis.
 Ang. BAC $\propto$ ADC quia uterque rect.

b 32. I.

^b Ergo B $\propto$ CAD.
 Adeoque ^a triang. BAC. ADC similia.

II. Pars. Triangulum ADB est simile
 ipsi BAC.
 Triangulum ADC est simile eidem
 BAC.

Ergo Triangula ADB. ADC inter se
 sunt similia per 21. VI. quæ hac non de-
 pendet.

COROLLARIUM I.

Perpendicularis ab angulo recto in ba-
 sin ducta, est mediaproportionalis inter
 duo basis segmenta.

DEMONSTRATIO.

Duo triangula BDA. ADC, sunt æ-
 quiangula.

a 4. VI.

Ergo ^a $BD : DA = DA : DC$.
 Adeoque DA est media proportiona-
 lis inter BD. DC.

CO.

COROLLARIUM. II.

Utrumlibet laterum angulum rectum comprehendendum est medium proportionale inter totam basin & illud segmentum basis quod sumpto lateri adjacet.

DEMONSTRATIO.

In triangulis similibus ABC. ADC.

$$^a BC \text{ --- } CA = AC / CD.$$

Et in triangulis similibus ACB. ADB

$$^a CB \text{ --- } BA = AB / BD.$$


SCHOLIUM.

In deducendis triangulorum proportionibus bene notandum est, ordine procedendum esse ab angulis æqualibus circa æquales angulos ad æquales angulos.

Probl. I.

PROPOSITIO IX.

*A data recta AB imperatam
partem abscindere.*



CONSTRUCTIO.

Sit auferenda pars tertia.

1. Rectæ AB sub quolibet angulo adijunge rectam AF, inque illa sume circino tres partes æquales AD. DE. EF.

2. Ductæ FB ex D ducatur parallela DG.

Dico AG esse quæsitam
ter-

tertiam partem rectæ
AB.

DEMONSTRATIO.

In triangulo FAB lateri FB
parallela est DG.

ergo $^a FD - DA = BG / GA.$ 22. VI.

Et componendo 18. V.

$$FA - DA = BA / GA$$

Atqui FA est tripla ipsius
DA.


Ergo BA etiam est tripla
ipsius GA.

Adeoque AG est tertia
pars lineæ AB.

Probl. 2.

PROPOSITIO X.

*Datam rectam AB similiter
secare ac data alia recta AC secta
fuerit in D & E.*



CONSTRUCTIO.

1. Jungantur datæ lineæ ad A.
2. Ductâ CB ex punctis D & E du-
cantur duæ rectæ DF. EG parallelæ ipsi
CB.

Dico factum esse quod quæritur.

DEMONSTRATIO.

^a 30. I. In triangulo AEG lineæ EG. DF
sunt parallelæ, ^a quia eidem lineæ CB
ductæ sunt parallelæ.

Ergo

Ergo $\text{b AF} \text{---} \text{FG} = \text{AD} / \text{DE}$.

.VI.

Deinde ex D ducta DH parallela AB^r
erit $\text{DI} \propto \text{FG}^c$ & $\text{IH} \propto \text{GB}$.

c 34. L

Eritque in triangulo DHC.

$\text{DI. f. FG} \text{---} \text{IH. f. GB} = \text{DE} / \text{EC}$.


Adeoque partes AF FG. GB, sunt
proportionales partibus AD. DE. EC.

Q. E. D.

SCHOLIUM.

Hinc facile patet ratio divi-
dendi lineam datam in quotcun-
que libet partes æquales: sumendo
scilicet in linea datæ adjuncta,
tot partes æquales in quot linea
data dividenda sit: & extre-
mitates lineæ utriusque recta con-
jungendo; si tum a divisionibus
intermediis ducantur rectæ pa-
rallæ lineæ jam ductæ; illæ
quæsitam facient divisionem. Ex.
Gr. sit linea AB dividenda in sex
partes æquales.

428 EUCLIDIS
CONSTRUCTIO.



1. Ipsi AB junge sub quolibet angulo rectam AC.

2. In linea AC sume ses partes æquales AI. IK. KL. LM. MN. NC.

3. Duc rectam CB; illique parallelas NA. MG. LF. KE. ID.

Dico lineam AB sectam esse in sex partes æquales AD. DE. EF. FG. GH. HB.

DEMONSTRATIO.

Per propositionem 10. linea AB secta est similiter ac AC.

Atqui linea AC secta est in sex partes æquales.


Ergo etiam AB in sex æquales partes secta erit.

SCHOLIUM II.

Haud inconcinne linea data CD poterit dividi in ratione datarum linearum A. B.

Con-

LIBER SEXTUS. 429
CONSTRUCTIO.



1. Ex C sub quolibet angulo ducatur recta CE $\propto$ datæ A.
 2. Et ex D recta DF, parallela ipsi CE, & $\propto$ datæ B.
 3. Jungatur EF.
- Dico rectam CE in K sectam esse in ratione A ad B.

DEMONSTRATIO.

In tri. CKE. DKF

Ang. C $\propto$ D

E $\propto$ F

K $\propto$ K

29. 1.

Ergo erit per 4. VI.

CE. f. A — CK = DF f. C / DK.

& permutando


A — C = CK / KD.

Hhh 3

Pro.

Probl. 3.

PROPOSITIO. XI.



*Datis
duabus re-
ctis AB, BC
tertiam pro-
portionalem
invenire.*

CONSRUCTIO.

1. Datas rectas conjunge in angulo recto ABC.

2. Ad ductæ rectæ AC punctum C excita perpendicularem CD.

3. Lineam AB produc usque ad occursum istius perpendicularis in D.
Dico BD esse quæsitam proportionalem.

DEMONSTRATIO.

Triangulum ACB est rectangulum per construct. & CB perpendicularis ex angulo recto ad basin ducta: quæ a est media proportionalis inter AB & BD. Adeoque BD erit tertia quæsitæ.


a 1 Cor:
8. VI.

Q. F. E.

Scho.

Si AB sit major quam BC haud inconcinna erit talis

CONSTRUCTIO.



1. Super AB describe Semicirculum ACB.

2. In illo accommodetur secunda data BC.

3. Ex C demitte perpendicularem CD.

Dico DB esse tertiam proportionalem quaesitam.

DEMONSTRATIO.

Ducta AC erit ACB triangulum rectangulum (31. III.)


Ergo erit $AB - BC = BC / BD$,
per 2 Cor. 8. VI.

Adeoque BD est tertia quaesita.

PRO-

Probl. 4.

PROPOSITIO XII.



*Datis tribus
rectis AB. BC.
AD quartam
proportionalem
DE invenire.*

CONSTRUCTIO.

1. Datarum duas quaslibet cunque AB. BC colloca in directum.
2. Tertiam AD conjunge ad punctum A, & duc rectam DB.
3. Ex C duc CE parallelam BD, quæ productæ AD occurrat in E.

Dico DE esse quæsitam quartam proportionalem.

DEMONSTRATIO.


In triangulo ACE lateri CE ducta est parallela BD.

a 2. VI. Ergo $AB : BC = AD : DE$.
Adeoque erit DE quarta proportionalis.

Q. E. F.

Alia

Alia Constructio.



Datæ sint tres lineæ A. B. CD, quæ est vel $<$ vel $>$ A.

1. Lineæ EF $\propto$ A junge FH $\propto$ B sub quolibet angulo, ducaturque EH.

2. In linea FE sume FG $\propto$ tertiæ CD. & ex puncto G ducatur GK parallela ipsi EH.

Dico lineam FK esse quartam quæsitam scil. FK supra H, si tertia CD sit major prima A: At vero FK infra H si sit CD $>$ A.

DEMONSTRATIO.

Facile ex constructione patet triangula EFH. GFK esse similia: quare erit per 4. VI,

$$EF : FH = GF : FK.$$

Hoc est

$$A : B = CD : \text{ad quartam FK.}$$

Q. D. E.


Iii

Pro-

Probl. 5.

PROPOSITIO XIII.

*Datis duabus rectis AB. BC
mediam proportionalem BD in-
venire.*



CONSTRUCTIO.

1. Datas lineas AB. BC collo-
ca in directum.
2. Super tota AC describe Se-
micirculum.
3. Ex B excita perpendicula-
rem BD usque ad Semicirculum.

Dico illam esse mediam quæ-
sitam.

De-

DEMONSTRATIO.

Ductis AD. DC. erit ADC
 triangulum rectangulum quia
 angulus ADC est rectus. Et ^{a 31. III,}
 linea DB est perpendicularis
 ex angulo recto ad basin du-
 cta, quæ ^b est media proportio-
 nalis inter AB. BC.

^b 1^a Co-
 roll. 8.
 VI.

Q. F. E.

SCHOLIUM.


Quævis recta a circumferentia
 ad diametrum perpendiculariter
 ducta, est media proportionalis
 inter segmenta diametri.

PROPOSITIO XIV.

Theor. 9.

1. *Parallelogramma equalia X. Z. que unum angulum O uni P aequalem habent; etiam latera circa aequales angulos habent reciproce proportionalia. (hoc est AB ad BG ut EB ad BC.*

2. *Et si latera habent reciproca, parallelogramma sunt equalia.*



DEMONSTRATIO.

1 Pars. Par. ^a X — Par. Y = Z / Par. Y. a 7. v.

Atqui X — Y = AB / BG. } I. VI.
Et Z — Y = EB / BC. }

Ergo substitutis istis rationibus.

AB — BG = EB / BC.

2 Pars. AB — BG = EB / BC.

Atqui AB — BG = X / Y. } I. VI.
Et EB — BC = Z / Y. }

Ergo istis rationibus substitutis.

X — Y = Z / Y.

Adeoque b Par: X ∞ Par: Z.

b 14. v.

PROPOSITIO XV.

Theor.

10.

Vide
fig. præ-
ceden-
tem.

1. *Æqualia triângula X. Z, quæ unum angulum O uni angulo P æqualem habent; etiam latera circa æquales angulos habebunt reciproce proportionalia. (hoc est AB ad BG, ut EB ad BC.*

2. *Et si latera sic habent reciproca, triângula sunt æqualia.*

DEMONSTRATIO.


234. I. Ductis rectis AC. CG. GE. hæc est omnino eadem cum præcedente; quoniam^a triângula sunt semisses parallelogrammorum, & triângula cum parallelogrammis eadem habent latera quæ demonstrationem ingrediuntur.

PROPOSITIO XVI.

Theor.
II.

1. Si quatuor rectæ A. G. F. B proportionales fuerint, rectangulum sub extremis A & B. erit æquale rectangulo sub mediis.

2. Et si rectangulum sub extremis sit æquale rectangulo sub mediis, illæ quatuor rectæ proportionales erunt.



DEMONSTRATIO.

1 Pars Fiat $\square$ AC sub extremis & FG sub mediis : illa habent angulum $A \propto F$, & latera reciproca, nimir: $AB \text{ --- } HF = \text{reciproce } FE / BC$. Ergo illa $\square$ la sunt æqualia.

a 14. VI.

2 Pars. $\square$ la AC. FG habent angulum $A \propto F$. & sunt æqualia: ^b Ergo ^b 14. VI. habent latera reciproce proportionalia.


PRO-

PROPOSITIO XVII.

Theor.
12.

1. Si tres lineæ A . F . B . proportionales fuerint, rectangulum sub extremis A & B erit æquale quadrato mediæ F .

2. Et si rectangulum sub extremis sit æquale quadrato mediæ, tres illæ rectæ proportionales erunt.




DEMONSTRATIO.

1 Pars. Fiat sub extremis $\square AC$, & a mediæ $\square GE$. Quæ quia habent angulum $A \propto G$ & latera reciproca scilicet $AB = GF = FE$. hoc est GF / BC . erunt inter se æqualia.

2 Pars. $\square$ la AC . GE sunt æqualia & habent angulum $A \propto G$. Ergo^a habent latera reciproca.

Pro.

LIBER SEXTUS. 441
SCHOLIUM.



Ex hac
proposit:
& præce-
dente 8
facillime
demon-
stratur.
Pr. 47. I.
hoc mo-
do,

PRÆPARATIO.

Super BC constituatur $\square$ BE, & ex
A ducatur AL parallela BD vel CE.

DEMONSTRATIO.

Lineæ BC. AC. CK sunt proportio-
nales. per 8. VI.

Ergo $\square$ BC. CK $\propto$ $\square$ AC.

$\square$ EK.

Deinde Lineæ BC. AB. BK. sunt proportionales.

Ergo $\square$ BC BK $\propto$ $\square$ AB

$\square$ LB

Supra $\square$ EK $\propto$ $\square$ AC

$\square$ EK $\propto$ $\square$ LB $\propto$ $\square$ AB $\propto$ $\square$ AC

$\square$ EB


Kkk

Pro.

PROPOSITIO XVIII.

Probl. 6.

Super data recta AB describere polygonum ABHIK, quod dato polygono CDEFG sit simile similiterque positum.



CONSTRUCTIO.

1. Datum Polygonum rectis FC. FD divide in triacula.

a 32. I.

b 32. I.

c 4. VI.

2. Super AB factis angulis a BAI. ABI æqualibus angulis DCF. CDF. erit b tertius æqualis tertio. adeoque c triangulum IAB simile triangulo FCD.

3. Eodem modo super lateribus IA: IB, fiant triacula IKA. IHA. æquiangula, adeoque & similia triangulis FGC. FED.

Dico ABHIK esse polygonum quæsitum.

DEMONSTRATIO.

Pro angulis.

Facile patet per constructionem angulos

los unius polygoni esse æquales angulis alterius. ninn.

K ∞ G.

Tres ad I ∞ ad F tribus.

H ∞ E

Duo ad B ∞ ad D duobus.

Duo ad A ∞ ad C duobus.

Ergo omnes anguli sunt æquales, adeoque duo polygoni sunt æquiangula, & similiter polita.

Pro lateribus.

In triangulis similibus IKA. FGC: ut & IAB. FCD.

Erit $KA - AI = GC / CF.$
Et $BA - AI = DC / CF.$ 4. VI.

Erit per 11. & 16. V.

$KA - AB = GC / CD.$

Deinde in triangulis similibus IAB. FCD: ut & IHB. FED.

Erit $AB - BI = CD / DF.$
Et $HB - BI = ED / DF.$ 4. VI.

Ergo per 11 & 16. V:

$AB - BH = CD / DE.$

Et eodem modo demonstratur latera circa reliquos angulos esse proportionalia: Ergo polygoni sunt similia.

Q. E. D.


Kkk 2

Pro.

THEOL. 13

PROPOSITIO XIX.

*Similia triangula ABC. DEF
inter se sunt in duplicata ratione
laterum homologorum BC. EF.*



DEMONSTRATIO.

Sit $BC < EF$.

Ipsis BC. EF, fiat a tertia propor.

211. VI. tionalis BG. eritque

b 10. BC — BG b in duplic. rat. BC/EF.

Def. V. Atqui BC — BG c = tr: ABC / tr: ABG

c 1 VI.

d 11. V. Ergo Triang: ABC d — Triang: ABG
in dupl: rat: BC / EF.

Atqui triang. ABG $\propto$ triang. DEF.
ut mox patebit.

Ergo.

Ergo triang. ABC — triang. DEF,
in dupl: rat: BC / CF.

Quod autem sit triangulum ABG ∞
DEF, hoc modo videre licet.

In triangulis similibus ABC. DEF.

$$AB — BC = DE / EF. \quad 4. VI.$$

Et permutando.

$$AB — DE = BC / EF. \quad 16. V.$$

Atqui per constructionem.

$$BC — EF = EF / BG.$$

$$\text{Ergo } AB — DE = EF / BG. \quad 11. V.$$

Adeoque triangu^a ABG. DEF ha-
bent angulum B ∞ E, & latera circa il-
lum reciproce proportionalia: Ergo
sunt æqualia. c 15. VI.

Sit deinde BC ∞ EF.

In triangulis similibus ABC. DEF.

$$AB — BC = DE. EF.$$

Atqui BC ∞ EF per propositionem.

$$\text{Ergo } AB ∞ DE. \quad f 14. V.$$

Adeoque triangu^a ABC. DEF inter
se sunt æqualia.


Atqui □ta BC & EF etiam sunt æqualia.

$$\text{Ergo triang. ABC — triang. DEF} \\ = \square BC / \square EF.$$

Atqui ratio $\square$ torum BC. EF. est eadem cum ratione duplicata ipsorum laterum BC. EF, ut supra dictum est ad 10. Def. V.

Ergo triang. ABC — triang. DEF
in dupl: rat: BC / EF.

COROLLARIUM.



Si tres lineæ A. B. C. fuerint proportionales, erit triangulum X supra primam ut triangulum Y priori simile supra secundam, ut prima linea A ad tertiam C.

DEMONSTRATIO.

Tres lineæ A. B. C. sunt proportionales.

a 10.
Def. V.

Ergo A — C^a in duplicata ratione A / B.

b 19. VI.

Atqui X — Y^b etiam in dupl: rat: A / B.

c 11. V.

Ergo X — Y^c = A / C.

Q. D. E.


Pro-

PROPOSITIO XX.

Theor.
14.

1. *Polygona similia ABHIK. CDEFG dividuntur in trian- gula, quæ sunt numero æqualia, similia & totis homologa.*

2. *Polygona inter se sunt in ra- tione duplicata laterum homologo- rum AB.CD.*



DEMONSTRATIO.

1 Pars: Ductis rectis IA. BA. ut & FC. FD. polygona erunt divisa in trian- gula.

Quod autem illa triangula sint numero æqualia, patet ex Scholio prop. 32. I. quia nim. polygona æque multa habent latera.

Quod sint similia sic probatur.

In

In triangulis IKA FGC.

Ang. K $\propto$ G, & latera circa illos proportionalia.

a 6. VI.

b 4. VI.

Ergo triangulum IKA, est æquiangulum & simile FGC.

Eodem modo in triangulis IHB FED.

Ang. H $\propto$ E, & latera circa illos proportionalia.

Ergo triangulum IHB est æquiangulum & simile FED.

Deinde ang. KAB $\propto$ GCD, /
KAI $\propto$ GCF. / S

IAB $\propto$ FCD.

Simili modo IBA $\propto$ FDC.

Ergo tertius AIB $\propto$ CFD.

Ergo triangulum IAB est æquiangulum & simile FCD.

Quod sint totis homologa, hoc est quod ita sit quodlibet triangulum in uno polygono ad suum correspondens in altero. Ut totum polygonum ad totum polygonum, patebit ex parte secunda.

2 Pars. Triangula IAB, FCD. probata sunt similia.

c 4. VI.

Ergo $\frac{IA}{FC} = \frac{AB}{CD}$.

Ut & $\frac{IB}{FD} = \frac{AB}{CD}$.

Tum.

Tum.

Triangula $\triangle IKA$. $\triangle FGC$. sunt in duplicata ratione laterum IA . FC .
 $\triangle IKA : \triangle FGC :: IA : FC$

hoc est AB . CD .
 $IA : FC :: AB : CD$

Et triangula $\triangle IAB$. $\triangle FED$ in duplicata ratione laterum IB . FD .
 $\triangle IAB : \triangle FED :: IB : FD$

hoc est AB . CD .
 $IB : FD :: AB : CD$

Ut & triangula $\triangle IAB$. $\triangle FCD$ in duplicata ratione laterum AB . CD .
 $\triangle IAB : \triangle FCD :: AB : CD$

Ergo omnia triangula unius polygoni ad omnia triangula alterius polygoni sunt in duplicata ratione laterum homologorum AB . CD . c. 12. VI.

Atqui omnia triangula istorum polygonorum constituunt tota Polygona.

Ergo ipsa polygona sunt in duplicata ratione laterum homologorum. AB . CD .

Cum autem etiam singula triangula unius polygoni ad singula triangula alterius polygoni habent rationem duplicatam eorundem laterum AB . CD ; patet ista triangula totis polygonis esse homologa,
 Q. E. D.

COROLLARIUM.


Si fuerint tres rectæ proportionales, polygonum super prima descriptum se habebit ad simile polygonum super secunda;

vel polygonum super secunda se habebit
ad polygonum super tertia, ut prima
proportionalis ad tertiam.

DEMONSTRATIO.

Hæc est fere eadem cum demonstra-
tione corollarii præp: præcedentis.

SCHOLIUM.



Com-

LIBER SEXTUS. 451

Commode hic demonstratur
haud inelegans Theorema.

Similium polygonorum X &
Z, circuitus ABCDE : FGHK,
cum lateribus homologis A & F,
sunt in eadem ratione.

DEMONSTRATIO.

$$\left. \begin{array}{l} A - F = A / F. \\ B - G = A / F. \\ C - H = B / G. \\ \text{hoc est } A / F. \\ D - I = C / H. \\ \text{hoc est } A / F. \\ E - K = D / I. \\ \text{hoc est } A / F. \end{array} \right\} \text{Def. 1. VI.}$$

Ergo per 12. V, additis omni-
bus terminis primis, ut & omni-
bus secundis


$$\frac{A + B + C + D + E}{\text{hoc est circuitus } X} = \frac{F + G + H + I + K}{\text{ad circuitum } Z} = A / F.$$

Q. E. D.

Theor. 15

PROPOSITIO XXI.

Figuræ ABC. GHI, quæ eadem figuræ DEF sunt similes, illæ & inter se similes erunt.



DEMONSTRATIO.

Angulus A $\propto$ D $\propto$ G.

B $\propto$ E $\propto$ H.

C $\propto$ F $\propto$ I.

Ergo figuræ ABC. GHI. sunt æquiangulæ; & habent latera circa æquales proportionalia, quia illa habent proportionalia lateribus figuræ DEF. Ergo ^a sunt similes.

^a 1 Def.
VL


Pro-

PROPOSITIO XXII.

Theor. 16

1. Si quatuor rectæ AB. CD. EF. GH. proportionales fuerint, figura similes ABI. CDK & LF. NH proportionales erunt.

2. Et si a rectis lineæ figura similes descriptæ sint; istæ rectæ proportionales erunt.



DEMONSTRATIO.

P A R S I.

Datæ sunt AB — CD = EF = GH.

Tr. ABI (a) — Tr. CDK in dupl. rat. $\frac{AB}{CD}$. a 19. VI.

hoc est $\frac{EF}{GH}$.

Atqui $\square LF$ b — $\square NH$ etiam in d. r. $\frac{EF}{GH}$. b 20. VI.

Ergo.

Tr. ABI (c) — Tr. CDK — $\square LF$, $\square NH$. c 11. V.

P A R S II.

AB — CD in subdup. rat. Tr. ABI, Tr. CDK.

hoc est $\square LF / \square NH$.


Atqui EF — GH etiam in subd. r. $\square LF / \square NH$

Ergo.

AB — CD = EF, GH.

L II 3

Pro-



DEMONSTRATIO.

Fiat $AB \text{ --- } BG = H$ quælibet / I.

Et $CB \text{ --- } BE = I$ / K.

Erit ratio H ad K composita ex rationibus AB ad BG & CB ad BE. vide dicta ad 5 Def. VI.

Demonstrandum ergo est esse parallelogr. $AC \text{ --- } BF = H / K$.

Quod sic probo.

$$\begin{array}{lcl} AC \text{ --- } BH & = (a) & AB / BG. \\ H \text{ --- } I & = (b) & AB / BG. \\ \hline \text{Ergo } AC \text{ --- } BH & (c) & = H / I. \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} BH \text{ --- } BF & (a) & = CB / BE. \\ I \text{ --- } K & (b) & = CB / BF. \\ \hline BH \text{ --- } BF & & = I / K. \end{array}$$

Ergo per 11. V.

$$AC \text{ --- } H = BF / K.$$


Et permutando 16. V.

$$AC \text{ --- } BF = H / K.$$

Q. E. D.
PRO-

a 2. VI.
b per
constr:
c 11. V.

SCHOLIUM.



Majori cum
facilitate &
cum apparatu
minori ea-
dem propo-
sitione demon-
strabitur in
numeris, si
parallelo-
gramma AC.
BF ponantur
rectangula.

Sit $\square$ li AC latus AB $\propto$ 5.

BC $\propto$ 3.

Erit Area $\propto$ 15.

Deinde $\square$ li BF latus BG $\propto$ 2.

e i Def.
II

Latus BE $\propto$ 4.

Erit Area $\propto$ 8.

Ergo $\square$ AC — $\square$ BF = area 15 / ar. 16

Atqui ratio composita ex rationibus 5
ad 2 & 3 ad 4. etiam dat^d $\frac{15}{8}$ seu ratio-
nem 15 ad 8.

d 5. Def.
VI

Ergo ratio $\square$ AC — $\square$ BF est com-
posita ex dictis rationibus 5 ad 2 & 3 ad 4.


Q. E. D.

Pro

PROPOSITIO XXIV.

Theor. 18

*In omni parallelogrammo AI,
parallelogramma FK. HE, quæ
circa diametrum sunt, & toti AC
& inter se sunt similia.*



DEMONSTRATIO.

In triangulis DAB & X.

Angulus O est communis.

$S^a \propto T.$

Ergo $Y^b \propto C.$

Adeoque triangula DAB & X sunt
æquiangula & similia.

Eodem

a 29. I.

b 32. L

Eodem modo probatur trian-
gula DIB & Z esse similia.

Ergo $AD \text{ --- } DB \text{ --- } HD / DG.$
Et $DB \text{ --- } DI \text{ --- } DG / DE.$ } 4. VI.

Eritque ex æquo 22. V.

$AD \text{ --- } DI \text{ --- } HD / DE.$

Similiter etiam probatur reli-
qua latera esse proportionalia :
Ergo Parallelogramma AI. HE,
sunt similia.


Eodem modo etiam demon-
stratur AI. & FK esse similia.

Ergo HE & FK ^c sunt inter se c 21. VI
similia.

Q. E. D.

Probl. 7. PROPOSITIO XXV.

Constituere rectilineum L, quod sit simile similiterque positum dato rectilineo A, & æquale alteri dato B.



CONSTRUCTIO.

1. Ad dati rectilinei A latus
a 45. I. CD, fiat $\square CE \propto^a$ ipsi A.
2. Super DE fiat $\square DK \propto B$.
b 44. I.
3. Inter CD & DG quærat
e 13. VI. c media proportionalis DH.
4. Super DH seu ipsi æquali
 IN, describatur rectilineum L
 si-

simile ipsi A.

d 18. IV.

Dico L esse rectilineum quæ-
situm.

DEMONSTRATIO.

Per constructionem sunt pro-
portionales CD. IN. DG.

Ergo $CD : DG = A : L$.

Atqui $CD : DG = \square CE : \square DK$.

e Cor.
19. VI.
f 1. VI.

Ergo $A : L = \square CE : \square DK$.

g 11. V.


Atqui $A \propto \square CE$.

Ergo $L \propto \square DK \propto B$.

Cum autem L per constructio-
nem sit simile A, patet L esse re-
ctineum quæsitum.

PROPOSITIO XXVI.

Theor. 19



DEMONSTRATIO.

Si adversarius neget diametrum BD
transire per I, transeat per aliud punctum
H: tum ducta HE parallela BA.

a 24. VI
b per
propof.

Erit $BA^a - AD = BG / GH$.

Atqui $BA^b - AD = BG / GI$.

c 7. Vel
11. V.

Ergo $c GH \propto GI$. Pars & totum,
quod est absurdum.

Ergo diameter non transit per H. Ea-
dem autem demonstratio locum habet in
omnibus punctis lineæ GI, quandiu sc:
inter H & I manet aliquod intervallum:
Ergo universim concludendum est dia-
metrum transire per punctum angulare I,
adeoque duo parallelogramma AC, GF,
circa eandem diametrum consistere.

Q. E. D.


Pro-

PROPOSITIO XXVII. XXVIII. XXIX.

Hæ prolixæ, tyronibus difficiles, & nullius fere usus sunt.

PROPOSITIO XXX.

Prob. 10.



*Propositi-
tam re-
ctam AB
extrema
ac media
F ratione se-*

care in G.

CONSTRUCTIO.

a II. II.

Divide ^a AB in G, ut $\square$ sub tota AB & minori segmento BG sit $\propto$ $\square$ majoris segmenti AG.

Dico factum esse quod quaeritur.

DEMONSTRATIO.

$$\square AB.BG \propto \square AG.AG.$$

Ergo 17. VI.

Latera sunt reciproce proportionalia. h.e.

$$AB : AG = AG : BG.$$

Adeoque ^b linea A in media & extre- ^{b ; Def. VI.} ma ratione secta est.


M m m 3

Pro-

PROPOSITIO XXXI.

Theor. 20

Si a lateribus trianguli rectanguli BAC, figuræ similes quæcunque describantur, erit illa quæ angulo recto A opponitur æqualis duabus reliquis simul sumptis.



DEMONSTRATIO.

Figuræ super AB. AC. BC. ponuntur
 220. VI. similes; ergo ^a habent inter se rationem
 duplicatam laterum homologorum AB.
 AC. BC, hoc est inter se sunt ut $\square^a$
 AB. AC. BD.

Atqui $\square^a$ ita sunt inter se ut sit

b 47. I.

$\square^b$ BC $\propto$ $\square^c$ AB. AC.

Ergo figura super BC $\propto$ figuris super
 AB. AC. Scho.

SCHOLIUM I.

Quod in prop. 47. I. demonstratum est de solis quadratis hic universim applicatur quibuslibet polygonis similibus.

SCHOLIUM II.

Potest hæc propositio generaliter, ut etiam involvat prop. 47. I. hoc modo demonstrari.

Sunt proportionales per 2 Cor. 8. VI.
BC. AC. CK Ut & BC. BA. BK.

Ergo per Coroll. 20. VI.

Fig. ab BC — Fig. ab AC = BC / CK.
Fig. ab BC — Fig. ab BA = BC / BK.

Et invertendo.

CK — BC = Fig. ab AC / fig. ab BC.
BK — BC = Fig. ab BA / fig. ab BC.

Erit per 2. V.

BK — KC — BC = Fig. ab AB —
Fig. ab AC. / Fig. ab BC.

Atqui BK — KC ∝ BC.

Ergo Fig. ab AB & AC ∝ Fig. ab BC.

Quare si istæ figuræ sunt quadrata, erit prop. 47. I.


Si vero aliæ figuræ similes erit 31. VI.

PRO-

PROPOSITIO XXXII.

Theor. 21

*Si duo triangula ABC. DCE
ad angulum C conjuncta, duo la-
tera AB AC habeant parallela
lateribus DC. DE. & latera circa
angulos A. D. proportionalia; tum
reliqua illorum latera BC. CE,
unam facient lineam rectam.*



DEMONSTRATIO.

29. I. Angulus A $\propto$ ACD, propter
parallelas AB. DC.
Angulus D $\propto$ ACD, propter
parallelas AC. DE.

Ergo ang. A $\propto$ D.

Cum autem latera circa angu-
los A & D sint proportionalia,
crit

erit triang. ^b ABC æquiangulum ^b 6. VI.
triang. DCE.

Adeoque ang. ABC $\propto$ DCE } A.
Ang. A $\propto$ ACD.

Ang. A & ABC $\propto$ toti ACE. } A.
ACB ACB

Tres ang. A. ABC. ACB $\propto$
duobus ACB. ACE.

^c Atqui tres A. ABC. ACB $\propto$ ^c 32. I.
2 Rectis.

Ergo etiam duo ACB. ACE
 $\propto$ 2 Rectis.


Adeoque BC. CE sibi invicem
^a jacebunt in directum. ^d 14. I.

Theor. 22

PROPOSITIO XXXIII.

1. In æqualibus circulis anguli siue ad peripheriam A & E , siue ad centra D & H , sunt in eadem ratione cum arcibus quibus insistant BC . FG .

2. Et Sectors BDC . FGH , eandem cum arcibus habent rationem.



DEMONSTRATIO,

PARS I.

Si anguli D & H ad centra sint æquales; erunt arcus BC , & FG etiam (26. III.) inter se æquales.
Fiat

XXIII
Fiat jam angulus $GHK \propto FHG$
adeoque FHK duplus FHG hoc
est BDC .

alis ang
A b E,
I, sunt in
us quibus
Tum arcus GK erit $\propto FG$ (per
eandem 26. 111) & totus FGK
duplus ipsius FG hoc BC .

C. FGH,
dendratu
Eodem modo si fiat arcus KHL
 $\propto GHK$ f. $FHG. \propto BDC$ adeo-
que FHL triplus BDC , etiam
probabitur arcum $FGKL$ esse tri-
plum arcus BC .

L
K
Ergo hinc universim concludi-
mus si anguli D & H sint æquales,
esse arcus BC . FG æquales : Si
anguli D & H sint inæquales,
etiam arcus esse inæquales, & hoc
juxta quam libet multiplicatio-
nem. ut nim. si H sit duplus D
etiam arius FK sit duplus BC : si
angulus H sit triplus D . & arcum
 $FGKL$ & ipsius BC sit triplus : &
sic in infinitum : id quod idem est
ac angulos cum arcubus esse in ea-
dem ratione.

0,
a sint
FG
les.
iat
Et quia anguli A . E . sunt semif-

N n n 2

fes

ses angulorum $D. H.$ etiam illi cum arcubus eandem habebunt rationem.

P A R S 2.

Hæc ex prima parte facile deducitur. Sectorum $DBC. HFG$: anguli $G \& H$ sunt æquales: ergo arcus $BC. FG$: & latera $DB. DC.$ æqualia $HF. HG$: ergo si superponantur congruent: Ergo Sēctores $DBC. HF$ Gerunt æquales.

Similiter si angulus GHK sit $\propto FHG$: sectores cōgruent, adeoque Sēctor $GHK \propto$ sēctori FHG hoc BDC : Ergo sēctor FHK duplus erit sēctoris FHG s. BDC .

Eodem modo si sit angulus FHL triplus D , erit arius $FGKL$ triplus BC : adeoque Sēctor $FHLKG$ triplus sēctoris BDC : & sic in infinitum. Q. E. D.

F I N I S.