

Notes du mont Royal

www.notesdumontroyal.com

Cette œuvre est hébergée sur « *Notes du mont Royal* » dans le cadre d'un exposé gratuit sur la littérature.

SOURCE DES IMAGES
Google Livres

EVCLIDIS ELEMENTORVM

SEX

LIBRI PRIORES.

DEMONSTRATI

ab

HENRICO COETSIO

Henricus Coetsius

B.C.

733



*A 21702
To Octob*

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION



EUCLIDIS
ELEMENTORUM
SEX
LIBRI PRIORES
Magnam partem novis demon-
strationibus
ADORNATI
OPERA & STUDIO
HENRICI COETSII.



LUGDUNI BATAVORUM,
Apud DANIELEM & GAESBEEK,
M DC XCH.



P R Æ F A T I O

A D

LECTOREM.

Elementa demonstrare aggredior Euclidis, Illustris Mathematici, qui tum propriis inventis, tum ab aliis inventorum, quæ passim dispersa jacebant, collectione & iusta ordinatione Magni adeptus Geometræ nomen, de omni Matheseos optime meritus est studio: id quod abunde testatum faciunt tot doctissimorum virorum commentarii, quibus hæc Elementa, quorum utilitas paucos latet, per multa celebrata sunt secula.

Admirandæ sane sunt Theonum, Proclorum, Commandi-

A

no-

P R Æ F A T I O.

norum, Clauiorum, Bettinorum,
& aliorum nominis haud obscu-
ri Mathematicorum lucubratio-
nes, quæ adeo fertiles sunt ac
dilucidæ, ut universæ Matheseos,
quantum imo plus quam sufficit,
exinde depromi queant fundamen-
ta. Quare ego, ne actum agere
videar & aliorum solummodo re-
petere dicta, quod rem ipsam
spectat & hujus Opusculi, quem
intendo, scopum paucis eloquar.
Omnium Mathematicorum, qui
in horum Euclidis Elementorum
dilucidatione & demonstratione
posteritati suam probare sategerunt
industriam, non una eademque
observatur methodus; aliis qui-
dem veterem & ab Euclide tradi-
tum nobis servantibus ordinem;
aliis

P R Æ F A T I O.

aliis vero non mordicus isti ordini inhærentibus, sed veritatum iis comprehensarum maxime naturalem contemplanribus concatenationem. Ego neglecta posteriori hac demonstrandi via, illorum, qui Clarissimi Geometræ authoritate ducuntur & veneratione, castra sequor; in quorum partes me vel unica hæc trahit ratio, quod illis, qui horum Elementorum notitia jam quodammodo sunt imbuti, ad sublimiora Veterum Mathematicorum evolvenda opera faciliorem longe suppeditare mihi manuductionem videantur & aditum. Licet ab alterà parte minime sua laude destituenti sint, qui liberiores ineuntes viam & rerum ipsarum, quan-

P R Æ F A T I O.

tum fieri potest, naturalem sequentes ductum, proprio ingenio & ratiocinio litare maluerunt quam Veteris jurare in Verba Magistri.

In quo laborum genere haud postremo loco collocandi sunt clarissimus Christophorus Sturmius & Ignatius Gaston Pardies, quorum alter natione Germanus in sua Mathesi enucleata, alter ex Galliis ortum ducens in suis Elementis Geometriæ, non solum Euclidis omnibus, verum etiam præcipuis Apollonii & Archimedis demonstratis theorematibus, haud exiguam sibi apud posteros gratiam conciliabunt & laudem. Cum autem hæc Methodus, ut modo dixi, nos ab Antiquorum de-

P R Æ F A T I O.

demonstrandi fontibus alienos reddat nimium, præscriptum Euclidis potius quam alium sequi placuit ordinem; cui tamen me non ita mancipare in animum induxi meum, ut illum ullo in loco invertere nefas duxerim: Si quidem Benignus comperiet Lector me non raro in demonstranda aliqua propositione sequentem & nondum demonstratam vocare in auxilium; quam tamen transpositionem haud mediocrem afferre facilitatem non minori cum brevitate conjunctam videbit is, qui inspicere dignabitur nostram demonstrationem ad § Libri I propositionem, eamque conferre cum Clavio, aut aliis, qui huic Propositioni multo plus quam altero

P R Æ F A T I O.

tanto longiorem accommodarunt demonstrationem; cujus prolixitas multorum tyronum vel maximam in discendo frangit constantiam; præterquam quod suæ demonstrationi immisceant æqualitatem angulorum infra basin, cum duo æqualia producta sint latera: quæ tamen æqualitas istius Propositionis primarium minime facit scopum. Cui malo ab omni parte nostram demonstrationem remedium afferre putamus. Nec huic transponendi methodo scrupulum Mathematicorum figit rigor, qui Paralogismos, Principii petitiones & sic dictos Circulos evitandi studio omnem suam vim referens acceptam, priorum per posteriora haudquaquam admittit.

P R Æ F A T I O.

mittit demonstrationem. Sic enim nostris ordinatis demonstrationibus, ut propositiones præcedentes ope sequentium demonstratæ, harum demonstrationi vice versa non iterum inserviant, in istum scopulum impingendine minimo quidem laboramus periculo. Cæterum ipsis Demonstrationibus Methodum Algebraicam applicuimus quodammodo, ita tamen ut a tyrone debitam non respiciente attentionem facile intelligi possint; præsertim si paginam, quam signorum, quibus utimur, dabimus interpretem & huic præfationi immediate subjungemus inspicere non recusaverit: quo facto totius plurimarum propositionum demonstrationis
cursum

P R Æ F A T I O.

cursum nullo negotio statim comprehendet.

Problematum quidem constructiones ita disponimus, ut singulæ illorum partes vel primo distinguantur intuitu; Theorematum vero propositionem statim distincta, si quæ desideratur, excipit præparatio, quæ claram ac perspicuam comitem habet demonstrationem, ut sic omnibus & Problematum & Theorematum partibus satisfactum sit abunde. Quid autem porro in singulis Libris, præsertim quinto, præstitum sit, non meum sed æquum Benigni Lectoris esto iudicium. Cujus tamen fiducia eam non postulo interpretationem, ac si mihi ipsi persuadere velim provectorum ad alteriora aspiranti

P R Æ F A T I O.

aspiranti nihil hic desiderari curiositati; cum non fercula doctorum palato grata virorum condire, sed Tyronum Mathematici studii cupidorum vota qualicunque hoc in eo implere labore unice habeam in scopo; quem si mihi assequi detur, tum sub idonea forma editorum, quorum jam diu laboravi inopia, exemplarium defectum supplendo; tum quam plurimas horum Elementorum propositiones noxio prolixarum nimis demonstrationum nudatas involucro, in clariorem, ut spero producendo lucem; abunde futurum puto, quod mihi gratuler. Hisce vale, Benigne Lector, & si quid hoc opusculum contineat proficui, in tuum verte commodum.

*

Ex-

EXPLICATIO NOTARUM.

NE Tyronum in demonstrando ardori vel minimam injiciamus moram, datam in Præfatione liberamus fidem, illique notarum ac signorum, quæ demonstrationum brevitati inservire fecimus, significationem subjungimus.

1.

Nota $\propto$ significat æqualitatem; ut $A \propto B$, idem est ac si dicam A est æqualis B .

2.

Nota $\triangleleft$ indicat majoritatem; quare si occurrat $A \triangleleft B$, intellige A est major quam B .

3.

Signum $\triangleright$ minoritatem exprimit: quare $A \triangleright B$ significabit A est minor quam B .

4. Nota

Explicatio Notarum.

4.

Nota $+$ vel plus significat Additionem; adeoq. $A + B$, idem sit ac A cum B , vel A & B simul; vel Bipsi A addendum esse.

5.

Nota $-$ seu minus subtractionem dicit: ut $A - B$ significet A minus B : vel A dempta B : vel B ab A subtrahendum esse.

6.

Si occurrat alicubi hæc formula.

$$\begin{array}{r} A \propto B \\ D \propto C \end{array} / A.$$

$$A + D \propto B + C.$$

intelligendum est ab una parte A & D debere addi, ut etiam ab altera parte C addendum esse ipsi B : & tum priorem summam $A + D$ esse aequalem posteriori $B + C$. per Axioma scilicet primum.

Explicatio Notarum.

7.

Si vero sese offerat talis designatio

$$\begin{array}{r} A \propto B. \\ D \propto C. \end{array} \Bigg) S$$

$$A \div D \propto B \div C.$$

illa significabit ab una parte D subtrahi debere ab A, ut & ab altera parte C q B, & tum primum residuum A ÷ D posteriori B ÷ C esse aequale.

8.

Eadem formula etiam non raro occurret applicata signis < & >. hoc modo.

$$\begin{array}{r} A < B. \\ D \propto C. \end{array} \Bigg) A.$$

$$A + D < B + C.$$

Vel.

$$\begin{array}{r} A > B. \\ D \propto C. \end{array} \Bigg) A.$$

$$A + D > B + C.$$

&

Explicatio Notarum.

Et tum intelligendum est post factam additionem summam $A + D$ esse vel maiorem in signo $<$ vel minorem in signo $>$ quam summa $B + C$.

Nec aliter si loco) A occurrat) S vel S (denotabitur residuum $A \div D$ esse majus in signo $<$ vel minus in signo $>$ quam residuum $B \div C$. id quod ex numero 7 sum ducit fundamentum.

9.

Si in materia proportionum se offerat.

$$A - B = C / D.$$

Vel in numeris

$$4 - 8 = 3 / 6.$$

denotat quantitatem A sese habere ad B , sicut C se habet ad D : vel numeram 4 se habere ad numerum 8, sicut 3 ad 6: adeoque ista quatuor esse proportionalia.

Explicatio Notarum.

10.

Litera X cum duobus punctis utrinque notata hoc modo $\cdot x \cdot$ significat multiplicationem : ut si occurrat $A \cdot x \cdot B$, designat A per B multiplicandum esse, ut ita fiat rectangulum AB. Eodem modo $4 \cdot x \cdot 8$ significat 4 debere multiplicari per 8 : quæ tamen multiplicatio non semper absolvitur, ut clarius pateat ex quam multiplicatione aliquod productum sit generatum.

11.

Nota $\square$, cujus omnia latera sunt æqualia, significat Quadratum : ut $\square AB$ idem est ac Quadratum AB.

12.

Nota $\square$, cujus latera sunt inæqualia, denotat Parallelogrammum Rectangulum, vel simpliciter

Explicatio Notarum.

ter Rectangulum; ut si occurrat
 $\square CD$, idem erit ac Rectangu-
lum CD .

13.

Nota $\sqrt{}$ significat radicem ali-
cujus quantitatis; ut $\sqrt{AB}$, de-
notat ex AB extrahendum esse ra-
dicem: similiter $\sqrt{12}$ vult, ut ex
 12 extrahatur radix, quæ non a-
liter quam per $\sqrt{12}$ designatur.

14.

In demonstrationibus non pau-
cis quædam literæ occurrunt, in-
fra se invicem scriptæ, cum linea
intermedia; quod ubique in genere
significat inferiora superioribus es-
se æqualia; ac proinde inferiora
in locum superiorum esse substituen-
da ac usurpanda: quemadmodum
hoc in specie etiam notavimus ad
demonstrationem Casus 3. Pro-
posit. 35. III. Id quod etiam in
propos. 36. III. probe notandum.

Si-

Explicatio Notarum.

Similiter in Proportionibus hoc observandum est bene, quando una quantitas collocatur supra aliam: tunc inferiorem legendam esse pro superiori, cum supponantur inter se æquales esse: Exemplo sit demonstratio propositionis 3, VI. quæ est pag. 411. quæ sic habet,

$$\text{Tri. Z} - \text{Tri X} = \text{AE} / \text{BC.}$$

leu Y.

dicendum est Triangulum Z se habet ad Triangulum X hoc est Triangulum Y: sicut basis AE se habet ad basin BC.

15.

Pro citationibus marginalibus notandum primum numerum minorem significare propositionem, secundum vero majorem denotare librum: ut 4. III. quantam propositionem Libri tertii dicit: & sic porro in omnibus aliis.

R. U.

EUCCLIDIS

ELEMENTORUM

LIBER PRIMUS.

CUm scientiæ nomen solummodo mereatur illa cognitio, quæ ex certis & indubitatis deducta principiis, omnem vel levissimæ dubitationis discutit nebulam; Mathematicæ procul dubio disciplinæ maximo cum jure hoc sibi vendicant nomen. Cum enim in aliis disciplinis tam sæpe de conclusionibus non aliam ob causam quam principiorum ambiguitatem contentionis serra reciprocetur; Mathematicæ vel ob hoc solum illis palmam præripiunt, quod conclusiones offerant, non ex verisimilibus & assensum emendicantibus, sed ex simplicissimis & inconcussis deductas principiis. Quid enim certi-

A

tu.

tudini & veritatis propagationi magis contrarium, quam in aliqujus materiæ pertractatione de varia & nunquam fere sibi simili vocum significatione sæpius repetita disputatio? Quid nos in majorem circa conclusiones dejicit fluctuationem, quam si illas superstruamus assertionibus aut temere assumtis, aut non probatis? quorum unum si contingat a veritate recedentes in turpissimum incidimus errorem; quod si vero alterius semitæ prementes vestigia veritatem assequimur, non firmum nostrum ratiocinium sed casum nos eo deduxisse certo certius existimandum est.

A quo duplici vitio Mathematici sese omnino præstiterunt liberos, tum Definitionum suarum claritate omnem vocabulorum & terminorum, quos in demonstrationum progressu adhibent, ambiguitatem tollendo; tum

LIBER PRIMUS. 3

tum præmissorum Axiomatum evidentiâ & naturali certitudine firmissimum demonstrationibus substruendo fundamentum.

Hinc est quod studia Mathematica, ex primis & simplicissimis emergentia principiis ad tam sublime perfectionis fastigium provecta cernere licet. Hinc est quod illæ scientiæ, quæ in suo initio & quasi nativitatis momento humi repere & pulverem lambere videntur, relicta terra per aerem volitantes, ad ipsum Cælum ascendant, illiusque aliis inaccessa arcana inconcussis calculi sui subjiciant legibus.

Horum autem Principiorum, quibus tota Mathesis ortum, progressum, omnemque qua eminet evidentiâ acceptam referre debet, genera sunt tria: Definitiones, Postulata, Axiomata.

DEFINITIONES.

I. *Punctum est, cujus pars nulla.*


Facile concipimus tale punctum in rerum natura minime dari. Quicquid enim est, aut ad Spiritum refertur aut ad corpus: nemo autem facile sibi persuadebit scientias Mathematicas Spiritum aut res spirituales & omni materia carentes pro suo subiecto assumere, cum agat de corpore quatenus mensuram & ad alia corpora proportionem aliquam admittit: unde patet omne punctum quantumvis parvum concipiatur, pertinere ad corpus, esse ipsum corpus & æque ac corpus trinam admittere dimensionem, sc. longitudinem latitudinem & profunditatem: licet enim puncta possint occurrere adeo minuta, ut harum dimensionum accurata distinctio vel intensissimam sensum fallat aciem, longius tamen patentem vim nostrarum cogitationem non effugiunt, cum semper in illis distinguere liceat partem dextram a sinistra, superiorem ab inferiori.

Si vero ab illis punctis in nostra cogi-

LIBER PRIMUS. ¶

gitatione trinam istam dimensionem abstrahamus, eamque licet istis propriam & semper inhaerentem, in illis non consideremus, obtinemus puncta Mathematica; quæ ad sensum nostrum relata acutissimæ acus impresso vestigio aliquo modo designari possunt, in quo sensus dubium relinquunt, utrum longitudo latitudinem superet nec ne, an vero latitudo longitudinem excedat: & utrum quælibet ex his profunditate sit major.

2. *Linea vero longitudo latitudinis expers.*



Quemadmodum a parte rei non datur punctum omni prorsus dimensione carens, ita nec datur linea longitudinis tantum capax: quare etiam per abstractionem in linea unam tantum consideramus dimensionem secundum longitudinem, seposita latitudine cum profunditate. Ad cujus considerationis imitationem in communi vitæ usu ulnam re-

A 3 bus

8 EUCLIDIS

bus mensurandis solummodo applicamus secundum longitudinem, reliquis dimensionibus in latitudinem & profunditatem neglectis.

Cæterum lineæ generationem hoc modo concipere licet. Si consideremus punctum quoddam in aliquo loco constitutum inde moveri incipere; ita ut motus sui visibile relinquat vestigium; illud nobis exhibebit lineam hoc modo generatam.

Quia autem illud punctum ab uno loco ad alium moveri potest vel per viam rectam vel per curvam, uti videre est in lineis A B. C D, inde oritur lineæ divisio in Rectam vel Curvam.

3. *Lineæ autem termini sunt puncta.*

Hoc facile intelligitur ex lineæ jam allata generatione; quod nimirum idem illud punctum quod in principio sui motus erat in loco A vel C, in fine perveniat ac subsistat in loco B vel D.

4. *Linea recta est, quæ ex æquo sua interjacet puncta.*


Vel

Vel cujus puncta extrema obumbrant omnia media,

Vel minima earum, quæ a puncto ad punctum duci possunt. Juxta Archimede-
dem.

Ex quibus per definitiones contrarias facile innotescit quænam sit Linea curva.

5. Superficies est quæ longitudinem latitudinemque tantum habet,



Sicut non datur punctum cum nulla, nec linea cum una tantum dimensione, sic etiam a parte rei non datur superficies cum duabus, sc. longitudine & latitudine tantum, seclusa profunditate, quæ idcirco nostro tantum cogitandi modo a reliquis separatur ac in corpore non consideratur.

Su-

Superficiei autem generationem hac ratione concipere possumus.

Cogitemus punctum A versus partes inferiores motum descripsisse lineam rectam AB; deinde eandem lineam AB moveri intipere versus partes dexteras, donec linea AB perveniat ad locum DC. Patet isto motu punctum A descripsisse lineam AD, & punctum B lineam BC; quemadmodum etiam omnia puncta intermedia lineæ AB suas lineas descripsisse concipiendum est: ut ex tali motu lineæ AB generata sit Superficies ABCD.

6. *Superficiei autem extrema sunt lineæ.*

Quod facile innotescit ex illis quæ circa superficiei generationem modo dicta sunt.


Quemadmodum autem antea pro diversa motus via vidimus lineam generari aut Rectam aut curvam; eodem etiam modo per diversum lineæ motum superficies describitur aut Recta seu Plana aut Curva,

7. *Plana superficies est, quæ ex æquo suas interjacet rectas.*

Quæ antea de linea recta dicta sunt, similiter hic applicari possunt.

Hinc nullo negotio intelligitur quæ nam sit superficies curva.

8. *Planus autem angulus est duarum linearum in plano se mutuo tangentium & non indirectum jacentium, alterius ad alteram inclinatio.*



Ad constituendum angulum planum seu angulum in superficie, requiritur.

1. Ut duæ lineæ se mutuo tangent.

B

2. Ut

2. Ut non jaceant in directum, sed una ad alteram inclinet.

Quemadmodum utramque hanc conditionem cernere licet in angulo CAB, ubi duæ lineæ AC. AB, se invicem tangentes in puncto A, non jacent in directum, sed ad se mutuo inclinant.

Non autem pauciores nec plures duabus ad angulum planum exiguntur lineæ:

Non pauciores, quia si unica ista linea dividatur in duas, duæ illæ sibi jacebunt in directum; id quod repugnat secundæ conditioni.

Non plures, quia ex gr: tertia AD, si cum reliquis in eodem sit plano, non unum sed duos faciet angulos DAC. CAB: si vero sit extra planum reliquarum linearum, non angulum faciet planum, sed solidum, cujus Definitionem Euclides libro XI. tradit.

Quia jam natura anguli plani consistit in duarum linearum ad se invicem inclinatione, patet anguli alicujus quantitatem non consistere in majori vel minori longitudine linearum: sed tantum in illarum majori vel minori inclinatione; duæ enim lineæ majores eandem possunt habere inclinationem cum duabus minoribus,

LIBER PRIMUS. II

bus, minime mutata anguli quantitate.

Deinde notandum Geometras ad designandum aliquem angulum tres adhibere literas, quarum media punctum denotat ad quod lineæ angulum continentes concurrunt. Ut ad denominandum angulum qui ad punctum A, constituitur a duabus lineis AC. AB. scribitur angulus CAB: vel ab altera parte angulus DAC est qui in puncto A fit a lineis AD. AC.

Nos autem brevitatis & perspicuitatis gratia in sequentibus non semel locotrium literarum angulo designando adhibemus unam ipsi inscriptam.

Ut ad nominandum angulum DAC: efferemus angulum P. sic etiam loco anguli CAB scribemus angulum O.

9. Cum autem continentes angulum lineæ fuerint rectæ, rectilineus appellatur angulus.

Accedit Euclides ad anguli divisionem: Supra vidimus linearum duo esse genera, scilicet illas esse vel rectas, vel curvas.


Quia autem illæ tribus diversis modis possunt conjungi, set vel recta cum re-

sta: vel recta cum curva; vel curva cum curva; hinc etiam tria oriuntur angulorum genera.

Primus quippe casus suppeditat angulum rectilineum, cujus Definitionem hic tradit Euclides.

Secundus casus nobis dat angulum mixtilineum, cujus mentionem factam videmus in Libro III. Tertius denique casus constituit angulum curvilineum.


10. Cum vero recta AB rectæ CD insistsens duos Angulos ABC : ABD æquales inter se facit; Rectus est uterque æqualium angulorum: & insistsens recta AB vocatur Perpendicularis lineæ CD . cui insistit.



Anguli ABC . ABD dicuntur recti, quia linea AB ; ipsi CD ita directo sita in-

insistit, ut. ab una parte non magis inclinet versus BC quam ab altera parte versus BD;

11. *Obtusus angulus EBC est, qui recto ABC major est.*



12. *Acutus vero EBD, qui recto ABD minor est.*

In tribus hisce definitionibus Euclides tradit anguli rectilinei subdivisionem petitam a triplici linearum inclinationis forma: quæ ab utraque parte vel est æqualis; vel ab una parte major altera; vel ab una parte minor altera: ut in Schemate videre est.

13. *Terminus est quod alicujus est extremum.*

Ut punctum lineæ: linea superficiei:
superficies corporis.

14. *Figura plana est superficies plana, una vel pluribus lineis undique terminata.*

Cum lineæ sint vel rectæ vel curvæ, illæque tribus modis possint conjungi; figurarum planarum inde oriuntur tres species.

Curvilineæ, quæ vel una vel pluribus curvis terminantur. Una terminatur circulus, cujus definitionem statim tradit Euclides.


Mixtilineæ, quæ partim curvis partim rectis terminantur: huc pertinent semicirculus & segmentum Circuli.

Rectilineæ quæ solis rectis terminantur, quæ comprehendunt omnia polygonæ sive regularia sive irregularia.

15. *Circulus est figura plana sub una linea curva DCF comprehensa, quæ vocatur Periphetia: ad quam ab uno puncto A eorum quæ intra figuram sunt posita,*

LIBER PRIMUS. 15

*ta, omnes cadentes recta AB.
AD. AE. AC inter se aequales
sunt.*



Proponit Euclides definitionem Circuli jam descripti, cujus delineationem & generationem hoc modo concipere possumus. Ducta sit quælibet recta linea AB. cujus una extremitas A ponatur immota & affixa plano; altera vero extremitas B cum tota linea moveatur circa punctum A, per loca AD. AE. AC. AF, donec tandem redeat ad locum AB, unde moveri cœperat: ista linea AB hâc circumductione describet circulum BDEC.F.

Ex qua descriptionis forma patet omnes Radios cujuslibet Circuli esse inter se æquales: cum linea AB, cujus circumvolutio circulo ortum dedit, per omnia

omnia loca, AD. AE. AC & similia transit, adeoque punctum B fuit aliquando in punctis D. E. C. &c. adeoque lineæ AD. AE. AC. sunt æquales eidem lineæ AB.

Hinc jam etiam immediate sequitur omnia puncta circumferentiæ DCFB æqualiter distare a puncto A.

16. *Illud autem punctum A centrum circuli dicitur.*

17. *Diameter Circuli est recta quædam BC per Centrum A ducta, & utrinque in punctis B. C. peripheriâ terminata; quæ & Circulum bifariam fecat.*

Ut linea in Circulo ducta sit Diameter duæ requiruntur conditiones.

- I. Ut transeat per centrum.
- II. Ut ab utraque parte terminetur in peripheria.

Adeoque omnis linea, harum nullam aut tantum unam habens conditionum, Diameter dici nullo modo potest.

Cæterum Diametrum circulum divide-

LIBER PRIMUS. 17

re bifariam patet ex eo quod transeat per Circuli punctum, quod ex omnibus medium est : quia scilicet est medium omnium Diametrorum quæ in Circulo duci possunt.

Sequitur jam secunda species figurarum, nempe mixtilinear.

18. *Semicirculus autem BDE CAB est figura, quæ continetur sub Diametro BC, & dimidia circumferentia BDEC.*

19. *Segmentum circuli est figura quæ continetur sub qualibet recta circulo inscripta & abscissa peripheria.*

Segmentum, excluso semicirculo, est duplex, vel majus Semicirculo, vel minus.

Segmentum majus est illud in quo reperitur centrum.

Segmentum minus est illud quod centrum non continet.

Nunc Euclides aggreditur tertiam speciem figurarum sc: rectilinearum.

20. *Rectilineæ figuræ sunt quæ sub rectis lineis continentur.*

Distinguuntur autem rursus hæ figuræ rectilineæ in tres species; vel enim sunt Trilateræ; vel Quadrilateræ; vel Multilateræ.

21. *Trilateræ quidem figuræ sunt, quæ sub tribus.*

22. *Quadrilateræ vero quæ sub quatuor.*

23. *Multilateræ denique quæ sub pluribus quam quatuor rectis comprehenduntur.*

Generali vocabulo hæ dicuntur Multilateræ ad infinitam nominum evitandam multitudinem.


Jam cum figurarum rectilinearum primam speciem constituent figuræ Trilateræ, seu vulgo sic dicta Triangula, illorum divisionem proponit Euclides, petitam ex consideratione tum laterum, tum angulorum, quorum numerus (ut & in omnibus figuris rectilineis) est æqua-

LIBER PRIMUS. 19


æqualis: quippe triangulum tot continet angulos quot latera.

Triangulum respectu laterum est triplex; Equilaterum, Isosceles, & Scalenum.


24. *Triangulum æquilaterum est, quod tria latera habet æqualia.*



25. *Isosceles autem, quod duobus tantum habet æqualia AB, AC.*




26. *Scalenum denique quod tria
inequalia habet latera.*



Secunda Triangulorum divisio pro fun-
damento habet tres angulorum species ;
sc: rectum, obtusum & acutum; hinc enim
Triangulum dividitur in Rectangulum,
Obtusangulum, & Acutangulum.

27. *Triangulum rectangulum est,
quod unum habet angulum rectum
ABC.*




28. Ob-

LIBER PRIMUS. II

28. *Obtusangulum est, quod unum habet angulum CDE obtusum id est majorem recto.*

29. *Acutangulum denique quod tres angulos F. G. H. habet acutos, hoc est, minores recto.*



Sequitur jam secunda species figurarum rectilinearum: scilicet Figuræ Quadrilateræ. Hæ autem ab Euclide recensentur quinque: Quadratum; Figura altera parte longior; Rhombus; Rhomboides; & Trapezia.

30. *Quadratum est, quod æquilaterum est & rectangulum.*




C 3

31. Al-


31. Altera parte longior figurā est, quæ rectangula quidem, at æquilatera non est.




32. Rhombus autem, quæ æquilatera quidem, sed rectangula non est.



33. Rhomboides est, quæ ad-versa & latera & angulos æqualia inter se habens, neque æquilatera est, neque rectangula.



34. Trapezia denique dicuntur reliquæ figura quadrilateræ, quæ ad nullam ex quatuor præcedentibus referri possint.



35. Rectæ lineæ parallelæ seu æquidistantes AB . CD sunt, quæ in eodem plano existentes, & utrimque in infinitum productæ, ad eandem distantiam a se invicem manent remotæ; ideoque nunquam concurrent.

A ————— B


C ————— D

Non omnes lineæ, quæ nunquam concurrent, parallelæ dicendæ sunt;
cum

cum dentur lineæ, quæ licet simul in infinitum producantur, ita ut ad se mutuo in infinitum magis ac magis accedant, nunquam tamen concurrent; ut Hyperbola & recta linea; Conchois & recta linea; Duæ æquales Parabolæ circa eandem Diametrum: quæ idcirco nequam dicendæ sunt parallelæ.

Unde facile manifestum evadit ad naturam parallelismi necessario requiri æqualem ab omni parte distantiam: quam conditionem ab Euclide omissam nos cum celeberrimo Tacqueto adjecimus.

Cæterum linearum parallelarum, quas Euclides ut jam descriptas considerat, generationem & delineationem duobus modis concipere possumus.



PRIMUS MODUS.


Ponamus lineam CA perpendiculariter insistere lineæ AB, ut angulus CAB sit rectus; deinde cogitemus lineam CA una suâ extremitate moveri super lineam AB, ut semper ipsi maneat perpendicularis; si jam linea CA hoc suo motu pervenerit in DE, punctum C descriptam relinquet lineam CD, quæ nunquam potest magis recedere a linea AB, nec ad ipsam propius accedere, cum linea AC durante suo motu semper fuerit eadem & sibi æqualis: adeoque linea CD in omnibus suis punctis manet cum AB in eadem distantia, & si iste motus lineæ CA in infinitum duraret, etiam linea CD in infinitum ab AB distaret, adeoque nunquam cum illa concurreret: unde jam certo concludere licet lineam CD hoc modo generatam lineæ AB esse parallelam.

Deinde cum jam constet lineam CD non posse magis in uno puncto ad lineam AB accedere aut ab illa recedere quam in alio, sequitur lineam CD ad lineas CF, CA habere æqualem inclinationem, adeoque per definitionem Per-

D

pen-

pendicularis angulum DCA esse rectum,
 & æqualem angulo CAB qui politus est
 rectus: adeoque duos angulos interiores
 ACD , CAB simul sumtos esse æquales
 duobus rectis. Id quod natura parallela-
 rum AB , CD hac ratione descriptarum
 omnino requirit.



SECUNDUS MODUS.

Ad lineæ KL punctum A concipia-
 tur facta linea AC perpendicularis, quæ
 licet in infinitum producat, nunquam
 inclinationem quam ad AK , AL habet
 (illa autem utrimque æqualis est) mutabit.
 cum

cum angust quantitas non in majori vel minori linearum longitudine, sed in majori vel minori inclinatione consistat.

Deinde ex alio quovis puncto B cogitemus duci lineam perpendicularem BD, quæ etiam licet infinite protrahatur, nunquam aliam acquirere inclinationem ab illâ quam jam habet ad lineas BK, BE.


Cum jam linea AC in infinitum producta non possit ascendere versus superiora nec descendere versus inferiora: similiter linea BD etiam in infinitum continuata nec altiora nec demissiora petere possit, necessario sequitur istas lineas AC. BD semper servaturas eandem a se invicem distantiam nec concurrere posse unquam; adeoque juxta hanc definitionem illas esse parallelas.

36. *Parallelogrammum est figura quadrilatera cujus binæ opposita latera sunt parallela seu equidistantia.*

37. Cum vero in parallelogrammo Diameter BD ducta fuerit, duæque rectæ CF. HK lateribus parallele secantes Diametrum in u-

no eodemque puncto G , ita ut parallelogrammum distributum sit in quatuor parallelogramma; illa per quae Diameter non transit, scilicet AG . GE . appellantur complementa eorum quae circa Diametrum consistunt, ut HE . CK .

PROPOSITIONE III




POSTULATA.


I. Postuletur a quovis puncto A ad quodvis punctum B rectam lineam AB ducere.



2. Et terminatam rectam AB
in continuum recta producere in C .



3. Et quovis centro A & quo-
libet radio AB . AC . AD . AE .
circulum describere.



AXIOMATA.

1. *Quae sunt eidem equalia,
& inter se sunt equalia.*

2. *Si equalibus equalia ad-
dantur, tota erunt equalia.*

3. *Si ab equalibus equalia
demantur, residua manebunt
equalia.*

4. *Si inequalibus equalia ad-
jecta sint, tota sunt inequalia.*

5. *Si ab inequalibus equalia
ablata sint, reliqua sunt ine-
qualia.*

6. *Et quae ejusdem sunt du-
plicia, inter se sunt equalia.*

Idem intelligendum de triplicibus,
quadruplicibus, quintuplicibus & sic in
infinitum.

7. Et


7. *Et quæ ejusdem sunt dimidia, inter se sunt equalia.*

Nec hoc axioma se tantum restringit ad partes dimidias; sed etiam in tertiis, quartis, in quintis & sic porro in infinitum suam habet veritatem.

8. *Quæ congruunt sibi mutuo, inter se sunt equalia.*

Si primo concipiamus lineam DE superimponi lineæ AB, ita ut puncta extrema D. A. ut & E. B. coincident; similiter omnia puncta intermedia lineæ DE respondeant omnibus mediis punctis lineæ AB, pro certo hinc asserere possumus lineam DE esse æqualem lineæ AB: quia omnes partes lineæ DE examissima conveniunt cum omnibus partibus lineæ AB.

Deinde



Deinde sub qualibet inclinatione ad lineæ AB punctum A ducatur linea AC: si jam ad lineæ DE punctum D ducatur linea DF, ita ut inclinatio lineæ DF ad lineam DE, sit æqualis vel similis inclinationi lineæ AC ad lineam AB: & linea DF sit æqualis lineæ AC: & tum angulus FDE superimponatur angulo CAB, omnia correspondebunt: scilicet linea DE cum AB, inclinatio cum inclinatione, & linea DF cum AC. Adeoque jam non tantum lineæ congruunt sed & anguli.

Si denique ducatur recta CB, ut & FE, & una figura DEF imponatur alteri ABC: jam etiam tertium latus FE congruet cum tertio latere CB; adeoque

que totum triangulum DEF congruet
triangulo ABC: unde necessario sequitur
unum alteri esse æquale.

9. Totum sua parte majus est.


10. Omnes anguli recti inter
se sunt æquales.

11. Si in duas rectas AG.
BD recta AB incidens interiores
& ad easdem partes angulos
ABD, BAG duobus rectis mino-
res faciat; productæ duæ illæ re-
ctæ tandem coincident inter se
ad eas partes, ubi sunt isti anguli
duobus rectis minores.

Cum in hoc Axiomate mentionem
faciat Euclides duarum linearum coinci-
dentiarum, & duorum interiorum angulo-
rum, facili negotio patet illud aliquo mo-
do respectum habere ad Definitionem li-
nearum parallelarum superius traditam:
cumque in ista definitione nec tertia li-

nea incidens, nec duo anguli interiores occurrant, fatendum ingenue erit, huius Axiomatis lucem in primo intuitu non apparere tantam, quanta in præcedentibus statim affulsit; imo quanta etiam in omnibus communibus sententiis requiritur.

Quod si vero in memoriam revoce-
mus supra allatos modos generationis parallelarum, putamus inde huic Axiomati multum affundi posse claritatis. Sumamus
Ex: Gt: secundam.



Ibi quippe vidimus lineas parallelas AC: BD ex sua natura & generationis modo requirere ut duo anguli CAB. DBA sint recti, hoc est istius parallelismi non aliud esse fundamentum quam cum angulus unus
ABD

ABD sit rectus ; (quod semper supponimus) ut alter BAC etiam sit rectus : adeoque ut linea AB perpendiculariter in lineam AC cadens etiam sit perpendicularis ad alteram BD.

Si jam ex puncto A infra lineam AC ducatur alia quælibet ut AE ; ita ut angulus BAE, sit minor recto : illa necessario si producat magis ac magis debet recedere ab AC : quia alias deberet aut esse parallela ipsi AC, aut iterum in alio puncto cum ipsa concurrere : non prius, quia habet punctum A commune adeoque in illo concidunt ; non posterius quia tum duæ rectæ spatium comprehenderent, quod repugnat Axiomi sequenti.

Cum manifestum nunc sit lineam AE magis ac magis recedere ab AC, etiam patet illud non posse fieri nisi illa magis ac magis appropinquet ad alteram parallelam BD ; quod tamen in infinitum absque concursu fieri minime possibile est ; si enim unius lineæ punctum A ab alterius lineæ puncto E ad quamlibet distantiam remotum esse concipiamus ; & a puncto A versus E ducere incipiamus lineam aliquam brevem ; illa si producat, adeoque ab AC magis ac magis recedat.

necessario ad punctum E magis ac magis accedet, donec tandem porro producta per illud punctum E transeat.

Si enim impossibile sit ut per E transeat, e duobus unum verum est; aut a puncto A. ad E. non posse duci lineam rectam, quod repugnat postulato primo; aut lineam AE, si quam proxime ad punctum E pervenerit, aliorum se determinare adeoque se flectere; quod non potest esse nisi ex recta fiat curva: quod tum est contra Hypothesin.

Dux tamen adhuc discutiendæ restant difficultates, quæ linearum AE. BD necessarium vacillare faciant concursum.

Prima est, quod Hyperbola & recta, Conchois & recta, dux Parabolæ æquales circa eandem diametrum, simul in infinitum productæ nunquam concurrant.

Quæ tamen difficultas evanescit si consideremus illas lineas esse extra genus linearum, de quibus agit Euclides in hoc Axiomate; expresse enim tantum loquitur de lineis rectis; cum Assymptoti sint (saltem altera) ex lineis mixtis.

Altera difficultas oritur ex Clarissimi Bettini duabus rectis (in Apiar. 3. & Arario Tom. I. pag. 354.) quæ licet inter-

ternos

ternos angulos duobus rectis minores efficiant, si producantur tamen nunquam coincident.

Sed nec hoc nostri Axiomatis evidentiam & veritatem labefactare potest. Cum istæ lineæ non simpliciter seu tanquam a puncto ad punctum, sed cum certa quadam conditione, scilicet adjuncta proportionem producantur. Quæ proportionalis linearum productio hic nullum omnino habet locum.

12. *Duæ rectæ spatium non comprehendunt.*

13. *Omne totum est æquale omnibus suis partibus simul sumptis.*

Quoniam majoris perspicuitatis gratia Mathematicis in more positum est, ut veritates quas demonstrandas suscipiunt, distinctis a se invicem complectantur propositionibus; notandum est hæc propositiones dividi in Problemata & Theoremata,

Problema est propositio in qua aliquid

proponitur efficiendum, & conclusionis formula semper talis est: Quod erat faciendum.


Theorema est propositio in qua proprietas quædam aut veritas de aliqua re jam facta & in figura jam constructa, proponitur demonstranda: & conclusionis formula semper est. Quod erat demonstrandum.

Corollarium est consecutarium quod ex facta jam demonstratione tanquam lucrum aliquod colligitur.

Lemma est demonstratio præmissæ alicujus, ut quæsitæ demonstratio clarior evadat & brevior.

PROPOSITIO. I.

Probl. I. *Super data recta terminata AB triangulum aequaliterum constituere.*



CON.

CONSTRUCTIO.

I. Centro A radio AB, ^a de- a Post. 3.
scribe circulum BCE.

II. Centro B, eodem radio
BA, ^a describe circulum ACF.

3. Ex puncto intersectionis
C ^b duce rectas CA. CB. b Post. 1.

Dico triangulum ABC esse æ-
quilaterum.

DEMONSTRATIO.

$$\begin{array}{l} AB \propto AC. \\ BA \propto BC. \end{array} \Bigg\}^c \quad c \text{ Def. 15.}$$

Ergo AC $\propto$ BC. d d Ax. 1.


Adeoque triangulum ABC est
æquilaterum. Quod erat facien- e Def. 24.
dum.

Pro-

PROPOSITIO. II.

Prop. 2.

Ad datum punctum A data recta BC aequalem rectam AF ponere.



CONSTRUCTIO.

1. Ducatur a C ad A recta
a Post. 1. CA.
2. Super CA^b fiat triangulum
b L. I. æquilaterum. CDA.
3. Centro C, radio CB de-
c Post. 3. scribe^c circulum.
4. Latus DC^d produc usque
d Post. 2. ad Circumferentiam in E.
5. Centro D radio DE^e de-
e Post. 3. scribe arcum circuli EF.

6. De-

LIBER PRIMUS. 41

6. Denique latus DA _f pro- _f Post. 2.
ducusque ad istum arcum in F.

Dico lineam AF esse æqua-
lem datæ BC.

DEMONSTRATIO.

$$S \begin{cases} DF \propto DE. g. \\ DA \propto DC. h. \end{cases}$$

g Def. 15

h Def.
24.

$$AF \propto CE. i.$$

i Ax. 2.

$$\text{Atqui } BC \propto CE. k.$$


k Def. 15.

$$\text{Ergo } AF \propto BC. l. \text{ Q.E.F. } l \text{ Ax. 4.}$$

Probl. 31

PROPOSITIO. III.

Datis duabus rectis inaequalibus A & BC; de majori BC minori A æqualem rectam BE detrabere.



CONSTRUCTIO.

1. Ad lineæ CB extremitatem
2. I. B, sub quolibet angulo ^a pono rectam BD æqualem minori A.
- b. Post. 3. 2. Centro B radio BD ^b describo arcum circuli, secantem rectam CB in E.


Dico lineam BE esse æqualem ipsi A.

De-

DEMONSTRATIO.

Quia sunt
 $BE \propto BD$ c. radii ejus-^{c Def. 15.}
 dem circuli.
 Atqui $A \propto BD$ d.^d Per con-
 structionem.


Ergo $BE \propto A$. d. Q.E.F. ^{d Ax. 1.}



PROPOSITIO. IV.

THEOR. I.

Si in triangulis ABC. DEF, unum latus AB, uni DE: & alterum AC alteri DF sit equalle; ut & anguli A. Distis lateribus contenti sint equales: Erit quoque basis BC equalis EF, angulus B angulo E: ut & C ipsi F; Et triangulum ABC equale triangulo DEF.



DEMONSTRATIO.

Concipiamus Triangulum DEF superimponi triangulo ABC, ita ut punctum E cadat in

in B, & latus ED super BA; quando punctum D præcise cadet in A, quia latera AB & DE dantur æqualia. ^a

Deinde latus DF cadet super AC, quia anguli BAC. EDF ponuntur æquales. ^a

Denique punctum F necessario cadet in C, quia latera AC. DF sunt æqualia. ^a

^a Ax. 3.


Ergo punctum E idem erit cum B; & F cum C. Ergo linea EF congruet cum AC, adeoque ipsi erit æqualis: & omnes anguli congruent, ut & tota triangula: quare illa sunt æqualia. ^a

Q. E. D.

PROPOSITIO. V.

Theor. 2.

*Isoſcelis Trianguli A C qui ad
baſin ſunt anguli A B C. A C B in-
ter ſe ſunt æquales.*



PRÆPARATIO.

Per prop: 9 ſequentem (quæ
ab hac non dependet) angulum
BAC divide bifariam recta linea
AD.

D E.

DEMONSTRATIO.

In Triangulis ADB. ADC.

Latus AB $\propto$ AC. per ipsum
triangulum.

Latus AD, utrique commune a-
deoque sibi ipsi æquale.

Angulus BAD $\propto$ CAD per con-
structionem.

Ergo angulus ABD $\propto$ ACD.

• Q. E. D.

a 4. L

COROLLARIUM I.

Omne triangulum æquilaterum
est æquiangulum.


COROLLARIUM II.

Si in triangulo Isoscele vel æquilatero,
ABC, linea AD bisecet angulum A, il-
la etiam oppositum latus BC bifariam di-
videt; ut & ipsi BC perpendicularis erit.

PRO-

Theor. 3.

PROPOSITIO. VI.



Si trianguli ABC,
duo anguli ABC. ACB.
inter se aequales fuerint;
latera aequalibus angulis
opposita AB. AC. etiam
inter se erunt aequalia.

DEMONSTRATIO.

Aut est $AB < AC$.

Aut est $AB > AC$.

Aut est $AB \cong AC$.

Ponatur $AB < AC$.

Abcindatur $DB \cong AC$, tum ducta
DC. erit in $\triangle$ lis DBC. ACB.

Latus $DB \cong AC$. per construct:

$BC \cong BC$. seu commune.

§ 4. I. Angulus DBC $\cong$ ACB.

Ergo erit $\triangle$ lum DBC $\cong$ $\triangle$ lo
ACB, sc: pars & totum. Quod est ab-
surdum; adeoque non potest esse $AB < AC$.

Ponatur deinde $AB > AC$.


Nec hoc posse esse eodem modo probatur ab AC abscindendo partem æqualem lateri AB .

Adeoque cum nequeat esse $AB < AC$.

Nec $AB > AC$.
Necessario erit $AB \propto AC$.

SCHOLIUM.

Non mius forsan quibusdam arridebit demonstratio quam inverso parumper propositionum ordine hoc modo proponemus.



PRÆPARATIO.—

Angulum BAC , ut ante
divide bifariam recta AD .

DEMONSTRATIO.

In triangulis ADB . ADC .

Latus AD utrique commune
sibi ipsi est æquale.

Angulus $B \propto C$, per proposi-
tionem.

Angulus $BAD \propto CAD$ per
constructionem.

Ergo

Ergo per 26 sequentem
(quæ ab hac non dependet)
Latus $AB \propto AC$. Q. E. D.


COROLLARIUM.

Omne Triangulum æqui-
angulum est æquilaterum.

PROPOSITIO. VII.

Theor. 4.

Si a lineæ AB extremitatibus A. B. ad datum aliquod punctum C ductæ fuerint due lineæ AC. BC. extra illud punctum C nullum datur aliud punctum, ad quod ab A & B due lineæ possint duci, quæ jam ductis lineis AC. BC sint æquales.



De.

DEMONSTRATIO.

Si tale punctum contendat Adversarius dari posse : dabitur vel extra vel intra triangulum ABC. vel in alterutro laterum.

Ponatur extra triangulum in D.
Ducta CD. erit in triangulo
ACD

Latus AC $\propto$ AD. juxta Adversarium.

Ergo angulus ACD $\propto$ ADC ; a s. 1.
qui eadem litera O insigniantur.

Deinde in triangulo BCD.
Latus BC $\propto$ BD. iterum juxta
Adv.

Ergo angulus BCD $\propto$ BDC
qui eadem litera P notentur.


Jam angulus O, a parte sinistra est major angulo P, a dextra vero minor, quod est absurdum.

Ac-

Atqui eadem demonstratio
obtinet in omnibus punctis extra
triangulum.

Ergo nullum omnino extra
triangulum datur tale punctum.

Ponatur intra triangulum in D.



A $\left\{ \begin{array}{l} \text{Latus } AC \propto AD \\ \text{Latus } BC \propto BD. \end{array} \right\}$ juxta Ad.
versarium.

Ergo $AC + CB \propto AD + DB.$
contra sequentem propof. 21. quæ ab
hac non dependet.

Cum jam eadem demonstra-
tionis

tionis forma applicari possit omnibus punctis intra triangulum ABC.

Sequitur nullum tale punctum intra illud dari.


Ponatur in alterutro laterum
AC. BC.

Nec ibi illud punctum potest inveniri, quia tum pars foret, æqualis suo toti contra AX. 9.

Ergo universim concludimus extra punctum C nullum omnino aliud dari posse, ad quod duæ lineæ æquales ipsis AC. BC duci queant. Q. E. D.

PROPOSITIO VIII.

Si duo triangula ABC. DEF
Theor. 5. duo latera AB. AC. duobus la-
teribus DE. DF. equalia ha-
beant, alterum alteri: ut &
basin BC equalem basi EF. Illa
etiam angulum A angulo D æ-
qualem habebunt, sub equali-
bus rectis contentum.



DEMONSTRATIO.

Triangulum ABC super-
 ponatur ipsi DEF, ita ut ba-
 sis BC congruat basi EF, tum
 pun-

punctum A cadet in D. & latera AB. AC congruent lateribus DE. EF. item angulus BAC congruet angulo EDF. Ergo ^a erunt anguli ^{Ax. 8.} æquales.

Quod si vero Adversarius contendat punctum A cadere extra D; tum sequeretur extra punctum D, dari aliud punctum, ad quod ab extremitatibus E. F. lineæ duæ possent duci quæ ipsis ED. FD jam ductis essent æquales; quod est absurdum. ^b 7. 1.

PROPOSITIO IX.

Prob. 4. Datum angulum rectilineum BAC bifariam secare.



CONSTRUCTIO.

1. Ex lateribus AB , AC abscinde partes æquales AD , AE .
 2. Super ducta DE constitue triangulum æquilaterum DEF .
 3. Duc rectam AF .
- Dico illam bifariam dividere angulum BAC .

DEMONSTRATIO.

In Triangulis ADF AEF .

Latus AD $\propto$ AE } per constructio-
 Latus DF $\propto$ EF } nem:
 Latus AF $\propto$ AF , quia utrique com-
 mune.

Ergo angulus DAF $\propto$ EAF . Q. E. P.
 CO-

COROLLARIUM.

Hinc patet methodus datum angulum secandi in aequales angulos 4. 8. 16. etc. singulas nimirum partes iterum bisariam dividendo.


SCHOLIUM.

Potest autem propositionis constructio hoc modo in compendium redigi.

I. In lateribus AB. AC. sume aequales AD. AE.


II. Centris D & E, quolibetumque radio describe duos arcus se intersecantes in F.

Quo facto recta AF angulum BAC bisecabit.



PROPOSITIO X.

Probl. 3. *Datam rectam terminatam GH
bifariam secare.*



CONSTRUCTIO.

- a 1. I. 1. Super data GH constitue ^a triangulum æquilaterum GAH.
b 9. I. 2. Angulum A divide bifariam ^b recta AF.

Dico illam lineam GH dividere bifariam.

DEMONSTRATIO.

In Triangulis AIG. AIH.

Latus GA $\propto$ HA. per constructionem.

Latus


LIBER PRIMUS. 61

Latus AI $\propto$ AI, seu utrique commune.

Angulus GAI $\propto$ HAI. per constructionem.

Ergo $\propto$ Basis GI $\propto$ IH: adeoque linea $\propto$ 4. l.
GH secta est bifariam. Q. E. F.

S C O L I U M.



Hujus operationis etiam tale est compendium.

Centris G & H, equali radio utrinque describantur arcus se interfecantes in A & F.

Tum recta AF, bisecabit rectam GH in I.


Notandum etiam pro sequenti propositione rectam AF esse

perpendicularem ipsi GH ex puncto dato I utrimque excitatam.

PROPOSITIO XI.

Prol. 6.

*Data recta DE a puncto linea
dato perpendicularem I A excitare.*



CONSTRUCTIO.

a 3. I.

1. A puncto I utrinque sume ^a partes
inter se æquales ID. IE.

b 1. I.

2. Super tota DE constitue ^b triangu-
lum æquilaterum DAE.

3. Duc rectam AI.

Dico illam esse perpendicularem
quæsitam.

DEMONSTRATIO.

In triangulis AID. AIE.

Latus AD	∞	AE.	} per constructio- nem.
Latus ID	∞	IE.	
Latus AI	∞	AI.	

a 8. I.


b Def. 10.

Ergo Angulus AID ∞ ^a AIE. Adco-
que AI est quæsitæ ^b perpendicularis.

Q. E. D.

P R O -

LIBER PRIMUS. 63
PROPOSITIO XII.



Ex dato puncto A ^{Probl. 7.} *extra lineam DE, ad ipsam lineam perpendicularem ducere.*

CONSTRUCTIO.

1. Centro A tali radio describe ^a circulum ut rectam datam secet in duobus punctis D. E. ^{a Post. 3.}

2. Duc ^b rectas AD. AE. ^{b Post. 1.}

3. Lineam DE ^c divide bifariam in puncto I. ^{c 10. I.}

Dico ductam AI esse quæsitam perpendicularem.

DEMONSTRATIO.

In Triangulis AID. AIE.

Latus AD $\propto$ AE. quia sunt radii ejusdem circuli.


Latus ID $\propto$ IE. per constructionem.

Latus AI $\propto$ AI.

Ergo angulus AID $\propto$ ^d AIE. Ergo AI est quæsitæ perpendicularis, ^{d 8. I.} Q. E. F. ^{e Def. 10.}
P R O.

PROPOSITIO. XIII.

theor. 6. Cum recta linea EB supra rectam CD consistens, angulos facit: aut duos rectos aut duobus rectis æquales efficiet.



DEMONSTRATIO.

Recta EB cum DC aut facit utrimque æquales, adeoque ^a duos rectos; aut non facit.

Si


Si non facit, ex puncto B ex-
citetur ^b perpendicularis BA: ^{b II. L.}
eruntque duo anguli O & P
+ Q singuli recti adeoque
 $O + P + Q \propto 2 R.$

Atqui ang: S $\propto O + P.$

Ergo $S + Q \propto 2 \text{ Rectis.}$
Quod E. D.

PROPOSITIO. XIV.

Theor. 7. *Si ad alicujus rectæ AC punctum C duæ rectæ DC. CE non ad easdem partes ductæ angulos qui sunt deinceps O & S duobus rectis æquales fecerint, in directum erunt istæ rectæ, hoc est DCE erit una recta linea.*



DEMONSTRATIO.

Si Adversarius contendat lineam CE cum CD non facere unam lineam rectam, utique aliam assignare nobis debet; illa autem assignabitur vel supra lineam CE vel infra illam,

Sit primo supra CE. ut CF.

Jam anguli O + P $\propto$ 2 Rectis.

juxta

LIBER PRIMUS. 67

juxta Adversarium.

Atqui anguli $O \perp S \propto 2 R.$ per propositionem.

Ergo $a O \perp P \propto O \perp S.$ Et dem- a Ax. 12
 to utrinque angulo O remanet $b P \propto S.$ b Ax. 21
 Pars & totum quod est absurdum $c.$ c Ax. 9.

Et eadem demonstratio habet locum in omnibus lineis quæ possunt duci supra $CE.$ Ergo nulla potest duci linea supra $CE,$ quæ cum CD faciat lineam rectam.

Sit deinde infra $CE.$ ut $CG.$

Tum anguli $O \perp T \propto 2$ Rectis. jux-
 ta Adversarium.

Atqui $O \perp S \propto 2 R.$ per pro-
 positionem.


Ergo $d O \perp T \propto O \perp S.$ Et ablato d Ax. 1.
 utrinque angulo O remanet $T \propto S.$ To-
 tum & Pars. quod e est absurdum. e Ax. 9.

Et cum eadem demonstrationis forma obtineat in omnibus lineis quæ possint duci infra $CE:$ sequitur etiam nullam infra CE posse duci. quæ cum CD facit lineam rectam. Unde concludendum erit ipsam lineam CE cum CD facere rectam $DCE.$ $Q. E. D.$

PROPOSITIO. XV.

Theor. 8.

Si duæ rectæ AB. CD se invicem secant, angulos ad verticem E oppositos, scilicet E & P æquales inter se facient.



DEMONSTRATIO.

a 13. I.

$$\left. \begin{array}{l} \text{Anguli } E + O \propto 2 R. \\ \text{Anguli } P + O \propto 2 R. \end{array} \right\} a$$

b Ax. 1.

$$\text{Ergo}^b E + O \propto P + O.$$

ablato utrimque O.

c Ax. 3.

$$E \propto P.$$

Co-

COROLLARIUM. I.


Duæ rectæ secantes se mutuo ad punctum intersectionis quatuor angulos faciunt quatuor rectis æquales.

COROLLARIUM. II.

Omnes anguli circa idem punctum constituti æquales sunt quatuor rectis.

PROPOSITIO. XVI.

Theor. 9. *Trianguli ABC uno latere
BA producto in E, externus
angulus EAC utrolibet interno
& opposito C vel B major est.*



PRÆPARATIO.

1. Latus AC bisecetur in F. ^a
 2. Ducta BF producatur b in G, ut BF sit $\propto$ FG.
 3. Ducatur AG.

^aro. 1.

^b Post. 1.

& 2.

DEMONSTRATIO.

Jam in triangulis BFC- AFG.

La-

Latus BF $\propto$ FG) Per con-
 Latus CF $\propto$ AF) structio-
 nem.

Angulus BFC $\propto$ AFG. per 15. I.

Ergo ang. FCB $\propto$ FAG. per 4. I.

Atqui totalis EAC externus
 major FAG.

Ergo idem EAC etiam major
 FCB. f. C.

Eodem modo bisecando latus
 AB procedatur, & probabitur
 angulum externum DAB majorem
 esse angulo ABC.

Atqui angulus DAB $\propto$ EAC.
 15. I.


Ergo EAC etiam est major
 quam ABC. f. B.

Q. E. D.

PROPOSITIO. XVII.

Theor. 10.

*Trianguli ABC duo anguli B.
T. vel alii quilibet, quocunque
modo simul sumpti, duobus re-
ctis sunt minores.*



DEMONSTRATIO.

Producto latere BC in D.

Duo anguli $O + T \propto 2 \text{ R. } 13. \text{ I.}$

Atqui $O < B. \quad 16. \text{ I.}$

Ergo $B + T > 2 \text{ Re.}$
 Simili modo demonstratur
 an-

angulos $A + T$ esse minores
seu $>$ duobus Rectis.

COROLLARIUM. I.

In omni triangulo cujus u-
nus angulus fuerit rectus vel
obtusus, reliqui sunt acuti.


COROLLARIUM II.

Omnes anguli trianguli
æquilateri; & trianguli Iso-
scelis anguli supra basim sunt
acuti.

PROPOSITIO. XVIII.

Theor.
II.

*Omnis Trianguli ABC maxi-
mo lateri AC opponitur maxi-
mus angulus ABC.*



DEMONSTRATIO.

Angulus ABC est $\angle$ C.

A majori latere AC abscinda-
tur AD $\propto$ AB.

Ergo angulus ABD $\propto$ P. ^a

Atqui P $\angle$ C. ^b

a 9. I.

b 16. I.

Ergo ABD $\angle$ C.

Adco-

Adeoque totalis ABC erit
multo $\angle C$.

Angulus ABC est $\angle A$.

A maximo latere AC abscindatur CE $\propto$ CB.

Eritque angulus EBC $\propto$ O. ^{c c 5. I.}

Atqui O $\angle$ A. ^{d d 16. I.}

Ergo EBC $\angle$ A.


Ergo totalis ABC erit multo
 $\angle A$.

Unde jam patet angulum ABC
esse omnium maximum. Q. E. D.

PROPOSITIO. XIX.

Theor.
12.

*In omni triangulo ABC maximo
angulo B opponitur latus maxi-
mum AC.*



DEMONSTRATIO.

Aut latus AC est $\propto$ AB.

Aut AC $>$ AB.

Aut AC $<$ AB.

Si Adversarius ponat AC $\propto$
 as. I. AB, erit $\angle$ angulus B $\propto$ C. quod
 est contra hypothesin.

Si

Si vero dicat esse $AC > AB$.
erit $\angle$ angulus $B > C$: quod ^{b18. l.}
iterum est contra hypothesin.

Ergo sequitur latus AC esse $<$
 AB .


Eodem modo demonstratur
 AC esse $<$ BC .

Ergo absolute latus AC est
maximum. Q. E. D.

PROPOSITIO. XX.

Theor.
13.

Trianguli ABC duo latera scilicet AB. AC. aut alio quocunque modo simul sumpta reliquo BC sunt maiora.



PRÆPARATIO.

1. Latus AC producatur in D ut sit $AD \cong AB$.
2. Ducatur DB.

DEMONSTRATIO.

In Triangulo DAB. latus $AD \cong AB$ per construct.

Ergo angulus ABD $\cong$ D.

Atqui angulus CBD $<$ ABD.

Ergo angulus CBD etiam $<$ D.

Adco-

Adeoquē latus DC hoc est duo latera BA + AC. sunt ^a majora tertio ^a 19. 1. latere BC. Q. E. D.

S C H O L I U M.

Propositionis hujus veritas immediate fuit ex Archimedæa lineæ Rectæ definitione; Ad oculum enim patet viam per quam linea fracta BAC a B ad C ducta est diversam esse, a via lineæ BC, quæ statuitur recta.

Ergo linea recta BC est omnium minima, quæ a B ad C potest duci.

Adeoquē etiam linea recta BC erit > linea fracta BAC.


Q. E. D.

PROPOSITIO XXI.

Theor.

14.

Si a terminis unius lateris BC intra triangulum jungantur due rectæ BD. CE hæc lateribus trianguli BA. AC. minores quidem erunt ; maiorem vero angulum BDC. continebunt.



DEMONSTRATIO.

P A R S I.

Producta BD in E. erit in triangulo BAE.

a 20. I.

$$A \left\{ \begin{array}{l} BA + AE < BE. \\ EC \propto EC. \end{array} \right.$$

b Ax. 4.

$$BA + AC < BE + EC.$$

Deinde in Triangulo DEC.

c 20. I.

$$A \left\{ \begin{array}{l} DE + EC < DC. \\ BD \propto BD. \end{array} \right.$$

BE

LIBER PRIMUS. 81

$BE \perp EC \angle BD \perp DC.$ ^d ^d Ax. 4.

Atqui supra $BA \perp AC \angle BE \perp EC.$

Ergo $BA \perp AC$ multo $\angle BD \perp DC.$

P A R S II.


Externus angulus $BDC \angle DEC.$ ^e 16. I.
interno.

Atqui angulus $DEC \angle A$ interno. ^f ^f 16. I.

Ergo angulus BDC multo $\angle A.$

Q.E.D.

Alia DEMONSTRATIO.



PARS I. Duc rectam ADO.

In triang. ADC ang. R $\angle$ Q.

In triang. ADB ang. D $\angle$ P.

Ergo per 19. I.

Latus AC $\angle$ DC. } A

Latus BA $\angle$ BD. }

Latera BA $\perp$ AB $\angle$ BD $\perp$ DC.

Quod autem angulus R sit $\angle$ Q sic patet. Pro-
ducatur AO in E, ut fiat CE $\cong$ CA. Triang.
ACE est isosceles. Ergo ang. Q $\cong$ E. Atqui ex-
ternus R $\angle$ interno E $\therefore$ Ergo R $\angle$ Q. Similiter
probatur esse D $\angle$ P.

a 5. I.

b 16. I.

c 16. I.

PARS 2.

Ang. S $\angle$ P
Ang. T $\angle$ Q c

Ergo

Ergo $S \perp T < P \perp Q$.
Hoc BDC $<$ BAC.

Vel aliter hoc modo.

P A R S I.

Per Archimedæam rectæ lineæ definitionem linea BOC est omnium brevissima, quæ a B duci possunt ad C. Ergo si a B ad C per aliam viam ducatur linea sive incurvata sive fracta, ut BAC, vel BDC. necessario illa via erit major. Patet autem ad oculum quo punctum fractionis magis a linea BEC recedat, eo viam per quam ista linea procedet esse etiam longiorem, adeoque etiam lineam esse majorem.

Atqui punctum fractionis A magis a linea BOC recedit quam D. Ergo linea BAC erit major linea BDC.

P A R S II.

Per proposit 32. I. (quæ ab hac non dependet.)


Omnes anguli triang. DBC ∞
omnibus ang. trian. ABC.
Atqui ang. DBC $\perp$ DCB $>$ } S
ang. ABC $\perp$ ACB.

Remanebit angulus BDC $<$ BAC.

PROPOSITIO XXII.

— Probl. 3.

Ex datis tribus rectis A. B. C. quarum due qualibet tertia sunt majores, Triangulum constituere.



CONSTRUCTIO.

1. In infinita linea DH, lineis datis A. B. C. sume æquales DF. FG. GH.

2. Centro F & radio FD describe Circulum DI, & centro G radio GH circulum HI.

3. Ex puncto intersectionis I, ducantur rectæ IF. IG.

Dico

LIBER PRIMUS. 85
 Dico FIG esse triangulum
 quæsitum.

DEMONSTRATIO.


FI $\propto$ ^a DF $\propto$ A. } Per con- ^a Def. 15.
 FG $\propto$ B. } structio.
 GI $\propto$ ^b GH $\propto$ C. } nem. ^b Def. 15.

Q. E. F.

PROPOSITIO XXIII.

Probl. 9.

*Ad data rectæ AB punctum
C angulo rectilineo DEF æqua-
lem GCB efficere.*



1. In rectis EH. EI sume
duo puncta D. F. illaque jun-
ge recta linea DF.

a 22. L

2. Tum ^a fiat ad punctum
C triangulum GCB, habens
latera æqualia lateribus trian-
guli EDF.

Dico angulum GCB ef-
se æqualem ipsi DEF.

De-


DEMONSTRATIO.

In triangulis GCB. DEF.

Latus GC $\propto$ DE Per con-
 Latus CB $\propto$ EF str etio-
 Latus BG $\propto$ FD nem.

Ergo ^b angulus GCB $\propto$ DEF. ^b 2.1.

Q. E. F.




Pro-

PROPOSITIO. XXIV.

Theor. 15.

*Si duo triangula BAC. BAD
 duo latera BA. AC duobus BA
 AD equalia habuerint. alterum
 alteri unum vero triangulum ha-
 beat angulum istis lateribus con-
 tentum BAC majorem altero
 BAD; habebit quoque basin
 BC majorem basi BD,*



PRÆPARATIO.

1. Centro A per C describe
 cir-

LIBER PRIMUS. 39

circulum, is transibit per D, cum AC. AD ponuntur æquales: Et BC cadit supra D.

2. Ducatur recta DC.

DEMONSTRATIO.

In Triangulo ADC. latus AD ponitur æquale AC. ergo angulus $S \propto Q$.

Atqui $S < O$.

Ergo $Q < O$.

Adeoque T multo $< O$.

Quare cum in triangulo BCD angulus T sit $< O$ erit latus seu Basis BC major ^a basi BD.

Q. E. D.

a 19. I.


M

Pro-

PROPOSITIO XXV.

Theor.
16.

*Si duo triangula ABC. DEF
duo latera AB. AC duobus late-
ribus DE. DF equalia habue-
rint alterum alteri; unum vero
triangulum habeat basin BC ma-
jorem altera EF: habebit quoque
angulum A majorem D.*



DEMONSTRATIO.

*Si angulus A non sit $\angle$ D.
Erit vel A $\propto$ D.
vel A $\triangleright$ D.*

Si

Si sit $A \propto D$, erit basis
 $^a BC \propto EF$. contra hypothe- $^a 4. I$
 sin.

Si vero $A > D$ erit $^b ba - ^b 24. I$
 sis $BC > EF$. iterum contra
 hyp.

Adeoque sequitur esse angu-
 lum $A < D$.


Q. E. D.

PROPOSITIO XXVI.

Theor.

17.

Si duo triangula duos angulos duobus angulis aequales habuerint, alterum alteri, & unum latus uni lateri aequale, sive quod adjacet aequalibus angulis, sive quod uni aequalium angulorum subiunditur; Illa & reliqua latera reliquis lateribus aequalia habebunt, alterum alteri, & reliquum angulum reliquo angulo.



DEMONSTRATIO,

In Triangulis ABC. DEF sint anguli B. E. ut & C. F. æquales.

Sitque primo BC $\parallel$ EF, sc. latera adjacentia.

si DE non sit $\parallel$ ipsi AB; sit DE $\angle$ AB, & abscindatur EG $\parallel$ AB, & ducatur GF.

Tum erit in Triangulis GEF, ABC.

Latus GE $\parallel$ AB per constructionem.

Angulus E $\parallel$ B Per proposi-

Latus EF $\parallel$ BC tionem.

a 4. I.

Ergo a angulus GFE $\parallel$ ACB,

Atqui angulus DFE $\parallel$ ACB per propositionem.

b Ax. I.

Ergo b angulus GFE $\parallel$ DFE, pars & totum, quod est absurdum.

c Ax. 9.

Ergo

Ergo non potest esse $DE < AB$,
Et eodem modo probatur DE non posse esse
minus latere AB :

Ergo $DE \cong AB$, adeoque triangula ABC ,
 DEF se habent juxta 4. Et omnia reliqua sunt
æqualia,

Sit deinde $AB \cong DE$, scilicet latera opposita,
Si non sit $EF \cong BC$, sit $EF < BC$, &
abscindatur $EG \cong BC$, ducaturque DG .

Tum erit in triangulis ABC, DEG .

Latus $AB \cong DE$ / per propositionem.

Angulus $B \cong E$ /

Latus $BC \cong EG$ per construct.

Ergo d. Angulus $ACB \cong DGE$.

Atqui angulus $ACB \cong DFE$ per propo- d 4. I.
tionem.

Ergo angulus $DGE \cong DFE$, quod est absur-
dum, cum DGE sit externus, qui interno DFE
major est. e

e 16. I.

Ergo non potest esse $EF < BC$.

Eodem modo probabitur non posse esse
 $EF > BC$.


Unde sequitur esse $EF \cong BC$: Adeoque in
triangulis ABC, DEF omnia per 4 esse æqualia.

Q. E. D.

PROPOSITIO XXVII.

Theor.
18.

*Si in duas rectas AB. CD
recta EF incidens angulos alter-
nos P. R. aequales faciat ; re-
cta erunt inter se parallela.*



DEMONSTRATIO.

*Si non sint parallelæ, coin-
dent*

cident puta in I , & fiet triangulum GIH .

Tum erit angulus externus $P < R$ interno. a 16. r.

Atqui per propof. angulus $P > R$.


Quæ duo simul vera effe absurdum eft. Ergo lineæ non concurrent; adeoque funt parallelæ.

PROPOSITIO XXVIII.

Theor.

19.

*Si in duas rectas AB. CD
recta EF incidens faciat exter-
num angulum O æqualem interno
E ad easdem partes opposito Q :
Aut. si faciat duos internos
ad easdem partes P. Q. simul
æquales duobus rectis : parallele
erunt inter se rectæ AB. CD.*



DEMONSTRATIO.

PARS I.

Angulus $T \propto O$.^a

a 15. L.

Atqui $Q \propto O$ per propositionem.

Ergo $T \propto Q$.^b

b Ax. 1.

Adeoque lineæ AB. CD. sunt parallelæ.^c

c 27. L.

PARS II.

Anguli $O \perp P \propto 2$ Rectis.^d

d 13. L.

Atqui $Q \perp P \propto 2$ Rectis per Prop.

Ergo $O \perp P \propto Q \perp P$. demto^e utrinque P. c Ax. 1.

$O \propto Q$

Ergo per partem primam hujus lineæ AB. CD sunt parallelæ.

Q. E. D.

PROPOSITIO XXIX.


Theor.
29.

*Si in rectas parallelas AB.
CD recta EF incidat.*

1. *Alterni anguli T. Q inter
se erunt aequales.*

2. *Externus G erit aequalis
interno S ad easdem partes op-
posito R.*

3. *Duo interni S ad eas-
dem partes T. R. simul erunt
aequales duobus rectis.*



DEMONSTRATIO.

PARS I.

Si angulus T non sit ∞Q ,
erit vel major vel minor.

Ponatur $T < Q$.) A
 P P .


Erit $T + P < Q + P$. a Ax. 4.

Atqui $T + P \infty^b 2$ Rectis. b 13. I.

Ergo $Q + P > 2$ Rectis:
adeoque lineæ AB . - CD non
sunt c parallelæ: quod est con- c Ax. 17.
tra hypothesin.

N 2

Dein-



Deinde ponatur $T > Q$
 seu $Q < T$.
 R. R. }

$$Q + R < T + R.$$

d 13. I.

Atqui $Q + R \propto 2 \text{ Rectis. } ^d$

^c Ax. II.

Ergo $T + R > 2 \text{ Rectis:}$
 adeoque duæ lineæ ^c AB CD
 non

LIBER PRIMUS. 101

non sunt parallelæ: quod iterum est contra Hypothesin.

Ergo est angulus $T \propto Q$.

Quod E. D.

P A R S II.

$G + T \propto 2$ Rectis. } f
 $R + Q \propto 2$ Rectis. }

f 13. I.]

S { Ergo $G + T \propto R + Q$. g g Ax. I.
 Atqui $T \propto Q$. h h per partem I.

Ergo $G \propto R$. i

i Ax. 3.

P A R S III.

$G + T \propto 2$ Rectis. k
 Atqui $G \propto R$. l

k 13. I.

l Per partem 2.

Ergo $R + T \propto 2$ Rectis.

Q. D. E.


N 3

Pro-

PROPOSITIO. XXX.

Theor.
21.

*Si due rectæ AB. CD. sint
parallelae ad eandem EF; illæ
erunt quoque inter se parallelae.*



DEMONSTRATIO.

Ducatur per tres datas re-
ctas linea GK.

An.


Angulus $O \propto P$.^a propter^a 29. I.
parallelas AB. EF.

Angulus $Q \propto P$.^a propter^a
parallelas CD. EF.

Ergo ang. $O \propto Q$ alterni.
Adeoquæ AB. CD sunt^b inter^b 27. I.
se parallelæ.

PROPOSITIO. XXXI.

Prob. 10. *Per datum punctum G ducere lineam AB, quæ data CD sit parallela.*



CONSTRUCTIO.

1. Ex puncto G ad datam CD duc rectam GH sub quolibet angulo GHC.

2. Ad lineæ GH punctum
 p. 23. I. G fac ^a angulum HGB æqualem angulo GHC.

Dico

LIBER PRIMUS. 1105

Dico BG productam esse
ipsi CD parallelam.

DEMONSTRATIO.


Anguli alterni $\angle GH$ $\angle HGB$
sunt æquales per constructio-
nem. Ergo ^b lineæ AB. CD. ^{b 27. I.}
sunt parallelæ.

PROPOSITIO XXXII.

Theor. 22. *Trianguli ABC uno latere BC producto in E.*

1. *Externus angulus S duobus internis & oppositis A & B. equalis est.*

2. *Trianguli tres anguli A. B. C. simul sumpti duobus rectis aequales sunt.*



DEMONSTRATIO.

PARS I.

Ducta recta CD parallela lateri BA,
erit.

A { Angulus P $\propto$ A, alterno; propter a 29. l.
incidentem AC.
Angulus Q $\propto$ B. interno; propter b 29. l.
incidentem BE.

Ergo anguli P $\perp$ Q hoc est totalis
S $\propto$ A $\perp$ B. Q. E. D.

PARS 2.

Duo anguli O $\perp$ S $\propto$ 2 Rectis. c c 13. l.
Atqui S $\propto$ A $\perp$ B. per partem I.

Ergo tres anguli A $\perp$ B $\perp$ O $\propto$
2 Rectis.

COROLLARIUM I.

Omnes anguli unius trianguli sunt
æquales tribus angulis cujuscunque alte-
rius trianguli simul sumtis; Et quando
duo sunt æquales duobus erit & tertius
æqualis tertio.

COROLLARIUM II.

In triangulo Isoscele rectangulo anguli ad basin sunt semirecti. Et quadrati diameter illius angulos bifariam secat.

COROLLARIUM III.


Angulus trianguli æquilateri est una tertia duorum rectorum, vel duæ tertiæ unius recti.

S C H O L I U M.

Omnis figura rectilinea dividitur in tot triangula, quot habet latera, demptis duobus, & anguli triangulorum constituunt angulos figuræ.

DE.

LIBER PRIMUS. 109
DEMONSTRATIO.



Intra quodlibet polygonum ex: gr: pentagonum $ABCDE$, sumatur aliquod punctum F , ex quo ad singulos angulos ducantur rectæ; & obtinebuntur tot triangula quot figura habet latera, adeoque hic quinque triangula.

Cum autem unumquodque triangulum contineat duos angulos rectos (per 32. I.) quinque triangula continebunt 10 angulos rectos; a quibus si demantur anguli recti quatuor circa F positi (15. I.) qui ad figuram non pertinent, remanebunt pro angulis figuræ 6 anguli recti.

Cum jam duo anguli recti contineantur in uno triangulo, 4 erunt in duobus & 6 in tribus triangulis. Un,

Unde jam concludimus pentagonum dividi posse in tria triangula: hoc est in tot triangula, quot figura habet latera demptis duobus.

Quæ demonstratio universalis est pro omnibus polygonis; & Tabellæ sequentis est fundamentum.

Latera
Trianguli
Anguli recti

3	4	5	6	7
1	2	3	4	5
2	4	6	8	10


Latera
Trianguli
Anguli recti

8	9	10	11	12
6	7	8	9	10
12	14	16	18	20

Cujus hic est Sensus. Figura Ex: Gr: 6 laterum, dividi potest in 4 triangula; & illius anguli omnes vident 8 rectos.

PROPOSITIO XXXIII.

*Rectæ AC. BD quæ æquales & Theor.
parallelas AB. CD ad easdem par- 23.
tes conjungunt, illæ & ipsæ æquales
sunt & parallele.*



DEMONSTRATIO.

Ducta Diametro AD, in Tri-
angulis BAD. ADC.

Latus AB $\propto$ CD per propo-
sitionem.

Angulus a O $\propto$ T propter 29. I.
pa-

parallelas AB. CD.

Latus AD $\propto$ AD.


Ergo per 4. omnia sunt æqualia, nim.

Latus AC $\propto$ BD.

Angulus Q $\propto$ S, adeoque

^b 27. I. ^b AC & BD parallelæ.

PROPOSITIO XXXIV.



Theor.
24.

*Paralle.
logrammi,
ABCD
opposita la-
tera & an-
guli equa-
lia sunt;
ipsumque a*

Diametro secatur bifariam.

DEMONSTRATIO.

In Triangulis BAD. ADC.

Angulus $\angle O \cong \angle T$ propter parallelas $\angle 29. \text{L}$
AB. CD.

Angulus $\angle S \cong \angle Q$ propter parallelas
AC. BD.

Latus AD $\cong$ AD.

Ergo per 26. omnia sunt æqualia; sc:

Latus AB $\cong$ CD.

Latus BD $\cong$ AC.

Angulus B $\cong$ C.

Adeoque per 4. Triangula BAD.
ADC inter se sunt æqualia.


P

PRO-

PROPOSITIO. XXXV.

Theor.
25.

*Parallelogramma AD. FD.
super eadem basi CD & inter
easdem parallelas AB. CD consti-
tuta sunt equalia.*



DEMONSTRATIO.

Tres hic occurrunt casus, qui
totidem figuris exhibentur.

Ad Figuram I.

Latus AE $\propto$ CD
Latus EB $\propto$ CD } 34. I.

Ergo

Ergo $AE \propto EB$.

^a Ax. 1.

Considerentur jam duo trian-
gula EAC. BED, in quibus

Latus $EA \propto BE$.

Angulus $A \propto BED$ propter
parallelas AC. ED.

Latus $AC \propto ED$ per 34. I.

Ergo Triang. ^b EAC $\propto$ /
Triang. BED Adde.
Triang. ECD $\propto$ ECD.

^b 4. I.

Parallelogr. EACD $\propto$ Parall.
BECD.

Ad Figuram. II.

Latus $AE \propto CD$.

Latus $FB \propto CD$. 34. I.

Ergo $AE \propto FB$ /
FE FE. S.

$AF \propto EB$.

Quare jam in Triangulis FAC.
BED.

Latus $FA \propto BE$.

Angulus $A \propto BED$. propter
parallelas AC . ED .

Latus $AC \propto ED$. per 34. I.

c4. I.

Ergo Triang. $\triangle FAC \propto BED$.
Trap. $EFCD$. $\propto EFCD$ } A

Parallelog. $AD \propto$ Parall. FD .

Ad Figuram III.

Latus $AE \propto CD$

Latus $FB \propto CD$. } 34. I.

Ergo $AE \propto FB$) A
 EF . EF .

$AF \propto EB$.

Quare iterum in triangulis
 FAC . BED .

Latus $FA \propto BE$

Angulus $A \propto BED$. ob
parallelas AC . ED .

Latus $AC \propto ED$. per 34. I.

Ergo

Ergo ^dTriang FAC $\propto$ Tri
 ang. BED. } ^{d 4.1}
 Triang. FEG $\propto$ Tri. } S
 ang. FEG.


Trapezium EACG $\propto$ Tra-
 pezio BGD. } A.
 Triang. GCD GCD

Parallelogr. AD $\propto$ Parallel. ED.
 Q. E. D.

PROPOSITIO XXXVI.

Theor.
26.

Parallelogramma AE. HD super æqualibus basibus CE. FD, & inter easdem parallelas AB. CD constituta, inter se sunt æqualia.



DEMONSTRATIO.

Ducantur rectæ CH. EB, quæ erunt
a 33. I. a æquales & parallelæ. Hoc facto erit.


Parallelogr. AE ∞ Parall. EH.
Atqui Parall. HD ∞ eidem } 5. I.
Parall: EH.

b AL. L. Ergo b Parall. AE ∞ Parall. HD.
Q. E. D.

Pro-

PROPOSITIO XXXVII.

*Triangula ACD. FCD super Theor.
eadem basi CD & inter easdem²⁷
parallelas AB. CD. constituta,
sunt inter se equalia.*



DEMONSTRATIO.

Ductis DE a parallela ipsi CA; ut & DB parallela CF, erit. a 31. I.
b 35. I.

Parallelogr. ^b EC ∝ Parallelogr. BC.

Atque Parall. EC semissis est

Triangulum ACD.

Et Parallelogr. BC semissis est 34. I.

triangulum FCD.

Ergo triang. ACD ∝ triang. FCD. c Ax. 7.


Q. E. D.

PRO-

PROPOSITIO XXXVIII.

Theor.
28.

Triangula ACE. HFD super equalibus basibus CE. FD. & inter easdem parallelas AB. CD constituta, inter se sunt equalia.



DEMONSTRATIO.

a 31. I. Ducatur ^a EG parallela
 ipsi AC & DB ipsi FH.
 b 24. I. Tum ^b Parall. CG $\propto$ Pa-
 rall. FB.

At-

LIBER PRIMUS. ~~XXI~~

Atqui dimidium CG
est Triang. ACE.


Et dimidium FB est 34. I.
Triang. HFD.

Ergo $\frac{1}{2}$ triang. ACE $\propto$ 34. 7.
triang. HFD.

PROPOSITIO XXXIX.

Theor.
29.

Si triangula AEC . DBC sint equalia, & super eadem basi BC & ad easdem partes constituta: illa erunt quoque inter easdem parallelas. Hoc est AD erit parallela BC .



DEMONSTRATIO.

Si Adversarius hoc neget. Sit AE parallela ipsi BC : & producta BD in E , ducatur recta EC .

a 37. I.

Tum Triang. $ABC \propto EBC$.

Atqui Triang. $ABC \propto DBC$ per propositionem.

Er-

Ergo Triang. ^b EBC $\propto$ DBC. To- ^b Ax. 1.
um & pars quod est absurdum.

Et eadem demonstratio obtinet in o- ^c Ax. 9.
mnibus lineis quæ possunt duci supra
AD.

Quare concludendum est nullam li-
neam posse duci supra AD, quæ sit ip-
si BC parallela.

Quod si adversarius contendat lineam
AF esse parallelam BC, eadem demon-
strationis forma ipsum ad absurdum de-
ducimus; & probabimus nullam lineam
infra AD posse duci quæ ipsi BC sit
parallela.


Ergo recte hinc concludimus ipsam li-
neam AD esse parallelam BC:

Q. E. D.

PROPOSITIO XL.

Theor.
30.

Si triangula ABC . DEF sint equalia, & super equalibus basibus BC . EF , & ad easdem partes constituta: Illa erunt quoque inter easdem parallelas AD . BF .



DEMONSTRATIO.

Si AD juxta Adversarium non fit parallela BF ; fit AG supra AD ducta, ipsi BF parallela: & producta ED in G , ducatur GF .

a 38. L. Tum erit $\triangle ABC \cong \triangle GEF$.

Atqui idem triang. $ABC \cong \triangle DEF$. per prop.

Ergo


Ergo ^btriang. GEF $\propto$ DEF. To- ^bAx. 1.
tum & pars; quod est ^cabsurdum. ^cAx. 9.

Adeoq̃ue linea AG non est parallela
BF: nec ulla quæ supra AD posset duci.

Et eodem modo demonstratur nec
AH nec ullam aliam quæ infra AD pos-
sit duci, esse parallelam ipsi BF.

Ergo concludimus iterum ipsam lineam
AD esse parallelam BF. Q. E. D.

PROPOSITIO XLI.

Theor.
31.

*Si parallelogram-
mum AECD
communem cum
triangulo FCD
basin CD habue-
rit, & in iisdem parallelis AF.
CD fuerit: parallelogrammum e-
rit duplum trianguli.*

DEMONSTRATIO.

a 37. I. Ducta AD erit triang. ^a ACD $\propto$ tri-
ang FCD.

b 34. I. Atqui ^b parallelogr. AECD est du-
plum triang. ACD.


Ergo etiam parall. AECD est duplum
triang. FCD.

S C H O L I U M.

Imo etiam si parallelogrammum
ABDC cum triangulo EFG æqua-
les bases CD. FG. habuerit & in iisdem
fuerit parallelis, parallelog. trianguli
duplum erit.

De-

LIBER PRIMUS. 127
DEMONSTRATIO.



Ducta FK parallela GE, erit.

Parallelog. AD $\propto$ Parall. KG. 36. I.

Atqui Parall. KG est duplum Trianguli EFG. per 34. I.

Ergo etiam Parall. AD ejusdem trianguli duplum erit.

Præterea si Trianguli EFH cum Parallelogr. AD inter easdem parallelas existentis, basis FH fuerit dupla baseos CD erit triangulum EFH $\propto$ parallegr. AD.


DEMONSTRATIO.

Triang. EFG $\propto$ triang. EHG (38. I.)

Ergo totum triangulum EFH est duplum trianguli EFG : atqui modo demonstratum est esse parallegr. AD duplum ejusdem trianguli EFG. Ergo erit parall. AD $\propto$ triang. EFG. PRO

PROPOSITIO XLII.

Prob. II.



Dato triangulo
ABC aequale paral-
lelogrammum GC
construere, habens
angulum aequalem
angulo dato D.

CONSTRUCTIO.

- a 10. I. 1. Divide a basin BC bifariam in E,
& duc rectam AE.
b 31. I. 2. Duc lineam AH parallelam BC.
3. Ex E duc rectam EG ut angulus
GEC sit æqualis angulo dato D.
4. Age CH parallelam EG.
Dico GC esse parallelogrammum
quæsitum.

DEMONSTRATIO.


- a 38. I. Triang. AEB $\propto$ triang. AEC.
Ergo triang. ABC est duplum triang.
AEC
b 41. I. Atqui Parall. GC^b est duplum ejusdem
triang. AEC.

- c Ax. 6. Ergo triang. ABC $\propto$ Parall. GC. c
Cum jam angulus GEC per constru-
tionem sit $\propto$ angulo dato D; patet fa-
ctum esse quod quæritur.

PRO

PROPOSITIO. XLIII.

Omnis parallelogrammi AC ^{Theor. 32.}
complementa AG. GC. sunt inter
se equalia.



DEMONSTRATIO.

$$S \left(\begin{array}{l} \text{Triang. BAD} \propto \text{Tri} \\ \text{ang. BCD.} \\ \text{Triang. BFG} + \text{GHD} \\ \propto \text{tri. BKG} + \text{GED} \end{array} \right) 34. I.$$


Remanet complem. AG $\propto$
^acompl. GC. Q. E. D. ^{a Ax. 32.}

R

Pro-

PROPOSITIO XLIV.

Prob. 12.



Ad datam
rectam Fda-
to triangulo
ABC aequale
parallelo-
grammum

CM applicare habens angulum aequalem an-
gulo dato D.

CONSTRUCTIO.

a 42. I. 1. Constitue ^aparallelogrammum CG
æquale triangulo ABC, & habens angu-
lum GEC ∞ angulo D.

b 3. I. 2. Produc ^bBC in K, ut CK sit ∞
datæ F.

c 31. I. 3. Age KI parallelam ^cCH, quæ
productæ AH occurrat in I.

4. Ex I per C ducatur IC. quæ pro-
ductæ GE occurrat in L.

5 Ducatur LM parallela BK, quæ
productæ IK occurrat in M.

6. Denique producat HC in N.

Dico CM esse parallelogrammum-
quæsitum.

De-

DEMONSTRATIO.

Triang. ABC $\propto$ complemento GC.
per Constr.

Compl. CM^a $\propto$ eidem compl. GC. ^a43. I.

Ergo triang. ABC ^b $\propto$ compl. CM. ^b Ax. 1.

Angulum autem CNM esse $\propto$ angulo
dato D sic demonstratur.

Ang. CNM ^c $\propto$ HCK. propter pa- ^c29. I.
rallelas CK. NM.

Ang. HCK $\propto$ ^e GEC. propter pa-
rallelas HC. GE.


Ang. GEC $\propto$ D. per constru-
tionem.

Ergo ang. CNM $\propto$ D. ^d ^d Ax. 1.

Cum jam denique latus CK factum
sit æquale lineæ datæ F, patet parallelo-
grammum CM quæsito satisfacere.

PROPOSITIO XLV.

Prob. 13. *Dato rectilineo AD aequale
parallelogrammum ED consti-
tuere habens angulum aequalem
angulo dato F.*



CONSTRUCTIO.

1. Ducta CB dividatur
rectilineum in triacula.
2. Fiat ^{a 42. I.]} parallelogram-
mum EI $\propto$ triangulo BCD,
habens angulum H $\propto$ dato F.
3. Su-

3. Supra latus GI^b fiat parallelogrammum $GD \propto$ triangulo ABC , habens angulum $GID \propto$ ipsi H .

Dico quæsitum satisfactum esse.

DEMONSTRATIO.

A $\left\{ \begin{array}{l} \text{Parallelogr. EI} \propto \\ \text{triang. BCD.} \\ \text{Parallelogr. GD} \propto \\ \text{triang. ABC.} \end{array} \right\}$ per const.


Ergo Parall. $ED \propto$ Rectilineo AD .

Q. E. F.

PROPOSITIO. XLVI.

Prob. 14.

Super data recta AB quadratum ABCD describere.



CONSTRUCTIO.

1. Ab extremitatibus A & B erige duas perpendiculares AC. BD. quæ sint æquales ipsi AB.

2. Ducatur recta CD.

Dico ABCD esse quadratum quæsitum.

DEMONSTRATIO.

Pro lateribus.

Latus AC^a ∞ BD, quia utrim-

trumque est $\propto$ eidem AB .

Latus AC est parallelum
 b BD , propter angulos rectos. $b_{28}.L$
 $A. B.$

Ergo c AB & CD sunt pa- $c_{33}.L$
 rallelae & æquales, adeoque
 omnia latera æqualia eidem
 AB , inter se sunt æqualia &
 parallela.

Pro angulis.

In parallelogrammo AD an-
 guli $A. B.$ sunt recti. Ergo d e - $d_{34}.L$
 tiam oppositi $D. C$ sunt recti.
 Ergo $ABDC$ est quadratum.


Q. E. D.

Pro-

PROPOSITIO XLVII.

THEOR.
33.

*In omni triangulo rectangulo
BAC quadratum lateris BC,
quod recto angulo opponitur, æ-
quale est duobus simul reliquo-
rum late in BA. AC. qua-
dratis.*



DEMONSTRATIO.

Ex A ducta AL parallela late-
ri BE, lateris BC quadratum BD
dividit

dividit in duo parallelogramma
BL. KD:

Si jam demonstratum sit Paral-
lelogr. KD esse $\propto$ quadrato AI ,
ut & parallelogr. BL esse $\propto$ qua-
drato AF , peracta res erit.

Pro Primo.

Ductis AD . BI ang. $BCD \propto ACI$. quia
uterque rectus.
A ang. $ACB. \propto ACB$.

Ang. $ACD \propto BCI$.

Ergo in triangulis ACD . BCI .

Latus $AC \propto CI$. } quia sunt latera eo-
Latus $CD \propto BC$. } rundem quadratorum.
Ang. $ACD \propto BCI$.

Ergo $\propto$ Triang. ACD triang. BCI . • 4 L

Atqui parallelogr. KD est } Quia sunt
duplum triang. ACD . } in iisdem ba- • 4 L
Et parallelogr. AI duplum } fibus & pa-
triang. BCI . } rallelis.

b AL. 6.] Ergo ^b parall. KD $\propto$ parall. seu quadrato AL.

Pro Secundo.

Ductis AE. CF. $\left\{ \begin{array}{l} \text{Ang. CBE} \propto \text{ABF.} \\ \text{quia uterque rectus.} \\ \text{A Ang. ABC. ABC.} \end{array} \right.$

Ang. ABE. $\propto$ CBF.

Quare in triangulis ABE. CBF.

Latus AB $\propto$ BF. $\left\{ \begin{array}{l} \text{Utpote ltera eorum} \\ \text{Latus BE} \propto \text{CB.} / \text{dem quadratorum.} \end{array} \right.$
 Ang. ABE $\propto$ CBF.

d4. I. Ergo Triang. ABE ^d $\propto$ Triang. CBF.

e Atqui parallelogr. BL est $\left\{ \begin{array}{l} \text{Quia sunt} \\ \text{duplum triang. ABE.} \end{array} \right.$ in iisdem
 e Et parallelogr. AF duplum $\left\{ \begin{array}{l} \text{basibus \&} \\ \text{triang. CBF.} \end{array} \right.$ parallelis.

Ergo

Ergo parall. BL $\propto$ parall. seu
 quadrato AF. f Ax. 6.
 Atqui antea parall KD $\propto$ qua-
 drato AI. A

Ergo Quadratum BD $\propto$ duobus qua-
 dratis. AF. AI.

Q. E. D.

Ergo $\square$ FEBG $\propto$ $\square$ ABLK. } Adde.
 Supra est $\square$ FDCG $\propto$ $\square$ AHIC.

Eritque $\square$ EDCB $\propto$ $\square$ ABLK $\perp$
 $\square$ AHIC. Q. E. D.

Nam quod latus BE occurrat lateri LK
 & latus BD continuato lateri IH sic patet,
 siquidem omnes anguli O, ut & P mani-
 festo æquales sunt, quia ubique O $\perp$ P
 constituunt unum rectum.


Adeoque $\triangle$ Ium ABC revolutum circa
 centrum B congruet cum triangulo BLE;
 revolutum autem circa centrum C, con-
 gruet cum triangulo CID.

S C H O L I U M. I.

Pulcherrimum hoc Pythagoræ inven-
 tum insigne per totam Mathesin est
 Theorema, & non pauca utilissima sup-
 peditat Problemata, quorum cum alia
 apud Clavium & alios Autores abun-
 danti satis copia videri possint, nos tria
 tantum afferemus.

EUCLIDIS

P R O B L E M A I.



Datis
quodli-
bet lineis
K. L. M.
N. O. in-
venire
Quadra-
tum
quod o-
mnium
linearum
quadratis
simul
sumtis sit
æquale.

Constructio & Demonstratio.

1. Duas lineas K & L, junge in an-
gu-

gulo recto ABC , erit ducta recta AC :

$\square AC \propto \square$ tis K , & L .


2. Facta $CD \propto M$ perpendiculari ad CA , erit $\square AD \propto \square$ tis. $K. L. M$.

3. Ad AD fiat perpendicularis $DE \propto N$, eritque $\square AE \propto \square$ tis $K. L. M. N$.

4. Ipsi AE fiat perpendicularis $EF \propto O$, eritque $\square AF \propto \square$ tis. $K. L. M. N. O$.

Quæ omnia sequuntur ex hac prop.
47. cum quatuor ista triangula ABC .
 ACD . ADE . AEF . per constructio-
nem sint rectangula.

PROBLEMA. II.



Datis duabus lineis inæqualibus $K. L.$ invenire quadratum, quo a se invicem quadrata ab illis facta differunt.

CONSTRUCTIO.

1. Fac rectam DB duplam datæ majoris K .
2. Super illa describe Semicirculum DEB .
3. Fiat ipsi DB perpendicularis $BC \propto$ datæ L .
4. Ducatur CE ad Semicirculum, parallela BD .
5. Ex

5. Ex puncto E demittatur perpendicularis EF.

Tum dico $\square$ AF esse differentiam $\square$ torum K. & L.

DEMONSTRATIO.

Ducta AE erit triangulum AEF per constructionem rectangulum; adeoque per 47. I.

$$\square AE \propto \square EF + \square AF$$

Atqui $\square AE \propto \square K$ Per con-


Et $\square EF \propto \square L$ } struct.

Ergo $\square K$ superat $\square L$ per $\square AF$ adeoque $\square AF$ est differentia $\square$ torum, K & L.

P R O B L E M A. III.

Cognitis trianguli rectanguli ABC duobus lateribus, invenire tertium.

P R A X I S.




Sint cognita duo latera AB 3. BC 4. Quia triangulum est rectangulum : duo quadrata AB & BC : seu 9 & 16 addantur in unam summam :

&

& obtinebitur 25: pro duobus $\square$ tis AB . BC . hoc est pro $\square$ to AC : cujus radix 5 dabit latus quæsitum AC .

Similiter cognita sint latera AC . 5 & BC 4: tum a $\square$ to AC 25 sublato $\square$ to BC , 16, restabit pro $\square$ to AB 9. cujus radix exhibebit latus quæsitum AB .

SCHOLIUM II.



Si triangulum rectangulum sit
simul Iosceles, facillime propo-
sitionis veritas demonstrabitur
hunc in modum.

PRÆPARATIO.

1. Super lateribus AB. AC. fiant $\square$ ta
AF. AG.

2. Ducantur rectæ CD. DE. EB.

Dico BCDE esse $\square$ tum a BC, &
 ∞ $\square$ tis AF. AG.

DEMONSTRATIO.

PARS I.

Per 32. I. illiusque Coroll. 2. tres angu-
li

li ad B sc. ABC. ABE. EBF. ut & tres ad C scil. ACB. ACD. DCG : præterea duo ad E sc: AEB. FEB, ut & ad D duo ADC. GDC; sunt semirecti: unde jam facile deducitur angulos AED. ADE etiam esse semirectos : adeoque quatuor angulos quadrilateri BCDE esse rectos: quare latera opposita sunt parallela: sc. BC. ED & EB. DC.

Atqui $BC \propto CD$ (6. I.) quia triang. BCD est rectangulum in C & habet duos angulos supra Basin BD æquales : unde etiam $BE \propto ED$.

Ergo quatuor latera BC. CD. DE. EB sunt æqualia : adeoque BCDE □tum lateris BC.

PARS II.


Sex triangula K. L. M. N. O. P. habent suas bases inter se æquales, (quia sunt latera □ti) & duos angulos supra basin, quia omnes sunt semirecti.

Ergo per 26. I. triangula omnia inter se sunt æqualia.

Adeoque 4 triangula K. M. L. N æqualia 4 triangulis. P. M. N. O.

Hoc est □tum. BCDE $\propto$ □tis AF. AG. Q. E. D.

Cui demonstrationi aliam sic breviter adjungimus.



Descriptis quadratis AF . AG . BE , producantur latera FB . GC . quæ necessario debere cadere in E & D facile probari potest, ut BE CD sint Diametri, quæ ipsum quadratum & singulos illius angulos bifariam secant.

Unde jam nullo negotio deducitur lineas BK . CK . DK . EK esse inter se & lateribus AB . AC . æqua-

α quales, adeoque trianguli DBC cum $\square$ to CI inter easdem parallelas IB GD existentis, basis DC , dupla est Parallelogrammi baseos CG : ergo per Scholium pro. 41. I. Triang. $DBC \propto \square$ to AG .

Deinde triangulum $DEC \propto$ triang. DBC . 34. I.

Et Triang. $DBC \propto \square$ to AG .

Et $\square$ tum $AG \propto \square$ to AF .

Ergo Triang. $DEC \propto \square$ to AF .

Quare sequitur duo Triangula DBC . DEC simul sumpta, hoc est $\square$ tum $BCDE$ esse $\propto$ le quadratis duobus AF . AG simul sumtis.

Cæterum ex hac eadem demonstrationis forma, sequens haud inelegans deducimus

Theorema. I.

In Triangulo Isoscele rectangulo ABC , quadratum Hypotenuse BC quadruplum est trianguli ejusdem propositi ABC .

De-

DEMONSTRATIO.

Ex superiori demonstratione patet singulos $\square$ ti BE angulos bisectos esse, & lineas BK . CK . DK EK lateribus AB . AC . æquales: Unde jam sequitur quatuor triangula BKC . CKE . EKD . DKB . & inter se & triangulo BAC esse æquiangula, & æquilatera: adeoque æqualia.

Cum autem quatuor ista triangula constituent $\square$ tum $BCDE$, patet illud $\square$ tum quadruplum esse Trianguli ABC . Q. E. D.

Quæ demonstratio præcedentis Theorematis, cum mihi occasionem præberet inquirendi, quomodo $\square$ tum hypotenusæ trianguli rectanguli inæqualium laterum se haberet ad ipsum Triangulum, sequens sese statim prodebat.


Theorema II.

In quolibet cunque Triangulo
Re-

Rectangulo inæqualium laterum,
 quadratum Hypotenusæ triangu-
 lum propositum quater sumtum
 superat $\square$ to quod fit a differentia
 reliquorum laterum : seu quod
 idem est ; $\square$ tum Hypotenu-
 sæ est æle triangulo proposito
 quater sumpto una cum $\square$ to diffe-
 rentiæ reliquorum laterum.

Demonstrationem vide pagina
 sequente.

DEMONSTRATIO.



■ Super trianguli rectanguli ABC lateribus construuntur $\square$ ta AF . AG . BE .

Deinde producantur latera FB GC : tum ex angulis E & D ducantur EK parallela FB , & DN parallela GC : istæ lineæ ita se interfecabunt, ut constituent quatuor triangula BLC . CKE . END DMB ,

DMB, & in illorum medio quadratum *KLMN*.

Quibus constructis vel leviter in præcedentibus exercitatus facile omnes angulos *O*, ut & omnes *P* inter se oles esse perspiciet.

Unde sequitur per 26. I. quinque ista Triangula esse inter se æqualia; & habere latera æqualia lateribus: sc. *BM. DN. EK. CL*: ut etiam *AC. CK. EN. DM. BL*.

Quare si auferatur *BL* a *BM*: *DM* a *DN*: *EN* ab *EK*: & *CK* a *CL*, remanebunt. *KL. LM. MN. NK* inter se oles, quæ sunt differentia laterum *AB. AC*.

Quia autem istæ æquales lineæ ad angulos rectos sunt junctæ, ut facile ex 26. I. patet, sequitur quadrilaterum *KLMN* esse quadratum differentia laterum *AB. AC*.

Cum ergo quatuor triangula *BMD. DNE. EKC. CLB*, cum

□to $KLMN$ constituent totum $BCDE$; quod fit ab hypotenusa BC : patebit abunde propositi nostri Theorematis veritas.


Vix autem possum quin hic afferam plus quam elegantem Clarissimi Christophori Sturmii demonstrationem præsentis prop. 47, quam ex hac figura, alio ac diverso a nobis ex fundamento, constructâ, nobis suppeditat, in calculo Alegebraico propositum: quæ tamen ab iis, qui vel a limine Analysin speciosam salutaverunt, intelligi potest.

Illa autem ita se habet. Trianguli Rectanguli ABC , latus BC seu hypotenusa dicatur a : AC vocetur b . AB c . Area Trianguli ABC erit $\frac{1}{2}bc$. adeoque quatuor triangula facient $2bc$: Deinde differentia laterum AB . AC erit $c-b$, ejusque □tum $cc-2bc+bb$: quod priori areæ quatuor triangulorum additum facit $cc+bb$,
quæ

quæ summa est æolis □to ~~aa~~ facto
ab hypotenusa.

Cum autem ista summa exhibeat duo □ta laterum *AB. AC.* sequitur etiam duo illa □ta esse æolia □to *BC.*

Q. E. D.



Cæterum illustris hujus propositionis aliam a præcedente generalem demonstrationem hoc modo damus.

Triangulum rectangulum datum sit ABC; laterum AB. AC. quadrata sint AD. AL: & lateris BC quadratum BH: Jam patet ad oculum quadratum BH a reliquis quadratis AD, AL, abscindere triangulum AFB & trapezium AIHC. Si jam, producta
DE

DE in G, & ducta NR per F
parallela BM & GK parallela
EA, demonstratur esse triangu-
lum

$$X \propto Y.$$

$$S \propto T.$$

Parallelogr. P $\propto$ Q.

Triangulum GFR $\propto$ IHM.

Certi esse poterimus de pro-
positionis veritate.

DEMONSTRATIO.

Generaliter notandum facile
posse ex præcedentibus demon-
strari omnes angulos O ut &
omnes R esse inter se æquales.

Primum X $\propto$ Y.

Duo triangula X & Y habent
duos angulos O & R ut & latera
BC. CH æqualia: Ergo (26. I.)
ipsa triangula sunt æqualia.

Se-

Secundum S $\propto$ T.

Duo triangula S & T, habent duos angulos O & R, & ut & latera NF. GK $\propto$ equalia : Ergo (26. I.) ipsa triangula sunt $\propto$ equalia. Et latus BF $\propto$ GI. quibus ab $\propto$ equalibus BG, GH ablatis, remanet FG $\propto$ IH.

Tertium P $\propto$ Q.

Quia sunt complementa parallelogrammi DK. (43. I.)

Quartum Triang. GFR $\propto$ IHM.


Duo triangula GFR & IHM, habent duos angulos O & R. ut & latera FG. IH $\propto$ equalia. Ergo (26. I.) ipsa triangula sunt inter se $\propto$ equalia.

Ex quibus patet lateris BC quadratum BH in se comprehendere duorum reliquorum laterum AB. AC quadrata AD. AI. Ergo quadratum BH etiam
per

per Axioma 13. duobus quadra-
tis AD. AI. æquale est.

Q. D. E.


Quod autem BG concurrat
cum DE in puncto G, & CH
cum ML in H, supra demon-
stratum est.



X

De

Alia DEMONSTRATIO.




Trianguli rectanguli ABC, laterum quadrata sunt AD. AK. BT. demonstrandum est hoc tertium BT esse æquale duobus reliquis.

Fiat AX æquale AE, erit super AX factum quadratum AF æquale AD. Producat in G ut sit HG æquale XF Ducatur AG. & per I ducatur MIN parallela AH & tandem agatur EG. Eritque HE parallelogrammum, cujus complementa EI. IH. sunt æqualia: si utrimque addatur commune parallelogrammum MX. erit quadratum AF hoc est AD æquale parallelog. MH:

Ergo totum parallelogr. MK esse æquale duobus quadratis AD. AK.

Deinde sumatur CL æquale CM, & CR æquale CK. & perfecto parallelo LR (quod erit æquale ipsi MK) producantur LO & TQ ut sibi occurrant in P, tum ducatur Diagonalis CS, quæ productâ cadet in P. (ut mox demonstrabitur.) Hisce factis in parallelogr. LT duo complementa LS. ST erunt (43. I.) inter se æqualia: quibus si addatur commune parallelogr. BR, erit parallelogr. LR (hoc est duo Quadrata AD. AK) æquale quadrato BT.



Ultima Demonstratio.

Intra lateris BC quadratum BR, sic
 $\square$ CH $\propto$ lateris AC $\square$ to Y: Quo a $\square$ to
 BR sublato remanebunt duo parallelo-
 grammata BO. OK. seu factio parallelogr.
 OS $\propto$ OK, remanebit totum parallelo-
 grammum BT, Quod si demonstratur
 esse $\propto$ $\square$ to X, peracta res erit.


Quare sumta BE $\propto$ BA, construatur
 $\square$ tum BG $\propto$ $\square$ to X. Tum productis la-
 teribus EG. ST, ut concurrant in N; ex
 B per L ducatur BLN; quæ etiam cadet
 in idem punctum N.

Tum in parallelogrammo-BN com-
 plementa EL. LS erunt æqualia & si ab
 utraque parte addas commune BL. erit
 parallelogr. BT (hoc est BO $+$ OK)
 $\propto$ $\square$ to BG seu X.

Unde jam patet duo $\square$ ta X & Y esse
 æqualia $\square$ to BR.

Q. D. E.

Quod autem Diameter BL producta
 cadat in punctum N, ubi latera EG,
 ST producta concurrunt, sic probatur.



LIBER PRIMUS. 167

Si tñon cadat in N, tum juxta adver-
sarium cadat.

Vel supra N in X, ut BX sit linea
recta.

Vel infra N in Y, ut BY sit recta.

In X supra N.

Angulus O ∞ Q. } 9. I.
Angulus O ∞ P. }

Ergo P ∞ Q externus interno con-
tra 16. I.

Quædemonstratio obtinet in omnibus
punctis supra N sitis.

In Y infra N.

Angulus O ∞ Q. } 22. I.
Angulus O ∞ T. }


Ergo Q ∞ T. iterum externus in-
terno contra 16. I.

Eademque demonstratio locum habet
in omnibus punctis infra N positis.

Ergo cum linea BL producta non pos-
sit cadere supra nec etiam infra N necessa-
rio cadet in ipsum punctum N.

PRO-

PROPOSITIO XLVIII.

Theor.
34-

*Si quadratum ab uno
Trianguli latere CB descri-
ptum sit aequale duobus reli-
quorum laterum CA, AB
quadratis : angulus CAB,
quem reliqua ista latera con-
tinent, rectus erit.*

DEMONSTRATIO.

a 11. I. Ex A ipsi AB (a) excitetur perpendicularis AD
 $\propto$ AC. & ducatur recta DB.

Tum in Triangulo DAB erit,

b 47. I. Quadr. DA (hoc est AC) $\perp$ quadr. AB (b) $\propto$
quadr. DB.

Atqui quadr. AC $\perp$ quadr. AB etiam est
 $\propto$ quadr. CB. per Prop.

c Ax. I. Ergo (c) quadr. DB $\propto$ quadr. CB.

Adeoque latus DB $\propto$ lateri CB.

Quare in Triangulis ADB, ACB.

Latus AD $\propto$ AC per constructionem.

Latus DB $\propto$ CB.

Latus AB commune.

d 8. I. Ergo (d) etiam omnes anguli sunt; æquales
adeoque

Ang. DAB $\propto$ CAB.

Atqui DAB est rectus.

Ergo CAB etiam rectus erit.

Q. D. E.

FINIS LIBRI PRIMI.

Eu.

E U C L I D I S

E L E M E N T O R U M

L I B E R S E C U N D U S.

IN primo libro instituta triangulorum tum quoad angulos tum quoad latera varia comparatione, & parallelogrammum non una & inter se & cum triangulis collatione, in hoc libro secundo aggreditur Euclides linearum ad librum sectarum parallelogramma Rectangula & Quadrata; docendo quomodo se habeant Parallelogramma rectangula quæ fiunt a partibus alicujus lineæ tum inter se tum relata ad Quadrata totius lineæ: sicut ex ipsis propositionibus porro manifestum evadet.

Cum autem hujus libri propositiones; licet numero non adeo multæ, tales sint, ut sua difficultate tyronum progressui haud exiguum sæpe injiciant moram, nos
Y oleum


oleum & operam non perdidisse existimabimus, si illarum demonstrationes ita ordinemus, ut quilibet illas attento perlegens studio, illisque primum librum bene perceptum rite applicans, maximam difficultatem penitus disparere comperiat.

Cæterum ne occurrentes ignotæ voces demonstrationum abruptant cursum, hic ut & in primo libro factum est, Definitiones præmittuntur terminorum adhibendorum tollentes dubiam significationem.

DEFINITIONES.

I.

Parallelogrammum rectangulum ABCD contineri dicitur sub duabus rectis CA. AB, rectum angulum A comprehendentibus.



Antea vidimus generationem alicujus superficiei. quæ in memoriam revocata parallelogrammi rectanguli formationem intellectu reddet faciliorem.


Rectæ lineæ AB perpendiculariter insistat lineæ CA, quæ concipiatur ferri supra lineam AB, ut ipsi semper maneat perpendicularis; cum ista lineæ CA pervenerit ad punctum B: tum extremum punctum C descriptam relinquet lineam CD æqualem ipsi AB; & cum lineæ BD sit quasi eadem cum lineæ AC ex puncto

Y 2

A

A delata in punctum B, erit linea BD etiam æqualis ipsi AB.

Unde patet ad inveniendam totam quantitatem seu aream alicujus parallelogrammi requiri tantum notam longitudinem duorum laterum angulū rectum continentium.



Quod ut adhuc clarius evadat, sicut & arctissimam inter linearum in se invicem ductum & numerorum multiplicationem esse affinitatem, ponamus lineam CA divisam esse in quatuor partes æquales CP. PX. XO. OA. similiter lineam AB

AB in quinque partes, quæ prioribus æquales sint. Si jam linea CA super AB mota pervenerit ad locum 1 Q punctum C. descriptum exhibebit lineam CQ. punctum P, lineam PR : X, lineam XS. O, lineam OT ; adeoque unico isto motu facta erunt quatuor ista minora quadrata CR. PS. XT. O 1, quot nim. linea CA partes habet : si enim ex pluribus constaret partibus, etiam plura constituta essent quadrata.

Facile autem intelligimus illud idem esse ac si numerus 4 ducatur seu multiplicetur per 1 seu unitatem.

Similiter si linea Q 1 (quæ eadem jam concipienda est cum AC) secundo motu pervenerit ad punctum 2, eodem modo quatuor alia quadrata efficientur quæ prioribus addita simul 8 dabunt : id quod iterum idem est, ac si numerus 4 bis multiplicetur per 1 seu semel per 2.

Non aliter si linea AC perget moveri ; tertius motus quatuor alia prioribus adjiciet quadrata ; quatuor alia quartus ; donec tandem quintus ultima quatuor adjungendo quadrata totum parallelogrammum rectangulum perficiat & compleat : quæ omnia quadrata sibi invicem addita,

20 exhibebunt; quod rursus idem est ac si numerus 4 quinquies per unitatem seu semel per 5 multiplicatus essent; quæ operatio similiter eundem producit numerum 20.

Cæterum notandum est in sequentibus ad multiplicandum lineam AB per lineam CD, seu adducendam lineam AB in lineam CD: vel tandem ad designandum rectangulum comprehensum sub lateribus AB, CD in se semper scripturum $\square$ AB. CD.

Unde jam existimo manifestam satis esse rationem ob quam ad inveniendam alicujus seu omnium parallelogrammorum rectangulorum aream solummodo duorum laterum rectum angulum comprehendentium requiratur notitia.

Hinc porro apparet, quomodo cognita area parallelogrammi rectanguli, & alterutro laterum alterum inveniri possit latus; dividendo scilicet datam aream per latus cognitum: id quod in parallelogrammo ABCD clare patet, quod 20 quadrata continet; qui numerus si dividatur per 4 seu cognitum latus CA. acquiremus 5 pro latere AB. & vicissim si 20 dividatur per 5 seu latus notum AB, invenietur 4 pro altero latere AC.

No-

N O T A.

Primo. Parallelogrammum dicitur rectangulum quod habet unum angulum rectum. Nam si unus est rectus, ^a erunt ^a 29 & & reliqui recti. ^{34. I.}

Secundo. Parallelogrammum est vel oblongum vel quadratum.

Oblongum est quod latera contigua habet inæqualia; sive quod continetur sub duabus rectis inæqualibus; illud autem nos in sequentibus semper exprimemus hoc signo $\square$; adeoque ex: gr: $\square$ AC, semper significabit parallelogrammum rectangulum AC.

Quadratum est, quod sub duabus rectis æqualibus continetur: illud etiam exprimemus tali signo $\square$ ut $\square$ CD, semper denotet Quadratum CD.

Tertio. In sequentibus nomine rectanguli Euclides semper intelligit parallelogrammum rectangulum.

Quarto. Geometræ omne parallelogrammum exprimunt, duas tantum nominando literas per diametrum oppositas: ut ad designandum parallelogrammum appositum adhibent literas AD. vel BC.

II. Omnis

II.

Omnis parallelogrammi spatii unum quodlibet eorum quæ circa diametrum illius, sunt, parallelogrammorum, cum duobus complementis, Gnomon vocatur.





Figura FGEH, composita ex duobus complementis FG. EH &, quod circa diametrum est parallelogrammo GE, dicitur Gnomon seu norma; ad imitationem illius instrumenti quo fabri utuntur, ad examinandum, utrum ex: gr: duo parietes, vel duo asseres ad angulum rectum conjuncti sint nec ne.

PROPOSITIO. I.



Si fuerint dua re- Theor. 1.

cta G & AB, quarum altera secta sit in quocunque partes AE. EB altera vero infecta; erit re- ctangulum sub illis

duabus G & AB comprehensum aequale re- ctangulis, qua sub infecta G, & sub singulis segmentis AE. EB continentur.

DEMONSTRATIO.

Ex punctis A & B erige duas perpendiculares AC, BD æquales datæ G: & juncta CD, ex E duc rectam EF parallelam AC vel BD. Tum lineæ CA, FE inter (a) se æquales erunt $\propto$ les datæ G. a 34. I.

Jam $\square$ AF continetur sub CA, hoc est G & segmento AE.

Et $\square$ ED continetur sub FE hoc G est & segmento ED.

Duo autem $\square$ la AF, ED simul sunt (b) $\propto$ lia b Ax. 16. toti $\square$ lo AD quod continetur sub data & tota AB.

Ergo patet veritas propositionis.

Sub calculi formula breviter sic demonstratur

$$\begin{array}{r} AB \propto AE + EB \\ G \quad G \quad G \end{array} \} M$$

$$(c) \square G, AB \propto \square G, AE + \square G, EB. c Ax. 6.$$

Q. D. E.

Vel in Numeris.

Sit AB. 10.

AE. 7.

EC. 3.

G. 4:

$$\begin{array}{r} 10 \propto 7 + 3 \\ 4 \quad 4 \quad 4 \end{array} \} M$$

$$40 \propto 48$$

Z


$$12. \propto 40.$$

Pro-

PROPOSITIO. II.

Theor. 2.

Si recta AB secta sit utcumque in C & D triarectangula sub tota AB, & singulis segmentis AC. CD. DB comprehensa aequalia sunt quadrato quod fit a tota AB.



DEMONSTRATIO.

Super AB fiat quadratum BE, ducantur CG. DH parallelæ AE: quæ sunt æquales a AE. hoc est AB.

□ EC fit ab EA hoc est AB & parte AC.

□ GD fit ab GC hoc est AB & parte CD. HB

$\square$ HB fit ex HD hoc est AB
& parte DB.

Cum autem tria $\square$ la EC. GD.
HB simul sumta constituent $\square$ rum
EB, patet illa etiam ipsi esse æ-
qualia. ^b b Ax. 13.

Sub calculo.

$$\begin{array}{r} AB \propto AC + CD + DB. \\ AB \quad AB \quad AB \quad AB. \end{array} \Bigg) M$$

$$\square AB \propto \square AB. AC + \square AB. \\ CD. + \square AB. DB.$$

Vel in numeris.


Sit AB 10. AC 2. CD 3. Ergo DB 5.

$$\begin{array}{r} 10 \propto 2 + 3 + 5. \\ 10 \quad 10 \quad 10 \quad 10. \end{array} \Bigg) M$$

$$100 \propto 20 + 30 + 50 \propto 100.$$

PROPOSITIO III.

Theor. 3. *Sit recta AB secta utcunque in E, rectangulum sub tota AB & partium alterutra AE comprehensum, æquale est ejusdem partis AE quadrato, una cum rectangulo sub partibus AE. EB comprehenso.*



DEMONSTRATIO.

Ex A & B erige perpendiculares AC. BD æquales segmento AE: tum juncta CD ducatur EF parallela AC, quæ ipsi AC etiam a erit æqualis

CE

- A { $\square$ CE continetur sub CA hoc est AE & segmento AE, adeoque CE est quadratum factum ab AE.
 $\square$ FB continetur sub FE hoc AE & segmento EB.

$\square$ CE cum seu $+$ $\square$ FB est æquale $\square$ CB, comprehenso sub CA hoc est segmento AE & tota linea AB. Q. E. D.

Sub calculo.

$$\begin{array}{r} AB \propto AE + EB \\ AE \quad AE \quad AE \end{array} \Bigg| M$$

$$\square AE. AB. \propto \square AE + \square AE. EB.$$

Vel in numeris.

Sit AB. 10. AE. 6. Ergo EB. 4.

$$\begin{array}{r} 10 \propto 6 + 4 \\ 6 \quad 6 \quad 6 \end{array} \Bigg| M$$

$$60 \propto 36 + 24 \propto 60.$$

tum ducantur ^b CF. KH paralle- ^b 31. I.
læ lateribus BE. BA.

Jam in triangulo DEB.

Angulus O $\propto$ P. quia uterque
semirectus. ^c

Atqui ang. Q $\propto$ P. ^d

^c 2 Cor.
32. I.
^d 19. I.

Ergo O $\propto$ Q. adeoque DF $\propto$ FG ^e 6. I.

Eodem modo probatur quod sit

Ang. R $\propto$ S. ac proinde latus
DH $\propto$ GH.

Atqui in parallelogrammo GD,
latera opposita DF. HG ut & DH,
FG sunt æqualia ^f

^f 34. I.

Ergo omnia illius latera sunt
inter se æqualia.

Atqui illorum unum HG $\propto$
AC. ^g

^g 34. I.

Ergo omnia sunt æqualia se-
gmento AC. Adeoque cum o-
mnes anguli sint recti, parallelo-
grammum DFGH est quadratum
factum ab uno segmento AC.

Eodem modo facile demon-
stra-

stratur parallelogrammum CK
esse quadratum alterius segmenti
CB.

Deinde $\square$ FK continetur sub FG
hoc est AC & sub GK hoc est CB.

Denique $\square$ AG continetur sub
uno segmento AC & sub CG hoc
est CB.

Quæ duo $\square$ la si ad duo reli-
quo $\square$ ta addantur exhibebunt to-
tum $\square$ quod fit ab AB; adeoque
ipsi æqualia erunt. Q. E. D.

Per calculum hoc modo de-
monstratur.

$$\begin{array}{r} AB \propto AC \perp CB \\ AB \propto AC \perp CB \quad M. \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \square AC \perp \square AC. CB. \\ \perp \square AC. CB \perp \square CB. \end{array}$$

$$\square AB \propto \square AC \perp 2 \square AC. CB \perp \square CB.$$

Seu in numeris.

$$\begin{array}{rcl} AB & \propto & 10. \\ AC & \propto & 6. \\ \hline \text{Ergo } CB & \propto & 4. \end{array}$$

$$\begin{array}{r} AB \ 10 \\ AB \ 10 \\ \hline 100 \end{array}$$

$$4 \ CB$$

LIBER SECUNDUS. 185

AC 6	4	CB		6 AC
AC 6	4	CB		4 CB
36		16		24
				2
				48
				36
				16
				100

COROLLARIUM I.


Parallelogramma circa diametrum quadrati sunt quadrata.

COROLLARIUM II.

Si recta linea bifariam secetur quadratum totius lineæ quadruplum est quadrati a dimidia facti.

PROPOSITIO V.

Theor. 5. Si recta linea AB secetur in æqualia in C, & non æqualia in D: rectangulum AG sub inæqualibus segmentis AD. DB comprehensum, una cum quadrato HF. ab intermedia sectione CD, æquale est quadrato CI, quod a dimidia CB describitur.



PRÆPARATIO.

1. Super dimidia CB fiat a quadratum CI, ducaturque diameter.
2. Ex D ducatur DF lateri BI ^b parallela.
3. Sumta BK ∞ BD, ducatur KL ^b parallela AB, ut & AL parallela BK.

De.

LIBER SECUNDUS. 187

DEMONSTRATIO.

A $\left\{ \begin{array}{l} \square CG \propto \square GI. \text{ quia sunt com-} \\ \text{plementa.} \\ \square DK \quad \square DK. \end{array} \right. \quad \text{c 43. I.}$

$\square CK \propto \square DI.$
 Atqui $\square CK \propto \square AH.$ quia sunt in iisdem parallelis & æqualibus basibus. d 36. I.

Ergo $\square AH \propto \square DI.$
 $\square CG \quad \square CG.$ A.

A $\left\{ \begin{array}{l} \square AG \propto \text{Gnomoni } GHBFG. \\ \square HF \quad \square HF, \text{ quod fit a } CD. \\ \quad \quad \quad 4. \text{ II.} \end{array} \right.$

$\square AG + \square HF. \propto \square CI.$ a dimidia CB. facto.

In numeris.

Sit tota AB 10. Ergo dimidia AC, CB 5.
 AD 8. Ergo DB 2. Et CD, 3.

$\begin{array}{r} CB \ 5 \\ CB \ 5 \\ \hline \square CB \ 25 \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} M.$

$\begin{array}{r} AD \ 8 \\ DB \ 2 \\ \hline \square AD. DB. \ 16. \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} M.$

Tum.

$\begin{array}{r} CD \ 3 \\ CD \ 3 \\ \hline \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} M.$

$\begin{array}{r} \square CD \ 9 \\ \square AD. DB \ 16. \\ \hline \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} A$


$\square ADB. + \square CD \ 25.$ ut ante.

Aa 2

PRO.

PROPOSITIO VI.

Theor. 6. *Si recta AB sit bifariam secta in C, eique recta quædam BD adjiciatur; Erit rectangulum sub tota composita AD & adjecta BD contentum una cum quadrato dimidiæ CB, æquale quadrato ipsius CD compositæ ex dimidia & adjecta.*



PRÆPARATIO.

1. Super CD fiat $\square$ CE.
2. Ducta Diametro FD, ex B agatur BG parallela DE.
3. Sumpta DI $\propto$ DB, ducatur IL parallela DA, ut & AL parallela DI:

De-

DEMONSTRATIO.

$\square AK \propto^a \square CH$. quia in iisdem pa-
rall els. a 36. 1

Atqui $\square HE \propto^b \square CH$, quia sunt
complementa. b 43. 1

Ergo $\square AK \propto^c \square HE$. c Ax. 1.
 $\square CI \quad \square CI.$ } A.

A $\left\{ \begin{array}{l} \square AI \propto^d \text{Gnomoni GHKDG.} \\ \square KG \quad \square KG \text{ factum a dimi-} \\ \quad \text{dia CB.} \end{array} \right.$ d Ax. 2.

$\square AI + \square KG \propto \square CE$ quod fit a CD

In numéris.

Sit línea AB 10. BD 2. Ergo tota
AD, 12. Dimidia AB. seu AC.
seu CB 5. Ergo CD 7.

AD 12. } M.
BC 2.


$\square AD. DB \frac{24}{25}$ A.
 $\square CB.$

$\square AD. DB + \square CB \frac{45}{45} \propto \square CD.$

PROPOSITIO VII.

Theor. 7.

Si recta AB utcumque secetur in C, erunt quadrata totius AB & utriusvis segmenti CB, equalia bis sumto rectangulo contento sub tota AB & segmento dicto CB, una cum quadrato alterius segmenti AC.



PRÆPARATIO.

a 46. I.

1. Super ^a AB fiat $\square$ AE.

b 31. I.

2. Sume BM $\propto$ BC, & ducantur CL
MK ^b parallelæ lateribus BE. BA. Erit-
que LE $\propto$ ^c CB.

c 34. I.

3. Super LE fiat $\square$ EG.

De-

DEMONSTRATIO.

Duo □ta AE. EF ∞^d duobus □lis d Ax 13.

AM. MF cum □to KL.

Atqui □ AM continetur sub AB & BM hoc est BC.

Et □ MF continetur sub MG (quæ facile probatur esse æqualis AB, cum sit ME ∞ AC & EG ∞ CB) & GF hoc est BC

Ut & □ KL sit a KH hoc est AC altero segmento.

Ergo patet veritas propositionis.

In numeris.

Sit AB 10. □ AB 100 | A.
AC 8. □ CB 4 |

Ergo CB 2. □ AB — □ CB 104.

AB 10 | M.
BC 2 |

□ AB BC 20


2
2 □ AB. BC. 40 | A.
□ AC 64 |

2 □ AB BC — □ AC 104.
ut ante.

PROPOSITIO VIII.

Theor. 8.

*Si recta linea AB secetur ut-
cunque in C; eique adjiciatur
BD $\propto$ BC; Rectangulum qua-
ter comprehensum, sub data AB
& alterutro segmento CB, una-
cum quadrato alterius segmenti
AC, erit æquale quadrato AF quod
fit a composita AD.*



PRÆPARATIO.

1. Super tota AD a fiat quadratum AF.
2. Sumtis DK. KM æqualibus ipsi
BC. ducantur KI. ML parallelæ DA; ut
& BG. CH parallelæ AE.
3. Ducatur Diameter ED.

De-

DEMONSTRATIO.

Facile patet quatuor $\square$ la IC. IS. GS
GM esse inter se $\propto$ qualia, & sub $\propto$ qua- a 36. &
libus lineis contenta. 43. 1.

Et circa R constituta sunt quatuor $\square$ ta
quorum latera omnia sunt ipsi BC $\propto$ qua-
lia. b Ergo si addantur

$$\begin{array}{r} \square \text{ la IC} \quad \text{IS} \quad \text{GS} \quad \text{GM.} \quad | \text{A.} \\ \square \text{ ta CR} \quad | \text{SR} \quad | \text{RD} \quad | \text{MR.} \end{array}$$

b 3 Cor.
4. hujus.

Erunt $\square$ la AR. LR. GS + RD:
GK. omnia inter se $\propto$ qualia, & con-
tenta vel sub lineis AB. BC, vel sub li-
neis quæ illis $\propto$ quales sunt.

Quibus si addatur $\square$ LH factum ab
LS hoc est altero segmento AC. Tota
ista summa seu quinque istæ figuræ ex-
 $\propto$ quabunt totum quadratum AF factum a
composita AD. Q. D. E.

In numeris.

Sit AB 10. AC 8. Ergo CB 2.

$$\begin{array}{r} \text{AC } 10 \\ \text{CB } 2 \end{array} \Bigg| \text{M.} \quad \begin{array}{r} \text{AD } 12 \\ \text{AD } 12 \end{array} \Bigg| \text{M}$$

$$\square \text{ AC. CB } 20 \Bigg| \text{M} \quad \square \text{ AD } 144$$

4/ . ut ante.

$$\begin{array}{r} 4 \square \text{ AC CB } 80 \\ \square \text{ AC } 64 \end{array} \Bigg| \text{A.}$$

144.


Bb

PRO-

PROPOSITIO IX.

Theor. 9.

Si recta linea AB secetur in equalia in C, & non equalia in D; quadrata inæqualium segmentorum AD. DB. dupla sunt quadratorum AC. CD. quæ a dimidia AC & ab intermedia CD fiunt.



PRÆPARATIO.

I. Ex C erigatur perpendicularis CE $\propto$ AC vel CB, & jungantur AE EB.

2. Ex D ducatur DF parallela CE.

3. Ex F agatur FG parallela AB: ut & denique FA.

Dc-

DEMONSTRATIO.

Triangulum ACE est rectangulum & Isosceles, ergo anguli A & E sunt semirecti; ut & in ^{a 32. I.} triangulo ECB anguli E & B sunt semirecti; adeoque totus angulus EAB est rectus.

Deinde in triangulo EGF, G ($\propto$ ECB) est rectus: ang. E ^{b 29. I.} semirectus: ergo F etiam semirectus: adeoque EG $\propto$ GF. ^c

Denique in triangulo FDB angulus D ($\propto$ ECB) rectus est. Angulus B semirectus: ergo & F semirectus; adeoque latus FD $\propto$ DB. ^{c 6. I.}

Hiscæ prædemonstratis.

I. In Triangulo rectangulo ACE.

^d $\square$ AE $\propto$ $\square$ AC $\perp$ $\square$ CE. seu ^{d 47. I.} quia AC $\propto$ CE.

$\square$ AE duplum $\square$ ti AC.

Bb 2

2. In

2. In Triangulo rectangulo *EGF*.

$\square EF \propto \square EG + \square GF$. seu quia $EG \propto GF$.

$\square EF$ duplum $\square$ ti GF hoc est CD .

Ergo duo $\square$ ta AE . EF sunt dupla $\square$ torum AC . CD .

3. Atqui in triangulo rectangulo *AEF*.

$\square AE + \square EF \propto \square AF$.

Ergo $\square AF$ etiam duplum $\square$ torum AC . CD .

4. Atqui denique in triangulo rectangulo *ADF*.

$\square AF \propto \square AD + \square DF$ hoc $\square DB$.

Ergo duo $\square$ ta AD . DB sunt dupla $\square$ torum AC . CD .

Q. E. D.

In

In numeris.

Sit AB 10. Ergo AC. CB. 5.

AD 7: Ergo DB 3.

Et CD 2.

□ AD 49) A.

□ DB 9/

□ta AD. DB 58.

□ AC 25) A.

□ CD 4/


□ta AC. CD. 29.) M.
2

— bis □ta AC. CD 58.

PROPOSITIO X.

Theor.
10.

Si recta AB secta sit bifariam in C, eique adjiciatur BO; Quadrata totius compositæ AO & adjectæ BO erunt dupla quadratorum ACCO, quæ a dimidio AC sunt, & a CB composita ex dimidia & adjecta.



PRÆPARATIO.

1. Ex C erigatur perpendicularis CE $\propto$ CA vel CB, junganturque AE. EB.

2. Ex E ducatur EF $\propto$ CO & parallela AO.

2. Ex F ducatur per O recta FG

FG quæ productæ EB occurrat in G.

4. Denique agatur AG.

DEMONSTRATIO.

Triangulum ACE est rectangulum & Isosceles, ergo anguli A & E sunt a semirecti; ut & in triangulo ECB anguli E & B semirecti sunt. ^{232. L}

Deinde in triangulo EFG angulus F ($\propto$ opposito C) est re-
ctus: & angulus FEG semire-
ctus, (quia angulus BEC est se-
mirectus;) adeoque alter FGE
etiam est semirectus: Ergo latus
 $GF \propto FE \propto CO$.

Denique in triangulo rectan-
gulo BOG angulus ad G semire-
ctus est: ergo etiam B semirectus;
adeoque latus $BO \propto OG$.

Hiscæ præmissis.

1. In triangulo rectangulo ACE.

647. L

$\square AE \propto {}^b \square AC \perp \square CE$. seu quia $AC \propto CE$.

$\square AE$ est duplum $\square$ ti AC .

2. In Triangulo rectangulo EFG.

$\square {}^b EG \propto \square EF \perp \square FG$, seu quia $EF (\propto CO) \propto FG$.

$\square EG$ duplum $\square$ ti EF hoc CO .

Ergo duo $\square$ ta AE . EG sunt dupla $\square$ torum AC . CO .

3. Atqui in triangulo rectangulo AEG.

$\square$ ta AE . $EG \propto {}^b \square AG$.

Ergo $\square AG$ est duplum $\square$ torum AC . CO .

4. Atqui denique in triangulo rectangulo AOG

$\square AG \propto \square AO \perp \square OG$.

Ergo duo $\square$ ta AO . OG (hoc est OB) sunt dupla $\square$ torum AC . CO .

Q. D. E.

Vel

Velin numeris.

Sit AB $\propto$ 16. Ergo AC. CB. 5.

Sit BO $\propto$ 2. Ergo AO $\propto$ 12.

Et CO $\propto$ 7.

$\square$ AO 144 $\square$ A.

$\square$ OG 4 $\square$ A.

$\square$ AC 25 $\square$ M.

$\square$ CO 49


$\square$ ta OA. OG 148 $\square$ ta AC. CO 74 $\square$ A.

Bis $\square$ ta AC. CO 148

PROPOSITIO. XI.

Probl. I.

Datam rectam AB ita secare in G, ut rectangulum comprehensum sub tota linea AB & uno segmentorum BG sit aequale alterius segmenti AG quadrato.



CONSTRUCTIO.

1. Ducatur AD perpendicularis & æqualis ipsi AB.
2. Divisa AD bifariam in E, junge EB
3. Sumatur EF = EB.
4. Fac AG = AF. Et dico factum esse quod queritur.

DEMONSTRATIO.

Supra data AB compleatur $\square$ AC, ut & supra AG $\square$ AH & Recta HG producat in I.

□

LIBER SECUNDUS. 203

$\square DF. FH$ (hoc est FA) $\perp$ $\square EA$ a 6. 2.
 $\propto$ $\square EF.$ (hoc est $\square EB.$

Atqui $\square EB \propto \square AB.$ seu $\square AC$ b 47. 1
 $\perp$ $\square EA.$

Ergo $\square DF. FH \perp \square EA \propto \square EA$
 $\perp \square AC.$

Et ablato utrimque $\square$ to $EA.$

$\square DF. FH \propto \square AC$ c Ax. 3.
 $\square DG \quad \square DG/S.$

$\square AG \propto \square CG.$

Atqui $\square AH$ fit a segmento AG & $\square$
 CG continetur CB hoc est AB & altero
segmento $BG.$

Ergo patet factum esse quod quærebatur.


SCHOLIUM.

In numeris hæc propositio nullo solvi
potest modo, cum radicis quadratæ ex-
tractio, quæ hic requiritur non semper
rationales numeros admittat.

PROPOSITIO XII.

Theor.
II.

In triangulo obtusangulo
 ABC quadratum lateris AC ,
 quod obtuso angulo opponitur,
 superat reliquorum laterum AB .
 BC quadrata, bis sumpto re-
 ctangulo, quod continetur sub
 latere CB , & sub ipsa BD
 in directum ei addita usque ad
 perpendicularem ab altero acu-
 to angulo A cadentem.



DEMONSTRATIO.

$$\square AC \propto \square AD + \square DC. \text{ } ^{247. I.}$$

$$\text{Atqui } \square DC \propto \square DB + \square BC \text{ } ^{b 4. II.}$$

Ergo hisce in locum $\square DC$
positis.

$$\square AC \propto \square AD + \square DB + \square BC + \square BC.$$

$$\text{Atqui rursus Duo } \square \text{ta } AD. DB \propto \square AB.$$

Ergo hoc in illorum locum re-
posito.

$$\square AC \propto \square AB + \square BC + \square BC.$$

$$\square AC \propto \square AD + \square DC.$$

$$\text{Atqui } \square DC \propto \square DB + \square BC + \\ 2 \square DBC.$$

Ergo.

$$\square AC \propto \square AD + \square DB + \square BC \\ + 2 \square DBC.$$

$$\text{Atqui } \square ta AD. DB. \propto \square to AB f. EB.$$

Ergo.

$$\square AC \propto \square EB + \square BC + 2 \square DBC \\ \square EC \propto \square EB + \square BC.$$

Quæ si a se invicem subtrahantur, erit
 $2 \square DBC$ differentia $\square$ torum AC. EC
 seu excessus quo $\square AC$ superat $\square EC$,
 hoc est $\square ta EB BC.$ seu AB. BC.


SCHOLIUM II.

Ex hac propositione deducitur generalis Regula Geometrarum, qua ex tribus trianguli obtusanguli lateribus cognitis inveniunt basin productam vel illius segmentum BD. quæ imperat, ut a $\square to AC$ demta summa $\square$ torum AB. BC, reliquum dividatur per duplum baseos BC; quæ operatio exhibebit quæsitam DB.

PROPOSITIO XIII.

Theor.
12.

In acutangulo triangulo ABC quadratum lateris AB , quod acuto angulo C opponitur, superatur a quadratis reliquorum laterum AC , BC , bis sumto rectangulo sub latere CB & sub assumpta interius linea CD usque ad occursum perpendicularis ab altero angulo acuto A cadentis.



DEMONSTRATIO.

$$\begin{array}{rcl} \square BC + \square DC \propto^2 \square BC & & 27. II. \\ \square CD + \square BD. & & \\ \square AD & \square AD & \} A. \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} \square BC + \square AD + \square DC \propto \square AD & & \\ + \square DB + 2 \square BCD. & & \end{array}$$

Atqui duo $\square$ ta AD. DC

$$\propto \square AC.$$

Et duo $\square$ ta AD. DB $\} 47. I.$


$$\propto \square AB.$$

Ergo his in illorum locum
substitutis.

$$\begin{array}{rcl} \square BC + \square AC \propto \square AB + 2 \square & & \\ BC, CD. & & \end{array}$$

Q. E. D.

Alia demonstratio.



Triangulum acutangulum sit, FBC , demonstrandum est duo $\square$ ta $FB.BC$, superare $\square$ FC per duplum $\square$ CBG .

Ex B erigitur perpendicularis $BE \propto BF$, & ducatur EC , tum duo triangula $EBC.FBC$, habebunt duo latera $EB.BC$, $\propto$ lateribus $FB.BC$ & angulum $EBC < FBC$: quare per 24. I. latus EC erit $< FC$. Adeoque EC hoc est duo $\square$ ta EB . seu FB . BC erunt $< \square$ FC .

Unde

Unde si $\square FC$ subtrahatur a $\square EC$, obtinebitur differentia seu excessus, quo $\square ta FB. BC$ superat $\square FC$, adeoque demonstrata erit propositio.

$$\square EC \propto \square EB.f. \square FB - \square BC.$$

Atqui

$$\square BC \propto \square BG - 2 \square BGC - \square GC.$$

Ergo facta substitutione

$$\square EC \propto \square FB - \square BG - 2 \square BGC$$

$$\square FC \propto \square FB - \square BG - \square GC - \square BC.$$

$$\square EC - \square FC \propto 2 \square BG.f. 2 \square BG. BG - 2 \square GC. BG$$

seu

$$2 \square BC. BG.$$

Hoc est duplum $\square$ sub basi BC & segmento BG ; pro differentia qua $\square EC$, hoc est duo $\square ta EB. f. FB - BC$ excedunt $\square FC$.

SCHOLIUM I.

Simili operatione quoque innotescet, differentia $\square$ torum AC & FC : quorum primum oppo-

Dd 2

ni.

nitur angulo obtuso ABC. alterum vero acuto FBC.

$$\begin{array}{l} \square AC \propto \square AB + \square BC + 2 \square DB.BC. \quad 12. II. \\ \square CF \propto \square FB \text{ seu } \square AB + \square BC + 2 \square BG.BC. \quad 13. II. \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} \square AC \propto \square AB + \square BC + 2 \square DB.BC. \\ \square CF \propto \square FB \text{ seu } \square AB + \square BC + 2 \square BG.BC. \end{array}} \right\} S$$

$$\begin{array}{l} \square AC - \square CF \propto 2 \square DB.BC + \\ 2 \square BG.BC. \\ \text{seu } 2 \square DG.BC. \end{array}$$

Ex quo calculo sequitur hoc
Theorema.

Si triangulum obtusangulum ABC cum acutangulo FBC latera AB. BC lateribus FB. BC æqualia habeat ; quadratum lateris obtuso angulo oppositi AC, superabit quadratum lateris acuto angulo oppositi FC, per duplum rectangulum quod fit a basi BC, & DG inter duas perpendiculares AD. FG intercepta.


SCHOLIUM II.

Hinc iterum fluit Geometrarum regula ad inveniendum baseos segmentum CD , ex tribus trianguli acutanguli lateribus cognitis: quod invenitur si a summa $\square$ torum $AC. CB.$ (circa angulum segmento adjacentem) subtrahatur $\square AC$, & reliquum per duplam basin BC dividatur.

PROPOSITIO XIV.

Prob. 2.

Dato rectilineo A æquale quadratum constituere.



CONSTRUCTIO.

45. L.

1. Constituatur $\square$ BD $\propto$ rectilineo A: quod si habeat latera æqualia. obtinemus quadratum quæsitum. Si vero non tum.

2. Producaturs latus DC in F, ut CF sit $\propto$ CB.

3. Linea DF bisecta in G, centro G radio GD vel GF describe femicirculum DHF.

4. Latus BC producaturs ad femicirculum in H.

Dico $\square$ CH esse $\propto$ rectilineo A.

DEMONSTRATIO.

□ DC. CB (seu CF) ⊥ □ GC b ∞ b, II.
□ GF. f. □ GH.

Atqui □ GH c ∞ □ GC ⊥ □ CH. c47. L

Ergo his in illius locum substitutis.

□ DC. CB ⊥ □ GC ∞ □ GC ⊥
□ CH.

Si auferatur utrimque □ GC.

□ DCB ∞ □ CH.

Atqui □ DCB ∞ rectilineo A
per constr.

Ergo □ CH etiam est ∞ eidem
rectilineo A.

Q. E. D.

Elementorum Libi Secundi Finis.


EUCLIDIS

ELEMENTORUM

LIBER TERTIUS.


DEFINITIONES.

I.



Æquales circuli sunt, quorum diametri AB. BC. sunt æquales: vel quorum, quæ ex centris D. & E. rectæ lineæ DF. EG. sunt æquales.

II.




Recta circulum tangere dicitur, quæ cum circulum tangat puta in B. si producat in C. circulum non se-

cat.


III.

III.




Circuli se mutuo tangere dicuntur qui sese mutuo tangentes ut in A. sese mutuo non secant.

IV.




In circulo equaliter distare à centro rectæ dicuntur, cum perpendiculares D E. D F. à centro D. ad ipsas AB. CK. ductæ æquales sunt; longius autem abesse dicitur GH. in quam major perpendicularis DI. cadit.

V.




Segmentum circuli, est figura quæ sub recta A B. & circuli peripheria A C B. comprehenditur.

VI.




Segmenti autem
angulus est CAB .
qui sub recta linea
 AB . & circuli
peripheria CA . comprehenditur.

VII.



In segmento au-
tem angulus est. puta
 ABC . cum in se-
gmenti circumferen-
tia sumptum fuerit
punctum quodpiam B . & ab eo in
terminos rectæ AC . segmentum
terminantes, lineæ rectæ ut BA .
 BC . fuerint ductæ.


VIII.



Cum verò com-
prehendentes angu-
lum DAB . rectæ
 AD . AB . aliquam
assumunt peripheri-
am ut BCD . illi
angulus dicitur infi-
stere.


IX.

IX.



Sector circuli est, cum ad ipsius circuli centrum A. angulus BAC. fuerit constitutus: comprehensa nimirum figura & à rectis AB. AC. angulum BAC. continentibus, & à peripheria BC. ab illis assumpta.


X.



Similia circuli segmenta sunt ABC. DEF. quæ angulos BAC. EDF. capiunt æquales, aut in quibus anguli CBA. FED. inter se sunt æquales.

PROPOSITIO I.

Probl. I.



*Dati circuli
ABC centrum F
reperire.*

CONSTRUCTIO.

a 10. I.

1. Ducta quælibet AC, ^a dividatur bifariam in E.

b 11. I.

2. Ex E erigatur utrinque ^b perpendicularis BD usque peripheriam.

3. Illa bifariam dividatur in F.

Dico punctum F esse centrum circuli.

DEMONSTRATIO.

Centrum aut est in BD, aut extra illam.

Si sit in BD, necessario est in puncto, quod illam dividit bifariam; quia Circuli radii sunt æquales; adeoque centrum est in F.

Si juxta Adversarium sit extra BD, ponatur illud ex: gr: in G: tum ductis AG.

LIBER TERTIUS. 221

AG. EG. CG in triangulis GEA.
GEC.

Latus GA $\propto$ GC. quia ponuntur radii. ^{c Def. 15. I.}
Latus EA $\propto$ EC. per constructionem.
Latus GE commune.

Ergo omnes anguli sunt æquales ^{d 8. I.}
adeoque Ang. GEA $\propto$ GEC.

Ergo $\angle$ GEA est rectus.
Atqui BEA est rectus per constructio- ^{c Def. 10. I.}
nem.

Ergo ang. GEA $\propto$ BEA. totum &
pars, quod est absurdum.

Et eadem demonstratio obtinet in
omnibus punctis quæ possunt assignari ex-
tra lineam BD: unde concludendum est
illud extra BD non reperiri.

Ergo in BD & quidem ejus puncto F
illud erit: Q. E. D.


COROLLARIUM.

Si linea recta in Circulo aliam lineam
rectam bifariam & ad angulos rectos se-
cat; in illa secante erit centrum.

PROPOSITIO. II.

Theor. I.

*Si in peripheria Circuli ADC
duo qualibet puncta A. C. su-
mantur, recta AC, quæ per il-
la ducitur, intra circulum ca-
dit.*



DEMONSTRATIO.

Ex invento Centro E. ductis radiis
EA. EC, ad rectam AC ducatur EB.

Tum in Triangulo. EAC.

Latus EA $\cong$ EC quia radii.

Ergo ang. A $\cong$ C. 5. I.

Atqui

Atqui externus EBA $\angle$ interno C . a 16. I.

Ergo EBA etiam $\angle$ A .

Adeoque in triangulo EBA latus EA oppositum angulo maximo erit $b \angle$ latere EB . b 19. I.

Atqui latus EA pertingit tantum ad peripheriam.

Ergo latus EB cadit intra circulum.

Et eadem demonstratio applicari potest ad omnia puncta lineæ AC .

Ergo tota lineæ AC cadit intra Circulum. $Q. E. D.$

COROLLARIUM.


Linea recta Circulum tantum in uno puncto tangit.

PROPOSITIO III.

Theor. 2.

PARS I.

*Si in circulo recta quedam
CE per centrum A ducta, aliam
BD non per centrum ductam,
bisariam in F secet; etiam illam
ad angulos rectos secabit.*



PARS II.

*Et si ad angulos rectos eam se-
cet; bisariam quoque secabit.*

DEMONSTRATIO.

Pars I. Ductis radiis AB. AD, in tri-
angulis AFB. AFD.

Latus

Latus AB $\propto$ AD quia radii.

Latus FB $\propto$ PD per propositionem.

Latus AF commune.

Ergo omnes anguli sunt inter se æquales, per 8. I. adeoque Ang. AFB $\propto$ AFD. qui propterea sunt a recti.

a Def.
10. I.

Pars 2. In iisdem triangulis AFB. AFD.

Ang. ABF $\propto$ ADF. qui triang. BAD est Isosceles.

Ang. AFB $\propto$ AFD per propositionem.

Latus AF commune.

Ergo latus BF $\propto$ FD.

b 16. I.


Q. E. D.

COROLLARIUM.

In omni triangulo æquilatero seu Isoscele linearecta basin bifariam secans, ad eandem perpendicularis est & contra.

Theor. 3.

PROPOSITIO. IV.



Si in circulo dua rectae AB. DC non ambe per centrum ductae, se invicem secant: illae sese non secabunt bifariam.

DEMONSTRATIO.

Duplex hic obtinet casus.

Casus I. Aut una tantum transit per centrum, ut ex: gr: FE, patet illam ab altera CB non secari bifariam: quia illa per hypothesein non transit per centrum.

Casus 2. Aut neutra transit per centrum.

Si jam Adversarius contendat duas lineas AB. DC se mutuo secare bifariam in E, ex centro F, ducatur recta FE.

Tum FE secat AB bifariam. Ergo

3. III.

ang. FEB est rectus.

Eadem FE secat DC bifariam. Ergo


ang. FEC est rectus.

Ergo erit ang. FEB $\propto$ FEC. Totum & pars: quod est absurdum.

PRO-

PROPOSITIO V.

Theor. 4.



*Si duo circuli BDCB.
BEC, sese mutuo secant
non habebunt idem cen-
trum.*

DEMONSTRATIO.

Si quis ponat A esse commune utriusque centrum, ducatur AB ab illo centro A ad punctum intersectionis B. ut & AD.

Linea AB $\propto$ AD; quia radii circuli BDC.

AB $\propto$ AE. quia radii circuli BEC.

Ergo AD $\propto$ AE. Quod est absurdum.

^a Ax. I.


At eadem demonstratio obtinet in omnibus punctis, quæ intra commune utriusque circuli spatium sunt posita.

Ergo universim patet veritas propositionis. Q. D. E.

Theor. 5.

PROPOSITIO VI.

*Si duo circuli BA. BC se
mutuo interius tangant in B :
non erit illorum idem centrum.*



DEMONSTRATIO

Si contendat aliquis punctum
ex: gr: D esse commune illorum
centrum; ductis DB. DC erit.

$DB \propto DC$. quia sunt radii cir-
culi BC.

$DB \propto DA$, quia sunt radii cir-
culi BA.

Ergo

Ergo $DC^2 \propto DA$. Totum & Ar . 1.
pars: quod est absurdum.

Adeoque cum eadem demon-
stratio omnibus punctis utrique
circulo communibus possit appli-
cari, non habebunt isti circuli
unum & idem centrum.

Q. E. D.

Theor. 7.

PROPOSITIO VII.

Si in circulo quovis extra centrum F accipiatur punctum G , ex quo quedam rectæ GA . GC . GD . GE . GN . in circulum cadant.


Tum

1. *Maxima erit GA , quæ per centrum F transit.*

2. *Minima erit reliqua diametri pars GB .*

3. *Aliarum vero major est GC , quæ maximæ GA propter.*

4. *Neque plures quam duæ ab illo puncto G ad circumferentiam duci possunt æquales.*



DEMONSTRATIO.

Pars 1. Ducta FC. in triangulo GFC

Duo latera GF. FC $\angle$ GC. a 20. I.

Atqui GF. FC $\propto$ GA. quia FC
 $\propto$ FA.

Ergo GA $\angle$ GC.

Pars 2. Ducta GE. In Triangulo FGE

Duo latera FG. GE $\angle$ FE. hoc
est FB. S

FG,

FG/

GE $\angle$

GB.

b Ax. 4.

Pars 3. Ducta GD, in triangulis
CFG. DFG,

Latus CF $\propto$ DF.

Latus FG utrique commune.

Sed Ang. CFG $\angle$ DFG.

Ergo basis CG $\angle$ DG.

c 24. I.

Pars 4. Patet ex præcedentibus; nam
si tres possent æquales GD. GE. GN du-
ci; tum forent duæ GD. GE ad ean-
dem partem inter se æquales.

Quod repugnat parti 3.

PRO-

Theor. 7.

PROPOSITIO VIII.

*Si a puncto A extra circum-
lum accepto ad circumulum ducan-
tur quedam rectæ AH. AG.
AF.*

1. *Earum quæ in cavam
peripheriam incidunt maxima e-
rit AH, quæ per centrum L
transit.*


2. *Aliarum major est ea,
AG, quæ maxima AH pro-
pior.*

3. *Extra circumulum minima
est AB, quæ producta per cen-
trum transit.*

4. *Quæ minima propior AC
remotiore AE minor erit.*

5. *Non*

§. Non plures quam due ex dicto puncto *A* in peripheriam duci possunt aequales sive intra circulum sive extra.



DEMONSTRATIO.

Pars I. Ducta recta *LG*. in triangulo *ALG*.

Duo latera AL . $LG < AG$. ^{a 20. L.}

Atqui AL . $LG \propto AH$.
quia $LG \propto LH$.

Ergo $AH < AG$.

Gg

Pars

Pars 2. Ducta linea LF, in triangulis
ALG. ALF.

Latus AL utrique commune.

Latus LG $\propto$ LF. quia sunt radii.

Atqui ang. ALG $<$ ALF.

b 24. I.

Ergo basis AG b $<$ basi AF.

Pars 3. Ducta LC. in triangulo ACL.

Duo latera AC. CL. b $<$ AL. $\left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} S$
CL. $\propto$ BL.

c Ax. 4.

Remanet AC $<$ c AB.

Pars 4. Ducta LE, in triangulis AEL
ACL,

Duo latera exteriora

AE. EL d $<$ AC. CL. $\left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} S$
LE $\propto$ LC.


d 21. I.

Remanet AE $<$ AC.

Pars 5. Pater ex præcedentibus; nam
ducta AI $\propto$ AE. quæ intra AI ducitur
erit illâ minor: quæ extra. illâ major:
adeoque ex A non possunt duci plures
quam duæ quæ sint æquales. Q. E. D.

PROPOSITIO IX.

Theor. 2.



*Si ab aliquo intra
Circulum puncto A plu-
res quam dua rectæ aqua-
les AB. AC. AD ad pe-
ripheriam duci possint :
Illud punctum erit cen-
trum.*

DEMONSTRATIO.

Ductas rectas DC CB. divide bifariam
in F & E per rectas FA. EA.

Tum in triangulis AFD. AFC.

Latus AF utrique commune.

Latus AD $\propto$ AC. per propositionem.

Latus FD $\propto$ FC. per constructionem.

Ergo Ang. AFD $\propto$ AFC, & uter-
que brevis: adeoque in perpendiculari
FA erit centrum. c

a 8. I.

b Def.

10. I.

c Coroll.

1. III.

Deinde eodem modo per triangu-
la AEC. AEB demonstratur centrum etiam
esse in perpendiculari EA.

Ergo necessario erit in puncto interse-
ctionis A. quia duæ lineæ FA. EA præ-
ter illud nullum habent commune.


Q. E. D.

G g 2

Tre.

PROPOSITIO X.

Theor. 9.



*Duo circuli
ADE. AFC se
mutuo non secant in
pluribus quam duo-
bus punctis.*

DEMONSTRATIO.

Juxta Adversarii opinionem
ponantur se invicem secare in
tribus punctis A. E. C. Tum ex
invento circuli ADE centro G.
ducantur rectæ. GA. GE. GC :
quæ sunt æquales: quia sunt ra-
dii circuli ADE.

Atqui tres istæ æquales GA. GE. GC
etiam pertingunt ad peripheriam alterius
circuli AFC: ergo punctum G illius
quoque a erit centrum.

a. g. II.


b. g. III.

Adeoque duo circuli se invicem secan-
tes haberent idem centrum. b quod est
absurdum.

PROPOSITIO XI.

Theor.
10.

Si duo circuli se interius tangent in A, recta FG illorum centra F. G. conjungens, si producat, transibit per contactum A.



DEMONSTRATIO.

Si juxta Adversarium non cadat in A, cadat aliorsum in D.

Gg 3

Tum

Tum

S { Recta $FGD \propto FGA$ quia sunt
radii majoris circuli.
FG FG

$GD \propto GA.$

Atqui $GB \propto GA.$ quia sunt radii minoris circuli.

Ergo $GD \propto GB.$ Totum & pars. quod est absurdum.


Atqui eadem demonstratio habet locum quandiu inter puncta D & B. manet aliquod interstitium; seu quandiu illa puncta non coincidunt hoc est quandiu linea GD non transit per contactum.

Ergo FG producta cadit in contactum A.

Q. E. D.

Scho-

S C H O L I U M.



Potest hæc propositio sic converti.

Si duo circuli se mutuo interius tangant, & a puncto contactus B, ad centrum unius circuli ducatur Recta, tum in illa aut illius producta quoque erit centrum alterius circuli.

DEMONSTRATIO.

Duplex hic obtinet casus: Aut enim ducta est BA ex contactu
ad

ad centrum majoris circuli: Aut ducta est BC ex contactu ad centrum minoris circuli C.

CASUS I.

Si centrum minoris circuli non sit in linea BA, sit extra illam in puncto G. ducantur lineæ BG & AD per G.

A. $\left\{ \begin{array}{l} GE \propto GB. \text{ quia sunt radii minoris} \\ \text{circuli.} \\ AG \quad AG. \text{ juxta Adv.} \end{array} \right.$


$$AE \propto AG + GB.$$

Atqui $AG + GB < AB. \text{ f. AD. 20. I.}$

Ergo $AE < AD.$ pars major toto.

Et eadem demonstratio habet locum in omnibus punctis assignatis extra lineam BA. Ergo centrum minoris circuli reperitur in linea BA.

CASUS II.



Sit centrum majoris Circuli extra re-
ctam BC, aut illius productam, in pun-
cto F. Ducantur BF & DF per C.

Eritque

$\frac{A}{CF} \cdot \frac{CE}{CF} \propto \frac{CB}{CF}$. quia radii minoris circuli.


$FE \propto FC \perp CB$,
Atqui $FC \perp CB < FB$ s. FD .

Ergo $FE < FD$. pars toto.
Q. E. A.

Theor.
II.

PROPOSITIO XII.

Si duo circuli se invicem exterius contingant in B. Recta quæ illorum centra conjungit, per contactum transibit.



DEMONSTRATIO.

Si Adversarius hoc neget ;
sint si fieri potest centra ita constituta, ut recta FG. illa conjungens non transeat per punctum contactus B, sed circulos secet in C & D. Tum ductis FB. GB, in triangulo FBG.

La-

Laterā FB. BG $\leq$ FG.

a 20. h

Atqui FB. BG $\propto$ partibus FC.
GD.

Ergo FC. GD $\leq$ tota FG.
quod est absurdum.


Eadem demonstratio vim habebit quandiu puncta C & D non coincidunt : quod solummodo fit in puncto contactus B. Ergo linea centra conjungens per illud transire debet.

Q. E. D.

Theor.
12.

PROPOSITIO XIII.

Circulus circulum non tangit in pluribus punctis quam uno; siue intus, siue extra tangat.



DEMONSTRATIO.

Casus I. Circulus ABC tangat (juxta Adversarium) in duobus punctis A & B:

a II. II. Tum recta FE, tendet a ad puncta contactus A & B; ducatur FB.

FE $\perp$ EB $\propto$ FA, quia sunt radii ejusdem circuli.


At-

Atqui $FB \propto FA$ propter eandem rationem.

Ergo $FE \perp EB \propto FB$. Quod est absurdum. ^{b 20. I.}

Casus II. Circulus ABC (si non in uno) in duobus punctis tangat circulum ABD. sc. in A & B, Recta FE quæ centra conjungit transit per contactum ^{c 12. II.} A:

Atqui (juxta adversum, qui etiam contactum in B ponit) illa etiam transit per B, ut linea FBE sit linea recta.



Ergo hinc sequeretur duas rectas FBE, FAE comprehendere spatium. Quod est absurdum.


d Ax. 12.

Theor.
13.

PROPOSITIO. XIV.

1. *Æquales rectæ AB. DC
in circulo æqualiter a centro di-
stant.*

2. *Et æqualiter a centro distan-
tes inter se æquales sunt.*



DEMONSTRATIO.

PARS I.

23. III. Ex centro E ductæ perpendi-
culares EF. EG, lineas^a AB. DC
bisecabunt; & quia totæ sunt æ-
quales erunt & semissæ AF. DG
æquales: ducantur radii EA. ED.

In triangulis rectangulis AFE
DGE.

□ta

□ta $AF.FE \propto \square AE$ |
 □ta $DG.GE \propto \square DE$ | 47. I.

Atqui □ $AE \propto \square DE$. quia fiunt
 a radiis.

Ergo □ta $AF.FE. \propto \square$ tis $DG.GE$
 $S \square AF \propto \square DG$.

Remanet □ $FE \propto \square GE$.

Ergo linea $FE \propto GE$ adeoque
 distantie æquales.

P A R S II.

Supra erant

□ta $AF.FE \propto \square$ tis $DG.GE$ | S
 $\square FE \propto \square GE$.


□ $AF \propto DG$.

Ergo ipsa $AF \propto DG$. & ipsarum
 dupla.

$AB^b \propto DC$.

Q. D. E. ^{b Ax. 6.}

PROPOSITIO XV.

Theor.
14.

1. In cir-
culo $ABCD$
rectarum in-
scriptarum
maxima est
Diameter
 AF .

2. Reliquarum vero ea BE ma-
jor quæ centro propior.

DEMONSTRATIO.

Pars I. Ductis GB, GE . in triangulo
 BGE .

¶ 20. I. Duolatera $a BG, GE < BE$.

Atqui $BG, GE \propto AF$. Diametro.

Ergo $AF < BE$.

Pars II. Ductis GC, GD : in triangulis
 BGE, CGD .

Latus $BG \propto CG$ } Quia sunt
Latus $GE \propto GD$ radii.


At ang. $BGE < CGD$.

¶ 24. I. Ergo basis $BE^b < CD$.

Q. D. E.

Pro-

PROPOSITIO XVI.

Theor.
15.

*Si per extremi-
tatem diametri A
ducatur perpendicu-
laris FE.*

1. *Illa cadet ex-
tra circulum.*

2. *Neque inter
ipsam & circulum*

*alia recta ad contactum A duci potest, qua
circulum non secet.*

DEMONSTRATIO.

Pars I. Ex centro D. ad quodlibet punctum F
ducta DF, erit in triangulo DAF.

Angulus A $\angle$ F. quia angulus A rectus.

Ergo Latus (a) DF $\angle$ latere DA.

a 19. I.

Atqui DH $\propto$ DA. quia sunt radii.

Ergo DF $\angle$ DH. Adeoque quia punctum H
est in circumferentia erit F extra.

Idem ratiocinium omnibus punctis lineæ
FAE potest applicari: adeoque tota FE (exce-
pto puncto A) erit extra circulum.

Pars 2. Ponat adversarius rectam AB posse
duci inter AE. & circulum absque circuli sectio-
ne. Ex centro D ad AB ducatur perpendicu-
laris DK. Eritque in triangulo DKA.

Ii

Ang.


Ang. $\angle DKA < \angle DAK$.

b 19. I. Ergo latus $DA > DK$.

Atqui DA pertingit ad peripheriam.
Ergo cadit DK . intra Circulum; adeoque linea AK illum secat.

COROLLARIUM.

Hinc rursus patet rectam lineam Circulum tantum in uno puncto tangere : nam demonstratum est totam rectam FE cadere extra circulum excepto unico puncto A ; adeoque in illo se se tantum contingunt.

PROPOSITIO XVII. Probl. 2.

*A dato puncta
A rectam lineam
AC ducere quæ
circulum datum
BCD tangat.*

CONSTRUCTIO.

1. Ex puncto A ad centrum ducatur recta AD.
2. Centro D radio DA describatur circuli arcus AE.
3. Ex puncto B erigatur perpendicularis BE.
4. Juncta ED, ducatur AC.
Dico lineam AC tangere circulum.

DEMONSTRATIO.

In triangulis ADC. EDB.

Latus AD $\propto$ ED Quia sunt radii eo-
Latus DC $\propto$ DB eundem circulorum.
Angulus D communis.

Ergo $\angle$ Ang. ACD $\propto$ EBD.


a 4. I.

Atqui Ang. EBD est rectus per const.

Ergo etiam ACD est rectus : adeoque
linea AC b tangit circulum.

b 16. III.

PROPOSITIO XVIII.

Theor.
16.

*Si recta linea AB tangat circum-
lum, quæ ex cen-
tro D ad conta-
ctum C ducitur
DC; illa tangen-
genti AB perpendicularis erit.*

DEMONSTRATIO.

Si neget Adversarius; Sit alia quæ-
dam DB perpendicularis ad tangentem :
tum in triangulo DCB,

Angulus DBC $\angle$ DCB. juxta Ad-
versarium.

a 19. I.

Ergo latus DC $\angle$ DB. a

Atqui DC $\propto$ DE.


b Ax. 9.

Ergo DE $\angle$ DB. Pars major to-
to : quod est b absurdum. Et eadem de-
monstratio habet locum in omnibus pun-
ctis lineæ CB.

PRO-

PROPOSITIO XIX.

Theor.
17.



*Si recta linea AB
tangat circulum, &
ex contactu C ducatur
perpendicularis
CE in illa erit cen-
trum.*

DEMONSTRATIO.

Si hoc ab Adversario negetur ; alibi
centrum assignare debet : Sit hoc in F :
tum ducta FC erit

Ang. ECB rectus. per proposit.

Atqui FCB = etiam rectus juxta posi- a 18. III.
tionem Adversarii.

Ergo ECB $\propto$ FCB. Totum & pars:
quod est absurdum.

Eadem autem demonstratio locum ha-
bet ubicunque ab adversario centrum po-
natur extra lineam CE.

Ergo in linea CE reperitur centrum.


Q. E. D.

PROPOSITIO XX.


Theor.
18.

Angulus ad Centrum GEB duplus est anguli GDB ad peripheriam, cum idem arcus GB est basis angularum.

DEMONSTRATIO.




Casus I. In triangulo Isoscele
 Angulus GEB $\propto$ ang. D $\perp$ B. 16. I.
 Atqui D $\propto$ B. 5. I.
 Ergo GEB. duplus anguli D.



Casus 2. Ducta AF per centrum E,
 A | Ang. BEF duplus ang. BAF. | per ca-
 | Ang. CEF duplus ang. CAF. | sum. I.

 Totus BEC duplus totius BAC.




Casus 3. Totus Ang. GEC est
 duplus totius GDC.
 Partialis GEB est duplus par- } S
 tialis GDB.

 Remanet BEC duplus BDC, Q. E. D.
 PRO-

Theor.
19.

PROPOSITIO XXI.

*In circulo, qui eidem arcui BC
insistunt anguli BAC. BDC, seu
qui sunt in eodem segmento, sunt
inter se aequales.*



DEMONSTRATIO.

Angulus BEC est duplus BAC
Atqui id. BEC est duplus BDC }^{20. III.}


Ergo BAC = BDC.

¶ Az. 7.

Pro

PROPOSITIO. XXII.

Theor.
20.



Quadrilateri
circulo
inscripti
ABCD
anguli op-
D. B. positi
duobus
rectis sunt
aequales.

DEMONSTRATIO.

Ductis diagonalibus AC. BD.

A { Ang. O $\propto$ Q. ^a quia insistant arcui AB.
Ang. S $\propto$ R. ^a quia insistant arcui CB.

Totus angulus ADC $\propto$ Q + R. } A.
Angulus ABC $\propto$ ABC. }

Duo anguli ADC. ABC $\propto$ tribus
Q + R + ABC.

Atqui hi tres sunt $\propto$ 2 Rectis.

Ergo & duo ADC + ABC


$\propto$ 2 Rectis.

Q. E. D.

Theor.
21.

PROPOSITIO. XXIII.

*Si super eadem recta DF constituta sint duo segmenta circulo-
rum inequalia; illa non sunt si-
milis.*



DEMONSTRATIO.

Si contendat Adversarius illa esse si-
milis; ducantur rectæ FE. ED. DI.

a Def.
10. III.


Ang. DEF $\propto$ DIF juxta a Adversarium
Atqui DEF $>$ DIF. per 16. I.

Quæ duo sunt contradictoria.

Pro-

PROPOSITIO XXIV. Theor.
22.

*Segmenta similia ACB. DEF,
super æqualibus rectis AB. DF
constituta, inter se sunt æqualia.*



DEMONSTRATIO.

Superponatur AB ipsi DF, aut congruent aut non.

Si non: tum peripheria ACD.

Vel cadet tota intra vel extra peripheriam DEF: contra præcedentem.


Vel interfecabit peripheriam DEF: tunc circulus circulum secabit in pluribus quam duobus punctis: contra 10. hujus.

Ergo congruent: adeoque sunt æqualia. Ax. 2.

Q. E. D.

Probl. 3.

PROPOSITIO XXV.



*Circuli datum
arcum ABD
perficere.*

CONSTRUCTIO.

1. Tria puncta ad libitum sumpta
A. B. D. jungantur rectis AB. BD.
2. Dividantur bifariam per perpendi-
culares EC. FC.

Dico in illarum intersectionis pun-
cto C esse arcus dati centrum quæsitum.

DEMONSTRATIO.

Centrum est in perpendiculari EC.
Ut & in perpendiculari a FC.

2. Cor.
1. III.

Ergo est in puncto intersectionis;
quia illud tantum habent commune, &
circuli unicum tantum est centrum.


Adeoq; ex centro C arcus perfici po-
terit. Q. E. F.

Pro-

PROPOSITIO XXVI.

Theor.
23.

*Si in circulis æqualibus anguli
sive ad centra. G. H, sive ad pe-
ripheriam B. E. sint æquales :
tunc etiam arcus AC. DF, qui-
bus insistant, erunt æquales.*



DEMONSTRATIO.

Ductis rectis AC. DF. in triangulis
AGC. DHF.

Latus AG $\propto$ DH } Quia sunt radii cir-
Latus GC $\propto$ HF } culorum æqualium.
Angulus G $\propto$ H. per propositionem.

Ergo Basis AC a $\propto$ DF.

a 4. l.

Fiant jam anguli B. E. ad periphe-
riam ductis AB. BC. DE. EF.

b Def. 10.
III.

Quia autem angulorum ad centra G.H. æqualium semisses ad peripheriam B.E. etiam sunt æquales; segmenta ABC DEF erunt b similia: adeoque quia super æqualibus rectis sunt constituta, erunt æqualia: Quæ si a totis circulis æqualibus auferantur remanebunt arcus AC. DF inter se æquales.

Pars 2. Hæc eodem fere ratiocinio demonstratur.

Sed notandum in parte prima figuras debere considerari sine angulis ad peripheriam; qui in demonstratione demum construi debent.

Sic etiam in parte secunda spectari debent absque angulis ad centra, quos demonstratio demum requirit.


Adeoque utriusque partis demonstratione ambo anguli & ad centra & ad peripheriam exiguntur: cum per illos demonstretur æqualitas rectarum; per hos vero similitudo segmentorum; quæ utraque necessaria sunt.

PROPOSITIO XXVII.

Theor.

24.

Si in aequalibus circulis arcus AI. DF. sint aequales, anguli illis insistentes sive ad centra G. H. sive ad peripherias. B. E. sunt inter se aequales.



DEMONSTRATIO.

Pars I. Si non sit angulus $G \propto H$:

Erit $G > H$.

Vel $G < H$.

Sit $G > H$ fiatque

Angulus $AGC \propto H$.

Ergo ^a Arcus $AC \propto DF$.

Atqui Arcus $AI \propto DF$ per proposit. ^a 6. III.

Ergo Arcus $AC \propto AI$. Totum & pars: quod est absurdum. Ergo angulus G non est minor H .

Eodem modo probatur angulum G non esse majorem angulo H .

Ergo sequitur G esse æqualem A .


Pars 2. Hæc facile eadem formula demonstratur.

Pro-

Theor.
25.

PROPOSITIO XXVIII.

Si in circulis æqualibus ductæ sint æquales rectæ AC. DF : erunt etiam, quos auferunt, arcus AC. DF inter se æquales.



DEMONSTRATIO.

Ductis rectis GA. GC : HD. HF, in triangulis AGC. DHF.

Latus AG $\propto$ DH. Quia radii æqualium circulorum.
Latus GC $\propto$ HF.

Basis AC $\propto$ DF. per propositionem.

a 8. I.
b 26. III.

Ergo Ang. AGC $\propto$ DHF.


Adeoquæ arcus AC $\propto$ DF.

Q. E. D.

PROPOSITIO XXIX.

Theor.
26.

Si in æqualibus circulis arcus AC. DF sint æquales; erunt & subtendentes rectæ AC. DF inter se æquales.



DEMONSTRATIO.

Ductis GA. GC. HD. HF. erunt in triangulis AGC. DHF.

Latus GA $\propto$ HD | Quia sunt radii æ-

Latus GC $\propto$ HF | qualium circularum.

Angulus C $\propto$ a H. quia arcus AC ponitur æqualis DF. a 27. III.


Ergo basis AC $\propto$ DF.

b 4. I.

Q. D. E.

PROPOSITIO XXX.

Probl. 4.



*Datum cir-
culi arcum ABC
bisariam se-
re.*

CONSTRUCTIO.

1. Ducatur recta AC, dati arcus ex-
tremitates conjungens.
2. Illa per perpendicularem DB, bi-
secetur.

Dico Arcum bisectum esse in B.

DEMONSTRATIO.

Ductis rectis AB. CB. erunt in triangu-
lis BDA. BDC,

Latus BD utrique commune.

Latus AD $\propto$ DC. Per con-
Angulus BDA $\propto$ BDC. /struct.

a 4. I.
b 28. I.

Ergo Basis BA $\propto$ a BC.

Adeoque Arcus BA $\propto$ b BC.

Ergo Arcus ABC divisus est bisariam.

Q. E. D.


PRO-

PROPOSITIO XXXI. ^{Theor.}

1. *Angulus ABC in semicirculo rectus est.* ^{27.}

2. *In segmento majori angulus BAC recto minor.*

3. *In segmento vero minori angulus BEC recto major.*



DEMONSTRATIO.

Pars I. Ducta DB, erunt duo triangula DAB. DBC. Isoscelia, adeoque anguli supra bases æquales.

Ergo ang. DBA $\propto$ DAB. a 5. L

Et ang. DBC $\propto$ DCB. / A.

Totus Ang. ABC $\propto$ duobus BAC
+ BCA.

Atqui in triang. ABC omnes tres anguli sunt $\propto$ b 2 Rectis.

Ll 2.

Er. b 32. L

Ergo ab una parte angulus ABC est rectus, & ab altera duor reliqui BAC. BCA etiam æquales uni recto.

Pars 2. Per partem I duo anguli BAC BCA simul constituunt unum rectum: ergo solus BAC est minor recto.

Pars 3. In quadrilatero ABEC.

c 22. III.

Duo anguli A $\perp$ E $\propto$ 2 Rectis.
Atqui ang. A $>$ uno recto per partem I.

Ergo ang. E $<$ uno recto.

SCHOLIUM I.

Si trianguli rectanguli hypotenusæ dividatur bifariam, erit punctum bisectionis centrum circuli per tria puncta angularia transeuntis: adeoque examen normæ.

SCHOLIUM II.


Ex hac propositione deducitur sequens

P R O B L E M A.

Minus quadratum Z a majore X subtrahere, seu exhibere differentiam quadratorum X & Z.

Con-

LIBER TERTIUS. 269
CONSTRUCTIO.



1. Super AB $\propto$ X fiat Semicirculus ACB.

2. In Diametro AB sumatur AD $\propto$ Z.

3. Centro A radio AD describe arcum DC. erit recta AC etiam $\propto$ Z.

Dico ducta CB illius $\square$ CB esse quartam differentiam quadratorum AB. AC.

DEMONSTRATIO.

Per propos. 31. III. angulus ACB est rectus, ergo in triangulo rectangulo ACB est

$$S \begin{cases} \square AB \propto \square AC + \square CB \text{ per 47. I.} \\ \square AC \quad \square AC, \end{cases}$$

$$\square AB + \square AC \propto \square CB.$$


LI 3

PRO-

Theor.
28.

PROPOSITIO XXXII.

Si recta linea AB circulum tangat in C, & a contactu ducatur alia circulum secans: erit angulus a tangente & secante factus equalis angulo qui fit in alterno segmento.



DEMONSTRATIO.

Casus hic obtinent omnino duo:

Aut enim linea circulum secans ad tangentem est perpendicularis & transit per centrum O, ut CD.

Aut non transit: ut CE.

Ca-

CASUS I.

Demonstrari debet angulum $ACD \propto$
 CFD .

Ang. ACD est rectus : per hypoth.

Ut & a CFD est rectus : quia est in Se- a 31. III.
 micirculo.

Ergo ang. $ACD \propto CFD$.

CASUS II.

Ab una parte probari debet esse ang.
 $ACE \propto CFE$.

S { Ang. $ACD \propto CFD$. per casum I.
 { Ang. $Q \propto b$ R. quia in eodem b 21. III;
 segmento.

Remanet ang. $ACE \propto CFE$.

Ab altera parte probari debet ang.
 $BCE \propto CHE$.

A { Ang. $BCD \propto CHD$ per casum I.
 { Ang. $Q \propto S$. quia sunt eodem
 segmento.


Totus ang. $BCE \propto$ Toti CHE .

Q. E. D.

Probl. 5.

PROPOSITIO XXXIII.

Super data recta AB segmentum circuli construere, quod capiat angulum dato angulo æqualem.



Est autem angulus datus vel rectus ut E, vel non rectus ut H. C.

CASUS I.

Constructio & Demonstratio.

31. IIL Data AB bifariam divisa in D. Centro D radio DA fiat semicirculus ACB. hic capit a angulum rectum ACB, adeoque dato recto E æqualem.

Ca

CASUS II.

CONSTRUCTIO.

1. Ad datæ BA punctum A ducatur DK, ut angulus DAB sit æquales b angulo dato C. ^{b 31. I.}

2. Ex A duc perpendicularem AF.

3. Fiat angulus ABE æqualis angulo BAE.

4. Centro E; radio EA vel EB (quæ per 6. I. sunt æquales) describe circumum BIAG.

Dico segmentum AGB capere angulum dato acuto C æqualem.

Ut & segmentum AIB capere angulum dato obtuso H æqualem.

Pars 1. Ang. DAB $\propto$ AGB, in ^{c 32. III.} alterno segmento.

Et Ang. DAB $\propto$ C per construct.

Ergo Ang. AGB $\propto$ C.

Pars 2. In quadrilatero AIBG.

Duo anguli I $\perp$ G $\propto$ 2 Rectis. ^{d 22. III.}

Et duo anguli H $\perp$ C $\propto$ 2 Rectis.


Ergo I $\perp$ G $\propto$ H $\perp$ C.
S { Atqui G $\propto$ C. per par- ^{c 32. III.}
tem I.

Ergo I $\propto$ H.
Mm

Q. D. E.
Pro-

Probl. 6. PROPOSITIO XXXIV.

A dato circulo ABC segmentum CBA auferre, capiens angulum B , dato angulo D æqualem.



CONSTRUCTIO.

1. Ducatur recta tangens Circulum in A.

2. Ad A fiat angulus EAC æqualis angulo dato D.

Di-

Dico segmentum ABC
capere angulum æqualem D.

DEMONSTRATIO.

Ang. EAC $\propto$ ABC in al-^{31. III}
terno segmento.

Atqui EAC $\propto$ D per con-
structionem.


Ergo ABC $\propto$ D.

Q. E. D.

PROPOSITIO XXXV.

Theor.
29.

Si in circulo dua rectæ AB. CD se mutuo in E secuerint: Rectangulum comprehensum sub segmentis unius AE. EB: aequale est ei quod sub segmentis alterius CE. ED. comprehenditur rectangulo.



Quatuor diversi hic occurrere possunt casus.

DEMONSTRATIO.

CASUS I.

Si rectæ AB. CD se mutuo secent in Centro: tum $\square$ AEB erit $\propto$ $\square$ CED: quia quatuor illorum latera sint radii, adeoque inter se æqualia.

Ca-

CASUS II.

Si una CD per centrum F ducta alteram AB non per centrum transeuntem fecet bifariam adeoque $\perp$ perpendiculariter in E : ducatur FB . a 3. III.

DEMONSTRATIO.

$\square CED \perp \square FE \propto \square FD$ seu $\square FB$. b 5. III.
Atqui $\square FE \perp \square EB \propto \square FB$.

Ergo illis in hujus locum positis

$\square CED \perp \square FE \propto \square FE \perp \square EB$.
Adeoque dempto utrinque eodem $\square FE$.

$\square CED \propto \square EB$ hoc est $\square AEB$.

CASUS III.

Si recta CD per centrum F ducta altera non per centrum non dividit bifariam in E .

DEMONSTRATIO.

Ducta FG perpendiculari ad AB , ut & FB tum erit.

$$\square CED + \square FE \propto \square FD \quad \text{hoc est } \square FB.$$

$$\square FG + \square GE \text{ 47. l. } \square FG + \square GB \text{ 47}$$

Sublato utimque $\square FG$. erit

$$\square CED + \square GE \propto \square GBI$$

Sublato $\square GE$ $\square AEB + \square GE$. 5. II.

$$\square CED \propto \square AEB. \quad \text{Q. D. E.}$$

CASUS IV.

Si neutra transeat per centrum & se mutuo secant utcunque.

DEMONSTRATIO.

Ducatur GH. transiens per centrum F & per intersectionis punctum E. Tum.

$$\square AEB \propto \square GEH \text{ per ca.}$$

Et $\square CED \propto$ eidem $\square GEH$ sum 3.


$$\text{Ergo } \square AEB \propto \square CED.$$

Q. E. D.

NOTA.

In casu 3. Illa quæ sibi invicem sub-
scribuntur inter se sunt æqualia & inferiora
loco superiorum legi debent, ac si in
una eadem linea essent substituta; id
quod etiam in plerisque aliis demonstra-
tionibus observandum,

Scho.



Suppositis Libri V. Definitione I. & prop. 4 & 16. (quæ cum hac propositione nihil habent commune) hæc unica demonstratio facillime omnibus casibus inservire potest.

DEMONSTRATIO.

Ductis AD. CB, erit in triangulis AED. CEB.

Angulus A $\propto$ C
Ang. D $\propto$ B $\left| \begin{smallmatrix} \text{21. III.} \\ \text{21. III.} \end{smallmatrix} \right.$
Ang. AED $\propto$ CEB. 15. I.

Ergo erit per 4. VI.

AE — ED $\propto$ CE $\propto$ EB.


Et per nostrum Theor. I. Lib. V.
vel 16. VI.

$\square$ AE. ED $\propto$ $\square$ CE. EB. Q. D. E.
Pro-

PROPOSITIO XXXVI.

Theor.

30.



Si a puncto A extra circulum dato ducantur duae rectae, una tangens AF, altera secans AB. Erit rectangulum BAC, sub tota secante BA & illius parte AC inter punctum A & circulum interjecta comprehensum, aequale quadrato tangentis AE.

Duo hic notandi sunt casus.

CASUS I.

Aut secans AB transit per centrum D.

DEMONSTRATIO.

Ducta DE, erit

$$\square BAC + \square DC = \square DA.$$

$$\square BAC + \square DC = \square DE + \square DF = \square FA. 47. I.$$

Atqui $\square DC = \square DF$. Quia sunt a radiis.

$$\square BAC = \square FA.$$

CASUS II.

Aut secans AE non transit per centrum.

De-

DEMONSTRATIO.

Ex centro D ducta perpendiculari
DG ut & DI; erit

$$\square EAI + \square GI \propto \square GA$$

$$\square DG \quad \square DG^A.$$

$$\square EAI + \square DG + \square GI \propto \square DG + \square GA.$$

$$47.1. \square DI \text{ seu } \square DF \quad \square DA. 47.1$$

Hoc est

$$\square FD + \square FA. 47.1.$$

$$\square EAI + \square DF \propto \square DF + \square FA.$$


Sublato utrinque $\square DF$.

$$\square EAI \propto \square FA.$$

Q. E. D.

COROLLARIUM. I.

Si a puncto quovis extra circulum sum-
pto, plures rectæ circulum secantes du-
cantur, rectangula comprehensa sub to-
tis secantibus & partibus exterioribus,
inter se sunt æqualia.



Suppositis iisdem quæ in Scholio præcedenti,
hanc damus Corollarii primi demonstrationem.

Demonstrandum est $\square$ CAB esse æquale
 $\square$ DAE.

DEMONSTRATIO.

Ductis CD & BE, erunt triangula CAD. EAB
inter se similia.

Nam anguli O — P $\propto$ 2 Rectis 22, 111.

Et anguli AEB — P $\propto$ 2 Rectis 13, 1.

Ergo O — P $\propto$ AEB — P.

Et Sublato communi angulo P,

O $\propto$ AEB

Deinde ang. A utrinque est communis,

Ergo R $\propto$ ABE, 32, 1.

Quare in triangulis CAD EAB erit per 4, VI.

CA — AD = EA — AB,

Et per 16, VI.

$\square$

$\square CA AB \propto \square DAAE$, Q. E. D.

SCHOLIUM II.

Si jam ex puncto A supra lineam AC ducatur ALG, eodem modo ductis GD LE probatur esse $\square GAL \propto \square DAE$; notandumque est puncta peripheriæ G. L. concavæ & convexæ propius ad se invicem accedere, quam puncta C. & B; quæ punctorum distantia adhuc magis immittitur si ex A supra lineam AG ducatur alia Circulum secans: donec tandem ducatur recta AF, quæ Circulum tangit in unico puncto F, in quo puncta peripheriæ concavæ & convexæ coincidunt, adeoque cum antea designatæ essent duæ lineæ AB AC seu AL AG. inter se inæquales; jam ex A ducitur solummodo unica linea AF. quæ ergo in superiori proportionem bis sumenda est sc: semel pro linea GA, & semel pro LA. quo facto proportio sic stabit $FA - AD = EA \mid AF$.

Ergo per 16. VI.

$\square$ Tangentis AF $\propto \square DA. AE$.

Quæ æqualitas ipsius Propositionis 36 genuinum exhibet sensum, ut hinc pateat quam arcto nexu hæ veritates inter se cohæreant, quamque naturali una ex alia deducatur consequentiâ.

COROLLARIUM II.

Duæ rectæ ab eodem puncto ductæ, quæ circumulum tangunt, inter se sunt æquales.

COROLLARIUM III.

Ab eodem puncto extra circumulum sumto, duci tantum possunt duæ rectæ, quæ circumulum tangunt.


EUCLIDIS

ELEMENTORUM

LIBER QUARTUS.


DEFINITIONES.

1. *Figura rectilinea, in figura rectilinea inscribi dicitur, cum singuli ejus figurae, quae inscribitur, anguli, singula latera ejus cui inscribitur tangunt.*




2. *Similiter & figura circum figuram describi dicitur, cum singula ejus, quae circumscribitur, latera singulos ejus figurae angulos tetigerint, circum quam illa describitur.*

3. *Fi-*



3. *Figura autem rectilinea in circulo inscribi dicitur, cum singuli ejus figurae, quae inscribitur, anguli tetigerint circuli peripheriam.*

4. *Circulus autem circum figuram describi dicitur, cum circuli peripheria, singulos tangit ejus figurae, quam circumscribit, angulos.*




5. *Figura vero rectilinea circa circulum describi dicitur, cum singula latera ejus, quae circumscribitur, circuli peripheriam tangunt.*

6. Si

6. *Similiter & circulus in figura inscribi dicitur, cum circuli peripheria singula latera tangit ejus figurae in qua inscribitur.*


7. *Recta in circulo accommodari, seu coaptari dicitur, cum ejus extrema in circuli peripheria fuerint.*



Sic *AB*. dicitur in circulo accommodata non vero *CD*.

PROPOSITIO. I.

Probl. 1.



*In dato cir-
culo ABC ac.
c commodare
rectam BA
equalem da-*

*te rectæ D : quæ Circuli diame-
tro BC non sit major.*

CONSTRUCTIO.

1. In dato circulo duc Diametrum BC; cui si data recta D sit æqualis, pe-
tito satisfactum erit. Si vero minor.

2. Abscinde $\cdot BE \propto D$: & centro B $\cdot$ 3. I.
radio BE describe arcum circuli EA.

Dico rectam BA esse æqualem D
& coaptatam in Circulo.

DEMONSTRATIO.

Linea D $\propto BE$ per constructionem.

EA $\propto BE$ quia radii.

Ergo linea D $\propto BA$, quæ est co-
aptata in circulo quia $\cdot$ utraque extremi-
tas terminatur in peripheria.


$\cdot$ b Ax. I.
 $\cdot$ c Def.

7. IV.

Probl. 2.

PROPOSITIO II.

In dato circulo ABC triangulum ABC describere, quod dato triangulo DFE sit æquiangulum.



CONSTRUCTIO.

a 17. III.

b 23. I.

1. Ad ductæ tangentis GH punctum A^b constituatur angulus GAB. æqualis angulo F.

2. Ad idem punctum A ab altera parte fiat HAC æqualis angulo E.

Jungatur recta BC.

Dico

Dico triangulum ABC ipsi
DEF esse æquiangulum.

DEMONSTRATIO.

In triangulis ACB. DEF.

A $\left\{ \begin{array}{l} \text{Ang. C (c)} \propto \text{GAB} \propto \text{F per construct.} \\ \text{Ang. B (c)} \propto \text{HAC} \propto \text{E per construct.} \end{array} \right.$

031. III.


Duo anguli $C + B \propto$ duobus
 $F + E.$

Ergo etiam tertius $A \propto$ ter- $d 2 \text{ Cor.}$
tiq D, $32. I.$

PROPOSITIO III.

Probl. 3.

*Circa datum circulum BCE tri-
angulum LMO describere æquian-
gulum dato triangulo AFD.*



CONSTRUCTIO.

1. Trianguli DAF latus AF produca-
tur in G & H.
- a 23. I. 2. In circulo ducto radio IB, a fiat
angulus BIE. æqualis trianguli externo
angulo DAG.
3. Fiat angulus BIC æqualis externo
DHF.
- b 16. & 17. III. 4. Ad tria puncta B. C. E. ducantur
tres b tangentes OL. OE. LM.
Dico ex illarum concursu oriri triangu-
lum OLM. dato DAF æquiangulum.

DEMONSTRATIO.

Ex Scholio prop. 32. I. quadrilaterum
BIEL diyidi potest in duo triangula, cum
au-

LIBER TERTIUS. 293

autem unum triangulum contineat duos
angulos rectos, duo continebunt qua-
tuor; adeoque quatuor anguli in quadri-
latero dicto erunt æquales quatuor rectis :
a quibus si demantur duo ^crecti LEI. ^c 16. III.
LBI. remanebunt.

Anguli BIE $\perp$ L $\propto$ 2 Rectis.

Atqui DAG $\perp$ DAF $\propto$ 2 Rectis.

Ergo BIE $\perp$ L $\propto$ DAG $\perp$ DAF $\backslash$ S
Atqui BIE $\propto$ DAG per const.

Remanet L $\propto$ DAF.

Eodem modo demonstratur quod sit
angulus M $\propto$ DFA, ergo tertius O erit
 $\propto$ d tertio D. ^{d 2 Cor.}
^{32. I.}

N O T A.

Quod autem tangentes EL & BL in
puncto L concurrere debeant sic patet.
Ducta BE.

Duo anguli toti LBI. LEI. $\propto$ 2 R.


Ergo ang. partiales LEB. LBE $>$ 2 R.

^c Ergo rectæ EL. BL concurrent. ^{c Ax. II.}

Probl. 4.

PROPOSITIO IV.

*Dato triangulo ABC circulum
inscribere.*



CONSTRUCTIO.

1. Duos quoslibet angulos B.
 a 9. I. C. ^a divide bifariam per rectas
 BD. CD.

2. Ex puncto concursus D duc
 perpendiculares DE. DF. DG.

3. Centro D, radio DE. de-
 scribe circulum.

Dico illum tangere omnia late-
 ra trianguli in punctis D. E. F. a-
 deoque ipsi inscriptum esse.

De-

DEMONSTRATIO.

In triangulis DGC. DFC.

Ang. $G \propto F$. per constr.

Ang. DCG $\propto$ DCF. quia totus
C bisectus est.

Latus DC commune.

Ergo latus DG $\propto$ DF.

b 16. I.

Eodem modo demonstratur ef-
se DF $\propto$ DE.

Adeoque tres lineæ DE. DF.
DG sunt inter se æquales.


Ergo circulus centro D ductus
transit per puncta E. F. G. & tan-
git c omnia latera; quia anguli c 16. III.
ad E. F. G. sunt recti; adeoque
d triangulo inscriptus est.

d Def. 6.

PROPOSITIO V.

Probl. 5.

*Circa datum triangulum ABC
circulum describere.*



CONSTRUCTIO.

1. Quælibetunque duo latera AB.
BC a divide bifariam in E. & F.
2. Ex E & F erige b perpendiculares
ED. FD.

3. Ex puncto concursus, describe
radio DA circulum.

Dico illum quoque transire per puncta
B, C. adeoque triangulo circumscriptum
esse.

DEMONSTRATIO.

Ductis DA DB DC. In triangulis
DEA, DEB.

Latus DE commune.

Latus EA $\propto$ EB | Per con.

Angulus DEA $\propto$ DEB /struct.

Ergo $\angle$ basis DA $\propto$ DB.

c 4. L.

Eodem modo demonstratur esse DB
 $\propto$ DC, adeoque tres lineæ DA. DB.
DC sunt inter se æquales.

Ergo Circulus centro D, radio DA
descriptus, transit per omnia trianguli
puncta angularia: adeoque ipsi est cir- ^{d Def.}
cumscriptus. d. _{4. IV.}

Eadem constructionis formula obtinet
in omnibus trianguli speciebus; cum hac
solummodo differentia, quod in Rectan-
gulo centrum cadat in punctum medium
hypotenusæ.

In Acutangulo centrum cadat intra tri-
angulum.

In obtusangulo vero extra.


SCHOLIUM.

Ex hac propositione deducitur Metho-
dus describendi circulum, per tria pun-
cta non in linea recta disposita, transeun-
tem.

Probl. 6.

PROPOSITIO VI.

Dato Circulo quadratum inscribere.



CONSTRUCTIO.

1. Ducantur duæ Diametri AC BD in centro C sead angulos rectos interfecantes.

2. Jungantur rectæ AB. BC. CD. DA.

Dico ABCD esse quadratum quæsitum.

DEMONSTRATIO.

Pro lateribus.

In triangulis AEB. AED.

Latus

Latus AE utrique commune.

Latus EB $\propto$ ED. quia radii.

Angulus AEB $\propto$ AED. quia uterque rectus.

Ergo basis AB $\propto$ AD.

a 4. L.

Eodem modo probatur AD $\propto$ DC: DC $\propto$ CB. CB $\propto$ BA.

Adeoque quatuor illa latera inter se erunt æqualia.

Pro angulis.

Quatuor anguli A B C.D. istis lateribus contenti sunt in Semicirculo. ergo recti.^b

b 31. III.


Adeoque ABCD est quadratum circulo inscriptum.

Q. E. F.

Probl. 7.

PROPOSITIO VII.

*Circa datum Circulum quadra-
tum describere.*



CONSTRUCTIO.

1. Ducantur duæ diametri
AC. BD se mutuo ad angulos re-
ctos in E secantes.

2. Per illarum extremitates du-
cantur tangentes FG. GH. HI. IF.

Dico illas coeuntēs consti-
tuere Quadratum quæsi-
tum FGHI.

De-

DEMONSTRATIO.

Pro angulis.

In quadrilatero AEBF.

4 Anguli A. E. B. F. ∞ 4 Rectis
Atqui 3 Ang. A. E. B. ∞ 3 Rectis

232. I.
& Scho-
lium.

Remanet ang. F ∞ 1 Recto.

Simuli ratiocinio probatur an-
gulos G. H. I esse rectos.

Pro lateribus.

In parallelogrammis FD. ID.
latera FG. IH sunt æqualia Dia-
metro BD. adeoque & inter se.

In parallelogrammis IA. HA.
latera FI. GH sunt^b æqualia Dia-
metro AC.

b 34. I.

Atqui Diametri AC. BD sunt
inter se æquales.


Ergo 4 latera FG. GH. HI.
IF sunt inter se æqualia.

Adeoque FIGH est quadra-
tum quæsitum. Q. F. E.

PROPOSITIO VIII.

Probl. 8.

In dato quadrato Circulum describere.



CONSTRUCTIO.

1. Ducantur duæ diagonales FH. GI se interfecantes in E.
2. Ex E demittatur ad latus FI perpendicularis EB.
3. Centro E radio EB, describatur Circulus.

Dico illum tangere latera in punctis A. B. C. D. adeoque quadrato inscriptum esse.

De.

DEMONSTRATIO.

Ex E. ductis perpendiculatibus EA.
ED. EC.

In triangulis FAE. FBE. erunt.

Angulus A $\propto$ B per constr. quia recti.

Angulus a O $\propto$ P. quia semirecti.

Latus FE utrique commune.

a 2 Cor.

32. I.

Ergo Latus EA $\propto$ EB. ^b

b 26. I.

Sic etiam probatur EB $\propto$ EC: &
EC $\propto$ ED: ut & ED $\propto$ EA.


Ergo circulus centro E, radio EB
descriptus transibit per puncta A. D. C:
& quia anguli ad illa puncta sunt recti,
tanger omnia iat ra; adeoque circulus
quadrato erit inscriptus.

Q. E. D.

Probl. 9.

PROPOSITIO IX.

*Circa datum quadratum circum-
lum describere.*



CONSTRUCTIO.

1. Ducantur diametri AC.
BD secantes sese in puncto E.
2. Centro E, radio EB, de-
scribatur Circulus.

*Dico illum transire per
omnia quadrati puncta
angularia; adeoque illi
esse circumscriptum.*

De-

DEMONSTRATIO.

Diametri AC. BD, quatuor
angulos A. B. C. D. ^a bifariam se- ^{a 2 Coro.}
cant, Ergo in triangulo EBA. ^{32. I.}

Angulus EBA $\propto$ EAB.

Ergo latus EA ^b $\propto$ EB.

Sic etiam probatur EB $\propto$ EC. ^{b 6. I.}
& EC $\propto$ ED: & ED $\propto$ A.


Adeoque quatuor lineæ EA.
EB. EC. ED. sunt inter se æqua-
les.

Ergo circulus centro E radio
EB descriptus transit per omnia
quadrati puncta angularia A. B.
C. D. adeoque illi circumscri-
ptus est.

Q. E. D.

PROPOSITIO. X.

Probl. 10.



*Triangulum Iso-
celes ABD construere,
cujus singuli ad basin
anguli B. & D dupli
sint reliqui ad verti-
cem A.*

CONSTRUCTIO.

1. Quamlibet cunque lineam AB ita
a II. II. divide a in C, ut $\square ABC$ sit $\square AC$.
 2. Centro A radio AB describe circu-
lum.
 3. Ex B in isto circulo accommoda
b r. IV. b rectam BD $\propto$ AC.
 4. Duc rectam AD.
- Dico ABD esse triangulum quæsitum.

DEMONSTRATIO.

Ducta recta CD, circa triangulum
ACD describatur circulus ACD.

$\square ABC \propto \square AC$ hoc est $\square BD$ per
constr.

c37. III. Ergo BD tangit circulum c: quem
BA, secat.

c32. III. A | Vnde ang. BDC c $\propto$ A in alterno seg.
Ang. CDA CDA.

A

Totalis ang. ADB ($\propto$ ABD) $\propto$ A
 $\perp$ CDA.

Atqui etiam BCD $\propto$ A $\perp$ CDA. ^{d 32. I.}

Ergo

In triangulo BCD ang. BCD $\propto$ CBD.

Adeoque latus BD $\propto$ CD. e 6. I.

Atqui latus BD $\propto$ AC.

Ergo

In triangulo ACD latus CD $\propto$ CA.

Adeoque angulus A $\propto$ CDA.

Ergo angulus BCD (qui duobus A & CDA est æqualis probatus) est duplus anguli A.

Ergo etiam BDC, qui angulo ABD demonstratus est æqualis, duplus erit anguli A.

Adeoque & ADB, qui angulo ^f ABD est æqualis, ejusdem anguli A duplus erit. Q. E. F.


COROLLARIUM.

In triangulo Ifocele hoc modo constructo, angulus ad basin valet duas partes quintas seu $\frac{2}{5}$ duorum vel $\frac{4}{5}$ unius Recti: quare angulus A valebit $\frac{1}{5}$ duorum vel $\frac{2}{5}$ unius Recti.

PROPOSITIO XI.

Theor.
II.

Dato circulo Pentagonum æquilaterum & æquiangulum inscribere.



CONSTRUCTIO.

1. Cuilibetunque triangulo Isosceli juxta præcedentem propositionem constituto, æquiangulum^a inscribatur EFG in circulo dato.

2. Illius supra basin anguli EFG. EGF bisecentur per rectas FI, GH.

3. Puncta E. H. F. G. I. jungantur totidem rectis.

Dico factum esse quod petitur.

De-

DEMONSTRATIO.

Pro lateribus.

Quinque anguli EFI . IFG . EGH .
 HGF . FEG sunt inter se æquales per
 constructionem.

Ergo α arcus quibus insistant sunt æ. a 26. III.
 quales.

Ergo illis β subtensæ rectæ, quæ sunt β . 29. III.
 Pentagoni latera, sunt æquales.

Pro angulis.

Arcus $HFGI$ $\propto$ Arcui $FGIE$. per
 partem I.


Ergo Angulus E $\propto$ Angulo H . quia c 27. III.
 æqualibus arcibus insistant.

Simili modo de duobus aliis angulis
 &c. Q. E. F.

PROPOSITIO XII.

Theor.
12.

*Circa datum circulum Pentagonum æquilaterum & equiangu-
lum describere.*



CONSTRUCTIO.

1. Inscribatur Pentagonum regulare per præced: ABCDE.

2. Ad puncta A. B. C. D. E. ducantur totidem tangentes, quæ concurrerent in punctis F. G. H. I. C.

Dico factum quod quæritur.

De-

DEMONSTRATIO.

Pro lateribus.

Ex centro O ductis perpendicularibus
OP. OQ, ut & radio OA in triangulis
OAP. OAQ

Latus OP ^a $\propto$ OQ, quia æquales ^{a 14. III.}
AB. AE æquidistant centro.

Latus PA ^b $\propto$ QA, quia æquales ^{b 3. III.}
AB. AC bisectiones sunt.

Latus OA utrique communes.

Ergo ang. ^c OAP $\propto$ OAQ. Qui si aufe- ^{c 8. I.}
rantur ab æqualibus Rectis angulis OAH
OAG : remanebit angulus HAB $\propto$
GAE.

Deinde Triangula BHA. EGA. sunt
Isoſceſia, quia ex puncto H ductæ sunt
ductæ tangentes HA. AB : ut ex puncto ^{d 2. Co-}
G duæ GA. GE : quæ sunt ^{d æquales : 16. I.}

Quare illa triangula habent bases AB.
AE æquales, & angulos ad basin HBA.
HAB. æquales GAE. GEA. non solum
alterum alteri, sed promiscue omnes ^{e 5. &}
quatuor inter se æquales. Adeoque ^{16. I.} qua-
tuor latera BH. HA. AG. GE. sunt in-
ter se æqualia.

Si-

Simili modo demonstratur omnes decem lineolas esse inter se æquales.

Si jam una sit æqualis uni etiam duæ erunt duabus æquales.

Adeoque quinque latera, quæ ex duabus lineolis constant, erunt æqualia.

Pro angulis.

Ex demonstra-tet triangula AHB
f 8. 1. AGE habere omnia latera æqualia.
Adeoque angulum H $\propto$ G. Et eodem modo de reliquis.


COROLLARIUM.

Si in circulo quælibetunque figura regularis fuerit inscripta, lineæ tangentes circulum in punctis illius angularibus, suo concursu semper constituent figuram similem circulo circumscriptam.

PROPOSITIO XIII.

Prob. 13.

Dato Pentagono. regulari circulum inscribere.



CONSTRUCTIO.

1. Quoslibet duos angulos A & E divide bifariam per rectas AF. EF.

2. Ex illarum puncto concursus F, ducantur ad omnia latera perpendicularares.

3. Ex F tanquam centro pro radio assumpta una ex istis perpendicularibus describatur circulus.

Dico illum Pentagono fore inscriptum.

Rr

De-

DEMONSTRATIO.

In Triangulis AGF. AHF.

Angulus GAF $\propto$ HAF | Per con-
 Angulus AGF $\propto$ AHF | stru&.
 Latus AF utrique commune.

a 26. I. Ergo a latus GF $\propto$ HF.

Eodem modo probatur HF $\propto$ IF.
 IF $\propto$ KF. KF $\propto$ LF & denique LF
 $\propto$ GF.

Adeoque omnes istæ perpendiculares
 erunt inter se æquales.

Quare circulus radio FH descriptus
 transibit quoque per puncta I. K. L. G.
 b 16. III. in quibus ista latera tanget; quia anguli
 ad ista puncta sunt recti.

Q. E. D.

COROLLARIUM. I.

In quolibet polygono regula-
 ri

ti omnes lineæ bifecantes angulos in uno eodemque puncto conveniunt.

COROLLARIUM II.

In omni Polygono laterum imparem habente numerum linea aliquem ex angulis bifecans oppositum etiam bifecabit latus.


SCHOLIUM.

Eadem methodo in quacunque figura regulari circulus describi potest.

Probl. 14.

PROPOSITIO XIV.

Circa datum Pentagonum regulare circulum describere.



CONSTRUCTIO.

1. Duos quoslibet angulos A & B divide bifariam per rectas AF . BF , quæ concurrent in F .
ax. 11.
2. Centro F , radio AF , vel BF describe circulum.

Dico illum transiturum per reliqua puncta angularia.

De-

DEMONSTRATIO.

In triangulo FAB .

Ang. $FAB \propto FBA$. quia illorum dupli sunt æquales.

Ergo latus $FA \propto FB$.

Eodem modo bisecto angulo C demonstrabitur $FB \propto FC$. & sic per orbem omnes lineæ bisecantes angulos erunt æquales.

Ergo circulus transibit per omnia puncta angularia, adeoque pentagono circumscriptus erit.

Q. E. E.


SCHOLIUM.

Eadem constructionis formæ circa quamlibet figuram regularem circulum describere licet.

Probl. 15.

PROPOSITIO XV.

*In dato circulo Hexagonum
regulare describere.*



CONSTRUCTIO.

1. Centro quolibet puncto D, radio circuli DG, describe arcum CGE.
2. Ex punctis C. D. E. per centrum G describe tres diametros CF. DA. EB.
3. Duc sex rectas AB. BC. CD. DE. EF. FA.

Dico ABCDEF esse hexagonum
quæsitum. De-

DEMONSTRATIO.

Pro lateribus.

Lineæ DC. DE singulæ sunt ∞ ;
Radio DG.

Lineæ GC. GE, GD singuli sunt Radii.

Ergo quinque lineæ GC. GD. GE.
DC. DE sunt æquales.

Adeoq. Triangula GCD. GDE
sunt æquilatera.

Ergo duo anguli G & O singuli sunt
una tertia pars duorum rectorum.

a 3 Cor.

Atqui tres anguli G. O. S. simul b va-
lent duos rectoros, seu tres tertias duorum
rectorum.

32. I.
b 13. I.

Ergo tertius S. etiam est una tertia
duorum rectorum.

Adeoq. tres G. O, S. sunt inter se
æquales.

Atqui illis æquales sunt tres c opposi- c 15. I.
ti X. Q. T.

Ergo sex anguli ad Centrum sunt æquales.

Ergo d sex arcus, quibus insistant, d 16. III.
sunt æquales.

Adeo-

e 29. III. Adeoque ^c sex subtensa, quæ constituunt latera figuræ, inter se sunt æquales.

Pro angulis.

Hos esse æquales facile patet, quia
f 21. III. f singuli insistant æqualibus arcubus, sc. quatuor sextis partibus totius peripheriæ: Ergo sunt inter se æquales.

COROLLARIUM.

Hexagoni latus æquale est radio.


SCHOLIUM.

Ductis tribus rectis AC. AE. CE. circumscriptionum erit triangulum æquilaterum.

LIBER QUARTUS. 321

PROPOSITIO XVI.

Probl. 16.



*In dato Cir-
culo Quindecag-
onum regulare
describere.*

CONSTRUCTIO.

1. Circulo (a) inscribe pentagonum regulare a r r. IV. AEF GH.

2. Itidem (b) triangulum regulare ABC.

Dico rectam BF, fore latus quindecago-
ni quæsit.

b Schol.
15. IV.

DEMONSTRATIO.

Pentagonum dividit totam peripheriam in quinque partes æquales; quare quælibet continet unam quintam seu tres decimas quintas totius peripheriæ: adeoque duæ AE, EF, sex decimas quintas continebunt.

Triangulum vero dividit totam peripheriam in tres partes æquales; quarum quælibet ut AB continet unam tertiam, seu quinque decimas quintas totius peripheriæ. Tum

Arcus AEF sex decimæ quintæ.

Arcus AEB quinque decimæ quintæ. / S.

Arcus BF una decima quinta.

Ergo sit ducatur recta BF, eique æquales quatuordecim in circulo coaptentur, descriptum erit quindecagonum, æquilaterum, cum omnes arcus sint æquales.

FINIS LIBRI QUARTI.

Sf

Pro.

EUCLIDIS

ELEMENTORUM

LIBER QUINTUS.

DEFINITIONES.

I. Pars est magnitudo magnitudinis, minor majoris, cum metitur maiorem.

Cum totum sit sua parte majus, patet partem contineri in suo toto. Hoc autem duplici modo fit.

Vel continetur ita ut aliquoties sumpta, præcise reddat suum totum seu ipsi æqualis sit; quemadmodum numerus quatuor seu 4, est minor toto 12, adeoque in illo continetur, & quidem ita, ut aliquot vicibus, scilicet tribus sumtus, accurate æqualis sit toti 12. Et inde hæc pars Mathematicis dicitur Aliquota, quæ suum totum absque residuo dividit, id quod idem est ac metiri: & hanc Partis speciem Euclides solummodo respexit, altera, quæ sequitur, neglecta.

Vel pars ita continetur in suo toto, ut aliquoties sumpta totum vel excedat vel ab illo

illo deficiat, adeoque non accurate ipsi æqualis sit. Quemadmodum numerus 4, cum minor sit toto 14, in illo continebitur; sed quia ter sumtus toto minor est ac quater toto maior, hæc pars non potest dici Aliquota, ut altera pars notata: quia tamen aliquam exhibet quantitatem totius quantitatis, vocatur pars Aliquanta.

Cæterum cum Euclides adhibuerit Magnitudinis vocabulum, suspicari licet illum meminisse solunquantitatis continuæ, quæ vulgo magnitudinis nomine Mathematicis venit; minime tamen excludenda est quantitas discreta & in numeris posita, quæ suas etiam habet partes: quibus illa omnia, quæ de rationibus & proportionibus toto hoc libro demonstrat, æque facile imo pro captu nostro facilius accommodari possunt.

Quare & nos cum multis aliis omnes hujus libri propositiones, neglectis lineis demonstrabimus in numeris; tum quia illis magis sumus affueti & de illis sæpius quam de lineis cogitavimus; tum etiam quia illa quæ de numeris probantur, si cui libet, ipsis lineis applicari possunt.

2. *Multiplex autem est major quantitas quam metitur minor.*

Quemadmodum pars suum totum dividit seu metitur abque residuo vel cum residuo; ita reciproce etiam totum a sua parte dividitur vel sine vel cum residuo. Prius illud totum idem est quod multiplex, cujus in hac definitione fit mentio, non intellecto altero. quod cum residuo divitur, quodque adeo multiplex dici non meretur.

3. *Ratio est duarum quantitatum ejusdem generis, mutua quædam secundum communem mensuram habitudo.*

Cum proprie loquendo una eademque res ad se ipsam non possit comparari secundum quantitatem, quia se ipsa non est major nec minor, patet plures requiri inter quas legitima instituatur comparatio; quæ etiam tantum possunt esse duæ.

Illæ autem necessario requiruntur ut sint res homogeneæ; ut quantitates ejusdem generis; quales sunt linea cum linea
com-

comparata; superficies cum superficie; corpus cum corpore: nullo ergo modo linea comparari potest cum superficie vel cum corpore, nec superficies cum corpore quia non sunt ejusdem generis.

Porro ulteriorem hujus homogeneitatis explicationem tradit Euclides in definitione 5.

Hæc autem intelligenda est in quantitatibus secundum magnitudinem, seu partium æqualium numerum, adeo ut una res altera sit vel major vel minor; hoc est ut una res plures vel pauciores similes seu æquales contineat partes quam altera.

Ex quibus patet rationem nihil aliud esse quam modum seu formulam continendi, qua una quantitas aliam quantitatem continet, vel in illa continetur; quæ capacitas cum per nullam aliam operationem quam per divisionem innotescat, liquet rationem seu comparisonem duarum quantitatum non clarius quam per fractionis formam posse exprimi.

Exempli gratia; ponantur duo numeri 16 & 4. qui saltem aliquam inter se habent rationem, quia numerus 16 major est numero 4, adeoque numerum 4 in

Sf 3 se

se continet. Ut jam ulterius ista ratio examinetur videndum est quoties 16 continet 4, quod per divisionem innoscitur; quia autem facta divisione acquiritur 4 pro quotiente pronuntiamus rationem 16 ad 4, esse quadruplam. hoc est 16 esse quadruplum numeri 4: vel 16 se habere ad 4 ut 4 ad 1: Id quod etiam commode hoc modo exprimitur per fractionem $\frac{16}{4}$ quæ innuit 16 per 4 esse dividendum vel jam supponit divisum.

Si jam sumantur duo alii numeri ex. gr. 8 & 2, & eorum rationem examinando comperiatur numerum 8 minorem 2 etiam quater in se continere, quia per divisionem idem quotiens 4 obtinetur; quæ per modum fractionis exposita sic stabit $\frac{8}{2}$.

Inde patebit rationem quæ intercedit inter 16 & 4, esse eandem, vel similem vel æqualem rationi quæ est inter 8 & 2: quia nimirum 16 toties continet 4, quoties 8 continet 2.

Porro hinc fit manifestum æquimultiplicem esse nihil aliud significare quam habere eandem rationem: ut si dicatur 16 esse æquemultiplicem numeri 4, ac
8 est

8 est numeri 2, idem est ac si dicatur numerum 16 ad 4 habere eandem rationem, quam habet 8 ad numerum 2; cum utriusque sc. & æquemultiplicitas & ejusdem rationis idem quotiens 4 per ejusdem divisionis acquiritur operationem: quare ejusdem rationis notationem hoc modo exprimere licet $\frac{16}{4} \propto \frac{8}{2}$.

Quæ fractiones, ut iterum in aliam rationum formam reducantur, dicimus 16 esse ad 4 quemadmodum 8 est ad 4; vel secundum nostram qua utimur descriptionis methodum $16 - 4 = 8 \mid 2$.

Duorum autem cujuslibet rationis terminorum ille qui ad alterum refertur Antecedens dicitur; ad quem vero fit relatio Consequens rationis dicitur. Ut in ratione 16 ad 4 terminus Antecedens est numerus 16; consequens vero 4: quemadmodum ab altera parte, in ratione 4 ad 16, numerus 4 Antecedens, 16 vero consequentis acquirit nomen.

Rationes autem non uno dividuntur modo: nos duas afferemus præcipuas.

I. Ratio dividitur in rationalem & irrationalem.

Rationalis est quæ veris numeris potest exprimi ut 6 ad 3: quæ est eadem

dem cum 2 ad 1. quæ dicitur dupla.

Irrationalis vero est quæ veris numeris exprimi nequit, ut in quadrato ratio lateris ad Diagonalem; quæ, licet aliquo modo exprimat per numeros qui Surdi dicuntur, scilicet ut 1 ad $\sqrt{2}$, cum tamen $\sqrt{2}$ non sit verus numerus, sed tantum imaginarii cujusdam numeri nota veris tamen numeris explicabilis non est.

II. Ratio dividitur in rationem æqualitatis vel inæqualitatis.

Ratio æqualitatis, est quando duo ad se comparata sunt æqualia: ut 4 ad 4: & 2 ad 2.

Inæqualitatis est, cum termini inter se comparati inæquales sint, ut 4 ad 3. & 2 ad 6.

Hæc autem iterum est.

Majoris inæqualitatis, cum terminus antecedens major est consequente: ut 4 ad 3. & 6 ad 2.

Minoris inæqualitatis, cum antecedens est minor suo consequente, ut 2 ad 6. & 4 ad 12.

Proportio est rationum similitudo.

Quem-

Quemadmodum in omni ratione requiruntur duo termini seu duæ quantitates, ita in omni proportionem requiruntur duæ rationes, cum una eademque ratio ad se ipsam proprie comparari nequeat.

Cum ergo duarum rationum una ita sit constituta, ut illius terminus antecedens suum consequentem toties contineat, vel in illo contineatur sive absolute & sine residuo sive cum annexa fractione, quoties alterius antecedens suum consequentem continet vel in illo continetur, vel sine vel cum fractione quæ præcedenti æqualis est, duæ istæ rationes constituent Proportionem.

Ex: Gr: quia numerorum 12 & 4, Antecedens 12 suum consequentem 4 toties (scilicet ter) continet. quoties numerorum 9 & 3, antecedens 9 suum consequentem 3, videlicet etiam ter, duæ istæ rationes 12 ad 4 & 9 ad 3 erunt inter se similes seu æquales seu potius eædem scilicet triplæ; & hæc similitudo apud Mathematicos vocatur Proportio.

Est autem proportio triplex, Arithmetica, Geometrica, & Musica.

I. Proportio Arithmetica est æqualitas excessuum vel differentiarum inter tres,

T t qua-

quatuor vel plures numeros; in qua notandum est quemlibet numerum posse recipi pro differentia.

Ut 1. 2. 3. 4. 5. 6. In quibus unitas est differentia.

Vel 1. 3. 5. 7. 9. 11. Qui binario se invicem excedunt.

Vel 1. 4. 7. 10. 13. 16. Qui ternario. Et sic in infinitum.

II. Proportio Geometrica est rationum similitudo inter tres, quatuor vel plures quantitates, seu numeros. Potest autem & hic quilibet numerus pro denominatore rationis assumi excepta unitate.

Ut 1. 2. 4. 8. 16. Qui sunt in ratione dupla adeoque 2 est rationis denominator.

Vel 1. 3. 9. 27. 81. Qui cum sint in ratione tripla numerum 3 pro denominatore habent.

Proportio Musica est qua tres quantitates ita ordinatae sunt, ut eadem sit ratio primae ad tertiam, quae differentiae inter primam & secundam ad differentiam inter secundam & tertiam. In qua proportionem sunt tres numeri 6. 8. 12. cum eadem sit ratio primi numeri 6 ad tert-

tium 12, quæ est numeri 2 (excessus primi) ad numerum 4. (excessum secundum.)

5. Rationem habere inter se quantitates dicuntur, quæ possunt multiplicatæ se mutuo superare.

Hic ulterius explicatur quænam sint quantitates ejusdem generis, inter quas intercedit ratio, ut supra definit 3. vidimus; nim. quarum illa quæ antea erat minor, per multiplicationem sic potest augeri, ut majorem superet.

Unde patet inter illa, in quibus talis multiplicatio nullum habet locum, etiam nullam omnino dari rationem. Sic linea in infinitum multiplicata & sibi ipsi addita, nunquam fiet maior aliqua superficie: cum lineam tali multiplicatione non degenerabit in superficiem; adeoque inter lineam & superficiem nulla intercedit ratio: quemadmodum etiam nulla reperitur inter lineam & corpus, nec inter superficiem & corpus; cum qualibet cunque multiplicatione nec linea, nec superficies relicta sua specie in corpus mu-

tabitur, adeoque nec ipso majus evadere possit.

Cum autem inter latus quadrati ejusque diagonalem multiplicatio obtineat, certo concludimus illa rationem inter se habere: latus enim ita multiplicari & sibi ipsi addi potest ut diagonalem superet; cum per 20. I pateat duo latera trianguli majora esse tertio latere quod est ipsa diagonalis: Hæc autem ratio, ut supra notavimus, est irrationalis, cum veris numeris illam exprimere non detur.

Præterea rectilinea & curvilinea inter se rationem habere possunt; cum inter illa sit æqualitas & inæqualitas. Lunulæ crescentis quadraturam Hippocrates Chius, & Parabolæ Archimedes invenerunt. Anguli rectilinei cum curvilineo æqualitatem exhibuit Proclus.

6. In eadem ratione quantitates dicuntur esse prima ad secundam, & tertia ad quartam, cum prima suam secundam toties præse vel cum tali fractione continet vel in illa continetur, quoties præ-

*præcise vel cum quali fractione
tertia suam quartam continet vel
in illa continetur.*

Cum proportionalitatis indicium ab Euclide datum non ex ipsis propositis numeris sed qualicumque eorum multiplicatione sit deductum; nos illud nimis longe petitam aliquam proportionalium proprietatem suppeditare putamus; quare illo omisso aliud exhibemus indicium ex ipsis numeris propositis derivatum, & immediate ex rationis natura, antea explicata deductum.

Supra quippe vidimus rationem nihil aliud esse quam certam quandam formulam seu modum continendi, quo una quantitas aliam continet, vel ab alia continetur: quemadmodum positis duobus numeris 16 & 4. modus ille quo 16 numerum 4 continet potest exprimi per nomen quadrupli quia 16 ipsum 4 quatuor vicibus continet.

Si jam ex duobus aliis numeris 8 & 2, unus 8 alterum 2 etiam contineat eodem modo qui quadruplus dicitur, patet utrinque modum continendi esse æqualem vel potius eundem; cum autem;

ut supra notatum est, ratio & modus continendi sit unum & idem, facile concludimur, rationem etiam utrinque esse eandem : adeoque quatuor quantitates 16 & 4 ut & 8 & 2, binas ac binas sumptas esse in eadem ratione.

Eodem modo cum numerus 20 numerum 8 non absolute aliquot vicibus absque fractione contineat, sed modo continendi qui dicitur duplus cum dimidio ; si ex numeris 10 & 4, primus 10 secundum 4 eodem modo duplo cum dimidio continet ; utrimque modus continendi, seu quod jam pro eodem sumimus, ratio erit eadem adeoque quatuor quantitates 20. 8 ut & 10. 4. binæ ac binæ acceptæ, in eadem erunt ratione.

7. Eandem autem rationem habentes quantitates, vocantur proportionales.

Quæ proportionales in duplici constituta sunt genere.

Aut enim sunt continue proportionales.

Aut non continue, quæ simpliciter tantum proportionales dicuntur.

Con-

Continue proportionales dicuntur illæ quantitates quæ sunt in Progressione geometrica, inter quas a termino ad terminum eadem continuatur ratio, eundem terminum bis repetendo, ut semel primæ rationis sit consequens, antecedens vero secundæ.

Ex. gr. ex progressione gemetrica, cujus dominator est 2, scilicet 1. 2. 4. 8. 16. eligantur quatuor termini 1. 2. 4. 8. illi erunt continue proportionales; quia eadem ratio scilicet dupla a termino ad terminum continuo procedit: primus enim 1 se habet ad secundum 2, sicut idem secundus 2 ad tertium 4. deinde secundus 2 se habet ad tertium 4. quemadmodum idem tertius 4 se habet ad quartum 8.

Non continue proportionales dicuntur quantitates. quando eadem ratio quæ est inter primum & secundum non continuatur inter secundum & tertium, sed ibi interrupta demum inter tertium & quartum invenitur, ut in hisce numeris 12. 6. 8. 4. Ratio quæ est inter 12 & 6 non continuatur 6 & 8, sed ibi interrupta transit ad duos reliquos terminos 8 & 4, cum 8 numerum 4 toties contineat quoties 12 continet 6. Hæ autem
quan-

quantitates, ut supra notavimus, generali nomine dicuntur Proportionales.

8. *Cum vero prima quantitas secundam pluribus vel paucioribus vicibus contineat, quam tertia continet quartam, tunc prima ad secundam dicitur habere majorem vel minorem rationem quam tertia ad quartam.*

Ponantur quatuor numeri 8. 2. 6. 3. ex quibus primus 8 secundum numerum 2 pluribus vicibus (scilicet quatuor) contineat quam tertius 6 quartum 3. (qui illum bis continet), ratio quam 8 habet ad 2 erit major ratione 6 ad 3. Ex rationis enim natura supra vidimus rationem 8 ad 2 exprimi posse per fractionem $\frac{8}{2}$ (cujus valor est 4), ut & rationem 6 & 2, per fractionem $\frac{6}{3}$ (quæ tantum 2 valet) Cum autem fractio prima secunda major sit, patet etiam immediate ex rationis natura primam rationem secunda esse majorem.

Deinde ex quatuor numeris 12. 6. 8 2. primus numerus 12 secundum 6 paucioribus

bus vicibus contineat (sc. bis) quam tertius 8 quantum 2 (utpote quater) : erit fractio $\frac{12}{6}$ minor fractione $\frac{8}{2}$ quippe prima valet tantum 2 secunda vero 4. Cum autem fractio & ratio unum idemque fonnent, etiam primam rationem secunda minorem esse patebit.

9. *Proportio vero in tribus ad minimum terminus consistit.*

Quælibet ratio duos requirit terminos: unum antecedentem & unum consequentem : Proportio vero duas ad minimum exigit rationes : adeoque quatuor postulat terminos : qui expresse etiam requiruntur si proportio non sit continua : si vero proportio constituatur continua, tres termini sufficiunt, & tum medium bis sumendo idem est ac si quatuor essent positi. Quemadmodum in numeris 2. 4. 8. vel 16. 8. 4. vel aliis tribus quibuslibet, ratio primi ad secundum est prima : ratio vero ejusdem secundi ad tertium est altera, quæ duæ unam constituunt proportionem.

10. *Cum tres quantitates proportionales fuerint, prima ad tertiam dicitur duplicatam habere rationem eam quam eadem prima habet ad secundam.*

At vero cum quatuor quantitates fuerint continue proportionales; prima ad quartam dicitur triplicatam habere eam rationem, quam eadem prima habet ad secundam.

Et sic porro uno amplius, quamdiu proportio exstiterit.

Quidam putant rationem duplam & rationem duplicatam, unam & eandem rem significare, quæ duo tamen accurate a se invicem sunt distinguenda.

Ratio enim dupla intercedit inter duas quantitates seu numeros, quorum unus alterum præcise bis continet: quemadmodum numeri 8 ad 4. vel 6 a 3. sunt in ratione dupla: cujus correlarum ratio sub dupla est in rationibus 4 ad 8 vel 3 a 6.

Duplicata vero ratio etiam invenitur
in

In numeris, ubi rationis duplæ ne minimum apparet vestigium. Exemplo gratia In hisce tribus numeris continue proportionalibus 3. 9. 27. ratio quam primus 3 ad tertium 27 est duplicata rationis quam idem numerus primus 3 habet ad secundum 9; licet nulla inter illos inveniatur dupla; unde patet rationem duplam & duplicatam significare res toto cœlo diversas.

Dicitur autem ista ratio duplicata, quia ratio quæ est inter primum numerum & secundum, inter secundum & tertium adhuc semel quasi repetitur. Notandum autem est hanc rationis repetitionem non aliter concipiendam esse quam per formam Multiplicationis; ita ut positus rationis terminus 3 ad 9, ad repetendam adhuc semel eandem rationem illius termini per se ipsos debere multiplicari, scilicet 3 per 3 & 9 per 9. ut obtineatur ratio terminorum 9 ad 81, quæ ratio erit duplicata rationis 3 ad 9.

Adeoque primus terminus 3 se habebit ad tertium 27. ut 9 ad 81. Illos quippe numeros esse proportionales evidenter ex rationis & proportionalium natura antea tradita fit manifestum, cum nim. primus

3 in secundo 27 tot vicibus (scilicet novies) continetur, quot vicibus tertius 9 continetur in quarto 81.

Si jam porro ponantur quatuor continue proportionales 2. 4. 8. 16. ratio quæ est inter primum 2 & secundum 4, prima vice repetitur inter secundum 4 & tertium 8; & deinde secunda vice inter tertium 8 & quartum 16. Quæ repetitio cum per multiplicationem fiat, ut rationis 2 ad 4 inveniatur triplicata, termini 2 & 4 primo debent per se ipsos multiplicari; cujus multiplicationis productis 4 & 16 adhuc semel per eosdem terminos 2 & 4 multiplicatis obtinebuntur termini 8 & 64, constituentes quæsitam rationem triplicatam. Terminos enim 2. 16. 8. 64. esse inter se proportionales ex natura rationis facile probari potest.

Cæterum ex his omnibus notandum venit, rationem duplicatam nihil aliud esse quam rationem quadratorum, quæ a propositæ rationis terminis fiunt. Rationem autem triplicatam alicujus rationis unam eandemque esse cum ratione cuborum, qui a terminis fiunt.

II. *Homologæ quantitates (in quatuor proportionalibus) dicuntur*

tur esse antecedentes quidem antecedentibus, consequentes vero consequentibus.

Sint quatuor proportionales 2. 4. 3. 6. quantitas prima 2 & tertia 3 sunt utriusque rationis antecedentes, adeoque homologæ seu ejusdem naturæ rem significantes: duæ vero reliquæ sc. secunda 4 & quarta 6; quia utriusque rationes sunt consequentes, similiter sunt homologæ.

De modis argumentandi.

Cum Mathematici ex quatuor proportionalibus non unam tantum sed plures eliciant conclusiones, quas modos seu formulas argumentandi vocant; Euclides illos ad sex revocat, qui totidem sequentibus proponuntur definitionibus, & in hoc libro 5 totidem tere propositionibus demonstrantur.

12. Alterna ratio est sumptio antecedentis ad antecedentem, & consequentis ad consequentem.

Sint quatuor quantitates proportionales

$$12 : 6 = 8 : 4.$$

In quibus 12 & 8 sint antecedentes; reliqui vero 6 & 4 consequentes; alterando erit

$$12 : 8 = 6 : 4.$$

Hoc est Antecedens 12 est ad antecedentem 8, sicut consequens 6 ad consequentem 4. Id quod demonstratur prop. 16.

13. Inversa ratio est sumptio consequentis instar antecedentis ad antecedentem velut consequentem.

Si ponantur quatuor proportionales

$$12 : 6 = 8 : 4.$$

Ratione inversa sit erit.

$$6 : 12 = 4 : 8.$$

Seu ordine retrogrado priorem proportionem legendo

$$4 : 8 = 6 : 12.$$

14. Compositio rationis est sumptis antecedentis cum consequente

quente velut unius ad ipsum consequentem.

Sint iterum quatuor proportionales

$$12 - 6 = 8 \mid 4.$$

Per compositionem rationis dicimus.

$$\frac{12 \overline{+} 6}{\text{feu } 18} - 6 = \frac{8 \overline{+} 4}{\text{feu } 12} \mid 4.$$

Hoc est prima quantitas una cum secunda sese habet ad ipsam secundam sicut tertia cum quarta ad ipsam quartam. Huius demonstrationem vide prop. 18.

15. Divisio rationis est sumtio excessus, quo antecedens superat consequentem, ad ipsum consequentem.

Sint quatuor proportionales,

$$18 - 6 = 12 \mid 4.$$

Per divisionem rationis proportio sic stabit.

$$\frac{18 \overline{-} 6}{\text{feu } 12} - 6 = \frac{12 \overline{-} 4}{\text{feu } 8} \mid 4.$$

Hoc est primus terminus minus seu dempto secundo se habet ad ipsum secundum.

cundum, quemadmodum tertius minus seu dempto quarto ad ipsum quartum. Hic argumentandi modus demonstratur prop. 17.

15. Conversio rationis est sumptio antecedentis ad excessum, quo antecedens superat ipsum consequens.

Propositi sint quatuor proportionales.
 $18 - 6 = 12 \mid 4.$

Per conversionem rationis hanc habemus proportionem.

$$18 - \frac{18 - 6}{\text{seu } 12} = 12 \mid \frac{12 - 4}{\text{seu } 8}.$$

Hoc est primus se habet ad ipsum primum minus seu dempto secundo, quemadmodum tertius se habet ad ipsum tertium minus seu dempto quarto. Hæc demonstratur in Coroll. prop. 17.

17. Ex æqualitate ratio est, si plures duabus sint quantitates, & his aliæ multitudine pares, quæ binæ sumantur in eadem ratio-

tio-

tionem; cum ut in primis quantitibus prima ad ultimam, sic & in secundis prima ad ultimam se habeat.

Sint tres quantitates. 12. 6. 4.

Et adhuc tres aliæ. 6. 3. 2.

Per rationem quæ est ex æqualitate concludimus

$$12 : 4 = 6 : 3.$$

Hoc est prima superiorum se habet ad suam ultimam, quemadmodum prima inferiorum ad suam tertiam.

Quia autem hæc conclusio duobus modis ex istis sex quantitibus elicitur, duplex etiam se aperit ex æqualitate ratio; sc. Ordinata & Perturbata.

18. *Ordinata proportio est, cum fuerit (positis scilicet sex quantitibus) ut prima superiorum ad suam secundam, ita prima inferiorum ad suam secundam; deinde ut secunda superiorum ad suam ultimam, ita secunda inferiorum ad suam ultimam: & con-*

X x clu-

*cluditur quod prima superiorum
se habeat ad suam ultimam, quem-
admodum prima inferiorum ad
suam ultimam.*

Sint tres quantitates 12. 6. 4.

Et tres aliæ 6. 3. 2.

In quibus $12 - 6 = 6 \mid 3$.

Deinde $6 - 4 = 2 \mid 2$.

Proportio ex æquo ordinata sic stabit.

$$12 - 4 = 8 \mid 2.$$

Hujus modi demonstrationem vide
prop. 22.

Cæterum hæc proportio dicitur *Ordi-
nata*, quia & in superioribus & in infe-
rioribus eundem servat ordinem.

19. *Perturbata autem propor-
tio est, cum positis tribus quanti-
tatibus & aliis tribus; ut in supe-
rioribus prima se habeat ad suam
secundam, sic in inferioribus se-
cunda ad suam ultimam: & in su-
perioribus secunda ad suam ulti-
mam, ita in inferioribus prima
ad suam secundam: & concludi-
tur*

*tur : quod prima superiorum se
ita habeat ad suam ultimam ,
quemadmodum prima inferiorum
ad suam ultimam.*

Sint tres quantitates 12. 6. 3.

Et aliarum totidem 16. 8. 4.

In quibus $12 - 6 = 6$ | 4.

Et $6 - 3 = 3$ | 16. 8.

Proportio ex æquo perturbata sic erit

$$12 - 3 = 9 \quad | \quad 16 \quad | \quad 4.$$

Hujus demonstrationem vide pro. 23.

Perturbata dicitur hæc proportio,
quod in superioribus & inferioribus non
idem servetur ordo, sed ille quasi pertur-
betur.

LEMMA I.

*Multiplicatio nihil est aliud
quam multiplex additio: sicut e-
tiam divisio nihil aliud quam mul-
tiplex & compendiosa subtractio.*

DEMONSTRATIO.

Pars I. Sit numerus 6 multiplicandus
X x 2 per

per numerum 4, nihil aliud imperatum est quam, ut numerus 6 toties sumatur, seu repetatur seu sibi ipsi addatur, quoties unitas continetur in 4, sc. quater: adeoque idem facimus sive numerum 6 multiplicemus per 4, sive eundem quater ponam & illos quatuor numeros 4 in unam summam colligam, cum utrobique obtineatur 24.

Pars 2. Si numerus 24 proponatur dividendus per numerum 4, idem est ac si examinandum esset, quoties numerus 4 a 24 possit subtrahi id quod in divisione unica subductione fit divisore prius per quotientem multiplicato cum subtractiones tot fieri possint, quot unitates divisionis contineat quotiens. Quare nulla est differentia sive 24 dividatur per 4 sive 4 a 24 subtrahatur quoties fieri potest cum utrobique idem obtineatur quotiens 6.

Notandum autem in multiplicatione non semper opus esse ut multiplicatio revera fiat, & numeri inter se commisceantur, ut productum unico numero exprimatur; cum eadem multiplicatio alia etiam forma designari possit, nimirum multiplicatores juxta se invicem scribendo

do interposito signo . x .

Ex. gr: sit 8 multiplicandus per 4 facta multiplicatione obtinetur productum 32, quod etiam hoc modo exprimi potest $8 \cdot x \cdot 4$. quod in pronuntiatione valet 8 multiplicata per 4.

Quæ exprimendi forma hoc habet commodum quod jam pateat ad oculum per quam operationem & ex quibus numeris illud productum sit ortum, quod in altero producto 32 non tam clare distinguere potest. cum illud etiam ex multis aliis additionibus & multiplicationibus generari potuisset.

Præterea si productam $8 \cdot x \cdot 4$ dividendum sit per 4, omisso numero 4 scribendum erit 8. vel scribendum est 4, si dividi debeat per 8.

Similiter in divisione non opus est ut semper vera fiat divisio; cum quotiens quæsitus etiam alia forma possit exprimi, si nim. numero dividendo subscribatur divisor inter utrumque ducta lineola.

Ex. gr. oporteat dividere numerum 32 per 8, facta reali divisione obtinetur quotiens 4, qui etiam designari posset per formam fractionis $\frac{32}{8}$, qui quo-

X x 3 tiens

tiens in elocutione idem valet 32 partes quartæ, seu 32 divisa per 4.

LEMMA II.

Si duo aequales numeri per eundem numerum multiplicentur, producta erunt inter se equalia. Si vero per eundem numerum dividantur, quotientes erunt aequales:

DEMONSTRATIO.

1 Pars. Per Lemna 1 multiplicatio est multiplex & compendiosa additio: adeoque unus numerus multiplicandus toties sibi additur, quoties alter (qui priori ponitur æqualis) sibi ipsi additur: quia multiplicator utrimque ponitur idem: unde patet idem fieri ac si æqualibus æqualia addantur; quando nimirum summæ (quæ producto æquivalent) inter se sunt æquales:

a Ax. 2.

2. Pars. Per idem Lemna 1 divisio est multiplex ac compendiosa subtractio: ergo ab uno numero dividendo toties subtrahitur divisor quoties ab altero dividendo (qui per hypothesein priori æqualis est)

est) subtrahitur idem divisor : quare in ista divisione utrinque idem fit, ac si ab æqualibus æqualia demantur; quare residua (quæ quotientibus æquivalent) inter se sunt æqualia.

b Ax. 3.

LEMMA III.

Si duo in æquales numeri per eundem numerum multiplicentur producta erunt inter se inæqualia. Si vero per eundem divisorem dividantur, quotientes erunt inæles.

DEMONSTRATIO.

1 Pars. Cum per Lemna I multiplicatio sit compendiosa Additio: si duo numeri inæquales per eundem numerum multiplicentur, idem est ac numerus major toties sibi addatur quoties minor minori. At vero si inæqualibus æqualia adjiciantur, a tota sunt inæqualia per Ax. a Ax. 4.

4. Ergo etiam, si numero majori majot toties adjiciatur quoties minori additur minori, prior summa, quæ hic producto æquivalet, erit maior altera.

2. Pars

2 Pars. Quia divisio nihil aliud est quam compendiosa subtractio, si duo numeri inæquales per eundem numerum dividantur, nihil aliud fit quam quod idem numerus ab una parte a majori subtrahitur, ab altera vero a minori.

Patet autem eundem numerum pluries subtrahi a majori posse quam a minori; cum major eundem numerum pluries contineat quam minor: & cum plures istæ subtractionis vices constituent majorem quotientem, sequitur ex divisione majoris numeri per alium quemlibet acquiri majorem quotientem, quam ex minoris numeri per eundem divisione.

LEMMA IV.

Si idem numerus vel duo numeri æquales per numeros inæquales multiplicentur, producta erunt inæqualia, & quidem productum majoris multiplicatoris erit majus producto minoris multiplicatoris.

Ut & si dividantur per numeros inæquales, quotientes erunt inæquales. Major quidem ille ubi di-

*divisor est minor; at vero minor,
ubi divisor est major.*

DEMONSTRATIO.

Hæc ex superioribus nullo negotio deduci potest.

Quatuor hisce Lemmatibus præmissis, & qualicunque Arithmeticarum in fractionibus operationum notitia præsupposita, quædam subjungimus Théoremata, quæ tanquam generale omnium fere totius libri quinti propositionum demonstrandarum fundamentum præstruimus.

THEOREMA I.

Si quatuor quantitates sint proportionales; productum quod oritur ex multiplicatione extremarum est æquale producto multiplicationis mediarum.

DEMONSTRATIO.

Sint quatuor proportionales.

$$8 : 4 = 6 : 3.$$

Ratio 8 ad 4 eadem est cum fractione
 $\frac{8}{4}$ &

$\frac{8}{4}$ & ratio 6 ad 3 exprimitur per fractionem $\frac{6}{3}$; quia autem rationes sunt eadem seu æquales; erunt quoque fractiones inter se inter se æquales.

Adeoquæ $\frac{8}{4} \propto \frac{6}{3}$.

———— utrinque multipl. per 4.

$$8 \propto \frac{4 \cdot x \cdot 6}{3} \text{ Per Lemma 2.}$$

Et ——— utrimque multipl. per 3.

$$8 \cdot x \cdot 3 \propto 4 \cdot x \cdot 6 \text{ per Lem. 2.}$$

Hoc est productum extremorum 8 & 3 per se invicem multiplicatorum est æquale producto mediorum etiam multiplicatorum. Q. E. D.

THEOREMA II.

Si duo producta sint inter se æqualia, unus multiplicator primi producti se habet ad unum multiplicatorem secundi producti, quemadmodum reciproce alter multiplicator ejusdem secundi producti se habet ad alterum multiplicatorem primi producti.

De-

DEMONSTRATIO.

Sint duo producta inter se æqualia.

$8 \cdot x \cdot 3 \text{ } \overline{\text{30}} 4 \cdot x \cdot 6.$ per Lemna 2.
utrumque divid. per 3.

$8 \propto 4 \cdot \frac{x \cdot 6}{3}$ per Lemna 2.

—utrinque divid. per 4:

$$\frac{8}{4} \gg \frac{6}{3} \text{ per Lemma 2.}$$

Quæ fractiones si revocentur ad ratio-
nes, erit

$$8 - 4 = 613.$$

Quod juxta tenorem Theorematis E. D.

COROLLARIUM I.

Eodem modo posset demonstrari esse.

$$8 - 6 = 4 \cdot 1 \cdot 3.$$

Vel $3 \rightarrow 4 \equiv 6 \mid 8.$

$$\text{Vel } 3 - 6 = 4 \text{ l } 3.$$

Quæ proportiones involvunt tum Al-
ternationem, tum inversam etiam ra-
tionem.

COROLLARIUM II.

Hinc evidenter patet, si quælibetunque quatuor quantitates eo ordine sint positæ, & productum extremarum producto mediarum fuerit æquale, certissime inde concludi posse, istas quatuor quantitates eo ordine proportionales esse.

SCHOLIUM.

Si quilibet datus numerus ex.gr. 24. resolvatur in duos per quorum multiplicationem potuerit generari (quod hic quater potest fieri vel per 1 in 24. vel per 2 in 12. vel per 3 in 8. vel per 4 in 6.) facile probatur esse.

	1	—	2	—	12	1	24.
Vel	2	—	3	—	8	1	12.
Vel	3	—	4	—	6	1	8.
Vel	1	—	3	—	8	1	24.
Vel	1	—	4	—	6	1	24.
Vel	2	—	4	—	6	1	12.

Et sic de quolibet alio numero dato.

Theore-

THEOREMA III.

Si ex quatuor quantitatibus prima ad secundam majorem habeat rationem, quam tertia ad quartam: productum quod fit per multiplicationem extremarum majus erit productio mediarum.

DEMONSTRATIO.

Sit in quatuor hisce quantitatibus

$$8 - 3 < 4 \text{ l. } 2.$$

Erit secundum ante dicta.

$$\frac{8}{3} < \frac{4}{2}.$$

utrinque multipl: per 3.

$$8 < \frac{3 \cdot x \cdot 4}{2} \text{ per Lemna 3.}$$

utrinque multipl. per 2.

$$8 \cdot x \cdot 2 < 3 \cdot x \cdot 4. \text{ per Lemna 3.}$$

Hoc est productum extremorum 8 & 2 majus productio mediorum 3 & 4.

Q. E. D.

Y y 3

Theore-

THEOREMA IV.

Si duo producta sint inæqualia, prima quantitas multiplicans majoris producti ad primam quantitatem multiplicantem minoris producti majorem habebit rationem, quam reciproce secunda quantitas ejusdem minoris producti ad secundam quantitatem majoris producti.

DEMONSTRATIO.

Sit ex propositis hisce productis

$$8 \cdot x \cdot 2 < 3 \cdot x \cdot 4.$$

utrinque divid. per 2.

$$8 < \frac{3 \cdot x \cdot 4}{2} \text{ per Lemna 3.}$$

utrimque div. per 3.

$$\frac{8}{3} < \frac{4}{2}$$

Hoc est redigendo hasce fractiones ad rationes.

$$8 - 3 < 4 \mid 2.$$

Q. E. D.

Co.

COROLLARIUM I.

Eadem methodo facile posset demonstrari esse

$$\begin{array}{l} 8 \text{ ————— } 4 < 3 \text{ } 1 \text{ } 2. \\ \text{Vel } 2 \text{ ————— } 3 < 4 \text{ } 1 \text{ } 8. \\ \text{Vel } 2 \text{ ————— } 4 < 3 \text{ } 1 \text{ } 2. \end{array}$$

COROLLARIUM II.

Hinc sequitur, si quælibetunque quatuor quantitates ordine sint positæ, & productum extremarum producto mediarum sit majus, firmiter concludendum esse, primam ad secundam habere majorem rationem, quam tertia habet ad quartam,

S C H O L I U M.

Si duo quilibet numeri inæquales 24 & 16 resolvantur in suos multiplicationes

sc: 24

in

1. 24.

2. 12.

3. 8.

4. 6.

& 16.

in

1. 16.

2. 8.

4. 4.

ex hoc Theoremate patet esse

$$\text{Vel } 1 \text{ — } 1 < 16 \mid 24.$$

$$\text{Vel } 1 \text{ — } 2 < 8 \mid 24.$$

$$\text{Vel } 1 \text{ — } 4 < 4 \mid 24.$$

Deinde

$$\text{Vel } 2 \text{ — } 1 < 16 \mid 12.$$

$$\text{Vel } 2 \text{ — } 2 < 8 \mid 12.$$

$$\text{Vel } 2 \text{ — } 4 < 4 \mid 12.$$

Postea.

$$\text{Vel } 3 \text{ — } 1 < 16 \mid 8.$$

$$\text{Vel } 3 \text{ — } 2 < 8 \mid 8.$$

$$\text{Vel } 3 \text{ — } 4 < 4 \mid 8.$$

Denique

$$\text{Vel } 4 \text{ — } 1 < 16 \mid 6.$$

$$\text{Vel } 4 \text{ — } 2 < 8 \mid 6.$$

$$\text{Vel } 4 \text{ — } 4 < 4 \mid 8.$$

Præter alias 36 majoritatis proportion-
nes, quæ ex hisce numeris elici possunt.

THEOREMA 5.

Si ex quatuor quantitibus prima ad secundam minorem habeat rationem, quam tertia ad quartam; productum quod fit per multiplicationem extremarum minus erit producto mediarum.

DEMONSTRATIO.

Sit in quatuor hisce quantitibus

$$4 - 2 > 8 \mid 3.$$

$$\text{Erit } \frac{4}{2} > \frac{8}{3}$$

utrinque multipl. per 3.

$$\frac{4 \cdot x \cdot 3}{2} > 8. \text{ Per Lemma 3.}$$

utrinque multipl. per 2.

$$4 \cdot x \cdot 3 > 8 \cdot x \cdot 2. \text{ per Lemma 3.}$$

Hoc est productum extremarum 4 & 3 est minus producto mediarum 2. 8;

THEOREMA 6.

Si duo producta sint inæqualia, prima quantitas multiplicans minoris producti ad primam quantitatem multiplicantem majoris producti minorem habebit rationem, quam reciproce secunda quantitas ejusdem majoris producti ad secundam quantitatem minoris producti.

DEMONSTRATIO.

Sit ex duobus hisce productis.

$$4 \cdot x \cdot 3 > 8 \cdot x \cdot 2.$$

utrinque divid. per 2.

$$\frac{4 \cdot x \cdot 3}{2} > 8. \text{ Per Lemma 3.}$$

utrinque div. per per 3.

$$\frac{4}{2} > \frac{8}{3} \text{ per Lemma 3.}$$

Hoc est redigendo ad rationes

$$4 : 2 > 8 : 3.$$

Co-

COROLLARIUM I.

Eadem methodo facile posset demonstrari. quod fit

$$\begin{array}{l} 4 \text{ --- } 8 > 2 \text{ l } 3. \\ \text{Vel } 3 \text{ --- } 8 > 2 \text{ l } 4. \\ \text{Vel } 3 \text{ --- } 2 > 8 \text{ l } 4. \end{array}$$

COROLLARIUM II.

Hinc patet, si quælibetunque quatuor quantitates ordine sint positæ, & productum extremarum sit minus producto mediarum, certissime concludi, primam ad secundam habere minorem rationem, quam tertia ad quartam.

SCHOLIUM.

Si duo quilibet numeri inæquales 16 & 24 resolvantur in suos multiplicatores:

sc: 16.	24.
in	
1. 16.	1. 24.
2. 8.	2. 12.
4. 4.	3. 8.
	4. 6.

Ex hoc Theoremate patet esse

$$\begin{array}{l} 1 - 1 \triangleright 24 \mid 16. \\ \text{Vel } 1 - 2 \triangleright 12 \mid 16. \\ \text{Vel } 1 - 3 \triangleright 8 \mid 16. \\ \text{Vel } 1 - 4 \triangleright 6 \mid 16. \end{array}$$

Præterea.

$$\begin{array}{l} \text{Vel } 2 - 1 \triangleright 24 \mid 8. \\ \text{Vel } 2 - 2 \triangleright 12 \mid 8. \\ \text{Vel } 2 - 3 \triangleright 8 \mid 8. \\ \text{Vel } 2 - 4 \triangleright 6 \mid 8. \end{array}$$

Denique

$$\begin{array}{l} \text{Vel } 4 - 1 \triangleright 24 \mid 4. \\ \text{Vel } 4 - 2 \triangleright 12 \mid 4. \\ \text{Vel } 4 - 3 \triangleright 8 \mid 4. \\ \text{Vel } 4 - 4 \triangleright 6 \mid 4. \end{array}$$

Præter alias 36 minoritatis proportionēs, quæ ex hisce numeris deduci possunt.

Jam sequuntur ipsæ Libri quinti Propositiones.

PROPOSITIO I.

Si sunt quotcunque magnitudines seu quantitates proportionales A. B. C. D. E. F. quemadmodum se habuerit una antecedentium ad suam consequentem, ita omnes antecedentes & simul se habebunt ad omnes consequentes etiam simul sumptas H.

DEMONSTRATIO.

Sint in eadem inter se ratione

$$\begin{array}{rcl} A & 3 & \text{---} 1 B \\ C & 6 & \text{---} 2 D \\ E & 9 & \text{---} 3 F \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{rcl} A & 3 & \text{---} 1 B \\ C & 6 & \text{---} 2 D \\ E & 9 & \text{---} 3 F \end{array}} \right\} A$$

$$G \quad 18 \text{ --- } 6 H.$$

Demonstrandum est esse summam ad summam ut quælibet antecedens ad suam consequentem.

Hoc est $18 \text{ --- } 6 \equiv 3 \mid 1$

Deinde $18 \text{ --- } 6 \equiv 6 \mid 2$.

Denique $18 \text{ --- } 6 \equiv 9 \mid 3$.

Quia in qualibet proportionem productum extremorum facta multiplicatione est æquale producto mediorum, quatuor illarum termini sunt proportionales.

Z z 3

PRO-

a 2 Corol.
Theor. 2.

PROPOSITIO II. & XXIV.

Si prima A ad secundam B eandem habuerit rationem, quam tertia C ad quartam D ; habuerit autem & quinta E ad secundam B eandem rationem quam sexta F ad quartam D ; Etiam G , composita prima cum quinta ad secundam B , eandem habebit rationem quam H tertia cum sexta ad quartam D .

DEMONSTRATIO.

$$\begin{array}{rcll} A & B & C & D \\ \text{Sit } 4 & 2 & 6 & 1 \\ E & 10 & F & 15 \\ \hline G & 14 & H & 21 \end{array} \quad \begin{array}{l} 3. A. \\ \\ \\ \end{array}$$

Si instituaturs multiplicatio, producta erunt aequalia, ergo (a) istae quantitates sunt proportionales.

a Theor.
2.

Aliter

$$\begin{array}{rcl} \frac{4}{2} & \propto & \frac{6}{3} \\ \frac{10}{2} & \propto & \frac{15}{3} \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} A.$$

b Ax. 2.

$$\frac{14}{2} b \propto \frac{21}{3} \quad \text{vel in proportione.}$$

$$14 \div 2 = 21 \div 3. \quad Q. E. D.$$

Pro

PROPOSITIO III.

Si quatuor quantitates A. B. C. D. sint proportionales; & prima A & tertia C per eundem quemlibet numerum G multiplicentur: productum primum E se habebit ad secundam B, quemadmodum productum secundum F ad quartam D.

DEMONSTRATIO.

$$\begin{array}{r} \begin{array}{ccccc} A & & B & & C & D \\ 4 & \text{---} & 2 & \text{---} & 6 & 13 \\ G & 2 & & & G & 2 \end{array} \Bigg\} M. \\ \hline E & 8 & & & F & 12 \end{array}$$

Demonstrandum est

$$\begin{array}{ccccccc} E & & B & & F & & D \\ 8 & \text{---} & 2 & \text{---} & 12 & 1 & 3. \end{array}$$

Id quod (a) exinde patet, quod producta extremorum & mediorum sunt æqualia, 2. Theor.

Aliter

$$\frac{4}{2} \propto \frac{6}{3}$$

utrimque multipl. per 2.

$$\frac{8}{2} \propto \frac{12}{3}$$

Lemna 2.

Hoc est in proportionibus

$$8 \text{ --- } 2 \text{ --- } 12 \text{ --- } 1 \text{ --- } 3.$$

Pro-

PROPOSITIO. IV.

Si quatuor quantitates A. B. C. D. sint proportionales; prima vero A & tertia C. per quemlibet eundem numerum G multiplicentur; ut & secunda B & tertia D per alium numerum K. quatuor ista producta inter se proportionalia erunt.

DEMONSTRATIO.

Sint quatuor proportionales

$$\begin{array}{ccccccc} A & B & C & D & & & \\ 4 & 2 & 6 & 3 & & & \\ \hline G & K & G & K & & & \\ \hline E & L & F & M & & & \end{array}$$

Demonstrandum est quatuor producta E. L. F. M. esse proportionalia scilicet

$$8 : 6 = 12 : 9.$$

Quod ex Theor. 2 sequitur, quia facta multiplicatione producta extremorum & mediorum inter se sunt aequalia.

Aliter

$$\frac{4}{2} \propto \frac{6}{3}$$

multipl. per 2.

$$\frac{8}{2} \propto \frac{12}{3} \text{ Lemma 2.}$$

divide per 3.

$$\frac{8}{6} \propto \frac{12}{9} \text{ per idem Lemma 2.}$$

Hoc est in proportione

$$8 : 6 = 12 : 9.$$

Pro-

PROPOSITIO V. XIX.

Si totum A ad totum B eandem habuerit rationem, quam ablata pars C ad partem ablatam D: etiam pars reliqua E ad partem reliquam F, eandem habebit rationem, quam totum A ad totum B.

DEMONSTRATIO.

A	8		4	B	S
C	6		3	D	S

Erit	E	F	A	B.
	2	— 1	= 8	1 4.

Quia producta sunt æqualia.
per Theor. 2.

PROPOSITIO VI.

Si prima A ad secundam B eandem habuerit rationem, quam tertia C ad quartam D, habuerit autem & quinta E ad secundam B eandem rationem quam sexta F ad quartam D. Si quinta E subtrahatur a prima A, & sexta F a tertia C,

Vel residuum primum G erit æquale secundæ B & residuum secundum H æquale quartæ D.

Vel residuum primum G se habebit ad secundam B sicut residuum secundum H ad quartam D.

DEMONSTRATIO.

CASUS I.

A	B	C	D
12	2	18	1 3
E 10	—	F 15.	S
G 2	=	H 3.	

CASUS II.

$$\begin{array}{ccccccc} A & B & C & D & & & \\ 12 & - & 2 & = & 18 & 1 & 3 \end{array} \left| \begin{array}{l} S \\ E \end{array} \right.$$

$$\begin{array}{ccccccc} E & 4 & & & F & 6 & \\ \hline \text{Erit } G & B & & & H & & D. \\ 8 & - & 2 & = & 12 & & 3. \end{array}$$

Per Theor. 2.

Aliter.

CASUS I.

$$\begin{array}{ccc} \frac{12}{2} & \propto & \frac{18}{3} \\ \hline \frac{10}{2} & \propto & \frac{15}{3} \end{array} \left| \begin{array}{l} S \\ S \end{array} \right.$$

$$\frac{2}{2} \propto \frac{3}{3} \text{ per Axioma 3.}$$

Erit in proportione, quæ ex rationis æqualitatis.

$$2 - 2 = 3 \quad 1 \quad 3.$$

CASUS II.

$$\begin{array}{ccc} \frac{12}{2} & \propto & \frac{18}{3} \\ \hline \frac{4}{2} & \propto & \frac{6}{3} \end{array} \left| \begin{array}{l} S. \\ S. \end{array} \right.$$

$$\frac{8}{2} \propto \frac{12}{3}$$

Hoc est in proportione

$$8 - 2 = 12 \quad 1 \quad 3.$$

Aaa 2 Pro-

PROPOSITIO VII.

1. *Æquales A & A ad eandem C eandem habent rationem.*
2. *Et eadem C ad æquales A & A eandem habet rationem.*

DEMONSTRATIO.

PARS I.

$$\begin{array}{cccc} A & C & A & C \\ 12 & - & 4 & = & 12 & | & 4 \end{array}$$

PARS II.

$$\begin{array}{cccc} C & A & C & A \\ 4 & - & 12 & = & 4 & | & 12 \end{array}$$

Quia utrobique producta sunt æqualia, per Th: 2.

Pro.

PROPOSITIO VIII.

1. *Inæqualium quantitatū A. B. major A ad eandem C majorem rationem habet, quam minor B.*

2. *Et eadem C ad minorem B majorem habet rationem quam ad majorem A.*

DEMONSTRATIO.

PARS I.

$$\begin{array}{ccc} A & & B \\ 16 & \triangleleft & 8 \text{ ex hypcth.} \end{array}$$

utrinque divide per 5. C.

$$\frac{16}{5} \triangleleft \frac{8}{5} \text{ per Lemma 3.}$$

Hoc est in proportione

$$16 - 5 \triangleleft 8 \quad 1 \quad 5.$$

PARS II.

$$\begin{array}{ccc} 5 & \supset & 5 \\ 8 & \supset & 16 \end{array} \text{D.}$$

$$\frac{5}{8} \supset \frac{5}{16} \text{ per Lemma 4.}$$

Hoc est in proportione.

$$5 - 8 \triangleleft 5 \quad 1 \quad 16.$$

Aaa 3

Pro-

PROPOSITIO IX.

1. Si A & B ad eandem C habeant eandem rationem, illæ æquales inter se erunt.

2. Et si eadem C ad A & B habeat eandem rationem, illæ itidem æquales erunt.

DEMONSTRATIO.

PARS I.

$A \quad C \quad B \quad C$

$15 - 4 = 15 \quad 1 \quad 4.$

Ergo $\frac{15}{4} \propto \frac{15}{4}.$

multipl. per 4.

$15 \propto 15.$

PARS II.

$C \quad H \quad C \quad B$

$4. - 15 = 4 \quad 1 \quad 15.$

Ergo $\frac{4}{15} \propto \frac{4}{15}$

mult. per 15.

$15 \cdot x \cdot 4 \propto 15 \cdot x \cdot 4.$ per Lem. 2.

div. per 4.

$15 \propto 15.$ per idem Lemma 2.

Pro₃

PROPOSITIO. X.

1. Si A ad C maiorem rationem habet quam B ad eandem C , erit A maior quam C .

2. At si eadem C ad B maiorem rationem habuerit quam ad A , erit B minor quam A .

DEMONSTRATIO.

PARS I:

$$\begin{array}{ccccccc} A & C & B & C \\ 16 & \text{---} & 4 & \triangleleft & 8 & | & 4. \\ \text{Ergo} & \frac{16}{4} & \triangleleft & \frac{8}{4}. \end{array}$$

$$16 \triangleleft 8. \quad \begin{array}{l} \text{mult. per 4.} \\ \text{per Lemina 3.} \end{array}$$

PARS II.

$$\begin{array}{ccccccc} C & B & C & A. \\ 4 & \text{---} & 8 & \triangleleft & 4 & | & 16. \\ \frac{4}{8} & \triangleleft & \frac{4}{16} \end{array}$$

$$4 \triangleleft \frac{4 \cdot x \cdot 8}{16} \quad \begin{array}{l} \text{Multipl. per 8.} \\ \text{per Lemma,} \end{array}$$

MuP.

$$\begin{array}{r}
 \text{Multipl. per 16.} \\
 4 \cdot x \cdot 16 < 4 \cdot x \cdot 8. \text{ Lem. 3.} \\
 \hline
 \text{div. per 4.} \\
 16 < 8.
 \end{array}$$

Alio modo.

$$\begin{array}{r}
 A \quad C \quad B \quad C \\
 16 \text{ — } 4 < 8 \mid 4. \\
 \text{Ergo } 4 \cdot x \cdot 16 < 4 \cdot x \cdot 8. \text{ The. 3.} \\
 \hline
 \text{div. per 4.} \\
 16 < 8. \quad \text{Lemma 3.}
 \end{array}$$

PARS II.

$$\begin{array}{r}
 C \quad B \quad C \quad A. \\
 4 \text{ — } 8 < 4 \mid 16. \\
 \text{Ergo } 4 \cdot x \cdot 16 < 4 \cdot x \cdot 8. \text{ Theor. 4.} \\
 \hline
 \text{div. per 4.} \\
 16 < 8. \quad \text{Lemma 3.}
 \end{array}$$

PROPOSITIO XI.

*Rationes, quæ eidem rationi
sunt eadem, vel similes vel æqua-
les, inter se sunt eadem vel simi-
les vel æquales.*

DEMONSTRATIO.

$$\text{Sit } 8 \text{ — } 4 = 6 \text{ l } 3.$$

$$\text{Et } 10 \text{ — } 5 = 6 \text{ l } 3.$$

$$\text{Erit } 8 \text{ — } 4 = 10 \text{ l } 5.$$

Quia nimir. producta sunt æqualia. per

Theor. 2. Velsic.

$$\begin{array}{ccc} 8 & \propto & 6 \\ \text{—} & & \text{—} \\ 4 & & 3. \\ 10 & & 6 \\ \text{—} & & \text{—} \\ 5 & \propto & 3. \end{array}$$

$$\text{Ergo } \frac{8}{4} \propto \frac{10}{5} \text{ Ax. I.}$$

Hoc est in proportione.

$$8 \text{ — } 4 = 10 \text{ l } 5.$$

PROPOSITIO XII.

*Hæc est eadem cum prima, quæ
videri potest.*

PROPOSITIO XIII.

Si prima ratio sit equalis secunda rationi; secunda vero sit major tertiâ: similiter etiam prima tertia major erit.

DEMONSTRATIO.

Sit $16 \text{ — } 8 = 12 \text{ l. } 6.$

At vero $12 \text{ — } 6 < 4 \text{ l. } 3.$

Ergo $16 \text{ — } 8 < 4 \text{ l. } 3.$

Quia productum extremorum est majus producto mediorum. per 2 Coroll.
Theor: 4.

Vel hoc modo.

$$\frac{16}{8} \propto \frac{12}{6}$$

$$\text{Atqui } \frac{12}{6} < \frac{4}{3}.$$

$$\text{Ergo } \frac{16}{8} < \frac{4}{3}.$$

Et in proportionem
 $16 \text{ — } 8 < 4 \text{ l. } 3.$

PROPOSITIO XIV.

*Si quatuor proportionalium A. B. C. D.
prima A fuerit major tertia C, erit & se-
cunda major quarta D.*

Si A aequalis C erit B aequalis D.

Si A minor C, erit B minor D.

DEMONSTRATIO.

CASUS I.

$$\begin{array}{cccc}
 A & B & C & D \\
 12 & \text{---} & 8 & = 6 \quad 1 \quad 4. \\
 \text{Ergo } 12 \cdot x \cdot 4 & \propto & 8 \cdot x \cdot 6 & \text{Div.} \\
 12 & & < 6 & \\
 \hline
 4 & & > 8. & \text{per Lemma 4.}
 \end{array}$$

CASUS II.

$$\begin{array}{cccc}
 A & B & C & D. \\
 12 & \text{---} & 4 & = 12 \quad 1 \quad 4. \\
 \text{Ergo } 12 \cdot x \cdot 4 & \propto & 12 \cdot x \cdot 4 & \text{D.} \\
 12 & & \propto 12 & \\
 \hline
 4 & \propto & 12. & \text{Per Lemma 2.}
 \end{array}$$

CASUS III.

$$\begin{array}{cccc}
 A & B & C & D. \\
 4 & \text{---} & 6 & = 8 \quad 1 \quad 12. \\
 \text{Ergo } 4 \cdot x \cdot 12 & \propto & 6 \cdot x \cdot 8 & \text{D.} \\
 4 & & > 8 & \\
 \hline
 12 & & < 6. & \text{Lemma 4.} \\
 & & \text{Bbb } 2 & \text{Pro.}
 \end{array}$$

PROPOSITIO XV.

Si duæ quantitates A & B æqualibus vicibus sumantur seu per eundem numerum multiplicentur, summæ seu producta habebunt inter se eandem rationem quam habent posite quantitates A & B.

DEMONSTRATIO.

$$\begin{array}{r} A \qquad B \\ 4 \qquad 12 \\ 2 \qquad 2 \end{array} M.$$

$$\text{Erit } 8 \text{ — } 24 = 4 \text{ l } 12.$$

Quia producta sunt æqualia. Theor: 2.

S C H O L I U M.

Si eadem quantitates A & B per eundem numerum dividantur, quotientes ipsis quantitatibus proportionales erunt.

$$\begin{array}{r} A \qquad B \\ 4 \qquad 12 \\ 2 \qquad 2 \end{array} D.$$

$$2 \text{ — } 6 = 14 \text{ l } 12. \text{ per Th: 2.}$$

PROPOSITIO XVI.

*Si quatuor quantitates A.B.C.
D. proportionales fuerint, illæ e-
tiam vicissim proportionales erunt.*

DEMONSTRATIO.

$$\begin{array}{cccc} A & B & C & D \\ 16 & — 8 & = 4 & 1 \quad 2. \end{array}$$

Erit etiam vicissim, seu permutando.

$$16 — 4 = 8 \quad 1 \quad 3.$$

Quia facta multiplicatione producta
sunt æqualia, per Theor: 2.

SCHOLIUM.

Commode hic demonstratur ratio in-
versa. Sint Proportionales.

$$\begin{array}{cccc} A & B & C & D. \\ 16 & — 8 & = 4 & 1 \quad 2. \end{array}$$

Erit per Theor. I.

$$16 \cdot x \cdot 2 \propto 8 \cdot x \cdot 4.$$

Ergo per Theor: 2.

$$2 — 4 = 8 \quad 1 \quad 16.$$

Q.E.D.

PROPOSITIO XVII.

Si compositæ quantitates proportionales fuerint, illæ quoque divisæ proportionales erunt.

DEMONSTRATIO.

A B C D.

$$16 - 12 = 8 \mid 6.$$

Erit quoque dividendo.

$$\frac{16 \div 4}{\text{feu } 4} - 12 = \frac{8 \div 2}{\text{feu } 2} \mid 6.$$

Id quod multiplicatione probatur per Theor. 2.

Vel alio modo per prop: 6 hujus

$$\begin{array}{r} 16 - 12 = 8 \mid 6 \\ 12 \qquad \qquad 6 \end{array} \mid S$$

$$4 - 12 = 2 \mid 6. \text{ Q.D.E.}$$

SCHOLIUM.

Cum ratio conversa commode hic inferi possit, sint proportionales.

$$16 - 12 = 8 \mid 6.$$

Erit convertendo

$$16 - \frac{16 \div 4}{\text{f. } 4} = 8 \mid \frac{8 \div 2}{\text{f. } 2}.$$

Quia nim: producta sunt æqualia.
per Theor: 2.

Pro.

PROPOSITIO XVIII.

Si divisæ quantitates proportionales fuerint, illæ quoque compositæ proportionales erunt.

DEMONSTRATIO.

A B C D.

$$4 - 12 = 2 \mid 6.$$

Erit componendo.

$$\frac{4+12}{f. 16} - 12 = \frac{2+6}{f. 8} \mid 6.$$

Per Theor: 2. cum producta sint æqualia.

Aliter per prop. 2. hujus.

$$\begin{array}{rcl} 4 - 12 = 2 \mid 6 & & \\ 12 & & 6 \end{array} \} A.$$

$$16 - 12 = 8 \mid 6.$$

PROPOSITIO XIX.

Vide propos. 5. quæ cum hac est eadem.

PROPOSITIO XX.

Hac demonstrabitur post pr. 22.

Pro-

PROPOSITIO XXI.

Et hæc post propof. 23.

PROPOSITIO XXII.

Si fuerint quotcunque quantitates A. B. C. & aliæ numero æquales D. E. F. fuerit autem ordinate ut A ad B. sic D ad E: & ut B. ad C ita E ad F: illæ ex æqualitate ordinatæ in eadem ratione erunt; hoc est A ad C. ut D ad F.

DEMONSTRATIO.

Positæ sint quantitates

A B C.

16 8 4.

D E F.

12 6 3.

Ita ut sit

A B D E.

16 — 8 = 12 1 6.

Et

B C E F.

8 4 = 6 1 3.

Erit

Erit ex æqualitate ordinata.

$$\begin{array}{cccc} A & C & D & F. \\ 16 & - & 4 & = 12 \quad 1 \quad 3. \end{array}$$

Per multiplicationem extremorum & mediorum juxta Theor: 2.

Alio modo

$$\begin{array}{ll} 16 - 8 = 12 \quad 1 \quad 6 & 8 - 4 = 6 \quad 1 \quad 3. \\ \text{vicissim } 16. V. & \text{vicissim } 16. V. \\ 16 - 12 = 8 \quad 1 \quad 6 & 8 - 6 = 4 \quad 1 \quad 3. \end{array}$$

Atqui etiam

$$4 - 3 = 8 \quad 1 \quad 6:$$

Ergo 11. V.

$$16 - 12 = 4 \quad 1 \quad 3.$$

Et vicissim 16. V.

$$\begin{array}{cccc} A & C & D & F. \\ 16 & - & 4 & = 12 \quad 1 \quad 3. \end{array}$$

Hisce sic demonstratis dicit propositio 20.

Si prima A fuerit < tertia C, etiam quartam D fore < sexta F.

Si A sit $\propto$ C. fore D $\propto$ F.

Si A sit > C. fore D > F.

Quæ omnia ex prop: 14 patent si ultima proportio permutetur ut sit

$$16 - 12 = 4 \quad 1 \quad 3.$$

Ccc

Pro-

PROPOSITIO XXIII.

Si fuerint tres quantitates A. B. C, & aliæ tres, D. E. F, fuerit autem perturbate ut A ad B ita E ad F; & ut B ad C ita D ad E; illæ ex æqualitate perturbata in eadem ratione erunt sc. A erit ad C ut D ad F.

DEMONSTRATIO.

Positæ sint quantitates A B C.

16 8 2.

D E F.

24 6 3.

Ita ut sit

$$16 : 8 :: 6 : 3.$$

Et

$$8 : 2 :: 24 : 6.$$

Erit ex æquo

$$16 : 2 :: 24 : 3.$$

Quia multiplicando acquiruntur producta æqualia. Ergo per Theor. 2. illæ quantitates proportionales.

Alio

Alio modo

$$\begin{array}{l|l} 16 - 8 = 6 \mid 3. & 8 - 2 = 24 \mid 6. \\ \text{Ergo Theor. I.} & \text{Theor. I.} \end{array}$$

$$3 \cdot x \cdot 16 \propto 8 \cdot x \cdot 6. \quad 8 \cdot x \cdot 6 \propto 2 \cdot x \cdot 24.$$

Ergo per Ax. I.

$$3 \cdot x \cdot 16 \propto 2 \cdot x \cdot 24.$$

Adeoque per Theor. 2.

A C D F.

$$16 - 2 = 24 \mid 3.$$

Quibus positis dicit propositio 21.

Si sit prima A. < tertia C, etiam quartam D fore maiorem sexta F.

Si A sit $\propto$ C, fore D $\propto$ F.

Si A sit $>$ C, fore D $>$ F.

Quæ omnia rursus ex 14. V. patent, si ultima proportio permutetur, ut sit

$$16 - 24 = 2 \mid 3.$$

PROPOSITIO XXIV.

Hæc est eadem cum trop. 21, quæ videri potest.

PROPOSITIO XXV.

Si quatuor quantitates A. B. C. D. proportionales fuerint: maxima A simul cum minima D. reliquis duabus B. C. simul sumptis majores erunt.

DEMONSTRATIO.]

$$\begin{array}{cccc} A & B & C & D \\ 12 & - 4 & = 9 & 1 \quad 3. \end{array}$$

Permutando 16. V.

$$\begin{array}{l} 12 - 9 = 4 \quad 13. \\ \text{dividendo } 17. V. \end{array}$$

$12 < 4 \text{ ex hyp.}$ $\text{Ergo } 9 < 3. \quad 14. V.$
--

$$3 - 9 = 1 \quad 1 \quad 3.$$

$$\text{Atqui } 9 < 3.$$

$$\text{Ergo } 3 < 1. \quad \left. \begin{array}{l} A. \text{ Duæ ultimæ.} \\ C. D. \end{array} \right\}$$

$$9 + 3 \propto 9 + 3$$

$$12 + 3 < 4 + 9.$$

Hoc est A & B simul < B & C.

Q. E. D.

Reliquæ sequentes novem propositiones non sunt Euclidis; possunt tamen, eadem, qua præcedentes Euclidis, facilitate demonstrari.

Pro-

PROPOSITIO XXVI.

Si prima A ad secundam B habuerit maiorem rationem quam tertia C ad quartam D, habebit invertendo quarta D ad tertiam C maiorem rationem quam secunda B ad primam A.

DEMONSTRATIO.

A B C D.

Sit 8 — 4 < 5 | 3.

Er̄t per Theor. 3.

3 · x · 8 < 5 · x · 4.

Ergo per Theor. 4.

3 — 5 < 4 | 8.

Q. E. D.

PROPOSITIO XXVII.

Si prima A ad secundam B habuerit maiorem rationem, quam tertia C ad quartam D, habebit quoque vicissim prima A ad tertiam C, maiorem rationem quam secunda B ad quartam D.

DEMONSTRATIO.

A B C D.

Sic 8 — 4 < 5 | 3.

Erit 8 · x · 3 < 5 · x · 4. Th:3.

Ergo per Theor: 4.

8 — 5 < 4 | 3.

Q. E. D.

PROPOSITIO. XXVIII.

Si prima A ad secundam B habuerit maiorem rationem quam tertia C ad quartam D. habebit quoque composita prima cum secunda ad ipsam secundam B maiorem rationem quam composita tertia cum quarta ad ipsam quartam D.

DEMONSTRATIO.

A . B C D.

Sit 8 — 4 < 5 1 3.

Erit quoque

$$\frac{8+4}{\text{feu } 12} - 4 < \frac{5+3}{\text{feu } 8} 1 3.$$

Quia productum extremorum est majus producto mediorum. per Theor: 4.

Aliter.

$$\left. \begin{array}{l} \frac{8}{4} < \frac{5}{3} \\ \frac{4}{4} = \frac{3}{3} \end{array} \right\} A.$$

$$\frac{12}{4} < \frac{8}{3} \text{ Ax. 4.}$$

$$\text{Hoc est } 12 - 4 < 8 1 3.$$

Pre-

PROPOSITIO XXIX.

Si prima A ad secundam B habuerit maiorem rationem quam tertia C ad quartam D, habebit. dividendo prima minus seu dempta secunda, ad ipsam secundam B maiorem rationem, quam tertia minus seu dempta quarta ad ipsam quartam D.

DEMONSTRATIO.

A B C D.
Sit 12 — 4 < 8 1 3.

Erit quæque

$$\frac{12 - 4}{\text{seu } 8} - 4 < \frac{8 - 3}{\text{seu } 5} 13.$$

Per Theor. 4. Quia productum extremorum est majus producto mediorum. Vel etiam hoc modo,

$$\begin{array}{rcl} \frac{12}{4} < \frac{8}{3} \\ \frac{4}{4} \propto \frac{3}{3} \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{rcl} \frac{12}{4} < \frac{8}{3} \\ \frac{4}{4} \propto \frac{3}{3} \end{array}} \right\} 5$$

$$\frac{8}{4} < \frac{5}{3} \text{ per Ax: 5}$$

Hoc est 8 — 4 < 5 13. Q. E. D.

Pro-

PROPOSITIO XXX.

Si prima A ad secundam B majorem habuerit rationem, quam tertia C ad quartam D; habebit per rationis conversionem, prima ad ipsam primam minus seu dempta secunda majorem rationem quam tertia ad ipsam tertiam minus quarta.

DEMONSTRATIO.

$$\begin{array}{cccc} A & B & C & D. \\ 12 — & 4 & < 8 & 1 \quad 3. \end{array}$$

Demonstrandum est quod sit

$$\begin{array}{ccc} 12 — & 12 \div 4 & > 8 \quad 8 \div 3. \\ \text{seu } 8 & & \text{seu } 5. \end{array}$$

Id quod patet ex multiplicatione : quia nim. productum extremorum est minus producto mediorum. per Theorema 6.

[PROPOSITIO XXXI.]

Si fuerint tres quantitates A. B. C. & aliæ tres D. E. F. sitque major ratio primæ priorum A ad secundam B, quam primæ posteriorum D ad suam secundam E: ut & major ratio secundæ priorum B ad suam tertiam C, quam secundæ posteriorum E ad suam tertiam F: Erit quoque ex æqualitate ordinata major ratio primæ priorum A ad suam tertiam C, quam primæ posteriorum D, ad suam tertiam F.

DEMONSTRATIO.

	A	B	C	
	16	8	4	
	D	E	F.	
	9	5	3.	
Sit	16	— 8	< 9	1 5.
Et	8	— 4	< 5	1 3.

Erit ex æquo.

$$16 \text{ — } 4 < 9 \text{ 1 } 3.$$

• Id

Id quod patet ex multiplicatione,
cum productum extremorum sit majus
producto mediorum, per Theor: 4.

Aliter.

$$16 - 8 < 9 \ 1 \ 5.$$

vicissim. 27. V.

$$16 - 9 < 8 \ 1 \ 5.$$

Et

$$8 - 4 < 5 \ 1 \ 3.$$

vicissim. 27. V.

$$8 - 5 < 4 \ 1 \ 3.$$

Ergo.

$$16 - 9 < 4 \ 1 \ 3.$$

Vicissim.

$$16 - 4 < 9 \ 1 \ 3.$$

Q. E. D.

PROPOSITIO. XXXII.

*Si sint tres quantitates A. B. C.
 & alie tres D. E. F. sitque ma-
 jor ratio primæ priorum A ad suam
 secundam B quam secundæ poste-
 riorum E ad suam tertiam F: ut &
 ratio secundæ priorum B ad suam
 tertiam C major quam primæ po-
 steriorum D ad suam secundam E.
 Erit quoque ex æqualitate pertur-
 bata major ratio primæ priorum A
 ad suam tertiam C, quam primæ
 posteriorum D ad suam tertiam F.*

DEMONSTRATIO.

A	B	C
16	8	5
D	E	F.
9	6	4

Sit 16 < 8 < 6 | 4.

Ut & 8 — 5 < 9 | 6.

Erit ex æquo.

16 — 5 < 9 | 4.

Per

Per Theor: 4. Quia scilicet productum extremorum est majus producto mediorum.

Alio modo.

$$16 \text{ — } 8 < 6 \mid 4.$$

$$\text{Ergo } 16 \cdot x \cdot 4 < 8 \cdot x \cdot 6.$$

Et

$$8 \text{ — } 5 < 9 \mid 6.$$

$$8 \cdot x \cdot 6 < 5 \cdot x \cdot 9.$$

Ergo.

$$16 \cdot x \cdot 4 < 5 \cdot x \cdot 9.$$

$$\text{Adeoque } 16 \text{ — } 5 < 9 \mid 4.$$

per Theor: 4.

PROPOSITIO XXXIII.

*Si fuerit major ratio totius
A ad totum B, quam ablati C
ad ablatum D, erit & reliqui
E ad reliquum F major ratio
quam totius A ad totum B.*

DEMONSTRATIO.

Sint in majori ratione tota

	A.	B.	
	12	6	S.
quam partes	4	3	D

Erit $8 - 3 < 12 \mid 6$.

Per Theor: 4. quia productum
extremorum est majus producto
mediorum.

PROPOSITIO XXXIV.

Si sunt quocunque quantitates, A. B. C. & alia equales numero D. E. F. sitque major ratio primæ priorum A ad primam posteriorum D, quam secundæ B ad secundam E: ut & secundæ B ad secundam E major, quam tertiæ C ad tertiam F, & sic deinceps.

1. *Habebunt omnes priores, simul A. B. C. ad omnes posteriores simul D. E. F. majorem rationem, quam omnes priores B. C. relicta prima A, ad omnes posteriores E. F. relicta quoque prima D.*

2. *Minorem autem quam prima priorum A ad primam posteriorum F.*

3. *Ma-*

3. *Majorem denique quam ultima priorum (ad ultimam posteriorum F.*

DEMONSTRATIO.

Positæ sint quantitates

Priores	Posteriores.
A 12	D 6
B 8	E 5
C 4	F 3.

Summæ 24. 14.

PARS I. $B + C = 12 + 4 = 16$ $E + F = 5 + 3 = 8$
 24 — 14 < 12 1 8.

PARS II. $A + D = 12 + 6 = 18$
 24 — 14 > 12 1 6.

PARS III. $C + F = 4 + 3 = 7$
 24 — 14 < 4 3.

Partis I & 3 demonstratio pendet ex Theoremate 4. quia producta extremorum sunt maiora productis mediorum.

Pars vero 2 demonstratur per The. 6, quia productum extremorum est minus producto mediorum.

FINIS LIBRI QUINTI.

Eu-


EUCLIDIS

ELEMENTORUM

LIBER SEXTUS.

DEFINITIONES.

1. *Similes figuræ rectilineæ sunt, quæ & angulos singulos singulis æquales habent, atque etiam latera, quæ circum angulos æquales sunt, proportionalia.*



AD constituendam figurarum rectilinearum similitudinem requiruntur duæ conditiones.

1. Ut singuli singulis inter se sint æquales anguli A & D: B. & E: C & F.

2. Ut latera circum istos æquales angulos sint proportionalia, scil.

E e e

Circa


Circa A. D $BA \text{ --- } AC \equiv FD \text{ I } DF.$

Circa B. E $CB \text{ --- } BA \equiv FE \text{ I } ED.$

Circa C. F $BC \text{ --- } CA \equiv EF \text{ I } FD.$

Ergo si una ex hisce conditionibus deficiat, figuræ nullo modo erunt similes : quemadmodum quadratum & altera parte longior figura, licet habeant omnes angulos æquales, utpote rectos, quia vero latera non habent proportionalia, similia dicenda non sunt.

2. Reciproca figuræ sunt, cum in utraque figura antecedentes & consequentes rationum termini fuerint.



Quemadmodum in parallelogrammis
AC. BF. & ductis diagonalibus in trian-
 gu-

gulis ABC. BEF. si sit AB in prima figura ad BG secundæ, sicut reciproce EB secundæ ad BC primæ, illæ dicuntur reciprocæ.


3. *Recta AB dicitur secta esse secundum extremam & mediam rationem, cum fuerit ut tota AB ad majus segmentum AC. ita idem majus segmentum AC ad minus segmentum CB.*



In propositione 11. Libri II. Euclides docuit secare lineam ita ut $\square$ sub tota linea AB & minori segmento CB comprehensum sit æquale $\square$ majoris segmenti AC: quod unum & idem esse cum hac Definitione videri potest ex prop: 30. VI Unde patet 11. II. hic inter Definitiones reponi.

Cæterum ob multiplicem illius usum Geometris hæc proportio divina dicitur.

4. *Altitudo cujusque figuræ est linea perpendicularis AD, ab il-
lius vertice ad ipsam basin vel il-
lius productam demissa.*



Cum mensura cujusque rei debeat esse certa determinata, non vero vaga & incerta, & distantia puncti alicujus verticalis a linea opposita per certam, & sibi semper æqualem ac minimam mensurari debet lineam. Sic distantia puncti verticalis A a linea seu basi DB, non mensuranda est juxta lineas oblique ductas AD, AB, quia illæ quasi infinitæ duci possunt, nec inter se æquales sunt; sed solummodo per lineam perpendiculariter ductam AC, quæ est certa, unica & minima: quæ hoc in casu semper quæritur. Et hæc perpendicularis AC. dicitur altitudo trianguli ADB, sumpta DB pro basi: quemadmodum sumpta AD pro
basi:

basi, perpendicularis ex B ad AD ducta altitudinem exhibebit: ut & sumtâ AB pro basi faciet perpendicularis ex D ad AB demissa.

Quia vero per punctum A duci potest linea parallela ipsi DB, illa altitudo dicitur esse in iisdem parallelis; unde si duo triangula sint in eadem altitudine idem est ac si dicantur esse in iisdem parallelis. ut loquitur Euclides Lib. I.

5. Ratio ex rationibus componi dicitur, cum rationum quantitates inter se multiplicatæ, aliquam effecerint rationem.

Supra notavimus rationem nihil aliud revera esse quam modum continendi quo una quantitas aliam quantitatem continet, vel ab alia continetur; quique non clarius, quam per fractionem exprimitur.

Si ergo datæ sint duæ rationes 2 ad 3, & 4 ad 5, illæ ad fractiones redactæ sic stabunt $\frac{2}{3}$ & $\frac{4}{5}$, quæ si inter se multiplicentur, obtinebitur $\frac{8}{15}$ seu ratio 8 ad 15, pro quæsitâ ratione quæ ex duabus datis

composita est. Sic ratio quæ ex dupla & tripla, seu ex duabus rationibus 2 ad 1 & 3 ad 1, hoc est ex duabus fractionibus $\frac{2}{1}$ & $\frac{3}{1}$ composita est, habebitur $\frac{6}{1}$ seu ratio 6 ad 1 seu sextupla. Et sic porro de aliis.

Notandum autem est rationum ab Euclide sic dictas quantitates Geometris vulgo dici Denominatores, quæ in fractionum consideratione quotientum nomine venire solent.

Sed minime omittendum putamus rationem $\frac{8}{15}$ seu 8 ad 5 (quæ ex rationibus $\frac{2}{3}$ & $\frac{4}{5}$ seu 2 ad 3 & 4 ad 5 componitur) etiam hoc modo posse inveniri.

Fiat 2 — 3 = quilibet numerus 6 | 9.

Tum 4 — 5 = 9 | $4^{\frac{45}{4}}$

Dico rationem 6 ad $\frac{45}{4}$ seu utrinque per eundem numerum 4 multiplicando 24 ad 45 esse eandem cum ratione 8 ad 15. Si enim fractio $\frac{24}{45}$ per 3 reducatur ad minimam,

obtinebitur $\frac{8}{15}$ ut requiritur; unde
patet

patet rationem 6 ad $\frac{5}{4}$ esse compositam ex
duabus rationibus 2 ad 3 & 4 ad 5.

A —————

B ———

C —————

D ———

H —————

I ———

K —

Quæ omnia lineis hac ratione applicari
possunt. Datae sint duæ rationes A ad B.
& C ad D, rationem ex istis duabus
compositam hoc modo inveniemus.

Fiat A — B = H I I.

Ut & CD — D = I I K.

Ratio H ad K exhibebit rationem com-
positam quæsitam.


Pro H assumere licet quamlibet cunque
lineam,

Pro

Theor. 1.

PROPOSITIO I.

Triangula ABC DEF. & parallelogramma BK EL, in eadem altitudine sive inter easdem parallelas constituta, sunt inter se ut bases BC. EF. hoc est si bases sint æquales figuræ erunt æquales: si bases inæquales figuræ erunt inæquales & quidem juxta rationem basium.



DEMONSTRATIO.

1. Sit basis $BC \propto EF$. Tum triangula ABC. DEF, inter easdem parallelas & super basibus æqualibus constituta inter se sunt æqualia.

æ 38. I.

2. Po-

LIBER SEXTUS. 409

2. Ponatur EG dupla ipsius EF, seu BC. Tum erunt duo DEF. DFG ^a æqualia : adeoque totum DEG duplum ipsius DEF hoc est ABC : quia nim. basis EG est dupla ipsius BC.

3. Ponatur EH dimidia baseos EF seu BC. adeoque $\frac{1}{4}$ EG. Erunt duo trian- gula DEH. DHF ^a æqualia : ergo DEH erit semissis ipsius DEH, hoc est ABC : & quarta pars ipsius DEG.

4. Ponatur EI $\propto \frac{1}{2}$ EH. seu $\frac{1}{4}$ EF. seu $\frac{1}{8}$ EG. similiter erit triangulum ^a DEI $\propto$ DIH. adeoque DEI erit $\propto \frac{1}{2}$

DEH. seu $\frac{1}{4}$ DEF hoc est ABC. seu $\frac{1}{8}$ DEG.

Et sic potro in infinitum.

Ergo absolute triangula se habent ut il-
* lorum bases.

Similiter etiam parallelogramma, cum dupla ^b sunt triangulorum.


b 39. I.

Theor. 2.

PROPOSITIO II.

1. Si in triangulo uni lateri CB parallela ducatur ED, hæc proportionaliter secabit latera AC AB. (hoc est ut sit $AE : EC = AD : DB$).

2. Et si recta ED secuerit latera AC. AB proportionaliter, erit illa reliquo lateri CB parallela.



DEMONSTRATIO.

1 Pars. Ducantur rectæ CD. BE. eruntque triangula X & Y in iisdem parallelis DE. CB & eadem basi ED, ergo inter se æqualia. Triang.

LIBER SEXTUS. 417

Tri. Z — Tri. X^b = bas: AE / bas: EC. ^{b1. VI.}
 seu Y

Atqui etiam

Tr: Z — Tr: Y^b = bas: AD / bas: DB.

Ergo c AE — EC = AD / DB. ^{c11. V.}

2 Pars. Est ex hypothesi.

AE — EC = AD / DB.

Atqui

AE — EC = Z / . X .
 Et AD — DB = Z / . Y . } ^{1. VI.}

Ergo hisce rationibus substitutis.

• Erit Z — X = Z / . Y .

Adcoque ^d triang. X ∞ Y & quia ^{d14. V.}
 sunt in eadem basi ED, erunt inter ^epa. ^{e39. I.}
 rallelas ED, CB.


Q. E. D.

Theor. 3.

PROPOSITIO III.

1. Si in triangulo ABC , recta AD angulum A bisariam secans, etiam secet basin BC , habebunt basis segmenta BD . DC eandem rationem, quam reliqua latera BA . AC .

2. Et si basis segmenta BD . DC eandem habeant rationem quam reliqua latera BA . AC , recta AD . basin secans, etiam angulum oppositum A secabit bisariam.



De-

DEMONSTRATIO.

Pars I. Ex B ducatur BE parallela ^{a 31. I.} DA, & producat CA, usque ad occursum perpendicularis in E: eruntque propter parallelas EB. DA.

Ang. O $\propto$ R. quia sunt alterni. }
Ang. P $\propto$ Q. externus interno } ^{29. I.}

Atqui O $\propto$ P ex hypothesi.

Ergo R $\propto$ Q. Et latus EA ^{b 6. I.} $\propto$ BA.

Quare ^c erit EA — AC = BD / DC. ^{c 2. VI.}
BA

Pars II.

Est BA — AC = BD / DC. ex h. ^{d 2. VI.}

Atqui ^d EA — AC = BD / DC.

Ergo II. V.

BA — AC = EA / AC. ^{e 14. V. f 5. I.}

Adeoqu^e BA $\propto$ AE & ang. R ^f $\propto$ Q.

Atqui ang. R $\propto$ C |

Ut & Q $\propto$ P | ^{29. I.}

Ergo O $\propto$ P.


Q. E. D.

PROPOSITIO IV.

Theor. 4.

a Def.
1. VI.

*Triangula sibi mutuo equi-
angula, sunt similia; hoc est
etiam latera circa equales an-
gulos habent proportionalia.*



DEMONSTRATIO.

b 28. I.

Bases CB, BE colloca in di-
rectum: quia jam angulus ACB
 $\propto$ DBE, ex hypothesi, erunt^b
CA & BD parallelæ, ut & AB
DE. quia ang. ABC etiam po-
nitur $\propto$ E.

Pro-

LIBER SEXTUS. 415

Producantur CA & ED in F,
eritque AFDB parallelogram-
mum, adeoque FA^c ∝ DB & ^{c34. I.}
FD ∝ AB.

Quia in triangulo FCE latus
AB est parallelum FE erit ^d d1. VI.

$$\frac{AC - AF}{DB} = CB / BE.$$

Et permutando. 16. V.

$$AC - CB = DB / BE.$$

Deinde

Quia in triangulo EFC latus
DB est parallelum FC.

$$\frac{\text{Erit } FD^d - DE}{AB} = CB / BE.$$


Et vicissim. 16. V.

$$AB - BC = DE / EB.$$

Theor. 5.

PROPOSITIO V.

Si duo triangula ABC. DEF, latera circa omnes angulos habeant proportionalia, erunt equiangulara, eosdem angulos A & D, B & E, F & C habebunt æquales, quibus homologa latera subtienduntur.



DEMONSTRATIO.

a 23. I. Ad punctum E fiat ^a angulus FEG $\propto$ B. ut & ad punctum F angulus EFG $\propto$ C. eritque tertius G æqualis tertio A.

Quare in triangulis similibus ABC. GEF.

AB

$$AB - BC = GE / EF.$$

Atqui etiam per propositionem.

$$AB - BC = DE / EF.$$

$$\text{Ergo}^b GE - EF = DE / EF.$$

b II. V.

$$\text{Adeoqu}^c GE \propto DE.$$

c 14. V.

Eodem modo ab altera parte
etiam probatur esse.

$$GF \propto DF.$$

Adeoqu triangula DEF. GEF
habent omnia latera æqualia, sin-
gula singulis. ergo per 8. I.

$$\text{Ang. } DEF \propto GEF \propto B.$$

$$\text{Ang. } DFE \propto GFE \propto C.$$


$$\text{Ang. } D \propto G \propto A.$$

Q. E. D.

Theor. 6.

PROPOSITIO VI.

Si duo triangula ABC. DEF, habeant unum angulum B, æqualem uni E, & latera circum proportionalia, (hoc est AB ad BC ut DE. ad EF) erunt triangula sibi mutuo equiangula.



De-

DEMONSTRATIO.

Ad puncta E, & F fiant anguli FEG.
 EFG æquales angulis B. (hoc est DEF)
 & C. critque tertius G æqualis tertio
 a A: Et triangula ABC. GEF similia, ^{a 32. I.}
 b, adeoque ^{b 4. VI.}

$$AB - BC = GE / EF.$$

Atque etiam per propositionem.
 $AB - BC = DE / EF.$

$$\text{Ergo } ^c GE - EF = DE / EF. \quad ^c 11. V.$$

$$\text{Adeoque } ^d GE \propto DE. \quad ^d 14. V.$$


Ergo duo triangula DEF. GEF se
 habent juxta quartam I. adeoque

$$\text{Ang. DEF} \propto \text{GEF} \propto B.$$

$$\text{Ang. DFE} \propto \text{GFE} \propto C.$$

$$\text{Ang. D} \propto G \propto A.$$

Q. E. D.



Datur hic angulus $A \propto D$. & latera
circa eos proportionalia : & tum.

Est vel angulus $B < E$.

Vel $B > E$.

Vel $B \propto E$.

Ponatur I. Angulus $B < E$.

Ducatur BG, ut fiat angulus $O \propto DEF$
eritque $P \propto R$.

Ergo $BA - AG = ED / DF$. 4. VI.

Atqui $BA - AC = ED / DF$ per pro.

Ergo $AG \propto AC$. per 11 & 14. V.
pars & totum.

Eodem modo ducta EH. demonstra-
tur angulum B non esse posse minorem
angulo E. Ergo $B \propto E$ & per 32. I.
 $C \propto F$. Q. E. D.

Pro-

PROPOSITIO VII.


Theor. 7.

Vix ullius est usus.

PROPOSITIO VIII.

Theor. 8.

*In triangulo rectangulo AEC,
perpendicularis AD ab angulo re-
cto in basin ducta, secat triangu-
lum in duo triangula ADB. ADC
quæ erunt & toti & inter se si-
milis.*



DEMONSTRATIO.

Pars I. In Triangulis BAC. ADB.

Ang. B est communis.

Ang. BAC $\propto$ ADB quia uterque rectus
Ergo C $\propto$ BAD.

Ggg 3

A.

a 4. VI. Adeoque $\triangle BAC$ $\triangle ADB$. similia.
 Deinde in triangulis BAC . ADC .
 Ang. C est communis,
 Ang. $BAC \propto ADC$ quia uterque rect.

b 32. I.

$\therefore$ Ergo $B \propto CAD$.
 Adeoque $\triangle BAC$. ADC similia.

II. Pars. Triangulum ADB est simile
 ipsi BAC .

Triangulum ADC est simile eidem
 BAC .

Ergo Triangula ADB . ADC inter se
 sunt similia per 21. VI. quæ hac non de-
 pendet.

COROLLARIUM I.

• Perpendicularis ab angulo recto in ba-
 sin ducta, est media proportionalis inter
 duo basis segmenta.

DEMONSTRATIO.

Duo triangula BDA . ADC , sunt æ-
 quiangula.

a 4. VI. Ergo $BD : DA = DA : DC$.

Adeoque DA est media proportiona-
 lis inter BD . DC .

CO-

COROLLARIUM. II.

Utrumlibet laterum angulum rectum
comprehendentium est medium propor-
tionale inter totam basin & illud segmen-
tum basis quod sumpto lateri adjacet.

DEMONSTRATIO.

In triangulis similibus ABC. ADC.

$$^a BC — CA = AC / CD.$$

Et in triangulis similibus ACB. ADB

$$^a CB — BA = AB / BD.$$


SCHOLIUM.

In deducendis triangulorum propor-
tionibus bene notandum est, ordine pro-
cedendum esse ab angulis æqualibus circa
æquales angulos ad æquales angulos.

Probl. I.

PROPOSITIO XL

*A data recta AB imperatam
partem abscindere.*



CONSTRUCTIO.

Sit. auferenda pars tertia.

1. Rectæ AB sub quolibet angulo adijunge rectam AF, inque illa sume circino tres partes æquales AD. DE. EF.

2. Ductæ FB ex D ducatur parallela DG.

Dico AG esse quæsitum
ter-

tertiam partem rectæ
AB.

DEMONSTRATIO.

In triangulo FAB lateri FB
parallela est DG.

ergo $FD - DA = BG / GA.$ a 2. VI

Et componendo 18. V.

$FA - DA = BA / GA$

Atqui FA est tripla ipsius
DA.


Ergo BA etiam est tripla
ipsius GA.

Adeoque AG est tertia
pars lineæ AB.

Probl. 2.

PROPOSITIO X.

*Datam rectam AB similiter
secare ac data alia recta AC secta
fuerit in D & E.*



CONSTRUCTIO.

1. Jungantur datæ lineæ ad A.
2. Ductâ CB ex punctis D & E ducantur duæ rectæ DF. EG parallelæ ipsi CB.

Dico factum esse quod quæritur.

DEMONSTRATIO.

30. I. In triangulo AEG lineæ EG. DF sunt parallelæ, ^a quia eidem lineæ CB ductæ sunt parallelæ.

Ergo

Ergo b $AF \text{ --- } FG = AD / DE.$

Deinde ex D ducta DH parallela AB ,
erit $DI \propto FG$ ^c & $IH \propto GB$. b 2. VI.

Eritque in triangulo DHC . c 4. I.


$DI. f. FG \text{ --- } IH. f. GB = DE / EC.$

Adeoque partes AF FG . GB , sunt
proportionales partibus AD . DE . EC .

Q. E. D.

SCHOLIUM.

Hinc facile patet ratio divi-
dendi lineam datam in quotcun-
que libet partes æquales: sumendo
scilicet in linea datæ adjuncta,
tot partes æquales in quot linea
data dividenda sit: & extre-
mitates lineæ utriusque recta con-
jungendo; si tum a divisionibus
intermediis ducantur rectæ pa-
rallelæ lineæ jam ductæ; illæ
quæsitam faciënt divisionem. Ex.
Gr. sit linea AB dividenda in sex
partes æquales.



1. Ipsi AB junge sub quolibet angulo rectam AC.

2. In linea AC sume ses partes æquales AI. IK. KL. LM. MN. NC.

3. Duc rectam CB, illicque parallelas NA. MG. LF. KE. ID.

Dico lineam AB sectam esse in sex partes æquales AD. DE. EF. FG. GH. HB.

DEMONSTRATIO.

Per propositionem 10. linea AB secta est similiter ac AC.

Atqui linea AC secta est in sex partes æquales.


Ergo etiam AB in sex æquales partes secta erit.

SCHOLIUM II.

Haud inconcinne linea data CD poterit dividi in ratione datarum linearum A. B.

Con.

CONSTRUCTIO.



1. Ex C sub quolibet angulo ducatur
recta CE $\propto$ datæ A.

2. Et ex D recta DF, parallela ipsi
CE, & $\propto$ datæ B.

3. Jungatur EF.

Dico rectam CE in K sectam esse in ra-
tione A ad B.

DEMONSTRATIO.

In tri. CKE. DKF

Ang. C $\propto$ D

E $\propto$ F 29. l.


K $\propto$ K

Ergo erit per 4. VI.

CE. f. A — CK = DF f. C / DK.

& permutando

A — C = CK / KD.



*Datis
duabus re-
ctis AB, BC
tertiam pro-
portionalem
invenire.*

CONSRUCTIO.

1. Datas rectas conjunge in angulo recto ABC.

2. Ad ductæ rectæ AC punctum C excita perpendicularem CD.

3. Lineam AB produc usque ad occursum istius perpendicularis in D.

Dico BD esse quæsitam proportionalem.

DEMONSTRATIO.


21 Cor: 8. VI. Triangulum ACB est rectangulum per construct. & CB perpendicularis ex angulo recto ad basin ducta: quæ a est media proportionalis inter AB & BD. Adcoque BD erit tertia quæsitæ.

Q. F. E.

SCHOLIUM.

Si AB sit major quam BC haud inconcinna erit talis

CONSTRUCTIO.



1. Super AB describe Semicirculum ACB.

2. In illo accommodetur secunda data BC.

3. Ex C demitte perpendicularem CD.

Dico DB esse tertiam proportionalem quaesitam.

DEMONSTRATIO.

Ducta AC erit ACB triangulum rectangulum (31. III.)

Ergo erit $AB : BC = BC : BD$.


per 2 Cor. 8. VI.

Adeoque BD est tertia quaesita.

PRO-

PROPOSITIO XII.

Probl. 4.



*Datis tribus
rectis AB. BC.
AD quartam
proportionalem
DE invenire.*

CONSTRUCTIO.

1. Datarum duas quaslibet cunque AB. BC colloca in directum.
2. Tertiam AD conjunge ad punctum A, & duc rectam DB.
3. Ex C duc CE parallelam BD, quæ productæ AD occurrat in E.

Dico DE esse quæsitam quartam proportionalem.

DEMONSTRATIO.

In triangulo ACE lateri CE ducta est parallela BD.


Ergo $\frac{AB}{BC} = \frac{AD}{DE}$.
Adeoquæ erit DE quarta proportionalis.

a 2. VI.

Q. E. F.

Alia

Alia Constructio.



Datæ sint tres lineæ A. B. CD, quæ est vel $<$ vel $>$ A.

1. Lineæ EF $\propto$ A junge FH $\propto$ B sub quolibet angulo, ducaturque EH.

2. In lineæ FE sume FG $\propto$ tertiæ CD. & ex puncto G ducatur GK parallela ipsi EH.

Dico lineam FK esse quartam quæsitam scilicet FK supra H, si tertia CD sit major prima A: At vero FK infra H si sit $CD > A$.

DEMONSTRATIO.

Facile ex constructione patet triangula EFH. GFK esse similia: quare erit per 4. VI,

$$EF : FH = GF : FK.$$

Hoc est

$$A : B = CD : \text{ad quartam FK.}$$

Q. D. E.


iii

Pro-

Probl. 5.

PROPOSITIO XIII.

*Datis duabus rectis AB. BC
mediam proportionalem BD in-
venire.*



CONSTRUCTIO.

1. Datas lineas AB. BC collo-
ca in directum.
2. Super tota AC describe Se-
micirculum.
3. Ex B excita perpendicula-
rem BD usque ad Semicirculum.

Dico illam esse mediam quæ-
sitam.

De-

DEMONSTRATIO.

Ductis AD. DC. erit ADC
 triangulum rectangulum quia
 a angulus ADC est rectus. Et ^{a 31. III;}
 linea DB est perpendicularis
 ex angulo recto ad basin du-
 cta, quæ b est media proportio-
 nalis inter AB. BC.

b 1^a Co-
 roll. 8.
 VI.

Q. F. E.

SCHOLIUM.


Quævis recta a circumferentia
 ad diametrum perpendiculariter
 ducta, est media proportionalis
 inter segmenta diametri.

PROPOSITIO XIV.

Theor. 9.

1. *Parallelogramma equalia X. Z. quæ unum angulum O uni P æqualem habent; etiam latera circa æquales angulos habent reciproce proportionalia. (hoc est AB ad BG ut EB ad BC.*

2. *Et si latera habent reciproca, parallelogramma sunt æqualia.*



De.

DEMONSTRATIO.

1 Pars. Par. $\cdot X \text{ — } Par. Y \text{ — } Z / Par. Y. \cdot 7. v.$

Atqui $X \text{ — } Y \text{ — } AB / BG. \}$ I. VI.
 Et $Z \text{ — } Y \text{ — } EB / BC. \}$

Ergo substitutis istis rationibus.

$AB \text{ — } BG \text{ — } EB / BC.$

2 Pars. $AB \text{ — } BG \text{ — } EB / BC.$

Atqui $AB \text{ — } BG \text{ — } X / Y. \}$ I. VI.
 Et $EB \text{ — } BC \text{ — } Z / Y. \}$

Ergo istis rationibus substitutis.

$X \text{ — } Y \text{ — } Z / Y.$

Adeoq; Par: $X \propto$ Par: $Z.$

b 14. v.

PROPOSITIO XV.

Theor.
10.

Vide
fig. præ-
ceden-
tem.

1. *Æqualia triangula X. Z, quæ unum angulum O uni angulo P æqualem habent; etiam latera circa æquales angulos habebunt reciproce proportionalia. (hoc est AB ad BG, ut EB ad BC.*

2. *Et si latera sic habent reciproca, triangula sunt æqualia.*

DEMONSTRATIO.

a 34. l.


Ductis rectis AC. CG. GE. hæc est omnino eadem cum præcedente; quoniam^a triangula sunt semisses parallelogrammorum, & triangula cum parallelogrammis eadem habent latera quæ demonstrationem ingrediuntur.

PROPOSITIO XVI.

Theor.
II.

1. Si quatuor rectæ A. G. F. B proportionales fuerint, rectangulum sub extremis A & B, erit æquale rectangulo sub mediis.

2. Et si rectangulum sub extremis sit æquale rectangulo sub mediis, illæ quatuor rectæ proportionales erunt.



DEMONSTRATIO.

1 Pars Fiat $\square AC$ sub extremis & FG sub mediis : illa habent angulum $A \propto F$, & latera reciproca, nimir: $AB \text{ --- } HF = \text{reciproce } FE / BC$. Ergo illa $\square$ la sunt æqualia.

a 14. VI.


2 Pars, $\square$ la $AC. FG$ habent angulum $A \propto F$. & sunt æqualia: ^b Ergo ^b 14. VI. habent latera reciproce proportionalia.

PROPOSITIO XVII.

Theor.
12.

1. Si tres lineæ A . F . B . proportionales fuerint, rectangulum sub extremis A & B erit æquale quadrato mediæ F .

2. Et si rectangulum sub extremis sit æquale quadrato mediæ, tres illæ rectæ proportionales erunt.




DEMONSTRATIO.

1 Pars. Fiat sub extremis $\square AC$, & a mediæ $\square GE$. Quæ quia habent angulum $A \simeq G$ & latera reciproca scilicet $AB = GF = FE$. hoc est GF / BC . erunt inter se æqualia.

2 Pars. $\square$ la AC . GE sunt æqualia & habent angulum $A \simeq G$. Ergo^a habent latera reciproca.

Pro.

LIBER SEXTUS. 441
SCHOLIUM.



Ex hac
proposit:
& præce-
dente 8
facillime
demon-
stratur.
Pr. 47. I.
hoc mo-
do,

PRÆPARATIO.

Super BC constituatur $\square$ BE; & ex
A ducatur AL parallela BD vel CE.

DEMONSTRATIO.

Lineæ BC. AC. CK sunt proportio-
nales, per 8. VI.

Ergo $\square$ BC. CK $\propto$ $\square$ AC.

$\square$ EK.

Deinde Lineæ BC. AB. BK. sunt proportionales.

Ergo $\square$ BC BK $\propto$ $\square$ AB $\left. \begin{array}{l} \square LB \\ \square EK \end{array} \right\} 17. VI. A.$

Supra $\square$ EK $\propto$ $\square$ AC
 $\square$ la EK $\square$ LB $\propto$ $\square$ AB $\square$ AC.

$\square$ EB


Kkk

Pro.

PROPOSITIO XVIII.

Probl. 6.

Super data recta AB describere polygonum ABHIK, quod dato polygono CDEFG sit simile similiterque positum.



CONSTRUCTIO.

1. Datum Polygonum rectis FC. FD. divide in triacula.

a 32. I.

2. Super AB factis angulis a BAI.

b 32. I.

c 4. VI.

ABI æqualibus angulis DCF. CDF. erit b tertius æqualis tertio. adeoque c triangulum IAB simile triangulo FCD.

3. Eodem modo super lateribus IA: IB, fiant triacula IKA. IHA. æqualangula, adeoque & similia triangulis FGC. FED.

Dico ABHIK esse polygonum quæsitum.

DEMONSTRATIO.

Pro angulis.

Facile patet per constructionem angulos

los unius polygoni esse æquales angulis alterius, nim.

K ∞ G.

Tres ad I ∞ ad F tribus.

H ∞ E

Duo ad B ∞ ad D duobus.

Duo ad A ∞ ad C duobus.

Ergo omnes anguli sunt æquales, adeoque duo polygoni sunt æquiangula, & similiter polita.

Pro lateribus.

In triangulis similibus IKA. FGC: ut & IAB. FCD.

Erit $KA - AI = GC / CF$
Et $BA - AI = DC / CF$ 4. VI.

Erit per 11. & 16. V.

$KA - AB = GC / CD$.

Deinde in triangulis similibus IAB. FCD: ut & IHB. FED.

Erit $AB - BI = CD / DF$
Et $HB - BI = ED / DF$ 4. VI.

Ergo per 11 & 16. V:

$AB - BH = CD / DE$.

Et eodem modo demonstratur latera circa reliquos angulos esse proportionalia: Ergo polygoni sunt similia.


Q. E. D.

Kkk 2 Pro-

Theor. 13

PROPOSITIO XIX.

*Similia triacula ABC. DEF
inter se sunt in duplicata ratione
laterum homologorum BC. EF.*



DEMONSTRATIO.

Sit $BC < EF$.

Ipsis BC. EF, fiat a tertia propor-
a II. VI. tionalis BG. eritque

b IO.

Def. V.

c I VI.

d II. V.

BC — BG b in duplic. rat. BC / EF.

Atqui BC — BG c = tr: ABC / tr: ABG

Ergo Triang: ABC d — Triang: ABG
in dupl: rat: BC / EF.

Atqui triang. ABG ∞ triang. DEF.
ut mox patebit.

Ergo

Ergo triang. ABC — triang. DEF,
in dupl: rat: BC / CF.

Quod autem sit triangulum ABG ∞
DEF, hoc modo videre licet.

In triangulis similibus ABC. DEF.

AB — BC = DE / EF. 4. VI.

Et permutando.

AB — DE = BC / EF. 16. V.

Atqui per constructionem.

BC — EF = EF / BG.

Ergo AB — DE = EF / BG. 11. V.

Adeoque triangula ABG. DEF habent
angulum B ∞ E, & latera circa il-
lum reciproce proportionalia: Ergo
sunt æqualia. e 15. VI.

Sit deinde BC ∞ EF.

In triangulis similibus ABC. DEF.

AB — BC = DE. EF.

Atqui BC ∞ EF per propositionem.

Ergo ^fAB ∞ DE.

f 14. V.

Adeoque triangula ABC. DEF inter
se sunt æqualia.


Atqui □ta BC & EF etiam sunt æqualia.

Ergo triang. ABC — triang. DEF
= □ BC / □ EF.

Atqui ratio $\square$ torum BC. EF. est eadem cum ratione duplicata ipsorum laterum BC. EF, ut supra dictum est ad 10. Def. V.

Ergo triang. ABC — triang. DEF
in dupl: rat: BC / EF.

COROLLARIUM.



Si tres lineæ A. B. C. fuerint proportionales, erit triangulum X supra primam ut triangulum Y priori simile supra secundam, ut prima linea A ad tertiam C.

DEMONSTRATIO.

Tres lineæ A. B. C. sunt proportionales.

^a 10.
Def. V.
^b 19. VI.

Ergo A — C^a in duplicata ratione A / B.
Atqui X — Y^b etiam in dupl: rat: A / B.

^c 11. V.

Ergo X — Y^c = A / C.

Q. D. E.
PRO-


PROPOSITIO XX.

Theor.

14.

1. *Polygona similia ABHIK. CDEFG dividuntur in triangula, quæ sunt numero equalia. similia & totis homologa.*

2. *Polygona inter se sunt in ratione duplicata laterum homologorum AB.C'D.*



DEMONSTRATIO.

I Pars: Ductis rectis IA. BA. ut & FC. FD. polygona erunt divisa in triangula.

Quod autem illa triangula sint numero æqualia, patet ex Scholio prop. 32. I. quia nim. polygona æque multa habent latera.

Quod sint similia sic probatur.

In

In triangulis IKA. FGC.

Ang. K $\propto$ G. & latera circa illos proportionalia.

a 6. VI.

b 4. VI.

Ergo triangulum IKA. est æquiangulum & simile FGC.

Eodem modo in triangulis IHB FED.

Ang. H $\propto$ E, & latera circa illos proportionalia.

Ergo triangulum IHB est æquiangulum & simile FED.

Deinde ang. KAB $\propto$ GCD. /
KAI $\propto$ GCF. /S

IAB $\propto$ FCD.

Simili modo IBA $\propto$ FDC.

Ergo tertius AIB $\propto$ CFD.

Ergo triangulum IAB est æquiangulum & simile FCD.

Quod sint totis homologa, hoc est quod ita sit quodlibet triangulum in uno polygono ad suum correspondens in altero. Ut totum polygonum ad totum polygonum, patebit ex parte secunda.

2 Pars. Triangula IAB, FCD probata sunt similia.

c 4. VI.

Ergo $\frac{IA}{IB} = \frac{FC}{FD} = \frac{AB}{CD}$.

Ut & $\frac{IB}{IA} = \frac{FD}{FC} = \frac{CD}{AB}$.

Tum.

Tum.

Triangula $\triangle IKA$. $\triangle FGC$. sunt in duplica- d 19. VI.
ta ratione laterum IA . FC .

hoc est AB . CD .

Et triangula $\triangle IAB$. $\triangle FED$ d in duplica-
ta ratione laterum IB . FD .

hoc est AB . CD .

Ut & triangula $\triangle IAB$. $\triangle FCD$ in dupli-
cate ratione laterum AB . CD .

Ergo e omnia triangula unius polygoni e 12. VI.
ad omnia triangula alterius polygoni sunt
in duplicata ratione laterum homologo-
rum AB . CD .

Atqui omnia triangula istorum poly-
gonorum constituunt tota Polygona.

Ergo ipsa polygona sunt in duplicata
ratione laterum homologorum. AB . CD .

Cum autem etiam singula triangula
unius polygoni ad singula triangula alte-
rius polygoni habent rationem duplicatam
eorundem laterum AB . CD ; patet ista
triangula totis polygonis esse homologa.

Q. E. D.

COROLLARIUM.


Si fuerint tres rectæ proportionales;
polygonum super prima descriptum se ha-
bebit ad simile polygonum super secunda;

vel polygonum super secunda se habebit
ad polygonum super tertia, ut prima
proportionalis ad tertiam.

DEMONSTRATIO.

Hæc est fere eadem cum demonstra-
tione corollarii præp: præcedentis.

SCHOLIUM.



LIBER SEXTUS. 451

Commode hic demonstratur
haud inelegans Theorema.

Similium polygonorum X &
Z, circuitus ABCDE:FGHIK,
cum lateribus homologis A & F,
sunt in eadem ratione.

DEMONSTRATIO.

$$\begin{array}{lcl}
 A - F = A / F. & & \\
 B - G = A / F. & & \\
 C - H = B / G. & & \\
 \quad \text{hoc est } A / F. & & \\
 D - I = C / H. & \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array} \right\} & \text{Def. 1. VI.} \\
 \quad \text{hoc est } A / F. & & \\
 E - K = D / I. & & \\
 \quad \text{hoc est } A / F. & &
 \end{array}$$

Ergo per 12. V, additis omni-
bus terminis primis, ut & omni-
bus secundis


$$\frac{A + B + C + D + E}{\text{hoc est circuitus } X} \sim \frac{F + G + H + I + K}{\text{ad circuitum } Z} = A / F.$$

Q. E. D.

Theol. 15

PROPOSITIO XXI.

Figuræ ABC. GHI, quæ eadem figuræ DEF sunt similes, illæ & inter se similes erunt.



DEMONSTRATIO.

Angulus A $\propto$ D $\propto$ G.

B $\propto$ E $\propto$ H.

C $\propto$ F $\propto$ I.

Ergo figuræ ABC. GHI. sunt æquiangulæ; & habent latera circa æquales proportionalia, quia illa habent proportionalia lateribus figuræ DEF. Ergo ^a sunt similes.


^a Def.
VL

Pro-

PROPOSITIO XXII. Theor. 16

1. Si quatuor recta AB, CD, EF, GH, proportionales fuerint, figura similes ABI, CDK & LF, NH proportionales erunt.

2. Et si a rectis linea figura similes descripta sint; ista recta proportionales erunt.



DEMONSTRATIO.

P A R S I.

Datæ sunt AB — CD = EF l GH.

Tr. ABI (a) — Tr. CDK in duplic. rat. AB / CD. a 19. VL

Atqui □ LF b — □ NH etiam in d. r. EF / GH. b 20. VL

Ergo.

Tr. ABI (c) — Tr. CDK — □ LF, □ NH. c 11. V.

P A R S II.

AB — CD in subdup. rat. Tr. ABI, Tr. CDK.

hoc est □ LF / □ NH.


Atqui EF — GH etiam in subd. r. □ LF / □ NH

Ergo.

AB — CD = EF, GH.

L II 3

Pro.



DEMONSTRATIO.

Fiat $AB \text{ --- } BG = H$ quolibet / I.

Et $CB \text{ --- } BE = I$ / K.

Erit ratio H ad K composita ex rationi-
bus AB ad BG & CB ad BE. vide dicta
ad 5 Def. VI.

Demonstrandum ergo est esse paralle-
logr. $AC \text{ --- } BF = H / K$.

Quod sic probō.

$$\begin{array}{lcl} AC \text{ --- } BH & = (a) & AB / BG. \\ H \text{ --- } I & = (b) & AB / BG. \\ \hline \text{Ergo } AC \text{ --- } BH & = (c) & H / I. \end{array} \quad \begin{array}{lcl} BH \text{ --- } BF & = (a) & CB / BE. \\ I \text{ --- } K & = (b) & CB / BF. \\ \hline BH \text{ --- } BF & = & I / K. \end{array}$$

Ergo per 11. V.

$$AC \text{ --- } H = BF / K.$$


Et permutando 16. V.

$$AC \text{ --- } BF = H / K.$$

Q. E. D.
PRO-

a 9. VI.
b per
constr:
c 11. V.

SCHOLIUM.



Majori cum
facilitate &
cum apparatu
minori ea-
dem propo-
sitione demon-
strabitur in
numeris, si
parallelo-
gramma AC.
BF ponantur
rectangula.

Sit $\square$ li AC latus AB $\propto$ 5.

BC $\propto$ 3.

$\therefore$ Erit Area $\propto$ 15.

Deinde $\square$ li BF latus BG $\propto$ 2.

Latus BE $\propto$ 4.

$\therefore$ Erit Area $\propto$ 8.

Ergo $\square$ AC — $\square$ BF = area 15 / ar. 16

Atqui ratio composita ex rationibus 5

ad 2 & 3 ad 4. etiam dat $\frac{15}{8}$ seu ratio-
nem 15 ad 8.

ϵ 1 Def.
II.

ϵ 5. Def.
VI.

Ergo ratio $\square$ AC — $\square$ BF est com-
posita ex dictis rationibus 5 ad 2 & 3 ad 4.


Q. E. D.

Pro

PROPOSITIO XXIV.

Theor. 18

*In omni parallelogrammo AI,
parallelogramma FK. HE, quæ
circa diametrum sunt, & toti AC
& inter se sunt similia.*



DEMONSTRATIO.

In triangulis DAB & X.

Angulus O est communis.

$S \propto T.$

Ergo $Y \propto C.$

Adeoque triangula DAB & X sunt
æquiangulara & similia.

Eodem

a 29. I.

b 32. I.

Eodem modo probatur trian-
gula DIB & Z esse similia.

$$\begin{array}{l} \text{Ergo } AD \text{ --- } DB \text{ --- } HD / DG. \\ \text{Et } DB \text{ --- } DI \text{ --- } DG / DE. \end{array} \} 4. VI.$$

Eritque ex æquo 22. V.

$$AD \text{ --- } DI \text{ --- } HD / DE.$$

Similiter etiam probatur reli-
qua latera esse proportionalia :
Ergo Parallelogramma AI. HE,
sunt similia.


Eodem modo etiam demon-
stratur AI. & FK esse similia.

Ergo HE & FK ^c sunt inter se c. 21. VI.
similia.

Q. E. D.

Probl. 7. PROPOSITIO XXV.

Constituererectilineum L, quod sit simile similiterque positum dato rectilineo A, & æquale alteri dato B.



CONSTRUCTIO.

1. Ad dati rectilinei A latus
a 45. I. CD, fiat $\square CE \propto^a$ ipsi A.
- b 44. I. 2. Super DE fiat $\square DK \propto B$.
3. Inter CD & DG quærat
c 13. VI. media proportionalis DH.
4. Super DH seu ipsi æquali
IN, describatur rectilineum L
fi.

^d simile ipsi A.

d18. IV.

Dico L esse rectilíneum quæ-
situm.

DEMONSTRATIO.

Per constructionem sunt pro-
portionales CD. IN. DG.

Ergo^e CD — DG = A / L.

Atqui^f CD — DG = □ CE / □ DK.

^e Cor.
19. VI.
^f 1. VI.

Ergo^g A — L = □ CE / □ DK.

^g 11. V.


Atqui A ∝ □ CE.

Ergo L ∝ □ DK ∝ B.

Cum autem L per constructio-
nem sit simile A, patet L esse re-
ctíneum quæsitum.

PROPOSITIO XXVI.

Theor. 19



DEMONSTRATIO.

Si adversarius neget diametrum BD transire per I, transeat per aliud punctum H: tum ducta HE parallela BA.

Erit $BA^a - AD = BG / GH$.

Atqui $BA^b - AD = BG / GI$.

a 24. VI
b per
propof.

Ergo $c GH \propto GI$. Pars & totum, quod est absurdum.

c 7. Vel
11. V.

Ergo diametrum non transit per H. Eadem autem demonstratio locum habet in omnibus punctis lineæ GI, quandiu sc: inter H & I manet aliquod intervallum: Ergo universim concludendum est diametrum transire per punctum angulare I, adeoque duo parallelogramma AC. GF, circa eandem diametrum consistere.

Q. E. D.


Pro-

PROPOSITIO XXVII. XXVIII. XXIX.

Hæ prolixæ, tyronibus difficiles, & nullius fere usus sunt.

PROPOSITIO XXX.

Prob. 10.



*Proposi-
tam re-
ctam AB
extrema
ac media
ratione se-*

care in G.

CONSTRUCTIO.

a 1 L. II.

Divide ^a AB in G, ut $\square$ sub tota AB & minori segmento BG sit $\propto$ $\square$ majoris segmenti AG.

Dico factum esse quod queritur.

DEMONSTRATIO.

$\square$ AB. BG $\propto$ $\square$ AG. AG.

Ergo 17. VI.

Latera sunt reciproce proportionalia. h.e.

AB — AG = AG / BG.

Adeoque ^b linea A in media & extrema ratione secta est.

b 3 DeL VI.


M m m 3

Pro-

Theor. 20

PROPOSITIO XXXI.

Si a lateribus trianguli rectanguli BAC, figuræ similes quæcunque describantur, erit illa quæ angulo recto A opponitur æqualis duabus reliquis simul sumptis.



DEMONSTRATIO.

Figuræ super AB. AC. BC. ponuntur
 420. VI. similes; ergo a habent inter se rationem
 duplicatam laterum homologorum AB.
 AC. BC, hoc est inter se sunt ut $\square$ ta
 AB. AC. BD.

847. I.

Atqui $\square$ ta ita sunt inter se ut fit
 $\square$ BC $\propto$ $\square$ tis AB: AC.

Ergo figura super BC $\propto$ figuris super
 AB. AC. Scho.

SCHOLIUM I.

Quod in prop. 47. I. demonstratum est de solis quadratis hic universim applicatur quibuslibet polygonis similibus.

SCHOLIUM II.

Potest hæc propositio generaliter, ut etiam involvat prop. 47. I. hoc modo demonstrari.

Sunt proportionales per 2 Cor. 8. VI.
BC. AC. CK Ut & BC. BA. BK.

Ergo per Coroll. 20. VI.

Fig. ab BC — Fig. ab AC = BC / CK.

Fig. ab BC — Fig. ab BA = BC / BK.

Et invertendo.

CK — BC = Fig. ab AC / fig. ab BC.

BK — BC = Fig. ab BA / fig. ab BC.

Erit per 2. V.

BK — KC — BC = Fig. ab AB —

Fig. ab AC. / Fig. ab BC.

Atqui BK — KC ∞ BC.

Ergo Fig. ab AB & AC ∞ Fig. ab BC.

Quare si istæ figuræ sunt quadrata, erit prop. 47. I.


Si vero aliæ figuræ similes erit 31. VI.

PRO-

Theor. 21

PROPOSITIO XXXII.

*Si duo triacula ABC. DCE
ad angulum C conjuncta, duo la-
tera AB. AC habeant parallela
lateribus DC. DE. & latera circa
angulos A. D. proportionalia; tum
reliqua illorum latera BC. CE,
unam facient lineam rectam.*



DEMONSTRATIO.

- a 29. I. Angulus A $\propto$ ACD, propter
parallelas AB. DC.
Angulus D $\propto$ ACD, propter
parallelas AC. DE.

Ergo ang. A $\propto$ D.

Cum autem latera circa angu-
los A & D sint proportionalia,
erit

^crit triang. ^bABC æquiangulum ^{b6. vl.}
triang. DCE.

Adeoque ang. ABC $\propto$ DCE)
Ang. A $\propto$ ACD.) A.

Ang. A & ABC $\propto$ toti ACE.)
ACB ACB) A.

Tres ang. A. ABC. ACB $\propto$
duobus ACB. ACE.

^eAtqui tres A. ABC. ACB $\propto$ ^{c32. l.}
2 Rectis.

Ergo etiam duo ACB. ACE
 $\propto$ 2 Rectis.


Adeoque BC. CE sibi invicem
^ajacebunt in directum. ^{d 14. l.}

Theor. 22

PROPOSITIO XXXIII.

1. *In aequalibus circulis anguli siue ad peripheriam A & E, siue ad centra D & H, sunt in eadem ratione cum arcubus quibus insistent BC. FG.*

2. *Et Sectores BDC. FGH, eandem cum arcubus habent rationem.*



DEMONSTRATIO.

PARS I.

Si anguli D & H ad centra sint æquales; erunt arcus BC, & FG etiam (26. III.) inter se æquales.

Fiat

Fiat jam angulus $GHK \propto FHG$
adeoque FHK duplus FHG hoc
est BDC .

Tum arcus GK erit $\propto FG$ (per
eandem 26. 111) & totus FGK
duplus ipsius FG hoc BC .

Eodem modo si fiat arcus KHL
 $\propto GHK$ f. $FHG. \propto BDC$ adeo-
que FHL triplus BDC , etiam
probabitur arcum $FGKL$ esse tri-
plum arcus BC .

Ergo hinc universim concludi-
mus si anguli D & H sint æquales,
esse arcus $BC. FG$ æquales: Si
anguli D & H sint inæquales,
etiam arcus esse inæquales, & hoc
juxta quam libet multiplicatio-
nem. ut nim. si H sit duplus D
etiam arcus FK sit duplus BC : si
angulus H sit triplus D . & arcum
 $FGKL$ & ipsius BC sit triplus: &
sic in infinitum: id quod idem est
ac angulos cum arcubus esse in ea-
dem ratione.

Et quia anguli $A. E.$ sunt semif-

ses angulorum *D. H.* etiam illi cum arcubus eandem habebunt rationem.

P A R S 2.

Hæc ex prima parte facile deducitur. Sectorum DBC. HFG: anguli G & H sunt æquales: ergo arcus BC. FG: & latera DB. DC. æqualia HF. HG: ergo si superponantur congruent: Ergo Sectors DBC, HFG erunt æquales.

Similiter si angulus GHK sit ∞ FHG: sectores congruent, adeoque Sector GHK ∞ sectori FHG hoc BDC: Ergo sector FHK duplus erit sectoris FHG s. BDC.

Eodem modo si sit angulus FHL triplus D, erit arius FGKL triplus BC: adeoque Sector FHLKG triplus sectoris BDC: & sic in infinitum. Q. E. D.

F I N I S.