

Notes du mont Royal

www.notesdumontroyal.com

Cette œuvre est hébergée sur « *Notes du mont Royal* » dans le cadre d'un exposé gratuit sur la littérature.

SOURCE DES IMAGES
Google Livres

EVCLIDIS

ELEMENTORVM

GEOMETRICORVM,

LIBRI SEX PRIORES.

Noua interpretatione in vsum studiosæ
iuuentutis in lucem dati

A IOANNE LANZ SOCIETATIS IESV.

Et nunc recens impressi.

NOBILISSIMIS

ACADEMIAE

PORTV ARDENTIBVS

DICATI.



Bononiæ, apud Hæredes Ioannis Rossij, & C. 1639.
Superiorum permisso.





NOBILISSIMIS
ACADEMIÆ

A P O R T V
A R D E N T I B V S.



Persij Rossij Hæredes ε' υπ'α'πειν.



Vsillvs hic partus, Spei
optime Adolescentes pau-
cis ab hinc annis è magni
Euclidis visceribus nescio
quo bono Machaone ex-
tractus; ac leuidensa, veste scilicet crasso,
& soloci filo, nisi mauultis centone con-
tectus; & quasi κεφαλος misellus errans
Persio Rossio Impressori fortè, vt fit, in
† 2 itinere

itinere occurrit ; adeoq; illum sua in huiusmodi etatula Parentum orbitate commouit, vt præter indolem, quam vultu, & acutis responfionibus optimam præseferbat, domum extemplò manu arreptum deduxerit. Vbi trito, & squallido illo amictu reiecto nouum Typis indumentum, quanta potuit diligentia, circumueftiuit, & modo quodam interpolauit. Sed (heu breuem vitæ noſtræ ſummam) Perſius hic inuida nobis morte ereptus non potuit cogitata perficere; & ille apud nos eius Hæredes eſſe vltèrius non ferens ſupplex, & lacrymabundus petijt, vt ſe dimitteremus, & ad vos dimitteremus, ne priorem denuò fortunam dimiſſus experiretur, quòd nempè vos vni ingruente nunc hyeme ipſum ardenti veſtro à frigore ardore defendetis; ſub acri xij. Virum, imò Patrum amantiffimorum cura, & cuſtodia educamini; Præter cæteras Artes, quæ iſtic vobis traduntur, vna eſt Lingua græca, quâ græci Patris ſui, & Græciæ Patriæ ſæpius recordabitur, eſtis,
& vos

& vos paruuli, & pares cum paribus facil-
limè congregantur, & apud vos demum
Mathematicus profitetur, qui bono ip-
sum naso nequis malo audax suspendat,
potèter vetabit, illud creberrimè succines

Inueni Portum, spes, & fortuna valete,

Nil mihi vobiscum, ludite nunc alio.

Quibus auditis, & vehementer probatis
conscij in primis Persianæ voluntatis, ec-
ce ad vos iam illum dimittimus, arden-
terq; obsecramus, vt quà ipse, & nos ani-
mi lætitia id facimus, ea vos illum exci-
piatis; nos Clientes vestros protegatis; &
pijs Persij manibus benè vsque precemi-
ni. Illum igitur Ardentes humanissimi
arridentes suscipite pro certissimo haben-
tes, si ipsum inter familiares vestros ad-
sciueritis, nec nos obsequij, nec vos facti
vnquam in posterum poenituros. Valete,
florete, proficite. Bonon. ex Laribus no-
stris Id. Nouemb. M. DC. XXIX.



INTERPRES CANDIDO LECTORI.



Vas Matheseos alias esse, recte scripsit Plato, Geometriam, & Arithmetice. hac posteriore cum vscunque instructa iam studiosa inuentus videretur, supererat, ut eadem & priore instrueretur. Itaq; cum de habenda aliqua Geometricorum Elementorum Epitome cogitationem suscepissem, nihilq; melius ipso summo Geometra Euclide in mentem venisset; capi sollicitus, & mecum ipse, & cum alijs quoque communicato consilio deliberare, quemnam potissimum ex tanta interpretum turba, quam-

quamque adeo in uniuersum rationem Euclidis publicandi deligerem. Mens una fuit omnium, iuuentutem nimia libri mole non esse gravandam. Recidenda ergo necessario fuerunt primùm scholia, & commentationes aliena, quibus plerique dum ingenio suo indulgent maximè, minimè nobis Euclidem ipsum repræsentarunt. Tum deinde quoniam vix aliqua apparebat tam religiosa interpretatio, qua non ab Autore, si sua lingua loquentem audias, licentiùs subinde recederet; optimum factum videbatur si in Latinum sermonem de integro conuerteretur. Ad eam ego provinciam postquam aggressus fui, illud antiquissima cura habui, ut quamlibet simplici dictione, genuinam demonstrationem sententiæ ex Græco prorsus exprimerem, sed pro instituta breuitate verbis sic appensis, ut longiorem alicubi circumductionem paullo breuiori gyro colligerem. Posteriores tamen libri quinti propositiones, quoniam in Euclide desiderantur, frandi non erit earum loco Pappi Alexandrini ex Commentarijs Federici Commandini

dini substituisse. Quin ad difficilioreſ etiam
definitiones breuiculas notas eo conſilio ap-
poſui, ne in ipſo ſtatim limine aut harere
Leitor, aut aliunde ſubſidium petere coge-
retur. Deniq; nonam, & decimam propoſi-
tionem libri decimi tertij idcirco adieci, ut ſi
quis Triangulorum Canonem, hoc eſt, Ta-
bularum Sinuum, Tangentium, & Secantium,
aut condere, aut conditas à Typographorum
non infrequentibus mendis vindicare cupe-
ret, id libelli huius auxilio poſſet. Vale Le-
itor, & his laboribus noſtris ad Dei gloriam
uſere. Bon. 9. Nouemb. Anno Chriſti. 1629.

LIBER PRIMVS

ELEMENTORVM

EVCLIDIS

*Libri Sex priores ex Græco fonte
translati.*

EVCLIDIS ELEMENTVM PRIMVM.

Definitiones.

- 1 Punctum est cuius pars nulla.
 - 2 Linea, longitudo latitudinis expers.
 - 3 Lineæ termini sunt puncta.
 - 4 Recta linea est, quæ ex æquali
suis interijcitur punctis:
 - 5 Superficies est, quæ longitu-
dinem, & latitudinem tantum habet.
 - 6 Superficies termini sunt lineæ.
 - 7 Plana superficies est, quæ ex æ-
quali inter suas lineas iacet.
 - 8 Planus angulus est, duarum li-
nearum in plano se mutuo tãgen-
tium, & nõ in directum iacetium
alterius ad alteram inclinatio.
- In directum iacetere dicuntur due li-
neæ quand. ex illis fit una linea 9.*
- 9 Si lineæ angulum continètes,
rectæ fuerint, recti lineus angulus
dicitur.

A 10 Si



10 Si recta linea super rectam consistens, eos, qui deinceps sunt angulos æquales fecerit, rectus est vterque æqualium angulorum. Et insistens recta, perpendicularis dicitur eius, cui insistit.

Linea AB consistens super CD dicitur perpendicularis. Anguli ABC, ABD dicuntur recti, dicuntur quoque anguli deinceps.

11 Obtusus angulus est, qui maior est recto.

12 Acutus, qui recto minor est.

13 Terminus est, quod aliquis est finis.

14 Figura est, quæ sub aliquo, aut aliquib. terminis continetur.

Circulus continetur sub vna linea circulari.



15 Circulus est figura plana, sub vna linea contenta, quæ peripheria dicitur, ad quam omnes lineæ ab vno puncto eorum, quæ intra figuram sunt cadentes, æquales sunt.

16 Punctum autem illud centrum circuli dicitur. *nimirum A.*

17 Diametrus circuli, est quædam recta linea per centrum acta, & ad vtramq; partem peripheriæ circuli terminata; quæ & circulum bifariam secat. *nempe linea BC.*



18 Semicirculus est figura à diametro, & intercepta circuli peripheria contenta.


LIBER I.

3



19 Segmentum circuli est, quod à recta linea, & peripheria circuli continetur.

20 Rectilinea figurae sunt, quae rectis lineis continentur. Trilaterae, quae tribus; quadrilaterae, quae quatuor; multilaterae, quae pluribus quam quatuor lineis rectis continentur.



21 Trilaterarum figurarum, æquilaterum triangulum est, quod tria latera habet æqualia.



22 Isosceles, quod duo tantum æqualia habet latera.



23 Scalenum, quod omnia tria inæqualia habet latera.




24 Trilaterarum præterea figurarum rectangulum triangulum est, quod rectum angulum habet.

25 Obtusangulum, quod obtusum, *ut est figura 23.*

26 Acutangulum, quod tres acutos habet angulos. *ut sunt figurae 21. & 22.*




27 Quadrilaterarum figurarum, Quadratum est, quod æquilaterum & equi angulum est.



28 Altera parte longior figura est, quæ æquiangula quidem, at non æquilatèra est.



29 Rhombus, quæ æquilatèra, æquiangula verò non est.



30 Rhomboides, quæ opposita, & latera, & angulos æqualia habet; at neq; æquilatèra est, neque æquiangula.



31 Reliqua ab his quadrilatera, vocentur trapezia.



32 Parallele rectæ lineæ sūt, quæ in eodem plano existentes, & vtrinq; in infinitum eiecitæ,

in neutram partem coincidunt.

Postulata.

Postuletur à quouis puncto ad quoduis rectam lineam ducere.

Et rectam lineam terminatam in continuum, & directum producere.

Et quouis centro & intervallo circulum describere.

Communes sententia seu axiomata.

1 **Q**uæ eidem sunt æqualia, & inter se sunt æqualia.

2 Et,

2 Et, si æqualibus æqualia adduntur, tota sunt æqualia.

3 Et, si ab æqualibus æqualia tollantur, reliqua sunt æqualia.

4 Et, si inæqualibus æqualia addantur, tota sunt inæqualia.

5 Et, si ab inæqualibus æqualia auferantur, reliqua sunt inæqualia.

6 Et, quæ eiusdem sunt dupla, inter se sunt æqualia.

7 Et, quæ eiusdem sunt dimidia, inter se sunt æqualia.

8 Et, quæ sibi inuicem congruunt, inter se sunt æqualia.

9 Et, totum est maius sua parte.

10 Et, omnes anguli recti inter se sunt æquales.


11 Et, si in duas rectas lineas recta incidens angulos interiores; & ad easdem partes, duobus rectis minores fecerit, coincident duæ illæ lineæ in infinitum protractæ versus illam partem, ad quam sunt duo anguli duobus rectis minores.

12 Et, duæ rectæ spaciū non concludunt.

Propositiones.

Propositio I. Prolēma I.


Super data recta linea terminata triangulum æquilaterum constituere.



SIt data recta AB, super qua oporteat triangulum æquilaterum constituere. a Centro A; intervallo AB describatur circulus B C

A. 3 D. Rur-

b *Post.*
3.



c *Post.*

1.

d *def*

15.

e *def.*


15

f *ax. 1.*

CB. Quoniam A centrum est circuli B C D, d erit A C æqualis ipsi A B. Rursus, quia B centrum est circuli C A E, e erit & B C æqualis ipsi B A. demonstrata est autem & C A æqualis ipsi A B: vtraque ergo C A, C B æqualis est ipsi A B: s quæ autem eidem sunt æqualia, & inter se sunt æqualia: igitur C A æqualis est C B: tres ergo C A, A B, B C sunt æquales. Quare triangulum A B C est æquilatrum, & super recta A B constitutum. Quod facere oportuit.

Propos. 2. Problema 2.

An datum punctum data recta linea æqualem rectam ponere.



a *prop.*

1 1.

b *post.*

2.

c *post.*

3.

sis D A, D B in E, & F. c Centro B, intervallo B C describatur circulus C G H. Rursus d centro D, inter-


S Int data, punctū A, recta B C, & oporteat ad punctū A rectæ B C æqualē ponere. Ducatur ab A ad B recta A B, super e eaq; constitua- tur triangulum æqui laterum D A B, b pro ductis in directum ip

interuallo DG describatur circulus GKL. Quoniam ergo B centrum est circuli CGH, e erit ipsi BC æqualis BG. Rursus cum D sit centrum circuli GKL, f erit DL æqualis ipsi DG: g quarum pars DA est æqualis parti DB: h reliqua ergo AL æqualis erit reliquæ BG. Ostensa est autem & BC æqualis ipsi BG: vtraque ergo AL, BC æqualis est ipsi BG. i Quæ autem eidem sunt æqualia, & inter se sunt æqualia: ergo AL æqualis est ipsi BC. Quare ad punctum datum A, datæ rectæ BC æqualis est posita, AL. Quod facere oportuit.

d post.
3.
e def.
15.
f def.
15.
g prop.
1.
h ax.3
i ax.1.

Propos. 3. Probl. 3.

Datis duabus inequalibus rectis lineis, à maiore minori æqualem abscindere.



Sint datæ rectæ inæquales AB, & C; quarum maior sit AB; à qua, minori C, æqualem abscindere oporteat. Sit a ad punctum A, rectæ C æ-

a prop.
2. 1.
b post.
3.
c def.
15.

qualis posita, AD. & b centro A, interuallo AD, describatur circulus DEF. Et quia A centrum est circuli DEF, c erit AE æqualis ipsi AD. sed & C æqualis est ipsi DA: vtraque ergo AE, C æqualis est ipsi AD: igitur & AE æqualis erit ipsi C. Duabus ergo inæqualibus datis rectis lineis AB, & C, à maiore AB, minori C æqualis est abscissa, AE. Quod facere oportuit.

Propos. 4. Theor. 1.

Si duo triangula duo latera duobus lateribus equalia habuerint, alterum alteri; habuerint autem & angulum angulo, equalibus lateribus cōtentum, æqualem, & basim basi æqualem habebunt: eritq; triangulum triangulo æquale, & reliqui anguli reliquis angulis æquales, quibus equalia latera subtenduntur.




Sint duo triāgula ABC , DEF , quæ duo latera AB , AC , duobus DE , DF æqualia habeāt,

utramque utrique, AB ipsi DE , & AC ipsi DF , & angulum BAC , angulo EDF . Dico quod & basis BC , basi EF sit æqualis, & triangulum ABC , triangulo DEF , & reliqui anguli reliquis, uterq; utrique, quibus æqualia latera subtenduntur, nempe ABC ipsi DEF ; & ACB ipsi DFE . Si enim ^{*super} triangulum ABC triangulo DEF ^{*}congruat, & ponatur. A super D ponatur, & congruet AB rectæ rectæ & $ax. 8.$ DE , & B ipsi E , quod AB sit æqualis DE . Congruente igitur AB ipsi DE , congruet & AC ipsi DF , quod angulus BAC angulo EDF sit æqualis: ideo & C ipsi F congruet, quod & AC æqualis sit ipsi DF . Sed & B ipsi E congruebat. Quare & basis BC basi EF congruet. Si enim congruente B ipsi E , & C ipsi F , basis BC basi EF nō cōgruat, conti-

continebunt duæ rectæ spaciū; *b* quod fieri ne-^{aa.12.}quit. Congruet ergo basis *BC* basi *EF*, & æqualis illi erit; adeoque totum triangulum *ABC* toti triangulo *DEF* congruet, & eiq; æquale erit: con-^{c ax.8.}gruent ergo & reliqui anguli reliquis, eritque *ABC* angulus angulo, *DEF*, & *ACB* ipsi *DFE* æqualis. Si ergo duo triangula duo latera duobus lateribus æqualia habuerint, &c.

Propos. 5. Theor. 2.

Isoscelium triangulorum anguli ad basim sunt æquales: & productis æqualibus rectis, erunt & anguli infra basim æquales.




Sit triangulum *ABC*, habens latus *AB*, lateri *AC* æquale. Producantur in directum *AB*, *AC* rectæ in *D* & *E*. Dico angulum *ABC*, angulo *ACB*; & *CBD*, ipsi *BCE* æqualem esse. Accipiat^{a prop.}ur in *BD* quoduis punctum *F*; & *a* auferatur à ^{3. 1.}

maiori *AE*, minori *AF* æqualis *AG*: ^{b post.1} *b* ducanturq; rectæ *FC*, *GB*. & cum *AF*, ipsi *AG*; & *AB* æqualis sit ipsi *AC*; erunt duæ *FA*, *AC*, duabus *GA*, *AB* æquales, altera alteri, continentque angulum communem *FAG*: ^{c prop.} *c* erit igitur basis *FC* basi *GB* æqualis & triangulum *AFC* triangulo *AGB*, & reliqui anguli reliquis, alter alteri, quibus æqualia ^{4. 1.} latera subtenduntur; nempe *ACF* ipsi *ABG*, & *AFC* ipsi *AGB*. Et quia tota *AF* toti *AG* æqualis

d ax. 3. lis est, quarum AB est æqualis ipsi AC ; d erit & reliqua BF , reliquæ CG æqualis. Oſtenſa autem eſt & FC æqualis ipsi GB . Cum ergo duæ BF , FC duabus CG , GB æquales ſint altera alteri: & angulus $BF C$ angulo $CG B$ æqualis, & baſis BC communis, *e prop. 4. 1.* erit triangulum $BF C$ triangulo $CG B$ æquale, & reliqui anguli reliquis alter alteri, quibus æqualia latera ſubtenduntur: ergo & angulus $FB C$ angulo $GC B$, & $BC F$ ipsi $CB G$ æqualis erit. Et quia totus $AB G$ toti $AC F$ oſtenſus eſt æqualis, & $CB G$ ipsi $BC F$; erit ergo & reliquus, ABC reliquo $AC B$ æqualis: & ſunt ad baſim trianguli ABC ; oſtenſus eſt autem $FB C$ angulus, angulo $GC B$ æqualis, & ſunt ſub baſi. Iſoſcelum igitur triangulorum anguli ad baſim æquales ſunt, & productis æqualibus lateribus, etiam anguli infra baſim. Quod demonſtrare oportuit.

Propoſ. 6. Theor. 3.

Si trianguli duo anguli æquales fuerint; erunt & latera æquales angulos ſubtendentia, æqualia.



S It triangulum ABC habens angulum ABC , angulo $AC B$ æqualem. dico & latera AB , AC æqualia eſſe. Si enim ſunt inæqualia, erit alterum maius, ſit maius AB .

a Auferatur à maiore AB , minori AC æqualis DB , ducaturque DC . Cum ergo DB , AC æquales ſint, communis verò BC ; erunt duæ DB , BC , duabus AC , CB , æquales, altera

a prop. 3. 1.

tera alteri, & angulus DBC æqualis angulo ACB : bigitur & basis DC , basi AB erit æqualis, & triangulum ABC , triangulo DBC , minus maiori, & quod est absurdum; non igitur in æqualis est AB , ipsi AC : ergo æqualis. Quare si trianguli duo anguli æquales fuerint, erunt & latera, æquales angulos subtendentia, æqualia. quod demonstrare oportuit.

b prop.

4.1.

cax-9

Propos. 7. Theor. 4.

Super eadem recta linea, duabus rectis lineis, aliæ duæ rectæ æquales altera alteri, non constituentur, ad aliud atq; aliud punctum, ad easdem partes, eosdemq; cum primò duobus terminos habentes.



SI enim fieri potest constituantur super eadem recta linea AB , duabus rectis AC , CB , duæ aliæ AD , DB æquales, altera alteri, ad aliud atque aliud punctum C & D , ad easdem partes C , D , eosdem terminos habentes A , B , quos primò ita, ut CA ipsi DA , eundem cum ipsa terminum A habens, CB verò ipsi DB , eundem cum illa terminum B habens, sit æqualis, & ducatur CD . Cum ergo AC sit æqualis ipsi AD , & erit & angulus ACD æqualis angulo ADC : maior ergo est ADC angulus, angulo DCB : multo ergo maior CDB . Rursus cum CB æqualis sit ipsi DB , erit & angulus CDB angulo DCB æqualis: ostend-

2 prop.


5.1.

ostend-

ax. 9. ostensus autem est multo illo maior . . *b* Quod fieri non potest. Non igitur super eadem recta linea duabus rectis lineis, alia dux rectæ æquales, altera alteri constituentur ad aliud atque aliud punctum, ad easdem partes, eosdem cum primò ductis terminos habentes. Quod demonstrare oportuit.

Propos. 8. Theor. 5.

Si duo triangula duo latera duobus lateribus æqualia habuerint, habuerint verò & basim basi æqualem, habebunt quoque angulum æqualibus lateribus contentum angulo æqualem.




Sint duo triangula ABC , DEF , quæ habeant duo latera AB , AC , duobus DE , DF æqualia, alterum alteri, nempe AB ipsi DE , & AC ipsi DF ; habeant quoque bases BC , EF æquales. Dico quod & angulus BAC , angulo EDF sit æqualis. Congruente enim triangulo ABC , triangulo DEF , positoque B super E , & recta BC super EF ; **ax. 8** a congruet & C ipsi F , quod BC , EF æquales sint. Congruente igitur ipsa BC ipsi EF , congruent & BA , CA , ipsis ED , DF . Quod si congruat quidem basis

basis BC , basi EF : at BA , AC latera ipsis, ED , DF , non congruant, sed aliò cadant, vt sint ED , DF , *b prop. 7.1.* constituantur super eadem recta duabus rectis, aliæ duæ rectæ æquales, altera alteri, ad aliud atque aliud punctum, ad easdem partes, eisdem terminos habentes. At non constituuntur. Non ergo congruente basi BC , basi EF , non congruent BA , AC latera ipsis ED , DF : congruent ergo. quare & angulus BAC angulo EDF congruet, eique æqualis erit. Si ergo duo triângula, duo latera duobus lateribus æqualia habeant, alterum alteri, habuerint verò & basim basi æqualem, habebunt quoque angulum æqualibus lateribus contentum, angulo æqualem. Quod oportuit demonstrare.

Propos. 9. Probl. 4.

Datum angulum rectilineum bifariam secare.




Sit datus angulus rectilineus BAC , quæ oporteat bifariam secare. Accipiat quoduis punctum D . Atque ex *a prop. 3.1.* AC , ipsi AD , æqualis auferatur AE : & super ductam DE , *b prop. 1.1.* constitutatur triângulum equilaterum DEF , & iungatur AF . Dico angulum BAC recta AF bifariam secari. Cum enim AD , AE æquales sint, communis AF , erunt duæ DA , AF , duabus EA , AF æquales, altera alteri, est verò & basis DF basi EF æqualis; ergo & angulus DAF , angulo BAF , *c prop. 8.1.* æqua-

B, æqualis erit. Datus ergo angulus rectilineus
BAC à recta AF bifariam secatur, Quod facere
oportuit.

Propos. 10. Probl. 5.

Datam rectam finitam bifariam secare.

a prop.
9. 1.



S It data recta finita A
B, quam oporteat bi-
fariam secare. Constitua-
tur super illa triangulum
æquilaterum ABC, &
secetur angulus ACB bi-
fariam recta CD. Dico
rectam AB, in D bifariam

esse sectam. Cum enim AC, CB æquales sint com-
munis CD: erunt duæ AC, CD, quibus BC, CD
æquales, altera alteri, & angulus ACD angulo B
CD æqualis: igitur & basis AD æqualis est basi
BD. data ergo recta finita AB in D secta est bifa-
riam, quod faciendum erat.

b prop.
4. 1.


Propos. 11. Probl. 6.

*Data recta linea ex puncto in illa dato lineam
rectam ad angulos rectos ducere.*

a prop.
2. 1.

b prop.
1. 1.

S It data recta AB, datum in illa punctum C,
oporteatq; ex C, ipsi AB rectam lineam ad an-
gulos rectos ducere. Accipiat in AC quoduis
punctum D, & ponatur ipsi CD æqualis CE,
& constituturque super ED triangulum æquilate-
rum FDE, & ducatur FC. Dico ad punctum C
datæ




data rectæ AB ad
angulos rectos esse
ductam FC . Cum
enim DC, CE sint
æquales, FC com-
munis; erunt duæ D
 C, CF , duabus $E C,$
 CF æquales, altera
alteri: sed & basis D

F , æqualis est basi $E F$: erit ergo & angulus DCF
æqualis angulo $E C F$; & sunt deinceps. *d* Quando
autem recta super rectam consistens, eos qui deinceps
sunt angulos, æquales fecerit, rectus est uterque;
æqualium angulorum: recti igitur sunt anguli DC
 $F, F C E$. Quare data rectæ, ex puncto in illa dato,
ducta est ad angulos rectos, recta FC . quod facere
oportuit.

c prop.
8. 1
d def.
10.

Propos. 12. Probl. 7.

*Ad datam infinitam, a puncto dato extra illam
perpendicularem rectam ducere.*



S It data recta infini-
ta AB , punctum
extra illam C . & oportet
ad rectam datam
 AB ex puncto C , quod
in illa non est, perpen-
dicularem rectam ducere.
Accipiatur ad
alteras partes rectæ A
 B , quoduis punctum D ,

a poss.
3.
b prop.
10. 1


& a centro C intervallo CD circulus EFG des-
cribatur, *b* diuidaturque EG in H bisariam, ductis
rectis

c def.
15.
d prop.
8. 1.
e def.
10.

rectis CG, CH, CE . Dico quod ad datam infinitam AB , à puncto extra illam dato C , perpendicularis ducta sit CH . Cum enim GH, HE sint æquales, HC communis: erunt duæ GH, HE , duabus EH, HC æquales, altera alteri; & sed & basi CG , basis CE , est æqualis; erit igitur & angulus CHG angulo EHC æqualis, & sunt deinceps. & quando autem recta super rectam consistens, eos qui deinceps sunt angulos, æquales fecerit, rectus est uterque æqualium angulorum, & insistentis linea, perpendicularis dicitur eius, cui insitit. Quare ad datam rectam infinitam AB à puncto extra illam dato C , perpendicularis ducta est, CH . quod facere oportebat.

Propos. 13. Theor. 6.

Quando linea recta super rectam consistens, angulos facit, aut duos rectos, aut duobus rectis æquales efficit.



a def.
10.
b def.
10.


Recta .n. quædã AB , super rectã CD , consistens, angulos faciat CBA, ABD . dico illos, aut duos rectos aut duobus rectis æquales esse. Si .n. CBA , ipsi ABD est æqualis, duo & recti sunt. Si non: ducatur à puncto B ipsi CD ad angulos rectos, BE : b ergo CBE, EBD duobus recti sunt. Et quia CBE duobus CBA, ABE , æqualis est, si apponatur communis EBD erunt duo CBE, EBD , tribus CBA, ABE, EBD æquales. Rursus cum angulus DBA , duobus DBE, EBA æqualis sit, si addatur communis ABC erunt duo DBA, ABC tribus

tribus DBE, EBA, ABC æquales. Ostensum est autem & duos CBE, EBD, iisdem tribus, æquales esse. Quæ autem eidem sunt æqualia, & inter se sunt æqualia: duo igitur CBE, EBD æquales sunt duobus DBA, ABC: sed CBE, EBD recti sunt: igitur DBA, ABC duobus rectis æquales. Si igitur recta super rectam consistens angulos facit, aut duos rectos, aut duobus rectis æquales facit. Quod oportuit demonstrare.

Propositio 14. Theor. 7.

Si ad rectam aliquam lineam, atq; ad punctum in illa datum, duæ rectæ non ad easdem partes ductæ angulos, qui deinceps sunt, duobus rectis æquales fecerint, in directum erunt illæ lineæ.


Ad rectam AB, & ad punctum in illa datum B, duæ rectæ BC, BD non ad easdem partes positæ, faciant angulos deinceps ABC, ABD, duobus rectis æquales. Dico BD ipsi CB in directum esse. Quod si BD ipsi BC non sit in directum, sit BE. Cum igitur recta AB rectæ CBE insistat, erunt anguli ABC, ABE duobus rectis æquales: Sunt verò & ABC, ABD duob. rectis æquales: anguli igitur CBA, ABE sunt angulis CBA, ABD, æquales. Communis ABC auferatur: reliquus ergo ABE, reliquo ABD, est æqualis, minor



can. 3. minor maiori, & quod fieri nequit. Non ergo BE in directum est ipsi B C. Similiter ostendemus nullam aliam esse, præter B D: in directum ergo est B D, ipsi C B. Si ergo ad rectam, & ad punctum in ea, datum duæ rectæ non ad easdem partes positæ, angulos qui deinceps sunt, duobus rectis æquales fecerint, in directum erunt illæ duæ lineæ. quod demonstrare oportuit.

Propositio 15. Theor. 8.

Si duæ rectæ se inuicem secuerint, angulos ad verticem æquales facient.



Rectæ AB, CD, secēt se in E puncto. Dico quod tam angulus AEB, quam CEB, angulo AED, æqualis sit. Cum enim rectæ AE, rectæ CD, infistat, faciens angulos CEA, AED, & erunt ipsi duo

a prop.

16 1. bus rectis æquales. Rursus cum recta DE rectæ AB infistat, faciens angulos AED, DEB & erunt

b prop.


13. 1. & ipsi duobus rectis æquales. Ostensi autem sunt

& CEA, AED duobus rectis æquales: Quare duo CEA, AED, duobus AED, DEB æquales sunt. auferatur communis AED: ergo reliquus CEA, reliquo BED æqualis est. Pariter ostendetur CEB, DEA æquales esse. Si ergo duæ rectæ se inuicem secuerint, facient angulos, qui ad verticem sunt æquales. Quod demonstrare oportuit.

Pro-

Propos. 16. Theor. 9.

*Omnis trianguli vno latere producto, exter-
nus angulus utrobet interno &
opposito maior est.*



S It triangulum ABC , & unum ipsius latus BC , in D producat. Dico angulum externum ACD , maiorem esse internis & oppositis $\angle B A$, $B A C$. *a prop. 11. 1.* Bisecetur AC in E , & ducta BE producat in F , sitque ipsi BE æqualis EF , iungatur CF , & producat AC in G . Et quia AE ipsi EC est æqualis; erunt duæ AE , EB , duabus CE , EF æquales, altera alteri; & angulus

$AE B$, angulo $FE C$ est *b prop. 15. 1.* æqualis, sunt enim ad verticem: igitur & basis AB , basi FC æqualis erit, & triangulum ABE triangulo $FE C$; adeoq; *c prop. 4. 1.* & reliqui anguli reliquis, alter alteri, quos æqualia subtendunt latera: Erit igitur & angulus BAE angulo ECF æqualis; est autem ECD maior, *d ax. 9.* quam ECF . Ergo & ACD maior est quam BAE . Pari modo secto BC latere bifariam demonstrabitur angulus BCG , hoc est, ACD maior esse angulo ABC . Omnis ergo trianguli vno latere producto externus angulus utrovis interno, & opposito maior est, quod oportuit demonstrare.

Propositio 17. Theor. 10.

Omnis trianguli duo anguli duobus rectis minores sunt, quomodocunque sumpti.




S It triangulum $A B C$. Dico duos eius angulos minores esse duobus rectis quomodocunque sumptos. Producatur $B C$ in D . Et quia trianguli $A B C$, angulus $A C D$ externus,

a prop. *16. 1.* $\angle$ maior est interno & opposito $A B C$. Si communis apponatur $A C B$: erunt $A C D$, $A C B$ anguli, maiores $A B C$, $B C A$ angulis: Sed $A C D$, $A C B$ duobus rectis sunt æquales: Ergo $A B C$, $B C A$ minores. Similiter ostendemus tam $B A C$, $A C B$, quam $C A B$, $A B C$ duobus rectis esse minores. Omnis ergo trianguli duo anguli quicunq; duobus rectis sunt minores, quod oportuit demonstrare.

Propos. 18. Theor. 11.

Omnis trianguli maius latus maiorem angulum subtendit.




S It triangulum $A B C$, habens latus $A C$ maius latere $A B$. Dico & angulum $A B C$ maiorem esse angulo $B C A$. Quia enim $A C$ maius est, quam $A B$,

AB; fiat AD ipsi AB æqualis: & ducatur BD. Et quia trianguli BDC externus angulus ADB *a prop.* maior est interno & opposito DCB, & b æqualis *16. 1.* angulo ABD, quod latera AB, AD æqualia sint, *b prop.* maior ergo etiam est ABD quam ACB: multo *5. 1.* ergo maior erit totus ABC, quam ACB. Omnis ergo trianguli maius latus, maiorem angulum subtendit.

Propos. 19. Theor. 12.

Omnis trianguli maior angulus maiori lateri subtenditur.




It triangulum ABC habens angulum ABC maiorem angulo BCA. dico & latus AC maius esse latere AB. Si non: erit AC ipsi AB aut æquale, aut minus. Non æquale. Si enim æquale, a esset & *a prop.* angulus ABC angulo ACB æqualis: at non est: *5. 1.* ergo AC æquale non est ipsi AB. Non minus: nam si AC minus esset quam AB, esset b & angulus ABC *b prop.* minor angulo ACB; at non est: non ergo AC *18. 1.* minus est ipso AB. Ostensum autem est, quod nec æquale: ergo maius. Omnis ergo trianguli maiori angulo maius latus subtenditur.



Propos. 20. Theor. 13.

Omnis trianguli duo latera reliquo maiora sunt quomodocumq; sumpta.



Sit triangulum ABC . dico duo latera BA , AC , maiora esse reliquo BC ; & AB ; BC reliquo AC ; & BC , CA reliquo AB . Producat enim BA in D ; sitq; recta DA ipsi CA æqualis, & iungatur DC . Cum ergo DA ipsi

AC sit æqualis, erit & angulus ADC , angulo ACD æqualis. Sed & BCD angulus maior est angulo ACD ; maior ergo etiam est BCD , ipso ADC . Et cum DCB sit triangulum habens angulum BCD maiorem angulo ADC , b maiorem autem angulum maius latus subtendat; erit DB maius ipso BC , æquale autem est DB ipsis AB , AC : maiora ergo sunt BA , AC , quam BC . Omnis ergo trianguli duo latera reliquo maiora sunt; quomodocumque sumpta.

Propos. 21. Theor. 14.

Si à terminis unius lateris trianguli duæ rectæ intra constituentur, erunt hæ minores reliquis duobus trianguli lateribus, at maiorem angulum continebunt.

A Terminis lateris BC , trianguli ABC , constituentur duæ rectæ BD , CD intra. Dico BD ,

B D, D C reliquis trianguli lateribus **B A, A C** minores esse; at angulum **B**



D C maiorem continere, angulo **B A C**. Producatur

enim **B D** in **E**. Et *a* quia

a prop.
20. 1.

omnis trianguli duo latera reliqua maiora sunt: erunt & trianguli **A B E**, latera **A B, A E** maiora **B E** latere, apponatur com-

munis **E C**, *b* eruntq; **B A, A C** maiora ipsis **B E, E C**. Rursus trianguli **C E D** latera **C E, E D** maiora sunt latere **C D**, communis apponatur **D B**, *b an. 4.*

eruntq; **C E, E B** maiora ipsis **C D, D B**. Sed **B A, A C** maiora ostensa sunt ipsis **B E, E C**; multo ergo *c prop.*

A B, A C maiora erunt ipsis **B D, D C**. Rursus, quoniam *d* omnis trianguli externus angulus inter-

d prop.
16. 1.

no, & opposito est maior; erit & trianguli **C D E** externus **B D C**, maior interno **C E D**. Eandem

ob causam erit trianguli **A B E**, externus **C E B**, maior interno **B A C**. sed & **B D C** ostensus est maior, ipso **C E B**; multo ergo maior est **B D C**; quàm **B A C**. Quare si à terminis, &c. quod oportuit demonstrare.


Propos. 22. Probl. 8.

Ex tribus rectis, tribus datis rectis aequalibus, triangulum constituere. Oportet autem duas, reliqua maiores esse quomodocumq; sumptas. quod omnis trianguli duo latera reliqua maiora sint, quomodocumq; sumatur.

Sint tres rectæ, **A, B, C**, quarum duæ quomodocumque sumptæ reliqua maiores sint, ut **A, B,**

B 4 quam

quam C; A, C quam B; B, C quā A. Oporteat autem ex tribus A, B, C, æqualibus triangulum cōstituere.



a prop.
3. I:

b def.

15.

c ax. I.

d def.

15.

e ax. I.


Exposita sit recta quædam DE, terminata ad D, interminata ad E; sitq; ϵ DF ipsi A, FG ipsi B; ipsi C æqualis facta GH. Describatur centro F, intervallo FD, circulus DKL: Centro verò G, intervallo GH, circulus LKH; iunganturq; FK, KG. Dico ex tribus FK, KG, GF æqualibus tribus datis A, B, C triângulum FKG esse constitutum. Cum enim F centrum sit circuli DKL, ϵ erit FD æqualis ipsi FK; sed FD est æqualis ipsi A; ϵ ergo & FK, erit æqualis ipsi A. Rursum cum G sit centrum circuli LKH, ϵ erit GH æqualis ipsi GK; sed GH æqualis est ipsi C: ϵ erit ergo & GK æqualis ipsi C: Est verò & FG æqualis ipsi B. Tres ergo KF, FG, GK æquales sunt tribus datis A, B, C. Quare ex tribus KF, FG, GK, æqualibus tribus A, B, C triângulum est constitutum. Quod facere oportuit.

Propos. 22. Probl. 9.

Ad datam rectam, datumq; in ea punctum dato angulo rectilineo, æqualem angulum rectilineum constituere.

S It data recta AB, datumque in ea punctum A, datus angulus rectilineus DCE. Oporteat autem

antem ad punctum datum A, datæ rectæ AB, dato angulo rectilineo DCE æqualem angulum rectilineum constituere. Capiantur in vtraq; CD, C



E, qualibet puncta D, E, & iungatur DE: ^{a prop. 22. 1.} atq; ex tribus rectis, quæ æquales sint tribus CD, DE, EC,

triangulum AFG constituatur: ita ut CD æqualis sit ipsi AF; CE ipsi AG; DE ipsi FG. Cum ergo duæ DC, CE æquales sint duabus FA, AG, altera alteri, sit verò & basis DE æqualis basi FG; ^{b prop. 8. 1.} erit & angulus DCE æqualis angulo FAG. Quare ad datam rectam AB datumq; in ea punctum A, dato rectilineo angulo DCE, æqualis angulus rectilineus FAG est constitutus. Quod oportuit facere.


Propos. 24. Theor. 15.

Si duo triângula duo latera duobus lateribus æqualia habuerint, alterum alteri; angulum vero angulo maiorem, qui æqualibus rectis lineis continetur, & basim basi maiorem habebunt.

Sint triângula ABC, DEF, habentia duo latera AB, AC, duobus DE, DF æqualia, alterum alteri: AB quidem ipsi DE; AC verò ipsi DF. Ac angulus BAC maior sit, angulo EDF. Dico & basim

basim BC maiorem esse basi EF . Cum enim angulus BAC maior sit EDF , angulo, a constitutur ad punctum D re DE angulo BAC , a qualis EDG ; sitq; utriusque AC , DF a -

a prop.
23. 1.



b prop.

4. 1.

c prop.

5. 1.

d ax. 9.

e prop.

19. 1.

qualis DG , & iungantur GE , FG . Quia igitur AB ipsi DE , & AC ipsi DG a qualis est; erunt duæ BA , AC , duabus ED , DG a quales, altera alteri; estque & angulus BAC , angulo EDG a qualis: *b* erit igitur & basis BC , basi EG a qualis. Rursus quia DG ipsi DF est a qualis, & *c* angulus DGF angulo DGF ; *d* erit angulus DFG maior angulo EGF : multo ergo maior erit EF , ipso EG . Et quia EF triangulum est, habens angulum EGF maiorem angulo EGF (*e* maiori autem angulo maius latus subtenditur) erit & latus EG maius latere EF : a quale autem est EG ipsi BC : maius ergo est & BC , ipso EF . Si ergo duo triacula, & *e*. quod oportuit demonstrare.

Propos. 25. Theor. 16.

Si duo triacula duo latera duobus lateribus a qualia habuerint, alterum alteri, & basim basi maiorem, & angulum angulo, qui a -qualibus lateribus continetur, maiorem habebunt.

Sint



S Int duo trian-
gula ABC, DEF , duo latera A
 B, AC , duobus D
 E, DF habentia æ-
qualia, alterum al-
teri, AB ipsi DE ,


& AC ipsi DF . Basim verò BC maiorem basi EF .
Dico & angulum BAC angulo EDF maiorem
esse. Si non: aut æqualis est, aut minor. Non æqua-
lis; Nam si angulo BAC , angulus EDF æqualis
esset, *a* esset & basis BC , basi EF æqualis; at non *a prop.*
est; non ergo angulus BAC angulo EDF est æ- *4. 1.*
qualis. Sed neque minor: nam si minor esset, *b* es- *b prop.*
set & basis BC minor basi EF : at non est: non er- *24. 1.*
go angulus BAC minor est angulo EDF . De-
monstratum est autem, quod nec æqualis: maior
ergo erit. Si ergo duo triangula, &c. Quod de-
monstrare oportuit.

Propos. 26. Theor. 17.

*Si duo triangula duos angulos duobus angulis
æquales habuerint, alterum alteri, &
vnum latus vni lateri æquale, seu quod æ-
qualibus angulis adiacet, seu quod vni æ-
qualium angulorum subtenditur; & reli-
qua latera reliquis lateribus, alterum alte-
ri; & reliquum angulum reliquo angulo,
æqualem habebunt.*

S Int duo triangula ABC, DEF , duos angulos
 ABC, BCA , duobus DEF, BFD æquales
habent-

habentia, alterum alteri, ABC quidem ipsi DEF ,
& BCA ipsi EFD : habeant verò & vnum latus



vni lateri æ-
quale. Et pri-
mo quod æ-
qualibus an-
gulis adiacet
nempe B, C ,
ipsi E, F . Dico
quod & reli-

qua latera, reliquis æqualia habeant, alterum alteri, AB ipsi DE , AC ipsi DF , & reliquum angulum BAC reliquo EDF . Quod si AB, DE inæqua-

a prop.
3. I.

lia sint; vnum erit maius. Sit maius AB : fiatque ipsi DE æqualis GB linea, & ducatur GC . Cum igitur tam BG, DE ; quam EF, BC æquales sint; erunt duæ BG, BC , duabus DE, EF æquales, altera alteri; & angulus BCG angulo DEF æqualis:

b prop.
4. I.

erit ergo & basis GC basi DF æqualis, & triangulum BCG triangulo DEF æquale, reliquique anguli reliquis, alter alteri, quibus æqualia latera subtenduntur. Quare angulus BCG æqualis erit angulo DFE : sed & DFE ponitur æqualis ipsi BCA : erit ergo BCG æqualis ipsi BCA , minor maiori, quod fieri nequit: non ergo AB, DE inæquales sunt: ergo æquales. Est verò & BC ipsi EF æqualis: duæ ergo AB, BC æquales sunt duobus DE, EF , altera alteri, & angulus ABC angulo D

c prop.
4. I.

E, F : ergo & basis AC basi DF , & reliquus angulus BAC reliquo EDF æqualis erit. Rursus sint latera æquales angulos subtendentia, AB, DE æqualia, dico & reliqua latera, reliquis lateribus, ut AC, DF , & BC, EF , reliquumq; angulum BAC , reliquo EDF , æqualem esse. Si enim $BC,$

EF

EF sunt inæqualia; erit vnum maius; sit, si fieri potest, maius BC, & fiat ipsi EF æqualis BH, iungaturq; AH. Et quia BH ipsi EF, & AB ipsi DE æqualis est: erunt duæ AB, BH, duabus DE, EF æquales, altera alteri, continentq; angulos æquales: & basis ergo AH, basi DF est æqualis, & triangulum ABH triangulo DEF, reliqui; anguli reliquis, alter alteri, quibus æqualia latera subtenduntur, æquales erunt. Est igitur angulus BHA æqualis angulo EDF: sed EDF æqualis est angulo BCA: erit ergo & BHA æqualis ipsi BCA. Trianguli ergo AHC externus angulus BHA æqualis est interno & opposito BCA, quod fieri nequit: igitur BC, EF inæquales non sunt: æquales ergo. Cum verò & AB, DE sint æquales: erunt duæ AB, BC duabus DE, EF æquales altera alteri, æqualesq; angulos continent: ergo & basis AC basi DF æqualis est, & triangulum ABC triangulo DEF, & reliquus angulus BAC, reliquo EDF. Si ergo due, &c. Quod demonstrare oportuit.

d prop.

3. 1.

e prop.

4. 1.

f prop.


16. 1.

g prop.


4. 1.

Propos. 27. Theor. 18.

Si in duas rectas lineas recta incidens angulos alternos æquales fecerit, parallelæ erunt illæ lineæ.



IN duas rectas AB, CD incidens recta EF faciat angulos alternos AEF, EFD æquales. Dico AB, CD parallelas esse.




esse. Si non; productæ concurrent, aut versus partes B, D; aut versus A, C: producantur, & concurrant versus partes B, D in G. *a* Est itaque

a prop. trianguli G E F angulus externus A E F maior interno, & opposito E F G: sed * & equalis; quod fieri nequit: non ergo A B, C D productæ concurrunt versus partes B, D. Par ratione demonstratur, quod neq; ad partes A, C: *b* quæ autem in neutram partem concurrunt, parallelæ sunt: parallelæ ergo sunt A B, C D. Si igitur, &c. quod oportuit demonstrare.

Propos. 28. Theor. 19.

Si in duas rectas lineas recta incidens, angulum externum interno, & opposito, & ad easdem partes, æqualem fecerit: vel internos, & ad easdem partes duobus rectis æquales, parallelæ erunt illæ lineæ.



IN duas rectas A B, C D incidens recta E F, externum angulum E G B, interno, & opposito G H D æqualem faciat: aut internos, & ad


eadem partes B G H. G H D duobus rectis æquales. Dico A B, C D parallelas esse. Cum enim

E G B

E G B angulus, * æqualis sit, & angulo G H D, a & * ex hy
 angulo A G H; b erit & A G H æqualis ipsi G H D *poshep.*
 c & sunt alterni: parallele ergo sunt A B, C D. Rur- *a prop.*
 sus cum B G H, G H D duobus rectis sint æquales; 15. 1.
 d sint autem & A G H, B G H, duobus rectis æqua- b ax. 1.
 les: erunt A G H, B G H ipsis B G H, G H D æqua- c prop.
 les: communis B G H auferatur: e erit igitur reli- 27. 1.
 quus A G H, reliquo G H D æqualis: f & sunt al- d prop.
 terni: sunt ergo A B, C D parallelæ. Si ergo in 13. 1.
 duas rectas, &c. Quod demonstrare oportuit. c ax. 3.
 f prop.
 27. 1.

Propositio 29. Theor: 20.

*Recta in parallelas rectas incidens æquales fa-
 cit angulos alternos: & externum interno
 & opposito, & ad easdem partes æqualem:
 & internos & ad easdem partes duobus
 rectis æquales efficit.*



I N parallelas re-
 ctas A B, C D re-
 ctæ E F incidat. Dico
 quod & alternos an-
 gulos A G H, G H D
 æquales faciat; & ex-
 ternum E G B inter-
 no, & opposito, & ad


easdem partes G H D æqualem; & internos, & ad
 easdem partes B G H, G H D duobus rectis æqua-
 les. Si enim A G H, G H D inæquales sunt, vnus
 illorum A G H sit maior: & quia A G H maior est
 quam G H D, communis addatur B G H. Hi er-
 go A G H, B G H maiores sunt his B G H, G H D.

a sed

- a* *prop.* *a* sed A G H, B G H duobus rectis sunt æquales: er-
 13. 1. go B G H, G H D duobus rectis minores erunt. *b*
b *ax. 11* Quæ autem à minoribus quam duobus rectis in in-
 finitum producuntur lineæ rectæ, concurrunt: ergo
 A B, C D in infinitum productæ cōcurrunt: at non
 concurrunt; parallelæ enim sunt: ergo anguli A G
 H, G H D, non sunt inæquales: igitur æquales. Por-
c *prop.* rò c A G H angulus æqualis est angulo E G B. Er-
 15. 1. go & E G B æqualis erit angulo G H D: commu-
 nis apponatur B G H: ergo hi E G B, B G H, æqua-
d *prop.* les sunt his B G H, G H D: *d* sed E G B, B G H sunt
 13. 1. æquales duobus rectis: erunt ergo & B G H, G H
 D duobus rectis æquales. Rectæ ergo in paralle-
 las, &c. Quod oportuit demonstrare.

Propos. 30. Theor. 21.

*Quæ eidem rectæ sunt parallelæ, & inter se
 sunt parallelæ.*




S It utraq; ipsæ
 rum A B, C D
 ipsi E F parallelæ.
 Dico & A B, C D
 esse parallelas. In-
 cidat enim in ip-

- sas rectæ G K. Et quia in rectas parallelas A B, E F
a *prop.* rectæ G K incidit; *a* erit angulus A G H, angulo
 27. 1. G H F æqualis. Rursus, quia in parallelas rectas
b *prop.* E F, C D cadit rectæ G K, *b* erit & angulus G H F
 28. 1. æqualis angulo G K D; ostentus est autem & angulus
c *ax. 1.* A G K angulo G H F æqualis: ergo & angulus
 A G K æqualis erit angulo G K D: & sunt alterni
d *prop.* d ergo A B, C D sunt parallelæ. Ergo quæ ei-
 28. 1. dem, &c. Quod oportuit demonstrare.

Pro-

Propos. 31. Probl. 10.

*Per datum punctum data recta linea paralle-
lam ducere.*



E X dato puncto
A, Data recta
BC. oporteat paral-
lelam ducere. Acci-
piatur in BC quod-
uis punctum D, iun-

ganturq; A, D. & constituatur ad A punctum re- *2 prop.*
cta DA angulo ADC æqualis DAE, ducaturq; *22. 1.*
ipsi AE in directum AF. *b* Quia ergo in duas rectas *b prop.*
BC, EF recta AD incidens angulos alternos EA *27. 1.*
D, ADC æquales facit, erunt BC, EF parallelæ.
Per datum ergo punctum, &c. quod facere oportuit.


Propos. 32. Theor. 22.

*Omnis trianguli vno latere producto, exter-
nus angulus, duobus internis, & oppo-
situs est æqualis; & tres interni duo-
bus rectis sunt æquales.*



S It triangulum
ABC, & vnum
eius latus BC pro-
ducatur in D. Dico
angulum externum
ACD æqualem
esse duobus internis, & oppositis CAB, ABC; &
tres

a prop.
31. 1.




tres internos AB
 C , BCA , CAB
duobus rectis equa-
les. α Ducatur per
C ipsi AB recta pa-
rallela CE . Quia

b prop. ergo in AB , CE parallelas cadit AC ; b erunt an-
27. 1. guli alterni BAC , ACE æquales. Rursus quia
 AB , CE parallelæ sunt, & in ipsas cadit recta BD ,
c prop. c erit externus angulus ECD , æqualis interno, &
28. 1. opposito ABC ; ostensus est autem & ACE equa-
lis BAC . Totus ergo ACD æqualis est duobus
internis, & oppositis BAC , ABC . Apponatur
communis ACB ; & erunt ACD , ACB æquales
d prop. tribus ABC , BCA , CAB ; sed ACD , ACB
13. 1. æquales sunt duobus rectis: ergo & ACB , CBA ,
 CAB æquales sunt duobus rectis. Omnis ergo
trianguli, &c. Quod oportuit demonstrare.

Propos. 33. Theor. 23.

*Linea recta, qua æquales & parallelas lineas
ad easdem partes coniungunt, & ipsa
æquales sunt, & parallela.*



S Int æquales, & paralle-
læ AB , CD . easque ad
easdem partes coniungant
rectæ AC , BD . Dico & ip-
sas AC , BD parallelos &
æquales esse. Ducatur enim

BC . Quoniam AB , CD parallelæ sunt, & in ip-
sas incidit BC ; α erunt anguli alterni ABC , BCD
27. 1. æquales. Et quia AB , CD æquales sunt; com-
munis

munis addatur BC ; erunt duæ AB, BC , duabus BC, CD æquales, estq; angulus ABC angulo BCD æqualis. ^b Quare & basis AC , basi BD æqualis erit, & triangulum ABC triangulo BCD ; & reliqui anguli reliquis, alter alteri, quibus æqualia altera subtenduntur, æquales erunt. Est ergo angulus ACB angulo CBD æqualis. Et quia in duas rectas AC, BD incidens recta BC , facit angulos alternos ACB, CBD æquales; ^c erunt AC, BD parallelæ; ostense autem sunt & æquales. Ergo lineæ rectæ, quæ æquales, &c. Quid oportuit demonstrare.


^b prop.
4. 1.

^c prop.
27. 1.

Propos. 34. Theor. 24.

Parallelogrammorum spaciolum, quæ ex aduerso & latera, & anguli, sunt inter se æqualia, eaq; diametrus bifecat.

Esto parallelogrammum $ACDB$ diametrus BC . Dico parallelogrammi $ACDB$, quæ ex aduerso, latera & angulos, æqualia esse; eaq; diametrum BC bifariam se-



care. Cum enim AB, CD parallelæ sint, & in ipsas incidat BC ; ^a erunt anguli alterni ABC, BCD æquales. Rursus cum AC, BD sint parallelæ, & in illas incidat BC , ^b erunt & anguli alterni ACB, CBD æquales. Due ergo triangula ABC, CBD habent duos angulos ABC, BCA , duobus BCD, CBD æquales, alterum alteri, & unum latus, vni lateri, quod adiacet, angulis æqualibus, utriq; com-

^a prop.
27. 1.

^b prop.
27. 1.

c prop. 26. 1. *mune* B C. Quare & reliqua latera reliquis, alterum alteri, & reliquum angulum reliquo, æqualem habebunt. æquale ergo est latus A B lateri C D; & A C, ipsi B D; & angulus B A C angulo B D C. Et cum tam anguli A B C, B C D, quam C B D, A C B
d ax. 2. æquales sint: d erit & totus A B D, toti A C D æqualis. ostensus est autem & B A C æqualis B D C: Parallelogrammorum ergo spaciolorum quæ ex aduerso, & latera, & anguli, inter se æqualia sunt. Dico & diametrum illa bifariam secare. Cum enim A B, C D æquales, & B C communis sit: orunt duo latera A B, B C, duobus C D, B C æqualia, alterum alteri; & angulus A B C æqualis angulo B C D: *e prop.* 4. 1. erit ergo & basis A C basi D B æqualis; & triangulum A B C triangulo B C D. Diametrus ergo B C, parallelogrammum A B C D bifariam secat. Quod oportuit demonstrare.

Propos. 35. Theor. 25.

Parallelogramma in eadem basi; & in iisdem parallelis constituta, inter se sunt æqualia.

S Vnto parallelogramma A B C D, E B F C in basi B C, & in parallelis A F in B C constituta.



a prop. 34. 1.

b ax. 1.

Dico A B C D æquale esse ipsi E B F C. Cum enim A B C D, parallelogramum sit; ærunt B C, A D, æquales: eandem ob causam E F, B C æquales erant; b vnde & A D

& AD ipsi EF æqualis erit; & communis est DE: *c ax.2.*
 ergo tota AE, tota DF æqualis est. Est & verò & *d prop.*
 AB ipsi DC æqualis: duæ ergo EA, AB, duabus *34. 1.*
 FD, DC æquales sunt, altera alteri; sed & angu- *e prop.*
 lus, FDC, angulo EAB æqualis est, externus in- *29. 1.*
 terno: square & basis EB basi FC æqualis erit; & *f prop.*
 triangulum EAB triangulo FDC. Commune *4. 1.*
 DGE auferatur; & erit reliquum trapezium AB *g ax.3.*
 GD, reliquo EFGC æquale. Apponatur com-
 munis GBC triangulus: *h ax.2.* totum ergo ABCD
 parallelogrammum, tota EFGC æquale erit: ergo
 parallelogramma in eadem basi, &c. Quod oportuit
 demonstrare.

Propos. 36. Theor. 36.

*Parallelogramma in æqualibus basibus, &
 in iisdem parallelis constituta, inter se sunt æqualia.*

S Vnto parallelogramma ABCD, EFGH super æqualibus basibus, BC, FG; & in iisdem parallelis AH, GB constituta. Dico illa



esse æqualia iungantur enim BE, CH. Quia enim BC, FG, æquales sunt: estque FG qualis ipsi EH; & erit & BCIp *a ax.1.*

æ EH æqualis: *b prop.* sunt verò & parallelæ, coniunguntq; ipsas rectæ BE, CH. *33. 1.* Quæ autem æquales, & parallelas ad easdem partes coniungunt, æquales, & parallelæ sunt: Quare EB, CH æquales, & *c prop.*
 C 3 paral- *33. 1.*

d prop. parallelæ sunt: d ergo $E B C H$ est parallelogram-
 34. 1. mum; estq; æquale ipsi $A B C D$, quippe eandem
 cum illo basim $B C$ habens; & in ijsdem parallelis
e ex 1. $B C$, $A H$ constitutum. Eandem ob causam $E F G H$
 eidem $E B C H$ est æquale. Quare & $A B C D$
 parallelogrammum æquale est $E F G H$ parallelo-
 grammo. Ergo parallelogramma, &c. Quod de-
 monstrare oportuit.

Propos. 37. Theor. 27.

*Triangula super eadem basi, & in ijsdem pa-
 rallelis constituta, inter se sunt æqualia.*

S Vnto triangula $A B C$, $D C B$ super eadem basi
 $B C$; & in ijsdem parallelis $A D$, $B C$ constitu-



a prop.
 32. 1.

ta. Dico triangulum
 $A B C$ æquale esse
 triangulo $D B C$.
 Producatur $A D$,
 vtrunque ad E , & F ;
 & per B ipsi $C A$,
 per C verò ipsi $B D$,
 parallelæ ducantur

b prop. $B E$, $C F$. Vtrumq; ergo $E B A C$, $D B C F$ paral-
 35. 1. lelogrammum est: b suntq; æqualia; quippe in e-
 c prop. dem basi $B C$; & in ijsdem parallelis $B C$, $E F$ con-
 34. 1. stituta. Et est parallelogrammum $E B C A$, dimi-
 ditum triangulum $A B C$; diametrum enim $A B$ ip-
 sum bisecat: Parallelogrammi verò $D B C F$, di-
 midium est triangulum $D B C$; nam diametrum D
d ex 7. C ipsum bisecat. Quæ autem æqualium sunt di-
 midia, & ipsa sunt æqualia. Triangula ergo super
 eadem basi, &c. quod oportuit demonstrare.

Pro-

Propos. 38. Theor. 28.

*Triangula super equalibus basibus; & in
ijsdem parallelis constituta, inter se
sunt equalia.*

Sunt triangula ABC , DEF super equalibus
basibus BC ; EF ; & in iisdem parallelis BF ,



DA constituta. Di-
co, illa esse equalia.

Producatur enim A
 D utrinque ad G & H .

Atque per B , & F a prop.
ducantur ipsi CA , $31. 1.$

DE parallelae BG :
 FH , eritque utrumque;

$GBCA$, $DEFH$,


parallelogrammum, b Et sunt equalia quippe su- b prop.
per equalibus basibus BC , EF , & in iisdem paral- $36. 1.$

lelis BF , GH constituta, c estque triangulum ABC c prop.
dimidium parallelogrammi $GBCA$; ipsum enim $34. 1.$

diameter AB bisecat: Et triangulum FED est
dimidium parallelogrammi $DEFH$; e nam & ip- e prop.

sium diameter FD bisecat. d Quae autem equalia $34. 1.$
sunt dimidia, & ipsa sunt equalia. Triangu- d ax. 7.

lum igitur ABC est aequale triangulo DEF . Quae
re triangula super equalibus basibus, &c. Quod
oportuit demonstrare.



Propositio 39. Theor. 29.

Triangula æqualia super eadem basi, & ad easdem partes constituta, in iisdem sunt parallelis.

Sunto triangula æqualia ABC , DBC super eadem basi BC constituta. Dico illa in iisdem

esse parallelis. Ducta enim AD , dico illam esse parallelam ipsi BC . Si non. Ducatur per A ipsi BC parallela AE : iuncta igitur EC , erit triangulum ABC æquale triangulo EBC ; sunt enim super eadem basi BC , & in iisdem parallelis

a prop.
31. 1.

b prop.
35. 1.



BC , AE . Sed triangulo ABC æquale ponitur triangulum DBC , erit ergo DBC triangulum æquale ipsi EBC triangulo maius minori; quod fieri nequit: non ergo AE parallela est ipsi BC , pari modo demonstrabimus quod nulla alia præter AD . Sunt igitur AD , BC parallelæ. Quare triangula æqualia super eadem basi, &c. Quod oportuit demonstrare.

Propositio 40. Theor. 30.

Æqualia triangula super æqualibus basibus, & ad easdem partes constituta, in iisdem sunt parallelis.

Sunto æqualia triangula ABC , CDE super æqualibus basibus BC , CE constituta. Dico illa

illa in iisdem parallelis esse. Siq̃: a Ducatur a *prop.*
per A ipsi B E parallela F A. iuncta ergo F E, b erit 31. 1.




triangulum A B C æquale b *prop.*
triangulo F C E. Sunt enim 38. 1.
super æqualibus basibus B
C, C E, & in iisdem paralle-
lis B E, A F. Sed triangulum
A B C æquale etiã est trian-
gulo D C E: c erit ergo & c ax. I.
D C E ipsi F C E æquale,
maius minori, quod fieri ne-

quit; non ergo A F ipsi B E parallela est. Similiter
ostendemus, quod præter A D, nulla alia. A D er-
go ipsi B E parallela est. Triangula ergo æqua-
lia, &c. quod demonstrare oportuit.

Propos. 41. Theor. 31.

*Si parallelogrammum, & triangulum ean-
dem habuerint basim, sintq; in iisdem
parallelis, erit parallelogrammum
duplum trianguli.*



S Int parallelogrammum
A B C D, & triangu-
lum E B C super eadem
basi B C; & in iisdem pa-
rallelis B C, A E. dico pa-
rallelogrammum A B C
D duplum esse trianguli
E B C. Ducta enim A C,

erit triangulum A B C æquale triangulo E B C: a *prop.*
habent quippe eandem basim B C, & sunt in iisdem 37. 1.
paral-

- b prop. parallelis BC, AE . Sed parallelogrammum AB
 34. 1. CD duplum est trianguli ABC ; b diametris enim
 c ax. 1. AC ipsum bisecat: & quadratum & trianguli EB C du-
 plum erit. Si igitur parallelogrammum & trian-
 gulum, &c. Quod demonstrare oportuit.

Propos. 42. Probl. 11.


Dato triangulo æquale parallelogrammum
 constituere in dato angulo rectilineo.



- Sto datum tri-
 angulum ABC
 datum angulus recti-
 lineus D . oporteat ex
 æquale parallelogr-
 amum constituere in
 a prop. dato angulo D . a Bisecetur BC in E ; iungatur AE ;
 10. 1. & b c d e f g h i k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm dn do dp dq dr ds dt du dv dw dx dy dz ea eb ec ed ee ef eg eh ei ej ek el em en eo ep eq er es et eu ev ew ex ey ez fa fb fc fd fe ff fg fh fi fj fk fl fm fn fo fp fq fr fs ft fu fv fw fx fy fz ga gb gc gd ge gf gg gh gi gj gk gl gm gn go gp gq gr gs gt gu gv gw gx gy gz ha hb hc hd he hf hg hh hi hj hk hl hm hn ho hp hq hr hs ht hu hv hw hx hy hz ia ib ic id ie if ig ih ii ij ik il im in io ip iq ir is it iu iv iw ix iy iz ja jb jc jd je jf jj jh ji jj jk jl jm jn jo jp jq jr js jt ju jv jw jx jy jz ka kb kc kd ke kf kg kh ki kj kk kl km kn ko kp kq kr ks kt ku kv kw kx ky kz la lb lc ld le lf lg lh li lj lk ll lm ln lo lp lq lr ls lt lu lv lw lx ly lz ma mb mc md me mf mg mh mi mj mk ml mm mn mo mp mq mr ms mt mu mv mw mx my mz na nb nc nd ne nf ng nh ni nj nk nl nm nn no np nq nr ns nt nu nv nw nx ny nz oa ob oc od oe of og oh oi oj ok ol om on oo op oq or os ot ou ov ow ox oy oz pa pb pc pd pe pf pg ph pi pj pk pl pm pn po pp pq pr ps pt pu pv pw px py pz qa qb qc qd qe qf qg qh qi qj qk ql qm qn qo qp qq qr qs qt qu qv qw qx qy qz ra rb rc rd re rf rg rh ri rj rk rl rm rn ro rp rq rr rs rt ru rv rw rx ry rz sa sb sc sd se sf sg sh si sj sk sl sm sn so sp sq sr ss st su sv sw sx sy sz ta tb tc td te tf tg th ti tj tk tl tm tn to tp tq tr ts tt tu tv tw tx ty tz ua ub uc ud ue uf ug uh ui uj uk ul um un uo up uq ur us ut uu uv uw ux uy uz va vb vc vd ve vf vg vh vi vj vk vl vm vn vo vp vq vr vs vt vu vv vw vx vy vz wa wb wc wd we wf wg wh wi wj wk wl wm wn wo wp wq wr ws wt wu wv ww wx wy wz xa xb xc xd xe xf xg xh xi xj xk xl xm xn xo xp xq xr xs xt xu xv xw xx xy xz ya yb yc yd ye yf yg yh yi yj yk yl ym yn yo yp yq yr ys yt yu yv yw yx yy yz za zb zc zd ze zf zg zh zi zj zk zl zm zn zo zp zq zr zs zt zu zv zw zx zy zz aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm dn do dp dq dr ds dt du dv dw dx dy dz ea eb ec ed ee ef eg eh ei ej ek el em en eo ep eq er es et eu ev ew ex ey ez fa fb fc fd fe ff fg fh fi fj fk fl fm fn fo fp fq fr fs ft fu fv fw fx fy fz ga gb gc gd ge gf gg gh gi gj gk gl gm gn go gp gq gr gs gt gu gv gw gx gy gz ha hb hc hd he hf hg hh hi hj hk hl hm hn ho hp hq hr hs ht hu hv hw hx hy hz ia ib ic id ie if ig ih ii ij ik il im in io ip iq ir is it iu iv iw ix iy iz ja jb jc jd je jf jj jh ji jj jk jl jm jn jo jp jq jr js jt ju jv jw jx jy jz ka kb kc kd ke kf kg kh ki kj kk kl km kn ko kp kq kr ks kt ku kv kw kx ky kz la lb lc ld le lf lg lh li lj lk ll lm ln lo lp lq lr ls lt lu lv lw lx ly lz ma mb mc md me mf mg mh mi mj mk ml mm mn mo mp mq mr ms mt mu mv mw mx my mz na nb nc nd ne nf ng nh ni nj nk nl nm nn no np nq nr ns nt nu nv nw nx ny nz oa ob oc od oe of og oh oi oj ok ol om on oo op oq or os ot ou ov ow ox oy oz pa pb pc pd pe pf pg ph pi pj pk pl pm pn po pp pq pr ps pt pu pv pw px py pz qa qb qc qd qe qf qg qh qi qj qk ql qm qn qo qp qq qr qs qt qu qv qw qx qy qz ra rb rc rd re rf rg rh ri rj rk rl rm rn ro rp rq rr rs rt ru rv rw rx ry rz sa sb sc sd se sf sg sh si sj sk sl sm sn so sp sq sr ss st su sv sw sx sy sz ta tb tc td te tf tg th ti tj tk tl tm tn to tp tq tr ts tt tu tv tw tx ty tz ua ub uc ud ue uf ug uh ui uj uk ul um un uo up uq ur us ut uu uv uw ux uy uz va vb vc vd ve vf vg vh vi vj vk vl vm vn vo vp vq vr vs vt vu vv vw vx vy vz wa wb wc wd we wf wg wh wi wj wk wl wm wn wo wp wq wr ws wt wu wv ww wx wy wz xa xb xc xd xe xf xg xh xi xj xk xl xm xn xo xp xq xr xs xt xu xv xw xx xy xz ya yb yc yd ye yf yg yh yi yj yk yl ym yn yo yp yq yr ys yt yu yv yw yx yy yz za zb zc zd ze zf zg zh zi zj zk zl zm zn zo zp zq zr zs zt zu zv zw zx zy zz

Propos. 43. Theor. 32.

*Omnis parallelogrammi, eorum quæ circa
diametrum sunt parallelogrammorum
complementa sunt inter se equalia.*



Sit parallelogrammum $A B C D$, diametrus eius $A C$; circa $A C$ parallelogramma sint $E H$, $F G$: & quæ dicuntur complementa $B K$, $K D$. Dico complementa $B K$, $K D$ æqualia esse: quia enī

$A B C D$ parallelogrammum est, diametrus eius $A C$; fit ut triangula $A B C$, $A D C$ æqualia sint. 2 prop.
Rursus quia $E K H A$ parallelogrammum est, eius 34. 1.
diametrus $A K$: erunt triangula $E A K$, $A H K$ æ- b prop.
qualia. Eandem ob causam erunt æqualia trian- 34. 1.
gula $K E C$, $K G C$. Cum igitur tam triangula A
 $E K$, $A H K$, quàm $K G C$, $K F C$ sint æqualia; erūt
& duo $A E K$, $K G C$, duobus $A H K$, $K F C$ æqua-
lia. Est verò & totum $A B C$, toti $A D C$ æquale:
igitur reliquo complemento $K D$, reliquum $B K$
est æquale. Omnis igitur parallelogrammi, &c.
Quod oportuit demonstrare.

Propos. 44. Probl. 12.


*Ad datam rectam lineam dato triangulo æ-
quale parallelogrammum applicare,
in dato angulo rectilineo.*

Sit data recta $A B$; datus triangulus E ; datus an-
gulus rectilineus D . Oporteat autem ad da-
tam

tam rectam AB dato triangulo C æquale parallelogrammum applicare in angulo æquali angulo

a prop.

42. 1.



D . 4. Constitutur triangulo C æquale parallelogrammum $BEFG$ in angulo EBG æquali angulo D , & iaceat BB ipsi AB indirectum; producat FG in

b prop.

31. 1.

c prop.

29. 1.

d ax. 9.

e ax. 11.

f prop.

31. 1.

g prop.

43. 1.

h prop.

43. 1.

i ax. 1.

k prop.

15. 1.

l ax. 1.

m ax. 1.

n ax. 1.

o ax. 1.

p ax. 1.

q ax. 1.

r ax. 1.

s ax. 1.

t ax. 1.

u ax. 1.

v ax. 1.

w ax. 1.

x ax. 1.

y ax. 1.

z ax. 1.

H ; b per A alterutri ipsarum BG, EF agatur parallela AH , & iungatur HB . Et quia in parallelas AH, EF recta HF incidit, c erunt anguli AHF, HFE duobus rectis æquales: d ergo BHG, GFE duobus rectis sunt minores: e quæ autem à minoribus angulis quam sint duo recti in infinitum producantur, concurrunt: igitur HB, FE productæ concurrent; concurrant in K ; f & per K ad alterutram ipsarum EA, FH ducatur parallela KL , productis HA, GB in L, M : erit igitur HL, KM parallelogrammum, diametrus eius HK : g parallelogramma circa HK , erunt AG, ME . Complementa LB, BF : h ergo LB ipsi BF æquale est: sed & C ipsi BF est æquale: i erit igitur & LB ipsi C æquale. Et k quia angulus GBE æqualis est angulo ABM ; & GBE æqualis angulo D : l erit & ABM , ipsi D æqualis. Ad datam ergo rectam, &c. Quod l ax. 1. facere oportuit.

Propos. 45. Probl. 13.

Dato rectilineo æquale parallelogrammum constituere in dato angulo rectilineo.

E Sto datum rectilineum $ABCD$: datus angulus rectilineus E . Oporteat autem ipsi AB


CD

C D æquale parallelogrammum in data angulo
E constituere. iungatur **D B**, & æ constituatur trian

a prop.

gulo **A B D**

42. 1.



æquale paral
 lelogrammū
F H in angu
 lo **H K F** æ
 quali angulo

E. Deinde b prop.

applicetur ad 44. 1.

lineam **G H** parallelogrammum **G M** triangulo

D B C æquale, in angulo **G H M** æquali angulo **E**.

c per

struē.

Et quia angulus **E** utriq; **H K F**, **G H M** est æqua
 lis: erunt & **H K F**, **G H M** æquales: addatur com
 munis **K H G**: ergo **H K F**, **K H G** æquales erunt

d ax. 2.

his **G H M**, **K H G**: at hi sunt æquales duobus re
 ctis; ergo & illi. Quare ad punctum **H** rectæ **G H**

e prop.

29. 1.

positæ sunt duæ lineæ **K H**, **H M** non ad easdem
 partes, facientes angulos deinceps æquales duobus

rectis, sin directum ergo erunt **K H**, **H M**. Et quia
 in parallelas **K M**, **F G** recta incidit **H G**, g erunt

f prop.

14. 1.

anguli alterni **M H G**, **H G F** æquales: Communis
 apponatur **H G L**: erunt ergo hi **M H G**, **H G L**,

g prop.

27. 1.

his **H G F**, **H G L**, æquales; k at illi sunt æquales
 duobus rectis: ergo & hi: l in directum ergo est **F**

i ax. 2.

k prop.

G ipsi, **G L**. Et quia tam **K F**, **H G** quam **H G**, **M**
L æquales & parallelæ sunt: m erunt & **K F**, **M L**

29. 1.

l prop.

æquales & parallelæ: & coniungunt illas rectæ **K**
M, **F L**: n ergo & **K M**, **F L** æquales & parallelæ

14. 2.

m prop.

erunt. Parallelogrammum ergo est **K F L M**. &
 cum triangulum **A B D** æquale sit parallelogram
 mo **H F**; & triangulum **D B C** parallelogrammo

30. 1.

n prop.

G M, erit totum rectilineum **A B C D** toti **K F L**
M æquale. Dato ergo rectilineo **A B C D** æqua


33. 1.

le parallelogrammum constituimus KFLM, in angulo dato fit. Quod facere oportebat.

Propos. 46. Probl. 14.

A data recta linea quadratum describere.

E Sto data recta A B, & qua quadratum describere oporteat. Ducatur à puncto A recta A B ad angulos rectos A C; & fiat b ipsi A B æqua-



lis A D; & à D ipsi A B agatur parallela D E; i. per B verò ipsi A D ducatur parallela B E: est ergo A D E B parallelogrammum: unde A B ipsi D E, & A D ipsi B E æqualis erit: c sed & A B æqualis est ipsi A D, Omnes ergo quatuor B A, A D, D E, B E sunt æquales; est ergo A D E B æqui-

laterum dico quod & rectangulum, Cum enim recta A D in parallelas A B, D E incidat, d erunt anguli B A D, A D E æquales duobus rectis. e rectus autem est B A D: ergo & A D E. f Parallelogrammorum autem spaciorem anguli & latera, quæ ex aduerso, æqualia sunt; erit igitur vterq; A B E, B E D rectus: rectangulum igitur est A D E B. Ostensum autem est & æquilaterum: g ergo est quadratum; & à recta A B descriptum. Quod oportebat facere.

Propositio 47. Theor. 43.

In rectangulis triangulis, quod à latere rectum angulum subtendente describitur quadra-


tum,

tum, aequale est illis, quæ à lateribus rectum
comprehendentibus describuntur quadratis.

E Sto triangulum rectangulum A, B, C , rectum
habens $B A C$. Dico quadratum à latere B
 C descriptum, æquale esse quadratis à lateribus B
 A , $A C$ descriptis. & describantur à rectis $B C$, B

a prop.
46. 1.

b prop.
31. 1.



A , $A C$ quadrata B
 $D C E$, $G B$, $H C$; &
b per A , utriq; $B D$,
 $C E$ agatur paralle-
la $A L$, iunganturq;
 $A D$, $F C$. Et quia
utroq; angulorum B
 $A C$, $B A G$ rectus
est, suntq; ad punctū
 A lineæ $A B$ duæ re-
ctæ $A C$, $A G$ positæ,
faciētes angulos de-
inceps duobus rectis

c prop.
14. 1.

d ax. 2.

e prop.
4. 1.

f prop.
4. 1.

g prop.
41. 1.

ipſi $A C$ in directum. Eandem ob causam est $A B$
ipſi $A H$ in directum. Et quia angulus $D B C$ æ-
qualis est angulo $F B A$, quod. utroq; sit rectus, si
apponatur communis $A B C$: d erit totus $D B A$, d ax. 2.
toti $F B C$ æqualis. Cumque duæ $D B$, $B A$, dua-
bus $B C$, $B F$ æquales sint, altera alteri, & angulus
 $D B A$, angulo $F B C$ æqualis; e erit & basis $A D$, e prop.
basi $F C$ æqualis, & triangulum $A B D$, triangulo
 $F B C$: festq; trianguli $A B D$ parallelogrammuni
 $B L$ duplum; habent enim eandem basim $B D$, &
sunt in iisdem parallelis $B D$, $A L$ g Trianguli ve-
rò $F B C$ duplum est quadratum $G B$; habent enim
eandem basim $F B$, & sunt in iisdem parallelis $F B$,
 $G C$;

h ex. 1. GC ; b quæ autem æqualitas fuit dupla, æqualia inter se sunt: parallelogrammum ergo BL æquale est GB quadrato. Eodem modo iunctis AE, BK demonstrabitur CL æquale esse quadrato HC : Totum ergo quadratum $DBEC$ æquale est duobus GB, HC quadratis: & est $DBEC$ à BC ; ipsa vero GB, HC à BA, AC , descripta; Quadratum ergo à BC descriptum æquale est quadratis à BA, AC descriptis. In rectangulis ergo Triangulis, &c. Quod oportuit demonstrare.

Propos. 48. Theor. 35.

Si quadratum ab uno trianguli latere descriptum, æquale fuerit quadratis à reliquis lateribus descriptis angulus à reliquis lateribus contentus, rectus erit.



a prop.
II. 1.

b prop.
2. 1.

c ex. 2.

d per
ruct.

E Sto quadratum à latere B
 C trianguli ABC descri-
 ptum, æquale quadratis à lateri-
 bus BA, AC descriptis. Dico
 angulum BAC rectum esse. a
 Ducatur enim ab A puncto li-
 neæ AC ad angulos rectos re-
 cta AD , & sit b AD ipsi AB æ-
 qualis, iungaturq; DC Et quia DA, AB æquales sūt,
 erit & quadratum ab AD descriptum æquale qua-
 drato ab AB descripto. a pponatur commune qua-
 dratum ab AC descriptum: & erunt igitur quadrata
 ipsarum DA, AC æqualia quadratis ipsarum BA, AC . Sed quadrata ipsarum DA, AC æqualia sunt
 quadrato ipsius DC . d angulus enim DAC rectus
 est.

est. Quadratis autem ipsarum AB, AC ponitur æquale quadratum ipsius BC . quadrata ergo ipsarum DC, BC sunt æqualia: ergo & latera. Et cum AD, AB æquales sint, communis AC , igitur duæ DA, AC , duabus BA, AC sunt æquales, & basis DC basi BC : erit ergo & angulus DA angulo BA æqualis: Est vero DA rectus; ergo & BA rectus erit. Si ergo quadratum, &c. Quod oportuit demonstrare.

prop. 8. 1.

EVLIDIS

ELEMENTVM

SECVNDVM.

Definitiones.




B Mne parallelogrammũ rectangulum contineri dicitur à duabus rectis lineis angulum rectum comprehendentibus. *Ita in propoſit. 1. parallelogrammum BH continetur à lineis BC, BG , quæ angulum rectum B continent.*

2. Parallelogrammi ſpaciij vnum eorum, quæ circa diametrum ſunt parallelogrammorum, cum duobus complementis gnomon vocetur. *Ita in propoſit. 5. figura $CBFGHL$ continet parallelogrammis DL, HF , & quadrato DC .*



Propositio 1. Theor. 1.

Si fuerint duæ rectæ lineæ, quarum altera secetur in quotcunq; partes, rectangulum ab ipsis contentum, æquale erit rectangulis ab infecta, & singulis secta partib. contentis.



a prop.

11. 1.

b prop.

2. 1.

c prop.

31. 1.


Sint duæ rectæ A, B C, quatum B C secetur utrunq; in D, & E. Dico rectangulum lineis A, & B C contentum æquale esse rectangulis contentis A, B D; & A, D E; & A, E C. Ducatur enim ex B ipsi B C ad angulos rectos B

F, fiatq; b ipsi A æqualis B G; & c per G ipsi B C parallela ducatur G H; per D, E, C verò ipsi B G parætele ducantur D K, E L, C H. Est autem B H æquale ipsis B K, D L, E H. Nam B H est rectangulum ipsarum A, B C; Continetur enim ipsis B C, B G, & B G est ipsi A æqualis. B K, est rectangulū ipsarum A, B D; Continetur enim rectis G B, B D; siquidem G B ipsi A æqualis est: D L est rectangulum ipsarum A, D E; nam & D K æqualis est ipsi A. & similiter E H est rectangulum ipsarum A, E C. Est ergo quod A, B C continetur æquale illis, quæ A, B D; A, D E; & A, E C continentur. Si ergo fuerint duæ rectæ, &c. Quod oportuit demonstrare.



Propos. 2. Theor. 2.

Si recta linea secetur utcumque, erunt rectangula, quæ tota & partibus continentur, æqualia quadrato, quod fit à tota.



D F E

Recta AB secetur utcumq; in C. Dico rectangula ipsis AB, AC, & AB, BC contenta, æqualia esse, quadrato ipsius AB. *a prop. 46. 1.* Describatur super AB quadratum A BDE, & ducatur per C ad utraq; AD, BE parallela CF. *b æquale b prop. 1. 2.* ergo est AE ipsis AF, CE. Est au-

tem AE quadratum ipsius AB, rectangulum ipsarum BA, AC est AF; Continetur enim ipsis AD, AC; & est AD ipsi AB æqualis. CE continetur AB, BC; Est autem BE æqualis ipsi AB; Ergo quæ AB, AC; & AB, CB continentur æqualia sunt quadrato ipsius AB. Si ergo recta linea, &c. Quod demonstrare oportebat.


Propos. 3. Theor. 3.

Si recta linea utcumq; secetur, erit rectangulum tota, & una parte contentum, æquale rectangulo partibus contento, & quadrato à dicta parte descripto.

Recta AB sit utcumq; secta in C. Dico rectangulum AB, BC contentum, æquale esse, & rectangulo AC, CB; & quadrato BC contento.

D 2 a De

a prop. 46. 1. Describatur enim à BC quadratum C D B E, pro
b prop. ducaturq; E D in F; & *b* per A vtriq; C D, B E pa-
 31. 1. rallela ducatur, A F: *c* Ergo
c prop. A E æquale est, ipsis AD, C E.
 1. 2. Estq; A E, rectangulum ipsis
d def. A B, B C contentum: conti-
 27. 1. netur enim ipsis A B, B E, &
 est B E ipsi B C æqualis.
 A D verò est rectangulum ip-
 sarum A C, C B; est enim D




C ipsi C B æqualis. D B, deniq; est quadratum ip-
 sius C B. Rectangulum ergo A B, B C contentum,
 æquale est A C, C B contento, vna cum quadrato
 ipsius C B. Si ergo recta linea, &c. Quod demon-
 strare oportuit.

Propos. 4. Theor. 4.

*Si recta linea vtcunq; secetur, quadratum to-
 tius æquale erit & partium quadratis,
 & rectangulo bis partibus contento.*

Recta A B secetur vtcunque in C. Dico qua-
 dratum ipsius A B æquale esse quadratis ip-
a prop. sarum A C, C B; & rectangulo bis A C, C B con-
 46. 1. tento. *a* Constituaturn enim super A B quadratum
b prop. A D E B, ducaturq; B D; ac *b* per C vtrique A D, B
 31. 1. D ducatur parallela C F; per G verò vtrique A B, D
c per E parallela H K. Et *c* quia C F, A D parallelae sunt
struct. in ipsasq; incidit B D, *d* erit externus angulus B G
d prop. C æqualis interno & opposito A D B: *e* sed A D B
 29. 1. est æqualis ipsi C B D; quod & latus B A lateri A
e prop. D sit æquale; erit igitur & C G B angulus, æqualis
 9. 1. G B C angulo. *f* Quare & latus B C lateri C G æ-
 quale

quale erit: g sed & CB ipsi GK , & CG ipsi KB est æquale; erit ergo & GK ipsi KB æquale: æqui-



laterum ergo est $CGKB$. Dico quod & rectangulum. Cum enim CG, BK parallelæ sint, in ipsasque incidat CB ; erunt $\angle$ anguli KBG, GCB æquales duobus rectis: i rectus autem est KBG ; ergo & GCB rectus erit: k Quare & qui ex aduerso CGK, G

KB recti erunt; rectangulum igitur est $CGKB$. Demonstratum autem est, quod & æquilaterum: quadratum i ergo est; & est à CB descriptum. Eadem ob causam & HF quadratum est; & est ab H G descriptum, hoc est, ab AC . Sunt ergo quadrata HF, CK ab ipsis AC, CB descripta. Et quia AG ipsi GE æquale est, estque AG quod AC, G B continetur; sunt enim GC, CB æquales; erit & GE æquale AC, CB contento. Ergo AG, GE æqualia sunt bis AC, CB contento. Sunt autem & HF, CK quadrata ipsarum AC, BC quatuor ergo HF, CK, AG, GE æqualia sunt, & quadratis ipsarum AC, CB ; & rectangulo bis AC, CB contento. Sed HF, CK, AG, GE constituunt totum $ADEB$, quod est quadratum ipsius AB . Quadratum ergo ipsius AB æquale est quadratis ipsarum AC, CB , & rectangulo bis AC, CB contento. Si ergo, &c. Quod demonstrare oportuit.

Alia demonstratio.

Dico quadratum ipsius AB æquale esse quadratis partium AC, CB , & rectangulo bis AC, CB contento. In eadem figura, cum BA, AD sint

D 3 æquæ

a *prop.* æquales, æ erunt & anguli ABD , ADB æquales.
 5. 1. Et b cum omnis trianguli tres anguli æquales sint
 b *prop.* duob. rectis; erunt & trianguli ABD tres ABD , A
 32. 1. DB , BAD æquales duob. rectis. c & est BAD re-
 c *per* ctus; ergo reliqui ABD , ADB vni testō æquales;
struct. cumq; sint æquales, erit vterque semirectus. d re-
 d *per* ctus autem est BCG , est namq; æqualis angulo op-
struct. posito ad A ; reliquus ergo CGB semirectus est: f
 e *per* igitur æquales sunt CGB , CBG : g quare & late-
 29. 1. ra BC , CG æqualia erunt: h sed CB æquale est ip-
 f *prop.* si KG , & CG ipsi BK : ergo CK est æquilaterum;
 32. 1. i cumq; habeat angulum CBK rectum: quadra-
 g *prop.* tum erit CK , & quidem, quod fit ex CB . Eandem
 6. 1. ob causam quadratum est FH , estque æquale illi,
 h *prop.* quod fit ex AC : sunt ergo CK , HF quadrata; æ-
 33. 1. qualiaque quadratis ipsarum AC , CB . Et k cum
 i *per* AG , EG æqualia sint, sitq; AG id, quod AC , CB
struct. continetur, sunt enim CG , CB æquales; ergo EG
 k *prop.* æquale est contento AC , CB : igitur AG , GE æ-
 43. 1. qualia sunt bis AC , CB contento. Sunt verò &
 CK , HF æqualia quadratis ipsarum AC , CB :
 Ergo CK , HF , AG , GE æqualia sunt quadratis
 ipsarum AC , CB ; & bis AC , CB contento: sed
 CK , HF , AG , GE totum AE constituunt, quod
 est ipsius AB quadratum. Ergo quadratum ipsius
 AB æquale est quadratis ipsarum AC , CB , & re-
 ctangulo bis AC , CB contento. Quod oportuit
 demonstrare.


Corollarium.

EX his manifestum est in quadrati spacijs illa
 quæ circa diametrum sunt, quadrata esse.

Propos. 5. Theor. 5.

Si recta linea secetur in aequalia, & in inaequalia, erit rectangulum inaequalibus totius partibus contentum una cum quadrato lineae, quae inter sectiones interijcitur aequale ei, quod dimidia fit quadrato.

Recta AB a secetur in aequalia ad C; in inaequalia ad D. Dico contentum AD, DB rectangulum cum quadrato quod ex CD, aequale esse quadrato ipsius CB. *a prop. 10. 1.* Describatur enim super B C quadratum CEFB; & ducatur BE; & atque per D utriq; CE, BF ducatur parallela DG: per H verò utriq; CB, EF parallela KO. Rursusq; per A utriq; CL, BO parallela AK; & cum complementa CH, HF aequalia sint, si addatur commune DO; erit totum CO, toti DF aequale. Sed C



O aequale est AL; quod & AC ipsi. CB fit aequalis: erit igitur & AL ipsi DF aequale: si addatur commune CH, erit AH ipsis DF, DL aequale: sed AH, contento AD, DB est a-

uale; & est enim, & DH ipsi DB aequalis: F D, DL autem sunt gnomon M N X: f ergo gnomon MNX est aequalis AD, DB contento. Si L G commune, quod est aequale quadrato ex CD, addatur: erunt M N X gnomon, & L G aequalia contento AD, DB, & illi quod ex CD fit quadrato. Sed gnomon MNX, & LG totum CEFB

D 4 qua-


quadratum, quod est quadratum ex CB ; ergo AD , DB contentum, cum quadrato quod fit ex CD , æquale est quadrato ipsius CB . Si ergo recta linea secetur, &c. Quod oportuit demonstrare.

Propositio 6. Theor. 6.

Si recta linea bisecetur, eiq; in directum quædam recta adijciatur, erit rectangulum, quod fit ex tota composita, & adiecta, vñ cum quadrato dimidiæ, æquale quadrato quod fit ex dimidia & adiecta.

Recta AB bisecetur in C , adijciaturq; ei quædam BD in directum. Dico rectangulum AD , DB contentum, cum quadrato rectæ CB , æquale esse quadrato quod fit ex CD . *a prop.* Describatur enim super CD quadratum $CEFD$; ducaturque

b prop.
46. 1.
31. 1.



DE . & b per B quidem utriq; EC , DF parallela ducatur BG ; per H verò utriq; AD , EF parallela KM . Item per A utriq; CL , DM parallela AK . Cum igitur AC æqualis sit


c prop. rectæ CB ; erit & AL æquale ipsi CH : sed CH æquale est ipsi HF : ergo & AL , æquale est ipsi HF . *d ax. 2.* F . Commune addatur CM : & totum ergo AM gnomoni NXO erit æquale: sed AM est quod continetur AD , DB (est enim DM æqualis ipsi DB): & gnomon NXO æqualis est AD , DB contento. Commune addatur LG , quod est æquale qua-

e def.
57.

quadrato rectæ CB: ergo contentum AD, DB, cum quadrato ipsius BC, æquale est gnomoni NXO, & LG, Sed gnomon NXO, & LG sunt quadratum CEDF, quod est quadratum ipsius CD: ergo quod AD, DB continetur, cum quadrato ipsius BC, æquale est ipsius CD quadrato. Si ergo recta linea, &c. Quod oportuit demonstrare.

Propos. 7. Theor. 7.

Si recta linea secetur utcumq; , quod à tota , quodq; ab una partium fit, utraq; quadrata, æqualia sunt ei, quod bis à tota & dicta parte fit rectangulo, una cum alterius partis quadrato:



Recta AB secetur utcumque in C. Dico quadrata, quæ ex AB, CB fiunt, æqualia esse bi AB, BC contento, & quadrato quod fit ex AC. Describatur enim super AB quadratū ADEB, & figura * construatur.

Et quia AG, GE æqualia sunt, si commune CF addatur, erunt tota AF, CE æqualia: utraq; ergo AF, CE dupla sunt ipsius AF: sed AF, CE sunt gnomon KLM & CF quadratum: gnomon ergo KLM, & CF dupla sunt ipsius AF. Est vero eiusdem AF duplum bis AB, BC contentum; b sunt enim, BF, BC æquales. Gnomon ergo KLM, & CF æquantur bis AB, BC contento. Commune addatur DG, quod est quadratum ex AC: gnomon ergo KLM, & quadrata BG,

GD

a prop.
46. 1.
* ut in
præcedens.

b def.
17.


GD æquantur bis AB, BC contento, & quadrato quod ex AC. Sed gnomon KLM, & quadrata BG, GD sunt totum ADEB, & CF; quæ sunt ex AB, BC quadrata. Quadrata ergo ex AB, BC æquantur bis AB, BC contento, & quadrato ex AC: si ergo, recta linea, &c. Quod oportuit demonstrare.

Propositio 8. Theor. 8.

Si recta linea secetur utcumq; , rectangulum quater tota, & una parte contentum, cum quadrato alterius partis, æquale est quadrato à tota & dicta parte, tanquam ab una linea descripto.

Recta AB sit secuta utcumq; in C. Dico rectangulum quater AB, BC contentum, cum eo, quod sit ex AC quadrato æquale esse quadrato, quod sit ex AB, BC, tanquam ex una linea. Producatur enim AB in directum, & sit BD æqualis CB; & a super AD constituitur quadratum AEF D, & dupla figura construatur. Quia igitur CB ip-

a prop.
46. 1.



b prop.
36. 1.

c prop.
43. 1.

sis BD; GK; BD verò ipsi KN æqualis est; erunt & GK, KN æquales. Ob eandem causam, erunt PR, RO æquales. Cumq; tam BC, BD; quam GK, KN æquales sint; b erunt etiam tam CK, KD: quam GR, RN æqualia sed CK, RN e sunt æqualia (sunt enim com-

complementa parallelogrammi CO) igitur & KD , GR æqualia erunt. Quatuor ergo DK , CK , GR , RN æqualia sunt: quatuor ergo illa sunt quadruplicia ipsius CK . Rursus cum CB ipsi BD : B D & ipsi BK , hoc est, ipsi CG ; & CB ipsi GK , hoc est, ipsi GP æqualis sit, erit CG ipsi GP æqualis. Et cum CG ipsi GP ; & PR ipsi RO æqualis sit; erit & AG ipsi MP ; & PL ipsi RF æquale. Sed MP , PL sunt æqualia, quippe parallelogrammi ML complementa, erunt & AG , RF æqualia. Quatuor ergo AG , MP , PL , RF sunt æqualia; quatuor ergo illa quadruplicia sunt ipsius AG , Ostensa autem sunt & CK , KD , GR , RN ipsius CK quadruplicia: ergo octo illi quæ gnomonem STY continent, quadrupla sunt ipsius AK : & cum AK contentó AB , BD sit æquale, est enim BK ; ipsi BD æqualis, erit quater AB , BD contentum, quadruplum ipsius AK . ostensus est autem & gnomon STY quadruplex ipsius AK . Quod ergo quater AB , BD continetur æquale est gnomoni STY . Commune addatur XH (quod æquale est quadrato ex AC) quater ergo AB , BD contentum rectangulum, cum quadrato quod sit ex AC , æquale est gnomoni STY , & XH . Sed gnomon & XH sunt AED quadratum, quod est quadratum ex AD : ergo quater AB , BD contentum rectangulum, cum quadrato ex AC , est æquale illi, quod sit ex AD quadrato, hoc est, quod sit ex AB , BC tanquam ex vna linea. Si ergo recta linea, &c. Quod oportuit demonstrare.

d corol.

4.2.0

def 27.

c prop.

43. 1.



Propos. 9. Theor. 9.

Si recta linea secetur in equalia, & non equalia, quadrata partium inaequalium dupla sunt, & eius quod fit à dimidia, & eius quod fit à linea, quæ inter sectiones intercipitur quadrati.



a prop.
21. 1.

Secetur recta AB in C æqualiter, in D inæqualiter. Dico quadrata ex AD , DB dupla esse eorum, quæ ex AC , CD fiunt. *a* Ducatur ex C ipsi AB ad angulos rectos EC , quæ sit utriq; A

C , CB æqualis, ducanturque EA , EB . Atq; per D ipsi EC agatur parallela DF : per F verò ipsi AB parallela FG iungaturq; AF . Et quia AC , CE æquales sunt; *b* erunt & anguli EAC , AEC æquales. Et cum angulus ad C rectus sit; *c* erunt reliqui AEC , EAC vni recto æquales, ideoq; semirecti. Eandem ob causam CEB , $EB C$ semirecti erunt: unde totus AEB rectus erit. Cumq; GEF semirectus sit; *d* rectus EGF (est enim interno & opposito ECB æqualis) erit reliquus FG semirectus: Ergo GEF ipsi FG est æqualis; *e* quare & latus EG lateri FG æquale erit. Rursus cum angulus ad B semirectus sit; rectus FDB (est enim æqualis interno & opposito ECB) erit reliquus BFD semirectus. Est ergo angulus ad B æqualis DFB angulo. / Quare & latus DF lateri DB æquale erit: Et cum AC , CE æquales sint, erunt & quadrata

f prop.
6. 1.

drata ex A C, C E æqualia : dupla ergo sunt quadrato ex A C: g æquale autem est quadratis ex A C, C E quadratum ex E A (nam angulus A C E re-
ctus est) est igitur quod ex E A duplum eius quod ex A C. Rurſus cum E G, G F æquales ſint; erunt & quæ ex E G, G F quadrata æqualia : dupla ergo ſunt eius quod ſit ex G F: Et h æqualis eius, quod ex E F: ergo quod ex E F duplum eſt eius, quod ex G F quadrati (ſunt autem G F, C D æqualis) ergo quod ex E F duplum eſt eius, quod ex C D. Eſt autem & quod ex A E duplum eius, quod ex A C: ergo quadrata quæ ex A E, E F dupla ſunt eorum, quæ ex A C; C D. Quadratis autem ex A E, E F, i æquale eſt quod ex A F (eſt enim angulus A E F, rectus) ergo quod ex A F quadratum, duplum eſt eorum, quæ ex A C, C D: ei autem, quod ex A F æqualia ſunt quæ ex A D, D F ſunt (nam angulus ad D rectus eſt) igitur quæ ex A D, D F dupla ſunt eorum, quæ ex A C, C D quadratorum (ſunt autem D F, D B æquales) ergo quæ ex A D, D B quadrata, dupla ſunt eorum, quæ ex A C, C D. Si ergo recta linea, &c. Quod oportuit demonſtrare.

Propoſ. 10. Theor. 10.

Si recta linea biſecetur, eique in rectum quædam alia adiſciatur; quæ à tota cum adiecta, & ab adiecta ſunt quadrata, dupla erunt quadratorum, quæ ſunt à dimidia, & ad compoſita ex dimidia & adiecta.

Recta A B biſecetur in C, adiſciaturq; ei in rectum B D. Dico quadrata quæ ex A D, D B
dupla


a prop. dupla esse eorum, quæ ex AC , CD . *a* Ducatur
11. 1. enim ex C ipsi AB ad angulos rectos CE ; *b* sitq;

b prop.

2. 1.

c prop.

31. 1.



CE ipsis, AC , CB
 æqualis; & iungantur
 AE , EB . atq; *c* per E
 ipsi AD agatur pa-
 rallela EF . Per D
 verò ipsi CE paral-
 lela DF ; & cum in
 parallelas EC , FD
 incidat EF , *d* erunt

d prop.

29. 1. anguli CEF , EFD æquales duobus rectis: unde
e ax. 11. $FE B$, EFD duobus rectis minores erunt. *a* Quæ

autem à minoribus quam sint duo recti producun-
 tur rectæ lineæ, concurrunt: ergo EB , FD ad par-
 tes B , D productæ concurrent: concurrant in G ,
 iungaturq; AG . Et quia AC , CE æquales sunt,

f prop.

5. 1.

g per
stru. 8.

h prop.

29. 1.

i prop.

15. 1.

k prop.

6. 1.

l prop.

34. 1.

m prop.

6. 1.

erunt & anguli AEC , EAC æquales; *g* & est
 angulus ad C rectus: ergo EAC , AEC sunt semi-
 recti. Eandem ob causam CEB , ECB semirecti
 sunt: ergo AEB rectus est: cumq; ECB sit semire-
 ctus, *h* erit & DBG semirectus: est verò BDG
 rectus; *i* æqualis enim est angulo DCE , quod sint
 alterni: reliquus ergo DGB semirectus est: quare
 anguli DGB , DBG æquales sunt; *k* erunt igitur
 & latera BD , GD æqualia. Rursus cum EGF se-
 mirectus sit: *l* rectus qui ad F (est enim ad C oppo-
 sito æqualis) erit & $FE G$ semirectus: sunt igitur
 EGF , $FE G$ æquales. *m* Quare & latera GF , EF
 æqualia erunt. Cum ergo EC , CA æquales sint;
 erit & quod ex EC quadratum, æquale ei, quod ex
 AC : Quadrata ergo quæ ex EC , CA , dupla sunt
n prop. eius, quod sit ex CA : illis autem, quæ ex CE , CA ,
47. 1. æquale est quod ex $E A$: ergo quod ex $E A$ duplum
 est

est eius quod ex A C. Rursus cum G F, E F sint
 æquales, erunt & quæ ex F G, F E quadrata æqua-
 lia. Sunt ergo quæ ex F G, F E dupla eius, quod
 ex E F: illis autem, quæ ex G F, F E o æquale est *o prop.*
 q̄ ex E G: ergo q̄ ex E G duplū est eius, q̄ ex E F, sūt *47. 1.*
 autē E F, C D æquales: ergo quod ex E G duplum
 est eius quod ex C D: ostensum est autem id, quod
 ex E A duplum esse eius quod ex A C: quæ ergo ex
 A E, E G quadrata dupla sunt eorum, quæ ex A C,
 C D: illis autem quæ ex A E, E G p æquale est quod
 ex A G: ergo quod ea A G duplum est eorum, quæ *p prop.*
 ex A C, C D: ei autem quod ex A G, q æqualia *47. 1.*
 sunt, quæ ex A D, D G: ergo quæ ex A D, D G qua- *q prop.*
 drata dupla sunt eorum, quæ ex A C, C D, æquales *47. 1.*
 autem sunt D G, D B. ergo quæ A D, D B quadra-
 ta, dupla sunt eorum, quæ ex A C, C D. Si ergo
 recta linea bisecetur, &c. Quod oportuit demon-
 strare.


Propos. II. Probl. I.

**Datam rectam secare, ut quod tota, & una
 parte continetur rectangulum, æquale sit
 quadrato quod fit ex reliqua parte.**

SIt data recta A B, quam oporteat ita secare, ut *a prop.*
 quod ex tota & una partium sit rectangulum, *46. 1.*
 æquale sit ei, quod ex altera parte sit quadrato. *a b prop.*
 Describatur ex A B quadratum A B C D, & b bise- *10. 1.*
 cetur A C in E, iungaturq; B E. producat C A in *c prop.*
 F, sitq; E F c æqualis rectæ B E. *d* constituatur su- *2. 1.*
 per A F quadratum F H, & producat G H in K. *d prop.*
 Dico rectam A B in H sectam esse, ut A B, B H *46. 1.*
con-

contentum rectangulū, æquale sit ei, quod ex A H
fit quadrato. Cum enim recta A C bisecta sit in

e prop. 6
2.



f prop.
47.1.

E, eique adiecta in directum A
F; erit CF, FA contentum,
cum eo quod sit ex A E, æquale
illi quod sit ex E F, sunt autem
E F, E B æquales: ergo CF, FA
contentum, cum eo quod sit ex
A E; æquale est illi; quod ex B
B quadrato: sed ei, quod ex E B
fæqualia sunt, quæ ex B A, A E
quadrata (rectus enim est angu-
lus ad A) ergo quod CF, FA

continetur, cum illo quod ex A E quadrato, æqua-
le est illis, quæ ex B A, A E quadratis: Commune
quod ex A E auferatur; reliquum ergo, quod CF,
FA continetur, æquale est ei, quod ex A B qua-
drato. Est autem CF, FA contentum, ipsum FK

g def. (g nam A F, FG sunt æquales) Quod autem sit ex
37. A B, est A D quadratum: ergo FK, A D sunt æqua-
lia. Commune AK auferatur: eruntq; reliqua F
H, HD æqualia. Est autem HD quod A B, B H


h def. tem est quod sit ex A H quadratum. Ergo quod A
37.

B, B H continetur rectangulum, æquale est
quadrato quod ex A H: recta ergo A B
secta est in H, ut quod A B, B H
continetur rectangulum æquale
sit ei, quod ex A H fit
quadrato. Quod
facere oportebat.

Propositio 12. Theor. 11.

In triangulis obtusangulis quadratum quod fit à latere angulum obtusum subtendente, maius est quadratis laterum obtusum continentium, rectangulo bis contento & ab uno latere obtusum continente in quod productum perpendicularis cadit, & à linea exterius assumpta à perpendiculari ad angulum obtusum.

Sit triangulum obtusangulum ABC , obtusum angulum habens BAC . Ducatur ex B ad C a *prop.*
A productam perpendicularis BD . Dico quadratum ex BC maius esse eis, 12. 1.



quæ ex BA , AC , rectangulo bis CA , AD contento. Cum enim recta CD secta sit utcumq; in A ; b erit b *prop.*
quod ex DC æquale illis, 4.2.

quæ ex CA , AD quadratis; & ei, quod bis CA , AD continetur. Commune addatur, quod ex DB . Ergo quæ ex CD , DB æqualia sunt illis, quæ ex CA , AD , DB quadratis; & illi, quod bis CA , AD continetur: sed illis, quæ ex CD , DB quadratis, c æquale est quod ex CB *c prop.*
(est enim angulus ad D rectus) illis autem, quæ ex AD , DB d æquale est, quod ex AB quadratum. *d prop.*
Quod igitur ex CB æquale est illis, quæ ex CA , AB quadratis, & rectangulo bis CA , AD contento. 47. 1.

tento . In triangulis ergo obtusangulis, &c. Quod oportuit demonstrare.


Propos. 13. Theor. 12.

In acutangulis triangulis quadratum lateris acutum angulum subtendentis minus est quadratis acutum continentibus rectangulo bis contento, & ab uno latere acutum continente, in quod perpendicularis cadit, & a linea a perpendiculari intus assumpta ad angulum acutum.

a prop.
12. 1.

Sit acutangulum triangulum $A B C$, habens acutum B ; a ducatur ab A in $B C$ perpendicularis $A D$. Dico quadratum quod fit ex $A C$ minus esse illis quæ fiunt ex $C B, B A$, rectangulo bis $C B, B D$ contento. Cum enim recta $C B$ secta sit utcumque in D ; erunt quæ ex $C B, B D$ quadrata æqualia bis $C B, B D$ contento, & illi quod ex $D C$ quadrato. Commune addatur,

b prop.
7. 2.



quod ex $A D$: Ergo quæ ex $C B, B D, D A$ quadrata, æqualia sunt bis $C B, B D$ contento, & quadratis quæ ex $A D, D C$. Sed illis, quæ ex $B D, D A$, quale est quod ex $A B$ (est enim angulus ad D rectus) illis verò quæ ex $A D, D C$ æquale est quod ex $A C$. Ergo quæ ex $C B, B A$, æqualia sunt & illi quod ex $A C$ quadrato; & illi quod bis $C B, B D$ continetur. Quare quod ex $A C$ quadratum minus est illis, quæ ex $C B, B A$ quadratis, rectangu-


lo bis B C, B D. contento. In triangulis ergo acutangulis, &c. Quod demonstrare oportuit.

Propos. 14. Probl. 2.

Dato rectilineo æquale quadratum constituere.

E Sto rectilineum A, cui oporteat æquale quadratum constituere. *a* Fiat rectilineo A æquale parallelogrammum rectangulum B D. Si igitur B E, E D fuerint æquales, factum est quod petitur; etiam enim rectilineo A æquale quadratum B D. Si

a prop.
45. 1.



non; erit una ipsarum B E, E D maior: Sit maior B E, quæ producat in F, *b* fiatq; F E, ipsi E D equalis, *c* biseceturq; F B in G, & centro G, intervallo G B, aut G

b prop.
2. 1.
c prop.
10. 1.

F describatur semicirculus B H F, & producat D E in H, ducaturq; G H. Cum itaq; recta B F secunda sit æqualiter in G, inæqualiter in E; *d* erit quod B E, E F continetur, cum eo quod ex E G quadrato, æquale ei quod ex G F quadrato. Sunt autem G F, G H æquales. Quod ergo B E, E F continetur cum eo quod ex G E, æquale est illi, quod ex G H; illi verò quod ex G H, æqualia sunt quæ ex H E, G E quadrata: ergo quod B E, E F continetur, cum eo quod ex G E, æquale est illis, quæ ex H E, G E Commune auferatur, quod ex G E; & erit reliquum, quod B E, E F continetur, æquale ei, quod ex E H quadrato: sed quod B E, E F continetur, est ipsum B D, siquidem E F, E D sunt æquales: parallelogrammum ergo B D æquale est ei quod ex H E, quadrato; Est autem B D æquale rectilineo A: er-

d prop.
5. 2.
e prop.
47. 1.

go rectilineum A æquale est quadrato ex EH descripto. Dato ergo rectilineo A, æquale quadratum constituimus, id nimirum quod ex EH. Quod facere oportuit.

ELEMENTVM

TERTIVM

EVCLIDIS.

Definitiones.

1



Equales circuli sunt, quorum diametri sunt æquales; vel quorum quæ ex centris sunt æquales.

2

Recta linea circulum tangere dicitur, quæ contingens circulum, & producta ipsum non secat. *In figura propof 16. linea AE tangit circulum ABC. In 18 & 19. DE tangit circulum ABC.*

3

Circuli se tangere dicuntur, qui se ipsos contingentes, se ipsos non secant. *Circuli se contingunt aut intus, ut Propof. 6. circuli ABC, DEC; aut extus, ut Propof. 12. circuli BAC, DAE.*

4

In circulo æqualiter à centro distare dicuntur rectæ lineæ, cum à centro ad ipsas perpendiculares ductæ æquales fuerint. *Vt Propof. 14. linea AB, CD à centro E, æqualiter distant quod EF, EG sint æquales.*

5

Magis distare dicitur, in quam maior perpendicularis cadit.

6

Portio circuli, est figura quæ recta linea & circuli

circuli circumferentia continetur. *Vt in prima propof. sunt portiones ACB , AEB .*

7 Portionis angulus est, qui recta linea, & circuli circumferentia continetur. *Vt in prima propof. sunt anguli CAB , EAB , recta AB , & peripherijs CA , EA contenti.*

8 In portione angulus est, cum in circumferentia portione acceptum punctum fuerit, & ab ipso ad terminos rectæ lineæ, quæ est basis portionis, iunguntur rectæ, angulus inquam his rectis contentus. *Vt in 26. propof. angulus EDF est in portione EDF .*

9 Quando vero lineæ angulum continentes, assumunt peripheriam, in illa insistere angulus dicitur. *Vt in propof. 27. angulus EDF insistit peripheriæ EF .*

10 Sector circuli est, quando angulus ad centrum circuli constiterit, figura contenta rectis lineis angulum comprehendentibus, & peripheria ab ipsis assumpta. *Vt in propof. 27 sector dicitur figura EHF .*


11 Similes circuli portiones sunt, quæ capiunt æquales angulos, aut in quibus anguli æquales consistunt.

Propof. 1. Probl. 1:

Dati circuli centrum inuenire:

F Sto datus circulus ABC , cuius centrum inuenire oporteat. Ducatur quædam recta linea AB vtrunque, & biseceturq; in D ; atq; per D ipsi AB ad b angulos rectos erigatur DC , & quæ producat in E , & d bisecetur CE in F . Dico F centrum esse circuli ABC . Si non; fit, si fieri potest, G , ducanturque GA , GD , GB ; & cum AD , DB

d prop. æqualis fiat, communis DG; erunt duæ AD, B
 10. 1. G, duabus GD, DB æquales, altera alteri; & ba-
 e prop. sis GA æqualis basi G
 8. 1. B; sunt enim ex centro
 f prop. G: ergo & anguli AD
 8. 1. G, GDB æquales erunt:
 Cum autem recta su-
 per rectam consistens
 angulos deinceps æqua-
 les fecerit, rectus erit
 vterq; angulorum: re-
 ctus ergo est GDB; sed
 & FDB rectus est; est
 ergo angulus, FDB æ-
 qualis angulo GDB,



maior minori, quod fieri nequit. Non ergo G cen-
 trum est. Similiter ostendemus quod præter F
 nullum aliud: F ergo centrum est. Quod inueni-
 re oportuit.

Corollarium.


EX his manifestum est, si in circulo recta quæ-
 dam rectam quandam bisariam, & ad angu-
 los rectos secet, in secante centrum circuli esse.

Propos. 2. Theor. 1.

*Si in circuli peripheria duo puncta accipian-
 tur, recta illa coniungens intra cir-
 culum cadet.*

Esto circulus ABC, & in eius peripheria ac-
 cipiantur quæcunq; duo puncta A, B. Dico
 rectam

rectam, que ex A in B ducitur intra circulum cadere. Si non: Cadat, si fieri potest, extra, ut AEB, & accipiatur centrum circuli ABC, quod sit D, iunganturque DA, DB, & producat DF in E.



Quia DA α equalis a def. 15.
est ipsi DB; β erit & b prop. 5. 11. 6
angulus DAE angulo
DBE α equalis; cumq;
trianguli DAE vnum
latus AE productum
sit in B; γ erit angulus c prop. 16. 1.
DEB maior angulo
DAE: α equalis sunt au
tem anguli DAE, DBE,
maior ergo est DEB
angulus quam DAE;
maior autem angulus
maius latus sub
tendit; maius ergo est

DB latus, quam DE α at DB ipsi DF α quale est;
maius ergo est DF, quā DE, minor maiore, quod
fieri nequit. Non ergo quæ ex A in B ducitur extra
circulum cadit. Similiter ostendemus quod nec
in ipsam peripheriam; cadet ergo extra. Si ergo in
circulo, &c. Quod oportuit demonstrare.

Propos. 3. Theor. 2.

Si in circulo recta quadam linea per centrum
ducta, rectam non per centrum ductam bi
secet, & ad angulos rectos ipsam secabit:
Et si ad angulos rectos ipsam secet, bifa
riam quoque secabit.

F Sto circulus A B C, & recta quædam C D per centrum, rectam quandam A B non per centrum ductam bisecet in F. Dico quod & ad angulos rectos ipsam secet. Accipiat enim centrum E, ducanturq; E A, E B. Cumque A F, F B æquales sint, communis F E; erunt duæ A F, F B & duabus F B, F E, æquales basisq; E A, basi E B; ergo & angulus A F E angulo B F E æqualis erit. Cum autem re-

b def.
10. 1.



c prop.
5. 1.


d prop.
26. 1.

cta super rectam consistens angulos deinceps æquales fecerit, & rectus erit uterque æqualium angulorum: uterq; ergo A F E, B F E rectus erit: ergo C D per centrum ducta bisecans A B non per centrum ductam, & ad angulos rectos ipsam secabit. Sed iam C D ad angulos rectos secet ipsam A B; dico & bisecare ipsam, hoc est, A F, F B æquales esse. iisdem constructis, cum E A, E B æquales sint; erunt & anguli E A F, E B F æquales: est autem rectus A F E recto B F E æqualis: duo ergo triângula E A F, E F B, duos angulos duobus angulis æquales habentia, & vnum latus vni lateri, nempe commune E F, quod vni æqualium angulorum subtenditur, & habebit & reliqua latera reliquis æqualia: æquales ergo sunt A F, F B. Si ergo in circulo, &c. Quod oportuit demonstrare.



Propos. 4. Theor. 3.

*Si in circulo duæ rectæ lineæ se mutuo secant,
non per centrum ductæ, se bifariam
non secabunt.*



E Sto circulus A
BCD, in eoq;
duæ rectæ AC, BD
non per centrum dū-
ctæ, se inuicem in E
secant. Dico quod
se bifariam non se-
cant. Si fieri potest,
se bifariam secant;
sintq; & AE, EC; &
DE, BE æquales; &

accipiatur centrum F ducaturq; FE. Cum ergo re-
cta quædam FE per centrum ducta, rectam quan-
dam AC non per centrum ductam bisecet, ad re-
ctos æ angulos ipsam secabit: angulus ergo FEA ^{a prop.}
rectus est. Rursum cum recta FE, rectam quandam ^{3. 3.}
BD non per centrum ductam bisecet, ad b angulos ^{b prop.}
rectos ipsam secabit; rectus ergo est FEB. ^{3. 3.} Oten-
sus autem est & FEA rectus: ergo FEA, æqualis
est FEB, minor maiori, quod fieri nequit: non ergo
AC, BD se bifariam secant. Si ergo in circulo, &c.
Quod oportuit demonstrare.

Propositio 5. Theor. 4.


*Si duo circuli se inuicem secuerint, non erit
ipsorum idem centrum.*

DVo circuli ABC, CDG se inuicem secant
in B, & C. dico ipsorum non esse idem cen-
trum.

trum. Si est; Esto E, iungatur EC; & ducatur EFG
 utcumq. Et quia E centrum est circuli ABC, erit
 EC æqualis EF.
 Rursus quia E cē
 trum est circuli
 CDG b erit &
 EC æqualis EG:
 Ostensa est au-
 tem EC æqualis
 EF. erit igitur E
 F æqualis EG,
 minor maiori.
 Quod fieri ne-
 quit. Non ergo
 E centrum est circulorum ABC, CDG. Si ergo
 duo circuli, &c. Quod oportuit demonstrare.

a def.
 15. 1.

b def.
 15. 1.




Propos. 6. Theor. 5.

*Si duo circuli interius se contingant, non erit
 illorum idem centrum.*

a def.
 15. 1.

b def.

15. 1.




Duo circuli ABC,
 CDE se tangant
 interius in C. Dico il-
 lorum non esse idē cen-
 trum. Si est: Esto F,
 iungaturq; FC, & du-
 catur FEB utcumque.
 Cum ergo F centrum
 sit circuli ABC, erit
 FC æqualis FB. Et cū
 F centrum etiam sit circuli CDE, b erit FC æqua-
 lis

lis FE: demonstrata est autem & FC æqualis EB: ergo FE æqualis est FB, minor maiori; quod fieri nequit. Non ergo F centrum est circularum ABC, CDE. Si ergo duo circuli, &c. Quod demonstrare oportuit.

Propol. 7: Theor. 6.

Si in diametro circuli accipiaturn punctum, quod centrum non sit, ab eoq; in circulum cadant rectæ quædam, maxima erit in qua est centrum; minima reliqua. aliarum verò propinquior ei, quæ per centrum transit remotiore semper maior est: Duæ autem tantum æquales à puncto in circulum cadent ad utraq; partes ipsius minime.




E Sto circulus AB CD, diametrus eius AD, in qua sumatur punctum quodvis F, quod centrum non sit: Centrum autem sit E: Cadant ab F ad circulum rectæ quædā FB, FC, FG. Dico maximam esse FA, minimam FD, aliarum FB maiorem, quam F

C; & FC maiorem quam FG. iungantur enim BE, CE, GE. Et quia omnis trianguli a duo latera a prop. reliquo maiora sunt, erunt EB, EF maiores BF; 29.1.

Est

Est autem AE ipsi BE æqualis; sunt ergo BE, EF æquales ipsi AF ; maior igitur est AF quam BF . Rursum cum BE, CE æquales sint communis E ; erunt duæ BE, EF , duabus CE, EF æquales: sed ax. 9. angulus BEF maior est angulo CEF : erit igitur & basis BF maior basi CF . Eandem ob causam maior est CF , quam FG . Rursum cum GF, FE



maiores sint quam E G : & EG, ED æquales; erunt GF, FE maiores quam ED ; communis auferatur EF ; reliqua ergo GF , reliqua FD maior erit. Est ergo FA maxima; minima DF ; maior autem FB , quam FC , & hæc maior quam FG . Dico secundo, quod ex F duæ tantum æquales

c prop. ad circumulum cadant vtrinq; à minima DF . Con-
 23. 1. stituatur enim ad E rectæ EF , angulus FEH æqualis angulo GEF , ducaturq; FH . Cum ergo GE, EH æquales sint, communis EF erunt duæ GE, BF , duabus HE, EF æquales, angulūq; GEF , angulo HEF æqualis: igitur & basis FG basi FH erit æqualis. Dico tertio, quod ipsi FG nulla aliæ æqualis ex F ad circumulum cadat. Si enim cadit; Cadat FK . Cum ergo vtraq; FK, FH ipsi FG sit æqualis; g erit & FK ipsi FH æqualis: propinquior ergo ei, quæ est per centrum, æqualis est remotiori, quod fieri nequit. Vel sic. Ducatur EK . Cum ergo GE, EK æquales sint, communis FE , item & basis GF basi FK æqualis; i erit & angulus GEF

GE F angulo K E F æqualis : sed G E F æqualis est angulus H E F : ergo & H E F æqualis erit ipsi K E F, minor maiori, quod fieri nequit . Non ergo ab F plures vna ipsi G F æquales ad circulum cadunt . Si ergo in diametro, &c. Quod oportuit demonstrare.

Propositio 8. Theor.7.

Si extra circulum accipiatur punctum, ab eoq; ad circulum ducantur rectæ quædam lineæ, quarum vna per centrum transeat, reliquæ ut libet. Earum quidem, quæ in cauam peripheriam cadunt, maxima est, quæ est per centrum: aliarum verò propinquior ei, quæ per centrum, remotiore semper maior est . At earum, quæ in conuexam peripheriam cadunt, minima est, quæ inter punctum & diametrum interijcitur; aliarum verò, quæ propinquior minimæ semper remotiore minor est. Duæ autem tantum æquales à puncto in circulum cadunt ad utraq; partes minimæ .

ESto circulus A B C, extra quem accipiatur punctum D, ab ipsoq; ducantur rectæ quædã ad circulum D A, D E, D P, D C, ducaturque D A per centrum . Dico quod cadentium ad cauam peripheriam A E P C maxima sit, quæ per centrum transit, D A; minima, quæ inter punctum D, & diametrum A G interijcitur, quæ est D G; maior autem D E, quam D P, & hæc maior quam D C. Earum

rum verò quę in conuexam peripheriam $HLKG$ cadunt semper propinquior $MINIMA$ EDG ,

minor est remotiore, hoc est, DK minor est quam DL , & hæc minor quam DH . Accipiatür centrū M , iunganturq; ME , MP , MC , MH , ML , KM . Et cum AM , EM a æquales sint, communis addatur MD , eritq; AD æqualis vtriusq; EM , MD ; sed EM , MD b maiores sunt quam ED : ergo & AD maior est quā ED . Rursus ME , MP æquales sunt, communis addatur MD ; eruntq; EM , MD æ-

quales ipsis PM , MD : sed angulus EMD maior est angulo $PM D$: c ergo & basis ED maior est basi PD . Similiter ostendemus PD maiorem esse CD . Maxima ergo est DA , maior DE quam D P , & DP maior quam DC . Cumq; MK , KD d maiores sint quam MD ; & MG æqualis MK ; e erit reliqua KD maior reliqua GD : Quare GD minor est quam KD , est enim omnium minima. Et quia linea MK , KD à terminis lateri MD intra triangulum MLD constitutę sunt, f erunt illę minores quam ML , LD : sunt autem MK , ML æquales: ergo reliqua DK minor est, reliqua DL . Eodem modo ostendemus DL minorem esse DH .

Mini-

a def. 15.

b prop.
20. 1.

c prop.

24. 1.


d prop.

20. 1.

e ax. 5.

f prop.

21. 1.



Minima ergo est DG ; minor autem DK quam D
 L , & DL minor quam DH . Deinde dico, quod à
 puncto D tantum duæ æquales in circulum cadant
 ad utrasq; partes Minimæ. *g prop.*
 Constitutur ad M li- 32. 1.
 neæ MD angulo KMD æqualis DMB , ducatur-
 que DB . Cum ergo MK , MB æquales sint, MD
 communis; erunt duæ KM , MD , duabus BM , M
 D æquales, altera alteri, sunt verò & anguli KMD ,
 BMD æquales, *h prop.*
 erunt igitur & bases DK , DB æquales. Dico tertio recta DK à puncto D ad 4. 1.
 circulum æqualem aliam non cadere. Si enim po-
 test, cadat DN . Cum ergo DK sit æqualis DN ;
 & ipsi DK æqualis DB ; erit, & DB ipsi DN æ- *i ax. 1.*
 qualis: propinquier minimæ remotiori, quod fieri
 non posse demonstratum est. Aliter. Ducatur MN .
 Cum igitur KM , æqualis sit MN , communis M ,
 D , & basis DK æqualis basi DN , *k prop.*
 erit & angulus 3. 1.
 KMD angulo DMN æqualis: sed KMD æqua-
 lis est angulo BMD : ergo & BMD æqualis erit
 NMD , minor maiori; quod fieri nequit: Non er-
 go plures quam duæ à puncto D ad circulum ABC
 C æquales ad utrasq; partes DG cadunt. Si ergo
 extra circulum, &c. Quod demonstrare oportuit.


Propos. 9. Theor. 8.

*Si intra circulum accipiatur punctum, ab eoq;
 ad circulum plures quam duæ æquales
 rectæ cadant, erit acceptum pun-
 ctum centrum circuli.*

E Sto intra circulum ABC acceptum punctum
 D , ab eoque ad circulum ABC plures quam
 duæ

duæ rectæ æquales cadant, nempe DA, DB, DC .
 Dico D centrum esse circuli ABC . iungantur AB, BC . bisecenturque in E & F , & iunctæ ED, DF ,

producantur in G, K : & H, L . Cum ergo AB æqualis sit BC , communis ED : erunt duæ AE, ED , duab. BE, ED æquales; est a verò & basis DA basi DB æqualis: erit b igitur & angulus ABD angulo BED æqualis: c rectus ergo uterque est, secat d ergo GK ipsam AB bifariam,



a ex hy-

pothefi.

b prop.

8. 1.

c def.

10. 1.

d prop.

33.

e Corol

prop. 1.

3.

& ad angulos rectos. Et quia, e quando in circulo recta rectam secat bifariam & ad angulos rectos, in secante centrum est circuli, erit in GK centrum circuli ABC . Eadem ratione centrum erit in HL : & nullum aliud commune punctum habent rectæ GK, HL præter D : ergo D centrum circuli ABC . Si ergo intra circulum, &c. Quod oportuit demonstrare.

Aliter.


INtra circulum ABC sumatur punctum D , ab eoq; ad circulum plures quam duæ rectæ æquales cadant, DA, DB, DC . Dico D esse centrum circuli ABC . Si non est. Esto E , & iuncta DE producat in F & G . a Est autem FG diametrus circuli ABC . Cum ergo in diametro FG acceptum sit punctum D , quod centrum circuli non est; b erit DG maxima; maior autem DC quam DB , & DB maior quam DA ; sed & æquales sunt; quod fieri

a def.

17. 1.

b prop.

7. 3.




feri non potest. Ergo centrum circuli A B C non est. Similiter ostendimus quod præter D aliud nullum; D ergo centrum est circuli.

Propos. 10. Theor. 9.

Circulus circulum in pluribus, quam duobus punctis non secat.

SI fieri potest secet circulus A B C circulum D E F in pluribus punctis quam duobus, ut in B,



G, F, H, iunctæq; BG, B H a bisecentur in K & L; atq; ex K, & L ipsis BG, B H ad $\angle$ angulos rectos ductæ KC, LM, in A, & E producuntur. Cum ergo in circulo A B C re-


cta quædam AC, rectam quandam BH bifariam, & ad angulos rectos secet, erit in AC centrum circuli A B C. Rursus cum in eodem circulo A B C recta quædam NX rectam quandam BG bifariam,

d prop. *5. 3.* *iam, & ad angulos rectos secet, d erit in NX* centrum circuli *ABC*. Demonstratum autē est quod & in *AC*: atqui in nullo alio puncto, rectę *AC*, *NX* concurrunt, quam in *O*: est ergo *O* centrum circuli *ABC*. Similiter demonstrabimus centrum circuli *DEF* in *O* esse: duorum ergo circularum *ABC*, *DEF* se invicem secantium idem est centrum *O*: e quod fieri nequit. Non ergo circulus circum-

5. 3.

Aliter. Circulus *ABC* circumlūm *DEF*, in pluribus quam duobus punctis secet, ut in *B*, *G*, *H*, *F*. Accipiat circuli *ABC* centrum *K*, iunganturque

KF, *KG*, *KB*. Cum ergo intra circumlūm *DEF* acceptum sit punctum *K*, ab eoq; ad circumlūm *DEF* cadant plures quam duę rectę equales *KB*, *KF*, *KG*, erit *K* centrū circuli *DEF*: sed est etiam centrum circuli *ABC*: Duorum ergo circularum se secantium idem



a prop.
9. 1.

b prop. *5. 3.* est centrum; b quod fieri non potest. Non ergo circulus circumlūm in pluribus quam duobus punctis secat. Quod oportuit demonstrare.


Propos. 11. Theor. 10.

Si duo circuli se interius contingant, recta linea eorum centra coniungens, si producat, cadet in contactum circularum.

DVo circuli *ABC*, *ADE* interius se contingant in *A*. Accipiat circuli quidem *ABC* centrum

cen-

sint F, G. Dico, quod, quæ F, G iungit, per contactum A transeat. Si non: transeat, si fieri potest,



a def.

15.

b prop.

20. 1.


vt F C D G; & iungantur A F, A G. Cum igitur F centrum sit circuli A B C; ærit F A, æqualis F C: Et cum G sit centrum circuli A D E, erit & G A ipsi G D æqualis. Oñsa est autem & F A æqualis F C. Sunt ergo F A, A G ipfis F C, D G æquales: Quare tota F G maior erit ipfis F A, A G: sed & b minor est: quod fieri non potest. Non ergo quæ ex F in G ducitur aliorsum quam per A contactum transit. Si ergo duo circuli, &c. Quod oportuit demonstrare.

Propos. 13. Theor. 12.

Circulus circulum in pluribus punctis vno non tangit, siue interius, siue exterius tangat.

SI fieri potest, tangat primo circulus A B D C circulum E B F D interius in pluribus quam vno punctis, vt in B, D: & sumatur circuli A B D C centrum G: circuli E B F D centrum H: ergo recta
a prop. 11. 3. centra G, H iungens, a cadet in contactus B, D; & a-
dat

dat & sit $B G H D$. Cum igitur G sit centrum circuli $A B D C$; erit $B G$ æqualis ipsi $G D$; maior igitur est $B G$ quam $H D$ multo ergo maior $B H$, quam $H D$. Rursus cum sit H centrum circuli $E B F D$, æqualis erit $B H$ ipsi $H D$: ostensa est autem multo illa maior, quod fieri nequit: Non igitur circulus circulum interioris pluribus quam vno puncto tangit. Dico quod neq; exterius. Si enim fieri potest, tangat circulus $A C K$



circulum $A B D C$ exterius in pluribus punctis vno, ut in A , & C , iunganturq; A, C . Cum ergo in peripheria circulorum $A B D C$, $A C K$ accepta sint quæcunq; puncta A , & C , & cadet recta illa coniungens intra utrumque circulum. Sed cadit quidem in circulum $A B D C$; extra verò circulum $A C K$. Quod est absurdum. Non ergo circulus circulum extra in pluribus punctis vno tangit. ostensum est autem quod neq; interioris. Circulus ergo, &c. Quod oportuit demonstrare.

Propositio 14. Theor: 13.

In circulo æquales rectæ lineæ æqualiter à centro distant. Et, quæ æqualiter à centro distant, æquales sunt.

SVnto in circulo $A B D C$ rectæ $A B, C D$, æquales. Dico eas æqualiter à centro distare. Esto centrum E , à quo ad rectas $A B, C D$ perpendiculares

Iares ducantur E F, E G, & iungantur A E, E C: Cum ergo recta E F per centrum ducta, rectam quandam

A B non per centrum ductam, ad angulos rectos secet; b & bifariam eam secabit: æquales ergo sunt A F, F B. Ergo A B dupla est ipsius A F. Ob eandem causam est C D, dupla ipsius C G: c æquales ergo sunt A F, C G: cum igitur a & A B, E C æquales sint, erunt & quadrata ipsarum A E, E C



b prop.

3. 4.

c ax 7.

d defi-

nit. hu-

ius.

f prop.

47. 1.

g def.

3. 1.

h prop.

47. 1.

æqualia. Sunt autem ei quadrato f quod ex A E, æqualia quæ ex A F, E F (est enim angulus ad F rectus) ei autem, quod ex E C æqualia sunt, quæ ex E G, G C (nam & angulus ad G rectus est.) Sunt ergo quæ ex A E, B F æqualia illis, quæ ex C G, G E. Cum ergo quod ex A F, æquale sit illi, quod ex G C (sunt enim A F, G G æquales) erit & reliquum, quod ex F E, reliquo quod ex E G, æquale: sunt ergo E F, E G æquales. g In circulo autem æqualiter à centro abesse dicuntur rectæ, quando perpendiculares ex centro ad ipsas ductæ, æquales fuerint. Sed iam distent A B, C D æqualiter à centro, hoc est, E F, E G sint æquales. Dico A B, C D æquales esse. iisdem constructis, demonstrabimus, ut prius, A B duplam esse ipsius A F, & C D ipsius C G. Cūq; A E, C E æquales sint; erunt & earum quadrata æqualia. h Sunt verò ei, quod ex A E æqualia, quæ ex E F, F A: & ei, quod ex C E, illa quæ ex E G, G C: ergo quæ ex E E, F A, sunt illis quæ ex E G, G C æqualia. Cum autem ei quod ex E G æquale sit quod ex E F (sunt enim E G, E F æquales) erit & reli-

reliquum, quod ex AF , reliquo, quod ex CG , æquale, æquales ergo sunt AF , CG . Est autem ipſus AF dupla AB ; & ipſus CG dupla CD ; æquales ergo sunt AB , CD . In circulo ergo æquales reſt, &c. quod oportuit demonſtrare.

Propoſ. 15. Theor. 14.

In circulo maxima eſt diameter: aliarum vero ſemper quæ propinquier eſt centro remotiore maior eſt.

Eſto circulus $ABCD$, cuius diameter AD , centrum E ; propinquier diametro BC , remotior ſit FG . Dico maximam eſſe, AD , maiorem BC , quam FG . *a prop.*



tur enim à centro ad BC , FG perpendiculares EH , EK . Et quia BC propinquier eſt centro, remotior FG : *b def.*

erit EK , quam EH . *c prop.*

Ponatur ipſi EH equalis EL ; & per L ducatur ipſi EK ad angulos rectos LM ; qua ducta in N iungantur EM , EN , EF . *d prop.*

Ecce. Cum ergo EH ipſi EL ſit æqualis, *e* erit & BC ipſi MN æqualis. Rurſus cum AE ipſi EM , ED ærò ipſi EN ſit æqualis; erit & AD ipſi ME , NE æqualis: ſed f ME , NE ipſa MN maiores ſunt: erit ergo & AD maior quam MN . Et quia duæ ME , EN , duabus FE , EG æquales ſunt; angulus vero MEN maior angulo FEG : *g prop.* *24. 1.* erit & baſis MN maior baſi FG : ſed MN oſtenſa eſt æqualis BC : ergo & BC maior eſt quam FG . Maxima ergo

F 4 eſt

est diameter; maior B C quam F G. Si ergo in circulo, &c. Quod oportuit demonstrare.

Propos. 16. Theor. 15.

Quæ diametro ad angulos rectos ab extremitate ducitur, extra circulum cadit. Et in locum, qui inter rectam lineam & peripheriam interijcitur, alia recta non cadit. Et semicirculi angulus omni acuto rectilineo maior est, reliquus autem minor.

Esto circulus A B C circa centrum D, & diameter A B. Dico rectam lineam ab A ipsi A B ad angulos rectos ductam extra circulum cadere. Si non: cadat, si fieri potest, intra, ut A C, & iungatur D C. Cum ergo D A sit æqualis D C,

erit & angulus D A C angulo A C D æqualis: est autem D A C* rectus, rectus ergo erit & A C D: sunt ergo D A C, A C D duobus rectis æquales, & quod fieri æquit: Non ergo quæ ab A puncto ipsi B A ad angulos rectos ducitur, intra circulum cadit.


Similiter ostendemus quod

nec in peripheriam: ergo extra cadit, ut A E. Dico secundò, in locum inuer A E, & peripheriam C H A interiectum, aliam rectam non cadere. Si potest: Cadat, ut F A, ducaturq; ex D ipsi F A perpendicularis D G. Et cum angulus A G D rectus sit, &

minor

* ex hypothesis.

a prop.
32. 1.



minor recto DAG ; & erit AD maior quam DG : *b prop.*
 est autem DA æqualis ipsi DH ; maior ergo est D *32. 1.*
 H , quam DG , minor maiore; quod fieri nequit. *c prop.*
 Non ergo in locum recta AE , & periphæria CH *19. 1.*
 A interceptum, alia recta cadit. Dico tertio an-
 gulum semicirculi recta AB , & periphæria CHA
 contentum, omni acuto rectilineo maiorem esse;
 reliquum verò periphæria CHA , & recta AE con-
 tentum, minorem. Si enim est aliquis angulus ma-
 ior contento recta BA , & periphæria CHA ; mi-
 nor verò contento periphæria CHA , & recta AE
 E , cadat inter periphæriam CHA , & rectam AE
 linea recta, quæ faciat angulum maiorem recta B
 A , & periphæria CHA contentum (qui rectis li-
 neis contineatur) minorem verò periphæria CH
 A , & recta AE contentum: at non cadit. Non ergo
 erit angulus acutus rectis lineis contentus, qui ma-
 ior sit angulo recta BA , & periphæria CHA con-
 tento; neq; minor, CHA , & AE contento.

Corollarium.

EX his manifestum est rectam, quæ diametro
 ab extremitate ad angulos rectos ducitur, cir-
 culum tangere. & rectam circum in vno duntaxat
 puncto tangere: siquidem quæ circulo in duobus *d prop.*
 punctis occurrunt, & intra circum cadere osten- *2. 3.*
 sum est. Quæ ergo diametro, &c. quod oportuit
 demonstrare.



Propos. 17. Probl. 2.

A dato puncto rectam lineam ducere, quæ datum circumulum tangat.

E Sto punctum datum A, circulus datus B C D.

Oporteat autem ex puncto A rectam ducere,

quæ circumulum B C D tangat. Accipiat

centrum circuli E, ducaturq; A E,

& centro E, intervallo E A describatur circulus A

F G, & ex D rectæ E A ad

angulos rectos ducatur D F,

iunganturque E B, F, A B. Dico à puncto A re-

ctam A B ductam esse, quæ circumulum B C D tangat.

Cum enim E cœtrum sit circumulorum B C D, A F G;

b def. b erunt tam E A, E F, quam E D, E B æquales: duæ

15. 1. ergo A E, E B duabus F E, E D æquales sunt, ha-

c prop. bentque angulum E communem: c erit igitur basis

4. 1. D F basi A B æqualis; & triangulum D E F, trian-

gulo E B A æquale; reliquiq; anguli reliquis: est igitur

ipsi E D F æqualis E B A: at E D F rectus est; erit

d Corol igitur & E B A rectus. Est verò E B ex centro: &

prop. 16 quæ autem diametro circuli ad rectos ducitur recta

3. linea, tangit circumulum: tangit ergo A B circumulum.


A dato ergo puncto, &c. Quod oportuit demon-

strare.



Propositio 18. Theor. 16.

Si circulum tangat linea quadam recta, à centro autem ad tactum recta ducatur, erit illa ad tangentem perpendicularis.



T Angat, re-
cta qu-
dam DE circu-
lum ABC in
C, sumaturque
centrum F, & q;
ab F ad C du-
catur FC. Di-
co FC ad DE

perpendicularem esse. Si non: ducatur ab F ad D
E perpendicularis FG. Cum ergo angulus FGC
rectus sit; a erit GCF acutus: b cumq; maiori an-
gulo maius latus subtendatur, erit linea FC maior,
quam FG: Est verò FC c æqualis ipsi FB: maior
est ergo FB, quam FG, minor maiore, quod est ab-
surdum: non ergo FG ad DE perpendicularis est.
Similiter ostendemus præter FC nullam aliam: F
C ergo ad DE est perpendicularis. Si ergo circu-
lum tangat, &c. Quod oportuit demonstrare.

a prop.

32. 1.

b prop.

19. 1.

c def.

15.

Propos. 19. Theor. 17.

*Si recta linea circulum tangat, & à tactu tan-
genti recta quadam ad angulos rectos du-
catur, erit in illa centrum circuli.*

T Angat circulum ABC recta DE in C, & ex
C ipsi DE ad angulos rectos ducatur CA.
Dico


Dico in C A esse centrum circuli. Si non: sit, si fieri potest, E , iungaturq; CF . Cum ergo circu-

lum ABC tangat recta DE , & à centro ad tactum ducta sit FC , & erit FC ad DE perpendicularis: angulus ergo FCE rectus est: est verò & ACE rectus: æqualis ergo est angulus FCE , angulo ACE , mi-

nor maiori; quod est absurdum: F ergo centrum circuli ABC non est. Similiter ostendemus nullum aliud esse, præter id quod in A C . Si ergo recta linea, &c. Quod demonstrare oportuit.

Propos. 20. Theor. 18.

In circulo angulus ad centrum duplus est anguli ad peripheriam, quando eandem peripheriam pro basi habent.




E Sto in circulo A B C angulus ad centrum BEC , ad peripheriam BAC , sitq; utriusq; basis peripheria BC . Dico angulum BEC duplum esse anguli BAC iuncta enim AE producat in F .
Cum

Cum $\angle$ ergo EAB $\angle$ equalis sit ipsi EB ; erit & angulus EAB $\angle$ equalis angulo EBA : Sunt ergo EAB , EBA dupli ipsius EAB : est $\angle$ autem BEF $\angle$ equalis duobus EAB , EBA : Est ergo BEF duplus ipsius EAB . ob eandem causam est angulus FEC duplus anguli EAC : totus ergo BEC totius BAC duplus est. Sit alter angulus BDC , iunctaque DE producatur in G ; & similiter demonstrabimus angulum GEC duplum esse anguli EDC : quorum GEB duplus est ipsius EDB : reliquus ergo BEC duplus erit reliqui BDC . Si ergo in circulo, &c. Quod oportuit demonstrare.

a def.
15. 1.
b prop.
32. 1.

Propositio 21. Theor. 19.

In circulo qui in eadem portione sunt anguli,
equales sunt.



Sint in portione $BAED$ circuli $ABCD$ anguli BAD , BED . Dico illos $\angle$ equales esse. Accipiat^r centrum F ; ducanturq; BF , FD . Et quia angulus BFD ad centrum est; angulus BAD ad peripheriam, habentque basim eandem peripheriam BCD : $\angle$ erit angulus BFD duplus anguli BAD . Ob eandem causam

a prop.
20. 3.


erit angulus BFD duplus anguli BED ; Sunt ergo BAD , BED $\angle$ equales. In circulo ergo, &c. Quod oportuit demonstrare.

Propof. 22. Theor. 20.

Quadrilaterorum in circulo descriptorum anguli, qui ex aduerso, duobus rectis æquales sunt.

S It in circulo $ABCD$ quadrilaterum $ABCD$. Dico angulos ex aduerso esse æquales duobus rectis. Ducantur AC, BD .

a prop.
32. 1.



b prop.
21. 3.

Quia ergo omnis trianguli tres anguli duobus rectis sunt æquales; erunt & trianguli ABC tres CAB, ABC, BCA duobus rectis æquales. Est autem CAB æqualis BD angulo (sunt enim in eadem portione $BADC$) & ACB ipsi ADB (sunt enim in portione $ADCB$).


totus ergo ADC duobus BAC, ACB æqualis est: Communis addatur ABC duobus BAC, ACB simul: & vni ADC seorsim; eruntque ABC, BAC, ACB duobus ABC, ADC æquales. c sed ABC, BAC, ACB æquales sunt duobus rectis: erunt ergo & ABC, ADC æquales duobus rectis. Similiter ostendemus & BAD, DCB æquales esse duobus rectis. Quadrilaterorum ergo, &c. Quod oportuit demonstrare.

c prop.
23. 1.



Propos. 23. Theor. 21.

Super eadem recta lineæ duæ circularum portiones similes, & inæquales ad easdem partes, non constituentur.



SI fieri potest, constituentur super eadē recta AB duæ circularum portiones similes, & inæquales ad easdē partes, ACB , ADB ; ductaq; ACD iungantur CB , BD . Cum ergo portio ACB similis sit portioni ADB , ^{a def.} & similes autem portiones æquales angulos capiant, erunt anguli ACB , ADB , æquales, ^{11. 3.} externus & internus oppositus, ^{b prop.} b quod fieri nequit. ^{16. 1.} Non ergo super eadem, &c. Quod oportuit demonstrare.

Propos. 24. Theor. 22.

Super æqualibus rectis lineis similes circularum portiones, æquales sunt.



Sint super æqualibus rectis AB , CD similes circularum portiones AEB , CFD . Dico illas esse

esse æquales. Congruente enim portione AEB
portioni CFD, positoq; A puncto super C, & re-



cta AB super CD, congruet & B ipsi D, quod AB,
CD æquales sint. Congruente autem recta AB
rectæ CD; congruet & portio AEB portioni
CFD. Quod si recta quidem AB congruat rectæ
CD; portio verò AEB, portioni CFD non con-
gruat; sed aliò cadat, vt CGD, secabit circulus cir-
culum in pluribus quam duobus locis vt in C, G,
a prop. D, & quod fieri nequit. Non ergo congruente re-
10. 3. cta AB rectæ CD, non congruet portio AEB,
b def. portioni CFD: Congruet ergo, b adeoq; æqua-
8. 1. lis illi erit. Si ergo super, &c. Quod oportuit de-
monstrare.



Propos. 25. Probl. 3.

*Data portione circuli, describere circum-
cuius est portio.*

a prop. **S** It data circuli portio ABC, oporteatque de-
10. 1. scribere circum, cuius ABC sit portio. &
b prop. Bisecetur AC in D, & ex D b ducatur ipsi AC ad
II. angulos rectos DB, iungaturq; AB. Angulus er-
go ABD, angulo BAD aut est maior, aut æqualis,
aut minor. Sit primo maior, & constituaturq; ad
c prop. A rectæ AB angulus BAE æqualis angulo ABD,
23. 1. produ-

producaturque DB ad E, & iungatur EC. Cum itaque angulus ABE sit æqualis angulo BAE, &

d. prop. 6. 1.



erit & EB æqualis ipsi AE & cum AD æqualis sit ipsi DC, si communis DE addatur, erunt huc AD, DE, duobus CD, DE æquales, altera alteri; & angulus ADE angulo CDE æqualis; est enim uterque rectus; e ergo & ba-

e prop. 4. 1.

sis AE basi CE æqualis erit. Sed ipsi AE demonstrata est BE æqualis; erit ergo & BE æqualis ipsi CE: tres ergo AE, BE, EC æquales sunt: si circulus ergo centro E, & intervallo vna ipsarum AE, EB, EC descriptus, transibit etiam per reliqua portio- nis puncta, & circulus descriptus erit. Circuli ergo portione data, descriptus est circulus, cuius est portio; & cum centrum extra portionem cadat, manifestum est, portionem minorem esse semicirculo. Similiter si ABD angulus, fuerit æqualis angulo BAD, gerit AD æqualis utrique BD, DC; ergo & tres, DA, DB, DC æquales sunt, & D centrum circuli, portioque semicirculus. Si vero angulus ABD minor fuerit angulo BAD, b constituatur ad A rectæ BA angulus BAE æqualis angulo ABD, h cadetque centrum in DB lineam intra portionem ABC, & erit portio ABG semicirculo maior.

f prop. 9. 3.

g ex stru- sitione, ex prop.

h prop. 23. 1.

G

Si ergo

Si ergo ducatur BC ostendetur ut in prima figura tres BE , EA , EC esse æquales. Data ergo portione circuli, descriptus est circulus, cuius est portio, quod oportuit facere.

Propos. 26. Theor. 22.

In æqualibus circulis æquales anguli æqualibus peripherijs insistant, siue ad centra, siue ad peripherias insistant.

IN circulis æqualibus ABC , DEF æquales insistant anguli ad centra, BGC , EHF ; ad peripherias BAC , EDF . Dico peripherias BKC ,




EKF æquales esse. Iungantur BC , EF . Et quia circuli æquales sunt, erunt & quæ ex centris æquales. Dux ergo BG , GC , duabus EH , HF æquales sunt: sed & anguli G , H æquales sunt: ergo & bases BC , EF æquales erunt. Et quia anguli ad A , D æquales ponuntur, erunt portiones BAC , EDF similes, & sunt in æqualibus rectis BC , EF , quæ autem circulorum portiones similes in æqualibus sunt rectis lineis, æquales sunt: portiones ergo BAC , EDF æquales sunt: Sunt verò & toti circuli æquales; reliqua ergo peripheria BKC , reliqua EKF æqualis est. In æqualibus ergo, &c. Quod demonstrare oportuit.

Propo-

Propositio 27. Theor. 24.

In aequalibus circulis anguli qui aequalibus insistent peripherijs, aequales sunt siue ad centra, siue ad peripherias insistant.

In aequalibus circulis $A B C$, $D E F$ aequalibus peripherijs $B C$, $E F$ insistant anguli ad centra



$B G C$; $E H F$; ad peripherias $B A C$, $E D F$ Dico tam angulos $B G C$, $E H F$, quam $B A C$, $E D F$ aequales esse. Si enim $B G C$, $E H F$ aequales sunt, & perspicuum est & $B A C$, $E D F$ aequales esse. Si vero sunt: erit unus maior. Sit maior $B G C$: & si constituantur ad punctum G rectae $B G$ & $G K$ angulus $B G K$ aequalis angulo $E H F$: & anguli autem aequales aequalibus peripherijs insistent, cum sunt ad centra: peripheriarum ergo $B K$ aequalis erit peripheriae $E F$ sed & $E F$ aequalis est $B C$: ergo & ipsi $B C$ aequalis erit $B K$, minor maiori; quod fieri non potest. Non ergo anguli $B G C$, $E H F$ inaequales sunt: aequales ergo. & Estque angulus ad A angulus $B G C$; & angulus ad D angulus $E H F$ dimidius: & sunt recti & anguli ad A , D aequales. In aequalibus ergo circulis, &c. Quod oportuit demonstrare.

a prop.

20. 1.

b prop.

23. 1.

c prop.

26. 3.

d prop.

20. 3.


e ax. 7.

1.

Propositio 28. Theor. 25:

*In æqualibus circulis æquales rectæ lineæ a-
quales peripherias auferunt, maiorem qui-
dem maiori; minorem autem minori.*

Sint in æqualibus circulis ABC , DEF æqua-
les rectæ BC , EF , auferentes peripherias ma-



iores BAC , EDF ; minores BGC , EHF . Dico-
tam maiores peripherias, quam minores æquales
esse. Sumantur enim circulorum centra K , L , &
ducantur KB , KC ; EL , LF ; & sunt circuli æqua-
les; *a* ergo & quæ ex centris æquales erunt: igitur
a *def.* *1.* *3.* duæ BK , KC , duabus EL , LF æquales sunt; sed
b *prop.* & bases BC , EF æquales sunt: *b* erunt ergo & an-
g. *1.* guli BKC , ELF æquales: *c* æquales autem angu-
c *prop.* li æqualibus peripherijs insistent cum fuerint ad
26. *3.* centra; ergo peripheriæ BGC , EHF æquales sunt;
sed & toti circuli sunt æquales: reliquæ ergo pe-
ripheriæ BAC , EDF æquales quoque erunt. Si
ergo in æqualibus circulis, &c. Quod oportuit
demonstrare.

Propos. 29. Theor. 26.

In æqualibus circulis æquales peripherias æquales rectæ lineæ subtendunt.


Accipiantur in æqualibus circulis ABC, DEF æquales peripheriæ, BGC, EHF, & ducantur rectæ BC, EF: Dico rectas BC, EF æquales esse. Sumantur enim circulorum centra K, L, & iungantur BK, KG; EL, LF: Cum ergo peripheriæ BGC, EHF æquales sint, æ erunt & anguli, BKC, ELF æquales; & cum circuli æquales sint; b erunt, & quæ ex centrīs æquales: Dux ergo BK, KC, duabus EL, LF æquales sunt, continentq. æquales angulos; æ ergo & bases BC, EF æquales erunt. In æqualibus ergo circulis, &c. Quod oportuit demonstrare.

fig. vi.
de prop.
præc.

a prop.
27. 3.
b def.
1. 3.
c prop.
4. 1.

Propos. 30. Probl. 4.

Datam peripheriam bifariam secare.



Esto data peripheria ADB, quam bifariam oporteat ducatur AB, æ bifeceturque in C; & à b puncto C ducatur ipsi AB ad angulos rectos CD, iunganturq. AD, DB. Et quia AC æqualis est CB, communis CD; erunt duæ AC, CD, duabus BC, CD æquales, & angulus ACD angulo BCD æqualis, est enim vterque rectus; æ erit ergo & basis AD basi DB æqualis; æ æquales autem rectæ æquales peripherias auferunt, maiorem ma-


a prop.
10. 1.
b prop.
11. 1.
c prop.
4. 1.
d prop.
29. 3.

iori, & minorem minori, estq; utraq; peripheriarum AD , DB minor semicirculo, quare peripheria AD æqualis est peripheriæ DB : data ergo peripheria bisecta est. Quod oportuit facere.

Propositio 31. Theor. 27.

In circulo angulus, qui in semicirculo rectus est; qui in portione maiore minor; qui in minore maior recto est. Insuper maioris portionis angulus maior recto; minoris recto minor est.

Esto circulus $ABCD$, diâmetrus BC , centrum E , & iungantur BA , AC , AD , DC . Dico



angulum BAC in semicirculo, rectum esse. ABC , qui est in portione maiore semicirculo, minorem; ADC , qui est in portione minore, maiorem recto. Ducatur AE , producatursque BA in F . Et quia BE , EA æquales sunt, erunt & anguli EAB , EBA æquales. Rursum, quia EA , EC æquales sunt, erunt & anguli EAC , ECA æ-

a prop.

5. 1.

b prop.

32. 1.

c def.

10. 1.

d prop.

17. 1.

quales: totus ergo BAC duobus ABE , ACE æqualis est. b Est vero, & FAC externus duobus ABC , ACB æqualis (æquales ergo sunt BAC , FAC); c ergo, rectus uterque. Quare angulus BAC in semicirculo BAC rectus est. d Et quia anguli ABC duo anguli ABC , BAC duobus rectis minores sunt; BAC autem rectus est; erit ABC minor recto; & est in portione ABC maiori semicirculo.

circulo. Rursus, quia $ABCD$ in circulo quadrilaterum *e prop.*
 est quadrilaterorum, autem in circulo descriptorum, qui 22. 3.
 ex aduerso anguli duobus rectis æquales sunt; erunt
 $\angle B$, $\angle D$ duobus rectis æquales; & est $\angle B$
 minor recto; reliquus ergo $\angle D$ maior; & est
 in portione minore semicirculo. Dico præterea
 maioris portiones angulum contentum periphe-
 ria ABC , & recta AC maiorem esse recto; mino-
 ris vero portiones peripheria ADC , & recta AC
 contentum, minorem. Quod per se apparet. Cum
 enim angulus rectis B , $\angle C$ contentus rectus sit,
 erit qui peripheria ABC , & recta AC continetur
 maior recto. Et cum angulus rectis A , $\angle C$ con-
 tentus, rectus sit; erit recta AC , & peripheria ADC
 contentus, minor recto. Aliter demonstratur $\angle BAC$
 rectum esse. Angulus AEC duplus est anguli BAE ,
 g æqualis enim est duobus internis & oppositis. *g prop.*
 Est vero & $\angle AEB$ duplus anguli EAC ; anguli ergo 32. 1.
 $\angle AEB$, $\angle AEC$ dupli sunt anguli BAC ; at $\angle AEB$,
 $\angle AEC$ æquales sunt duobus rectis; ergo $\angle BAC$
 rectus est.

Corollarium.

Ex his manifestum est, si in triangulo vnus an-
 gulus duobus sit æqualis, cum rectum esse, quod
 etiam, qui est ei deinceps, duobus rectis æqualis sit:
 scilicet autem anguli deinceps æquales fuerint, recti sunt.

Propos. 32 Theor. 28.

**Si circulum quadam recta tetigerit, ex qua tan-
 gen-
 tibus ducatur recta circulum secans; erunt an-
 guli quos ad tangentem facit, æquales illis,
 qui in alternis circuli portionibus consistunt.**

T Angat circulum $ABCD$ recta quædam BF ,
in B ; à quo ducatur alia BD secans circulum.



Dico angulos,
quos BD cum tan-
gente facit, equa-
les esse illis, qui
sunt in alternis
circuli portioni-
bus: hoc est, an-
gulum FBD æ-
qualem esse illi,

qui est in portione DAB : angulum verò EBD
illi, qui est in portione DCB .

a prop. B ipsi EF ad angulos rectos BA , & accipiat in
11. 1. peripheria BD quoduis punctum C ; & ducantur
 AD , DC , CB ; & quia circulum tangit recta quæ-
b prop. dam EF in B , & à tangente B ducta est tangenti ad
19. 1. angulos rectos BA , B erit in BA centrum circuli:
c prop. & angulus ergo ADB in semicirculo existens, re-
31. 3. ctus est: reliqui ergo BAD , ABD unirecto equa-
les. Sed & ABF rectus est, æqualis ergo angulis
 BAD , ABD ; communis ABD auferatur: ergo re-
liquus DBF erit æqualis reliquo BAD in alterna
circuli portione existenti. Et quia $ABCD$ qua-

d prop. drilaterum est in circulo descriptum; & erunt an-
22. 3. guli oppositi duobus rectis æquales: erunt ergo
anguli DBF , DBE æquales angulis BAD , BCD ;
quorum BAD ostensus est æqualis DBF ; erit ergo
& reliquus DBE , reliquo DCB in alterna cir-
culi portione DEB existens æqualis. Si ergo cir-
culum recta quædam, &c. Quod oportuit demon-
strare.

gulo $\angle$ AEB in alterna sectione $\angle$ estigitur & AEB; *1 prop.*
 angulo C. æqualis. Descripta ergo est super AB *23. 3.*
 portio circuli AEB capiens angulum AEB æqua-
 lem angulo C. Sit tertio angulus C obtusus. *m prop.*
 ponatur ei ad A rectæ AB æqualis BA D, vt in ter-
 tia descriptione, & ducaturq; rectæ AD ad angu-
 los rectos rectæ AE; & AB in F bisecetur, cui ex
 F ad angulos rectos ducatur FG, & iungatur GB.
 Cuiusq; AF æqualis sit FB, communis FG; erunt due
 FG, AF, duabus FG, BF æquales, & angulus AFG
 angulo BFG æqualis: & erigitur & basis AG
 basi BG æqualis. Circulus ergo centro G, inter-
 uallo GA descriptus transibit etiam per B, tran-
 seat vt AEB, quia ergo diametro AE ab extremi-
 tate A ad angulos rectos ducta est AD, & tanget
 illa circulum; & cum à tactu A in circulum ducta
 sit AB; erit angulus BAD æqualis angulo AHB,
 qui est in alterna portione circuli AHB: Sed an-
 gulus BAD æqualis est angulo C. erit ergo &
 angulus AHB in alterna portione æqualis angulo
 C. super data ergo recta AB descripta est por-
 tio circuli AHB capiens angulum æqualem an-
 gulo C. quod oportuit facere.

Propos. 34. Probl. 6.

*A dato circulo portionem auferre, quæ capiat
 angulum æqualem dato angulo rectilineo.*

Esto datus circulus ABC, datus angulus recti-
 lineus D. Oporteat autem à circulo ABC
 portionem auferre, quæ capiat angulum; angulo
 D æqualem. Ducatur EF tangens circulum in B. *2 prop.*
 a. Constituanturq; ad B rectæ EF, angulus FBC *23. 1.*
 æqualis

æqualis angulo D. Cum ergo circulum ABC tan-
gat recta EF, & à tactu B ducta sit BC, b erit angu-
lus FBC æqua-
lis angulo BAC
in alterna por-
tione BAC cō-
stituto: sed an-
gulus FBC æqua-
lis est angulo D:
erit igitur & BA
C in alterna sectione eidē angulo D æqualis, à dato
ergo circulo ABC ablata est portio BAC capiens
angulū æqualē dato angulo D. q̄ oportebat facere.


b. prop.
34. 3.



Propos. 35. Theor. 9.

*Si in circulo duæ rectæ se inuicem secent, erit
rectangulum portionibus unius contentum,
æquale portionibus alterius contento.*

Secent in circulo ABCD se inuicem duæ rectæ
AC, BD in E. Dico rectangulum AE, EC
contentum, æ-
quale esse DE,
EB cōtēto. Si
igitur AC, BD
per cētrū tran-
seāt, perspicuū
est cū AE, EC:
DE, EB quales
sint; et AE, EC
cōtētrū, æquale esse, DE, EB contento. Quod si per
centrum non transeant: accipiat̄ centrum F, ab
eoque ad rectas AC, DB a ducantur perpen-
diculares FG, FH, iunganturq; FB, FC, FE. Et quia
recta quædam GF per centrum ducta, rectam quā-
dam



a. prop.
21. 1.

dam AC non per centrum ductam ad angulos rectos secat, & b bifariam illam secabit: equales ergo sunt AG, GC. Cum igitur recta AC in G equaliter, in E inequaliter secta sit; c erit quod AE, EC continetur rectangulum, cum quadrato quod ex EG æquale quadrato quod ex GC, si commune, quod ex GF, addatur, erit quod AE, EC continetur, cum illis, quæ ex GE; GF quadratis, æquale illis, quæ ex CG, GF. d Sed illis, quæ ex CG, GF æquale est, quod ex FC: illis verò, quæ ex GE, GF, æquale est, quod ex FE: ergo quod AE, EC continetur, cum eo quod ex FE, æquale est ei, quod ex FC (æqualis autem est FC ipsi FB) ergo quod AE, EC continetur, cum illo quod ex EF, æquale est ei, quod ex FB. Ob eandem causam erit quod DE, EB continetur, cum illo quod ex FE æquale ei quod ex FB. ostensum est autem & id, quod AE, EC continetur, cum eo quod ex FE, æquale esse ei, quod ex FB: ergo quod AE, EC continetur cum illo quod ex FE, æquale est illi quod DE, EB, continetur, cum illo quod ex FE quadrato; commune, quod ex FE, auferatur; & erit reliquum AE, EC contentum, æquale reliquo DE, EB contenta. Si ergo in circulo, &c. quod oportuit demonstrare.

b prop.

3. 3.

c prop.

5. 2.

d prop.



47. 1.

Propos. 36. Theor. 30.

Si extra circulum punctum sumatur, ab eoq; in circulum duæ rectæ lineæ cadant, quarum una circulum secet, altera tangat, rectangulum tota secante, & ea parte, quæ inter punctum, & curvam peripheriam est, erit æquale tangentis quadrato.

Extra

Extra circulum ABC sumatur quodvis punctum D , ab eoq; ad circulum cadant duæ



rectæ DCA , DB ; quarum DC A circulum fecerit, DB tangat. Dico rectangulum AD , CD contentum, æquale esse quadrato, quod sit ex DB . Transsit autem DCA per centrum, aut non. Transeat primo per centrum quod sit E . Ducta ergo EB , erit
 18. 3. angulus EBD rectus. Et quia recta AC bisecatur
 in E , eiq; apposita est, in directum CD ; erit quod
 6. 2. AD , DC continetur: cum eo, quod ex EC æquale ei, quod ex ED ; est vero EC æqualis ipsi EB : ergo quod AD , DC continetur rectangulum, cum quadrato quod ex EB , æquale est ei, quod ex ED , quadrato. *c* Est autem quod ex ED æquale illis, quæ ex
a prop. EB , BD quadratis, quod angulus EBD rectus sit.
 47. 1. Ergo quod AD , DC continetur, cum eo quod ex
 EB ; æquale est illis, quæ ex EB , BD ; commune, quod ex EB tollatur, eritque quod AD , DC continetur, æquale ei quod ex Tangente DB quadrato.

Sed


Sed iam D C A non transeat per centrum, acci-
piaturq; centrum E, & ab eoq; ad A C perpendicu-
laris ducatur FE, iunganturq; E B, E C, E D; & erit
ergo angulus E B D rectus. Et cum recta quædam
EF per centrum ducta, rectam quandam A C non
per centrum ductam secet, & ad rectos angulos il-
lim, & bisariam secabit; sunt ergo A F, F C æqua-
les. Et quia recta A C bisecatur in F, eiq; in dire-
ctum additur C D, g erit quod A D, D C contine-
tur, cum illo quod ex E C, æquale ei quod ex F D: g *prop.*
Commune, quod ex E F, addatur, & erit quod A D, 6. 2.
D C contineatur, cum illis quæ ex F C, F E, æquale
illis, quæ ex F D; F E: illis autem, quæ ex D E; E F, B h *prop.*
æquale est, quod ex D E: (est enim angulus E F D 47. 1.
rectus:) illis vero, quæ ex C E, F E, æquale est, quod
ex C E. Ergo quod A D, D C contineatur cum illo
quod ex E C, æquale est ei, quod ex E D, & est autem
E C, æqualis ipsi E B: Ergo quod A D, D C contine- i d. f. 15
tur, cum illo quod ex E B, æquale est ei, quod ex
E D: ei autem quod ex E D æqualia sunt quæ ex k *prop.*
E B, B D, cum angulus E B D sit rectus: ergo quod 47. 1.
A D, D C contineatur cum eo quod ex E B, æquale est
illis, quæ ex E B, B D; Commune, quod ex E B tol-
latur, & erit quod A D, D C contineatur rectangu-
lū, æquale quadrato ex tangentis D E. Si ergo
extra circulum, &c. Quod oportuit demonstrare.

Propos. 37. Theor. 31.

Si extra circulum punctum sumatur, ab eoq;
in circulum dua rectæ cadant; quarum una
circulum secet; altera incidat; sit autem
quod tota secante, & ea parte, quæ inter
punctum

punctum & curvam peripheriam est, continetur rectangulum, aequale quadrato quod fit ab incidente, tanget incidens circulum.

Sumat extra circulum ABC punctum D , ab eoque in circulum cadant duæ rectæ DEA , DB ; quarum DCA secet, DB incidat circulo. Sit autem quod AD , DC continetur rectangulum; æquale quadrato quod fit ex DB . Dico DB circulum tangere. *a* Ducatur enim DE circulum tangens, sumptoq; centro F , iungantur FE , FB , FD , *b* & erit angulus FED rectus. Et quia DE tangit, DCA secat circulum; erit quod AD , DC continetur æquale ei quod ex DB ; ponitur autem & quod AD , DC continetur; æquale ei quod ex DB . ergo quod ex DE æquale est ei; quod ex DB ; æquales sunt ergo DE , DB ; *d* sunt verò & FE , FB æquales: duæ igitur DE , EF , duabus DB , BF æquales sunt; & basis FD communis; *e* angulus ergo DEF æqualis est angulo DBF : est autem DEF rectus; ergo & DBF rectus est. Et BF , si producat, est diameter, *f* quæ



d def.
15. 1.

e prop.
8. 1.

f cor.
prop.
16. 3.

autem diametro ad angulos rectos ducitur ab extremitate, circulum tangit. Idem demonstrabitur pari modo si centrum sit in AC . Si ergo extra circulum; &c. quod oportuit demonstrare.

EVLIDIS

ELEMENTVM

QVARTVM.

Definitiones.



Figura rectilinea figura rectilinea inscribi dicitur, cum singuli anguli singula latera eius, cui inscribitur, tangunt.

2 Similiter figura figuræ circumscribi dicitur, cum singula latera circumscriptæ, singulos angulos eius, cui circumferibitur, tangunt.

3 Figura rectilinea circulo inscribi dicitur; cū singuli anguli inscriptæ tangunt peripheriam circuli. Ita prop. 2. triangulum ABC sexta quadratum $ABCD$ circulo inscriptum vides.

4 Figura rectilinea circulo circumscribi dicitur, cum singula latera circumscriptæ circuli peripheriam tangunt. Ita prop. 4. triangulum ABC sexta quadratum $ABCD$ circulo circumscriptum vides.

5 Circulus similiter figuræ inscribi dicitur, cum circuli peripheria singula latera eius, cui inscribitur, tangit. Ita prop. 4. circulum EFG triangulo ABC octava circulum $EFGH$ quadrato, $ABCD$ inscriptum vides.

6 Circulus figuræ circumscribi dicitur, cum peripheria circuli singulos angulos eius, cui circumscribitur, tangit. Ita prop. 2. circulum ABC triangulo, sexta circulum $ABCD$ quadrato circumscriptum vides.


H

7 Recta

7 Recta linea in circulo aptari dicitur, cū eius termini in circuli peripheria fuerint.

Propos. 1. Probl. 1.

In dato circulo, data recta linea, quæ diametro circuli maior non sit, æqualem rectam lineam aptare.



Sit datus circulus ABC, data recta, quæ circuli diametro maior non sit, BD. Oportet autem circulo ABC rectam, rectæ D æqualem, aptare. Ducatur diameter circuli BE. Si ergo BE æqualis est ipsi D, factum est, quod iubebatur. Circulo enim ABC aptata est BE æqualis rectæ datæ. Si autem BE maior est quam D. Fiat CE æqualis ipsi D; & centro C, intervallo CE describarur circulus EAF, ducaturq; CA. Quia ergo C centrum est circuli EAF; erit CA æqualis CE; sed ipsi D æqualis est CE; erit ergo & D æqualis ipsi AC. Dato ergo circulo ABC, datæ rectæ D non maiori circuli diametro, æqualis CA aptata est. Quod oportuit facere.

a prop.
3. 1.


b def.
15. 1.

Propos. 2. Probl. 2.

Dato circulo triangulum dato triangulo æquiangulum inscribere.

Sit

Sit circulus datus $A B C$, triangulum datum $D E F$; oportetque circulo $A B C$ triangulum, triangulo $D E F$ æquiangulum inscribere. Ducatur



GAH tangens circulum $A B C$ in A ; & constitua-
turque ad A rectæ GAH , angulus HAC æqualis
angulo DEF , & GAB æqualis DFE ; ducaturque
 BC . Quia ergo circulum $A B C$ tangit recta GAH ,
& à A tæstus ducta est AC , erit angulus HAC
æqualis angulo ABC in alterna portione: sed
 HAC est æqualis DEF angulo; erit ergo & ABC
æqualis eidem DEF . Eadem ratione erit angulus
 ACB angulo DFE æqualis, & reliquis ergo BAC
æqualis erit reliquo EDF . Est ergo triangulum
 ABC triangulo DEF æquiangulum, & inscriptum
est circulo $A B C$. Dato ergo circulo, &c. Quod
oportuit facere.

Propos. 3. Probl. 3.

**Circa datum circulum dato triangulo æquian-
gulum triangulum describere.**

Est datus circulus $A B C$, datum triangulum
 $D E F$. oportetque circa $A B C$ circulum
triangulum


triangulo DEF æquiangulum triangulum describere. Produca-
tur utrinque EF in G & H, su-
matutque centrum K circuli ABC, & ducatur re-
cta KB ut libet; & a constituatur ad K rectæ KB
angulo DEG æqualis BKA; angulo verò DFH
æqualis BKC, perque puncta A, B, C ducantur

a prop.

23. 1.

b prop.

17 3.



tangentes circumulum LAM, MBN, NCL. Et quia
LM, MN, NL tangunt circumulum in A, B, C, & a
centro K ad puncta A, B, C ductæ sunt KA, KB,
KC: recti igitur erunt anguli ad A, B, C puncta.
Et quis quadrilateri AMBK quadranguli equa-
les sunt quatuor rectis; Quia dicitur enim quadrila-
terum AMKB in duobus triangulis KAM, KBM, quo-
rum anguli KAM, KBM recti sunt; reliqui ergo
AKB, AMB duobus rectis æquales erunt: & sunt
verò & DEG, DEF duobus rectis æquales: ergo
AKB, AMB anguli æquales sunt angulis DEG,
DEF, quorum AKB, DEG æquales cum sint; erunt
& reliqui AMB, DEF æquales. Pari modo de-
monstrabitur angulum LNM angulo DFE æqua-
lem esse: reliquus ergo MLN reliquo EDF æqua-
lis erit: equiangularum ergo est triangulum LMN
triangulo DEF, & descriptum est circa circumulum
ABC.

c prop.

28. 3.

* Si in-

tellega-

tur du-

sta li-

nea K

M.

d prop.

23. 1.

ABC. Ergo circa datum circulum, &c. Quod oportuit facere.

Propositio 4. Probl. 4.

In dato triangulo circulum describere.

Sit datum triangulum ABC, in quo oporteat circulum describere. Bisecentur anguli A BC, BCA rectis BD, CD, quæ in D puncto concurrant, & ducanturque ex D ad rectas AB, BC, CA perpendiculæ DE, DF, DG. Equia anguli ABD, CBD æquales sunt (est enim ABC bisectus)




anguli verò BBD, BCD recti, habebunt duo triangu-
la BBD, BCD duos angulos
duobus angulis, & unum la-
tus uni lateri æquale, nempe
commune BD, & habebunt
ergo & reliqua latera reli-
qua æqualia; unde DE, DF
æquales erunt: Eandem ob
causam DG, DF æquales

erunt. Circulus ergo centro D, intervallo vno pū-
ctorum E, F, G descriptus, transibit etiam per alia
puncta, tangetque rectas AB, BC, CA quod angu-
li ad B, F, G recti sint: Si enim ipsas secaret, cade-
ret, quæ ab extremitate diametri ad angulos re-
ctos ducitur, intra circulum; & quod est absurdum.
Non ergo circulus centro D, intervallo vna ha-
rum DE, DF, DG descriptus secat rectas AB, BC,
CA; ergo eas tanget; estque circulus in triangulo
ABC descriptus. In dato ergo triangulo, &c. Quod
oportuit facere.

Propositio 5. Probl. 5.

Circa datum triangulum circulum describere.

E Sto datum triangulum ABC , circa quod oporteat circulum describere. biscentur AB, AC in $D \& E$, atque à punctis D, E ducantur ad AB, AC ad angulos rectos DF, EF , quæ con-



currentes aut in triangulo ABE , aut in recta BC , aut extra triangulum. Concurrant in primo intra triangulum in F , ducanturque BF, FC, FA . Et quia AD, DB æquales sunt, communis & ad angulos rectos DF , erunt & bases AF, FB æquales. Similiter demo-

2 prop
4. 1.

strabimus CF, AF æquales esse quare & FB, FC æquales erunt. Tres ergo FA, FB, FC æquales sunt. Circulus ergo etatò F intervallo vna ipsarum FA, FB, FC descriptus transibit & per reliqua puncta, eritque circulus circa ABC triangulum descriptus. Concurrant iam DF, EF in recta BC in F , vt in secunda descriptione, iungaturque AF . Similiter demonstrabimus punctum F centrum es-

se cir-

se circuli circa triangulum ABC descripti. Concurrent demum DF, EF extra triangulum ABC in F , ut tertia habet descriptio, & iungantur AF, FB, FC . Cumque AD, DB æquales sint, communis, & ad angulos rectos DF , erunt & bases AF, BF æquales. Similiter demonstrabimus & CF ipsi FA æqualem esse: quare & BF æqualis erit FC . Rursus ergo circulus centro F : intervallo una harum FA, FB, FC , descriptus transibit etiam per reliqua puncta, estque circa ABC triangulum descriptus. Quod facere oportuit.

b prop.
4. 1.

Corollarium.

Vnde perspicuum est, quando centrum circuli in triangulum cadit, angulum BAC in maiore portione semicirculi existentem recto minorem esse, quando verò centrum in BC cadit, in semicirculo existentem, rectum: quando demique centrum extra BC cadit, in minore portione semicirculi existentem, maiorem recto. Vnde quando datus angulus minor est recto, intra triangulum cadunt rectæ DF, EF ; quando rectus, in BC ; quando maior recto, extra BC ; quod oportuit demonstrare.

Propos. 6. Probl. 6.

In dato circulo quadratum describere.

Sit in dato circulo $ABCD$ quadratum describendum: & ducantur diametri AC, BD ad angulos rectos, iunganturque AB, BC, CD, DA . Cum ergo BE, ED sint æquales, quippe ex centro communis, & ad angulos rectos EA ; erit &

a prop.
11. 1.
b prop.
4. 1.

bas AB basi AD æqualis. Eadem ratione utraque ipsarum BC, CD , utriq; AB, AD est æqualis.



c prop.

31. 3.

d def.

27. 1.


Est ergo quadrilaterum $ABCD$ æquilaterum. Dico quod & æquiangulum. Cum recta BD diametris sit circuli $ABCD$; erit BAD semicirculus; rectus est ergo angulus BAD .

Ob eandem causam qui libet angulorum ABC, BCD, CDA rectus est; rectangulum ergo est quadrilaterum $ABCD$. Ostensum est autem & æquilaterum; & quadratum ergo est; & est circulo inscriptum. In dato ergo circulo, &c. Quod oportuit facere.

Propos. 7. Probl. 7.

Circa datum circulum quadratum describere.

Sic circa datum circulum $ABCD$ quadratum describendum. Ducantur diametri AC, BD



a prop.

18. 3.

b prop.

28. 1.

c prop.

34. 1.

ad angulos rectos, & per puncta A, B, C, D ducantur tangentes circulum: FG, GH, HK, KF . Cum ergo FG tangat circulum, & E a centro E ad tactum A ducta sit EA ; erunt anguli ad A recti, Eadem de causa erunt & anguli ad B, C, D recti,


cumque anguli AEB, EBG recti sint, erunt GH, AC parallelæ. Eadem de causa erunt AC, FK parallelæ; Similiter demonstrabimus, quod GF, HK sint ipsi BED parallelæ: Sunt ergo GK, GC, AK, FB, BK parallelogramma, unde æqualis est GF ipsi

GF ipsi HK; & GH ipsi FK. d. & quia AC, BD d. def.
 æquales sunt. Atque AO utrique GH, FK; & BD 15. 1.
 utrique GF, HK est æqualis; ergo utraque GH,
 FK, utrique GF, HK est æqualis. Est igitur FGHK
 quadrilaterum æquilaterum; dico quod & rectan-
 gulum. Cum enim GBEA sit parallelogrammum,
 sitq; angulus AEB rectus, erit & AGB rectus. Si- c. prop.
 militer demonstrabimus quod anguli ad H, K; E 34. 1.
 recti sint; est ergo FGHK rectangulum quadri-
 laterum, ostensum est autem, & æquilaterum; qua- f. def.
 dratum ergo est, & est circa ABCD circulum de- 27. 1.
 scriptum: ergo circa datum, &c. Quid oportuit
 facere.

Propos. 8. Probl. 8.

In dato quadrato circulum describere.

Sit in dato quadrato ABCD circulus descri-
 bendus. a Bisecentur AB, AD in F, E; b a c per 2. prop.
 E quidem ducatur alterutri 10. 1.
 AB, CD parallela EH: per b prop.
 F verò alterutri AD, BC 1. 1.
 parallela FE. Sunt ergo AK,
 KB, AH, HD, AG, GC, BG,
 GD parallelogramma, c. prop.
 ideoque latera opposita æ- 34. 1.
 qualia. Et quia AD, AB æ-
 quales sunt, erunt & semisses




carum AE, AF æquales: d. quare & oppositæ illis d. prop.
 FG, GE æquales erunt. Similiter demonstrabimus 34. 1.
 utramq; GH, GK utrique FG, GE æqualem esse.
 Sunt igitur quatuor GE, GF, GH, GK æquales.
 Circulus igitur centro G, intervallo vna harum
 GE, GF, GH, GK descriptus, transibit & per re-
 liqua

liqua puncta: sed & tangit rectas AB, BC, CD, DA, quod anguli ad E, F, H, K recti sint. Si enim circulus ipsas AB, BC, CD, DA secaret, caderet quæ ab extremitate diametri ad angulos rectos ducitur, in circulum, & quod est absurdum; Non ergo circulus centro G, & intervallo una harum GE, GF, GH, GK descriptus secat rectas AB, BC, CD, DA: tangit ergo: & est quadrato ABCD inscriptus. In dato ergo quadrato, &c, Quod oportuit facere.

Propos. 9. Probl. 9.

Circa datum quadratum circulum describere.

Sit circa datum quadratum ABCD circulus describendus: ductæ rectæ AC, BD se in E secant. Et quia DA, AB æquales sunt, AC communis; erunt duæ DA, AC, duabus BA, AC æquales: sed & bases DC, BC æquales sunt: b erunt ergo & anguli DAC, BAC æquales: angulus ergo



DAB recta AC bisecatur. Similiter demonstrabimus quælibet horum ABC, BCD, CDA rectis AC, DB bisecari. Et cum anguli DAB, ABC æquales sint; sintque EAB, EBA eorum dimidij, erunt & ipsi æquales: quare & latera EA, EB æqualia erunt. Similiter demonstrabimus utramque rectarum EC, ED, utriusque EA, EB æqualem esse. Quatuor ergo EA, EB, EC, ED æquales sunt. Igitur circulus centro E, intervallo una harum EA, EB descriptus, transibit & per reliqua puncta,

a def.
37.
b prop.
8. 1.

c ax. 7.

puncta, est igitur circa $ABCD$ quadratum descriptum. Ergo circa datum, &c. Quod oportuit facere.

Propositio 10. Probl. 10.

Triangulum isoscele constitutare, habens utrumque qui ad basim angulum duplum reliqui.




Exponatur recta quædam AB , a quæ in C sic secetur, ut AB, BC contentum æquale sit quadrato ex CA descripto. Igitur centro A , intervallò AB describatur circulus BDE , *a prop. 11. 2.* aptetur recta BD æqualis ipsi AC ; & ductis DA, DC , describatur circa triangulum ACD circulus AED , *b prop. 1. 4.* Et cum quod AB, BC continetur æquale sit ei, quod ex AC quadrato, sitque AC ipsi BD æqualis; erit & quod AB, BC continetur æquale ei, quod ex BD . Cum igitur extra circulum ACD adceptum sit punctum B , ab eoq; ad circulum ACD cadant duæ rectæ BCA, BD , quarum una circulum secat, altera ei incidit, sitque quod AB, BC continetur æquale ei quod ex BD , & tanget BD circulum ACD ; cumque BD circulum ACD tangat, à tactu autem D ducta sit DC , erit angulus BDC angulo DAC in alterna circuli portione consistenti æqualis. Cum ergo anguli BDC, DAC sint æquales, si communis CDA addatur, erit totus BDA duobus CDA, DAC *c prop. 3. 4.*

lum ACD circulus AED . Et cum quod AB, BC continetur æquale sit ei, quod ex AC quadrato, sitque AC ipsi BD æqualis; erit & quod AB, BC continetur æquale ei, quod ex BD . Cum igitur extra circulum ACD adceptum sit punctum B , ab eoq; ad circulum ACD cadant duæ rectæ BCA, BD , quarum una circulum secat, altera ei incidit, sitque quod AB, BC continetur æquale ei quod ex BD , & tanget BD circulum ACD ; cumque BD circulum ACD tangat, à tactu autem D ducta sit DC , erit angulus BDC angulo DAC in alterna circuli portione consistenti æqualis. Cum ergo anguli BDC, DAC sint æquales, si communis CDA addatur, erit totus BDA duobus CDA, DAC *d prop. 37. 3. e prop. 32. 3.*

f prop. $\triangle DAC$ æqualis: sed duobus CDA , $\triangle DAC$ æqua-
 32.1. lis est externus BCD : ergo BDA æqualis erit

g def.
 15.1.



ipſi BCD : sed ipſi BDA
 æqualis eſt CBD , cum & g
 latera AD , AB ſint æqualia:
 quare & DBA , BCD æqua-
 les erūt: tres ergo BDA , DB
 A , BCD ſunt æquales: & cū
 anguli DBC , BCD æquales
 ſint, erunt & latera BD , DC
 æqualia; ſed B & D ipſi CA
 ponitur æquale: ſunt ergo
 AC , CD æqualia: vnde &
 anguli CDA , DAC æquales erunt: ergo anguli
 CDA : DAC dupli ſunt anguli DAC : eſt vero &
 BCD æqualis duobus CDA , DAC : ergo BCD
 duplus eſt ipſius DAC : Et cum vterque BDA ,
 DBA angulo BCD ſit æqualis, duplus erit vterq;
 reliquo DAB . Triangulum ergo iſoſceles, &c.
 Quod oportuit facere.


Propoſ. 11. Probl. 11.

*Dato circulo pentagonum æquilaterum, &
 æquiangulum inſcribere.*

S It in dato circulo $ABCDE$ pentagonum æ-
 quilaterum & æquiangulum deſcribendum:
 Exponatur triangulum iſoſceles duplum habens
 vtrumq; angulum ad G , H , eius qui eſt ad F ; & a
 2. *prop.* inſcribatur circulo $ABCDE$ triangulum ACD
 2.4. æquiangulum triangulo FGH ; ita vt angulo F
 æqualis ſit angulus CAD ; angulis G , H an-
 guli ACD , CDA . Et quia vterque ACD ,
 CDA duplus eſt anguli CAD , b biſecentur rectis:
 b *prop.* CE , DB , iunganturque AB , BC , CD , DE , EA .
 9.1.

Cum

Cum itaque vterque angulorum $\angle ACD$, $\angle CDA$ duplus sit anguli $\angle CAD$, bisectique sint rectis CE , DE , erunt



quinque anguli $\angle DAC$, $\angle ACE$, $\angle ECD$, $\angle CDB$, $\angle BDA$ æquales inter se: Et cum æquales anguli æqualib. per-

c prop.
26.3.

ipherijs insistant, erunt quinque peripheriæ AB , BC , CD , DE , EA æquales: sed æquales peripheriæ æquales recte subvendantur, sunt ergo hæ quinque rectæ AB , BC , CD , DE , EA æquales; est ergo pentagonum $ABCDE$ æquilaterum. Dico quod & æquiangulum. Quia AB , DE peripheriæ æquales sunt, si communis BCD addatur, erunt totæ $ABCD$, $EDCB$ æquales; & insitit peripheriæ $ABCD$ angulus AED ; peripheriæ vero $BCDE$ angulus BAE ; & sunt ergo AED , BAE anguli æquales. Eadem de causa; quilibet angulorum A , B , C , BCE , CDE vtrique AED , BAE æqualis erit: est ergo pentagonum $ABCDE$ æquiangulum; demonstratum autem est, quod & æquilaterum. Dato ergo circulo, &c. Quod oportuit facere.

d prop.
29.3.

e prop.
29.3.

Propos. 12. Probl. 12.

Circa datum circulum pentagonum æquilaterum & æquiangulum describere.

O Porteat circa circulum $ABCDE$ pentagonum æquilaterum & æquiangulum describere.

here. Cogitentur angulorum pentagoni inscripti puncta, A, B, C, D, E, & peripheriæ, AB, BC,

4 prop.

17.3.



CD, DE, EA æquales

sint, & ducanturque per

A, B, C, D, E rectæ GH,

HK, KL, LM, MG tan

gentes circum, & ac

cipiatur centrum cir

culi F, iunganturque

FB, FK, FC, FL, FD.

Cum itaque KL recta

circulum in C tangat,

b prop.

18.3.

c prop.

47.1.

& ab F ad contactum C ducta sit FC, erit ipsa

ad KL perpendicularis: uterque ergo angulus ad

Cem rectus. Eandem ob causam recti sunt anguli

ad B, D; & cum angulus FCK rectus sit, erit quod

ex FK æquale illis, quæ ex FC, CK quadratis.

eadem de causa, erunt quæ ex FB, BK æqualia illis,

quod ex FK: sunt ergo quæ ex FC, CK æqualia

illis, quæ ex BF, BK; quorum quod ex FC æqua

le est ei, quod ex FB, erit igitur & reliquum quod

sunt ex CK, æquale reliquo, quod ex BK: sunt ergo

quæ ex BK, CK æquales. Et quia FB, FC æquales sunt,

quippe communis FK, erunt duc BF, FK duplus CF,

ex cen- FK æquales, & basis BK basi CK æqualis; & por

ro ad go & angulus BFK æqualis erit angulo KFC: &

periphe angulus BKF, angulo FKC: est ergo angulus

riam. BFD duplus anguli KFC; & BKC duplus an

d prop. guli FKC. Ob eandem causam erit & CFD du

8.1. plus ipsius CFL: & CLD duplus ipsius CLF.

e prop Cumq; peripheriæ BC, CD æquales sint, erunt

27.3. & anguli BFC, CFD æquales, estq; BFC ipsius

f prop KF C duplus, DFC, verò duplus ipsius LFC: æ

26.1. quæles ergo sunt KFC, CFL, duo ergo triangula

FAD,


FKC , FLC duos angulos duobus habentia æquales alterum alteri, & latus vnum vni lateri FC utrique commune; habebunt & reliqua latera reliquis æqualia, angulumque reliquum reliquo. Sunt igitur tam rectæ KC , CL , quam anguli FKC , FLC æquales, cumque KC æqualis sit CL , dupla erit KL ipsius KC . Eadem de causa dem. intrabitur HK dupla ipsius BK ; & cum demonstratum sit BK æqualis KC , sitq; KL dupla ipsius KC ; & HK dupla ipsius BK ; erit & HK ipsi KL æqualis. Similiter demonstrabitur quælibet ipsarum GH , GM , ML utriq; HK , KL æqualis: est ergo pentagonum $G H K L M$ æquilaterum. Dico quod & æquiangulum. Cum enim anguli FKC , FLC æquales sint, ostensusque sit HKL duplus ipsius FKC : & ipsius FLC duplus KLM ; erit & HKL ipsi KLM æqualis. Similiter demonstrabitur quilibet ipsorum KHG , HGM , GML utrique HKL , KLM æqualis. Quinque ergo anguli $G H K$, $H K L$, $K L M$, LMG , $M G H$ sunt æquales; æquiangulum ergo est pentagonum. Ostensum autem est & æquilaterum, & est descriptum circa circulum $A B C D E$. Quod oportebat facere.

Propol. 13. Probl. 13.

Dato pentagono æquilatere, & æquiangolo circulum inscribere.

O Porteat dato pentagono æquilatere & æquiangolo $A B C D E$ circulum inscribere. & bisecetur uterq; angulorum $B C D$, $C D E$ rectis CF , DE , & à puncto F , in quo CF , DE concurrunt, ducantur rectæ FB , FA , FE . & quia BC , CD æquales

b prop
4. 1. æquales sunt; communis CF, erunt duæ BC, CF
duabus DC, CF æquales; & angulus BCF angu-
lo DCF æqualis: b ergo & basis BF, basi DF æ-
qualis erit, & triangulum BCF triangulo DCF,
reliquiq; anguli reliquis, quibus æqualia latera



subtenduntur, æqua-
les erant. Sunt igitur
anguli CBF, CDF
æquales. Et cum an-
gulus CDB duplus
sit anguli CDF; æ-
quales autem & CD
E, ABC; & CDF,
CBF; erit & CBA
duplus ipsius CBF;
æquales ergo sunt A

BF, FBG: bisecatur ergo angulus ABC recta BF.

Similiter demonstratur quolibet angulorum

c prop
12. 1. BAE, AED rectis FA, FE bisecari. Ducantur
enim ab F ad AB, BC, CD, DE, EA recta per-

pendiculares FG, FH, FK, FL, FM. Quia ergo
anguli HCF, KCF æquales sunt; FHC rectus;
æqualis recto FKE; erunt duo triangu-
la FHC, FKC duos angulos duobus æquales habentia

d prop
16. 1. vnumque latus vni, FC latus commune, & vni
æqualium angulorum subtensum, & habebunt ergo

& reliqua latera reliquis æqualia sunt ergo
perpendiculares FH, FK æquales. pari modo de-
monstratur quolibet harum FL, FM, FG vtriq;
FH, FK æqualis. quinque ergo rectæ FG, FH, FK,
FL, FM æquales sunt; circulus ergo centro F; in-
teruallo vna harum FG, FH, FK, FL, FM descri-
ptus, transibit & per reliqua puncta, tangetq; re-
ctas AB, BC, CD, DE, EA, eo quod anguli ad G,
H, K,

H, K, L, M rectis sunt. Quod si illas non tangat, sed fecerit, cadet quæ ab extremitate diametri ad angulos rectos ducitur intra circulum, & quod absurdum esse ostensum est; non ergo circulus centro F, intervallo FG, FH, FK, FL, FM descriptus secat rectas AB, BC, CD, DE, EA; ergo tanget. dato ergo pentagono. quod oportuit facere.

c prop.
16. 1.

Propol. 14. Probl. 14.

Circa datum pentagonum æquilaterum, & æquiangulum, circulum describere.



O Porteat circa datum pentagonum æquilaterum & æquiangulum ABCDE circulum describere. a Bisecetur uterq; angulorum BCD, CDE rectis CF, FD; & ab F puncto in quo rectæ concurrunt ad B, A, E ducantur rectæ FB, FA, FE. Similiter ergo, ut in præcedente, demonstrabitur, quemlibet angulorum CBA, BAE, AED, rectis BF, FA, FE bisecant. Et quia anguli BCD, CDE æquales sunt, æq; FCD dimidiis ipsis BCD, & CDF dimidiis ipsis CDE; erunt FCD, FDC æquales, b quare & latera FC, FD æqualia erunt. Similiter demonstrabitur, quamlibet ipsorum FB, FA, FE, utriuslibet FC, FD æqualem esse. Quinque ergo FA, FB, FC, FD, FE æquales sunt. circulus igitur centro F, intervallo una harum FA, FB, FC, FD, FE

a Bi 2 prop.
9. 1.


b prop.
6. 1.

describitur. Quidam autem dicunt, quod si pentagonum non sit æquilaterum & æquiangulum, non potest circulus circumscribi. Sed hoc est falsum, ut patet ex præcedente. Quia si pentagonum sit æquilaterum & æquiangulum, potest circulus circumscribi. Quod si non sit æquilaterum & æquiangulum, non potest circulus circumscribi. Sed hoc est falsum, ut patet ex præcedente.

descriptus, transibit & per reliqua puncta; eritq;
circa pentagonum $A B C D E$ descriptus. Circa
datum, ergo, &c. Quod facere oportebat.

Propos. 15: Probl: 15.

In dato circulo hexagonum equilaterum & equiangularum describere.



S It in dato circulo
ABCDEF he-
xagonum equilaterum
& æquiangulum descri-
bendum. Ducta dia-
metro AD, sumatur
centrum G, atque cen-
tro D, intervallo DG
describatur circulus E
GCH; & ductæ EG,
CG producantur, ad
B, F, iunganturq; AB,
BC, CD, DE, EF, FA.

Dico $ABCDEF$ hexagonum æquilaterum, & æquiangulum esse. Cum enim C centrum sit circuli cui $ABGDEH$, & erunt EC , GC æquales. Et cum D centrum sit circuli $EGCH$, erunt & DE , DC æquales. Sed GB ostensa est æqualis ipsi DE G erit ergo & GE æqualis ipsi ED ; triangulum ergo EGD æquilaterum est, & tres anguli eius, E , G , D , GDE , DEG æquales, cum isosceium triangulum cui anguli ad basin æquales sint. Et quia tres anguli trianguli duobus rectis æquales sunt,

32-1. Similiter demonstretur: D. G. G. tertia pars est duo.

duorum rectorum, & cum recta CG super EB consistens $\angle$ angulos deinceps, $\angle GCB$ duobus rectis $\propto$ uales faciat; erit & reliquus $\angle GCB$ tertia pars duorum rectorum, sunt igitur anguli $\angle GCD$, $\angle DGC$, $\angle GCB$ inuicem $\propto$ uales; $\angle$ erunt igitur & qui ad verticem BGA , $\angle GCF$, $\angle FGE$ $\propto$ uales, & $\propto$ uales autem anguli $\propto$ ualibus peripherijs insunt; peripheriæ ergo AB , BC , CD , DE , EF , FA sunt $\propto$ uales, & $\propto$ ualibus autem peripherijs $\propto$ uales rectæ lineæ subtenduntur: sex igitur rectæ $\propto$ uales sunt; ideoque hexagonum $ABCDEF$ $\propto$ uilaterum est. Dico quod & $\propto$ uiangulum. Cum enim peripheriæ AF , ED $\propto$ uales sint: si communis $ABCD$, addatur, erunt totæ $FABC$, $EDCBA$ $\propto$ uales. Sed peripheriæ $FABC$ D insitit angulus FED ; peripheriæ $EDCBA$, angulus FAE ; sunt ergo anguli FAE , DEF $\propto$ uales. Similiter demonstrabitur reliquos hexagoni $ABCDEF$ angulos, utriq; FAE , FED $\propto$ uales esse. Est ergo hexagonum $ABCDEF$ $\propto$ uiangulum: ostensum est autem & $\propto$ uilaterum; & est in circulo descriptum. In dato ergo circulo, &c. Quod oportebat facere.

c prop.
13. 1.d prop.
12. 1.e prop.
26. 3.f prop.
29. 3.g def.
9. 3.


Corollarium.

EX his manifestum est latius hexagoni $\propto$ uale esse ei, quæ ex centro circuli. Et si per puncta A, B, C, D, E, F tangentes circum rectæ ducantur, circa circum hexagonum $\propto$ uilaterum, & $\propto$ uiangulum descriptum esse, ut in illis quæ de pentagono dicta sunt videre licet. Præterea iuxta illa quæ de pentagono dicta sunt in dato hexagono circum describemus.

h prop.
17. 3.

Propos. 16. Probl. 16.

In dato circulo quindecagonum æquilaterum
& æquiangulum describere.



O Porteat in dato circu-
lo $ABCD$ quin-
decagonum æqui-
laterum, & æqui-
angulum descri-
bere. Describa-
tur in circulo AB
 CD , trianguli æ-
quilateri latus AC ,
pentagoni æqui-
lateri AB . Qua-
lium. ergo totus

circulus partium est quindecim, talium est ABC
peripheria, tertia circuli pars existens, quinque;
 AB , quinta pars circuli existens, trium; pars ergo
 BC , duarum; quæ si in E bisecetur, erit quælibet
peripheriarum BE , EC decima quinta pars

a prop.

30. 3.

b prop.

2. 3.

circuli. Si ergo ductis rectis BE , EC ,

eis æquales in continuum circulo

rectas b aptemus, erit quin-

decagonum æquilate-

rum, & æquiangu-

lum descri-

ptum.

Quod facere oportuit.

E V C L I D I S

133

E L E M E N T V M

Q V I N T V M.

Definitiones.

I  **A** R s est magnitudo magnitudinis , minor maioris , quando minor metitur maiorem . *Ut , 2. est pars ipsius 6. at non ipsius 7. quia 2. metitur 6. non metitur 7.*

2 Multiplex est maior minoris , quando minor metitur maiorem . *Ut 6. est multiplex ipsius 2. at 7. ipsius 2. multiplex non est . Quia 2. metitur 6. non item 7*

3 Proportio est duarum magnitudinum eiusdem generis mutua quædam secundum quantitatem , habitudo . *Proportio ergo est inter res eiusdem generis ut inter numeros , lineas , superficies , corpora , &c.*

4 Proportionem inter se habere dicuntur magnitudines , quæ multiplicatæ possunt se inuicem superare . *Vnde liquet inter angulum contingentiæ , & rectis lineum quemcumque proportionem non esse . Quia licet prior in infinitum multiplicetur , nunquam tamen superabit posteriorem .*

5 In eadem proportionem dicuntur esse magnitudines , prima ad secundam , & tertia ad quartam , quando æquæ multiplices , primæ & tertiæ , æquæ multiplices , secundæ , & quartæ , secundum quam-

uis multiplicationem, utraq; ab utraque, vel æquè deficiunt, vel æquè æquales sunt, vel æquè superant, si ordine sumantur. *Ut si horum quatuor numerorum 8. 6. 4. 3. primi, & tertij accipiantur æquè multiples 16. & 8 secundi, & quarti 18. & 9 & collocentur eo ordine, qui numeri, quarum sunt multiples, hoc nimirum 16. 18 8. 9. si iam primus minor sit secundo, erit & tertius quarto minor; & si maior, maior, si æqualis, æqualis, si inquam hoc semper contingat dicentur quatuor magnitudines in eadem esse proportionem.*

6 Magnitudines quæ eandem proportionem habent, proportionales vocantur. *Ut 4 & 2. item 6 & 3. cum habeant eandem proportionem, nempe duplicatam, dicuntur proportionales.*

7 Quando æquè multiplicium multiplex prima superat multiplicem secundæ; at multiplex tertie non superat multiplicem quartæ; prima ad secundam dicitur habere maiorem proportionem quam tertia ad quartam.

8 Analogia est proportionum similitudo.

9 Analogia in tribus minimis terminis consistit. *Ut in his numeris 4. 6. 9. ut enim est primus ad secundum, ita secundus ad tertium.*

10 Cum fuerint tres magnitudines proportionales, prima ad tertiam duplicatam proportionem habere dicitur eius, quam habet ad secundam. *Ut cum fuerint proportionales hi tres numeri 2. 4. 8. erit proportio quam habet 2. ad 8. duplicata eius, quam habet ad 4.*

11 Cum fuerint quatuor magnitudines proportionales prima ad quartam triplicam proportionem habere dicitur eius, quam habet ad secundam. Et deinceps semper una amplius quoad usque proportio extiterit. *Ut si sint proportionales hi quatuor numeri*

meri

11. *1. 4. 8. 16. erit proportio quam habet 1. ad 16. triplica eius quam habet ad 4.*

12. *Homologæ, seu similis rationis magnitudines dicuntur esse, antecedentes antecedentibus, consequentes consequentibus.*

13. *Permutata ratio, est sumptio antecedentis ad antecedentem, & consequentis ad consequentem. Demonstratur prop. 16. in qua cum est ut A ad B, ita C ad D, est quoque permutando, ut A ad C, ita B ad D.*

14. *Conuersa ratio, est sumptio consequentis ut antecedentis ad antecedentem, ut ad consequentem. Vide cor. prop. 4.*

15. *Compositio rationis est sumptio antecedentis unâ cum consequente, ut una ad consequentem. Demonstratur prop. 18. in qua cum est ut A ad B, ita C ad D, ita E ad F, ita G ad H, est quoque ut A ad B, ita C ad D, ita E ad F, ita G ad H.*

16. *Diuisio rationis est sumptio excessus, quo antecedens superat consequentem, ad consequentem. Demonstratur prop. 17. in qua cum est, ut A ad B, ita C ad D, ita E ad F, ita G ad H, est quoque ut A ad B, ita C ad D, ita E ad F, ita G ad H.*

17. *Conuersio rationis est sumptio antecedentis ad excessum, quo antecedens consequentem superat. Demonstratur prop. 19. in qua cum est ut A ad B, ita C ad D, ita E ad F, ita G ad H, est quoque ut A ad B, ita C ad D, ita E ad F, ita G ad H.*

18. *Ex æquali ratio est cum plures fuerint magnitudines, & alix ipsas numero æquales, quæ binæ, & in eadem ratione sumantur, fuerintque ut in primis magnitudinibus primæ ad ultimam, ita in secundis primæ ad ultimam. Vel est sumptio extremarum per subtractionem mediarum. Demonstratur 22. in qua cum est ut A ad B, ita C ad D, ita E ad F, ita G ad H, est quoque ut A ad B, ita C ad D, ita E ad F, ita G ad H.*

B ad C, ita E ad F; erit ex æquali, ut A ad C, ita D ad F.

19 Ordinata proportio est, cum fuerit ut antecedens ad consequentem, ita antecedens ad consequentem; ut autem consequens ad aliam quampiam, ita consequens ad aliam quampiam. *In prop. 20. & 23. in primis magnitudinibus antecedens est A, consequens B, alia quæpiam C, in secundis antecedens est D, consequens E, alia quæpiam F.*

20 Perturbata proportio est, quando tribus existentibus magnitudinibus; & alijs ipsis numero æqualibus fuerit ut in primis magnitudinibus antecedens ad consequentem; ita in secundis antecedens ad consequentem. Ut autem in primis consequens ad aliam quampiam: ita in secundis alia quæpiam ad antecedentem. *Ut in 21. & 23. prop. in primis tribus magnitudinibus antecedens est A consequens B, alia quæpiam C. In secundis antecedens est E, consequens F, alia quæpiam D.*


Propos. I. Theor. I.

Si fuerint quotcunq; magnitudines quotcunq; magnitudinum, æqualium numero, singule singularum æque multiplices, quotuplex est una magnitudo unius totuplices sunt omnes omnium.

SInt quotcunq; magnitudines A B, C D, quotcumque magnitudinum E, F æqualium numero, singule singularum æque multiplices. Dico quam multiplex est A B ipse E, tam multiplices esse A B, C D simul, ipsarum E, F simul. Cum enim quam multiplex est A B ipse E, tam multiplex sit

C D

CD ipsius F; erunt in C D tot magnitudines æquales ipsi F; quot sunt in A B æquales ipsi E. Di-



uidatur A B in magnitudines A G, G B æquales ipsi E; Et C D in C H, H D æquales ipsi F; eritque multitudo ipsarum A G, G B æqualis multitudini ipsarum C H, H D: cumque A G ipsi E, & C H æquale sit ipsi F; erunt A G, C H æquales ipsis E, F. Eadem de causa erunt G B; H D ipsis

E, F æquales: quot ergo in A B sunt magnitudines æquales ipsi E, tot sunt in A B; C D æquales ipsis E, F. Quare quam multiplex est A B ipso E, tam multiplices sunt A B, C D ipsarum E, F. Si ergo fuerint, &c. Quod oportuit demonstrare.

Propos. 2. Theor. 2.

Si prima secunda æquè multiplex fuerit, atque tertia quarta, fuerit autem & quinta secunda æquè multiplex, atque sexta quarta; erit & composita ex prima & quinta æquè multiplex secunda, atque tertia & sexta, quarta.

E Sto prima A B secunda C æquè multiplex, atque tertia D E quarta F: sit verò & quinta B G secunda C æquè multiplex, atque sexta E H quarta F. Dico & compositam ex prima & quin-


ta A G secunda C, æquè multiplicem esse, atque
 est tertia & sexta D H quarta E. Cum enim quam
 multiplex est A B ipse C,
 A D E F, tam multiplex sit D E ip-
 D E F, sius F, erunt in D E tot ma-
 D E F, gnitudines æquales ipsi F,
 B E F, quot sunt in A B æquales
 B E F, ipsi C. Eademque de cau-
 B E F, sa quot sunt in B G æqua-
 B E F, les ipsi C, tot erunt in E H
 B E F, æquales ipsi F: quot ergo
 B E F, sunt in tota A G æquales
 G C H F, ipsi C, tot sunt in tota D
 G C H F, H æquales ipsi F. Quam
 G C H F, multiplex est ergo A G ip-
 G C H F, sus C, tam multiplex est D H ipse F. Ergo A G
 composita ex prima, & quinta secunda C æquè
 multiplex est, atq; tertia & sexta D H quarta F.
 Si ergo prima secunda, &c. Quod oportuit de-
 monstrare.

Propos. 3. Theor. 3.

Si prima secunda æquè fuerit multiplex, atq;
 tertia quarta sumantur autem æquè mul-
 tiplices prima, & tertia; erit ex equali
 sumptarum utraq; utriusq; æquè multi-
 plex, altera quidem secunda, altera au-
 tem quarta.

E St o prima A secunda B æquè multiplex, at-
 que tertia C quarta D, & accipiantur ipsa-
 rum A, C æquè multiplices E, F, G H. Dico æquè
 multi-

multiplicem esse EF ipsius B, atque est GH ipsius D. Cum enim eque multiplex sit EF ipsius A, at-



que est GH ipsius C: continebuntur in G H tot magnitudines eque ipsi C, quot in EF eque ipsi A. Diuidatur EF in magnitudines EK, KF, eque ipsi A; & GH in GL, LH, eque ipsi C. Est autem multitudo ipsarum EK, KF eque multitudini ipsarum GL, LH. Et quia eque multiplex est

A ipsius B, ut C ipsius D; estque EK ipsi A; & GL ipsi C eque, erit & EK eque multiplex ipsius B, ut GL ipsius D. Eadem de causa eque multiplex est KF ipsius B, ut LH ipsius D. Cum igitur prima EK secunde B eque multiplex sit, ut tertia GL quartę D; sit verò & quinta KF secunde B eque multiplex, ut est sexta LH quartę D; erit & composita ex prima & quinta EF secunde B eque multiplex, atque est tertia cum sexta GH quartę D. Si ergo prima secunda, &c. Quod oportuit demonstrare.

2. prop.
2. 5.

Propos. 4. Theor. 4.

Si prima ad secundam eandem habuerit proportionem, quam tertia ad quartam; habebunt, & aequemultiplices prima & tertia

tia ad æquemultiplices secundas; & quarta, secundum quamvis multiplicationem, eandem proportionem, si, ut inter se respondent, sumpta fuerint.

Habeat prima A ad secundam B eandem proportionem, quam tertia C ad quartam D.

Et accipiatur ipsarum A, C æque multiplices E, F; ipsarum verò B, D quæcunque alix æque multiplices G, H. Dico ut est E ad G, ita esse F ad H. Accipiantur enim ipsarum E, F æque multiplices K, L; ipsarum verò G, H æque multiplices M, N. Et quia ita multiplex est E ipsius A, ut F ipsius C: acceptæque sunt ipsarum E, F æque multiplices K, L: & ita ergo multiplex est K ipsius A, ut L ipsius C. Eadem de causa ita multiplex est M ipsius B, ut N ipsius D. Et quia est ut A ad B, ita C ad D, acceptæque sunt ipsarum A, C æque multiplices K, L; ip-



2 prop.
3. 5.

b def.
5. 5.

sarum verò B, D alix quæcunque M, N: b ergo si K superat M, superabit & L ipsam N; & si æqualis, æqualis; si minor minor; suntque K, L ipsarum E, F æque multiplices; M vero & N sunt ipsarum G, H æque

Hæque multiplices: c est ergo, vt E ad G; ita F ad c def.
 H. Si ergo prima a d secundam, &c. Quod oportet demonstrare. 5. 5.

Lemma.

Quoniam demonstratum est, si K superet M, superare & L ipsum N; & si sit æqualis, esse æqualem; si minor, minorem. Constat etiam, si M, superet K, superare & N ipsum L, & si sit æqualis, esse æqualem, si minor, minorem, atque idcirco erit vt G ad E; ita H ad F.

Corollarium.

EX hoc manifestum est, si quatuor magnitudines fuerint proportionales, & conuersim proportionales esse. Hoc est si est vt A ad B; ita C ad D; esse quoque B ad A, vt D ad C.

Propos. 5. Theor. 5.

Si magnitudo magnitudinis æque multiplex fuerit, atque ablata ablata; & reliqua reliqua æque multiplex erit atque tota totius.

Sit magnitudo A B magnitudinis C D æque multiplex, atque est ablata A E ablata C F. Dico & reliquam E B, reliqua F D æque multiplex esse, vt est tota A B totius C D. Quotuplex enim est A E ipsius C F, totuplex fiat E B ipsius C G. Et quia æque multiplex est A E ipsius C F, atque E B ipsius C G, erit A E æque multiplex C F, atque

a prop.
1. 5.
atque

atque AB ipſius GF ; ponitur autem AE æque multiplex ipſius CF ; atque eſt AB ipſius CD ; æque multiplex ergo multiplex eſt AB vtriuſque GF, CD ; æquales ergo ſunt GF, CD ; Cõmunis CF auferatur, & erit reliqua GC reliquæ DF æqualis. Et cum æque multiplex ſit

b Colligitur ex ax. 7.



AB ipſius CF , atque E ipſius GC , eſtque GC æqualis DF ; æque ergo multiplex eſt AE ipſius CF , atque AB ipſius FD ; ponitur autem & AE ipſius CF æque multiplex, vt AB ipſius CD ; æque ergo multiplex E ipſius FD ; atque AB ipſius CD ; ergo reliqua EB , reliquæ FD æque multiplex eſt, atque eſt tota AB totius CD . Si ergo magnitudo, &c. Quod oportuit demonſtrare.

Propoſitio 6. Theor. 6.

Si duæ magnitudines duarum magnitudinum æque multiplices fuerint, & ablata quadam ſint eaiũdem æque multiplices, erunt reliquæ eiũdem aut æquales, aut æque multiplices.

Sint duæ magnitudines AB, CD duarum magnitudinum E, F æque multiplices; auferanturque AG, CH earundem E, F æque multiplices. Dico reliquas GB, HD ipſis BF , aut æquales eſſe, aut æque multiplices. Sic primo GB ipſi E æqualis. Dico & HD ipſi E æqualem eſſe. Ponatur ipſi F æqualis AK . Cum igitur AG æque multiplex

plex sit ipſus E, atque CH ipſus E, ſit vero. C B

equalis ipſi E, & CK ipſi E, a prop.

aque multiplex erit AB 1.5.

A K

I C

I D

I E

I F

I G

I H

I I

I J

I K

I L

I M

I N

I O

I P

I Q

I R

I S

I T

I U

I V

I W

I X

I Y

I Z

Donitur autem eque multi-

plex AB ipſus E, atque eſt

CD ipſus F: eque ergo mul-

tiplex eſt KH ipſus F, at-

que CD eiſdem F. Cum

ergo vtraque KH, CD ip-

ſus F eque ſit multiplex, b b Colli-

equalis erit KH ipſi CD. gatur ex

Communis CH auferatur, ax. 6.

erunt relique KC, HD

equales. Sed KC equalis

eſt F ergo, & HD eidem F

equalis erit. Eſt ergo GA

equalis ipſi E, & H D ipſi

F. Similiter demonſtrabis

mus ſi G B ipſus E fuerit

multiplex, eque multipli-

ces eſſe H D ipſus F. Si

ergo due magnitudines

Quod oportuit demon-

ſtrare.

Propoſ. 7. Theor. 7.

Aequales ad eandem, eandem habent propor-
tionem, & eadem ad aequales.

Sint magnitudines A, B equales, & alia quæcun-
que C. Dico vtramque A, B eandem pro-
portionem habere ad C, & C eandem ad eandem
A, B.

A, B. Accipiuntur ipsarum A, B æque multiples
D, E; & alia F ipsius C, utrunque multiplex. Cum

a Colli-
gitur ex
6.

I I
D Δ

igitur æque multiplex sit
D ipsius A, & E ipsius B; sit

verò A æqualis B, & erit &
D æqualis E; est quæ alia F

utrunque multiplex ipsius
C. Si ergo D maior est ip-

sa B, erit & E eadem F ma-
ior, & si æqualis, æqualis; si

minor, minor; suntq; D, E
ipsarum A, B æque multi-

plices, & ipsius C alia F
utrunque multiplex: est b

ergo ut A ad C; ita B ad
E. Dico & C ad utramque

A, B eandem habere proportionem. Iisdem enim
constructis ostendemus D æqualem esse E; & aliam

quandam F. Si ergo F maior est D; erit & maior
quam E; & si æqualis, æqualis; si minor, minor; est-

que F ipsius C multiplex; aliæ verò D, E utrunque
multiplices ipsarum A, B; est ergo ut C ad A, ita

C ad B. Si ergo æquales ad eandem, &c. Quod
oportuit demonstrare.

c def.
5. 5.


Propositio 8. Theor. 8.

*Inæqualium magnitudinum maior ad ean-
dem maiorem habet proportionem, quam
minor; Et eadem ad minorem maiorem
habet, quam ad maiorem.*

Int inæquales magnitudines A, B, C; sitque A
B maior quam C, sit & alia D quæcunque.

Dico

Dico $\& B$ ad D maiorem habere proportionem, quam C ad D ; & D ad C maiorem, quam ad $A B$. Cum enim $A B$ maior sit, quam C ; ponatur ipsi



C æqualis $B E$. Itaque minor ipsarum $A E$, $E B$ æ multiplicetur, donec maior fiat quam D . Sit primò $A E$ minor quam $E B$; & multiplicetur $A E$, donec maior fiat quam D , quæ sit $F G$, Et quam multiplex est $F G$ ipsius $A E$, tam multiplex fiat $G H$ ipsius $E B$, & K ipsius C . Sumatur L ipsius D dupla, M tripla, & ita deinceps una plus quoad sumpta multiplex ipsius D , fiat primò maior quam K , sumpta sit N quadrupla ipsius D , & primo maior quam K . Cū ergo K primò minor sit quā N , non erit K minor quam

a def.
4. 5.

M , cumque æque multiplex sit $F G$ ipsius $A E$, & $G H$ ipsius $E B$; b erit $F G$ æque multiplex ipsius $A E$, & $F H$ ipsius $A B$. æque autem multiplex est $F G$ ipsius $A E$, & K ipsius C . c æque ergo multiplex est $F H$ ipsius $A B$, & K ipsius C : sunt ergo $F H$, & K æque multiplices ipsarum $A B$, C . Rursus cum $G H$ ipsius $E B$ æque sit multiplex, ut K ipsius C ; sitque $E B$ ipsi C æqualis: d erit & $G H$ ipsi K æqualis. At K non est minor M : ergo nec $G H$ minor erit M : maior autem est $F C$ quā D ; tota ergo $F H$ utraq; D , M maior est. Sed utraq; D , M æqualis est ipsi N , cum M ipsius D sit tripla, utraque autem M ,
K D ipsius

b prop.
1. 5.


c ax. 1.

d Colli
gitur
ex ax.
1.

c def.
7.5.

F Cū. n.
fint qua
suor ma
gnitudi
nes AB,
D, C, D.
superet
que mul
tiplex
prima
FH mul
tiplicem
secunde
N; ac
multi
plex ter
tia k nō
superet
multipli
cē quar
ta Ne.
vis ma
ior pro
portio A
B ad D,
quam C
ad D per
def. 7 hu
ius.

D ipsius D quadrupla: est vero & N ipsius D qua
drupla: ergo utraq; M, D æquales sunt ipsi N: sed
F H ipsis M, D maior est. Ergo F H superat N,
& K non superat N, Quia ergo F H, & K sunt æ
que multiplices ipsarum A B, C; At N ipsius D
vtcunq; multiplex est, habebit A B ad D maiore
proportionem quam C ad D. Dico contra D ad
C maiorem habere, quam ad A B. ipsidem enim
constructis, similiter demonstrabimus N supera
re K, & non superare F H. Etenim N multiplex
D, C, D. est ipsius D: ipsarum vero A B, C vttunque mul
tiplices sunt F H, K: habet ergo D ad C maiorem



proportionem, quam ad A B.
Sit iam A E maior quam E B,
& minor E B multiplicata fiat
maior quam D, quæ sit G H,
multiplex quidem ipsius E B,
maior vero quam D. Et quam
multiplex est G H ipsius E B,
tam multiplex fiat F G ipsius
A B, & K ipsius C; similiterq;
ostendemus E H, & K ipsarum
A B, C æque multiplices esse.
Sumatur deinde N multiplex
quidem ipsius D; primo au
tem maior quam F G, vt rur
sus F G minor non sit quam
M; maior verò G H quam D;
ita vt tota F H ipsas D, M,
hoc est, N superet; K vero
ipsam N non superet, quoniã
& G F maior quam G H, hoc est, quam K, non su
perat N. atq; ita perficiemus demonstrationem
vt supra. Inæqualiū ergo, &c. Quod oportuit, &c.

Pro-

Propositio 9. Theor. 9.

*Quæ ad eandem, eandem habent proportio-
nem, æquales sunt: Et ad quas
eadem eandem habet, & il-
la sunt æquales.*

Habeat utraque A, & B ad C eandem pro-
portionem. Dico A, B æquales esse. Si non
sunt æquales, a non habebit utraque
A, B ad C eandem proportionem; ^{a prop. 8. 5.}
Autem; æquales ergo sunt. Ha-
beat deinde C ad A, B, eandem pro-
portionem. Dico A, B æquales esse.
Si non sunt æquales; b non habebit ^{b prop. 8. 5.}
C ad A, B eandem proportionem.
Babet autem, æquales ergo sunt. Quæ
ergo ad eandem, &c. Quod oportuit demonstrare.

Propositio 10. Theor. 10.

*Ad eandem proportionem habentium, quæ
maiores habet maior est, ad quam
verò eandem maiorem
habet, minor est.*

Habeat A ad C maiorem proportionem,
quam B. Dico A maiorem esse. Si non, aut ^{a prop. 9. 5.}
A est æqualis B, aut minor. non æqualis a v-
traque

b prop.
8. 5.

A

d

c prop.
9. 5.

B

d prop.
8. 5.

traque enim A, B eandem habet proportionem ad C; at non habet; non ergo B æqualis est ipsi A. Non minor, quia si minor esset A quam B, b haberet A ad C minorem proportionem, quam B; at non habet: non ergo A minor est quam B. ostensum est autem quod neque sit æqualis, maior est ergo A quam B. Habeat rursus C ad B maiorem proportionem quam ad A; dico B minorem esse, quam A. Si non; aliter est æqualis, aut maior. Non equalis, & haberet enim C ad A & B eandem proportionem; at non habet; non ergo A æqualis est ipsi B. Neque maior est B quam A; & haberet enim C ad B minorem proportionem quam ad A; at non habet: non ergo B maior est quam A. Ostensum est autem quod neque æqualis, maior ergo est A, quam B. Ad eandem ergo proportionem, &c. Quod oportuit demonstrare.

Propos. 11. Theor. 11.

Quæ eidem eadem sunt proportionem, & inter se eadem sunt.


Sit ut A ad B, sic C ad D; & ut C ad D, sic E ad F. Dico esse ut A ad B; ita E ad F. Accipiantur enim ipsarum A, C, E æque multiplices G, H, K: ipsarum verò B, D, F alię utcumque æque multiplices L, M, N. Et quia est, ut A ad B, ita C ad D, acceptęque sunt ipsarum A, C æque multiplices G, H; ipsarum verò B, D utcumque æque multiplices


 Multiplicis L, M: ergo si G excedit L, excedit & H ipsam M, & si æqualis; si minor, minor. Rursus cū sit ut C ad D; ita E ad F, & acceptæ sint ipsarū C, E æque multiplices H, K, ipsarū verò D, F alia utcumque æque multiplices M, N. ergo si excedit H ipsam M, excedet & K ipsam N; & si æqualis, æqualis; si minor, minor. Sed si excedit H ipsam M, excedet & G ipsam L; & si æqualis, æqualis; si minor, minor. Quare si excedit G ipsam L, excedet & K ipsam N; & si æqualis, æqualis: si minor, minor. Et sunt quidem G, K ipsarū A, E æque multiplices: L, N verò ipsarū B, F sunt alia utcumque æque multiplices. Est ergo ut A ad B; ita E ad F. Quare ergo eidem, &c. Quod demonstrare oportuit.

Propos. 12. Theor. 12.

Si quotcunque magnitudines proportionales fuerint, erit ut una antecedentium ad unam consequentium ita omnes antecedentes ad omnes consequentes.

Sint quotcunq; magnitudines A, B, C, D, E, F, ut quidem A ad B; ita C ad D, & E ad F. Dico ut est A ad B; ita esse A, C, E ad B, D, F. Accipiantur enim ipsarum A, C, E æque multiplices K, G, H,



a def.
5. 5.



b prop.
5. 1.






G, H, K: ipsarum verò B, D, F aliz, utcumque æque multiples L, M, N. Et cum sit ut A ad B; ita C ad D; & E ad F, acceptæque sint ipsarum quidem A, C, E æque multiples G, H, K; ipsarum verò B, D, F. aliz utcumque æque multiples L, M, N; ergo si A G excedit L, excedet & H ipsam N; & K ipsam N; & si æqualis, æqualis; si minor, minor. Quare si excedit G ipsam L; excedent & G, H, K ipsas L, M, N; & si æqualis, æquales; si minor, minores; suntque G; & G, H, K ipsarum A, & A, C, E, æque multiples; b qui si fuerint quæcumque magnitudines quoruncq; magnitudinum, æqualium numero, singule singulari æque multiples, quam multiplex est una vniús, tam multiples sunt omnes omnium. Eadem de causa sunt, L, & L, M, N ipsarum B, & B, D, F æque multiples. Est ergo ut A ad B; ita A, C, E ad B, D, F. Si ergo quodcumque magnitudines, &c. Quod oportuit demonstrare.

Propos. 13. Theor. 13.

Si prima ad secundam eandem proportionem habuerit, quam tertia ad quartam; tertia verò ad quartam maiorem habuerit, quam quinta ad sextam; habebit & prima ad secundam maiorem, quam quinta ad sextam.

Prima A habeat ad secundam B eandem proportionem, quam tertia C ad quartam D. Tertia verò C ad quartam D maiorem habeat, quam quinta E ad sextam F. Dico primam A ad secundam B maiorem habere, quam quintam E ad sextam F. Cum enim C ad D maiorem proportionem habeat, quam E ad F; sintque ipsarum C, E quædam æque multiplices; ipsarum verò D, F aliæ quæcumque: ac multiplex quidem ipsis C excedat multiplicem ipsius D; multiplex verò ipsius E non excedat multiplicem ipsius F. Sint ergo ipsarum C, E æque multiplices



G, H: ipsarum D, F aliæ utcumque K, L, & sic, ut G quidem K excedat: H verò L non excedat. & quam multiplex est G ipsius C, tam multiplex sit M ipsius A; & quam multiplex est K ipsius D, tam multiplex sit N ipsius B. Et cum sit ut A ad B; ita C ad D, acceptæque sint ipsarum A, C æque multiplices M, G: ipsarum verò B, D aliæ utcumque æque multiplices N, K, si M superat N, & G superabit K; & si æqualis, æqualis si minor, minor: superat autem

a def.
75.

G ipsam K; b superabit ergo & M ipsam N: at H non superat L; & sunt M, H ipsarum A, E æque multiplices; N verò & L ipsarum B, F utcumque æque

b def.
75.

æque multiplicēs sunt : habet ergo A ad B maiorem proportionem, quam E ad F. Si ergo prima ad secundam, &c. Quod oportuit demonstrare.

Propos. 14. Theor. 14.

Si prima ad secundam eandem habuerit proportionem, quam tertia ad quartam; prima autem quam tertia maior fuerit, erit & secunda quam quarta maior: & si æqualis, æqualis; si minor, minor.

Prima A ad secundam B eandem habeat proportionem, quam tertia C ad quartam D.



a prop.
8. 5.

& sit A quam C maior. Dico & B quam D maiorem esse. Cum enim A quam C maior sit, sitque alia quæcunq; magnitudo B; a habebit A ad B maiorem proportionem, quam C ad B. Ut autem A ad B, sic est C

ad D: ergo C ad D maiorem habet proportionem, quam C ad B. Ad b quam autem eisdem maiorem proportionem habet; illa minor est; minor ergo est D quam B. quare B quam D maior est. Similiter demonstrabimus si A æqualis sit C, & B ipsi D æqualem esse: & si A minor sit quam C, & B minorem esse quam D. Si ergo prima ad secundam, &c. Quod oportuit demonstrare.

b prop.
8. 5.

Propos. 15. Theor. 15:

*Partes cum pariter multiplicibus eandem
habent proportionem; si ut sibi mutuo
respondent, sumantur.*

Sint æque multiples AB ipsius C, & DE ip-
sius F. Dico esse ut C ad F; ita AB ad DE.
Cum enim AB ipsius C ita multiplex sit, ut DE
ipsius F, erunt in AB tot magnitudines æquales
ipsi C; quot sunt in DE æquales ipsi F. Diuidatur



enim AB in magnitudines AG
GH, HB æquales ipsi C. Et DE
in DK, KL, LE æquales ipsi F,
eritq; multitudo AG, GH, HB
æqualis multitudini DK, KL, L
E. Et quia tam AG, GH, HB,
quam DK, KL, LE æquales sunt,
erit ut AG ad DK; ita GH ad
KL, & HB ad LE; & erit ergo ut
vnum antecedentium ad vnum

consequentium; ita omnes ante-
cedentes ad omnes consequentes. Est ergo ut AG
ad DK; ita AB ad DE. Est autem AG ipsi C æ-
qualis, & DK ipsi F: ergo ut C ad F; ita AB ad
DE. Partes ergo, &c. Quod oportuit demonstrare.

a prop.
12. 5.

Propos. 16. Theor. 16.

*Si quatuor magnitudines proportionales fue-
rint, & permutatae proportionales erunt.*

Sint quatuor magnitudines proportionales A,
B, C, D. Ut A ad B; ita C ad D. Dico & per-
mutatas

mutatas proportionales esse: Vt A ad C; ita B ad D. Accipiantur enim ipsarum A, B æque multipli-

ces, E, F; ipsarum C, D aliz utcumque G, H. Et quia E, F æque multiplices sunt ipsarum A, B,

a habentq; partes eodem modo multiplicium eandem proportionem inter se comparataz, erit

vt A ad B; ita E ad F. Vt verò A ad B; ita est C ad D: ergo vt C

ad D; ita est B ad F. Rursus cum G, H ipsarum C, D sint æque multi-

tiplices; b erit vt C ad D, ita G ad H. Vt autem C ad D; ita est

B ad F; ergo vt E ad F; ita est G ad H. c Cum autem quatuor ma-

gnitudines proportionales fue-

rint, & prima quam tertia maior fuerit, erit & secunda quam quarta maior; & si æ-

qualis, æqualis; si minor, minor. Ergo si B superat G, & F superabit H. & si æqualis, æqualis; si mi-

nor, minor. Sunt autem E, F ipsarum A, B, æque multiplices. G, H verò ipsarum C, D utcumque

sunt eque multiplices. d Est ergo vt A ad C: ita B ad D. Si ergo quatuor magnitudines, &c. Quod oportuit demonstrare.

Propos. 17. Theor. 17.

Si composita magnitudines proportionales fuerint, & diuise proportionales erunt.

SInt compositæ magnitudines AB, BE, CD, DF proportionales. Vt quidam A B, ad B E; ita C D, ad D F. Dico & diuise proportionales esse, vt A E

ut A E ad E B; ita C F ad F D. Accipiantur enim ipsarum A E, E B, C F, F D æque multiplices G H, H K. L M, M N ipsarum verò E B, F D aliæ utcumque æquè multiplices K X, N P. Et quia æquè multiplex est G H ipsius A E, ut H K ipsius E B; ærit G H ipsius A E æquè multiplex; ut G K ipsius A B. æquè autem multiplex est G H ipsius A E; ut L M ipsius C F: b ergo æque multiplex est G K ipsius

a prop.
1. 5.
b prop.
11. 5.

AB, ut L M ipsius C F. Rursus quia æquè multiplex est L M ipsius C F, ut M N ipsius F D; ærit L M ipsius C F æquè multiplex, ut L N ipsius C D. æquè autem multiplex erat L M ipsius C F, ut G K ipsius A B: ærit ergo G K æque multiplex est ipsius A B, ut L N ipsius C D. Sūt ergo G K, L N ipsarum A B, C D æquè multiplices. Rursus quia H K ipsius E B æquè multiplex est, ut M N ipsius F D.

c prop.
1. 5.
d prop.
11. 5.

Est verò & K X ipsius E B æquè multiplex, ut N P ipsius F D. ærit composita H X ipsius E B æquè multiplex, ut M P ipsius D F. Et quia est ut A B ad B E; ita C D ad F D; sumptæque sunt ipsarum A B, C D æque multiplices G K, L N. Ipsarum verò E B, F D aliæ utcumque æquè multiplices H X, M P. Si ergo G K superat H X, & L N superabit M P. Et si æqualis, equalis; si minor, minor. Superet G K ipsam H X, ablata communis H H, superabit G H ipsum K X. Sed si G K superat H X, superabit & L N ipsam M P. Superet ergo L N ipsam M P, superabit (communis M N ablata) & L M ipsam N P. Quare si G H superat K X, &

f. def.
55. KX , & LM superabit NP . Similiter demonstrabimus, si GH equalis sit KX , & LM equalem esse NP ; & si minor, minorem. Et sunt GH , LM ipsarum AE , CF æquæ multiplices. ipsarum verò E , B , FD alię utcumque KX , NP . Est ergo ut AE ad EB ; ita CF ad FD . Si ergo compositę, &c. Quod oportuit demonstrare.

Propos. 18. Theor. 18. X

Si diuise magnitudines proportionales fuerint, & compositę proportionales erunt.

Sint diuise magnitudines AE , EB ; CF , FD proportionales. Ut AE ad EB ; ita CF ad FD . Dico & compositas proportionales esse, ut AB ad BE ; ita CD ad FD . Si non est ut AB ad BE ; ita CD ad FD ; sit ut AB ad BE ; ita CD vel ad minorem FD ; vel ad maiorem. Sit primo ad minorem DG . Cum ergo sit, ut AB

a prop.
17.5.

b prop.
11.5.

c prop.
14.5.



ad BE ; ita CD ad DG , erunt compositę magnitudines proportionales; & sunt ergo & diuise, ut AE ad EB , ita CG ad GD ; ponitur autem ut AE ad EB ; ita CF ad FD ; b erit ergo ut CG ad GD , ita CF ad FD . Est autem prima CG maior tertia CF ; c erit ergo & secunda GD maior quarta FD ; sed & minor est: quod fieri non potest. Non ergo est

ut AB ad BE ; ita CD ad minorem ipsa FD . Similiter demonstrabimus, quod neque ad maiorem FD ; ergo ad ipsam: Si ergo diuise, &c. Quod oportuit demonstrare.

Pro-

Propos. 19. Theor. 19.

Si fuerit ut tota ad totam; ita ablata ad ablatam; & reliqua ad reliquam erit, ut tota ad totam.

Sit ut tota AB ad totam CD ; ita ablata AE ad ablatam CF . Dico & reliquam EB ad reliquam FD esse, ut est tota AB ad totam CD . Cū enim sit ut tota AB ad totam CD ,



ita AE ad CF ; *a prop.*
 AB ad AE ; ut CD ad CF , & *b* di- 16. 5.
 uidendo BE ad EA , ut DF ad FC ; *b prop.*
 rursumque permutando ut BE ad 17. 5.
 DF ; ita EA ad FC . Ut uero AE ad CF ; sic ponitur tota AB ad totam CD . *c prop.*
c est ergo reliqua EB ad reli- 11. 5.
 quam FD , ut tota AB ad totam CD . Si ergo fuerit, &c. Quod oportuit demonstrare.

Corollarium.


Et quia demonstratum est, ut est AB ad CD , sic esse EB ad FD , erit *a* permutando ut AB ad EB ; ita CD ad FD . compositæ ergo magnitudines proportionales sunt. Ostensum est autem, ut est AB ad AE ; ita esse CD ad CF , quod est per conuersionem rationis. Vnde perspicuum est, si compositæ magnitudines proportionales sint; & *e def.*
 per conuersionem rationis proportionales esse. 17. 5.
 Factæ autem sunt proportionēs, & in æque multiplici-

tiplicibus, & in analogijs. Nam si prima secundę
ęque fuerit multiplex, atq; tertię quartę; erit vt
prima ad secundam; ita tertię ad quartam. Sed
non ita ex contrario conuertitur. Si enim fuerit
vt prima ad secundam, ita tertię ad quartam, non
omnino erit prima secundę, & tertię quartę ęque
multiplex, vt in sesquialteris, vel sesquiterijs pro
portionibus, vel alijs huiusmodi.

Propos. 20. Theor. 20.

*Si fuerint tres magnitudines, & alie illis nu-
mero aequales, quę bina & in eadem ra-
tione sumantur, ex aequali autem prima
quam tertię maior fuerit, erit & quarta
quam sexta maior; etsi aequalis, aequalis; si
minor, minor.*

Sint tres magnitudines A, B, C; & alie ipsis nu-
mero æquales D, E, F, quę binę, & in eadem
ratione sumantur. Vt quidem



A B C



D E F

ratione sumantur. Vt quidem
A ad B; ita D ad E. Vt verò
B ad C; sic E ad F, ex æquali
autem A maior sit quam C.
Dico & D quam F maiorem
esse: & si æqualis, æqualem: si
minor minorem. Cum enim
A maior sit quam C; alia ve-
ro quęcumq; B. Habebit A
ad B maiorem proportionē
quam C ad B. Sed vt A ad B:
sic est D ad E, vt autem C ad

ita est B conuertendo F ad E: Ergo D ad E ma-
iorem

a prop.

8. 5.

b prop.

16. 5.

iorem proportionem habet, quam F ad E: & ad eandem autem proportionem habentium, quæ maiorem habet, illa maior est; maior est ergo D quam F. Similiter demonstrabimus. Si A sit æqualis C; & D æqualem esse F; & si minor, minorem. Si ergo tres fuerint magnitudines, &c. Quod demonstrare oportuit.

c prop.
10. 5.

Propos. 21. Theor. 21.

Si fuerint tres magnitudines, & alia ipsis numero æquales quæ binæ, & in eadem proportionem sumantur, fuerit autem earum perturbata proportio, & ex æquali prima maior fuerit quam tertia, & quarta quæ sexta maior erit. & si æqualis, æqualis, & si minor, minor.

Sint tres magnitudines A, B, C, & alia ipsis numero æquales D, E, F quæ binæ, & in eadem ratione sumantur. Sic autem perturbata earum proportio ut A ad B, sic E ad F, & ut B ad C, sic D ad E; sitq; ex æquali A quam C maior. Dico & D maiorem esse ipsa F; & si æqualis, æqualem; si minor, minorem. Cum ergo A maior sit quam C, sitque alia quædam

a prop.

3. 5.

b prop.


4. 5.

c prop.

8. 5.




b convertendo, ut C ad B, ita E ad D: & quare E ad



re E ad F maiorem proportionem habet, quam E ad D. Ad quam autem eadem maiorem proportionem habet, illa minor est: minor est ergo F, quam D: adeoque maior D quam F. Similiter ostendemus si A sit æqualis C, & D ipsi F æqualem esse: & si minor, minorem. Si ergo fuerint tres magnitudines, &c. Quod oportuit demonstrare.

Propos. 22. Theor. 22.

Si fuerint quotcumq; magnitudines, & aliæ ipsis numero æquales, quæ binæ, & in eadem proportioni sumantur, & ex æquali in eadem proportioni erunt.



Sint quotcumque magnitudines A, B, C; & aliæ ipsis numero æquales D, E, F; quæ binæ & in eadem proportioni sumantur, ut quidem A ad B; ita D ad E; ut verò B ad C; sic E ad F. Dico quod ex æquali in eadem sint proportioni. Hoc est, dico ut est A ad C; ita esse D ad F. Sumantur enim ipsarum A, D quæ multiples G, H: ipsarum B, E aliæ utcumque K, L. Item ipsarum C, F aliæ utcumq; M, N. Et cum

com sit, vt A ad B; ita B ad E, acceptæq; sint ipsarum A, D æquæ multiplices G, H. Ipsarum B, E aliz vtcumq; æquæ multiplices K, L, & erit vt *a prop.*
 G ad K; ita H ad L. Eadem de causa erit, vt K ad *4. 5.*
 M; ita L ad N. Cum ergo tres magnitudines sint G, K, M; & aliz ipsis æquales numero H, L, N, quæ binæ, & in eadem proportionē sumuntur, *b b prop.*
 ex æquali si G superat M, & H superabit N; si æ- *20. 5.*
 qualis, æqualis; si minor, minor. Et sunt G, H ipsarum A, D æquæ multiplices. M, N ipsarum C, F: erit ergo, vt A ad C; ita D ad F. Si ergo *c def. 5.*
 quotcumque, &c. Quod oportuit demonstrare.


Propos. 23. Theor. 23.

Si fuerint tres magnitudines, & alia ipsis æquales numero, quæ binæ, & in eadem proportionē sumantur, fueritque earum perturbata proportio; & ex æquali in eadem proportionē erunt.

Sint tres magnitudines A, B, C, & aliz ipsis æquales numero binæ in eadem proportionē sumptæ D, E, F; sit autem earum perturbata proportio. Vt A ad B; sic E ad F. Vt verò B ad C; sic D ad E. Dico esse vt A ad C; ita D ad F. Sumantur ipsarum A, B, D æquæ multiplices G, H, K. Ipsarum C, E, F, aliz vtcumque L, M, N. Et quia G, H ipsarum A, B sunt æquæ multiplices, & partes autem eodem modo multiplicium *a prop.*
 eandem habent proportionem, erit vt A ad B; *15. 5.*
 sic G ad H. Eadem de causa erit, vt E ad F; sic M

L ad

b prop. ad N, cumq; sit vt A ad B; ita E ad F; *b* erit quocq;
 xi. 5. vt C ad H; ita M ad N. Rursus quia est vt B ad C



e. def.
 5. 5.

ita D ad E, sumptaq; sunt
 ipsarum B, D æque mul-
 tiplices H K: ipsarum ve-
 rò C, E alie vrcumq; L;
 M; erit vt H ad L; ita K
 ad M. Ostensum est au-
 tem esse, vt G ad H; ita M
 ad N. Cum ergo tres ma-
 gnitudines G, H, L, pro-
 portionales sint; & alie
 ipsis numero æquales K,
 M, N, binę in eadem pro-
 portione sumptę, sitque
 earũ perturbata propor-
 tio; ex *d* æquali si G supe-
 rat L; & K superabit N;
 & si æqualis, æqualis; si
 minor, minor, suntq; G,
 K ipsarum A, D æque multiplices. L, N verò ip-
 sarum C, F. Est ergo, vt A ad C; ita D ad F. Si
 ergo sint tres, &c. Quod oportuit demonstrare.

Propositio 24. Theor. 24.

*Si prima ad secundam eandem habuerit pro-
 portionem, quam tertia ad quartam; ha-
 beat autem & quinta ad secundam ean-
 dem, quam sexta ad quartam: habebit &
 composita ex prima & quinta ad secun-
 dam eandem proportionem, quam tertia
 & sexta ad quartam.*

Non

Habeat prima AB ad secundam CEandem proportionem, quam tertia DE ad quartam F. habeat verò & quinta BG ad secundam CEandem proportionem, quam sexta EH ad quartam F. Dico compositam ex prima, & quinta AG ad secundam CEandem habere proportionem, quam habet composita ex tertia, & sexta DH ad quartam F.



Cum enim sit vt BG ad C; ita EH ad F; erit conuertendo vt C ad BG; ita F ad EH. Et quia est vt AB ad C: ita DE ad F. Vt verò C ad BG; ita F ad EH. *b* Ex æquali ergo est; vt AB ad BG: ita DE ad EH. *c* Et

a Lemma
ma pro
pos. 4.
5.
b prop.
22. 5.
c prop.
18. 5.

cum diuise magnitudines proportionales sint, erunt & compositæ proportionales. Vt ergo AG ad GB; ita DH ad HE. Est vero, vt GB ad C: ita EH ad F: *d* ex æquali ergo est, vt AG ad C: ita DH ad F. Si ergo prima ad secundam, &c. *22.* 5. Quod oportuit demonstrare.


Propos. 25. Theor. 25.

Si quatuor magnitudines proportionales fuerint, maxima & minima duabus reliquis maiores erunt.

Sint quatuor magnitudines proportionales AB, CD, E, F, vt quidem AB, ad CD: ita E ad F. Sit maxima AB, minima F. Dico AB, & F,

quam

a prop. 3. 1. quam CD, & maiores esse. & Ponatur ipsi E æqualis AG; ipsi F, æqualis CH. Cum ergo sit



b prop. 19. 5.

c ax. 4.

vt AB ad CD; ita E ad F. Sic autem ipsi E æqualis AG; F vero CH. erit vt AB ad CD; ita AG ad CH. Et quia est vt tota AB ad totam CD, ita ablata AG ad ablatam CH; b erit & reliqua GB ad reliquam HD, vt tota AB ad totam CD: maior est autem AB quam CD. maior ergo etiam est GB, quam HD. Et cum AG æqualis sit ip. si E; & CH ipsi E; etunt AG & F æquales ipsis CH, & E, & eam, c quando equalia inæqualibus adduntur, tota fiant inæqualia. Ergo si (GB, HD inæqualibus existentibus & maiori GB) addantur ipsi GB, ipsæ AG; & F; ipsi vero HD; ipsæ CH, & E, colligentur AB, & F maiores, quam CD; & E. Si ergo quatuor, &c. Quod oportuit demonstrare.


Sequentes propositiones non sunt Euclidis, sed à Federico Commandino ex Pappo Alexandrino collectæ.

Propos. 26. Theor. 26.

Si prima ad secundam maiorem habuerit proportionem, quam tertia ad quartam, habebit conuertendo secunda ad primam minorem, quam quarta ad tertiam.

Habeat AB ad BC maiorem proportionem, quam DE ad EF. Dico CB ad BA mino-

minorem habere, quam FE ad ED . Sit ut AB ad BC : ita DE ad aliam G : ergo DE ad G maiorem habet proportionem, quam DE ad



EF : & minor ergo erit a prop. 8. 5. G , quam EF . Ponatur ipsi G æqualis $E H$.

Quia igitur ut AB ad BC ; ita est DE ad $E H$: erit convertendo, ut CB ad BA ; ita HE

ad ED . & Sed HE ad ED minorem habet proportionem, quam FE ad ED : Ergo & CB ad AB minorem habebit, quam FE ad ED . Quod oportuit demonstrare.

b Lemma ma pro pos. 4. 5. c prop. 8. 5.



Quod si AB ad $B C$ minorem habuerit proportionem, quam DE ad EF ; habebit convertendo CB ad BA maiorem, quam

FE ad ED . sit ut AB ad BC ; ita DE ad aliam G , & quæ maior erit quam EF . & Convertendo ergo erit ut CB ad BA ; ita GE ad ED . f At GE ad ED maiorem habet proportionem, quam FE ad ED : ergo CB ad BA maiorem habebit, quam FE ad ED .

d prop. 8. 5. e Lemma ma pro pos. 4. 5. f prop. 8. 5.


Propos. 27. Theor. 27.

Si prima ad secundam maiorem habuerit proportionem, quam tertia ad quartam;

L 3 habet

*habebit permutando prima ad tertiam
maiores, quam secunda ad quartam.*

Habeat AB ad BC maiorem proportionem,
quam DE ad EF . Dico AB ad DE ma-
iorem habere, quam



a prop.
8. 5.


b prop.

16. 5.

c prop.

8. 5.

BC ad EF . Vt
enim AB ad BC ;
ita sit alia GE ad
 EF : *a* quæ maior
erit, quam DE . *b*
Est ergo permutan-
do, vt AB ad GE ; ita BC ad EF . *c* Habet autem
 AB ad DE maiorem proportionem, quam AB
ad GE , hoc est, quam BC ad EF . Ergo AB ad
 DE maiorem proportionem habebit, quam BC
ad EF . Quod oportuit demonstrare.



Eadem ratio-
ne, si AB ad B
 C minorem ha-
beat proportio-
nem, quam DE
ad EF , sequetur

permutando AB ad DE minorem habere, quam
 BC ad EF . Sit enim vt AB ad BC ; ita alia GE
ad EF , *a* quæ minor erit quam DE . *c* Sed AB
ad DE minorem habet proportionem, quam A
 B ad GE , hoc est, quam BC ad EF . Habebit
igitur AB ad DE minorem proportionem,
quam BC ad EF .

d prop.

8. 5.


e prop.

8. 5.

Propositio 28. Theor. 28.

Si prima ad secundam maiorem proportionem habeat, quam tertia ad quartam, etiam componendo prima & secunda ad secundam maiorem proportionem habebunt, quam tertia & quarta ad quartam.

Habeat AB ad BC maiorem proportionem, quam DE ad EF . Dico & AC ad



CB maiorem habere, quam DF ad FE . fit

ut AB ad BC ; ita alia

GE ad EF : α erit GE

maior quā DE . Quia

igitur est, ut AB ad B

C ; ita GE ad EF ; b erit componendo, ut AC ad

CB ; ita GF ad FE . ϵ Sed GF ad FE maiorem

proportionem habet, quam DF ad FE . Ergo &

AC ad CB maiorem habet proportionē, quam

DF ad FE . Quod oportuit demonstrare.

α prop.

8. 5.

b prop.

18. 5.

ϵ prop.

8. 5.

Quod si AB ad BC mine

rem proportionem habeat,

quam DE ad EF , α habebit d prop.

etiam componendo AC ad

CB minorem, quam DF ad

EF . Quia enim AB ad BC

minorem proportionem habet, quam DE ad H

F ; fit ut AB ad B C ; ita alia GE ad EF , ϵ erit ea

minor quam DE ergo ut AC ad CB , ita erit G

F ad FE . sed GF ad FE minorem habet pro-

ϵ prop.

8. 5.

portionem, quam DF ad FE . Ergo & AC ad C
 B minorem habebit, quam DF ad FE .


Propos. 29. Theor. 29.

*Si prima, & secunda ad secundam maiorem
 habeat proportionem, quam tertia, &
 quarta ad quartam, habebit & diuidendo
 prima ad secundam maiorem proportio-
 nem, quam tertia ad quartam.*



Habeat AC ad
 CB maiorem
 proportionem, quam
 DF ad FE . Dico &
 AB ad BC maiorem
 habere, quam DE ad

EF . Vt enim DF ad FE ; ita sit alia GC ad C
a prop. B ; & eritque GC minor, quam AC ; & diuiden-
 8. 5. do erit GB ad BC ; vt DE ad EF . *b* sed AB ad
b prop. BC maiorem proportionem habet, quam GB
 8. 5. ad BC . Ergo & AB




ad BC maiorem habe-
 bit, quam DE ad EF .
 Si vero AC ad CB
 minorem habeat pro-
 portionem, quam DF
 ad FE ; habebit & diui-

dendo AB ad BC minorem, quam DE ad EF .
c prop. Si enim sit vt DF ad FE ; ita alia GC ad CB , &
 8. 5. erit GC quam AC maior, & eritque diuidendo
d prop. GB ad BC , vt DE ad EF . Habet autem AB ad
 8. 5. BC minorem proportionem, quam GB ad B
 C ; ha-

C; habebit ergo & A B ad B C minorem, quam D E ad E F.

Propos. 30. Theor. 30.

Si prima, & secunda ad secundam maiorem proportionem habeat, quam tertia, & quarta ad quartam; per conuersionem rationis prima, & secunda ad primam minorem habebit, quam tertia, & quarta ad tertiam.



Habeat A C ad B C maiorem proportionem, quam

D F ad F E. Dico C A ad A B minorem

habere, quam F D ad D E. Sit enim vt A C ad C B, sic D F ad


aliam F G, quæ minor erit quam F E. Quare per conuersionem rationis, vt C A

a prop.
8. 9.
b coroll.
19. 5.
c prop.
8. 5.

ad A B: ita erit F D ad D G. sed F D ad D G minorem proportionem habet, quam F D ad D E. Ergo & C A ad A B minorem habebit, quam F D ad D E. Quod si A C ad C B minorem proportionem habeat, quam D F ad F E; habebit per conuersionem rationis C A ad A B maiorem, quam F D ad D E; erit enim vt A C ad C B, ita D F ad maiorem quam F E reliqua manifesta sunt.

Propos. 31. Theor. 31.

Si prima ad tertiam maiorem proportionem habeat; quam secunda ad quartam; habebit etiam prima ad tertiam maiorem, quam prima & secunda ad tertiam, & quartam.



Habeat AB ad DE maiorem proportionem, quam BC ad EF . Dico & AB ad DE maiorem habere, quam

AC ad DF . Sit enim ut AB ad DE ; ita BC ad EF aliam EG , a qua minor erit quam EF . $\therefore$ Ergo $8.5.$ tota AC ad totam DG est ut AB ad DE . $\therefore$ sed b prop. AC ad DG maiorem proportionem habet quam $12.5.$ ad DF ; ergo AB ad DE maiorem habebit, quam c prop. AC ad DF . Et manifestum est totam AC ad totam DF minorem habere, quam AB ad DE , & $8.5.$ si minor sit proportio partis, totius maior erit.

Propos. 32. Theor. 32.

Si tota ad totam maiorem habuerit proportionem, quam ablata ad ablatam; habebis & reliqua ad reliquam maiorem quam tota ad totam.

Habeat AC ad DF maiorem proportionem, quam AB ad DE . Dico & reliquam BC ad re-

ad reliquam E F maiorem habere, quam A C ad D F. Si enim ut A C ad D F, ita A B ad D G. *a prop.*



ergo & reliqua B C ad reliqua G F est, ut A C ad D E. sed & B C ad E F maiorem proportionem

b prop. 8.5.

habet, quam ad F G. Ergo & B C ad E F maiorem habebit, quam A C ad D F. Si verò A C ad D F minorem proportionem habeat, quam A B ad D E, & reliqua B C ad reliquam E F minorem habebit, quam A C ad D F, quod eodem, quo supra, modo ostendetur.

Propos. 33. Theor. 33.

Si sint tres magnitudines, & alie ipsi numero equales, habeatq; prima priorum ad secundam maiorem proportionem, quam prima posteriorum ad secundam; secunda verò priorum ad tertiam maiorem habeat quam secunda posteriorum ad tertiam: etiam ex equali prima priorum ad tertiam maiorem habebit, quam prima posteriorum ad tertiam.

Habeat A ad B maiorem proportionem, quam D ad E, & B ad C maiorem, quam E ad F. Dico ex equali A ad C maiorem habere

re quam D ad F. Cum enim A ad B maiorem
 27. 3. proportionem habeat, quam D ad E, & habebit
 permutando A ad D maio-
 rem, quam B ad E. Et eadem
 ratione B ad E maiorem,
 quam C ad F, ergo A ad D
 maiorem habet quam C ad
 F, & permutando A ad C ma-
 iorem habebit, quā D ad F.
 Quod oportebat demonstra-
 re.



Quod si prima priorum ad
 secundam minorem habeat
 proportionem, quam prima
 posteriorum ad secundam;
 secunda vero priorum ad ter-
 tiam minorem habeat; quam
 secunda posteriorum ad ter-
 tiam. Similiter demonstra-

bitur etiam ex æquali primam priorum ad ter-
 tiam minorem proportionem habere, quam pri-
 mam posteriorum ad tertiam.



E V C L I D I S

E L E M E N T V M

S E X T V M.

Definitiones.

1



Imiles figuræ rectilinez sunt, quæ singulos angulos æquales habent, & latera circa æquales angulos proportionata. Cuiusmodi sunt propo-

4. triangula ABC, DCE .

2 Reciproca figuræ sunt, quando in vtraque figura antecedentes, & consequentes rationes sunt. *Vt* propo. 14. sunt figura ADF, BEC , in quibus antecedentes sunt DB, CB , consequentes BE, BF . & propo. 15. triangula ABC, ADE . in quibus antecedentes sunt CA, AE consequentes AD, AB .

3 Extrema ac media ratione linea recta secari dicitur, quando est ut tota ad maiorem portionem, ita maior portio ad minorem. Hæc sectio demonstrata est prop. 11. lib. 2. in qua linea AB in H extrema ac media ratione secta est, & itaque ut recta AB ad maiorem portionem AH , ita maior ad minorem BH . demonstrabitur etiam lib. 6. prop. 30.

4 Altitudo cuiusque rectilinez figuræ est perpendicularis, quæ à vertice ad basim ducitur. *Vt* propo. prima triangulorum AHB, ABD, ABL , altitudo est perpendicularis AC .

5 Proportio ex proportionibus componi dicitur, quando proportionum quantitates inter se multi-

multiplicatz, aliquam efficiunt proportionem.
Et ex præpositione dupla & tripla componitur sexcupla: nam denominator dupla 2. ductus in denominatorem tripla 3. facit 6. sunt autem ipsi denominatores quantitates proportionum.

Propos. 1. Theor. 1.

Triangula & parallelogramma eandem habentia altitudinem, inter se sunt ut bases.



Sint triangula ABC, ACD , parallelogramma EC, CF habentia altitudinem eandem, perpendicularem nempe. ex A in BD ductam. Dico esse, & triangulum ABC , ad triangulum ACD , & parallelogrammum EC , ad parallelogrammum CF , ut est basis BC , ad basim CD . Prodeatur enim BD utrinque in H, L , sintque basi BC æquales BG, GH ; basi verò CD quæcunque DK, KL , & iungantur AG, AH, AK, AL . Cumque BC, BG, GH æquales sint, & erunt & triangula AGH, AGB, ABC æqualia. Quam multiplex ergo est basis HC bases BC , tam multiplex est triangulum AHC trianguli ABC . Eodem de causa quam multiplex est LC bases

a prop.
38.1.

basis ipsius CD , tam multiplex est triangulum
 ALC trianguli ACD . Et si basis HC , basi CL
 $\propto$ qualis sit; erit & triangulum AHC ; triangulo
 ACL $\propto$ quale; Et si superet HC , ipsam CL , su-
perabit & triagulum AHC , triangulum ACL ,
& fuminor, minus. Cum ergo quatuor sint ma-
gnitudines, duæ bases BC, CD ; & duo triangu-
la ABC, ACD ; acceptæq; sint baseos quidem B
 C , & trianguli ABC $\propto$ que multiplicia, basis H
 C , & triangulum AHC . Baseos verò CD , &
trianguli ACD , alia utcunque, nempe basis C
 L ; & triangulum ALC : demonstratumq; sit si
 HC excedat CL , & AHC excedere ALC ; &
si $\propto$ qualis, $\propto$ quale; & si minor, minus; *b def.*
s. s.
sit BC ad basim CD ; ita triangulum ABC , ad
triangulum ACD . Et cum trianguli ABC
duplum sit parallelogrammum EC ; trianguli ve-
rò ACD duplum parallelogrammum FC , & *c prop.*
partes eodem modo multiplicium eandem ha-
beant proportionem, erit ut triangulum ABC
ad triangulum ACD ; ita parallelogrammum
 BC , ad parallelogrammum FC . Et quia demon-
stratum est, esse ut basim BC ad basim CD , ita
triangulum ABC ad triangulum ACD . Ut ve-
ro ABC ad ACD ; ita BC ad CF ; & erit ut ba-
sis BC ad basim CD ; ita parallelogrammum B
 C ad parallelogrammum CF , triangu-
la ergo & parallelogramma, &c. Quod oportuit demon-
strare.


b def.
s. s.
c prop.
41. 1.
d prop.
15. 5.

e prop.
11. 5.



Propos. 3. Theor. 2.

Si uni laterum trianguli parallela recta ducta fuerit, proportionaliter secabit trianguli latera. Et si trianguli latera proportionaliter secta fuerint, recta sectiones coniungens, reliquo lateri parallela erit.



a prop.
37.1.

Lateri BC trianguli ABC ducta sit parallela DE . Dico esse, ut BD ad DA ; ita CE ad EA . Ductis enim BE , CD erit triangulum BDE aequale triangulo CDE ; habent enim eandem basim DE , & sunt in iisdem

parallelis DE , BC . Aliud autem triangulum est ADE . *b prop.* Aequalia autem ad idē eandem habent proportionem: erit ergo ut BDE triangulum ad ADE ; ita CDE triangulum ad idem ADE triangulum. *a prop.* Sed ut BDE ad ADE ; ita est BD ad DA . cum enim in eadem sint altitudine, quam perpendicularis ex E in AB ducta ostendit, inter se erunt ut bases. Ob eandem causam, ut est triangulum CDE ad ADE ; ita est CE ad EA : d ut ergo BD ad DA ; ita est CE ad EA . Sint iam trianguli ABC latera AB , AC proportionaliter secta, sitq; ut BD ad DA , ita CE ad EA . *a prop.* *37.1.*

ad E A. Ducta ergo D E, dico illam ipsi B C parallelam esse, ijsdem enim constructis, cum sit ut B D ad D A, ita C E ad E A; & atqui ut B D ad D A; ita est triangulum B D E ad triangulum A D E. Et ut C E ad E A; ita triangulum C D E ad idem A D E; fvt ergo triagulum B D E ad triangulum A D E, sic triangulum C D E, ad triangulum A D E. vtrumque ergo triangulorum B D E, C D E, ad triangulum A D E eandem habet proportionem, æqualia ergo sunt, suntq; in eadem basi D E. h at triangula æqualia eandem habentia basim, in ijsdem sunt parallelis, ergo D E parallela est ipsi B C. Si er. go vni lateri, &c. Quod oportuit demonstrare.

e prop.
1. 6.

f prop.
11. 5.

g prop.
9. 5.

h prop.
40. 1.

Propos. 3. Theor. 3.

Si trianguli angulus bisecetur, recta q; angulum secans, secet & basim, habebunt basis partes eandem proportionem, quam reliqua trianguli latera. Et si basis partes eandem habeant proportionem, quam reliqua trianguli latera, quæ à vertice ad basim ducitur recta linea, trianguli angulum bisecabit.


E Sto triangulum A B C, & angulus B A C bisecetur recta A D. Dico esse, ut B D ad D C, ita B A ad A C. Ducatur C E per C, parallela D A, cui B A producta in E occurrat. Et quia in parallelas A D, E C recta A C incidit, & erunt

a prop.
29. 1.

M

angu-

anguli ACB , CAD æquales sed CAD , BAD ponuntur æquales; b erunt ergo & BAD , ACE æquales. Rursus cum in parallelas AD , EC incidat BE , c erit angulus externus BAD , æqualis interno AEC ; ostensus est autem & ACE ipsi BAD æqualis: d erit ergo & ACE æqualis ipsi AEC . e vnde & latera AE , AC æqualia erunt. Et quia trianguli BCE lateri EC ducta est parallela AD ; f erit ut BD ad DC ; ita BA ad AE ; est autem AE ipsi AC æqualis: g est ergo ut BD ad DC ita BA ad AC . Sed esto iam ut BD ad DC ; ita BA ad AC , iunctaq; sit AD . Dico angulum BAC bisecari recta AD : iisdem enim constructis, cum sit ut BD ad DC ; ita BA ad AC : h & ut BD ad DC ; ita BA ad AE (est enim lateri EC trianguli BCE ducta parallela AD) erit ut BA ad AC ita BA ad AE ; i æqualis ergo est AC ipsi AE . $9.5.$ k Quare & angulus AEC angulo ACE æqualis erit. l sed AEC externo BAD est æqualis; $6.1.$ m & ACE alterno CAD ; erit ergo & BAD æqualis ipsi CAD : ergo BAC recta AD bisecatur. Si ergo trianguli angulus, &c. Quod oportuit demonstrare.




h prop. 2.6. i prop. 9.5. k prop. 6.1. l prop. 9.1. m prop. 29.1.

Propos. 4. Theor. 4.

Aequiangulorum triangulorum latera circa æquales angulos proportionalia sunt; Et latera equalibus angulis subtensa, homologia, sine eiusdem rationis.

Sint


Sint triangula ABC , DCE æquiangula, æquales habentia angulos ABC , DCE , & ACB , DEC , & BAC , CDE . Dico latera circa æquales angulos esse proportionalia; & latera æqualibus angulis subtensa, homologa. Cōponantur enim B



C , CE in directum. Et cum anguli ABC , ACB duobus rectis minores sint, sit autem angulus DCE angulo ACB æqualis, erunt & ABE , DE a def. C duobus rectis minores & cōcurrent ergo BA , ED productæ. Concurrant in F ; cumque anguli DCE , ABC æquales sint, b erunt rectæ BF , CD parallelæ. Rursus cum anguli ACB , DEC æquales sint, c erunt & AC , FE parallelæ, ideoque $FACD$ parallelogramum est; d eritque FA æqualis ipsi CD ; & AC ipsi FD ; & cum ad latus FE trianguli FBE ducta sit parallela AC , e erit ut BA ad AF ; ita BC ad CE ; est autem AF æqualis ipsi CD ; ut f ergo BA ad CD ; ita BC ad CE ; & g permutando, ut AB ad BC ; ita DC ad CE . Rursus cum CD , BF parallelæ sint, h erit ut BC ad CE ; ita FD ad DE . Est autem DF æqualis AC . Ut ergo BC ad CE ; ita AC ad ED . k ergo permutando, ut BC ad CA ; ita CE ad ED . Cum ergo demonstratum sit, esse ut AB ad BC ; ita DC ad CE . Ut verò BC ad CA ; ita CE ad ED ; erit ex l æquali ut BA ad K AC ; ita CD ad DE , æquiangulorum ergo, &c. Quod oportuit demonstrare.

Propos. 5. Theor. 5.

Si duo triangula latera proportionalia habuerint, æquiangula erunt, habebuntque angulos, quibus homologa latera subtenduntur, æquales.



Habeant triangula ABC , DEF latera proportionalia, nempe, ut AB ad BC ; ita DE ad EF . Et ut BC ad CA ; ita EF ad FD : atque ut BA ad AC , ita ED ad DF . Dico triangula ABC , DEF æquiangula esse, æqualesque habere angulos, quibus homologa latera subtenduntur, unde æquales erunt anguli ABC , DEF ; & BCA , EFD ; & BAC , EDF . *a* Constituantur enim ad puncta E , F rectæ EG , FG anguli $FE G$, EFG æquales angulis ABC , BCA erunt ergo & reliqui BAC , EGF æquales: triangula ergo ABC , EGF sunt æquiangula: *b* habent igitur latera circa æquales angulos proportionalia; eruntque latera æqualibus angulis subtensa, homologa. Ergo ut AB ad BC ; ita EG ad GF : Sed ut *c* AB ad BC ; ita ponitur DE ad EF : *c* ut igitur *11. 5.* DE ad EF ; ita GE ad GF . Vtraque ergo DE , GE

Ge ad E F eandem habet proportionem; & $\frac{2}{d}$ *prop.*
 quales igitur sunt DE, GE. Eadem de causa DF, *9. 5.*
 GF æquales erunt. Cum igitur DE, EG æqua-
 les sint, communis EF: erunt duæ DE, EF, dua-
 bus GE, EF æquales; & basi DF basi GF æqua-
 lis; & erit ergo angulus DFE angulo GEF æ- *prop.*
 qualis; & triangulum DEF triangulo GEF æ- *8. 1.*
 quale; & reliqui anguli, reliquis, quibus æqualia
 latera subtenduntur: anguli ergo DFE, GFE
 sunt æquales; item EDF, EGF: & cum angulus
 FED æqualis sit angulo GEF; & GEF ipsi A
 BC; ferit & ABC ipsi FED æqualis. Eadem *fac. 1.*
 de causa erit angulo ACB æqualis angulus D
 FE; & angulus ad A angulo ad D. triangula er-
 go ABC, DEF æquiangula sunt. Si ergo duo
 triangula, &c. Quod oportuit demonstrare.


Propos. 6. Theor. 6.

*Si duo triangula unum angulum uni æqua-
 lem, & circa æquales angulos latera pro-
 portionalia habuerint, æquiangula erunt,
 habebuntque angulos, quos homologa la-
 tera subtendunt, æquales.*

Sint duo triangula ABC, DEF, angulos B
 AC, EDF habentia æquales, & circa ipsos
 latera proportionalia, ut BA ad AC; ita ED ad
 DF. Dico triangula ABC, DEF esse æqui-
 angula, adeoque angulum ABC angulo DEF; &
 ACD ipsi DFE, æqualem habere. & Constitua- *a prop.*
 tur enim ad puncta D, F rectæ DF alterutri an- *23. 1.*

gulorum BAC , EDF æqualis FDG ; angulo
verò ACB æqualis $D FG$: erit igitur & reliquus

b. *prop.*
8. 1.



ad B , reli-
quo ad G æ-
qualis b tri-
angula ergo
 ABC ,
 $D FG$ sunt
æquiangula.
Est ergo ut
 BA ad AC ;
ita GD ad
 DF : poni-
tur autè ut

c *prop.*

9. 5.

d *prop.*

8. 1.

e *ex. 1.*

BA ad AC , ita ED ad DF ; ergo ut ED ad DF ;
ita est GD ad DF ; c æqualis ergo est ED ipsi G
 D , communis DF . Duæ ergo ED , DF , duabus
 GD , DF sunt æquales, & angulus EDF angulo
 GDF æqualis; d erit ergo, & basis EF basi GF
æqualis, & triangulum DEF triangulos GDF ;
quare reliqui anguli reliquis æquales erunt, al-
ter alteri, quibus æqualia latera subtenduntur.
Angulus ergo DFG æqualis est angulo DFE ;
& qui ad G illi, qui ad E . Sed DFG æqualis est
 ACB angulo; ergo & ACB ipsi DFE æqua-
lis erit; ponitur autem & BAC ipsi EDF æqua-
lis: reliquus ergo ad B æqualis erit reliquo ad
triangula ergo ABC , DEF æquiangula sunt.
Si ergo duo triangula, &c. Quod oportuit de-
monstrare.



Propos. 7. Theor. 7.

Si duo triangula vnum angulum vni angulo aequalem; & circa alios angulos latera proportionalia habuerint; reliquorum vero vtrumque, aut minorem, aut non minorem recto, equiangula erunt triangula; & angulos, circa quos latera sunt proportionalia, aequales habebunt.




Sint duo triangula ABC, DEF, habentia angulos BAC, EDF aequales; circa alios vero angulos ABC, DEF latera proportionalia. Vt AB ad BC; ita DE ad EF. re-

liquorum verò angulorū qui ad C, & F, primum vtrumque minorem recto. Dico ABC, DEF triangula, esse æquiangula; angulumque ABC angulo DEF; & qui est ad C, illi qui est ad F, æqualem. Quod si anguli ABC, DEF inæquales sint; erit vnus maior. Sit maior ABC; & a
constituatur ad punctum B recta AB angulus A
BG, æqualis angulo DEF. Et cum anguli A, D
æquales sint; item ABG, DEF; erunt & reli-
qui AGB, DFE æquales. triangula ergo ABG, DEF æquiangula sunt; est ergo vt AB, ad BG;
ita DE ad EF: sed vt DE ad EF; ita ponitur A
B ad BC: ergo vt AB ad BC; ita est AB ad BG.

M 4 Cum

d prop.
9. 5.

e prop.
5. 1.



d Cum ergo A B ad
vtramque B C, B G
eandem habeat pro-
portionem, erunt B
C, B G æquales. e
ergo & anguli B G
C, B C G æquales
erunt: At B C G mi-
nor recto ponitur,
erit ergo & B G C

f prop.
13. 1.

g prop.
32. 1.

h prop.
5. 1.

i prop.
17. 1.

k prop.
32. 1.

recto minor: f quare angulus A G B ei deinceps
maior erit recto: ostensus est autem æqualis an-
gulo F: erit igitur & angulus F maior recto; at mi-
nor ponitur, quod est absurdum: anguli ergo A B
C, D E F non sunt inæquales: æquales ergo. g
sunt verò & anguli A, D æquales: ergo & qui ad
C & F æquales erunt. Quare triangula A B C,
D E F æquiangula erunt. Sic fursus vterque an-
gulus ad C & F non minor recto. Dico & sic
triangula A B C, D E F æquiangula esse, iisdem
enim constructis, ostendemus rectas B C, B G es-
se æquales, ut prius: h erunt igitur & anguli C,
B G C æquales. Cum ergo C recto non sit mi-
nor, nec B G C recto minor erit. Sunt ergo tri-
anguli B G C duo anguli non minores duobus
rectis, i quo d fieri non potest, non ergo anguli
A B C, D E F inæquales sunt: æquales ergo. Sunt
vero & anguli ad A & D æquales; erunt & igitur
& reliqui ad C & F æquales. Quare triangula A
B C, D E F sunt æquiangula. Si ergo duo trian-
gula; &c. Quod oportuit demonstrare.


Propof. 8. Theor. 8.

*In reftangulo triangulo fi ab angulo recto ad
bafim perpendicularis ducatur, quæ ad
perpendiculararem sunt triangula, & toti,
& inter fe fimilia sunt.*



E Sto triangu-
lum reftan-
gulum ABC re-
ctum habens BA
 C , ducaturque ab
 A ad BC perpen-

dicularis AD . Dico triangula ABD , ADC , &
toti ABC , & inter fe effe fimilia. Cum enim
angulus BAC equalis fit angulo ADB ; rectus
enim est uterque: & angulus ad B communis utriq;
triangulo ABC , ABD ; ^{a colligitur & x} erit & reliquus ACB
reliquo BAD æqualis: æquiangula ergo sunt
triangula ABC , ABD . ^{32. 1.} Est ergo ut BC rectū
trianguli ABC subtendens, ad BA rectum tri-
anguli ABD subtendentem; ita ipsa AB angu-
lum C trianguli ABC subtendens, ad BD sub-
tendentem angulum BAD trianguli ABD . Et
ita AC ad AD subtendentem angulum B com-
munem utriusque trianguli. Triangula ergo A
 BC , ABD æquiangula sunt, habentque latera
circa æquales angulos proportionalia; ^{c def. 1.} & fimilia
ergo sunt triangula ABC , ABD . Eodem mo-
do ostendemus triangulum ADC triangulo A
 BC simile effe. Utrumque ergo triangulum A
 BD , ADC toti ABC simile est. Dico quod &
inter



inter se similia
sint ABD, ADC
triangula. Cū enim
anguli BDA, ADC
recti sint, erunt
& æquales: osten-

d colli-
gitur ex

32. 1.
e prop
4. 6.

sus est autem & BAD ipsi C æqualis: & ergo &
reliquus ad B , reliquo DAC æqualis erit. Trian-
gula ergo ABD, ADC æquiangula sunt. Est
ergo, ut BD subtendens angulum BAD triangu-
li ABD , ad DA subtendentem angulum C trian-
guli ADC æqualem angulo BAD ; ita ipsa AD
subtendens trianguli ABD , angulum B , ad D
 C subtendentem angulum DAC trianguli ADC
æqualem angulo B ; & ita BA ad AC subten-
tem rectum ADC . Triangula ergo ABD, ADC
similia sunt. Si ergo in triangulo rectangu-
lo, &c. Quod oportuit demonstrare.

Corollarium.

EX his manifestum est, si in triangulo rectan-
gulo ab angulo recto ad basim perpendi-
cularis ducatur, ipsam inter basim partes mediam
proportionalem esse. Et inter basim, & partem
basim, medium proportionale esse latus, quod ad
partem. Ut inter BC, BD medium proportionale, &
latus BA . Inter BC, CD , latus DC .



Propos. 9. Probl. 1.

A data recta linea imperatam partem auferre.



O Porteat à data recta AB , imperatam partem auferre. Sit auferenda pars tertia. Ducatur ab A recta AC cum AB quemcumque angulum continens; & accipiatur in AC quodcumque punctum D , & ponanturq; ipsi A *a prop.* D æquales DE , EC ; ducatur CB , *3. 1.* b eiq; per D parallela ducatur D *b prop.*

F. Cum ergo lateri BC trianguli ABC parallela sit ducta DF ; erit ut CD ad DA ; ita BF ad FA . Est autem DC ipsius DA dupla; dupla ergo est & BF ipsius FA . tripla ergo est BA ipsius AF . A data ergo recta AB imperata pars, nimirum tertia AF ablata est. Quod oportuit facere.

Propos. 10. Probl. 2.

Datam rectam lineam insectam, datæ rectæ sectæ similiter secare.

O Porteat datam insectam AB similiter secare, ut secta est AC . Sit AC in punctis D, E secta. Collocentur AB , AC ut angulum quemcumque contineant, & ducatur CB ; atque per D, E agantur ipsi BC parallelæ DF, EG ; & per D ipsi AB ducatur parallela DH ; & erit
utrum-

a prop.

34. 1.

b prop.


2. 6.

c prop.

34. 1.

d prop.


2. 6.



sius *d* cum lateri *E G* trianguli *A G E* ducta sit parallela *F D*, erit vt *E D* ad *D A*; ita *G F* ad *F A*: ostensum est autem esse, vt *C E* ad *E D*, ita *B G* ad *G F*, est ergo vt *C E* ad *E D*; ita *B G* ad *G F*, vt verò *E D* ad *D A*; ita *G F* ad *F A*: data ergo recta infecta *A B* similiter secta est, vt secta *A C*. Quod oportuit facere.

Propos. 11. Probl. 3.

Duabus rectis datis tertiam proportionalem inuenire.



a prop.

3. 1.

b prop.

31. 1.

c prop.

2. 6.



Sint datæ *B A*, *A C*, & ponatur vt angulum quemcumque contineant. oportet ergo ipsis *B A*, *A C* tertiam proportionalem inuenire. Producantur *A B*, *A C* ad *D*, *E* puncta; & a ponatur ipsi *A C* æqualis *B D*; & ipsi *B C* ducatur parallela *D E* per *D*. Cum itaque lateri *D E* trianguli *A D E* ducta sit parallela *B C*; erit vt *A B* ad *D B*; ita *A C* ad *C E*; æqualis est autem *B D* ipsi *A C*; est ergo vt *A B* ad *A C*; ita *A C* ad *C E*.

Datis

Datis ergo duabus $A B$, $A C$ inuenta est tertia proportionalis $C E$. Quod oportuit facere.

Propos. 12. Probl. 4.

Tribus datis rectis lineis quartam proportionalem inuenire.




O Porteat tribus datis rectis A, B, C , quartam proportionalem inuenire. Exponentur duæ rectæ $D E$, $D F$ continentes angulum quemcunque $E D F$: & *a* ponatur ipsi A ^{a prop.} æqualis recta $D G$; ipsi B , ^{3. 1.} recta $G E$: & ipsi C recta $D H$; *b* atque ipsi $G H$ aga- ^{b prop.} tur parallela $E F$ per E . ^{3. 1. 1.} Cum ergo lateri $E F$ trianguli $D E F$ ducta sit parallela $G H$, *c* erit vt $D G$ ^{c prop.} ad $G E$; ita $D H$ ad $H F$. ^{2. 6.} Est autem $D G$ æqualis ipsi A , $G E$ ipsi B ; $D H$ ipsi C ;

est ergo vt A ad B ; ita C ad $H F$. Tribus ergo datis A, B, C inuenta est quarta proportionalis $H F$. Quod oportuit facere.



Propos. 13. Probl. 5.

*Duabus rectis datis mediam proportionalem
inuenire.*



a prop.

11. 1.

b prop.

3. 1. 3.

c corol.

1. prop.

8. 6.

*A C ad angulos rectos, iunctis A D, D C. b Et quia
angulus A D C rectus est; quippe in semicirculo,
estque in triangulo rectangulo ex angulo recto
D ad basim A C perpendicularis ducta D B. c erit
B D inter partes basis A B, B C, media proportio-
nalis. Duabus ergo, &c. Quod oportuit facere.*



Propositio 14. Theor. 9.

*Aequalium, & unum uni angulo aequalem
habentium parallelogrammorum, reci-
proca sunt latera, quae circa aequales an-
gulos. Et parallelogramma, quae unum
uni angulum aequalem habent, & quo-
rum reciprocantur latera circa aequales
angulos, aequalia sunt.*


*S*int parallelogramma A B, B C aequalia, ha-
bentia angulos ad B aequales, positæque sint
D B,

DB, BE in directum, & erunt ergo & FB, BG in ^a *Coll.*
directum. Dico parallelogrammorum AB, BC ^g *gitur ex*
latera, quæ circa æquales angulos, esse recipro- 13. 14.
ca. Hoc est, esse vt DB ad BE ; ita GB ad BF . & 15.

1.




Perficiatur enim parallelogrammum FE . Et quia
 AB, BC parallelogramma æqualia sunt, aliud
autem quoddam est, FE : ^b *erit vt* AB ad FE ; ita ^b *prop.*
 BC ad idem FE . ^c *sed vt* AB ad FE ; ita est DB 7. 5.
ad BE ; & vt BC ad FE ; ita est GB ad BF . ^d *Er-* ^c *prop.*
go est vt DB ad BE ; ita GB ad BF . Parallelo- 1. 6.
grammorum ergo AB, BC & latera sunt reci- ^d *prop.*
proca. ^f *Reciprocentur iam latera, quæ circa æ-* 11. 1.
quales angulos; sitque vt DB ad BE ; ita GB ad ^c *def.*
 BF . Dico parallelogramma AB, BC æqualia 6. 1.
esse. Cum enim sit vt DB ad BE ; ita GB ad BF . ^f *def.*
Et vt DB ad BE ; ita AB ad FE ; atque vt GB 2. 6.
ad BF ; ita BC ad FE ; erit vt AB ad FE ; ita BC ^g *prop.*
ad idem FE ; ^h *æqualia ergo sunt parallelogram-* 1. 6.
ma AB, BC . ^h *Æqualium ergo, & vnum vni, &c.* ^h *prop.*
Quod oportuit demonstrare. 9. 5.



Propositio 15. Theor. 10.

Aequalium triangularum, & vnum angulum vni aequalem habentium, reciproca sunt latera, quæ circa æquales angulos. Et triangula, quæ vnum angulum vni æqualem habent, & quodum latera quæ circa æquales angulos, reciprocantur, sunt æqualia.



Sint triangu-
la ABC ,
 ADE æqualia,
habeâtq; vnum
angulum BAC ,
vni DAE æqua-
lem. Dico la-
tera, quæ circa
æquales sūt an-
gulos, reciproca

a Colligatur ex

13. 14.

& 15.

1.

b prop.

7. 5.

c prop.

1. 6.

d prop.

11. 5.

ca esse. Hoc est, esse, vt CA ad AD ; ita EA ad AB . Ponantur enim CA, AD in directum; a erunt ergo & EA, AB in directum, & ducatur BD . Cum igitur triangula ABC, ADE æqualia sint, sitque aliud ABD ; b erit vt CAB ad BAD ; ita ADE ad idem BAD : c sed vt CAB ad BAD ; ita est CA ad AD . Et vt EAD ad BAD ; ita est EA ad AB : d Ergo vt CA ad AD ; ita est EA ad AB . Triangulorum ergo ABC, ADE latera, quæ circa æquales angulos, reciprocantur. Sed reciproca sint iam latera triangulorum ABC, ADE . Et sit vt CA ad AD ; ita EA ad AB . Dico trian-


triangula ABC, ADE esse æqualia. Iuncta
rursus BD, erit vt CA ad AD; ita EA ad AB,
sed vt CA ad AD; ita est triangulum ABC
ad triangulum BAD; vtverò EA ad AB; ita
triangulum EAD ad triangulum BAD. Vt er-
go ABC ad BAD; ita est EAD ad idem BAD:
vtrumque ergo ABC, EAD ad BAD ean-
dem habet proportionem: æquale ergo est trian-
gulum ABC, triangulo EAD. Æqualium er-
go triangulorum, &c. Quod oportuit demon-
strare.

c prop.
1. 6.

f prop.
9. 5.

Propositio 16. Theor. 11.


Si quatuor rectæ lineæ proportionales sup-
rint, erit quod extremis continetur re-
ctangulum, æquale illi quod medijs con-
tinetur rectangulo. Et si rectangulum
extremis contentum, æquale fuerit me-
dijs contento rectangulo; quatuor illæ li-
neæ proportionales erunt,



Sint quatuor rectæ AB, CD, E, F proportio-
nales, vt AB ad CD; ita E ad F. Dico re-
ctangulum AB, & F contentum, æquale esse con-
tento CD, & E. Ducantur à punctis A, C ad re-
ctas

a prop.
11. 1.

Etas AB, CD ad angulos rectos AG, CH ; sitq;
 ipsi F equalis AG ; & ipsi E , ipsa CH , compleanturque parallelogramma BG, DH . Et quia est,
 ut AB ad CD ; ita E ad F , & est E ipsi CH ; & F
 ipsi AG æqualis, erit ut AB ad CD ; ita CH ad
 AG : *b* parallelogrammorum ergo BG, DH la-
 tera, quæ circa æquales angulos sunt, reciprocan



a prop.
 14. 6.



tur: e quorum autem parallelogrammorum æ-
 quiangulorum latera reciprocantur, illa æqua-
 lia sunt: parallelogramma ergo BG, DH æqua-
 lia sunt. Et est BG , quod AB , & F continetur,
 (est enim AG ipsi F æqualis) DH , quod CD &
 E continetur (est enim CH ipsi E æqualis.) Quod
 ergo AB , & F continetur, æquale est ei, quod C
 D & E continetur rectangulo. Sit iam quod A
 B , & F continetur, æquale ei quod C D & E con-
 tinetur. Dico quatuor rectas esse proportiona-
 les. Ut AB ad CD ; ita E ad F . iisdem constru-
 ctis, cum quod AB , F continetur, æquale sit ei
 quod CD , E continetur, sitque BG id quod AB ,
 & F continetur (est enim AG ipsi F æqualis) D
 H vero, quod CD , & E continetur (est enim &
 CH ipsi E æqualis) erit BG ipsi DH æquale: &
 sunt æquiangula. d Æqualium autem & æqui-
 angulorum parallelogrammorum latera, quæ
 circa æquales angulos, reciproca sunt: Erit ergo

d prop.
 14. 6.

vt A B ad C D; ita E ad F. Si ergo quatuor rectæ lineæ, &c. Quod oportuit demonstrare.

Propof. 17. Theor. 12.

Si tres rectæ lineæ proportionales fuerint; erit quod extremis continetur rectangulum, æquale quadrato quod fit à media. Et si quod extremis continetur rectangulum æquale fuerit quadrato quod à media fit, erunt tres lineæ illæ proportionales.



S Int tres rectæ A, B, C proportionales, vt A ad B; ita B ad C. Dico quod A, C continetur æquale esse ei quod ex B. Ponatur D æqualis ipfi B. Et cum fit, vt A ad B; ita B ad C; fit vero ipſa B æqualis D; erit vt A ad

B; ita D ad C. Cum autem quatuor rectæ proportionales sunt, eſt quod extremis continetur rectangulum, æquale ei quod medijs continetur rectangulo. Quod ergo A & C continetur, æquale eſt ei quod B, D continetur; at quod B, D continetur æquale eſt ei quod ex B; eſt enim D ipſi B æqualis; Ergo quod A, C continetur, æquale eſt ei quod ex B quadrato. Sit iam quod

N 2 A, C.

A, C continetur, æquale ei, quod ex B. Dico esse, ut A ad B; ita B ad C. iisdem enim constructis,

cū quod A, C continetur æquale sit ei quod ex B; & quod ex B, æquale ei quod B, D continetur, quod B, D æquales sint; erit quod A, C continetur, æquale ei quod B, D continetur. *b* quādo autem quod extremis continetur, æquale est ei

quod continetur medijs, sunt quatuor illæ lineæ proportionales. Est igitur ut A ad B; ita D ad C: æqualis autem est D ipsi B: ergo ut A ad B; ita est B ad C. Si ergo tres lineæ, &c. Quod oportuit demonstrare.

Propos. 18. Probl. 6.

Super data recta linea dato rectilineo simile similiterque positum rectilineum describere.



O Porteat super data A B dato rectilineo C B simile similiterque positum rectilineum describere. Ducatur D F, & *a* constituentur ad puncta A, B rectæ A B anguli G A B, A B G æquales angulis C, C D F; eritque reliquus C F D reliquo A G B æqualis: triangula igitur F C D, G A B sunt æquiangula. *b* Est ergo, ut F D ad G B; ita

b prop.
16. 6.

a prop.
23. 1.

b prop.
4. 6.

B; ita FC ad GA ; & CD ad AB . c Constituantur rursus ad puncta B, G rectæ BG anguli BG 23. 1.




H, GBH æquales angulis DFE, FDE ; eritque reliquus E reliquo H æqualis: triangula ergo FDE, GBH æquiangula sunt; d est igitur ut FD *d prop. 4. 6.* ad GB ; ita FE, GH ; & ED ad HB . Ostensum autem est, esse ut FD ad GB ; ita FC ad GA , & CD ad AB ; e igitur ut FC ad AG ; ita est CD *e prop. 11. 5.* ad AB ; & FE ad GH ; itemque ED ad HB . Et cum angulus CFD æqualis sit angulo AGB ; & DFE ipsi BGH : erit totus CFE toti AGH æqualis. Eadem de causa erit angulus CDE æqualis angulo ABH . Est verò & angulus C angulo A ; Et angulus E angulo H æqualis: æquiangula ergo sunt AH, CE , habentque latera circa æquales angulos proportionalia. *f* Est igitur *f def. 8. 1.* AH rectilineum simile similiterque positum rectilineo CE . Super data ergo recta linea, &c. Quod oportuit facere.



Propof. 19. Theor. 13.

*Similia triangu la inter fe fun t in dupla pro-
portione fuorum laterum .*



S Int ABC,
DEF triā
gula ſimilia ,
habentia an-
gulos B, E æ-
quales; ſitque
vt A B ad B
C; ita D E ad
E F, vt latera
B C, E F ſint
homologa.

Dico triangulum A B C ad triangulum D E F
duplam habere proportionem eius , quam habet
a prop. B C ad E F. *a* Sumatur enim ipſarum B C, E F
15. 6. tertia proportionalis B G; vt ſit quomodo B C
ad E F; ita E F ad B G; ducaturque G A. Cum
b def. igitur ſit vt A B ad B C; ita D E ad E F; *b* erit
10. 5. permutando vt A B ad D E; ita B C ad E F, ſed vt
B C ad E F; ita eſt E F ad B G: ergo vt A B ad D
E; ita eſt E F ad B G: Triangulorum ergo A B G,
D E F latera circa æquales angulos reciprocantur.
Quorum autem triangulorum vnum angu-
lum vni æqualem habentium latera circa æqua-
les angulos reciprocantur , illa æqualia ſunt: *c*
c prop. triangula ergo D E F, A B G æqualia ſunt. Et
15. 6. quia eſt vt B C ad E F; ita E F ad B G; quando au-
d def. tem tres lineæ proportionales ſunt , *d* prima ad
10. 5. tertiam duplam proportionem habere dicitur
eius ,

eius, quam habet ad secundam. B C ergo habet ad B G duplam proportionem eius, quam habet ad E F. Vt vero B C ad B G; ita est triangulum A B C ad triangulum A B G: habet ergo triangulum A B C ad triangulum A B G duplam proportionem eius, quam habet B C ad E F. Est autem triangulum A B G æquale triangulo D E F: habet ergo triangulum A B C ad triangulum D E F duplam proportionem eius, quam habet B C ad E F. Similia ergo triangula, &c. Quod oportuit demonstrare.

c prop.
1. 6.

Corollarium.


EX his manifestum est, si tres lineæ proportionales fuerint; esse; vt primâ ad tertiam, ita triangulum super prima descriptum ad triangulum super secunda simile similiterq; descriptū. Ostensum est enim, vt est C B ad B G: ita esse triangulum A B C ad triangulum A B G, hoc est, ad triangulum D E F. Quod oportuit demonstrare.

Propos. 20. Theor. 14.

Similia polygona in similia triangula diuiduntur; & numero equalia. & homologa totis; & polygonum ad polygonum duplam habet proportionem eius, quam habet latus homologum ad latus homologum.

Sint similia polygona A B C D E, F G H K L, & sit latus A B homologum ipsi F G. Di-


co polygona $ABCDE$, $FGHKL$ in similia
triangula diuidi, & numero æqualia, & homolo-
ga totis: & polygonum $ABCDE$ ad polygo-
num $FGHKL$ duplicatam habere proportio-



nem eius, quam habet AB ad FG . Iungantur
enim BE, EC, GL, LH ; & quia polygonum A
 $BCDE$ simile est polygono $FGHKL$; erit
angulus $B AE$ æqualis angulo $G FL$; & est, vt
 BA ad AE ; ita GF ad FL . Cum itaque duo sint
triangula ABE, FGL , vnum angulum vni æqua-
lem, & circa æquales angulos latera proportio-
nalia habentia, *a* erunt ipsa æquiangula, ideòq;
a prop.
6. 6. & similia: æqualis est ergo angulus ABE angulo
 $FG L$; est verò & totus ABC , toti FGH æqua-
b ex. 3. lis, propter similitudinem polygonorum; *b* reli-
quus ergo EC , reliquo LGH æqualis erit.
Et quia propter similitudinem triangulorum A
 BE, FGL , est, vt EB ad BA ; ita LG ad GF .
Sed & propter similitudinem polygonorum, est
c prop.
22. 5. vt AB ad BC ; ita FG ad GH : *c* ex æquali ergo
est, vt EB ad BC ; ita LG ad GH ; latera ergo
circa

circa æquales angulos $EB C$, LGH , sunt pro-
 portionalia; æquiangula & ergo sunt triangula E *d prop.*
 BC , LGH ; quare & similia. Eadem de causa *6. 6.*
 similia sunt triangula ECD , LHK : Similia
 ergo polygona $ABCDE$, $FGHKL$ in similia
 triangula, & æqualia numero diuisa sunt. Dico
 & homologa esse totis, hoc est, proportionalia,
 & antecedentia quidem ABE , $EB C$, ECD ;
 Consequentia verò ipsorum $FG L$, LGH , LH
 K ; atque polygonum $ABCDE$ ad polygonum
 $FGHKL$ duplam habere proportionem eius,
 quam habet latus homologum AB ad latus ho-
 mologum FG . Iungantur enim AC , FH . Et
 quia propter similitudinem polygonorum, sunt
 anguli ABC , FGH æquales; estque ut AB ad
 BC ; ita FG ad GH ; æquiangula ergo sunt tri- *e prop.*
 angula ABC , FGH : æquales igitur sunt tam an- *6. 6.*
 guli BAC , $G F H$, quam $B C A$, $G H F$. Et quia
 anguli BAM , $G F N$ æquales sunt, ostensique
 sunt & ABM , FGN æquales; erunt & reliqui
 AMB , FNG æquales; sunt ergo triangula AB
 M ; FGN æquiangula. Similiter ostendemus,
 & triangula $BM C$, GNH esse æquiangula. Est
 ergo ut AM ad MB ; ita FN ad NG . Et ut BM
 ad MC ; ita GN ad NH ; ex æquali ergo est ut *f prop.*
 AM ad MC ; ita FN ad NH ; sed ut AM ad M *22. 5.*
 C ; ita est triangulum ABM ad triangulum MB *g prop.*
 C ; & AME ad $EM C$; sunt enim ad se inuicem *1. 6.*
 ut bases; & *h* ut vnum antecedentium, ad vnum *h prop.*
 consequentium; ita omnia antecedentia ad om- *12. 5.*
 nia consequentia. Ut ergo triangulum AMB
 ad $BM C$; ita triangulū ABE ad CBE : sed ut *i prop.*
 AMB ad $BM C$; ita est AM ad MC ; Ut ergo *1. 6.*
 AM ad MC ; ita triangulum ABE ad $EB C$.
 Eadem

Eadem de causa, est vt FN ad NH; ita triangulum FGL ad GLH. Et est vt AM ad MC; ita



FN ad NH; Vt ergo triangulum ABE ad BE
k prop. C; ita triangulum FGL ad GLH; *k* & permutando, vt ABE ad FGL; ita EBC ad GLH.
 16. 5. Similiter demonstrabimus ductis BD, GK. Esse vt triangulum BEC ad LGH; ita ECD ad LHK: & quia est, vt ABE ad FGL; ita EBC ad
l prop. LGH; & ECD ad LHK: *l* erit vt vnum antecedentium ad vnum consequentium; ita omnia antecedentia ad omnia consequentia: est ergo vt ABE ad FGL; ita ABCDE ad FGHL: sed ABE ad FGL duplam proportionem habet eius, quam AB latus homologum ad FG latus homologum *m* Similia enim tria in
 19. 6. *m prop.* 19. 6. dupla proportione sunt laterum homologorum: habet ergo & ABCDE polygonum ad FGHL polygonum duplam proportionem eius, quam habet AB ad FG. Similia ergo polygona, &c. Quod oportuit demonstrare. Eodem modo in similibus quadrilateris ostenderetur in
 dupla

dupla illa esse proportionem laterum homologorum. *a* Ostensum est autem & in triangulis.

a prop.
19. 6.

Corollarium I.



V Niuersè ergo similes rectilineæ figuræ ad se inuicem sunt in dupla proportionem laterum homologorum; & si ipsarum *A B*, *F G* tertiam proportionalem sumamus *X*, *b* habebit *A B* ad *X* duplam proportionem eius, quam habet ad *F G*. Habet autem & polygonum

b def.
10. 5.

ad polygonum, & quadrilaterum ad quadrilaterum duplam proportionem eius, quam habet homologum latus ad homologum, hoc est: *A B* ad *F G*. *c* Ostensum est autem hoc in triangulis.

c cor. prop.
19. 6.

Corollarium II.

V Niuersè ergo manifestum est; si tres fuerint rectæ, esse ut prima est ad tertiam, ita figuram à prima descriptam, ad figuram à secunda similiter descriptam. Quod oportuit demonstrare.


Corol. prop.
19. 6.

Ostendemus etiam aliter, & expeditius triangula esse homologa. Exponantur rursus polygoni *A B C D E*, *F G H K L*, ducanturque *B E*, *E C*, *G L*, *L H*. Dico esse ut triangulum *A B E* ad triangulum *F G L*; ita *E B C* ad *I G H*; & *C D E* ad *H K L*. Cum enim triangula *A B E*, *F G L* similia sint, *a* habebit *A B E* ad *F G L* duplam proportionem eius, quâ habet latus *B E* ad *G L*.

a prop.
9. 6.

Eadem

Eadem de causa habebit triangulum $BE C$ ad $G L H$ duplam proportionem eius, quam habet B




E ad $G L$. Est ergo ut ABE ad $FG L$; ita $EB C$ ad $G L H$. Rursus cum triacula $EB C$, $L G H$ similia sint; habebit $EB C$ ad $L G H$ duplam proportionem eius, quam habet CE recta ad $H L$. Eadem de causa habet triangulum $E C D$ ad $L H K$ duplam proportionem eius, quam habet CE ad $H L$. Est ergo ut $BE C$ ad $L G H$; ita $CE D$ ad $L H K$. Ostensum autem est, esse, ut $EB C$ ad $L G H$; ita ABE ad $FG L$; ergo ut ABE ad $FG L$; ita est $BE C$ ad $G L H$; & EC b-prop. D ad $L H K$, b ut ergo vnum antecedentium ad 12. 3. vnum consequentium; ita omnia antecedentia ad omnia consequentia; & reliqua ut in priori demonstratione. Quod oportuit demonstrare.

Propos. 21. Theor. 15.

Quæ eidem rectilineo sunt similia, & inter se sunt similia.

S It utrumque rectilineorum A , B ipsi C simile. Dico & A ipsi B simile esse. Cum enim
A ipsi

A ipsi C sit simile, erit & æquiangulum illi, habebitque latera circa æquales angulos proportionalia. Rursus cum B simile sit ipsi C, æqui-



angulum illi erit, habebitque circa æquales angulos latera proportionalia: Vtrumq;

ergo ipsorum A, B æquiangulum est ipsi C, & habet circa æquales angulos latera proportionalia: erunt ergo & A, B æquiangula, habebuntq; circa æquales angulos, latera proportionalia: similia ergo sunt. Quod oportuit demonstrare.


Propos. 22. Theor. 16.

Si quatuor rectæ lineæ proportionales fuerint; erunt, & rectilinea ab ipsis similia similiterque descripta proportionalia: Et si rectilinea similia similiterque ab ipsis descripta proportionalia fuerint; erunt & ipsæ proportionales.

Sint quatuor rectæ A B, C D, E F, G H proportionales. Vt A B ad C D; ita E F ad G H, & describanturque super A B, C D similia, similiterque posita rectilinea K A B, L C D. super E F, G H similia similiterque posita M F, N H. Dico esse, vt K A B ad L C D; ita M F ad N H. a prop. 18. 5.
b sumatur enim ipsarum A B, C D tertia propor- b prop. 11. 6.
tionalis X; ipsarum vero E F, G H tertia pro-
portio-

portionalis O. Et cum sit vt AB ad CD; ita E
c prop. Fad GH & vt CD ad X; ita GH ad O: e erit
 22. 5. ex æquali; vt AB ad X; ita EF ad O: d sed vt A
d prop.
 19. 6.

e cor.
prop.
 26. 6.



B ad X, ita
 est K A B
 ad L C D;
 & vt E F ad
 O; ita e M
 F ad N H:
 ergo vt A B
 K ad C D
 L, ita est M
 F ad N H.
 Sed sit vt K
 A B ad L C
 D; ita M F
 ad N H. Di-
 co esse, vt A
 B ad C D;
 ita F E ad
 G H. Fiat

f *prop.* senim vt A B ad C D, ita E F ad P R, g descri-
 12. 6. baturque super P R rectilineum S R simile simi-
 g *prop.* literque positum ipsis M F; N H. Cum ergo sit,
 18. 6. vt A B ad C D; ita E F ad P R, descriptaque sint
 super A B, C D rectilinea K A B, L C D similia
 similiterque posita; super E F, P R verò similia si-
 militerque posita M F, S R; erit vt K A B ad L
 C D; ita M F ad S R; ponitur autem vt K A B ad
 L C D; ita M F ad N H. Habet ergo M F ad N
 H, & ad S R eandem proportionem; h æqualia
 h *prop.* ergo sunt N H, S R; sed sunt similia similiterque
 9. 5. posita; æquales ergo sunt G H, P R. Et quia est,
 vt A B ad C D, ita E F ad P R; sunt P R, G H æ-
 quales;

quales; erit ut $A B$ ad $C D$: ita $E F$ ad $G H$. Si ergo quatuor, rectæ, &c. Quod oportuit demonstrare.

Lemma.



Quod autē quando rectilinea æqualia similia fuerint, ipsorum

latera homologa æqualia sint, sic ostendemus. Sint $N H$, $S R$ æqualia, & similia; sitque ut $H G$ ad $G N$; ita $R P$ ad $P S$. Dico $R P$, $G H$ æquales esse. Si non: erit una maior. Sit maior $R P$; cum ergo sit ut $R P$ ad $P S$; ita $H G$ ad $G N$; & erit permutando, ut $R P$ ad $G H$; ita $P S$ ad $G N$: maior est autem $P R$ quam $G H$: maior ergo etiam erit $P S$ quam $G N$. Quare & $R S$ maius erit, quam $H N$: sed est illi æquale; quod fieri non potest: Non est ergo $P R$ maior quam $G H$. Quod oportuit demonstrare.

*2 prop.
16. 5.*

Propos. 23. Theor. 17.


Æquiangula parallelogramma inter se proportionem habent ex lateribus compositam.

Sint æquiangula parallelogramma $A C$, $C F$ æquales angulos $B C D$, $E C G$ habentia. Dico illa proportionem habere, ex proportionem laterum compositam ex illa nimirum quam habet

a prop. bet BC ad CG ; & quam habet DC ad CE . Po
 14. 1. natur BC ipsi CG in directum; *a* erit ergo & D

C ipsi CE in directum, & compleatur parallelogrammum DG . Exponatur quædam recta K , *b* fiatque ut B C ad CG ; ita K ad L ; & ut DC ad C E ; ita L ad M . Proportiones ergo K ad L , & L ad M , eadem sunt quæ laterum, BC ad CG &


b prop.
 12. 6.



c def. 5. DC ad CE . *c* Sed proportio K ad M componitur ex proportione K ad L , & L ad M ; habet ergo & K ad M proportionem ex laterum proportione compositam. Et cum sit ut BC ad CG ; *d* ita AC parallelogrammum ad CH : & ut BC ad CG ; ita K ad L ; *e* erit ut K ad L , ita AC ad CH . Rursus *f* cum sit ut DC ad CE ; ita parallelogrammum CH ad CF ; & ut DC ad CE ; ita L ad M , *g* erit ut L ad M , ita CH ad CF . Cum igitur ostensum sit, ut K ad L ; ita esse AC ad CH ; ut verò L ad M ; ita CH ad CF ; *h* erit ex æquali, ut K ad M , ita AC ad CF . At K ad M proportionem habet compositam ex lateribus: ergo & AC ad CF , proportionem habet compositam ex lateribus: æquiangula ergo parallelogrammum, &c. Quod oportuit demonstrare.

Propof. 24. Theor. 18.


Omnis parallelogrammi quæ circa diametrum sunt parallelogramma, fimilia sunt toti, & inter fe.



S It parallelogræ
mum $A B C D$,
diametrum $A C$, cir-
ca quam sint paral-
lelogramma $E G$,
 $H K$. Dico utrumq;
 $E G$, $H K$ toti $A B$
 $C D$, & inter fe fi-
milia esse. Cû enim

ad latus $B C$ trianguli $A B C$ ducta sit parallela
 $E F$, & erit ut $B E$ ad $E A$; ita $C F$ ad $F A$. Rursus
cum ad latus $C D$ trianguli $A C D$ ducta sit pa-
rallela $F G$, erit, ut $C F$ ad $F A$; ita $D G$ ad $G A$.
Sed ut $C F$ ad $F A$; ita ostensa est $B E$ ad $E A$: *b prop.*
ergo ut $B E$ ad $E A$; ita est $D G$ ad $G A$: & compo-
nendo ergo ut $B A$ ad $A E$; ita $D A$ ad $A G$: & *c prop.*
per *d* mutando, ut $B A$ ad $A D$; ita $A E$ ad $A G$:
parallelogrammorum ergo $A B C D$, $E G$ latera
circa communem angulum $B A D$ sunt propor-
tionalia. Cumque $G F$, $D C$ parallelæ sint, &
erunt anguli $A G F$, $A D C$; item $G F A$, $D C A$
æquales; communis $D A C$: triângula ergo $A D$
 C , $A G F$ æquiángula sunt. Eadem de causa erunt
& $A B C$, $A F E$ æquiángula: tota ergo paralle-
logramma $A B C D$, $E G$ sunt æquiángula; *f prop.*
igitur ut $A D$ ad $D C$; ita $A G$ ad $G F$; & ut $D C$
ad $C A$; ita $G F$ ad $F A$. Ut verò $A C$ ad $C B$; ita

AF ad FE ; & ut CB ad BA ; ita FE ad EA . Et quia demonstratum est, esse ut DC ad CA ; ita G F ad FA . Ut verò AC ad CB ; ita AF ad FE ; erit ex æquali ut DC ad CB ; ita GF ad FE . Par-



allelogrammorum ergo $ABCD$, EG latera circa æquales angulos sūt proportionalia; similia ergo sunt. Eadem de causa erit parallelogrammum KH toti $ABCD$ simile: utrumq; ergo EG ,



g prop. KH toti $ABCD$ simile est, *g* Quæ autem ei-
 21. 6. dem sunt similia; & inter se sunt similia: est ergo BG ipsi KH simile. Omnis ergo parallelogram-
 mi, &c. Quod oportuit demonstrare.

Propos. 25. Probl. 7.

*Dato rectilineo simile, & alteri dato æquale
 constituere.*

S It dato rectilineo ABC simile, constituen-
 dum, æquale verò ipsi D . *a* Applicetur ad la-
 tus BC triangulo ABC æquale parallelogram-
 2 *prop.* mum BE ; ad C E verò æquale ipsi D , nimirum C
 14. 1. *b prop.* M in angulo FCE , æquali angulo $CB L$; *b* in-
 14. 1. directum ergo erit $B C$ ipsi $C F$, & $L E$ ipsi $B M$.
c prop. *c* Accipiaturs ipsarum BC , CE media propor-
 13. 6. tionalis GH ; & super ipsa ipsi ABC rectilineo
d prop. *d* simile describatur, & similiter positum KGH .
 18. 6. Cum ergo sit ut BC ad GH , ita GH ad CE
 (quan-

(quando enim fuerint tres α rectæ proportionales, est ut prima ad tertiam; ita figura super prima descripta ad figuram super secunda similem, simili 20. 6.



literq; descriptam) Est ergo ut BC ad CF; ita triāgulum ABC ad triāgulum KGH. *f* Sed ut BC ad CF, ita est BE ad EF. *f prop. 1. 6.* ut ergo α triāgulum ABC ad triāgulum KGH; ita est BE parallelogrammum ad EF parallelo-

f prop. 1. 6.


g prop. 11. 5.

h prop. 16. 5.

grammum: & *h* permutando, ut ABC ad BE; ita est KGH ad EF. Æquale autem est triāgulum ABC parallelogrammo BE; ergo & triāgulum KGH æquale est parallelogrammo EF. Sed EF æquale est ipsi D: ergo & KGH ipsi D est æquale. Est verò & KGH ipsi ABC simile. Dato ergo rectilineo, &c. Quod oportuit facere.

Propos. 26. Theor. 19.

Si à parallelogrammo parallelogrammum auferatur, simile toti similiterque positum, communem ipsi habens angulum, circa eandem diametrum est toti.




A Parallelogrammo $ABCD$ auferatur parallelogrammum AF simile toti $ABCD$, & similiter positum, communem angulum DAB cum ipso habens. Dico AB

CD circa eandem diametrum esse ipsi AF . Si non, Sit ipsorum diametrus AHC . & ducatur per H utrique AD , BC parallela HK . Cum ergo $ABCD$ circa eandem diametrum sit ipsi AF simile, erit $ABCD$ ipsi KG simile. Est ergo ut DA ad AB ; ita GA ad AK : est autem propter similitudinem ipsorum $ABCD$, EG , ut DA ad AB ; ita GA ad AE . ergo ut GA ad AE , ita GA ad AK ; habet ergo GA ad utramque AK , AE eandem proportionem, æqualis ergo est AE ipsi AK , minor maiori, quod fieri nequit. Non ergo $ABCD$ circa eandem diametrum est ipsi AF . Circa eandem ergo diametrum est ipsi AF . Si ergo à parallelogrammo, &c. Quod oportuit demonstrare.

Pro-

Propos. 27. Theor. 20.

Omnium parallelogrammorum ad eandem rectam lineam applicatorum, & deficientium figuris parallelogrammis similibus, & similiter positis ei quæ à dimidia describitur, maximum est quod ad dimidiam est applicatum, simile existens defectui.



Recta AB a bisecetur in C, & applicetur ad AB recta
* parallelogrammum A D deficiens figura
parallelogramma D B, simili; & similiter
posita ei, quæ à dimidia ipsius AB descripta est. Dico omniū
parallelogrammorum
ad AB applicatorum,
& deficientium figuris

a prop.
10. 1.
"qua-
lectuq;

parallelogrammis similibus, similiterque positis
ipsi DB, maximum esse AD. b Applicetur enim
ad rectam AB parallelogrammum AF, deficiens
parallelogrammo FB simili similiterque posito
ipsi DB. Dico AD maius esse ipso AF. Cum
enim DB simile sit ipsi FB, erunt circa eandem
diametrum. Ducatur illorum diametrus DB, &
describatur figura. d Cum ergo ipsi CF æquale
sit FE, si commune apponatur FB, erit totum


b prop.
44. 1.

c prop.
26. 6.

d prop.
43. 1.

e ax. 1.

CH toti KE æquale. Sed ipsi CH æquale est CG cum AC, CB æquales sint; ergo & GC ip. si EK æquale est. Commune CF apponatur; & erit totum AF gnomoni LMN æquale. Quare DB, hoc est AD, quam AF maius est. Omnium ergo parallelogrammorum, &c. Quod oportuit demonstrare.



Aliter. Sit AB rursus in C bisecta, & applicatum AL, deficiens figura LB. Applice- tur ad AB parallelo- grammu AE deficiens figura EB, simili & si- militer posita ipsi LB à dimidia AB descri- ptæ. Dico parallelo- grammum AL ad di- midiam applicatū ma- ius esse ipso AE. Cum

a prop. 20. 6. enim EB ipsi LB simile sit & erunt circa eandem diametrum, quæ sit EB, perficiaturq; figura. Quia

ergo LF ipsi LH æquale est, quod & FG ipsi GH sit æqualis; FL, quam EK

maius erit: b æquale est autem L

F ipsi DL: maius ergo est D

L quam EK, commu-

ne addatur KD;

totum ergo

AL


toto AE maius est. Quod

oportuit demon-

strare.

Propof. 28. Probl. 8.


Ad datam rectam lineam dato rectilineo æquale parallelogrammum applicare deficiens figura parallelogramma, quæ sit fimilis alteri datæ. Oportet autem datum rectilineum, cui æquale applicandum est, maius uon esse eo, quod ad dimidiam applicatur, similibus existentibus defectibus; & eo quod à dimidia, & eorum oportet simile deficere.



S It recta data A B; rectilineum datum, cui oporteat æquale applicare, sit C, nō maius existens eo quod ad dimidiā applicatum est, similibus existentibus defectibus. Cui autem oportet simile deficere, sit D. Oportet ergo ad

AB rectilineo C æquale parallelogrammum applicare deficiens figura parallelogramma simili

a prop.
10. 1.
b prop.
18. 6.



ipfi D. a Bisecetur AB in E & b describatur super EB ipfi D simile, similiterq; posittum EBF G compleaturque AG parallelogrammum: quod ipfi C aut æquale est, aut maius ob determinationē. Si æquale, factum est quod iubebatur; applicatum enim est ad AB

rectilineo C æquale parallelogrammum AG deficiens figura parallelogramma GB simili ipfi D. Si verò HE maius est quam C; erit & GB maius, cum GB ipfi HE sit æquale. Excessui autem, quo GB excedit C, fiat æquale KLMN, simile similiterque posittum ipfi D. Et cum D simile sit ipfi GB, erit & KM ipfi GB simile. sit linea KL ipfi GE; & LM ipfi GF homologa; quia ergo GB æquale est ipsis C, & KM, erit G

c prop.
25. 6.

B; quam

B; quam K M maius ; erit ergo & G E linea maior quam K L; & G F, quam L M. *a* Fiat ipsi K L æqualis G X; ipsi L M ipsa G O, compleaturque parallelogrammum X G O P, quod erit æquale; & simile ipsi K M, sed K M ipsi G B simile est; erit ergo & G P ipsi G B simile: *f* sunt ergo G P, G B circa eandem diametrum, quæ sit G P B. & describatur figura. Cum itaque G B æquale sit ipsis C; K M, & G P ipsi K M; erit reliquus Y gnomon ipsi C æqualis, *g* cumq; O R ipsi X S sit æquale, si commune P B addatur; erit *h* totum O B toti X B æquale. sed X B ipsi T E est æquale, quod A E, E B sint æquales: est ergo & T E ipsi O B æquale, si commune X S addatur, erit totum T S gnomoni Y æquale. Sed gnomon ipsi C ostensus est æqualis: *k* est ergo T S ipsi C æquale. Ad datam ergo A B dato rectilineo C æquale parallelogrammum T S applicatum est deficiens figura P B simili ipsi D, cum P B ipsi G P simile sit. Quod oportuit facere.

d prop.
3. 1.

e prop.
21. 6.

f prop.
26. 6.

g prop.
43. 1.

h ax.2.
i prop.

36. 1.

k ax.1.

Propos. 29. Probl. 9.


Ad datam rectam dato rectilineo æquale parallelogrammum applicare, excedens figura parallelogramma, simili alteri datæ.

S It data recta A B; & rectilineum C, cui oportet ad A B æquale applicare, cui autem simile esse debeat excedens sit D: *a* Bisecetur A B in E, *b* describaturque super E B parallelogrammum simile, similiterq; positum ipsi D; *c* æquale verò utriq; B F, & C & simile ipsi D *e*, fiat G H, quod

a prop.
10. 1.

b prop.
18. 6.

c prop. quod ipsi FB simile erit. Sit autem latus KH
 25. 6. homologum lateri FL ; KG ipsi FE . Et cum




GH maius sit quā FB , erit & KH maior, quam
 FL ; & KG quam FE ; producantur FL , FE , vt
 ipsi KH , KG æquales fiant, in M & N , complea
 turque MN , quod ipsi GH æquale, & simile est:
d prop. sed ipsi GH simile est EL ; *d* est ergo & MN ip
 21. 6. si EL simile; e sunt ergo circa eandem diametru,
e prop. quæ ducatur, & sit FX , compleaturque figura.
 26. 6. Quia ergo GH tam ipsis EL , & C , quam ipsi M
 N æquale est; ferit & MN ipsis EL & C æquale.
fax. 1. Commune EL tollatur; & erit gnomon Y ipsi C
 æqualis. Cumque EA ipsi EB sit æqualis, *g* erit
g prop. & AN ipsi NB æquale. hoc est, *h* ipsi LO , com
 36. 1. mune addatur EX , eritque totam AX , toti gno
h prop. moni Y æquale: sed gnomon ipsi C æqualis est:
 43. 1. erit ergo & AX ipsi C æquale. Ad datam ergo
 AB ,

AB, dato rectilineo C æquale parallelogrammum AX applicatum est, excedens figura parallelogramma P O simili ipsi D, i cum & E L ipsi O P simile sit. Quod oportuit facere. i prop. 24. 6.

Propos. 30. Probl. 10.

Datam rectam lineam terminatam extrema ac media ratione secare.



O Porteat datam terminatam AB extrema ac media ratione secare. a 2 prop. 46. 1. Describatur super AB quadratum BC, b appliceturq; b prop. 29. 6, ad AC parallelogrammum CD, æquale quadrato BC, excedens fi-


gura AD simili BC quadrato, quæ quadratum erit. Et quia BC ipsi CD æquale est, si commune CE auferatur; erit reliquum BF reliquo AD æquale, sunt vero, & æquiangula; c latera ergo ipsorum BF, AD reciproca sunt circa æquales angulos: est ergo ut FE ad ED; ita AE ad EB: & est FE ipsi AC, hoc est, ipsi AB æqualis: & ED ipsi AE; quare est ut BA ad AE; ita AE ad EB: d maior est autem AB quam AE: maior ergo, & AE quam EB: est igitur recta AB extrema ac media ratione secta in E; & maior portio est AE. Quod oportuit facere. c prop. 14. 6. d prop. 14. 5.

Aliter.

Aliter. Oporteat rectam AB extrema ac media ratione secare: & secetur AB in C ; ut quod
e prop. AB , BC continetur, æquale sit ei quod ex AC
 11. 2. quadrato. Cum ergo quod AB , BC continetur æquale sit ei quod ex AC fit quadrato: ferit
f prop. ut AB ad AC ; ita AC ad CB . Est ergo AB extrema ac media ratione secta. Quod oportuit
 17. 6. facere.

Propositio 31. Theor. 21:

In triangulis rectangulis figura quæ fit à latere rectum subtendente æqualis est figuris quæ fiunt à lateribus rectum continentibus, similibus; similiterque descriptis.




S It triangulum rectangulum ABC rectum habens angulum BAC . Dico, id quod fit ex BC æquale esse illis, quæ fiunt ex BA , AC similibus similiterque descriptis. Ducatur perpendicularis AD , & eruntque triangula ABD , ADC
a prop. à perpendiculari facta, & toti ABC , & inter se similia. Cumque ABC , ABD similia sint, erit
 3 6. ut C Bad BA , ita AB ad BD , quando autem
 tres

tres sunt proportionales, est ut prima ad tertiā; *b cor. 2.*
 ita quæ à prima describitur figura ad figuram si- *prop.*
 milem à secunda descriptam. Ut ergo CB ad $20. 6.$
 BD ; ita est figura ex CB ad figuram ex BA , si-
 milem similiterque descriptam. Eadem de cau-
 sa, erit ut BC ad CD ; ita figura ex BC ad figu-
 ram ex CA . Ergo ut BC ad BD, DC ; ita figu-
 ra ex BC descripta, ad figuras ex BA, AC de-
 scriptas similes, similiterque positas: æqualis est
 autem BC ipsis BD, DC ; ergo & figura ex BC
 æqualis erit figuris ex BA, AC similibus simili-
 terque descriptis. In rectangulis ergo triangu-
 lis, &c. Quod oportuit demonstrare. Aliter. *c c prop.*
 Cum similes figuræ in dupla proportionē sint *20. 6.*
 homologorum laterum, habebit figura ex BC
 ad figuram ex BA duplam proportionem eius,
 quam habet latus BC ad BA . Habet verò &
 quod ex BC quadratum, ad quadratum ex BA
 duplam proportionem eius, quam habet BC ad
 BA . *d* Ut ergo est figura ex BC ad figuram ex *d prop.*
 BA ; ita est quadratum ex BC ad quadratum ex *11. 5.*
 BA . Eadem de causa est, ut figura ex BC ad fi-
 guram ex CA ; ita quadratum ex BC ad quadra-
 tum ex CA . Est ergo ut figura ex BC ad figuras
 ex BA, AC ; ita quadratum ex BC ad qua-
 drata ex BA, AC . Sed & quadratum *e prop.*
 ex BC est æquale quadratis ex *47. 1.*
 BA, AC : Est ergo & figu-
 ra ex BC æqualis figu-
 ris ex BA, AC ,
 similibus si-
 mili-
 terque descriptis. Quod oportuit
 demonstrare.

Propof. 32. Theor. 22.

Si duo triangula duo latera duobus lateribus proportionalia habentia, ad unum angulum componantur, ita ut latera homologa sint parallela, reliqua latera in directum erunt constituta.



Sint triangula ABC , DCE habentia duo latera BA , AC , duobus DC , DE proportionalia. Ut AB ad AC ; ita DC ad DE , sintq; tam AB , DC , quam AC , DE parallela; Dico CE ipsi BC in directum esse. Cum enim in *a prop.* B , D C parallelas recta AC incidat, erunt anguli alterni BAC , ACD æquales. Eadem de causa & CDE , ACD æquales erunt: ynde & BAC , CDE æquales sunt. Cum igitur duo triangula ABC , DCE unum angulum qui est ad A , uni qui est ad D æqualem habeant, & circa æquales angulos latera proportionalia, ut *b BA* ad AC , ita CD ad DE , æquiangula erunt: anguli igitur ABC , DCE æquales sunt. *6. 6.* Ostensi autem sunt & ACD , BAC æquales. totus ergo ACE



ACE duobus ABC, BAC est æqualis: communis ACB addatur, & erunt ACE, ACB æquales his, BAC, ACB, CBA: sed hi tres duobus rectis sunt æquales: ergo & ACE, ACB duobus rectis æquales erunt. Ad punctum ergo C rectæ AC duæ rectæ BC, CE non ad easdem partes positæ, angulos deinceps ACE, ACB duobus rectis æquales faciunt; in d directum ergo est B C, ipsi CE. Si ergo duo triangula, &c. Quod oportuit demonstrare.

c prop.
32. 1.

d prop.
14. 1.


Propos. 33. Theor. 23.

In æqualibus circulis anguli eandem proportionem habent, quam periphæria, quibus insistent, siue ad centra, siue ad periphærias constituti insistant. Quin & sectores, quippe ad centra constituti.




IN æqualibus circulis ABC, DEF ad centra G, H constituti sint anguli BGC, EHF ad periphærias BAC, EDF. Dico esse, ut BC periphæria ad EF periphæriâ; ita angulum BGC; ad

ad angulum $E H F$; & $B A C$ ad $E D F$; & insuper $B G C$ sectorem ad $E H F$ sectorem. Ponantur peripheriæ $B C$ & quales quotcunque deinceps $C K$, $K L$: peripheriæ $E F$ quotcunq; æquales $F M$,



a prop.
27.3. M, N , ducanturque $G K, G L; H M, H N$. Cum ergo peripheriæ $C B, C K, K L$ æquales sint, & erunt & anguli $B G C, C G K, K G L$ æquales, quam multiplex ergo est peripheria $B L$ peripheriæ $B C$, tam multiplex est angulus $B G L$ anguli $B G C$. Eadem de causa quam multiplex est peripheria $N E$ peripheriæ $E F$, tam multiplex est angulus $N H E$ anguli $E H F$. Si igitur peripheriæ $B L, E N$ æquales sunt, erunt & anguli $B G L, E H N$ æquales: Et si peripheria $B L$ quam $E N$ maior est, erit & angulus $B G L$ maior angulo $E H N$; & si minor, minor. Cum igitur quatuor sint magnitudines, duæ peripheriæ $B C, B F$, & duo anguli $B G C, E H F$; acceptæque sint peripheriæ $B C$ & anguli $B G C$ æque multiplices peripheria $B L$, & angulus $B G L$. Peripheriæ verò $E F$ & anguli $E H F$ peripheria $E N$, & angulus $E H N$, demonstratumque sit si peripheria $B L$ maior sit peripheria $E N$, & angulum $B G L$ angulo.

angulo EHN maiorem esse; & si æqualis æqualis; si minor, minorem: *b* Est ergo ut BC periph- *b def.*
 eria ad peripheriam E F; ita angulus BGC 5. 5.
 ad angulum EHF. Sed ut BGC ad EHF; ita *c prop.*
 est BAC angulus ad EDF angulum, vterque 15. 5.
 enim vtriusque duplus est: ergo ut BGC ad EHF; ita
 est BGC ad EHF; & BAC ad EDF. In æquali-
 bus ergo circulis, &c. Quod oportuit demon-
 strare.



Dico præterea, ut est BC periph-
 eria ad EF peripheriam; ita esse GBC sectorem ad HFE
 sectorem. Ducantur BC, CK; accipianturque
 periferiarum BC, CK puncta X, O, & ducantur
 BX, XC, CO, OK. Cum ergo duæ BG, GC,
 duabus CG, GK æquale sint, angulosque æqua-
 les contineant: *d* erunt & bases BC, CK æqua-
 les igitur & triangula BGC, GCK æqualia
 erunt; cumque peripheriæ BC, CK sint æqua-
 les, erit & reliqua BAC periph- *d prop.*
 eria reliquæ C *4. 1.*
 AK æqualis; *e* ergo & angulus BXC angulo C *e prop.*
 OK æqualis erit, *27. 3.* *f def.*
 & sunt super æqualibus rectis B *11. 3.*
 C, CK: *g prop.* g circulorum autem portiones super æ-
 quali- *24. 3.*

qualibus rectis constitutæ, æquales sunt: portiones igitur BXC , COK æquales sunt. Sunt verò & triangula BGC , GCK æqualia; totus ergo sector BGC toti GKC est æqualis. Eadem de causa, erunt sectores GKL , GKC æquales: tres igitur sectores BGC , CGK , GLK æquales sunt. eandem de causa, erunt & tres HEF , HFM , HMN æquales. quam multiplex ergo est peripheria BL peripheriæ CB , tam multiplex est sector GBL sectoris GBC . Eadem de causa quam multiplex est peripheria EN peripheriæ EF , tam multiplex est sector HEN sectoris HEF . Si ergo peripheria BL maior est peripheria EN , erit & sector GBL maior sectore HEN ; Et si æqualis, æqualis; & si minor, minor. Cum igitur quatuor sint magnitudines, duæ peripheriæ BC , EF , & duo sectores GBC , HEF ; acceptæque sint peripheriæ BC , & sectoris GBC . æque multiplices BL peripheria, & GBL sector. Peripheriæ verò EF , & sectoris HEF , peripheria EN , & sector HEN ; demonstratumque sit si BL maior sit quam EN ; & sectorem GBL maiorem esse sectore HEN ; & si æqualis, æqualis; si minor minorem. g. erit vt peripheria

g. def.
s. s.


BC ad EF peripheriam; ita GBC sector ad HEF sectorem. Manifestum ergo est, esse, vt est sector ad sectorem, ita angulum ad angulum.



Ex libro 13. Euclidis.

Propositio 9.

Si latera hexagoni & decagoni eidem circulo inscripta componantur, erit tota composita proportionaliter secta.



SInt in circulo D C B, latera B C decagoni, A C hexagoni in directum posita. Dico totam A B in C proportionaliter esse sectam, maioremque portionem esse A C. Sumpto enim centro E. iungantur rectæ E B, E C, E A, producatque E B in D.

Quia igitur B C latus est decagoni æquilateri, erit peripheria B C D quintupla peripheriæ C B: igitur C D quadrupla erit eiusdem C B. Vt *a* *a prop.*
verò peripheſia C D ad peripheriam C B: ita est *33. 6.*
angulus C E D ad angulum C E B. Quadruplus
est ergo angulus C E D anguli B E C. Et quia *b* *b prop.*
angulus E B C æqualis est angulo B C E, erit *5. 1.*
angulus D E C duplus anguli E C B, cumque E C *c prop.*
rectæ C A sit æqualis (vtraque enim est æqualis *30. 3.*
lateri hexagoni circulo B C D inscripti) *d* erit *d prop.*
& angulus C E A angulo E A C æqualis: *e* duplus *5. 1.*
ergo est angulus B C E anguli C A E: sed anguli *e prop.*
B C E duplus ostensus est angulus C E D: qua- *32. 1.*

P a druplus

druplus igitur est angulus CED anguli CAE .
 ostensus est autem & angulus CED quadruplus
 anguli CEB : æquales ergo sunt anguli CAE ,
 CEC . Triangulorum autem ABE , ECB an-
 gulus ECB est communis; *f* erit ergo & reli-
 quus AEB . reliquo ECB æqualis. Quare trian-
 gula ABE , CBE sunt æquiangula: *g* est ergo ut
 AB ad EB ita EB ad CB . Est verò BE ipsi A
 C æqualis: igitur est ut AB ad AC ; ita AC ad
 CB : Maior autem est AB , quam AC : *h* igitur
 AC quam CB . Quo circa AB in C secta est
 proportionaliter, & portio maior est AC . Quod
 demonstrare oportuit.

Propositio 10.

*Si circulo pentagonum æquilaterum inscri-
 batur, latus pentagoni poterit, & latus
 hexagoni, & latus decagoni, ei-
 dem circulo inscriptorum.*

E Sto circulus $ABCDE$, cui pentagonem
 æquilaterum $ABCDE$ inscribatur. Di-
 co latus pentagoni posse & hexagoni, & de-
 cagoni latus eidem circulo inscriptorum. Ac-
 cepto enim centro F ducantur AFG , FB , & ex
 F ad AB perpendicularis FI , quæ producat in
 H , iunganturque AH , HB , rursusque ab F ad A
 H agatur perpendicularis FL , quæ in K produ-
 catur, iungaturque HM . Et quia peripheria A
 BCG æqualis est peripheriæ $AEDG$, & qua-
 rum ABC æqualis est AED : est igitur & reli-
 qua CG , reliquæ DG æqualis. Est autem CD
 penta-

k prop. ergo rectis AB, BM contentum æquale est qua-
 27. 6. drato ipsius FB . Rursus / quoniam AL, LH æ-
l prop. quales sunt; communis, & ad angulos rectos L
 3. 3. M ; *m* erunt & bases HM, MA æquales. *n* Vnde
m prop. & anguli LHM, LAM æquales erunt; sed *o* an-
 4. 1. gulus LAM , angulo HBM est æqualis: erunt
n prop. igitur & LHM, HBM æquales, & est duorum
 5. 1. triangulorum BAH, HAM angulus BAH
o prop. communis: erit igitur & reliquus AHB reliquo
 27. 2. HMA æqualis. Triangula igitur AHB, HAM
p prop. sunt æquiangula. *p* Quare est, ut BA ad AH ;
 4. 6. ita AH ad AM . Rectangulum ergo *q* rectis A
q prop. B, AM contentum, æquale est quadrato rectæ A
 17. 6. H . Ostensum est autem & rectangulum recta-
 rum AB, BM æquale esse quadrato rectæ BF ; er-
r prop. go rectangulum linearum AB, BM , cum rectan-
 2. 2. gulo linearum AB, AM (& quæ sunt equalia qua-
 drato totius AB) est æquale quadratis ipsarum
 BF, AH ; & est AB latus pentagoni; FB hexa-
 gonii; AH decagoni: igitur latus pentagoni po-
 test & latus hexagoni, & latus decagoni eidem
 circulo inscriptorum, quod erat demonstrandum.

FINIS.

D. Aegidius Polus R. Pœnit. pro Illustribs. & Reuerendis. D. Cardinali Archiepiscopo Bononiæ.

Imprimatur

Fr. Hieron. Onuphr. pro Reuerendis. P. Inquisit. Bonon.

B O N O N I A E,
Apud Hæredes Ioannis Rossij, & C.
M. DC. XXIX.