Notes du mont Royal

WWW.NOTESDUMONTROYAL.COM

Cette œuvre est hébergée sur «*Notes du mont Royal*» dans le cadre d'un exposé gratuit sur la littérature.

SOURCE DE LA PAGE INTERNET
Site de Philippe Remacle

RETOUR À L'ENTRÉE DU SITE

Euclide

Oeuvres numérisées par Marc Szwajcer

L'INTRODUCTION HARMONIQUE

DE CLÉONIDE

ET

LA DIVISION DU CANON

D'EUCLIDE LE GÉOMÈTRE

NOUVELLE TRADUCTION FRANÇAISE, AVEC COMMENTAIRE PERPÉTUEL

PAR CH. EM. RUELLE

LA DIVISION DU CANON

NOTE ADDITIONNELLE

TRADUCTION DES TROIS CANONS HARMONIQUES DE FLORENCE

LES ÉLÉMENS

DE

GÉOMÉTRIE

D'EUCLIDE,

traduits littéralement, et suivis d'un Traité du Cercle, du Cylindre, du Cône et de la Sphère; de la mesure des Surfaces et des Solides; avec des Notes;

Par F. PEYRARD, Bibliothécaire de l'École Polytechnique.

OUVRAGE APPROUVÉ PAR L'INSTITUT NATIONAL.

Et nova sunt semper. — OVID....

A PARIS,

CHEZ F. LOUIS, LIBRAIRE, RUE DE SAVOIE, N° 12.

AN XII — 1804.

INTRODUCTION

GÉOMÉTRIE LIVRE I

GÉOMÉTRIE LIVRE II

GÉOMÉTRIE LIVRE III

GÉOMÉTRIE LIVRE IV

GÉOMÉTRIE LIVRE VI

GÉOMÉTRIE LIVRE XI

GÉOMÉTRIE LIVRE XII

TABLE.

RAPPORT DE L'INSTITUT..... page j
PRÉFACE..... v
LIVRE I..... 1
LIVRE II..... 70
LIVRE III..... 107
LIVRE IV..... 178
LIVRE VI..... 208
LIVRE XI..... 284
LIVRE XII..... 374
SUPPLÉMENT..... 445
NOTES..... 559

RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE

ALLER À LA TABLE DES MATIÈRES D'EUCLIDE

Euclide le Géomètre

PRÉFACE

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

Géométrie livre I

Euclide le Géomètre

LA DIVISION DU CANON

LES ÉLÉMENTS DE GÉOMÉTRIE D'EUCLIDE,

traduits littéralement, et suivis d'un Traité du Cercle,

du Cylindre, du Cône et de la Sphère;

de la mesure des Surfaces et des Solides ; avec des Notes ;

Par F. PEYRARD,

Bibliothécaire

de l'École Polytechnique.

OUVRAGE APPROUVÉ PAR L'INSTITUT NATIONAL.

Et nova sunt semper. — OVIDE,...

A PARIS,

CHEZ F. LOUIS, LIBRAIRE, RUE DE SAVOIE, N° 12.

AN XII - l804.

RAPPORT

fait à la Classe des Sciences physiques et mathématiques de l'Institut national,

par les citoyens LAGRANGE et DELAMBRE.

Séance du lundi 28 ventôse an XII.

PEU d'ouvrages ont été aussi souvent traduits, commentés et reproduits, que les Éléments d'Euclide; mais il n'est pas d'auteur avec qui ses traducteurs aient pris d'aussi étranges libertés. Sous prétexte de donner aux démonstrations plus de clarté et de simplicité, il n'est presque pas de proposition dont ils n'aient changé ou modifié les preuves. Pour ne parler que des traducteurs français, il suffît de jeter les yeux sur l'Euclide de Dechalles, réimprimé plusieurs fois successivement par Ozanam et Audierne, pour voir que ces éditeurs n'ont presque rien respecté dans l'auteur original, si ce n'est l'ordre et l'énoncé des théorèmes. Mais malgré tous leurs soins et leurs prétentions, ils n’ont pas fait oublier le véritable Euclide ; on trouve même encore quelques savants qui, soit avec raison, soit par un goût un peu trop exclusif pour les méthodes des anciens, prétendent que malgré les talents et les succès des auteurs modernes, les Éléments d'Euclide sont, à quelques endroits près, le meilleur ouvrage que nous ayons en ce genre. Sans prendre aucun parti sur cette question, on peut conclure au moins de leur opinion, que le citoyen Peyrard a fait une chose utile en

traduisant fidèlement un ouvrage dont nous n'avons pas eu de traduction exacte depuis plus de deux cents ans, et, dont les bonnes éditions, soit grecques soit latines, sont assez rares, et à la portée de peu de savants, sans compter les difficultés des deux langues, qui diminuent encore assez considérablement le nombre des lecteurs.

Nous avons lu avec soin la nouvelle traduction, en la comparant à l'original grec, du moins quant à l'énoncé de chaque proposition, et pour les parties essentielles des démonstrations; car c'eût été un travail aussi long qu'inutile que de suivre le traducteur dans des détails qui ne peuvent se traduire de deux manières. Partout le citoyen Peyrard nous a paru rendre avec exactitude le sens et même les expressions de son auteur.

L'ouvrage d'Euclide, quelque estimable qu'il soit, est pourtant incomplet à plusieurs égards. Il y manque surtout nombre de propositions importantes relatives à la surface du Cercle, de la Sphère, du Cylindre et du Cône, et à la solidité de ces trois derniers corps. Le traducteur en a fait la matière d'un Supplément, qu'il commence par deux propositions empruntées d'Archimède, en avertissant dans une note que la seconde lui paraît impossible à démontrer bien rigoureusement. Il ajoute que c'est sans doute pour celte raison qu'Euclide n'a rien dit de la surface du Cercle ni de celle de la Sphère. Il s'agit de prouver que le contour du Polygone, circonscrit est plus grand que celui du Cercle. Pour y parvenir, Archimède avait posé en, principe que *de deux lignes concaves du même côté et qui ont mêmes extrémités, celle qui environne l'autre est la plus grande, des deux*. Il est vrai que ce principe méritait bien une démonstration, mais il n'est pas prouvé que ce soit précisément cette difficulté qui ait arrêté Euclide. Quand il composa ses Éléments, Archimède n'était peut-être pas né, il est bien probable au moins qu'il n'avait encore publié ni son Traité de la Sphère et du Cylindre, ni celui de la mesure du Cercle,

les Théorèmes que contient cet ouvrage étaient encore inconnus pour la plupart, et la réputation qu'ils ont acquise à leur auteur, le prix qu'il y attachait lui-même, nous prouvent combien on les avait jugés difficiles. Il est donc tout simple d'imaginer qu'Euclide les ignorait entièrement; car s'il les eût connus, ils sont d'une telle importance, qu'il aurait dû, ce me semble, les indiquer, sauf à convenir de ce que la démonstration pouvait renfermer d'hypothétique.

Tous les Théorèmes sont démontrés dans le Supplément du citoyen Peyrard, à la manière d'Euclide, et en se servant autant qu'il a été possible des propositions qui se trouvent dans les Éléments. Ces démonstrations sont presque toutes indirectes, c'est-à-dire qu'elles prouvent, non pas qu'une chose soit de telle ou de telle manière, mais qu'il y aurait de l'absurdité à la supposer autrement... Quelques-unes des démonstrations du citoyen Peyrard ressemblent beaucoup à celles qu'on trouve dans l'ouvrage du citoyen Legendre ; mais quand on compose un livre d'Éléments, on ne s'impose pas l'obligation d'être toujours neuf, toujours inventeur; tout le monde sait bien que c'est la chose impossible. On trouvera du moins plusieurs propositions importantes qui sont démontrées d'une manière nouvelle ; ainsi pour arriver au théorème sur la solidité de la Sphère, le citoyen Peyrard emploie la proposition XVII du livre XII^{e}, et ce théorème paraît en effet un corollaire assez simple de cette proposition. La démonstration qu'elle fournit est plus facile que celle d'Archimède. Mais cette proposition n'était qu'imparfaitement démontrée dans Euclide. Robert Simson y avait relevé plusieurs omissions et inexactitudes. Le citoyen Peyrard en a complété la démonstration d'une manière qui ne laisse rien à désirer.

Le Supplément est terminé par quelques théorèmes connus, d'un usage très fréquent dans la mesure des Lignes, des Surfaces et

des Solides, et qui ne se trouvaient pas assez expressément énoncés dans les Éléments d'Euclide....

L'ouvrage est terminé par des notes où l'on rapporte et l'on discute quelques objections et quelques corrections proposées par Robert Simson.

L'auteur, dans sa Préface, annonce un travail semblable, qu'il a commencé, sur Archimède. Nous pensons que la Classe, en approuvant celui qu'il vient de faire sur Euclide, doit engager le citoyen Peyrard à terminer la traduction, non moins importante, et bien plus difficile, d'Archimède.

Signé LAGRANGE *et* DELAMBRE.

La Classe approuve le Rapport et en adopte les conclusions.

Signé DELAMBRE, *Secrétaire perpétuel*.

PRÉFACE.

Lorsque je fus nommé Bibliothécaire de l'Ecole Polytechnique, je formai le projet de donner au public une traduction littérale des Œuvres d'Euclide et d'Archimède, les deux plus grands Géomètres de l'antiquité. Je pensais qu'il était en quelque sorte de mon devoir de consacrer mes moments de loisir à des travaux qui fussent analogues à ceux de l'Ecole Polytechnique. Je publierai, dans le courant de l'an xiii, une traduction littérale des Œuvres complètes d'Archimède; cette traduction sera accompagnée d'un Commentaire pour faciliter l'intelligence des endroits difficiles.[1] Je fais paraître aujourd'hui la traduction des Livres de la Géométrie d'Euclide, auxquels j'ai ajouté un Traité du Cercle, du Cylindre, du Cône et de la Sphère ; la mesure des Surfaces et des

Solides. J'ai traduit Euclide littéralement, et même mot à mot, quand le génie de la langue française a pu me le permettre. Dans mon Supplément, j'ai adopté les principes d'Archimède, et je me suis conformé, autant qu'il a été en mon pouvoir, à la méthode et à la marche d'Euclide. Dans les notes qui accompagnent ce Supplément, je me suis appliqué à éclaircir quelques endroits obscurs; je rapporte et je discute quelques objections proposées par Robert Simson. Je fais voir dans ces notes que Robert Simson est tombé dans une erreur très grave au sujet de la définition X du Livre XI.

Au lieu du Supplément que j'ai composé pour servir de suite à la Géométrie d'Euclide, je devais donner la traduction littérale du Traité du Cylindre et de la Sphère et du Traité de la mesure du Cercle d'Archimède; mais ayant fait réflexion que ces deux Traités ne sont pas assez élémentaires, je me suis décidé à composer un Traité succinct du Cercle, du Cylindre, du Cône et de la Sphère, qui fût à la portée de ceux qui apprennent les mathématiques, et dont toutes les propositions fussent rigoureusement démontrées.

La démonstration d'Archimède, qui regarde la mesure de la sphère, est tellement compliquée, qu'il faut la plus grande Contention d'esprit pour la comprendre; la démonstration que je lui substitue est courte et facile à saisir, et cependant elle a toute la rigueur qu'on peut exiger.

Je ne ferai pas l'éloge d'Euclide; on se méfie toujours de l'éloge d'un auteur fait par son traducteur. Je laisserai parler deux illustres Géomètres, Montucla et Bossut.

« C'est surtout à ses Éléments qu'Euclide doit la célébrité de son nom. Il ramassa dans cet ouvrage, le meilleur encore de tous ceux de ce genre, les vérités élémentaires de la Géométrie, découvertes avant lui. Il y mit cet enchaînement si admiré par les amateurs de la rigueur géométrique, et qui est tel, qu'il n'y a aucune proposition qui n'ait des

rapports nécessaires avec celles qui la précèdent ou qui la suivent. En vain divers Géomètres, à qui l'arrangement d'Euclide a déplu, ont tâché de le réformer, sans porter atteinte à la force des démonstrations. Leurs efforts impuissants ont fait voir combien il est difficile de substituer à la chaîne formée par l'ancien géomètre, une chaîne aussi ferme et aussi solide. Tel était le sentiment de l'illustre M. Leibnitz, dont l'autorité doit être d'un grand poids en ces matières; et M. Wolf, qui nous l'apprend, convient d'avoir tenté inutilement d'arranger les vérités géométriques dans un ordre différent, sans supposer des choses qui n'étaient point encore démontrées, ou sans se relâcher beaucoup sur la solidité de la démonstration. Les Géomètres anglais, qui semblent avoir le mieux conservé le goût de la rigoureuse géométrie, ont toujours pensé ainsi ; et Euclide a trouvé chez eux de zélés défenseurs dans divers Géomètres habiles. L'Angleterre voit moins éclore de ces ouvrages, qui ne facilitent la science qu'en l'énervant ; Euclide y est presque le seul auteur élémentaire connu, et l'on n'y manque pas de Géomètres.

» Le reproche de désordre fait à Euclide m'oblige à quelques réflexions sur l'ordre prétendu qu'affectent nos auteurs modernes d'éléments, et sur les inconvénients qui en sont la suite. Peut-on regarder comme un véritable ordre, celui qui oblige à violer la condition la plus essentielle à un raisonnement géométrique, je veux dire, celte rigueur de démonstration, seule capable de forcer un esprit disposé à ne se rendre qu'à l'évidence métaphysique ? Or rien n'est plus commun chez les auteurs dont on parle, que ces atteintes portées à la rigueur géométrique. Mais il leur fallait nécessairement se relâcher jusqu'à ce point, ou commencer à traiter d'un certain genre d'étendue, avant que d'avoir épuisé ce qu'il y avait à dire d'un autre plus simple, et ils ont mieux aimé ne démontrer qu'à demi, c'est-à-dire, ne point démontrer du tout, que de

blesser un prétendu ordre dont ils étaient épris.

» Il y a même, à mon avis, une sorte de puérilité dans cette affectation de ne point parler d'un genre de grandeur, des triangles, par exemple, avant que d'avoir traité au long des lignes et des angles : car pour peu que, s'astreignant à cet ordre, on veuille observer la rigueur géométrique, il faut faire les mêmes frais de démonstrations, que si l'on eût commencé par ce genre d'étendue plus composé, et d'ailleurs si simple, qu'il n'exige pas qu'on s'y élève par degrés. J'ose aller plus loin, et je ne crains point de dire que cet ordre affecté va à rétrécir l'esprit, et à l'accoutumer à une marche contraire à celle du génie des découvertes. C'est déduire laborieusement plusieurs vérités particulières, tandis qu'il n'était pas plus difficile d'embrasser tout d'un coup le tronc, dont elles ne sont que les branches. Que sont en effet la plupart de ces propositions sur les perpendiculaires et les obliques, qui remplissent plusieurs sections des ouvrages dont on parle, sinon autant de conséquences fort simples de la propriété du triangle isocèle ? Il était bien plus lumineux, et même plus court, de commencer à démontrer cette propriété, et d'en déduire ensuite toutes ces autres propositions ». (*Histoire des Mathématiques*, par J. F. Montucla. *Paris*, an VII, tom. I, pag. 205.)

« Jamais livre de science n'a eu un succès comparable à celui des Éléments d'Euclide. Ils ont été enseignés exclusivement pendant plusieurs siècles dans toutes les écoles de mathématiques, traduits et commentés dans toutes les langues; preuve certaine de leur excellence ». (*Essai sur l'Histoire générale des Mathématiques,* par Ch. Bossut. *Paris*, 1802, tom. I, pag. 45.)

N. B. Il est indispensable de faire les corrections indiquées dans l'*errata*, avant d'entreprendre la lecture d'Euclide.

[1] La souscription pour la traduction littérale des Œuvres complètes d'Archimède, avec un commentaire et des planches, par *F. Peyrard*, Bibliothécaire de l'École Polytechnique, est ouverte d'ici au 1er vendémiaire an XIII. Cet ouvrage sera imprimé par *Crapelet*, sur caractère dit saint-Augustin, format in-4°, papier fin d'Angoulême. Prix 36 fr., et en papier vélin 72 fr. Tous les exemplaires seront numérotés et livrés suivant l'ordre des souscriptions. La liste des souscripteurs sera imprimée en tête du volume. Il ne sera pas tiré un seul exemplaire au-delà du nombre des souscriptions ; ainsi il sera absolument impossible de s'en procurer autrement qu'en souscrivant. Cet ouvrage paraîtra dans le courant de l'an XIII. On souscrit à Paris, chez l'Éditeur, à l'École Polytechnique, et chez F. Louis, Libraire, rue de Savoie, n° 12.

RETOUR À L'ENTRÉE DU SITE

ALLER À LA TABLE DES MATIÈRES
D'EUCLIDE

EUCLIDE

Éléments de Géométrie

LIVRE I

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

Euclide le Géomètre

LES ÉLÉMENTS DE GÉOMÉTRIE D'EUCLIDE,

traduits littéralement, et suivis d'un Traité du Cercle,

du Cylindre, du Cône et de la Sphère;

de la mesure des Surfaces et des Solides ; avec des Notes ;

Par F. PEYRARD,

Bibliothécaire

de l'École Polytechnique.

OUVRAGE APPROUVÉ PAR L'INSTITUT NATIONAL.

Et nova sunt semper. — OVIDE,...

A PARIS,

CHEZ F. LOUIS, LIBRAIRE, RUE DE SAVOIE, N° 12.

AN XII - l804.

ÉLÉMENS

DE

GÉOMÉTRIE

D'EUCLIDE.

LIVRE PREMIER.

DÉFINITIONS.

1. Le point est ce qui n'a aucune partie.

2. La ligne est une longueur sans largeur.

3. Les extrémités d'une ligne sont des points.

4. La ligne droite est celle qui est également placée entre ses points.[1]

5. Une superficie est ce qui a longueur et largeur seulement.

6. Les extrémités d'une superficie sont des lignes.

7. Une superficie plane est celle qui est également placée entre ses lignes droites.

8. Un angle plan est l'inclinaison mutuelle de deux lignes qui se louchent dans un plan et qui ne sont point placées dans la même direction.

9. Lorsque des lignes droites comprennent un angle, l'angle s'appelle rectiligne.

10. Lorsqu'une droite tombant sur une droite fait les angles de suite égaux entre eux, chacun des angles égaux est droit. La droite tombante est dite perpendiculaire sur celle sur laquelle elle tombe.

11. L'angle obtus est celui qui est plus grand que l'angle droit.

12. L'angle aigu est celui qui est plus petit que l'angle droit.

13. On appelle terme ou *limite* ce qui est l'extrémité de quelque chose.

14. On appelle figure ce qui est compris entre une ou plusieurs limites.

15. Le cercle est une figure plane comprise dans une seule ligne qu'on appelle circonférence ; toutes les droites menées à la circonférence d'un seul point de ceux qui sont placés dans la figure, sont égales entre elles.

16. Ce point se nomme le centre du cercle.

17. Le diamètre du cercle est une droite menée par le centre et terminée de part et d'autre par la circonférence du cercle ; le diamètre partage le cercle en deux parties égales.

18. Un demi-cercle est une figure comprise entre le diamètre et la portion de la circonférence qui est sous-tendue par le diamètre.

19. Un segment de cercle est une portion du cercle comprise entre une droite et la circonférence du cercle.

20. Les figures rectilignes sont celles qui sont terminées par des droites.

21. On appelle trilatères ou *triangles* les figures terminées par trois droites.

22. Quadrilatères, celles qui sont terminées par quatre.

23. Multilatères, celles qui sont terminées par plus de quatre droites.

24. Parmi les figures trilatères, celle qui est terminée par trois côtés égaux se nomme triangle équilatéral.

25 Celle qui a seulement deux côtés égaux se nomme triangle isocèle.

26. Celle dont tous les côtés sont inégaux se nomme triangle scalène.

27. Parmi les figures trilatères, celle qui a un angle droit se nomme triangle rectangle.

28, Celle qui a un angle obtus se nomme triangle amblygone ou *triangle obtusangle*.

29. Celle qui a ses trois angles aigus, triangle oxygone ou *triangle acutangle*.

30. Parmi les figures quadrilatères, celle qui a ses côtés égaux et ses angles droits, se nomme carré.

31. Celle qui a ses angles droits, mais qui n'a pas ses côtés égaux, se nomme carré oblong ou *rectangle*.

32. Celle qui a ses côtés égaux, mais qui n'a pas ses angles droits, se, nomme rhombe.

33. Celle dont les côtés et les angles opposés sont égaux, mais dont tous les côtés ne sont pas égaux et dont les angles ne sont pas droits, se nomme rhomboïde.

34. Les autres quadrilatères, ceux-là exceptés, se nomment trapèzes.[2]

35. Enfin, les parallèles sont des droites qui, étant placées sur un même plan, et qui étant prolongées de part et d'autre à l'infini, ne se rencontrent nulle part.

DEMANDES.[3]

1. Conduire une droite d'un point quelconque à un point quelconque.

2. Prolonger continuellement, selon sa di rection, une droite finie.

3. D'un point quelconque et avec un inter valle quelconque décrire une circonférence de cercle.

***Notions communes ou axiomes*.**

1. Les quantités qui sont égales aune même quantité sont égales entre elles.

2. Si à des quantités égales on ajoute des quantités égales, les tous seront égaux.

3. Si de quantités égales on retranche des quantités égales, les restes seront égaux.

4. Si à des quantités inégales on ajoute des quantités égales, les tous seront inégaux.

5. Si de quantités inégales on retranche des quantités égales, les restes seront inégaux.

6. Les quantités qui sont doubles d'une même quantité sont égales entre elles.

7. Les quantités qui sont les moitiés d'une même quantité sont égales entre elles.

8. Les choses qui se conviennent mutuellement sont égales entre elles.

9. Le tout est plus grand que sa partie.

10. Tous les angles droits sont égaux. **[4]**

11. Si une droite tombant sur deux droites fait les angles intérieurs du même côté plus petits que deux droits, les deux droites prolongées à l'infini se rencontreront du côté où les angles sont plus petits que deux droits.

12. Deux droites ne renferment point un espace.

PROPOSITION PREMIÈRE.

PROBLÈME.

Sur une droite donnée et finie, construire un triangle équilatéral.



Soit AB (fig. 1) la droite donnée et finie : il faut construire sur la droite AB un triangle équilatéral.

Du centre A et avec un intervalle AB, décrivez la circonférence BCD (dem. 3); ensuite du centre B et avec l'intervalle BA décrivez la circonférence ACE, et du point C, où les circonférences se coupent mutuellement, conduisez aux points A, B, les droites CA, CB (dem. 1).

Car puisque le point A est le centre du cercle CDB, la droite AC sera égale à la droite AB (déf. 15); de plus, puisque le point B est le centre du cercle CAE, la droite BC sera égale à la droite BA; mais il a été démontré que la droite CA était égale à la droite AB : donc chacune des droites CA, CB est égale à la droite AB ; or les quantités qui sont égales à une même quantité sont égales entre elles ; donc la droite CA est égale à la droite CB : donc les trois droites CA, AB, BC sont égales entre elles.

Donc le triangle ABC (déf. 24) est équilatéral, et de plus il est construit sur la ligne donnée et finie AB; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION II.

PROBLÈME.

D'un point donné conduire une droite égale à une droite donnée.



Soit A (fig. 2) le point donné et BC la droite donnée : il faut conduire du point A une droite égale à la droite BC.

Conduisez du point A au point B la droite AB (dem. 1) ; sur cette droite construisez le triangle équilatéral DAB (prop. 1), et prolongez les droites AE, BF dans la direction des côtés DA, DB ; du centre B et avec l'intervalle BC, décrivez la circonférence CGH (dem. 5); et du centre D et avec l'intervalle DG décrivez ensuite la circonférence GKL.

En effet, puisque le point B est le centre du cercle CGH, la droite BG sera égale à la droite BG (déf. 15) ; de plus, puisque le point D est le centre du cercle GKL, la droite DL sera égale à la droite DG ; mais la droite DA est égale à la droite DB : donc la droite AL sera égale à la droite BG (axiome 3) ; mais il a été démontré que la droite BC est égale à la droite BG : donc les droites AL, BC sont

égales chacune à la droite BG. Mais les quantités qui sont égales à une même quantité sont égales entre elles : donc la droite AL est égale à la droite BC.

Donc du point donné B on a conduit une droite AL égale à la ligne donnée BC; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION III.

PROBLÈME.

Deux droites inégales étant données, retrancher de la plus grande une droite égale à la plus petite.



Soient AB et C (fig. 3) les deux droites inégales données dont la plus grande soit AB : il faut de la plus grande AB retrancher une droite qui soit égale à la plus petite C.

Du point A conduisez une droite AD égale à la droite C (prop. 2), et du centre A et avec un intervalle AD décrivez la circonférence DEF (dem. 3).

Puisque le point A est le centre du cercle DEF, la droite AE sera égale à la droite AD ; mais la droite C est égale à la droite AD : donc les deux droites AE, C sont égales chacune à la droite AD : donc la droite AE est égale à la droite C.

Donc les deux droites inégales AB, C ayant été données, il a été retranché de la plus grande AB une droite AE égale à la plus petite C ; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION IV.

THÉORÈME.

Si deux côtés d'un triangle sont égaux à deux côtés d'un autre triangle chacun à chacun, et si l'angle compris entre les côtés égaux est égal dans les deux triangles, la base de l'un sera égale à la base de l'autre; ces deux triangles seront égaux, et les autres angles compris entre les côtés égaux de ces deux triangles seront aussi égaux entre eux.



Soient les deux triangles ABC, DEF (fig. 4) dont les deux côtés AB, AC sont égaux aux deux côtés DE, DF chacun à chacun, savoir, le côté AB égal au côté DE, et le côté AC au côté DF ; que l'angle BAC soit aussi égal à l'angle EDF : je dis que la base BC est égale à la base EF, que le triangle ABC est égal au triangle DEF, et que les autres angles compris entre les côtés égaux de ces deux triangles sont aussi égaux chacun à chacun; l'angle ABC égal à l'angle DEF, et l'angle ACB égal à l'angle DFE.

Car si le triangle ABC est appliqué sur le triangle DEF, le point A étant posé sur

le point D, la droite AB sur la droite DE, le point B tombera sur le point E, parce que la droite AB est égale à la droite DE ; mais la droite AB s'appliquant exactement sur la droite DE, la droite AG s'appliquera de même exactement sur la droite DF, parce que l'angle BAC est égal à l'angle EDF ; le point C tombera sur le point F, parce que la ligne AC est égale à la ligne DF ; mais le point B tombe sur le point E : donc la base BC est égale à la base EF, car si le point B tombant sur le point E, et le point C sur le point F, la base BG ne s'applique pas exactement sur la base EF, il faut nécessairement que deux lignes droites comprennent un espace, ce qui est impossible (axiome 12) ; donc la base BC s'appliquera exactement sur la base EF, et lui sera égale ; donc aussi le triangle entier ABC s'appliquera exactement sur le triangle entier DEF et lui sera égale. Par conséquent les autres angles de l'un des triangles s'appliqueront exactement sur les autres angles de l'autre triangle et seront par conséquent égaux aussi entre eux ; c'est-à-dire l'angle ABC sera égal l'angle DEF, et l'angle ACB égal à l'angle DFE.

Donc si deux côtés d'un triangle sont égaux à deux côtés d'un autre triangle chacun à chacun, et si l’angle compris entre les côtés égaux est égal dans les deux triangles, la base de l'un sera égale à la base de l'autre ; ces deux triangles seront égaux, et les autres angles compris entre les côtés égaux des deux triangles seront aussi égaux entre eux ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION V.

THÉORÈME.

Dans les triangles isocèles les angles placés sur la base sont égaux entre eux et les côtés égaux étant prolongés, les angles placés au-dessous de la base seront aussi égaux entre eux.



Soit le triangle isocèle ABC (fig. 5) dont le côté AB est égal au côté AC; prolongez les droites AB, AC, vers D et vers E (dem. 2) : je dis que l'angle ABC est égal à l'angle ACB et que l'angle CBD est encore égal à l'angle BCE.

Car prenons sur la droite BD un point quelconque F, et de la droite AE retranchons la droite AG égale à la droite AF, qui est plus petite que la droite AE (prop. 3), et conduisons les droites FC et GB.

Puisque la droite AF est égale à la droite AG et la droite AB à la droite AC, les deux droites FA, CA seront égales aux deux droites GA, BA chacune à chacune ; mais ces droites comprennent l'angle commun FAG: donc (prop. 4) la base FC sera égale à la base GB ; le triangle AFG sera égal au triangle AGB et les autres angles compris entre les côtés égaux de ces deux triangles seront aussi égaux entre eux, c'est-à-dire, l'angle ACF égal à l'angle ABG, et l'angle AFC à l'angle AGB ; mais comme la droite AF est égale à la droite AG et la droite AB à la droite AC, la droite BF égalera la droite CG (axiome 5), mais il a été démontré que la droite FC est égale à la droite GB : donc les deux droites BF, FC sont égales aux droites CG, GB chacune à chacune; mais l'angle BFC est égal à l'angle CGB et la droite BC est la base commune de ces deux triangles : donc le triangle BFC sera égal au triangle CGB et les autres angles compris entre les côtés

égaux de ces deux triangles seront aussi égaux chacun à chacun (prop. 4) donc l'angle FBC est égal à l'angle GCB, et l'angle BCF égal aussi à l'angle CBG. Mais comme il a été démontré que l'angle total ABG était égal à l'angle total ACF et que l'angle CBG était aussi égal à l'angle BCF, l'angle restant ABC (axiome 3) et l'angle restant ACB placés sur la base seront égaux. Il a été démontré aussi que les angles FBC et GCB placés au-dessous de la base étaient aussi égaux.

Donc dans les triangles isocèles les angles placés sur la base sont égaux entre eux, et les côtés égaux étant prolongés, les angles placés au-dessous de la base seront aussi égaux entre eux; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION VI.

THÉORÈME.

Si deux angles d'un triangle sont égaux entre eux, les côtés opposés à ces angles égaux seront aussi égaux entre eux.



Soit le triangle ABC (fig. 6) ayant l'angle ABC égal à l'angle ACB : je dis que le côté AC est égal au côté AB.

Car si le côté AC n'est pas égal au côté AB, l'un d'eux sera plus grand que l'autre. Soit AB le plus grand ; retranchez de AB qui est le plus grand côté (prop. 3) la droite DB égal au plus petit côté AC, et menez la droite DC.

Puisque la droite DB est égale à la droite AC, et que la droite BG est le côté commun, les deux droites DB, BC sont,

égales aux deux droites AC, CB chacune à chacune ; mais l'angle DBC est égal à l'angle ACB : donc la base DC est égale à la base AB et le triangle ABC égal au triangle DCB ; c'est-à-dire que le plus grand est égal au plus petit : ce qui est absurde. Donc la droite AB n'est pas plus grande que la droite AG, donc elle lui est égale.

Donc si deux angles d'un triangle sont égaux entre eux, les côtés opposés aux angles égaux seront aussi égaux entre eux ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION VII.

THÉORÈME.

Ayant conduit par les extrémités d'une droite deux droites qui se rencontrent, il est impossible de mener des mêmes extrémités deux autres droites qui leur soient égales chacune à chacune, si le point où se rencontrent les deux dernières droites est placé du même côté et s'il n'est pas le même que celui où se rencontrent les deux premières.



Supposons qu'il soit possible de conduire par les extrémités A, B de la droite AB (fig. 7), deux droites AD, DB égales chacune à chacune à deux autres droites AC, CB conduites aussi par les mêmes extrémités A, B et se rencontrant au point C qui est placé du même côté et qui n'est pas le même que celui où se rencontrent les deux droites AD, DB, de manière que les deux droites CA, DA partant

de la même extrémité A soient égales entre elles, et que les deux droites CB, DB partant de la même extrémité B soient aussi égales entre elles ; conduisez la droite CD.

Puis donc que la droite AC est égale à la droite AD, l'angle ACD est égal à l'angle ADG (prop. 5) ; d'où il suit que l'angle ADC est plus grand que l'angle DCB, et que l'angle CDB est beaucoup plus grand que DCB; de plus puisque la droite CB est égale à la droite DB, l'angle CDB sera égal à l'angle DCB; mais il a été démontré qu'il est beaucoup plus grand, ce qui est impossible.

Donc ayant conduit par les extrémités d'une droite deux droites qui se rencontrent, il est impossible de conduire par les mêmes extrémités deux autres droites qui leur soient égales chacune à chacune, lorsque le point où se rencontrent ces deux dernières droites est placé du même côté et qu'il n'est pas le même que celui où se rencontrent les deux premières ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION VIII.

THÉORÈME.

Si deux côtés d'un triangle sont égaux à deux côtés d'un autre triangle, chacun à chacun, et si la base de l'un est égale à la base de l'autre, l'angle compris entre les côtés égaux est égal dans les deux triangles.



Soient les deux triangles ABC, DEF (fig. 8) ayant les deux côtés AB, AC égaux aux côtés DE, DF, chacun à chacun, c'est-à-dire le côté AB égal au côté DE, et le côté, AG égal au côté DF ; que la base BC soit aussi égale à la base EF; je dis que l'angle BAC est égal à l'angle EDF.

Car si le triangle ABC est appliqué sur le triangle DEF, le point B sur le point E, et la droite BC sur la droite EF, le point C tombera sur le point F, parce que la droite BC est égale à la droite EF. La droite BC s'appliquant exactement sur la droite EF, les droites BA, AC s'appliqueront exactement sur les droites DE, DF : car si la base BC s'appliquant exactement sur la base EF, les côtés BA, AC ne s'appliquaient pas exactement sur les côtés DE, DF, et prenaient une autre position comme EG, GF, il serait possible, après avoir conduit par les extrémités d'une droite deux droites qui se rencontrent, de mener par les mêmes extrémités deux autres droites qui leur seraient égales chacune à chacune, lors même que le point où se rencontraient les deux dernières serait placé du même côté et ne serait pas le même que celui où se rencontrent les deux premières ; mais cela est impossible (prop. 7) : donc la base BC s'appliquant exactement sur la base EF, il est impossible que les côtés AB, AC ne s'appliquent pas exactement sur les côtés ED, DF : donc ils s'appliquent exactement les uns sur les autres : donc l'angle BAC

s'applique exactement sur l'angle EDF : donc il lui est égal.

Si donc deux côtés d'un triangle sont égaux à deux côtés d'un autre triangle, chacun à chacun, et si la base de l'un est égale à la base de l'autre, l'angle compris entre les côtés égaux est égal dans les deux triangles ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION IX.

PROBLÈME.

Partager un angle rectiligne donné en deux parties égales.



Soit BAC (fig. 9) l'angle rectiligne donné: il faut le partager en deux parties égales.

Prenez sur la droite AB un point quelconque D, retranchez de la droite AC la droite AE égale à la droite AD (prop. 3), conduisez la droite DE, sur la droite DE construisez le triangle équilatéral DEF (prop. 1), et conduisez la droite AF : je dis que l'angle BAC est partagé en deux parties égales par la droite AF.

Puisque la droite AD est égale à la droite AE et que la droite AF est commune, les deux droites DA, AF seront égales aux deux droites EA, AF, chacune à chacune ; mais la base DF est égale à la base EF : donc l'angle DAF est égal à l'angle EAF (prop. 8) : donc l'angle rectiligne donné

BAC est partagé en deux parties égales par la ligne AF ; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION X.

PROBLÈME.

Partager une droite donnée et finie en deux parties égales.



Soit AB (fig. 10) la droite donnée et finie : il faut partager cette droite AB en deux parties égales.

Construisez sur cette ligne un triangle équilatéral ABC (prop. 1), et partagez l'angle ACB en deux parties égales (prop. 9) ; je dis que la droite AB est partagée en deux parties égales au point D.

Car puisque la droite AC est égale à la droite CB, et que la droite CD est commune, les deux droites AC, CD sont égales aux deux droites BC, CD, chacune à chacune ; mais l'angle ACD est égal à l'angle BCD : donc la base AD est égale à la base BD (prop. 4).

Donc la droite donnée et finie AB est partagée en deux parties égales au point D ; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION XI.

PROBLÈME.

Sur une droite donnée et d'un point donné dans cette ligne, conduire une droite qui fasse deux angles droits avec la droite donnée.



Soit AB (fig. 11) la droite donnée et C le point donné dans cette droite : il faut par le, point C conduire sur la droite AB une droite qui fasse deux angles droits.

Prenez dans la ligne AC un point quelconque D, faites CE égale à CD (prop. 3), construisez sur la droite DE un triangle équilatéral FDE (prop. 1), et menez la droite FG : je dis que la droite CF, conduite par le point C, sur la droite donnée AB, fait deux angles droits avec elle.

Car puisque la droite CD est égale à la droite CE et que la droite FC est commune, les deux droites DC, CF sont égales aux deux droites EC, CF, chacune à chacune; mais la base DF est égale à la base EF : donc l'angle DCF est égal à l'angle ECF (prop. 8). Or ces deux angles sont de suite ; mais quand une droite fait avec une autre les angles de suite égaux entre eux, chacun des angles égaux est droit (déf. 10) : donc chacun des angles DCF, FCE est droit.

Donc la droite FC, conduite par le point G sur la droite AB, fait deux angles droits avec la droite AB ; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION XII.

PROBLÈME.

Sur une droite donnée et indéfinie et d'un point placé hors d'elle, mener une perpendiculaire.



Soit AB (fig. 12) la droite donnée et indéfinie, et C le point donné placé hors de cette droite : il faut sur cette droite donnée et indéfinie AB, conduire du point donné C, pris hors de cette droite, une droite perpendiculaire.

Prenez de l'autre côté de la droite AB un point quelconque D, et du centre C et avec un intervalle CD décrivez une circonférence EFG (dem. 3), partagez la droite EG en deux parties égales au point H (prop. 10), et conduisez les droites CG, CH, CE : je dis que sur la droite indéfinie AB et du point donné C placé hors de cette droite on a mené une perpendiculaire CH.

Car puisque la droite GH est égale à la droite HE, et que la droite CH est commune, les deux droites GH, HC sont égales aux deux droites EH, HC, chacune à chacune ; mais la base CG est aussi égale à la base CE (déf. 15) : donc l'angle GHG est égal à l'angle EHC (prop. 8). Or ces deux angles sont de suite ; mais lorsqu'une droite tombant sur une droite fait avec elle les angles de suite égaux entre eux, chacun de ces angles est droit, et la droite tombante est dite perpendiculaire à celle sur laquelle elle tombe.

Donc on a conduit une perpendiculaire CH sur la droite indéfinie AB, du point donné C, qui est placé hors de cette droite ; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION XIII.

THÉORÈME.

Si une droite placée sur une autre droite fait des angles, elle fera avec elle ou deux angles droits ou deux angles égaux à deux angles droits.



Qu'une droite quelconque AB (fig. 13) placée sur une droite DC fasse les angles CBA, ABD : je dis que les angles CBA, ABD ou seront droits ou égaux à deux droits.

Car si l'angle CBA est égal à l'angle ABD, ces deux angles seront droits (déf. 10). Si le contraire arrive, du point B conduisez la droite BE de manière qu'elle fasse deux angles droits avec la droite DC (prop. 11). Puisque l'angle CBE est égal aux deux angles CBA, ABE, si on ajoute un angle commun EBD, les angles CBE, EBD seront égaux aux trois angles CBA, ABE, EBD. De plus, comme l'angle DBA est égal aux deux angles DBE, EBA, si on ajoute un angle commun ABC, les angles DBA, ABC seront égaux aux trois angles DBE, EBA, ABC ; or il a été démontré que les angles CBE, EBD sont aussi égaux à ces trois angles : donc puisque les choses qui sont égales à une même chose sont égales entre elles, les angles CBE, EBD seront égaux aux angles DBA, ABC; mais les angles CBE, EBD sont deux angles droits ; donc les angles DBA, ABC sont égaux à deux angles droits.

Donc si une droite placée sur une autre droite forme des angles, elle fera ou deux angles droits ou deux angles égaux à deux droits; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XIV.

THÉORÈME.

Si dans un point quelconque d'une ligne droite, deux droites placées de différents côtés font avec elle deux angles de suite égaux à deux droits, ces deux droites seront dans la même direction, c'est-à-dire qu'elles ne formeront qu'une seule et même droite.



Que dans un point B (fig. 14) de la ligne droite ÀB les deux droites BC, BD placées de différents côtés fassent avec elle les angles de suite ABC, ABD égaux à deux droits : je dis que la droite BD est dans la direction de la droite CB.

Car si la droite BD n'est point dans la direction de la droite BC, supposons que la droite BE soit dans la direction de la droite BC (dem. 2).

Puis donc que la droite AB est placée sur la droite CBE, les angles ABC, ABE seront égaux à deux droits (prop. 13) ; mais les angles ABC, ABD sont égaux à deux droits par supposition : donc les angles CBA, ABE sont égaux, aux angles CBA, ABD. Otez l'angle commun ABC, l'angle restant ABE sera égal à l'angle restant ABD, c'est-à-dire que le plus petit sera égal au plus, grand ; ce qui est impossible. La droite BE n'est donc pas dans la direction de la droite BC. Nous démontrerons de la même manière qu'il n'y en a point d'autre qui

soit dans la direction de BC, si ce n'est BD. Donc la droite CB est dans la direction BD.

Donc si dans un point quelconque d'une ligne droite, deux droites placées de différents côtés font avec elle deux angles de suite égaux à deux droits, ces deux droits seront dans la même direction ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XV.

THÉORÈME.

Si deux droites se coupent mutuellement, elles font les angles au sommet égaux entre eux.



Que les deux droites AB, CD (fig. 15) se coupent mutuellement au point E : je dis que l'angle AEC est égal à l'angle DEB, et l'angle CEB égal à l'angle AED,

Car puisque la droite AE est placée sur la droite CD, faisant les deux angles CEA, AED, les angles CEA, AED sont égaux à deux droits (prop. 15). De plus, puisque la droite DE est placée sur la droite AB ; faisant les deux angles AED, DEB, les angles AED, DEB sont égaux à deux droits (prop. 13). Mais il a été démontré que les angles CEA, AED sont égaux à deux droits : donc les angles CE A, AED sont égaux aux angles AED, DEB. Retranchez l'angle commun AED, l'angle restant CEA égalera l'angle restant BED. On démontrera de la même

manière que les angles CEB, DEA sont égaux entre eux.

Donc si deux droites se coupent mutuellement, elles feront les angles au sommet égaux entre eux ; ce qu'il fallait démontrer.

COROLLAIRE.

De là il suit manifestement que quel que soit le nombre des lignes qui se coupent en un point, les angles au point de section sont égaux à quatre angles droits.

PROPOSITION XVI.

THÉORÈME.

Ayant prolongé un côté d'un triangle quelconque, l'angle extérieur est plus grand que chacun des angles intérieurs et opposés.



Soit le triangle ABC (fig. 16), prolongez le côté BC jusqu'en D : je dis que l'angle extérieur ACD est plus grand que chacun des angles intérieurs et opposés CBA, BAC.

Partagez la droite AC en deux parties égales en E (prop. 10) ; et après avoir conduit la droite BE, prolongez-la vers le point F, faites la droite EF égale à la

droite BE (prop. 3), conduisez la droite FG et prolongez AC jusqu'en G.

Puisque la droite AE est égale à la droite EC et la droite BE égale aussi à la droite EF, les deux droites AE, EB seront égales aux deux droites CE, EF ; chacune à chacune ; l'angle AEB est égal à l'angle FEC (prop. 15), puisqu'ils sont opposés au sommet ; donc la base AB est égale à la base FC (prop. 4) ; le triangle ABE est égal au triangle FEC, et les angles opposés à des côtés égaux sont égaux chacun à chacun : donc l'angle BAE est égal à l'angle ECF (ax. 9) ; mais l'angle ECD est plus grand que l'angle ECF : donc l'angle ACD est plus grand que l'angle BAE. Si on partage le côté BC en deux parties égales, on démontrera de la même manière que l'angle BCG, c'est-si-dire l'angle ACD (prop. 15), est plus grand que l'angle ABC.

Donc, ayant prolongé un côté d'un triangle quelconque, l'angle extérieur est plus grand que chacun des angles intérieurs et opposés ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XVII.

THÉORÈME.

Deux angles d'un triangle quelconque, de quelque manière qu'ils soient pris, sont moindres que deux droits.



Soit le triangle ABC (fig. 17) : je dis que deux angles du triangle ABC, de quelque manière qu'ils soient pris, sont moindres que deux droits. Prolongez la droite BC jusqu'en D (dem. 2). L'angle extérieur ACD du triangle ABC est plus grand que l'angle intérieur et opposé ABC (prop. 16). Donc si nous ajoutons un angle commun ACB, les angles ACD, ACB seront plus grands que les angles ABC, BCA; mais les angles ACD, ACB sont égaux à deux droits. (prop. 13) : donc les angles ABC, BCA sont moindres que deux droits. On démontrera de la même manière que les angles BAC, ACB sont aussi moindres que deux droits; on démontrera encore la même chose par rapport aux angles CAB, ABC.

Donc deux angles d'un triangle quelconque, de quelque manière qu'ils soient pris, sont moindres que deux angles droits, ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XVIII.

THÉORÈME.

Dans tout triangle, un plus grand côté est opposé à un plus grand angle.



Soit le triangle ABC (fig. 18) ayant le côté AC plus grand que le côté AB : je dis que l'angle ABC est plus grand que l'angle BCA.

Puisque le côté AC est plus grand que le côté AB, faites la droite AD égale au côté AB (prop. 3), et conduisez la ligne BD.

L'angle ADB, qui est un angle extérieur du triangle BDC, est plus grand que l'angle intérieur et opposé DCB (prop. 16); mais l'angle ADB est égal à l'angle ABD (prop. 5), parce que le côté AB est égal au côté AD : donc l'angle ABD est plus grand que l'angle ACB : donc l'angle ABC est beaucoup plus grand que l'angle ACB.

Donc dans un triangle quelconque, un plus grand côté est opposé à un plus grand angle, ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XIX.

THÉORÈME.

Dans tout triangle, un plus grand angle est opposé à un plus grand coté.



Soit le triangle ABC (fig. 19) ayant l'angle ABC plus grand que l'angle BCA : je dis que le côté AC est plus grand que le côté AB.

Car s'il n'est pas plus grand, le côté AC est égal au côté AB, ou bien il est plus petit. Or le côté AC n'est pas égal au côté AB, car alors l'angle ABC serait égal à l'angle ACB (prop. 5) ; or l'angle ABC n'est point égal à l'angle ACB : donc le côté AC ne sera pas égal au côté AB. Le côté AC n'est pas plus petit que le côté AB, car alors l'angle ABC serait plus petit que l'angle ACB (prop. 18); or l'angle ABC n'est pas plus petit que l'angle ACB ; donc le côté AC ne sera pas plus petit que le côté AB. Mais il a été démontré qu'il ne lui est pas égal : donc le côté AC est plus grand que le côté AB.

Donc dans un triangle quelconque, un plus grand angle est opposé à un plus grand côté ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XX.

THÉORÈME.

Deux cotés d'un triangle quelconque, de quelque manière qu'ils soient pris sont plus grands que le côté restant.



Car soit le triangle ABC (fig. 20) : je dis que deux côtés du triangle ABC, de quelque manière qu'ils soient pris, sont plus grands que le côté restant ; c'est-à-dire que les côtés BA, AC sont plus grands que le côté BC ; les côtés AB, BC plus grands que le côté AC, et les côtés BC, CA plus grands que le côté AB.

Prolongez le côté AB vers le point D, faites la droite DA égale à la droite CA (prop. 3), et conduisez la droite DC.

Puisque la droite DA est égale à la droite AC, l'angle ADC sera égal à l'angle ACD (prop. 5) ; mais l'angle BCD est plus grand que l'angle ACD (ax. 9) ; donc l'angle BCD est plus grand que l'angle ADC : donc, puisque dans le triangle DCB, l'angle BCD est plus grand que l'angle BDC, et qu'un plus grand côté est opposé à un plus grand angle (prop. 19), le côté DB sera plus grand que le côté BC ; mais la droite DB est égale aux côtés AB, AC; donc les côtés AB, AC sont plus grands que le

côté BC. Nous démontrerons de la même manière que les côtés AB, BC sont plus grands que le côté CA, et les côtés BC, CA plus grands que le côté AB.

Donc deux côtés d'un triangle quelconque, de quelque manière qu'ils soient pris, sont plus grands que le côté restant ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXI.

THÉORÈME.

Si des extrémités d'un côté d'un triangle on mène deux droites qui se rencontrent dans ce triangle, ces deux droites seront plus courtes que les deux autres cotés du triangle, mais elles comprendront un angle plus grand.



Des extrémités B, C (fig. 21) du côté BC, menez en dedans du triangle ABC les deux droites BD, DC : je dis que les droites BD, DC seront plus petites que les deux autres côtés BA, AC du triangle ABC, et qu'elles comprendront un angle BDC plus grand que l'angle BAC.

Prolongez la droite BD jusqu'au point E.

Puisque deux côtés d'un triangle quelconque sont plus grands que le côté restant (prop. 20), les deux côtés AB, AE du triangle ABE sont plus grands que le côté BE. Donc si nous ajoutons une droite commune EC, les côtés BA, AG seront plus

grands que les droites BE, EG. De plus, puisque les deux côtés CE, ED du triangle CED sont plus grands que le côté CD, si nous ajoutons une droite commune DB, les droites CE, EB seront plus grandes que les droites CD, DB ; mais on a démontré que les côtés BA, AC sont plus grands que les droites BE, EC : donc les côtés BA, AC sont beaucoup plus grands que les côtés BD, DC.

Mais comme un angle extérieur d'un triangle quelconque est plus grand qu'un des angles intérieurs et opposés (prop. 16), l'angle BDC, qui est un angle extérieur du triangle CDE, est plus grand que l'angle CED. Par la même raison l'angle CEB, qui est un angle extérieur du triangle ABE, est plus grand que l'angle BAC ; mais il a été démontré que l'angle BDG est plus grand que l'angle CEB : donc l'angle BDC est beaucoup plus grand que l'angle BAC.

Donc si des extrémités d'un côté d'un triangle quelconque on mène deux droites qui se rencontrent dans ce triangle, ces deux droites seront plus petites que les deux autres côtés du triangle, et elles comprendront un plus grand angle ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXII.

PROBLÈME.

Avec trois droites égales à trois droites données construire un triangle ; il faut que deux de ces trois droites, de quelque manière qu'elles soient prises, soient plus grandes que la troisième.



Soient données les trois droites A, B, C (fig. 22), dont deux, de quelque manière qu'on les prenne, soient plus grandes que la troisième ; c'est-à-dire les droites A, B plus grandes que la droite C, les droites A et C plus grandes que B, et enfin les droites B et C plus grandes que A : il faut avec trois droites égales aux droites A, B, C construire un triangle.

Supposons la droite DE terminée en D et indéfinie vers E ; faites la droite DF égale à la droite A (prop. 3), la droite FG égale à la droite B et la droite GH égale à la droite C ; ensuite du centre F et avec l'intervalle FD, décrivez la circonférence DKL (dem. 5), du centre G avec l'intervalle GH décrivez la circonférence KLH, et conduisez les droites KF, KG : je dis que le triangle KFG est construit avec trois droites égales aux droites A, B, C.

Car puisque le point F est le centre du cercle DKL, la droite FK est égale à la droite FD (déf. 15) ; mais la droite FD est égale à la droite A : donc la droite KF égale la droite A. De plus, puisque le point G est le centre du cercle LKH, la droite GH est égale à la droite GR; mais la droite GH est égale à la droite C : donc la droite KG égale la droite C ; or la droite KG est égale à la droite B : donc les trois droites KF, FG, GK égalent les trois droites A, B, C. Donc le triangle KFG a été construit avec trois droites KF, FG, GK qui

sont égales aux trois droites données A, B, C ; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION XXIII.

PROBLÈME.

Sur une droite donnée et à un point donné dans cette droite, construire un angle égal à un angle donné.



Soit AB (fig. 23) la droite donnée et A le point donné dans cette droite; que DCE soit l'angle donné : il faut sur la droite donnée AB et au point donné A construire un angle rectiligne égal à l'angle rectiligne donné DCE.

Soient pris dans Tune et l'autre ligne CD, CE deux points quelconque D, E ; conduisez la droite DE, et avec trois droites égales aux droites CD, DE, CE, construisez le triangle AFG (prop. 22), de manière que la droite CD soit égale à la droite AF, la droite CE égale à la droite AG, et la droite DE égale à la droite FG.

Puisque les deux droites DC, CE sont égales aux deux droites FA, AG, chacune à chacune, et que la base DE est égale à la base FG, l'angle DCE sera égal à l'angle FAG (prop. 8).

Donc l'angle rectiligne FAG a été construit égal à l'angle rectiligne DCE sur la droite donnée AB, et au point donné A dans cette droite.

PROPOSITION XXIV.

THÉOREME.

Si deux triangles ont deux côtés égaux à deux côtés, chacun à chacun, et si l'un des angles compris entre ces côtés égaux est plus grand que l'autre, la base de l'un de ces triangles sera aussi plus grande que la base de l'autre.



Soient les deux triangles ABC, DEF (fig. 24) dont les deux côtés AB, AC sont égaux aux deux côtés. DE, DF, chacun à chacun, c'est-à-dire le côté AB égal au côté DE et le côté AG au côté DF ; que l'angle BAC soit plus grand que l'angle EDF : je dis que la basé BC est plus grande que la base EF.

Car puisque l'angle BAC est plus grand que l'angle EDF, construisez sur la droite DE et au point D un angle EDG égal à l'angle BAC (prop. 25) ; faites la droite DG égale à l'une ou à l'autre des droites AC, DF (prop. 3), et conduisez les droites GE, FG.

Puisque la droite AB est égale à la droite DE, et la droite AC égale à la droite DG, les deux droites BA, AC seront égales aux deux droites ED, DG, chacune à chacune ; mais l'angle BAC est égal par construction à l'angle EDG: donc la base BC sera égale à la base EG (prop. 4). De plus,

puisque la droite DG est égale à la droite DF, et l'angle DFG sera égal à l'angle DGF (prop. 5), donc l'angle DFG sera plus grand que l'angle EGF : donc l'angle EFG sera beaucoup plus grand que l'angle EGF ; mais puisque l'angle EFG du triangle EFG est plus grand que l'angle EGF, et qu'un angle plus grand est opposé à un côté plus grand (prop. 19), le côté EG est plus grand que le côté EF; mais le côté EG est égal au côté BC par construction : donc le côté BC est plus grand que le côté EF.

Donc si deux triangles ont deux côtés égaux à deux côtés, chacun à chacun, et si l'un des angles compris entre ces côtés égaux est plus grand que l'autre, la base de l'un de ces triangles sera plus grande que la base de l'autre.

PROPOSITION XXV.

THÉORÈME.

Si deux triangles ont deux côtés égaux chacun à chacun, et si la base de l'un est plus grande que la base de l'autre, ils auront aussi les angles compris entre les côtés égaux plus grands l'un que l'autre.



Soient ABC, DEF (fig. 25) deux triangles qui aient les deux côtés AB, AC égaux aux deux côtés DE, DF, chacun à chacun, c'est-à-dire le côté AB égal au côté DE, et le côté AC égal au côté DF; que la base BC

soit plus grande que la base EF : je dis que l'angle BAC est plus grand que EDF.

Car si l'angle BAC n'est pas plus grand que l'angle EDF, il lui est égal, ou il est plus petit ; or l'angle BAC n'est pas égal à l'angle EDF, car alors la base B C serait égale à la base EF (prop. 4) ; niais elle ne lui est pas égale ; donc l'angle BAC n'est pas égal à l'angle EDF. L'angle BAC n'est pas plus petit que l'angle EDF, car s'il était plus petit, la base BC serait plus petite que la base EF (prop. 24) ; or elle n'est pas plus petite : donc l'angle BAC n'est pas plus petit que l'angle EDF. Mais il a été démontré qu'il ne lui est pas égal : donc l'angle BAC est plus grand que l'angle EDF.

Donc si deux triangles ont deux côtés égaux, chacun à chacun, et si la base de l'un est plus grande que la base de l'autre, ils auront aussi les angles compris entre les côtés égaux plus grands l'un que l'autre ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXVI.

THÉORÈME.

Si deux triangles ont deux angles égaux, chacun à chacun, s'ils ont de plus un coté égal à un côté, ou celui qui est adjacent aux angles égaux ou celui qui est opposé à un des angles égaux, ils auront les autres côtés égaux, chacun à chacun, et le troisième angle de l'un sera encore égal au troisième angle de l'autre.



Soient ABC, DEF (fig. 26) deux triangles qui aient les deux angles ABC, BCA égaux aux deux angles DEF, EFD, chacun à chacun, c'est-à-dire l'angle ABC égal à l'angle DEF et l'angle BCA égal à l'angle EFD ; que ces deux triangles aient aussi un côté égal à un côté, et d'abord celui qui est adjacent aux angles égaux, c'est-à-dire le côté BC égal au côté EF : je dis qu'ils auront les autres côtés égaux aux autres côtés, chacun à chacun, c'est-à-dire le côté AB égal au côté DE, et le côté AC égal au côté DF; je dis de plus que l'angle BAC sera encore égal à l'angle EDF.

Car si le côté AB n'est pas égal au côté DE, l'un de ces côtés sera plus grand que l'autre. Soit AB le plus grand côté ; faites la droite GB égale au côté DE (prop. 3), et conduisez la droite GC.

Puisque le côté BG est égal au côté DE, et le côté BC égal au côté EF, les deux côtés BG, BC sont égaux aux deux côtés DE, EF, chacun à chacun ; mais l'angle GBC est égal à l'angle DEF : donc la base GC est égale à la base DF (prop. 4); le triangle GCB est égal au triangle DEF, et les autres angles qui sont opposés à des côtés égaux sont aussi égaux entre eux : donc l'angle GCB est égal à l'angle DFE ; mais l'angle DFE est supposé égal à l'angle BCA : donc l'angle BCG est égal à l'angle BCA, c'est-à-dire que le plus petit est égal au plus grand, ce qui est impossible : donc les côtés AB et DE ne sont pas inégaux : donc

ils sont égaux ; ruais le côté BG est égal au côté EF : donc les deux côtés AB, BC sont égaux aux deux côtés DE, EF, chacun à chacun; mais l'angle ABC est égal à l'angle DEF : donc la base AC est égale à la base DF (prop. 4), et le troisième angle BAC est égal au troisième angle EDF.

Supposons à présent que les côtés qui sont opposés aux angles égaux soient égaux, c'est-à-dire le côté AB égal au côté DE : je dis que les autres côtés de l'un de ces triangles sont encore égaux aux autres côtés de l'autre triangle; c'est-à-dire que le côté AC sera égal au côté DF, le côté BC égal au côté EF, et le troisième BAC égal aussi au troisième angle EDF.

Car si le côté BC n'est pas égal au côté EF, l'un de ces côtés sera plus grand que l'autre. Supposons s'il est possible que BC soit le plus grand ; faites BH égal au côté EF (prop. 3), et conduisez la droite AH.

Puisque le côté BH est égal au côté EF et le côté AB égal au côté DE, les deux côtés AB, BH seront égaux aux deux côtés DE, EF, chacun à chacun ; mais ces côtés comprennent des angles égaux : donc la base AH est égale à la base DF (prop. 4) 5 le triangle ABH est égal au triangle DEF, et les autres angles qui sont opposés à des côtés égaux seront aussi égaux, chacun à chacun : donc l'angle BHA est égal à l'angle EFD; mais par supposition l'angle EFD est égal à l'angle BGA : donc l'angle BHA est égal à l'angle BCA, c'est-à-dire que l'angle extérieur BHA du triangle ACH est égal à l'angle BCA intérieur et opposé ; ce qui est impossible (prop. 16) : donc les côtés BG et EF ne sont pas inégaux : donc ils sont égaux. Mais le côté AB est égal au côté DE : donc les deux côtés AB, BC sont égaux aux deux côtés DE, EF, chacun à chacun ; mais ces côtés comprennent des angles égaux : donc la base AC est égale à la base DF (prop. 4) ; le triangle ABC est égal au triangle DEF, et

le troisième angle BAC égal aussi à un troisième angle EDF.

Donc si deux triangles ont deux angles égaux, chacun à chacun, et un côté quelconque égal à un côté, ou celui qui est adjacent aux angles égaux, ou celui qui est opposé à un des angles égaux, les autres côtés sont égaux aux autres côtés, chacun à chacun, et ces deux triangles auront un troisième angle égal à un troisième angle ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXVII.

THÉORÈME.

Si une droite tombant sur deux autres droites fait les angles alternes égaux entre eux, ces deux droites seront parallèles.



Que la droite EF (fig. 27) tombant sur les deux droites AB, CD fasse les angles alternes AEF, EFD égaux entre eux : je dis que la droite AB est parallèle à la droite CD.

Car si elle ne lui est pas parallèle, les droites AB, CD étant prolongées se rencontreront ou du côté BD ou du côté AC. Prolongez ces droites, et supposons qu'elles se rencontrent du côté BD au point G.

L'angle AEF, qui est hors du triangle EGF, est plus grand que l'angle intérieur et opposé EFG (prop. 16) ; mais par supposition il lui est égal, ce qui est impossible : donc les droites AB, CD prolongées du côté BD ne se rencontreront point. On démontrerait de la même manière qu'elles ne se rencontreront pas non plus du côté AC ; or les droites qui ne se rencontrent d'aucun côté sont parallèles (déf. 25) : donc la droite AB est parallèle à la droite CD.

Donc si une droite tombant sur deux autres droites fait les angles alternes égaux entre eux, ces deux droites seront parallèles ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXVIII.

THÉORÈME.

Si une droite tombant sur deux autres droites fait un angle extérieur égal à un angle intérieur opposé et placé du même côté, ou bien si elle fait les angles intérieurs et placés du même côté égaux à deux droits, ces deux droites seront parallèles.



Que la droite EF (fig. 28) tombant sur les deux droites AB, CD fasse l'angle extérieur EGB égal à l'angle intérieur opposé et placé du même côté GHD, ou bien les angles intérieurs et placés du même côté BGH, GHD égaux à deux droits : je dis

que la droite AB est parallèle à la droite CD.

Car puisque l'angle EGB est égal à l'angle GHD, et que l'angle EGB est égal à l'angle AGH (prop. 15), l'angle AGH sera égal à l'angle GHD; mais ces angles sont alternes: donc la droite AB est parallèle à la droite CD (prop. 27).

De plus, puisque les angles BGH, GHD sont égaux à deux droits, et que les angles AGH, BGH sont encore égaux à deux droits (prop. 13), les angles AGH, BGH seront égaux aux angles BGH, GHD. Donc si nous retranchons l'angle commun BGH, l'angle restant AGH sera égal à l'angle restant GHD; mais ces deux angles sont alternes : donc la droite AB est parallèle à la droite CD (prop. 27).

Donc si une droite tombant sur deux autres droites fait un angle extérieur égal à un angle intérieur opposé et placé du même côté, ou si elle fait les angles intérieurs et placés du même côté égaux à deux droits, ces droites seront parallèles ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXIX.

THÉORÈME.

Si une droite tombe sur deux parallèles, les angles alternes sont égaux entre eux, l'angle extérieur est égal à l'angle intérieur opposé et placé du même côté, et les angles intérieurs placés du même côté sont égaux à deux droits.



Si la droite EF (fig. 28) tombe sur les parallèles AB, CD, je dis que les angles alternes AGH, GHD seront égaux entre eux, l'angle extérieur EGB sera égal à l'angle intérieur opposé et placé du même côté GHD, et les angles intérieurs et placés du même côté BGH, GHD seront égaux à deux droits.

Car si l'angle AGH n'est pas égal à l'angle GHD, l'un de ces angles sera plus grand. Que l'angle AGH soit le plus grand; puisque l'angle AGH est plus grand que l'angle GHD, si on leur ajoute un angle commun BGH, les angles AGH, BGH seront plus grands que les angles BGH, GHD ; mais les angles AGH, BGH sont égaux à deux droits (prop. 13) : donc les angles BGH, GHD sont moindres que deux droits ; mais deux droites étant prolongées à l'infini du côté où les angles intérieurs sont plus petits que deux droits se rencontrent entre elles (ax. 11) : donc les droites AB, CD prolongées à l'infini se rencontreront ; mais elles ne se rencontreront pas puisqu'elles sont parallèles : donc les angles AGH, GHD né sont point inégaux, donc ils sont égaux. Mais l'angle AGH est égal à l'angle EGB (prop. 15) : donc l'angle EGB sera égal à l'angle GHD. Donc si nous ajoutons un angle commun BGH, les angles EGB, BGH seront égaux aux angles BGH, GHD ; mais les angles EGB, BGH sont égaux à deux droits (prop. 13) : donc les angles BGH, GHD sont égaux à deux droits.

Donc si une droite tombe sur deux parallèles, les angles alternes sont égaux

entre eux, l'angle, extérieur est égal à l'angle intérieur opposé et placé du même côté, et les angles intérieurs placés du même côté sont égaux à deux droits ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXX.

THÉORÈME.

Les droites qui sont parallèles à une même droite sont parallèles entre elles.



Que chacune des droites AB, CD (fig. 29) soit parallèle à la droite EF : je dis que la droite AB est parallèle à la droite CD.

Conduisez sur ces droites la droite GK.

Puisque la droite GK tombe sur les parallèles AB, EF, l'angle AGH est égal à l'angle GHF (prop. 27). De plus puisque la droite GK tombe sur les parallèles EF, CD, l'angle GHF est égal à l'angle GKD (prop. 28). Or il a été démontré que l'angle AGK est égal à l'angle GHF : donc l'angle AGK est égal à l'angle GKD; mais ces angles sont alternes : donc la droite AB est parallèle à la droite CD (prop. 29).

Donc les droites qui sont parallèles à une même droite sont parallèles entre elles ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXXI.

PROBLÈME.

Par un point donné conduire une droite parallèle à une droite donnée.



Soit A (fig. 30) le point donné et BC la droite donnée : il faut par le point A conduire une droite parallèle à la droite BC.

Prenez sur la droite BC un point quelconque t), et menez AD ; construisez sur la droite DA et en tin point A un angle DAE égal à l'angle ADC, et prolongez la droite AF dans la direction de EA.

Puisque la droite AD tombant sur les deux droites BC, EF fait les angles alternés EAD, ADC égaux entre eux, la droite BC sera parallèle à la droite EF (prop. 27).

Donc par le point donné A, la droite EAF a été menée parallèle à la droite donnée BC, ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION XXXII.

THÉORÈME,

Ayant prolongé un côté d'un triangle quelconque, l'angle extérieur est égal aux deux angles intérieurs et opposés, et les trois angles intérieurs du triangle sont égaux à deux droits.



Soit le triangle ABC (fig. 31) ; prolongez le côté BC vers D : je dis que l'angle extérieur ACD est égal aux deux angles intérieurs et opposés CAB, ABC, et que les trois angles intérieurs ABC, BCA, CAB sont égaux à deux droits.

Menez par le point C la droite CE parallèle à la droite AB (prop. 21),

Puisque la droite CE est parallèle à la droite AB et que la droite AC tombe sur ces deux droites, les angles alternes BAC, ACE sont égaux entre eux (prop. 29). De plus, puisque la droite AB est parallèle à la droite CE et que la droite BD tombe sur ces deux droites, l'angle extérieur ECD est égal à l'angle intérieur et opposé ABC. Or il a été démontré que l'angle ACE est égal à l'angle BAC : donc l'angle extérieur total ACD est égal aux deux angles extérieurs et opposés BAC, ABC.

Donc si on ajoute un angle commun ACB, les angles ACD, ACB seront égaux aux trois angles ACB, BCA, CAB; mais les angles ACD, ACB sont égaux à deux droits (prop. 13) : donc les angles ACB, CBA, CAB sont égaux à deux droits.

Donc, ayant prolongé un côté de tout triangle, l'angle extérieur est égal aux deux angles intérieurs et opposés, et les trois angles intérieurs du triangle sont égaux à deux droits; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXXIII.

THÉORÈME.

Les droites qui joignent des mêmes côtés des droites égales et parallèles sont elles-mêmes égales et parallèles.



Soient AB, CD (fig. 32) deux droites égales et parallèles ; joignez-les des mêmes côtés par les droites AC, BD : je dis que les droites AC, BD sont aussi égales et parallèles.

Menez la droite BC.

Puisque la droite AB est parallèle à la droite CD et que la droite BC tombe sur ces deux droites, les angles alternes ABC, BCD sont égaux (prop. 29). De plus, puisque la droite AB est égale à la droite CD et que la droite BC est commune aux deux triangles BCA, BDC, les deux droites AB, BC sont égales aux deux droites CD, BC; mais l'angle ABC est égal à l'angle BCD : donc la base AC est égale à la base BD, le triangle ABC est égal au triangle BCD, et les autres angles qui sont opposés à des côtés égaux sont égaux, chacun à chacun : donc l'angle ACB est égal à l'angle CBD. Donc puisque la ligne droite BC tombant sur deux droites AC, BD fait les angles alternes égaux entre eux, la droite AC est parallèle à la droite BD et lui est égale (prop. 27).

Donc les droites qui joignent des mêmes côtés deux droites égales et parallèles, sont elles-mêmes égales et parallèles ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXXIV.

THÉORÈME.

Les côtés et les angles opposés des parallélogrammes sont égaux, et la diagonale les partage en deux parties égales.



Soit ACDB (fig. 32) un parallélogramme et BC sa diagonale : je dis que les côtés et les angles opposés du parallélogramme ACDB sont égaux, et que sa diagonale BC le partage en deux parties égales.

Car puisque la droite AB est parallèle à la droite CD et que la droite BC tombe sur ces deux droites, les angles alternes ABC, BCD seront égaux entre eux (prop. 29). De plus, puisque la droite AC est parallèle à la droite BD et que la droite BC tombe sur ces deux droites, les angles alternes ACB, CBD sont égaux entre eux ; donc les deux triangles ABC, CBD ont deux angles ABC, BCA égaux aux deux angles BCD, CBD, chacun à chacun, ils ont de plus un côté commun BC adjacent à des angles égaux: donc ils auront les autres côtés égaux aux autres côtés, chacun à chacun (prop. 26), et le troisième angle égal au troisième angle : donc le côté AB est égal au côté CD, et l'angle BAC égal à l'angle BDC. Puisque l’angle ABC est égal à l'angle BCD, et l'angle CBD égal à l'angle ACB, l'angle total ABD sera égal à l'angle total ACD: Mais il a été démontré que l'angle BAC est égal à l’angle BDC.

Donc les côtés et les angles opposés des parallélogrammes sont égaux entre eux.

Je dis de plus que la diagonale partage les parallélogrammes en deux parties égales. Car puisque la droite AB est égale à la droite CD et que la droite BC est commune aux deux triangles, les deux droites AB, BC seront égales aux droites DC, CB, chacune à chacune ; mais l'angle ABC est égal à l'angle BCD : donc la base AC est égale à la base BC (prop. 4), et le triangle ABC égal au triangle BCD.

Donc la diagonale BC partage le parallélogramme ACDB en deux parties égales ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXXV.

THÉORÈME.

Les parallélogrammes qui sont construits sur la même base et entre les mêmes parallèles sont égaux entre eux.



Soient les parallélogrammes ABCD, EBCF (fig. 33) construits sur la même base BC et entre les mêmes parallèles AF, BC : je dis que le parallélogramme ABCD est égal au parallélogramme EBCF.

Car puisque ABCD est un parallélogramme, la droite AD est égale à la droite B C (prop. 34), et par la même raison la droite EF est aussi égale à la droite B C : donc la droite AD est égale à la droite EF : donc, si on ajoute une droite commune DE, la droite totale AE sera égaler la droite

totale DF (axiome 2) ; mais la droite AB est égale à la droite DC : donc les deux droites EA, AB sont égales aux deux droites FD, DC, chacune à chacune ; mais l'angle extérieur F'DC est égal à l'angle intérieur EAB (prop. 29) : donc la base EB est égale à la base FC (prop. 4), et le triangle EAB égal au triangle FDC ; donc si l'on retranche la partie commune DGE, le trapèze restant ABGD sera égal au trapèze restant EGCF. Donc si on leur ajoute le triangle commun GBC, le parallélogramme total ABCD sera égal au parallélogramme total EBCF.

Donc les parallélogrammes construits sur les mêmes bases et entre les mêmes parallèles sont égaux entre eux ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXXVI.

THÉORÈME.

Les parallélogrammes construits sur des bases égales et entre les mêmes parallèles sont égaux entre eux.



Soient les parallélogrammes ABCD, EFGH (fig. 34) construits sur des bases égales BC, FG et entre les mêmes parallèles AH, BG : je dis que le parallélogramme ABCD est égal au parallélogramme EFGH.

Conduisez les droites BE, CH.

Puisque la droite BC est égale à la droite FG et la droite FG égale à la droite EH, la droite BC sera égale à la droite EH ; mais les droites BC, EH sont

parallèles et joignent les droites BE, CH ; or les droites qui joignent des mêmes côtés deux droites égales et parallèles, sont égales et parallèles (prop. 33) : donc les droites EB, CH sont égales, et parallèles : donc EBCH est un parallélogramme, et ce parallélogramme est égal au parallélogramme ABCD (prop. 35) ; car il a la même base BC que lui, et il est construit entre les mêmes parallèles. Par la même raison le parallélogramme EFGH est égal au parallélogramme EBCH ; donc le parallélogramme ABCD est égal au parallélogramme EFGH.

Donc les parallélogrammes construits sur des bases égales et entre les mêmes parallèles, sont égaux ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXXVII.

THÉORÈME.

Les triangles construits sur la même base et entre les mêmes parallèles sont égaux.



Soient les triangles ABC, DEC (fig. 35) construits sur la même base BC et entre les mêmes parallèles AD, BC, je dis que le triangle ABC est égal au triangle DBC,

Prolongez de part et d'autre la droite AD vers les points E, F, et par le point B conduisez une droite BE parallèle à la droite CA (prop. 31), et par le point C conduisez aussi une droite CF parallèle à BD.

Les figures EBCA, DBCF sont des parallélogrammes, et le parallélogramme EBCA est égal au parallélogramme DBCF (prop. 35) ; car ils sont construits l'un et l'autre sur la même base et entre les mêmes parallèles ; mais le triangle ABC est la moitié du parallélogramme EBCA; car la diagonale AB le partage en deux parties égales; le triangle DBC est la moitié du parallélogramme DBCF, car la diagonale DC la partage en deux parties égales (prop. 34) ; mais, les moitiés des quantités égales sont égales; entre elles ; donc le triangle ABC est égal au triangle DBC.

Donc les triangles construits sur la même base et entre les mêmes parallèles sont égaux entre eux; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXXVIII.

THÉORÈME.

Les triangles construits sur des bases égales et entre les mêmes parallèles sont égaux entre eux.



Soient les triangles ABC, DEF (fig. 36) construits sur des bases égales BC, EF et entre les mêmes parallèles BF, AD : je dis que le triangle ABC est égal au triangle DEF.

Car prolongez de part et d'autre la droite AD vers les points G, H; par le point B conduisez la droite BG parallèle à la droite CA (prop. 31), et par le point F

conduisez aussi la droite FH parallèle à la droite DE.

Les figures GBCA, DEFH sont des parallélogrammes ; mais les parallélogrammes GBCA, DEFH sont égaux entre eux (prop. 36), car ils sont construits sur des bases égales et entre les mêmes parallèles. Or le triangle ABC est la moitié du parallélogramme GBCA, car la diagonale AB le partage en deux parties égales (prop. 34); le triangle EFD est la moitié du parallélogramme DEFH, car la diagonale DF le partage en deux parties égales ; mais les moitiés des quantités égales sont égales entre elles : donc le triangle ABC est égale au triangle DEF.

Donc les triangles construits sur des bases égales et entre les mêmes parallèles sont égaux entre eux ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXXIX.

THÉORÈME.

Les triangles égaux qui sont construits sur la même base et qui sont placés du même côté sont compris entre les mêmes parallèles.



Soient les deux triangles égaux ABC, DBC (fig. 37) construits sur la même base BC et placés du même côté : je dis que ces deux triangles sont compris entre les mêmes parallèles.

Conduisez la droite AD : je dis que la droite AD est parallèle à la droite BC.

Car si la droite AD n'est pas parallèle à la droite BC, conduisez par le point A une droite AE parallèle à la droite BC (prop. 31); conduisez ensuite la droite EC.

Le triangle ABC est égal au triangle EBC (prop. 37), car ces deux triangles sont construits sur la même base BC, et compris entre les mêmes parallèles BC, AE. Mais par hypothèse le triangle ABC est égal au triangle DBC: donc le triangle EBC est égal au triangle DBC, c'est à-dire que le plus grand est égal au plus petit, ce qui ne peut se faire : donc la droite AE n'est point parallèle à la droite BC. Nous démontrerons de même que toute autre droite, excepté AD, ne peut être parallèle à BG : donc la droite AD est parallèle à la droite BC.

Donc les triangles égaux qui sont construits sur la même base et qui sont placés du même côté sont compris entre les mêmes parallèles ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XL.

THÉORÈME.

Les triangles égaux qui sont construits sur des bases égales et qui sont placés du même côté sont compris entre les mêmes parallèles.



Soient les triangles égaux ABC, CDE (fig. 38) construits sur des bases égales. BC, CE et placés du même côté : je dis qu'ils sont compris; entre les mêmes parallèles. Conduisez la droite AD: je dis que la droite AD est parallèle à la droite BE.

Car si la droite AD n'est pas parallèle à la droite BE, conduisez par le point A la droite AF parallèle à la droite BC, et conduisez ensuite la droite FE.

Le triangle ABC est égal au triangle FCE (prop. 38) ; car ces deux triangles sont construits sur des bases égales et compris entre les mêmes parallèles BE, AF ; mais le triangle ABC est égal au triangle DCE : donc le triangle DCE est égal au triangle FCE, c'est-à-dire que le plus grand est égal au plus petit, ce qui ne peut être : donc la droite AF n'est point parallèle à la droite BE. Nous démontrerons de la même manière que toute autre droite, excepté AD, ne peut être parallèle à BF : donc la droite AD est parallèle à la droite BE.

Donc les triangles égaux qui sont construits sur des bases égales et qui sont placés du même côté sont compris entre les mêmes parallèles ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XLI.

THÉORÈME.

Si un parallélogramme et un triangle ont la même base et sont compris entre les mêmes parallèles, le parallélogramme est double du triangle.



En effet, que le parallélogramme ABCD et le triangle EBC (fig. 39) aient la même base et soient compris l'un et l'autre entre les mêmes parallèles BC, AE ; je dis que le parallélogramme ABCD est double du triangle BEC.

Conduisez la droite AC. Le triangle ABC est égal au triangle EBC (prop. 37), car ces deux triangles, sont construits sur la même base BC et compris entre les mêmes parallèles BC, AE ; mais le parallélogramme ABCD est double du triangle ABC, car la diagonale AC partage ce parallélogramme en deux parties égales (prop. 34) : donc le parallélogramme ABCD est aussi double du triangle EBC.

Donc si un parallélogramme et un triangle ont la même base et sont compris entre les mêmes parallèles, le parallélogramme sera double du triangle ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XLII.

PROBLÈME.

Construire dans un angle donné, un parallélogramme égal à un triangle donné.



Soit ABC (fig. 40) le triangle donné et D l'angle donné : il faut construire un parallélogramme qui soit égal au triangle ABC dans un angle égal à l'angle donné D.

Partagez la droite BC en deux parties égales au point E et conduisez la droite AE ; sur la droite EC et au point E construisez un angle CEF égal à l'angle D (prop. 23), par le point A conduisez une droite AG parallèle à la droite EC (prop. 31), et par le point C conduisez aussi une droite CG parallèle à la droite FE : la figure FECG sera un parallélogramme.

Puisque la droite BE est égale à la droite EC, le triangle ABE sera égal au triangle AEG (prop. 38), car ces deux triangles sont construits sur des bases égales BE, EC, et compris entre les mêmes parallèles BC, AG : donc le triangle ABC est double du triangle AEC ; mais le parallélogramme FECG est double du triangle AEC, car ils ont la même base et ils sont compris entre les mêmes parallèles : donc le parallélogramme FECG est égal au triangle ABC (ax. 6), et il a un angle égal à l'angle D.

Donc le parallélogramme FECG a été construit égal au triangle ABC dans un angle CEF égal à l'angle donné D ; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION XLIII.

THÉORÈME.

Dans tout parallélogramme, les compléments des parallélogrammes qui sont autour de la diagonale sont égaux entre eux.



Soit le parallélogramme ABCD (fig. 41) dont AC est la diagonale autour de laquelle sont les parallélogrammes EH, FG, et les parallélogrammes BK, KD qu'on appelle compléments : je dis que le complément BK est égal au complément KD.

Car puisque la figure ABCD est un parallélogramme dont la droite AC est la diagonale, le triangle ABC est égal au triangle ADC (prop. 34). De plus, puisque la figure EKHA est un parallélogramme dont la droite AK est la diagonale, le triangle AEK est égal au triangle AHK; le triangle KFG est égal au triangle EGC, par la même raison : donc puisque le triangle AEK est égal au triangle AHK, et que le triangle KFC est aussi égal au triangle KGC, le triangle AEK, réuni avec le triangle KGC, est égal au triangle AHK réuni avec le triangle KFC; mais le triangle total ABC est égal au triangle total ADC : donc les restes BK, KD, qu'on appelle compléments, sont égaux entre eux (axiome 3).

Donc dans tout parallélogramme, les compléments des parallélogrammes qui sont

autour de la diagonale sont égaux entre eux; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XLIV.

PROBLÈME.

Sur une droite donnée et dans un angle donné, construire un parallélogramme qui soit égal à un triangle donné.



Soient donnés la droite AB (fig. 42), le triangle C et l'angle D : il faut sur la droite AB et dans un angle égal à l'angle D, construire un parallélogramme égal au triangle donné C.

Construisez un parallélogramme BEFG égal au triangle C ; dans un angle EBG égal à l'angle D (prop. 42); placez la droite BE dans la direction de la droite AB; prolongez la droite FG vers H ; et par le point A conduisez la droite AH parallèle à la droite BG ou à la droite EF (prop. 31), et menez la droite GB. Puisque la droite HF tombe sur les parallèles AH, EF, les angles AHF, HFE sont égaux à deux angles droits (prop. 29) : donc les angles BHG, GFE sont moindres que deux angles droits; mais les droites qui sont prolongées à l'infini du coté où les angles intérieurs sont moindres que deux angles droits se rencontrent (ax. 11) : donc les droites HB, FE se rencontreront étant prolongées ; que ces

deux droites soient pro longées (dem. 2), et supposons qu'elles se rencontrent en K; par le point K conduisez la droite KL parallèle à la droite EA ou à la droite FH (prop. 31), et prolongez les droites AH, GB vers les points L, M.

La figure HLKF est un parallélogramme dont HK est la diagonale ; autour de la diagonale, HK sont les parallélogrammes AG, ME, et les parallélogrammes LB, BF, qu'on nomme compléments: donc le parallélogramme LB est égal au parallélogramme BF (prop. 43); mais le parallélogramme BF est égal au triangle C ; donc le parallélogramme LB sera égal au triangle C ; et puisque l'angle GBE est égal à l'angle ABM (prop. 15) et que l'angle GBE est égal à l'angle D, l'angle ABM sera égal à l'angle D.

Donc sur la droite donnée AB et dans un angle ABM égal à l'angle D, le parallélogramme LB a été construit égal au triangle donné C ; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION XLV.

PROBLÈME.

Construire, dans un angle donné, un parallélogramme qui soit égal à une figure rectiligne donnée.



Soit ABCD (fig. 43) la figure rectiligne donnée et E l'angle donné : il faut, dans un angle égal à l'angle E, construire un parallélogramme qui soit égal à la figure ABCD.

Conduisez la droite DB, et construisez dans l'angle HKF égal à l'angle E, un parallélogramme FH qui soit égal au triangle ADB, et sur la droite GH construisez ensuite dans l'angle GHM égal à l'angle E, un parallélogramme GM qui soit égal au triangle DBC.

Puisque l'angle E est égal à chacun des angles HKF, GHM, l'angle GHM sera égal, à l'angle HKF : donc si nous leur ajoutons l'angle commun KHG, les angles FKH, KHG seront égaux aux angles KHG, GHM. Mais les angles FKH, KHG sont égaux à deux angles droits (prop. 29) : donc les angles KHG, GHM seront égaux à deux angles droits. Mais puisque les deux droites KH, HM, placées de différents côtés, font sur la droite GH et au point H de cette droite, deux angles de suite égaux à deux droits, la droite KH est dans la direction de la droite HM (prop. 14) ; et puisque la droite HG tombe sur les parallèles KM, PG, les angles alternes MHG, HGF sont égaux (prop. 29) ; donc si nous leur ajoutons l'angle commun HGL, les angles MHG, HGL seront égaux aux angles HGF, HGL. Mais les angles MHG, HGL sont égaux à deux angles droits (prop. 29) ; donc les angles HGF, HGL seront aussi égaux à deux angles droits ; donc la droite FG est dans la direction de la droite GL; et puisque la droite KF est égale et parallèle à la droite HG, et que la droite HG est aussi égale et parallèle à la droite ML, la droite KF sera égale et parallèle à la droite ML (ax. 1 et prop. 30). Mais ces deux droites sont jointes ensemble par les droites RM, FL : donc les droites KM, FL sont égales et parallèles (prop. 33) : donc la figure KFLM est un parallélogramme ; mais comme le triangle ABD est égal au parallélogramme HF, et que le triangle ABC

est égal au parallélogramme GM, la figure totale ABCD sera égale au parallélogramme total KFLM.

Donc le parallélogramme KFLM a été construit égal à la figure rectiligne ABCD, dans l'angle FKM égal à l'angle donné E ; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION XLVI.

PROBLÈME.

Décrire un carré sur une droite donnée.



Soit AB (fig. 44) la droite donnée : il faut décrire un carré sur cette droite.

Du point A, donné dans la droite AB, conduisez une droite AC perpendiculaire sur la droite AB (prop. 11) ; faites la droite AD égale à la droite AB (prop. 31); par le point D conduisez la droite DE parallèle à la droite AB (prop. 31), et par le point B conduisez aussi une droite BE parallèle à la droite AD.

La figure ADEB est un, parallélogramme : donc la droite AB est égale à la droite DE, et la droite AD égale à la droite BE; mais la droite AB est égale à la droite AD : donc les quatre droites BA, AD, DE, EB sont égales entre elles : donc le parallélogramme ADEB, est équilatéral. Je dis de plus, qu'il est rectangle, car puisque la droite AD tombe sur les

parallèles AB, DE, les angles BAD, ADE sont égaux à deux droits (prop. 29) ; mais l'angle BAD est droit par construction; donc l'angle ADE est droit aussi. Mais les côtés et angles opposés des parallélogrammes sont égaux (prop. 34) ; donc chacun des angles opposés ABE, BED est droit, et par conséquent le parallélogramme ADEB est rectangle ; mais nous avons démontré qu'il était équilatéral.

Donc le parallélogramme ADEB est un carré décrit sur la droite AB ; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION XLVII.

THÉORÈME.

Dans les triangles rectangles, le carré décrit sur le côté opposé à l'angle droit est égal aux carrés construits sur les côtés oui comprennent l'angle droit.



Soit ABC (fig. 45) un triangle rectangle dont l'angle droit est BAC : je dis que le carré construit sur le coté BC est égal aux carrés construits sur les côtés BA, AC.

Construisez le carré BDEC sur le côté BC; construisez aussi les deux carrés GB, HC sur les côtés BA, AC, et par le point A

conduisez une droite AL parallèle à l'une ou à l'autre des droites BD, CE, conduisez ensuite les droites

Puisque chacun des angles BAC, BAG est droit et que les deux droites AC, AG, placées de part et d'autre de la droite BA, font au point A, avec la droite AB, deux angles de suite égaux à deux angles droits, la droite CA est dans la direction de la droite AG : la droite AB est dans la direction de la droite AH, par la même raison; et puisque l'angle DBC est égal à l'angle FBA (axiome 10), étant droits l'un et l'autre, si nous leur ajoutons un angle commun ABC, l'angle total DBA sera égal à l'angle total FBC ; mais les deux droites DB, BA étant égales aux deux droites CB, BF, chacune à chacune, et l'angle DBA égal à l'angle FBC, la base AD sera égale à la base FC, et le triangle ABD égal au triangle FBC (prop. 4). Or le parallélogramme BL est double du triangle ABD (prop. 41) car ils ont la même base BD et sont compris entre les mêmes parallèles BD, AL. Le carré GB est aussi double du triangle FBC, car ils ont la même base FB et sont compris entre les mêmes parallèles FB, GC, mais les quantités qui sont doubles de quantités égales sont égales entre elles : donc le parallélogramme BL est égal au carré GB.

Ayant conduit les droites AE, BK, nous démontrerons de la même manière que le parallélogramme CL est égal au carré HC : donc le carré total BDEC est égal aux deux carrés GB, HC ; mais le carré BDEC est construit sur le côté BC, et les carrés GB, HC sont construits sur les côtés BA, AC : donc le carré BE, construit sur le côté BC, est égal aux carrés construits sur les côtés BA, AC.

Donc dans les triangles rectangles, le carré construit sur le côté opposé à l'angle droit est égal aux deux carrés construits sur les côtés qui comprennent

l'angle droit ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XLVIII.

THÉORÈME.

Si le carré qui est construit sur un des côtés d'un triangle est égal aux carrés construits sur les autres côtés du triangle, l'angle compris entre ces deux derniers côtés est droit.



Que le carré construit sur un côté BC (fig. 46) d'un triangle ABC, soit égal aux carrés construits sur les deux autres côtés BA, AC : je dis que l'angle BAC est droit.

Conduisez du point A une droite AD perpendiculaire sur la droite AC (prop. 11) ; faites la droite AD égale à la droite BA, et conduisez la droite DC.

Car puisque la droite DA est égale à la droite AB, le carré construit sur DA sera égal au carré construit sur AB. Donc si nous ajoutons un carré commun, celui qui est construit sur AC, les carrés construits sur DA, AC seront égaux aux carrés construits sur BA, AC. Mais le carré construit sur DC est égal aux carrés construits sur DA, AC (prop. 47) car l'angle DAC est droit. Or le carré construit sur BG est supposé égal aux carrés construits sur BA, AC : donc le carré construit sur DC est égal à celui qui est construit sur BC : donc le côté DC est

égal au côté CB ; et comme le côté AD est égal au côté AB et que le côté AC est commun, les deux côtés AD, AC sont égaux aux deux côtés BA, BC, chacun à chacun; mais la base DC est égale à la base CB ; donc l'angle DAC est égal à l'angle BAC (prop. 8) ; mais l'angle DAC est droit : donc l'angle BAC est droit aussi.

Donc si le carré construit sur un côté d'un triangle est égal aux carrés construits sur les deux autres côtés, l'angle compris par ces deux derniers côtés sera droit ; ce qu'il fallait démontrer.

FIN DU PREMIER LIVRE.

[1] Dans la suite nous dirons une droite au lieu de dire une ligne droite.

[2] On nomme aujourd'hui trapèze un quadrilatère dont deux de ses côtés seulement sont parallèles, et les autres quadrilatères, excepté le trapèze et les quadrilatères dont parle Euclide, se nomment ordinairement quadrilatères simplement dits.

[3] Ou postulats.

[4] Dans quelques manuscrits les axiomes IO et ils se trouvent placés parmi les demandes.

RETOUR À L'ENTRÉE DU SITE

ALLER À LA TABLE DES MATIÈRES
D'EUCLIDE

EUCLIDE

Éléments de Géométrie

LIVRE II

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

INTRODUCTION -GÉOMÉTRIE LIVRE I - LIVRE III - LIVRE IV - LIVRE VI

Euclide le Géomètre

LES ÉLÉMENTS DE GÉOMÉTRIE D'EUCLIDE,

traduits littéralement, et suivis d'un Traité du Cercle,

du Cylindre, du Cône et de la Sphère;

de la mesure des Surfaces et des Solides ; avec des Notes ;

Par F. PEYRARD,

Bibliothécaire

de l'École Polytechnique.

OUVRAGE APPROUVÉ PAR L'INSTITUT NATIONAL.

Et nova sunt semper. — OVIDE,...

A PARIS,

CHEZ F. LOUIS, LIBRAIRE, RUE DE SAVOIE, N° 12.

AN XII - l804.

LIVRE II.

DÉFINITIONS.

1. Tout parallélogramme rectangle est dit contenu sous les deux droites qui comprennent un angle droit.

2. Dans tout parallélogramme, on appelle gnomon la réunion de l'un quelconque des parallélogrammes décrits autour de la diagonale avec les deux compléments.

PROPOSITION PREMIÈRE.

THÉORÈME.

Si l'on a deux droites, et si l'une d'elles est partagée en un certain nombre de parties, le rectangle compris sous ces deux droites est égal aux rectangles compris sous la droite qui n'a point été partagée, et sous chacun des segments de l'autre.



Soient deux droites A, BC (fig. 47), et que la droite BC soit partagée d'une manière quelconque aux points D, E : je dis que le rectangle compris sous les droites A, BC est égal au rectangle compris sous les droites A, BD, au rectangle compris sous les droites

A, DE, et au rectangle compris sous les droites A, EC.

Conduisez par le point B la droite BF perpendiculaire sur la droite BC (prop. 11. I)[1]; faites la droite BG égale à la droite A, et par le point G conduisez la droite GH parallèle à la droite BC (prop. 31. I); par les points D, E, C, conduisez ensuite les droites DK, EL, CH, parallèles à la droite BG.

Le rectangle BH est égal aux rectangles BK, DL, EH; mais le rectangle BH est compris sous les droites A, BC, car il est compris sous les droites GB, BC, dont la droite BG est égale à la droite A ; le rectangle BK est compris sous les droites A, BD, car il est compris sous les droites GB, BD, dont la droite GB est égale à la droite A; le rectangle DL est compris sous les droites A, DE, puisque DK, c'est-à-dire BG, est égale à la droite A; et enfin, le rectangle EH est compris sous les droites A, EC : donc le rectangle compris sous les droites A, BC est égal, au rectangle compris sous les droites A, BD, au rectangle compris sous les droites A, DE ; et enfin au rectangle compris sous les droites A, EC.

Donc si l'on a deux droites, et si l'une d'elles est partagée en un certain nombre de parties, le rectangle compris sous ces deux droites est égal aux rectangles compris sous la droite qui n'a point été partagée et sous chacun des segments de l'autre ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION II.

THÉORÈME.

Si une droite est partagée d'une manière quelconque en deux parties, le rectangle compris sous la droite totale et sous l'un et l'autre segment, est égal au carré de la droite entière.



Que la droite AB (fig. 48) soit partagée d'une manière quelconque au point C : je dis que le rectangle-compris sous les droites AB, BÇ, avec le rectangle compris sous les droites BA, AC, est égal au carré de la droite AB.

Sur la droite. AB construisez le carré ADEB (prop. 46. I), et par le point C conduisez la droite CF parallèle à l'une et à l'autre des droites AD, BE (prop. 31. I).

Le carré AE est égal aux rectangles: AF, CE ; mais le carré AE est construit sur la droite AB ; le rectangle AF est compris sous les droites BA, AC, car il est compris sous les droites DA, AC, dont la droite AD est égale à AB; et enfin le rectangle CE est compris sous les droites AB, BC, puisque la droite BE est égale à la droite AB ; donc le rectangle compris sous les droites BA, AC, avec le rectangle compris sous les droites AB, BC, est égal au carré de la droite AB.

Donc si une droite est partagée d'une manière quelconque en deux parties, les rectangles compris sous la droite totale et sous chacun des segments sont égaux au quatre construit sur la droite totale ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION III.

THÉORÈME.

Si une droite est partagée d'une manière quelconque en deux parties, le rectangle compris sous la droite totale et l'un des segments, est égal au rectangle compris sous

les segments et au carré formé sur le segment premièrement pris.



Que la droite AB (fig. 49) soit partagée en un point quelconque C : je dis que le rectangle compris sous les droites AB, BC est égal rectangle compris sous les droites AC, CB, et au carré de la droite BC.

Sur la droite BC construisez le carré CDEB (prop. 46. I), prolongez en F la droite ED, et par le point A conduisez la droite AF parallèle à l'une ou à l'autre des droites CD, BE (prop. 31. I).

Le rectangle AE est certainement égal aux rectangles AD, CE; mais le rectangle AE est compris sous les droites AB, BC, car il est compris sous les droites AB, BE, dont la droite BE est égale à la droite BC ; le rectangle AD est compris sous les droites AC , CB, puisque la droite DE est égale à la droite CB; et enfin le carré DB est construit sur la droite BC : donc le rectangle compris sous les droites AB, BC est égal au rectangle compris sous les droites AC, CB et au carré de la droite BC.

Donc si une droite est partagée d'une manière quelconque en deux parties, le rectangle compris sous la droite totale et sous un des segments, est égal au rectangle compris sous les segments et au carré construit sur le segment premièrement pris ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION IV.

THÉORÈME.

Si une droite est partagée d'une manière quelconque en deux parties, le carré construit sur la droite entière est égal aux carrés formés sur les deux segments et au double du rectangle compris sous ces deux segments.



Que la droite AB (fig. 50) soit partagée d'une manière quelconque au point C : je dis que le carré construit sur AB est égal aux carrés construits sur AC, CB, et au double du rectangle compris sous les segments AC, CB.

Construisez le carré ADEB sur la droite AB (prop. 46. I), conduisez la droite BD; par le point C conduisez la droite CGF parallèle à l'une ou à l'autre des droites AD, BE (prop. 31. I), et par le point G conduisez la droite HK parallèle à l'une ou à l'autre des droites AB, DE.

Puisque la droite CF est parallèle à la droite AD, et que la droite BD tombe sur ces deux droites, l'angle extérieur BGC sera égal à l'angle intérieur et opposé ADB (prop. 29. I) ; mais l'angle ADB est égal à l'angle ABD (prop. 5. I), parce que le côté BA est égal au côté AD ; donc l'angle CGB est égal à l'angle GBC : donc le côté BC est égal au côté CG (prop. 6. I) ; mais le côté CB est égal au côté GK (prop. 34. I), et le côté CG égal au côté BK : donc le côté GK est égal au côté GG : donc le quadrilatère

CGKB est équilatère. Je dis dé plus qu'il est rectangle; car puisque la droite CF est parallèle à la droite BK, et que la droite CB tombe sur ces deux droites, les angles KBC, GCB sont égaux à deux droites (prop. 29. I); mais l'angle KBC est droit (déf. 50. I) : donc l'angle GCB est droit aussi : donc les angles opposés CGK, GKB seront encore droits (prop. 34. I) : donc le quadrilatère CGKB est rectangle. Mais on a démontré qu'il était équilatère; donc ce quadrilatère est un carré, et ce carré est construit sur la droite BC. Par la même raison le quadrilatère HF est encore un carré qui est construit sur HG, c'est-à-dire sur AC. Donc HF, CK sont deux carrés construits sur AC, CB; et puisque le rectangle AG est égal au rectangle GE (prop. 43. I), et que ce rectangle AG est compris sous les droites AC, CB, la droite GC étant égale à CB, le rectangle GE sera égal à un rectangle qui est compris sous les droites AC, GB : donc les rectangles AG, GE sont égaux au double du rectangle qui est compris sous les droites CB ; mais les carrés HF, CK sont construits sur les droites AC, CB: donc les quatre figures HF, CK, AG, GE sont égales aux carrés construits sur AC, CB et au double du rectangle compris sous les droites AC, CB; mais les quatre figures HF, CK, AG, GE composent toute la figure ADEB qui est le carré construit sur AB ; donc le carré construit sur AB est égal aux carrés construits sur AC, CB, et au double du rectangle compris sous les droites AC, CB.

Donc si une droite est partagée d'une manière quelconque, le carré de la droite entière est égal au carré des segments et au double du rectangle compris sous ces segments; ce qu'il fallait démontrer.

AUTREMENT.

Je dis que le carré construit sur la droite AB est égal aux carrés construits sur AC, CB et au double du rectangle compris sous AC, CB.

En effet, puisque dans la même figure le côté BA est égal au côté AD, l'angle ABD sera égal à l'angle ADB (prop. 5. I); et comme les trois angles d'un triangle quelconque sont égaux à deux droites (prop. 32. I), les trois angles ABD, ADB, BAD du triangle ABD seront égaux à deux droits. Mais l'angle BAD est droit : donc les deux autres angles ABD, ADB sont égaux à un angle droit ; or ces deux angles sont égaux entre eux : donc chacun des angles ABD, ADB est égal à la moitié d'un angle droit. Mais l'angle BCG est droit, car il est égal à l'angle intérieur et opposé BAD : donc l'angle restant CGB est la moitié d'un angle droit; donc l'angle CGB est égal à l'angle CBG : donc le côté BC est égal au côté CG (prop. 34. I) ; mais CB est égal à KG, et CG égal aussi à BK (prop. 34. I) : donc le quadrilatère CK est équilatère ; mais il a un angle droit : donc ce quadrilatère est un carré, et ce carré est construit sur le segment CB. Le quadrilatère HF est un carré, par la même raison, et ce carré est construit sur le segment AC : donc les quadrilatères CK, HF sont deux carrés, et ces deux carrés sont construits sur les segments AC, CB. De plus, puisque le rectangle AG est égal au rectangle EG (prop. 31. I), et que le rectangle AG est compris sous les droites AC, CB, car la droite CG est égale à la droite CB, le rectangle EG est égal au rectangle compris sous les droites AC, CB : donc les rectangles AG, GE sont égaux au double du rectangle qui serait compris sous les droites AC, CB, mais les carrés CK, HF sont égaux à ceux qui seraient construits sur les segments AC, CB : donc les quatre figures CK, HF, AG, GE sont égales aux carrés construits sur les segments AC, CB, et au double du rectangle compris sous ces mêmes segments. Mais les figures CK, HF, AG, GE composent toute la figure AE qui est le carré construit sur AB.

Donc le carré formé sur la droite AB est égal aux carrés formés sur les droites AC, CB, et au double du rectangle compris sous

les mêmes droites AC, CB; ce qu'il fallait démontrer,

COROLLAIRE.

Il suit de là que, dans les carrés, les parallélogrammes qui sont autour de la diagonale sont toujours des carrés.

PROPOSITION V.

Si une droite est coupée en deux parties égales et en deux parties inégales, le rectangle compris sous les deux segments inégaux de la droite entière avec le quatre de la droite qui est placée entre les points de section, est égal au carré de la moitié de cette droite.



Qu'une droite quelconque AB (fig. 51) soit coupée en deux parties égales au point C et en deux parties inégales au point D : je dis que le rectangle compris sous les droites AD, DB, avec le carré construit sur CD, est égal au carré construit sur CB.

Sur la droite BC construisez le carré CEFB (prop. 46. I), et conduisez la droite BE ; par le point D conduisez la droite DHG parallèle à l'une ou à l'autre des droites CE, BF (prop. 31. I) ; par le point H conduisez la droite KLM parallèle à l'une ou à l'autre des droites CB, EF, et enfin par le point A conduisez la droite AK parallèle à l'une ou l'autre des droites CL, BM.

Puisque le complément CH est égal au complément HF (prop. 43. ï), si nous

ajoutons à chacun de ces compléments le quatre DM, le rectangle total CM sera égal au rectangle total DF ; mais le rectangle CM est égal au rectangle AL (prop. 56. I), puisque la droite AC est égale à la droite CB : donc le rectangle AL est égal au rectangle DF; donc si nous ajoutons le rectangle CH à chacun de ces deux rectangles, le rectangle total AH sera égal aux rectangles DF, DL; mais le rectangle AH est compris sous les droites AD, DB, puisque la droite DH est égale à la droite DB; or les rectangles FD, DL forment le gnomon NOP : donc le gnomon NOP est égal au rectangle compris sous les droites AD, DB ; donc si nous ajoutons à chacune de ces deux quantités le carré LG qui est égal au carré de CD (corol. 4. II), le gnomon NOP et le carré LG seront égaux au rectangle compris sous les droites AD, DB, et au carré construit sur CD; mais le gnomon NOP et le carré LG forment tout le carré CEFB qui est construit sur CB : donc le rectangle compris sous AD, DB, avec le carré construit sur CD, est égal au carré construit sur CB.

Donc si une droite est coupée en deux parties égales et en deux parties inégales, le rectangle compris sous les deux segments inégaux de la droite totale avec le carré de la droite qui est placée entre les deux points de section, est égal au carré de la moitié de cette droite ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION VI.

THÉORÈME.

Si une ligne droite est coupée en deux parties égales, et si on lui ajoute, directement une droite qui ait la même direction, le rectangle compris sous une droite composée de la première droite et de la droite ajoutée, et sous la droite ajoutée avec le carré de la moitié de la première ligne droite, est égal au carré d'une droite

composée de la moitié de la première ligne droite et de la droite ajoutée.



Qu'une ligne droite quelconque AB (fig. 52) soit coupée en deux parties égales au point C ; qu'on lui ajoute directement une droite quelconque BD : je dis que le rectangle compris sous AD, DB, avec le carré de la droite CB, est égal au carré de CD.

Sur la droite CD décrivez le carré CEFD (prop. 46. I); conduisez la droite DE; par le point B conduisez la droite BHG parallèle à l'une ou à l'autre des droites CE, DF (prop. 31. I); par le point H conduisez la droite KLM parallèle à l'une ou à l'autre des droites ÀD, EF, et enfin par le point A conduisez la droite AK parallèle à l'une ou à l'autre des droites CL, DM. Puisque la droite AC est égale à la droite CB, le rectangle AL sera égal au rectangle CH (prop. 36. I) ; mais le rectangle CH est égal au rectangle HF (prop. 43. I) : donc le rectangle AL sera égal au rectangle HF; donc si nous ajoutons à chacun de ces rectangles le rectangle CM, le rectangle total AM sera égal au gnomon NOP ; mais le rectangle A M est compris sous les droites AD, DB, car DM est égal à DB (corrol. 4. II) ; donc le gnomon NOP est égal à un rectangle qui est compris sous les droites AD, DB ; donc si nous ajoutons à chacune de ces deux quantités le carré LG qui est égal au carré construit sur CB, le rectangle compris sous les droites AD, DB avec le carré construit sur BC sera égal au gnomon NPO et au carré LG. Mais le gnomon NPO et le carré LG

composent le carré total CEFD qui est construit sur CD : donc le rectangle compris sous AD, DB avec le carré construit sur BC est égal au carré construit sur CD.

Donc si une ligne droite est coupée en deux parties égales et si on lui ajoute directement une droite qui ait la même direction, le rectangle compris sous une droite composée de la première ligne droite et de la droite ajoutée, et sous la droite ajoutée, avec le carré de la moitié de la première ligne droite, est égal au carré d'une droite composée de la moitié de la première ligne droite et de la droite ajoutée ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION VII.

THÉORÈME.

Si une droite est partagée en deux parties d'une manière quelconque, le carré de la droite entière et le carré de l'un de ses segments égalent le double du rectangle compris sous la droite entière et ce segment et le carré de l'autre segment.



Qu'une droite quelconque AB (fig. 53) soit partagée d'une manière quelconque au point C : je dis que le carré de AB et le carré de BC sont égaux au double du rectangle compris sous AB, BC, et au carré de AC,

Sur AB décrivez le carré ADEB (prop. 46. I) et construisez la figure.

Puisque le rectangle AG est égal au rectangle GE (prop. 43. I), si nous ajoutons à l'un et à l'autre le carré CF, le rectangle AF sera égal au rectangle CE : donc les rectangles AF, CE sont doubles du rectangle AF; mais les rectangles AF, CE composent le gnomon KLM et le carré CF : donc le gnomon KLM et le carré CF sont doubles du rectangle AF; mais le double du rectangle compris sous les droites AB, BC est double du rectangle AF, car la droite BF est égale à la droite BC (cor. 4. II) : donc le gnomon KLM et le carré CF sont égaux au double du rectangle compris sous les droites AB, BC; donc si nous ajoutons à ces quantités le carré HN, qui est construit sur la droite AC, le gnomon KLM et les carrés CF, HN seront égaux au double du rectangle compris sous AB, BC, et au carré de AC ; mais le gnomon KLM et les carrés CF, HN forment le carré total ADEB et le carré CF qui sont construits sur AB, BC : donc les carrés de AB et de BC sont égaux au double du rectangle compris sous AB, BC, et au carré de AC.

Donc si une droite est partagée en deux parties d'une manière quelconque, le carré de la droite entière et le carré de l'un de ses segments sont égaux au double du rectangle compris sous la droite entière et ce segment, et au carré de l'autre segment ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION VIII.

THÉORÈME.

Si une droite est partagée en deux parties d'une manière quelconque, le quadruple du rectangle compris sous la droite entière et un de ses segments, avec le quatre de l'autre segment, est égal au carré construit sur la droite entière et le premier segment, considérés comme, ne formant qu'une seule droite.



Que la droite AB (fig. 54) soit partagée en deux parties d'une manière quelconque au point C : je dis que le quadruple du rectangle compris sous les droites AB, BC avec le carré de AC, est égal au carré construit sur les droites AB, BC, considérées comme ne formant qu'une seule droite.

Prolongez la droite DB dans la direction de AB ; faites BD égal à CB ; décrivez sur AD le carré AEFD (prop. 46. II), et construisez une double figure.

Puisque la droite GB est égale à la droite BD, et que la droite CB est égale à la droite GR (prop. 34. I) et la droite BD égale aussi à la droite KN, la droite GK sera égale à la droite KN; la droite QR est égale à la droite RP par la même raison. Puisque CB est égal à BD, et GK égal à KN, le rectangle CK sera égal au rectangle BN, et le rectangle GR égal au rectangle KP (prop. 36. I) ; mais le rectangle CK est égal au rectangle RN (prop. 43. I), car ils sont les compléments du parallélogramme CP : donc le rectangle BN est égal au rectangle GR : donc les quatre rectangles BN, KC, GR, RN sont égaux entre eux : donc ils sont le quadruple du rectangle CK. De plus, puisque CB est égal à BD et que BD est égal à BK, c'est-à-dire à CG (34. I), et CB égal à GK, c'est-à-dire à GQ, la droite CG sera égale à la droite GQ; or QR est égal à RP : donc le rectangle AG est égal au rectangle MQ (prop. 36. I), et le rectangle QL égal au rectangle

RF ; mais le rectangle MQ est égal au rectangle QL (prop. 43. I), puisqu'ils sont les compléments du parallélogramme ML : donc les rectangles AG, RP sont égaux : donc les quatre rectangles AG, MQ, QL, RF sont égaux entre eux, et sont par conséquent quadruples du rectangle AG. Mais on a démontré que les quatre carrés CK, BN, GR, RN, étaient quadruples du carré CK : donc les huit figures qui composent le gnomon STV sont quadruples du rectangle AK, et puisque le rectangle AK est compris cous les droites AB, BD ; car BK est égal à BD (cor. 4. II), le quadruple du rectangle AK sera compris sous les droites AB, BD ; mais il a été démontré que le gnomon STV est quadruple du rectangle AK ; donc le rectangle qui est compris sous les droites AB, BD est égal au gnomon STV ; donc si nous ajoutons à ces quantités égales le carré OH qui est égal au carré de AC (cor. 4. II), le quadruple du rectangle compris sous les droites AB, BD, et le carré de AC seront égaux au gnomon STV et au carré OH, mais le gnomon STV et le carré OH comprennent tout le carré AEFD qui est décrit sur AD : donc le quadruple du rectangle compris sous les droites AB, BC et le carré de AC est égal au carré construit sur les droites AB, BC considérées comme ne faisant qu'une seule droite.

Donc si une droite est partagée en deux parties égales d'une manière quelconque, le quadruple du rectangle compris sous la droite entière et un de ses segments et le carré de l'autre segment, sont égaux au carré construit sur la droite entière et le premier segment, considérés comme ne formant qu'une seule droite ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION IX.

THÉORÈME.

Si une droite est partagée en deux parties égales et en deux parties inégales, les carrés des segments inégaux sont doubles

du carré de la moitié de cette droite et du carré de la droite interceptée entre les points de section.



Que la droite AB (fig. 55) soit partagée en deux parties égales au point C et en deux parties inégales au point D : je dis que les carrés de AD, DB sont doubles des carrés de AC, CD.

Du point C conduisez une droite CE qui soit perpendiculaire à la droite AB (prop. 11. I) ; faites la droite EC égale à l'une ou à l'autre des droites AC, CB, et menez les droites EA, EB ; par le point D conduisez la droite DF parallèle à la droite EC (prop. 31. I), et par le point F conduisez la droite FG parallèle à la droite AB, et menez la droite AF.

Puisque la droite AC est égale à la droite CE, l'angle EAC sera égal à l'angle AEC (prop. 5. I) ; et puisque l'angle ACE est droit, les angles AEC, EAC seront égaux à un angle droit (prop. 32. I); mais ces deux angles sont égaux entre eux : donc chacun des angles AEC, EAC est la moitié d'un angle droit. Par la même raison, chacun des angles CEB, EBC est aussi la moitié d'un angle droit : donc l'angle total AEB est droit. Puisque l'angle GEF est la moitié d'un angle droit et que l'angle EGF est droit, car il est égal à l'angle intérieur et opposé ECB (prop. 29. I), l'angle EFG sera la moitié d'un angle droit : donc l'angle GEF est égal à l'angle EFG : donc le côté EG est égal au côté GF (prop. 6. I). De plus, puisque l'angle EBD est la moitié d'un angle droit, et que l'angle FDB est droit, car il est égal à l'angle intérieur et

opposé ECB, l'angle BFD sera la moitié d'un angle droit : donc l'angle FBD est égal à l'angle DFB : donc le côté DF est égal au côté DB (prop, 6. I). Puisque la droite AC est égale à la droite CE, le carré de AC sera égal au carré de CE : donc les carrés de AC, CE sont doubles du carré de AC; mais le carré de EA est égal aux carrés de AC, CE (prop. 47. I), puis l'angle. ACE est droit : donc le carré de EA est double du carré de AC. De plus, puisque EG est égal à GF et que le carré de EG est égal au carré de GF, les carrés de EG, GF seront doubles du carré de GF ; mais le carré de EF est égal aux carrés de EG, GF (prop. 47. I) : donc le carré de EF est double du carré de GF; mais la droite GF est égale à la droite CD (prop. 34. I) : donc le carré EF est double du carré de CD ; mais le carré de AE est double du carré de AC : donc les carrés de AE, EF sont doubles des carrés de AC, CD ; or le carré de AF est égal aux carrés de AE, EF (prop. 47. I) puisque l'angle AEF est droit : donc le carré de AF est double des carrés de AC, CD; mais les carrés de AD, DF sont égaux au carré de AF (prop. 47. I) car l'angle ADF est droit : donc les carrés de AD, DF sont doubles des carrés de AC, CD ; or la droite DF est égale à la droite DB : donc les carrés de AD, DB seront doubles des carrés de AC, CD.

Donc si une droite est partagée en deux parties égales et en deux parties inégales, les carrés des deux segments inégaux sont doubles du carré de la moitié de cette droite et du carré de la droite interceptée entre les deux points de section ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION X.

THÉORÈME.

Si une ligne droite est coupée en deux parties égales, et si on lui ajoute directement une droite qui ait la même direction, le carré d'une droite composée de

la ligne droite entière et de la droite ajoutée, et le carré de la droite ajoutée, sont doubles du carré de la moitié de cette ligne droite et du carré d'une droite composée de la moitié de cette ligne droite et de la droite ajoutée comme ne faisant qu'une seule droite.



Que la droite AB (fig. 56) soit partagée en deux parties égales au point C, et qu'on lui ajoute directement une droite quelconque BD : je dis que les carrés de AD, DB sont doubles des carrés de AC, CD.

Du point C conduisez la droite CE perpendiculaire sur AB (prop. 11. I) ; faites la droite CE égale à l'une ou à l'autre des droites AC, CB; menez les droites AE, EB; par le point E conduisez la droite EF parallèle à la droite AD, et par le point D conduisez la droite DF parallèle à la droite CE. Puisque la droite EF tombe sur les parallèles EC, FD, les angles CEF, EFD sont égaux à deux droits (prop. 29. I) : donc les angles FEB, EFD sont moindres que deux angles droits ; or deux droites se rencontrent quand elles sont prolongées à l'infini du côté où elles forment deux angles moindres que deux droits (ax. 11) : donc les droites EB, FD, prolongées du côté BD, se rencontreront. Prolongez ces droites, et supposons qu'elles se rencontrent au point G ; menez la droite AG.

Puisque la droite AC est égale à la droite CE, l'angle AEC sera égal à l'angle

EAC (prop. 5. I) ; or l'angle ACE est droit : donc chacun des angles EAC, AEC est la moitié d'un angle droit (prop. 32. I). Par la même raison, chacun des angles CEB, EBC est la moitié d'un angle droit : donc l'angle AEB est droit. Puisque l'angle EBC est la moitié d'un angle droit, l'angle DBG est aussi la moitié d'un angle droit (prop. 15. I). Mais l'angle BDG est droit (prop. 29. I), car il est égal à l'angle alterne DCE : donc l'angle DGB est la moitié d'un angle droit : donc l'angle DGB est égal à l'angle DBG : donc le côté BD est égal au côté GD (prop. 6. I). De plus, puisque l'angle EGF est la moitié d'un angle droit, et que l'angle EFD est droit, car il est égal à l'angle opposé ECD (prop. 34. I), l'angle FEG est la moitié d'un angle droit : donc l'angle EGF est égal à l'angle FEG : donc le côté GF est égal au côté EF (prop. 6. I) ; et comme la droite EC est égale à la droite CA, le carré de EC est égal au carré de AG : donc les carrés de EG, GA sont doubles du carré de GA. Or le carré de EA est égal aux carrés de EC, CA (prop. 47. I) donc le carré de EA est double du carré de AC. De plus, puisque la droite GF est égale à la droite EF, le carré de FG est égal au carré de FE : donc les carrés de FG, FE sont doubles du carré de EF; or le carré de EG est égal aux carrés de GF, FE (prop. 47. I) donc le carré de EG est double du carré de EF ; mais la droite EF est égale à la droite CD : donc le carré de EG est double du carré de CD ; mais on a démontré que le carré de EA est double du carré de AC, donc les carrés de AE, EG sont doubles des carrés de AC, CD ; mais le carré de AG est égal aux carrés de AE, EG (prop. 47. I) : donc le carré de AG est double des carrés de AC, CD. Or les carrés de AD, DG sont égaux au carré de AG (prop. 47. I), donc les carrés de AD, DG sont doubles des carrés de AC, CD ; mais la droite, DG est égale à la droite DB : donc les carrés de AD, DB sont doubles des carrés de AC, CD.

Donc si une ligne droite est partagée en deux parties égales et si on lui ajoute directement une droite qui ait la même direction, le carré d'une droite composée de la ligne droite entière et de la droite ajoutée, et le carré de la droite ajoutée, sont doubles du carré de la moitié de la ligne droite et au carré d'une droite composée de la moitié de la ligne droite et de la droite ajoutée comme ne faisant qu'une seule droite; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XI.

PROBLÈME.

Partager une droite donnée de manière que le rectangle compris sous la droite entière et l'un de ses segments, soit égal au carré de l'autre segment.



Soit AB (fig. 57) la droite donnée : il faut partager la droite AB de manière que le rectangle compris sous la droite entière et l'un de ses segments, soit égal au carré de l'autre segment.

Sur la droite AB décrivez le carré ABDG (prop. 46. I), partagez la droite AC en deux parties égales en E (prop. 10. I), et menez la droite BE ; ayant prolongé ensuite la droite GA vers F, faites la droite EF égale à la droite BE (prop. 3. I), décrivez sur AF le carré FH, et prolongez la droite GH vers K : je dis que la droite AB est partagée en

H de manière que le rectangle compris sous AB et BH est égal au carré de AH.

Puisque la droite AC est coupée en deux parties égales en E, si nous lui ajoutons directement la droite AF, le rectangle compris sous les droites CF, FA et le carré de AE, pris ensemble, seront égaux au carré de EF (prop. 6. II); mais la droite EF est égale à la droite EB : donc le rectangle compris sous CF, FA et le carré de AE, pris ensemble, sont égaux au carré de EB; mais les carrés de BA, AE sont égaux au carré de EB (prop. 47. I), car l'angle BAE est droit ; donc le rectangle compris sous CF, FA avec le carré de AE est égal aux carrés de BA, AE. Donc, si on retranche le carré de AE qui est commun, le rectangle compris sous CF, FA sera égal au carré de AB ; mais le rectangle FK est compris sous les droites CF, FA, puisque la droite AF est égale à la droite FG, et le carré de AB est égal au carré AD : donc le rectangle FK est égal au carré AD : donc, si l'on-retranche le rectangle commun AK, le carré FH sera égal au rectangle HD; mais le rectangle HD est compris sous les droites AB, BH, puisque AB est égal à BD et que FH est le carré de AH: donc le rectangle compris sous AB, BH sera égal au carré de AH.

Donc la droite AB est coupée au point H, de manière que le rectangle compris sous AB, BH est égal au carré de AH ; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION XII.

THÉORÈME.

Dans les triangles obtusangles le carré du côté opposé à l'angle obtus est égal aux carrés des deux côtés qui comprennent l'angle obtus, et au double du rectangle compris sous le coté de l'angle obtus qui est prolongé jusqu'à la perpendiculaire abaissée du sommet de l'angle opposé et sous la droite interceptée entre la

perpendiculaire et le sommet de l'angle obtus.



Soit ABC (fig. 58) un triangle obtusangle dont l'angle BAC est obtus; du point B conduisez une perpendiculaire BD sur le côté prolongé CA : je dis que le carré de BC est égal aux carrés de BA, AC, et au double du rectangle compris sous les droites CA, AD.

Puisque la droite CD est coupée d'une manière quelconque au point A, le carré de CD sera égal aux carrés de CA, AD, et au double du rectangle compris sous les droites CA, AD (prop. 4. II) : donc si on ajoute à ces quantités égales le carré de DB, les carrés de CD, DB seront égaux aux carrés de CA, AD, DB, et au double du rectangle compris sous les droites CA, AD ; mais le carré de CB est égal aux carrés de CD, DB (prop. 47. I), car l'angle CDB est droit, et le carré de AB est égal aux carrés de AD, DB : donc le carré de CB est égal aux carrés de CA, AB, et au double du rectangle compris sous les droites CA, AD.

Donc dans les triangles obtus angles le carré du côté opposé à l'angle obtus est égal aux carrés des deux côtés qui comprennent l'angle obtus et au double du rectangle compris sous le côté de l'angle obtus qui est prolongé jusqu'à la perpendiculaire abaissée du sommet de l'angle opposé et sous la droite interceptée entre la perpendiculaire et le sommet de l'angle obtus ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XIII.

THÉORÈME.

Dans les triangles acutangles, le carré d'un côté opposé à un angle aigu est égal aux carrés des côtés qui comprennent cet angle aigu moins le double du rectangle compris sous le côté de l'angle aigu sur lequel tombe la perpendiculaire abaissée du sommet de l'angle opposé, et sous la droite interceptée entre cet angle aigu.



Soit le triangle acutangle ABC (fig. 59) dont l'angle B est aigu du point A conduisez sur la droite BC la perpendiculaire AD : je dis que le carré de AC égale les carrés de CB, BA moins le double du rectangle compris sous les droites CB, BD.

Puisque la droite CB est coupée; d'une manière quelconque au point D, les carrés de CB, BD seront égaux au double du rectangle compris sous les droites CB, BD, et au carré de DC (prop. 7. II) : donc si nous ajoutons à ces quantités égales le carré de AD, les carrés de CB, BD, DA seront égaux au double du rectangle compris sous les droites CB, BD, et aux carrés de AD, DC ; mais le carré de AB est égal aux carrés de BD, DA (prop. 47. I), car l'angle ADB est droit, et le carré de AC est égal aux carrés de AD, DC : donc les carrés de CB, BA sont égaux au carré de AC et au rectangle compris sous les droites CB, BD : donc le carré de AC égale

les carrés de CB, BA, moins le double du rectangle compris sous CB, BD.

Donc dans les triangles acutangles le carré d'un côté opposé à un angle aigu est égal au carré des deux autres côtés qui comprennent l'angle aigu moins le double du rectangle compris sous le côté de l'angle aigu, sur lequel tombe la perpendiculaire abaissée du sommet de l'angle opposé et sous la droite, interceptée entre la perpendiculaire et cet angle aigu.[2]

PROPOSITION XIV.

PROBLÈME.

Construire un carré égal à une figure rectiligne donnée.



Soit A (fig. 60) la figure rectiligne donnée : il faut construire un carré qui soit égal à cette figure.

Construisez un rectangle BD égal à la figure rectiligne donnée A (prop. 45. I). Si le côté BE était égal au côté ED, on aurait déjà fait ce qu'on proposait, car le carré BD aurait été construit égal à la figure rectiligne A. Si, au contraire, l'un des côtés BE, ED est plus grand que l'autre, et si le côté BE est le plus grand, prolongez-le vers F, et faites, EF égal à ED (prop. 3. I); ayant ensuite partagé la droite FB en deux parties égales au point G, du point G

et avec un intervalle égal à l'une ou à l'autre des droites GB, GF, décrivez la demi-circonférence BHF (dem. 3), prolongez DE jusqu'en H, et menez la droite GH.

Puisque la droite BF est partagée en deux parties égales au point G et en deux parties inégales au point E, le rectangle compris sous les droites BE, EF et le carré de EG, seront égaux au carré de GF (prop. 5. II) ; mais la droite GF est égale à la droite GH : donc le rectangle compris sous les droites BE, EF et le carré de EG seront égaux au carré de GH ; mais les carrés de HE, GE sont égaux au carré de GH (prop. 47. I) : donc le rectangle compris sous les droites BE, EF et le carré de GE, pris ensemble, sont égaux aux carrés de HE, GE : donc, si nous retranchons le carré commun de GE, le rectangle compris sous les droites BE, EF sera égal au carré de EH ; mais le rectangle compris sous les droites BE, EF, est le parallélogramme BD, puisque la droite EF est égale à la droite ED : donc le parallélogramme BD est égal au carré de HE; or le parallélogramme BD est égal, par construction, a la figure rectiligne A : donc la figure rectiligne A est égale au carré construit sur la droite EH.

Donc, le carré construit sur la droite EH est égal à la figure rectiligne donnée A ; ce qu'il fallait faire.

FIN DU SECOND LIVRE.

[1] Le premier nombre indique la proportion, et le second indique le livre.

[2] Cette proposition est encore vraie, lors même que l'angle A est droit ou obtus.

RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE

ALLER À LA TABLE DES MATIÈRES D'EUCLIDE

EUCLIDE

Éléments de Géométrie

LIVRE III

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

INTRODUCTION -GEOMETRIE LIVRE I - LIVRE II - LIVRE IV - LIVRE VI

Euclide le Géomètre

LES ÉLÉMENTS

DE

GÉOMÉTRIE

D'EUCLIDE,

traduits littéralement, et suivis d'un Traité du Cercle,

du Cylindre, du Cône et de la Sphère;

de la mesure des Surfaces et des Solides ; avec des Notes ;

Par F. PEYRARD,

Bibliothécaire

de l'École Polytechnique.

OUVRAGE APPROUVÉ PAR L'INSTITUT NATIONAL.

Et nova sunt semper. —

OVIDE,...

A PARIS,

CHEZ F. LOUIS, LIBRAIRE,
RUE DE SAVOIE, N° 12.

AN XII - l804.

EUCLIDE

ELEMENTS DE GEOMETRIE

LIVRE III.

DÉFINITIONS.

1. Les cercles égaux sont ceux dont les diamètres sont égaux, ou ceux dont les droites menées des centres aux circonférences sont égales.

2. Une droite qui touchant le cercle et qui étant prolongée ne le coupe point, est appelée *tangente du cercle.*

3. Les cercles qui se touchant ne se coupent point, sont appelés *cercles tangents.*

4. Dans le cercle on dit que les droites sont également éloignées du centre, lorsque les perpendiculaires menées du centre sur ces droites sont égales.

5. On dit qu'une droite est plus éloignée du centre lorsque la perpendiculaire qui tombe sur elle est plus grande.

6. Un segment de cercle est une figure qui est comprise entre une droite et la circonférence du cercle.

7. L'angle du segment est celui qui est compris par une droite et la circonférence du cercle.

8. Un angle est dans le segment lorsque l'on prend un point quelconque dans la circonférence du segment, et que l'on conduit de ce point deux lignes droites aux extrémités de la droite qui est la base du segment ; l'angle est compris par les deux lignes droites qui ont été menées d'un point de la circonférence.

9. Mais lorsque les droites qui comprennent l'angle embrassent une portion de la circonférence, cet angle est dit appuyé sur la circonférence.

10. Un secteur de cercle est une figure comprise entre deux rayons qui font un angle au centre et la portion de la circonférence qu'embrassent ces deux rayons.

11. Les segments des cercles sont semblables lorsqu'ils reçoivent des angles égaux ou lorsque les angles qu'ils contiennent sont égaux entre eux.[1]

PROPOSITION PREMIÈRE.

PROBLÈME.

Trouver le centre d'un cercle donné.

Soit ABC (fig. 61) le cercle donné : il faut trouver le centre du cercle ABC.



Conduisez dans le cercle une droite quelconque AB, partagez-la en deux parties égales au point D (prop. 10. I) ; du point D élevez une perpendiculaire DC sur AB (prop. 11. I), prolongez la droite DC jusqu'en E, et partagez CE en deux parties égales au point F : je dis que le point F est le centre du cercle ABC.

Car supposons que le point F ne le soit pas, et que ce soit le point G, si cela est possible. Conduisez les droites GA, GD, GB. Puisque la droite AD est égale à la droite DB et que la droite DG est commune, les deux droites AD, DG seront égales aux deux droites DB, DG, chacune à chacune ; mais la base GA est égale à la base GB, puisque ce sont deux droites menées du centre à la circonférence (déf. 15. I) : donc l'angle ADG est égal à l'angle GDB (prop. 8. I); mais lorsqu'une droite tombant sur une autre droite fait avec elle les angles de suite égaux, chacun de ces angles égaux est droit (déf.10. I) : donc l'angle GDB est droit; mais l'angle FDB est droit aussi : donc l'angle FDB est égal à l'angle GDB; c'est-à-dire que le plus grand est égal au plus petit, ce qui est impossible : donc le point G n'est pas le centre du cercle ABC. On démontrera de la même manière que tout autre point, excepté le point F, n'est pas le centre du cercle.

Donc le point F est le centre du cercle.

COROLLAIRE.

De là il suit évidemment que si dans un cercle une droite en coupe une autre en deux parties égales en faisant avec elle

deux angles droits, le centre du cercle est placé dans la droite sécante.

PROPOSITION II.

THÉORÈME.

Si l'on prend deux points quelconques dans la circonférence d'un cercle, la droite qui joint ces deux points tombera dans le cercle.

Soit le cercle ABC (fig. 62) ; qu'on prenne deux points quelconques A, B, dans la circonférence de ce cercle : je dis que la droite qui est menée du point A au point B, tombe dans le cercle.



Si cette droite ne tombe pas dans le cercle, supposons, s'il est possible, qu'elle tombe en dehors, en AEB par exemple ; cherchez le centre du cercle ABC (prop. 1. III), supposons que D soit ce centre ; menez les rayons AD, DB, et prolongez DF jusqu'en E.

Puisque la droite DA est égale à la droite DB, l'angle DAE sera égal à l'angle DBE (prop. 5. I) ; et puisque l'on a prolongé un côté AEB du triangle DAE, l'angle DEB sera plus grand que l'angle DAE (prop. 16. I) ; mais l'angle DAE est égal à l'angle DBE : donc l'angle DEB est plus grand que l'angle DBE ; mais le plus grand côté est opposé à un plus grand angle (prop. 18. I) : donc la droite DB est plus grande que la droite DE ; mais la droite DF est égale à la droite DB : donc la droite DF est plus grande que la droite DE ; c'est-à-dire que la plus petite surpasse la plus grande, ce qui est impossible : donc la droite menée du point A au point B ne tombe pas hors du cercle. Nous démontrerons de la même manière qu'elle ne tombe

pas dans la circonférence : donc elle tombe en-dedans du cercle. Donc si l'on prend deux points quelconques de la circonférence, la droite qui joint ces deux points tombe en-dedans du cercle; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION III.

THÉORÈME.

Si dans un cercle une droite qui passe par le centre coupe en deux parties égales une droite qui ne passe pas par le centre, la première droite coupera la seconde à angles droits ; et si la première coupe la seconde à angles droits, elle la coupera en deux parties égales.

Soit le cercle ABC (fig. 63) ; supposons que la droite CD menée dans le cercle par le centre coupe la droite AB, qui ne passe pas par le centre, en deux parties égales au point F : je dis que la première droite coupe la seconde à angles droits.



Cherchez le centre du cercle ABC (prop. 1. III); supposons que son centre soit le point E, conduisez les droites EA, EB.

Puisque la droite AF est égale à la droite FB et que la droite FE est commune, les deux droites AF, FE sont égales aux deux droites FB, FE ; mais la hase EA est égale à la hase EB : donc l'angle AFE sera égal à l'angle BFE (prop. 8. I); mais lorsqu'une droite tombant sur une autre droite, fait les angles de suite égaux entre eux, chacun de ces angles est droit : donc chacun des angles AFE, BFE est droit: donc la droite CD, menée par le centre et coupant en deux parties égales la droite AB qui ne passe pas par le centre, coupe la droite AB à angles droits.

Si la droite CD coupe la droite AB à angles droits, je dis qu'elle la coupe aussi en deux parties égales, c'est-à-dire que la droite AF est égale à la droite FB.

Faites la même construction ; puisque la droite EA est égale à la droite EB, l'angle EAF sera égal à l'angle EBF (prop. 5. I) ; mais l'angle droit AFE est égal à l'angle droit BFE : donc les deux triangles EAF, EBF auront deux angles égaux à deux angles, chacun à chacun, et un coté égal à un côté, c'est-à-dire un côté commun qui est opposé à des angles égaux : donc ces deux triangles auront les autres côtés égaux aux autres côtés (prop. 26. I) : donc la droite AF est égale à la droite BF.

Donc si dans un cercle une droite qui passe par le centre coupe en deux parties égales une autre droite qui ne passe pas par le centre, la première coupera la seconde à angles droits ; et si la première coupe la seconde à angles droits, elle la coupera en deux parties égales ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION IV.

THÉORÈME.

Si dans un cercle deux droites qui ne passent point par le centre se coupent, elles ne se couperont point en deux parties égales.

Soit le cercle ABCD (fig. 64), et supposons que les deux droites AC, BD, qui ne sont point conduites par le centre, se coupent mutuellement au point E : je dis qu'elles ne se coupent point en deux parties égales.



Supposons, s'il est possible, qu'elles se coupent en deux parties égales, de manière que AE soit égal à EC et BE égal à

ED : prenez le centre du cercle ABCD, et supposons que son centre soit le point F ; menez FE.

Puisque la droite FE conduite par le centre, coupe en deux parties égales la droite AC qui n'est point conduite par le centre, la première coupera la seconde à angles droits (prop. 3. III): donc l'angle FEA est droit. De plus, puisque la droite FE coupe en deux parties égales la droite BD qui n'est pas conduite par le centre, la première coupera la seconde à angles droits, donc l'angle FEB est droit. Mais on a démontré que l'angle FEA est droit aussi : donc l'angle FEA est égal à l'angle FEB; c'est-à-dire que le plus petit est égal au plus grand, ce qui est impossible: donc les droites AC, BD ne se coupent point en deux parties égales.

Donc si dans un cercle deux droites qui ne sont point conduites par le centre se coupent mutuellement, elles ne se couperont point en deux parties égales ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION V.

THÉORÈME.

Si deux cercles se coupent mutuellement, ils n'auront pas le même centre.

Que les deux cercles ABC, CDG (fig. 65) se coupent mutuellement aux deux points B, G : je dis qu'ils n'auront pas le même centre.



65

Supposons, s'il est possible, qu'ils aient le même centre et que ce centre soit le point E ; après avoir conduit la droite E C, conduisez la droite EFG d'une manière quelconque.

Puisque le point E est le centre du cercle ABC, la droite EC sera égale à la droite EF (déf. 15. I). De plus, puisque le

point E est le centre du cercle CDG, la droite EC sera égale à la droite EG. Mais on a démontré que la droite EC est égale à la droite EF : donc la droite EF est égale à la droite EG, c'est-à-dire que la plus petite est égale à la plus grande, ce qui est impossible. Donc le point E n'est pas le centre des cercles ABC, CDG.

Donc si deux cercles se coupent mutuellement, ils n'auront pas le même centre ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION VI.

THÉORÈME.

Si deux cercles se touchent intérieurement, ils n'auront pas le même centre.

Que les deux cercles ABC, CDE (fig. 66) se touchent intérieurement au point C : je dis qu'ils n'auront pas le même centre.



Supposons que cela se puisse et que leur centre soit le point F ; après avoir conduit la droite FC, conduisez d'une manière quelconque la droite FEB.

Puisque le point F est le centre du cercle ABC, la droite FC est égale à la droite FB. De plus, puisque le point F est le centre du cercle CDE, la droite FC est égale à la droite FE. Mais on a démontré que la droite FC est égale à la droite FB : donc la droite FE est égale à la droite FB; c'est-à-dire que la plus petite est égale à la plus grande, ce qui est impossible : donc le point F n'est point le centre des cercles ABC, CDE. Donc si deux cercles se touchent intérieurement, ils n'auront pas le même centre ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION VII.

THÉORÈME.

Si dans le diamètre d'un cercle on prend un point quelconque qui ne soit pas. le centre de ce cercle, et si de ce point on conduit des droites à la circonférence, la plus grande sera celle qui passera par le centre, et la plus petite sera le reste du diamètre; quant aux autres droites, celle qui sera plus proche de celle qui passe par le centre sera plus grande que celle qui en est plus éloignée; et enfin du même point on ne peut conduire de part et d'autre de la plus petite que deux droites qui soient égales.

Soit le cercle ABCD (fig. 67), que AD soit son diamètre, prenez un point quelconque F qui ne soit pas le centre de ce cercle, que. le centre du cercle soit le point E ; du point F conduisez à la circonférence ABCD les droites FB, FC, FG : je dis que la droite FA est la plus grande, que la droite FD est la plus petite, et que parmi les autres la droite FB est plus grande que la droite FC, et que la droite FC est plus grande que la droite FG.

Conduisez les droites BE, CE, GE.



Puisque deux côtés d'un triangle sont plus grands que le côté restant (prop. 21. I), les droites EB, EF seront plus grandes que la droite BF; mais la droite AE est égale à la droite BE : donc les droites BE, EF sont égales à la droite AF : donc la droite AF est plus grande que la droite BF. De plus, puisque la droite BE est égale à la droite CE et que la droite EF est commune, les deux droites BE, EF sont égales aux

deux droites CE, EF; mais l'angle BEF est plus grand que l'angle CEF : donc la base BF est plus grande que la base CF (prop. 24. I) ; par la même raison la base CF plus grande que la base FG.

De plus, puisque les droites GF, FE sont plus grandes que la droite EG et que la droite EG est égale à la droite ED, les droites GF, FE seront plus grandes que la droite ED : donc si on retranche la droite commune EF, la droite restante GF sera plus grande que la droite restante FD : donc la droite FA est la plus grande, et la droite FD la plus petite : donc la droite FB est plus grande que la droite FC, et la droite FG plus grande que la droite FG.

Je dis aussi que du point F, on ne peut conduire à la circonférence ABCD, de part et d'autre de la pins petite FD, que deux droites égales ; car sur la droite EF et au; point donné E pris; sur cette droite construisez l'angle FEH égal à l'angle GEF (prop. 23. I), et conduisez la droite FH. Puisque la droite GE est égale à la droite EH et que la droite EF est commune *y.* les deux droites GE, EF sont égales aux deux, droites HE, EF; mais l'angle GEF est égal à l'angle HEF par construction : donc la base FG sera égale à la base FH (prop. 4. I) : je dis que du point F on ne peut conduire une autre droite égale à FG. (Dar supposons que cela se, puisse, et que ce soit la droite FK ; puisque la droite FK est égale à FG, et que FH est aussi égale à FG, la droite FH sera égale à la droite FK, c'est-à-dire que la droite qui est plus près de celle qui passe par le centre est égale à celle qui en est plus éloignée ; ce qui ne peut être.

AUTREMENT.

Conduisez la droite EK; puisque la droite GE est égale à la droite EK, que la droite FE est commune, et que la base GF est égale à la Base FK, l'angle GEF sera égal à l'angle KEF (prop. 8. I) ; mais l'angle GEF est aussi égal à l'angle HEF : donc l'angle HEF sera égal à l'angle KEF, c'est-à-dire que le plus petit est égal au plus grand ; ce qui est impossible : donc par le point F on ne peut pas conduire à la circonférence une autre droite qui soit égale à GF : donc on n'en peut conduire qu'une seule.

Donc si dans le diamètre d'un cercle on prend un point quelconque qui ne soit pas le centre de ce cercle, et si de ce point on conduit des droites à la circonférence, la plus grande sera celle qui passe par le centre, et la plus petite sera le reste du diamètre ; quant aux autres droites, celle qui sera plus proche de celle qui passe par le centre sera plus grande que celle qui en est plus éloignée ; et enfin du même point on

ne peut conduire de part et d'autre de la plus petite que deux droites qui soient égales ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION VIII.

THÉORÈME.

Si l'on prend un point quelconque hors d'un cercle, et si de ce point on conduit à ce cercle plusieurs droites dont l'une passe par le centre et dont les autres passent partout où l'on voudra; parmi tes droites qui vont à la circonférence concave y la plus grande est celle qui passe par le centre; celle qui est plus près de celle qui passe par le centre est plus grande que celle qui s'en éloigne davantage; mais parmi les droites qui vont à la circonférence convexe, la plus petite est celle qui est comprise entre le point pris hors du cercle et le diamètre ; et celle qui est plus près de la plus petite est plus courte que celle qui s'en éloigne davantage; enfin de ce point on ne peut, mener à la circonférence et de part et d'autre de la plus petite que deux droites qui soient égales.

Soit le cercle ABC (fig. 68), et hors de ce cercle soit pris un point quelconque D ; de ce point menez à ce cercle les droites DA, DE, DF, DC, et supposons que DA passe par le centre: je dis que de toutes les droites qui vont à la circonférence concave AEFC, la droite DA, qui passe par le centre, est la plus grande, et que celle qui est plus près de celle qui passe par le centre est plus grande que celle qui s'en éloigne davantage, c'est-à-dire que la droite DE est plus grande que la droite DF, et la droite DF plus grande que la droite DC ; mais parmi les droites qui vont à la circonférence convexe HLKG, celle qui est comprise entre le point D et le diamètre AG est la plus petite, et celle qui est plus près de la plus petite est toujours plus courte que celle qui s'en éloigné davantage ; c'est-à-dire que la droite DK est plus courte que la droite DL, et la droite DL plus courte que la droite DH.



Cherchez le centre du cercle ABC (prop. 1. III), supposons que M soit ce centre; conduisez les droites ME, MF, MC, MR, ML; MH.

Puisque la droite A M est égale à la droite EM, si nous leur ajoutons une droite commune MD, la droite AD sera égale aux droites EM, MD; mais les droites EM; MD sont plus grandes que la droite ED (prop. 20. I) : donc la droite AD est plus, grande que la droite ED. De plus, puisque la droite ME est égale à la droite MF, et que la droite MD est commune, les droites EM, MD seront égales aux droites MF, MD; mais l'angle EMD est plus grand que l'angle FMD : donc la base ED sera plus grande que la base FD (prop. 24 I.) Nous démontrerons de la même manière que la droite FD est plus grande que la droite CD : donc la droite DA est la plus grande, la droite DE est plus grande que la droite DF, et la droite DF plus grande que la droite CD.

De plus, puisque les droites MK, KD sont plus grandes que la droite MD (prop. 20. I), et que la droite M G est égale à la droite MK, la droite restante KD sera plus grande que la droite restante GD : donc la droite GD est plus petite que la droite KD : donc elle est la plus petite. Si des extrémités du côté MD du triangle MLD on conduit intérieurement les droites MK, KD, les droites MK, KD seront plus petites que les droites ML, LD (prop. 21. I) ; mais la droite MK est égale à la droite ML : donc la droite restante DK est plus petite que la droite restante DL. Nous démontrerons de la même manière que la droite DL est plus petite que la droite DH : donc la droite DG est la plus petite, et la droite DK est plus petite que la droite DL, et la droite DL plus petite que la droite DH.

Je dis encore que du point D on ne peut conduire au cercle, de part et d'autre de la plus petite, que deux droites égales. Construisez sur la droite MD, et au point donné M, un angle DMB égal à l'angle KMD, et conduisez DB, Puisque la droite MK est égale à la droite MB et que la droite MD est commune, les deux droites KM, MD sont égales aux deux droites BM, MD, chacune à chacune; mais l'angle KMD est égal à l'angle BMD : donc la base DK est égale à la base DB (prop. 4. I) : je dis qu'il est impossible de conduire du point D au cercle ABC une autre droite qui soit égale à la droite DK. Supposons que cela se puisse et que cette droite soit DN ; puisque la droite DK est égale à la droite DN et la droite DB égale aussi à la droite D K, la droite DB sera égale à la droite DN, c'est-à-dire que la droite qui est plus près de la plus petite est égale à la droite qui s'en éloigne davantage; ce qui a été démontré impossible.

AUTREMENT.

Conduisez la droite MN; puisque la droite KM est égale à la droite MN, que la droite MD est commune et que la base DK est égale à la base DN, l'angle KMD sera égal à l'angle DMN (prop. 8. I); mais l'angle KMD est égal à l'angle BMD : donc l'angle BMD est égal à l'angle NMD, c'est-à-dire que le plus petit est égal au plus grand, ce qui est impossible : donc il est impossible de conduire du point D au cercle ABC, et de part et d'autre de la plus petite droite GD, plus de deux droites égales.

Donc si l'on prend un point quelconque hors d'un cercle, et si de ce point on conduit à ce cercle plusieurs droites dont l'une passe par le centre et dont les autres passent partout où l'on voudra ; parmi les droites qui vont à la circonférence concave, la plus grande est celle qui passe par le centre ; celle qui est plus près de celle qui passe par le centre est plus grande que celle qui s'en éloigne davantage ; mais parmi les droites qui vont à la circonférence convexe, la plus petite est celle qui est comprise entre le point pris hors du cercle et le diamètre ; et celle qui est plus près de la plus petite est plus courte que celle qui s'en éloigne davantage ; enfin de ce point on ne peut mener à la circonférence, et de part et d'autre de la plus petite, que deux droites qui soient égales ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION IX.

THÉORÈME.

Si dans un cercle l'on prend un point quelconque, et si parmi les droites menées de ce point à la circonférence il y en a plus de deux qui soient égales entre elles, ce point sera le centre du cercle.

Soit le cercle ABC (fig. 69), que dans ce cercle l'on prenne le point D et qu'il y ait plus de deux droites égales entre elles qui aillent, de ce point à la circonférence, c'est-à-dire les droites DA, DB, DC: je dis que le point D est le centre du cercle ABC.

Conduisez les droites AB, BC, et partagez-les en deux parties égales aux points E, F (prop. 10. I), conduisez les droites ED, DF, que vous prolongerez vers les points G, K, H, L.



Puisque la droite AE est égale à la droite EB, et que la droite ED est commune, les deux droites AE, ED seront égales aux deux droites BE, ED ; mais la base DA est égale à la base DB : donc l'angle AED est égal à l’angle BED (prop. 8. I), et par conséquent chacun des angles AED, BED est droit : donc la droite GR, qui coupe la droite AB en deux parties égales, la coupe aussi à angles droits ; mais lorsque dans un cercle une droite coupe une autre droite en deux parties égales et à angles droits, le centre du cercle est placé dans la droite sécante (cor. 1. III) : donc le centre du cercle ABC sera dans

la droite GK ; par la même raison le centre du cercle ABC sera placé dans la droite HL ; mais les droites GK, HL n'ont qu'un seul point commun qui est le point D : donc le point D est le centre du cercle ABC.

Donc si dans un cercle on prend un point quelconque, et si parmi les droites menées de ce point à la circonférence il y en a plus de deux qui soient égales entre elles, ce point sera le centre du cercle.

AUTREMENT.

Dans le cercle ABC (fig. 70) soit pris un point quelconque D, et que parmi les droites menées du point D à la circonférence ABC il y en ait plus de deux qui soient égales entre elles, c'est-à-dire les droites DA, DB, DC : je dis que le point D est le centre du cercle ABC.

Supposons, s'il est possible, que le point D ne soit pas le centre du cercle ABC, et supposons que le centre de ce cercle soit le point E, conduisez la-droite DE et prolongez-la vers F, G.



La droite FG sera un diamètre du cercle ABC. Si l'on prend dans le diamètre FG du cercle ABC un point D qui ne soit pas le centre de ce cercle, la droite DG sera la plus grande de toutes, et la droite DC sera plus grande que la droite DB, et la droite DB plus grande que la droite DA (prop. 7. III) ; mais ces droites sont égales, ce qui ne peut être : donc le point E n'est pas le centre du cercle ABC. Nous démontrerons de la même manière qu'il n'y a pas d'autre point, excepté le point D, qui soit le centre du cercle ADC : donc le point D est le centre du cercle ABC.

PROPOSITION X.

THÉORÈME.

Une circonférence de cercle ne peut couper la circonférence d'un autre cercle qu'en deux points.

Supposons que cela puisse arriver, et que la circonférence du cercle ABC (fig. 71) coupe la circonférence du cercle DEF en plus de deux points : savoir, aux points B, G, H; conduisez les droites BG, BH, et partagez-les en deux parties égales aux points K, L; par les points K, L, conduisez les droites KC, LM perpendiculaires sur BG, BH, et prolongez-les vers les points A, E.



Puisque dans le cercle ABC, la droite AC coupe la droite BH en deux parties égales et à angles droits, le centre du cercle ABC sera placé dans la droite AC (corol. 1. III). De plus, puisque dans le même cercle ABC la-droite NO coupe la droite BG en deux parties égales et à angles droits le centre du cercle ABC sera placé dans la droite NO. On à démontré que le centre est placé dans la droite AC, et les deux droites AC, MO ne se rencontrent qu'au seul point O : donc le point O est le centre du cercle ABC. Nous démontrerons de la même manière que le point O est le centre du cercle DEF : donc les deux cercles ABC, DEF, qui se coupent mutuellement, auront le même centre O; ce qui est impossible (prop. 5. III).

Donc la circonférence d'un cercle ne peut pas couper la circonférence d'un autre cercle en plus de deux points ; ce qu'il fallait démontrer.

AUTREMENT.

Car que la circonférence du cercle ABC (fig. 72) coupe la circonférence du cercle DEF en plus de deux points, savoir, aux points B, G, F ; prenez le centre du cercle ABC, et que son centre soit le point K; menez les droites KF, KG, KB.



Puisque dans le cercle DEF on a pris un point K, et que parmi les droites qui vont de ce point à la circonférence DEF il y en a plus de deux qui sont égales entre elles, savoir, les droites KB, KF, KG, le point K sera le centre du cercle DEF (prop. 9. III); mais le point K est le centre du cercle ABC : donc ces deux circonférences, qui se coupent, auront le même centre ; ce qui est impossible (prop. 5. III).

Donc une circonférence de cercle ne peut pas couper la circonférence d'un autre cercle en plus de deux points ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XI.

THÉORÈME.

Si deux circonférences de cercle se touchent intérieurement, et si on prend leurs centres, la droite qui joindra leurs centres ira au point de contact si elle est prolongée.

Que les deux cercles ABC, ADE (fig. 73) se touchent intérieurement au point A ; qu'on prenne leurs centres, que le point F soit le centre du cercle ABC, et que le point G soit le centre du cercle ADE : je dis que la droite menée du point G au point F ira au point de contact A, si elle est prolongée.



Supposons, s'il est possible, que cette droite étant prolongée n'aille pas au point de contact et qu'elle ait la position FGDH; menez les droites AF, AG.

Puisque les droites AG, GF sont plus grandes que la droite FA (prop. 20. I), c'est-à-dire que la droite FH, car la droite FA est égale à la droite FB, puisqu'elles partent du même centré: donc si on ôte la droite commune FG, la droite AG sera plus grande que la droite GH ; mais la droite AG est égale à la droite GD : donc la droite GD est plus grande que la droite GH ; c'est-à-dire que la plus petite surpasse la plus grande ; ce qui est impossible : donc la droite menée du point F au point G ne peut pas passer autre part qu'au point de contact A : donc elle passe au point de contact.

Donc si deux cercles se touchent intérieurement, la droite qui joint leurs centres passera par le point de contact, si elle est prolongée ; ce qu'il fallait démontrer.

AUTREMENT.

Supposons que la droite menée du point G au point F ait la position GFC et qu'elle soit prolongée directement vers le point H, menez les droites AG, AF.

Puisque les droites AG, GF sont plus grandes que la droite AF, et que la droite AF est égale à la droite CF, ou bien à la droite FH, si l'on retranche la droite commune FG, la droite restante AG sera plus grande que la droite restante GH, mais AG est égal à GD : donc la droite GD est plus grande que la droite GH, c'est-à-dire que la plus petite surpasse la plus grande; ce qui est impossible. Si le centre du grand cercle est hors du petit cercle, nous démontrerons de même qu'il s'en suit une absurdité.

PROPOSITION XII.

THÉORÈME.

Si deux circonférences de cercle se touchent extérieurement, la droite qui joindra les deux centres passera par le point de contact.

Que les circonférences des deux cercles ABC, ADE (fig. 74) se touchent extérieurement au point A ; qu'on prenne leurs centres, que le centre du cercle ABC soit le point F, et que le centre du cercle ADE soit le point G : je dis que la droite qui est conduite du point F au point G passe par le point de contact.



Supposons, s'il est possible, que le contraire arrive, et que cette droite ait la position FCDG ; conduisez les droites AF, AG.

Puisque le point F est le centre du cercle ABC, la droite FA sera égale à la droite FC. De plus, puisque le point G est le centre du cercle ADE, la droite AG sera égale à la droite GD ; mais on a démontré que la droite FA est égale à la droite FC : donc les droites FA, AG sont égales aux droites FC, DG : donc la droite totale FG est plus grande que les droites FA, AG; mais, au contraire, elle est plus petite (prop. 20. I), ce qui est impossible : donc la droite menée du point F au point G ne peut pas passer autre part qu'au point de contact : donc il faut nécessairement qu'elle passe au point de contact.

Donc si deux circonférences de cercles se touchent extérieurement, la droite qui joindra leurs centres passera par le point de contact, ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XIII.

THÉORÈME.

Une circonférence de cercle ne peut pas toucher une autre circonférence de cercle en plus d'un point, soit qu'elle la touche intérieurement, soit qu'elle la touche extérieurement.

Car si cela est possible, supposons d'abord que la circonférence du cercle ABDC (fig. 75) touche intérieurement la circonférence du cercle EBFD en plusieurs points, savoir aux points B, D.



Cherchez les centres des cercles ABDC, EBFD ; que le point G soit le centre du premier et le point H le centre du second.

La droite qui est conduite du point G au point H passera par les points B, D (prop. 11. III). Qu'elle ait la position BGHD ; puisque le point G est le centre du cercle ABDC, la droite BG est égale à la droite GD : donc la droite BG est plus grande que la droite HD, et la droite BH beaucoup plus grande que la droite HD. De plus, puisque le point H est le centre du cercle EBFD, la droite BH est égale à la droite HD; mais on a démontré qu'elle est beaucoup plus grande, ce qui est impossible : donc une circonférence de cercle ne touche point intérieurement une autre circonférence de cercle en plus d'un point.

Je dis encore qu'il est impossible qu'une circonférence de cercle touche extérieurement une autre circonférence de cercle en plus d'un point ; car si cela était possible, il faudrait que la circonférence du cercle ACK touchât extérieurement la circonférence du cercle ABDC en plus d'un point, aux points A, C, par exemple ; conduisez la droite AG.

Puisque dans la circonférence des cercles ABDC, ACK on a pris deux points quelconques A, C, la droite qui joint ces deux

points tombera intérieurement dans l'une et l'autre des deux circonférences (prop. 2. III); mais la droite qui tombe dans le cercle ABDC tombera hors du cercle ACK (déf. 3. III), ce qui est absurde : donc une circonférence de cercle ne touche point extérieurement une autre circonférence de cercle en plus d'un point. On a démontré qu'une circonférence ne touche point intérieurement une autre circonférence en plus de deux points.

Donc une circonférence de cercle ne touche point une autre circonférence de cercle en plus d'un point, soit qu'elle la touche intérieurement, soit qu'elle la touche extérieurement; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XIV.

THÉORÈME.

Dans un cercle les droites égales sont également éloignées du centre, et celles qui sont également éloignées du centre sont égales.

Soit le cercle ABDC (fig. 76) et que les droites AB, CD, prises dans sa circonférence, soient égales : je dis que ces deux droites sont également éloignées du centre.



Cherchez le centre du cercle ABDC, et que ce centre soit le point E ; de ce point conduisez les droites EF, E G perpendiculaires sur les droites AB, CD, et menez les droites AE, EC.

Puisque la droite EF, menée par le centre, coupe à angles droits la droite AB, qui n'est pas menée par le centre, elle la coupe en deux parties égales (prop. 3. III) : donc la droite AF est égale à la droite FB, et par conséquent la droite AB est double de la droite AF. Par la même raison la droite CD est double de la droite CG; mais la droite AB est égale à la droite CD : donc la droite AF est égale à la droite CG : et puisque la

droite AE est égale à la droite EC, le carré de la droite AE est égal au carré de la droite EC ; mais les carrés des droites AF, FE sont égaux au carré de la droite AE (prop. 47. I) car l'angle AFE est droit; et les carrés des droites EG, GC sont égaux au carré de la droite EC, puisque l'angle CGE est droit : donc les carrés des droites AF, FE sont égaux aux carrés des droites CG, GE; mais le carré de la droite AF est égal au carré de la droite CG, puisque la droite AF est égale à la droite CG : donc le carré restant de la droite FE est égal au carré restant de la droite EG : donc la droite FE est égale à la droite EG ; mais dans un cercle les droites sont dites également éloignées du centre lorsque les perpendiculaires menées du centre sur ces lignes sont égales (déf. 4. III) : donc les droites AB, CD sont également éloignées du centre.

Supposons actuellement que les droites AB, CD soient également éloignées du centre ; c'est-à-dire, supposons que la droite FE soit égale à la droite EG : je dis que la droite AB est égale à la droite CD.

Avec les mêmes constructions nous démontrerons également que la droite AB est double de la droite AF, et que la droite CD est double aussi de la droite CG. Puisque la droite AE est égale à la droite EC, le carré de la droite AE sera égal au carré de la droite EC ; mais les carrés des droites EF, FA sont égaux au carré de la droite de AE (prop. 47. I), et les carrés des droites EG, GC égaux au carré de la droite EC : donc les carrés des droites EF, FA sont égaux aux carrés des droites EG, GC ; mais le carré de la droite EG est égal au carré de la droite EF, car la droite EG est égale à la droite EF : donc le carré restant de la droite AF est égal au carré restant de la droite CG : donc la droite AF est égale à la droite CG ; mais la droite AB est double de la droite AF, et la droite CD double de la droite CG : donc la droite AB sera égale à la droite CD.

Donc dans une circonférence de cercle les droites égales sont également distantes du centre, et les droites également distantes du centre sont égales ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XV.

THÉORÈME.

Dans une circonférence de cercle le diamètre est la plus grande de toutes les droites, et la droite qui est plus près du centre est plus grande que celle qui en est plus éloignée.

Soit le cercle ABCD (fig. 77) dont le diamètre est la droite AD et dont le centre est le point E ; que la droite BC soit plus près du centre E que la droite FG : je dis que la droite

AD est la plus grande de toutes, et que la droite BC est plus grande que la droite FG.

Conduisez du centre les droites EH, EK perpendiculaires sur BC, FG. Puisque la droite BC est plus près du centre que la droite FG, la droite EK sera plus grande que la droite EH (déf. 5. III); faites la droite EL égale à la droite EH, et par le point L conduisez la droite LM perpendiculaire sur EK, prolongez la droite LM vers le point N, et menez les droites EM, EN, EF, EG.



Puisque la droite EL est égale à la droite EH, la droite MN sera égale à la droite BC (prop. 14. III). De plus, puisque la droite AE est égale à la droite EM et la droite ED égale à la droite EN, la droite AD sera égale aux droites ME, EN; mais les droites ME, EN sont plus grandes que la droite MN : donc la droite AD est plus grande que la droite MN ; mais la droite MN est égale à la droite BC: donc la droite AD est plus grande que la droite BC; et puisque les deux droites ME, EN sont égales aux deux droites FE, EG, et que l'angle MEN est plus grand que l'angle FEG, la base MN sera plus grande que la base FG (prop. 24. I) Mais on a démontré que la droite MN est égale à la droite BC : donc la droite BC est plus grande que la droite FG : donc le diamètre AD est la plus grande de toutes les droites, et la droite BC est plus grande que la droite FG.

Donc dans une circonférence de cercle le diamètre est la plus grande de toutes les droites, et la droite qui est plus près du centre est plus grande que celle qui en est plus éloignée ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XVI.

THÉORÈME.

Une droite perpendiculaire sur le diamètre d'un cercle et menée par une de ses extrémités, tombe hors de ce cercle; il est impossible qu'il y ait une droite dans l'espace qui est compris entre cette perpendiculaire et la circonférence ; l'angle du demi-cercle est plus grand qu'aucun angle rectiligne aigu, et l'autre angle est plus petit qu'aucun angle rectiligne aigu.

Soit le cercle ABC (fig. 78) dont le point D est le centre et la droite AB le diamètre : je dis que la perpendiculaire sur la droite AB, menée par le point A, tombe hors du cercle.

Car si cela n'est point, supposons s'il est possible, qu'elle tombe en-dedans et qu'elle ait la position AC ; conduisez la droite DC.

Puisque la droite DA est égale à la droite DC, l'angle DAC sera égal à l'angle ACD (prop. 5. I) ; mais l'angle DAC est droit : donc l'angle ACD est droit aussi : donc les angles DAC, ACD sont égaux à deux angles droits, ce qui est impossible (prop. 17. I) : donc la perpendiculaire au diamètre AB, menée par le point A ne tombe point dans le cercle. Nous démontrerons de la même manière qu'elle ne tombe point sur la circonférence : donc il est nécessaire qu'elle tombe en dehors, et qu'elle ait la même position que la droite AE.

Je dis qu'il est impossible qu'il y ait une droite dans l'espace qui est compris entre la droite AE et la circonférence CHA.

Car si cela est possible, supposons qu'il y ait une droite qui ait la position FA ; du point D menez une droite DG perpendiculaire à FA.



Puisque l'angle AGD est droit et que l'angle DAG est plus petit qu'un angle droit, la droite AI sera plus grande que la droite DG; mais la droite DA est égale à la droite DH : donc la droite DH est plus grande que la droite AG, c'est-à-dire que la plus petite surpasse la plus grande, ce qui est impossible : donc il est impossible qu'il y ait une droite dans l'espace qui est compris entre cette perpendiculaire et la circonférence.

Je dis de plus, que l'angle du demi-cercle qui est compris par la droite BA et la circonférence CHA est plus grand qu'aucun angle rectiligne aigu, et que l'angle restant compris par la circonférence CHA et la droite AE est plus petit qu'aucun angle rectiligne aigu.

Car s'il y a un angle rectiligne plus grand que l'angle compris par la droite BA et par la circonférence CHA, pu s'il y a un angle rectiligne plus petit que l'angle compris par la circonférence CHA et par la droite AE, supposons que dans l'espace compris entre la circonférence CHA et la droite AE, il y ait une droite quelconque qui fasse un angle plus grand que celui qui est compris par la droite BA et la circonférence CHA, savoir, un angle compris par deux droites, et qu'il y ait un angle plus petit que celui qui est compris par la circonférence CHA et la droite AE ; mais il n'y en a point : donc il n'y a point d'angle aigu qui, étant compris par des droites, soit plus grand que l'angle compris par la droite BA et la circonférence CHA, ni d'angle plus petit que celui qui est compris par la circonférence CHA et la droite AE ; ce qu'il fallait démontrer.

COROLLAIRE.

Il suit manifestement de là que la droite perpendiculaire au diamètre, et menée d'une de ses extrémités, touche la circonférence, et que cette droite ne la touche qu'en un seul

point, parce que nous avons démontré que les droites que rencontre le cercle en deux points, entrent dans le cercle (prop. 2. III).

PROPOSITION XVII.

PROBLEME.

D'un point donné, conduire une droite qui touche la circonférence d'un cercle donné.

Soit A (fig. 79) un point donné quelconque et BCD le cercle donné, il faut conduire, du point À une droite qui touche la circonférence du cercle BCD.

Prenez le centre de ce cercle, conduisez la droite AE; du centre E et avec un intervalle EA, décrivez la circonférence AFG (dem. 3) ; par le point D conduisez une perpendiculaire DP sur la droite EA et menez les droites EBF, AB : je dis que la droite AB menée du point A, touche la circonférence du cercle BCD.



Puisque le point E est le centre des cercles BCD, AFG, la droite EA sera égale à la droite EF, et la droite ED égale à la droite EB : donc les deux droites AE, EB sont égales aux deux droites FE, ED; mais ces droites comprennent un angle commun qui est en E : donc la base DF est égale à la base AB, le triangle DEF au triangle EBA, et les autres angles de l'un de ces triangles sont égaux aux autres angles de l'autre triangle (prop. 4. I) donc l'angle EBA est égal à l'angle EDF ; mais l'angle EDF est droit : donc l'angle EBA est droit aussi. Mais la droite EB est un rayon et la perpendiculaire à une des extrémités d'un diamètre touche le cercle (prop. 16. III) : donc la droite AB touche le cercle.

Donc la droite AB, qui a été menée par le point A, touche le cercle BCD ; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION XVIII.

THÉORÈME.

Si une droite touche la circonférence d'un cercle i et si du centre on mène une droite au point de contact, cette dernière droite sera perpendiculaire sur la première.

Que la droite DE (fig. 80) touche au point C la circonférence du cercle ABC; prenez le centre F de ce cercle, et de ce centre conduisez la droite FG au point C : je dis que la droite FC est perpendiculaire sur la droite DE.



Car si elle ne l'est, pas, du point F conduisez la droite FC perpendiculaire sur la droite DE (prop. 12. I).

Puisque l'angle FGC est droit, l'angle GCF sera aigu (prop. 17. I); mais un plus grand angle est opposé à un plus grand côté (prop. 19. I): donc la droite FG est plus grande que la droite FG; or la droite FG est égale à la droite FB : donc la droite FB est plus grande que la droite FG ; c'est-à-dire que la plus petite surpasse la plus grande ; ce qui est impossible : donc la droite FG n'est pas perpendiculaire sur la droite DE. Nous démontrerons d'une manière semblable qu'il n'y a point d'autre droite, excepté FC, qui soit perpendiculaire sur la droite DE: donc la droite FC est perpendiculaire sur la droite DE.

Donc si une droite touche une circonférence de cercle, et si du centre on mène une droite au point de contact, cette dernière droite sera perpendiculaire sur la première; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XIX.

Si une droite touche le cercle, et si par le point de contact on lui mène une perpendiculaire, cette perpendiculaire passera par le centre.

Qu'une droite DE (fig. 81) touche le cercle ABC au point C ; par le point C conduisez une perpendiculaire sur la droite DE : je dis que la perpendiculaire AG passera par le centre. Car si cela n'est point, supposons, s'il est possible, que le centre soit le point F, et menons la droite CF.



Puisque la droite DE touche le cercle ABC et que la droite FC a été menée du centre au point de contact, la droite FC sera perpendiculaire sur la droite DE, (prop. 18. III) : donc l'angle FCE, est droit, mais l'angle ACE est droit aussi : donc l'angle FCE est égal à l'angle; ACE, c'est-à-dire que le plus petit est égal au plus grand, ce qui est impossible : donc le point F n'est pas le centre du cercle ABC. Nous de montrerons d'une manière semblable qu'il n'y a aucun autre point qui puisse être le centre du cercle, à moins qu'il ne soit placé dans la droite AC.

Donc si une droite touche un cercle, et si par le point de contact on lui mène une perpendiculaire, cette perpendiculaire passera par le centre ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XX.

THÉORÈME.

Dans le cercle, l'angle au centre est double de l'angle à la circonférence, quand ils ont pour base la même portion de la circonférence.

Soit le cercle ABC (fig. 82), que l'angle BEC soit au centre de ce cercle, que l'angle BAC soit à la circonférence, et que ces deux angles aient pour, basé la même portion de la circonférence BC : je dis que l'angle BEC est double de l'angle BAC.

Conduisez la droite AE et prolongez-la jusqu'en F.



Puisque la droite EA est égale à la droite EB, l'angle EAB sera égal à l'angle EBA (prop. 5. I) ; donc les angles EAB, EBA sont doubles de l'angle EAB ; mais l'angle BEF est égal aux angles EAB, EBA (prop. 32. I); donc l'angle BEF est double de l'angle EAB. L'angle FEC est double de l'angle FAC par la même raison; donc l'angle total BEC est double de l'angle total BAC.

Que l'angle BAC change de position et qu'il devienne BDC ; conduisez la droite DE et prolongez-la jusqu'en G. Nous démontrerons semblablement que l'angle GEC est double de l'angle GDG ; mais l'angle GEB est double de l'angle GDB : donc l'angle restant BEC est double de l'angle restant BDC.

Donc dans le cercle, l'angle au centre est double de l'angle à la circonférence, quand ils ont pour base la même portion de la circonférence ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXI.

THÉORÈME.

Les angles placés dans un même segment de cercle sont égaux entre eux.

Soit le cercle ABCD (fig. 83) et que les angles BAD, BED soient placés dans le même segment BAED : je dis que ces angles sont égaux entre eux.



Prenons le centre du cercle ABCD (prop. 1. III), et que ce centre soit le point F ; menez les droites BF, FD.

Puisque l'angle BFD est au centre, que l'angle BAD est à la circonférence, et que ces deux angles ont pour base la même portion de la circonférence, l'angle BFD sera double de l’angle BAD (prop. 20. III) ; l'angle BFD est double aussi de l'angle BED, par la même raison : donc l'angle BAD est égal à l’angle BED (ax. 7). Donc les angles, placés dans le même segment de cercle, sont égaux entre eux ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXII.

THÉORÈME.

Les angles opposés des quadrilatères inscrits dans des cercles sont égaux à deux droits.

Soit le cercle ABCD (fig. 84) et que le quadrilatère ABCD soit inscrit dans ce cercle : je dis que les angles opposés de ce quadrilatère sont égaux à deux droits.

Conduisez les droites AC, BD.



Puisque les trois angles de tout triangle sont égaux à deux droits (prop. 32. I), les trois angles CAB, ABC, BCA du triangle ABC seront égaux à deux angles droits; mais l'angle CAB est égal à l'angle BDC (prop. 21. III), car ces deux angles sont placés dans le même segment BADC ; l'angle ACB est égal à l'angle ADB, parce que ces deux angles sont placés dans le même segment ; donc l'angle total ADC est égal aux angles BAC, ACB ; donc si nous ajoutons un angle commun ABC, les angles ABC, BAC, ACB seront égaux aux angles ABC, ADC; mais les angles ABC, BAC, ACB sont égaux à deux droits : donc les angles ABC, ADC sont égaux à deux angles droits. Nous démontrerons semblablement que les angles BAD, DCB sont aussi égaux à deux droits.

Donc les angles opposés des quadrilatères inscrits dans des cercles sont égaux à deux droits ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXIII.

THÉORÈME.

Sur une même droite, on ne peut pas décrire du même côté deux segments de cercles semblables et inégaux.

Supposons que cela soit possible ; décrivez du même côté et sur la même droite AB (fig. 85) deux segments de cercle ACB, ADB semblables et inégaux, et conduisez la droite ADC et les droites CB, DB.



Puisque le segment ACB est semblable au segment ADB, et que les segments de cercles semblables sont ceux qui reçoivent des angles égaux (déf. 11. III), l'angle ACB sera égal à l'angle ADB, c'est-à-dire qu'un angle intérieur est égal à un angle extérieur ; ce qui est impossible (prop. 16. I).

Donc sur une même droite on ne peut pas décrire du même côté deux segments de cercles semblables et inégaux ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXIV.

THÉORÈME.

Sur des droites égales, les segments de cercles semblables sont égaux entre eux.

Que sur les droites égales AB, CD (fig. 86) soient décrits les segments de cercles semblables AEB, CFD : je dis que le segment AEB est égal au segment CFD.



Car le segment AEB étant appliqué sur le segment CFD, le point A sur le point C et la droite AB sur la droite CD, le point B s'appliquera sur le point D, puisque la droite AB est égale à la droite CD ; mais la droite AB s'appliquant exactement sur la droite CD, le segment AEB s'appliquera exactement sur le segment CFD ; car si la droite AB s'appliquant exactement sur la droite CD, le segment AEB ne s'applique pas exactement sur le segment CFD, le segment AEB changera de position et prendra par exemple la position CHGD; mais une circonférence de cercle ne peut couper une autre circonférence de cercle en plus de deux points (prop. 10. III), et la circonférence CHGD coupe la circonférence GFD en plus de deux points, savoir, aux points G, G, D, ce qui est impossible; donc la droite AB s'appliquant exactement sur la droite CD, il est impossible que le segment AED ne s'applique pas exactement sur le segment CFD : donc le premier segment s'appliquera exactement sur le second : donc il lui sera égal.

Donc, sur des droites égales, les segments de cercles semblables sont égaux entre eux ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXV.

PROBLEME.

Un segment de cercle étant donné, décrire le cercle dont il est segment.

Soit ABC (fig. 87, 88, 89) le segment de cercle donné : il faut décrire le cercle dont ABC est le segment.

Coupez la droite AC en deux parties égales au point D (prop. 10. I), du point D conduisez la perpendiculaire DB sur AC (prop. 11. I), et menez la droite AB ; l'angle ABD est ou plus grand que l'angle BAD, ou il lui est égal, ou il est plus petit.







Supposons d'abord qu'il soit plus grand; sur la droite donnée BA; (fig. 87) et au, point donné A faites l'angle BAE égal à l'angle ABD (prop. 23. I), prolongez la droite, DB jusqu'en. E, et conduisez la droite EC. Puisque l'angle ABE est égal à l'angle BAE, la droite BE sera égale à la droite EA (prop. 6. I), et puisque la droite AD est égale à la droite DC et que la droite DE est commune, les deux droites AD, DE sont égales aux deux droites CD, DE, chacune à chacune ; mais l'angle ADE est égal à l'angle CDE, car ils sont droits l'un et l'autre ; donc la base AE est égale à la base EC (prop. 4. I) a s'il a été démontré que la droite AE est égale à la droite EB : donc la droite BE est égale à la droite EC : donc les trois droites AE, EB, EC sont égales entre elles : donc la circonférence de cercle décrite du point E comme, centre, et avec un intervalle égal à l'une des droites AE, EB, EC, passera par les autres points, et le cercle sera décrit : donc un segment de cercle ayant été donné, on a décrit le cercle dont il est segment (prop. 9. III). Il est évident que le segment ABC est plus petit qu'un demi-cercle, puisque le centre E est placé en-dehors de ce segment.

Si l'angle ABD (fig. 88) est égal à l'angle BAD, la droite AD étant égale à chacune des droites BD, DC, les trois droites DA, DB, DC seront égales entre elles ; le point. D sera le centre du cercle entier (prop. 9. III), et le segment ABC sera un demi-cercle.

Mais si l'angle ABD (fig. 89) est moindre que l'angle BAD, et si sur la droite BA et au point A donné dans cette droite, on fait l'angle BAE égal à l'angle ABD, le centre E sera en-dedans du segment ABC et sur la droite DB, et le segment sera

plus grand qu'un demi-cercle. Donc étant donné un segment de cercle, on a décrit le cercle dont il est segment ; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION XXVI.

THÉORÈME.

Dans des cercles égaux des angles égaux s'appuient sur des arcs égaux, soit qu'ils soient placés tous deux au centre ou tous deux à la circonférence.

Soient ABC, DEF (fig. 90) des cercles égaux, qu'aux centres de ces cercles soient les angles égaux BGC, EHF, et qu'à leurs circonférences soient les angles égaux BAC, EDF je dis que l'arc BKC est égal à l'arc ELF.

Conduisez les droites BC, EF.



Puisque les cercles ABC, DEF sont égaux, leurs rayons seront égaux : donc les deux droites BG, GC sont égales aux deux droites EH, HF ; mais les angles G, H sont égaux : donc la base BC est égale à la base EF (prop. 4. I). Puisque l'angle A est égal à l'angle D, le segment BAC sera semblable au segment EDF (déf. 11. III) ; mais ces segments sont placés sur les droites égales BC, EF, et les segments semblables, qui sont placés sur des droites égales, sont égaux entre eux (prop. 24. III) : donc le segment BAC est égal au segment EDF ; mais le cercle entier ABC est égal au cercle entier DEF : donc le segment restant BKC est égal au segment restant ELF : donc l'arc BKC sera égal à l'arc ELF.

Donc, dans les cercles égaux, des angles égaux s'appuient sur des arcs égaux, soit qu'ils soient placés tous deux au centre ou tous deux à la circonférence ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXVII.

THÉORÈME.

Dans les cercles égaux, les angles qui s'appuient sur des arcs égaux sont égaux entre eux, soit qu'ils soient placés tous deux au centre ou tous deux à la circonférence.

Que dans les cercles égaux ABC, DEF (fig. 91) les angles au centre BGC, EHF, et les angles à la circonférence BAC, EDF s'appuient sur les arcs égaux BC, EF : je dis que l'angle BGG est égal à l'angle EHF, et l'angle BAC égal à l'angle EDF.



Car si l'angle BGG est égal à l'angle EHF, il est évident que l'angle BAC est égal à l'angle EDF (prop. 20. III) ; car si cela n'est pas, l'un de ces angles est nécessairement plus grand que l'autre. Supposons que l'angle BGC soit le plus grand. Sur la droite BG et au point G faisons l'angle BGK égal à l'angle EHF (prop. 23. I); or les angles égaux s'appuient sur des arcs égaux lorsqu'ils sont placés au centre (prop. 26. III) : donc l'arc BK est égal à l'arc EF, mais, l'arc EF est égal à l'arc BC : donc l'arc BK est égal à l'arc BC, c'est-à-dire que le plus petit est égal au plus grand ; ce qui est impossible donc les angles BGC, EHF ne sont pas inégaux : donc ils sont égaux ; mais l'angle en A est la moitié de l'angle BGC et l'angle en D la moitié de l'angle EHF (prop. 20. III) : donc l'angle en À est égal à l'angle en D.

Donc, dans les cercles égaux, les angles qui s'appuient sur des arcs égaux sont égaux entre eux, soit qu'ils soient placés tous deux au centre ou tous deux à la circonférence ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXVIII.

THÉORÈME.

Dans les cercles égaux, des cordes égales, sous-tendent des arcs égaux, le plus grand arc étant égal au plus grand, et le plus petit égal au plus petit.

Soient ABC, DEF (fig. 92) deux cercles égaux, et BC, EF deux cordes égalés qui sous-tendent les deux grands arcs BAC ; EDF, et les deux petits arcs BGC, EHF : je dis que le grand arc BAC est égal au grand arc EDF, et que le petit arc BGC est égal au petit arc EHF.



Prenez les centres E, L de ces cercles (prop. 1. III), et menez les droites BK, KC, EL, LF.

Puisque ces cercles sont égaux leurs rayons seront égaux : donc les deux droites BK, KC sont égales aux deux droites EL, LF ; mais la base BC est égale à la base EF : donc l'angle BKC est égal à l'angle ELF (prop. 8. I) ; or les angles égaux s'appuient sur des arcs égaux quand ils sont placés aux centres (prop. 26. III) ; donc l'arc BGC est égal à l'arc EHF ; mais la circonférence entière ABC est égale à la circonférence entière DEF : donc l'arc restant ABC est égal à l'arc restant EDF.

Donc, dans des cercles égaux, des cordes égales sous-tendent des arcs égaux, le plus grand arc étant égal au plus grand, et le plus petit égal au plus petit ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXIX.

THÉORÈME.

Dans des cercles, égaux des cordes égales sous-tendent des, arcs égaux.

Soient, les cercles égaux ABC, DEF (fig. 92) ; que dans ces cercles soient pris les arcs égaux BGC, EHF, et menez les cordes BG, EF : je dis que la corde BC est égale à la corde EF.



Prenez les centres K, L de ces cercles, et menez les droites BK KC, EL, LF. Puisque l'arc BGC est égal à l'arc EHF, l'angle BKC est égal à l'angle ELF (prop. 27. III); et puisque les cercles ABC, DEF sont égaux, leurs rayons seront égaux : donc les deux droites BK, KC sont égales aux deux droites EL, LF ; mais ces droites comprennent des angles égaux : donc la base BC est égale à la base EF (prop. 4. I)

Donc, dans des cercles égaux, des cordes égales sous-tendent des arcs égaux ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXX.

PROBLÈME.

Partager un arc donné en deux parties, égales.

Soit ADB (fig. 93) un arc donné : il faut partager l'arc ADB en deux parties.

Menez la corde AB, et partagez-la en deux parties égales en C (prop. 10. I) ; du point C élevez une perpendiculaire CD sur la corde AB (prop. 11. I), et menez les droites AD, DB.



Puisque la droite AC est égale à la droite CB et que la droite CD est commune, les deux droites AC, CD sont égales aux deux droites BC, CD ; mais l'angle ACD est égal à l'angle BCD; car ils sont droits l'un et l'autre ; donc la base AD est égale à la base DB (prop. 4. I), or les cordes égales sous-tendent des arcs égaux, le plus grand arc étant égal au plus grand, et le plus petit égal au plus petit (prop. 28. III) ; mais l'un et l'autre des arcs AD, DB est moindre qu'une demi-circonférence : donc l'arc AD est égal à l'arc DB.

Donc l'arc donné a été partagé en deux parties égales ; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION XXXI.

THÉORÈME.

Dans un cercle, l'angle qui est compris dans le demi-cercle est droit; celui qui est compris dans un segment plus grand est plus petit qu'un angle droit, et celui qui est compris dans un segment moindre est plus grand qu'un angle droit. L'angle d'un plus grand segment est plus grand qu'un angle droit, et celui d'un segment moindre est plus petit qu'un angle droit.

Soit un cercle ABCD (fig. 94) dont le diamètre est BC et le centre le point E ; menez les droites BA, AC, AD, DG : je dis que l'angle qui est compris dans le demi-cercle BAC est droit ; que l'angle compris dans le segment ABC plus grand qu'un demi-cercle, savoir, l'angle ABC est plus petit qu'un angle droit, et que l'angle compris dans le segment ADC plus petit qu'un demi-cercle, savoir, l'angle ADC est plus grand qu'un angle droit.



Conduisez la droite AE, et prolongez BA vers F. Puisque la droite BE est égale à la droite E A, l'angle EAB sera égal à l'angle EBA (prop. 5. I). De plus, puisque la droite EA est égale à la droite EC, l'angle ACE sera égal à l'angle CAE : donc l'angle total BAC est égal aux deux angles ABC, ACB; mais l'angle extérieur FAC du triangle ABC est égal aux deux angles ABC, ACB (prop. 32. I) : donc l'angle BAC est égal à l'angle FAC : donc chacun de ces angles est droit (prop. 10. I) : donc l'angle BAC, compris dans le demi-cercle BAC, est droit.

Puisque les deux angles AB C, B AC du triangle ÀBC sont plus petits que deux droits (prop. 17. I), et que l'angle BAC est droit, l'angle ABC sera plus petit qu'un angle droit, et cet angle est compris dans le segment ABC plus grand qu'un demi-cercle.

Puisque le quadrilatère ABCD est placé dans un cercle et que les angles opposés des quadrilatères décrits dans des cercles sont égaux à deux angles droits (prop. 22. III), les angles ABC, ADC sont égaux à deux angles droits ; mais l'angle ABC est plus petit qu'un angle droit : donc l'angle restant ADC est plus grand qu'un angle droit, et cet angle est compris dans le segment ADC plus petit qu'un demi-cercle.

Je dis en outre que l'angle d'un plus grand segment, compris par l'arc ABC et la droite AC, est plus grand qu'un angle droit, et que l'angle d'un segment moindre, compris, par l'arc ADC et la droite AC, est moindre qu'un angle droit, et cela est certainement évident ; car puisque l'angle compris par les droites BA, AC est droit, l'angle compris par l'arc ABC et la droite AC sera plus grand qu'un angle droit. De plus, puisque l'angle compris par les droites CA, AF est droit, l'angle compris par la droite CA et l'arc ADC sera plus petit qu'un angle droit.

Donc, dans un cercle, l'angle compris dans un demi-cercle est droit ; celui qui est compris dans un plus grand segment

est plus petit qu'un angle droit, et celui qui est compris dans un segment plus petit est plus grand qu'un angle droit. De plus, l'angle d'un plus grand segment est plus grand qu'un angle droit, et l'angle d'un segment moindre est plus petit ; ce qu'il fallait démontrer.

AUTREMENT.

L'angle BAC est droit, puisque l'angle AEC est double de l'angle BAE, car il est égal aux deux angles intérieurs et opposés (prop. 32. I) ; mais l'angle AEB est double de l'angle EAC : donc les angles AEB, AEC seront doubles de l'angle BAC ; mais les angles AEB, AEC sont égaux à deux angles droits (prop. 13. I) : donc l'angle ABC est droit ; ce qu'il fallait démontrer.

COROLLAIRE.

De là il suit manifestement que si l'un des angles d'un triangle est égal aux deux autres, cet angle sera droit, parce que son angle de suite est égal aux deux autres ; or quand deux angles de suite sont égaux, ces deux angles sont droits l'un et l'autre (déf. 10. I).

PROPOSITION XXXII.

THÉORÈME.

Si une droite touche la circonférence d'un cercle, et si du point de contact on conduit une corde, les angles que cette corde fait avec la tangente seront égaux aux angles qui sont placés dans les segments alternes du cercle.

Que la droite EF (fig. 95) touche la circonférence du cercle ABCD au point B, et que du point B soit conduite la corde BD d'une manière quelconque : je dis que les angles que la corde BD fait avec la tangente EF sont égaux à ceux qui sont compris dans les segments alternes du cercle ; c'est-à-dire que l'angle FBD est égal à l'angle compris dans le segment DAB, et que l'angle EBD est égal à l'angle qui est compris dans le segment DCB.



D'un point B conduisez la droite BA perpendiculaire sur EF (prop. 11. I), et dans l'arc BD prenez un point quelconque C et menez les cordes AD, DC, CB.

Puisque la droite EF touche la circonférence du cercle AB CD au point B, et que la droite BA a été menée du point de contact B perpendiculaire sur la tangente EF, le centre du cercle AB CD sera placé sur la droite B A (prop. 19. III) : donc l'angle ADB, compris dans le demi-cercle, est droit (prop. 31. III) : donc les angles restants BAD, ABD sont égaux à un angle droit; mais l'angle ABF est droit par construction : donc l'angle ABF est égal aux angles BAD, ABD (ax. 10) : donc si on retranche l'angle commun ABD, l'angle restant DBF est égal à celui qui est compris dans le segment alterne du cercle, c'est-à-dire à l'angle BAD. Actuellement, puisque le quadrilatère ABCD est inscrit dans le cercle, ses angles opposés sont égaux à deux droits (prop. 22. III) : donc les angles DBF, DBE seront égaux aux angles BAD, BCD (prop. 13. I); mais on a démontré que l'angle BAD est égal à l'angle DBF : donc l'angle restant DBE sera égal à celui qui est compris dans le segment alterne du cercle DCB, c'est-à-dire à l'angle DCB.

Donc si une droite touche la circonférence d'un cercle, et si du point de contact on conduit une corde, les angles que cette corde fera avec la tangente seront égaux à ceux qui sont compris dans les segments alternes ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXXIII.

THÉORÈME.

Sur une droite donnée, décrire un segment de cercle qui reçoive un angle égal à un angle donné.

Soit AB (fig. 96, 97, 98) la droite donnée et C l’angle donné : il faut sur la droite donnée AB décrire un segment de cercle qui reçoive un angle égal à l'angle donné C. L'angle C est aigu ou droit ou obtus.



Supposons d'abord que cet angle soit aigu, comme dans la figure 96; sur la droite AB et au point A construisez un angle BAD égal à l'angle C (prop. 23. I) ; l'angle BAD sera aigu. Du point A conduisez la droite AE perpendiculaire sur la droite AD (prop. 11. I) ; partagez AB en deux parties égales au point F (prop. 10. I) y et du point F conduisez la droite FG perpendiculaire sur la droite AB, et menez la droite GB. Puisque la droite AF est égale à la droite FB et que la droite FG est commune, les deux droites AF, FG sont égales aux deux droites FB, FG ; mais l'angle AFG est égal à l'angle GFB : donc la base AG est égale à la base GB (prop. 4. I) : donc la circonférence décrite du centre G et avec l'intervalle AG passera par le point B. Décrivez cette circonférence et qu'elle soit ABE, et menez la droite EB. Puisque du point A, extrémité du diamètre AE, on à conduit sur la droite AE une perpendiculaire AD, cette perpendiculaire AD touchera la circonférence (prop. 16. III) ; et puisque la droite AD touche la circonférence du cercle ABE, et que du point de contact qui est en A on a conduit une corde AB, l'angle DAB sera égal à l'angle qui est dans, le segment alterne du cercle (prop. 32. III); c'est-à-dire à l'angle AEB ; mais l'angle DAB est égal à l'angle C : donc l'angle C sera égal à l'angle AEB : donc sur la droite donnée AB, on décrit un segment de cercle AEB qui reçoit un angle AEB égal à l'angle donné C.



Supposons ensuite que l'angle C soit droit, et qu'il faille décrire sur la droite AB un segment de cercle qui reçoive un angle égal à l'angle droit C. Construisez un angle BAD égal à l'angle droit C (prop. 23. I), comme dans la figure 97 ; partagez la droite AB en deux parties égales au point F (prop. 10. I), et du centre F et avec un intervalle égal à l'une ou à l'autre des droites AF, FB, décrivez la circonférence de cercle AEB. La droite AD est tangente à la circonférence ABE (prop. 16. III), parce que l'angle BAD est droit, et l'angle BAD est égal à l'angle qui est compris dans le segment AEB, cap cet angle est droit, puisqu'il est compris dans un demi-cercle (prop. 31. III) ; mais l'angle BAD est égal à l'angle C : donc on a décrit sur la droite AB un segment de cercle AEB qui reçoit un angle égal à l'angle droit C.



Enfin que l'angle C soit obtus ; sur la droite AB et au point A construisez un angle BAD égal à l'angle C, comme dans la figure 98 (prop. 25. I) et conduisez la droite AE perpendiculaire à la droite AD (prop. 11. I) ; partagez la droite AB en deux parties égales au point F (prop. 10. I) ; du

point F conduisez sur AB la perpendiculaire FG, et menez la droite GB. Puisque la droite AF est égale à la droite FB et que la droite FA est commune, les deux droites FA, FG sont égales aux deux droites BF, FG ; mais l'angle AFG est égal à l'angle GFB : donc la base AG est égale à la base GB (prop. 4. I) : donc la circonférence de cercle décrite du point G avec l'intervalle AG passera par le point B. Que cette circonférence ait la position AEB ; puisqu'on a mené la droite AD perpendiculaire à l'extrémité du diamètre AE, la droite AD touchera la circonférence (prop. 16. III), et parce que la droite AB a été menée du point de contact qui est en A, l'angle BAD est égal à celui qui est compris dans le segment alterne du cercle. Mais l'angle BAD est égal à l'angle C : donc l'angle qui est dans le segment AHB sera égal à l'angle C : donc on a décrit sur la droite AB un segment de cercle AHB qui reçoit un angle égal à l'angle C ; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION XXXIV.

PROBLÈME.

D'un cercle donné, retrancher un segment qui reçoive un angle égal à un angle donné.

Soit ABC (fig. 99) le cercle donné, et D l'angle donné : il faut du cercle ABC retrancher un segment qui reçoive un angle égal à l'angle donné D.



Menez une droite EF qui touche le cercle ABC au point B (prop. 17. III), et sur la droite FE et au point B, pris dans cette droite, faites l'angle FBC égal à l'angle D (prop. 23. I).

Puisque la droite EF touche le cercle ABC et que la droite BC a été menée du point de contact B, l'angle FBC sera égal à

celui qui est compris dans le segment alterne du cercle BAC (prop. 32. III) ; mais l'angle FBC est égal à l'angle D : donc l'angle qui est compris dans le segment BAC sera égal à l'angle D.

Donc d'un cercle donné ABC on a retranché le segment BAC qui reçoit un angle égal à l'angle donné D ; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION XXXV.

THÉORÈME.

Si dans un cercle, deux cordes se coupent mutuellement, le rectangle compris sous les segments de l'une de ces cardes est égal au rectangle compris sous les segments de l'autre.

Que dans le cercle ABCD (fig. 100) les deux cordes, AC, BD se coupent mutuellement au point E : je dis que le rectangle compris sous les droites. AE, EG est égal à celui qui est compris sous les droites DE, EB.



Si les droites AG, BD passent par le centre, de manière que le point E soit le centre du cercle ABCD, il est évident que les droites AE, EC, DE, EB étant égales, le rectangle compris sous les droites AE, EC est égal à celui qui est compris sous les droites DE, EB.

Si les droites AC, DB (fig. 101) ne passent pas par le centre, prenez le centre du cercle ABCD (prop. 1. III), que ce centre soit le point F ; du centre F conduisez les droites FG, FH perpendiculaires sur les droites AC, DB (prop. 12. I), et menez les droites FB, FC, FE.



Puisque la droite GF menée par le centre est perpendiculaire sur la droite AG qui n'est pas menée par le centre, la droite GF coupe la droite AC à angle droit, et la partage en deux parties égales (prop. 3. III) : donc la droite AG est égale à la droite GC. Puisque la droite AC est coupée en deux parties égales au point G et en deux parties inégales au point E, le rectangle compris sous les droites AE, EC avec le carré de GE, est égal au carré de GC (prop. 5. II) : donc si nous ajoutons à ces quantités le carré de GF, le rectangle compris sous les droites AE, EC, avec les carrés de GE, GF, est égal aux carrés de CG, GF. Mais le carré de FE est égal aux carrés de EG, GF (prop. 47. I), et le carré de FC égal aux carrés de CG, GF : donc le rectangle compris sous tes droites AE, EC, avec le carré de FE, est égal au carré de FC. Or la droite FC est égale à la droite FB : donc le rectangle compris sous les droites AE, EC, avec le carré de EF, est égal au carré de FB. Par la même raison le rectangle compris sous les droites DE, EB, avec le carré de FE, est égal au carré de FB. Mais on a démontré que le rectangle compris sous les droites AE, EC, avec le carré de FE, est égal au carré de FB : donc le rectangle compris sous les droites AE, EC, avec le carré de FE, est égal au rectangle compris sous les droites DE, EB, avec le carré de FE: donc si on retranche le carré de FE, qui est commun, le rectangle restant compris sous AE, EC sera égal au rectangle restant compris sous DE, EB.

Donc si dans un cercle deux cordes se coupent mutuellement, le rectangle compris sous les segments de Tune sera égal au rectangle compris sous les segments de l'autre ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXXVI.

THÉORÈME.

Si l'on prend un point quelconque hors d'un cercle, et si de ce point on mène deux droites dont l'une coupe le cercle et dont l'autre lui soit tangente, le rectangle compris sous la sécante entière et le segment extérieur qui est intercepté par ce point et l'arc convexe sera égal au quatre de la tangente.

Que hors du cercle ABC (fig. 102) soit pris un point quelconque D, et que de ce point soient menées deux droites DCA, DB; que la droite DCA coupe le cercle ABC, et que la droite AB lui soit tangente : je dis que le rectangle compris sous AD, DC est égal au carré de DB, soit que la droite DCA passe par le centre ou non.



Supposons d'abord qu'elle passe par le centre du cercle AB C, et que ce centre soit le point F ; menez la droite FB. L'angle FBD sera droit (prop. 18. III). Puisque la droite AC est coupée en deux parties égales au point F et que la droite CD lui est ajoutée) le rectangle compris sous les droites AD, DC, avec le carré de FC, sera égal au carré de FD (prop. 6. II) ; mais la droite FC est égale à la droite FB : donc le rectangle compris sous AD, DC, avec le carré de F B, est égal au carré de FD ; mais le carré de FD est égal aux carrés des droites FB, BD (prop. 47. I) car l'angle FBD est droit : donc le rectangle compris sous AD, DC, avec le carré de FB, est égal aux carrés des droites FB, BD. Donc si on retranche le carré de

FB, qui est commun, le rectangle compris sous les droites AD, DC sera égal au carré de la tangente DB.



Supposons à présent que la droite DCA (fig. 103) ne passe pas par le centre du cercle ABC ; prenons le centre E, et du point E conduisons sur la droite AC la perpendiculaire EF (prop. 12. I), et menons les droites EB, EC, ED. Puisque l'angle EFD est droit, et que la droite EF menée par le centre coupe à angles droits la droite AC qui n'est pas menée par le centre, la droite EF coupera la droite AC en deux parties égales (prop. 3. III) : donc la droite AF est égale à la droite FC. De plus, puisque, la droite AC est coupée en deux parties égales au point F et que la droite. CD lui est ajoutée, le rectangle compris sous les droites AD, DC, avec le carré de FC, sera égal au carré de FD (prop. 6. II) : donc si on ajoute à ces deux quantités le carré de FE, le rectangle compris sous les droites AD, DC, avec les carrés des droites CF, FE, est égal aux carrés de DF, FE. Mais le carré de DE est égal aux carrés de DF, FE (prop. 47. I) car l'angle EFD est droit, et le carré de CE est égal aux carrés de CF, FE : donc le rectangle compris sous les droites ÀD, DC, avec le carré de CE, est égal au carré de ED ; mais la droite CE est égale à la droite EB : donc le rectangle compris sous les droites AD, DC, avec le carré de EB, est égal au carré de ED; mais les carrés de EB, BD sont égaux au carré de ED (prop. 47. I) puisque l'angle EBD est droit : donc le rectangle compris sous les droites AD, DC, avec le carré de EB, est égal aux carrés de EB, BD : donc si on retranche le carré de EB, qui est commun, le rectangle restant compris sous les droites AD, DC sera égal au carré de DB.

Donc si hors du cercle on prend un point quelconque, et si de ce point on mène deux droites dont l'une coupe le cercle et dont l'autre lui soit tangente, le rectangle compris sous la sécante entière et le segment extérieur qui est intercepté par

ce point et l'arc convexe sera égal au carré de la tangente ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXXVII.

THÉORÈME.

Si l'on prend un point quelconque hors d'un cercle, et si de ce point on mène deux droites dont l'une coupe le cercle et dont l'autre tombe sur sa circonférence, et si le rectangle compris sous la sécante totale et le segment extérieur intercepté entre ce point et tare convexe est égal au carré de la droite qui tombe sur la circonférence, cette dernière droite sera tangente à la circonférence.

Que hors du cercle ABC (fig. 104) soit pris un point quelconque D, et que de ce point on mène les deux droites DCA, DB dont la droite DCA coupe le cercle et dont la droite DB tombe sur sa circonférence ; si le rectangle compris sous les droites AD, DC est égal au carré de DB : je dis que la droite DB est tangente au cercle ABC.



Conduisez la droite DE de manière qu'elle soit tangente au cercle ABC (prop. 17. III), et prenez le centre du cercle ABC (prop. 1. III), que le point F soit ce centre ; menez les droites FE, FB, FD; l'angle FED sera droit (prop. 18. III).

Puisque la droite DE touche le cercle ABC et que la droite DCA le coupe, le rectangle compris sous AD, DG sera égal au carré de DE (prop. 36. III) ; mais le rectangle compris sous AD, DC est supposé égal au carré de DB : donc le carré de DE sera égal au carré de DB, et par conséquent la droite DE sera égale à la droite DB. Mais la droite FE est égale à la droite FB : donc les deux droites DE, EF sont égales aux deux droites DB, BF, mais la base FD est commune : donc l'angle DEF est égal à l'angle DBF (prop. 8. I) ; mais l'angle DEF est droit : donc

l'angle DBF est droit aussi ; mais la droite FB prolongée est un diamètre, et la droite qui est perpendiculaire à l'extrémité d'un diamètre est tangente au cercle (prop. 16. III). On démontrerait la même chose si le centre était placé sur la droite AC.

Donc si l'on prend un point quelconque hors d'un cercle, et si de ce point on mène deux droites dont l'une coupe le cercle et dont l'autre tombe sur la circonférence, et si le rectangle compris sous la sécante totale et le segment extérieur intercepté par ce point et l'arc convexe est égal au carré de la droite qui tombe sur la circonférence, cette dernière droite sera tangente à la circonférence ; ce qu'il fallait démontrer.

FIN DU TROISIÈME LIVRE.

[1] Une droite menée du centre à la circonférence se nomme *rayon.* Une droite menée d'un point de la circonférence à une autre, se nomme *corde.* On nomme arc une portion de la circonférence.

RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE

ALLER À LA TABLE DES MATIÈRES D'EUCLIDE

Euclide

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

INTRODUCTION –GEOMETRIE LIVRE I – LIVRE II – LIVRE III – LIVRE VI

Éléments de Géométrie : livre IV

Euclide le Géomètre

LES ÉLÉMENTS

DE

GÉOMÉTRIE

D'EUCLIDE,

traduits littéralement, et suivis d'un Traité du Cercle,

du Cylindre, du Cône et de la Sphère;

de la mesure des Surfaces et des Solides ; avec des Notes ;

Par F. PEYRARD,

Bibliothécaire

de l'École Polytechnique.

OUVRAGE APPROUVÉ PAR L'INSTITUT NATIONAL.

Et nova sunt semper. — OVIDE,...

A PARIS,

CHEZ F. LOUIS, LIBRAIRE, RUE DE SAVOIE, N° 12.

AN XII - l804.

EUCLIDE

ÉLÉMENTS DE GÉOMÉTRIE

LIVRE IV.

DÉFINITIONS.

1. UNE figure rectiligne est dite inscrite dans une figure rectiligne, lorsque chaque angle de la figure inscrite touche chaque côté de celle dans laquelle elle est inscrite.

2. Semblablement une figure est dite circonscrite à une figure, lorsque chaque côte de la figure circonscrite touche chaque angle de la figure autour de laquelle elle est circonscrite.

3. Une figure rectiligne est dite inscrite dans un cercle, lorsque chaque angle de la figure inscrite touche la circonférence de ce cercle.

4. Une figure rectiligne est dite circonscrite à un cercle, lorsque chaque côté de la figure circonscrite touche la circonférence de ce cercle.

5. Semblablement un cercle est dit inscrit dans une figure rectiligne, lorsque la circonférence du cercle touche chaque côté de la figure dans laquelle elle est inscrite.

6. Un cercle est dit circonscrit à une figure rectiligne, lorsque la circonférence du cercle touche chaque angle de la figure autour de laquelle elle est circonscrite.

7. Une droite est dite appliquée dans un cercle, lorsque ses extrémités sont dans la circonférence de ce cercle.

PROPOSITION PREMIÈRE.

PROBLÈME.

Dans un cercle donné, appliquer une droite égale à une droite donnée qui ne soit pas plus grande que le diamètre.

Soit ABC (fig. 105) le cercle donné, et D la droite donnée moins grande que le diamètre de ce cercle : il faut dans le cercle ABC appliquer une droite égale à la droite D.



Conduisez le diamètre BC du cercle ABC. Si la droite BC est égale à la droite D, on a déjà fait ce que l'on proposait : car on a appliqué dans le cercle ABC une droite égale à la droite D. Si, au contraire, la droite BC est plus grande que la droite D, faites la droite CE égale à la droite D (prop. 3. I), et du centre C et avec l'intervalle CE décrivez la circonférence AEF (dem. 5.), et conduisez-la droite CA (dem. 1). Puisque le point C est le centre du cercle AEF, la droite CA sera égale à la droite CE; mais la droite D est égale à la droite CE : donc la droite D sera égale à la droite CA.

Donc, dans le cercle donné ABC on a appliqué la droite CA égale à la droite

donnée D qui est moindre que son diamètre ; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION II.

PROBLÈME.

Dans un cercle donné, inscrire un triangle qui soit équiangle à un triangle donné.

Soit ABC (fig. 106) le cercle donné et DEF le triangle donné : il faut dans le cercle ABC inscrire un triangle qui soit équiangle au triangle donné DEF.



Conduisez la droite GAH de manière qu'elle touche le cercle ABC au point A, et sur la droite AH et au point A faites l'angle HAC égal à l'angle DEF (prop. 23, I). De plus, sur la droite GA et au point A faites l'angle GAB égal à l'angle FDE, et menez la droite BC.

Puisque la droite HAG touche le cercle ABC et que la droite AG a été menée du point de contact, l'angle HAC est égal à celui qui est placé dans le segment alterne du cercle, c'est-à-dire à l'angle ABC (prop. 32. III) ; mais l'angle HAC est égal à l'angle DEF : donc l'angle ABC est égal à l'angle DEF. Par la même raison l'angle ACB est égal à l'angle FDE : donc l'angle restant. BAC sera égal à l'angle restant EFD (prop. 32. I) : donc le

triangle ABC est équiangle au triangle DEF, et il est inscrit dans le cercle ABC (déf. 3. IV). Donc dans le cercle donné on a inscrit un triangle équiangle au triangle donné ; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION III.

PROBLÈME.

Autour d'un cercle circonscrire un triangle équiangle à un triangle donné.

Soit ABC (fig. 107) le cercle donné et DEF le triangle donné : il faut autour du cercle ABC circonscrire un triangle équiangle au triangle donné DEF.



Prolongez la droite EF de part et d'autre vers les points H, G (dem. 2), prenez le centre K du cercle ABC (prop. 1. III) ; conduisez d'une manière quelconque la droite KB, faites sur la droite KB et au point K un angle BKA égal à l'angle DEG, et l'angle BKC égal à l'angle DFH (prop. 25. I) ; par les points A, B, C conduisez les droites LAM, MBN, NCL de manière qu'elles soient tangentes au cercle ABC (prop. 17. III). Puisque les droites LM, MN, NL touchent le cercle ABC aux points A, B, C et que les droites KA, KB, KC sont menées du centre K aux points A, B, C, les angles seront droits aux points A, B, C

(prop. 18. III); et puisque les quatre angles du quadrilatère AMBK sont égaux à quatre angles droits (prop. 32. I), car ce quadrilatère peut se diviser en deux triangles; mais parmi les angles de ce quadrilatère, les angles KAM, KBM sont droits : donc les angles restants AKB, AMB seront égaux à deux angles droits ; mais les angles DEG, DEF sont égaux à deux droits (prop. 13. I) : donc les angles AKB, AMB sont égaux aux angles DEG, DEF ; mais l'angle DEG est égal à l'angle AKB : donc l'angle restant AMB sera égal à l'angle restant DEF. Nous démontrerons semblablement que l'angle LNM est égal à l'angle DFE : donc l'angle restant MLN est égal à l'angle EDF (prop. 32. I): donc le triangle LMN est équiangle avec le triangle DEF, et il est circonscrit autour du cercle ABC (déf. 4. IV). Donc un triangle équiangle avec un triangle donné a été circonscrit autour du cercle donné ; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION IV.

PROBLÈME.

Inscrire une circonférence de cercle dans un triangle donné.

Soit ABC (fig. 108) le triangle donné : il faut dans le triangle ABC inscrire un cercle.

Partagez en deux parties égales les angles ABC, BCA par les droites BD, CD qui se rencontrent au point D, et du point D conduisez sur les droites AB, BC, CA les perpendiculaires DE, DF, DG (prop, 12. I).



Puisque l'angle ABD est égal à l'angle CBD, car l'angle ABC a été partagé en deux parties égales, et que l'angle droit BED est égal à l'angle droit BFD, les deux triangles EBD, DBF auront deux angles égaux à deux angles et un côté égal à un côté, car BD, qui est opposé à deux angles égaux, est commun : donc ils auront les autres côtés égaux aux autres côtés (prop. 36. I) ; donc le côté DE sera égal au côté DF. Par la même raison le côté DG sera égal au côté DF: donc la circonférence décrite du point D avec un intervalle égal à une des droites DE, DF, DG passera par les autres points et touchera les droites AB, BC, CA, parce que les angles sont droits en E, F, G ; car si cette circonférence coupait ces droites, la perpendiculaire à l'extrémité d'un diamètre tomberait dans le cercle; ce qui est absurde (prop. 16. III). Donc la circonférence décrite du point D avec un intervalle égal à une des droites DE, DF, DG ne coupera point les droites AB, BC, CA : donc elle les touchera, et cette circonférence sera inscrite dans le triangle ABC (déf. 5. IV).

Donc dans le triangle donné ABC on a inscrit la circonférence de cercle EFG ; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION V.

PROBLÈME.

Autour d'un triangle donné décrire une circonférence de cercle.

Soit ABC (fig. 109) le triangle donné : il faut autour du triangle donné ABC décrire une circonférence de cercle.

Partagez les côtés AB, AC en deux parties égales aux points D, E (prop. 10. I), et des points D, E conduisez sur les droites AB, AC les perpendiculaires DF, EF (prop. 11. I) ; ces perpendiculaires se rencontreront ou dans le triangle ABC, ou dans la droite BC, ou hors du triangle ABC.



Supposons d'abord que ces perpendiculaires se rencontrent dans le triangle au point F; menez les droites BF, FC, FA; puisque la droite AD est égale à la droite DB, et que la perpendiculaire DF est commune, la base AF sera égale : la base FB (prop. 4. I). Nous démontrerons semblablement que la droite CF est égale à la droite FA : donc la droite BF est égale à la droite FC : donc les trois droites FA, FB, FC sont égales entre elles : donc si du centre F et avec un

intervalle égal à une des droites FA, FB, FC on décrit une circonférence, cette circonférence passera par les autres points, et cette circonférence sera décrite autour du triangle ABC (déf. 6. 4); décrivez la circonférence ABC.

Supposons actuellement, que les droites DF, EF se rencontrent dans la droite BC et au point F, comme dans la figure 109* ; menez la droite AF. Nous démontrerons semblablement que le point F est le centre de la circonférence circonscrite au triangle ABC.

Supposons enfin que les droites DF, EF se rencontrent hors du triangle ABC, au point F comme dans la figure 109** ; menez les droites AF, FB, FC. Puisque la droite AD est égale à la droite DB et que la perpendiculaire DF est commune, la base AF sera égale à la base F B (prop. 4. I). Nous démontrerons semblablement que la droite CF est égale à la droite FA : donc la droite BF est égale à la droite FC: donc si du centre F et avec un intervalle égal à une des droites FA, FB, FC on décrit une circonférence, elle passera par les autres points, et cette circonférence sera circonscrite autour du triangle ABC ; décrivez donc la circonférence ABC.

Donc une circonférence de cercle a été circonscrite autour du triangle donné ; ce qu'il fallait faire.

COROLLAIRE.

Il est évident que si le centre du cercle tombe dans le triangle, et si l'angle ABC est compris dans un segment plus grand qu'un demi-cercle, cet angle sera moindre qu'un angle droit. Si le centre du cercle tombe sur la droite BC, si cet angle est compris dans un demi-cercle, cet angle sera droit ; si enfin le centre du cercle tombe hors du triangle ABC, et si cet angle est compris dans un segment plus petit qu'un demi-cercle, cet angle sera plus grand qu'un angle droit : donc si le triangle donné est acutangle, les droites DE, EF se rencontreront dans le

triangle ; si ce triangle a un angle droit BAC, les droites se rencontreront dans la droite BC ; si enfin cet angle a un angle obtus, ces droites se rencontreront hors du triangle ABC.

PROPOSITION VI.

PROBLÈME,

Décrire un carré dans un cercle donné.

Soit ABCD (fig. 110) le cercle donné : il faut décrire un carré dans le cercle ABCD.

Conduisez les diamètres AC, BD du cercle ABCD de manière qu'ils soient perpendiculaires l'un sur l'autre (prop. 11. I) ; menez les droites AB, BC, CD, DA.



Puisque la droite BE est égale à la droite ED, car le point E est le centre, et que la droite EA est commune et perpendiculaire sur BD, la base AB sera égale à la base AD (prop. 4. I). Par la même raison, chacune des droites BC, CD est égale à chacune des droites BA, AD : donc le quadrilatère ABCD est équilatère. Je dis aussi qu'il est rectangulaire ; car puisque la ligne droite B D est un diamètre du cercle ABCD, la figure DAD sera un demi-cercle : donc l'angle BAD est droit (prop. 31. I); par

la même raison chacun des angles ABC, BCD, CDA sera droit aussi : donc le quadrilatère ABCD est rectangulaire ; mais on a démontré qu'il est équilatère : donc ce quadrilatère est un carré, et ce quatre est inscrit dans le cercle ABCD.

Donc on a inscrit le carré ABCD dans le cercle donné ABCD ; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION VII.

PROBLÈME.

Circonscrire un carré à un cercle donné.

Soit ABCD (fig. 111) le cercle donné : il faut circonscrire un carré au cercle ABCD.

Conduisez dans le cercle ABCD les deux diamètres AC, BD de manière qu'ils soient perpendiculaires l'un sur l'autre ; et par les points A, B, C, D conduisez les droites FG, GH, HK, KF de manière qu'elles soient tangentes du cercle ABCD (prop. 17. III).



Puisque la droite FG est tangente du cercle ABCD, et que la droite EA a été conduite du centre E au point de contact qui est en A, les angles seront droits en A (prop. 18. III). Par la même raison les

angles seront droits en B, C, D. Puisque l'angle AEB est droit et que l'angle EBG est droit aussi, la droite GH sera parallèle à la droite AC (prop. 28. I). Par la même raison la droite AG est parallèle à la droite FK. Nous démontrerons semblablement que l'une et l'autre des droites GF, HK est parallèle à la droite BED : donc les figures GK, GC, AK, FB, BK sont des parallélogrammes : donc la droite GF est égale à la droite HK (prop. 34. I), et la droite GH égale à la droite FK; et puisque la droite AC est égale à la droite BD, que la droite AC est égale à Tune et à l'autre des droites GH, FK, et que la droite BD est égale à l'une et à l'autre des droites GF, HK, les droites GH, FR seront égales aux droites GF, HK : donc le quadrilatère FGHK est équilatère, et je dis qu'il est rectangulaire ; car puisque le quadrilatère GBEA est un parallélogramme, et que l'angle AEB est droit, l'angle AGB sera droit aussi (prop. 34. I). Nous démontrerons semblablement que les angles qui sont placés vers les points H, K, F sont des angles droits : donc le quadrilatère FGHK est rectangle. Mais on a démontré qu'il est équilatère j donc le quadrilatère est un carré, et il est circonscrit autour du cercle ABCD.

Donc on a circonscrit un carré au cercle donné; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION VIII.

PROBLÈME.

Inscrire un cercle dans un carré donné.

Soit ABCD (fig. 112) le carré donné : il faut inscrire un cercle dans le carré ABCD.



Coupez en deux parties égales l'une et l'autre des droites AB, AD aux points F, E (prop. 10. I), et par le point E conduisez la droite EH parallèle à l'une et à l'autre des droites AB, CD (prop. 31. I), et par le point F conduisez aussi la droite FK parallèle à l'une et à l'autre des droites AD, BC : donc chacune des figures AK, KB, AH, HD, AG, GC, BG, GD est un parallélogramme, et leurs côtés opposés sont égaux (prop. 34. Ï). Puisque la droite AD est égale à la droite AB, que la droite AE est la moitié de AD et la droite AF la moitié de AB, la droite AE sera égale à la droite AF. Mais les côtés qui leur sont opposés sont égaux : donc la droite F G est égale à la droite GE. Nous démontrerons semblablement que les droites GH, GK sont égales aux droites FG, GE, chacune à chacune : donc les quatre droites. GE, GF, GH, GK sont égales entre elles : donc le cercle décrit du centre G avec un intervalle égal à une des droites GE, GF, GH, GK passera par les autres points, et sera tangent aux droites AB, BC, CD, DA, parce que les angles en E, F, H, K sont droits ; car si la circonférence coupait les droites AB, BC, CD, DA, la perpendiculaire à l'extrémité d'un diamètre entrerait dans le cercle ; ce qui est absurde (prop. 16. III) : donc la circonférence de cercle décrite du centre G avec un intervalle égal à une des droites GE,

GF, GH, GK ne coupera point les droites AB, BC, CD, DA: donc elle sera tangente à ces droites, et elle sera inscrite dans le carré ABCD (déf. 5. IV).

Donc on a inscrit une circonférence de cercle dans le carré donné ; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION IX.

PROBLÈME.

Circonscrire un cercle à un carré donné.

Soit ABCD (fig. 113) le carré donné : il faut à ce carré ABCD circonscrire une circonférence de cercle.

Menez les droites AC, BD qui se coupent mutuellement au point E.



Puisque la droite DA est égale à la droite AB et que la droite A G est commune, les deux droites DA, AC sont égales aux deux droites BA, AC ; mais la base DC est égale à la base BC : donc l'angle DAC est égal à l'angle BAC (prop. 8. I): donc l'angle DAB est coupé en deux parties égales par la droite AC. Nous démontrerons semblablement que chacun des angles ABC BCD, CDA est coupé en deux parties égales par les droites AC, DB : donc puisque l'angle DAB est égal à

l'angle ABC, que l'angle EAB est la moitié de l'angle DAB, et l'angle EBA la moitié de l'angle ABC, l'angle EAB sera égal à l'angle EBA : donc le côté EA est égal au côté EB (prop. 6. I). Nous démontrerons semblablement que les droites EC, ED sont égales aux droites EA, EB, chacune à chacune : donc les quatre droites EA, EB, EC, ED sont égales entre elles : donc la circonférence de cercle décrite du centre E avec un intervalle égal à une des droites EA, EB, ED passera par les autres points et elle sera circonscrite au carré ABCD ; circonscrivez le cercle ABCD.

Donc on a circonscrit un cercle à un carré donné ; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION X.

PROBLÈME.

Construire un triangle isocèle qui ait chacun des angles de sa base double du troisième angle.

Soit la droite AB (fig. 114) ; que cette droite soit coupée en un point C de manière que le rectangle compris sous les droites AB, BC soit égal au carré de CA (prop. 11. II) ; du centre A et avec l'intervalle AB décrivez la circonférence BDE (dem. 3); dans le cercle BDE menez la corde BD égale à la droite AC qui est moindre que le diamètre de ce cercle (prop. 1. IV), et ayant conduit les droites DA, DC, circonscrivez la circonférence ACD au triangle ACD (prop. 5. IV).



Puisque le rectangle compris sous les droites AB, BC est égal au carré de la droite AC et que la droite AC est égale à la droite BD, le rectangle compris sous les droites AB, BC sera égal au carré de BD : puisque le point B est pris hors du cercle ACD et que du point B on a mené un cercle ACD, les droites BCA, BD, dont l'une coupe le cercle et dont l'autre ne le coupe point, et puisque le rectangle compris sous les droites AB, BC est égal au carré de BD, la droite BD sera tangente au cercle ACD (prop. 37. III). Donc, puisque la droite BD est tangente et que la corde DC a été menée du point de contact D, l'angle BDC sera égal à celui qui est compris dans le segment alterne du cercle, c'est-à-dire à l'angle DAC (prop. 32. III). Mais, puisque l'angle BDC est égal à l'angle DAC, si nous ajoutons un angle commun CDA, l'angle total BDA sera égal aux deux angles CDA, DAC. Mais l'angle extérieur BCD est égal aux deux angles CDA, DAC (prop. 32. I): donc l’angle BDA est égal à l'angle BCD ; mais l'angle BDA est égal à l'angle CBD (prop. 5. I), puisque le côté AD est égal au côté AB ; donc l'angle DBA sera égal à l'angle BCD : donc les trois angles BDA, DBA, BCD sont égaux entre eux ; et puisque l'angle DBC est égal à l'angle BCD, le côté BD sera égal au côté DC (prop. 6. I); mais le côté BD est supposé égal au côté CA : donc le côté AC est égal au côté

CD : donc l'angle CDA est égal à l'angle DAC (prop. 5. I) : donc les angles CDA, DAC, pris ensemble, sont double de l'angle DAC ; mais l'angle BCD est égal aux angles CDA, DAC (prop. 32. I) : donc l'angle BCD est double de l'angle DAC ; mais l'angle BCD est égal à chacun des angles BDA, DBA : donc chacun des angles BDA, DBA est double de l'angle DAB.

Donc on a construit un triangle isocèle. ADB, dont chacun des angles de sa base BD est double du troisième angle ; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION XI.

PROBLÈME.

Dans un cercle donné, inscrire un pentagone, équilatéral et équiangle.

Soit ABCDE (fig. 115) le cercle donné : il faut inscrire dans ce cercle un pentagone équilatéral et équiangle

Soit le triangle isocèle FGH, ayant, chacun des angles de sa base G, H double de l'angle E (prop. 10. IV). Inscrivez dans le cercle. ABCDE un triangle ACD équiangle avec le triangle FGH (prop. 2. IV), de manière que l'angle CAD soit égal à l'angle F, et de manière que chacun des angles ACB, CDA soit égal à chacun des angles G, H qui sont placés sur la base GH. Chacun des angles ACD, CDA sera double de l'angle CAD. Partagez chacun des angles ACD, CDA en deux parties égales par les droites CE, DB (prop. 9. I), et menez les droites AB, BC, DE, EA.



Puisque chacun des angles ACD, CDA est double de l'angle CAD, et que chacun de ces angles est coupé en deux parties égales par les droites CE, DB, les cinq angles DAC, ACE, ECD, CDB, BDA sont égaux entre eux; mais des angles égaux sont appuyés sur des arcs égaux (prop. 26. III) : donc les cinq arcs AB, BC, CD, DE, EA sont égaux; mais des cordes égales sous-tendent des arcs égaux (prop. ag. III) : donc les cinq cordes AB, BC, CD, DE, EA sont égales entre elles : donc le pentagone ABCDE est équilatéral. Je dis qu'il est aussi équiangle ; car puisque l'arc AB est égal à l'arc DE, si l'on ajoute un arc commun BCD, l'arc total ABCD sera égal à l'arc total EDCB. Or l'angle AED est appuyé sur l'arc ABCD et l'angle BAE est appuyé sur l'arc EDCB : donc l'angle BAE est égal à l'angle AED (prop. 27. III) ; par la même raison chacun des angles ABC, BCD, CDE est égal à chacun des angles BAE, AED : donc le pentagone ABCDE est équiangle; mais il a été démontré, qu'il est équilatéral. Donc dans un cercle donné, on a inscrit un pentagone équilatéral et équiangle; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION XII.

PROBLÈME.

Circonscrire à un cercle donné un pentagone équilatéral et équiangle.

Soit ABCDE (fig. 116) le cercle donné: il faut à ce cercle circonscrire un pentagone équilatéral et équiangle.

Supposons que les points A, B, C, D, E soient les sommets des angles d'un pentagone inscrit dans ce cercle (prop. 11. IV), de manière que les arcs AB, BC, CD, DE, EA soient égaux; par les points A, B, C, D, E, conduisez à ce cercle les tangentes GH, HK, KL, LM, MG (prop. 17. III); et ayant pris le centre F du cercle ABCDE, menez les droites FB, FK, FC, FL, FD.



Puisque la droite KL touche le cercle ABCDE au point C, et que la droite FC a été menée du centre F au point de contact C, la droite F C sera perpendiculaire sur KL (prop. 18. III): donc chacun des angles FCK, FCL est droit; chacun des angles FBH, FBK, FDL, FDM est droit par la même raison. Puisque l'angle FCK est droit, le carré de la droite FK est

égal aux carrés des droites FC, CK (prop. 47. I).

Le carré de la droite FK est égal aux carrés des droites FB, BK, par la même raison : donc les carrés des droites FC, CK sont égaux aux carrés des droites FB, BK; mais le carré de la droite FC est égal au carré de la droite FB : donc le carré restant de la droite CK sera égal au carré restant de la droite BK : donc la droite CK est égale à la droite BK. Puisque la droite FB est égale à la droite FG et que la droite FK est commune, les deux droites BF, FK sont égales aux deux droites CF, FK ; mais la base BK est égale à la base CK : donc l'angle BFK est égal à l'angle KFC, et l'angle BKF à l'angle FKC (prop. 8. I) : donc l'angle BFC est double de l'angle KFC et l'angle BKC double de l'angle FKC. Par la même raison l'angle CFD est double de l'angle CFL, et l'angle CLD double de l'angle CLF. Puisque l'arc BC est égal à l'arc CD, l'angle BFC sera égal à l'angle CFD (prop. 27. III) ; mais l'angle BFC est double de l'angle KFC, et l'angle DFC double de l'angle LFC : donc l'angle KFC est égal à l'angle CFL : donc les deux triangles FKC, FLC ont deux angles égaux à deux angles, chacun à chacun, et un côté égal à un côté, puisque le côté FC leur est commun : donc ces deux triangles ont leurs autres côtés égaux aux autres côtés, et l'angle restant égal à l'angle restant (prop. 26. I) : donc la droite KC est égale à la droite CL, et l'angle FKC égal à l'angle FLC. La droite KL sera double de la droite KC, puisque la droite KC est égale à la droite CL. Par la même raison la droite HK sera double de la droite BK. De plus, puisqu'on a démontré que la droite BK est égale à la droite KC, que la droite KL est double de la droite KC et la droite HK double de la droite BK, la droite HK sera égale à la droite KL. Nous démontrerons semblablement que chacune des droites GH, GM, ML est égale à l'une ou à l'autre des droites HK, KL : donc le pentagone GHKLM est équilatéral. Je dis aussi qu'il est équiangle ; car puisque l'angle FKC

est égal à l'angle FLC, et qu'on a démontré que l'angle HKL est double de l'angle FKC et l'angle KLM double aussi de l'angle FLC, l'angle HKL sera égal à l'angle KLM. Nous démontrerons par une raison semblable que chacun des angles KHG, HGM, GML est égal à l'un ou à l'autre des angles HKL, KLM : donc les cinq angles GHK, HKL, KLM, LMG, MGH sont égaux entre eux : donc le pentagone GHKLM est équiangle. Nous avons démontré qu'il est équilatéral, et il est circonscrit au cercle ABCDE ; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION XIII.

PROBLÈME.

Dans un pentagone équilatéral et équiangle, inscrire un cercle.

Soit ABCDE (fig. 117) le pentagone équilatéral et équiangle donné : il faut inscrire un cercle dans le pentagone ABCDE.



Partagez chacun des angles BCD, CDE en deux parties égales par les droites CF, DF (prop. 9. I) ; et du point F où les deux droites CF, DF se rencontrent, menez les droites FB, FA, FL. Puisque la droite BC est

égale à la droite C D et que la droite FC est commune, les deux droites BC, CF sont égales aux deux droites DC, CF ; mais l'angle BCF est égal à l'angle DCF : donc la base BF est égale à la base DF (prop. 4. I) ; le triangle BFC est égal au triangle DCF et les autres angles, qui sous-tendent des côtés égaux dans ces deux triangles sont égaux entre eux (prop. 4. I) : donc l'angle CBF sera égal à l'angle CDF et puisque l'angle CDE est double de l'angle CDF et que l'angle CDE est égal à l'angle ABC et l'angle CDF égal à l'angle CBF, l'angle CBA sera double de l'angle CBF, et par conséquent l'angle ABF sera égal à l'angle FBC : donc l'angle ABC est partagé en deux parties égales par la droite BF. Nous démontrerons semblablement que chacun des angles BAE, AED est partagé en deux parties égales par les droites FA, FE. Actuellement du point F conduisez sur les droites AB, BC, CD, DE, EA les perpendiculaires FG, FH, FK, FL, FM. Puisque l'angle HCF est égal à l'angle KCF et que l'angle droit FHC est égal à l'angle droit FKC, les deux triangles FHC, FKC auront deux angles égaux à deux angles et un côté égal à un côté ; savoir, le côté commun FC qui soutend des angles égaux : donc ces deux triangles auront les autres côtés égaux aux autres côtés (prop. 26. I), et la perpendiculaire FH sera égale à la perpendiculaire FK. On démontrera semblablement que chacune des droites FL, FM, FG est égale à l'une ou à l'autre des droites FH, FK : donc les cinq droites FG, FH, FK, FL, FM sont égales entre elles : donc si du centre F et avec un intervalle égal à une des droites FG, FH, FK, FL, FM on décrit une circonférence de cercle, cette circonférence passera par les autres points et touchera les droites AB, BC, CD, DE, EA, parce que les angles sont droits en G, H, K, L, M ; en effet, si au lieu de les toucher, elle les coupait, la perpendiculaire menée à l'extrémité d'un diamètre entrerait dans le cercle ; ce qui a été démontré absurde (prop. 16. 3) : donc la circonférence décrite du centre F avec un intervalle égal à une des droites FG, FH, FK, FL, FM ne coupera point

les droites AB, BC, CD, DE, EA: donc elle les touchera. Décrivez la circonférence GHKLM.

Donc on a inscrit une circonférence de cercle dans un pentagone équilatéral et équiangle ; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION XIV.

PROBLÈME.

Circonscrire une circonférence de cercle à un pentagone équilatéral et équiangle donné.

Soit ABCDE (fig. 118) un pentagone équilatéral et équiangle : il faut à ce pentagone circonscrire une circonférence de cercle.



Partagez en deux parties égales chacun des angles BCD, CDE par les droites CF, FD (prop. 9. I), et du point F où ces droites se rencontrent, menez aux points B, A, E les droites FB, FA, FE. Nous démontrerons, comme dans la proposition précédente, que chacun des angles CBA, BAE, AED est coupé en deux parties égales par les droites BF, FA, FE. Puisque l'angle BCD est égal à l'angle CDE, et que l'angle FCD est la moitié de l'angle BCD, et l'angle CDF la moitié de l'angle CDE, l'angle FCD sera égal à l'angle FDC : donc le côté FC est égal au côté FD (prop. 6. I). On

démontrera semblablement que chacune des droites FB, FA, FE est égale à chacune des droites FC, FD : donc les cinq droites FA, FB, FC, FD, FE sont égales entre elles : donc la circonférence décrite du point F et avec un intervalle égal à une des droites FA, FB, FC, FD, FE passera par les autres points et sera circonscrite au pentagone équilatéral et équiangle ABCDE. Décrivez la circonférence ABCDE.

Donc une circonférence de cercle a été circonscrite à un pentagone équilatéral et équiangle ; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION XV.

PROBLÈME.

Inscrire dans un cercle donné un hexagone équilatéral et équiangle.

Soit ABCDEF (fig. 119) le cercle donné : il faut dans ce cercle inscrire un hexagone équilatéral et équiangle.

Menez le diamètre AD du cercle ABCDEF, prenez le centre G de, ce cercle, et du centre D avec l'intervalle DG décrivez la circonférence EGCH (dem. 3) ; menez les droites EG, CG, prolongez-les vers les points B, F, et menez les droites AB, BC, CD, DE, EF, FA : je dis que l'hexagone ABCDEF est équilatéral et équiangle.



Puisque le point G est le centre du cercle ABCDEF, la droite GE sera égale à la droite GD. De plus, puisque le point D est le centre du cercle EGCH, la droite DE sera égale à la droite DG ; mais on a démontré que la droite GE est égale à la droite GD : donc la droite GE est égale à la droite ED : donc le triangle EGD est équilatéral : donc ses trois angles EGD, GDE, DEG sont égaux entre eux, puisque dans les triangles isocèles les angles à la base sont égaux entre eux (prop. 5. I) ; mais les trois angles d'un triangle sont égaux à deux droits (prop. 32. I) : donc l'angle EGD est le tiers de deux angles droits. On démontrera semblablement que l'angle DGC est le tiers de deux angles droits ; donc, puisqu'une droite CG tombant sur la droite EB fait les angles de suite EGC, CGB égaux à deux droits (prop. 13. I), l'angle restant CGB sera le tiers de deux angles droits : donc les angles EGD, DGC, CGB sont égaux entre eux; mais les angles BGA, AGF, FGE sont égaux aux angles EGD, DGG, CGB, parce que ces angles sont opposés par le sommet (prop. 15. I): donc les six angles EGD, DGC, CGB, BGA, AGF, FGE sont égaux entre eux; mais des angles égaux s'appuient sur des

arcs égaux (prop. 26. III) : donc les six arcs AB, BC, CD, DE, EF, FA sont égaux entre eux ; mais des arcs égaux sont sous-tendus par des cordes égales (prop. 29. III) : donc les six cordes sont égales entre elles : donc l'hexagone ABCDEF est équilatéral. Je dis qu'il est équiangle, car puisque l'arc AF est égal à l'arc ED, si nous leur ajoutons à chacun l'arc ABCD, l'arc total FABCD sera égal à l'arc total EDCBA : donc, puisque l'angle FED s'appuie sur l'arc FABCD et que l'angle AFE s'appuie sur l'arc EDCBA, l'angle AFE est égal à l'angle DEF (prop. 27. III). On démontrera semblablement que les autres angles de l'hexagone ABCDEF sont égaux chacun à l'un ou à l'autre des angles AFE, FED : donc l'hexagone ABCDEF est équiangle. Mais on a démontré qu'il est équilatéral, et il est inscrit dans le cercle ABCDEF.

Donc on a inscrit un hexagone équilatéral et équiangle dans un cercle donné; ce qu'il fallait faire.

Il suit manifestement de là que le côté de l'hexagone est égal au demi-diamètre du cercle.

Si par les points A, B, C, D, E, F nous menons des tangentes au cercle, on circonscrira à ce cercle un hexagone équilatéral et équiangle en suivant la méthode que nous avons donnée pour le pentagone ; c'est aussi de la même manière que nous inscrirons et que nous circonscrirons une circonférence de cercle à un hexagone donné.

PROPOSITION XVI.

PROBLÈME.

Inscrire dans un cercle donné un quindécagone équilatéral et équiangle.

Soit ABCD (fig. 120) le cercle donné : il faut dans ce cercle inscrire un quindécagone équilatéral et équiangle.



Inscrivez dans le cercle ABCD le côté AC d'un triangle équilatéral et le côté AB d'un pentagone équilatéral. Puisque la circonférence entière ABCD doit être partagée en quinze parties égales, l'arc ABC qui est la troisième partie de la circonférence en contiendra cinq, et l'arc AB qui est le cinquième de la circonférence en tiendra trois : donc l'arc restant BC en contiendra deux. Partagez l'arc restant BC en deux parties égales au point E (prop. 30. III), chacun des arcs BE, EC sera la quinzième partie de la circonférence du cercle ABCD : donc si l'on porte une des droites BE, EC sur la circonférence ABCD autant de fois qu'on le pourra (prop. 1. IV), on aura un quindécagone équilatéral et équiangle qui sera inscrit dans cette circonférence; ce qu'il fallait faire.

En suivant la méthode que nous avons donnée pour le pentagone, si par les points de division d'un cercle on conduit des tangentes à ce cercle, on circonscrira à ce cercle un quindécagone équilatéral et équiangle. En suivant la même méthode, nous inscrirons et nous circonscrirons une circonférence de cercle à un quindécagone équilatéral et équiangle donné.

FIN DU QUATRIÈME LIVRE.

RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE

ALLER À LA TABLE DES MATIÈRES D'EUCLIDE

EUCLIDE

Géométrie

LIVRE VI

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

INTRODUCTION -GEOMETRIE LIVRE I - LIVRE II - LIVRE III - LIVRE IV

Euclide le Géomètre

LES ÉLÉMENTS DE GÉOMÉTRIE D'EUCLIDE,

traduits littéralement, et suivis d'un Traité du Cercle,

du Cylindre, du Cône et de la Sphère;

de la mesure des Surfaces et des Solides ; avec des Notes ;

Par F. PEYRARD,

Bibliothécaire

de l'École Polytechnique.

OUVRAGE APPROUVÉ PAR L'INSTITUT NATIONAL.

Et nova sunt semper. — OVIDE,...

A PARIS,

CHEZ F. LOUIS, LIBRAIRE, RUE DE SAVOIE, N° 12.

AN XII - l804.

EUCLIDE

ELEMENTS

LIVRE VI.

DÉFINITIONS.

1. LES figures rectilignes semblables sont celles dont les angles sont égaux chacun à chacun et dont les côtés placés autour des angles égaux sont proportionnels.

2. Les figures sont réciproques lorsque les antécédents et les conséquents des raisons se trouvent dans l'une et l'autre figure.

3. Une droite est dite coupée en extrême et moyenne raison lorsque la droite totale est au plus grand segment comme le plus grand segment est au plus petit.

4. La hauteur d'une figure est une perpendiculaire menée de son sommet sur sa base.

5. On dit qu'une raison est composée de raisons lorsque les quantités des raisons multipliées entre elles produisent la quantité de cette raison.

PROPOSITION PREMIÈRE.

THÉORÈME.

Les triangles et les parallélogrammes qui ont la même hauteur sont entre eux comme leurs bases.

Soient les triangles ABC, ACD (fig. 121) et les parallélogrammes EC, CF qui ont la même hauteur, savoir, la perpendiculaire menée du point A sur la droite BD : je dis que le triangle ABC est au triangle ACD et que le parallélogramme EC est au parallélogramme CF comme la base BC est à la base CD.

Prolongez la droite BD de part et d'autre vers les points H, L, et faites les droites BG, GH égales chacune à la base B C ; faites aussi les droites DK, KL égales chacune à la base CD, et menez les droites AG, AH, AK, AL.



Puisque les droites CB, BG, GH sont égales entre elles, les triangles AGH, AGB, ABC seront égaux entre eux (prop. 38. I) : donc le triangle AHC contient le triangle ABC autant de fois que la base HC contient la base BC. Par la même raison le triangle ALC contient le triangle ACD autant de fois que la base LC contient la base CD. Si la base HC est égale à la base CL, le triangle AHC sera égal au triangle ABC (prop. 38. I) ; si la base HC surpasse la base CL, le triangle AHC

surpassera le triangle ALC, et si cette base est plus petite le triangle sera plus petit. Ayant donc quatre quantités, savoir, les deux bases BC, CD et, les deux triangles ABC, ACD, on a pris des équimultiples de la base BC et du triangle ABC, savoir, la base HC et le triangle AHC ; on a pris aussi d'autres équimultiples de la base CD et du triangle ACD, savoir, la base CL et le triangle ALC ; et l'on a démontré que si la base HC surpasse la base CL, le triangle AHC surpassera le triangle ALC; que si la base HC est égale à la base CL, le triangle AHC sera égal au triangle ALC, et que si la base HC est plus petite que la base GL, le triangle AHC sera plus petit que le triangle ALC : donc le triangle ABC est au triangle ACD comme la base BC et la base CD (déf. 5. 5).

Puisque le parallélogramme EC est double du triangle ABC, que le parallélogramme FC est double aussi du triangle ACD (prop. 41. I), et à cause que les parties ont entre elles la même raison que leurs équimultiples (prop. 15. V), le parallélogramme EC sera un parallélogramme FC comme le triangle ABC est un triangle ACD : donc puisqu'on a démontré que le triangle ABC est au triangle ACD comme la base BC est à la base CD; et à cause que le parallélogramme EC est au parallélogramme FC comme le triangle ABC est au triangle ACD, le parallélogramme EC sera au parallélogramme FC comme la base BC est à la base CD (prop. 11. V).

Donc les triangles et les parallélogrammes qui ont la même hauteur sont entre eux comme leurs bases ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION II.

THÉORÈME.

Si l'on conduit une droite qui soit parallèle à un des côtés d'un triangle, cette droite coupera proportionnellement les côtés de ce triangle; et si deux côtés d'un triangle sont coupés proportionnellement, la

droite qui joindra les sections sera parallèle au côté restant du triangle.

Que l'on mène la droite DE (fig. 122) de manière qu'elle soit parallèle à un des côtés du triangle ABC : je dis que CE est à EA comme BD est à DA. Menez les droites BE, CD.



Le triangle BDE est égal au triangle CDE (prop. 37. I), parce qu'ils ont la même base et qu'ils sont compris entre les mêmes parallèles.

Mais deux quantités égales ont la même raison avec une même quantité (prop. 7. V) : donc le triangle CDE est au triangle ADE comme le triangle BDE est au triangle ADE. Mais le triangle BDE est au triangle ADE comme BD est à DA : car ces deux triangles, qui ont la même hauteur, savoir, la perpendiculaire menée du point E sur la base AB, sont entre eux comme leurs bases (prop. 1. VI). Par la même raison le triangle CDE est au triangle ADE comme CE est à EA : donc BD est à DA comme CE est à EA (prop. 11. V).

Si les côtés AB, AC du triangle ABC sont coupés proportionnellement aux points D, E de manière que BD soit à DA comme CE est à EA, et si l'on mène la droite DE : je dis que la droite DE est parallèle à la droite BC.

Faites la même construction. Puisque BD est à DA comme CE est à EA, que BD est à DA comme le triangle BDE est au. triangle ADE (prop. 1. VI), et que CE est à EA comme le triangle CDE est au triangle ADE; le triangle BDE sera au triangle ADE comme le triangle CDE est au triangle ADE (prop. 11. V) : donc chacun des triangles BDE, CDE a la même

raison avec le triangle ADE : donc le triangle BDE est égal au triangle CDE (prop. 9, V), et ils ont la même base. Mais des triangles égaux et construits sur la même base sont compris entre les mêmes parallèles (prop. 39. I) : donc la droite DE est parallèle à la droite BC.

Donc si l'on conduit une droite qui soit parallèle à un des côtés d'un triangle, cette droite coupera proportionnellement les côtés de ce triangle ; et si les côtés d'un triangle sont coupés proportionnellement, la droite qui joindra les sections sera parallèle au côté restant de ce triangle ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION III.

THÉORÈME.

Si un angle d'un triangle est partagé en deux parties égales, et si la droite qui partage cet angle coupe la base, les segments de la base auront la même raison que les autres côtés de ce triangle ; et si les segments de la hase ont la même raison que les autres côtés du triangle, la droite qui est menée du sommet à la section partagera l'angle de ce triangle en deux parties égales.

Soit le triangle ABC (fig. 123), que l'angle BAC soit partagé en deux parties égales par la droite AD : je dis que BD est à DC comme BA est à AC.

Par le point C menez la droite CE parallèle à la droite DA (prop. 31. I) ; prolongez la droite BA jusqu'à ce qu'elle rencontrera la droite CE au point E.



Puisque la droite AC tombe sur les parallèles AD, EC, l'angle ACE sera égal à l'angle CAD (prop. 29. I) ; mais l'angle CAD est supposé égal à l'angle BAD : donc l'angle BAD sera égal à l'angle ACE. De plus, puisque la droite BAE tombe sur les parallèles AD, EC, l'angle extérieur BAD est égal à l'angle intérieur AEC (prop. 29. I). Mais on a démontré que l'angle ACE est égal à l'angle BAD : donc l'angle ACE sera égal à l'angle AEC : donc le côté AE sera égal au côté AC (prop. 6. I). Puisque la droite AD est parallèle à un des côtés du triangle BCE, savoir, au côté EC, la droite BD sera à la droite DC comme la droite BA est à la droite AE (prop. 2. VI). Mais la droite AE est égale à la droite AC : donc la droite BD est à la droite DC comme la droite BA est à la droite AC (prop. 7. V).

Supposons à présent que la droite BD soit à la droite DC comme la droite BA est à la droite AC ; menez la droite AD : je dis que l'angle BAC est partagé en deux parties égales par la droite AD.

Faites la même construction. Puisque BD est à DC comme BA est à AC, et que BD est à DC comme BA. est à AE (prop. 2. VI), car la droite AD est parallèle à un des côtés du triangle BCE, savoir au côté EC, il est évident que BA sera à AC comme BA est à AE : donc la droite AC est égale à la droite AE (prop. 9. V) : donc l'angle AEC est égal à l'angle ACE (prop. 5, I); mais l'angle AEC est égal à l’angle extérieur BAD (prop. 29.

I), et l'angle ACE égal à l'angle alterne CAD : donc l'angle BAD sera égal à l'angle CAD : donc l'angle BAC est partagé en deux parties égales par la droite AD.

Donc si un angle d'un triangle est partagé en deux parties égales, et si la droite qui partage cet angle coupe la base, les segments de la base auront la même raison que les autres côtés de ce triangle ; et si les segments de la base ont la même raison que les autres côtés du triangle, la droite qui est menée du sommet à la section de la base partage l'angle de ce triangle en deux parties égales ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION IV.

THÉORÈME.

Dans les triangles équiangles, les côtés qui sont autour des angles égaux sont proportionnels ; et on appelle côtés homologues ceux qui sous-tendent des angles égaux.

Soient les triangles équiangles ABC, DCE (fig. 124) dont l'angle ABC soit égal à l'angle DCE, l'angle ACB égal à l'angle DEC, et l'angle BAC égal à l'angle CDE : je dis que dans les deux triangles ABC, DCE, les côtés qui sont autour des angles égaux sont proportionnels, et que les côtés qui sous-tendent des angles égaux sont homologues.



Placez le côté BC dans la direction de CE; puisque les angles ABC, ACB sont moindres que deux angles droits (prop. 17. I), et que

l'angle ACB est égal à l'angle DEC, les angles ABC, DEC seront plus petits que deux angles droits : donc les deux droites BA, ED étant prolongées se rencontreront entre elles (ax. 11) et supposons qu'elles se rencontrent au point F.

Puisque l'angle DCE est égal à l'angle ABC, la droite DC sera parallèle à la droite BF (prop. 28. I). De plus, puisque l'angle ACB est égal à l'angle DEC, la droite AC sera parallèle à la droite FE. Donc la figure FACD est un parallélogramme : donc la droite FA est égale à la droite FD et la droite AC égale à la droite FD (prop. 34. I) et puisqu'un des côtés du triangle FBE, savoir, le côté AC est parallèle au côté FE, le côté BA sera au côté AF comme le côté BC est au côté CE (prop. 2. VI). Mais la droite AF est égale à la droite CD ; donc BA est à CD comme BC est à CE (prop. 7. V), et, en alternant, AB est à BC comme CD est à CE (prop. 16. V). De plus, puisque la droite CD est parallèle à la droite BF, la droite BC sera à la droite CE comme la droite FD est à la droite DE. Mais la droite DF est égale à la droite AC : donc BC est à CE comme AC est à ED, et en alternant, BC est à CA comme CE est à ED; mais puisqu'on a démontré que AB, est à BC comme DC est à CE, et que BC est à CA comme CE est à ED, la droite BA sera à la droite AC comme CD est à DE (prop. 23. V). Donc dans les triangles équiangles les côtes qui sont autour des angles égaux sont proportionnels, et les côtés qui sous-tendent des angles égaux sont homologues ; ce qu'il fallait dé montrer.

PROPOSITION V.

THÉORÈME.

Si deux triangles ont leurs côtés proportionnels, ces deux triangles seront équiangles et les angles sous-tendus par les côtés homologues seront égaux.

Soient deux triangles ABC, DEF (fig. 125) dont les côtés soient proportionnels, de

manière que AB soit à BC comme DE est à EF, que BC soit à CA comme EF est à FD et que BA soit à AC comme ED est à DF : je dis que les triangles ABC, DEF sont équiangles et que les angles sous-tendus par les côtés homologues sont égaux, savoir, l'angle ABC égal à l'angle DEF, l'angle BCA égal à l'angle EFD, et enfin l'angle BAC égal à l'angle EDF.



Construisez sur la droite EF et aux points E, F l'angle FEG égal à l'angle ABC et l'angle EFG égal à l'angle BCA (prop. 25. I) ; le troisième angle BAC sera égal au troisième angle ÉGF (prop. 32. I) : donc les triangles ABC, EGF sont équiangles : donc dans les deux triangles ABC, EGF, les côtés qui sont autour des angles égaux sont proportionnels et les côtés qui sous-tendent les angles égaux sont homologues (prop. 4. VI) : donc AB est à BC comme GE est à EF, mais AB est à BC comme DE est à EF : donc DE est à EF comme GE est à EF (prop. 11. V) : donc l'une et l'autre des droites DE, GE ont la même raison avec la droite EF : donc la droite DE est égale à la droite GE (prop. 9. V). La droite DF sera égale à la droite GF, par la même raison. Donc, puisque la droite EG est égale à la droite DE, et que la droite EF est commune, les deux droites DE, EF sont égales aux deux droites GE, EF ; mais la base DF est égale à la base GF : donc l'angle DEF est égal à l'angle GEF (prop. 8. I); donc le triangle DEF est égal au triangle GEF et les autres angles qui sont sous-tendus par les côtés égaux sont encore égaux : donc l'angle DFE est égal à l'angle GFE et l'angle EDF égal à l'angle EGF. Puisque DEF est égal à

l'angle GEF et que l'angle GEF est égal à l'angle ABC, par construction, l'angle ABC sera égal à l'angle DEF. Par la même raison l'angle ACB sera égal à l'angle DFE et l'angle A égal à l'angle D : donc les triangles ABC, DEF sont équiangles.

Donc si deux triangles ont leurs côtés proportionnels, ces deux triangles seront équiangles, et les angles sous-tendus par les côtés homologues seront égaux ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION VI.

THÉORÈME.

Si deux triangles ont un angle égal à un angle, et si les côtés qui sont autour des angles égaux sont proportionnels, ces deux triangles seront équiangles et les angles sous-tendus par les côtés homologues seront égaux.

Soient les deux triangles ABC, DEF (fig. 126), ayant un angle BAC égal à un angle EDF, et ayant de plus les côtés qui sont autour des angles égaux proportionnels entre eux, de manière que BA soit à AC comme ED est à DF : je dis que les triangles ABC, DEF sont équiangles et que l'angle ABC est égal à l'angle DEF et l'angle ACB égal à l'angle DFE.



Sur la droite DF et aux points D, F construisez l'angle FDG égal à l'un ou à

l'autre des angles BAC, EDF et l'angle DFG égal à l'angle ACB (prop. 23. I). L'angle restant B sera égal à l'angle restant G (prop. 32. I) : donc les triangles ABC, DGF sont équiangles : donc B A est à AC comme GD est à DF (prop. 4. VI) ; mais on suppose que BA est à AC comme ED est à DF : donc ED est à DF comme GD est à DF (prop. 11. V) : donc le côté ED est égal au côté DG (prop. 9. V); mais le côté DF est commun : donc les deux droites ED, DF sont égales aux deux droites GD, DF; mais l'angle EDF est égal à l'angle GDF : donc la base EF est égale à la base FG (prop. 4. I) donc le triangle DEF égal au triangle GDF et les autres angles qui sont sous-tendus par les côtés égaux sont encore égaux : donc l'angle DFG est égal à l'angle DFE et l'angle G égal à l'angle E. Mais l'angle DFG est égal à l'angle ACB, par construction : donc l'angle ACB est égal à DFE; mais l'angle BAC est supposé égal à l'angle EDF : donc l'angle restant B est égal à l'angle restant E (prop. 32. I) : donc les deux triangles ABC, DEF sont équiangles.

Donc si deux triangles ont un angle égal à un angle, et si les côtés qui sont autour des angles égaux sont proportionnels, ces deux triangles seront équiangles, et les angles sous-tendus par les côtés homologues seront égaux ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION VII.

THÉORÈME.

Si deux triangles ont un angle égal à un angle, si les côtés placés autour de deux autres angles sont proportionnels entre eux, et si chacun des angles restons est en même temps ou plus petit ou n'est pas plus petit qu'un angle droit, les triangles seront équiangles et les angles adja-cens aux côtés proportionnels seront égaux.

Soient les deux triangles ABC, DEF (fig. 127) ayant un angle égal à un angle, savoir, l'angle BAC égal à l'angle EDF et les côtés qui sont autour de deux autres angles ABC,

DEF proportionnels entre eux, de manière que DE soit à EF comme AB est à BC, et que chacun des deux autres angles ACB, DFE soit plus petit qu'un angle droit : je dis que les triangles ABC, DEF sont équiangles, que l'angle ABC est égal à l'angle DEF, et l'angle ACB égal à l'angle DFE.



Car si l'angle ABC n'est pas égal à l'angle DEF, l'un d'eux sera plus grand. Que l'angle ABC soit le plus grand. Construisez sur la droite AB et au point B un angle ABG égal à l'angle DEF (prop. 23. I).

Puisque l'angle A est égal à l'angle D et l'angle ABG égal à l'angle DEF, l'angle AGB sera égal à l'angle DFE (prop. 32. I) : donc les triangles ABG, DEF sont équiangles : donc AB est à BG comme DE est à EF (prop. 4. VI) ; mais par supposition DE est à EF comme AB est à BC : donc AB est à BC comme AB est à BG (prop. 11. V) : donc la droite AB a la même raison avec chacune des droites BC, BG : donc la droite BC sera égale à la droite BG et par conséquent l'angle BGC est égal à l'angle BCG (prop. 5. I) ; mais on a supposé que l'angle G est plus petit qu'un angle droit : donc l'angle BGC est plus petit qu'un angle droit et par conséquent l'angle de suite AGB est plus grand, qu'un angle droit (prop. 13. I) ; mais on a démontré que l'angle AGB est égal à l'angle F : donc l'angle F est plus grand qu'un angle droit ; mais on a supposé qu'il était plus petit qu'un, angle droit, ce qui est absurde : donc les angles, ABG, DEF ne sont pas inégaux : donc ils sont égaux ; mais

l'angle A est égal à l'angle D : donc l'angle C est égal à l'angle F : donc les triangles ABC, DEF sont égaux.

Supposons à présent que l'un et l'autre des angles C, F n'est pas plus petit qu'un angle droit : je dis encore que les triangles ABC, DEF sont équiangles.

Ayant fait la même construction, nous démontrerons semblablement que le côté BC est égal au côté BG et l'angle C égal à l'angle BGC ; mais l'angle C n'est pas plus petit qu'un angle droit : donc l'angle BGC n'est pas plus petit qu'un angle droit : donc deux angles du triangle BGC ne sont pas plus petits que deux angles droits, ce qui est impossible (prop. 17. I) : donc les angles ABC, DEF ne sont pas inégaux : donc ils sont égaux ; mais l'angle A est égal à l'angle D : donc l'angle C est égal à l'angle F (prop. 32. I) : donc les triangles ABC, DEF sont équiangles.

Donc si deux triangles ont un angle égal à un angle, si les côtés placés autour de deux autres angles sont proportionnels entre eux, et si chacun-des angles restants est en même tems plus petit ou n'est pas plus petit qu'un angle droit, les triangles seront équiangles et les angles adja-cens aux côtés proportionnels seront égaux ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION VIII.

THÉORÈME;

Si dans un triangle rectangle on conduit une perpendiculaire de l'angle droit sur la base, les triangles placés autour de la perpendiculaire sont semblables au triangle total et semblables entre eux.

Soit le triangle rectangle ABC (fig. 128) dont l'angle BAC est droit; du point A conduisez la perpendiculaire AD sur la base BC : je dis que les triangles ABD, ADC sont semblables au triangle total ABC et semblables entre eux.



Car puisque l'angle BAC est égal à l'angle ADB, étant droits l'un et l'autre, et que l'angle B est commun aux deux triangles ABC, ABD, l'angle restant ACB sera égal à l'angle restant BAD (prop. 32. I) : donc les deux triangles ABC, ABD sont équiangles : donc le côté BC qui sous-tend l'angle droit du triangle ABC, est au côté BA qui sous-tend l'angle droit du triangle ABD comme le côté AB qui sous-tend l'angle C du triangle ABC, est au côté BD qui sous-tend un angle égal à l'angle C, c'est-à-dire l'angle BAD du triangle ABD, et enfin comme le côté AC est au côté AD qui soutend un angle B commun à ces deux triangles : donc les triangles ABC, ABD sont équiangles, et les côtés placés autour à des angles égaux sont proportionnels entre eux (prop. 4. VI) : donc le triangle ABC est semblable au triangle ABD (déf. 1. VI). Nous démontrerons que de même le triangle ADC est semblable au triangle ABC : donc chacun des triangles ABD, ADC est semblable au triangle total ABC.

Je dis de plus que les triangles ABD, ADC sont semblables entre eux.

Car puisque l'angle droit BDA est égal à l'angle droit ADC, et à cause qu'il a été dé montré que l'angle BAD est égal à l'angle C, l'angle restant B sera égal à l'angle restant DAC (prop. 32. I) : donc les deux triangles ABD, ADC sont équiangles : donc le côté BD du triangle ABD, qui sous-tend l'angle BAD est au côté DA du triangle ADC, qui sous-tend l'angle C égal à l'angle BAD, comme le côté AD du triangle ABD qui sous-tend l'angle B est au côté DC du triangle ADC qui sous-tend l'angle DAC égal à l'angle B, et comme le

côté BA qui soutend l'angle droit ADB est au côté AC qui soutend l'angle droit ADC (prop. 4. VI) : donc le triangle ABD est semblable au triangle ADC (déf. 1. VI).

Donc si dans un triangle rectangle, on conduit une perpendiculaire de l'angle droit sur la base, les triangles placés autour de la perpendiculaire sont semblables au triangle total et semblables entre eux ; ce qu'il fallait démontrer.

COROLLAIRE.

Il suit de là que, dans un triangle rectangle la perpendiculaire conduite de l'angle droit, sur la base, est moyenne proportionnelle entre les segments de la base, et que chaque côté de l'angle droit est moyen proportionnel entre la base et le segment qui lui est contigu.

PROPOSITION IX.

PROBLÈME.

D'une droite donnée retrancher une partie demandée.

Soit AB (fig. 129) la droite donnée : il faut de la droite AB retrancher une partie demandée.

Que la partie demandée soit le tiers de cette droite du point A conduisez une droite quelconque AC qui fasse avec la droite AB un angle quelconque ; prenez sur la droite À C un point quelconque D et faites les droites DE, EC égales chacune à la droite AD (prop. 3. I); conduisez ensuite la droite BC et par le point D conduisez la droite DF parallèle à la droite BC (prop. 31. I).



Puisqu'on a conduit la droite FD parallèle à un des côtés du triangle ABC, savoir, au côté BC, la droite CD sera à la droite DA comme la droite BF est à la droite FA (prop. 2. VI); mais la droite CD est double de la droite DA : donc la droite BF est double de la droite FA : donc la droite BA est double de la droite AF.

Donc on a retranché de la droite donnée AB sa troisième partie demandée ; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION X.

PROBLÈME.

Partager une droite donnée qui n'est point partagée de la même manière qu'une autre droite donnée est partagée.

Soit AB (fig. 130) la droite donnée qui n'est point partagée et AC la droite donnée qui est partagée: il faut partager la droite AB qui n'est pas partagée de la même manière que la droite AC est partagée.

Que la droite AC soit partagée aux points D, E, et que les droites AC, AB soient placées de manière qu'elles comprennent un angle quelconque. Conduisez la droite BC, et par les points D, E, conduisez les droites DF, EG parallèles à la droite BC (prop. 31. I), et par le point D conduisez la droite DHK parallèle à la droite AB.



Les figures FH, HB sont des parallélogrammes, et par conséquent la droite DH est égale à la droite FG et la droite HK égale à la droite GB (prop. 34. I) et puisqu'on a conduit la droite HE parallèle à un des côtés du triangle DKC, savoir, au côté KC, la droite CE sera à la droite ED comme la droite KH est à la droite HD (prop. 2. VI); mais puisque la droite KH est égale à la droite BG et que la droite HD est égale à la droite GF, la droite CE est à la droite ED comme la droite BG est à la droite GF. De plus, puisqu'on a conduit la droite F D parallèle à un des côtés du triangle AGE, savoir au côte EG, la droite ED sera à la droite DA comme]a droite G F est à la droite FA. Mais on a démontré que la droite CE est à la droite ED comme la droite BG est à la droite GF : donc la droite CE est à la droite ED comme la droite BG est à la droite GF, et la droite ED est à la droite DA comme la droite GF est à la droite FA.

Donc la droite donnée AB, qui n'est partagée, a été partagée de la même manière que la droite donnée AC; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION XI.

PROBLÈME.

Deux droites étant données, trouver une troisième proportionnelle.

Soient AB, AC (fig. 131) les deux droites données; placez-les de manière qu'elles comprennent un angle quelconque : il faut trouver une troisième proportionnelle aux droites AB, AC.



Prolongez les droites AB, AC vers les points D, E; faites la droite BD égale à la droite AC; menez la droite BC, et, par le point D, menez la droite DE parallèle à la droite BC (prop. 31. I).

Puisque la droite BC est parallèle à un des côtés du triangle ADE, savoir au côté DE, la droite AB sera à la droite BD comme la droite AC est à la droite CE (prop. 2. VI); mais la droite BD est égale à la droite AC : donc la droite AB est à la, droite AC comme la droite AC est à la droite CE.

Donc les deux droites AB, AC ayant été, données, on a trouvé une troisième proportionnelle CE; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION XII.

PROBLÈME.

Trois droites étant données, trouver une quatrième proportionnelle.

Soient A, B, C (fig. 132), les trois droites données, il faut trouver une quatrième proportionnelle aux trois droites A, B, C.

Menez les deux droites DE, DF, comprenant un angle quelconque EDF ; faites la droite DG

égale à la droite A, la droite GE égale à la droite B et la droite DH égale à la droite C. Menez la droite GH, et par le point E menez la droite EF parallèle à la droite GH.



Puisque la droite GH est parallèle à un des côtés du triangle DEF, savoir au côté EF, la droite DG sera à la droite GE comme la droite DH est à la droite HF (prop. 2. VI). Mais la droite DG est égale à la droite A, la droite GE égale à la droite B, et la droite DH égale à la droite C : donc la droite A est à la droite B comme la droite C est à la droite HF.

Donc trois droites A, B, C étant données, on a trouvé, une quatrième proportionnelle HF ; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION XIII.

PROBLÈME.

Deux droites étant données, trouver une moyenne proportionnelle.

Soient AB, BC (fig. 133) les deux droites données ; il faut trouver une moyenne proportionnelle entre ces deux droites.



Placez ces deux droites dans la même direction, et sur la droite AC décrivez le demi-cercle ADC, du point B élevez la perpendiculaire AC et menez les droites AD, DC (prop. 11. I).

Puisque l'angle ADC est dans un demi-cercle, cet angle est droit (prop. 31. III); et puisque dans le triangle rectangle ADC on a conduit de l'angle droit la droite DB perpendiculaire sur la base, la droite DB sera moyenne proportionnelle entre les segments de la base AB, BC (corrol. 8. VI).

Donc les deux droites AB, BC ayant été données, on a trouvé une moyenne proportionnelle DB; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION XIV.

PROBLÈME.

Si deux parallélogrammes égaux ont un angle égal à un angle, les côtés qui sont placés autour des angles égaux sont réciproquement proportionnels ; et si deux parallélogrammes ont un angle égal à un angle, et si les cotés qui sont placés autour des angles égaux sont réciproquement proportionnels, ces deux parallélogrammes sont égaux entre eux.

Soient AB, BC (fig. 134) deux parallélogrammes égaux, ayant deux angles égaux en B. Placez la droite BE dans la direction de DB; la droite BC sera dans la direction de FB (prop. 14. I) : je dis que les côtés des parallélogrammes AB, BC qui sont placés autour des angles égaux sont

réciproquement proportionnels, c'est-à-dire que DB est à BE comme GB est à BF.



Achevez le parallélogramme FE.

Puisque le parallélogramme AB est égal au parallélogramme BC et que EF est un troisième parallélogramme, AB sera à FE comme BC est à FE (prop. 7. V); mais AB est à FE comme DB est à BE (prop. 1. VI); et BC est à FE comme GB est à BF : donc DB est à BE comme GB est à BF (prop. 11. V) : donc les côtés des parallélogrammes AB, BC qui sont autour des angles égaux sont réciproquement proportionnels.

Supposons à présent que les côtés qui sont autour des angles égaux soient réciproquement proportionnels, c'est-à-dire que DB soit à BE comme GB est à BF : je dis que le parallélogramme AB est égal au parallélogramme BC.

Puisque DB est à BE comme GB est à BF que DB est à BE comme le parallélogramme AB est au parallélogramme FE (prop. 1. VI), et que GB est à BF comme le parallélogramme BC est au parallélogramme FE, AB sera à FE comme BG est à FE (prop. 11. V) : donc le parallélogramme AB est égal au parallélogramme BC. (prop. 9. V).

Donc si deux parallélogrammes égaux ont un angle égal à un angle, les côtés qui sont autour des angles égaux sont réciproquement proportionnels ; et si deux parallélogrammes ont un angle égal à un angle, et si les côtés qui sont autour des angles égaux sont

réciproquement proportionnels, ces deux parallélogrammes sont égaux; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XV.

THÉORÈME.

Si deux triangles égaux ont un angle égal à un angle, les côtés placés autour des angles égaux sont réciproquement proportionnels ; et si deux triangles ont un angle égal à un angle, et si les côtés placés autour de ces angles égaux sont réciproquement proportionnels, ces deux triangles sont égaux entre eux.

Soient ABC, ADE (fig. 135) des triangles égaux, ayant un angle égal à un angle, savoir, l'angle BAC égal à l'angle DAE : je dis que les côtés des triangles ABC, ADE placés autour des angles égaux sont réciproquement proportionnels entre eux, c'est-à-dire que CA est à AD comme EA est à AB.



Placez ces triangles de manière que la droite CA soit dans la direction de la droite AD; la droite EA sera dans la direction de la droite AB (prop. 14. I). Menez la droite BD.

Puisque le triangle ABC est égal au triangle ADE et que ABD est un autre triangle, le-triangle CAB sera au triangle BAD comme le triangle ADE est au triangle BAD (prop. 7. V) ; mais le triangle CAB est au triangle BAD comme CA est à AD (prop. 1. VI), et le triangle EAD est au triangle BAD comme

EA est à AB : donc CA est à AD comme EA est à AB (prop. 11. V) : donc les côtés des triangles ABC, ADE, qui sont autour des angles égaux, sont réciproquement proportionnels.

Supposons à présent que les côtés des triangles ABC, ADE soient réciproquement proportionnels, c'est-à-dire que CA soit à AD comme EA est à AB : je dis que le triangle ABC l'est égal au triangle ADE. Menez BD.

Puisque CA est à AD comme EA est à AB, que CA est à AD comme le triangle ABC est au triangle BAD (prop. 1. VI), et que EA est à AB comme le triangle EAD est au triangle BAD, le triangle ABC sera au triangle BAD comme le triangle EAD est au triangle BAD (prop. 11. V) : donc l'un et l'autre des triangles ABC, ADE ont la même raison avec le triangle BAD : donc le triangle ABC est égal au triangle EAD (prop. 9. V).

Donc si deux triangles égaux ont un angle égal a un angle, les côtés placés autour de ces angles égaux sont réciproquement proportionnels ; et si deux triangles ont un angle égal à un angle, et si les côtés placés autour des angles égaux sont réciproquement proportionnels, ces deux triangles seront égaux ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XVI.

THÉORÈME.

Si quatre droites sont proportionnelles, le rectangle compris sous les deux droites extrêmes est égal au rectangle qui est compris sous les deux droites moyennes ; et si le rectangle compris sous deux droites extrêmes est égal à celui qui est compris sous deux droites moyennes, ces *quatre droites sont proportionnelles.*

Soient AB, CD, E, F (fig. 136) quatre droites proportionnelles de manière qu'on ait AB est à CD comme E est à F : je dis que le rectangle compris sous les droites AB, F est

égal au rectangle compris sous les droites CD, E.

Des points A, C et sur les droites AB, CD élevez les perpendiculaires AG, CH (prop. 11. I), faites la droite AG égale à la droite F et la droite CH égale à la droite E, et terminez les parallélogrammes BG, DH.



Puisque AB est à CD comme E est à F et que E est égal à CH et F égal à AG, AB sera à CD comme CH est à AG (prop. 7. V) : donc les côtés des parallélogrammes BG, DH placés autour des angles égaux sont, réciproquement, proportionnels ; mais lorsque les côtés des parallélogrammes équiangles qui sont autour des angles égaux sont réciproquement proportionnels, ces parallélogrammes sont égaux entre eux (prop. 14. VI) : donc le parallélogramme BG est égal au parallélogramme DH, mais le parallélogramme BG est compris sous les droites AB, F ; car AG est égal à F, et le parallélogramme DH est compris sous les droites CD, E ; puisque CH est égal à E : donc le rectangle compris sous les droites AB, F est égal à celui qui est compris sous les droites CD, E.

Si le rectangle compris sous les droites AB, F est égal à celui qui est compris sous les droites CD, E : je dis que ces quatre droites sont proportionnelles, c'est-à-dire que AB est à CD comme E est à F.

Faites la même construction ; le rectangle compris sous les droites AB, F est égal à celui qui est compris sous les droites CD, E ; mais le, rectangle BG est compris sous les droites AB, F ; car AG est égal à F et le rectangle DH est compris sous les

droites CD, E, car CH est égal à E : donc le parallélogramme BG est égal au parallélogramme DH et ces deux parallélogrammes sont équiangles. Mais les côtés des parallélogrammes égaux et équiangles placés autour des angles égaux sont réciproquement proportionnels (prop. 14. VI) : donc AB est à CD comme CH est à AG; mais CH est égal à E et AG égal à F : donc AB est à CD comme E est à F.

Donc si quatre droites sont proportionnelles, le rectangle compris sous les droites extrêmes est égal au rectangle compris sous les droites moyennes ; et si un rectangle compris sous deux droites extrêmes est égal à un rectangle compris sous deux droites moyennes, ces quatre droites sont, proportionnelles ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XVII.

THÉORÈME.

Si trois droites sont proportionnelles, le rectangle compris sous les droites extrêmes est égal au carré de la droite moyenne; et si un rectangle compris sous deux droites extrêmes est égal au carré d'une droite moyenne, ces trois droites sont proportionnelles.

Soient AE, BG, C (fig. 137) trois droites proportionnelles, de manière que l'on ait AE est à BG comme BG est à C : je dis que le rectangle compris sous les droites AE, C est égal au carré de BG.

Faites la droite D égale à la droite BG.



Puisque AE est à BG comme BG est à C et que BG est égal à D, la droite AE sera à la droite BG comme la droite D est à la droite C ; mais si quatre droites sont proportionnelles, le rectangle compris sous les droites extrêmes est égal à celui qui est compris sous les droites moyennes (prop. 16. VI) : donc le rectangle compris sous les droites AE, C est égal à celui qui est compris sous les droites BG, D. Mais le rectangle compris sous les droites BG, D est égal au carré de BG, car la droite BG est égale à la droite D : donc le rectangle compris sous les droites AE, C est égal au carré de BG.

Si le rectangle compris sous les droites AE, C est égal au carré de BG : je dis que AE est à BG comme BG est à C.

Faites la même construction. Puisque le rectangle compris sous les droites AE, C est égal au carré de BG et que le carré de BG est un rectangle compris sous les droites BG, D, car BG est égal à D, le rectangle compris sous les droites AE, C. est égal au rectangle compris sous les droites BG, D. Mais si un rectangle compris sous deux droites extrêmes est égal à un rectangle compris sous deux droites moyennes, les quatre droites seront proportionnelles (prop 16. VI) : donc AE est à BG comme D est à C; mais BG est égal à D : donc AE est à BG comme BG est à C. Donc si trois droites sont proportionnelles, le rectangle compris sous les droites extrêmes sera égal au carré de la droite moyenne ; et

si un rectangle compris sous deux droites extrêmes est égal au carré de la droite moyenne, ces trois droites seront proportionnelles, ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XVIII.

PROBLEME.

Sur une droite donnée, décrire une figure rectiligne semblable à une autre et semblablement placée.

Soit AB (fig. 138) la droite donnée et CE la figure donnée : il faut sur la droite AB décrire une figure semblable à la figure CE et semblablement placée.



Menez la droite DF, et sur la droite AB et aux points A, B faites l'angle GAB égal à l'angle C, et l'angle ABG égal à l'angle CDF (prop. 23. I); l'angle restant CFD sera égal à l'angle restant AGB (prop. 32. I) : donc les triangles FCD, GAB sont équiangles : donc F D est à GB comme FC est à GA, et comme CD est à AB (prop. 4. VI). Construisez ensuite sur la droite BG et aux points B, G l'angle BGH égal à l'angle DFE et l'angle GBH égal à l'angle FDE ; l'angle E restant sera égal à l'angle H restant : donc les triangles FDE, GBH sont équiangles : donc FD est à GB comme FE est à GH, et comme ED est à HB (prop. 4. VI). Mais on a démontré que FD est à GB comme FC est à GA, et comme CD est à AB : donc FC est à G A comme CD est à AB, comme FE est à GH, et comme ED est à HB (prop. 11. V). Mais l'angle CFD est égal à l'angle AGB par

construction, et l'angle DFE égal à l'angle BGH : donc l'angle total CFE est égal à l'angle total AGH. Par la même raison, l'angle CDE est égal à l'angle ABH, l'angle C égal à l'angle A et l'angle E égal à l'angle H : donc les figures AH, CE sont équiangles, et elles ont les côtés opposés aux angles égaux proportionnels entre eux : donc les deux figures AH, CE sont semblables (déf. 1. VI).

Donc, sur la droite AB on a décrit la figure AH semblable à la figure CE et semblablement placée ; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION XIX.

THÉORÈME.

Les triangles semblables sont entre eux en raison doublée des côtés homologues.

Soient ABC, DEF (fig. 139) deux triangles semblables, ayant l'angle B égal à l'angle E. Supposons que AB soit à BC comme DE est à EF, de manière que le côté BC soit l'homologue du côté EF (déf. 12. V) : je dis que les triangles ABC, DEF sont entre eux en raison doublée des côtés BC, EF.



Prenez une troisième proportionnelle BG (fig. 138) aux droites BC, EF, de manière que BC soit à EF comme EF est à BG, et menez la droite GA (prop. 11. VI).

Puisque AB est à BC comme DE est à EF, si l'on rechange les places des moyens, on aura AB est à DE comme BC est à EF (prop. 16. V) ; mais BC est à EF comme EF est à BG : donc AB est à DE comme EF est à BG (prop. 11. 5) : donc les côtés des triangles ABG, DEF placés autour des angles égaux sont réciproquement proportionnels. Mais deux triangles sont égaux entre eux lorsqu'ils ont un angle égal à un angle et lorsque les côtés placés autour des angles égaux sont réciproquement proportionnels (prop. 15. VI) : donc le triangle ABG est égal au triangle DEF. Mais puisque BC est à EF comme EF est à BG, et que lorsque trois droites sont proportionnelles, la première et la troisième sont entre elles en raison doublée de la première et de la seconde (déf. 10. V), les droites BC et BG seront entre elles en raison doublée de BC et de EF ; mais BC est à BG comme le triangle ABC est au triangle ABG (prop. 1. VI) : donc le triangle ABC et le triangle ABG sont entre eux en raison doublée de BC et de EF ; mais le triangle ABG est égal au triangle DEF : donc le triangle ABC et le triangle DEF sont entre eux en raison doublée de BC et de EF (prop. 7. V).

Donc les triangles semblables sont entre eux en raison doublée des côtés homologues ; ce qu'il fallait démontrer.

COROLLAIRE.

Il suit manifestement de là que si trois droites sont proportionnelles, la première sera à la troisième comme triangle décrit sur la première est triangle semblable qui est décrit semblablement sur la seconde, puisqu'il a été démontré que CB est à BG comme le triangle ABC est au triangle ABG, c'est-à-dire au triangle DEF.

PROPOSITION XX.

THÉORÈME.

Les polygones semblables peuvent se diviser en triangles semblables, égaux en

nombre et proportionnels aux polygones ; et ces polygones sont entre eux en raison doublée de leurs côtés homologues.

Soient ABCDE, FGHKL (fig. 140) deux polygones semblables et que le côté AB soit l'homologue du côté FG : je dis que les polygones ABCDE, FGHKL peuvent se diviser en triangles semblables, égaux en nombre et proportionnels aux polygones, et que les polygones ABCDE, FGHKL sont entre eux en raison doublée des côtés AB, FG.

Menez les droites BE, EC, GL, LH.



Puisque le polygone ABCDE est semblable au polygone FGHKL, l'angle BAE est égal à l'angle GFL ; mais BA est à AE comme GF est à FL : donc, puisque ces deux triangles ont un angle égal à un angle et que les côtés placés autour des angles égaux sont proportionnels, les triangles ABE, FGL seront équiangles (prop. 6. VI), et par conséquent semblables (prop. 4. VI) : donc l'angle ABE est égal à l'angle FGL; mais l'angle total ABC est égal à l'angle total FGH, à cause de la similitude des polygones : donc l'angle restant EBC est égal à l'angle restant LGH ; mais à cause de la similitude des triangles ABE, FGL, EB est à BA comme LG est à GF, et à cause de la similitude des polygones, AB est à BC comme FG est à GH, EB sera à BC comme LG est à GH (prop. 22. V), c'est-à-dire que les côtés placés autour des angles égaux EBC, LGH

seront proportionnels : donc les triangles EBC, LGH sont équiangles (prop. 6. VI), et par conséquent semblables (prop. 4. VI). Par la même raison, les triangles ECD, LHK sont encore semblables : donc les polygones ABCDE, FGHKL sont divisés en triangles semblables et égaux en nombre.

Je dis de plus que ces triangles sont proportionnels aux polygones, c'est-à-dire que ces triangles sont entre eux comme les antécédents ABE, EBC, ECD sont aux conséquents FGL, LGH, LHK; je dis encore que les polygones ABCDE, FGHKL sont en raison doublée des côtés homologues, c'est-à-dire en raison doublée des côtés AB, FG.

Menez les droites AC, FH.

Puisqu'à cause de la similitude des polygones l'angle ABC est égal à l'angle FGH, et que AB est à BC comme F G est à GH, les triangles ABC, FGH seront équiangles (prop. 6. VI) : donc l'angle BAC est égal à l'angle GFH et l'angle BCA égal à l'angle GHF. De plus, puisque l'angle BAM est égal à l'angle GFN et qu'il a été démontré que l'angle ABM est égal à l'angle FGN, l'angle restant AMB sera égal à l'angle restant FNG (prop. 32. I) : donc les deux triangles ABM, FGN sont équiangles. Nous démontrerons semblablement que les deux triangles BMC, GNH sont équiangles : donc AM est à MB comme FN est à NG, et BM est à MC comme GN est à NH (prop. 4. VI) : donc AM est à MC comme FN est à NG (prop. 23. 5); mais A M est à MC comme le triangle ABM est au triangle MBC, comme le triangle AME est au triangle EMC, car ils sont entre eux comme leurs bases (prop. 1. VI), mais un seul des antécédents est à un seul des conséquents comme tous les antécédents sont à tous les conséquents (prop. 12. V) : donc le triangle AMB est au triangle BMC comme le triangle ABE est au triangle CBE; mais AMB est à BMC comme AM est à MC : donc AM est à MC comme le triangle ABE est au triangle EBC (prop. 11. V). Par la même raison FN est à NH comme le triangle FGL est au triangle GLH ; mais AM est à MC comme

FN est à NH : donc le triangle ABE est au triangle BEC comme le triangle FGL est au triangle GLH (prop. 11. V) : ou bien en échangeant les places des moyens, le triangle ABE est au triangle FGL comme le triangle BEC est au triangle GLH (prop. 16. V). Nous démontrerons semblablement, après avoir mené BD, GH, que le triangle BEC est au triangle GLH comme le triangle ECD est au triangle LHK; mais puisque le triangle ABE est au triangle FGL comme le triangle EBC est au triangle LGH et comme le triangle ECD est au triangle LHK, un des antécédents sera à un des conséquents comme tous les antécédents seront à tous les conséquents (prop. 12. V) : donc le triangle ABE est au triangle FGL comme le polygone ABCDE est au polygone FGHKL; mais les triangles ABE, FGL sont entre eux en raison doublée des côtés AB, FH ; car les triangles semblables sont en raison doublée des côtés homologues (prop. 19. 6): donc les polygones ABCDE, FGHKL sont en raison doublée des côtés homologues AB, FG.

Donc les polygones semblables peuvent être divisés en un même nombre de triangles semblables et proportionnels aux polygones ; et les polygones semblables sont entre eux en raison doublée des côtés homologues ; ce qu'il fallait démontrer.

COROLLAIRE I.

On démontrera de la même manière que les quadrilatères semblables sont en raison doublée des côtés homologues ; mais cela a été démontré pour les triangles semblables (corol. 19. VI) : donc généralement les figures rectilignes semblables sont entre elles en raison doublée des côtés homologues.

COROLLAIRE II.

Si nous prenons une troisième proportionnelle O aux deux droites AB, FG, les droites AB, O seront en raison doublée des droites AB, FG (déf. 10. V) ; mais les polygones et les quadrilatères sont entre eux en raison doublée des côtés homologues,

c'est-à-dire en raison doublée des côtés AB, FG ; l'on démontre cela pour les triangles ; il est donc généralement évident que si trois droites sont proportionnelles, la première et la troisième sont entre elles en raison doublée de la figure décrite sur la première, et de la figure semblable décrite semblablement sur la seconde.

AUTREMENT.

Nous démontrerons autrement et plus brièvement que les triangles sont proportionnels aux polygones de la manière suivante :

Soient les polygones ABCDE, FGHKL (fig. 141). Menez BE, EC, GL, LH : je dis que le triangle ABE est au triangle FGL comme le triangle EBC est au triangle LGH et comme le triangle CDE est au triangle H KL.



Puisque les triangles ABE, FGL sont semblables, les triangles ABE, FGL sont en raison doublée des côtés BE, GL (prop. 19. VI). Par la même raison les triangles BEC, GLH sont en raison doublée des côtés BE, GL : donc le triangle ABE est au triangle FGL comme le triangle EBC est au triangle LGH (prop. 11. V). De plus, puisque le triangle EBC est semblable au triangle LGH, les triangles EBC, LGH sont en raison doublée des

droites CE,-HL (prop. 19. VI). Par la même raison les triangles ECD, LHK sont en raison doublée des droites CE, HL : donc le triangle EBC est au triangle LGH comme le triangle ECD est au triangle LHK (prop. 11. V) ; mais on a démontré que le triangle EBC est au triangle LGH comme le triangle ABE est au triangle FGL : donc le triangle ABE est au triangle FGL comme le triangle BEC est au triangle GLH et comme le triangle ECD est au triangle LHK : donc un des antécédents est à un des conséquents comme tous les antécédents sont à tous les conséquents (prop. 12. V) ; et le reste comme dans la première démonstration ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXI.

THÉORÈME.

Les figures rectilignes qui sont semblables à une même figure rectiligne sont semblables entre elles.

Que chacune des figures rectilignes A, B (fig. 142) soit semblable à la figure rectiligne C : je dis que la figure rectiligne A est semblable à la figure rectiligne B.



Car puisque les figures rectilignes A et B sont semblables, ces deux figures sont équiangles et les côtés placés autour des angles égaux sont proportionnels (déf. 1. VI). De plus, puisque les figures rectilignes B, C sont semblables, ces deux figures sont équiangles et les côtés placés autour des

angles égaux sont proportionnels : donc l'une et l'autre des figures rectilignes A, B sont équiangles avec la figure rectiligne C, et les côtés placés autour des angles égaux sont proportionnels : donc les figures rectilignes A, B sont équiangles (ax. 1), et les côtés placés autour des angles égaux sont proportionnels (prop. 11. V) : donc les figures rectilignes A, B sont semblables (déf. 1. VI); ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXII.

THÉORÈME.

Si quatre droites sont proportionnelles, les figures rectilignes semblables, construites semblablement sur ces droites, seront proportionnelles ; et si les figures rectilignes semblables et construites semblablement sur ces droites sont proportionnelles, ces droites seront proportionnelles.

Soient AB, CD, EF, GH (fig. 143) quatre droites proportionnelles, de manière que AB soit à CD comme EF est à GH. Soient décrites sur les droites AB, CD les figures rectilignes semblables et semblablement placées KAB, LCD, et sur les droites EF, GH soient décrites les figures semblables et semblablement placées MF, NH : je dis que la figure rectiligne KAB est à la figure rectiligne LCD comme la figure rectiligne MF est à la figure rectiligne NH.



Prenez une troisième proportionnelle O aux droites AB, CD, et une troisième proportionnelle P aux droites EF, GH (prop. 11. VI). Puisque AB est à CD comme EF est à GH et que CD est à O comme GH est à P, AB

sera à O comme EF est à P (prop. 22. V) ; mais AB est à O comme la figure rectiligne KAB est à la figure rectiligne LCD (cor. 2. prop. 20. VI), et EF est à P comme la figure rectiligne MF est à la figure rectiligne NG : donc KAB est à LCD comme MF est à NH (prop. 11. V).

Si la figure rectiligne KAB est à la figure rectiligne LCD comme la figure rectiligne MF est à la figure rectiligne NH : je dis que AB est à CD comme EF est à GH.

Prenons une quatrième proportionnelle aux trois droites AB, CD, EF de manière que l'on ait AB est à CD comme EF est à QR (prop. 12.6), et sur QR décrivez la figure rectiligne SR de manière qu'elle soit semblable à l'une et à l'autre des figures MF, NH, et semblablement placée (prop. 18. VI).

Puisque AB est à CD comme EF est à QR, que les figures rectilignes KAB, LCD décrites sur les droites AB, CD sont semblables et semblablement placées, et que les figures rectilignes MF, SR décrites sur les droites EF, QR sont semblables et semblablement placées, la figure rectiligne KAB est à la figure rectiligne LCD comme MF est à SR, ainsi que dans la première partie de cette proposition ; mais on suppose que la figure rectiligne KAB est à la figure rectiligne LCD comme la figure rectiligne MF est à la figure rectiligne NH : donc la figure rectiligne MF a la même raison avec l'une et l'autre des figures rectilignes NH, SR (prop. 11. V) : donc la figure rectiligne NH est égale à la figure rectiligne SR (prop. 9. V) ; mais la figure rectiligne NH est semblable à la figure SR et semblablement placée : donc GH est égal à QR (lem. suiv.), et puisque AB est à CD comme EF est à QR et que QR est égal à GH, AB sera à CD comme EF est à GH (prop. 7. V). Donc si quatre droites sont proportionnelles, les figures rectilignes semblables, construites semblablement sur ces droites, seront proportionnelles ; et si les figures rectilignes semblables et

semblablement construites sur ces droites sont proportionnelles, ces droites seront proportionnelles ; ce qu'il fallait démontrer.

LEMME.

Si des figures rectilignes sont égales et semblables ; nous démontrerons de cette manière que leurs côtés homologues sont égaux entre eux.

Supposons que les figures rectilignes NH, SR soient égales et semblables, et que HG soit à GN comme QR est à QS : je dis que QR est égal à GH.

Car si ces droites sont inégales, une d'elles sera plus grande ; supposons que la droite QR soit plus grande que la droite HG. Puisque QR est à QS comme HG est à GN, si on échange les places des moyens, QR sera à HG comme QS est à GN (prop. 16. V) ; mais QR est plus grand que HG : donc QS sera plus grand que GN : donc la figure rectiligne RS est plus grande que la figure rectiligne HN (prop. 20. VI) ; mais elle lui est égale, ce qui est impossible : donc les droites QR, GH ne sont pas inégales : donc elles sont égales ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XX 111.

THÉORÈME.

Les parallélogrammes équiangles sont entre eux en raison composée des côtés.

Soient les parallélogrammes équiangles AC, CF (fig. 144), ayant l'angle BCD égal à l'angle ECG : je dis que les parallélogrammes AC, CF sont entre eux en raison composée des côtés, c'est-à-dire, en raison composée de la raison de BC à CG et de la raison DC à CE.



Placez la droite B C dans la direction de la droite CG; la droite DC sera placée dans la direction de CE (prop. 14. I). Achevez le parallélogramme DG; prenez une droite quelconque R, de manière que BC soit à CG comme, R est à L et que DC soit à CE comme L est à M (prop. 12. VI).

Les raisons de R à L et de L à M sont les mêmes que les raisons des côtés, c'est-à-dire de BC à CG et de DC à CE; mais la raison de R à M est composée de la raison de R à L et de la raison de L à M (déf. 5. VI) : donc les droites R et L sont entre elles en raison composée des côtés ; et puisque BC est à CG comme le parallélogramme AC est au parallélogramme CH (prop. 1. VI), et que BC est à CG comme R est à L, R sera à L comme le parallélogramme AC est au parallélogramme CH (prop. 11. V). De plus, puisque DC est à CE comme le parallélogramme CH est au parallélogramme CF, et que DC est à CE comme L est à M (prop. 1. VI), L sera à M comme le parallélogramme CH est au parallélogramme CF (prop. 11. V) : donc puisqu'il a été démontré que R est à L comme le parallélogramme AC est au parallélogramme CH, et que L est à M comme le parallélogramme CH est au parallélogramme GF, K sera à M comme le parallélogramme AC est au parallélogramme C F (prop. 22. V). Mais les droites K et M sont en raison composée des côtés : donc les parallélogrammes AC, CF sont entre eux en raison composée des côtés.

Donc les parallélogrammes équiangles sont entre eux en raison composée des côtés ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXIV.

THÉORÈME.

Dans tout parallélogramme, les parallélogrammes placés autour du diamètre sont semblables au parallélogramme total et semblables entre eux.

Soit le parallélogramme ABCD (fig. 145) dont AC est le diamètre ; qu'autour du diamètre AC soient les parallélogrammes EG, HK : je dis que les parallélogrammes EG, HK, sont semblables au parallélogramme total ABCD et semblables entre eux.



Car puisque la droite EF est parallèle à un des côtés du triangle ABC, savoir au côté BC, la droite BE sera à la droite EA comme la droite GF est à la droite FA (prop. 2. VI). De plus, puisque la droite FG est parallèle à un des côtés du triangle ACD, savoir au côté CD, la droite CF sera à la droite FA comme la droite DG est à la droite GA ; mais on a démontré que CF est à FA comme BE est à EA : donc BE est à EA comme DG est à GA (prop. 11. V) ; ajoutant les conséquents aux antécédents (prop. 18. V), BA sera à AE comme DA est à AG, et enfin en échangeant les places des moyens (prop. 16. V), BA sera à AD comme AE est à AG : donc les côtés des parallélogrammes ABCD, EG qui comprennent un

angle commun BAD sont proportionnels. Puisque GF est parallèle à DC, l'angle AGF est égal à l'angle ADC (prop. 29. I), et l'angle GFA égal à l'angle DCA; mais l'angle DAC est commun aux deux triangles ADC, AGF : donc les triangles ADC, AGF sont équiangles. Les triangles ABC, AFE sont équiangles, par la même raison : donc le parallélogramme total ABCD et le parallélogramme EG sont équiangles : donc AD est à DC comme AG est à GF (prop. 4. VI) ; et AC est à CB comme AF est à FE, et de plus CB est à BA comme FE est à EA : donc puisqu'on a démontré que DC est à GA comme GF est à FA et que AC est à CB comme AF est à FE, DC sera à CB comme GF est à FE (prop. 23. V); donc les côtés dès parallélogrammes ABCD, EG qui sont autour des angles égaux sont proportionnels : donc le parallélogramme ABCD est semblable au parallélogramme EG (déf. 1. VI). Le parallélogramme ABCD est semblable au parallélogramme KH, par la même raison : donc chacun des parallélogrammes EG, HK est semblable au parallélogramme ABCD; mais les figures qui sont semblables chacune à une autre figure, sont semblables entre elles (prop. 21. VI) : donc le parallélogramme EG est semblable au parallélogramme HK.

Donc, dans tout parallélogramme, les parallélogrammes placés autour du diamètre sont semblables au parallélogramme total et semblables entre eux; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXV.

PROBLÈME.

Construire une figure semblable à une figure donnée et égale à une autre figure aussi donnée.

Soit ABC (fig. 146) la figure donnée, à laquelle il faut construire une figure semblable, et D la figure à laquelle il faut la faire égale : il faut construire une figure qui soit semblable à la figure ABC et égale à la figure D.



Construisez sur la droite BC un parallélogramme BE qui soit égal au triangle ABC, (prop. 44 et 45. I) et sur la droite CE et dans l'angle FCE qui est égal à l'angle CBL, construisez un parallélogramme CM égal à la figure D ; la droite BC sera dans la direction de CF, et la droite LE dans la direction de EM (prop. 14. I). Prenez une moyenne proportionnelle GH entre les droites BC, CF (prop. 13. VI), et sur cette moyenne proportionnelle G H, construisez une figure KGH semblable à la figure ABC et semblablement placée (prop. 18. VI).

Puisque BC est à GH comme GH est à CF, et puisque, lorsque trois droites sont proportionnelles, la première est à la troisième comme la figure qui est construite sur la première est à la figure semblable construite sur la seconde et semblablement placée (cor. 2, prop. 20. VI), la droite BC sera à la droite CF comme le triangle ABC est au triangle KGH; mais BC est à CF comme le parallélogramme BE est au parallélogramme EF (prop. 1. VI), et le triangle ABC est au triangle KGH comme le parallélogramme BE est au parallélogramme EF : donc en changeant les places des moyens (prop. 16. V), le triangle ABC sera au parallélogramme BE comme le triangle KGH est au parallélogramme EF; mais le triangle ABC est égal au parallélogramme

BE, par construction : donc le triangle KGH est égal au parallélogramme EF ; mais le parallélogramme EF est égal à la figure D : donc le triangle KGH est aussi égal à la figure D; mais le triangle KGH est semblable au triangle ABC, par construction.

Donc on a construit une figure KGH semblable à la figure ABC et égale à une autre figure donnée; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION XXVI.

THÉORÈME.

Si d'un parallélogramme on retranche un parallélogramme qui soit semblable au parallélogramme entier et semblablement placé, et qui ait avec lui un angle commun, ces deux parallélogrammes seront placés autour du même diamètre.

Que du parallélogramme ABCD (fig. 147) on retranche le parallélogramme AEFG semblable au parallélogramme ABCD et semblablement placé et ayant avec lui un angle commun DAB : je dis que les parallélogrammes ABCD, AEFG sont placés autour du même diamètre.



Car si cela n'est point, supposons, si cela est possible, que la droite AHC soit leur diamètre, et par le point H conduisons la droite HK parallèle à l'une et à l'autre des droites AD, BC. Puisque les parallélogrammes ABCD, KG sont placés autour du même diamètre, le parallélogramme ABCD sera semblable au parallélogramme KG (prop. 24. VI) : donc DA est à AB comme G A est à AK (déf. 1. VI), mais à cause de la similitude

des parallélogrammes ABCD, EG, la droite DA est à la droite AB comme la droite GA est à la droite AE : donc G A est à AE comme GA est à AK (prop. 11. V) : donc la droite GA a la même raison avec chacune des droites AK, AE : donc la droite AK sera égale à la droite AE (prop. 9. V), c'est-à-dire que la plus petite sera égale à la plus grande, ce qui est impossible : donc les parallélogrammes ABCD, KG ne sont point placés autour du même diamètre : donc les parallélogrammes ABCD, AEFG sont placés autour du même diamètre. Donc si d'un parallélogramme on retranche un parallélogramme qui soit semblable au parallélogramme total et semblablement placé, et qui ait avec lui un angle commun, ces deux parallélogrammes seront placés autour du même diamètre ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXVII.

THÉORÈME.

De tous les parallélogrammes qui sont appliqués sur la même droite et qui sont défaillants de parallélogrammes semblables au parallélogramme décrit sur la moitié de cette droite et semblablement placés que lui, le plus grand est celui qui est appliqué sur la moitié de cette droite et qui est semblable à son défaut. [1]

Soit la droite AB (fig. 148), que cette droite soit coupée en deux parties égales au point C, et que sur cette droite AB soit appliqué le parallélogramme AD qui est défaillant du parallélogramme CE semblable à celui qui est décrit sur la moitié de AB, c'est-à-dire sur AC : je dis que de tous les parallélogrammes qui sont appliqués sur la droite AB et qui sont défaillants de parallélogrammes semblables au parallélogramme CE et semblablement placés que lui, le plus grand est le parallélogramme AD. En effet, appliquez sur la droite AB le parallélogramme AF défaillant du parallélogramme RH semblable au parallélogramme CE et semblablement placé que

lui : je dis que le parallélogramme AD est plus grand que le parallélogramme AF.



Puis le parallélogramme CE est semblable au parallélogramme KH, ces deux parallélogrammes seront placés autour du même diamètre (prop. 26. VI). Menez leur diamètre DB et décrivez la figure.

Puisque le parallélogramme CF est égal au parallélogramme FE (prop. 43. I), si l'on ajoute à chacun le parallélogramme KH, le parallélogramme total CH sera égal au parallélogramme total KE. Mais CH est égal à CG (prop. 36. I), parce que la droite AC est égale à la droite CB. Donc GC est égal à EK : donc si nous ajoutons à chacune de ces quantités le parallélogramme CF, le parallélogramme total AF sera égal au gnomon LMN : donc le parallélogramme CE, c'est-à-dire le parallélogramme AD, est plus grand que le parallélogramme AF (prop. 36. I).

Partageons de nouveau la droite AB (fig. 149) en deux parties égales au point C, et appliquons sur cette droite le parallélogramme AL défaillant du parallélogramme CM, et de plus appliquons sur la droite AB le parallélogramme AE défaillant du parallélogramme DF, semblablement posé et semblable au parallélogramme qui est décrit sur la moitié de AB, c'est-à-dire au parallélogramme CM. Je dis que le parallélogramme AL qui est appliqué sur la moitié de la droite AB est plus grand que le parallélogramme AE.

Car puisque les parallélogrammes DF et CM sont semblables, ces deux parallélogrammes sont autour du même diamètre (prop. 26. VI). Soit EB leur diamètre et décrivez la figure.

Attendu que LF est égal à LH (prop. 36. I), car FG est égal à GH, LF sera plus grand que EK. Mais LF est égal à LD (prop. 43. I) : donc DL est plus grand que EK : donc si nous ajoutons à chacun de ces deux parallélogrammes le parallélogramme KD; le parallélogramme total AL sera plus grand que le parallélogramme total AE.

Donc de tous les parallélogrammes qui sont appliqués sur la même droite et qui sont défaillants de parallélogrammes semblables au parallélogramme décrit sur la moitié de cette droite et semblablement placés que lui, le plus grand est celui qui est appliqué sur la moitié de cette droite et qui est semblable à son défaut ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXVIII.

PROBLÈME.

Sur une droite donnée appliquer un parallélogramme qui soit égal à une figure rectiligne donnée et qui soit défaillant d'un parallélogramme semblable à un autre parallélogramme donné; il faut que la figure rectiligne donnée, à laquelle on doit substituer une figure qui lui soit égale, ne soit pas plus grande que le parallélogramme qui est appliqué sur la moitié de la droite donnée; les défauts du parallélogramme appliqué sur la moitié de cette droite et de celui qui doit être défaillant d'un parallélogramme semblable étant semblables entre eux.

Soit AB (fig. 150) la droite donnée à laquelle il faut appliquer un parallélogramme égal à la figure rectiligne donnée C, que cette figure soit plus petite que le parallélogramme appliqué sur la moitié de la droite AB, les défauts étant semblables, et que le parallélogramme auquel le défaut doit

être semblable soit D. Il faut sur la droite AB appliquer un parallélogramme qui soit égal à la figure rectiligne donnée C et qui soit défaillant d'un parallélogramme semblable au parallélogramme D.



Coupez la droite AB en deux parties égales au point E (prop. 10. I), et sur EB décrivez le parallélogramme EBFG semblable au parallélogramme D et semblablement placé que lui (prop. 18. VI), et terminez le parallélogramme AG. Le parallélogramme AG est égal à la figure C, ou il est plus grand que cette figure. Si le parallélogramme AG est égal à la figure C, on a fait ce qui était proposé ; car on a appliqué sur la droite AB un parallélogramme AG égal à la figure rectiligne donné C et défaillant d'un parallélogramme EF semblable au parallélogramme D. Au contraire, si le parallélogramme HE n'est pas égal à la figure rectiligne C, ce parallélogramme sera plus grand que cette figure. Mais HE est égal à EF : donc EF est plus grand que C. Construisez le parallélogramme KLMN de manière que ce parallélogramme soit égal à l'excès du parallélogramme EF sur la figure C, et semblable au parallélogramme D et semblablement placé que lui (prop. 25. VI) ; mais EF est semblable à D : donc le parallélogramme KM sera semblable au parallélogramme EF. Que la droite LK soit l'homologue de la droite GE et la droite LM l'homologue de la droite G F. Puisque le parallélogramme EF est égal aux deux figures C, KM, le parallélogramme EF sera plus grand que le parallélogramme KM : donc la droite GE

est plus grande que la droite KL, et la droite GF plus grande que la droite LM (prop. 20. VI). Faites la droite GO égale à la droite LK, et la droite GP égale à la droite LM (prop. 3. I), et terminez le parallélogramme OGPQ (prop. 31. I). Le parallélogramme OP sera égal et semblable au parallélogramme KM (prop. 26. VI) ; mais le parallélogramme KM est semblable au parallélogramme EF : donc le parallélogramme OP est semblable au parallélogramme EF (prop. 21. VI): donc ces deux parallélogrammes sont autour du même diamètre (prop. 26. VI). Soit GQB leur diamètre et décrivez la figure.

Puisque le parallélogramme EF est égal aux deux figures C, KM, et que OP est égal à KM, le gnomon restant VXY sera égal à la figure restante C; et à cause que PR est égal à OS (prop. 43. I), si l'on ajoute à chacun de ces deux parallélogrammes le parallélogramme RS, le parallélogramme total P B sera égal au parallélogramme total OB. Mais OB est égal à TE (prop. 36. I), parce que le côté AE est égal au côté EB : donc TE est égal à PB : donc si on ajoute à chacun de ces deux parallélogrammes TE, PB le parallélogramme OS, le parallélogramme total TS sera égal au gnomon total VXY. Or on a démontré que le gnomon VXY est égal à C : donc le parallélogramme TS est égal à la figure rectiligne C.

Donc on a appliqué sur la droite AB un parallélogramme TS qui est égal à la figure rectiligne donnée C et qui est défaillant d'un parallélogramme BS semblable à un parallélogramme D, puisque BS est semblable à PO ; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION XXIX.

PROBLÈME.

Appliquer sur une droite donnée un parallélogramme qui soit égal à une figure rectiligne donnée et qui soit excédent d'un parallélogramme semblable à un autre parallélogramme donné.

Soit AB (fig. 151) la droite donnée à laquelle il faut appliquer un parallélogramme qui soit égal à une figure rectiligne donnée C et qui soit excédent d'un parallélogramme semblable au parallélogramme D : il faut sur la droite AB appliquer un parallélogramme qui soit égal à la figure rectiligne C, et qui soit excédent d'un parallélogramme semblable au parallélogramme D.



Partagez la droite AB en deux parties égales au point E (prop. 9. I), sur la droite EB décrivez le parallélogramme EL semblable au parallélogramme D et semblablement placé que lui, et construisez le parallélogramme GH égal aux deux figures EL, C, et semblable au parallélogramme D et semblablement posé que lui (prop. 25. VI); le parallélogramme GH sera semblable au parallélogramme EL. Que le côté KH soit l'homologue du côté FL et le côté KG l'homologue du côté FE. Puisque le parallélogramme GH est plus grand que le parallélogramme EL, la droite KH sera plus grande que la droite EL et la droite KG plus grande que la droite FE. Prolongez FL et FE jusqu'à ce que la droite FLM soit égale à la droite KH et jusqu'à ce que la droite FEN soit égale à la droite KG (prop. 3. I), et terminez le parallélogramme MN. Le parallélogramme MN sera égal et semblable au parallélogramme GH ; mais le parallélogramme EL est semblable au parallélogramme GH : donc le parallélogramme MN sera semblable au parallélogramme EL (prop. 21. VI) : donc les deux parallélogrammes FL, MN seront autour du

même diamètre (prop. 26. VI). Conduisez leur diagonale FO et terminez la figure.

Puisque le parallélogramme GH est égal aux deux figures EL, G et que MN est égal à GH, le parallélogramme MN sera égal aux deux figures EL, C : donc, si l'on retranche le parallélogramme commun EL, le gnomon restant ZYX sera égal à la figure rectiligne C ; et puisque EA est égal à EB, le parallélogramme AN sera égal au parallélogramme NB (prop. 36. I), c'est-à-dire au parallélogramme LP (prop. 43. I): donc si nous ajoutons à chacun de ces deux parallélogrammes le parallélogramme EO, le parallélogramme total AO sera égal au gnomon total ZYX; mais le gnomon ZYX est égal à la figure rectiligne C : donc le parallélogramme AO est égal à la figure rectiligne C.

Donc on a appliqué sur la droite donnée AB un parallélogramme AO qui est égal à la figure rectiligne C et qui est excédent d'un parallélogramme QP semblable au parallélogramme D, parce que le parallélogramme QP est semblable au parallélogramme LE ; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION XXX.

PROBLÈME.

Couper une droite finie et donnée en moyenne et extrême raison.

Soit la droite AB (fig. 152) finie et donnée: il faut couper cette droite AB en moyenne et extrême raison.

Sur la droite AB construisez le carré BG (prop. 46. I) et sur la droite AC appliquez un parallélogramme CD qui soit égal au carré BG et dont le parallélogramme excédent AD soit semblable au carré BC (prop. 29. VI).



La figure BC est un carré : donc la figure AD sera aussi un carré; et puisque BC est égal à CD, si l'on retranche la partie commune CE, la figure restante BF sera égale à la figure restante AD ; mais ces deux figures sont équiangles : donc les côtés des figures BF, AD qui sont autour des angles égaux sont réciproquement proportionnels (prop. 14. VI) : donc FE est à ED comme AE est à EB; mais FE est égal à AC (fig. 34. I), c'est-à-dire à AB et ED est égal à AE : donc AB est à AE comme AE est à EB ; mais AB est plus grand que AE : donc ÀE est plus grand que EB.

Donc la droite AE a été coupée au point E en moyenne et extrême raison, et sa partie AE est son plus grand segment ; ce qu'il fallait faire.

AUTREMENT.

Soit AB (fig. 153) la droite donnée : il faut couper cette droite en moyenne et extrême raison.



Partagez la droite AB au point C de manière que le rectangle compris sous les droites AB, BC soit égal au carré de AC (prop. 11. II).

Puisque le rectangle compris sous les droites AB, BC est égal au carré de AC, AB sera à AC comme AC est à CB (prop. 17. VI) :

donc la droite AB a été coupée en moyenne et extrême raison (déf. 3. VI) ; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION XXXI.

THÉORÈME.

Dans les triangles rectangles, la figure construite sur le côté qui sous-tend l'angle droit est égale aux figures semblables qui sont décrites semblablement sur les côtés qui comprennent l'angle droit.

Soit le triangle rectangle ABC (fig. 154) dont l'angle BAC est droit : je dis que la figure construite sur BC est égale aux ligures semblables décrites semblablement sur les côtés BA, AC.

Conduisez sur BC la perpendiculaire AD.



Puisque dans le triangle ABC on a conduit de l'angle A sur la base BC la perpendiculaire AD, les triangles ABD, ADC placés autour de la perpendiculaire sont semblables au triangle total ABC et semblables entre eux (prop. 8. VI). Puisque le triangle ABC est semblable au triangle ABD, CB sera à BA comme AB est à BD; mais lorsque trois droites sont proportionnelles, la première droite est à la troisième comme, la figure construite sur la première droite est à la figure semblable construite

semblablement sur la seconde (prop. 2. cor. 20. VI) : donc CB est à BD comme la figure construite sur CB est à la figure semblable construite semblablement sur BA. Par la même raison, BC est à CD comme la figure construite sur BC est à la figure décrite sur CA : donc BC est à BD plus DC comme la figure construite sur BC est aux figures semblables qui sont décrites semblablement sur BA, AC ; mais BC est égal à BD plus DC[2] : donc la figure construite sur BC est égale aux figures semblables qui sont décrites semblablement sur BA, AC.

Donc dans les triangles rectangles, la figure qui est construite sur le côté qui sous-tend l'angle droit est égale aux figures semblables qui sont semblablement décrites sur les côtés qui comprennent l'angle droit ; ce qu'il fallait démontrer.

AUTREMENT.

Puisque les figures semblables sont entre elles en raison doublée des côtés homologues (prop. 25. VI), la figure construite sur BC et celle qui est construite sur BA seront entre elles en raison doublée des côtés BC, BA ; mais le carré construit sur BC et le carré construit sur BA sont en raison doublée de BC, BA (prop. 1. cor. 20. VI) : donc la figure construite sur BC est à celle qui est construite sur BA comme le carré de BC est au carré de BA (prop. 11. V). Par la même raison la figure construite sur BC est à celle qui est construite sur CA comme le carré de BC est au carré de CA : donc la figure construite sur BC est aux figures construites sur BA, AC comme le carré de B C est aux carrés de BA et de AC. Mais le carré de BC est égal aux carrés de BA et de AC (prop. 47. I) : donc la figure construite sur BC est égale aux figures semblables qui sont semblablement décrites sur BA et sur AG; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXXII.

THÉORÈME.

Si deux triangles qui ont deux cotés proportionnels à deux côtés sont disposés selon un angle de manière que leurs côtés homologues soient parallèles, les autres côtés formeront une seule droite.

Soient les deux triangles ABC, DCE (fig. 155) qui aient les deux côtés BA, AC proportionnels aux deux côtés CD, DE de manière que B A soit à AC comme CD est à DE, et que AB soit parallèle à DC et AG parallèle aussi à DE : je dis que BC et CE ne formeront qu'une seule droite.



Puisque AB est parallèle à DC et que AC tombe sur ces deux droites, les angles alternes BAC, ACD sont égaux entre eux (prop. 29. I). Par la même raison, l'angle CDE est égal à l'angle ACD : donc l'angle BAC est égal à l'angle CDE ; et puisque les deux triangles ABC, ACE ont deux angles égaux en A et en D, et que les côtés qui comprennent ces deux angles égaux sont proportionnels, c'est-à-dire que BA est à AC comme CD est à DE, les triangles ABC, DCE seront équiangles (prop. 6. VI) : donc l'angle ABC est égal à l'angle DCE. Mais on a démontré que l'angle ACD est égal à l'angle BAC : donc l'angle total ACE est égal aux deux angles ABC, BAC : donc, si nous ajoutons à chacune de ces deux quantités l'angle ACB, les angles ACE, ACB seront aux angles BAC, ACB, ABC ; mais les angles BAC, ACB, ABC sont égaux à deux angles droits

(prop. 32. I) : donc les angles ACE, ACB sont égaux à deux angles droits : donc avec une droite quelconque AC et au point C les deux droites BC, CE placées de différents côtés font les angles de suite ACE, ACB égaux à deux angles droits : donc les deux droites BC, CE ne forment qu'une seule droite (prop. 14. I).

Donc si deux triangles qui ont deux côtés proportionnels à deux côtés sont disposés selon un angle de manière que leurs côtés homologues soient parallèles, les autres côtés formeront une seule droite ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXXIII.

THÉORÈME.

Dans les cercles égaux, les angles sont proportionnels aux arcs qu'ils comprennent, soit que ces angles soient placés aux centres ou bien aux circonférences. Il en est de même des secteurs qui sont placés aux centres.

Soient les cercles égaux ABC, DEF (fig. 156), que les angles BGC, EHF soient placés à leurs centres G, H, et que les angles BAC, EDF soient placés à leurs circonférences : je dis que l'arc BC est à l'arc EF comme l'angle BGC est à l'angle EHF, comme l'angle BAC est à l'angle EDF et comme le secteur GBC est au sec-leur HEF.

Faites les arcs de suite CK, KL, etc. égaux chacun à l'arc BC ; faites aussi les arcs de suite FM, MN, etc. égaux chacun à l'arc EF, et menez les rayons GK, GL, HM, UN.



Puisque les arcs BC, CK, KL sont égaux entre eux, les angles BGC, CGH, KGL sont aussi égaux entre eux (prop. 27. III) : donc l'arc BL est multiple de Tare BC autant de fois que l'angle BGL est multiple de l'angle BGC. Par la même raison, l'arc EN est multiple de l'arc EF autant de fois que l'angle EHN est multiple de l'angle EHF. Donc si l'arc BL est égal à l'arc EN, l'angle BGL sera égal à l'angle EHN (prop. 27. III), si l'arc BL est plus grand que l'arc EN, l'angle BGL sera plus grand que l'angle EHN, et si l'arc BL est plus petit que l'arc EN, l'angle BGL sera plus petit que l'angle EHN. Ayant donc quatre quantités, savoir les arcs BC, EF et deux angles AGC, BHF, on a pris des équimultiples de l'arc BC et de l'angle BGL, savoir, l'arc BL et l'angle BGL; on a pris aussi des équimultiples de l'arc EF et de l'angle EHF, savoir, l'arc EN et l'angle EHN ; mais on a démontré que si l'arc BL surpasse l'arc EN, l'angle BGL surpassera l'angle EHN; que si l'arc BL est égal à l'arc EN, l'angle BGL sera égal à l'angle EHN, et que si Parc BL est plus petit que l'arc EN, l'angle BGL sera plus petit que l'angle EHN : donc l'arc BC est à l'arc EF comme l'angle BGC est à l'angle EHF (déf. 5. V); mais l'angle BGC est à l'angle EHF comme l'angle BAC est à l'angle EDF (prop. 15. V), car ils sont doubles les uns des autres (prop. 20. III) : donc l'arc BC est à l'arc EF comme l'angle BGC est à l'angle EHF, et comme l'angle BAC est à l'angle EDF. Donc dans des cercles égaux, les angles sont proportionnels

aux arcs, soit que ces angles soient placés aux centres ou bien aux circonférences ; ce qu'il fallait démontrer.

Je dis de plus que l'arc BC est à l'arc EF comme le secteur GBC est au secteur HEF.

Menez les droites BC, CK (fig. 157), et ayant pris sur les arcs BC, CK, les points O, P, conduisez les droites BO, OC, CP, PK.



Puisque les deux droites BG, GC sont égales aux deux droites CG, GK, et qu'elles comprennent des angles égaux, la base BC sera égale à la base CK : donc le triangle GBC est égal au triangle GCK (prop. 4. I) ; et à cause que l'arc BC est égal à l'arc CK, et que le reste CAB de la circonférence qui complète le cercle entier ABC est égal au reste KAC de la circonférence qui complète le même cercle (ax. 5), l'angle BOC sera égal à l'angle CPK (prop. 27. III) : donc le segment BOC est semblable au segment CPK (déf. 11. III), et ces deux segments sont placés sur des droites égales ; mais les segments semblables qui sont placés sur des droites égales sont égaux (prop. 24. III) : donc le segment BOC est égal an segment CPK ; mais le triangle BGC est égal au triangle CGK : donc le secteur total GBC sera égal au secteur total GCK (ax. 2). Par la même raison, le secteur GKL sera égal à l'un ou à l'autre des secteurs GKG, GCB : donc les trois secteurs GBC, GCK, GK.L sont égaux entre eux. Les secteurs HEF, HFM, HMN sont pareillement égaux entre eux : donc l'arc BL est multiple de l'arc B C autant de fois que le secteur

GBL est multiple du secteur GBC. Par la même raison, l'arc EN est multiple de l'arc EF autant de fois que le secteur HEN est multiple du secteur HEF : donc d'après ce que l'on vient de voir, si l'arc BL est égal à l'arc EN, le secteur GBL sera égal au secteur HEN ; si l'arc BL surpasse l'arc EN, le secteur GBL surpassera le secteur HEN, et si l'arc BL est plus petit que l'arc EN, le secteur GBL sera plus petit que le secteur HEN. Ayant donc quatre quantités, savoir les deux arcs BC, EF et les deux secteurs GBC, HEF, on a pris des équimultiples de l'arc BC et du secteur GBC, savoir, l'arc BL et le secteur GBL; on a pris aussi des équimultiples de l'arc EF et du secteur HEF, savoir, l'arc EN et le secteur HEN ; mais on a démontré que si l'arc BL surpasse l'arc EN, le secteur GBL surpassera le secteur HEN, que si l'arc BL est égal à l'arc EN, le secteur GBL sera égal au secteur HEN, et que si l'arc BL est plus petit que l'arc EN, le secteur GBL sera plus petit.que le secteur GEN : donc l'arc BC est à l'arc EF comme le secteur GBC est au secteur HEF (déf. 5. V).

COROLLAIRE.

Il est évident qu'un secteur est à un autre secteur comme l'angle du premier secteur est à l'angle du second secteur (prop. 11. V).

FIN DU SIXIÈME LIVRE.

[1] Un parallélogramme est dit appliqué sur une droite lorsqu'il est décrit sur cette droite.

Un parallélogramme est dit défaillant d'un parallélogramme lorsqu'il est décrit sur une partie delà base d'un autre parallélogramme, sous les mêmes angles et

entre les mêmes parallèles; le parallélogramme dont il est défaillant se nomme son défaut. Soit AO le parallélogramme que l'on considère, le parallélogramme AD sera le parallélogramme défaillant et son défaut sera le parallélogramme CO.

Un parallélogramme est dit excédent d'un parallélogramme lorsqu'il est décrit sur la base prolongée d'un autre parallélogramme, sous le même angle et entre les mêmes parallèles; le parallélogramme dont il surpasse le parallélogramme que l'on considère se nomme son excès.

Soit AO le parallélogramme que l'on considère ; le parallélogramme AE sera le parallélogramme excédent et le parallélogramme KE sera son excès.

[2] En effet, si l'on ajoute les deux proportions CB:BD::BE:BF, et BC:CD::BE:CG, et si l'on divise les antécédents par deux, on aura la proportion BC:BD+CD:: BE:BF+CG.

RETOUR À L'ENTRÉE DU SITE

ALLER À LA TABLE DES MATIÈRES D'EUCLIDE

Euclide

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

INTRODUCTION -GEOMETRIE LIVRE I - LIVRE II - LIVRE III - LIVRE IV- LIVRE VI

Éléments de Géométrie : livre XI

Euclide le Géomètre

LES ÉLÉMENTS

DE

GÉOMÉTRIE

D'EUCLIDE,

traduits littéralement, et suivis d'un Traité du Cercle,

du Cylindre, du Cône et de la Sphère;

de la mesure des Surfaces et des Solides ; avec des Notes ;

Par F. PEYRARD,

Bibliothécaire

de l'École Polytechnique.

OUVRAGE APPROUVÉ PAR L'INSTITUT NATIONAL.

Et nova sunt semper. —
OVIDE,...

A PARIS,

CHEZ F. LOUIS, LIBRAIRE, RUE
DE SAVOIE, N° 12.

AN XII - l804.

EUCLIDE

ÉLÉMENTS DE GÉOMÉTRIE

EUCLIDE

LIVRE XI.

DEFINITIONS.

1. UN solide est ce qui a longueur, largeur et épaisseur.

2. Un solide est terminé par des surfaces.

3. Une droite est perpendiculaire sur un plan lorsqu'elle fait des angles droits avec toutes les droites qui la rencontrent et qui sont dans ce plan.

4. Un plan est perpendiculaire sur un plan, lorsque les perpendiculaires menées dans un seul plan sur la commune section des plans sont perpendiculaires sur l'autre plan.

5. L'inclinaison d'une droite sur un plan est l'angle aigu compris par cette même droite et par la droite qui joint le point du plan que la première droite rencontre et le point de ce plan que rencontre la perpendiculaire menée sur ce plan de l'extrémité supérieure de la première droite.

6. L'inclinaison d'un plan sur un plan est l'angle aigu compris entre les perpendiculaires sur leur commune section, menées d'un point de cette commune section dans l'un et dans l'autre plan.

7. L'inclinaison d'un plan sur un plan est égale à l'inclinaison d'un autre plan sur un autre plan, lorsque les angles de leurs inclinaisons sont égaux entre eux.

8. Les plans parallèles sont ceux qui, étant prolongés, ne se rencontrent point.

9. Les solides semblables sont ceux qui sont contenus dans le même nombre des plans semblables.

10. Les solides semblables et égaux sont ceux qui sont contenus dans le même nombre de plans semblables et égaux.

11. Un angle solide est l'inclinaison de plus de deux droites les unes vers les autres, qui se rencontrent et qui ne sont pas dans le même plan.

AUTREMENT.

Un angle plan est celui qui est compris par plus de deux angles plans qui ne sont pas dans le même plan et qui sont construits dans le même point.

12. Une pyramide est un solide compris sous des plans qui, étant construits sur un seul plan, se réunissent dans un même point.

13. Un prisme est un solide compris sous des plans, dont deux plans opposés sont égaux, semblables et parallèles, et dont les autres plans sont des parallélogrammes.

14. Une sphère est un solide compris sous la surface décrite par l'arc d'un demi-cercle qui tourne autour du diamètre immobile jusqu'à ce qu'il soit revenu au même endroit d'où il était parti.

15. L'axe de la sphère est cette droite immobile autour de laquelle tourne le demi-cercle.

16. Le centre de la sphère est le même que celui du demi-cercle.

17. Un diamètre de la sphère est une droite menée par le centre et terminée de l'un et de l'autre côté par la surface de la sphère.

18. Un cône est un solide compris sous la superficie décrite par deux côtés d'un triangle rectangle tournant autour d'un des côtés de l'angle droit qui reste immobile, jusqu'à ce qu'il soit revenu au même endroit d'où il était parti. Si le côté immobile est égal à l'autre côté de l'angle droit, le cône est rectangle; s'il est plus petit, il est

obtus-angle, et s'il est plus grand le cône est acutangle.

19. L'axe, du cône est la droite immobile autour de laquelle tourne le triangle rectangle.

20. La base du cône est le cercle décrit par un des côtés qui tournent.

21. Un cylindre est un solide compris sous la surface décrite par trois côtés d'un parallélogramme rectangle tournant autour du quatrième côté qui reste immobile jusqu'à ce que ce rectangle soit revenu au même endroit d'où il était parti.

22. L'axe du cylindre est la droite immobile autour de laquelle tourne le parallélogramme.

23. Les bases du cylindre sont les cercles décrits par les deux côtés opposés du parallélogramme qui se meuvent.

24. Les cônes et les cylindres semblables sont ceux dont les axes et dont les diamètres des bases sont proportionnels.

25. Un cube est un solide compris sous six carrés égaux.

26. Un tétraèdre est un solide compris sous quatre triangles égaux et équilatéraux.

27. Un octaèdre est un solide compris sous huit triangles égaux et équilatéraux.

28. Un dodécaèdre est un solide compris sous douze pentagones égaux, équilatéraux et équiangles.

29. Un icosaèdre est un solide compris sous vingt triangles égaux et équilatéraux.

PROPOSITION PREMIÈRE.

THÉORÈME.

Une partie d'une droite ne peut être dans un plan et une autre partie de cette droite hors de ce plan.

Supposons, si cela peut se faire, qu'une partie AB (fig. 158) de la droite ABC soit dans un plan et une autre partie BC hors de ce plan.



Prolongez la droite AB dans le plan sur lequel elle est placée ; soit BD le prolongement de cette droite; les deux droites ABC, ABD auront une partie commune AB, ce qui est impossible, car deux droites ne peuvent se rencontrer qu'en un seul point, autrement elles se confondraient.

Donc une partie d'une droite n'est point dans un plan et une autre partie de cette droite hors de ce plan ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION II.

THÉORÈME.

Si deux droites se coupent, elles sont dans un seul plan ; tout triangle est aussi placé dans un seul plan.

Que les deux droites AB, CD (fig. 159) se coupent mutuellement au point E : je dis que les droites AB, CD sont dans un seul plan ;

je dis aussi que tout triangle est placé dans un seul plan.



Prenez sur les droites EB, EC deux points quelconques F, G ; menez CB, FG et FH, GK: je dis d'abord que le triangle EBC est placé dans un seul plan, car si la partie FHC ou la partie GBK du triangle EBC est dans un plan et l'autre partie dans un autre plan, une partie de l'une des droites EG, EB sera dans un plan et l'autre partie dans un autre plan; mais si une partie FCBG du triangle ECB est dans un plan et l'autre partie dans un autre plan, une certaine partie de l'une et de l'autre des droites EC, EB sera dans un plan et certaine autre partie dans un autre plan; ce qui a été démontré absurde : donc le triangle EBC est dans un seul plan; mais l'un et l'autre des droites EC, EB sont, dans le même plan que le triangle BCE, et les droites AB, CD sont dans le même plan que l'une et que l'autre des droites EC, EB (prop. 1. 11) : donc les droites AB, CD sont dans un seul plan, et tout triangle est aussi placé dans un seul plan ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION III.

THÉORÈME.

Si deux plans se coupent mutuellement, leur commune section est une ligne droite.

Que les deux plans AB, BC (fig. 160) se coupent mutuellement et que leur commune

section soit DB : je dis que la ligne DB est une ligne droite.



Car si cela n'est point, du point D au point B et sur le plan AB conduisez la droite DEB, et sur le plan BC conduisez la droite DFB ; les extrémités des deux droites DEB, DFB seront les mêmes, et ces deux droites renfermeront un espace, ce qui est absurde (ax. 12) : donc les lignes DEB, DFB ne sont pas des lignes droites. Nous démontrerons semblablement que toute autre ligne menée du point D au point B n’est point une ligne droite, excepté la ligne DB, c'est-à-dire la commune section des plans AB, BC.

Donc si deux plans se coupent mutuellement, leur commune section sera une ligne droite ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION IV.

THÉORÈME.

Si deux droites se coupent mutuellement, la droite qui sera perpendiculaire sur ces deux droites, à leur section commune, le sera aussi sur le plan qui passera par ces deux droites.

Que les deux droites AB, CD (fig. 161) se coupent mutuellement au point E et que la

droite EF leur soit perpendiculaire au point E : je dis que la droite EF est aussi perpendiculaire sur le plan qui passé par les droites AB, CD.



Prenez les droites AE, EB, CE, ED égales entre elles. Par le point E et sur le plan AB conduisez d'une manière quelconque une droite GEH, menez AD, CB, et ensuite d'un point quelconque F conduisez les droites FA, FG, FD, FC, FH, FB. Puisque les deux, droites AE, ED sont égales aux deux droites CE, EB, et que ces droites comprennent des angles égaux (prop. 15. 1), la base AD sera égale à la base CB (prop. 4. 1) le triangle AED égal au triangle CEB, et l'angle DAE égal à l'angle EBG ; mais l'angle AEG est égal à l'angle BEH (prop. 15. 1) : donc les deux triangles AGE, BEH ont deux angles égaux à deux angles, chacun à chacun; mais les côtés AE, EB adjacents à des angles égaux sont égaux entre eux : donc les autres côtés de ces triangles seront aussi égaux entre eux (prop. 26. 1) : donc GE est égal à EH et AG égal à BH ; et puisque AE est égal à EB et que la perpendiculaire FE est commune, la base FA sera égale à la base FB (prop. 4. 1) Par la même raison, FC sera aussi égal à FD. De plus, puisque la droite AD est égale à la droite CB et la droite FA égale à la droite FB, les deux droites FA, AD seront égales aux deux droites FB, BC, chacune à chacune; mais on a démontré que la base FD est égale à la

base FC : donc l'angle FAD est égal à l'angle FBC (prop. 8. 1) ; mais on a démontré de plus que AG est égal à BH et FA est égal à FB : donc les deux droites FA, AG sont égales aux deux droites FB, BH ; mais on a démontré que l'angle FAG est égal à l'angle FBH; donc la base FG est égale à la base FH (prop. 4. 1) ; et, puisqu'on a démontré encore que GE est égal à EH, et à cause que la droite EF est commune, les deux droites GE, EF seront égales aux deux droites HE, EF ; mais la base FH est égale à la base FG : donc l'angle GEF est égal à l'angle HEF (prop. 8. 1) : donc l'un et l'autre des angles GEF, HEF sont droits : donc la droite FE fait des angles droits avec la droite GH, de quelque manière que la droite GH soit menée dans le plan AB par le point E. Nous démontrerons semblablement que la droite FE fait des angles droits avec toutes les droites qui la rencontrent et qui sont, dans le plan AB ; mais une droite est perpendiculaire sur un plan lorsqu'elle fait des angles droits avec toutes les droites qui la rencontrent et qui, sont placées dans ce plan (déf. 3. 11) : donc la droite EF est perpendiculaire sur le plan AB ; mais le plan AB est celui qui passe par les deux droites AB, CD: donc la droite FE est perpendiculaire sur le plan qui passe par les droites AB, CD.

Donc si deux droites se coupent mutuellement, et si une droite est perpendiculaire sur ces deux droites à leur commune section, cette droite sera aussi perpendiculaire sur le plan qui passe par ces deux droites ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION V.

THÉORÈME.

Si trois droites, se rencontrent et si une droite leur est perpendiculaire à leur commune section, ces trois droites seront dans un seul plan.

Si une droite AB (fig. 162) est perpendiculaire, sur trois droites BC, BD, BE au point de contact B : je dis que les trois droites BC, BD, BE sont dans, un seul plan.



Car, supposons, si cela est possible, que BD, BE soient dans un plan et BC dans un autre, plan élevé au-dessous du premier ; faites passer un plan par les droites AB, BC ; la commune, section de ce plan avec le plan inférieur sera mie ligne droite (prop. 3. 11); que cette droite soit BF. Il est évident que les trois droites AB, BC, BF sont dans le plan qui passe par les droites AB, BC : donc puisque la droite AB est perpendiculaire sur l'une et l'autre des droites BD, BE, cette droite sera perpendiculaire sur le plan qui passe par DB, BE (prop. 4. 11) mais le plan qui passe par DB, BE est le plan intérieur : donc la droite AB est perpendiculaire sur le plan inférieur : donc cette droite sera perpendiculaire sur toutes les droites qui la rencontrent et qui sont dans ce plan (déf. 3. 11); mais cette perpendiculaire est rencontrée dans le plan inférieur par la droite BF : donc l'angle ABF est droit; mais on a supposé que l'angle ABG est droit : donc les deux angles ABF, ABC, placés dans le même-plan, sont égaux entre eux, ce qui est impossible (ax. 9) : donc la droite BC n'est pas dans un plan élevé au-dessus de celui qui

passe par les droites BD, BE : donc les trois droites BC, BD, BE sont dans un seul plan.

Donc si trois droites se rencontrent, et si une droite leur est perpendiculaire à leur commune section, ces trois droites seront dans un seul plan, ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION VI.

THÉORÈME.

Si deux droites sont perpendiculaires sur le même plan, ces deux droites seront parallèles.

Que les deux droites AB, CD (fig. 163) soient perpendiculaires sur un même plan, je dis que AB est parallèle à. CD.



Supposons que ces perpendiculaires rencontrent ce plan aux points B, D ; menez la droite BD; conduisez dans ce plan la droite DE perpendiculaire sur BD, et après avoir fait DE égal à AB menez les droites BE, AE, AD.

Puisque la droite AB est perpendiculaire sur le plan BDE, elle est perpendiculaire sur toutes les droites, qui la rencontrent et qui sont dans ce plan (déf. 3. 11) ; mais cette

droite est rencontrée par l'une et l'autre des droites BD, BE; qui sont dans ce plan : donc les angles ABD, ABE sont droits l'un et l'autre. Par la même raison, les angles CDB, CDE sont aussi droits l'un et l'autre. Mais puisque la droite AB est égale à la droite DE et que la droite BD est commune, les deux droites AB, BD sont égales aux deux droites ED, DB; mais ces droites comprennent des angles droits : donc la base AD, est égale à la base BE (prop. 4. 1), et puisque la droite AB est égale à la droite DE et la droite AD égale à la droite DE; les deux droites AB, BE sont égales aux deux droites ED, DB ; mais la base AE est commune ; donc l'angle ABE est égal à l'angle EDA (prop. 8. 1); mais l'angle ABE est droit: donc l'angle EDA est droit aussi; donc la droite ED est perpendiculaire sur la droite DA; mais, la droite ED, est perpendiculaire sur l'une et l'autre des droites BD, DC: donc ED est perpendiculaire sur les trois droites BD, DA, DC à leur point de contact : donc les trois droites BD, DA, DC sont dans un seul plan (prop. 5. 11) ; mais la droite AB est dans le même plan que les droites BD, DA, car tout triangle est dans un seul plan (prop. 2. 11) : donc les trois droites AB, BD, DC sont dans un seul plan ; mais les angles ABD, BDC sont droits l'un et l'autre : donc la droite AB est parallèle à la droite CD (prop. 28. 1).

Donc si deux droites sont perpendiculaires sur le même plan, ces deux droites seront parallèles entre elles ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION VII.

THÉORÈME.

Si deux droites sont parallèles, et si l'on prend sur chacune de ces droites des points quelconques, la droite qui joindra ces points sera dans le même plan que les parallèles.

Soient AB, CD (fig. 164) deux droites parallèles, et soient pris dans ces droites des points quelconques E, F : je dis que la droite qui joint les points E, F est dans le même plan que les deux parallèles.



Supposons que cela ne soit point, et supposons, si cela est possible, que cette droite soit dans un plan élevé au-dessus du premier et qu'elle ait par exemple, la position EGF ; par la ligne EGF conduisez un plan qui fasse avec le plan inférieur une section qui sera une ligne-droite (prop. 3. 11); que cette section soit EF : il est évident que les deux droites EGF, EF renfermeront un espace, ce qui est impossible (ax. 12) : donc la droite conduite du point E au point F n'est point dans un plan élevé au-dessus du premier : donc elle est dans celui qui, passe par les parallèles AB, CD.

Donc si deux droites sont parallèles, et si l'on prend dans l'une et l'autre de ces parallèles des points quelconques, la droite qui joindra ces points sera dans le même plan que les parallèles ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION VIII.

THÉORÈME.

Si deux, droites sont parallèles et si l'une d'elles est perpendiculaire sur un plan, l'autre sera aussi perpendiculaire sur ce plan.

Soient AB, CD (fig. 163) deux droites parallèles, et que l'une de ces droites AB soit perpendiculaire sur le plan BED : je dis que l'autre droite CD sera aussi perpendiculaire sur ce plan.



Que les droites AB, CD rencontrent le plan BED aux points B, D, Menez BD. Les droites AB, DC, BD seront dans le même plan (prop. 7.11). Conduisez dans le plan BED la droite DE perpendiculaire sur BD; faites ensuite DE égal à AB, et menez BE, AE, AD. Puisque AB est perpendiculaire sur le plan AED, elle sera perpendiculaire sur toutes les droites qui la rencontrent et qui sont dans ce plan (déf. 3. 11) ; donc les angles ABD, ABE sont droits l'un et l'autre ; et puisque la droite BD tombe sur les, droites AB, CD, les angles ABD, CDB seront égaux à deux angles droits (prop. 29. 1). Mais l'angle ABD est droit : donc l'angle CDB est droit aussi : donc CD est perpendiculaire sur BD ; et puisque la droite AB est égale à la droite DE, et que la droite BD est commune, les deux droites AB, DB sont égales aux deux droites. ED, DB; mais l'angle ABD est égal à l'angle EDB, car ils sont droits l'un et l'autre : donc la base AD est égale à la base BE (prop. 4. 1) et puisque AB est égal à DE et BE égal à AD, les deux droites AB, BE seront égales aux deux droites ED, DA, chacune à chacune ; mais la base AB est commune : donc l'angle ABE est égal à l'angle EDA (prop. 8. 1) ; mais l'angle ABE est droit : donc l'angle EDA est droit aussi: donc ED est perpendiculaire

sur DA, mais ED est aussi perpendiculaire sur BD : donc la droite ED sera perpendiculaire sur le plan qui passe par les droites BD, DA (prop. 4. 11) : donc la droite ED est perpendiculaire sur toutes les droites qui la rencontrent et qui sont dans ce plan. Mais la droite DC est dans le plan qui passe par les droites BA, AD, parce que les droites AB, BD sont dans, le plan qui passe par les droites BD, DA (prop. 2. 11) ; et la droite DC est dans le même plan que les droites AB, BD (prop. 7. 11): donc la droite ED est perpendiculaire sur DC ; donc la droite CD est perpendiculaire sur DE ; mais la droite CD est perpendiculaire sur la droite BD : donc la droite CD est perpendiculaire sur les deux droites DE, DB à leur point de rencontre D : donc la droite CD est perpendiculaire sur le plan qui passe par les droites DE, DB (prop. 4. 11) ; mais le plan qui passe par les droites DE, DB est le plan BED : donc CD est perpendiculaire sur le plan BED ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION IX.

THÉORÈME.

Les droites qui sont parallèles à une même droite, sans être dans le même plan que cette autre droite, sont cependant parallèles entre elles.

Que l'une et l'autre des droites AB, CD (fig. 165) soient parallèles à la droite EF, et que les droites AB, CD né soient pas dans le même plan que la droite EF : je dis que la droite AB est parallèle à la droite CD.



Prenez sur EF un point quelconque G, et de ce point menez dans le plan qui passe par EF, AB la droite GH perpendiculaire sur EF, et dans le plan qui passe par FE, CD, menez la droite GK perpendiculaire aussi sur FE : puisque la droite EF est perpendiculaire sur l'une et l'autre des droites GH, GK, la droite EF sera aussi perpendiculaire sur le plan qui passe par les droites GH, GK (prop. 4. 11) ; mais AB est parallèle à EF : donc AB est perpendiculaire sur le plan qui passe par les points H, G, K (prop. 8. 11) ; par la même raison CD est perpendiculaire sur le plan qui passe par les points H, G, K : donc les droites AB, CD sont perpendiculaires l'une et l'autre sur le plan qui passe par les points H, G, K ; mais si deux droites sont perpendiculaires sur un seul plan, ces deux droites sont parallèles entre elles (prop. 6. 11) : donc la droite AB est parallèle à la droite CD, ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION X.

THÉORÈME.

Si deux droites qui se touchent sont parallèles à deux droites qui se touchent et qui ne sont pas dans le même plan, ces droites comprendront des angles égaux.

Que les deux droites AB, BC (fig. 166) qui se touchent soient parallèles aux deux droites DE, EF qui se touchent et qui ne sont

pas dans le même plan : je dis que l'angle ABC est égal à l'angle DEF.



Prenez les droites BA, BC, ED, EF égales entre elles, et menez les droites AD, CF, BE, AC, DF. Puisque BA est égal et parallèle à ED, AD sera égal et parallèle à BE (prop. 35. 1). Par la même raison CF sera égal et parallèle à BE : donc les deux droites AD, CF sont égales et parallèles chacune à la droite BE ; mais les droites qui sont parallèles à une même droite sont parallèles entre elles (prop. 9. 11) : donc la droite AD est parallèle et égale à la droite CF ; mais ces parallèles sont jointes par les droites AC, DF : donc la droite AC est parallèle et égale à la droite DF ; et puisque les droites AB, BC sont égales aux deux droites DE, EF, et que la base AC est égale à la base DF, l'angle ABC sera égal à l'angle DEF (prop. 8. 1).

Donc si deux droites qui se touchent sont parallèles à deux droites qui se touchent et qui ne sont pas dans le même plan, ces deux droites comprendront des angles égaux ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XI.

PROBLÈME.

D'un point donné hors d'un plan, mener une perpendiculaire sur ce plan.

Soit A (fig. 167) le point donné hors d'un plan, soit BH le plan donné : il faut du point A mener une perpendiculaire sur ce plan.



Dans le plan donné, conduisez une droite BC d'une manière quelconque, et du point A menez la droite AD perpendiculaire sur BC (prop. 12. 1). Si la droite AD est aussi perpendiculaire sur ce plan, on aura fait ce qui était proposé ; si cela n'est pas, du point D et dans le plan donne menez sur BC la perpendiculaire DE (prop. 11. 1), et du point A menez sur DE la perpendiculaire AF (prop. 12. 1), et enfin par le point F conduisez la droite GH parallèle à BC.

Puisque BC est perpendiculaire sur l'une et sur l'autre des droites DA, DE, la droite BC sera perpendiculaire sur le plan qui passe par les droites ED, DA, et parallèle à la droite GH (prop. 4. 11) ; mais si deux droites sont parallèles et si l'une d'elles est perpendiculaire sur un plan, l'autre droite est aussi perpendiculaire sur ce même plan (prop. 8. 11): donc GH est perpendiculaire sur le plan qui passe par ED, DA, et par conséquent perpendiculaire sur toutes les droites qui se rencontrent dans ce

plan (déf. 3. 11) ; mais la droite AF rencontre la droite GH dans le plan qui passe par ED, DA : donc la droite GH est perpendiculaire sur AF : donc AF est perpendiculaire sur GH ; mais AF est perpendiculaire sur DF, par construction : donc la droite AF est perpendiculaire sur l'une et sur l'autre des droites GH, DE ; mais si une droite est perpendiculaire au point de contact sur deux droites qui se rencontrent, elle sera aussi perpendiculaire sur le plan qui passe par ces deux droites (prop. 4. 11) : donc FA est perpendiculaire sur le plan qui passe par ED, GH; mais le plan qui passe par ED, GH est le plan BH : donc la droite AF est perpendiculaire sur le plan BH.

Donc du point donné A, pris au-dessus d'un plan, on a mené une perpendiculaire AF sur ce plan; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION XII.

PROBLÈME.

D'un point donné dans un plan donné, élever une perpendiculaire sur ce plan.

Soit EF (fig. 168) le plan donné, et soit A le point donné dans ce plan : il faut du point A élever une perpendiculaire sur ce plan.



D'un point quelconque B, pris au-dessus du plan donné, menez une perpendiculaire BC sur ce plan (prop. 31. 11), et par le point A menez AD parallèle à BC (prop. 31. 1).

Puisque les deux droites AD, CB sont parallèles et que BC, l'une de ces droites, est perpendiculaire sur le plan donné, l'autre droite AD sera aussi perpendiculaire sur ce plan (prop. 8. 11).

Donc, d'un point donné dans un plan donné; on a élevé une perpendiculaire sur ce plan ; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION XIII.

THÉORÈME.

D'un point donné dans un plan donné, on ne peut élever du même côté deux perpendiculaires sur ce plan.

Supposons que cela soit possible; du point donné A (fig. 169) pris dans le plan donné, élevez du même côté les deux perpendiculaires AB, AC sur ce plan ; conduisez un plan par les deux droites BA, AC; ce plan fera au point A avec le plan donné une section qui sera une ligne, droite (prop. 3. 11); que cette section soit DAE; les droites AB, AC, DAE seront dans le même plan; mais puisque CA est perpendiculaire sur le plan donné $_t$ elle sera perpendiculaire sur toutes les droites qui la rencontrent et qui sont dans le plan donné (déf. 3. 11) ; mais la droite DAE, qui est dans le plan donné, rencontre la droite CA : donc l'angle CAE est droit. L'angle BAE est droit, par la même raison ; donc l’angle CAE et l'angle BAE qui sont dans le même plan sont égaux entre eux, ce qui est impossible (ax. 9)



Donc, d'un point donné dans un plan donné, on ne peut élever deux perpendiculaires sur ce plan; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XIV.

THÉORÈME.

Les plans sur lesquels une même droite est perpendiculaire sont parallèles entre eux.

Que la droite AB (fig. 170) soit perpendiculaire sur l'un et l'autre plan CD, EF : je dis que ces plans sont parallèles.



Car si cela n'est point, ces plans étant prolongés se rencontreront et leur section

sera une ligne droite (prop. 3. 11). Que cette section soit GH; ayant pris dans cette section un point quelconque K, menez AK, BK. Puisque la droite AB est perpendiculaire sur le plan EF, cette droite sera perpendiculaire sur la droite BK, qui est placée dans le prolongement du plan EF (déf. 3. 11) : donc l'angle ABK est droit. L'angle BAK est droit, par la même raison : donc les deux angles ABK, BAK du triangle ABK sont égaux à deux angles droits; ce qui est impossible (prop. 17. 1) : donc les plans CD, EF étant prolongés, ne se rencontreront point entre eux : donc les plans CD, EF sont parallèles.

Donc les plans sur lesquels une même droite est perpendiculaire sont parallèles entre eux ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XV.

THÉORÈME.

Si deux droites qui se rencontrent sont parallèles à deux droites qui se rencontrent et qui ne sont pas dans le même plan, les plans qui passeront par ces droites seront parallèles.

Que les droites AB, BC (fig. 171) qui se rencontrent soient parallèles à deux droites DE, EF qui se rencontrent et qui ne sont pas dans le même plan : je dis que les plans qui passent par les droites AB, BC et par les droites DE, EF ne se rencontreront point s'ils sont prolongés.



Du point B menez sur le plan qui passe par les droites DE, EF la perpendiculaire BG qui rencontre ce plan au point G (prop. 11. 11); par le point G menez la droite GH parallèle a la droite ED et la droite GK parallèle à la droite EF (prop. 31. 1). Puisque la droite BG est perpendiculaire sur le plan qui passe par les droites DE, EF, elle sera perpendiculaire sur toutes les droites qui la rencontrent et qui sont dans ce même plan (déf. 3. 11) ; mais cette droite est rencontrée par l'une et l'autre des droites GH, GK qui sont dans le plan qui passe par les droites DE, EF : donc les angles BGH, BGK sont droits l'un et l'autre; et puisque BA est parallèle à la droite GH, les angles GBA, BGH seront égaux à deux angles droits (prop. 29. 1) ; mais l'angle BGH est droit : donc l'angle GBA sera droit : donc GB est perpendiculaire sur BA. Par la même raison, BG est perpendiculaire sur BC : donc puisque la droite BG est perpendiculaire sur les deux droites BA, BC qui se coupent mutuellement, la droite BG sera perpendiculaire sur le plan qui passe par les deux droites AB, BC (prop. 4. 11). Par la même raison, la droite BG est perpendiculaire sur le plan qui passe par les droites GH, GK. Mais le plan qui passe par les droites GH, GR est le même que celui qui passe par les droites DE, EF : donc la droite BG est perpendiculaire sur le plan qui passe par les droites DE, EF. Mais on a démontré que la droite BG est perpendiculaire sur le plan qui

passe par les droites AB, BC, et cette droite est encore perpendiculaire sur le plan qui passe par les droites DE, EF : donc la droite BG est perpendiculaire sur l'un et l'autre des plans qui passent par les droites AB, BC et par les droites DE, EF ; mais les plans sur lesquels une même droite est perpendiculaire sont parallèles entre eux (prop. 14. 11) : donc le plan qui passe par les droites AB, BC est parallèle à celui qui passe par les droites DE, EF.

Donc si deux droites qui se rencontrent sont parallèles à deux droites qui se rencontrent et qui ne sont pas dans le même plan, les plans qui passeront par ces droites seront parallèles entre eux ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XVI.

THÉORÈME.

Si deux plans parallèles sont coupés par un plan quelconque, leurs communes sections seront parallèles.

Que les deux plans parallèles AB, CD (fig. 172) Soient coupés par un plan quelconque EFGH, et que leurs communes sections soient EF, GH : je dis que EF est parallèle à GH.



Supposons que cela ne soit point ; prolongez les droites EF, GH, ces droites se

rencontreront ou du côté des points F, H, ou du côté des points E, G. Prolongez ces droites du côté des points F, H, et supposons qu'elles se rencontrent au point K ; puisque EFK est dans le plan AB, tous les points pris dans EFK seront dans le même plan ; mais le point K est un des points pris sur EFK : donc le point K est dans le plan AB. Par la même raison, le point K est dans le plan CD : donc les plans AB, CD prolongés, se rencontreront entre eux; mais ces deux plans ne se rencontreront point puisqu'ils sont parallèles : donc les droites EF, GH prolongées ne se rencontreront point du côté des points; F, H. Nous démontrerons semblablement que les droites EF, GH prolongées ne se rencontreront point du côté des points E, G. Mais les droites qui ne se rencontrent d'aucun côté sont parallèles (déf. 35. 1) : donc les droites EF, GH sont parallèles.

Donc si deux plans parallèles sont coupés par un plan quelconque, leurs communes sections, seront parallèles entre elles ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XVII.

THÉORÈME.

Si deux droites sont coupées par des plans parallèles, elles seront coupées proportionnellement.

Que les deux droites AB, CD (fig. 173) soient coupées par les plans parallèles GH, KL, MN aux points A, E, B, C, F, D: je dis que AE est à EB comme CF est à FD.



Menez les droites AC, BD, AD; supposons que lai droite AD rencontre le plan KL au point O ; et conduisez les droites EO, OF. Puisque les deux plans parallèles KL, MN sont coupés par le plan EBDG, leurs sections EO, BD sont parallèles (prop. 16. 11) ; puisque les deux plans parallèles GH, KL sont coupés par le plan AOFC, leurs sections communes AC, FO sont parallèles, par la même raison. Mais puisque EO est parallèle à un des côtés du triangle ABD, savoir au côté BD, le côté AE sera au côté EB comme le côté AO est au côté OD (prop. 2. 6). De plus, puisque le côté OF est parallèle à un des côtés du triangle ADC, savoir au côté AC, le côté AO est au côté OD comme le côté CF est au côté FD. Mais on a démontré que le côté AO est au côté OD comme le côté AE est au côté EB : donc le côté AE est au côté EB comme le côté CF est au côté FD (prop. 11. 5).

Donc si deux droites sont coupées par des plans parallèles, ces droites seront coupées proportionnellement ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XVIII.

THÉORÈME.

Si une droite est perpendiculaire sur un plan, tous les plans qui passant par cette

droite sont perpendiculaires sur ce même plan.

Qu'une droite quelconque AB (fig. 174) soit perpendiculaire sur un plan : je dis que tous les plans qui passent par cette droite sont perpendiculaires sur ce même plan.



Par la droite AB conduisez le plan DE, et que la droite CE soit la commune section du plan DE et du plan donné; sur la droite CE prenez un point quelconque F ; de ce point et dans le plan DE conduisez la droite FG perpendiculaire sur la droite CE. Puisque la droite AB est perpendiculaire sur le plan donné, cette droite sera perpendiculaire sur toutes les droites qui la rencontrent et qui sont dans ce plan (déf. 3. 11): donc la droite AB est perpendiculaire sur la droite CE : donc l'angle ABF est droit ; mais l'angle GFB est droit aussi : donc AB est parallèle à FG (prop. 28. 1) ; mais AB est perpendiculaire sur le plan donné : donc FG sera perpendiculaire sur ce même plan (prop. 8. 11) ; mais un plan est perpendiculaire sur un plan, lorsque les droites menées dans l'un de ces plans sont perpendiculaires sur leur commune section et sur l'autre plan (déf. 4. 11) : donc la droite FG menée dans le plan DE et perpendiculaire sur la droite CE, commune section des plans, est aussi perpendiculaire sur le plan donné : donc le plan DE est perpendiculaire sur le plan donné. Nous démontrerons semblablement que tous les autres plans qui passent par la droite AB

sont aussi perpendiculaires sur le plan donné.

Donc si une droite est perpendiculaire sur un plan, tous les plans qui passeront par cette droite seront perpendiculaires sur ce même plan ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XIX.

THÉORÈME.

Si deux plans qui se coupent mutuellement sont perpendiculaires sur un plan, leur commune section sera aussi perpendiculaire sur ce plan.

Que deux plans AB, BC (fig. 175) qui se coupent mutuellement soient perpendiculaires sur un plan donné, et que leur commune section soit BD : je dis que la droite BD est perpendiculaire sur le plan donné.



Supposons que cela ne soit point ; du point D menez dans le plan AB la droite DE perpendiculaire sur la droite AD (prop. 11. 1), et du point D et dans le plan BC menez la droite DF perpendiculaire sur la droite CD. Puisque le plan AB est perpendiculaire sur le plan donné et que la droite DE a été menée dans le plan AB perpendiculaire à la commune section AD de ces plans, la droite DE sera

perpendiculaire sur le plan donné. Nous démontrerons semblablement que DF est perpendiculaire sur le plan donné : donc du point D on a mené du même côté deux perpendiculaires sur le plan donné ; ce qui est impossible (prop. 13. 11) : donc du point D ou ne peut pas mener d'autres droites qui soient perpendiculaires sur le plan donné, si ce n'est la commune section DB des plans AB, BC.

Donc si deux plans qui se coupent mutuellement sont perpendiculaires sur un plan donné, leur commune section sera perpendiculaire sur ce plan ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XX.

THÉORÈME.

Si un angle solide est compris sous trois angles plans, deux de ces angles, de quelque manière qu'on les prenne, sont plus grands que le troisième.

Que l'angle solide A (fig. 176) soit compris, sous les trois angles plans BAC, CAD, DAB : je dis que deux quelconques des trois angles plans BAC, CAD, DAB, de quelque manière qu'on les prenne, sont plus grands que l'angle restant.



Car si les angles BAC, CAD, DAB sont égaux entre eux, il est évident que deux

quelconques de ces angles, de quelque manière qu'on les prenne, sont plus grands que l'angle restant. Supposons que ces trois angles ne sont point égaux entre eux, et que l'angle BAC est le plus grand. Sur la droite AB et au point A faisons dans le plan qui passe par BAC l'angle BAE égal à l'angle DAB (prop. 23. 11). Faisons AE égal à AD (prop. 3. 1), menons ensuite par le point E la droite BEC qui coupe les droites AB, AC aux points B, C, menons aussi les droites DB, DC. Puisque la droite DA est égale à la droite AE et que la droite AB est commune, les deux droites DA, AB sont égales aux deux droites AE, AB ; mais l'angle DAB est égal à l'angle BAE : donc la base DB est égale à la base BE (prop. 4. 1) ; et puisque les deux droites DB, DC sont plus grandes que la droite BC et que la droite DB est égale à la droite BE, la droite restante DC sera plus grande que la droite restante EC ; mais puisque la droite DA est égale à la droite AE, que la droite AC est commune et que la base DC est plus grande que la base EC, l'angle DAC sera plus grand que l'angle EAC, (prop. 25. 1). Mais l'angle DAB est égal à l'angle BAE, par construction : donc les angles DAB, DAC sont plus grands que l'angle BAC. Si l'on prend deux autres angles quelconques, nous démontrerons semblablement qu'ils sont plus grands que l'angle restant.

Donc si un angle solide est compris sous trois angles plans, deux quelconques de ces angles, de quelque manière qu'on les prenne, sont plus grands que le troisième; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXI.

THÉORÈME.

Tout angle solide est compris sous des angles plans qui sont moindres que quatre angles droits.

Soit l'angle solide A (fig. 177) compris sous les angles plans BAC, CAD, DAB : je dis que les angles BAC, CAD, DAB sont moindres que quatre angles droits.



Dans chacune des droites AB, AC, AD, prenez des points quelconques B, C, D, et menez BC, CD, DB. Puisque l'angle solide B est compris sous les trois angles plans CBA, ABD, CBD, deux quelconques de ces triangles sont plus grands que l'angle restant (prop. 20. 11) : donc les angles CBA, ABD sont plus grands que l'angle CBD. Par la même raison, les angles BCA, ACD sont plus grands que l'angle BCD, et les angles CDA, ADB plus grands que l'angle CDB : donc les six angles CBA, ABD, BCA, ACD, ADC, ADB sont plus grands que les trois angles CBD, BCD, CDB. Mais les trois angles CBD, BCD, CDB sont égaux à deux angles droits (prop. 32. 1): donc les six angles CBA, ABD, BCA, ACD, ADC, ADB sont plus grands que deux angles droits ; mais puisque les trois angles de chacun des triangles ABC, ACD, ADB sont égaux à deux angles droits, les neuf angles CBA, ACB, BAC, ACD, DAC, CDA, ADB, DBA, BAD de ces trois triangles sont égaux à six angles droits ; mais les six angles ABC, BCA, ACD, CDA, ADB, DBA sont plus grands que deux angles droits : donc les angles restants BAC, CAD, DAB qui contiennent l'angle solide sont plus petits que quatre angles droits.

Donc tout angle solide est compris sous des angles plans plus petits que quatre angles droits ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXII.

THÉORÈME.

Si l'on a trois angles plans, dont deux de ces angles, de quelque manière qu'on les prenne, sont plus grands que l'angle restant, et si ces angles sont compris par des côtés égaux, on pourra construire un triangle avec les droites qui joignent ces côtés égaux.

Soient les trois angles plans ABC, DEF, GHK (fig. 178) dont deux de ces angles, de quelque manière qu'on les prenne, sont plus grands que l'angle restant, c'est-à-dire que les deux angles ABC, DEF sont plus grands que l'angle GHK, que les deux angles DEF, GHK sont plus grands que l'angle ABC, et enfin que les deux angles GHK, ABC sont plus grands que l'angle DEF ; que les droites AB, BC, DE, EF, GH, HK soient égales ; menez AC, DF, GK : je dis qu'on peut construire un triangle avec des droites égales aux droites AC, DF, GK ; c'est-à-dire que deux quelconques des droites AC, DF, GK, de quelque manière qu'on les prenne, sont plus grandes que la droite restante.



Si les angles ABC, DEF, GHK sont égaux entre eux, il est évident qu'on pourra construire un triangle avec des droites égales aux droites AC, DF, GK qui sont alors égales entre elles. Au contraire, si ces angles ne sont point égaux, sur la droite HK et au point H, faites l'angle KHL égal à l'angle ABC (prop. 23. 1) ; faites aussi la droite HL égale à une des droites AB, BC, DE, EF, GH, HK, et menez les droites GL, KL.

Puisque les deux droites AB, BC sont égales aux deux droites KH, HL, et que l'angle B est égal à l'angle KHL, la base AC sera égale à la base KL (prop. 4. 1) et puisque les angles ABC, GHK sont plus grands que l'angle DEF et que l'angle ABC est égal à l'angle KHL, l'angle GHL sera plus grand que l'angle DEF. De plus, puisque les deux droites GH, HL sont égales aux deux droites DE, EF et que F angle GHL est plus grand que l'angle E, la base GL sera plus grande que la base DF (prop. 24. 1) ; mais les droites GK, KL sont plus grandes que la droite GL (prop. 20. 1) : donc, à plus forte raison, les droites GK, KL sont plus grandes que la droite DF ; mais KL est égal à AC : donc les droites AC, GK sont plus grandes que la droite restante DF. Nous démontrerons semblablement que les droites AC, DF sont plus grandes que la droite GK; et que les droites GK, DF sont aussi plus grandes que la droite AC : donc on peut construire un triangle avec des droites égales aux droites AC, DF, GK (prop. 22. 1).

AUTREMENT.

Soient donnés les trois angles plans ABC, DEF, GHK (fig. 179) dont deux de ces angles, de quelque manière qu'on les prenne, sont plus grands que l'angle restant ; que ces angles soient compris par des droites égales AB, BC, DE, EF, GH, HK.



Menez les droites AC, DF, GK : je dis qu'on peut construire un triangle avec des droites égales aux droites AC, DF, GK; c'est-à-dire que deux de ces droites, de quelque manière qu'on les prenne, sont plus grandes

que la droite restante. Si les angles ABC, GHK sont égaux, les droites AC, DF, GK seront égales entre elles (prop. 4. 1) et deux de ces droites seront plus grandes que la droite restante. Au contraire, si ces angles ABC, DEF, GHK sont inégaux, et si l'angle ABC est plus grand que l'un et que l'autre des angles E, H, la droite AC sera plus grande que l'une et que l'autre des droites DF, GK (prop. 24. 1); et il est évident que la droite AC avec l'une ou avec l'autre des droites DF, GK sera plus grande que la droite restante. Je dis aussi que les droites DF, GK sont plus grandes que la droite AC. Sur la droite AB et au point B construisez l'angle ABL égal à l'angle GHK (prop. 23. 1) ; faites la droite BL égale à une des droites AB, BC, DE, EF, GH, HK, et menez AL, LC. Puisque les deux droites AB, BL sont égales aux deux droites GH, HK, chacune à chacune, et qu'elles comprennent des angles égaux, la base AL sera égale à la base GK (prop. 4. 1) ; et puisque les angles E, H sont plus grands que l'angle ABC et que l'angle GHK est égal à l'angle ABL, l'angle restant E sera plus grand que l'angle LBC. De plus, puisque les deux droites LB, BC sont égales aux deux droites DE, EF, chacune à chacune, et que l'angle DEF est plus grand que l'angle LBC, la base DF sera plus grande que la base LC (prop. 24. 1). Mais on a démontré que la droite GK est égale à la droite AL : donc les droites DF, GK sont plus grandes que les droites AL, LC, mais les droites AL, LG sont plus grandes que la droite AC (prop. 20. 1) : donc à plus forte raison les droites DF, GK sont plus grandes que la droite AC : donc deux des droites AC, DF, GK, de quelque manière qu'on les prenne, sont plus grandes que la droite restante.

Donc on peut construire un triangle avec trois droites égales aux droites AC, DF, GK (prop. 22. 1) ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXIII.

PROBLÈME.

Construire un angle solide avec trois angles plans dont deux de ces angles, de quelque manière qu'on tes prenne, sont plus grands que l'angle restant; il faut que ces trois angles soient plus petits que quatre angles droits.

Soient donnés les trois angles plans ABC, DEF, GHK (fig. 180) dont deux de ces angles, de quelque manière qu'on les prenne, sont plus grands que l'angle restant; que ces trois angles soient plus petits que quatre angles droits : il faut avec des angles égaux aux angles ABC, DEF, GHK construire un angle solide.

Faites les droites AB, BC, DE, EF, GH, HK égales entre elles et menez AC, DF, GK. On peut avec des droites égales à AC, DF, GK construire mi triangle (prop. 22. 11). Construisez le triangle LMN (prop. 22. 1) de manière que LM soit égal à AC, MN égal à DF et LN égal à GK. Décrivez ensuite une circonférence de cercle LMN autour du triangle LMN (prop. 5. 4); prenez le centre de ce cercle qui sera ou dans le triangle LMN ou sur un de ses côtés, ou hors de ce triangle.



Que le centre du cercle soit d'abord dans le triangle, et que ce centre soit O ; menez LO, MO, NO : je dis que AB est plus grand que LO ; car si cela n'est point, la droite AB sera égale à la droite LO ou plus petite que cette droite. Supposons d'abord qu'elle lui

soit égale. Puisque AB est égal à LO et que AB est égal à BC, LO sera égal à BC ; mais LO est égal à OM : donc les deux droites AB, BC sont égales aux deux droites LO, OM, chacune à chacune; mais la base AC est supposée égale à la base LM : donc l'angle ABC est égal à l'angle LOM (prop. 8. 1). Par la même raison, l'angle DEF est égal à l'angle MON et l'angle GHK égal à l'angle NOL: donc les trois angles ABC, DEF, GHK sont égaux aux trois angles LOM, MON, NOL; mais les trois angles LOM, MON, NOL sont égaux à quatre angles droits : donc les trois angles ABC, DEF, GHK sont égaux à quatre angles; mais on les a supposés plus petits, que quatre angles droits, ce qui est absurde : donc la droite AB n'est pas égale à la droite LO : je dis de plus que la droite AB n'est pas plus petite que la droite LO. Car supposons, si cela est possible, qu'elle soit plus petite, et que la droite AB soit égale à la, droite OP et la droite BC égale à la droite OQ; menez PQ. Puisque la droite AB est égale à la droite BC, la droite OP sera égale à la droite OQ ; donc la droite restante PL sera égale à la droite restante QM : donc la droite LM est-parallèle à la droite PQ (prop. 2. 6): donc les triangles LMO, PQO sont équiangles : donc OL est à LM comme OP est à PQ (prop. 4. 6) et en échangeant les places des moyens, LO est à OP comme LM est à PQ (prop. 16. 5) ; mais LO est plus grand que OP : donc LM est plus grand que PQ ; mais LM est égal à AC, par construction : donc AC sera plus grand que PQ ; et puisque les deux droites AB, BC sont égales aux deux droites PO, OQ et.que la base AC est plus grande que la base PQ, l'angle ABC sera plus grand que l'angle POQ (prop. 24. 1) Nous démontrerons semblablement que l'angle DEF est plus grand que l'angle MON et l'angle GHK plus grand que l'angle NOL : donc les trois angles ABC, DEF, GHK sont plus grands que les angles LOM, MON, NOL ; mais les angles ABC, DEF, GHK sont supposés plus petits que quatre angles droits : donc à plus forte raison les trois angles LOM, MON, NOL sont plus petits que quatre angles droits:;

mais ces trois angles sont égaux à quatre angles droits, ce qui est absurde : donc la droite AB n'est pas plus petite que la droite LO. On a démontré qu'elle ne lui est point égale : donc la droite AB est plus grande que la droite LO. Du point O élevez une perpendiculaire OR sur le plan du cercle LMN (prop. 12. 11). Supposons que le carré de OR soit égal à l'excès du carré de AB sur le carré de LO (lem. suiv.), et menons les droites RL, RM, RN. Puisque la droite OR est perpendiculaire sur le plan du cercle LMN, cette, droite sera perpendiculaire sur chacune des droites LO, MO, NO (déf. 3. 11); et puisque LO est égal à QM et que la droite OR est commune et qu'elle est perpendiculaire sur ces deux droites, la base LR sera égale à la base RM (prop. 4. 1). Par la même raison, la droite RN est égale à l'une et à l'autre des droites RL, RM : donc les trois droites RL, RM, RN sont égales entre elles. Puisque le carré fait sur OR est égal à l'excès du carré de AB sur le carré LO, le carré de AB sera égal aux carrés des droites LO, OR; mais le carré de RL est égal aux carrés des droites LO, OR (prop. 47. 1), car l'angle LOR est droit : donc le carré de la droite AB est égal au carré de la droite RL : donc la droite AB est égale à la droite RL ; mais chacune des droites BC, DE, EF, GH, HK est égale à la droite AB, et chacune des droites RM, RN est égale à la droite RL : donc chacune des droites AB, BC, DE, EF, GH, HKL est égale à chacune des droites RL, RM, RN ; mais puisque les deux droites LR, RM sont égales aux deux droites AB, BC et que la base LM est égale à la base AC, l'angle LRM sera égal à l'angle ABC (prop. 8. 1). L'angle MRN sera égal à l'angle DEF et l'angle LRN égal à l'angle GHK, par la même raison : donc avec les trois angles plans LRM, MRN, LRN, qui sont égaux aux trois angles donnés, on a construit un angle solide R qui est compris sous les angles LRM, MRN, LRN.



Que le centre du cercle sort présentement sur un des côtés, savoir, sur le côté MN (fig. 181), et que le centre de ce cercle soit le point O, menez OL : je dis de nouveau que AB est plus grand que LO ; car si cela n'est point, la droite AB sera égale à la droite LO ou bien elle sera plus petite que cette droite. Supposons d'abord qu'elle lui soit égale ; les deux droites AB, BC, c'est-à-dire les deux droites DE, EF, sont égales aux deux droites MO, OL, c'est-à-dire à la droite MN ; mais la droite MN est supposée égale à la droite DP : donc les droites DE, EF sont égales à la droite DF, ce qui ne peut être (prop. 20. 1) : donc la droite AB n'est point égale à la droite LO. On démontrerait semblablement qu'elle n'est pas plus petite, car de cette supposition il s'ensuivrait une plus grande absurdité : donc la droite AB est plus grande que la droite LO. Si l'on mène la droite RO perpendiculaire sur le plan du cercle, et si l'on suppose que le carré de OR soit égal à l'excès du carré de AB sur le carré LO (lem. suiv.), le problème sera résolu.



Que le centre du cercle soit enfin hors du triangle LMN (fig. 182), et que le centre de ce cercle soit O ; menez LO, MO, NO : je dis que la droite AB est plus grande que la droite LO ; car si cela n'est point, elle lui sera égale pu plus petite. Supposons d'abord qu'elle lui soit égale ; dans cette supposition les deux droites AB, BC sont égales aux deux droites MO, OL, chacune à chacune ; mais la base AC est aussi égale à la base ML : donc l'angle ABC est égal à l'angle MOL (prop. 8. 1). L'angle GHK est égal à l'angle LON, par la même raison : donc l'angle total MON est égal aux deux angles ABC, GHK; mais les angles ABC, GHK sont plus grands que l'angle DEF : donc l'angle MON est plus grand que l'angle DEF; et puisque les deux droites DE, EF sont égales aux deux droites MO, ON, et que la base DF est égale à la base MN, l'angle MON sera égal à l'angle DEF (prop. 8. 1) ; mais on a démontré qu'il est plus grand, ce qui est absurde : donc la droite AB n'est pas égale à la droite LO. Nous démontrerons de suite qu'elle n'est pas plus petite, donc elle est nécessairement plus grande. Si nous menons de nouveau la droite OR perpendiculaire sur le plan du cercle, et si nous supposons cette perpendiculaire égale à une droite dont le carré soit égal à l'excès du carré de la droite AB sur le carré de la droite LO (lem. suiv.), le problème sera résolu. Je dis, à présent que la droite AB n'est, pas plus petite que la droite LO. Supposons, si cela

est possible, qu'elle soit plus petite ; faites OP égal à AB et OQ égal à BC et menez PQ. Puisque AB est égal à BC, la droite OP sera égale à la droite OQ : donc la droite restante PL sera égale à la droite restante QM : donc la droite LM est parallèle à la droite QP (prop. 2. 6) : donc les deux triangles LMO, QOP sont équiangles r. donc LO est à LM comme OP est à PQ (prop. 4. 6), et en échangeant les plans des moyens, LO est à OP comme LM est à PQ; mais LO est plus grand que OP : donc LM est plus grand que PQ ; mais LM est égal à AC par construction: donc AC sera plus grand que PQ ; mais puisque les deux droites AB, BC sont égales aux deux droites PO, OQ, chacune à chacune, et que la base AC est plus grande que la base PQ, l'angle ABC sera plus grand que l'angle POQ (prop. 25. 1). Si l'on prend la droite OV égale à chacune des droites OP, OQ, et si l'on mène PV, nous démontrerons semblablement que l'angle GHK est plus grand que l'angle POV. Sur la droite LO et au point O, pris sur celle droite, construisez l'angle LOS égal à l'angle ABC et l'angle LOT égal à l'angle GHK; faites chacune des droites OS, OT égale à l'a droite PO, et menez PS, PT, ST. Puisque les deux droites AB, BC sont égales aux deux droites PO, OS, et que l'angle ABC est égal à l'angle POS, la base AC, c'est-à-dire la droite LM, sera égale à la base PS (prop. 4. 1). La droite LN sera égale à la droite PT, par la même raison; et puisque les deux droites ML, LN sont égales aux deux droites PS, PT et que l'angle MLN est plus grand que l'angle SPT, la base MN sera plus grande que la base ST (prop. 24. 1) ; mais MN est égal à DF : donc DF sera plus grand que ST : donc puisque les deux droites DE, EF sont égales aux deux droites SO, OT et que la base DF est plus grande que la base ST, l'angle DEF sera plus grand que SOT (prop. 25. 1) ; mais l'angle SOT est égal aux angles ABC, GHK : donc l'angle DEF est plus grand que les angles ABC, GHK : mais il est au contraire plus petit ; ce qui est impossible.

LEMME.

Nous allons faire voir de quelle manière on fait sur RO un carré qui soit égal à l'excès du carré de la droite AB sur le carré de la droite LO.

Soient les droites AB, LO (fig. 183); que AB soit la plus grande, et sur cette droite décrivez la demi-circonférence ABC, et appliquez dans la demi-circonférence ABC une droite AC égale à la droite LO et menez la droite BC.



Puisque l'angle ACB est compris dans le demi-cercle ABC, l'angle ACB sera droit (prop. 31. 3) : donc le carré de la droite AB est égal aux carrés des droites AC, CB (prop. 47. 1): donc le carré de AB surpasse le carré de AC du carré de CB ; mais AC est égal à LO ; donc le carré de AB surpasse le carré de LO du carré de CB : donc si nous faisons, la droite OR égale à la droite CB, le carré de la droite AB surpassera le carré de la droite LO du carré de la droite OR; ce que nous voulions faire.

PROPOSITION XXIV.

THÉORÈME.

Si un solide est compris sous des plans parallèles, les plans opposés sont des parallélogrammes a *égaux.*

Que le solide CDHG (fig. 184) soit compris, sous les plans parallèles AC, GF, AH, DF, FB, AE : je dis que les plans opposés sont des parallélogrammes égaux.



Puisque les deux plans parallèles BG, CE sont coupés, par le plan AC, leurs communes, sections sont parallèles. (prop. 16. 11) : donc la droite AB est parallèle à la droite DC. De plus, puisque les deux plans parallèles BF, AE sont coupés sur le plan AC, leurs communes sections sont parallèles : donc la droite AD est parallèle à la droite BC ; mais on a démontré que la droite AB est parallèle à la droite DC : donc le plan AC est un parallélogramme. Nous démontrerons semblablement que chacun des plans DF, FG, GB, BF, AE est un parallélogramme.

Menez les droites AH, DF. Puisque AB est parallèle à DC et BH parallèle à CF, les deux droites AB, BH qui se rencontrent seront parallèles aux deux droites DC, CF qui se rencontrent et qui ne sont pas dans le même plan : donc ces droites comprendront des angles égaux (prop. 10. 11) : donc l'angle ABH est égal à l'angle DCF ; et puisque les deux droites AB, BH sont égales aux deux droites DC, CF (prop. 34. 1), et que l'angle ABH est égal à l'angle DCF, la base AH sera

égale à la base DF (prop. 4. 1) et le triangle ABH égal au triangle DCF ; mais le parallélogramme BG est double du triangle ABH et le parallélogramme CE double aussi du triangle DCF (prop. 34.1) : donc le parallélogramme BG sera égal au parallélogramme CE. Nous démontrerons semblablement que le parallélogramme AC est égal au parallélogramme GF et le parallélogramme AE égal au parallélogramme BF.

Donc si un solide est compris sous des plans parallèles, les plans opposés sont des parallélogrammes égaux; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXV.

THÉORÈME.

Si un parallélépipède est coupé par un plan parallèle à des plans opposés, les solides obtenus par cette section seront entre eux comme leurs hases.

Que le parallélépipède ABCD (fig. 185) soit coupé par un plan VE parallèle aux plans opposés RA, DH : je dis que le solide ABFV est au solide EGCD comme la base AEFX est à la base EHCF.



Prolongez de part et d'autre la droite AH et prenez autant de droites égales que vous voudrez HM, MN égales chacune à la droite EH; prenez aussi autant de droites que vous voudrez AK, KL égales chacune à la droite AE et achevez les parallélogrammes LP, KX, HY, MS, et les parallélépipèdes AQ, KZ, DM, MT. Puisque les droites LK, KA, AE sont égales entre elles, les parallélogrammes LP, KX, AF seront égaux entre eux. (prop. 38. 1). Les parallélogrammes KO, KB, AG sont aussi égaux entre eux, ainsi que les parallélogrammes LZ, KQ, AR (pro. 24. 11) car ces parallélogrammes sont opposés. Par la même raison, les parallélogrammes EC, HY, MS sont encore égaux entre eux, ainsi que les parallélogrammes HG, HI, IN et les parallélogrammes DH, MA, NT : donc trois plans des solides LQ, KR, AV sont égaux à trois plans; mais trois plans de ces solides sont égaux à trois plans opposés : donc les trois parallélépipèdes LQ, KR, AV seront égaux entre eux (déf. 10. 11). Les trois parallélépipèdes ED, DM, MT sont égaux entre eux, par la même raison : donc la base LF est multiple de la base AF autant de fois que le parallélépipède LV est multiple du parallélépipède AV. Par la même raison la base NF est multiple de la base HF autant de fois que le parallélépipède NV est multiple du parallélépipède HV. Enfin si la base LF est égale à la base NF, le parallélépipède LV sera égal au parallélépipède NV ; si la base LF surpasse la base NF, le parallélépipède LV surpassera le parallélépipède NV, et si la base LF est plus petite que la base NF, le parallélépipède, LV sera plus petit que le parallélépipède MV. On a donc quatre quantités, savoir, les deux bases AF, FH et les deux parallélépipèdes AV, VH, et l'on a pris des équimultiples de la base AF et du parallélépipède AV, savoir, la base LF et le parallélépipède LV ; on a pris aussi des équimultiples de la base HF et du parallélépipède HV, savoir, la base NF et le parallélépipède NV. Mais on a démontré que si la base LF surpasse la base NF, le parallélépipède LV surpassera le parallélépipède NV ; que si la base LV est

égale à la base NV, le parallélépipède LV sera égal au parallélépipède NV, et que si la base LV est plus petite que la base NV, le parallélépipède LV sera plus petit que le parallélépipède NV : donc le parallélépipède AV est au parallélépipède VH comme la base AF est à la base FH (déf. 5. 5) ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXVI.

PROBLÈME.

Sur une droite donnée et à un point donné dans cette droite, construire un angle solide égal à un angle solide donné.

Soit AB (fig. 186) la droite donnée, A le point donné dans cette droite, et D l'angle solide donne et compris sous les plans EDC, EDF, FDC: il faut sur la droite donnée AB et au point A donné dans cette droite construire un angle solide égal à l'angle solide donné D.



Prenez dans la droite DF un point quelconque F, et de ce point menez une perpendiculaire FG sur le plan qui passe par les droites ED, DC (prop. 11. 11) ; que la perpendiculaire FG rencontre le plan DEC au point G ; menez la droite DG. Ensuite sur la droite AB et au point donné A pris dans cette droite construisez l'angle BAL égal à l'angle EDC (prop. 23. 1), et l'angle BAK égal à

l'angle EDG ; faites ensuite AK égal à DG (prop. 3. 1) ; du point K menez KH perpendiculaire sur le plan qui passe par BAL (prop. 12. 11), faites enfin la droite KH égale à la droite GF et menez la droite HA : je dis que l'angle solide A, compris sous les angles BAL, BAH, HAL, est égal à l'angle solide D, compris sous les angles EDC, EDF, FDC.

Faites AB égal à DE et menez les droites HB, KB, FE, GE. Puisque la droite FG est perpendiculaire sur le plan EDC, cette droite sera perpendiculaire sur toutes les droites qui la rencontrent et qui sont dans ce plan (déf. 3. 11) : donc chacun des angles FGD, FGE est droit; chacun des angles HKA, HKB est droit, par la même raison; et puisque les deux droites KA, AB sont égales aux deux droites GD, DE, chacune à chacune, et que ces droites comprennent des angles égaux, la base B K sera égale à la base EG (prop. 4. i) ; mais la droite KH est égale à la droite GF, et les angles HKB, FGE sont droits l'un et l'autre : donc la droite HB est égale à la droite FE. De plus, puisque les deux droites AK, KH sont égales aux deux droites DG, GF, et que ces droites comprennent des angles droits, la base AH sera égale à la base DF ; mais la droite AB est égale à la droite DE : donc les deux droites HA, AB sont égales aux deux droites FD, DE; mais la base HB est égale à la base FE : donc l'angle BAH sera égal à l'angle EDF. L'angle HAL est égal à l'angle FDC, par la même raison ; en effet, faites la droite AL égale à la droite DC, et menez les droites KL, HL, GC, FC. Puisque l'angle total BAL est égal à l'angle total EDG et que l'angle BAK est égal à l'angle EDG, l'angle restant KAL sera égal à l'angle restant GDC ; et puisque les deux droites KA, AL sont égales aux deux droites GD, DC, et qu'elles renferment des angles égaux, la base KL sera égale à la base GC (prop. 4. 1) ; mais la droite KH est égale à la droite GF : donc les deux droites LK, KH sont égales aux deux droites CG, GF ; mais ces deux droites renferment des angles droits : donc la base

HL est égalé à la base FC. De plus, puisque les deux droites HA, AL sont égalés aux deux droites FD, DC et que la base HL est égale à la base FC, l'angle H AL sera égal à l'angle FDC (prop. 8. 1); mais l'angle BAL est égal à l'angle EDC : donc, sur une droite donnée et à un point pris dans cette droite, on a construit un angle solide égal à un angle solide donné; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION XXVII.

PROBLÈME.

Sur une droite donnée décrire un parallélépipède qui soit semblable à un parallélépipède donné et semblablement placé que lui.

Soit AB (fig. 187) la droite donnée et DC le parallélépipède donné : il faut décrire sur la droite AB un parallélépipède qui soit semblable au parallélépipède donné DC et semblablement placé que lui.



Sur la droite AB et au point A donné dans cette droite construisez un angle solide qui soit compris sous les angles plans BAH, HAK, KAB et qui soit égal à l'angle solide C, de manière que l'angle BAH soit égal à l'angle ECF, l'angle BAK égal à l'angle ECG et l'angle KAH égal à l'angle GCF, et ensuite faites en sorte que EC soit à CG comme BA est à AK, et que GC soit à CF comme KA est à AH

(prop. 12. 6) : EC sera à CF comme BA est à AH (prop. 22. 5) ; terminez le parallélogramme BH et le parallélépipède AL.

Puisque EC est à CG comme BA est à AK, les côtés qui sont autour des angles égaux ECG, BAK seront proportionnels : donc le parallélogramme GE sera semblable au parallélogramme KB (prop. 4. 6). Par la même raison, le parallélogramme GF sera semblable au parallélogramme KH, et le parallélogramme FE semblable au parallélogramme HB : donc trois parallélogrammes du parallélépipède CD sont semblables à trois parallélogrammes du parallélépipède AL ; mais trois parallélogrammes de ces parllélépipèdes sont égaux et semblables à trois parallélogrammes opposés (prop. 24. 1) donc le parallélépipède total CD sera semblable au parallélépipède total AL.

Donc, sur la droite AB, on a construit un parallélépipède AL qui est semblable à un parallélépipède donné CD et semblablement placé ; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION XXVIII.

THÉORÈME.

Si un parallélépipède est coupé par un plan selon les diagonales de deux plans opposés, le parallélépipède sera coupé en deux parties égales par ce plan.

Que le parallélépipède AB (fig. 188) soit coupé par le plan CDEF selon les diagonales des deux plans opposés CF, DE : je dis que le parallélépipède AB sera coupé en deux parties égales par le plan CDEF.



Puisque le triangle CGF est égal au triangle CBF (prop. 34. 1) et le triangle ADE égal au triangle DEH, de plus, puisque le parallélogramme CA est égal au parallélogramme BE (prop. 24. 11), car ces deux parallélogrammes sont opposés, et puisque le parallélogramme GE est aussi égal au parallélogramme CH, le prisme compris sous les deux triangles CGF, ADE et sous les trois parallélogrammes GE, AC, CE, sera égal au prisme compris sous les deux triangles CFB, DEH, et les trois parallélogrammes CH, BE, CE, car ils sont compris sous des plans égaux en nombre et en grandeur (déf. 10. 11) : donc le parallélépipède total AB est coupé en deux parties égales par le plan CDEF ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXIX.

THÉORÈME.

Les parallélépipèdes qui ont la même base et la même hauteur, et dont les arêtes sont placées dans les mêmes droites, sont égaux entre eux.

Que les parallélépipèdes CM, CN (fig. 189) aient la même base AB et la même hauteur, et que les arêtes AF, AG, LM, LN, CD, GE, BH, B K soient dans les mêmes droites FN, DK : je dis que le parallélépipède CM est égal au parallélépipède CN.



Car puisque chacune des figures CH, CK est un parallélogramme, la droite CB sera égale à chacune des droites DH, EK (prop. 34. 1) : donc la droite DH sera égale à la droite EK. Retranchez la partie commune EH, la droite restante DE sera égale à la droite restante HK : donc le triangle DEC est égal au triangle HKB (prop. 8. 1), et le parallélogramme DG égal au parallélogramme HN (prop. 56. 1). Par la même raison le triangle AFG est égal au triangle LMN. Mais le parallélogramme CF est égal au parallélogramme BM et le parallélogramme CG égal au parallélogramme BN (prop. 24. n), car ces parallélogrammes sont opposés : donc le prisme contenu sous les deux triangles AFG, DEC et sous les trois parallélogrammes AD, DG, GC est égal au prisme contenu sous les deux triangles LMN, HBK et sous les trois parallélogrammes BM, NH, BN (déf. 10. 11) : donc si nous ajoutons à chacun de ces prismes le solide dont une des bases est le parallélogramme AB et dont l'autre base est le parallélogramme GEHM, le parallélépipède total CM sera égal au parallélépipède total CN.

Donc les parallélépipèdes qui ont la même base et la même hauteur, et dont les arêtes sont placées dans les mêmes droites sont égaux entre eux ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXX.

THÉORÈME.

Des parallélépipèdes qui ont la même base et la même hauteur, et dont les droites insistantes ne sont point placées dans les mêmes droites, sont égaux entre eux.

Soient CM, CN (fig. 190) des parallélépipèdes qui ont la même base AB et la même hauteur, et dont .les droites insistantes AF, AG, LM, LN, CD, CE, BH, BK ne sont point placées dans les mêmes droites : je dis que le parallélépipède CM est égal au parallélépipède CN.



Prolongez les droites NK, DH et les droites GE, FM, et que ces droites se rencontrent aux points P, R, Q, O. Menez AO, LP, CQ, BR. Le parallélépipède CM, dont la base est le parallélogramme ACBL opposé au parallélogramme FDHM sera égal au parallélépipède CP dont la base est le parallélogramme ACBL opposé au parallélogramme OQRP (pr. 29. 11), car ces deux parallélogrammes ont la même base et la même hauteur, et leurs droites insistantes AF, AO, LM, LP, CD, CQ, BH, BR sont dans les mêmes droites FP, DR; mais le parallélépipède CP dont la base est le parallélogramme ACBL opposé au parallélogramme OQRP est égal au parallélépipède CN dont la base est le parallélogramme ACBL opposé au parallélogramme GEKN (prop. 29. 11); car ces deux parallélépipèdes ont la même base et la même hauteur, et leurs arêtes AG, AO, CE, CQ, LN, LP, BK, BR sont dans les mêmes droites

GQ, NR : donc le parallélépipède CM est égal au parallélépipède CN.

Donc les parallélépipèdes qui ont la même base et la même hauteur, et dont les arêtes ne sont point placées dans les mêmes droites, sont égaux entre eux ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXXI.

THÉORÈME.

Les parallélépipèdes qui ont des bases égales et la même hauteur, sont égaux entre eux.

Que les parallélépipèdes AE, CF (fig. 191) aient des bases égales AB, CD et la même hauteur : je dis que le parallélépipède AE est égal au parallélépipède CF.



Supposons d'abord que les arêtes HK, BE, AG, LM, PQ, DF, CO, RS soient perpendiculaires sur les bases AB, CD, et que l'angle ALB ne soit pas égal à l'angle CRD. Conduisez la droite RT dans la direction de la droite CR, et faites sur la droite RT et au point R pris dans cette droite l'angle TRV égal à l'angle ALB (prop. 23. 1), faites la droite RT égale à la droite AL et la droite RV égale à la droite LB; par le point V conduisez la droite YV parallèle à la droite RT, achevez la base RY et le parallélépipède

ZV. Puisque les deux droites TR, RV sont égales aux deux droites AL, LB et qu'elles comprennent des angles égaux, le parallélogramme RY sera égal et semblable au parallélogramme HL. De plus, puisque RT est égal à AL et RS égal à LM et que ces droites comprennent des angles égaux, le parallélogramme RZ sera égal et semblable au parallélogramme AM. Le parallélogramme SV sera égal et semblable au parallélogramme LE, par la même raison : donc trois parallélogrammes du parallélépipède AE seront égaux et semblables à trois parallélogrammes du parallélépipède ZV: donc puisque trois parallélogrammes sont égaux et semblables à trois parallélogrammes opposés (prop. 24. 11), le parallélépipède total AE sera égal au parallélépipède total ZV. Prolongez DR, YV, et que ces droites se rencontrent au point A’ ; par le point T conduisez la droite TT’ parallèle à la droite DA’, et prolongez TT’, PD jusqu'à ce qu'elles se rencontrent au point B’, et complétez les parallélépipèdes A’Z, RI. Le parallélépipède ZA’ qui a pour base le parallélogramme RZ opposé au parallélogramme A’Q’ est égal au parallélépipède ZV qui a pour base le parallélogramme RZ opposé au parallélogramme VX, attendu que ces deux parallélépipèdes ont la même base RZ et la même hauteur, et que les droites insistantes RA’, RV, TT ’, TY, SS’, SN, ZQ’, ZX sont placées dans les mêmes droites A’Y, S’X ; mais le parallélépipède ZV est égal au parallélépipède AE : donc le parallélépipède AE est égal au parallélépipède ZA’. Mais le parallélogramme RVYT est égal au parallélogramme A’T (prop. 35. 1), car ces deux parallélogrammes ont la même base RT et sont compris entre les mêmes parallèles RT, A’Y, et le parallélogramme RVYT est égal au parallélogramme C D parce que le parallélogramme CD est égal au parallélogramme AB : donc le parallélogramme A’T sera égal au parallélogramme CD, mais DT est un autre parallélogramme : donc la base CD est à la base DT comme la base A’T est à la base DT (prop. 7. 5); et puisque le parallélépipède CI est coupé par le plan RF

parallèle aux plans opposés, la base CD sera à la base DT comme le parallélépipède CF est au parallélépipède RI (prop. 25. 11). Par la même raison, puisque le parallélépipède A'I est coupé par le plan RZ parallèle aux plans opposés, la base A'T sera à la base DT comme le parallélépipède AZ est au parallélépipède RI; mais la base CD est à la base DT comme la base A'T est à la base TD : donc le parallélépipède CF est au parallélépipède RI comme le parallélépipède AZ est au parallélépipède RI (prop. 15. 5) : donc puisque chacun des parallélépipèdes CF, A'Z a la même raison avec le parallélépipède RI, le parallélépipède CF sera égal au parallélépipède A'Z (prop. 9. 5) ; mais on a démontré que le parallélépipède A'Z est égal au parallélépipède AE : donc le parallélépipède AE est égal au parallélépipède CF.

Supposons à présent que les droites insistantes AG, HK, BE, LM, CO, PQ, DF, RS (fig. 192) ne soient point perpendiculaires sur les bases AB, CD : je dis encore que le parallélépipède AE sera égal au parallélépipède CF.



Des points K, E, G, M, Q, F, O, S conduisez sur les plans LN, A'D les perpendiculaires KN, ET, GV, MX, QY, FZ, OA', SI qui rencontrent ces plans aux points N T, V, X, Y, Z, A', I (prop. 11. 11), et menez les droites NT, VX, NV, TX, YZ, YA', A'I, ZI. Le parallélépipède KX sera égal au parallélépipède QI (prop. 31. 11), parce que les parallélépipèdes KX, QI ont des bases égales KM, QS, et la même hauteur, et que leurs arêtes sont perpendiculaires sur leurs

bases. Mais le parallélépipède KX est égal au parallélépipède AE (prop. 30. 11), et le parallélépipède QI égal au parallélépipède CF, puisqu'ils ont la même base et la même hauteur, et que leurs arêtes ne sont pas dans les mêmes droites : donc le parallélépipède AE est égal au parallélépipède CF.

Donc les parallélépipèdes qui ont des bases égales et la même hauteur, sont égaux entre eux ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXXII.

THÉORÈME.

Les parallélépipèdes qui ont la même hauteur sont entre eux comme leurs bases.

Soient AB, CD (fig. 193) deux parallélépipèdes qui aient la même hauteur : je dis que ces parallélépipèdes sont entre eux comme leurs bases, c'est-à-dire que le parallélépipède AB est au parallélépipède CD comme la base AE est à la base CF.



Appliquez sur FG un parallélogramme FH qui soit égal au parallélogramme AE (prop. 45. 1), et sur la base FH construisez le

parallélépipède GK dont la hauteur soit la même que celle du parallélépipède CD. Le parallélépipède AB sera égal au parallélépipède GK (prop. 31. 11), car ces parallélépipèdes ont des bases égales AE, FH et la même hauteur. Puisque le parallélépipède CK est coupé par un plan DG parallèle aux plans opposés, le parallélépipède HD sera au parallélépipède DC comme la base HF est à la base CF (prop. 25. 11) ; mais la base FH est égale à la base, AE et le parallélépipède GK égal au parallélépipède AB : donc le parallélépipède AB est au parallélépipède CD comme la base AE est à la base CF.

Donc les parallélépipèdes qui ont la même hauteur sont entre eux comme leurs bases ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXXIII.

THÉORÈME.

Les parallélépipèdes semblables sont entre eux en raison triplée de leurs côtés homologues.

Soient AB, CD (fig. 194) deux parallélépipèdes semblables et que le côté AE soit l'homologue du côté CF : je dis que les parallélépipèdes AB, CD sont entre eux en raison triplée des côtés AE, CF.



Menez les droites EK, EL, EM dans la direction des droites AE, GE, HE ; faites EK égal à CF, EL égal à FN et EM égal à FR; achevez le parallélogramme KL et le parallélépipède KP. Les deux droites EK, EL sont égales aux deux droites CF, FN ; l'angle REL est égal à l'angle CFN, parce que l'angle AEG est égal à CFN, à cause de la similitude des parallélépipèdes AB, CD : donc le parallélogramme KL sera égal et semblable au parallélogramme CN. Par la même raison, le parallélogramme KM est égal et semblable au parallélogramme CR, et le parallélogramme PE égal et semblable au parallélogramme DF : donc trois parallélogrammes du parallélépipède KP sont égaux et semblables à trois parallélogrammes du parallélépipède CD : donc puisque trois parallélogrammes sont égaux et semblables à trois parallélogrammes opposés (prop. 24. 11), le parallélépipède total KP sera égal et semblable au parallélépipède total CD (déf. 10. 11). Achevez le parallélogramme GK, et sur les bases GK, KL construisez deux parallélépipèdes EO, LQ qui aient la même hauteur que le parallélépipède AB. Puisqu'à cause de la similitude des parallélépipèdes AB, CD le côté AE est au côté CF comme le côté EG est au côté FN comme le côté EH est au côté FR, et puisque FC est égal à EK, le

côté FN est égal à EL, et que FR est égal au côté EM, AE sera au côté EK comme le côté GE est au côté EL et comme le côté HE est au côté EM. Mais AE est à EK comme le parallélogramme AG est au parallélogramme GK (prop. 1. 6), et GE est à EL comme le parallélogramme GK est au parallélogramme KL, et, de plus, HE est à EM comme le parallélogramme QE est au parallélogramme RM : donc le parallélogramme AG est au parallélogramme GK comme le parallélogramme GK est au parallélogramme KL et comme le parallélogramme QE est au parallélogramme KM. Mais AG est à GK comme le parallélépipède AB est au parallélépipède EO (prop. 32. 11), et GK est à KL comme le parallélépipède OE est au parallélépipède QL, et de plus QE est à KM comme le parallélépipède QL est au parallélépipède KP : donc le parallélépipède AB est au parallélépipède EO comme le parallélépipède EO est au parallélépipède QL et comme le parallélépipède QL est au parallélépipède KP ; mais si l'on a quatre quantités de suite qui soient proportionnelles, la première et la quatrième seront entre elles en raison triplée de la première et de la seconde (déf. 11. 5) : donc les parallélépipèdes AB, KP sont entre eux en raison triplée des parallélépipèdes AB, EO ; mais AB est à EO comme le parallélogramme AG est au parallélogramme GK et comme la droite AE est à la droite EK (prop. 1. 6) : donc les parallélépipèdes AB, KP sont en raison triplée des droites AE, EK. Mais le parallélépipède RP est égal au parallélépipède CD et la droite EK égale à la droite CF : donc les parallélépipèdes AB, CD sont en raison triplée des côtés homologues AE, CF ; ce qui fallait démontrer.

COROLLAIRE.

Il suit manifestement de là, que si quatre droites sont proportionnelles, la première sera à la quatrième comme le parallélépipède construit sur la première est au parallélépipède semblable et semblablement construit sur la seconde, puisque la première

et la quatrième droite sont en raison triplée de la première et de la seconde.

PROPOSITION XXXIV.

THÉORÈME.

Les bases des parallélépipèdes égaux sont réciproquement proportionnelles aux hauteurs ; et les parallélépipèdes dont les bases sont réciproquement proportionnelles aux hauteurs sont égaux entre eux.

Que les parallélépipèdes AB, CD (fig. 195) soient égaux : je dis que leurs bas.es sont réciproquement proportionnelles à leurs hauteurs; c'est-à-dire que la base EH est à la base NQ comme la hauteur du parallélépipède CD est à la hauteur du parallélépipède AB.



Supposons d'abord que les droites insistantes AG, EF, LB, HK, CM, NO, PD, QR soient perpendiculaires sur les bases : je dis que la base EH est à la base NQ comme CM est à AG. Si la base EH est égale à la base NQ et le parallélépipède AB égal au parallélépipède CD, la hauteur CM sera égale à la hauteur AG ; car si les bases EH, NQ étant égales, les hauteurs AG, C M n'étaient pas égales, le parallélépipède AB ne serait point égal au parallélépipède CD (prop. 31. 11) ; mais ces deux parallélépipèdes sont supposés égaux : donc les hauteurs CM, AG ne sont pas inégales : donc elles sont égales :

donc la base EH est à la base NQ comme CM est à AG, d'où il suit évidemment que les bases des parallélépipèdes AB, CD sont réciproquement proportionnelles à leurs hauteurs.

Supposons à présent que la base EH ne soit pas égale à la base NQ et que la base EH soit la plus grande ; puisque le parallélépipède AB est égal au parallélépipède CD la hauteur CM sera plus grande que la hauteur AG ; car si cela n'était point, les parallélépipèdes AB, CD ne seraient pas égaux (prop. 31. 11) ; mais ils sont supposés égaux. Faites CT (fig. 196) égal à AG et sur la base NQ construisez un parallélépipède XC dont la hauteur soit CT. Puisque le parallélépipède AB est égal au parallélépipède CD et que XC est un autre parallélépipède avec lequel les deux parallélépipèdes égaux AB, CD ont la même raison (prop. 7. 5), le parallélépipède AB sera au parallélépipède CX comme le parallélépipède CD est au parallélépipède CX; mais le parallélépipède AB est au parallélépipède CX comme la base EH est à la base NQ (prop. 32. 11), car les parallélépipèdes AB, CX sont égaux en hauteur, et le parallélépipède CD est au parallélépipède CX comme la base MQ est à la base QT (prop. 25. 11), et comme le côté MC est au côté CT (prop. 1. 6): donc la base EH est à la base NQ comme le côté MC est au côté CT ; mais CT est égal à AG : donc la base EH est à la base NQ comme le côté MC est au côté AG : donc les bases des parallélépipèdes AB, CD sont réciproquement proportionnelles aux hauteurs.



Supposons ensuite que les bases des parallélépipèdes AB, CD soient réciproquement proportionnelles aux hauteurs, c'est-à-dire que la base EH soit à la base NQ comme la hauteur du parallélépipède CD est à la hauteur du parallélépipède AB : je dis que les parallélépipèdes AB, CD sont égaux entre eux.

Que les arêtes soient encore perpendiculaires sur les bases. Si la base EH est égale à la base NQ et si la base EH est à la base NQ comme la hauteur du parallélépipède CD est à la hauteur du parallélépipède AB, la hauteur du parallélépipède CD sera égale à la hauteur du parallélépipède AB. Mais les parallélépipèdes qui ont des bases égales et la même hauteur sont égaux entre eux (prop. 31. 11): donc le parallélépipède AB sera égal au parallélépipède CD.

Mais supposons que la base EH ne soit point égale à la base NQ et que EH soit la plus grande base ; la hauteur du parallélépipède CD sera plus grande que la hauteur du parallélépipède AB, c'est-à-dire que CM sera plus grand que AG; faites CT égal à AG, achevez également le parallélépipède CX. Puisque la base EH est à la base NQ comme le côté CM est au coté AG et que AG est égal à CT, la base EH sera à la base NQ comme le côté MC est au côté CT. Mais la base EH est à la base NQ comme le parallélépipède AB est au parallélépipède CX (prop. 32. 11), car les

parallélépipèdes AB, CX sont égaux en hauteur; mais le côté MC est au côté CT (prop. 1. 6), comme la base MQ est à la base QT et comme le parallélépipède CD est au parallélépipède CX (prop. 25. 11); donc le parallélépipède AB est au parallélépipède CX comme le parallélépipède CD est au parallélépipède CX : donc l'un et l'autre des parallélépipèdes AB, CD ont la même raison avec le parallélépipède CX : donc le parallélépipède AB sera égal au parallélépipède CD (prop. 9. 5) ; ce qu'il fallait démontrer.



197

Supposons maintenant que les arêtes FE, BL, GA, KH, ON, DP, MC, RQ (fig. 197) ne soient point perpendiculaires sur les bases des parallélépipèdes. Des points F, G, B, K, O, M, D, R conduisez sur les plans des bases EH, NQ des perpendiculaires qui rencontrent ces plans aux points S, T, V, X, Y, Z, B', A', et achevez les parallélépipèdes FX, OA (prop. 11. 11) : je dis que les bases des parallélépipèdes égaux AB, CD sont réciproquement proportionnelles aux hauteurs, c'est-à-dire que la base EH est à la base NQ comme la hauteur du parallélépipède CD est à la hauteur du parallélépipède AB. Mais le parallélépipède AB est égal au parallélépipède CD ; le parallélépipède BT est égal au parallélépipède AB (prop. 30. 11) car ils ont la même base FK et la même hauteur, et leurs droites insistantes ne sont point placées dans les mêmes droites ; et le parallélépipède DC est égal aussi au parallélépipède DZ, car ces deux

parallélépipèdes ont la même base OR et la même hauteur, et leurs droites insistantes ne sont point dans les mêmes droites : donc le parallélépipède BT est égal au parallélépipède DZ. Mais nous venons de voir que les bases des parallélépipèdes égaux dont les hauteurs sont perpendiculaires sur les bases sont réciproquement proportionnelles aux hauteurs : donc la base FK est à la base OR comme la hauteur du parallélépipède DZ est à la hauteur du parallélépipède BT. Mais la base FK est égale à la base EH (prop. 24. 11), et la base OR égale à la base NQ : donc la base EH est à la base NQ comme la hauteur du parallélépipède DZ est à la hauteur du parallélépipède BT. Mais les hauteurs des parallélépipèdes DZ, BT sont les mêmes que celles des parallélépipèdes DC, BA : donc la base EH est à la base WQ comme la hauteur du parallélépipède DC est à la hauteur du parallélépipède BA : donc les bases des parallélépipèdes AB, CD sont réciproquement proportionnelles à leurs hauteurs.

Supposons enfin que les bases des parallélépipèdes AB, CD soient réciproquement proportionnelles aux hauteurs, c'est-à-dire que la base EH soit à la base NQ comme la hauteur du parallélépipède CD est à la hauteur du parallélépipède AB : je dis que le parallélépipède AB est égal au parallélépipède CD.

Faites la même construction. Puisque la base EH est à la base NQ comme la hauteur du parallélépipède C D est à la hauteur du parallélépipède AB, que la base EH est égale à la base FK et la base NQ égale à la base OR, la base FK sera à la base OR comme la hauteur du parallélépipède CD est à la hauteur du parallélépipède AB. Mais les hauteurs des parallélépipèdes AB, CD sont les mêmes que celles des parallélépipèdes BT, DZ : donc la base FK est à la base OR comme la hauteur du parallélépipède DZ est à la hauteur du parallélépipède BT: donc les bases des parallélépipèdes BT, DZ sont réciproquement proportionnelles aux hauteurs.

Mais nous avons démontré que les parallélépipèdes qui ont leurs hauteurs perpendiculaires sur les bases et qui ont leurs bases réciproquement proportionnelles aux hauteurs sont égaux entre eux : donc le parallélépipède BT est égal au parallélépipède DZ. Mais le parallélépipède BA est égal au parallélépipède BT (prop. 30. 11), car ces deux parallélépipèdes ont la même base FK et la même hauteur, et leurs arêtes ne sont point dans les mêmes droites ; et outre cela le parallélépipède DZ est égal au parallélépipède DC, puisque ces deux parallélépipèdes ont la même base OR et la même hauteur, et que leurs droites insistantes ne sont pas dans les mêmes droites : donc le parallélépipède AB est égal au parallélépipède CD ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXXV.

THÉORÈME.

Si des sommets de deux angles égaux on mène au-dessus de leurs plans des droites qui fassent avec leurs côtés des angles égaux chacun à chacun ; si dans ces droites on prend des points quelconques, si de ces points on mène des perpendiculaires sur les plans des angles donnés, et si des points où ces perpendiculaires rencontrent ces plans on mène des droites aux sommets des angles donnés, les angles compris par ces droites et par celles qu'on a d'abord menées des sommets des angles au-dessus de leurs plans, seront égaux entre eux.

Soient les deux angles égaux BAC, EDF (fig. 198) ; des points A, D menez au-dessus des plans de ces angles les droites AG, DM qui fassent avec les côtés de ces mêmes angles des angles égaux chacun à chacun, savoir, l'angle GAB égal à l'angle MDE et l'angle GAC égal à l'angle MDF ; prenez sur les droites AG, DM des points quelconques G,

M ; des points G, M menez sur les plans BAC, EDF les perpendiculaires GL, MN qui rencontrent ces plans aux points L,N, et menez les droites LA, ND : je dis que l'angle GAL est égal à l'angle MDN.



Faites la droite AH égale à la droite DM, et par le point H menez la droite HK parallèle à la droite GL. Puisque la droite GL est perpendiculaire sur le plan BAC, la droite HK sera aussi perpendiculaire sur le plan BAC (prop. 8. 11) ; des points K, N conduisez sur AB, AC, DF, DE les perpendiculaires KB, KC, NF, NE et menez HC, CB, MF, FE. Puisque le carré de la droite HA est égal aux carrés des droites HK, KA et que les carrés des droites KC, CA sont égaux au carré de la droite KA (prop. 47. 1) ; le carré de la droite HA sera égal aux carrés des droites HK, KC, CA. Mais le carré de la droite HC est égal aux carrés des droites HK, KC : donc le carré de la droite HA sera égal aux carrés des droites HC, CA : donc l'angle HCA est droit. L'angle DFM est droit, par la même raison : donc l'angle ACH est égal à l'angle DFM. Mais l'angle HAC est égal à l’angle MDF: donc les deux triangles MDF, HAC ont deux angles égaux à deux angles, chacun à chacun, et un coté égal à un coté, c'est-à-dire les côtés adjacents à des angles égaux, savoir, le côté AH qui est égal au côté DM par construction : donc ces deux triangles ont les autres-côtés égaux aux autres côtés, chacun à chacun (prop. 26. 1) : donc AC est égal à DF. Nous démontrerons semblablement

que AB est égal à DE. Menez les droites HB, ME. Puisque le carré de la droite AH est égal aux carrés des droites AK, KH et que les carrés des droites AB, BK sont égaux au carré de la droite AK, les carrés des droites AB, BK, KH seront égaux au carré de la droite AH. Mais le carré de la droite BH est égal aux carrés des droites BK, KH, car l'angle HKB est droit à cause que la droite HK est perpendiculaire sur le plan BAC : donc le carré de la droite AH est égal aux carrés des droites AB, BH : donc l'angle ABH est droit. L'angle DEM est droit, par la même raison ; mais l'angle BAH est égal à l'angle EDM, par supposition, et la droite AH est égale à la droite DM : donc la droite AB est égale à la droite DE ; donc puisque AG est égal à DF et AB égal à DE, les deux droites CA, AB sont égales aux deux droites FD, DE; mais l'angle CAB est égal à l'angle FDE : donc la base BC est égale à la base EF (prop. 4. 1), le triangle égal au triangle et les autres angles égaux aux autres angles : donc l'angle ACB est égal à l'angle DFE; mais l'angle droit ACK est égal à l'angle droit DFN, par construction : donc l'angle restant BCK est égal à l'angle restant EFN. Par la même raison l'angle GBK est égal à l'angle FEN : donc les deux triangles CBK, FEN ont deux angles égaux à deux angles, chacun à chacun, et un côté égal à un côté, c'est-à-dire les côtés qui sont adjacents à des angles égaux, savoir, le côté BC qui est égal au côté EF : donc ces deux triangles auront les autres côtés égaux aux autres côtés (prop. 26. 1) : donc le côté CK est égal au côté FN ; mais AC est égal à DF : donc les deux droites AC, CK sont égales aux deux droites DF, FN et ces droites comprennent des angles droits : donc la base AK est égale à la base DN (prop. 4. 1) ; et puisque la droite AH est égale à la droite DM, le carré de AH sera égal au carré de DM ; mais les carrés des droites AK, KH sont égaux au carré de la droite AH (prop. 47. 1), car l'angle AKH est droit et les carrés des droites DN, NM sont égaux au carré de la droite. DM, parce que l'angle DNM est droit : donc les carrés des droites AK, KH

sont égaux aux carrés des droites DN, NM; mais le carré de AK est égal au carré de DN : donc le carré de KH est égal au carré de NM : donc la droite HK est égal à la droite MN : donc puisque les deux droites HA, AK sont égales aux deux droites. MD, DN, chacune à chacune, et qu'on a démontré que la base H K est égale à la base NM, l'angle HAK sera égal à l'angle MDN (prop. 8. 1), ce qu'il fallait démontrer.

COROLLAIRE.

Il suit manifestement de là que si deux angles sont égaux à deux angles et que si des sommets de ces angles et au-dessus de leurs plans on mène des droites qui fassent avec les côtés des angles donnés des angles égaux chacun à chacun, les perpendiculaires menées de ces droites sur les plans des premiers angles, sont égales entre elles, si les points d'où elles, partent sont également éloignés des sommets de ces angles.

PROPOSITION XXXVI.

THÉORÈME.

Si trois droites sont proportionnelles, le parallélépipède construit avec ces trois droites est égal au parallélépipède construit avec la droite moyenne ; il faut que ce dernier parallélépipède, qui sera équilatéral, soit équiangle avec le premier parallélépipède.

Soient trois droites proportionnelles A, B, C (fig. 199), de manière que A soit à B comme B est à C : je dis que le parallélépipède construit avec les trois droites A, B, C est égal au parallélépipède construit avec la droite B ; il faut que ce dernier parallélépipède, qui sera équilatéral, soit équiangle avec le premier parallélépipède.



Soit l'angle solide E compris sous les trois angles plans DEG, GEF, FED ; faites chacune des droites DE, GE, EF égales à la droite B, et achevez le parallélépipède EK. Faites ensuite LM égal à A, sur la droite LM et au point L construisez un angle solide qui étant compris sous les plans NLO, OLM, MLN soit égal à l'angle solide E (prop. 26. 11) ; faites LO égal à B, et LN égal à C. Puisque A est à B comme B est à C, que A est égal à LM, que B est égal à chacune des droites LO, EF, EG, ED et que C est égal à LN, la droite LM sera à la droite EF comme la droite DE est à la droite LN : donc les côtés placés autour des angles égaux MLN, DEF sont réciproquement proportionnels : donc le parallélogramme MN est égal au parallélogramme DF (prop. 14. 6) ; et puisque les deux angles DEF, NLM sont égaux, que les droites LO, EG qui sont égales entre elles et qui sont menées au-dessus des plans des angles égaux DEF, NLM font avec leurs côtés des angles égaux, chacun à chacun, les perpendiculaires menées des points G, O sur les plans DEF, NLM seront égales entre elles (corol. 35. 11); donc les parallélépipèdes LH, EK ont la même hauteur. Mais les parallélépipèdes qui ont des bases égales et la même hauteur sont égaux entre eux (prop. 31.11) : donc le parallélépipède HL est égal au parallélépipède EK. Mais le parallélépipède HL a été construit avec les trois droites A, B, C, et le parallélépipède EK a été construit avec la droite B : donc le parallélépipède construit avec les trois droites A, B, C est égal au parallélépipède construit avec la droite B, lequel est

équilatéral et équiangle avec le premier parallélépipède.

Donc si trois droites sont proportionnelles, le parallélépipède construit avec ces trois droites est égal au parallélépipède construit avec la droite moyenne, et ce dernier parallélépipède est équilatéral et équiangle avec le premier parallélépipède ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXXVII.

THÉORÈME.

Si quatre droites sont proportionnelles, les parallélépipèdes semblables et semblablement construits sur ces droites sont proportionnels, et si des parallélépipèdes semblables et semblablement construits sur quatre droites sont proportionnels, ces droites seront aussi proportionnelles entre elles.

Soient quatre droites proportionnelles AB, CD, EF, GH (fig. 200), de manière que AB soit à CD comme EF est à GH; construise» sur les quatre droites AB, CD, EF, GH les parallélépipèdes semblables et semblablement posés KA, LC, ME, NG : je dis que KA est à LC comme ME est à NG.



Puisque le parallélépipède KA est semblable au parallélépipède LC, les parallélépipèdes KA, LC seront entre eux en raison triplée des côtés AB, CD (prop. 35. 11). Par la même raison, les parallélépipèdes

ME, NG, seront entre eux en raison triplée des côtés EF, G H. Mais, par hypothèse, AB est a C D comme EF est à GH: donc AK est à LC comme ME est à NG.

Si le parallélépipède AK est au parallélépipède LC comme le parallélépipède ME est au parallélépipède NG: je dis que la droite AB est à la droite CD comme la droite EF est à la droite GH.

Puisque les parallélépipèdes AK, LC sont entre eux en raison triplée des côtés AB, CD, et que les parallélépipèdes ME, NG sont aussi en raison triplée des côtés EF, GH, et à cause que AK est à LC comme ME est à NG, la droite AB sera à la droite CD comme la droite EF est à la droite GH.

Donc si quatre droites sont proportionnelles, les parallélépipèdes semblables et semblablement construits sur ces quatre droites seront proportionnels ; et si quatre parallélépipèdes construits sur quatre droites sont proportionnels, ces quatre droites seront aussi proportionnelles ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXXVIII.

THÉORÈME.

Si un plan est perpendiculaire sur un autre plan, et si d'un point pris dans un de ces plans on conduit une perpendiculaire sur l'autre plan, cette perpendiculaire tombera sur la section commune des plans.

Que le plan CD (fig. 201) soit perpendiculaire sur le plan AB, que leur commune section soit AD, et que dans le plan CD soit pris un point, quelconque E : je dis que la perpendiculaire menée du point E sur le plan AB tombe sur la droite AD.



Que cette perpendiculaire tombe, si cela est possible, hors de la commune section des plans ; qu'elle ait, par exemple, la position E F et qu'elle rencontre le plan AB au point F ; du point F et dans le plan AB conduisez la droite FG perpendiculaire sur DA (prop. 10. 1), cette droite sera certainement perpendiculaire sur le plan CD (déf. 4. 11). Menez EG.

Puisque la droite FG est perpendiculaire sur le plan CD et qu'elle rencontre la droite EG qui est dans le plan CD, l'angle FGE sera droit (clef. 5. 11). Mais la droite EF est perpendiculaire sur le plan AB : donc, l'angle EFG est droit : donc le triangle EFG a deux angles droits, ce qui est absurde (prop. 17. 1): donc la perpendiculaire menée du point E sur le plan AB ne tombe pas hors de la droite DA : donc elle tombe sur la droite DA.

Donc si un plan est perpendiculaire sur un autre plan, et si d'un point pris dans un de ces plans on mène une droite perpendiculaire sur l'autre plan, cette droite sera perpendiculaire sur la commune section des plans; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XXXIX.

THÉORÈME.

Si dans un parallélépipède on coupe en deux parties égales les côtés des plans opposés, et si par leurs sections on mène des plans, la commune section de ces plans et le diamètre du parallélépipède se couperont mutuellement en deux parties égales.

Que dans le parallélépipède AF (fig. 202) les côtés des plans opposés CF, AH soient coupés en deux parties égales aux points K, L, M, N, O, Q, P, R, et par les sections de ces côtés soient conduits les plans KN, OR; que la commune section de ces plans soit VS, et que le diamètre du parallélépipède soit DG : je dis que les droites VS, DG se coupent en deux parties égales, c'est-à-dire que VT est égal à TS et DT égal à TG.



Menez DV, VE, BS, SG. Puisque DO est parallèle à PE, les angles alternés DOV, VPE sont égaux entre eux (prop. 29. 1) ; et puisque DO est égal à PE, OV égal à VP et que ces droites comprennent des angles égaux, la base DV sera égale à la base VE, le triangle DOV égal au triangle VPE, et les autres angles égaux aux autres angles : donc l'angle OVD est égal à l'angle PVE : donc la ligne DVE est une ligne droite (prop. 14. 1). Par la même raison, la ligne BSG est aussi une ligne droite, et la droite BS est égale à la droite SG. Puisque la droite CA est égale et parallèle à DB et que la droite CA est aussi

égale et parallèle à la droite EG, la droite DB sera égale et parallèle à la droite EG (pr. 30. 1) ; mais ces droites sont jointes par les, droites DE, BG : donc la droite DE est parallèle à la droite BG (prop. 33. 1); mais on a pris dans chacune de ces droites des points quelconques D, V, G, S et on a mené les droites DG, VS : donc ces droites sont dans un seul plan (prop. 7. 11) : donc puisque la droite DE est parallèle à la droite BG, les angles EDT, BGT sont égaux, car ils sont alternes (prop. 29. 1); mais l'angle DTV est égal à l'angle GTS (prop. 15. 1) : donc les deux triangles DTV, GTS ont deux angles égaux à deux angles, un côté égal à un côté, ces côtés sous-tendant des angles égaux, c'est-à-dire que le côté DV est égal au côté GS, car ces côtés sont les moitiés des droites DE, BG : donc ces deux triangles auront les autres côtés égaux aux autres côtés (prop. 26. 1) : donc DT est égal à TG et VT égal à TS.

Donc si dans un parallélépipède on coupe en deux parties égales les côtés des plans opposés, et si par leurs sections on mène des plans, la commune section de ces plans et le diamètre du parallélépipède se couperont mutuellement en deux parties égales ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XL.

THÉORÈME.

Si deux prismes sont égaux en hauteur, si l'un d'eux a pour base un parallélogramme et l'autre un triangle, et si le parallélogramme est double du triangle, ces prismes seront égaux.

Soient ABCDEF, GHKLMN (fig. 203) des prismes égaux en hauteur, que l'un d'eux ait pour base le parallélogramme AF et l'autre le triangle GHK, et que le parallélogramme AF soit double du triangle GHK : je dis que le prisme ABCDEF est égal au prisme GHKLMN.



Achevez les parallélépipèdes AO, GP. Puisque le parallélogramme AF est-double du triangle GHK et le parallélogramme HK double aussi du triangle GHK, le parallélogramme AF sera égal au parallélogramme HK. Mais les parallélépipèdes qui ont des bases égales et la même hauteur sont égaux entre eux (prop. 31. 11): donc les parallélépipèdes AO, GP sont égaux; mais le prisme ABCDEF est la moitié du parallélépipède AO et le prisme GHKLMN la moitié du parallélépipède GP : donc le prisme ABCDEF est égal au prisme GHKLMN.

Donc si deux prismes ont la même hauteur, si l'un d'eux a pour base un parallélogramme et l'autre un triangle, et si le parallélogramme est double du triangle, ces deux prismes sont égaux ; ce qu'il fallait démontrer.

FIN DU ONZIEME LIVRE.

RETOUR À L'ENTRÉE DU SITE

ALLER À LA TABLE DES MATIÈRES D'EUCLIDE

Euclide

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

INTRODUCTION - GEOMETRIE LIVRE I - LIVRE II - LIVRE III - LIVRE IV- LIVRE VI - LIVRE XI

Éléments de Géométrie : livre XII

Euclide le Géomètre

LES ÉLÉMENTS

DE

GÉOMÉTRIE

D'EUCLIDE,

traduits littéralement, et suivis d'un Traité du Cercle,

du Cylindre, du Cône et de la Sphère;

de la mesure des Surfaces et des Solides ; avec des Notes ;

Par F. PEYRARD,

Bibliothécaire

de l'École Polytechnique.

OUVRAGE APPROUVÉ PAR L'INSTITUT NATIONAL.

Et nova sunt semper. — OVIDE,...

A PARIS,

CHEZ F. LOUIS, LIBRAIRE, RUE DE SAVOIE, N° 12.

AN XII - l804.

EUCLIDE

ÉLÉMENTS DE GÉOMÉTRIE

ELEMENTS

LIVRE XII.

PROPOSITION PREMIÈRE.

THÉORÈME.

Les polygones semblables inscrits dans des cercles sont entre eux comme les carrés des diamètres.

SOIENT les cercles ABCDE, FGHKL (fig. 204) dans lesquels sont décrits les polygones semblables ABC DE, FGHKL ; que les diamètres de ces cercles soient BM, GN : je dis que le polygone ABCDE est au polygone FGHKL comme le carré de BM est au carré de GN.



Menez BE, AM, GL, FN. Puisque le polygone ABCDE est semblable au polygone FGHKL, que l'angle BAE est égal à l'angle GFL (déf. 1. 6) et que BA est à AE comme GF est à FL, les deux triangles BAE, GFL ont un angle égal à un angle, savoir, l'angle BAE égal à l'angle GFL et les côtés placés autour de ces angles sont proportionnels entre eux : donc les deux triangles ABE, FGL sont équiangles (prop. 6. 6) : donc l'angle AEB est égal à l'angle FLG, mais l'angle AEB est égal à l'angle AMB (prop. 21. 3), car ils sont appuyés sur le même arc et l'angle FLG est aussi égal à l'angle FNG : donc l'angle AMB est égal à l'angle FNG; mais l'angle droit BAM est égal à l'angle droit GFN : donc l'angle restant est égal à l'angle restant : donc les deux triangles ABM, FGN sont équiangles : donc BM est à GN comme BA est à GF (prop. 4. 6). Mais les carrés des droites BM, GN sont en raison doublée des droites BM, GN (prop. 20. 6), et les polygones ABCDE, FGHKL sont en raison doublée des côtés BA, GF : donc le polygone ABCDE est au polygone FGHKL comme le carré de BM est au carré de GN. Donc les polygones semblables inscrits dans des cercles sont entre eux comme les carrés des diamètres ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION II.

THÉORÈME.

Les cercles sont entre eux comme les carrés de leurs diamètres.

Soient les cercles ABCD, EFGH (fig. 205) et que leurs diamètres soient BD, FH : je dis que le cercle ABCD est au cercle EFGH comme le carré de BD est au carré de FH.



Si cela n'est point, le carré du diamètre BD sera au carré du diamètre FH comme le cercle ABCD est à une surface plus grande ou à une surface plus petite que le cercle EFGH. Supposons d'abord que cette surface soit plus petite et qu'elle soit S. Dans le cercle EFGH décrivez le carré EFGH; le carré décrit dans ce cercle est plus grand que la moitié du cercle EFGH, parce que si par les points E, F, G, H nous menons des tangentes à ce cercle, le carré EFGH sera la moitié du carré circonscrit (prop. 47. 11, prop. 1.3): mais un cercle est plus petit que le carré circonscrit : donc le carré EFGH est plus grand que la moitié du cercle EFGH. Partagez les arcs EF, FG, GH, HE en deux parties égales aux points K, L, M, N, et menez les

droites EK, KF, FL, LG, GM, MH, HN, NF. Chacun des triangles EKF, FLG, GMH, HNE est plus grand que la moitié du segment dans lequel il est placé ; parce que si par les points K, L, M, N nous menons des tangentes au cercle, et si sur les droites EF, FG, GH, HE et entre ces tangentes nous construisons des parallélogrammes, chacun des triangles EKF, FLG, GMH, HNE sera la moitié du parallélogramme dans lequel il est placé (pr. 37. 1). Mais chaque segment est plus petit qu'un parallélogramme : donc chacun des triangles EKF, FLG, GMH, HNE est plus grand que la moitié du segment dans lequel il est placé. Si nous partageons ensuite les arcs restants en deux parties égales, et si nous joignons leurs extrémités par des droites, et si nous continuons toujours de faire la même chose, il nous restera certains segments de cercles dont la somme sera moindre que l'excès du cercle EFGH sur l'espace S ; car nous avons démontré dans le premier théorème du dixième Livre que deux quantités inégales étant données, si l'on retranche de la plus grande quantité une partie plus grande que la moitié de cette quantité, si on retranche ensuite de ce qui reste une partie plus grande que la moitié de ce reste, et si l'on continue toujours de faire la même chose, il reste enfin une certaine quantité qui est moindre que la plus petite des quantités données. Supposons qu'on ait pour reste les segments du cercle EFGH placés sur les cordes EK, KF, FL, LG, GM, MH, HN, NE, et que ces segments soient moindres que l'excès du cercle EFGH sur l'espace S, il est évident que le polygone EKFLGMHN sera plus grand que l'espace S. Décrivez dans le cercle ABCD un polygone AOBPCQDR semblable au polygone EKFLGMHN ; le carré de BD sera au carré de F H comme le polygone AOBPCQDR est au polygone EKFLGMHN (prop. 1. 12) ; mais par supposition le carré de BD est au carré de FH comme le cercle ABCD est à l'espace S : donc le cercle ABCD est à l'espace S comme le polygone AOBPCQDR est au polygone EKFLGMHN, et en échangeant les plans des moyens, le cercle ABCD est au polygone qui lui est inscrit

comme l'espace S est au polygone EKFLGMHN; mais le cercle ABCD est plus grand que le polygone qui lui est inscrit : donc l'espace S est plus grand que le polygone EKFLGMHN; mais, par supposition, il est au contraire plus petit, ce qui est impossible : donc le carré de BD n'est point au carré de FH comme le cercle ABCD est à un espace quelconque plus petit que le cercle EFGH. Nous démontrerons semblablement que le carré de FH n'est point au carré de BD comme le cercle EFGH est à un espace quelconque plus petit que le cercle ABCD. Je dis ensuite que le carré de BD n'est point au carré de FH comme le cercle ABCD est à un espace quelconque plus grand que le cercle EFGH ; car si cela est possible, supposons que le carré de BD soit au carré de FH comme le cercle ABCD est à un espace plus grand, et supposons que S soit cet espace. En mettant les antécédents à la place des conséquents et les conséquents à la place des antécédents, le carré de FH sera au carré de BD comme l'espace S est. au cercle ABCD ; mais on démontrera plus bas que l'espace S est au cercle ABCD comme le cercle EFGH est à un espace quelconque plus petit que le cercle ABCD : donc le carré de FH est au carré de BD comme le cercle EFGH est à un espace plus petit que le cercle ABCD, ce qui a été démontré impossible ; donc le carré de BD n'est pas au carré de FH comme le cercle ABCD est à un espace quelconque plus grand que le cercle EFGH. Mais on a démontré que le carré de BD n'est point au carré de FH comme le cercle ABCD est à un espace quelconque plus petit que le cercle EFGH : donc le carré de BD est au carré de FH comme le cercle ABCD est au cercle EFGH.

Donc les cercles sont entre eux comme les carrés des diamètres ; ce qu'il fallait démontrer.

LEMME.

Si l'espace S est plus grand que le cercle EFGH (fig. 206) : je dis que l'espace S est au cercle ABCD comme le cercle EFGH est

à un espace quelconque plus petit que le cercle ABCD.



Car supposons que l'espace S soit au cercle ABCD comme le cercle EFGH est à un espace T : je dis que l'espace T est plus petit que le cercle ABCD; car puisque l'espace S est au cercle ABCD comme le cercle EFGH est à l'espace T, en échangeant les plans des moyens, l'espace S sera au cercle EFGH comme le cercle ABCD est à l'espace T (prop. 16. 6). Mais par supposition l'espace S est plus grand que le cercle EFGH : donc le cercle ABCD est plus grand que l'espace T ; et par conséquent l'espace S est au cercle ABCD comme le cercle EFGH est à un espace quelconque plus petit que le cercle ABCD.

PROPOSITION III.

THÉORÈME.

Toute pyramide triangulaire[1] peut se diviser en deux pyramides triangulaires égales et semblables entre elles et semblables à la pyramide totale, et en deux prismes égaux qui sont plus grands que la moitié de la pyramide entière.

Soit une pyramide dont la base soit le triangle ABC (fig. 207) et dont le sommet soit le point D : je dis que la pyramide ABCD peut se diviser en deux pyramides triangulaires égales et semblables entre elles et semblables à la pyramide totale, et en deux prismes égaux qui sont plus grands que la moitié de la pyramide totale.



Partagez les côtés AB, BC, CA, AD, DB, DC en deux parties égales aux points E, F, G, H, K, L, et menez les droites EH, EG, GH, HK, KL, LH, EK, KF, FG. Puisque AE est égal à EB et AH égal à HD, la droite EH sera parallèle à la droite DB (prop. 2. 6). La droite HK est parallèle à la droite AB, par la même raison : donc la figure HEBK est un parallélogramme : donc HK est égal à EB (prop. 34. 1). Mais EB est égal à AE : donc AE sera égal à HK. Mais AH est égal à HD: donc les deux droites AE, AH sont égales aux deux droites KH, HD, chacune à chacune ; mais l'angle EAH est égal à l'angle KHD (prop. 29. 1) : donc la base EH est égale à la base KD (prop. 4. 1) donc le triangle AEH est égal et semblable au triangle HKD. Par la même raison, le triangle AHG est égal et semblable au triangle HLD. Puisque les deux droites EH, HG qui se touchent sont parallèles aux deux droites KD, DL qui se touchent et qui ne sont pas dans le même plan, ces droites comprendront des angles égaux (prop. 10. 11): donc l'angle EHG est égal à l'angle KDL. De plus, puisque les deux droites EH, HG sont égales aux deux droites KD, DL, chacune à chacune, et que l'angle EHG est égal à l'angle KDL, la base EG sera égale à la base KL : donc le triangle EHG est égal et semblable au triangle KDL. Par la même raison, le triangle AEG est égal et semblable au triangle HKL: donc la pyramide dont la

base est le triangle AEG et dont le sommet est le point H est égale et semblable à la pyramide dont la base est le triangle HKL et dont le sommet est le point D. Puisque la droite HK est parallèle à un des côtés du triangle ADB, savoir, au côté AB, le triangle ADB sera équiangle avec le triangle DHK (prop. 29. 1) : donc ces deux triangles auront leurs côtés proportionnels (prop. 4. 6), et seront par conséquent semblables. Par la même raison, le triangle DBC est semblable au triangle DKL et le triangle ADC est semblable aussi au triangle DHL. Mais puisque les deux droites BA, AC qui se touchent sont parallèles aux deux droites KH, HL qui se touchent et qui ne sont pas dans le même plan, ces droites comprendront des angles égaux (prop. 10. 11): donc l'angle BAC est égal à l'angle KHL. Mais BA est à AC comme KH est à HL : donc le triangle ABC est semblable au triangle HKL (prop. 6. 6), et par conséquent la pyramide dont la base est le triangle ABC et dont le sommet est le point D est semblable à la pyramide dont la base est le triangle HKL et dont le sommet est le point D. Mais nous avons démontré que la pyramide dont la base est le triangle HKL et dont le sommet est le point D est semblable à la pyramide dont la base est le triangle AEG et dont le sommet est le point H : donc la pyramide dont la base est le triangle ABC et dont le sommet est le point D est semblable à la pyramide dont la base est le triangle AEG et dont le sommet est le point H : donc l'une et l'autre des pyramides AEGH, HKLD sont semblables à la pyramide totale ABCD. Puisque BF est égal à FC, le parallélogramme EBFG sera double du triangle GFC (pr. 41. 1) : mais deux prismes de même hauteur dont l'un a pour base un parallélogramme et dont l'autre a pour base un triangle sont égaux entre eux lorsque le parallélogramme est double du triangle (prop. 40. 11) : donc le prisme compris sous les deux triangles BKF, EHG et sous les trois parallélogrammes EBFG, EBKH, KHGF est égal au prisme qui est compris sous les deux triangles GFC, HKL et les trois

parallélogrammes KFCL, LCGH, HKFG. Mais il est évident que chacun de ces prismes et celui dont la base est le parallélogramme EBFG opposé à la droite HK et celui dont la base est le triangle GFC opposé au triangle KLH est plus grand que chacune des pyramides dont les bases sont AEG, HKL et les sommets les points H, D; puisque si nous menons les droites EF, EK, le prisme dont la base est le parallélogramme EBFG opposé à la droite HK est plus grand que la pyramide qui a pour base le triangle. EBF et pour sommet le point K. Mais la pyramide qui a pour base le triangle EBF et pour sommet le point K est égale à la pyramide qui a pour base le triangle AEG et pour sommet le point H (déf. 10. 11), car elles sont comprises sous des plans égaux et semblables : donc le prisme qui a pour base le parallélogramme EBFG opposé à la droite HK est plus grand que la pyramide qui a pour base le triangle AEG et pour sommet le point H. Mais le prisme qui a pour base le parallélogramme EBFG opposé à la droite HK est égal au prisme qui a pour base le triangle GFC opposé au triangle HKL ; et la pyramide qui a pour base le triangle AEG et pour sommet le point H est égale à la pyramide qui a pour base le triangle HKL et pour sommet le point D : donc les deux prismes dont nous venons de parler sont plus grands que les deux pyramides qui ont pour bases les triangles AEG, HKL et pour sommets les points H, D : donc la pyramide totale qui a pour base le triangle ABC et pour sommet le point D a été divisée en deux pyramides triangulaires égales et semblables entre elles et semblables à la pyramide totale et en deux prismes égaux qui sont plus grands que la moitié de la pyramide totale ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION IV.

THÉORÈME.

Si deux pyramides triangulaires de même hauteur sont divisées l'une et l'autre en deux pyramides égales entre elles et

semblables à la pyramide totale et en deux prismes égaux, si ces nouvelles pyramides sont divisées de la même manière et ainsi de suite, la base de l'une de ces pyramides sera à la base de l'autre pyramide comme tous les prismes de l'une de ces pyramides sont à un même nombre de prismes contenus dans l'autre pyramide.

Soient deux pyramides triangulaires de même hauteur qui aient pour bases les triangles ABC, DEF (fig. 208) et pour sommets les points G, H ; que chacune de ces pyramides soit divisée en deux pyramides égales entre elles et semblables aux pyramides totales et en deux prismes égaux, que ces nouvelles pyramides soient divisées de la même manière et ainsi de suite : je dis que la base ABC sera à la base DEF comme tous les prismes contenus dans la pyramide ABCG sont au même nombre de prismes contenus dans la pyramide DEFH.



Puisque BO est égal à OC et AL égal à LC, la droite AB sera parallèle à la droite OL (prop. 2. 6), et le triangle ABC sera semblable au triangle LOC (prop. 4. 6). Le triangle DEF sera semblable au triangle RXF, par la même raison ; et puisque la droite BC est double de la droite CO et la droite EF double aussi de la droite FX, la droite BC sera à la droite CO comme la droite EF est à la droite FX. Mais les figures rectilignes semblables et semblablement posées ABC, LOC ont été décrites sur les droites BC, CO, et les figures rectilignes semblables et semblablement posées DEF, RXF ont été

décrites sur les droites EF, FX : donc le triangle ABC est au triangle LOC comme le triangle DEF est au triangle RXF (prop. 22. 6), et en échangeant les plans des moyens, le triangle ABC est au triangle DEF comme le triangle LOC est au triangle RXF. Mais on démontrera plus bas que le triangle LOC est au triangle RXF comme le prisme qui a pour base le triangle LOC opposé à PMN est au prisme qui a pour base le triangle RXF opposé à STV : donc le triangle ABC est au triangle DEF comme le prisme qui a pour base le triangle LOC opposé à PMN est au prisme qui a pour base le triangle RXF opposé à STV; et puisque les deux prismes qui sont dans la pyramide ABCG sont égaux entre eux et que les deux prismes qui sont dans la pyramide DEFH sont aussi égaux entre eux, le prisme qui a pour base le parallélogramme KLOB opposé à la droite MP sera au prisme qui a pour base le triangle LOC opposé à PMN comme le prisme qui a pour base le parallélogramme EQRX opposé à la droite ST est au prisme qui a pour base le triangle RXF opposé à STV : donc, en ajoutant les conséquents aux antécédents (prop. 15. 5), les prismes KBOLMP, LOCMNP sont au prisme LOCMNP comme les prismes QEXRST, RXFSTV sont au prisme RXFSTV, et enfin en échangeant les places des moyens, les prismes KBOLPM, LOCPMN sont aux prismes QEXRST, RXFSTV comme le prisme LOCMNP est au prisme RXFSTV. Mais on a démontré que le prisme LOCMNP est au prisme RXFSTV comme la base LOC est à la base RXF et comme la base ABC est à la base DEF : donc le triangle ABC est au triangle DEF comme les deux prismes qui sont dans la pyramide ABCG sont aux deux prismes qui sont dans la pyramide DEFH. Si nous partageons de la même manière les nouvelles pyramides, savoir les pyramides PMNG, STVH, la base PMN sera à la base STV comme les deux prismes de la pyramide PMNG sont aux deux prismes de la pyramide STVH. Mais la base PMN est à la base STV comme la base ABC est à la base DEF : donc la base ABC est à la base DEF comme les deux prismes de la pyramide ABCG sont aux deux prismes de la pyramide DEFH, comme les deux prismes de la pyramide PMNG sont aux

deux prismes de la pyramide STVH et comme les quatre prismes sont aux quatre prismes. On démontrera la même chose pour tous les autres prismes qu'on obtiendra par la division des pyramides AKLP et DQRS, et en général de toutes les pyramides égales en nombre ; ce qu'il fallait démontrer.

LEMME.

Nous démontrerons de la manière suivante que le triangle LOC est au triangle BXF comme le prisme qui a pour base le triangle LOC opposé à PMN, est le prisme qui a pour base le triangle RXF opposé à STV.

Dans les mêmes figures imaginez des perpendiculaires menées des points G, H sur les plans des triangles ABC, DEF. Ces perpendiculaires seront égales entre elles, parce qu'on a supposé ces pyramides égales en hauteur. Puisque la droite GC et la perpendiculaire menée du point G sont coupées par les plans parallèles ABC, PMN, ces deux droites seront coupées proportionnellement (prop. 11. 11). Or la droite GC est coupée en deux parties égales au point N par le plan PMN : donc la perpendiculaire menée du point G sur le plan ABC est coupée en deux parties égales par le plan PMN par la même raison, la perpendiculaire menée du point H sur le plan DEF est coupée en deux parties égales par le plan STV. Mais les perpendiculaires menées des points G, H sur les plans ABC, DEF sont égales entre elles: donc les perpendiculaires menées des triangles PMN, STV sur les triangles ABC, DEF sont égales entre elles : donc les prismes qui ont pour bases les triangles LOC, RXF opposés à PMN, STV sont égaux en hauteur : donc les parallélépipèdes qui sont décrits sur les prismes égaux en hauteur dont nous venons de parler sont entre eux comme leurs bases, et il en sera de même de leurs moitiés, c'est-à-dire que les bases LOC, RXF seront entre elles comme les prismes dont nous avons parlé ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION V.

THÉORÈME.

Les pyramides triangulaires qui ont la même hauteur sont entre elles comme leurs bases.

Que les pyramides dont les bases sont les triangles ABC, DEF (fig. 208) et dont les sommets sont les points G, H aient la même hauteur : je dis que la base ABC est à la base DEF comme la pyramide ABCG est à la pyramide DEFH.



Car si cela n'est point, la base ABC sera à la base DEF comme la pyramide ABCG est à un solide plus petit que la pyramide DEFH ou a un solide plus grand. Supposons d'abord que la base ABC soit à la base DEF comme la pyramide ABCDH est à un solide plus petit et que ce solide soit Y. Divisez la pyramide DEFH en deux pyramides égales entre elles et semblables à la pyramide totale, et en deux prismes égaux ; les deux prismes seront plus grands que la moitié de la pyramide totale (prop. 3. 12). Que les nouvelles pyramides obtenues par cette division soient partagées de la même manière jusqu'à ce qu'on ait obtenu de la pyramide DEFH certaines pyramides qui soient plus petites que l'excès de la pyramide DEFH sur le solide Y. Qu'on cherche ces pyramides, et qu'elles soient par exemple DQRS, STVH, les prismes restants de la pyramide DEFH seront plus grands que le solide Y. Partagez semblablement la pyramide ABCG en autant de parties que la pyramide

DEFH. La base ABC sera à la base DEF comme les prismes de la pyramide ABCG sont aux prismes de la pyramide DEFH (prop. 4. 12); mais par supposition la base ABC est à la base DEF comme la pyramide ABCG est au solide Y : donc la pyramide ABCG est au solide Y comme les prismes de la pyramide ABCG sont aux prismes de la pyramide DEFH, et en échangeant les places des moyens, la pyramide ABCG est aux prismes qu'elle renferme comme le solide Y est aux prismes de la pyramide DEFH. Mais la pyramide ABCG est plus grande que les prismes qu'elle renferme : donc le solide Y est plus grand que les prismes que renferme la pyramide DEFH; mais, au contraire, il est plus petit; ce qui ne peut être : donc la base ABC n'est point à la base DEF comme la pyramide ABCG est à un solide quelconque plus petit que la pyramide DEFH. Nous démontrerons semblablement que la base DEF n'est point à la base ABC comme la pyramide DEFH est- à un solide quelconque plus petit que la pyramide ABCG. Je dis enfin que la base ABC n'est point à la base DEF comme la pyramide ABCH est à un solide plus grand que la pyramide DEFH; car supposons, si cela est possible, que la base ABC soit à la base DEF comme la pyramide ABCG est à un solide quelconque plus grand que la pyramide DEFH et que ce solide soit Y. En mettant les antécédents à la place des conséquents et les conséquents à la place des antécédents, la base DEF sera à la base ABC comme le solide Y est à la pyramide ABCG. Mais le solide Y est à la pyramide ABCG comme la pyramide DEFH est à un solide quelconque plus petit que la pyramide ABCG, ainsi que cela a été démontré : donc la base DEF est à la base ABC comme la pyramide DEFG est à un solide quelconque plus petit que la pyramide ABCG, ce qui est absurde : donc la base ABC n'est point à la base DEF comme la pyramide ABCG est à un solide quelconque plus grand que la pyramide DEFH. Mais on a démontré que la base ABC n'est point à la base DEF comme la pyramide ABCG est à un solide quelconque plus petit que la pyramide DEFH : donc la base ABC

est à la base DEF comme la pyramide ABCG est à la pyramide DEFH.

Donc les pyramides triangulaires qui ont la même hauteur sont entre elles comme leurs bases ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION VI.

THÉORÈME.

Les pyramides qui ont la même hauteur et qui ont des polygones pour bases sont entre elles comme leurs bases.

Que les pyramides dont les bases sont les polygones ABCDE, FGHKL (fig. 209) et dont les sommets sont les points M, N aient la même hauteur : je dis que la base ABCDE est à la base FGHKL comme la pyramide ABCDEM est à la pyramide FGHKLN.



209

Partagez la base ABCDE en triangles et que ces triangles soient ABC, ACD, ADE ; partagez aussi la base FGHKL en triangles et que ces triangles soient FGH, FHK, FKL, et supposons que chacun de ces triangles soit la base d'une pyramide qui ait la même hauteur que les deux pyramides qu'on avait d'abord. Puisque le triangle ABC est au triangle ACD comme la pyramide ABCM est à la pyramide ACDM (prop. 5. 12), si l'on ajoute les conséquents aux antécédents, le quadrilatère ABCD sera au triangle ACD comme la pyramide

ABC DM est à la pyramide ABCM (prop. 18. 5); mais le triangle ACD est au triangle ADE comme la pyramide ACDM est à la pyramide ADEM: donc la base ABCD sera à la base ADE comme la pyramide ABCDM est à la pyramide ADEM (prop. 22. 5) : donc en ajoutant les conséquents aux antécédents, la base ABCDE sera à la base ADE comme la pyramide ABCDEM est à la pyramide ADEM. Par la même raison, la base FGHKL est à la base FKL comme la pyramide FGHKLN est à la pyramide FKLN ; et puisque ces deux pyramides triangulaires ont la même hauteur, la base ADE sera à la base FKL comme la pyramide ADEM est à la pyramide FKLN : donc puisque la base ABCDE est à la base ADE comme la pyramide ABCDEM est à la pyramide ADEM, et que la base ADE est à la base FKL comme la pyramide ADEM est à la pyramide FKLN, la base ABCDE sera à la base FKL comme la pyramide ABCDEM est à la pyramide FKLN (prop. 22. 5) ; mais la base FKL est à la base FGHKL comme la pyramide FKLN est à la pyramide FGHKLN : donc la base ABCDE est à la base FGHKL comme la pyramide ABCDEM est à la pyramide FGHKLM.

Donc les pyramides qui ont la même hauteur et dont les bases sont des polygones sont entre elles comme leurs, bases; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION VII.

THÉORÈME.

Tout prisme triangulaire peut se diviser en trois pyramides triangulaires égales entre elles.

Soit un prisme dont la base soit le triangle ABC opposé au triangle DEF (fig. 210) : je dis que le prisme ABCDEF peut être partagé en trois pyramides triangulaires égales entre elles.



Menez les droites BD, EC, CD. Puisque la figure ABED est un parallélogramme dont BD est la diagonale, le triangle ABD sera égal au triangle EDB (prop. 34. 1) : donc la pyramide qui a pour base le triangle ABD et pour sommet le point C est égale à la pyramide qui a pour base le triangle EDB et pour sommet le point C (prop. 5. 12) ; mais la pyramide qui a pour base le triangle EDB et pour sommet le point C est égale à la pyramide qui a pour base le triangle EBC et pour sommet le point D, car elles sont comprises dans les mêmes plans : donc la pyramide qui a pour base le triangle ABD et pour sommet le point C est égale à la pyramide qui a pour base le triangle EBC et pour sommet, le point D. De plus, puisque la figure FCBE est un parallélogramme qui a pour diagonale la droite CE, le triangle ECF est égal au triangle CBE (prop. 34. 1) : donc la pyramide qui a pour base le triangle BEC et pour sommet le point D est égale à la pyramide qui a pour base le triangle ECF et pour sommet le point D (prop. 5. 11). Mais on a démontré que la pyramide qui a pour base le triangle BCE et pour sommet le point D est égale à la pyramide qui a pour base le triangle ABD et pour sommet le point C : donc la pyramide qui a pour base le triangle C EF et pour sommet le point D est égale à la pyramide qui a pour base le triangle ABD et pour sommet le point C : donc le prisme

ABCDEF a été partagé en trois pyramides triangulaires égales entre elles, mais la pyramide qui a pour base le triangle ABD et pour sommet le point C est égale à la pyramide qui a pour base le triangle CAB et pour sommet le point D, car ces pyramides sont comprises sous les mêmes plans ; mais on a démontré que la pyramide qui a pour base le triangle ABD et pour sommet le point C est la troisième partie du prisme qui a pour base le triangle ABC opposé au triangle DEF : donc la pyramide qui a pour base le triangle ABC et pour sommet le point D est la troisième partie d'un prisme qui a la même base, savoir, le triangle ABC opposé au triangle DEF; ce qu'il fallait démontrer.

COROLLAIRE.

Il suit manifestement de là que toute pyramide est la troisième partie d'un prisme qui a la même base et la même hauteur ; car une des bases du prisme étant une figure rectiligne quelconque, la base opposée sera une figure égale et semblable, et ce prisme pourra être divisé en prismes qui auront des bases triangulaires et dont les bases opposées seront des triangles.

PROPOSITION VIII.

THÉORÈME.

Les pyramides semblables qui ont des bases triangulaires sont entre elles en raison triplée de leurs côtés homologues.

Soient deux pyramides semblables et semblablement placées qui aient pour bases les triangles ABC, DEF (fig. 211) et pour sommets les points G, H : je dis que les pyramides ABCG, DEFH sont entre elles en raison triplée des côtés BC, EF.



Achevez les parallélépipèdes BGML, EHQP. Puisque la pyramide ABCG est semblable à la pyramide DEFH, l'angle ABC sera égal à l'angle DEF (déf. 9. 11), l'angle GBC égal à l'angle HEF, l'angle ABG égal à l'angle DEH et AB sera à DE comme BC est à EF et comme BG est à EH : donc, puisque AB est à DE comme BC est à EF et que les côtés placés autour d'angles égaux sont proportionnels, le parallélogramme BM sera semblable au parallélogramme EQ. Par la même raison, le parallélogramme BN sera semblable au parallélogramme ER et le parallélogramme BK semblable au parallélogramme EO : donc les trois parallélogrammes BM, KB, BN sont semblables aux trois parallélogrammes EQ, EO, ER ; mais les trois parallélogrammes MB, BK, BN sont égaux et semblables aux trois parallélogrammes opposés et les trois parallélogrammes EQ, EO, ER sont aussi égaux et semblables aux trois parallélogrammes opposés (prop. 24. 11): donc les parallélépipèdes BGML, EHQP sont compris dans des plans semblables et égaux en nombre : donc le parallélépipède BGML est semblable au parallélépipède EHQP (déf. 9. 11). Mais les parallélépipèdes semblables sont entre eux en raison triplée de leurs côtés homologues (pr. 33. 11) : donc les parallélépipèdes BGMH, EHQP sont entre eux en raison triplée des côtés homologues BC, EF; mais le parallélépipède BGML est au parallélépipède EHQP comme la pyramide ABCG est à la pyramide DEFH (prop. 15. 5), car une pyramide est la sixième partie d'un parallélépipède, puisqu'un prisme triangulaire qui est la

moitié d'un parallélépipède est triple d'une pyramide : donc les pyramides ABCG, DEFH sont entre elles en raison triplée des côtés BC, EF ; ce qu'il fallait démontrer.

COROLLAIRE.

De là il suit évidemment que les pyramides semblables qui ont des polygones pour bases sont entre elles en raison triplée de leurs côtés homologues ; car ces pyramides peuvent être divisées en pyramides triangulaires, puisque les polygones semblables qui sont les bases de ces pyramides peuvent être divisés en un même nombre de triangles semblables entre eux et proportionnels à ces polygones : donc une des pyramides triangulaires contenue dans la première pyramide est à une autre des pyramides triangulaires contenue dans la seconde pyramide comme la somme de toutes les .pyramides triangulaires contenues dans la première pyramide est à la somme de toutes les pyramides triangulaires contenues dans l'autre pyramide, c'est-à-dire comme une des pyramides qui a pour base un polygone est à l'autre pyramide qui a aussi pour base un polygone. Mais les pyramides triangulaires semblables sont entre elles en raison triplée de leurs côtés homologues : donc les pyramides semblables qui ont pour bases des polygones sont entre elles en raison triplée de leurs côtés homologues.

PROPOSITION IX.

Les bases des pyramides égales, qui ont des bases triangulaires sont réciproquement proportionnelles aux hauteurs de ces pyramides, et les pyramides triangulaires qui ont des bases réciproquement proportionnelles à leurs hauteurs sont égales entre elles.

Soient deux pyramides égales qui aient les bases triangulaires ABC, DEF (fig. 212) dont les sommets soient les points G, H : je dis que les bases des pyramides ABCG, DEFH sont réciproquement proportionnelles aux hauteurs de ces pyramides, c'est-à-dire que

la base ABC est à la base DEF comme la hauteur de la pyramide DEFH est à la hauteur de la pyramide ABCG.



Achevez les parallélépipèdes BGML, EHQP. Puisque la pyramide ABCG est égale à la pyramide DEFH, que le parallélépipède BGML est sextuple de la pyramide ABCG et que le parallélépipède EHQP est aussi sextuple de la pyramide DEFH, le parallélépipède BGML sera égal au parallélépipède EHQP (pr. 15. 5). Mais les bases des parallélépipèdes égaux sont réciproquement proportionnelles aux hauteurs de ces parallélépipèdes (prop. 34. 11) : donc la base BM est à la base EQ comme la hauteur du parallélépipède EHQP est à la hauteur du parallélépipède BGML. Mais la base BM est à la base EQ comme le triangle ABC est au triangle DEF : donc le triangle ABC est au triangle DEF comme la hauteur du parallélépipède EHQP est à la hauteur dû parallélépipède BGML. Mais la hauteur du parallélépipède EHQP est la même que la hauteur de la pyramide DEFH et la hauteur du parallélépipède BGML est la même que la hauteur de la pyramide ABCG : la base ABC est à la base DEF comme la hauteur de la pyramide DEFH est à la hauteur de la pyramide ABCG : donc les bases des pyramides ABCG, DEFH sont réciproquement, proportionnelles à leurs hauteurs.

Si les bases des pyramides ABCG, DEFH sont réciproquement proportionnelles à leurs hauteurs, c'est-à-dire que si la base ABC est à la base DEF. Comme la hauteur de la

pyramide DEFH est à la hauteur de la pyramide ABCG, je dis que la pyramide ABCG sera égale à la pyramide DEFH.

Faites la même construction. Puisque la base ABC est à la base DEF comme la hauteur de la pyramide DEFH est à la hauteur de la pyramide ABCG et que la base ABC est à la base DEF comme le parallélogramme BM est au parallélogramme EQ, le parallélogramme BM sera au parallélogramme EQ comme la hauteur de la pyramide DEFH est à la hauteur de la pyramide ABCG. Mais la hauteur de la pyramide DEFH est la même que la hauteur du parallélépipède EHQP, et la hauteur de la pyramide ABCG est la même que la hauteur du parallélépipède BGML : donc la base BM est à la base EQ comme la hauteur du parallélépipède EHQP est à la hauteur du parallélépipède BGML ; mais les parallélépipèdes qui ont leurs bases, réciproquement proportionnelles à leurs hauteurs s.pnt égaux; entre eux (pr. 34. 11) ; donc le parallélépipède BGML est égal au parallélépipède EHQP. Mais la pyramide ABCG est la dixième partie du parallélépipède BGML et la pyramide DEFH est aussi la sixième partie du parallélépipède EHQP ; donc la pyramide ABCG est égale à la pyramide DEFH.

Donc les bases des pyramides égales qui ont des bases triangulaires sont réciproquement proportionnelles aux hauteurs de ces pyramides, et les pyramides triangulaires qui ont des bases, réciproquement proportionnelles à leurs hauteurs sont égales entre elles; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION X.

THÉORÈME.

Un cône est la troisième partie d'un cylindre qui a la même base et une hauteur égale.

Qu'un cône ait la même base qu'un cylindre, savoir le cercle ABCD (fig. 213) et une hauteur égale ; je dis que ce cône est la troisième partie de ce cylindre.



Car si le cylindre n'est pas le triple du cône, il sera plus grand que le triple ou plus petit ; supposons d'abord qu'il soit plus grand que le triple. Décrivez dans le cercle ABCD le carré, ABCD ; le carré ABCD sera plus grand que la moite du cercle ABCD. Sur le carré ABCD élevez un prisme qui ait la même hauteur que le cylindre ; ce prisme sera plus grand que la moitié du cylindre ; parce que si l'on circonscrit un carré au cercle ABCD, le carré inscrit sera la moitié du carré circonscrit, mais les parallélépipèdes, c'est-à-dire les prismes élevés sur ces bases ont la même hauteur : donc ces prismes sont, entre eux comme leurs bases : donc le prisme élevé sur le carré ABCD est la moitié du prisme élevé sur le carré circonscrit au cercle ABCD; mais le cylindre est plus petit que le prisme élevé sur le carré circonscrit au cercle ABCD : donc le prisme élevé sur le carré ABCD, qui a une hauteur égale à celle du cylindre, est plus grand que la moitié du cylindre. Partagez les arcs AB, BC, CD, DA en deux parties égales aux points E, F, G, H, et menez les droites AE, EB, BF, FC, CG, GD, DH, HA; chacun des triangles AEB, BFG, CGD, DHA sera plus grand que le demi-segment du cercle où il est placé, comme nous l'avons démontré

plus haut (prop. 2. 12); sur chacun de ces triangles élevons des prismes qui aient une hauteur égale à celle du cylindre ; chacun de ces prismes sera plus grand que la moitié du segment respectif du cylindre, parce que si par les points E, F, G, H on mène des parallèles aux droites AB, BC, CD, DA, et si sur les droites AB, BC, CD, DA et si entre ces parallèles on construit des parallélogrammes sur lesquels on élève des parallélépipèdes qui aient la même hauteur que le cylindre, les prismes qui auront pour bases les triangles AEB, BFC, CGP, DHA seront les moitiés de chacun de ces parallélépipèdes. Mais les segments du cylindre sont plus petits que ces parallélépipèdes : donc les prismes qui ont pour bases les triangles AEB, BFC, CGD, DHA sont plus grands que les moitiés des segments respectifs du cylindre. Partageons les arcs restants en deux parties égales, joignons leurs extrémités par des droites, sur chacun de ces triangles élevons des prismes qui aient la même hauteur que le cylindre, et continuons de faire la même chose jusqu'à ce qu'il reste certains segments du cylindre qui soient plus petits que l'excès du cylindre sur le triple du cône (prop. 1. 10). Supposons que les segments restants du cylindre soient AE, EB, BF, FC, CG, GD, DH, HA; il est évident que le prisme restant qui a pour base le polygone AEBFCGDH et qui a la même hauteur que le cylindre sera plus grand que le triple du cône ; mais le prisme qui a pour base le polygone AEBFCGDH et qui a la même hauteur que le cylindre, est triple de la pyramide qui a pour base le polygone AEBFCGDH et qui a le même sommet que le cône (prop. 7. 12): donc la pyramide qui a pour base le polygone AEBFCGDH et qui a le même sommet que le cône est plus grande que le cône qui a pour base le cercle ABCD ; mais au contraire la pyramide est plus petite, car le cône comprend la pyramide ; ce qui est impossible : donc le cylindre n'est pas plus grand que le triple du cône.

Je dis à présent que le cylindre n'est pas plus petit que le triple du cône ; car s'il pouvait arriver que le cylindre fût moindre que le triple du cône, le cône serait plus grand que la troisième partie du cylindre. Dans le cercle ABCD décrivons le carré ABCD; le carré ABCD sera plus grand que la moitié du cercle ABCD. Sur le carré ABCD élevez une pyramide qui ait le même sommet que le cône, cette pyramide sera plus grande que la moitié du cône ; parce que si nous circonscrivons un carré au cercle ABCD, le carré ABCD sera la moitié du carré circonscrit à ce cercle, ainsi que nous l'avons démontré ; et si sur ces carrés nous élevons des parallélépipèdes, c'est-à-dire des prismes, celui qui sera élevé sur le carré inscrit dans le cercle sera la moitié du prisme élevé sur le carré circonscrit, car ces parallélépipèdes sont entre eux comme leurs bases (prop. 32. 11); mais leurs troisièmes parties sont aussi entre elles comme leurs bases : donc la pyramide qui a pour base le carré ABCD est la moitié de la pyramide qui a pour base le carré circonscrit au cercle. Mais la pyramide élevée sur le carré circonscrit au cercle est plus grande que le cône, car elle le comprend : donc la pyramide qui a pour base le carré ABCD et qui a le même sommet que le cône est plus grand que la moitié du cône. Partagez les arcs AB, BG, CD, DA eu deux parties égales aux points E, F, G, H, et menez les droites AE, EB, BF, FC, CG, GD, DH, HA. Chacun des triangles AEB, BFC, CGD, DHA sera plus grand que la moitié dû segment respectif du cercle ABCD; sur chacun des triangles AEB, BFC, CGD, DHA élevez des pyramides qui aient le même sommet que le cône; chacune de ces pyramides sera plus grande que la moitié du segment respectif du cône. Partageons les arcs restants en deux, parties égales, et joignons leurs extrémités par des droites; sur chacun dé: ces triangles élevons, une pyramide qui ait le: même sommet que le cône et continuons de faire la même chose; il restera enfin certaines portions: de cône qui, seront

moindres que l'excès du cône sur la troisième partie du cylindre (prop. 1. 10). Qu'on ait ces portions restantes du cône, et qu'elles soient celles qui ont pour bases les segments AE, EB, BF, FC, CG, GD, DH, HA. La pyramide restante qui a pour base le polygone AEBFCGDH et qui a le même sommet que le cône est plus grande que la troisième partie du cylindre. Mais la pyramide qui a pour base le polygone AEBFCGDH et qui a le même sommet que le cône, est la troisième partie du prisme qui a pour base le polygone AEBFCGDH et qui a la même hauteur que le cylindre (pr. 7. 12) : donc le prisme qui a pour base le polygone AEBFCGDH et qui a la même hauteur que le cylindre est plus grand que le cylindre qui a pour base le cercle ABCD; mais le prisme est au contraire plus petit que le cylindre, car le cylindre comprend ce prisme ; ce qui est impossible : donc le cylindre n'est pas plus petit que le triple du cône; mais on a démontré qu'il n'est pas plus grand que le triple : donc le cylindre est le triple du cône et par conséquent le cône est la troisième partie du cylindre.

Donc un cône est la troisième partie d'un cylindre qui a la même base et une hauteur égale, ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XI.

THÉORÈME.

Les cônes et les cylindres qui ont la même hauteur sont entre eux comme leurs bases.

Que les cônes et les cylindres dont les bases sont les cercles ABCD, EFGH (fig. 214), dont les axes sont les droites KL, MN, et dont les diamètres des bases sont les droites AC, EG aient la même hauteur : je dis que le cercle ABCD sera au cercle EFGH comme le cône AL est au cône EN.



Car si cela n'est point, le cercle ABCD est au cercle EFGH comme le cône AL sera à un solide quelconque plus petit ou plus grand que le cône EN. Que le cercle ABCD soit d'abord au cercle EFGH comme le cône AL est au solide plus petit que le cône EN ; que ce solide soit O, et que l'excès du cône EN sur le solide O soit égal au solide Z, le cône EN sera égal aux solides O, Z. Dans le cercle EFGH décrivons le carré EFGH ; ce carré sera plus grand que la moitié de ce cercle. Sur le carré EFGH élevons une pyramide qui ait la même hauteur que le cône. Cette pyramide sera plus grande que la moitié du cône ; car si nous décrivons un carré autour du cercle EFGH, et si sur ce carré nous élevons une pyramide qui ait la même hauteur que le cône, la pyramide inscrite, sera la moitié de la pyramide circonscrite, parce que ces pyramides sont comme leurs hases (prop. 6. 13); mais le cône est plus petit que la pyramide circonscrite : donc la pyramide qui a pour hase le carré EFGH et qui a le même sommet que le cône est plus grande que la moitié du cône. Partageons les arcs EF, FG, GH, HE en deux parties égales aux points P, Q, R, S, et menons les droites HP, PE, EQ, QF, FR, RG, GS, SH; chacun des triangles HPE, EQF, FRG, GSH sera plus grand que la moitié du segment respectif du cercle. Sur chacun des triangles HPE, EQF, FRG, GSH élevons une pyramide qui ait la même hauteur que le

cône ; chacune de ces pyramides sera plus grande que la moitié du segment respectif du cône. Si donc nous, partageons en deux parties égalas les arcs, restant et si nous joignons les extrémités de ces arcs par des droites, et si sur chacun des triangles nous élevons des pyramides qui aient la même hauteur que le cône, et si nous continuons de faire la même chose, il restera enfin certains segments du cône qui seront plus petits que le solide Z (pr. 1. 10). Supposons que l'on ait ces segments et que ces segments soient ceux qui ont pour bases les segments circulaires HP, PE, EQ, QF, FR, RG, GS, SH. La pyramide restante qui a pour base le polygone HPEQFRGS et qui a la même hauteur que le cône sera plus grande que le solide O. Dans le cercle ABCD décrivons un polygone DTAVBXCY qui soit semblable au polygone HPEQFRGS et semblablement placé, et sur le polygone DTAVBXCY élevons une pyramide qui ait la même hauteur que le cône AL. Puisque le carré de AC est au carré de EG comme le polygone DTAVBXCY est au polygone HPEQFRGS (pr. 20. 6, pr. 1. 12), et que le carré de AC est au carré de EG comme le corde ABGD est au cercle EFGH (pr. 2. 12), le cercle ABCD sera au cercle EFGH comme le polygone DTAVBXCY est au polygone HPEQFRGS (prop. 11. 5). Mais par supposition le cercle ABCD est au cercle EFGH comme le cône AL est au solide O, et le polygone DTAVBXCY est au polygone HPEQFRGS comme la pyramide qui a pour base 'le polygone DTAVBXGY et pour sommet le point L est à la pyramide qui a pour base le polygone HPEQFRGS et pour sommet le point N (prop. 6. 12) : donc le cône AL est au solide O comme la pyramide qui a pour basé le polygone DTAVBXCY et pour sommet le point L est à la pyramide qui a pour base le polygone HPEQFRGS et pour sommet le point N : donc en échangeant les plans des moyens, le cône AL est à la pyramide qui lui est inscrite comme le solide O est à la pyramide inscrite dans le; cône EN. Mais le cône AL est plus grand que la pyramide qui lui est inscrite : donc le solide O est plus grand que la pyramide

qui est inscrite dans le cône EN ; mais le solide O est ad contraire plus petit que la pyramide inscrite dans le cône EN, ce qui est une absurdité : donc le cercle ABCD n'est point au cercle EFGH comme le cône AL est à un solide quelconque plus petit que le cône EN. On démontrera semblablement que le cercle EFGH n'est point au cercle ABCD comme le cône EN est à un solide quelconque plus petit que le cône AL.

Je dis à présent que le cercle ABCD n'est point au cercle EFGH comme le cône AL est à un solide quelconque plus grand que le cône EN.

Supposons que cela soit possible et que le cercle ABCD soit au cercle EFGH comme le cône AL est à un solide plus grand que le cône EN et que ce solide soit O. Mettons les conséquents à la place des antécédents et les antécédents à la place des conséquents, le cercle EFGH sera au cercle ABCD comme le solide O est au cône AL. Mais le solide O est au cône AL comme le cône EN est à un solide quelconque plus petit que le cône AL ; donc le cercle EFGH est au cercle ABCD comme le cône EN est à un solide plus petit que le cône AL ; ce que nous avons démontré impossible : donc le cercle ABCD n'est point au cercle EFGH comme le cône AL est à un solide quelconque plus grand que le cône EN. Mais on a démontré que le cercle ABCD n'est point au cercle EFGH comme le cône AL est à un solide plus petit que le cône EN : donc le cercle ABCD est au cercle EFGH comme le cône AL est au cône EN. Mais un cône est à un cône comme un cylindre est à un cylindre, car un cylindre est le triple d'un cône (prop. 10. 12) : donc les cercles ABCD, EFGH sont entre eux comme les cylindres qui ont ces cercles pour bases et qui ont des hauteurs égales à celles des cônes.

Donc les cônes et les cylindres qui ont la mettre hauteur sont entre eux comme leurs bases, ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XII.

THÉORÈME.

Les cônes et cylindres semblables sont entre eux en raison triplée des diamètres de leurs bases.

Que les cônes et les cylindres qui ont pour bases les cercles ABCD, EFGH (fig. 215), pour diamètres de leurs bases les droites BD, FH et pour axes les droites KL, MN soient semblables entre eux : je dis que le cône qui a pour base le cercle ABCD et pour sommet le point L, est au cône qui a pour base le cercle EFGH et pour sommet le point N en raison triplée de BE à FH.



Car si le cône ABCDL n'est point au cône EFGHN eu raison triplée du diamètre BD au diamètre FH, le cône ABCDL sera à un solide quelconque plus grand ou plus petit que le cône EFGHN en raison triplée du diamètre BD au diamètre FH. Supposons d'abord que le cône ABCDL soit à un solide O plus petit, que le

cône EFGHN en raison triplée du diamètre AD au diamètre FH; dans le cercle EFGH décrivons le carré EFGH; le carré EFGH sera plus petit que la moitié du cercle EFGH. Ensuite sur le carré EFGH élevez une pyramide qui ait la même hauteur que le cône ; cette pyramide sera plus grande que la moitié du cône. Partager les arcs EF, FG, GH, HE en deux parties égales aux points P, Q, R, S, et menez les droites EP, PF, FQ, QG, GR, RH, HS, SE ; chacun des triangles EPF, FQG, GRH, HSE sera plus grand que la moitié du segment respectif du cercle EFGH. Sur chacun de ces triangles, élevez des pyramides qui aient le même sommet que le cône; chacun de ces pyramides sera plus grande que la moitié du segment respectif du cône. Si nous partageons les arcs restants en deux parties égales, si nous joignons les extrémités de ces arcs par des droites et si nous élevons sur chacun de ces triangles des pyramides qui aient le même sommet que le cône et si nous continuons de faire la même chose, il restera enfin certains segments de cône qui seront plus petits que l'excès du cône EFGHN sur le solide O (prop. 1. 10). Supposons que l'on ait ces segments, que ces segments soient ceux qui sont élevés sur les segments circulaires EP, PF, FQ, QG, GR, RH, HS, SE, la pyramide restante qui a pour base le polygone EPFQGRHS et pour sommet le point N sera plus grande que le solide O ; dans le cercle ABCD décrivez un polygone ATBVCXDY qui soit semblable au polygone EPFQGRHS et semblablement placé. Sur le polygone ATBVCXDY élevez une pyramide qui ait le même sommet que le cône; que LBT soit un des triangles qui comprennent la pyramide dont la base est le polygone ATBVCXDY et dont le sommet est le point L, que NFP soit un des triangles qui comprennent la pyramide dont la base est le polygone EPFQGRHS et dont le sommet est le point N, et enfin menez les droites KT, MP. Puisque le cône ABCDL est semblable au cône EFGHN, la droite BD sera à la droite FH comme l'axe KL est à l'axe MN (déf. 24. 11) ; mais

BD est à FH comme BK est à FM: donc BK est à FM comme KL est à MN : donc en échangeant les plans des moyens, B K sera à KL comme FM est à MN. Mais les angles BKL, FMN sont égaux parce qu'ils sont droits, et ces angles égaux sont compris par des côtés proportionnels : donc le triangle BKL est semblable au triangle FMN (prop. 6. 6). De plus, puisque la droite BK est à la droite KT comme la droite FM est à la droite MP et que ces droites comprennent les angles égaux BKT, FMP, car la portion des quatre angles droits placés au centre H que comprend l'angle BKT est la même portion des quatre angles droits placés au centre M que comprend l'angle FMP : donc puisque les côtés qui comprennent les angles égaux BKC, FMP sont proportionnels, le triangle BKT est semblable au triangle FMP (prop. 6. 6). De plus, puisqu'on a démontré que BK est à KL comme FM est à MN, et à cause que BK est égal à KT et FM égal à MP, la droite KT sera à la droite KL comme PM est à MN. Mais les côtés qui comprennent les angles droits TKL, PMN sont proportionnels : donc le triangle LKT est semblable au triangle JNMP. Mais à cause de la similitude des triangles BKL, FMN la droite LB est à la droite BK comme la droite NF est à la droite FM, et à cause de la similitude des triangles BKT, FMP la droite KB est à la droite BT comme la droite MF est à la droite FP: donc la droite LB est à la droite BT comme la droite NF est à la droite FP (prop. 22. 5). De plus, à cause de la similitude des triangles LTK, NPM la droite LT est à la droite TK comme la droite NP est à la droite PM, et à cause de la similitude des triangles KBT, PMF la droite KT est à la droite TB comme la droite MP est à la droite PF : donc la droite LT sera à la droite TB comme la droite NP est à la droite PF. Mais on a démontré que TB est à BL comme PF est à FN : donc TL est à LB comme PN est à NF: donc les côtés des triangles LTB, NPF sont proportionnels : donc les triangles LTB, NPF sont équiangles et par conséquent semblables entre eux (prop. 5. 6) : donc la pyramide qui a pour base le triangle BKT et pour sommet le point L est

semblable à la pyramide qui a pour case le triangle FMP et pour sommet le point N (déf. 9. 11); car ces deux pyramides sont comprises sous des plans semblables et égaux .en nombre ; mais les pyramides semblables qui ont des bases triangulaires sont entre elles eu raison -triplée de leurs côtés homologues (prop. 8. 12): donc les pyramides BKTL, FMPN sont entre elles en raison triplée des droites BK, FM. Si, nous menons des droites des points A, Y, D, X, C, V au point K et des points E, S, H, R, G, Q au point M, et si sur les triangles que ces droites forment avec les côtés des polygones inscrits nous élevons des pyramides qui aient les mêmes sommets que le cône, nous démontrerons semblablement que chaque pyramide du polygone ATBVCXDY est à chaque pyramide <lu polygone EPFQGRHS en raison triplée du côté BK au côté homologue F M, c'est-à-dire du diamètre BD au diamètre F H. Mais un seul des antécédents est à un seul des conséquents comme tous les antécédents sont à tous les conséquents (prop. 12. 5): donc la pyramide BKÏL est à la pyramide FMPN comme la pyramide totale qui a pour base le polygone ATBVCXDY et pour sommet le point L est à la pyramide totale qui a pour base le polygone EPFQGRHS et pour sommet le point N : donc la pyramide qui a pour base le polygone ATBVXDY et pour sommet le point L est à la pyramide qui a pour base le polygone EPFQGRHS en raison triplée du diamètre BD au diamètre FH. Mais on a supposé que le cône qui a pour base le cercle ABCD et pour sommet le point L est au solide O en raison triplée de BD à FH : donc le cône qui a pour base le cercle ABCD et pour sommet le point L est au solide O comme la pyramide qui a pour base le polygone ATBVCXDY et pour sommet le point L est à la pyramide qui a pour base le polygone EPFQGRHS et pour sommet le point N : donc, en échangeant les places des moyens (prop. 16. 5), le cône qui a pour base le cercle ABCD et pour sommet le point L est à la pyramide qui a pour base le polygone ATBVCXDY et pour sommet le point N comme le solide O est à la pyramide qui a pour base le polygone EPFQGRHS et pour sommet le point N. Mais le cône qui a

pour base le cercle ABCD et pour sommet le point L est plus grand que la pyramide inscrite; car le cône la comprend : donc le solide Q est plus grand que la pyramide qui a pour base le polygone EPFQGRHS et pour sommet le point N ; mais au contraire ce solide est plus petit que cette pyramide ; ce qui est impossible :, donc le cône qui a pour base le cercle ABCD et pour sommet le point L n'est point à un solide quelconque plus petit que le cône qui a pour base le cercle EFGH et pour sommet le point N en raison triplée de BD à FH. Nous démontrerons semblablement que le cône EFGHN n'est point à un solide quelconque plus petit que le cône ABCDL en raison triplée de FH à BD. Je dis enfin que le cône ABCDH n'est point à un solide quelconque plus grand que le cône EFGHN en raison triplée de BD à FH ; car s’il peut arriver que le cône ABCDL, soit à un solide O plus grand que le cône EFGHN en raison triplée de BD à FH, en mettant les conséquents à la place des antécédents et les antécédents à la place ses conséquents, le solide O sera au cône ABCDL en raison triplée de FH à BD. Mais le solide O est au cône ABCDL comme le cône EFGHN est à un solide plus petit que le cône ABCDL: donc le cône EFGHN est à un solide quelconque plus petit que le cône ABCDL en raison triplée de FH à BD, ce qui a été démontré impossible : donc le cône ABCDL n'est point à on solide quelconque plus grand que le cône EFGHN en raison triplée de BD à FH. Mais on a démontré que le cône ABCDL n'est point à un solide quelconque plus petit que le cône EFGHN en raison triplée de BD à FH : donc le cône ABCDL est au cône EFGHN en raison triplée de BD à FH ; mais un cône est à un autre cône comme un cylindre est à un autre cylindre ; car un cylindre qui a la même base qu'un cône et une hauteur égale est triple de ce cône, puisqu'on a démontré qu'un cône est la troisième partie du cylindre qui a la même base et une hauteur égale (prop. 11. 12): donc ces cylindres semblables sont entre eux en raison triplée des droites BD, F H.

Donc les cônes et les cylindres semblables sont entre eux en raison triplée des diamètres des bases, ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XIII.

THÉORÈME.

Si un cylindre est coupé par un plan parallèle aux plans opposés, l'un de ces cylindres sera à l'autre cylindre comme l'axe du premier est à l'axe du second.

Que le cylindre AD (fig. 216) soit coupé par un plan GH parallèle aux plans opposés AB, CD, et que ce plan rencontre l'axe EF, au point K : je dis que le cylindre BG est au cylindre GD comme l'axe EK est à l'axe KF.



Prolongez de part et d'autre l'axe EF vers les points L, M, et prenez autant de droites que vous voudrez EN, NL égales chacune à l'axe EK ; prenez aussi autant de droites, que vous voudrez FO, OM égales chacune à l'axe FK ; par les points L, N, O, M conduisez des plans parallèles aux plans AB, CD, et dans les plans qui passent par les points L, N, O, M et autour des centres L, N, O, M imaginez des cercles PQ, RS, TV, XY égaux aux cerclés AB, CD; imaginez ensuite

les cylindres QR, RB, DT, TY. Puisque les axes LN, NE, EK sont égaux entre eux, les cylindres QR, RB, BG seront entre eux comme leurs bases (prop. 11. 12) ; mais les bases sont égales : donc les cylindres QR, RB, BG sont égaux entre eux. Puisque les axes LN, NE, EK sont égaux entre eux, que les cylindres QR, RB, BG sont aussi égaux entre eux et que le nombre des axes LN, NF, EK est égal au nombre des cylindres QR, RB, BG, l'axe KL sera multiple de l'axe EK autant de fois que le cylindre QG est multiple du cylindre GB ; par la même raison, l'axe MK est multiple de l'axe KF autant de fois que le cylindre YG est multiple du cylindre GD. Si l'axe KL est égal à l'axe KM, le cylindre QG sera égal au cylindre GY ; si l'axe KL est plus grand que l'axe KM, le cylindre QG sera plus grand que le cylindre GY, et si l'axe KL est plus petit que l'axe KM, le cylindre QG sera plus petit que le; cylindre GY. On a donc quatre quantités, savoir les axes EK, KF et les cylindres BG, GD et l'on a pris des équimultiples de l'axe EK et du cylindre BG savoir, l'axe KM et le cylindre QG; on a pris aussi des équimultiples de l'axe KF et du cylindre GD, savoir, l'axe KM et le cylindre GY; on a démontré aussi que si l'axe KL surpasse l'axe KM, le cylindre QG surpassera le cylindre GY, que si l'axe KL est égal à l'axe KM, le cylindre QG sera égal au cylindre GY, et que si l'axe KL est plus petit que l'axe KM, le cylindre KM sera plus petit que le cylindre GY : donc l'axe EK est à l'axe KF comme le cylindre BG est au cylindre GD (déf. 4. 5), ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XIV.

THÉORÈME.

Les cônes et les cylindres qui ont des bases égales sont entre eux comme leurs hauteurs.

Que les cylindres FD, EB (fig. 217) aient des bases égales AB, CD : je dis que le

cylindre EB est au cylindre FD comme l'axe GH est à l'axe KL.



Prolongez l'axe KL vers le point N, faites LN égal à l'axe GH et autour de l'axe LN imaginez le cylindre CM. Puisque les cylindres EB, CM ont la même hauteur, ces cylindres sont entre eux comme leurs bases (prop. 11. 12) ; mais leurs bases sont égales : donc les cylindres EB, CM seront égaux entre eux. Mais puisque le cylindre FM est coupé par le plan CD parallèle aux plans opposés, le cylindre CM sera au cylindre FD comme l'axe LN est à l'axe KL. Mais le cylindre CM est égal au cylindre EB et l'axe LN égal à l'axe GH : donc le cylindre EB est au cylindre FD comme l’axe G H est à l'axe KL (prop. 13. 12); mais le cylindre EB est au cylindre FD comme le cône ABG est au cône CDK, car les cylindres sont triples des cônes (prop. 10.12) : donc l’axe GH est à l'axe KL comme le cône ABG est au cône CDK et comme le cylindre EB est au cylindre FD ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XV.

THÉORÈME.

Les bases des cônes ou des cylindres égaux sont réciproquement proportionnelles

aux hauteurs de cônes de ces cylindres ; et lorsque les bases des cônes ou des cylindres sont réciproquement proportionnelles aux hauteurs, les cônes ou les cylindres sont égaux entre eux.

Que les cônes et les cylindres dont les bases sont les cercles ABCD, EFGH (fig. 218), dont les diamètres des bases sont les droites AC, EG et dont les axes sont les droites KL, MN qui sont en même tems les hauteurs des cônes et des cylindres soient égaux entre eux ; achevez les cylindres AO, EP : je dis que les bases de ces cylindres AO, EP sont réciproquement proportionnelles aux hauteurs; c'est-à-dire que la base ABCD est à la base EFGH comme la hauteur MN est à la hauteur KL.



La hauteur KL est égale à la hauteur MN où elle lui est inégale ; qu'elle lui soit d'abord égale. Puisque le cylindre AO est égal au cylindre EP et que les cônes ou les cylindres qui ont la même hauteur sont entre eux comme leurs bases (prop. 11. 12), la base ABGD sera égale à la base EFGH : donc les bases sont réciproquement proportionnelles aux hauteurs, c'est-à-dire que ABCD est à EFGH comme la hauteur MN est à la hauteur KL. Supposons à présent que la hauteur KL ne soit point égale à la hauteur MN et que la hauteur MN soit la plus grande. De la hauteur MN retranchez la droite QM égale à la droite KL

et par le point Q coupez le cylindre EP par le plan STV parallèle aux cercles opposés EFGH, RPX, et imaginez un cylindre ES dont la base soit le cercle EFGH et la hauteur l'axe QM. Puisque par supposition le cylindre AO est égal au cylindre EP et que ES est un autre cylindre, le cylindre AO sera au cylindre ES comme le cylindre EP est au cylindre ES (prop. 7. 5). Mais le cylindre AO est au cylindre ES comme la base ABCD est à la base EFGH (prop. 11. 12), car les cylindres AO, ES ont la même hauteur; mais le cylindre EP est au cylindre ES comme la hauteur MN est à la hauteur MQ (prop. 13. 12), car le cylindre EP est coupé par le plan TVS parallèle aux plans opposés ; mais la base ABCD est à la base EFGH comme la hauteur MN est à la hauteur MQ, et la hauteur MQ est égale à la hauteur KL : donc la base ABCD est à la base EFGH comme la hauteur MN est à la hauteur KL : donc les bases des cylindres AO, EP sont réciproquement proportionnelles aux hauteurs de ces cylindres.

A présent que les bases des cylindres AO, EP soient réciproquement proportionnelles aux hauteurs de ces cylindres, c'est-à-dire que la base ABCD soit à la base EFGH comme la hauteur MN est à la hauteur KL : je dis que le cylindre AO est égal au cylindre EP.

Faites la même construction. Puisque la base ABCD est à la base EFGH comme la hauteur MN: est à la hauteur KL et puisque la hauteur KL est égale à la hauteur MQ, la base ABCD sera à la base EFGH comme la hauteur MN est à la hauteur MQ; mais la base ABCD est à la base EFGH comme le cylindre AO est au cylindre ES (prop. 11. 12), car ils ont la même hauteur, et la hauteur MN est à la hauteur MQ comme le cylindre EP est au cylindre ES (prop. 13. 12) : donc le cylindre AO est au cylindre ES comme le cylindre EP est au cylindre ES : donc le cylindre AO est égal au cylindre EP (prop. 9. 5) : la démonstration sera la même pour les cônes;, ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XVI.

PROBLÈME.

Deux cercles concentriques étant donnés, décrire dans le plus grand un polygone dont les côtés soient égaux et pairs en nombre et qui ne touche point le plus petit cercle.

Soient les deux cercles ABCD, EFGH (fig. 219) ayant le même centre K : il faut dans le plus grand cercle ABCD décrire un polygone dont les côtés soient égaux et pairs en nombre et qui ne touche point le plus petit cercle EFGH.



Par le centre K menez la droite BD ; par le point G menez la droite AG perpendiculaire sur BD et prolongez cette droite vers le point C. La droite AC touchera le cercle EFGH (prop. 16. 3). Partagez la demi-circonférence BAD en deux parties égales et sa moitié en deux parties égales, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il reste un arc plus petit que l'arc AD (prop. 1. 10). Qu'on ait cet arc et que cet arc soit LD ; par le point L conduisez sur BD la perpendiculaire LM ; prolongez celte perpendiculaire vers le point N et menez les droites LD, DN ; la droite LD sera égale à la droite DN; et puisque la droite LN est parallèle à la droite AC et que la droite AC touche le cercle EFGH, la droite LN ne touchera point le cercle EFGH, à plus

forte raison les droites LD, DN ne toucheront point ce même cercle : donc si l'on applique à la circonférence ABCD, à la suite les unes des autres, des droites égales à la droite LD (prop. 1. 4), on décrira un polygone dont les côtés seront égaux et pairs en nombre et qui ne touchera point le cercle EFGH ; ce qu'il fallait faire.

PROPOSITION XVII.

PROBLÈME.

Deux sphères concentriques étant données, décrire dans la plus grande un polyèdre dont les faces ne touchent point la surface de la plus petite.

Imaginez deux sphères qui aient le même centre A (fig. 220) : il faut dans la plus grande sphère décrire un polyèdre dont les faces ne touchent point la surface de la plus petite.



220



Faites passer un plan quelconque par le centre de ces sphères, les sections seront des cercles, parce qu'une sphère étant engendrée par tin demi-cercle qui tourne autour de son diamètre immobile (déf. 14. 11)} dans quelque position que nous concevions ce demi-cercle, le plan prolongé de ce demi-cercle produira nécessairement une circonférence de cercle sur la surface de la sphère ; et il est évident que cette circonférence sera celle, d'un grand cercle, parce que le diamètre de la sphère, qui est aussi celui du demi-cercle, est la plus grande de toutes les droites menées dans le cercle ou dans la sphère (prop. 15. 5). Supposons en conséquence que BCDE soit un cercle de la plus grande sphère et que FGH soit un cercle de la plus petite ; menez leurs diamètres BD, CE de manière qu'ils soient perpendiculaires l'un sur l'autre. Les deux cercles BCDE, FGH ayant le même centre décrivez dans le plus grand BCDE un polygone dont les côtés soient égaux et pairs en nombre et qui rie touche point le plus petit cercle FGH (prop. 16. 12); que les côtés de ce polygone qui sont dans le quart de cercle BE soient BK, KL, LM, ME ; menez la droite KA que vous prolongerez vers N ; au point A et sur le plan du cercle BCDE élevez la perpendiculaire A 0 qui rencontre la surface de la sphère au point O, et par la droite AO et par chacune des droites BD, KN conduisez deux plans qui, d'après ce que nous avons

dit, produiront deux grands cercles dans la surface de la sphère. Supposons qu'on ait ces deux grands cercles et que BOD, KON en soient les moitiés, et que BD, KN en soient les diamètres. Puisque la droite OA est perpendiculaire sur le plan du cercle BCDE, tous les plans qui passeront par cette droite AO seront perpendiculaires sur le plan du cercle BCDE (prop. 18. 11) : donc les demi-cercles BOD, KON sont perpendiculaires sur ce même plan ; et puisque les demi-cercles BED, BOD, KON sont égaux, car leurs diamètres EC, BD, KN sont égaux entre eux, les quarts de leurs circonférences BE, BO, KO seront égaux entre eux : donc les quarts de cercle BO, KO contiendront chacun autant de côtés du polygone inscrit que le quart de cercle BE, et les côtés contenus dans les quarts de cercles BO, KO seront égaux aux côtés BK, KL, LM, ME, chacun à chacun. Menez les côtés BP, PQ, QR, RO, KS, ST, TV, VO et conduisez les droites SP, TQ, VR, et des points P, S abaissez des perpendiculaires sur le plan du cercle BCDE; ces perpendiculaires tomberont sur les communes sections BD, KN des plans des demi-cercles BOD, KON (prop. 38, 11), puisque ces plans sont perpendiculaires sur le plan du cercle BCDE, par construction; que ces perpendiculaires tombent donc sur ces communes sections et que ces perpendiculaires soient PX, SY ; menez la droite XY. Puisqu'on a pris les arcs égaux BP, KS dans les demi-circonférences égales BOD, KON et qu'on a mené les perpendiculaires PX, SY, la droite PX sera égale à la droite SY et la droite BX égale à la droite KY. Mais la droite totale BA est égale à la droite totale KA : donc la droite restante XA est égale à la droite restante YA : donc BX est à XA comme KY est à YA : donc la droite XY est parallèle à la droite KB (prop. 2. 6); et puisque chacune des droites PX, SY est perpendiculaire sur le plan du cercle BCDE, la droite PX sera parallèle à la droite SY (prop. 6. 11); mais on a démontré que ces droites sont égales : donc les droites YX, SP sont égales et parallèles (pr. 33. 11) ; et puisque la droite YX est parallèle à la droite SP et à

la droite KB, la droite SP sera parallèle à la droite KB (prop. 9. 11); mais ces droites sont jointes par les droites BP, KS : donc le quadrilatère KBPS est dans un seul plan, car si deux droites sont parallèles et si dans chacune de ces droites on prend des points quelconques, les droites qui joignent ces points sont dans le même plan que ces parallèles (prop. 7. 11). Par la même raison l'un et l'autre des quadrilatères SPQT, TQRV sont dans un seul plan; mais le triangle VRO est aussi dans un seul plan (prop. 2. 11) : donc si des points P, S, Q, T, R, V on conçoit des droites menées au point A, on aura construit entre les arcs BO, KO un certain polyèdre composé des pyramides dont les hases seront les quadrilatères KBPS, SPQT, TQRV, et le triangle VRO et dont le sommet commun sera le point A. Si sur chacun des côtés KL, LM, ME nous faisons la même construction que nous avons faites sur le côté KB, si nous faisons ensuite la même chose dans les autres quarts de cercle et dans l'autre hémisphère, nous aurons inscrit dans la sphère un certain polyèdre qui sera composé des pyramides dont les hases sont les quadrilatères KBPS, SPQT, TQRV et le triangle VRO, elles quadrilatères et les triangles correspondais à ces quadrilatères et à ce triangle et dont le sommet commun sera le point A.

Je dis à présent que ce polyèdre ne touche point la surface de la petite sphère dans laquelle est le cercle FGH. Du point A menez la droite AZ perpendiculaire sur le plan du quadrilatère KBPS (prop. 11. 11), que cette perpendiculaire rencontre ce plan au point Z et menez les droites BZ, ZK. Puisque AZ est perpendiculaire sur le plan du quadrilatère KBPS, elle sera perpendiculaire sur toutes les droites, qui la rencontrent et qui sont dans ce plan (déf. 3. 11) : donc AZ est perpendiculaire sur l'une et l'autre des droites BZ, ZK; mais puisque AB est égal à AK, le carré de AB sera égal au carré de AK; mais les carrés des droites AZ, ZB sont égaux au carré de AB (prop. 47. 1), car l'angle en

Z est droit par construction, et les carrés de AZ, ZK sont égaux au carré de AK : donc les carrés des droites AZ, ZB sont égaux aux carrés des droites AZ, ZK. Retranchant le carré de AZ qui est commun, le carré de BZ sera égal au carré de ZK : donc la droite BZ est égale à la droite ZK. On démontrera semblablement que les droites menées du point Z aux points P, S sont égales chacune à l'une et à l'autre clés droites BZ, ZK : donc le cercle décrit du centre Z et avec un intervalle égal à une des droites ZB, ZK passera aussi par les points P, S : donc le quadrilatère KB PS sera inscrit dans un cercle ; et puisque la droite KB est plus grande que la droite YX et que la droite YX est égale à la droite SP, la droite KB sera plus grande que la droite SP. Mais la droite KB est égale à l'une et à l'autre des droites KS, BP : donc l'une et l'autre des droites KS, BP sont plus grandes que la droite SP. Puisque le quadrilatère KBPS est décrit dans un cercle et que les droites KB, BP, KS sont égales, que la droite PS est plus petite et que la droite BZ est menée; du centre du cercle, le carré de KB sera, plus grand que le double du carré de BZ. Du point K menez la droite KA' perpendiculaire sur BD. Puisque la droite BD est plus petite que le double de DA' et que DB est à DA' comme le rectangle compris sous DB, BA' est au rectangle compris sous DA', A'B (prop. 1. 6), si l'on décrit un carré sur BA' et si sur A'D on complète le parallélogramme compris sous A'D, A'B, le rectangle compris sous DB, BA' sera plus petit que le double de celui qui est compris sous DA', A'B. Menez la droite KD. Le parallélogramme compris sous DB, BA' égal au carré de KB (prop. 8. 6), et le parallélogramme compris sous DA', A'B égal au carré de KA' : donc le carré de KB est plus petit que le double du carré de KA' ; mais le carré de KB est plus grand que le double du carré de BZ : donc le carré de KA' est plus grand que le carré de BZ ; et puisque BA est égal à KA, le carré de BA sera égal au carré de KA. Mais les carrés des droites BZ, ZA sont égaux au carré de la droite BA (prop.

47. 1), et les carrés des droites KA', A'A égaux au carré de la droite KA : donc les carrés des droites BZ, ZA sont égaux aux carrés des droites KA', A'A ; mais le carré de KA' est plus grand que le carré de BZ : donc le carré de A'A est plus petit que le carré de ZA: donc la droite AZ est plus grande que la droite AA' : donc la droite AZ est à plus forte raison plus grande que la droite A G ; mais la droite AZ est une perpendiculaire sur une des faces du polyèdre et la droite AG est un rayon de la plus petite sphère : donc les faces de ce polyèdre ne touchent point la surface de la plus petite sphère.

AUTREMENT.

Nous allons démontrer autrement et d'une manière plus prompte que la droite AZ est plu» grande que la droite AG. Du point G conduisez une perpendiculaire GL sur AG et menez AL. Puisque si l'on partage en deux parties égales l'arc EB et la moitié de cet arc en deux parties égales et ainsi de suite, il restera enfin un certain arc plus petit que celui de la circonférence du cercle BCD qui est sous-tendu par une droite égale à la droite GL (prop. 1. 10). Qu'on ait cet arc et que cet arc soit KB, la droite KB est plus petite que la droite GL ; mais puisque le quadrilatère BKSP est inscrit dans un cercle et que les droites PB, BK, KS sont égales et que la droite PS est plus petite que chacune de ces droites, l'angle BZK sera obtus : donc la droite BK sera plus grande que la droite BZ; mais la droite GL est plus grande que BK par construction : donc à plus forte raison la droite GL sera plus grande que la droite BZ et par conséquent le carré de GL sera plus grand que le carré de BZ ; mais puisque la droite AL est égale à la droite AB, le carré de AL sera égal au carré de AB ; mais les carrés des droites AG, GL sont égaux au carré de la droite AL et les carrés des droites BZ, ZA sont égaux aux carrés de la droite AB : donc les carrés des droites AG, GL sont égaux aux carrés des droites BZ, ZA ; mais le carré

de BZ est plus petit que le carré de GL: donc le carré de ZA est plus grand que le carré de AG : donc la droite AZ est plus grande que la droite AG.

Donc, deux sphères concentriques ayant été données, on a décrit dans la plus grande un polyèdre dont les faces ne touchent pas la surface de la plus petite ; ce qu'il fallait faire.

COROLLAIRE.

Si l'on décrit dans une autre sphère un polyèdre semblable à celui qui est décrit dans la sphère BCDE, le polyèdre décrit dans la sphère BCDE sera au polyèdre qui est décrit dans une autre sphère en raison triplée du diamètre de la sphère BCDE au diamètre de l'autre sphère; car ayant divisé ces polyèdres en pyramides égales en nombre et dans le même ordre, on aura des pyramides semblables. Mais les pyramides semblables sont en raison triplée des côtés homologues (cor. 8. 12) : donc la pyramide qui a pour base le quadrilatère KBPS et pour sommet le point A sera à la pyramide correspondante de l'autre sphère en raison triplée d'un côté de la première au côté homologue de la seconde, c'est-à-dire en raison triplée du rayon AB de la sphère qui a pour centre le point A au rayon de l'autre sphère. Semblablement chacune des pyramides comprises dans la sphère qui a pour centre le point A sera à chacune des pyramides du même ordre comprise dans l'autre sphère en raison triplée du rayon AB au rayon de l'autre sphère. Mais un des antécédents est à un des conséquents comme tous les antécédents sont à tous les conséquents (prop. 12. 5) : donc le polyèdre total compris dans la sphère qui a pour centre le point A est au polyèdre total compris dans l'autre sphère en raison triplée du rayon AB au rayon de l'autre sphère, c'est-à-dire en raison triplée du diamètre AB au diamètre de l'autre sphère ; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION XVIII.

THÉORÈME.

Les sphères sont entre elles en raisons triplées de leurs diamètres.

Imaginez les sphères ABC, DEF (fig. 221) dont les diamètres sont les droites BC, EF : je dis que la sphère ABC est à la sphère DEF en raison triplée du diamètre BC au diamètre EF.



221

Car si cela n'est point, la sphère ABC sera à une sphère plus petite ou à une sphère plus grande que la sphère DEF en raison triplée de BC à EF. Supposons d'abord que la sphère ABC soit à une sphère plus petite, savoir à la sphère GHK en raison triplée de BC à EF. Imaginez la sphère DEF placée autour du même centre que la sphère GHK; décrivez dans la plus grande sphère DEF un polyèdre dont les faces ne touchent point la surface de la plus petite sphère GHK (prop. 17. 12), et dans la sphère ABC décrivez un polyèdre semblable à celui qui est décrit, dans la sphère DEF; le polyèdre inscrit dans la sphère ABC sera au polyèdre inscrit dans la sphère DEF en raison triplée de BC à EF (cor. 17. 12); mais, par supposition, la sphère ABC est à la sphère GHK en raison triplée de BC à EF : donc la sphère ABC est à la sphère GHK comme le polyèdre inscrit dans la sphère ABC est au polyèdre inscrit dans la sphère DEF

(prop. 11. 5) : donc en échangeant les places des moyens la sphère ABC sera au polyèdre inscrit dans cette sphère comme la sphère GHK est au polyèdre inscrit dans la sphère DEF; mais la sphère ABC est plus grande que le polyèdre qui lui est inscrit : donc la sphère GHK est plus grande que le polyèdre inscrit dans la sphère DEF ; mais au contraire il est plus petit, car il est inscrit dans cette sphère, ce qui est impossible : donc la sphère ABC n'est point à une sphère plus petite que la sphère DEF en raison triplée de BC à EF. Nous démontrerons semblablement que la sphère DEF n'est point à une sphère plus petite que la sphère ABC en raison triplée de EF à BC. Je dis de plus que la sphère ABC n'est point à une sphère plus grande que la sphère DEF en raison triplée de BC à EF; car si cela peut se faire, supposons que la sphère ABC soit à une sphère plus grande que la sphère DEF, savoir à la sphère LMN en raison triplée de BC à EF; en mettant les conséquents à la placé des antécédents et les antécédents à la place des conséquents, la sphère LMN sera à la sphère ABC en raison triplée du diamètre EF au diamètre BC. Mais la sphère LMN est à la sphère ABC comme la sphère DEF est à une sphère plus petite que la sphère ABC, ainsi que cela a été démontré, puisque la sphère LMN est plus grande que la sphère DEF : donc la sphère DEF est à une sphère plus petite que la sphère ABC en raison triplée de EF à BC; ce qui a été démontré impossible : donc la sphère ABC n'est point à une sphère plus grande que la sphère DEF en raison triplée de BC à EF ; mais nous avons démontré que la sphère ABC n'est point à une sphère plus petite que la sphère DEF en raison triplée de AB à EF : donc la sphère ABC est à la sphère DEF en raison triplée de AB à EF ; ce qu'il fallait démontrer.

FIN DU DOUZIÈME ET DERNIER LIVRE.

NOTES.

LIVRE I. — DEFINITION IV.

CETTE définition d'Euclide a paru insignifiante à plusieurs géomètres; pour en comprendre le sens, comparons une ligne droite avec une autre ligne qui ait les mêmes extrémités. Soit pour cet effet la droite AFGE (fig. 240) et la ligne ABCDE.



La ligne AB est également placée entré ses points A et B, c'est-à-dire qu'elle ne s'avance ni vers la droite ni vers la gauche, qu'elle ne va ni en haut ni en bas; il en est de même de la ligne BC ; mais il n'en est pas de même de la ligne ABC, car cette ligne s'avance vers B. La ligne CDE n'est pas également placée entre ses points C et E, car elle s'avance vers D: donc la ligne ABCDE n'est pas également placée entre ses points A, B, C, E, car elle 8'avance tantôt vers un endroit, tantôt vers un autre. La ligne AFGE est au contraire également placée entre ses points A et F, F et G, G et E, A et G, F et E, A et E, car elle ne s'avance jamais vers aucun côté.

Selon Archimède, la ligne droite est la plus courte des lignes qui ont les mêmes extrémités.

Selon Platon, la ligne droite est celle dont les extrémités sont ombragées par les points intermédiaires. Ne pourrait-on pas dire que la ligne droite est celle qui peut tourner sur extrémités immobiles sans changer de place?

Cette définition est analogue à celle de la ligne droite et peut par conséquent être expliquée d'une manière analogue.

Selon Héron, la superficie plane est celle sur toutes les parties de laquelle on peut appliquer une ligne droite.

LIVRE I. — DÉFINITION XXXIII.

Cette définition renferme une condition superflue car si les côtés opposés d'un quadrilatère sont égaux, les angles opposés sont nécessairement égaux. (*Robert Simson*.)

LIVRE I. — AXIOME VIII.

Cet axiome veut dire que les lignes, que les surfaces qui s'appliquent exactement les unes sur les autres sont égales que les angles dont les côtés s'appliquent exactement les uns sur les autres sont égaux, et que deux solides sont égaux lorsque les faces de l'un s'appliquent exactement sur les faces de l'autre. Si l'on disait que les choses qui *s'appliquent exactement les unes sur les autres sont égales,* on ne pourrait point se servir de cet axiome, lorsque l'on voudrait conclure que deux solides dont les faces s'appliquent exactement les unes sur les autres, sont égaux entre eux.

LIVRE I. — PROPOSITION VII.

Cette proposition a deux cas, car il peut arriver que le point D tombe dans le triangle ABC. Robert Simson démontre Le second cas; mais cela était inutile, car le second cas est compris implicitement dans la proposition XXI du même livre, où Euclide démontre que les deux droites BD, DC sont plus courtes que les droites BA, AC; car il est évident que si les deux droites BD, D sont plus courtes que les deux droites BA, AC, les deux droites BD ,C ne seront point égales aux deux droites BA, AC, chacune à chacune.

LIVRE I. — PROPOSITION XXIV.

Car puisque, &c. *lisez* que parmi les droites DE, DF la droite DE soit celle qui

n’est pas plus grande que la droite DF. Puisque, &c (*Robert Simson*).

LIVRE I. — PROPOSITION XXXV.

Robert Simson remarque que cette proposition a trois cas, et qu’Euclide ne démontre que le cas où le point E tombe entre le point D et le point F.

Les deux autres cas ont lieu lorsque le point E (fig. 241) tombe sur le point D et lorsque le point E tombe entre le point A et le point D (fig. 242). Voici comment on peut démontrer ces deux autres cas:





Après avoir démontré, pour le second cas, que le triangle ABD (fig. 241) et égal au triangle DCF, et après avoir ajouté chacun de ces deux triangles égaux le triangle BCD, on conclura que le parallélogramme ABCD sera égal au parallélogramme BCFD.

Après avoir démontré, pour le troisième cas, que le triangle ABE (fig. 242) est égal au triangle DC, et après avoir ajouté à chacun de ces deux triangles égaux le quadrilatère BCDE, on conclura que le parallélogramme ABCD sera égal au parallélogramme BCF

LIVRE IV — COROLLAIRE DE LA PROPOSITION XXV.

Hexagone, *lisez* hexagone équilatéral et équiangle. (*Robert Simson*).

LIVRE VI. —DEFINITION II.

Rober Simson trouve cette définition obscure et la remplace par la suivante:

« Les figures, les triangles et les parallélogrammes, par exemple, sont réciproques lorsque les côtés qui comprennent deux angles sont proportionnels, de manière qu'un côté de la première figure est à un côté de la seconde comme un autre côté de la seconde est à un autre côté de la première. Je donne la préférence à la définition d'Euclide, mais j'approuve la définition de Robert Simson comme explication.

LIVRE VI. — DEFINITION V.

Euclide entend par la quantité d'une raison le quotient qui résulte la division de l'antécédent par son conséquent: D'où il suit que la quantité d'une raison peut toujours être représentée par une fraction dont le numérateur est l'antécédent de la raison et dont le dénominateur est le conséquent.

Soient les raisons suivantes : a : b, c : d, e : f

Les quantités de ces raisons sont les fractions a/b, c/d, e/f dont le produit est la fraction ace/bdf, ou la raison *ace : bdf* qui est une raison composée des raisons a : b, c : d, e : f.

Il est évident que l'antécédent *ace* de la raison composée est égal au produit de tous les antécédents des raisons composantes, et que le conséquent *bdf* de la raison composée est égal au produit de tous les conséquents des raisons composantes; d'où il suit qu'on pourrait énoncer la définition V de la manière suivante:

Une raison composée de raisons est celle dont l'antécédent est égal au produit de tous les antécédents de raisons composantes et dont le conséquent est égal au produit de tous les conséquents des raisons composantes.

LIVRE XI. — DEFINITION X.

Cette définition n'est pas proprement une définition, mais bien un théorème qu'il faut démontrer. Je donnerai la démonstration de cette définition dans le cas où les angles

solides ne sont pas compris par plus de trois angles plans; je ne démontrerai que ce cas, parce que dans toutes les démonstrations qui sont appuyées sur cette définition, il n'est pas question d'un seul solide dont les angles solides soient compris par plus de trois angles plans.

Robert Simson soutient que la définition X n'est pas vraie dans tous les cas, et que par conséquent un grand nombre de démonstrations du XI^{e} Livre et plusieurs démonstrations du Livre XII ont un fondement ruineux; en conséquence il supprime cette définition et la remplace par trois théorèmes, qu'il met à la suite de la proposition XXII.

Pour démontrer que la définition X est fausse dans certains cas, Robert Simson suppose deux solides qui ont le même nombre, de faces semblables et égales mais dont l'un a un angle solide rentrant, tandis que tous les angles solides de l'autre sont saillants. Mais n'est-il pas évident qu'Euclide n'avait en vue que les solides qui n'ont point d'angles rentrants? Etait-il nécessaire de l'énoncer d'une manière expresse? Cette définition est vraie dans tous les cas, lorsque les angles solides sont saillants. *Voyez* les notes qui sont à la suite des Eléments de Géométrie de A. M. Legendre.

Le théorème que Robert Simson met à la place de cette définition est exprimé ainsi: « Les solides qui sont contenus dans des plans semblables, égaux en nombre et en grandeur et semblablement posés, et dont les angles solides ne sont pas contenus par plus de trois angles plans, sont égaux et semblables entre eux ».

Ce théorème renferme une condition superflue; de cela seul que deux solides sont terminés par le même nombre de faces égales et semblables, les faces de ces solides sont également posées dans chaque solide. C'est comme si l'on disait que les triangles qui sont terminés par des droites égales et

semblablement posées sont égaux et semblables.

Le théorème de Robert Simson a deux cas; car une face du premier solide étant appliquée exactement sur la face homologue du second, il peut arriver que les autres faces du premier solide s'appliquent exactement sur les autres faces du second solide, et il peut arriver aussi que le premier solide soit placé hors du second. Robert Simson ne démontre que le premier cas, et il ne parle pas du second, qui sert de base aux démonstrations XXVIII et XL du XI^{e} Livre et aux démonstrations III et IV du XII^{e} Livre: donc toutes ces démonstrations ont véritablement un fondement ruineux par le moyen des corrections de Robert Simson.[2]

LIVRE XI. — PROPOSITION XV.

Après cette phrase, « et puisque BA est parallèle à la droite OH », Robert Simson veut qu'on ajouter « car chacune de ces deux droites est parallèle à la droite ED qui n'est pas dans le même plan que ces droites. »

N.B. Les propositions suivantes, qui sont la démonstration de la définition X, doivent être mises après la proposition XXII.

PROPOSITION *A*.

Si deux angles solides sont compris chacun par trois angles plans, et si les angles plans du premier sont égaux aux angles plans du second, chacun à chacun, les plans des angles égaux seront également inclinés les uns sur les autres dans les deux solides.

Soient les deux angles solides A et A' (fig. 243); que l'angle solide A soit compris par les trois angles plans BAC, CAD, DAB; que l'angle solide A' soit compris par les trois angles plans B'A'C', C'A'D', D'A'B'; que l'angle BAC soit, égal à l'angle B'A'C', l'angle CAD égal à l'angle C'AD' et l'angle DAB égal à l'angle D'A'B' : je dis que les plans des angles égaux sont également

inclinés les uns sur les autres dans les deux angles solides.



D'un point quelconque B de la droite AB menez dans le plan BAD la droite BD perpendiculaire sur la droite AB; du même point B menez dans le plan BAC la droite EC perpendiculaire sur la droite AB; joignez les points C, D faites la droite A'B' égale à la droite AB, et du point B' menez dans le plan A'B'D' la droite B'D' perpendiculaire sur la droite A'B', et dans le plan B'A'C' la droite BC' perpendiculaire sur la droite A'B'; joignez les points C', D'. La droite Ail étant égale à la droite A'B', l'angle BAD égal à l'angle B'A'D', et l'angle ABD étant droit ainsi que l'angle A'B'D', les triangles ABD, A'B'D' seront égaux donc la droite BD est égale à la droite B'D' et la droite AD égale à la droite A'D'. La droite BC est égale à la droite B'C' et la droite AC égale à la droite A'C', par la même raison. Mais l'angle CAD est égal à l'angle C'A'D', la droite AC égale à la droite A'C' et la droite AD égale à la droite A'D' donc le triangle CAD est égal au triangle C'A'D': donc les deux triangles BCD, B'C'D' ont leurs côtés égaux chacun à chacun : donc ces deux triangles ont aussi leurs angles égaux chacun à chacun donc l'angle CBD est égal â l'angle C'B'D' : donc l'inclinaison du plan CBA sur le plan DBA est égale à l'inclinaison du plan C'B'A' sur le plan D'B'A'. On démontrera de la même manière que les plans des autres angles égaux sont également inclinés les uns sur les autres dans ces deux angles solides.

Donc si deux angles solides sont compris chacun par trois angles plans, et si les angles plans du premier sont égaux aux angles plans du second, chacun à chacun, les plans des angles égaux seront également inclinés les uns sur les autres dans les deux solides; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION *B.*

Si deux angles solides sont compris chacun par trois angles plans, et si les angles plans du premier sont égaux aux angles plans du second, chacun à chacun, angles solides seront égaux entre eux.

Soient les angles solides A, A'; que les angles plans BAC, CAD, DAB de l'angle solide A soient égaux aux angles plans B'A'C', C'A'D', D'A'B' de l'angle solide A, chacun à chacun : je dis que l'angle solide A sera égal à l'angle solide A'.

Appliquons exactement l'angle BAD sur son égal B'A'D', il peut arriver que les autres angles plans qui sont égaux dans les deux angles solides A, A' soient placés des mêmes côtés ou ne soient pas placés des mêmes côtés. Supposons d'abord que l'angle BAD étant appliqué exactement sur son égal B'A'D', les autres angles plans qui sont égaux dans les deux angles solides A, A' soient placés des mêmes côtés. Puisque l'inclinaison du plan de l'angle BAC sur le plan de l'angle BAD est égale à l'inclinaison du plan de l'angle B'A'C' sur le plan de l'angle B'A'D' (pr. 4), le plan de l'angle BAC s'appliquera exactement sur le plan de l'angle B'A'C'; mais l'angle BAC est égal à l'angle B'A'C' donc la droite AC s'applique exactement sur la droite A'C'; mais la droite AD est appliquée sur la droite A'D' et la droite AC sur la droite A'C' donc l'angle plan DAC s'applique exactement sur l'angle plan D'A'C' donc les trois angles plans de l'angle solide A s'appliquent exactement sur les trois angles plans de l'angle solide A' donc les angles solides A et A' sont égaux.

Supposons en second lieu que les angles plans BAD, *dab*, qui sont égaux entre eux, soient appliqués exactement l'un sur l'autre, la droite AB sur la droite *ad* et la droite AD sur la droite *ab*, et que les autres angles plans qui sont égaux entre eux ne soient pas placés des mêmes côtés; il est évident, dans cette supposition, que le plan BAC ne s'appliquera point sur le plan *dac*, parce que l'inclinaison du plan BAC sur le plan BAD n'est pas égale à l'inclinaison du plan *dac* sur le plan *dab.* Le plan DAC ne s'appliquera point sur le plan *bac,* par la même raison : donc les angles plans BAD, *dab* étant appliqués exactement l'un sur l'autre, la droite AB sur la droite *ad* et la droite An sur la droite *ab,* les autres angles plans qui sont égaux dans ces deux angles solides ne s'appliqueront pas les nus sur les autres.

Si l'on plaçait l'angle plan BAD sur l'angle plan *bad,* de manière que le point A tombât sur le point *a*, que la droite AB s'appliquât sur la droite *ab,* il est évident que la droite AD s'appliquerait sur la droite *ad* ; mais alors le plan de l'angle BAC aurait la position *bac',* et le plan de l'angle CAD aurait la position C'*ad,* de sorte que l'angle solide A serait placé au-dessous du plan *abd.* D'où je conclus que le principe de superposition ne peut pas être employé pour démontrer l'égalité de deux angles solides qui sont compris chacun par trois angles plans et dont les angles plans du premier sont égaux aux angles plans du second, chacun à chacun, lorsqu'ayant appliqué l'un sur l'autre deux angles plans qui sont égaux, les autres angles égaux de ces angles solides ne sont pas placés des mêmes côtés:[3] donc, dans ce cas, l'on doit se contenter de dire que deux angles solides qui sont compris chacun par trois angles plans et dont les angles plans du premier sont égaux aux angles plans du second sont égaux entre eux, parce que leurs parties constituantes, leurs angles plans et leurs inclinaisons sont égaies de part et d'autre.

Donc si deux angles solides sont compris chacun par trois angles plans, et si les angles plans du premier sont égaux aux angles plans du second, chacun à chacun, ces angles solides sont égaux entre eux; ce qu'il fallait démontrer.

PROPOSITION *C*.

Les solides qui sont contenus dans le même nombre de faces égales et semblables entre elles et dont les angles solides ne sont pas compris par plus de trois angles plans sont égaux et semblables entre eux.

Soient les solides ABCDEF, A'B'C'D'E'F' (fig. 244) dont les angles solides ne sont pas compris par plus de trois angles plans et que ces solides soient contenus sous le même nombre de faces égales et semblables, c'est-à-dire que les faces ABC, DEF, BD, BE, EC soient semblables et égales aux faces A'B'C', D'E'F', B'D', B'E', E'C' je dis que ces solides sont égaux et semblables.



Si l'on pose une face quelconque ABC du premier solide sur la face homologue A'B'C' du second, de manière que les côtés de ces faces, qui sont des côtés homologues des faces égales et semblables BD, BE, EC, B'D', B'E', E'C' soient appliqués exactement les uns sur les autres, ces deux solides seront placés du même côté sur le plan A'B'C', où

ils seront placés l’un au-dessus et l’autre au-dessous du plan A’B’C’.[4]

Supposons d’abord que les deux solides ABCDEF, A’B’C’D’E’F’ soient placés du même côté sur le plan A’B’C’. Puisque l’inclinaison du plan AF sur le plan ABC est égale l’inclinaison du plan A’.F’ sur le plan A’]3’C’ (pr.A), la face AF s’appliquera exactement sur la face A’F’ qui lui est semblable et égale. Les autres faces du solide ABCDEF s’appliqueront exactement sur les autres faces des solides A’B’C’D’E’F’, par la même raison: donc ces deux solides seront égaux. Mais les faces homologues sont également inclinées les unes sur les autres dans ces deux solides (pr. *A*): donc les deux solides ABCDEF, A’B’C’D’E’F’, qui sont contenus dans le même nombre de faces égales et semblables, sont égaux et semblables entre eux

Supposons en second lieu que les solides ABCDEF, *abcdef* soient placés l’un au-dessus et l’autre au-dessous du plan *abc* ; il est évident que dans ce cas le principe de superposition ne peut pas être employé pour démontrer l’égalité de deux solides qui sont contenus dans le même nombre de faces égales et semblables entre elles, et dont les angles solides ne sont pas compris par plus de trois angles plans: donc l’on doit se contenter de dire que ces deux solides sont égaux et semblables, parce que leurs parties constituantes, savoir, leurs faces, les inclinaisons de ces faces (pr. *A*), leurs angles solides (pr. *B*), sont parfaitement égales de part et d’autre.

Donc les solides qui sont contenus dans le même nombre de faces égales et semblables entre elles, et dont les angles solides ne sont pas compris par plus de trois angles plans, sont égaux et semblables entre eux; ce qu’il fallait démontrer.

LIVRE XI. — PROPOSITION XXVIII.

Selon Robert Simson et Clavius, Euclide aurait dû démontrer que les diagonales CF, DE

sont parallèles; ce que Robert Simson démontre de la manière suivante:

« Soit le parallélépipède AB (fig. 188) et que les diagonales DE, CF joignent les extrémités des mêmes arêtes; puisque chacune des *arêtes* CD, FE est parallèle à l'arête GA qui n'est pas dans le même plan, les arêtes CD, FE seront parallèles: donc les diagonales CF, DE sont dans le même plan que les arêtes CD, FE, et sont parallèles entre elles: je dis, &c. »

LIVRE XI. — PROPOSITION XXIX.

Cette proposition a trois cas, et Euclide n'en démontre qu'un seul. En effet, il peut arriver que la droite MH tombe sur la droite GE ou bien entre la droite GE et la droite FD. Pour démontrer ces deux derniers cas, on fera des raisonnements analogues à ceux qu'on a faits pour démontrer les deux derniers cas de la proposition XXXV du I^{er} Livre. *Voyez* la note sur cette proposition.

LIVRE XII. — PROPOSITION XVII.

Cette démonstration est incomplète selon Robert Simson et selon moi. Après avoir démontré que le quadrilatère BKSP ne touchera point la surface de la plus petite sphère, Euclide conclue que les faces du polyèdre inscrit ne toucheront point la surface de la plus petite sphère. J'ai complété cette démonstration d'Euclide.

FIN.

DE L'IMPRIMERIE DE CRAPELET.

[1] Une pyramide triangulaire est celle dont la base est un triangle.

[2] Etonné que les Géomètres aient cru pendant treize siècles que la définition X était vraie, Robert Simson s'écrie: Mais que devons-nous dire si cette proposition n'est pas vraie? Ne devons-nous pas avouer que les Géomètres ont été dans l'erreur pendant treize siècles au sujet de cette proposition élémentaire? Que cela nous apprenne à être modestes et à reconnaître combien il nous est difficile d'être toujours sur nos gardes, et combien notre esprit est faible, puisque nous ne pouvons pas même nous garantir de l'erreur dans les principes des sciences qui passent avec raison pour les plus certaines.

[3] Les angles solides égaux dont les angles plans ne peuvent point être superposés les uns sur les autres, s'appellent solides symétriques.

[4] Lorsque les solides sont placés l'un au-dessus et l'autre au-dessous du plan A' B' C', ils s'appellent solides symétriques.