

Notes du mont Royal

www.notesdumontroyal.com

Cette œuvre est hébergée sur « *Notes du mont Royal* » dans le cadre d'un exposé gratuit sur la littérature.

SOURCE DES IMAGES
Google Livres

EUCLIDIS^E
ELEMENTA
GRAECE ET LATINE.

COMMENTARIIS INSTRUCTA
EDIDERUNT
IOANNES GUILIELMUS CAMERER
ET
CAROLUS FRIDERICUS HAUBER.

BEROLINI
SUMTIBUS G. REIMERI
MDCCCXXV.

EUCLIDIS

THE ELEMENTORUM

LIBRI SEX PRIORES

GRAECE ET LATINE

COMMENTARIO E SCRIPTIS VETERUM AC RECEN-
TIORUM MATHEMATICORUM ET PFLEIDERERI
MAXIME ILLUSTRATI.

EDIDIT

IOANNES GUILIELMUS CAMERER

GYMNASII STUTTGARDIANI RECTOR.

TOM. II. COMPLECTENS LIBR. IV—VI.

CUM VI. TABULIS.

BEROLINI
SUMTIBUS G. REIMERI
MDCCCXXV.

QA

31

,E88

S72

C2

Met. of sec
Bergdahl
3-9-29
18679

E U C L I D I S
E L E M E N T O R U M
L I B R I S E X P R I O R E S .

Ε Τ Κ Α Ε Ι Δ Ο Τ
Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ω Ν
Β Ι Β Λ Ι Ο Ν Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Ν .

Ο Ρ Ο Ι .

α. Σχήμα εὐθύγραμμον εἰς σχῆμα εὐθύγραμμον ἐγγράφεσθαι λέγεται, ὅταν ἐκάστη τῶν τοῦ ἐγγραφομένου σχήματος γωνιῶν ἐκάστης, πλευρᾶς τοῦ εἰς ὃ ἐγγράφεται ᾗπτηται.

β. Σχήμα δὲ ὁμοίως περὶ σχῆμα περιγράφεσθαι λέγεται, ὅταν ἐκάστη πλευρὰ τοῦ περιγραφομένου ἐκάστης γωνίας τοῦ περὶ ὃ περιγράφεται ᾗπτηται.

γ. Σχήμα δὲ εὐθύγραμμον εἰς κύκλον ἐγγράφεσθαι λέγεται, ὅταν ἐκάστη γωνία τοῦ ἐγγραφομένου ᾗπτηται τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας.

δ. Σχήμα δὲ εὐθύγραμμον περὶ κύκλον περιγράφεσθαι λέγεται, ὅταν ἐκάστη πλευρὰ τοῦ περιγραφομένου ἐφάπτηται τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας ¹⁾.

ε. Κύκλος δὲ εἰς σχῆμα ὁμοίως λέγεται ἐγγράφεσθαι, ὅταν ἡ τοῦ κύκλου περιφέρεια ἐκάστης πλευρᾶς τοῦ εἰς ὃ ἐγγράφεται ᾗπτηται ²⁾.

1) Ita rectius omnino cum Cod. a. legit Peytardus. Prior editiones habebant: ὅταν ἐκάστη πλευρὰ τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας τοῦ περιγραφομένου ἐφάπτηται.

2) Si vera sunt, quae e Rob. Simson. ad III. Def. 2. notavimus, hic legendum fuerit ἐφάπτηται.

E U C L I D I S E L E M E N T O R U M

LIBER QUARTUS.

DEFINITIONES.

1. **F**igura rectilinea in figura rectilinea inscribi dicitur, quando unusquisque inscriptae figurae angulus tangit unumquodque latus eius, in qua inscribitur.

2. Figura autem similiter circa figuram circumscribi dicitur, quando unumquodque latus circumscriptae tangit unumquemque angulum eius, circa quam circumscribitur.

3. Figura vero rectilinea in circulo inscribi dicitur, quando unusquisque angulus circumscriptae tangit circuli circumferentiam.

4. Figura autem rectilinea circa circulum circumscribi dicitur, quando unumquodque latus circumscriptae contingit circuli circumferentiam.

5. Circulus vero in figura similiter dicitur inscribi, quando circuli circumferentia unumquodque latus eius, in qua inscribitur contingit.

DEFIN.

Obs. Campanus habet tantum duas primas huius libri definitiones. At illae ipsae nusquam adhibentur. Hinc du-

ζ'. Κύκλος δὲ περὶ σχῆμα περιγράφεσθαι λέγεται, ὅταν ἡ τοῦ κύκλου περιμέτρησις ἐκάστης γωνίας τοῦ περὶ ὃ περιγράφεται ἀπληγῇται.

ζ'. Εὐθεία εἰς κύκλον ἐναρμόζεσθαι λέγεται, ὅταν τὰ πέρατα αὐτῆς ἐπὶ τῆς περιφερείας ἢ τοῦ κύκλου.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ α'.

Εἰς τὸν δοθέντα κύκλον τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ, μὴ μείζονι οὐσῇ τῆς τοῦ κύκλου διαμέτρου, ἴσην εὐθεῖαν ἐναρμόσαι.

Ἐστω ὁ δοθείς κύκλος ὁ $ABΓ$, ἡ δὲ δοθείσα εὐθεία μὴ μείζων τῆς τοῦ κύκλου διαμέτρου ἢ $Δ$ · δεῖ δὴ εἰς τὸν $ABΓ$ κύκλον τῇ $Δ$ εὐθείᾳ ἴσην εὐθεῖαν ἐναρμόσαι.

Ἦχθω τοῦ $ABΓ$ κύκλου διάμετρος ἡ $ΒΓ$. Εἰ μὲν οὖν ἴση ἴσθιν ἡ $ΒΓ$ τῇ $Δ$, γεγονὸς ἂν εἴη τὸ ἐπιταχθῆν· ἐνῆρμους γὰρ εἰς τὸν $ABΓ$ κύκλον τῇ

bium videri possit, annon serius adiectae fuerint ad analogiam sequentium,

PROPOSITIO I.

Obs. Quum punctum F in circumferentiā pro lubita siml queat, patet, innumeris modis problema solvi posse, nisi nova adhuc determinatio accedat. Eiusmodi determinatio ea esse potest, si punctum F datum esse sumere velis. Verum, etiam hoc sumto, duplex tamen, quod et Commandinus monuit, solutio locum habebit: aequae enim ducta recta FZ ad punctum Z , in quo circuli iterum sibi occurrunt, problemati satisfaciet, ac recta FA . Alia determinatio haec esse poterit, ut recta circulo inscribenda vel ipsa, vel producta, per datum punctum transeat, quod non sit in circuli circumferentiā; vel ut illa parallela sit rectae positione datae. Et,

6. Circulus autem circa figuram circumscribi dicitur, quando circuli circumferentia unumquemque angulum ipsius, circa quam circumscribitur, tangit.

7. Recta in circulo aptari dicitur, quando termini eius in circumferentia sunt circuli.

PROPOSITIO I. (Fig. 283.)

In dato circulo datae rectae, quae non maior sit diametro circuli, aequalem rectam aptare.

Sit datus circulus $AB\Gamma$, data autem recta Δ non maior circuli diametro, oportet igitur in circulo $AB\Gamma$ rectae Δ aequalem rectam aptare.

Ducatur circuli $AB\Gamma$ diameter $B\Gamma$. Si quidem igitur $B\Gamma$ aequalis est Δ , factum erit propositum. Aptata est enim in circulo $AB\Gamma$, $B\Gamma$ rectae Δ aequalis quidem illud postuletur, ut recta circulo dato inscribenda per datum punctum transeat, problema unum ex iis est, quae Pappo testante in Praefat. ad libr. VII. Collect. Math. Apollonius in libris *περί νεύσεων* tractavit. (Cf. Apollonii Pergaei *Inclinat. Libri duo* ed. Horsley Oxon. 1770. et: *Die Bücher des Apollonius von Perga de Inclinationibus* von Diesterweg Berlin. 1823.). Et particulare illud problema facile solvetur sequentem in modum.

Anal. Puta factum, et Fig. 284. recta AB , quae aequalis sit rectae datae Δ diametro non maiori, inscripta sit circulo dato ABZ , eaque ipsa aut producta per datum punctum Γ transeat, quod non sit in circuli dati circumferentia. Et 1) quidem, si recta data sit aequalis diametro circuli, recta circulo inscribenda erit diameter per datum punctum ducta. Si autem non fuerit diameter, erit ex hyp. minor diametro,

Δ εὐθεία ἴση ἢ $B\Gamma$. Εἰ δὲ οὐ μείζων ἐστὶν ἢ $B\Gamma$ τῆς Δ , καὶ κείσθω ¹⁾ τῇ Δ ἴση ἢ ΓE , καὶ κέντρον μὲν τῷ Γ , διαστήματι δὲ τῷ ΓE κύκλος γεγράφθω ὁ AEZ , καὶ ἐπεξεύχθω ἡ ΓA .

Ἐπεὶ οὖν τὸ Γ σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ AEZ κύκλου, ἴση ἐστὶν ἢ ΓA τῇ ΓE . Ἀλλὰ τῇ Δ ἢ ΓE ἐστὶν ἴση· καὶ ἡ Δ ἄρα τῇ ΓA ἐστὶν ἴση.

Εἰς ἄρα τὸν δοθέντα κύκλον τὸν $AB\Gamma$, τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ ²⁾, μὴ μείζονι οὕσῃ τῆς τοῦ κύκλου διαμέτρου, ἴση ἐνῆρμυσται ἡ ΓA . Ὅπερ ἔδει ποιῆσαι.

Π Ρ Ο Τ Α Σ Ι Σ β.

Εἰς τὸν δοθέντα κύκλον τῷ δοθέντι τριγώνῳ ἰσογώνιον τριγωνοῦν ἐγγράψαι.

Ἐστω ὁ δοθείς κύκλος ὁ $AB\Gamma$, τὸ δὲ δοθὲν τριγωνοῦν τὸ $\Delta E Z$: δεῖ δὴ εἰς τὸν $AB\Gamma$ κύκλον τῇ $\Delta E Z$ τριγώνῳ ἰσογώνιον τριγωνοῦν ἐγγράψαι.

1) Peyrardus cum Cod. a legit: εἰ δὲ μείζων ἐστὶν ἢ $B\Gamma$ τῆς Δ , κείσθω. Nos restituumus lectionem ed. Oxon.

2) Peyrardus cum Cod. a. omittit verba μὴ μείζονι οὕσῃ τῆς τοῦ κύκλου διαμέτρου et eorum loco ponit τῇ Δ : nos ista verba, quae necessariam omnino determinationem continent, restituumus.

adeoque extra centrum E transibit (III. 15.). Demissa igitur in eam o centro perpendicularis $E\theta$ eam bisecabit (III. 3.), adeoque, ob datam AB , data erit dimidia $A\theta$, adeoque data erit, vel inveniri poterit in triangulo ad θ rectangulo $A\theta E$, in quo etiam EA datur, recta $E\theta$ (I. 47. Cor. 20.) vel distantia, qua recta AB a centro E abest, vel, ut aliter dicamus, notum erit, in qua distantia a centro E situm esse debeat punctum θ , nempe in circulo centro E , radio $E\theta$ descripto. (Quod ipsum brevius e III. 15. Cor. derivari poterat.). Qui circulus si describatur, continget eum recta AB

qualis. Sin minus, maior est BF ipsa Δ , et ponatur ipsi Δ aequalis FE (I. 3.), et centro F , intervallo vero FE , circulus describatur AEZ (Post. 3.), et iungatur FA .

Quoniam igitur punctum F centrum est circuli AEZ , aequalis est FA ipsi FE . Sed FE ipsi Δ est aequalis; et Δ igitur ipsi FA est aequalis.

In dato igitur circulo ABF , datae rectae, quae non maior est diametro circuli, aequalis aptata est FA . Quod oportebat facere.

PROPOSITIO II. (Fig. 285.)

In dato circulo inscribere triangulum aequiangulum dato triangulo.

Sit datus circulus ABF , datum vero triangulum AEZ ; oportet in circulo ABF triangulo AEZ aequiangulum triangulum inscribere.

in θ (III. 16.), adeoque tota extra eum posita erit. Unde, ut recta AB transire possit per punctum datum F , necesse est, ut punctum F non sit intra circulum centro E , radio EO , descriptum. Quodsi non fuerit, problema reductum est ad hoc: e puncto dato F , quod non sit intra circulum datum, ducere ad hunc circulum rectam, quae eum contingat, i. e. ad III. 17.

Compositio problematis itaque huc redit. Si recta data Δ aequalis sit diametro circuli dati, ducatur per punctum datum F diameter circuli. (Punctum nempe F a centro E diversum esse sumitur, quodsi non foret, quaevis diameter problemati satisfaceret.). Sin autem recta data minor sit diametro circuli dati, sumatur in circumferentia circuli punctum quodcunque H , et ex IV. 1. circulo inscribatur recta $HK = \Delta$, et, demisso in HK perpendicularo EI , centro E , radio EI , describatur circulus. Quodsi iam punctum datum F sit intra hunc circu-

Ἦχθω τοῦ $ABΓ$ κύκλου ἐφαπτομένη ἡ $HΘ$ κατὰ τὸ A , καὶ συνενάτω πρὸς μὲν τῇ $ΑΘ$ εὐθείᾳ καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ σημείῳ τῷ A τῇ ὑπὸ $ΔΕΖ$ γωνία ἴση ἢ ὑπὸ $ΘΑΓ$ πρὸς δὲ τῇ HA εὐθείᾳ καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ σημείῳ τῷ A τῇ ὑπὸ $ΖΔΕ$ γωνία ἴση ἢ ὑπὸ HAB , καὶ ἐπεξεύχθω ἡ $BΓ$.

Ἐπεὶ οὖν κύκλου τοῦ $ABΓ$ ἐφάπτεται τις εὐθεῖα ἡ $ΘA$, καὶ ἀπὸ τῆς κατὰ τὸ A ἐπαφῆς εἰς τὸν κύκλον διῆκται εὐθεῖα ἡ $ΑΓ$ ἡ ἄρα ὑπὸ $ΘΑΓ$ ἴση ἐστὶ τῇ ἐν τῷ ἐνυλλὰς τοῦ κύκλου τμήματι γωνίᾳ, τῇ ὑπὸ $ABΓ$. Ἀλλ' ἡ ὑπὸ $ΘΑΓ$ τῇ ὑπὸ $ΔΕΖ$ ἴσιν ἴση καὶ ἡ ὑπὸ $ABΓ$ ἄρα γωνία τῇ ὑπὸ $ΔΕΖ$ ἐστὶν ἴση. Διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ ὑπὸ $ΑΓB$ τῇ ὑπὸ $ΖΔΕ$ ἐστὶν ἴση, καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ $BΑΓ$ λοιπῇ τῇ ὑπὸ $EΖΔ$ ἐστὶν ἴση· ἰσογώνιον ἄρα ἐστὶ τὸ $ABΓ$ τρίγωνον τῷ $ΔΕΖ$ τριγώνῳ, καὶ ἐγγέγραπται εἰς τὸν $ABΓ$ κύκλον.

lum, problema solvi nequit. Si autem HK transeat per punctum F , factum erit, quod petebatur. Sin minus ex puncto F ducatur recta $ΑΓB$ circumulum interiorem contingens (III. 17. vel III. 16. Cor.) eritque illa $=HK$ (Obs. 4. ad III. 18.) $=A$. Et patet ex III. 17. duas semper solutiones locum habere, excepto eo casu, quo punctum F est in circumferentia circuli interioris, qui non nisi unam solutionem admittit. Notari meretur, ad facillimum hoc et simplicissimum problema facile reduci posse alia magis composita v. c. problema, circulo dato inscribendi triangulum, cuius duo latera parallela sint duabus rectis positione datis, et cuius tertium latus transeat per datum punctum, vel generalius problema circulo dato inscribendi Polygonum quodcunque, quod impari laterum numerum habeat, ita, ut eius latera omnia, uno excepto, sint parallela rectis positione datis, reliquum autem latus transeat per punctum datum, vel etiam, ut omni polygona

Ducatur recta $H\Theta$ contingens circulum $AB\Gamma$ in A (III. 17.), et consituatur ad rectam $A\Theta$ et ad punctum in ea angulo ΔEZ aequalis $\Theta A\Gamma$ (I. 23.); rursus, ad rectam HA et ad punctum in ea A angulo ZAE aequalis HAB , et iungatur BF .

Quoniam igitur circulum $AB\Gamma$ contingit aliqua recta ΘA , a contactu autem ad A in circulo ducta est recta $A\Gamma$, angulus $\Theta A\Gamma$ aequalis est angulo $AB\Gamma$ in alterno circuli segmento (III. 32.). Sed angulus $\Theta A\Gamma$ ipsi ΔEZ est aequalis; angulus igitur $AB\Gamma$ ipsi ΔEZ est aequalis. Ex eadem ratione et angulus $A\Gamma B$ ipsi ZAE est aequalis, et reliquus igitur $B A\Gamma$ reliquo EZA est aequalis (I. 32.). Triangulum igitur $AB\Gamma$ aequiangulum est triangulo ΔEZ , et inscriptum est in circulo $AB\Gamma$.

latera transeant per puncta data, aliaque huius generis plura, quod primum ostendit Annibale Giordano di Ottaviano (Memorie di Fisica e di Math. della Societa Italiana T. IV.), et post eum eodem loco Malfatti. Cf. l'Huilier *Elémens d'Analyse Géométrique et d'Analyse Algébrique* §. 146. sqq. Klügel. *Wörterb.* T. III. p. 155. Meier. Hirsch. *Samml. geom. Aufg.* I. Th. §. 150. sqq. Carnot. *Géom. de Position*. Transcimus iam ad aliud, de quo ante diximus, problema. Inscribenda nempe sit circulo dato recta AB aequalis rectae datae Δ , quae non maior esse ponitur, quam circuli diameter, ita, ut recta AB simul parallela sit rectae positione datae. Praetermisso eo casu, quo recta data Δ aequalis est diametro, ostendetur, ut in problemate praecedente, rectam AB esse contingentem circuli ex eodem centro cum circulo dato descripti: cuius radii quadratum aequale sit differentiae quadrati radii circuli dati, et quadrati dimidia rectae Δ . Quum itaque

Εἰς τὸν δοθέντα ἄρα κύκλον τῷ δοθέντι τριγώνῳ ἰσογώνιον τρίγωνον ἐγγέγραπται. Ὅπερ ἔδει ποιῆσαι.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ γ'.

Περὶ τὸν δοθέντα κύκλον τῷ δοθέντι τριγώνῳ ἰσογώνιον τρίγωνον περιγράψαι.

Ἐστω ὁ δοθεὶς κύκλος ὁ $ABΓ$, τὸ δὲ δοθέν τριγώνον τὸ $ΔΕΖ$ · δεῖ δὴ περὶ τὸν $ABΓ$ κύκλον τῷ $ΔΕΖ$ τριγώνῳ ἰσογώνιον τρίγωνον περιγράψαι.

Ἐκβεβλήσθω ἡ EZ ἐφ' ἑκάτερα τὰ μέρη κατὰ τὰ $H, Θ$ σημεία, καὶ εἰλήφθω τοῦ $ABΓ$ κύκλου κέντρον τὸ K , καὶ διήχθω ὡς ἐτύχεν εὐθεῖα ἡ KB , καὶ συνεστήτω πρὸς τῇ KB εὐθείᾳ καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ σημείῳ τῷ K τῇ μὲν ὑπὸ $ΔΕΗ$ γωνίᾳ ἰσὴ ἡ ὑπὸ BKA , τῇ δὲ ὑπὸ $ΔΖΘ$ ἰσὴ ἡ ὑπὸ $BKΓ$, καὶ διὰ τῶν $A, B, Γ$ σημείων ῥηθῶσαν ἐξαπτόμεναι τοῦ $ABΓ$ κύκλου αἱ $ΛΑΜ, ΜΒΝ, ΝΓΑ$.

Καὶ ἐπεὶ ἐφάπτονται τοῦ $ABΓ$ κύκλου αἱ $ΛΜ, ΜΝ, ΝΑ$ κατὰ τὰ $A, B, Γ$, ἀπὸ δὲ τοῦ K κέντρου ἐπὶ τὰ $A, B, Γ$ ¹⁾ σημεία ἐπιζευγνύμεναι εἰσὶν αἱ $ΚΑ, ΚΒ, ΚΓ$ ὁρθαὶ ἄρα εἰσὶν αἱ πρὸς τοῖς $A,$

1) Verba: ἀπὸ δὲ τοῦ K κέντρου ἐπὶ τὰ $A, B, Γ$, quae cum Cod. a. omittit Peyrardus, ex antiq. ed. restituiimus, quod magis determinate exprimunt, rectas ex centro ductas esse.

hic circulus eodem ac ante modo describi possit, problema redit ad id, de quo Obs. 5. ad III. 17. diximus. Aliam et faciliorem huius problematis solutionem tradunt Commandinus et ex eo Clavius. Nempe ducta diametro rectae positione datae parallela, abscindantur in ea e centro ex utraque parte segmenta aequalia dimidia rectae A , atque ex horum extremitatibus erigantur ad diametrum perpendiculara, quae inter se comprehendunt segmenta circuli, quorum singulae chordae

In dato igitur circulo triangulum dato triangulo aequiangulum descriptum est. Quod oportebat facere.

PROPOSITIO III. (Fig. 286.)

Circa datum circulum dato triangulo aequiangulum triangulum circumscribere.

Sit datus circulus $AB\Gamma$, datum autem triangulum ΔEZ ; oportet circa $AB\Gamma$ circulum triangulo ΔEZ aequiangulum triangulum circumscribere.

Producatur EZ ex utraque parte ad H , Θ puncta, et sumatur centrum K circuli $AB\Gamma$ (III. 1.), et ducatur utcumque recta KB , et constituatur ad KB rectam et ad punctum in ea K angulo ΔEH aequalis BKA , angulo vero $\Delta Z\Theta$ aequalis $BK\Gamma$ (I. 23.) et per puncta A , B , Γ ducantur rectae AM , MBN , NGA circulum $AB\Gamma$ contingentes.

Et quoniam contingunt circulum $AB\Gamma$ rectae AM , MN , NA in punctis A , B , Γ , ex centro K autem ad puncta A , B , Γ ductae sunt KA , KB , $K\Gamma$; recti sunt anguli ad puncta A , B , Γ (III. 18.). Et

propositum efficient. Caeterum (ope III. 20.) ad hoc problema facile reducitur illud: circulo dato inscribere triangulum, cuius singula latera parallela sint rectis positione datis, quae omnes se intersecant.

PROPOSITIO II.

Obs. In hoc quoque problemate punctum A in circumferentia pro lubitu sumi, aut datum esse, aut nova aliqua alia conditio accedere potest. Praeterea, etiam si punctum A datum sit, triangulum circulo inscribendum sex diversis modis in circulo poni poterit. Nempe angulus $\Theta A\Gamma$ cuilibet angulorum E , Δ , Z aequalis fieri potest, quo ipso iam tres

B, Γ σημείοις γωνίαι. Καὶ ἐπεὶ τοῦ AMBK τετραπλεύρου αἱ τέσσαρες γωνίαι τέττασιν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶν, ἐπειδήπερ καὶ εἰς δύο τρίγωνα διαιρεῖται τὸ AMBK, καὶ εἰσιν ὀρθαὶ αἱ ὑπὸ MAK, KBM γωνίαι λοιπαὶ ἄρα αἱ ὑπὸ AKB, AMB δυοῖν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶν. Εἰσὶ δὲ καὶ αἱ ὑπὸ ΔΕΗ, ΔΕΖ δυοῖν ὀρθαῖς ἴσαι αἱ ἄρα ὑπὸ AKB, AMB ταῖς ὑπὸ ΔΕΗ, ΔΕΖ ἴσαι εἰσὶν, ὧν ἡ ὑπὸ AKB τῇ ὑπὸ ΔΕΗ ἐστὶν ἴση λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ AMB λοιπῇ τῇ ὑπὸ ΔΕΖ ἐστὶν ἴση. Ὅμοίως δὴ δειχθήσεται ὅτι καὶ ἡ ὑπὸ ANM τῇ ὑπὸ ΔZE ἐστὶν ἴση καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ MAN λοιπὴ τῇ ὑπὸ EAZ ἐστὶν ἴση. Ἰσογώνιον ἄρα ἐστὶ τὸ AMN τρίγωνον τῷ ΔΕΖ τριγώνῳ, καὶ περιγέγραπται περὶ τὸν ABΓ κύκλον.

Περὶ τὸν δοθέντα ἄρα κύκλον τῷ δοθέντι τριγώνῳ ἰσογώνιον τρίγωνον περιγέγραπται. Ὅπερ εἶδει ποιῆσαι.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ δ.

Εἰς τὸ δοθὲν τρίγωνον κύκλον ἔγγραψαι.

Ἐστω τὸ δοθὲν τρίγωνον τὸ ABΓ· δεῖ δὴ εἰς τὸ ABΓ τρίγωνον κύκλον ἔγγραψαι.

modi trianguli constituendi efficiuntur. Deinde, cuicumque angulorum *B, Δ, Z* angulum *ΘΑΓ* aequalem facias, duo reliqui adhuc anguli locum inter se mutare possunt, quo itaque sex omnino modi prodeunt. Magnitudo tamen laterum trianguli semper eadem est, quamvis variari possit eorum positio. Facile etiam patet, reduci hoc problema posse (ut a Borellio factum est) ad Prop. III. 34. adeoque etiam ad alteram, quae ibi allata est, solutionem, vel eam quoque, quam tum habuimus, conditionem admittere.

Cor. Nominatim itaque circulo dato triangulum aequi-

quoniam quadrilateri $AMBK$ quatuor anguli quatuor rectis aequales sunt (I. 32.), quippe in duo triacula dividitur $AMBK$, et sunt recti anguli MAK , KBM ; reliqui igitur AKB , AMB duobus rectis aequales sunt; sunt autem et ΔEH , ΔEZ duobus rectis aequales (I. 13.); anguli igitur AKB , AMB angulis ΔEH , ΔEZ aequales sunt, quorum AKB ipsi ΔEH est aequalis; reliquus igitur AMB reliquo ΔEZ est aequalis. Similiter ostendetur et angulum ANM ipsi ΔZE esse aequalem; et reliquus igitur MAN reliquo ΔEZ est aequalis. Triangulum igitur AMN aequiangulum est triangulo ΔEZ , et circumscribitur circum ABT circulum.

Circa datum igitur circulum dato triangulo aequiangulum triangulum circumscriptum est. Quod oportebat facere.

PROPOSITIO IV. (Fig. 287.)

In dato triangulo circulum inscribere.

Sit datum triangulum ATB ; oportet in triangulo ABT circulum inscribere.

angulum, adeoque (I. 6.) aequilaterum inscribetur ope I. 1. quod ipsum fieri posse in IV. 16. sumitur.

PROPOSITIO III.

Oba, Similes hic observationes locum habent acin praecedente. Nempe punctum B pro lubitu, *vis erige*, in circumferentia sumi aut etiam datum esse, aut quacunque alia ratione determinari potest. Deinde etiam determinato puncto B sex variis modis trianguli AMN situs variari potest, quamvis magnitudo laterum non varietur. Praeterea iure quidem

Τετμήσθωσαν αἱ ὑπὸ $AB\Gamma$, $ΑΓΒ$ γωνίαι διχα ταῖς $ΒΔ$, $ΓΔ$ εὐθείαις, καὶ συμβαλλέτωσαν ἀλλήλαις κατὰ τὸ $Δ$ σημεῖον, καὶ ῥηθῶσαν ἀπὸ τοῦ $Δ$ ἐπὶ τὰς AB , $ΒΓ$, $ΓΑ$ εὐθείας κάθετοι αἱ $ΔΕ$, $ΔΖ$, $ΔΗ$.

Καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ $ΑΒΔ$ γωνία τῇ ὑπὸ $ΑΒΓ$, ἰσὶ δὲ καὶ ὀρθῇ ἡ ὑπὸ $ΒΕΔ$ ὀρθῇ τῇ ὑπὸ $ΒΖΔ$ ἴση, δύο δὴ τρίγωνά ἐστι τὰ $ΕΒΔ$, $ΖΒΔ$, τὰς δύο γωνίας ταῖς δυαὶ γωνίαις ἴσας ἔχοντα, καὶ μίαν πλευρὰν μιᾷ πλευρᾷ ἴσην, τὴν ὑποτείνουσαν ἐπὶ μίαν τῶν ἴσων γωνιῶν, κοινὴν αὐτῶν τὴν $ΒΔ$, καὶ τὰς λοιπὰς ἅρα πλευρὰς ταῖς λοιπαῖς πλευραῖς ἴσας ἔξουσιν ἴση ἅρα ἡ $ΔΕ$ τῇ $ΔΖ$. Διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ἡ $ΔΗ$ τῇ $ΔΖ$ ἐστὶν ἴση. Αἱ τρεῖς ἅρα εὐθεῖαι αἱ $ΔΕ$, $ΔΖ$, $ΔΗ$ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶν ὁ ἅρα κέντρον τῆ $Δ$, καὶ διαστήματι ἐνὶ τῶν $ΔΕ$, $ΔΖ$, $ΔΗ$ κύκλος γραφόμενος ἥξει καὶ διὰ τῶν λοιπῶν σημείων, καὶ ἐγράφεται τῶν AB , $ΒΓ$, $ΓΑ$ εὐθειῶν, διὰ τὸ ὀρθὰς εἶναι τὰς πρὸς τοῖς $Ε$, $Ζ$, $Η$ σημείοις γωνίας. Εἰ γὰρ τεμεῖ αὐτὰς, ἐσται ἡ τῇ διαμέτρῳ τοῦ κύκλου πρὸς ὀρθὰς ἀπ' ἀκρας ἀγομένη ἐντὸς πίπτουσα τοῦ κύκλου, ὅπερ ἄτοπον ἐδείχθη οὐκ ἅρα ὁ κέντρον $Δ$, διαστήματι δὲ ἐνὶ τῶν $ΔΕ$, $ΔΖ$, $ΔΗ$ γραφόμενος

observat Austin., demonstrari oportere, contingentes AM , BN , $ΓΑ$ inter'se convenire, quod facillimum est, ducta v. c. recta AB , quae tum, quum anguli KAM , KBN recti sint, summam angulorum MAB , $ΜΒΑ$ duobus rectis minorem efficiet, unde res consequitur ope 11. axiom. vel I. Post. 5., verum eandem demonstrationem iam dederat Tacquet. Denique notandum Peletarium et Borellium aliam adhuc huius problematis solutionem exhibere, in qua, ope praecedentis propositionis primum circulo triangulum dato aequiangulum inscribitur, et deinde ope problem. in Obs. 5. ad III. 17.

Secentur $AB\Gamma$, $\Gamma B\Delta$ anguli bifariam a rectis BA , ΓA (I. 9.), et convenient inter se in puncto Δ , et ducantur a Δ ad AB , $B\Gamma$, ΓA rectae perpendiculares ΔE , ΔZ , ΔH (I. 12.).

Et quoniam aequalis est angulus $AB\Delta$ angulo $\Delta B\Gamma$, est autem et rectus $BE\Delta$ recto $BZ\Delta$ aequalis; duo igitur sunt triangu-
la EBA , ZBA , duos angulos duobus angulis aequales habentia, et unum latus uni lateri aequale, et utrique commune BA , quod uni aequalium angulorum subtenditur; ergo et reliqua latera reliquis lateribus aequalia habebunt (I. 26.); aequalis igitur ΔE ipsi ΔZ . Ex eadem ratione et ΔH ipsi ΔZ est aequalis. Tres igitur rectae ΔE , ΔZ , ΔH aequales inter se sunt; ergo centro Δ , et intervallo una ipsarum ΔE , ΔZ , ΔH circulus descriptus transibit et per reliqua puncta, et continget AB , $B\Gamma$, ΓA rectas, propterea quod recti sunt ad E , Z , H puncta anguli. Si enim secet ipsas, recta diametro circuli ad rectos angulos ab extremitate ducta intra ipsum cadet circulum, quod absurdum ostensum est (III. 16.); circulus igitur centro Δ , intervallo autem una ipsarum ΔE , ΔZ , ΔH descriptus non secat rectas AB ,

rectae inscripti huius trianguli lateribus parallelae circulum contingentes ducuntur. Caeterum de simili problemate generaliore vide infra ad IV. 7. Obs. 2.

PROPOSITIO IV.

Obs. 1. Analysis huius problematis ita institui potest. Quum centrum circuli esse debeat ex III. 17. Obs. 1. in recta, quae angulum $AB\Gamma$ bifariam dividit, dividat eum bifariam recta BA , eritque in BA centrum circuli (vel, ut aliter geometrarum more dicamus, erit recta BA locus centri circuli

κύκλος τέρμει τὰς AB , BF , $ΓΑ$ εὐθείας· ἐγράφεται ἄρα αὐτῶν καὶ ἔσται κύκλος ἐγγεγραμμένος εἰς τὸ $ABΓ$ τρίγωνον. Ἐγγεγράφθω ὡς ZEH ¹⁾.

Εἰς ἄρα τὸ δοθὲν τρίγωνον τὸ $ABΓ$ κύκλος ἐγγράπται ὁ EZH . Ὅπερ ἔδει ποιῆσαι.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ε.

Περὶ τὸ δοθὲν τρίγωνον κύκλον περιγράψαι.

Ἐστω τὸ δοθὲν τρίγωνον τὸ $ABΓ$ · δεῖ δὴ περὶ τὸ δοθὲν τρίγωνον τὸ $ABΓ$ κύκλον περιγράψαι.

Τετμήσθωσαν αἱ AB , $ΑΓ$ εὐθεῖαι διχα κατὰ τὰ $Δ$, $Ε$ σημεία, καὶ ἀπὸ τῶν $Δ$, $Ε$ σημείων ταῖς AB , $ΑΓ$ πρὸς ὀρθὰς ἵχθωσαν αἱ AZ , ZE · συμπεσοῦνται δὲ ἥτοι ἐντὸς τοῦ $ABΓ$ τριγώνου, ἢ ἐπὶ τῆς BF εὐθείας, ἢ ἐκτὸς τῆς BF .

1) Verba: Ἐγγεγράφθω ὡς ZEH , quae in edd. Oxon. te Basil. omitta sunt, recte omnino e Cod. a restituit Peyrardus. Pariter certe in Prop. 5. 9. 13. 14. ad finem similia verba adiecta legimus. Eadem tamen ad finem Prop. 8. desunt.

describendi). Eodem modo, quum id centrum esse debeat in recta, quae angulum $ΑΓΒ$ bifariam dividit, dividat eum bifariam recta $ΓΔ$, eritque in recta $ΓΔ$ centrum circuli. Erit itaque in concursu utriusque rectae. Rectas autem $ΒΔ$, $ΓΔ$ necessario concurrere, facile patet. Quum enim anguli $ABΓ$, $ΑΓΒ$ simul minores sint duobus rectis (I. 17.), multo magis anguli $ABΓ$, $ΔΓΒ$ simul (quippe dimidii priorum) minores erunt duobus rectis, adeoque rectae $ΒΔ$, $ΓΔ$ convenient (Ax. 11. vel I. Post. 5.).

Obs. 2. Cor. 1. Quum etiam rectae $ΑΕ$, $ΑΗ$ circulum contingant, recta quoque $ΑΔ$, quae angulum $ΒΑΓ$ bifariam dividit, in eodem puncto $Α$, centro circuli, conveniet (III. 17. Obs. 1.). Itaque tres rectae, quae angulos trianguli aliquis bifariam secant, in eodem intra ipsum puncto conve-

BF, GA; contingit igitur ipsas, et erit circulus descriptus in triangulo *ABF* (IV. Def. 5.). Inscribatur ut *ZHE*.

In dato igitur triangulo ABF circulus inscriptus est EZH . Quod oportebat facere.

PROPOSITION V. (Fig. 290.)

Circa datum triangulum circulum circumscribere.

Sit datum triangulum $AB\Gamma$; oportet circa datum
triangulum $AB\Gamma$ circulum circumscribere.

Secentur AB , AF rectae bifariam in Δ , E punctis (I. 10.), et punctis Δ , E ipsis AB , AF ad rectos angulos ducantur AZ , ZE (I. 11.). Convenient autem vel intra triangulum ABF , vel in recta BF , vel extra BF .

nunt. Et vice versa: Recta, quae ex puncto A , in quo conveniunt rectae, quae duos angulos B et Γ trianguli bisecant, ad tertium angulum ducitur, hunc quoque bisecat (Obs. 2. ad I. 26. Cas. 5.). Cf. PHeiderer., e cuius annotationibus partim manuscriptis, etiam in hoc libro plura hausimus, Schol. in VI. Elem. P. I. §§. 41. 42. Caeterum ipsam propositionem IV. 4. Euclides ex absurdo demonstrat, Rob. Simson. paulo brevius directe. Neque vero cum Matthiae (Auszug aus Rob. Simsons Uebersetzung) dixerim, verba $\epsilon\iota\varsigma\ \tau\epsilon\mu\epsilon\iota\varsigma\ \alpha\upsilon\tau\alpha\iota\varsigma\ \kappa.\ \tau.\ \lambda.$ usque ad finem demonstrationis manifesto otiosum esse additamentum. Ad indirectam demonstrationem omnino necessaria sunt.

Obs. 3. Cor. 2. Et, quæ a puncto, in quo tres rectæ conveniunt, quæ angulos alicuius trianguli bisecant, ad latera eius trianguli demittuntur, sunt inter se æqualia.

Obs. 4. Cor. 3. Et, quum sit $AE=AH$, et $\Gamma Z=\Gamma H$ (III. 17. Obs. 5.), erit itaque $BZ+BE$, vel, quod eodem credit, $2BE$ excessus, quo summa duorum laterum BA , $B\Gamma$

Συμπιπτεύωσαν οὖν πρότερον ἐντὸς κατὰ τὸ Z , καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ ZB , $ZΓ$, ZA . Καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ AA τῇ BA , κοινὴ δὲ καὶ πρὸς ὀρθὰς ἡ AZ βάσις ἄρα ἡ AZ βάσει τῇ ZB ἐστὶν ἴση. Ὅμοιως δὲ δεῖξομεν ὅτι καὶ ἡ $ΓZ$ τῇ AZ ἐστὶν ἴση, ὥστε καὶ ἡ ZB τῇ $ZΓ$ ἐστὶν ἴση· αἱ τρεῖς ἄρα αἱ ZA , ZB , $ZΓ$ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶν. Ὁ ἄρα κέντρον τῷ Z , διαστήματι δὲ ἐνὶ τῶν ZA , ZB , $ZΓ$ κύκλος γεγραμμένος ἔξει καὶ διὰ τῶν λοιπῶν σημείων, καὶ ἐστὶ περιγεγραμμένος ὁ κύκλος περὶ τὸ $ABΓ$ τρίγωνον. Περιγραφέσθω ὡς ὁ $ABΓ$.

Ἀλλὰ δὴ αἱ AZ , EZ συμπιπτεύωσαν ἐπὶ τῆς $BΓ$ εὐθείας κατὰ τὸ Z , ὥς ἔχει ἐπὶ τῆς δευτέρας καταγραφῆς, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ AZ . Ὅμοιως δὲ δεῖξομεν ὅτι τὸ Z σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ περὶ τὸ $ABΓ$ τρίγωνον περιγεγραμμένου κύκλου.

Ἀλλὰ δὴ αἱ AZ , EZ συμπιπτεύωσαν ἐκτὸς τοῦ $ABΓ$ τριγώνου, κατὰ τὸ Z πάλιν, ὥς ἔχει ἐπὶ τῆς τρίτης καταγραφῆς, καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ AZ , BZ , $ΓZ$. Καὶ ἐπεὶ πάλιν ἴση ἐστὶν ἡ AA τῇ AB , κοινὴ

superat tertium $ΑΓ$, quo ipso propius determinatur I. 20. Hanc observationem Clavius ad Ioann. Baptistam Benedictum refert.

Obs. 5. Facile patet, eadem ratione solvi problema generalius, quo iubetur circulus describi, qui contingat tres rectas positione datas, quae non omnes tres inter se sunt parallelae. Erunt enim vel a) (Fig. 288.) duae rectarum positione datarum AB , $ΓΔ$ parallelae, et secabuntur a tertia $ΑΓ$ in punctis A , $Γ$, et tum eodem modo ostendetur, si anguli $ΓAB$, $ΑΓΔ$ bifariam secantur rectis $ΓE$, AE , has rectas in puncto aliquo E convenire, et demissa ex E in rectas perpendiculara EZ , $EΘ$, EH esse inter se aequalia, adeoque cir-

Convenient igitur primum intus in Z , et iungantur ZB , $Z\Gamma$, ZA . Et quoniam AA aequalis est BA , communis autem et ad rectos angulos AZ ; basis igitur AZ basi ZB est aequalis (I. 4.). Similiter ostendemus et rectam ΓZ rectae AZ esse aequalem, quare et ZB aequalis est $Z\Gamma$; tres igitur ZA , ZB , $Z\Gamma$ aequales inter se sunt. Ergo circulus centro Z , intervallo autem una ipsarum ZA , ZB , $Z\Gamma$ descriptus transibit et per reliqua puncta, et erit circulus circumscriptus (IV. Def. 6.) circa $AB\Gamma$ triangulum. Circumscribatur ut $AB\Gamma$.

Sed AZ , EZ convenient in recta $B\Gamma$ in Z , ut in secunda figura, et iungatur AZ . Similiter ostendemus punctum Z centrum esse circuli circa $AB\Gamma$ triangulum circumscripti.

Sed AZ , EZ convenient extra triangulum $AB\Gamma$, rursus in Z , ut in tertia figura, et iungantur AZ , BZ , ΓZ . Et quoniam rursus AA aequalis est AB , communis autem et ad rectos angulos AZ ; basis igi-

culum centro E , radio EZ descriptum tres rectas in Z , Θ , H contingere. Et eodem modo etiam ex altera rectae $A\Gamma$ parte inveniatur circulus, qui propositum efficiet. Aliter, ducto ad utramque rectarum parallelarum perpendicularo quocunque ZH , eoque in E bifariam diviso, ac per E ducta recta $E\epsilon$ parallela rectis AB , ΓA , ostendetur, in hac parallela esse centra describendorum circulorum. (Vel (Fig. 269.) b) nulla rectarum positione datarum parallela erit alteri. Omnes igitur tres AB , $B\Gamma$, $A\Gamma$ inter se convenient, vel triangulum $AB\Gamma$ efficient, adeoque problema idem erit, quod nostrum IV. 4. et inveniatur centrum A circuli intra triangulum describendi, qui tres rectas AB , $B\Gamma$, $A\Gamma$ contingat.

δε καὶ πρὸς ὁρθὰς ἡ AZ βάσις ἄρα ἡ AZ ZB ἐστὶ
τῇ ZB ἴση. Ὅμοίως δὴ δεῖξομεν ὅτι $ZΓ$ ἀεὶ
 $ZΓ$ τῇ ZA ἐστὶν ἴση, ὥστε καὶ ἡ ZB τῇ ZA , ἐργ
ἴση, ὁ ἄρα πάλιν κέντρον τῷ Z , διαστήματι
τῶν ZA , ZB , $ZΓ$ καθ' ὅλον γραγόμενος ἤξει
τῶν λοιπῶν σημείων, καὶ ἔσται περιγραφόμενος
τὸ $ABΓ$ τρίγωνον. Καὶ γεγράφθω ὡς $ABΓ$.

Περὶ τὸ δοθὲν ἄρα τρίγωνον κύκλος περι-
πται. Ὅπερ εἶδει ποιῆσαι.

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α.

Καὶ φανερόν ὅτι, ὅτε μὲν ἐντὸς τοῦ τριγ-
 πίπτει τὸ κέντρον τοῦ κύκλου, ἢ ὑπὸ ΒΑΓ
 ἐν μείζονι τμήματι τοῦ ἡμικυκλίου τυγχάνουσα,
 των ἐστὶν ὁρθῆς· ὅτε δὲ ἐπὶ τῆς ΒΓ εὐθείας τὸ
 κέντρον πίπτει, ἢ ὑπὸ ΒΑΓ γωνία ἐν ἡμικυκλίῳ
 τυγχάνουσα ὁρθή ἐστίν· ὅτε δὲ τὸ κέντρον τοῦ κύ-
 κλου ἐκτὸς τριγώνου πίπτει¹⁾, ἢ ὑπὸ ΒΑΓ, ἐν ἐλάττω

1) Ita sane rectius Peyrardus ex Cod. a habet, quam
gata lectio: ὅταν ἰσὺς τῆς ΒΓ εὐθείας τὸ κέντρον πίπτει.
torum iam Gregorius in versione latina veram lectionem
pressit.

Facile autem patet, eodem modo intra spatia $KBF\Theta$, ABA , $MG\Lambda O$ describi posse circulos, qui rectas AB , BF , AF ex triangulum ABF contingant. Nolumus huic problemati, quod unum ex iis est, quae Apollonius in libris de Tactionibus tractavit, plenius evolvendo insistere. Plura scitu digna, quae ad illud pertinent, et ex hac constructione derivari possunt, conguessit Pflaiderer, abene Trigonometrie Tiib. 1802. Ita v.

c. facile patet, esse $A\epsilon = A\eta = \frac{AB + A\Gamma + B\Gamma}{2}$, pariter ac in

Obs. 4. vidimus esse $AE = \frac{AB + AT - BT}{2}$, et angulum $AB\delta$ esse rectum etc.

si basi ZB est aequalis (I. 4.). Similiter ostenditur et ZF aequalem esse ZA , quare et ZB aequalis ZF ; ergo rursus circulus centro Z , inter-
 autem una ipsarum ZA , ZB , ZF descriptus
 sit per reliqua puncta, et erit circa triangulum
 circumscriptus. Describatur igitur ut ABF .

si datum igitur triangulum circulus circumscri-
 bitur. Quod oportebat facere.

COROLLARIUM.

manifestum est, quod si centrum circuli intra
 triangulum cadit, angulus BAF , in segmento maiore
 semicirculo positus, minor sit recto; si au-
 tem centrum in rectam BF cadit, angulus BAF , in
 semicirculo positus, rectus sit; si vero centrum cir-
 culi extra triangulum cadit, angulus BAF , in seg-
 mento minore quam semicirculo, maior sit recto.

PROPOSITIO V.

Obs. 1. Rob. Simson. putat, demonstrationem huius
 propositionis ab aliquo vitiatam esse, non enim ostendere,
 rectas, quae latera trianguli bifariam et ad angulos rectos se-
 cutur, inter se convenire, et inepte dividere propositionem in
 tres casus, cum una eademque demonstratio omnibus inser-
 vatur, ut iam Campanus observavit. Et illud quidem, rectas,
 quae ex A et E ad angulos rectos lateribus ducuntur, inter
 se convenire, facile, ut est apud Campanum, probatur, ducta
 recta AE , unde res eodem modo ex Ax. 11. vel I. Post. 5.
 patet, ac in IV. 3. de rectis circulum contingentibus. Quod
 autem rectae FZ , EZ nec in unam lineam coincidere possint,
 inde patet, quod si id fieret, rectae AB , AF forent inter se
 parallelae (I. 28.), quod est contra hypothesin. Rob. Simson.
 rectas AZ , EZ convenire inde probat, quod si non conveni-

τμήματι τοῦ ἡμικυκλίου τυγχάνουσα, μείζων ἐστὶν ὀρθῆς. Ὡστε καὶ ὅταν ἐλάττων ὀρθῆς τυγχάνῃ ἡ διδομένη γωνία, ἐντὸς τοῦ τριγώνου συμπεσοῦνται αἱ AZ , EZ : ὅταν δὲ ὀρθῇ, ἐπὶ τῆς $BΓ$: ὅταν δὲ μείζων ὀρθῆς, ἐκτὸς τοῦ $ABΓ$ τριγώνου ¹⁾.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ 5.

Εἰς τὸν δοθέντα κύκλον τετράγωνον ἐγγράψαι.

Ἔστω ὁ δοθεὶς κύκλος ὁ $ABΓΔ$: δεῖ δὴ εἰς τὸν $ABΓΔ$ κύκλον τετράγωνον ἐγγράψαι.

Ἠχθωσαν τοῦ $ABΓΔ$ κύκλου δύο διάμετροι πρὸς ὀρθὰς ἀλλήλαις αἱ $ΑΓ$, $ΒΔ$: καὶ ἐπεξεύχθω αἱ AB , $BΓ$, $ΓΔ$, $ΔΑ$.

1) Ἐκτὸς τοῦ $ABΓ$ τριγώνου ex coniectura, quam iam versiones Campani, Clavii, Gregorii, Rob. Simsonis aliorumque habent, posuimus pro vulgata omnium editionum (in Paris. ex sphalmate typographico est ἐντὸς pro ἐκτὸς) ἐκτὸς τῆς $BΓ$.

rent parallelae forent; at si parallelae forent AZ , EZ , parallelae quoque forent AB , AI , qui iis sunt ad angulos rectos. Hanc demonstrationem reprehendit Matthias Auszug aus Rob. Sims. Uebersetzung et Austin., quod propositio illa, rectas, quae perpendiculares sint ad duas parallelas, ipsas etiam parallelas esse, non praecedat. Facillime tamen res ad I. 28. reducitur. Caeterum poterat quoque Analysis addi simili ratione ac in IV. 4. facile deducenda ex III. 1. Cor. 1.

Obs. 2. Cor. 2. Quum centrum circuli describendi esse debeat (III. 1. Cor. 1.) in recta AZ , quae rectam AB bifariam et ad angulos rectos secat, pariterque in recta EZ , quae rectam AI bifariam et ad angulos rectos secat, et denique eodem modo in recta, quae rectam $BΓ$ bifariam et ad angulos rectos secat, patet, hoc, quod ultimo loco diximus, perpendiculum cum duobus reliquis in uno eodemque puncto convenire debere.

Quare et si datus angulus minor est recto, intra triangulum convenient AZ , EZ ; si autem rectus, in $B\Gamma$; si vero maior recto, extra triangulum $AB\Gamma$.

PROPOSITIO VI. (Fig. 291.)

In dato circulo quadratum inscribere.

Sit datus circulus $AB\Gamma\Delta$; oportet in circulo $AB\Gamma\Delta$ quadratum inscribere.

Ducantur circuli $AB\Gamma\Delta$ duae diametri $A\Gamma$, $B\Delta$ ad rectos angulos inter se (I. 11.), et iungantur AB , $B\Gamma$, $\Gamma\Delta$, ΔA .

Obs. 3. Cor. 3. Et quae ab hoc communi trium perpendicularum concursu ad angulos trianguli A , B , Γ ducuntur rectae ZA , ZB , $Z\Gamma$ aequales sunt. Casu itaque figurae secundae (Fig. 290. b.) quo angulus $BA\Gamma$ rectus est, centrum Z circuli circumscribendi facillime invenitur, bisecando tantum latus recto angulo oppositum. Cf. III. 31. Cor. 2.

Obs. 4. Eodem modo per tria puncta, quae non in eadem recta sunt, circulus describetur.

Obs. 5. Corollarii 1., quod in graeco textu legitur, pars prior non est apud Campanum, neque omnino ex hac constructione consequitur, sed patet ex III. 31. Pars posterior consequitur ex conversa III. 31. vid. Obs. ad III. 31. In parte posteriore corollarii praeterea, ut Rob. Simson. notat, sermo est de angulo dato, quum tamen propositio nihil habeat, nec habere possit de angulo dato, atque hinc ille corollarium hoc manifeste vitiatum esse concludit. Austin. id omnino ex hoc loco eliminandum esse putat.

PROPOSITIO VI.

Obs. A sexta inde huius libri propositione Euclides non nisi de figuris quibusdam regularibus tractat, et de his iis,

Καὶ ἐπεὶ ἴσῃ ἐστὶν ἡ BE τῇ EA , κέντρον γὰρ τὸ E , κοινὴ δὲ καὶ πρὸς ὀρθὰς ἡ EA . βάσεις ἄρα ἡ AB βάσει τῇ AA ἴση ἐστίν. Διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ἑκατέρω τῶν $BΓ$, $ΓΔ$ ἑκατέρω τῶν BA , AD ἴση ἐστὶν ἰσοπλευρον ἄρα ἐστὶ τὸ $ABΓΔ$ τετράπλευρον. Λέγω δὲ ὅτι καὶ ὀρθογώνιον. Ἐπεὶ γὰρ ἡ BD εὐθεῖα διάμετρος ἐστὶ τοῦ $ABΓΔ$ κύκλου, ἡμικύκλιον ἄρα ἐστὶ τὸ $BAΔ$ ὀρθὴ ἄρα ἡ ὑπὸ $BAΔ$ γωνία. Διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ἐκύστη τῶν ὑπὸ $ABΓ$, $ΒΓΔ$, $ΓΔΑ$ ὀρθὴ ἐστὶν ὀρθογώνιον ἄρα ἐστὶ τὸ $ABΓΔ$ τετράπλευρον. Ἐδείχθη δὲ καὶ ἰσοπλευρον τετράγωνον ἄρα ἐστίν. Καὶ ἐγγέγραπται εἰς τὸν δοθέντα $ABΓΔ$ κύκλον.

Εἰς ἄρα δοθέντα κύκλον τὸν $ABΓΔ$ τετράγωνον ἐγγέγραπται τὸ $ABΓΔ$. Ὅπερ ἔδει ποιῆσαι.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Ζ.

Περὶ τὸν δοθέντα κύκλον τετράγωνον περιγράψαι.
Ἔστω δοθεὶς κύκλος ὁ $ABΓΔ$. δεῖ δὲ περὶ τὸν $ABΓΔ$ κύκλον τετράγωνον περιγράψαι.

quae Prop. 2—5 generatim de triangulis docuerat, similia proponit. Neque enim poterant ad figuras multilateras quascunque illa omnia applicari. Nonnulla tamen de aliis quoque figuris non regularibus valent. Propositio sexta, ut de hac iam dicamus, de quadrato idem docet, quod Prop. 2. de triangulo dato alicui aequiangulo. Quodvis autem quadratum etiam cuiusvis alii quadrato est aequiangulum. Nec vero generaliter iam proponi poterat problema: in dato circulo inscribere quadrilaterum dato quadrilatero aequiangulum. Vidimus nempe in Obs. 2. ad III. 22, ut quadrilaterum circulo inscribi possit, necesse esse, si quaestio sit de figuris, quae nullos angulos gibbos habent, ut duo anguli oppositi simul sumpti aequales sint reliquis duobus angulis. Itaque etiam, si circulo dato

Et quoniam BE aequalis est EA , centrum enim E , communis autem et ad rectos angulos EA ; basis igitur AB basi AD aequalis est (I. 4.). Ex eadem ratione et utraque rectarum BF , FD utrique rectarum BA , AD aequalis est; aequilaterum igitur est quadrilaterum $ABFD$. Dico autem et rectangulum. Quoniam enim recta BD diameter est circuli $ABFD$, semicirculus igitur est BAD ; quare angulus BAD rectus est (III. 31.). Ex eadem ratione et unusquisque angulorum ABF , BFD , FDA rectus est; rectangulum igitur est quadrilaterum $ABFD$. Ostensum est autem et aequilaterum; quadratum igitur est. Et inscriptum est in dato circulo $ABFD$.

In dato igitur circulo $ABFD$ quadratum inscriptum est $ABFD$. Quod oportebat facere.

PROPOSITIO VII. (Fig. 293.)

Circa datum circulum quadratum describere.

Sit datus circulus $ABFD$; oportet circa circulum $ABFD$ quadratum circumscribere.

inscribi debet quadrilaterum dato quadrilatero aequiangulum, in dato quadrilatero eadem conditio obtinere debet. Quod si fuerit, poterit non modo, et quidem ita, ut punctum in circumferentia, per quod unum laterum quadrilateri inscribendi transeat, datum sit, aut pro lubitu sumatur, res fieri, sed innumeris modis fieri poterit, vel, ut aliter dicamus, problema generaliter sumtum erit indeterminatum. Nempe, si propositum sit, dato circulo $ABFD$ (Fig. 292.) inscribere quadrilaterum, quod aequiangulum sit dato quadrilatero $BZOH$, cuius anguli oppositi $ZEH + ZO H = Z + H = 2$ rectis, ita, ut unum eius latus transeat per punctum datum A in circumferentia circuli, fieri id poterit sequentem in modum. Abscindatur per III. 34. recta AF segmentum ADF , quod ca-

ἤχθωσαν τοῦ $AB\Gamma A$ κύκλου δύο διαμέτροι πρὸς ὁρθὰς ἀλλήλαις αἱ AF , BA , καὶ διὰ τῶν A , B , Γ , A σημείων ἤχθωσαν ἐφαπτόμεναι τοῦ $AB\Gamma A$ κύκλου αἱ ZH , $H\Theta$, ΘK , KZ .

Ἐπεὶ οὖν ἐφάπτεται ἡ ZH τοῦ $AB\Gamma A$ κύκλου, ἀπὸ δὲ τοῦ E κέντρου ἐπὶ τὴν κατὰ τὸ A ἐπαφὴν ἐπέξευκται ἡ EA αἱ ἄρα πρὸς τῷ A γωνίαι ὀρθαὶ εἰσιν. Διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ αἱ πρὸς τοῖς B , Γ , A

piat angulum aequalem angulo H , ductaque ΘE fiat angulus $\Gamma A A = \Theta E H$, et $\Gamma A B = \Theta E Z$, et iungantur $B\Gamma$, $A\Gamma$, eritque, ut facile ex III. 22. consequitur, quadrilaterum $AB\Gamma A$ aequiangulum quadrilatero $EZ\Theta H$. Neque vero solum quadrilaterum $AB\Gamma A$ propositum efficiet. Quodsi enim v. g. ducta fuisset recta $\zeta\theta$ parallela rectae $Z\Theta$, iunctaque $E\theta$, angulus $\Gamma A \delta = \theta E H$, et angulus $\Gamma A \beta = \theta E \zeta$ constitutus esset, quadrilaterum $A\beta\Gamma\theta$ pariter scopo respondisset, atque ita innumera alia, quae idem praestarent, exhiberi poterant. Nominatim, si circulo dato inscribenda fuerit figura quadrato aequiangula, innumera rectangula problema solvent. At, si figura inscribenda ipsa etiam quadratum esse, et per punctum in circumferentia datum A transire debet, una tantum figura his conditionibus satisfaciet. Si circulo inscribi iubetur figura multilatera aequiangula figurae datae, ante omnia, an res fieri possit, ex observatis ad III. 22. diiudicari debet, et si fieri possit, problema plerumque erit indeterminatum. Caeterum propositioni VI. 6. addi potest hoc

Cor. Circulus quoque (Fig. 291.) diametris AF , BA in quatuor segmenta aequalia dividitur (III. 26.).

PROPOSITIO VII.

Obs. 1. Rectas circulum contingentes HZ , ΘK cum contingentibus $H\Theta$, ZK convenire, patet ex I. 29. Cor. 3.

Cor. 1. Quodvis quadrati circumscripti latus aequale est diametro circuli, cui circumscribitur (I. 34.).

Ducantur circuli $AB\Gamma A$ duae diametri AT , BA ad rectos angulos inter se (I. 11.); et per puncta A , B , Γ , A ducantur rectae ZH , $H\Theta$, ΘK , KZ circulum $AB\Gamma A$ contingentes (III. 17.).

Quoniam igitur ZH contingit circulum $AB\Gamma A$ centro autem E ad contactum A ducta est EA ; anguli ad A recti sunt (III. 18.). Ex eadem ratione et anguli ad B , Γ , A puncta recti sunt. Et quoniam

Cor. 2. Si ductis rectis AB , $B\Gamma$, ΓA , AA eidem circulo quadratum inscribatur, erit quadratum circumscriptum duplum quadrati inscripti, hoc nempe erit aequale duplo quadrati radii (I. 47.), illud autem quadrato diametri Cor. 1.

Cor. 3. Circulus etiam hic diametris AT , BA in quatuor segmenta aequalia dividitur (III. 26.).

Cor. 4. Pariter latera quadrati circumscripti diametris AT , BA bisecantur. Est nempe $HA=BE$ (I. 34.) et $ZA=EA$. At $BE=EA$, itaque et $HA=ZA$.

Obs. 2. Quum quodvis quadratum aequiangulum sit cuiusvis alii, etiam haec propositio conferri potest cum propositione IV. 3. Et facile patet, propositionem IV. 3. longe generalius, et certe ad figuram rectilineam quamcunque, quae angulos gibbos non habet, extendi posse. Factis nempe (Fig. 294.) ut in IV. 3. angulis ad centrum O circuli dati ex ordine aequalibus iis, qui deinceps sunt angulis figurae datae $Z\Theta HKA$, nempe angulo $\alpha O \epsilon =$ angulo, qui Z deinceps est $\alpha O \beta$ ei, qui Θ deinceps est etc. ductisque per puncta ϵ , α , β etc. (quorum unum etiam datum esse potest) rectis circulum contingebis, demonstrabitur, ut in IV. 3. rectarum harum contingentium unamquamque convenire cum duabus ipsi proxime positis, et esse figuram ita enatam aequiangulam datae $Z\Theta HKA$. Nec generaliter omnes ii casus excludentur, quibus figura data angulos gibbos habet: in figura autem datae aequiangula circa circulum circumscripta latera angulos gibbos comprehendentia non ipsa, sed producta tantum intra figuram circulum con-

σημείοις γωνίαι ὀρθαί εἰσιν. Καὶ ἐπεὶ ὀρθή ἐστιν ἡ ὑπὸ AEB γωνία, ἔστι δὲ ὀρθή καὶ ἡ ὑπὸ EBH παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ $H\Theta$ τῇ AF . Διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ AF τῇ ZK ἐστὶ παράλληλος. Ὡστε καὶ ἡ $H\Theta$ τῇ ZK ἐστὶ παράλληλος. Ὅμοιως δὲ δεῖξομεν ὅτι καὶ ἑκατέρα τῶν HZ , ΘK τῇ BEA ἐστὶ παράλληλος. Παραλληλόγραμμα ἐστὶ τὰ HK , HG , AK , ZB , BK . ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ μὲν HZ τῇ ΘK , ἡ δὲ $H\Theta$ τῇ ZK . Καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ AF τῇ BA , ἀλλὰ καὶ ἡ μὲν AF ἑκατέρα τῶν $H\Theta$, ZK , ἡ δὲ

tingent, et anguli quoque ad centrum situm aliquatenus diversum obtinebunt, quae omnia, quum singulis casibus evolvendis haud vacot, hic et in sequentibus praeterimus.

Obs. 3. In figuris circulo alicui circumscriptis (hic quoque praeterimus eas, quae angulos gibbos habent) observari potest circa latera aliquid admodum simile ei, quod in figuris circulo inscriptis circa angulos observavimus Obs. 2. sq. ad III. 22. Nempe, si parem laterum numerum habuerint, et latera, initio facto a quocunque eorum ordine numeris indicentur, erit summa laterum numeris imparibus notatorum aequalis summae laterum numeris paribus notatorum. Sit v. c. talis figura, quae nullos angulos gibbos habet $AB\Gamma A\epsilon Z$ (Fig. 295.), quae circulum contingat in punctis α , β , γ , etc. eritque ex III. 17. Obs. 1.

$$A\alpha = A\zeta$$

$$B\alpha = B\beta$$

$$\Gamma\gamma = \Gamma\beta$$

$$A\gamma = A\delta$$

$$E\epsilon = E\delta$$

$$Z\zeta = Z\epsilon$$

$$\text{unde } (A\alpha + B\alpha) + (\Gamma\gamma + A\gamma) + (E\epsilon + Z\zeta) = (B\beta + \Gamma\beta) + (A\delta + E\delta) + (Z\epsilon + A\zeta)$$

$$\text{i. e. } AB + \Gamma A + EZ = B\Gamma + AE + ZA.$$

Similis demonstratio locum habet in figuris, quae plura ha-

rectus est angulus AEB , rectus autem est et EBH ; $H\theta$ parallela erit AF (I. 28.) Ex eadem ratione et AF parallela est ZK ; quare et $H\theta$ parallela est ZK (I. 30.). Similiter ostendemus et utramque ipsarum HZ , θK ipsi BEA esse parallelam. Parallelogramma igitur sunt HK , $H\Gamma$, AK , ZB , BK ; aequalis igitur est HZ quidem ipsi θK , $H\theta$ vero ipsi ZK . Et quoniam AF aequalis est BA , sed et AF utrique ipsarum $H\theta$, ZK , BA vero utrique ipsarum HZ , θK est aequalis; et utraque $H\theta$, ZK utrique HZ ,

bent latera. Hinc consequitur, rectangulum et rhomboiden circulo AE circumscribi non posse.

Obs. 4. Simile quid obtinet in figuris circulo circumscriptis, quae numerum laterum imparem habent. In illis nempe, si unius cuiuscunque lateris v. c. (Fig. 296.) in pentagono $ABFAE$ lateris EA partes As , et sE in quae in puncto contactus dividitur, separatim numeremus, pariter summa laterum imparibus notatorum aequalis erit summae numeris paribus notatorum, quod eodem modo demonstrabitur.

Obs. 5. In quadrilateris propositio, quam Obs. 3. habuimus, valet etiam conversa. Nempe si quod quadrilaterum ita comparatum sit, ut summa duorum laterum oppositorum aequalis sit summae duorum reliquorum laterum oppositorum, poterit illi circulus inscribi. Demonstrari id potest vel directe, vel indirecte. Directa demonstratio haec erit. Sit (Fig. 297.) quadrilaterum $ABFA$, in quo summa laterum $AB+FA$ aequalis est summae laterum $BF+AA$, poterit ei circulus inscribi. Nam ex Obs. 5. ad IV. 4. circulus potest describi, qui tria quaecunque contigua latera v. c. AB , BF , FA contingat in punctis α , β , γ , adeoque erit, si O huius circuli centrum sit, $O\alpha=O\beta$, et $O\alpha^2=O\beta^2$. Est autem $O\alpha^2=OA^2-A\alpha^2$, et $O\beta^2=OB^2-B\beta^2$ (I. 47. Cor. 2.), adeoque erit $OA^2-A\alpha^2=OB^2-B\beta^2$. Et, quum sit ex hyp. $AB+FA=BF+AA$, et

$ΒΔ$ ἑκατέρω τῶν $ΗΖ$, $ΘΚ$ ἐστὶν ἴση καὶ ἑκατέρα ἄρα τῶν $ΗΘ$, $ΖΚ$ ἑκατέρω τῶν $ΗΖ$, $ΘΚ$ ἐστὶν ἴση. Ἰσοπλευρον ἄρα ἐστὶ τὸ $ΖΗΘΚ$ τετράπλευρον. Αἰγὼ δὲ ὅτι καὶ ὀρθογώνιον. Ἐπεὶ γὰρ παραλληλόγραμμὸν ἐστὶ τὸ $ΗΒΕΑ$, καὶ ἐστὶν ὀρθὴ ἡ ὑπὸ $ΑΕΒ$ ὀρθὴ ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ $ΑΗΒ$. Ὀμοίως δὲ δεῖξομεν ὅτι καὶ αἱ πρὸς τοῖς $Θ$, $Κ$, $Ζ$ γωνίαι ὀρθαὶ εἰσιν ὀρθογώνιον ἄρα ἐστὶ τὸ $ΖΗΘΚ$ τετράπλευρον. Ἐδείχθη δὲ καὶ ἰσοπλευρον τετράγωνον ἄρα ἐστίν. Καὶ περιγέγραπται περὶ τὸν $ΑΒΓΔ$ κύκλον.

Περὶ τὸν δοθέντα ἄρα κύκλον τετράγωνον περιγέγραπται. Ὅπερ ἔδει ποιῆσαι.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ γ.

Εἰς τὸ δοθέν τετράγωνον κύκλον ἐγγράψαι.

Ἐστω τὸ δοθέν τετράγωνον τὸ $ΑΒΓΔ$. δεῖ δὲ εἰς τὸ $ΑΒΓΔ$ τετράγωνον κύκλον ἐγγράψαι.

Τετμήσθω ἑκατέρα τῶν $ΑΒ$, $ΔΔ$ διχα κατὰ τὰ $Ζ$, $Ε$ σημεῖα, καὶ διὰ μὲν τοῦ $Ε$ ὁποτέρω τῶν $ΑΒ$, $ΓΔ$ παράλληλος ᾗχθω ἡ $ΕΘ$, διὰ δὲ τοῦ $Ζ$ ὁποτέρω τῶν $ΑΔ$, $ΒΓ$ παράλληλος ᾗχθω ἡ $ΖΚ$. παραλληλό-

$Βα=Ββ$, $Γγ=Γδ$ (Obs. 1. ad III. 17.) erit, aequalibus utrimque demtis, $Αα+Αγ=ΔΔ$. Iam erit vel $Αα=Αγ$ (Fig. 297. a), vel alterutra earum maior altera (Fig. 297. b): Utroque casu, demisso ex $Ο$ in $ΑΔ$ perpendiculo $Οδ$, dico esse $Οδ=$

$Ογ$. Nam, si 1) $Αα=Αγ$, erit tam $Αα$, quam $Αγ=\frac{ΔΔ}{2}$.

Et, quum $ΟΑ^2-Αα^2=ΟΔ^2-Αγ^2$, erit $ΟΑ^2=ΟΔ^2$, adeoque $ΟΑ=ΟΔ$, undò perpendiculum $Οδ$ rectam $ΑΔ$ bisecabit in $δ$

(I. 26. Cor. 3.), eritque $Αδ=\frac{ΔΔ}{2}=Αγ$. Est autem $Οδ^2=$

$ΟΔ^2-Αδ^2$ et $Ογ^2=ΟΔ^2-Αγ^2$, itaque $Οδ^2=Ογ^2$, adeoque $Οδ=Ογ$. Sive autem non sit $Αα=Αγ$, sit alterutra earum v. c.

ΘK est aequalis. Aequilaterum igitur est $ZH\Theta K$ quadrilaterum. Dico et rectangulum. Quoniam enim parallelogrammum est $HBEA$, et est rectus angulus AEB ; rectus igitur et AHB . Similiter ostendemus et angulos ad Θ , K , Z rectos esse; rectangulum igitur est quadrilaterum $ZH\Theta K$. Ostensum est autem et aequilaterum; quadratum igitur est. Et circumscriptum est circa $AB\Gamma A$ circulum.

Circa datum igitur circulum quadratum circumscriptum est. Quod oportebat facere.

PROPOSITIO VIII. (Fig. 299.)

In dato quadrato circulum inscribere.

Sit datum quadratum $AB\Gamma A$; oportet in quadrato $AB\Gamma A$ circulum inscribere.

Secetur utraque ipsarum AB , AA bifariam in punctis E , Z (I. 10.), et per E alterutri rectarum AB , ΓA parallela ducatur $E\Theta$ (I. 31.); per Z vero alterutri rectarum AA , $B\Gamma$ parallela ducatur ZK (I.

$\Delta\gamma$ maior altera $A\alpha$. Quoniam igitur $OA^2 - A\alpha^2 = OD^2 - \Delta\gamma^2$; erit $\Delta\gamma^2 - A\alpha^2 = OA^2 - OD^2$. At, demisso ex O in rectam AA perpendiculo $O\delta$, est $OA^2 - OD^2 = A\delta^2 - A\delta^2$ (I. 47. Cor. 3), itaque $\Delta\gamma^2 - A\alpha^2 = A\delta^2 - A\delta^2$ i. e. rectangulum $(\Delta\gamma + A\alpha)(\Delta\gamma - A\alpha) = \text{rectang. } (A\delta + A\delta)(A\delta - A\delta)$ (II. 4. Cor. 4.) Quum autem sit $\Delta\gamma + A\alpha = A\delta - A\delta + A\delta$, erit $\Delta\gamma - A\alpha = A\delta - A\delta$ (Obs. 3. ad I. 40.), adeoque erit $A\Gamma + A\alpha + A\Gamma - A\alpha = A\delta + A\delta + A\delta - A\delta$ i. e. $2A\gamma = 2A\delta$, vel $A\gamma = A\delta^2$, et quum $O\delta = OA - A\delta$ et $O\gamma^2 = OA^2 - A\gamma^2$, erit $O\delta^2 = O\gamma^2$, et $O\delta = O\gamma$, adeoque utroque casu circulus radio $O\gamma$ descriptus etiam per δ transibit, et coniunget rectam AA in δ (III. 16. Cor. 1.). Hinc consequitur quadrato et rhombo circulum posse inscribi.

γραμμὸν ἄρα ἐστὶν ἕκαστον τῶν AK , KB , $A\Theta$, ΘA , AH , $H\Gamma$, BH , HA , καὶ αἱ ἀπεναντίον αὐτῶν πλευραὶ δηλονότι ἴσαι εἰσὶν. Καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ AD τῇ AB , καὶ ἐστὶ τῆς μὲν AD ἡμίσεια ἡ AE , τῆς δὲ AB ἡμίσεια ἡ AZ , ἴση ἄρα καὶ ἡ AE τῇ AZ . ὥστε καὶ αἱ ἀπεναντίον ἴσαι εἰσὶν, ἴση ἄρα καὶ ἡ ZH τῇ HE . Ὀμοίως δὴ δείκμεν ὅτι καὶ ἑκάτερον τῶν $H\Theta$, HK ἑκατέρῃ τῶν ZH , HE ἐστὶν ἴση. Αἱ τέσσαρες ἄρα αἱ HE , HZ , $H\Theta$, HK ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶν. Ὁ ἄρα κέντρον μὲν τῷ H , διαστήματι δὲ ἐνὶ τῶν HE , HZ , $H\Theta$, HK κύκλος γραφόμενος ἔξει καὶ διὰ τῶν λοιπῶν σημείων καὶ ἐξάψεται τῶν AB , $B\Gamma$, ΓA , AA εὐθειῶν, διὰ τὸ ὁρθὰς εἶναι τὰς πρὸς τοῖς E , Z , Θ , K γωνίας· εἰ γὰρ τεμεῖ ὁ κύκλος τὰς AB , $B\Gamma$, ΓA , AA , ἡ τῇ διαμέτρῳ τοῦ κύκλου πρὸς ὁρθὰς ἀπ' ἀκρας ἀγομένη ἐντὸς πεσεῖται τοῦ κύκλου, ὅπερ ἀτοπον ἐδείχθη. Οὐκ ἄρα ὁ κέντρον μὲν τῷ H , διαστήματι δὲ ἐνὶ τῶν HE , HZ , $H\Theta$, HK κύκλος γραφόμενος τέμνει τὰς AB ,

Obs. 6. In figuris autem, quae plura quam quatuor latera habent, propositio, quam Obs. 3. habuimus, pariterque altera Obs. 4. exhibita converti nequit, quod similiter fere demonstratur ac Obs. 6. ad III. 22. Sit nempe (Fig. 296.) figura $AB\Gamma A E Z$ circulo, cuius centrum est O , radius Oa circumscripta, et contingat ille latera in punctis α , β , γ , δ , ϵ , ζ , iam sumantur duo quaecunque latera contigua v. c. AZ , EZ , et producat utrumque ultra Z usque ad Θ et H eadem quantitate, nempe ita, ut sit $Z\Theta = ZH$, et centro A radio $A\Theta$, pariterque centro E radio EH describantur circuli, qui se intersecabunt in puncto aliquo K , ita ut ductis AK , EK sit punctum Z inter AK et EK , oriaturque novum polygonum $AB\Gamma A EK$, quod a priori $AB\Gamma A E Z$ tantum quoad latera AK , EK , eorumque positionem discrepabit, caeterum vero,

31.); parallelogrammum igitur est unumquodque ipsorum AK , KB , $A\Theta$, ΘA , AH , $H\Gamma$, BH , HA , et opposita ipsorum latera aequalia sunt (I. 31.). Et quoniam AA aequalis est AB , et ipsius quidem AA dimidia est AE , ipsius vero AB dimidia AZ , aequalis erit et AE ipsi AZ ; quare, et opposita aequalia sunt, ergo ZH aequalis HE . Similiter ostendemus et utramque $H\Theta$, HK utrique ZH , HE esse aequalem. Quatuor igitur HE , HZ , $H\Theta$, HK aequales inter se sunt. Circulus igitur centro H , intervallo vero aequali uni ipsarum HE , HZ , $H\Theta$, HK descriptus transibit et per reliqua puncta; et continget rectas AB , $B\Gamma$, ΓA , AA , propterea quod recti sunt anguli ad E , Z , Θ , K anguli; si enim secat circulus rectas AB , $B\Gamma$, ΓA , AA , quae diametro circuli ad rectos angulos ab extremitate ducitur, intra circulum cadet, quod absurdum ostensum est (III. 16.) Circulus igitur centro H , intervallo vero aequali uni ipsarum HE , HZ , $H\Theta$, HK descriptus non secatur rectas

quum polygonum $AB\Gamma AEZ$ circulo circumscriptum sis, erit ex Obs. 3. $AB + \Gamma A + EZ = B\Gamma + AE + ZA$, adeoque, quum $EK = EZ + ZH$, et $KA = ZA + Z\Theta$, sumtum autem sit $ZH = Z\Theta$, erit etiam $AB + \Gamma A + EK = B\Gamma + AE + KA$. Polygonum itaque $AB\Gamma AEK$ etiam ita comparatum est, ut numerus laterum alterne numeratorum aequalis sit numero reliquorum laterum, et tamen manifestum est, huic polygono circulum inscribi non posse. Si enim inscribi posset, idem etiam latera AB , $B\Gamma$, ΓA ex ea parte lateris $B\Gamma$ contingere deberet, ex qua sunt reliqua latera. At, qui hoc efficit, unicus circulus est, nempe is, qui centro O radio Oa describitur. Is autem, quum latera EZ , AZ contingat, nequit simul latera EK , AK extra illa posita contingere.

$B\Gamma$, $\Gamma\Delta$, ΔA εὐθείας. Ἐφάπεται ἄρα αὐτῶν καὶ ἔσται ἐγγεγραμμένος εἰς τὸ $AB\Gamma\Delta$ τετράγωνον.

Εἰς ἄρα τὸ δοθὲν τετράγωνον κύκλος ἐγγέγραπται.
Ὅπερ ἔδει ποιῆσαι.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Θ'.

Περὶ τὸ δοθὲν τετράγωνον κύκλον περιγράψαι.

Ἔστω τὸ δοθὲν τετράγωνον τὸ $AB\Gamma\Delta$ · δεῖ δὴ περὶ τὸ $AB\Gamma\Delta$ τετράγωνον κύκλον περιγράψαι.

Ἐπεξευχθεῖσαι γὰρ αἱ $ΑΓ$, $B\Delta$ τεμνέτωσαν ἀλλήλας κατὰ τὸ E .

Καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΔA τῇ AB , κοινὴ δὲ ἡ $ΑΓ$, δύο δὴ αἱ ΔA , $ΑΓ$ δυοὶ ταῖς BA , $ΑΓ$ ἴσαι εἰσὶ, καὶ βάσις ἡ $\Delta Γ$ βάσει τῇ $B\Gamma$ ἴση· γωνία ἄρα ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ $\Delta ΑΓ$ γωνία τῇ ὑπὸ $B ΑΓ$ · ἡ ἄρα ὑπὸ ΔAB γωνία δίχα τέμνεται ὑπὸ τῆς $ΑΓ$. Ὅμοιως δὴ δεῖξομεν ὅτι καὶ ἑκάστη τῶν ὑπὸ $AB\Gamma$, $B\Gamma\Delta$, $\Gamma\Delta A$ δίχα τέμνεται ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, ΔB εὐθειῶν. Καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΔAB γωνία τῇ ὑπὸ $AB\Gamma$, καὶ ἐστὶ τῆς μὲν ὑπὸ ΔAB ἡμίσεια ἡ ὑπὸ EAB , τῆς δὲ ὑπὸ $AB\Gamma$ ἡμίσεια ἡ ὑπὸ EBA · καὶ ἡ ὑπὸ EAB ἄρα τῇ ὑπὸ EBA ἐστὶν ἴση· ὥστε καὶ πλευρὰ ἡ EA πλευρὰ τῇ EB ἐστὶν ἴση. Ὅμοιως δὴ δεῖξομεν ὅτι καὶ ἑκατέρα τῶν EA , EB εὐθειῶν ἑκατέρα τῶν $ΕΓ$, $ΕΔ$ ἴση ἐστὶν. Αἱ τέσσαρες ἄρα αἱ EA , EB ,

Obs. 7. In figuris circulo circumscriptis, quas numerum laterum imparem habent, propositio, quam Obs. 4. habuimus, etiam ita exprimi poterit: erit in illis summa laterum primi, tertii, quinti etc. aequalis summae laterum secundi, quarti etc. si huic addas duplum segmentum primi lateris, quod inter punctum contactus et eum eius terminum iacet, a quo numerare coeptum est, v. c. (Fig. 296.) in pentagono

$AB, B\Gamma, \Gamma A, AA$. Continget igitur ipsas et erit inscriptus in quadrato $AB\Gamma A$.

In dato igitur quadrato circulus inscriptus est. Quod oportebat facere.

PROPOSITIO IX. (Fig. 291.)

Circa datum quadratum circulum circumscribere.

Sit datum quadratum $AB\Gamma A$; oportet circa quadratum $AB\Gamma A$ circulum circumscribere.

Iunctae $A\Gamma, BA$ sese secant in E .

Et quoniam AA aequalis est AB , communis autem $A\Gamma$, duae $AA, A\Gamma$ duabus $BA, A\Gamma$ aequales sunt, et basis $A\Gamma$ basi $B\Gamma$ aequalis; angulus igitur $AA\Gamma$ aequalis est $BA\Gamma$ (I. 8.); angulus igitur AAB bifariam sectus est ab $A\Gamma$. Similiter ostendemus et unumquemque angulorum $AB\Gamma, B\Gamma A, \Gamma A A$ bifariam sectum esse a rectis $A\Gamma, AB$. Et quoniam aequalis est angulus AAB angulo $AB\Gamma$, et est ipsius AAB dimidius angulus EAB , et ipsius $AB\Gamma$ dimidius angulus EBA ; et EAB igitur angulo EBA erit aequalis. Quare et latus EA lateri EB est aequale (I. 6.). Similiter ostendemus, et utramque rectarum EA, EB utrique $E\Gamma, EA$ aequalem esse; quatuor igitur $EA, EB, E\Gamma, EA$ aequales inter se

circulo circumscripto, quod supra delineatum fuit, erat, si a puncto A versus B numerare incipias ex Obs. 4. $AB + \Gamma A + E\Gamma = B\Gamma + EA + A\Gamma$ unde si utrimque addas $A\Gamma$, erit $AB + \Gamma A + EA = B\Gamma + EA + 2A\Gamma = B\Gamma + EA + 2AA$. Hinc consequitur, si latera figurae circulo circumscriptae, quae numerum laterum imparem habet, omnia data sint, data etiam esse segmenta, in quae illa in puncto contactus dividuntur. Erit nempe $2AA$

$ΕΓ$, $ΕΔ$ ἴσαι ἀλλήλαις εἶσιν. Ὁ ἄρα κέντρον τῷ $Β$, καὶ διαστήματι ἐνὶ τῶν $ΕΑ$, $ΕΒ$, $ΕΓ$, $ΕΔ$ κύκλος γραφόμενος ἥξει καὶ διὰ τῶν λοιπῶν σημείων, καὶ ἔσται περιγεγραμμένος περὶ τὸ $ΑΒΓΔ$ τετράγωνον. Περιγεγράφθω ὡς ὁ $ΑΒΓΔ$.

Περὶ τὸ δοθὲν ἄρα τετράγωνον κύκλος περιγράφεται. Ὅπερ ἔδει ποιῆσαι.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Ι.

Ἰσοσκελὲς τρίγωνον συστήσασθαι, ἔχον ἑκατέρων τῶν πρὸς τῇ βάσει γωνιῶν διαπλασίονα τῆς λοιπῆς.

Ἐκκείσθω τις εὐθεῖα ἡ $ΑΒ$, καὶ τεταμῆσθω κατὰ τὸ $Γ$ σημεῖον, ὥστε τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$ περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον εἶναι τῷ ἀπὸ τοῦ $ΓΑ$ τετραγώνῳ· καὶ κέντρον μὲν τῷ $Α$, διαστήματι δὲ τῷ $ΑΒ$ κύκλος γεγράφθω ὁ $ΒΔΕ$, καὶ ἐνηρμόσθω εἰς τὸν $ΒΔΕ$ κύκλον τῇ $ΑΓ$ εὐθείᾳ, μὴ μείζονι οὕσῃ τῆς τοῦ $ΒΔΕ$ κύκλου διαμέτρου, ἴση εὐθεῖα ἡ $ΒΔ$ καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ $ΑΔ$, $ΓΔ$, καὶ περιγεγράφθω περὶ τὸ $ΑΓΔ$ τρίγωνον κύκλος ὁ $ΑΓΔ$.

Καὶ ἐπεὶ τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς $ΑΓ$, ἴση δὲ ἡ $ΑΓ$ τῇ $ΒΔ$ τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς $ΒΔ$. Καὶ ἐπεὶ κύκλον τοῦ $ΑΓΔ$ εἵληπται τι σημεῖον ἐκτὸς τὸ $Β$, καὶ ἀπὸ τοῦ $Β$ πρὸς τὸν $ΑΓΔ$ κύκλον προσπεπτώκασι δύο εὐθεῖαι αἱ $ΒΑ$, $ΒΔ$, καὶ ἡ μὲν αὐτῶν τέμνει, ἡ δὲ προσπίπτει, καὶ ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$ ἴσον τῷ ἀπὸ

$=AB+ΓΔ+ΕΑ-ΒΓ-ΔΕ$. Caeterum haec disquisitio a tertia inde observatione instituta primum facta est a Pírot. (Mém. de l'Acad. des Sc. de Paris 1725. p. 45.). Cf. Kraft. Geom. Sublim. §. 104.

sunt. Circulus igitur centro E , et intervallo aequali EA , EB , EF , EA descriptus transit et per reliqua puncta, et erit circumscriptus circa quadratum $ABFA$. Circumscribatur ut $ABFA$.

Circa datum igitur quadratum circulus circumscriptus est. Quod oportebat facere.

PROPOSITIO X. (Fig. 301.)

Isosceles triangulum constituere, habens utrumque angulorum ad basin duplum reliqui.

Ponatur aliqua recta AB , et secetur in puncto Γ , ita ut rectangulum sub AB , $B\Gamma$ contentum aequale sit quadrato ex ΓA (II. 11.); et centro A , et intervallo AB describatur circulus BAE (Post. 3.), et appetur in circulo BAE rectae $A\Gamma$, quae non maior est diametro circuli $BA\Gamma$, aequalis recta BA (IV. 1.); et iungantur AA , ΓA , et circumscribatur circa triangulum $A\Gamma A$ circulus $A\Gamma A$.

Et quoniam rectangulum sub AB , $B\Gamma$ aequale est quadrato ex $A\Gamma$, $A\Gamma$ autem aequalis BA , rectangulum igitur sub AB , $B\Gamma$ aequale est quadrato ex BA . Et quoniam extra circulum $A\Gamma A$ sumptum est aliquod punctum B , et a B in circulum $A\Gamma A$ cadunt duae rectae BA , BA , quarum altera quidem ipsum secat, altera vero in eum incidit; et est rectangulum

PROPOSITIO VIII.

Obs. Si cui rhombo dato $ABFA$ (Fig. 300.) circulus inscribendus est, quod ex Obs. 5. ad praeced. semper fieri potest, centrum quidem circuli inscribendi eadem ratione inveniri potest, ut hic pro quadrato ostensum fuit, ductis nempe

τῆς BA ἢ BA ἄρα ἐγράφεται τοῦ $ΑΓΔ$. [Καὶ ἐπεὶ
 ἐγράφεται μὲν ἡ BA , ἀπὸ δὲ τῆς κατὰ τὸ $Δ$ ἐπαφῆς
 διήκται ἡ $ΔΓ$ ἢ ἄρα ὑπὸ $ΒΔΓ$ γωνία ἴση ἐστὶ τῇ
 ἐν τῷ ἐναλλὰξ τοῦ κύκλου τμήματι γωνίᾳ τῇ ὑπὸ
 $ΔΑΓ$. Ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ $ΒΔΓ$ τῇ ὑπὸ $ΔΑΓ$,
 κοινῇ προσκείσθω ἡ ὑπὸ $ΓΔΑ$ ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ $ΒΔΑ$
 ἴση ἐστὶ δύοι ταῖς ὑπὸ $ΓΔΑ$, $ΔΑΓ$. Ἀλλὰ ταῖς
 ὑπὸ $ΓΔΑ$, $ΔΑΓ$ ἴση ἐστὶν ἡ ἐκτὸς ἡ ὑπὸ $ΒΓΔ$ ἢ
 ἄρα ὑπὸ $ΒΔΑ$ ἴση ἐστὶ τῇ ὑπὸ $ΒΓΔ$. Ἀλλ' ἡ ὑπὸ
 $ΒΔΑ$ τῇ ὑπὸ $ΓΒΔ$ ἐστὶν ἴση, ἐπεὶ καὶ πλευρὰ ἡ $ΔΑ$
 τῇ $ΑΒ$ ἐστὶν ἴση ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ $ΔΒΑ$ τῇ ὑπὸ $ΒΓΔ$
 ἐστὶν ἴση, Αἱ τρεῖς ἄρα αἱ ὑπὸ $ΒΔΑ$, $ΔΒΑ$, $ΒΓΔ$
 ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶν. Καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ $ΔΒΓ$
 γωνία τῇ ὑπὸ $ΒΓΔ$, ἴση ἐστὶ καὶ πλευρὰ ἡ $ΒΔ$ πλευρᾷ
 τῇ $ΔΓ$. Ἀλλ' ἡ $ΒΔ$ τῇ $ΓΑ$ ὑπόκειται ἴση καὶ ἡ
 $ΑΓ$ ἄρα τῇ $ΓΔ$ ἐστὶν ἴση ὥστε καὶ γωνία ἡ ὑπὸ
 $ΓΔΑ$ γωνία τῇ ὑπὸ $ΔΑΓ$ ἐστὶν ἴση· αἱ ἄρα ὑπὸ
 $ΓΔΑ$, $ΔΑΓ$ τῆς ὑπὸ $ΔΑΓ$ εἰσὶ διπλασίους. Ἰση δὲ
 καὶ ἡ ὑπὸ $ΒΓΔ$ ταῖς ὑπὸ $ΓΔΑ$, $ΔΑΓ$ καὶ ἡ ὑπὸ
 $ΒΓΔ$ ἄρα τῆς ὑπὸ $ΔΑΓ$ ἐστὶ διπλῇ. Ἰση δὲ ἡ ὑπὸ
 $ΒΓΔ$ ἐκατέρα τῶν ὑπὸ $ΒΔΑ$, $ΔΒΑ$ καὶ ἐκατέρα ἄρα
 τῶν ὑπὸ $ΒΔΑ$, $ΔΒΑ$ τῆς ὑπὸ $ΒΔΑ$ ἐστὶ διπλῇ.

rectis ZK , $EΘ$ per puncta, quae latera rhombi opposita bis-
 riam dividunt, eruntque adhuc ut ante $ZH=HK=HE=HQ=$
 $\frac{AD}{2}$: at circulus inscribendus iam alium radium habebit, qui
 invenitur, demisso ex H ad unum laterum rhombi v. c. AD
 perpendicularo He , quod, ut facile probatur, aequale est per-
 pendiculo cuicumque ex H in reliqua latera demisso v. c. $Hζ$.
 Est enim in triangulis HEe , $HζZ$, $HE=Hζ$, angulus $E=Z$ et
 ad e et $ζ$ sunt anguli recti, unde ex I. 26. est $Hε=Hζ$, et
 circulus centro H radio $Hε$ descriptus etiam per puncta $ζ$, $θ$.

sub AB, BF aequale quadrato ex BA , recta BA contingit circulum AGA (III. 37.). Quoniam igitur BA contingit, a contactu vero ad A ducta est AF ; angulus igitur BAG aequalis est angulo AGA in alterno circuli segmento (III. 32.). Quoniam igitur aequalis est angulus BAG angulo AGA , communis addatur GAA . Totus igitur BAA aequalis est duobus GAA, AAG . Sed angulus GAA, AAG aequalis est exterior BGA (I. 32.); angulus igitur BAA aequalis est angulo BGA . Sed angulus BAA angulo GBA est aequalis, quoniam et latus AA lateri AB est aequale (I. 5.); quare et ABA ipsi BGA est aequalis. Tres igitur BAA, ABA, BGA aequales inter se sunt. Et quoniam aequalis est angulus ABG angulo BGA , et latus BA aequale est lateri AG (I. 6.). Sed BA ipsi GA ponitur aequalis; et AG igitur ipsi GA est aequalis; quare et angulus GAA angulo AAG est aequalis (I. 5.); anguli igitur GAA, AAG anguli AAG sunt dupli. Aequalis autem et BGA angulis GAA, AAG (I. 32.); et BGA igitur anguli AAG est duplus. Aequalis autem et BGA utrique angulorum BAA, ABA , uterque igitur angulorum BAA, ABA anguli BAA est duplus.

* transit, et rhombum in his punctis contingit (III. 16. Cor. 1.). Paullo brevius centrum H inveniatur, ductis diagonalibus AF, BA , quae pariter in H se intersecant.

PROPOSITIO IX.

Obs. Eadem constructione etiam circa rectangulum non aequilaterum circulus circumscribetur, quod fieri semper posse patet ex Obs. 5. ad III. 22. Demonstratio tantum paulo diversa erit, et absolvetur ope I. 34. Cor. 1. et I. 34. Cor. 17.

Ἰσοσκελὲς ἄρα τρίγωνον συνίσταται τὸ $ΑΒΒ$, ἔχον ἑκατέραν τῶν πρὸς τῇ $ΑΒ$ βάσει γωνιῶν διπλασίονα τῆς λοιπῆς. Ὅπερ ἔδει ποιῆσαι.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ια΄.

Εἰς τὸν δοθέντα κύκλον πεντάγωνον ἰσοπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον ἐγγράψαι.

Ἐστω ὁ δοθείς κύκλος ὁ $ΑΒΓΔΕ$. δεῖ δὴ εἰς τὸν $ΑΒΓΔΕ$ κύκλον πεντάγωνον ἰσοπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον ἐγγράψαι.

Ἐκκεῖσθω τρίγωνον ἰσοσκελὲς τὸ $ΖΗΘ$, διπλασίονα ἔχον ἑκατέραν τῶν πρὸς τοῖς $Η, Θ$ γωνιῶν τῆς πρὸς τῷ $Ζ$, καὶ ἐγγεγράφθω εἰς τὸν $ΑΒΓΔΕ$ κύκλον τῷ $ΖΗΘ$ τριγώνῳ ἰσογώνιον τρίγωνον τὸ $ΑΓΔ$, ὥστε τῇ μὲν πρὸς τῷ $Ζ$ γωνίᾳ ἴσην εἶναι τὴν ὑπὸ $ΓΑΔ$, ἑκατέραν δὲ τῶν πρὸς τοῖς $Η, Θ$ ἴσην ἑκατέρα τῶν ὑπὸ $ΑΓΔ, ΓΔΑ$ καὶ ἑκατέρα ἄρα τῶν ὑπὸ $ΑΓΔ, ΓΔΑ$ τῆς ὑπὸ $ΓΑΔ$ ἐστὶ διπλῇ. Τετμησθω δὴ ἑκατέρα τῶν ὑπὸ $ΑΓΔ, ΓΔΑ$ δίχα ὑπὸ τῶν $ΓΕ, ΔΒ$ εὐθεϊῶν, καὶ ἐπεξενήχθωσαν αἱ $ΑΒ, ΒΓ, ΔΕ, ΕΑ$.

Ἐπεὶ οὖν ἑκατέρα τῶν ὑπὸ $ΑΓΔ, ΓΔΑ$ γωνιῶν διπλασίον ἐστὶ τῆς ὑπὸ $ΓΑΔ$, καὶ τετμημέναι εἰσὶ

PROPOSITIO X.

Praemitti potest huic problemati sequens analysis. Puta factum, sitque $ΑΒΔ$ triangulum aequicrurum, in quo uterque angulorum ad basin duplus est reliqui. Bisecetur unus angulorum ad basin recta $ΔΓ$ (I. 9.), eritque angulus $ΒΔΓ=ΒΔΑ$, pariterque $ΓΔΑ=ΒΔΑ$, adeoque (I. 5.) $ΔΓ=ΓΑ$. Praeterea, quum in triangulis $ΒΓΔ, ΒΔΑ$ sit $ΒΔΓ=ΒΔΑ$, et angulus $Β$ communis, erit etiam reliquus $ΒΓΔ=ΑΔΒ$ (I. 32.). At ex Hyp. $ΑΒΔ=ΑΔΒ$: erit itaque $ΒΓΔ=ΑΒΔ$, adeoque $ΔΓ=ΒΔ$. Praeterea, si triangulo $ΑΓΔ$ circumscribatur circulus

Isosceles igitur triangulum constitutum est AAB habens utrumque angulorum ad AB basin duplum reliqui. Quod oportebat facere.

PROPOSITIO XI. (Fig. 302.)

In dato circulo pentagonum aequilaterum et aequi-
angulum inscribere.

Sit datus circulus $AB\Gamma\Delta E$; oportet in circulo $AB\Gamma\Delta E$ pentagonum aequilaterum et aequiangulum inscribere.

Ponatur triangulum isosceles $ZH\Theta$ duplum habens utrumque angulorum ad H, Θ anguli ad Z (IV. 10.), et inscribatur in circulo $AB\Gamma\Delta E$, triangulo $ZH\Theta$ aequiangulum triangulum $A\Gamma\Delta$ (IV. 2.), ita ut angulo quidem Z aequalis sit angulus ΓAA , uterque vero angulorum ad H, Θ aequalis utrique angulorum $A\Gamma\Delta, \Gamma AA$; et uterque igitur angulorum $A\Gamma\Delta, \Gamma AA$ anguli ΓAA est duplus. Secetur autem uterque angulorum $A\Gamma\Delta, \Gamma AA$ bifariam a rectis $\Gamma E, AB$ (I. 9.) et iungantur $AB, B\Gamma, \Delta E, EA$.

Quoniam igitur uterque angulorum $A\Gamma\Delta, \Gamma AA$ duplus est anguli ΓAA ; et secti sunt bifariam a re-

(IV. 5.), ob angulum $B\Gamma\Gamma = BAA$, BA hunc circulum continget (Obs. 2. ad III. 32.), adeoque erit $BA\eta = AB \times B\Gamma$ (III. 36.), vel ob $BA = A\Gamma = A\Gamma$, $A\Gamma\eta = AB \times B\Gamma$. Solutio problematis itaque eo redit, ut recta AB ita secetur in Γ , ut rectangulum sub tota et segmento $B\Gamma$ aequale sit quadrato reliqui segmenti $A\Gamma$ i. e. ad II. 1f. Quo facto sumenda erit in circulo BAE recta $BA = A\Gamma$, et ducenda AA . Cacterum manifestum est, positionem rectae AB pro lubitu sumi, itaque, si datum sit punctum A , punctum B in circumferentia cir-

δ'χα ὑπὸ τῶν $ΓΕ$, $ΔΒ$ εὐθειῶν αἱ πέντε ἄρα γωνίαι αἱ ὑπὸ $ΔΑΓ$, $ΑΓΕ$, $ΕΓΔ$, $ΓΔΒ$, $ΒΔΑ$ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν. Αἱ δὲ ἴσαι γωνίαι ἐπὶ ἴσων περιφερειῶν βεβήκασιν· αἱ πέντε ἄρα περιφέρειαι αἱ $ΑΒ$, $ΒΓ$, $ΓΔ$, $ΔΕ$, $ΕΑ$ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν. Ὑπὸ δὲ τὰς ἴσας περιφερείας ἴσαι εὐθεῖαι ὑποτείνουσιν αἱ πέντε ἄρα εὐθεῖαι αἱ $ΑΒ$, $ΒΓ$, $ΓΔ$, $ΔΕ$, $ΕΑ$ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν· ἰσοπλευρον ἄρα ἐστὶ τὸ $ΑΒΓΔΕ$ πεντάγωνον. Λέγω δὲ ὅτι καὶ ἰσογώνιον. Ἐπεὶ γάρ ἡ $ΑΒ$ περιφέρεια τῇ $ΔΕ$ περιφερείᾳ ἐστὶν ἴση, κοινὴ προσεσθὶς ἡ $ΒΓΔ$ ὅλη ἄρα ἡ $ΑΒΓΔ$ περιφέρεια ὅλη τῇ $ΕΑΓΒ$ περιφερείᾳ ἐστὶν ἴση. Καὶ μῆρκεν ἐπὶ μὲν τῆς $ΑΒΓΔ$ περιφερείας γωνία ἡ ὑπὸ $ΑΕΔ$, ἐπὶ δὲ τῆς $ΕΑΓΒ$ περιφερείας γωνία ἡ ὑπὸ $ΒΑΕ$ · καὶ ἡ ὑπὸ $ΒΑΕ$ ἄρα γωνία τῇ ὑπὸ $ΑΕΔ$ ἐστὶν ἴση. Διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἐκάστη τῶν ὑπὸ $ΑΒΓ$, $ΒΓΔ$, $ΓΔΕ$ γωνιῶν ἐκατέρα τῶν ὑπὸ $ΒΑΕ$, $ΑΕΔ$ ἐστὶν ἴση· ἰσογώνιον ἄρα ἐστὶ τὸ $ΑΒΓΔΕ$ πεντάγωνον. Ἐδείχθη δὲ καὶ ἰσοπλευρον.

culi $ΒΑΕ$ pro lubitu sumi aut datum esse posse. Compositio deinde fiet, ut apud Euclidem.

Cor. 1. Quum $ΑΒΔ = ΑΔΒ = 2ΒΑΔ$, erit $ΒΑΔ = \frac{ΑΒΔ + ΑΔΒ + ΒΑΔ}{5}$, vel, quum $ΑΒΔ + ΑΔΒ + ΒΑΔ = 2$ rectis (I. 32.), erit $ΒΑΔ = \frac{2 \text{ Rect.}}{5} = \frac{4 \text{ Rect.}}{10}$, et angulus $ΑΒΔ = \frac{4 \text{ Rect.}}{5}$.

Cor. 2. Simul cum nostro problemate solutum est etiam hoc: Isosceles triangulum constituere, cuius angulus ad verticem triplus sit utriusque anguli ad basin. Id nempe est triangulum $ΑΓΔ$, quod vidimus esse isosceles, nempe $ΑΓ = ΓΔ$, et in quo angulus $ΑΓΔ = ΑΒΔ + ΒΔΓ = 3ΒΔΓ = 3ΓΔΑ =$

ctis FE , AB ; quinque igitur anguli $\angle A\Gamma F$, $\angle AFE$, $\angle F\Gamma A$, $\angle F\Gamma B$, $\angle B\Gamma A$ aequales inter se sunt. Aequales autem anguli aequalibus circumferentiis insistant (III. 26.); quinque igitur circumferentiae AB , BF , ΓA , ΔE , EA aequales inter se sunt. Aequales autem circumferentias aequales rectae subtendunt (III. 29.); quinque igitur rectae AB , BF , ΓA , ΔE , EA aequales inter se sunt; aequilaterum igitur est $ABF\Delta E$ pentagonum. Dico et aequiangulum. Quoniam enim circumferentia AB circumferentiae ΔE est aequalis, communis addatur $B\Gamma A$; tota igitur circumferentia $AB\Gamma A$ toti circumferentiae $E\Gamma B$ est aequalis. Et insistit quidem circumferentiae $AB\Gamma A$ angulus AEA , circumferentiae vero $E\Gamma B$ angulus BAE , et angulus BAE igitur angulo AEA est aequalis (III. 27.) Ex eadem ratione unusquisque angulorum $AB\Gamma$, $B\Gamma A$, $\Gamma A E$ alterutri angulorum BAE , AEA est aequalis; aequiangulum igitur est pentagonum $ABF\Delta E$. Ostensum est autem et aequilaterum.

3 $\Gamma A\Delta$. Et vice versa, si quis construere sciat triangulum isosceles $\Gamma A\Delta$, in quo $\angle \Gamma A\Delta = 3\angle A\Delta\Gamma$, construere quoque poterit triangulum isosceles BAA , in quo $BAA = \frac{AB\Delta}{2}$.

Obs. 2. Campanus et Peletarius, ut bene monet Clavius, sine causa se excruciant, ut probent, rectam $B\Delta$ contingere circumulum $\Gamma A\Delta$, quum id ex III. 37. manifesto consequatur. Id autem iure observat Campanus, circulos $\Gamma A\Delta$, BAB se in puncto A non contingere, sed se iterum secare in puncto aliquo E , ita, ut arcus maioris circuli $\Delta E = BA$, pariterque arcus minoris circuli $\Delta E = \Gamma A$. Quod facile ita probatur. Hi circuli se non contingunt in A , si enim contingerent, recta BA , quae minorem contingit, contingeret etiam maiorem (Obs. 2. ad III. 17.). Eadem autem maiori inscripta est

Εἰς ἄρα τὸν δοθέντα κύκλον πεντάγωνον ἰσό-
πλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον ἐγγράφηται. Ὅπερ εἶδει
ποιῆσαι.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ιβ.

Περὶ τὸν δοθέντα κύκλον πεντάγωνον ἰσόπλευρόν
τε καὶ ἰσογώνιον περιγράψαι.

Ἐστω ὁ δοθείς κύκλος ὁ $ΑΒΓΔΕ$. δεῖ δὴ περὶ
τὸν $ΑΒΓΔΕ$ κύκλον πεντάγωνον ἰσόπλευρόν τε καὶ
ἰσογώνιον περιγράψαι.

Νενοήσθω τοῦ ἐγγεγραμμένου πενταγώνου τῶν
γωνιῶν σημεῖα, τὰ $A, B, Γ, Δ, E$, ὥστε ἴσας εἶναι
τὰς $ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ, ΔΕ, ΕΑ$ περιφερείας· καὶ διὰ
τῶν $A, B, Γ, Δ, E$ ῥηθῶσαν τοῦ κύκλου ἐφαπτό-
μεναι αἱ $HΘ, ΘΚ, ΚΛ, ΛΜ, ΜΗ$. καὶ εἰλήφθω
τοῦ $ΑΒΓΔΕ$ κύκλου κέντρον τὸ Z , καὶ ἐπεξεύχθω-
σαν αἱ $ZB, ZK, ZΓ, ΖΑ, ΖΔ$.

q. e. a. Secent igitur se in E , eritque, ductis rectis AE ,
 $ΔΕ$, angulus $ΑΕΔ = ΒΓΔ$ (III. 22. Cor. 1.) $= ΑΒΔ$. Est au-
tem etiam, ob $AE = AD$ (I. Def. 15.) $ΑΔΕ = ΑΒΔ$ (I. 5.)
 $= ΑΒΔ = ΑΔΒ$. Itaque (I. 32.) aequiangula sunt triangu-
la $ΑΔΕ, ΑΔΒ$, et nominatim angulus $ΔΑΕ = ΒΑΔ$, unde et ar-
cus maioris circuli $ΔΕ = ΔΒ$ (III. 26.) et recta $ΔΕ = ΒΔ$ (III.
29.) $= ΓΔ$, adeoque et arcus minoris circuli $ΔΕ = ΓΔ$. Pe-
letarius addit, rectam $ΓΔ$ vel $ΑΓ$ esse latus pentagoni regu-
laris circulo $ΑΓΔ$ inscripti. Nempe quum, ut vixdum vidi-
mus, sit arcus $ΔΕ = ΓΔ$, recta autem $ΓΔ = ΑΓ$, erit etiam
arcus $ΑΓ = ΓΔ = ΔΕ$ (III. 28.). Eodem modo, quum recta
 $ΑΕ = ΑΔ$, erit arcus $ΑΖΒ = ΑΓΔ$ (III. 28.), adeoque, si is
bifariam secetur, circulus $ΑΓΔ$ in quinque arcus aequales di-
visus erit, quorum chordae aequales sunt (III. 29.) et binae
proximae angulos aequales comprehendunt (III. 27.).

In dato igitur circulo pentagonum aequilaterum et aequiangulum inscriptum est. Quod oportebat facere.

PROPOSITIO XII. (Fig. 303.)

Circa datum circulum pentagonum aequilaterum et aequiangulum circumscribere.

Sit datus circulus $AB\Gamma\Delta E$; oportet circa circulum $AB\Gamma\Delta E$ pentagonum aequilaterum et aequiangulum circumscribere.

Intelligentur inscripti pentagoni angularum puncta A, B, Γ, Δ, E , ita ut aequales sint $AB, B\Gamma, \Gamma\Delta, \Delta E, EA$ circumferentiae; et per A, B, Γ, Δ, E ducantur rectae circulum contingentes $HO, \Theta K, KA, AM, MH$ (III. 17.); et sumatur circuli $AB\Gamma\Delta E$ centrum Z , et iungantur $ZB, ZK, Z\Gamma, ZA, ZE$.

PROPOSITIO XI.

Cor. (Clavii.) Quam ex IV. 10. Cor. 1. angulus $\Gamma\Delta\Delta$ sit $\frac{2}{3}$ rect. sit autem $B\Delta\Gamma = \Gamma\Delta\Delta = \Delta\Delta E$, sequitur, angulum $B\Delta E$ pentagoni regularis complecti sex quintas unius recti, vel tres quintas duorum rectorum; quod consentit cum I. 32. Cor. 18.; angulus autem $ABE = AEB$ erit (I. 32.) quinta pars duorum rectorum: itaque angulus $B\Delta E$ triplus est anguli ABE . Cf. IV. 10. Cor. 2. Caeterum simpliciore propositionis IV. 11. solutionem dabit XIII. 10.

Obs. Eodem modo, quo hic ostensum fuit, descriptionem pentagoni regularis in dato circulo pendere a constructione trianguli aequicruri, cuius angulus ad basin uterque duplus sit reliqui — dum nempe ope huius trianguli, aliisque illi aequicruri in dato circulo descripti circulus in quinque partes aequales divisus fuit, quo facto res erat facillima — generaliter demonstrabitur, descriptionem polygoni regularis cuius-

Καὶ ἐπεὶ ἡ μὲν $ΚΑ$ εὐθεία ἐφάπτεται τοῦ $ΑΒΓΔΕ$ κύκλου κατὰ τὸ $Γ$, ἀπὸ δὲ τοῦ $Ζ$ κέντρου ἐπὶ τὴν κατὰ τὸ $Γ$ ἑπαφὴν ἐπέξτεται ἡ $ΖΓ$ ἡ $ΖΓ$ ἄρα κέντρος ἐστὶν ἐπὶ τὴν $ΚΑ$ ὀρθὴ ἄρα ἐστὶν ἑκατέρα τῶν πρὸς τῷ $Γ$ γωνιών. Διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ αἱ πρὸς τοῖς $Β$, $Δ$ σημείοις γωνίαι ὀρθαὶ εἰσιν. Καὶ ἐπεὶ ὀρθὴ ἐστὶν ἡ ὑπὸ $ΖΓΚ$ γωνία, τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς $ΖΚ$ ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν $ΖΓ$, $ΓΚ$. Διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τοῖς ἀπὸ τῶν $ΖΒ$, $ΒΚ$ ἴσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς $ΖΚ$ ὥστε τὰ ἀπὸ τῶν $ΖΓ$, $ΓΚ$ τοῖς ἀπὸ τῶν $ΖΒ$, $ΒΚ$ ἐστὶν ἴσα, ὡν τὸ ἀπὸ τῆς $ΖΓ$ τῷ ἀπὸ τῆς $ΖΒ$ ἐστὶν ἴσον· λοιπὸν ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς $ΓΚ$ λοιπὸν τῷ ἀπὸ τῆς $ΒΚ$ ἐστὶν ἴσον, ἴση ἄρα ἡ $ΓΚ$ τῇ $ΒΚ$. Καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ $ΖΒ$ τῇ $ΖΓ$, καὶ κοινὴ ἡ $ΖΚ$, δύο δὴ αἱ $ΒΖ$, $ΖΚ$ δυοὶ ταῖς $ΓΖ$, $ΖΚ$ ἴσαι εἶσι, καὶ βάσεις ἡ $ΒΚ$ βάσει τῇ $ΓΚ$ ἐστὶν ἴση· γωνία ἄρα ἡ μὲν ὑπὸ $ΒΖΚ$ γωνία τῇ ὑπὸ $ΚΖΓ$ ἐστὶν ἴση, ἡ δὲ ὑπὸ $ΒΚΖ$ τῇ ὑπὸ $ΖΚΓ$ ἐστὶν ἴση· διπλὴ ἄρα ἡ μὲν ὑπὸ $ΒΖΓ$ τῆς ὑπὸ $ΚΖΓ$, ἡ δὲ ὑπὸ $ΒΚΓ$ τῆς ὑπὸ $ΖΚΓ$. Διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ μὲν ὑπὸ $ΓΖΔ$ τῆς $ΓΖΑ$ ἐστὶ διπλὴ ἡ δὲ ὑπὸ $ΓΑΔ$ τῆς ὑπὸ $ΓΑΖ$. Καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ $ΒΓ$ περιφέρεια τῇ $ΓΔ$, ἴση ἐστὶ καὶ γωνία ἡ ὑπὸ $ΒΖΓ$ τῇ ὑπὸ $ΓΖΔ$. Καὶ ἐστὶν ἡ μὲν ὑπὸ $ΒΖΓ$ τῆς ὑπὸ $ΚΖΓ$ διπλὴ, ἡ δὲ ὑπὸ $ΔΖΓ$ διπλὴ τῆς ὑπὸ $ΑΖΓ$ · ἴση ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ $ΚΖΓ$ τῇ ὑπὸ $ΑΖΓ$ · ἐστὶ δὲ καὶ ἡ ὑπὸ $ΖΓΚ$ γωνία τῇ ὑπὸ $ΖΓΑ$ ἴση. Δύο δὴ τρίγωνά ἐστι τὰ $ΖΚΓ$, $ΖΑΓ$

cunque, quod numerum laterum imparem $=2n+1$ habeat, pendere a descriptione trianguli aequicruri, [cuius angulus ad basin uterque sit n plus reliqui anguli, ita ut v. gr. pro heptagono angulus ad basin triplus esse debeat anguli ad verticem; in enneagono 4 plus etc. vel, quod eodem redit, et p^{ro}

Et quoniam recta KA contingit circulum $AB\Gamma\Delta E$ in Γ , a centro autem Z in contactum ad Γ ducta est $Z\Gamma$; erit $Z\Gamma$ perpendicularis ad KA (III. 18.); rectus igitur est uterque angulorum ad Γ . Ex eadem ratione anguli ad puncta B , Δ recti sunt. Et quoniam rectus est angulus $Z\Gamma K$, quadratum ex ZK aequale est quadratis ex $Z\Gamma$, ΓK (I. 47.). Ex eadem ratione et quadratis ex ZB , BK aequale est quadratum ex ZK ; quare quadrata ex $Z\Gamma$, ΓK quadratis ex ZB , BK aequalia sunt, quorum quadratum ex $Z\Gamma$ quadrato ex ZB est aequale; reliquum igitur ex ΓK reliquo ex BK est aequale; aequalis igitur recta ΓK rectae BK . Et quoniam aequalis est ZB ipsi $Z\Gamma$, et communis ZK , duae BZ , ZK duabus ΓZ , ZK aequales sunt, et basis BK basi ΓK est aequalis; angulus igitur BZK angulo $KZ\Gamma$ est aequalis (I. 8.), angulus autem BKZ angulo $ZK\Gamma$ est aequalis; duplus igitur angulus $BZ\Gamma$ anguli $KZ\Gamma$, angulus, autem $BK\Gamma$ anguli $ZK\Gamma$. Ex eadem ratione et angulus ΓZA anguli ΓZA est duplus, angulus autem ΓAA anguli ΓAZ . Et quoniam aequalis est circumferentia $B\Gamma$ ipsi ΓA , aequalis est et angulus $BZ\Gamma$ angulo ΓZA (III. 27.). Et est angulus $BZ\Gamma$ anguli $KZ\Gamma$ duplus, angulus autem $\Delta Z\Gamma$ duplus anguli $AZ\Gamma$; aequalis igitur et $KZ\Gamma$ ipsi $AZ\Gamma$; est autem et angulus $Z\Gamma K$ angulo $Z\Gamma A$ aequalis. Duo itaque triangula sunt $ZK\Gamma$, $Z\Gamma A$ duos angulos duobus an-

omnibus polygonis regularibus valet, a divisione circuli in tot partes aequales, quot latera habere debet polygonum describendum. Sin autem polygonum parem laterum numerum $=2n$ habeat, pendebit eius descriptio a descriptione trianguli aequieruri, cuius angulus ad basin uterque sit $(n-1/2)$

τὰς δύο γωνίας ταῖς δυσὶ γωνίαις ἴσας ἔχοντα ἐκατέραν ἐκατέρα, καὶ μίαν πλευρὰν μιᾷ πλευρᾷ ἴσην, κοινὴν αὐτῶν τὴν $ZΓ$, καὶ τὰς λοιπὰς ἄρα πλευρὰς ταῖς λοιπαῖς πλευραῖς ἴσας ἔξει, καὶ τὴν λοιπὴν γωνίαν τῇ λοιπῇ γωνίᾳ ἴση ἄρα ἡ μὲν $ΚΓ$ εὐθεῖα τῇ $ΓΑ$, ἡ δὲ ὑπὸ $ZΚΓ$ γωνία τῇ ὑπὸ $ΖΑΓ$. Καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ $ΚΓ$ τῇ $ΓΑ$, διπλῇ ἄρα ἡ $ΚΑ$ τῆς $ΚΓ$. Διὰ τὰ αὐτὰ δὲ δεῖχθήσεται, καὶ ἡ $ΘΚ$ τῆς $ΒΚ$ διπλῇ. Καὶ ἐστὶν ἡ $ΒΚ$ τῇ $ΚΓ$ ἴση γ'. καὶ $ΘΚ$ ἄρα τῇ $ΚΑ$ ἐστὶν ἴση. Ὀμοίως δὲ δεῖχθήσεται καὶ ἐκάστη τῶν $ΘΗ$, $ΗΜ$, $ΜΑ$ ἐκατέρα τῶν $ΘΚ$, $ΚΑ$ ἴση· ἰσοπλευρον ἄρα ἐστὶ τὸ $ΗΘΚΑΜ$ πεντάγωνον. Λέγω δὲ ὅτι καὶ ἰσογώνιον. Ἐπεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ $ZΚΓ$ γωνία τῇ ὑπὸ $ΖΑΓ$, καὶ ἐδείχθη τῆς μὲν ὑπὸ $ZΚΓ$ διπλῇ ἢ ὑπὸ $ΘΚΑ$, τῆς δὲ ὑπὸ $ΖΑΓ$ διπλῇ ἢ ὑπὸ $ΚΑΜ$ · καὶ ἡ ὑπὸ $ΘΚΑ$ ἄρα τῇ ὑπὸ $ΚΑΜ$ ἐστὶν ἴση. Ὀμοίως δὲ δεῖχθήσεται καὶ ἐκάστη τῶν ὑπὸ $ΚΘΗ$, $ΘΗΜ$, $ΗΜΑ$ ἐκατέρα τῶν ὑπὸ $ΘΚΑ$, $ΚΑΜ$ ἴση· αἱ πέντε ἄρα γωνίαι αἱ ὑπὸ $ΗΘΚ$, $ΘΚΑ$, $ΚΑΜ$, $ΑΜΗ$, $ΜΗΘ$ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν. Ἰσογώνιον ἄρα ἐστὶ τὸ $ΗΘΚΑΜ$ πεντάγωνον. Ἐδείχθη δὲ καὶ ἰσοπλευρον, καὶ περιγράφεται περὶ τὸν $ΑΒΓΔΕ$ κύκλον. Ὅπερ ἔδει ποιῆσαι.

Π Ρ Ο Τ Α Σ Ι Σ ιγ'.

Εἰς τὸ δοθὲν πεντάγωνον, ὃ ἐστὶν ἰσοπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον, κύκλον ἐγγράψαι.

1) Edd. Oxon. et Basil. habent: καὶ ἐπεὶ ἐδείχθη ἴση ἡ $ΒΚ$ τῇ $ΚΓ$, καὶ ἐστὶ διπλῇ ἡ μὲν $ΚΑ$ τῆς $ΚΓ$, ἡ δὲ $ΘΚ$ τῆς $ΒΚ$ καὶ $ΘΚ$ ἄρα τῇ $ΚΑ$ ἐστὶν ἴση: quae verba, quum sint mera repetitio eius, quod modo dictum erat, cum Peyrardo et Cod. a. omisimus.

plus reliqui anguli, ita ut v. c. pro octogono angulus ad be-

gulis aequales habentia utrumque utrique, et unum latus uni lateri aequale, commune ipsis ZI' , et reliqua igitur latera reliquis lateribus aequalia habebunt, et reliquum angulum reliquo angulo (I. 26.); aequalis igitur recta KI' rectae IA , angulus vero ZKI' angulo ZAI' . Et quoniam aequalis est KI' ipsi IA , dupla igitur KA ipsius KI' . Ex eadem ratione et OK ipsius BK dupla ostendetur. Et est BK ipsi KI' aequalis; et OK igitur ipsi KA est aequalis. Similiter ostendetur et unaquaeque rectarum OH , HM , MA alterutri ipsarum OK , KA aequalis; aequilaterum igitur est pentagonum $HOKAM$. Dico autem et aequiangulum. Quoniam enim aequalis est angulus ZKI' angulo ZAI' , et ostensus est anguli ZKI' duplus angulus OKA , anguli autem ZAI' duplus angulus KAM ; et angulus OKA angulo KAM est aequalis. Similiter et unusquisque angulorum KOH , OHM , HMA ostendetur alterutri angulorum OKA , KAM aequalis; quinque igitur anguli HOK , OKA , KAM , AMH , MHO aequales inter se sunt. Aequiangulum igitur est pentagonum $HOKAM$. Ostensum est autem et aequilaterum, et circumscriptum est circa circulum $ABΓΔΕ$. Quod oportebat facere.

PROPOSITIO XIII. (Fig. 304.)

In dato pentagono, aequilatero et aequiangulo, circulum inscribere.

sin $(4 - \frac{1}{2})$ plus vel $\frac{1}{2}$ plus anguli ad verticem esse debeat. Cf. Tacquet. Euclid. ed. Whiston. Schol. 1. ad V. 11.; Barrow. Euclid. Schol. ad IV. 11.; Clavius Schol. ad IV. 16.; Boermannus Schol. 3. ad IV. 11. alique. Potest etiam haec observatio pro polygonis imparem aut parum laterum nu-

Ἐστω τὸ δοθὲν πεντάγωνον, ἰσοπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον, τὸ $ABΓΔΕ$. δεῖ δὴ εἰς τὸ $ABΓΔΕ$ πεντάγωνον κύκλον ἐγγράψαι.

Τετμήσθω γὰρ ἑκατέρα τῶν ὑπὸ $ΒΓΔ$, $ΓΔΕ$ γωνιῶν διχα ὑφ' ἑκατέρας τῶν $ΓΖ$, $ΔΖ$ εὐθειῶν καὶ ὑπὸ τοῦ Z σημείου, καθ' ὃ συμβάλλουσιν ἀλλήλαις αἱ $ΓΖ$, $ΔΖ$ εὐθεῖαι, ἐπεξερχθῶσαν αἱ ZB , ZA , ZE εὐθεῖαι. Καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ $ΒΓ$ τῇ $ΓΔ$, κοινὴ δὲ ἡ $ΓΖ$, δύο δὴ αἱ $ΒΓ$, $ΓΖ$ δυοὶ ταῖς $ΔΓ$, $ΓΖ$ ἴσαι εἰσὶ, καὶ γωνία ἡ ὑπὸ $ΒΓΖ$ γωνία τῇ ὑπὸ $ΔΓΖ$ ἴση ἐστὶ βάσις ἄρα ἡ BZ τῇ βάσει $ΔΖ$ ἐστὶν ἴση, καὶ τὸ BZF τρίγωνον τῷ $ΔΖΓ$ τριγώνῳ ἐστὶν ἴσον, καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι ταῖς λοιπαῖς γωνίαις ἴσαι εἰσὶν, ὑφ' ἧς αἱ ἴσαι πλευραὶ ὑποτείνουσιν· ἴση ἄρα ἡ ὑπὸ $ΓΒΖ$ γωνία τῇ ὑπὸ $ΓΔΖ$. Καὶ ἐπεὶ διπλὴ ἐστὶν ἡ ὑπὸ $ΓΔΕ$ τῆς ὑπὸ $ΓΔΖ$, ἴση δὲ ἡ μὲν ὑπὸ

merum habentibus una regula comprehendendi, nempe, si numerus laterum polygoni describendi sit $=N$, eius descriptio pendebit a descriptione trianguli isoscelis, in quo utervis angulus ad basin sit $\left(\frac{N-1}{2}\right)$ plus anguli ad verticem. Tum vero, ut facile (IV. 10. Cor. 2.) probatur, simul in potestate erit describere triangulum isosceles, cuius angulus ad verticem sit $(N-2)$ plus utriusvis anguli ad basin, et vice versa. Possunt autem etiam polygoni, quae parem laterum numerum habeant, quando is non est formae $2n$, reduci ad polygoni, quae impari laterum numerum habent; si autem est formae $2n$, ad quadrata.

PROPOSITIO XII.

Obs. 1. Probandum erat ante omnia, quod Austin. monet, rectas $ΘΚ$, $ΚΑ$, $ΑΜ$ etc. inter se convenire, quod, ductis rectis $ΒΓ$, $ΓΔ$ etc. facile eodem modo probatur, ac in IV. 3. vidimus.

Sit datum pentagonum aequilaterum et aequiangulum $AB\Gamma\Delta E$; oportet in pentagono $AB\Gamma\Delta E$ circumulum inscribere.

Secetur uterque angulorum $B\Gamma A$, $\Gamma\Delta E$ bifariam ab utraque rectorum ΓZ , ΔZ (I. 9.); et a puncto Z , in quo conveniunt inter se rectae ΓZ , ΔZ , ducantur rectae ZB , ZA , ZE . Et quoniam $B\Gamma$ aequalis est ΓA , communis autem ΓZ , duae $B\Gamma$, ΓZ duabus $\Delta\Gamma$, ΓZ aequales sunt, et angulus $B\Gamma Z$ angulo $\Delta\Gamma Z$ aequalis est; basis igitur BZ basi ΔZ est aequalis (I. 4.), et triangulum BZI triangulo $\Delta Z\Gamma$ est aequale, et reliqui anguli reliquis angulis aequales sunt, quos aequalia latera subtendunt; aequalis igitur angulus ΓBZ angulo $\Gamma\Delta Z$. Et quoniam duplus est $\Gamma\Delta E$ anguli $\Gamma\Delta Z$, aequalis autem angulus $\Gamma\Delta E$ angulo $AB\Gamma$, angulus vero $\Gamma\Delta Z$ angulo ΓBZ , et angulus $\Gamma B A$

Obs. 2. Generaliter pariter demonstratur, si ad puncta circumferentiae, in quae incidunt anguli polygoni regularis circulo inscripti, ducantur rectae circumulum contingentes, enasci exinde polygonum regulare eundem habens laterum numerum, eique circulo circumscriptum. Circumscriptio polygoni regularis circa circumulum datum itaque pariter pendet a divisione circuli in tot partes aequales, quot polygonum latera habet. Caeterum in hoc et praecedente problemate unum punctorum in circumferentia v. c. A pro lubitu sumi aut datum esse potest.

PROPOSITIO XIII.

Obs. 1. Quamvis hypothetice sumi possit pentagonum regulare vel aequilaterum et aequiangulum super aliqua recta ΓA descriptum esse, etiamsi modus illud describendi antea ostensus non fuerit, multi tamen geometrae hac occasione docuerunt, quomodo super data recta describi possit pentagonum

$\Gamma Δ Ε$ τῇ ὑπὸ $ΑΒΓ$, ἢ δὲ $\Gamma ΑΖ$ τῇ ὑπὸ $\Gamma ΒΖ$,
 ἢ ὑπὸ $\Gamma ΒΑ$ ἄρα τῆς ὑπὸ $\Gamma ΒΖ$ ἐστὶ διπλῇ ἰσὴ αἰ-
 ἢ ὑπὸ $ΑΒΓ$ γωνία τῇ ὑπὸ $ΖΒΓ$ ἢ ἄρα ὑπὸ $ΑΙ$
 γωνία δίχα τέμνεται ὑπὸ τῆς $ΒΖ$ εὐθείας. Ὀμο-
 ως δὴ δειχθήσεται ὅτι καὶ ἑκατέρα τῶν ὑπὸ $ΒΔ$
 $ΑΕΔ$ δίχα τέμνεται ὑπὸ ἑκατέρας τῶν $ΖΑ$,
 εὐθειῶν. Ἠχθωσαν δὴ ἀπὸ τοῦ $Ζ$ σημεῖον
 τὰς $ΑΒ$, $ΒΓ$, $\Gamma Δ$, $ΔΕ$, $ΕΑ$ εὐθείας κάθετοι
 $ΖΗ$, $ΖΘ$, $ΖΚ$, $ΖΛ$, $ΖΜ$. Καὶ ἐπεὶ ἰσὴ ἐστὶ
 ὑπὸ $\Theta Γ Ζ$ γωνία τῇ ὑπὸ $Κ Γ Ζ$, ἐστὶ δὲ καὶ ὀρθὴ
 ὑπὸ $ΖΘΓ$ ὀρθῇ τῇ ὑπὸ $ΖΚΓ$ ἰσὴ, δύο δὴ τρίτη
 ἐστὶ τὰ $ΖΘΓ$, $ΖΚΓ$ τὰς δύο γωνίας ταῖς δυοί-
 ναις ἴσας ἔχοντά, καὶ μίαν πλευρὰν μιᾶς πλε-
 ῖσιν, κοινὴν αὐτῶν $ΖΓ$ ὑποτείνουσιν ὑπὸ μίαν
 ἴσων γωνιῶν καὶ τὰς λοιπὰς ἄρα πλευρὰς ταῖς
 παῖς πλευραῖς ἴσας ἔξει ἰσὴ ἄρα ἡ $ΖΘ$ κάθετος
 $ΖΚ$ καθέτω. Ὀμοίως δὴ δειχθήσεται ὅτι καὶ ἐκά-
 των $ΖΑ$, $ΖΜ$, $ΖΗ$ ἑκατέρα τῶν $ΖΘ$, $ΖΚ$ ἰσὴ ἐ-
 στί πέντε ἄρα εὐθεῖαι αἱ $ΖΗ$, $ΖΘ$, $ΖΚ$, $ΖΛ$,
 ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν. Ὁ ἄρα κέντρον τῷ $Ζ$, δια-
 ματρὶ δὲ ἐνὶ τῶν $ΖΗ$, $ΖΘ$, $ΖΚ$, $ΖΑ$, $ΖΜ$ κύ-
 κλου γράφμενος ἡξει καὶ διὰ τῶν λοιπῶν σημείων,
 ὑφάσσεται τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$, $\Gamma Δ$, $ΔΕ$, $ΕΑ$ εὐθει-
 ἀν διὰ τὸ ὀρθὰς εἶναι τὰς πρὸς τοῖς $Η$, $Θ$, $Κ$, $Λ$,

regulare. Et Clavius quidem ad IV. 11. ita hoc probl
 solvit. Sit super recta data $\Gamma Δ$ (Fig. 302.) describendum
 tagonum regulare. Fiat triangulum aequicrurum $ΖΗΘ$
 ut uterque angulus ad basin duplus sit reliqui (IV. 10).
 inde circa triangulum $ΑΓΔ$, quod super basi $\Gamma Δ$ ope I.
 triangulo $ΖΗΘ$ aequiangulum construitur, describatur circ
 (IV. 5.), huicque inscribatur ex IV. 11. ope eiusdem
 guli $ΑΓΔ$ pentagonum regulare. Eodem fere redit consti

igitur anguli ΓBZ est duplex; aequalis igitur angulus ABZ angulo $ZB\Gamma$. Ergo angulus $AB\Gamma$ bifariam secatur a recta BZ . Similiter ostendetur et utrumque angulorum BAE , AEA bifariam secari ab utraque rectarum ZA , ZE . Ducantur autem a puncto Z ad AB , $B\Gamma$, ΓA , AE , EA rectae perpendiculares ZH , $Z\Theta$, ZK , ZA , ZM (I. 12.). Et quoniam aequalis est angulus $\Theta\Gamma Z$ angulo $K\Gamma Z$, est autem et rectus $Z\Theta\Gamma$ recto $ZK\Gamma$ aequalis, duo triangula sunt $Z\Theta\Gamma$, $ZK\Gamma$ duos angulos duobus angulis aequales habentia, et unum latus uni lateri aequale, commune scilicet utrique $Z\Gamma$, subtendens unum aequalium angulorum; et reliqua igitur latera reliquis lateribus aequalia habebunt (I. 26.); aequalis igitur perpendicularis $Z\Theta$ perpendiculari ZK . Similiter ostendetur et unamquamque rectarum ZA , ZM , ZH , alterutri rectarum $Z\Theta$, ZK aequalem esse; quinque igitur rectae ZH , $Z\Theta$, ZK , ZA , ZM aequales inter se sunt. Ergo circulus centro Z , intervallo vero una ipsarum ZH , $Z\Theta$, ZK , ZA , ZM descriptus transibit et per reliqua puncta, et continget AB , $B\Gamma$, ΓA , AE , EA rectas; propterea quod recti sunt anguli ad puncta H , Θ , K , A , M . Si enim ipsas non contingit, sed secat, eveniet ut recta diametro circuli ad rectos angulos ab

Peletarii, quam habet ille ad IV. 10. Alia Clavii solutio nititur observatione in Cor. ad IV. 10. et in Cor. ad IV. 11. facta. Nempe, quum in triangulo $ZH\Theta$ (Fig. 302.) uterque

angulorum ad basin sit ex IV. 10. Cor. $= \frac{4 \text{ Rect.}}{5}$, erit angulus

ei deinceps, qui basi producta oritur, $= 2 \text{ Rect.} - \frac{4 \text{ Rect.}}{5}$

(I. 13.) $= \frac{6 \text{ Rect.}}{5}$ i. e. ex Cor. IV. 11. $\approx$ angulo, quem duo

σημείοις γωνίας. Εἰ γὰρ οὐκ ἐφάπτεται αὐτῶν, ἀλλὰ τεμνεί αὐτάς, συμβήσεται τὴν τῇ διαμέτρῳ τοῦ κύκλου πρὸς ὁρθὰς ἀπ' ἑκτρὸς ἀγομένην ἐντὸς πίπτειν τοῦ κύκλου, ὅπερ ἄτοπον ἐδείχθη. Οὐκ ἄρα ὁ κέντρον τῷ Z , διχοστήματι δὲ ἐνὶ τῶν ZH , $Z\Theta$, ZK , ZA , ZM εὐθειῶν γραφόμενος κύκλος τεμνεί τὰς AB , BF , GA , AE , EA εὐθείας. Ἐφάπτεται ἄρα αὐτῶν. Γεγραμμένῳ ὡς ὁ $H\Theta KAM$.

Εἰς ἄρα τὸ δοθὲν πεντάγωνον, ὃ ἐστὶν ἰσοπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον, κύκλος ἐγγράσσεται. Ὅπερ ἔδει ποιῆσαι.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ 18.

Περὶ τὸ δοθὲν πεντάγωνον, ὃ ἐστὶν ἰσοπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον, κύκλος περιγράφεται.

latera contigua pentagoni regularis comprehendunt. Sufficiat igitur, ad punctum Γ extremum rectae datae ΓA angulum applicare, qui aequalis sit ei, qui angulo $ZH\Theta$ deinceps est, et rectam sub hoc angulo ductam aequalem facere rectae datae ΓA , atque ita per omnem describendi pentagoni ambitum rem continuare.

Obs. 2. Simili ratione in polygono regulari quocunque circulus inscribetur.

PROPOSITIO XIV.

Obs. 1. Cor. Quum centrum circuli pentagono regulari circumscribendi in IV. 11. prorsus eodem modo inveniat, ac centrum circuli eidem pentagono inscribendi in IV. 13. patet, utrumque circulum idem centrum habere.

Obs. 2. Generaliter eodem modo circa datum polygono regulare quodcunque circulus circumscribetur.

Obs. 3. Hinc etiam (coll. 2. Obs. ad IV. 13.) Cor. in Obs. 1. allatum valet generaliter, nempe circulus polygono

extremitate ducta cadat intra circulum, quod absurdum ostensum est (III. 16.). Circulus igitur centro Z , intervallo vero una ipsarum ZH , $Z\Theta$, ZK , ZA , ZM rectarum descriptus non secabit rectas AB , BF , GA , AE , EA ; continget igitur ipsas. Describatur ut $H\Theta KAM$.

In dato igitur pentagono, quod est aequilaterum et aequiangulum, circulus inscriptus est. Quod oportebat facere.

PROPOSITIO XIV. (Fig. 305.)

Circa datum pentagonum, aequilaterum et aequiangulum, circulum circumscribere.

alicui regulari inscriptus idem centrum habebit, quod circulus ei circumscriptus.

Obs. 4. Quodsi e centro circuli polygono alicui regulari inscripto, vel (quod eodem redit Obs. 3.) circumscripto ad singulos polygoni angulos ducantur rectae, dividunt illae polygonum in tot triangula aequalia, quot polygonum latera habet.

Obs. 5. Haec triangula omnia eandem habent altitudinem, quae si circulus polygono inscriptus sit, aequalis est radio circuli inscripti; si circulus polygono circumscriptus sit, aequalis est perpendiculari e centro in unum laterum polygoni demissum. Radius itaque circuli inscripti aequalis est huic perpendiculari, quod et apothema vocatur.

Obs. 6. Summa omnium istorum triangulorum, i. o. integrum polygonum itaque aequale est (I. 38. Cor. 4.) triangulo, cuius basis aequalis est perimetro polygoni, et cuius altitudo aequalis est altitudini unius ex istis triangulis, i. e. si circulus polygono circumscriptus sit, radio circuli polygoni

Ἐστω τὸ δοθὲν πεντάγωνον, ὃ ἴστιν ἰσοπλευρὸν τε καὶ ἰσογώνιον, τὸ $ABΓΔΕ$. δεῖ δὴ περὶ τὸ $ABΓΔΕ$ πεντάγωνον κύκλον περιγράψαι.

Τετμήσθω δὴ ἑκάτερα τῶν ὑπὸ $ΒΓΔ$, $ΓΔΕ$ γωνιῶν διχα ὑπὸ ἑκατέρας τῶν $ΓΖ$, $ΖΔ$, καὶ ἀπὸ τοῦ $Ζ$ σημείου, καθ' ὃ συμβάλλουσιν αἱ εὐθεῖαι, ἐπὶ τὰ $Β$, $Α$, $Ε$ σημεία ἐπεξέχθωσαν εὐθεῖαι αἱ $ΖΒ$, $ΖΑ$, $ΖΕ$. Ὁμοίως δὴ τῷ πρὸ τούτου δειχθήσεται, ὅτι καὶ ἑκάστη τῶν ὑπὸ $ΓΒΑ$, $ΒΑΕ$, $ΑΕΔ$ γωνιῶν διχα τέτμηται ὑπὸ ἑκάστης τῶν $ΖΒ$, $ΑΖ$, $ΕΖ$ εὐθειῶν.

inscripti, vel si circulus polygono circumscriptus sit, perpendiculari e centro circuli polygono circumscripti in unum latrum demisso.

Obs. 7. Observatio praecedens valet etiam, si polygonum aliquod non regulare circulo alicui sit circumscriptum, quod nempe etiam tum omnia triangula, in quae illud dispesci potest rectis e centro ad singulos angulos polygoni ductis, eandem habent altitudinem nempe radium circuli ipsi inscripti. Tali tamen polygono non semper circulus circumscribi poterit, quod hic obiter notamus.

His observationibus circa polygona regularia addi possunt adhuc sequentia.

Obs. 8. Si quod polygonum regulare (Fig. 306.) v. e. pentagonum circulo inscriptum sit, et bifariam dividantur singuli eius anguli ad centrum, adeoque etiam (III. 26.) singuli arcus, quos subtendunt latera polygoni circulo inscripti, et per puncta, in quibus hi arcus dividuntur, ducantur rectae circulum contingentes, enascetur novum polygonum regulare priori aequilaterum, circulo circumscriptum. Quod simili ratione demonstrabitur ac IV. 12. Et facile patet, singula latera polygoni circumscripti parallela esse singulis lateribus polygoni circulo inscripti. Habet hanc Prop. de pentagono Peletarius ad IV. 12. et generaliter Ambros. Rhodius ad IV. 6.

Obs. 9. Quaevis figura aequilatera circulo inscripta est

Sit datum pentagonum, aequilaterum et aequiangulum $AB\Gamma AE$; oportet circa pentagonum $AB\Gamma AE$ circulum circumscribere.

Secetur uterque angulorum $B\Gamma A$, ΓAE bifariam ab utraque rectarum ΓZ , ZA (I. 9.), et a puncto Z , in quo conveniunt rectae, ad puncta B , A , E ducantur rectae ZB , ZA , ZE . Similiter ut in praecedente ostendetur et unumquemque angulorum ΓBA , BAE , AEA bifariam secari ab una rectarum ZB , AZ , EZ . Et quoniam aequalis est angulus $B\Gamma A$

etiam aequiangula. Latera enim eius absciuntur arcus aequales (III. 28.), adeoque anguli a binis quibusvis polygoni lateribus contiguis comprehensi arcibus aequalibus insistant, adeoque aequales sunt (III. 27.). At non omnis figura aequiangula circulo inscripta necessario quoque aequilatera est, nisi quando numerus laterum ipsius est impar: vel, si par est, quando duo latera proxima aequalia sunt, vel dummodo, duo quaecunque aequalia sint, quorum uno posito primo, alterum occupet locum parem quemcunque, ut quartum, sextum etc. Est haec observatio Clavii. Nempe, si circulo inscripta sit figura aequiangula quaecunque v. c. (Fig. 305.) $AB\Gamma AE$, erit, ob angulum $BAE = \Gamma BA$, etiam arcus $BAE = \Gamma BA$ (III. 26. Cor. 1.), hinc, demto communi AB arcus $AE = \text{arc. } B\Gamma$, adeoque recta $AE = \text{rectae } B\Gamma$ (III. 29.). Eadem ratione erit recta $B\Gamma = AE$, atque ita deinceps, si figura plura habet latera, erit semper tertium quodque latus ei, a quo tertium est, uno relicto in medio, aequale: hoc est, primum (quodvis autem latus constitui primum potest) aequale erit tertio, tertium quinto, quintum septimo etc., atque in hunc modum omnia latera in locis imparibus posita aequalia inter se erunt. Eadem autem ratione omnia latera locorum parium, ut secundum, quartum, sextum etc. aequalia inter se erunt, quum quartum sit a secundo tertium etc. Et haec quidem in omnibus figuris aequiangulis circulo inscriptis locum habebunt.

Καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ $B\Gamma\Delta$ γωνία τῇ ὑπὸ $\Gamma\Delta E$, καὶ ἐστὶ τῆς μὲν ὑπὸ $B\Gamma\Delta$ ἡμίσεια ἡ ὑπὸ $Z\Gamma\Delta$, τῆς δὲ ὑπὸ $\Gamma\Delta E$ ἡμίσεια ἡ ὑπὸ $\Gamma\Delta Z$, καὶ ἡ ὑπὸ $Z\Gamma\Delta$ ἄρα τῇ ὑπὸ $Z\Delta\Gamma$ ἐστὶν ἴση· ὥστε καὶ πλευρὰ ἡ $Z\Gamma$ πλευρὰ τῇ $Z\Delta$ ἐστὶν ἴση. Ὅμοίως δὲ δειχθήσεται ὅτι καὶ ἐκάστη τῶν ZB , ZA , ZE ἐκατέρα τῶν $Z\Gamma$, $Z\Delta$ ἐστὶν ἴση· αἱ πέντε ἄρα εὐθεῖαι αἱ ZA , ZB , $Z\Gamma$, $Z\Delta$, ZE ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν. Ὁ ἄρα κέντρον τῷ Z , διαστήματι δὲ ἐνὶ τῶν ZA , ZB , $Z\Gamma$, $Z\Delta$, ZE κύκλος γραγόμενος ἔξει καὶ διὰ τῶν λοιπῶν σημείων, καὶ ἔσται περιγεγραμμένος. Περιγεγράφθω, καὶ ἔστω ὁ $AB\Gamma\Delta E$.

Iam vero, si figura inscripta imparem laterum numerum habeat, inde consequetur, ultimum latus aequale esse primo, cui proximum est, quod nempe et ultimum impari loco erit. Idem ultimum autem etiam aequale erit secundo, quod quippe ab ultimo tertium est. Itaque omnia latera inter se aequalia erunt. Si vero figura inscripta parem laterum numerum habeat, nihil concludi poterit, nisi omnia ea latera, quae impari loco sunt, inter se esse aequalia, et pariter omnia ea, quae pari loco sunt, inter se esse aequalia. Quodsi autem unum eorum, quae impari loco sunt, aequale sit uni eorum, quae pari loco sunt, etiam omnia latera inter se erunt aequalia. Caeterum esse posse figuras aequiangulas circulo inscriptas, quae tamen non sint aequilaterae, iam exemplo rectangulorum constat (III. 22. Obs. 5.).

Obs. 10. Simili ratione omnis quidem figura aequiangula circulo circumscripta est etiam aequilatera, at non omnis figura aequilatera circulo circumscripta est etiam necessario aequiangula, nisi quando numerus angulorum ipsius est impar: vel, si par est, quando duo proximi anguli aequales sunt, vel dummodo duo quicumque anguli aequales sint, quorum uno posito primo, alter occupet locum patrem

angulo ΓAE , et est anguli BIA dimidius angulus ΓIA , anguli vero ΓAE dimidius ΓAZ , et ΓIA igitur angulo ZAI est aequalis; quare (I. 6.) et latus ZI lateri ZA est aequale. Similiter ostendetur et unamquamque rectarum ZB , ZA , ZE alterutri ZI , ZA esse aequalem; quinque igitur rectae ZA , ZB , ZI , ZA , ZE aequales inter se sunt. Circulus igitur centro Z et intervallo una rectarum ZA , ZB , ZI , ZA , ZE descriptus transibit et per reliqua puncta, et erit circumscriptus. Circumscribatur, et sit $AB\Gamma AE$.

quemcunque, ut quartum, sextum etc. (Est et haec observatio Clavii contra Campanum, qui in nota ad IV. 15. putaverat, omnem figuram aequilateram circulo circumscriptam esse aequiangulam.). Nempe si (Fig. 304.) circulo, cuius centrum Z circumscripta sit aliqua figura aequiangula $AB\Gamma AE$, ducantur e centro rectae ad angulos figurae ZA , ZB etc., quo omnes hos angulos bisecabunt (III. 17. Obs. 1.), et, quum integri anguli aequales sint, aequales erunt etiam dimidii. Quum igitur in triangulis AZB , BZI commune sit latus BZ , angulus autem $BAZ = BIZ$, et $ABZ = IBZ$, erit et (I. 26.) $AB = BI$, atque ita duo quaecunque latera inter se aequalia erunt. Sin autem figura $AB\Gamma AE$ circulo circumscripta sit aequilatera, erit iterum $ABZ = IBZ$, et quum praeterea in triangulis ABZ , IBZ $AB = BI$ et BZ communis, erit (I. 4.)

$BIZ = BAZ$. At, quum $BAZ = \frac{BAE}{2}$, et $BIZ = \frac{BIA}{2}$, erit etiam $BAE = BIA$, i. e. primus quisque angulus aequalis erit tertio, tertius quinto etc. Eademque ratione omnes anguli parium locorum ut secundus, quartus, sextus etc. aequales erunt. Et haec quidem in omnibus figuris aequilateris circulo circumscriptis. Iam, si numerus angulorum impar sit, erit

Περὶ ἄρα τὸ δοθὲν πεντάγωνον, ὃ ἐστὶν ἰσόπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον, κύκλος περιγέγραπται. Ὅπερ ἔδει ποιῆσαι.

Π Ρ Ο Τ Α Σ Ι Σ ιε.

Εἰς τὸν δοθέντα κύκλον ἐξάγωνον ἰσόπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον ἐγγράψαι.

Ἐστω ὁ δοθείς κύκλος ὁ $ΑΒΓΔΕΖ$ · δεῖ δὴ εἰς τὸν $ΑΒΓΔΕΖ$ κύκλον ἐξάγωνον ἰσόπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον ἐγγράψαι.

Ἦχθω τοῦ $ΑΒΓΔΕΖ$ κύκλου διάμετρος ἡ $ΑΔ$, καὶ εἰληφθῶ τὸ κέντρον τοῦ κύκλου τὸ $Η$, καὶ κέντρον μὲν τῷ $Δ$, διαστήματι δὲ τῷ $ΔΗ$ κύκλος γεγράφθω ὁ $ΕΗΓΘ$, καὶ ἐπιζευχθεῖσαι αἱ $ΕΗ$, $ΓΗ$ διήχθωσαν

ultimus angulus, quippe impari loco positus, aequalis primo, qui ei proximus est: at etiam secundo, quippe qui ab ultimo tertius est: itaque omnes anguli aequales erunt. Sin autem figura circumscripta parem angulorum numerum habeat, nihil concludi poterit, nisi omnes angulos, qui impari loco sunt, aequales inter se esse, et pariter omnes eos, qui pari loco sunt. Quodsi autem unus eorum, qui ad secundam classem pertinent, aequalis sit uni eorum, qui ad primam classem pertinent, omnes anguli aequales erunt. — Esse autem posse figuras aequilateras circulo circumscriptas, quae tamen non sint aequiangulae, iam exemplo rhombi constat (IV. 7. Obs. 5.).

Obs. 11. In figuris quoque non regularibus, quibus circulus circumscribi potest, centrum circuli circumscribendi invenitur, si duo latera continua bisecentur, et in punctis sectionis perpendiculara ad ea erigantur, quorum sectio centrum erit, ut in IV. 8. in figuris autem non regularibus, quibus circulus inscribi potest, centrum circuli inscribendi invenitur, si duo anguli proximi bisecentur, ubi pariter rectorum istorum

Circa datum igitur pentagonum, aequilaterum et aequiangulum, circulus circumscriptus est. Quod oportebat facere.

PROPOSITIO XV. (Fig. 307.)

In dato circulo hexagonum aequilaterum et aequiangulum inscribere.

Sit datus circulus $AB\Gamma\Delta EZ$; oportet in circulo $AB\Gamma\Delta EZ$ hexagonum aequilaterum et aequiangulum inscribere.

Ducatur circuli $AB\Gamma\Delta EZ$ diameter AD , et sumatur centrum circuli H , et centro quidem A , intervallo vero AH circulus describatur $EHT\Theta$ (Post. 3.), et iunctae EH , ΓH producantur ad puncta B , Z , et

angulos bisecantium sectio centrum erit, ut in IV. 9. In figuris regularibus utraque methodus eodem redit, unde in IV. 8. problema circulum dato quadrato inscribendi modo priore, in IV. 9. autem problema circulum dato quadrato circumscribendi modo posteriore traditur.

PROPOSITIO XV.

Obs. 1. Ex hac propositione alia consequitur methodus faciliior ea, quam in IV. 2. Cor. habuimus circulo dato triangulum aequilaterum inscribendi, ductis nempe rectis AT , TE , EA . Et quum $AB\Gamma H$ sit figura aequilatera, patet ex I. 8. eam a recta AT bifariam dividi, unde consequitur, triangulum circulo inscriptum esse hexagoni regularis eidem circulo inscripti dimidium.

Obs. 2. Quum $\text{angulus } ABH = HB\Gamma = \frac{2 \text{ Rect.}}{3}$, erit $\text{angulus } AB\Gamma = \frac{4 \text{ Rect.}}{3}$, et $\text{angulus } B\Gamma A = \Gamma AB = \frac{\text{Rect.}}{3}$. Patet itaque ratio describendi trianguli isoscelis $AB\Gamma$, cuius

ἐπὶ τὰ B, Z σημεῖα, καὶ ἐπεξείχθωσαν αἱ $AB, BG, ΓΔ, ΔΕ, ΕΖ, ΖΑ$ λέγω ὅτι τὸ $ΑΒΓΔΕΖ$ ἐξάγων. ἰσοπλευρόν τε ἔστι καὶ ἰσογώνιον.

Ἐπεὶ γὰρ τὸ H σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ $ΑΒΓΔΕΖ$ κύκλου, ἴση ἐστὶν ἡ HE τῇ $HΔ$. Πάλιν, ἐπεὶ τὸ $Δ$ σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ $ΕΗΓΘ$ κύκλου, ἴση ἐστὶν ἡ $ΔΕ$ τῇ $ΔΗ$. Ἀλλ' ἡ HE τῇ $HΔ$ ἔδειχθη ἴση, καὶ ἡ HE ἄρα τῇ $ΕΔ$ ἴση ἐστὶν ἰσοπλευρον ἄρα ἐστὶ τὸ $ΕΗΔ$ τρίγωνον, καὶ αἱ τρεῖς ἄρα αὐτοῦ γωνίαι αἱ ὑπὸ $ΕΗΔ, ΗΔΕ, ΔΕΗ$ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν, ἐπειδὴ περ τῶν ἰσοσκελῶν τριγώνων αἱ πρὸς τῇ βάσει γωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν. Καὶ εἰσιν αἱ τρεῖς τοῦ τριγώνου γωνίαι δυοῖν ὀρθαῖς ἴσαι ἡ ἄρα ὑπὸ $ΕΗΔ$ γωνία τρίτον ἐστὶ δύο ὀρθῶν. Ὅμοιως δὲ δειχθήσεται καὶ ἡ ὑπὸ $ΔΗΓ$ τρίτον δύο ὀρθῶν. Καὶ ἐπεὶ ἡ $ΓΗ$ εὐθεῖα ἐπὶ τὴν $ΕΒ$ σταθεῖσα τὰς ἐφεξῆς γωνίας τὰς ὑπὸ $ΕΗΓ, ΓΗΒ$ δυοῖν ὀρθαῖς ἴσας ποιεῖ, καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ $ΓΗΒ$ τρίτον ἐστὶ δύο ὀρθῶν αἱ ἄρα ὑπὸ $ΕΗΔ, ΔΗΒ, ΓΗΒ$ γωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν ὥστε καὶ αἱ κατὰ κορυφὴν αὐταῖς αἱ ὑπὸ $ΒΗΑ, ΑΗΖ, ΖΗΕ$ ἴσαι εἰσὶ ταῖς ὑπὸ $ΕΗΔ, ΔΗΓ, ΓΗΒ$ αἱ ἐξ ἄρα γωνίαι αἱ ὑπὸ $ΕΗΔ, ΔΗΓ, ΓΗΒ, ΒΗΑ, ΑΗΖ, ΖΗΕ$ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν. Αἱ δὲ ἴσαι γωνίαι ἐπὶ ἴσων περιφερειῶν βεβήκασιν αἱ ἐξ ἄρα περιφέρειαι αἱ $ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ, ΔΕ, ΕΖ, ΖΑ$ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν. Ὑπὸ δὲ τὰς ἴσας περιφέρειας ἴσαι εὐθεῖαι ὑποτείνουσιν αἱ ἐξ ἄρα εὐθεῖαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν ἰσοπλευρόν ἄρα ἐστὶ τὸ $ΑΒΓΔΕΖ$ ἐξά-

angulus ad verticem sit quadruplus utriusque anguli ad basin. Et generaliter (Cf. etiam Obs. ad V. 11.) facile patet, si describi possit polygonum regulare, quod laterum numerum =

ἐπὶ τὰ B, Z σημεία, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ $AB, BG, ΓΔ, ΔΕ, ΕΖ, ΖΑ$ λέγω ὅτι τὸ $ΑΒΓΔΕΖ$ ὅλον ἰσοπλευρόν τε ἔστι καὶ ἰσογωνίον.

Ἐπεὶ γὰρ τὸ H σημείον κέντρον ἐστὶ τοῦ $ΑΒΓΔΕΖ$ κύκλου, ἴση ἐστὶν ἡ HE τῇ HA . Πάλιν, καὶ $Δ$ σημείον κέντρον ἐστὶ τοῦ $ΕΗΓΘ$ κύκλου, ἴση ἐστὶν ἡ $ΔΕ$ τῇ $ΔH$. Ἀλλ' ἡ HE τῇ HA ἴση ἐστὶ, καὶ ἡ HE ἄρα τῇ $ΔΑ$ ἴση ἐστὶν ἰσοπλευρὸν ἐστὶ τὸ $ΕΗΔ$ τρίγωνον, καὶ αἱ ἐν αὐτῷ ἄρα ὅροι γωνίαι αἱ ἐπὶ $ΕΗΔ, ΗΔΕ, ΔΕΗ$ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶν. Ὁμοίως δὲ καὶ ἐκ τῶν ἰσοσκελῶν τριγώνων αἱ ἐν αὐτοῖς γωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶν. Καὶ εἰσὶν αἱ ἐν τῷ $ΕΗΔ$ τριγώνῳ γωνίαι δύο ὁρθαί, ἴσας ἡ ἄρα ἐν τῷ $ΕΗΔ$ γωνία τρίτον ἐστὶ δύο ὁρθῶν. Ὅμοιος δὲ καὶ σκεπτεται καὶ ἡ ἐπὶ $ΔΗΓ$ τρίτον δύο ὁρθῶν. Ἐπεὶ ἡ $ΓH$ εὐθεία ἐκ τῆς EB σταθείας τῆς ἐκείνης τῆς ἐπὶ $ΕΗΓ, ΓHB$ δύο ὁρθαί ἴσαι καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ἐπὶ $ΓHB$ τρίτον ἐστὶ δύο ὁρθῶν καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ἐπὶ $ΓHB$ γωνία ἴση αἱ ἄρα ἐπὶ $ΕΗΔ, ΔHB, ΓHB$ γωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶν ὥστε καὶ αἱ κατὰ κορυφὴν αὐτῶν $ΒΗΑ, ΑΗΖ, ΖΗΕ$ ἴσαι εἰσὶ τῇς ἐπὶ $ΕΗΔ, ΔΗΓ, ΓHB$ αἱ ἐξ ἄρα γωνίαι αἱ ἐπὶ $ΕΗΔ, ΔΗΓ, ΓHB$ αἱ $ΒΗΑ, ΑΗΖ, ΖΗΕ$ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶν. Ἰσάων περιμετρίων βελημενεία ἴσα γωνία ἐπὶ τῶν περιμετρίων βελημενείων ἴσα περιμετρία αἱ $AB, BG, ΓΔ, ΔΕ, ΕΖ, ΖΑ$ ἴσας ἀλλήλαις εἰσὶν. Ἐπὶ δὲ τῆς ἴσης περιμετρίας εὐθείαι ὑποτείνουσιν αἱ $ΕΖ$ ἄρα εὐθείαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶν ἰσοπλευρόν ἄρα ἐστὶ τὸ $ΑΒΓΔΕΖ$.

iungantur $AB, BG, ΓΔ, ΔΕ, ΕΖ, ΖΑ$; hexagonum $ΑΒΓΔΕΖ$ aequilaterum esse et aequangulum.

Quoniam enim punctum H centrum est circuli $ΑΒΓΔΕΖ$, HE aequalis est HA . Rursus, quoniam punctum $Δ$ centrum est circuli $ΕΗΓΘ$, $ΔΕ$ aequalis est $ΔH$. Sed HE ipsi HA ostensa est aequalis, igitur ipsi $ΕΔ$ aequalis est; aequilaterum igitur est angulum $ΕΗΔ$, et tres igitur ipsius anguli $ΕΗΔ, ΔΕΗ$ aequales inter se sunt (I. 5.), quia scilicet triangulorum ad basin anguli aequales inter se sunt. Et sunt tres trianguli anguli duobus rectis aequales (I. 32.); angulus igitur $ΕΗΔ$ tertia pars duorum rectorum. Similiter ostendetur et $ΔΗΓ$ tertia pars duorum rectorum. Et quoniam recta $ΓH$ super EB insistens angulos deinceps $ΕΗΓ, ΓHB$ duobus rectis aequales facit (I. 13.), et reliquus igitur $ΓHB$ tertia pars est duorum rectorum; anguli igitur $ΕΗΔ, ΔΗΓ, ΓHB$ aequales inter se sunt; quare et anguli ad verticem $ΒΗΑ, ΑΗΖ, ΖΗΕ$ aequales sunt ipsi $ΕΗΔ, ΔΗΓ, ΓHB$ (I. 15.); sex igitur anguli $ΕΗΔ, ΔΗΓ, ΓHB, ΒΗΑ, ΑΗΖ, ΖΗΕ$ aequales inter se sunt. Aequales autem anguli aequalibus circumferentiis insistent (III. 26.); sex igitur circumferentiae $AB, BG, ΓΔ, ΔΕ, ΕΖ, ΖΑ$ aequales inter se sunt. Aequales autem circumferentiae aequales rectae subtendunt (III. 29.); sex igitur rectae aequales inter se sunt; aequilaterum igitur est hexagonum $ΑΒΓΔΕΖ$.

N habeat, describi etiam posse triangulum isosceles, cuius angulus ad verticem sit ($N-2$) plus utriusque anguli ad basin, et vice versa.

angulus ad verticem sit quadruplus utriusque anguli ad basin
Et generaliter (Cf. etiam Obs. ad V. 11.) facile poterit describi possit polygonum regulare, quod latus numerum

γωνον· λέγω· δη· ὅτι καὶ ἰσογώνιον. Ἐπεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν ἡ ZA περιφέρεια τῇ EA περιφερείᾳ, κοινὴ προσκείσθω ἡ $ABΓΔ$ περιφέρεια· ὅλη ἄρα ἡ $ZABΓΔ$ ὅλη τῇ $EAΓBA$ ἐστὶν ἴση, καὶ βέβηκεν ἐπὶ μὲν τῆς $ZABΓΔ$ περιφερείας ἡ ὑπὸ ZEA γωνία, ἐπὶ δὲ τῆς $EAΓBA$ περιφερείας ἡ ὑπὸ AZE γωνία· ἢ· ἡ ἄρα ἡ ὑπὸ AZE γωνία τῇ ὑπὸ ZEA . Ὅμοιως δὴ δευχθήσεται ὅτι καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι τοῦ $ABΓΔEZ$ ἐξαγώνου κατὰ μίαν ἴσαι εἰσὶν ἑκατέρω τῶν ὑπὸ AZE , ZEA γωνιῶν ἰσογώνιον ἄρα ἐστὶ τὸ $ABΓΔEZ$ ἐξαγώνον. Ἐδείχθη δὲ καὶ ἰσόπλευρον, καὶ ἐγγέγραπται εἰς τὸν $ABΓΔEZ$ κύκλον.

Εἰς ἄρα τῶν δοθέντα κύκλον ἐξαγώνον ἰσόπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον ἐγγέγραπται. Ὅπερ ἔδει ποιῆσαι.

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α.

Ἐκ τούτου φανερόν ὅτι ἡ τοῦ ἐξαγώνου πλευρὰ ἴση ἐστὶ τῇ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου.

Καὶ εἰν διὰ τῶν $A, B, Γ, Δ, E, Z$ σημείων ἐφαπτομένης τοῦ κύκλου ἀγόμεναι, περιγραφῆσεται περὶ τὸν κύκλον ἐξαγώνον ἰσόπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον, ἀκολουθῶς τοῖς ἐπὶ τοῦ πενταγώνου εἰρημένοις. Καὶ ἔτι διὰ τῶν ὁμοίων τοῖς ἐπὶ τοῦ πενταγώνου

Obs. 3. Quum recta AG a recta BH bifariam et ad angulos rectos secetur (I. 34. Cor. 1. et 20.), erit quadratum dimidia AG , i. e. quarta pars quadrati ex AG (II. 4. Cor. 2.) aequale excessui quadrati ex AH super quadratum ex dimidia BH vel AH (I. 47. Cor. 2.) i. e. (II. 4. Cor. 2.) = tribus quartis quadrati radii. Quadratum ex AG , latere trianguli aequilateri igitur triplum est quadrati radii eius circuli, in quem inscriptum est. Tacquet ad h. l.

dico etiam et aequiangulum. Quoniam enim aequalis est circumferentia ZA circumferentiae EA , communis addatur $AB\Gamma A$ circumferentia; tota igitur $ZAB\Gamma A$ toti $EA\Gamma BA$ est aequalis, et insistit quidem circumferentiae $ZAB\Gamma A$ angulus ZEA , circumferentiae vero $EA\Gamma BA$ angulus AZE . Aequalis igitur angulus AZE angulo ZEA . Similiter ostendetur et reliquos angulos hexagoni $AB\Gamma AEZ$ sigillatim aequales esse alterutri angulorum AZE , ZEA . Aequiangulum igitur est hexagonum $AB\Gamma AEZ$. Ostensum est autem et aequilaterum, et inscriptum est in circulo $AB\Gamma AEZ$.

In dato igitur circulo hexagonum aequilaterum et aequiangulum inscriptum est. Quod oportebat facere.

COROLLARIUM.

Ex hoc manifestum hexagoni latus aequale esse circuli semidiametro.

Et si per puncta A, B, Γ, A, E, Z contingentes circumlum ducamus, circumscribetur circa circumlum hexagonum aequilaterum et aequiangulum, congruenter eis, quae de pentagono dicta sunt. Et etiam con-

Obs. 4. Circa circumlum quemcunque centro H , radio $\frac{HA}{2}$ descriptum e punctis A, B, Γ, A, E, Z describi possunt sex circumli, inter se et primum descripto aequales, quorum quisque tres, nempe eum, qui ex H radio $\frac{HA}{2}$ descriptus est, et duos sibi proximos continget, si nempe radii omnium eorum sumantur aequales $\frac{HA}{2}$ (Obs. 3. ad III. 12.).

Euclid. Element. P. II.

E

είρημένοις, εἰς τὸ δοθέν ἐξάγωνον ¹⁾ κύκλον ἐγγράψομεν τε καὶ περιγράψομεν.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κς.

Εἰς τὸν δοθέντα κύκλον πεντεκαδεκάγωνον ἰσόπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον ἐγγράψαι.

Ἐστω ὁ δοθείς κύκλος ὁ $ΑΒΓΔ$ · δεῖ δὴ εἰς τὸν $ΑΒΓΔ$ κύκλον πεντεκαδεκάγωνον ἰσόπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον ἐγγράψαι.

1) Rob. Simson. monet, addendum hic esse ἰσόπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον. Recte ille quidem. Attamen haec ex praecedentibus facile suppleri posse sine dubio auctor putabat. Et si omnia ad summum rigorem exigere velis, etiam ad initium Cor. similiter addendum erat ἰσοπ. καὶ ἰσων. ubi nec ipse Simson. addit.

PROPOSITIO XVI.

Obs. 1. Eodem modo, quo Euclides ostendit, quum arcus $ΑΓ$ sit $1/3 = 5/15$ circuli integri, et arcus $ΑΒ = 1/5 = 3/15$ circuli integri, fore arcum $ΒΓ = 2/15$, adeoque per III. 30. inveniri posse arcum, qui sit $1/15$ integri circuli, generaliter ostendetur, si describi possit in circulo polygonum regulare m laterum, aliudque n laterum, ubi $m > n$ sumitur, et si $m - n$ vel $pm - qa$ per continuas bisectiones ad unitatem reduci possit, vel ut aliter dicamus, si $m - n$ vel $pm - qa$ sit $2r$, describi quoque posse in circulo polygonum regulare, quod habeat $m \cdot n$ latera, ubi p et q denotare potest numeros integros quoscunque.

Obs. 2. Ex iis, quae Euclides hoc libro tradidit, consequitur, circulum posse in 3, 6, 12, 24 etc.

— 4, 8, 16, 32 ...

— 5, 10, 20, 40 ...

— 15, 30, 60, 120 ...

partes aequales dividi, et figuras regulares totidem laterum ipsi posse inscribi et circumscribi. Figuras autem regulares,

gruenter eis, quae de pentagono dicta sunt, in dato hexagono circulum inscribemus et circumscribemus.

PROPOSITIO XVI. (Fig. 308.)

In dato circulo quindecagonum aequilaterum et aequiangulum inscribere.

Sit datus circulus *ABTA*; oportet in circulo *ABTA* quindecagonum aequilaterum et aequiangulum inscribere.

quorum laterum numerus in istis seriebus haud contineretur, geometricae in circulo describendi ars hactenus ignorabatur Gaussius, iam apud Göttingenses Matheseos Professor, in Disquisitionibus Arithmeticis 1801. editis, Sect. VII. de aequation. circuli section. definitibus, primus methodo algebraico-trigonometrica demonstravit, circulum non tantum in

$\left(\begin{smallmatrix} 2 \\ 2^0+1 \end{smallmatrix} \right) \left(\begin{smallmatrix} 3 \\ 2^1+1 \end{smallmatrix} \right) \left(\begin{smallmatrix} 5 \\ 2^2+1 \end{smallmatrix} \right)$ verum etiam in $\left(\begin{smallmatrix} 17 \\ 2^4+1 \end{smallmatrix} \right)$
 $\left(\begin{smallmatrix} 257 \\ 2^8+1 \end{smallmatrix} \right) \left(\begin{smallmatrix} 65537 \\ 2^{16}+1 \end{smallmatrix} \right)$ etc. generaliter nempe in 2^m+1 par-

tes dividi posse, quoties 2^m+1 sit numerus primus. Ope divisionis in 17. partes aequales, collatis iia, quae in Obs. I. et in Obs. ad IV. 11. diximus, circulus deinde porro in $2 \times 17, 4 \times 17, 8 \times 17$ etc. praeterea in 3×17 vel 51 partes aequales dividetur, quod nempe $6/17 - 1/3 = 1/15$

in 6×17 vel 85, quia $1/5 - 3/17 = 2/85$

in 15×17 vel 255, quia $1/15 - 1/17 = 2/255$

et in eas adhuc partes aequales, quae bisectionibus ex praecedentibus consequuntur. Cf. etiam v. Huguenin. mathem. Beiträge Königsb. 1803. p. 272. sq. et Rothe. de Divisione Peripheriae circuli in 17. et 13. partes aequales, Erlangae 1804, qui pro quaestione generali, an polygonon aliquod regulare geometricae circulo inscribi possit, hanc adfert regulam generalem: sit M numerus quicumque integer positivus, atque litera m designetur multitudo numerorum integrorum positivorum $< M$ atque

Ἐγγράψω εἰς τὸν $ABΓΔ$ κύκλον τριγώνον μὲν ἰσοπλευροῦ τοῦ εἰς αὐτὸν ἐγγραφομένου πλεονὰς ἢ $ΑΓ$, πενταγώνου δὲ ἰσοπλευροῦ ἢ $ΑΒ$ · οἷων ἅρα ἐστὶν ὁ $ΑΒΓΔ$ κύκλος ¹⁾ ἴσων τριημιῶν δεκαπέντε, τοιούτων ἢ μὲν $ΑΒΓ$ περιφέρεια τρίτον οὖσα τοῦ κύκλου ἐστὶ πέντε· ἢ δὲ $ΑΒ$ περιφέρεια, πεμπτόν οὖσα τοῦ κύκλου, ἐστὶ τριῶν λοιπῇ ἅρα ἢ $ΒΓ$ τῶν ἴσων δύο. Τετμήσθω ἢ $ΒΓ$ διῆμι κατὰ τὸ $Ε$, ἐκείνη ἅρα τῶν $ΒΕ$, $ΕΓ$ περιφερειῶν πεντεκαιδέκατον ἐστὶ τοῦ $ΑΒΓΔ$ κύκλου. Ἐὰν ἅρα ἐπιζεύξαντες τὰς $ΒΕ$, $ΕΓ$ εὐθείας, ἴσας αὐταῖς κατὰ τὸ συνεχὲς εὐθείας ἐναρμόσωμεν εἰς τὸν $ΑΒΓΔ$ κύκλον, ἐστὶ εἰς αὐτὸν ἐγγεγραμμένον πεντεκαιδεκάγωνον ἰσοπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον. Ὅπερ ἔδει ποιῆσαι.

Ὅμοιως δὲ τοῖς ἐπὶ τοῦ πενταγώνου, εἰὰν διὰ τῶν κατὰ κύκλου διαιρέσεων ἐφαπτομένης τοῦ κύκλου ἀγῶμεν, περιγραφήσεται περὶ τὸν κύκλον πεντεκαιδεκάγωνον ἰσοπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον. Ἐν δὲ διὰ τῶν ὁμοίων τοῖς ἐπὶ τοῦ πενταγώνου εἰρημένοις, καὶ

1) Pro ὁ $ΑΒΓΔ$ κύκλος Rob. Simson. mavult legere: $ΑΒΓΔ$ περιφέρεια. Quum tamen vox κύκλου etiam postea saepius recurrat, κύκλος hic dictum videtur pro integrā circumferentia.

erga M relative primorum. Polygonon regulare M laterum geometricè circulo inscribi poterit, si M potentia est numeri 2 exponentis integri positivi. Si vero hoc non valeat, papheria etiam in M partes aequales geometricè dividi nequit. Caeterum geometrica quoque solutio ex formulis, quas habent viri supra laudati, deduci omnino potest, et Pflaiderer. pervenit ad geometricam constructionem satis elegantem et pro rei natura concinnam, cuius etiam demonstrationem exhibuit e mere geometricis principiis petitam. Aliam e formulis

Inscribatur in circulo $AB\Gamma A$ trianguli aequilateri in ipso inscripti latus AF (IV. 2.), pentagoni vero aequilateri latus AB (IV. 11.); qualium igitur est circulus $AB\Gamma A$ aequalium segmentorum quindecim, talium circumferentia $AB\Gamma$, quae tertia pars est circuli, erit quinque; AB vero circumferentia, quae quinta est circuli, erit trium; reliqua igitur $B\Gamma$ aequalium duarum. Secetur $B\Gamma$ bifariam in E (III. 30.), utraque igitur circumferentiarum BE , $E\Gamma$ quintadecima erit circuli $AB\Gamma A$. Si igitur iungentes rectas BE , $E\Gamma$, aequales ipsis in continuum rectas aptemus in circulo $AB\Gamma A$ (IV. 1.), erit in ipso inscriptum quindecagonum aequilaterum et aequiangulum. Quod oportebat facere.

Congruenter autem eis, quae de pentagono, si per circuli divisiones contingentes circumducamus, circumscribetur circa circum quindecagonum aequilate-

algebraicis a Rothe. exhibitis deductam constructionem exhibet Müller. (Mathem. kritische Bearbeit. des ersten Buchs der Elemente 1821. im Anhang.). Aliam satis concinnam constructionem vide in Paukers ebene Geometrie 1823. p. 187. sq. Illa tamen hoc loco praeteriunda nobis sunt, quum demonstratio ex ipsa problematis natura non possit non esse prolixa, et ex parte haud exigua e libris elementorum sequentibus deum petita. Praeterea plures subinde mathematici methodos tradiderunt vel generales, vel ad singulares figuras spectantes, polygona regularia quaecunque, aut certe plura adhuc, quam Euclides docuerat, circulo dato inscribendi etc., haud quidem, ut probe norant, rigore veras, at tamen magis minus prope ad veritatem accedentes, atque ita comparatas, ut usui pra-

εἰς τὸ δοθὲν πεντεκαίδεκάγωνον, ὃ ἐστὶν ἰσοπλευ-
ρόν τε καὶ ἰσογώνιον, κύκλον ἐγγράψομεν τε καὶ πε-
ριγράψομεν.

clico, ubi saepe summus rigor attingi nequit, inservire posse
videantur. Haec talia autem satis ingeniose nonnunquam ex-
cogitata nihil huc pertinent, nec diiudicatio horum tentami-
num plerumque ex altioribus fontibus repetendorum, vel maxime
mechanicorum, huius loci esse potest. Huc tamen haudrefertur

rum et aequiangulum. Praeterea congruenter eis, quae de pentagono dicta sunt, et in dato quindecagono circulum inscribemus et circumscribemus.

debent eorum conatus, qui aperte falsa de arcu quocunque in aequales, quotquot libuerit, partes dividendo praecepta dedere, qualia v. c. videre est in Hadaly de Hada Taxometria edita Budae 1820.

Ε Τ Κ Α Ε Ι Δ Ο Τ
Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ω Ν
Β Ι Β Λ Ι Ο Ν , Η Ε Μ Η Τ Ο Ν .

Ο Ρ Ο Ι .

α. *Μ*είζων ἐστὶ μέγεθος μεγέθους, τὸ ἐλάσσον τοῦ μείζονος, ὅταν καταμετρήτῃ τὸ μείζον.

β. Πολλαπλάσιον δὲ τὸ μείζον τοῦ ἐλάσσονος, ὅταν καταμετρήται ὑπὸ τοῦ ἐλάττωτος.

Isaac. Monachus in scholiis ad hunc librum refert, asserere nonnullos, huius libri doctrinam ab Eudoxo, Platonis praeceptore, inventam traditamque esse. Caeterum aliqua in eo corrupta ad nos pervenisse, ex sequentibus patebit.

D E F I N . I .

*Π*ᾶς, ut iam Isaacus Monachus, Campanus, Commandinus, Clavius aliique notant, duplici sensu apud Geometras adhibetur. Aut enim designat quamvis magnitudinem minorem altera eiusdem generis. Ita v. c. Euclides I, 9. Def. ait: omne totum sua parte maius est. Aut sensu strictiore, ut hic sumitur pro ea magnitudine minore, quae aliquoties repetita aliam maiorem eiusdem generis efficit aut *mensurat*, unde eius *mensura* vocatur. Prioris sensu v. c. 4. erit pars numeri 6, non vero posteriore sensu: 3 autem utroque sensu pars est numeri 6. Diximus, maiorem magnitudinem, cum qua minor

E U C L I D I S

E L E M E N T O R U M

LIBER QUINTUS.

DEFINITIONES.

1. **P**ars est magnitudo magnitudinis, minor maioris, quando mensurat maiorem.

2. Multiplex autem maior minoris, quando mensuratur a minore.

comparetur, esse debere eiusdem generis ac minorem. Pates enim lineam v. c. non nisi a linea, superficiem a superficie, corpus a corpore, pondus a pondere etc. mensurari posse. Caeterum, quam Euclides vocat hic partem sensu strictiore, alii partem *aliquotam*, aut *submultipulum* maioris vocant, maior contra *multipulum* minoris appellatur, quam exacte aliquoties continet (Def. 2.). Ita 3 erit submultipulum numeri 6, nempe eius pars dimidia, vel subdupla: 2 est numeri 6 pars tertia aut subtripla etc. Pars aliquota igitur aut submultipula prodit, si magnitudo aliqua in quocunque partes aequales dividatur. Talis pars *aliquota* distinguitur ab *aliquantis*, magnitudinem ipsam non metientibus, sed conflatis ex summa aliquot eius partium aliquotarum. Ita 4 erit pars *aliquanta* numeri 6, nempe erit eius pars tertia bis sumta. Euclidis libro VII. et sqq. partes aliquotas et aliquantas ita distinguit, ut priores simpliciter *partem*, posteriores *partes* appellet.

γ'. Λόγος ἐστὶ δύο μεγεθῶν ὁμογενῶν ἢ κατὰ πηλικιότητα πρὸς ἀλλήλα ποιά σχέσις ¹⁾,

1) Robert. Simson. persuasus de huius et sequentis orationis definitionis inutilitate, quam et Barrovius fateatur, frimenter se credere ait, eas non Euclidis esse, sed cuiusdam minus periti editoris. Eodem modo iudicat Borellius in Obs. ad axioma VI. L. III. Euclid. restituit.

DEFIN. II

Addi potest, duas magnitudines A, B duarum C, D *aequemultiples*, aut *aequemultiplices* vocari, si maior A minorum C toties exacte contineat, quoties B contineat D, seu, si minor C toties praecise repetenda est, ut efficiat aequalem maiori A, quoties D repeti debet, ut efficiatur aequalis magnitudini B. Eodem casu magnitudines C, D duarum A, B *partes aequaliquotas* vocantur. Ita v. c. quum sit $15 = 3 \cdot 5$ et $20 = 4 \cdot 5$, erunt numeri 15 et 20 numerorum 3 et 4 *aequemultiplices*, et contra numeri 3 et 4 numerorum 15 et 20 *aequaliquotae* partes. Aequemultiplices autem partium aequaliquotarum duarum magnitudinum vocantur magnitudinum harum *partes aequaliquantae*. Sic 6 et 8 erunt numerorum 15 et 20 *partes aequaliquantae*. Partes aequaliquotas duarum magnitudinum Euclides *eandem* illarum *partem*, aequaliquantas autem *easdem* partes appellat. Quodsi eadem magnitudo minor C utramque A et B metitur, tum C *communis mensura* magnitudinum A et B vocatur. Cf. Pfeiderer Expositio ac Dilucidatio libri V. Elem. Euclid. Tub. 1782. p. 11. Peletarius vocem *multiplex* aliter intelligi vult, pariter ac vocem *pars* in Def. 1. Nempe multiplicem vocat maiorem minoris, non tantum: quum a minore ipsa, verum etiam, quum a parte aliqua minoris maior exacte mensuratur. Ita ait, 5 esse multiplicem numeri 2, esse nempe eius duplum sesquialterum; ternarium esse binarii, unitatem esse sui ipsius multiplicem. At vulgo hae voces non hoc sensu dicuntur, nec ab Euclide ita sumptae sunt, et multiplex semper *repetitionem* minoris, aut certe po-

3. Ratio est duarum magnitudinum homogenearum secundum quantitatem (quantuplicitatem) inter se quaedam habitudo.

sionem *integrae* alterius (quo sensu: *simplam* dicitur), non vero positionem partis tantum minoris involvere videtur. Idem de aequemultiplicis dicendum.

DEFIN. III.

„*Λόγος*, ratio, sensu generalissimo indicat modum quemcunque ex mutua duarum quantitatum comparatione erutum, magnitudinem unius ex magnitudine alterius determinandi seu inferendi, atque ita necessario ad duas quantitates homogeneas restringitur. Concipi autem possunt infiniti modi diversi, magnitudinem unius duorum quantorum ex magnitudine alterius determinandi. Horum simplicissimi sunt, qui quantitates ipsas immediate, absque ulla earum praevia mutatione invicem comparant, magnitudinemque unius ex altera determinant, indicando: vel quanto una alteram excedat, aut ab ea deficiat; vel quoties una alteram contineat, aut in eo insit. Posterio-rem modum quantitates invicem comparandi, magnitudinemque unius ex magnitudine alterius determinandi accuratissime libro V. discutit, atque in sequentibus libris ad obiecta geometriae applicat Euclides, nulla uspiam iniecta mentione expressa prioris: unde suspicari licet factum esse, ut eiusmodi rationes *geometricae*; altera autem priores, quae excessus unius magnitudinis super alteram, seu defectu unius ab altera occupantur, et quae primarum arithmetices operationum simplicium, additionis ac subtractionis obiectum constituunt, arithmeticae vocari consueverint. Caeterum neutra harum rationum ad arithmeticae vel ad geometriam seorsim pertinent; verum utraque in numeris pariter et extensis locum habet, et ambae iunctim limites fere figunt matheseos, quam vocant elementarem.“ Cf. Pfeiderer. l. c. p. 6. Definitio itaque haec nostra, in qua, ut semper apud Euclidem de *geometrica* tantum ratione sermo est, nihil aliud dicere videtur, quam in hac ra-

δ. Λόγον ἔχειν πρὸς ἄλληλα μεγέθη λέγεται, ἂ δύναται πολλαπλασιαζόμενα ἀλλήλων ὑπερίχειν.

itione disquiri, quanta sit una magnitudo comparata cum alia eiusdem generis i. e. si aliam eiusdem generis pro mensura prioris sumere velis; vel (Wallisii verbis utimur in Tract. de Algebr. Oper. T. II. p. 86.) qualiter se habeat una ad alteram quoad quantuplicitatem (πληκότητα) considerata. Putat autem Wallisius, Euclidem dixisse potius *πληκότητα* quam *ποσότητα*, quo facilius etiam quantitates incommensurabiles, nec eae tantum, quarum una multipla est alterius, hac voce comprehenderentur. Atque eo, quo Wallisius vult, sensu vocem *πληκότητα* intelligere, suadet etiam ordo Def. 3. Post. 1. et 2. atque expressio Def. 4. 5. 7., ut observat Pfeiderer. in Promptuario Mathem. Lipsi. Fascic. 7. p. 259. Idem tamen addit ibidem, Fasc. 8. p. 415. vocem *πληκότης* videri potius significare *quantitatem*, quo sensu occurrit apud Ptolem. Magna Syntax. L. I. p. 8. (Basil. 1538.) *περί τῆς πληκότητος τῶν ἐν τῷ κύκλῳ εὐθετῶν*, et ita vocem interpretatos esse Clavius et Barrovius in Lection. Cantabrig. Observare tamen liceat, chotdarum quoque catalogum non absolutam aliquam rectarum circulo inscriptarum quantitatem, sed semper relativam tantum, i. e. comparatam cum aliqua unitate v. c. cum radio circuli continere, ita ut doceat, quot vicibus quaeque earum hanc unitatem aut eius partes contineat, aut *quantupla* illius sit. Denique Barrow. notat l. c. p. 225. verba: *πρὸς ἄλληλα* significare *ἀδιαφορίαν* quandam, quoad situm et ordinem terminorum, ita ut utervis prior, alter autem posterior poni possit. Is autem, qui prior positus est, antecedens vulgo, qui posterior, consequens dici solet. Quod rationis genera attinet, antecedens aut maior est consequente, quae ratio maioris *inaequalitatis* vocatur, vel ei aequalis est — quae ratio *aequalitatis*, vel antecedens minor est consequente, — quae ratio minoris *inaequalitatis* appellatur. Praeterea haec genera in varias denno species dividunt, quas videre est apud Clavius aut Barrovium p. 240., quibus hic immorari nihil attinet. Antecedens autem consequentis non

4. Rationem inter se magnitudines habere dicuntur, quae multiplicatae sese superare possunt.

tantum aliquod multiprum, sed etiam eius pars aliquota aut pars aliquanta esse potest. „Numerus integer vel fractus, hique vel spurius vel verus, qui indicat, quoties antecedens contineat consequentem, *exponens rationis* vocatur. Praeterea autem occurrunt magnitudines eiusdem generis, e. g. lineae, quarum maior nec ipsa, nec ullum eius multiprum, minoris cuiuspiam multiplo aequatur. Eiusmodi magnitudines, mensuram quippe communem nullam habentes, *incommensurabiles* vocantur. Ratio igitur istiusmodi duarum magnitudinum assignari numeris nequit, quare etiam *irrationales* vocantur: limites tamen exponentis huius definiti possunt, qui invicem minus differant, quam dato numero facto quocunque, seu duo assignari possunt multipla immediate contigua magnitudinis unius, quae sint limites multipli cuiuscunque dati magnitudinis alterius: hoc est, quorum unum dato hoc multiplo minus sit, alterum maius.“ Pfleiderer Expos. ac Dilucid. L. V. p. 7. Atque haec quidem causa fuisse videtur Euclidi, cur in sequentibus nunquam definitionem V. 5., si modo ea genuina sit, in ulla demonstratione adhiberet, sed quantam insuper adderet. „Nihil forte aliud, Barrovii verba sunt p. 250. in definitione 3. tradenda, Euclidi propositum fuit, quam ut methodi plenioris, aut ornatus qualiscunque causa, pracludens scilicet accuratioribus istis eiusdem, maioris et minoris rationis definitionibus mox subiungendis, *generalem quaedam* et *ὁλοσχερῇ τοῦ λόγου* ideam discentium insinuaret animis per metaphysicam hanc definitionem, metaphysicam dico, nec enim proprie mathematica est, cum ab ea nihil quicquam dependeat aut deducatur a mathematicis, neo, ut existimo, deduci possit. Cuiusmodi quoque censeretur posthac tradita definitio analogiae: analogia est rationum similitudo, quae nulli mathematico deserviat usui, nec alio opinor fine proponitur, quam ut per eam generalis quaedam analogiae notio, crassa licet et confusa tyronibus indatur. Definitionibus autem ex-

ε. Ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ μεγέθη λέγεται εἶναι, πρῶτον πρὸς δεύτερον καὶ τρίτον πρὸς τέταρτον, ὅταν τὰ τοῦ πρώτου καὶ τρίτου ἰσάκεις πολλαπλάσια, τῶν τοῦ δευτέρου καὶ τέταρτου ἰσάκεις πολλαπλάσιων, καὶ ὅποιοι οὖν πολλαπλασιασμὸν, ἑκατέρου ἑκατέρου ἢ ἅμα ὑπερέχῃ, ἢ ἅμα ἴσα ᾗ, ἢ ἅμα ἐλλείπῃ ληφθέντα κατάλληλα.

ς. Τὰ δὲ τὸν αὐτὸν ἔχοντα λόγον μεγέθη, ἀνάλογον καλεῖσθω.

quisitis, mox ab illo subiunctis tota rationum doctrina, tota res mathematica subnuitur; ad illas igitur potissimum attendi debet, per illas rationum doctrina perfectius elucescit: hæc et consimiles absque notabili matheseos detrimento prorsus omitti possent: sicut in Elem. VII. factum videmus, ubi numerorum analogia definitur et pertractatur, nulla tamen rationis numero competentis exhibita definitione; quamvis illic aequè necessaria fuit et utilis talis definitio, atque hic est, sed neutro loco magna fuit necessitas." Unde et Rob. Simsonem hæc definitiones pro spuris habuisse diximus. Et cum Rob. Simson. consentit Pflaiderer. l. c. p. 9., qui observat, Euclidem hac definitione non solum nusquam in sequentibus uti, verumetiam uti ob vagam, quam offerat, notionem non potuisse.

DEFIN. IV.

Sive genuina sit definitio 3., sive spuria, Euclidi certe ob eas, quas diximus, causas non ex omni parte satisfacere poterat. Hinc definitionem 4. vel priori adiunxisse vel solam dedisse censendus est, qua non tam rationis geometricæ rationem ipsam explicare, quam characterem distinctivum magnitudinum, quas vocant, homogenearum, et quæ terminos rationis alicuius constituere possunt, assignare volebat: ita tamen, ut simul innueret, quid in illis, quatenus ratio earum geometrica spectatur, præcipue sit considerandum. Accuratiorẽ notionis evolutionem definitionibus identitatis ac diversitatis rationum reservavit. Cf. Pflaiderer. l. c. p. 8. Cæte-

5. In eadem ratione magnitudines esse dicuntur, prima ad secundam et tertia ad quartam, quando primae et tertiae aequae multiplices, secundae et quartae aequae multiplices, iuxta quamvis multiplicationem, utraque utramque vel una superant, vel una aequales sunt, vel una deficiunt inter se comparatae.

6. Magnitudines autem eandem rationem habentes proportionales vocentur.

rum Campanus hanc definitionem non habet, eius loco autem aliam hand satis claram, qua quantitates continue proportionales explicare studet. Quo magis confirmare videtur, quod Barrovius monet, qui p. 277. ita habet: „Non diffiteor, elementi quinti definitiones attentius inspectanti, nonnihil in iis exscriptorum culpa videri transpositum ac immutatum.“

DEFIN. V.

Male omnino hanc definitionem intellexit Campanus, qui eius sensum ita explicat: proportio primae ad secundam est sicut tertiae ad quartam, cum sumtis aequemultiplicibus ad primam et tertiam, itemque aequemultiplicibus ad secundam et quartam, erit proportio multiplicis primae ad multiplex secundae, sicut multiplex tertiae ad multiplex quartae. Hoc enim, ut Campanus ipse ad definitionem praecedentem observat, esset idem per idem definire, nec illud vitium corrigeretur, si verborum Euclidis, quamvis non aperte idem dicerent, is tamen sensus esset. Falsam hanc Campani interpretationem sequitur etiam Orontius Finaeus. Iure autem id absurdum esse, Clavius ait. Nec melius Euclidis sensum assecutus est Ramus, qui vel eodem modo ac Campanus, rem interpretatur, vel definitionem Euclidis pro falsa haberi posse putat, quoniam v. e. si quatuor numeri sint 4, 3, 5, 4, et sumatur primi et tertii sexuplum 24, 30, secundi et quarti autem nonuplum 27, 36, sit simul $24 < 27$, et $30 < 36$, adeoque putare quis possit, esse $4:3=5:4$, ubi proisus obli-

ζ' (ὅταν δὲ τῶν ἰσάνεσς πολλαπλασίων, τὸ μὲν τοῦ πρώτου πολλαπλάσιον ὑπερέχῃ τοῦ τοῦ δευτέρου πολλαπλάσιον, τὸ δὲ τοῦ τρίτου πολλαπλάσιον μὴ ὑπερέχῃ τοῦ τοῦ τετάρτου πολλαπλάσιον· τὸ τε τὸ πρῶτον πρὸς τὸ δεῦτερον μείζονα λόγον ἔχειν λέγεται, ἤπερ τὸ τρίτον πρὸς τὸ τέταρτον.

ζ'. Ἀναλογία δὲ ἐστὶν ἡ τῶν λόγων ταυτότης¹⁾.

δ'. Ἀναλογία δὲ ἐν τρισὶν ὄροις ἐλαχίστη ἐστὶν²⁾.

1) Haec definitio in edd. Oxon. et Basil. est octava, atque ita nos restituiimus. Praeterea in his edd. loco: ταυτότης legitur: ὁμοιότης. Peyrardus secutum se esse ait Codd. a. et c. i. e. 140. et 103b., et huic definitioni quartum locum assignat. Et apud Campanum etiam est haec definitio 4., pariterque apud Zambertum et Clavium.

2) Ita melius Peyrardus e Cod. a. quam edd. Basil. et Oxon. quae legunt: ἐλαχίστοις. Cf. quae infra ad hanc definitionem moncbimus.

citur verborum, quae in Euclidis definitione sunt: καθ' ὅπου πολλαπλασιασμών. Quodsi enim v. c. sumtum fuerit in iisdem numeris primi quidem et tertii sexuplum 24, 30, secundi autem et quarti octuplum 24, 32, erit quidem $24 = 24$, at $30 < 32$, unde patet, quatuor numeros 4, 3, 5, 4 non esse proportionales. Nempe tum saltem erit proportio, si in aequemultiplicis quibuscunque locum habet, quod in definitione dicitur, ut iam Candalla respondit ad istam obiectionem. Plura, quae ad hanc definitionem, et ad V. 7. Def. pertinent, vide in Excursu ad finem huius libri.

DEFIN. VIII.

Barrovius notat l. c. p. 275. melius forte pro ὁμοιότης aut ταυτότης dici posse ἰσότης. Similitudinem enim verbum esse laxius et magis ambiguum, et identitatem haud optime quadrare rebus actu diversis immediate qua talibus, et sub diversorum ratione comparatis; praeterea rationum habitudines alias, hyperlogiam nimirum et hypologiam non ex diui-

ἵνα δὲ τῶν ἰσῶς πολλαπλασίων, πρῶτον πολλαπλασίον ἐπερχῇ τοῦ τοῦ πολλαπλασίου, τὸ δὲ τοῦ τρίτου πολλαπλασίον ἐπερχῇ τοῦ τοῦ τετάρτου πολλαπλασίου πρῶτον πρὸς τὸ δεύτερον μείζονα λόγον ἔσται, ἢ πρὸς τὸ τρίτον πρὸς τὸ τέταρτον.

γ. Ἀναλογία δὲ ἐστὶν ἡ τῶν λόγων ἰσότης.

δ. Ἀναλογία δὲ ἐν τριῶν ὅροις διακρίνεται.

1) Haec definitio in edd. Oxon. et Bail. est corrupta non testamur. Praeterea in his edd. loc. noster est: *ἴσους*. Peyrardus secutum se esse in Cod. v. e. 140. et 1036., et huic definitioni quartum addidit. Et apud Campanum etiam est haec deinde et quae apud Zambarium et Clavium.

2) Ita melius Peyrardus o Cod. v. e. quam Oxon. quae legunt: *ἰσότης*. Cf. quae infra ad hanc definitionem monemus.

enar verborum, quae in Euclidis definitione sunt: *ἴσους πολλαπλασίων*. Quodsi enim v. e. *ἴσους* in eisdem numeris primi quidem et tertii sexuplum 24, eundem autem et quarti octuplum 32, ex parte 24, et 30 < 32, unde patet, quatuor numeros 4, 6, 8, 12 esse proportionales. Nempe tum saltem ex propriis aequimultiplicis quibuscunque locum habet, quod in hoc dicitur, ut iam Candalla respondit ad istam definitionem. Plura, quae ad hanc definitionem, et ad V. 2. Deinde vide in Excursu ad finem huius libri.

DEFIN. VIII.

Barrovius notat l. e. p. 275. melius forte potest aut tertiorum dici posse *ἴσους*. Similitudinem esse esse *ἴσους* et magis ambiguum, et identitatem habere quadrare rebus actu diversis immediate quae aliter diversorum ratione comparatis: praeterea rationes nos alias, hypotegiam nimirum et hypologiam aut

7. Quando vero aequae multiplicium, primum simplex superat multiplicem secundae simplex vero tertiae non superat multiplicem quartae prima ad secundam maiorem rationem habet quam tertia ad quartam.

8. Proportio autem est rationum identitas.

9. Proportio in tribus ad minimum terminis distinguitur.

similitudine vel diversitate, sed ex inaequalitate duarum maiorem et minorem; denique rationum aequae nominatores, a quibus rationes habeant, quod nullae se comparentur, non eodem, aut similes, sed aequae. De latina voce *proportio* idem observat p. 194. sq. eam a Cicerone aliquoties usurpatam, quamquam exacte eodem. Alias enim apud ipsum idem valeat quod simplex ratio, nonnunquam vero rationum similitudinem vel analogiam designare, primumque videri illius usum adinvenisse, saltem ad res mathematicas applicuisse. Sic in fragmento, quod Timaeus inscribit, dicere „graecorum *ἀναλογία* (audendum est enim, haec primum a nobis novantur) comparatio, proportio potest.“ Eius autem effingendae hinc acceptam vicem vel occasionem. Cum in corrogandis vectigalibus importandis oneribus publicis, pro facultatum modum aequas leges taxato, sua cuique pars persolveretur, quae nempe rata cuiusque portio dicta sit; hanc quemque solvere dictum pro portione, vel pro ratione: hinc emeruisse vocabulum *proportio*, dignum Ciceroni, quum graecas litteras suo donare Latine quod *λόγος* et *ἀναλογία*, obvias Platonem et alios philosophos inspectanti voces, referret et exprimeret. — Cuius rationes alias dicunt arithmeticas, alias geometricas simili modo proportionales alias vocare solent arithmeticas

Euclid. Element. P. II.

F

i. "Όταν δὲ τρία μεγέθη ἀνάλογον ᾗ, τὸ πρῶτον πρὸς τὸ τρίτον διπλασίονα λόγον ἔχειν λέγεται, ἥπερ πρὸς τὸ δεύτερον."

ii. "Όταν δὲ τέσσαρα μεγέθη (συνεχῆς) ¹⁾ ἀνάλογον ᾗ, τὸ πρῶτον πρὸς τὸ τέταρτον τριπλασίονα λόγον ἔχειν λέγεται, ἥπερ πρὸς τὸ δεύτερον καὶ αἱ ἐξῆς ὁμοίως ὡς ²⁾ αὖ ἡ ἀναλογία ὑπάρχη."

1) Vocem *συνεχῆς*, quamvis in nullo codice reperiamur, addidimus, quod monente Rob. Simson. omnino necessaria est, et in XI. 33. ita citatur.

2) Ita Peyrardus e Cod. a. Edd. Basil. et Oxon. contra: καὶ αἱ ἐξῆς ἐνὶ πλεόν, ὥς αὖ, quod nescio an non sit praefendum. Caeterum definitioni 11. Rob. Simson. subiungit aliam praecedentibus analogam, qua ratio composita explicatur. Aliam quidem rationis compositae definitionem vulgo habent in VI. Def. 5. ubi plura videbimus.

nempe, quibus prima magnitudo secundam eodem excedit, quod tertia quartam; alias geometricas, de quibus solis Euclidi tum in omni opere, tum hic potissimum et in V. 3. Def. sermo est. His postea addiderunt, quod verbo indicasse sufficiat proportionales harmonicas, seu musicas. Dicunt nempe, tres magnitudines A, B, C esse *harmonice continue* proportionales, si *geometrica* ratio primae ad tertiam aequalis sit *geometricae* rationi excessus (secundae super primam) ad excessum (tertia super primam super secundam) i. e. si sit $A : C = \frac{(B-A) \cdot (C-B)}{(A-B) \cdot (B-C)}$ v. c. in numeris 3, 4, 6, quum sit $3 : 6 = 4 - 3 : 6 - 4$. Eodem modo quatuor magnitudines A, B, C, D harmonice proportionales esse dicunt, si fuerit $\frac{(A-B) \cdot (C-D)}{(B-A) \cdot (D-C)} = A : D$. Rationem huius denominationis vide v. c. in Klügels mathem. Wörterb. ad vocem: Harmon. Proportion.

DEFIN. IX.

Haud satis clare patet, quid verba huius definitionis sibi velint, quae edd. Basil. et Oxon. ita proferunt: *Ἀνάλογα ἐν*

10. Si autem tres magnitudines proportionales sint, prima ad tertiam duplicatam rationem habere dicitur, eius quam habet ad secundam.

11. Si quatuor magnitudines (deinceps) proportionales sint, prima ad quartam triplicatam rationem habere dicitur eius quam habet ad secundam; et semper deinceps similiter quamdiu proportio exstiterit.

τριῶν ὅρων ἐλαχίστος ἐστίν. Quid enim termini minimi sibi velint, incertum videri possit. Candalla quidem explicat ἐλαχίστος saltim, atque eodem modo Peletarius et Gregorii ponunt: *minimum* vel *ad minimum*, quam ipsam interpretationem habent etiam Ambros. Rhodius, Baermannus, Rob. Simson. alique. Recte illi quidem, quoad sensum, an tamen vox ἐλαχίστος grammatice id significari possit, valde dubitamus. Hinc praeferendam putavimus lectionem Peyrardi: ἐλαχίστη, quae facilius certe ac illa altera significare posse videtur, proportionem, quum illa minima i. e. minimis terminis expressit, vel, ut aliter dicamus, *ad minimum* tres continere terminos. Simplicissimum forte fuerit, in graeco quoque ponere: ἐλαχίστα, idque adverbialiter sumere. Quod deinde vocem ὅρων attinet, ea ipsa quoque, ut Candalla monet, improprie hic sumta est. Nempe in omni ratione duo omnino termini, alter antecedens, alter consequens adesse debet, adeoque, quum duae rationes inter se comparantur, ut sit in analogia, proprie quatuor omnino termini aderunt, quamvis, ut sit in proportionem continua, eadem magnitudo, quae efficit terminum consequentem prioris rationis, efficere simul possit terminum antecedentem posterioris, ubi deinde improprie tres saltim terminos dicere possis, quum potius tres magnitudines, quarum secunda bis ponitur, quatuor etiam nunc terminos efficiant. Forte itaque pro ὅρων ponendum fuerit μετῴρων, qua voce Euclides etiam alias, ubi de rationibus sermo est, utitur. Et usus ille vocis ὅρων, quo terminos rationis significat, forte sequioris saltim aevi fuerit. Cf. Pfeleiderer. in

ιβ. Ὀμόλογα μεγέθη λέγεται, τὰ μὲν ἡγούμενα τοῖς ἡγουμένοις, τὰ δὲ ἐπόμενα τοῖς ἐπομένοις.

ιγ. Ἐναλλάξ λόγος ἐστὶ λήψις τοῦ ἡγουμένου πρὸς τὸ ἡγούμενον, καὶ τοῦ ἐπομένου πρὸς τὸ ἐπόμενον.

Schol. ad libr. VI. Elem. Euclid. §. 132. et, qui ab eo citatur, Isaac. Barrov. (Lectio. Cantabrig. habitae 1666. p. 197. sq. et p. 214.). Hinc omnis haec definitio Pflaiderero l. c. suspecta est. Quum tamen sequens definitio 10. se ad eam referre videatur, possis fortasse eam, ita, uti diximus, mutam aut intellectam retinere.

DEFIN. X. XI.

Post has definitiones locum proprium fuisse definitionem rationis compositae Rob. Simson. recte monet. Caeterum Clavius observat, probe distinguendum esse inter rationem duplicam et duplicatam, triplam et triplicatam etc. Et Euclides quoque semper dicit λόγος διπλασίων, non, ut de recta aut angulo διπλάσιος aut διπλος. Quodsi igitur fuerint magnitudines A, B, C, D, E etc. continue proportionales i. e. ita, ut $A:B=B:C=C:D=D:E$ etc. ratio A:C duplicata dicitur rationis A:B, quoniam inter A et C duae rationes ponuntur, quae aequales sunt rationi A ad B: eodem modo ratio A:D triplicata dicitur rationis A:B etc. Contra, eodem casu, ratio A:B dicitur subduplicata rationis A:C; eodemque modo ratio A:B subtriplicata dicitur rationis A:D, subquadruplicata rationis A:E etc. Pariter, si fuerit $A:B=B:C$, sitque $M:N=A:C$, etiam M:N dicetur aequalis rationi, quae duplicata est rationis A:B, vel brevitatis causa ratio M:N dicetur duplicata rationis A:B, idemque valebit in ratione triplicata, quadruplicata etc. Eodem modo, si sit $A:B=B:C$ et $P:Q=A:B$, dicetur P:Q ratio, quae eadem est subduplicatae rationis A:C, vel brevius P:Q dicetur subduplicata rationis

12. Homologae magnitudines dicuntur, antecedentes quidem antecedentibus, consequentes vero consequentibus.

13. Alterna (permutata) ratio est sumptio antecedentis ad antecedentem, et consequentis ad consequentem.

$A:C$, atque ita in reliquis. Ratio duplicata, triplicata etc. species tantum sunt rationis compositae, in quibus nempe singulae rationes, ex quibus aliae componuntur, inter se aequales sunt. Unde ea omnia, quae ex definitione rationis compositae consequuntur (vide infra in Exc. ad libr. VI.) et applicari possunt ad rationem duplicatam, triplicatam etc. etiam de hac valent. Nominatim, ut hoc non demonstrationis causa, quae in locis citatis infra habetur, sed in antecessum, ut aiunt, dicamus, rationum inter se earundem duplicatae (triplicatae etc.) sunt pariter inter se eadem (Excurs. in libr. VI. §. 9. et infra Cor. ad V. 22.) et vice versa, rationum inter se earundem subduplicatae, subtriplicatae sunt inter se eadem (vid in Exc. ad Libr. V. Cor. ad Prop. m.). Et si, quando id fieri potest, numeris exprimantur rationes duplicatae, triplicatae etc. erit (Exc. ad Libr. VI. §. 7.) exponens rationis duplicatae (triplicatae) numerus quadratus (cubus) multiplicatione denominatoris rationis simplicis per se ipsum factus, vel ratio duplicata (triplicata) eadem est rationi quadratorum (cuborum) eorum numerorum, qui rationem simplicem exhibent. Porro, si $A:C$ est ratio duplicata (triplicata) rationis $A:B$, inverse erit $C:A$ ratio duplicata (triplicata) rationis $B:A$ (Exc. ad Libr. VI. §. 17.) etc. Caeterum apud ipsum Euclidem nulla rationis duplicatae etc. mentio fit ante VI. 19.

DEFIN. XIII.

Quae hic alterna ratio dicitur, melius forsitan alterna *proportio* diceretur. Manifesto enim non de duabus saltim quantitatibus, sed de quatuor sermo est. Caeterum patet, ut quan-

ιδ'. Ἀνάπαλιν λόγος ἐστὶ λήψις τοῦ ἐπομένου
ὡς ἡγούμενον πρὸς τὸ ἡγούμενον ὡς ἐπόμενον.

ιε'. Σύνθεσις λόγου ἐστὶ λήψις τοῦ ἡγούμενου μετὰ
τοῦ ἐπομένου ὡς ἐνὸς πρὸς αὐτὸ τὸ ἐπόμενον.

ις'. Διαιρέσις δὲ λόγου ἐστὶ λήψις τῆς ὑπεροχῆς,
ἢ ὑπερέχει τὸ ἡγούμενον τοῦ ἐπομένου, πρὸς αὐτὸ
τὸ ἐπόμενον.

ιζ'. Ἀναστοφὴ λόγου ἐστὶ λήψις τοῦ ἡγούμενου
πρὸς τὴν ὑπεροχὴν, ἢ ὑπερέχει τὸ ἡγούμενον τοῦ
ἐπομένου.

ιη'. Δίττου λόγος ἐστὶ, πλειόνων ὄντων μεγεθῶν
καὶ ἄλλων αὐτοῖς ἴσων τὸ πλῆθος, σὺν ὁνὶ λαμβανόμενων
καὶ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, ὅταν ἢ ὡς ἐν τοῖς
πρώτοις μεγέθεσι τὸ πρῶτον πρὸς τὸ ἔσχατον, οὕτως
ἐν τοῖς δευτέροις μεγέθεσι τὸ πρῶτον πρὸς τὸ ἔσχατον.
Ἡ ἄλλως. Λήψις τῶν ἁκρῶν κατ' ὑπεξαίρεσιν
τῶν μέσων.

ιθ'. Τεταγμένη ἀναλογία ἐστίν, ὅταν ἢ ὡς ἡγούμενον
πρὸς ἐπόμενον οὕτως ἡγούμενον πρὸς τὸ ἐπόμενον,
ἢ δὲ καὶ ὡς ἐπόμενον πρὸς ἄλλο τι οὕτως
ἐπόμενον πρὸς ἄλλο τι ¹⁾).

κ'. Τεταραγμένη δὲ ἀναλογία ἐστίν, ὅταν, τριῶν
ὄντων μεγεθῶν καὶ ἄλλων αὐτοῖς ἴσων τὸ πλῆθος,

1) Peyrardus refert, hanc definitionem omitti a Codd. a. c. quod, quam perturbata ratio postea tamen occurrat, met. librarii oscitantia, cuius oculus a τεταγμένη in τεταραγμένη aberrabat, factum fuisse videtur.

titates ita alterne comparare possint, omnes quatuor eiusdem generis esse debere.

DEFIN. XVI. et XVII.

Manifestum est, sumi in his definitionibus, consequentem

14. Inversa ratio est sumptio consequentis ut antecedentis, ad antecedentem ut ad consequentem.

15. Compositio rationis est sumptio antecedentis cum consequente tanquam unius ad ipsam consequentem.

16. Divisio autem rationis est sumptio excessus, quo superat antecedens consequentem, ad ipsam consequentem.

17. Conversio rationis est sumptio antecedentis ad excessum, quo antecedens superat consequentem.

18. Ex (aequo) aequalitate ratio est, quando, pluribus existentibus magnitudinibus et aliis ipsis numero aequalibus, et in eadem ratione binis sumptis, est, ut in primis magnitudinibus prima ad ultimam, ita in secundis magnitudinibus prima ad ultimam. Vel aliter. Sumptio extremarum per subtractionem mediarum.

19. Ordinata proportio est, quando est ut antecedens ad consequentem ita antecedens ad consequentem; ut autem consequens ad aliam quampiam, ita consequens ad aliam quampiam.

20. Perturbata autem proportio est, quando tribus existentibus magnitudinibus et aliis ipsis numero ae-

minoram esse antecedente. Quodsi contra consequens maior fuerit antecedente, similis erit argumentatio, si sumatur excessus, quo consequens superat antecedentem.

DEFIN. XVIII—XX.

Monente Rob. Simson. Def. 19. et 20. speciem tantum continent eius proportionis, quae Def. 18. explicatur. Unde forte coniecere liceat, in Def. 18. quoque pro λόγος legendum esse ἀναλογία. Erit igitur ex Def. 19. τετραμέλην sive διῶον

γίνεται, ὡς μὲν ἐν τοῖς πρώτοις μεγέθεσιν ἡγούμενον πρὸς ἐπόμενον, οὕτως ἐν τοῖς δευτέροις μεγέθεσιν ἡγούμενον πρὸς ἐπόμενον ὡς δὲ ἐν τοῖς πρώτοις μεγέθεσιν ἐπόμενον πρὸς ἄλλο τι, οὕτως ἐν τοῖς δευτέροις μεγέθεσιν ἄλλο τι πρὸς ἡγούμενον.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ α.

Εὰν ἡ ὅποσαοῦν μεγέθη ὅποσανοῦν μεγεθῶν ἴσων τὸ πλῆθος, ἕκαστον ἐκάστου ἰσάνεις πολλαπλάσιον, ὁσαπλάσιόν ἐστιν ἐν τῶν μεγεθῶν ἐνός, τοσαυταπλάσια ἔσται καὶ τὰ παντὰ τῶν πάντων.

Ἔστω ὅποσαοῦν μεγέθη τὰ AB , $ΓΔ$ ὅποσανοῦν μεγεθῶν τῶν E , Z ἴσων τὸ πλῆθος, ἕκαστον ἐκάστου ἰσάνεις πολλαπλάσιον· λέγω ὅτι ὁσαπλάσιόν ἐστι

τετραγμένη ἀναλογία, sive simpliciter διῶου, quando fuerit (prout ut in Def. 18.) prima ad secundam in primis quantitatibus, ut in secundis prima ad secundam; ut autem in primis, secunda ad tertiam, ita in secundis, secunda ad tertiam, et ita deinceps, et concluditur, ut in Def. 18. dictum est. Vide V. 22. Ex Def. 20, autem διῶου τετραγμένη, vel simpliciter τετραγμένη ἀναλογία est, quando in primis magnitudinibus fuerit ut prima ad secundam, ita in secundis penultima ad ultimam; ut autem in primis secunda ad tertiam, ita in secundis antepenultima ad penultimam; et ut in primis tertia ad quartam, ita in secundis quae antepenultimam praecedit ad antepenultimam, et ita deinceps, et concluditur, ut in Def. 18. Vide V. 23. Ita fere Rob. Simson. rem explicat.

ΑΧΙΟΜΑΤΑ.

Sequentia praemittit Rob. Simson. et ex eo Playfair.

1. Eiusdem sive aequalium aequemultiplices inter se aequales sunt.

2. Quantum ealem aequae multiplex est, vel quantum aequales sunt aequae multiplices, et ipsae inter se sunt aequales.

qualibus, fit, ut in primis magnitudinibus antecedens ad consequentem, ita in secundis magnitudinibus antecedens ad consequentem; ut vero in primis magnitudinibus consequens ad aliam quampiam, ita in secundis magnitudinibus alia quaequam ad antecedentem.

PROPOSITIO I. (Fig. 309.)

Si sint quotcunque magnitudines quotcunque magnitudinum aequalium multitudine, singulae singularum aequae multiplices, quam multiplex est una magnitudinum unius, tam multiplices erunt et omnes omnium.

Sint quotcunque magnitudines AB , ΓA quotcunque magnitudinum E , Z aequalium multitudine, singulae singularum aequae multiplices, dico quam multiplex est

3. Multiplex maioris maior est aequemultiplici minoris.

4. Magnitudo, cuius multiplex maior est aequemultiplici alterius, maior est altera illa magnitudine.

Quae sane ita perspicua sunt, ut axiomatum loco haberi possint. Demonstravit ea tamen Pfeiderer. in Promptuario Mathem. Lipsionsi Fascic. 7. 1798. p. 263. sqq. §§. 14—19. et in dissertatione de Dimensione circuli P. II. Tub. 1790. p. 5. not. 4. Cf. Hauber. de rationibus inter se diversis Demonstr. Tub. 1793. §. 2. Aliud autem axioma vel postulatam, quod Campanus, Clavius alique complures pariter sumere se posse putarunt, quodque ita habet:

„Quam rationem habet magnitudo aliqua ad aliam, eandem habebit quaevis magnitudo proposita ad aliquam aliam; et eandem habebit quaedam alia magnitudo ad quamvis magnitudinem propositam“

merito accuratiores Geometriae respuunt. Vid. Exc. ad hunc librum.

PROPOSITIO I.

Symbolice haec propositio ita efferi potest. Si sit $A =$

τὸ AB τοῦ E , τοσανταπλάσια ἔσται καὶ τὰ AB , ΓA τῶν E , Z .

Ἐπεὶ γὰρ ἰσάκεις ἐστὶ πολλαπλάσιον τὸ AB τοῦ E , καὶ τὸ ΓA τοῦ Z ὅσα ἄρα ἐστὶν ἐν τῷ AB μεγέθη ἴσα τῷ E , τοσαῦτα καὶ ἐν τῷ ΓA ἴσα τῷ Z . Διηροῦσθω τὸ μὲν AB εἰς τὰ τῷ E μεγέθη ἴσα τὰ AH , HB , τὸ δὲ ΓA εἰς τὰ τῷ Z ἴσα τὰ $\Gamma\Theta$, ΘA ἔσται δὴ ἴσον τὸ πλῆθος τῶν AH , HB τῷ πλῆθει τῶν $\Gamma\Theta$, ΘA . Καὶ ἐπεὶ ἴσον ἐστὶ τὸ μὲν AH τῷ E , τὸ δὲ $\Gamma\Theta$ τῷ Z ἴσα ἄρα καὶ τὰ AH , $\Gamma\Theta$ τοῖς E , Z . Διὰ τὰ αὐτὰ δὴ ἴσον ἐστὶ τὸ HB τῷ E , καὶ τὸ ΘA τῷ Z ἴσα ἄρα καὶ τὰ HB , ΘA τοῖς E , Z ὅσα ἄρα ἐστὶν ἐν τῷ AB ἴσα τῷ E , τοσαῦτα καὶ ἐν τοῖς AB , ΓA ἴσα τοῖς E , Z ὅσαπλάσιον ἄρα ἐστὶ τὸ AB τοῦ E , τοσανταπλάσια ἔσται καὶ τὰ AB , ΓA τῶν E , Z . Ἐὰν ἄρα ἢ ὅποσαοῦν, καὶ τὰ ἐξῆς.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ β.

Ἐὰν πρῶτον δευτέρου ἰσάκεις ἢ πολλαπλάσιον καὶ τρίτον τετάρτου, ἢ δὲ καὶ πέμπτον δευτέρου ἰσάκεις πολλαπλάσιον καὶ ἕκτον τετάρτου καὶ συντέθεν πρῶτον καὶ πέμπτον δευτέρου ἰσάκεις ἔσται πολλαπλάσιον καὶ τρίτον καὶ ἕκτον τετάρτου.

$r.L; B=r.M; C=r.N$ etc. r denotante numerum integrum quemcunque, erit et $A+B+C$ etc. $=r(L+M+N$ etc.). Ceterum propositioni huic vulgaris innuitur praxis multiplicandum compositum per multiplicatorem simplicem multiplicandi. Nimirum, ut v. g. numerum 7364 per 8 multiplicemus, seu ut octuplum efficiamus numeri 7364: octies sumimus primum 4 unitates, tum 6 denarios, dein 3 centenarios, denique ?

τὸ AB τοῦ E AB ἰpsius E , tam multiplices esse et AB , $ΓΔ$ ἰpsius E , Z . m E , Z .

Ἐπεὶ γὰρ ὅταν AB aequae multiplex est ἰpsius E
 E , καὶ τὸ $ΓΔ$ ἰpsius Z ; quot magnitudines sunt in AB ae-
 γίδι, ἴσαι τῷ E , tot sunt et in $ΓΔ$ aequales ipsi Z .
 διχοτομήσθαι τὸ $ΓΔ$ quidem in magnitudines $ΑΗ$, $ΗΒ$ ae-
 $ΑΗ$, $ΗΒ$, τοῦ $ΓΔ$ vero in partes $ΓΘ$, $ΘΔ$ aequales
 ἴσαι δὲ ἴσων $ΑΗ$, $ΗΒ$ multitudine ἰpsarum $ΑΗ$, $ΗΒ$ ae-
 τῶν $ΓΘ$, $ΘΔ$. Et quantum ae-
 E , τὸ δὲ $ΓΘ$ $Γ$ $ΓΘ$ vero ipsi Z ; erunt
 τοῖς E , Z . n E , Z ipsi E , et $ΘΔ$ ipsi
 τῷ E , καὶ $Γ$ E , Z ; quot igitur
 $ΘΔ$ τοῖς E , Z sunt et in $ΑΗ$,
 τοσαῦτα καὶ ἐν $ΑΗ$ igitur est
 πλάσιον ἀρα ἴσιν $ΑΗ$ ἰpsius
 καὶ τὰ AB , $ΓΔ$ AB ἰpsius E , tam multiplices erunt et AB ,
 καὶ τὰ $ΓΔ$.

Π

Ἐάν πρῶτον
 τρίτον τετάρτου
 πολλαπλάσιον πε-
 τον καὶ πέμπτον
 καὶ τρίτον καὶ ἑξ-

r , L ; $B = m$, M ; $C =$
 quaecumque, erit et
 totum propositioni h
 dum compositum per
 Nimirum, ut v , g ,
 ut octuplum efficiam
 4 unitates, tum 6 dena, deinde 12 centena, &c.

AB ipsius E , tam multiplices erunt et AB ,
 ipsius E , Z . Si igitur quocumque etc.

PROPOSITIO II. (Fig. 310.)

Si prima secundae aequae sit multiplex ac tertia
 quartae, sit autem et quinta secundae aequae multiplex
 ac sexta quartae; et simul sumptae prima et quinta se-
 cundae aequae erunt multiplices ac tertia et sexta quartae.

millenarius, hominque octuplorum conficimus summam. Cf.
 Pleiderer. Expos. et Dilucid. Libri V. Elem. p. 2.

PROPOSITIO II.

Symbolice haec propositio generalius ita offertur. Si sit

$A = p \cdot L$, $B = g \cdot L$, $C = r \cdot L$ etc. et simul $E = p \cdot M$, $F = g \cdot M$,

$G = r \cdot M$ etc. p , g , r denotantibus numeros integros quoscumque

Πρώτον γὰρ τὸ AB δευτέρου τοῦ Γ ἰσάκεις ἔστιν
πολλαπλάσιον καὶ τρίτον τὸ ΔE τετάρτου τοῦ Z , ἔστι
δὲ καὶ πέμπτον τὸ BH δευτέρου τοῦ Γ ἰσάκεις πολλα-
πλάσιον καὶ ἕκτον τὸ $E\Theta$ τετάρτου τοῦ Z . λέγω ὅτι
καὶ συντεθέν πρῶτον καὶ πέμπτον τὸ AH δευτέρου
τοῦ Γ ἰσάκεις ἔσται πολλαπλάσιον καὶ τρίτον καὶ ἕκτον
τὸ $\Delta\Theta$ τετάρτου τοῦ Z .

Ἐπεὶ γὰρ ἰσάκεις ἔστι πολλαπλάσιον τὸ AB τοῦ
 Γ καὶ τὸ ΔE τοῦ Z , ὅσα ἄρα ἔστιν ἐν τῷ AB μεγέθει
ἴσα τῷ Γ , τοσαῦτα καὶ ἐν τῷ ΔE ἴσα τῷ Z . Διὰ
τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ὅσα ἔστιν ἐν τῷ BH ἴσα τῷ Γ , το-
σαῦτα καὶ ἐν τῷ $E\Theta$ ἴσα τῷ Z , ὅσα ἄρα ἔστιν ἐν
ὅλῳ τῷ AH ἴσα τῷ Γ , τοσαῦτα καὶ ἐν ὅλῳ τῷ $\Delta\Theta$
ἴσα τῷ Z . ὅσαπλάσιον ἄρα ἔστι τὸ AH τοῦ Γ , το-
σαυταπλάσιον ἔσται καὶ τὸ $\Delta\Theta$ τοῦ Z . καὶ συντεθὲν
ἄρα πρῶτον καὶ πέμπτον τὸ AH δευτέρου τοῦ Γ
ἰσάκεις ἔσται πολλαπλάσιον καὶ τρίτον καὶ ἕκτον τὸ
 $\Delta\Theta$ τετάρτου τοῦ Z . Εἴν ἄρα πρῶτον, καὶ τὰ ἑξῆς.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ γ'.

Εἴν πρῶτον δευτέρου ἰσάκεις ἢ πολλαπλάσιον καὶ
τρίτον τετάρτου, ληφθῇ δὲ ἰσάκεις πολλαπλάσια τοῦ
πρώτου καὶ τρίτου καὶ δίσσου τῶν ληφθέντων ἐκά-

que: erunt tam $A+B+C$ etc. $=(p+g+r$ etc.). L, quam
 $E+F+G$ etc. $=(p+g+r$ etc.). M. Generaliorem hanc enun-
ciationem corollarii loco subiungit Rob. Simson. propositionem
ipsam statim ita exprimit Pfeleiderer, l. c. p. 3. Hanc propo-
sitioni innititur praxis numerum per multiplicatorem compo-
situm multiplicandi. Nempe ut ex gr. numerum 5728 per
634 multiplicemus, primum quater sumimus numerum propo-
situm 5728, tum tricies, dein sexcenties, horumque produ-

Prima enim AB secundae Γ aequae sit multiplex ac tertia ΔE quartae Z , sit autem et quinta BH secundae Γ aequae multiplex ac sexta $E\Theta$ quartae Z ; dico et simul sumptas primam et quintam AH secundae Γ aequae fore multiplices ac tertiam et sextam $A\Theta$ ipsius Z .

Quoniam enim aequae multiplex est AB ipsius Γ ac ΔE ipsius Z ; quot magnitudines sunt in AB aequales ipsi Γ , tot et in ΔE erunt aequales ipsi Z . Ex eadem ratione et quot sunt in BH aequales ipsi Γ , tot et in $E\Theta$ erunt aequales ipsi Z ; quot igitur sunt in tota AH aequales ipsi Γ , tot et in tota $A\Theta$ aequales ipsi Z ; quam multiplex igitur est AH ipsius Γ , tam multiplex erit et $A\Theta$ ipsius Z ; et simul sumptae igitur prima et quinta AH secundae Γ aequae erunt multiplices ac tertia et sexta $A\Theta$ quartae Z . Si igitur prima etc.

PROPOSITIO III. (Fig. 311.)

Si prima secundae aequae sit multiplex ac tertia quartae, sumantur autem aequae multiplices primae et tertiae; et ex aequo sumptarum utraque utriusque ae-

ctorum particularium colligimus summam. Cf. Pfeiderer. l. c. p. 3. 4.

PROPOSITIO III.

Symbolice ita: si sit $A \equiv p.L$, $I \equiv n.A$, et $E \equiv p.M$, $K \equiv n.E$, erit tam $I \equiv (n.p).L$, quam $E \equiv (n.p)M$, n et p designantibus numeros integros quoscunque, et $n.p$ designante productum, quod fit ex numero p toties sumto, quot

τερον ἑκατέρου ἰσάκεις ἔσται πολλαπλάσιον, τὸ μὲν τοῦ δευτέρου, τὸ δὲ τοῦ τετάρτου.

Πρῶτον γὰρ τὸ A δευτέρου τοῦ B ἰσάκεις ἔστω πολλαπλάσιον καὶ τρίτον τὸ Γ τετάρτου τοῦ Δ , καὶ εἰληφθῶ τῶν A, Γ ἰσάκεις πολλαπλάσια τὰ $EZ, H\Theta$ λέγω ὅτι ἰσάκεις ἔστι πολλαπλάσιον τὸ EZ τοῦ B καὶ τὸ $H\Theta$ τοῦ Δ .

Ἐπεὶ γὰρ ἰσάκεις ἔστι πολλαπλάσιον τὸ EZ τοῦ A καὶ τὸ $H\Theta$ τοῦ Γ ὅσα ἄρα ἔστιν ἐν τῷ EZ ἴσα τῷ A , τοσαῦτα καὶ ἐν τῷ $H\Theta$ ἴσα τῷ Γ . Δηριόσθω τὸ μὲν EZ εἰς τὰ τῷ A μεγέθη ἴσα τὰ EK, KZ , τὸ δὲ $H\Theta$ εἰς τὰ τῷ Γ ἴσα τὰ $HA, A\Theta$ ἔσται δὴ ἴσον τὸ πλῆθος τῶν EK, KZ τῷ πλῆθει τῶν $HA, A\Theta$. Καὶ ἐπεὶ ἰσάκεις ἔστι πολλαπλάσιον τὸ A τοῦ B καὶ τὸ Γ τοῦ Δ ἴσον δὲ τὸ μὲν EK τῷ A , τὸ δὲ HA τῷ Γ ἰσάκεις ἄρα ἔστι πολλαπλάσιον τὸ EK τοῦ B καὶ τὸ HA τοῦ Δ . Διὰ τὰ αὐτὰ δὴ ἰσάκεις ἔστι πολλαπλάσιον τὸ KZ τοῦ B καὶ τὸ $A\Theta$ τοῦ Δ . Ἐπεὶ οὖν πρῶτον τὸ EK δευτέρου τοῦ B ἰσάκεις ἔστι πολλαπλάσιον καὶ τρίτον τὸ HA τετάρτου τοῦ Δ ἔστι δὲ καὶ πέμπτον τὸ KZ δευτέρου τοῦ B ἰσάκεις πολλαπλάσιον καὶ ἕκτον τὸ $A\Theta$ τετάρτου τοῦ Δ καὶ συντεθεὶν ἄρα πρῶτον καὶ πέμπτον τὸ EZ δευτέρου

alter n continet unitates. Huic propositioni, quod sit nA , seu $n(pL) = (n.p).L$, inhihitur praxis multiplicandi numerum integrum per multiplicatorem, qui solis denariis, vel centenariis etc. constat. Nempe, ut v. g. numerum 5728 per 30 vel per 600 multiplicemus, triplo vel sextuplo numeri 5728 unum vel duo zero ad dextram adiungimus, hoc est, triplum numeri 5728 decuplicamus, sextuplum centuplicamus, siquae huius numeri efficiamus trigecuplum, sexcentuplum. Patitur

que erit multiplex, altera quidem secundae, altera vero quartae.

Prima enim A secundae B aequae sit multiplex ac tertia Γ quartae Δ , et sumantur ipsarum A , Γ aequae multiplices EZ , $H\Theta$; dico aequae esse multiplicem EZ ipsius B ac $H\Theta$ ipsius Δ .

Quoniam enim aequae est multiplex EZ ipsius A ac $H\Theta$ ipsius Γ ; quot magnitudines sunt in EZ aequales ipsi A , tot et in $H\Theta$ erunt aequales ipsi Γ . Dividatur EZ quidem in magnitudines ipsi A aequales EK , KZ , $H\Theta$ vero in magnitudines ipsi Γ aequales HA , $A\Theta$; erit aequalis multitudo ipsarum EK , KZ multitudini ipsarum HA , $A\Theta$. Et quoniam A aequae est multiplex ipsius B , ac Γ ipsius Δ ; aequalis autem EK quidem ipsi A , HA vero ipsi Γ ; aequae multiplex est EK ipsius B ac HA ipsius Δ . Ex eadem ratione aequae multiplex est KZ ipsius B ac $A\Theta$ ipsius Δ . Quoniam igitur prima EK secundae B aequae est multiplex ac tertia HA quartae Δ , est autem et quinta KZ secundae B aequae multiplex ac sexta $A\Theta$ quartae Δ ; et composita e prima et quinta nempe EZ secundae B aequae multiplex erit ac composita e

duodecuplum e. g. numeri alicuius efficitur, sumto tripli eius quadruplo, vel quadrupli triplo. Cf. Pfeiderer. l. c. p. 4. Generalius idem theorema ita exprimi et simili ratione demonstrari poterit: si sit $A = mB$, $B = nC$, $C = pD$ etc. pariterque $a = m\beta$, $\beta = ny$, $y = p\delta$ etc. erit tam $A = mnp \dots D$ quam $a = mnp \dots d$.

Obs. Ex hac propositione sequitur etiam alia illi similia, quam Nordmark. (Lacunae in Doctr. proportionum Euclidea

τοῦ B ἰσάκεις ἐστὶ πολλαπλάσιον καὶ τρίτον καὶ ἕκτον
τὸ $H\Theta$ τετάρτου τοῦ A . Ἐὰν ἄρα πρῶτον, καὶ τὰ
ἐξῆς.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ δ.

Ἐὰν πρῶτον πρὸς δεύτερον τὸν αὐτὸν ἔχη λόγον
καὶ τρίτον πρὸς τέταρτον· καὶ τὰ ἰσάκεις πολλαπλάσια
τοῦ τε πρώτου καὶ τρίτου πρὸς τὰ ἰσάκεις πολλαπλάσια
τοῦ δευτέρου καὶ τετάρτου, καθ' ὅποιον οὖν πολλα-
πλασιασμόν, τὸν αὐτὸν ἔξει λόγον ληφθέντα κατὰ-
λγλα.

Πρῶτον γὰρ τὸ A πρὸς δεύτερον τὸ B τὸν αὐ-
τὸν ἔχτω λόγον καὶ τρίτον τὸ Γ πρὸς τέταρτον τὸ Δ ,
καὶ εἰλήφθω τῶν μὲν A, Γ ἰσάκεις πολλαπλάσια τὰ
 E, Z , τῶν δὲ B, Δ ἄλλα ἃ ἐτυχεν ἰσάκεις πολλα-
πλάσια τὰ H, Θ λέγω ὅτι ἐστὶν ὡς τὸ E πρὸς τὸ
 H , οὕτως τὸ Z πρὸς τὸ Θ .

Εἰλήφθω γὰρ τῶν μὲν E, Z ἰσάκεις πολλαπλάσια
τὰ K, Λ , τῶν δὲ H, Θ ἄλλα ἃ ἐτυχεν 1) ἰσάκεις
πολλαπλάσια τὰ M, N .

Καὶ ἐπεὶ ἰσάκεις ἐστὶ πολλαπλάσιον τὸ μὲν E τοῦ
 A , τὸ δὲ Z τοῦ Γ , καὶ εἰληπται τῶν E, Z ἰσάκεις
πολλαπλάσια τὰ K, Λ ἰσάκεις ἄρα ἐστὶ πολλαπλάσιον
τὸ K τοῦ A καὶ τὸ Λ τοῦ Γ . Διὰ τὰ αὐτὰ δὴ ἰσά-

1) Verba ἄλλα ἃ ἐτυχεν non habent edd. Basil. et Oxon.
Ea autem necessaria esse iure censuerat Rob. Simson. in nota
ad hunc locum. Hanc viri doctissimi coniecturam confirmavit
Peyrardus, qui e Cod. a. ea textui inseruit.

animadversae Expletio in Nov. Act. Reg. Societ. Upsal. Vol.
VI. Upsalae 1799.) his verbis exhibet et demonstrat: si sint
(Fig. 312.) quotcunque magnitudines AL, B, C , et aliae ipsius

tertia et sexta nempe $H\Theta$ quartae A (V. 2.). Si igitur prima etc.

PROPOSITIO IV. (Fig. 313.)

Si prima ad secundam eandem habeat rationem quam tertia ad quartam; et aequae multiplices primae et tertiae ad aequae multiplices secundae et quartae, iuxta quamvis multiplicationem, eandem habebunt rationem inter se comparatae.

Prima enim A ad secundam B eandem habeat rationem quam tertia Γ ad quartam Δ , et sumantur ipsarum quidem A, Γ aequae multiplices E, Z , ipsarum vero B, Δ aliae utcunque aequae multiplices H, Θ ; dico esse ut E ad H , ita Z ad Θ .

Sumantur enim ipsarum quidem E, Z aequae multiplices K, A , ipsarum vero H, Θ aliae utcunque aequae multiplices M, N .

Et quoniam aequae multiplex est E ipsius A , atque Z ipsius Γ , et sumptae sunt ipsarum E, Z aequae multiplices K, A ; aequae igitur multiplex est K ipsius A ac A ipsius Γ (V. 3.). Ex eadem ratione aequae

numero aequales D, E, F , quae binae sumantur in eadem multiplicitate, sit autem perturbata earum multiplicitas, h. e., sit AL ipsius B aequae multiplex, atque E ipsius F ; similiter sit B ipsius C totuplex, quotuplex est D ipsius E : erunt ex aequo etiam aequemultiplices, seu quantuplex est AL ipsius C , tantuplex erit D ipsius F . Dem. Ponantur primo tres esse utrinque magnitudines. Sumatur QP ipsius C aequemultiplex,

μὲν ἐστὶ πολλαπλάσιον τὸ M τοῦ B καὶ τὸ N τοῦ A . Καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς τὸ A πρὸς τὸ B οὕτως τὸ Γ πρὸς τὸ Δ , καὶ εἰληπται τῶν μὲν A, Γ ἰσάκεις πολλαπλάσια τὰ K, Λ , τῶν δὲ B, Δ ἄλλα ἃ ἐτύχεν ἰσάκεις πολλαπλάσια τὰ M, N · εἰ ἄρα ὑπερέχει τὸ K τοῦ M , ὑπερέχει τὸ Λ τοῦ N καὶ εἰ ἴσον, ἴσον καὶ εἰ ἐλάττω, ἐλάττω. Καὶ ἐστὶ τὰ μὲν K, Λ τῶν E, Z ἰσάκεις πολλαπλάσια, τὰ δὲ M, N τῶν H, Θ ἄλλα ἃ ἐτύχεν ἰσάκεις πολλαπλάσια· ἐστὶν ἄρα ὡς τὸ E πρὸς τὸ H , οὕτως τὸ Z πρὸς τὸ Θ . Εἴν ἄρα πρῶτον, καὶ τὰ ἐξῆς.

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α.

Ἐπεὶ οὖν ἐδείχθη, ὅτι, εἰ ὑπερέχει τὸ K τοῦ M , ὑπερέχει καὶ τὸ Λ τοῦ N καὶ εἰ ἴσον, ἴσον καὶ εἰ ἐλάττω, ἐλάττω· δηλονότι καὶ εἰ ὑπερέχει τὸ M τοῦ K , ὑπερέχει καὶ τὸ N τοῦ Λ καὶ εἰ ἴσον, ἴσον καὶ εἰ ἐλάττω, ἐλάττω· καὶ διὰ τοῦτο ἔσται καὶ ὡς τὸ H πρὸς τὸ E , οὕτως τὸ Θ πρὸς τὸ Z . Ἐκ δὲ τούτου φανερόν, ὅτι εἰν τέσσαρα μεγέθη ἀνάλογον ἢ, καὶ ἀνάπαλιν ἀνάλογον ἔσται.

Π Ρ Ο Τ Α Σ Ι Σ ε.

Ἐάν μέγεθος μεγέθους ἰσάκεις ἢ πολλαπλάσιον, ὅπερ ἀφαιρεθὲν ἀφαιρεθέντος καὶ τὸ λοιπὸν τοῦ λοιποῦ ἰσάκεις ἔσται πολλαπλάσιον, ὁσαπλάσιόν ἐστι τὸ ὅλον τοῦ ὅλου.

ac est AL ipsius B, vel E ipsius F, sitque GP divisa in partes GM, MN, NP singulas ipsi C aequales; et AL in partes AH, HK, KL aequales ipsi B: eritque multitudo partium GM, MN, NP aequalis multitudini partium AH, HK, KL.

multiplex est M ipsius B ac N ipsius A . Et quoniam est ut A ad B ita Γ ad A , et sumptae sunt ipsarum quidem A , Γ aequae multiplices K , A , ipsarum vero B , A aliae utcunque aequae multiplices M , N ; si K superat ipsam M , superat et A ipsam N ; et si aequalis, aequalis; et si minor, minor erit (V. Def. 5.). Et sunt K , A ipsarum E , Z aequae multiplices, M , N vero ipsarum H , Θ aliae utcunque multiplices; est igitur ut E ad H , ita Z ad Θ (V. Def. 5.) Si igitur prima etc.

COROLLARIUM.

Quoniam igitur ostensum est, si superat K ipsam M , superare et A ipsam N ; et si aequalis sit, aequalem; et si minor, minorem esse; manifestum est, et si M superat K , superare et N ipsam A ; et si aequalis sit, aequalem; et si minor, minorem esse; et propterea ut H est ad E , ita erit Θ ad Z . Ex hoc manifestum est, si quatuor magnitudines proportionales sint, et inverse proportionales fore.

PROPOSITIO V. (Fig. 314.)

Si magnitudo magnitudinis aequae sit multiplex ac ablata ablatae, et reliqua reliquae aequae multiplex erit ac multiplex est tota totius.

Quum igitur sit $AH=HK=KL=B$, et $GM=MN=NP=C$; erunt AH , HK , KL , B ipsarum GM , MN , NP , C aequae multiplices, adeoque tota AL erit totius GP aequae multiplex atque AH est ipsius GM (V. 1.), vel B ipsius C , vel D

Μέγεθος γὰρ τὸ AB μεγέθους τοῦ $ΓΔ$ ἰσάκις
 ἔστω πολλαπλάσιον, ὅπερ ἀφαιρεθὲν τὸ AE ἀφ'
 ῥεθέντος τοῦ $ΓΖ$ · λέγω ὅτι καὶ λοιπὸν τὸ EB ἰσάκις
 τοῦ $ΖΔ$ ἰσάκις ἔσται πολλαπλάσιον, ὅσαπλάσιον
 ἔστιν ὅλον τὸ AB ὅλον τοῦ $ΓΔ$.

Ὅσαπλάσιον γὰρ ἔστι τὸ AE τοῦ $ΓΖ$, τοσαύτη
 πλάσιον γερωνέτω καὶ τὸ EB τοῦ $ΓΗ$.

Καὶ ἐπεὶ ἰσάκις ἔστι πολλαπλάσιον τὸ AE τοῦ
 $ΓΖ$ (καὶ τὸ EB τοῦ $ΗΓ$ · ἰσάκις ἄρα ἔστι πολλαπλάσιον
 τὸ AE τοῦ $ΓΖ$) ¹⁾ καὶ τὸ AB τοῦ $ΗΖ$ · κείτω
 δὲ ἰσάκις πολλαπλάσιον τὸ AE τοῦ $ΓΖ$ καὶ τὸ AB
 τοῦ $ΓΔ$ · ἰσάκις ἄρα ἔστι πολλαπλάσιον τὸ AB ἐκ-
 τέρου τῶν $ΗΖ$, $ΓΔ$ · ἴσον ἄρα τὸ $ΗΖ$ τῷ $ΓΔ$ · κοινὸν
 ἀφηρήσθω τὸ $ΓΖ$ · λοιπὸν ἄρα τὸ $ΗΓ$ λοιπῷ τῷ $ΔΖ$
 ἴσον ἔστιν. Καὶ ἐπεὶ ἰσάκις ἔστι πολλαπλάσιον τὸ AE
 τοῦ $ΓΖ$ καὶ τὸ EB τοῦ $ΗΓ$, ἴσον δὲ τῷ $ΗΓ$ τὸ
 $ΔΖ$ · ἰσάκις ἄρα ἔστι πολλαπλάσιον τὸ AE τοῦ $ΓΖ$
 καὶ τὸ EB τοῦ $ΖΔ$. Ἰσάκις δὲ ὑπὸκειται πολλαπλάσιον
 τὸ AE τοῦ $ΓΖ$ καὶ τὸ AB τοῦ $ΓΔ$ · ἰσάκις ἄρα
 ἔστι πολλαπλάσιον τὸ EB τοῦ $ΖΔ$ καὶ τὸ AB τοῦ $ΓΔ$.

1) Verba, quae uncis inclusimus, desunt in edd. Basil. et Oxon. Peyrardus ea e Cod. a. addidit. Quamvis autem abesse possint, aliquid tamen ad facilius intelligendam demonstrationem facere videntur.

ipsius E. Habentur igitur tres magnitudines AL, GP, C, atque aliae ipsis numero aequales D, E, F, quarum binarum summae sunt in eadem multiplicitate, idque ordinate, ita nempe, ut AL et D sint ipsarum GP et E aequemultiplices, similiterque GP et E ipsarum C et F: ergo (V. 3.) erit AL ipsius C aequemultiplex ac D ipsius F. Si quatuor pluresve sint utriusque magnitudines, patet demonstrationis continuatio per iam ostensa .Q.E.D. Symbolice ita: si sit $A=mb$, $B=rc$, pariterque $D=re$, $E=mf$, erit tam $A=mr.C$, quam $D=mr.F$.

Magnitudo enim AB magnitudinis ΓA aequae multiplex sit ac ablata AE ablatae ΓZ ; dico et reliquam B reliquae $Z A$ aequae fore multipliceim ac multiplex tota AB totius ΓA .

Quam multiplex enim est AE ipsius ΓZ , tam multiplex fiat et EB ipsius ΓH .

Et quoniam aequae multiplex est AE ipsius ΓZ ac EB ipsius $H \Gamma$; aequae igitur multiplex est AE ipsius ΓZ ac AB ipsius $H Z$ (V. 1.); ponitur autem aequae multiplex AE ipsius ΓZ ac AB ipsius ΓA ; aequae igitur multiplex est AB utriusque ipsarum $H Z$, ΓA ; aequalis igitur $H Z$ ipsi ΓA . Communis auferatur ΓZ ; reliqua igitur $H \Gamma$ reliquae $A Z$ est aequalis (I. Ax. 3.). Et quoniam aequae multiplex est AE ipsius ΓZ ac EB ipsius $H \Gamma$, $A Z$ autem aequalis ipsi $H \Gamma$; aequae igitur multiplex est AE ipsius ΓZ ac EB ipsius $Z A$. Aequae autem ponitur multiplex AE ipsius ΓZ ac AB ipsius ΓA ; aequae igitur multiplex est EB ipsius

PROPOSITIO IV.

Symbolice haec propositio, eiusque demonstratio ita exprimi poterit. Si $A:B=C:D$, erit etiam $pA \cdot qB = pC \cdot qD$; p, q denotantibus numeros integros quoscunque, unitate haud exclusa. Nam ob $A:B=C:D$, erit, quoties $npA > < r qB$, etiam $npC > < r qD$ (V. Def. 5.), adeoque ex eadem definitione $pA : qB = pC : qD$. Pfeleiderer. l. c. p. 19. De demonstratione huius propositionis ex vulgari proportionalium definitione vide Excursum ad hunc librum.

Corollarium huic propositioni adiectum, ut rite observat Rob. Simson., verum quidem est, at non huc pertinet, nec legitima est, quae ex Prop. V. 4. deducitur, eius demonstratio. Nempe ostensum quidem est, si sit $K > < M$, esse etiam $A > < N$, at non ex eo, quod proportionales sint

καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ $\bar{E}B$ λοιποῦ τοῦ $Z\Delta$ ἰσάνεις ἔσται πολλαπλάσιον, ὅσαπλάσιόν ἐστιν ὅλον τὸ AB ὅλου τοῦ $\Gamma\Delta$. Ἐὰν ἄρα μέγεθος, καὶ τὰ ἐξῆς.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ε'.

Ἐὰν δύο μεγέθη δύο μεγεθῶν ἰσάνεις ἢ πολλαπλάσια, καὶ ἀφαιρεθέντα τινὰ τῶν αὐτῶν ἰσάνεις ἢ πολλαπλάσια καὶ τὰ λοιπὰ τοῖς αὐτοῖς ἦτοι ἴσα ἐσὶν, ἢ ἰσάνεις αὐτῶν πολλαπλάσια.

Δύο γὰρ μεγέθη τὰ AB , $\Gamma\Delta$ δύο μεγεθῶν τῶν E , Z ἰσάνεις ἔστω πολλαπλάσια, καὶ ἀφαιρεθέντα τὰ AH , $\Gamma\Theta$ τῶν αὐτῶν τῶν E , Z ἰσάνεις ἔστω πολλαπλάσια· λέγω ὅτι καὶ λοιπὰ τὰ HB , $\Theta\Delta$ τοῖς E , Z ἦτοι ἴσα ἐσὶν, ἢ ἰσάνεις αὐτῶν πολλαπλάσια,

E , H , Z , Θ , id enim erat conclusio propositionis, unde ineptum est illud ratiocinium: Quoniam ostensum est etc. Poterat autem legitime, non adhibita propositione V. 4. propositio in hoc corollario contenta deduci, ut Rob. Simson ostendit. Nos autem hanc reliquasque a Rob. Simson. huic libro insertas vel adiectas propositiones exhibebimus infra in Excursu ad hunc librum, ubi et hanc vide nota B designatam. Aliam autem propositionem meliore iure corollarii nomine subiungit Rob. Simson., quod distinctionis causa

Cor. a.

appellabimus, quodque ita habet: si prima ad secundam eandem habet rationem quam tertia ad quartam, et aequae multiplices primae et tertiae iuxta quamvis multiplicationem ad secundam et quartam eandem rationem habebunt: et similiter prima et tertia ad aequae multiplices quasvis secundae et quartae eandem habebunt rationem. Quod eodem prorsus modo ac ipsa propositio demonstratur, ut facile etiam patet, posita in symbolica propositionis expressione, quam supra dedimus, vel $p=1$, vel $q=1$. Hoc corollarium ex V. 22. demonstrat Cla-

ZA ac AB ipsius GA ; et reliqua igitur EB reliquae ZA aequae multiplex erit ac multiplex est tota AB totius GA . Si igitur magnitudo etc.

PROPOSITIO VI. (Fig. 316.)

Si duae magnitudines duarum magnitudinum aequae multiplices sint, et ablatae quaedam earundem sint aequae multiplices; et reliquae iisdem vel aequales sunt, vel earum aequae multiplices.

Duae enim magnitudines AB , GA duarum magnitudinum E , Z aequae sint multiplices, et ablatae AH , IO earundem E , Z aequae sint multiplices; dico et reliquas HB , OA ipsis E , Z vel aequales esse, vel aequae multiplices earum.

visus, at non satis accurate. Sumit enim propositionem C (in Excursu ad hunc librum afferendam), quam non ante demonstraverat.

PROPOSITIO V.

Iure observat Rob. Simson., constructionem, quae demonstrationi in textu graeco praemittitur, depravatam videri. Nempe, ut iam Peletarius monuerat, id quod sumitur, ut EB fiat aequemultiplex ipsius IH , ac est AE ipsius IZ , eo redit, ut magnitudo EB in partes aequales, quotcunque libuerit, dividatur, quod nec de rectis quidem lineis, nedum de aliis magnitudinibus ante VI. 9. docuerat Euclides. Nec ad excusationem rei sufficit, quod Peletarius observat divisionem hanc rectae EB demonstrationis causa tantum sumi, non ad usum aliquem praesentem adhiberi, quippe etiam demonstrationis causa talia non sumere solet Euclides. Accedit, quod perfacilis est alia demonstratio, quam iam Campani ex arabico facta traductio, caeterum in hac propositione valde vitiosa, innuit, et quam, praesente Peletario et Clavio, qui tamen etiam vitiosam illam vulgarem demonstrationem habent,

"Εστω γάρ πρότερον τὸ HB τῇ E ἴσον· λέγω ὅτι καὶ τὸ $ΘΔ$ τῇ Z ἴσον ἐστίν. Κείσθω γάρ τῇ Z ἴσον τὸ $ΓΚ$.

Καὶ ἐπεὶ ἰσάκεις ἐστὶ πολλαπλάσιον τὸ AH τοῦ E καὶ τὸ $ΓΘ$ τοῦ Z , ἴσον δὲ τὸ μὲν HB τῇ E , τὸ δὲ $ΚΓ$ τῇ Z : ἰσάκεις ἄρα ἐστὶ πολλαπλάσιον τὸ AB τοῦ E καὶ τὸ $ΚΘ$ τοῦ Z . Ἰσάκεις δὲ ὑπόκειται πολλαπλάσιον τὸ AB τοῦ E , καὶ τὸ $ΓΔ$ τοῦ Z : ἰσάκεις ἄρα ἐστὶ πολλαπλάσιον τὸ $ΚΘ$ τοῦ Z , καὶ τὸ $ΓΔ$ τοῦ Z . Ἐπεὶ οὖν ἐκάτερον τῆς $ΚΘ$, $ΓΔ$ τοῦ Z ἰσάκεις ἐστὶ πολλαπλάσιον ἴσον ἄρα ἐστὶ τὸ $ΚΘ$ τῇ $ΓΔ$. Κοινὸν ἀφγρῆσθω τὸ $ΓΘ$: λοιπὸν ἄρα τὸ $ΚΓ$ λοιπῇ τῇ $ΘΔ$ ἴσον ἐστίν. Ἀλλὰ τῇ Z τὸ $ΚΓ$ ἐστίν ἴσον· καὶ τὸ $ΘΔ$ ἄρα τῇ Z ἴσον ἐστίν. Ὡστε εἰ τὸ HB τῇ E ἴσον ἐστὶ, καὶ τὸ $ΘΔ$ ἴσον ἔσται τῇ Z .

Rob. Simson., 'praemisso propositionis enunciatio his verbis exhibet: Quam multiplex est (Fig. 315.) AE ipsius $ΓZ$, tam multiplex fiat AH ipsius $ZΔ$. (Hoc vero fieri potest, magnitudine $ZΔ$ sibi ipsi aliquoties addita). Erat igitur (V. 1.) AE aequemultiplex ipsius $ΓZ$, ita EH ipsius $ΓΔ$: ponitur autem AE aequemultiplex ipsius $ΓZ$, ac AB ipsius $ΓΔ$: ac propterea EH ipsi AB aequalis est (V. Ax. 1.). Communis auferatur AE , reliqua igitur AH aequalis est reliquae EB . Itaque, quoniam AE aequemultiplex est ipsius $ΓZ$, atque AB ipsius $ZΔ$, estque AH aequalis EB : erit AB aequemultiplex ipsius $ΓZ$, ac EB ipsius $ZΔ$. Aequemultiplex autem ponitur AE ipsius $ΓZ$, ac AB ipsius $ΓΔ$: ergo EB ipsius $ZΔ$ aequemultiplex est ac AB ipsius $ΓΔ$. Quare, si etc. Symbolice propositio ita exprimitur: si sint mA' , mB quaecunque aequemultiplica magnitudinum A , B , quarum $A > B$, erit etiam $mA - mB$ idem multiplum magnitudinis $A - B$, nempe erit $m(A - B)$.]

Sit enim primum (Fig. 316. a.) HB ipsi E aequalis; dico et θA ipsi Z aequalem esse. Ponatur enim ipsi Z aequalis ΓK .

Et quoniam aequae multiplex est AH ipsius E ac $\Gamma\theta$ ipsius Z , aequalis autem HB ipsi E , $K\Gamma$ vero ipsi Z ; aequae igitur multiplex est AB ipsius E ac $K\theta$ ipsius Z . Aequae autem multiplex ponitur AB ipsius E ac ΓA ipsius Z ; aequae igitur multiplex est $K\theta$ ipsius Z ac ΓA ipsius Z . Et quoniam utraque ipsarum $K\theta$, ΓA ipsius Z aequae multiplex est; aequalis igitur est $K\theta$ ipsi ΓA . Communis auferatur $\Gamma\theta$; reliqua igitur $K\Gamma$ reliquae θA aequalis est. Sed $K\Gamma$ ipsi Z est aequalis; et θA igitur ipsi Z aequalis est. Quare si HB ipsi E aequalis est, et θA aequalis erit ipsi Z .

PROPOSITIO VI.

Rob. Simson. observat, casus posterioris demonstrationem omissam esse in textu graeco, quum tamen in versione Campani ex arab. facta utriusque casus demonstratio habeatur. Id autem eo factum arbitratur, quod in mutilata Theonis editione libri quinti huius casus nulla occurrat applicatio. Eundem tamen casum adhiberi perfectiori V. Prop. 18. demonstrationi, cui soli etiam prior casus et V. 5. inserviat. Unde ipse et huius posterioris casus demonstrationem addidit. Ego autem putaverim, omissam esse in textu graeco, qui caeterum figuram posteriori casui inservientem in omnibus editionibus habet, casus posterioris demonstrationem eo tantum, quod sit demonstrationi casus prioris simillima. Si enim casu posteriore, quam multiplex est HB ipsius E , tam multiplex sumatur $K\Gamma$ ipsius Z , reliqua prorsus eodem modo procedunt ac in casu priore, adhibita V. 2. Caeterum utriusque casus communem demonstrationem hanc tradit Clavius. Quum ex hyp. magnitudines AB , ΓA ipsarum E , Z sint aequemulti-

Ὅμοίως δὴ δείξομεν ὅτι καὶ πολλὰ πλάσιον ἢ
 HB τοῦ E , τοσαυταπλάσιον ἔσται καὶ τὸ ΘA τοῦ
 E . Ἐὰν ἄρα δύο μεγέθη, καὶ τὰ ἐξῆς.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Ζ.

Τὰ ἴσα πρὸς τὸ αὐτὸ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, καὶ
τὸ αὐτὸ πρὸς τὰ ἴσα.

Ἐστω ἴσα μεγέθη τὰ A, B , ἄλλο δέ τι ὃ ἐν
μεγέθος τὸ Γ . λέγω ὅτι ἐκάτερον τῶν A, B πρὸς
τὸ Γ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, καὶ τὸ Γ πρὸς ἐκάτερον
τῶν A, B .

Εἰλήφθω γάρ τῶν μὲν A, B ἰσάνεις πολλαπλασίον
τὰ Δ, E , τοῦ δὲ Γ ἄλλο ὃ ἔτυχε πολλαπλασίον
τὸ Z .

Ἐπεὶ οὖν ἰσάνεις ἐστὶ πολλαπλασίον τὸ Δ τοῦ
καὶ τὸ E τοῦ B , ἴσον δὲ τὸ A τῷ B ἴσον ἄρα καὶ
τὸ Δ τῷ E . Ἄλλο δὲ ὃ ἔτυχε τὸ Z τοῦ Γ πολλα-
πλάσιον· εἰ ἄρα ὑπερέχει τὸ Δ τοῦ Z , ὑπερέχει καὶ
τὸ E τοῦ Z · καὶ εἰ ἴσον, ἴσον· καὶ εἰ ἐλάττω, ἐλά-
ττω. Καὶ ἐστὶ τὰ μὲν Δ, E τῶν A, B ἰσάνεις πο-
λλαπλάσια, τὸ δὲ Z τοῦ Γ ἄλλο ὃ ἔτυχε πολλαπλο-
σίον· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ A πρὸς τὸ Γ , οὕτως τὸ
πρὸς τὸ Γ .

Λέγω δὴ ὅτι καὶ τὸ Γ πρὸς ἐκάτερον τῶν A ,
τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον.

plices, erunt in AB tot magnitudines aequales ipsi E , quae in TA sunt aequales ipsi Z . Unde, si ex numero aequalium magnitudinum, quae in AB, TA continentur, dematur unusquisque aequalis magnitudinem, quae in $AI, I\Theta$ sunt; remanebit in HB numerus magnitudinum ipsi E aequalium aequali numero magnitudinum ipsi Z aequalium, quae in ΘA con-

Similiter (Fig. 316. b.) ostendemus et si multiplex est HB ipsius E , aequae multiplicem fore et magnitudinem θA ipsius Z . Si igitur duae etc.

PROPOSITIO VII. (Fig. 317.)

Aequales magnitudines ad eadem eandem habent rationem, et eadem ad aequales.

Sint aequales magnitudines A, B , alia autem quaelibet magnitudo Γ ; dico utramque ipsarum A, B ad Γ habere eandem rationem; et Γ ad utramque ipsarum A, B .

Sumantur enim ipsarum A, B aequae multiplices d, E , ipsius vero Γ alia utcumque multiplex Z .

Quoniam igitur aequae multiplex est d ipsius A ac E ipsius B , aequalis autem A ipsi B ; aequalis igitur et d ipsi E . Alia vero Z ipsius Γ utcumque multiplex est; si igitur superat d ipsam Z , superat et E ipsam Z ; et si aequalis, aequalis; et si minor, minor. Et sunt quidem d, E ipsarum A, B aequae multiplices, ipsa vero Z ipsius Γ alia utcumque multiplex est; est igitur ut A ad Γ , ita B ad Γ (V. Def. 5.).

Dico autem et Γ ad utramque ipsarum A, B eandem habere rationem.

nentur i. e. si $HB=B$, erit etiam $\theta\theta=Z$: sin autem HB sit multiplex ipsius B , erit etiam $\theta\theta$ aequemultiplex ipsius Z . Symbolice propositio haec ita exhibetur: si sit $A=pI$, $B=qL$; et $E=pM$, $F=qM$, p, q denotantibus numeros integro- quoscuque, quorum prior p maior altero q : erit tam $A-B=(p-q)L$, quam $E-F=(p-q)M$, speciatim tam $A-B=L$.

Τῶν γὰρ αὐτῶν κατασκευασθέντων ὁμοίως δὴ δεῖ-
 ξομεν ὅτι ἴσον ἐστὶ τὸ Δ τῷ E . ἄλλο δέ τι τὸ Z ἢ
 ἄρα ὑπερέχει τὸ Z τοῦ Δ , ὑπερέχει καὶ τοῦ E καί
 εἰ ἴσον, ἴσον· καὶ εἰ ἔλαττον, ἔλαττον. Καὶ ἐστὶ τὸ
 μὲν Z τοῦ Γ πολλαπλάσιον, τὰ δὲ Δ , E τῶν A ,
 B ἄλλα ἃ ἔτυχεν ἰσάκεις πολλαπλάσια· ἔστιν ἄρα ὡς
 τὸ Γ πρὸς τὸ A , οὕτως τὸ Γ πρὸς τὸ B . Τὸ ἴα
 ἄρα, καὶ τὰ ἐξῆς ¹⁾).

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ἦ.

Τῶν ἀνίσων μεγεθῶν, τὸ μείζον πρὸς τὸ αὐτὸ
 μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ἔλαττον· καὶ τὸ αὐτὸ
 πρὸς τὸ ἔλαττον μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ πρὸς τὸ
 μείζον.

Ἔστω ἀνισα μεγέθη τὰ AB , Γ , καὶ ἔστω μείζον
 τὸ AB , ἄλλο δὲ ὃ ἔτυχεν τὸ Δ · λέγω ὅτι τὸ AB πρὸς
 τὸ Δ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ Γ πρὸς τὸ Δ , καὶ
 τὸ Δ πρὸς τὸ Γ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ πρὸς τὸ
 AB .

Ἐπεὶ γὰρ μείζον ἐστὶ τὸ AB τοῦ Γ , κείσθω τῷ
 Γ ἴσον τὸ BE , τὸ δὴ ἔλασσον τῶν AE , EB πολ-
 λαπλασιαζόμενον ἔσται ποτὲ τοῦ Δ μείζον. Ἔστω
 πρότερον τὸ AE ἔλαττον τοῦ EB , καὶ πεπολλαπλα-
 σιάσθω τὸ AE , καὶ ἔστω αὐτοῦ πολλαπλάσιον τὸ ZH
 μείζον ὃν τοῦ Δ , καὶ ὁσαπλάσιόν ἐστὶ τὸ ZH τοῦ

1) Codex a. hic addit: Πρόσσμα. Ἐκ δὴ τούτου φανερόν,
 ὅτι ἐὰν μεγέθη τινὰ ἀνάλογον ᾖ, καὶ ἀναπάλιν ἀνάλογον ἔσται.
 Ὅπερ ἔδει δεῖξαι. At hoc Corollarium, quod idem dicit,
 quod Rob. Simsonis Prop. B. V. minime ex praecedente pro-
 positioni consequitur: indicare tamen hanc lectionem volui-
 mus.

quam $E-F=M$, si fuerit $p-q=1$, seu $p=q+1$. Cf. Pfei-
 derer. l. c. p. 4. 5. Post hanc propositionem Rob. Simson.

lisdem enim constructis, similiter ostendemus, aequalem esse A ipsi E ; alia vero quaedam est Z : si igitur superat Z ipsam A , superat Z et ipsam E ; et si aequalis, aequalis; et si minor minor. Et est Z quidem ipsius Γ multiplex; ipsae autem A , E ipsarum A , B aliae utcumque aequae multiplices; est igitur ut Γ ad A , ita Γ ad B (V. Def. 5.). Aequales igitur etc.

PROPOSITIO VIII. (Fig. 318. a. b.)

Inaequalium magnitudinum, maior ad eandem maiorem rationem habet quam minor; et eadem ad minorem maiorem rationem habet quam ad maiorem.

Sint inaequales magnitudines AB , Γ , et sit maior AB , alia vero utcumque A ; dico AB ad A maiorem rationem habere quam Γ ad A , et A ad Γ maiorem rationem habere quam ad AB .

Quoniam enim maior est AB ipsa Γ , ponatur ipsi Γ aequalis BE (I. 3.), minor ipsarum AE , EB multiplicata erit aliquando ipsa A maior (V. Def. 4.). Sit primum AE minor ipsa EB , et multiplicetur AE , et sit ipsius multiplex ZH maior ipsa A , et quam multiplex est ZH ipsius AE , tam multiplex fiat et

addit propositiones A, B, C, D, quas vide in Excursu ad hunc librum.

PROPOSITIO VII.

Cor. Eodem modo ostenditur, aequalia ad aequalia eandem rationem habere.

AE , τοσαυταπλάσιον γεγονέτω καὶ τὸ μὲν $H\Theta$ τοῦ EB , τὸ δὲ K τοῦ Γ καὶ εἰλήφθω τοῦ Δ ἀπλάσιον μὲν τὸ A , τριπλάσιον δὲ τὸ M , καὶ ἐξῆς ἐνὶ πλείον ἕως οὐ τὸ λαμβανόμενον πολλαπλάσιον μὲν γένηται τοῦ Δ , πρώτως δὲ μείζον τοῦ K . Εἰλήφθω, καὶ ἔστω τὸ N τετραπλάσιον μὲν τοῦ Δ , πρώτως δὲ μείζον τοῦ K .

Ἐπεὶ οὖν τὸ K τοῦ N πρώτως ἐστὶν ἔλαττον, τὸ K ἄρα τοῦ M οὐκ ἐστὶν ἔλαττον. Καὶ ἐπεὶ ἰσούς ἐστὶ πολλαπλάσιον τὸ ZH τοῦ AE καὶ τὸ $H\Theta$ τοῦ EB , ἰσούς ἄρα ἐστὶ πολλαπλάσιον τὸ ZH τοῦ AE καὶ τὸ $Z\Theta$ τοῦ AB . Ἰσούς δὲ ἐστὶ πολλαπλάσιον τὸ ZH τοῦ AE καὶ τὸ K τοῦ Γ . Ἰσούς ἄρα ἐστὶ πολλαπλάσιον τὸ $Z\Theta$ τοῦ AB , καὶ τὸ K τοῦ Γ τῷ $Z\Theta$; K ἄρα τῶν AB , Γ ἰσούς ἐστὶ πολλαπλάσιον. Πάλιν, ἐπεὶ ἰσούς ἐστὶ πολλαπλάσιον τὸ $H\Theta$ τοῦ EB καὶ τὸ K τοῦ Γ , ἴσον δὲ τὸ EB τῷ Γ , ἴσον ἄρα καὶ τὸ K τῷ $H\Theta$. Τὸ δὲ K τοῦ M οὐκ ἐστὶν ἔλαττον· οὐδ' ἄρα τὸ $H\Theta$ τοῦ M ἔλατιόν ἐστιν. Μείζον δὲ τὸ ZH τοῦ Δ ὅλον ἄρα τὸ $Z\Theta$ συναμφοτέρων τῶν Δ , M μείζον ἐστὶν. Ἀλλὰ συναμφοτέρα τὰ Δ , M τῷ N ἐστὶν ἴσα· (ἐπειδήπερ τὸ M τοῦ Δ τριπλάσιόν ἐστι, συναμφοτέρα δὲ τὰ Δ , M τοῦ Δ ἐστὶ τετραπλάσια, ἐστὶ δὲ καὶ τὸ N τοῦ Δ τετραπλάσιον συναμφοτέρα ἄρα τὰ M , Δ τῷ N ἴσα ἐστὶν. Ἀλλὰ τὸ $Z\Theta$ τῶν Δ , M μείζον ἐστὶν¹⁾· τὸ $Z\Theta$ ἄρα τοῦ N

1) Quae uncis inclusimus e Cod. a. Peyrardus addidit. Poterant tamen egregie abesse, aut certe saltem usque ad vocem τετραπλάσιον illustrationis causa adici.

PROPOSITIO VIII.

Rob. Simson. in nota ad hanc propositionem primo ex-

$H\Theta$ ipsius EB , ipsa vero K ipsius Γ ; et sumatur ipsius Δ dupla quidem A , tripla vero M , et deinceps una maior, quoad sumpta multiplex fiat ipsius Δ et primo maior ipsa K . Sumatur, et si N quadrupla ipsius Δ , et primo maior ipsa K .

Quoniam igitur K primo minor est quam N , non erit K ipsa M minor. Et quoniam aequae multiplex est ZH ipsius AE ac $H\Theta$ ipsius EB , aequae igitur multiplex est ZH ipsius AE ac $Z\Theta$ ipsius AB (V. 1.). Aequae autem multiplex est ZH ipsius AE ac K ipsius Γ ; aequae igitur multiplex est $Z\Theta$ ipsius AB ac K ipsius Γ ; ipsae $Z\Theta$, K igitur ipsarum AB , Γ aequae multiplices sunt. Rursus, quoniam aequae est multiplex $H\Theta$ ipsius EB ac K ipsius Γ , EB autem aequalis Γ ; aequalis igitur et K ipsi $H\Theta$. Sed K ipsa M non est minor; non igitur est $H\Theta$ minor quam M . Maior autem ZH ipsa Δ ; tota igitur $Z\Theta$ utriusque simul Δ , M maior est. Sed utraeque simul Δ , M ipsi N sunt aequales, (quandoquidem M ipsius Δ est tripla, utraeque autem simul Δ , M ipsius Δ sunt quadruplae, est vero et N ipsius Δ quadrupla, utraeque simul igitur M , Δ ipsi N aequales sunt. Sed $Z\Theta$ ipsis Δ , M maior est); $Z\Theta$ igitur ipsam N superat. K vero ipsam N non superat. Et sunt $Z\Theta$,

plicat, cui demonstratio in textu graeco obvia non eadem constructione pro utroque casu, quem habet, uti potuerit; iure deinde illud potissimum ineptum esse dicit, quod utroque casu magnitudo K demonstrationi inserta sit, quae nulli alii rei inserviat, nisi ut demonstratio proluxior fiat. Denique ad-

ὑπερέχει, τὸ δὲ K τοῦ N οὐχ ὑπερέχει. Καί ἐστι τὰ μὲν $Z\Theta$, K τῶν AB , Γ ἰσάκεις πολλαπλάσια, τὸ δὲ N τοῦ Δ ἄλλο ὃ ἔτυχε πολλαπλάσιον τὸ AB ἄρα πρὸς τὸ Δ μείζονα λόγον ἔχει ἤπερ τὸ Γ πρὸς τὸ Δ .
 Λέγω δὴ ὅτι καὶ τὸ Δ πρὸς τὸ Γ μείζονα λόγον ἔχει, ἤπερ τὸ Δ πρὸς τὸ AB .

Τῶν γὰρ αὐτῶν κατασκευασθέντων, ὁμοίως δείξομεν, ὅτι τὸ μὲν N τοῦ K ὑπερέχει, τὸ δὲ N τοῦ $Z\Theta$ οὐχ ὑπερέχει. Καί ἐστι τὸ μὲν N τοῦ Δ πολλαπλάσιον, τὰ δὲ $Z\Theta$, K τῶν AB , Γ ἄλλα ἃ ἔτυχε ἰσάκεις πολλαπλάσια· τὸ Δ ἄρα πρὸς τὸ Γ μείζονα λόγον ἔχει, ἤπερ τὸ Δ πρὸς τὸ AB .

Ἀλλὰ δὴ τὸ AE τοῦ EB μείζον ἔστω· τὸ δὲ ἔλαττον τὸ EB πολλαπλασιαζόμενον ἔσται ποτὲ τοῦ Δ μείζον. Πεπολλαπλασιασθῶ, καὶ ἔστω τὸ $H\Theta$ πολλαπλάσιον μὲν τοῦ EB , μείζον δὲ τοῦ Δ καὶ ὅσα πλάσιόν ἐστι τὸ $H\Theta$ τοῦ EB , τοσαυταπλάσιον γεγονέτω καὶ τὸ μὲν ZH τοῦ AE , τὸ δὲ K τοῦ Γ . Ὅμοιως δὴ δείξομεν ὅτι τὰ $Z\Theta$, K τῶν AB , Γ ἰσάκεις ἐστὶ πολλαπλάσια. Καὶ εἰλήθῃ ὁμοίως τὸ N πολλαπλάσιον μὲν τοῦ Δ , πρῶτως δὲ μείζον τοῦ ZH ὥστε πάλιν τὸ ZH τοῦ M μὴ ἔλασσον εἶναι, μείζον δὲ τὸ $H\Theta$ τοῦ Δ ὅλον ἄρα τὸ $Z\Theta$ τῶν A , M τοιούτου τοῦ N ὑπερέχει, τὸ δὲ K τοῦ N οὐχ ὑπερέχει.

dit, esse etiam tertium casum specialem, cuius mentio non facta sit in demonstratione, nempe si AE in primo, aut EB in secundo casu maior sit quam Δ , in quo sumendae sint quaevis ipsius AE et EB aequemultiplices, v. c. duplas ipsarum. (Quin deest etiam alius adhuc casus generalis. Casus enim, quos graecus textus habet, sunt 1) si $AE < EB$ 2) si $AE > EB$. At potest etiam esse 3) $AE = EB$.) Ex his omnibus Simson. concludit, Theonem aut alium geometriae non

K ipsarum AB , F aequae multiplices, N vero ipsius Δ alia utcumque multiplex; AB igitur ad Δ maiorem rationem habet quam F ad Δ (V. Def. 7.).

Dico autem et Δ ad F maiorem rationem habere, quam Δ ad AB .

Iisdem enim constructis, similiter ostendemus, N superare K , ipsam vero $Z\Theta$ non superare. Et est N quidem ipsius Δ multiplex, et $Z\Theta$, K ipsarum AB , F aliae utcumque aequae multiplices; Δ igitur ad F maiorem rationem habet quam Δ ad AB (V. Def. 7.).

Sed sit AE maior ipsa EB ; minor EB multiplicata, erit aliquando ipsa Δ maior. Multiplicetur, et sit $H\Theta$ multiplex ipsius EB , maior vero ipsa Δ ; et quam multiplex est $H\Theta$ ipsius EB , tam multiplex fiat ZH ipsius AE et K ipsius F . Similiter ostendemus $Z\Theta$, K ipsarum AB , F aequae multiplices esse. Et sumatur similiter N multiplex ipsius Δ , primo autem maior ipsa ZH ; quare rursus ZH ipsa N non minor erit, maior autem $H\Theta$ ipsa Δ ; tota igitur $Z\Theta$ ipsas Δ , M , hoc est N superat, K vero ipsam N non superat, quandoquidem ZH quae maior est ipsa $H\Theta$, hoc est ipsa K , non superat N . Et

satis peritum propositionem hanc vitiasse. Quamvis autem haec Simsonis reprehensio satis iusta esse videatur, et facile esset, superfluum illam magnitudinem K e demonstratione eliminare, nolimus tamen e mera coniectura textum corrigere. Caeterum Rob. Simsonis demonstratio simplicior omnino est, et omnes casus simul complectitur. Ea symbolice expressa ita habet: si $A > B$, erit $A : C > B : C$, et $C : B > C : A$. Tempe, si magnitudinum $(A - B)$, B , ea: quae non maior est altera,

ἐπειδήπερ καὶ τὸ ZH μείζον ὢν τοῦ $H\Theta$, τοῦτοισι
τὸ K , τοῦ N οὐχ ὑπερίχει. Καὶ ὁσαύτως κατακο-
λουθούντες τοῖς ἐπάνω περαινομένην τὴν ἀπόδειξιν.
Τῶν ἄρα ἀνίσων, καὶ τὰ ἐξῆς.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Θ'.

Τὰ πρὸς τὸ αὐτὸ τὸν αὐτὸν ἔχοντα λόγον, ἴσα
ἀλλήλοις ἐστί· καὶ πρὸς ἃ τὸ αὐτὸ τὸν αὐτὸν ἔχον-
τα λόγον, ἐκείνα ἴσα ἀλλήλοις ἐστίν.

Ἐγέτω γὰρ ἐκάτερον τῶν A, B πρὸς τὸ Γ τὸν
αὐτὸν λόγον· λέγω ὅτι ἴσον ἐστὶ τὸ A τῷ B .

Εἰ γὰρ μὴ, οὐκ ἂν ἐκάτερον τῶν A, B πρὸς τὸ
 Γ τὸν αὐτὸν εἶχε λόγον· ἔχει δὲ ἴσον ἄρα ἐστὶ τὸ A
τῷ B .

Ἐγέτω δὴ πάλιν τὸ Γ πρὸς ἐκάτερον τῶν A, B
τὸν αὐτὸν λόγον· λέγω ὅτι ἴσον ἐστὶ τὸ A τῷ B .

sit $\overline{\overline{C}}$, sumantur $2(A-B)$, et $2B$, vel generaliter $m(A-B)$,

mB : sin autem magnitudinum $(A-B)$, B ea, quae non ma-
ior est altera, sit $<C$, sive ea sit $(A-B)$, sive B ; erit ali-
quando aliquod eius multipulum m maius quam C , nempe vel
 $m(A-B) > C$, vel $mB > C$. Et quum multipulum m eius, quae
non maior est altera, ponamus $>C$, erit idem multipulum al-
terius tanto magis pariter $>C$, i. e. erit semper tam $m(A-
B) > C$, quam $mB > C$. Sit deinde omnibus casibus nC illud
multipulum magnitudinis C , quod primo maius est quam mB ,
nempe sit $nC > mB$, at $(n-1)C \overline{\overline{mB}}$, vel $mB \overline{\overline{(n-1)C}}$,
erit, ob $m(A-B) > C$, $n(A-B) + mB > nC$ i. e. $nA > nC$.
Quum itaque $nA > nC$, at $mB < nC$, erit ex V. Def. 7.
 $A:C > B:C$, et $C:B > C:A$.

similiter ut in iis, quae ante diximus, absolvemus demonstrationem. Ergo inaequalium etc.

PROPOSITIO IX. (Fig. 319.)

Quae ad eandem eandem habent rationem, aequales inter se sunt; et ad quas eandem eandem habet rationem, illae aequales inter se sunt.

Habeat enim utraque ipsarum A, B ad Γ eandem rationem, dico aequalem esse A ipsi B .

Si enim non, non utraque ipsarum A, B ad Γ eandem haberet rationem (V. 8.), habet autem; aequalis igitur est A ipsi B .

Habeat autem rursus Γ ad utramque A, B eandem rationem; dico aequalem esse A ipsi B .

PROPOSITIO IX.

Magis explicite hanc propositionem Rob. Simson, et ad eius exemplum Playfair. ita fere demonstrat. 1) Si $A:C=B:C$, erit $A=B$. Si enim non fuerit $A=B$, erit alterutra earum maior altera v. c. $A>B$. At tum, ut in propositione praecedente, duo numeri m, n possunt inveniri, ita ut $mA>nC$, at $mB<nC$. Quum vero ponatur $A:C=B:C$, erit (V. Def. 5.), quoties $mA>nC$, etiam $mB>nC$. Erit itaque simul $mB>nC$, et $mB<nC$, quod fieri nequit. Nequit itaque esse $A>B$, et similiter nec $B>A$, itaque $A=B$. Pariter si $C:A=C:B$, vel simili ratione immediate demonstrabitur, ut Nr. 1. esse $A=B$, quod Rob. Simson. fecit, vel, ut Playfair. docuit, ope inversionis ex Prop. B (vid. Exc. ad hunc librum) concludetur $A:C=B:C$, unde res redit ad Nr. 1.

Εἰ γὰρ μὴ, οὐκ ἂν τὸ Γ πρὸς ἐκάτερον τῶν A , B τὸν αὐτὸν εἶχε λόγον· ἔχει δὲ ἴσον ἄρα ἐστὶ τὸ A τῷ B . Τὰ ἄρα πρὸς τὸ αὐτὸ καὶ τὰ ἐξῆς.

Π Ρ Ο Τ Α Σ Ι Σ ι.

Τῶν πρὸς τὸ αὐτὸ λόγον ἔχόντων, τὸ τὸν μείζονα λόγον ἔχον, ἐκείνο μείζον ἐστίν. Πρὸς ὃ δὲ τὸ αὐτὸ μείζονα λόγον ἔχει, ἐκείνο ἐλαττόν ἐστιν.

Ἐχέτω γὰρ τὸ A πρὸς τὸ Γ μείζονα λόγον, ἥπερ τὸ B πρὸς τὸ Γ . λέγω ὅτι μείζον ἐστὶ τὸ A τοῦ B .

Εἰ γὰρ μὴ, ἤτοι ἴσον ἐστὶ τὸ A τῷ B , ἢ ἐλάσσον. Ἴσον μὲν οὖν οὐκ ἐστὶ τὸ A τῷ B , ἐκείτερον γὰρ ἂν τῶν A , B πρὸς τὸ Γ τὸν αὐτὸν εἶχε λόγον. Οὐκ ἔχει δὲ, οὐκ ἄρα ἴσον ἐστὶ τὸ A τῷ B . Οὐδὲ μὴν ἐλασσόν ἐστὶ τὸ A τοῦ B , τὸ A γὰρ ἂν πρὸς τὸ Γ τὸν ἐλάσσονα εἶχε λόγον ἥπερ τὸ B πρὸς τὸ Γ . Οὐκ ἔχει δὲ, οὐκ ἄρα ἐλασσόν ἐστὶ τὸ A τοῦ B . Ἐδείχθη δὲ ὅτι οὐδὲ ἴσον, μείζον ἄρα ἐστὶ τὸ A τοῦ B .

Ἐχέτω δὴ πάλιν τὸ Γ πρὸς τὸ B μείζονα λόγον ἥπερ τὸ Γ πρὸς τὸ A . λέγω ὅτι ἐλασσόν ἐστὶ τὸ B τοῦ A .

Εἰ γὰρ μὴ, ἤτοι ἴσον ἐστίν, ἢ μείζον. Ἴσον μὲν οὖν οὐκ ἐστὶ τὸ B τῷ A , τὸ Γ γὰρ ἂν πρὸς ἐκάτερον τῶν A , B τὸν αὐτὸν εἶχε λόγον. Οὐκ ἔχει δὲ, οὐκ ἄρα ἴσον ἐστὶ τὸ A τῷ B . Οὐδὲ μὴν μείζον ἐστὶ τὸ B τοῦ A , τὸ Γ γὰρ ἂν πρὸς τὸ B ἐλάσσονα

PROPOSITIO X.

Rob. Simson. ad hanc propositionem observat: „Ea, quae huius propositionis demonstratio exhibetur, in editionibus graecis et latinis aliisque, legitima non est. Verba enim:

Si enim non, non Γ ad utramque ipsarum A , B eandem haberet rationem (V. 8.); habet autem; aequalis igitur est A ipsi B . Quae igitur ad eandem etc.

PROPOSITIO X. (Fig. 320.)

Magnitudinum ad eandem rationem habentium, quae maiorem rationem habet, maior est; ad quam autem eandem maiorem rationem habet, minor est.

Habeat enim A ad Γ maiorem rationem, quam B ad Γ ; dico maiorem esse A ipsa B .

Si enim non, vel aequalis est A ipsi B , vel minor. Aequalis autem non est A ipsi B , utraque enim ipsarum A , B ad Γ eandem haberet rationem (V. 7.). Non habet vero; non igitur aequalis est A ipsi B . Sed neque minor est A ipsa B , nam A ad Γ minorem haberet rationem quam B ad Γ (V. 8.). Non habet autem, non igitur minor est A ipsa B . Ostensa autem est neque aequalis, maior igitur est A ipsa B .

Habeat autem rursus Γ ad B maiorem rationem quam Γ ad A ; dico minorem esse B ipsa A .

Si enim non, vel aequalis est, vel maior. Aequalis quidem non est B ipsi A , nam Γ ad utramque ipsarum A , B eandem haberet rationem (V. 7.). Non habet vero, non igitur aequalis est A ipsi B . Sed neque maior est B ipsa A , nam Γ ad B minorem ra-

maior eadem sive aequalis, minor de magnitudinibus et rationibus diverso prorsus sensu dicuntur, ut ex Def. 5. et 7. huius libri patet. Ope igitur harum examinemus demonstrationem propositionis decimae, in qua vis ratiocinii haec est: si

λόγον εἶχεν ἥπερ πρὸς τὸ A . Οὐκ ἔχει δὲ, οὐκ ἄρα
μειζὸν ἐστὶ τὸ B τοῦ A . Ἐδείχθη δὲ ὅτι οὐδὲ ἴσον,
ἐλαττον ἄρα ἐστὶ τὸ B τοῦ A . Τῶν ἄρα πρὸς τὸ
αὐτὸ, καὶ τὰ ἕξ.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ια.

Οἱ τῷ αὐτῷ λόγοι οἱ αὐτοὶ, καὶ ἀλλήλοις εἶναι
οἱ αὐτοί.

Ἐστωσαν γὰρ ὡς μὲν τὸ A πρὸς τὸ B οὕτως τὸ
 Γ πρὸς τὸ Δ , ὡς δὲ τὸ Γ πρὸς τὸ Δ οὕτως τὸ E
πρὸς τὸ Z : λέγω ὅτι εἶναι ὡς τὸ A πρὸς τὸ B οὕ-
τως τὸ E πρὸς τὸ Z .

Εἰλήθῃω γὰρ τῶν μὲν A, Γ, E ἰσάκεις πολλα-
πλάσια τὰ H, Θ, K , τῶν B, Δ, Z ἄλλα ἅ ἕντην
ἰσάκεις πολλαπλάσια τὰ M, N .

Καὶ ἵπεί ἐστιν ὡς τὸ A πρὸς τὸ B οὕτως τὸ Γ
πρὸς τὸ Δ , καὶ εἴληπται τῶν μὲν A, Γ ἰσάκεις πολ-
λαπλάσια τὰ H, Θ , τῶν δὲ B, Δ ἄλλα ἅ ἕντην ἰσά-
κεις πολλαπλάσια τὰ M, N · εἰ ἄρα ὑπερέχει τὸ H
τοῦ A , ὑπερέχει καὶ τὸ Θ τοῦ M · καὶ εἰ ἴσον, ἴσον
καὶ εἰ ἐλαττον, ἐλαττον. Πάλιν, ἐπεὶ ἐστιν ὡς τὸ Γ
πρὸς τὸ Δ οὕτως τὸ E πρὸς τὸ Z , καὶ εἴληπται τῶν
μὲν Γ, E ἰσάκεις πολλαπλάσια τὰ Θ, K , τῶν δὲ $\Delta,$

fuerit $A=B$, foret $A:\Gamma=B:\Gamma$, unde sumtis ipsarum A, B
quibuscunque aequemultiplicibus, et sumta quavis multiplici
ipsius Γ , si multiplex ipsius A maior fuerit multiplici ipsius
 Γ , erit (V. Def. 5.) multiplex ipsius B maior eadem multipli-
plici ipsius Γ . Sed, quoniam ex hypothesis $A:\Gamma > B:\Gamma$,
erunt ex V. Def. 7. quaedam ipsarum A, B aequemultiplices,
et quaedam multiplex ipsius Γ tales, ut multiplex ipsius A
maior sit multiplici ipsius Γ , at multiplex ipsius B non maior
sit multiplici ipsius Γ : haec autem propositio directe repugnat

tionem haberet quam ad A (V. 8.). Non habet vero, non igitur maior est B ipsa A . Ostensa autem est neque aequalis, minor igitur est B ipsa A . Ipsarum igitur ad eandem etc.

PROPOSITIO XI. (Fig. 321.)

Quae eidem eadem sunt rationes, et inter se sunt eadem.

Sint enim ut A ad B ita Γ ad Δ , ut vero Γ ad Δ , ita E ad Z ; dico esse ut A ad B ita E ad Z .

Sumantur enim ipsarum A , Γ , E aequae multiples H , Θ , K , ipsarum vero B , Δ , Z aliae utcumque aequae multiples M , N .

Et quoniam est ut A ad B ita Γ ad Δ , et sumptae sunt ipsarum A , Γ aequae multiples H , Θ , ipsarum vero B , Δ aliae utcumque aequae multiples M , N ; si H superat ipsam M , superat et Θ ipsam N ; et si aequalis, aequalis, et si minor, minor (V. Def. 5.). Rursus, quoniam est ut Γ ad Δ ita E ad Z , et sumptae sunt ipsarum Γ , E aequae multiples Θ , K , ipsarum vero Δ , Z aliae utcumque aequae multiples M ,

praecedenti, quare A non est aequalis B . Pergit demonstratio, sed neque minor est A quam B , haberet enim A ad Γ minorem rationem, quam B ad Γ : atqui non habet minorem, non igitur A minor est quam B . Hic dicitur: haberet A ad Γ minorem rationem quam B ad Γ , sive, quod idem est, haberet B ad Γ maiorem rationem quam A ad Γ , hoc est (V. Def. 7.) forent quaedam ipsarum B , A aequemultiples, et quaedam ipsius Γ multiplex talis, ut multiplex ipsius B maior sit multiplici ipsius Γ , at multiplex ipsius A non maior sit

Z ἄλλα ἢ ἔνυχεν ἰσάκεις πολλαπλάσια τὰ M , N · εἰ ἄρα ὑπερέχει τὸ Θ τοῦ M , ὑπερέχει καὶ τὸ K τοῦ N · καὶ εἰ ἴσον, ἴσον· καὶ εἰ ἔλασσον, ἔλασσον. Ἀλλ' εἰ ὑπερέχει τὸ Θ τοῦ M , ὑπερέχει καὶ τὸ H τοῦ A · καὶ εἰ ἴσον, ἴσον· καὶ εἰ ἔλαττον, ἔλαττον· ὥστε καὶ εἰ ὑπερέχει τὸ H τοῦ A , ὑπερέχει καὶ τὸ K τοῦ N · καὶ εἰ ἴσον, ἴσον· καὶ εἰ ἔλαττον, ἔλαττον. Καὶ ἐστὶ τὰ μὲν H , K τῶν A , E ἰσάκεις πολλαπλάσια, τὰ δὲ A , N τῶν B , Z ἄλλα ἢ ἔνυχεν ἰσάκεις πολλαπλάσια· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ A πρὸς τὸ B οὕτως τὸ E πρὸς τὸ Z . Οἱ ἄρα τῷ ἀντιῷ, καὶ τὰ ἐξῆς.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ιβ'.

Ἐὰν ἡ ὁποσοῦν μεγέθη ἀνάλογον· ἔσται ὡς ἐν τῶν ἡγουμένων πρὸς ἓν τῶν ἐπομένων, οὕτως ἅπαντα τὰ ἡγούμενα πρὸς ἅπαντα τὰ ἐπόμενα.

Ἔστωσαν ὁποσοῦν μεγέθη ἀνάλογον, τὰ A , B , Γ , Δ , E , Z , ὡς τὸ A πρὸς τὸ B οὕτως τὸ Γ πρὸς τὸ Δ καὶ τὸ E πρὸς τὸ Z · λέγω ὅτι ἐστὶν ὡς τὸ A πρὸς τὸ B οὕτως τὰ A , Γ , E πρὸς τὰ B , Δ , Z .

Εἰλήφθω γὰρ τῶν μὲν A , Γ , E ἰσάκεις πολλαπλάσια τὰ H , Θ , K , τῶν δὲ B , Δ , Z ἄλλα ἢ ἔνυχεν ἰσάκεις πολλαπλάσια τὰ Λ , M , N .

multiplici ipsius Γ , et ostendendum fuit, hoc nunquam contingere posse, si sit $A:\Gamma > B:\Gamma$; demonstrandum igitur fuit, in hoc casu multiplicem ipsius A semper superare multiplicem ipsius Γ , si aequimultiplex ipsius B eandem superet; hoc enim ostenso, manifestum esset, non posse esse $B:\Gamma > A:\Gamma$, h. e. non posse esse $A:\Gamma < B:\Gamma$. Minime autem hoc ostensum est in demonstratione propositionis decimae, sed, si decima demonstrata esset, immediate ex ea deduci posset, verum sine eius ope non facile idem ostendetur, ut demonstrationem ten-

N ; si superat Θ ipsam M , superat et K ipsam N ; et si aequalis, aequalis; et si minor, minor (V. Def. 5.). Sed si superat Θ ipsam M , superat et H ipsam A ; et si aequalis, aequalis; et si minor, minor; quare et si superat H ipsam A , superat et K ipsam N ; et si aequalis, aequalis; et si minor, minor. Et sunt H , K ipsarum A , E aequae multiplices, A , N vero ipsarum B , Z aliae nuncunquae aequae multiplices; est igitur ut A ad B ita E ad Z (V. Def. 5.). Ergo eadem etc.

PROPOSITIO XII. (Fig. 322.)

Si sint quotcunque magnitudines proportionales, erit ut una antecedentium ad unam consequentium, ita omnes antecedentes ad omnes consequentes.

Sint quotcunque magnitudines proportionales A , B , Γ , Δ , E , Z , ut A ad B ita Γ ad Δ , et E ad Z ; dico esse ut A ad B ita A , Γ , E ad ipsas B , Δ , Z .

Sumantur enim ipsarum A , Γ , E aequae multiplices H , Θ , K , ipsarum vero B , Δ , Z aliae utcunque aequae multiplices A , M , N .

tanti patebit. Quare demonstratio decimae legitima non est. Videtur autem is, qui demonstrationem decimae, quae iam habetur, posuit vice eius, quam Euclides vel Eudoxus dederat, deceptus fuisse transferendo id, quod manifestum est magnitudinibus ad rationes, magnitudinem sc. quamvis non posse simul maiorem et minorem esse alia. Quae eidem aequalia, et inter se sunt aequalia, axioma est maxime evidens, si de magnitudinibus intelligatur, Euclides autem eo non nititur ad ostendendum, rationes, quae eidem rationi sunt eadem, inter

Καὶ ἐπεὶ ἔστιν ὡς τὸ A πρὸς τὸ B οὕτως τὸ Γ πρὸς τὸ Δ καὶ τὸ E πρὸς τὸ Z , καὶ εἰληγται τῶν μὲν A, Γ, E ἰσάκεις πολλαπλάσια τὰ H, Θ, K . τῶν δὲ B, Δ, Z ἄλλα ἂ ἐτυχεν ἰσάκεις πολλαπλάσια τὰ Λ, M, N . εἰ ἄρα ὑπερέχει τὸ H τοῦ Λ , ὑπερέχει καὶ τὸ Θ τοῦ M , καὶ τὸ K τοῦ N . καὶ εἰ ἴσον, ἴσον καὶ εἰ ἔλασσον, ἔλασσον. Ὡστε καὶ εἰ ὑπερέχει τὸ H τοῦ Λ , ὑπερέχει καὶ τὰ H, Θ, K τῶν Λ, M, N καὶ εἰ ἴσον, ἴσα καὶ εἰ ἔλασσον, ἐλάσσονα. Καὶ ἐστὶ τὸ μὲν H καὶ τὰ H, Θ, K τοῦ Λ καὶ τῶν Λ, Γ, E ἰσάκεις πολλαπλάσια· ἐπειδή τε γὰρ ἂν ἡ ὁποιοῦν μεγέθη ὁποσωνοῦν μεγεθῶν ἴσων τὸ πλῆθος, ἕκαστον ἐκάστου ἰσάκεις πολλαπλάσια, ὅσαπλάσιόν ἐστι ἐν τῶν μεγεθῶν ἑνὸς, τοσαυταπλάσια ἔσται καὶ ἐν πάντα τῶν πάντων. Αὐτὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὸ Λ καὶ τὰ Λ, M, N τοῦ B καὶ τῶν B, Δ, Z ἰσάκεις ἐστὶ πολλαπλάσια· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ A πρὸς τὸ B , οὕτως τὰ A, Γ, E πρὸς τὰ B, Δ, Z . Ἐὰν ἄρα ἡ ὁποιοῦν, καὶ τὰ ἐξῆς.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ιγ.

Ἐὰν πρῶτον πρὸς δεύτερον τὸν αὐτὸν ἔχη λόγον καὶ τρίτον πρὸς τέταρτον, τρίτον δὲ πρὸς πέμπτον μείζονα λόγον ἔχη ἤπερ πέμπτον πρὸς ἕκτον καὶ πρῶτον πρὸς δεύτερον μείζονα λόγον ἔξει ἤπερ πέμπτον πρὸς ἕκτον.

Πρώτην μὲν γὰρ τὸ A πρὸς δεύτερον τὸ B τὸν αὐτὸν ἔχτω λόγον καὶ τρίτον τὸ Γ πρὸς τέταρτον τὸ Δ , τρίτον δὲ τὸ Γ πρὸς πέμπτον τὸ E μείζονα λό-

se eandem esse, sed hoc explicite demonstrat in V. 11." Hinc Simson. aliam Prop. V. 10. demonstrationem dedit, quam

Et quoniam est A ad B ita Γ ad Δ et E ad Z , et sumptae sunt ipsarum A , Γ , E aequae multiplices H , Θ , K , ipsarum vero B , Δ , Z aliae utcumque aequae multiplices A , M , N ; si H superat ipsam A , superat et Θ ipsam M , et K ipsam N (V. Def. 5.); et si aequalis, aequalis; et si minor, minor. Quare et si superat H ipsam A , superant et H , Θ , K ipsas A , M , N ; et si aequalis, aequales; et si minor, minores. Et est H quidem et H , Θ , K ipsius A et ipsarum A , Γ , E aequae multiplices; quoniam si sint quotcunque magnitudines quotcunque magnitudinum aequalium multitudine, singulae singularum aequae multiplices, quam multiplex est una magnitudinum unius, tam multiplices erunt et omnes omnium. Ex eadem ratione et A et A , M , N ipsius B et ipsarum B , Δ , Z aequae sunt multiplices; est igitur ut A ad B , ita A , Γ , E ad B , Δ , Z (V. Def. 5.). Si igitur sint quotcunque etc.

PROPOSITIO XIII. (Fig. 323.).

Si prima ad secundam eandem habeat rationem quam tertia ad quartam; tertia autem ad quartam maiorem rationem habeat quam quinta ad sextam; et prima ad secundam maiorem rationem habeat quam quinta ad sextam.

Prima enim A ad secundam B eandem habeat rationem quam tertia Γ ad quartam Δ , tertia vero Γ ad quartam Δ maiorem rationem habeat quam quinta E

eandem esse cum ea, quam Euclides vel Eudoxus dederat, nullus dubitat, quum ex ipsa definitione maioris rationis V.

γον ἐχέτω ἥπερ πέμπτον τὸ E πρὸς ἕκτον τὸ Z λέγω ὅτι καὶ πρῶτον τὸ A πρὸς δευτέρον τὸ B μείζονα λόγον ἔξει ἥπερ πέμπτον τὸ E πρὸς ἕκτον τὸ Z .

Ἐπεὶ γάρ τὸ Γ πρὸς τὸ Δ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ E πρὸς τὸ Z · ἔστι τινα τῶν μὲν Γ , E ἰσάκως πολλαπλάσια, τῶν δὲ Δ , Z ἄλλα ἃ ἔτυχεν ἰσάκως πολλαπλάσια, καὶ τὸ μὲν τοῦ Γ πολλαπλάσιον ἐπερ-
έχει τοῦ τοῦ Δ πολλαπλάσιον, τὸ δὲ τοῦ E πολλα-
πλάσιον τοῦ τοῦ Z πολλαπλάσιον οὐχ ὑπερέχει. Εἰ-
λήφθω, καὶ ἔστω τῶν μὲν Γ , E ἰσάκως πολλαπλάσια
τὰ H , Θ , τῶν δὲ Δ , Z ἄλλα ἃ ἔτυχεν ἰσάκως πο-
λλαπλάσια τὰ K , Λ , ὥστε τὸ μὲν H τοῦ K ἐπερ-
έχειν, τὸ δὲ Θ τοῦ Λ μὴ ὑπερέχειν· καὶ ὁσαπλάσιον
μὲν ἔστι τὸ H τοῦ Γ , τοσαυταπλάσιον ἔστω καὶ τὸ
 M τοῦ A · ὁσαπλάσιον δὲ τὸ K τοῦ Δ , τοσαυταπλά-
σιον ἔστω καὶ τὸ N τοῦ B .

Καὶ ἐπεὶ ἔστιν ὡς τὸ A πρὸς τὸ B οὕτως τὸ Γ
πρὸς τὸ Δ , καὶ εἰληπται τῶν μὲν A , Γ ἰσάκως πο-
λλαπλάσια τὰ M , H , τῶν δὲ B , Δ ἄλλα ἃ ἔτυχεν
ἰσάκως πολλαπλάσια τὰ N , K · εἰ ἄρα ὑπερέχει τὸ M
τοῦ N , ὑπερέχει καὶ τὸ H τοῦ K · καὶ εἰ ἴσον, ἴσον,
καὶ εἰ ἔλασσον, ἔλασσον. Ὑπερέχει δὲ τὸ H τοῦ K

7. breviter et directe ostendatur. Ita autem habet: si $A : \Gamma > B : \Delta$, est $A > B$ pariterque si $\Gamma : B > \Delta : A$, erit $B < A$. Sit enim 1) $A : \Gamma > B : \Delta$: eruntque (V. Def. 7.) quaedam ipsarum A , B aequemultiplices, et ipsius Γ quaedam multi-
plex, ita ut multiplex quidem ipsius A superet multiplicem ipsius Γ , multiplex vero B non superet eandem. Sumantur, et sint ipsarum A , B aequemultiplices mA , mB , ipsius vero Γ multiplex sit $n\Gamma$, ita ut $mA > n\Gamma$, at $mB < n\Gamma$. Est igitur $mA > mB$, adeoque $A > B$ (V. Ax. 4.). Sit 2) $\Gamma : B > \Delta : A$,

ad sextam Z ; dico et primam A ad secundam B maiorem rationem habituram esse quam quintam E ad sextam Z .

Quoniam enim Γ ad A maiorem rationem habet quam E ad Z , sunt quaedam ipsarum Γ , E multiplices, ipsarum vero A , Z aliae utcumque aequae multiplices; ita ut ipsius Γ multiplex ipsius A multiplicem superet, ipsius vero E multiplex ipsius Z multiplicem non superet. Sumantur, et sint ipsarum Γ , E aequae multiplices H , Θ ; ipsarum vero A , Z aliae utcumque aequae multiplices K , A ; ita ut H quidem ipsam K superet, ipsa vero Θ ipsam A non superet; et quam multiplex est H ipsius Γ , tam multiplex sit et M ipsius A ; quam vero multiplex K ipsius A , tam multiplex sit et N ipsius B .

Et quoniam est ut A ad B ita Γ ad A , et sumptae sunt ipsarum A , Γ aequae multiplices M , H , ipsarum vero B , A aliae utcumque aequae multiplices N , K ; si superat M ipsam N , superat et H ipsam K ; et si aequalis, aequalis; et si minor, minor (V. Def. 5.). Superat autem H ipsam K , superat igitur et M ipsam

enim $B < A$. Erunt enim (V. Def. 7.) quaedam $n\Gamma$, mB , mA talia, ut $n\Gamma > mB$, at $n\Gamma < mA$, adeoque erit $mB < mA$, et $B < A$ (V. Ax. 4.). Atque iam, demonstrata V. 10., ut porro observat Rob. Simson., facile demonstrabitur ea propositio, quae in vulgari eius demonstratione tacite supponitur. Nempe, si $A : \Gamma > B : \Gamma$, et sumantur utcumque mA , mB , $n\Gamma$, sitque $mB > n\Gamma$, erit etiam $mA > n\Gamma$. Nam ob $A : \Gamma > B : \Gamma$, erit (ex V. 10.) $A > B$, adeoque $mA > mB$, unde, si $mB > n\Gamma$, tanto magis erit $mA > n\Gamma$.

ὑπερίχει ἄρα καὶ τὸ M τοῦ N . Τὸ δὲ Θ τοῦ A οὐκ ὑπερίχει· καὶ ἐστὶ τὰ μὲν M , Θ τῶν A , E ἰσῆς· πολλαπλάσια, τὰ δὲ N , A τῶν B , Z ἄλλα ἃ ἔστιν ἰσῆς πολλαπλάσια· τὸ ἄρα A πρὸς τὸ B μείζονα λόγον ἔχει ἤπερ τὸ E πρὸς τὸ Z . Ἐὰν ἄρα πρῶτον, καὶ τὰ ἐξῆς.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ιδ.

Ἐὰν πρῶτον πρὸς δεύτερον τὸν αὐτὸν ἔχη λόγον καὶ τρίτον πρὸς τέταρτον, τὸ δὲ πρῶτον τοῦ τρίτου μείζον ἢ καὶ τὸ δεύτερον τοῦ τετάρτου μείζον ἔσται καὶ ἴσον, ἴσον καὶ ἔλασσον, ἔλασσον.

Πρῶτον γὰρ τὸ A πρὸς δεύτερον τὸ B τὸν αὐτὸν ἔχτω λόγον καὶ τρίτον τὸ Γ πρὸς τέταρτον τὸ Δ , μείζον δὲ ἔστω τὸ A τοῦ Γ · λέγω ὅτι καὶ τὸ B τοῦ Δ μείζον ἔστιν.

Ἐπεὶ γὰρ μείζον ἔστι τὸ A τοῦ Γ , ἄλλο δὲ ὅ ἔστι μέγεθος τὸ B · τὸ A ἄρα πρὸς τὸ B μείζονα λόγον ἔχει ἤπερ τὸ Γ πρὸς τὸ B . Ὡς δὲ τὸ A πρὸς τὸ B , οὕτως τὸ Γ πρὸς τὸ Δ · καὶ τὸ Γ ἄρα πρὸς τὸ Δ μείζονα λόγον ἔχει ἤπερ τὸ Γ πρὸς τὸ B . Πρὸς ὃ δὲ τὸ αὐτὸ μείζονα λόγον ἔχει, ἐκείνο ἔλαττον ἔστιν· ἔλαττον ἄρα τὸ Δ τοῦ B · ὥστε μείζον ἔστι τὸ B τοῦ Δ .

PROPOSITIO XII.

Patet, hanc propositionem tum saltem locum habere, si magnitudines, de quibus sermo est, omnes sint eiusdem generis.

PROPOSITIO XIII.

Obs. In versione latina, monente Rob. Simson, non posuimus, ut in graeco textu est: „et multiplex Γ superat

N. Ipsa vero Θ ipsam A non superat; et sunt M , Θ ipsarum A ; E aequae multiplices, ipsae vero N ; A ipsarum B , Z aliae utcunque aequae multiplices; ergo A ad B maiorem rationem habet quam E ad Z (V. Def. 7.). Si igitur prima etc.

PROPOSITIO XIV. (Fig. 321.)

Si prima ad secundam eandem habeat rationem quam tertia ad quartam, prima vero tertia maior sit, et secunda tertia maior erit; et si aequalis, aequalis; et si minor, minor.

Prima enim A ad secundam B eandem habeat rationem quam tertia Γ ad quartam Δ , maior autem sit A ipsa Γ ; dico et B ipsa Δ maiorem esse.

Quoniam enim maior est A ipsa Γ , alia autem utcunque magnitudo B ; ergo A ad B maiorem rationem habet quam Γ ad B (V. 8.). Ut autem A ad B , ita Γ ad Δ ; et Γ igitur ad Δ maiorem rationem habet quam Γ ad B (V. 13.). Ad quam autem eandem maiorem rationem habet, illa minor est (V. 10.); minor igitur Δ ipsa B ; quare maior est B ipsa Δ .

multiplicem ipsius Δ etc. sed ad rem accommodatius: ita, ut superet etc. Caeterum Simson hoc addit

Cor. Et si prima ad secundam maiorem rationem habeat, quam tertia ad quartam; tertia autem ad quartam eandem rationem habeat, quam quinta ad sextam; similiter ostendetur, primam ad secundam maiorem rationem habere quam quintam ad sextam. (Ad hoc corollarium facile illud reducitur, quod Clavius hic habet: si $A:B=C:D$, et $C:D < E:F$,

Ὅμοιως δὴ δεῖξομεν ὅτι καὶ ἴσον ἢ τὸ A τῷ Γ , ἴσον ἔσται καὶ τὸ B τῷ Δ καὶ ἔλασσον ἢ τὸ A τοῦ Γ , ἔλασσον ἔσται, καὶ τὸ B τοῦ Δ . Ἐὰν ἄρα πρῶτον καὶ τὰ ἐξῆς.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ιε.

Τὰ μέρη τοῖς ὡσαύτως πολλαπλάσις τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ληφθέντα κατάλληλα.

Ἐστω γὰρ ἰσάνεις πολλαπλάσιον τὸ AB τοῦ Γ καὶ τὸ ΔE τοῦ Z · λέγω ὅτι ἐστὶν ὡς τὸ Γ πρὸς τὸ Z οὕτως τὸ AB πρὸς τὸ ΔE .

Ἐπεὶ γὰρ ἰσάνεις ἐστὶ πολλαπλάσιον τὸ AB τοῦ Γ καὶ τὸ ΔE τοῦ Z · ὅσα ἄρα ἐστὶν ἐν τῷ AB μεγέθῃ ἴσα τῷ Γ , τοσαῦτα καὶ ἐν τῷ ΔE ἴσα τῷ Z . Διηγήσθω τὸ μὲν AB εἰς τὰ τῷ Γ μεγέθῃ ἴσα, τὰ AH , $H\Theta$, ΘB , τὸ δὲ ΔE εἰς τὰ τῷ Z ἴσα, τὰ ΔK , $K\Lambda$, ΛE · ἐστὶ δὴ ἴσον τὸ πλῆθος τῶν AH , $H\Theta$, ΘB τῷ πλῆθει τῶν ΔK , $K\Lambda$, ΛE . Καὶ ἐπεὶ ἴσα ἐστὶ τὰ AH , $H\Theta$, ΘB ἀλλήλοις, ἐστὶ δὲ καὶ τὰ ΔK , $K\Lambda$, ΛE ἴσα ἀλλήλοις· ἐστὶν ἄρα ὡς τὸ AH πρὸς τὸ ΔK οὕτως τὸ $H\Theta$ πρὸς τὸ $K\Lambda$, καὶ τὸ ΘB πρὸς τὸ ΛE · ἐστὶ ἄρα καὶ ὡς ἐν τῶν ὑπομμένων πρὸς ἐν τῶν ἐπομένων οὕτως ἅπαντα τὰ ὑπομείνα πρὸς ἅπαντα τὰ ἐπόμενα· ἐστὶν ἄρα ὡς τὸ AH πρὸς τὸ ΔK οὕτως τὸ AB πρὸς τὸ ΔE . Ἰσον δὲ τὸ μὲν AH

erit et $A:B < E:F$. Aliud autem, quod Clavius addit, corollarium non huc pertinet. Habetur illud infra in appendice Prop. 6.)

PROPOSITIO XIV.

Casus duos posteriores expressis verbis ita demonstrat Rob. Simson. Si $A:B = \Gamma\Delta$, sitque $\Delta = \Gamma$, erit $A:B = A:\Delta$ (V.

Similiter ostendemus et si aequalis sit A ipsi Γ , aequalem fore et B ipsi Δ ; et si minor sit A ipsa Γ , minorem fore et B , ipsa Δ . Si igitur prima etc.

PROPOSITIO XV. (Fig. 325.)

Partes inter se comparatae eandem habent rationem quam earum aequae multiplices.

Sit enim aequae multiplex AB ipsius Γ ac AE ipsius Z ; dico esse ut Γ ad Z ita AB ad AE .

Quoniam enim aequae multiplex est AB ipsius Γ ac AE ipsius Z ; quot in AB sunt magnitudines aequales ipsi Γ , tot sunt et in AE aequales ipsi Z . Dividatur AB in magnitudines ipsi Γ aequales AH , $H\Theta$, ΘB , AE vero in AK , KA , AE ipsi Z aequales; erit aequalis multitudo ipsarum AH , $H\Theta$, ΘB multitudini ipsarum AK , KA , AE . Et quoniam aequales sunt AH , $H\Theta$, ΘB inter se, sunt autem et AK , KA , AE aequales inter se; est igitur ut AH ad AK ita $H\Theta$ ad KA , et ΘB ad AE (V. 7.); erit igitur et ut una antecedentium ad unam consequentium, ita omnes antecedentes ad omnes consequentes (V. 12.); est igitur ut AH ad AK ita AB ad AE . Aequalis

7.), adeoque $B=A$ (V. 9.). Sit porro $A:B=\Gamma:\Delta$, et sit $A<\Gamma$, erit $\Gamma>A$, et, quoniam $\Gamma:A=A:B$, erit $A>B$ patet primum, qui est in textu graeco.

Cor. Clavius hoc addit corollarium: si $A:B=\Gamma:\Delta$, sitque $B>A$, erit et $A>\Gamma$. Quod breviter ita demonstrari potest. Si $A:B=\Gamma:\Delta$, erit et inverse (Prop. B. in

τῷ Γ , τὸ δὲ ΔK τῷ Z · ἔστιν ἄρα ὡς τὸ Γ πρὸς τὸ Z οὕτως τὸ AB πρὸς τὸ ΔE . Τὰ ἄρα μέρη, καὶ τὰ ἐξῆς.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ις'.

Ἐὰν τέσσαρα μεγέθη ἀνάλογον ᾗ, καὶ ἐναλλάξ ἀνάλογον ἔσται.

Ἐστω τέσσαρα μεγέθη ἀνάλογον, τὰ A, B, Γ, Δ , ὡς τὸ A πρὸς τὸ B οὕτως τὸ Γ πρὸς τὸ Δ · λέγω ὅτι καὶ ἐναλλάξ ἀνάλογόν ἐστιν, ὡς τὸ A πρὸς τὸ Γ οὕτως τὸ B πρὸς τὸ Δ .

Εἰλήφθω γὰρ τῶν μὲν A, B ἰσάκεις πολλαπλάσια τὰ E, Z , τῶν δὲ Γ, Δ ἄλλα ἃ ἐτύχεν ἰσάκεις πολλαπλάσια τὰ H, Θ .

Καὶ ἐπεὶ ἰσάκεις ἐστὶ πολλαπλάσιον τὸ E τοῦ A καὶ τὸ Z τοῦ B , τὰ δὲ μέρη τοῖς ὡσαύτως πολλαπλάσιοις τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον λεγόμενα κατὰλληλα· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ A πρὸς τὸ B οὕτως τὸ E πρὸς τὸ Z . Ὡς δὲ τὸ A πρὸς τὸ B οὕτως τὸ Γ πρὸς τὸ Δ καὶ ὡς ἄρα τὸ Γ πρὸς τὸ Δ οὕτως τὸ E πρὸς τὸ Z . Πάλιν, ἐπεὶ τὰ H, Θ τῶν Γ, Δ ἰσάκεις ἐστὶ πολλαπλάσια· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ Γ πρὸς τὸ Δ οὕτως τὸ H πρὸς τὸ Θ . Ὡς δὲ τὸ Γ πρὸς τὸ Δ οὕτως τὸ E

Excursu ad hunc librum) $B : A = \Delta : \Gamma$, unde ex V. 14. constat propositum.

PROPOSITIO XV.

Obs. Per partes in hac propositione intelliguntur partes aliquotae (cf. dicta ad V. Def. 2.). Asserit itaque haec propositio, esse $A : B :: pA : pB$, vel $\frac{1}{p} A : \frac{1}{p} B :: A : B$. Addi autem potest, quod habet Pfléiderer. (Exposit. et Dilucid. libri V.

autem AH ipsi Γ , ΔK vero ipsi Z ; est igitur ut Γ ad Z ita AB ad AE . Ergo partes etc.

PROPOSITIO XVI. (Fig. 326.)

Si quatuor magnitudines proportionales sint, et alterne proportionales erunt.

Sint quatuor magnitudines proportionales A , B , Γ , Δ , ut A ad B ita Γ ad Δ ; dico et alterne proportionales esse, ut A ad Γ ita B ad Δ .

Sumantur enim ipsarum A , B aequae multiplices E , Z , ipsarum vero Γ , Δ aliae utcumque aequae multiplices H , Θ .

Et quoniam aequae multiplex est E ipsius A ac Z ipsius B ; partes autem inter se comparatae eandem habent rationem, quam earum aequae multiplices (V. 15.); ergo ut A ad B ita E ad Z . Ut autem A ad B ita Γ ad Δ ; ergo ut Γ ad Δ ita E ad Z (V. 11.). Rursus, quoniam H , Θ ipsarum Γ , Δ aequae multiplices sunt; est igitur ut Γ ad Δ ita H ad Θ (V. 15.). Ut autem Γ ad Δ ita E ad Z ; ergo ut E ad Z ita H ad Θ (V. 11.). Si autem quatuor magnitudines pro-

§. 45.), etiam partes aequaliquantas eandem rationem habere, quam magnitudines ipsas. Sit nempe $p.R=A$, $p.S=B$, seu

$$R=\frac{1}{p}A, S=\frac{1}{p}B, \text{ erit (ex V. 15.) } R:S=pR:pS, \text{ vel } R:S=A:B;$$

pariterque (ex V. 15.) $R:S=mR:mS$, seu $R:S=$

$$\frac{m}{p}A:\frac{m}{p}B, \text{ unde (V. 11.) } \frac{m}{p}A:\frac{m}{p}B=A:B.$$

PROPOSITIO XVI.

Obs. Applicari potest haec propositio tantum, ubi om-

πρὸς τὸ Z · καὶ ὡς ἄρα τὸ E πρὸς τὸ Z οὕτως τὸ H πρὸς τὸ Θ . Ἐὰν δὲ τέσσαρα μεγέθη ἀνάλογον ᾗ τὸ δὲ πρῶτον τοῦ τρίτου μείζον ᾗ, καὶ τὸ δεύτερον τοῦ τετάρτου μείζον ᾖ· καὶ ἴσον, ἴσον, καὶ ἔλαττον, ἔλαττον. Εἰ ἄρα ὑπερέχει τὸ E τοῦ H , ὑπερέχει καὶ τὸ Z τοῦ Θ · καὶ εἰ ἴσον, ἴσον· καὶ εἰ ἔλαττον, ἔλαττον. Καὶ ἔστι τὰ μὲν E, Z τῶν A, B ἰσάνεις πολλαπλάσια, τὰ δὲ H, Θ τῶν Γ, Δ ἄλλα ἃ ἔτυχεν ἰσάνεις πολλαπλάσια· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ A πρὸς τὸ Γ οὕτως τὸ B πρὸς τὸ Δ . Ἐὰν ἄρα τέσσαρα καὶ τὰ ἐξῆς.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΙΖ.

Ἐὰν συγκείμενα μεγέθη ἀνάλογον ᾗ, καὶ διαιρεθέντα ἀνάλογον ᾖ.

Ἐστω συγκείμενα μεγέθη ἀνάλογον τὰ $AB, BE, \Gamma A, \Delta Z$, ὡς τὸ AB πρὸς τὸ BE οὕτως τὸ ΓA πρὸς τὸ ΔZ · λέγω ὅτι καὶ διαιρεθέντα ἀνάλογον ᾖ, ὡς τὸ AE πρὸς τὸ EB οὕτως τὸ ΓZ πρὸς τὸ ZA .

Εἰλήφθω γὰρ τῶν μὲν $AE, EB, \Gamma Z, ZA$ ἰσάνεις πολλαπλάσια τὰ $H\Theta, \Theta K, \Lambda M, MN$ · τῶν δὲ EB, ZA ἄλλα ἃ ἔτυχεν ἰσάνεις πολλαπλάσια, τὰ $K\Xi, N\Pi$.

Καὶ ἐπεὶ ἰσάνεις ἐστὶ πολλαπλάσιον τὸ $H\Theta$ τοῦ AE καὶ τὸ ΘK τοῦ EB · ἰσάνεις ἄρα ἐστὶ πολλαπλάσιον τὸ $H\Theta$ τοῦ AE καὶ τὸ HK τοῦ AB . Ἰσάνεις δὲ ἐστὶ πολλαπλάσιον τὸ $H\Theta$ τοῦ AE καὶ τὸ ΛM

nes quatuor magnitudines sunt eiusdem generis. De corollario ei vulgo adiecto vide ad Prop. A. in Excursu ad hunc librum.

PROPOSITIO XVII.

Aliter haec propositio ita offerri potest: si quatuor magnitudines proportionales sint, et prima earum maior est, quam

portionales sint, prima autem maior sit tertia, et secunda maior erit quarta; et si aequalis, aequalis; et si minor, minor (V. 14.). Si igitur superat E ipsam H , superat et Z ipsam Θ ; et si aequalis, aequalis; et si minor, minor. Et sunt E , Z ipsarum A , B aequae multiplices, H , Θ vero ipsarum Γ , Δ aliae utcumque aequae multiplices; est igitur ut A ad Γ ita B ad Δ (V. Def. 5.). Si igitur quatuor etc.

PROPOSITIO XVII. (Fig. 327.)

Si compositae magnitudines proportionales sint, et divisae proportionales erunt.

Sint compositae magnitudines proportionales AB , BE , ΓA , ΔZ , ut AB ad BE ita ΓA ad ΔZ ; dico et divisae proportionales fore, ut AE ad EB ita ΓZ ad ΔA .

Sumantur enim ipsarum AE , EB , ΓZ , ΔA aequae multiplices $H\Theta$, ΘK , AM , MN ; ipsarum vero EB , ΔA aliae utcumque aequae multiplices KZ , NI .

Et quoniam aequae multiplex est $H\Theta$ ipsius AE ac ΘK ipsius EB ; aequae igitur multiplex est $H\Theta$ ipsius AE ac HK ipsius AB (V. 1.). Aequae autem multiplex est $H\Theta$ ipsius AE ac AM ipsius ΓZ ; aequae

secunda, adeoque etiam (Prop. A. in Excursu ad hunc librum) tertia maior quam quarta: erit etiam excessus primae super secundam ad secundam, ut excessus tertiae super quartam ad quartam. Cf. Pfeiderer. l. c. p. 21.

Cor. 1. Si quatuor magnitudinum A , B , C , D , binae fuerint in eadem ratione, et prima A minor quam secunda

τοῦ ΓΖ· ἰσάνεις ἄρα ἐστὶ πολλαπλάσιον τὸ ΗΚ τοῦ
 ΑΒ καὶ τὸ ΑΜ τοῦ ΓΖ. Πάλιν, ἐπεὶ ἰσάνεις ἐστὶ
 πολλαπλάσιον τὸ ΑΜ τοῦ ΓΖ καὶ τὸ ΜΝ τοῦ ΖΔ,
 ἰσάνεις ἄρα ἐστὶ πολλαπλάσιον τὸ ΑΜ τοῦ ΓΖ καὶ τὸ
 ΑΝ τοῦ ΓΔ. Ἰσάνεις δὲ ἦν πολλαπλάσιον τὸ ΑΜ
 τοῦ ΓΖ καὶ τὸ ΗΚ τοῦ ΑΒ· ἰσάνεις ἄρα ἐστὶ πολλα-
 πλάσιον τὸ ΗΚ τοῦ ΑΒ καὶ τὸ ΑΝ τοῦ ΓΔ τὰ
 ΗΚ, ΑΝ ἄρα τῶν ΑΒ, ΓΔ ἰσάνεις ἐστὶ πολλαπλάσια.
 Πάλιν, ἐπεὶ ἰσάνεις ἐστὶ πολλαπλάσιον τὸ ΘΚ τοῦ
 ΕΒ καὶ τὸ ΜΝ τοῦ ΖΔ, ἐστὶ δὲ καὶ τὸ ΚΞ τοῦ
 ΕΒ ἰσάνεις πολλαπλάσιον καὶ τὸ ΝΠ τοῦ ΖΔ· καὶ
 συντεθέν τὸ ΘΞ τοῦ ΕΒ ἰσάνεις ἐστὶ πολλαπλάσιον
 καὶ τὸ ΜΠ τοῦ ΖΔ. Καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς τὸ ΑΒ πρὸς
 τὸ ΒΕ οὕτως τὸ ΓΔ πρὸς τὸ ΔΖ, καὶ εἰληγται τῶν
 μὲν ΑΒ, ΓΔ ἰσάνεις πολλαπλάσια τὰ ΗΚ, ΑΝ,
 τῶν δὲ ΕΒ, ΖΔ ἄλλα ᾧ ἐννεγεν ἰσάνεις πολλαπλά-
 σια τὰ ΘΞ, ΜΠ· εἰ ἄρα ὑπερέχει τὸ ΗΚ τοῦ ΘΞ,
 ὑπερέχει καὶ τὸ ΑΝ τοῦ ΜΠ· καὶ εἰ ἴσον, ἴσον· καὶ
 εἰ ἐλάττω, ἐλάττω. Ὑπερέχτω δὴ τὸ ΗΚ τοῦ ΘΞ,
 καὶ κοινοῦ ἀφαιρεθέντος τοῦ ΘΚ, ὑπερέχει ἄρα καὶ
 τὸ ΗΘ τοῦ ΚΞ. Ἀλλ' εἰ ὑπερέχει τὸ ΗΚ τοῦ ΘΞ,
 ὑπερέχει καὶ τὸ ΑΝ τοῦ ΜΠ· ὑπερέχει ἄρα καὶ τὸ ΑΝ
 τοῦ ΜΠ, καὶ κοινοῦ ἀφαιρεθέντος τοῦ ΜΝ ὑπερέχει
 καὶ τὸ ΑΜ τοῦ ΝΠ· ὥστε εἰ ὑπερέχει τὸ ΗΘ τοῦ
 ΚΞ, ὑπερέχει καὶ τὸ ΑΜ τοῦ ΝΠ. Ὁμοίως δὴ δεί-
 ξομεν ὅτι καὶ ἴσον ἢ τὸ ΗΘ τῷ ΚΞ, ἴσον ἔσται καὶ
 τὸ ΑΜ τῷ ΝΠ· καὶ ἐλάττω, ἐλάττω. Καὶ ἐστὶ τὰ

B, adeoque etiam (Prop. A in Excursu) tertia C minor quam
 quarta D: erit etiam inverse (Prop. B in Excursu) B:A= D:C,
 ubi iam B>A, et D>C, adeoque B-A:A=D-C:C.
 Cf. Pflöiderer. l. c. p. 23.

igitur multiplex est HK ipsius AB ac AM ipsius ΓZ (V. 11.). Rursus, quoniam aequae multiplex est AM ipsius ΓZ ac MN ipsius ZA ; aequae igitur multiplex est AM ipsius ΓZ ac AN ipsius ΓA (V. 1.). Aequae autem multiplex erat AM ipsius ΓZ ac HK ipsius AB ; aequae igitur est multiplex HK ipsius AB ac AN ipsius ΓA (V. 11.); ipsae HK , AN igitur ipsarum AB , ΓA aequae sunt multiplices. Rursus, quoniam aequae multiplex est ΘK ipsius EB ac MN ipsius ZA ; est autem et $K\Xi$ ipsius EB aequae multiplex ac NII ipsius ZA ; et composita $\Theta\Xi$ ipsius EB aequae est multiplex ac MII ipsius ZA (V. 2.). Et quoniam est ut AB ad BE ita ΓA ad AZ , et sumptae sunt ipsarum AB , ΓA aequae multiplices HK , AN , ipsarum vero EB , ZA aliae utcunque aequae multiplices $\Theta\Xi$, MII ; si superat HK ipsam $\Theta\Xi$, superat et AN ipsam MII ; et si aequalis, aequalis; et si minor, minor (V. Def. 5.). Superet autem HK ipsam $\Theta\Xi$, et communi ablata ΘK , superat igitur et $H\Theta$ ipsam $K\Xi$. Sed si superat HK ipsam $\Theta\Xi$, superat et AN ipsam MII ; superat igitur et AN ipsam MII ; et communi MN ablata, superat et AM ipsam NII ; quare si superat $H\Theta$ ipsam $K\Xi$, superat et AM ipsam NII . Similiter ostendemus et si aequalis sit $H\Theta$ ipsi $K\Xi$, aequalem fore et AM ipsi NII ; et si minor, minorem. Et sunt $H\Theta$, AM ipsarum AE , ΓZ aequae multiplices, $K\Xi$, NII vero ipsarum EB , ZA aliae utcunque

COR. 2. Generatim igitur, si duae magnitudines inaequales A et B eandem mutuo habeant rationem, quam aliae duae inaequales C et D : differentia quoque duarum priorum erit ad earundem minorem, uti differentia duarum posteriorum

μὲν $HΘ$, AM τῶν AE , $ΓΖ$ ἰσῆες πολλαπλάσια,
τὰ δὲ $KΞ$, $ΝΠ$ τῶν EB , $ΖΔ$ ἄλλα ὃ ἔτυχεν ἰσῆες
πολλαπλάσια· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ AE πρὸς τὸ EB οὕ-
τως τὸ $ΓΖ$ πρὸς τὸ $ΖΔ$. Ἐὰν ἄρα συγκείμενα, καὶ
τὰ ἐξῆς.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ εἴ.

Ἐὰν διηρημένα μεγέθη ἀνάλογον ᾖ, καὶ συντε-
θέντα ἀνάλογον ἔσται.

Ἐστω διηρημένα μεγέθη ἀνάλογον, τὰ AE , EB ,
 $ΓΖ$, $ΖΔ$, ὡς τὸ AE πρὸς τὸ EB οὕτως τὸ $ΓΖ$
πρὸς τὸ $ΖΔ$ · λέγω ὅτι καὶ συντεθέντα ἀνάλογον ἔσται,
ὡς τὸ AB πρὸς τὸ BE οὕτως τὸ $ΓΔ$ πρὸς τὸ $ΖΔ$.

Εἰ γὰρ μὴ ἔστιν ὡς τὸ AB πρὸς τὸ BE οὕτως
τὸ $ΓΔ$ πρὸς τὸ $ΖΔ$ · ἔσται ὡς τὸ AB πρὸς τὸ BE
οὕτως τὸ $ΓΔ$, ἤτοι πρὸς ἑλασσόν τι τοῦ AZ , ἢ πρὸς
μείζον.

Ἐστω πρότερον πρὸς ἑλασσόν τὸ AH . Καὶ ἐκεί-
νῃ ὡς τὸ AB πρὸς τὸ BE οὕτως τὸ $ΓΔ$ πρὸς τὸ
 AH , συγκείμενα μεγέθη ἀνάλογόν ἔστιν ὥστε καὶ
διατεθέντα ἀνάλογον ἔσται· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ AE
πρὸς τὸ EB , οὕτως τὸ $ΓH$ πρὸς τὸ HA . Τηνέμι-
ται δὲ καὶ ὡς τὸ AE πρὸς τὸ EB οὕτως τὸ $ΓΖ$ πρὸς
τὸ $ΖΔ$ · καὶ ὡς ἄρα τὸ $ΓH$ πρὸς τὸ HA οὕτως τὸ

sum ad ipsam minorem; vel etiam inverse (Prop. B in Ex-
cursu), minor duarum priorum erit ad ipsarum differentiam,
uti minor duarum posteriorum ad earundem differentiam. Bre-
viter, si $A : B = C : D$, erit etiam *dividenda*

vel *divisim* $A - B : B = C - D : D$, seu $B : A - B = D : C - D$

vel $B - A : A = D - C : C$, seu $A : B - A = C : D - C$.

Cl. Pfeiderer. l. c.

aeque multiplices; est igitur ut AE ad EB ita ΓZ ad ZA (V. Def. 5.). Si igitur compositae etc.

PROPOSITIO XVIII. (Fig. 238.)

Si divisae magnitudines proportionales sint, et compositae proportionales erunt.

Sint divisae magnitudines proportionales AE , EB , ΓZ , ZA ut AE ad EB ita ΓZ ad ZA ; dico et compositae proportionales fore, ut AB ad BE ita ΓA ad ZA .

Si enim non est ut AB ad BE ita ΓA ad ZA ; erit ut AB ad BE ita ΓA , vel ad minorem ipsa AZ , vel ad maiorem.

Sit primum ad minorem AH . Et quoniam est ut AB ad BE ita ΓA ad AH , compositae magnitudines proportionales sunt; quare et divisae proportionales erunt (V. 17.); est igitur ut AE ad EB ita ΓH ad HA . Ponitur autem et ut AE ad EB ita ΓZ ad ZA ; ut igitur ΓH ad HA ita ΓZ ad ZA (V. 11.). Maior autem prima ΓH tertia ΓZ ; maior igitur et secunda

PROPOSITIO XVIII.

Obs. Ita sane satis breviter demonstraretur V. 18. dummodo sumere liceat propositis tribus magnitudinibus, quarum duae saltem sint eiusdem generis, quartam semper existere ipsis proportionalem. Verum enim vero, quanvis Clavius id pro axioma sumi posse censeret, dudum tamen Saccherius in Euclide ab omni naevo vindicato p. 111. sq. indecorum huius assumpto naevum inesse confessus est, cui quidem moderi ille,

GZ πρὸς τὸ ZA . Μείζον δὲ τὸ πρῶτον τὸ $ΓΗ$ τοῦ τρίτου τοῦ GZ · μείζον ἄρα καὶ τὸ δεύτερον τὸ $ΗΔ$ τοῦ τετάρτου τοῦ ZA . Ἀλλὰ καὶ ἑλάττων, ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον· οὐκ ἄρα ἐστὶν ὡς τὸ AB πρὸς τὸ BE οὕτως τὸ $ΓΔ$ πρὸς ἑλασσον τοῦ ZA . Ὀμοίως δὲ δεῖξομεν, ὅτι οὐδὲ πρὸς μείζον· πρὸς αὐτὸ ἄρα. Ἐν ἄρα διηρημένα καὶ τὰ ἐξῆς.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ιθ'.

Ἐάν ἡ ὡς ὅλον πρὸς ὅλον οὕτως ἀφαιρεθὲν πρὸς ἀφαιρεθὲν, καὶ τὸ λοιπὸν πρὸς τὸ λοιπὸν ἔσται ὡς ὅλον πρὸς ὅλον.

Ἔστω γάρ ὡς ὅλον τὸ AB πρὸς ὅλον τὸ $ΓΔ$ οὕτως ἀφαιρεθὲν τὸ AE πρὸς ἀφαιρεθὲν τὸ $ΓΖ$ · λέγῃ ὅτι καὶ λοιπὸν τὸ EB πρὸς λοιπὸν τὸ ZA ἔσται ὡς ὅλον τὸ AB πρὸς ὅλον τὸ $ΓΔ$.

Ἐπεὶ γάρ ἐστιν ὡς τὸ AB πρὸς τὸ $ΓΔ$ οὕτως τὸ AE πρὸς τὸ $ΓΖ$ · καὶ ἐναλλάξ ὡς τὸ BA πρὸς τὸ AE οὕτως τὸ $ΔΓ$ πρὸς τὸ $ΓΖ$. Καὶ ἐπεὶ συγκείμενα μεγέθη ἀνάλογόν ἐστι, καὶ διαιρεθέντα ἀνάλογον ἔσται· ὡς ἄρα τὸ BE πρὸς τὸ EA οὕτως τὸ AZ πρὸς τὸ $ZΓ$, καὶ ἐναλλάξ, ὡς τὸ BE πρὸς τὸ AZ οὕτως

at. ex Rob. Simsonis et Pfeidereri iudicio irrito p̄teritus conatu tentavit. In eo autem cum Saccherio consenti Rob. Simson., haud legitimam esse, et a genio Euclidis abhorrere, quae vulgo in Elementis habetur, propositionis huius demonstrationem. Nunquam enim Euclidem aliquid in demonstratione propositionis sumere, quod non prius ostenderit, salum quod existere posse non perspicuum sit; ope enim propositionis incertae conclusionem certam elici non posse. Aliam itaque demonstrationem substituit Simson., quam, quamvis prolixiorē, legitimam et Euclidis genio magis conformem esse inde maxime concludit, quod, pariter ac Prop. 17. de

HA quarta *ZA* (V. 14.). Sed, et minor, quod fieri nequit; non igitur est ut *AB* ad *BE* ita *GA* ad minorem ipsa *ZA*. Similiter utique ostendemus neque ad maiorem; ad ipsam igitur. Si igitur divisae etc.

PROPOSITIO XIX. (Fig. 329.)

Si sit ut tota ad totam ita ablata ad ablatam, et reliqua ad reliquam erit ut tota ad totam.

Sit enim ut tota *AB* ad totam *GA* ita ablata *AE* ad ablatam *FZ*; dico et reliquam *EB* ad reliquam *ZA* fore ut tota *AB* ad totam *GA*.

Quoniam enim est ut *AB* ad *GA* ita *AE* ad *FZ*; et alterne erit ut *BA* ad *AE* ita *AG* ad *FZ* (V. 16.). Et quoniam compositae magnitudines proportionales sunt, et divisae proportionales erunt (V. 17.); ut igitur *BE* ad *EA* ita *AZ* ad *ZF*; et alterne (V. 16.), ut *BE* ad *AZ* ita *EA* ad *ZF*. Ut autem *AE* ad

monstratur ope Prop. 1. et 2. huius libri, ita in sua hac demonstratione Propositionis 18. tum Prop. 5. tum uterque casus V. Prop. 6. adhibeantur, quae quidem propositionis conversae sint primae et secundae, neque ulli propositioni huius libri, ut eum nunc habemus, demonstrandae inserviant, quin nulli praeterquam huic 18. inservire possint. Simsonis demonstratio, quam brevitatis causa symbolice expressam hic sistimus, haec est. Si fuerit $A:B=C:D$, erit etiam componendo $A+B:B=C+D:D$. Sumantur enim aequae multiplae quaecunque magnitudinum *B*, *D*, pariterque magnitudinum $(A+B)$, $(C+D)$, v. c. mB , mD , $m(A+B)$, $m(C+D)$, pariterque aliae quae-

τὸ EA πρὸς τὸ ZF . Ὡς δὲ τὸ AE πρὸς τὸ FZ οὕτως ὑπόκειται ὅλον τὸ AB πρὸς ὅλον τὸ $ΓΔ$ καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ EB πρὸς λοιπὸν AZ ἔσται ὡς ὅλον τὸ AB πρὸς ὅλον τὸ $ΓΔ$. Ἐὰν ἄρα ἡ καὶ τὰ ἐξ ἑ-

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α.

Καὶ ἐπεὶ ἐδείχθη ὡς τὸ AB πρὸς τὸ $ΓΔ$ οὕτως τὸ EB πρὸς τὸ $ΖΔ$ καὶ ἐναλλαξ ὡς τὸ AB πρὸς τὸ BE οὕτως τὸ $ΓΔ$ πρὸς τὸ $ΖΔ$ συγκείμενα ἄρα μεγέθη ἀνάλογόν ἐστιν. Ἐδείχθη δὲ ὡς τὸ AB πρὸς τὸ AE οὕτως τὸ $ΔΓ$ πρὸς τὸ FZ , καὶ ἐστὶν ἀναστρέφαντι. Ἐκ δὲ τούτου φανερόν, ὅτι ἐὰν συγκείμενα μεγέθη ἀνάλογον ᾖ, καὶ ἀναστρέφαντι ἀνάλογον ἔσται ¹⁾. Ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

1) Ita hunc locum habent edd. Oxon. et Basil., cum quibus teste Peyrardo consentit Cod. a. Peyrardus ex ingenio, ut videtur, locum ex Gregorii quoque sententia corruptissimum nec ope veterum exemplarium restituendum ita mutavit: καὶ ἐπεὶ ὡς τὸ AB πρὸς τὸ $ΓΔ$ οὕτως τὸ AE πρὸς τὸ FZ καὶ ἐναλλαξ ὡς τὸ AB πρὸς τὸ BE οὕτως τὸ $ΓΔ$ πρὸς τὸ FZ συγκείμενα ἄρα μεγέθη ἀνάλογόν ἐστιν. Ἐδείχθη δὲ ὡς τὸ AB πρὸς τὸ EB οὕτως τὸ $ΔΓ$ πρὸς τὸ $ΖΔ$, καὶ ἐστὶν ἀναστρέφαντι κ. τ. λ. Quamvis autem fateamur, lectionem receptam viliorem esse et omnino corollarium hoc non huc pertinere, nec eius demonstrationem, qua ad V. 16. recurritur legitimam esse, quoniam ita contra, ac res est, haec propositio tantum ad quatuor magnitudines eiusdem generis pertinere videretur (Cl. Clavius, Rob. Simson., Pfeiderer. ad hunc locum) nolimus tamen Peyrardi lectiones, nulla msscriptorum auctoritate auxilio, in textum recipere, praesertim quum vitia vulgaris lectionis hac ratione non tollantur. Caeterum Edit. Basileensis aliud adhuc hic additamentum habet, quod, cum prorsus non huc pertineat, nec omnino ullius momenti sit, cum edd. Oxon. et Paris. omisimus.

cumque aequemultiplices magnitudinum B, D v. c. rB, rD , eritque vel $r > m$, vel $r = m$, vel $r < m$. Sit 1) $r < m$, adeo-

ΓZ ita posita est tota AB ad totam ΓA ; et reliqua igitur EB ad reliquam ΔZ erit ut tota AB ad totam ΓA (V. 11.). Si igitur sit etc.

COROLLARIUM.

Et quoniam ostensum est ut AB ad ΓA ita EB ad ZA ; et alterne (V. 16.) ut AB ad BE ita ΓA ad ZA ; compositae igitur magnitudines proportionales sunt. Ostensum autem est, ut AB ad AE ita $\Delta \Gamma$ ad ΓZ , et est per conversionem. Ex hoc manifestum est, si compositae magnitudines proportionales sint, et per conversionem proportionales fore. Quod erat demonstrandum.

que $rB = mB$, et $rD = mD$. Quum igitur $m(A+B) > mB$ (V.

Ax. 3.), erit etiam, vel tanto magis $m(A+B) > rB$, eodemque modo $m(C+D) > rD$, adeoque $A+B:B=C+D:D$ (V. Def. 5.). Sit autem 2) $r > m$, adeoque $rB > mB$, $rD > mD$, et, si ab aequemultiplis magnitudinum $A+B$, $C+D$, nempe a $m(A+B)$, $m(C+D)$ auferantur aequemultipla magnitudinum B , D , nempe mB , mD , relinquentur aequemultipla mA , mC magnitudinum A , B (V. 5.). Si autem a rB auferatur mB , pariterque a rD auferatur mD , relinquentur $(r-m)B$, $(r-m)D$, eritque vel $(r-m)B = B$, et simul $(r-m)D = D$; vel $(r-m)B = nB$, et simul $(r-m)D = nD$ (V. 6.). Sit a) $(r-m)B = B$, et $(r-m)D = D$. Quoniam igitur $A:B=C:D$, erit etiam V. 4. Cor. a. $mA:B=mC:D$ i. e. $mA:(r-m)B = mC:(r-m)D$. Hinc, si $mA > (r-m)B$, erit etiam $mC > (r-m)D$ (Prop. A. in Excursu ad hunc librum.) Sit autem b) $(r-m)B = nB$, adeoque etiam $(r-m)D = nD$. Quoniam igitur $A:B=C:D$, erit, quoties $mA > nB$, etiam $mC > nD$ i. e. iunctim iam sumtis casibus a et b, quoties

ΠΡΟΤΑΣΙΣ 4.

Ἐάν ἡ τρία μεγέθη, καὶ ἄλλα αὐτοῖς ἴσα τὸ πλῆθος, σύνδυο λαμβανόμενα ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, δῶσαν δὲ τὸ πρῶτον τοῦ τρίτου μείζον ἢ καὶ τὸ τέταρτον τοῦ ἑκτου μείζον ἔσται καὶ ἐὰν ἴσον, ἴσον καὶ ἐὰν ἔλασσον, ἔλασσον.

Ἐστω τρία μεγέθη τὰ A, B, Γ , καὶ ἄλλα αὐτοῖς ἴσα τὸ πλῆθος τὰ Δ, E, Z , σύνδυο λαμβανόμενα ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, ὥς μὲν τὸ A πρὸς τὸ B οὕτως τὸ Δ πρὸς τὸ E , ὥς δὲ τὸ B πρὸς τὸ Γ οὕτως τὸ E πρὸς τὸ Z , δῶσαν δὲ μείζον ἔστω τὸ A τοῦ Γ λέγω ὅτι καὶ τὸ Δ τοῦ Z μείζον ἔσται καὶ ἴσον, ἴσον καὶ ἐὰν ἔλασσον, ἔλασσον.

Ἐπεὶ γὰρ μείζον ἐστὶ τὸ A τοῦ Γ , ἄλλο δὲ αὐτὸ B , τὸ δὲ μείζον πρὸς τὸ αὐτὸ μείζονα λόγον ἔχει ἢ πρὸς τὸ ἑλάττω· τὸ A ἄρα πρὸς τὸ B μείζονα λόγον ἔχει ἢ πρὸς τὸ Γ πρὸς τὸ B . Ἀλλὰ ὥς μὲν τὸ A πρὸς τὸ B οὕτως τὸ Δ πρὸς τὸ E , ὥς δὲ τὸ Γ πρὸς τὸ B ἀνάπαλιν οὕτως τὸ Z πρὸς τὸ E · καὶ τὸ Δ ἄρα πρὸς τὸ E μείζονα λόγον ἔχει ἢ πρὸς τὸ Z πρὸς τὸ E . Τῶν δὲ πρὸς τὸ αὐτὸ λόγον ἐχόντων, τὸ τὸν μείζονα λόγον ἔχον μείζον ἐστὶ· μείζον ἄρα τὸ Δ τοῦ Z . Ὁμοίως δὲ δείξομεν, ὅτι καὶ ἴσον ἢ τὸ A τοῦ Γ , ἴσον ἔσται καὶ τὸ Δ τοῦ Z · καὶ ἐλάττω, ἐλάττω. Ἐὰν ἄρα ἡ καὶ τὰ ἐξῆς.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ 5.

Ἐάν ἡ τρία μεγέθη, καὶ ἄλλα αὐτοῖς ἴσα τὸ πλῆθος σύνδυο λαμβανόμενα καὶ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, ἢ δὲ

$mA > (r-m)B$, etiam $mC > (r-m)D$, adeoque quoties $mA + mB > rB$, etiam $mC + mD > rD$, vel, quoties

PROPOSITIO XX. (Fig. 330.)

Si sint tres magnitudines, et aliae ipsis aequales multitudine, binae sumptae in eadem ratione, ex aequo autem prima tertia maior sit, et quarta sexta maior erit; et si aequalis, aequalis; et si minor, minor.

Sint tres magnitudines A , B , Γ , et aliae ipsis aequales multitudine Δ , E , Z , binae sumptae in eadem ratione, ut A ad B ita Δ ad E , ut vero B ad Γ ita E ad Z , ex aequo autem maior sit A ipsa Γ ; dico et Δ ipsa Z maiorem fore; et si aequalis, aequalem; et si minor, minorem.

Quoniam enim maior est A ipsa Γ , alia autem quaedam B , maior vero ad eandem maiorem rationem habet quam minor (V. 8.); habebit A ad B maiorem rationem quam Γ ad B . Sed ut A ad B ita Δ ad E , ut vero Γ ad B per inversionem ita Z ad E et Δ igitur ad E maiorem habet rationem quam Z ad E (V. 13.). Ad eandem autem rationem habentium, maiorem rationem habens maior est (V. 10.); maior igitur est Δ ipsa Z . Similiter ostendemus, et si A aequalis sit ipsi Γ , aequalem fore et Δ ipsi Z ; et si minor, minorem. Si igitur sint etc.

PROPOSITIO XXI. (Fig. 331.)

Si sint tres magnitudines, et aliae ipsis aequales multitudine, binae sumptae et in eadem ratione, sit

ut $m(A+B) > < rB$, erit etiam $m(C+D) > < rD$, adeoque etiam casu 2. erit $A+B : B = D+D : D$. Eodem modo de-

τεταραγμένη αὐτῶν ἡ ἀναλογία, δῖσκον δὲ τὸ πρῶτον τοῦ τρίτου μείζον ἢ· καὶ τὸ τέταρτον τοῦ ἑκτου μείζον ἔσται· καὶ ἴσον, ἴσον, καὶ ἔλασσον, ἔλασσον.

Ἐστω τρία μεγέθη τὰ A, B, Γ , καὶ ἄλλα αὐτῶν ἴσα τὸ πλῆθος τὰ Δ, E, Z σύνδυο λαμβανόμενα καὶ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, ἔστω δὲ τεταραγμένη αὐτῶν ἡ ἀναλογία, ὡς μὲν τὸ A πρὸς τὸ B οὕτως τὸ E πρὸς τὸ Z , ὡς δὲ τὸ B πρὸς τὸ Γ οὕτως τὸ Δ πρὸς τὸ E . δῖσκον δὲ τὸ A τοῦ Γ μείζον ἔστω· λέγω ὅτι καὶ τὸ Δ τοῦ Z μείζον ἔσται· καὶ ἴσον, ἴσον· καὶ ἔλαττον, ἔλαττον.

Ἐπεὶ γὰρ μείζον ἔστι τὸ A τοῦ Γ , ἄλλο δὲ τὸ B · τὸ A ἄρα πρὸς τὸ B μείζονα λόγον ἔχει ἢ τὸ Γ πρὸς τὸ B . Ἀλλ' ὡς μὲν τὸ A πρὸς τὸ B οὕτως τὸ E πρὸς τὸ Z , ὡς δὲ τὸ Γ πρὸς τὸ B οὕτως τὸ E πρὸς τὸ Δ · καὶ τὸ E ἄρα πρὸς τὸ Z μείζονα λόγον ἔχει, ἢ περ τὸ E πρὸς τὸ Δ . Πρὸς δὲ τὸ αὐτὸ μείζονα λόγον ἔχει, ἐκείνο ἔλαττον ἔστιν· ἔλασσον ἄρα ἔστι τὸ Z τοῦ Δ · μείζον ἔστι αὖ τὸ Δ τοῦ Z . Ὁμοίως δὲ δειξόμεν ὅτι καὶ ἴσον ἢ τὸ A τῷ Γ , ἴσον ἔσται καὶ τὸ Δ τῷ Z · καὶ ἔλασσον, ἔλασσον. Ἐάν ἄρα ἢ τρία καὶ τὰ ἐξῆς.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κβ.

Ἐάν ἢ ὅποσαοῦν μεγέθη, καὶ ἄλλα αὐτοῖς ἴσα τὸ πλῆθος σύνδυο λαμβανόμενα ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ καὶ δῖσκον ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ ἔσται.

1) Rectius ita e Cod. a. legit Peyrardus, quum in edd. Oxon. et Basil. habeatur: ὁμοίως δὲ δειξόμεν, ὅτι καὶ ἴσον· ὡς πρὸς τὸ Γ , ἴσον ἔσται καὶ τὸ Δ τῷ Z .

monstratur, esse etiam $A+B:A=C+D:C$, unde V. Prop. 16. generalius ita enunciari potest: si quatuor magnitudines

autem perturbata earum proportio, ex aequo autem prima tertia maior sit, et quarta sexta maior erit; et si aequalis, aequalis; et si minor, minor.

Sint tres magnitudines A , B , Γ , et aliae ipsis aequales multitudine A , E , Z , binae sumptae et in eadem ratione, sit autem perturbata earum proportio, ut A ad B ita E ad Z , ut vero B ad Γ ita A ad E , ex aequo autem A ipsa Γ maior sit; dico et A ipsa Z maiorem fore; et si aequalis, aequalem; et si minor, minorem.

Quoniam enim maior est A ipsa Γ , alia vero quaedam B ; A ad B maiorem rationem habet quam Γ ad B (V. 8.). Sed ut A ad B ita E ad Z , ut vero Γ ad B per inversionem ita E ad A (Prop. B.); quare et E ad Z maiorem rationem habet quam E ad A (V. 13.). Ad quam autem eadem maiorem rationem habet, illa minor est (V. 10.); minor igitur est Z ipsa A ; maior est igitur A ipsa Z . Similiter ostendimus et si aequalis sit A ipsi Γ , aequalem fore et A ipsi Z ; et si minor, minorem. Si igitur tres etc.

PROPOSITIO XXII. (Fig. 332.)

Si sint quocunque magnitudines, et aliae ipsis aequales multitudine, binae sumptae in eadem ratione; et ex aequo in eadem ratione erunt.

fuerint proportionales, summa quoque duarum priorum erit ad alterutram earum, uti summa duarum posteriorum erit ad eam harum, quae priori in proportionis assumptae ordine responderet.

Cf. Pfeiderer. l. c. p. 26.

Euclid. Element. P. II.

K

Ἐστω ὅποσαοῦν μεγέθη τὰ A, B, Γ , καὶ ἄλλα αὐτοῖς ἴσα τὸ πλῆθος τὰ Δ, E, Z , σύνδνο λαμβανόμενα ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, ὥς μὲν τὸ A πρὸς τὸ B οὕτως τὸ Δ πρὸς τὸ E , ὡς δὲ τὸ B πρὸς τὸ Γ οὕτως τὸ E πρὸς τὸ Z · λέγω ὅτι καὶ δίσσου ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ ἔσται, ὡς τὸ A πρὸς τὸ Γ οὕτως τὸ Δ πρὸς τὸ Z .

Εἰληφθῶ γὰρ τῶν μὲν A, Δ ἰσάκεις πολλαπλάσια τὰ H, Θ , τῶν δὲ B, E ἄλλα ἃ ἔτυχεν ἰσάκεις πολλαπλάσια τὰ K, Λ , καὶ ἐν τῶν Γ, Z ἄλλα ἃ ἔτυχεν ἰσάκεις πολλαπλάσια τὰ M, N .

Καὶ ἐπεὶ ἔστιν ὡς τὸ A πρὸς τὸ B οὕτως τὸ Δ πρὸς τὸ E , καὶ εἰληπται τῶν μὲν A, Δ ἰσάκεις πολλαπλάσια τὰ H, Θ , τῶν δὲ B, E ἄλλα ἃ ἔτυχεν ἰσάκεις πολλαπλάσια τὰ K, Λ · ἔστιν ἄρα ὡς τὸ H πρὸς τὸ K οὕτως τὸ Θ πρὸς τὸ Λ . Διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ὡς τὸ K πρὸς τὸ M οὕτως τὸ Λ πρὸς τὸ N . Ἐπεὶ οὖν τρία μεγέθη ἐστὶ τὰ H, K, M , καὶ ἄλλα αὐτοῖς ἴσα τὸ πλῆθος Θ, Λ, N σύνδνο λαμβανόμενα καὶ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ· δίσσου ἄρα εἰ ὑπερέχει τὸ H τοῦ M , ὑπερέχει καὶ τὸ Θ τοῦ N · καὶ εἰ ἴσον,

PROPOSITIO XIX.

Symbolice ita: si $A:B=A:C:B:D$, erit etiam $A:B=C:D$, ubi patet, eiusdem generis esse magnitudines A, B, C, D . Addit hic Rob. Simson. sequens Cor. a. Si fuerit, ut tota ad totam, ita ablata ad ablatam: erit et reliqua ad reliquam ut ablata ad ablatam, hoc enim in ipsa demonstratione ostensum est. Illud autem Corollarium, quod vulgo huic propositioni adiungitur, quodque, ne quid textui deesse videretur, et nos in textu posuimus, non huc pertinere, iam in variantibus lectionibus diximus. Legitime autem illud demonstratum est infra in Excursu ad hunc librum Prop. E.

Sint quotcunque magnitudines A, B, Γ , et aliae ipsis aequales multitudine Δ, E, Z , binae sumptae in eadem ratione, ut A ad B ita Δ ad E , ut B vero ad Γ ita E ad Z ; dico et ex aequo in eadem ratione fore, ut A ad Γ ita Δ ad Z .

Sumantur enim ipsarum A, Δ aequae multiplices H, Θ , ipsarum vero B, E aliae utcunque aequae multiplices K, Λ , et insuper ipsarum Γ, Z aliae utcunque aequae multiplices M, N .

Et quoniam est ut A ad B ita Δ ad E , et sumptae sunt ipsarum A, Δ aequae multiplices H, Θ , ipsarum vero B, E aliae utcunque aequae multiplices K, Λ ; est igitur ut H ad K ita Θ ad Λ (V. 4.). Ex eadem ratione et ut K ad M ita Λ ad N . Et quoniam tres magnitudines sunt H, K, M , et aliae ipsis aequales multitudine Θ, Λ, N binae sumptae in eadem ratione; ex aequo igitur si superat H ipsam M , superat et Θ ipsam N ; et si aequalis, aequalis; et si minor, minor (V. 20.). Et sunt H, Θ ipsarum A ,

PROPOSITIO XX.

Propositionis huius demonstrationem magis explicitam dedit Rob. Simson., quas ita habet: si sit $A:B=D:E$, et $B:C=E:F$, sit autem $A>= < C$, erit ex aequo $D>= < F$. Sit enim 1) $A>C$, eritque $A:B>C:B$ (V. 8.), adeoque, ob $A:B=D:E$, erit etiam $D:E>C:B$ (V. 13.). At $F:E=C:B$ (Prop. B.), adeoque etiam $D:E>F:E$ (V. 13.), unde $D>F$ (V. 10.). Sit 2) $A=C$, erit et $D=F$. Nam ob $A=C$, erit $A:B=C:B$ (V. 7.). Est autem $A:B=D:E$, et $C:B=F:E$ (Prop. B.), unde $D:E=F:E$ (V. 11.), adeoque $D=F$ (V. 9.). Sit 3) $A<C$, erit et $D<F$. Nam ob $A<C$,

ἴσον, καὶ εἰ ἔλαττον, ἔλαττον. Καὶ ἔστι τὰ μὲν H , Θ τῶν A , Δ ἰσάκεις πολλαπλάσια, τὰ δὲ M , N τῶν Γ , Z ἄλλα ἃ ἔτυχεν ἰσάκεις πολλαπλάσια· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ A πρὸς Δ οὕτως τὸ Δ πρὸς τὸ Z . Ἐάν ἄρα ἢ ὁποσαοῦν, καὶ τὰ ἐξῆς.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κγ'.

Ἐάν ἢ τρία μεγέθη, καὶ ἄλλα αὐτοῖς ἴσα τὸ πλῆθος, σύνδυο λαμβανόμενα ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, ἢ δὲ τεταραγμένη αὐτῶν ἡ ἀναλογία καὶ διῆσου ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ ἔσται.

Ἐστω τρία μεγέθη τὰ A , B , Γ , καὶ ἄλλα αὐτοῖς ἴσα τὸ πλῆθος, σύνδυο λαμβανόμενα ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ τὰ Δ , E , Z , ἔστω δὲ τεταραγμένη αὐτῶν ἡ ἀναλογία, ὡς μὲν τὸ A πρὸς τὸ B οὕτως τὸ E πρὸς τὸ Z , ὡς δὲ τὸ B πρὸς τὸ Γ οὕτως τὸ Δ πρὸς τὸ E . λέγω, ὅτι ἔστιν ὡς τὸ A πρὸς τὸ Γ οὕτως τὸ Δ πρὸς τὸ Z .

Εἰλήφθω τῶν μὲν A , B , Δ ἰσάκεις πολλαπλάσιαι τὰ H , Θ , K , τῶν δὲ Γ , E , Z ἄλλα ἃ ἔτυχεν ἰσάκεις πολλαπλάσια τὰ Λ , M , N .

Καὶ ἐπεὶ ἰσάκεις ἐστὶ πολλαπλάσια τὰ H , Θ τῶν A , B , τὰ δὲ μέρη τοῖς ὡσαύτως πολλαπλασίοις τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ A πρὸς τὸ B οὕτως τὸ H πρὸς τὸ Θ . Διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ὡς τὸ E πρὸς τὸ Z οὕτως τὸ M πρὸς τὸ N · καὶ ἔστιν ὡς τὸ A πρὸς τὸ B οὕτως τὸ E πρὸς τὸ Z · καὶ ὡς ἄρα

erit $C > A$. Iam vero (Prop. B.) est $C : B = F : E$, et $B : E : D$, unde, ob $C > A$, erit $F > D$ (Cas. 1.) vel $D < F$. Eadem fere ratione rem Clavius demonstrat, nisi quod casum

A aequae multiplices, et M, N ipsarum Γ, Z aliae utcumque aequae multiplices; est igitur ut A ad Γ ita A ad Z (V. Def. 5.). Si igitur quotcumque etc.

PROPOSITIO XXIII. (Fig. 333.)

Si sint tres magnitudines, et aliae ipsis aequales multitudine, binae sumptae in eadem ratione, sit autem perturbata earum proportio; et ex aequo in eadem ratione erunt.

Sint tres magnitudines A, B, Γ , et aliae ipsis aequales multitudine, binae sumptae in eadem ratione A, E, Z , sit autem perturbata earum proportio, ut A ad B ita E ad Z , et ut B ad Γ ita A ad E ; dico esse ut A ad Γ ita A ad Z .

Sumantur ipsarum A, B, A aequae multiplices H, Θ, K , ipsarum vero Γ, E, Z aliae utcumque aequae multiplices M, N .

Et quoniam aequae multiplices sunt H, Θ ipsarum A, B , partes vero eandem habent rationem quam earum aequae multiplices (V. 15.); erit ut A ad B ita H ad Θ . Ex eadem ratione ut E ad Z ita M ad N ; et est ut A ad B ita E ad Z ; itaque ut H ad Θ ita M ad N (V. 11.). Et quoniam est ut B ad Γ ita A

tertium non ad primum reducit, sed pariter immediate adstruit.

τὸ H πρὸς τὸ Θ οὕτως τὸ M πρὸς τὸ N . Καὶ ἐπι-
 ἔστιν ὡς τὸ B πρὸς τὸ Γ οὕτως τὸ A πρὸς τὸ E ,
 καὶ ἡ εἰληπται τῶν μὲν B, A ἰσάνεις πολλαπλάσια
 τὰ Θ, K , τῶν δὲ Γ, E ἄλλα, ἃ ἐτυχεν ἰσάνεις πολ-
 λαπλάσια τὰ A, M ἔστιν ἄρα ὡς τὸ Θ πρὸς τὸ A ,
 οὕτως τὸ K πρὸς τὸ M . Ἐδείχθη δὲ καὶ ὡς τὸ H
 πρὸς τὸ Θ , οὕτως τὸ M πρὸς τὸ N . ἐπεὶ οὖν τρία
 μεγέθη ἐσὶ, τὰ H, Θ, A , καὶ ἄλλα αὐτοῖς ἰσα τὰ
 κληῖθος, τὰ K, M, N , σύνδυο λαμβανόμενα ἐν τῇ
 αὐτῇ λόγῳ, καὶ ἐστὶν αὐτῶν τεταραγμένη ἡ ἀναλογία
 διῦσον ἄρα εἰ ὑπερέχει τὸ H τοῦ A , ὑπερέχει καὶ
 τὸ K τοῦ N · καὶ εἰ ἴσον, ἴσον καὶ εἰ ἐλάττω, ἐλα-
 ττω. Καὶ ἐστὶ τὰ μὲν H, K τῶν A, A ἰσάνεις πολ-
 λαπλάσια, τὰ δὲ A, N τῶν Γ, Z ἄλλα, ἃ ἐτυχεν
 ἰσάνεις πολλαπλάσια ὅ· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ A πρὸς τὸ Γ
 οὕτως τὸ A πρὸς τὸ Z . Ἐὰν ἄρα ἡ τρία, καὶ τὰ
 ἑξῆς.

1) Loco eorum, quae hio habentur, Peyrardus e Codd.
 a. c. d. longe prolixius et manifesto errore demonstrat esse,
 ut Θ ad A , ita K ad M . Nempe ex eo, quod $B : \Gamma = A : E$
 concludit, esse alteras $B : A = \Gamma : E$ (V. 16.). At $B : A = \Theta : K$
 (V. 15.), adeoque $\Gamma : E = \Theta : K$ (V. 11.); et $A : M = \Gamma : E$
 (V. 15.), adeoque $\Theta : K = A : M$ (V. 11.) et iterum alteras
 $\Theta : A = K : M$. Ita vero propositio locum tantum habere vide-
 retur, si magnitudines A, B, Γ , et reliquae A, E, Z fue-
 rint omnes eiusdem generis, quod longe secus est. Restitui-
 mus itaque locum, ut est in ed. Oxoniensi. Ed. Basilensis
 in loco, de quo disputamus, cum Oxoniensi consentit. Po-
 stea autem absurde eadem addit, quae vix e Peyrardo stu-
 litinus

2) Ἄλλα, ἃ ἐτυχεν, ἰσάνεις πολλαπλάσια. Haec verba, que
 monente Rob. Simson. omnino necessaria sunt, etiam sine
 Codd. auctoritate addidimus.

PROPOSITIO XXI.

Huius quoque propositionis demonstrationem magis ex-
 plicitam dedere Clavius et Rob. Simson., similem prorsus ei,

ad E , et sumptae sunt ipsarum B , A aequemultiplices Θ , K , ipsarum Γ , E autem aliae utcumque aequemultiplices A , M ; erit, ut Θ ad A , ita K ad M (V. 4.). Ostensum autem est, et, ut H ad Θ , ita esse M ad N ; quoniam igitur tres magnitudines sunt H , Θ , A , et aliae ipsis aequales multitudine K , M , N , binae sumptae in eadem ratione, et est earum perturbata proportio; ex aequo (V. 21.) si H superat A , superat et K ipsam N ; et si aequalis, aequalis; et si minor, minor. Et sunt H , K ipsarum A , A aequemultiplices, A , N vero ipsarum Γ , Z ; alia utcumque aequemultiplicia; est igitur ut A ad Γ ita A ad Z (V. Def. 5.). Si igitur sint tres etc.

quam in propositione praecedente vidimus, unde facile illa derivabitur.

PROPOSITIO XXII.

Expressis quidem verbis in textu graeco haec propositio demonstrata tantum est eo casu, quo sunt tres magnitudines, et aliae ipsis numero aequales. Eandem autem valere generaliter, ut in enunciato propositionis asseritur, eadem ratione demonstrari potest, ut monuerunt Campanus, Clavius, Rob. Simson, alique. Nempe si sint quatuor magnitudines A , B , C , D , aliaeque ipsis numero aequales E , F , G , H , sitque $A:B=E:F$, $B:C=F:G$, $C:D=G:H$, erit $A:D=E:H$. Quum enim pro tribus magnitudinibus iam demonstratum sit, esse $A:C=E:G$, et iam denuo sit $C:D=G:H$, res pariter redit ad tres magnitudines A , C , D , et totidem alias E , G , H . Atque ita semper, si res demonstrata fuerit pro m magnitudinibus, inde demonstrabitur pro $(m+1)$ magnitudinibus, adeoque demonstratio est generalis.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ 28.

Ἐάν πρῶτον πρὸς δεύτερον τὸν αὐτὸν ἔχη λόγον καὶ τρίτον πρὸς τέταρτον, ἔχη δὲ καὶ πέμπτον πρὸς δεύτερον τὸν αὐτὸν λόγον καὶ ἕκτον πρὸς τέταρτον καὶ συντεθέν πρῶτον καὶ πέμπτον πρὸς δεύτερον τὸν αὐτὸν ἔξει λόγον καὶ τρίτον καὶ ἕκτον πρὸς τέταρτον.

Πρῶτον γάρ τὸ AB πρὸς δεύτερον τὸ Γ τὸν αὐτὸν ἔχτω λόγον καὶ τρίτον τὸ ΔE πρὸς τέταρτον τὸ Z · ἔχτω δὲ καὶ πέμπτον τὸ BH πρὸς δεύτερον τὸ Γ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ ἕκτον τὸ $E\Theta$ πρὸς τέταρτον τὸ Z · λέγω ὅτι καὶ συντεθέν πρῶτον καὶ πέμπτον τὸ AH πρὸς δεύτερον τὸ Γ τὸν αὐτὸν ἔξει λόγον καὶ τρίτον καὶ ἕκτον τὸ $\Delta\Theta$ πρὸς τέταρτον τὸ Z .

Ἐπεὶ γάρ ἐστιν ὡς τὸ BH πρὸς τὸ Γ οὕτως τὸ $E\Theta$ πρὸς τὸ Z · ἀνάπαλιν ἄρα ὡς τὸ Γ πρὸς τὸ BH οὕτως τὸ Z πρὸς τὸ $E\Theta$. Ἐπεὶ οὖν ἐστιν ὡς τὸ AB πρὸς τὸ Γ οὕτως τὸ ΔE πρὸς τὸ Z , ὡς δὲ τὸ Γ πρὸς τὸ BH οὕτως τὸ Z πρὸς τὸ $E\Theta$ · διῆκον ἄρα ἐστὶν ὡς τὸ AB πρὸς τὸ BH οὕτως τὸ ΔE πρὸς τὸ $E\Theta$. Καὶ ἐπεὶ διηρημένα μεγέθη ἀνάλογόν ἐστι, καὶ συντεθέντα ἀνάλογον ἔσται· ἐστὶν ἄρα ὡς τὸ AH πρὸς

Cor. Sponte inde fluit, rationum aequalium duplicatas, triplicatas etc. etiam aequales esse (Baermann.). Nemp, si $A:B=B:C$, et $P:Q=Q:R$, sitque $A:B=P:Q$, erit et (V. 11.) $B:C=Q:R$, unde $A:C=P:R$, et similiter de triplicata ratione etc. res demonstrabitur. (Conversam huius vide in Excursu ad Prop. m.)

PROPOSITIO XXIII.

Hanc quoque propositionem valere de quocunque magnitudinibus, quamvis in textu graeco non tam generaliter enun-

PROPOSITIO XXIV. (Fig. 334.)

Si prima ad secundam eandem habeat rationem quam tertia ad quartam; habeat autem et quinta ad secundam eandem rationem quam sexta ad quartam; et simul sumptae prima et quinta ad secundam eandem rationem habebunt quam tertia et sexta ad quartam.

Prima enim AB ad secundam Γ eandem habeat rationem quam tertia AE ad quartam Z ; habeat vero et quinta BH ad secundam Γ eandem rationem quam sexta $E\Theta$ ad quartam Z ; dico et simul sumptas primam et quintam AH ad secundum Γ eandem habituras esse rationem quam tertia et sexta $A\Theta$ ad quartam Z .

Quoniam enim est ut BH ad Γ ita $E\Theta$ ad Z ; per inversionem erit (Prop. B.) ut Γ ad BH ita Z ad $E\Theta$. Et quoniam est ut AB ad Γ ita AE ad Z , ut autem Γ ad BH ita Z ad $E\Theta$; ex aequo igitur est ut AB ad BH ita AE ad $E\Theta$ (V. 22.). Et quoniam divisae magnitudines proportionales sunt, et compositae proportionales erunt (V. 18.); ut igitur AH ad BH ita $A\Theta$ ad ΘE . Est autem et ut BH ad Γ ita

ciata sit, similique ac praecedentem ratione demonstrari, monuerunt Campanus, Clavius, Rob. Simson. aliique.

PROPOSITIO XXIV.

Huic propositioni Rob. Simson. sequentia addit corollaria:

Cor. 1. Manente hypothesis propositionis, erit excessus primae et quintae ad secundam, ut excessus tertiae et sextae ad quartam. Demonstratio eadem est cum demonstratione propositionis, dummodo vice componendo utamur dividendo.

τὸ BH οὕτως τὸ $\Delta\Theta$ πρὸς τὸ ΘE . Ἐστὶ δὲ καὶ ὁ
τὸ BH πρὸς τὸ Γ οὕτως τὸ $E\Theta$ πρὸς τὸ Z . διὸ
ἄρα ἐστὶν ὡς τὸ AH πρὸς τὸ Γ οὕτως τὸ $\Delta\Theta$ πρὸς
τὸ Z . Ἐὰν ἄρα πρῶτον, καὶ τὰ ἐξῆς.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κέ.

Ἐὰν τέσσαρα μεγέθη ἀνάλογον ᾗ, τὸ μέγιστον καὶ
τὸ ἐλάχιστον δύο τῶν λοιπῶν μείζονά ἐστιν.

Ἐστω τέσσαρα μεγέθη ἀνάλογον, τὰ AB , ΓA ,
 E , Z , ὡς τὸ AB πρὸς τὸ ΓA οὕτως τὸ E πρὸς τὸ
 Z , ἔστω δὲ μέγιστον μὲν αὐτῶν τὸ AB , ἐλάχιστον δὲ
τὸ Z . λέγω ὅτι τὰ AB , Z τῶν ΓA , E μείζονά ἐστιν.

Κείσθω γὰρ τῇ μὲν E ἴσον τὸ AH , τῇ δὲ Z
ἴσον τὸ $\Gamma\Theta$.

Ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς τὸ AB πρὸς τὸ ΓA οὕτως
τὸ E πρὸς τὸ Z , ἴσον δὲ τῇ μὲν E τὸ AH , τῇ δὲ
 Z τὸ $\Gamma\Theta$. ἐστὶν ἄρα ὡς τὸ AB πρὸς τὸ ΓA οὕτως
τὸ AH πρὸς τὸ $\Gamma\Theta$. Καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ὅλον τὸ
 AB πρὸς ὅλον τὸ ΓA οὕτως ἀφαιρεθὲν τὸ AH πρὸς
ἀφαιρεθὲν τὸ $\Gamma\Theta$. καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ HB πρὸς λοι-
πὸν τὸ ΘA ἔσται ὡς ὅλον τὸ AB πρὸς ὅλον τὸ ΓA .
Μείζον δὲ τὸ AB τοῦ ΓA μείζον ἄρα καὶ τὸ HB
τοῦ ΘA . Καὶ ἐπεὶ ἴσον ἐστὶ τὸ μὲν AH τῇ E , τὸ
δὲ $\Gamma\Theta$ τῇ Z . τὰ ἄρα AH , Z ἴσα ἐστὶ τοῖς $\Gamma\Theta$, E .
Καὶ ἐπεὶ, ἐὰν ἀνίσοις ἴσα προστεθῇ, τὰ ὅλα ἄνισα

COR. 2. Ipsa autem propositio vera est de quocunque
magnitudinibus, quarum priores ad communem secundam ean-
dem habent rationes, quas habent reliquae ad communem quar-
tam, singulae sc. priorum ad secundam, eandem, quam sin-
gulae reliquarum ad quartam; ut patet. (Nempe, si $A:M=F:N$,
 $B:M=G:N$, $C:M=H:N$, $D:M=I:N$ etc. erit

EO ad Z ; ex aequo igitur est (V. 22.) ut AH ad Γ ita AO ad Z . Si igitur prima etc.

PROPOSITIO XXV. (Fig. 335.)

Si quatuor magnitudines proportionales sint, maxima et minima duabus reliquis maiores sunt.

Sint quatuor magnitudines proportionales $AB, \Gamma A, E, Z$, ut AB ad ΓA ita E ad Z ; sit autem maxima quidem ipsarum AB , minima vero Z ; dico AB, Z ipsis $\Gamma A, E$ maiores esse.

Ponatur enim ipsi E aequalis AH ipsi vero Z aequalis $\Gamma\Theta$.

Quoniam igitur est ut AB ad ΓA ita E ad Z , aequalis autem E ipsi AH , Z vero ipsi $\Gamma\Theta$; est igitur ut AB ad ΓA ita AH ad $\Gamma\Theta$. Et quoniam est ut tota AB ad totam ΓA ita ablata AH ad ablatam $\Gamma\Theta$; et reliqua HB ad reliquam ΘA erit ut tota AB ad totam ΓA (V. 19.). Maior autem AB ipsa ΓA ; maior igitur et HB ipsa ΘA (Prop. A.). Et quoniam aequalis est AH ipsi E , $\Gamma\Theta$ vero ipsi Z ; erunt AH, Z aequales ipsis $\Gamma\Theta, E$. Et quoniam si inaequalibus aequalia addantur, tota inaequalia sunt (I. Ax. 4.); cum igitur $HB, \Theta A$ inaequalia sint, sitque maior

etiam $A+B+C+D$ etc. : $M=F+G+H+I$ etc. : N , vel etiam excessus quarundam priorum super reliquas priores ad secundam, ut similis excessus reliquarum ad quartam v. c. $A+B+C-D : M=F+G+H-I : N$, vel $A+B-C-D : M=F+G-H-I : N$ etc.) 9

ἔστιν ἰσὺς ἅρα τῶν HB , $\Theta\Delta$ ἀνίστων ὄντων, καὶ μείζονος τοῦ HB , τῷ μὲν HB προστεθῇ τὰ AH , Z , τῷ δὲ $\Theta\Delta$ προστεθῇ τὰ $\Gamma\Theta$, E , συνάγεται τὰ AB , Z μείζονα τῶν $\Gamma\Delta$, E . Ἐὰν ἄρα τέσσαρα, καὶ τὰ ἑξῆς.

PROPOSITIO XXV.

Observante Rob. Simsone, si sumitur, primam quatuor magnitudinum proportionalium maximam esse omnium, proinde hinc ope Prop. A. et V. 14. quartam esse omnium mi-

HB , cui addantur AH , Z , ipsi vero ΘA addantur $I\Theta$, E , fient AB , Z maiores ipsis ΓA , E . Si igitur quatuor etc.

niam. Caeterum sub finem huius libri Rob. Simson. quatuor adhuc addit propositiones F , G , H , K , quas nos exhibemus in Excursu ad librum VI. §§. 9. 10. 15.

Ε Τ Κ Λ Ε Ι Δ Ο Τ
Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ω Ν
ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΚΤΟΝ.

Ο Ρ Ο Ι.

α. Ὅμοια σχήματα εὐθύγραμμά ἐστιν, ὅσα τὰς γωνίας ἴσας ἔχει κατὰ μίαν, καὶ τὰς περὶ τὰς ἴσας γωνίας πλευρὰς ἀνάλογον.

β. Ἀντιπεπονθότα δὲ σχήματά ἐστιν, ὅταν ἐκ τέρω τῶν σχημάτων ἡγοῦμενοι τε καὶ ἐπόμενοι ἴσων ¹⁾ ᾖσιν.

1) Editio Basil. et cum ea plures Elementorum editiones, quae textum graecum definitionem et enunciatorum propositionum habent, nominatim Oronii Fineii, Ioach. Cametarii, Scheubelii, Peletarii, Dasypodii habent λόγοι. Eadem lectio est etiam in excerptis ἐκ τῶν τοῦ Ἡρώτος περὶ τῶν τῆς γεωμετρίας ὀνομάτων a Dasypodio editis Argent. 1570. Ed. Oxon. legit ὄροι, quam vocem etiam Petr. Ramus ponendam putaverat. Conferantur tamen, quae ad V. Defin. 9. de superiore vocis ὄροι dicta sunt. Candalla iam suspicatus erat, legendum esse λόγων, quam lectionem Peyrardus e Cod. a. eruit, et in ed. Paris. posuit. Quod ex Candallae sententia ita interpretandum erit, utramque figuram binarum rationum antecedens et consequens comprehendere: scilicet antecedens primae et consequens secundae ad priorem, consequens vero primae et antecedens secundae rationis ad posteriorem figuram pertinere debent. Pflsidoier. Schol. in L. VI. Elem. §. 127-128. Iam legenda fuerit utraque vox: λόγων ὄροι, aut potius: ἡγοῦμενοι τε καὶ ἐπόμενα λόγων.

E U C L I D I S E L E M E N T O R U M

LIBER SEXTUS.

DEFINITIONES.

1. Similes figurae rectilineae sunt, quae et singulos angulos singulis aequales habent, et circa aequales angulos latera proportionalia.

2. Reciprocae autem figurae sunt, quando in utraque figurarum antecedentes et consequentes rationum sunt.

DEFIN. I.

Austin. contra hanc definitionem monet, non statim patere, an simul consistere possit in duabus figuris rectilineis mutua aequalitas angulorum, et proportionalitas laterum circa aequales angulos. Atque ita haec definitio ponenda aut saltem explicanda foret demum post VI. 4. At, quum in figuris regularibus, quas liber quartus describere docet, mutua illa aequalitas angulorum, et proportionalitas laterum locum habeat, si figurae istae eundem numerum laterum habeant, exemplum certe eiusmodi figurarum prostat, nec quisquam generaliter asserere poterit, esse ista *ἀναγκαῖα*. Et, quod Pfeiderer. observat, (Schol. ad Libr. VI. Elem. Euclid. Tub. 1800. sqq. §. 297. Ista nempe scholia non integra, sed saltem ad §. 268.

γ'. Ἄκρον καὶ μέσον λόγον εὐθεία τεμνῆσθαι λέγεται, ὅταν ἢ ὡς ἡ ὅλη πρὸς τὸ μείζον τμήμα οὕτως τὸ μείζον πρὸς τὸ ἐλασσον.

δ' Ὅψος ἐστὶ πάντος σχήματος ἡ ἀπὸ τῆς κορυφῆς ἐπὶ τὴν βάσιν κάθετος ἀγομένη.

lucem publicam viderunt, integra tamen in scriniis suis elaborata habuit beatus auctor et benevole mecum communicavit, unde, ipso permittente, nonnulla in nostrum usum convertimus) Euclidea rectilineorum similium definitio ipsam communem similitudinis notionem (quae lineamentorum similem situm ac proportionalitatem requirit) ad illa adplicatam et accurate determinatam sistit. Et Euclides, eodem monente, denominationem similium triangulis in VI. 8. demum applicat, postquam in VI. 4—7. aequalitatem angulorum ac proportionalitatem laterum circa angulos aequales non solum generaliter coexistere posse, sed sub quibus conditionibus reapse coexistant, ostenderat: (tum rectilinea universam, quae iuxta suam definitionem similia dici possint, in VI. 18. describere docet, antequam ad proprietates eorum discutiendas progrediatur. Cf. Phil. mathem. Abhandl. von Kästner und Klügel. Halle 1807. p. 16. sqq. Ipse Austin. contra similia triangula ea esse dicit, in quibus anguli unius aequales sunt respective angulis alterius. Similes autem rectilineas figuras plurium quam trium laterum eas esse dicit, quae dividi possint in aequalem numerum triangulorum similium, similiter positorum. Circa has Austin. definitiones Pflaiderer. l. c. observat, definitionem triangulorum similium communem figurarum similium notionem non exhaustire, et demum adiecta propositione VI. 4: eam exhaustiri. Ceterorum vero rectilineorum definitionem Austinianam, cum et multifariam ea possint in triangula dividi, et, quid similis triangulorum situs involvat, ab auctore non declaratur, vagam et ambiguam esse. Praeter necessitatem igitur, nec sine incommodo, uni definitioni duas substitui.

D E F I N. II.

Rob. Simson. observat, definitionem 2. non videri Eucli-

3. Secundum extremam et mediam rationem recta esse dicitur, quando est ut tota ad maius segmentum ita maius ad minus.

2. Altitudo est omnis figurae a vertice ad basin perpendicularis ducta.

dis esse, sed cuiusdam imperiti, quum nulla figurarum reciprocarum mentio fiat ab Euclide, nec a quoquam alio geometra, et definitio praeterea obscure enunciata sit. Ipse autem Simson. clarius eam ita exhibuit: „reciprocae figurae, triangula sc. et parallelogramma sunt, quando circa duos angulos latera ita sunt proportionalia, ut latus primae sit ad latus secundae, ut reliquum secundae latus ad latus reliquum primae.“ In adiectis deinde notis aliam generaliore vice eius posuit, nempe „duae magnitudines dicuntur reciproce proportionales duobus aliis, quando altera priorum est ad alteram posteriorum, ut reliqua posteriorum ad reliquam priorum.“ Simsonis iudicium de Def. 2. confirmat Pfeiderer. Schol. ad Libr. VI. Elem. §. 132., dum observat, Prop. VI. 14., VI. 15., XI. 34. etc. non dicere, ἀντιστρόφως αὐτὰς πλεοναί κ. τ. λ., quarum formularum sensus praeterea in singularum propositionum enunciatione VI. 14., VI. 15. etc. diserte indicetur. Caeterum Pfeiderer. monet, Rob. Simsonis definitionem, per se ad quatuor homogeneas magnitudines restrictam, ad solas libri VI. propositiones quadrare.

DEFIN. IV.

Pfeiderer. in Schol. §. 1. observat, hanc definitionem non genuinam esse videri, cum in parallelogramma, parallelepipeda, prismata, cylindros, quorum altitudines in elementis commemorantur, non quadret. Praeterea eam deesse in versione Campani, nec Proclum ad I. 38. eius rationem habere. Nempe altitudo in figura rectilinea non absolute dicitur, sed semper refertur ad aliquod figurae latus, quod pro basi sumitur, et significat maximum perpendicularum, quod a puncto

ε. (Λόγος ἐκ λόγων συγκείσθαι λέγεται, ὅταν αἱ τῶν λόγων πηλικότητες ἐφ' ἑαυτὰς πολλαπλασιασθεῖσαι ποιῶσι τινα ¹).

ΠΡΟΤΑΣΙΣ α.

Τὰ τρίγωνα καὶ τὰ παραλληλόγραμμα, τὰ ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὕψος ὄντα, πρὸς ἄλληλά ἐστιν ὡς αἱ βάσεις.

Ἐστω τρίγωνα μὲν τὰ $ABΓ$, $ΑΓΔ$, παραλληλόγραμμα δὲ τὰ $ΕΓ$, $ΙΖ$, ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὕψος ὄντα, τὴν ἀπὸ τοῦ A ἐπὶ τὴν $ΒΔ$ κάθετον ἀγομένην· λέγω ὅτι ἐστὶν ὡς ἡ $ΒΓ$ βάσις πρὸς τὴν $ΓΔ$ βάσιν οὕτως τὸ $ΑΒΓ$ τρίγωνον πρὸς τὸ $ΑΓΔ$ τρίγωνον, καὶ τὸ $ΕΓ$ παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ $ΙΖ$ παραλληλόγραμμον.

Ἐκβεβλήσθω γὰρ ἡ $ΒΔ$ ἐφ' ἑκάτερα τὰ μέρη, ἐπὶ τὰ $Θ$, $Λ$ σημεία, καὶ κείσθωσαν τῇ μὲν $ΒΓ$ βάσει ἴσαι ὁσαιδηποῦν αἱ $ΒΗ$, $ΗΘ$, τῇ δὲ $ΓΔ$ βάσει ἴσαι ὁσαιδηποῦν αἱ $ΔΚ$, $ΚΛ$, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ $ΑΗ$, $ΑΘ$, $ΑΚ$, $ΑΛ$.

Καὶ ἐπεὶ ἴσαι εἰσὶν αἱ $ΓΒ$, $ΒΗ$, $ΗΘ$ ἄλλήλαις, ἴσα ἐστὶ, καὶ τὰ $ΑΘΗ$, $ΑΗΒ$, $ΑΒΓ$ τρίγωνα ἄλλη-

1) Hanc definitionem quintam, quae apud Peyrardum deest, at ipso teste in omnibus codicibus (quanquam in Cod. i. tantum in margine) reperitur (nisi quod pro *τινά* legunt *τινάς*) ex ed. Oxon. huc reposuimus, non quod ipsam geometriam esse putaremus, sed quo melius ea, quae viri docti de VI. 5. Def. disputant, intelligi possint. Campanus hanc definitionem non habet. Ed. Basil. pro *τινά*, quod Oxon. habet, legit *τινάς*. Vide caeterum Excurs. ad finem huius libri.

aliquo figurae in hoc latus demitti potest. Iam vero vel unum aliquod figurae punctum ab hac basi magis distat, quam reliqua figurae puncta quaecunque, et tum perpendiculum ab hoc puncto in basin demissum altitudo figurae, quatenus ad hanc basin refertur, vocatur: vel plura figurae puncta unam ean-

(5. Ratio ex rationibus componi dicitur, quando rationum quantitates inter se multiplicatae illius faciunt quantitatem.)

PROPOSITIO I. (Fig. 373.)

Triangula et parallelogramma, quae eandem altitudinem habent, inter se sunt ut bases.

Sint triangula ABF , AGD , parallelogramma vero EF , GZ , quae eandem altitudinem habent, nempe perpendicularem ab A ad BD ductam; dico, esse ut basis BF ad GD basin ita triangulum ABF ad triangulum AGD , et parallelogrammum EF ad parallelogrammum GZ .

Producatur enim BD ex utraque parte ad puncta Θ , A , et ponantur basi BF aequales quotcunque BH , $H\Theta$, basi vero GD aequales quotcunque AK , KA , et iungantur AH , $A\Theta$, AK , AA .

Et quoniam aequales sunt GB , BH , $H\Theta$ inter se, aequalia sunt et $A\Theta H$, AHB , ABF triangula inter

demque inter se a basi distantiam habent, adeoque I. 34. Cor. 4. in recta basi parallela sita sunt, ea ipsa distantia a basi autem maior est quovis perpendiculo ex alio quocunque figurae puncto in hanc basin demisso, tum iterum communis illa punctorum a basi distantia vel perpendiculum maius quovis alio a reliquis figurae punctis non in recta ista basi parallela sitis demisso altitudo figurae ad hanc basin relata vocatur. Itaque in triangulo quidem perpendiculum a vertice in oppositam basin demissum, in parallelogrammo autem perpendiculum e puncto quocunque rectae basi parallelae in basin demissum erit altitudo figurae, quatenus ea ad hanc basin refertur. Quoniam igitur duae figurae inter easdem parallelas constitutae sint,

λοις· ὁσαπλασίον ἄρα ἐστὶν ἡ $\Theta\Gamma$ βάσις τῆς $B\Gamma$ βάσεως, τοσανταπλάσιόν ἐστι καὶ τὸ $A\Theta\Gamma$ τρίγωνον τοῦ $AB\Gamma$ τριγώνου. Διὰ τὰ αὐτὰ δὴ ὁσαπλασίον ἐστὶν ἡ $\Gamma\Delta$ βάσις τῆς $\Gamma\Delta$ βάσεως, τοσανταπλάσιόν ἐστι καὶ τὸ $A\Lambda\Gamma$ τρίγωνον τοῦ $A\Gamma\Delta$ τριγώνου· καὶ εἰ ἴση ἐστὶν ἡ $\Theta\Gamma$ βάσις τῇ $\Gamma\Delta$ βάσει, ἴσον ἐστὶ καὶ τὸ $A\Theta\Gamma$ τρίγωνον τῷ $A\Lambda\Gamma$ τριγώνῳ· καὶ εἰ ὑπερέχει ἡ $\Theta\Gamma$ βάσις τῆς $\Gamma\Delta$ βάσεως, ὑπερέχει καὶ τὸ $A\Theta\Gamma$ τρίγωνον τοῦ $A\Lambda\Gamma$ τριγώνου· καὶ εἰ ἔλασσον, ἔλασσον. Τεσσάρων δὴ ὄντων μεγεθῶν, δύο μὲν βάσεων τῶν $B\Gamma$, $\Gamma\Delta$, δύο δὲ τριγώνων τῶν $AB\Gamma$, $A\Gamma\Delta$, ἀληπται ἰσάκεις πολλαπλάσια τῆς μὲν $B\Gamma$ βάσεως καὶ τοῦ $AB\Gamma$ τριγώνου, ἥτε $\Theta\Gamma$ βάσις καὶ τὸ $A\Theta\Gamma$ τρίγωνον· τῆς δὲ $\Gamma\Delta$ βάσεως καὶ τοῦ $A\Gamma\Delta$ τριγώνου ἄλλα ἃ ἔτυχεν ἰσάκεις πολλαπλάσια ἥτε $\Gamma\Delta$ βάσις καὶ τὸ $A\Lambda\Gamma$ τρίγωνον· καὶ δέδεικται ὅτι εἰ ὑπερέχει ἡ $\Theta\Gamma$ βάσις τῆς $\Gamma\Delta$ βάσεως, ὑπερέχει καὶ τὸ $A\Theta\Gamma$ τρίγωνον τοῦ $A\Lambda\Gamma$ τριγώνου καὶ εἰ ἴση, ἴσον· καὶ εἰ ἔλαττων, ἔλαττον· ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ $B\Gamma$ βάσις πρὸς τὴν $\Gamma\Delta$ βάσιν οὕτως τὸ $AB\Gamma$ τρίγωνον πρὸς τὸ $A\Gamma\Delta$ τρίγωνον.

Καὶ ἐπεὶ τοῦ μὲν $AB\Gamma$ τριγώνου διπλάσιόν ἐστι τὸ $E\Gamma$ παραλληλόγραμμον, τοῦ δὲ $A\Gamma\Delta$ τριγώνου διπλάσιόν ἐστι τὸ $Z\Gamma$ παραλληλόγραμμον, τὰ δὲ

eandem altitudinem habent, et vice versa Cor. 3. et I. 34. Cor. 4.

DEFIN. V.

De hac definitione vide Excursum sub finem huius libri.

PROPOSITIO I.

Obs. 1. Demonstratio partis prioris supponit corollarium ex I. 38. deductum simile corollario 2. ex Prop. 36. deducto.

se (I. 38.), quam multiplex igitur est basis $\Theta\Gamma$ ipsius BF basis, tam multiplex est et triangulum $A\Theta\Gamma$ ipsius $AB\Gamma$ trianguli. Ex eadem ratione quam multiplex est basis ΓA ipsius ΓA basis, tam multiplex est et triangulum $A\Lambda\Gamma$ ipsius $A\Gamma A$ trianguli; et (I. 38.) si aequalis est basis $\Theta\Gamma$ ipsi basi ΓA , aequale est et triangulum $A\Theta\Gamma$ ipsi triangulo $A\Lambda\Gamma$; et si superat basis $\Theta\Gamma$ ipsam basin ΓA , superat et triangulum $A\Theta\Gamma$ ipsum triangulum $A\Lambda\Gamma$; et si minor, minus. Quatuor igitur existentibus magnitudinibus, duabus quidem basibus BF , ΓA , duobus vero triangulis $AB\Gamma$, $A\Gamma A$, sumpta sunt aequae multiplicia basis BF et trianguli $AB\Gamma$, ipsa basis $\Theta\Gamma$ et triangulum $A\Theta\Gamma$; basis vero ΓA et trianguli $A\Gamma A$ alia utcumque aequae multiplicia, basis ΓA et triangulum $A\Lambda\Gamma$. Et ostensum est si superat basis $\Theta\Gamma$ ipsam ΓA basin, superare et triangulum $A\Theta\Gamma$ ipsum triangulum $A\Lambda\Gamma$; et si aequalis, aequale, et si minor, minus; est igitur (V. Def. 5.) ut basis BF ad basin ΓA ita triangulum $AB\Gamma$ ad triangulum $A\Gamma A$.

Et quoniam trianguli $AB\Gamma$ duplum est parallelogrammum EF (I. 41.), ipsius vero trianguli $A\Gamma A$ duplum est parallelogrammum $Z\Gamma$, partes autem eandem

quod pariter locum habere diximus ad I. 38., nempe triangula in iisdem parallelis constituta, sed super basibus inaequalibus, inaequalia esse, maius nempe illud, cuius basis maior sit. Cf. Pfeiderer. l. c. §. 4.

Obs. 2. Quamvis autem enunciatum propositionis et expositio supponat triangula et parallelogramma invicem contigua, super basibus in directum iacentibus constituta, et quidem in adiecto schemate ad oppositas partes lateris communis

μήνη τοῖς ὡσαύτως πολλαπλασίοις τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ἔστιν ἄρα ὡς τὸ $ABΓ$ τρίγωνον πρὸς τὸ $ΑΓΔ$ τρίγωνον οὕτως τὸ $ΕΓ$ παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ $ΖΓ$ παραλληλόγραμμον. Ἐπεὶ οὖν ἐδείχθη, ὡς ἡ $ΒΓ$ βάσις πρὸς τὴν $ΓΔ$ οὕτως τὸ $ABΓ$ τρίγωνον πρὸς τὸ $ΑΓΔ$ τρίγωνον, ὡς δὲ τὸ $ABΓ$ τρίγωνον πρὸς τὸ $ΑΓΔ$ τρίγωνον οὕτως καὶ τὸ $ΕΓ$ παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ $ΖΓ$ παραλληλόγραμμον· καὶ ὡς ἄρα ἡ $ΒΓ$ βάσις πρὸς τὴν $ΓΔ$ βάσιν οὕτως τὸ $ΕΓ$ παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ $ΖΓ$ παραλληλόγραμμον. Ταῦτα ἄρα τρίγωνα, καὶ τὰ ἐξῆς.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ β.

Ἐν τριγώνῳ παρὰ μίαν τῶν πλευρῶν ἄγθῃ τις εὐθεΐα ¹⁾, ἀνάλογον τεμνέι τὰς τοῦ τριγώνου πλευρὰς καὶ ἐν αἰ τοῦ τριγώνου πλευραὶ ἀνάλογον τμηθῶσι, ἢ ἐπὶ τὰς τομὰς ἐπιζευγμένη εὐθεΐα παρὰ τὴν λοιπὴν ἔσται τοῦ τριγώνου πλευράν.

1) Edd. Basil. et Oxon. hic et sub finem propositionis addunt *παράλληλος*, quam vocem, quum in *παρὰ* iam contineatur, ex hīde Cod. a. cum Peyrardo omisimus.

delineata, demonstratio tamen aequè pertinet ad triangula et parallelogramma aequalium altitudinum: quibus ita dispositis, ut bases illorum sint in eadem recta linea, et figurae ipsae ad eandem huius rectae partes recta per vertex, triangulorum ducta ei, in qua bases sunt, sit parallela (I. 28. I. 33.); parallelogrammorum vero latera basibus opposita in eandem incidunt rectam, ei, in qua bases sunt, parallelam (I. 28. I. 33.). Quare triangula etiam et parallelogramma aequalia sunt aui basi. (Pfeiderer. I. c. §§. 5—8. Rob. Simson, Cor. ad VI. 1. Cf. demonstratio et figura Clavii, et expositio Procli ad I. 38., qui ita habet: τὸ αὐτὸ ὕψος οὐδὲν διαφέρει ἢ ἐν ταῖς αὐταῖς εἶναι παραλλήλοις. Πάντα γὰρ τὰ ἐν ταῖς αὐταῖς ὄντα

habent rationem quam earum aequae multiplices (V. 15.); est igitur ut triangulum ABF ad triangulum APA ita parallelogrammum EF ad parallelogrammum ZF . Quoniam igitur ostensum est, ut basis BF ad basin PA ita triangulum ABF ad triangulum APA ; ut autem triangulum ABF ad triangulum APA ita parallelogrammum EF ad parallelogrammum ZF ; igitur (V. 11.) basis BF ad basin PA ita parallelogrammum EF ad parallelogrammum ZF . Ergo triacula etc.

PROPOSITIO II. (Fig. 338.)

Si uni laterum trianguli parallela ducatur quaedam recta, illa proportionaliter secabit trianguli latera; et si trianguli latera proportionaliter secta fuerint, recta sectiones coniungens reliquo trianguli lateri parallela erit.

παράλληλοις ὑπὸ τὸ αὐτὸ ἔστιν ὕψος, καὶ ἀναπάλιν. "Τυγος γάρ ἐστιν ἡ ἀπὸ τῆς ἐτέρας παράλλου κάθετος ἐπὶ τὴν λοιπὴν.

Obs. 3. Propositiones I. 35–38, theoremate VI. 1. quidem comprehenduntur, sed, cum huius demonstratio illis nitatur, non simul cum hoc una stabiliri demonstratione dici possunt, quamvis Proclus l. c. contrarium asserat. Pfeiderer. l. c. §. 10.

Obs. 4. Parallelogramma et triangula rectangula, quae unum latus circa angulum rectum commune, vel aequale habent, esse ut altera ipsorum latera circa angulum rectum, asserto generali VI. 1. et Obs. 2. continetur. Hinc parallelogramma et triangula, primum rectangula, tum (I. 35. I. 37.) quaelibet super eadem vel aequalibus basibus constituta, sunt uti altitudines. Quod ipsum Clavius simili modo infert, Commandinus p. olivius, nec legitime deducit. Pfeiderer. l. c. §§. 11. 12.

Τριγώνου γὰρ τοῦ ABF παράλληλος μὲν τῇ πλευρῶν τῇ BF ᾗχθω ἡ AE . λέγω ὅτι ἐστὶν ὡς ἡ BA πρὸς τὴν AA οὕτως ἡ GE πρὸς τὴν EA .

Ἐπεξεύχθωσαν γὰρ αἱ BE , GA .

Ἴσον δὲ ἐστὶ τὸ BDE τρίγωνον τῷ GAE τριγώνῳ. ἐπὶ γὰρ τῆς αὐτῆς βάσεως ἐστὶ τῆς AE καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ταῖς AE , BF . Ἀλλὸ δὲ π τὸ ADE τρίγωνον τὰ δὲ ἴσα πρὸς τὸ αὐτὸ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον· ἐστὶν ἄρα ὡς τὸ BAE τρίγωνον πρὸς τὸ ADE τρίγωνον οὕτως τὸ GAE τρίγωνον πρὸς τὸ ADE τρίγωνον. Ἀλλ' ὡς μὲν τὸ BAE τρίγωνον πρὸς τὸ ADE οὕτως ἡ BA πρὸς τὴν AA ὑπὸ γὰρ

Obs. 5. Ea, quae Obs. 4. ad initium dicta sunt, complectuntur Lemmata Elem. libro X. vulgo inserta, nempe ante X. 23. X. 32. Lemm. 2. ante X. 34. et Lemm. 3. ante X. 34. Pfeiderer l. c. §. 13.

Obs. 6. Per deductionem ad impossibile similem ei, quae demonstrandis I. 39. I. 40. adhibetur, facile demonstratur VI Prop. 1. et Obs. 2. et Obs. 4. conversae: nempe triangula et parallelogramma, quae sunt inter se, ut bases, aequales habere altitudines, vel eandem; et quae sunt inter se, ut altitudines, aequales habere bases, si unam et eandem non habeant. Cf. Pfeiderer. l. c. §. 14. Clavius, aliique.

PROPOSITIO II.

Obs. 1. In Prop. 2. sumitur, rectam, quae basi trianguli parallela ducitur, necessario convenire cum reliquis trianguli lateribus ipsis aut productis, quod quidem necessario fieri patet ex I. 29. Cor. 3. Cf. Pfeiderer. l. c. §. 15.

Obs. 2. Ex VI. Prop. 2. quod nempe sit $BA:AA=GE:EA$, sequitur etiam, esse inversae $AA:BA=EA:GE$ (Prop. B in Excursu ad Libr. V. Elem.) et componendo (V. 18.) $AB:(\frac{AA}{BA})=AE:(\frac{AE}{EG})$, et alterno (VI. 16.) $BA:GE=AA:EA$,

Trianguli enim ABF uni laterum BF parallela ducatur AE ; dico esse ut BA ad AA ita FE ad EA .

Iungantur enim BE , FA .

Aequale igitur est triangulum BAE triangulo FAE (I. 37.), in eadem enim basi sunt AE et intra easdem parallelas AE , BF . Aliud autem quoddam triangulum est AAE ; aequalia vero ad idem eandem habent rationem (V. 7.); est igitur ut triangulum BAE ad triangulum AAE , ita triangulum FAE ad triangulum AAE . Sed ut triangulum BAE ad AAE ita BA ad AA ; nam cum sub eadem altitudine sint, nempe sub

et $AB:AI=AA:AE=BA:EF$. Cf. Pflöiderer. I. c. §§. 16. 17. 22.

Obs. 3. Pariter earum propositionum omnium, quae Obs. 2. continentur, conversae eodem modo locum habent, ac in parte altera VI. Prop. 2. Conversa partis prioris demonstratur. Nempe ex suppositionibus $AB:(\frac{AA}{AB})=AI:$

$(\frac{AE}{EF})$ dividendo (V. 17.), pariterque ex suppositione $BA:FE=AA:EA$ alterne (V. 16.) consequitur, esse $BA:AA=FE:EA$, unde ex parte altera V. Prop. 2. consequitur, omnibus his casibus esse rectam AE parallelam basi. Cf. Pflöiderer. I. c. §§. 20. 21. 22.

Obs. 4. Quae in VI. Prop. 2. similiterque ea, quae in Obs. 2. et 3. continentur, pariter locum habent, si recta AE ita ducatur (Fig. 339. 340.), ut non ipais trianguli ABF lateribus, sed saltim iis vel ultra verticem A , vel ultra basin BF productis occurrat, quod facile eodem modo probatur. Cf. Pflöiderer. I. c. §§. 23. 24. Unde et Rob. Simson. et Playfair. rem ita enunciant: si uni laterum trianguli parallela quaedam recta linea ducta fuerit, proportionaliter secabit reliqua trianguli latera, vel latera producta: et, si latera trianguli, vel latera producta proportionaliter secta fuerint, quae sectiones

τὸ αὐτὸ ὕψος ὄντα, τὴν ἀπὸ τοῦ E ἐπὶ τὴν AB καθέκτον ἀγομένην, πρὸς ἄλληλά εἰσιν ὡς αἱ βάσεις. Διὰ τὰ αὐτὰ δὴ ὡς τὸ $\Gamma Δ E$ τρίγωνον πρὸς τὸ $Α Δ E$ οὕτως ἡ $Γ E$ πρὸς τὴν $Ε Α$ καὶ ὡς ἄρα ἡ $Β Δ$ πρὸς τὴν $Δ Α$ οὕτως ἡ $Γ E$ πρὸς τὴν $Ε Α$.

Ἀλλὰ δὴ αἱ τοῦ $Α Β Γ$ τριγώνου πλευραὶ αἱ $Α Β$, $Α Γ$ ἀνάλογον τετμήσθωσαν κατὰ τὰ $Δ$, $Ε$ σημεία, ὡς ἡ $Β Δ$ πρὸς τὴν $Δ Α$ οὕτως ἡ $Γ E$ πρὸς τὴν $Ε Α$ καὶ ἐπεξεύχθω ἡ $Δ Ε$. λέγω ὅτι παράλληλός ἐστιν ἡ $Δ Ε$ τῇ $Β Γ$.

Τῶν γὰρ αὐτῶν κατασκευασθέντων, ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ $Β Δ$ πρὸς τὴν $Δ Α$ οὕτως ἡ $Γ E$ πρὸς τὴν $Ε Α$, ἀλλ' ὡς μὲν ἡ $Β Δ$ πρὸς τὴν $Δ Α$ οὕτως τὸ $Β Δ E$ τρίγωνον πρὸς τὸ $Α Δ E$ τρίγωνον, ὡς δὲ $Γ E$ πρὸς τὴν $Ε Α$ οὕτως τὸ $Γ Δ E$ τρίγωνον πρὸς τὸ $Α Δ E$ τρίγωνον· καὶ ὡς ἄρα τὸ $Β Δ E$ τρίγωνον πρὸς τὸ $Α Δ E$ τρίγωνον οὕτως τὸ $Γ Δ E$ τρίγωνον πρὸς τὸ $Α Δ E$ τρίγωνον. Ἐκατέρον ἄρα τῶν $Β Δ E$, $Γ Δ E$ τριγώνων πρὸς τὸ $Α Δ E$ τρίγωνον τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον. Ἰσὺν ἄρα ἐστὶ τὸ $Β Δ E$ τρίγωνον τῷ $Γ Δ E$ τριγώνῳ· καὶ

coniungit recta linea reliquo trianguli lateri parallela erit. Omnia, etiam ea, quae in observationibus 2—4 dicta sunt, sic etiam licet complecti: quae ab cruribus eiusdem anguli, vel duorum angulorum ad verticem oppositorum per duas rectas parallelas tam verticem inter et alteram earum, quam ipsas inter patallas abscinduntur segmenta, sic proportionalia sunt, ut, quam rationem mutuo habent duo segmenta unius cruris eandem invicem habeant duo segmenta homologa, seu similiter sita cruris alterius; et ut singula unius cruris segmenta ad segmenta homologa cruris alterius sint in eadem ratione. Vicissim parallelae sunt rectae, quae ab cruribus eiusdem anguli, vel duorum angulorum ad verticem oppositorum, seg-

perpendiculari ab E ad AB ducta, inter se sunt ut bases (VI. 1.). Ex eadem ratione ut triangulum ΓAE ad $A \Delta E$ ita ΓE ad EA ; ut igitur $B \Delta$ ad ΔA ita ΓE ad EA (V. 11.).

Sed trianguli $AB \Gamma$ latera AB , $A \Gamma$ proportionaliter secta sint in punctis Δ , E , ut $B \Delta$ ad ΔA ita ΓE ad EA , et iungantur ΔE ; dico parallelam esse ΔE ipsi $B \Gamma$.

Iisdem enim constructis, quoniam est ut $B \Delta$ ad ΔA ita ΓE ad EA , sed ut $B \Delta$ ad ΔA ita triangulum $B \Delta E$ ad triangulum $A \Delta E$, ut ΓE vero ad EA ita triangulum ΓAE ad triangulum $A \Delta E$ (VI. 1.); erit (V. 11.) ut triangulum $B \Delta E$ ad triangulum $A \Delta E$ ita triangulum ΓAE ad triangulum $A \Delta E$. Utrumque igitur triangulorum $B \Delta E$, ΓAE ad triangulum $A \Delta E$ eandem habet rationem. Aequale igitur est (V. 9.) triangulum $B \Delta E$ triangulo ΓAE ; et sunt super eadem basi ΔE . Aequalia autem triangula super eadem basi

menta alterutro ordine indicato proportionalia abscindunt. Cf. Pfeiderer. l. c. §. 25. Denique observari potest, similes proportionales locum habere, si non duas tantum, sed plures rectae parallelae a cruribus anguli, vel duorum angulorum ad verticem oppositorum segmenta abscindant, et vice versa. Cf. Tacquet. VI. 2. Cor. 1.

Obs. 5. Pariter duas rectas non contiguas, duabus interceptas parallelis, pariter ab tertia his parallela proportionaliter secari, et vicissim, facile probatur, et ad segmenta etiam pluribus, quam tribus rectis inter se parallelis abscissa extendi potest. Cf. Pfeiderer. l. c. §§. 29. 30. 31. et, quae ibi citantur, demonstrationes Euclidis in VI. 10. et XI. 17. adhibitas.

είσω ἐπὶ τῆς ἀντίης βάσεως τῆς ΔE . Τὰ δὲ ἴσα τριγῶνα ἐπὶ τῆς ἀντίης βάσεως ὄντα, καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ἐστίν. Παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ ΔE τῇ $\tilde{B}\Gamma$. Ἐὰν ἄρα τριγώνου, καὶ τὰ ἐξῆς.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ γ'.

Ἐὰν τριγώνου γωνία δίχα τμηθῇ, ἡ δὲ τέμνουσα τὴν γωνίαν εὐθεῖα τέμνη καὶ τὴν βάσιν, τὰ τῆς βάσεως τμήματα τὸν αὐτὸν ἔξει λόγον ταῖς λοιπαῖς τοῦ τριγώνου πλευραῖς· καὶ ἂν τὰ τῆς βάσεως τμήματα τὸν αὐτὸν ἔχῃ λόγον ταῖς λοιπαῖς τοῦ τριγώνου πλευραῖς, ἡ ἀπὸ τῆς κορυφῆς ἐπὶ τὴν τομὴν ἐπιζευγμένη εὐθεῖα δίχα τέμνει τὴν τοῦ τριγώνου γωνίαν.

PROPOSITIO III.

Propositio haec valet de triangulis aequicruris pariter ac non aequicruris. Et de aequicruris quidem pars prior propositionis iam ex I. 4. pars posterior ex I. 8. patet. Cf. I. 2. Cor. 1. 2. Quod triangula non aequicrura attinet, illud autem omnia facile ostendetur, rectam, quae angulum ad verticem bifariam secat, basin ad angulos obliquos (in aequicruris anguli fiunt recti) et in partes inaequales secare, sic, ut minus segmentum adiaceat cruri minori, atque is angulus acutus sit, qui cruri minori opponitur. Nempe, si (Fig. 342.) $AF > AB$, et AD angulum BAF bifariam dividit, ob angulum $B > F$ (I. 18.), sunt anguli $B + \angle ADB > F + \angle ADF$, ideoque (I. 32.) $ADF > ADB$. Et, ab AF abscissa $AE = AB$, et iuncta recta AE , sunt (I. 4.) $AE = AB$, et ang. $AEF = ABA$. Quare, producta AB versus Z , est ang. $ABZ = AEF$ (I. 13.). At $ABZ > F$ (I. 16.), ergo $AEF > F$, ideoque $AF > AB$ (I. 19.) i. e. $AF > AB$. Pflaederer. l. c. §§. 32. 33.

Obs. 2. Quae igitur trianguli non aequicruri basin BF bifariam secat ex vertice trianguli A ducta recta AD in huius segmentum AF incidit, proinde in inaequales dividit angulum ad verticem BAF , sic, ut maior sit angulus BAH , qui mi-

constituta et intra easdem parallelas sunt (I. 39.). Parallela igitur est AE ipsi $B\Gamma$. Si igitur trianguli etc.

PROPOSITIO III. (Fig. 341.).

Si trianguli angulus bifariam secetur, secans autem angulum recta secet et basin; segmenta basis eandem habebunt rationem quam reliqua trianguli latera; et si segmenta basis eandem habeant rationem quam reliqua trianguli latera, recta a vertice ad sectionem ducta bifariam secat trianguli angulum.

noni cruri AB adiacet: eademque AH obliqua est basi, ob angulum $AH\Gamma >$ obtuso $A\Delta\Gamma$, et $AHB <$ acuto $A\Delta B$ (I. 16.), quae posterior pars etiam ex I. 25. consequitur. Cf. Pflaiderer. I. c. §§. 34. 35.

Obs. 3. In demonstratione VI. Prop. 3., quae complet ea, quae Obs. 1. 2. dicta sunt, ostendendum est ante omnia, rectam FE (Fig. 341.) convenire cum producta BE , quod facile op^{te} I. 29. Cor. 3. fiet, vel simili modo, quo in demonstratione VI. 4. res ad I. Ax. 11. vel I. Post. 5. reducitur. Poterat autem constructio etiam ita absolvi, ut a producta BA abscinderetur segmentum $AB=AT$, ubi tum facile ex parte posteriore VI. Prop. 2. ostenderetur, iunctam FE parallelam esse rectae AE . Et forte haec ipsa applicatio partis posterioris VI. 2. indicaverit, hanc constructionem, et, quae inde fluit, demonstrationem genuinam potius esse, quam quae nunc in elementis exstant, quae, nisi suppleantur, quae initio huius observationis diximus, quodammodo manca videri possit. Cf. Pflaiderer. I. c. §§. 37—40.

Obs. 4. Rectae AZ , BH , FE (Fig. 343.) bifariam secantes angulos cuiuslibet trianguli, et ad latera usque opposita productas, ita se mutuo in puncto sectionis communi A

Ἐστω τρίγωνον τὸ $ABΓ$, καὶ τετμήσθω ἡ ἐκτὸς $BAΓ$ γωνία διχα ὑπὸ τῆς AA εὐθείας· λέγω ὅτι ἐστὶν οἷς ἡ BA πρὸς τὴν $ΔΓ$ οὕτως ἡ BA πρὸς τὴν $ΑΓ$.

Ἦχθω γὰρ διὰ τοῦ $Γ$ τῇ AA παράλληλος ἡ $ΓΕ$, καὶ διαχθείτω ἡ BA συμπληρώσθω αὐτῇ κατὰ τὸ E .

Καὶ ἐπεὶ εἰς παραλλήλους τὰς AA , $ΕΓ$ εὐθείαι ἐπέπεσεν ἡ $ΑΓ$, ἡ ἄρα ὑπὸ $ΑΓΕ$ γωνία ἴση ἐστὶ τῇ ὑπὸ $ΓAA$. Ἀλλ' ἡ ὑπὸ $ΓAA$ τῇ ὑπὸ $BAΔ$ ἐκπίπτει ἴση· καὶ ἡ ὑπὸ $BAΔ$ ἄρα τῇ ὑπὸ $ΑΓΕ$ ἴση ἴση. Πάλιν, ἐπεὶ εἰς παραλλήλους τὰς AA , $ΕΓ$ εὐθείαι ἐπέπεσεν ἡ BAE , ἡ ἐκτὸς γωνία ἡ ὑπὸ $BAΔ$ ἴση ἐστὶ τῇ ἐντὸς τῇ ὑπὸ $ΑΕΓ$. Ἐδείχθη δὲ καὶ

(Obs. 2. ad IV. 4. Cf. Pfeiderer. §§. 41. 42.) dividam, ut cuiuslibet segmentum adiacens angulo trianguli sit ad eius segmentum adiacens lateri opposito trianguli, ut summa laterum trianguli comprehendentium illum angulum est ad latus hoc ei oppositum; tota autem recta sit ad segmentum ipsius adiacens (angulo lateri) trianguli, uti perimeter trianguli est ad (summam laterum circa hunc angulum). Nempe ex VI. 3.

$$\text{erit } AA:AZ = \left(\begin{array}{l} AB:BZ, \text{ ob ang. } ABA=ZBA \\ AG:GZ, \text{ ob ang. } AGA=ZGA \end{array} \right) \\ = AB+AG:BG \text{ (V. 12.)}$$

$$\text{et hinc } AZ:\left(\frac{AA}{AZ}\right) = AB+AG+BG:\left(\frac{AB+AG}{BG}\right) \text{ (V. 13.)}$$

Eodemque modo ostenditur, esse

$$BH:BA:AH = AB+BG+AG:AB+BG:AG$$

$$IE:GA:AE = AG+BG+AB:AG+BG:AB.$$

Nominatim itaque in triangulo aequilatero sunt

$$\left. \begin{array}{l} AZ:AA:AZ \\ BH:BA:AH \\ IE:GA:AE \end{array} \right\} = 3:2:1.$$

Pfeiderer. l. c. §§. 43. 44.

Sit triangulum $AB\Gamma$, et secetur angulus $BA\Gamma$ bifariam ab ipsa AA recta; dico esse ut BA ad $A\Gamma$ ita BA ad $A\Gamma$.

Ducatur enim per Γ ipsi AA parallela ΓE (I. 31.), et producta BA conveniat cum ipsa in E .

Et quoniam in parallelas AA , $E\Gamma$ recta incidit $A\Gamma$; ergo angulus AFE aequalis est angulo ΓAA (I. 29.). Sed ΓAA ipsi BAA ponitur aequalis; ergo et BAA ipsi AFE est aequalis. Rursus, quoniam in parallelas AA , $E\Gamma$ recta incidit BAE , angulus exterior BAA aequalis est interiori $AE\Gamma$ (I. 29.). Ostensus autem est et AFE ipsi BAA aequalis; ergo angulus AFE

Obs. 5. Vicissim, si recta AZ trianguli perimetro terminata, et aliquem eius angulum bifariam dividens ita secetur in puncto A , ut sit $AA:AZ=AB+\Gamma\Gamma:BF$; cacterae etiam rectae per punctum huius sectionis A ex verticibus angulorum trianguli ductae bifariam hos angulos dividunt. Non enim bifariam dividant angulos B , Γ rectae BA , ΓA , sed $B\theta$, $\Gamma\theta$ (Obs. 2. ad IV. 4.): itaque foret (Obs. 4.) $A\theta:\theta Z=BA+\Gamma\Gamma:BF$ (Obs. 4.): ideoque $A\theta:\theta Z=AA:AZ$ (V. 11.), $AZ:\theta Z=AZ:AZ$ (I. 18.) et $\theta Z=AZ$ (V. 9.) contra I. Ax. 9. Simili modo enunciantur, et vel immediate similiter demonstrantur, vel ad proxime praecedentem casum ope V. 17. reducuntur conversae reliquarum partium Obs. 4. Pflleiderer. I. c. §§. 45. 46.

Obs. 6. Quodsi iam recta ducatur, quae bifariam dividat angulum exteriorem ad verticem trianguli, recta ita ducta 1) in triangulo aequicruro $AB\Gamma$ (Fig. 544.) parallela erit basi BF . Nam, quum ex supp. angulus $ZA\theta=\theta AB=\frac{ZAB}{2}=\frac{B+\Gamma}{2}$ (I. 32.) $=B=F$ (I. 5.), adeoque θA parallela rectae BF (I. 27.). Et conversa quoque, nempe, si θA parallela sit rectae BF , fore angulum ZAB ad θA bisectum, ope I. 29. et I. 5. facile ostendetur. 2) In triangulo autem non aequicruro

ὑπὸ $ΑΓΕ$ τῇ ὑπὸ $ΒΑΔ$ ἴση, καὶ ἡ ὑπὸ $ΑΓΕ$ ἄρα γωνία τῇ ὑπὸ $ΑΕΓ$ ἐστὶν ἴση ὥστε καὶ πλευρὰ ἡ $ΑΕ$ πλευρᾷ τῇ $ΑΓ$ ἐστὶν ἴση. Καὶ ἐπεὶ τριγώνου τοῦ $ΒΓΕ$ παρὰ μίαν τῶν πλευρῶν τὴν $ΕΓ$ ἤκται ἡ $ΑΔ$ ἀνάλογον ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ $ΒΔ$ πρὸς τὴν $ΔΓ$ οὕτως ἡ $ΒΑ$ πρὸς τὴν $ΑΕ$. Ἰση δὲ ἡ $ΑΕ$ τῇ $ΑΓ$ ὡς ἄρα ἡ $ΒΔ$ πρὸς τὴν $ΔΓ$ οὕτως ἡ $ΒΑ$ πρὸς τὴν $ΑΓ$.

Ἀλλὰ δὴ ἔστω ὡς ἡ $ΒΔ$ πρὸς τὴν $ΔΓ$ οὕτως ἡ $ΒΑ$ πρὸς τὴν $ΑΓ$, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ $ΑΔ$ λέγω οὖν διχα τέμνεται ἡ ὑπὸ $ΒΑΓ$ γωνία ὑπὸ τῆς $ΑΔ$ εὐθείας.

Τῶν γὰρ αὐτῶν κατασκευασθέντων, ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ $ΒΔ$ πρὸς τὴν $ΔΓ$ οὕτως ἡ $ΒΑ$ πρὸς τὴν $ΑΓ$, ἄλλα καὶ ὡς ἡ $ΒΔ$ πρὸς τὴν $ΔΓ$ οὕτως ἐστὶν ἡ $ΒΔ$ πρὸς τὴν $ΑΕ$ τριγώνου γὰρ τοῦ $ΒΓΕ$ παρὰ μίαν τῶν πλευρῶν τὴν $ΕΓ$ ἤκται ἡ $ΑΔ$ καὶ ὡς ἄρα ἡ $ΒΔ$

(Fig. 345.), si angulus exterior ZAB bisecetur recta $AΘ$, hac ipsa recta cum basi $BΓ$ producta ad eam partem, ad quam est crux minus AB , concurret in puncto aliquo H . Nam, quoniam angulus $ZAB = Γ + ABΓ$ (I. 32.), at $ABΓ > Γ$ (I. 18.) erit

$ZAB < 2ABΓ$, adeoque $ΘAB = \frac{ZAB}{2} < ABΓ$, et $ΘAB + ABH < ABΓ + ABH < 2$ rect. (I. 13.) unde $ΘA$, BH ex hac parte concurrent (I. Post. 5.). Pflaiderer. §§. 47. 48.

Obs. 7. Recta $AΘ$, quae angulum externum ZAB trianguli non aequicruri bisecat, cum basi ad partem cruris minoris productam concurret (Obs. 6.) et ita quidem, ut segmenta in ipsa inter punctum hoc concursus et terminos basis abscissa BH , $ΓH$ eandem habeant rationem, quam trianguli crura BA , FA quibus adjacent. Abscindatur enim ab $ΑΓ$ recta $ΑΕ = AB$, et iungatur BE , eritque angulus $ZAB = ABE + AEB$ (I. 32.)

ipsi AET est aequalis; quare et latus AE lateri AT est aequale (I. 6.). Et quoniam uni laterum trianguli BTE nempe ET parallela ducta est AD ; erit (VI. 2.) ut BA ad AT ita BA ad AE . Aequalis autem est AE ipsi AT ; ut igitur BA ad AT ita BA ad AT .

Sed sit ut BA ad AT ita BA ad AT ; et iungatur AD ; dico bifariam sectum esse angulum BAT ab AD recta.

Hisdem enim constructis, quoniam est ut BA ad AT ita BA ad AT , sed et ut BA ad AT ita est BA ad AE (VI. 2.); trianguli enim BTE uni lateri ET parallela ducta est AD ; erit igitur BA ad AT ita BA ad AE ; aequalis igitur AT ipsi AE (V. 9.); quare

$\angle ABE$ (I. 5.), adeoque $\angle ABH = \left(\frac{\angle ABH}{2}\right) ABE$, et AH parallela rectae BE (I. 27.), adeoque $BH:GH = AE:AT$ (Obs. 2. ad VI. 2.) $= AB:AT$ (V. 11.). Vicissim, si $BH:GH = AB:AT$, iuncta AH angulum ZAB bisecabit. Rursus enim, facta $AE = AB$, iunctaque BE , erit $BH:GH = AE:AT$ (V. 11.), adeoque rectae AH , BE parallelae (VI. 2. Obs. 3.), proinde angulus $\angle ABH = \angle ABE$ (I. 29.), et $\angle ZAH = \angle AEB$ (I. 29.), adeoque, ob $\angle ABE = \angle AEB$ (I. 5.), etiam $\angle ABH = \angle ZAH = \angle ZAB$

2. Cf. Pfeiderer. I. c. §. 48.

Obs. 8. Poterat autem inberi, ut recta BE rectae AH parallela agatur, et demonstratio eodem modo absolvi ac in textu elementorum VI. 3., atque hac ratione rem efficiunt Rob. Simson. in Prop. A. post VI. 3. inserta, quae idem enunciat, quod praecedens Obs. 7., ac Playfair. Et Simson. qui

πρὸς τὴν $ΑΓ$ οὕτως ἢ $ΒΑ$ πρὸς τὴν $ΑΕ$ ἴση ᾗτε ἡ $ΑΓ$ τῇ $ΑΕ$, ὥστε καὶ γωνία ἡ ὑπὸ $ΑΕΓ$ γωνία τῇ ὑπὸ $ΑΓΕ$ ἐστὶν ἴση. Ἀλλ' ἡ μὲν ὑπὸ $ΑΕΓ$ ἐκτὸς τῇ ὑπὸ $ΒΑΔ$ ἴση, ἡ δὲ καὶ ἡ ὑπὸ $ΑΓΕ$ ἐναλλαξ τῇ ὑπὸ $ΓΑΔ$ ἐστὶν ἴση· καὶ ἡ ὑπὸ $ΒΑΔ$ ᾗτε τῇ ὑπὸ $ΓΑΔ$ ἐστὶν ἴση. Ἡ ἄρα ὑπὸ $ΒΑΓ$ γωνία διχα τέτμηται ὑπὸ τῆς $ΑΔ$ εὐθείας. Ἐάν ἄρα τραγώνου καὶ τὰ ἐξῆς.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ 8.

Τῶν ἰσογωνίων τριγώνων ἀνάλογόν εἰσιν αἱ πλευραὶ αἱ περὶ τὰς ἴσας γωνίας, καὶ ὁμόλογοι αἱ ὑπὸ τὰς ἴσας γωνίας ὑποτείνουσαι πλευραὶ.

dem monet: „casus secundus, qui habetur in Prop. A, puer utilis ac primus, tertiae propositioni additus est, videlicet is, quo angulus trianguli exterior bifariam secatur recta linea. Demonstratio eius simillima est demonstrationi primi casus, et ob hanc forsam causam tum ea, tum enuntiatio casus, omissa est ab Imperito quodam editore. Pappus certe hac tanquam propositione elementari (simul cum ipsa VI. 3.) utitur in VII. Prop. 39. Collect. Mathem.“ Utamque etiam propositionem, nempe VI. 3. et alteram ei similem Obs. 7. allatam uno enunciato complecti licet, quod et Playfair. notat Cf. Pfeiderer. l. c. §§. 49. 50.

Obs. 9. Quodsi simul angulus trianguli non aequicruri $ΒΑΓ$ (Fig. 346.) recta $ΑΔ$, et anguli externi $ΒΑΖ$ recta $ΒΘ$ bisecetur, angulus $ΑΑΘ$, quem rectae $ΑΔ$, $ΑΘ$ efficiunt, rectus erit. Nam, quum $ΒΑΖ + ΒΑΓ = 2$ Rect. (I. 13. erit $ΘΑΔ = \left(\frac{ΒΑΖ}{2} + \frac{ΒΑΓ}{2} \right)$ Recto. Quodsi super eadem basi $ΒΓ$ aliud triangulum $αΒΓ$ constitutum sit, cuius crura eandem inter rationem habent, quam crura trianguli $ΑΒΓ$, ita, ut sit $αΒ : αΓ = ΑΒ : ΑΓ$, et bisecetur etiam huius trianguli angulus ad verticem $ΒαΓ$, et qui ei deinceps est, $ζαΒ$, rectae hos angulos bisecant.

et angulus AET angulo AFE est aequalis (I. 5.) Sed
 AET exteriori BAA aequalis (I. 29.); AFE vero al-
 tero TAA est aequalis; angulus BAT igitur angulo
 TAA est aequalis. Itaque angulus BAT bifariam se-
 cutus est ab AA recta. Si igitur trianguli etc.

PROPOSITIO IV. (Fig. 347.)

Aequiangulorum triangulorum proportionalia sunt la-
 tera circa aequales angulos; et homologa, quae aequa-
 les angulos subtendunt, latera.

tes ad eadem puncta A , H baseos ipsius et productae vergent,
 ad quae rectae AA , AH , quae angulos BAT , ZAA bifariam
 secant. Si enim fieri potest, recta v. c., quae angulum BAT
 bifariam secat, secet basin in puncto K , quod a A diversum
 sit, eritque ex VI. 3. $BK:TK=Ba:Ta=BA:TA$ (supp.)
 $=BA:TA$ (VI. 3.), adeoque erit $BT:TK=BT:TA$ (V. 18.),
 et $TK=TA$ (V. 9.), quod est absurdum. Et eodem modo
 res de recta, quae angulum zAB bifariam secat, probatur.

Obs. 10. Quum rectae Ha , Aa pariter inter se rectum
 angulum efficiant, idemque obtineat in omnibus triangulis non
 aequicruris super eadem basi BT constitutis, quorum crura
 eandem inter se rationem habent, vertices omnium eiusmodi
 triangulorum erunt in semicirculo super HA descripto, sive
 iste semicirculus erit locus geometricus verticum omnium tri-
 angulorum, quorum basis est BT , et quorum crura eandem
 inter se rationem habent, quam habet AB ad AT (III. 31.
 Cor. 2.). Cf. Apollon. Loc. Plan. II, Loc. 2. De triangulis
 aequicruris vide I. 26. Cor. 6.

Obs. 11. Quum sit (Obs. 7.) $BH:TH=AB:AT$ vel
 $BH:TH=(\frac{TA}{HA-BH}):(\frac{TA}{TH-HA})$ rectae HB , HA , HI

Ἐστω ἰσογώνια τρίγωνα τὰ $ABΓ$, $ΔΙΕ$ ἴσην ἔχοντα τὴν μὲν ὑπὸ $ΒΑΓ$ γωνίαν τῇ ὑπὸ $ΓΔΕ$, τὴν δὲ ὑπὸ $ΑΓΒ$ τῇ ὑπὸ $ΔΕΓ$, καὶ ἔτι τὴν ὑπὸ $ΑΒΓ$ τῇ ὑπὸ $ΔΓΕ$. λέγω ὅτι τῶν $ΑΒΓ$, $ΔΓΕ$ τριγώνων ἀτάλογόν εἰσιν αἱ πλευραὶ αἱ περὶ τὰς ἴσας γωνίας, καὶ ὁμόλογοι αἱ ὑπὸ τὰς ἴσας γωνίας ὑποτείνονται πλευραί.

Κείσθω γὰρ ἐπ' εὐθείας ἡ $ΒΓ$ τῇ $ΓΕ$. Καὶ ἐπεὶ αἱ ὑπὸ $ΑΒΓ$, $ΑΓΒ$ γωνίαι δύο ὀρθῶν ἐλάσσονες εἰσιν, ἴση δὲ ἡ ὑπὸ $ΑΓΒ$ τῇ ὑπὸ $ΔΕΓ$, αἱ ἄρα ὑπὸ $ΑΒΓ$, $ΔΕΓ$ δύο ὀρθῶν ἐλάσσονες εἰσιν· αἱ $ΒΑ$, $ΕΔ$ ἄρα ἐκβαλλόμεναι συμπεσούσινται. Ἐκβεβλήσθωσαν, καὶ συμπιπτέτωσαν κατὰ τὸ $Ζ$.

erunt harmonice continue proportionales. Cf. dicta ad lib. V. Defin. 8. Et conversa quoque facile demonstrabitur, nempe, si sit $HB:HT=BA:GA$, fore etiam $AB:AG=HA:GA=HB:HT$, et rectam AA angulum BAI' pariterque rectam AA angulum ZAH bisecare.

PROPOSITIO IV.

Obs. 1. Triangula, qualia in hac propositione occurrunt, vel (I. 32. Cor. 3.) quorum duo saltem anguli unius duobus alterius, singuli singulis aequales sunt, iuxta VI. Def. 1. similia dicuntur. Propositiones itaque IV. 2. et IV. 3. docent circulo dato inscribere et circumscribere triangulum simile dato. Cf. Pflaiderer. l. c. §§. 54. 59. Quum autem in triangulis in hac propositione occurrentibus latera, quae angulis aequales subtendunt, homologa dicuntur, id ex V. Def. 12. dicere vult, esse $AB:BF=AG:GE$, et $BF:AG=GE:AE$, et $AB:AG=AG:AE$, unde et alterne sequitur, $AB:AE=BF:GE=AG:AE$, vel, quam rationem habeant duo duorum triangulorum aequiangulorum latera, aequalibus angulis op-

Sint æquiangula triangula $AB\Gamma$, ΔFE , æqualem habentia angulum $BA\Gamma$ angulo $\Gamma\Delta E$, angulum vero ΓAB angulo ΔEF , et præterea angulum $AB\Gamma$ angulo ΔFE ; dico triangulorum $AB\Gamma$, ΔFE proportionalia esse latera circa æquales angulos; et homologa, quæ æquales angulos subtendunt, latera.

Ponatur enim $B\Gamma$ in directum ipsi ΓE Et quoniam anguli $AB\Gamma$, ΓAB duobus rectis minores sunt (I. 17.), æqualis autem ΓAB ipsi ΔEF , anguli igitur $AB\Gamma$, ΔEF duobus rectis minores sunt; rectæ igitur BA , EA productæ convenient (I. Post. 5.) Producantur, et convenient in Z .

posita, eandem habere bina illorum reliqua latera æqualibus angulis opposita, et (V. 12.) perimetros utriusque trianguli Cf. Pflleiderer. l. c. §§. 51. 52.

Obs. 2. Recta, quæ in triangulo parallela ducitur uni eius lateri, abscindit (I. 29.) triangulum simile toti (Pflleiderer. l. c. §. 60. Clavius VI. Cor. 4. alii.). Recta hæc æ habet ad latus trianguli, cui est parallela, uti segmentum alterutrius reliquorum trianguli laterum ipsam inter et verticem anguli oppositi comprehensum est ad hoc latus (Pflleiderer. l. c. §. 61.). Eadem per rectas ex vertice trianguli opposito ductas in eadem ratione secatur, ac basis trianguli, seu latus eius, cui est parallela (Pflleiderer. l. c. §. 62. Clavius in Schol. ad IV. 4. Theor. 2.). Quod idem valet, si recta trianguli lateri parallela secat eius reliqua latera producta (Pflleiderer. l. c. §. 63. sq.). Denique, si trianguli alicuius lateri plures rectæ parallelæ ducuntur, quæ cum reliquis lateribus trianguli convenient, erunt hæc omnes inter se, ut homologa crura triangulorum a parallelis his abscissorum.

Obs. 3. Praemissa IV. 4. Prop., quæ non pendet a VI. 3. facile etiam VI. 3. et quæ ei adiecta fuit similis propositio VI. 3.

Καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ $\Delta Γ Ε$ γωνία τῇ ἐν
 $Α Β Γ$, παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ $Β Ζ$ τῇ $Γ Δ$. Πάλιν
ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ $Α Γ Β$ τῇ ὑπὸ $Δ Ε Γ$, παράλλη-
λος ἐστὶν ἡ $Α Γ$ τῇ $Ζ Ε$ παραλληλόγραμμον ἔσται το
 $Ζ Α Γ Δ$. ἴση ἄρα ἡ μὲν $Ζ Α$ τῇ $Δ Γ$, ἡ δὲ $Α Γ$ τῇ $Ζ Δ$.
Καὶ ἐπεὶ τριγώνου τοῦ $Ζ Β Ε$ παρὰ μίαν τῶν πλευρῶν τῆς
 $Ζ Ε$ ἤκται ἡ $Α Γ$, ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ $Β Α$ πρὸς τὴν $Α Ζ$
οὕτως ἡ $Β Γ$ πρὸς τὴν $Γ Ε$. Ἰση δὲ ἡ $Α Ζ$ τῇ $Γ Δ$
ὡς ἄρα ἡ $Β Α$ πρὸς τὴν $Γ Δ$ οὕτως ἡ $Β Γ$ πρὸς τὴν
 $Γ Ε$, καὶ ἐναλλάξ ὡς ἡ $Α Β$ πρὸς τὴν $Β Γ$ οὕτως ἡ
 $Δ Γ$ πρὸς τὴν $Γ Ε$. Πάλιν, ἐπεὶ παράλληλος ἐστὶν
ἡ $Γ Δ$ τῇ $Β Ζ$, ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ $Β Γ$ πρὸς τὴν $Γ Ε$
οὕτως ἡ $Ζ Δ$ πρὸς τὴν $Δ Ε$. Ἰση δὲ ἡ $Ζ Δ$ τῇ $Α Γ$
ὡς ἄρα ἡ $Β Γ$ πρὸς τὴν $Γ Ε$ οὕτως ἡ $Α Γ$ πρὸς τὴν
 $Ε Δ$, ἐναλλάξ ἄρα ὡς ἡ $Β Γ$ πρὸς τὴν $Γ Δ$ οὕτως ἡ

Obs. 7. ita probari potest. Si recta $Α Δ$ (Fig. 348.) bifariam dividat
angulum $Β Α Γ$ trianguli non æquicruri $Α Β Γ$, erit $Α Β : Α Γ =$
 $Β Δ : Γ Δ$. Demittantur enim ex $Β, Γ$ in $Α Δ$ perpendiculara $Β Δ$,
 $Γ Δ$, eruntque triangula $Β Α Δ, Γ Ο Δ$ æquiangula, pariterque
triangula $Β Α Α, Γ Ο Α$, unde erit $Β Α : Α Γ = Β Δ : Γ Δ = Β Δ : Γ Δ$
(VI. 4.). Ita rem demonstrat Thom. Simpson. (Elem. of
Geom. IV. 18.). Et similiter res de recta, quæ angulum ex-
ternum bifariam secat, demonstratur.

Obs. 4. Si (Fig. 349.) latera $Β Γ, Α Γ$ trianguli $Α Β Γ$
bifariam secantur per rectas $Α Δ, Β Ε$ ex verticibus angulorum
oppositorum $Α, Β$ ductas; recta quoque $Γ Ζ$ ex tertii anguli $Γ$
vertice ducta per punctum sectionis $Θ$ duarum $Α Δ, Β Ε$ bifariam
secat tertium trianguli latus $Α Β$. Quippe ob $Β Δ = Α Γ, Ε Α = Ε Γ$,
utrunque triangulum $Α Β Δ, Β Α Ε$ dimidium est trianguli $Α Β Γ$
(I. 38. vel VI. 1.): igitur triang. $Α Β Δ =$ triang. $Β Α Ε$, demo-
que communi triang. $Α Β Θ$, erit triang. $Β Δ Θ =$ triang. $Α Θ Ε$,
pariterque 2 triang. $Β Δ Θ = 2$ triang. $Α Θ Ε$, h. e. ob $Β Δ = Α Γ$,
et $Α Ε = Ε Γ$, triang. $Γ Β Θ =$ triang. $Γ Θ Α$ (I. 38. vel VI. 1.).

Et quoniam aequalis est angulus $\angle FE$ angulo $\angle ABF$, parallela igitur est BZ ipsi FA (I. 28.). Rursus, quoniam aequalis est $\angle AFB$ ipsi $\angle AEF$, parallela est AF ipsi ZE ; parallelogrammum igitur est $ZAFA$; aequalis igitur ZA ipsi AF (I. 34.), AF vero ipsi ZA . Et quoniam uni laterum trianguli ZBE nempe ZE ducta est parallela AF , est ut BA ad AZ ita BF ad FE . (VI. 2.). Aequalis autem AZ ipsi FA ; ut igitur BA ad FA ita BF ad FE (V. 7.), et alterne (V. 16.) ut AR ad BF ita AF ad FE . Rursus, quoniam parallela est FA ipsi BZ , est igitur ut BF ad FE ita ZA ad AE (VI. 2.). Aequalis autem ZA ipsi AF ; ut igitur BF ad FE ita AF ad EA (V. 7.), alterne igitur (V. 16.) ut BF ad FA ita FE ad EA . Et quoniam ostensum est, ut AB quidem ad

Atqui tam triang. $F\theta\theta$:triang. FBZ)= $F\theta$: FZ (VI. 1.). Ergo quam triang. $F\theta A$:triang. FAZ)= $F\theta$: FZ (VI. 1.). Ergo (V. 11.) triang. $F\theta\theta$:triang. FBZ = triang. $F\theta A$:triang. FAZ , et hinc (V. 14.) triang. FBZ = triang. FAZ , ac (I. 38. conv.). $BZ=AZ$. Cf. Pfeiderer, l. c. §. 66.

Obs. 5. Tres rectae, quae ex singulorum trianguli cuiuscunque ABF angulorum verticibus A , B , F (Fig. 350.) ducuntur ad puncta A , E , Z laterum oppositorum, ubi haec bifariam dividuntur, in eodem intra triangulum puncto se secant. Duas enim AA , BE , quae se in puncto θ secant, trahat, si fieri potest, tertia FZ in punctis K , H . Per puncta F , θ agatur recta $F\theta A$. Cum haec bifariam secet latus AF in puncto A , ubi ei occurrit (Obs. 4.), atque hoc non coincidere possit cum puncto Z (I. Post. 6.): foret AB bifariam secta in duobus punctis Z , A , quod fieri nequit (I. 9. I. 7. Ax.). Cf. Pfeiderer, l. c. §. 67.

Obs. 6. Eaedem tres rectae (Fig. 349.) ita se in puncto communi θ secant, ut segmentum cuiuslibet adiacens lateri trianguli, eiusdemque segmentum adiacens vertici anguli op-

GE πρὸς τὴν EA . Καὶ ἐπεὶ ἰδείσθῃ ὡς μὲν ἡ AB πρὸς τὴν BF οὕτως ἡ AG πρὸς τὴν GE , ὡς δὲ ἡ BF πρὸς τὴν GA οὕτως ἡ GE πρὸς τὴν EA καὶ δάσκει ἄρα ὡς ἡ BA πρὸς τὴν AG οὕτως ἡ GA πρὸς τὴν AE . Τῶν ἄρα ἰσογωνίων καὶ τὰ ἐξῆς.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ι.

Ἐάν δύο τρίγωνα τὰς πλευρὰς ἀνάλωγον ἔχῃ, ἰσώνια ἔσται τὰ τρίγωνα καὶ ἴσας ἔξει τὰς γωνίας, ὅφ' αἱ αἱ ὁμόλογοι πλευραὶ ὑποτείνουσιν.

Ἐστω δύο τρίγωνα τὰ $ABΓ$, $ΔΕΖ$ τὰς πλευρὰς ἀνάλωγον ἔχοντα, ὡς μὲν τὴν AB πρὸς τὴν BF οὕτως τὴν $ΔΕ$ πρὸς τὴν $ΕΖ$, ὡς δὲ τὴν BF πρὸς τὴν $ΓΑ$ οὕτως τὴν $ΕΖ$ πρὸς τὴν $ΖΔ$, καὶ εἴτι ὡς τὴν BA πρὸς τὴν $ΑΓ$ οὕτως τὴν $ΕΔ$ πρὸς τὴν $ΔΖ$: λέγω ὅτι ἰσογώνιον ἐστὶ τὸ $ABΓ$ τρίγωνον πρὸς $ΔΕΖ$ τρίγωνον.

positi, ac tota recta sint uti 1:2:3; triangulum vero in sex triangula aequalia dividunt; ad punctum autem sectionis communis usque tantum ductae triangulum dividunt in tria aequalia. Nempe 1) ob $BA:AG=AE:EG=BE:EA$ (supp. et V. 5. Def.), sunt AE et AB , AG et AG parallelae (VI. 2.). Quare (I. 15. et I. 29.) triangula ABE et ABG , AGE et AGB sunt aequiangula, adeoque $AE:EA =$

$$\left(\frac{GE:EB=AE:AB \text{ (VI. 4.)} = AG:BG \text{ (VI. 4. 2. Obs.)}}{\frac{GE:EG=AE:AE} = BA:BG} \right) =$$

$$1:2 \text{ et } AE:EA:AA=GE:EB:BE=GE:EG:GI=1:2:3 \text{ (V. 18.)}$$

$$2) \triangle ABE = \triangle AGE \text{ (Obs. 4. Dem.)} = \triangle AG = \triangle EG \text{ (I. 38.) et triang. } \left(\frac{GE:EB:GB}{GE:EA:GA} \right) = GE:EG \text{ (VI. 1.)} = 1:2 \text{ (nr. 1.)}$$

$$\text{itaque } \frac{GE:EB=GE:GB}{GE:EA=GE:GA} \text{ et pariter } \frac{GE:EB=GE:GB}{GE:EA=GE:GA}$$

$$3) \triangle ABE = \triangle AG \text{ (Obs. 4. Dem.) et } \triangle ABE = \left(\frac{GE:EB}{GE:EA} \right)$$

$$\text{(I. 38.)} = \left(\frac{GE:GB}{GE:GA} \right) \text{ (nr. 2.)}. \text{ Cf. Pfeleiderer. l. c. §. 68.}$$

BF ita AF ad FE ; ut vero BF ad FA ita FE ad EA ; et ex aequo igitur (V. 22.) ut BA ad AF ita FA ad AE . Aequiangulorum igitur etc.

PROPOSITIO V. (Fig. 351.)

Si duo triangula latera proportionalia habeant, aequiangula erunt triangula; et aequales habebunt angulos, quos homologa latera subtendunt.

Sint duo triangula ABF , AEZ latera proportionalia habentia, sitque ut AB quidem ad BF ita AE ad EZ , ut BF vero ad FA ita EZ ad ZA ; et adhuc ut BA ad AF ita EA ad AZ ; dico aequiangulum esse triangulum ABF triangulo AEZ , et aequales habere angulos, quos homologa latera subtendunt.

Obs. 7. Cum in triangulis aequilateris rectae bifariam dividentes angulos bifariam quoque secant latera opposita, et vicissim (I. 4. I. 8.); liquet identitas conclusionum (Obs. 4. ad VI. 3. et VI. 4. Obs. 6.) ad ipsa applicatarum. Eademque per rectas AA , BB , IZ in sex, per rectas $A\theta$, $B\theta$, $F\theta$ in tria triangula similia et aequalia dividuntur. Cf. Pfleiderer. l. c. §. 69.

Obs. 8. Vicissim, si recta AA ab vertice aliquo trianguli ad punctum bisectionis lateris oppositi A ducta ita secatur in θ , ut segmentum ipsius $A\theta$ adiacens vertici trianguli duplum sit alterius segmenti $\theta\theta$ adjacentis lateri opposito trianguli; ceterae etiam rectae per punctum θ huius sectionis ex verticibus trianguli ductae bifariam latera iis opposita secant.

Ductis nempe rectis $B\theta E$, AE , erunt triangula $BA\theta = 2B\theta\theta$
 $EA\theta = 2E\theta\theta$

(VI. 1.) igitur $\triangle BAE = 2\triangle BAE$. Sed ob $BI = 2BA$ (supp.) etiam $\triangle BIE = 2\triangle BAE$ (VI. 1.). Quare $\triangle BAE = \triangle BIE$.

καὶ ἴσας ἔχουσι τὰς γωνίας, ὅφ' αὖς ὁμολογοὶ πλευραὶ ὑποτείνουσι, τὴν μὲν ὑπὸ $ABΓ$ τῇ ὑπὸ $ΔΕΖ$, τὴν δὲ ὑπὸ $ΒΓΑ$ τῇ ὑπὸ $ΕΖΔ$, καὶ εἰ τὴν ὑπὸ $ΒΑΓ$ τῇ ὑπὸ $ΕΔΖ$.

Συνεστάτω γάρ πρὸς τῇ EZ εὐθείᾳ, καὶ τοῖς πρὸς αὐτῇ σημείοις τοῖς E, Z , τῇ μὲν ὑπὸ $ABΓ$ γωνία ἴση ἡ ὑπὸ ZEH , τῇ δὲ ὑπὸ $ΒΓΑ$ ἴση ἡ ὑπὸ EZH . λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ $ΒΑΓ$ λοιπῇ τῇ ὑπὸ $ΕΗΖ$ ἐστὶν ἴση.

Ἰσογώνιον ἄρα ἐστὶ τὸ $ABΓ$ τρίγωνον τῷ $ΕΗΖ$ τριγώνῳ· τῶν ἄρα $ABΓ, ΕΗΖ$ τριγώνων ἀνάλογον εἰσιν αἱ πλευραὶ αἱ περὶ τὰς ἴσας γωνίας, καὶ ὁμολογοὶ αἱ ὑπὸ τὰς ἴσας γωνίας πλευραὶ ὑποτείνουσιν· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ AB πρὸς τὴν $ΒΓ$ οὕτως ἡ HE πρὸς τὴν EZ . Ἀλλ' ὡς ἡ AB πρὸς τὴν $ΒΓ$ οὕτως ὑποκείται ἡ $ΔΕ$ πρὸς τὴν EZ · ὡς ἄρα ἡ $ΔΕ$ πρὸς τὴν EZ οὕτως ἡ HE πρὸς τὴν EZ · ἐκότερα ἄρα τῶν $ΔΕ, HE$ πρὸς τὴν EZ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ $ΔΕ$ τῇ HE . Διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ $ΔΖ$

et hinc (I. 38. conv.) $AB=HE$. Similiterque ostenditur, vel nunc ex Obs. 4. inferitur, ducta $ΓOZ$ recta fieri etiam $AZ=BZ$. Cf. Pflaiderer. I. c. §; 70.

Obs. 9. Pariter, si tres rectae OA, OB, OG ab puncto O intra triangulum ad vertices angulorum eius ductae triangulum in tria aequalia dividunt; rectae hae ad latera usque trianguli opposita continuatae bifariam ea dividunt. Est enim (VI. 1.) $\triangle AOB: \triangle OAB=AO:OA=\triangle OAG: \triangle OG$. Quare, ob $\triangle AOB=\triangle OAG$ (supp.), etiam $\triangle OAB=\triangle OG$ (V. 14.) et hinc (I. 38. conv.) $BA=GA$. Et similiter in reliquis. Cf. Pflaiderer. I. c. §. 71.

PROP. V. VI.

Obs. 1. Propositiones hae conversae sunt praecedentis quartae, atque uti haec propositioni I. 26. ita illae propositioni-

dunt, angulum quidem $AB\Gamma$ angulo ΔEZ , angulum vero $B\Gamma A$ angulo EZA ; et insuper angulum $BA\Gamma$ angulo EAZ .

Constituatur enim (I. 23.) ad rectam EZ , et ad puncta in ea E , Z , angulo quidem $AB\Gamma$ aequalis ZEH , angulo vero $B\Gamma A$ aequalis angulus EZH ; reliquus (I. 32.) igitur $BA\Gamma$ reliquo EHZ est aequalis.

Aequiangulum igitur est triangulum $AB\Gamma$ triangulo EHZ ; triangulorum igitur $AB\Gamma$, EHZ proportionalia sunt latera (VI. 4.), circum aequales angulos, et homologa latera aequales angulos subtendunt; est igitur ut AB ad $B\Gamma$ ita HE ad EZ . Sed ut AB ad $B\Gamma$ ita ponitur ΔE ad EZ ; ut igitur ΔE ad EZ ita HE ad EZ (V. 11.); utraque igitur ipsarum ΔE , HE ad EZ eandem habet rationem; aequalis igitur est ΔE ipsi HE (V. 9.). Ex eadem ratione et ΔZ ipsi HZ aequalis est. Et quoniam aequalis est ΔE

libris I. 8. I. 4. respondent, ad quas earum demonstrationes reducuntur, et sub quarum conditionibus triangula similia et aequalia sunt. Cf. Pfeiderer. l. c. §. 72.

Obs. 2. Sub quintae conditionibus similia esse triangula propositio haec aequae immediate ac quarta efficit: positis autem sextae conditionibus, mediante quarta demum proportionalitas reliquorum circa angulos aequales laterum, ad triangulorum similitudinem per VI. 1. Def. requisita, colligitur. Cf. Pfeiderer. l. c. §. 73.

Obs. 3. Ope sextae demonstrantur conversae nonnullarum propositionum, quae Obs. 2. ad VI. 4. comprehenduntur, nempe quod, sumtis (Fig. 338. 339.) in eadem recta tribus punctis A , B , Δ , et per duo eorum B , Δ ductis duabus parallelis $B\Gamma$, ΔE ad easdem (vel oppositas) rectae illius partes,

τῇ HZ ἐστὶν ἴση. Ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ ΔE τῇ EH , κοινὴ δὲ ἡ EZ , δύο δὲ αἱ ΔE , EZ ὁσοὶ ταῖς HE , EZ ἴσαι εἰσὶ, καὶ βάσεις ἡ ZA βάσει τῇ ZH ἐστὶν ἴση· γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ ΔEZ γωνία τῇ ὑπὸ HEZ ἐστὶν ἴση. Καὶ τὸ ΔEZ τρίγωνον τῷ HEZ τριγώνῳ ἴσον, καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι ταῖς λοιπαῖς γωνίαις ἴσαι, ἐφ' ὧς αἱ ἴσαι πλευραὶ ὑποτείνουσιν· ἴση ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΔZE γωνία τῇ ὑπὸ HZE , ἡ δὲ ὑπὸ $E\Delta Z$ τῇ ὑπὸ EHZ . Καὶ ἐπεὶ ἡ μὲν ὑπὸ $Z\Delta E$ τῇ ὑπὸ ZEH ἐστὶν ἴση, ἀλλ' ἡ ὑπὸ HEZ τῇ ὑπὸ $AB\Gamma$ ἐστὶν ἴση· καὶ ἡ ὑπὸ $AB\Gamma$ ἄρα γωνία τῇ ὑπὸ ΔEZ ἐστὶν ἴση. Διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ἡ ὑπὸ $AB\Gamma$ τῇ ὑπὸ ΔZE ἐστὶν ἴση, καὶ ἔτι ἡ πρὸς τῷ A τῇ πρὸς τῷ Δ ἰσογώνιον ἄρα ἐστὶ τὸ $AB\Gamma$ τρίγωνον τῷ ΔEZ τριγώνῳ. Ἐὰν ἄρα δύο καὶ τὰ ἐξ ἧς.

Π Ρ Ο Τ Α Σ Ι Σ ζ'.

Ἐὰν δύο τρίγωνα μίαν γωνίαν μὴ γωνίᾳ ἴσην ἔχῃ, περὶ δὲ τὰς ἴσας γωνίας τὰς πλευρὰς ἀνέλογον

prouti puncta B , Δ in ea iacent ad eandem (vel oppositam) partes puncti A , sic, ut sit $B\Gamma : \Delta E :: AB : \Delta\Delta$, puncta A , F , E pariter iaceant in directum. Iunctis enim AF , AE rectis, ob angulum $AB\Gamma = \Delta\Delta E$ (I. 29.) et $B\Gamma : \Delta E :: AB : \Delta\Delta$ (supp.) est angulus $BAF = \Delta\Delta E$ (VI. 6.), ideoque priori casui rectarum AF , AE una in alteram incidit (Conv. I. 8. Ax.); posteriori eadem rectae in directum sibi invicem sunt (Conv. I. 15.). Clavius posteriorius eodem modo, prius indirecte demonstrat. Cf. Pfeleiderer. l. c. §. 76.

Obs. 4. Sint (Fig. 353.) AB , FA parallelae, et O , Π rectae quaecunque inaequales. Utrumque a punctis E , Z in parallelis ubicunque sumtis, abscondantur in priore $ZH = Z\eta = O$, in posteriore $E\theta = E\vartheta = \Pi$, ita ut puncta H , θ sint ex una rectae EZ parte, η , ϑ ex altera: tres rectae EZ , θH , $\vartheta \eta$ in

ipsi EH , communis autem EZ ; duae AE , EZ duabus HE , EZ aequales sunt, et basis ZA basi ZH est aequalis; angulus igitur AEZ angulo HEZ est aequalis (I. 8.). Et triangulum AEZ triangulo HEZ aequale, et reliqui anguli reliquis angulis aequales, quos aequalia latera subtendunt; aequalis igitur est et angulus quidem AZE ipsi HZE , angulus vero EAZ ipsi EHZ . Et quoniam angulus quidem ZEA ipsi ZEH est aequalis, sed HEZ ipsi ABF est aequalis, et ABF igitur angulus ipsi AEZ est aequalis (I. Ax. 1.). Ex eadem ratione angulus ABF ipsi AZE est aequalis, et insuper angulus ad A ipsi ad A ; aequiangulum igitur est triangulum ABF triangulo AEZ . Si igitur duo etc.

PROPOSITIO VI. (Fig. 352.)

Si duo triangula unum angulum uni angulo aequalem habeant, circa aequales autem angulos latera pro-

eodem extra parallelas puncto K concurrent: et, si duo segmenta ZN , EM ad eandem rectae EZ partes ab parallelis AB , GA abscissae sunt, ita ut sit $ZN:EM=O:H$, recta quoque NM , altera eorum extrema N , M iungens per punctum K transibit. Quippe rectis EZ , GH se in puncto K secantibus (parallelae enim esse nequeunt, quodsi enim parallelae essent, foret $ZH=E\theta$ (I. 34.) i. e. $O=H$ contra supposit.) est (Obs. 2. ad VI. 4.) $ZH:E\theta=KZ:KE$. Sed ob $Z\eta=ZH$, $E\theta=E\theta$ est (V. 7. Cor.) $Z\eta:E\theta=ZH:E\theta$, ac (hyp. et V. 7. V. 11.) est $ZN:EM=O:H=ZH:E\theta$, ideoque (V. 11.) tam $Z\eta:E\theta=KZ:KE$, quam $ZN:EM=KZ:KE$, et hinc (Obs. 3.) tam puncta η , θ , K , quam puncta N , M , K iacent in directu. Iisdem porro, quae supra, sumtis et factis (nisi quod rectae O , H nunc etiam possunt esse aequales): tres rectae EZ , HO ,

ἰσογώνια ἔσται τὰ τρίγωνα, καὶ ἴσας ἔξει τὰς γωνίας, ὑφ' αἷς αἱ ὁμόλογοι πλευραὶ ὑποτείνονται.

Ἐστω δύο τρίγωνα τὰ $ABΓ$, $ΔEZ$, μίαν γωνίαν τὴν ὑπὸ $BAΓ$ μιᾶ γωνίᾳ τῇ ὑπὸ EAZ ἴσην ἔχοντα, περὶ δὲ τὰς ἴσας γωνίας τὰς πλευρὰς ἀνάλογον, ὡς τὴν BA πρὸς τὴν $ΑΓ$ οὕτως τὴν EA πρὸς τὴν $ΔZ$. λέγω ὅτι ἰσογώνιον ἔστι τὸ $ABΓ$ τρίγωνον τῷ $ΔEZ$ τριγώνῳ, καὶ ἴσην ἔξει τὴν μὲν ὑπὸ $ABΓ$ γωνίαν τῇ ὑπὸ $ΔEZ$, τὴν δὲ ὑπὸ $ΑΓB$ τῇ ὑπὸ $ΔZE$.

Συνεστιάτω γάρ πρὸς μὲν τῇ $ΔZ$ εὐθείᾳ, καὶ τοῖς πρὸς αὐτῇ σημείοις τοῖς $Δ$, Z , ὁποῦνα μὲν τῶν ὑπὸ $BAΓ$, EAZ ἴση ἢ ὑπὸ $ZΔH$, τῇ δὲ ὑπὸ $ΑΓB$ ἴση ἢ ὑπὸ $ΔZH$.

Αὐτοπὴ ἄρα ἡ πρὸς τῷ B γωνία λοιπῇ τῇ πρὸς τῷ H ἴση ἔστιν ἰσογώνιον ἄρα ἔστι τὸ $ABΓ$ τρίγωνον τῷ $ΔHΖ$ τριγώνῳ ἀνάλογον ἄρα ἔστιν ὡς ἡ BA πρὸς τὴν $ΑΓ$ οὕτως ἡ HA πρὸς τὴν $ΔZ$. Ἐποικεῖται δὲ καὶ ὡς ἡ BA πρὸς τὴν $ΑΓ$ οὕτως ἡ EA πρὸς τὴν $ΔZ$ καὶ ὡς ἄρα ἡ EA πρὸς τὴν $ΔZ$ οὕτως ἡ HA πρὸς τὴν $ΔZ$ ἴση ἄρα ἡ EA τῇ HA , καὶ κοινὴ ἡ $ΔZ$ δύο δὴ αἱ EA , $ΔZ$ δυοὶ ταῖς HA , $ΔZ$ ἴσαι

et se in eodem intra parallelas puncto κ secabunt, et, si segmenta $Z\nu$, $E\mu$ ad alteras rectae EZ partes ab parallelis AB , ΓA abscissa sunt, ut O ad Π , recta etiam $\nu\mu$ altera eorum extrema iungens per punctum κ transibit, quod eodem modo demonstratur. Cf. Pfeiderer. I. c. §§. 77. 78.

Obs. 5. Quae in Obs. 4. vidimus, inserviunt solvendo problemati, quod in Loc. 1. et 2. Libri I. Apollonii de Sectione rationis habetur. Praeterea indē patet, in quadrilateris, quorum duo latera sunt parallela, rectam, quae haec latera bifariam dividit, et diagonales figurae in eodem intra quadrilaterum puncto se secare; et si altera duo latera parallela non

portionalia; aequiangula erunt triangula, et aequales habebunt angulos, quos homologa latera subtendunt.

Sint duo triangula ABF , AEZ , unum angulum BAF uni angulo EAZ aequalem habentia, circa aequales autem angulos latera proportionalia, ut BA ad AF ita EA ad AZ ; dico aequiangulum esse triangulum ABF triangulo AEZ , et aequalem habiturum esse angulum ABF quidem angulo AEZ , angulum vero AFB ipsi AZE .

Constituatur enim (I. 23.) ad rectam AZ , et ad puncta in ipsa A , Z , alterutri angulorum BAF , EAZ aequalis angulus ZAH , angulo vero AFB aequalis ipse AZH .

Reliquus igitur angulus ad B reliquo ad H aequalis est (I. 32.); aequiangulum igitur est triangulum ABF triangulo AHZ ; proportionaliter igitur est (VI. 4.) ut BA ad AF ita HA ad AZ . Ponitur autem et ut BA ad AF ita EA ad AZ ; ut igitur (V. 11.) EA ad AZ ita HA ad AZ ; aequalis igitur (V. 9.) EA ipsi HA , et communis AZ ; duae igitur EA , AZ duabus HA , AZ aequales sunt, et angulus EAZ angulo HAZ

sint, haec, atque rectam bifariam latera parallela dividentem in eodem extra figuram puncto concurrere; in parallelogrammis igitur diagonales, et rectas bina latera opposita bifariam dividentes eodem in puncto se secare: quod ita fieri alio modo ostenditur in demonstratione XI. 39. Cf. Pfeiderer. l. c. §§. 79—82.

Obs. 6. Perpendiculara e tribus angulis trianguli alicuius in latera opposita demissa in eodem puncto se intersecant. Sit (Fig. 354.) ABF triangulum, in quo duo perpendiculara ex oppositis angulis in latera AF , AB demissa se intersecant in puncto Z , iungatur AZ , et producatur, si opus est, usque dum

εἰσι, καὶ γωνία ἡ ὑπὸ EAZ γωνία τῇ ὑπὸ HAZ ἴση
 βάσει ἄρα ἡ EZ βάσει τῇ ZI ἴσιν ἴση, καὶ τὸ ΔEZ
 τρίγωνον τῷ ΔHZ τριγώνῳ ἴσον ἐστὶ, καὶ αἱ λοιπὴ
 γωνίαι ταῖς λοιπαῖς γωνίαις ἴσαι ἔσονται ἑκατέρω ἑκα-
 τέρα ¹⁾ ὑφ' ὧν αἱ ἴσαι πλευραὶ ὑποτείνονται. ἴση ἄρα
 ἐστὶν ἡ μὲν ὑπὸ ΔZH τῇ ὑπὸ AZE , ἡ δὲ ὑπὸ ΔHZ
 τῇ ὑπὸ AEZ . Ἀλλ' ἡ ὑπὸ ΔZH τῇ ὑπὸ AGB ἴση
 ἴση, καὶ ἡ ὑπὸ AGB ἄρα τῇ ὑπὸ AZE ἴσιν ἴση.
 Ὑποκειται δὲ καὶ ἡ ὑπὸ BAG τῇ ὑπὸ EAZ ἴση, καὶ
 λοιπὴ ἄρα ἡ πρὸς τῷ B λοιπὴ τῇ πρὸς τῷ E ἴση
 ἴσιν ἰσογώνιον ἄρα ἐστὶ τὸ ABG τρίγωνον τῷ ΔEZ
 τριγώνῳ. Ἐάν ἄρα δύο τρίγωνα καὶ τὰ ἐξῆς.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ζ.

Ἐάν δύο τρίγωνα μίαν γωνίαν μίᾳ γωνίᾳ ἴσην
 ἔχῃ, περὶ δὲ τὰς ἄλλας γωνίας τὰς πλευρὰς ἀνύλογον.
 τῶν δὲ λοιπῶν ἑκατέραν ἅμα ᾗτοι ἐλλείσονται, ἡ μὲν
 ἐλλείσονται ὀρθῶς ἰσογώνια ἔσονται τὰ τρίγωνα, καὶ ἴσες
 ἔξει τὰς γωνίας, περὶ ὧν ἀνύλογόν εἰσιν αἱ πλευραί.

1) Verba ἑκατέρω ἑκατέρω, quae Peyrardus consentiens
 Cod. a. omittit, ex edd. Oxon. et Basil. restituumus, quoniam
 alias etiam Euclidi solemne sit, verba propositionum antecor-
 dentium exacte citare, et in I. 4. haec verba expressa sint.

rectae BI occurrat in Θ , erit $A\Theta$ perpendicularis ad BI . Iun-
 gatur enim AE , et circa triangulum AEZ describatur circulus
 (IV. 5.), eritque, ob angulum rectum AEB , AZ diameter cir-
 culi (Obs. 1. ad III. 31.). Eodem modo ostendetur, AZ esse
 diametrum circuli circa triangulum AZA circumscripti: itaque
 puncta A , E , Z , A in circumferentia eiusdem circuli posi-
 unt. At ob angulum $EZB = AZI$ (I. 15.) et angulum BEZ
 $= IAZ$ (utroque enim rectus est), triangu-
 la BEZ , IAZ aequiangula, adeoque $BZ : EZ = IZ : AZ$ (VI. 4.), aut alterno

aequalis; basis igitur (I. 4.) EZ basi ZH est aequalis, et triangulum AEZ triangulo AHZ aequale est, et reliqui anguli reliquis angulis aequales erunt, alter alteri, quos aequalia latera subtendunt; aequalis igitur est AZH quidem ipsi AZE , angulus vero AHZ ipsi AEZ . Sed ipse AZH ipsi ATB est aequalis (constr.), et ATB igitur ipsi AZE est aequalis. Ponitur autem et BAF ipsi EAZ aequalis; et reliquus igitur ad B reliquo ad E aequalis (I. 32.); equiangulum igitur est triangulum ABF triangulo AHZ . Si igitur duo triangula etc.

PROPOSITIO VII. (Fig. 355.)

Si duo triangula unum angulum uni angulo aequalem habeant, circa alios autem angulos latera proportionalia, reliquorum vero utrumque simul vel minorem, vel non minorem recto; equiangula erunt triangula, et aequales habebunt angulos, circa quos proportionalia sunt latera.

$BZ:IZ=EZ:AZ$ (V. 16.). Quoniam igitur latera circa angulos aequales BZF , EZA sunt proportionalia, triangula BZF , AZE sunt equiangula (VI. 6.), adeoque angulus $ZFB=EAZ$. At $BAZ=EAZ$ (III. 21.): itaque $EAZ=ZFB=ZIG$. Praeterea autem et $EZA=OZF$ (I. 15.): itaque etiam $AHZ=ZOG$ (I. 32.), adeoque, quum AEZ rectus sit, rectus erit etiam ZOG , vel OG perpendicularis erit ad BF (Playfair. VI. Prop. H.). — Paullo brevius ita demonstratur, esse angulum $ZFB=EAZ$. Quum BEF sit rectus aequae ac BAF , ex Cor. 2. ad III. 21. semicirculus super diametro BF descriptus per E et A transibit, unde erit $ZFB=EAZ$ (III. 21.). Vid. Klügels Wörterb. I. Th. p. 925. et, qui ibi p. 926. laudatur, Eulerus in Nov. Commentar. Petrop. Tom. XI. a. 1765. — Addi po-

Ἐστω δύο τρίγωνα τὰ $ABΓ$, $ΔΕΖ$, μίαν γωνίαν
μία γωνία ἰσὴν ἔχοντα, τὴν ὑπὸ $ΒΑΓ$ τῇ ὑπὸ $ΕΔΖ$
ἡμεῖς δὲ ἄλλας γωνίας τὰς ὑπὸ $ΑΒΓ$, $ΔΕΖ$, τα-
πεινότερας ἀνάλογον, ὥς τὴν $ΑΒ$ πρὸς τὴν $ΒΓ$ οὕτως
τὴν $ΔΕ$ πρὸς τὴν $ΕΖ$, τῶν δὲ λοιπῶν τῶν πρὸς τοῖς
 $Γ$, $Ζ$ προτέριον ἐκατέρωθεν ἅμα ἐλάσσονα ὁρθῆς ὡς
ὅτι ἰσογώνιον ἐστὶ τὸ $ΑΒΓ$ τρίγωνον τῷ $ΔΕΖ$ τρι-
γώνῳ, καὶ ἴση ἐστὶ ἡ ὑπὸ $ΑΒΓ$ γωνία ἢ ὑπὸ $ΔΕΖ$
καὶ λοιπὴ δηλονότι ἡ πρὸς τῷ $Γ$ λοιπῇ τῇ πρὸς τῷ
 $Ζ$ ἴση.

Εἰ γὰρ ἄνισός ἐστιν ἡ ὑπὸ $ΑΒΓ$ γωνία τῇ ὑπὸ
 $ΔΕΖ$, μία αὐτῶν μείζων ἐστίν. Ἐστω μείζων ἡ
ὑπὸ $ΑΒΓ$ καὶ συνεστήτω πρὸς τῇ $ΑΒ$ εὐθείᾳ, κα-
τὰ πρὸς αὐτῇ σημειῶ τῷ $Β$, τῇ ὑπὸ $ΔΕΖ$ γωνίᾳ ἴση
ἡ ὑπὸ $ΑΒΗ$.

Καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ μὲν $Α$ γωνία τῇ $Δ$, ἡ δὲ ὑπὸ
 $ΑΒΗ$ γωνία τῇ ὑπὸ $ΔΕΖ$, λοιπὴ ἅρα ἡ ὑπὸ $ΑΗΒ$ ἴση
τῇ ὑπὸ $ΔΖΕ$ ἐστὶν ἴση· ἰσογώνιον ἅρα ἐστὶ τὸ $ΑΗΒ$
τρίγωνον τῷ $ΔΕΖ$ τριγώνῳ· ἐστὶν ἅρα ὥς ἡ $ΑΒ$ πρὸς
τὴν $ΒΗ$ οὕτως ἡ $ΔΕ$ πρὸς τὴν $ΕΖ$. Ὡς δὲ ἡ $ΔΕ$
πρὸς τὴν $ΕΖ$ οὕτως ὑπόκειται ἡ $ΑΒ$ πρὸς τὴν $ΒΓ$ καὶ
ὥς ἅρα ἡ $ΑΒ$ πρὸς τὴν $ΒΓ$ οὕτως ἡ $ΑΒ$ πρὸς τὴν

rerat: et vice versa, si $ΑΘ$ perpendicularis est ad $ΒΓ$, transire
debet per $Ζ$. Si enim non transeat, alia recta per $Α$ et $Ζ$
ducta ex demonstratione pariter erit ad $ΒΓ$ perpendicularis,
quod fieri nequit (I. 17. Cor. 4.).

PROPOSITIO VII.

Obs. 1. Rob. Simson, duobus hac propositione enun-
tatis casibus tertium addit „omissum, et in demonstrationibus
non raro occurrentem“ quo reliquorum angulorum alter sit
rectus. Demonstratio autem huius casus eadem fere est, quae

Sint duo trianguia $AB\Gamma$, ΔEZ , unum angulum uni angulo aequalem habentia, angulum nempe $B\hat{A}\Gamma$ angulo $E\hat{Z}Z$, circa alios autem angulos $AB\Gamma$, ΔEZ , latera proportionalia, ut AB ad $B\Gamma$ ita ΔE ad EZ , reliquorum vero ad Γ , Z primo utrumque simul minorem recto; dico aequiangulum esse triangulum $AB\Gamma$ triangulo ΔEZ , et aequalem fore angulum $AB\Gamma$ angulo ΔEZ , et reliquum nempe angulum ad Γ reliquo ad Z aequalem.

Si enim inaequalis est angulus $AB\Gamma$ angulo ΔEZ , unus ipsorum maior est. Sit maior $AB\Gamma$; et constituatur (I. 23.) ad rectam AB et ad punctum in ea B , angulo ΔEZ aequalis angulus ABH .

Et quoniam aequalis est angulus quidem A angulo Δ , angulus vero ABH ipsi ΔEZ , reliquus igitur AHB reliquo ΔZE est aequalis (I. 32.); aequiangulum igitur est triangulum ABH triangulo ΔEZ ; est igitur (VI. 4.) ut AB ad BH ita ΔE ad EZ . Ut autem ΔE ad EZ ita ponitur AB ad $B\Gamma$; ut igitur AB ad $B\Gamma$ ita AB ad BH (V. 11.), recta igitur AB ad utramque ipsarum $B\Gamma$, BH eandem habet rationem; aequalis

casus secundi, nec omnino necesse videtur, tertium hunc casum nominatim afferre, quum expressio „non minor recto“ eum etiam casum, quo angulus rectus est, comprehendat.

Obs. 2. Patet, hanc propositionem respondere ei, quam ad I. 26. Obs. 2. ut casum quintum, quo duo trianguia aequalia esse possunt, notavimus. Et hoc triangulorum aequalium casu praemisso potest nostra haec propositio eodem modo, quo praecedentes duae demonstrari. Cf. Pfeiderer. l. c. P. II. §. 56.

BH , ἢ AB ἄρα πρὸς ἑκατέραν τῶν $BΓ$, BH τὴν αὐτὴν ἔχει λόγον· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ $BΓ$ τῇ BH . ὥστε καὶ γωνία ἡ πρὸς τῷ $Γ$ γωνία τῇ ὑπὸ BHG ἴση. Ἐλάττων δὲ ὀρθῆς ὑπόκειται ἡ πρὸς τῷ $Γ$ ἐλάττων ἄρα ἐστὶν ὀρθῆς ἡ ὑπὸ BHG , ὥστε ἡ ἐπὶ αὐτῇ γωνία ἡ ὑπὸ AHB μείζων ἐστὶν ὀρθῆς. Καὶ ἐδείχθη ἴση οὖσα τῇ πρὸς τῷ Z , καὶ ἡ πρὸς τῷ Z ἄρα μείζων ἐστὶν ὀρθῆς. Ὑπόκειται δὲ ἐλάττων ὀρθῆς, ὅπερ ἄτοπον· οὐκ ἄρα ἀνισός ἐστιν ἡ ὑπὸ $ABΓ$ γωνία τῇ ὑπὸ $ΔEZ$, ἴση ἄρα. Ἔστι δὲ καὶ ἡ πρὸς τῷ $Η$ ἴση τῇ πρὸς τῷ $Δ$, καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ πρὸς τῷ $Γ$ λοιπὴ τῇ πρὸς τῷ Z ἴση ἐστὶν· ἰσογώνιον ἄρα ἐστὶ τὸ $ABΓ$ τρίγωνον τῷ $ΔEZ$ τριγώνῳ.

Ἀλλὰ δὴ πάλιν ὑποκείσθω ἑκατέρα τῶν πρὸς ταῖς $Γ$, Z μὴ ἐλάττων ὀρθῆς· λέγω πάλιν ὅτι καὶ οὕτως ἰσογώνιον ἐστὶ τὸ $ABΓ$ τρίγωνον τῷ $ΔEZ$ τριγώνῳ.

Τῶν γὰρ αὐτῶν κατασκευασθέντων, ὁμοίως δεῖξομεν, ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ $BΓ$ τῇ BH · ὥστε καὶ γωνία ἡ πρὸς τῷ $Γ$ τῇ ὑπὸ BHG ἴση ἐστὶν. Οὐκ ἐλάττων δὲ ὀρθῆς ἡ πρὸς τῷ $Γ$, οὐκ ἐλάττων ἄρα ὀρθῆς οὐδὲ ἡ ὑπὸ BHG . Τριγώνου δὲ τοῦ BHG αἱ δύο γωνίαι δύο ὀρθῶν οὐκ εἰσὶν ἐλάττονες, ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον· οὐκ ἄρα πάλιν ἀνισός ἐστιν ἡ ὑπὸ $ABΓ$ γωνία τῇ ὑπὸ $ΔEZ$, ἴση ἄρα. Ἔστι δὲ καὶ ἡ πρὸς τῷ $Α$ τῇ πρὸς τῷ $Δ$ ἴση, λοιπὴ ἄρα ἡ πρὸς τῷ $Γ$ λοιπὴ τῇ πρὸς τῷ Z ἴση ἐστὶν· ἰσογώνιον ἄρα ἐστὶ τὸ $ABΓ$ τρίγωνον τῷ $ΔEZ$ τριγώνῳ. Ἐὰν ἄρα δύο τρίγωνα καὶ τὰ ἐξῆς.

Obs. 3. Triangula sub conditionibus VI. 7. similia esse, uti ex VI. 6. (vid. ad VI. 6. Obs. 2.) inferitur. Cf. Pflauser. l. c. §. 87.

igitur est BF ipsi BH (V. 9.); quare et angulus ad Γ angulo BHF est aequalis (I. 5.). Minor autem recto ponitur angulus ad Γ ; minor igitur est recto angulus BHF , quare (I. 13.) qui ei deinceps est angulus AHB maior est recto. Et ostensus est aequalis esse angulo ad Z , et ipse angulus ad Z igitur maior est recto. Ponitur autem minor recto, quod est absurdum; non igitur inaequalis est angulus ABF angulo AEZ , aequalis igitur. Est autem et angulus ad A aequalis angulo ad A , et reliquus igitur (I. 32.) ad Γ reliquo ad Z aequalis est; aequiangulum igitur est triangulum ABF triangulo AEZ .

Sed et rursus ponatur uterque angulorum ad Γ , Z non minor recto; dico rursus et sic aequiangulum esse triangulum ABF triangulo AEZ .

Iisdem enim constructis, similiter ostendemus aequalem esse BF ipsi BH ; quare et angulus ad Γ ipsi BHF aequalis est. Non minor autem recto est angulus ad Γ ; non est igitur minor recto BHF . Trianguli igitur BHF duo anguli duobus rectis non sunt minores, quod fieri nequit (I. 17.); rursus igitur non inaequalis est angulus ABF angulo AEZ ; aequalis igitur. Est autem et angulus ad A angulo ad A aequalis, reliquus igitur (I. 32.) ad Γ reliquo ad Z aequalis est; aequiangulum igitur est triangulum ABF ipsi triangulo AEZ . Si igitur duo triangu-
la etc.

Obs. 4. Notari etiam potest, casum primum, quo nempe angulorum ad Γ , Z uterque minor est recto, semper existere, si latera AB , AE adjacentia angulis (supp.) aequalibus A , A

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ι.

Εάν ἐν ὀρθογωνίῳ τριγώνῳ ἀπὸ τῆς ὀρθῆς γωνίας εἰς τὴν βάσιν κάθετος ἀχθῇ· τὰ πρὸς τῇ καθέτῳ τρίγωνα ὁμοία ἐστὶ τῷ δὲ ὅλῳ καὶ ἀλλήλοις.

Ἐστω τριγωνον ὀρθογώνιον τὸ $ABΓ$, ὁρθὴν ἔχον τὴν ὑπὸ $BAΓ$ γωνίαν, καὶ ἵχθῃ ἀπὸ τοῦ A εἰς τὴν $ΒΓ$ κάθετος ἡ $ΑΔ$. λέγω ὅτι ὁμοίων ἐσιν ἐκάτερον τῶν $ABΔ$, $ADΓ$ τριγώνων ὅλῳ τῷ $ABΓ$ καὶ ἑτι ἀλλήλοις.

Ἐπεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ $BAΓ$ γωνία τῇ ὑπὸ $ΔAB$, ὁρθὴ γὰρ ἐκάτερα, καὶ κοινὴ τῶν δύο τριγώνων τοῦ τε $ABΓ$ καὶ τοῦ $ABΔ$ ἡ πρὸς τῷ B λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ AGB λοιπὴ τῇ ὑπὸ $BAΔ$ ἐστὶν ἴση· ἰσογώνιον ἄρα ἐστὶ τὸ $ABΓ$ τριγωνον τῷ $ABΔ$ τριγώνῳ.

Ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ $ΒΓ$ ὑποτείνουσα τὴν ὀρθὴν τοῦ $ABΓ$ τριγώνου πρὸς τὴν BA ὑποτείνουσαν τὴν ὀρθὴν τοῦ $ABΔ$ τριγώνου, οὕτως αὐτὴ ἡ AB ὑποτείνουσα τὴν πρὸς τῷ $Γ$ γωνίαν τοῦ $ABΓ$ τριγώνου πρὸς τὴν BA ὑποτείνουσαν τὴν ἴσην τῇ πρὸς τῷ $Γ$, τὴν ὑπὸ $BAΔ$ τοῦ $ABΔ$ τριγώνου· καὶ ἔτι ἡ AG πρὸς τὴν AD ὑποτείνουσαν τὴν πρὸς τῷ B γωνίαν, κοινὴν τῶν δύο τριγώνων· τὸ $ABΓ$ ἄρα τριγωνον τῷ $ABΔ$ τριγώνῳ ἰσογώνιον τέ ἐστι, καὶ τὰς περὶ τὰς ἴσας γωνίας πλάγας ἀνάλογον ἔχει· ὁμοιον ἄρα ἐστὶ τὸ $ABΓ$ τριγ-

minora sint alteris BF , EZ (I. 18, et I. 17, Cor. 3. Cf. Pfleiderer. I. c. §, 88.

Obs. 5. Necessitas tertiae conditionis propositioni VI. adiunctae simili fere ratione evincitur, ac in Obs. 2, ad I. 26. vidimus, duo triangula, in quibus duo latera cum angulo eorum opposito utrimque aequalia sint, Inon semper aequalia esse, et nova ad hanc aequalitatem determinatione opus esse. Cf. Pfleiderer. I. c. §§. 89. 90.

PROPOSITIO VIII. (Fig. 356.)

Si in triangulo rectangulo ab angulo recto ad basin perpendicularis ducatur; quae ad perpendicularem sunt triacula similia et toti et inter se.

Sit triangulum rectangulum $AB\Gamma$, rectum habens angulum $B\Lambda\Gamma$, et ducatur ab A ad $B\Gamma$ perpendicularis AA ; dico simile esse utrumque triangulorum ABA , $AA\Gamma$ toti $AB\Gamma$ et inter se.

Quoniam enim aequalis est angulus $B\Lambda\Gamma$ angulo ABA , rectus enim uterque, et communis duobus triangulis $AB\Gamma$ et ABA angulus ad B ; reliquus igitur $\Gamma B\Lambda$ reliquo $BA\Lambda$ est aequalis (I. 32.); aequiangulum igitur est triangulum $AB\Gamma$ triangulo ABA . Est igitur (VI. 4.) ut $B\Gamma$ subtendens angulum rectum trianguli $AB\Gamma$ ad BA subtendentem angulum rectum trianguli ABA , ita eadem AB subtendens angulum ad Γ trianguli $AB\Gamma$ ad BA subtendentem angulum aequalem angulo ad Γ , nempe $BA\Lambda$ ipsius trianguli ABA ; et etiam $A\Gamma$ ad AA subtendentem angulum ad B , communem duobus triangulis; triangulum igitur $AB\Gamma$ triangulo ABA aequiangulum est, et latera circa aequales angulos proportionalia habet; simile igitur est triangulum $AB\Gamma$ triangulo ABA . Similiter ostendit

PROPOSITIO VIII.

Obs. 1. Robert. Simson. monet: „manifestum est, aliquem mutasse demonstrationem, quam Euclides huius propositionis dederat. Etenim auctor eius postquam demonstravit triacula esse inter se aequiangula, particularim ostendit, latera eorum circa aequales angulos proportionalia esse, quae hoc non factum fuisset in propositione quarta huius libri. Haec autem superflua non inveniuntur in versione (Campani)

νον τῷ $AB\Delta$ τριγώνῳ. Ὅμοιος δὲ δείξομεν, ὅτι καὶ τῷ $AD\Gamma$ τριγώνῳ ὁμοίον ἐστὶ τὸ $AB\Gamma$ τρίγωνον ἐκάτερον ἄρα τῶν $AB\Delta$, $AD\Gamma$ τριγώνων ὁμοίον ἐστὶ ὅλῳ τῷ $AB\Gamma$ τριγώνῳ.

Λέγω δὲ, ὅτι καὶ ἀλλήλοις ἐστὶν ὅμοια τὰ $AB\Delta$, $AD\Gamma$ τρίγωνα.

Ἐπει γὰρ ὀρθὴ ἡ ὑπὸ $B\Delta A$ ὀρθὴ τῇ ὑπὸ $AD\Gamma$ ἐστὶν ἴση, ἀλλὰ μὴν καὶ ἡ ὑπὸ BAA τῇ πρὸς τῷ Γ εὑχθῆ ἴση, καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ πρὸς τῷ B λοιπὴ τῇ ὑπὸ $AD\Gamma$ ἐστὶν ἴση· ἰσογώνιον ἄρα ἐστὶ τὸ $AB\Delta$ τρίγωνον τῷ $AD\Gamma$ τριγώνῳ. Ἔστιν ἄρα ὡς ἡ $B\Delta$ τοῦ $AB\Delta$ τριγώνου, ὑποτείνουσα τὴν ὑπὸ BAA , πρὸς τὴν AA τοῦ $AD\Gamma$ τριγώνου, ὑποτείνουσα τὴν πρὸς τῷ Γ γωνίαν, ἴσην τῇ ὑπὸ BAA , οὕτως αὐτὴ ἡ AA τοῦ $AB\Delta$ τριγώνου, ὑποτείνουσα τὴν πρὸς τῷ B γωνίαν, πρὸς τὴν AD ὑποτείνουσαν τὴν ὑπὸ $AD\Gamma$ τοῦ $AD\Gamma$ τριγώνου, ἴσην τῇ πρὸς τῷ B καὶ ἐν ἡ BA ὑποτείνουσα τὴν ὀρθὴν τὴν ὑπὸ AAB , πρὸς τὴν AD ὑποτείνουσαν τὴν ὀρθὴν τὴν ὑπὸ $AD\Gamma$ ὁμοίον ἄρα ἐστὶ τὸ $AB\Delta$ τρίγωνον τῷ $AD\Gamma$ τριγώνῳ. Ἐάν ἄρα ἐν ὀρθογώνιῳ, καὶ τὰ ἐξῆς.

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α.

Ἐκ δὲ τούτου φανερόν, ὅτι ἐάν ἐν ὀρθογώνιῳ τριγώνῳ ἀπὸ τῆς ὀρθῆς γωνίας ἐπὶ τὴν βάσιν κάθετος

ex lingua arabica et nunc (a Simsone) ommissa sunt. "Oscula nempe angulorum aequalitate, infort Rob. Simson: „aequalia igitur sunt triangula, quare latera circa aequales angulos proportionalia habent (VI. 4.); et propterea inter se similia sunt" (VI. 1. Def.). Et eadem fere est demonstratio Campani.

demus et triangulo $A\Delta\Gamma$ simile esse triangulum $AB\Gamma$; utrumque igitur triangulorum $AB\Delta$, $A\Delta\Gamma$ simile est toti triangulo $AB\Gamma$.

Dico etiam et inter se esse similia triangula $AB\Delta$, $A\Delta\Gamma$.

Quoniam enim rectus BAA recto $A\Delta\Gamma$ est aequalis, sed et BAA angulo ad Γ ostensus est aequalis, et reliquus igitur (I. 32.) ad B reliquo $\Delta A\Gamma$ est aequalis; aequiangulum igitur est triangulum $AB\Delta$ triangulo $A\Delta\Gamma$. Est igitur (VI. 4.) ut BA trianguli $AB\Delta$, subtendens angulum BAA , ad ΔA trianguli $A\Delta\Gamma$ subtendentem angulum ad Γ , aequalem ipsi BAA , ita eadem $A\Delta$ ipsius trianguli $AB\Delta$, subtendens angulum ad B , ad $\Delta\Gamma$ subtendentem angulum $A\Delta\Gamma$ trianguli $A\Delta\Gamma$, aequalem angulo ad B , et etiam BA subtendens rectum AAB , ad $A\Gamma$ subtendentem rectum $A\Delta\Gamma$; simile igitur est triangulum $AB\Delta$ triangulo $A\Delta\Gamma$. Si igitur in rectangulo, etc.

COROLLARIUM.

Ex hoc evidens est, si in triangulo rectangulo ab angulo recto ad basin perpendicularis ducta fuerit,

Obs. 2. Austin. p. 68. corollarium etiam propositioni adiunctum reprobat. Pfeiderer. I. c. §. 95. circa hanc rem observat: „priori huius corollarii parte, ipsis eius verbis pro more relatis, demonstrationes nituntur VI. 13. partis tertiae Lemm. 1. ante X. 34. ac Lemm. post XIII. 13. Contra eiusdem pars altera in demonstrationibus partis primae Lemm. 1. ante X. 34.; partis tertiae XIII. 13.; Lemm. post eam; partis

ἄρχῃ, ἢ ἀρχεῖσα τῶν τῆς βύσεως τμημάτων μὴ ἀνάλογόν ἐστιν καὶ ἐπὶ τῆς βύσεως καὶ ἐπὶ ὅποιον τῶν τμημάτων ἢ πρὸς τῷ τμήματι πλεονεξία ἀνάλογόν ἐστιν.

ΗΡΟΤΑΣΙΣ Θ'.

Τῆς δοθείσης εὐθείας τὸ προτεταχθὲν μέρος ἀφελείν.

Ἐστω ἡ δοθείσα εὐθεῖα ἡ AB . δεῖ δὲ τῆς AB τὸ προτεταχθὲν μέρος ἀφελείν.

Ἐμπελάσθω δὲ τὸ τοῖτον καὶ διήχθω τις εὐθεῖα ἀπὸ τοῦ A ἢ AG , γωνίαν περιέχουσα μετὰ τῆς AB τεταυθεῖαν καὶ εἰλήθω τεχὸν σημεῖον ἐπὶ τῆς AG τὸ Δ , καὶ κείσθωσαν τῇ AD ἴσαι αἱ AE , EF καὶ ἐκτελέσθω ἡ BF , καὶ διὰ τοῦ Δ παράλληλος αὐτῇ ἔχθω ἡ AZ .

ultimae XIII. 18. ac III. 6. Collect. mathem. Pappi, a Propositionibus VI. 8. et VI. 4. deducta traditur: serius inquisitus illius frequentis causa, tum locis citatis, tum alibi, ut in demonstrationibus XIII. 14, XIII. 15. XIII. 16. addita (saepe restituta) est censenda." Addit deinde Pfeleiderer., praeceps duas proportionales corollario hoc enunciatas notari mereri adhuc sequentes: 1) latus, quod trianguli rectanguli angulum rectum subtendit, est ad alterutrum eius latus circa angulum rectum, uti reliquum ipsius latus circa angulum rectum ex ad perpendicularum ex vertice anguli recti in hypotenusam demissum, et alterne (IV. 4.). 2) Unum trianguli rectanguli latus circa angulum rectum est ad alterum: uti, quod priori adiacet, segmentum hypotenusae, perpendicularo in eam ex vertice anguli recti demisso abscissum, est ad ipsum hoc perpendicularum; vel uti hoc perpendicularum est ad segmentum hypotenusae adiacens lateri posteriori (IV. 4.).

ductam inter basis segmenta mediam proportionalem esse; et etiam inter basin et utrumlibet segmentorum, huic segmento adiacens latus, medium proportionale esse.

HYPOTHESES

PROPOSITIO IX. (Fig. 357.)

Ab data recta imperatam partem auferre.

Sit data recta AB ; oportet ab ipsa AB imperatam partem auferre.

Imperetur pars tertia; et ducatur quaedam recta AF ab A , quemlibet angulum continens cum ipsa AB ; et sumatur quodlibet punctum d in AF , et ponantur ipsi Ad aequales AE , EF (I. 3.); et iungatur BF , et per d parallela huic ducatur dZ (I. 31.).

Obs. 3. Cum anguli in semicirculo sint recti (III. 31.); perpendicularis ab quocunque peripheriae circuli puncto ad aliquam eius diametrum ducta est media proportionalis inter segmenta diametri huius ab perpendicularo illo facta: et quodlibet circuli chorda per centrum non transiens media proportionalis est inter diametri per alterutrum eius extremum ductas segmentum ipsi adiacens, quod perpendicularum ab altero chordae extremo in diametrum hanc demissum ab ea abscindit, ipsamque diametrum (VI. 8. Cor.). Cf. Pflaiderer. I. c. §. 94.

PROPOSITIO IX.

Obs. 1. Rob. Simson. monet „demonstratio huius facta est in casu particulari, in quo scilicet pars tertia abscindenda est a data recta“ (contra tenorem, ut Pflaiderer. addit, tam propositionis, quam expositionis, et absque ulla mentione applicationis solutionis exhibitae particularis ad caeteros casus),

Ἐπεὶ οὖν τριγώνου τοῦ $ABΓ$ παρὰ μίαν τῶν πλευρῶν τὴν $ΒΓ$ ἔγκται ἡ $ΖΔ$ ἀνέυλογον ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ $ΓΔ$ πρὸς τὴν $ΔΑ$ οὕτως ἡ $ΒΖ$ πρὸς τὴν $ΖΔ$. Διπλὴ δὲ ἡ $ΓΔ$ τῆς $ΔΑ$ διπλὴ ἄρα καὶ ἡ $ΒΖ$ τῆς $ΖΔ$ τριπλὴ ἄρα ἡ $ΒΑ$ τῆς $ΑΖ$.

Τῆς ἄρα δοθείσης εὐθείας τῆς $ΑΒ$ τὸ ἐπιταχθὲν τρίτον μέρος ἀφίησται τὸ $ΑΖ$. Ὅπερ ἔδει ποιῆσαι.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ι.

Τὴν δοθείσαν εὐθείαν ἀμνητον τῇ δοθείσῃ αὐτοῖς τετμημένῃ ὁμοίως τεμεῖν.

Ἐστω ἡ μὲν δοθείσα εὐθεῖα ἀμνητος ἡ $ΑΒ$, ἡ δὲ τετμημένη ἡ $ΑΓ$ (δεῖ δὲ τὴν $ΑΒ$ ἀμνητον τῇ $ΑΓ$ τετμημένῃ ὁμοίως τεμεῖν. Ἐστω τετμημένη ἡ $ΑΓ$ ¹⁾, κατὰ τὰ $Δ$, $Ε$ σημεία, καὶ κείσθωσαν αὐτῇ γωνίαν τυχούσαν περιέχειν, καὶ ἐκτετύχθω ἡ $ΓΒ$, καὶ διὰ τῶν $Δ$, $Ε$ τῇ $ΒΓ$ παράλληλοι ἔχθωσαν αἱ $ΑΖ$, $ΕΗ$, διὰ δὲ τοῦ $Δ$ τῇ $ΑΒ$ παράλληλος ἔχθω ἡ $ΔΘΚ$.

1) Quae uncis inclusa sunt, desunt in ed. Parisiensī et Codd. a. c. d. Quum tamen in expositione apud Euclidem, ea quae in problemate fieri iubentur, expresse repeti soleant, genuina illa omnino esse videntur, et librarii tantum incuria in Mss. omissa. Itaque illa restituiimus ex add. Oxon. et Basil.

„quare minime videtur Euclidis esse. Praeterea in quatuor magnitudinibus proportionalibus concludit auctor, tertiam sequomultiplicem esse quartae, atque prima est secundae: quod quidem in libro V. ut eum nunc habemus, nullibi ostensum est. (Vid. Prop. D. in Exc. ad L. V.). Sed hoc, ut alia, assumit editor ex confusanea apud vulgus recepta proportionalium notione.“ Generalem deinde Simson. addit demonstrationem, dum nempe iubet rectam $ΑΓ$ tam multiplicem

Itaque quoniam uni lateri BF trianguli ABF parallela ducta est recta ZD ; erit (VI. 2.) ut GA ad AA ita BZ ad ZA . Dupla autem GA ipsius AA ; dupla igitur et BZ ipsius ZA ; tripla igitur BA ipsius AZ .

Ab ipsa igitur data recta AB imperata tertia pars ablata est AZ . Quod oportebat facere.

HYPOTHESES

PROPOSITIO X. (Fig. 358.)

Datam rectam insectam similiter secare, ut data recta secta est.

Sit data quidem recta insecta AB , secta vero AF : oportet insectam rectam AB similiter secare, ut AF secta est. Sit AF secta in punctis A , E , et ponantur ita ut angulum quemlibet contineant, et iungatur IB , et (I. 31.) per A , E ipsi BF parallelæ ducantur AZ , EH , per A autem ipsi AB parallela ducatur AK .

sumi rectae AA pro lubitu sumtae, quam multiplex esse debet AB partis abscindendae, et reliquis peractis, ut in textu graeco, concludit, esse (VI. 2.) $GA:AA=BZ:AZ$, et (V. 16.) componendo $AF:AA=AB:AZ$, unde (V. Prop. D.) AB tam multiplex erit rectae AZ , quam multiplex sumta fuit AF rectae AA adeoque AZ eadem pars erit rectae AB , quae pars est AA rectae AF i. e. AZ erit pars a recta AB abscindenda. Eadem demonstratio, notante Pfeiderer. l. c. §. 98. ita etiam absque subsidio Prop. D. absolvi potest, ut a Baermanno in scholio adiuncto factum est. Ob parallelas BF , ZA est $AF:AA=AB:AZ$ (VII. 2. Obs. 2.) vel alterne (V. 16.) $AF:AB=AA:AZ=n.AA:n.AZ$ (V. 11. V. 15.) denotante n numerum integrum, iuxta quem data AB multiplex esse debet partis abscindendae. Quare cum sit $AF=n \times AA$ (constr.); pariter est $AB=n \times AZ$ (V. 14.).

Quam tamen in expositione quædam fieri iubentur, expressè rationis esse videntur, et libere sumi itaque illa testimonia et in idetur Euclidis esse. Propter proportionalibus conclusa sunt. Quartae, atque primae et secundae cum hanc habent, ut in Exc. ad L. V. Soli confusum apud vulgum interpretum Generalem deinde Summam semper iubet rectam AF sumi

Παραλληλόγραμμον ἄρα ἐστὶν ἐκότερον τῶν 2
 ΘB . ἴση ἄρα ἡ μὲν $\Delta \Theta$ τῇ ZH , ἡ δὲ ΘK τῇ H .
 Καὶ ἐπει τριγώνου τοῦ $\Delta K \Gamma$ παρὰ μίαν τῶν πλ-
 ρῶν τὴν $K \Gamma$ εὐθεῖα ἤκται ἡ ΘE ἀνάλογον ἄρα ἐσ-
 τὶς ἡ ΓE πρὸς τὴν $E \Delta$ οὕτως ἡ $K \Theta$ πρὸς τὴν E .
 Ἰση δὲ ἡ μὲν $K \Theta$ τῇ BH , ἡ δὲ $\Theta \Delta$ τῇ HZ . ἴσ-
 ἄρα ὥς ἡ ΓE πρὸς τὴν $E \Delta$ οὕτως ἡ BH πρὸς
 HZ . Πάλιν, ἐπει τριγώνου τοῦ AHE παρὰ μ-
 τῶν πλευρῶν τὴν EH ἤκται ἡ $Z \Delta$ ἀνάλογον ἐ-
 στίιν ὥς ἡ $E \Delta$ πρὸς τὴν ΔA οὕτως ἡ HZ πρὸς
 $Z \Delta$. Ἐδείχθη δὲ καὶ ὥς ἡ ΓE πρὸς τὴν $E \Delta$ οὕ-
 τως ἡ BH πρὸς τὴν HZ . ἐστὶν ἄρα ὥς μὲν ἡ ΓE π-
 ρὸς τὴν $E \Delta$ οὕτως ἡ BH πρὸς τὴν HZ , ὥς δὲ ἡ
 πρὸς τὴν ΔA οὕτως ἡ HZ πρὸς τὴν $Z \Delta$.

Ἡ ἄρα δοθεῖσα εὐθεῖα ἀτμητος ἡ AB ἐν δοθε-
 ῖσιν εὐθείαις τετμημένη τῇ AG ὁμοίως τέτμηται. Ὅ-
 σθαι ποιῆσαι.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ια.

Δύο δοθεισῶν εὐθειῶν, τρίτην ἀνάλογον πρ-
 οβαίνειν.

Obs. 2. Eadem ratione ab data recta AB abscindetur
 mentum, quod ad totam habeat rationem datam rectae m-
 ris M ad maiorem $M+N$; vel quod ad segmentum revidi-
 habeat rationem datae rectae M ad datam N ; seu data
 AB secabitur in data ratione, rectae nimirum datae M ad
 tam N , abscissa nempe $AD=M$, $AI=N$, reliquisque u-
 VI. 9. peractis (Vid. Pappi ad Libros de Sect. rationis Le-
 I. Collect. Mathem. Halley p. XVIII. XLV. Clavius, Tasq-
 alli) Pfeleiderer. l. c. §. 99. Similique ratione datae rectae
 alia ab puncto inde A in directum adicietur, quae ad ip-
 habeat datam rationem, datae nimirum rectae M ad datam

Parallelogrammum igitur est utrumque ipsorum ZO , OB ; aequalis igitur (I. 34.) AO ipsi ZH , OK vero ipsi HB . Et quoniam uni lateri trianguli AKT ipsi nempe KT parallela ducta est recta OE ; est (VI. 2.) ut TE ad EA ita KO ad OA . Aequalis autem est KO quidem ipsi BH , OA vero ipsi HZ ; est igitur ut TE ad EA ita BH ad HZ . Rursus, quoniam uni laterum trianguli AHE ipsi nempe EH parallela ducta est ZA ; est (VI. 2.) ut EA ad AA ita HZ ad ZA . Demonstratum autem est et ut TE ad EA ita BH ad HZ ; est igitur ut TE quidem ad EA ita BH ad HZ , ut vero EA ad AA ita HZ ad ZA .

Data igitur recta insecta AB datae rectae sectae AT similiter secta est. Quod oportebat facere.

PROPOSITIO XI. (Fig. 359.)

Duobus datis rectis, tertiam proportionalem invenire.

vel etiam ita, ut composita ex data AB , eique ab extremo inde A versus oppositas partes adiecta habeat ad datam (vel ad adiectam) rationem datae maioris M ad datam minorem N (Pfleiderer I. c. §§. 100. 101.). Casterum apud Campanum propositio nostra 9. est VI. 11.

PROPOSITIO X.

Obs. 1. Demonstratio huius propositionis (quae apud Campanum est VI. 12.) expeditior redditur, praemissa propositione in Obs. 5. ad VI. 2. contenta. Cf. Pfeleiderer I. c. §. 102.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ

Δοθέντων δύο ῥηθύνων, εὑρεῖν τὴν τρίτην ὡς λόγον ἔχουσαν πρὸς αὐτὰς ὡς αὐτὰς πρὸς ἀλλήλας.

2. Eadem ratione ab data recta AB quod ad totam habet rationem totae ad totam $M+N$; vel quod ad partem maiorem M habet rationem totae ad partem maiorem M ; vel quod ad partem minorem N habet rationem totae ad partem minorem N .
in data ratione, data maiore
issa nempe $M+N$, M , N est
(Vid. Pappi et aliorum commentaria
in Eudemii *Metaphysicam* I. c. §. 98.)
unde A in quocumque
rationem, datae minoris N ad

"Εστωσαν αἱ δοθεῖσαι δύο εὐθεῖαι αἱ ὅ AB, ΑΓ, καὶ κείσθωσαν γωνίαν περιέχουσαι τυχούσαν διὰ δὲ τῶν AB, ΑΓ τρίτην ἀνάλογον προσεφείν.

Ἐκκεῖσθωσαν γὰρ αἱ AB, ΑΓ ἐπὶ τὰ Δ, Ε σημεῖα, καὶ κείσθω τῇ ΑΓ ἴση ἡ ΒΔ, καὶ ἐπεζευχθῇ ἡ ΒΓ, καὶ διὰ τοῦ Δ παρὰλληλος αὐτῇ ἤχθω ἡ ΔΕ.

Ἐπεὶ οὖν τριγώνου τοῦ ΔΔΕ, παρὰ μίαν τῶν πλευρῶν τὴν ΔΕ ἔκται ἡ ΒΓ. ἀνάλογόν ἐστιν ὡς ἡ AB πρὸς τὴν ΒΔ οὕτως ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΓΕ. Ἰση δὲ ἡ ΒΔ τῇ ΑΓ, ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ AB πρὸς τὴν ΑΓ οὕτως ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΓΕ.

Δύο ἄρα δοθεισῶν εὐθειῶν τῶν AB, ΑΓ, τρίτη ἀνάλογον αὐταῖς προσεφείηται ἡ ΓΕ. Ὅτιερ εἶδει ποιῆσαι.

Π Ρ Ο Τ Α Σ Ι Σ ιβ'.

Τριῶν δοθεισῶν εὐθειῶν, τετάρτην ἀνάλογον προσεφείν.

"Εστωσαν αἱ δοθεῖσαι τρεῖς εὐθεῖαι αἱ Α, Β, Γ διὰ δὲ τῶν Α, Β, Γ τετάρτην ἀνάλογον προσεφείν.

Ἐκκεῖσθωσαν δύο εὐθεῖαι, αἱ ΔΕ, ΔΖ, γωνίαν περιέχουσαι τυχούσαν τὴν ὑπὸ ΕΔΖ· καὶ κείσθω τῇ μὲν Α ἴση ἡ ΔΗ, τῇ δὲ Β ἴση ἡ ΗΕ, καὶ ἐκ τῇ Γ ἴση ἡ ΔΘ καὶ ἐπιζευχθείσθης τῆς ΗΘ, παρὰλληλος αὐτῇ ἤχθω διὰ τοῦ Ε ἡ ΕΖ.

1) Verba: δύο εὐθεῖαι, quae Peyrardus, codicem a secutus, omittit, ex edd. Basil. et Oxon. restitimus ex more Euclidii in enunciatione solenni.

Obs. 2. Si aequalia fuerint unius trianguli lateris ΑΓ segmenta, alterius etiam lateris ΑΒ segmenta, rectis tertio lateri ΒΓ parallelis facta erunt aequalia (V. Prop. Α.). Recta itaque data ΑΒ in partes quotcunque aequales secabitur simili

Sint datae duae rectae AB , AF , et ponantur ita ut angulum quemlibet contineant; oportet ipsis AB , AF tertiam proportionalem invenire.

Producantur AB , AF ad puncta Δ , E , et ponatur ipsi AF aequalis $B\Delta$, et iungatur $B\Gamma$, et per Δ parallela huic ducatur ΔE (I. 31.).

Quoniam igitur uni laterum trianguli $\Delta E\Gamma$, nempe ipsi ΔE parallela ducta est $B\Gamma$, est (VI. 2.) ut AB ad $B\Delta$ ita AF ad ΓE . Aequalis autem $B\Delta$ ipsi AF , est igitur ut AB ad AF ita AF ad ΓE .

Duabus igitur datis rectis AB , AF , tertia proportionalis inventa est ΓE . Quod oportebat facere.

PROPOSITIO XII. (Fig. 360.)

Tribus datis rectis, quartam proportionalem invenire.

Sint datae tres rectae A , B , Γ ; oportet ipsis A , B , Γ quartam proportionalem invenire.

Exponentur duae rectae ΔE , ΔZ , angulum continentes quemlibet $E\Delta Z$; et ponatur ipsi quidem A aequalis ΔH , ipsi vero B aequalis HE , et insuper ipsi Γ aequalis $\Delta\Theta$; et iuncta $H\Theta$, parallela illi ducatur per E ipsa EZ (I. 31.).

modo, quo propositum VI. 9. fiebat (Pfeiderer l. c. §§. 103. 104. Clavius, Tacquet., alii). Cf. I. 34. Cor. 23.

Obs. 3. Hac propositione nituntur solutiones variorum problematum, figuras rectilineas datas vario modo in partes quotcunque aequales, seu etiam ita secandi, ut partes datas invicem habeant rationes. Talia problemata habentur in Eu-

Euctid. Element. P. II.

O

ΗΠΟΤΑΣΙΣ

Tribus datis rectis, quartam proportionalem invenire.

Sint datae tres rectae A , B , Γ ; oportet ipsis A , B , Γ quartam proportionalem invenire.

Exponentur duae rectae ΔE , ΔZ , angulum continentes quemlibet $E\Delta Z$; et ponatur ipsi quidem A aequalis ΔH , ipsi vero B aequalis HE , et insuper ipsi Γ aequalis $\Delta\Theta$; et iuncta $H\Theta$, parallela illi ducatur per E ipsa EZ (I. 31.).

modo, quo propositum VI. 9. fiebat (Pfeiderer l. c. §§. 103. 104. Clavius, Tacquet., alii). Cf. I. 34. Cor. 23.

Obs. 3. Hac propositione nituntur solutiones variorum problematum, figuras rectilineas datas vario modo in partes quotcunque aequales, seu etiam ita secandi, ut partes datas invicem habeant rationes. Talia problemata habentur in Eu-

Euctid. Element. P. II.

O

Ἐπεὶ οὖν τριγώνου τοῦ ΔEZ παρὰ μίαν τῶν πλευρῶν τὴν EZ ἔχεται ἡ $H\Theta$, ἔστιν ἄρα ὡς ΔH πρὸς τὴν HE , οὕτως ἡ $\Delta\Theta$ πρὸς τὴν ΘZ . Ἰσὴ δὲ ἡ μὲν ΔH τῇ A , ἡ δὲ HE τῇ B , ἡ δὲ $\Delta\Theta$ τῇ Γ ἔστιν ἄρα ὡς ἡ A πρὸς τὴν B οὕτως ἡ Γ πρὸς τὴν ΘZ .

Τριῶν ἄρα δοθεισῶν εὐθειῶν τῶν A, B, Γ τῆς τέταρτης ἀνάλογον προσεύρεται ἡ ΘZ . Ὅπερ εἶδει πρῆσαι.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ιγ.

Δύο δοθεισῶν εὐθειῶν, μέσην ἀνάλογον προσεῦρεν.

Ἐστώσαν αἱ δοθεῖσαι δύο εὐθεῖαι, αἱ AB, BG δεῖ δὴ τῶν AB, BG μέσην ἀνάλογον προσεῦρεν.

Κείσθωσαν ἐπ' εὐθείας, καὶ γεγραῖθω ἐπὶ τῆς AG ἡμικύκλιον τὸ $AA\Gamma$, καὶ ἔχθω ἀπὸ τοῦ B σημείου τῇ AG εὐθείᾳ πρὸς ὀρθὰς ἡ BA , καὶ ἐκτείνεσθωσαν αἱ AA, AG .

clidis, ut quidam arbitrantur, vel, ut alii volunt, in Machometi Bagdedini de Divisionibus libro; apud Wilke neue und erleichterte Methode den Inhalt geradlinichter Flächen zu finden; in I. T. Mayers practisch. Geom. T. III.; apud Pfeiderer. I. c. §§. 108—118.

PROPOSITIO XI.

Obs. Tertiae proportionali duabus rectis datis invenienda inservit quoque VI. 8. Cor. Sumta nempe (Fig. 556.) recta BA aequali primae rectarum datarum, et ducta ad eam per A perpendiculari AA aequali secundae, iungatur BA . Ducta deinde in A ad BA perpendiculari AG , quae productae BA occurret in Γ , erit $BA : AA = AA : AG$ (VI. 8. Cor.). (Clavius ad hanc Prop. Pfeiderer. I. c. §. 125.). Aliter idem fiet per

ὅτι τριγώνου τοῦ ΔΕΖ
ἡ ΕΖ ἴσται ἢ ΗΘ, ἡ
ΗΕ, οὕτως ἢ ΑΘ πρὸς
Η τῇ Α, ἢ δὲ ΗΕ τῇ Β,
ὡς ἢ Α πρὸς τὴν Β ὡς

Et quoniam uni laterum trianguli ΔEZ , nempe ipsi EZ parallela ducta est $H\Theta$, est igitur ut ΔH ad HE ita $\Delta\Theta$ ad ΘZ (VI. 2.). Aequalis autem ΔH quidem ipsi A , HE vero ipsi B , $\Delta\Theta$ autem ipsi Γ ; est igitur ut A ad B ita Γ ad ΘZ .

ἡ δὲ δοθεὶς ἡ ΕΖ ἴσται
τὴν ΗΘ, οὕτως ἢ ΑΘ
πρὸς τὴν Η τῇ Α, ὡς
ἢ ΗΕ τῇ Β, ὡς ἢ Α
πρὸς τὴν Β ὡς ἢ Α
πρὸς τὴν Β ὡς ἢ Α

Tribus igitur datis rectis A, B, Γ , quarta proportionalis inventa est ΘZ . Quod oportebat facere.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ

PROPOSITIO XIII. (Fig. 361.)

ἡ δὲ δοθεὶς ἡ ΕΖ ἴσται
τὴν ΗΘ, οὕτως ἢ ΑΘ
πρὸς τὴν Η τῇ Α, ὡς
ἢ ΗΕ τῇ Β, ὡς ἢ Α
πρὸς τὴν Β ὡς ἢ Α
πρὸς τὴν Β ὡς ἢ Α

Duabus datis rectis, mediam proportionalem invenire.

ἡ δὲ δοθεὶς ἡ ΕΖ ἴσται
τὴν ΗΘ, οὕτως ἢ ΑΘ
πρὸς τὴν Η τῇ Α, ὡς
ἢ ΗΕ τῇ Β, ὡς ἢ Α
πρὸς τὴν Β ὡς ἢ Α
πρὸς τὴν Β ὡς ἢ Α

Sint datae duae rectae AB, BF ; oportet ipsis AB, BF mediam proportionalem invenire.

ἡ δὲ δοθεὶς ἡ ΕΖ ἴσται
τὴν ΗΘ, οὕτως ἢ ΑΘ
πρὸς τὴν Η τῇ Α, ὡς
ἢ ΗΕ τῇ Β, ὡς ἢ Α
πρὸς τὴν Β ὡς ἢ Α
πρὸς τὴν Β ὡς ἢ Α

Ponantur in directum, et describatur super AF semicirculus ADF , et ducatur a B puncto ipsi AF rectae ad rectos BA (I. 11.), et iungantur AA, AF .

ἡ δὲ δοθεὶς ἡ ΕΖ ἴσται
τὴν ΗΘ, οὕτως ἢ ΑΘ
πρὸς τὴν Η τῇ Α, ὡς
ἢ ΗΕ τῇ Β, ὡς ἢ Α
πρὸς τὴν Β ὡς ἢ Α
πρὸς τὴν Β ὡς ἢ Α

partem alteram eiusdem VI. 8. Cor. Nempe, si prima recta data maior est, quam secunda, fiat BF aequalis primae, et, descripto super eam circulo, ex altero eius extremo B aptetur BA aequalis secundae, et ex altero huius extremo A demittatur in BF perpendicularis AA , eritque $BF:BA=BA:BA$ (VI. 8. Cor.). Sin autem prima recta data minor est, quam secunda: super illa v. c. BA tanquam catheto triangulum constitutur rectangulum AAB , cuius hypotenusa AB aequalis sit secundae (ut in II. 14. III. 17.). Tum ad hanc BA in puncto eius extremo ductum perpendiculum AF productae BA occurret in F (I. Post. 5.), eritque $BA:AB=AB:BF$ (VI. 8. Cor.) Pflaiderer l. c. §. 124. Pappus Collect. Mathem. III. 7. et III. 8. (Nostra Prop. 11. apud Campanum est VI. 10.) Caeterum, si ratio duarum magnitudinum expressa sit per datas rectas,

PROPOSITIO XI.

ἡ δὲ δοθεὶς ἡ ΕΖ ἴσται
τὴν ΗΘ, οὕτως ἢ ΑΘ
πρὸς τὴν Η τῇ Α, ὡς
ἢ ΗΕ τῇ Β, ὡς ἢ Α
πρὸς τὴν Β ὡς ἢ Α
πρὸς τὴν Β ὡς ἢ Α

ἡ δὲ δοθεὶς ἡ ΕΖ ἴσται
τὴν ΗΘ, οὕτως ἢ ΑΘ
πρὸς τὴν Η τῇ Α, ὡς
ἢ ΗΕ τῇ Β, ὡς ἢ Α
πρὸς τὴν Β ὡς ἢ Α
πρὸς τὴν Β ὡς ἢ Α

ἡ δὲ δοθεὶς ἡ ΕΖ ἴσται
τὴν ΗΘ, οὕτως ἢ ΑΘ
πρὸς τὴν Η τῇ Α, ὡς
ἢ ΗΕ τῇ Β, ὡς ἢ Α
πρὸς τὴν Β ὡς ἢ Α
πρὸς τὴν Β ὡς ἢ Α

ἡ δὲ δοθεὶς ἡ ΕΖ ἴσται
τὴν ΗΘ, οὕτως ἢ ΑΘ
πρὸς τὴν Η τῇ Α, ὡς
ἢ ΗΕ τῇ Β, ὡς ἢ Α
πρὸς τὴν Β ὡς ἢ Α
πρὸς τὴν Β ὡς ἢ Α

ἡ δὲ δοθεὶς ἡ ΕΖ ἴσται
τὴν ΗΘ, οὕτως ἢ ΑΘ
πρὸς τὴν Η τῇ Α, ὡς
ἢ ΗΕ τῇ Β, ὡς ἢ Α
πρὸς τὴν Β ὡς ἢ Α
πρὸς τὴν Β ὡς ἢ Α

ἡ δὲ δοθεὶς ἡ ΕΖ ἴσται
τὴν ΗΘ, οὕτως ἢ ΑΘ
πρὸς τὴν Η τῇ Α, ὡς
ἢ ΗΕ τῇ Β, ὡς ἢ Α
πρὸς τὴν Β ὡς ἢ Α
πρὸς τὴν Β ὡς ἢ Α

Καὶ ἐπεὶ ἐν ἡμικυκλίῳ γωνία ἐστὶν ἡ ὑπὸ $ΑΔΓ$. ὀρθή ἐστιν. Καὶ ἐπεὶ ἐν ὀρθογωνίῳ τριγώνῳ τῷ $ΑΔΓ$ ἀπὸ τῆς ὀρθῆς γωνίας ἐπὶ τὴν βάσιν κάθετος ἔκται ἡ $ΔΒ$. ἡ $ΔΒ$ ἄρα τῶν τῆς βάσεως τμημάτων τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$ μέση ἀνάλογόν ἐστιν.

Δύο ἄρα δοθεισῶν εὐθειῶν τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$, μέση ἀνάλογον προσέυρεται ἡ $ΒΔ$. Ὅπερ εἶδει ποιῆσαι.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΙΔ.

Τῶν ἴσων τε καὶ ἰσογωνίων ¹⁾ παραλληλογράμμιαι ἀντιπεπόνθασιν αἱ πλευραὶ, αἱ περὶ τὰς ἴσας γωνίας καὶ ὧν ἰσογωνίων παραλληλογράμμιαι, ἀντιπεπόνθασιν αἱ πλευραὶ αἱ περὶ τὰς ἴσας γωνίας, ἴσα ἐστὶν ἐκείνα.

Ἐστω ἴσα τε καὶ ἰσογώνια παραλληλόγραμμα τὰ $ΑΒ$, $ΒΓ$, ἴσας ἔχοντα τὰς πρὸς τῷ $Β$ γωνίας, καὶ κείσθωσαν ἐπ' εὐθείας αἱ $ΔΒ$, $ΒΕ$, ἐπ' εὐθείας ἄρα εἰσὶ καὶ αἱ $ΖΒ$, $ΒΗ$. λέγω ὅτι τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$ ἀντιπεπόνθασιν αἱ πλευραὶ, αἱ περὶ τὰς ἴσας γωνίας, τουτέστιν ὅτι ἐστὶν ὡς ἡ $ΔΒ$ πρὸς τὴν $ΒΕ$ οὕτως ἡ $ΗΒ$ πρὸς τὴν $ΒΖ$.

1) Loco ἰσογωνίων, quae vox omnino sufficit, hic et in sequentibus addi. Basil. et Oxon. habent: *μὴν μὴ ἴσων ἔχοντων γωνίαν*. Utraque lectio ex I. 29. I. 34. eodem redit. Ceterum etiam infra in demonstratione VI. 16., ubi nostra haec propositio adhibetur, vox ἰσογωνίων ponitur.

docet haec propositio modum inveniendi rationem duplicatam rationis datae.

ΠΡΟΠΟΣΙΤΙΟ XII.

Obs. Facile patet, e tribus rectis datis, quibus quarta proportionalis invenienda est, secundam, quae in figura textus graeci primae $ΔΗ$ in directum adiecta est, posse etiam ex $Η$

Et quoniam in semicirculo angulus est $A\Delta\Gamma$, rectus est (III. 31.). Et quoniam in rectangulo triangulo $A\Delta\Gamma$ a recto angulo ad basin perpendicularis ducta est ΔB ; ipsa ΔB inter basis segmenta ΔB , $B\Gamma$ media proportionalis est (VI. 8. Cor.).

Duabus igitur datis rectis ΔB , $B\Gamma$, media proportionalis inventa est $\Delta\Delta$. Quod oportebat facere.

PROPOSITIO XIV. (Fig. 362.)

Parallelogrammorum aequalium et aequiangulorum reciproca sunt latera, quae circa aequales angulos sunt; et quorum aequiangulorum parallelogrammorum reciproca sunt latera circa aequales angulos, illa sunt aequalia.

Sint aequalia et aequiangula parallelogramma ΔB , $B\Gamma$, aequales habentia angulos ad B , et ponantur in directum ΔB , $B\Gamma$, in directum igitur sunt (I. 14.) et $B\Gamma$, $B\Delta$: dico ipsorum ΔB , $B\Gamma$ reciproca esse latera circa aequales angulos, hoc est, esse ut ΔB ad $B\Gamma$ ita $B\Delta$ ad $B\Gamma$.

versus $H\Delta$, vel etiam (coll. Obs. 2. ad VI. 2.) e vertice Δ ex eadem parte, ad quam est recta ΔH , vel in crure ΔH anguli $H\Delta B$ ad partes oppositas ultra Δ producto sumi, et tum reliqua in cruribus anguli assumpti, vel ad verticem ei oppositi simili ratione ac in textu graeco peragi. Praeterea etiam secunda et tertia alterne inter se permutari possunt, ita ut iam non, ut ante prima et secunda in uno anguli assumpti crure, tertia et quarta in altero, verum prima et tertia in uno, secunda et quarta in altero sint. Elseiderer l. c. §. 119. 120. Si quis vero disideret, ut prima et quarta in uno, secunda et tertia in altero crure anguli sint, hoc quoque fieri poterit, si

PROPOSITIO III

poterit, e tribus rectis lineis
construenda est, secundum, quae
in directum adiecti est, per

Συμπεληρώσθω γάρ τὸ ZE παραλληλόγραμμον.

Ἐπεὶ οὖν ἴσον ἐστὶ τὸ AB παραλληλόγραμμον τῷ $BΓ$ παραλληλογράμμῳ, ἄλλο δέ τι τὸ ZE ἔστιν ἄρα ὡς τὸ AB πρὸς τὸ ZE οὕτως τὸ $BΓ$ πρὸς τὸ ZE . Ἀλλ' ὡς μὲν τὸ AB πρὸς τὸ ZE οὕτως ἡ AB πρὸς τὴν BE , ὡς δὲ τὸ $BΓ$ πρὸς τὸ ZE οὕτως ἡ HB πρὸς τὴν BZ · καὶ ὡς ἄρα ἡ AB πρὸς τὴν BE οὕτως ἡ HB πρὸς τὴν BZ . Τῶν AB , $BΓ$ ἄρα παραλληλογράμμων ἀντιπεπόνθασιν αἱ πλευраὶ, αἱ περὶ τὰς ἴσας γωνίας.

Ἀλλὰ δὴ ἀντιπεπονθέτωσαν αἱ πλευраὶ αἱ περὶ τὰς ἴσας γωνίας, καὶ ἔστω ὡς ἡ AB πρὸς τὴν BE οὕτως ἡ HB πρὸς τὴν BZ · λέγω ὅτι ἴσον ἐστὶ τὸ AB παραλληλόγραμμον τῷ $BΓ$ παραλληλογράμμῳ.

Ἐπεὶ γάρ ἐστιν ὡς ἡ AB πρὸς τὴν BE οὕτως ἡ HB πρὸς τὴν BZ , ἀλλ' ὡς μὲν ἡ AB πρὸς τὴν BE οὕτως τὸ AB παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ ZE παραλληλόγραμμον, ὡς δὲ ἡ HB πρὸς τὴν BZ οὕτως τὸ $BΓ$ παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ ZE παραλληλόγραμμον· καὶ ὡς ἄρα τὸ AB πρὸς τὸ ZE οὕτως τὸ $BΓ$ πρὸς τὸ ZE · ἴσον ἄρα ἐστὶ τὸ AB παραλληλόγραμμον τῷ $BΓ$ παραλληλογράμμῳ. Τῶν ἄρα ἴσων, καὶ τὰ ἐξίης.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ιε.

Τῶν ἴσων καὶ μίαν μὲν ἴσην ἐχόντων γωνίαν τριγώνων ἀντιπεπόνθασιν αἱ πλευραὶ, αἱ περὶ τὰς ἴσας

ex vertice anguli propositi prima in uno crure, secunda in altero sumatur, et altera harum rectarum puncta extrema rectae aliqua iungantur, deinde in eodem crure, in quo sumta est secunda, a vertice abscindatur tertia, atque ab altero eius ex-

[illegible]

ΠΡΟΤΑΣΙΣ
καὶ μίαν μὴ ὡς ἑνὴν
ἐκπύουσαν αἱ ἀντιπρὸς, ἀλλὰ
ἢ προpositi prima in uno tractat
et altera huius tractatus pars
deinde in eodem tractatu
ce abscidantur utri, quae in se

Et quoniam aequale est parallelogrammum AB parallelogrammo BF ; est autem aliud quoddam ZE ; est igitur (V. 7.) ut AB ad ZE ita BF ad ZE . Sed (VI. 1.) ut AB quidem ad ZE ita AB ad BE , ut vero BF ad ZE ita HB ad BZ ; erit igitur (V. 11.) AB ad BE ita HB ad BZ . Parallelogrammorum igitur AB , BF reciproca sunt latera, quae circa aequales angulos sunt.

Sint autem reciproca latera circa aequales angulos,
et sit ut AB ad BE ita HB ad BZ ; dico aequale
esse parallelogrammum AB parallelogrammo BF .

Quoniam enim est ut AB ad BE ita HB ad BZ , sed ut AB quidem ad BE ita (VI. 1.) parallelogrammum AB ad parallelogrammum ZE , ut HB vero ad BZ ita parallelogrammum BF ad parallelogrammum ZE ; erit igitur (V. 11.) AB ad ZE ita BF ad ZE ; aequale igitur est (V. 9.) parallelogrammum AB parallelogrammo BF . Ergo aequalium etc.

Aequalium et unum angulum uni aequalem habentium triangulorum reciproca sunt latera, quae circa

tremo ducatur ad illud crus, in quo prima sumta fuit, recta, quae sit, ut vocant, antiparallela ei, quae primae et secundae extrema iungit i. e. ita ducatur, ut cum crure uno eundem angulum efficiat, quem illa, cui antiparallela esse debet, cum

γωνίας· καὶ ὧν, μίαν μὲν ἴσην ἔχοντων γωνίαν ἀντιπεπόνθασιν αἱ πλευραὶ, αἱ περὶ τὰς ἴσας γωνίας, ἴσα ἐστὶν ἐκεῖνα.

Ἐστω ἴσα τρίγωνα τὰ $ABΓ$, $ΔΕ$, μίαν μὲν ἴσην ἔχοντα γωνίαν τὴν ὑπὸ $ΒΑΓ$ τῇ ὑπὸ $ΔΑΕ$ λέγω ὅτι τῶν $ABΓ$, $ΔΕ$ τριγώνων ἀντιπεπόνθασιν αἱ πλευραὶ, αἱ περὶ τὰς ἴσας γωνίας, τουτέστιν ὅτι ἐστὶν ὡς ἡ $ΓΑ$ πρὸς τὴν $ΑΔ$ οὕτως ἡ $ΕΑ$ πρὸς τὴν $ΑΒ$.

Κεῖσθω γὰρ ὥστε ἐπ' εὐθείας εἶναι τὴν $ΓΑ$ τῇ $ΑΔ$ · ἐπ' εὐθείας ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ $ΕΑ$ τῇ $ΑΒ$. Καὶ ἐπεξεύχθω ἡ $ΒΔ$.

Ἐπεὶ οὖν ἴσον ἐστὶ τὸ $ABΓ$ τρίγωνον τῷ $ΔΕ$ τριγώνῳ, ἄλλο δὲ τὸ $ΑΒΔ$ · ἐστὶν ἄρα ὡς τὸ $ΓΑΒ$ τρίγωνον πρὸς τὸ $ΒΑΔ$ τρίγωνον οὕτως τὸ $ΔΕ$ τρίγωνον πρὸς τὸ $ΒΑΔ$ τρίγωνον. Ἀλλ' ὡς μὲν τὸ $ΓΑΒ$ πρὸς τὸ $ΒΑΔ$ οὕτως ἡ $ΓΑ$ πρὸς τὴν $ΑΔ$, ὡς δὲ τὸ $ΕΑΔ$ πρὸς τὸ $ΒΑΔ$ οὕτως ἡ $ΕΑ$ πρὸς τὴν $ΑΒ$ · καὶ ὡς ἄρα ἡ $ΓΑ$ πρὸς τὴν $ΑΔ$ οὕτως ἡ $ΕΑ$ πρὸς τὴν $ΑΒ$ · τῶν $ABΓ$, $ΔΕ$ ἄρα τριγώνων ἀντιπεπόνθασιν αἱ πλευραὶ, αἱ περὶ τὰς ἴσας γωνίας.

altera, et vice versa. Hic quoque situs secundae et tertiae inter se permutari possunt. Cf. Pfeiderer l. c. §. 121. Apud Campanum Prop. nostra VI. 12. non separatim numeratur, sed praecedenti VI. 11. (apud Campanum VI. 10.) tantum subiungitur.

PROPOSITIO XIII.

Obs. Pars posterior Obs. 5. ad VI. 8. etiam adhuc huius problematis solutionem exhibet, facile inveniendam. Pfeiderer l. c. §. 126. Caeterum VI. 15. Prop. est apud Campanum VI. 9. Docet illa aliis verbis „si ratio duarum magni-

aequales angulos sunt; et quorum triangulorum unum angulum uni aequalem habentium reciproca sunt latera circa aequales angulos, illa sunt aequalia.

Sint aequalia triangula $AB\Gamma$, $A\Delta E$, unum angulum uni aequalem habentia, scilicet angulum $B\Gamma A$ angulo $\Delta A E$; dico triangulorum $AB\Gamma$, $A\Delta E$ reciproca esse latera, quae circa aequales angulos sunt, hoc est, esse ut ΓA ad $A\Delta$ ita $E A$ ad AB .

Ponantur enim ita ut in directum sit ΓA ipsi $A\Delta$; in directum igitur est (I. 14.) et $E A$ ipsi AB . Et iungatur $B\Delta$.

Et quoniam aequale est triangulum $AB\Gamma$ triangulo $A\Delta E$, est autem aliud triangulum $AB\Delta$; est igitur (V. 7.) ut triangulum ΓAB ad triangulum $B\Delta A$ ita triangulum $A\Delta E$ ad triangulum $B\Delta A$. Sed ut ΓAB quidem ad $B\Delta A$ ita (VI. 1.) ΓA ad $A\Delta$, ut $E A\Delta$ vero ad $B\Delta A$ ita $E A$ ad AB : erit igitur (V. 11.) ΓA ad $A\Delta$ ita $E A$ ad AB ; triangulorum igitur $AB\Gamma$, $A\Delta E$ reciproca sunt latera, quae circa aequales angulos sunt.

radiorum expressa sit per datas rectas invenire rationem subduplicatam rationis datae.

PROPOSITIO XIV.

Obs. 1. Exemplum huiusmodi parallalogrammorum praebent, quae in I. 43. vocantur parallelogrammorum circa diagonalem complementa. Cf. Pfeiderer l. c. §. 134.

Obs. 2. Demonstratio, qua ex aequalitate angulorum ad B op. I. 14. infertur, si AB , BE sint in directum, fore et ZB , BH in directum, praeter morem praeceptum videtur, et rectius deduci posse videtur ex ea conversa I. 15. Prop. quam

Ἀλλὰ δὴ ἀντιπεπονθέτωσαν αἱ πλευραὶ τῶν $ABΓ$ $ΔΕ$ τριγώνων, καὶ ἔστω ὡς ἡ $ΓΑ$ πρὸς τὴν $Α$ οὕτως ἡ $ΕΑ$ πρὸς τὴν $ΑΒ$. λέγω ὅτι ἴσον ἐστὶ τὸ $ΑΒΓ$ τριγώνον τῷ $ΔΕ$ τριγώνῳ.

Ἐπιζευχθείσης γὰρ πάλιν τῆς $ΒΔ$, ἐπεὶ ἴσιν ἡ $ΓΑ$ πρὸς τὴν $ΑΔ$ οὕτως ἡ $ΕΑ$ πρὸς τὴν $ΑΒ$ ἀλλ' ὡς μὲν ἡ $ΓΑ$ πρὸς τὴν $ΑΔ$ οὕτως τὸ $ΑΒ$ τριγώνον πρὸς τὸ $ΒΑΔ$ τριγώνον, ὡς δὲ ἡ $ΕΑ$ πρὸς τὴν $ΑΒ$ οὕτως τὸ $ΕΑΔ$ τριγώνον πρὸς τὸ $ΒΑ$ τριγώνον· ὡς ἄρα τὸ $ΑΒΓ$ τριγώνον πρὸς τὸ $ΒΑ$ οὕτως τὸ $ΕΑΔ$ τριγώνον πρὸς τὸ $ΒΑΔ$ · ἐκότερον ἄρα τῶν $ΑΒΓ$, $ΔΕ$ πρὸς τὸ $ΒΑΔ$ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον. ἴσον ἄρα ἐστὶ τὸ $ΑΒΓ$ τριγώνον τῷ $ΕΑ$ τριγώνῳ. Τῶν ἄρα ἴσων, καὶ τὰ ἐξῆς.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ιε'.

Ἐὰν τέσσαρες εὐθεῖαι ἀνάλογον ᾧσι, τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν μέσων περιεχομένῳ ὀρθογώνιῳ· καὶ τὸ ὑπὸ τῶν

iam Proclus desideravit, et nos ex eo supra attulimus. Cf. Pfeiderer l. c. §, 136.

PROPOSITIO XV.

Obs. 1. Propositiones 14. et 15. uno enunciato, parit ac duas propositionis VI. 1. partes comprehendere, atque eundem ope I. 34. unam ex altera inferre licet. Coniunctae autem quam seiunctae cur facilius intelligerentur, quod Austin. valde haud apparet. Cf. Pfeiderer l. c. §§. 139. 140.

Obs. 2. Propositiones 14. 15. parallelogrammi vel trianguli dati transformationem in aliud dati lateris, circa eundem vel aequalem angulum reducunt ad problemam VI. 12. Idem scilicet quarta proportionalis lateri dato, et duobus parallelogrammi, triangulive dati circa angulum designatum lateribus

Ἀλλὰ διὰ ἀντιπεπονημένου τοῦ
 $\triangle ADE$ τριγώνου, καὶ ἴσως ὅτι
 οὕτως ἡ EA πρὸς τὴν AB ὡς
 $\triangle ABΓ$ τριγώνου πρὸς τὸ $\triangle ADE$ τριγώνου.

Ἐπισημειώσας γὰρ πάλιν τὴν
 ἡ GA πρὸς τὴν AD οὕτως ἡ EA
 ἀλλ' ὡς μὲν ἡ GA πρὸς τὴν AD
 τριγώνου πρὸς τὸ $\triangle BAD$ τριγώνου, καὶ
 τὴν AB οὕτως τὸ EAD τριγώνου
 τριγώνου ὡς ὅρα τὸ $ABΓ$ τριγώνου
 οὕτως τὸ EAD τριγώνου πρὸς τὸ BAD
 ὅρα τὸν $ABΓ$, $\triangle ADE$ πρὸς τὸ BAD
 ἔχει λόγον ἴσον ὅρα ὅτι τὸ $ABΓ$ τριγώνου
 τριγώνου. Τὸν ὅρα ἴσον, καὶ τὸ BAD

ΠΡΟΤΑΣΙΣ

Ἐάν τέσσαρες εὐθείαι ἀντιστοιχίαν
 ἔχον περιεχόμενον ὀρθογώνιον
 τῶν μέσων περιεχομένων ὀρθογώνι-
 ον Proclus desideravi, et nos ex eo ap-
 Pfliderer l. c. §. 136.

PROPOSITIO II

Obs. 1. Propositiones 11. et 15. aequi-
 ae deas propositionis VI. 1. parte componi-
 ope I. 34. unam ex altera inferre licet. Ita
 quam seinnactae cur facilius intelligeretur,
 haud apparet. Cf. Pfliderer l. c. §. 136.

Obs. 2. Propositiones 14. 15. parallelogra-
 guli dati transformationem in aliud dati lateris
 vel aequalem angulum reducant ad problemata
 scilicet quarta proportionalis lateris dati, et data
 grammi, triangulive dati circa angulum

Sint autem reciproca latera triangulorum $ABΓ$,
 $\triangle ADE$, et sit ut GA ad AD ita EA ad AB ; dico ae-
 quale esse triangulum $ABΓ$ triangulo $\triangle ADE$.

Iuncta enim rursus BA , quoniam est ut GA ad
 AD ita EA ad AB , sed ut GA quidem ad AD ita
 (VI. 1.) triangulum $ABΓ$ ad triangulum BAD , ut EA
 vero ad AB ita triangulum EAD ad triangulum BAD :
 erit igitur (V. 11.), ut triangulum $ABΓ$ ad BAD ita
 triangulum EAD ad BAD ; utrumque igitur ipsorum
 $ABΓ$, $\triangle ADE$ ad BAD eandem habet rationem; ae-
 quale igitur est (V. 9.) triangulum $ABΓ$ triangulo
 EAD . Aequalium igitur etc.

PROPOSITIO XVI. (Fig. 364.)

Si quatuor rectae proportionales sint, rectangulum
 sub extremis contentum aequale est rectangulo sub me-
 diis contento; et si rectangulum sub extremis conten-
 exhibit alterum circa hunc angulum latus parallelogrammi-
 angulive construendi. Nominatum ope Prop. 14. in compen-
 dium redigitur solutio problematis I. 44. Cf. Pfliderer l. c.
 §§. 141. 142.

Obs. 3. Facile etiam Prop. 15. extendi potest ad trian-
 gula, quorum unus angulus unius, et unus angulus alterius simul
 sumti sunt duobus rectis aequales. Cf. infra ad VI. 25. Obs. 9.

PROP. XVI. XVII.

Obs. 1. Prop. 16. ut Corollarium 14. et Prop. 17. ut
 Cor. 16. sisti, vel etiam utraque immediate demonstrari potest
 eisdem modis, quibus 14. Ambae etiam sic enuncitari pos-
 sunt: parallelogrammorum rectangulorum aequalium bases sunt
 altitudinibus reciproce proportionales; ac vicissim aequalia sunt

ἄκρων περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον ἢ τῷ ὑπὸ τῶν
 μείων περιεχομένῳ ὀρθογωνίῳ, αἱ τέσσαρες εὐθείαι
 ἀνάλογον εἰσονται.

Ἔστωσαν αἱ τέσσαρες εὐθεῖαι ἀνάλογον αἱ AB
 $ΓΔ$, E , Z ὡς ἡ AB πρὸς τὴν $ΓΔ$ οὕτως ἡ E πρὸς
 τὴν Z · λέγω ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν AB , Z περιεχόμενον
 ὀρθογώνιον ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν $ΓΔ$, περιεχομένῳ
 ὀρθογωνίῳ.

Ἠχθωσαν γὰρ ἀπὸ τῆς A , $Γ$ σημείων ταῖς AB
 $ΓΔ$ εὐθείαις πρὸς ὁρθὰς αἱ AH , $ΓΘ$, καὶ τετα-
 τῇ μὲν Z ἴση ἡ AH , τῇ δὲ E ἴση ἡ $ΓΘ$, καὶ συμ-
 πεπληρώσωσαν τὰ BH , $ΔΘ$ παραλληλόγραμμα.

Καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ AB πρὸς τὴν $ΓΔ$ οὕτως ἡ E
 πρὸς τὴν Z , ἴση δὲ ἡ μὲν E τῇ $ΓΘ$, ἡ δὲ Z τῇ
 AH · ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ AB πρὸς τὴν $ΓΔ$ οὕτως ἡ $ΓΘ$
 πρὸς τὴν AH · τῶν BH , $ΔΘ$ ἄρα παραλληλογράμμου

parallelogramma rectangula, quorum bases sunt altitudinibus
 reciproce proportionales Cf. Pfeiderer l. c. §. 143.

Obs. 2. Cum quodvis parallelogrammum obliquangulum
 aequale sit rectangulo aequo alto super eadem basi (I. 35.)
 generatim etiam (V. 7. V. 11.) duo quaecunque parallelogramma
 aequalia habent bases altitudinibus reciproce proportionales
 ac vicissim. Unde ope I. 41. V. 15. idem de triangulis a-
 qualibus deducitur (ibid. §§. 144. 145.).

Obs. 3. Quodsi priores 16. et 17. partes ad corollaria 1.
 in Elementis ac in Obs. 2. 3. ad VI. 8. subiuncta applicen-
 tur; hae emergunt propositiones. Perpendiculo ab vertice an-
 guli recti trianguli rectanguli in hypotenusam demisso, 1) qua-
 dratum huius perpendiculi aequatur rectangulo sub segmentis
 hypotenusae ab ipso factis. 2) Cuiuslibet catheti quadratum
 aequale est rectangulo sub hypotenusa, et sub eius segmento,
 quod catheto huic adiacet. 3) Rectangulum sub lateribus circa
 angulum rectum aequale est rectangulo sub hypotenusa et per-

ἴσων περιγόμενον ὀρθογώνιον ἴσων περιγόμενον ὀρθογώνιον, ὅτι ἐκ τῶν ἴσων ἐκείνων.

Ἐστωσαν αἱ τέσσαρες εὐθείαι $AB, \Gamma A, E, Z$ ὥς ἡ AB πρὸς τὴν ΓA τὴν E πρὸς τὴν Z . λέγω ὅτι τὸ ἐκ τῶν $AB, \Gamma A$ ὀρθογώνιον ἴσον ἐστὶ τῷ ἐκ τῶν E, Z ὀρθογώνιῳ.

Ἦρῃσιν γὰρ ἀπὸ τῆς A τῶν ΓA εὐθείας πρὸς ὀρθόν· αἱ $AB, \Gamma A$ γὰρ μὲν Z ἴση ἡ AB , τὴν δὲ E ἴση τῇ ΓA συμπληρώσονται τὰ $BH, \Delta\Theta$ παραλληλόγραμμα.

Καὶ ἐπει τὸν ὡς ἡ AB πρὸς τὴν ΓA πρὸς τὴν Z , ἴση δὲ ἡ μὲν E τῇ ΓA · ἴσων ἄρα ὡς ἡ AB πρὸς τὴν ΓA πρὸς τὴν $\Delta\Theta$ τὰν $BH, \Delta\Theta$ ἀνὰ ἑκάστην.

tum aequale est rectangulo sub extremis contento, quatuor rectae proportionales erunt.

Sint quatuor rectae proportionales $AB, \Gamma A, E, Z$, ut AB ad ΓA ita E ad Z ; dico rectangulum sub $AB, \Gamma A$ contentum aequale esse rectangulo sub E, Z contento.

Ducantur enim ab ipsis A, Γ punctis ipsis $AB, \Gamma A$ rectis ad rectos angulos $AH, \Gamma\Theta$, et ponatur ipsi quidem Z aequalis AH , ipsi vero E aequalis $\Gamma\Theta$, et compleantur parallelogramma $BH, \Delta\Theta$.

Et quoniam est ut AB ad ΓA ita E ad Z , aequalis autem E quidem ipsi $\Gamma\Theta$, ipsa vero Z ipsi AH ; est igitur (V. 7.) ut AB ad ΓA ita $\Gamma\Theta$ ad AH ; parallelogrammorum igitur $BH, \Delta\Theta$ reciproca sunt la-

parallelagramma rectangula, quorum bases sunt reciprocae proportionales Cf. Phaedrus I. c. 2.

Obs. 2. Cum quodvis parallelogrammum aequale sit rectangulo aequo alto super eadem generationem etiam (V. 7. 11.) duo quaecunque aequalia habent bases alitudinibus reciprocae ac vicissim. Unde ope I. 44. V. 13. alia quaelibet deducitur (ibid. §§. 14. 15.).

Obs. 3. Quodsi priores 16. et 17. pars in Elementis ac in Obs. 2. §. ad VI. 8. attinet; haec emergunt propositiones. Perpendiculum recti trianguli rectanguli in hypotenusa etiam huius perpendiculi aequatur rectangulo sub hypotenusa ab ipso factis. 2) Cuiuslibet recti trianguli rectanguli in hypotenusa aequale est rectangulo sub hypotenusa, et sub catheto huic adiacenti. 3) Rectangulum sub angulo rectum aequale est rectangulo sub angulo recto et sub perpendiculo aequatur rectangulo sub altero latere circa angulum rectum et sub segmento hypotenusae, quod priori adiacet catheto. In circulo 5) quadratum perpendiculi ab quocunque peripheriae puncto ad aliquam eius diametrum ducti aequatur rectangulo sub segmentis diametri ab perpendiculo factis. 6) Cuiuslibet chordae per centrum non transeuntis quadratum aequale est rectangulo sub diametro per unum chordae extremum ducta, et sub diametri huius segmento chordae contiguo, quod ab illa abscindit perpendiculum in illam ex altero chordae extremo demissum. Unde porro con-

sequitur: perpendiculo in hypotenusam trianguli rectanguli (diametrum circuli) demisso ex vertice anguli recti (puncto quocunque peripheriae), et in circulo ductis ab hoc puncto rectis ad extrema diametri; 7) hypotenusam (diametrum) esse aequale ad alterutrum ipsius segmentum, uti quadratum hypotenusae (diametri) ad quadratum catheti (chordae) huic segmento ad-

ἀντισπεπόνθασιν αἱ πλευραὶ, αἱ περὶ τὰς ἴσας γωνίας.
 Ὡν δὲ ἰσογωνίων παραλληλογράμμιων ἀντισπεπόν-
 θασιν αἱ πλευραὶ, αἱ περὶ τὰς ἴσας γωνίας, ἴσα ἐστὶ
 ἐκείνα· ἴσον ἄρα ἐστὶ τὸ BH παραλληλόγραμμον τῷ
 $\Delta\Theta$ παραλληλογράμμῳ. Καὶ ἐστὶ τὸ μὲν BH τὸ ἐν
 τῶν AB, Z , ἴση γὰρ ἢ AH τῇ Z · τὸ δὲ $\Delta\Theta$ τὸ ἐν
 τῶν $\Gamma\Delta, E$, ἴση γὰρ ἢ $\Gamma\Theta$ τῇ E · τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν
 AB, Z περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον ἐστὶ τῷ ἐν
 τῶν $\Gamma\Delta, E$ περιεχομένῳ ὀρθογώνιῳ.

Ἀλλὰ δὴ τὸ ὑπὸ AB, Z περιεχόμενον ὀρθογώ-
 νιον ἴσον ἔστω τῷ ὑπὸ τῶν $\Gamma\Delta, E$ περιεχομένῳ ὀρ-
 θογώνιῳ· λέγω ὅτι αἱ τέσσαρες εὐθεῖαι ἀνάλογον ἴσυν-
 ται, ὥς ἢ AB πρὸς τὴν $\Gamma\Delta$ οὕτως ἢ E πρὸς τὴν Z .

Τῶν γὰρ αὐτῶν κατασκευασθέντων, ἐπεὶ τὸ ἐν
 τῶν AB, Z ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν $\Gamma\Delta, E$, καὶ ἐστὶ
 τὸ μὲν ὑπὸ τῶν AB, Z τὸ BH , ἴση γὰρ ἐστὶν ἡ
 AH τῇ Z · τὸ δὲ ὑπὸ τῶν $\Gamma\Delta, E$ τὸ $\Delta\Theta$, ἴση γὰρ

iacentis: vel ut huius catheti (chordae) quadratum ad quadra-
 tum istius segmenti; vel ut quadratum catheti (chordae) ad
 iacentis alteri segmento ad quadratum perpendiculari. Nemp
 (Fig. 356.)

$$\begin{aligned} BG : \Gamma\Delta &= BGq : BG \times \Gamma\Delta \text{ (Obs. 4. ad VI. 1.) } = BGq : \Gamma\Delta q \\ &= BG \times \Gamma\Delta : \Gamma\Delta q &= \Gamma\Delta q : \Gamma B \\ &= \Gamma B \times B\Delta : \Gamma\Delta \times \Delta B &= ABq : ABq \end{aligned}$$

nr. 2. 6.

8) Ipsa autem hypotenussae (diametri) segmenta esse, cui qua-
 drata cathetorum (chordarum) adiacentium $B\Delta : \Delta\Gamma = \Gamma B \times B\Delta$
 $\Gamma B \times \Delta\Gamma$ (Obs. 4. ad VI. 1.) $= ABq : A\Gamma q$ (nr. 2. 5.)

9) Eodemque, quo nr. 8. modo ostenditur, ex eodem pen-
 pheriae puncto ductis diametro et duabus pluribusve chordis
 perpendicularisque ab alteris harum terminis in diametrum de-
 missis: quadrata chordarum esse ut segmenta ipsis adiacentibus

tera, quae circa aequales angulos sunt. Quorum autem aequiangulorum parallelogrammorum reciproca sunt latera circa aequales angulos, illa sunt aequalia (VI. 14.); aequale igitur est parallelogrammum BH parallelogrammo $\Delta\Theta$. Et est BH quidem sub AB , Z contentum, aequalis enim AH ipsi Z ; parallelogrammum vero $\Delta\Theta$ sub $\Gamma\Delta$, E continetur, aequalis enim $\Gamma\Theta$ ipsi E ; rectangulum igitur sub AB , Z contentum aequale est rectangulo sub $\Gamma\Delta$, E contento.

Sit autem rectangulum sub AB , Z contentum aequale rectangulo sub $\Gamma\Delta$, E contento; dico quatuor rectas proportionales fore, ut AB ad $\Gamma\Delta$ ita E ad Z .

Hisdem enim constructis, quoniam rectangulum sub AB , Z aequale est rectangulo sub $\Gamma\Delta$, E contento, et est rectangulum quidem sub AB , Z ipsum BH , aequalis enim AH ipsi Z ; rectangulum vero sub $\Gamma\Delta$,

diametri. Cf. Pfleiderer l. c. §. 147. (Caeterum quatuor primas in hac observatione occurrentes propositiones iam vidimus in corollariis ad I. 41. et I. 43.).

Obs. 4. Propositionum obs. praecedente expositarum tres primae, usus in demonstrandis X. 34. X. 35. X. 36. gratia traduntur in Lemm. 1. ante X. 34. et ope VI. 17. VI. 16. stabiliuntur mediantibus analogiis una ab VI. 8. Cor. parte priori petita, caeteris ex ipsis propositionibus VI. 8. VI. 4. deductis (vid. Obs. 2. ad VI. 8.); tertia insuper demonstratur, rectangulis sub BA et AF , BF et AD descriptis, colligendo ex I. 34. utrumque: duplum esse trianguli ABF . Primae et secundae demonstratio eadem, quae in Lemm. 1. ante X. 34. reperitur in Lemm. post XIII. 13. ad efficiendam praecedentis septimae (Obs. 3.) partem tertiam. Eiusdem septimae pars prima in demonstrationibus XIII. 14. XIII. 15. XIII. 16. tan-

ἡ $\Gamma\Theta$ τῇ E . τὸ ἄρα BH ἴσον ἐστὶ τῷ $\Delta\Theta$ καὶ ἐστὶ ἰσογώνια. Τῶν δὲ ἴσων καὶ ἰσογώνιων παραλληλογράμμων ἀντιπεπόνθαι αἱ πλευραὶ, αἱ περὶ τὰ ἴσας γωνίας· ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ AB πρὸς τὴν $\Gamma\Delta$ οὕτως ἡ $\Gamma\Theta$ πρὸς τὴν AH . ἴση δὲ ἡ μὲν $\Gamma\Theta$ τῇ E , ἡ δὲ AH τῇ Z . ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ BA πρὸς τὴν $\Gamma\Delta$ οὕτως ἡ E πρὸς τὴν Z . Ἐὰν ἄρα τέσσαρες, καὶ τὴν ἐξῆς.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΙΖ.

Ἐὰν τρεῖς εὐθεῖαι ἀνάλογον ᾦσι, τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς μέσης τετραγώνῳ· καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον ἢ τῷ ἀπὸ τῆς μέσης τετραγώνῳ, αἱ τρεῖς εὐθεῖαι ἀνάλογον ἔσονται.

Ἐστῶσαν τρεῖς εὐθεῖαι ἀνάλογον αἱ A, B, Γ , ὡς ἡ A πρὸς τὴν B οὕτως ἡ B πρὸς τὴν Γ . λέγεται ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν A, Γ περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς μέσης τῆς B τετραγώνῳ.

Κείσθω τῇ B ἴση ἡ Δ .

quam nota simpliciter sumitur: pariterque bis in demonstratione XIII. 18. semel autem, bisve, cum adiuncta ratione ἰσογώνιον γάρ ἐστι τὸ $AB\Gamma$ τρίγωνον τῷ $\Gamma\Delta\Delta$ τριγώνῳ: in demonstrationibus XIII. 13. autem, pariter ac secunda pars XIII. 18. ex proportione $B\Gamma:\Gamma\Delta=A\Gamma:\Gamma\Delta$, vel $\Gamma\Delta:A\Gamma=B\Gamma$ rursus utrobique ab VI. 8. VI. 4. deducta inferitur p. VI. 20. Cor. 2. Quae omnia, iuncta iis, quae Obs. 2. a VI. 8. notata fuere, nimis, quam ut auctori Elementorum tribui possint, ab methodo abludunt alias ipsi solenni, praemissas demonstrationum subsequentium suis locis ad perpetuum deinceps usum stabilicendi; nominatim etiam theorematum generaliorum ad speciales casus applicationes frequenter deinceps;

ἡ $\Gamma\Theta$ τῇ E · τὸ ἀπὸ BH ἰσὺν ἡ
 ἰσώνη. Τὴν δὲ ἰσὺν καὶ ἀπὸ
 ῥαβδίων ἀντιστοιχούντων αἱ ἰσὺν
 ἰσὺς γωνίας ἔστιν ἀπὸ τῆς AB ἰσὺς
 ἡ $\Gamma\Theta$ πρὸς τὴν AH · ἰσὺν δὲ τῆς
 AH τῇ Z ἰσὺν ἀπὸ τῆς AM ·
 τὴν δὲ E πρὸς τὴν Z · ἔστιν ἰσὺς
 ἡ E ·

E ipsum: $\Delta\Theta$, aequalis enim $\Gamma\Theta$ ipsi E ; erit para-
 ellogrammum BH aequale parallelogrammo $\Delta\Theta$ et su-
 equiangula. Aequalium autem et equiangulorum pa-
 allelogrammorum reciproca sunt latera (VI. 14.), circū-
 equales angulos; est igitur ut AB ad $\Gamma\Delta$ ita $\Gamma\Theta$ a-
 AH . Aequalis autem $\Gamma\Theta$ quidem ipsi E , ipsa ver-
 AH ipsi Z ; est igitur ut AB ad $\Gamma\Delta$ ita E ad Z .
 Si igitur quatuor etc.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ

PROPOSITIO XVII. (Fig. 365.)

Ἐὰν τρεῖς εὐθείαι ἀνέγκειν
 ἄλλων περιεχόμενον ὀρθόγωνον
 τῆς μίτης τετραγώνου τὸν τὸ ὑπὸ τῶν
 ῥαβδίων ὀρθόγωνον ἰσὺν τῷ ἀπὸ
 τῶν ῥαβδίων, αἱ τρεῖς εὐθείαι ἀνέγκειν

Si tres rectae proportionales sint, rectangulum sub
 extremis contentum aequale est quadrato ex media; et
 si rectangulum sub extremis contentum aequale sit qua-
 drato ex media, tres rectae proportionales erunt.

Ἐστωσαν τρεῖς εὐθείαι ἀνέγκειν
 ἡ A πρὸς τὴν B ὡς τῇ Γ ·
 ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν A, Γ περιεχόμενον
 ὅτι τὸ ἀπὸ τῆς μίτης τῆς B τετραγώνου

Sint tres rectae proportionales A, B, Γ , ut A a-
 B ita B ad Γ ; dico rectangulum sub A, Γ conten-
 tum aequale esse quadrato ex B .

Ponatur ipsi B aequalis Δ .

Κείσθω τῇ B ἰσὺν ἡ Δ .

adhibendas. quamvis obvias et faciles, seorsim enunciand
 ut immediate essent ad usus occurrentes paratae. Cf. Obs. 2
 ad II. 3. Unde, quum ineutiae et oscitantiae auctoris is
 tribuere haud liceat, probabile sit, ut hodiernum, ita et olim
 communibus, uironum praecipue etiam usibus parata fuisse ele
 mentorum exemplaria variis modis respectibusque, compand
 eo facilitatis gratia, forsan et arctioris systematis praetext
 (vid. Proclus in libr. II. p. 21.) truncata, sicque plura, praec
 sertim, quae solis X. ac XIII. in praecedentibus libris inserv
 rent, his excidisse: ac multifariam, nec apte semper et un
 formiter, illorum textui assutis lemmatibus (Cf. Obs. 5. a
 Euclid. Element. P. II.

P

quam nota simpliciter remittit: perinde
 cione XIII. 18. semel enim, hinc, cum
 ἰσώνητος γὰρ ἐστὶ τὸ $AB\Gamma$ τῶν τῶν $AB\Gamma$
 demonstrationibus XIII. 13. item, perinde
 XIII. 18. ex proportione $BF:FA=AF:FA$
 $AF:BF$ rursus utrobique ab VI. 5. VI. 4. habet
 VI. 20. Cor. 2. Quae omnia, hinc, ut
 VI. 8. notata finire, nimis, quam ut nota
 bui possint, ab methodo ablatum aliquid
 as demonstrationum subsequenter tam
 deinceps usum stabilendi; notatum cum
 mentalium ad speciales casus applicandum

Καὶ ἵπεί ἐστιν ὡς ἡ A πρὸς τὴν B οὕτως ἡ B πρὸς τὴν Γ , ἴση δὲ ἡ B τῇ Δ ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ A πρὸς τὴν B οὕτως ἡ Δ πρὸς τὴν Γ . Ἐάν δὲ πάλιν εὐθείαι ἀνάλογον ᾧσι, τὸ ὑπὸ τῶν ἁρῶν περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν μέσων περιεχομένῳ ὀρθογώνιῳ· τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν A, Γ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν B, Δ . Ἀλλὰ τὸ ὑπὸ τῶν B, Δ ἀπὸ τῆς B ἐστὶν, ἴση γὰρ ἡ B τῇ Δ τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν A, Γ περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς B τετραγώνῳ.

VI. 1.), insertisque auctariis ansam dedisse. Cf. Pfeiderer §. 148.

Obs. 5. Ope Prop. VI. 17. demonstrari posse I. 47. diximus in Excursu ad I. 47. Cf. Pfeiderer §. 149.

Obs. 6. Eadem Prop. VI. 17. explicat identitatem constructionis problematum II. 14. et VI. 13., quae sequepeller docet. Cf. Pfeiderer §. 150.

Obs. 7. Uti casus particularis Prop. III. 35. quem sinit assertum Obs. 3. nr. 5. ac solutio problematis II. 14. (vid. Obs. 3. ad II. 14. sub finem) in libro II. et III. ope II. 5. I. 47. demonstratur, heic per III. 31. VI. 8. VI. 17. adstruitur, et universim Prop. III. 35. ex III. 21. VI. 4. VI. 16. potest inferri. Ostenditur nempe, duas rectas intra circulum se secantes se mutuo secare in partes reciproce proportionales, unde caetera ex VI. 16. fluunt. Cf. Pfeiderer. §. 151.

Obs. 7. Similiter Prop. III. 36. ipsiusque conversam III. 37. ex III. 32. eiusque conversa, et VI. 4. VI. 6. VI. 17. accipere licet. Ostenditur nempe, duabus rectis in circulum incidentibus, quarum una circulum contingat, altera secet, contingentem mediam proportionalem esse inter secantem, eiusque partem exteriorem, et contingentis quadratum aequari rectangulo sub tota secante, ipsiusque parte exteriori, et vice versa. Cf. Pfeiderer. §. 152.

Ἀλλὰ δὴ τὸ ὑπὸ τῶν A, Γ ἴσον ἔστι τῷ ἐπὶ τῆς B · λέγω ὅτι ἴστιν ὡς ἡ A πρὸς τὴν B οὕτως Γ πρὸς τὴν Γ .

Τῶν γὰρ αὐτῶν κατασκευασθέντων, ἐπὶ τὸ ἐπὶ τῶν A, Γ ἴσον ἔστι τῷ ἀπὸ τῆς B , ἀλλὰ τὸ ἀπὸ τῆς B τὸ ὑπὸ τῶν B, Δ ἴστιν, ἴση γὰρ ἡ B τῇ Δ · τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν A, Γ ἴσον ἔστι τῷ ὑπὸ B, Δ . Ἐπὶ

extremisque basis interiacentibus aequale sit quadrato rectae ab eodem occursus puncto ad verticem trianguli ductae: recta vero inter punctum illud occursus ac terminos basis in ipsa abscissae eandem habéant rationem, quam crurum trianguli, quibus adiacent, quadrata. Nempe, si triangulo AFB , cuius crura $AB > BF$, circulus circumscribitur, et hunc in B contingens agitur recta BA : ob angulum $ABF = A$ (III. 32.) $< AFB$ (I. 18.), ideoque angulos $ABF + AFB < AFB + AFB$ h. e. (I. 13.) < 2 rectis: ad partes angulorum ABF, AFB concurrent rectae AF, BA (I. Post. 5.). Ac tum rectang. $AA \times AF = ABq$ (Obs. 7.) et $AA : AF = ABq : BFq$ (Obs. 6.) Vicissim 1) si trianguli non aequicruri AFB basis AF ad partes cruris minoris BF sic producitur, ut rectangulum sub adiecta GA et sub composita AA ex basi AF et adiecta GA aequale sit quadrato rectae AB ab termino A continuationis basis ad trianguli verticem B ductae: recta haec circulum triangulo circumscriptum in B contingit (Obs. 8. nr. 2.) et segmenta basis AA, AF terminis ipsius A, Γ , ac puncto A intercepta sunt uti quadrata crurum trianguli AB, BF , ipsis adiacentium (Obs. 8. nr. 1.). Atque 2) si trianguli non aequicruri AFB basis AF ad partes cruris minoris sic in A usque producitur, ut segmenta eius AA, AF , puncto hoc A , terminisque basis A, Γ intercepta, sint, ut crurum trianguli AB, BF ipsis adiacentium quadrata: recta ab puncto A ad verticem B trianguli ducta circulum triangulo circumscriptum in B contingit (Obs. 9. nr. 2.) et rectae AB quadratum aequale est rectangulo sub segmentis AA, AF basis puncto A ac terminis eius A, Γ

*Αἰτὶ δὲ τὸ ὅτι τῶν A, Γ Sed rectangulum sub A, Γ aequale sit quadra-
 τῆς B ἵστω ὅτι ἴσων ἐστὶν A B ; dico esse ut A ad B ita B ad Γ .
 B πρὸς τὴν Γ .*

*Τῶν γὰρ αὐτῶν κατασκευῶν, Iisdem enim constructis, quoniam rectangulum
 τῶν A, Γ ἵσων ἐστὶν τῷ B A, Γ aequale est quadrato ex B , sed quadratu
 τῆς B τὸ τῆς B B, Δ B est rectangulum sub B, Δ , aequalis enim B
 τὸ Δ τῶν A, Γ Δ ; erit igitur rectangulum sub A, Γ aequale re*

extremisque basis interiacentibus aequale interceptis (Obs. 8. nr. 1.). Posterior conversa est Lem
 eodem occurrit puncto ad rectam AE Libri II. Locorum planorum Apollonii. Cf. Pflleiderer. §
 vero inter punctum illud occurrit a AE Obs. 10. Pariter immediate per III. 21. vel III.
 alicuius eadem habeant rationem, quae VI. 4. VI. 16, demonstratur, quod a Clavio et Baermann
 quibus adjacent, quadrata. Nempe, ut Prop. 36. subiungitur corollarium (vid. supra III. 36. Cor
 erus $AB > BF$, circulus circumscriptus, nempe si a puncto extra circulum ducantur duae rectae
 tingens igitur recta BA : ob angulum $\angle AFB$ secantes, rectangula sub totis secantibus, et partibus
 $< \angle AFB$ (I. 18.), ideoque angulus $\angle AFB$ exterioribus aequalia esse, sive, quod eodem redit, tot
 h. e. (I. 13.) < 2 rectis: ad punctum secantes esse partibus suis exterioribus reciproce proportio
 concurrunt rectae AF, BE (I. Pm. 31.) Cf. Pflleiderer. §. 155.
 $AA \times AF = AB^2$ (Obs. 7.) α $AA : AF = AB^2 : AF^2$ Obs. 11. Ex VI. 16. porro consequitur, cuiuslibet
 Vicissim 1) si trianguli non sequatur anguli ABA (Fig. 366.) angulo quocunque A bifariam sect
 tes cruris minoris BF sic producat, ut rectam AF , rectangulum sub eius lateribus AA, AB ang
 iecta FA et sub composita AA ex basi AA A comprehendentibus aequale esse rectangulo sub segm
 quale sit quadrato rectae AB ab termino AF, FB tertii lateris, ab recta AF factis, una cum
 sis ad trianguli verticem B ductae rectae AF quadrato (quae est Rob. Simson. Libr. VI.
 gulo circumscriptum in B contingit (Obs. 8. B.). Circumscribatur enim triangulo ABA circulus (IV
 basis AA, AF terminis ipsius A, F , ut per quii recta AF producta rursus occurrat in E , et iungatur
 sunt uti quadrata crurum trianguli AB, BF una recta AE, BE . Posteriore ducta, est angulus $A = E$
 (Obs. 8. nr. 1.). Atque, si trianguli AB, BF 21.). Quare, cum etiam sit angulus $AA\Gamma = BAE$ (hyp
 basis AF ad partes cruris minoris de AF $AA : AF = EA : AB$ (VI. 4.) et hinc rectang. $AA \times AB =$
 ut segmenta eius AA, AF , puncto AE AF (VI. 16.) $= AF \times FE + AF^2$ (II. 3.) $= AF \times FB +$
 A, Γ intercepta, sint, ut crurum trianguli AB, BF (III. 35.). Cf. Pflleiderer. §. 157.
 i. e. ut quadrata: recta ab puncto A AE Obs. 12. Porro rectangulum sub duobus quibus
 gulo ducta circulum triangulo circumscripto latetibus cuiuslibet trianguli aequale est rectangulo sub
 (Obs. 9. nr. 2.) et rectae AB quadrato AE metro circuli triangulo circumscripti et sub perpendiculari
 sub sequenti AA, AF basi puncto A AE vertice anguli, quem latera ista comprehendunt, in latu

δὲ τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων ἴσων ἢ τῷ ὑπὸ τῶν μέσων, α
τέσσαρες εὐθείαι ἀνάλογόν εἰσιν ἔστιν ἄρα ὡς ϵ Δ
πρὸς τὴν B οὕτως ἢ Δ πρὸς τὴν Γ . Ἰση δὲ ἢ B
τῇ Δ ὡς ἄρα ἢ A πρὸς τὴν B οὕτως ἢ B πρὸς τὴν
 Γ . Ἐὰν ἄρα τρεῖς, καὶ τὰ ἐξῆς.

Π Ρ Ο Τ Α Σ Ι Σ ιγ.

Ἀπὸ τῆς δοθείσης εὐθείας τῷ δοθέντι εὐθε-
γράμῳ ὁμοίῳ τε καὶ ὁμοίως κείμενον εὐθύγραμ-
μον ἀναγράφαι.

tium demisso. 1) Si ipsum alterutrum latus AB (Fig. 367.)
tertio $B\Gamma$ est perpendiculare: alterum AI diameter est circuli
triangulo circumscripti (III. 31. Conv. vid. Obs. ad III. 31.
vel III. 33. nr. 2.) et propositio ad hanc identicam recta:
rectang. $BA \times AI = \Gamma A \times AB$. 2) Si uterque ad basin conten-
tium latus $B\Gamma$ (Fig. 368.) angulus est acutus, quicumque sit
angulus BAG duobus lateribus BA , AG comprehensus; vel
si alteruter ad basin angulus $AB\Gamma$ (Fig. 369.) est obtusus,
per verticem A ducta diametro AZE , et iuncta BE recta, pe-
pendiculoque AA in basin $B\Gamma$ demisso; ob angulos ABE ,
 $AA\Gamma$ rectos (III. 31. et Constr.) atque $E = \Gamma$ (III. 21.) in tri-
angulis ABE , $AA\Gamma$ est $BA : AE = AA : AG$ (VI. 4.), primò
rectangul. $BA \times AG = EA \times AA$ (VI. 16.). (Rob. Simson
Prop. C. Libr. VI. Pfeiderer, §. 158.). Hinc rectang. $B\Gamma \times$
 $AA : BA \times AG = B\Gamma \times AA : EA \times AA$ (V. 7.) $= B\Gamma : EA$ (Obs.
4. ad VI. 1.), ubi rectang. $B\Gamma \times AA$ duplum est areae trian-
guli (I. 41.). Quare duplum areae cuiusvis trianguli est et
rectangulum sub duobus ipsius lateribus, uti tertium latus et
diametrum circuli triangulo circumscripti. Cf. Pfeiderer
§. 159.

Obs. 13. Rectangulum contentum diagonalibus AG , BI
(Fig. 370.) figurae quadrilaterae circulo inscriptae aequale est
duobus rectangulis $AB \times AI + B\Gamma \times AA$ contentis oppositis eius
lateralibus. Fiat enim angulus ABE aequalis angulo $AB\Gamma$, et

Ἐστω ἡ μὲν δοθεῖσα εὐθείαι ἡ AB , τὸ δὲ δοθεὶς
εὐθύγραμμον τὸ $ΓΕ$. δεῖ δὴ ἀπὸ τῆς AB εὐθείας
τῷ $ΓΕ$ εὐθύγραμμῳ ὁμοῖον τε καὶ ὁμοίως περικεῖσθαι
εὐθύγραμμον ἀναγράψαι.

Ἐκτετεύχθω ἡ AZ , καὶ συνεστατω πρὸς τῇ AB
εὐθείᾳ καὶ τοῖς πρὸς αὐτῇ σημείοις τοῖς A , B τῇ
μὲν πρὸς τῷ $Γ$ γωνία ἴση ἡ ὑπὸ HAB , τῇ δὲ ἐπὶ
 GAZ ἴση ἡ ὑπὸ ABH . λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ GAZ λοιπὴ
τῇ ὑπὸ AHB ἐστὶν ἴση· ἰσογώνιον ἄρα ἐστὶ τὸ $ZΓA$
τρίγωνον τῷ HAB τριγώνῳ· ἀνάλογον ἄρα ἐστὶν ὡς
ἡ ZA πρὸς τὴν HB οὕτως ἡ $ZΓ$ πρὸς τὴν HA καὶ

segmenti ad AG basin segmenti dimidii. Quum enim si
 $ABGA$ quadrilaterum circulo inscriptum, erit ex præced. AA
 $\times BG + AB \times AG = AB \times AG$ i. e. ob $BΓ = AG$ (III. 29.) $(AA$
 $+ AB) \times AG = AB \times AG$ (II. 1.), adeoque $AA + BA : GA = AB$
 $: AG$ (VI. 14.). (Playfair Prop. E. VI. Cf. 91. vel ut est apud
Rob. Sims. Dat. 97.).

Obs. 14. Conversas præcedentium, præter iam Obs. 1.
sq. expositas notamus adhuc sequentes. Si quadratum per-
pendiculari AA (Fig. 356.), quod in trianguli $ABΓ$ latus $BΓ$ an-
gulis ipsius acutis interiacens ex vertice opposito A demittit-
tur, æquale est rectangulo sub segmentis BA , AG lateris $BΓ$
ab perpendicularo AA factis, seu (VI. 17.) si perpendicularum
 AA medium proportionale est inter segmenta BA , AG lateris
 $BΓ$: trianguli ad verticem A angulus est rectus. Quippe ob
 $BA : AA = AA : AG$, et angulos ad A rectos, est angulus BAA
 $= Γ$ (VI. 6.); angulus igitur $BAG = Γ + ΓAA =$ recto (I. 32.
Cor. 5.). Cf. Pfleiderer. §. 160. Pappus Collect. Mathem.
I. VII, Prop. 203. propositioni huic adiungit: si quadratum
perpendiculari AA (Fig. 372.) minus fuerit rectangulo sub seg-
mentis BA , AG lateris $BΓ$, angulus BAG erit obtusus, si minus
(Fig. 373.) acutus. Semicirculo enim super diametro $BΓ$ de-
scripto, qui perpendicularum AA in puncto E secet, ac rectus

Sit data quidem recta AB , datum autem rectilineum ΓE ; oportet a recta linea AB rectilineo ΓE simile et similiter positum rectilineum describere.

Iungatur AZ , et constituatur (I. 23.) ad rectam AB et ad puncta in ea A , B angulo quidem ad Γ aequalis angulus HAB , angulo vero ΓAZ aequalis angulus ABH ; reliquus igitur ΓZA reliquo AHB est aequalis (I. 32.); aequiangulum igitur est triangulum ZTA triangulo HAB ; est igitur (VI. 4.) ut ZA ad HB ita ZT ad HA et ΓA ad AB . Rursus, con-

BE , ΓE iunctis ob $EA \perp$ rectangulo $BA \times \Gamma A$ (Obs. 3. nr. 5.) priori casu erit $AA < EA$, et hinc angulus $BA\Gamma > BE\Gamma$ (I. 21.); posteriori $AA > EA$, atque angulus $BA\Gamma < BE\Gamma$ (I. 21.). Rectus autem est angulus $BE\Gamma$ (III. 31.). Cf. Pflaiderer. §. 161. Propositorum in hac observatione casus specialis, quo segmenta BA , ΓA aequalia sunt, comprehenditur etiam iis, quae nr. 2. in Excursu ad I. Prop. 47. etc. ad finem libri II. diximus. Cf. Pflaiderer. §. 162. Et, quum ostensum sit, rectum esse angulum $BA\Gamma$ (Fig. 356.), quem ab extremis B , Γ rectae $B\Gamma$ ad extremum A perpendiculari AA ductae BA , ΓA comprehendunt, si rectang. $BA \times \Gamma A = AA^2$, seu si $BA:AA = AA:\Gamma A$; per conversam III. 31. consequitur: circuli super diametro $B\Gamma$ descripti peripheriam transire per verticem A rectae AA diametro $B\Gamma$ inter extrema ipsius normalis, quae media proportionalis est inter segmenta diametri $B\Gamma$ puncto A facta, seu cuius quadratum rectangulo sub segmentis illis est aequale. Cf. Pflaiderer. §. 163. Ea quae ad hanc propositionem notata sunt solutioni etiam plurimorum problematum inservire possunt, quorum exquisitam copiam exhibet Pflaiderer. l. c. §§. 166–194, quae brevitatis studio hic praeterimus. Quae hactenus ad Propositiones libri VI. observata sunt, desumimus pleraque ex Pflaidereri scholiis in libro VI. Elementorum Eu-

ἡ $\Gamma\Delta$ πρὸς τὴν AB . Πάλιν, συνεστιάτω πρὸς τῇ BH εὐθείᾳ καὶ τοῖς πρὸς αὐτῇ σημείοις τοῖς B , H τῇ μὲν ὑπὸ ΔZE γωνίᾳ ἴση ἡ ὑπὸ $BH\Theta$, τῇ δὲ ἐπὶ $\Delta\Delta E$ ἴση ἡ ὑπὸ $HB\Theta$ λοιπὴ ἄρα ἡ πρὸς τῷ E λοιπῇ τῇ πρὸς τῷ Θ ἴσιν ἴση· ἰσογώνιον ἄρα ἐστὶ τὸ $\Delta\Delta E$ τρίγωνον τῷ $HB\Theta$ τριγώνῳ· ἀνάλογον ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ ΔZ πρὸς τὴν HB οὕτως ἡ ZE πρὸς τὴν $H\Theta$, καὶ ἡ EA πρὸς τὴν ΘB . Ἐδείχθη δὲ καὶ ὡς ἡ $\Delta\Delta$ πρὸς τὴν HB οὕτως ἡ τε $Z\Gamma$ πρὸς τὴν HA καὶ ἡ $\Gamma\Delta$ πρὸς τὴν AB · καὶ ὡς ἄρα $Z\Gamma$ πρὸς τὴν AH οὕτως ἡ τε $\Gamma\Delta$ πρὸς τὴν AB καὶ ἡ ZE πρὸς τὴν $H\Theta$, καὶ ἔτι ἡ EA πρὸς τὴν ΘB . Καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ μὲν ὑπὸ $\Gamma\Delta\Delta$ γωνία τῇ ὑπὸ AHB , ἡ δὲ ὑπὸ ΔZE τῇ ὑπὸ $BH\Theta$ ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ ΓZE ὅλη τῇ ἴσῃ $AH\Theta$ ἴσιν ἴση. Διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ἡ ὑπὸ $\Gamma\Delta E$ τῇ ὑπὸ $AB\Theta$ ἴσιν ἴση, ἔστι δὲ καὶ ἡ μὲν πρὸς τῷ Γ τῇ πρὸς τῷ A ἴση, ἡ δὲ πρὸς τῷ E τῇ πρὸς τῷ Θ · ἰσογώνιον ἄρα ἐστὶ τὸ $A\Theta$ τῷ ΓE , καὶ τὰς περὶ τὰς ἴσας γωνίας αὐτῷ πλευρὰς ἀνάλογον ἔχει ὁμοίαν ἄρα ἐστὶ τὸ $A\Theta$ εὐθύγραμμον τῷ ΓE εὐθύγραμμο.

elidis, quorum P. I. Tubingae 1800.; P. II. 1801.; P. III. 1802. typis expressae fuerunt. Pars IV. prodit ibidem 1805. in qua unice de VI. propositione 23. et VI. definitione 5. utpote qua nititur VI. Prop. 23. agitur. Quippe hanc ipsam VI. 23. inapte loco suo motam et inter propositiones ad figuras similes pertinentes positam fuisse iudicat auctor. De hac itaque postea loco suo, et in excursu ad hunc librum videmus. Dolendum autem est, scholia Pfsleidereri in reliquis libri VI. propositiones, quas ille iam elaborata in scriptis habet, sublata in Universitate Tubingensi consuetudine, occasione Magisterii philosophici quotannis dissertationes publicas conscribendi, non in publicam lucem exire potuisse. E quibus benevolae ab auctore nobiscum communicatis, nonnullae

utitur (I. 23.) ad rectam BH et ad puncta in ea B , H , angulo quidem $\angle ZE$ aequalis $BH\theta$, angulo vero $\angle AE$ aequalis $HB\theta$; reliquus igitur ad E reliquo ad θ est aequalis (I. 32.); equiangulum igitur est triangulum $\triangle ZE$ triangulo $HB\theta$; est igitur (VI. 4.) ut AZ ad HB ita ZE ad $H\theta$, et EA ad θB . Ostensum est autem etiam, ut ZA ad HB ita $Z\Gamma$ ad HA et ΓA ad AB , ut igitur (V. 11.) $Z\Gamma$ ad AH ita et ΓA ad AB et ZE ad $H\theta$, et adhuc EA ad θB . Et quoniam aequalis est angulus quidem $\angle ZA$ angulo AHB , angulus vero $\angle ZE$ angulo $BH\theta$; totus igitur $\angle ZE$ toti $AH\theta$ est aequalis. Ex eadem ratione et $\angle AE$ angulo $AB\theta$ est aequalis, est autem et angulus quidem ad Γ ipsi ad A aequalis, angulus vero ad E ipsi ad θ ; equiangulum igitur est $\triangle A$ ipsi $\triangle E$, et circa aequales angulos latera proportionalia habet; simile igitur est rectilineum $A\theta$ rectilineo ΓE (VI. 1. Def.),

certe in sequentibus breviter lectoribus nostris sistere volumus, nos rem ipsis admodum gratam facturos esse, persuasi. Cf. quae supra diximus ad VI. Def. 1.

PROPOSITIO XVIII.

Obs. 1. Quod ad sensum problematis, et maxime verborum „similiter positum“ attinet, Clavius eum ita exprimit: „dicuntur rectilinea super lineas rectas descripta esse similia et similiter posita, quando anguli aequales constituuntur super ipsas rectas lineas, et tam reliqui aequales anguli, quam latera proportionalia semper ordine sese consequuntur.“ Borellus autem rem ita explicat (Euclid. restit. lib. IV. Prop. 16.): problema poscit, super data recta linea describere polygonum

Απὸ τῆς δοθεῖσης ἄρα εὐθείας τῆς AB τῇ δοθέντι εὐθυγράμμῳ $ΓΕ$ ὁμοίων τε καὶ ὁμοίως τεταμένον εὐθύγραμμον ἀναγέγραπται τὸ $ΑΘ$. Ὅπου ἔδει ποιῆσαι.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ 19.

Τὰ ὅμοια τρίγωνα πρὸς ἀλλήλα ἐν διπλασίονι λόγῳ ἔστι τῶν ὁμολόγων πλευρῶν.

Ἐστω ὅμοια τρίγωνα τὰ $ABΓ$, $ΔΕΖ$ ἵσιν ἔστω τὴν πρὸς τῷ B γωνίαν τῇ πρὸς τῷ E , ὡς δὲ τῇ AB πρὸς τὴν $ΒΓ$ οὕτως τὴν $ΔΕ$ πρὸς τὴν $ΕΖ$, ὥστε ὁμολόγον εἶναι τὴν $ΒΓ$ τῇ $ΕΖ$. λέγω ὅτι τὸ $ABΓ$ τρίγωνον πρὸς τὸ $ΔΕΖ$ τρίγωνον διπλασίονα λόγῳ ἔχει ἤπερ ἡ $ΒΓ$ πρὸς τὴν $ΕΖ$.

Εἰλήφθω γὰρ τῶν $ΒΓ$, $ΕΖ$ τρίτη ἀνάλογος ἡ BH , ὥστε εἶναι ὡς τὴν $ΒΓ$ πρὸς τὴν $ΕΖ$ οὕτως τὴν $ΕΖ$ πρὸς τὴν BH . καὶ ἐπεξείχθω ἡ HA .

Ἐπεὶ οὖν ἔστιν ὡς ἡ AB πρὸς τὴν $ΒΓ$ οὕτως ἡ $ΔΕ$ πρὸς τὴν $ΕΖ$. ἐναλλάξ ἄρα ἔστιν ὡς ἡ AB πρὸς τὴν $ΔΕ$ οὕτως ἡ $ΒΓ$ πρὸς τὴν $ΕΖ$. Ἀλλ' ὡς ἡ $ΒΓ$ πρὸς τὴν $ΕΖ$ οὕτως ἔστιν ἡ $ΕΖ$ πρὸς τὴν BH . καὶ ὡς ἄρα ἡ AB πρὸς τὴν $ΔΕ$ οὕτως ἡ $ΕΖ$ πρὸς τὴν BH . τῶν ABH , $ΔΕΖ$ ἄρα τριγώνων ἐπιτεπρόνθασιν αἱ πλευραὶ, αἱ περὶ τὰς ἴσας γωνίας

dato aequiangulum, et habens circum angulos aequales latera proportionalia lateribus illius, ita ut data recta homologa sit dato lateri polygoni. Necessitatem autem vocum „similitudinis“, quae Ramus definiti debuisse non sine ratione monet, iure asserit Tartalea contra Campanum (in cuius versione VI. Prop. apud ipsum 19. illae omissae sunt). Nempe omittuntur haec verba plura uno rectilineo super data recta construi possunt, ita ut dato rectilineo sint similia. Cf. Pfeiderer. Schol. msc. §§. 256. 257.

A data igitur recta AB dato rectilineo TE simile et similiter positum rectilineum $A\theta$ descriptum est. Quod oportebat facere.

PROPOSITIO XIX. (Fig. 376.)

Similia triangu^{la} inter se sunt in duplicata ratione homologorum laterum

Sint similia triangu^{la} $AB\Gamma$, ΔEZ , angulum ad B aequalem habentia angulo ad E , et sit ut AB ad $B\Gamma$ ita ΔE ad EZ , ita ut homologum sit $B\Gamma$ ipsi EZ ; dico triangu^{lum} $AB\Gamma$ ad triangu^{lum} ΔEZ duplicatam rationem habere eius quam habet $B\Gamma$ ad EZ .

Sumatur enim (VI. 11.) ipsis $B\Gamma$, EZ tertia proportionalis BH , ita ut sit ut $B\Gamma$ ad EZ ita EZ ad BH ; et iungatur HA .

Et quoniam est ut AB ad $B\Gamma$ ita ΔE ad EZ ; alterne igitur est (V. 16.) ut AB ad ΔE ita $B\Gamma$ ad EZ . Sed ut $B\Gamma$ ad EZ ita est EZ ad BH ; ut igitur (V. 11.) AB ad ΔE ita EZ ad BH ; triangu^{lorum} igitur ABH , ΔEZ reciproca sunt latera circa aequales angulos. Quorum autem triangu^{lorum} unum angulum uni aequalem habentium, reciproca sunt latera circa ae-

Obs. 2. Circa demonstrationem huius propositionis, ut est in textu graeco, iure monet Rob. Simson., vitiatam eam videri, quod in quadrilateris tantum ostendatur propositio, nec dicatur, quo modo extendi possit ad rectilinea quinque aut plurium laterum. Idem praeterea observat, in duobus triangu^{lis} inter se aequiangulis hic concludi, esse latus unius ad latus homologum alterius, ut latus aliud primi ad latus alterius huic homologum, sine permutatione proportionalium contra morem Euclidis, ut ex sequente Prop. 19. manifestum sit,

Ἐάν δὲ, μίαν μιᾷ ἴσην ἔχοντων γωνίαν τριγώνων, ἀντι-
πεπόνθωσιν αἱ πλευραὶ, αἱ περὶ τὰς ἴσας γωνίας.
ἴσα ἔστιν ἐκεῖνα· ἴσον ἄρα ἔστι τὸ ABH τρίγωνον τῷ
 ΔEZ τριγώνῳ. Καὶ ἐπεὶ ἔστιν ὡς ἡ $BΓ$ πρὸς τὴν
 EZ οὕτως ἡ EZ πρὸς τὴν BH . ἔάν δὲ τρεῖς εὐθείαι
ἀνάλογον ᾧσιν, ἡ πρώτη πρὸς τὴν τρίτην διπλασίονα
λόγον ἔχειν λέγεται ἥπερ πρὸς τὴν δευτέραν ἡ $BΓ$
ἄρα πρὸς τὴν BH διπλασίονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ $BΓ$
πρὸς τὴν EZ . Ὡς δὲ ἡ $BΓ$ πρὸς τὴν BH οὕτως
τὸ $ABΓ$ τρίγωνον πρὸς τὸ ABH τρίγωνον καὶ τὸ
 $ABΓ$ ἄρα τρίγωνον πρὸς τὸ ABH διπλασίονα λόγον
ἔχει ἥπερ ἡ $BΓ$ πρὸς τὴν EZ . Ἰσον δὲ τὸ ABH
τρίγωνον τῷ ΔEZ τριγώνῳ καὶ τὸ $ABΓ$ ἄρα τρίγ-
ωνον πρὸς τὸ ΔEZ τρίγωνον διπλασίονα λόγον ἔχει
ἥπερ ἡ $BΓ$ πρὸς τὴν EZ . Τὰ ἄρα ὅμοια, καὶ ταῖς ἐξ-

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α.

Ἐκ δὴ τούτου φανερόν, ὅτι ἔάν τρεῖς εὐθείαι
ἀνάλογον ᾧσιν, ἔστιν ὡς ἡ πρώτη πρὸς τὴν τρίτην
οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς πρώτης τρίγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς
δευτέρας ὅμοιον καὶ ὁμοίως ἀναγραφόμενον ἐπειπερ
ἐδείχθη, ὡς ἡ $ΓΒ$ πρὸς τὴν BH οὕτως τὸ $ABΓ$ τρι-
γωνον πρὸς τὸ ABH τρίγωνον, τοιούτοι τὸ ΔEZ .

Π Ρ Ο Τ Α Σ Ι Σ ι.

Τὰ ὅμοια πολύγωνα εἰς τε ὅμοια τρίγωνα δια-
ρεῖται καὶ εἰς ἴσα τὸ πλῆθος καὶ ὁμόλογα τοῖς ὅλοις

idemque vitium recurrere in conclusionem. Contra hanc tamen
observationem forte haud iniuria monere queas, nisi conclu-
sionem a Rob. Simson. reprehensam non quidem enunciato &
demonstratione VI. 4. Cf. Pfeiderer. l. c. §. 261. Perfectior
autem demonstratio problematis solutionem ostendere potest
primum in triangulis, ab his procedere ad figuras quadrilateras,
ab his ad quinquelateras, et ita semper a quavis figura recti-

quales angulos, illa sunt aequalia (VI. 15.); aequale igitur est triangulum ABH triangulo $\triangle EZ$. Et quoniam est ut BF ad EZ ita EZ ad BH ; si autem tres rectae proportionales sint, prima ad tertiam duplicatam rationem habere dicitur (V. 10. Def.) eius quam ad secundam; BF igitur ad BH duplicatam rationem habet eius quam BF ad EZ . Ut autem BF ad BH ita (VI. 1.) triangulum ABF ad triangulum ABH ; ergo et triangulum ABF ad ABH duplicatam rationem habet eius quam BF ad EZ . Aequale autem est triangulum ABH triangulo $\triangle EZ$; unde et triangulum ABF (V. 7.) ad triangulum $\triangle EZ$ duplicatam rationem habet eius quam BF ad EZ . Ergo similia etc.

COROLLARIUM.

Ex hoc manifestum est, si tres rectae proportionales sint, esse ut prima ad tertiam ita triangulum ex prima ad triangulum ex secunda simile et similiter descriptum; quia ostensum est, ut FB ad BH ita triangulum ABF ad triangulum ABH , hoc est $\triangle EZ$.

PROPOSITIO XX. (Fig. 378.)

Similia polygona in similia triangula dividuntur, et numero aequalia et homologa totis; et polygonum ad lineam ad aliam, quae habeat numerum laterum unitate maiorem, unde deinde generaliter propositum constabit.

Obs. 3. Aliam modum paullo expeditiorem, super linea data AB constituendi figuram rectilineam similem et similiter positam dato rectilineo $\triangle AEZ$ (Fig. 375.) Clavius docet ita fere. Ponatur data AB super latus AE , quod ei homologum esse debet, ducantur deinde ex A ad vertex angulorum figurae

καὶ τὸ πολύγωνον πρὸς τὸ πολύγωνον διπλασίονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ὁμόλογος πλευρὰ πρὸς τὴν ὁμόλογον πλευράν.

Ἐστω ὅμοια πολύγωνα τὰ $ABΓΔΕ$, $ZHΘΚΛ$. ὁμόλογος δὲ ἔστω ἡ AB τῇ ZH . λέγω ὅτι τὰ $ABΓΔΕ$, $ZHΘΚΛ$ πολύγωνα εἰς τε ὅμοια τρίγωνα διαιροῦνται καὶ εἰς ἴσα τὸ πλῆθος καὶ ὁμόλογα τοῖς ὅλοις, καὶ τὸ $ABΓΔΕ$ πολύγωνον πρὸς τὸ $ZHΘΚΛ$ πολύγωνον διπλασίονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ AB πρὸς τὴν ZH .

Ἐπεξεύρωσαν αἱ BE , $ΕΓ$, $ΗΑ$, $ΑΘ$.

Καὶ ἐπεὶ ὁμοιὸν ἐστὶ τὸ $ABΓΔΕ$ πολύγωνον τῷ $ZHΘΚΛ$ πολυγώνῳ, ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ BAE γωνία τῇ ὑπὸ HZA καὶ ἐστὶν ὡς ἡ BA πρὸς AE οὕτως ἡ ZH πρὸς ZA . Ἐπεὶ οὖν δύο τρίγωνα ἐστὶ τὰ ABE , ZHA μίαν γωνίαν μὲν γωνία ἴσην ἔχοντα, περὶ δὲ τὰς ἴσας γωνίας τὰς πλευρὰς ἀνάλογον ἔχοντα γινώσκοντες ὅτι τὸ ABE τρίγωνον τῷ ZHA τριγώνῳ, ὥστε καὶ ὁμοιον ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ $ABΓ$

rectae AA , AE etc. per B ducatur $BΘ$ parallela rectae $ΓΔ$; per $Θ$ pariter $ΘΙ$ parallela rectae $ΔΕ$ etc. et facile ostendetur esse triangula $ABΘ$, $ΑΓΑ$; $ΑΘΙ$, $ΑΔΕ$ etc. adeoque tota recta linea $ABΘΙΚ$, $ΑΓΔΕΖ$ similia et similiter posita.

Obs. 4. Huc pertinet problema (vid. XII. 2. et XII. 11.) dato circulo inscribendi (circumscribendi) figuram rectilineam datæ circulo alii inscriptæ (circumscriptæ) similem et similiter positam. Cf. Pfeleiderer. l. c. §§. 263. 264.

PROPOSITIO XIX.

Obs. 1. Sensus huius propositionis est (Cf. dicta ad V. Def. 10.), similia triangula inter se habere rationem, quæ eadem sit rationi duplicatæ laterum homologorum, vel triangulum $ABΓ$ esse ad aliud ei simile $ΔΕΖ$ in eadem ratione in

καὶ τὸ πολυγώνον πρὸς τὸ ὁμολογόν
ἔχει ἴσην τῇ ὁμολογῶν πρὸς
λογὸν πλάτους.

Ἐστὶ ὁμοία πολυγώνη τὰ $ABΓΔΕ$
ὁμολογὸς δὲ ἔστω τῇ AB τῇ ZH ἡ
 $ZHΘΚΑ$ πολυγώνη εἰς πέντε γωνίας
καὶ ἵς ἴσα τὸ πλάτος καὶ ὁμολογῶν
τὸ $ABΓΔΕ$ πολυγώνον πρὸς τὸ
γωνίων ἀπλοσίονα λόγον εἶναι τῇ
 ZH .

Ἐπεὶ γὰρ ὁμοίαι αἱ BE , EF , HA , $ΑΘ$.
Καὶ ἐπεὶ ὁμοίων ἐστὶ τὸ $ABΓΔΕ$
 $ZHΘΚΑ$ πολυγώνον, ἴση ἔστω ἡ
τῇ ἐπὶ HZ καὶ ἴσων αἱ τῇ BE
ἡ ZH πρὸς $ZΛ$. Ἐπεὶ οὖν ὁμοίαι
 ABE , ZHA ἴσων γωνίων καὶ ἴσων
πρὸς δὲ τὰς ἴσας γωνίας τὸ ABE
γωνίων ἀρα ἴσων τὸ ABE γωνίων
γωνία, ὥστε καὶ ὁμοίων ἴσων ἔσται

rectae AA , AE etc. per E ducatur BE etc.
per Θ paret ΘI parallela rectae AE etc. et
esse trianguia $AB\Theta$, $AT\Gamma$, $AT\Delta$, $AT\Theta$ etc.
hinc $AB\Theta I\Delta$, $AT\Delta EZ$ similia et similia etc.
Obs. 4. Hoc pertinet problema (vid. Lib.
dato circulo inscribendi (circumscripti) etc.
dato circulo alii inscripae (circumscripti) etc.
hinc positam. Cf. Pfeiderer. L. c. §§. 269. 270. 271. 273.

PROPOSITIO III

Obs. 1. Sensus huius propositionis (vid. Lib.
Def. 10.), similia trianguia inter se habent
eandem sit rationi duplicatae laterum homologorum
gulum $AB\Gamma$ esse ad aliud ei simile DEF etc.

polygonum duplicatam rationem habet eius quam ho-
nologum latus ad homologum latus.

Sint similia polygona $ABΓΔΕ$, $ZHΘΚΑ$, homo-
logum vero sit latus AB ipsi ZH ; dico $ABΓΔΕ$,
 $ZHΘΚΑ$ polygona in similia trianguia dividi et in
numero aequalia et homologa totis, et polygonum
 $ABΓΔΕ$ ad polygonum $ZHΘΚΑ$ duplicatam ratio-
nem habere eius quam habet AB ad ZH .

lungantur BE , EF , HA , $ΑΘ$.

Et quoniam simile est polygonum $ABΓΔΕ$ poly-
gono $ZHΘΚΑ$, aequalis est angulus BAE angulo
 HZA ; et est ut BA ad AE ita ZH ad ZA (VI.
Def. 1.). Et quoniam duo trianguia ABE , ZHA
unum angulum uni angulo aequalem habentia, circa
aequales autem angulos latera proportionalia; aequian-
gulum igitur est triangulum ABE triangulo ZHA
(VI. 6.), quare et (VI. 4.) simile; aequalis igitur est

qua est latus BF prioris trianguli ad rectam aliquam, ad quam
 BF habet rationem duplicatam eius rationis, quam BF habet
ad latus EZ ipsi homologum in altero triangulo, vel, si su-
mitur (VI. 11.) $BF : EZ = EZ : BH$, esse triangulum ABF ad
triangulum $A EZ$ in eadem ratione, in qua est BF ad BH .
Cacterum patet, loco laterum BF , EZ quaevis alia homologa
poni potuisse. Et inverse erit ratio trianguli $A EZ$ ad triangu-
lum ABF duplicata lateris EZ ad BF , vel erit triangulum
 $A EZ$ ad triangulum ABF ut BH ad BF (Cor. ad B. V.).
Pfeiderer. in sched. msc. §§. 269. 270. 271. 273.

Obs. 2. Quodsi in triangulorum similium (Fig. 377.)
homologa latera BF , EZ perpendicularia $ΑΘ$, AK demittantur
ex verticibus angularum homologorum, erit, ob angulos B et
 E , pariterque Θ et K , adeoque (I. 32.) etiam reliquos aequa-

Euclid. Element. P. II.

Q

γωνία τῇ ὑπὸ ZHA . Ἐστὶ δὲ καὶ ὅλη ἡ ὑπὸ $ABΓ$ ὅλη τῇ ὑπὸ $ZHΘ$ ἴση, διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν πολυγώνων· λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ $EBΓ$ γωνία λοιπῇ τῇ ὑπὸ $AHΘ$ ἴσιν. Καὶ ἐπεὶ διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν ABE , ZHA τριγώνων, ἐστὶν ὡς ἡ EB πρὸς BA οὕτως ἡ AH πρὸς HZ , ἀλλὰ μὲν καὶ διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν πολυγώνων, ἐστὶν ὡς ἡ AB πρὸς BF οὕτως ἡ ZH πρὸς $HΘ$ · διότου ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ EB πρὸς $BΓ$ οὕτως ἡ AH πρὸς $HΘ$, καὶ περὶ τὰς ἴσας γωνίας τὰς ὑπὸ $EBΓ$, $AHΘ$ αἱ πλευραὶ ἀνάλογαι εἰσιν· ἰσογώνιον ἄρα ἐστὶ τὸ $EBΓ$ τρίγωνον τῷ $AHΘ$ τριγώνῳ, ὥστε καὶ ὅμοιον (ἐστὶ τὸ $EBΓ$ τρίγωνον τῷ $AHΘ$ τριγώνῳ¹). Διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὸ $EΓΔ$ τρίγωνον ὅμοιον ἐστὶ τῷ $AΘΚ$ τριγώνῳ· τὰ ἄρα ὅμοια πολύγωνα τὰ $ABΓΔΕ$, $ZHΘΚΑ$ εἰς τε ὅμοια τρίγωνα διίκεται καὶ εἰς ἴσα τὸ πλῆθος.

Λέγω ὅτι καὶ ὁμόλογα τοῖς ὅλοις, τοιούστιν, ἔτι ἀνάλογον εἶναι τὰ τρίγωνα, καὶ ἡγούμενα μὲν εἶναι τὰ ABE , $EBΓ$, $EΓΔ$, ἐπόμενα δὲ αὐτῶν τὰ ZHA , $AHΘ$, $AΘΚ$, καὶ ὅτι τὸ $ABΓΔΕ$ πολύγωνον πρὸς τὸ $ZHΘΚΑ$ πολύγωνον διπλασίονα λόγον ἔχει ἤπερ ὁμόλογος πλευρὰ πρὸς τὴν ὁμόλογον πλευράν, τοιούστιν ἡ AB πρὸς τὴν ZH .

1) Verba uncis inclusa desunt in Ed. Oxon., nec multum refert, utrum ea ponas an omittas.

les, in triangulis aequiangulis $AΘ:AK=AB:AE$ (VI. 4. demonstr.) $=BΓ:EZ=AF:AZ$, adeoque (vid. dicta ad V. Def. 10.) triangula $ABΓ$, AEZ erunt etiam in ratione duplicata altitudinum $AΘ$, AK , vel perpendicularium similem situm habentium. Pfeiderer. §§. 280. 281.

Obs. 3. Quum parallelogramma semper dupla sint tri-

Ἐπεξεύχθωσαν γὰρ αἱ $ΑΓ$, $ΖΘ$.

Καὶ ἐπεὶ διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν πολυγώνων ἴσος ἐστὶν ἡ ὑπὸ $ΑΒΓ$ γωνία τῇ ὑπὸ $ΖΗΘ$, καὶ ὅτι ὡς ἡ $ΑΒ$ πρὸς $ΒΓ$ οὕτως ἡ $ΖΗ$ πρὸς $ΗΘ$ ἰσογώνιον ἐστὶ τὸ $ΑΒΓ$ τρίγωνον τῷ $ΖΗΘ$ τριγώνῳ ἴσος ἄρα ἐστὶν ἡ μὲν ὑπὸ $ΒΑΓ$ γωνία τῇ ὑπὸ $ΗΖΘ$, δὲ ὑπὸ $ΒΓΑ$ τῇ ὑπὸ $ΗΘΖ$. Καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶ ὑπὸ $ΒΑΜ$ γωνία τῇ ὑπὸ $ΗΖΝ$, ἐδείχθη δὲ καὶ ὑπὸ $ΑΒΜ$ τῇ ὑπὸ $ΖΗΝ$ ἴση καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ $ΑΜΒ$ λοιπῇ τῇ ὑπὸ $ΖΝΗ$ ἴση ἐστὶν ἰσογώνιον ἐστὶ τὸ $ΑΒΜ$ τρίγωνον τῷ $ΖΗΝ$ τριγώνῳ. Ὅμοιος δὲ δειξομεν ὅτι καὶ τὸ $ΒΜΓ$ τρίγωνον ἰσογώνιον ἐστὶ τῷ $ΗΝΘ$ τριγώνῳ ἀνάλογον ἄρα ἐστὶν, ὡς μὲν $ΑΜ$ πρὸς $ΜΒ$ οὕτως ἡ $ΖΝ$ πρὸς $ΝΗ$, ὡς δὲ ἡ $ΒΜ$ πρὸς $ΜΓ$ οὕτως ἡ $ΗΝ$ πρὸς $ΝΘ$ ὥστε καὶ ὅσον, ὡς ἡ $ΑΜ$ πρὸς $ΜΓ$ οὕτως ἡ $ΖΝ$ πρὸς $ΝΘ$. Ἀλλ' ὡς μὲν ἡ $ΑΜ$ πρὸς $ΜΓ$ οὕτως τὸ $ΑΒΜ$ τρίγωνον πρὸς $ΜΒΓ$, καὶ τὸ $ΑΜΕ$ πρὸς $ΕΜΓ$, πρὸς ἄλληλα γὰρ εἰσιν ὡς αἱ βάσεις καὶ ὡς ἄρα ἐν τῶν ἡγουμένων πρὸς ἐν τῶν ἐπομένων οὕτως ἅπαντα τὰ ἡγουμένα πρὸς ἅπαντα τὰ ἐπόμενα ὡς ἄρα τὸ $ΑΜΒ$ τρίγωνον πρὸς τὸ $ΒΜΓ$ οὕτως τὸ $ΑΒΕ$ πρὸς τὸ $ΓΒΕ$. Ἀλλ' ὡς τὸ $ΑΜΒ$ πρὸς τὸ $ΒΜΓ$ οὕτως ἡ $ΑΜ$ πρὸς $ΜΓ$ καὶ ὡς ἄρα ἡ $ΑΜ$ πρὸς $ΜΓ$ οὕτως τὸ $ΑΒΕ$ τρίγωνον πρὸς τὸ $ΕΒΓ$ τρίγωνον. Διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ὡς ἡ

triangula, quam quadrata in ratione duplicata rectorum $ΒΓ, ΕΖ$, adeoque etiam triangula similia erunt in ratione quadratorum laterum homologorum. Pfeiderer. §. 278.

Obs. 5. Quodsi latera homologa duorum similium triangulorum (parallelogrammorum) aequalia sunt, ista triangula (parallelogramma) aequalia erunt (V. 22. Cor.) et vice versa (Cor. Prop. m. in Excursu ad libr. V.)

Επεὶ ἐγγράφον γὰρ αἱ $ΔΓ, Ζδ$ Jungantur enim $ΑΓ, ΖΘ$.
 Καὶ ἐπεὶ διὰ τῆς ὁμοιότητος Et quoniam propter similitudinem polygonorum
 ὅτις ἡ $ΑΒ$ πρὸς $ΒΓ$ οὕτως ἡ $ΖΕ$ qualis est angulus $ΑΒΓ$ angulo $ΖΗΘ$, et est ut
 ὅτις ἡ $ΑΒ$ πρὸς $ΒΓ$ οὕτως ἡ $ΖΕ$ ad $ΒΓ$ ita $ΖΗ$ ad $ΗΘ$; aequiangulum est (VI.
 ὅτις ἡ $ΑΒ$ πρὸς $ΒΓ$ οὕτως ἡ $ΖΕ$ triangulum $ΑΒΓ$ triangulo $ΖΗΘ$; aequalis igitur
 ὅτις ἡ $ΑΒ$ πρὸς $ΒΓ$ οὕτως ἡ $ΖΕ$ angulus quidem $ΒΑΓ$ angulo $ΗΖΘ$, angulus v
 ὅτις ἡ $ΑΒ$ πρὸς $ΒΓ$ οὕτως ἡ $ΖΕ$ $ΒΓΑ$ angulo $ΗΘΖ$. Et quoniam aequalis est
 ὅτις ἡ $ΑΒ$ πρὸς $ΒΓ$ οὕτως ἡ $ΖΕ$ angulus $ΒΑΜ$ angulo $ΗΖΝ$, ostensus autem
 ὅτις ἡ $ΑΒ$ πρὸς $ΒΓ$ οὕτως ἡ $ΖΕ$ et $ΑΒΜ$ angulo $ΖΗΝ$ aequalis; et reliquus i
 ὅτις ἡ $ΑΒ$ πρὸς $ΒΓ$ οὕτως ἡ $ΖΕ$ (I. 32.) $ΑΜΒ$ reliquo $ΖΝΗ$ aequalis est; aeq
 ὅτις ἡ $ΑΒ$ πρὸς $ΒΓ$ οὕτως ἡ $ΖΕ$ angulum igitur est triangulum $ΑΒΜ$ triangulo $ΖΗ$
 ὅτις ἡ $ΑΒ$ πρὸς $ΒΓ$ οὕτως ἡ $ΖΕ$ Similiter ostendemus et triangulum $ΒΜΓ$ aequiang
 ὅτις ἡ $ΑΒ$ πρὸς $ΒΓ$ οὕτως ἡ $ΖΕ$ lum esse triangulo $ΗΝΘ$; est igitur (VI. 4.) ut $Α$
 ὅτις ἡ $ΑΒ$ πρὸς $ΒΓ$ οὕτως ἡ $ΖΕ$ quidem ad $ΜΒ$ ita $ΖΝ$ ad $ΝΗ$, ut vero $ΒΜ$
 ὅτις ἡ $ΑΒ$ πρὸς $ΒΓ$ οὕτως ἡ $ΖΕ$ $ΜΓ$ ita $ΗΝ$ ad $ΝΘ$; quare et ex aequo (V. 22.)
 ὅτις ἡ $ΑΒ$ πρὸς $ΒΓ$ οὕτως ἡ $ΖΕ$ $ΑΜ$ ad $ΜΓ$ ita $ΖΝ$ ad $ΝΘ$. Sed ut $ΑΜ$ ad $Μ$
 ὅτις ἡ $ΑΒ$ πρὸς $ΒΓ$ οὕτως ἡ $ΖΕ$ ita triangulum $ΑΒΜ$ ad $ΜΒΓ$, et $ΑΜΕ$ ad $ΕΜ$
 ὅτις ἡ $ΑΒ$ πρὸς $ΒΓ$ οὕτως ἡ $ΖΕ$ inter se enim sunt ut bases (VI. 1.); et (V. 12.)
 ὅτις ἡ $ΑΒ$ πρὸς $ΒΓ$ οὕτως ἡ $ΖΕ$ unum antecedentium ad unum consequentium ita om
 ὅτις ἡ $ΑΒ$ πρὸς $ΒΓ$ οὕτως ἡ $ΖΕ$ antecedentia ad omnia consequentia. Ut igitur tria
 ὅτις ἡ $ΑΒ$ πρὸς $ΒΓ$ οὕτως ἡ $ΖΕ$ ngulum $ΑΜΒ$ ad $ΒΜΓ$, ita $ΑΒΕ$ ad $ΓΒΕ$. Sed
 ὅτις ἡ $ΑΒ$ πρὸς $ΒΓ$ οὕτως ἡ $ΖΕ$ $ΑΜΒ$ ad $ΒΜΓ$ ita $ΑΜ$ ad $ΜΓ$; ergo ut (V. 11)
 ὅτις ἡ $ΑΒ$ πρὸς $ΒΓ$ οὕτως ἡ $ΖΕ$ $ΑΜ$ ad $ΜΓ$ ita triangulum $ΑΒΕ$ ad triangulum $ΕΒ$
 ὅτις ἡ $ΑΒ$ πρὸς $ΒΓ$ οὕτως ἡ $ΖΕ$ Ex eadem ratione et ut $ΖΝ$ ad $ΝΘ$ ita triangulu
 ὅτις ἡ $ΑΒ$ πρὸς $ΒΓ$ οὕτως ἡ $ΖΕ$ $ΖΗΑ$ ad triangulum $ΗΑΘ$. Et est ut $ΑΜ$ ad $Μ$

triangles, quam quadrat in ratione duplicata
 adeoque etiam tria similia sunt in ratio
 laterum homologorum. Pfeleiderer. § 25.
 Obs. 5. Quodsi latera homologa
 gylorum (parallelogrammorum) aequalia
 (parallelogramma) aequalia erant (V. 22. Cor.
 (Cor. Prop. m. in Excursu ad lib. V.)
 Obs. 6. Corollarium Prop. 19. adiectam, quod et Austri
 observat, nonnisi ipsam Prop. 19. aliis verbis, substituen
 nempe termino „ratio duplicata“ definitionem eius, enuncia
 verumtamen expeditionis in sequentibus (vid. Demonstr. V.
 22.; VI. 25.; VI. 31.) argumentationis causa diserte ea exp
 nere a re erat. Idem observandum est de Cor. Prop. 20. V.
 2. Cf. Pfeleiderer. §. 300.

ZN πρὸς $NΘ$ οὕτως τὸ ZHA τρίγωνον πρὸς τὸ $HAΘ$ τρίγωνον. Καὶ ἐστὶν ὡς ἡ AM πρὸς MG οὕτως ἡ ZN πρὸς $NΘ$ καὶ ὡς ἄρα τὸ ABE τρίγωνον πρὸς τὸ BEG τρίγωνον οὕτως τὸ ZHA τρίγωνον πρὸς τὸ HOA τρίγωνον, καὶ ἐναλλαξ ὡς τὸ ABE τρίγωνον πρὸς τὸ ZHA τρίγωνον οὕτως τὸ BEG τρίγωνον πρὸς τὸ $HAΘ$ τρίγωνον. Ὀμοίως δὲ δεῖξομεν, ἐπιζευχθεῖσιν τῶν BA , HK , ὅτι καὶ ὡς τὸ BEI τρίγωνον πρὸς τὸ $HAΘ$ τρίγωνον οὕτως τὸ $EΓA$ τρίγωνον πρὸς τὸ $AΘK$ τρίγωνον. Καὶ ἐστὶν ὡς τὸ ABE τρίγωνον πρὸς τὸ ZHA τρίγωνον οὕτως τὸ EBG πρὸς τὸ $AHΘ$, καὶ ἔτι $EΓA$ πρὸς τὸ $AΘK$ καὶ ὡς ἄρα ἐν τῶν ἡγουμένων πρὸς ἐν ταῖς ἐπομένων οὕτως ἅπαντα τὰ ἡγούμενα πρὸς ἅπαντα

PROPOSITIO XX.

Obs. 1. Quum polygona hac varia ratione in triangula dividi possint, distinctius dici oportebat, qua ratione id fieri debeat, ut in utroque similium polygonorum respective similia existant triangula. Nempe si in uno polygonorum a vertice anguli cuiuscunque v. gr. a vertice E ad vertices reliquorum angulorum omnium (exceptis duobus proximis) ducantur rectae EB , EF etc., pariterque in altero polygono a vertice eius anguli, qui cum angulo E similiter positus est, ducantur ad vertices reliquorum angulorum rectae AH , AO etc., tum etc. Atque, triangulis ita formatis, diagonales homologae, i. e. quae vertices angulorum respective aequalium iungunt, ut ex demonstratione patet, in partes respective aequales dividunt angulos, per quos transeunt, et ipsae hae diagonales sunt lateribus figurarum homologis proportionales. Cf. Pfeiderer Schol. §. 292.

Obs. 2. Quod demonstrationem attinet, pars secunda quod nempe homologa sint triangula ABE , ZHA , pariterque EBG , $AHΘ$ praeter rationem prolixa esse videtur, quum, de-

LIBER SEXTUS.

ΖΝ πρὸς ΝΘ οὕτως τὸ ΖΗΛ
H. 19 τρίγωνον. Καὶ ὅτι ἐὰν
πρὸς ΖΝ πρὸς ΝΘ καὶ ὡς ἐκεί-
νους τὸ ΒΕΓ τρίγωνον οὕτως
πρὸς τὸ ΗΘΑ τρίγωνον, καὶ ὡς ἐκεί-
νους πρὸς τὸ ΖΗΛ τρίγωνον
τρίγωνον πρὸς τὸ ΗΙΘ τρίγωνον.
Συνεπὲς, ἐκτεταγμένων τῶν ΒΓ, ΗΙ
ΒΕΓ τρίγωνον πρὸς τὸ ΗΙΘ
ΕΓΔ τρίγωνον πρὸς τὸ ΑΘΚ
ΕΓΔ τρίγωνον πρὸς τὸ ΑΘΚ
ἐστὶν ὡς τὸ ΑΒΕ τρίγωνον πρὸς
οὕτως τὸ ΕΒΓ πρὸς τὸ ΗΘΑ
ΑΘΚ καὶ ὡς ἄρα ἐν τῷ προηγου-
μένῳ οὕτως ἀπαντᾷ τὴν ἀναλογίαν
τρίγωνον ΖΗΛ

ita ZN ad NO; ergo (V. 11.) ut triangulum
ad triangulum BEG, ita triangulum ZHA ad
triangulum HOA, et alterne (V. 16.) ut triangulum
ZHA ita triangulum BEM ad
triangulum HAO. Similiter ostendemus, iunctis BE
ut triangulum BEG ad triangulum HAO ita tri-
angulum EGA ad triangulum AOK. Et quoniam
triangulum ABE ad ZHA ita EBG ad ALI
insuper EGA ad AOK; erit ut (V. 12.) unum ante
unum consequentium ita omnia anteceden-
tia ad omnia consequentia; est igitur ut triangulum
ZHA ita polygonum ABGAE
polygonum ZHOKA. Sed triangulum ABE ad
triangulum ZHA duplicatam rationem habet eius

PROPOSITIO monstrata ante triangulorum similitudine, res statim ex

Oba. I. Quum polygoni huiusmodi et V. 11. pateat, ut in altera demonstratione ad finem dividi possunt, distinctius dici oportet, ostenditur. Unde haud paucis potior visa fuit haec demonstratio, quam multi editores solam habent (v. g. Giordano da Birento, Candalla, Billingsley, O. Fineus, Henrion, Borellus, Barrow, Cotesius, Rob. Simpson, Playfair, alii) vel alteri addunt (ut Campanus, Zamachius, Commandinus, Boermannus, alii). Pseuderero tamen (S. 1. prior illa, subtiliori arte, et per consequentias magis diatras suppositi argumentans, potius genuina videtur. Altera expeditior, at remotiori consectario utens, et demonstrationem partis tertiae imitans. Caeterum, si haec altera demonstratio eo tantum consilio adhibetur, quod inscribi dicat, nempe ut ostendatur, homologa esse illa triangula, nihil opus erat verbis in Ed. Oxon. ad finem additis, quod variantibus notavimus: sin autem tertia quoque propositio

Obs. 2. Quod demonstratum est pars, nempe, similia polygona esse in ratione duplicata homologorum inde derivanda sint, sunt illa omnino necessaria. *Alia* praeter rationem prolixa esset.

τὰ ἐπόμενα ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ABE τρίγωνον πρὸς τὸ ZHA τρίγωνον οὕτως τὸ $ABΓΔΕ$ πολύγωνον πρὸς τὸ $ZHΘΚΑ$ πολύγωνον. Ἀλλὰ τὸ ABE τρίγωνον πρὸς τὸ ZHA τρίγωνον διπλασίονα λόγον ἔχει ἢπερ ἡ AB ὁμόλογος πλευρὰ πρὸς τὴν ZH ὁμόλογον πλευράν· τὰ γὰρ ὅμοια τρίγωνα ἐν διπλασίονι λόγῳ ἔστι τῶν ὁμολόγων πλευρῶν καὶ τὸ $ABΓΔΕ$ ἄρα πολύγωνον πρὸς τὸ $ZHΘΚΑ$ πολύγωνον διπλασίονα λόγον ἔχει ἢπερ ἡ AB ὁμόλογος πλευρὰ πρὸς τὴν ZH ὁμόλογον πλευράν. Τὰ ἄρα ὅμοια, καὶ τὰ ἐξ ἑ-

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α α.

᾽Ωσαύτως δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ὁμοίων τετραπλευρῶν δειχθήσεται, ὅτι ἐν διπλασίονι λόγῳ ἔστι τῶν ὁμολόγων πλευρῶν. Ἐδείχθη δὲ καὶ ἐπὶ τῶν τρίγωνων ὥστε καὶ καθόλου τὰ ὅμοια εὐθύγραμμα σχήματα πρὸς ἀλλήλα ἐν διπλασίονι λόγῳ εἶσι τῶν ὁμολόγων πλευρῶν.

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α β.

Καὶ ἐὰν τῶν AB , ZH τρίτην ἀνάλογον λάβωμεν τὴν Ξ , ἡ AB πρὸς τὴν Ξ διπλασίονα λόγον ἔχει ἢπερ ἡ AB πρὸς τὴν ZH . Ἐχει δὲ καὶ τὸ πολύγωνον πρὸς τὸ πολύγωνον, καὶ τὸ τετράπλευρον πρὸς τὸ τετράπλευρον διπλασίονα λόγον ἢπερ ἡ ὁμόλογος

vat Austin., quemvis lectorem videre, vocem polygoni hu-
adhiberi de quavis figura rectilinea, quas plura quam tria la-
tera habeat, unde nihil opus sit tædiosis his corollaris, quæ
in ipsa propositione contenta sint. Verum enim vero, præter
quam quod vox πολύγωνον vel πολίπλευρον ita alio sensu re-
menda foret, ac in I. Def. 23. eadem etiam rationes, quas in
Obs. 6. ad VI. 19. vidimus, corollarii secundi enunciationem

latus homologum AB habet ad ZH latus homologum; similia enim triangula in duplicata ratione sunt (VI. 19.) laterum homologorum; ergo et polygonum $ABΓΔΕ$ ad polygonum $ZHΘΚΑ$ duplicatam rationem habet eius quam homologum latus AB ad homologum latus ZH . Ergo similia etc.

COROLLARIUM I.

Similiter et in similibus quadrilateris ostendetur, ea in duplicata ratione esse laterum homologorum. Ostensum autem est et in triangulis (VI. 19.); quare et universe similes rectilineae figurae inter se in duplicata ratione sunt laterum homologorum.

COROLLARIUM II.

Et si ipsis AB , ZH tertiam proportionalem sumamus quae sit E , AB ad E duplicatam rationem habet (V. 10. Def.) eius quam AB ad ZH . Habet autem et polygonum ad polygonum, et quadrilaterum ad quadrilaterum duplicatam rationem eius quam homologum

uidentur. Praeterea observat Austin. in corollario hoc secundo primum occurrere vocem *εἶδος*, quum alias Euclides, qui a recepta semel dicendi forma recedere non solet, voce *οὗτος* utatur, ut. in I. Def. 14. ad indicandum spatium terminis circumscriptum. Nec vocem *εἶδος* apud Euclidem recurrere, nisi in demonstratione VI. 25., ubi hoc ipsum corollarium modo minus necessario in usum vocetur, et in Prop. VI. 27; VI.

πλευρὰ πρὸς τὴν ὁμόλογον πλευρὰν, τοῦτέστι ἡ AE πρὸς τὴν ZH . ἐδείχθη δὲ τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν τετραγώνων ὥστε καὶ καθόλου φανερόν, ὅτι ἐὰν τρεῖς ἀ-
θελαι ἀνάλογον ὦσιν, ἔσται ὡς ἡ πρώτη πρὸς τὴν
τρίτην οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς πρώτης εἶδος πρὸς τὸ ἐκ
τῆς δευτέρας, τὸ ὁμοιον καὶ ὁμοίως ἀναγραφόμενον

$A A A \Omega \Sigma$.

Δείξομεν δὴ καὶ ἑτέρως προχειρότερον ὁμολογῆ-
τὰ τρίγωνα.

Ἐκκείσθωσαν γὰρ πάλιν τὰ $ABΓAE$, $ZHΘKΛ$ πολύγωνα, καὶ ἐπεξεύθωσαν αἱ BE , $ΕΓ$, $ΗΑ$, $ΑΘ$ λέγω ὅτι ἐστὶν ὡς τὸ ABE τρίγωνον πρὸς τὸ $ZHΛ$ οὕτως τὸ $EBΓ$ πρὸς τὸ $ΛΗΘ$ καὶ τὸ $ΓAE$ πρὸς τὸ $ΘΚΛ$.

Ἐπεὶ γὰρ ὁμοίόν ἐστι τὸ ABE τρίγωνον τῷ $ZHΛ$ τριγώνῳ, τὸ ABE ἄρα τρίγωνον πρὸς τὸ $ZHΛ$ δι-
πλασίονα λόγον ἔχει ἤπερ ἡ BE πρὸς τὴν $ΗΑ$. Ἀπὸ
τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὸ $BEΓ$ τρίγωνον πρὸς τὸ $ΗΛΘ$
τρίγωνον διπλασίονα λόγον ἔχει ἤπερ ἡ BE πρὸς τὴν
 $ΗΑ$. ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ABE τρίγωνον πρὸς τὸ $ZHΛ$
τρίγωνον οὕτως τὸ $EBΓ$ πρὸς τὸ $ΛΗΘ$. Πάλιν,

28.; VI. 29.; VI. 30.; VI. 31., quae hoc ipso nomine in-
specta videantur. Nec omnino consequi hoc corollarium in-
generaliter expressum ex propositione, in qua sermo sit tantum
de figuris rectilineis aut polygonis, non de quibuscunque
spatii speciebus aut figuris. — Forte tamen non sine ratione
responderi possit, ad vocem εἶδος subintelligendam esse vocem
πολύπλευρον, vel πολύγωνον ex antecedentibus facile suppo-
nendam, et id ipsum, quod corollarium non de figura qua-
cunque ex propositione consequatur, Euclidī causae fuisse,
cuius generaliore voce σχῆμα hic uti nollet.

latus ad homologum latus, hoc est AB ad ZH ; ostensum est autem hoc et in triangulis; quare et universe manifestum est, si tres rectae proportionales sint, ut prima ad tertiam ita futuram esse figuram a prima ad figuram a secunda, similem et similiter descriptam.

A L I T E R.

Ostendemus etiam aliter expeditius homologa esse triangula.

Exponentur enim rursus polygona $ABΓΔE$, $ZHΘKA$, et iungantur BE , $ΕΓ$, HA , $AΘ$; dico esse ut triangulum ABE ad ZHA ita $EBΓ$ ad $AHΘ$ et $ΓΔE$ ad $ΘKA$.

Quoniam enim simile est triangulum ABE triangulo ZHA , triangulum ABE ad triangulum ZHA duplicatam rationem habet (VI. 19.) eius quam BE ad HA . Ex eadem ratione et triangulum $BΕΓ$ ad triangulum $HAΘ$ duplicatam rationem habet eius quam BE ad HA ; est igitur (V. 11.) ut triangulum ABE ad triangulum ZHA ita $EBΓ$ ad $AHΘ$. Rursus, quoniam

Obs. 4. Patet etiam, polygona similia, quorum homologa latera sunt inter se aequalia, esse quoque aequalia inter se. Nempe, quum ratio homologorum laterum sit (supp.) ratio aequalitatis, ratio duplicata laterum homologorum pariter erit ratio aequalitatis (V. 22. Cor.) i. e. ratio polygonorum similium super homologis istis lateribus descriptorum erit ratio aequalitatis, adeoque polygona aequalia. Et contra, si polygona similia fuerint aequalia, vel rationem aequalitatis habeant, ratio subduplicata eorum, h. e. ratio laterum homologorum etiam erit ratio aequalitatis (Cor. ad Prop. m. in Excursu ad

ἔπειτα ὁμοίων ἐστὶ τὸ EBF τρίγωνον τῷ $AH\Theta$ τριγώνῳ· τὸ EBF ἄρα πρὸς τὸ $AH\Theta$ διπλασίονα λόγον ἔχει ἤπερ ἡ GE εὐθεία πρὸς τὴν ΘA . Διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὸ $EΓA$ τρίγωνον πρὸς τὸ $A\Theta K$ τρίγωνον διπλασίονα λόγον ἔχει ἤπερ ἡ GE πρὸς τὴν ΘA · ἔστιν ἄρα ὡς τὸ EBF τρίγωνον πρὸς τὸ $AH\Theta$ οὕτως τὸ $EΓA$ πρὸς τὸ $A\Theta K$. Ἐδείχθη δὲ καὶ ὡς τὸ EBF πρὸς τὸ $AH\Theta$ οὕτως τὸ ABE πρὸς τὸ ZHA · καὶ ὡς ἄρα τὸ ABE πρὸς τὸ ZHA οὕτως τὸ BEF πρὸς τὸ $HA\Theta$ καὶ τὸ $EΓA$ πρὸς τὸ $A\Theta K$ 1). Ὅπερ ἰδοὺ δεῖξαι.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κα΄.

Τὰ τῷ αὐτῷ εὐθυγράμμῳ ὅμοια, καὶ ἀλλήλοις ἐστὶν ὅμοια.

Ἔστω γὰρ ἐκάτερον τῶν A, B εὐθυγράμμων τῷ Γ ὅμοιον· λέγω ὅτι καὶ τὸ A τῷ B ἐστὶν ὅμοιον.

Ἐπεὶ γὰρ ὁμοίων ἐστὶ τὸ A τῷ Γ , ἰσογώνιον τε ἐστὶν αὐτῷ, καὶ τὰς περὶ τὰς ἴσας γωνίας πλευρὰς ἀνάλογον ἔχει. Πάλιν, ἐπεὶ ὁμοίων ἐστὶ τὸ B τῷ Γ , ἰσογώνιον τε ἐστὶν αὐτῷ, καὶ τὰς περὶ τὰς ἴσας γωνίας πλευρὰς ἀνάλογον ἔχει· ἐκάτερον ἄρα τῶν A, B τῷ Γ ἰσογώνιον τε ἐστὶ καὶ τὰς περὶ τὰς ἴσας γωνίας πλευρὰς ἀνάλογον ἔχει, ὥστε καὶ τὸ A τῷ B ἰσογώνιον τε ἐστὶ καὶ τὰς περὶ τὰς ἴσας γωνίας πλευρὰς

1) Edd. Basil. et Oxon. addunt: καὶ ὡς ἄρα (V. 12.) τῶν ἡγουμένων πρὸς ἐν τῶν ἐπομένων, οὕτως ἅπαντα τὰ ἡγούμενα πρὸς ἅπαντα τὰ ἐπόμενα, καὶ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν τῇ προτέρᾳ δεῖξει. De hac lectione vide infra, quae ad hanc Propos. observantimus.

Libr. V.) i. e. latera homologa erunt aequalia. (Quod posterius est Lemma ad VI. 22.) Cf. Obs. 5. ad VI. 19. Borellus

simile est triangulum EBF triangulo $AH\theta$; EBF igitur (VI. 19.) ad $AH\theta$ duplicatam rationem habet eius quam FE recta ad θA . Ex eadem ratione et triangulum ETA ad triangulum $A\theta K$ duplicatam rationem habet eius quam FE ad θA ; est igitur (V. 11.) ut triangulum EBF ad $AH\theta$ ita ETA ad $A\theta K$. Ostensum est. autem et ut EBF ad $AH\theta$ ita ABE ad ZHA ; ergo ut ABE ad ZHA ita BET ad $H\theta\theta$ et ETA ad $A\theta K$. Quod oportebat ostendere.

PROPOSITIO XXI. (Fig. 379.)

Quae eidem rectilineo sunt similia, et inter se sunt similia.

Sit enim utrumque rectilineorum A , B ipsi Γ simile; dico et A ipsi B esse simile.

Quoniam enim est simile rectilineum A ipsi Γ , et aequiangulum est ipsi (VI. 1. Def.), et circa aequales angulos latera proportionalia habet. Rursus, quoniam simile est rectilineum B ipsi Γ , et aequiangulum est ipsi (VI. 1. Def.), et circa aequales angulos latera proportionalia habet; utrumque igitur ipsorum A , B ipsi Γ aequiangulum est et circa aequales angulos latera proportionalia habet, quare et rectilineum A ipsi B

Cor. 2. ad Prop. IV. 17. Pfeiderer. l. c. §. 299. Pariter, si polygonorum similium areae fuerint aequales, triangula quoque, quae diagonales homologae abscindunt, et similia et aequalia erunt. Cf. Pfeiderer. §. 298.

Obs. 5. Ut duo rectilinea M , N (triangulis quoque sub hac denominatione comprehensis) similia eam habeant rationem, quam latus aliquod A prioris habet ad rectam datam Γ ,

ἀνάλογον ἔχει ὁ. Ὅμοιον ἄρα ἐστὶ τὸ A τῷ B .
Ὅπερ εἶδει δαίξαι.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κβ.

Ἐὰν τέσσαρες εὐθεῖαι ἀνάλογον ὦσι, καὶ τὰ ἐκ αὐτῶν εὐθύγραμμα, ὁμοιά τε καὶ ὁμοίως ἀναγεγραμμένα, ἀνάλογον ἐστὶν· καὶ τὰ ἀπὸ αὐτῶν εὐθύγραμμα ὁμοιά τε καὶ ὁμοίως ἀναγεγραμμένα ἀνάλογον ἦ, καὶ αὗται αἱ εὐθεῖαι ἀνάλογον ἐσονται.

Ἐστωσαν τέσσαρες εὐθεῖαι ἀνάλογον αἱ AB , ΓA , EZ , $H\Theta$, ὡς ἡ AB πρὸς τὴν ΓA οὕτως ἡ EZ πρὸς τὴν $H\Theta$, καὶ ἀναγεγράφωσαν ἀπὸ μὲν τῶν AB , ΓA ὁμοιά τε καὶ ὁμοίως κείμενα εὐθύγραμμα τὰ KAB , $\Lambda\Gamma A$, ἀπὸ δὲ τῶν EZ , $H\Theta$ ὁμοιά τε καὶ ὁμοίως κείμενα εὐθύγραμμα τὰ MZ , $N\Theta$ λέγω ὅτι ὡς τὸ KAB πρὸς τὸ $\Lambda\Gamma A$ οὕτως τὸ MZ πρὸς τὸ $N\Theta$.

Εἰλήφθω γὰρ τῶν μὲν AB , ΓA τρίτη ἀνάλογον ἡ Ξ , τῶν δὲ EZ , $H\Theta$ τρίτη ἀνάλογον ἡ O . Καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς μὲν ἡ AB πρὸς τὴν ΓA οὕτως ἡ EZ πρὸς τὴν $H\Theta$, ὡς δὲ ΓA πρὸς τὴν Ξ οὕτως ἡ $H\Theta$ πρὸς τὴν O διῆσιν ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ AB πρὸς τὴν Ξ οὕτως ἡ EZ πρὸς τὴν O . Ἀλλ' ὡς μὲν ἡ AB πρὸς τὴν Ξ οὕτως τὸ KAB πρὸς τὸ $\Lambda\Gamma A$, ὡς δὲ ἡ EZ πρὸς τὴν O οὕτως τὸ MZ πρὸς τὸ $N\Theta$ · καὶ ὡς ἄρα τὸ KAB πρὸς τὸ $\Lambda\Gamma A$ οὕτως τὸ MZ πρὸς τὸ $N\Theta$.

1) Verba haec ab ὥστε inde ad absolvendam demonstrationem prorsus necessaria, quae ex Cod. a. sine dubio tantum ex oscitantia librarii exciderant, omittit Peyrardus. Nos morem Euclidi solemnem secuti ea restitimus, ut sunt in Edd. Basil. et Oxon.

posterioris latus homologum debet esse media proportionalis

et aequiangulam (I. Ax. 1.) et latera circum aequales angulos habet proportionalia (V. 11.). Simile igitur est A ipsi B (VI. Def. 1.). Quod oportebat ostendere.

PROPOSITIO XXII. (Fig. 380.)

Si quatuor rectae proportionales sint, et quae ab ipsis sunt rectilinea, similia et similiter descripta, proportionalia erunt; et si, quae ab ipsis sunt rectilinea similia et similiter descripta proportionalia sint, et ipsae rectae proportionales erunt.

Sint quatuor rectae proportionales $AB, \Gamma A, EZ, H\Theta$, ut AB ad ΓA ita EZ ad $H\Theta$, et describantur ab ipsis quidem $AB, \Gamma A$ similia et similiter posita rectilinea $KAB, \Lambda \Gamma A$, ab ipsis vero $EZ, H\Theta$ similia et similiter posita rectilinea $MZ, N\Theta$; dico esse ut KAB ad $\Lambda \Gamma A$ ita MZ ad $N\Theta$.

Sumatur enim (VI. 11.) ipsis quidem $AB, \Gamma A$ tertia proportionalis E , ipsis vero $EZ, H\Theta$ tertia proportionalis O . Et quoniam est ut AB quidem ad ΓA ita EZ ad $H\Theta$, ut ΓA vero ad E ita (V. 11.) $M\Theta$ ad O ; ex aequo igitur est (V. 22.) ut AB ad E ita EZ ad O . Sed (VI. 20. Cor. 2.) ut AB quidem ad E ita KAB ad $\Lambda \Gamma A$, ut EZ vero ad O ita MZ ad $N\Theta$; ut igitur (V. 11.) KAB ad $\Lambda \Gamma A$ ita MZ ad $N\Theta$.

Inter latus illud A , et rectam datam Γ . Sit enim illa media proportionalis B , ita ut $A:B=B:\Gamma$, dico, latus illud homologue posterioris figurae esse $=B$. Quodsi enim non fuerit $=B$, sit illud alia recta quaecunque Δ diversa a B , sitque $A:\Delta=\Delta:E$, eritque $M:N=A:E$. At, quum ratio $A:\Delta$ diversa sit a ratione $A:B$, diversa quoque erit ratio $A:E$

Ἀλλὰ δὴ ἔστω ὡς τὸ KAB πρὸς τὸ $ΛΓΔ$ οὕτως τὸ MZ πρὸς τὸ $ΝΘ$ λέγω ὅτι ἐστὶ καὶ ὡς ἡ AB πρὸς τὴν $ΓΔ$ οὕτως ἡ EZ πρὸς τὴν $ΗΘ$.

Γεγονέντω γάρ ¹⁾ ὡς ἡ AB πρὸς τὴν $ΓΔ$ οὕτως ἡ EZ πρὸς τὴν $ΠΡ$, καὶ ἀναγεγράφθω ἀπὸ τῆς $ΠΡ$ ὁποτέρῃ τῶν MZ , $ΝΘ$ ὁμοίων τε καὶ ὁμοίως κείμενον εὐθύγραμμον τὸ $ΣΡ$.

Ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς ἡ AB πρὸς τὴν $ΓΔ$ οὕτως ἡ EZ πρὸς τὴν $ΠΡ$, καὶ ἀναγέγραπται ἀπὸ μὲν τῆς AB , $ΓΔ$ ὁμοιά τε καὶ ὁμοίως κείμενα τὰ KAB , $ΛΓΔ$, ἀπὸ δὲ τῶν EZ , $ΠΡ$ ὁμοιά τε καὶ ὁμοίως κείμενα τὰ MZ , $ΣΡ$ · ἐστὶν ἄρα ὡς τὸ KAB πρὸς τὸ $ΛΓΔ$ οὕτως τὸ MZ πρὸς τὸ $ΣΡ$. Τησάται δὲ καὶ ὡς τὸ KAB πρὸς τὸ $ΛΓΔ$ οὕτως τὸ MZ πρὸς τὸ $ΝΘ$ (καὶ ὡς ἄρα τὸ MZ πρὸς τὸ $ΣΡ$ οὕτως τὸ MZ πρὸς τὸ $ΝΘ$ ²⁾ τὸ MZ ἄρα πρὸς ἑκατέρον τῶν $ΝΘ$, $ΣΡ$ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον· ἴσον ἄρα ἐστὶ τὸ $ΝΘ$ τῇ $ΣΡ$. Ἔστι δὲ αὐτῇ ὁμοιον καὶ ὁμοίως κείμενον ἴση ἄρα ἡ $ΗΘ$ τῇ $ΠΡ$. Καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ AB πρὸς τὴν $ΓΔ$ οὕτως ἡ EZ πρὸς τὴν $ΠΡ$, ἴση δὲ ἡ $ΠΡ$ τῇ $ΗΘ$ · ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ AB πρὸς τὴν $ΓΔ$ οὕτως ἡ EZ πρὸς τὴν $ΗΘ$. Ἐὰν ἄρα τέσσαρες, καὶ τὰ ἑξῆς.

1) Loco verborum γεγονέντω γάρ Peyrardus ex Cod. a habet: εἰ γὰρ μὴ ἐστὶν ὡς ἡ AB πρὸς τὴν $ΓΔ$, οὕτως EZ πρὸς τὴν $ΗΘ$. ἔστω κ. τ. λ. At, quum ita indirecta demonstratio sequi debere videatur, Euclides autem directam habeat, praefereunda omnino videtur lectio Edd. Oxon. et Basil.

2) Voces uncis inclusas omittit Ed. Oxon. et possunt illas omnino abesse.

a ratione $A:F$ (Cor. ad Prop. m in Excursu ad Libr. V.) At utraque ratio $A:F$ (suppos.) et $A:E$ (demonstr.) aequalis est rationi $M:N$: itaque (V. 11.) etiam ratio $A:F$ eadem est

Ἀλλὰ δι' ἴσων ὡς τὸ KAB Sed sit ut KAB ad $ΑΓΔ$ ita MZ ad $ΝΘ$
 ὡς MZ πρὸς τὸ $ΝΘ$ ἴση ἢ ἑ- esse et ut AB ad $ΓΔ$ ita EZ ad $ΗΘ$.
 πρὸς τὴν $ΓΔ$ οὕτως ἢ EZ πρὸς τὴν

Γεγονέναι γὰρ ὅτι ἢ AB πρὸς $ΓΔ$ ita EZ ad $ΗΠ$, et describatur (VI. 18.) a $ΗΠ$ alterutri
 ὁμοίᾳ τῶν MZ , $ΝΘ$ ὁμοίᾳ MZ , $ΝΘ$ simile et similiter positum rectilineum
 μέγεθος ἐκδογραμμὸν τὸ $ΣΡ$.

Ἐκεί οὖν ἴσων ὡς ἢ AB πρὸς $ΓΔ$ ita EZ ad $ΗΠ$, et descripta sunt ab ipsis quidem AB , $ΓΔ$, sin-
 AB , $ΓΔ$ ὁμοίᾳ τε καὶ ὁμοίᾳ MZ similiter posita KAB , $ΑΓΔ$, ab ipsis vero EZ
 $ΑΓΔ$, ἀπὸ δὲ τῶν EZ , $ΗΠ$ ὁμοίᾳ MZ , $ΣΡ$; est igitur
 καί μιν τὸ MZ , $ΣΡ$ ἴσων ὡς KAB ad $ΑΓΔ$ ita MZ ad $ΣΡ$ ac
 τὸ $ΑΓΔ$ οὕτως τὸ MZ πρὸς τὸ $ΣΡ$ ac et ut igitur (V. 11.) MZ ad $ΣΡ$ ita MZ ad
 καὶ ὡς τὸ KAB πρὸς τὸ $ΗΠ$ ac et ut igitur (V. 11.) MZ ad $ΣΡ$ ita MZ ad
 τὸ $ΝΘ$ (καὶ ὡς ἀπὸ τὸ MZ πρὸς τὸ $ΣΡ$ ergo MZ (V. 11.) ad utrumque ipsorum $ΝΘ$
 MZ πρὸς τὸ $ΝΘ$) τὸ MZ ὁμοίᾳ $ΣΡ$. eandem habet rationem; aequale igitur est (V. 9.)
 $ΝΘ$, $ΣΡ$ τὸν αὐτὸν ἵση λόγον ἵση $ΣΡ$. ipsi $ΣΡ$. Est autem ipsi simile et similiter po-
 τὸ $ΣΡ$. Ἐστὶ δὲ αὐτὸ ὁμοίᾳ καὶ $ΗΠ$ aequalis igitur (sequens Lemma) $ΗΘ$ ipsi $ΗΠ$.
 ἵση ἀπὸ ἢ $ΗΘ$ τῇ $ΗΠ$. καὶ ἵση quoniam est ut AB ad $ΓΔ$ ita EZ ad $ΗΠ$, a
 πρὸς τὴν $ΓΔ$ οὕτως ἢ EZ πρὸς τὴν $ΗΠ$ autem $ΗΠ$ ipsi $ΗΘ$; est igitur (V. 7.) ut AB
 ἢ $ΗΠ$ τῇ $ΗΘ$ ἴσων ἀπὸ ὡς AB ita EZ ad $ΗΘ$. Si igitur quatuor etc.
 οὕτως ἢ EZ πρὸς τὴν $ΗΘ$. Ἐὰν δὲ
 οὕτως ἢ EZ πρὸς τὴν $ΗΘ$.

1) Loco verborum γεγονέναι γὰρ πρὸς τὴν $ΗΠ$ posterioris figuræ erit $=B$. Cf. Pfeiderer. §. 301.
 2) Voces unci inclusæ omniæ $ΕΔ$ (hæc) omnino abesse.
 Obs. 6. Hinc facile solvetur problema describenda
 rectilineæ similis datæ figuræ M , et quæ ad hanc
 M eandem rationem habeat, quam recta data $Σ$ ad
 datam $Η$. Sumatur nempe latus quodcunque A fig-
 et fiat $Η$; $Σ=A:F$ (VI. 12.). Inveniatur deinde recta
 media proportionalis B (VI. 11.), ut itaque sit $A:B$
 et super recta B describatur (VI. 18.) figura similis
 Euclid. Element. P. IV.

A H M M A.

"Οτι δέ, ἐὰν εὐθύγραμμα ἴσα ἢ καὶ ὁμοία, αἱ ὀρί-
λογοι αὐτῶν πλευραὶ ἴσαι ἀλλήλαις εἶσι, δείξωμεν
οὕτως.

"Εστω ἴσα καὶ ὁμοία εὐθύγραμμα τὰ ΝΘ, ΣΡ
καὶ ἔστω ὡς ἡ ΘΗ πρὸς τὴν ΗΝ οὕτως ἡ ΡΠ πρὸς
τὴν ΗΣ· λέγω ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΡΗ τῇ ΘΗ.

Εἰ γὰρ ἀνισοὶ εἴσι, μία αὐτῶν μείζων ἐστί.
"Εστω μείζων ἡ ΡΗ τῆς ΘΗ. Καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ
ΡΗ πρὸς τὴν ΗΣ οὕτως ἡ ΘΗ πρὸς τὴν ΗΝ, καὶ
ἐναλλάξ ὡς ἡ ΡΗ πρὸς τὴν ΘΗ οὕτως ἡ ΗΣ πρὸς
τὴν ΗΝ. Μείζων δὲ ἡ ΗΡ τῆς ΘΗ· μείζων ἔσται
καὶ ἡ ΗΣ τῆς ΗΝ· ὥστε καὶ τὸ ΡΣ μείζον ἐστί τοῦ
ΘΝ· ἀλλὰ καὶ ἴσον, ὅπερ ἀδύνατον οὐκ ἄρα ἐνός
ἐστὶν ἡ ΗΡ τῆς ΗΘ, ἴση ἄρα. "Οπερ εἶδει δεῖξαι.

H P O T A Σ I Σ κγ'.

Τὰ ἰσογώνια παραλληλόγραμμα πρὸς ἀλλήλα ἴσην
ἔχει τὸν σιγκαίμενον ἐκ τῶν τῶν πλευρῶν 1).

1) Omnes quidem editiones legunt saltem: ἐκ τῶν πλευρῶν,
nec Peyraudus aliam ex Codd. Mss. lectionem notavit. Quam
tamen, ut recte monet Rob. Simon, in Not. ad VI. 23. p. 336.
vulgaris lectio sit absurda, non dubitavimus illi aliam veno-
rem substituere.

liter posita figurae M , ita ut latera B , A , sint latera homo-
loga, erit figura descripta, quam N vocabimus ea, quae de-
scribi iussa erat. Est enim $M:N=A:I=H:S$, vel $N:M=$
 $S:H$. Cf. Pfeiderer. §. 302. Nominatim eodem modo solve-
tur problema, triangulum datum per rectas designato eius lateri
parallelas dividendi in partes quotcunque aequales, vel etiam
quae rationes invicem habeant aequales rationibus rectarum
datarum. Cf. Pfeiderer. §. 303.

Obs. 7. Quum nominatim etiam quadrata super homo-

L E M M A.

Si autem rectilinea aequalia sint et similia, homologa ipsorum latera aequalia inter se esse, sic ostendemus.

Sint aequalia et similia rectilinea $N\Theta$, ΣP , et sit ΘH ad HN ita PII ad $II\Sigma$; dico aequalem esse PII ipsi ΘH .

Si enim inaequales sint, una ipsarum maior est. Sit maior PII ipsa ΘH . Et quoniam est ut PII ad $II\Sigma$ ita ΘH ad HN , et alterne (V. 16.) ut PII ad ΘH ita $II\Sigma$ ad HN . Maior autem PII ipsa ΘH ; maior igitur (Prop. A. libri V.) et $II\Sigma$ ipsa HN ; quare et (VI. 20.) $P\Sigma$ maius est ipso ΘN ; sed et aequale, quod fieri nequit; non igitur inaequalis est PII ipsi ΘH , aequalis igitur. Quod oportebat ostendere.

P R O P O S I T I O XXIII. (Fig. 381.)

Aequiangula parallelogramma inter se rationem habent compositam ex rationibus laterum.

Logis lateribus figurarum similium descripta sint in ratione duplicata horum laterum patet, polygona similia quaecunque (triangulis quoque et quadrilateris similibus sub hac denominatione comprehensis Obs. 4. ad VI. 19.) esse in ratione quadratorum laterum homologorum.

P R O P O S I T I O XXI.

Obs. Potest haec propositio deduci ut corollarium Prop. VI. 18. Ita est apud Borellum in Cor. ad Prop. 16. Libr. IV.

P R O P O S I T I O XXII.

Obs. 1. Propositi, haec derivari facile potest ex VI. 20. et ex Cor. V. 22. et Cor. Prop. in Excursu ad Lib. V.

Ἐστω ἰσογώνια παραλληλόγραμμα τὰ $ΑΓ, ΓΖ$, ἴσας ἔχοντα τὴν ἐπὶ $ΒΓΔ$ γωνίαν τῇ ἐπὶ $ΕΓΗ$ λέγω ὅτι τὸ $ΑΓ$ παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ $ΓΖ$ παραλληλόγραμμον λόγον ἔχει τὸν συγκείμενον ἐν τῶν πλευρῶν ¹⁾, τοῦ τε ὃν ἔχει ἡ $ΒΓ$ πρὸς τὴν $ΓΗ$ καὶ τοῦ ὃν ἔχει ἡ $ΔΓ$ πρὸς τὴν $ΓΕ$.

Κείσθω γάρ ὥστε ἐπ' εὐθείας εἶναι τὴν $ΒΓ$ τῇ $ΓΗ$ ἐπ' εὐθείας ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ $ΔΓ$ τῇ $ΓΕ$ καὶ συμπληρωσθῶ τὸ $ΔΗ$ παραλληλόγραμμον, καὶ ἐκείσθω τις εὐθεῖα ἡ $Κ$, καὶ γεγονέτω ὡς μὲν ἡ $ΒΓ$ πρὸς τὴν $ΓΗ$ οὕτως ἡ $Κ$ πρὸς τὴν $Α$, ὡς δὲ ἡ $ΔΓ$ πρὸς τὴν $ΓΕ$ οὕτως ἡ $Α$ πρὸς τὴν $Μ$.

Οἱ ἄρα λόγοι τῆς τε $Κ$ πρὸς τὴν $Α$ καὶ τῆς $Α$ πρὸς τὴν $Μ$ οἱ αὐτοὶ εἰσι τοῖς λόγοις τῶν πλευρῶν, τῆς τε $ΒΓ$ πρὸς τὴν $ΓΗ$ καὶ τῆς $ΔΓ$ πρὸς τὴν $ΓΕ$.

1) Hic quoque ex eadem ratione ac in ipsa propositione ex ingenio adiecimus vocem τῶν.

Lemma subsequens deductum est supra in Obs. 4. ad VI. 20. Aliter ac in textu graeco Boermannus, et accuratius, omnia etiam permutatione superflua, hoc lemma ita demonstrat. Si rectilinea $NΘ, ΣΡ$ sint similia et aequalia, latera quoque homologa $ΗΘ, ΗΡ$ aequalia erunt. Si enim non sint aequalia, alterutrum velut $ΗΡ$ maius erit, unde, quum sit (VI. Def. 1.) $ΗΡ: ΗΣ=ΗΘ: ΗΝ$, erit quoque $ΗΣ>ΗΝ$ (V. 14.) adeoque triangulum $ΣΗΡ$ ipsi $ΝΗΘ$ impositum non congruet, et maius erit (Cor. ad I. 14.). Est autem rectilin. $ΣΡ$: rectilin. $NΘ=$ triang. $ΣΗΡ$: triang. $ΝΗΘ$ (VI. 20.) Itaque rectilin. $ΣΡ>$ rectilin. $NΘ$ (Prop. A. libr. V.) contra hypothesin, ergo $ΗΡ=ΗΘ$.

Obs. 2. Prop. 22. etiam valet de quatuor figuris rectilineis, non bisis solum, sed omnibus similibus. Speciatim quatuor rectorum quadrata sunt proportionalia et vicissim.

Ἀλλ' ὁ τῆς K πρὸς τὴν M λόγος σύγκειται ἐκ τοῦ
 τῆς K πρὸς τὴν A λόγου καὶ τοῦ τῆς A πρὸς τὴν
 M ὥστε καὶ ἡ K πρὸς τὴν M λόγον ἔχει τῶν συγχε-
 μενον ἐκ τῶν τῶν πλευρῶν ¹⁾. Καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς
 ἡ $BΓ$ πρὸς τὴν $ΓΗ$ οὕτως τὸ $ΑΓ$ παραλληλόγραμ-
 μον πρὸς τὸ $ΓΘ$ ἄλλ' ὡς ἡ $BΓ$ πρὸς τὴν $ΓΗ$ οὕτως
 ἡ K πρὸς τὴν A καὶ ὡς ἄρα ἡ K πρὸς τὴν A οὕ-
 τως τὸ $ΑΓ$ πρὸς τὸ $ΓΘ$. Πάλιν, ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ A
 πρὸς τὴν $ΓΕ$ οὕτως τὸ $ΓΘ$ παραλληλόγραμμον πρὸς
 τὸ $ΓΖ$ ἄλλ' ὡς ἡ $AΓ$ πρὸς τὴν $ΓΕ$ οὕτως ἡ A πρὸς
 τὴν M καὶ ὡς ἄρα ἡ A πρὸς τὴν M οὕτως τὸ $ΓΘ$
 παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ $ΓΖ$ παραλληλόγραμμον.
 Ἐπεὶ οὖν ἐδείχθη, ὡς μὲν ἡ K πρὸς τὴν A οὕτως
 τὸ $ΑΓ$ παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ $ΓΘ$ παραλληλό-
 γραμμον, ὡς δὲ ἡ A πρὸς τὴν M οὕτως τὸ $ΓΘ$ πα-
 ραλληλόγραμμον πρὸς τὸ $ΓΖ$ παραλληλόγραμμον
 διῶου ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ K πρὸς τὴν M οὕτως τὸ $ΑΓ$

1) Hic quoque et pariter ad finem demonstrationis voca-
 tῶν altera vice positam ex coniectura adieciimus.

sitione haud apta propositiones inter ad figuras similes per-
 nentes, nec ullo modo cum ipsa connexas, insertam fuisse vi-
 deri. Caeterum $ΑΓ$ et $ΓΕ$ in directum fore, si $BΓ$, $ΓΗ$ in
 directum ponantur, simili ratione ostendi potest ac in Obs. 2.
 ad VI. 14.

Obs. 2. Rationem, quae ex duabus datis rationibus per
 lineas rectas expressis componitur, dari, h. e. (Eucl. Dat.
 Def. 2.) ipsi aequalem lineis rectis exhiberi posse, efficit de-
 monstratio Prop. VI. 25. idemque similiter ad plures, quae
 d. as rationes sic datas, ex iisque compositas extenditur. C.
 Pfeiderer. §. 212.

Obs. 3. Eadem consequentiae, quae in demonstratione
 inde deducuntur, quod rationes $BΓ:ΓΗ$, et $ΑΓ:ΓΕ$ dati sup-

παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ FZ παραλληλόγραμμον
Ἡ δὲ K πρὸς τὴν M λόγον ἔχει τὸν συγκείμενον ἐκ
τῶν τῶν πλευρῶν καὶ τὸ AG ἄρα πρὸς τὸ FZ λόγον
ἔχει τὸν συγκείμενον ἐκ τῶν τῶν πλευρῶν. Τὰ ἀρ-
ιστογώνια, καὶ τὰ ἐξῆς.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κδ.

Παντὸς παραλληλογράμμου τὰ περὶ τὴν διάμετρον
παραλληλόγραμμοι ὁμοῖά ἐστι τῷ τε ὅλῳ καὶ ἀλλή-
λοις.

Ἐστω παραλληλόγραμμον τὸ $ABΓΔ$, διάμετρον
δὲ αὐτοῦ ἡ AG , περὶ δὲ τὴν AG παραλληλόγραμμοι
ἔστω τὰ $ΕΗ$, $ΘΚ$ · λέγω ὅτι ἐκάτερον τῶν $ΕΗ$, $ΘΚ$
παραλληλόγραμμων ὁμοῖόν ἐστιν ὅλῳ τῷ $ABΓΔ$ καὶ
ἀλλήλοις.

Ἐπεὶ γὰρ τριγώνου τοῦ $ABΓ$ παρὰ μίαν τῶν
πλευρῶν τὴν $ΒΓ$ ἦκται ἡ EZ , ἀνάλογόν ἐστιν ὡς
ἡ BE πρὸς τὴν EA · οὕτως ἡ FZ πρὸς τὴν ZA
Πάλιν, ἐπεὶ τριγώνου τοῦ $ΑΓΔ$ παρὰ μίαν τῶν
πλευρῶν τὴν $ΓΔ$ ἦκται ἡ ZH , ἀνάλογον ἄρα ἐστὶ
ὡς ἡ FZ πρὸς τὴν ZA οὕτως ἡ AH πρὸς τὴν HA

datam rationem in Dat. Prop. 8. (apud Rob. Simson. et Schwab.
Prop. 9.). Cf. Pfeiderer. §. 214. Quo nixus principio Euclides
deinde suam datorum tractationem absque rationum com-
positione instruit; nominatim Prop. 70. partem priorem (apud
Rob. Simson. et Schwab. Prop. 67.) Elementorum VI. 23. re-
spondentem demonstrat. Cf. Pfeiderer. §. 215.

Obs. 5. Quatenus ab mo. lo^g rationem ex laterum $BΓ$ et
 $ΓΗ$, $ΑΓ$ ac $ΓΕ$ rationibus compositam, lineis rectis datis ex-
hibendi abstrahitur; demonstratio VI. 23. praesente Candalla
eo redigi potest, ut observetur: rationem parallelogrammorum
 $ΑΓ$, FZ componi ex rationibus parallelogrammi $ΑΓ$ ad $ΓΒ$, et

compositam ex rationibus laterum. Ergo aequiangula, etc.

PROPOSITIO XXIV. (Fig. 383.)

Omnis parallelogrammī, quae circa diametrum sunt parallelogramma similia sunt et toti inter se.

Sit $\square$ parallelogrammum $AB\Gamma A$, diameter autem eius recta $A\Gamma$, circa $A\Gamma$ autem parallelogramma sint EH , ΘK ; dico utrumque parallelogrammorum EH , ΘK simile esse toti $AB\Gamma A$ et inter se.

Quoniam enim uni laterum trianguli $AB\Gamma$ videlicet ipsi $B\Gamma$ parallela ducta est EZ , erit (VI. 2.) ut BE ad EA ita ΓZ ad ZA . Rursus, quoniam uni lateri trianguli $A\Gamma A$ nempe ipsi ΓA parallela ducta est ZH , erit (VI. 2.) ut ΓZ ad ZA ita AH ad HA . Sed ut ΓZ ad ZA ita ostensa est et BE ad EA ;

huius ad ΓZ (Exc. ad hunc libr. §. 3. nr. 1.) quae eadem sint rationibus laterum ipsorum $B\Gamma : \Gamma H$, $A\Gamma : \Gamma E$ (VI. 1.); itaque etiam dici ex his componi (Exc. ad hunc libr. §. 3. nr. 2.). Cf. Clavius et Rob. Simson. Pflaiderer. §. 216.

Obs. 6. Quodsi desideratur, ut ratio parallelogrammorum $A\Gamma$, ΓZ (Fig. 382.) seu composita ex rationibus laterum eorum, exhibeatur per rationem quam ipsum prioris lateris alterutrum $B\Gamma$ habeat ad aliquam rectam datam; hæc erit quanta proportionalis duobus reliquis parallelogrammorum lateribus $A\Gamma$, ΓE , et lateri ΓH posterioris ΓZ , quod respondet lateri $B\Gamma$ prioris $A\Gamma$.

Ἀλλ' ὡς ἡ GZ πρὸς τὴν ZA οὕτως ἐδείχθη καὶ ἡ BE πρὸς τὴν EA καὶ ὡς ἄρα ἡ BE πρὸς τὴν EA οὕτως ἡ $ΔH$ πρὸς τὴν HA , καὶ συντεθέντι ὡς ἡ BA πρὸς τὴν AE οὕτως ἡ $ΔA$ πρὸς τὴν AH , καὶ ἐκείλῃ ὡς ἡ BA πρὸς τὴν $ΔA$ οὕτως ἡ EA πρὸς τὴν AH τῶν ἄρα $ABΓΔ$, EH παραλληλογράμμων ἀνάλогον εἰσιν αἱ πλευραὶ αἱ περὶ τὴν κοινὴν γωνίαν τὴν ὑπὸ BAD . Καὶ ἐπεὶ παράλληλός ἐστιν ἡ HZ τῇ $ΔΓ$ ἴση ἐστὶν ἡ μὲν ὑπὸ AHZ γωνία τῇ ὑπὸ $ΔΔΓ$, ἡ δὲ ὑπὸ HZA τῇ ὑπὸ $ΔΓA$, καὶ κοινὴ τῶν δύο τριγώνων τῶν $ΔΔΓ$, AHZ ἡ ὑπὸ $ΔΔΓ$ γωνία ἰσογώνιον ἄρα ἐστὶ τὸ $ΔΔΓ$ τρίγωνον τῷ AHZ τριγώνῳ. ὁμοία αὐτὰ δὴ καὶ τὸ $ΑΓB$ τρίγωνον ἰσογώνιον ἐστὶ τῷ AZE τριγώνῳ καὶ ὅλον ἄρα τὸ $ABΓΔ$ παραλληλογράμμον τῷ EH παραλληλογράμμῳ ἰσογώνιον ἐστὶν ἀνάλογον ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ $ΑΔ$ πρὸς τὴν $ΔΓ$ οὕτως ἡ AH πρὸς τὴν HZ . Ὡς δὲ ἡ $ΔΓ$ πρὸς τὴν $ΓA$ οὕτως ἡ HZ πρὸς τὴν ZA , ὡς δὲ ἡ $ΑΓ$ πρὸς τὴν $ΓB$ οὕτως ἡ AZ πρὸς τὴν ZE , καὶ ἐπεὶ ὡς ἡ $ΓB$ πρὸς τὴν BA οὕτως ἡ ZE πρὸς τὴν EA καὶ ἐπεὶ

Facta enim (VI. 12.) $ΔΓ:ΓE=ΓH:I$

erunt parallelogr. $ΑΓ:IΘ = BΓ:ΓH$ (VI. 1.)

$IΘ:ΓZ=ΔΓ:ΓE$ (VI. 1.) $= ΓH:I$ (VI. 12.)

proinde $ΑΓ:ΓZ=BΓ:I$ (V. 22.). Cf. Pfeleiderer.

§. 217.

Obs. 7. Si ab recta $ΓB$ (producta, quando opus est) abscinditur $ΓN=I$ (Fig. 382.) (quod iuxta Obs. 4. ad VI. 12. immediate fit, diagonali $ΔH$ parallelam EN agendo per punctum E) ac per N ducitur rectae $ΔΓ$ parallela: fit parallelogrammum $ΓO=ΓZ$ (VI. 14.), et hinc

$$ΑΓ:ΓZ=ΑΓ:ΓO \text{ (V. 7.) } EF: \left\{ \begin{matrix} ΓN \\ I \end{matrix} \right. \text{ (VI. 1.)}$$

ergo (V. 11.) ut BE ad EA ita AH ad HA ; et componendo (V. 18.), ut BA ad AE ita AA ad AH , et alterne (V. 16.) ut BA ad AA ita EA ad AH ; parallelogrammorum igitur $ABFA$, EH proportionalia sunt latera, quae circa communem angulum BAF sunt. Et quoniam parallela est HZ ipsi AF , aequalis est angulus AHZ angulo AAF (I. 29.), angulus vero HZA angulo FAA , et communis duobus triangulis AAF , AHZ angulus AAF ; aequiangulum igitur est triangulum AAF triangulo AHZ . Ex eadem ratione et triangulum AFB aequiangulum est triangulo AZE ; totum igitur parallelogrammum $ABFA$ parallelogrammo EH aequiangulum est; ergo (VI. 4.) ut AA ad AF ita AH ad HZ . Ut autem AF ad FA ita HZ ad ZA , ut AF vero ad FB ita AZ ad ZE , et insuper ut FB ad BA ita ZE ad ZA : itaque quoniam ostensum est ut AF ad FA ita HZ ad ZA , ut vero AF ad FB ita AZ ad ZE ; ex aequo igitur est (V. 22.) ut AF ad BF ita HZ ad ZE . Parallelogrammorum igitur $ABFA$, EHI proportio-

Quare sic etiam potest Prop. VI. 23. enunciari: si parallelogramma AF , FZ sint aequiangula; fiatque, ut unum latus AF prioris ad unum latus FE posterioris, sic huius alterum latus FH ad rectam I : erit parallelogrammum AF ad FZ , ut alterum latus BF prioris ad hanc rectam I . Cf. Pfleiderer. §§. 218. 219. Unde, data ratione parallelogrammi AF ad FZ datur ratio lateris BF prioris ad rectam I : estque, ut unum latus AF prioris parallelogrammi AF ad unum latus FE posterioris FZ , sic huius alterum latus FH ad hanc rectam I , ad quam alterum parallelogrammi prioris AF latus BF habet datam rationem mutuam parallelogrammorum AF , FZ . Quae

εδείχθη ὡς μὲν ἡ $\Delta\Gamma$ πρὸς τὴν $\Gamma\Lambda$ οὕτως ἡ HZ πρὸς τὴν ZA , ὡς δὲ ἡ $\Delta\Gamma$ πρὸς τὴν ΓB οὕτως ἡ AZ πρὸς τὴν ZE . διῶσον ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ $\Delta\Gamma$ πρὸς τὴν $B\Gamma$ οὕτως ἡ HZ πρὸς τὴν ZE . τῶν ἄρα $AB\Gamma$ καὶ $E\Lambda H$ παραλληλογράμμων ἀνάλογόν εἰσιν αἱ πλεονεξίαι περὶ τὰς ἴσας γωνίας· ὅμοιον ἄρα ἐστὶ τὸ $AB\Gamma$ τῷ $E\Lambda H$ παραλληλόγραμμῳ. καὶ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὸ $AB\Gamma\Delta$ παραλληλόγραμμον καὶ τῷ ΘK παραλληλόγραμμῳ ὅμοιον ἐστὶν ἐκείνῳ· ἄρα τῶν $E\Lambda H$, ΘK παραλληλογράμμων τῷ $AB\Gamma\Delta$ παραλληλόγραμμῳ ὅμοιον ἐστὶ. Τὰ δὲ τῷ αὐτῷ ἐνθύγραμμῳ ὅμοια καὶ ἀλλήλοις ἐστὶν ὅμοια καὶ τὸ $E\Lambda H$ ἄρα παραλληλόγραμμον τῷ ΘK παραλληλόγραμμῳ ὅμοιον ἐστὶ. Παντὸς ἄρα, καὶ τὰ ἐξῆς.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κε.

Τῷ δοθέντι ἐνθύγραμμῳ ὅμοιον, καὶ ἄλλο τὸ δοθέντι ἴσον τὸ αὐτὸ συστήσασθαι.

Ἔστω τὸ μὲν δοθὲν ἐνθύγραμμον, ᾧ δεῖ ὅμοιον συστήσασθαι, τὸ $AB\Gamma$, ᾧ δὲ ἴσον, τὸ Δ . δεῖ δὲ τὸ μὲν $AB\Gamma$ ὅμοιον, τῷ δὲ Δ ἴσον τὸ αὐτὸ συστήσασθαι.

est Dator. Prop. 56. (apud Rob. Simson. et Schwab. prior 65.). Cf. Pfeiderer. §. 220.

Obs. 8. Triangula quoque unum angulum aequalem habentia sunt in ratione composita ex rationibus laterum circa aequales angulos. Quod ipsum vel immediate simili ratione demonstrari potest ac VI. 23. vel ex VI. 23. ops I. 31. V. 15. derivari. Cf. Pfeiderer. in sched. mss. §. 259. Commandinus Cor. ad VI. 23.

Obs. 9. Parallelogramma quaecvis aequiangula sunt inter se ut parallelogramma rectangula sub iisdem respective later-

Παραβεβλήσθω γὰρ παρὰ μὲν τὴν $BΓ$ τῷ $ABΓ$ τριγώνῳ ¹⁾ ἴσον παραλληλόγραμμον τὸ BE , παρὰ τὴν $ΓΕ$ τῷ $Δ$ ἴσον παραλληλόγραμμον τὸ $ΓΜ$ ἐκ γωνία τῇ ὑπὸ $ZΓΕ$, ἥ ἐστιν ἴση τῇ ὑπὸ $ΓΒΔ$ ἐκ εὐθείας ἄρα ἐστὶν ἡ μὲν $BΓ$ τῇ $ΓΖ$, ἡ δὲ AE τῇ FM . Καὶ εἰλήφθω τῶν $BΓ$, $ΓΖ$ μέση ἀνάλογον ἡ $HΘ$, καὶ ἀναγεγράφθω ἀπὸ τῆς $HΘ$ τῷ $ABΓ$ ὁμοῦν τε καὶ ὁμοίως κείμενον τὸ $KHΘ$.

Καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ $BΓ$ πρὸς τὴν $HΘ$ οὕτως ἡ $HΘ$ πρὸς τὴν $ΓΖ$, ἐὰν δὲ τρεῖς εὐθεῖαι ἀνάλογον ὦσιν, ἐστὶν ὡς ἡ πρώτη πρὸς τὴν τρίτην οὕτως τὸ ὑπὸ τῆς πρώτης εἶδος πρὸς τὸ ὑπὸ τῆς δευτέρας, ὁμοῖον καὶ ὁμοίως ἀναγραφόμενον· ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ $BΓ$ πρὸς τὴν $ΓΖ$ οὕτως τῇ $ABΓ$ τρίγωνον πρὸς τὸ $KHΘ$ τρίγωνον. Ἀλλὰ καὶ ὡς ἡ $BΓ$ πρὸς τὴν $ΓΖ$ οὕτως τὸ BE παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ $EΖ$ παραλληλόγραμμον καὶ ὡς ἄρα τὸ $ABΓ$ τρίγωνον πρὸς τὸ $KHΘ$ τρίγωνον οὕτως τὸ BE παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ $EΖ$ παραλληλόγραμμον· ἐναλλαξὶς ἄρα ὡς τὸ $ABΓ$ τρίγωνον πρὸς τὸ BE παραλληλόγραμμον οὕτως τὸ $KHΘ$ τρίγωνον πρὸς τὸ $EΖ$ παραλληλόγραμμον. Ἰσον δὲ τὸ $ABΓ$ τρίγωνον τῷ BE παραλλη-

1) Vox τριγώνῳ, τριγώνον et similia propriis non huc pertinent, quum manifesto de figuris rectilineis quibuscunque sermo sit. Vid. observationem Rob. Simsonis ad hunc locum. Quum tamen illa in omnibus, qui hactenus comparati sunt, codicibus legantur, nolimus ea expungere.

qualis est angulo deinceps posito alterius trianguli, productus usquedum latus ita productum aequale sit ei ipsi, quod producebatur, lateri, ubi tum res facile patet. Poterat autem idem etiam aliis modis demonstrari.

Obs. 10. Prop. VI. 23. et Obs. 8. duo parallelogramma (triangula) rectangula, et hinc quaevis (I. 55. I. 57. V. 5. V.

Applicetur enim (I. 44. et 45.) ad rectam quidem BF triangulo ABF aequale parallelogrammum BE , ad rectam vero FE ipsi A aequale parallelogrammum FM in angulo ZFE , qui est aequalis angulo FBA ; in directum igitur est (I. 14.) BF quidem ipsi FZ , et AE ipsi EM . Et sumatur (VI. 13.) inter ipsas BF , FZ media proportionalis $H\Theta$, et describatur (VI. 18.) ex $H\Theta$ rectilineo ABF simile et similiter positum rectilineum $KH\Theta$.

Et quoniam est ut BF ad $H\Theta$ ita $H\Theta$ ad FZ , si item tres rectae proportionales sint, est (VI. 20. Cor.) ut prima ad tertiam ita figura ex prima ad figuram et secunda, similem et similiter descriptam; est igitur ut BF ad FZ ita triangulum ABF ad triangulum $KH\Theta$. Sed et (VI. 1.) ut BF ad FZ ita parallelogrammum BE ad parallelogrammum EZ ; ut igitur triangulum ABF ad triangulum $KH\Theta$ ita parallelogrammum BE ad parallelogrammum EZ ; alterne igitur (V. 16.) ut triangulum ABF ad parallelogrammum BE ita triangulum $KH\Theta$ ad parallelogrammum EZ . Aequale autem triangulum ABF parallelogrammo BE ; aequale igitur et triangulum $KH\Theta$ parallelo-

1.) sunt in ratione composita ex rationibus basium et altitudinum, quod et aliter demonstrari potest. Commandinus et Clavius ad VI. 23. Pfeiderer, §§. 247. 248. Cuiuslibet igitur parallelogrammi ad quadratum aliquod ratio componitur ex rationibus, quas basis et altitudo parallelogrammi habent ad latus quadrati. Unde per Defin. Simson. (in Exc. ad h. libr. . 3. coll. §. 7.) consequitur regula generalis dimensionis parallelogrammorum. Cf. in Prop. II. 1. Cor. 4. Pfeiderer, §. 49. Schol. in libr. II. Elem. P. I. §. 5. sq.

Obs. 11. Ex VI. 23. indeque deductis Obs. 8. 10. per

λογράμμου ἴσον ἄρα καὶ τὸ $KH\Theta$ τριγώνον τῷ EZ παραλληλογράμμῳ. Ἀλλὰ τὸ EZ παραλληλόγραμμον τῷ Δ ἴσθιν ἴσον· καὶ τὸ $KH\Theta$ ἄρα τῷ Δ ἴσθιν ἴσον. Ἔστι δὲ τὸ $KH\Theta$ καὶ τῷ $AB\Gamma$ ὁμοιον· τῷ ἄρα δοθέντι εὐθυγράμμῳ τῷ $AB\Gamma$ ὁμοιον, καὶ ἄλλῳ τῷ δοθέντι τῷ Δ ἴσον τὸ αὐτὸ συνίσταται τὸ $KH\Theta$. Ὅπερ ἔδει ποιῆσαι.

Π Ρ Ο Τ Α Σ Ι Σ κς'.

Ἐὰν ἀπὸ παραλληλογράμμου παραλληλόγραμμον ἀφαιρεθῇ, ὁμοιὸν τε τῷ ὅλῳ καὶ ὁμοίως κείμενον, κοινὴν γωνίαν ἔχον αὐτῷ· περὶ τὴν αὐτὴν διάμετρον ἴσθι τῷ ὅλῳ.

Ἀπὸ παραλληλογράμμου γὰρ τοῦ $AB\Gamma\Delta$ παραλληλόγραμμον ἀφαιρήσθω τὸ $AEZH$, ὁμοιον τῷ $AB\Gamma\Delta$ καὶ ὁμοίως κείμενον, κοινὴν γωνίαν ἔχον αὐτῷ τὴν ἐπὶ ΔAB . λέγω ὅτι περὶ τὴν αὐτὴν διάμετρον ἴσθι τὸ $AB\Gamma\Delta$ τῷ $AEZH$.

ea, quae in Exc. ad hunc libr. §. 22. §. 25. notantur, consequuntur propositiones VI. 14. VI. 15. et Obs. 12. ad Prop. 16. 17. libr. VI. Pfeiderer. §. 250.

Obs. 12. Sint rectae $A : B = C : D$

et $E : F = G : H$

erunt etiam (per VI. 23. et Exc. ad hunc libr. §. 10.) rectangula $A \times E : B \times F = C \times G : D \times H$. Vicissim si $A \times E : B \times F = C \times G : D \times H$, atque $E : F = G : H$, pariter erit $A : B = C : D$ (VI. 23. et in Exc. ad hunc libr. §. 14.). Cf. Pfeiderer §. 251.

Obs. 13. Per Obs. 10. et Exc. ad hunc libr. §. 13. duorum quorumvis parallelogrammorum, triangulorumve altitudines sunt in ratione composita ex directa arearum et inversa basium; bases in ratione composita ex directa arearum et inversa altitudinum. Pfeiderer. §. 263.

λογισμένην ἴσον αὐτῷ τῷ $KH\Theta$ **grammo EZ.** Sed parallelogrammum EZ ip-
 σαλλομένην. Ἄλλοις τῷ EZ **aequale;** et $KH\Theta$ igitur ipsi Δ est aequale.
 τῷ Δ ἴσιν ἴσον καὶ τῷ $KH\Theta$ **tem $KH\Theta$ et ipsi ABF simile;** dato igitur r-
 ἔστι δὲ τῷ $KH\Theta$ καὶ τῷ ABF **ABF simile, et alteri dato Δ aequale idem e-**
 ὅτι ἐκδιγμένῳ τῷ ABF **stum est $KH\Theta$.** Quod oportebat facere.
 δοθέντι τῷ Δ ἴσον τὸ αὐτῷ
 ὅτιοι εἶναι ποιεῖται.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ

PROPOSITIO XXVI. (Fig. 3)

Εἰν ἀπὸ παραλλογράμμου **Si a parallelogrammo parallelogrammum au-**
 ἐφαρμόξῃ, ὅμοιον τε τῷ αὐτῷ **simile toti et similiter positum, communem cu-**
 καὶ τὴν γωνίαν ἔχον αὐτῷ **angulum habens, circa eandem diametrum e-**
 ἴσιν τῷ ὅλῳ. **quam totum.**

Ἀπὸ παραλλογράμμου **A parallelogrammo enim $ABF\Delta$ parallelogr-**
 ἀφαιρέσῃ ἐφαρμόξας τὸ $AEZH$ **auferatur $AEZH$, simile ipsi $ABF\Delta$ et simil-**
 καὶ ὅμοιος καὶ τὴν γωνίαν **situm, communem angulum habens ΔAB cur-**
 τῷ ΔAB λέγεται ὅτι περὶ τὴν αὐτὴν **dico circa eandem diametrum esse $ABF\Delta$ circa**
 τὸ $ABF\Delta$ τῷ $AEZH$. **ipsum $AEZH$.**

es, quae in Exc. ad hunc libr. §. 22. **Obs. 14. Rursus (quae est altera Prop. 23. et**
 quuntur propositiones VI. 14. VI. 15. **Obs. 8. conversa), duo parallelogramma vel triangula,**
 16. 17. libr. VI. Pfeiderer. §. 250. **areae sunt in ratione composita ex rationibus duorum**
 Obs. 12. Sicut rectae $A:P=C:D$ **contiguum, habent angulos lateribus his comprehe-**
 et $E:F=G:H$ **tingulos aequales, vel simul aequales duobus rectis**
 ornat etiam (per VI. 23. et Exc. ad hunc **apsum facile, sumto contrario, probatur. Pfeiderer. §**

PROPOSITIO XXIV.

§. 251. **Obs. 1. Rob. Simson. monet, videri imperitum**
 regula $A \times E : B \times F = C \times G : D \times H$. **dam ex duabus diversis huius propositionis demonstra-**
 $= C \times G : D \times H$, atque $E : F = G : H$, per **hanc, quam nunc habemus, composuisse, ex una nempe**
 (VI. 23. et in Exc. ad hunc libr. §. 250. **per VI. 2. et ex altera, quae per VI. 4. fieri potes-**
 §. 251. **quam enim, ita pergit Simson., per VI. 2. et comp-**

Obs. 13. Per Obs. 10. et Exc. ad hunc **permutandoque ostenderat, latera circa communem**
 rum quorumvis parallelogrammorum, **parallelogrammorum (taliam enim parallelogramma ob-**
 nes sunt in ratione composita ex duabus **Euclid. Element. P. II.**
 basium: bases in ratione composita ex duabus **S**
 versa altitudinum. Pfeiderer. §. 251

Μὴ γὰρ, ἀλλ' εἰ δυνατόν, ἔστω αὐτοῦ ¹⁾ ἡ διάμετρος ἢ $ΑΘΓ$, καὶ ²⁾ ἐκβληθεῖσα ἢ $ΗΖ$ διήχθω ἐν τῷ $Θ$, καὶ ἤχθω διὰ τοῦ $Θ$ ὑποτέρᾳ τῶν $ΑΔ$, $ΒΕ$ παραλλήλος ἢ $ΘΚ$.

Ἐπεὶ οὖν περὶ τὴν αὐτὴν διάμετρον ἔστι τὰ $ΑΒΓΔ$ τῷ $ΚΗ$, ὁμοίων ἔστι τὸ $ΑΒΓΔ$ τῷ $ΚΗ$ ἔστιν ἄρα ὡς ἡ $ΔΑ$ πρὸς τὴν $ΑΒ$ οὕτως ἢ $ΗΕ$ πρὸς τὴν $ΑΚ$. Ἔστι δὲ καὶ διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν $ΑΒΓΔ$, $ΕΗ$, ὡς ἡ $ΔΑ$ πρὸς τὴν $ΑΒ$ οὕτως ἢ $ΗΕ$ πρὸς τὴν $ΑΕ$ καὶ ὡς ἄρα ἡ $ΗΑ$ πρὸς τὴν $ΑΚ$ οὕτως ἢ $ΗΑ$ πρὸς τὴν $ΑΕ$ ἢ $ΗΑ$ ἄρα πρὸς ἑκατέραν τῶν $ΑΚ$, $ΑΕ$ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον· ὅση ἄρα ἔστιν $ΑΕ$ τῇ $ΑΚ$, ἢ ἐλάττω τῇ μείζονι, ὅπερ ἔστιν ἀδύνατον· οὐκ ἄρα ἔστι περὶ τὴν αὐτὴν διάμετρον τὸ $ΑΒΓΔ$ τῷ $ΚΗ$ ³⁾ περὶ τὴν αὐτὴν ἄρα ἔστι διάμετρον τὸ $ΑΒΓΔ$ παραλληλόγραμμον τῷ $ΑΕΖΗ$ πα-

1) Ita recte ex Cod. a posuit Peyrardus, quum add. Basil. et Oxon. haberent: αὐτῶν, quum tamen de diametro tantum parallelogrammi $ΑΒΓΔ$ hic sermo sit.

2) Pro verbis: καὶ ἐκβληθεῖσα ἢ $ΗΖ$ διήχθω ἐν τῷ $Θ$ π. ἤχθω διὰ τοῦ $Θ$, quae ex Cod. a. posuit Peyrardus, cum quibus contentit etiam versio Commandini, in edd. Oxon. et Basil. solum legitur: καὶ ἤχθω διὰ τοῦ $Θ$. Utraque lectio bene habet, prout schema ita formatum imaginem, ut diametri $ΑΘΓ$ rectam $ΗΖ$ productam, aut ipsam rectam $ΗΖ$ in puncto aliquo $Θ$ secet. Priorem casum et figuram locum codicum posteriori lectio ed. Oxon. supponit.

3) Pro his verbis Cod. a. et ex eo Peyrardus, correctio mendis typographicis ad calcem libri indicatis, habet: οὐκ ἔστι περὶ τὴν αὐτὴν διάμετρον τὸ $ΑΒΓΔ$ τῷ $ΕΗ$ (ita enim legendum est, non $ΚΗ$). Nos veriorē lectionem ex Cod. Basil. et Oxon. restituumus.

Clavio intelliguntur, quae habeant unum angulum cum tota parallelogrammo communem, quod etiam Caudalla, Henricus alique nominatim addunt proportionalia esse, immediate concludere potuisset, proportionalia esse latera circa reliquos angulos aequales, ope scilicet Prop. I. 51. et V. 7. Verum

Non enim, sed si fieri potest, sit ipsius diameter $A\Theta\Gamma$, et ducta HZ producat ad Θ , et ducatur per Θ alterutri ipsarum AA , $B\Gamma$ parallela ΘK (I. 31.)

Quoniam igitur circa eandem diametrum est parallelogrammum $AB\Gamma A$ circa quam parallelogrammum KH , simile est (VI. 24.) $AB\Gamma A$ ipsi KH ; est igitur (VI. Def. 1.) ut AA ad AB ita HA ad AK . Est autem et propter similitudinem ipsorum $AB\Gamma A$, EH , ut AA ad AB ita HA ad AE ; ut igitur (V. 11.) HA ad AK ita HA ad AE ; ipsa HA igitur ad utramque ipsarum AK , AE eandem habet rationem; aequalis igitur est (V. 9.) AE ipsi AK , minor maiori, quod fieri nequit; non igitur est circa eandem diametrum parallelogrammum $AB\Gamma A$ circa quam ipsum KH ; circa eandem igitur est diametrum parallelogrammum

hoc negligens pergit ostendere, triangula et parallelogramma esse aequiangula, et longo circuitu, ope VI. 4. et V. 22. concludit rem eandem. Manifestum propterea est, hanc inscite factam demonstrationem minime Euclidis esse. Ipse deinde Rob. Simson., superfluis reiectis, simpliciore exhibet demonstrationem, postquam ostenderat, aequiangula esse triangula AHZ , $AA\Gamma$ ope VI. 4. I. 34. et V. 7., quoad maximam partem similem ei, quae est apud Campanum, nisi quod is pro VI. 4. adhibet VI. 2., et triangula, quae diximus, aequiangula esse monet quidem, at non demonstrat. Simsonis demonstrationem habet etiam Playfair. et Peletarius.

Obs. 2. Perspicuum est, quod Clavius monet, parallelogramma* circa eandem diametrum non solum similia esse sed etiam similiter posita. Cf. observata ad VI. 18.

Obs. 3. Praeterea, eodem Clavio monente, etiam, si circa diametrum alicuius parallelogrammi productam consistat parallelogrammum aliud, ita, ut duo huius latera recta duas

παλληλογράμμω. Ἐάν ἄρα ἀπὸ παραλληλογράμμου, καὶ τὰ ἐξῆς.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κζ.

Πάντων τῶν παρὰ τὴν αὐτὴν εὐθείαν παραβαλλομένων παραλληλογράμμων, καὶ ἑλλειπόντων εἶδει παραλληλογράμμοις, ὁμοίοις τε καὶ ὁμοίως κειμένοις τῷ ἀπὸ τῆς ἡμισείας ἀναγραφόμενῳ, μέγιστόν ἐστι τὸ ἀπὸ τῆς ἡμισείας παραβαλλόμενον παραλληλόγραμμον, ὅμοιον ὃν τῷ ἑλλείμματι.

Ἐστω εὐθεῖα ἡ AB , καὶ τετμήσθω διχα κατὰ τὸ Γ , καὶ παραβεβλήσθω παρὰ τὴν AB εὐθείαν τὸ AA παραλληλόγραμμον ἑλλείπον εἶδει παραλληλόγραμμῳ τῷ GE , ὁμοίῳ τε καὶ ὁμοίως κειμένῳ τῷ ἀπὸ τῆς ἡμισείας ἀναγραφέντι τῆς AB , τουτέστι τῆς GB . λέγω ὅτι πάντων τῶν παρὰ τὴν AB παραβαλλομένων παραλληλογράμμων, καὶ ἑλλειπόντων εἶδει παραλληλογράμμοις ὁμοίοις τε καὶ ὁμοίως κειμένοις

componant lineas cum duobus lateribus alterius, vel certe illi his sint parallela, eadem fere ratione ostenditur, hoc illi esse simile.

Obs. 4. Parallelogramma, quae unum angulum uni angulo aequalem, et circum eos proportionalia latera habent, similia sunt. Hoc Corollarium addit Boerhaavius. Et ope Obs. 5. ad Prop. 5. et 6. libri VI. et nostrae huius propositionis id facile probatur.

PROPOSITIO XXV.

Obs. 1. Rob. Simson. ad hanc propositionem monuit, „liquido patet. demonstrationem huius, quam Euclides dederat, vitiatam fuisse ab editore quodam geometriae minus perito. Postquam enim ostenderat, „ut rectilineum ABF ad rectilineum KH , ita parallelogrammum BE ad parallelogrammum EZ “ opus fuit

$ABFA$ quam parallelogrammum $AEZH$. Si igitur a parallelogrammo etc.

PROPOSITIO XXVII. *) (Fig. 386.)

Omnium secundum eandem rectam applicatorum parallelogrammorum et deficientium figuris parallelogrammis, similibus et similiter positis ei, quae ex dimidia describitur, maximum est quod ad dimidiam est applicatum parallelogrammum, simile existens defectui.

Sit recta AB et secetur bifariam in F , et applicetur ad rectam AB parallelogrammum AA deficiens figura parallelogramma FE , simili et similiter posita ei, quae ex dimidia ipsius AB descripta est, hoc est ex FB ; dico omnium secundum AB applicatorum parallelogrammorum, et deficientium figuris parallelogrammis similibus et similiter positis ipsi FE , maximum esse AA . Applicetur enim ad rectam AB parallelogram-

*) Ut sequentes tres propositiones melius intelligantur Rob. Simson. praemittit sequentia: 1) Parallelogrammum ad rectam applicari dicitur, quando super recta illa describitur. Ex. gr. parallelogrammum $A\theta$ (Fig. 386.) applicari dicitur, ad rectam AB , quando super AB describitur. (Hoc casu dicitur Pheiderero monente: ἀναγράφεσθαι seu παραβάλλεσθαι ἀπὸ τῆς AB . 2) Sed parallelogrammum AZ dicitur applicari ad (secundum) rectam AB (παραβάλλεσθαι παρὰ τὴν AB) deficiens figura parallelogramma, quando AK basis eius minor est recta AB , et propterea parallelogrammum AZ deficit ab ipso $A\theta$, quod super recta AB describitur in eodem angulo, et inter easdem parallelas figura parallelogramma $K\theta$, quae quidem dicitur defectus ipsius AZ . 3) Et parallelogrammum $A\Xi$ (Fig. 293.) applicari dicitur ad (secundum) rectam AB (παραβάλλεσθαι παρὰ τὴν AB), excedens figura parallelogramma, quando AO basis ipsius $A\Xi$ maior est recta AB , et propterea $A\Xi$ excedit parallelogrammum $A\theta$ ad AB applicatam figura parallelogramma ΠO .

solummodo addere, est autem rectilineum ABF aequale pa-

τῷ ΓΕ, μείζον ἐστὶ τὸ ΑΔ. Παραβεβλήσθω γὰρ παρὰ τὴν ΑΒ εὐθείαν τὸ ΑΖ παραλληλογράμμου, ἑλλείπον εἶδει παραλληλογράμμῳ τῷ ΚΘ, ὁμοίῳ τε καὶ ὁμοίως κειμένῳ τῷ ΓΕ· λέγω ὅτι μείζον ἐστὶ τὸ ΑΔ τοῦ ΑΖ.

Ἐπεὶ γὰρ ὁμοίον ἐστὶ τὸ ΓΕ παραλληλόγραμμον τῷ ΚΘ παραλληλογράμμῳ, περὶ τὴν αὐτὴν εἶσι διαμέτρον. Ἠχθῶ αὐτῶν διάμετρος ἡ ΔΒ, καὶ καταγεγράφθω τὸ σχῆμα.

Ἐπεὶ οὖν ἴσον ἐστὶ τὸ ΓΖ τῷ ΖΕ, κοινὸν προσκείσθω τὸ ΚΘ· ὅλον ἄρα τὸ ΓΘ ὅλῳ τῷ ΚΕ ἴσον ἔσται. Ἀλλὰ τὸ ΓΘ τῷ ΓΗ ἐστὶν ἴσον· ἐπεὶ καὶ ἡ ΑΓ τῇ ΓΒ ἴση ἐστὶν καὶ τὸ ΗΓ ἄρα τῷ ΕΚ ἴσον ἔσται. Κοινὸν προσκείσθω τὸ ΓΖ· ὅλον ἄρα τὸ ΑΖ τῷ ΑΜΝ γνώμονι ἐστὶν ἴσον ὥστε τὸ ΓΕ παραλληλόγραμμον, τουτίστι τὸ ΑΔ, τοῦ ΑΖ παραλληλογράμμου μείζον ἐστὶν. ¹⁾

1) Ed. Basil. hic iam addit: πάντων ἄρα τῶν παρὰ τὴν εὐθεῖαν παραβαλλομένων, καὶ τὰ ἐξ ἧς, quae Gregorius, quamvis ea in omnibus codicibus tam mss. quam impressis invenitur, iure ad casus secundi finem reiecit, quem etiam Peyrardus, nulla tamen lectionis variantis mentione facta, secutus est.

rallelogrammo BE, aequale igitur est rectilineum KΘ parallelogrammo EZ videlicet per V. 14, sed inter has duas sententias interposuit „quare alterne, ut rectilineum ABΓ ad parallelogrammum BE ita rectilineum KΘ ad parallelogrammum EZ“ putavit scilicet, non tam perspicuum esse concludere secundam quatuor proportionalium quartae aequalem esse ex aequalitate primae et tertiae, quod quidem demonstratum est in V. Prop. 14. quam concludere, tertiam aequalem esse quartae ex aequalitate primae et secundae, quod nusquam in Elementis, quae iam habemus, ostensum est. Verum quamvis haec propositio, tertiam scilicet quatuor proportionalium aequalem esse quartae, si

$ΓΕ$, μέγιστον ἐστὶ τὸ $ΑΙ$ ἢ
ἐπὶ τὴν $ΑΒ$ εὐθείαν τὸ $ΑΖ$
πὺν εἶδει παραλλήλογον
ποῖως περιέχεται τὸ $ΓΕ$ ὑπὸ
τοῦ $ΑΖ$.

καὶ γὰρ ὁμοίον ἐστὶ τὸ $ΓΕ$ πρὸς
τὸ $ΚΘ$ παραλλήλογον, καὶ πρὸς
τὸ $ΑΖ$ ἐπὶ τὴν $ΑΒ$ εὐθείαν.
Ἡ δὲ αὐτῶν διάμετρος $ΑΒ$
τὸ σῆμα.

καὶ οὖν ἴσον ἐστὶ τὸ $ΓΖ$ τῷ $ΖΕ$
τὸ $ΚΘ$ ὅλον ὅρα τὸ $ΠΘ$
Ἄλλὰ τὸ $ΓΘ$ τῷ $ΓΗ$ ἴσον
ἔστιν, ὅτι τὸ $ΓΒ$ ἴσον ἐστὶ τῷ $ΗΓ$
κοινὸν προσκείμεν τὸ $ΓΖ$
τῷ $ΠΝ$ γνόμονι ἴσων ὡς ἴσων
ἔστιν, τοιούτως τὸ $ΑΙ$, ὅτι $ΕΖ$
μείζον ἐστίν. ὅ

1. Basil. hic iam addit: τὸν $ΕΖ$
παραλλήλογον, καὶ τὸ $ΕΖ$, quod
ἴσους codicibus tam mss. quam mss.
assus secundi lineam tenet. quod
in lectionis varietatis mentione non.

mo $ΒΕ$, aequale igitur est rectae
ἢ $ΕΖ$ videlicet per V. 14, vel
propositum, quare alterae, ut rectae
tum $ΒΕ$ ita rectilinum $ΕΖ$ a
scilicet, non tam perspicuum est
tuor proportionalium quarta equa
nae et tertiae, quod quatuor
quam concludere, tertium aequale
primae et secundae, quod ostendit
mus, ostensum est. Verum quatuor
quatuor proportionalium aequale est.

mum AZ , deficiens figura parallelogramma
mili et similiter posita ipsi $ΓΕ$; dico maius
parallelogrammo AZ .

Quoniam enim simile est parallelogrammum
parallelogrammo $KΘ$, circa eandem sunt di
(VI. 26.). Ducatur eorum diameter AB , et
tur figura.

Quoniam igitur aequale est $ΓΖ$ ipsi $ΖΕ$ (L. 43.)
mune addatur $KΘ$; totum igitur $ΓΘ$ toti $ΚΕ$ est
Sed $ΓΘ$ ipsi $ΓΗ$ est aequale (L. 36.), quoniam
 $ΑΓ$ ipsi $ΓΒ$ aequalis est; ergo et $ΗΓ$ ipsi
aequale. Commune addatur $ΓΖ$; totum igitur
ipsi gnomoni AMN est aequale; quare et p
grammum $ΓΕ$, hoc est $ΑΔ$, parallelogrammum
maius est.

prima aequalis fuerit secundae, fuisset ab Euclide Ele
inserta, ut verisimile est eam fuisse, nunquam tamen ille
casu eadem usus fuisset; quoniam, ut dictum fuit, sine
hac proportionalium permutatione eadem conclusio
elici potest. Haec autem fusius ostendimus, tum
centum praebent indicium, textum Euclidis vitiatum
idem enim error invenitur in textu graeco XI. 23. b.
in XII. 2. et in Prop. 5. 11. 12. 18. eiusdem, in qu
XII. locis, excepto ultimo, recte omissa est haec p
proportionalium in versionis Commandini editione C
tum, ut caveant geometrae ab usu permutationis in
non raro enim recentiores, et inter alios ipse Comma
Commentario ad III. 5. pag. 6. b. Pappi Alexandrin
incidunt in hunc errorem; praecoccupavit scilicet
mentes vulgaris proportionum idea, qua fit, ut accu

Ἐστω γὰρ πάλιν ἡ AB τμηθεῖσα διὰ κατὰ τὸ Γ , καὶ παραβλήθην τὸ AA' ἑλλείπον εἶδει τῷ ΓM , καὶ παραβελήσθω πάλιν παρὰ τὴν AB τὸ AE παραλληλόγραμμον ἑλλείπον τῷ AZ , ὁμοίω τε καὶ ὁμοίως κειμένω τῷ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς AB , τῷ ΓM . λέγο ὅτι μείζον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ἡμισείας παραβληθὲν τὸ AA' τοῦ AE .

Ἐπεὶ γὰρ ὁμοίων ἐστὶ τὸ AZ τῷ ΓM , περὶ τὴν αὐτὴν εἰσι διάμετρον· ἔστω αὐτῶν διάμετρος ἡ EB , καὶ καταγεγράφθω τὸ σχῆμα.

Καὶ ἐπεὶ ἴσον ἐστὶ τὸ AZ τῷ $A\Theta$, ἐπεὶ καὶ ἡ ZB τῇ $H\Theta$ μείζον ἄρα τὸ AZ τοῦ KE . Ἰσον δὲ τὸ AZ τῷ AA' μείζον ἄρα καὶ τὸ AA' τοῦ EK . Κοινὸν προσκείσθω ¹⁾ τὸ KA' ὅλον ἄρα τὸ AA' ὁῖον τοῦ AE μείζον ἐστίν. Πάντων ἄρα, καὶ τὰ ἐξῆς.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κη.

Παρὰ τὴν δοθείσαν εὐθείαν τῷ δοθέντι εὐθύγραμμῳ ἴσον παραλληλόγραμμον παραβαλεῖν, ἑλλείπον εἶδει παραλληλογράμμου, ὁμοίω τῷ δοθέντι δὲ δὴ τὸ διδόμενον εὐθύγραμμον, ὃ δὲ ἴσον παραβαλεῖν, μὴ μείζον εἶναι τοῦ ἀπὸ τῆς ἡμισείας παρα-

1) Ita rectius omnino Peyrardus ex Cod. a. habet, quae ut vulgo legitur: κοινὸν ἔστω τὸ KA' .

percipiant. Praeterea, quamvis rectilineum $AB\Gamma$, cui simile acriendum est, possit esse cuiuscunque generis, in demonstratione tamen graeci codices habent utriusque triangulum vice rectilinei, qui error correctus est in versionis Commandini editione, quae Oxonii impressa est. Huic Simsonis observationi addi potest Campani quoque duplicem demonstrationem differre a demon-

Sit enim rursus AB secta bifariam in Γ ; et applicatum sit AA , deficiens figura ΓM , et applicetur rursus secundum AB parallelogrammum AE , deficiens figura AZ , simili et similiter posita ei, quae ex dimidia AB describitur, nempe ΓM , dico maius esse parallelogrammum, quod ad dimidiam applicatur, nempe AA parallelogrammo AE .

Quoniam enim simile est AZ ipsi ΓM , circa eandem sunt diametrum (VI. 26.); sit eorum diameter EB , et describatur figura.

Et quoniam (I. 36.) aequale est AZ ipsi $A\Theta$, etenim et ZH aequalis est ipsi $H\Theta$; maius igitur AZ ipso KE . Aequale autem AZ ipsi AA (I. 43.); maius igitur est AA ipso EK . Commune addatur KA ; totum igitur AA toto AE maius est. Omnium igitur etc.

PROPOSITIO XXVIII. (Fig. 390.)

Secundum datam rectam dato rectilineo aequale parallelogrammum applicare, deficiens figura parallelogramma simili alteri dato; oportet autem datum rectilineum, cui aequale applicandum est, non maius esse eo, quod ad dimidiam applicatur, similibus existenti-

stratione sextus graeci. In eorum priore sine permutatione proportionalium res refertur ad partem posteriorem V. 9. in posteriore permutatio proportionalium pariter adhibetur.

Obs. 2. Pfeiderer. in schedis mss. §. 308 monet, inepte inter VI. 24. eiusque conversam VI. 26. insertam esse hanc VI. 25. quae nullam ad illas habeat relationem, contra immediate nitatur VI. 20. Apud Campanum id vitium non reperitur, quum, quae vulgo sunt VI. 24., VI. 26. sint apud ipsum

βαλλόμενον, ὁμοίων ὄντων τῶν ἑλλειμμάτων τοῦ ϵ ἀπὸ τῆς ἡμισείας καὶ τοῦ ϕ δεῖ ὁμοιον ἑλλεῖπειν.

Ἐστὼ ἡ μὲν δοθεῖσα εὐθεῖα ἡ AB , τὸ δὲ δοθὲν εὐθύγραμμον, ϕ δεῖ ἴσον παρὰ τὴν AB παραβαλεῖν. τὸ Γ , μὴ μείζον ὄν τοῦ ἀπὸ τῆς ἡμισείας παραβαλλομένου, ὁμοίων ὄντων τῶν ἑλλειμμάτων, ϕ δὲ δεῖ ὁμοιον ἑλλεῖπειν, τὸ Δ δὲ δὴ παρὰ τὴν δοθεῖσαν εὐθεῖαν τὴν AB τῷ δοθέντι εὐθυγράμμῳ τῷ Γ ἴσον παραλληλόγραμμον παραβαλεῖν, ἑλλείπον εἶδει παραλληλογράμμῳ, ὁμοίῳ ὄντι τῷ Δ .

Τειμήσθω ἡ AB δίχα κατὰ τὸ E σημείον, καὶ ἀναγεγράφθω ἀπὸ τῆς EB τῷ Δ ὁμοιον καὶ ὁμοίως κείμενον τὸ $EBZH$, καὶ συμπληρώσθω τὸ AH παραλληλόγραμμον· τὸ δὲ AH ἡτοί ἴσον ἐστὶ τῷ Γ . ἢ μείζον αὐτοῦ, διὰ τὸν ὅρισμον. Εἰ μὲν οὐκ ἴσον ἐστὶ τὸ AH τῷ Γ , γεγονός ἂν εἴη τὸ ἐπιτεχθεῖν παραβέβληται γὰρ παρὰ τὴν δοθεῖσαν εὐθεῖαν τὴν AB τῷ δοθέντι εὐθυγράμμῳ τῷ Γ ἴσον παραλληλόγραμμον τὸ AH , ἑλλείπον εἶδει παραλληλογράμμῳ τῷ Δ .

VI. 22., VI. 23., nostra haec autem pariter VI. 25. Quae item vulgo est VI. 23. apud Campanum est VI. 24.

Obs. 3. Iluc referri. potest problema, quod est apud Thom. Simpson 14. libri VI., quo iubetur describi figuram, cujus una datae figurae rectilineae, quae ad aliam datam figuram rectilineam sit in ratione data.

PROPOSITIO XXVI.

Obs. 1. Si quis sumere velit, dari posse rectam AG quae non transeat per punctum Z , necessario is ponere debet rectam HZ ipsam aut productam convenire in puncto aliquo cum recta AG . Quoniam enim, ob angul. $AHZ = AGZ$ (supp.) recta HZ parallela est rectae AG (I. 28.) et AG sec.

us defectu eius, quod ad dimidiam et parallelogrammo, ui oportet simile deficere ¹⁾.

Sit data quidem recta AB , datum vero rectilineum, cui oportet aequale ad AB applicare, sit Γ , non maius existens eo, quod ad dimidiam applicatum est similibus existentibus defectibus, cui autem oportet simile deficere, sit Δ ; oportet secundum datam rectam AB dato rectilineo Γ aequale parallelogrammum applicare, deficiens figura parallelogramma, quae similis sit ipsi Δ .

Secetur AB (I. 10.) bifariam in puncto E , et describatur ex ipsa EB (VI. 18.) ipsi Δ simile et similiter positum $EBZH$, et compleatur parallelogrammum AH ; itaque AH vel aequale est ipsi Γ , vel maius ipso, ob determinationem. Et si quidem aequale est AH ipsi Γ , factum erit propositum; applicatum erit enim secundum datam rectam AB dato rectilineo Γ aequale parallelogrammum AH , deficiens figura parallelogramma EZ ipsi Δ simili. Si autem non, maius

1) Ad finem huius propositionis in versione latina praesente Boermannio paululum recessimus a textu graeco, quo verius rem ipsam exprimeremus. Neque enim de duobus defectibus sermo esse potest, quorum alter pertineret ad parallelogrammum illud, cui oportet simile deficere. Itaque graeca quoque ita habere debebant: ὁμοίων ὄντων τοῦ τε ἐλλείματος τοῦ ἀπὸ τῆς ἡμισίας καὶ τοῦ (εἶδους) ᾧ δὲ ὅμοιον ἐλλείπειν. Caeterum, monente Pileiderero propositio haec ita etiam potest exprimi: datae figurae rectilineae aequale describere parallelogrammum sub angulo dato, cuius unum latus circa hunc angulum sit segmentum rectae datae, alterum vero latus habeat rationem datam ad reliquum segmentum rectae datae: dummodo figura rectilinea data maior non sit parallelogrammo sub eodem angulo dato, cuius unum latus circa hunc angulum est semissis rectae datae, alterum vero ad semissem rectae datae, seu ad prius eius latus haber eandem rationem datam.

rectam $A\Theta F$ in Γ (supp.), etiam HZ ipsa vel producta eandem

ὁμοίῳ ὄντι τῷ Δ . Εἰ δὲ οὐ, μείζον ἔστι τὸ $\Theta\epsilon$ τοῦ Γ . Ἰσὸν δὲ τὸ $\Theta\epsilon$ τῷ HB · μείζον ἄρα καὶ τὸ HB τοῦ Γ . Ὡς δὴ μείζον ἔστι τὸ HB τοῦ Γ , ταύτης τῆς ὑπεροχῇ ἴσον, τῷ δὲ Δ ὁμοιον καὶ ὁμοίως κείμενον τὸ αὐτὸ συνεστήτω τὸ $KAMN$. Ἀλλὰ τὸ Δ τῷ HB ἔστιν ὁμοιον· καὶ τὸ KM ἄρα τῷ HB ἔστιν ὁμοιον. Ἐστω οὖν ὁμόλογος ἡ μὲν KA τῇ HE , ἡ δὲ AN τῇ HZ . Καὶ ἐπεὶ ἴσον ἔστι τὸ HB τοῖς Γ, KM · μείζον ἄρα ἔστι HB τοῦ KM · μείζων ἄρα ἔστι καὶ ἡ μὲν HE τῆς AK , ἡ δὲ HZ τῆς AM . Κεῖσθε τῇ μὲν KA ἴση ἡ $H\Xi$, τῇ δὲ AM ἴση ἡ HO , καὶ συμπληρώσθω τὸ $\Xi\theta\theta\Pi$ παραλληλόγραμμον ἴσον ἄρα καὶ ὁμοίον ἔστι τῷ KM τὸ $\theta\Pi\Pi$. Ἀλλὰ τὸ KM τῷ HB ὁμοίον ἔστι καὶ τὸ $\theta\Pi\Pi$ ἄρα τῷ HB ὁμοίον ἔστι· περὶ τὴν αὐτὴν ἄρα διάμετρον ἔστι τὸ $\theta\Pi\Pi$ τῷ HB . Ἐστω αὐτῶν διάμετρος ἡ $\theta\Pi\theta$, καὶ καταγεγράφθω τὸ σχῆμα.

Ἐπεὶ οὖν ἴσον ἔστι τὸ BH τοῖς Γ, KM , ὅν τε $\theta\Pi\Pi$ τῷ KM ἔστιν ἴσον· λοιπὸς ἄρα ὁ $\Gamma\Phi X$ γνώμων λοιπῷ τῷ Γ ἴσος ἔστιν. Καὶ ἐπεὶ ἴσον ἔστι τὸ OF τῷ $\Xi\Sigma$, κοινὸν προσκείσθω τὸ $\theta\theta$ · ὅλον ἄρα τὸ OB ὅλον τῷ ΞB ἴσον ἔστιν. Ἀλλὰ τὸ ΞB τῷ TE ἔστιν ἴσον, ἐπεὶ καὶ πλευρὰ ἡ AE πλευρὰ τῇ EB ἔστι ἴση καὶ τὸ TE ἄρα τῷ OB ἔστιν ἴσον. Κοινὸν προσκείσθω τὸ $\Xi\Sigma$ · ὅλον ἄρα τὸ $T\Sigma$ ὅλον τῷ $\Gamma\Phi$ γνώμονι ἔστιν ἴσον. Ἀλλὰ ὁ $\Gamma\Phi X$ γνώμων τῷ Γ ἐδείχθη ἴσος· καὶ $\theta\Pi\Pi$ ἄρα τῷ Γ ἔστιν ἴσον.

Παρά τὴν δοθεῖσαν ἄρα εὐθεῖαν τὴν AB τῷ δοθέντι εὐθυγράμμῳ τῷ Γ ἴσον παραλληλόγραμμον πε-

ATH secabit in puncto aliquo θ (I. 29. Cor. 3.). Hinc proprie duo casus distingui debere videntur, prout punctum θ in ipso

$\triangle O E$ ipso Γ . Aequale autem $\triangle O E$ ipsi $H B$;
 maius igitur et $H B$ ipso Γ . Quo autem maius est
 $H B$ ipso Γ , ei excessui aequale, ipsi autem Δ si-
 mile et similiter positum idem constituitur. $K A M N$
 (VI. 25.). Sed Δ ipsi $H B$ est simile; et $K M$ igitur
 ipsi $H B$ est simile. Sit igitur homologa quidem $K A$
 ipsi $H E$, $A M$ vero ipsi $H Z$. Et quoniam aequale
 est $H B$ ipsis Γ , $K M$, maius igitur est $H B$ ipso $K M$;
 maior igitur est et $H E$ ipsa $A K$ (VI. 20. Cor. 1.),
 $H Z$ vero ipsa $A M$. Ponatur (I. 3.) ipsi quidem $K A$
 aequalis $H \Xi$, ipsi vero $A M$ aequalis $H \Theta$, et complea-
 tur parallelogrammum $\Xi H O \Pi$; aequale igitur et si-
 mile est ipsi $K M$ ipsum $H \Pi \Pi$ (VI. 24.). Sed $K M$
 ipsi $H B$ simile est; et $H \Pi \Pi$ igitur ipsi $H B$ simile est:
 circa eandem igitur diametrum est $H \Pi \Pi$, circa quam
 $H B$ (VI. 26.). Sit eorum diameter $H I B$, et descri-
 batur figura.

Et quoniam aequale est $B H$ ipsis Γ , $K M$, quorum
 $H \Pi \Pi$ ipsi $K M$ est aequale; reliquus igitur $T \Phi X$ gno-
 mon reliquo Γ est aequalis. Et quoniam (I. 43.) ae-
 quale est $O P$ ipsi $\Xi \Sigma$, commune apponatur $I I B$; to-
 tum igitur $O B$ toti ΞB aequale est. Sed ΞB ipsi $T E$
 est aequale (I. 36.), quoniam et latus $A E$ lateri $E B$
 est aequale; et $T E$ ipsi $O B$ est aequale. Commune
 apponatur $\Xi \Sigma$; totum igitur $T \Sigma$ toti gnomoni $T \Phi X$
 est aequale. Sed gnomon $T \Phi X$ ipsi Γ ostensus est
 aequalis; et $A \Pi \Pi$ igitur ipsi Γ est aequale.

Secundum datam igitur rectam $A B$ data rectilineo
 Γ aequale parallelogrammum applicatum est $\Sigma' T'$, de-

scripta $H Z$, vel in ea producta poni sumas. Atque haec ipsa causa
 huius videtur lectionis variantis, quam ad hunc locum obser-

ραβιβλῆται τὸ $\Sigma\Gamma$, ἔλλειπον εἶδει παραλληλογράμμου τῷ $\Pi\beta$ ὁμοίῳ ὄντι τῷ Δ , ἐπειδήπερ τὸ $\Pi\beta$ τῇ $\text{H}\delta$ ὁμοίον ἐστίν. Ὅπερ ἔδει ποιῆσαι.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ κδ.

Παρά τὴν δοθείσαν εὐθείαν τῷ δοθέντι εὐθγράμῳ ἴσον παραλληλόγραμμον παραβαλεῖν, ὑπερβάλλον εἶδει παραλληλογράμῳ ὁμοίῳ τῷ δοθέντι.

Ἐστω ἡ μὲν δοθείσα εὐθεῖα ἡ AB , τὸ δὲ δοθέν εὐθγράμμον, ὃ δὲ ἴσον παρὰ τὴν AB παραβαλεῖν, τὸ Γ , ὃ δὲ δεῖ ὁμοίον ὑπερβαλεῖν, τὸ Δ ἐκ δὲ παρὰ τὴν AB εὐθείαν τῷ Γ εὐθγράμῳ ἴσον παραλληλόγραμμον παραβαλεῖν, ὑπερβάλλον εἶδει παραλληλογράμῳ ὁμοίῳ τῷ Δ .

Τετμήσθω ἡ AB δίχα κατὰ τὸ E , καὶ ἐντεγράψθω ἀπὸ τῆς EB τῷ Δ ὁμοίον καὶ ὁμοίως κείμενον παραλληλόγραμμον τὸ BZ , καὶ συναμφοτέρωθεν τοῖς BZ , F ἴσον, τῷ δὲ Δ ὁμοίον καὶ ὁμοίως κείμενον τὸ αὐτὸ συνεσιύτω τὸ $H\theta$ ὁμοίον ἄρα ἐστὶ τὸ $H\theta$ τῷ EA . Ὁμολογος δὲ ἔστω ἡ μὲν $K\theta$ τῇ ZA , ἡ δὲ KH τῇ ZE . Καὶ ἐπεὶ μείζων ἐστὶ τὸ $H\theta$ τοῦ ZB , μείζων ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ μὲν $K\theta$ τῆς ZE ἢ δὲ KH τῆς ZE . Ἐκβεβλήσθωσαν αἱ ZA , ZI καὶ τῇ μὲν $K\theta$ ἴση ἔστω ἡ ZIM , τῇ δὲ KH ἡ ZEN , καὶ συμπληρώσθω τὸ MN . τὸ MN τῷ $H\theta$ ἴσον τέ ἐστὶ καὶ ὁμοίον. Ἀλλὰ τὸ $H\theta$

vavirius. In versione Commandini uterque situs puncti θ expressus est. Neque tamen id necessario fiet, dum obsecro, rectam $A\theta$, nisi per punctum Z transeat, necessario alteram rectarum HZ , EZ secare, ubi tum punctum θ pro puncto

αφαιρείται το ΣΤ, παίρνουμε
το ΠΒ όμοιο όστι το Δ. Έπει-
τότε είναι ίσους. Όσο θέλουμε.

ficiens figura parallelogramma $II B$ simili ex
 A , quandoquidem $II B$ ipsi III simile es
 oportebat facere.

ПРОТАЗЫ.

Παρά τῆν δοδεκάτην αὐτῶν
 ἡμερῶν ἴσον παραλλήλογραμ-
 μόν εἶδε παραλλήλογραμ-
 μόν. Ὅταν ἡ μὲν δοδεκάτη αὐτῶν
 εὐθεγραμμὸς, ὃ δὲ ἴσον παρὰ
 τὴν Γ, ὃ δὲ δὲ ὅσον τῶν
 διὰ παρὰ τῆν ΑΒ εὐθεγραμ-
 μόν παραλλήλογραμμὸν παραλεί-
 πει, παραλλήλογραμμὸν ὅσον τὸ Δ.

Τετράγωνον ἔστι δὲ ἀπὸ καὶ τῶν
 τετραγώνων ἀπὸ τῆς ΕΒ τῆς δι-
 μέτου παραλλήλογραμμου ἐστὶ ΕΖ·
 μέν τοις ΒΖ, ΓΙ ἴσων, τῶν δὲ
 κειμένων τὸ αὐτὸ πλάτος ἐστὶ τῶν
 τῶ ΗΘ τῶ ΕΑ. Ὁμοίως ἔστι
 ΖΙ, ἡ δὲ ΚΗ τῶ ΖΕ. Καὶ τῶ
 τοῦ ΖΒ, μέλλον ἴσος ἐστὶ καὶ
 ἡ δὲ ΚΗ τῶ ΖΒ. Ἐξαιρέτωμεν
 καὶ τῶ μέν ΚΘ ἴσος ἐστὶ τῶ ΖΒ·
 ἡ ΖΕΝ, καὶ οὐκ ἐτετραγώνου ἐστὶ
 τῶ ΗΘ ἴσων τε ἐστὶ καὶ ἴσων.

varians. In versione Comandante accet-
pressus est. Neque tamen ad accet-
octans 40, nisi per punctum T. accet-
tam rectarum HL, EZ accet, ab his pos-

PROPOSITIO XXIX. (Fig.

Secundam datam rectam dato rectilineo ac
 rallelogrammum applicare, excedens figura
 gramma simili datae.

Sit data recta AB , datum vero rectilineum
oportet aequale secundum AB applicare, Δ
oportet simile applicare; oportet igitur secun
rectam ipsi Γ rectilineo aequale parallelogram
plicare, excedens figura parallelogramma sim

Secetur AB bifariam in E (I. 9.), et de
ex EB (VI. 18.) ipsi A simile et similiter
parallelogrammum BZ , et utrisque simul quod
 Γ aequale, ipsi vero A simile et similiter pos
constituatur $H\Theta$ (VI. 25.); simile igitur est
 EA . Homologa autem sit $K\Theta$ quidem ipsi
vero ipsi ZE . Et quoniam maius est, paral
mum $H\Theta$ ipso ZB , maior igitur est et rect
 $K\Theta$ ipsa ZA , recta vero KH ipsa ZE . Pro
 ZA , ZE , et ipsi quidem $K\Theta$ aequalis sit
3.), ipsi vero KH aequalis ZEN et comp
rallelogrammum MN ; ergo MN ipsi $H\Theta$ a

intersectionis cum alterutra harum rectarum sumi potest, quae in ea ipsa positum est. Atque ita rem expedit

Obs. 2. In conditionibus Theorematis, ut mon-
stratum est, haud negligi debet ea, parallelogramma non tantum

EA ἔστιν ὁμοίον καὶ τὸ MN ἄρα τῷ EA ὅμοιον ἔστι· περὶ τὴν αὐτὴν ἄρα διάμετρον ἔστι τὸ EA πρὸς MN . Ἡλθω αὐτῶν ἡ διάμετρος ἡ ZZ , καὶ περγράψω τὸ σχῆμα.

Ἐπεὶ οὖν ἴσον ἔστι τὸ HO τοῖς EA , Γ , αὖτις τὸ HO τῷ MN ἴσον ἔστι· καὶ τὸ MN ἄρα τοῖς EA , Γ ἴσον ἔστιν. Κοινὸν ἀφγρήσθω τὸ EA λοιπὸς ὁ

sed etiam similiter posita esse debere. Hac enim praeterea non valeret propositio.

Obs. 3. Idem Clavius directam quoque huius Propositionis demonstrationem addit, ducta nempe recta, quae utraque rectarum AB , BF bisecat, cui deinde ostendit parallelam esse utramque rectarum AZ , FZ , unde, quum per punctum Z una tantum recta alteri datae parallela esse possit, necessario in directum erunt puncta A , Z , F . Cf. infra Obs. 1. ad VI. 32.

Obs. 4. Denique Clavius monet Propositionem hanc adhuc valere, si duo parallelogramma similia, similiterque posita non habeant angulum communem, sed unum sit extra alterum hac tamen lege, ut duo latera unius cum duobus lateribus alterius duas rectas lineas constituent, nempe, etiam hoc casu parallelogramma circa eandem consistere diametrum, quod eodem modo directe vel indirecte demonstrari poterit. Idemque etiam monet Rob. Simson. ad VI. 32. (Vide infra.)

PROPOSITIO XXVII.

Obs. 1. Robert. Simson. monet secundum casum huius Propositionis habere in Editione nempe Basil. ἄλλως ante verbum ἔστω γὰρ πάλιν praefixum, quasi alia esset demonstratio, ab interposito, ut videatur, librario adiectum, quam vocem recte omiserit Gregorius (Peyrardus quoque eam iure omittit, nulla variantis huius lectionis mentione facta.) Librarii autem non animadvertisse videntur, a vocibus inde ἔστω γὰρ πάλιν etiam secundum incipere, cuius negligentiae causa forte in eo

ὁ $\Psi\chi\Phi$ γνώμων τῷ Γ ἴσος. Καὶ ἐπεὶ ἴσους εἰσὶν ἡ AE τῇ EB , ἴσον ἐστὶ καὶ τὸ AN τῷ N τουτέστι τῷ AO . Κοινὸν προσκείσθω τὸ $E\Xi$. ἄρα τὸ $A\Xi$ ἴσον ἐστὶ τῷ $\Phi\chi\Psi$ γνώμονι. Ἄλλοι $\Phi\chi\Psi$ γνώμων τῷ Γ ἴσος ἐστὶ καὶ τὸ $A\Xi$ ἴσον ἐστὶν τῷ Γ ἴσον ἐστίν.

Παρά τὴν δοθείσαν ἄρα εὐθείαν τὴν AB τῷ δέντι εὐθυγράμμῳ τῷ Γ ἴσον παραλληλόγραμμον περιβλητὸν τὸ $A\Xi$, ὑπερβάλλον εἶδει παραλληλόγραμμῳ τῷ $ΠΟ$ ὁμοίῳ ὄντι τῷ Δ , ἐπεὶ καὶ τῷ Δ ἴσους ὁμοίον τὸ $ΟΠ$. Ὅπερ εἶδει ποιῆσαι.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Α'.

Τὴν δοθείσαν ¹⁾ εὐθείαν πεπερασμένην ἔχον μέσον λόγον τεμεῖν.

1) Austin. refert, pro voce: δοθείσαν se in omnibus exemplaribus reperire *τιθείσαν*, quam vocem *εἰσμένη* Campanus et Tartalea per „propositam“ explicant. At nec Hardus nec Gregorius quidquam circa vocem *δοθείσαν*, ipsi habent, monent, editio autem Basileensis habet: *τιθείσαν*.

Ita statim apparet, casum secundum a primo eo tantum differre, quod in illo basis AK parallelogrammi AZ minor quam AF dimidia rectae AB , in hoc contra maior.

Obs. 2. Quum plures queri soleant, sensum huius positionis, pariterque duarum sequentium esse satis obscurus paullo clarius ita forte exprimi posse videtur: si recta qua AB (Fig. 386. 388.) bifariam dividatur in Γ , et super dimidia $B\Gamma$ constituatur parallelogrammum quodcunque BE cuius diameter sit BA , et compleatur totum parallelogrammum $ABEO$, tum dicitur parallelogrammum super dimidia $B\Gamma$ constitutum, applicatum esse secundum rectam AB , def. 10 parallelogrammo $ΓΕ$. Quodsi iam in diametro BA ipsa, et

quale est. Commune auferatur EA ; reliquus igitur $\Phi X \Phi$ gnomon ipsi Γ est aequalis. Et quoniam aequalis est AE ipsi EB , aequale est (I. 36.) et AN ipsi NB , hoc est (I. 43.) ipsi AO . Commune apponatur $E\Xi$; totum igitur $A\Xi$ aequale est gnomoni $\Phi X \Psi$ et $\Phi X \Psi$ gnomon ipsi Γ aequalis est; et $A\Xi$ igitur ipsi Γ aequale est.

Secundum datam igitur rectam AB dato rectilineo aequale parallelogrammum applicatum est $A\Xi$, exedens figura parallelogramma ΠO simili ipsi A , quoniam et ipsi EA simile est OII . Quod oportebat facere.

PROPOSITIO XXX. (Fig. 395.)

Datam rectam terminatam secundum extremam et mediam rationem secare.

producta sumatur punctum quodcunque Z , et per illud ducantur rectae $HZ\theta$, ZK , quae sint parallelae rectis AB , $B\theta$; dicatur parallelogrammum AZ super recta AK constitutum applicari secundum rectam AB ita, ut deficiat parallelogrammo $K\theta$ simili et similiter posito (VI. 26.) parallelogrammo ΓE , et demonstrari poterit, parallelogrammum AA super dimidia recta AF constitutum maius esse quocunque parallelogrammo AZ hac ratione super alio segmento rectae AB nempe AK constituto. Ita fere Clavius.

Obs. 3. Differentia, qua parallelogrammum AA superat alterum AZ , aequalis est parallelogrammo ZA simili et similiter posito parallelogrammo ΓE . Huius parallelogrammi ZA unum latus $ZN = KF$ (I. 34.) $= AF - AK$ (vel $AK - AF$) alterum NA : $\left\{ \frac{ZN}{KI} = AF : FB = ZK : KB \right.$ (VI. 4.). Ex schedis Pflleiderer. Hinc eodem observante sequens emergit propositionis huius enunciatum magis determinatum: parallelogram-

Ἐστω ἡ δοθεῖσα εὐθεῖα πεπερασμένη ἡ AB καὶ δὴ τὴν AB εὐθεῖαν ἄκρον καὶ μέσον λόγον τέμνει.

Ἀναγεγράφθω γὰρ ἀπὸ τῆς AB τετράγωνον $BΓ$, καὶ παραβεβλήσθω παρὰ τὴν $ΑΓ$ τῷ $BΓ$ ὁμοίω παράλληλογραμμον τὸ $ΓΔ$, ὑπερβάλλον εἶδει τὸ $Δ$ ὁμοίω τῷ $BΓ$.

Τετράγωνον δὲ ἐστὶ τὸ $BΓ$ τετράγωνον ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ $ΑΔ$. Καὶ ἐπεὶ ἴσον ἐστὶ τὸ $BΓ$ τῷ $ΓΔ$ κοινὸν ἀφαιρήσθω τὸ $ΓΕ$ λοιπὸν ἄρα τὸ $BΖ$ ὅμοιον τῷ $ΑΔ$ ἐστὶν ἴσον. Ἐστὶ δὲ ἀντὶ καὶ ἰσοσκελὲς τῶν $BΖ$, $ΑΔ$ ἄρα ἀντιπεπόνθασιν αἱ πλευραὶ περὶ τὰς ἴσας γωνίας ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ $ΖΕ$ πρὸς τὴν $ΕΔ$ οὕτως ἡ $ΑΕ$ πρὸς τὴν $ΕΒ$. Ἰσὴ δὲ ἡ μὲν $ΖΕ$ τῇ $ΑΓ$, τοιούτεσι τῇ $ΑΒ$, ἡ δὲ $ΕΔ$ τῇ $ΑΕ$ ἄρα ὡς ἡ $ΒΑ$ πρὸς τὴν $ΑΕ$ οὕτως ἡ $ΑΕ$ πρὸς τὴν $ΕΒ$. Μείζων δὲ ἡ $ΑΒ$ τῆς $ΑΕ$ μείζων ἄρα καὶ τῆς $ΑΕ$ τῆς $ΕΒ$.

morum sub dato angulo A secundum rectam datam applicatorum et deficientium (ab parallelogrammis aequiangulis et similibus inter easdem parallelas super tota AB) parallelogrammis similibus ac similiter positis, maximum est, quod ad $AF = \frac{AB}{2}$ applicatur, nempe hoc excedit aliud quodcunque parallelogrammo simili similiterque posito iis, quibus deficient, eius unum latus aequale est differentiae ipsius AF et segmenti rectae AB , cui alterum parallelogrammum insistit.

Obs. 4. Casus particularis, ad maxime memorabilis, saepissime occurrens is est, quo parallelogramma, de quibus agitur, fiunt rectangula, et simul $ΓΔ = ΓΒ = ΓΑ$, adeoque $ΑΔ$ quadratum abit, pariter ac $ΓΕ$, inde et $KΖ = ΚΒ$. Hoc expropositio mutatur in hanc: ex omnibus rectangulis, quorum latera sunt segmenta rectae datae, maximum est quadratum

Sit data recta terminata AB ; oportet igitur AB etiam secundum extremam et mediam rationem scire.

Describatur enim (I. 46.) ex AB quadratum BF , et applicetur (VI. 29.) secundum AF ipsi BF aequale parallelogrammum FA , excedens figura AA simili ipsi BF .

Quadratum autem est BF ; quadratum igitur est et AA . Et quoniam aequale est BF ipsi FA , commune auferatur FE ; reliquum igitur BZ reliquo AA est equale. Est autem et ipsi aequiangulum; ipsorum BZ , AA igitur (VI. 14.) reciproca sunt latera circa aequales angulos; est igitur ut ZE ad EA ita AE ad EB . Aequalis autem est ZE ipsi AF , (I. 34.) hoc est ipsi AB , et EA ipsi AE ; est igitur ut BA ad AE ita AE ad EB . Maior autem AB ipsa AE ; major igitur et AE ipsa EB .

super dimidia recta. (Hoc nempe excedit rectangulum quodcunque ipsi ipso perimetrum quadrato, cuius latus aequale est, differentiae inter latus prioris quadrati et latus quodcunque illius rectanguli.) Atque haec propositio eadem est cum ea, quam habuimus in II. 5. Cor. 1., quae itaque casus particularis est VI. Prop. 27. (vid. Pfeidereri Schol. in Libr. 3. §. 53. sqq.) Playfair. loco generalioris propositionis Euclideaet quam in elementis haud necessariam esse indicat, tantum hunc casum particularem, utpote saepissime obuium, et tironibus magis accommodatum et sufficientem posuit, et similiter etiam in duabus sequentibus propositionibus versatus est. Paullo generalior adhuc maneret propositio, si parallelogrammum super dimidia AB descriptum foret quidem aequilaterum, a non rectangulum.

Ἡ ἄρα AB εὐθεῖα ἄκρον καὶ μέσον λόγον πε-
 τριγνται κατὰ τὸ E , καὶ τὸ μείζον αὐτῆς τετμήται
 κατὰ τὸ AE . Ὅπερ ἔδει ποιῆσαι ¹⁾.

Α Λ Α Ω Σ

Ἐστω ἡ δοθεῖσα εὐθεῖα ἡ AB . δεῖ δὴ τὴν AB
 ἄκρον καὶ μέσον λόγον τεμεῖν.

Τετμήσθω γὰρ ἡ AB κατὰ τὸ Γ , ὥστε τὸ ἐκ-
 τῶν AB , $B\Gamma$ ἴσον εἶναι τὸ ἀπὸ τῆς $A\Gamma$ τετραγώνου.

Ἐπεὶ οὖν τὸ ὑπὸ τῶν AB , $B\Gamma$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ
 τῆς ΓA · ἔστιν ἄρα ὡς ἡ AB πρὸς τὴν $A\Gamma$ οὕτως
 ἡ $A\Gamma$ πρὸς τὴν $B\Gamma$. Ἡ ἄρα AB ἄκρον καὶ μέσον
 λόγον τέτμηται κατὰ τὸ Γ . Ὅπερ ἔδει ποιῆσαι.

Π Ρ Ο Τ Α Σ Ι Σ λ α.

Ἐν τοῖς ὀρθογωνίοις τριγώνοις, τὸ ἀπὸ τῆς ἐν
 ὀρθῇ γωνίᾳ ὑποτείνουσας πλευρᾶς εἶδος ἴσον ἐστὶ

1) Austin. refert, hic legi: ὅπερ ἔδει δεῖξαι, et inde argu-
 mentatur inter alia, haud ab Euclide esse hanc propositionem.
 Peyrardus autem et Gregorius habent: ὅπερ ἔδει ποιῆσαι, Be-
 silienensis hic quidem legit: δεῖξαι, at post alteram democ-
 strationem pariter habet: ποιῆσαι.

Obs. 5. Si secundum eandem rectam AB (Fig. 388.)
 applicentur parallelogramma AZ , $A\zeta$, deficientia parallelogram-
 mis BZ , $B\zeta$ similibus et similiter positia, parallelogrammo AB
 vel BA , quod a rectae AB dimidio describitur, ita tamen,
 sit $AK=B\kappa$, vel $FK=F\kappa$, parallelogramma AZ , $F\zeta$ erunt
 aequalia. Nam, quum ex hyp. sint parallelogramma BZ , $B\zeta$
 similia et similiter posita parallelogrammo BA communem cum
 eo angulum habenti, erunt BZ , BA circa eandem diametrum
 et ex simili ratione erunt $B\zeta$, BA circa eandem diametrum
 (VI. 26.) adeoque puncta Z , A , ζ , B erunt in eadem recta.

Ἡ ἀπὸ AB εὐθεία ἀπὸ κ , Ipsa igitur AB , recta secundum extremam et mediam rationem secta est in E , et maius eius segmentum est AE . Ὅτις ἐστὶν αὐτῶν, Segmentum est AE . Quod oportebat facere.

ΑΛΛΗΛΕ

A L I T E R. (Fig. 396.)

Ἐστω ἡ δοθεὶς εὐθεῖα AB . Sit data recta AB ; oportet rectam AB secundum extremam et mediam rationem secare.

Τετραγώνη γὰρ Γ AB καὶ Γ . Secetur enim AB in Γ , ita (II. 11.) ut rectangulum sub AB , $B\Gamma$ ἴσον ᾖ τῷ τετραγώνῳ sub AB , $B\Gamma$, aequale sit quadrato ex $A\Gamma$.

Ἐπεὶ οὖν τὸ ἴσον τῷ AB , $B\Gamma$ τετραγώνῳ sub AB , $B\Gamma$ aequale est τῷ GA ἴσον ἀπὸ τοῦ AB , $B\Gamma$ quadrato ex GA ; est igitur (VI. 17.) ut AB ad $A\Gamma$ ἢ $A\Gamma$ πρὸς τὴν $B\Gamma$. Ἐὰν δὲ ἡ $A\Gamma$ ad GB ; ergo (VI. Def. 3.) AB secundum extremam et mediam rationem secta est in Γ . Quod oportebat facere.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ.

P R O P O S I T I O XXXI. (Fig. 396.)

Ἐν τοῖς ὀρθογωνίοις ῥηθμοῖς. In rectangulis triangulis figura ex latere rectanguli angulum subtendente aequalis est figuris ex lateribus

Erit itaque (I. 43.) parallelogrammum $K\zeta$ aequale parallelogrammo $\Theta\zeta$ (I. 43.). At ob $B\kappa=AK$ (hyp.) vel $M\Theta=HZ$, erit parallelogrammum $\Theta\zeta=HA$, itaque et $K\zeta=HA$, additoque communi AA , erit $AZ=A\zeta$ (Whiston. Cor. 1. ad VI. 27.).

Aliter ita: quum parallelogrammum BA , vel id, quod ei aequale est, AA superet, ut ex demonstr. VI. 27. patet, parallelogrammum $A\zeta$ parallelogrammo $A\delta$; pariterque parallelogrammum BA superet parallelogrammum AZ parallelogrammo AA , si autem, ob $K\Gamma=I\kappa$ (hyp.), etiam parallelogrammum $A\zeta=AA$, erit $A\zeta=AZ$. Contra, si sit $AZ=A\zeta$, caeteris ut antea manentibus, erit $I\kappa=IK$ Nam parallelogramma aequalia AZ , $A\zeta$ aequaliter different a parallelogrammo AA , nempe parallelogrammis AA , $A\zeta$: itaque AA , $A\zeta$ aequalia erunt, unde erit $AN=N\zeta$ (Obs. ad I. 36.), adeoque $IK=I\kappa$ (I. 34.) Simul (VI. 26.) adeoque puncta Z , A , I collineant.

τοῖς ἀπὸ τῶν τὴν ὀρθὴν γωνίαν περιχουῶν πλε-
ρῶν εἶδει, τοῖς ὁμοίοις τε καὶ ὁμοίως ἀναγραφο-
μένοις.

Ἐστω τρίγωνον ὀρθογώνιον τὸ $ABΓ$, ὀρθὴν ἔχον
τὴν ἐπὶ $ΒΑΓ$ γωνίαν· λέγω ὅτι τὸ ἀπὸ τῆς $ΒΓ$
εἶδος ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν $ΒΑ$, $ΑΓ$ εἶδει, τοῖς
ὁμοίοις τε καὶ ὁμοίως ἀναγραφομένοις.

Ἦχθω κάθετος ἡ $ΑΔ$.

Ἐπεὶ οὖν ἐν ὀρθογωνίῳ τριγώνῳ τῷ $ABΓ$, ἐπὶ
τῆς πρὸς τὸ $Α$ ὀρθῆς γωνίας ἐπὶ τὴν $ΒΓ$ βάσιν κα-
θετος ἤκται ἡ $ΑΔ$ · τὰ $ABΔ$, $ΑΔΓ$ ἄρα πρὸς τὴν
κάθετον τριγωνα ὁμοιά ἐστι τῷ τε ὅλῳ τῷ $ABΓ$ καὶ
ἀλλήλοις. Καὶ ἐπεὶ ὁμοίων ἐστὶ τὸ $ABΓ$ τῷ $ABΔ$,
ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ $ΓΒ$ πρὸς τὴν $ΒΑ$ οὕτως ἡ AB πρὸς
τὴν $ΒΔ$. Καὶ ἐπεὶ τρεῖς εὐθεῖαι ἀνάλογόν εἰσι,
ἐστὶν ὡς ἡ πρώτη πρὸς τὴν τρίτην οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς
πρώτης εἶδος πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς δευτέρας, τὸ ὅμοιον

patet, esse etiam $AK=Bx$, adeoque $AK+Ax=AB$. Cf.
Whiston. Cor. 2. ad VI. 27.

PROPOSITIO XXVIII.

Obs. 1. Ex iis, quae in Obs. 4. ad VI. 27. dicta sunt,
emergit casu secundo alia adhuc huius problematis solutio.
Factis nempe, ut ante (Fig. 391.) parallelogrammis $EBZH$,
 $AEHΘ$ dato $Δ$ similibus, producaturs ipsius $EBZH$ latus EH ,
et diameter BH , fiatque in angulo ipsi EHZ ad verticem op-
posito parallelogrammum $ΗΟΠΞ$ aequale ipsi $KAMN$ i. e. æ-
quale excessui parallelogrammi $EBZH$ super figuram $Γ$, ipsi-
que $EBZH$ simile, similiterque positum. Erit itaque $Hπ$ si-
mile et aequale HII in constructione priori, et productis rectis
 $πΞ$, $ΑΘ$, usquedum in $γ$, pariterque rectis $πΞ$, BZ , usquedum
in $ρ$ conveniant, ob $Eγ=Hο=AM=HO$ (const.) $=EΣ$, et

us rectumangulum subtendentibus, similibus et similiter descriptis.

Sit triangulum rectangulum $AB\Gamma$, rectum habens $BA\Gamma$ angulum; dico figuram ex $B\Gamma$ aequalem esse figuris ex BA , $A\Gamma$, similibus et similiter descriptis.

Ducatur perpendicularis AA .

Quoniam igitur in triangulo rectangulo $AB\Gamma$, ab angulo recto ad A super basim $B\Gamma$ ducta est perpendicularis AA ; erunt triacula ABA , $AA\Gamma$, quae sunt ad perpendiculararem similia et toti $AB\Gamma$ et inter se (VI. 8.) Et quoniam simile est $AB\Gamma$ ipsi ABA , est igitur ut ΓB ad BA ita AB ad BA . Et quoniam tres rectae proportionales sunt, est ut prima ad tertiam ita figura ex prima ad figuram ex secunda, similem et similiter descriptam; (VI. 20. Cor. 2.) ut igitur ΓB

(VI. 27. Obs. 4.) $A\pi = A\pi =$ dato rectilineo Γ . Et, quum $B\pi$ sit simile et similiter positum ipsi BH i. e. ipsi A (VI. 24.), erit $A\pi$ secundum datam rectam AB applicatum aequale dato Γ , ita ut deficiat figura parallelogramma BH simili et similiter posita ipsi A . Duplex itaque solutio locum habet, neque tamen ad alteram hanc obtinendam nova constructione opus est, quum (Obs. 5. ad VI. 27.) semper $A\sigma = B\Sigma$, adeoque una $A\Sigma$ cognita, altera $A\sigma = AB - A\Sigma$ semper simul innotescat. Whiston. Schol. ad VI. 28. et Cor. 2. ad eandem.

Obs. 2. Si parallelogrammum datum A quadratum fuerit, problema sic effertur: secundum datam rectam AB dato rectilineo Γ aequale rectangulum applicare, deficiens quadrato: oportet autem datum rectilineum Γ non maius esse quadrato super dimidia AE vel EB . (Ita Whiston in Cor. 1. ad VI. 28. et Rob. Simson. in Not. ad h. l.) Aliter ita: datam re-

καὶ ὁμοίως ἀναγραφόμενον ὡς ἄρα ἡ $ΓΒ$ πρὸς τὴν $ΒΔ$ οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς $ΓΒ$ εἶδος πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $ΒΑ$, τὸ ὁμοιον καὶ ὁμοίως ἀναγραφόμενον. Διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ὡς ἡ $ΒΓ$ πρὸς τὴν $ΓΔ$ οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς $ΒΓ$ εἶδος πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $ΓΑ$ ὥστε καὶ ὡς ἡ $ΒΓ$ πρὸς τὰς $ΒΔ$, $ΔΓ$ οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς $ΒΓ$ εἶδος πρὸς τὸ ἀπὸ τῶν $ΒΑ$, $ΑΓ$, τὰ ὁμοια καὶ ὁμοίως ἀναγραφόμενα. Ἰση δὲ ἡ $ΒΓ$ ταῖς $ΒΔ$, $ΔΓ$ ἴση ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς $ΒΓ$ εἶδος τοῖς ἀπὸ τῶν $ΒΑ$, $ΑΓ$ εἶδουσ, τοῖς ὁμοίοις τε καὶ ὁμοίως ἀναγραφόμενοι. Ἐν ἄρα τοῖς, καὶ τὰ ἐξῆς.

$A \ A \ A \ \Omega \ \Sigma$.

Ἐπεὶ τὰ ὁμοια σχήματα ἐν διπλασίονι λόγῳ ἴσι τῶν ὁμολόγων πλευρῶν, τὸ ἀπὸ τῆς $ΒΓ$ ἄρα εἶδος

etiam AB ita dividere, ut rectangulum inter segmenta eius contentum aequale sit dato spatio: hoc spatium autem oportet non maius esse quadrato ex linea dimidia. Ita Playfair. rem exprimit, qui hunc modo casum particularem huius problematis, utpote maxime necessarium exprimit. Aliter problema ita enunciari potest: data summa AB laterum trianguli, et rectangulo ipso magnitudine dato, latera invenire. Vid. Rob. Simson. l. c. Potest autem hic casus particularis brevius multo ac generalis ille construi. Nempe datum spatium rectilineum, cui aequale constituendum est rectangulum inter segmenta rectae AB , vel quadratum erit, vel non. Priore casu quomodo res efficiatur, iam ostensum fuit in Obs. 3. ad II. 14., unde committimus lectorem. Poterit tamen etiam huic casui applicari solutio problematis generalis. Posterior casus ope VI. 25. facile ad priorem revocari poterit. Eius autem casus, sub posterioriore hoc comprehensi, quo spatium rectilineum datum est rectangulum (qui ope VI. 15. et VI. 17. vel ope II. 14. etiam

καὶ ὁμοίως ἀναγραφόμενα καὶ
 BA ὅτις τὸ ἀπὸ τῆς $ΓB$ ἑστὸς
 BA , τὸ ὁμοίον καὶ ὁμοίως ἀναγραφόμενον
 αὐτῇ δὲ καὶ ὅς ἡ BF πρὸς τὴν
 τῆς BF εἶδος πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $ΓB$
 BF πρὸς τὴν BA , BF ὅτις τὸ ἀπὸ
 πρὸς τὸ ἀπὸ τῶν BA , BF , καὶ
 ἀναγραφόμενα. Ἰσχυρὸν δὲ ἡ BF καὶ
 ἀπὸ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς BF εἶδος τὸ
 εἶδος, τοῖς ὁμοίοις καὶ καὶ ὁμοίως
 Ἐν ἀρα τοῖς, καὶ τὰ εἶς.

A A I 25

Ἐπὶ τὰ ὁμοία σχήματα ἡ δὲ
 τῶν ὁμοίων πλάτος, τὸ ἀπὸ τῆς

etiam AB ita dividere, ut rectangulum in quo
 continetur aequale sit dato spatio: hoc quoniam
 aequale esse quadrato ex linea dimidia in
 partem, qui hunc modo casum periculum non
 vixit maxime necessarium exprimit. Hic
 committitur potest: data summa AB laterum
 angulo ipso magnitudinis dato, laterum inter
 l. c. Potest autem hic casus periculum non
 vixit ille consuevit. Nempe datum spatium
 aequale constituendum est rectangulum aut
 AD , vel quadratum erit, vel non. Potest
 efficiatur, iam ostensum fuit in Ob. 2. ad 5. h.
 mittimus lectorem. Potest tamen etiam
 solutio problematis generalis. Potest autem
 rite ad priorem revocari potest. Eius autem
 s. erroris hoc comprehendit, quo spatium
 rectangulum (qui ope VI. 15. u. VI. 17. ut

ad BA ita figura ex BF ad figuram ex BA ,
 et similiter descriptam. Eadem ratione et ut
 $ΓA$ ita figura ex BF , ad figuram ex $ΓA$; quare
 BF ad ipsas BA , $ΔΓ$ ita figura ex BF ad figu-
 BA , $ΔΓ$, similes et similiter descriptas. Aequa-
 tem BF ipsis BA , $ΔΓ$; igitur et figura ex BF a
 figuris ex BA , $ΔΓ$, similibus et similiter des-
 Ergo in rectangulis, etc.

A L I T E R.

Quoniam (VI. 23.) similes figurae in dupla
 sunt laterum homologorum, figura ex BF ad figu-

facile ad priorem reduci poterat) sequentem solutionem
 Rob. Simson. in Not. ad VI. 28. desumptam ex Wil-
 Snellii Apollonio Batavo, et Halleio in Schol. ad Pr.
 libri 8. Conicor. Apollonii. Sit nempe data recta A
 392.), datum autem rectangulum, quod rectis $Γ$, $Δ$, con-
 non minus existens quadrato ex dimidio rectae AB :
 secundum datam rectam AB dato rectangulo $Γ \times Δ$
 rectangulum applicare, deficiens quadrato. Ducantur
 ad rectos angulos ipsi AB , et ad easdem eius partes,
 AB quidem aequalis sit $Γ$, BZ vero $Δ$. Bifariam secetur
 EZ in I , centroque I , intervallo IE describatur circulus
 curvatque rectae AB rursus in H , et iungatur HZ , cu-
 tela ducatur IK , et ad AB ducatur LA parallela rectae
 Quoniam igitur angulus EHZ in semicirculo aequalis est
 EAB , parallelae erunt AB , HZ , et parallelae sunt A
 quare AH aequalis est BZ et rectangulum $EA \times AH$ aequi-
 ipsi $EA \times BZ$, hoc est rectangulo $Γ \times Δ$. Et, quoniam a

πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς BA εἶδος διπλασίονα λόγον ἢ
ἤπερ ἡ GB πρὸς τὴν BA . Ἐχει δὲ καὶ τὸ ἀπὸ
τῆς $BΓ$ τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς BA τετράγωνον
διπλασίονα λόγον ἤπερ ἡ GB πρὸς τὴν BA · καὶ ὥς
ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς GB εἶδος πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς BA εἶδος
οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς GB τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς
 BA τετράγωνον. Διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ὥς τὸ ἀπὸ
τῆς $BΓ$ εἶδος πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $ΓA$ εἶδος οὕτως τε
τῆς $BΓ$ τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $ΓA$ τετράγω-
νον· ὥστε καὶ ὥς τὸ ἀπὸ τῆς $BΓ$ εἶδος πρὸς τὸ ἀπὸ
τῶν BA, AG εἶδη οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς $BΓ$ τετράγωνον
πρὸς τὰ ἀπὸ τῶν BA, AG τετράγωνα. Ἰσον δὲ τὸ
ἀπὸ τῆς $BΓ$ τετράγωνον τοῖς ἀπὸ τῶν BA, AG τε-
τραγώνοις· ἴσον ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς $BΓ$ εἶδος τοῖς
ἀπὸ τῶν BA, AG εἶδεσι, τοῖς ὁμοίοις τε καὶ ὁμοίως
ἀναγραφομένοις. Ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ λβ.

Ἐὰν δύο τρίγωνα συντεθῇ κατὰ μίαν γωνίαν,
τὰς δύο πλευρὰς ταῖς δυοὶ πλευρὰς ἀνάλογον ἔχοντα.

AI, BZ inter se parallelæ, æquales erunt AA, AB , et æqua-
les etiam sunt (III. 5.) EK, KH . Est autem, ob determina-
tionem, rectangulum $\Gamma X A$ non maius quadrato ex AA di-
midio ipsius AB , ergo et rectangulum $EA X AH$ non maius
est quadrato ex AA h. e. ex IK : commune addatur quadratum
ex KE , et quadratum ex AK (II. 6.) non maius erit quadra-
tis ex EK, IK h. e. quadrato ex IE : quare recta AK seu IA
non maior est ipsa IE . Et, siquidem IE æqualis fuerit ipsi
 IA , circulus $EIHZ$ continget rectam AB in A , et quadratum
ex AA (III. 36.) æquale erit rectangulo $EA X AH$, sive dato
rectangulo $\Gamma X A$, et factum erit, quod proponebatur. Si vero

προς τὸ ἀπὸ τῆς BA εἶδος BA διπλὴν ἢ GB προς τὴν BA . Habet igitur et quadratum ex BF (VI. 20. Cor. II.) ad quadratum ex BA duplam rationem eius quam GB ad BA ; ut igitur (V. 11.) figura ex BF ad figuram ex BA ita quadratum ex GB ad quadratum ex BA . Ex eadem ratione et ut figura ex BF ad figuram ex TA ita quadratum ex BF ad quadratum ex GA ; quare et ut figura ex BF ad figuras ex BA , AG ita quadratum ex BF ad quadrata ex BA , AG . Aequale autem quadratum ex BF (I. 47.) quadratis ex AB , AG aequalis igitur et figura ex BF figuris ex BA , AG similibus et similiter descriptis. Quod oportebat ostendere.

ΗΠΟΤΑΣΙΣ

Ἐάν δύο τρίγωνα συντεθῇ καὶ
 τὰς δύο πλευρὰς τῆς ἀπὸ αὐτῶν

AI , BZ inter se parallelas, aequales erunt AI , BZ etiam sunt (III. 5.) EA , EB . Ex constructione, rectangulum $ΓΧΔ$ non minus quam in medio ipsius AB , ergo et rectangulum $ΕΖΔ$ ex quadrato ex AI h. e. ex IK : compositum ex KE , et quadratum ex AK (II. 5.) aequale est IK h. e. quadrato ex IE : quoniam non maior est ipsa IE . Et, siquidem IE tangit $ΛΔ$, circulus $ΕΗΖ$ continget rectam $ΛΔ$ ex $ΔΔ$ (III. 36.) aequale erit rectangulum $ΕΗΖ$ ex $ΔΔ$ (III. 36.) aequale erit rectangulum $ΓΧΔ$, et factum erit, quod proposuitur.

PROPOSITIO XXXII. (Fig. 397.)

Si duo triangula componentur secundum unum angulum, duo latera duobus lateribus proportionalia ha-

sunt BI , IZ , et AE , inaequales fuerint IE , IA , erit IE maior, et propterea circulus $ΕΗΖ$ secabit rectam AB : secet in M , N punctis, et super NB describatur quadratum $NBOH$, et compleatur rectangulum $ANHO$. Quoniam igitur aequales sunt MA , AN , et aequales ostensae sunt AA , AB , aequales erunt AM , NB . Rectangulum igitur $AN \times NB$ aequale est ipsi $NA \times AM$, hoc est (III. 36. Cor.) rectangulo $EA \times AH$, sive rectangulo $ΓΧΔ$. Rectangulum vero $AN \times NB$ est ipsum AH , est enim $HN = NB$. Ergo rectangulum AH aequale est rectangulo $ΓΧΔ$. Igitur secundum datam rectam AB dato $ΓΧΔ$ rectangulo aequale

ὥστε τὰς ὁμολόγους αὐτῶν πλευρὰς καὶ παραλλήλους εἶναι· αἱ λοιπαὶ τῶν τριγώνων πλευραὶ ἐπ' εὐθείας ἴσονται.

Ἐστω δύο τρίγωνα τὰ $ABΓ$, $ΔΓΕ$, τὰς δύο πλευρὰς τὰς $ΒΑ$, $ΑΓ$ ταῖς δυοὶ πλευραῖς ταῖς $ΓΔ$, $ΔΕ$ ἀνάλογον ἔχοντα, ὥς μὲν τὴν $ΑΒ$ πρὸς τὴν $ΑΓ$ οὕτως τὴν $ΔΓ$ πρὸς τὴν $ΔΕ$, παραλλήλον δὲ τὴν μὲν $ΑΒ$ τῇ $ΔΓ$, τὴν δὲ $ΑΓ$ τῇ $ΔΕ$. λέγω ὅτι ἐπ' εὐθείας ἔσθιν ἡ $ΒΓ$ τῇ $ΓΕ$.

Ἐπεὶ γὰρ παραλλήλός ἐστιν ἡ $ΑΒ$ τῇ $ΔΓ$, καὶ εἰς αὐτὰς ἐμπίπτουσαν εὐθεῖα ἡ $ΑΓ$, καὶ αἱ ἐναλλὰς γωνίαι αἱ ὑπὸ $ΒΑΓ$, $ΑΓΔ$ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν. Διὸ καὶ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ ὑπὸ $ΓΔΕ$ τῇ ὑπὸ $ΑΓΔ$ ἐστὶν ἴση, ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ $ΒΑΓ$ τῇ ὑπὸ $ΓΔΕ$ ἐστὶν ἴση. Καὶ ἐπεὶ δύο τρίγωνα ἐστὶ τὰ $ΑΒΓ$, $ΔΓΕ$ μίαν γωνίαν τὴν πρὸς τῷ $Α$ μιᾷ γωνίᾳ τῇ πρὸς τῷ $Δ$ ἰσχυρόντα, περὶ δὲ τὰς ἴσας γωνίας τὰς πλευρὰς ἀνάλογον, ὥς τὴν $ΒΑ$ πρὸς τὴν $ΑΓ$ οὕτως τὴν $ΓΔ$ πρὸς τὴν $ΔΕ$ ἰσογώνιον ἄρα ἐστὶ τὸ $ΑΒΓ$ τρίγωνον τῷ $ΔΓΕ$ τριγώνῳ ἴση ἄρα ἡ ὑπὸ $ΑΒΓ$ γωνία τῇ ὑπὸ $ΔΓΕ$. Ἐδείχθη δὲ καὶ ἡ ὑπὸ $ΑΓΔ$ τῇ ὑπὸ $ΒΑΓ$ ἴση ὅλη

rectangulum $ΑΠ$ applicatum est deficiens quadrato $ΒΠ$, quod facere oportebat.

Obs. 3. Data recta $ΑΒ$, et rectilineo, per hanc propositionem et observationem praecedentem habebitur $ΝΒ$ vel $ΝΠ$ latus quadrati, quo deficit rectangulum $ΑΠ$ rectilineo dato aequale, et secundum datam rectam $ΑΒ$ applicatum. Pro quantitate incognita $ΝΒ$ vel $ΝΠ$ ponatur y , unde $ΑΟ = ΑΒ \times y$, et $ΝΟ = y^2$, ergo $ΑΠ = ΑΒ \times y - y^2$, vel $Γ \times Δ = ΑΒ \times y - y^2$. Atque haec est prima aequationum affectarum quadraticarum species seu forma, quam ex hac Prop. 28. solverunt geometrici

ὅτι ταῖς ὁμολογούμεναις ἀντι-
στροφαις αἱ λοιπὰ τῶν τριγώνων
δοῦνται.

Ἐστω δὴ τριγώνον τὸ $ABΓ$.
ἴσως ταῖς BA , $ΑΓ$ ταῖς διὰ τὴν
ἀντιλογίαν ἔχοντα, ὡς μὲν τῇ AB ἰ-
σὺν $ΑΓ$ πρὸς τὴν $ΑΕ$, ὡς δὲ
τῇ $ΑΓ$, τὴν δὲ $ΑΓ$ τῇ $ΒΕ$ ἰ-
σὺν $ΓΕ$ ἢ $ΒΓ$ τῇ $ΓΕ$.

Ἐπει γὰρ παράλληλος ἐστὶν
αἱ αὐτὰς, ἰσχυρίζονται ὅτι αἱ $ΑΓ$
ἰσὺν αἱ τῇ BA , $ΑΓ$ ἰσὺν αἱ
τῇ $ΒΕ$ ὅτι καὶ ἡ τῇ $ΓΕ$ ἰσὺν
ὅτι καὶ ἡ τῇ BA ἰσὺν τῇ $ΓΕ$.
ἔστι δὴ τριγώνον ἰσὺν τὸ $ABΓ$.
τὴν πρὸς τὸ A μὲν ἰσὺν τῇ
πρὸς τὸ $Β$ ἰσὺν, τὴν δὲ
τῇ BA πρὸς τὴν $ΑΓ$ ἰσὺν, τὴν
ἰσὺν τῇ $ΒΕ$ πρὸς τὸ $ABΓ$ ἰσὺν
τῇ $ΒΕ$ ἰσὺν, ὡς καὶ ἡ τῇ $ABΓ$ πρὸς
ἔστι δὴ καὶ ἡ τῇ $ΑΓ$ ἰσὺν

bentia, ita ut homologa eorum latera et parallela sint; reliqua triangulorum latera in directum erunt.

Sint duo trianguia $ABΓ$, $ΑΓΕ$, duo latera BA , $ΑΓ$ duobus lateribus $ΓΑ$, $ΑΕ$ proportionalia habentia ut AB quidem ad $ΑΓ$ ita $ΑΓ$ ad $ΑΕ$, parallela vero sit AB ipsi $ΑΓ$, $ΑΓ$ verò ipsi $ΑΕ$; dico $ΒΓ$ in directum esse ipsi $ΓΕ$.

Quoniam enim parallela est AB ipsi $ΑΓ$, et in ip-
sas incidit recta $ΑΓ$, alterni anguli $BAΓ$, $ΑΓΑ$ ae-
quales inter se sunt (I. 29.) Ex eadem ratione et $ΓΑΕ$
ipsi $ΑΓΑ$ est aequalis; quare et $BAΓ$ ipsi $ΓΑΕ$ est
aequalis. Et quoniam duo trianguia sunt $ABΓ$, $ΑΓΕ$
unum angulum ad A uni angulo ad A aequalem ha-
bentia, circa aequales autem angulos latera proportio-
nalia, ut BA ad $ΑΓ$ ita $ΓΑ$ ad $ΑΕ$; aequiangulum
est (VI. 6.) triangulum $ABΓ$, triangulo $ΑΓΕ$; aequa-
lis igitur angulus $ABΓ$ ipsi $ΑΓΕ$. Ostensus autem
est et $ΑΓΑ$ ipsi $BAΓ$ aequalis; totus igitur $ΑΓΕ$
duobus $ABΓ$, $BAΓ$ aequalis est. Communis appo-

rectangulum $ΑΠ$ applicatum in deficiens
locare oportebat.

Obs. 3. Data recta AB , et rectum
quadratum et observationem praecedentem lateris
quadrati, quo deficiens rectangulum $ΑΒ$
aequale, et secundum datam rectam $ΑΒ$ equa-
litate incognita NB vel NI ponere
et NO γὰρ, ergo $AB=ABXY$ τὴν AB
Atque haec est prima aequationem
speciem seu formam, quam ex hac Prop. 2. habet

veteres, inveniendō quantitatem incognitam NB , vel NI per
applicationem rectanguli dato rectangulo aequalis secundum
datam rectam AB et deficientis quadrato. Et ipsa etiam ro-
gula, qua ad solvendas aequationes huius formae utuntur re-
centiores, ex huius Prop. 28. constructione, vel, quod idem
est, ex constructione in Obs. 3. ad II. 14. allata deduci po-
test (Whiston. Cor. 2. et 3. ad VI. 28.). Obtinetur nempe

$$BE=AE-BZ=Γ-Δ, \text{ et } KE=\frac{HE \cdot Γ-Δ}{2}, \text{ et ob } KI=AA=$$

ἄρα ἡ ὑπὸ $\triangle AΓE$ δυοὶ ταῖς ὑπὸ $\triangle ABΓ$, $\triangle BAΓ$ ἴσῃ ἔσσι.
 Κοινὴ προσκείσθω ἡ ὑπὸ $\triangle AΓB$. αἱ ἄρα ὑπὸ $\triangle AΠΓ$,
 $\triangle AΓB$ ταῖς ὑπὸ $\triangle BAΓ$, $\triangle ABΓ$, $\triangle AΓB$ ἴσαι εἰσὶν. Ἄρα
 αἱ ὑπὸ $\triangle BAΓ$, $\triangle ABΓ$, $\triangle AΓB$ δυοὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶν.
 καὶ αἱ ὑπὸ $\triangle AΓE$, $\triangle AΓB$ ἄρα δυοὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶν.
 Πρὸς δὴ τινι εὐθείᾳ τῇ $ΑΓ$, καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ ὀρ-
 μίῳ τῷ $Γ$, δύο εὐθεῖαι αἱ $BΓ$, $ΓE$, μὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ
 μέρη κείμεναι, τὰς ἐφεξῆς γωνίας τὰς ὑπὸ $\triangle AΓE$,
 $\triangle AΓB$ δυοὶν ὀρθαῖς ἴσας ποιοῦσιν· ἐπ' εὐθείας ἐκ-
 στίν ἡ $BΓ$ τῇ $ΓE$. Ἐὰν ἄρα δύο, καὶ τὰ ἐξῆς.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ λγ'.

Ἐν τοῖς ἴσοις κύκλοις αἱ γωνίαι τὸν αὐτὸν λόγον
 ἔχουσι ταῖς περιφερείαις ἐφ' ὧν βεβήκασιν, ἂν //

$$\frac{AB}{2}, \text{ erit } IE^q = KI^q + KE^q = \left(\frac{AB}{2}\right)^q + \left(\frac{\Gamma - \Delta}{2}\right)^q. \text{ Et } IA =$$

$$AK = AH + HK = \Delta + \frac{\Gamma - \Delta}{2} = \frac{\Gamma + \Delta}{2}; \text{ hinc } NA = IN + IA =$$

$$IE^q - IA^q = \left(\frac{AB}{2}\right)^q + \left(\frac{\Gamma - \Delta}{2}\right)^q - \left(\frac{\Gamma + \Delta}{2}\right)^q = \left(\frac{AB}{2}\right)^q$$

$$- \Gamma \times \Delta, \text{ unde } NB = AB - NA = \frac{AB}{2} - \sqrt{\left(\left(\frac{AB}{2}\right)^q - \Gamma \times \Delta\right)},$$

$$\text{eodem modo } NA = \frac{AB}{2} + \sqrt{\left(\left(\frac{AB}{2}\right)^q - \Gamma \times \Delta\right)}.$$

PROPOSITIO XXIX.

Obs. 1. Quod primum sensum huius propositionis attri-
 met, facile ille intelligetur ex ea explicatione, quam in Obs.
 2. ad VI. 27. de similī expressione attulimus. Nempe in
 Prop. 27. 28. de defectu, in Prop. 29. de excessu sermo est,
 resque ita intelligenda erit: Si linea aliqua AB producat^{ur} ad
 punctum aliquod O , tumque super AO constituatur parallelo-
 grammum AE excedens figura parallelogramma BE , et bas

natur ATB : anguli igitur ATE , ATB ipsis EAF , ABF , ATB aequales sunt. Sed (I. 32.) BAF , ABF ATB duobus rectis aequales sunt; et ipsi ATE , ATB igitur duobus rectis aequales sunt. Ad quandam igitur rectam AT ; et ad punctum in ea T , duae rectae BT , TE , non ad easdem partes positae, angulos deinceps ATE , ATB duobus rectis aequales faciunt; in directum igitur est BT ipsi TE (I. 14.). Si igitur duto etc:

PROPOSITIO XXXIII. (Fig. 400.)

In aequalibus circulis anguli eandem rationem habent quam circumferentiae quibus insistent, sive ad

ipsa figura $B\Gamma$ excessus dicitur, isque excessus in hac propositione 29. similis esse debet dato parallelogrammo Δ , et totum parallelogrammum AE debet aequale esse spatio dato I . Caeterum etiam hic duplex solutio locum habet, at posterior cum priore eodem redit.

Obs. 2. Si datum istud rectangulum Δ quadratum fuerit, problema sic efferetur: Ad datam rectam AB dato rectilineo I aequale rectangulum applicare excedens quadrato (Ita Whiston in Cor. 1. ad VI. 29. et Rob. Simson in Not. ad h. l.) Aliter ita: Datam rectam AB producere ad punctum aliquod O , ita ut rectangulum contentum segmentis inter hoc punctum et puncta extrema rectae AB interceptis aequale sit spatio dato: Ita Playfair. rem exprimit, qui etiam hic in casu hoc particulari subsistit. Vel etiam: data AB differentia laterum rectanguli, ipsoque rectangulo magnitudine dato, invenire latera. Vid. Rob. Simson. l. c. Erit autem spatium datum, cui aequale fieri debet rectangulum, vel quadratum, vel non. Priore casu problema solutum est supra in Obs. 4. ad II. 11. Posterioris casum particularem, quo spatium datum est rectan-

πρὸς τοῖς κέντροις, ἐάν τε πρὸς ταῖς περιφερείαις
οἱ βεβηκῆναι· ἔτι δὲ καὶ οἱ τομεῖς (ἅτε πρὸς τοῖς
κέντροις συνιστάμενοι ¹⁾).

[Ἐστωσαν ἴσοι κύκλοι οἱ $ABΓ$, $ΔΕΖ$, καὶ πρὸς
μὲν τοῖς κέντροις αὐτῶν τοῖς H , $Θ$ γωνίαι ἐστῶσαι
αὐτὴν ὑπὸ $BHΓ$, $ΕΘΖ$, πρὸς δὲ ταῖς περιφερείαις αὐ-
τῶν ὑπὸ $BAΓ$, $ΕΔΖ$ · λέγω ὅτι ἐστὶν ὡς ἡ $BΓ$ περιφέρει-
α πρὸς τὴν $ΕΖ$ περιφέρειαν οὕτως ἢ τε ὑπὸ $BHΓ$ γωνί-
α πρὸς τὴν ὑπὸ $ΕΘΖ$, καὶ ἡ ὑπὸ $BAΓ$ πρὸς τὴν ὑπὸ
 $ΕΔΖ$ · καὶ ἔτι ὁ $HΒΓ$ τομεὺς πρὸς τὸν $ΘΕΖ$ τομεῖ-

1) Verba, quae uncis inclusimus, Rob. Simson. omi-
tenda censet, utpote imperiti cuiusdam additamentum. Scar-
burgh. etiam iudicat, haec verba absurdam continere notam
e margine in textum receptam. Et reapse, quum ex III. 18.
Def. nulli alii dentur sectores circuli, quam qui ad centum
constituti sunt, superflua certe sunt haec verba, quibus inae-
quandis praecedentes anguli sive ad centrum, sive ad circumfe-
rentias insistentes occasionem dedisse videntur. In Cod. 2.
omnino, quae de sectoribus dicta sunt, nec non Corollarium
manu aliena vel inter lineas, vel in margine exarata sunt vo-
cabulis contractis. Hinc Peyrardus iudicat, in Praefat. ad Tom.
I. quoniam Rob. Simson. in Ed. Angl. monuerat, pariter a
Scarburgh. additam esse hanc secundam. Propositionis partem,
quae moram saltem afferat, Euclidi et nusquam in sequentibus
adhibeatur, a Theone ipso referente in Commentar. a
Ptol. *Μετὰ τὴν σύνταξιν* p. 50. Ed. 1558, ubi ille: *ὅτι δὲ αὐ-
τῶν ἴσων κύκλων τομεῖς πρὸς ἀλλήλους εἶναι, ὡς αἱ γωνίαι, ἡ
ὧν βεβηκαὶ, δέδεικται ἡμῖν ἐν τῇ ἀπόδειξι τῶν στοιχείων πρὸς
τῷ τέλει τοῦ ἔκτου βιβλίου.*

gulum (qui pariter ope VI. 13. et VI. 17. vel ope II. 14. a
priorem reduci potest) exhibet Rob. Simson. in not. ad VI.
29., et solutionem similem ei, quae in problemate simili a
VI. 28. habebatur, in hunc modum affert. Sit data recta $ΑΔ$.
(Fig. 59t.), datum autem rectangulum sit id, quod rectis $ΑΔ$
continetur: oportet secundum datam rectam AB dato rectan-
gulo $ΓΧΔ$ aequale rectangulum applicare excedens quadratū
Ducantur AE , BZ ad rectos angulos ipsi AB , et ad contrari-
as eius partes, quarum AE aequalis sit ipsi $Γ$, et BZ rectū

centra, sive ad circumferentias insistant; adhuc etiam
et sectores (quippe ad centra constituti).

Sint aequales circuli $AB\Gamma$, ΔEZ , et ad centra
quidem ipsorum H , Θ sint anguli $BH\Gamma$, $E\Theta Z$; ad
circumferentias vero anguli BAG , EAZ ; dico esse
ut $B\Gamma$ circumferentia ad EZ circumferentiam ita an-
gulum $BH\Gamma$ ad angulum $E\Theta Z$, et angulum BAG
ad angulum EAZ ; et adhuc sectorem HBI ad sec-
torem ΘEZ .

A. Iungatur EZ et bifariam secetur in I , centroque I , inter-
vallo IB describatur circulus, occurratque rectae AE rursus in
 H , et iungatur HZ , et ad AB ducatur IA parallela ipsi AE ;
occurrat vero circulus rectae AB productae in M et N , et
super BN describatur quadratum $NBOI$, et compleatur rectan-
gulum $ANN\Theta$. Quoniam igitur angulus EIZ in semicirculo
aequalis est angulo recto EAB , parallelae erunt AB , IZ : ae-
quales igitur sunt AH , BZ , et rectangulum $EA \times AH = EA$
 $\times BZ$ h. e. rectangulo $\Gamma \times \Delta$. Et, quoniam aequales sunt
 MA , AN , ut et AA , AB , erunt et MA , BN aequales, et prop-
terea rectangulum $AN \times NB = MA \times AN =$ (III. 35.) $EA \times$
 $AH = \Gamma \times \Delta$. Rectangulum igitur $AN \times NB$ h. e. ipsum AI
aequale est rectangulo $\Gamma \times \Delta$. Secundum datam igitur rectam
 AB dato rectangulo $\Gamma \times \Delta$ aequale rectangulum AI applica-
tum est excedens quadrato BI . Quod oportebat facere.

Obs. 3. Data recta linea AB , et rectilineo, per hanc
propositionem et observationem praecedentem habebitur NB
vel NI latus quadrati, quo excedit rectangulum datum.
 AI secundum datam rectam AB applicatum Pro quan-
titate incognita NB vel NI ponatur y , unde $AO = AB \times y$, et
 $NO = yq$, ergo $AI = AB \times y + yq$, i. e. $\Gamma \times \Delta = AI = AB \times y + yq$. Pa-
riterque, si ponatur $AN = x = AB + y$, erit $BN = x - AB$, unde
 $AI = AN \times BN = xq - x \times AB$. Et has aequationum quadrati-
carum affectarum species ex hac Prop. 29. solverunt Geome-

Κείσθωσαν γὰρ τῇ μὲν $BΓ$ περιφέρειᾳ ἴσαι πᾶσι τὸ ἐξῆς ὁσμεθροποῦν αἱ $ΓΚ$, $ΚΑ$, τῇ δὲ $ΕΖ$ περιφέρειᾳ ἴσαι ὁσμεθροποῦν αἱ $ΖΜ$, $ΜΝ$, καὶ ἐπιείχθωσαν αἱ $ΗΚ$, $ΗΑ$, $ΘΜ$, $ΘΝ$.

Ἐπεὶ οὖν ἴσαι εἰσὶν αἱ $BΓ$, $ΓΚ$, $ΚΑ$ περιφέρειαι ἀλλήλαις, ἴσαι εἰσὶ καὶ αἱ ὑπὸ $BΗΓ$, $ΓΗΚ$, $ΚΗΑ$ γωνίαι ἀλλήλαις· ὁσαπλασίων ἄρα ἐστὶν ἡ $ΒΑ$ περιφέρεια τῇ $BΓ$, τοσαυταπλασίων ἐστὶ καὶ ἡ ὑπὸ $BΗΑ$ γωνία τῇ ὑπὸ $BΗΓ$. Διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ὁσαπλασίων ἐστὶν ἡ $ΕΝ$ περιφέρεια τῆς $ΕΖ$, τοσαυταπλασίων ἐστὶ καὶ ἡ ὑπὸ $ΕΘΝ$ γωνία τῆς ὑπὸ $ΕΘΖ$. Εἰ ἄρα ἴση ἐστὶν ἡ $ΒΑ$ περιφέρεια τῇ $ΕΝ$ περιφέρειᾳ, ἴση ἐστὶ καὶ γωνία ἡ ὑπὸ $BΗΑ$ τῇ ὑπὸ $ΕΘΝ$.

trae veteres, inveniendō quantitatem incognitam BN vel AN per applicationem rectanguli dato rectangulo aequalis secundum datam rectam AB et excedentis quadrato. Et ipsa etiam regula, qua ad solvendas aequationes harum formarum utuntur recentiores, facile ex huius Prop. 29. constructione, vel, quod idem est, ex constructione in Obs. 4. ad II. 11. allata deduci potest simili ratione ac factum est in Obs. 5. ad VI. 28. Est nempe $BN = \sqrt{\left(\frac{AB}{2}\right)^2 + \Gamma \times \Delta} - \frac{AB}{2}$, et $AN = \sqrt{\left(\frac{AB}{2}\right)^2}$

$+ \Gamma \times \Delta + \frac{1}{2} \frac{AB}{2}$. Cf. Whiston. Cor. 2—5 ad VI. 29.

Quam itaque haec problemata in Prop. 28. et 29. contenta sint maxime utilia, et in solutione aliorum problematum saepissime adhibita, maxime etiam in libro décimo Elementorum Euclidis et in Conicis Apollonii, ubi applicatio 28. ad Ellipsin, 29. autem ad Hyperbolam spectat, Rob. Simson iure censet incite admodum ab Andr. Tacquet et Claud. Dechaies in his, quas dederunt, Elementorum Editionibus has propositiones omissas esse, et insulse admodum ab his dici nullius fere usus esse. Caeterum vide adhuc ad calcem VI. Prop. 51.

Ponantur enim circumferentiae quidem BF aequales quotcunque deinceps FK , KA , circumferentiae vero EZ aequales quotcunque ZM , MN , et iungantur HK , HA , OM , ON .

Quoniam igitur aequales sunt circumferentiae BF , FK , KA inter se, aequales sunt et anguli BHF , GHK , KHA inter se (III. 27.) Quam multiplex igitur est circumferentia BA circumferentiae BF , tam multiplex est et angulus BHA anguli BHF . Ex eadem ratione et quam multiplex est circumferentia EN circumferentiae EZ , tam multiplex est et angulus EON anguli EOZ . Si igitur aequalis est circumferentia BA circumferentiae EN , aequalis est et angulus BHA

PROPOSITIO XXXI.

Obs. 1. Pflaiderer monet in sched. mss. §. 306. propositionem 31. incongrue a VI. 20 cum qua proxime cohaereat, se-iunctam, et propositionibus 27-30 minime ad eam pertinentibus subiunctam esse.

Obs. 2. Rob. Simaon. observat, in demonstratione his omissam esse inversionem ope Prop. B. V. vel, ut vulgo habent, ope Cor. V. 4. faciendam. Ita enim demum demonstrati-nem ope V. 24. rite procedere, unde et Clavius ea inversione usus sit. Nempe ita habere debet demonstratio: Ut FB ad BA , ita figura ex FB ad figuram similem et similiter positam, ex BA , et invertendo (B.V.) ut BA ad FB ita figura ex BA ad figuram ex FB : unde (V. 24.) ut $BA+FA$ ad FB ita figurae ex BA et FA ad figuram ex FB . Aequales autem sunt $BA+FA$ ipsi FB : unde (A. V.) figurae ex BA et FA aequales erunt figurae ex FB .

Obs. 3. Propositio VI 31. generaliorem reddit propositionem I. 47. et in demonstratione priore ex praemissis ab hac independentibus sistit (Pflaiderer l. c. §. 306.).

Obs. 4. Converti quoque potest haec propositio eadem.

καὶ εἰ μείζων ἐστὶν ἡ BA περιφέρεια τῆς EN περιφερεί-
ας, μείζων ἐστὶ καὶ ἡ ὑπὸ BHA γωνία τῆς ὑπὸ EON
γωνίας καὶ εἰ ἐλάσσων, ἐλάσσων τεσσάρων δὲ ὄντων με-
γεθῶν, δύο μὲν περιφερειῶν τῶν $BΓ$, EZ , δύο δὲ γω-
νιῶν τῶν ὑπὸ $BHΓ$, EOZ , εἴληπται τῆς μὲν $BΓ$
περιφερείας καὶ τῆς ὑπὸ $BHΓ$ γωνίας ἰσάις πολλα-
πλασίων ¹⁾, ἢ τε BA περιφέρεια καὶ ἡ ὑπὸ BHA γω-
νία, τῆς δὲ EZ περιφερείας καὶ τῆς ὑπὸ EOZ γω-
νίας, ἢ τε EN περιφέρεια καὶ ἡ ὑπὸ EON γωνία
καὶ δέδεικται ὅτι εἰ ὑπερέχει ἡ BA περιφέρεια τῆς
 EN περιφερείας, ὑπερέχει καὶ ἡ ὑπὸ BHA γωνία τῆς

1) Hic inserendum Rob. Simson *ὅς ἐστις* iure censet, col-
lat. in V. 5. Def. verbis: καὶ ὅποιον ὄν πολλαπλασιασμὸν αἰ-
πρα in praeparatione ad demonstrationem voce: ὅσαι ὀρθοί.

ratione ac I. 47. Praeterea ope VI. 31. deducta quoque ex I. 47.
problemata generaliorem formam induunt. Cf. Pfeiderer. l. c. §.
305. Clavius ad h. l. Tacquet et Whiston. in Cor. ad hanc
propositionem.

Obs. 5. Denique notabimus, Austino omnes propositiones
27—31 spurias esse videri, non quod ipsarum utilitatem neget,
quam potius de propositionibus 27—29 agnoscit, at non suffi-
cere putat ad eas Euclidi vindicandas, sed maxime ob usum
vocis *εἶδος* alias apud Euclidem non occurrentis, de qua dixi-
mus in Obs. 3. ad VI. 20, et quod demonstrationum concatenatio
inter VI. 26. et VI. 32. quae inter se cohaereant, abrupta sit.
Praeterea VI. 30. adeo facile ad Ib. 11. referri, ut ea non opus sit.
Denique, quoad VI. 31. patere (it is evident) omnes figuras
similes rectilineas descriptas super quibusdam rectis ad se in-
vicem in eadem ratione esse, ac alias quascunque similes figu-
ras rectilineas super iisdem rectis descriptas, unde res facilius
I. 47. conficiatur. Nobis turbatus quidem ordo propositionum
videtur, omnes autem has propositiones 25—31 spurias esse,
vix adducimur, ut credamus.

angulo EON ; et si maior est circumferentia BA circumferentia EN maior est et angulus BHA angulo EON ; et si minor, minor; quatuor igitur existentibus magnitudinibus, duabus quidem circumferentiis BF , EZ , duobus vero angulis BHF , EOZ , sumpta sunt circumferentiae quidem BF , et anguli BHF aequae multiplicia, et BA circumferentia et BHA angulus, ipsius vero EZ circumferentiae et ipsius EOZ anguli et EN circumferentia et EON angulus; et ostensum est, si superat circumferentia BA circumferentiam EN , superare et angulum BHA angulum EON et si aequalis, aequalem; et si minor, minorem esse;

PROPOSITIO XXXII.

Obs. 1. Rob. Simson, monet enunciatum propositionis VI. 26. non esse satis generalem, sed eam eo etiam sensu sumi posse, quem indicavimus in Obs. 4. ad VI. 26. Addit, fons etiam aliam fuisse demonstrationem propositionis VI. 26. directam (diversam ab ea, quam Clavius habet, vide Obs. 1. ad VI. 26.) Deinde exhibet aliam paulo breviorē demonstrationem propositionis VI. 32. in hunc modum: Sint duo triangula $A\theta Z$, ZHI (f. 398.) quorum duo latera $A\theta$, θZ duobus lateribus HZ , HI proportionalia sint, sc. sit ut $A\theta$ ad θZ ita HZ ad HI ; parallela autem sit θA ipsi HZ , et θZ ipsi HI : erit AZ ipsi ZI in directum. Ducatur IK parallela ipsi ZH (I. 31.) occurratque rectae θZ productae in K . Quoniam igitur utraque $A\theta$, IK parallela est ipsi ZH , erunt et $A\theta$, KI inter se parallelae (I. 30.), quare anguli $A\theta Z$, ZKI sunt inter se aequales (I. 29.) Est autem $A\theta$ ad θZ ut (ZI ad HI , h. e. (I. 34), ut) IK ad KZ ; et sunt circa aequales angulos; ergo (VI. 6.) aequiangula sunt $A\theta Z$, IKZ triangula, et propterea angulus $AZ\theta$ aequalis est angulo IKZ , est autem θZK recta linea; igitur AZ ipsi IZ est in directum (I. 11.). Operis huius propositionis, deinde VI. 26. ita demonstrat. Si duo

ὕπὸ $ΕΘΝ$ · καὶ εἰ ἴση, ἴση καὶ εἰ ἴσασιν, ἴσασιν· ὥστε ὥς $ΒΓ$ περιφέρεια πρὸς τὴν $ΕΖ$, οὕτως ἡ ὑπὸ $ΒΗΓ$ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ $ΕΘΖ$. Ἀλλ' ὥς ἡ ὑπὸ $ΒΗΓ$ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ $ΕΘΖ$ οὕτως ἡ ὑπὸ $ΒΑΓ$ πρὸς τὴν ὑπὸ $ΕΔΖ$, διπλασίων γὰρ ἑκάτερα ἑκτέρῳ· καὶ ὥς ὥστε ἡ $ΒΓ$ περιφέρεια πρὸς τὴν $ΕΖ$ περιφέρειαν οὕτως ἦτε ὑπὸ $ΒΗΓ$ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ $ΕΘΖ$, καὶ ἡ ὑπὸ $ΒΑΓ$ πρὸς τὴν ὑπὸ $ΕΔΖ$.

Ἐν ἄρα τοῖς ἴσοις κύκλοις αἱ γωνίαι τῶν κέντρων ἔχουσι λόγον ταῖς περιφερείαις, ἐφ' ὧν βεβήκασιν αὐτὰς πρὸς τοῖς κέντροις, ἢν τε πρὸς ταῖς περιφερείαις· ὡς βεβήκναι. Ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

parallelogramma similia et similiter posita communem habuerint angulum aut angulos ad verticem oppositos; erunt illorum diametri in recta linea. Primo habebant parallelogramma $ΑΒΓΑ$, $ΑΕΖΘ$ communem angulum $ΒΑΔ$, sintque similia et similiter posita, erunt $ΑΒΓΑ$, $ΑΕΖΘ$ circa eandem diametrum. Producantur enim $ΕΖ$, $ΓΖ$ ad $Η$, $Κ$ et iungantur $ΖΑ$, $ΖΓ$. Quoniam igitur similia sunt $ΑΒΓΑ$, $ΑΕΖΘ$ parallelogramma, erit $ΑΔ$ ad $ΑΒ$, ut $ΘΑ$ ad $ΑΕ$; quare reliqua $ΑΘ$ erit ad reliquam $ΕΒ$ ut $ΘΑ$ ad $ΑΕ$ (V. 19. Cor.) Est autem $ΑΘ$ aequalis ipsi $ΖΗ$, $ΕΒ$ ipsi $ΓΗ$, et $ΑΕ$ ipsi $ΘΖ$. Ergo ut $ΖΗ$ ad $ΓΗ$ ita $ΑΘ$ ad $ΘΖ$, et parallelae sunt $ΖΗ$, $ΓΗ$ ipsis $ΑΘ$, $ΘΖ$; et triacula $ΑΘΖ$, $ΖΗΓ$ ad unum angulum composita sunt in puncto $Ζ$; quare erunt $ΑΖ$, $ΖΓ$ sibi ipsis in directum (VI. 32.). Secundo, sint parallelogramma $ΚΖΗΓ$, $ΘΖΕΑ$ similia et similiter posita, habeantque angulos $ΚΖΗ$, $ΕΖΘ$ ad verticem oppositos; erunt diametri $ΑΖ$, $ΖΓ$ sibi ipsis in directum. Quoniam enim parallelae sunt $ΑΘ$, $ΘΖ$ ipsis $ΖΗ$, $ΗΓ$, et est $ΑΘ$ ad $ΘΖ$ ut $ΖΗ$ ad $ΗΓ$; erunt $ΑΖ$, $ΖΓ$ in directum (VI. 32.).

Obs. 2. Clavius monet, ut vera sit propositio VI. 32. duo ista, de quibus sermo est, triacula, ita secundum unum

est igitur (V. Def. 5.) ut circumferentia BF ad circumferentiam EZ ita angulus BHF ad angulum EOZ . Sed (V. 15.) ut angulus BHF ad angulum EOZ ita angulus BAF ad angulum EZZ ; duplus enim uterque utriusque; (III. 20.) ut igitur circumferentia BF ad circumferentiam EZ ita et angulus BHF ad angulum EOZ , et angulus BAF ad angulum EZZ .

In aequalibus igitur circulis anguli eandem habent rationem quam circumferentiae quibus insistent; sive ad centra, sive ad circumferentias insistant. Quod oportebat ostendere.

angulum composita esse debere, ut uterque angulorum a lateribus proportionalibus comprehensus alterius sit illi angulo, secundum quem triacula componuntur.

PROPOSITIO XXXIII.

Obs. 1. In praeparatione demonstrationis loco arcuum FK , KA arcui BF aequalium anguli GHK , KHA angulo BHF aequales poni possunt iuberi. Modum hoc faciendi immediate docet L. 23. Modus prius faciendi nititur IV. 1; III. 28, immediate autem non exponitur, nisi addere velis ut IV. 1. Cor. (Pfleiderer.)

Obs. 2. Si in parte secunda propositionis sectores occurrant semicirculo aequales aut maiores, bisecando illi facile ad sectores minores semicirculo reducentur. Cacterum angulos gibbos etiam per demonstrationem partis primae non excludi posse diximus ad III. 20.

Obs. 3. Ex hac propositione sequentia adhuc derivantur Corollaria, quae sunt apud Clavius, Tacquetum, Baermannum, Pfeidererum, aliosque. 1. Ut est angulus ad centrum ad quatuor angulos rectos, ita arcus isti angulo subtensus

Λέγω ¹⁾ ὅτι καὶ ὡς ἡ ΒΓ περιφέρεια πρὸς τὴν ΕΖ περιφέρειαν οὕτως ὁ ΗΒΓ τομεὺς πρὸς τὸν ΘΕΖ τομία.

Ἐπεξεύχθωσαν γὰρ αἱ ΒΓ, ΓΚ, καὶ ληφθῶσι ἐπὶ τῶν ΒΓ, ΓΚ περιφερειῶν τῶν Ξ, Ο σημείων, ἐπεξεύχθωσαν καὶ αἱ ΒΞ, ΞΓ, ΓΟ, ΟΚ.

Καὶ ἐπεὶ δύο αἱ ΒΗ, ΗΓ διῶσι ταῖς ΓΗ, ΗΚ, ἴσαι εἰσὶ, καὶ γωνίας ἴσας περιέχουσιν καὶ βάσεις τῆ ΒΓ τῇ ΓΚ ἐστὶν ἴση, καὶ ἴσον ἐστὶ ²⁾ καὶ τὸ ΒΗΓ τρίγωνον τῷ ΗΓΚ τριγώνῳ. Καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΒΓ περιφέρεια τῇ ΓΚ περιφέρειᾳ, καὶ ἡ λοιπὴ ἢ εἰς τὸν ὅλον ΑΒΓ κύκλον περιφέρεια ἴση ἐστὶ τῇ λοιπῇ τῇ εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον περιφέρειᾳ ³⁾ ὥστε καὶ γωνία τῇ ὑπὸ ΒΞΓ τῇ ὑπὸ ΓΟΚ ἐστὶν ἴση· ὁμοιον ἄρα ἐστὶ τὸ ΒΞΓ τμήμα τῷ ΓΟΚ τμήματι καὶ εἰσὶν ἐπίϊστον εὐθειῶν τῶν ΒΓ, ΓΚ. Τὰ δὲ ἐπὶ ἴσων εὐθειῶν ὅμοια τμήματα κύκλων ἴσα ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσον ἄρα ἐστὶ τὸ ΒΞΓ τμήμα τῷ ΓΟΚ τμήματι. Ἐπὶ δὲ καὶ τὸ ΒΗΓ τρίγωνον τῷ ΗΓΚ τριγώνῳ ἴσον καὶ ὅλος ἄρα ὁ ΗΒΓ τομεὺς ὅλῳ τῷ ΗΓΚ τομῇ ἴσος ἐστὶν. Διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ὁ ΗΚΑ τομεὺς ἐκείνου

1) Peyrardus in Praefat. ad Tom. I. ait: „In textu graeco manuscripti 190 vel Cod. a nequaquam agitur de circulo sectoribus in ultima sexti libri propositione. Manus aliena inter lineas et in margine manuscripti exaravit omnia quae ad sectores pertinent, et quidem, ut in lect. variant. addit, reverbulis contractis.“ Quum igitur postea ad Cod. a provocet Peyrardus, id saltem de lectione ista ad marginem notata intelligi debet.

2) Pro: ἴσον ἄρα ἐστὶ quod vulgo habent, legendum esse: καὶ ἴσον ἐστὶ recte monet Rob. Simson.

3) Ita leg. Gregorius, cuius lectionem hic restituit Peyrardus ex Cod. a habet: καὶ ἡ λοιπὴ ἢ ἐστὸν ὅλος κύκλος περιφέρεια ἴση ἐστὶ τῇ λοιπῇ τῇ εἰς τὸν ὅλον κύκλον περιφέρειᾳ ad totam peripheriam, et vice versa, Vel etiam, ut arguitur

των $ΗΚΓ$, $ΗΓΒ$ ἴσος ἐστίν· οἱ τρεῖς ἄρα τομεῖς ὁ $ΗΒΓ$, $ΗΓΚ$, $ΗΚΑ$ ἴσοι ἀλλήλοις εἰσίν. Διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ $ΘΕΖ$, $ΘΖΜ$, $ΘΜΝ$ τομεῖς ἴσοι ἀλλήλοις εἰσίν· ὁσαυταπλάσιον ἄρα ἐστὶν ἡ $ΒΑ$ περιφέρεια τῆς $ΒΓ$ περιφερείας, τοσαυταπλάσιον ἐστὶ καὶ ὁ $ΗΒΑ$ τομεὺς τοῦ $ΗΒΓ$ τομέως. Διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ὁσαυταπλάσιον ἐστὶν ἡ $ΕΝ$ περιφέρεια τῆς $ΕΖ$ περιφερείας, τοσαυταπλάσιον ἐστὶ καὶ ὁ $ΘΕΝ$ τομεὺς τοῦ $ΘΕΖ$ τομέως. Ἐν ἄρα ἴση ἐστὶν ἡ $ΒΑ$ περιφέρεια τῇ $ΕΝ$ περιφερείᾳ, ἴσος ἐστὶ καὶ ὁ $ΗΒΑ$ τομεὺς τῷ $ΘΕΝ$ τομεῖ· καὶ εἰ ὑπερέχει ἡ $ΒΑ$ περιφέρεια τῆς $ΕΝ$ περιφερείας, ὑπερέχει καὶ ὁ $ΗΒΑ$ τομεὺς τοῦ $ΘΕΝ$ τομέως καὶ εἰ ἐλλείπει, ἐλλείπει. Τισσίων δὲ ὄντων μεγεθῶν, δύο μὲν τῶν $ΒΓ$, $ΕΖ$ περιφερειῶν, δύο δὲ τῶν $ΗΒΓ$, $ΘΕΖ$ τομέων, εἴληπται ἰσῶς πολλαπλάσια ὅ τῶν $ΒΓ$ περιφερείας, καὶ τοῦ $ΗΒΓ$ τομέως, ἤτε $ΒΑ$ περιφέρεια καὶ ὁ $ΗΒΑ$ τομεὺς, τῆς δὲ $ΕΖ$ περιφερείας καὶ τοῦ $ΘΕΖ$ τομέως ἰσῶς πολλαπλάσια ὅ, ἤτε $ΕΝ$ περιφέρεια καὶ ὁ $ΘΕΝ$ τομεὺς. Καὶ δέδεικται ὅτι εἰ ὑπερέχει ἡ $ΒΑ$ περιφέρεια τῆς $ΕΝ$ περιφερείας, ὑπερέχει καὶ ὁ $ΗΒΑ$ τομεὺς τοῦ $ΘΕΝ$ τομέως· καὶ εἰ ἴση ἴσος· καὶ εἰ ἐλλείπει, ἐλλείπει· ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ $ΒΓ$ περιφέρεια πρὸς τὴν $ΕΖ$ οὕτως ὁ $ΗΒΓ$ τομεὺς πρὸς τὸν $ΘΕΖ$ τομεῖα.

1) Verbis: ἰσῶς πολλαπλάσια addenda esse: ἃ εἴρηξε, τὸν μόνον Rob. Simson.

quot gradus sint in duobus arcibus circuli alicuius, patet per VI. 33. rationem angulorum, quos hi arcus subtendunt, in numeris exhiberi posse. Et si unus angulus consideratur, et numerus graduum in arcu ad eum pertinente inventus est:

equalis est. (2. Ax.) Ex eadem ratione et sector HKA trique ipsorum HKT , HTB equalis est; tres igitur sectores HBT , HTK , HKA aequales inter se sunt. Similiter et sectores θEZ , θZM , θMN aequales inter se sunt; quam multiplex igitur est circumferentia BA circumferentiae BT , tam multiplex est et sector HBA sectoris HBT . Ex eadem ratione et quam multiplex est circumferentia EN circumferentiae EZ , tam multiplex est et sector θEN sectoris θEZ ; si igitur aequalis est circumferentia BA circumferentiae, EN aequalis est et sector HBA sectori θEN ; et si superat circumferentia BA circumferentiam EN , superat et sector HBA sectorem θEN ; et si deficit, deficit. Quatuor igitur existentibus magnitudinibus, duobus quidem circumferentiis BT , EZ , duobus vero sectoribus HBT , θEZ , sumpta sunt aequae multiplicia ipsius quidem circumferentiae BT et ipsius sectoris HBT , circumferentia BA , et sector HBA , circumferentiae vero EZ et sectoris θEZ aequae multiplicia, circumferentia EN et sector θEN . Et ostensum est si superat circumferentia BA circumferentiam EN , superare et sectorem HBA sectorem θEN ; et si aequalis sit, aequalem esse et si deficit, deficere; est igitur (V. Def. 5.) ut circumferentia BT , ad circumferentiam EZ , ita sector HBT ad sectorem θEZ .

constat ratio anguli ad 4. rectos per nr. I. Sit e gr. numerus graduum, quos arcus habet $\equiv 45$, erit angulus ad eam arcum pertineas: 4 rect. $\equiv 45: 360 = 1: 8$. Caeterum loco 360 partium vel graduum, in quos vulgo circumferentiam quamcunque dividere solent, recentiores Galli eam in 400, adeoque quadrantem in 100 partes aequales dividere instituerunt. 5) Mensura quoque angulorum circulo insistentium, quorum

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α.

Καὶ δῆλον ὅτι καὶ ὡς ὁ τομεὺς πρὸς τὸν τομέως
οὕτως καὶ ἡ γωνία πρὸς τὴν γωνίαν.

vertex intra vel extra circulum est, facile habetur per summum
vel differentiam arcuum, quibus insistent. 6) Inaequaliter
circularum arcus sunt in ratione composita ex rationibus an-
gularum ad centrum et peripheriarum. Denique notandum
est, apud Clavius ad calcem libri VI. plura adhuc addita
esse theoremata et problemata, quorum multa versantur circa

COROLLARIUM.

Et manifestum est (V. 11.) et ut sector ad sectorem
ita esse angulum ad angulum.

inventionem superficierum proportionalium. Et sunt quidem
illa, ut Clavius ait, scitu non iniucunda, et augeri etiam eorum
numerus facile poterat e scriptis veterum et recentiorum Ma-
thematicorum. At memores, nos in Elementis versari, nolui-
mus nimii esse.

EXCURSUS
AD
ELEMENTORUM

L. V. et maxime ad Def. 5. et 7.

A primis inde litterarum in Europa restitutarum temporibus ad nostram usque aetatem haud defuere Mathematici, qui in libro quinto Elementorum Euclidis multa difficilia, obscura, haud satis explicata esse contenderent, quum contra alii hunc ipsum librum pulcherrimum ingenii Euclidei foetum iudicaret. Gravissima autem dubia, quae contra demonstrationes in hoc libro obvias afferunt, ipsa fundamenta, quibus illae nituntur, spectant, definitiones nempe rationum aequalium aut inaequalium, et ad haec fere redeunt. Euclidem aiunt (v. c. Borellus Euclid. restitut. L. III. Ax. VI. et quae ad illud observat) multifariam rationem et proportionem (aut, ut alii dicunt, proportionalitatem) magnitudinum definivisse duplici modo, primo quidem in libro quinto, et aliter deinde in libro septimo, quod ipsum indicio sit eum sibi ipsi non constituisse, aut forte in primis istis definitionibus ipsum sibi non satisfacisse. Eam autem potissimum definitionem rationum aequalium aut inaequalium, cui integer fere liber quintus superstruatur, nempe 5. Def. V. et 7. Def. V. esse subobscuram, nec naturam rei definitae satis declarare aut distinguere a quavis alia, et notissimas adeo magnitudinum proportionalium proprietates in deduci non posse v. c. propositionem: si quatuor magnitudines proportionales fuerint, et prima superet secundam, tertiam quoque necessario excedere quartam. Defectum autem definiti-

onis 5tae et 7mae in eo potissimum latere, quod ea quae in his Definitionibus de magnitudinibus, quae eandem aut non eandem rationem inter se habeant, dicantur, non sint proprietas prima et omnium notissima, quae istis magnitudinibus competat, qualis tamen esse debeat illa, quae definitionem scientificam constituat. Plura alia adhuc carpit in his definitionibus Thom.

Simpson, de quibus infra videbimus. Consulto omicimus oblectiones manifesto falsas, a Ramo, iniquissimo illo Euclidis reprehensore aliisque factas, qui male intellecta Euclidis definitione — in quem errorem a Campano (vid. obs. supra ad Def. V. 5.) inducti fuisse videntur — calumniantur Euclidem

ELEMENTO

L. V. et maxime ad Def.

generalem datorum proportionem definire per specialem aequi- multiplicium proportionem. Et fortasse falsa ista Campani expositio causa fuerit, cur multi primo post litteras renatas tem- pore Euclidem male intelligerent. (Cl. Barrow. Lect. 1666.

Lect. VII.) Tacquetus etiam putat (Element. Euclid. Geom. planae ac solidae L. V. ab initio) Euclidis definitionem non naturam aequalium rationum sed affectionem solummodo aliquam explicare. Et illam multiplicium proprietatem adduci vel tanquam signum infallibile rationum aequalium ut, quandocunque ea demonstrata fuerit de quibusvis rationibus, inferre certo liceat, aequales eas esse: vel eum illius sensum esse, ut per magnitudines eandem rationem habentes nihil aliud intelligi velit quam eas quarum multiples modo iam dicto excedant vel excedantur. Si prius, demonstrare debuisse Euclidem, eam affectionem omnibus et suis rationibus aequalibus inesse. Id vero nec Euclidem nec alium iquemquam demonstrasse. Si posterius, securos nos quidem esse de veritate theorematum in sensu definitionis acceptorum, minime tamen ex vi demonstrationum nobis constare de absoluta rationum aequalitate. — Taquetus itaque fundamenti loco sumere videtur, aliunde constare, quid sit rationum aequalitas et demonstrandum esse, cum vulgari isto conceptu de rationum aequalitate necessario coniunctam esse eam quam Euclides affert, proprietatem, et vice versa. Eodem vero redire videntur, quae Galilaei monet (vid. principio della

Euclid. Element. P. II.

X

A primis inde hauritur in Europae ad nostram usque aetatem hanc deinde libro quinto Elementorum Euclidis hanc sensu explicari esse concedendum, ipsum librum pulcherrimum regere rationem. Gravissima autem dubia, quae in hoc libro obvia afferant, ipsi latere videntur, spectant, defensionem recipiunt, et ad haec se referunt. Boreus Euclid. restat, L. III. in quo servat multifariam rationem et proportionem, proportionalitatem) inquit, de primo quidem in libro quinto, et septimo, quod ipsum rediret ad eandem rationem in primis istis definitionibus. Etiam autem potissimum definitionem inaequalium, cui integer fore liber per 5 Def. V. et 7. Def. V. non solum definitione satis declarata ut distinguat, et tamen adeo magnitudinum proportionales deduci non posse v. c. proportionales proportionales fuerint, et prius super quo quo necessario excedere quantitas. Boreus

Quinta Giornata del Galileo dettata ad Evang. Torricelli.
Elem. Euclid. Ital. editis a Carlieri Flor. 1769. p. 111.
qui ita habet: Quodnam ingenium adeo felix est, ut cer-
sciat, quatuor magnitudinum proportionalium aequemultipla
semper (Euclide more) inter se convenire? Aut quis novi-
ista aequemultipla non semper convenire, etiam si istae mag-
nitudines non sint proportionales? — Euclidis itaque illud
assertum Theorema potius esse ait, quam definitionem. E-
varia haec contra Euclidis theoriam dubia alii alio modo eni-
tare vel refellere studuerunt. Atque ii quidem, qui ad
Euclidis ratione habita diversam ab eo quantitatum propor-
tionalium theoriam dederunt, huc non pertinent. Inter eos
autem, qui sua cum Euclide conciliare voluerunt, ii maxime
perfunctorie versati esse videntur, qui ut Tacquetus, Torricel-
lius, van Swinden aliique plurima ab Euclide demonstrata
theoremata v. c. 7. V. 8. V. 9. V. Axiomatum fere loco ha-
buerunt, quippe quae declaratione potius subinde aliqua, quam
demonstratione egere putarent. Aliam deinde rationum aequa-
lium notionem sumentes, demonstrare satēgerunt, Euclidis
notionem cum ea qua ipsi usi erant, convenire, atque ex ea
derivari posse. Perfunctorie diximus eos in hac re versatos
esse. Neque enim hoc est demonstrare v. c. duas rationes
quae eidem tertiae aequales sint aequales esse inter se, si tantum
affirmaveris, rem ita se habere, nec provocare licet ad Ax. 11
quum id, quod de duabus magnitudinibus valet, nequaquam
applicari semper possit ad duas, quae inter magnitudines ob-
tinent, rationes aut relationes. Ad demonstrandum autem Eu-
clideam notionem rationum aequalium cum sua notione con-
venire, plerique ut per se clarum sumunt, datis tribus qua-
titatibus A, B, C, dari semper quartam, ad quam eandem ra-
tionem habeat, quam habet A ad B quod pariter sine de-
monstratione, qua ratione illa quantitas D inveniri possit, sumit
a rigore Euclidi solemniter alienum esse videtur. Id tamen
praeceunte Campano et Clavio, qui caeterum cum Tacquetis in
hac re nihil commune habet, sibi permiserunt Tacquetus,
Galilaei, Carlieri, aliique. Saccherius contra (Euclid. ab omni
naevo restituit. p. 111 sqq.) quam maxime iustat, illud posuit

latum in Geometria sumere hand licere. Cf. Pfeiderer. de dimens. Circuli P. II. §§. 51. 52. et Rob. Simson in notis ad V. 18. Plura praeterea alia notatu dignissima contra Taqueti similesque aliorum obiectiones habet Barrow in Lection. Cantabrig. habitis 1666. Lect. VII. e quibus haec adhuc afferemus. «Nulla, inquit p. 297 sqq., definitio rei cuiusvis naturae aliter explicat, quam aliquam eius affectionem necessariam et reciprocam, id est, huic nostrae parem, assignando. Qui circulum e radiorum paritate, triangulum e trium rectarum concursu spatium includente etc. definit, quid aliud quam figurarum istarum naturam ex affectionibus quibusdam suis explicat? Nec dari aut concipi potest natura ab affectionibus eiusmodi necessariis distincta, iisve prior. Habere talem aliquam affectionem ipsa rei natura est, ei essentiale est, eam constituit. Unde qui dicit: res talem habens affectionem, eius naturam explicat. Igitur Euclides cum proportionalium affectionem necessariam exhibuerit, eius naturam, quantum fieri solet et potest, abunde declaravit et explicuit. Caeterum Euclidis reliquisque definitionum auctoribus lex iniusta et impossibilis figitur, scilicet, ut demonstrent, definitionis praedicatum subiecto convenire: non tenentur, neque possunt id demonstrare, sed gratis assumunt, hoc est, attributo proprium subiecti nomen imponunt ex arbitrato suo. Num incumbit mihi demonstrare, circuli nomen solis pares radios habentibus figuris competere? Minime vero, sed iis omnibus et solis jure meo circuli nomen adsigno. Eodem plane modo pro lubitu suo (quamvis non temere nec imprudenter, at certis de causis iustis illis et idoneis) aequalium rationum nomen attribuit *ἰσότητι* omnibus et solis dicta proprietate praeditis rationibus; proportionalium appellamentum appropriat quantis conditionem istam obtinentibus; unde propterea hoc ipsum rationum aequalium et quantorum proportionalium nomen censendum est iis omnibus et solis congruere. — *Unicum est, quod definitionis auctor ostendere tenetur (exemplis scilicet ad sensum claris aut per evidentem discursum) attributum definitionis impossibile nihil aut mere imaginarium complecti, sed revera posse res existere proprietate seu conditione supposita praeditas.* —

Cum igitur perfacile perspicueque probari possit, *adque pars* praestetur ab Euclide, ubicunque definitionem hanc applicatae materiae cuius determinatae, dari quanta, quibus *convenit* huiusce definitionis hypothesis, nihil amplius est exigendum, etque licet optimo iure quantis iis omnibus et solis proportionalium nomen affigere. — Caeterum quod, hanc proprietatem proportionalibus accidere, theorema esse dicunt, respondet, quod secundum rem ipsam omnis definitio est *theorema*, propositio scilicet demonstrabilis ex aliis subiecti definitionibus aut ex aliis reciprocis affectionibus prius attributis subiecto. Vixissim omne theorema poterit in definitionem compingi. Simili fere ratione iudicat Saccherius (Euclides ab omni *maest* vindicatus p. 125.): „Licitum est unicuique definire, prout ipsi libuerit, terminos suae facultatis, dum tamen ex *una parte* eos nunquam usurpet, nisi iuxta Definitiones iam *stabilis*, et ex altera accusari istae non possint de confusione *utrius* termini cum altero“ Cf. idem p. 125. Reapse etiam alii *hanc* negant, iure suo Euclidem definitionem magnitudinum *proportionalium* eam, quae est Def. V. 5. dare potuisse, et eam tamen intellectu difficilem, et subobscuram, et ab affectione aliqua magnitudinum proportionalium, quae minus obvia ut *petitam* esse putant, unde hanc Euclidis definitionem vel explicare, vel pariter ac Tacquetus, firmiteribus tamen argumentis nec tot propositionibus Axiomatum loco habitis ex alia facilitate earundem definitione quasi Theorema derivare studuerunt, quo facto demum secare illa uti se posse putarunt. Atque *his* ipse etiam Clavius annumerandus videtur. Quamvis *enim* ille asserat, potuisse omnino Euclidem iure suo quantitates proportionales aut non proportionales appellare, ut def. 5 et 7. stabilivit, et quamvis etiam causam, qua permotus Euclides illis definitionibus usus sit, asserat veram omnino ab incommensurabilibus petitam, addit tamen, ex definitionibus istis non videri colligi posse, *vere* magnitudines, quarum aequemultiplicam conditionem habeant, esse proportionales, vel non proportionales, etiamsi eas solum Euclides velit ita appellare. Itaque ad excusandas Euclidis definitiones haec fere habet. „Si de magnitudinibus saltim rationabilibus quaestio fuisset, potuisset

nino Euclides magnitudines proportionales eodem modo
 inire ac VII. 20. Def. numeros proportionales. Dicere
 npe poterat: Magnitudines proportionales sunt, cum pri-
 ma secundae et tertia quartae aequemultipla est, vel eadem
 partes, vel eadem partes, vel: cum prima secundam, et
 tertia quartam aequaliter continet, eandemque insuper il-
 las partem, vel eadem partes. Et simili ratione poterat
 definire magnitudines non proportionales. At quum irratio-
 nales quoque complecti vellet, iam non uti poterat hac defini-
 tione, quod in irrationalibus maior magnitudo neque multi-
 plex esse potest minoris, neque eam semel, aut aliquoties, et
 insuper aliquam eius partem aut partes continere. Iam pu-
 tat Euclidem, cum omnis proportio rationalis sive mag-
 nitudinum commensurabilium sit ut proportio numeri ad nu-
 merum, circumspexisse primum aliquid, quod certum sit
 convenire quibuslibet quatuor numeris, sive magnitudinibus
 eandem habentibus proportionem, vel non eandem, ut si
 idem illud convenire demonstratur quatuor magnitudinibus
 etiam incommensurabilibus, iure optimo magnitudines illae
 quatuor proportionales etiam dici possint, vel non proportio-
 nales, quandoquidem eandem habent proprietatem, quam quae-
 libet magnitudines commensurabiles, eandem habentes propor-
 tionem, vel non eandem, necessario habere demonstrantur.
 Primum itaque, sumtis propositionibus libri VII, quae nullo
 modo ex V. 5. Def. et V. 7 aut omnino libro V. pendent,
 ostendit: propositis quatuor numeris proportionalibus, sum-
 tisque primi ac tertii aequemultiplis iuxta quamvis multipli-
 cationem, item secundi et quarti aequemultiplis iuxta quam-
 cunque pariter multiplicationem: si multipolum primi maius sit
 multiplo secundi, fore etiam multipolum tertii maius multiplo
 quarti; et si multipolum primi aequale sit multiplo secundi,
 fore et multipolum tertii aequale multiplo quarti; si denique
 multipolum primi minus sit multiplo secundi, fore et multi-
 plum tertii minus multiplo quarti. Quod ita demonstrat.
 Sint quatuor numeri proportionales a, b, c, d . Quoniam igitur
 $a:b=c:d$, erit (VII. 13,) permutando, $a:c=b:d$. Iam, si
 summum fuerit ma , mc , erit $max=mc$ (VII. 17,) pariter-

que, si sumtum fuerit rb , rd , erit $rb:rd=b:d$, unde ex le-
mate quod Clavius habet ad VII. 13, erit $ma:mc=rb:rd$, et
permutando (VII. 13.) $ma:rb=mc:rd$, unde, si $ma>rb$,
erit $mc>rd$, quod ex VII. 20. Def. consequitur i. e. e
vulgari numerorum proportionalium Definitione consequitur
eorum proprietas, quam Euclides V. 5. Def. exprimit. Deinde
similiter demonstrat, si $a:b>c:d$, sumi posse aliquam multi-
ma, mc , et rb , rd , ita ut $ma>rb$, at non $mc>rd$, quod satis
prolixè evincit. Itaque ex vulgari numerorum non propor-
tionalium Definitione consequitur ea eorum proprietas, quam
Euclides habet 7. Def. V. Pariter deinde vice versa ostendit
e Definitionibus Euclidis 5. et 7. libri V. ad numeros appli-
catis, consequi vulgares numerorum proportionalium et non
proportionalium Definitiones. Addit deinde, in magnitudi-
bus, quae aliis incommensurabiles sint, et quae ex Def. 5, V.
proportionales sint, eam plerumque reperiri proportionem, quae
in numeris exhiberi possit, nec unquam hactenus aliquid falsi
aut absurdi ex applicatione Def. 5. et 7. ad magnitudines in-
commensurabiles deductum esse, unde colligit, generaliter recte
se habere Definitiones 5, V. et 7. V. Quae tamen argumentum
aut satis certa sit, quam maxime dubitamus. Coniectura illa potius,
satis forte probabilis, quam demonstratio mathematica fuerit.

Giordano da Bitonto explicatione saltim aliquis opus esse
putat, quo melius Definitio 5, V, quae multis obscura, et a
principio remoto petita esse visa sit, intelligi possit. Hanc au-
tem explicationem sequentibus Propositionibus Definitioni in-
praemittendis, facileque probandis exhiberi posse putat:

Prop. 1. Si duae magnitudines sint multiplae alicuius tertiae,
erunt illae aequales, si aequemultiplae illius tertiae fuerint; si
autem non aequemultiplae fuerint, ea, quae tertiam saepius
continet, maior erit.

Prop. 2. Vice versa, si duae magnitudines sint multiplae
alicuius tertiae, sintque istae magnitudines aequales, erunt il-
lius tertiae aequemultiplae; sin autem fuerint inaequales, ma-
ior saepius eandem tertiam continebit, quam minor.

Prop. 3. Si sint duae magnitudines A , B duarum C , D
aequemultiplae (v. c. $A=mC$, $B=nC$), et sint aliae duae

si autem fuerit $rd, et rB = F$, F pariter aequimultiplae earundem C, D (v. c. $E = rC$,
 aut quod Clavius habet ad VII. H. $F = rD$), erit, si $A > = < B$, etiam $B > = < F$. (i. e. si
 permittendo (VII. 13.) aut $rB = mC > = < rC$, erit etiam $mD > = < rD$).
 erit $mC > = < rD$, quod ex VII. A. de. Prop. 4. Si sint 4 magnitudines A, B, C, D , sitque pri-
 vulgari numerorum proportionalium definitio A aequimultipla aut aequesubmultipla secundae B , ac ter-
 eorum proprietates, quam Euclides VII. 13. et
 similiter demonstrat, ut $a:b::c:d$, sumantur primae et tertiae quaecunque aequimultiplae F, G ,
 $ma, mc, et rd, rd, na et md$, sumantur primae et tertiae quaecunque aequimultiplae F, G ,
 proinde erunt. Itaque ex vulgari definitio-
 nali Definitione consequitur a. s. (puta $F = pA, G = pC$), et secundae et quartae aequimultiplae
 Euclides habet 7. Def. V. Prout dicitur
 e Definitionibus Euclides 5. et 7. Def. V. Prout dicitur
 casis, consequi valentes summae pro-
 portionalium Definitiones. Adhuc
 bas, quae aliis incommensurabilibus sit,
 proportionales sint, cum plerumque expressio-
 in numeris exhiberi possit, ne quidem
 aut absurdum ex applicatione Def. 5. et 7.
 commensurabiles deducatur, cum, ut
 se habere Definitiones 5. et 7. V. (v. c. $a:b::c:d$)
 an satis certa sit, quam maxime dubium sit
 satis forte probabilis, quam demonstrari
 Quotiana da Binomo explicatur au-
 potat, quo melius Definitio 5. V. per
 principio remoto petita esse sua sit, inq-
 tem explicationem sequentibus Propositioni-
 praemittendis, facileque probando ostendit
 Prop. 1. Si duae magnitudines aequi-
 etunt inter se aequales, si aequimultiplae sint
 autem non aequimultiplae fuerint, si pri-
 continet, maior erit.
 Prop. 2. V. e. vera, si duae magnitudines
 alicuius tertiae, sitque inter magnitudines
 huius tertiae aequimultiplae: ut si $a:b::c:d$,
 ut saepius eandem tertiam continet, per
 Prop. 3. Si sint duae magnitudines
 aequimultiplae (v. c. $A = mC, B = nC$),

Similiter deinde, postquam quatuor magnitudines A, B, C, D non proportionales esse dixerat, si A aliquanto maior fuerit E magnitudine $A-E$, quae ita comparata est, ut $A-E:B=C:D$, ex hac Definitione satis profixe ostendit, consequi Conversam Def. 8, V, nempe tum esse posse aliquando $mA > pB$, quamvis non sit $mC > pD$. Sumatur nempe magnitudinis E tale multipulum mE , ut sit $mE > B$, pariterque sumatur magnitudinum $A-E$, et C aequemultiplica $m(A-E)$, mC . Pariter sumatur magnitudinis B tale multipulum pB , quod ex multis magnitudinis B primum maius sit magnitudine $m(A-E)$, nempe, ut sit quidem $pB > m(A-E)$, at $(p-1)B < m(A-E)$, vel, quod eodem redit, $m(A-E) > (p-1)B$, pariterque magnitudinis D sumatur aequemultipulum pD . Iam si addantur mE et $m(A-E)$, erit eorum summa, nempe mA (ob $mE > B$, et $m(A-E) > (p-1)B$) semper $> pB$. At, quum $A-E:B=C:D$, erit ex Galil. Prop. 1. quoties $m(A-E) < pB$, etiam $mC < pD$. Summum autem est $m(A-E) < pB$: itaque necessario $mC < pD$, quamvis sit $mA > pB$. Iaque, si quatuor magnitudines A, B, C, D non proportionales sunt, semper talia aequemultiplica primae et tertiae, pariterque aliqua aequemultiplica secundae et quartae inveniri possunt, ut sit quidem multipulum primae maius multiplo secundae, at multipulum tertiae non maius multiplo quartae, quae est Conversa 8. Def. V. seu Galil. Prop. 2.

His praemissis, iam Definit. 5, V, et 7, V. ex suis Definitionibus consequi, ita ostendit Galilaei. Si sint 4 magnitudines A, B, C, D ita comparatae, ut, quoties $mA > pB$, etiam $mC > pD$, erit $A:B=C:D$. Si enim non sit $A:B=C:D$, sit e. g. A maior ea magnitudine $A-E$, quae ita comparata est, ut sit $A-E:B=C:D$, poteruntque ex Propositione Galilaei 2 talia aequemultiplica mA, mC primae ac tertiae, pariterque aequemultiplica pB, pD secundae et quartae inveniri, ut sit quidem $mA > pB$, at non simul $mC > pD$, quod est contra hypothesin. Atque haec est Galilaei Propos. 3.

Pariter denique Definitionem 7, V. ex suis Definitionibus ita deducit Galilaei. Si sint 4 magnitudines A, B, C, D

ita comparatae, ut sit quidem $mA > pB$, at non simul $mC > pD$, erit $A : B > C : D$, vel A maior erit ea magnitudine, quae ita comparata est, ut ad B eandem rationem habeat, quam habet C ad D . Si enim A non maior est ista magnitudine, illi aut aequalis, aut minor ea erit. Si illi aequalis sit, erit ex Prop. 1. Galilaei, quoties $mA > pB$, etiam $mC > pD$, quod est contra hypothesin. Sin autem prima A minor sit ea magnitudine, quae ad secundam eandem rationem habet, quam tertia habet ad quartam, id indicio est, tertiam maiorem esse ea, quae ad quartam eandem habet rationem, quam prima ad secundam. Erit itaque aliquo $C - E$ ita comparata, ut $A : B = C - E : D$, adeoque ex Prop. 1. Galilaei, quoties $mA > pB$, erit $m(C - E) > pD$. At posuimus $mA > pB$, itaque erit $m(C - E) > pD$, unde multo magis $mC > pD$, quod est contra hypothesin. Fieri igitur nequit, ut A non maior sit ea magnitudine, quae ad B eandem rationem habet, quam C ad D ; maior itaque erit, sive erit $A : B > C : D$, quae est Propositio 4. Galilaei.

Borellus autem, de cuius dubiis contra Euclidis methodum mox videbimus, pariter ab alia magnitudinum proportionalium et non proportionalium Definitione progreditur, distinctis casibus, quibus illae magnitudines vel commensurabiles sunt, vel non. Nempe si quatuor quantitatum prima secundae, et tertia quartae aequae multiplae fuerint, vel eadem pars, vel eadem partes: quatuor quantitates vocantur proportionales commensurabiles, et proportio (ratio) commensurabilis quantitatis primae ad secundam eadem vel aequalis proportioni (rationi) quantitatis tertiae ad quartam. Sin autem quantitas prima maior (vel minor) fuerit illa quantitate, quae ad secundam eandem rationem commensurabilem habet, quam tertia habet ad quartam: vocatur ratio primae ad secundam maior (vel minor) commensurabili ratione tertiae ad quartam. Si vero quatuor quantitatum antecedentes fuerint incommensurabiles consequentibus, et ratio quantitatis primae ad secundam maior (minor) fuerit, atque ratio quantitatis tertiae ad quartam minor (maior) sit eadem tertia commensurabili ratio-

ne: vocatur ratio primae quantitatis ad secundam maior (minor) illa incommensurabili ratione, quam tertia habet ad quartam. Denique si in quatuor incommensurabilibus quantitatibus ratio primae ad secundam non fuerit maior nec minor ratione incommensurabili, quam tertia habet ad quartam: tum ratio incommensurabilis primae ad secundam eadem vocatur rationi tertiae ad quartam, et quatuor istae quantitates vocantur proportionales incommensurabiles. His deinde Definitionibus suam proportionalium theoriam superstruit, et denique ad finem libri Euclidean Definitiones ut theorematum suis deducit. Et ipse etiam Barrovi^{us} iudicat, eius methodum in se spectatam admodum pulchram et elegantem esse (III. c. p. 333 et 314.) et, si nulla daretur alia, haberi posse pro sufficiente ac satis absoluta, ac fuisse eum in sua methodo exstruenda felicior^{em} quam in Euclidean diruenda. Displicet tamen ei in Definitionibus Borelli generalis subiecti distractio, et per inferiora circuitus, quum dari possit et ab Euclide exhibetur rationum aequalium omnigenarum (ut et (inaequalium) proprietates aliqua generalis, ex qua possant universaliter definiiri. Minus placet rationum incommensurabilium negativa Definitio, et praeposterum videtur ex inaequalitate de aequalitate statuere. Omnis porro doctrina prolixior, et demonstrationes plerumque apagogicae anfractuosae videntur. Denique potissimum displicet Barrovio harum definitionum ad speciales materias applicatio. Non enim, ut apud Euclidem v. c. in 1, VI. aut 33, VI. definitionum ope statim innotescit, aut ex iis promte deducitur rerum proportionalitas, sed ex intermediis propositionibus, iisque non adeo comprehensu facilibus, et per indirectam argumentationem comprobatis demonstratur. Ad eas autem, quas contra Euclidis doctrinam Borellus affert obiectiones praeter ea, quae supra habuimus, Barrovi^{us} monet (p. 314. sequ. coll. p. 306.) obscuritatem illam, quam Euclidi obiciat, vel in re ipsa positam esse, vel ex interpretum incuria, vel e discentium culpa repetendam esse. Rem ipsam quidem habere omnino aliquam difficultatis propter asymmetriam quantorum, sic ut nemo non

arduum esse fateatur, affectionem aliquam proportionalibus aequae congruam deprehendere, definitionem aliquam cunctas rationum aequalitates complectentem exhibere. Quod et hinc pateat, quod praeclearis viris huic morbo remedium adhibere conieci haecenus acciderit, ut vel nihil praestiterint omnino sufficiens, aut viis institerint prolixioribus, nec minus impeditis, et implicitis, aut methodos saltem tradiderint culpae cuiquam graviori subditas; caeterum Euclidis verba esse clarissima, nullam in vocabulis amphibologiam, nullum a prolixitate tedium, semperque directissimum adhibere discursum, hinc tantam obscuritatem aut difficultatem subesse non posse, nisi quis arcanam, nescio quam, naturam, omni definitionem ingredientem proportionem priorem, quae certe nulla sit, somnari velit. Interpretes omnino rem omnem exemplis illustribus et apposis illustrare debere, nec eos forte ab omni culpa liberari posse. Maxime vero discentes sibi plerumque deesse. Quum enim definitionis verba clarissima sint, quotusquisque tamen sit, qui iis penitus intelligendis operam navet, qui tantam a suo stomacho patientiam impetret, ut trium lineolarum sensum accurate perpendat? Neque vero (ibid. p. 319.) Euclidem a propter definitionem suam 5. V. insufficientem iudicasse, quoniam in libro VII. adhibuerit aliam. Sibi minus probata, nedum improbata proferre abhorruisse sane ab Euclidis ingenio. Contra potius, quia septimi libri definitionem omnigenae proportionalitati deprehenderit haud competentem, solis utpote symmetrorum proportionabilibus adaptabilem, hanc vero compererit universis congruam, idcirco, dum hic loci generalem iniret analogiae tractatum, illa reiecta hanc amplexatum esse iure meritoque. Illam vero (20. Def. VII.) symmetris proportionalibus applicuisse non tam necessitatis quam commoditatis gratia, quis nonnihil ad vulgarem captum istius specialis materiae respectu faciliior ac simplicior visa fuerit. — His, quae Barrovinus habet, addi potest, multis editoribus, et praecipue Rob. Simsoni, ut supra diximus, Defin. 3, V. et 8, V. in quibus pariter de rationibus et rationum aequalitate sermo est, serius additamentum esse vi-

deri. — Denique Barrovius addit, quod Borellus criminetur, facillimam Propositionem: si quatuor magnitudines proportionales fuerint, et prima superet secundam, tertiam quoque necessario excedere quartam, e Definitione Euclidis derivari non posse, falsum omnino esse, et posse facillime illam e doctrina Euclidis demonstrari. Ipse etiam eiusmodi demonstrationem exhibet indirectam, sed perspicuam. Atque ita omnibus illis priusae aetatis objectionibus satisfactum esse videri poterat. At recentiori aetate Euclidis theoriam acerrime denuo impugnavit Thom. Simpson. (Elem. of Geometry Lond. 1800.) Is nempe, postquam ipsius Rob. Simsonis, magni illius Euclidis administratoris et propugnatoris verbis docuerat, verba, *maior, cadra sive aequalis, minor*, de magnitudinibus et rationibus diverse prorsus sensu dici, adeoque non licere Axiomata de magnitudinibus aut aequalibus aut inaequalibus proposita immediate ad rationes applicare, unde etiam ipse Rob. Simson vulgarem Propos. 10, V. demonstrationem reiiciat, addit, omnem Rob. Simsonis objectionem eo niti, quod neget, tuto sumi posse, rationem $A:C$ non posse simul maiorem ac minorem esse ratione $A:B$. At ita ex Defin. 7, V. nunquam quemquam scire, posse, an ratio $A:B$ maior aut minor sit ratione $C:D$. Nempe Euclidem dicere quidem, esse $A:B > C:D$, si acciderit unquam, ut $mA > nB$, nec tamen simul $mC > nD$. Verum enim vero, quum inter multipla tertiae et quartae pro habita sumta quaedam etiam ita comparata esse possint, ut sit $pC > qD$ ut Definitio sibi constet, demonstrandum esse, tum nunquam fieri posse, ut sit simul $pA = < qB$. Hoc enim si fieri posset, esset etiam ex Defin. 7, V. $A:B < C:D$. Usquedum igitur hoc praestetur, quod fieri posse haud negare velit, quamvis difficile ipsi videatur, nullius usus esse Definit. 7, V. et totum Euclidis aedificium theoriae [proportionum] fundamento parum valido superstructum videri. Hinc etiam ipse Propositionem 10, V; 13, V et reliqua iis, aut Definitioni 7, V. iunixa prorsus omittit. Caeterum sibi persuasum esse dicit, habuisse omnino homines ante Euclidis tempora aliquam rationum et proportionum notionem magis minus distinctam, quam Euclides

quantum expoliverit, quo facilius incommensurabilibus adaptari possit, ita vero primam et originariam huius notionis formam adeo immutatam esse, ut aliqua ingenii vi opus sit ad eam in Euclidis Definitionibus agnoscendam. Caeterum multum subtilitatis et acuminis habere hanc Euclidis theoriam, at subobscuram sibi videri, adeoque tantis laudibus offerri, ac a Rob. Simsone fiat, haud debere.

Gravia haec contra Euclidis theoriam dubia removeri tamen videntur observationibus, quibus Pfeiderer et Nordmark eam stabilire tentarunt. Prior quidem in Dissertat. Academics: Expositio ac Dilucidatio Libri V. Element. Euclid. P. 1. Tubing. 1782 (Pars II. nunquam prodit), et potissimum in Dissertatione inserta Promptuarii Mathematici Hindenburg. 7. et 8. fasciculo p. 257. sqq. et 440 sqq. ad defendendam Euclidis theoriam haec fere habet, quae, quantum fieri potest, brevissime hic sistimus.

§§. 1—8. Qui rationem duarum magnitudinum eiusdem generis A, B inter se commensurabilium indicare volunt, docent, esse magnitudinem A magnitudinis B aut aliquod multipulum, aut aliquam partem, aut aliquas partes, vel esse aut $A = mB$, aut $A = \frac{1}{n}B$, aut $A = \frac{m}{n}B$, ubi m , $\frac{1}{n}$, $\frac{m}{n}$ exponentis nomine veniunt: sin autem A et B incommensurabiles sint, docent, esse $A > \frac{r}{n}B$ et $A < \frac{r+1}{n}B$, ubi $\frac{r}{n}$ et $\frac{r+1}{n}$ limites exponentis rationis A:B vocant. Unde, si quantitates sunt commensurabiles, erit vel $A = mB$, vel $nA = B$, vel $nA = mB$; sin autem sint incommensurabiles, erit $nA > rB$; at $nA < (r+1)B$. Atque in hac ultima expressione de nulla magnitudinum divisione, sed de multiplicatione tantum i. e. repetita additione sermo est, quae simplicior est divisione. Caeterum Euclides, qui hanc ultimo loco positam expressionem adhibet, pariter ac Archimedes (de sphaera et cylindro Libr. 1. et quadrat. parabol. Praef.) tacite postulat, eiusmodi magnitudinum homogenearum minorem ita multiplicari posse, ut superet maiorem.

§§. 9–12. Duas rationes $A:B$, $C:D$ vulgo aequales dicunt, si commensurabiles sint A et B , adeoque etiam C et D , quando eundem utraque ratio exponentem habet, aut, si incommensurabiles sunt, quando utriusque exponentis intra eodem semper terminos cadit, h. e. priore casu, si $A=mB$, debet etiam esse $C=mD$; si $A=\frac{1}{n}B$ (vel, quod eodem redit, si $nA=B$) debet simul $B=\frac{1}{n}D$, vel $nB=D$; si $A=\frac{m}{n}B$ (vel $nA=mB$), debet etiam $C=\frac{m}{n}D$, vel $nC=mD$ esse: si autem incommensurabiles sint, debet pro numero quocunque n , pro quo est $A > \frac{r}{n}B < \frac{r+1}{n}B$ etiam esse $C > \frac{r}{n}D < \frac{r+1}{n}D$, vel, ut aliter dicamus: quoties $nA > rB$, at $< (r+1)B$, debet etiam esse $nC > rD$, at $< (r+1)D$, et vice versa. Euclides autem in Definitione V. 5. ad aequalitatem rationum $A:B$ et $C:D$ postulat, ut quoties $nA = mB$, sit simul $nC = mD$. Euclides itaque Definitio, quod ad quantitates commensurabiles attinet, eo quidem respectu plus continet quam altera, quam vulgarem vocabimus, quod non tantum vult, si $nA = mB$, debere etiam esse $nC = mD$, sed etiam addit, quoties $nA < mB$, debere etiam esse $nC < mD$. Id vero nihil difficultatis habet, et inservit omnibus una expressione complectendis. Contra autem (§§. 35. 36.) eos quidem casus (quum m , n propriè pro numeris unitate maioribus sumantur) non expressè habet, quibus vel $A=mB$, vel $nA=B$, tacite tamen eos complectitur. Nempe, si $A=mB$, erit simul $pA=pmB$. Ut itaque esse possit $A:B=C:D$, ex Euclidis Definitione simul esse debet $pC=pmD$, adeoque $C=mD$. Pariter, si $nA=B$, erit simul $pnA=pB$. Ut itaque esse possit $A:B=C:D$, erit ex Euclidis Definitione simul $pnC=pD$, adeoque $nC=D$. Quod vero ad quantitates incommensurabiles attinet, ut dici possit, esse $A:B=C:D$, ex Euclidis sententia, quoties $nA = mB$, esse debet simul $nC = mD$. In his autem conditionibus manifesto continentur conditiones Definitionis vulgaris, quibus, si $nA > rB < (r+1)B$, esse debet simul

$nC > rD < (r+1)D$. Nec opus est iam pro multiplo aliquo nA determinare multiplica proxime se insequentia rB , $(r+1)B$, quae ad limites rationis determinandos pertinent, atque hactenus simplicior est Euclidea ratio. Semper itaque, quae ex Euclidis Definitione proportionalia sunt, proportionalia sunt etiam ex Definitione vulgari.

Contra vero, quoties ex vulgari Definitione sit $A:B=C:D$, esse etiam aequalitatem rationum ex Euclidis Definitione, auctor, expositis §§. 14–30. antea quibusdam propositionibus facillimis, quae ad doctrinam de multiplis et aequimultiplis pertinent, et quorum pars est apud Euclidem Prop. 1, V; 2, V; 3, V, aliisque, quae hic pro Axiomatibus vel Lemmatibus sumere liceat, v. c. si $a=b$, esse $ma=mb$, et vice versa: contra, si $a > b$, esse $ma > mb$, et vice versa (cf. Axiom. ad initium libri V.) ita fere §§. 31–46. demonstrat. Ut dici possit, esse $A:B=C:D$, si magnitudines sunt commensurabiles, ex vulgari Definitione erit vel $A=mB$, et simul $C=mD$, vel $nA=B$, et simul $nC=D$; vel $mA=nB$ et simul $mC=nD$. Sit (§§. 31. 32.) 1.) $A=mB$, et $C=mD$, erit itaque, si p denotet numerum quemcunque, etiam $pA=pB$, et $pC=pD$. Itaque, quoties $pa > < qB$ (q pariter denotante numerum quemcunque) erit etiam $pmB > < qB$, adeoque $pm > < q$, unde et $pmD > < qD$ i. e. $pC > < qD$.

Sit 2.) $nA=B$, $nC=D$, erit etiam $qnA=qB$, et $qnC=qD$. Itaque, quoties $pa > < qB$, etiam $pa > < qnA$, et $p > < qn$, adeoque $pC > < qnC$ i. e. $pC > < qD$.

Denique sit 3.) $nA=mB$, et simul $nC=mD$, erit itaque, quoties $pa > < qB$, etiam $npA > < nqB$. At, quum $nA=mB$, erit pnA vel $npA=pmB$, itaque, quoties $pa > < qB$, erit $pmB > < nqB$, vel $pm > < nq$, adeoque $pmD > < nqD$. At ob $nC=mD$ (hyp.), erit $pnC=pmD$. Itaque, quoties $pa > < qB$, erit $pnC > < nqD$, vel $pC > < qD$. Quoties igitur ex vulgari Definitione duae rationes quantitatum commensurabilium aequales sunt, eadem etiam aequales sunt ex Euclidea Definitione.

Si autem (§§. 33. 34.) quantitates sint incommensurabiles, erit ex vulgari Definitione $A:B=C:D$, si quoties $nA > rB < (r+1)B$, simul etiam fuerit $nC > rD < (r+1)D$. Itaque, quoties $nA > mB$, esse debet $mB = < rB$, adeoque $m = < r$, et $mD = < rD$. Quoties igitur $nA > mB$, erit nC (quod ex hypoth. $> rD$) $> mD$. Quoties autem $nA < mB$, esse debet $mB = > (r+1)B$, adeoque $m = > r+1$, et $mD = > (r+1)D$, adeoque nC (quod ex hypoth. $< (r+1)D$) erit $< mD$. Et, quum hoc casu nunquam esse possit nec $nA = mB$, nec $nC = mD$, pariter quae ex vulgari Definitione proportionales sunt quatuor quantitates incommensurabiles, proportionales erunt etiam ex Definitione Euclidea. Omnibus itaque casibus certi esse possumus, quantitates, quas ex una Definitione proportionales esse dicimus, proportionales esse etiam ex altera Definitione diiudicatas.

Hactenus de aequalitate duarum rationum dictum est. Veniamus nunc (§§. 37—46.) ad rationes inaequales. Et hic quidem (§. 38.) distingui possunt varii casus, prout in utraque ratione quantitates sint commensurabiles; vel in utraque incommensurabiles, vel in una commensurabiles, in altera incommensurabiles. Sint itaque 1. (§. 39.) A et B pariterque C et D commensurabiles, eritque ex vulgari Definitione $A:B > C:D$, si exponens rationis $A:B$ maior est, quam exponens rationis $C:D$ et vicissim. Itaque, si $A = mB$, debet esse $C < mD$; si $A = \frac{1}{n}B$; erit $C < \frac{1}{n}D$; si $A = \frac{m}{n}B$, erit $C < \frac{m}{n}D$; vel, ut aliter dicamus, si $A = mB$, at $C < mB$; si $nA = B$, at $nC < D$; si $nA = mB$, at $nC < mD$, erit $A:B > C:D$, et vicissim. Sint deinde 2. (§. 40.) A et B commensurabiles, C et D incommensurabiles, eritque ex communi Definitione $A:B > C:D$, si $A = mB$ (ubi sumitur $m = > (r+1)$, unus nempe maiorum limitum secundae rationis), at $C > rD < (r+1)D$, adeoque $C < mD$; vel, si $nA = B$, at $nC < D$, vel si $nA = mB$ (sumto iterum $m = > (r+1)$), at $nC > rD < (r+1)D$, adeoque iterum $nC < mD$. Iam hi quidem casus, ubi in utraque,

ut in priore saltem ratione quantitates occurrunt commensurabiles, non expresse memorantur in *Euclidis* Definitione, non tamen excluduntur. Nempe (§. 44, 1) si $A = mB$, et $C < mD$, sit $C + E = mD$. Quoties igitur $C = < E$, erit $2C = < C + E$ i. e. $2C = < mD$, at $2A (= 2mB) > mB$, ubi igitur habemus aequemultipla primae et tertiae $2A$, $2C$, quorum illud maius est multiplo aliquo secundae mB , hoc vero non maius aequemultiplo quartae mD . Sin autem $C > E$, sumi potest aliquod multipulum magnitudinis E v. e. $rE > C$, vel $C < rE$, itaque $rC + C < rC + rE$ i. e. $(r+1)C < r(C+E) < rmD$: contra vero $(r+1)A > rA$ i. e. $> rmB$. Si deinde (§44, 2.) $nA = B$, at $nC < D$, nempe $D = nC + E$, erit, si $C = < E$, adeoque $nC + C < nC + E$, vel $(n+1)C = < D$, $2(n+1)C = < 2D$: at $(n+1)A < nA$ vel $> B$, adeoque $2(n+1)A > 2B$. Sin autem $C > E$, sit $C < rE$, eritque $rnC + C < rnC + rE$ i. e. $(rn+1)C < r(nC+E)$ vel $< rD$: contra autem $rnA + A$ vel $(rn+1)A > rnA$ vel $> rB$. Denique (§. 44, 3.) si $nA = mB$, at $nC < mD$, nempe $mD = ntC + E$, erit, si $C = < E$, $nC + C = < nC + E$ i. e. $< mD$: at $(n+1)A > nA$ i. e. $> mB$. Sin autem $C > E$, et sumatur $C < rE$, erit denuo $rnC + C < rnC + rE$ i. e. $(rn+1)C < r(nC+E)$ i. e. $< rmD$: at $(rn+1)A > rnA$ i. e. $> rmB$. Semper itaque habemus aliqua aequemultipla primae ac tertiae, quorum illud quidem maius est aliquo multiplo secundae, hoc vero non maius aequemultiplo quartae.

Contra vero (§. 45.) si ex *Euclidis* Definitione est $A:B > C:D$, nempe, si $pA > qB$, at $pC = < qD$, sitque $A = mB$, erit $C < mD$. Nam ob $pA > qB$, vel $pmB > qB$, erit et $pm > q$, adeoque $pmD > qD$. At $pC = < qD$, unde semper $pmD > pC$, vel $mD > C$ i. e. $C < mD$.

Pariter, si, reliquis manentibus, sit $nA = B$, erit $nC < D$. Nam ob $nA = B$, erit $qnA = qB$. At ex hypoth. $pA > qB$, itaque $pA > qnA$, et $p > qn$, adeoque $pD > qnD$. At ex hypoth. $pC = < qD$, adeoque $npC = < \left(\begin{smallmatrix} nqD \\ qnD \end{smallmatrix} \right)$

adeoque semper $pnC < pD$, et $nC < D$. Denique, si caeteris manentibus $nA = mB$, adeoque $pnA = pmB$, vel $npA = mpB$,

erit, ob $pA > qB$ (hyp.) $npA > nqB$, adeoque $mpB > nqB$, vel $mp > nq$, adeoque $mpD > nqD$. At $pC = < qD$, adeoque $mpC = < nqD$, et $npC < mpD$, et $nC < mD$. Rationes igitur huius generis, quae ex *Euclidis* Definitione inaequales sunt, inaequales etiam sunt ex communi Definitione.

Veniamus iam ad eos casus, quibus prior ratio $A:B$ habet quantitates incommensurabiles, et tum erunt vel C et D commensurabiles, vel non. Sint commensurabiles (§. 41.), eritque ex *vulgari* Definitione $A:B > C:D$, si $A > \frac{r}{n}B < \frac{r+1}{n}B$, at C vel $= \frac{r}{n}D$, vel $< \frac{r}{n}D$, adeoque, si $nA > rB$, at $nC = < rD$, et vice versa. Denique ut (§. 42.) A et B pariter ac C et D incommensurabiles, eritque ex *vulgari* Definitione $A:B > C:D$, si $A > \frac{r}{n}B < \frac{(r+1)B}{n}$, at tantum $C > \frac{(r-1)D}{n} < \frac{rD}{n}$, vel adeo $C < \frac{(r-1)D}{n}$, utque iterum, si $nA > rB$, at $nC < rD$ et vice versa.

Ex his omnibus deinde §. 46. concluditur, Definitiones, V.5. et V.7. continere conditiones et proprietates rationum inter se aequalium, aut quarum una maior est altera, quae in *vulgari* notione insunt, variosque ibi obvios casus, generalissime, et ita, ut ad paucissimos terminos omnia reducta sint.

Ex sola deinde *Euclidea* definitione rationum aequalium aut inaequalium, seposita prorsus *vulgari* notione, deducit *Pfleiderer* §§. 48. 49. 50. sive (§. 48.) magnitudines A, C ipsas cum quibusdam aequemultiplicis magnitudinum B, D . sive magnitudines ipsas B, D cum quibusdam aequemultiplicis magnitudinum A, C ; sive denique (§. 49.) quaedam aequemultiplica magnitudinum A, C cum quibusdam aliis aequemultiplicis magnitudinum B, D comparemus, esse aut 1) quosensque numeros integros, exclusa unitate, p, q denotant, semper simul $pA \geq qB$, et $pC \geq qD$, aut 2) pro nonnullis numeris integris n, m (iterum exclusa unitate) $nA > mB$, at $nC = < mD$. (Esse quidem etiam potest, ut sub finem §. 50. observatur, $nC > mD$, et $nA = < mB$, at hic casus redit ad

adeoque non erit $A:B=C:D$ (Def. 5, V.) nec β) tum esse potest $A:B<C:D$ aut $C:D>A:B$ i. e. pro nullis numeris integris p, q simul esse potest $pC>qD$, at $pA=<qB$. Nam ob $nA>mB$, at $nC=<mD$ (hyp.) est etiam $pnA>pmB$, at $pc=<pmD$, aut $pmD=>pnC$. Et si $pC>qD$, est etiam $npC>mqD$, adeoque semper $pmD>nqD$, vel $pm>nq$, adeoque et $pmB>nqB$, unde tanto magis $pnA>nqB$, adeoque $pA>qB$. Atque etiam ita *Thom. Simpson* dubia remota sunt.

Denique observat *Pfleiderer* (§§. 57–62) si sit $nA=mB$, et $nC=mD$, fore etiam $A=B$, et $C=D$, adeoque prout $pA=<qB$, i. e. prout $pA=<qA$, fore $p=<q$ adeoque $pC=<qC$ i. e. $pC=<qD$, ac proinde $A:B=C:D$, vel posse Definitionem 5, V. etiam ad aequemultiplica omnium 4 magnitudinem applicari, et nominatim (§. 60. Nr. 1.) si fuerit $A=B$, $C=D$ esse $A:B=C:D$: pariter idem valere de Defin. 7, V. Vice versa etiam, si $A:B=C:D$, esse simul $A=<B$, et $C=<D$ (vid. infra Prop.); sin autem $A:B>C:D$, esse debere $C<D$, si $A=<B$: contra vero esse debere $A>B$, si $C=>D$ fuerit.

Nordmarkius autem (in Nov. Act. reg. Societ. Upsal. Vol. VI. Upsal. 1799. Nr. XIII. Lacunae in doctrina Proportionum Euclidea animadversae expletio.) ita in hac us versatur. Postquam obiectionem a *Thom. Simpson* factam contra Defin. 7, V. attulit, fatetur omnino §. 3. illa ipsum probandi nervum huius Definitionis prorsus esse incisum, frustra ad Principium Contradictionis immediate provocari, ex rationibus ab ipso *Rob. Simson* exhibitis patere ait. Omnia autem, §. 4. addit, ex proportionum theoria omittere, quae ad rationes inter se inaequales pertineant, ut *Thom. Simson* fecerit, non sine doctrinae proportionum iactura fieri posse. Adicit praeterea §. 5 multa etiam alia esse, quae nexum inter multiplicium attributa spectent, et adhuc quaeri possint, v. c. si $mA=mB$, at $mC<mD$, an tum $A:B>C:D$. Id vero *Euclidem* omittere. Quia (§. 6.) ipsam etiam Definitionem 5, V. internae possibilitatis demonstrationem desiderare, nec satis de nexu inter aequemultiplicium proprietates cogitasse Geometras, aut certe non tacite semper loqui. Ita v. c. ipsum *Barrovium* p. 284. lac

habere: » Accidere potest in aliquo casu simultaneis iste defectus, excessus aut aequalitas etiam quantissimè proportionalibus; ast solis proportionalibus universaliter convenit. » Id autem (de aequalitate) falsum esse. Si enim vel semel simul $mA = nB$, et $mC = nD$, necessario, quoties $pA > qB$, esse etiam $pC > qD$. Pariter (§. 7.) si semper simul $mA < nB$, et $mC < nD$, fore etiam semper simul $mA = nB$ et $mC = nD$, unde prior conditio proprie sufficiat scopo Definitionis 5, V. Necesse itaque esse (§. 8.) notarum characteristicarum in Def. 5, V. et 7, V. obviarum partim per mutuum nexum absolutam necessitatem, partim compossibilitatem independentem ab ipsis Definitionibus demonstrare. Quod si non factum sit in Elementis Euclidis, id non ipsius auctoris, sed sine dubio temporis, quo plura deperdita fuerint, culpam esse. Praeterea sibi in animo esse, consensum quoque notionis vel definitionis quam vulgo de Proportionibus in Arithmeticis afferant, cum Euclidæ ex ipsis his Definitionibus ostendere. Praemittit autem §. 10. Lemma 1. supra ad 3, V. ipsis auctoris verbis allatum quod brevitatis causa ita exprimere liceat: Si sint quocunque magnitudines $A, B, C, D, \dots$ et aliae ipsis numero aequales $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \dots$ quae binæ sumantur in eadem multiplicitate, sit autem perturbata ipsarum multiplicitas h. e. sit

$$A = m B \text{ et } \gamma = m \delta$$

$$B = n C - \beta = n \gamma$$

$$C = p D - \alpha = p \beta$$

erunt ex aequo etiam aequemultiplices, sive quantiplex est A magnitudinis D, tantiplex erit α magnitudinis δ . Quod quidem Nordmarkius more Geometris solemni demonstrat, ut ad 3, V. vidimus, ex nostra autem expressione statim patet, dum tam $A = mnpD$, quam $\alpha = pm\delta = mnp\delta$. Atque hoc quidem Lemma ab Euclide praetermissum esse miratur Nordmark. quamvis cum 3, V. arcissimo vinculo coniungatur, et omnia doctrinae proportionum arcana eo referentur, praesertim, quum in Prop. 20. 21. 22. 23. l. V. semper uterque casus quantitatum ordinate et perturbate sumtarum ostensus sit. Huic addit Lemm. 2. quod ita habet: α) Si duae quantitates commensu-

sabiles sint, erit 1) aliqua unius multiplex aequalis alterius multiplici et 2) vice versa. β) Si autem duae magnitudines incommensurabiles sint, 1) non erit aliqua unius multiplex aequalis cuidam alterius multiplici et 2) vice versa. Quorum α , 1. et ope Lemm. 1. etiam α , 2. facile probatur, unde β) 1. 2. apagogice derivantur. His praemissis sequentia habet theorematum, quae primum ordine iunctim afferemus.

Theor. 1. Si vel semel acciderit, ut existens $mA = nB$, sit etiam $mC = nD$, erit $A:B = C:D$.

Theor. 2. Si, quando $mA > nB$, sit etiam semper $mC > nD$, erit $A:B = C:D$.

Theor. 3. Si, quando $mA > nB$, semper etiam sit $mC > nD$, et vicissim, quando $mC > nD$, semper etiam sit $mA > nB$, erit $A:B = C:D$.

Atque haec quidem ad ostendendum mutuum filum, qui inter multiplicium symptomata in Defn. 5, V. intercedit, nexum. Observat Nordmark. addi adhuc posse: si sit $A:B = C:D$, esse etiam $C:D = A:B$. Quamvis enim nimiam identitatis speciem prae se ferant Thesis et Hypothesis (unde etiam omiserit) adsertum tamen non constituere propositionem plane identicam, quae prae evidentia demonstrationem non admittat. Excludi enim semper debere in Propositionibus ita conversis binas adsumto contrarias hypotheses.

Theor. 5. Si acciderit aliquando, ut sit $mA = nB$, sed $mC < nD$, erit $A:B > C:D$.

Theor. 6. Si $A:B > C:D$, sitque $mA = nB$, erit $mC < nD$.

Theor. 7. Si $A:B > C:D$, sitque $mC > nD$, erit $mA > nB$.

Theor. 8. Si $A:B > C:D$, sitque $mC = nD$, erit $mA > nB$.

Atque haec quidem ad Defn. 7, V, pertinent, et nominatim Theor. 7. obiectionem Simpsonianam directe et funditus tollit. Reliqua consensum notionis vulgaris aut Arithmeticae cum Definitionibus Euclidis ostendunt.

Theor. 9. Si (ex Euclidea Definitione) sit $AF:B = CE:D$, atque B et D in aequae multas partes quotcunque, utrimque seorsum aequales, dividantur, quarum unaquaeque in B sit $= G$, et unaquaeque in D sit $= H$, adeo, ut G et H ipsas B et

D aequaliter metiantur; auferatur porro G ex AF, quoties potest, donec vel nihil, vel se minorem relinquat: dico, toties auferri posse H ex CE, quoties G ex AF; et eodem modo superesse vel nihil, vel aliquam ipsa II minorem (i. e. si quantitates AF, B, CE, D ex Euclidea Definitione proportionales sint, proportionales sunt etiam ex vulgari notione.)

Theor. 10. Est conversum praecedentis.

Theor. 11. Si fuerit $AF:B > CE:D$ (ex Euclidea Definitione); dabuntur aliquae tam parvae magnitudines G et H, quae ipsae B et D aequaliter metiuntur, ut G ablata ex AF quoties potest saepius in hac contineri deprehendatur, quam H in CE, quando nempe H ex CE auferatur, quoties potest. (Aliiter; si ex Euclidea Definitione $AF:B > CE:D$, erit etiam ex vulgari Definitione $AF:B > CE:D$).

Theor. 12. Conversum praecedentis.

Ut autem methodus viri acutissimi uno certe exemplo pateat, liceat adponere, quam Theorematis 1. dedit demonstrationem.

Theor.

Si vel semel acciderit, ut existente $mA = nB$, sit etiam $mC = nD$, erit $A:B = C:D$. (f. 336.)

Dem. Sint E, G illae ipsarum A, C aequae multiplices, et F, H illae aequemultiplices ipsarum B, D, quae faciant $E = F$, et $G = H$: sint autem I, L ipsarum A, C utcumque aequemultiplices, et similiter K, M ipsarum B, D aequemultiplices quaelibet. Hisce positis, quantiplex est M ipsius D, tantiplices sumantur N, O, P, Q ipsarum E, F, G, H: et quantiplex est H ipsius D, tantiplices sumantur R, S, T, U ipsarum I, K, L, M. Erunt ergo N, O, P, Q, ipsarum E, F, G, H aequemultiplices, et R, S, T, U ipsarum I, K, L, M. ideoque ob $E = F$, $G = H$, erit $N = O$, $P = Q$. Praeterea erunt (3, V.) N et P ipsarum A et C aequemultiplices, atque O et Q ipsarum B et D: pariterque R et T ipsarum A et C, atque S et U ipsarum B et D. Quia iam Q est ipsius H aequemultiplex ac M ipsius D, atque H ipsius D tantiplex, quantiplex est U ipsius M: erit (Lemm. 1.) Q ipsius D totiplex, quotiplex est U eiusdem D. Ergo

Q et U aequales erunt. Sed quantiplex est Q ipsius D, tantiplex est O ipsius B, et quotuplex est U ipsius D, totiplex est S ipsius B: ergo O et S sunt eiusdem B aequemultiplices, adeoque etiam aequales. Ponatur iam $I > K$; dico esse $L > M$. Quia enim R et S sunt ipsarum I et K aequemultiplices, et $I > K$: erit $R > S$, h. e. $R > O$ h. e. $R > N$. Sed utraque tam R quam N est ipsius A magis multiplex, quam N eiusdem A est. Ergo etiam T est ipsius C multiplicior, quam P eiusdem C est. Unde erit $T > P$, h. e. $T > Q$, seu $T > U$. Sed L et M sunt ipsarum T et U similes (eandem) partes: ergo etiam $L > M$.

Sit iam $I = K$, dico esse $L = M$. Etenim ob $I = K$, est $R = S$, h. e. $R = O$, seu $R = N$. Quocirca R et N sunt ipsius A aequemultiplices; ideoque etiam T et P ipsius C: unde $T = P$, h. e. $T = Q$, seu $T = U$. Ergo etiam $L = M$.

Quodai denique $I < K$, dico, esse $L < M$. Nam, ob $I < K$, erit $R < S$, h. e. $R < O$, seu $R < N$. Ergo N est ipsius A multiplicior, quam R eiusdem A est: quocirca etiam P est ipsius C multiplicior quam T eiusdem C est. Unde $P > T$, seu $T < P$, h. e. $T = Q$ vel $T < U$. Unde etiam $L < M$.

Quum itaque ostensum sit, consistente $I > = < K$, esse quoque $L > = < M$, h. e. quando $mA > = < nB$, esse simul $mC > = < nD$, erit $A:B = C:D$ q. e. d. (Aliter haec demonstratio ita sisti potest. Si $mA = nB$, et $mC = nD$, erit, quoties $pA > = < qB$, etiam $pC > = < qD$, adeoque (Def. 5, V.) $A:B = C:D$. Nam, si $mA = nB$, et $mC = nD$, erit et $mqA = nqB$, et $mqC = nqD$. Itaque, si $pA > = < qB$, erit $npA > = < \begin{pmatrix} nqB \\ mqA \end{pmatrix}$, adeoque $np > = < mq$, et $npC > = < \begin{pmatrix} mqC \\ nqD \end{pmatrix}$, adeoque $pC > = < qD$. Unde patet, hanc demonstrationem aliis verbis eandem esse, quam *Pfleiderer* dedit §. 31. Nr. 3.

His praemissis, Propositiones, quae ad theoriam Proportionum pertinent, semper eodem rigore e vulgari Proportionalium Definitione atque ex Euclidea derivari poterunt, ac demonstrationes e vulgari Definitione petitae, si iusto rigore exhibere velis, plerumque longiores sunt. (Cf. *Playfair* ad Def. 5, V.) V. c. Propositio 4, V. cuius demonstrationem Euclidean supra habuimus, e vulgari Definitione ita demon-

strabitur. Si $A:B=C:D$, erit etiam $pA:qB=pC:qD$, p et q denotantibus numeros integros quoscunque, unitate haud exclusa. Nam 1) quando commensurabiles sunt magnitudines A et B , C et D ; ob $A:B=C:D$ (supp.) ex vulgari Definitione simul erunt $A=\frac{r}{n}B$, et $C=\frac{r}{n}D$, adeoque et simul $pA=\frac{pr}{n}B$, et $pC=\frac{pr}{n}D$, et $pA=\frac{pr}{qn}.qB$, et $pC=\frac{pr}{qn}.qD$; unde ex vulgari Definitione $pA:qB=pC:qD$.

2) Quodsi magnitudines A et B , C et D sunt incommensurabiles; ex vulgari Definitione utriusque rationis Exponentes iisdem continebuntur limitibus, ita ut simul sint $A>\frac{r}{n}B$ et $<\frac{r+1}{n}B$, ac $C>\frac{r}{n}D$ et $<\frac{r+1}{n}D$, vel etiam $pA>\frac{pr}{qn}.qB$ et $<\frac{pr+1}{qn}.qB$, ac $pC>\frac{pr}{qn}.qD$ et $<\frac{pr+1}{qn}.qD$, unde etiam rationum $pA:qB$ et $pC:qD$ Exponentes iisdem respective limitibus $\frac{pr}{qn}$ et $\frac{pr+1}{qn}$ continentur (*Pfleiderer. Expos. ac Dilucid. libri V. Elem. p. 18. 19.*)

Post generales has ad librum Vtum observationes eas iam Propositiones, quas *Rob. Simson* huic libro inseruit, vel addidit, eodem ordine, eademque nota, qua ipse usus est, designatas exhibebimus. Demonstrationes tamen brevitatis causa symbolice sistemus.

Est nempe apud *Rob. Simsonem* post V. 6. haec

Propositio A.

(Haec est ea ipsa Propositio, quam *Borellus* negaverat ex Euclidea theoria demonstrari posse, et quam doctiss. *Pfleiderer*, ut supra notavimus, sponte ex *Euclidis* praeceptis fluere ostendit l. c. §. 61. et in *Expos. et Dilucid. libri V. p. 5. Prop. VI.*)

Si prima ad secundam eandem habuerit rationem, quam tertia ad quartam, fueritque prima maior secundâ, erit tertia maior quartâ; et si aequalis, aequalis; et si minor, minor.

Euclid. Element. P. II.

Z

Nempe, si $A:B=C:D$, fueritque $A>B$, erit (V. Ax. 5.) etiam $2A>2B$. Tum vero, ob $A:B=C:D$, ex V. Def. 5. est etiam $2C>2D$, adeoque pariter $C>D$.

Robert. Simson observat, Propositione hac saepissime ab Geometras, eamque in V. 25. VI. 34. XI. 34. XII. 15. adhiberi, à Theone autem eam ex Elementis sublatam esse potat, quoniam satis evidens visa sit ei, aliisque, qui confusam et indistinctam proportionalium ideam apud vulgus receptam substituant loco accuratae ideae, quas ex Definitione V. 5. habeatur. Nullum enim dubium esse, *Endoxam* vel *Euclidem*, qui hac nihilo difficiliore 7^{ma} sc. et 9^{na} huius Libri demonstratione muniverit, etiam huic in Elementis locum dedisse. *Commandinum* quidem eam ut V. 16. Cor. subiunxisse, quod vero recte *Clavius* reprehendat, quoniam ita saltem ad quatuor magnitudines eiusdem generis pertinere videretur. Neque tamen ipsum *Clavius* aliam eius demonstrationem dedisse, sed asseruisse, eam perspicuam esse ex natura proportionum. Quo ipso occasionem dederit *Borello*, *Euclidem* iniuste cavillandi.

Propositio B.

(Vulgo Corollarium V. Prop. 4. ubi vide notata.)

Si quatuor magnitudines proportionales fuerint, et inventae proportionales erunt. Si $A:B=C:D$, erit etiam Inversa: $B:A=D:C$. Sumtis enim aequemultiplis quibuscunque primae ac tertiae nA , nC , pariterque aliis aequemultiplis quibuscunque secundae et quartae rB , rD , erunt ex V. Def. 5. quoties $nA>rB$, etiam simul $nC>rD$, adeoque etiam, quoties $rB>nA$, simul $rD>nC$, unde ex V. Def. 5. est $B:A=D:C$ (vel $D:C=B:A$.)

(Cor. Hinc consequitur, si $A:C$ sit duplicata ratio rationis $A:B$, fore $C:A$ duplicatam rationis $B:A$. Erit enim (V. Def. 10.) $A:B=B:C$, adeoque ex hac Propositione $C:B=B:A$, unde $C:A$ est ratio duplicata rationis $C:B$, vel rationis $B:A$. Similia ostenduntur de triplicata ratione etc.)

Prop. C.

Si prima aequae multiplex fuerit, vel eadem pars (vel, quod addi potest, eadem partes) secundae, atque tertia quartae: erit prima ad secundam, ut tertia ad quartam: vel ut *Pfleiderer* rem exprimit (Expos. ac Dilucid. Libr. V. §. 29.) Magnitudinum A et B aequemultiplices, vel partes aequae aliquotae, vel et partes aequae aliquantae ad magnitudines ipsas A et B eadem respective habent rationes. Nempe $pA:A=pB:B$;

$$\frac{A}{q}:A=\frac{B}{q}:B; \quad \frac{pA}{q}:A=\frac{pB}{q}:B. \quad \text{Nam, cum tam } n(pA)=$$

$(np)A$, quam $n(pB)=(np)B$ (V. 3.) erit, quoties $n(pA)>=<rA$, simul $n(pB)>=<rB$, prout $np>=<r$, adeoque ex

V. Def. 5. $pA:A=pB:B$. Sit deinde $\frac{A}{q}=E$, $\frac{B}{q}=F$, adeoque

$$A=qE, \quad B=qF, \quad \text{erit per modo demonstrata } qE:E=qF:F,$$

adeoque (Prop. B) $E:qE=F:qF$, i. e. $\frac{A}{q}:A=\frac{B}{q}:B$. Deni-

que, quum sit $\frac{A}{q}:A=\frac{B}{q}:B$, erit etiam (V. 4, Cor. a.)

$$\frac{pA}{q}:A=\frac{pB}{q}:B. \quad \text{Haec Propositio, ut Rob. Simson observat,$$

saepius à Geometris usurpatur, et necessaria est in X. 5,

et X. 6. Caeterum ex ea evincitur, ut supra à *Pfleidereri*

Dissertat, Promtuarium Mathem. *Hindenburgii* inserta §§. 31. 32.

allatum fuit, quoties ex vulgari Definitione i. e. ex ea, quae

habetur in VII. Def. 20. sit $A:B=C:D$, esset etiam aequali-

tatem rationum ex altera *Euclidea* Definitione, nempe V. Def. 5.

Quod ipsum, ut supra vidimus, *Clarius* in notis post V.

Def. 8. in numeris ostendit ope quarundam Propositionum

libri VII, sc. V. Def. 5. quatenus numeris congruat, ex ea

numerorum proportionalitate, quae in VII. Def. 20. habetur,

demonstrari posse.

Prop. D.

(Conversa antecedentis.)

Si fuerit prima ad secundam, ut tertia ad quartam, fueritque prima multiplex, vel pars (vel partes) secundae:

erit tertia eadem multiplex, vel eadem pars (vel eadem partes) quartae.

Si enim $A:B=C:D$, erit etiam $A:qB=C:qD$, $mA:B=mC:D$, et $mA:qB=mC:qD$ (V. 4, et V. 4, Cor. 2.), unde ex Prop. A, si $A=qB$, erit et $C=qD$: si $mA=B$, vel $A=\frac{1}{m}B$, erit $mC=D$, vel $C=\frac{1}{m}D$: si $mA=qB$, vel $A=\frac{q}{m}B$, erit $mC=qD$, seu $C=\frac{q}{m}D$. Observat Rob. Simson,

hanc Propositionem non raro ad alias demonstrationes adhiberi, et necessariam esse ad demonstrandam VI. 9. Videntur autem à Theone omissam esse propter rationem ad Prop. A memoratam.

Prop. E.

quam habet Rob. Simson post V. Prop. 19.

Si quatuor magnitudines proportionales sint, et coarctes, do proportionales erunt, vel si $A:B=C:D$, sitque $A>B$, adeoque etiam (Prop. A.) $C>D$, erit $A:A-B=C:C-D$. Nam, quum $A:B=C:D$, erit dividendo (V. 17.) $A-B:B=C-D:D$, et invertendo (Prop. B.) $B:A-B=D:C-D$. Quare componendo (V. 18.) erit $B+A-B:A-B=D+C-D:C-D$ i. e. $A:A-B=C:C-D$.

Observ. Eandem demonstrationem habet Gregorū in nota ad nunc locum. Caeterum haec Propositio, quae cum V. 17. recto nexu cohaeret, potest etiam pariter ac illa sine opo V. 18. demonstrari (Pfleiderer. Expos. ac Dilucid. Libr. V. p. 23.)

Cor. 1. Si quatuor magnitudines A, B, C, D proportionales sunt, et $A<B$, adeoque etiam (Prop. A.) $C<D$: erit etiam inverse (Prop. B.) $B:A=D:C$, adeoque ex hac Propositione $B:B-A=D:D-C$.

Cor. 2. Generatim itaque, si duae magnitudines inaequales A et B eandem invicem habent rationem, quam aliae duae inaequales C et D: erit et maior priorum duarum ad ipsarum differentiam, uti maior duarum posteriorum ad earundem differentiam; vel etiam inverse (Prop. B.) differentia duarum

priorum ad eundem maiorem erit, ut differentia duarum posteriorum ad ipsarum maiorem. Breviter, si $A:B=C:D$, erit etiam convertendo $A:A-B=C:C-D$, seu $A-B:A=C-D:D$, vel $B:B-A=D:D-C$, seu $B-A:B=D-C:D$.

Cor. 3. Generaliusque, si duae magnitudines inaequales eandem invicem habent rationem, quam aliae duae magnitudines inaequales: etiam alterutra priorum erit ad ipsarum differentiam, uti posterior homologa, seu quae priori ordine respondet, est ad differentiam posteriorum; et inverse (V. 17. Cor. 2. et Cor. 2. E. *Pfleiderer*. l. c. p. 25.)

Sub finem libri quinti *Rob. Simson* adhuc quatuor addit Propositiones, quas nos, cum cohaereant cum aliis ad Definitionem rationis compositae pertinentibus, reiecit in Excursum ad Libr. VI. ubi de ea Definitione agitur. Plures praeterea Propositiones de rationibus inter se diversis *Euclidis* interpretes et commentatores libro quinto subiungere solent. Multas earum habet *Pappus* (*Collect. Mathem. Libr. VII. Prop. 3-11.*), quas ut Lemmata *Apollonii* libris de sectione rationis et spatii praemisit. Ex *Pappo* deinde *Campanus*, *Commandinus* (qui expresse se eas ex *Collectionibus Pappi* transferre monet, immutato tamen ordine, et quibusdam additis detractisve) *Clavius*, *Tacquetus*, *Barrovius*, *Baermannus* alique has Propositiones huc transtulere, aliasque similes adiecerunt. Plerique omnes tamen in iis demonstrandis pro Axiomate aut Postulato sumserunt, posse tribus magnitudinibus datis semper aliquam quartam proportionalem, vel duabus datis tertiam proportionalem inveniri, quod ipsum pro Axiomate summi haud licere supra ad Axiomata libri V. monuimus, ex pro lineis rectis demum in libri VI. Propositionibus 11 et 12. demonstratur. *Hauberus* autem, vir doctissimus nunc Seminarii Schönthalensis Professor in Dissertatione »Propositionum de Rationibus inter se diversis Demonstrationes ex solis libri V. Elementorum Definitionibus ac Propositionibus deductae Tubing. 1793.« sine ope illius Postulati eas demonstravit, ita ut primum Propositiones ad duas vel

plures rationes inter se diversas *universim* pertinentes stabilire. et deinde ad eos casus progredieretur, quibus omnes omnium rationum termini sunt eiusdem generis. Ita autem rem expedit *Hauberus*. Praemittit §§. 2—4. Lemmata, quorum primum cum Axiomatibus ad Librum V. supra allatis consentit. Nemp §. 2. si $A=B$, erit etiam $mA=mB$, et vice versa: contra si $A>B$, etiam $mA>mB$, et vice versa. §. 3. Si $A=B$, et $m>n$, erit $mA>nB$. Contra, si $mA>nB$, erit $m>n$, at, si $mA=mB$, erit $m=n$. §. 4. $n.(mA)=m.(nA)$. Deinde sequentes Propositiones, earumque demonstrationes exhibet, quas consentiente amicissimo auctore hic denuo sistimus.

Propositio a. (*Hauberi Prop. 1. Diss. §. 5. apud Pappum VII. 7. apud Clavius V. 26.*)

Si quatuor magnitudinum A, B, C, D prima A ad secundam B maiorem rationem habet quam tertia C ad quartam D: inverse secunda B ad primam A minorem rationem habebit, quam quarta D ad tertiam C. Breviter, si $A:B>C:D$, erit $B:A<D:C$, seu $D:C>B:A$. Demonstratio. Ob $A:B>C:D$ (supp.) sumi poterunt (V. Def. 7.) mA , mC , et nB , nD ita, ut $mA>nB$, et $mC<nD$. Quodsi fuerit $mC<nD$, vel $nD>mC$, cum sit $nB<mA$, constabit propositum ex V. Def. 7.

Sin autem sit $mC=nD$: quoniam test $mA>nB$, sit $nB+E=mA$, et 1) $E=>A$, quibus subductis, erit $nB<(m-1)A$: et, cum $nD=mC$ (supp.) $>(m-1)C$, rursus per V. Def. 7. constat propositum. Iam, si 2) sit $E<A$, sit aliquod multipulum E, velut $rE>A$ (V. Def. 4.). Tum, quia $nB+E=mA$, erit etiam (V. Ax. 1.) $r(nB+E)$ i. e. (V. 1.) $rnB+rE=rmA$, unde, demtis $rE>A$, erit $rnB<(rm-1)A$. Sed, quia $nD=mC$, erit et $rnD=rmC>(rm-1)C$. Unde ex V. Def. 7. constat propositum.

Cor. (*Hauber. §. 6. apud Clavius Schol. ad V. 26.*) Pariter, si $A:B<C:D$, erit etiam $D:C<B:A$, seu $B:A>D:C$. Tum enim est $C:D>A:B$. Omnino autem, si ea ratio, quae altera est maior, ex V. Def. 7. hac ipsa minor dicatur, facile,

plures rationes hinc et inde traduntur, ad minores applican-
tur deinde ad eos casus progreditur, si transpositis rationibus ea, quâ altera minor est, maior
rationum termini sunt eandem ponatur.

et Hauberus. Praemissa §§ 1-12

Propositio b. (Hauber §. 7.)

cum Axiomatibus ad Librum I. §. 1. Si sex magnitudinum A, B, C, D, E, F sit $A:B > C:D$,
§. 2. si $A=B$, erit etiam $C:D > E:F$, erit et $A:B > E:F$.

si $A > B$, etiam $mA > mB$, cum sit $mC < mD$; et $pC > qD$, $pE < qF$,
et $m > n$, erit $mA > nB$. Cum, itaq. Def. 7. $mA > nB$, $mC < nD$; et $pC > qD$, $pE < qF$,
et, si $mA = nB$, erit $mC < nD$. Designantibus m, n, p, q semper numeros integros: erit
sequentes Propositiones, eandem quoque (V. Ax. I.) $pmC < pnD$, $mpC > mqD$, seu $pnD =$
quam consequente unicuique pmC , $pmC > mqD$, hincque $pnD > mqD$, et $pn > mq$, ac

Propositio a. (Hauber Prop. 1. Def. 7.) proinde etiam $pnB > mqB$: cumque sit $mA > nB$, itaque et
VII. 7. apud Clavius $pmA > pnB$, erit à fortiori $pmA > mqB$, seu $mpA > mqB$, et

Si quatuor magnitudines A, B, C, D
constat propositum.

dat B magnitudinem hinc et inde

inverso secunda B ad primam A

quam quarta D ad tertiam C. Dant

B:A < D:C, seu D:C > B:A. Dant

(supp.) eandem potuerunt (V. Def. 7. sit

ut $mA > nB$, et $mC < nD$, quod

$mD > mC$, cum sit $nB < mC$, unde

Def. 7.

Sim autem sit $mC = nD$, quod

$nB + E = mA$, et 1) $E > A$, quod

$< m-1)A$: et, cum $nD = mC$ (supp.)

Vel si $A > B$, et $C = < D$, erit $A:B > C:D$, seu invetse

Prop. a.) B:A < D:C.

Demonstrationi praemissa est apud Hauberum §. 9. ea

V. Def. 7. constat propositum. In

aliquid multiplicam E, velut E > A

mus, quamque Lemma ad c. vocabimus, nempe si $A=B$,

$nB + E = mA$, erit etiam (V. Ax. I.) $C=D$, esse $A:B = C:D$. Tum vero, Hauberus ita pergit.

$nB + E = mA$, unde, dantis E > A, 1)

Sed, quia $nD = mC$, erit et $nB + E = C + E + D$, cumque sit $C + E + D > C + D$ (V. 8.) erit etiam

ex V. Def. 7. constat propositum.

A:B > C:D (V. 13.). 2) Hinc etiam, si $A > B$, $C = D$, seu

Cor. (Hauber §. 6. apud Clavius) $D = C$, et $B < A$, erit $D:C > B:A$, seu (Prop. a.) $A:B > C:D$,

Pater, si $A:B < C:D$, erit etiam $D:C > B:A$, quao est Pappi VII. 10. 3) Si $A > B$, et $C < D$, sit $A=B$

Tum enim est $C:D > A:B$ (omne est +E, $C + F = D$, erit $A:B > A:B + E$ (V. 8.) et $A:B + E = C$

aliter est maior, ex V. Def. 7. hincque

Scholion. (Hauber. §. 8.). Hanc Propositionem quidam
editores Elementorum V. 13. pro corollario subiunxe-
runt, et Clavius quidem expresse addens in Schol. ad V. 13.
eodem modo eam demonstrari posse, quo V. 13. ipsa demon-
strata sit: quod non ita se habet.

Propos. c. (Hauber. §. 10. Pfleiderer. in Promt. Mathem.
Lips. 1798. §. 60. Nr. 2.3.)

Quatuor magnitudinum A, B, C, D si $A=B$, et $C < D$,

vel si $A > B$, et $C = < D$, erit $A:B > C:D$, seu invetse

Prop. a.) B:A < D:C.

Demonstrationi praemissa est apud Hauberum §. 9. ea

Propositio, quam supra ex Promt. Lips. §. 60. Nr. 1. attuli-

mus, quamque Lemma ad c. vocabimus, nempe si $A=B$,

$C=D$, esse $A:B = C:D$. Tum vero, Hauberus ita pergit.

1) Si $A=B$, $C < D$, sit $C + E = D$; erit ex modo dictis $A:B$

$C + E + D$, cumque sit $C + E + D > C + D$ (V. 8.) erit etiam

A:B > C:D (V. 13.). 2) Hinc etiam, si $A > B$, $C = D$, seu

Cor. (Hauber §. 6. apud Clavius) $D = C$, et $B < A$, erit $D:C > B:A$, seu (Prop. a.) $A:B > C:D$,

Pater, si $A:B < C:D$, erit etiam $D:C > B:A$, quao est Pappi VII. 10. 3) Si $A > B$, et $C < D$, sit $A=B$

Tum enim est $C:D > A:B$ (omne est +E, $C + F = D$, erit $A:B > A:B + E$ (V. 8.) et $A:B + E = C$

aliter est maior, ex V. Def. 7. hincque

$\vdash F:D$ ex Lemm. ad initium Demonstrationis alleto, ac proinde $A:B > C \vdash F:D$ (V. 13.): quoniamque $C \vdash F:D > C:D$ (V. 8.): etiam $A:B > C:D$ (Prop. b.). Est haec *Pappi* VII. 11.

Prop. d. (*Hauber.* §. 11. *Pfleiderer.* in *Promt. Mathem.*

Lips. 1798, §. 62.)

Si $A:B > C:D$, erit $C < D$, si $A = B$, et erit $A > B$, si $C = D$.

Dem. 1) Si $A:B > C:D$, atque $A = B$, seu $B = A$, erit $B:B = A:B$ (V. 7. 8.) quare $B:B > C:D$ (V. 13. et Prop. b.). Sed, cum sit $B:B = D:D$ (Lemm. ad c.), erit $D:D > C:D$ (V. 13.) ac proinde $D > C$, seu $C < D$ (V. 10.).

2) Si $A:B > C:D$, atque $C = D$, erit $C:D = D:D$ (V. 7. 8.) hincque $A:B > D:D$ (V. 13. et Prop. b.). Sed quia $D:D = B:B$ (Lemm. ad c.), erit et $A:B > B:B$ (V. 13.) ac proinde $A > B$ (V. 10.).

Prop. e. (*Hauber.* §. 12.)

Si $A:B > C:D$; erit etiam $mA:mB > C:D$, et $A:B > nC:nD$, et $mA:mB > nC:nD$, ac vicissim, denotantibus m , n numeros integros quoscunque.

Dem. 1) Cum sit $mA:mB = A:B$ (V. 15.), si sit $A:B > C:D$, erit etiam $mA:mB > C:D$ (V. 13.): pariterque, si sit $mA:mB > C:D$, etiam $A:B > C:D$ (V. 13.).

2) Sic et, quum sit $nC:nD = C:D$ (V. 15.) si rursus $A:B > C:D$, erit quoque $A:B > nC:nD$ (V. 13.): si vero $A:B > nC:nD$, pariter $A:B > C:D$ (V. 13.).

3) Denique, si $A:B > C:D$, erit $mA:mB > C:D$ per modo demonstrata nr. 1. adeoque et $mA:mB > nC:nD$ per demonstrata nr. 2. Vicissim, si $mA:mB > nC:nD$, erit et $A:B > nC:nD$ (nr. 1.), atque hinc $A:B > C:D$ (nr. 2.)

Cor. 1. (*Hauber.* §. 13.) Hinc etiam, si $A:B > C:D$, erit

$$\left. \begin{array}{l} A:B \\ \frac{1}{m}A:\frac{1}{m}B \\ \frac{p}{m}A:\frac{p}{m}B \end{array} \right\} > \frac{q}{n}C:\frac{q}{n}D, \text{ atque } \frac{p}{m}A:\frac{p}{m}B > \left\{ \begin{array}{l} C:D \\ \frac{1}{n}C:\frac{1}{n}D \end{array} \right.$$

Cor. 2. (*Hauber* §. 14.). Atque etiam, si rursus $A:B > C:D$

$$\text{erit } mA:mB > \left\{ \begin{array}{cc} \frac{1}{n}C:\frac{1}{n}D & \frac{1}{m}A:\frac{1}{m}B \\ \frac{q}{n}C:\frac{q}{n}D & \frac{p}{m}A:\frac{p}{m}B \end{array} \right\} > nC:nD.$$

Prop. f. (*Hauber*. §. 15.)

Si $A:B > C:D$; erit etiam $mA:B > mC:D$, et $A:nB > C:nD$,
et $mA:nB > mC:nD$, m et n denotantibus numeros integros
quosounque.

Dem. Si ob $A:B > C:D$ (supp.) sit $pA > qB$, $pC = < qD$
(V. Def. 7.) etiam (V. Ax. 3.) erit $m.pA > mqB$; $mpC = < m.qD$,
 $n.pA > nqB$; $npC = < n.qD$,
 $mnpA > mnqB$; $mnpC = < mnqD$,

seu $p(mA) > m.qB$; $p(mC) = < m.qD$

$n.pA > q.(nB)$; $n.pC = < q(nD)$

$np(mA) > mq(nB)$; $np(mC) = < mq(nD)$,

et cum aequemultiples magnitudinum pA , pC ; qB , qD
sint ipsarum quoque magnitudinum A , C ; B , D , pariterque
aequemultiples magnitudinum $p(mA)$, $p(mC)$; $q(nB)$,
 $q(nD)$ sint ipsarum mA , mC , nB , nD aequemultiples
(V. 3.), per V. Def. 7. constat propositum.

Prop. g. (*Hauber*. §. 16.)

Vicissim, si $A:B > C:D$

seu si $mA:B > mC:D$,

erit etiam $\frac{A}{m}:\frac{B}{m} > \frac{C}{m}:\frac{D}{m}$

vel $A:nB > C:nD$

et $A:\frac{B}{n} > C:\frac{D}{n}$

vel $mA:nB > mC:nD$

et $\frac{A}{m}:\frac{B}{n} > \frac{C}{m}:\frac{D}{n}$

erit etiam $A:B > C:D$

Dem. Ob $mA:B > mC:D$, $A:nB > C:nD$, $mA:nB > mC:nD$
 (supp.), fit (V. Def. 7.) $p(mA) > qB$, $p(mC) = < qD$
 $pA > q(nB)$, $pC = < q(nD)$
 $p(mA) > q(nB)$, $p(mC) = < q(nD)$,
 sive (V. 3.) $(pm)A > qB$, $(pm)C = < qD$
 $pA > (qn)B$, $pC = < (qn)D$
 $(pm)A > (qn)B$, $(pm)C = < (qn)D$
 proinde V. Def. 7. erit $A:B > C:D$.

Cor. 1. (Hauber. §. 17.). Hinc et per Prop. f., si $A:B$

$$> C:D, \text{ erit } \frac{p}{m}A : \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{n}B \\ \frac{q}{n}B \end{array} \right\} > \frac{p}{m}C : \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{n}D \\ \frac{q}{n}D \end{array} \right\}$$

$$\text{et } \frac{1}{m}A \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{n}B \\ \frac{q}{n}B \end{array} \right\} > \frac{1}{m}C \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{n}D \\ \frac{q}{n}D \end{array} \right\}.$$

Cor. 2. (Hauber §. 18.). Itemque

$$mA : \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{n}B \\ \frac{q}{n}B \end{array} \right\} > mC : \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{n}D \\ \frac{q}{n}D \end{array} \right\} \text{ et } \frac{1}{m}A \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{n}B \\ \frac{p}{m}A \end{array} \right\} : nB > \frac{1}{m}C \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{n}D \\ \frac{p}{m}C \end{array} \right\} : nD.$$

Prop. h. (Hauber. §. 19. Pappi Prop. VII. 3. coll. VII. 4.
 apud Clavius V. 28.)

Si $A:B > C:D$, erit componendo $A+B:B > C+D:D$.

Dem. Sit $mA > nB$, $mC = < nD$ (supp. et V. Def. 7.),
 et additis mB , mD , erit $mA+mB > nB+mB$, $mC+mD = < nD+mD$, cumque

Dem. Ob $mA > nD$, (V. 1.) sit $mA + mB = m(A+B)$, $mC + mD = m(C+D)$, ac
(supp.) sit (V. Def. 7.) $nB + mB = (n+m)B$, $nD + mD = (n+m)D$, et proinde
 $m(A+B) > (n+m)B$, $m(C+D) = < (n+m)D$, per
V. Def. 7. constat propositum.

ave (V. 3.) $(pm)A > (qn)B$, $(pm)C =$

proinde V. Def. 7. ex $A:B < C:D$

Cor. 1. (Hauber. §. 12.)

$$> C:D, \text{ et } \frac{p}{q}A > \frac{p}{q}B > \frac{p}{q}C > \frac{p}{q}D$$

$$\frac{1}{m}A > \frac{1}{n}B > \frac{1}{n}C > \frac{1}{n}D$$

Cor. 2. (Hauber. §. 13.)

$$mA > nC, \text{ et } \frac{1}{m}B > \frac{1}{n}D$$

Prop. h. (Hauber. §. 13.)

Dem. Sit $mA > nB$, $mC = < nD$
et additis mB , mD , ex $mA + mB > nB + mD$, cumque

Cor. 1. (Hauber. §. 20.) Aliter haec Propositio sic exprimetur: Si differentia duarum magnitudinum ad earum minorem in maiori ratione est, quam differentia duarum aliarum ad harum minorem: etiam maior priorum ad ipsarum minorem in maiori ratione erit, quam maior posteriorum ad minorem. Nam si $A-B:B > C-D:D$, erit $A-B+B:B > C-D+D:D$ hoc est $A:B > C:D$.

Cor. 2. Hauber. §. 21.) Eodem supposito, quod in Prop. h., summa duarum priorum ad earum priorem in maiori ratione erit, quam summa posteriorum ad tertiam. Nam, si $A:B > C:D$, inverse erit (Prop. a.) $B:A < D:C$, adeoque $A+B:A < C+D:C$ (Prop. h.), seu $A:A+B < C:C+D$ (Prop. a.)

Prop. i. (Hauber. §. 22. Clav. V. 29.)

Si $A:B > C:D$, et $C > D$, ac proinde etiam $A > B$ (Prop. d.), erit etiam dividendo $A-B:B > C-D:D$, seu inverse $B:A-B < D:C-D$.

Dem. Sit $mA > nB$, $mC = < nD$ (supp. et V. Def. 7.); tum (V. Ax. 3.) quia $D < C$, erit $nD < nC$, proinde ex aequo vel a fortiori $mC < nC$, itaque $m < n$, et $nB > mB$, $nD > mD$. Iam, demtis mB , mD , erit $mA - mB > nB - mB$, $mC - mD = < nD - mD$, cumque

per V. 5. $mA - mB = m(A-B)$, $mC - mD = m(C-D)$

ac per V. 6. $nB - mB = (n-m)B$, $nD - mD = (n-m)D$:

erit $m(A-B) > (n-m)B$, $m(C-D) = < (n-m)D$.

Quodsi $n-m$, qui est numerus integer, sit > 1 , propositum constat ex V. Def. 7. si vero $n-m=1$, erit $2m(A-B) > 2B$, $2m(C-D) = < 2D$, quoniamque aequemultiplices magnitudinum $m(A-B)$, $m(C-D)$ sunt ipsarum $A-B$, $C-D$ aequemultiplices (V. 5.), rursus per V. Def. 7. constat propositum.

Coroll. (Hauber. §. 23.) Quod quidem sic quoque exprimi potest: Si summa duarum magnitudinum ad earum alteram maiorem rationem habet, quam summa duarum aliarum ad harum alteram; ad eam priorum, quae terminum consequentem rationis maioris constituit, etiam altera ipsarum maiorem rationem habebit, quam altera posteriorum ad eam harum, quae est terminus consequens rationis minoris. Quippe

$$\text{si } A+B:B > C+D:D;$$

$$\text{et } A+B-B:B > C+D-D:D$$

$$\text{i. e. } A:B > C:D.$$

Prop. k. (Hauber. §. 24. Pappi VII. 6. Clav. V. 30.)

Si $A:B > C:D$, et $C > D$, ac proinde (Prop. d.) $A > E$, erit convertendo $A:A-B < C:C-D$, seu inverse $A-B:A > C-D:C$.

Dem. Ob $A:B > C:D$ (supp.), erit dividendo (Prop. i.) $A-B:B > C-D:D$, ac proinde $A-B+B:A-B < C-D+D:C-D$ (Prop. h. Cor. 2.) i. e. $A:A-B < C:C-D$, seu

$$A-B:A > C-D:C \text{ (Prop. a.)}.$$

Cor. 1. (Hauber. §. 25.) Sive etiam: si summa duarum magnitudinum ad earum unam maiorem rationem habet, quam summa duarum aliarum ad harum unam; summa priorum ad earum alteram minorem rationem habebit, quam summa posteriorum ad harum alteram. Etenim, si

$$A+B:B > C+D:D$$

$$\text{erit } A+B:A+B-B < C+D:C+D-D$$

$$\text{i. e. } A+B:A < C+D:C.$$

Quod etiam consequitur ex Prop. i. Cor. et Prop. h. Cor. 2.

Cor. 2. (Hauber. §. 26.) Generatim, si quatuor magnitudinum, quarum prior ad secundam maiorem rationem habet, quam tertia ad quartam, tertia maior fuerit quam quarta, adeoque (Prop. d.) etiam prima maior quam secunda; differentia priorum ad earum alterutram maiorem rationem habebit, quam differentia posteriorum ad harum alterutram, quae nimirum ei, quae in maiori ratione assumpta erat, ordine respondet.

Cor. 2. (Hauber. §. 26.) Quod si summa duarum magnitudinum ad eam minorem habet rationem maiorem, quam maiorem rationem hanc, quam differentia duarum aliarum ad harum minorem, priorum ad harum alteram: id est, si quoque differentia ad earum maiorem in maiori ratione erit quoniam rationis maiorem habebit, quam differentia posteriorum ad ipsarum maiorem.

Si enim $A-B:B > C-D:D$
erit $A-B:A-B+B > C-D:C-D+D$ (Prop. h. Cor. 2.)
i. e. $A-B:A > C-D:C$.

ut $A+B:B > C+D:D$.

et $A+D-B:B > C+D-D:D$

i. e. $A:B > C:D$.

Quod etiam consequitur ex Prop. h. Cor. 1. et Prop. k.

Prop. l. (Hauber. §. 28.)

Prop. k. (Hauber. §. 27.)

Si $A:B > C:D$, et $C:D > E:F$,
conferendo $A:A-B < C:C-D$, et
 $C-D:C$.

Si $A:B > C:D$, et $B > A$ adeoque (Prop. d.) $D > C$, erit

$$\frac{A}{B} : \frac{B-A}{D} > \frac{C}{D} : \frac{D-C}{D} \text{ et inverse.}$$

Dem. Cum sit $A:B > C:D$ (supp.), seu

$$D:C > B:A \text{ (Prop. a.) et } B > A \text{ (supp.)}$$

dividendo erit $D-C:C > B-A:A$ (Prop. i.), atque etiam

$$D-C:D > B-A:B \text{ (Prop. k.)}$$

unde pariter (Prop. a.) $A:B-A > C:D-C$

$$\text{et } B:B-A > D:D-C.$$

Dem. Ob $A:B > C:D$ (supp.)
 $A-B:B > C-D:D$, et proinde
(Prop. h. Cor. 2.) i. e. $A-B < C$
 $A-B:A > C-D:C$ (Prop. l.)

Cor. 1. (Hauber. §. 25.)

Si summa duarum magnitudinum ad earum minorem habet rationem maiorem, quam summa duarum aliarum ad harum alteram minorem rationem habebit, quam differentia posteriorum ad harum alteram.

$$A+B:B > C+D:D$$

$$\text{erit } A+B:A+B-B < C+D-D$$

$$\text{i. e. } A+B:A < C+D:D$$

Quod etiam consequitur ex Prop. l.

Cor. 2. (Hauber. §. 26.) Quod si summa duarum magnitudinum, quarum prior ad earum minorem habet rationem maiorem, quam tertia ad quartam, tunc summa priorum ad earum alteram minorem habebit, quam differentia posteriorum ad ipsarum minorem ei, quae in maiori ratione est, respondet.

Cor. 1. (Hauber. §. 29.) Si duarum magnitudinum differentia ad earum maiorem in maiori ratione est, quam duarum aliarum differentia ad harum maiorem: priorum quoque maior ad ipsarum minorem in maiori ratione erit, quam posteriorum maior ad harum minorem. Nam, si

$$A-B:A > C-D:C$$

$$\text{est } A:A-(A-B) > C:C-(C-D) \text{ Prop. l.}$$

$$\text{i. e. } A:B > C:D.$$

Cor. 2. (Hauber. §. 30.) Item, eodem supposito, quod in Cor. praeced. pariter differentia priorum ad ipsarum minorem in maiori ratione erit, quam differentia posteriorum ad harum minorem. Si enim

$$A-B:A > C-D:C$$

$$\text{est } A-B:A-(A-B) > C-D:C-(C-D) \text{ Prop. l.}$$

$$\text{i. e. } A-B:B > C-D:D$$

quod et consequitur ex Cor. 1. et Prop. i.

Prop. m. (Hamb. §. 31. Clav. V. 31. cum Schol.)

Si vel $A:B=D:E$ vel $A:B>D:E$ vel tam $A:B>D:E$
 et $B:C>E:F$ et $B:C=E:F$ quam $B:C>E:F$

ex aequo etiam erit $A:C>D:F$

Dem. 1) Si $A:B=D:E$ et $B:C>E:F$, sit $mB>nC$,
 $mE=<nF$ (V. Def. 7.). Tnm, quia $nC<mB$ erit
 $A:nC>A:mB$ (V. 8.), et, cum ob $A:B=D:E$ (supp.) sit
 $A:mB=D:mE$ (V. 4.), etiam $A:nC>D:mE$ (V. 13.), quoniamque
 $mE=<nF$, erit et $D:mE=<D:nF$ (V. 7. 8.), ac proinde
 $A:nC>D:nF$ (V. 13. et Prop. b.), itaque $A:C>D:F$ (Prop. c.).

2) Si $A:B>D:E$, et $B:C=E:F$, inverse (V. 4. et Prop. a.)
 erit $C:B=F:E$

et $B:A<E:D$

igitur ex aequo per demonstrata nr. 1. $C:A<F:D$ seu inverse
 (Prop. a.) $A:C>D:F$.

3) Si tam $A:B>D:E$, quam $B:C>E:F$, sit $mA>nB$,
 $ml=<nE$, et $pB>qC$, $pE=<qF$ (V. Def. 7.) erit et
 $pmA>pnB$, $pmD=<pnE$, $npB>nqC$, $npE=<nqF$
 seu $pmA>pnB$, et $pnB>nqC$, pariterque
 $pmD=<pnE$, et $pnE=<nqF$: itaque hinc $pmA>nqC$,
 $pmD=<nqF$. Quare, cum aequomultiplices magnitudinum
 mA , mD , qC , qF sint ipsarum etiam A , D , C , F aequo-
 multiplices (V. 3.), propositum per V. Def. 7. constat.

(Hinc sequens deduci potest Corollarium: Rationum inter
 se diversarum duplicatae (triplicatae etc.) etiam inter se di-
 versae sunt, et maioris quidem maior. Nempe, sit v. gr.
 $A:B>B:C$, et $P:Q=Q:R$, sitque $A:B>P:Q$, et $mA>nB$,
 $mP=<nQ$. Iam, quoties $mA>nB$, erit et $mB>nC$,
 et quoties $mP=<nQ$, erit et $mQ=<nR$ (V. Def. 7.)
 itaque erunt simul $mB>nC$, et $mQ=<nR$, adeo-
 que (V. Def. 7.) $B:C>Q:R$, unde ex hac Propositione m.
 erit $A:C>P:R$. Cf. observ. ad V. Def. 10. 11. Atque hinc
 porro facile coll. Cor. ad V. 22. per indirectum demonstrabitur,
 rationum earundem inter se subduplicatas (subtriplicatas etc.)
 pariter inter se esse easdem, diversarum diversas.)

Prop. m. (Hauber. §. 32. Clav. V. 32. cum Schol.)
 Si vel $A:B=D:E$ vel $A:B=E:F$, vel $A:B=E:F$, vel $A:B>E:F$, vel tam $A:B>E:F$
 et $B:C>D:E$ et $B:C=D:E$ et $B:C=D:E$ quam $B:C>D:E$

et aequo cum sit $A:C>D:F$ erit etiam *ex aequo perturbate* $A:C>D:F$.

Dem. 1) Si $A:B=D:E$ et $B:C>D:E$ sit $mB>nC$, $mD=mE<nF$ (V. Def. 7. Im. p. nE (V. Def. 7.), et erit $nE:mF=>mD:mF$ (V. 7 et 8.) $A:C>D:F$ (V. 3.), et $nB>nC$, quia ob $A:B=E:F$ (supp.) etiam $nA:mB=nE:mF$ (V. 4.), $A:mB=D:nE$ (V. 4.) cum sit $nB>nC$ et $nA:mB=>mD:mF$ (V. 11. 13.). Sed, cum sit $mE<nF$, sit et $D:nE<nB>nC$, est $nA:nC>mD:mF$ (V. 13. et Prop. b.), unde $A:C>D:F$ (V. 13. et Prop. a.) $A:C>D:F$ (Prop. e.).

2) Si $A:B>E:F$, et $B:C=D:E$, erit inverse
 $C:B=E:D$ (V. Cor. 4. vel Prop. B.)
 et $B:A<F:E$ (Prop. a.)

igitur ex aequo per demonstrata nr. 1. $C:A<F:D$; seu inverse $A:C>D:F$ (Prop. a.) $A:C>D:F$ (Prop. a.)

3) Si tam $A:B>E:F$, et $B:C>D:E$, sit $mA>nB$, $mE<nF$, $mD=<nF$, et $pB>qC$, $pD=<qE$ (V. Def. 7.), igitur et $pmA>pnB$, $pmA>pnB$, $pmD=<pnE$, seu $pnB>nqC$, pariterque $qmE=<qnF$, mpD seu $pmA>pnB$, et $pmD=<pnE$, seu $pmD=<mqE$ seu qmE , atque hinc $pmA>nqC$, $pmD=<pnE$, et $pmE=<qnF$, et, quoniam magnitudinum mA , mD ; qC , qF aequales $pmD=<qnF$. Quare, cum aequales multiplices ipsarum quoque A , D ; C , F sunt (V. 3.), erit mA , mD , qC , qF ut paria sunt per V. Defin. 7. $A:C>D:F$.

multiplices (V. 3.), propositum patet.

(Hinc sequens debet potius considerari de diversorum duplicatae (multiples et veritas sunt, et maiori quidem maiore $A:B=B:C$, et $pB>qC$, quae sit)

$mpF=<nQ$. Im. quoniam sit, et Prop. h.) et, cum sit $A:B=C:D$ (supp.), ex aequo etiam et quoniam $mpF=<nQ$, sit et $mpF=<nQ$ (Prop. m.) $A+E:B>C+F:D$.

Itaque erant simul $mB>nC$, et $pE>qB$, $pF=<qD$, erit etiam $pmA>pnB$, quae (V. Def. 7.) $EC>QB$, et $pE>qB$, $pF=<qD$, erit etiam $pmA>pnB$, erit $A:C>P:R$. Cl. observ. ad V. Def. 7. $pmC=<pnD$, et mpE , seu $pmE>mqB$, mpF seu porro facile coll. Cor. ad V. 3. $pmF=<mqD$, ergo etiam $pmA+pmE>pnB+mqB$, tam rationem eorundem inter $pmC+pmF=<pnD+mqD$, seu (V. 3., V. 1., V. 2.) paria inter se esse ostendit, divisa de

Prop. o. (Hauber. §. 33.)

Si $A:B=>C:D$, et $E:B>F:D$, erit $A+E:B>C+F:D$.

Dem. 1) Si $A:B=C:D$ et $E:B>F:D$, sive inverse
 $B:E<D:F$ (Prop. a.), ex aequo erit (Prop. m.)
 $A:E<C:F$, itaque $A+E:A>C+F:C$ (Cor.

Prop. h.) et, cum sit $A:B=C:D$ (supp.), ex aequo etiam et quoniam $A+E:A>C+F:C$ (Prop. m.) $A+E:B>C+F:D$.

2) Si $A:B>C:D$, et $E:B>F:D$, sit $mA>nB$, $mC=<nD$, quae (V. Def. 7.) $EC>QB$, et $pE>qB$, $pF=<qD$, erit etiam $pmA>pnB$, erit $A:C>P:R$. Cl. observ. ad V. Def. 7. $pmC=<pnD$, et mpE , seu $pmE>mqB$, mpF seu porro facile coll. Cor. ad V. 3. $pmF=<mqD$, ergo etiam $pmA+pmE>pnB+mqB$, tam rationem eorundem inter $pmC+pmF=<pnD+mqD$, seu (V. 3., V. 1., V. 2.) paria inter se esse ostendit, divisa de

$pm(A+E) > (pn+mq)B$, pariterque
 $pm(C+F) = < (pn+mq)D$, unde et
 $A+E:B > C+F:D$ per V. Def. 7.

Corol'. (Hauber. §. 34.) Sive etiam, si

$$A:B = > C:D$$

$$\text{et } E-A:B > F-C:D$$

$$\text{erit } A+E-A:B > C+F-C:D$$

$$\text{i. e. } E:B > F:D.$$

Prop. p. (Hauber. §. 35.)

Si $A:B = < C:D$, et $E:B > F:D$, erit $C > F$, si $A > E$,
 $A < E$, si $C < F$.

Dem. Nam, ob $A:B = < C:D$, et $E:B > F:D$ (supp.)

$$B:E < D:F \text{ (Prop. a.)}$$

erit etiam ex aequo $A:E < C:F$ (Prop. m.)

$$\text{seu } E:A > F:C \text{ (Prop. a.)}$$

unde per Prop. d. constat propositum.

Prop. q. (Hauber. §. 36.)

Si $A:B = < C:D$, et $E:B > F:D$, erit

$A-E:B < C-F:D$, si $B > E$, ac proinde (Prop. p.) $C > F$,
 sed $E-A:B > F-C:D$, si $C < F$ $A < E$

Dem. 1) Si est $A:B = < C:D$, et $E:B > F:D$, et $A > E$

$$\text{inverse erit } B:E < D:F \text{ (Prop. a.)}$$

igitur ex aequo $A:E < C:F$ (Prop. m.)

$$\text{et quia } A > E, A-E:A < C-F:C \text{ (Prop. k.)}$$

$$\text{quoniamque } A:B = < C:D \text{ (supp.)}$$

$$\text{etiam ex aequo } A-E:B < C-F:D \text{ (Prop. m.)}$$

2) Si est $E:B > F:D$, et $A:B = < C:D$, atque $D < C$,
 erit inverse $B:A = > D:C$ (Prop. B et a.)

quare ex aequo $E:A > F:C$ (Prop. m.),

$$\text{et hinc } E-A:E > F-C:F \text{ (Prop. i.) quia } C < F,$$

$$\text{cumque sit } E:B > F:D \text{ (supp.)}$$

$$\text{ex aequo etiam } D-A:B = F-C:D \text{ (Prop. m.)}$$

Cor. 1. (*Hauber. §. 37.*) Quod quidem etiam sic exprimi potest

Si est $A + E : B = C + F : D$

et $A : B > C : D$

erit et $E : B < F : D$.

Sed, si $A : B = C : D$

et $A + E : B > C + F : D$

erit et $E : B > F : D$.

Cor. 2. (*Hauber. §. 38.*) Hinc etiam, si

$A - E : B < C - F : D$

et $A : B = C : D$

erit $A - (A - E) : B < C - (C - F) : D$ (Prop. q. nr. 1.)

seu $E : B < F : D$.

Et, si $A : B > C : D$

atque $A - E : B = C - F : D$

erit $A - (A - E) : B > C - (C - F) : D$ (Prop. q. nr. 2.)

hoc est $E : B > F : D$.

Prop. r. (*Hauber. §. 39.*)

Si $A : B > C : D$, tum si $C > D$, ergo et (Prop. d.) $A > B$, erit
 $A + B : A - B < C + D : C - D$; et, si $A < B$, ergo et (Prop. d.)
 $C < D$, erit $A + B : B - A > C + D : D - C$.

Dem. Ob $A : B > C : D$ (supp.)

1) erit $A + B : A < C + D : C$ (Cor. 2. Prop. h.)

et, si $C > D$, convertendo $A : A - B < C : C - D$ (Prop. k.)

quare ex aequo $A + B : A - B < C + D : C - D$ (Prop. m.)

2) erit quoque $A + B : B > C + D : D$ (Prop. h.),

et, si $A < B$, $B : B - A > D : D - C$ (Prop. l.)

unde rursus ex aequo $A + B : B - A > C + D : D - C$ (Prop. m.)

Prop. s. (*Hauber. §. 40.*)

Vicissim, si $A + B : A - B > C + D : C - D$

erit $A : B < C : D$

Dem. Nam, ob $A+B:A-B < C+D:C-D$ (supp.)
 est $A+B+A-B:A+B-(A-B) < C+D+C-D:C+D-(C-D)$ (Prop. r.) hoc est $2A:2B < 2C:2D$
 et proinde $A:B < C:D$ (Prop. e.)

Et hactenus quidem de magnitudinibus universim sermone fuit, sive ea, quae ad duas diversas rationes pertinent, inter se eiusdem, sive diversi generis fuerint. Iam vero transiit auctor ad magnitudines *homogeneas*.

Prop. t. (Hauber. §. 41.) Conf. Prop. c.

Si quatuor homogenearum magnitudinum A, B, C, D sit $A=C$, et $B < D$, vel, si $A > C$, et $B = C$, erit $A:B > C:D$.

Dem. 1) Si $A=C$, et $B > D$,
 erit $A:B > A:D$ (V. 8.)
 et $A:D = C:D$ (V. 7.)

ac proinde $A:B > C:D$ (V. 13.)

2) Si $A > C$, et $B = C$,
 erit $A:B > C:D$ (V. 8.)
 et $C:B = C:D$ (V. 7. 8.)

itaque et $A:B > C:D$ (V. 13. et Prop. b.)

Prop. u. (Hauber. §. 42.)

Vicissim, si $A:B > C:D$, erit $B < D$, si $A = C$, et $A < C$, si $B = D$.

Dem 1) Si $A = C$, erit
 $C:B = A:B$ (V. 7. 8.)

et cum sit $A:B > C:D$ (supp.)
 etiam $C:B > C:D$ (V. 13 et Prop. b.)
 proindeque $B < D$ (V. 10.)

2) Si $B = D$, erit $C:D = C:B$ (V. 7. 8.)
 quare, cum sit $A:B > C:D$ (supp.)

erit et $A:B > C:B$ (V. 13 et Prop. b.)
 itaque $A > C$ (V. 10.)

Prop. v. (Hauber. §. 43. Pappi VII. Prop. 5. apud Clav. V. 27.)

Si $A:B > C:D$, erit et alterne $A:C > B:D$, seu inverse
 $C:A = D:B$.

Dem. Sit $mA > nB$, et $mC \leq nD$ (supp. et V. Def. 7.)

erit igitur $mA:mC > nB:nD$ (Prop. t.)

et hinc $A:C > B:D$ (Prop. e.)

Prop. w. (Hauber. §. 44.)

Si $A:B > C:D$, erit $A+E:C+D \begin{cases} > B:D \\ < A:C \end{cases}$

Dem. Ob $A:B > C:D$ (supp.) erit

1) componendo $A+B:B > C+D:D$ (Prop. h.)

et alterne $A+B:C+D > B:D$ (Prop. v.)

2) erit etiam $A+B:A < C+D:C$ (Cor. 2. Prop. h.)

et rursus alterne $A+B:C+D < A:C$ (Prop. v.)

Cor. 1. (Hauber. §. 45. Pappi VII. 8.) Pariter, si $A:B > C:D$,

erit et $A+C:B+D \begin{cases} > C:D \\ < A:B \end{cases}$. Nam, ob $A:B > C:D$ (supp.)

erit alterne $A:C > B:D$ (Prop. v.) et hinc

$A+C:B+D \begin{cases} > C:D \\ < A:B \end{cases}$ (Prop. w.)

Cor. 2. Inaequalium duarum magnitudinum maior ad minorem in maiori ratione est, quam summa maioris et cuiuscunque tertiae ad summam minoris et eiusdem tertiae.

Nam, si $A > B$, est $A:C > B:C$ (V. 8.), ideoque

$A+C:B+C < A:B$ (Prop. w.), seu $A:B > A+C:B+C$.

Prop. x. (Hauber. §. 47.)

Si $A:B > C:D$, et $C > D$, itaque (Prop. d.) $A > B$, erit

$A-B:C-D > \begin{cases} A:C \\ B:D \end{cases}$; sed si $B > A$, adeoque (Prop. d.)

$D > C$, erit $B-A:D-C < \begin{cases} A:C \\ B:D \end{cases}$.

Dem. Propter $A:B > C:D$ (supp.)

1) si $C > D$, erit $A-B:A > C-D:C$ (Prop. k.)

et $A-B:B > C-D:D$ (Prop. i.)

proinde etiam alterne $A-B:C-D > A:C$

et $A-B:C-D > B:D$ (Prop. v.)

2) si $B > A$, erit $B-A:A < D-C:C$

pariterque $A-A:B < D-C:D$ (Prop. l.)

unde iterum alterne $B-A:D-C < A:C$

et $B-A:D-C < B:D$ (Prop. v.)

Cor. 1. (Hauber. §. 48. Pappi VII. 9. Clav. V. 33.) Si $A-B > C:D$, et fuerit $B > D$, adeoque (Prop. u.) $A > C$, erit $A-C$

$B-D > \begin{cases} A:B \\ C:D \end{cases}$; sin autem $A < C$, ac proinde (Prop. u.) $B < D$,

erit $C-A:D-B < \begin{cases} A:B \\ C:D \end{cases}$

Nam, ob $A:B > C:D$ (supp.), erit alterne (Prop. o.)

$A:C > B:D$, atque hinc, si $B > D$, erit

$A-C:B-D > \begin{cases} A:B \\ C:D \end{cases}$; sin autem $A < C$,

$C-A:D-B < \begin{cases} A:B \\ C:D \end{cases}$ Prop. x.

Cor. 2. Inaequalium duarum magnitudinum maior ad minorem in minori ratione est, quam excessus maioris super tertiam quamcunque ad excessum minoris super eandem, minorem nimirum ambabus; in maiori vero, quam excessus tenere cuiuscunque, quae sit ambabus maior, super maiorem, ad excessum eiusdem super minorem.

Etenim, si $A > B$, est $A:C > B:C$ (V. 8.)

et proinde $A-C:B-C > A:B$, si $C < B$

et $C-A:C-B < A:B$, si $C > A$ (Prop. x.)

sen $A:B \begin{cases} < A-C:B-C \\ > C-A:C-B \end{cases}$

Prop. y. (Hauber. §. 50. Clav. V. 34.)

Si $A:B > C:D$, et $C:D > E:F$ etc. erit summa omnium priorum $A+C+E+$ etc. ad summam omnium posteriorum $B+D+F+$ etc. in maiori ratione, quam postrema E priorum ad postremam F posteriorum; in minori autem, quam prima A priorum ad primam B posteriorum; et denique in maiori quam summa priorum $C+E+$ etc. omnium excepta prima A ,

ad summam posteriorum $D+F$ etc. omnium, excepta ha-
curn prima B.

Dem. Ob $A:B > C:D$ (supp.)

est $A+C:B+D > C:D$ et $\angle A:B$ (Cor. 1. Prop. v.)

Quoniam autem $C:D > E:F$ (supp.), erit etiam

$A+C:B+D > E:F$ (Prop. b.)

atque hinc $A+C+E:B+D+F > E:F$, sed $\angle A+C:B+D$
(Cor. 1. Pr. f.) Unde porro ob $A+C:B+D < A:B$ per demou-

strata erit $A+C+E:B+D+F < A:B$ (Prop. b.)

atque hinc $A+C+E:B+D+F > C+E:D+F$

(Cor. 1. Prop.)

Prop. z. (Hauber. §. 51.)

Si $A:B > C:D$, et $B > D$, pariterque $C > D$, et proinde
(Prop. d. et Prop. u.) etiam $A > B$, et $A > C$: summa maxi-
mae et minimae $A+D$ maior est, quam summa duarum reli-
quarum $B+C$.

Dem. Ob $A:B > C:D$, et $C > D$ (supp.)

dividendo est $A-B:B > C-D:D$ (Prop. i.)

quoniamque $B > D$ (supp.) etiam $A-B > C-D$ (Prop. u.)

et, addito utrimque $B+D$

$A+D > B+C$.

Prop. a. (Hauber. §. 52. Pappi VII. 16.)

Si sint quatuor numeri vel lineae A, B, C, D, ita, ut
 $A:B > C:D$; erit productum vel rectangulum extremorum ma-
ius, quam productum aut rectangulum mediorum, et vicis-
sim. (Hanc Propositionem, quamvis iam supponat Proposi-
tiones aliquas libri VI. vel VII., quae tamen independentes
ab ea demonstrantur, propter nexum cum praecedentibus, no-
luimus à reliquis Hauberianis saeparare, et suo demum loco
ponere, cui facile eam restituet lector intelligens).

Dem. 1) Quoniam $A:B > C:D$ (supp.)

et $A:B = A \times C : B \times C$ (VII. 17. VII. 18. VI. 1.)

erit etiam $A \times C : B \times C > C:D$ (V. 13.)

et quia rursus $C:D = A \times C : A \times D$ (VII. 17. VII. 18. VI. 1.)

etiam $A \times C : B \times C > A \times C : A \times D$ (V. 13.)

et hinc $B \times C < A \times D$ (V. 10.) seu

$$A \times D > B \times C.$$

2) Si $A \times D > B \times C$, pariter erit

$$A \times C : B \times C > A \times C : A \times D \text{ (V. 8.)}$$

et ob $A \times C : B \times C = A : B$ (VII. 17. VII. 18. VI. 1.)

$$A : B > A \times C : A \times D \text{ (V. 13.):}$$

et, quia rursus $A \times C : A + D = C : D$ (VII. 17. VII. 18. VI. 1.)

$$\text{pariter } A : B > C : D \text{ (V. 13.)}$$

Cor. (Hauber. §. 53.). Proinde, si $A : B > B : C$, designantibus rursus A, B, C numeros, vel lineas,

est $A \times C > B^2$, vel B^2 , et vicissim.

EXCURSUS
AD
ELEMENTORUM

L. VI. et maxime ad VI. Def. 5.

§. 1. *H*_{æc} Definitio in Editione *Oxonienſi* ita habet:
Λόγος ἐκ λόγων συγχεῖσθαι, ὅταν αἱ τῶν λόγων πηλικότητες ἐφ'
ἑαυτὰς πολλὰ πλασιασθεῖσαι ποιῶσι τινά. Editio *Basileensis*
legit: τινάς. Theon seculi post C. N. quarti scriptor in Com-
mentar. in *Ptolomæi* *Almagestum* (*Πτολεμαίου μεγάλης συν-*
ταξεως βιβλ. ιγ. Θεωνος Ἀλέξανδρείως εἰς τὰ αὐτὰ ὑπομνημάτων
βιβλ. ια. Basil. 1538 p. 61. post ambiguum illud et vagum
τινά addit πηλικότητα λόγου. Et Scholion Anonymi in Edit.
Elementor. *Basileensi* p. 67. pro τινά substituit λόγόν. *Euto-*
cius in locum *Archimedis* (*Ἀρχιμήδους τὰ σωζόμενα, μετὰ*
τῶν Εὐτοκίου Ἀσκαλωνίτου ὑπομνημάτων iisdem verbis hanc
Definitionem habet, ut nunc legitur in Edit. Oxon. Plerique
Commentatores, ut *Clavius*, *Tartalea*, *David Gregorius* alii-
que vocem πηλικότης vertunt: quantitas, vel, ut ipsi vocem:
quantitas interpretantur: rationum denominator vel exponens.
Wallisius (*Opera Mathem. Tom. II. p. 665 sqq.*) πηλικότης
interpretatur: quantuplicitas, quam exponi ait per exponen-
tem rationis. (*Pfleiderer*. in Schol. in libr. VI. Elem. P. IV,
ἐ quibus excerpta sunt, quæ in hoc Excursu habentur §. 200.
not. 7. 8. 9 coll. §. 202. not. 15.).

§. 2. Verum enim vero, ut *Rob. Simson* observat, hu-
ius Definitionis, laxo, in quod definit, effato (vide *Pfleide-*
rer l. c. §. 200.) satis suspectæ, in sequentibus apud *Eu-*

clidem. Archimedes, Apollonium, reliquosque veteres, quae ratione composita saepius utuntur, nullum amplius vestigium invenitur. (Id ipsum etiam, si non verbis, re tamen ipsa fatetur Clavius, nec satis excusare studet Saccherius (Euclidis ab omni naevo vindicatus P. 158 sq.)). Ita v. c. in demonstratione VI. 23. in qua primum rationis compositae fit mentio, nihil prorsus occurrit, quod ad hanc Definitionem referret. Campanus quoque Definitionem VI. 5. non habet.

§. 3. Aliam potius rationis compositae Definitionem, analogam ei, quae V. Def. 10. 11. habetur, aperte supponunt demonstrationes Euclidis, in quibus de rationibus compositis semo est v. c. VI. 23. et VII. 5. Eam à Campano iam strictius indicatam in VII. Def. 19. varii recentiores Mathematici, quorum plures nominat *Pfleiderer*. l. c. §. 201. dedere, uberrime exhibuit *Rob. Simson* in Definitione A, quam V. Defin. 11. subnectit, his verbis:

1. Si fuerint quotanque magnitudinis eiusdem generis, prima ad ultimam habere dicitur rationem compositam ex ratione, quam habet prima ad secundam, et ratione secundae ad tertiam, et ea, quam habet tertia ad quartam, et ita deinceps usque ad ultimam. Ex. gr. sint magnitudines A, B, C, D: prima A habere dicitur ad ultimam D rationem compositam ex ratione ipsius A ad B, et ratione B ad C, et ratione C ad D; vel ratio A ad D dicitur composita esse ex rationibus A ad B, B ad C, et C ad D.

2. Si igitur ratio A ad B eadem sit rationi E ad F; et ratio B ad C eadem fuerit rationi G ad H; et ratio C ad D eadem rationi K ad L: A ad D habere dicitur rationem compositam ex rationibus, quae eadem sunt rationibus E ad F, G ad H, et K ad L. Idemque intelligitur, quando brevitatibus gratia dicitur A ad D habere rationem compositam ex rationibus E ad F, G ad H, et K ad L.

3. Similiter, si ratio M ad N eadem sit rationi A ad B, praecedentibus manentibus: brevitatibus gratia dicitur ratio M ad N eadem esse rationi compositae ex rationibus E ad F, G ad H, et K ad L, (vel. quod *Pluysfair* addit, ipso etiam

tio M, ad N composita dicitur ex rationibus E ad F, G ad
, et K ad L.)

Eodem sensu caeteri quoque Geometrae veteres Graeci
enominationem rationis compositas usurpant, v. c. *Archime-*
es Libr. II. Prop. 5 de Sphaera et Cylindro; *Apollonius*
onic. I. Prop. 39. I. 40. III. 54. III. 66. *Ptolemaeus* loco
supra citato, alique.

§. 4. Ex his omnibus non sine ratione concludunt magni
ominis Geometrae, inprimis *Rob. Simson* in Not. ad VI. 23.
Wleiderer. l. c. §. 204. not. 17. cum quibus consentiunt etiam
alures eorum Mathematicorum, qui Definitionem §. 3. alla-
am etiam ipsi exhibent, et maxime *Scarburgh* (the English
Euclide Oxf. 1705. Schol. in V. Def. 10. et in Def. 5. vul-
garem libri VI.), vulgarem illam §. 1. exhibitam Definitio-
nem non esse ipsius *Euclidis*, sed a *Theone* sine dubio, sub-
ata genuina §. 3. allata, substitutam fuisse eam, quae nunc
habetur explicationem, quae tamen minus apta, et, ut *Rob.*
Simson ait, puerilis sit, quippe quae eis solummodo rationi-
bus conveniat, quae numeris exhiberi possint. Atque hac
ratione omnem de compositione rationum doctrinam absurdam
et ἀνεπιμετρήτην redditam esse. Unde et *Savilius*, qui vulga-
rem illam Definitionem §. 1. genuinam putarat, professus est,
in pulcherrimo Geometriae corpore duas esse laves, nec,
quod sciat, plures, in quibus eluendis et emaculandis cum
veterum tum recentiorum vigilaverit industria. Priorem
nempe Post. 5, I: posteriorem, quae ad compositionem ratio-
num pertineat (*Savilii* Praelect. Lect. VII. p. 140.).

§. 5. Hanc suspicionem, nempe *Theonem* Architectum
esse vulgaris Definitionis §. 1. confirmare videntur ea, quae *Theon*
in Commemorat. ad Ptolem. loco supra citato habet. Ibi nem-
pe, postquam *Ptolemaeus* propositionem aliquam de composi-
tione rationum legitimo more eo sensu demonstraverat, quem
Definitio §. 3. supponit, *Theon* ulterioris, quod ait, illustra-
tionis gratia VI. Propos. 23. adhibet, quae vero argumenta-
tionem complicit potius quam explicat, tum vero ex abrupto
et sine ulla ad propositum applicatione Definitionem cum
Euclid. Element. P. II.

vulgari illa exacte consentientem, nisi quod ad finem addis „*πληρότητα λόγου*“ exhibet. Atque hoc primum certum est vestigium Definitionis §. 1. allatae, quam ipsam deinde *Eutocius* seculi post C. N. sexti scriptor in *Commentario in Archimedem* eo, quem §. 1. diximus, loco, ut in *Elementis* occurrentem, designat.

§. 6. Aliud praeterea argumentum, quo vulgarem rationis compositae Definitionem §. 1. allatam supposititiam esse probari possit, in eo deprehendit *Rob. Simson* p. 374 sequod VIII. Prop. 5. nihil aliud continet, quam quod in ipsa illa vulgari Definitione asseritur. Absurdum autem foret, propositionem aliquam in *Elementis* poni tanquam Definitionem, et eandem in iisdem demonstrari. Propositionem autem VIII. 5. in *Elementis* locum habere debere, non est dubium, idem enim in ea demonstratur de numeris planis, quod in VI. 23. de parallelogrammis aequiangulis; quare VI. Definitio 5. in *Elementis* locum habere non potest. Quae quum ita sim, liceat vulgarem illam Definitionem §. 1. positam, Definitionem *Theonis*, alteram autem §. 3. exhibitam, V. Definitionibus 10. 11. analogam, adeoque sine dubio magis ex *Euclidis* mente positam, Definitionem *Simsonis* appellare.

§. 7. Vulgarem illam Definitionem minus aptam esse non tantum inde patet, quod rei mere geometricae numeri, atque operationes in numeris usitatae immiscentur, verum etiam quarumlibet rationum datarum exponentes integros fractosque dari, nullo tot rationum numeris ineffabilium censu habito, supponitur. Quando autem numeris integris aut fractis rationes datae exprimuntur, ex quibus alia haud immediate cognita componitur, seu inferitur, tum omnino haec eadem est ratio, quam productum multiplicationis terminorum antecedentium rationum habet ad productum ex ipsarum terminis consequentibus, vel, quod eodem redit: denominator, (i. e. numerus integer aut fractus indicans, cui multiplo, aut cui parti, quibusve partibus consequentis aequetur terminus antecedens rationis) rationes primae quantitatis ad ultimam exprimitur denominatoribus mediarum rationum inter se multiplicatis. Nemp,

370

ELEM.

valget illa exacte demonstratio
„*synthetice*“ *Logos* exhibet. *Logos*
vestigium Definitionis § 1. ubi p.
tactus secuti ponit C. N. ubi
Archimedes eo, quem § 1. *Archi*
occurrentiam, designat.

§. 6. Aliud proutem *Logos* *Archi*
nis compositae Definitionem § 1. *Archi*
adproberi possit, ut eo deprehendatur
quod VIII. Prop. 5. nihil aliud
illa vulgari Definitione avertit. *Archi*
positionem aliquam in Elementis
et eandem in illis demonstrat. *Archi*
in Elementis locum haberi debet, ut
omni in eo demonstratur de *Archi*
de parallelogrammi requiritur; per
Elementis locum haberi ad pro.
licet vulgarem illam Definitionem § 1.
nem Theonem, alteram rursus § 1. *Archi*
M. II. analogam, adeoque ut *Archi*
mente positum, Definitionem *Archi*

§. 7. Vulgarem illam Definitionem
tantum inde patet, quod in *Archi*
operationes in numeris *Archi*
ramlibet rationum *Archi*
nullo tot rationum *Archi*
matur. Quando enim numeri *Archi*
eo exprimitur, ex quo *Archi*
ponitur, seu inferitur, tam *Archi*
quam productum *Archi*
rationum habet ad productum *Archi*
tibus, vel, quod eodem *Archi*
integer aut fractus indicat, cui *Archi*
basse partibus consequenti *Archi*
tionis) rationes primae *Archi*
nominatoribus *Archi*

si $A:B=m:n$ denotantibus m, n, p, q, r, s numeros datos,
 $B:C=p:q$ eosque integros (quia rationes numero integro
 $C:D=r:s$ et fracto, vel duobus fractis expressae facile
etc.

per V. 15. aequipollentes numeris integris expressas reducun-
tur): erit $A:C=mp:nq$; $A:D=mp:nqrs$ etc. Necessarium est autem
ad hanc propositionem, in qua de numeris agitur, demon-
strandam, doctrinam de numeris, ut libr. VII. Elementorum
(qui nihil de rationum compositione supponit) traditur, ad-
hibere, aut, quae huc pertinent, separatim demonstrare.
Quod quum omnino liceat, haec erit demonstratio (vid. *Pfleiderer*.
l. c. §. 207.)

Ob $A:B=m:n=pm:pn$ (V. 15.) $=mp:np$ (VII. 16.)
et $B:C=p:q=$ $up:uq$ (V. 15.)

est $A:C=mp:nq$ (V. 22.),

Tum, ob $A:C=mp:nq$ (V. 15.) $=mpr:nqr$ (VII. 16.)
et $C:D=r:s=$ $nqr:nqs$ (V. 15.)

fit $A:D=mpr:nqs$ (V. 22.) etc.

vel $\frac{A}{D} = \frac{mpr}{nqs} = \frac{m}{n} \cdot \frac{p}{r} \cdot \frac{q}{s} = \frac{A}{B} \cdot \frac{B}{C} \cdot \frac{C}{D} = \frac{A \cdot B \cdot C}{B \cdot C \cdot D} = \frac{A \cdot B \cdot C}{B \cdot C \cdot D}$

Varios aliorum conatus Definitiones Theonis et Rob. Simsoni
inter se conferendi refert *Pfleiderer*. *l. c.* not. 17. et ipse
plures etiam exhibet.

§. 8. Usus rationis compositae, quum omnia, in qui-
bus solet adhiberi ratio composita, possint etiam sine eius
auxilio tum enuntiari, tum demonstrari, in hoc unico con-
sistere ait Rob. Simson, quod eius ope periphrases evitentur
et ita Propositiones possint vel enuntiiari vel demonstrari bre-
vius, vel utrumque simul fieri possit. Ex. gr. si Propositio
VI. 23. enuntianda esset, non facta rationis compositae men-
tione, id ita fieret: Si duo Parallelogramma aequiangula
fierint, et at, si ut unum latus prioris ad unum posterioris,
ita quaecumque recta assumpta ad secundam aliquam; et, uti alter-
um latus prioris ad alterum posterioris, ita secunda illa fiat
ad tertiam: erit prius Parallelogrammum ad posterius, ut recta
primitus assumpta ad hanc tertiam. Veteres autem cum vidis-

sent, hanc enunciationem posse breviorē reddi, si nomen impositum esset rationi, quam habet prima recta ad ultimam, quo nomine simul indicarentur rationes intermedie, primae scilicet ad secundam, et secundae ad tertiam rectam, et indeinceps, si plures fuerint rectae: rationem hanc primae ad ultimam dixerunt rationem compositam ex rationibus primae ad secundam, et secundae ad tertiam rectam, hoc est, in praesenti casu ex rationibus, quae eadem sunt rationibus laterum, atque ita brevius Propositionem enunciarunt: Si fuerint duo aequiangula parallelogramma, habebunt inter se rationem eandem ei, quae composita est ex rationibus, quae eadem sunt rationibus laterum, vel adhuc brevius: aequiangula parallelogramma inter se rationem habeat eandem ei, quae composita est ex rationibus laterum. Quum itaque ratio composita sit tantum modus loquendi, *Euclides* utitur quoque in Definitionibus rationis duplicatae et triplicatae verbo: *ἄλγεα*, quo verbo sine dubio utebatur etiam in Definitione rationis compositae, quam *Theon* aliisque ex *Elementis* sustulit; nam idem verbum retentum est in inepta Definitione rationis compositae, quae nunc in VI. Def. 5. habetur. In citationibus autem harum Definitionum aliquando retinetur, ut in *Dem.* VI. 19.; aliquando omittitur ut in *Dem.* XI. 33. ubi tamen *ἔχει* sine dubio idem significat, ac *ἔχει ἄλγεα*, et in V. 23. ubi *σύνκεῖται* brevitatis causa dicitur pro: *σύνκεῖσθαι ἄλγεα*. Ita fere *Rob. Simson* l. c. *Fleischer* tamen l. c. §§. 222. 223. monet, hac denominatione indicari simul, rationem, quae ex aliis componi dicatur, ab his pendere, per eas determinari, sic ut ex his cognitis iuxta normam quandam constantem colligi atque inferri possit. Has porro et omnes, et simplicissimas designari supponi, quas indolis magnitudinum, de quarum ratione ex iis componenda precipiatur, requirat, vel quas datorum problematis, cui enodando earum compositio adhibeatur, conditio suggerat.

§. 9. Ex Definitione *Rob. Simsonis* plures deduci possunt consequentiae, quarum partem habet ipse *Rob. Simson* in *Proposit.* F, G, H, K. *Append.* ad *Libr.* V. Nos casus

ita sistemus, ut, sunt apud *Pfleiderer*. l. c. Earum prima haec est: Rationes ex rationibus respective inter se iidem compositae (sensu strictiori Defin. *Simson*. nr. 1.) sunt inter se eadem. (Est haec *Simson*. Propos. F in Append. ad Libr. V. vel, si mavis, V. Prop. 22. et 23. (caeterum antea demonstrandae, ut ab *Euclide* factum est) aliis verbis ita exprimi possunt. *Pfleiderer*. §. 208.)

Sit enim $A : B = D : E$

$B : C = E : F$

erit (V. 22.) $A : C = D : F$

Vel, sit $A : B = E : F$

$B : C = D : E$

erit (V. 22.) $A : C = D : F$.

Et similiter, si fuerint plures rationes in utroque casu.

§. 10. Pariter, si duae pluresve rationes eadem sint totidem aliis; terminisque singularum ac magnitudini datae vel assumptae quarta proportionalis inveniri potest (quae eadem determinatio propositionibus analogis sequentibus est applicanda): latiori etiam sensu Def. *Simson*. nr. 2. sq. eadem erunt inter se rationes, quarum una ex prioribus, altera ex posterioribus componitur.

Quodsi enim $A : B = E : F$

$C : D = G : H$

fiat $A : B = K : L$

et $E : F = N : O$

$C : D = L : M$

$G : H = O : P$,

eruntque ex V. 11. $K : L = N : O$

$L : M = O : P$

adeoque V. 22. $K : M = N : P$

Eodemque modo assertum de pluribus, quam duabus rationibus, compositioneque rationum iuxta Def. *Simson*. nr. 3. accepta demonstratur. (*Rob. Simson*. l. c. Prop. G. *Pfleiderer*. l. c. §. 209.).

In sequentibus rationem ex duabus pluribusve sensu Def. *Simson*. nr. 2. 3. compositam, ubi e re erit, compendii causa designabimus, has serie verticali scriptas uncis includendo.

Sic modo praecedens propositio ita exprimetur:

$$\left(\frac{A:B}{C:D} \right) = \left(\frac{E:F}{G:H} \right), \text{ si } A:B = E:F \\ C:D = G:H.$$

§. 11. Eaedem porro inter se sunt rationes, quarum utraque sensu Def. *Simson*. nr. 2. ex iisdem rationibus componitur. Hoc quippe sensu, si tam ratio A:B, quam altera C:D ex rationibus E:F, G:H componitur, sintque $E:F = K:L$

$$G:H = L:M$$

erit tam $A:B = K:N$ (Def. *Simson*. nr. 2.) quam $C:D = K:M$: igitur $A:B = C:D$ (V. 11.) *Pfleiderer*. I. c. §. 210.

§. 12. Sicut rationis ignotae investigatio compositione eius ex rationibus scopo congruis dirigitur, et, quando has liquent, absolvitur: ita vicissim indagatio rationis, quam unam esse constat earum, ex quibus ratio data componitur, ad determinandam alteram, alterasve hanc componentes reducit: quo facto illa *divisione*, quam vocant, *datas rationis compositae* per notam componentem alteram vel ex alteris compositam innotescit. (*Pfleiderer*. I. c. §. 224.).

§. 13. Reductionem divisionis huius ad compositionem docet *Pappi* Propositio 171. Lib. VII. Collect. *Mathem.* seu Lemm. 7. in Lib. I. *Conicor.* Apollonii: quo, si A sit ad B in ratione composita ex rationibus C:D, E:F; vicissim rationem C:D ex rationibus A:B ac F:E seu inversa ipsius E:F componi ostendit. Facto enim $E:F = D:H$; erit (Def. *Simson*.) ratio, quae ex rationibus C:D, E:F componitur, h. e. (supp.) $A:B = C:H$.

Quare, cum ita sint $C:H = A:B$

$$H:D = F:E$$

$$\text{est (Def. } \textit{Simson}.) \ C:D = \left(\frac{A:B}{F:E} \right)$$

Eodemque modo, ex quocunque rationibus C:D, E:F, G:H etc. componatur ratio A:B; caeteris E:F, G:H etc. ad unam P:Q ex iis compositam reductis, demonstratur, rationem C:D componi ex rationibus A:B et Q:P; seu C esse ad D in ratione composita ex directa A ad B et inversa rationis P ad Q. (*Pfleiderer*. I. c. §. 225.)

§. 14. Hinc eadem etiam inter se sunt rationes, quae rationibus iisdem inter se $A:B$, $C:D$ per alias $E:F$, $G:H$ pariter inter se eadem divisionis obtinentur. Quippe ob $E:F=G:H$ (supp.) est etiam $F:E=H:G$ (Prop. B. in Excurs. ad Libr. V.). Quare, cum quoque sit $A:B=C:D$, ratio ex $A:B$ ac $F:E$ composita eadem est rationi compositae ex $C:D$ et $H:G$ (§. 10.) h. e. (§. 13.) quae rationem $A:B$ per alteram $E:F$ dividendo prodit, ratio eadem est rationi divisione rationis $C:D$ per alteram $G:H$ oriundae. (Pfleiderer. l. c. §. 226.)

§. 15. Idem in Propositionibus H, K Element. Libr. V. annexis Rob. Simson uberius sic enūciat: „Si ratio ex quibusdam rationibus“ (sive strictiori, sive latiori in Def. Sima. exposito sensu) „composita eadem sit rationi ex quibusdam aliis rationibus compositae, fueritque una ratio ex prioribus, vel ratio ex quibusdam ex prioribus composita, eadem uni rationi ex posterioribus, vel rationi ex quibusdam ex posterioribus compositae: erit reliqua ratio ex prioribus, vel ratio ex reliquis prioribus composita, eadem rationi reliquae ex posterioribus, vel rationi ex reliquis posterioribus compositae. (Pfleiderer. l. c. §. 227.)

§. 16. Quando $A:B=\left(\frac{C:D}{E:F}\right)$, pariter est $A:B=\left(\frac{E:F}{C:D}\right)$.

Factis enim $\frac{C:D=K:L}{E:F=L:M}$, est $A:B=\left(\frac{K:L}{L:M}\right)=K:M$ (V. 22.)

at ob $K:M$ quoque $=\left(\frac{L:M}{K:L}\right)$ (V. 23.) $=\left(\frac{E:F}{C:D}\right)$:

pariter est $A:B=\left(\frac{E:F}{C:D}\right)$. Similiterque rationem

ex pluribus quam duabus compositam, mutato horum ordine haud mutari ostenditur (Pfleiderer. §. 228.)

§. 17. Inverse, quando $A:B=\left(\frac{C:D}{E:F}\right)$, erit $B:A=\left(\frac{D:C}{F:E}\right)$.

Factis enim $\frac{C:D=K:L}{E:F=L:M}$ est $A:B=\left(\frac{K:L}{L:M}\right)=K:M$,

et $B:A=M:K$ (Prop. B. in Excursu ad Libr. V.) $= \left(\frac{L:K}{M:L} \right)$ (V. 23.)
 $= \left(\frac{D:C}{F:E} \right)$ (Prop. B in Exc. ad Libr. V.). Quod rursus si-
 militer ad rationem ex pluribus quam duabus compositam ex-
 tenditur (Pfleiderer. §. 229.)

§. 18. Si A, B, C, D sunt magnitudines homogeneae, et
 $\left(\frac{A:B}{C:D} \right) = \left(\frac{A:D}{C:B} \right)$. Factis enim $A:B=K:L$ $A:D=K:O$
 $C:D=L:M$; $C:B=O:P$
 ut sint $\left(\frac{A:B}{C:D} \right) = K:M$, $\left(\frac{A:D}{C:B} \right) = K:P$ (Def. Simson.)
 ob $A:B=K:L$
 $B:C=P:O$ (Prop. B in Exc. ad Libr. V.)
 $C:D=L:M$

est $A:D$ seu (constr.) $K:O = \left(\frac{K:L}{P:O} \right)$,

unde, §. 13. $\left(\frac{K:O}{O:P} \right) = \left(\frac{K:L}{L:M} \right)$

h. e. (V. 22.) $K:P=K:M$, ideoque $\left(\frac{A:B}{C:D} \right) = \left(\frac{A:D}{C:B} \right)$.
 (Pfleiderer. §. 230.)

§. 19. Si $A:B = \left(\frac{C:D}{E:F} \right)$, atque $E:F=D:I$, est

$A:B = \left(\frac{C:I}{G:H} \right)$. Facto enim $G:H=I:K$, fit

$A:B = \left(\frac{B:D}{D:I} \right) \left(\frac{B:I}{I:K} \right)$ (§. 10.) $= C:K$ (Def. Sims.) $= \left(\frac{C:I}{I:K} \right)$

(Def. Sims.) $= \left(\frac{C:I}{G:H} \right)$ §. 10. (Pfleiderer. §. 231.)

§. 20. Sit A ad B in ratione composita ex rationibus E:F

et $B:A=M:I$ (Prop. 1 in Elem. et Def. 5.)

$$= \left(\frac{D:C}{F:E} \right) \text{ (Prop. 1 in Elem. et Def. 5.)}$$

maior ad rationem ex pluribus quoniam transmutatur (Pflöiderer. §. 223.)

§. 18. Si A, B, C, D sunt magnitudines

$$\left(\frac{A:B}{C:D} \right) = \left(\frac{A:D}{C:I} \right) \text{ Factis enim } \frac{A:I}{C:I}$$

$$\text{ut autem } \left(\frac{A:B}{C:D} \right) = \frac{A:I}{C:I} \text{, } \left(\frac{A:D}{C:I} \right) = \frac{A:I}{C:I}$$

$$\text{ob } A:B=K:L$$

$$B:C=P:Q \text{ (Prop. 1 in Elem. et Def. 5.)}$$

$$C:D=L:M$$

$$\text{et } A:D \text{ seu (const.) } K:O = \left(\frac{K:L}{L:M} \right)$$

$$\text{unde §. 13. } \left(\frac{K:O}{O:P} \right) = \left(\frac{K:L}{L:M} \right)$$

$$\text{h. a. (V. 22.) } K:P=L:M, \text{ (Prop. 1 in Elem. et Def. 5.)}$$

(Pflöiderer. §. 230.)

$$\text{§. 19. Si } A:B = \left(\frac{C:D}{E:F} \right) \text{, ut in §. 18.}$$

$$A:B = \left(\frac{C:I}{G:H} \right) \text{ Factis enim } \frac{C:I}{G:H}$$

$$A:B = \left(\frac{B:D}{D:I} \right) \left(\frac{B:I}{I:K} \right) = \left(\frac{B:D}{I:K} \right) \text{ (h. a.)}$$

$$\text{(Def. Simil.) } = \left(\frac{C:I}{G:H} \right) \text{ §. 18. (Pflöiderer. §. 231.)}$$

§. 20. Si A ad B in ratione composita

et $G:H$: atque $B:C=I:K$: erit A ad C in ratione composita ex rationibus $E:F$, $G:H$, $I:K$. Factis enim

$$P:Q=E:F$$

$$Q:R=G:H; \text{ unde } P:R = \left(\frac{E:F}{G:H} \right)$$

$$R:S=I:K \quad P:S = \left(\frac{E:F}{I:K} \right)$$

$$\text{erunt } A:B=P:R \text{ (§. 21.)}$$

$$B:C=R:S \text{ (V. 11.)}$$

$$A:C=P:S \text{ (V. 22.)} = \left(\frac{E:F}{G:H} \right) \left(\frac{G:H}{I:K} \right) \text{ Idemque simili-}$$

liter et ad plures magnitudines A, B, C, D etc. et ad rationes ipsarum rationibus mutuis aequipollentes simplices compositas-ve quaslibet extenditur (Pflöiderer. §. 232.)

§. 21. Si $A:B = \left(\frac{C:D}{E:F} \right)$, et A, B, C, D, E, F sunt magnitudines homogeneae: ob $B:C=B:C$

$$B:E=B:E$$

$$\text{sunt } A:C = \left(\frac{C:D}{E:F} \right) = \left(\frac{B:C}{E:F} \right) = \left(\frac{B:D}{E:F} \right)$$

§. 20.

§. 16.

§. 19.

§. 18.

$$A:E = \left(\frac{C:D}{E:F} \right) = \left(\frac{C:D}{B:E} \right) = \left(\frac{C:D}{B:F} \right) = \left(\frac{B:D}{C:F} \right)$$

(Castillon sur une nouvelle propriété des sections coniques in Nouv. Mem. de l'Acad. de Berlin. Année 1776. p. 298.) Ceterae,

quae ibidem ex $A:B = \left(\frac{C:D}{E:F} \right)$ deducuntur rationes, ex

§. 13. 17. 18. et nunc §. 21 ostensis consequuntur. (Pflöiderer. §. 233.)

§. 22. Ratio composita ex eiusdem rationis directa et inversa est ratio aequalitatis, seu aequalium. Quippe, si

$$A:B=E:F$$

$$\text{et } B:C=F:E$$

fit $A:C=E:E$ (V. 22.), proinde $A=C$ (Excurs. ad Libr. V. (Prop. A.) (Pfleiderer. §. 234.))

§. 23. Compositionem vero plurium rationum ingredientis eiusdem rationis directæ et inversæ se mutuo destruantur

$$\text{ita ut sint } \begin{pmatrix} A:B \\ C:D \\ B:A \end{pmatrix} = C:D, \begin{pmatrix} A:B \\ C:D \\ E:F \\ B:A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C:D \\ E:F \end{pmatrix} \text{ etc.}$$

$$\text{Factis enim } A:B=K:L$$

$$C:D=L:M$$

$$E:F=M:N$$

$$\text{ideoque (Def. Sims.) } \begin{pmatrix} A:B \\ C:D \end{pmatrix} = K:M$$

$$\begin{pmatrix} A:B \\ C:D \\ E:F \end{pmatrix} = K:N$$

ob $B:A=L:K$ (const. et Prop. B. in Excurs. ad Libr. V.)

$$\text{fiunt } \begin{pmatrix} A:B \\ C:D \\ B:A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K:M \\ L:K \end{pmatrix} = L:M = C:D \text{ (Constr. et V. 11.)}$$

§. 20.

$$\begin{pmatrix} A:B \\ C:D \\ E:F \\ B:A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K:N \\ L:K \end{pmatrix} = L:N = \begin{pmatrix} C:D \\ E:F \end{pmatrix} \text{ (Constr. et §. 11.)}$$

(Pfleiderer. §. 235.)

§. 24. Hinc, si $\begin{pmatrix} A:B \\ C:D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E:F \\ G:H \end{pmatrix}$, atque $C:D=G:H$;

pariter erit $A:B=E:F$.

$$\text{Quippe, ob } \begin{pmatrix} A:B \\ C:D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E:F \\ G:H \end{pmatrix}$$

$$\text{est } A:B = \begin{pmatrix} E:F \\ G:H \\ D:C \end{pmatrix} \text{ §. 13.} = \begin{pmatrix} E:F \\ C:D \\ D:C \end{pmatrix} \text{ (supp. et §. 10.)}$$

$$=E:F \text{ (§. 23.) (Pfleiderer. §. 256.)}$$

§. 25. Vicissim si ratio, quae ex duabus componitur, est ratio aequalitatis: rationum, ex quibus componitur, una est alterius inversa.

Nempe, si $\frac{A:B=E:F}{B:C=G:H}$ igitur $A:C=\left(\frac{E:F}{G:H}\right)$:

et $A=C$, ideoque $A:B=C:B$ (V. 7.): fit $E:F=H:G$ (supp. et Prop. B in Exc. ad Libr. V. et V. 11.) (Pfleiderer. §. 237.)

§. 26. Pariter, si in Compositione trium pluriumve rationum duae se mutuo destruunt, harum una alterius est inversa.

Quippe si $\left(\frac{A:B}{C:D}\right) = A:B$, et $\frac{A:B=K:L}{C:D=L:M}$
 $\frac{E:F}{G:H} = E:F=M:N$

est (Def. Sims.) $K:N=K:L$, ideoque (V. 9.) $N=L$, et (V. 7.) $L:M=N:M$; proinde $C:D=F:E$ (Prop. B in Excurs. ad Libr. V. et V. 11.)

Pariter, si $\left(\frac{A:B}{C:D}\right) = \left(\frac{A:B}{C:D}\right)$; et $\frac{A:B=K:L}{C:D=L:M}$
 $\frac{E:F}{G:H} = E:F=M:N$
 $G:H=N:O$

est (Def. Sims.) $K:O=K:M$

et (V. 9.) $O=M$

et (V. 7.) $M:N=O:N$; itaque $E:F=H:G$.

Et sic ulterius. (Pfleiderer. §. 238.)

BONNAE
TYPIS BÜSCHLERIANIS
1825.

CORRIGENDA.

IN TOMO I.

- p. XI v. 24 Boermann l. Baermann
 — XVI v. 7 Ptolomaeo l. Ptolemaeo
 — 5 v. 27 $\epsilon\phi'$ l. $\epsilon\phi$, eodemque modo p. 6. v. 32.
 — 13 v. 32 circuli, quadrati l. circuli quadrati
 — 24 v. 11 e l. et
 — 27 v. 34 et l. ao
 — 28 v. 35 quoque l. quoquo
 — 30 v. ult. §. l. §. 28
 — 32 v. 29 ad oculos l. ob oculos
 — 56 v. 29 prope l. pro.
 — 72 v. 24 Coila l. Cod. a
 — 73 v. ult. duobus l. quatuor
 — 105 v. 26 scalarum l. scalenum
 — 120 v. 20 et 21 $(n-2) \times 2R$ l. $(n-2) \times 2R$
 — 124 v. 4 ABA l. AGA
 — 150 v. 23 et 25 hypotenusa l. hypotenusa
 — 168 v. 21 $\beta\omega\theta\eta\rho\acute{\alpha}\iota\nu$ l. $\beta\omega\theta\eta\rho\acute{\alpha}\iota\nu$
 — 173 v. 10 habent l. habent ZB
 — ibid. v. penult. Quadrata l. quadrata
 — 180 v. 23 ostender l. ostendent
 — 181 v. ult. et p. 182 v. 20 parallelogrammum l. parallelogrammorum.
 — 297 v. antepen. recat l. recta
 — 200 v. 30 $\frac{AI-IB}{2}$ l. $\frac{IB-AI}{2}$
 — 201 v. 15 $AI=IP+PI=II+A=\frac{AI-IB}{2}$
 l. $AI=PI+IA=\frac{IR-AI}{2}$
 — 202 v. 25 $AA-Bd$ l. $\frac{AA-Bd}{2}$
 — 206 v. 5 EO l. NEO
 — 208 v. 21 II. ad 10. Obs. 8. l. ad II. 10. Obs. 10
 — 214 v. 21 $\tau\epsilon\tau\rho\alpha\gamma\acute{\omega}\nu\omicron\nu$ l. $\tau\epsilon\tau\rho\alpha\gamma\acute{\omega}\nu\omicron\nu$

- P. 292 v. 6 *a fine ad l. at*
 — 293 v. 13 *a fine es, l. est*
 — ibid. v. 8 *a fine Euclidea et l. Euclidean*
 — ibid. v. 2 *a fine a l. at*
 — 294 v. 9 *το l. τῷ*
 — 298 v. 12 *a fine: trianguli l. rectanguli*
 — 301 v. 10 *a fine verba: sunt BI,IZ, et AE deleantur.*
-

