

Notes du mont Royal

www.notesdumontroyal.com

Cette œuvre est hébergée sur « *Notes du mont Royal* » dans le cadre d'un exposé gratuit sur la littérature.

SOURCE DES IMAGES
Google Livres

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ

ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΣΤΟΙ-
ΧΕΙΩΝ, ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ ΘΕΩΝΟΣ
σωσσιῶν τὸ πρῶτον.

EVCLIDIS QVINDE-
cim Elementorum Geometriæ
primum: ex Theonis Commen-
tarijs Græcè, & Latine.

Cui accesserunt
Scholia, in quibus quæ
ad percipienda Geometriæ Ele-
menta spectant, breuiter & dilucidè ex-
plicantur, authore Cunrado Da-
syodio, Scholæ Argenti-
nensis professore.

*Sum laudis
vbi Heyfer
frygen
nensis
Fobrie
mote*

ARGENTORATI EXCV-
debat Christianus Mylius,

M. D. LXIII

EST





1557

C V N R A D V S D A S Y P O D I V S L E C T O R I S. D.



ANNIS viginti sex nostri
Gymnasij cōsuetudo fu-
it : vt qui ex classibus ad
publicas lectiones pro-
mouentur , primum audiant Euclidis
librum : quò præcepta τῆς ἀποδείξεως
exercere , & ad vsum aliquem accom-
modare possint : siquidem nemo faci-
lius vim , & efficaciam eorum , quæ in
libro de demonstratione explicantur :
aut etiam ab ipso Aristotele in suo or-
gano traduntur , intelliget : quàm qui
in puluerem descenderit Geometricū.
Idcirco in nostra schola prudēter hoc
est institutum : vt post linguarum &
artiū cognitionem , in disciplinis Ma-
thematicis adolescentes exerceantur :
præsertim verò hoc probandum , &
laudandum , quod in ipso disciplinarū
vestibulo , cognitionem rerum Geo-

PRÆFATIO.

metricarum sibi comparent, & in ijs
quæ certissimis nituntur rationibus,
sua exaquant ingenia: vt assuescant eo
facilius naturæ & cæterarum artium,
atq; disciplinarum abstrusiora com-
prehendere. Nam & Pythagoricorū
hoc quoq; fuit *ῥῆμα, καὶ βῆμα*: quo di-
cto volebant significare, pueros esse
quàm primum deducendos ad Geo-
metriæ cognitionem, & ita gradatim
per mathematicas disciplinas ad altio-
ra ascendendum, sicuti & Plato nemi-
nem aptum & idoneum iudicauit ad
percipienda Philosophiæ præcepta:
nisi instructus esset rebus Geometri-
cis, cum diceret: *ὅδε ἐς ἀνωμίτην ὁ δὲ
εἶρω*. Itaq; cum hanc studiorum ratio-
nem omnibus eruditis, etiam antiquis-
simis Philosophis probari viderem,
tanquam studiosis adolescentibus vti-
lem, & valde necessariam; fui & ego
quoq; nostro Typographo author, &
suasor, vt cum nulla amplius extarent
exem-

exemplaria, hunc libellum imprimeret: ne bona, & fructuosa scholę nostrę constitutio intercideret. quoniam verò plerosq; audiebam de difficultate demonstrationum Geometricarū solere conqueri, meis quibuscunq; illustrare volui scholīs. Idq; eo feci consilio, nō vt egregiū, & magni quid cogitaremedere. Sciebam enim rem esse paruam, neq; vllius ingenij aut industrię ex Proclo, aut alijs decerpere ea quę propriē ad hanc tractationē pertinent: sed vt in assequendis hisce disciplinis, bonos adolescentes Geometrię imperitos aliquantulum mea iuuarem opera. Nam Geometrię elementa nuda, atq; sterilia vidētur, & prima fronte nullum peculiarē prę se ferunt fructum: sed si aditus ad ea percipiēda pręparetur, aut si quis diligentius consideret, & intueatur ipsam οἰκονομίαν τῆ γεωμετρικῶν λόγων: atq; perpendat exactius ipsam πορείαν, ἢ συνέχσαν τῶν προτάσεων,

PRÆFATIO.

τάσων, cæteraq; omnia, quæ Geometria tractat, ad amussim examinet: tum abundè se ostendunt vtilitates in res humanas sese diffundentes: quas hoc loco enumerare prolixū esset. Quantum igitur in me fuit, simplici & aperto sermonis genere, latinis verbis Græca interpretor: deinde breuibus scholijs, non nisi conor ea explicare, quæ difficiliora sunt: neq; omnia, sed præcipua tantum, & maximè necessaria, propediem certè plura, auxiliante Deo Opt. Max. sum editurus, cū in hunc, tum in alios Euclidis libros. Inter cætera verò etiam explicabo secundum Euclidis librum, qui de potentia lineæ rectæ demonstrationes habet Geometricas. Quia verò *τομή, καὶ διαίρεσις* commune est *σύμμετρον* linearum, corporum, & numerorum: idcirco statui demonstrationes illarum ipsarum secundi libri propositionum addere, petitas ex Arithmeticæ & Stereometrie principi

PRÆFATIO.

principijs. Imò si commodè fieri poterit, publicabo etiam *ὀνομαστικὸν γλωσσάριον*: in quo explicabuntur vocabula huius scientiæ propria, quo studiosi possint terminos, ut vocant, artis intelligere, & sensum verborum assequi. Erit sanè dictionarium hoc, omnibus Philosophiæ studiosis utilissimū, & valdè iucundum. Sunt nonnulla penes me, quæ cum confidam doctis viris grata & accepta fore, aliquando etiam in lucē emittam.

Calendis Aprilis,

Anno 1564.

ETKÆL.



ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΣΤΟΙ- ΧΕΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ, ΕΚ ΤΩΝ Τῶ ΘΕΩΝ σωσίων.

ΟΡΟΙ.

ΣΗΜΕΙΟΝ ὅστις, ὃ μίς, ὃ ἑδίς.

Γραμμὴ ἥ, μὴν, ἀπλάγῃς.

Γραμμὴ δὲ πῖρατα συμῆ.

Εὐθεῖα γραμμὴ ὅστις, ἥτις ὀρίσῃ τοῖς ἰφ' ἰαυτῇ σημείοις κῆται.

Επιφάνεια δὲ ὅστις, ὃ μὴν, ὃ καὶ πλάγῃ μόνον ἔχει.

Επιφανείας ἥ πῖρατα, γραμμαί.

Εὐπίπδ, ὃ επιφάνεια ὅστις, ἥτις ὀρίσῃ τῶς ἰφ' ἰαυτῇς ἑνὲς ἑαυτῆς κῆται.

Εὐπίπδ, ὃ δὲ γωνία ὅστις, ἥ ἑνὲς ὀπίπδ, ὃ δύο γραμμῶν ἀπὸ μόνων ἀλλήλων, καὶ μὴ ἑνὲς ἑνὲς ἑαυτῆς ἑμῖνον, πρὸς ἀλλήλας τῶν γραμμῶν κῆσις.

Ὅταν δὲ αἱ περιέχουσιν τὴν γωνίαν γραμμαι, ἑνὲς ἑαυτῆς ὅστις, ἑνὲς γραμμῆ καὶ κῆται ἡ γωνία.

Ὅταν δὲ ἑνὲς ἑαυτῆς ἑνὲς ἑαυτῆς ὅστις, τῶς

ἑνὲς γωνίας ἑαυτῆς ἀλλήλας ποιεῖ, ὃ ἑνὲς ὅστις ἑαυτῆς τῶν ἑαυτῆς γωνίῶν. Καὶ ἡ ἑνὲς ἑαυτῆς ἑνὲς ἑαυτῆς κῆται, ἡ ἑνὲς ἑαυτῆς.

Ἀνέλε

EVCLIDIS ELEMENTVM

primum ex Theonis Commentarijs.

Definitiones.

Punctum est, quod partem non habet.

Linea est, longitudo absq; latitudine.

Termini lineæ sunt puncta.

Linea recta est, quæ ex æquo posita est inter sua puncta.

Superficies est, quæ longitudinem & latitudinem tantum habet.

Termini superficiei sunt lineæ.

Plana superficies est, quæ ex æquo posita est inter suas lineas rectas.

Angulus planus est, duarum linearum sese in plano tangentium, & non ex aduerso positarum mutua inclinatio.

Rectilineum vocamus angulum, quem lineæ rectæ continent.

Cum recta super rectam stans, angulos vicinos inter se fecerit æquales: rectus est uterq; equalium illorum angulorum.

Recta verò linea angulos illos æquales faciens: perpendicularis dicitur ad eam lineam, super qua consistit.

Αμβλῆα γωνία ὅσῃ, ἢ μέσῳ ὀρθῆς.

Οξεία δὲ ἢ ἑλάσσων ὀρθῆς.

Ορθὸς ὅσῃ, ὅτινές ἐστι πέντε.

Σχήμα ὅσῃ, τὸ ὑπότιν^θ, ἢ τινῶν ὅσων
περιχόμενον.

Κύκλ^θ ὅσῃ, σχῆμα ἐπίπλευ, ὑπὸ μιᾶς
γραμμῆς περιχόμενον, ἢ λατῆται
περιφέρειαν, πρὸς ἢ ἀφ' ἑνὸς σημείου
τὸν ὡς τὸ σχήματ^θ λαμίνων,
πᾶσαι αἱ προσπίπτουσαι ἑνδαῖαι, ἴσαι
ἀλλήλαις εἰσὶ.

Κέντρον δὲ, τὸ κύκλου τὸ σημῖον κατε-
λῆται.

Διάμετρος δὲ ἡ κύκλου ῥῆσι, ἑνθαῖα τις
διὰ τὸ κέντρον ἑγμένη, καὶ περιεργμῆ-
σθ^ι ἑκάτερα τὰ μέρη ὑπὸ αἷ ἡ κύ-
κλου περιφέρειας, ἥ τις, καὶ δίχα τέμ-
νει τὸν κύκλον.

Ἡμικύκλιον δὲ ὅσῃ, τὸ περιχόμενον σχῆ-
μα ὑπὸτι αἷ διάμετρος, καὶ αἷ ἀπο-
λαμβανομένης ὑπ' αὐτῆς αἷ τὸν κύ-
κλου περιφέρειας.

Τμήμα κύκλου ὅσῃ, τὸ περιχόμενον ὑπὸτι
τις ἑνθαῖας, καὶ κύκλου περιφέρειας.

Εὐθύγραμμα σχῆματ^θ ὅσῃ, αἷ ὑπὸ ἑνδαῖων περιχόμενα.

Τρίγωνον

Obtusus angulus est, qui recto est maior.

Acutus verò, qui recto est minor.

Terminus est, quod alicuius finis est.

Figura est, quæ termino aliquo, aut aliquibus terminis continetur.

Circulus est figura plana, vna linea contenta, quam vocamus circumferentiam: ad quam ab vno aliquo ex punctis, quæ intra ipsam sunt, omnes lineæ rectæ procident, inter se sunt æquales.

Centrum verò circuli, vocatur hoc in circulo medium.

Dimetiens circuli est, recta quædam linea, per Centrum circuli ducta, vtrinque ad circumferentiam circuli desinens: ipsumque circumulum in duas partes æquales diuidens.

Semicirculus est figura, quam dimetiens circuli, & intercepta à dimetiente circumferentia continet.

Segmentum circuli est, figura, quam linea recta, & circuli circumferentia continet.

Rectilineæ figuræ sunt, quas rectæ lineæ ambiunt.

Τρίπλευρα μὲν τὰ ἐπὶ τριῶν.

Τετράπλευρα δὲ τὰ ἐπὶ τεσσάρων.

Πεντάπλευρα δὲ, τὰ ἐπὶ πέντε, ἢ
τεσσάρων ὑποῶν περιχώματα.

Τῶν δὲ τριπλῶν σχημάτων, ἰσοπλευ-
ρον μὲν τρίγωνον ὅτι, τὸ τρεῖς ἰσας
ἔχον πλευράς.

ἰσοκυλῖς δὲ, τὸ τὰς δύο μῆκας ἰσας ἔχον
πλευράς.

Σκαλινὸν δὲ, τὸ τὰς ῥᾶς ἀνίσας ἔχον
πλευράς.

Ἐστὶ τὶ τῶν πλῶν σχημάτων, ὀρθογώ-
νον μὲν τρίγωνον ὅτι, τὸ ἔχον μίαν
ὀρθὴν γωνίαν.

Ἀμβλυγώνιον δὲ, τὸ μίαν ἔχον ἀμβλῆ-
αν γωνίαν.

ὀξυγώνιον δὲ, τὸ ῥᾶς ὀξείας ἔχον γωνίας.


Τῶν ἢ τετραπλῶν σχημάτων, τετρά-
γωνον μὲν ὅστις, ὁ ἰσόπλευρόν τι ἔστι,
καὶ ὀρθογώνιον.

Ἐπιρρέμιον δὲ, ὁ ὀρθογώνιον μὲν, ἢ ἰσο-
πλευρον δὲ.

Ρέμβιον δὲ, ὁ ἰσόπλευρον μὲν, ἢ ὀρθογώ-
νον δὲ.

Ρεμβοειδὲς δὲ, τὸ τὰς ἀπεναντίων πλευράς τι καὶ γωνίας,
ἰσας κατέλπει ἔχον, ὅτι ἰσόπλευρόν ἔστιν, ὅτι ὀρθογώνιον.

Τὸ



Trilateræ quidem, quas ambiunt tres rectæ.
Quadrilateræ verò, quas plures, quàm qua-
tuor rectæ ambiunt.

Ex trilateris autē figuris. Triangulus equi-
laterus est, qui tria habet equalia latera.
Æquicrurus, qui duo tantum habet equalia
latera.

Scalenus triangulus, qui tria habet inæqua-
lia latera.

Item ex trilateris figuris, triangulus rectan-
gulus est: qui angulum habet rectum.

Amblygonius, qui angulū habet obtusum.

Oxygonius qui angulos tres acutos habet.

Ex quadrilateris figuris, quadratū est, quod
æquilaterum est, & rectangulum.

Quadrangulum oblōgum, quod rectangulum
quidem est, sed non æquilaterum.

Rhombus, quod æquilaterum quidem est,
sed non rectangulum.

Rhomboides, quod latera è regione posita ha-
bet equalia, ac etiam angulos: non tamen
est æquilaterum, neq. rectangulum.

Τὰ δὲ παρὰ ταῦτα τετραπλόρα, Τραπίζια καλεῖσθαι.


Παράλληλοι εἰς ἑνὺς εὐθεῖαν, αἱ τινες ἐν τῷ

αὐτῷ ὑπὸ πλάτῃ ὄσαι, καὶ ἐκβαλλόμεναι

μὴναι ὡς ἄπαρον ἢ ἐκείναι τὰ

μῆκη, ὅτι καλλιτέρα συμπίπτουσιν

ἀλλήλαις.



ΑΙΤΗΜΑΤΑ.

Η ΤΗΣ ΘΩ, ἀπὸ παντός σημείου ἐπὶ πᾶν
σημεῖον, εὐθεῖαν γραμμὴν ἀγαγεῖν.

Καὶ πρὸς περασμένῳ εὐθεῖαν, καὶ τὸ συνεχὲς
ἐπὶ εὐθείας ἐκβάλλειν.

Καὶ παντὶ κέντρῳ, καὶ διαστήματι, κύκλον
γράφεσθαι.

ΚΟΙΝΑΙ ΕΝΝΟΙΑΙ.

ΤΑ ΤΩ αὐτῷ ἴσα, καὶ ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα.

Καὶ ἐὰν ἴσοις ἴσα προσεθῇ, τὰ ὅλα ἐστὶν ἴσα.

Καὶ ἐὰν ἀπὸ ἴσων ἴσα ἀφαιρεθῇ, τὰ κατὰλει-
πόμενά ἐστὶν ἴσα.

Καὶ ἐὰν ἀνίσοις ἴσα προσεθῇ, τὰ ὅλα ἐστὶν ἄ-
νισα.

Καὶ ἐὰν ἀπὸ ἀνίσων ἴσα ἀφαιρεθῇ, τὰ λοι-
πώ ἐστὶν ἄνισα.

Καὶ

Omnes reliquæ præter has quadrilateræ figuræ, Trapezia vocentur.

Æquedistantes rectæ lineæ sunt, quæ in eodẽ plano sitæ: & in infinitum ex utraq; parte extense: in neutra tamen concurrunt.

POSTVLATA.

Petatur. A quouis puncto, ad quoduis punctum rectam lineam describere.

Item, lineam rectam finitam, in infinitum vsq; extendere.

Item, quouis centro, & interuallo describere circulum.

COMMVNES NOTIONES,

seu sententiæ.

Quæ eidem sunt æqualia, illa inter se sunt æqualia.

Si æqualibus æqualia fuerint adiecta, etiam tota sunt æqualia.

Si ab æqualibus æqualia fuerint ablata, etiã quæ relinquuntur, sunt æqualia.

Si inæqualibus æqualia fuerint adiecta: etiã tota sunt inæqualia.

Si ab inæqualibus æqualia fuerint sublata: quæ relinquuntur sunt inæqualia.

Καὶ τὰ τῷ αὐτῷ διπλάσια, ἴσαι ἀλλήλοις εἰσὶ.

Καὶ τὰ τῷ αὐτῷ ἡμίση, ἴσαι ἀλλήλοις εἰσὶ.

Καὶ τὰ ἐφαρμόζοντα ἐπ' ἀλλήλα, ἴσαι ἀλλή-
λοις εἰσὶ.

Καὶ τὸ ὅλον τῷ μέρει μείζον εἰσὶ.

Καὶ πᾶσαι αἱ ὀρθαὶ γωνίαι, ἴσαι ἀλλήλαις
εἰσὶ.

Καὶ ἐὰν εἰς δύο εὐθεΐας, εὐθεΐα ἐμπρίκηται,
τὰς ἐντός, καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη γωνίας,
δύω ὀρθῶν ἐλάσσονας ποιῇ, ἐκβαλλό-
μεναι αἱ δύο αὐταὶ εὐθεΐαι ἐπ' ἄπειρον,
συμπεσῶνται ἀλλήλαις, ἐφ' ἃ μέρη εἰσὶν
αἱ τῶν δύο ὀρθῶν ἐλάσσονες γωνίαι.

Καὶ δύο εὐθεΐαι, χωρίον ἔχοντες περιέχουσιν.

Qua



Quae sunt eiusdem dupla, inter se sunt equalia.

Quae eiusdem sunt dimidia, inter se sunt equalia.

Quae applicata inter se conueniunt, sunt equalia.

Totum est maius sua parte.

Omnes recti anguli inter se sunt aequales.

Cum in duas rectas, recta incidens linea, duos internos ex vna parte angulos, duobus rectis facit minores: producta ista due linea rectae in infinitum, ex ea parte concurrent, ubi sunt illi duo anguli duobus rectis minores.

Due linea rectae figuram non faciunt.


B 5



Πρότασις, α. πρόβλημα

ΕΠΙ ΤΗΣ δοθείσης ὀθείας πεπερασ-
μένης, τρίγωνον ἰσόπλευρον συστήσασθ.

Εκθεσις.) Εστω ἡ δοθεῖσα πεπερασμένη, ἡ
 $\alpha\beta$. (Διορισμός.) Δεῖ δὴ ἐπὶ τῇ $\alpha\beta$ ὀθείας,
τρίγωνον ἰσόπλευρον συστήσασθαι. (Κατα-
σκευὴ.) Κέντρῳ μὲν τῷ α , διαστήματι δὲ, τῷ
 $\alpha\beta$, κύκλῳ γεγράφθω, ὁ $\beta\gamma\epsilon$. καὶ πάλιν
κέντρῳ μὲν τῷ β , διαστήματι δὲ τῷ $\beta\alpha$, κύ-
κλῳ γεγράφθω, ὁ $\alpha\gamma\delta$, καὶ ἀπὸ ξ γση-
μεῖς, καθ' ὃ τέμνουσιν ἀλ-
λήλας οἱ κύκλοι, ἐπὶ τὰ
 α, β , σημεία, ἐπεζεύχθα-
σαν ὀθεῖαι, αἱ $\gamma\alpha, \gamma\beta$.
(Αποδείξις.) Ὡς ἐν τῷ
 α σημείον, κέντρον ἐστὶ ξ



γεῖ κύκλῳ ἴση ἐστὶν ἡ $\alpha\gamma$ τῇ $\alpha\beta$, πάλιν ἐπεὶ
τὸ β σημείον, κέντρον ἐστὶ, ξ γὰρ κύκλῳ, ἴση
ἐστὶν ἡ $\beta\gamma$, τῇ $\beta\alpha$. εἰδείχθη δὲ καὶ ἡ $\gamma\alpha$, τῇ
 $\alpha\beta$ ἴση. ἐκατέρα ἄρα τῶν $\gamma\alpha, \gamma\beta$, τῇ $\alpha\beta$ ἴ-
σιν ἴση. τὰ ὅτ' αὐτὰ ἴσα, ἔ' ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα,
καὶ ἡ $\gamma\alpha$ ἄρα τῇ $\gamma\beta$ ἐστὶν ἴση. αἱ τρεῖς ἄρα αἱ
 $\gamma\alpha,$

Propositio prima: problema.

SVper data linea recta finita, triangulum æquilaterum constituere.

Explicatio dati.) Sit data linea recta finita $\alpha\beta$. (*Explicatio quæsitæ.)* Oportet super linea recta $\alpha\beta$, triangulum æquilaterum constituere. (*Delineatio.)* Centro α , interuallo $\alpha\beta$, describatur circulus $\beta\gamma\epsilon$. Item centro β , interuallo $\beta\alpha$, describatur circulus $\alpha\gamma\delta$. Ducantur deniq, lineæ rectæ $\alpha\gamma$, $\gamma\beta$, (*Demonstratio.)* Quoniam punctum α , est centrum circuli $\gamma\epsilon\beta$: idcirco recta $\alpha\gamma$, est æqualis rectæ $\alpha\beta$. rursus quoniam punctum β , est centrum circuli $\gamma\alpha\delta$: idcirco recta $\beta\gamma$, æqualis est rectæ $\beta\alpha$. Verum demonstratum est, quod recta $\gamma\alpha$, etiam æqualis sit rectæ $\alpha\beta$. Ergo utraq, rectarum $\gamma\alpha$, $\gamma\beta$, est æqualis rectæ $\alpha\beta$. Quæ verò eidem sunt æqualia, illa etiam inter se sunt æqualia. Ergo $\gamma\alpha$ recta, etiam æqualis est rectæ $\gamma\beta$. Tres igitur lineæ rectæ $\gamma\alpha$, $\alpha\beta$, $\beta\gamma$, sunt in-

γα, αβ, βγ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν. (Συμπέρασμα.) Ἰσόπλευρον ἄρα ἐστὶ τὸ αβγ τρίγωνον, καὶ συνέπεται ὅτι τ' ὁδοθείσης ὁθείας πεπερασμένης τῆς αβ. ὅπως ἔδεικται.

Πρότασις β. πρόβλημα

Πρὸς τῷ θιθέντι σημεῖω, τῇ δοθείσῃ ᾠ-
δεῖα, ἴστω ἑβείαν δέσσειν.

Εκθεσις.) Εστω τὸ μὲν δοθέν σημεῖον τὸ α , ἢ
 ζ διθεῖσαι $\alpha\theta\epsilon\iota\alpha$ ἢ $\beta\gamma$. (Διορισμός.) Δεῖ δὲ
 πρὸς τῇ α σημείω, τῇ $\beta\gamma$ $\alpha\theta\epsilon\iota\alpha$, ἴσην $\alpha\theta\epsilon\iota\alpha\alpha$
 θέσθαι. (Κατασκευὴ.) Ἐπιζυγίσθω γὰρ ἀπὸ τῆς
 α σημείας, ὅτι τὸ β σημεί-
 ον, $\epsilon\upsilon\theta\epsilon\iota\alpha$ ἢ $\alpha\beta$, καὶ σπε-
 ράτω ἐκ αὐτῆς τριγ-
 ωνον ἰσοπλευρον, τὸ $\delta\alpha\epsilon$.
 καὶ ἐκβεβλήσωσαν ἐπ'
 $\epsilon\upsilon\theta\epsilon\iota\alpha\varsigma$ ταῖς $\delta\alpha$, $\delta\epsilon$, $\delta\epsilon$ -
 $\delta\epsilon\iota\alpha$, αἱ $\alpha\epsilon$, $\epsilon\zeta$, καὶ κέντρῳ μὲν τῇ β , δι-
 στασίματι δὲ τῇ $\beta\gamma$, κύκλος γεγράφθω ὁ $\gamma\eta\theta$.
 Ἐπάλιν κέντρῳ μὲν τῇ δ , διαστήματι δὲ τῇ
 $\delta\eta$, κύκλος γεγράφθω ὁ $\eta\kappa\lambda$. (Ἀπόδει-
 ξις.)

ter se æquales. (Conclusio.) Triangulus itaq; $\alpha\beta\gamma$, est æquilaterus: & consistit super data linea recta finita $\alpha\beta$. Quod faciendum erat.

Propositio secunda. Problema.

AD punctum datum, lineæ rectæ datæ, æqualem lineam rectam ponere.

Explicatio dati.) Sit punctum datum α , & data recta linea $\beta\gamma$. (*Explicatio quæsitæ*) Ad punctum datum α , data linea rectæ $\beta\gamma$, ponenda est recta linea equalis. (*Delineatio.*) Ab α puncto, ad punctum β , ducatur linea recta $\alpha\beta$, & super linea $\alpha\beta$ statuatur triangulus æquilaterus $\alpha\delta\beta$. Extendantur etiam lineæ rectæ $\delta\alpha$, $\delta\beta$ versus puncta ϵ , ζ , & fiant rectæ $\alpha\epsilon$, $\beta\zeta$. Centro quoq; ϵ , in intervallo $\beta\gamma$, describatur circulus $\gamma\eta\theta$. Item Centro δ , intervallo $\delta\eta$, describatur circulus $\eta\kappa\lambda$ (secans lineam rectam $\delta\zeta$, in puncto η .)


Demon-

ξίς.) Ἐπεὶ ὅν τὸ β σημεῖον κέντρον ἐστὶ τῆ γηθ
κύκλου, ἴση ἐστὶν ἡ β γ, τῇ β η. καὶ πάλιν, ἔπει
τὸ δ σημεῖον, κέντρον ἐστὶ τῆ η κ λ κύκλου, ἴση
ἐστὶν ἡ δ λ, τῇ δ η, ὧν ἡ δ α, τῇ δ β ἴση ἐστὶ. λοι-
πὴ ἄρα ἡ α λ, λοιπὴ τῇ β η ἐστὶν ἴση. ἐδείχ-
θη δὲ ὅτι ἡ β γ, τῇ β η ἴση. ἐκείρα ἄρα τῶν
α λ, β γ, τῇ β η ἐστὶν ἴση. τὰ δὲ τὰ ὠπὼ ἴσα,
καὶ ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα. καὶ ἡ α λ ἄρα, τῇ β γ, ἐ-
στὶν ἴση. (Συμπέρασμα.) Πρὸς ἄρα τὰ δο-
θέντα σημεῖα τὰ α, τῇ δοθείσῃ ὁθείᾳ τῇ β γ,
ἴση ὁθείᾳ κείτῃ ἡ α λ. ὥστε ἔδει ποιῆσαι.

Πρότασις γ. πρόβλημα.

Δ Το δοθέντων ὁθέντων ἀνίσων, ἀπὸ τοῦ μεί-
ζοντος, τῇ ἐλάσσονι ἴσιν ὁθεῖαν ἀφε-
λεῖν.

Ἐκθεσις.) Ἐςωσαν αἱ
δοθεῖσαι δύο ὁθεῖαι ἀνί-
σοι αἱ α β, γ, ὧν μείζων
ἔστω ἡ α β. (Διορισμός.)
Δεῖ δὴ ἀπὸ τοῦ μείζοντος
τῆς α β, τῇ ἐλάσσονι τῇ
γ, ἴσιν ὁθεῖαν ἀφελεῖν. (Κατασκευή.) Κεί-



ἔστω

Demonstratio.) Quoniam punctum β est centrum circuli $\gamma\eta\theta$: idcirco recta $\beta\gamma$, est æqualis rectæ $\beta\eta$. Item quoniam punctum δ , est centrum circuli $\eta\kappa\lambda$: igitur recta $\delta\lambda$ est æqualis rectæ $\delta\eta$, ex quibus $\delta\alpha$ fuit æqualis rectæ $\delta\beta$. reliqua igitur $\alpha\lambda$, reliquæ $\beta\eta$ est æqualis. Vtraq; idcirco rectarum $\alpha\lambda$, $\beta\gamma$, est æqualis rectæ $\beta\eta$. quæ verò eidem sunt æqualia, illa etiã inter se sunt æqualia. quare recta $\alpha\lambda$, etiam erit æqualis rectæ $\beta\gamma$. (*Conclusio.*) Ad datum igitur punctum α , datæ lineæ rectæ $\beta\gamma$: æqualis posita est recta linea $\alpha\lambda$, quod faciendum erat.

Propositio tertia. Problema.

DVabus rectis inæqualibus datis: Ex maiore minori æqualem rectā lineam auferre.

Explicatio dati.) Sit data linea recta maior $\alpha\beta$, minor verò γ . (*Explicatio quæsitæ.*) Ex maiore linea $\alpha\beta$, tollenda est recta æqualis lineæ γ . (*Delineatio.*) Pona-
tur

ὅτω πρὸς τὰ $\bar{a}$ σημείω, τῇ γ ὀρθείᾳ, ἴση ἢ $\bar{a}\delta$,
 καὶ κέντρῳ μὲν τὰ $\bar{a}$, ἀγαστήματι δὲ τὰ $\bar{a}\delta$ κύ-
 κλον γεγράφθω ὁ $\delta\iota\epsilon\zeta$. (Ἀπόδειξις) Καὶ
 ἵππει τὸ $\bar{a}$ σημείον, κέντρον ἐστὶ $\delta\iota\epsilon\zeta$ κύκλου,
 ἴση ἐστὶν ἢ $\bar{a}\epsilon$, τῇ $\bar{a}\delta$. ἀλλὰ καὶ ἡ γ , τῇ $\bar{a}\delta$ ἴ-
 σιν ἴση. ἐκαστέρᾳ ἄρα τῶν $\bar{a}\epsilon$, γ , τῇ $\bar{a}\delta$ ἐστὶν ἴ-
 ση. ὥστε καὶ ἡ $\bar{a}\epsilon$ τῇ γ ἐστὶν ἴση. (Συμπέρασμα.)
 Δύο ἄρα δοθέντων ὀρθείων ἀνίσων τῶν
 $\bar{a}\beta$, γ , ἀπὸ τῆς μείζονος $\bar{a}\delta$, τῇ ἐλάσσονι
 τῇ γ , ἴση ἀφήρηται ἢ $\bar{a}\epsilon$. ὅπερ ἔδει ποιῆσαι.

Πρότεσις δ. θεώρημα

ΕΑΝ δύο τρίγωνα τὰς δύο πλευρὰς ταῖς
 δυσὶ πλευραῖς ἴσαι ἔχη ἐκάπερα ἐκαστέ-
 ρα, καὶ τὴν γωνίαν τῇ γωνίᾳ ἴσην ἔχη, τὴν ὑ-
 πὸ τῶν ἴσων ὀρθῶν περιεχομένην: καὶ τὴν
 βάσιν τῇ βάσει ἴσιν ἔξει, ὥστε τὸ τρίγωνον τὰς
 τριγώνων ἴσον ἔσται, καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι ταῖς
 λοιπαῖς γωνίαις ἴσαι ἔσονται, ἐκάπερα ἐκαστέ-
 ρα, ὅφρα αἱ ἴσαι πλευραὶ ὑπολείψωνται.


Εκθεσις.) Ἐστω δύο τρίγωνα, τὰ $\bar{a}\beta\gamma$,
 $\delta\iota\epsilon\zeta$, τὰς δύο πλευρὰς τὰς $\bar{a}\delta$, $\bar{a}\gamma$, ταῖς
 δυσὶ

etur ad punctum a , linea γ , æqualis recta linea ad . deinde centro a , intervallo ad , describatur circulus $de\zeta$ (secans rectam $a\beta$, in puncto e . (Demonstratio.) Quoniã punctum a , centrũ est circuli $de\zeta$. idcirco recta ae , est æqualis rectæ ad . Verũ recta γ , etiã est æqualis rectæ ad . Vtraq; igitur rectarũ ae , γ , est æqualis rectæ ad . Quare ae etiã est æqualis rectæ γ . Duabus igitur rectis datis inæqualibus $a\beta$, γ : ex maiore $a\beta$, ablata est ae , æqualis minori γ . Quod faciendum erat.

Propositio quarta. Theorema.

SI duo trianguli duo latera duobus lateribus habuerint æqualia alterũ alteri. & angulum angulo æqualem, qui ex equalibus rectis lineis continetur: etiam basim basi habebunt æqualem: & triangulus triangulo erit æqualis: & reliqui anguli, reliquis angulis erunt æquales, alter alteri, quos latera subtendũt æqualia.

Explicatio dati.) Sint duo trianguli $a\beta\gamma$, $de\zeta$, habentes duo latera $a\beta$, ae æqualia,
 γ de
C duo-

δυσὶ πλευραῖς ταῖς δ' ε,
 δ' ζῖσας ἔχοντα ἑκάτεραν
 ἑκατέρα, πῶ μὲν αβ, τῇ
 δ' ε, πῶ δ' ε α γ, τῇ δ' ζ, καὶ
 γωνίαν πῶ ὑπὸ β α γ,
 γωνία τῇ ὑπὸ ε δ' ζ ἴσην. 
 (Διορισμός.) Λέγω ὅτι, Ἐ βάσις ἡ β γ, βάσις
 τῇ ε ζ ἴση ἐστίν, καὶ τὸ α β γ τρίγωνον πᾶσι δ' ε ζ
 τριγώνω ἴσον ἔσται, καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι, ταῖς
 λοιπαῖς γωνίαις ἴσαι ἔσονται ἑκάτερα ἑκατέ-
 ρα, ὅφ' αἱ αἱ ἴσαι πλευραὶ ὑπολείνθωσιν. ἡ
 μὲν ὑπὸ α β γ, τῇ ὑπὸ δ' ε ζ, ἡ δ' ὑπὸ α γ β,
 τῇ ὑπὸ δ' ζ ε. (Απόδειξις.) Εφαρμοζομέ-
 ναι γὰρ τὸ α β γ τρίγωνον ἐπὶ τὸ δ' ε ζ τρίγωνον,
 καὶ πθεμέναις τῶ μὲν α σημείω, ἐπὶ τὸ δ σημεί-
 ων, τὸ δ' ε α β εθείας, ἐπὶ πῶ δ' ε, ἐφαρμόσθαι
 καὶ τὸ β ἐπὶ τὸ ε. Διὰ τὸ ἴσην εἶναι πῶ α β,
 τῇ δ' ε. ἐφαρμοσάσης δ' ε τὸ α β ἐπὶ πῶ δ' ε,
 ἐφαρμόσθαι ἡ α γ εθεία, ἐπὶ πῶ δ' ζ. Διὰ
 τὸ ἴσην εἶναι πῶ ὑπὸ β α γ γωνίαν, τῇ ὑπὸ
 ε δ' ζ. ὥς πε καὶ τὸ γ σημείον, ἐπὶ τὸ ζ σημείον ἐ-
 φαρμόσθαι. Διὰ τὸ ἴσην πάλιν εἶναι πῶ α γ,
 τῇ δ' ζ.

duobus lateribus $\delta \epsilon$, $\delta \zeta$ alterum alteri: latus $\alpha \beta$, æquale lateri $\delta \epsilon$: & latus $\alpha \gamma$, æquale lateri $\delta \zeta$: & angulum $\beta \alpha \gamma$, æqualem angulo $\epsilon \delta \zeta$. (Explicatio quæsitæ.) Dico quòd basis $\beta \gamma$, sit æqualis basi $\epsilon \zeta$: & triangulus $\alpha \beta \gamma$, sit æqualis triangulo $\delta \epsilon \zeta$, & reliqui anguli, reliquis angulis sint æquales, alter alteri, quos æqualia illa latera subtendunt: angulus etiam $\alpha \beta \gamma$, sit æqualis angulo $\delta \epsilon \zeta$: angulus deniq, $\alpha \gamma \beta$, sit æqualis angulo $\delta \zeta \epsilon$. (Demonstratio.) Quando enim triangulus $\alpha \beta \gamma$, applicatur triangulo $\delta \epsilon \zeta$. Punctum α , ponitur super puncto δ : & recta $\alpha \beta$, applicatur rectæ $\delta \epsilon$. Cadet etiam punctum β , super puncto ϵ . quia $\alpha \beta$ est æqualis rectæ $\delta \epsilon$. Deinde si recta $\alpha \beta$, applicatur rectæ $\delta \epsilon$: etiam recta $\alpha \gamma$, applicabitur rectæ $\delta \zeta$. quoniam angulus $\beta \alpha \gamma$, proponitur æqualis angulo $\epsilon \delta \zeta$. quare & punctum γ , applicabitur puncto ζ . cum recta $\alpha \gamma$, æ-

C 2 qualis

τῇ δζ. ἀλλὰ μὲν καὶ τὸ β, ὅτι τὸ εἰς φημὸς
 κει. ὥστε βάσις ἡ βγ, ὅτι βάσιν πλὴν ἐξ
 φημὸς. εἰ γὰρ τῷ, μὲν β ὅτι τὸ εἰς φημὸς
 σαι,  γ ὅτι τὸ ζ, ἡ βγ βάσις ὅτι πλὴν
 ἐξ κει φημὸς; δύο ὁθεῖαι χωρίον περιέ-
 ξουσιν, ὅπως ἀδιώκον. Εφημὸς ἄρα ἡ
 βγ βάσις, ὅτι πλὴν ἐξ καὶ ἴση αὐτῇ ἔσται, ὥς
 περὶ ὅλον τὸ αβγ τρίγωνον, ὅτι ὅλον τὸ δεξ
 τρίγωνον ἐφημὸς, καὶ ἴσον αὐτῷ ἔσται. καὶ
 αἱ λοιπαὶ γωνίαι, ὅτι τὰς λοιπὰς γωνίας
 ἐφημὸς, καὶ ἴσαι αὐταῖς ἔσονται, ἡ μὲν
 ὑπὸ αβγ, τῇ ὑπὸ δεξ, ἡ δὲ ὑπὸ αγκβ
 τῇ ὑπὸ δζε. (Συμπέρασμα.) Εὰν ἄρα
 δύο τρίγωνα τὰς δύο πλευρὰς ταῖς διῦσι ἴ-
 σαις ἔχη ἐκάτεραν ἐκείρα, ἢ πλὴν γωνίαν τῇ
 γωνία ἴσην ἔχη, πλὴν ὑπὸ τῶν ἴσων ὁθεῶν
 περιεχομένῳ: καὶ πλὴν βάσιν τῇ βάσει ἴσην ἔ-
 ξαι, καὶ τὸ τρίγωνον τῷ τριγώνῳ ἴσον ἔσται: καὶ
 αἱ λοιπαὶ γωνίαι ταῖς λοιπαῖς γωνίαις ἴσαι
 ἔσονται ἐκάτερα ἐκείρα, ὅφ' αἱ ἴσαι πλε-
 ραὶ ὑπολείνουσιν. ὅπως εἶδει δεῖξαι.

Πρότασις ε. Θεώρημα.

Τῶν

qualis sit rectæ $\delta\zeta$. Verum punctum β , applicabatur puncto ϵ . Basis igitur $\beta\gamma$, basi $\epsilon\zeta$ applicabitur. Nam si punctum β , applicetur puncto ζ , & basis $\epsilon\gamma$, non applicetur basi $\epsilon\zeta$: tum duæ rectæ figuram facient, quod est impossibile. Basis igitur $\beta\gamma$, basi $\epsilon\zeta$ applicatur, & est ei equalis. Unde & totus triangulus $\alpha\beta\gamma$, toto triangulo $\delta\epsilon\zeta$ applicabitur, & ei erit equalis: & reliqui anguli, reliquis angulis applicabuntur, eisq; erunt æquales: angulus $\alpha\beta\gamma$, angulo $\delta\epsilon\zeta$: & angulus $\alpha\gamma\beta$, angulo $\delta\zeta\epsilon$. (Conclusio.) Si igitur duo trianguli, duo latera duobus lateribus habuerint æqualia alterum alteri, & angulum angulo æqualem, qui æqualibus rectis lineis continetur: etiam basin basi habebunt æqualem: & triangulus triangulo erit equalis: & reliqui anguli, reliquis angulis erunt æquales alter alteri, quos æqualia illa latera subtendunt. quod erat demonstrandum.


Propositio quinta. Theorema.

C 3 Trian-

Τὼν ἰσοσκελῶν τριγώνων, αἱ πρὸς τῇ βάσει
γωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶ. καὶ προσεκ-
κληθῶσιν τῶν ἴσων ὀρθῶν, αἱ ὑπὸ τῷ βά-
σιν γωνίαι, ἴσαι ἀλλήλαις ἔσονται.

Εκθεσις.) Εἶπω τρίγωνον ἰσοσκελὲς τὸ $\alpha\beta\gamma$,
ἴσῳ ἔχον τῷ $\alpha\beta$ πλάγῳ, τῇ $\alpha\gamma$ πλάγῳ
καὶ προσεκβεβλήσασιν ἐπ' ὀθείας $\lambda\alpha\iota\varsigma$ $\alpha\beta$,
 $\alpha\gamma$, ὀθείαι αἱ $\beta\delta$, $\gamma\epsilon$. (Διορισμός.) Λέγω ὅτι
ἡ μὲν ὑπὸ $\alpha\beta\gamma$ γωνία,
τῇ ὑπὸ $\alpha\gamma\beta$ ἴση ἐστίν, ἡ
δὲ ὑπὸ $\gamma\beta\delta$, τῇ ὑπὸ
 $\beta\gamma\epsilon$. (Κατασκευὴ.) Εἰ-
λήφθω γὰρ ὅτι τῇ $\beta\delta$, τυ-
χὸν σημεῖον τὸ ζ , καὶ ἀφῆ-
ρήστω ἀπὸ τῆς μείζονος τῆς $\alpha\epsilon$, τῇ ἐλάττω
τῇ $\alpha\zeta$ ἴση ἡ $\alpha\eta$, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ $\zeta\gamma$, $\eta\beta$
εὐθεῖαι. (Απόδειξις.) Ὡς ἐν ἴση ἐστίν ἡ μὲν
 $\alpha\zeta$, τῇ $\alpha\eta$, ἡ δὲ $\alpha\beta$, τῇ $\alpha\gamma$, δύο δὲ αἱ $\zeta\alpha$, $\alpha\gamma$,
δυσὶ ταῖς $\eta\alpha$, $\alpha\beta$, ἴσαι εἰσὶν ἐκάτερα ἐκάτε-
ρα. καὶ γωνίαι κοινῶς περιέχουσιν τῷ ὑπὸ
 $\zeta\alpha\eta$. βάσις ἄρα ἡ $\zeta\gamma$, βάσις τῇ $\eta\beta$ ἴση ἐστίν. καὶ
τὸ $\alpha\zeta\gamma$ τρίγωνον, τῷ $\alpha\eta\beta$ τριγώνῳ ἴσον ἔσται.

καὶ



TRIangulorum, qui duo æqualia habēt latera, anguli ad basim sunt æquales. Et productis æqualibus illis rectis, etiam qui sub basi sunt anguli, inter se erunt æquales.

Explicatio dati.) Sit triangulus æquicrurus $αβγ$, habens latus $αβ$, æquale lateri $αγ$: & producantur lineæ $αβ$, $αγ$, & $α$ ἐν $δε$ ίαις, (hoc est, ut continuè extendatur secundum lineam rectam) & fiant rectæ $βδ$, $γε$. (*Explicatio quæsiti*) Dico quod angulus $αβγ$, sit æqualis angulo $αγβ$. Et quod angulus $γβδ$, sit æqualis angulo $βγε$. (*Delineatio.*) Sumatur in linea $βδ$, punctum quoduis $ζ$. deinde tollatur à maiore linea $αε$, minori $αζ$, æqualis linea recta $αη$. deniq; ducantur rectæ $ζγ$, $ηβ$. (*Demonstratio.*) Quoniam recta $αζ$, est æqualis rectæ $αη$: & recta $αβ$, æqualis rectæ $αγ$: duæ igitur rectæ $ζα$, $αγ$, duobus rectis $ηα$, $αβ$ sunt æquales, altera alteræ: & cōmūnem ambiunt $ζαν$ angulum. quare basis $ζγ$, basi $ηβ$ est æqualis, & triangulus $αζγ$,

καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι ταῖς λοιπαῖς γωνίαις
 ἴσαι ἔσονται ἐκάτερα ἐκάτερα, ὅφ' ἂς αἱ ἴσαι
 πλάραι ὑπολείνθωσιν. ἢ μὲν ὑπὸ $\alpha\gamma\zeta$, τῇ
 ὑπὸ $\alpha\beta\eta$, ἢ δὲ ὑπὸ $\alpha\zeta\gamma$, τῇ ὑπὸ $\alpha\eta\beta$. καὶ
 ἐπεὶ ὅλη ἡ $\alpha\zeta$, ὅλη τῇ $\alpha\eta$ ἐστὶν ἴση, ὧν ἡ $\alpha\beta$ τῇ
 $\alpha\gamma$ ἐστὶν ἴση, λοιπὴ ἄρα ἡ $\beta\zeta$ λοιπῇ τῇ $\gamma\eta$ ἐ-
 στὶν ἴση. ἐδείχθη δὲ ὅτι ἡ $\zeta\gamma$, τῇ $\eta\beta$ ἴση. δύο δὲ
 αἱ $\beta\zeta$, $\zeta\gamma$, δυσὶ ταῖς $\gamma\eta$, ἡ β , ἴσαι εἰσὶν, ἐκά-
 τερα ἐκάτερα, καὶ γωνία ἡ ὑπὸ $\beta\zeta\gamma$, γωνία
 τῇ ὑπὸ $\gamma\eta\beta$ ἐστὶν ἴση, καὶ βάσις αὐτῶν κοινὴ, ἡ $\beta\gamma$.
 ὁ $\beta\zeta\gamma$ ἄρα τρίγωνον, τῷ $\gamma\eta\beta$ τριγώνῳ
 ἴσον ἔσται, ὅτι αἱ λοιπαὶ γωνίαι, ταῖς λοιπαῖς
 γωνίαις ἴσαι ἔσονται) ἐκάτερα ἐκάτερα, ὅφ' ἂς
 αἱ ἴσαι πλάραι ὑπολείνθωσιν. ἴση ἄρα ἐστὶν, ἢ
 μὲν ὑπὸ $\zeta\beta\gamma$, τῇ ὑπὸ $\eta\gamma\beta$, ἢ δὲ ὑπὸ $\beta\gamma\zeta$
 τῇ ὑπὸ $\gamma\beta\eta$. ἐπεὶ ἔν ὅλη ἡ ὑπὸ $\alpha\beta\eta$ γω-
 νία, ὅλη τῇ ὑπὸ $\alpha\gamma\zeta$ γωνία ἐδείχθη ἴση, ὧν
 ἡ ὑπὸ $\gamma\beta\eta$, τῇ ὑπὸ $\beta\gamma\zeta$ ἴση, λοιπὴ ἄρα ἡ
 ὑπὸ $\alpha\beta\gamma$, λοιπῇ τῇ ὑπὸ $\alpha\gamma\beta$ ἐστὶν ἴση. καὶ εἰσι
 πρὸς τῇ βάσει, ὅτι $\alpha\beta\gamma$ τριγώνον. ἐδείχθη δὲ καὶ
 ἡ ὑπὸ $\zeta\beta\gamma$, τῇ ὑπὸ $\eta\gamma\beta$ ἴση, καὶ εἰσὶν ὑπο-
 τῶν βάσιν. (Συμπέρασμα.) Τῶν ἄρα ἰσοσκε-
 λῶν


triangulo $\alpha\eta\beta$ aequalis est: reliqui etiam an-
 guli, reliquis angulis aequales sunt, alter al-
 teri, quos aequalia illa latera subtendunt: an-
 gulus $\alpha\gamma\zeta$ angulo $\alpha\beta\eta$: & angulus $\alpha\zeta\gamma$, an-
 gulo $\alpha\eta\beta$. Cū verò tota recta $\alpha\zeta$, toti rectæ $\alpha\eta$
 sit aequalis, & recta $\alpha\beta$ ablata, sit aequalis re-
 ctæ $\alpha\gamma$ ablata, idcirco reliqua linea recta $\zeta\gamma$,
 reliquæ rectæ $\gamma\eta$ etiam erit aequalis. Verum
 recta $\zeta\gamma$ demonstrata est aequalis esse rectæ
 $\eta\beta$. duæ igitur rectæ $\beta\zeta$, $\zeta\gamma$, duabus rectis
 $\gamma\eta$, $\eta\beta$ sunt aequales altera alteræ: & angu-
 lus $\beta\zeta\gamma$, aequalis est angulo $\gamma\eta\beta$: basis eti-
 am eorum communis est recta $\beta\gamma$: triangu-
 lus igitur $\beta\zeta\gamma$, triangulo $\gamma\eta\beta$ etiam erit æ-
 qualis: & reliqui anguli, reliquis angulis
 aequales: quos aequalia illa latera subtendunt.
 angulus $\zeta\beta\gamma$, aequalis angulo $\eta\gamma\beta$: & an-
 gulus $\beta\gamma\zeta$, angulo $\gamma\beta\eta$. Quoniam nunc to-
 tus angulus $\alpha\beta\eta$, toto angulo $\alpha\gamma\zeta$ demonstra-
 tus est aequalis: quorū ablati angulus $\gamma\eta\beta$,
 ablato angulo $\beta\gamma\zeta$ est aequalis: ergo reliquus
 $\alpha\zeta\gamma$ angulus, reliquo $\alpha\gamma\zeta$ angulo est æqua-
 lis, & sunt anguli ad basim trianguli $\alpha\beta\gamma$.

λῶν τριγώνων, αἱ πρὸς τῇ βάσει γωνίαι, ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶ. καὶ προσεκβληθῶν τῶν ἴσων εὐθειῶν, αἱ ὑπὸ τῷ βάσει γωνίαι, ἴσαι ἀλλήλαις εἰσονται. ὅπως ἔδει δεῖξαι.

Πρότασις 5. Θεώρημα.

ΕΑν τριγώνῳ αἱ δύο γωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις ᾦσι, καὶ αἱ ὑπὸ τὰς ἴσας γωνίας ὑπολείπουσαι πλῆραι, ἴσαι ἀλλήλαις εἰσονται.

Εκθεσις.) Εἰς τριγώνον, τὸ $\alpha\beta\gamma$, ἴσην ἔχον τῷ ὑπὸ $\alpha\beta\gamma$ γωνίαν, τῇ ὑπὸ $\alpha\gamma\beta$ γωνία. (Διορισμός.) Λέγω ὅτι καὶ πλῆρὰ ἢ $\alpha\beta$, πλῆρὰ τῇ $\alpha\gamma$ εἰσὶν ἴση. (Κατασκευὴ.) Εἰ γὰρ ἄνισός ἐστιν ἡ $\alpha\beta$, τῇ $\alpha\gamma$, ἢ ἑτέρα αὐτῇ μείζων ἐστίν. ἔσω μείζων ἢ $\alpha\beta$, καὶ ἀφηρήσθω ἀπὸ τῆς μείζονος τῆς $\alpha\beta$, τῇ ἐλάσσονι τῇ $\alpha\gamma$, ἴση ἢ $\delta\beta$, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ $\delta\gamma$. (Απόδειξις.) Ἐπεὶ ἄν ἴση ἐστίν ἡ $\delta\beta$ τῇ $\alpha\gamma$, κοινὴ δὲ ἡ $\beta\gamma$: δύο δὲ αἱ $\delta\beta, \beta\gamma$ δύοσι ταῖς $\alpha\gamma, \gamma\beta$, ἴσαι εἰσὶν, ἐκάτερα ἐκατέρᾳ, καὶ γωνία ἡ ὑ-



πὸ

Angulus verò $\angle \beta \gamma$, angulo $\alpha \gamma \epsilon$ demonstratus est equalis esse: & sunt sub basi. (Conclusio.) Triangulorum igitur, qui duo habent equalia latera, anguli ad basim sunt equalles, & productis equalibus illis rectis, etiam qui sub basi sunt anguli, inter se erunt equalles. Id quod erat demonstrandum.

Propositio sexta. Theorema.

STrianguli duo anguli equalles inter se fuerint: etiam latera, quæ equalles illos angulos subtendunt, erunt inter se equalia.


Explicatio dati.) Sit triangulus $\alpha \beta \gamma$, habens angulum $\alpha \beta \gamma$, æqualem angulo $\alpha \gamma \beta$. *Explicatio quesiti.)* Dico quod latus $\alpha \beta$, est æquale lateri $\alpha \gamma$. (Delineatio cum hypothefi.) Si enim recta $\alpha \epsilon$, nō est equalis rectæ $\alpha \gamma$: altera illarum erit maior, sit recta $\alpha \beta$ maior. ex recta $\alpha \beta$ maiore: lineæ rectæ $\alpha \gamma$ minori auferatur lineæ rectæ $\beta \delta$ equalis: & ducatur recta $\delta \gamma$. (Demonstratio.) Quoniā latus $\delta \beta$, æquale est lateri $\alpha \gamma$, & cōmune latus $\epsilon \gamma$: duo igitur latera $\delta \epsilon$, $\beta \gamma$, duobus laterib⁹ $\alpha \gamma$, $\gamma \beta$

πὸ δβγ, γωνία τῇ ὑπὸ ᾱγβ ἐστὶν ἴση, βάσις
 ἄρα ἡ δγ, βάσις τῇ ᾱβ ἴση ἐστὶν. καὶ τὸ ᾱβγ
 τριγώνον, τὰ δγβ τριγώνω ἴσον ἔσται. τὰ δ
 λαοσόνι τὸ μείζον. ὅπως ἄττον, ἐκ ἄρα αὐ-
 σός ἐστιν ἡ ᾱβ, τῇ ᾱγ: ἴση ἄρα. (Συμπέρασ-
 μα.) Εἰν ἄρα τριγώνω αὐ δὺο γωνία ἴσαι
 ἀλλήλαις ὡσι, καὶ αὐ ὑπὸ τὰς ἴσαις γωνίας
 ὑπολείπονται πλῆρη, ἴσαι ἀλλήλαις ἔσονται.
 ὅπως ἔδει δείξαι.

Πρότασις ζ. Θεώρημα.

Εἰ τῆς αὐτῆς εὐθείας δύοσι ταῖς αὐταῖς
 εὐθείαις, ἄλλαι δύο εὐθεῖαι ἴσαι ἐκάτερα
 ἐκατέρα εὐσταθήσονται, πρὸς ἄλλω, ὥς ἄλλω
 σημείω, ὅτι τὰ αὐτὰ μέρη, τὰ αὐτὰ πέρα-
 τα ἔχουσι ταῖς ἐξ ἀρχῆς εὐθείαις.

Εκθεσις.) Εἰ γὰρ διω-
 τὸν, ὅτι τῆς αὐτῆς εὐθεί-
 ας τῆς ᾱβ, δύοσι ταῖς αὐ-
 ταῖς εὐθείαις ταῖς ᾱγ,
 γβ, ἄλλαι δύο εὐθεῖαι, αὐ
 ᾱδ, δβ, ἴσαι ἐκάτερα ἐκα



τέρη συνεσάτωσαν, πρὸς ἄλλω, καὶ ἄλλω ση-
 μείω

LIBER I.

sunt equalia alteri alteri: & angulus $\delta\beta\gamma$,
 angulo $\alpha\gamma\beta$ est equalis. Basis igitur $\delta\gamma$, basi
 $\alpha\beta$ est equalis: & triangulus $\alpha\beta\gamma$, trian-
 gulo $\delta\gamma\beta$ est equalis: maior minori. quod
 est absurdum. Quare recta $\alpha\beta$, non est ine-
 qualis recte $\alpha\gamma$, itaq; erit ei equalis. (Con-
 clusio.) Si ergo trianguli, duo anguli equa-
 les inter se fuerint: etiam latera, quæ aequales
 illos angulos subtendunt, erunt inter se aqua-
 lia. Id quod erat demonstrandum.

Propositio septima. Theorema.

SV per eadē lineā rectā, duabus eif-
 dem rectis, aliæ duę rectæ æquales
 altera alteri, non statuentur ad aliud,
 atq; aliud punctum, in easdem partes,
 eosdem habentes terminos, quos li-
 neæ primæ.

Explicatio dati.) Si enim est possibile, sit
 lineā rectā $\alpha\beta$, & super ea duabus rectis $\alpha\gamma$,
 $\gamma\beta$, constitutis: aliæ duæ lineæ rectæ ad, $\delta\beta$.
 constituentur æquales altera alteri: ad aliud
 atq;

μείω, τῷ τε γ, καὶ δ, ὅτι τὰ αὐτὰ μέρη τὰ
 γδ, τὰ αὐτὰ πέρατα ἔχουσι, τὰ α, β, ταῖς
 ἐξ ἀρχῆς εὐθείαις, ὥτε ἴσῃ εἶναι, πλὴν μὲν
 γα, τῇ δα, τὸ αὐτὸ πέρας ἔχουσιν αὐτῇ,
 τὸ α, πλὴν δὲ γβ τῇ δβ, τὸ αὐτὸ πέρας ἔχου-
 σιν αὐτῇ τὸ β. (Κατασκευὴ.) Καὶ ἐπιζεύχ-
 θω ἡ γδ. (Απόδοξις.) Ἐπεὶ ἔν ἴσῃ εἰσὶν ἡ αγ
 τῇ αδ, ἴση ἐστὶ καὶ γωνία ἡ ὑπὸ αγδ, τῇ ὑπὸ
 αδγ. μείζων ἄρα ἡ ὑπὸ αδγ τῆς ὑπὸ δγβ.
 πολλῶν ἄρα ἡ ὑπὸ γδβ, μείζων ἐστὶ τῇ ὑπὸ
 δγβ, πάλιν ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ γβ τῇ δβ, ἴση ἐ-
 στὶ, ἢ γωνία ἡ ὑπὸ γδα, γωνία τῇ ὑπὸ δγβ.
 εἰδείχθη δὲ αὐτῆς, καὶ πολλῶν μείζων, ὅπερ ἐστὶν
 ἀδύνατον. (Συμπεράσμα.) Ὅσα ἄρα ὅτι τῇ
 αὐτῆς εὐθείας, δύοσι ταῖς αὐταῖς εὐθείαις,
 ἄλλαι δύο εὐθεῖαι ἴσαι ἐκάτερα ἐκαστέρα
 εἴσονται, πρὸς ἄλλω, καὶ ἄλλω σημείω, ὅτι τὰ
 αὐτὰ μέρη, τὰ αὐτὰ πέρατα ἔχουσι ταῖς
 ἐξ ἀρχῆς εὐθείαις. ὅπως εἶδει δεῖξαι.

Πρότασις η. Θεώρημα.

Ε Αν δύο τρίγωνα, τὰς δύο πλευρὰς ταῖς
 δύοσι πλευραῖς ἴσας ἔχη ἐκάτεραν ἐκαστέ-
 ρα, ἔχη δὲ καὶ πλὴν βάσιν, τῇ βάσει ἴσῃ, καὶ


atq; aliud punctum γ & δ in easdem partes
 γ , & δ : eosdē habentes terminos α , & β : quos
 linea recta prima: ita ut $\gamma\alpha$ aequalis sit $\delta\alpha$: et
 eundem habeat terminū α : recta verò $\gamma\beta$, sit
 aequalis recta $\delta\beta$, & eundem cum ea habeat
 terminū β . (Delineatio.) Et ducatur recta
 $\gamma\delta$. (Demonstratio.) Quoniā $\alpha\gamma$ recta est α -
 qualis recta $\alpha\delta$: etiam angulus $\alpha\gamma\delta$, erit α -
 qualis angulo $\alpha\delta\gamma$. Verum angulus $\alpha\delta\gamma$,
 maior est angulo $\delta\gamma\beta$: multò ergo angulus
 $\gamma\delta\beta$ maior est angulo $\delta\gamma\beta$. Item, quoniam
 latus $\gamma\beta$, est æquale lateri $\delta\beta$: erit etiam an-
 gulus $\gamma\delta\alpha$, angulo $\delta\gamma\beta$ æqualis. Verum ille
 ipse angulus $\gamma\delta\alpha$ demonstratus est esse multò
 maior angulo $\delta\gamma\beta$, quod est impossibile. (Cō-
 clusio.) Super eadem igitur recta, duabus eisdem re-
 ctis, aliæ duæ rectæ æquales altera alteri: non statu-
 entur ad aliud atq; aliud punctum, in easdem partes,
 eosdem habentes terminos, quos linea prima. Id
 quod erat demonstrandum.

Propositio octava. Theorema.

SI duo trianguli, duo latera duobus lateri-
 bus habuerint æqualia alterum alteri, ha-
 buerint verò etiam basin, æqualem basi: etiā
 angu-

πὺν γωνίαν τῇ γωνίᾳ ἴσην ἔξῃ, πὺν ὑπὸ τῶν
ἴσων ἐν θῶν περιεχομένῳ.

Εκθεσις.) Εἰς δύο τρί-
γωνα, τὰ $\alpha\beta\gamma$, δὲ, τὰς
δύο πλευράς τὰς $\alpha\beta$,
 $\alpha\gamma$, ταῖς δυσὶ πλευραῖς
ταῖς δὲ, δὲ, ἴσας ἔχοντα ἐ-
κάτεραν ἐκάτερα, πὺν μὲν



$\alpha\beta$, τῇ δὲ, πὺν δὲ $\alpha\gamma$, τῇ δὲ, ἔχεται ἡ καὶ βά-
σιν πὺν $\beta\gamma$, βάσις τῇ ἐξ ἴσην. (Διορισμός.)
Λέγω ὅτι, καὶ γωνία ἡ ὑπὸ $\beta\alpha\gamma$, γωνία τῇ
ὑπὸ $\epsilon\delta\zeta$ ἐστὶν ἴση. (Κατασκευὴ.) Εφαρμοζο-
μένῃς γὰρ $\alpha\beta\gamma$ τριγώνῃς, ὅτι τὸ δὲ τρίγω-
νον, καὶ πεποιημένῃς τῶν μὲν β σημείῳ ὅτι τὸ ἐση-
μεῖον, τῷ δὲ $\beta\gamma$ ἐνθείᾳ ὅτι πὺν ἐξ, ἐφαρμό-
σας, ἔστω τὸ γ σημεῖον ὅτι τὸ ζ : Διὰ τὸ ἴσην εἶναι
πὺν $\beta\gamma$ τῇ ἐξ. (Απόδοξις.) Εφαρμοσάσης δὲ
τῷ $\beta\gamma$, ὅτι πὺν ἐξ, ἐφαρμόξασσι, ἔστω αἱ $\beta\alpha$, $\gamma\alpha$,
ὅτι τὰς $\epsilon\delta$, $\delta\zeta$. εἰ γὰρ βάσις μὲν ἡ $\beta\gamma$, ὅτι βά-
σιν πὺν ἐξ ἐφαρμόσας, αἱ δὲ $\beta\alpha$, $\alpha\gamma$ πλευραὶ
ὅτι τὰς $\epsilon\delta$, $\delta\zeta$, ὅτι ἐφαρμόξασιν, ἀλλὰ πα-
ραλλάξασιν, ὡς αἱ $\epsilon\eta$, $\eta\zeta$, συσταθήσονται ὅτι τῆς
αὐτῆς

angulum angulo habebunt æqualem, quem
æquales illæ lineæ rectæ continent.

Explicatio dati.) Sint duo triäguli $\alpha\beta\gamma$,
 $\delta\epsilon\zeta$: habentes duo latera $\alpha\epsilon$, $\alpha\gamma$: duobus la-
teribus $\delta\epsilon$, $\delta\zeta$ æqualia, alterum alteri, latus
scilicet $\alpha\beta$, æquale lateri $\delta\epsilon$: & latus $\alpha\gamma$, æ-
quale lateri $\delta\zeta$: item basim $\beta\gamma$, æqualem ba-
si $\epsilon\zeta$. (*Explicatio quesiti.)* Dico quòd an-
gulus $\beta\alpha\gamma$, sit æqualis angulo $\alpha\delta\zeta$. (*Deline-*
atio.) Quando enim triangulus $\alpha\beta\gamma$, appli-
catur triangulo $\delta\epsilon\zeta$, & punctum β , ponitur
super puncto ϵ : linea quoq, recta $\epsilon\gamma$, applica-
tur rectæ $\epsilon\zeta$: tum punctum γ , etiam applica-
bitur puncto ζ : quia recta $\beta\gamma$, est æqualis re-
ctæ $\epsilon\zeta$. (*Demonstratio.)* Quando verò recta
 $\beta\gamma$, applicatur rectæ $\epsilon\zeta$: applicabuntur etiã
rectæ $\beta\alpha$, $\alpha\gamma$, rectis $\epsilon\delta$, $\delta\zeta$. Si enim basis $\beta\gamma$,
applicatur basi $\epsilon\zeta$, & latera $\beta\alpha$, $\alpha\gamma$, non ap-
plicentur lateribus $\epsilon\delta$, $\delta\zeta$. Verũ diuersum ha-
buerint sitũ, ut rectæ $\epsilon\eta$, $\eta\zeta$ Constituentur sus-
D per

αὐτῆς ὁθείας, δύοσι ταῖς αὐταῖς ὁθείαις, ἄλλαι δύο ὁθεῖαι ἴσαι, ἐκάτερα ἐκαστέρα πρὸς ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ σημείῳ, ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη, τὰ αὐτὰ πέρατα ἔχουσι. ὃ συνίστανται δὲ, ὅτι ἄρα ἐφαρμοζομένης τῆ βγ, βάσεως ἐπὶ τῷ ἐξ βάσιν, ὅτι ἐφαρμόσῃσι εἰς αἱ βᾶ, αγ πλῆρη καὶ ἐπὶ τὰς ἐδ, δζ. ἐφαρμόσῃσι ἄρα. ὥστε καὶ γωνία ἡ ὑπὸ βᾶγ, ἐπὶ γωνίαν τῷ ὑπὸ ἐδζ ἐφαρμόσῃ, καὶ ἴση αὐτῇ ἔσται. (Συμπέρασμα.) Εάν ἄρα δύο τρίγωνα τὰς δύο πλῆρεις ταῖς δύοσι πλῆρεσι, ἴσας ἔχη ἐκάτερα ἐκαστέρα, καὶ τῷ βάσιν τῇ βάσει ἴσην ἔχει, καὶ τῷ γωνίαν τῇ γωνίᾳ ἴσην ἔξει, τὴν ὑπὸ τῶν ἴσων ὁθῶν περιεχομένην. ὅπως ἐδδ δεῖξαι.

Πρότασις θ. Πρόβλημα.

Τὴν δοθεῖσαν γωνίαν ὁθύγραμμον, δίχα πεμεῖν.

Εκθεσις.) Εἰς ἡ δοθεῖσα γωνία ὁθύγραμμοι, ἡ ὑπὸ βᾶγ. (Διορισμός.) Δεῖ δὴ αὐτὴν δίχα πεμεῖν. (Κατασκευὴ.) Εἰλήφθω ἐπὶ τῆς αβ τυχὸν σημεῖον τὸ δ. καὶ ἀφῆρή-
δω


per eadē lineā rectā, duabus eisdē rectis aliā
 duā rectā equales altera alteri, ad aliud, atq;
 aliud punctum, ad easdem partes, eosdem ha-
 bentes terminos, quos lineā primā. sed non
 statuentur ad diuersum punctum. Quare fal-
 sum est, quod applicata basi $\beta\gamma$, basi $\epsilon\zeta$: non
 applicetur $\beta\alpha$, $\alpha\gamma$, latera, lateribus $\epsilon\delta$, $\delta\zeta$.
 applicabuntur ergo. Unde sequitur, quod an-
 gulus $\beta\alpha\gamma$, applicabitur angulo $\epsilon\delta\zeta$ & ei e-
 rit equalis. (Conclusio.) Si igitur duo tri-
 anguli, duo latera duobus lateribus habue-
 rint equalia alterum alteri: habuerint verò
 etiam basim basi equalem: etiam angulum
 angulo habebunt equalem, quem equales il-
 læ rectæ lineæ cōtinent. Id quod erat demon-
 strandum.

Propositio nona. Problema.

Datum angulū rectilineū per medium
 secare, vel in duas partes equales secare.

Explicatio dati.) Sit datus angulus recti-
 lineus $\beta\alpha\gamma$. (Explicatio quæsit.) Angulus
 $\beta\alpha\gamma$ secāndus est in duas partes equales. (De-
 lineatio.) Sumatur in lineā $\alpha\epsilon$, punctū quod-

ὡς ἀπὸ τῆς $\alpha\gamma$, τῇ $\alpha\delta$
 ἴση, ἢ $\alpha\epsilon$, καὶ ἐπεζεύχθω
 ἡ $\delta\epsilon$, καὶ σιυνεσάτω ὅππῃ
 δὲ τρίγωνον ἰσόπλευρον,
 τὸ $\delta\lambda\epsilon$, καὶ ἐπεζεύχθω
 ἡ $\alpha\zeta$. (Διορισμὸς τῆς καὶ
 σκευῆς.) Λέγω ὅτι ἡ ὑ-



πὸ $\beta\alpha\gamma$ γωνία δίχα τέτμη) ὑπὸ τῆς $\alpha\zeta$ α
 θείας. (Απόδειξις.) Ἐπεὶ γὰρ ἴσῃ ἐστὶν ἡ $\alpha\delta$,
 τῇ $\alpha\epsilon$, καὶ ἡ $\delta\epsilon$ ἡ $\alpha\zeta$, δύο δὲ αἱ $\delta\lambda\alpha$, $\alpha\zeta$ δυσὶ
 ταῖς $\epsilon\alpha$, $\alpha\zeta$ ἴσαι εἰσὶν ἐκάτερα ἐκείρα. καὶ βά-
 σις ἡ $\delta\lambda\epsilon$, βάσις τῇ $\epsilon\zeta$ ἴση ἐστὶ. γωνία ἄρα ἡ ὑ-
 πὸ $\delta\lambda\alpha\zeta$ γωνία τῇ ὑπὸ $\epsilon\alpha\zeta$ ἐστὶν ἴση. (Συμ-
 πέρασμα.) Ἡ ἄρα διδιθεῖσα γωνία $\alpha\delta\gamma$ -
 γραμμῶν ἡ ὑπὸ $\beta\alpha\gamma$, δίχα τέτμηται ὑ-
 πὸ τῆς $\alpha\zeta$ α θείας. ὅπως εἰρηποίησα.

Πρότασις ι. Πρόβλημα.

Τὴν διδιθεῖσαν $\alpha\delta\epsilon$ ἴαν πεπερασμένην,
 δίχα πμεῖν.

Εκθεσις.) Ἐστω ἡ διδιθεῖσα $\alpha\delta\epsilon$ ἴα πεπερασ-
 μένη, ἢ $\alpha\beta$. (Διορισμὸς.) Δεῖ δὲ πλὴν $\alpha\beta$, δί-
 χα πμεῖν. (Κατασκευὴ.) Σιυνεσάτω ἐπ' αὐ-
 τῆς

uis δ , & collatur ex linea $\alpha\gamma$, linea ad δ æqualis recta linea $\alpha\epsilon$: postea ducatur linea $\delta\epsilon$: & statuatur super linea $\delta\epsilon$, triangulus æquilaterus $\delta\zeta\epsilon$: deniq; ducatur linea $\alpha\zeta$. (Explicatio iam facta delineationis.) Dico quòd linea $\alpha\zeta$ in duas partes æquales secet angulū $\beta\alpha\gamma$. (Demonstratio.) Quoniam recta $\alpha\delta$, æqualis est rectæ $\alpha\epsilon$, et communis sit recta $\alpha\zeta$: idcirco duo latera $\delta\alpha$, $\alpha\zeta$, duobus lateribus $\epsilon\alpha$, $\alpha\zeta$, sunt æqualia alterum alteri: & basis $\delta\zeta$, æqualis basi $\epsilon\zeta$. Angulus igitur $\delta\alpha\zeta$, angulo $\epsilon\alpha\zeta$ est æqualis. (Conclusio.) Datus igitur angulus rectilineus $\beta\alpha\gamma$, per lineam rectam $\alpha\zeta$, est dissectus in duas partes æquales. Id quod faciendum erat.


Propositio decima. Problema.

DAtam lineam rectam finitam in duas partes æquales secare.

Explicatio dati.) Sit data linea recta finita $\alpha\beta$. (Explicatio quæsiti.) Linea recta finita $\alpha\beta$, diffecanda est in duas partes æquales. (Delineatio.) Statuatur super recta

$\alpha\beta$,
D 3

τῆς τριγώνου ἰσόπλευρον
τὸ $\alpha\beta\gamma$, καὶ τεμήσθω ἡ ὑ-
πὸ $\alpha\beta\gamma$ γωνία δίχα, τῇ
 $\gamma\delta$ εὐθείᾳ. (Διορισμός τῆς
κατασκευῆς.) Λέγω ὅτι ἡ
 $\alpha\beta$ εὐθεῖα, δίχα τέτμηται



καὶ τὸ δ σημεῖον. (Απόδειξις.) Ὡς γὰρ ἴση
ἔστιν ἡ $\alpha\gamma$, τῇ $\gamma\delta$, κοινὴ δὲ ἡ $\gamma\delta$, δύο δὲ αἱ $\alpha\gamma$,
 $\gamma\delta$, δύοσι ταῖς $\beta\gamma$, $\gamma\delta$, ἴσαι εἰσὶν ἐκάτερα ἐκα-
τέρα, καὶ γωνία ἡ ὑπὸ $\alpha\gamma\delta$, γωνία τῇ ὑπὸ
 $\beta\gamma\delta$ ἔστιν ἴση. Βάσις ἄρα ἡ $\alpha\delta$, βάσις τῇ $\beta\delta$
ἔστιν ἴση. (Συμπέρασμα.) Ἡ ἄρα διχοθεῖσα
εὐθεῖα πεπερασμένη ἡ $\alpha\beta$, δίχα τέτμηται
κατὰ τὸ δ, ὅπερ ἔδει ποιῆσαι.

Πρότασις ια. πρόβλημα.

Τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ, ἀπὸ Γ πρὸς αὐτῇ δο-
θέντος σημείου, πρὸς ὀρθᾷ γωνίᾳ, εὐθεί-
αν χαμμελῶ ἀγαγεῖν.

Εκθεσις.) Ἐστω ἡ μὲν δοθεῖσα εὐθεῖα, ἡ $\alpha\beta$,
τὸ δὲ δοθέν σημεῖον ἐπ' αὐτῆς, τὸ γ . (Διο-
ρισμός.) Δεῖ δὲ ἀπὸ τοῦ γ σημείου, τῇ $\alpha\beta$ εὐ-
θείᾳ, πρὸς ὀρθᾷ γωνίᾳ εὐθείαν χαμμελῶ
ἀγα-

$\alpha\beta$ triangulus æquilaterus $\alpha\beta\gamma$: & secetur
 angulus $\alpha\beta\gamma$ in duas partes æquales, per li-
 neam rectam $\gamma\delta$. (Explicatio factæ delinea-
 tionis) Dico quòd recta $\alpha\delta$, secta sit in duas
 partes æquales in puncto δ . (Demonstratio.)
 Quoniam recta $\alpha\gamma$, est æqualis rectæ $\gamma\beta$, &
 communis recta $\gamma\delta$: duo igitur latera $\alpha\gamma$, $\gamma\delta$
 duobus lateribus $\beta\gamma$, $\gamma\delta$ sunt equalia alte-
 rum alteri, & angulus $\alpha\gamma\delta$, est æqualis an-
 gulo $\beta\gamma\delta$. Ergo basis $\alpha\delta$, est æqualis basi $\beta\delta$.
 (Conclusio.) Data igitur linea recta finita,
 $\alpha\beta$, secta est in duas partes æquales in puncto
 δ . Id quod faciendum erat.


Propositio vndecima. Problema.

DAtæ lineæ rectæ, à dato in ea pun-
 cto: ducere lineam rectam ad an-
 gulos rectos, id est, rectos facientem
 angulos.

Explicatio dati.) Sit data linea recta $\alpha\beta$,
 & datum in ea punctum γ . (Explicatio qua-
 siti.) Ducenda est à puncto γ , linea recta re-

ἀγαγῆν. (Κατασκευή.)

Εἰλήφθω ὅτι ἔστω $\alpha\gamma$, τυ-
χόν σημεῖον τὸ δ, καὶ κεί-
σθω τῇ $\gamma\delta$ ἴση, ἢ $\gamma\epsilon$, καὶ συ-
νεσάτω ὅτι ἔστω δὲ τρίγων-
ον ἰσόπλευρον τὸ $\zeta\delta\epsilon$, καὶ



ἐπιζεύχθω ἡ $\zeta\gamma$. (Διορισμὸς τῆς κατασκευ-
ῆς.) Λέγω ὅτι τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ τῇ $\alpha\beta$, ἀπὸ
τοῦ πρὸς αὐτῇ δοθέντος σημείου τῆς γ , πρὸς ὀρ-
θᾶς γωνίας εὐθεῖα γραμμὴ ἦκειαι ἡ $\zeta\gamma$. (Α-
πόδειξις.) Ἐπεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν ἡ $\delta\gamma$, τῇ $\gamma\epsilon$, καὶ
τῇ δὲ ἡ $\zeta\gamma$, δύο δὲ αἱ $\delta\gamma$, $\gamma\zeta$, δυοῖν ἰαῖς $\epsilon\gamma$, $\gamma\zeta$,
ἴσαι εἰσὶν, ἐκάπερα ἐκατέρα, ἡ βᾶσις ἡ $\delta\zeta$,
βάσις τῇ $\epsilon\zeta$ ἴση ἐστὶ. γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ $\delta\gamma\zeta$,
γωνία τῇ ὑπὸ $\epsilon\gamma\zeta$ ἴση ἐστὶ, καὶ εἰσὶν ἐφεξῆς.
ὅταν δὲ εὐθεῖα ἐπ' εὐθείαν σταθεῖσι, τὰς ἐ-
φεξῆς γωνίας, ἴσας ἀλλήλαις ποιῇ, ὀρθὴ ἐστὶν
ἐκατέρα τῶν ἴσων γωνιῶν. ὀρθὴ ἄρα ἐστὶν ἐ-
κατέρα, τῶν ὑπὸ $\delta\gamma\zeta$, $\zeta\gamma\epsilon$. (Συμπέρασμα.)
Τῇ ἄρα δοθείσῃ εὐθείᾳ τῇ $\alpha\beta$, ἀπὸ τῆς πρὸς
αὐτῇ δοθέντος σημείου τῆς γ , πρὸς ὀρθᾶς γωνί-
ας εὐθεῖα γραμμὴ ἦκειαι, ἡ $\zeta\gamma$. ὅπερ εἶδει ποι-
ῆσαι.


Etos faciens angulos cum linea $\alpha\epsilon$. (Delineatio.) Sumatur in linea $\alpha\gamma$, quoduis punctum δ ; & fiat linea $\gamma\delta$, equalis linea $\gamma\epsilon$. Et statuatur super linea $\delta\epsilon$, triangulus equilaterus $\delta\zeta\epsilon$. deniq; ducatur recta $\zeta\gamma$. (Explicatio factæ delineationis.) Dico, q; data linea rectæ $\alpha\beta$, à dato in ea pūcto γ , ad angulos rectos ducta sit recta linea $\gamma\zeta$. (Demonstratio.) Quoniam recta $\delta\gamma$, est equalis rectæ $\gamma\epsilon$, communis verò recta $\zeta\gamma$. Duo igitur latera $\delta\gamma$, $\delta\zeta$, duobus lateribus $\epsilon\gamma$, $\gamma\zeta$ sunt equalia alteram alteri, & basis $\delta\zeta$, equalis est basi $\epsilon\zeta$. ergo angulus $\delta\gamma\zeta$, equalis est angulo $\epsilon\gamma\zeta$. (& sunt $\hat{\imath}\phi\epsilon\tilde{\chi}\eta\varsigma$, id est, vicini) Quando verò recta super rectam stans, angulos vicinos aequales fecerit inter se: vterq; equalium angulorum est rectus. Ergo vterq; angulorum $\delta\gamma\zeta$, $\zeta\gamma\epsilon$, est rectus. (Conclusio.) Data igitur linea rectæ $\alpha\beta$, à dato, quod in ea est puncto γ : ad angulos rectos ducta est recta $\zeta\gamma$. Id quod faciendum erat.

Πρότασις ιβ. πρόβλημα.

Επὶ τῷ δοθεῖσαν εὐθείᾳ ἀπὸ τῆς
δοθέντος σημείου ὃ μὴ ἔστιν ἐπ' αὐτῆς, κά-
θετον εὐθείαν γραμμὴν ἀγαγεῖν.

Εκθεσις.) Εἰς ἡ μὲν δοθεῖσα εὐθεῖα ἀπὸ
τῆς αβ, τὸ δὲ δοθέν σημεῖον ὃ μὴ ἔστιν ἐπ'
αὐτῆς, τὸ γ. (Διορισμός.) Δεῖ δὴ ἐπὶ τῷ
δοθεῖσαν εὐθεῖαν ἀπὸ τῆς αβ, ἀπὸ τῆς
δοθέντος σημείου δ γ, ὃ μὴ ἔστιν ἐπ' αὐτῆς, κάθε-
τον εὐθεῖαν γραμμὴν ἀγαγεῖν. (Κατασκευὴ)

Εἰλήφθω γὰρ ἐπὶ τῇ αβ ἑτε-
ρα μέρη τῆς αβ εὐθείας,
τυχὸν σημεῖον τὸ δ. καὶ
κέντρῳ μὲν τῷ γ, διαστή-
ματι δὲ τῷ γδ, κύκλῳ



γεγράφθω ὁ κύκλος, καὶ πε-
τμήσθω ἡ εἰς δὶχα καὶ τὸ θ. καὶ ἐπεζεύχθωσαν
αὐτῇ γη, γθ, γε. (Διορισμός τῆς κατασκευῆς.)
Λέγω ὅτι ἐπὶ τῷ δοθεῖσαν εὐθεῖαν ἀπὸ τῆς
αβ, ἀπὸ τῆς δοθέντος σημείου τῆς γ, ὃ μὴ
ἔστιν ἐπ' αὐτῆς, κάθετῳ ἢ κλειῇ ἢ γθ. (Από-
δειξις.) Εὔεται γὰρ εἰς τὴν αβ τῇ θ, κείνη δὲ

ἡ θγ.

Proposicio duodecima. Problema.

AD lineam rectam datā infinitam,
à dato puncto, quod in ea non est,
perpendicularem rectam lineam du-
cere.

Explicatio dati.) Sit data linea recta in-
finita $αβ$, & punctum quod in ea non est da-
tum $γ$. (*Explicatio quæsit.*) A puncto da-
to $γ$, ad datam lineam rectam infinitam $αβ$:
ducenda est linea recta perpendicularis.

Delineatio.) Sumatur ex altera parte lineæ
 $αβ$, punctum quoduis $δ$: & centro $γ$, interval-
lo $γδ$, describatur circulus $εζη$, secans lineam
 $αβ$, in punctis $ε$, & $η$. Postea dissecetur linea
recta $εη$, in duas partes æquales in puncto $θ$.
& ducantur lineæ $γη$, $γθ$, $γε$. (*Explicatio iā*
factæ delineationis.) Dico quod ad lineam
rectam datā infinitam $αβ$, à puncto $γ$ dato,
quod in ea non est, perpendicularis ducta sit
recta linea $γθ$. (*Demonstratio.*) Quoniam
recta $ηθ$, æqualis est rectæ $δε$: & communis
recta


ἡ $\theta\gamma$, δύο δὲ αἱ $\eta\theta$, $\theta\gamma$, δύοσι ταῖς $\epsilon\theta$, $\theta\gamma$, ἴσαι
 εἰσὶν ἐκάτερα ἐκείρα, καὶ βάσις ἡ $\gamma\eta$, βάσις
 τῇ $\gamma\epsilon$, εἰς ἴση. γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ $\gamma\theta\eta$, γω-
 νία τῇ ὑπὸ $\epsilon\theta\gamma$ εἰς ἴση. καὶ εἰσὶν ἐφεξῆς.
 ὅταν δὲ εὐθεῖα ἐπ' εὐθείαν σταθεῖσα, τὰς ἐ-
 φεξῆς γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ποιῇ, ὀρθὴ ἐ-
 σὶν ἐκάτερα τῶν γωνιῶν. καὶ ἡ ἐφεσηκῆα
 εὐθεῖα, κάθελ[⊥] καλεῖται ἐφ' ἣν ἐφέσηκεν.
 (Συμπέρασμα.) Ἐπὶ τῇ δοθεῖσαν ἄρα
 εὐθείαν ἀπὸρον, τῇ $\alpha\beta$, ἀπὸ ϵ δοθέντ[⊥]
 σημείω τῇ γ , ὃ μὴ ἐστὶν ἐπ' αὐτῆς, κάθελ[⊥]
 ἡκίαι ἡ $\gamma\delta$. ὅπως ἔδει ποιῆσαι.

Πρότεσις ιγ. Γεώρημα.

Ως αὖ εὐθεῖα ἐπ' εὐθείαν σταθεῖσα, γω-
 νίας ποιῇ, ἥτοι δύο ὀρθὰς, ἢ δυσὶν ὀρθαῖς
 ἴσας ποιήσῃ.

Εκθεσις.) Εὐθεῖα γὰρ
 τις ἡ $\alpha\beta$, ἐπ' εὐθείαν τὴν
 $\gamma\delta$ σταθεῖσα, γωνίας ποιῇ
 τω, τὰς ὑπὸ $\gamma\beta\alpha$, $\alpha\beta\delta$.

(Διορισμός) Λέγω ὅτι
 αἱ ὑπὸ $\gamma\beta\alpha$, $\alpha\beta\delta$, γω-



recta dy . ergo duo latera nd , dy , duobus lateribus ed , dy , sunt equalia alterum alteri: & basis yn , basi ye , est equalis. quare angulus ydn , angulo edy est equalis: & sunt vicini. Quando verò recta super recta stans, angulos vicinos aequales inter se fecerit: uterq, equalium illorū angulorum est rectus, & recta super recta stans, perpendicularis ad eam dicitur. (Conclusio.) Ad datam igitur lineam rectam infinitam ab , à puncto y dato quod in ea non est: perpendicularis ducta est recta yd . Id quod faciendum erat.

Propositio decima tertia: Theorema.

VT vt recta super recta stans, angulos fecerit: vel duos rectos, vel duobus rectis æquales eos faciet.

Explicatio dati.) Recta quædam ac , stans super recta yd , faciat angulos yba , abd .
Explicatio q̃siti.) Dico q̃ anguli yca , acd ,
vel

νία ἢ δύο ὀρθαὶ εἰσιν, ἢ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι.
 (Κατασκευή.) Εἰ μὲν ἔν ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ γβα,
 τῇ ὑπὸ αβδ, δύο ὀρθαὶ εἰσιν. εἰ δὲ ἔ, ἢ χθω
 ἀπὸ τῆς β σημείωσεν τῇ γδ πρὸς ὀρθὰς, ἢ βε. αἱ
 ἄρα ὑπὸ γβε, εβδ, δύο ὀρθαὶ εἰσι. Ἐπεὶ ἡ
 ὑπὸ γβε δυσὶ ταῖς ὑπὸ γβα, αβε ἴση ἐστὶ,
 κοινὴ προσκείσθω ἡ ὑπὸ εβδ. αἱ ἄρα ὑπὸ
 γβε, εβδ, τρισὶ ταῖς ὑπὸ γβα, αβε, εβδ,
 εἰσιν ἴσαι. πάλιν ἐπεὶ ἡ ὑπὸ δβα δυσὶ ταῖς
 ὑπὸ δβε, εβα ἴση ἐστὶ. κοινὴ προσκείσθω, ἡ
 ὑπὸ αβγ. αἱ ἄρα γωνίαι, αἱ ὑπὸ δβα, αβγ
 τρισὶ ταῖς ὑπὸ δβε, εβα, αβγ ἴσαι εἰσιν. ἐδεί-
 χθησαν δὲ, καὶ αἱ ὑπὸ γβε, εβδ, τρισὶ ταῖς
 αὐταῖς ἴσαι. τὰ δὲ πᾶν αὐτὰ ἴσα, καὶ ἀλλή-
 λους εἰσιν ἴσα. καὶ αἱ ὑπὸ γβε, εβδ ἄρα, ταῖς
 ὑπὸ δβα, αβγ, ἴσαι εἰσιν. ἀλλὰ αἱ ὑπὸ γβε,
 εβδ, δύο ὀρθαὶ εἰσὶ, καὶ αἱ ὑπὸ δβα, αβγ ἄ-
 ρα δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσιν. (Συμπέρασμα.)
 Ὡς ἂν ἄρα εὐθεῖα ἐπ' εὐθεῖαν σταθεῖσι γωνί-
 ας ποιῇ, ἢ τοὶ δύο ὀρθὰς, ἢ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαις
 ποιήσῃ. ὅπως εἶδε δεῖξαι.

vel sint duo recti, vel duobus rectis aequales. Delineatio cū hypothesi.) Si igitur angulus $\gamma\beta\alpha$, aequalis est angulo $\alpha\epsilon\delta$: tum sunt duo recti. quod si verò non, tum ducatur à puncto β , recta linea $\gamma\delta$, ad angulos rectos linea recta $\epsilon\alpha$. (Demonstratio.) Anguli igitur $\gamma\beta\epsilon$, $\epsilon\beta\delta$ sunt duo recti. & cū angulus $\gamma\beta\epsilon$, sit aequalis duobus angulis $\gamma\beta\alpha$, $\alpha\beta\epsilon$. Communis addatur angulus $\epsilon\beta\delta$. quare duo anguli $\gamma\beta\epsilon$, $\epsilon\beta\delta$, tribus angulis $\gamma\beta\alpha$, $\alpha\beta\epsilon$, $\epsilon\beta\delta$, sunt aequales. Rursus quoniam angulus $\delta\epsilon\alpha$ aequalis est duobus angulis $\delta\epsilon\epsilon$, $\epsilon\beta\alpha$, communis addatur angulus $\alpha\epsilon\gamma$. anguli igitur $\delta\epsilon\alpha$, $\alpha\epsilon\gamma$, tribus angulis $\delta\beta\epsilon$, $\epsilon\beta\alpha$, $\alpha\epsilon\gamma$ sunt aequales. Verum demonstratum est, angulos $\gamma\epsilon\epsilon$, $\epsilon\beta\delta$ tribus iisdem angulis esse aequales. Quae verò eidē sunt aequalia, illa inter se sunt aequalia. ergo anguli $\gamma\epsilon\epsilon$, $\epsilon\beta\delta$, sunt duobus angulis $\delta\beta\alpha$, $\alpha\beta\gamma$, aequales. sed anguli $\gamma\epsilon\epsilon$, $\epsilon\beta\delta$, sunt duo recti: ergo $\delta\epsilon\alpha$, $\alpha\epsilon\gamma$, anguli, sunt aequales duobus rectis. (Cōclusio.) Ut ut igitur recta super recta stans, fecerit angulos: vel duos rectos, vel duobus rectis aequales faciet. Id quod erat demonstrandum.


Πρότασις ιδ. Γεώρημα.

ΕΑν πρὸς τινὶ εὐθείᾳ, ἔστω πρὸς αὐτῇ σημείῳ. δύο εὐθεῖαι μὴ ὅτι τὰ αὐτὰ μέρη κείδμεν, τὰς ἐφεξῆς γωνίας, δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ποιῶσιν, ἔστω εὐθείας ἔσονται, ἀλλήλαις αἱ εὐθεῖαι.

Εκθεσις.) Πρὸς γὰρ τινὶ εὐθείᾳ τῇ $\alpha\beta$, καὶ πρὸς αὐτῇ σημείῳ β , δύο εὐθεῖαι αἱ $\beta\gamma$, $\beta\delta$, μὴ ὅτι τὰ αὐτὰ μέρη κείδμεν, τὰς ἐφεξῆς γωνίας τὰς ὑπὸ $\alpha\beta\gamma$, $\alpha\beta\delta$, δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ποιεῖτωσαν. (Διο-

ρισμός.) Λέγω ὅτι ἔστω εὐθείας ἐστὶ τῇ $\gamma\beta$ ἢ $\beta\delta$.

Κατασκευὴ.) Εἰ γὰρ μὴ ἐστὶ τῇ $\beta\gamma$ ἔστω εὐθείας ἢ $\beta\delta$, ἔστω τῇ $\gamma\beta$ ἐπ' εὐθεί-



ας ἢ $\beta\epsilon$. (Απόδειξις.) Ἐπεὶ ἔν εὐθεία ἡ $\alpha\beta$, ἔστω εὐθείαν τῇ $\gamma\beta$ ἐφέσηκεν, αἱ ἄρα ὑπὸ $\alpha\beta\gamma$, $\alpha\beta\epsilon$ γωνίαι, δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσιν. αἰσι δὲ καὶ αἱ ὑπὸ $\alpha\beta\gamma$, $\alpha\beta\delta$, δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι, αἱ ἄρα ὑπὸ $\gamma\beta\alpha$, $\alpha\beta\epsilon$, ταῖς ὑπὸ $\gamma\beta\alpha$, $\alpha\beta\delta$ ἴσαι εἰσὶ καὶ ἡ ἀφ' ἡρώδω, ἢ ὑπὸ $\alpha\beta\gamma$, λοι-

πῇ

Propositio decimaquarta. Theorema.

SI ad lineam quandam rectā, & punctum in ea datum, duæ rectæ non in easdem partes sitæ, angulos ($\angle \Phi \epsilon \xi \eta \varsigma$) vicinos, duobus rectis angulis æquales fecerint: duæ istæ rectæ $\epsilon \pi'$ $\angle \theta \epsilon \iota \alpha \varsigma$, altera alteri erunt.

Explicatio dati.) Nam ad lineam quandam rectam $a \Gamma$: & ad punctum in ea datum Γ : duæ rectæ lineæ $\beta \gamma$, $\Gamma \delta$, non in easdem partes sitæ faciant angulos $\angle \Phi \epsilon \xi \eta \varsigma$ (vicinos) $a \beta \gamma$, $a \Gamma \delta$, æquales duobus angulis rectis. (*Explicatio quesiti.)* Dico quod rectæ $\gamma \beta$, sit $\epsilon \pi'$ $\angle \theta \epsilon \iota \alpha \varsigma$ recta $\beta \delta$. (*Delineatio.)* Si enim $\Gamma \gamma$ non est $\epsilon \pi'$ $\angle \theta \epsilon \iota \alpha \varsigma$ recta $\beta \delta$: sit recta $\beta \epsilon$, rectæ $\gamma \beta$, $\epsilon \pi'$ $\angle \theta \epsilon \iota \alpha \varsigma$. (*Demonstratio.)* Quoniam recta $a \beta$, constituta est super recta $\gamma \beta$: anguli igitur $a \beta \gamma$, $a \beta \epsilon$, sunt æquales duobus rectis. Verum anguli $a \beta \gamma$, $a \beta \delta$ etiam sunt æquales duobus rectis. anguli igitur $\gamma \beta a$, $a \beta \epsilon$, angulis $\gamma \beta a$, $a \beta \delta$ sunt æquales. Communis auferatur angulus $a \beta \gamma$. reliquis igitur

E m

τῇ ἄρα ἢ ὑπὸ $\alpha\beta\epsilon$, λοιπὴ τῇ ὑπὸ $\alpha\delta\epsilon$ ἴ-
 σιν ἴση ἢ ἐλάσσων τῇ μείζονι. ὅπως ἐστὶν ἀδύ-
 νατον, ὅτι ἄρα ἐπ' ὁθείας ἐστὶν ἡ βῆ, τῇ βγ.
 ὁμοίως δὴ δείξομεν, ὅτι καὶ δὲ ἄλλη τις, πλὴν
 τῆ βδ. (Συμπέρασμα.) Ἐπ' ὁθείας ἄρα ἐ-
 στὶν ἡ γβ, τῇ βδ. Ἐὰν ἄρα πρὸς πνι ὁθεία, ἔ-
 τω πρὸς αὐτῇ σημείω, δύο ὁθεῖαι μὴ ὅππὶ τὰ
 αὐτὰ μέρη κείμεναι, τὰς ἐφεξῆς γωνίας δυ-
 σὶν ὀρθαῖς ἴσας ποιῶσιν, ἐπ' ὁθείας ἐσονται
 ἀλλήλαις αἱ ὁθεῖαι. ὅπως εἶδει δεῖξαι.

Πρότασις ιε. θεώρημα.

ΕΑΝ δύο ὁθεῖαι τέμνωσιν ἀλλήλας, τὰς
 κατὰ κορυφὴν γωνίας, ἴσας ἀλλήλαις
 ποιήσονται.

Εκθεσις.) Δυο γὰρ ὁθεῖαι αἱ $\alpha\beta$, $\gamma\delta$, τέμ-
 νείωσιν ἀλλήλας καὶ τὸ ἐ σημεῖον. (Διορισ-
 μός.) Λέγω ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ
 μὲν ὑπὸ $\alpha\epsilon\gamma$ γωνία, τῇ
 ὑπὸ $\delta\epsilon\zeta$, ἢ δὲ ὑπὸ $\gamma\epsilon\zeta$,
 τῇ ὑπὸ $\alpha\epsilon\delta$. (Απόδει-
 ξις.) Ἐπὶ γὰρ εὐθεῖα ἡ
 $\alpha\epsilon$, ἐπ' εὐθείαν τὴν $\gamma\delta$

ἐφέσηκε

tur angulus $\alpha\beta\epsilon$, reliquo angulo $\alpha\beta\delta$ est æqualis, minor maiori, quod est impossibile. Quare recta $\beta\epsilon$, non est $\epsilon\pi'$ iudeias recta $\beta\gamma$. Similiter etiam demonstrabimus, quod nulla alia præter rectam $\beta\delta$, sit $\epsilon\pi'$ iudeias recta $\gamma\beta$. (Conclusio.) Ergo recta $\gamma\beta$, est $\epsilon\pi'$ iudeias recta $\beta\delta$. Si igitur ad lineam quandam rectam, & punctum in ea datum, due rectæ non in easdem partes sitæ angulos $\epsilon\Phi\epsilon\eta\delta$; duobus rectis angulis fecerint æquales: due istæ rectæ $\epsilon\pi'$ iudeias erunt altera alteri. Id quod erat demonstrandum.

Propositio decimaquinta. Theorema.

Si duæ lineæ rectæ, sese mutuo secant: faciēt angulos ad verticem inter se æquales.

Explicatio dati.) Duæ lineæ rectæ enim $\alpha\beta$, $\gamma\delta$: sese mutuo secant in puncto ϵ . (Explicatio quesiti) Dico quod angulus $\alpha\epsilon\gamma$, angulo $\delta\epsilon\beta$ sit æqualis, & angulus $\gamma\epsilon\beta$, angulo $\alpha\epsilon\delta$ etiam æqualis. (Demonstratio.) Quoniam recta $\alpha\epsilon$, super recta $\gamma\delta$, constituta est,

ἰφέςηκε, γωνίας ποιῶσαι τὰς ὑπὸ γα, αἰδ, αἱ ἄρα ὑπὸ γα, αἰδ, γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶ. πάλιν ἐπεὶ εὐθεία ἡ δὲ, ἐπ' εὐθείαν τὴν αβ ἰφέςηκε, γωνίας ποιῶσαι τὰς ὑπὸ αἰδ, δέβ. αἱ ἄρα ὑπὸ αἰδ, δέβ, γωνίαι, δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶν. ἐδείχθησαν ἤ καὶ αἱ ὑπὸ γα, αἰδ, δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι. αἱ ἄρα ὑπὸ γα, αἰδ, ταῖς ὑπὸ αἰδ, δέβ, ἴσαι εἰσὶ. κοινὴ ἀφηρήσθω ἡ ὑπὸ αἰδ, λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ γα, λοιπὴ τῇ ὑπὸ βεδ ἴση ἐστίν. ὁμοίως δὲ δεχθήσεται, ὅτι καὶ αἱ ὑπὸ γεβ, δεα, ἴσαι εἰσὶν. (Συμπέρασμα.) Εἰάν ἄρα δύο εὐθεῖαι τέμνωσιν ἀλλήλας, τὰς καὶ κορυφῶν γωνίας ἴσας ἀλλήλας ποιῶσιν. ὅπως ἔδει δεῖξαι.

Πόρισμα. Εκ δὲ τούτου φανερόν ὅτι καὶ ὅσαι δήποτε ἐν εὐθείαι τέμνωσιν ἀλλήλας, τὰς πρὸς τῇ τομῇ γωνίας τετρασὶν ὀρθαῖς ἴσας ποιήσουσι.

Πρότασις ις. Θεώρημα.

Παντὸς τριγώνου μιᾶς τῶν πλευρῶν ἐκβληθείσης, ἡ ἐκείνη γωνία, ἐκατέρωθεν τῶν ἑνὸς καὶ ἀπ' ἐναντίον μείζων ἐστίν.

Εκθε-


Et facit angulos $\gamma\alpha$, $\alpha\epsilon\delta$. anguli igitur $\gamma\alpha$, $\alpha\epsilon\delta$, duobus rectis sunt aequales. Item quoniam recta $\delta\epsilon$, super recta $\alpha\beta$ est constituta, faciatq; angulos $\alpha\epsilon\delta$, $\delta\epsilon\beta$, anguli igitur $\alpha\epsilon\delta$, $\delta\epsilon\beta$, sunt aequales duobus rectis. Verum anguli $\gamma\alpha$, $\alpha\epsilon\delta$ duobus rectis sunt aequales. quare duo anguli $\gamma\alpha$, $\alpha\epsilon\delta$, sunt aequales duobus angulis $\alpha\epsilon\delta$, $\delta\epsilon\beta$. Communis auferatur angulus $\alpha\epsilon\delta$. reliquus igitur angulus $\gamma\alpha$, reliquo angulo $\beta\epsilon\delta$ est equalis. Simili demonstratione probabimus angulum $\gamma\epsilon\beta$, angulo $\delta\epsilon\alpha$ esse aequalem. (Conclusio.) Si igitur duae rectae sese mutuò secant: facient angulos ad verticem inter se aequales. Id quod erat demonstrandum.

Corollarium. Ex hoc est manifestum, quòd quaecunq; lineae rectae sese mutuò secant, faciunt angulos ad punctam sectionis quatuor rectis aequales.

Propositio decimasexta. Theorema.

OMnis trianguli, vno ex lateribus protracto: angulus extraneus, veròq; eorū, qui intra triangulum sunt, quibus ipse opponitur, est maior.

Εκθεσις.) Εστω τρίγωνον, τὸ $\alpha\beta\gamma$, καὶ προσεκβε-
 βλήστω αὐτῷ μία πλω-
 ρὰ ἢ $\beta\gamma$, ὅπῃ τὸ δ. (Διο-
 ρισμός.) Λέγω ὅτι ἡ ἐκ-
 τὸς γωνία ἢ ὑπὸ $\alpha\gamma\delta$,
 μείζων ἐστὶν ἐκατέρᾳ τῶν $\alpha\epsilon$ καὶ ἀπεναντίον τῇ
 ὑπὸ $\gamma\beta\alpha$, $\beta\alpha\gamma$ γωνιῶν. (Κατασκευὴ.) Τετ-
 μήστω ἡ $\alpha\gamma$ δίχα κατὰ τὸ ϵ , καὶ ὁρίσθη-
 σα ἡ $\beta\epsilon$, ἐκβεβλήστω ὅπῃ τὸ ζ , καὶ κείστω
 τῇ $\beta\epsilon$ ἴση ἡ $\epsilon\zeta$, καὶ ἐπιζύχθω ἡ $\zeta\gamma$. καὶ δι-
 ήχθω ἡ $\alpha\gamma$, ὅπῃ τὸ η . (Απόδειξις) Ἐπεὶ ἂν
 ἴση ἐστὶν ἡ μὲν $\alpha\epsilon$, τῇ $\epsilon\gamma$. ἢ ὅ $\beta\epsilon$, τῇ $\epsilon\zeta$. δύο δὲ
 αἱ $\alpha\epsilon$, $\epsilon\beta$, δυσὶ ταῖς $\gamma\epsilon$, ἴσην εἰσὶν ἐκάτερα
 ἐκατέρα, καὶ γωνία ἢ ὑπὸ $\alpha\epsilon\beta$, γωνία τῇ ὑ-
 πὸ $\zeta\epsilon\gamma$ ἴση ἐστὶν. κατὰ κερυφλήν γάρ. βάσις
 ἄρα ἡ $\alpha\beta$, βάσις τῇ $\zeta\gamma$ ἴση ἐστὶ. καὶ τὸ $\alpha\beta\epsilon$ τρί-
 γωνον, τὰ $\zeta\epsilon\gamma$ τρίγωνον ἐστὶν ἴσον, καὶ αἱ λοι-
 παὶ γωνίαι, ταῖς λοιπαῖς γωνίαις ἴσην εἰσὶν
 ἐκάτερα ἐκατέρα ὅφ' ἃς αἱ ἴσην πλωρὰι ὑπο-
 τίνυσιν. ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ $\beta\alpha\epsilon$, τῇ ὑπὸ $\epsilon\gamma\zeta$.
 μείζων δ' ἐστὶν ἡ ὑπὸ $\epsilon\gamma\delta$, τῇ ὑπὸ $\epsilon\gamma\zeta$. μείζων
 αρα




Explicatio dati.) Sit triangulus $\alpha\beta\gamma$, & protrahatur latus eius $\beta\gamma$, ad punctum δ . (*Explicatio quesiti.)* Dico. quòd angulus $\alpha\beta\delta$, est maior angulo $\gamma\beta\alpha$, interno sibi opposito: & maior angulo $\beta\alpha\gamma$, interno sibi opposito. (*Delineatio.)* Diffecetur latus $\alpha\gamma$, in duas partes aequales in puncto ϵ . deinde ducatur linea $\beta\epsilon$, & producat ad punctum ζ . Fiat etiam linea $\beta\epsilon$, aequalis linea $\epsilon\zeta$. deniq; ducatur linea $\zeta\gamma$, & extendatur recta $\alpha\gamma$, ad punctum vsq; η . (*Demonstratio.)* Quoniam recta $\alpha\epsilon$, aequalis est rectae $\epsilon\gamma$: & recta $\beta\epsilon$, aequalis rectae $\epsilon\zeta$. duo igitur latera $\alpha\epsilon$, $\epsilon\beta$ duobus lateribus $\gamma\epsilon$, $\epsilon\zeta$ sunt equalia alterum alteri, & angulus $\alpha\epsilon\beta$, aequalis est angulo $\zeta\epsilon\gamma$. quia sunt anguli ad verticem. Basis igitur $\alpha\beta$, basi $\zeta\gamma$ erit aequalis, & triangulus $\alpha\beta\epsilon$, aequalis erit triangulo $\zeta\epsilon\gamma$: & reliqui anguli, reliquis angulis sunt aequales alter alteri, quos equalia illa latera subtendunt. itaq; angulus $\beta\alpha\epsilon$, aequalis est angulo $\epsilon\gamma\zeta$. Verum angulus $\epsilon\gamma\delta$, maior est angulo $\epsilon\gamma\zeta$. quare angulus $\alpha\gamma\delta$, angulo $\beta\alpha\epsilon$

ἄρα ἡ ὑπὸ $\alpha\gamma\delta$ τῇ ὑπὸ $\beta\alpha\epsilon$. ὁμοίως δὲ τῇ $\beta\gamma$
 πλημμένης δίχα, διχθήσεται καὶ ἡ ὑπὸ $\epsilon\gamma\eta$.
 τῶν ἐστὶν ἡ ὑπὸ $\alpha\gamma\delta$, μείζων καὶ τῇ ὑπὸ $\alpha\beta\gamma$.
 (Συμπίεσμα.) Πάντος ἄρα τριγώνου μι-
 ας τῶν πλευρῶν προσεκβληθείσης, ἡ ἐκτός
 γωνία, ἐκατέρας τῶν ἐντὸς ἐκτετραγώνου μεί-
 ζων ἐστίν. ὅπως εἶδει δεῖξαι.

Πρότασις 17. θεώρημα.

Πάντος τριγώνου αἱ δύο γωνίαι, δύο ὀρθῶν
 ἐλάσσονες εἰσι, πάντῃ μετὰ λαμβανόμε-
 ναι.

Εκθεσις.) Ἐστω τρίγω-
 νον, τὸ $\alpha\beta\gamma$. (Διορισμός.)
 λέγω ὅτι τῶν $\alpha\beta\gamma$, τριγώ-
 νου αἱ δύο γωνίαι δύο ὀρ-
 θῶν ἐλάσσονες εἰσι, πάν-
 τη μετὰ λαμβανόμεναι.



(Κατασκευή.) Εκτεβλήσθω τῇ $\beta\gamma$, ὅτι τὸ
 δ. (Απόδειξις.) Καὶ ἐπὶ τριγώνου $\alpha\beta\gamma$ ἐκ-
 τὸς ἐπὶ γωνία ἡ ὑπὸ $\alpha\gamma\delta$, μείζων ἐστὶ τῇ ἐντὸς
 καὶ ἀπ' ἐναντίον, τῇς ὑπὸ $\alpha\beta\gamma$. κοινὴ προσ-
 κείσθω, ἡ ὑπὸ $\alpha\gamma\beta$. αἱ ἄρα ὑπὸ $\alpha\gamma\delta$, $\alpha\gamma\beta$,
 τῶν

etiam est maior. Similiter demonstrabitur quando recta $\beta\gamma$, dissecta fuerit in duas partes aequales: quod angulus $\beta\gamma\eta$, hoc est, angulus $\alpha\gamma\delta$ maior sit angulo $\alpha\beta\gamma$. (Conclusio.) Omnis igitur trianguli uno ex lateribus protracto: extraneus angulus, utroque eorum, qui intra triangulum sunt, quibus ipse opponitur est maior. Id quod erat demonstrandum.

Propositio decima septima. Theorema.

OMnis trianguli, cuius duo anguli: duobus rectis angulis sunt minores.

Explicatio dati.) Sit triangulus $\alpha\beta\gamma$. (*Explicatio quesiti*) Dico quod trianguli $\alpha\beta\gamma$, duo anguli sint minores duobus rectis, quorum modo sumpti. (*Delineatio.*) Producat^{ur} linea $\beta\gamma$, ad punctum δ . (*Demonstratio.*) Quoniam trianguli $\alpha\beta\gamma$, angulus extraneus $\alpha\gamma\delta$, maior est angulo $\alpha\beta\gamma$, interno sibi opposito. Communis addatur angulus $\alpha\gamma\beta$. anguli igitur $\alpha\gamma\delta$, $\alpha\gamma\beta$, sunt maio-

τῶν ὑπὸ $\alpha\beta\gamma$, $\beta\gamma\alpha$ μείζονες εἰσὶν. ἀλλ' αἱ ὑ-
 πὸ $\alpha\gamma\delta$, $\alpha\gamma\beta$, δύο σὺν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶν. αἱ ἄρα
 ὑπὸ $\alpha\beta\gamma$, $\beta\gamma\alpha$, δύο ὀρθῶν ἐλάσσονες εἰσι, ὁμοί-
 ως δὲ δείξομεν: ὅτι ἔστω αἱ ὑπὸ $\beta\alpha\gamma$, $\alpha\gamma\beta$, δύο
 ὀρθῶν ἐλάσσονες εἰσι, καὶ ἐπὶ αἱ ὑπὸ $\alpha\gamma\beta$, $\alpha\beta\gamma$.
 (Συμπίεσμα.) Παντὸς ἄρα τριγώνου αἱ
 δύο γωνίαι, δύο ὀρθῶν ἐλάσσονες εἰσι πάντῃ
 μεταλαμβάνομεν. ὅπως εἶδε δεῖξαι.


Πρότασις ιη. θεώρημα.

Παντὸς τριγώνου ἡ μείζων πλευρὰ, πλεονεκτεῖ
 μείζονα γωνίαν ὑπολείπει.

Εκθεσις.) Εἰς τριγώνον, τὸ $\alpha\beta\gamma$, μείζονα
 ἔχον πλεονεκτεῖ πλευρὰν, τὴν $\alpha\beta$. (Διορισμός.)

Λέγω ὅτι ἔστω γωνία ἡ ὑπὸ α
 $\alpha\beta\gamma$, μείζων εἴςτι, τῆς ὑ-
 πὸ $\beta\gamma\alpha$. (Κατασκευή.)

Ἐπεὶ γὰρ μείζων εἴςτιν ἡ $\alpha\gamma$
 τῆς $\alpha\beta$, κείσθω τῇ $\alpha\beta$ ἴση
 ἡ $\alpha\delta$, καὶ ἐπιζήχθω ἡ



$\beta\delta$. (Απόδειξις.) Καὶ ἐπὶ τριγώνου $\beta\delta\gamma$
 ὁπότε εἴςτι γωνία ἡ ὑπὸ $\alpha\delta\beta$, μείζων εἴςτι τῆς
 ὁπότε, καὶ ἀπ' ἐναντίον, τὴν ὑπὸ $\delta\gamma\beta$. ἴση δὲ ἡ ὑ-
 πὸ α

res angulis $\alpha\beta\gamma$, $\beta\gamma\alpha$. Verum anguli $\alpha\gamma\delta$, $\alpha\gamma\beta$, sunt duo recti. ergo anguli $\alpha\beta\gamma$, $\gamma\beta\alpha$, sunt minores duobus rectis. Simili ratione demonstrabimus angulos $\beta\alpha\gamma$, $\alpha\gamma\beta$, duobus rectis esse minores. Item & angulos $\alpha\gamma\beta$, $\alpha\beta\gamma$ duobus rectis esse minores. (Conclusio.) Omnis igitur trianguli quivis duo anguli, minores sunt duobus angulis rectis. Id quod erat demonstrandum.

Propositio decima octava. Theorema.

VT quodvis latus trianguli est maius: ita maiorem subtendit angulum.


Explicatio dati.) Sit triangulus $\alpha\beta\gamma$, habens latus $\alpha\gamma$, maius latere $\alpha\beta$. (*Explicatio quesiti.)* Dico quod angulus $\alpha\beta\gamma$, maior sit angulo $\alpha\gamma\beta$. (*Delineatio.)* Cum enim latus $\alpha\gamma$ sit maius latere $\alpha\beta$: fiat linea $\alpha\epsilon$, aequalis recta $\alpha\delta$: & ducatur recta $\epsilon\delta$. (*Demonstratio.)* Quoniam trianguli $\epsilon\delta\gamma$, angulus $\alpha\delta\epsilon$ externus, maior est angulo $\delta\gamma\epsilon$ interno sibi oppo-

πὸ $\alpha\delta\epsilon$, τῇ ὑπὸ $\alpha\beta\delta$. ἐπεὶ καὶ πλάρᾳ ἢ $\alpha\beta$,
 τῇ $\alpha\delta$ εἰς ἴση. μείζων ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ $\alpha\beta\delta$,
 ἢ ὑπὸ $\alpha\gamma\beta$. πολλῶν ἄρα ἢ ὑπὸ $\alpha\beta\gamma$ μεί-
 ζων εἰς, τῆς ὑπὸ $\alpha\gamma\delta$. (Συμπεράσμα.)
 Πάντος ἄρα τριγώνου ἢ μείζων πλάρᾳ, τὴν
 μείζονα γωνίαν ὑπολείπει. ὅπως εἶδει δᾶξαι.

Πρότεσις ιθ. Θεώρημα.

Πάντος τριγώνου ὑπὸ τῇ μείζονα γωνί-
 αν, ἢ μείζων πλάρᾳ ὑπολείπει.

Εκθεσις.) Εἰς τριγώνον τὸ $\alpha\beta\gamma$, μείζονα ἔχον
 τῇ ὑπὸ $\alpha\beta\gamma$ γωνίαν, ἢ
 ὑπὸ $\beta\gamma\alpha$. (Διορισμός.)
 λέγω ὅτι καὶ πλάρᾳ ἢ $\alpha\gamma$,
 πλάρᾳς τῇ $\alpha\beta$ μείζων εἶ-
 σιν. (Απόδειξις.) Εἰ γὰρ μὴ ᾗτι ἴση εἰσὶν ἢ
 $\alpha\gamma$, τῇ $\alpha\beta$ ἢ ἐλάσσων. ἴση μὲν ἂν ὅση εἰσὶν ἢ
 $\alpha\gamma$ τῇ $\alpha\beta$. ἴση γὰρ ἂν καὶ γωνία ἢ ὑπὸ $\alpha\beta\gamma$,
 τῇ ὑπὸ $\alpha\gamma\beta$. ὅση εἰσι δέ, ὅση ἄρα ἴση εἰσὶν ἢ
 $\alpha\gamma$, τῇ $\alpha\beta$. καὶ δευτέρῳ ἐλάσσων εἰσὶν ἢ $\alpha\gamma$, τῆς
 $\alpha\beta$,



opposito: & angulus adC , sit equalis angulo aCd : cum latus aC , lateri ad sit equale. idcirco angulus aCd , maior est angulo ayC . Ergo angulus aCy , multo est maior angulo ayC . (Conclusio.) Ut quoduis igitur latus trianguli est maius: ita maiorem subtendit angulum. id quod erat demonstrandum.

Propositio decima nona. Theorema.

VT Triangulus aliquis, angulum quemuis habuerit maiorem: ita eam maiorem habebit eam lineam rectam, quæ illum subtendit angulum.


Explicatio dati.) Sit triangulus aCy , habens angulum aCy , maiorem angulo ayC .
Explicatio quesiti.) Dico quod trianguli aCy , latus ay , maius sit latere aC . (Demonstratio.) Si enim non fuerit maius, cum vel erit ei equale, vel erit eo minor. sed recta ay , non est equalis rectæ aC . nam & angulus aCy , angulo ayC esset equalis. id quod tamen non est. quare neq. latus ay , lateri aC , erit equale: neq. etiam latus ay , poterit esse minus latere

$\alpha\beta$, ἐλάσσων γὰρ ἂν ἢ καὶ γωνία ἢ ὑπὸ $\alpha\beta\gamma$,
 τῆς ὑπὸ $\alpha\gamma\delta$. ὅκ' ἐστὶ δὲ, ὅκ' ἄρα ἐλάσσων
 ἐστὶν ἢ $\alpha\gamma$, τῆς $\alpha\beta$. ἐδείχθη δὲ, ὅτι ἔδειξεν ἐστὶ,
 μείζον ἄρα ἐστὶ ἢ $\alpha\gamma$, τῆς $\alpha\beta$. (Συμπέρασ-
 μα) Πάντος ἄρα τριγώνου ὑπὸ τῷ μείζονα
 γωνίαν, ἢ μείζων πλάρᾳ ὑπολείπει. ὅπως εἶδει
 δεῖξαι.

Πρότασις κ. θεώρημα.

Πάντος τριγώνου αἱ δύο πλάραι, τῆς λοι-
 πῆς μείζονές εἰσι, πάντα μεταλαμβάνου-
 νόμῳ.

Εκθεσις.) Εἶπω γὰρ τρί-
 γωνον τὸ $\alpha\beta\gamma$. (Διορισ-
 μός.) λέγω ὅτι τῶ $\alpha\beta\gamma$
 τριγώνου αἱ δύο πλάραι,
 τῆς λοιπῆς μείζονές εἰσι
 πάντα μεταλαμβάνομε-
 ναί, αἱ μὲν $\beta\alpha$, $\alpha\gamma$, τῆς $\beta\gamma$, αἱ δὲ $\alpha\beta$, $\beta\gamma$, τῆς $\alpha\gamma$,
 αἱ δὲ $\beta\gamma$, $\gamma\alpha$, τῆς $\alpha\beta$. (Κατασκευὴ.) Διήχθω
 γὰρ ἡ $\beta\alpha$ ὅτι τὸ δ σημεῖον, καὶ κείδω τῇ $\gamma\alpha$,
 ἵση ἡ $\delta\alpha$, καὶ ἐπέζωχθω ἡ $\delta\gamma$. (Απόδοξις.)
 Ἐπεὶ ἂν ἴση ἐστὶν ἡ $\delta\alpha$, τῇ $\alpha\gamma$. ἴση ἐστὶν καὶ γω-
 νία



tere $a\epsilon$. quia etiam angulus $a\epsilon\gamma$. minor est
 angulo $a\gamma\epsilon$. Cum tamen non sit. Quare neq.
 latus $a\gamma$. minus est latere $a\epsilon$. antea autē de-
 monstratum est, quod ei non sit aequale. Erit
 ergo $a\gamma$ latus, maius latere $a\epsilon$. (Conclusio.)
 Omnis igitur trianguli maiorem angulum
 maius latus subcendit quicumq. sumatur. Id
 quod erat demonstrandum.

Propositio vigesima, Theorema.

OMnis trianguli, quævis duo late-
 ra sunt maiora reliquo.

Explicatio dati.) Sit triangulus $a\epsilon\gamma$,
 Explicatio quæsit.) Dico quod triaguli $a\epsilon\gamma$
 quævis duo latera, sint maiora reliquo. latera
 ϵa , $a\gamma$, maiora latere $\epsilon\gamma$. Item latera $a\epsilon$, $\epsilon\gamma$
 maiora latere $a\gamma$: deniq. latera $\epsilon\gamma$, γa , maio-
 ra latere $a\epsilon$. (Delineatio.) Producatur linea
 ϵa , ad punctum d : & fiat linea $a\gamma$, æqualis li-
 nea ad : deniq. ducatur linea γd . (Demōstra-
 tio.) Quoniam latus da , æquale est lateri $a\gamma$.
 etiam

νία ἢ ὑπὸ $\alpha\delta\gamma$, τῇ ὑπὸ $\alpha\gamma\delta$, ἀλλ' ἢ ὑπὸ $\beta\gamma\delta$ γωνία, τῆς ὑπὸ $\alpha\gamma\delta$ μείζων ἐστὶ. μείζων ἄρα ἢ ὑπὸ $\beta\gamma\delta$, τῆς ὑπὸ $\alpha\delta\gamma$. καὶ ἐπεὶ τρίγωνον ἐστὶ τὸ $\delta\beta\gamma$, μείζονα ἔχον τὴν ὑπὸ $\beta\gamma\delta$ γωνίαν, τῇ ὑπὸ $\alpha\delta\gamma$, ὑπὸ δὲ τὴν μείζονα γωνίαν ἢ μείζων πλεονάζει. ἢ δὲ ἄρα, τῆς $\beta\gamma$ ἐστὶν μείζων. ἴση δὲ ἢ δὲ, ταῖς $\alpha\beta$, $\alpha\gamma$. μείζονες ἄρα αἱ $\beta\alpha$, $\alpha\gamma$, τῇ $\beta\gamma$. ὁμοίως δὲ δειξομεν ὅτι καὶ αἱ μὲν $\alpha\beta$, $\beta\gamma$, τῆς $\gamma\alpha$ μείζονες εἰσιν. αἱ δὲ $\beta\gamma$, $\gamma\alpha$, τῆς $\alpha\beta$. (Συμπέρασμα.) Παντὸς ἄρα τριγώνου αἱ δύο πλευραὶ, τῇ λοιπῇ μείζονες εἰσι, πάντη μεταλαμβάνομεν. ὅπως εἰδὲ δεῖξαι.

Πρότασις κα. θεώρημα.

ΕΑν τριγώνου ὅπῃ μιᾶς τῶν πλευρῶν ἀπὸ τῶν περάτων δύο εὐθεῖαι ἐντός συσταθῶσιν, αἱ συσταθεῖσαι, τῶν λοιπῶν τῷ τριγώνου δύο πλευρῶν, ἐλάττωες μὲν ἔσονται, μείζονα δὲ γωνίαν περιέξωσι.

Εκθεσις.) Τριγώνου γὰρ τῷ $\alpha\beta\gamma$, ὅπῃ μιᾶς τῶν πλευρῶν τῆς $\beta\gamma$, ἀπὸ τῶν περάτων τῇ β , γ δύο εὐθεῖαι ἐντός συνεστάθωσαν αἱ $\beta\delta$, $\gamma\delta$.

etiā angulus ady , eſt equalis angulo ayd .
 Verum angulus Eyd , maior eſt angulo ayd .
 quare & angulus Eyd , angulo ady maior e-
 rit. & quia triangulus dyE , angulū Eyd ma-
 iorē habet angulo ayd : atq; maius latus ſub-
 tendat angulū maiorem: idcirco & latus dE ,
 maius eſt latere Ey . Sed dE latus, aequale eſt
 aE , ay lateribus. quare Ea , ay , duo latera,
 ſunt maiora latere Ey . Similiter demonſtra-
 bimus, quòd latera aE , Ey , ſint maiora latere
 ay , & Ey , ya latera ſint maiora latere aE .
 (Concluſio.) Omnis igitur trianguli, quævis
 duo latera ſunt maiora reliquo, id quod erat
 demonſtrandum.

Propoſitio vigefima prima. Theorema.

Si à finibus vnus lateris trianguli cuiuſuiſ
 duæ rectę lineę intra triangulum ad pun-
 ctum idem ſtatuantur: erunt quidem iſtę du-
 æ rectę lineę, reliquis duobus trianguli eius
 lateribus minores: verū maiorem angu-
 lum comprehendent.


Explicatio dati.) Sup latere enim Ey tri-
 anguli aEy : à finib. E , et y dua lineę rectę Ed ,

F

dy



διγ. (Διορισμός.) Λέγω ὅτι αἱ βδ, δγ, τῶν
λοιπῶν τοῦ τριγώνου δύο πλευρῶν τῶν
βα, αγ, ἐλάσσονες μὲν εἰ-
σὶ, μείζονα ᾧ γωνίαν πε-
ριέχουσι τὴν ὑπὸ βδγ,
τῆς ὑπὸ βαγ. (Κατα-
σκευὴ.) Διήχθω γὰρ ἡ βδ,
ᾧ τὸ ε. (Απόδοξις.)



Καὶ ἐπεὶ πάντος τριγώνου αἱ δύο πλευραὶ τῆς
λοιπῆς μείζονες εἰσι. τῷ αβε ἄρα τριγώνου,
αἱ δύο πλευραὶ αἱ αβ, αε, τῷ βε μείζονες εἰσι.
κρινὴ προσκείσθω ἡ εγ. αἱ ἄρα βα, αγ, τῶν
βε, εγ, μείζονες εἰσι. πάλιν ἐπεὶ τῷ γεδ τρι-
γώνου αἱ δύο πλευραὶ αἱ γε, εδ, τῆς γδ μεί-
ζονες εἰσι, κρινὴ προσκείσθω ἡ δβ, αἱ γε, εβ
ἄρα τῶν γδ, δβ μείζονες εἰσιν. ἀλλὰ τῶν βε,
εγ, μείζονες ἐδείχθησαν αἱ βα, αγ, πολλῶν ἄ-
ρα αἱ βα, αγ, τῶν βδ, δγ, μείζονες εἰσι. πάλιν
ἐπεὶ πάντος τριγώνου ἡ ἑκτὸς γωνία, τῆς
ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον μείζων ἐστὶ. τῷ γδε ἄρα
τριγώνου ἡ ἑκτὸς γωνία ἡ ὑπὸ βδγ, μείζων
ἐστὶ τῆς ὑπὸ γεδ. Διὰ τὰ αὐτὰ ἄρα καὶ τῷ
αβε


$\delta\gamma$ statuentur intra triangulū.) Explicatio
 quæsti.) Dico quod duæ rectæ $\beta\delta, \delta\gamma$, mi-
 nores quidem sint reliquis duobus trianguli
 lateribus $\beta\alpha, \alpha\gamma$: verum angulum $\beta\delta\gamma$,
 maiorem angulo $\beta\alpha\gamma$, contineant. (Deline-
 atio.) Producaturs enim linea $\beta\delta$, ad pun-
 ctum η s. q. e. (Demonstratio.) Quoniam om-
 nis trianguli duo latera maiora sunt reliquo:
 idcirco trianguli $\alpha\epsilon\delta$, duo latera $\alpha\beta$, $\alpha\epsilon$ sunt
 maiora latere $\epsilon\delta$. Cōmune addatur latus $\epsilon\gamma$.
 latera igitur $\beta\alpha$, $\alpha\gamma$, maiora sunt lateribus
 $\beta\epsilon$, $\epsilon\gamma$. Item quia trianguli $\gamma\epsilon\delta$, duo latera
 $\gamma\epsilon$, $\epsilon\delta$ maiora sunt latere $\gamma\delta$. Commune ad-
 datur latus $\delta\beta$. quare latera $\gamma\epsilon$, $\epsilon\beta$ maiora
 sunt lateribus $\gamma\delta$, $\delta\beta$. Verum latera $\epsilon\alpha$, $\alpha\gamma$,
 demonstrata sunt maiora lateribus $\epsilon\epsilon$, $\epsilon\gamma$, er-
 go $\epsilon\alpha$, $\alpha\gamma$ latera longe erunt maiora laterib⁹
 $\epsilon\delta$, $\delta\gamma$. Rursus quoniam omnis trianguli an-
 gulus extraneus, angulo intra triangulum
 sibi opposito est maior: idcirco trianguli $\gamma\delta\epsilon$,
 angulus $\epsilon\delta\gamma$ extraneus, angulo $\gamma\epsilon\delta$ interno
 sibi opposito est maior. Per eadem demonstra-

ἂδε τριγώνῳ, ἢ ὅστις γωνία ἢ ὑπὸ γέ μεί-
ζων ἐστὶ τῆς ὑπὸ βᾶγ. ἀλλὰ τῆς ὑπὸ γέ,
μείζων ἐδείχθη ἢ ὑπὸ βδγ, πολλῶ ἄρα ἢ ὑ-
πὸ βδγ, μείζων ἐστὶ τῆς ὑπὸ βᾶγ. (Συμπέ-
ρασμα.) Εὰν ἄρα τριγώνῳ ὅπῃ μιᾶς τῶν
πλευρῶν ἀπὸ τῶν περάτων δύο δοθεῖαι ἐν-
τός συσπαθῶσιν, αἱ συσπαθεῖσαι, τῇ λοιπῶν τοῦ
τριγώνῳ δύο πλευρῶν, ἐλάττωες μὲν εἰσι,
μείζονα δὲ γωνίαν περιέχουσιν. ὅπως ἔδειξαι.

Πρότεσις κβ. Πρόβλημα.

Εκ τριῶν δοθεῶν αἱ εἰσὶν ἴσαι τρεῖσι ταῖς
δοθείσαις δοθείαις, τρίγωνον συστήσασθαι.
Δεῖ δὴ τὰς δύο, τῆς λοιπῆς μείζονας εἶναι
πάντη μετалаμδανομένης, διὰ τὸ ὅτι παν-
τός τριγώνῳ τὰς δύο πλευρὰς, τῆς λοιπῆς
μείζονας εἶναι, πάντη μετалаμδανομένης.

Εκθεσις.) Εἰσωσαν
αἱ δοθεῖσαι τρεῖς
δοθεῖαι αἱ α, β, γ,
ὧν αἱ δύο, τῆς λοι-
πῆς μείζονες ἔσω-
σαν πάντη μετала-



LIBER I.

bitur quòd trianguli $\alpha\beta\gamma$, angulus $\gamma\beta$, maior sit angulo $\alpha\gamma$. verùm angulo $\gamma\beta$ maior est demonstratus angulus $\beta\delta\gamma$. Ergo angulus $\delta\delta\gamma$, multò est maior angulo $\alpha\gamma$. (Conclusio.) Si igitur à finibus unius lateris trianguli cuiusvis, due recte lineæ intra triangulũ, ad punctum idem statuatur: erunt quidem istæ due recte lineæ, reliquis duobus trianguli eius lateribus minores: verùm maiorem angulum comprehendent. Id quod erat demonstrandum.

Propositio vigesima secunda. Problema.

Ex tribus lineis rectis, quæ sunt α , β , γ quales tribus rectis lineis datis: triangulũ cõstituere. Oportet uerò quavis duas reliquas esse maiores: propterea quod in omni triägulo quævis duo latera maiora sunt reliquo.

Explicatio dati.) Sint tres lineæ recte datæ α , β , γ : & sint quævis due maiores quàm reli-

λαμβανόμεναι, αἱ μὲν $\bar{a}$, $\bar{b}$, τῆς $\bar{\gamma}$, αἱ δὲ $\bar{a}$,
 $\bar{\gamma}$, $\bar{b}$, καὶ ἐπὶ αἱ β , γ , $\bar{a}$. (Διορισμός.)
 Δεῖ δὴ ἐκ τῶν ἴσων ταῖς $\bar{a}$, $\bar{b}$, $\bar{\gamma}$, τρίγωνον συ-
 στήσασθαι. (Κατασκευὴ.) Εκκείσθω τίς $\bar{a}$ -
 θῆα ἡ δὲ, πεπερασμένη μὲν κατὰ τὸ δ, ἄ-
 περ $\odot$ δὲ κτ' τὸ ε, καὶ κείσθω τῇ μὲν $\bar{a}$ ἴση, ἡ
 δὲ τῇ δὲ β ἴση, ἡ ζῆ, τῇ δὲ εὔ ἴση ἡ ἥθ. καὶ κέν-
 τρω μὲν τῷ ζ, διαστήματι δὲ τῷ ζδ, κύκλῳ
 γεγραφθῶ, ὁ δὲ κλ. καὶ πάλιν κέντρω μὲν τῷ
 ἥ, διαστήματι δὲ τῷ ἥθ, κύκλῳ γεγραφθῶ
 ὁ κλθ. καὶ ἐπιζῶχθωσαν αἱ κζ, κη. (Διο-
 ρισμός τῆς κατασκευῆς.) Λέγω ὅτι ἐκ τρι-
 ῶν $\bar{a}$, $\bar{b}$, $\bar{\gamma}$ τῶν ἴσων ταῖς $\bar{a}$, β , γ , τρίγωνον
 συνίστηκε τὸ κζη. (Απόδειξις.) Ἐπεὶ γὰρ τὸ
 ζ σημεῖον, κέντρον ἐστὶ τῷ δ κλ κύκλῳ, ἴση ἐστὶν
 ἡ ζδ, τῇ ζκ, ἀλλὰ ἡ ζδ τῇ $\bar{a}$ ἐστὶν ἴση, καὶ ἡ κζ
 ἄρα τῇ $\bar{a}$ ἐστὶν ἴση. πάλιν ὅτι τὸ ἥ σημεῖον,
 κέντρον ἐστὶν τῷ λ κθ κύκλῳ, ἴση ἐστὶν ἡ ἥθ, τῇ
 ἥκ. ἀλλὰ ἡ ἥθ, τῇ $\bar{\gamma}$ ἐστὶν ἴση, καὶ ἡ κη ἄρα, τῇ
 $\bar{\gamma}$ ἐστὶν

reliqua: scilicet α & ϵ maiores quàm γ , & α ,
 atq; γ maiores quàm ϵ : deniq; ϵ & γ , maio-
 res quàm α . (Explicatio quesiti.) Oportet i-
 gitur ex tribus lineis rectis, quæ datis tribus
 α, β, γ , sunt æquales triangulum componere.
 (Delineatio.) Sumatur recta aliqua linea
 $\delta\epsilon$: finita quidem ad punctum δ : infinita ve-
 rò ad punctum ϵ . deinde fiat linea recta α , æ-
 qualis linea recta $\delta\zeta$. Itē recta ϵ , æqualis re-
 cta $\zeta\eta$. præterea recta γ , æqualis recta $\eta\theta$. Ad
 hæc centro ζ interuallo $\zeta\delta$, describatur circus-
 lus $\delta\kappa\lambda$. centro etiam η , interuallo $\eta\theta$, descri-
 batur circulus $\kappa\lambda\theta$: secans circulum $\delta\eta\lambda$, in
 puncto κ . Deniq; ducatur linea recta $\zeta\kappa, \kappa\eta$.
 (Delineationis factæ explicatio.) Dico quòd
 ex lineis rectis tribus, quæ sunt æquales tribus
 rectis datis, compositus sit triangulus $\kappa\zeta\eta$.
 (Demonstratio.) Quoniam punctum ζ , cen-
 trum est circuli $\delta\kappa\lambda$. idcirco recta $\zeta\delta$, æqua-
 lis est recta $\zeta\eta$: verū recta $\zeta\delta$ est æqualis recta
 α : itaq; & $\kappa\zeta$ recta, æqualis est rectæ α . Item
 quoniam punctum η , est centrum circuli $\kappa\lambda\theta$:
 idcirco recta $\eta\theta$, est æqualis rectæ $\eta\kappa$. verū $\eta\theta$


ἔστιν ἴση. ἔστι δὲ καὶ ἡ ζῆ, τῇ βίση. αἱ τρεῖς
 ἄρα δοθεῖαι, αἱ κζ, ζῆ, ηκ τρισὶ ταῖς α, β, γ,
 ἴσαι εἰσιν. (Συμπέρασμα.) Εκ τριῶν ἄρα
 δοθέντων τῶν κζ, ζῆ, ηκ, αἱ εἰσὶν ἴσαι τρισὶ
 ταῖς δοθείσας δοθείαις ταῖς α, β, γ, τρίγων-
 νον συνίσταται, τὸ κζη. ὅπερ ἔδει ποιῆσαι.

Πρότασις κγ. πρόβλημα.

Πρὸς τῇ δοθείσῃ δοθείᾳ, καὶ τὸ πρὸς αὐτῇ
 σημείῳ, τῇ δοθείσῃ γωνίᾳ εὐθυγράμμω,
 ἴσην γωνίαν εὐθύγραμμον συστήσασθαι.

Εκθεσις.) Εἶπω ἡ μὲν δο-
 θεῖσα δοθεῖα ἡ αβ, τὸ δὲ
 πρὸς αὐτῇ σημεῖον τὸ α,
 ἡ δὲ δοθεῖσα γωνία εὐθύ-
 γραμμος, ἡ ὑπὸ δγε.

(Διορισμός.) Δεῖ δὲ πρὸς
 τῇ δοθείσῃ δοθείᾳ τῇ αβ, καὶ τὰ πρὸς αὐτῇ
 σημείῳ τὰ α, τῇ δοθείσῃ γωνίᾳ εὐθυγράμ-
 μω, τῇ ὑπὸ δγε, ἴσων γωνίαν εὐθύγραμμον
 συστήσασθαι. (Κατασκευὴ.) Εἰλήφθω ἐφ' ἑκα-
 θέρας τῶν γδ, γε, τυχόντα σημεία τὰ δ, ε, καὶ
 ἐπέζευ-



æqualis est γ rectæ. ergo & η rectæ, æqualis est rectæ γ . Verum $\zeta\eta$, eiam est æqualis rectæ β . Tres igitur rectæ κ , $\zeta\eta$, $\eta\kappa$, tribus rectis α , β , γ , sunt æquales. (Conclusio.) Ex tribus igitur rectis $\kappa\zeta$, $\zeta\eta$, $\eta\kappa$, quæ sunt æquales tribus datis α , β , γ , recte triangulus est factus $\kappa\zeta\eta$. Quod faciendum erat.

Propositio vigesima tertia. problema.

AD datam lineam rectam, & datum in ea punctum, dato angulo rectilineo, æqualem angulum rectilineum statuere.

Explicatio dati.) Sit data linea recta $\alpha\beta$: sit datum in ea punctum α . sit angulus rectilineus datus $\delta\gamma\epsilon$. (Explicatio quesiti.) Ad lineam rectam datam $\alpha\beta$, & punctum in ea datum α , statuendus est angulus rectilineus, æqualis angulo $\delta\gamma\epsilon$ rectilineo dato. (Declinatio.) Sumantur in lineis rectis $\gamma\delta$, $\gamma\epsilon$, puncta quævis δ , ϵ . Ducatur etiam linea

F 5 recta

ἐπεζεύχῃς ἢ δὲ καὶ ὅκ τριῶν εὐθεϊῶν αἰεῖσιν
 ἴσαι τρισὶ ταῖς γδ, δὲ, γε τρίγωνον σωεσά-
 τω τὸ ἀζη, ὥς ἐστιν εἶναι πλὴν μὲν γδ, τῇ ἀζ,
 πλὴν δὲ γε, τῇ ἀη καὶ ἐπὶ πλὴν δὲ, τῇ ζη. (Ἀπο-
 δέξις.) Ἐπεὶ αἱ δύο αἰ δγ, γε, δύοσι ταῖς
 ζα, ἀη, ἴσαι εἰς ἑκάτερα ἑκατέρω, καὶ βάσις
 ἢ δὲ, βάσις τῇ ἢ ἴση. γωνία ἄρα ἢ ὑπὸ δγε,
 γωνία τῇ ὑπὸ ζαη εἰς ἴση. (Συμπέρασμα)
 Πρὸς ἄρα τὴν δοθείσιν εὐθείαν τῇ αβ, καὶ πρὸς
 πρὸς αὐτῇ ἰμείω πρὸς α, τῇ δοθείσιν γωνίαν
 εὐθυγράμω τῇ ὑπὸ δγε, ἴση γωνία εὐθυ-
 γραμμῶ (σωεῖται), ἢ ὑπὸ ζαη. ὅπως ἔδει ποι-
 ῆσαι.

Πρότεσις καὶ θεώρημα.

ΕΑν δὲ τρίγωνον τὰς δύο πλευρὰς ταῖς
 δυοῖν πλευρῶν ἴσας ἔχη ἑκάτεραν ἑκατέρω-
 ρα, πλὴν ἢ γωνίαν τῆς γωνίας μείζονα ἔχη,
 πλὴν ὑπὸ ὧν ἴσων εὐθεϊῶν περιεχομένῃ, καὶ
 πλὴν βάσις τῆς βάσεως μείζονα ἔξει.

Εκθεσι.) Ἐστω δύο τρίγωνα, τὰ αβγ, δεζ,
 τὰς δύο πλευρῶν τὰς αβ, αγ, ταῖς δυοῖν
 πλευ-


recta $\delta\epsilon$. Postea ex talibus lineis rectis, quæ sunt æquales tribus rectis $\gamma\delta$, $\delta\epsilon$, $\gamma\epsilon$, componatur triangulus $\alpha\zeta\eta$: sic ut lineæ $\gamma\delta$, sit æqualis lineæ $\alpha\zeta$: & lineæ $\gamma\epsilon$ lineæ $\alpha\eta$, item lineæ $\delta\epsilon$ æqualis lineæ $\zeta\eta$. (Demonstratio.) Quoniam duo latera $\delta\gamma$, $\gamma\epsilon$, duobus lateribus $\zeta\alpha$, $\alpha\eta$, sunt æqualia alterum alteri, & basis $\delta\epsilon$, æqualis sit basi $\zeta\eta$. Erit igitur angulus $\delta\gamma\epsilon$, æqualis angulo $\zeta\alpha\eta$. (Conclusio.) Ad datam igitur lineam rectam $\alpha\beta$, & ad punctum in ea datum α , dato angulo rectilineo $\delta\gamma\epsilon$, constitutus est angulus rectilineus $\zeta\alpha\eta$. Id quod erat faciendum.

Propositio vigesimaquarta. Theorema.

SI fuerint trianguli vnus, duo latera æqualia duobus lateribus alterius trianguli, alterum alteri: sed angulus vnus maior angulo alterius, quæ æquales rectæ lineæ comprehendunt: etiam basis basi maior erit.

Explicatio dati.) Sint duo triāguli $\alpha\beta\gamma$, $\delta\epsilon\zeta$, quorum duq; latera $\alpha\beta$, $\alpha\gamma$, duobus lateribus

πλευραῖς, ταῖς δὲ, δζ, ἴσας ἔχοντα ἐκάτερα
ἐκάτερα, τὴν μὲν αβ, τῇ
δε, τὴν δὲ αγ, τῇ δζ, γω-
νία δὲ ἡ ὑπὸ βαγ, γω-
νίας τῆς ὑπὸ εδζ μείζων
ἔστω. (Διορισμός.) Λέγω



ὅτι καὶ βάσις ἡ βγ, βά-
σεως τῆς εζ, μείζων ἐστίν. (Κατασκευὴ.) Ε-
πεὶ γὰρ μείζων ἐστίν ἡ ὑπὸ βαγ γωνία, τῆς
ὑπὸ εδζ γωνίας, συνεχάτω πρὸς τῇ δε ὁ-
θεία, καὶ τὴν πρὸς αὐτῇ σημείω τὴν δ, τῇ ὑπὸ
βαγ γωνία ἴση ἡ ὑπὸ εδη, καὶ κείτω ὀπίε-
ρα τῶν αγ, δζ, ἴση ἡ δη, καὶ ἐπεζώχθωσαν,
αἱ ηε, ζη. (Απόδοξις.) Επεὶ ἔν ἴση ἐστίν ἡ μὲν
αβ, τῇ δε, ἡ δὲ αγ, τῇ δη, δύο δὲ αἱ εα, αγ,
δυσὶ ταῖς εδ, δη, ἴσαι εἰσὶν ἐκάτερα ἐκάτερα,
καὶ γωνία ἡ ὑπὸ βαγ, γωνία τῇ ὑπὸ εδη, ἴση
ἐστὶ, βάσις ἄρα ἡ βγ, βάσις τῇ εη, ἐστὶν ἴση. πάλιν,
ἐπεὶ ἴση ἐστίν ἡ δη, τῇ δζ, ἴση ἐστὶ καὶ γω-
νία ἡ ὑπὸ δζη, γωνία τῇ ὑπὸ δηζ, μείζων ἄ-
ρα ἡ ὑπὸ δζη, τῆς ὑπὸ εηζ. πολλῶν ἄρα μεί-
ζων ἐστίν ἡ ὑπὸ εζη, τῇ ὑπὸ εηζ. καὶ ἐπεὶ τρί-
γωνόν ἐστι, τὸ εζη, μείζονα ἔχον τὴν ὑπὸ

ribus de , $d\zeta$ sint equalia, alterum alteri latus ab , lateri de , & latus ay , lateri $d\zeta$: sed angulus Gay sit maior angulo $ed\zeta$.

(Explicatio quæsitæ.) Dico quod basis $E\gamma$, basi $e\zeta$ sit maior. (Delineatio.) Quoniam angulus Gay maior est angulo $ed\zeta$. Statuatur ad lineam rectam ed , & ad punctum in ea d , angulus $ed\eta$ equalis angulo Gay : & fiat alterutri laterum ay , $d\zeta$ equalis linea recta $d\eta$. & ducantur linea recta ne , $\zeta\eta$.


(Demonstratio.) Quoniam latus ab , equalis est lateri de , & latus ay equalis est lateri $d\eta$: duo igitur latera ba , ay , duobus lateribus ed , $d\eta$ sunt equalia, alterum alteri, & angulus βay , equalis est angulo $e d\eta$. Ergo basis $E\gamma$, basi $e\eta$ est equalis. Item quoniam latus $d\eta$, est equalis lateri $d\zeta$: erit etiã angulus $d\zeta\eta$, equalis angulo $d\eta\zeta$, ergo angulus $d\zeta\eta$ maior est angulo $e\eta\zeta$, quare angulus $e\zeta\eta$, longè maior est angulo $e\eta\zeta$. Cum etiam triangulus $e\zeta\eta$, habeat angulum

ἔξῃ γωνίαν τῆς ὑπὸ ἐηζ, ὑπὸ δὲ τῷ μείζονα γωνίαν ἢ μείζων πλῆρὰ ὑπολείνῃ. μείζων ἄρα καὶ πλῆρὰ ἢ ἐη, τῆς ἐζ. ἴση δὲ ἢ ἐη, τῇ βγ, μείζων ἄρα καὶ ἢ βγ, τῇ ἐζ. (Συμπέρασμα.) Ἐὰν ἄρα δύο τρίγωνα, τὰς δύο πλῆρὰς ταῖς δυσὶ πλῆρᾶς ἴσας ἔχη ἑκατέραν ἑκατέρᾳ, τῷ δὲ γωνίαν τῆς γωνίας μείζονα ἔχη, τῷ ὑπὸ τῶν ἴσων ὀρθῶν περιεχομένην, καὶ τῷ βάσιν τῆς βάσεως μείζονα ἔξῃ. ὅπως ἔδειξαι.

Πρότασις κε. θεώρημα.

ΕΑΝ δύο τρίγωνα τὰς δύο πλῆρὰς ταῖς δυσὶ πλῆρᾶς ἴσας ἔχη ἑκατέραν ἑκατέρᾳ, τῷ βάσιν δὲ τῆς βάσεως μείζονα ἔχη, ὃ τῷ γωνίαν τῆς γωνίας μείζονα ἔξει, τῷ ὑπὸ τῶν ἴσων ὀρθῶν περιεχομένῳ.

Εκθεσις.) Ἐστω δύο τρίγωνα τὰ $\alpha\beta\gamma$, δὲ $\epsilon\zeta$, τὰς δύο πλῆρὰς τὰς $\alpha\beta$, $\alpha\gamma$ ταῖς δυσὶ πλῆρᾶς ταῖς $\delta\epsilon$, $\delta\zeta$ ἴσας ἔχοντα ἑκατέραν ἑκατέρᾳ, τῷ μὲν $\alpha\beta$,



gulum $\epsilon\eta$, maiorem angulo $\epsilon\zeta$: maiorem
 angulum maius latus subtendat idcirco la-
 tus $\epsilon\eta$, maius est latere $\epsilon\zeta$. verum latus $\epsilon\eta$,
 æquale est lateri $\zeta\gamma$. ergo & $\beta\gamma$ latus maius
 est latere $\epsilon\zeta$. (Conclusio.) Si ergo duo fue-
 rint trianguli, habentes duo latera, duobus
 lateribus æqualia, alterum ateri: angulum
 verò angulo maiorem, qui æqualibus illis la-
 teribus continetur: etiam in basi maio-
 rem habebunt. Id quod erat a monstrandum.

Propositio vigesima quinta Theorema.

SI trianguli vnus, duo latera fuerint
 æqualia duobus lateribus trianguli
 alterius, sed basis vnus fuerit maior
 basi alterius: erit etiam angulus vnus
 maior angulo alterius, quem æquales
 illæ rectæ lineæ comprehendunt.

Explicatio dati.) Sint duo trianguli $\epsilon\gamma$,
 $\delta\epsilon\zeta$: quorū duo latera $\alpha\beta$, $\alpha\gamma$, sint æqualia
 duobus laterib. $\delta\epsilon$, $\delta\zeta$, alterū alteri, latus $\alpha\beta$,
 equale

τῇ δὲ, πλὴν ἐὰν, τῇ δὲ, βάσις δὲ ἢ βῆ, βά-
 σεως τῆς ἐμείζων ἔστω. (Διορισμός.) Λέ-
 γω ὅτι καὶ γωνία ἢ ὑπὸ βᾶν γωνίας τῆς
 ὑπὸ ἐδζ, μείζων ἐστίν. (Απόδειξις.) Εἰ γὰρ
 μὴ, ἦτοι ἴση ἐστὶν αὐτῇ, ἢ ἐλάττω. ἴση μὲν ἔν-
 τε ἐστὶν ἢ ὑπὸ βᾶν γωνία, τῇ ὑπὸ ἐδζ, ἴση
 γὰρ ἢ καὶ ἢ βάσις ἢ βῆ, βάσεως τῆς ἐδζ, οὐκ ἐστὶ δὲ,
 οὐκ ἄρα ἴση ἐστὶ ἢ ὑπὸ βᾶν γωνία, τῇ ὑ-
 πὸ ἐδζ. ἀλλ' ἔσθ' ἐλάττω. ἐλάττω γὰρ
 ἢ καὶ βάσις ἢ βῆ, βάσεως τῆς ἐδζ, οὐκ ἐστὶ δὲ,
 οὐκ ἄρα ἐλάττω ἐστὶν ἢ ὑπὸ βᾶν γωνία,
 τῆς ὑπὸ ἐδζ. εἰδείχθη δὲ ὅτι ἔσθ' ἴση, μείζων
 ἄρα ἐστὶν ἢ ὑπὸ βᾶν γωνία, τῆς ὑπὸ ἐδζ.
 (Συμπέρασμα.) Εὰν ἄρα δύο τρίγωνα,
 τὰς δύο πλευρὰς ταῖς δυσὶ πλευραῖς ἴσας
 ἔχη κατέναντι κατέναντι, πλὴν δὲ βάσιν τῆς βά-
 σεως μείζονα ἔχει, καὶ πλὴν γωνίαν τῆς γω-
 νίας μείζονα ἔξει, πλὴν ὑπὸ τῶν ἴσων ὀθει-
 ῶν περιεχομένην. ὅπως ἐδζ δεῖξαι.

Πρότασις κς. θεώρημα.

Εάν


æquale lateri de , & latus ay , æquale lateri
 ed , sed basis By , sit maior basi ed . (Explica-
 tio quesiti.) Dico quod angulus Gay , maior
 sit angulo ed . (Demonstratio.) Quod si enim
 nō fuerit maior, aut erit ei æqualis, aut eo mi-
 nor. sed angulus Gay , non est æqualis angu-
 lo ed , nam & basis By , etiam esset æqualis
 basi ed : Verūm non est ei æqualis. quare nec
 angulus Gay , est æqualis angulo ed : sic eti-
 am non est eo minor: siquidem & basis By ,
 basi ed minor esset: quod tamen nō est. quare
 nec angulus Gay , angulo ed minor est. de-
 monstratum verò antea fuit, quod ei non sit
 æqualis. Erit igitur angulus Gay , angulo
 ed maior. (Conclusio.) Si ergo fuerint tri-
 anguli unius duo latera æqualia duobus late-
 ribus trianguli alterius, alterum alteri, sed ba-
 sis unius maior basi alterius: erit etiam an-
 gulus unius, maior angulo alterius, quem æ-
 quales rectæ lineæ comprehendunt. Id quod
 erat demonstrandum.

Propositio vigesima sexta. Theorema.

G

Quo-

ΕΑν δύο τρίγωνα τὰς δύο γωνίας, ταῖς
 δυσὶ γωνίαις ἴσας ἔχη ἐκείραν ἐκείρα,
 καὶ μίαν πλευρὰν μιᾷ πλευρᾷ ἴσην, ἥτοι τὴν
 πρὸς ταῖς ἴσας γωνίας, ἢ τὴν ὑπολείνουσαν
 ὑπὸ μίαν τῶν ἴσων γωνιῶν, καὶ τὰς λοιπὰς
 πλευρὰς ταῖς λοιπαῖς πλευραῖς ἴσας ἔξει,
 ἐκείραν ἐκείρα, καὶ τὴν λοιπὴν γωνίαν, τῇ
 λοιπῇ γωνίᾳ.

Εκθεσις πρώτη.) Εσώ-
 σαν δύο τρίγωνα, τὰ $\alpha\beta\gamma$
 $\delta\epsilon\zeta$, τὰς δύο γωνίας τὰς
 ὑπὸ $\alpha\beta\gamma$, $\beta\gamma\alpha$, δυσὶ
 ταῖς ὑπὸ $\delta\epsilon\zeta$, $\epsilon\zeta\delta$, ἴσας
 ἔχοντα, ἐκείραν ἐκείρα. 
 τὴν μὲν ὑπὸ $\alpha\beta\gamma$, τῇ ὑπὸ $\delta\epsilon\zeta$, τὴν δὲ ὑ-
 πὸ $\beta\gamma\alpha$, τῇ ὑπὸ $\epsilon\zeta\delta$. ἐχέτω δὲ καὶ μίαν
 πλευρὰν, μιᾷ πλευρᾷ ἴσην, πρὸτερον τὴν πρὸς
 ταῖς ἴσας γωνίαις, τὴν $\beta\gamma$, τῇ $\epsilon\zeta$. (Διορισ-
 μὸς πρῶτος.) Λέγω ὅτι καὶ τὰς λοιπὰς
 πλευρὰς, ταῖς λοιπαῖς πλευραῖς ἴσας ἔξει
 ἐκείραν ἐκείρα, τὴν μὲν $\alpha\beta$, τῇ δὲ, τὴν δὲ
 $\alpha\gamma$, τῇ $\delta\epsilon$, καὶ τὴν λοιπὴν γωνίαν, τῇ λοι-
 πῇ

QVorum triangulorum duo anguli vnus fuerint æquales duobus angulis alterius: alter alteri: & latus vnum, æquale vni: siue illud appositū sit æqualibus illis angulis: siue subtrahat vnum ex æqualibus illis angulis: illorum tum reliqua latera inter se erunt æqualia, alterum alteri: tum etiam reliquus angulus reliquo angulo erit æqualis.

Prima explicatio dati.) Sint duo trianguli $\alpha\beta\gamma$, $\delta\epsilon\zeta$, quorum duo anguli $\alpha\beta\gamma$, $\beta\gamma\alpha$ sint æquales duobus angulis $\delta\epsilon\zeta$, $\epsilon\zeta\delta$, alter alteri: angulus $\alpha\beta\gamma$, æqualis angulo $\delta\epsilon\zeta$, & angulus $\beta\gamma\alpha$, angulo $\epsilon\zeta\delta$: habeant etiam vnum latus vni lateri æquale, & primo loco latus quod positum est ad æquales illos angulos, latus $\beta\gamma$, lateri $\epsilon\zeta$. (*Prima explicatio quesiti.*) Dico quod & reliqua latera reliquis lateribus habebunt æqualia, alterum alteri, latus $\alpha\epsilon$, lateri $\delta\epsilon$, & latus $\alpha\gamma$, æquale lateri $\delta\zeta$: & reliquum angulum reliquo angulo

G 2 gulo

τῇ γωνίᾳ, πάλι ὑπὸ βαγ, τῇ ὑπὸ εδζ. (Κα-
 τισκευὴ πρώτη.) Εἰ γὰρ ἀνισός ἐστι ἡ αβ, τῇ
 δε, μία αὐτῶν μείζων ἔσται. ἔστω μείζων, ἡ
 αβ, καὶ κείῳ τῇ δε ἴση ἡ ηβ, ἔτι περὶ δὲ χθω ἡ
 ηγ. (Αποδείξις πρώτη.) Ἐπεὶ ἔν ἴση ἐστὶν ἡ
 μὲν βῆ, τῇ δε, ἡ δε βγ, τῇ εζ, δύο δὲ αἰ βῆ,
 βγ, δυοὶ ταῖς δε, εζ ἴσαι εἰσὶν ἐκάτερα ἐκα-
 τέρα, καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ηβγ γωνία τῇ ὑπὸ
 δεζ ἴση ἐστὶ. βάσις ἄρα ἡ ηγ, βάσις τῇ δεζ ἴση
 ἐστὶ. καὶ τὸ ηγβ τρίγωνον, τὰ δεζ τριγώνω ἴ-
 σον ἔσται, καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι, ταῖς λοιπαῖς
 γωνίαις ἴσαι ἔσονται ἐκάτερα ἐκάτερα, ὅφ' αὖτε
 αἱ ἴσαι πλευραὶ ὑπείνυσιν. ἴση ἄρα ἡ ὑπὸ
 ηγδ γωνία, τῇ ὑπὸ δεζ, ἀλλὰ ἡ ὑπὸ δεζ, τῇ
 ὑπὸ βγα ὑπόκειται ἴση, καὶ ἡ ὑπὸ βγη ἄρα,
 τῇ ὑπὸ βγα ἴση ἐστὶν, ἡ ἐλάσσων τῇ μείζονι,
 ὅπως ἀδυνάτον. (Συμπέρασμα πρώτον.) ὣς τε
 ἄρα ἀνισός ἐστιν ἡ αβ, τῇ δε, ἴση ἄρα ἔστι δὲ καὶ
 ἡ βγ, τῇ εζ ἴση, δύο δὲ αἰ αβ, βγ, δυοὶ ταῖς
 δε, εζ ἴσαι εἰσὶν ἐκάτερα ἐκάτερα, καὶ γωνία
 ἡ ὑπὸ αβγ, γωνία τῇ ὑπὸ δεζ ἐστὶν ἴση, βά-
 σις

gulo equalem, nempe angulum $\beta\alpha\gamma$, equalem angulo $\delta\epsilon\zeta$. (Prima delineatio.) Si enim $\alpha\beta$, latus, inaequale fuerit lateri $\delta\epsilon$, unum ex istis sit maius. sit igitur latus $\alpha\beta$ maius, & fiat recta $\delta\epsilon$, equalis recta $\beta\eta$, & ducatur recta $\eta\gamma$. (Prima demonstratio.) Cum itaq; latus $\beta\eta$, sit equale lateri $\delta\epsilon$, & latus $\beta\gamma$ equale lateri $\epsilon\zeta$, duo igitur latera $\beta\eta$, $\beta\gamma$, duobus lateribus $\delta\epsilon$, $\epsilon\zeta$, sunt equalia alterum alteri, & angulus $\eta\beta\gamma$, angulo $\delta\epsilon\zeta$ equalis: ergo basis $\eta\gamma$, basi $\delta\zeta$ esse equalis, & triangulus $\alpha\gamma\epsilon$, triangulo $\delta\epsilon\zeta$ est equalis, & reliqui anguli, reliquis angulis sunt aequales, alter alteri, quos equalia illa latera subtendunt angulus $\eta\gamma\epsilon$, equalis angulo $\delta\zeta\epsilon$, sed angulus $\delta\zeta\epsilon$, pponitur equalis angulo $\epsilon\gamma\alpha$, erit igitur angulus $\epsilon\gamma\eta$, etiam equalis angulo $\epsilon\gamma\alpha$, minor maiori, quod fieri nequit. (Conclusio prima.) Ergo latus $\alpha\epsilon$, non est inaequale lateri $\delta\epsilon$. ergo erit ei equale, verum latus $\epsilon\gamma$ etiam esse equale lateri $\epsilon\zeta$: duo igitur latera $\alpha\epsilon$, $\epsilon\gamma$, duobus lateribus $\delta\epsilon$, $\epsilon\zeta$, sunt equalia alterum alteri: & angulus $\alpha\epsilon\gamma$, angulo $\delta\epsilon\zeta$

σις ἄρα ἡ $\alpha\gamma$, βάσι τῇ $\delta\zeta$, ἴση ἐστὶ, καὶ λοιπὴ
 γωνία ἡ ὑπὸ $\beta\alpha\gamma$, λοιπὴ γωνία τῇ ὑπὸ $\epsilon\delta\zeta$
 ἴση ἐστίν. (Ἐκθεσις δὲ $\delta\delta\lambda\epsilon\rho\alpha$.) Ἀλλὰ δὴ πάλιν
 ἔσωσαν αἱ ὑπὸ τὰς ἴσας γωνίας πλευραὶ ὑ-
 πολείνεσθαι ἴσαι, ὡς ἡ $\alpha\beta$, τῇ δὲ. (Διορισμὸς
 δὲ $\pi\rho\theta$.) Λέγω πάλιν, ὅτι καὶ αἱ λοιπαὶ
 πλευραὶ, ταῖς λοιπαῖς πλευραῖς ἴσαι ἔσυν-
 ται, ἡ μὲν $\alpha\gamma$, τῇ $\delta\zeta$, ἡ δὲ $\beta\gamma$, τῇ $\epsilon\zeta$, καὶ ἐπὶ ἡ
 λοιπὴ γωνία ἡ ὑπὸ $\beta\alpha\gamma$, λοιπὴ τῇ ὑπὸ $\epsilon\delta\zeta$
 ἴση ἐστίν. (Κατασκευὴ δὲ $\delta\delta\lambda\epsilon\rho\alpha$.) Εἰ γὰρ αὐ-
 σὸς ἐστὶν ἡ $\beta\gamma$, τῇ $\epsilon\zeta$, μία αὐτῶν μείζων ἐστίν.
 ἔσω εἰ δυνατὸν μείζων, ἡ $\beta\gamma$, καὶ κείτω τῇ
 $\epsilon\zeta$, ἴση ἡ $\gamma\theta$, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ $\alpha\theta$. (Ἀποδείξις
 δὲ $\delta\delta\lambda\epsilon\rho\alpha$.) Καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ μὲν $\beta\theta$ τῇ $\epsilon\zeta$, ἡ
 δὲ $\alpha\beta$ τῇ $\delta\epsilon$, δύο δὴ αἱ $\alpha\beta$, $\beta\theta$, δυσὶ ταῖς $\delta\epsilon$,
 $\epsilon\zeta$ ἴσαι εἰσὶν ἑκάτερα ἑκατέρω, καὶ γωνίας ἴ-
 σαι περιέχουσι, βάσις ἄρα ἡ $\alpha\theta$, βάσις τῇ $\delta\zeta$
 ἴση ἐστὶ, καὶ τὸ $\alpha\beta\theta$ τρίγωνον, τῷ $\delta\epsilon\zeta$ τριγώνῳ
 ἴσον ἐστὶ, καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι, ταῖς λοιπαῖς
 γωνίαις ἴσαι ἔσονται ἑκάτερα ἑκατέρω, ὑφ'
 ἧς αἱ ἴσαι πλευραὶ ὑπολείνεσθαι. ἴση ἄρα ἐστὶ
 ἡ ὑπὸ $\beta\theta\alpha$ γωνία, τῇ ὑπὸ $\epsilon\zeta\delta$, ἀλλὰ ἡ ὑπὸ
 $\epsilon\zeta\delta$.

equalis. basis itaq. ay , basi $d\zeta$ erit equalis,
& reliquus angulus Cay , reliquo angulo $id\zeta$
equalis. (Secunda explicatio dati.) Verũ ite-
rũ statuuntur latera equalis angulos subtenden-
teria equalia, ut $a\text{C}$ latus, equale lateri $d\epsilon$.
(Secunda explicatio quesiti.) Dico quod etiã
reliqua latera, reliquis laterib. sint equalia,
latus ay , equale lateri $d\zeta$, et latus Cy , equa-
le lateri $e\zeta$; deniq. reliquus angulus Cay , reli-
quo angulo $id\zeta$ equalis. (Secunda delineatio.)
Si enim latus Cy , nõ fuerit equale lateri $e\zeta$:
sed alterum ex eis fuerit maius. sit latus Cy ,
si poterit fieri, maius latere $e\zeta$: & fiat lateri
 $e\zeta$, equale latus $\text{C}\theta$, & ducatur recta ad . (So-
cunda Demonstratio.) Quoniam latus $\text{C}\theta$, e-
quale est lateri $e\zeta$, & latus $a\text{C}$, equale lateri
 $d\epsilon$: duo itaq. latera $a\text{C}$, $\text{C}\theta$, duobus laterib. $d\epsilon$,
 $e\zeta$, sunt equalia alterum alteri: & angulos
comprehendunt equalis: basis igitur ad , est
equalis basi $d\zeta$: & triangulus $a\text{C}\theta$, triangulo
 $d\epsilon\zeta$ est equalis: & reliqui anguli, reliquis an-
gulis sunt equalis alter alteri, quos equalia
illa latera subtendunt: angulus $\text{C}\theta a$, equalis

$\epsilon\zeta\delta$, τῇ ὑπὸ βγα γωνία ἴση, καὶ ἡ ὑπὸ
 βθα ἄρα, τῇ ὑπὸ βγα εἰς ἴση. τριγώνου δὲ
 $\epsilon\zeta\alpha\beta\gamma$, ἡ ἐκτός γωνία ἡ ὑπὸ βθα ἴση ἐστὶ τῇ ἐν-
 τὸς καὶ ἀπ' ἐναντίον τῇ ὑπὸ βγα, ὅτε ἀδύ-
 νατον εἶναι. (Συμπέρασμα δεύτερον.) ὅτε ἄ-
 ρα ἀνισός ἐστιν ἡ βγ. τῇ $\epsilon\zeta$, ἴση ἄρα. ἐστὶ δὲ καὶ
 ἡ αβ, τῇ δὲ ἴση, δύο δὲ αὖ αβ, βγ, δύοσι ταῖς
 δὲ, $\epsilon\zeta$, ἴση εἰσὶν ἐκάπερα ἐκείρα, καὶ γωνίας
 ἴσας περιέχουσι. βάσις ἄρα ἡ αβ, βάσις τῇ δὲ
 ἴση ἐστὶ, καὶ τὸ αβγ τρίγωνον, τὰ δὲ $\epsilon\zeta$ τριγώ-
 νω ἴσον ἐστὶ, καὶ ἡ λοιπὴ γωνία ἡ ὑπὸ βαγ,
 τῇ λοιπῇ γωνίᾳ τῇ ὑπὸ εδζ, ἴση ἐστὶν. (Συμ-
 πέρασμα καθόλου.) Εἰάν ἄρα δύο τρίγωνα
 τὰς δύο γωνίας ταῖς δύοσι γωνίαις ἴσας ἔχη
 ἐκάπεραν ἐκείρα, καὶ μίαν πλευρὰν μιᾶ
 πλευρᾷ ἴσην ἔχη, ἥτοι τὴν πρὸς ταῖς ἴσας
 γωνίαις, ἢ τὴν ὑπολείνουσαν ὑπὸ μίαν τῶν
 ἴσων γωνιῶν, ἔστω τὰς λοιπὰς πλευρὰς, ταῖς
 λοιπαῖς πλευραῖς ἴσας ἔξει, καὶ τὴν λοι-
 πὴν γωνίαν τῇ λοιπῇ γωνίᾳ ὅπως εἶδει δεῖ-
 ξαι.


angulo $\epsilon\delta$. Verum angulus $\epsilon\delta$, est equalis
 angulo $\beta\gamma\alpha$. ergo angulus $\beta\delta\alpha$, est equalis
 angulo $\beta\gamma\alpha$. Trianguli igitur $\alpha\beta\gamma$, angulus
 $\beta\delta\alpha$ externus, angulo $\beta\gamma\alpha$ interno sibi op-
 posito est equalis, quod fieri nequit. Quare
 latus $\beta\gamma$, non est inaequale lateri $\epsilon\delta$: erit igitur
 ei aequale. sed & $\alpha\beta$ latus, est aequale la-
 teri $\delta\epsilon$: duo igitur latera $\alpha\beta$, $\beta\gamma$, sunt equa-
 lia duobus lateribus $\delta\epsilon$, & alterum alteri, &
 angulos comprehendunt aequales. basis igitur
 $\alpha\gamma$, basi $\delta\epsilon$ est equalis, & triangulus $\alpha\beta\gamma$,
 est equalis triangulo $\delta\epsilon\zeta$: & reliquus angu-
 lus $\beta\alpha\gamma$, reliquo angulo $\epsilon\delta\zeta$ est equalis.
 (Conclusio.) Quorum ergo triangulorum
 duo anguli unius, fuerint aequales duobus
 angulis alterius, alter alteri: & latus unum
 uni lateri aequale: siue illud appositum sit a-
 qualibus illis angulis: siue subtendat unum
 ex aequalibus illis angulis: illorum cum reli-
 qua latera inter se erunt aequalia, alterum
 alteri: cum etiam reliquus angulus, reliquo
 angulo erit equalis. Id quod erat demon-
 strandum.

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ
ΤΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ.

Πρότασις κζ. Γεώρημα.

ΕΑν εἰς δύο ὁθείας ὁθεῖαι ἐμπίπῃσαι τὰς ἐναλλὰξ γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ποιῇ, παράλληλοι ἴσονται ἀλλήλαις αἱ ὁθεῖαι.

Εκθεσις.) Εἰς γὰρ δύο ὁθεῖας τὰς $\alpha\beta$, γδ, ὁθεῖαι ἐμπίπῃσαι ἡ $\epsilon\zeta$, τὰς ἐναλλὰξ γωνίας τὰς ὑπὸ $\alpha\epsilon\zeta$, $\epsilon\zeta\delta$, ἴσας ἀλλήλαις ποιήτω. (Διορισμός.) Λέγω ὅτι παράλληλός ἐστιν ἡ $\alpha\beta$, τῇ γδ ὁθεῖαι. (Υπόθεσις.) Εἰ γὰρ μὴ ἐκβαλλόμεναι αἱ $\alpha\beta$, γδ συμπέσῃσι, ἤτοι ὅτι τὰ βδ μέρη ἢ ὅτι τὰ $\alpha\gamma$ ἐκβεβλήσθωσαν καὶ συμπιπέντωσαν ὅτι τὰ βδ μέρη κατὰ τὸ η . (Απόδειξις.) Τελύων δὴ ϵ ἢ ζ ἡ ἐκτὸς γωνία ἡ ὑπὸ $\alpha\epsilon\zeta$ μείζων ἐστὶ τῆς ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον γωνίας τῆς ὑπὸ $\epsilon\zeta\delta$, ἀλλὰ καὶ ἴση, ὅπως ἐστὶν ἀδυνάτον. ὅθεν ἄρα αἱ $\alpha\beta$, γδ ἐκβαλλόμεναι συμπέσονται, ὅτι τὰ βδ μέρη. Ομοίως δὲ δειχθήσεται,



PARS ALTERA HVIVS PRIMI ELEMENTI.

Propositio vigesima septima. Theorema.

SI in duas líneas rectas, recta incidēs línea, angulos alternos æquales inter se fecerit: æquedistantes inter se erunt rectæ illæ duæ lineæ.


Explicatio dati.) In lineas duas rectas ab , gd incidens linea recta ez , angulos alternos aez , gdz , æquales inter se faciat. (*Explicatio quaesiti.)* Dico quod recta ab , recta gd , æquedistet. (*Hypothesis.)* Si enim nō æquedistant, tum protracta linea recta ab , gd concurrunt vel ex partibus β & d : vel ex partibus a , & g . protrahantur & concurrant ex partibus β , & d : in puncto η . (*Demōstratio.)* Trianguli igitur aez , angulus aez , externus, angulo $ez\eta$ interno opposito est maior: verum etiam est ei æqualis. quod fieri non potest. quare rectæ ab , gd , si protrahantur, non concurrent ex partibus β , & d . similiter demonstra-

σῆται, ὅπῃ δὲ ὅπῃ τὰ $\alpha\gamma$. αἱ δὲ ὅπῃ μηδέποτε
τὰ μέρη συμπίπτουσι, παράλληλοί εἰσι, πα-
ράλληλοι. Ἄρα εἰς ἡ $\alpha\beta$, τῇ $\gamma\delta$. (Συμ-
πίπτουσα.) Εἰς ἄρα εἰς δύο ὁθείας ὁθεῖα
ἐμπίπτουσι τὰς ἐναλλὰξ γωνίας ἴσας ἀλλή-
λαις ποιῇ, παράλληλοι ἐσονται αἱ ὁθεῖαι. ὅ-
πως ἴδῃ δὲ εἶξαι.

Πρότασις κή. θεώρημα.

ΕΑΝ εἰς δύο ὁθείας ὁθεῖα ἐμπίπτουσα,
τὴν ἐκτός γωνίαν, τῇ ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον
καὶ ὅπῃ τὰ αὐτὰ μέρη ἴσῳ ποιῇ, ἢ τὰς ἐν-
τὸς, καὶ ὅπῃ τὰ αὐτὰ μέρη δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας
ποιῇ, παράλληλοι ἐσονται ἀλλήλαις αἱ ὁ-
θεῖαι.

Εκθεσις.) Εἰς γὰρ δύο ὁ-
θείας τὰς $\alpha\beta$, γὰρ ὁθεῖα $\alpha\gamma$
ἐμπίπτουσα ἢ εἰς, τὴν ἐκτός
γωνίαν τὴν ὑπὸ $\epsilon\eta\beta$, τῇ
ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον γω-
νία, τῇ ὑπὸ $\eta\theta\delta$, ἴσην ποι-
εῖται, ἢ τὰς ἐντὸς καὶ ὅπῃ τὰ αὐτὰ μέρη τὰς
ὑπὸ $\beta\eta\theta$, $\eta\theta\delta$, δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας. (Διορισ-
μός.)



monstrabitur, quod neq. ex partibus a, & γ, concurrant. recta vero, quæ ex neutra parte concurrunt, si protabantur, sunt inter se æquedistantes. quare recta αβ, æquedistat rectæ γδ. (Conclusio.) Si igitur in duas lineas rectas, recta incidat linea, ac faciat angulos alternos inter se æquales: recta ista linea inter se sunt æquedistantes. Id quod erat demonstrandum.

Propositio vigesima octava. Theorema.

SI linea recta in duas rectas incidens lineas, extraneum angulum interno cui opponitur ex eadem parte fecerit æqualem: vel si duos internos ex eadem parte fecerit æquales duobus angulis rectis: æquedistantes inter se erunt duæ illæ lineæ rectæ.

Explicatio dati.) In lineas duas rectas αβ, γδ, incidens linea recta εζ: angulum extraneum ενβ, interno opposito ex eadem parte angulo ηδδ faciat æqualem: & faciat duos angulos internos ex eadem parte ζηθ, ηθδ, æquales duobus angulis rectis. (Explicatio

μὸς.) Λέγω ὅτι παράλληλός ἐστιν ἡ $\alpha\beta$, τῇ $\gamma\delta$. (Απόδειξις.) Ἐπεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ $\epsilon\eta\theta$, τῇ ὑπὸ $\eta\theta\delta$, ἀλλὰ ἡ ὑπὸ $\epsilon\eta\beta$, τῇ ὑπὸ $\alpha\eta\theta$ ἐστὶν ἴση, καὶ ἡ ὑπὸ $\alpha\eta\theta$ ἄρα, τῇ ὑπὸ $\eta\theta\delta$ ἐστὶν ἴση. καὶ εἰσὶν ἐναλλάξ. παράλληλοι $\odot$ ἄρα ἐστὶν ἡ $\alpha\beta$, τῇ $\gamma\delta$. Πάλιν ἐπεὶ αἱ ὑπὸ $\epsilon\eta\theta$, $\eta\theta\delta$, δύοσιν ὀρθαῖς ἴσται εἰσὶν, εἰσὶ δὲ καὶ αἱ ὑπὸ $\alpha\eta\theta$, $\epsilon\eta\theta$ δύοσιν ὀρθαῖς ἴσται, αἱ ἄρα ὑπὸ $\alpha\eta\theta$, $\beta\eta\theta$, ταῖς ὑπὸ $\beta\eta\theta$, $\eta\theta\delta$, ἴσται εἰσὶ, καὶ ἡ ἀφ' ἧς ῥηθῆναι ἡ ὑπὸ $\beta\eta\theta$, λοιπὴ ἄρα, ἡ ὑπὸ $\alpha\eta\theta$, λοιπὴ τῇ ὑπὸ $\eta\theta\delta$ ἐστὶν ἴση. καὶ εἰσὶν ἐναλλάξ, παράλληλοι $\odot$ ἄρα ἐστὶν ἡ $\alpha\beta$, τῇ $\gamma\delta$. (Συμπέρασμα.) Εὰν ἄρα εἰς δύο ὀρθεῖας ὀρθεῖα ἐμπέπησαι, πλὴν ἐκείνης γωνίας τῇ ἐντὸς ϵ ἀπεναντίον καὶ ὅτι τὰ αὐτὰ μέρη ἴσην ποιῇ, ἢ τὰς ἐντὸς καὶ ὅτι τὰ αὐτὰ μέρη δύοσιν ὀρθαῖς ἴσται, παράλληλοι ἔσονται αἱ ὀρθεῖαι. ὅπερ εἶναι δεῖξαι.

Πρότερος κθ. θεώρημα.

Η εἰς


quesiti.) Dico quod recta ab , equedistet recte gd . (Demonstratio.) Cum enim angulus enb , sit equalis angulo hbd : & angulus enb , etiam sit equalis angulo anb : idcirco angulus anb , etiam est equalis angulo hbd , & sane anguli alterni. quare recta ab , recte gd , est equedistans. Rursus, quoniam anguli cnb , hbd , duobus rectis sunt equales: & duo anguli anb , cnb , etiam duobus rectis equales: idcirco anguli anb , hbd sunt duobus angulis bnh , hbd equales: communis auferatur angulus bnh . reliquus igitur angulus anb , reliquo angulo hbd est equalis, & sunt anguli alterni. ergo recta ab , equedistat recte gd . (Conclusio.) Si igitur linea recta in duas rectas incidens lineas, extraneum angulum interno cui opponitur, ex eadem parte fecerit equalē: vel si duos angulos internos ex eadem parte fecerit equales duobus angulis rectis: equedistātes inter se erunt due illae lineae recte. Id quod erat demonstrandum.

Propositio vigesima nona. Theorema.

Linea

Η εἰς τὰς παραλλήλῃς βθείας βθεῖα ἐμ-
πίπτουσα, τὰς πένταλὰς γωνίας ἴσας
ἀλλήλαις ποιεῖ, καὶ τὴν ἐκτὸς, τῇ ἐντὸς καὶ ἀ-
πεναντίον, καὶ ὅτι τὰ αὐτὰ μέρη, ἴσω, καὶ
τὰς ἐντὸς καὶ ὅτι τὰ αὐτὰ μέρη δυσὶν ὀρθαῖς
ἴσας.

Εκθίσις.) Εἰς γὰρ πα-
ραλλήλῃς βθείας τὰς $\alpha\beta$, $\gamma\delta$, βθεῖα ἐμπίπ-
τω, ἡ $\epsilon\zeta$. (Διορισμός.) Λέ-
γω ὅτι τὰς πένταλὰς
γωνίας τὰς ὑπὸ $\alpha\eta\theta$,
 $\eta\theta\delta$, ἴσας ποιεῖ, καὶ τὴν ἐκτὸς γωνίαν τὴν
ὑπὸ $\epsilon\eta\beta$, τῇ ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον καὶ ὅτι τὰ
αὐτὰ μέρη τῇ ὑπὸ $\eta\theta\delta$ ἴσην, καὶ τὰς ἐντὸς,
καὶ ὅτι τὰ αὐτὰ μέρη τὰς ὑπὸ $\beta\eta\theta$, $\eta\theta\delta$,
δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας. (Αποδείξις μετὰ τῆς ὑ-
ποθέσεως.) Εἰ γὰρ ἀνισός ἐστιν ἡ ὑπὸ $\alpha\eta\theta$,
τῇ ὑπὸ $\eta\theta\delta$, μία αὐτῶν μείζων ἐστίν. ἔστω
μείζων ἡ ὑπὸ $\alpha\eta\theta$, καὶ ἐπεὶ μείζων ἐστίν ἡ ὑ-
πὸ $\alpha\eta\theta$, τῆς ὑπὸ $\eta\theta\delta$, κρινὴ περισκείσθω ἡ
ὑπὸ $\beta\eta\theta$. αἱ ἄρα ὑπὸ $\alpha\eta\theta$, $\beta\eta\theta$, ἔῃ ὑπὸ $\beta\eta\theta$,
 $\eta\theta\delta$.



Linea recta in duas rectas æquedistantes lineas incidens, facit angulos alternos inter se æquales; & angulum externum interno opposito ex eadem parte facit æqualem: item duos angulos internos ex eadem parte facit æquales duobus rectis.

Explicatio dati.) Sint due lineæ rectæ æquedistantes $\alpha\beta$, $\gamma\delta$: & in eas incidat linea recta $\epsilon\zeta$. (*Explicatio quesiti.)* Dico quod faciat angulos $\alpha\eta\zeta$, $\eta\theta\delta$, qui sunt alterni, inter se æquales: & angulum externum $\epsilon\eta\beta$, angulo interno opposito ex eadem parte $\eta\theta\delta$ æqualem: & angulos internos ex eadem parte positos $\epsilon\eta\theta$, $\eta\theta\delta$, duobus rectis æquales. (*Demonstratio cum hypothesi.)* Si enim angulus $\alpha\eta\zeta$, nō est æqualis angulo $\eta\theta\delta$: alter illorum erit maior, sit angulus $\alpha\eta\theta$ maior. Quoniam angulus $\alpha\eta\theta$, maior est angulo $\eta\theta\delta$: cōmunis addatur angulus $\beta\eta\zeta$. ergo anguli $\alpha\eta\theta$, $\beta\eta\theta$, sunt maiores angulis $\beta\eta\zeta$, $\eta\theta\delta$. Verum.

H rum.


ἡθδ, μείζονες εἰσιν. ἀλλὰ καὶ αἱ ὑπὸ αἱθ, βηθ, δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσιν. καὶ αἱ ἄρα ὑπὸ βηθ, ἡθδ, δύο ὀρθῶν ἐλάσσονες εἰσιν. αἱ δὲ ὑπὸ ἐλασσόνων ἢ δύο ὀρθῶν ἐκβαλλόμεναι εἰς ἄπφρον, συμπίπτεσιν. αἱ ἄρα αβ, γδ, ἐκβαλλόμεναι, εἰς ἄπειρον, συμπεισῶν. ὃ συμπίπτει, διὰ τὸ παραλλήλως αὐτὰς ὑποκείσθαι. ὅτι ἄρα ἀνίσος ἐστὶν ἡ ὑπὸ αἱθ, τῇ ὑπὸ ἡθδ, ἴση ἄρα. ἀλλὰ ἡ ὑπὸ αἱθ, τῇ ὑπὸ εἱβ, ἐστὶν ἴση, καὶ ἡ ὑπὸ εἱβ, ἄρα, τῇ ὑπὸ ἡθδ, ἐστὶν ἴση, κοινὴ περὶ κείῳ, ἡ ὑπὸ βηθ. αἱ ἄρα ὑπὸ εἱβ, βηθ, ταῖς ὑπὸ βηθ, ἡθδ, ἴσαι εἰσιν. ἀλλὰ αἱ ὑπὸ εἱβ, βηθ, δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσιν, καὶ αἱ ὑπὸ βηθ, ἡθδ, ἄρα, δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσιν. (Συμπέρασμα.) Ἡ ἄρα εἰς τὰς παραλλήλους εὐθείας εὐθεῖα ἐμπίπτουσα, τὰς τε ἐναλλὰξ γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ποιεῖ, καὶ τὴν ἐκτός, τῇ ἐντός καὶ ἀπεναντίον, καὶ ὅτι τὰ αὐτὰ μέρη ἴσην, καὶ τὰς ἐντός, ὃ ὅτι τὰ αὐτὰ μέρη, δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας. ὅπερ εἶδεν δεῖξαι.

rum anguli $\alpha\eta\theta$, $\zeta\eta\theta$ duobus rectis sunt equales. ergo anguli $\beta\eta\theta$, $\eta\theta\delta$, duobus rectis sunt minores: lineæ verò rectæ à duobus angulis, qui sunt minores duobus angulis rectis, in infinitum usq; ductæ concurrunt: quare rectæ $\alpha\zeta$, $\gamma\delta$ in infinitum productæ concurrent: sed quia æquedistantes proponuntur esse, non cōcurrunt: idcirco angulus $\alpha\eta\theta$, non est inequalis angulo $\eta\theta\delta$, erit igitur ei æqualis. Verum angulus $\alpha\eta\theta$, angulo $\epsilon\eta\beta$ est æqualis: ideo etiam angulus $\epsilon\eta\zeta$, angulo $\eta\theta\delta$ est æqualis: communis addatur angulus $\beta\eta\theta$: ergo anguli $\epsilon\eta\beta$, $\zeta\eta\theta$, angulis $\beta\eta\theta$, $\eta\theta\delta$ sunt æquales: verum anguli $\epsilon\eta\beta$, $\beta\eta\theta$ duobus rectis sunt æquales, idcirco & anguli $\beta\eta\theta$, $\eta\theta\delta$ duobus rectis æquales erunt. (Conclusio.) Linea igitur recta, in duas æquedistantes lineas rectas incidens, facit angulos alternos inter se æquales: & angulum externum interno opposito ex eadem parte facit æqualem: item duos angulos internos ex eadem parte facit æquales duobus rectis. Id q; erat demonstrandum.

Πρότεσις λ. θεώρημα.

Αι τῇ αὐτῇ ὁθεΐα παράλληλοι, καὶ ἀλλήλαις εἰσι παράλληλοι.

Εκθεσις.) Εστω ἑκάτερα τῶν $\alpha\beta$, $\gamma\delta$, τῇ ἐξ παραλλήλῳ. (Διορισμός.) Λέγω ὅτι καὶ ἡ $\alpha\beta$, τῇ $\gamma\delta$ ἐστὶ παράλληλος. (Κατασκευὴ.) Εμπιπέντω γὰρ εἰς αὐτὰς ὁθεΐα ἡ $\eta\kappa$. (Απόδειξις.) Καὶ ἐπεὶ εἰς παραλλήλης ὁθεΐας τὰς $\alpha\beta$, ἐξ ὁθεΐα ἐμπέπλωκεν, ἡ $\eta\kappa$, ἴση ἄρα ἡ ὑπὸ $\alpha\eta\theta$, τῇ ὑπὸ $\eta\theta\zeta$. πάλιν ἐπεὶ εἰς τὰς παραλλήλης ὁθεΐας τὰς $\epsilon\zeta$, $\gamma\delta$, ὁθεΐα ἐμπέπλωκεν ἡ $\eta\kappa$, ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ $\eta\theta\zeta$, τῇ ὑπὸ $\eta\kappa\delta$, ἐδείχθη δὲ καὶ ἡ ὑπὸ $\alpha\eta\kappa$, τῇ ὑπὸ $\eta\theta\zeta$ ἴση, καὶ ἡ ὑπὸ $\alpha\eta\kappa$ ἄρα, τῇ ὑπὸ $\eta\kappa\delta$ ἐστὶν ἴση, ἔτι εἰσιν ἐναλλάξ, παραλλήλῳ ἄρα ἐστὶν ἡ $\alpha\beta$, τῇ $\gamma\delta$. (Συμπέρασμα.) Αἱ ἄρα τῇ αὐτῇ ὁθεΐα παράλληλοι, καὶ ἀλλήλαις εἰσι παράλληλοι. ὥς ἐδειξάμεθα.



Πρώτα.

Propositio Trigesima. Theorema.

QUæ eidem lineæ rectæ æquedistant:
illæ etiam inter se æquedistant.


Explicatio dati.) Sit linea recta $\epsilon\zeta$, cui æquedistant rectæ lineæ $\alpha\beta$, $\gamma\delta$. (*Explicatio quæsitæ.)* Dico quod recta $\alpha\beta$, etiam æquedistet rectæ $\gamma\delta$. (*Delineatio.)* Incidat in prædictas lineas recta quædam linea $\eta\kappa$. (*Demonstratio.)* Quoniam in duas æquedistantes rectas $\alpha\beta$, $\epsilon\zeta$: incidit recta $\eta\kappa$: idcirco angulus $\alpha\eta\theta$, est æqualis angulo $\eta\theta\zeta$. Præterea quoniam in duas rectas æquedistantes $\epsilon\zeta$, $\gamma\delta$ recta incidit $\eta\kappa$: angulus $\eta\theta\zeta$, erit æqualis angulo $\eta\kappa\delta$. demonstratum verò est, quod angulus $\alpha\eta\kappa$, angulo $\eta\theta\zeta$ sit æqualis. quare & angulus $\alpha\eta\kappa$, angulo $\eta\kappa\delta$ est æqualis, & sunt anguli alterni. Quare recta $\alpha\beta$, æquedistat rectæ $\gamma\delta$. (*Conclusio.)* Quæ igitur rectæ eidem lineæ rectæ æquedistant: illæ etiam inter se æquedistant. Id quod erat demonstrandū.

Πρότασις λα. Πρόβλημα.

ΑΠὸ τῆς δοθέντος σημείου, τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ, παράλληλον εὐθεῖαν γραμμὴν ἀγαγεῖν.

Εκθεσις.) Εἰς τὸ μὲν δοθέν σημείον, τὸ α , ἡ δὲ δοθεῖσα εὐθεῖα, ἡ $\beta\gamma$. (Διορισμός.) Δεῖ δὴ διὰ τῆς α σημείου, τῇ $\beta\gamma$ εὐθείᾳ, παράλληλον εὐθεῖαν γραμμὴν ἀγαγεῖν. (Κατασκευή.) Εἰλήφθω ὅτι τῆς $\beta\gamma$ τυχὸν σημείον τὸ δ ,

καὶ ἐπεζέχθω ἡ $\alpha\delta$, καὶ συνεσθῶ πρὸς τῇ $\delta\alpha$ εὐθείᾳ, καὶ πρὸς αὐτῇ σημείῳ τῇ α , τῇ ὑπὸ $\alpha\delta\gamma$ γωνίᾳ, ἴση ἡ ὑπὸ $\delta\alpha\epsilon$, καὶ ἐκβεβλήσθω ἐκ τῆς εὐθείας



τῇ $\alpha\epsilon$, εὐθείᾳ ἡ $\alpha\epsilon$. (Απόδειξις.) Καὶ ἐπεὶ εἰς δύο εὐθείας τὰς $\beta\gamma$, ἡ $\epsilon\delta$, εὐθεῖα ἐμπισθῶσι ἡ $\alpha\delta$, τὰς ἐναλλὰξ γωνίας τὰς ὑπὸ $\epsilon\alpha\delta$, $\alpha\delta\gamma$, ἴσας ἀλλήλαις ποιήσεικε, παράλληλον ἄρα ἐστὶν ἡ $\epsilon\delta$ τῇ $\beta\gamma$. (Συμπέρασμα.) Διὰ τῆς δοθέντος ἄρα σημείου τῆς α , τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ τῇ $\beta\gamma$ παράλληλον εὐθεῖαν γραμμὴν ἡ $\epsilon\delta$ ἡ $\alpha\epsilon$ ὥς εἶδε ποιήσεται.

Propositio trigesima prima. Problema.


A Puncto dato, datæ lineæ rectæ, rectam lineam æquedistantem ducere.

Explicatio dati.) Sit datum punctum α , et data linea recta $\beta\gamma$. (*Explicatio quesiti.)* A dato puncto α , ducenda est linea recta æquedistans lineæ rectæ datæ, $\beta\gamma$. (*Delineatio.)* Sumatur in linea recta $\beta\gamma$, punctum quoduis δ , & ducatur linea recta ad ; Ad lineam rectam ad , & punctum in ea α , angulo rectilineo $ad\gamma$, æqualis statuatur angulus rectilineus $\delta\alpha\epsilon$, & ducatur linea $\alpha\epsilon$, & ev-
deat linea $\epsilon\alpha$. (*Demonstratio.)* Quoniam in duas lineas rectas $\beta\gamma$, $\epsilon\delta$, incidens linea recta ad angulos alternos ϵad , $ad\gamma$, æquales inter se fecit: idcirco recta $\epsilon\delta$, æquedistat rectæ $\beta\gamma$. (*Conclusio.)* A puncto igitur dato α , datæ lineæ rectæ $\beta\gamma$, ducta est linea recta $\epsilon\alpha$ æquedistans. Id quod faciendum erat.

Πρότασις λβ. θεώρημα.

Πάντος τριγώνου μίας τῶν πλυσρῶν προσεκβληθείσης, ἡ ἐκτός γωνία, δυσὶ ταῖς ἐκτός καὶ ἀπεναντίον ἴση ἐστὶ· Ἐὰν αἱ ἐκτός τῶν τριγώνου τρεῖς γωνίαι, δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσιν.

Εκθεσις.) Ἐστω τρίγωνον, τὸ $\alpha\beta\gamma$, καὶ προσεκβεβλήσθω αὐτοῦ μία πλυσρά, ἡ $\beta\gamma$ ὅπῃ τὸ δ . (Διορισμός.) Λέγω ὅτι ἡ ἐκτός γωνία ἡ ὑπὸ $\alpha\gamma\delta$



ἴση ἐστὶ ταῖς δυσὶ ταῖς ἐκτός Ἐὰν ἀπεναντίον ταῖς ὑπὸ $\gamma\alpha\beta$, $\alpha\beta\gamma$, καὶ αἱ ἐκτός τῶν τριγώνου τρεῖς γωνίαι, αἱ ὑπὸ $\alpha\beta\gamma$, $\beta\gamma\alpha$, $\gamma\alpha\beta$, δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσιν. (Κατασκευὴ.) Ἡχθῶ γὰρ ἀπὸ τῶν σημείων τῇ $\alpha\beta$ εὐθείᾳ, παράλληλῃ ϵ ἢ $\gamma\epsilon$. (Απόδειξις.) Καὶ ἐπεὶ παράλληλός ἐστιν ἡ $\alpha\beta$, τῇ $\gamma\epsilon$, καὶ εἰς αὐτὰς ἐμπέπλωκεν ἡ $\alpha\gamma$, αἱ ἄρα ἐναλλαζόμεναι γωνίαι αἱ ὑπὸ $\beta\alpha\gamma$, $\alpha\gamma\epsilon$, ἴσαι ἀλλήλαις εἰσι. πάλιν, ἐπεὶ παράλληλός ἐστιν ἡ $\alpha\beta$, τῇ $\gamma\epsilon$, καὶ εἰς αὐτὰς ἐμπέπλωκεν εὐθεῖα ἡ $\beta\delta$, ἡ ἐκτός γωνία ἡ ὑπὸ $\epsilon\gamma\delta$.

Propositio trigesima secunda.

Theorema.

OMnis triāguli vno è lateribus p-
tracto, exterior angulus, duobus an-
gulis interioribus quibus opponitur,
est equalis: & trianguli tres interiores
anguli, duobus rectis sunt equales.

(Explicatio dati.) Sit triangulus $\bar{a}\bar{b}\bar{c}$,
& protrahatur latus eius $\bar{b}\bar{c}$, ad punctum d ,
(Explicatio quæsit.) Dico quod angulus
 $\bar{a}\bar{y}d$, est equalis duobus angulis $\bar{y}\bar{a}\bar{b}$, $\bar{a}\bar{b}\bar{c}$
interioribus quibus opponitur: & quod angu-
li tres interiores $\bar{a}\bar{b}\bar{c}$, $\bar{b}\bar{c}\bar{a}$, $\bar{c}\bar{a}\bar{b}$ sint equales
duobus angulis rectis. (Delineatio.) Ducatur
à puncto $\bar{y}$, linea recta $\bar{a}\bar{e}$, æquedistans linea
recta $\bar{y}\bar{e}$. (Demonstratio.) Quoniā recta $\bar{a}\bar{e}$,
æquedistat recta $\bar{y}\bar{e}$, & in eas incidit recta $\bar{a}\bar{y}$
Idcirco alterni anguli $\bar{b}\bar{a}\bar{y}$, $\bar{a}\bar{y}\bar{e}$ sunt inter
se equales. Item cum recta $\bar{a}\bar{e}$, æquedistet re-
cta $\bar{y}\bar{e}$, & in eas incidit recta $\bar{c}\bar{d}$: angulus
H 5 $\bar{c}\bar{y}d$

$\bar{\epsilon}\gamma\delta$, ἴση ἐστὶ τῇ $\bar{\epsilon}\nu\tau\omicron\varsigma$ καὶ ἀπεναντίον, τῇ ὑπὸ
 $\bar{\alpha}\beta\gamma$. ἰδέσθῃ δὲ καὶ ἡ ὑπὸ $\bar{\alpha}\epsilon\gamma$, τῇ ὑπὸ
 $\bar{\beta}\alpha\gamma$ ἴση. ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ $\bar{\alpha}\gamma\delta$ ἐκ τῶν γωνιῶν,
ἴση ἐστὶ δυσὶ ταῖς $\bar{\epsilon}\nu\tau\omicron\varsigma$, ἢ ἀπεναντίον, ταῖς
ὑπὸ $\bar{\beta}\alpha\gamma$, $\bar{\alpha}\beta\gamma$. κοινὴ προσκείσθω ἡ ὑπὸ
 $\bar{\alpha}\gamma\beta$. αἱ ἄρα ὑπὸ $\bar{\alpha}\gamma\delta$, $\bar{\alpha}\gamma\beta$ τρισὶ ταῖς ὑπὸ
 $\bar{\alpha}\beta\gamma$, $\bar{\beta}\gamma\alpha$, $\bar{\gamma}\alpha\beta$, ἴσαι εἰσιν. ἀλλ' αἱ ὑπὸ $\bar{\alpha}\gamma\delta$,
 $\bar{\alpha}\gamma\beta$, δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶ. καὶ αἱ ὑπὸ $\bar{\alpha}\gamma\beta$,
 $\bar{\gamma}\beta\alpha$, $\bar{\gamma}\alpha\beta$ ἄρα δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶ. (Συμ-
πέρασμα.) Παντὸς ἄρα τριγώνου μιᾶς τῶν
πλευρῶν προσεκβληθείσης, ἡ ἐκ τῶν γωνιῶν,
δυσὶ ταῖς ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον ἴση ἐστὶ, καὶ αἱ
ἐντὸς τῷ τριγώνῳ τρεῖς γωνίαι, δυσὶν ὀρθαῖς
ἴσαι εἰσιν. ὅπως εἶδει δεῖξαι.

Πρότασις λγ. θεώρημα.

ΑΙ τὰς ἴσας τὲ ἑ παραλλήλους ὅπῃ τὰ αὐ-
τὰ μέρη ὅπῃ ζυγύωσιν εὐθεΐαι, ἢ αὐ-
ται ἴσαι τε καὶ παράλληλοι εἰσιν.

Εκθεσις.) Εξωσαν ἴσαι τὲ καὶ παράλληλοι,
αἱ $\bar{\alpha}\beta$, $\bar{\gamma}\delta$, ἢ ὅπῃ ζυγύωσιν αὐτάς ὅπῃ τὰ
αὐτὰ


$\alpha\gamma\delta$ externus, est æqualis angulo $\alpha\beta\gamma$ interno opposito. sed demonstratum est angulum $\alpha\epsilon\gamma$, angulo $\beta\alpha\gamma$ esse æqualem. totus igitur angulus $\alpha\gamma\delta$ externus, duobus angulis internis oppositis $\beta\alpha\gamma$, $\alpha\beta\gamma$ est æqualis. Communi addatur angulus $\alpha\gamma\epsilon$. anguli igitur $\alpha\gamma\delta$ $\alpha\gamma\epsilon$, tribus angulis $\alpha\epsilon\gamma$, $\epsilon\gamma\alpha$, $\gamma\alpha\beta$ sunt æquales. sed duo anguli $\alpha\gamma\delta$, $\alpha\gamma\beta$ sunt duobus rectis æquales. quare tres anguli $\alpha\gamma\beta$, $\gamma\beta\alpha$, $\gamma\alpha\epsilon$, duobus rectis erunt æquales. (Conclusio.) Omnis igitur trianguli, vno è lateribus protracto: exterior angulus duobus angulis interioribus, quibus opponitur, est æqualis: et trianguli tres interiores anguli, duobus rectis sunt æquales. Id quod erat demonstrandū.

Propositio trigesima tertia. Theorema.

Lineæ rectæ, quæ æquales, & æquedistantes inter se lineas rectas ex eadem parte coniungunt: etiam ipsæ æquales, & æquedistantes inter se sunt.

Explicatio dati.) Sint lineæ rectæ $\alpha\beta$, $\gamma\delta$, æquales, & æquedistantes: easq; ex eadem
parte

αὐτὰ μέρη εὐθεῖαι αἱ
 $\alpha\gamma, \beta\delta$. (Διορισμός.)
 Λέγω ὅτι καὶ αἱ $\alpha\gamma, \delta\beta$, ἴ-
 σαι καὶ παράλληλοι εἰσιν.
 (Κατασκευὴ.) Επεξέ-
 χθω γὰρ ἡ $\beta\gamma$. (Απόδοσι-



ξις.) Καὶ ἐπεὶ παράλληλός ἐστιν ἡ $\alpha\beta$, τῇ $\gamma\delta$,
 καὶ εἰς αὐτὰς ἐμπίπτωκεν ἡ $\beta\gamma$, αἱ ἐναλλαξ
 γωνίαι, αἱ ὑπὸ $\alpha\beta\gamma, \beta\gamma\delta$, ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶ.
 καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ $\alpha\beta$, τῇ $\gamma\delta$, κοινὴ δὲ ἡ $\beta\gamma$, δύο
 δὴ αἱ $\alpha\beta, \beta\gamma$, δυσὶ ταῖς $\beta\gamma, \gamma\delta$ ἴσαι εἰσι, καὶ
 γωνία ἡ ὑπὸ $\alpha\beta\gamma$, γωνία τῇ ὑπὸ $\beta\gamma\delta$ ἴση ἐ-
 στίν. βάσις ἄρα ἡ $\alpha\gamma$, βάσις τῇ $\beta\delta$ ἐστὶν ἴση, ὥ-
 στὸ $\alpha\beta\gamma$ τρίγωνον, τὰ $\beta\gamma\delta$ τριγώνω ἴσον ἐστίν,
 καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι ταῖς λοιπαῖς γωνίαις
 ἴσονται ἴσαι, ἑκάπερ ἑκάτερα ὑφ' ἃς αἱ ἴσαι
 πλευραὶ ὑπολείπονται. ἴση ἄρα ἡ ὑπὸ $\alpha\gamma\delta$ γω-
 νία τῇ ὑπὸ $\gamma\delta\beta$, καὶ ἡ ὑπὸ $\beta\alpha\gamma$, τῇ ὑπὸ $\gamma\delta\beta$.
 καὶ ἐπεὶ εἰς δύο εὐθείας τὰς $\alpha\gamma, \beta\delta$: εὐθεῖα
 ἐμπίπτει ἡ $\beta\gamma$, τὰς ἐναλλαξ γωνίας τὰς
 ὑπὸ $\alpha\gamma\beta, \gamma\beta\delta$ ἴσας ἀλλήλαις πεποίηκεν.
 παράλληλῳ ἄρα ἐστὶν ἡ $\alpha\gamma$, τῇ $\beta\delta$, ἐδείχ-
 θη δ' αὐτῇ καὶ ἴση. (Συμπεράσμα.) Αἱ ἄρα

parte coniungant due rectæ, $\alpha\gamma$, $\beta\delta$. (Explicatio quesiti.) Dico quod rectæ $\alpha\gamma$, $\beta\delta$, æquales, & æquedistantes sint. (Delineatio.) Ducatur linea recta $\beta\gamma$. (Demonstratio.) Quoniam recta $\alpha\beta$, æquedistat rectæ $\gamma\delta$: & in eas incidit recta $\beta\gamma$: idcirco anguli $\alpha\epsilon\gamma$, $\beta\gamma\delta$ alterni: sunt inter se æquales. Et cum recta $\alpha\epsilon$, sit æqualis rectæ $\gamma\delta$, communis verò $\beta\gamma$: duo igitur latera $\alpha\beta$, $\beta\gamma$, duobus lateribus $\beta\gamma$, $\gamma\delta$ sunt æqualia: & angulus $\alpha\beta\gamma$, angulo $\beta\gamma\delta$ est æqualis. basis igitur $\alpha\gamma$, basi $\epsilon\delta$ est æqualis, & triangulus $\alpha\beta\gamma$, triangulo $\beta\gamma\delta$ est æqualis, & reliqui anguli reliquis angulis sunt æquales alter alteri, quos æqualia illa latera subtendunt. angulus igitur $\alpha\gamma\epsilon$, angulo $\gamma\beta\delta$ est æqualis, & angulus $\beta\alpha\gamma$, angulo $\gamma\delta\beta$. & quoniam in duas rectas $\alpha\gamma$, $\beta\delta$, recta incidens $\beta\gamma$, angulos alternos $\alpha\gamma\beta$, $\gamma\beta\delta$, æquales inter se fecerit: idcirco recta $\alpha\gamma$, æquedistat rectæ $\epsilon\delta$. Verum demonstrata fuit ei esse æqualis. (Conclusio.)

Lineæ

τὰς ἴσας τὲ καὶ παραλλήλους ἐπὶ τὰ αὐτὰ
μέρη ἐπὶ ζυγύσσαι εὐθεῖαι, Ἐ αὐταὶ, ἴσαι
τὲ καὶ παράλληλοι εἰσιν. ὅπως εἶδ' δειξαι.

Πρότασις λδ. θεώρημα.


Τῶν παραλληλογραμμίων χωρίων αἱ ἀ-
πεναντίον πλευραὶ καὶ γωνίαι ἴσαι ἀλλή-
λαι, εἰσὶ, Ἐ ἡ διάμετρος αὐτὰ δίχα τέμνῃ.

Εκθεσις.) Εἰς παραλ- α

ληλόγραμμον, τὸ αὐδβ,
διάμετρος δὲ αὐτῶ, ἡ βγ.

(Διορισμός.) λέγω ὅτι β

αὐδβ παραλληλογραμ-
μου, αἱ ἀπεναντίον πλευ



ραίτε καὶ γωνίαι, ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶ, Ἐ ἡ βγ,
διάμετρος αὐτοῦ δίχα τέμνῃ. (Απόδειξις.)

Επεὶ γὰρ παράλληλός ἐστιν ἡ αβ τῇ γδ, καὶ
εἰς αὐτὰς ἐμπέπηκεν εὐθεῖα ἡ βγ, αἱ ἐναλ-

λάξ γωνίαι αἱ ὑπὸ αβγ, βγδ, ἴσαι ἀλλή-
λαις εἰσὶ. πάλιν ἐπεὶ παράλληλός ἐστιν ἡ αγ,

τῇ βδ, καὶ εἰς αὐτὰς ἐμπέπηκεν ἡ βγ, αἱ ἐν-
αλλάξ γωνίαι αἱ ὑπὸ αγβ, γβδ, ἴσαι ἀλλή-

λαις

Linea igitur recta, quæ æquales, & æquedistantes inter se lineas rectas, ex eadem parte coniungunt: etiam ipsæ æquales, & æquedistantes inter se sunt. Id quod erat demonstrandum.

Propositio trigesima quarta. Theorema.

AREÆ quæ æquedistantibus lineis rectis continentur, habent latera opposita, & angulos oppositos in se æquales: & dimetiēs ipsas medias secant.

Explicatio dati.) Sit figura æquedistantibus lineis rectis contenta $\alpha\gamma\delta\epsilon$: dimetiens eius linea $\beta\gamma$. (*Explicatio quesiti.*) Dico quod area $\alpha\beta\gamma\delta$, latus $\alpha\beta$, sit æquale lateri $\gamma\delta$: itē latus $\alpha\gamma$, æquale lateri $\beta\delta$. Præterea dimetiens $\epsilon\gamma$ ipsam figuram secet in duas partes æquales. (*Demonstratio.*) Quoniam recta $\alpha\epsilon$, æquedistat rectæ $\gamma\delta$, & in eas incidit recta $\beta\gamma$: anguli alterni $\alpha\epsilon\gamma$, $\epsilon\gamma\delta$ sunt inter se æquales. Item quoniam recta $\alpha\gamma$, æquedistat rectæ $\beta\delta$, & in eas incidit recta $\epsilon\gamma$: anguli igitur alterni inter se sunt æquales.

Quare

λαις εἰσὶ, δύο δὲ τρίγωνα εἰς τὰ $\alpha\beta\gamma$, $\gamma\beta\delta$,
 τὰς δύο γωνίας τὰς ὑπὸ $\alpha\beta\gamma$, $\beta\gamma\alpha$ δυσὶ
 ταῖς ὑπὸ $\beta\gamma\delta$, $\gamma\beta\delta$, ἴσας ἔχοντα ἐκάτεραν ἐ-
 κατέρα καὶ μίαν πλευρὰν τῇ μιᾷ πλευρᾷ
 ἴσην τὴν πρὸς ταῖς ἴσας γωνίαις κοινὴν αὐ-
 τῶν, τὴν $\beta\gamma$, καὶ τὰς λοιπὰς ἄρα πλευράς,
 ταῖς λοιπαῖς ἴσας ἔξει ἐκατέρα ἐκατέρα, καὶ
 τὴν λοιπὴν γωνίαν, τῇ λοιπῇ γωνίᾳ. ἴση ἄ-
 ρα ἡ μὲν $\alpha\beta$ πλευρὰ, τῇ $\gamma\delta$, ἡ δὲ $\alpha\gamma$ τῇ $\beta\delta$,
 καὶ ἡ ὑπὸ $\beta\alpha\gamma$ γωνία, τῇ ὑπὸ $\beta\delta\gamma$. Ἐπεὶ
 ἴση ἐστὶν ἡ μὲν ὑπὸ $\alpha\beta\gamma$ γωνία, τῇ ὑπὸ $\beta\gamma\delta$,
 ἡ δὲ ὑπὸ $\gamma\beta\delta$, τῇ ὑπὸ $\alpha\gamma\delta$. ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ
 $\alpha\beta\delta$, ὅλη τῇ ὑπὸ $\alpha\gamma\delta$ ἴση ἐστὶν. εἰδείχθη δὲ καὶ
 ἡ ὑπὸ $\beta\alpha\gamma$, τῇ ὑπὸ $\beta\delta\gamma$ ἴση. (Συμπέρασμα.)
 Τῶν ἄρα παραλληλογραμμίων χωρίων αἱ
 ἀπεναντίον πλευραὶ καὶ γωνίαι, ἴσαι ἀλ-
 λήλαις εἰσιν. (Διορισμὸς δῶτερ.) Λέγω
 δὲ ὅτι ἢ διίσταται αὐτὰ δίχα τέμνει.
 (Δείξετε ἀπόδειξις.) Επεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν ἡ $\alpha\beta$,
 τῇ $\gamma\delta$, κοινὴ δὲ ἡ $\beta\gamma$, δύο δὲ αἱ $\alpha\beta$, $\beta\gamma$, δυ-
 σὶ ταῖς $\gamma\delta$, $\beta\gamma$ ἴσαι εἰσιν ἐκάτερα ἐκατέρα,
 καὶ

Quare cum duo trianguli $\alpha\beta\gamma$, $\gamma\epsilon\delta$, duos
 angulos $\alpha\epsilon\gamma$, $\beta\gamma\alpha$, habeant duobus angulis
 $\epsilon\gamma\delta$, $\gamma\epsilon\delta$ aequales, alterum alteri: & unum
 latus, uni lateri aequale, nempe latus $\beta\gamma$ com-
 mune quod ad angulos aequales est positum.
 idcirco & reliqua latera, reliquis lateribus
 habent aequalia, alterum alteri: & reliquam
 angulum reliquo angulo aequalem. latus $\alpha\beta$,
 aequale lateri $\gamma\delta$, & latus $\alpha\gamma$, aequale lateri
 $\beta\delta$, & angulum $\beta\alpha\gamma$, angulo $\epsilon\delta\gamma$, aequalem.
 Quia vero angulus $\alpha\epsilon\gamma$, angulo $\beta\gamma\delta$ est a-
 qualis, & angulus $\gamma\beta\delta$, angulo $\alpha\gamma\epsilon$ etiam
 equalis. Totus igitur angulus $\alpha\beta\delta$, toto an-
 gulo $\alpha\gamma\delta$ est equalis. Verū & angulus $\epsilon\alpha\gamma$,
 demonstratus est equalis angulo $\epsilon\delta\gamma$. (Con-
 clusio.) Area igitur, quæ æquidistatib⁹ lineis
 rectis continentur: habent latera opposita, &
 angulos oppositos inter se aequales. (Secunda
 explicatio quæsitæ.) Dico quod diameter se-
 cet eam in duas partes aequales. (Demōstra-
 tio secunda.) Quoniā latus $\alpha\beta$, est aequale la-
 teri $\gamma\delta$, & latus $\epsilon\gamma$ cōmune, duo igitur late-
 ra $\alpha\epsilon$, $\epsilon\gamma$, duob⁹ lateribus $\gamma\delta$, $\epsilon\gamma$ sunt aequa-


καὶ γωνία ἡ ὑπὸ $\alpha\beta\gamma$, γωνία τῇ ὑπὸ $\beta\gamma\delta$ ἴση ἐστὶ, καὶ βάσις ἄρα ἡ $\alpha\gamma$ βάσις τῇ $\delta\beta$ ἴση ἐστὶ, καὶ τὸ $\alpha\beta\gamma$ τρίγωνον πρὸς τὸ $\beta\gamma\delta$ τριγώνω ἴσον ἐστίν. (Συμπέρασμα.) Ἡ ἄρα $\beta\gamma$ διὰ μέτρον διχα τέμνει τὸ $\alpha\beta\gamma\delta$ παραλληλόγραμμον. ὅπως εἶδει δεῖξαι.

ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ
ΤΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ.

Πρότασις λε. θεώρημα.

ΤΑ παραλληλόγραμμα τὰ ἐπὶ τῆς αὐτῆς βάσεως ὄντα, καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις, ἴσα ἀλλήλοις ἐστίν.

Εκθεσις.) Ἐστω παραλληλόγραμμα τὰ $\alpha\beta\gamma\delta$, $\epsilon\delta\zeta\eta$, ἐπὶ τῇ αὐτῆς βάσεως ὄντα τῆς $\beta\alpha$, καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ταῖς $\alpha\zeta$, $\beta\eta$. (Διορισμός.) Λέγω ὅτι ἴσον ἐστὶ τὸ $\alpha\beta\gamma\delta$, πρὸς $\epsilon\delta\zeta\eta$. (Απόδειξις.) Ἐπεὶ γὰρ παραλληλόγραμμὸν ἐστὶ τὸ $\alpha\beta\gamma\delta$, τῇ $\beta\eta$ ἴση ἐστὶν ἡ $\alpha\delta$. Διὰ τὰ αὐτὰ δὲ



lia alterum alteri: & angulus $\alpha\epsilon\gamma$, angulo, $\beta\gamma\delta$ æqualis. ergo basis $\alpha\gamma$, basi $\delta\beta$ est æqualis: & triangulus $\alpha\beta\gamma$, triangulo $\beta\gamma\delta$ etiam æqualis. (Conclusio.) Ergo diameter $\beta\gamma$, figuram $\alpha\beta\gamma\delta$ secat in duas partes æquales. Id quod demonstrandum erat.

TERTIA HVIVS ELEMENTI PARS.

Propositio trigesima quinta. Theorema.

QUæ parallelogramma eandem habent basin: & in eisdem æquedistantibus sunt lineis rectis: illa sunt æqualia inter se.

Explicatio dati.) Sint parallelogramma $\alpha\beta\gamma\delta$, $\epsilon\beta\gamma\zeta$: in eadem basi $\beta\gamma$: & eisdem lineis rectis æquedistantibus $\alpha\zeta$, $\beta\gamma$. (*Explicatio quæsti.)* Dico quod parallelogrammum $\alpha\epsilon\gamma\delta$, sit æquale parallelogrammo $\epsilon\beta\gamma\zeta$. (*Demonstratio.)* Quoniã $\alpha\beta\gamma\delta$, figura est parallelogrammum, idcirco latus $\epsilon\gamma$, est æquale lateri $\alpha\delta$. Per eadem demonstrabitur quoque

I 2 latus

τὰ δὲ καὶ ἡ $\epsilon\zeta$, τῇ $\beta\gamma$ ἴση ἐστίν, ὥστε καὶ ἡ $\alpha\delta$,
 τῇ $\epsilon\zeta$ ἴση ἐστίν. Ἐκκείνη ἡ $\delta\epsilon$, ὅλη ἄρα ἡ $\alpha\epsilon$, ὅλη
 τῇ $\delta\zeta$ ἐστίν ἴση. ἐστὶ δὲ καὶ ἡ $\alpha\beta$, τῇ $\delta\gamma$ ἴση, δύο
 δὲ αἱ $\epsilon\alpha$, $\alpha\beta$, δυσὶ ταῖς $\zeta\delta$, $\delta\gamma$, ἴσων εἰσὶν ἐκά-
 περα ἑκατέρω, καὶ γωνία ἡ ὑπὸ $\zeta\delta\gamma$, γωνία
 τῇ ὑπὸ $\epsilon\alpha\beta$ ἴση ἐστίν, ἡ ὁμοίως τῇ ἐν θ . βάσις
 ἄρα ἡ $\epsilon\delta$, βάσις τῇ $\zeta\gamma$ ἴση ἐστίν. καὶ τὸ $\epsilon\alpha\delta$ τρί-
 γωνον πρὸς $\zeta\delta\gamma$ τριγώνῳ ἴσον ἐστίν. κείνὸν ἀφη-
 ρήσω τὸ $\delta\eta\epsilon$, λοιπὸν ἄρα τὸ $\alpha\beta\eta\delta$ τετραπέ-
 ζιον, λοιπὸν πρὸς $\epsilon\eta\gamma\zeta$ τετραπείζῳ, ἴσον ἐστίν. κεί-
 νον προσκείσω τὸ $\eta\beta\gamma$ τρίγωνον, ὅλον ἄρα
 τὸ $\alpha\beta\gamma\delta$ παραλληλόγραμμον, ὅλῳ πρὸς $\epsilon\delta\zeta\gamma$
 παραλληλογράμμῳ, ἴσον ἐστίν. (Συμπέρασ-
 μα.) Τὰ ἄρα παραλληλόγραμμα τὰ $\theta\pi\alpha$
 τῆς αὐτῆς βάσεως ὄντα, καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς
 παραλλήλοις, ἴσα ἀλλήλοις ἐστίν. ὅπως ἔδει
 δεῖξαι.

Πρότασις λς. θεώρημα.

ΤΑ παραλληλόγραμμα τὰ $\theta\pi\alpha$ τῶν ἴσων
 βάσεων ὄντα καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλ-
 λήλοις, ἴσα ἀλλήλοις ἐστίν.


Εκθε-

latus $\epsilon\zeta$, æquale lateri $\beta\gamma$. quare & latus ad , est æquale lateri $\epsilon\zeta$. communis verò est recta de . totum igitur latus ae , toti lateri $d\zeta$ est æquale. Verum latus ae , est etiam æquale lateri $d\gamma$: duo itaq; latera ea , ae , duobus lateribus ζd , $d\gamma$ sunt æqualia alterum alteri, & angulus $\zeta d\gamma$, æqualis angulo $ea\epsilon$, externus interno. basis igitur $\epsilon\epsilon$, basi $\zeta\gamma$ est æqualis, & triangulus $ea\epsilon$, triangulo $\zeta d\gamma$ æqualis, communis auferatur triangulus dne . quare reliquum trapezion $ae\epsilon d$, reliquo trapezio $en\gamma\zeta$ est æquale. Communis addatur triangulus $en\beta\gamma$: totum igitur parallelogrammon $ae\gamma d$, est æquale toto parallelogrammo $\epsilon\beta\gamma\zeta$. (Conclusio.) Quæ igitur parallelogramma eandem habent basin: & in eisdem æquedistantibus sunt lineis rectis: illa sunt inter se æqualia. Id quod erat demonstrandū.

Propositio trigesima sexta. Theorema.

QUæ parallelogramma æquales habent bases: & sunt in eisdem æquedistantibus lineis rectis: illa sunt æqualia inter se.

Εκθεσις.) Ετω πα-
ραλληλόγραμμα τὰ
αβγδ, ἐζηθ, ὅππῃ ἴσων
βάσεων, τῶν βγ, ζη,
καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς πα-
ραλλήλοις ταῖς αθ,
βη. (Διορισμός.) Λέ-



γω ὅππῃ ἴσων ἐστὶ τὸ αβγδ παραλληλόγραμμον
τῷ ἐζηθ. (Κατασκευὴ.) Ἐπιζεύχθωσαν γὰρ
αἱ βε, γθ. (Απόδοξις.) Καὶ ὅππῃ ἴση ἐστὶν ἡ βγ
τῇ ζη, ἀλλὰ καὶ ἡ ζη, τῇ εθ ἐστὶν ἴση, καὶ ἡ βγ
ἄρα, τῇ εθ ἐστὶν ἴση. εἰσὶ δὲ καὶ παράλληλοι, καὶ
ὅππῃ ζεύγνυσιν αὐτάς αἱ βε, γθ. αἱ δὲ τὰς ἰ-
σῆς τε εἰς παραλλήλους ὅππῃ τὰ αὐτὰ μέρη ἐ-
πιζεύγνυσται, ἴσται τε καὶ παραλλήλοί εἰσι.
καὶ αἱ εβ, γθ ἄρα ἴσται τε εἰσὶ, καὶ παράλληλοι.
παραλληλόγραμμον ἄρα ἐστὶ, τὸ εβγδ. καὶ ἔ-
στιν ἴσον τῷ αβγδ, βάσιν τε ἔχει αὐτὸ πρὸς αὐ-
τῷ ἔχει πρὸς βγ, καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλή-
λοις ἐστὶ αὐτῷ, ταῖς βγ, αθ. Διὰ τὰ αὐτὰ δὴ
εἰς τὸ ζηθε, τῷ αὐτῷ, τῷ εβγθ, ἐστὶν ἴσον, ὥστε εἰς
τὸ αβγδ παραλληλόγραμμον, τῷ ἐζηθ ἴσον
ἐστὶ. (Συμπέρασμα.) Τὰ ἄρα παραλληλό-


Explicatio dati.) Sint parallelogramma $\alpha\beta\gamma\delta$, $\epsilon\zeta\eta\theta$: habentia bases $\beta\gamma$, $\zeta\eta$ aequales: & sint inter easdem aequedistantes rectas lineas $\alpha\theta$, $\beta\eta$. (*Explicatio quaesiti.*) Dico quod parallelogrammon $\alpha\beta\gamma\delta$, sit aequale parallelogrammo $\epsilon\zeta\eta\theta$. (*Delineatio.*) Ducantur lineae rectae $\beta\epsilon$, $\gamma\theta$. (*Demonstratio.*) Quoniam recta $\beta\gamma$, aequalis est rectae $\zeta\eta$: & $\zeta\eta$ est aequalis rectae $\epsilon\theta$. idcirco & $\beta\gamma$, est aequalis rectae $\epsilon\theta$. verum sunt lineae rectae aequedistantes, easq; coniungunt rectae $\beta\epsilon$, $\gamma\theta$: rectae verò quae aequales, & aequedistantes rectas ex eadē parte coniungunt: & ipsae aequales, & aequedistantes sunt: quare rectae $\epsilon\beta$, $\gamma\theta$ aequales & aequedistantes sunt: atq; figura $\epsilon\beta\gamma\delta$ est parallelogrammon, et est aequale parallelogrammo $\alpha\beta\gamma\delta$. quia cum eo eandem habet basim $\beta\gamma$: & in eisdem est aequedistantib; rectis $\epsilon\gamma$, $\alpha\theta$. Similiter demonstrabimus quod $\zeta\eta\theta\epsilon$ eidem parallelogrammo $\epsilon\beta\gamma\delta$ sit aequale. quare parallelogrammon $\alpha\beta\gamma\delta$, parallelogrammo $\epsilon\zeta\eta\theta$ est aequale. (*Conclusio.*) Quae igitur parallelogramma aequales habent bases: & sunt in

γραμμά τὰ ἐπὶ τῶν ἴσων βάσεων ὄντα καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ἴσα ἀλλήλοις εἶναι. ὅπως εἶδει δεῖξαι.

Πρότασις λζ. θεώρημα.

ΤΑ τρίγωνα δὲ ἐπὶ τῆς αὐτῆς βάσεως ὄντα, καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις, ἴσα ἀλλήλοις εἶναι.

Εκθεσις.) Εἶπω τρίγωνα τὰ $\alpha\beta\gamma$, $\delta\gamma\beta$, ἐπὶ τῇ αὐτῆς βάσεως ὄντι τῆς $\beta\gamma$, καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις, ταῖς $\alpha\delta$, $\epsilon\gamma$. (Διορισμός.) Λέγω ὅτι ἴσον εἶναι τὸ $\alpha\beta\gamma$ τρίγωνον, τῷ $\delta\beta\gamma$ τριγώνῳ. (Κατασκευὴ.)



Εκβεβλήσθω ἡ $\alpha\delta$ ἐφ' ἐκάτερα τὰ μέρη, ἐπὶ τὰ ϵ , ἵσημεῖα, καὶ διὰ μέν τῃ $\beta\epsilon$, τῇ $\gamma\alpha$ παράλληλος ἦχθω ἡ $\beta\epsilon$, διὰ δὲ τῇ γ , τῇ $\beta\delta$ παράλληλος ἦχθω ἡ $\gamma\zeta$. (Ἀποδείξις.) Παραλληλόγραμμον ἄρα εἰναι ἐκάπρον τῶν $\epsilon\beta\alpha\gamma$, $\delta\beta\gamma\zeta$. καὶ ἴσον τὸ $\epsilon\beta\gamma\alpha$, τῷ $\delta\beta\gamma\zeta$. ἐπὶ τε γὰρ αὐτῆς βάσεως εἰσὶ τῇ $\beta\gamma$, καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ταῖς $\beta\epsilon$, $\epsilon\zeta$. καὶ εἴτι τῷ μὲν $\epsilon\beta\gamma\alpha$ παραλληλόγραμμῳ ἡμισυ

τὸ $\alpha\beta\gamma$

eisdem æquedistantibus lineis rectis, illa sunt æqualia inter se, id quod erat demonstrandū.

Propositio trigesima septima. Theorema.

Qui trianguli eandē habent basim, & sunt in eisdem æquedistantibus lineis rectis: illi sunt inter se æquales.


Explicatio dati.) Sint duo trianguli $\alpha\beta\gamma$, $\delta\gamma\beta$, super eadem basi $\beta\gamma$: & in eisdem æquedistantibus lineis rectis $ad, \epsilon\gamma$. (*Explicatio quaesiti.*) Dico quod triangulus $\alpha\beta\gamma$, sit æqualis triangulo $\delta\gamma\beta$. (*Delineatio.*) Producaturs linea recta ad , in utramq; partē ad puncta ϵ , & ζ : & ex puncto β , ducatur linea recta $\beta\epsilon$, æquedistans lineæ rectæ $\alpha\gamma$. præterea ex puncto γ , ducatur recta $\gamma\zeta$, æquedistans rectæ $\beta\delta$. (*Demonstratio.*) Vtraq; igitur figura $\epsilon\beta\alpha\gamma$, & $\delta\beta\gamma\zeta$ est parallelogrammon, & parallelogrammō $\epsilon\beta\alpha\gamma$, est æquale parallelogrammo $\delta\beta\gamma\zeta$, quia super eadē basi $\beta\gamma$ est, & inter easdem æquedistantes lineas rectas $\epsilon\gamma, \zeta\gamma$, & parallelogrammi $\epsilon\beta\alpha\gamma$ dimidiū
I 5 est,

$\alpha\beta\gamma$ τρίγωνον. ἡ γὰρ $\alpha\beta$ διάμετρος $\odot$ αὐτὸ δίχα τέμνει, τῷ δὲ $\delta\epsilon\zeta$ παραλλήλογράμμου, ἡμῖς τὸ $\delta\beta\gamma$ τρίγωνον, ἡ γὰρ $\delta\gamma$ διάμετρος $\odot$ αὐτὸ δίχα τέμνει. τὰ δὲ τῶν ἴσων ἡμίση, ἴσα ἀλλήλοις εἰσίν. ἴσον ἄρα ἐστὶ τὸ $\alpha\beta\gamma$ τρίγωνον, τῷ $\delta\beta\gamma$ τριγώνῳ. (Συμπέρασμα.) Τὰ ἄρα τρίγωνα τὰ $\delta\beta\gamma$ τῆς αὐτῆς βάσεως ὄντα, καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις, ἴσα ἀλλήλοις εἰσίν. ὥς ἑδεῖ δειξάμεν.

Πρότεσις λη. θεώρημα

ΤΑ τρίγωνα τὰ $\delta\beta\gamma$ τῶν ἴσων βάσεων ὄντα, καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις, ἴσα ἀλλήλοις εἰσίν.

Εκθεσις.) Εἰς τρίγωνον $\alpha\beta\gamma$, διζ, $\delta\beta\gamma$ τῶν ἴσων βάσεων ὄντα, τῶν $\beta\gamma$, ἐζ, καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις, ταῖς $\epsilon\zeta$, $\delta\alpha$. (Διορισμός.) Λέγω ὅτι ἴσον ἐστὶ τὸ $\alpha\beta\gamma$ τρίγωνον, τῷ $\delta\beta\gamma$ τριγώνῳ.



(Κατασκευή.) Εκβεβλήστω γὰρ ἡ $\alpha\delta$ ἐφ' ἑκάπερ τὰ μέρη, $\delta\beta$ τὰ η , θ , καὶ $\delta\gamma$ μὲν ζ β , τῇ

est, triangulus $\alpha\beta\gamma$. nam diameter $\alpha\epsilon$ ipsum per medium secat. parallelogrammi verò $\delta\epsilon\gamma\zeta$ dimidium est triangulus $\delta\epsilon\gamma$. nam diameter $\delta\gamma$ ipsum per medium secat. Quæ verò equalium sunt dimidia, illa inter se sunt equalia. triangulus igitur $\alpha\epsilon\gamma$, triangulo $\delta\epsilon\gamma$ est equalis. (Conclusio.) Qui igitur trianguli sunt super eadem basi, & inter easdem lineas rectas equedistantes, illi inter se sunt æquales. Id quod erat demonstrandum.

Propositio trigesima octava. Theorema.

Qui trianguli æquales habent bases: & sunt in eisdem equedistantibus lineis rectis, illi inter se sunt æquales.

Explicatio dati.) Sint trianguli $\alpha\epsilon\gamma$, $\delta\epsilon\zeta$, super basibus equalibus $\epsilon\gamma$, $\epsilon\zeta$, in eisdem equedistantibus lineis rectis $\alpha\delta$, $\beta\zeta$. (Explicatio quesiti.) Dico quod triangulus $\alpha\beta\gamma$, sit equalis triangulo $\delta\epsilon\zeta$. (Delineatio.) Producaturs linea recta $\alpha\delta$, in utramque partem ad puncta η , & θ . Ex puncto β , ducatur
linea

β, τῇ γὰ παράλληλῳ ἤχθω, ἢ βῆ, ἀλλὰ δὲ
 τῷ ζ, τῇ δὲ παράλληλῳ ἤχθω ἢ ζθ. (Από-
 δεξις.) Παραλληλόγραμμον ἄρα ἐστὶν ἐκά-
 προν τῶν ἡβγα, δεζθ, καὶ ἴσον τὸ ἡβγα, πρὸς
 δεζθ. Ὅππτε γὰ ἴσων βάσεων ἐσὶ τῶν βγ, ἐζ
 καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ταῖς βζ
 ἡθ. καὶ ἐστὶ τῷ μὲν ἡβγα παραλληλογράμ-
 μου, ἡμῖν, τὸ αβγ τρίγωνον. ἢ γὰρ αβ ἀλά-
 μετρεῖ, δίχα αὐτὸ τέμνει. τῷ δὲ δεζθ, πα-
 ραλληλογράμμου, ἡμῖν τὸ ζεδ τρίγωνον, ἢ
 γὰρ ζδ, ἀλάμετρε, δίχα αὐτὸ τέμνει. τὰ δὲ
 τῶν ἴσων ἡμίση, ἴσα ἀλλήλοις ἐσὶν. ἴσον ἄρα
 ἐστὶ τὸ αβγ τρίγωνον πρὸς δεζθ τριγώνῳ. (Συμ-
 πέρασμα.) Τὰ ἄρα τρίγωνα τὰ ὅππτε τῶν
 ἴσων βάσεων ὄντα καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς πα-
 ραλλήλοις, ἴσα ἀλλήλοις ἐστὶ ὥστε εἶδει δεῖξαι.

Πρότασις λθ. θεώρημα.

ΤΑ ἴσα τρίγωνα τὰ ὅππτε τῆς αὐτῆς βάσε-
 ως ὄντα, ἔσππτε τὰ αὐτὰ μέρη, καὶ ἐν ταῖς
 αὐταῖς παραλλήλοις ἐσὶν.


linea recta $\beta\eta$, aequidistans lineae rectae $\alpha\gamma$.
 Item ex puncto ζ ducatur linea recta $\zeta\theta$, a-
 quidistans lineae rectae $\delta\epsilon$. (Demonstratio.)
 Utraque igitur figura $\eta\beta\gamma\alpha$, $\delta\epsilon\zeta\theta$ est paralle-
 logrammon. & parallelogrammon $\eta\beta\gamma\alpha$,
 est æquale parallelogrammo $\delta\epsilon\zeta\theta$. quia su-
 per basibus $\beta\gamma$, $\epsilon\zeta$, equalibus, & in eisdem
 lineis rectis aequidistantibus $\epsilon\zeta$, $\eta\theta$ sunt. præ-
 terea parallelogrammi $\alpha\beta\gamma\alpha$ dimidium, est
 triangulus $\alpha\beta\gamma$, quoniam diameter $\alpha\beta$ ip-
 sum secat per medium. & parallelogrammi
 $\delta\epsilon\zeta\theta$ dimidium, est $\zeta\epsilon\delta$ triangulus. quia dia-
 meter $\zeta\delta$, ipsum secat medium. Quae verò æ-
 qualium sunt dimidia, illa inter se sunt æqua-
 lia. quare triangulus $\alpha\beta\gamma$, triangulo $\delta\epsilon\zeta$ est
 æqualis. (Conclusio.) Qui igitur trianguli
 super basibus fuerint equalibus, & in eisdem
 lineis aequidistantibus, illi inter se sunt æqua-
 les. Id quod erat demonstrandum.

Propositio trigesima nona. Theorema.

Trianguli æquales, eandem habentes ba-
 sim: & ex eadem parte, & in eisdem æ-
 quidistantibus rectis sunt.

Explanatio

Εκθεσις.) Εστω τρίγωνα ἴσα τὰ $\alpha\beta\gamma$, $\delta\beta\gamma$,
 ὅπῃ τῆς αὐτῆς βάσεως
 ὄντα, τῆς $\beta\gamma$. (Διορισ-
 μός.) Λέγω ὅτι καὶ ἐν ταῖς
 αὐταῖς παραλλήλοις ἐ-
 σὶν. (Κατασκευὴ.) Επε-
 ζεύχθω γὰρ ἡ $\alpha\delta$, λέγω ὅ-
 τι παράλληλῃ ἐσὶν ἡ $\alpha\delta$, ἢ τῇ $\beta\gamma$. Εἰ γὰρ μὴ,
 ἤχθω διὰ τῶν σημείων τῆς $\beta\gamma$ εὐθεία παράλ-
 ληλῃ ἢ $\alpha\epsilon$, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ $\epsilon\gamma$. (Απόδει-
 ξις.) Ἰσὸν ἄρα ἐστὶ τὸ $\alpha\beta\gamma$ τρίγωνον, τῷ $\epsilon\beta\gamma$
 τριγώνῳ. ὅπῃτε γὰρ τῆς αὐτῆς βάσεως ἐσὶν
 αὐτῷ τῆς $\beta\gamma$, καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλή-
 λαις ταῖς $\beta\gamma$, $\alpha\epsilon$. ἀλλὰ τὸ $\alpha\beta\gamma$, τῷ $\delta\beta\gamma$ ἴσων
 ἐσὶν, καὶ τὸ $\delta\beta\gamma$ ἄρα τρίγωνον, τῷ $\epsilon\beta\gamma$ ἴσων
 ἐσὶν, τὸ μείζον τῷ ἐλάττω, ὅπως ἀδιύατον.
 ὅθεν ἄρα παράλληλός ἐστιν ἡ $\alpha\epsilon$, τῇ $\beta\gamma$. Ο-
 μοίως δὲ δείξομεν, ὅτι ὁδὲ ἄλλη τις πλὴν τῆς
 $\alpha\delta$. ἡ $\alpha\delta$ ἄρα, τῇ $\beta\gamma$ ἐσὶν παράλληλῃ.
 (Συμπέρασμα.) Τὰ ἄρα ἴσα τρίγωνα τὰ ἐ-
 πὶ τῆς αὐτῆς βάσεως ὄντα, καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς
 παραλλήλοις ἐσὶν. ὅπως ἔδει δεῖξαι.




Explicatio dati.) Sint trianguli $\alpha\beta\gamma$, $\delta\epsilon\gamma$ super eadē basi $\epsilon\gamma$. (*Explicatio quaesiti.)* Dico quod etiam in eisdē sint lineis rectis aequedistantibus. (*Delineatio.)* Ducatur linea recta ad : dico quod recta ad , aequedistet rectae $\epsilon\gamma$. si enim ei non aequedistat, ducatur per punctum α , recta linea $\beta\gamma$ aequedistans rectae ae : & ducatur linea recta $\epsilon\gamma$. (*Demōstratio.)* Triangulus igitur $\alpha\beta\gamma$, est aequalis triangulo $\epsilon\beta\gamma$, quia super eadem basi $\epsilon\gamma$ est, & in eisdem lineis rectis aequedistantibus $\epsilon\gamma$, ae . verum triangulus $\alpha\beta\gamma$, est aequalis triangulo $\delta\epsilon\gamma$: idcirco & triangulus $\delta\epsilon\gamma$, triangulo $\epsilon\beta\gamma$ est aequalis: maior minori. quod fieri nequit. Quare recta ae , nō aequedistat rectae $\epsilon\gamma$. Simili ratione demonstrabimus, quod nulla alia praterquam ad , recta, aequedistet rectae $\epsilon\gamma$. recta igitur ad , rectae $\beta\gamma$ aequedistat. (*Conclusio.)* Trianguli igitur aequales, eandem habentes basin, in eisdem sunt aequedistantibus rectis. Id quod erat demonstrandum.

Propo-

Πρότασις μ. Γεώρημα.

ΤΑ ἴσα τρίγωνα τὰ ὀπί τῶν ἴσων βάσεων
ὄντα, καὶ ὀπί τὰ αὐτὰ μέρη, καὶ ἐν ταῖς
αὐταῖς παραλλήλοις εἰσιν.

Εκθεσις.) Εἶπω τρίγωνα.
ἴσα, τὰ $\alpha\beta\gamma$, γδε, ὀπί ἴ-
σων βάσεων ὄντα τῶν $\beta\gamma$,
δε. (Διορισμός.) Λέγω
ὅτι καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς πα-
ραλλήλοις εἰσιν. (Καὶ α-
ποδείξις.) Επεζεύχθω γὰρ ἡ $\alpha\delta$. Λέγω ὅτι πα-
ράλληλῃ εἰσιν ἡ $\alpha\delta$, τῇ $\beta\epsilon$. Εἰ γὰρ μὴ, ἤχθω
διὰ τῆς α , τῇ $\beta\epsilon$ παράλληλῃ εἰς $\zeta\alpha$. καὶ ἐπε-
ζεύχθω ἡ $\zeta\epsilon$. (Απόδειξις.) Ἰσὸν ἄρα εἰς τὸ
 $\alpha\beta\gamma$ τρίγωνον, τῷ $\zeta\gamma\epsilon$ τριγώνῳ. ὀπίτε γὰρ
ἴσων βάσεων εἰσὶ τῶν $\beta\gamma$, $\gamma\epsilon$, καὶ ἐν ταῖς αὐ-
ταῖς παραλλήλοις ταῖς $\beta\epsilon$, $\alpha\zeta$. ἀλλὰ τὸ $\alpha\beta\gamma$
τρίγωνον, ἴσον εἰς, τῷ δὲ $\gamma\epsilon$ τριγώνῳ, καὶ τὸ
δὲ $\gamma\epsilon$ τρίγωνον ἄρα, ἴσον εἰς τὸ $\zeta\gamma\epsilon$ τριγώνῳ,
τὸ μᾶλλον, τῷ ἐλάσσονι: ὥς ἀδιώκον. οὕτως
ἄρα παράλληλῃ εἰσιν ἡ $\alpha\zeta$, τῇ $\beta\epsilon$. Ομοίως
δὲ δείξομεν, ὅτι καὶ ἄλλητις πᾶσι τῆς $\alpha\delta$. ἡ
αδ ἄρα



Propositio quadragesima. Theorema.

Trianguli æquales, super æqualibus constituti basibus: sunt in eisdem lineis rectis æquedistantibus.


Explicatio dati.) Sint trianguli $\alpha\beta\gamma$, $\gamma\delta\epsilon$ super basibus $\beta\gamma$, $\gamma\epsilon$ æqualibus. (*Explicatio quæsitæ.*) Dico quod in eisdem sint æquedistantibus lineis rectis. (*Delineatio.*) Ducatur recta ad , dico quod ad , æquedistet rectæ $\beta\epsilon$: si enim ei non æquedistat, ducatur per punctum a recta $\beta\epsilon$, æquedistans rectæ ζa : & ducatur recta ζe . Triangulus igitur $\alpha\beta\gamma$, est æqualis triangulo $\zeta\gamma\epsilon$, quia sunt constituti super basibus $\beta\gamma$, $\gamma\zeta$ æqualibus, & in eisdem lineis rectis æquedistantibus $\beta\epsilon$, $a\zeta$. sed triangulus $\alpha\beta\gamma$, est æqualis triangulo $\delta\gamma\epsilon$. quare triangulus $\delta\gamma\epsilon$, etiam erit æqualis triangulo $\zeta\gamma\epsilon$, maior minori, quod fieri nequit. non igitur recta $a\zeta$, æquedistat rectæ $\beta\epsilon$. Simili ratione demonstrabimus,
K quod

$\alpha\delta'$ ἄρα τῇ $\beta\epsilon'$ παράλληλός ἐστι. (Συμμέ-
ροσμα.) Τὰ ἄρα ἴσα τρίγωνα τὰ ἐπὶ τῶν
ἴσων βάσεων ὄντα, ἔν ταῖς αὐταῖς ἐστὶ πα-
ραλλήλοις. ὥς ἔδει δεῖξαι.

Πρότεσις μα. θεώρημα.

ΕΑν παραλληλόγραμμον τρίγωνον βάσιν
τέχευ τὴν αὐτὴν, καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς πα-
ραλλήλοις ἢ, διπλάσιον ἔσται τὸ παραλληλό-
γραμμον ἢ τρίγωνον.

Εκθεσις.) Παραλληλό- α
γραμμον γὰρ τὸ $\alpha\beta\gamma\delta'$,
τρίγωνον τῷ $\epsilon\beta\gamma$, βάσιν
τέχευ τὴν αὐτὴν τὴν
 $\beta\gamma$, καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς
ἔστω παραλλήλοις ταῖς



$\beta\gamma$, αε. (Διορισμός.) Λέγω ὅτι διπλάσιον ἐ-
στὶ τὸ $\alpha\beta\gamma\delta'$, παραλληλόγραμμον, ἢ $\beta\epsilon\gamma$ τρι-
γώνον. (Κατασκευὴ.) Επεξέχθω γὰρ ἡ $\alpha\gamma$.
(Απόδειξις.) Ἰσὸν δὲ ἐστὶ τὸ $\alpha\beta\gamma$, τῷ $\epsilon\beta\gamma$ τρι-
γώνῳ. ὅτι περὶ γὰρ τῆς αὐτῆς βάσεως ἐστὶν αὐτὰ,
καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ταῖς

$\epsilon\gamma$

quod nulla alia præterquam ad recta, æquedistet recta $\beta\epsilon$. (Conclusio.) Trianguli igitur æquales, super æqualibus constituti basibus: sunt in eisdem lineis rectis æquedistantibus. id quod erat demonstrandum.

Propositio quadragesima prima.
Theorema.

Parallelogrammon trianguli est duplum, si super eadem consistat basi: & in eisdem fuerit æquedistantibus lineis rectis.

Explicatio dati.) Parallelogrammon $\alpha\beta\gamma\delta$, & triangulus $\epsilon\beta\gamma$: sint super eadem basi $\beta\gamma$, in eisdem æquedistantibus lineis rectis $\alpha\epsilon$, $\beta\gamma$. (Explicatio quesiti.) dico quod parallelogrammon $\alpha\beta\gamma\delta$, sit duplum trianguli $\epsilon\beta\gamma$. (Delineatio.) Ducatur recta $\alpha\gamma$. (Demonstratio.) Triangulus $\alpha\beta\gamma$, est æqualis triangulo $\epsilon\beta\gamma$, quia super eadem basi sunt $\beta\gamma$: & in eisdem æquedistantibus lineis rectis


$K \quad 2 \quad \beta\gamma$

βγ, αἰ. ἀλλὰ τὸ $\alpha\beta\gamma\delta$ παραλληλόγραμ-
 μον, διωλάσιόν ἐστι τῷ $\alpha\beta\gamma$ τριγώνῳ. ἢ γὰρ $\alpha\gamma$
 διάμετρος, αὐτὸ δίχα τέμνει. ὥστε τὸ $\alpha\beta\gamma\delta$
 παραλληλόγραμμον, ἢ τῷ $\epsilon\beta\gamma$ τριγώνῳ ἐστὶ
 διωλάσιον. (Συμπέρασμα.) Εἰ ἀρα πα-
 ραλληλόγραμμον, τριγώνῳ βάσιν τὴν ἔχει
 πλὴν αὐτοῦ, καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις
 ἢ, διωλάσιόν ἐστι τὸ παραλληλόγραμμον τῷ
 τριγώνῳ. ὅπως εἶδει δεῖξαι.

Πρότεσις μβ. Πρόβλημα.

Τὸ δοθέντι τριγώνῳ, ἴσον παραλληλό-
 γραμμον συστήσασθαι, ἐν τῇ δοθείσῃ ὠ-
 θυγραμμῷ γωνίᾳ.

Εκθεσις.) Εἰς τὸ μὲν δοθέν τρίγωνον, τὸ
 $\alpha\beta\gamma$, ἢ δὲ δοθεῖσα ὠθύ-
 γραμμὸς γωνία, ἢ δ.
 (Διορισμός.) Δεῖ δὴ τῷ
 $\alpha\beta\gamma$ τριγώνῳ, ἴσον πα-
 ραλληλόγραμμον συστή-
 σασθαι, ἐν ἰσῇ τῇ δ γωνίᾳ
 ὠθυγραμμῷ. (Κατασκευὴ.) Τέμνωμεν ἢ
 βγ δίχα



$\beta\gamma$, æ. sed parallelogrammon $\alpha\epsilon\gamma\delta$, est duplum trianguli $\alpha\epsilon\gamma$: quia $\alpha\gamma$ diameter ipsum medium secat. quare & parallelogrammon $\alpha\epsilon\gamma\delta$, trianguli $\epsilon\epsilon\gamma$ duplum erit. (Conclusio.) Parallelogrammon igitur trianguli est duplum: si super eadem consistat basi, & in eisdem fuerit æquedistantibus lineis rectis. Id quod erat demonstrandum.

Propositio quadragesima secunda.

Problema.

Dato triangulo, æquale statuere parallelogrammon in angulo rectilineo dato.

Explicatio dati.) Sit triangulus datus $\alpha\beta\gamma$: & datus angulus rectilineus δ . (Explicatio quesiti.) Dato triangulo $\alpha\beta\gamma$, statuendum est parallelogrammon æquale: in angulo qui est æqualis dato angulo rectilineo δ . (Delineatio.) Dissecetur linea recta

K 3 $\beta\gamma$.


$\beta\gamma$ δίχα κατὰ τὸ ϵ , καὶ ἐπιζύχθω ἡ $\alpha\epsilon$,
καὶ συνεσάτω πρὸς τῇ $\epsilon\gamma$ ὀρθεία, ἔστω πρὸς
αὐτῇ σημείω τῷ ϵ , τῇ δὲ γωνίᾳ ἴση ἡ ὑπὸ
 $\gamma\epsilon\zeta$ καὶ διὰ μὲν τῷ α , τῇ $\epsilon\gamma$ παράλληλῃ
ἤχθω ἡ $\alpha\eta$, διὰ δὲ τῷ γ , τῇ $\zeta\epsilon$ παράλληλῃ
ἤχθω ἡ $\gamma\eta$, παραλληλόγραμμον ἄρα ἐστὶ τὸ
 $\zeta\epsilon\gamma\eta$. (Αποδείξις.) Καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ $\beta\epsilon$,
τῇ $\epsilon\gamma$, ἴσων ἐστὶ καὶ τὸ $\alpha\beta\epsilon$ τρίγωνον, τῷ $\alpha\epsilon\gamma$
τρίγωνῳ. ὅπῃτε γὰρ ἴσων βάσεων εἰσὶ τῶν $\beta\epsilon$,
 $\epsilon\gamma$, ἔσονται αὐταῖς παραλλήλοις ταῖς $\beta\gamma$,
 $\alpha\eta$. διπλασίον ἄρα ἐστὶ τὸ $\alpha\beta\gamma$, τῷ $\alpha\epsilon\gamma$ τρι-
γώνῳ. ἐστὶ δὲ καὶ τὸ $\zeta\epsilon\gamma\eta$ παραλληλόγραμ-
μον, διπλασίον τῷ $\alpha\epsilon\gamma$ τριγώνῳ. βάσιν τε γὰρ
αὐτῷ τῷ αὐτῷ ἔχει, καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς ἐ-
στὶν αὐτῷ παραλλήλοις. ἴσων ἄρα ἐστὶ τὸ $\zeta\epsilon\gamma\eta$
παραλληλόγραμμον, τῷ $\alpha\beta\gamma$ τριγώνῳ. καὶ
ἔχεται τῷ ὑπὸ $\gamma\epsilon\zeta$ γωνίαν, ἴσῃ τῇ δ. (Συμ-
πέρασμα.) Τῷ ἄρα δοθέντι τριγώνῳ τῷ
 $\alpha\beta\gamma$, ἴσων παραλληλόγραμμον συνεσάθη
τὸ $\zeta\epsilon\gamma\eta$, ἐν γωνίᾳ τῇ ὑπὸ $\zeta\epsilon\gamma$, ἥ ἐστιν ἴση τῇ
δ. ὥς ἐδει ποιῆσαι.

By media in puncto ϵ : & ducatur linea recta
 $\alpha\epsilon$: atq; ita statuatur ad lineam rectam $\epsilon\gamma$, &
 punctū eius ϵ , dato angulo rectilineo δ : equalis
 angulus rectilineus $\gamma\epsilon\zeta$: postea ducatur
 per punctum α , linea recta $\gamma\epsilon$, aequidistans li-
 nea recta $\alpha\eta$: & per punctum γ , linea recta
 $\epsilon\zeta$, aequidistans linea recta $\gamma\eta$. Erit itaq; figu-
 ra $\zeta\epsilon\gamma\eta$ parallelogrammon. (Demōstratio.)
 Quoniam $\beta\epsilon$ est equalis $\epsilon\gamma$: idcirco & trian-
 gulus $\alpha\beta\epsilon$, triangulo $\alpha\epsilon\gamma$ est equalis: sunt e-
 nim super basibus equalibus $\beta\epsilon$, $\epsilon\gamma$, & in
 eisdem lineis rectis $\beta\gamma$, $\alpha\eta$ aequedistantibus.
 Quare $\alpha\beta\gamma$ triangulus, duplus est trianguli
 $\alpha\epsilon\gamma$: verum parallelogrammon $\epsilon\zeta\gamma\eta$, etiam
 est duplum trianguli $\alpha\epsilon\gamma$: quia eandem ha-
 bent basin $\epsilon\gamma$: & in eisdem sunt aequedistan-
 tib' lin'is rectis $\epsilon\gamma$, $\zeta\eta$. Quare parallelogram-
 mon $\epsilon\zeta\gamma\eta$, est aequale triangulo $\alpha\beta\gamma$, & ha-
 bet angulum $\gamma\epsilon\zeta$, aequalem angulo δ . (Con-
 clusio.) Dato igitur triangulo $\alpha\beta\gamma$, statu-
 rum est aequale parallelogrammon $\epsilon\zeta\gamma\eta$ in an-
 gulo $\zeta\epsilon\gamma$, qui est equalis dato angulo rectili-
 neo δ . Quod faciendum erat.

Πρότασις μγ. θεώρημα.

Πάντος παραλληλογράμμου τῶν πρὸς τὴν
 διάμετρον παραλληλογράμμων τὰ πα-
 ραπληρώματα, ἴσα ἀλλήλοις εἰσιν.

Εκθεσις.) Εἶπω παραλληλόγραμμον, τὸ
 $\alpha\beta\gamma\delta$, διάμετρον $\theta\zeta$ δὲ αὐτοῦ, ἢ $\alpha\gamma$, πρὸς δὲ τὴν
 $\alpha\gamma$, παραλληλόγραμ-
 μα μὲν ἔσω τὰ $\epsilon\theta$, $\zeta\eta$, τὰ
 δὲ λεγόμενα παραπλη-
 ρώματα, τὰ $\beta\kappa$, $\kappa\delta$. (Διο-
 ρισμός.) Λέγω ὅτι ἴσον ἐ-
 στί τὸ $\beta\kappa$ παραπληρώ-
 μα, τὰ $\kappa\delta$, παραπληρώματι. (Απόδειξις.)



Επεὶ γὰρ παραλληλόγραμμόν ἐστι τὸ $\alpha\beta\gamma\delta$,
 διάμετρον $\theta\zeta$ δὲ αὐτοῦ ἢ $\alpha\gamma$, ἴσον ἐστί τὸ $\alpha\beta\gamma$
 τρίγωνον, τὰ $\alpha\delta\gamma$ περιγώνω. πάλιν ὅτι τὸ
 $\epsilon\kappa\theta\alpha$ παραλληλόγραμμόν ἐστι, διάμετρον $\theta\zeta$
 δὲ αὐτοῦ ἢ $\alpha\gamma$, ἴσον ἐστί τὸ $\epsilon\alpha\kappa$ τρίγωνον τὰ $\alpha\theta\kappa$
 περιγώνω. Διὰ τὰ αὐτὰ δὲ ϵ τὸ $\kappa\zeta\gamma$ τρίγω-
 νον, τὰ $\kappa\eta\gamma$ εἰσιν ἴσον. ἐπεὶ ὅν τὸ μὲν $\alpha\epsilon\kappa$ τρί-
 γωνον, τὰ $\alpha\theta\kappa$ περιγώνω εἰσιν ἴσον, τὸ δὲ $\kappa\zeta\gamma$,
 τὰ $\kappa\eta\gamma$, τὸ $\alpha\epsilon\kappa$ τρίγωνον μὲν $\alpha\epsilon$ $\kappa\eta\gamma$, εἰσιν
 ἴσον

*Propositio quadragesima tertia.**Theorema.*

OMnis parallelogrammi eorum quę circa eandem sunt dimetientem parallelogrammōn supplementa: æqualia sunt inter se.

Explicatio dati.) Sit parallelogrammon $a\epsilon\gamma\delta$, dimetiens eius $a\gamma$, & circa $a\gamma$, sint parallelogramma $\epsilon\theta$, $\zeta\eta$: & quę vocantur supplementa sint $\beta\kappa$, $\kappa\delta$. (*Explicatio quę sit.*) Dico quod supplementum $\beta\kappa$, sit æquale supplemento $\kappa\delta$. (*Demonstratio.*) Quoniā $a\epsilon\gamma\delta$ parallelogrammon, diametrum habet $a\gamma$: idcirco triangulus $a\epsilon\gamma$, est æqualis triangulo $a\delta\gamma$. Rursus quoniam $\epsilon\theta\delta\alpha$ parallelogrammon, diametrum habet $a\alpha$ lineā rectā: ideo eam triangulus, est æqualis triangulo $a\theta\alpha$. per eadem demonstrabitur triangulum $\kappa\zeta\gamma$, triangulo $\kappa\eta\gamma$ esse æqualem. Cum igitur triangulus $a\epsilon\kappa$, triangulo $a\theta\alpha$ sit æqualis: & triangulus $\kappa\zeta\gamma$, æqualis triangulo $\kappa\eta\gamma$: erit itaq; triangulus $a\epsilon\kappa$ cum triāgulo $\kappa\eta\gamma$ æqua-


K 5 lis tri-

ἴσον τῷ $\alpha\theta\kappa$ τριγώνῳ μὲν $\alpha\tau\zeta$ τριγώνῳ. ἔστι δὲ ϵ ὅλον τὸ $\alpha\beta\gamma$ τρίγωνον, ὅλῳ τῷ $\alpha\delta\gamma$ ἴσον. λοιπὸν ἄρα τῷ $\kappa\delta$ παραπληρώματι ἴσον ἐστὶ τὸ $\beta\kappa$ παραπληρώμα. (Συμπίεσμα.) Πάντος ἄρα παραλληλογράμμου τῶν περὶ τὴν διάμετρον παραλληλογράμμων, τὰ παραπληρώματα, ἴσα ἀλλήλοις ἐστίν. ὅπως εἶδει δεῖξαι.

Πρότεσις μδ. Πρόβλημα.

ΠΑρὰ τὴν δοθεῖσαν $\alpha\beta$ εὐθεῖαν, τῷ δοθέντι τριγώνῳ, ἴσον παραλληλόγραμμον παραβαλὼν ἐν τῇ δοθείσῃ γωνίᾳ $\alpha\theta\upsilon$ γράμμου.

Εκθεσις.) Εἰωήμεν δοθεῖσαι $\alpha\beta$ εὐθεῖα, ἡ $\alpha\beta$, τὸ δὲ δοθέν τρίγωνον, τὸ γ , ἡ δὲ δοθεῖσα γωνία $\alpha\theta\upsilon$ γράμμου, ἡ δ . (Διορισμός.) Δεῖ δὴ παρὰ τὴν



δοθεῖσαν $\alpha\beta$ εὐθεῖαν τὴν $\alpha\beta$, τῷ δοθέντι τριγώνῳ τῷ γ , ἴσον παραλληλόγραμμον παραβαλὼν, ἐν ἰσῇ τῇ δ γωνίᾳ. (Κατασκευὴ.) Συμ-

τάτω

lis triangulo abx , cum triangulo xzy . verū
 totus triangulus aby , toto triangulo ady
 est equalis : quare reliquum supplementum
 bx , reliquo supplemento xd est aequale. (Con-
 clusio.) Omnis igitur parallelogrammi co-
 rum quæ circa eandem sunt dimetientem pa-
 rallelogrammorum supplementa equalia sunt
 inter se. Id quod erat demonstrandum.

Propositio quadragesima quarta.
Problema.

AD datam lineam rectam, dato tri-
 angulo, æquale statuere paralle-
 logramon, in angulo rectilineo dato.

Explicatio dati.) Sit data linea recta ab :
 datus vero triangulus γ : datus angulus re-
 ctilineus d . (*Explicatio quasiti.)* Ad da-
 tam lineam rectam ab , statuendum est pa-
 rallelogrammon æquale triangulo dato γ : in
 angulo, qui est equalis angulo d dato. (*Dei-*

εἶπω τῷ γ' τε γωνίῳ ἴσον παραλληλόγραμ-
 μον τὸ βεζή, ἐν γωνία, τῇ ὑπὸ εβη, ἥ ἐστὶν ἴση
 τῇ δ, κ, κείδω ὥσπερ ἐπ' αὐθείας εἶναι τῷ βε,
 τῇ αβ, καὶ διήχθω ἡ ζή, ὅτι τὸ θ, εἰ δὲ τοῦ
 αὐτοῦ τε τῶν βη, εἰ παραλληλῳ ἡ χθω ἡ
 αθ, καὶ ἐπεζέχθω ἡ θβ. (Απόδειξις.) Καὶ
 ἐπεὶ εἰς παραλλήλους τὰς αθ, εἰς αὐθεῖα ἐμ-
 πέπιπκεν ἡ θζ, αἱ ἄρα ὑπὸ αθζ, θζε γωνίαι
 δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶν. αἱ ἄρα ὑπὸ βθη, ηζε
 δύο ὀρθῶν ἐλάσσονές εἰσιν. αἱ δὲ ὑπὸ ἐλασ-
 σόνων, ἡ δύο ὀρθῶν, εἰς ἀπφρον ἐκβαλλόμεναι,
 συμπίπτουσιν, αἱ θβ, ζε ἄρα ἐκβαλλόμεναι,
 συμπεσῶνται. (Καθασκώδης τὸ ἕτερον μέρος.)
 ἐκβεβλήδωσαν εἰ συμπιπνέτωσαν κτ τὸ κ,
 καὶ διὰ τῶ κ σημεία, ὁπότερα τῶν εα, ζθ, πα-
 ράλληλῳ ἡ χθω ἡ κλ, καὶ ἐκβεβλήδω-
 σαν αἱ θα, ηβ, ὅτι τὰ λ, μ, σημεία. (Αποδεί-
 ξεως τὸ ἕτερον μέρος.) Παραλληλόγραμ-
 μον ἄρα ἐστὶ τὸ θλκζ, διάμετρος δὲ αὐτοῦ ἡ
 εκ. πρὶν δὲ θκ, παραλληλόγραμμά μιν, τὰ
 αη, με, τὰ δὲ λεγόμενα παραπληρώματα
 κβ, βζ, ἴσον ἄρα ἐστὶ τὸ λβ, τῷ βζ. ἀλλὰ καὶ
 τὸ βζ


neario.) Fiat ϵ triangulo γ aequale parallelogrammon $\beta\epsilon\zeta\eta$: in angulo $\epsilon\beta\eta$, aequali angulo δ dato, & sit linea recta $\beta\epsilon$ $\epsilon\pi$ & $\theta\epsilon$ $\alpha\epsilon$ rectae $\alpha\epsilon$: atq; producat^rur linea recta $\zeta\eta$, ad punctum θ . per punctum etiam α ducatur alterutri linearum $\beta\eta$, & ϵ aequidistans linea recta $\alpha\theta$: deniq; ducatur linea recta $\theta\epsilon$. (Demonstratio.) Quoniam in duas rectas aequidistantes $\alpha\theta$, & ϵ recta linea $\theta\zeta$ incidit: idcirco anguli $\alpha\theta\zeta$, $\theta\zeta\epsilon$ duobus rectis sunt aequales, atq; ideo anguli $\epsilon\theta\eta$, $\eta\zeta\epsilon$ duobus rectis sunt minores. verum linea recta α duobus angulis, qui sunt minores duobus angulis rectis, in infinitum usque ducta concurrunt. quare $\theta\epsilon$, & producta concurrent. (Altera delineationis pars.) Producantur duae lineae rectae $\zeta\epsilon$ $\theta\epsilon$, & concurrant in puncto κ , & per punctum κ , alterutri linearum $\epsilon\alpha$, & θ ducatur $\kappa\lambda$ aequidistans: atq; producantur linea rectae $\eta\beta$, $\theta\alpha$ ad puncta usq; λ , μ . (Demonstrationis altera pars.) Est igitur figura $\theta\lambda\kappa\zeta$ parallelogrammon: eius ζ diameter $\theta\kappa$: circa dimetientem verò parallelogramma sunt $\alpha\eta$, $\mu\epsilon$: dicta verò supplementa $\lambda\epsilon$, $\epsilon\zeta$. quare $\lambda\epsilon$

τὸ βζ, τῷ γ̃ τριγώνῳ ἐστὶν ἴσον, καὶ τὸ λβ ἄρα
 τῷ γ̃ ἐστὶν ἴσον, καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ἥβε
 γωνία, τῇ ὑπὸ ᾱβμ, ἀλλὰ ἡ ὑπὸ ἥβε τῇ δ
 ἐστὶν ἴση, καὶ ἡ ὑπὸ ᾱβμ, τῇ δ γωνία ἐστὶν ἴση.
 (Συμπέρασμα.) Παρὰ τὴν δοθεῖσαν ἄρα
 εὐθεῖαν τὴν ᾱβ, τῷ δοθέντι τριγώνῳ τῷ γ̃,
 ἴσον παραλληλόγραμμον παραδέβληται τὸ
 λβ, ἐν γωνία τῇ ὑπὸ ᾱβμ, ἥ ἐστὶν ἴση τῇ δ.
 ὥς εἶδει ποιῆσαι.

Πρότασις με. Πρόβλημα.

Τὸ δοθέντι εὐθυγράμμῳ, ἴσον παραλλη-
 λόγραμμον συστήσασθαι ἐν τῇ δοθείσῃ
 εὐθυγράμμῳ γωνία.

Εκθεσις.) Εἰς τὸ δοθέν
 εὐθύγραμμον, τὸ ᾱβγδ,
 ἡ δὲ δοθεῖσα γωνία εὐ-
 θυγραμμοῦ, ἡ ε̄. (Διορισ-
 μός.) Δεῖ δὴ τῷ ᾱβγδ εὐ-
 θυγράμμῳ, ἴσον παρα-
 λληλόγραμμον συστήσασθαι ἐν ἴσῃ γωνία τῇ ε̄.
 (Κατασκευὴ.) Εἰς τὸ ᾱβ, καὶ συ-



ρυσά-

supplementum est æquale $\angle$ supplemento.
 verum $\angle$ supplementum, est æquale trian-
 gulo γ : ergo & $\angle$ supplementum triangulo
 γ est æquale. præterea quoniam angulus $\eta\epsilon\alpha$
 est æqualis angulo $\alpha\beta\mu$: & angulus $\eta\epsilon\alpha$ etiã
 est æqualis angulo δ : idcirco & angulus $\alpha\beta\mu$
 etiam est æqualis angulo δ . (Conclusio.) Ad
 datam igitur lineam rectam $\alpha\epsilon$: dato trian-
 gulo γ : æquale cõstitutum est parallelogram-
 mon $\lambda\epsilon$, in angulo $\alpha\beta\mu$, qui est æqualis angu-
 lo δ . Id quod erat faciendum.

Propositio quadragesima quinta.

Problema.

Dato rectilineo, æquale statuere
 parallelogrammon in angulo re-
 ctilineo dato.

Explicatio dati.) Sic datum rectilineum
 $\alpha\epsilon\gamma\delta$: & datus angulus rectilineus ϵ . (Ex-
 plicatio quesiti.) Dato rectilineo $\alpha\epsilon\gamma\delta$, sta-
 tuendum est æquale parallelogrammon in
 angulo rectilineo, qui est æqualis angulo ϵ da-
 to. (Delineatio.) Ducatur linea recta $\epsilon\delta$, &
 consti-

πεσάτω τὰ $\alpha\beta\delta$ τριγώνω, ἴσον παραλληλό-
 γραμμον, τὸ $\zeta\theta$, ἐν τῇ ὑπὸ $\theta\kappa\zeta$ γωνία, ἡ ἐ-
 σὶν ἴση τῇ ϵ , καὶ παραβεβλήστω παρὰ τὴν
 $\eta\theta$ $\delta\theta\epsilon\acute{\iota}\alpha$ ν τὰ $\delta\beta\gamma$ τριγώνω, ἴσον παραλ-
 ληλόγραμμον, τὸ $\eta\mu$, ἐν τῇ ὑπὸ $\eta\theta\mu$ γωνία,
 ἡ ἐσὶν ἴση τῇ ϵ . (Απόδειξις.) Καὶ ἐπεὶ ἡ ϵ γω-
 νία, ἐκατέρᾳ τῶν ὑπὸ $\theta\kappa\zeta$, $\eta\theta\mu$ ἐστὶν ἴση, καὶ
 ἡ ὑπὸ $\eta\theta\mu$ ἄρα τῇ ὑπὸ $\theta\kappa\zeta$ ἐστὶν ἴση, κοινὴ
 προσκείστω, ἡ ὑπὸ $\kappa\theta\eta$. αἱ ἄρα ὑπὸ $\zeta\kappa\theta$,
 $\kappa\theta\eta$ ταῖς ὑπὸ $\kappa\theta\eta$, $\eta\theta\mu$, ἴσαι εἰσὶν. ἀλλ' αἱ ὑ-
 πὸ $\zeta\eta\theta$, $\kappa\theta\eta$, δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶν, καὶ αἱ ὑ-
 πὸ $\kappa\theta\eta$, $\eta\theta\mu$ ἄρα δύσιν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶν. πρὸς
 δὴ πινὶ $\delta\theta\epsilon\acute{\iota}\alpha$, τῇ $\eta\theta$, καὶ τὰ πρὸς αὐτῇ σημείω
 τὰ θ , δύο $\delta\theta\epsilon\acute{\iota}\alpha$ ι αἱ $\kappa\theta$, $\theta\mu$, μὴ ὅπῃ τὰ αὐτὰ
 μέρη κείμεται, τὰς ἐφεξῆς γωνίας δυσὶν ὀρ-
 θαῖς ἴσας ποιῶσιν. ἐπὶ $\delta\theta\epsilon\acute{\iota}\alpha$ ς ἄρα ἐστὶν ἡ $\kappa\theta$,
 τῇ $\theta\mu$. καὶ ἐπεὶ εἰς παραλλήλους τὰς $\kappa\mu$, $\zeta\eta$,
 $\delta\theta\epsilon\acute{\iota}\alpha$ ἐνέπεσεν ἡ $\theta\eta$, αἱ ἐναλλαξ γωνίαί, αἱ
 ὑπὸ $\mu\theta\eta$, $\theta\kappa\zeta$ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶ. κοινὴ προσ-
 κείστω ἡ ὑπὸ $\theta\eta\lambda$. αἱ ἄρα ὑπὸ $\mu\theta\eta$, $\theta\eta\lambda$,
 ταῖς ὑπὸ $\theta\eta\zeta$, $\theta\eta\lambda$, ἴσαι εἰσὶν. ἀλλ' αἱ ὑπὸ
 $\mu\theta\eta$, $\theta\eta\lambda$, δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶν, Ἐαὶ ὑπὸ
 $\theta\eta\zeta$

constituatur triangulo $\alpha\beta\delta$ aequale parallelogrammon $\zeta\theta$: habens angulum $\theta\kappa\zeta$ aequalem angulo ϵ . statuatur etiam ad lineam rectam $\eta\theta$, parallelogrammon $\eta\mu$, aequale triangulo $\delta\beta\gamma$, habens angulum $\kappa\theta\mu$ aequalem angulo ϵ . (Demonstratio.) Quoniam angulus ϵ alterutri angulo $\theta\kappa\zeta$, $\eta\theta\mu$ est equalis: idcirco & angulus $\eta\theta\mu$, angulo $\theta\kappa\zeta$ est equalis. communis addatur angulus $\kappa\theta\eta$: ergo duo anguli $\zeta\kappa\theta$, $\kappa\theta\eta$, duob. angulis $\kappa\theta\eta$, $\eta\theta\mu$ sunt aequales. verum duo anguli $\zeta\eta\theta$, $\kappa\theta\eta$ duobus rectis sunt aequales: quare & anguli $\kappa\theta\eta$, $\eta\theta\mu$ duobus rectis sunt aequales. ad lineam rectam $\eta\theta$, & punctum in ea datum θ in diuersas partes ductae sunt lineae rectae $\kappa\theta$, $\theta\mu$: atq; faciunt angulos $\epsilon\Phi\epsilon\zeta\eta\theta$ aequales duobus rectis: quare recta $\kappa\theta$ est $\epsilon\pi'$ $\delta\theta\epsilon\iota\alpha\varsigma$ rectae $\theta\mu$. Et quia in lineas rectas equedistantes $\kappa\mu$, $\zeta\eta$ recta quaedam $\theta\eta$ incidit: anguli idcirco alterni sunt inter se aequales, angulus $\mu\theta\eta$, equalis angulo $\theta\kappa\zeta$. Communis addatur angulus $\theta\eta\lambda$. anguli igitur $\mu\theta\eta$, $\theta\eta\lambda$, angulis $\theta\kappa\zeta$, $\theta\eta\lambda$ sunt aequales, verum $\mu\theta\eta$, $\theta\eta\lambda$ anguli sunt aequales duo-

θηζ, θηλ ἄρα δυσὶν ὁρθαῖς ἴσαι εἰσὶν. ἐπ' αὐ-
 θείας ἄρα ἐστὶν ἡ ζῆ, τῇ ἡλ. καὶ ἐπεὶ ἡ κζ τῇ
 θῆ, ἴση τε καὶ παράλληλός ἐστιν, ἀλλὰ ἔῃ θῆ
 τῇ μλ, καὶ ἡ κζ ἄρα τῇ μλ ἴση τὴν παραλ-
 ληλός ἐστιν, καὶ ὅτι ζῇ γνώσιν αὐτὰς αὐθείαι,
 αἱ κμ, ζλ. καὶ αἱ κλ, ζμ, ἴσαι τὴν ἔῃ παράλλη-
 λοι εἰσὶ. παραλληλόγραμμον ἄρα ἐστὶ τὸ
 κζλμ. καὶ ἐπεὶ ἴσον ἐστὶ τὸ μδν ἂβδ τρίγων-
 ον, τῷ θζ παραλληλογράμμῳ, τὸ δὲ δβγ,
 τῷ ἡμ, ὅλον ἄρα τὸ ἂβγδ αὐθύγραμμον, ὅ-
 λω τῷ κζλμ παραλληλογράμμῳ, ἴσον ἐστὶ.
 (Συμπίεσμα.) Τῷ ἄρα δοθέντι αὐ-
 γράμμῳ τῷ ἂβγδ, ἴσον παραλληλόγραμμον
 συνίσταται τῷ κζλμ, ἐν γωνία, τῇ ὑπὸ ζκμ
 ἢ ἐστὶν ἴση τῇ δοθείσῃ τῇ ε. ὅπως ἔδει ποιῆσαι.

Πρότασις μς. Πρόβλημα.

Απὸ τ' δοθείσης αὐθείας περὶ ἄγωνιον ἀνα-
 γράψαι.

Εκθεσις.) Εἰω ἡ δοθεῖσα αὐθεῖα, ἡ ἂβ. (Διο-
 ρισμός.) Δεῖ δὲ ἀπὸ τ' ἂβ αὐθείας, περὶ ἄγω

bus rectis. quare & anguli $\theta\kappa\zeta$, $\theta\eta\lambda$ duobus
 rectis sunt aequales. quare recta $\zeta\eta$ est $\epsilon\pi'$ Δ -
 Δ είας recta $\eta\lambda$. Cum vero $\kappa\zeta$ recta, recta $\theta\eta$
 sit aequalis, & aequidistans: item $\theta\eta$ recta, re-
 cta $\mu\lambda$ aequalis & aequidistans: idcirco & $\kappa\zeta$
 recta, recta $\mu\lambda$ aequalis & aequidistans est: e-
 asq; cōiungunt recta $\kappa\mu$, $\zeta\lambda$, quare & $\kappa\lambda$, $\zeta\mu$
 aequales & aequidistantes sunt, unde fit, quod
 figura $\kappa\zeta\lambda\mu$ sit parallelogrammon. Cum au-
 tē triangulus $\alpha\beta\delta$, sit aequalis parallelogram-
 mo $\theta\zeta$: & triangulus $\delta\epsilon\gamma$ parallelogrammo
 $\eta\mu$. totum igitur rectilineum $\alpha\beta\gamma\delta$: toto pa-
 rallelogrammo $\kappa\zeta\lambda\mu$ est aequale. (Cōclusio.)
 Dato igitur rectilineo $\alpha\beta\gamma\delta$, constitutum est
 parallelogrammon $\kappa\zeta\lambda\mu$ aequale, in angulo
 $\zeta\eta\mu$, qui est aequalis dato angulo ϵ . Id quod
 faciendum erat.

Propositio quadragesima sexta. Problema.


A Data linea recta describere qua-
 dratum.

Explicatio dati.) Sit data linea recta $\alpha\beta$.

Explicatio quaesiti.) A data linea recta $\alpha\beta$,

L 2 descri-

νον ἀναγράψαι. (Κατασκευή.) Ἦχθω τῇ $\alpha\beta$
 ὀθεῖα, ἀπὸ τῆς πρὸς αὐτῇ σημείας τῆς α , πρὸς
 ὀρθᾶς ἡ $\alpha\gamma$, καὶ κείσθω τῇ
 $\alpha\beta$ ἴση, ἡ $\alpha\delta$, καὶ διὰ μέν
 τῆς δ σημείας, τῇ $\alpha\beta$ πα-
 ράλληλῃ ζ ἤχθω, ἡ δὲ,
 διὰ δὲ τῆς β σημείας τῇ
 $\alpha\delta$ παράλληλῃ ζ ἤχθω,



ἡ $\beta\epsilon$. (Απόδειξις.) Παραλληλόγραμμον ἄ-
 ρα ἐστὶ τὸ $\alpha\delta\epsilon\zeta$, ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ μὲν $\alpha\beta$ τῇ $\delta\epsilon$,
 ἡ δὲ $\alpha\delta$, τῇ $\beta\epsilon$. ἀλλὰ καὶ ἡ $\alpha\beta$, τῇ $\alpha\delta$ ἐστὶν ἴ-
 ση. αἱ τέσσαρες ἄρα αἱ $\beta\alpha$, $\alpha\delta$, $\delta\epsilon$, $\beta\epsilon$, ἴσαι ἀλ-
 λήλαις εἰσὶν, ἰσόπλευρον ἄρα ἐστὶ τὸ $\alpha\delta\epsilon\zeta$
 παραλληλόγραμμον. (Διορισμὸς δόκτε-
 ρ ζ .) Λέγω δὴ ὅτι καὶ ὀρθογώνιον. (Απόδει-
 ξις.) Ἐπεὶ γὰρ εἰς παραλλήλους τὰς $\alpha\beta$, $\delta\epsilon$ ὀ-
 θεῖα ἐνέπεσεν ἡ $\alpha\delta$, αἱ ἄρα ὑπὸ $\beta\alpha\delta$, $\alpha\delta\epsilon$
 γωνίαι, δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶν. ὀρθὴ δὲ ἡ ὑ-
 πὸ $\beta\alpha\delta$, ὀρθὴ ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ $\alpha\delta\epsilon$. τῶν δὲ
 παραλληλογραμμῶν χωρίων αἱ ἀπ' ἐναντί-
 ον πλευραῖτε ϵ γωνίαι, ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶν.
 ὀρθὴ ἄρα καὶ ἐκάτερα τῶν ἀπεναντίων τῶν ὑ-
 πὸ

describendum est quadratum. (Delineatio.)

Ducatur ex puncto a linea recta $a\epsilon$, ad angulos rectos recta linea ay : & fiat recta $a\beta$ equalis recta ad : per punctum etiam d , linea recta $a\epsilon$ ducatur aequidistans linea recta de : deniq; per punctum β linea recta de , ducatur aequidistans linea recta $\epsilon\epsilon$. (Demonstratio.)


Figura igitur $a\epsilon de$, est parallelogrammon: & $a\epsilon$ est equalis de , atq; ad recta βe : sed & $a\beta$ etiam est equalis recta ad . quatuor igitur recte $a\epsilon$, ad , de , ϵe sunt inter se aequales, atq; idcirco parallelogrammon $ade\epsilon$ est equilaterum. (Secunda explicatio quaesiti.) Dico quod parallelogrammon $ade\epsilon$ etiã sit rectangulum. (Demonstratio.) Cum in duas rectas aequidistantes $a\epsilon$, de recta quaedam ad inciderit, anguli ϵad , ade duobus rectis sunt aequales. verum angulus ϵad , est rectus, idcirco & angulus ade etiam est rectus, parallelogramma vero angulos oppositos, & latera opposita habet equalia: quare uterq; angulorũ

πρὸ $\alpha\delta\epsilon$, βεδ γωνιῶν. ὀρθογώνιον ἄρα ἐστὶ τὸ $\alpha\delta\epsilon\zeta$. ἐδείχθη δὲ καὶ ἰσόπλευρον. (Συμπίεσμα.) Τετράγωνον ἄρα ἐστὶ, καὶ ἔστιν ἀπὸ τῆς $\alpha\beta$ ὁθείας ἀναγεγραμμένον. ὅπερ ἔδει ποιῆσαι.

Πρότασις μζ. θεώρημα.

ΕΝ τοῖς ὀρθογωνίοις τριγώνοις, τὸ ἀπὸ τῆς ὀρθῆς γωνίας ὑποτεινέσης πλευρᾶς τετράγωνον ἴσον ἐστὶ, τοῖς ἀπὸ τῶν πᾶσι ὀρθῶν γωνιῶν περιχρυσῶν πλευρῶν τετράγωνοις.

Εκθεσις.) Εἰς τρίγωνον ὀρθογώνιον, τὸ $\alpha\beta\gamma$, ὀρθὴν ἔχον πρὸς τὸ $\beta\alpha\gamma$. (Διορισμός.) Λέγω ὅτι τὸ ἀπὸ τῆς $\beta\gamma$ τετράγωνον ἴσον ἐστὶ, τοῖς ἀπὸ τῶν $\beta\alpha$, $\alpha\gamma$ τετράγωνοις. (Κατασκευὴ.) Αναγε-



γράφθω γὰρ ἀπὸ τοῦ $\mu\epsilon\iota$ τῆς $\beta\gamma$, τετράγωνον, τὸ $\beta\delta\gamma\epsilon$, ἀπὸ δὲ τῶν $\beta\alpha$, $\alpha\gamma$, τὰ $\eta\beta$, $\theta\gamma$, καὶ διὰ τῆς α , ὁπόπερ αἱ τῶν $\beta\delta$, $\gamma\epsilon$, παράλληλοι ἦχθω ἡ $\alpha\lambda$, ἥ ἐπεὶ ἔχθωσαν αἱ $\alpha\delta$, $\zeta\gamma$. (Α-

πόσα-

oppositorum $\alpha\beta\epsilon$, sed est rectus : ideoq; ad $\epsilon\delta$ parallelogrammon, est rectangulum, sed & æquilaterum esse fuit demonstratum. (Conclusio.) Quare $\alpha\epsilon\delta$ figura, est quadratū: & est descriptum à linea recta data $\alpha\beta$. id quod erat faciendum.

Propositio quadragesima septima.

Theorema.

IN triangulis rectangulis, quadratum lateris angulum rectum subtendentis, est æquale quadratis laterum, rectum angulum continentium.

Explicatio dati.) Sit triangulus rectangulus $\alpha\beta\gamma$, habens angulum $\epsilon\alpha\gamma$ rectum. (Explicatio quæsi.) dico quod quadratum lateris $\beta\gamma$, sit æquale quadratis laterum $\epsilon\alpha$, $\alpha\gamma$. (Delineatio.) Describatur à linea $\beta\gamma$, quadratum $\beta\delta\epsilon\gamma$: & à linea $\beta\alpha$ quadratum $\beta\eta$. Præterea à linea $\alpha\gamma$ quadratum $\gamma\theta$. Ducatur etiam per punctum α , alterutri linearum $\beta\delta$, $\gamma\theta$ æquedistans recta linea $\alpha\lambda$. deniq; ducantur duæ lineæ rectæ $\alpha\delta$, $\zeta\gamma$. (Do-

L 4 mon-

πόδειξις.) Καὶ ἐπεὶ ὀρθὴ ἐστὶν ἑκατέρω τῶν
 ὑπὸ βαγ, βαη γωνιών, πρὸς δὲ πινὶ Δθεία,
 τῇ βα, καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ σημείῳ τῷ α, δύο
 Δθείαι, αἱ αγ, αη, μὴ ὅτι τὰ αὐτὰ μέρη κεί-
 μεναι, τὰς ἐφεξῆς γωνίας δύοσιν ὀρθαῖς ἴσας
 ποιοῦσιν. ἐπ' Δθείας ἄρα ἐστὶν ἡ γα, τῇ αη. Διὰ
 τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ἡ αβ, τῇ αθ ἐστὶν ἐπ' Δθείας.
 καὶ ἐπὶ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ δβγ γωνία τῇ ὑπὸ
 ζβα ὀρθῇ γὰρ ἑκάπερα. κοινὴ προσκείμεται ἡ ὑ-
 πὸ αβγ, ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ δβα, ὅλη τῇ ὑπὸ
 ζβγ ἐστὶν ἴση. καὶ ἐπεὶ δύο αἱ δβ, βα. δυεὶ ταῖς
 βζ, βγ ἴσαι εἰσιν, ἑκάπερα ἑκατέρω, καὶ γω-
 νία ἡ ὑπὸ δβα, γωνία τῇ ὑπὸ ζβγ, ἴση ἐ-
 στὶν. βάσις ἄρα ἡ αδ, βάσις τῇ ζγ ἐστὶν ἴση, καὶ
 τὸ αβδ τρίγωνον, τῷ ζβγ τριγώνῳ ἐστὶν ἴσον.
 καὶ ἐπὶ τῷ μὲν αβδ τριγώνῳ, διπλάσιον τὸ
 βλ παραλλήλογραμμον, βάσιν τὴν γδ πλὴν
 αὐτῷ ἔχουσι πλὴν βδ, καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς εἰσὶ
 παραλλήλοις, ταῖς βδ, αλ. τῷ δὲ ζβγ τρι-
 γώνῳ, διπλάσιον τὸ ηβ τετράγωνον. βάσιν τε
 γδ πάλιν πλὴν αὐτῷ ἔχουσι, πλὴν ζβ. καὶ ἐν
 ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις εἰσὶ, ταῖς ζβ, ηγ.

τὰ δὲ

monstratio.) Quoniam uterq; angulorū $\angle a\gamma$, $\angle a\alpha$ est rectus: idcirco ad rectam quandam ϵa , & ad punctum quod in ea est a , duæ rectæ $a\gamma$, $a\alpha$ in diuersas partes ductæ, faciunt angulos vicinos inter se æquales: quare recta γa est $\epsilon\pi'$ Obiciat recta $a\alpha$. per eadem ista demonstrabitur, quod recta $a\epsilon$, est $\epsilon\pi'$ Obiciat recta ad . quoniam verò angulus $\delta\epsilon\gamma$, æqualis est angulo $\zeta\epsilon a$, quia uterq; est rectus. communis addatur angulus $a\epsilon\gamma$: totus igitur angulus $\delta\epsilon a$, toto angulo $\zeta\beta\gamma$ est æqualis. cum verò duo latera $\delta\epsilon$, ϵa , duobus lateribus $\epsilon\zeta$, $\beta\gamma$ sint equalia, alterum alteri: & angulus $\delta\beta a$, angulo $\zeta\epsilon\gamma$ æqualis. basis igitur ad , basi $\zeta\gamma$ est æqualis, & triangulus $a\epsilon d$ triangulo $\zeta\epsilon\gamma$ æqualis: verum trianguli $a\epsilon d$ parallelogrammon $\beta\lambda$ est duplum, quia habent eandem basin ϵd , & sunt in eisdem lineis rectis æquedistantibus ϵd , $a\lambda$. Item trianguli $\zeta\beta\gamma$, duplum, est quadratum $\eta\epsilon$, quia habent eandem basin $\zeta\epsilon$, & sunt in eisdem lineis rectis æquedistantibus $\zeta\beta$, $\eta\gamma$. Quæ verò æ-

τὰ δὲ τῶν ἴσων διπλάσια ἴσιν ἀλλήλοις ἐστὶ
 ἴσων ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ βλ παραλληλόγραμμον,
 τὰ ἡβ τετραγώνω. Ομοίως δὲ ὁπιζόμεν-
 ῶν τῶν αἰ, βη, δειχθήσεται καὶ τὸ γλ πα-
 ραλληλόγραμμον ἴσων τὰ θγ τετραγώνω, ὅ-
 λον ἄρα τὸ δβεγ τετράγωνον, δυσὶ τοῖς ἡβ,
 θγ τετραγώνοις, ἴσων ἐστὶ, καὶ ἐστὶ τὸ μδγ
 τετράγωνον, ἀπὸ τῆς βγ ἀναγεφέν, τὰ δὲ
 ἡβ, θγ, ἀπὸ τῶν βα, αγ. τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς βγ
 πλωρὰς τετράγωνον, ἴσων ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν
 βα, αγ πλωρῶν τετραγώνοις. (Συμπί-
 ρασμα.) Εν ἄρα τοῖς ὀρθογωνίοις τριγώνοις,
 τὸ ἀπὸ τῆς πρὸς ὀρθῶν γωνίαν ὑποκείνου
 πλωρὰς τετράγωνον, ἴσων ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν
 πρὸς ὀρθῶν περιεχσῶν πλωρῶν τετραγώ-
 νοις. ὅπως εἶδει δεῖξαι.

Πρότασις μη. θεώρημα.

ΕΑν τριγώνῃ τὸ ἀπὸ μίας τῶν πλωρῶν
 τετράγωνον, ἴσων ἢ τοῖς ἀπὸ τῶν λοιπῶν
 τῶν τριγώνῃ δύο πλωρῶν τετραγώνοις, ἢ
 περιεχομένη γωνία ὑπὸ τῶν λοιπῶν τοῦ
 τριγώνου δύο πλωρῶν ὀρθή ἐστι.

Εκθε-

qualitū sunt dupla, illa inter se sunt equalia, ideoq; parallelogrammon $\epsilon\lambda$, equale est quadrato $\eta\zeta$. Simili ratione quando $\alpha\epsilon$, $\beta\eta$ recte coniunguntur: demonstrabitur quod parallelogrammon $\gamma\lambda$ sit equale quadrato $\theta\gamma$. totum igitur quadratum $\delta\beta\epsilon\gamma$, duobus quadratis $\eta\beta$, $\theta\gamma$ est equale. sed $\beta\delta\epsilon\gamma$ quadratum, est descriptum à latere $\epsilon\gamma$, & quadrata $\eta\zeta$, $\theta\gamma$ sunt descripta à lateribus $\beta\alpha$, $\alpha\gamma$. Quadratum igitur lateris $\epsilon\gamma$, est equale quadratis laterum $\beta\alpha$, $\alpha\gamma$. (Conclusio.) In triangulis igitur rectangulis quadratum lateris rectum angulum subtendens, est equale quadratis laterum rectum angulum continentium. quod erat demonstrandum.

Propositio quadragesima octava.

Theorema.

SI quadratum unius lateris trianguli fuerit equale quadratis reliquorum duorum laterum: erit angulus quem reliqua illa duo trianguli latera continent, rectus.

Expli-

Εκθεσις.) Τριγώνω γὰρ $\tau\tilde{\alpha}\bar{\alpha}\beta\gamma$, τὸ ἀπὸ
μίας τῆς $\beta\gamma$ πλωρᾶς τετράγωνον, ἴσων ἐστὶ
τοῖς ἀπὸ τῶν $\beta\alpha, \alpha\gamma$ πλωρῶν τετραγώνοις.

(Διορισμὸς.) Λέγω ὅτι ὁρ
θὴ ἐστὶν ἡ ὑπὸ $\beta\alpha\gamma$ γω-

νία. (Κατασκευὴ.) Ηχθω
γὰρ ἀπὸ $\tilde{\alpha}$ σημεία τῇ $\bar{\alpha}\beta$

πρὸς ὀρθὰς εὐθεῖα, ἡ $\bar{\alpha}\delta$,

καὶ κείδω τῇ $\gamma\alpha$, ἴση ἡ $\bar{\alpha}\delta$,

καὶ ἐπέζωχθω ἡ $\delta\beta$.

(Απόδειξις.) Καὶ ἐπεὶ

ἴση ἐστὶν ἡ $\delta\alpha$, τῇ $\bar{\alpha}\gamma$, ἴσων ἐστὶ,

καὶ τὸ ἀπὸ

τῆς $\delta\alpha$ τετράγωνον, τῷ ἀπὸ τῆς $\bar{\alpha}\gamma$ τε-

τραγώνῳ. κοινὸν προσκείδω, τὸ ἀπὸ τῆς

$\bar{\alpha}\beta$ τετράγωνον, τὰ ἄρα ἀπὸ τῶν $\delta\alpha, \bar{\alpha}\beta$

τετράγωνα, ἴσα ἐστὶ, τοῖς ἀπὸ τῶν $\beta\alpha, \alpha\gamma$ τε-

τραγώνοις. ἀλλὰ τοῖς μὲν ἀπὸ τῶν $\delta\alpha, \bar{\alpha}\beta$,

ἴσων ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς $\delta\beta$, ὀρθὴ γὰρ ἐστὶν ἡ ὑπὸ

$\delta\alpha\beta$ γωνία, τοῖς δὲ ἀπὸ τῶν $\bar{\alpha}\beta, \alpha\gamma$, ἴσων ἐστὶ


τὸ ἀπὸ τῆς $\beta\gamma$ ὑπόκειται γὰρ. τὸ ἄρα ἀπὸ

τῆς $\delta\beta$ τετράγωνον, ἴσων ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς $\beta\gamma$

τετραγώνῳ. ὥστε καὶ πλωρὰ ἡ $\delta\beta$, τῇ $\beta\gamma$

ἐστὶν ἴση. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ $\bar{\alpha}\delta$ τῇ $\bar{\alpha}\beta$, κοινὴ δὲ


ἡ $\bar{\alpha}\gamma$, δύο δὲ αἱ $\delta\alpha, \bar{\alpha}\beta$, δυσὶ ταῖς $\beta\alpha, \alpha\gamma$ ἴση



Explicatio dati.) Sit quadratum lateris
 $\beta\gamma$, trianguli $\alpha\beta\gamma$ aequale quadratis lateri
 $\zeta\alpha, \alpha\gamma$. (*Explicatio quaesiti.*) Dico quod an-
 gulus $\zeta\alpha\gamma$ sit rectus. (*Delineatio.*) Ducatur
 à puncto α , linea recte $\alpha\zeta$, ad angulos rectos
 linea recta αd : & fiat linea $\alpha\gamma$ equalis rectae
 linea αd : deniq; ducatur linea recta $d\beta$. (*De-*
monstratio.) Quoniam recta $d\alpha$, est equalis
 rectae $\alpha\gamma$: idcirco & quadratum à recta $d\alpha$
 descriptum, erit aequale, quadrato à recta $\alpha\gamma$
 descripto. Commune addatur quadratum re-
 ctæ $\alpha\zeta$. quare quadrata rectarum $d\alpha$, $\alpha\beta$ sunt
 equalia quadratis rectæ $\zeta\alpha, \alpha\gamma$. verum qua-
 dratis rectarum $d\alpha, \alpha\beta$, aequale est quadra-
 tum rectæ $d\beta$, quia angulus $d\alpha\zeta$ est rectus.
 quadratis verò rectarum $\alpha\zeta, \alpha\gamma$ aequale pro-
 ponitur esse quadratū rectæ $d\zeta$. Quare qua-
 dratum rectæ $d\beta$, aequale est quadrato rectæ
 $\beta\gamma$. unde etiam latus $d\zeta$ lateri $\beta\gamma$ est aequa-
 le. Quoniam vero latus αd , est aequale lateri
 $\alpha\zeta$, commune verò latus $\alpha\gamma$: duo latera $d\alpha$,
 $\alpha\zeta$, duobus lateribus $\beta\alpha, \alpha\gamma$ sunt equalia, &
 basis


οἰσὶ, καὶ βάσις ἡ δὲ, βάσις τῇ βγ ἐστὶν ἴση. γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ δαβ, γωνία, τῇ ὑπὸ βαγ, ἐστὶν ἴση. ὀρθὴ δὲ ἡ ὑπὸ δαβ, ὀρθὴ ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ βαγ. (Συμπέρασμα.) Εὰν ἄρα τριγώνῳ τὸ ἐκ μίας τῶν πλευρῶν τετραγώνον, ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν λοιπῶν τριγώνῳ δύο πλευρῶν τετραγώνοις, ἡ περιεχομένη γωνία ὑπὸ τῶν λοιπῶν τοῦ τριγώνου πλευρῶν ὀρθὴ ἐστὶν. ὅπως εἶδεν δεῖξαι.

Τ Ε Λ Ο Σ.



bas $d\beta$, est equalis *bas* $\beta\gamma$: idcirco & an-
 gulus $d\alpha\beta$, angulo $\beta\alpha\gamma$ est equalis. Verum
 angulus $d\alpha\beta$ est rectus, quare & angulus
 $\beta\alpha\gamma$ etiam erit rectus. (Conclusio.) Si igitur
 quadratum unius lateris trianguli fuerit a-
 quale quadratis reliquorum duorum laterum
 erit angulus quem reliqua duo trianguli
 latera continent rectus. Id quod
 erat demonstrandum.

FINIS.



Scholia in hoc primum Euclidis elementum, autore Cunrado Dasypodio.

De scientijs Mathematicis.

Mathematicas scientias sic dictas volunt, quòd cum alias artes etiam absq[ue] preceptore intelligere, & addiscere possimus: has tamen non nisi instituti, & edocti, imò in illis exercitati percipere queamus: ut à discendo disciplina, à μαθήσις Πιστήμωι μαθηματικῇ dicantur. Pythagorici autem mathematica nomen, duabus tantum scientijs Arithmetica, & Geometriae imposuerunt: quoniam in his potissimum τὸ Πιστημονικόν, & ipsa μάθησις cerni potest. postea tamen nonnulli latius sumpto vocabulo, alias scientias hisce cognatas appellarunt mathematicas, Astronomiam, Musicam, & quae huius sunt generis. Hinc fit, ut mathematica definiatur scientia contemplationē habens rerū, non tantum abstractarum, ut sunt numeri, & figu-

& figura: sed & sensibus ipsis subiectarum, utpote cæli, terræ, stellarum, sonorum, tonorum, & quæcunq; his sunt similia.

Hanc verò vniuersalem mathesin in duas potissimum partes diuidunt: altera enim versatur circa res mēte & ratione perceptas, quæ Græcis nominantur τὰ νοητά, & ἀνοητά. altera verò τὸν αἰσθητὸν, rerum sensu subiectarum habet perceptionem: illa Geometriam, & Arithmeticam cōplectitur: hæc verò in sex esse diuisa scientias, Geodesiam, & Opticam, quæ ex Geometria nascuntur: Logisticam & Canonicam prognatas ex Arithmetica: deniq; Mechanicam, & Astronomiam, quas ad vtramq; referri tradunt. Esse & alia mathematicæ diuisio, in quatuor partes tantum facta. quoniam μὲν οὖν habet perceptionem quantitatis cōtinuæ, vel quantitatis discreta. Geometria enim, & Astronomia sibi habent subiectas ipsas magnitudines: Geometria quidem eam, quæ est sine motu: Astronomia eam, quæ mouetur. sic etiam

Μ

mul-

multitudinis & numerorū fit cōtemplatio in
Arithmetica, & Musica: illa enim numeros
per se considerat, eorumq; proprietates inue-
stigat: hæc verò numeros tractat relatos, quos
etiam harmonicos appellant. Itaq; vniuer-
salis quedam mathematica cognitio & do-
ctrina est statuenda, sub se complectens reli-
quas disciplinas omnes, suaq; principia, & v-
niuersales propositiones omnibus communi-
cans, non quatenus numeris, aut figuris, vel
deniq; motibus illa insunt: sed quatenus eorū
vniuersalis est natura, & talis, quæ singula-
ribus illis disciplinis attribui potest. Sunt au-
tem eiusmodi principia τὸ πᾶνος, καὶ τὸ ἀπεί-
ρον, finitum, & infinitum: quia numerus in-
cipit ab unitate, & in infinitū vsq; crescit: is
verò qui sumitur, finitus semper est: sic etiam
magnitudines in infinitum vsque diuidi pos-
sunt: cum tamen ea, quæ diuiduntur, sint fi-
nita, & terminata. Propositiones verò ma-
thematicæ communes sunt istæ, in quibus cō-
templamur λέγους, ἀναλογίας, σωθέσς,
διαρέ-

SCHOLIA.

διαρίσεις, ἀναποφὰς, ἐναλλαγὰς, τὸ αἰὼν, id est, rationes, proportiones, compositiones, diuisiones, conuersiones, alterationes, permutationes, aequale, & inaequale. Deinde τὸ κάλλος, καὶ τὰς, ipsaq; methodos, praeterea ὁμοιότης, καὶ ἀνομοιότης, similitudo, & dissimilitudo rerum in figuris, numeris, & motibus vniuersaliter considerantur. haec inquam omnia, & his similia vnaquaq; disciplina ad suam accomodat rem subiectam, eaq; ei inesse proprijs confirmat rationibus. Praeterea Mathematicarum disciplinarum fastigium & vertex quasi est ipsa ἀποδείξις, quia per ipsam haec scientia perficiuntur, dum definitionibus, diuisionibus, demonstrationibus, & quicquid harum rerum est, videntur.

De Geometria, & eius elementis.

Proclus Geometriam sic definit: γεωμετρία ἐστὶ γνωστικὴ μεγεθῶν, καὶ σχημάτων, καὶ τῶν ἐν ταῖς περὶ αὐτῶν λόγων τῶν ἐν αὐτοῖς, ἐκ παλαιῶν τῶν παλαιῶν, καὶ τῶν παντοίων θέσεων, καὶ κινήσεων. Geo-

metria est scientia, vel cognitio magnitudinum, & figurarum, atq; etiam terminorum quibus illæ clauduntur: quæq; proportionēs, & rationes, atq; etiam passionēs his accidentēs demonstrat: positionum deniq; & motuū varietates explicat. Hæc scientia duplex est: altera nominatur Γεωγία τῶν Πλάνων: altera στερεωμετρία. Planorum contemplatio tanquam simplicior præcedit, siquidem ex superficierum contemplatione nascitur corporum & solidorum cognitio. in utraq; verò tria (sicuti in omnibus scientijs) considerantur. Primum τὸ ὑποκείμενον γένε, res ipsa, de qua doctrina est instituta: alterum τὸ κατ' αὐτὸ ὑπάρχον, id quod rei per se inest, & τὰ πάθη, rerum affectiones: tertium ἀξιιώματα, & αἰτήματα, propositiones, per quas rebus subiectis inesse aliquid demonstratur. illa itaque in Geometria consideranda veniunt: nam ut ex definitione Geometrie licet videre: subiecta sunt trianguli, quadrata, circuli, sphaera, Cylindri, & ut summatim

matim dicam, figura plana, corpora solida, deniq omnes magnitudines immobiles, & harum termini. quæ verò his per se insunt, διαμέτρως, συστάως, ἀφαί, παραβολαί, ὑπεροχή, ἔλκευσις, ισότης, καὶ ἀνισότης, id est, diuisiones, constitutiones, contactus, applicationes, excessus, defectus, equalitas, & inequalitas: cum alijs quibusdam huius generis. Axiomata, & petitiones, quibus singula rebus subiectis demonstrantur inesse: sunt huiusmodi, quæ eidem sunt equalia, illa inter se sunt equalia: item à puncto ad punctum ducere lineam rectam. Hæc verò cum latè pateant, & ipsarum rerum subiectarum, atq propositionum geometricarum magna, variaq sit copia: necesse est, vt delectus habeatur, & in tradendo, atq docendo incipiamus à simplicioribus, ac principalioribus: ex quibus tanquam notissimis extruamus demonstrationes rerum in geometria abstrusarum. quas quidem simpliciores propositiones συχῆα, earumq doctrinam συχῆασις Græci

nominant. sunt enim στοιχεῖα, seu elementa
 Geometriæ, propositiones simplicissimæ, in
 quas compositæ resolvuntur, & à quibus tan-
 quam principijs omnes Geometricæ demon-
 strationes egressæ sunt: tales sunt hæ propo-
 sitiones Euclidis, quibus Archimedes, Apollo-
 nius, & ceteri geometræ tanquam principijs,
 & notissimis elementis utuntur: ita tamen
 hæc prima, & simplicissima Geometriæ prin-
 cipia ab Euclide conscripta sunt, ut nemo sa-
 tis possit hominis & ingenium, & industriam
 mirari. quæ enim ab antiquis fuerunt inuen-
 ta, in optimum redegit ordinem: delectum e-
 tiam in tanta copia, & varietate proposicio-
 num habuit talem, ut non omnia quæ dici
 poterant, assumeret: sed ea tantum, quæ ele-
 mentari institutioni conveniebant. deinde o-
 mnes modos, omniaq; genera syllogismorum
 adhibuit, quæcunq; ab ipsis apodicticis reci-
 piuntur. Præterea utitur divisionibus in in-
 veniendis rerum speciebus, item definitioni-
 bus in substantiali rerum subiectarum expli-
 catio-

catione, adhæc demonstratione in ijs, quæ à principijs fiunt ad quæsitæ. deniq; resolutione cum à quæsitis ad ipsa principia sit reditus. Taceo de varijs, quibus utitur conuertendi modis, continuatione, & dispositione singulari ipsorum elementorum. ut vnum absq; altero videatur esse non posse. Quæ cum ita sint, meritò omnes studiosi philosophiæ, & bonarũ artium, sibi hæc Euclidis elemēta familiaria reddere debebant, ut ad altiores capefcendas scientias fierent paratiores.

De Propositionibus Geometriæ.

Solent Geometriæ duo præcipua propositionum genera habere: vnum est τῶν δεξιῶν principiorum: alterum τῶν μὲν τὰς ἀρχὰς ἀκολούτων: id est, propositionum, quæ principia sequuntur, principia ipsa quia per se manifesta, & simplicia sunt nulla adhibita demonstratione primo explicantur loco: subsequuntur propositiones demonstratione indigentes, & ex ipsis demanantes principijs: & nisi hic ordo teneatur, verum permisceantur

omnia, tum & ipsa cognitio perturbatur: & quæ natura sunt distincta, coniunguntur. Illud ipsum facit Euclides, & principiorum facta enumeratione, absq; ulla demonstratione: transit ad propositiones demonstrabiles, diuidit verò ipsa in *ὑποθέσεις αἰτήματα, καὶ ἀξιώματα ἢ κοινὰς ἐννοίας*. Est autem *ὑπόθεσις*, cum aliquis rei propositæ cognitionem nondum habet, quæ per se fidem rei faciat, verum concedit assumentis illud verum esse. eiusmodi sunt ipsæ definitiones Euclidis. Postulatum verò in genere est, cum neq; cognitum quid est, neq; ab audiente concessum, tamen petitur ab alieno, ut assumi concedatur. sicuti cum peto mihi concedi omnes angulos rectos aequales inter se esse. Axioma, vel pronunciatum est quando quid cognitum est, & tam manifestum, ut per sese fidem habeat. ut quæ eidem sunt equalia, illa inter se sunt equalia: totum maius est sua parte. Geometra tamen hypotheseis vocant etiam *ὁρισμοὺς* definitiones rerum subiectarum: ut si definiam
line-

lineam, angulos, figuras, & similia: quo sciatur, quibus de rebus sermo sit institutus. deinde aliqua, seu postulatum non sic sumuntur ut Philosophi: sed postulatum vocant propositionem immediatam, in qua petitur aliquid quod factum est facile, & nulla indiget varia aut proluxa delineatione, ut si dicam, à puncto ad punctum ducatur linea recta. Communis denique sententia Geometris dicitur propositio immediata, quæ per se manifesta, & cognitu perfacilis est, sine ulla demonstratione recepta: & communi omnium consensu concessa. Itaque tria ista propositionum genera in eo conueniunt, quod principiorum naturam habeant, ac per se sint manifesta. differunt verò, quòd hypothesis sit rerum subiectarum explicatio: postulatum proponit aliquid, quod factum sit facile: axioma rei per se manifestæ sit cognitio. Quidam verò petitiones dicunt tantum ad Geometriam spectare: axioma vero ad omnes disciplinas. Alij diuidunt hoc modo ipsas communes sententias, ut quasdam

Geometriae, nonnullas Arithmeticae proprias esse dicant: alias denique communes. atque hac sint paucis dicta de principiis. Propositiones vero, quae principia sequuntur, & demonstrari possunt ac debent: aliae sunt *πρῶτα*, aliae *δευτέρωτα*. Problemata dicuntur propositiones, in quibus aliquid nobis ad agendum proponitur: ut quando figurarum ortus & constitutiones, sectiones, subtractiones, additiones, & similia proponuntur. Theoremata autem sunt, in quibus ad contemplandum quiddam proponitur, ut si ea, quae rebus per se insunt, aut accidunt, consideramus. cuiusmodi dicuntur esse τὰ καθ' αὐτὰ ὑπάρχοντα ἢ συμπεληκότα, vel etiam συμπίσματα, aut denique τὰ πάδη. Differunt itaque inter se, sed non aliter quam petitio, & axioma. Euclides utroque genere utitur. nam interdum tantum habet problemata, ut in quarto libro, interdum verò solum theorematata, sicuti in quinto: nonnunquam denique theorematata problematibus commiscet, ut in reliquis facit libris.

De

De primo Libro.

Proposuit sibi Euclides in hoc primo elemento principia figurarum rectilinearū tradere: nam triangulus & parallelogrammon sunt in figuris rectilineis omnium primæ, & simplicissimæ. Diuisit verò librum in partes tres: in prima, post explicationem principiorum, docet quomodo triangulus sit constituendus, quæ sint eius proprietates, cum quo ad angulos, tum etiam latera: præterea eosdem comparat inter se, & vnumquodq; accidens per se considerat: in altera de lineis æquedistantibus, & parallelogrammīs doctrinam instituit, demonstrans quæ eis per se insint, & quomodo ipsa fiant parallelogramma. in postrema, parallelogramma & triangulos inter se confert, primum seorsim, deinde coniunctim. Atq; hæc breuiter sint dicta, & explicata de vniuersali illa rerum mathematicarum & Geometria cognitione: nunc subiungemus perbreues locorum difficiliorum expositiones, & si quid forsan occurrerit, quod latius sit explicandum, & ad vniuersam Geometri-

metriam spectare videbitur, id fusius exponemus. cuiusmodi est ille locus $\omega\delta\epsilon\iota \ \& \ \pi\omicron\rho\iota\sigma\mu\alpha\lambda\ \Theta$, $\epsilon\iota\varsigma \ \acute{\alpha}\sigma\epsilon\omega\varsigma \ \acute{\alpha}\pi\alpha\gamma\omega\gamma\eta\varsigma$, & de ijs, quæ his similia.

$\Sigma\eta\mu\epsilon\iota\omicron\nu$.) Alij sic definiunt: $\sigma\eta\mu\epsilon\iota\omicron\nu$ $\epsilon\iota\varsigma\ \mu\omicron\upsilon\alpha\varsigma$ $\delta\epsilon\omicron\nu$ $\epsilon\chi\theta\omicron\alpha$, punctum est unitas quæ positionem habet. solum punctum in Geometria dividi non potest: sicut in Arithmetica unitas non admittit diuisionem. sunt enim unitas, eiusdemq; naturæ: quum duarum scientiarum omniũ prima, & simplicissima sint principia: differunt tamen in eo, quòd punctum dari & poni possit: unitas verò puncto simplicior existens non ponatur: cum ab omni intervallo, omniq; materia, ac loco sit abstracta. Vitur autem definitione negatiua, quoniam negationes maximè conueniunt principijs.

$\Gamma\epsilon\gamma\mu\mu\eta$.) Principium omnium magnitudinum sola negatione definiuit: lineam verò nunc describit affirmando, & negando. quia affirmatione excedit naturam puncti, & minus est simplex puncto, cum sit longitudo diuisionem admittens: negatione verò est
princi-

principium respectu superficiei, & corporis.
 sunt enim tres dimensiones: longitudinis quæ
 attribuitur lineæ, longitudinis & latitudi-
 nis simul, quæ ad superficiem refertur: denique
 longitudinis & latitudinis, atque profundita-
 tis coniunctim in corpore. cum itaque in defi-
 nitione ponit ἀπλάτης latitudine carens:
 una cum latitudine adimit quoque profundi-
 tatem, atque eam ob causam non addidit καὶ
 ἀπλάτης, cum superfluum esset. Alij sic defini-
 unt lineam: γραμμή ἐστὶ πύσις τῶ ὀμύων, id
 est, lineæ sit ex fluxu puncti: nonnulli γραμ-
 μὴν μέγεθος ὅφ' ἐν ἀξιώσει nominant,
 magnitudinem uno contentam intervallo.
 Euclidis tamen definitio perfectior est, essen-
 tiam & substantiam lineæ explicans. Possu-
 mus autem lineam hoc modo cognoscere, si
 longitudines parietum, aut itinerum spacia
 dimetiamur, quia tum neque latitudinem, ne-
 que crassitiem subiungimus, sed unicam con-
 sideramus distantiam, sicuti cum metimur
 prata, & campos, videmus ipsam tantum su-
 persi-

perficiem, id est, longitudinem & latitudinem tantum eius loci, vel agri. Cum verò puteos, tū est solidum, quia omnes distantiae, omniaq; interualla ibi coniunguntur: dicimus enim longitudinis, latitudinis, profunditatis ipsius putei, tantum vel tantum esse spatium, melius tamen cognoscemus lineam, quando obseruamus quomodo lucidum ab obscuro, illuminatum ab obumbrato distinguatur.

Εὐθεΐα.) Duæ simplicissimæ, ac præcipuæ linearum species sunt, recta & circularis: reliquæ omnes sunt mixtæ: & vel in superficiebus planis, vel in corporibus solidis considerantur. Plato lineam rectam definit sic: Εὐθεΐα γραμμὴ ἐστὶ, ἥς τὰ μέσα τοῖς ἄκροις ὀπίσσω ὁδεῖ: cuius media obumbrant extrema: quod licet videre in Eclipsi Solis, quando in una linea recta sunt Sol, Luna, & oculus noster, Luna media inter nos & Solem existente. Archimedes definit lineam rectam sic: Εὐθεΐα γραμμὴ ἐστὶν ἐλαχίστη τῶν τὰ αὐτὰ πέγραφα ἔχουσῶν γραμμῶν, ἐξ brevissima ea-

rum linearum, quæ eisdem habent terminos. atq; hæc definitio explicat Euclidean, & vicissim illa declarat hanc.

ΕπιΦανεία.) Post punctum & lineam sequitur superficies, quæ duplici intervallo distat longitudine, & latitudine: caret verò crassitudine: atq; eam ob causam addidit particulam $\mu\acute{o}\nu\omicron\nu$.

ΕπιΦανίαι δὲ.) sicut corpus solidum clauditur, & terminatur superficie, sic & superficies linea finitur, & linea puncto, quod quidē est omnium magnitudinū communis, & simplicissimus, atq; externus terminus.

Επίπεδον & Σφαιρική.) Omnis superficies vel est plana, vel circularis, & spherica. unam igitur geometra delegit, eamq; definit, nempe planam. possunt ei etiam congruere definitiones lineæ rectæ supra posita: in hac autem plana superficie nos tanquam in aliquo subiecto contemplamur figuras, & figurarum affectiones. nam in plana superficie nos ducimus lineas rectas, circulares, & figuras

ras omnis generis : item linearum, circularū,
 & figurarum sectiones, contactus, applicatio-
 nes angulorum, constitutiones, & quicquid
 harum est rerum: sed planam superficiem id-
 circo elegit, quoniā in alijs superficiebus ista
 omnia non possunt ita intelligi aut descri-
 bi, quemadmodum in plana. Vocat itaq; hic
 planum id, quod nobis ante oculos est posi-
 tum, & in quo mente atq; cogitatione omnia
 describimus, & delineamus, atq; firmis ratio-
 nibus confirmamus.

Επίπεδον & γωνία.) Genus definitionis est
 κλίσις, inclinatio: locus autem in quo descri-
 bitur angulus, est τὸ ἐπίπεδον, planum ip-
 sum: ortus verò eius est, quòd ad minimum
 duæ debet esse lineæ rectæ: sicuti in solido an-
 gulo lineæ tres: deinde illæ duæ lineæ rectæ
 debent sese mutuo tangere, neq; sitæ esse in di-
 recto, illud enim est τὸ ὀρθόγωνον, quando duæ
 lineæ rectæ ita collocatæ sunt, ut protractis
 istis lineis rectis, & concurrentibus una ex
 duabus fiat lineæ recta.

Ὅτι δὲ.) Enumerat species substantiales anguli rectilinei. definitionibus acuti & obtusi anguli est addendum genus, quod scilicet uterq; sit rectilineus, alter maior recto, alter vero recto minor. Verum non absolute illud est sumendum, quod omnis angulus recto minor sit acutus, quia sunt anguli nonnulli etiā non rectilinei, & tamen non acuti: sicut neq; illud simpliciter sumitur, quod obtusus sit recto maior, & idcirco omnes recto angulo maiores sunt obtusi, quoniam sunt anguli recto maiores, qui non sunt obtusi.

Ἐπὶ αὐτοῖσι.) Rectam super recta constituit in definitione anguli recti, non autem in anguli obtusi aut acuti descriptione: quia angulus rectus est angulorum non rectorum mensura: sicuti equalitas est regula & norma in equalitatis.

ἀλλήλων.) Possunt enim aequales esse, sed si inter se aequales sint, necesse est ut sint recti.

Ἐφεξῆς.) Indicat causam rectitudinis, quia si anguli contigui inter se sunt aequales,
N rectus

rectus erit uterq; illorum equalium angulorum: nam stans illa recta in neutrum inclinatur partem, & idcirco causa est non equalitatis tantum, sed & rectitudinis. Traditur verò hic de angulis, qui sunt in vno eodemq; plano, sicuti & perpendicularis non quælibet hic definitur, sed illa tantum, quæ in vno, eodemq; est plano.

Κύκλος.) Prima simplicissima, atq; perfectissima figura plana est circulus, ut in corporibus solidis sphaera.

Σχῆμα.) quia vno comprehenditur termino. ἀφ' ἐν.) sunt enim infinita in circulo puncta, quorum omnium vnum tantum centri nomen & naturam retinet. Ἐντος.) ad differentiam eius puncti, quod extra circum sumitur, & polus dicitur: omnia enim in vno sunt plano. idcirco etiam statim definitionem illius puncti subiungit, ut sciamus non solum, sed centrum intelligi.

Διάμετρος.) Circulo propriè conuenit: nam ἄξων vel axis est ipsius sphaera, Διὰ γὰρ

vi. $\odot$ verò figurarum quadrilaterarum.

ἡμικύκλιον.) Semicirculum inquit circuli diametro & circumferentia comprehendit propter τμήματα segmenta circulorum, quorum alterum μείζων maius, alterum ἔλαττον minus dicitur.

Ευθύγραμμα.) à figura quæ uno termino ad eam quæ duobus comprehenditur, est progressus: nunc ad alias pergit explicandas: idq; iuxta ordinem numerorū, binarium, & ternarium, & ita deinceps, quamvis ultra quadrilateras figuras, quæ in elementis locum habent, non progreditur specialiter: verum sub uno vocabulo comprehendit: & eas nominat τὰ πολύπλευρα, multi lateras figuras. Omnis igitur figura rectilinea, vel est trilatèra: vel quadrilatera, vel gradatim multilatera: sed non è contra omnis trilatèra, quadrilatera, aut multilatera est rectilinea.

Τριπλευρὸν. Triangulorum duplex est diuisio: una per se manifesta, & cognita sumpta ab ipsis lateribus: altera quæ eam subse-

quitur est propria ab ipsis angulis facta.

Τετραπλόγων.) Præcipua diuisio quadrilaterarum figurarum hæc est : aliæ dicuntur parallelogramma, aliæ nõ parallelogramma: quæ verò parallelogramma dicuntur : aliæ rectangula, & æquilatera sunt, vt τετράγωνον quadratum : aliæ verò horum neutrum habent, vt τὸ ῥόμβος Rhombi speciem habens. nonnulla verò sunt quidem rectangula, sed non æquilatera, vt τὸ ἐμπόμηνιον, parallelogrammon altera parte longius : denique sunt parallelogramma, quæ æquilatera quidem, sed non rectangula sunt, vt est ῥόμβος, Rhombus. Figura verò quadrilatera, quæ non sunt parallelogramma, aut duo tantum habent parallela latera, & sunt τραπέζια, trapezia: aut nulla prorsus parallela latera, & nominantur τετραπλόγων, speciem trapezij habentia. Verum Euclides hanc diuisionem facere non potuit, cum de parallelis lineis aut figuris hisce lineis contentis nulla sit facta mentio: idcirco simpliciore illam facit

facit diuisionem $\pi\epsilon\tau\alpha\pi\lambda\acute{\omicron}\varsigma\omega\nu$.

$\text{Καὶ } \omega\acute{\alpha}\sigma\tau\eta\ \delta\epsilon\theta\alpha\iota$.) Quidam iuxta Peripateticos volunt hanc propositionem esse αἰτημα, petitionem: alij verò & melius ἀξίωμα pronunciatum. Cum nunc paucis absoluimus principia: restant propositiones demonstrabiles. omnis enim scientia vel versatur in principiorum explicatione, quas sine ulla demonstratione adhibita recipit: vel in doctrina propositionum earum, quæ ex ipsis demanant principijs: & per ea demonstrantur: quare & nos illas aggrediamur.

De partibus problematis, atq;
Theorematis.

Propositiones quæ demonstrationem admittunt, suprà duplices constituimus esse: vel enim sunt $\pi\omicron\beta\lambda\acute{\eta}\mu\alpha\tau\alpha$, problemata: in quibus ea, quæ quodammodo nondum existunt comparare, & constituere proponitur: vel $\theta\epsilon\omega\acute{\rho}\eta\mu\alpha\tau\alpha$, theoremata, in quibus id quod iam constitutum est, & in rerum natura existit, cognoscere, & perspicere statuimus. Geo-

metria enim, ut & alia scientia, habet omnes quatuor quaestiones : an sit, quid sit, quale sit, & quare sit : de quibus quidem omnibus sermonem instituit ipsa Geometria, ut apud Euclidem videbimus. Omne verò problema, omneq; theorema, quod suis perfectum, & absolutum est partibus, hac in se habet : πρότασιν, ἔκθεσιν, διόρισμόν, καὶ κατασκευὴν, ἀπόδειξιν, καὶ συμπέρασμα, id est, propositionem, in qua est δεδομένον, datum, & ζητούμενον, quaesitum : deinde explicationem dati : tertio explicationem quaesiti : quarto delineationē : quinto demonstrationem : sexto & postremo conclusionem totius. Nam in propositione quid de re subiecta, vel ipso dato quaeratur, proponitur. perfecta enim propositio, & datum, & quaesitum habet, quamvis nonnullae sint, quae altero careant : postea ἐκθεσις ipsum datum per sese cōsiderat, & ipso quaesito quasi prae-parat & struit viam. διόρισμός seorsim proponit quid de subiecto quaeratur. Delineatio verò solet ea addere, quae ad investigationem

nem quaesiti pertinent : ipsa autem demonstratio adhibitis certis atq; firmis, priusq; concessis & affirmatis rationibus id de subiecto dici, quod proponitur, confirmat. tandem facta ipsa demonstratione, conclusio redit ad ipsam propositionem, eamq; confirmatam, & demonstratam iam esse colligit: solet verò interdum duplex esse, vna specialis in ipsa delineatione, & demonstratione facta : altera generalis, quæ totam confirmationem propositionis datæ colligit vniuersaliter.

Ex his vniuscuiusq; problematis, aut theorematis partib. maximè necessariae sunt istæ tres : Propositio, demonstratio, & conclusio: reliquæ interdum adhibentur, & id vti plurimum, interdum non adhibentur, vti in Arithmeticis fit, & in decimo Euclidis libro.

Πρὸς τῇ δοθείσῃ.) Sunt quædam in Geometria, quæ nobis solent in medio demonstrationis cursu occurrere : qualis etiam in hac propositione est πᾶσις, casus. dicitur autem casus nihil aliud esse, quàm delineationis

transpositio, quæ sit propter diuersas positiones. ab hoc casu quædam propositiones dicuntur Græcis ἀπλῶτα προβλήματα, problemata quæ carēt casu, quando vna tantum est positio, & delineatio, siquidem casus respiciunt ipsam delineationem: quædam verò nominantur πολύπλωτα, problemata multos casus habentia, in quibus aliter atq; aliter fieri possunt delineationes. Hoc itaq; secundum problema multos habet casus, varias etiam delineationes. nam cum punctum detur positione, illa fieri potest varijs modis: vel enim ponitur extra datam lineam rectam, vel in ipsa linea recta, & si in ipsa, aut erit alterū extremorum, aut inter ipsa extrema: & si extra ipsam, aut à latere, ita vt recta protracta à puncto ad datam lineam rectam, angulum faciat, aut è directo. Euclides sumpsit casum difficiliorem, & punctum extra lineam rectam datam à latere eius ponit.

Δοθείσῃ ᾠθείᾳ.) Omne datum vel datur θέσι, positione, uel λόγῳ, ratione, vel μεγέθει, magni-

magnitudine, vel eīdei, specie. positione tantum datur ipsum punctum, linea verò, & reliqua Geometria subiecta omnib' modis. hoc tamen in loco linea recta datur eīdē specie, est enim linea recta & dicitur positione.

Δύο δοθεῖσιν.) In hac propositione lineæ dantur magnitudine: ipsa delineatio multos habet casus, nam aut distāt inter se, ut apud Euclidem, aut in vno puncto coniunguntur, aut sese mutuo secant: aut altera alteram in extremo alterius puncto tantum secat: & vel maior minorem, vel minor maiorem, & quicunq; eiusmodi fieri possunt casus. veruntamen ad omnes huiusmodi casus Euclidis demonstratio se accommodat.

Ἐὰν δύο τρίγωνα.) Prius docuit trianguli constitutionem, quàm ea explicaret, quæ per se triangulis accidunt: præterea duabus propositionibus ostēdit viam & methodum, qua lineæ rectæ faciendæ sit alia recta æqualis. altera quidem non existentem facit per σύνθεσιν, constitutionem, & δέσιν positionem æ-

qualem. altera verò per ἀφαίρεσιν, ablatio-
nē, idq̃, fecit vt latera laterib⁹ posset equalia
proponere. dantur in hac propositione duo,
equalitas laterum duorum, & angulus an-
gulo equalis: idq̃ datum ratione dari dicitur:
queruntur tria, basis basi, triangulus trian-
gulo equalis: reliqui denique anguli reliquis
angulis aequales.

Εκάπρω ἐκείρα.) quia aliàs Theorema
verum non esset, idcirco nō simpliciter inquit
latus lateri equalē, sed alterum alteri. pos-
sent enim duo latera simul iuncta duobus si-
mul iunctis esse equalia: sed non idcirco tri-
angulus esset triangulo equalis.

ὑπὸ τῶν ἴσων.) hoc addidit ne sumere-
mus basin, nam in triangulis duo latera di-
cuntur angulum aliquem comprehendere πε-
ριέχειν, tertium verò ὑπολείπον subtere-
re: nam latera quæ angulis opponuntur ἐ regio-
ne, sunt ὑπολείπονται πλευραὶ, latera subten-
dencia, & interdum βάσεις bases dicuntur,
quòd tanquam fundamento figura ipsa hoc
nitatur latere.

Τρίγωνον.) *Intelligit aream ipsam triangularem, seu spatium ipsum, quod à trianguli lateribus intercipitur.*

Demonstratio tota facta ex his duabus propositionibus, quæ inter se applicata conueniunt: æqualia erunt: & vicissim. Quæ inter se sunt æqualia: si applicentur, conueniēt etiam inter se.

Τῶν ἰσοσκελῶν.) *Theoremata apud Geometras magnam habent varietatem. alia enim sunt ἀπλά, simplicia, in quibus vnum est datum, & vnum quæsitum: quorum & data, & quæsita diuidi & seiungi non possunt. Vt si dicat Euclides, omnis triangulus æquicrurus, habet angulos ad basin æquales. alia composita συνθετα, quæ ex pluribus vel datis, vel quæsitis constant: vt data sint plura, & vnum quæsitum: vel plura quæsita, & vnum datum, vel deniq; plura data, & plura quæsita. composita sunt duplicia: quædam dicuntur συμπεπλεγμένα, quæ possunt in alia*

alia simplicia theoremata diuidi: vt cum dico trianguli, & parallelogramma sub eadem altitudine existentia: eam habent rationem, quam basis ad basin. de vtroq; enim, & triangulo, & parallelogrammo seorsim eadem dici possunt. Quaedam verò ἀσύνθετα, quæ cum sint composita, in simplicia tamen theoremata diuidi non possunt: quale est præcedens theorema quartum. Est & alia diuisio theorematum, de qua alibi. Hoc theorema ex vtraq; parte, dati nempe, & quesiti compositum est, idcirco etiam distinxit quæ data sint & quæ quesita.

Εἰς τριγώνῳ.) In hac propositione duo nobis occurrunt explicanda: primum est ἀναστροφὴ τῶν προτάσεων: alterum ἀπαγωγὴ εἰς τὸ ἀδυνάτου. Est autem ἀναστροφὴ τῶν προτάσεων, quando ex dato alicuius propositionis, fit quesitum: & ex quesito datum. vt triangulus æquicrurus, id est, habens duo equalia latera: etiam angulos ad basin habet
 equa-

aequales, per ἀναστροφὴν conuersionem sic.
 Triangulus qui angulos ad basim habet æ-
 quales, etiam est æquicrurus, id est, duo habet
 æqualia latera: nam propositio quinta hic cō-
 uertitur iam dicto modo. Est etiam alia con-
 uersionis ratio in propositionibus compositis
 obseruata, quæ fit permutatione partium, etsi
 non omnium, tamē aliquarum: ut fit in octa-
 ua propositione: quæ cōuertitur cum quarta.
 Quare notemus hic esse duo genera proposi-
 tionum: vnum est τῶν ἀεὶ ἀληθῶν, quādo
 id quod natura subiectum est, datur: quod uero
 illi per se inest, queritur de eodem: alterum
 τῶν ἀντιστροφῶν, cum è cōtrario σύμπτωσις
 seu accidens quoddam datur: et id, cui hoc ac-
 cidit, in quæstionem adhibetur, ut in his duo-
 bus licet videre propositionibus, quinta, &
 sexta. Proximum est, ut dicamus de ἀνα-
 γωγῇ εἰς τὸ ἀδύνατον, de reductione ad im-
 possibile. sciendum itaq, est, quod omnis de-
 monstratio mathematica, vel sit διὰ τῶν ἀρ-
 χῶν, quæ ab ipsis principijs ad ea, quæ ex his
 dema-

demanant, progreditur: vel Ἰπὶ τὰς δεχὰς,
 dum à re proposita regressus fit ad principia.
 utraq; verò est duplex: illa enim vel ex prin-
 cipijs rem propositam confirmat, vel ex re-
 bus antea affirmatis, & concessis: hæc autem
 vel est ἡλική, & nominatur ἀνάλυσις, cui op-
 ponitur συνθεσις: vel ἀναρκετική, & dicitur
 ἀπαγωγὴ εἰς τὸ ἀδυνάτον. est autem redu-
 ctio ad impossibile, quando in aliquod mani-
 festum absurdum, & impossibile desinimus:
 & cuius contrarium omnes fatentur esse ve-
 rum: eam quoq; faciunt bifariam: vel enim
 nos deducit ad ea, quæ principijs, ipsisq; axio-
 matibus manifestè repugnant, ut si quis sua
 argumentatione eò deueniat, totum esse æ-
 quale parti: vel ad id, quod demonstratis, &
 affirmatis è directo opponitur: sicuti facit in
 demonstratione propositionis octavæ. fit igitur
 reductio ad impossibile, cum id quod qua-
 esito repugnat, accipimus pro vero, & ita pro-
 grediendo tandem in manifestum absurdum
 incidimus: quo deniq; sublato, id confirma-
 mus,

mus, quod ab initio erat propositum, verum
esse. Hæc demonstrandi forma syllogismi v-
ritur hypotheticis, quemadmodum in dire-
ctis demonstrationibus vrimur categoricis.
Hoc in loco Euclides conuersione est usus in
propositionis partibus: deductione verò in ip-
sa delineatione, ac demonstratione.

ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ.) in Geometria, & Arith-
metica, vt plurimum sunt propositiones vni-
uersales affirmatiuæ: verum Euclides hic po-
suit negatiuam, sed omnibus additamentis
ita eam muniuit, & tam certam, atq; indubi-
tata reddidit, vt minimè conuinci possit.
quamuis non magnum in Geometria usum
habeat: tamen præcipuè posita est ad confir-
mandam octauam propositionem.

Τὸ δ' ὀρθόγων.) Angulus hic datur specie
tantum: potest enim omnibus quatuor modis
dari, nempe positione, cum ad certum quod-
dam punctum constituitur: forma deinde, vt
se ponatur esse rectilineus: ratione verò, quan-
do duplum triplumue statuo: deniq; magnitu-
dine,

dine, si dicam eam esse tertiam recti partem.

Πεπεγομένω.) Omnis enim linea recta aut est finita ex utraque parte, aut ex altera tantum finita, et ex altera infinita: aut denique ex utraque parte infinita.

Κάθετον Γεῖον.) κάθετὸν perpendicularis etiam dicitur γινώσκων, & eandem habet naturam cum ea, quae nominatur ἡ πρὸς ὀρθὰς γωνία. est autem duplex: una plana, altera solida: plana perpendicularis est, quando à puncto aliquo ad lineam rectam in eodem plano existentem alia linea recta ducitur, ut anguli contigui sint aequales, quam in hoc loco antea ducere praecipit. solida, quae in Stereometria consideratur, dicitur quando punctum in alio fuerit plano, & non ad rectam, sed ad aliud planum ducitur linea quaedam ad angulos rectos. differant igitur inter se, quia perpendicularis est in eodem plano, & ducitur ad lineam rectam: solida verò non in uno eodemque plano, nec etiam ad rectam, verum ad planum ducitur: denique in solida id consideran-

derandum, quòd ad omnes quæ in eo sunt plano rectas, non ad vnâ tantum, vt plana, debet esse perpendicularis.

Ανδρον.) quæ pro nostro sumitur arbitrio satis longa vel brevis, longior vel breuior, vt visum fuerit necessarium esse ad rei demonstrationem.

Κατὰ ῥηυϕλὺ.) Differunt anguli ἐϕεξῆς, & anguli κατὰ ῥηυϕλὺ, quòd anguli ἐϕεξῆς contigui sunt per lineam, quæ alteram non secat: sed anguli κατὰ ῥηυϕλὺ per lineas duas sese secantes, sic dicti sunt, quod vertex in vno coniungant puncto.

Εκ δὲ τῆς ρυ.) Locus hic expostulat vt aliquid dicamus de corollario. in elementis igitur προτάματα, seu corollaria sunt propositiones, quæ dum aliæ demonstrantur, simul apparent, & manifesta fiunt, nobis etiam querentibus, aut inuestigantibus eas. quale est hoc præsens πρόμα. dum enim proponitur, quod duabus lineis rectis sese secantibus, anguli ad verticem sint inter se æquales, &

O firmis

firmis demonstratur rationib⁹, in ipsa occurrit nobis demonstratio quatuor illos angulos esse aequales quatuor rectis. Itaq^{ue} lucrifecimus per ipsam hanc propositionē, hoc πρόβλημα tripliciter verò diuidūtur: primū enim omne corollarium vel est Geometricum, vel Arithmeticum, vel alterius scientiæ, ut iam dictū, proprium est Geometriæ. In septimo verò Euclidis libro, propositione secunda, est Arithmeticum. deinde quædam corollaria sequuntur ipsa problemata: quædam verò theoremata: nam in hoc loco theorematibus corollarium habemus: verum in libro secundo problematis. tertio alia corollaria sunt demonstrationis directæ, alia vero indirectæ, sicuti hoc præsens porisma natum est ex demonstratione directâ: sed in propositione prima libri tertij facta demonstratione per reductionem ad impossibile, nascitur corollarium. possunt & alia porismatum discrimina tradi, nobis tamen hæc monstrasse satis est.

Εκτος γωνία.) In definitionibus mentionem

nem fecit diuisionis angulorum substācialis : nunc alia est facienda eorum diuifio per accidens. omnis angulus vel est ἐντός, vel ἐκτός. id est, omnis angulus vel est intra ipsam figuram, vel extra eam. deinde anguli quidam sunt ἐφ' ἑξῆς, quidam ἀπ' ἐναντίον, id est, contigui, aut oppositi. in triangulis igitur sic se res habet, quando aliquod trianguli latus extenditur : nascitur angulus qui ad ipsam trianguli substantiam non pertinet, & cum extra figuram existat : nominatur externus. Verum ex illis tribus, qui ad triāgulum pertinent: vnus qui ei est proximus, nominatur contiguus, reliqui vero duo oppositi, respectu eius, qui extra triangulum est.

Πάντη μετὰ λαμβανόμενα.) Est Geometrica phrasis, qua vtimur, dū volumus ostendere, quouis modo sumi vel latera, vel aliquod aliud Geometriae subiectū, aut accidēs per se.

Explicauit Euclides quaecunq; in primis illis elementis poterant dici, de triangulorum constitutione, equalitate, aut inequalitate

eorundem, aut etiam laterum, & angulorū
 nunc pergit de quadrilateris figuris enarra-
 re ea, quæ ad eorum contemplationem ele-
 mentarem pertinet. Cum verò ex lineis æque
 distantibus fiant eiusmodi figura: prius earū
 proprietates docet, & parallelogramma con-
 stituit: postea persequitur doctrinam de figu-
 ris quadrilateris, seu parallelogrammis. ἐστὶ
 autem παραλληλόγραμμον figura quæ cir-
 cumscribitur lineis rectis æquedistantibus,
 atq; oppositis inter se.

Tria itaq; in lineis parallelis sunt consi-
 deranda, quæ eis per se insunt, & ita attribu-
 untur, ut inde cognoscere possimus lineas re-
 ctas esse æquedistantes. Primum est, ut angu-
 li ἐναλλὰς alterni (qui fiunt per lineam re-
 ctam in alias duas rectas incidentem) sint in-
 ter se æquales. Alterum, recta linea inciden-
 te in duas alias rectas, si anguli interni fue-
 rint duobus rectis æquales, tū proposita duæ
 rectæ sunt æquedistantes. Postremum, Recta
 linea secante alias duas rectas, si externus
 angu-

angulus, angulo interno sibi opposito ex eadem parte, fuerit equalis, iterum erunt illæ rectæ equedistantes.

ἢ εἰς τὰς.) Hoc Theorema conuertitur cum ambobus præcedentibus. in demonstratione utitur propositione, quæ inter principia est relata, sed principium non est.

Παύλος τριγώνων.) Ea quæ decima sexta, & decima septima propositione erant omissa, in hac præsentī addit, & quanto minores sint, explicat, nempe tertio, & huius propositionis maxima est utilitas.

Αἱ τὰς ἴσας.) Hæc propositio finit doctrinam linearum equedistantium, & incipit parallelogrammorum traditionem.

Τῶν παραλληλογράμμων.) Postquam constituit parallelogrammon, inuestigat tria quæ parallelogrammis per se insunt. Primum latera opposita esse equalia. Secundum, angulos oppositos esse æquales. Tertium, diametrum per medium ipsam secare figuram. Ita fit, ut à lateribus ab angulis, & ab ipsis
0 3 arcis

areis proprietates inquirat parallelogram-
morum.

Παρά τὴν δοθεῖσαν.) Tria sunt apud Ge-
ometras vocabula: παραβολή, ὑπερβολή,
ἔλλειψις. cum enim figura applicatur ad
lineam rectam, ut neq; excedat, neq; deficiat,
est tum παραβολή applicatio. quando ve-
rò excedit ὑπερβολή, cum deficit ἔλλειψις,
atq; in Conicis figuris maximè consideran-
tur ista.

Ἀπὸ τῆς.) Videtur Euclides voluisse præ-
stantiores figuras rectilineas describere, in
triangulis, eum quem æquilaterum nomina-
mus: in quadrilateris figuris ipsum quadratū.

Ἀναγκάσαι.) Vtitur hoc verbo, quoniā
ab uno latere describitur: συσῆσαι δὲ verò
est, cum ex multis constituitur.

Ἐν τοῖς ὀρθογωνίοις.) In hoc, & sequenti
theoremate vtitur λήμμασι, id est, assum-
ptiuis propositionibus, utpote: Quæ ab æqua-
libus rectis lineis descripta sunt quadrata, il-
la sunt equalia inter se. item equalium qua-
dratorum equalia sunt latera.

In qui-

In quibusdam etiam propositionibus videntur alijs λήμμασι, assumptionibus, quas hic subiungam.

I. Si prima magnitudo fuerit equalis magnitudini secunda, & secunda maior sit tertia: erit etiam prima maior quàm tertia.

II. Si prima magnitudo fuerit maior secunda, & secunda sit equalis tertia: erit etiam prima maior quàm tertia.

III. Si prima magnitudo fuerit maior quàm secunda: et secunda maior sit quàm tertia: erit etiam prima longè maior quàm tertia. Sunt & alia huius generis, de quibus aliàs.

FINIS.

Errata.

Pag. 1. linea 19. rectam, lege recta. pag. 2. 9. τὸν ἐνός, lege τῶν. pag. 4. 12. τῶν πλῶ-
ρων, lege τῶν τετραπλῶρων. pag. 5. 2. quadri-
latera verò, lege quadrilatera verò quas qua-
tuor, multilatera deniq. quas. Reliqua si quæ
sunt, quiuis facile emendare poterit.