Notes du mont Royal

www.notesdumontroyal.com

Cette œuvre est hébergée sur « *Notes du mont Royal* » dans le cadre d'un exposé gratuit sur la littérature.

SOURCE DES IMAGES

Google Livres



EVCLIDIS
ELEMENTORVM LIBRI XV.

Vnà cum Scholijs antiquis.

A' FEDERICO COMMANDINO VRBINATE

NVPER IN LATINVM conuersi, commentarijsque quibusdam illustrati.

PISAVRI, M D LXXII.
Cum Priuilegio Pont. Max.

IACOBVS Chriegher Germ.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

14-18. I. 2

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

GREGORII XIII. PONT. MAX.
PRIVILEGIVM.

OTV PROPRIO &c. Cum, ſicut accepimus, dilectus filius Federicus Commandinus Laicus Vrbinatenſis nonnulla noua opera hactenus non impreſſa, videlicet Euclidis elementorum libros quindecim è greco nuper conuerſos, & Ariſtarchi librum de magnitudinibus & diſtantijs Solis & Lunæ, necnon Pappi Alexandrini mathematicarum collectionũ libros ſex. Heronis Alexandrini ſpiritalium librum. Euclidis opera reliqua. Theodoſii de habitationibus librum, eiuſdem de diebus & noctibus libros duos. Autolyci de ortu & occaſu libros duos. eiuſdem de ſphæra, quæ mouetur, librum, & Archimedis opera omnia, ad publicam & communem omnium ſtudioſorum vtilitatem imprimere ſeu imprimi facere intendat, dubitetque ne eiuſmodi opera poſtmodum ab alijs ſine eius licentia imprimantur, quod in maximum ſuum tenderet præiudicium, Nos propterea eius indemnitati conſulere uolentes, eidem Federico, ne prędicta opera omnia & ſingula uel quolibet ipſorum per ipſum Federicum, ſeu de eius ordine poſtquam per ordinarios locorum, & Inquiſitores hęreticę prauitatis partium illarum examinata fuerint, imprẽmenda, per decem annos, poſt eorundem operum uel cuiuſlibet ipſorum impreſſionem, à quocunque vel quibuſcunque ſine ipſius Federici licentia imprimi, aut ab ipſis uel alijs uendi, ſeu in eorum apothecis uel aliàs uenalia, præter quàm à dicto Federico, uel de eius ordine impreſſa, aut imprimenda teneri poſſint, concedimus & indulgemus. Inhibentes omnibus & ſingulis Chriſti fidelibus tam in Italia, quàm extra eam exiſtentibus, præſertim bibliopolis & librorum impreſſoribus, ſub excommunicationis latæ ſententiæ, in terris uerò Sanctę Ro. Eccleſiæ mediate, uel immediate ſubiectis, etiam quingentorum ducatorum auri Cameræ Apoſtolicę applicandorum, & inſuper ammiſſionis librorum pœnis toties ipſo facto, & abſque alia declaratione incurrendis, quoties contrauentum fuerit. ne intra decem annos prædictos ab impreſſione dictorum, uel cuiuſlibet ipſorum reſpectiue computandos dicta opera, uel quodlibet ipſorum ſine eiuſdem Federici expreſſa licentia dictis decem annis durantibus

imprimere

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

imprimere, ſeu ab ipſis, uel alijs præter, quàm à dicto Federico impreſſa & imprimenda uendere, ſeu uenalia habere, uel proponere, uel ea, ut ſupra, habere audeant. Mandantes uniuerſis uenerabilibus fratribus noſtris Epiſcopis, Archiepiſcopis, eorumq'ue Vicarijs in ſpiritualibus generalibus & in ſtatu temporali Sanctæ Ro. Eccleſiæ etiam Legatis et Vicelegatis Sedis Apoſtolicæ, aut ipſius ſtatus Gubernatoribus, ut quoties pro ipſius Federici parte fuerint requiſiti, vel eorum aliquis fuerit requiſitus, eidem Federico efficacis defenſionis præſidio adſiſtentes, præmiſſa ad omnem dicti Federici requiſitionē contra inobedientes & rebelles per cenſuras Eccleſiaſticas, etiam ſæpius aggrauando, & per alia iuris remedia, auctoritate Apoſtolica exequantur, inuocato etiam ad hoc, ſi opus fuerit, auxilio brachij ſecularis. Et inſuper quia difficile admodum eſſet præſentes ad quodlibet forum deferri, volumus & Apoſtolica auctoritate decernimus ipſarum tranſumptis uel exemplis in ipſis operibus impreſſis plenam & eandem prorſus fidem ubique tam in iudicio, quàm extra haberi, quæ præſenti originali haberetur. Et cum abſolutione à cenſuris ad effectum præſentium. et quod ſola ſignatura ſufficiat, præmiſſis omnibus conſtitutionibus & ordinationibus Apoſtolicis, ceteriſque in contrarium facientibus non obſtantibus quibuſcunque.

Placet V.

Datum Romæ apud Sanctum Marcum Non. Septembr. Anno primo.

ILLVSTRISSIMO ATQVE EXCELLENTISSIMO FRANCISCO MARIAE II VRBINATVM PRINCIPI.

VM mihi in mentem venit Illustrissime Princeps quanta mathematicę facultatis olim apud veteres illos felicioris certe seculi, atque ingenij homines, & celebritas, & dignitas fuerit; non possum non vehementer dolere temporũ nostrorũ conditionem, qua nobilis disciplinę cultus, & splendor squalore immenso, ac tenebris penitus contabescit, dum vnusquisque detestanda auri cupiditate quicquid certam in se lucri non habet occasionem, statim insolenter abijcit, temereq́ue aspernatur. Exulat iam, publiciſq́ue ferè exclusum est gymnasijs nobile hoc, & pulcherrimum matheseos studium, quo nihil iucundius, ac magis domesticum vniuersa quondam habuit graecia. Non est sanè quòd his temporibus vereare, ne triangulis, tetragoniſq́ue, aut circulis depictas porticus intueri, aut de huiusmodi rebus loquentes audire cogaris. Iacet omnino, iacet hoc disciplinae genus, et quod in delitijs olim habebatur, nunc quasi rude, & obscurũ passim reijcitur, vsq; adeo auaritia, caecaq; diuitiarum libido apud nostrae aetatis homines increbuit. minuitur tamen in dies hic dolor meus, tum quòd ab externis magnae doctrinae uiris hae artes amanter excitatas, scio diligentissime promoueri: tũ quòd aliquot imperio, ac dignitate florentes iã hęc studia benigne complecti, liberaliterq́; fouere uideo: uerum enim illud esse quouis tempore homines sunt experti, qualia fuerint eorum, qui summae rerum praesunt, eadem & reliquorũ fore studia. quam ob rem si non ad pristinum dignitatis fastigium, ad honestiorem certe gradũ eas breui peruenturas minime despero. idq́; eu praesertim ratione, quòd te Princeps Illustrissime, eximia mentis probitate, singulariq́; ornatum prudentia, preclaros omnes animi tui conatus ad compensanda literarum incommoda iam diu conuertisse laetus intueor. neque id iniuria profecto. nam vt illustria, & nunquam interitura memorię exempla tuae gentis omittam, Patrem habes incomparabilis iustitiae, magnanimitatis, & prudentię Ducem, qui artes ingenuas benignitate fouet, auctoritate defendit, & prẽmijs ornat. huic te similẽ, ac parem vt praestes necesse est. Age vero quanti est illud ad confirmandã, augendamque indies per egregium hanc voluntatẽm, quòd non solum

literas diligis, verùm etiam quo semper fuisti mentis acumine, tantos in illis progressus facis, ut omnes qui te noscunt, admiratione, ac gaudio afficiantur incredibili. Vt enim de me dicam, quoties summam ingenij tui præstantiam, atque solertiam in percipiendis Euclidis elementis magna cum voluptate sum admiratus? Hoc tu honestissimo, nec vnquam satis laudato bonarum artium studio inflammatus nuper vertendi, explanandiq'ue Euclidis onus mihi iniunxisti, quòd geometrarum omnium facile principem, tu Princeps optime iniquo patiebare animo, nec recte multis in locis conuersum, nec scite figuris ornatum fuisse. præterea vero typographorum ita corruptum negligentia, vt non sine maxima studiosorum offensione legi, nedum intelligi posset. Ego vero prouinciam hanc tot difficultatibus impeditam alacri animo suscepi, tum vt optime tuę voluntatis mandato, quod semper obnixe studui, obtemperarem; tum etiam, vt pro ueteri meo instituto amatores huius disciplinæ quacunque liceret ratione iuuarem. haud enim multis abhinc annis medicinæ, cui me totum dederam, salutem plurimam dixi, vt his me tantum oblectarer studijs, & in eorum cognitione parum de alijs solicitus, conquiescerem; veterumq'ue præstantissima in hoc genere scripta, pro ingenij tenuitate à situ, ac tenebris uindicarem; & meis illustrata commentarijs in lucem, & omnium conspectum non sine aliqua studiosorum gratia proferrem. quod partim iam sumus assecuti, partim summis uigilijs diu, noctuq'ue contendimus. Archimedis enim, Ptolemæi, Apollonij, Sereniq'ue excellentium virorum opera nonnulla superioribus annis conuersa à nobis, & explicata quàm accuratissime emisimus. Hoc autem tempore multum laboris, ac diligentiæ in Pappo, Herone, Theodosio, Autolyco, Aristarcho, & alijs, quorum magna pars nec græce, nec latinæ habetur, ponebamus, cum tuo iussu his depositis studium, operam, laborem, & curam denique omnem ad unum Euclidem conuertimus, ut rem à multis tentatam, Deo iuuante ad finem perduceremus. Nam ut pauca de hac re loquar, Orontius quidem Phinæus haud obscuri nominis auctor priores tantum sex libros nulla græci codicis ratione habita edidit. Iacobi uero Peletarij in eadē re labor eo etiā minus probatur, quòd Cāpani leditionem ex arabica conuersam lingua, magis, quàm græcam sequi uouerit. Alij autem peracuti sanè ingenij homines ἀναλύσεις geometricas in priores sex libros conscripserunt, cetera tamen non sunt prosecuti. At Candalla uir & generis nobilitate, & rerum cognitione insignis, licet omnes Elementorum libros, qui postulari à latinis uidebātur, latinos fecerit, locupletaueritq'ue, parum tamen (vt audio) eo nomine commenda-

tur,

tur, quod longius iter ab Euclide auerterit; & demonſtrationes, quę in græcis codicibus habentur, uelut inelegantes, & mancas ſuis appoſitis reiecerit. An uero, quod ab omnibus requiri dicimus, noſtra opera præſtiterimus, aliorum erit iudicium. Illud quidem uere affirmare poſſumus, nullam à nobis nec impẽſę, nec laboris, nec ualetudinis habitam fuiſſe rationẽm, ut hoc geometriæ columen, ac decus non ſolum expurgatum à mẽdis, & figuris eleganter excultum haberent ſtudioſi, uerum etiam ſumma fide conuerſum, & ſcholijs antiquis, commentarijsq́ue quibuſdam noſtris illuſtratũ. Hoc igitur qualecumq́ue eſt meę induſtriæ teſtimoniũ, nunc tibi magnanime Princeps, cui plurimum debeo, & cupio omnia, dono, dicoq́ue, ut quibus poſſum officijs meam in te fidem, perpetuamq́ue obſeruantiam, non modo noſtrę ætatis hominibus declarem, ſed ipſi etiã poſteritati teſtatam literarum monumentis relinquam. & quod ſemper uehementiſſime conatus ſum, uere perſuadeam, neminem te habere, qui præſtantem animi tui uirtutem, egregiamq́ue doctrinam memoria ſempiterna apud omnes propagare magis ſtuduerit, ac ſemper ſit ueneratus. Vale, & nos, liberalesq́ue diſciplinas, quod facis, tuere, & adiuua.

Federicus Commandinus.

QVOD plerique interpretum, atque eorum præsertim, qui maxime laudantur, facere solent, vt antequam euoluendi clarorum virorum monumenta, ac scripta, quę sibi pro reipublicæ literariæ commodo explicanda, exornandaq; sumpsere, initium faciant, quædam primo loco differant: idem & mihi huius tam præclari operis initio faciendum putaui. neque enim dubium est, quin rudis adhuc lectoris animus de re vniuersa à principio admonitus, maiori postea cum labore, ac breuiori tempore conformetur ad vnũquodque intelligendum. Primum igitur non nulla summatim de hac tam nobili mathematicarum artium facultate dicemus, quæ nam subiecta illis materia sit, tum generatim, tum particulatim, quis ordo, ac dignitatis gradus, quae sit earumdem diffinitio, quis ortus. Deinde vero miram ipsarum ad humanos vsus opportunitatem paucis ad modum enarrabimus. Post de Auctore, videlicet de Euclide ipso, de operis inscriptione, de scopo, ac de ipsius demonstrationibus, deq; eorum, quæ in his libris complexus est, dispositione, & methodo quædam minime inutilia attingemus. Denique summam vniuersæ τοιχειώσεως eo consilio adiungemus, vt non solum facilius quicquid de hoc genere præcipit Euclides intelligatur, verum etiam vt fidelius memoriæ mandatum custodiatur. Itaque philosophiam omnem, quæ in contemplatione versatur, vitæ clarissimi philosophorum in tres partes distributam nobis ea ducti ratione tradiderunt, quòd rerum aliæ prorsus materiei quasi labe, ac vel omnino sola per se subsistunt, atque intelliguntur: aliæ vero diuersam penitus materiam ab his sortitæ, sic materiæ immiscentur, vt nullo pacto absque illa possint consistere: aliæ denique medium inter has naturæ, ac dignitatis locum obtinent; tum quòd omni vacant materia, si accuratiori studio veram illarum conditionem inspexeris, tum quòd materia præditæ quodam modo videantur, quia sine aliqua eius adiunctione ob ingenij nostri imbecillitatem cognosci nequeunt. Hinc triplex illud philosophiæ genus, Diuinum, quod quidem vt nomine, ita & re duo reliqua supra quam dici potest, antecellit; Naturale, quod tertium est, ac postremas ordine, ac dignitate habet partes; & medium, quod mathematicum appellatur: quoniam solum vere disci, ac sciri potest, ob summam rei subiectæ constantiam, & certam demonstrandi rationem: Hoc quidem vt diuinis substantijs inferius est (quid enim tam eximium, vt cum illis comparetur?) ita naturalibus præstat, atque superius est; quæ materiæ funditus immersa, variam, & mutabilem eius sequuntur naturam. Hoc primum ab ijs inuentum est hominibus, qui ante orbis terrarum eluuiem cum feliciori fruerentur & cælo, & ingenio, sapientiam rerum cœlestium, admirabilemq; mundi ornatum animaduerterunt; ac duabus columnis erectis, quarum altera quidem lapidea, altera vero lateritia, quæ inuenerãt, diligentissime inscripserunt, ne aut aquarum inundatione, aut incendio, quorum alterum euenturum prædictione veterum nouerant, tantarum rerum notitia dilaberetur. quare nec primis illis temporibus, quæ tam inculta creduntur, nobile matheseos studiũ incultum iacuit. Hoc post terrarum eluuionem apud chaldæos summo præsertim Abrahami diuini propè hominis studio ornatum, & auctum viguit. Idem Aegyptij homines cum ob perpetuam cæli serenitatem, tum ob magnam locorum planitiem ad hoc genus scientiæ nati à Chaldæis acceptum summopere excoluerunt. Ab Agyptijs ad græcos, quibus nec ingenij acumine, nec sciendi cupiditate quemquem merito anteposueris, translatum est, Thaletis Milesij, Pytagoræ Samij, aliorumq; excellentium hominum industria, quos scientiæ amor & vastamaria trãsire, & longinquas peragrare regiones coegit, & præcipue Aegyptum, vbi, si græcis credimus, natæ & altæ sunt mathematicæ disciplinæ. quas postea & exercitatione, & scriptis illustrarunt Anaxagoras, Oenopides, Zenodotus, Brito, Antipho, Hippocrates, Theodorus, Plato, Theætetus, Architas, Euclides, Aristarcus, Archimedes, aliiq; immunerabiles, qui hac eximia, præstantiq; matheseos disciplina mortales propè cunctos in sui admirationem conuerterunt. Verum de his hactenus, neque enim historiam hic contexere propositum est. sed hæc pauca attigimus, vt antiquam huius studij nobilitatem obiter quasi digito ostenderemus. Nunc de materia & præcipuis Mathematicæ facultatis partibus

tibus, illarumq; ordine breuiter dicatur. Mathematicę omnes circa quantitatem versantur, atque illius præsidio quicquid moliuntur efficiunt. hinc facile est cognoscere, quot, & quæ sint huius disciplinę partes. Quis enim ignorat quantitatem aliam esse continuam, aliam vero discretam? & harum vtramque bifariam diuidi, quòd continua sit mutabilis, et immutabilis. discreta vero per se & ad aliquid, ita ut quadruplex quoque sit matheseos genus. scientia igitur, quæ magnitudines, et figuras continuas, non mobiles contemplatur, Geometrię sibi nomen vindicat. & est scientia quantitatis continuæ, atque immobilis positione. quæ vero mobilem, & continuam contemplatur quantitatem Astronomia dicitur. & est cognitio quantitatis continuæ semper mobilis, & eorum, quæ illius motu accidũt. Eodem modo quantitatem discretam Arithmetica obtinet, quæ numerum aut parem, aut imparem non ad alium comparando, sed per se considerat. estq; scientia discretę quantitatis, ac per se cognitæ. Musica circa mutuam sonorum uersatur habitudinem, ex quibus harmonia efficitur, ob discretam quidem, sed tamen alia ratione coniunctam quantitatem: & est discretæ quantitatis inuicem comparatæ atque ad aliquid cognitio. sed antequã ceteras matheseos species enumeremus, explicanda nobis est ratio, & modus aperiendus, quo mathematicis quantitatem & continuam, & discretam pro subiecto, eruditorum auctoritate substerni dicimus: neque enim de quoto, quod in sensilibus ipsis est, nec de quanto, quod circa corpora excogitatur, est absolute intelligendum; physici enim potius, quàm mathematici finibus continetur hęc contemplatio. Eorum igitur quæ naturali corpori insunt, nec ab eo separãtur, alia quidem nec re, nec cogitatione remoueri queunt, ut calor frigus, siccitas, quòd illa qua naturale est corpus, obtineat, alia vero etiam si re ipsa disiungi minime queant, animi tamen cogitatione fingimus abesse, eò quòd per accidens, non aũt per se, nec quatenus natura præditum est corpus, hęc habeat, qualia sunt rectũ, ciruũ, inflexũ, ceteraq; id genus. Mathematicus igitur hoc pacto ἐκ τῆς ἀφαιρέσεως circa quantitatem, formasq; à materia separabiles uersatur: & earum diffinitiones tradit, materiam non attingens. Quid est linea? μῆκος ἀπλατὲς, longitudo latitudinis expers. quid est triangulum? figura, quæ tribus rectis lineis contmetur. & circulus figura, quæ ab vna comprehenditur linea. nulla hic materiæ mentio est, nullum eius vestigium ob allatam modo rationem. nemo tamen suspicetur mathematicas aliquo errore labi, quòd ita infirmo, ac debilis nitantur subiecto, quòd sola cogitatione conceptum possidetur. nam imaginatione quidem Geometra tamquam abaco vtitur, magnitudines diuidendo, interualla dimetiendo, & lineas describendo. hæc tamen omnia, non vt figmenta quędam, sed vti res quasdam, quę non nullam habent cum natura connexionem, nec mera somnia dici possunt; nec illarum imaginatione aliquo contaminantur mendacio mathematicæ disciplinæ. quæ vt subiectę materiei conditione à Diuinis distant, sic illas constanti, certaq; rationum demonstratione longe antecellunt. Sed recensemus iam reliquas mathematicæ species. Altera igitur facta diuisione dicimus mathematicam facultatẽ, aut in intellectilibus dũtaxat aut in sensilibus versari; intellectilia vtrique appellantes, quascunque inspectiones anima ipsa per se ipsam excitat, à materialibus sese vindicans formis. atque huius sanè generis duas principes, longeq; præstantes ponimus species, Arithmeticam & Geometriam. Eius vero generis, quod in sensilibus officium, atque opus exercet suum, sex fieri solent partes. Mechanica, Astrologia, Optica, Geodesia, Canonica, vel Musica, & supputatrix. Geometria rursus diuiditur in planorum, & solidorum contemplationem, quæ stereometria appellatur. si quidem circa puncta, & lineas peculiaris quædam non est tractatio, quoniam neq; figura in his vlla sine planis, vel solidis fieri posset. Geometria enim nihil aliud vbique agit, nisi vt plana, & solida vel constituat, vel iam constituta inter se comparet, aut diuidat. Arithmetica similiter diuiditur in numerorum linearium, & planorum, & solidorum contemplationem; etenim species numeri per se considerat ab vnitate procedentes, ortusq; planorum numerorum, tum similium, tum dissimilium; & ad tertiam vsque auctionem progressus. Geodesia, & supputatrix congruenter his non de intellectilibus numeris, vel figuris, sed de sensilibus tractant. non enim ad Geodesiam attinet cylindrum, vel conum metiri, sed aceruos, vt conos metitur, & puteos vt cylindros, neque id rectis lineis intellectilibus, sed sensilibus efficit, interdum quidem certioribus quodammodo, vt radijs solaribus, interdum vero crassioribus, vt spartis, & perpendiculo. neque supputator ipsas per se serum numerorum passiones considerat, sed vt sunt in sensilibus inuoluti. Rursus Optica, & Canonica à Geometria, & Arithmetica ortum habent. nam Optica quidem radijs visorijs tamquam lineis vtitur & angulis, qui ex his constant. diuiditur autem in tres partes,

in

in Opticam, quę generis nomen obtinuit, catoptricam, & ſcenographicam. Optica reddit cauſas eo rum, quæ aliter quàm ſint, ſeſe nobis offerunt, ob alios, atque alios rerum viſarum ſitus, ac diſtantias. Catoptrica circa varias, multipliceſq; verſatur reflexiones, & coniecturali cognitioni implicatur. Scenographrica oſtendit, quo pacto ea, quæ apparent in imaginibus, non inconcinna videantur, vel deformia, iuxta diſtantias, atque altitudines eorum, quæ deſignantur. non igitur veram æqualitatem, & concinnitatem imitandam præcipit, ſed eam, quæ aſpectum noſtrum concinne, & appoſite feriat, ita vt cum circuli repręſentandi ſint, interdum non circuli, ſed ellipſes deſcribantur, & quadrata altera parte longiora fiant. Canonica, vel Muſica apparentes harmoniarum conſiderat proportiones, regularũ ſectiones adinueniẽs, et ſenſus vbique vtens adminiculo. Mechanica circa res ſenſiles, ac materiæ coniũctas verſatur, dum aut bellica parat inſtrumenta, qualia Archimedes excogitauit, cum Marcellus Syracuſas graui premeret obſidione: aut admirabilia quædam ſummo cum artificio conſtruit ſpiritu, ponderibus, & ſpartis, qualia Cteſibius, Hero, & Archimedes non ſine maximo ſtupore ſuorum temporum hominibus ſpectanda propoſuerunt. Quis enim non admiretur, vt alia omittam vitreum illum Archimedis orbem? atque vel hac vna re mathematicas facultates, quæ talia præſtare poſſint, non ſummopere venereturꝰ Percurrit propriũ mentitus ſignifer annum, Et ſimulata nouo cynthia menſe redit. ita ut eleganter exclamet Iuppiter apud Claudianum. Huccine mortalis progreſſa potentia curæ. Iam meus in fragili luditur arte labor. Quid quod aiũt Architam hac in re tantum potuiſſe, ut columbam ligneam in aere uolantẽ, quaſi anima præditam, ac ſeſe ſuſtentantẽ fecerit. Aſtrologia de mundanis ediſſerit motibus, de cœleſtium corporum magnitudine figura, atque illuminandi ui, nec non de eorundem à nobis diſtantia. Huius partes ſunt Gnomonica, Meteoroſcopica, Dioptrica. Gnomonica circa horarum dimenſionem per gnomonum poſitiones uerſatur, de quibus Ptolemæus in libro, qui de Analemmate inſcribitur, diffuſe pertractat. Meteoroſcopica eleuationum differentias, & diſtantias ſyderum exquirit, atque alia multa, & uaria, quę ad Aſtrologiam attinent theoremata docet. Dioptrica diſtantias ſolis, & lunæ, aliorumq; aſtrorum, per eiuſmodi inſtrumenta inueſtigat. Ceterum de his hactenus ſummatim dixiſſe ſatis ſit. Sed quoniam plerique his præſertim temporibus ſola utilitate ad optimarum artium ſtudia excitantur, liberaleſq; colunt diſciplinas, uideamus obſecro, an mathematicæ nullius ſint commodi ad iuuandos humanæ uitę uſus, uti cęca quorundam turpiſſimi lucri cupiditas falſa iam prædicatione diuulgauit, ita ut qui hanc amplectuntur facultatem ab imperitis, uel a ſtudio occupatis hominibus palàm derideantur, tamquam in re inutili, atque uana oleum, & operem perdant. Agamus igitur pingui, quod aiunt, Minerua, quando nobis negocium eſt cum ijs, qui ſola quæſtus ratione perſuaderi poſſunt, & inuramus hanc notam ingenuæ, ac nobili diſciplinæ, ut iucrum, & diuitias pollicendo huiuſmodi hominum ſibi ſtudia, & gratiam comparet. Negent iſti primum, ſi poſſunt, mathematicas artes popularem utilitatem nullam habere, ſi mercatura cuius exercitatione tam multi diſtinentur ob magnam quæſtus occaſionem, ſine arithmetica tractari poteſt. Experiantur deinde ſiquid dimetiri queunt abſque Geodeſiæ adiumento. ſulcent maria, & longinquas petant regiones, nouum perquirant orbem nullo aſtrologiæ nauticæ fulti præſidio. Quid medicus? quantum uel unius Hipocratis iudicio debet Aſtronomiæ, cuius ductu ſyderum curſus & lunæ præſertim cognoſcit. Vnde uniuerſa dierum, quos criticos uocant, dependet ratio, quam diligenter cauendum eſt, ne grauiori aliqua curatione uexet ęgrotantem, dum luna, idq; præcipue morbi initio, à combuſtione, ut nunc loquuntur, ad oppoſitionis gradum proficiſcitur? Quantum denique commodi, atque utilitatis affert Geometria, Arithmetica, & relique omnes in publicos, & priuatos uſus? cum nulla uel infimarum artium, ut finem conſequatur, matheſeos ope non egeat. quod ſingulas accuratius intuenti facile patet; & à nobis nullo negocio probaretur, niſi longam de re certa uitaremus diſputationem. colore, umbra, ſitu, raritate, ac denſitate mediorum, & refractione, quã uarios ornatus, admirabileſq; rerum figuras quotidie cernimus? & magna cum uoluptate ſpectando decipimur? ſed erramus, ſola enim vtilitate cum illis agendum eſt. quare omiſſis opticis, & pictoribus mera afferantur commoda. Quónam pacto igitur diffiteri poſſunt, quin mathematicæ ad uniuerſam ciuitatum utilitatum mirabiliter ualeant, tum actionum tempora dimetiendo, tum uarias uniuerſi reuolutiones demonſtrãdo? Ars uero militaris, quę politices dextra manus eſt, qua ratione uolens, quæ numeroſa eſt, pauciſſimam oſtendere multitudinem, caſtra, aciesu̇e ad figuram circuli; ubi uero copias oſtentare cupit, ad figuram quadranguli format, niſi mus Geometriæ auxilio? Quomodo aut hoſtiũ vrbes oppugnat, & capit, aut proprias tuetur, niſi

ipſius

ipſius Mechanices adiumento, quæ admirabiles ad oppugnandum, aut reſiſtendum fabricatur machinas, vti Archimedes aduerſus Marcellum, qui (nam Cteſibios, Architas, Priſcos, Eudoxos, Diogenetos miſſos facio) cum hanc adeo miram artem aliquando apud Hieronem prædicaret, Rex Geometram admiratus rogauit, vt tantæ fiduciæ periculum faceret. Quare Archimedes emptam è regijs nauibus vnam, & in ſiccum eductam, grauiusq; oneratam ſolus machinis ſuis ad ſe pertraxit, non ſecus ac ſi in mari remis, ac uelis agitaretur. contra poſtea Alexandriam regis eiuſdem nauim è littore in Mare deduxit, quod omnes ſiciliæ vires non potuerunt. Hac igitur arte qui inſtructi ſint, vrbis mœnia tueri, & hoſtium oppugnationes eludere queunt. & habuiſſet tanto impetu res cæpta fortunam (ait Liuius, cum de Marcello Syracuſas oppugnante loquitur) niſi vnus homo Syracuſis ea tempeſtate fuiſſet. Archimedes is erat, vnicus ſpectator cœli, Syderumq;, mirabilior tamen inuentor, ac machinator bellicorum tormentorum, operumq;, è quibus ea quæ hoſtes ingenti mole agerent, ipſe perleui momento ludificaret. libuit tam inſigne illuſtris hiſtorici de Archimede teſtimonium afferre, vt huius exemplo, quantum vtilitatis, ac commodi ſibi ac patriæ homines comparare poſſint, intelligant, ſi nobilem Matheſeos facultatem diligenti cura, ſtudioq; excoluerint. ceterum diſſimulare nequeo, me multo grauius perturbari quorundam philoſophorū, (vt ſibi videntur) impudenti audacia (Cur enim grauius non ferā mathematicas ab ijs calumniari, quorū eſſet minus eas colere, ac tueri, quàm ab hominibus, quos mala diuitiarū cupiditas arctiſſimis deuinctos laqueis tenet) Sed aduerſus hoc philoſophorum genus nihil aliud dicā nūc, quòd ſciā Ariſtippos iſtos, & Epicureos, vt vere, & eleganter eos nominat Petrus Ramus vir multę eruditionis, potius dolore quodā, ſtudioq; ſitam tegendi ignorantiam talia dicere, quàm quòd reuera putēt matheſeos cognitionem nihil vtilitatis, nihil adiumenti afferre ad omnes liberalium artium diſciplinas, præſertimq; ad Platonis Ariſtoteliſq; monumenta, quos hoc doctrinæ genere plurimū delectatos fuiſſe planè conſtat. Qui enim hoc putent, cum multa quotidie neceſſaria imprimis, ſcituq; pulcherrima apud hos inueniant, quę quoniam mathematico more tradita ſunt, quaſi ſcopulos quoſdam euitare coguntur. Hinc Timæum non attingunt tāquā fabuloſum, & nullius pretij librū. Hinc ſeptimum phyſicæ auſcultationis librum, multaq; alia Ariſtotelea ſuis diſcipulis, quòd, vt aiūt, inutilia ſint, explanare grauantur. ſed plura fortaſſe dicta ſunt de hac re, quàm oportuit. nam vera matheſeos vtilitas, eximij fructus, incredibileſq; voluptates in ſola veritatis cognitione, ad quam nati ſumus, poſitæ ſunt. hac vna nos vere homines, uereq; diuini luminis participes oſtendimus. cetera terrenam & fragilem præſeferunt conditionem. Age vero accedamus ad ea, quæ ad Geometram noſtrum ſpectant. Et primum de ipſo Euclide; deinde de inſcriptione, et ſcopo dicamus. poſtremo de illius demonſtrationibus, quemadmodum à principio promiſeramus. Liberemus igitur, multos ab eo errore, quo perſuaſi credunt Euclidem noſtrum eundem eſſe & philoſophum megarenſem, & geometram, totamq; hanc rem breuiter explanemus. Fuit ſenior Euclides ex Megaris oppido, quod iſthmo adiacet, Parmenidis librorum in primis ſtudioſus, ac megaricæ ſectæ princeps, ad quem mortuo Socrate Plato ac plerique omnes ſocratici, triginta tyrannorum metu cōfugerūt. Hic dialogos ſex conſcripſit, quos enumerat Laertius. vſus eſt probationibus non ijs, quę per aſſumptiones, ſed quę per concluſiones fiunt, ac magis dialecticę ſunt. ſucceſſorem habuit Eubulidem. Iunior autem Euclides qui στοιχειώτης ac geometra, dictus eſt, tempore Primi Ptolemæi floruit, academiam diligenter coluit, & quotidiana ferè Platonis diſcipulorum conſuetudine egregie eruditus, Matheſim, quæ in Academia præceptoris inſtituto tunc maxime vigebat, ita præclaro animi impetu eſt aggreſſus, vt progreſſus admirabiles, ac ſempiterna æui memoria dignissimos in ea fecerit; conſtantiq; omnium doctorum teſtimonio principem locum ſibi vendicarit. nemo autem mihi ignotum eſſe arbitretur, Valerium Maximum ſcribere Platonem ſacræ aræ conductores ad Euclidem, tamquam ad primarium mathematicum reiecciſſe. ſed nos Heronem, & Proclum matheſeos ſtudio inſignes ſequimur, vel potius Eudemum ac Theophraſtum ex peripateticis poſt præceptorem nobiliſſimos. hi namque hoc tradiderunt memoriæ in ijs libris, quos de hiſtoria geometrica conſcriptos magno cum dolore, ac literatorum incommodo periſſe non ignoramus. Euclides igitur noſter poſt Hippocratem, Leontem, Theudium, & Hermotimum, qui geometrica elementa, alius poſt aliū conſcripſerant, opus hoc vere aureū, ſummo cum labore, præſtantiq; mentis iudicio contexuit. Multa quidē inuenerant ſuperiores illi homines excellenti quodā, ac propè diuino ingenij acumine, non pauca addiderant Theætetus atque Eudoxus, qui cum Platone verſati ſunt. Itaque Euclides

diſperſa

diſperſa collegit, collecta diſpoſuit, & quæ pinguius, neg ligentiuſq; demonſtrata fuerant, ipſe ad ab ſolutas, ἀνελέκτους q; demonſtrationes redegit. magna profecto laus ſupcriorũ, multo tamen maior Euclidis, qui indigeſta eo compoſuit ordine, vt vel hac vna re perpetuam ſibi apud ſanę mentis homines laudem compararit. inchoata ita abſoluit, incerta ita firmiſſimis rationibus certiſſima effecit, vt nihil amplius propè in eo deſideretur. Iam duo ferè annorum millia abierunt, ex quo Euclides inter viuos cõnumeratus eſt. multos habuit aduerſarios, qui inuidiæ potius morbo, quàm veritatis amore illius ſcripta omni ſtudio labefactare ſunt conati; nullam tamẽ adhuc in illis ψευδολογίαν, nullum errorem, nullum paralogiſmum ſeueri inquiſitores deprehendere potuerunt. Cetera vero præſtantiſſimi huius viri monumenta hęc habentur. Optica, Catoptrica, Muſica, Data, phænomena, ſcripſit etiam librum de diuiſionibus, conicorum libros quattuor, poriſmatum tres, vt ex Proclo, Pappoq; conſtat, qui quidem ad manus noſtras non peruenerunt. Atque hæc ſunt, quæ inuenire potuimus de Euclide noſtro, cuius immortali beneficio Matheſis, quæ græcũ mare ex Aegypto tranſgreſſa iam ducentos annos, ac paulo plures Græciam incoluerat, ſuam dignitatem, ſuoſq; honores non ſine deorum voluntate eſt conſecuta. Nunc quæ ſtudioſorum mentes haud leuiter perturbat opinio de elementorum demonſtrationibus, paucis referatur. quamuis enim hæc diſceptatio nullam futuro geometræ afferat vtilitatem, maxime tamen ſolicitos habet, neſcio quo pacto huius diſciplinæ amatores; quippe quòd ſcire percupiant, cui nam tantum beneficij, atque adeo ſingulare munus acceptum referant. Inter ceteros igitur, qui hac de re diſputarunt, Ioannes Buteo, & Petrus Ramus acerrimi iudicij homines in contrarias prorſus abiere ſententias. hic enim in ſuo Matheſeos proœmio non ſolum demonſtrationes Theoni, (quod etiam alij dixerunt) aſcribendas putat, verum etiã ipſa elementa, tum quia στοιχειώτης vltimus fuerit, nullius q; propoſitionis inuentio inter Euclidis laudes à Proclo referatur, tum etiam quia Theon ipſe ſuas editiones in elementa nominatim laudarit in primo commentario ſuper Ptolemæi magnam conſtructionem, ita vt elementa ſibi eo iure vindicare poſſit Theon, quo antea Euclides. Idipſum ea quoq; probat ratione, quòd Euclidis demonſtrationes, quæ in Procli commentarijs leguntur, minime cum ijs conueniant, quas in elementis habemus. Ille autem (de Buteone loquor) in ſuis annotationibus in Euclidem hoc diſcere negat; veteremq; præclariſſimi hominis laudem tuetur; quoniam apud antiquos numquam ſine demõſtratione theoremata proferãtur; vt quæ nullã, ſi nuda fuerint, habeant vtilitatẽ, ac dignitatẽ; quodq; vero ſimile ſit, verba illa ἐκ τῶν θεωνος συνουσιῶν, ex quibus omnis effluxit diſputãdi occaſio, ita poſſint intelligi, vt dicamus, Theonem conſcripſiſſe quidem commentarios in elementa, ſed illos temporum calamitate periiſſe, quemadmodum & quæ in eundem Pappus Alexandrinus ſcripſerat, conſeruato tamen titulo, qui poſtea Euclidi ipſi negligentur adiectus eſt. Nos autem medium ſecuti credimus libros de elementis ſuis ornatos demonſtrationibus ab Euclide nobis fuiſſe relictos. qui enim de hoc dubitare poſſumus, cum Proclus in commentarijs in X. propoſitionem, poſt recitatam Apollonij pergæi demonſtrationem hęc verba ſubiungat? πολλῷ δὴ οὖν κρείττων ἡ τοῦ στοιχειώδους ἀποδείξις hoc eſt lõge igitur melior eſt ſtichiotę (ita enim Euclidem appellat) demonſtratio, & ſimplicior, magiſq; ex principijs. vt autem hoc vere aſſerimus, ita illud meritò concedemus, Theonem excellentis ingenij virum Euclidis demonſtrationes fuſius, planiuſq; explicatas in lucẽ protuiſſe: quod apud Proclum obſeruari poteſt. Sic data nõ eo prorſus habentur modo, quo apud Pappum in ſeptimo mathematicarum collectionum libro. nec optica, catoprica, quæ nos vidimus Romę in vaticana bibliotheca. Quamobrem ſi hæc omnium conſenſu Euclidi concedimus, etiam elementa concedenda ſunt, præſertim cum verbis potius, quàm re ipſa Theon ab eo diſcrepet in demonſtrandi ratione. ſunt igitur illę quidem demonſtrationes Euclidis, ſed eo modo conſcriptæ, quo olim Theon Euclidem ſecutus ſuis diſcipulis explicauit. Non inutile autem, nec inuiſum illud legentibus fore crediderim, ſi Platonis, Xenocratis, nec non Euclidis noſtri inſignes huic diſputationi ſententias, tamquam coronidem addidero. poterunt enim Geometriæ candidatis eſſe loco orationis copioſæ, atque elegantis. Plato igitur vt neceſſariam prorſus facultatis huius cognitionem futuro philoſopho palam oſtenderet, verba hęc pro foribus gymnaſij poſuit. ἀγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω. nemo rudis Geometrię huc pedem inferat. Xenocrates vero, qui poſt præceptorem tertius in academia docuit, cuidam Mathematum, ac Geometrię ignaro gymnaſium ingredienti, Abi, inquit, λαβὰς γὰρ οὐκ ἔχεις φιλοσοφίας. anſas enim philoſophiæ non habes. Quid vero de noſtro Geometra habemus dicere? Hic Ptolemæo Regi primo interroganti,

an alia

an alia facilior, atque commodior eſſet, diſcendæ Geometriæ methodus, ac ratio. Nulla, inquit, ὁ Rex eſt via regia, quæ ducat ad Geometriam. Quàm conſtantem igitur animi diligentiam, alacremq́, diſcendi voluntatem iuuenes ad hæc ſtudia afferre oporteat, non ſolum Geometriæ, quæ per ſe nobiliſſima eſt, ſed & totius philoſophiæ cauſſa, nos tantorum virorum teſtimonijs declaraſſe ſit ſatis. Dicamus iã de operis inſcriptione, ſimulq́, de Auctoris propoſito. Nã quoties illa ab operis argumento deſumpta eſt, explicatione vnius, & alterum fermè cognoſcitur. Proclus meo quidem iudicio, videtur legiſſe Ευκλείδου ſοιχείωσις. qui vero ex Theonis ſententia hoc opus nobis exortum reliquit. Ευκλείδου ſοιχείων βιβ. ιε. Idem tamen vtraque ſignificat, ſiue illa ſit Elementaris inſtitutio, ſiue elementorum libri XV. Dixi autem non Theonem, quod multi credunt, ſed illius familiarem quendam, virum planè eruditum, quicũque ille fuerit, Euclidem nobis, eo, quo nunc habetur, modo legendum cõceſſiſſe, verborum illorum ἐκ τῶν θέωνος συνουσιῶν permotus teſtimonio, nam & Ioannes cognomento Philoponus, quos in Ariſtotelem commentarios ipſe compoſuit, ſe ex Hamonij Hermeæ colloquijs, ac diſputationibus collegiſſe, ingenue prorſus grati animi exemplo profeſſus eſt. Haud tamen neganerim Theonis auditorẽ, cum nomẽ ſuum ſuppreſſerit, voluiſſe nos totum hunc laboris, ac induſtriæ fructum Theoni dũtaxat acceptum referre. At enim quæret fortaſſe aliquis, nec iniuria profecto, cur Auctor hoc nomen elementum, aut elementare, quod de multis dicitur, ſolum protulerit. cum enim & de literarum principijs, & de rebus naturalibus, aliiſq́, dici ſoleat, adiungendum erat omnino, cuiusnam rei illa eſſent elementa, elementorum ve inſtitutio, vt à latinis poſtea factum eſt, qui Geometricorum addiderunt. Nos ita dubitanti, hoc ea omiſſum diceremus ratione, quia ſtatim idipſum ex primis verbis de puncti notione cognoſcitur, aut Hamonium ſecuti, qui Porphyrianam inſcriptionem ab eadem culpa defendit, affirmaremus hanc inſcriptionem κατ' ἐξοχὴν, ac quandam Geometriæ excellentiam; & ſi ex nomine, quod multis commune eſt, factum ſit, de Geometricis tantum elementis intelligi poſſe. ſic Poetam dicentes de Homero, aut Virgilio intelligimus; frequens enim ac percelebre erat tunc Geometriæ ſtudium. Elementa vero hic dicuntur de Theorematibus, quæ principij rationem habent. Theorematum enim (vt proclus ſcribit) alia quidem elementa appellare conſueuerunt, alia elementaria, alia vero extra horum vim determinantur. Elementa igitur dicuntur, quorum contemplatio ad aliorum pertinet ſcientiam, & ex quibus apparet ſolutio eorum, quæ in ipſis dubitare contingit. Vt enim vocis literatæ ſunt principia prima, & ſimplicia, & indiuiſibilia, quibus elementorum nomen imponimus: & omnis dictio, oratioq́, ex his conſtat, ſic & totius Geometriæ ſunt quædam Theoremata principalia, & rationem habentia principij ad ea, quæ ſequuntur, perq́, omnia peruadentia, & multorum accidentium præbentia demonſtrationes, quæ elementa appellant. Elementaria vero dicuntur, quæcunque ad plura pertinent & ſimplicẽ quandam ſuauitatem habent, non tamen eam, quæ eſt elementorum; propterea quòd eorum contemplatio non ſit communis omni ſcientiæ. Quæcunque demum cognitionem non habent ad plura pertinentem, neque ſcitum aliquod, aut elegans demonſtrant, hæc extra elementarium vim cadunt. Rurſus elementum dupliciter dicitur, vt ait Menæchmus. illud enim, quod cõfirmat, eius quod confirmatur elementum eſt, vt primum ſecundi apud Euclidem, & quartũ quinti; ſic & alia multa inter ſeſe elementa eſſe dicentur, quippe cum alterum ex altero confirmetur. nam ex eo, quòd extrinſeci rectilineorum anguli quattuor rectis ſunt æquales, intrinſecorum recto æqualium multitudo, & contra ex hoc illud oſtenditur. eſtq́, huiuſmodi elementum lemmati aſſimile. Aliter præterea dicitur elementum, in quod, cum ſit magis ſimplex, compoſitum reſoluitur. Ita vero non omne rurſus elementum dicetur, ſed quę principaliſſima ſunt eorum, quæ in rei effectæ ratione ſunt cõſtituta, quemadmodum Petitiones, & Dignitates Theorematum ſunt elementa. iuxta hoc elementi ſignificatum & ab Euclide elementa conſtructa ſunt, alia quidem illius Geometriæ, quę circa plana verſatur; alia vero eius, quæ circa ſolida. ſic & in Arithmeticis, & in Aſtronomicis elementa res inſtitutiones multi conſcripſerũt. Propoſitũ igitur fuit Euclidi in his libris tradere elemẽta ad vniuersã Geometriã neceſſaria, hoc eſt principaliſſima, ſimpliciſſimaq́, ac primis principijs maxime affinia theoremata, ſine quibus reliquæ huius ſciẽtię partes cõprehẽdi nõ pũt. Euclides. n. ipſe in aliis libris Ariſtarchus, Archimedes, Apollonius, Theodoſius, Autolycus, Menelaus, Ptolemæus, Pappus, Serenus, et reliqui ad eorum demonſtrationes his tamquam notiſſimis vbique vtuntur. Quod vero ad diſpoſitionẽ, ac methodum Geometricorũ ſermonũ attinet, ſciendum eſt (vt inquit

Proclus) Geometriam, quemadmodum, & alias ſcientias certa quędam, & definita principia habere, ex quibus ea, quę ſequuntur, demonſtrat. quare neceſſe eſt ſeorſum quidem de principijs, ſeorſum vero de ijs, quæ à principijs fluuut pertractare. & principiorum nullam reddere rationem, quæ autem principia conſequuntur, rationibus confirmare. nulla enim ſcientia ſua demonſtrat principia, verum circa ea per ſeſe ſibi fidem facit, cum magis euidentia ſint, quàm quæ ex ipſis deriuãtur: & illa quidem per ſeſe, hæc vero deinceps per illa cognoſcit. Ita & naturalis philoſophus à determinato principio rationes producit, motum eſſe ponens; ita & medicus, & aliarum ſcientiarum, atq; artium peritus. Quòd ſi quis principia cum ijs, quæ à principijs fluunt, in idem commiſceat, is totam pertũrbat cognitionem: eaq; conglutinat, quæ nullo pacto inter ſe conueniunt. Primum igitur principia, deinde ea, quę conſequuntur, ſunt diſtinguenda. quod ſanè Euclides in vnoquoque ſuorum librorum obſeruauit; quippe qui ante omnem tractationem communia huius ſcientię principia exponit: et ipſa in ſuppoſitiones, ſeu diffinitiones, poſtulata, et axiomata diuidit. differũt nãque hæc omnia inter ſe, nec idem eſt axioma, & poſtulatum, & ſuppoſitio, vt Ariſtoteles aſſerit. Cum enim is, qui audit propoſitionem aliquam, ſtatim ſine doctore vt veram admittit, eiue certeſſimam fidem adhibet, hoc Axioma appellatur, vt quæ eidem æqualia, & inter ſe æqualia ſunt. Cum vero audiens dicente aliquo, eius, quod dicitur, notionem non habuerit, quæ per ſe ſe fidem faciat; verum tamen ſupponit, & eo vtenti aſſentitur, ea ſuppoſitio eſt, verbi gratia, circulum eiuſmodi eſſe figuram, communi quadam notione non percepimus, ſed audientes abſque vlla demonſtratione approbamus. Cum autem rurſus & ignotum ſit addiſcenti, quod dicitur, & tamen eo aſſentiente aſſumatur, tunc id poſtulatum appellamus, vt omnes rectos angulos æquales eſſe. Quæ autẽ à principijs enaſcũtur, ea ſunt vel Problemata, vel Theoremata. Problema illud eſt, in quo quippiam, cum primum non ſit proponitur inueniendum, ac conſtruendum. Theorema autẽ in quo quippiam in conſtituta iam figura ita eſſe uel non eſſe demonſtratur. In hac igitur elementari inſtitutione Euclidem quis non ſummopere admiretur propter ordinem, & electionem eorum, quæ per elementa diſtribuit, theorematũ, atque problematũ? non enim oĩa aſſumpſit, quæ poterat dicere, ſed ea duntaxat, quæ elementari tradere potuit ordine. adhuc autem varios ſyllogiſmorũ modos vſurpauit, alios quidem à cauſis fidem accipientes, alios vero à ſignis profectos, omnes neceſſarios & certos, atque ad ſcientiam accõmodatos. omnes præterea dialecticas vias, ac rationes; diuidentem in formarum inuentionibus; diffinientem in eſſentialibus rationibus; demonſtrãtem vero in progreſſibus, qui à principijs ad quæſita fiunt. denique reſoluentem in ijs, qui à quæſitis ad principia fiunt regreſſibus. Quin etiam varias conuerſionum ſpecies tum ſimplicium, tum compoſitarum in hac tractatione intueri licet. & quę tota totis conuerti poſſint, quæ vero tota partibus, & contra, & quę vt partes partibus. Poſtremo admirabilem omnium diſpoſitionem, antecedentiũq; & conſequentiũ ordinẽ, ac cohærentiã, vt nihil prorſus addi, aut detrahi poſſe videatur.

In primo igitur libro tractat de rectilineis figuris, videlicet de triangulis, ac parallelogrammis. Et primum triangulorum ortus, proprietateſq; tradit, tum iuxta angulos, tum iuxta latera; ipſa inter ſe ſe comparans. Deinde parallelarum proprietates interijciens ad parallelogramma tranſit, eorumq; ortum declarat, & ſymptomata, quę in ipſis ſunt, demonſtrat. poſtea triangulorum, parallelogrammorumq; communicationem oſtendit, & quo nam pacto parallelogrammum fiat æquale triangulo. Denique de ijs, quę in triãgulis rectangulis à lateribus deſcribuntur, quadratis, quam habeat proportionem quòd à ſubtendente rectum angulum deſcribitur ad ea, quæ comprehendentibus ipſum fiunt.

In ſecundo libro parallelogrammum rectangulum, & gnomon definitur. deinde parallelogrammorum rectangulorum, & quadratorum, quę ex rectarum linearum ſectionibus fiunt, proportiones declarantur. poſtea de quadratis, quæ à lateribus obtuſiangulorum, & acutiangulorum triangulorum deſcribuntur, quam habeant proportionem, quæ à ſubtendentibus obtuſum & acutum angulum fiunt ad ea, quę à comprehendentibus deſcribuntur. Denique qua ratione dato rectilineo æquale quadratum conſtituatur.

In tertio libro agitur de ijs, quæ circulis accidunt, & de rectis lineis in circulo, vel ad circulum ductis, itemq; de angulis, qui ad circulorum centra, vel ad circumferentias conſiſtunt.

In quarto libro de figurarum planarum inſcriptionibus & circumſcriptionibus.

In quinto de Analogijs.

In ſexto de proportionibus figurarum inter ſeſe, de figuris ſimilibus, & reciprocis. de rectis lineis proportionalibus, de parallelorum applicationibus ad rectas lineas, quę vel deficiant parallelogrammis ſimilibus, vel excedant. quomodo recta linea terminata extrema, ac media ratione ſecetur, de proportionibus circumferentiarum & angulorum, itemq; ſectorũ in circulis æqualibus.

Septimus, Octauus, & Nonus ad Arithmeticam pertinent.

In ſeptimo agitur de numeris primis, & compoſitis; & quo pacto numerorum non primorum maxima communis menſura inueniatur. de numerorum parte, et partibus. de numeris multiplicibus, de proportionalibus, & quæcunque in quinto libro de magnitudinibus generatim, eadem ferè & de numeris particulatim hic demonſtrantur.

In octauo de numeris deinceps proportionalibus, de numeris planis, de quadratis, de cubis, & ſolidis. de ſimilibus planis, & ſimilibus ſolidis.

In nono item de ſimilibus planis, de cubis, & ſolidis, & de numeris deinceps proportionalibus. ſiue ab vnitate, ſiue ſimpliciter, de numeris primis, de numeris paribus, de imparibus, de pariter paribus, de pariter imparibus, de pariter paribus & pariter imparibus. de numeris perfectis.

In decimo de commenſurabilibus, & incommenſurabilibus magnitudinibus, itẽq; de rationalibus & irrationalibus.

Vndecimus, duodecimus, & reliqui ad ſtereometriam ſpectant, hoc eſt ad ſolidorum corporum contemplationem.

Et in vndecimo quidem primum agitur de rectis lineis quatenus ad ſolida corpora referũtur, vt̃ delicet quando ſint in vno plano, quando rectæ, ſeu perpendiculares ad planum, quando parallelę, quomodo à puncto in ſublimi dato ad planum perpendiculares ducantur. Deinde vero de planis ſimul deſſerit, tũ de ſolidis angulis, poſtremo de ſolidis parallelepipedis, & nõnulla de priſmatibus.

In duodecimo de pyramidibus, et priſmatibus; poſtea de conis et cylindris, demum de ſphęris.

In tertiodecimo de conſtitutione quinque figurarum mundanarum, quas corpora regularia appellãt; videlicet tetraedri vel pyramidis; hexaedri vel cubi; octaedri, dodecaedri, et icoſaedri, ad quorum euidentiam præmittit nonnulla de ijs, quæ accidunt rectæ lineæ extrema, ac media ratione ſectæ, de pentagono æquilatero, de hexagoni, & decagoni lateribus, & de triangulo æquilatero.

In quartodecimo de dodecaedri, & icoſaedri in eadem ſphęra deſcriptorum comparatione.

In quintodecimo & vltimo de inſcriptione quinque figurarum iam dictarum, & de earundẽ lateribus, & angulis.

FINIS.

* * *

INDEX EORVM, QVAE IN HIS LIBRIS demonſtrantur præter ea, quę Euclidis ſunt.

IN PRIMO LIBRO.

IRCVLI diameter biſariam circulum ſecat. 3.b

In data recta linea triangulum æquicrure, & ſcalenum conſtituere. 8

Si ad aliquam rectam lineam duæ rectæ lineę non ad eaſdem partes ſumptæ angulos ad verticem æquales fecerint, ipſæ rectæ lineæ in directum ſibi inuicem erunt. 14.b

Si alteram parallelarum ſecuerit recta quędam linea, reliquam quoque ſecabit. 19.b

Rectæ lineæ, quę à minoribus, quàm ſint duo recti, in infinitũ producuntur, inter ſe conueniunt. 20

Omnis rectilinea figura, angulos, qui extra cõſtituuntur, quatuor rectis æquales habet. 21

Omne quadrilaterum, quod latera ex oppoſito, & angulos æqualia habet, parallelogrãmũ eſt. 22

Omne quadrilaterum, quod ab vtriſque diametris biſariam ſecatur, parallelogrammum eſt. 24

Si trianguli parallelogrammum duplum fuerit, eandemq; baſim, aut æquales habuerint, & fuerint ad eaſdem partes: in eiſdem etiam parallelis erunt. 25

Si trianguli parallelogrammum duplum fuerit, in eiſdemq; ambo fuerint parallelis; aut in vna eademq; baſi, aut in æqualibus erunt. 25

Quomodo ad datam rectam lineam, dato rectilineo æquale parallelogrammum applicari poſſit in dato angulo rectilineo. 26.b

Quadrata ab æqualibus rectis lineis deſcripta, etiam inter ſe ęqualia ſunt. 27

Quadrata ęqualia ab ęqualibus rectis lineis deſcripta ſunt.

Ex duabus rectis lineis, quæ duabus datis æquales ſint, & in dato angulo rectilineo parallelogrãmum conſtituere. 27.b

IN SECVNDO LIBRO.

SI fuerint duæ rectæ lineæ, quæ ſecentur in quotcunque partes, rectangulum duabus rectis lineis contentum eſt æquale rectangulis, quæ vnaquaque parte vnius ad vnamquamque partem alterius applicata continentur. 29.b

Si fuerint duæ rectę lineæ, quæ vtcunque ſecentur, rectangulum totis contẽtum vnà cum eo, quod continetur duabus partibus ipſarum eſt ęquale rectangulis, quæ continentur totis, & dictis partibus vnà cum eo, quod reliquis partibus continetur.

Arithmeticę analogię demonſtratio. Theorema autem eſt.

Quadratũ, qđ fit ab exceſſu vnà cũ eo, quod extremis cõtinetur, quadrato medij æquale eſſe. 31.b

Si recta linea in partes inæquales ſecetur, earũ partiũ quadrata æqualia ſunt rectãgulo, quod bis dictis partibus continetur, vnà cum quadrato eius lineę, qua maior pars ſuperat minorem. 32

Propoſitio IX aliter demonſtratur. 33

Propoſitio X aliter demonſtratur. 33.b

Cuiuſlibet trianguli obtuſum angulum habentis, aream dimetiri. 34

Propoſitionis XIII conuerſa. 35

Cuiuſlibet trianguli, ſiue acutianguli, ſiue rectanguli, ſiue obtuſianguli, quod nota latera habeat, aream inuenire. 35.b

IN TERTIO LIBRO.

COnuerſum diffinitionis circuli. ſi in ambitũ figuræ ab aliquo puncto eorum, quę ſunt intra, incidant æquales rectę lineę, ea circulus eſt. 37.b.38

Propoſitionis VII conuerſa. 39.b

Si in circumferentia circuli aliquod punctum ſumatur, ab eoq; in circulũ ducãtur rectę lineę; quæ per centrum tranſit, omnium erit maxima, aliarum vero quæ trãſeũti per cẽtrũ propinquiores ſunt, remotioribus erunt maiores, duæ aũt tantum æquales ſunt ad vtraſque partes maximę. 40

Propoſitionis XIX. conuerſa 43.b

Spacium

Spacium quod eſt ad centrum duplum eſt anguli, qui ad circumferẽtiã, quando circumferentiã eãdem pro baſi habuerint. 44

Propoſitio XXI aliter demonſtratur

In eadem recta linea neutra ex parte ſimiles & inæquales circulorum portiones conſtitui poſſunt. 44.b

In eadem recta linea, vel in ęqualibus rectis lineis ęquales circulorum portiones ſimiles ſunt. 45

Si ęquales rectæ lineæ æquales, & ſimiles circumferentias auferant, circuli æquales erunt, quorum illæ ſunt circumferentiæ. 46.b.47

In circulis inæqualibus ęquales rectæ lineæ diſſimiles circumferentias auferunt. 47

In circulis inęqualibus ſimiles circumferentias inæquales rectæ lineæ ſubtendunt.

Similes & inæquales circumferentias inęquales rectæ lineæ ſubtendunt.

Si à puncto extra circulum ſumpto ducantur in circulum quotcunque rectæ lineę ipſum ſecantes, rectangula, quæ totis, & earum portionibus extrinſecis continentur, inter ſe ęqualia ſunt. 50

A puncto extra circulum ſumpto ductę duę rectæ lineæ circulum contingentes, inter ſe æquales ſunt.

IN QVARTO LIBRO.

IN dato circulo rectam lineam rectæ lineæ datæ, quæ diametro maior non ſit, ęqualem, & alteri datę parallelam aptare.

IN QVINTO LIBRO.

SI prima ad ſecundam eandem habeat proportionem, quam tertia ad quartam, tertia autem, ad quartam minorem proportionem habeat quàm quinta ad ſextam, & prima ad ſecundam minorem proportionem habebit, quàm quinta ad ſextam. 64.b

Si prima ad ſecundam maiorem habeat proportionem, quàm tertia ad quartã, tertia autẽ ad quartam maiorem habeat, quàm quinta ad ſextam, & prima ad ſecundam maiorem proportionem habebit, quàm quinta ad ſextam. 64.b

Si prima ad ſecundam eandem proportionem habeat, quam tertia ad quartam ſitq; prima maior quàm ſecunda; & tertia quàm quarta maior erit, et ſi æqualis, æqualis, & ſi minor, minor. 65.b

Si tres magnitudines fuerint proportionales, maxima ipſarum & minima quàm dupla reliquæ maiores erunt. 68.b

Si prima ad ſecundam maiorem habeat proportionem, quàm tertia ad quartam, & conuertendo ſecunda ad primam minorem proportionem habebit, quàm quarta ad tertiam. 69

Si prima ad ſecundam maiorem proportionem habeat, quàm tertia ad quartam, & permutando prima ad tertiam maiorem habebit proportionem, quàm ſecunda ad quartam. 69

Si prima ad ſecundam maiorem proportionem habeat, quàm tertia ad quartam, etiam componendo prima, & ſecunda ad ſecundam maiorem proportionem habebit, quàm tertia, & quarta ad quartam. 69.b

Si prima, & ſecunda ad ſecundam maiorem habeat proportionẽ, quàm tertia, & quarta ad quartam, & diuidendo prima ad ſecundam maiorem proportionem habebit, quàm tertia ad quartã.

Si prima, & ſecunda ad ſecundam maiorem proportionem habeat, quàm tertia & quarta ad quartam, per conuerſionem rationis prima & ſecunda ad primam minorem habebit proportionem, quàm tertia, & quarta ad tertiam. 70

Si prima ad tertiam maiorem proportionem habeat, quàm ſecunda ad quartam, etiã prima ad tertiam habebit maiorem proportionem, quàm prima & ſecunda ad tertiam & quartam.

Si tota ad totam maiorem habeat proportionem, quàm ablata ad ablatam, & reliqua ad reliquã maiorem proportionem habebit, quàm tota ad totam

Si ſint tres magnitudines, & aliæ ipſis numero æquales, habeatq; prima priorum ad ſecundam maiorem proportionem, quàm prima poſteriorum ad ſecundã, ſecunda verò priorũ ad tertiã maiorem proportionẽ habeat, quã ſecunda poſteriorum ad tertiam; etiam ex æquali prima priorum ad tertiam maiorem habebit proportionem, quàm prima poſteriorum ad tertiam. 70.b

IN SEXTO LIBRO.

TRiangula & parallelogramma in æqualibus baſibus conſtituta, eãdem inter ſe proportionem habent, quam eorum altitudines. 72. b
Propoſitio VI. aliter demonſtratur. 74. b
Datam rectam lineam in datam proportionem ſecare. 75. b
In dato triangulo quadratum deſcribere. 76
Tribus datis rectis lineis AB. BC. & D. Inuenire vt AB ad BC, ita aliam quandam ad ipſam D. 76. b
Si rectilinea æqualia, & ſimilia ſint, homologa ipſorum latera inter ſe æqualia erunt. 81
Triangula, quę vnum angulum vni angulo æqualem habent, proportionem habere ex lateribus compoſitam. 81. b
Quomodo ex duabus datis proportionibus, vel etiam pluribus proportio componatur.
Proportio data ex data proportione maiori quo pacto auferatur.
Quomodo in numeris proportiones & componantur, & auferantur.
Triangula, quorum vnus angulus vni angulo eſt æqualis inter ſe proportionem habent eandem, quam rectangula, quæ lateribus æqualem angulum comprehendentibus continentur.
Parallelogramma æquiangula inter ſe proportionem habere eandem, quam rectangula, quę ipſorum lateribus continentur. 82
Triangula, & parallelogramma inter ſe proportionem habent compoſitam ex proportione baſiũ, & proportione altitudinum.
Propoſitio XXVII aliter explicatur. 84
Duorum rectilineorum inæqualium exceſſum, quo maius ſuperat minus inuenire. 84. b
Theorema Pappi, quod multo vniuerſalius eſt, quàm XXXI Euclidis.

IN SEPTIMO LIBRO.

EXpoſitis duobus numeris inter ſe primis, ſi de maiori ſemper minor detrahatur, non ceſſabit huiuſmodi detractio antequam ad vnitatem deuentum fuerit. 90.
Expoſitis duobus numeris inter ſe compoſitis, ſi de maiori ſemper detrahatur minor, detractio ad vnitatem vſque non perueniet.
Duobus numeris expoſitis, comperire an inter ſe primi ſint, an compoſiti.
Si numerus plures numeros metiatur, & communem eorum menſuram metiri. 91.
Si numerus numeri multiplex fuerit, et alter alterius æque multiplex; & vterque vtriuſque æque multiplex erit, atque vnus vnius. 91. b
Si fuerint quotcunque numeri quotcunque numerorum æqualium multitudine ſinguli ſingulorum æque multiplices; quotuplex eſt vnus vnius, totuplices erunt & omnes omnium.
Si quotcunque numeri minores ad totidem alios maiores referãtur, ſintq; ſinguli ſingulorum, vel eadem pars, vel eadem partes; quæ pars, vel partes eſt vnus vnius, eadem pars, vel eædem partes erunt & omnes omnium. 92
Si numerus numeri æque multiplex fuerit, atque ablatus ablati; & reliquus reliqui æque multiplex erit, atque totus totius.
Quę eidem eadem ſunt numerorum proportiones, & inter ſe eædem erunt. 93. b
Si quattuor numeri proportionales ſint, & conuertendo proportionales erunt. 94. b
Si quattuor numeri proportionales ſint, & componendo proportionales erunt.
Si quattuor numeri proportionales ſint, & dividendo proportionales erunt.
Si quattuor numeri proportionales ſint, & per conuerſionem rationis proportionales erunt.
Si primus ad ſecundum eandem habeat proportionem, quam tertius ad quartum; habeat autem & quintus ad ſecundum proportionem eandem, quam ſextus ad quartum: & compoſitus primus, & quintus ad ſecundum eandem proportionem habebit, quã tertius & ſextus ad quartũ.
Si numerus aliquis plures numeros multiplicans fecerit totidem alios, facti eandem, quam multiplicati proportionem habebunt. 95. b

Si

Si plures numeri numerum aliquem multiplicantes fecerint totidem alios, facti eandem, quam multiplicantes proportionem habebunt. 95.b

Numeris quotcunque datis deinceps proportionalibus, inuenire duos minimos, qui eandem, quam ipſi proportionem habeant. 99.b

IN OCTAVO LIBRO.

Plani numeri, qui proportionem habent, quam quadratus numerus ad quadratum numerum, inter ſe ſimiles ſunt. 109

Solidi numeri, qui proportionem habent, quam numerus cubus ad numerum cubum, inter ſe ſimiles ſunt. 109.b

IN NONO LIBRO.

Si cubus numerus numerum non cubum multiplicans faciat aliquem, factus non erit cubus. 111

Si cubus numerus numerum aliquem multiplicans faciat numerum non cubum, & multiplicatus non erit cubus.

Si duobus numeris propoſitis, eorum alter in quotlibet numeros diuidatur, numerus planus, qui fit ex duobus numeris ab initio propoſitis, æqualis erit numeris planis, qui ex numero indiuiſo, & ſingulis partibus numeri diuiſi fiunt. 114

Si numerus in duos numeros diuidatur, duo numeri plani, qui fiunt ex toto, & vtraque parte inter ſe compoſiti æquales ſunt numero quadrato, qui à toto efficitur.

Si numerus in duos numeros diuidatur, planus numerus, qui ex toto, & vna parte fit, æqualis eſt plano, qui fit ex partibus vnà cum eo quadrato, qui à prædicta parte efficitur. 115

Si numerus diuidatur in duos numeros, qui à toto fit quadratus æqualis eſt quadratis, qui à partibus fiunt, & ei, qui bis ex dictis partibus fit numero plano.

Si par numerus bifariã diuidatur, diuidatur autem & in numeros inæquales; qui ex inæqualibus partibus fit numerus planus, vnà cum quadrato numeri interiecti, æqualis eſt ei, qui ex dimidio fit quadrato.

Si par numerus bifariam diuidatur, adijciatúr, ipſi numerus aliquis; qui fit ex toto cum adiecto, & adiecto planus numerus vnà cum quadrato dimidij eſt æqualis quadrato eius, qui ex dimidio & adiecto conſtat. 115.b

Si numerus in duos numeros diuidatur, qui à toto fit quadratus vnà cum quadrato vnius partis æqualis eſt numero plano, qui bis fit ex toto, et dicta parte vnà cũ reliquæ partis quadrato. 116

Si numerus in duos numeros diuidatur, qui quater ex toto, et vna parte fit numerus planus vnà cũ quadrato reliquæ partis æqualis eſt quadrato, qui à toto, et dicta parte tamquam ab vno efficitur. 116

Si par numerus bifariam diuidatur, diuidatur autem & in numeros inæquales; quadrati, qui ab inæqualibus numeri fiunt, dupli ſunt eius quadrati, qui fit à dimidio vnà cum quadrato numeri interiecti.

Si par numerus bifariam diuidatur, adijciatúr, ipſi alter numerus, qui fit ex toto cum adiecto, & qui ex adiecto vtrique quadrati, dupli ſunt quadrati ex dimidio, & quadrati qui ex dimidio et adiecto tamquam ex vno efficitur. 116.b

Illud autem, quod vndecimæ ſecundi libri reſpondet, nempe numerum ita diuidere, vt qui ex toto & altera parte ſit numerus planus, æqualis ſit ei, qui à reliqua parte fit quadrato, nullo modo fieri poteſt.

IN DECIMO LIBRO.

Propoſitis duabus magnitudinibus commenſurabilibus, quàm inter ſe proportionem habeant in numeris inuenire. 126.b

Duobus datis numeris, & recta linea, facere vt numerus ad numerum ita quadratum rectæ lineæ ad alterius rectæ lineæ quadratum. 130.b

Duos numeros planos diſſimiles inuenire. 131

Magnitudines, quæ incõmenſurabilibus ſunt cõmẽſurabiles, & inter ſe incõmenſurabiles erũt. 132

Datis

Duabus datis rectis lineis inæqualibus inuenire id, quo maior plus poteſt, quam minor. 132
Datis duabus rectis lineis, quæ ipſas poteſt, quo pacto inueniatur.
Si tota magnitudo ex duabus magnitudinibus compoſita vni componentium ſit incommenſurabilis & reliquæ incommenſurabilis erit. 133
Si ad aliquam rectam lineam applicetur parallelogrammum deficiens figura quadrata, parallelogrammum applicatum æquale eſt ei rectangulo, quod partibus rectæ lineæ ex applicatione factis continetur. 133.b
Si duæ rectæ lineæ inæquales ſint, quarta autem pars quadrati, quod à minori fit, ad maiorem applicetur, deficiens figura quadrata; quod applicatum eſt per bipartitam ſectionem non tranſit.
Duabus datis rectis lineis inæqualibus, quartam partem quadrati minoris ad maiorem applicare, ita vt deficiat figura quadrata.
Datam rectam lineam ita ſecare, vt rectangulum, quod partibus continetur ſit æquale dato rectilineo. oportet autem datũ rectilineum minus eſſe quadrato, quod à dimidia deſcribitur. 134.b
Datum numerum in duas partes ita diuidere, vt qui ex ipſis producitur dato numero ſit æqualis. oportet autem datum numerum, cui æqualis eſſe debet, quadrato dimidij minorem eſſe.
Rationales magnitudines commenſurabiles eſſe: 135.b
Inuenire duas rationales potentia commenſurabiles.
Rationali commenſurabile & ipſum rationale eſſe. 136
Quod duabus datis rectis lineis rationalibus continetur rectangulum datum erit. 136
Si ad datã rectã lineã rationalem applicetur ſpaciũ datũ, & latitudo quã facit, data erit. 136.b
Quæ ex duabus rationalibus longitudine commenſurabilibus rectis lineis componitur recta linea data erit. 137.b
Duarum datarum rationalium, quæ inæquales ſint, & longitudine commenſurabiles differentia data erit. 138
Inuenire duas rationales potentia ſolum commenſurabiles. 138.b
Recta linea, quæ poteſt irrationale ſpacium, irrationalis eſt. 138.b
Media eſt irrationalis, quæ poteſt ſpacium contentum rationalibus potentia ſolum commenſurabilibus. 139
Mediam, quæ vna eſt irrationalium in geometrica analogia conſiderari.
Si ſint duæ rectæ lineæ, erit vt prima ad ſecundam, ita quadratum, quod fit à prima ad rectangulum, quod duabus rectis lineis continetur. 136.b
Spacium medio ſpacio commenſurabile medium eſt. 140.b
Quod datis duabus mediis, vel media, & rationali continetur rectangulum datum erit. 141
Si ad datam mediam applicetur ſpacium datum, latitudo quam facit, data erit.
Quæ ex duabus datis mediis longitudine cõmenſurabilibus cõponitur recta linea data erit. 141.b
Duarũ datarũ mediarũ, quæ inæquales ſint, & longitudine cõmẽſurabiles differẽtia data erit. 142
Rationale non ſuperat rationale niſi rationali. 143.b
Inuenire duos numeros quadratos, ita vt qui ex ipſis componitur, etiam quadratus ſit 144.b
Inuenire duos numeros quadratos, ita vt ipſorum exceſſus ſit quadratus. 144.b
Inuenire duos numeros quadratos, ita vt ipſorum exceſſus non ſit quadratus.
Si ſint duæ rectæ lineæ in proportione aliqua, erit vt recta linea ad rectam lineam, ita rectangulũ duabus rectis lineis contentum ad quadratum minoris. 146
Si fuerint tres rectæ lineæ in proportione aliqua, erit vt prima ad tertiam, ita rectangulum contẽtum prima, & media ad id, quod media & tertia continetur. 146.b
Ex duobus ſpaciis irrationalibus inter ſe compoſitis, totum fieri rationale. 148
Data recta linea, quæ ſit ex binis, vel pluribus nominibus, & quadratum eius datum erit. 148.b
Datis duabus rectis lineis, quæ ex binis, vel pluribus nominibus conſtant & rectangulum ipſius contentum datum erit. 149
Datæ apotomes quadratum datum erit.
Datis duabus rectis lineis earum, quas apotomas appellamus, & rectangulum quod ipſis continetur, datum erit.
Data recta linea, quæ ſit ex binis, vel pluribus nominibus, & data apotoma, rectangulum, quod ipſis

ſis continetur datum erit. 149.b
Si plus per minus, vel minus per plus multiplicetur, produci minus.
Spacium ex mediis compoſitum irrationale eſt. 155.b
Binomialis ſpacij latus quadratum, vel radicem inuenire. 160
Si recta linea in partes inæquales ſecetur, ipſarum partium quadrata maiora ſunt rectãgulo, quod bis dictis partibus continetur. 162.b
Sint quattuor magnitudines AB C EF G & AB excedat ipſam C eodem exceſſu, quo EF excedit G. Dico & permutando AB eodem exceſſu excedere ipſam EF, vel excedi ab ea, quo C excedit G, vel ab ea exceditur. 171

IN VNDECIMO LIBRO.

Conuerſa X. Si fuerint duo anguli æquales, contenti rectis lineis in eodẽ plano nõ exiſtentibus, & earum vna parallela ſit vni continentium æqualem angulum; & reliqua reliquæ parallela erit. 195
Conuerſa XIIII. Si duo plana parallela fuerint, recta linea, quæ ad vnum ipſorum eſt perpendicularis, etiam ad reliquum perpendicularis erit. 196
Conuerſa. XVIII. Si omnia, quæ per aliquam rectam lineam plana producuntur, cuipiam plano ad rectos fuerint angulos; & recta linea eidem plano ad rectos angulos erit. 197.b
Conuerſa XIX. Quorum planorum ſeſe mutuo ſecantium communis ſectio alicui plano ad rectos fuerit angulos, & ſecantia plana eidem plano ad rectos angulos erunt.
Si fuerint quotlibet anguli plani, quorum vno reliqui ſint maiores, quomodocunque ſumpti; contineant autem ipſos rectę lineę æquales. Dico & rectarum linearum angulos ſubtendẽtium, vna reliquas maiores eſſe quomodocunque ſumptas, hoc eſt fieri poſſe, vt ex ijs, quæ rectas lineas coniungunt, multorum laterum figura conſtituatur. 200.b
Si in aliquod planũ à quodam ſublimi puncto æquales rectæ lineæ cadant, in circuli erunt circumferentia: & quæ à dicto puncto ad centrũ circuli ducitur, ad circulũ perpendicularis erit. 201
Omnis anguli ſolidi, qui æquicruribus planis continetur, baſim ipſam in circulo deſcribi. 201.b
Ex planis quotlibet datis angulis quorum vno reliqui ſint maiores, quomodocunque ſumpti, ſolidum angulum conſtituere, oportet autem datos angulos quattuor rectis eſſe minores.
Si ſolidum parallelis planis contineatur, oppoſita ipſius plana & æqualia eſſe, & ſimilia. 202.b
Si ſolidum parallelepipedum ſecetur plano baſibus parallelo, erit ſolidum ad ſolidum, vt altitudo ad altitudinem. 203
Solida parallelepipeda in eadem baſi, vel in æqualibus baſibus conſtituta, eam inter ſe proportionem habere, quam altitudines. 205.b
Priſmata triangulares baſes habentia, quæ vel in eiſdem, vel æqualibus baſibus conſtituuntur, & eadem altitudine, inter ſe æqualia eſſe. Et inſuper quæ eandem habent altitudinem inter ſe eſſe, vt baſes. Et quæ vel in eiſdem vel æqualibus baſibus conſtituuntur, inter ſe eſſe, vt altitudines.
Æqualium priſmatum, & triangulares baſes habentium, baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent. Et quorum priſmatum triangulares baſes habentium, baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent ea inter ſe ſunt æqualia. 207.b
Propoſitio XXXVIII aliter demonſtratur. 209.b

IN DVODECIMO LIBRO.

IN dato circulo, deſcripto in circulo polygono ſimile polygonum deſcribere. 212.b
Priſmata omnia, quæ eadem ſunt altitudine inter ſe eſſe, vt baſes. 215.b
Priſmata omnia, & pyramides, quæ in eiſdem, vel æqualibus baſibus conſtituuntur eam inter ſe proportionem habent, quam altitudines.
Priſmata omnia, & pyramides inter ſe proportionem habent compoſitam ex proportione baſium & proportione altitudinum. 216
Pyramides ſimiles, quæ multiangulas baſes habent, diuidi in pyramides triangulares baſes habentes ſimiles, & numero æquales, & homologas totis. 216.b

Priſmata ſimilia, quæ triangulares baſes habent in pyramides ſimiles, numeroq; æquales diuidun tur: & priſma ad priſma triplam habet proportionem eius, quam latus homologum habet ad homologum latus. 217

Priſmata ſimilia, quæ multiangulas habent baſes in ſimilia priſmata, triangulares baſes habentia diuiduntur, numeroq; æqualia, & homologa totis: & priſma ad priſma triplam proportionem habet eius, quam latus homologum habet ad homologum latus. 217.b

Æqualium pyramidum & multiangulas baſes habentium, baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent: & quarum pyramidum multiangulas baſes habentium, baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent, illæ ſunt æquales. 218.b

Priſmatum omnium æqualium baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondere, & quorum priſmatum baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent, ea eſſe æqualia. 219

Omnem conum ſiue rectum, ſiue ſcalenum tertiam partem eſſe cylindri ſiue recti, ſiue ſcaleni, qui eandem baſim habet, & eandem altitudinem. 220

Similes coni & cylindri omnes inter ſe in tripla ſunt proportione diametrorum, quę ſunt in baſibus. 222

Si cylindrus ſcalenus plano ſecetur oppoſitis planis parallelo, erit vt cylindrus ad cylindrum, ita axis ad axem. 223.b

Si quilibet cylindrus ſecetur plano baſibus parallelo, vt cylindrus ad cylindrum, ita eſſe altitudinem cylindri ad cylindri altitudinem.

Conorum omnium & cylindrorum æqualium baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent, & quorum conorum & cylindrorum baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent, illi inter ſe ſunt æquales. 224

Cylindri omnes, & coni inter ſe proportionem habent compoſitam ex proportione baſium, et proportione altitudinum. 224.b

IN TERTIODECIMO LIBRO.

PRopoſitio prima aliter demonſtratur. 229.b

Data recta linea extrema, ac media ratione ſecta, & vtraque ipſius portio data erit.

Si recta linea rationalis, expoſitæ rationali longitudine commenſurabilis, extrema ac media ratione ſecta fuerit, maiorẽ eius portionẽ apotomen eſſe quintam, & minorẽ eſſe apotomen primã.

Data maiori portione, totam rectam lineam, quæ extrema, ac media ratione ſecta ſit, inuenire.

Data maiori portione rectæ lineę, quæ extrema, ac media ratione ſecetur, & minorem portionem & totam lineam datam eſſe. 230

Propoſitio ſecunda aliter demonſtratur. 230.b

Data minori portione totam rectã lineã, quę extrema, ac media ratione ſecta ſit, inuenire. 231.b

Data minori portione rectæ lineę quæ extrema, ac media ratione ſecatur, & maiorem portionẽ, & totam lineam datam eſſe.

Si recta linea extrema, ac media ratione ſecetur, abſcindaturq; à maiori portione linea, quæ minori ſit æqualis, erit etiam ea extrema, ac media ratione ſecta, & maior portio erit quę abſciſſa eſt recta linea. 232.b

Si maior portio rectę lineę extrema, ac media ratione ſectæ ſit rationalis, expoſita rationali longitudine commenſurabilis; erit minor portio apotome quinta, & tota ex binis nominibus quinta. 233

Si minor portio rectę lineæ extrema, ac media ratione ſectæ ſit rationalis, expoſitæq; rationali longitudine commenſurabilis, erit maior portio ex binis nominibus quinta, & tota ex binis nominibus prima. 233.b

Si latus hexagoni extrema, ac media ratione ſecetur, erit maior eius portio decagoni latus. 234.b

Si in circulo rationalem diametrum habente decagonum æquilaterum deſcribatur, erit decagoni latus apotome quinta. 235

Si latus decagoni æquilateri in circulo deſcripti ſit rationale, erit circuli diameter ex binis nominibus quinta. 235

Latus

Latus trianguli æquilateri ad rectam lineam, quæ ab angulo ad baſim perpendicularis ducitur, eam potentia proportionem habere quam 4 ad 3. 236.b

Si ſint tres rectæ lineæ, ſitq; vt prima ad tertiam, ita quadratum ſecundæ ad quadratum tertiæ, erunt dictæ lineæ deinceps proportionales. 240

IN QVARTODECIMO LIBRO.

Eam, quæ à centro circuli ad latus trianguli æquilateri perpendicularis ducitur, dimidiam eſſe eius, quæ ex centro circuli: 244

IN QVINTODECIMO LIBRO.

Si à vertice pyramidis ad baſim perpendicularis ducatur, cadet ea in centrum circuli, qui circa baſis triangulum deſcribitur. 249.b

Recta linea ab angulo trianguli æquilateri ducta per centrum circuli, qui circa triangulum deſcribitur, baſim bifariam ſecat:

Rectam lineam ab angulo trianguli æquilateri ductam per centrum circuli, qui circa triangulum deſcribitur, ad baſim perpendicularem eſſe.

Propoſitio ſecunda planius demonſtratur. 250

Omne parallelogrammum eſt in vno plano. 251.b

In dato dodecaedro cubum deſcribere. 255

In dato dodecaedro pyramidem, & octaedrum deſcribere.

In dato Icoſaedro cubum deſcribere.

In dato Icoſaedro pyramidem deſcribere.

In dato dodecaedro Icoſaedrum deſcribere.

FINIS.

EVCLIDIS ELEMENTORVM LIBER PRIMVS

CVM COMMENTARIIS FEDERICI COMMANDINI VRBINATIS.

DIFFINITIONES.

I.

PVNCTVM EST, cuius nulla eſt pars, vel quod magnitudinem nullam habet.

F. C. COMMENTARIVS.

Euclides per negationem partium ſignificauit nobis punctum, quod eſt principium totius propoſitę contemplationis. cum enim principia aliam rationem habeant ab ijs, quorum ſunt principia, & eorum negationes illorum quodammodo naturam oſtendant; non immerito negantes ſermones principijs ipſis conuenire comperti ſunt: quod etiam aſſerit Proclus auctoritate Parmenidis. Pythagorici vero per proportionem, & tranſlationem quandam, punctum diffinierunt eſſe vnitatem poſitionem habentem: punctum enim poſitionem habet, vnitas non habet. Ariſtoteles in quarto diuinę phyloſophię libro. vbique, inquit, ipſum vnum aut forma, aut quantitate indiuiſibile. eorum autem, quae quantitate, & vt quantitas eſt, diuidi non poſſunt, id quidem, quod penitus eſt tale, & ſine poſitione, dicitur vnitas; quod vero penitus eſt tale, poſitionemq́, habet, dicitur punctũ; & id quod vno modo diuidi poteſt, linea nuncupatur; & id quod duabus ex partibus, ſuperficies: quod vero omni ex parte, & trinam dimenſionẽ habet, dicitur corpus.

Punctum ſecundum Pythagoricos eſt unitas poſitionem habens.

II.

Linea vero eſt longitudo latitudinis expers.

F. C. COMMENTARIVS.

Poſt punctum linea ſecundum obtinet locum: namque vt punctum ad lineam, ita linea ad ſuperficiem, de qua mox dicetur, rationem habet principij. punctum quidem ipſum, vt magnitudinum omnium principium per ſolam negationem, lineam vero partim per affirmationem, partim per negationem ſignificauit cum dixit, longitudinem eſſe latitudinis expertem. fuerunt qui lineam aliter diffinirent: alij enim συμείου ῥύσιν hoc eſt puncti fluxum dixerunt; alij vt Ariſtoteles τὸ μέγεθος μοναχῇ διαιρετὸν ἢ ἐφ' ἓν διαιρετὸν hoc eſt magnitudinem, quae vno modo diuiſi poteſt, nempe ſecundum longitudinem. lineae autem notionem habemus, vt Apollonius inquit, cum longitudines tantum vel viarum, vel parietum dimetiri volumus; non enim tunc latitudinem, & craſſitudinem adiungimus; ſed vnicam duntaxat dimenſionem conſideramus; quemadmodum & cum agros metimur, ſuperficiem reſpicimus; cum autem puteos, ſolidum: omnes enim dimenſiones ſimul colligentes dicimus tantum eſſe ſpacium putei ſecundum longitudinem, latitudinem, & craſſitudinem. ſenſum vero ipſius lineae habebimus, ſi diſtinctiones locorum illuminatorum ab vmbroſis inſpexerimus, tum in luna, tum in terra; hoc enim medium iuxta latitudinem, dimenſionem non habet, ſed iuxta longitudinem, quae vna cum lumine, & vmbra producitur,

Punctũ magnitudinum omniũ principium.

Linea notio.

Superficiei notio.

Solidi.

Lineæ ſenſus unde habeatur.

Lineæ simplices. Mixtæ.

ducitur. linearum aliae simplices, aliae mixtae. simplices sunt recta, & circularis, quamquam recta simplicior sit, reliquae vero omnes mixtae, quales sunt coni sectiones, helices, conchoides, cissoides, & aliae.

III.

Lineæ fines sunt puncta.

F. C. COMMENTARIVS.

Linea tribus modis utitur Euclides

Circularis linea p se nullos habet fines.

Ellipsis.



Cum linea tribus modis vtatur Euclides, vel enim terminata, & finita ex vtraque parte, vel infinita, vel ex altera quidem parte finita, ex altera vero infinita: hoc loco de ea, quae vtrinque finita est, sermo habetur; cuius fines dicit esse duo puncta. Circularis autem linea per se nullos habet fines; sed si aliquod in ea punctum accipiatur, idem erit & principium, & finis, diuersa tamen ratione. quod diximus de circulari linea, idem & de ellipsi dici potest, quae ipsa in se ipsam vergit sicuti circulus: si autem sumatur portio circularis lineae, seu ellipsis, eius non aliter, quàm rectae lineae fines erunt duo puncta. Eodem modo & de alijs curuis lineis intelligendum est.

IIII.

Recta linea est, quæ ex æquali suis interijcitur punctis.

F. C. COMMENTARIVS.

Plato q. rectã lineam diffiniat.

Archimedis diffinitio recte lineæ.

Hoc est recta linea est, quae aequalem continet distantiam, eam scilicet, quae inter sua interijcitur puncta. quantum enim alterum punctorum ab altero distat, tanta est magnitudo rectae lineae ab ijs terminatae. atque hoc est ex aequali suis interijci punctis. si autem in circumferentia circuli, aut alia quauis linea duo puncta sumantur; eius portio, quae interijcitur, longe maior erit, quàm sit dictorum punctorum distantia. ad hunc quidem modũ rectae lineae diffinitionem exponere mihi videtur Proclus. Plato autem rectam lineã diffinit esse eam ἣ τὰ μέσα τοῖς ἄκροις ἐπιπροσθεῖ, hoc est cuius media extremis obsistunt. illud. n. ijs, quę in recta linea sunt, necessario contingit; ijs vero, quae in circulari, aut alia quapiam linea, non item. Vnde & astrologi dicunt solem deficere, cum in eadem recta linea constituitur ipse, lunaq; et oculus noster: obsistit enim ei tunc luna media existens. At Archimedes, vt Proclus auctor est, dixit rectam lineam esse breuissimam omnium, quae eosdem habent fines. quae quidem diffinitio recepta est in Campani editione. linea, inquit, recta est ab vno puncto ad alium breuissima extensio in extremitates suas eos recipiens.

V.

Superficies est id, quod longitudinem, et latitudinem tantum habet.

F. C. COMMENTARIVS.

Superficiei variæ diffinitiones.

Superficiei cognitio & sensus.

Superficiem dixit longitudinem, & latitudinem tantum habere, propterea quòd crassitudinis expers sit. alij corporis terminum ipsam esse diffinierunt; alij magnitudinem binis distantem interuallis. superficiei vero cognitionem nos habere dicunt, quando agros dimetimur, & eorum terminos iuxta longitudinem, ac latitudinem distinguimus. sensum vero quendam capere, quando vmbras aspicimus, cum enim ipsae crassitudinis sint expertes, quòd partes terrae interiores penetrare non possint; latitudinem, & longitudinem tantum habent. superficierum aliae simplices sunt, aliae

alię mixtę, ſi mplices ſunt plana, & ſphęrica, reliquę vero mixtę, vt Cylindrica, conica, & quę à coni ſectionibus ortum habent, videlicet conoidum, & ſphęroidum figurarum, & alię.

Superficies ſimplices & Mixtæ.

VI.

Superficiei fines ſunt lineæ.

F. C. COMMENTARIVS.

Quemadmodum non omnis lineae fines ſunt puncta, ita non omnis ſuperficiei fines ſunt lineae; ſuperficies enim ſphęrae, vel ſphęroidis per ſe nullos habet huiuſmodi fines, niſi planis abſcindatur, nam tunc fines habet lineas ipſas, quę ex ſectione oriuntur. ſuperficiei autem circuli, & eius, quę ellipſi continetur, finis eſt linea vna, videlicet circumferentia, & ellipſis. quòd ſi ſecentur tunc pro finibus lineas habebunt.



Superficies Sphæræ, & Sphæroidis. Superficies circuli, & ellipſi cõtẽta.

VII.

Plana ſuperficies eſt quæ ex æquali ſuis interijcitur lineis.

F. C. COMMENTARIVS.

Antiquiores philoſophi (vt teſtatur Proclus, τὴν ἐπιφάνειαν καὶ τὸ πλατὸς hoc eſt ſuperficiem, & planum pro vno, eodemq; accipiebant. At Euclides, & qui eum ſecuti ſunt, genus quidem ſuperficiem faciunt, eius vero ſpeciem planum, vel planam ſuperficiem, quemadmodum lineę ſpeciem rectam lineam. & idcirco planum diffiniunt ex quadam ad rectam lineam proportione. vt enim recta linea eſt, qua ex æquali ſuis interijcitur punctis, vel cuius media extremis obſiſtunt, vel breuiſſima omnium, quę eoſdem habent fines, ita planam ſuperficiem dixerunt eſſe eam, quę ex æquali ſuis interijcitur lineis, vel cuius media extremis obſiſtunt, vel breuiſſimam omnium ſuperficierum eoſdem fines habentium, & omnino quecunque ſunt rectę lineę diffinitiones, omnes ad planam ſuperficiem commodiſſime transferri poſſunt. Quòd cum multę ſint ſuperficierum ſpecies, Euclides planam tantum diffiniuit, atque in hac figuras, & earum affectiones contemplatur.



Superficiē, & planū Antiqui pro eodem accipiebant.



Planæ superficiei uariæ diffinitiones

Euclides ſuperficiē planam tãtum diffiniuit.

VIII.

Planus angulus eſt duabus lineis in plano ſe ſe contingentibus, & non in directum iacentibus, alterius ad alteram inclinatio.

IX.

Quando autem quę angulum continent rectæ lineæ fuerint, rectilineus angulus appellatur.

F. C. COMMENTARIVS.

Angulum alij quidem in prędicamento eorum quę ſunt ad aliquid ponentes, inclinationem eſſe dixerunt, vel linearum, vel planorum, quę ad ſe mutuò inclinata ſunt. alij in qualitate ipſum comprehendentes, vt rectum, & inflexum, talem quandam affectionem dixerunt eſſe ſuperficiei, vel ſolidi. alij autem ad quantitatem referentes vel ſuperficiem, vel ſolidum eſſe aſſeuerarunt. diuiditur, inquiunt, is, qui in ſuperficie eſt angulus linea; qui in ſolidis ſuperficie. quod

autem his diuiditur nihil aliud eſt, niſi magnitudo; & hęc non linearis, namque lineam punctum diuidit. quare relinquitur, vt ſit ſuperficies, vel ſolidum. Quid igitur in tanta controuerſia dicendum? aut quid eorum dicemus eſſe angulum? Reſpondet Proclus angulum nihil eſſe eorum per ſe ſe, ſed ex concurſu omnium conſtitui. contingere autem hoc non ſolum angulo, ſed & ipſi triangulo, quod quidem particeps eſt quantitatis; & idcirco ęquale dicitur, & inęquale, vt pote materię rationem habens. particeps quoque eſt qualitatis eius, quę ad figuram pertinet, quoniam & ſimilia dicuntur triangula, & inęqualia. Ita igitur angulus quoque omnino quidem indiget quantitate, indiget autem & qualitate, per quam veluti propriam habet formam, & exiſtentię figuram. indiget denique & determinantium ipſum linearum, vel planorum comprehendentium habitudine. atque ex his omnibus angulus conſtat. non tamen eſt vnum aliquod eorum. & eſt quidem diuiſibilis, & ęqualitatem, & inęqualitatem ſuſcipere poteſt, iuxta eam, quę in ipſo eſt, quantitatem.

Angulorũ diuiſio.

Angulorum alij quidem in ſuperficiebus, alij vero in ſolidis conſiſtunt: & eorum qui in ſuperficiebus alij in ſimplicibus, alij in mixtis. Eorum qui in planis ſiunt alij ſimplicibus lineis comprehenduntur, alij mixtis, alij vtriſque. omnes autem qui rectis comprehenduntur lineis rectilinei appellantur.

X.

Cum vero recta linea ſuper rectam lineam inſiſtens eos, qui deinceps ſunt angulos æquales inter ſe fecerit, rectus eſt vterque ęqualium angulorum: et quæ inſiſtit recta linea perpendicularis vocatur ad eam, cui inſiſtit.

XI.

Obtuſus angulus eſt, qui maior eſt recto.

XII.

Acutus autem, qui recto eſt minor.

F. C. COMMENTARIVS.

In diffinitione anguli obtuſi, & acuti genus ſubintelligi oportet, eſt enim vterque ipſorum rectilineus; hic quidem minor recto, ille autem maior. Sed non ſimpliciter quicunque minor eſt recto, is eſt acutus; neque quicunque maior recto eſt obtuſus. nam qui græce κερατοειδὴς dicitur, hoc eſt cornicularis, qui continetur recta linea circulum contingente, & circumferentia ipſa, non tantum recto, ſed etiam omni acuto eſt minor, acutus autem non eſt. & ſemicirculi angulus omni recto eſt minor, ſed tamen non eſt acutus. quorum quidem cauſa eſt, quod ſint mixti, & non rectilinei. & eorum, qui lineis circularibus, aut alioqui curuis continentur multi recto maiores apparent, non tamen ſunt obtuſi. Cum igitur rectum angulum diffinire propoſuiſſet Euclides rectã aſſumpſit lineam ſuper aliam rectam inſiſtentem; & angulos, qui ex vtraque parte ſunt, quos angulos deinceps appellat, inter ſe aequales facientem. Obtuſum autem, & acutum diffiniens non item aſſumpſit rectam lineam ad alterutram

Angulus cornicularis. Semicirculi angulus.



Anguli deinceps qui ſit.

partem

partem inclinatam, ſed per comparationem ad rectum explicauit. ipſe enim etiam non rectorum menſura eſt, quemadmodum & inæqualium æqualitas. lineæ vero ad alterutram partem inclinatæ infinitæ ſunt, & non vna tantum, vt perpendicularis. Illud autem meminiſſe oportet Euclidem hoc loco de ijs ſermonem habere, quæ in eodem plano conſiſtunt. quare neque perpendicularem omnem diffinit, neque omnem angulum. ſolida enim perpendicularis non ad vnam tantum rectam lineam angulos rectos facit, ſed ad omnes, quæ ipſam tangunt, in ſubiecto exiſtentes plano, de qua in vndecimo libro agetur.

Angulus rectus eſt non rectarũ mẽſura, quemadmodum inæqualium æqualitas.

XIII.

Terminus eſt, qui alicuius eſt finis.

F. C. COMMENTARIVS.

Terminum non ad omnem magnitudinem referri oportet, vt ſcribit Proclus, lineæ namque terminus eſt, & finis, ſed ad ſpacia, quæ ſunt in ſuperficiebus, & ad ſolida. nunc enim terminum vocat ambitum, qui ſpacium vnumquodque determinat; & huiuſmodi terminum, finem eſſe dicit, non vt punctum dicitur lineæ finis, ſed vt includit, & ſeiungit ab ijs, quæ circumpoſita ſunt. eſt autem hoc nomen priſcæ illi geometriæ proprium, per quam agros metiebantur, & eorum terminos diſtinctos ſeruabant, ex qua huius ſcientiæ cognitionem aſſecuti ſunt. huiuſmodi igitur ambitum exteriorem terminum vocans Euclides iure, & merito ipſum finem determinauit ſpaciorum. per hunc enim vnumquodque contentorum præfinitur, veluti in circulo, circumferentia quidem terminus eſt, & finis; ipſum vero planum aliquod ſpacium eſt, & ſimiliter in triangulo tria latera, & in quadrilatero quattuor latera termini ſunt, & fines; ſpacium vero, quod his lateribus continetur.

Terminus, & finis.

XIIII.

Figura eſt, quæ aliquo, vel aliquibus terminis continetur.

F. C. COMMENTARIVS.

Figurarum aliæ planæ, aliæ ſolidæ. planarum figurarum circulus quidem, & ellipſis, ſolidarum ſphæra, & ſphæroides vnico termino, aliæ pluribus terminis continentur.

Figurarum aliæ planæ, aliæ ſolidæ.

XV.

Circulus eſt figura plana vna linea contenta, quæ circumferentia appellatur: ad quam ab vno puncto intra figuram exiſtente omnes rectæ lineæ pertinentes ſunt æquales.

XVI.

Hoc autem punctum centrum circuli nuncupatur.

F. C. COMMENTARIVS.

Circulus planarum figurarum prima eſt, ſimplicitate quidem ſolidis præſtans; vnitatis vero ad planas rationem habens.

Figura] *loco generis.* Plana] *ad differentiam figurarum ſolidarum.* Vna linea contenta] *vt differat ab ijs, quæ pluribus lateribus continentur.* quæ circumferentia appellatur] *per hoc differt ab ellipſi, quæ & ipſa vna linea continetur, ſed eam ellipſim vocant. liceat enim mihi nunc ſpacium ellipſi contentum etiam ellipſim appellare.* Ad quam] *ab ellipſis autem centro non plures, quam quattuor rectæ lineæ æquales ad ambitum duci poſſunt.* ab vno puncto] *ex infinitis punctis, quæ intra figuram ſunt, vnum duntaxat hoc præſtare poteſt.* intra figuram exiſtente] *eſt etiam punctum extra figuræ planum, à quo omnes rectæ lineæ ad circumferentiam ductæ ſunt æquales, quod non centrum, ſed circuli polus in ſphæricis appellatur.*



Ellipſis.

Circuli polus.

Diameter

XVII.

Diameter circuli eſt recta quædam linea per centrum ducta, & ex vtraque parte à circumferentia circuli terminata, quæ quidem et bifariam circulum ſecat.

F. C. COMMENTARIVS.

Diametri parallelogrammorum.

Diameter circuli] *ſunt enim parallelogrammorum quoque diametri, ſed hę interdum διαγώνιοι hoc eſt diagonij appellantur. ſimi & diametri ellipſis, quarum duę axes dicuntur. præterea etiam ſphęrę diametri ſunt, quę axes nuncupantur. circuli igitur propria eſt diameter.* recta quædam linea per centrum ducta] *poſſunt namque in circulo duci infinitae rectae lineę, quę per centrum non tranſeunt.* & ex vtraque parte à circumferentia circuli terminata.] *rectę lineę etiam per centrum ductę, quę vel citra, vel vltra circumferentiam terminantur, diametri non ſunt.* quæ & bifariam circulum ſecat.] *ſit enim circulus A B C D, cuius diameter A C: et ſtante diametro intelligatur circumferentia A B C elevari, ac ſuperponi circumferentię A D C. Dico circumferentiam A B C ipſi A D C congruere. ſi enim non congruit, vel cadet extra, vel intra, vel partim extra, partim intra. cadat primum extra ſi fieri poteſt: & ex centro circuli, quod ſit E, ducatur E B ſecans circumferentiam A D C in F. quoniam igitur rectę lineę a centro ad circumferentiam ductę inter ſe ſunt æquales, erit recta linea E B æqualis ipſi E F, hoc eſt totum parti quod fieri non poteſt. quare circumferentia A B C extra ipſam A D C non cadet. ſimiliter demonſtrabimus neque eam cadere intra, neque partim extra partim intra. in ipſam igitur cadat neceſſe eſt: & circumferentia A B C congruet ipſi A D C. Quòd ſi circumferentia circumferentię congruit, & ſuperficies contenta recta linea A C, & circumferentia A B C congruet ſuperficiei, quę eadem A C, & circumferentia A D C continetur. ex quibus ſequitur per octauam communem notionem & circumferentiam circumferentię, & ſuperficiem ſuperficiei æqualem eſſe. diameter igitur A C circulum A B C D bifariam ſecat. quod oportebat demonſtrare.*



XVIII.

Semicirculus eſt figura, quæ continetur diametro, & ea quæ ex ipſa circuli circumferentia intercipitur.

XIX.

Portio circuli eſt figura, quę recta linea, & circuli circumferentia continetur.

F. C. COMMENTARIVS.



Ex circuli quidem diffinitione centri naturam inuenit, ab omnibus alijs punctis quę in circulo ſunt differentem; à centro autem diametrum diffiniuit, & ab omnibus alijs rectis lineis, quę intra circulum deſcribuntur, ſeiunxit. nunc autem à diametro quid nam ſit ſemicirculus tradit, cum dicat ipſum contineri duobus terminis, ijſq; ſemper differentibus, videlicet recta linea, & circumferentia, & rectam

& rectam lineam non esse quamlibet, sed circuli diametrum, si quidem & minor portio circuli, & maior continetur recta linea, & circumferentia; quae tamen semicirculi non sunt, quoniam circuli diuisio non est facta per centrum. omnes autem huiusmodi figurae biformes sunt, & ex dissimilibus constant. figurae enim contentae duobus terminis, vel duabus circumferentijs continentur, vt lunularis, vel recta linea, & circumferentia, vt iam dictae, vel duabus lineis mixtis, vt si duae ellipses se inuicem secent, figuram continebunt, quae inter ipsas intericitur, vel mixta & recta, vt ellipsis dimidium. itaque semicirculus duabus quidem lineis dissimilibus, sed tamen simplicibus, atque ad se se applicatis continetur. antequam igitur triadicas figuras diffiniat, iure merito post circulum ad biformes accessit, quoniam duae rectae lineae spacium concludere nunquam possunt; recta autem linea & circumferentia possunt. & duae circumferentiae similiter vel angulum facientes, vt in lunulari, vel figuram angulis expertem, vt si duos intelligas circulos idem centrum habentes. quod enim medium intericitur spacium duabus circumferentijs continetur interiori, & exteriori, & nullus fit angulus, cum se inuicem non secent, vt in lunulari, & vtrinque conuexa figura. At vero centrum semicirculi idem esse, quod & circuli centrum, manifeste constat. diameter enim centrum in se habens complet semicirculum. Illud autem notatione dignum solam hanc figuram ex planis in ambitu centrum habere. vnde colligitur centri tres esse locos, vel enim intra figuram, vt in circulo & ellipsi, vel in ambitu vt in semicirculo, vel extra, vt in vna sectionum conicarum, videlicet in hyperbola.

Centrū tres habet locos.

X X.

Rectilineæ figuræ sunt, quæ rectis continentur lineis.

X X I.

Trilateræ quidem, quæ tribus.

X X I I.

Quadrilaterę, quæ quattuor.

X X I I I.

Multilateræ vero, quæ pluribus, quàm quattuor rectis lineis comprehenduntur.

F. C. COMMENTARIVS.

Post circulum, semicirculum, & circuli portiones, transit ad figuras rectilineas, quae quidē ordinatim per numeros in infinitum procedunt, initium ducentes à ternario, quoniam duae rectae lineae spacium concludere non possunt, vti dictum est. Meminit autem trilaterarum, & quadrilaterarum duntaxat figurarum, vtpote quae magis elementares sunt; in primo enim libro de triangulis, & parallelogrammis agit, reliquas communi nomine multilateras appellans. Porrò figurarum planarum aliae simplicibus continentur lineis, aliae mixtis, aliae vtrisque. & earū, quae simplicibus, aliae quidem similibus specie continentur, vt rectilinea, aliae specie dissimilibus, vt semicirculi, & circulorum portiones. earum insuper, quae specie similibus, aliae circulari cōprehenduntur linea, aliae recta. At earū quae circulari, aliae duabus, aliae pluribus continentur & vna quidem circulus ipse, quae vero duabus, aliae angulorum expertes.



Figurarum planarum diuisio.

sunt,

Corona. *sunt, vt corona, quae concentricis circulis terminatur, aliæ angulares ut menisci. earum quae pluribus, quam duabus continentur, processus est in infinitum: tribus namque, & quattuor, et quae deinceps sunt circumferentijs quædam figurae comprehenduntur. si enim tres circuli se se contingant, spacium concludunt trilaterum, quod tribus circumferentijs terminatur, si vero quattuor, quattuor circumferentijs, & deinceps similiter. postremo earum, quae rectis lineis, aliae quidem tribus, aliae quattuor, aliae pluribus continentur.*



XXIIII.

Trilaterarum figurarum æquilaterum est triangulum, quod tria latera habet æqualia.

XXV.

Isosceles, siue æquicrure, quod duo tantũ æqualia latera habet.

XXVI.

Scalenum vero est, quod tria inæqualia habet latera.

XXVII.

Adhæc, trilaterarum figurarum, rectangulum quidem est triangulum, quod rectum angulum habet.

XXVIII.

Obtusangulum est, quod obtusum habet angulũ.

XXIX.

Acutiangulum vero, quod tres acutos angulos habet.

F. C. COMMENTARIVS.

Triangulorum diuisio interdum quidem à lateribus, interdum vero ab angulis ortum habet: & precedit ea, quae à lateribus tamquam nota, sequitur autem ea quae ab angulis tamquam propria, quoniam & tres ipsi anguli, videlicet rectus, obtusus, & acutus solis rectilineis figuris conueniunt: aequalitas verò laterum, & inequalitas inuenitur etiam in ijs, quae rectilineae non sunt. dicit igitur triangulorũ alia esse aequilatera, alia acquicruria, alia scalena, vel enim omnia latera aequalia sunt, vel omnia inequalia, vel duo tantũ aequalia. Rursus triangulorum alia rectangula, alia obtusiangula, alia acutiangula, & rectangulum quidem differt, quòd vnum angulum rectum habet, quemadmodum obtusangulum, quod vnum habet





habet obtusum, fieri enim non potest, vt triangulum plures vno, vel rectos, vel obtusos angulos habeat: acutiangulum vero, quod omnes habet acutos; non enim satis est vnicum acutum habere, omnia si quidem triangula hoc modo acutiangula essent, namque omne triangulum duos habeat acutos necesse est, tres autem acutos acutiangulum solum. ex his diuisionibus colligitur septem tantum esse triangulorum rectilineorum species, & neque plures, neque pauciores. aequilaterum enim acutiangulum tantum est: reliquorum vero vnumquodque est triplex; nam aequicrure vel rectangulum est, vel obtusiangulum, vel acutiangulum: & similiter scalenum vel rectangulum, vel obtusiangulum, vel acutiangulum.

Septem triã gulorum rectilineorum species.

XXX.

Quadrilaterarum figurarum quadratum est quod & æquilaterum est, & rectangulum.

XXXI.

Altera parte longior figura est, quæ rectangula quidem, æquilatera vero non est.



XXXII.

Rhombus, quæ æquilatera quidem, sed rectangula non est.

XXXIII.

Rhomboides, quæ & oppositos latera, & oppositos angulos inter se æquales habet, neque æquilatera est, neque rectangula.

XXXIIII.

Præter has autem reliquæ quadrilateræ figuræ trapezia vocentur.

F. C. COMMENTARIVS.

Quadrilaterarum figurarũ aliae aequilaterae sunt, aliae non aequilaterae. rursus aliae rectangulae; aliae non rectangulae. quae igitur aequilaterae, & rectangulae sunt quadrata appellantur. quae vero rectangulae & non aequilaterae, altera parte longiores: & quae aequilaterae, & non rectangulae, rhombi. & postremo quae neque aequilaterae, neque rectangulae latera habent, & angulos, qui è regione sunt inter se aequales, rhomboides vocantur. alij in hunc modum diuidunt. Quadrilaterarum figurarum aliae parallelogramma sunt, quae latera



Quadrilaterarum figurarum diuisio.

Quadratũ.

Altera parte longius.

Rhombus.

Rhomboides.

Quadrata. τετράγωνα

Rhomboidea.

Rhombus.

Trapezia.

Trapezoidea.

Trapezia aequicruria, & Scalena.

tera ex oppoſito parellela habent, non parallelogramma vero, quae latera parallela non habent. parallelogrammorum autem alia quidem & rectangula, & aequilatera ſint vt quadrata, quae à graecis τετράγωνα appellantur, alia neque rectangula, neque aequilatera, vt rhombo idea, quae figuram rhombo ſimilem habent. alia rectangula quidem, ſed non aequilatera, vt altera parte longiora; alia è contrario aequilatera quidem, non autem rectangula, vt rhombus. non parallelogrammorum vero alia duo latera tantum habent parallela, alia nulla proſus parallela habent: & illa quidem vocantur trapezia, hęc vero trapezoidea. Trapeziorum alia quidem latera, quae parallelas lineas coniungunt, aequalia habent, alia vero inaequalia. & illa aequicruria trapezia, hęc ſcalena trapezia appellantur. quadrilatera igitur figura ſeptem modis conſtituitur. nam prima quidem quadratum eſt, ſecunda altera parte longius, tertia rhombus, quarta rhomboides, quinta aequicrure trapezium, ſexta ſcalenum trapezium, ſeptima trapezoides. Euclides autem figuras quadrilateras in parallelogramma, & non parallelogramma diuidere minime potuit, quippe qui neque de parallelis, neque de parallelogrămo prius tractarit: trapezia autem, & trapezoidea omnia communi nomine appellauit trapezia ad eorum quattuor differentiam, in quibus parallelogrammorum ineſt proprietas, nempe ex oppoſito latera & angulos habere aequales; quod ipſe in rhomboide tantum poſuit, ne ſolis negationibus ipſum diffiniret, cum dixit, neque aequilaterum, neque rectangulum; in quibus enim propriis caremus rationibus, communibus vti neceſſarium eſt. videtur autem rhombus dimotum eſſe quadratum, & rhomboides dimotum altera parte longius, propterea quòd iuxta latera quidem hęc ab illis non differunt, ſed iuxta angulorum diamaxat obtuſitates, & acuminа, cum illa rectangula ſint.

In quibus proprijs rōnibus caremus, cōmunibus utendum.

XXXV.

Parallelæ, ſeu æquidiſtantes rectæ lineę ſunt, quę cum in eodem ſint plano, & ex vtraque parte in infinitum producātur, in neutram partem inter ſe conueniunt.



F. C. COMMENTARIVS.

Quae nam ſint parallelarum, ſeu aequidiſtantium rectarum linearum elementa, & quibus accidentibus dignoſcantur, poſtea diſcemus. nunc quae ſint parellelae his verbis diffinit. Quę cum in eodem ſint plano] *ſi enim altera quidem ſit in ſubiecto plano, altera autem in ſublimi iuxta quamuis poſitionem, inter ſe non conueniūt, non tamē propterea parallelae ſunt.* Et ex vtra que parte in infinitum producantur, in neutram partem inter ſe conueniunt] *nam rectae lineae non parallelae, ſi aliquatenus producantur, non conuenient; in infinitum autem produci, & non conuenire, parallelas deſignat, neque hoc ſimpliciter, ſed ex vtraque parte, in infinitum produci, & non conuenire. fieri namque poteſt, vt non parallelae etiam ex vna quidē parte in infinitum producantur, ex altera vero minime. annuentes enim in hac parte, in altera plurimum diſtant. cauſſa autem hęc eſt, quoniam duae rectae lineae ſpacium aliquod comprehēdere non poſſunt, quòd ſi ex vtraque parte annuant hoc non continget. & Euclides quidem rectas lineas parallelas in hunc modum diffinit. Poſſidonius vero parallelae, inquit, ſunt, quae neque annuūt, neque abnuunt in vno plano, ſed aequales habent omnes perpendiculares, quae à punctis alterius ad alteram ducuntur; quęcunque vero minores faciunt perpendiculares inter ſe conueniunt. perpendicularis enim, & ſpaciorum altitudines, & linearum interualla determinare poteſt. quamobrem cum perpendiculares ſint aequales, & rectarum linearum interualla aequalia erunt: cum vero minores, & interuallum minuitur, & conueniunt inter ſe ad eas partes, in quibus perpendiculares ſunt minores. Pitho geometra parallelas rectas lineas explicans non contentus ijs, quae ſcripſit Euclides, eas aptiſſime exemplo declarauit. dixit enim rectas lineas parallelas eſſe, quales in parietibus, vel pauimento columnarum vmbras à lampade è regione ardente, vel lucerna factas videmus, quod quomodo intelligendum ſit vide apud Serenum*

Poſſidonius parallelas aliter diffinit.

Perpendicularis ſpaciorum altitudines & linearū interualla determinat.

renum in fine libri de ſectione Cylindri. Poſt diffinitiones ſequuntur poſtulata, deinde exiomata, ſeu communes notiones. poſtulata autem & axiomata, vt refert Proclus ex Gemino il, lud habent commune, vt non indigeant demonſtratione aliqua, aut geometrica fide, ſed ſumatur tamquam nota, & principia fiant eorum, quae ſequuntur. at differunt axiomata à poſtulatis eodem prorſus modo, quo theoremata à problematibus: vt enim in theorematibus quidem id, quod ſubiecta conſequitur, perſpicere & cognoſcere proponimus; in problematibus vero excogitare aliquid, & facere iubemur: ita & in axiomatibus ea ſumuntur, per quae ſeſe manifeſta ſunt, noſtriſq́; inſitis notionibus ſunt in promptu; in poſtulatis vero ea ſumere querimus, quae facilia, parabiliaq́; ſunt, & in quibus ſumendis cogitatio non defatigatur, queq́; nulla neque varietate, neque conſtructione indigent.

Axiomata a poſtulatis differunt codē modo, quo theoremata a problematibus.

POSTVLATA.

I

Poſtuletur à quouis puncto ad quoduis punctum rectam lineam ducere.

II.

Rectam lineam terminatam in continuum, & directum producere.

III.

Quouis centro, & interuallo circulum deſcribere.

F. C. COMMENTARIVS.

Tria hęc & ob facilitatem, & quod aliquod comparare nobis imperant in poſtulatis neceſſario collocanda ſunt, ex Gemini ſententia. nam illud quidem, A quouis puncto ad quoduis punctum rectam lineam ducere, ſequitur eam diffinitionem, quae tradit lineam eſſe puncti fluxum, & rectam lineam aequabilem, & non decliuem fluxum. ſi igitur intelligamus punctum aequabili, & breuiſsimo motu ferri in alterum punctum incidemus, & primum poſtulatum factum erit, nihil vtique varium intelligentibus nobis. ſi vero recta linea puncto terminata, ſimiliter intelligamus eius terminum breuiſſimo, & aequabili motu ferri, ſecundum poſtulatum facili, ſimpliciq́; aggreſſione comparatum erit. Quòd ſi rurſus terminatam rectam lineam manere quidem ex altera parte, ex altera autem moueri circa manens punctum intelligamus, tertium fiet poſtulatum; centrum namque erit punctum manens, interuallum vero recta linea; & quanta ea fuerit, tantum erit interuallum à centro ad omnes circumferentiae partes.



IIII.

Omnes angulos rectos inter ſe æquales eſſe.

F. C. COMMENTARIVS.

Hoc quamquam vt manifeſtum, & nulla indigens demonſtratione à nobis concedatur, poſtulatum tamen non eſt ex ſententia Gemini, ſed axioma. axioma enim quoddam per ſe rectis angulis dicit, nihil ſimplici notione facere iubens. ſi cui vero non ſatis conſtet rectos angulos omnes inter ſe aequales eſſe, is petat demonſtrationem à Proclo, quam affert in commentarijs. Pappus recte animaduertit huius conuerſum non etiam verum eſſe, nempe angulum recto aequalem omnino eſſe rectum, niſi rectilineus ſit; poteſt enim curuilineus quoque angulus recto aequalis eſſe.

V.

Et ſi in duas rectas lineas recta linea incidés interiores,& ex eadem parte angulos duobus rectis minores fecerit, rectas lineas illas in infinitum productas, inter ſe conuenire ex ea parte, in qua sũt anguli duobus rectis minores.



F. C. COMMENTARIVS.

Hoc à poſtulatis penitus reijciendum cenſet Proclus, cum theorema ſit, quod multas habet & dubitationes, quas Ptolemęus in quodam libro ſoluere ſibi propoſuit. multis vero & diffinitionibus, & theorematibus in demonſtratione indiget, cuius conuerſion Euclides etiam tanquam theorema oſtendit. ſed de hoc inferius ſuo loco agetur.

AXIOMATA, SEV COMMVNES NOTIONES.

I.

Quę eidem ęqualia, et inter ſe ſunt ęqualia.

II.

Et ſi ęqualibus ęqualia adijciantur tota ſunt ęqualia.

III.

Et ſi ab ęqualibus ęqualia auferantur, reliqua ſunt ęqualia.

IIII.

Et ſi inęqualibus ęqualia adijciantur, tota ſunt inęqualia.

V.

Et ſi ab inęqualibus ęqualia auferãtur, reliqua ſunt inęqualia.

VI.

A Et quę eiuſdem dupla, inter ſe ſunt ęqualia.

VII.

Et quę eiuſdem dimidia inter ſe ſunt ęqualia:

VIII.

B Et quę ſibi ipſis congruunt, inter ſe ſunt ęqualia.

IX.

Totum eſt ſua parte maius

X.

C Duę rectæ lineæ ſpacium non comprehendunt.

F. C. COMMENTARIVS.

Axiomata mathematicis ſcientijs communia.

Axiomata ferè omnia mathematicis ſcientijs communia ſunt: neque ſolum in magnitudinibus, ſed & in numeris, & motibus, & temporibus vera eſſe deprehenduntur. aequale enim & inęquale, totum & pars, maius, & minus, quantitatibus continuis, & diſcretis communia ſunt. contemplatio igitur quae circa tempora, & quae circa motus, & quae circa numeros, & quae circa magnitudines verſatur, his omnibus tanquam manifeſtis indiget. communibus autem exiſtentibus vnuſquiſque vtitur ſecundum propriam materiam, quoad ipſa requirit: & alius quidem ut in magnitudinibus, alius ut in numeris, alius uero ut in temporibus ipſis utetur, & hoc modo propriae in vnaquaque ſcięntia cõcluſiones fiunt, licet axiomata cõmunia fuerint.

Et quæ eiuſdem dupla inter ſe ſunt æqualia. A

Hoc ex illo ſequitur, Si aequalibus aequalia adiiciantur tota aequalia eſſe, nam quae dimidio ſunt aequalia, cum ipſum dimidium aſſumpſerint eiuſdem dupla fiunt, & inter ſe aequalia ob aequale additamentum: & hac ratione non ſolum dupla, ſed & tripla & eiuſdem etiam multiplicia omnia aequalia apparebunt.

Et quæ ſibi ipſis congruunt inter ſe ſunt æqualia] *hoc geometriae proprium eſt.* B

Duæ rectæ lineę ſpacium non comprehendunt] *Hoc non admodum manifeſtum videtur. quare in editione Campani inter petitiones locum obtinuit.* C

His axiomatibus nonnulla alia adijcienda cenſuit Pappus, vt videre licet apud Proclum. Cum autē omnis ſcientia duplex ſit. alia quidem circa immediatas propoſitiones verſatur, alia vero circa ea quę ex illis demonſtrantur, comparanturq́, & omnino circa ea, quae principia conſequuntur, ſuam perficit tractationem. hęc rurſus in geometricis rationibus ſe ipſam in problematum perfectionem, & in theorematum inuentionem diſpertiuit; problemata quidem appellans ea, in quibus, quae non ſunt quodammodo comparare proponit, in apertumq́, proferre; & machinaris theoremata vero, in quibus id, quod ineſt, vel non ineſt perſpicere, cognoſcereq́, ac demonſtrare inſtituit. & illa quidem ortus, & poſitiones, & applicationes, & deſcriptiones, & circumſcriptiones, & bipartitiones, atque alia huiuſmodi conſtituere iubent; hęc vero ſymptomata, & quae ſubiectis geometriae per ſe inſunt, perſuadere, demonſtrationibuſq́, firmare contendunt. Omne autem problema, & omne theorema perfectum, expletumq́, ſuis partibus, hęc omnia in ſe ipſo habere debet, Propoſitionem, Expoſitionem, Determinationem, Conſtructionem, Demonſtrationem, & Concluſionem. harum autem Propoſitio dicit quo dato quid queſitum ſit, perfecta enim propoſitio ex vtriſque conſtat. Expoſitio ipſum per ſe datum aſſumens preparat queſtioni. Determinatio ſeorſum queſitum quodnam ſit explicat. Conſtructio ea, quae dato deſunt ad queſiti uenationem adijcit. Demonſtratio perite ex conceſſis quod propoſitum eſt colligit. Concluſio rurſus ad propoſitionem regreditur confirmans id, quod oſtenſum eſt. & omnes quidem problematum, & theorematum partes tot ſunt. maxime autem neceſſariae, & quae in omnibus inſunt Propoſitio, Demonſtratio, & Concluſio: oportet enim ante cognoſcere queſitum, perq́, media oſtendere. & quod oſtenſum eſt concludere. Harum autem trium, vt aliqua deſit, fieri non poteſt. at reliquae ſępe aſſumuntur, ſępe vero, cum nullam afferant vtilitatem, omittuntur. Determinatio enim, & Expoſitio non ſunt in illo problemate. Aequicrure triangulum conſtituere, quod habeat vtrumque eorum, qui ad baſim ſunt, angulorum duplum reliqui. Conſtructio autem in compluribus theorematibus non eſt, cum ſatis ſit expoſitio abſque alia additione, vt ex datis propoſitum oſtendatur. Quando igitur deficere expoſitionem dicimus? cum in propoſitione nullum fuerit datum. quamquam enim propoſitio diuidatur in datum & queſitū, non tamen hoc ſemper fit, ſed aliquando ſolum dicit queſitum, quod cognoſcere, vel comparare oportet, vt in iam dicto problemate. non enim ante dicit, quo dato oporteat aequicrure triangulum conſtituere, habens vtrumque aequalium angulorum duplum reliqui, ſed tantum quod oportet illud comparare. & ſit quidem etiam hoc loco ex ante cognitis propoſiti ſumptio. etenim quid aequicrure, & quid aequale, vel duplum ſit cognoſcimus. hoc autem omni dianoiticae diſciplinae proprium eſſe dicit Ariſtoteles. nihil tamen nobis ſubijcitur, quemadmodum in alijs problematibus, vt quando dicit, Datam rectam lineam terminatam bifariam ſecare. hic enim recta linea data eſt, iubemur autem ipſam bifariam diuidere. ſeorſum igitur ponitur datum, & ſeorſum queſitum. Cum autem propoſitio vtrumque habuerit, tum & determinatio inuenitur, & expoſitio; ſed cum deficit datum, & hae deficiant neceſſe eſt. expoſitio etenim eſt dati, & determinatio, quae propoſitioni eadem erit. nam quid aliud dicas determinans in iam dicto problemate, niſi quod aequicrure triangulum inuenire oportet? hoc autem erat propoſitio. ſi igitur propoſitio non habeat datum, & queſitum, expoſitio quidem tacetur, quod non ſit datum; determinatio vero prętermittitur, ne eadem fiat, quae propoſitio. multa autem alia inueniuntur huiuſmodi problemata, preſertim in arithmeticis, & in decimo libro, vt inuenire duas rectas lineas potentia commenſurabiles, quae medium comprehendant, & omnia, quae eiuſmodi ſunt. Animaduertendum tamen Archimedem quidem ſępe, vt in libro de quadratura parabolae, Pappum vero fere ſemper propoſitionem ipſam omittere, contentos expoſitione, ac determinatione, loco propoſitionis. Datum autem inter, vno horum modorum datur vel poſitione, vel proportione, vel magnitudine, vel ſpecie: punctum enim dumtaxat poſitione datur, linea vero, & alia

Omne problema, & omne theorema perfectū ſex habet partes.

Propoſitio, demonſtratio & cōcluſio maxime neceſſariae.

Cōſtructio deeſt, cum expoſitio ſatis ſit.

Archimedes & Pappus aliquādo propoſitionem omittunt.

Specie, *alia omnibus. nam cum dicimus datum angulum rectilineum bifariam secare, speciem anguli, quae data est, significamus, nempe rectilineam, vt ne quęramus eisdem methodis etiam curuilineum angulum bifariam secare. Cum vero dicimus, Datis duabus rectis lineis inequalibus à maiori aequalẽ minori abscindere, magnitudine datae sunt. maius enim, & minus, terminatum, & infinitum ad magnitudinem referuntur. At cum dicimus, Si quattuor magnitudines proportionales*

Magnitudine

Proportione *sint, & permutando proportionales erunt, datur eadem proportio in quattuor magnitudinibus, & cum dicimus. Ad datum punctum oportet datae lineae aequalem rectam lineam ponere, punctum positione datur. quare cum positio varia esse possit, & constructio variabitur; datur enim punctum vel extra rectam lineam, vel in recta linea, & in extremitate, vel inter ipsius terminos. itaque cum datum quadrupliciter sumatur, & expositio quadrupliciter fit, & quandoque duos etiam, & tres modos complectitur. demonstratio vero interdum quidem quae demonstrationis propria sunt habere inuenietur, ex diffinitionibus medijs quęsitum ostendens; hęc enim demonstrationis perfectio est: interdum uero ex certis notis arguens; quod diligenter attendere oportet, ubique enim geometricae rationes necessitatem habent ob subiectam materiam, non ubique uero demonstrantibus methodis perficiuntur. denique conclusio duplex esse solet, particularis, & uniuersalis. nam cum in dato conclusionem fecerimus, ne uideamur particularia proposuisse, ad uniuersalem transimus conclusionem. Verum cum hęc ita determinata sint, de ijs quae ipsis adnectuntur, breuiter differemus, nempe quid sit lemma, quid casus, quid corollarium, quid instantia, quid deductio. lemma uel sumptio proprie in geometricis est propositio fide indigens. cũ enim uel in constructione, uel in demonstratione aliquod sumimus eorum, quae ostensa non sunt, sed ratione indigent, tunc id quod simptum est, veluti per se ambiguum inquisitione dignum esse arbitrati, lemma ipsum appellamus, à postulato, & axiomate differens quatenus demonstrari potest, cum illa absque demonstratione ad aliorum fidem faciendam per se sumantur. Casus autem differentes constructionis modos, & positionis mutationem indicat, nimirum transpositis punctis, uel lineis, uel planis, uel solidis, & omnino ipsius uarietas circa descriptionem uersatur; ac propterea dicitur casus, quòd sit constructionis transpositio. Corollarium uero dicitur quidem & de quibusdam problematibus, qualia sunt corollaria Euclidi ascripta. sed proprie dicitur corollarium, quando ex demonstratis aliquod aliud theorema apparet, quod à nobis propositum non est; & corollarium ob id uocant, quòd sit tanquam lucrum quoddam accedens prꝛter demonstrationis propositum. Instantia uero totum orationis impedit cursum, uel constructioni, uel demonstrationi occurrens, quam tamen non oportet ut ueram admittere, sed remouere, & ostendere falsam esse. Deductio autem est transitus ab alio problemate, uel theoremate ad aliud, quo cognito, uel comparato etiam illud, quod propositum est, apparet, ut cum quęreretur cubi duplicatio transtulerint quęsitum in aliud, quod hoc consequitur, uidelicet in duarum mediarum inuentionem. & deinceps quęsierunt quo nam pacto datis duabus rectis lineis duae mediae proportionales inueniantur.*

Cum positio uaria sit, & constructio uariabitur.

Demonstratio perfecta.

Geometricae rationes necessitatẽ habent ob subiectam materiam.

Cõclusio duplex.

Lemma.

Casus.

Corollarij.

Instantia.

Deductio.

Cubi duplicatio.

PROBLEMA I. PROPOSITIO I.

In data recta linea terminata, triangulũ æquilaterũ constituere.

Sit data recta linea terminata A B. oportet in ipsa A B triangulum æquilaterum constituere. centro quidem A interuallo autem A B circulus describatur B C D. & rursus centro B, interualloq; B A describatur circulus A C E, & à puncto C, in quo circuli se inuicem secant ad A B ducantur rectæ lineæ C A C B. Quoniam igitur A centrum est circuli C B D, erit A C ipsi A B æqualis. rursus quoniã B circuli C A E est centrum, erit B C æqualis B A. ostensa est autem et C A æqualis A B. vtraque igitur ipsarum C A C B ipsi A B est æqualis. quæ autem eidẽ sunt æqualia, et inter se æqualia sunt. ergo C A ipsi C B est æqualis. tres igitur C A A B B C inter



ter se sunt æquales; ac propterea triangulum æquilaterum est A B C, & constitutum est in data recta linea terminata A B, quod faciſſe oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

Ea omnia, quae ante dicta sunt, in hoc primo problemate contemplari licet. nam problema esse manifesto apparet: imponit enim nobis trianguli aequilateri ortum machinari. & propositio ex dato; & quæsito constat. datur enim recta linea terminata, quæritur autem quo pacto in ipsa triangulum aequilaterum constituatur. & præcedit quidem datum, sequitur autem quæsitum, vt coniunctum etiam texere possis, si est recta linea terminata, fieri potest vt in ipsa constituatur triangulum aequilaterum. neque enim non recta existente triangulum constituetur, quod ex rectis lineis constat, neque non terminata; angulus enim fieri non potest, nisi ad vnum punctum, infinitae autem extremum punctum non est. post propositionem sequitur expositio. Sit data recta linea terminata A B] *& vides expositionem datum solum explicare, non etiam quæsitum adiungere, post quam determinatio* [oportet in data recta linea triangulum æquilaterũ constituere] *determinatio autem quoddammodo attentionis est causa, attentiores enim ad demonstrationem nos reddit quæsitum pronunciando, quemadmodum expositio dociliores efficit, datum ante oculos ponendo. post determinationem constructio sequitur* [centro quidem altero rectæ lineæ termino, interuallo autem reliquo circulus describatur, rursusq; centro quidem reliquo, interuallo autem eo, quod prius centrum erat, describatur circulus, et à communi sectionis circulorum puncto ad lineæ terminos rectæ lineæ ducantur] *& vides me ad constructionem vti postulatis, videlicet à quouis puncto ad quodvis punctum rectam lineam ducere. & quouis centro & interuallo circulum describere. vniuersæ enim postulata constructionibus, axiomata vero demonstrationibus vtilitatem afferunt. deinde sequitur demonstratio, quae ex circuli diffinitione, & illo axiomate. Quae eidem aequalia, & inter se sunt aequalia, concludit tres rectas lineas C A, A B, B C inter se esse aequales. vnde colligitur triangulum A B C aequilaterum esse, atque hæc est prima conclusio, quae expositionem consequitur; post hanc est ipsa vniuersalis.* [In data igitur recta linea triangulum æquilaterum constitutum est.] *siue enim duplam eius, quae nunc exposita est, feceris datam, siue triplam, siue aliam quamlibet maiorem, vel minorem; eadem constructiones, & demonstrationes congruent. his apposuit particulam* [quod faciſſe oportebat] *ostendens conclusionem problematicam esse; etenim in theorematibus apponit* [quod ostendisse oportebat] *namq; illa factionem alicuius, hæc demonstrationem, & inuentionem denuntiant. In vno igitur hoc primo problemate omnia examinare voluimus, ac perspicua facere. oportet autem illos, qui hæc legent, in reliquis eadem quærere, & quæ nam eorum assumantur, quænam omittantur, & id, quod datum est, quotupliciter detur: & ex quibus principijs vel constructiones, vel demonstrationes pendeant: horum enim perspicua contemplatio non paruam exercitationem, geometricarumq; rationum meditationem affert. sed fortasse non inutile erit reliqua eiam triangula constituere. & primum aequicrure. Sit igitur A B, in qua oportet aequicrure triangulum constituere. & describantur circuli, vt in aequilatero, producaturq; A B ex vtraque parte ad C D puncta. aequalis igitur est C B ipsi A D. quare centro quidem B, interuallo autem C B circulus C E describatur. & rursus centro A, & interuallo D A describatur circulus D E. & à puncto E, in quo se se circuli secant ad A B puncta ducantur E A, E B. quoniam igitur E A aequalis est ipsi A D, & E B ipsi B C: aequalis autem A D ipsi B C: erit & E A ipsi E B aequalis. sed & maiores sunt quam A B. aequicrure igitur triangulum est A B E, quod faciſſe oportebat. At propositum sit scalenũ constituere triangulum in data recta linea A B, & describantur circuli centris A, B, interuallis autem A B, vt in superioribus. & sumatur in circumferentia circuli, A centrum habentis, punctum F, & ducta A F producatur ad G, & G B iungatur. quoniam*



Propositio, quæ ex dato & quæsito constat.

Expositio.

Determinatio.

Constructio.

Postulata cõstructionib⁹ utilia

Demonstratio.

Conclusio prima, & particularis.

Cõclusio uniuersalis.

Quod faciſſe oportebat.

Quod ostendisse oportebat.

Aequicruris trianguli cõstitutio.

Scaleni triãguli constitutio.

quoniam igitur A cẽtrum eſt circuli D E, erit A F ipſi A D aequalis. maior igitur eſt A G quàm A D, hoc eſt quàm G B. centrum enim eſt ipſium B circuli C E. ergo G B eſt aequalis B C, ac propterea G B quàm B A maior. at G A maior quàm G B. tres igitur C B B A A G inęquales ſunt. quare ſcalenum triangulum eſt. tria igitur triangula ſunt conſtituta. ſed hęc diuulgata ſunt.

Aequilaterũ triangulum unico modo conſtituitur.

Illud vero in his pulchrum inuenitur. Triangulum ſcilicet aequilaterum vndequaque aequale exiſtens vnico modo conſtitui, Aequicrure autem in duobus tantum lateribus aequalitatem habens, conſtitui dupliciter; data namque recta linea, vel ambabus aequalibus minor eſt, vt nos poſuimus,

Aequicrure dupliciter.

vel maior: ſcalenum vero vndique inęquale exiſtens tripliciter conſtitui. vel enim data recta linea maxima eſt, vel minima trium, vel alterа quidem maior, altera vero minor. & licet in vna quaque harum poſitionum vel protendenti, vel contrahenti ſe exercere. nobis autem quae ſunt expoſita ſufficiant. At ſi vniuerſe contemplabimur dicemus, problematum alia quidem ſimpliciter, alia vero multipliciter, & alia infinite conſtitui, & ea, quae ſimpliciter conſtituuntur (vt inquit amphinomus) ordinata appellantur, & quae conſtituuntur multipliciter, media, quae vero infinite, inordinata vocantur. Vide reliqua apud Proclum, fortaſſe enim hęc ſatis ſuperq;.

Scalenum tripliciter.

Problemata ordinata.

Media.

Inordinata.

PROBLEMA II. PROPOSITIO II.

Ad datum punctũ datæ rectæ lineę ęqualẽ rectam lineã ponere.

Sit datum quidem punctum A, data vero recta linea B C. oportet ad A punctum ipſi B C rectæ lineæ æqualem rectam lineam ponere. ducatur à puncto A ad B recta linea A B: et in ipſa conſtituatur triangulum ęquilaterum D A B, producanturq; in directum ipſis D A D B rectæ lineæ A E B F. et centro quidem B, interuallo autem B C circulus C G H deſcribatur. rurſuſq; centro D, et interuallo D G deſcribatur circulus G K L. Quoniam igitur punctum B cẽtrum eſt C G H circuli, erit B C ipſi B G æqualis. & rurſus quoniam D centrum eſt circuli G K L, erit D L æqualis D G: quarum D A eſt æqualis D B. reliqua igitur A L reliquę B G eſt æqualis. oſtenſa autẽ eſt B C æqualis B G.



Poſtul. 1.

Prima huius

Poſtul. 2.

3.

Diffin. 15.

Com. no. 3.

Com. no. 1.

quare vtraque ipſarum A L B C eſt æqualis ipſi B G. quæ autem eidem æqualia ſunt, et inter ſe ſunt æqualia. ergo & A L eſt æqualis B C. ad datum igitur punctũ A datę rectę lineę B C ęqualis poſita eſt A L. quod facere oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

Problematum, & theorematum alia ſunt ſine caſu, alia multos habent caſus.

Problematum, & theorematum alia quidem ſine caſu ſunt, alia vero multos habent caſus. quęcunque igitur eandem vim habent per plures deſcriptiones peruadentem, & poſitiones permutantia eandem demonſtrationis rationem ſeruant, hęc caſum habere dicuntur. quęcunque vero iuxta vnam duntaxat poſitionem, vnamq; conſtructionem procedunt, ea ſunt ſine caſu. ſimpliciter enim caſus circa conſtructionem tum theorematum, tum problematum conſideratur.

Secundũ problema multos habet caſus.

ſecundum igitur problema multos habet caſus. datur autem in ipſo punctum quidem poſitione, eo enim tantum modo dari poteſt; linea vero ſpecie, & magnitudine datur. quęritur autem rectae lineae aequalem rectam lineam ponere ad datum punctum, vbicunque ſitum fuerit. & conſtat omnino punctum illud in eo-



dem

dem esse plano, in quo & recta linea, non autem in sublimi. omnibus si quidem planorum problematibus, & theorematibus vnum subiici planum existimare oportet. at vero huius problematis casus fieri iuxta puncti dati differentem positionem manifestum est. aut enim punctum extra rectam lineam ponitur, aut in ipsa: & siquidem in ipsa, vel in altero eius termino, vel intra terminos. si vero extra rectam lineam, vel à lateribus ponitur, ita vt ab eo ad terminum rectae lineae ducta angulum faciat; vel in directum ipsi siue à fronte, siue à tergo, ita vt producta linea ad dictum punctum pertineat. Euclides autem punctum datum extra rectam lineam sumpsit, atque à lateribus. si enim in ipsa, frustra duceretur à puncto A ad B recta linea, quippe quae iam ducta esset. at si in recta linea B C punctum sumatur inter B C, vel in directum ipsi, producta nimirum B C ad A, similiter in ipsa B A constituetur triangulum aequilaterum D A B: latera autem eodem protendentur modo, & demonstratio eadem erit. Quòd si loco trianguli aequilateri, aequicruri vti libeat, nihilo minus eadem sequentur. denique si punctum datum fuerit in altero rectae lineae termino, non opus erit neque triangulo, neque altero circulo, sed sola descriptio vnius circuli satis erit. centro enim dicto termino, in quo est punctum datum, interuallo autem reliquo, si circulus describatur, quot quot ab eo ad circumferentiam rectae lineae ductae fuerint, problema efficient.





Aequicruri triangulo pro æquilatero uti licet.

PROBLEMA III.
PROPOSITIO III.

Duabus datis rectis lineis inæqualibus à maiori minori æqualem abscindere.



Sint datæ duæ rectæ lineæ inæquales A B C; quarum maior sit A B. oportet à maiori A B minori C æqualem rectam lineam abscindere. ponatur ad A punctum ipsi C æqualis recta linea A D: & centro quidem A, interuallo autem A D circulus describatur D E F. et quoniam A centrũ est D E F circuli, erit A E ipsi A D æqualis. sed & C est æqualis AD. vtraque igitur ipsarum AE C ipsi AD æqualis erit. Quare & A E ipsi C est æqualis. Duabus igitur datis rectis lineis inæqualibus AB C à maiori AB minori C æqualis Abscissa est A E. quod fecisse oportebat.



Ex antecedente.

pcst. 3.

Com. no. 1.

THEOREMA. I. PROPOSITIO. IIII.

A Si duo triangula duo latera duobus lateribus æqualia habeant, alterum alteri; habeant autem et angulum angulo æqualem, qui æqualibus rectis lineis continetur: & baſim baſi æqualem habebunt; & triangulum triangulo æquale erit; et reliqui anguli reliquis angulis æquales, alter alteri; quibus æqualia latera ſubtenduntur.



Sint duo triangula A B C D E F, quæ duo latera A B A C duobus lateribus D E D F æqualia habeant, alterum alteri, videlicet latus quidem A B lateri D E æquale, latus vero A C ipſi D F; et angulum B A C angulo E D F æqualem. Dico & baſim B C baſi E F æqualem eſſe, et triangulum A B C æquale triangulo D E F, et reliquos angulos reliquis angulis æquales, alterum alteri; quibus æqualia latera ſubtenduntur; nempe angu-

B lum A B C angulo D E F: et angulum A C B angulo D F E. triangulo enim A B C congruente ipſi D E F, et puncto quidem A poſito in D, recta vero linea A B in ipſa D E: et punctum B puncto E congruet; quòd A B ipſi D E ſit æqualis. congruente autem A B ipſi D E; congruet & A C recta linea rectæ lineæ D F, cum angulus B A C ſit æqualis angulo E D F. quare et C congruet ipſi F: eſt enim rurſus recta linea A C æqualis rectæ D F. ſed et punctum B congruebat puncto E. ergo et baſis B C baſi E F congruet. nã ſi puncto quidẽ B congruẽte ipſi E, C vero ipſi F; Com. no. 10 baſis B C baſi E F non congruit; duæ rectæ lineæ ſpacium comprehendent: quòd fieri non poteſt. congruet igitur B C baſis baſi E F, & ipſi æqualis erit. quare et totum A B C triangulum congruet toti triangulo D E F, et ipſi erit æquale; et reliqui anguli reliquis angulis congruent, et ipſis æquales erunt, videlicet angulus A B C angulo D E F, et angulus A C B angulo D F E. ſi igitur duo triangula duo latera duobus lateribus æqualia habeant, alterum alteri, habeant autem et angulũ angulo æqualem, qui æqualibus rectis lineis continetur; & baſim baſi æqualem habebunt; et triangulum triangulo æquale erit; et reliqui anguli reliquis angulis æquales, alter alteri; quibus æqualia latera ſubtenduntur: quòd oſtẽdere oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

A Si duo triangula duo latera duobus lateribus æqualia habeant alterum alteri] *in hac propoſitione duo ſunt, quę dantur, videlicet duorum laterum æqualitas, & æqualitas eorum angulorum, qui æqualibus lateribus continentur. quae quidem proportione dari manifeſtum eſt. quęruntur autem tria, aequalitas baſium, aequalitas triangulorum, & aequalitas reliquorum angulorum. ſed quoniam fieri poteſt vt duo quidem latera duobus lateribus ſint aequalia, theorema autem verum non ſit, quòd non alterum alteri eſt aequale, ſed vtraque ſimul: propterea addidit, aequalia eſſe latera non ſimpliciter, ſed alterum alteri.*

B Triangulo enim A B C congruente ipſi D E F, et puncto quidem A poſito in D, recta vero linea A B in ipſa D E: et punctum B puncto E congruet, quòd A B ipſi D E ſit æqualis, et reliqua.

Demonſtratio per ſuperpoſitionẽ figurarũ mathematicis uſitata.

Hic demonſtrationis modus, qui fit per ſuperpoſitionem figurarum prętęrquam quod approbatur à Proclo mathematicarum ſcientiarum peritiſſimo, eſt etiam maximo vſui mathematicis. Archimedes enim eum vſurpat non ſolum in planis figuris, vt in libro de centro grauitatis planorum, ſed etiam in ſolidis, vt in libro de conoidibus, & ſphęroidibus.

THEO-

THEOREMA II. PROPOSITIO. V.

Aequicrurium triangulorum qui ad baſim anguli inter ſe ſunt æquales: & productis æqualibus rectis lineis anguli qui ſunt ſub baſi inter ſe æquales erunt.



Sit æquicrure triangulum A B C; habens A B latus lateri A C æquale, et producantur indirectum ipſis A B A C rectæ lineæ B D C E. Dico angulum quidem A B C angulo A C B; angulum vero C B D angulo B C E æqualem eſſe. ſumatur enim in linea B D, quod vis punctum F: atque à maiori A E minori A F æqualis auferatur A G: iunganturq; F C, G B. Quoniam igitur A F quidem eſt æqualis A G; A B vero ipſi A C; duæ F A A C, duabus G A A B æquales ſunt, altera alteri; et angulum F A G communem continent. baſis igitur F C baſi G B eſt æqualis; et triangulum A F C æquale triangulo A G B; et reliqui anguli reliquis angulis æquales erunt, alter alteri; quibus æqualia latera ſubtenduntur: Videlicet angulus quidem A C F æqualis angulo A B G; angulus vero A F C; angulo A G B. Et quoniam tota A F, toti A G eſt æqualis; quarum A B eſt æqualis A C; erit et reliqua B F reliquæ C G æqualis. oſtenſa eſt autem F C æqualis G B. duæ igitur B F, F C duabus C G G B æquales ſunt, altera alteri; et angulus B F C æqualis angulo C G B: eſtq; baſis ipſorum B C communis. ergo et triangulum B F C triangulo C G B æquale erit; et reliqui anguli reliquis angulis æquales, alter alteri quibus æqualia latera ſubtenduntur. angulus igitur F B C eſt æqualis angulo G C B: et angulus B C F angulo C B G. Itaque quoniam totus A B G angulus toti angulo A C F æqualis oſtenſus eſt, quorum angulus C B G eſt æqualis ipſi B C F: erit reliquus A B C reliquo A C B æqualis: et ſunt ad baſim A B C trianguli: oſtenſus autem eſt & F B C angulus æqualis angulo G C B; qui ſunt ſub baſi. æquicrurium igitur triangulorum, qui ad baſim anguli inter ſe ſunt æquales; et productis æqualibus rectis lineis anguli, qui ſunt ſub baſi inter ſe æquales erunt. quod oſtendiſſe oportebat.

5. Huius.

Ex præcedente.

Axioma. 3.

Ex præcedente.

Axioma. 3.

F. C. COMMENTARIVS.

Theorematum alia ſimplicia ſunt, alia compoſita. dico autem ſimplicia quæcunque iuxta poſitiones, & concluſiones indiuidua ſunt, vnam habentia datum, et vnum quæſitum. vt ſi Euclides ita dixiſſet. omne triangulum aequicrure aequales habet, qui ad baſim ſunt, angulos. compoſita verò ſunt, quae ex pluribus conſtantia, vel poſitiones habẽt compoſitas, vel concluſiones, vel etiam vtraſque. compoſitorum autem alia ſunt complexa, alia incomplexa. incomplexa ſunt quæcunque in ſimplicia theoremata diuidi non poſſunt, cuiuſmodi eſt quartum theorema; in eo enim & datum componitur, & quæſitum, ſed datum in ſimplicia diuidi minime poteſt, vt plura fiant theoremata: non enim ſi triangula aequales habeant angulos, vel eum dumtaxat, qui eſt ad verticem, reliqua contingunt. complexa vero ſunt quæcunque in ſimplicia diuiduntur, vt illud theorema, Triangula, & parallelogramma quae eandem habent altitudinem inter ſe ſunt, vt baſes. fieri enim poteſt, vt diuidentes ita dicamus. Triangula quae eandem habent altitudinem inter ſe ſunt, vt baſes; & in parallelogrammis ſimiliter. Omnium autem compoſitorum alia quidem iuxta concluſionem componuntur, ab eadem poſitione ortum habentia; alia vero iuxta poſitiones, & eandem omnibus concluſionem inferunt; & alia iuxta concluſiones, & poſitiones componuntur. Itaque iuxta concluſionem compoſitio eſt in quarto theoremate. in eo enim tria ſunt quae concluduntur, videlicet baſes aequales eſſe, & triangula aequalia, & reliquos angulos reliquis angulis aequales; quibus aequalia latera ſubtenduntur. iuxta poſitiones compoſitio inuenitur in theoremate, quod triangulis, & parallelogrammis, eandem habentibus altitudinem commune eſt. iuxta vtraſque autem in illo.

Theoremata ſimplicia.

Theoremata cõpoſita.

Compoſit. Theo. alia. cõplexa, alia incomplexa.

Complexa theoremata.

Theorema compoſitũ iuxta concluſionem.

Theo. cõpo. iuxta poſitiones.

in illo. Diametri circulorum & ellipſium tum ſpacia, tum lineas ſpacia continentes bifariam diuidunt. Rurſus complexorum theorematum alia vniuerſalia ſunt, alia ex particularibus vniuerſale concludunt. omnino autem has compoſitiones geometrae ob breuitatem, ac reſolutiones excogitarunt, multa enim cum incompoſita ſint, non reſoluuntur: compoſita vero ſolum commoditates prębent ad reſolutionem, quae in principia tendit. his igitur conſideratis apparet quintum theorema compoſitum eſſe, tum iuxta datum, tum iuxta queſitum, & vtrumque eorum, quae componuntur perfectum eſt ac verum. quamobrem reſolutio quoque vera eſt in vtroque. ſiue enim qui ad baſim anguli, ſiue productis aequalibus rectis lineis anguli ſub baſi aequales ſint, aequicrure triangulum erit. Huius theorematis inuentor fuit Thales, vt refert Proclus. is enim primus dicitur animaduertiſſe omnis aequicruris angulos qui ad baſim eſſe aequales, ac more antiquorum aequales ſimiles appellaſſe.

Complexorem Theorematũ alia, uniuerſalia, alia ex particularibus uniuerſale cõcludunt.

Thales quinti Theorematis inuẽtor.

THEOREMA III. PROPO. VI.

Si trianguli duo anguli inter ſe ſint æquales, et æquales angulos ſubtendentia latera inter ſe æqualia erunt.

Sit triangulum A B C, habens angulum A B C angulo A C B æqualem. Dico et A B latus lateri A C æquale eſſe; ſi enim inæqualis eſt A B ipſi A C; altera ipſarum eſt maior. ſit maior A B; atque à maiori A B minori A C æqualis auferatur D B; et D C iungatur. Quoniam igitur D B eſt æqualis ipſi A E; communis autem B C: erunt duæ D B B C duabus A C C B æquales, altera alteri; et angulus D B C æqualis angulo A C B. baſis igitur D C baſi A B eſt æqualis; et triangulum D B C æquale triangulo A C B, minus maiori; quod eſt abſurdum. non igitur inæqualis eſt A B ipſi A C. ergo æqualis erit. Si igitur trianguli duo anguli inter ſe ſint æquales, et æquales angulos ſubtendentia latera inter ſe æqualia erunt: quod demonſtraſſe oportuit.



3. huius.

4. huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Preſens theorema duo hęc in primis oſtendit, theorematum ſcilicet conuerſionem, & deductionem ad id, quod fieri non poteſt. conuertitur enim precedenti theoremati, & per deductionem ad id, quod fieri non poteſt, demonſtratur. conuerſio autem apud Geometras proprie dicitur, quando concluſiones, & poſitiones viciſſim in theorematibus tranſmutantur, & quod prioris eſt concluſio, in poſteriori poſitio fit: & contra poſitio tanquam concluſio infertur. vt in illo, Aequicrurium triangulorum, qui ad baſim anguli ęquales ſunt. poſitio quidem eſt aequicrure triãgulum: concluſio autem triangulorum, qui ad baſim ſunt, aequalitas. Et quorum anguli qui ad baſim aequales; ea aequicruria ſunt, vt in hoc theoremate, in quo poſitio quidem eſt, angulorum, qui ab baſim, aequalitas; concluſio autem aequalitas laterum, quae aequalibus angulis ſubtendũtur. eſt etiam alia conuerſio iuxta quandam duntaxat compoſitorum tranſmutationẽ. Si enim ſit theorema compoſitum à pluribus poſitionibus incipiens, & in concluſionem deſinens, ſumentes concluſionem, & vnam ex poſitionibus, vel etiam plures; concluſionem faciunt aliquã reliquarum poſitionum. & hoc modo quarto theoremati octauum conuertitur. In illo enim ponuntur quidem duo latera aequalia; & angulus angulo aequalis, qui aequalibus lateribus continetur: cõcluditur aũt baſim baſi aequalẽ eſſe. At in octauo ponuntur duo latera aequalia; baſisq; baſi aequalis: & concluditur angulum, qui aequalibus lateribus continetur, aequalem eſſe. Cum igitur duae ſint conuerſiones, ea quae proprie ſic dicitur, vniformis eſt, & determinata; altera vero varia, & non in vno, ſed in multis conuertens ob multitudinem poſitionum, quae in compoſitis theorematibus ſunt. Theorematum vero, quae conuertuntur, alia precedentia vocare conſueuerunt; alia conuerſa. Cum enim genus quoddam ponentes, aliquod de ipſo ſymptoma demõſtrãt, hoc precedens appellatur: & cum è contrario poſitionem quidem faciunt ſymptoma; concluſionẽ vero genus, cui illud accidit, conuerſam vocatur. vt omne triangulum aequicrure angulos qui

Hoc theorema præcedẽti cõuertitur

Conuerſio apud Geometras quæ proprie dicatur.

Conuerſio alia.

Quarto octauum conuertitur.

Theorematũ, q̃ cõuertũtur, alia precedentia sũt alia cõuerſa.

ad

ad baſim ſint, æquales habet. hoc præcedens eſt. Omne triangulum duos angulos æquales habẽs, latera quoque æquales angulos ſubtendentia habet æqualia, & eſt æquicrure. hoc cõuerſum eſt. & hęc de cõuerſionibus geometricis dicta ſufficiant. deductiones vero id, quod fieri non põt, in eui dens abſurdum deſinunt, & cuius oppoſitã omnes fatentur. accidit autem ipſarũ alias deſinere in ea, quae cõmunibus notionibus, vel poſtulatis, vel poſitionibus opponũtur; alias in ea, quae prius demonſtratis contradicunt. Nam ſextum hoc theorema, quod accidit fieri non poſſe oſtendit, cum deſtruat communem notionem illam: Omne totum eſt maius ſua parte. octauum vero deſinit quidem in id, quod fieri non poteſt; non tamen deſtruit communem notionem, ſed id quod per ſeptimum theorema oſtenſum eſt. quod enim ſeptimum fieri poſſe negauit, hoc illud affirmans conſequi oſtendit ijs, qui quęſitum non concedunt. omnis autem deductio ad id, quod fieri non poteſt, ſumens quod cum quęſito pugnat, & hoc ponens progreditur, donec euidenti abſurdo occurat, perq; illud poſitionem deſtruens, cõfirmat id quod à principio querebatur. omnino enim ſcire oportet mathematicas probationes omnes vel à principijs eſſe, vel ad principia: vt etiã inquit Porphyrius. & quae à principijs ſunt, itidem duplices eſſe. aut enim ex cõmunibus notionibus, & ſola euidentia per ſe fidem faciente emanant; aut ex ijs, quae ante oſtenſa fuere. Quae vero ad principia aut principia ponunt, aut deſtruunt. quae principia ponunt reſolutiones vocantur; atque his opponuntur compoſitiones. fieri enim poteſt, vt à principijs illis ad quęſitum ordinate procedamus, & hoc nihil aliud eſt, niſi compoſitio. quae vero principia deſtruunt, deductiones ad id, quod fieri non poteſt nuncupantur. aliquid enim eorum, quae conceſſa, manifeſtaq; ſunt deſtruere huius ipſius viae munus eſt: atque eſt hac ſyllogiſmus quidam, ſed non idem, qui in reſolutione. Nam in deductionibus ad id, quod fieri non poteſt iuxta ſecundum hypotheticarum ratiocinationum modum complexio eſt. vt ſi triangulorum æquales angulos habentium latera aequales illos angulos ſubtendentia aequalia non ſint; totum parti eſt aequale. atqui hoc fieri non poteſt. triangulorum igitur duos angulos aequales habentium latera quoque aequales angulos ſubtendentia aequalia erunt. Vtitur autem Euclides conuerſione quidem in propoſitione ipſa; vtpote qui concluſionem quinti theoretis, vt datum accipiens, poſitionem illius adiunxit, vt quęſitum; deductione autem ad id, quod fieri non poteſt in conſtructione, & demonſtratione vtitur. hęc ex Proclo.

Deductiones ad id, qd fieri non poteſt in euidens abſurdũ deſinunt.

Mathematicæ probationes uel a prĩcipijs sũt uel ad principia. Reſolutiõs. Compoſitiones.

Deductiones ad id, q̃ fieri non poteſt.

THEOREMA. IIII. PROPOSITIO. VII.

In eadem recta linea, duabus eiſdem rectis lineis aliæ duæ rectæ lineæ æquales, altera alteri non conſtituentur ad aliud, atque aliud punctum, ad eaſdem partes, eoſdem, quos primæ rectæ lineæ, terminos habentes.



Si enim fieri poteſt, in eadem recta linea A B duabus eiſdem rectis lineis A C C B aliæ duæ rectæ lineæ A D D B æquales, altera alteri conſtituantur ad aliud, atque aliud punctum C D; ad eaſdem partes vt ad C D, eoſdem habentes terminos A B, quos primæ rectæ lineæ; ita vt C A quidem ſit æqualis D A, eundem, quem ipſa terminum, habens A; C B vero ſit æqualis D B, eundem habens B terminum; & C D iungatur. Itaque quoniam A C eſt æqualis A D; erit et angulus A C D angulo A D C æqualis. maior igitur eſt A D C angulus angulo D C B. quare angulus C D B angulo D C B multo maior erit. Rurſus quoniam C B eſt æqualis D B; et angulus C D B æqualis erit angulo D C B: oſtenſus autem eſt ipſo multo maior; quod fieri non poteſt. Non igitur in eadem recta linea duabus eiſdem rectis lineis aliæ duæ rectæ lineæ æquales, altera alteri conſtituentur ad aliud, atque aliud punctum, ad eaſdem partes, eoſdem, quos primę rectæ lineæ, terminos habentes; quod oſtendiſſe oportebat.

5. huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Hoc Theorema rarum quiddam habet; quod haud frequenter propoſitionibus, quae ſcientiam pariunt

Propoſitiones theorematum geometricorũ, arithmeticorũq; utpluri mũ affirmationes sunt.

pariunt euenire conſueuit. per negationem enim, & non per affirmationem formari haud quaquam ipſarum proprium eſt, cum propoſitiones geometricorum, arithmeticorumq; theorematum magna ex parte affirmationes ſint. Cauſſa autem eſt (vt inquit Ariſtoteles) quod vniuerſale affirmans ſcientijs maxime conuenit, tanquam magis idoneum, & non indigens negatione. at vniuerſale negans etiam affirmatione indiget. ex negantibus enim tantum neque demonſtratio, neque ratiocinatio aliqua conſtat: ac propterea demonſtrantes ſcientiae plurima affirmantia oſtendunt: raro autem negantibus concluſionibus utuntur. hęc Proclus. Theorema uero multos habet caſus. Nam punctum D vel cadit extra lineas A C C B, vel intra, vel in ipſis. & ſiquidem extra, hoc duobus modis fit; aut enim altera linearum A C C B ſecat alteram ipſarum A D D E, aut neutra neutram ſecat. cadat primum extra, ſecetq; A D ipſam C B, ut apparet in prima figura, & iũgatur C D. cui quidem conſtructioni Euclidis demonſtratio conguit. Sed cum ea breuis, & quodammodo obſcura quibuſdam viſa ſit, planius, & apertius ſic explicabitur. Itaque quoniam A C eſt aequalis ipſi A D,

Theorematis uarij caſus.



5. huius.

erit angulus A C D angulo A D C aequalis. angulus autem A C D

9 com. not.

maior eſt angulo D C B; quippe quòd totum maius ſit ſua parte. angulus igitur A D C angulo D C B eſt maior. Sed C D B angulus eadem ratione maior eſt angulo A D C. Quare angulus C D B angulo D C B multo maior ſit neceſſe eſt. Rurſus quoniam B C eſt aequalis B D; erit & angulus C D B aequalis angulo D C B. atqui oſtenſus eſt multo maior; quod fieri non poteſt. ſimiliter demonſtrabitur idem ſequi abſurdum ſi recta linea B D ſecet ipſam A C. cadat deinde punctum D extra lineas A C C B, ita vt neutra neutram ſecet; & producantur rectae linae A C A D in puncta E F. Quoniam

5. huius.

igitur A C eſt aequalis A D, angulus A C D ad baſim angulo A D C aequalis erit; & productis A C A D, erit angulus F D C ſub baſi aequalis angulo D C E. Rurſus cum B C ſit aequalis ipſi B D, angulus B C D angulo B D C eſt aequalis. ſed F D C angulus maior eſt angulo C D B, quare & D C E ipſo D C B eſt maior, pars ſcilicet toto; quod fieri non poteſt. Non aliter demonſtrabimus ſequi abſurdum, ſi punctum D intra dictas lineas cadere ponatur. denique in ipſis cadere non poſſe manifeſto conſtat. totum enim parti eſſet aequale. Videtur autem hoc, ut inquit Proclus, lemma eſſe octaui Theorematis: ſiquidem ad illius demonſtrationem confert, & neque ſimpliciter elementum eſt, neque elementare: non enim ad plura ſuam extendit vtilitatem. rariſſimum igitur ipſius vſum apud geometram inueniemus.





Theorema hoc ſequentis lemma eſſe uidetur.

THEOREMA V. PROPOSITIO VIII.

Si duo triangula duo latera duobus lateribus æqualia habeant, alterũ alteri; habeant autem, et baſim baſi æqualẽ: angulũ quoque qui æqualibus lateribus continetur angulo æqualẽ habebunt.

Sint duo triangula A B C, D E F, quæ duo latera A B, A C duobus lateribus D E D F æqualia habeant alterum alteri; vt ſit A B quidẽ æquale D E; A C uero ipſi D F: habeant autem et baſim B C baſi E F æqua-



lem. Dico

lem. Dico angulum quoque BAC angulo EDF æqualem esse. Triangulo enim ABC congruente ipsi DEF triangulo; et puncto quidem B posito in E; recta vero linea BC in EF: congruet, et C punctum puncto F, quoniam BC ipsi EF est æqualis. Itaque congruente BC ipsi EF; congruent et BA AC ipsis ED DF. si enim basis quidem BC basi EF congruit; latera autem BA AC lateribus ED DF non congruunt, sed permutantur; vt EG GF: constituentur in eadem recta linea, duabus eisdem rectis lineis, aliæ duæ rectæ lineæ æquales, altera alteri; ad aliud atque aliud punctum; ad easdem partes; eosdem habentes terminos. non constituuntur autem; vt demonstratum est. non igitur, si basis BC congruit basi EF, non congruent et BA AC latera lateribus ED DF. congruent igitur. Quare et angulus BAC angulo EDF congruet, et ipsi erit æqualis. Si igitur duo triangula duo latera duobus lateribus æqualia habeant, alterum alteri; habeant autem et basim basi æqualem: angulum quoque æqualibus lateribus contentum angulo æqualem habebunt; quod demonstrare oportebat.

In antecedente.

F. C. COMMENTARIVS.

Octauum Theorema quarti conuersum est, vt supra diximus, non tamen iuxta propriam conuersionem, non enim totam illius positionem, conclusionem, totamq́, conclusionem positionem facit. Sed aliquam quidem ex positionibus, aliquam vero ex conclusionibus quarti theorematis contexens, vnum quid eorum, quae in illo data fuerunt, ostendit.

Octauum Theorema quarti conuersum est.

PROBLEMA IIII. PROPOSITIO IX.

Datum angulum rectilineum bifariam secare.

A

Sit datus angulus rectilineus BAC. Itaque oportet ipsum bifariã secare. Sumatur in linea AB quod vis punctum D; & à linea AC ipsi AD æqualis auferatur AE; iunctaq́; DE constituatur in ea triangulum æquilaterum DEF; & AF iungatur. Dico angulum BAC à recta linea AF bifariam secari. Quoniam enim AD est æqualis AE; communis autem AF: duæ DA AF duabus EA AF æquales sunt, altera alteri; & basis DF æqualis basi EF. angulus igitur DAF angulo EAF est æqualis. Quare datus angulus rectilineus BAC à recta linea AF bifariam sectus est: quod facere oportebat.



3. huius.
B
1. huius.
Ex antecedente.

F. C. COMMENTARIVS.

A

Datum angulum rectilineum bifariam secare] *Angulus hoc loco specie datur, quippe qui rectilineus sit, & non quilibet. namque angulum omnẽ bifariam secare ex elementari institutione non licet; quandoquidem ambiguum etiam est, num omnis angulus bifariam secari possit. Sectionis autem ratio non ab re distincta fuit: in quamlibet enim proportionem secare præsentem constructionem trãsgreditur, verbi gratia in tres, vel quattuor, vel quinque partes aequales. nam rectum quidem angulum trifariam secare possumus, paucis eorum, quae posterius tradentur, vtentes: acutũ vero minime, nisi ad alias lineas, quae mixtae sunt, transcendamus. Datum enim angulum rectilineum trifariam secare docuit Nicomedes ex conchoidibus: alij vero ex alijs lineis mixtis idem fecerunt, nimirũ ijs, quae à græcis τετραγωνίζουσαι dicũtur, nos quadrãtes appellare possumus, alij ex lineis cõicis, vt Pappus tradit in quarto libro collectionum mathematicarum. alij denique ex lineis spiralibus, de quibus Archimedes, incitati in datam proportionem datum angulum rectilineum secuerunt. Quorum contemplationes cum difficiles sint, præsertim ijs, qui instituuntur, in præsentia omittemus.*

Omnem angulum bifariam secare ex elementari institutione non licet. Rectum angulum trifariam secare possumus, acutũ uero minime, nisi ad lineas mixtas transcendamus.

Iunctaq́; DE constituetur in ea triangulum æquilaterum DEF.

B

Idem

Loco æquilateri trianguli æquicrure constituti potest.

Idem etiam sequetur si loco aequilateri tum in hoc, tum in sequentibus aequicrure triangulum constituamus, & demonstratio eadem erit.

PROBLEMA V. PROPOSITIO X.

Datam rectam lineam terminatam bifariam secare.

1.huius. Ex antecedē te.

Sit data recta linea terminata A B. oportet ipsam A B bifariam secare. constituatur in ea triangulum æquilaterum A B C; & secetur A C B angulus bifariam recta linea C D. Dico A B rectam lineam in puncto D bifariam secari. Quoniam enim A C est æqualis C B; communis autem C D; duæ A C C D duabus B C C D æquales sunt; altera alteri: et angulus A C D æqualis angulo B C D. basis igitur A D basi B D est æqua-



4.huius. lis. et ob id recta linea terminata A B bifariam secta est in puncto D: quod facere oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

Hoc etiam Theorema est, quod rectam lineam terminatam ponit. Si quidem ex vtraque parte infinitam terminare non possumus. Infinitae vero ex altera parte tantum, vbicunque punctum accipiatur, in partes inæquales fit sectio. etenim quae in eisdem partibus est, in quibus recta linea infinita existit, reliqua finita existente necessario est maior. relinquitur igitur, vt ex vtraque parte finita accipiatur, quae bifariam secari debet. Apollonius vero Pergæus rectam lineam terminatam bifariam secat in hūc modum. Sit, inquit, recta linea terminata A B, quam bifariam secare debemus. & centro quidem A, interuallo autem A B circulus describatur: & rursus centro B, & interuallo B A describatur alius circulus; & ducatur C D communes circulorum sectiones coniungens, quae rectam lineam A B bifariam secabit. Iungantur enim A C C B, quae inter se aequales sunt, cum vtraque ipsi A B sit aequalis. communis autem C D; & D A est aequalis D B ob eandem causam. angulus igitur A C D est aequalis angulo B C D. quare A B per quartum bifariam secta est.

Rectā lineā terminatam quō Apollonius bifariā secat.



PROBLEMA VI. PROPOSITIO XI.

Datæ rectæ lineę à pūcto in ipsa dato ad rectos angulos rectam lineam ducere.

Sit data recta linea A B, et datum in ipsa pūctum C. oportet à puncto C ipsi A B ad rectos angulos rectam lineam ducere. Sumatur in

2.huius. A C quoduis punctum D: ipsiq; C D æqualis ponatur C E, et in D E constituatur triangulū æquilaterum F D E, et E F iungatur. Dico datæ rectę lineę A B à puncto C in ipsa dato, ad rectos angulos ductam esse F C. Quoniam enim D C est æqualis C E, et F C communis; erunt duæ D C C F duabus E

8.huius. C C F æquales, altera alteri: et basis D F est æqualis basi F E. angulus igitur D C F angulo E C F est æqualis: et sunt deinceps. Quando autem recta linea super rectam lineam insistens, eos qui deinceps sunt, angulos æquales inter se fecerit: rectus est vterque æqualium angulorum. ergo vterque ipsorum D C F F C E

Diffi.10.



est

est rectus. datæ igitur rectæ lineę A B à puncto in ipsa dato C ad rectos angulos ducta est F C recta linea. quod fecisse oportuit.

F. C. COMMENTARIVS.

Datæ rectæ lineę à puncto in ipsa dato.] *linea specie datur; punctum vero positione: quod vel in medio erit rectae linae, vel in altera eius extremitate. Euclides in medio rectae linae sumpsit. Quòd si in extremitate altera sumatur, vel ipsam producentes, reliqua eodem modo construemus; vel aliter propositum assequemur. Appollonius autem rectam lineam ad rectos angulos ducit hoc pacto. Sit data quidem recta linea A B, datum vero in ea punctum C, & in linea A C sumpto quouis puncto D, ab ipsa C B auferatur C E aequalis ipsi C D: & centro quidem D, interuallo autem D E circulus describatur. Rursusq; centro E, & interuallo E D alius circulus describatur: & à puncto F, in quo circuli se inuicem secant, ducatur F C. Dico eam ad rectos angulos esse. si enim iungatur F D, F E aequales inter se erunt. sed & D C C E aequales; & cõmunis F C. Quare ex octauo anguli qui ad C etiam inter se aequales sint necesse est. Si vero punctum in extremitate rectae lineae sumatur, ita faciendum censet Proclus. Sit recta linea A B, datumq; punctum A, & sumatur in A B quod vis punctum C, à quo ipsi A B, quemadmodum nos docuit, ad rectos angulos ducatur C E: & ab ea ipsi A C aequalis abscindatur C D. angulus vero qui est ad C per rectam lineam C F bifariam secetur: atque à puncto D ipsi E C ad rectos angulos ducta occurat rectae lineae C F in F puncto; & F A iungatur. Dico angulum, qui ad A rectum esse. Quoniam enim D C est aequalis C A, communis autem C F, & angulos aequales continent, quòd angulus ad C bifariam sectus est: erit & D F ipsi F A aequalis, & omnia similiter per quartum theorema omnibus aequalia. quare & angulus ad A aequalis est angulo ad D. angulus igitur ad A rectus erit; quod facere oportebat.*



* Problematis casus.

Quo Apollonius rectã lineam ad rectos angulos ducit.

3.huius.

Postul.3.



Quãdo pũctum in extremitate lineæ sumitur quo faciẽdum sit.
3.huius.
9.huius.

4.huius.

PROBLEMA VII. PROPOSITIO XII.

Super datam rectam lineam infinitam, à dato pũcto, quod in ea non est, perpendicularem rectam lineam ducere.

Sit data quidem recta linea infinita A B, datum vero punctum C, quod in ea non est. oportet super datam rectam lineam infinitam A B, à dato puncto C, quod in ea non est, perpendicularem rectam lineam ducere. Sumatur enim ad alteras partes ipsius A B rectæ lineę quod vis punctum D: et centro quidem C, interuallo autem C D circulus describatur E F G: et E G in H bifariam secetur: iunganturq; C G C H C E. Dico super datam rectam lineam infinitam A B, à dato puncto C, quod in ea non est, perpendicularem C H ductam esse. Quoniam enim æqualis est G H ipsi H E, communis autem H C, duę G H H C, duabus E H H C æquales sunt, altera alteri; & basis C G est æqualis basi C E.



Postul.3.
10.huius.

D angulus

8.huius. angulus igitur CHG angulo EHC eſt ęqualis; & ſunt deinceps.cum autem recta linea ſuper rectam lineam inſiſtens eos, qui deinceps ſunt angulos, ęquales inter ſe fecerit; rectus eſt vterque ęqualium angulorum; et quę inſiſtit recta linea perpendicularis appellatur ad eam,cui inſiſtit.ergo ſuper datam rectam lineam infinitam AB à dato puncto C, quod in ea non eſt,perpendicularis ducta eſt CH. quod facere oportebat.

Diffi.10.

F. C. COMMENTARIVS.

Oenopides hoc problema inuenit.

Perpendiculare antiqui gnomonem appellarunt.

Perpendicularis plana, & ſolida.

Hoc problema,vt refert Proclus,Oenopides primus indagauit, vtile ipſum ad aſtrologiam exiſtimans.perpendicularem vero antiquorum more,gnomonem appellat,quoniam & gnomon horizonti ad angulos rectos eſt. quae autem ad angulos rectos, eadem eſt perpendicularis,habitudine tantum ab ea differens, cum ſubiecto eadem ſit,quemadmodum et gnomon. Rurſus perpendicularis duplex eſt,alia plana,alia ſolida.quando enim punctum,à quo perpendicularis recta linea ducitur in ſubiecto plano ſit, plana appellatur; quando autem punctum ſit ſublime,atque extra ſubiectum planum,ſolida,& plana quidem ad rectam lineam ducitur,ſolida vero ad planum.Quare neceſſarium eſt illam non ad vnam rectam lineam angulos rectos facere, ſed ad omnes,quae in ſubiecto exiſtentes plano ipſam contingunt. In hoc igitur problemate Euclides perpendicularem planam ducere proponit, quippe cum ad rectam lineam ducatur:& quatenus in vno plano omnia conſiſtant,ſermo procedat. At in linea quae eſt ad angulos rectos quoniam punctum in ipſa ſumptum eſt, nulla erit infinitatis neceſſitas: datam vero rectam lineam infinitam ponit, cum punctum,à quo perpendicularis duci debet, extra ipſam ſtatuatur. ſi enim non eſſet infinita, poterat ita punctum ſumi;vt extra quidem rectam lineam eſſet, indirectum autem ipſi, adeo vt protracta recta linea in ipſum incideret, & non fieret problema.Adde,quod niſi eſſet infinita, poſſemus etiam punctum ita ſumere,vt ſi duceretur perpendicularis, non in ipſam,ſed extra ipſam neceſſario caderet.His igitur de cauſis recta linea,ad quam perpendicularis ducēda eſt,infinita ponitur.

THEOREMA VI. PROPOSITIO XIII.

✻ Cum recta linea ſuper rectam cōſiſtens lineam angulos fecerit, vel duos rectos,vel duobus rectis ęquales efficiet.



Recta enim linea quædam AB ſuper rectam CD conſiſtens angulos faciat CBA ABD. Dico CBA ABD angulos; vel duos rectos eſſe, vel duobus rectis æquales.ſi enim CBA eſt æqualis ipſi ABD, duo recti ſunt; ſin minus, ducatur à puncto B ipſi CD ad rectos angulos BE. anguli igitur CBE EBD ſunt duo recti. Et quoniam CBE, duobus CBA ABE eſt æqualis, communis apponatur EBD. ergo anguli CBE EBD tribus angulis CBA ABE EBD ſunt ęquales.Rurſus quoniam DBA angulus eſt ęqualis duobus DBE EBA, communis apponatur ABC. anguli igitur DBA ABC tribus DBE EBA ABC ęquales ſunt. At oſtenſum eſt angulos quoque CBE EBD eiſdem tribus ęquales eſſe:quę vero eidem ſunt ęqualia, et inter ſe æqualia ſunt.ergo et anguli CBE EBD ipſis DBA ABC ſunt ęquales. ſuntq; CBE EBD duo recti. anguli igitur DBA ABC duobus rectis ęquales erunt. ergo cum recta linea ſuper rectam lineam conſiſtens angulos fecerit,vel duos rectos,vel duobus rectis ęquales efficiet.quod oportebat demonſtrare.

diffi.10.

Axioma.1.

F. C. COMMENTARIVS.

✻ Cum recta linea ſuper rectam lineam conſiſtens angulos fecerit.] *Animaduertendum eſt, vt inquit Proclus, Euclidem in hac propoſitione maximam diligentiam adhibuiſſe. non enim*

enim ſimpliciter dixit. Omnis recta linea ſuper rectã lineã conſiſtẽs, vel duos rectos facit, vel duobus rectis aequales, ſed ſ. angulos fecerit. quid enim ſi in rectae lineae extremitate cõſiſtens vnum efficit angulum? accidit ne quandoque hunc duobus rectis aequalem eſſe? hoc certe fieri non poteſt. Omnis ſi quidem rectilineus angulus duobus rectis eſt minor, quemadmodum omnis ſolidus minor eſt quattuor rectis. Quòd ſi angulum, qui maxime obtuſus eſſe videatur, accipias, hunc quoque augebis, tanquam eum qui duorum rectorum menſuram adhuc non recipit. Oportet igitur rectam lineam ſic conſiſtere, vt angulos efficiat.

Omnis angulus rectilineus duobus rectis eſt minor.

THEOREMA VII. PROPO. XIIII.

Si ad aliquam rectam lineam, atque ad punctum in ea duę rectę lineæ non ad eaſdem partes poſitę, angulos qui deinceps ſunt, duobus rectis ęquales fecerint; ipſę rectæ lineæ indirectum ſibi in uicem erunt.



Ad aliquam enim rectam lineam A B, atque ad punctum in ea B, duę rectę lineę B C B D non ad eaſdem partes poſitę angulos, qui deinceps ſunt, A B C A B D duobus rectis ęquales faciant. Dico B D ipſi C B indirectũ eſſe. ſi enim B D non eſt in directũ ipſi C B, ſit ipſi C B in directum B E. Quoniã igitur recta linea A B ſuper rectam C B E conſiſtit; anguli A B C A B E duobus rectis ſunt ęquales. Sed et anguli A B C A B D ſunt ęquales duobus rectis. anguli igitur C B A A B E ipſis C B A A B D ęquales erunt. cõis auferatur A B C. ergo reliquus A B E reliquo A B D eſt ęqualis, minor maiori, quod fieri non põt. non igitur B E eſt indirectũ ipſi B C. Similiter oſtendemus neque aliam quampiam eſſe, pręter B D. ergo C B ipſi B D indirectum erit. Si igitur ad aliquam rectam lineam, atque ad punctum in ea duę rectę lineę non ad eaſdem partes poſitę angulos, qui deinceps ſunt, duobus rectis ęquales fecerint, ipſę rectę lineę indirectum ſibi inuicem erunt. quod demonſtrare oportebat.

Ex antecedente.

F. C. COMMENTARIVS.

Hoc Theorema precedentis conuerſum eſt, & per deductionem ad id, quod fieri non poteſt, oſtẽditur. ſic enim conuerſa theorematum oſtendi debent, vt inquit Proclus.

Conuerſa theoremata per deductionẽ ad id, qđ fieri nõ põt, oſtenditur.

THEOREMA. VIII. PROPOSITIO. XV.

Si duę rectę lineæ ſe inuicem ſecuerint, angulos qui ad uerticẽ ſunt, inter ſe ęquales efficient.



Duæ enim rectæ lineæ A B C D ſe inuicem ſecent in puncto E. Dico angulum quidem A E C angulo D E B; angulum vero C E B angulo A E D æqualem eſſe. Quoniam enim recta linea A E ſuper rectã C D conſiſtens angulos facit C E A A E D; erunt hi duobus rectis æquales. Rurſus quoniam recta linea D C ſuper rectam A B cõſiſtens facit angulos A E D D E B; erunt A E D D E B anguli æquales duobus rectis. Oſtenſum autẽ eſt angulos quoque C E A A E D duobus rectis eſſe æquales. anguli igitur C E A A E D angulis A E D D E B æquales ſunt. communis auferatur A E D. ergo reliquus C E A reliquo B E D eſt

13. huius.

3. com. not.

æqualis. Simili ratione, & anguli C E B D E A æquales oſtendentur. Si igitur duæ rectæ lineæ ſe inuicem ſecuerint, angulos, qui ad verticem ſunt, æquales efficient. quod oſtendere oportebat.

COROLLARIVM.

✻ Ex hoc manifeſte conſtat rectas lineas quot quot ſe inuicem ſecant, facere angulos ad ſectionem quattuor rectis æquales.

F. C. COMMENTARIVS.

Anguli deinceps.
Anguli ad uerticem.

Anguli qui deinceps ſunt ab angulis, qui ad verticem, differunt; horum enim ortus ex duarum rectarum ſectione fit; illorũ uero ex altera tãtũ ab altera ſecta. Nã ſi recta linea ipſa inſecta manẽs, alteramq; ſuo extremo ſecãs, duos angulos fecerit; hos deinceps angulos vocamus. Si uero duae rectae linae, ſe inuicẽ ſecuerint, anguli ad uerticẽ efficiuntur, ſic dicti, quòd vertices in eodẽ puncto coniunctos habeant. Vertices autem ipſorum ſunt puncta, ad quae plana dum contrahuntur, angulos efficiunt. Itaque hoc theorema oſtendit duabus rectis lineis ſe inuicem ſecantibus, angulos ad verticem aequales eſſe: inuentum quidem à Thalete primo, vt inquit Eudemus, ab Euclide vero demonſtratum; in quo deeſt conſtructio, vtpote minus neceſſaria: demonſtratio enim expoſitione contenta conſtructione aliqua non indiget.

Angulorum uertices.
Theorema a Thalete inuentũ.

✻ Ex hoc manifeſtum eſt.] *Corollarium eſt quod ex precedenti demõſtratione apparet. corollaria enim in elementari inſtitutione ſunt, vt inquit Proclus, quae ſimul cum aliorum demonſtrationibus apparent, ipſa vero non precipue quęruntur: veluti id quod in preſentia propoſitum eſt, nam querebatur quidem ſi duabus rectis lineis ſe inuicem ſecantibus, anguli ad verticem æquales eſſent. dum autem hoc oſtenditur, ſimul etiam oſtẽſum eſt, quattuor, quæ ſunt, angulos, quattuor rectis aequales eſſe. Corollarium igitur eſt theorema, quod ex alterius problematis, uel theorematis demonſtratione ex improuiſo emergit. nam ueluti caſu quodam in corollaria incidere uidemur, neque enim proponentibus nobis, neque etiam quęrentibus obuiam ſe ſe offerunt. Corollariorum uero alia geometrica ſunt, alia arithmetica, & rurſus alia problematibus conſequentia ſunt, alia theorematibus; & alia directis oſtenſionibus, alia deductionibus ad id, quod fieri non poteſt, oſtẽduntur. Huius autem theorematis conuerſum à Proclo ita demonſtratur.*

✻ Corollaria quæ nã ſint in elementari inſtitutione.

Corollaria geometrica, et arithmet.

Huius theorematis conuerſũ a Proclo demonſtratur.

Si ad aliquam rectam lineam duæ rectæ lineæ non ad eaſdem partes ſumptæ angulos ad uerticem æquales fecerint, ipſæ rectæ lineæ indirectũ ſibi inuicem erunt.



Sit enim recta linea quędam A B, & in ipſa quod vis punctum C; & ad C duae rectae lineae C D C E non ad eaſdẽ partes ſumptae, quae angulos A C D B C E aequales faciant. Dico ipſas, C D C E in directum ſibi ipſis eſſe. Quoniam enim recta linea C D ſuper rectam lineã A B inſiſtit, duos angulos duobus rectis efficit aequales; videlicet D C A D C B. Sed angulus D C A angulo B C E eſt aequalis. anguli igitur D C B B C E duobus rectis aequales ſunt. Itaque quoniam ad aliquam rectam lineam B C duae rectae lineae conſequenter C D C E non ad eaſdem partes ſumptae, angulos deinceps duobus rectis aequales efficiunt: indirectum ſibi inuicem erunt.

13. huius.

14. huius.

THEOREMA IX. PROPOSITIO XVI.

Omnis trianguli vno latere producto exterior angulus vtroque interiore, & oppoſito eſt maior.

Sit

Sit triangulum A B C, et vnum ipsius latus B C ad D producatur. Dico exteriorem angulum A C D vtroque interiore, et opposito, videlicet C B A et B A C maiorem esse. Secetur enim A C bifariam in E, et iuncta B E producatur ad F; ponaturq; ipsi B E æqualis E F. iungatur præterea F C, et ducta A C ad G producatur. Quoniam igitur A E quidem est æqualis E C, B E vero ipsi E F, duæ A E E B duabus C E E F æquales sunt, altera alteri: et angulus A E B angulo F E C est æqualis, ad verticem enim sunt. basis igitur A B æqualis est basi F C; et A B E triangulum triangulo F E C, et reliqui anguli reliquis angulis æquales, alter alteri, quibus æqualia latera subtenduntur. ergo angulus B A E est æqualis angulo E C F. Sed E C D angulus maior est ipso E C F. maior igitur est angulus A C D angulo B A E. Similiter recta linea B C bifariam secta, ostendetur etiã B C G angulus, hoc est A C D angulo A B C maior. Omnis igitur trianguli vno latere producto exterior angulus vtroque interiore et opposito maior est. quod oportebat demonstrare.



4. huius.

THEOREMA X. PROPOSITIO XVII.

Omnis trianguli duo anguli duobus rectis minores sunt, quomodocunque sumpti.

Sit triangulum A B C. Dico ipsius A B C triãguli duos angulos quomodocunque sumptos duobus rectis minores esse. producatur enim B C ad D. et quoniam trianguli A B C exterior angulus A C D maior est interiore, et opposito A B C: cõmunis apponatur A C B. anguli igitur A C D A C B angulis A B C B C A maiores sunt. Sed A C D A C B sunt æquales duobus rectis. ergo A B C B C A duobus rectis sunt minores. Similiter demõstrabimus angulos quoque B A C A C B, itemq; C A B A B C duobus rectis minores esse. Omnis igitur trianguli duo anguli duobus rectis minores sunt; quomodocunque sumpti. quod demonstrare oportebat.



13. huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Nunc quidem, vt inquit Proclus, indeterminate ostenditur, trianguli duos quoslibet angulos duobus rectis minores esse, in sequentibus vero determinabitur etiam quanto sint minores, nempe reliquo trianguli angulo: tres enim ipsius anguli duobus rectis æquales sunt. quare duo tanto minores sunt duobus rectis, quantus est reliquus trianguli angulus.

THEOREMA XI. PROPOSITIO XVIII.

Omnis trianguli maius latus maiorem angulum subtendit.

Sit triangulum A B C habens latus A C latere A B maius. Dico et A B C angulum angulo B C A maiorem esse. Quoniam enim A C maior est quàm A B, ponatur ipsi A B æqualis A D; et B D iungatur. Et quoniam trianguli B D C exterior angulus est A D B, erit is maior interiore, et opposito



16. huius.

5.huius. posito D C B. Sed A D B æqualis est ipsi A B D, quòd et latus A B lateri A D sit æquale. maior igitur est et A B D angulus angulo A C B. quare A B C ipso A C B multo maior erit. Omnis igitur trianguli maius latus maiorem angulum subtendit: quod oportebat demonstrare.

THEOREMA XII. PROPOSITIO. XIX.

Omnis trianguli maiorem angulum maius latus subtendit.

Sit triangulum A B C maiorem habens A B C angulum angulo B C A. Dico et latus A C latere A B maius esse. Si enim non est maius, vel A C est æquale ipsi A B, vel ipso minus. æquale igitur non est, nam et angulus A B C angulo A C B æqualis esset. non est autem. non igitur A C ipsi A B est æquale. Sed neque minus. esset enim et angulus A B C angulo A C B minor. atqui non est. non igitur A C minus est ipso A B. ostensum autem est neque æquale esse. ergo A C ipso A B est maius. Omnis igitur trianguli maiorem angulum maius latus subtendit. quod oportebat demonstrare.



F. C. COMMENTARIVS.

Hoc precedentis theorematis conuersum est, quare & per deductionem ad id, quod fieri non potest, demonstratur.

THEOREMA XIII. PROPOSITIO XX.

Omnis trianguli duo latera reliquo maiora sunt, quomodocumque sumpta.

Sit enim triangulum A B C. Dico ipsius A B C triãguli duo latera reliquo maiora esse, quomodocũque sumpta: videlicet latera quidem B A A C maiora latere B C; latera vero A B B C maiora latere A C: et latera B C C A maiora ipso A B. producatur enim B A ad punctum D; ponaturq; ipsi C A æqualis A D; et D C iungatur. Quoniam igitur D A est

5.huius. æqualis A C, erit et angulus A D C angulo A C D æqualis. Sed B C D angulus maior est angulo A C D. angulus igitur B C D angulo A D C est maior. Et quoniam triangulum est D C B, habens B C D angu-

Ex antecedente. lum maiorem angulo B D C: maiorem autem angulum maius latus subtendit: erit latus D B latere B C maius. Sed D B est æquale ipsis B A A C. quare latera B A A C ipso B C maiora sũt. Similiter ostendemus et latera quidem A B B C maiora esse latere C A: latera vero B C C A ipso A B maiora. Omnis igitur trianguli duo latera reliquo maiora sunt, quomodocumque sumpta. quod ostendere oportebat.



F. C. COMMENTARIVS.

Hoc theorema Epicurei impugnarũt tamquam. Asino manifestum.

Presens theorema, vt scribit Proclus, Epicurei impugnare consueuerunt, tum Asino ipsum manifestum esse dicentes, tum nulla egere probatione. Asino autem manifestum esse, ostendunt ex eo, quòd herba in altero laterũ extremo posita, Asinus pabulũ expetens, vnũ latus peragrat, & non duo. Aduersus hec dicendum. Theorema sensu quidem manifestum esse, non autem & scientiam gignente ratione. multis enim rebus hoc accidit. exempli gratia ignis calefacit. hoc quoque sensui indubitatum

dubitatum eſt, ſed quo nam pacto calefaciat, conuincere ſcientiae officium eſt. Sic igitur duo trianguli latera reliquo eſſe maiora, ſenſui manifeſtum, quo aũt hoc fiat dicere ad ſcientiã pertinet. Alij aliter hoc theorema demonſtrarunt, recta linea minime producta; vt videre licet apud Proclũ.

THEOREMA XIIII. PROPOSITIO XXI.

Si à terminis vnius lateris trianguli duę rectæ lineæ intra conſtituantur, hę reliquis duobus trianguli lateribus minores quidem erunt, maiorem vero angulum continebunt.

Trianguli enim A B C in vno latere B C à terminis B C duæ rectæ lineæ intra conſtituantur B D D C. Dico B D D C reliquis duobus trianguli lateribus B A A C minores quidem eſſe, maiorem vero continere angulum B D C angulo B A C. producatur enim B D ad E. Et quoniam omnis triãguli duo latera reliquo ſunt maiora, erunt trianguli A B E duo latera B A A E maiora latere B E. communis apponatur E C. ergo B A A C ipſis B E E C maiora ſunt. Rurſus quoniam C E D triãguli duo latera C E E D ſunt maiora latere C D, communis apponatur D B. quare C E E B ipſis C D D B ſunt maiora. Sed oſtenſum eſt B A A C maiora eſſe B E E C. multo igitur B A A C ipſis B D D C maiora ſunt. Rurſus quoniam omnis trianguli exterior angulus interiore, et oppoſito eſt maior: erit trianguli C D E exterior angulus B D C maior ipſo C E D. Eadem ratione et trianguli A B E exterior angulus C E B ipſo B A C eſt maior. Sed angulus B D C oſtenſus eſt maior angulo C E B. multo igitur B D C angulus angulo B A C maior erit. Quare ſi à terminis vnius lateris trianguli duæ rectę lineæ intra conſtituantur, hę reliquis duobus trianguli lateribus minores quidem erunt, maiorem vero angulum continebunt. quod demonſtrare oportebat.



Ex antecedente.

16. huius.

PROBLEMA VIII. PROPOSITIO XXII.

Ex tribus rectis lineis, quę tribus rectis lineis datis ęquales ſint, triangulum conſtituere. oportet autem duas reliqua maiores eſſe, quomodocumque ſumptas; quoniam omnis trianguli duo latera reliquo maiora ſunt, quomodocumque ſumpta. *

Sint tres datæ rectę lineæ A B C, quarum duæ reliqua maiores ſint, quomodocũque ſumptæ, vt ſcilicet A B quidem ſint maiores quàm C, A C vero maiores quàm B, et præterea B C maiores quàm A. Itaq; oportet ex rectis lineis ęqualibus ipſis A B C triãgulũ cõſtituere. exponatur aliqua recta linea D E, terminata quidem ad D, infinita vero ad E; et ponatur ipſi quidem A æqualis D F, ipſi vero B æqualis F G, et ipſi C æqualis G H: et centro



3.poſtul. centro F, interuallo autem F D circulus deſcribatur D K L. Rurſusq; centro G, et interuallo G H alius circulus K L H deſcribatur, et iungantur K F K G. Dico ex tribus rectis lineis æqualibus ipſis A B C triangulum K F G conſtitutum eſſe. Quoniam enim punctum F centrum eſt D K L circuli; erit F D æqualis F K. Sed F D eſt æqualis A. ergo et F K ipſi A eſt æqualis. Rurſus quoniam punctum G centrum eſt circuli L K H, erit G H æqualis G K. Sed G K eſt æqualis C. ergo et G H ipſi C æqualis erit. eſt autem et F G æqualis B. tres igitur rectæ lineæ K F F G G K tribus A B C æquales ſunt. Quare ex tribus rectis lineis K F F G G K, quæ ſunt æquales tribus datis rectis lineis A B C, triangulum conſtitutum eſt K F G. quod facere oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

Problematũ alia indeterminata, alia terminata.

Determinatio duplex.

Preſens problema determinatum eſt. problematum enim quemadmodum & theorematum alia quidem indeterminata ſunt, alia vero determinata. Si enim hoc modo ſimpliciter dixerimus, ex tribus rectis lineis, quæ tribus datis rectis lineis æquales ſint, triangulum conſtituere. problema indeterminatum erit, & fieri non poterit. Si autem addiderimus, quarum duæ reliqua ſint maiores, quomodocunque ſumptæ, determinatum erit, & fieri poterit. determinatio enim duplex eſt, altera quidem pars problematis, vel theorematis, quæ poſt expoſitionem ponitur, ſignificans quid ſit illud, quod quæritur; altera uero, quæ propoſitionem vniuerſalem eſſe prohibet, explicans quando, & qua ratione, & quot modis id quod propoſitum eſt fieri poſſit, vt hoc loco, [oportet autem duas reliqua maiores eſſe, quomodocumque ſumptas. quoniam omnis trianguli duo latera reliquo ſunt maiora, quomodocumque ſumpta] *& in ſexto libro*] Ad datam rectam lineam dato rectilineo æquale parallelogrãmum applicare, deficiens figura parallelogramma, quę ſimilis ſit alteri datæ. oportet autem datum rectilineum, cui æquale applicandum eſt, non maius eſſe eo, quod ad dimidiam applicatur, ſimilibus exiſtentibus defectibus, et eo, quod à dimidia, et eo, cui oportet ſimile deficere.] *Quemadmodum autem theorematum iuxta verum, & falſum diuiſio fit, ita & problematum iuxta id, quod fieri, & quod non fieri poteſt. Proclus in commentarijs citat Eucl. dis verba, quæ à verbis huiuſce demonſtrationis diſcrepant, vt luce clarius ſit Euclidis demonſtrationes aliquibus in locis à Theone immutatas eſſe, & eas, quas nunc habemus Theonis eſſe, non Euclidis.*

Theorematum diuiſio iuxta uerum & falſum.

Problematũ diuiſio iuxta id, quod fieri, & qđ non fieri poteſt.

PROBLEMA IX. PROPOSITIO XXIII.

Ad datam rectam lineam, & ad datum in ea punctum, dato angulo rectilineo æqualem angulum rectilineum conſtituere.



Sit data quidem recta linea A B, datum vero in ipſa punctum A, et datus angulus rectilineus D C E. oportet igitur ad datam rectam lineam A B, et ad datum in ea punctum A dato angulo rectilineo D C E, æqualem angulum rectilineum conſtituere. Sumãtur in vtraque ipſarum C D, C E quęuis puncta D E, iungaturq; D E, et ex tribus rectis lineis, quæ æquales ſint tribus C D D E E C triangulum conſtituatur A F G, ita ut C D ſit æqualis A F, et C E ipſi A G, et D E ipſi F G. Itaque quoniam duę D C C E duabus F A A G æquales ſunt, altera alteri; et baſis D E eſt æqualis baſi F G: erit et angulus D C E angulo F A G æqualis. Ad datam igitur rectam lineam A B, et ad datum in ea punctum A, dato angulo rectilineo D C E æqualis angulus rectilineus conſtitutus eſt F A G. quod facere oportebat.

8.huius.

F. C.

F. C. COMMENTARIVS.

Et ex tribus rectis lineis, quę æquales sint tribus CD DE EC triangulum constituatur AFG.] *A recta linea AB abscindatur AG æqualis ipsi CE: & centro quidem A, interuallo autem ipsi CD æquali describatur circulus: & rursus centro G & interuallo æquali ipsi ED alius circulus describatur, vt circuli se inuicem in puncto F secent: & iungantur AF FG. Dico iam factum esse, quod proponebatur. & demonstratio eadem erit. Hoc autem problema ab Oenopide inuentum esse tradit Eudemus.*



* 3. Huius. 9. Postul.

Hoc theorema ab Oenopide inuentum est.

THEOREMA. XV. PROPOSITIO. XXIIII.

Si duo triangula duo latera duobus lateribus æqualia habeant, alterum alteri, angulum autem angulo maiorem, qui æqualibus rectis lineis continetur; et basim basi maiorem habebunt.

Sint duo triangula A B C D E F, quæ duo latera A B A C duobus lateribus D E D F æqualia habeant, alterum alteri, videlicet latus quidem A B æquale lateri D E, latus vero A C æquale D F: & angulus B A C angulo E D F sit maior. Dico et basim B C basi E F maiorem esse. Quoniam enim angulus B A C maior est angulo E D F, constituatur ad rectam lineam D E, et ad punctũ in ea D, angulo B A C æqualis angulus E D G, ponaturq; alterutri ipsarum A C D F æqualis D G, & G E F G iungantur. Itaque quoniam A B quidem est æqualis D E, A C vero ipsi D G; duæ B A A C duabus E D D G æquales sunt, altera alteri; et angulus B A C est æqualis angulo E D G, ergo basis B C basi E G est æqualis. Rursus quoniam æqualis est D G ipsi D F; et angulus D F G angulo D G F: erit D F G angulus angulo E G F maior. multo igitur maior est E F G angulus ipso E G F. Et quoniam triangulum est E F G, angulum E F G maiorem habens angulo E G F, maiori autem angulo maius latus subtenditur; erit et latus E G latere E F maius. Sed E G latus est æquale lateri B C. ergo et B C ipso E F maius erit. Si igitur duo triangula duo latera duobus lateribus æqualia habeant, alterum alteri, angulum autem angulo maiorem, qui æqualibus rectis lineis continetur: et basim basi maiorem habebunt. quod oportebat demonstrare.



Ex antecedente. * 4. huius. 5. huius. 19. huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Hoc theorema quarto oppositum est, illud enim angulos qui sunt ad vertices triangulorũ æquales ponit, hoc inæquales; illud bases æquales, hoc inæquales esse demonstrat.

Et G E F G iungantur] *recta linea E G, vel cadit supra E F, vel in ipsam, vel infra ipsam. Euclides vt supra cadentẽ accepit. Quòd si in ipsam cadat, vt in secunda figura, idẽ ostendetur. Sunt enim duę B A A C duabus E D D G æquales: & cũ æquales contineant angulos, & basis B C basi E G æqualis erit. Sed E G*



Hoc theorema quarto oppositum. * 4. Huius.

est maior, quàm E F, vt totum est maius, quàm ipsius pars. ergo & B C quàm E F est maior. Cadat postremo infra ipsam. ut in tertia figura. Similiter demonstrabimus basim B C basi E G aequalem esse. Cum aũt duae E F F D intra triangulum E D G constitutae minores sint, quàm duae E G G D; sitq; D G ipsi D F aequalis; erit reliqua E G maior, quàm reliqua E F. Sed B C est æqualis E G. ergo et B C quàm E F maior sit necesse est.

21. huius.



THEOREMA XVI. PROPOSITIO XXV.

Si duo triangula duo latera duobus lateribus æqualia habeant, alterum alteri, basim vero basi maiorem; & angulum angulo, qui æqualibus lateribus continetur, maiorem habebunt.

Sint duo triangula A B C D E F, quæ duo latera A B A C duobus lateribus D E D F æqualia habeant, alterum alteri, videlicet latus A B æquale lateri D E, et latus A C lateri D F: basis autem B C basi E F sit maior. Dico et angulum B A C angulo E D F maiorem esse. si enim non est maior, vel æqualis est, vel minor. æqualis autẽ non est angulus B A C angulo E D F: esset enim et basis B C basi E F æqualis; non est aũt. nõ igitur æqualis est B A C angulus angulo E D F. sed neque minor. minor enim esset et basis B C basi E F. atqui nõ est. non igitur angulus B A C angulo E D F est minor. ostensum autẽ est, neque esse æqualem. ergo angulus B A C angulo E D F necessario maior erit. Si igitur duo triangula duo latera duobus lateribus æqualia habeant, alterum alteri, basim vero basi maiorem; et angulum angulo, qui æqualibus lateribus continetur, maiorem habebunt. quod demonstrare oportebat.



4. huius.

Ex antecedenti.

F. COMMENTARIVS.

Hoc theorema octauo quidem oppositum est, præcedentis vero conuersum, quod alij aliter demonstrarunt, vt tradit Proclus.

Hoc theorema octauo oppositum est et præcedentis conuersum.

THEOREMA XVII. PROPOSITIO. XXVI.

Si duo triangula duos angulos duobus angulis æquales habeãt, alterum alteri, vnumq; latus vni lateri æquale, vel quod æqualibus adiacet angulis, vel quod vni æqualium angulorum subtenditur; et reliqua latera reliquis lateribus æqualia, alterum alteri, et reliquum angulum reliquo angulo æqualem habebunt.

Sint duo triangula A B C D E F, quæ duos angulos A B C B C A duobus angulis D E F. E F D æquales habeant, alterum alteri, videlicet angulum quidem A B C æqualem angulo D E F; angulum vero B C A angulo E F D. habeant autem et vnum latus vni lateri æquale, et primum quod æqualibus adiacet angulis; nempe latus B C lateri E F. Dico et reliqua latera reliquis lateribus æqualia habere, alterũ alteri, latus scilicet A B lateri D E; et latus A C



ipsi

ipſi DF, et reliquum anguium BAC reliquo angulo EDF æqualem. Si enim inęqualis eſt AB ipſi DE, vna ipſarum maior eſt. Sit maior AB, ponaturq; GB ęqualis DE; et GC iungatur. Quoniam igitur BG quidem eſt ęqualis DE, BC vero ipſi EF, duę GB BC duabus DE EF ęquales ſunt, altera alteri: et angulus GBC æqualis angulo DEF. baſis igitur GC baſi DF eſt æqualis: et GBC triangulũ triãgulo DEF, et reliqui anguli reliquis angulis ęquales, alter alteri, quibus ęqualia latera ſubtẽdũtur. ergo GCB angulus eſt ęqualis angulo DFE. Sed angulus DFE angulo BCA ęqualis ponitur. quare et BCG angulus angulo BCA eſt æqualis, minor maiori, quod fieri nõ põt. non igitur inæqualis eſt AB ipſi DE. ergo ęqualis erit. eſt autem et BC æqualis EF. Itaque duę AB BC duabus DE EF æquales ſunt, altera alteri, et angulus ABC æqualis angulo DEF. baſis igitur AC baſi DF, et reliquus angulus BAC reliquo angulo EDF eſt ęqualis. Sed rurſus ſint latera, quæ æqualibus angulis ſubtenduntur ęqualia, vt AB ipſi DE. Dico rurſus et reliqua latera reliquis lateribus ęqualia eſſe; AC quidem ipſi DF, BC vero ipſi EF: et adhuc reliquum angulum BAC reliquo angulo EDF ęqualem. Si enim inæqualis eſt BC ipſi EF, vna ipſarum maior eſt. Sit maior BC, ſi fieri poteſt; ponaturq; BH ęqualis EF, et AH iungatur. Quoniam igitur BH quidem eſt æqualis EF, AB vero ipſi DE; duæ AB BH duabus DE EF æquales ſunt, altera alteri, et angulos æquales continent. ergo baſis AH baſi DF eſt ęqualis: et ABH triangulum triangulo DEF, et reliqui anguli reliquis angulis æquales erunt, alter alteri, quibus æqualia latera ſubtenduntur. ęqualis igitur eſt angulus BHA angulo EFD. Sed EFD eſt æqualis angulo BCA. ergo et BHA angulus angulo BCA eſt æqualis. Trianguli igitur AHC exterior angulus BHA ęqualis eſt interiori; et oppoſito BCA, quod fieri non poteſt. quare non inęqualis eſt BC ipſi EF. ęqualis igitur. eſt autem et AB æqualis DE. duæ igitur AB BC duabus DE EF æquales ſunt, altera alteri: anguloſq; æquales continent. quare baſis AC æqualis eſt baſi DF, et ABC triangulum æquale triangulo DEF, et reliquus angulus BAC reliquo angulo EDF eſt æqualis. Si igitur duo triangula duos angulos duobus angulis æquales habeant, alterum alteri, vnumq; latus vni lateri æquale, vel quod æqualibus adiacet angulis, vel qnod vni ęqualium angulorum ſubtenditur; et reliqua latera reliquis lateribus æqualia, alterum alteri, et reliquum angulum reliquo angulo æqualem habebunt. quod oportebat demonſtrare.

4. huius.

4. huius.

4. huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Hoc theorema ad Thaletem refertur, vt Proclus ex Eudemo tradit. De triangulorum quidem ortu, & aequalitate, vel inęqualitate quęcunque in elementari inſtitutione dici poterant, ex ſuperioribus didicimus. De quadrilateris deinceps Euclides agit; præcipue vero de parallelogrammis: ſimul cum horum contemplatione de trapezijs diſſerens. diuiditur enim quadrilaterum, vt ſuperius dictum eſt in parallelogrammum, & trapezium: rurſuſq; parallelogrammum in alias ſpecies: & trapezium ſimiliter. Verum quoniam parallelogrammum quidem ob ęqualitatis participationem ordinatum eſt: trapezium vero neque eundem, neque ſimilem ſeruat ordinem: non immerito præcipue quidem de parallelogrammis ſermonem habet; ſimul vero cum his trapezium contemplatur. ex parallelorum enim ſectione ortus trapeziorum apparebit, vt procedentibus nobis fiet manifeſtum. Sed quoniam rurſus fieri non poteſt, vt de parallelogrammorum, vel conſtructione, vel aequalitate aliquid dicatur abſque parallelarum conſideratione; vt enim ex ipſo quoque nomine apparet parallelogrammum eſt, quod à parallelis rectis lineis è regione poſitis deſcribitur: neceſſario à parallelis doctrinae initium facit. paulum vero progreſſus ab his ad parallelogrammorum tractationem accedit, vno vſus theoremate medio inter harum, illorumq; inſtitutionem elementarem, quod quidem videtur ſymptoma quoddam, quod parallelis ineſt, contemplari: primum autem ortum parallelogrammorum tradit. tale enim eſt. [Rectæ lineæ, quæ æquales, et parallelas ad eaſdem partes coniungunt, et ipſæ æquales, et parallelæ ſunt.] *nam in hoc conſideratur quidem ſymptoma quoddam aequalibus, ac parallelis; ex coniunctione autem apparet parallelogrammum, quod latera aequalia, et parallela è regione poſita habet. Parallelarum*

Hoc theorema ad Thaletem refertur.

Parallelogrãmum ordinatum eſt, trapeziũ uero minime.

Parallelogrãmum eſt q̃ a parallelis deſcribitur.

Parallelogrãmorum ortus.

Parallelis tria per ſe inuicem.

igitur ſermonem neceſſario præſumptum eſſe, ex his conſtat. Tria autem aſſumere oportet, quæ parallelis per ſe inſunt, ipſaſq; explicant: & cum ipſis cõueneuntur. neque ſolum tria ſimul, ſed & vnum quodque ſeorſum ab alijs ſumptum. quorum vnum hoc eſt. recta linea parallelas ſecante, alternos angulos inter ſe æquales eſſe: aliud, recta linea parallelas ſecante angulos interiores duobus rectis eſſe æquales. reliquum vero, recta linea parallelas ſecante, angulum exteriorem interiori; & oppoſito æqualem eſſe. horum autem ſymptomatum vnumquodque demonſtratum parallelas eſſe rectas lineas affirmare poteſt. Hoc modo & alij mathematici de lineis diſſerere conſueuerunt, vniuſcuiuſque ſpeciei ſymptoma tradentes. Apollonius enim in qualibet conicarum linearum, quid ſymptoma ſit oſtendit: & Nicomedes in conchoidibus, & Hippias in quadratibus. & Perſeus in ſpiricis. nam poſt earum ortum, quod ipſis per ſe, & quatenus ipſum ineſt, aſſumptum, conſtitutam nobis formam ab omnibus alijs diſtinguit. Eodem igitur modo, & elementorum inſtitutor parallelarum ſymptomata primum inueſtigat. Hæc ex Proclo.

Apollonius de conicis lineis aget.
Nicomedes de cõchoid.
Hippias de quadrãtibus
Perſeus de ſpiricis.

THEOREMA XVIII. PROPOSITIO XXVII.

Si in duas rectas lineas recta linea incidens alternos angulos inter ſe æquales fecerit, parallelæ erunt rectæ lineæ.



In duas enim rectas lineas A B C D, recta linea E F incidens alternos angulos A E F E F D æquales inter ſe faciat. Dico rectam lineam A B ipſi C D parallelam eſſe. Si enim non eſt parallela, productæ A B C D, vel ad partes B D conuenient, vel ad partes A C. producantur, conueniantq; ad partes B D in pũcto G. Itaque G E F trianguli exterior angulus A E F maior eſt interiore & oppoſito E F G. Sed & æqualis. quod fieri nõ põt. non igitur A B C D productę ad partes B D conuenient. Similiter demonſtrabitur neque conuenire ad partes A C. quę vero in neutras partes conueniunt, parallelę inter ſe ſunt. parallela igitur eſt A B ipſi C D. Quare ſi in duas rectas lineas recta linea incidens alternos angulos inter ſe æquales fecerit, parallelę inter ſe erunt rectę lineæ. quod oſtendere oportebat.

16. huius.

diff. 35.

F. C. COMMENTARIVS.



Si in duas rectas lineas recta linea incidens alternos angulos] *Alternos angulos appellat eos, qui neque ad eaſdem partes, neque deinceps ſunt, ſed ab incidente linea diſtinguuntur, cum vtrique intra parallelas exiſtant. differunt autem quòd alter ſurſum alter deorſum ponatur. Vt exempli gratia, rectis lineis A B, & C D exiſtentibus, incidenteq; in ipſas recta linea E F, angulos A E F D F E; itemq; angulos C F E B E F alternos eſſe dicit. vt pote alterno, commutatóue ordine iuxta poſitionem ſe habentes. Illud autem ſciendum eſt, cum talis ſit rectarum linearum ſitus, omnia ſymptomata ex diuiſione ſex fieri, quorum tria tantum Geometra accepit, tria vero omiſit. vel enim ad eaſdem partes angulos ſumemus, vel non ad eaſdem: & ſi ad eaſdem, vel vtroſque intra rectas lineas, quas parallelas oſtendit, vel vtroſque extra, vel vnum quidem intra, alterum vero extra. Si vero non ad eaſdem partes, ſimiliter vel vtroſque intra, vel extra, vel vnum intra, & alterum extra. Sint enim rurſus rectæ lineæ A B C D, in quas incidat recta linea E F: & ad H G pũcta producatur. Si igitur ad eaſdẽ partes angulos accipias, vel vtroſq; intra pones, vt B E F, & E F D, vel ipſos, A E F, & E F C, vel vtroſq; extra, vt H E B D F G, vel H E A C F G, vel vnum quidem intra, alterum vero extra, vt H E B E F D, vel G F D. F E B; vel H E A E F C, vel G F C. A E F, quadrupliciter*

quadrupliciter enim hi accipiuntur. Si vero non ad eaſdem partes, vel vtroſque intra, vt A E F E F D, vel C F E F E B: vel vtroſque extra, vt A E H D F G, vel H E B C F G, vel vnum quidem intra, alterum vero extra; atque hoc rurſus quadrupliciter, vel enim A E H E F D, vel H E B E F D, vel G F C F E B, vel G F D F E A. Cum igitur anguli ſex modis ſumatur, Euclides tres ſolas ſumptiones elegit, vnam quidem ex ijs angulis, qui non ad eaſdem ſunt partes, et qui intra tantum ſumũtur; quos alternos appellauit; duas vero ex ijs, qui ad eaſdem partes vel vtrique intra ſumuntur, quos duobus rectis aequales eſſe dicit: vel vnus quidem extra, alter vero intra ſumitur, quos dicit inter ſe aequales eſſe. Tres vero reliquas omiſit, vt pote quos eadem omnino conſequãtur. Sint enim ad eaſdem partes vtrique extra anguli H E B D F G. Dico hos duobus rectis aequales eſſe. angulus enim D F E angulo H E B, & angulus B E F angulo D F G eſt aequalis. Si autem anguli B E F E F D duobus rectis ſint aequales, anguli etiam D F G H E B duobus rectis aequales erunt. Sint rurſus non ad eaſdem partes anguli A E H E F D, quorum alter ſit extra, alter intra; ipſi quoque duobus rectis ſunt aequales. Quoniam enim angulus A E H aequalis eſt angulo B E F, anguli vero B E F E F D duobus rectis aequales ſunt; erunt & anguli A E H E F D duobus rectis aequales. Sint poſtremo non ad eaſdem partes vtrique extra anguli A E H D F G. Dico eos etiam inter ſe aequales eſſe. Nam cum angulus A E H aequalis ſit angulo B E F, & angulus D F G angulo E F C, ſintq; anguli B E F E F C alterni inter ſe aequales: anguli etiam A E H D F G inter ſe aequales ſint neceſſe eſt.

Cum anguli ſex modis ſumantur. Euclides tres ſolas ſumptiones elegit, reliquas omiſit.

THEOREMA XIX. PROPOSITIO XXVIII.

Si in duas rectas lineas recta linea incidens exteriorem angulũ interiori, et oppoſito, et ad eaſdem partes æqualem fecerit, vel interiores, et ad eaſdem partes duobus rectis æquales; parallelæ erũt inter ſe rectæ lineæ.



In duas enim rectas lineas A B C D recta linea E F incidens exteriorem angulum E G B interiori et oppoſito G H D æqualem faciat; vel interiores, et ad eaſdem partes B G H G H D, duobus rectis æquales. Dico rectam lineam A B rectæ C D parallelam eſſe. Quoniam enim E G B angulus æqualis eſt angulo G H D, angulus autem E G B angulo A G H, erit et angulus A G H angulo G H D æqualis: et ſunt alterni. parallela igitur eſt A B ipſi C D. Rurſus quoniam anguli B G H G H D duobus rectis ſunt æquales, et ſunt A G H B G H æquales duobus rectis: erunt anguli A G H B G H angulis B G H G H D æquales. communis auferatur B G H. reliquus igitur A G H eſt æqualis reliquo G H D: et ſunt alterni. ergo A B ipſi C D parallela erit. Si igitur in duas rectas lineas recta linea incidens exteriorem angulum interiori et oppoſito, et ad eaſdem partes æqualem fecerit, vel interiores, et ad eaſdem partes duobus rectis æquales; parallelæ erunt inter ſe rectæ lineæ. quod demonſtrare oportebat.

15. huius.

Ex antecedente. 13. huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Hoc theorema à Ptolemæo aliter demonſtratur, vt tradit Proclus.

Theorema a Ptolemæo aliter demõſtratur.

THEOREMA XX. PROPOSITIO XXIX.

In parallelas rectas lineas recta linea incidens, et alternos angulos inter ſe æquales, et exteriorem interiori et oppoſito, et ad eaſdem

easdem partes æqualem, et interiores et ad easdem partes duobus rectis æquales efficiet.



In parallelas enim rectas lineas AB CD recta linea incidat E F. Dico alternos angulos AGH GHD inter se æquales efficere, et exteriorē EGB interiori et opposito, et ad easdē partes GHD æqualē: et interiores et ad easdem partes BGH GHD duobus rectis æquales. Si enim inæqualis est AGH ipsi GHD, vnus ipsorum maior est. Sit maior AGH. et quoniam AGH angulus maior est angulo GHD; communis apponatur BGH. anguli igitur AGH BGH angulis BGH GHD maiores sunt. Sed anguli AGH BGH sunt æquales duobus rectis. ergo BGH GHD anguli sunt duobus rectis minores. Quæ vero à minoribus, quàm sint duo recti in infinitum producuntur rectæ lineæ inter se conueniunt. ergo rectæ lineæ AB CD in infinitum productæ conuenient inter se. atqui non conueniunt, cum parallelę ponantur. non igitur inæqualis est AGH angulus angulo GHD. quare necessario est æqualis. angulus autem AGH æqualis est angulo EGB. ergo et EGB ipsi GHD æqualis erit. communis apponatur BGH. anguli igitur EGB BGH sunt æquales angulis BGH GHD. Sed EGB BGH æquales sunt duobus rectis. ergo et BGH GHD duobus rectis æquales erunt. In parallelas igitur rectas lineas recta linea incidens, et alternos angulos inter se æquales, et exteriorē interiori et opposito, et ad easdem partes æqualem; et interiores et ad easdem partes duobus rectis æquales efficiet. quod oportebat demonstrare.

15. huius.

* Post. 5.

15. huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Hoc theorema, vt inquit Proclus, vtrisque præcedentibus conuertitur. quod enim in vtroque illorum est quæsitum, positionem facit; & quae in illis data sunt, demonstrare proponit. atque hæc conuersorū differentia silentio pretereunda non est. nam omne quod conuertitur, aut vnum vni conuertitur, vt quinto sextum, aut pluribus vnum, vt præcedentibus, quod nunc proponitur: aut plura vni, vt paulo post manifestum erit.

* Quæ vero à minoribus, quàm sint duo recti in infinitum producuntur rectæ lineę inter se conueniunt] *Postulatum quintum est, quod tamen cum euidens non sit, & demonstratione indigere videatur, Proclus ita demonstrandum censuit, duobus præmissis, nimirum axiomate quopiam, quo etiam Aristoteles vsus est, & lemmate.*

AXIOMA.

Si ab vno puncto duæ rectæ lineæ angulum facientes in infinitum producantur, ipsarum distantia omnem finitam magnitudinem excedit.

LEMMA.

Si alteram parallelarum secuerit recta quædam linea; reliquam quoque secabit.



Sint parallelae AB CD; secetq; ipsam AB recta linea EFG. Dico EFG reliquam quoque CD secare. Quoniam enim duae rectae lineae sunt, quae ab vno puncto F in infinitum producuntur, BF FG; omni finita magnitudine maiorem habebunt distantiam. quare & maiorem ea magnitudine, quae tanta est, quantum est interuallum inter parallelas interiectum. cum igitur harum linearum distantia maior fuerit, quàm distantia parallelarum, recta linea FG secabit ipsam CD. Quare si alteram parallelarum se-

cueris

cuerit quædam recta linea, reliquum quoque secabit.



Hoc ante demonstrato consequenter propositum demonstrabitur. Sint enim duæ rectæ lineæ A B C D, & in ipsas incidat recta linea E F, angulos B E F D F E duobus rectis minores efficiens. Dico rectas lineas inter se conuenire ad eas partes, in quibus sunt anguli duobus rectis minores. Cum enim anguli B E F D F E duobus rectis minores sint, sit excessui duorum rectorum æqualis H E B angulus, & H E ad K producatur. Itaque quoniam in rectas lineas H K C D recta linea E F incidit, interiores ad easdem angulos H E F D F E duobus rectis efficit æquales; rectæ lineæ H K C D parallelæ erunt. & A B secat ipsam H K. ergo reliquam quoque C D secabit per antecedens lemma. conueniunt igitur inter se rectæ lineæ A B C D ad eas partes, in quibus sunt anguli duobus rectis minores. quod demonstrare oportebat.

THEOREMA XXI. PROPOSITIO XXX.

Quæ eidem rectæ lineæ sunt parallelæ, & inter se parallelæ erunt. *

Sit vtraque ipsarum A B C D ipsi E F parallela. Dico et A B ipsi C D parallelam esse. Incidat enim in ipsas recta linea G K. Et quoniam in parallelas rectas lineas A B E F, recta linea G K incidit, angulus A G H angulo G H F est æqualis. Rursus quoniam in parallelas rectas lineas E F C D, recta linea incidit G K, æqualis est G H F angulus angulo G K D. ostensus autem est & angulus A G K angulo G H F æqualis. ergo et A G K ipsi G K D æqualis erit. et sunt alterni. parallela igitur est A B ipsi C D. ergo quæ eidem rectæ lineæ sunt parallelæ, & inter se parallelæ erunt, quod oportebat demonstrare.



F. C. COMMENTARIVS.

Quæ eidem rectæ lineæ sunt parallelæ, et inter se parallelæ erunt] *Contingit autem hoc, vt inquit Proclus, non in omnibus respectibus, verum esse. non enim quæ eiusdem dupla, & inter se dupla sunt, nec quæ eiusdem sesquialtera, inter se sunt sesquialtera, sed in illis solis locum habere videtur, quæcumque vnitate conuertuntur, vt in æqualitate, in similitudine, in identitate, & in parallela positione. Quæ enim parallelae parallela, & ipsa parallela est, quemadmodum, & quod aequali aequale, & ipsum est aequale; & quod simili simile, & ipsum simile. parallelarum enim ad se se respectus similitudo positionis est.* *

PROBLEMA X. PROPOSITIO XXXI.

Per datum punctum datæ rectæ lineæ parallelam rectam lineam ducere. *

Sit datum quidem punctum A, data vero recta linea B C, oportet per A punctum ipsi B C rectæ lineæ parallelam rectam lineam ducere. Sumatur in B C quod vis punctum D, & iungatur A D: constituatur & ad rectam lineam D A, & ad punctum in ipsa A, angulo A D C æqualis angulus D A E: & in directum ipsi E A recta linea A F producatur. Quoniã igitur in duas rectas lineas B C E F recta linea A D incidens alternos angulos E A D A D C inter se æquales efficit, E F ipsi B C parallela erit. Per datum igitur punctum A datæ rectæ lineæ B C parallela ducta est recta linea E A F. quod facere oportebat.



23. Huius.

27. Huius.

F. C.

F. C. COMMENTARIVS.

* Per datum punctum datæ rectæ lineæ parallelam rectam lineam ducere.] *Videtur hoc problema parallelarũ ortũ tradere. At datum punctũ extra rectam lineam sumere oportet, ita ut à puncto ad ipsam ducta recta linea angulum faciat, alioqui nulla alia præter iam dictã, duci poterit. differunt autem per datum punctum, & à dato puncto rectam lineam ducere. Quando enim punctum rectae lineae, quae ducitur, principium est; ab ipso fit deductio, vt in illo problemate,* [super datam rectam lineam infinitam à puncto, quod in ea non est, perpendicularem rectam lineam ducere] *Quando autem punctum in recta linea est, per ipsum deductio fieri dicitur, vt nunc in parallelis.* [per datum punctum datæ rectæ lineæ parallelã rectam lineam ducere.] *& quemadmodum non licet ab eodem puncto super datam rectam lineam duas perpendiculares, vel plures ducere, ita neque per idem punctum datae rectae lineae duas, uel plures parallelas ducere. parallelae enim in dicto puncto inter se, conuenirent. quod est absurdum.*

Per datum punctum, & a dato pũcto lineã ducere.

THEOREMA XXII. PROPOSITIO XXXII.

Omnis trianguli vno latere producto exterior angulus duobus interioribus, et oppositis est æqualis; et trianguli tres interiores anguli duobus rectis æquales sunt.



Sit triangulum A B C: et vnum ipsius latus B C in D producatur. Dico angulum exteriorem A C D duobus interioribus et oppositis C A B A B C æqualem esse; et trianguli tres interiores angulos A B C B C A C A B duobus rectis esse æquales. Ducatur enim per punctũ C ipsi A B rectæ lineæ parallela C E. Et quoniam A B ipsi C E parallela est, et in ipsas incidit A C, alterni anguli B A C A C E inter se

Ex antecedente.

29. huius.

æquales sunt. Rursus quoniã A B parallela est C E, et in ipsas incidit recta linea B D, exterior angulus E C D interiori et opposito A B C est æqualis. Ostensus autem est angulus A C E æqualis angulo B A C. Quare totus A C D exterior angulus æqualis est duobus interioribus et oppositis B A C A B C. communis apponatur A C B. anguli igitur A C D A C B tribus A B C B C A C A B æquales sunt. Sed anguli A C D A C B sunt æquales duobus rectis. Ergo et A C B C B A C A B duobus rectis æquales erunt. Omnis igitur trianguli uno latere producto exterior angulus duobus interioribus & oppositis est æqualis; et trianguli tres interiores anguli duobus rectis æquales sunt. quod demonstrare oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

Quantum deficiebat in sextodecimo, & septimodecimo theoremate, tantum in hoc addit, vt notat Proclus. non solum enim ex hoc discimus, trianguli exteriorem angulum vtroque interiore & opposito maiorem esse, sed & quanto maiorem. nam cum vtrisque sit aequalis; maior quam alteruter reliquo est. nec trianguli duos quoslibet angulos duobus rectis minores esse solum ex hoc cognoscimus, sed quanto etiam minores: reliquo enim trium. illa igitur quodam modo magis indefinita fuerunt theoremata, hoc vero scientiae terminum vtrisque attulit. eius theorematis, triangulum scilicet interiores angulos duobus rectis aequales habere, inuẽtionem ad Pythagoricos refert Eudemus, quod ipsi aliter demonstrarunt, vt Proclus tradit, quã etiam huius theorematis duo ostendit conuersa, ex quibus apparere potest, quomodo vni duo conuertantur. Cum igitur ex hoc constet, trianguli tres interiores angulos duobus rectis esse aequales, aperta est nobis via, per quã ceterarum quoque figurarum rectilinearum angulos inueniemus, quot rectis aequales sint. vt pu-

ta quadrilaterae, quinquelaterae, & aliarum, quae sequuntur. Itaque primo sciendum est omnem rectilineam figuram in triangula resolui; omnium si quidem constitutionis principium est triangulum. vnaquaeque autem in triangula binario pauciora, quàm sint propria latera, resoluitur, vt si

Omnis recti linea figura in triangula binario pauciora quam sit propria latera resoluitur.



quattuor latera habeat, in duo resoluitur triangula; si quinque in tria, si sex in quattuor, & similiter reliquae. Quòd cum omnis trianguli tres interiores anguli duobus rectis sint aequales, numerus triangulorum, ex quibus vnaquaeque figura constat, duplicatus multitudinem prebebit rectorum, quibus ea aequales angulos habet. Quapropter omnis quadrilatera figura ex duobus triangulis constans angulos habet quattuor rectis aequales. & omnis quinquelatera habet angulos aequales sex rectis, & deinceps eodem modo. Sed & illud ferendum est, [omnem rectilineam figuram vnoquoque ex eius lateribus semel producto, angulos qui extra constituũtur, quattuor rectis æquales habere] *quod nos hoc modo demonstrabimus.*

Omnis recti linea figura angulos qui extra constituũtur quattuor rectis æquales habet.

Sit triangulum A B C, et producãntur latera A B B C C A ad puncta D E F. Dico angulos C B D B A E A C E, qui extra constituuntur, quattuor rectis æquales esse.



Sumatur enim intra triangulum, quod vis punctum G, & iungãtur G A G B G C. erunt triangulorum A G B B G C C G A omnes anguli sex rectis aequales; Sed & anguli C B A C B D B A C B A F A C B. A C E sunt aequales sex rectis. Ergo dictorum triangulorum anguli angulis C B A C B D B A C B A F A C B A C E aequales sunt. communes auferantur C B A B A C A C B. reliqui igitur, qui fiunt ad G sunt aequales angulis extra figuram constitutis. anguli autem ad G quattuor rectis sunt aequales. ergo & anguli, qui extra figuram constituuntur, videlicet C B D B A F A C E quattuor rectis aequales erunt. quod demonstrare oportebat. eodẽ modo demonstrabimus in reliquis figuris, angulos qui extra ipsas constituuntur, quattuor rectis esse aequales. Corol. 15.

THEOREMA. XXIII. PROPOSITIO. XXXIII.

Quę æquales, et parallelas ad easdem partes coniungunt rectę lineę, et ipsæ æquales, et parallelæ sunt.

Sint ęquales et parallelę A B C D: et ipsas cõiungant ad easdem partes rectę lineę A C B D. Dico A C B D æquales, et parallelas esse. iungatur enim B C. et quoniam A B parallela est C D: in ipsasq; incidit B C, alterni anguli A B C B C D æquales sunt. Rursus quoniam A B est æqualis C D, communis autẽ B C, duæ A B B C duabus B C C D sunt ęquales; et angulus A B C ęqualis angulo B C D. basis igitur A C basi B D est ęqualis: triangulumq; A B C trian



29. huius.

4. huius.

gulo B C D: et reliqui anguli reliquis angulis æquales erũt, alter alteri, quibus æqualia latera ſubtenduntur. ergo angulus A C B angulo C B D eſt æqualis. Et quoniam in duas rectas lineas A C B D recta linea B C incidens, alternos angulos A C B C B D æquales inter ſe efficit, parallela eſt A C ipſi B D. oſtenſa autem eſt et ipſi æqualis. Quæ igitur æquales et parallelas ad eaſdem partes coniungunt rectæ lineæ, et ipſæ æquales et parallelæ ſunt. quod oportebat demonſtrare.

29. huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Hoc theorema veluti confinium parallelarum, parallelogrammorumq́, conſiderationis eſſe dicebamus. aequalium namque & parallelarum rectarum linearum ſymptoma quoddam dicere videtur, parallelogrammorumq́, ortum latenter tradit. parallelogrammum enim fit ex aequalibus, & parallelis, quae initio ductae ſunt, & ex ijs, quae ipſas coniungunt rectis lineis: quae etiam aequales & parallelae oſtenduntur. Qua propter quod ſtatim ſequitur, veluti conſtituto iam parellelogrammo, quae per ſe inſunt eiuſmodi ſpacijs, contemplatur. Quanta autem diligentia in hac propoſitione adhibita ſit, accurate & diligenter notauit Proclus.

Parallelogrãmum quomodo fiat.

THEOREMA XXIIII. PROPO. XXXIIII.

Parallelogrammorum ſpaciorum latera, quæ ex oppoſito, et anguli, inter ſe æqualia ſunt; et diameter ea bifariam ſecat.



Sit parallelogrammum A C D B, cuius diameter B C. Dico A C D B parallelogrammi latera, quæ ex oppoſito, et angulos inter ſe æqualia eſſe; et diametrum B C ipſum bifariam ſecare. Quoniam enim parallela eſt A B ipſi C D, et in ipſas incidit recta linea B C; anguli alterni A B C B C D inter ſe æquales ſunt. Rurſus quoniam A C ipſi B D parallela eſt, et in ipſas incidit B C; alterni anguli A C B C B D æquales ſunt inter ſe. duo igitur triangula ſunt A B C C B D, quę duos angulos A B C B C A duobus angulis B C D C B D æquales habent, alterum alteri: et vnum latus vni lateri æquale, quod eſt ad æquales angulos, vtrique commune B C. ergo et reliqua latera reliquis lateribus æqualia habebunt, alterum alteri, et reliquum angulum reliquo angulo æqualem. æqualis igitur eſt latus quidem A B lateri C D: latus vero A C ipſi B D; et angulus B A C, angulo B D C æqualis. Et quoniam angulus A B C eſt æqualis angulo B C D; et angulus C B D angulo A C B; erit totus angulus A B D æqualis toti A C D. oſtenſus autem eſt, et angulus B A C angulo B D C æqualis, parallelogrammorũ igitur ſpaciorum latera, quę ex oppoſito, et anguli, inter ſe æqualia ſunt. Dico etiam diametrum ea bifariam ſecare. Quoniam enim æqualis eſt A B ipſi C D, communis autem B C, duæ A B B C duabus D C C B æquales ſunt, altera alteri, et angulus A B C æqualis eſt angulo B C D. baſis igitur A C baſi D B æqualis. quare et triangulum A B C triangulo B C D æquale erit. ergo diameter B C parallelogrammum A C D B bifariam ſecat. quod oportebat demonſtrare.

F. C. COMMENTARIVS.

Theorematum, vt inquit Proclus, alia vniuerſalia ſunt, alia non vniuerſalia. quomodo autem vtrumque horum dicamus, commemorabimus, cum quęſitum partiemur, quod vnam partem habet vniuerſalem, alteram vero non vniuerſalem. quamuis enim omne theorema vniuerſale quidem eſſe fortaſſe videretur, & omne, quod ab Euclide oſtenditur huiuſmodi eſſe (quamadmodum in præſentia quoque non ſolum latera, quae ex oppoſito ſunt, & angulos aequales habere vniuerſe de omnibus parallelogrammis dici videtur, verum etiam diametrum vtrunquodque bifariam ſecare) attamen alia quidem vniuerſe oſtendi dicimus, alia uero non vniuerſe. aliter enim vniuerſale appellari conſueuit, quod de omnibus rerum dicit, de quibus prędicatur; aliter autem quod omnia comprehendit,

Theorematum alia uniuerſalia, alia non vniuerſalia.

Vniuerſale duobus modis appellari conſueuit.

comprehendit, quibus idem ſymptoma ineſt. vniuerſale ſiquidem eſt, & quod omne aequicrure tres angulos duobus rectis aequales habet, quoniam de omnibus aequicruribus verum eſt; vniuerſale autem, & quod omne triangulum habet tres angulos duobus rectis aequales, quoniam omnia comprehendit, quibus hoc per ſe ineſt. Quocirca primum quoque hoc de triangulo oſtendi dicimus, tres angulos duobus rectis aequales habere. Itaque iuxta hanc ſignificationem alia quidem vniuerſalia theorematum dicentes, alia vero non vniuerſalia, preſens theorema dicimus vnum quidem queſitorum vniuerſale habere: alterum vero non vniuerſale. nam hoc quidem latera, quae ex oppoſito ſunt, & angulos aequales habere vniuerſale eſt. ſolis enim parallelogrammis ineſt. hoc vero, diametrum biſariam ſpatium ſecare, non vniuerſale, quoniam non omnia comprehendit, in quibus ſymptoma hoc inſpicitur. etenim circulis, & ellipſibus hoc etiam ineſt. & videntur primae quidem rerum huiuſcemodi notiones eſſe magis particulares, progreſſae autem totum comprehendere. Cum enim antiqui contemplati fuiſſent, diametrum biſariam ſecare circulum, ellipſim, & parallelogrammum, commune in his poſtea contemplati fuere. Hallucinatur autem, inquit Ariſtoteles, quidā nō vniuerſale tanquā vniuerſale oſtendens, eō quod commune eſt innominatū, cui primum ſymptoma ineſt. nam quid commune ſit numeris, & magnitudinibus, & motibus, & ſonis, quibus omnibus ineſt permutata proportio, dicere non licet. quid preterea cōmune ſit circulo, ellipſi, & parallelogrammo, difficile eſt exprimere, nā vna quidem figura rectilinea eſt, altera circularis, altera vero mixta. Quapropter vniuerſale eā oſtēdere opinamur, qui demonſtrat, omne parallelogrāmū à diametro biſariā ſecari, eo quòd commune ſimul nō cernimus, propter quod hoc verum eſt. Hoc igitur in parallelogrammis etiam huiuſcemodi vniuerſale non eſt propter iam dictam cauſſam. illud vero eſt, omne parallelogrammum latera, quae ex oppoſito ſunt & angulos habere aequalia. Etenim ſi aliqua figura poſita fuerit, quae ex oppoſito ſunt latera, & angulos aequalia habere, parallelogrammum hęc eſſe oſtendetur: hęc Proclus. Huius autem theorematis conuerſum, quatenus ad primam partem attinet, tale eſt.

Tres angulos duobus rectis æquales habere primū de triangulo oſtenditur.

Diametrum biſariam ſecare ſpaciū, ineſt non ſolum parallelogrāmo ſed circulis, et ellipſibus.

Omne quadrilaterum, quod latera ex oppoſito, et angulos æqualia habet, parallelogrammum eſt.



Sit quadrilaterum A B C D, habens latus quidem A B aequale lateri D C; latus vero A D lateri B C; angulumq; A B C angulo A D C aequalem; & angulum B A D angulo B C D. Dico quadrilaterum A B C D parallelogrammum eſſe. Ducatur diameter B D. Et quoniam A B eſt aequalis D C, & A D ipſi B C, duae D A A B duabus B C C D aequales ſunt, angulosq; aequales cōtinēt, & baſis B D vtrique cōis. triangulū igitur A B D triangulo C D B aequale erit, et reliqui anguli reliquis angulis aequales, videlicet angulus A B D angulo C D B, & angulus A D B angulo C B D, qui ſunt alterni. ergo A B parallela eſt ipſi D C & A D ipſi B C; ideoq; A B C D parallelogrammum eſt. quod demonſtrare oportebat.

27. huius.

Conuerſum vero vt ad ſecundam partem huiuſmodi erit [omne quadrilaterum, quod ab vtriſque diametris biſariam ſecatur, parallelogrammum eſt, *quod nos Paulo poſt demonſtrabimus.*

THEOREMA XXV. PROPOSITIO XXXV.

Parallelogramma in eadem baſi, et in eiſdem paralellis conſtituta, inter ſe æqualia ſunt.



Sint parallelogramma A B C D E B C F in eadem baſi B C, et in eiſdem parallelis A F B C conſtituta. Dico A B C D parallelogrammū parallelogrammo E B C F æquale eſſe. Quoniā enim parallelogrammum eſt A B C D, æqualis eſt A D ipſi B C. Eadem quoque ratione, et E F eſt æqualis B C. Quare et A D ipſi E F æqualis erit: et communis D E. tota igitur A E æqualis F D eſt æqualis. eſt autem et A B æqualis D C. ergo duę E A A B duabus F D D C æquales ſunt, altera alteri, et angulus F D C æqualis angulo E A B, exterior interiori. baſis igitur E F baſi F C eſt æqualis, et E A B

4. huius.

triangulum æquale triangulo FDC. commune auferatur D G E. reliquum igitur trapezium A B G D reliquo trapezio E G C F est æquale. commune apponatur G B C triangulum. ergo totum parallelogrammum A B C D toti parallelogrammo E B C F æquale erit. parallelogramma igitur in eadem basi; et in eisdem parallelis cõstituta inter se æqualia sunt. quod oportebat demonstrare.

F. C. COMMENTARIVS.

Quemadmodum theorematum, vt inquit Proclus, alia quidem vniuersalia, alia vero particularia esse dicebamus, & quemadmodum hæc diuidentes subiungebamus, alia esse simplicia, alia composita, & quid vnumquodque horum esset ostendebamus, ita sanè iuxta aliã distinctionem, alia quidem localia esse dicimus, alia vero non localia. Voco autem localia, quibuscunque idem symptoma in toto quodam loco accidit. locum uero lineae, vel superficiei situm, qui vnum, idemq; symptoma efficiat. localium enim alia in lineis constituuntur, alia in superficiebus. Et quoniam linearum aliæ sunt planae, aliae solidae. & planae quidem, quarum simplex est in plano intelligentia, ut ipsius rectae: solidae uero quarum ortus ex quadam solidae figurae sectione apparet. ut Cylindricae helicis, canonicarumque linearum, dicerem utique eorum etiam, quae in lineis constituuntur, localium theorematum, alia quidem planum habere locum, alia uero solidum. Præsens igitur theorema & locale est, & in lineis locale, & planum. totum enim spacium, quod inter parallelas interijcitur, locus est parallelogrammorum, quae in eadem basi constituuntur. quae sanè aequalia quoque inter se Euclides ostendit. eorum uero localium theorematum, quae solida uocantur, tale sit exemplum, [parallelogramma, quæ in asymptotis, et hyperbolã describuntur æqualia sunt.] *nam hyperbolen solidam esse lineam, manifestum est, quòd sit una ex coni sectionibus. Cum autem in præsentia de rectilineis sermo sit, localia plana in rectis lineis tradit; in tertio autem libro, cũ de circulis, eorumq; symptomatibus pertractet, ea etiam, quae in circumferentijs constituuntur locum simul, & planorum theorematum docebit, tale siquidem in illis est, quod ait* [Qui in eadem portione sunt anguli inter se sunt æquales] *nec non illud.* [Anguli qui in semicirculo recti sunt] *nam si infiniti quidẽ anguli in circũferentia constituti fuerint, eadẽ existẽte basi, omnes aequales esse ostenduntur, & illa quidem proportione respondent triangulis, & parallelogrammis, quae in eadem basi, & in eisdem sunt parallelis. Species igitur theorematum, quae mox sequuntur talis est, quae apud antiquos mathematicos localis nuncupatur. Sunt præterea hæc theoremata ex eorum numero, quae admirabilia in mathematicis disciplinis appellantur. stupet enim uulgus statim si longitudo multiplicata spaciorum aequalitatem non destruit, eadem existẽte basi, quantum enim parallelas producimus, tantum parallelogrammorum quoque longitudines augentur. Sciendum autem est angulorum aequalitatem, & inæqualitatem maximam uim habere ad augenda minuendaq; spacia. quo enim magis angulos inæquales efficimus, eò spacium magis diminuimus, si longitudo latitudoq; eadem sit. Hoc theorema plures habet casus, uel igitur latus B E secat C D, uel non secat. & si non secat, uel E cadit inter A D uel in D. Euclides autem difficiliorem casum elegit, cum scilicet latus B E ipsum C D secat. si uero E cadit inter A D ita argumentabimur. Quoniam enim A D est aequalis E F, quòd utraque ipsi B C sit aequalis, communi ablata E D, erit reliqua A E aequalis reliquae D F. est autem D C aequalis A B. Itaque duae F D D C duabus E A A B aequales sunt, & angulos aequales continent. basis igitur F C basi E B est aequalis. & F D C triangulum triangulo E A B. addatur cõmune trapezium E B C D. erit totum A E C D parallelogrammum toti E B C F parallelogrammo aequale. Quòd si E cadat in D, similiter demonstrabimus triangulum F D C aequale triangulo D A B. quare addito utrique communi D B C triangulo, totum A B C D parallelogrammum toti parallelogrammo D B C F, hoc est E B C F aequale erit.*

Theoremata localia.
Locus lineæ, uel superficiei situs, qui idẽ symptoma efficit.
Linearum aliæ planæ aliæ solidæ.
Localium theorematũ alia planum habent locũ, alia solidũ.
Localia theoremata, quæ solida appellantur.
Hyperbole solida linea.
Localia plana in rectis lineis.
Localia plana in circumferentijs.
Theoremata quæ in mathematicis admirabilia dicuntur.
Angulorum æqualitas, et inæqualitas maximam uim habent ad augenda minuendaq; spacia.
Theorematis casus.
4. huius.



THEOREMA XXVI. PROPOSITIO XXXVI.

Parallelogramma in æqualibus basibus,

et in eiſdem parallelis conſtituta inter ſe ęqualia ſunt.



Sint parallelogramma ABCD EFGH in æqualibus baſibus B C F G, et in eiſdē parallelis AH BG conſtituta. Dico parallelogrammum A B C D parallelogrammo E F G H æquale eſſe. coniungantur enim BE C H. Et quoniam æqualis eſt BC ipſi FG, & FG ipſi EH; erit et BC ipſi EH æqualis. ſuntq; parallelæ, et ipſas cō iungunt BE CH. quæ autem æquales, et parallelas ad eaſdem partes coniungunt, æquales, et parallelæ ſunt. Ergo E B, C H et æquales ſunt, et parallelæ: quare E B CH parallelogrammum eſt, et æquale parallelogrammo ABCD; baſim enim eandem habet B C, et in eiſdem parallelis B C, A D conſtituitur. ſimili ratione, et EFGH parallelogrammum eidem parallelogrammo EBCH eſt ęquale. ergo parallelogrammum ABCD parallelogrammo EFGH ęquale erit. Parallelogramma igitur in æqualibus baſibus, et in eiſdem parallelis conſtituta inter ſe ſunt æqualia. quod oportebat demonſtrare.

33.huius.

Ex antecedente.

F. C. COMMENTARIVS.



Parallelogrāma in eiſdē parallelis, quæ ſint. Theorematis caſus.

Præcedens theorema eaſdem baſes accipiebat, hoc vero æquales. commune autem vtriſque eſt in eiſdem eſſe parallelis. oportet igitur ipſa neque intra ſubiectas cadere parallelas, neque extra. parallelogramma enim in eiſdem dicuntur eſſe parallelis, cum baſes ipſorum, & quæ his ex oppoſito ſunt, latera eiſdem parallelis aptantur. Caſus huius theorematis plures ſunt. Nam vel baſes omnino ſeiunctæ ſunt, vel ſe ſe contingunt, uel aliquam partem habent communem, vtcunque ſe habeant latera, quæ baſibus opponuntur. & quamquam Proclus dicat Euclidem cum baſim ſeiunctam accepiſſet, theorema demonſtraſſe, attamen demonſtratio, quam habemus omnibus caſibus congruere mihi videtur, vt etiam ex hoc loco colligi poſſit de monſtrationes Euclidis à Theone in meliorem formam redactas eſſe.



THEOREMA XXVII. PROPOSITIO XXXVII.

Triangula in eadem baſi, & in eiſdem parallelis conſtituta inter ſe æqualia ſunt.



Sint triangula ABC DBC in eadem baſi BC, et in eiſdem parallelis AD BC conſtituta. Dico ABC triangulum triangulo D B C ęquale eſſe. producatur AD ex utraque parte in E F pūcta: et per B quidem ipſi CA parallela ducatur BE, per C vero ipſi BD parallela CF. parallelogrammū igitur eſt vtrūque ipſorū EBCA DBCF, et parallelogrammum E B C A eſt ęquale parallelogrammo D B C F, etenim in eadem ſunt baſi BC, et eiſdem parallelis BC EF, eſtq; parallelogrammi quidem EBCA dimidium ABC triangulum, cum diameter AB ipſum bifariam ſecet: parallelogrammi vero DBCF dimidium triangulum DBC; diameter enim DC ipſum bifariā ſecat. Quæ autem æqualium dimidia, inter ſe ęqualia ſunt. ergo triangulum A B C triangulo DBC eſt æquale. Triangula igitur in eadem baſi, et in eiſdem parallelis conſtituta inter ſe ęqualia ſunt. quod oportebat demonſtrare.

31.huius.

35.huius.

34.huius.

7.com.no.

F. C.

F. C. COMMENTARIVS.

Theoremata de triangulis localia, & in lineis localia & plana

Sunt etiam hęc theoremata de triangulis, quae in eadem baſi, vel in aequalibus baſibus, & in eiſdem parallelis conſtituuntur localia, & in lineis localia, & plana. dicuntur autem triangula in eiſdem eſſe parallelis, quae cum baſes habeant in vna parallelarum, in reliqua vertices figũt.

THEOREMA XXVIII. PROPOSITIO XXXVIII.

Triangula in baſibus, ęqualibus et in eiſdem parallelis conſtitu ta, inter ſe ſunt ęqualia.



Sint triangula ABC DEF in æqualibus baſibus, B C EF, et in eiſdem parallelis BF AD conſtituta. Dico ABC triangulum triangulo DEF æquale eſſe. producatur enim AD ex vtraq; parte in GH puncta: et per B quidem ipſi CA parallela ducatur BG: per F vero ducatur FH parallela ipſi DE. parallelogrammum igitur eſt utrumque ipſorum GBCA DEFH. atque eſt parallelogrammum GB CA ęquale parallelogrammo DEFH: in æqualibus enim ſunt baſibus BC EF, et in eiſdem BF GH parallelis. parallelogrammi vero G B C A dimidium eſt ABC triangulum, nam diameter AB ipſum bifariam ſecat. et parallelogrammi DEFH dimidium eſt triangulum DEF, diameter enim D F ipſum ſecat bifariam. quę autem ęqualiũ dimidia, inter ſe æqualia ſunt. ergo ABC triangulum triangulo DEF eſt ęquale. triangula igitur in ęqualibus baſibus, et in eiſdem parallelis conſtituta, inter ſe ſunt æqualia. quod demonſtrare oportebat.

31. huius.

35. huius.

34. huius.

7 com not.

F. C. COMMENTARIVS.

Caſus in hoc theoremate tot ſunt, quot in xxvi. videtur autem Euclides quod in his quattuor theorematibus oſtendit, vno illo theoremate comprehendiſſe, in principio ſexti libri. [triangula et parallelogramma, quę eandem habent altitudinem inter ſe ſunt, ut baſes.] *eadem enim altitudo nihil aliud eſt, niſi in eiſdem eſſe parallelis. nã figurae oẽs quę in eiſdẽ ſunt parallelis, eandẽ altitudinẽ habent, & contra, altitudo ſiquidem eſt perpendicularis, quae ab altera parallelarũ ad reliquã pertinet. illic igitur per proportionem oſtenſum eſt, ita ſe ſe habere triangula, et parallelogramma, quae eandem altitudinem habent, hoc eſt quae in eiſdẽ ſunt parallelis, vt baſes: & aequalibus exiſtentibus baſibus aequalia eſſe ſpacia, & dupla duplis, & aliam proportionẽ habentibus, eandem habere & ſpatia inter ſe proportionem: in preſentia uero, quoniam non decebat proportione uti, qui nondũ de ipſa docuerat, contentus fuit aequalitate ſola, atque identitate.*

THEOREMA XXIX. PROPOSITIO XXXIX.

Triangula æqualia in eadem baſi, et ad eaſdem partes conſtitu ta, in eiſdem quoque ſunt parallelis.



Sint æqualia triangula A B C D B C in eaſdem baſi B C conſtituta, et ad eaſdem partes. Dico et in eiſdem parallelis eſſe. Iungatur enim A D. Dico A D parallelam eſſe ipſi B C. Si enim non eſt parallela, ducatur per A punctum ipſi B C parallela recta linea A E, et E C iungatur. æquale igitur eſt A B C triangulum triangulo E B C, in eadem enim eſt baſi BC, et in eiſdem BC, AE parallelis. Sed A BC triangulũ triangulo D B C eſt ęquale. ergo et triangulum

DBC

D B C æquale eſt ipſi E B C triangulo, maius minori, quod fieri non poteſt. non igitur A E ipſi B C parallela eſt. Similiter oſtendemus neque aliam quampiam parallelam eſſe, præter ipſam A D. ergo A D ipſi B C eſt parallela. Triangula igitur æqualia in eadem baſi, et ad eaſdem partes conſtituta in eiſdem quoque ſunt parallelis. quod oportebat demonſtrare.

F. C. COMMENTARIVS.

Hoc theorema vigeſimi ſeptimi conuerſum eſt, & quod ſequitur eſt conuerſum vigeſimi octauũ. nam, vt inquit Proclus, cum triplex ſit theorematum conuerſio, aut enim totum toti conuertitur, vt duodecimum theorema vndecimo; aut pars toti, vt tertium ſecũdo; aut pars parti, vt quintum primo. non enim totum in altero datum, quæſitum in altero eſt, nec quæſitum, datum, ſed pars: talia videntur eſſe hæc quoque theoremata in triangulis. erat ſiquidem quæſitum in præcedentibus, triangula æqualia eſſe, hoc autem non ſolum in his datum eſt, quippe cum partem inſuper ſumpſerit eius, quae in illis erat, poſitionis: hoc enim, in eadem baſi eſſe, & in æqualibus baſibus tum in his, tum in illis datum eſt, præterquam quòd in hiſce poſitionibus quoddam adiecit, quod quidem nec quæſitum, nec datum in illis erat. particula enim illa, ad eaſdem partes, extrinſecus inſuper fuit aſſumpta. conuerſa vero vigeſimi quinti, & vigeſimi ſexti in parallelogrammis conſulto omiſit, quod eadem ſit in vtriſque demonſtratio.

Theorematũ conuerſio triplex.

Et ad eaſdem partes.] *Quae his reſpondent, videlicet καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη in aliquibus græcis exẽplaribus, tum in hoc theoremate, tum in ſequenti nõ legũtur, ſed neceſſario addita ſunt. fieri enim poteſt vt in eadem baſi æqualia triangula ſumantur, vnum quidẽ ad partes ſuperiores, aliud vero ad inferiores, quae tamen non ſunt in eiſdem parallelis, & quandoque non eadem altitudine.* A



B

Maius minori quod fieri non põt.] *Idẽ abſurdũ ſequetur, ſi recta linea A E ſumatur extra ipſam A D, vt notat Proclus. Ex his, quae hoc loco demonſtrata ſunt, patebit cõuerſũ ſe cũdę partis vigeſimi quarti theorematis, quod erat huiuſmodi.*

Omne quadrilaterum, quod ab vtriſque diametris bifariam ſecatur, parallelogrammum eſt.

Sit quadrilaterum A B C D, cuius diametri A C B D ipſum bifariam ſecent. Dico A B C D parallelogrammum eſſe. Quoniam enim triangula A B C D B C eiuſdem ſunt dimidia, inter ſe aequalia ſunt: & eandem habent baſim B C. quare in eiſdem ſunt parallelis. parallela igitur eſt A D ipſi B C. ſimiliter cum triangulum A B C aequale ſit triangulo A B D, & ſint in eadem baſi A B, demonſtrabitur rectam lineam D C ipſi A B parallelam eſſe. Ergo A B C D parallelogrammum erit. quod oportebat demonſtrare.



THEOREMA XXX. PROPOSITIO XL.

Triangula æqualia in baſibus æqualibus, et ad eaſdem partes conſtituta, in eiſdem quoque ſunt parallelis.

Sint æqualia triangula A B C C D E in æqualibus baſibus B C C E conſtituta. Dico etiam in eiſdem eſſe parallelis. cõiungatur enim A D. Dico A D ipſi B E parallellam eſſe. Nam ſi non eſt, ducatur per A ipſi B E parallela A F, et F E iungatur. triangulum igitur A B C triangulo F C E eſt æquale, cum in æqualibus baſibus, et in eiſdem parallelis B E A F conſtituantur. Sed triangulũ A B C æquale eſt triangulo D C E.



38. huius.

ergo

ergo et triangulum D C E triangulo F C E æquale erit, maius minori, quod fieri nõ potest. non igitur A F ipsi B E est parallela. similiter demonstrabimus neque aliam quampiam parallelam esse, præter A D. ergo A D ipsi B E parallela erit. Æqualia igitur triangula in basibus æqualibus, et ad easdem partes constituta, etiam in eisdem sunt parallelis. quod demonstrare oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

Cum tria sint in iam dictis propositionibus, videlicet in aequalibus, vel eisdem basibus esse, in eisdem parallelis, & aequalia esse triangula, & parallelogramma; nos duo semper contexentes, vnum vero relinquentes varie conuertemus. aut enim bases easdem, vel aequales ponemus, in eisdemq; parallelis triangula, & parallelogramma, & quattuor faciemus theoremata: aut aequalia ipsa suscipiemus, & bases easdem, vel aequeles, & faciemus alia quattuor; quorum duo quidem omisit Euclides, nimirum ea, quae sunt in parallelogrammis; reliqua vero duo ostendit, videlicet ea, quae in triangulis sunt: aut etiam cum aequalia sumpserimus, & in eisdẽ parallelis, reliquum ostendemus, vel in eisdem basibus esse, vel in aequalibus, & faciemus alia quattuor, quae etiam Euclides omisit. in his namque eadem est demonstratio, nisi quòd duo ex his quattuor per se vera non sunt. non enim aequalia parallelogramma, vel triangula, & quae in eisdem sunt parallelis, necessario in eadem basi sint. Sed totum hoc in hisce positionibus verum est, vel in eisdem esse basibus, vel in æqualibus; alterum autem, non omnino sumptas positiones consequitur. Quapropter cũ decem sint omnia theoremata, sex quidem geometra conscripsit, quattuor vero omisit, ne rursus eadem ratione frustra laboret, cum eadem sit demõstratio. ostẽdetur enim in triangulis hoc modo.

Triangula æqualia, et in eisdem parallelis constituta, vel in eisdem, vel in æqualibus basibus erunt.



Sint aequalia triangula A B C D E F in eisdem parallelis A D B F constituta. Dico in aequalibus quoque basibus esse. Non enim, sed si fieri potest, sint bases B C E F inæquales, & sit B C maior, abscindaturq; B H aequalis ipsi E F; &
38. huius. *A H iungatur. Itaque quoniam triangula A B H D E F in aequalibus sunt basibus B H E F, & in eisdem parallelis, inter se aequalia sunt. Sed & ipsa A B C D E F triangula posita sunt aequalia. ergo triangulum A B C triangulo A B H est aequale; sed & maius, quod fieri non potest. Non igitur inæquales sunt triangulorum A D C D E F bases. Idem demonstrabitur, & in parallelogrammis. Quare cum modus demonstrandi idem sit, & id, quod fieri non potest, idem, totum, scilicet suae parti aequale esse: non immerito ab Euclide prætermissum fuit. hæc ex Proclo.*

THEOREMA XXXI. PROPOSITIO XLI.

Si parallelogrammum, et triangulum eandem basim habeant, in eisdemq; sint parallelis; parallelogrammum ipsius trianguli duplum erit.



Parallelogrammum enim A B C D, et triãgulum E B C, basim habeant eandem B C, et in eisdem sint parallelis B C A E. Dico parallelogrammum A B C D trianguli E B C duplum esse. Iũgatur enim A C. triangulum igi-
37. huius. tur A B D triangulo E B C est æquale; namque in eadem basi B C, et in eisdem B C A E
34. huius. parallelis constituitur. Sed A B C D parallelogrammum duplum est trianguli A B C, cum diameter A C ipsum bifariam secet. Quare et ipsius E B C trianguli duplum erit. Si igitur parallelogrammum, et triangulum

gulum eandem baſim habeant, et in eiſdem ſint perallelis; duplum erit parallelogrammum ipſius trianguli. quod demonſtrare oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

Huius theorematis duo ſunt caſus, vel enim triangulum verticem habet intra parallelogrammum, vel extra. Sed in vtriſque demonſtratio eadem eſt. Quòd ſi baſes aequales ſint, eodem modo oſtendemus, parallelogrammi diametrum ducentes. nam cum triangula in baſibus aequalibus conſtituta inter ſe aequalia ſint, parallelogrammum, quod alterius eſt duplum, reliqui quoque duplum erit. Sed duo eius conuerſa ſimiliter demonſtrabuntur, quorum vnum eſt.

Si trianguli parallelogrammum duplum fuerit, eandemq; baſim, aut æquales habuerint, et fuerint ad eaſdem partes: in eiſdem etiam parallelis erunt.

Si enim non ita ſit, totũ parti erit aequale, eademq; ratio vigebit. nã eſſe enim eſt, aut intra parallelas trianguli verticem cadere, aut extra: vtro autem modo ſe ſe habuerit, idem ſequetur abſurdum, parallela ipſi baſi per trianguli verticem ducta. alterum vero eſt.

Si trianguli parallelogrammum duplum fuerit, in eiſdemq; ambo fuerint parallelis; aut in vna eademq; baſi, aut in æqualibus erunt.

Si enim in baſibus inaequalibus ſint, cum aequales ſumpſerimus, totum parti aequale erit. In hoc igitur commune abſurdum omnia hęc theoremata deſinunt. Quare elementorum inſtitutor nobis reliquit eam, quae in his eſt, veritatem inueſtigare, cum in ſimplicioribus ipſe, & principalioribus contemplationem contraxerit. ex Proclo.

PROBLEMA XI. PROPOSITIO XLII.

Dato triangulo æquale parallelogrammum conſtituere in dato angulo rectilineo.



Sit datum triangulum A B C, datus autem rectilineus angulus D. Itaq; oportet, dato triangulo ABC æquale parallelogrãmum conſtituere in angulo rectilineo ipſi Dæ quali. ſecetur B C bifariam in E, et iuncta A E ad rectam lineam E C, atque ad pũctum in ea E, conſtituatur angulus C E F æqualis ipſi D: et per A quidẽ ipſi E C parallela ducatur A G; per C vero ipſi F E ducatur parallela C G. parallelogrãmum igitur eſt F E C G. Et quoniam B E eſt æqualis E C, erit et A B E triangulum triangulo A E C æquale; in æqualibus enim ſunt baſibus B E E C, et in eiſdem B C A G parallelis. Ergo triangulum A B C trianguli A E C eſt duplum. eſt autem et parallelogrammum F E C G duplum trianguli A E C; baſim enim eandem habet, et in eiſdẽ eſt parallelis. æquale igitur eſt F E C G parallelogrammum triangulo A B C, habetq; C E F angulum æqualem angulo D dato. Dato igitur triangulo A B C æquale parallelogrammum F E C G conſtitutum eſt, in angulo C E F, qui angulo D eſt æqualis. quod quidem facere oportebat.

23.huius.
31.huius.
38.huius.
34 huius.

THEOREMA XXXII. PROPOSITIO XLIII.

Omnis parallelogrammi ſpacij eorum, quæ circa diametrum ſunt, parallelogrammorum ſupplementa inter ſe ſunt æqualia.

Sit parallelogrammum A B C D, cuius diameter A C: et circa ipſam A C parallelogramma quidem ſint E H F G, quæ vero ſupplementa dicuntur B K K D. Dico B K ſuplementum ſupplemento K D æquale eſſe. Quoniam enim parallelogrammum eſt A B C D, et eius diameter A C, æquale eſt A B C triangulum triangulo A D C.

34.huius.

A D C. Rurſus quoniam E K H A parallelogrammum eſt, cuius diameter A K, triangulum A E K triangulo A H K æquale erit. Eadem ratione, et triangulum K G C triangulo K F C eſt æquale. Cum igitur triangulum quidem A E K æquale ſit triangulo A H K: triangulum vero K G C ipſi K F C; erit triangulum A E K vnà cum triangulo K G C æquale triangulo A H K vna cum H F C triangulo. eſt autem et totum triãgulum A B E æquale toti A D E. reliquum igitur B G ſupplementum reliquo ſupplemento K D eſt æquale. Ergo omnis parallelogrammi ſpacii eorum, quę circa diametrum ſunt, parallelogrãmorum ſuppleméta inter ſe æqualia ſunt. quod oportebat demonſtrare.



F. C. COMMENTARIVS.

Huius theorematis tres ſunt caſus. vel enim parallelogramma, quae circa eandem conſiſtunt diametrum, ſe ſe in puncto contingunt, vel ſe ſe ſecant, vel quadam diametri parte à ſe diſiunguntur. In omnibus autem eadem congruit demonſtratio, quamquam non ſemper quadrilatera ſint ſupplementa. Euclides ſumpſit ea parallelogramma, quae proprie circa diametrum conſiſtere dicuntur, videlicet quae ſe ſe in puncto contingunt, in quo caſu ſupplementa B K K D quadrilatera ſunt, vt appareat in prima figura. Sit rurſus parallelogrammum A B C D, cuius diameter B D, & circa B D parallelogramma ſint E F G D H B L K, quae ſe ſe in punctis M N ſecent. Dico quadrilatera A H M E N L C G inter ſe aequalia eſſe. Quoniam enim triangulum quidem A B D eſt aequale triangulo D B C; triangulum vero E F D triãgulo D F G; erit reliquum quadrilaterum A B F E æquale reliquo quadrilatero C B F G. Rurſus quoniam triangulũ H B K eſt aequale triangulo K B L, triangulumq; M F K triãgulo K F N; erit reliquum quadrilaterum H B F M aequale reliquo L B F N. erat autem & totum A B F E aequale toti C B F G. reliquum igitur A H M E quadrilaterum reliquo quadrilatero N L C G aequale ſit neceſſe eſt; & hęc quidem quadrilatera ſunt, quae ſupplementa dicuntur.

§4. huius.



Sit denique parallelogrammum A B C D, & eius diameter B D, circa quam parallelogramma E L F D G B H K, quae à ſe inuicem diſiunguntur parte ipſius diametri K L. Et quoniam triangulum A B D eſt aequale triangulo D B C, & triangula E L D G B K aequalia ſunt triangulis D L F K B H; erit reliquum quinquelaterum A G K L E aequale reliquo H K L F C. atque hęc quidem parallelogrammorum ſupplementa ſunt. At nomen ſupplementorum à re ipſa ſumptũ eſt, quatenus hęc quoque pręter duo parallelogramma, quae ſunt circa diametrum, totum parallelogrammum complent. Illa autem parallelogramma circa eãdem diametrum ſunt, quęcunque partem totius diametri pro ſua etiam diametro habent. Sed cum totius parallelogrammi diameter aliquod ex lateribus interiũ parallelogrammi ſecat, tunc parallelogrãmum hoc toti parallelogrammo circa eandem diametrum non eſt, vt in parallelogrammo A B C D diameter B D ſecat E F latus ipſius E F G D parallelogrammi. quare E F G D parallelogrammum non eſt circa eandem diametrum.

Supplementorũ nomen a re ipſa sũptum.





PROBLEMA XII. ROPOSITIO. XLIIII.

Ad datam rectam lineam dato triangulo æquale parallelogrammum applicare in dato angulo rectilineo.

Sit data quidem recta linea A B; datum vero triangulum C, et datus angulus rectilineus D. oportet igitur ad datam rectam lineam A B, dato triangulo C æquale parallelogrammum applicare in angulo ipsi D æquali. constituatur triangulo C æquale parallelogrammum B E F G, in angulo E B G, qui est æqualis D. et ponatur B E in directum ipsi A B, producaturq; F G ad H: et per A alterutri ipsarum B G E F parallela ducatur A H, et H B iungatur. Quoniã igitur in parallelas A H E F recta linea HF incidit, anguli AHF HFE duobus rectis æquales sunt. quare BHG GFE duobus rectis sunt minores. Quæ vero à minoribus, quàm sint duo recti, in infinitum producuntur, cõueniunt inter se. Ergo H B F E prò ductæ conuenient. producantur, et cõueniant in K: perq; K alterutri ipsarum E A F H parallela ducatur K L, et A H G B ad L M puncta producantur. parallelogrammum igitur est H L K F, cuius diameter H K, et circa H K parallelogramma quidem sunt A G M E; ea vero, quæ supplementa dicuntur L B B F: ergo L B ipsi B F est æquale. Sed et B F æquale est triangulo C. quare et L B triangulo C æquale erit. Et quoniã G B E angulus æqualis est angulo A B M, sed et æqualis angulo D; erit et angulus A B M angulo D æqualis. Ad datam igitur rectam lineam A B, dato triangulo C æquale parallelogrammum constitutum est L B, in angulo A B M, qui est æquaiis angulo D. quod facere oportebat.



42. huius.
31. huius.
29. huius.
5. postul.
31. huius.
Ex antecedente.
43. huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Antiqua hæc sunt, vt ait Eudemus, & pythagoreorum inuenta, applicatio spaciorum, excessus, & defectus. cum enim proposita recta linea, datum spacium toti rectae linae coaptaueris, tunc spacium illud applicari dicunt; cum vero spacij longitudinem ipsa recta linea maiorem feceris, tunc excedere; cum autem minorem, ita vt spacio descripto aliqua rectae linae pars extra sit, tunc deficere. & hoc modo Euclides in sexto libro, tum excessus, tum defectus mentionem facit. in præsentia vero applicatione indiguit ad datam rectam lineam dato triangulo æquale parallelogrammum applicare volens, vt non solum parallelogrammi dato triangulo æqualis constitutionem habeamus, sed etiam ad terminatam rectam lineam, applicationem. ex Proclo.

PROBLEMA XIII. PROPOSITIO XLV.

Rectilineo dato æquale parallelogrammum constituere in dato angulo rectilineo.

Sit datum rectilineum ABCD: datus vero angulus rectilineus E. Itaque oportet rectilineo ABCD æquale parallelogrammum constituere in angulo ipsi E æquali. coniungatur enim DB, et constituatur triangulo ADB æquale parallelogrammum FH, in angulo HKF, qui est æqualis angulo E. deinde ad rectam lineam GH applicetur triangulo DBC æquale parallelogrammum GM, in angulo GHM, qui angulo E est æqualis. Et quoniam angulus E æqualis est vtrique ipsorum HKF GHM; erit et HKF angulo GHM æqualis. communis apponatur KHG. anguli igitur FKH

42. huius.
Ex antecedente.

29.huius. KHG angulis KHG GHM æquales sunt. Sed FKH KHG sunt æquales duobus rectis. ergo et KHG GHM duobus rectis æquales erunt. Itaque ad aliquam rectam lineam GH, et ad datum in ea punctum H duæ rectæ lineæ KH HM non ad easdem partes positę angulos deinceps duobus rectis æquales efficiunt. in directum igitur est KH ipsi HM. Et quoniam in parallelas KM FG recta linea H G incidit, alterni anguli MHG HGF æquales sunt. communis apponatur HGL. anguli igitur MHG HGL angulis HGF HGL sunt æquales. at anguli MHG HGL æquales sunt duobus rectis. quare et anguli HGF HGL duobus rectis æquales erunt. In directum igitur est FG ipsi GL. Et quoniam KF ipsi HG et æqualis est, et parallela; sed et HG ipsi ML; erit KF ipsi ML et æqualis, et parallela: ipsasq; coniungunt rectæ lineæ KM FL. ergo et KM F L æquales et parallelæ sunt. parallelogrammum igitur est K F L M. Quòd cum triangulum quidem A B D æquale sit parallelogrammo H F: triangulum vero DBC parallelogrammo GM; erit totum ABCD rectilineum toti parallelogrammo KFLM æquale. Dato igitur rectilineo ABCD æquale parallelogrammum constitutum est K F L M in angulo FKM, qui est æqualis angulo E dato. quod facere oportebat.

14 huius.

29.huius.



34.huius. 30.huius. 33.huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Duobus problematibus, in quibus & constitutionem inuenit, & applicationem aequalium dato triangulo parallelogrammorum, hoc vniuersalius est. siue enim triangulum, siue quadratum, siue omnino quadrilaterum, siue aliquod aliud multilaterum datum fuerit, per hoc problema aequale ipsi parallelogrammum constituemus. Omne enim rectilineum, vt prius diximus, per se in triangula resoluitur, & methodum inueniendae triangulorum multitudinis tradidimus. resoluentes igitur datum rectilineum in triangula, & vni quidem ipsorum aequale parallelogrammum constituentes, reliquis uero ad datam rectam lineam aequalia applicantes parallelogramma, nempe ad illam, ad quam prima applicatio facta est; habebimus ex his parallelogrammum aequale rectilineo, quod ex illis triangulis constat; et factum iam erit, quod proponebatur. Hęc Proclus.

COROLLARIVM.

Ex iam dictis manifestum est, quomodo ad datam rectam lineam, dato rectilineo æquale parallelogrammum applicari possit in dato angulo rectilineo.

PROBLEMA XIIII. PROPOSITIO XLVI.

A data recta linea quadratum describere.

Sit data recta linea AB. oportet ab ipsa AB quadratũ describere. Ducatur rectę lineę AB à pũcto in ea dato A ad rectos angulos AC: & ipsi AB æqualis ponatur AD; perq; punctum D ducatur DE ipsi AB parallela: et per B ipsi AD parallela ducatur BE. parallelogrammum igitur est ADEB. et A B quidem est æqualis D E, A D vero ipsi B E. Sed et B A ipsi AD est æqualis. quattuor igitur BA, AD DE EB inter se æquales sunt, ideoq; æquilaterum est ADEB parallelogrammum. Dico etiam rectangulum esse. Quoniam enim in parallelas AB DE recta linea incidit AD, anguli BAD ADE duobus rectis sunt æquales. rectus autem est BAD. ergo et A D E rectus erit. parallelogrammorum vero spaciorum, quæ ex oppositio sunt latera, et anguli inter se æqualia sunt. rectus igitur est vterque oppositorum ABE BED angulorum: et ob id rectangulum est ADEB. ostensum autem est, et æquilaterum esse. quadratum igitur sit necesse est. atque est à recta linea AB descriptum. quod ipsum facere oportebat.

29.huius. 34.huius.



F. C.

F. C. COMMENTARIVS.

Hoc problemate indigemus potiſſimum in ſequentis theorematis conſtructionem. Videtur autem Euclides duorum in rectilineis optimorum ortus tradere voluiſſe: nimirum trianguli æquilateri, & quadrati, quoniam ad conſtitutionem quoque mundanarum figurarum, & præcipue earum quattuor, quarum & ortus eſt & reſolutio, hiſce rectangulis opus eſt. nam icoſaedrum quidem, & octaedrum, & pyramis ex aequilateris triangulis conſtant; cubus vero ex quadratis. Proclus hoc loco duo theoremata demonſtrat, quibus mathematici tamquam demonſtratis paſſim vtuntur, nempe hæc.

Quadrata ab æqualibus rectis lineis deſcripta, etiam inter ſe æqualia ſunt.

Sint enim aequales rectae lineae AB CD, & ab ipſa quidem AB deſcribatur A B E G quadratum; ab ipſa vero C D quadratum C D F H. Dico hæc quadrata inter ſe aequalia eſſe. Quoniam enim rectae linae A B C D aequales ſunt, erunt & ipſae A G C H aequales, angulosq; aequales continent. ergo & baſis G B eſt aequalis baſi H D, & triangulum A E G aequale triangulo C D H; & ipſorum dupla ſunt aequalia. quadratum igitur A B E G quadrato C D F H aequale erit.. Sed & huius ipſius conuerſum.



4. huius.

Quadrata æqualia ab æqualibus rectis lineis deſcripta ſũt.

Sint enim quadrata aequalia A F C G: & ponatur ita, vt latus A B ſit in directum ipſi BC. Cum igitur anguli recti ſint, recta quoque linea FB rectae B G in directum erit. iungantur F C C G G A A F rectae linae. Et quoniam A F quadratum eſt aequale quadrato C G, & A F B triangulum aequale erit triangulo C B G. commune apponatur B C F triangulum: totum igitur triangulum A C F toti C F G eſt aequale; ideoq; parallela eſt A G ipſi F C. Rurſus quoniam angulus A F G eſt aequalis angulo C G B, cum vterque ſit dimidia pars recti; erit A F ipſi C G parallela. aequalis igitur eſt recta linea A F rectae linae C G, parallelogrammi ſiquidem latera ex oppoſito iacentia ſunt. Itaque quoniam duo ſunt triangula A B F B C G, quae alternos angulos aequales habent, quippe quòd A F C G parallelae ſint, & latus vnum A F eſt aequale lateri C G; erit & latus A B lateri B C, & latus B F lateri B G aequale. Oſtenſum igitur eſt latera etiam à quibus deſcripta ſunt A F C G quadrata inter ſe aequalia eſſe, cum illa aequalia ſint. poſſumus etiam aliter propoſitum demonſtrare per deductionem ad id, quod fieri non poteſt in hunc modum. Sint aequalia quadrata A B C D E F G H. Dico rectas lineas A B E F à quibus ea deſcribuntur inter ſe aequales eſſe. Si enim A B E F aequales non ſint, altera earum eſt maior, ſit maior A B, & abſcindatur A K, quae ipſi E F ſit aequalis, & ex A K quadratum A K L M deſcribatur. Quoniam igitur A K eſt aequalis E F, erit & quadratũ A K L M, ex ante demõſtratis, aequale quadrato E F G H; ſed et quadratum A B C D aequale erit eidem E F G H, quadrato. ergo quadratum A B C D quadrato A K L M eſt aequale, totum parti, quod fieri non poteſt. non igitur aequalibus exiſtentibus quadratis A B C D E F G H rectae lineae A B E F à, quibus ea deſcribũtur, inæquales ſunt. ergo inter ſe aequales ſint neceſſe eſt.



39. huius.

28. huius.
34. huius.





Non

Non inutile autem erit ad parallelogrammorum etiam constitutionem problema, quod sequitur.

Ex duabus rectis lineis, quæ duabus datis æquales sint, et in dato angulo rectilineo parallelogrammum constituere.



Sint datae quidem rectae linae A B, datus autem angulus rectilineus C. oportet ex duabus rectis lineis, quae ipsis A B aequales sint, & in angulo ipsi C aequali, parallelogrammum constituere. exponatur recta linea D E, 23.huius. *quae ipsi A sit aequalis. Itaque ad datam rectam lineam D E, & ad datum in ea punctum D, dato angulo rectilineo C aequalis angulus constituatur F D E: ita vt F D sit aequalis ipsi B rectae linae datae. postea per F ducatur F G parallela ipsi D E, & per E ducatur parallela ipsi D F, quae cum F G in puncto G conueniat. parallelogrammum igitur est F D E G, ex rectis lineis D E D F constitutum, quae datis rectis lineis A B sunt aequales, & angulum continent F D E dato angulo C aequalem. quod facere oportuit.*

THEOREMA XXXIII. PROPOSITIO XLVII.

In rectangulis triangulis, quod à latere rectum angulum subtendente describitur quadratum æquale est quadratis, quæ à lateribus rectum angulum continentibus describuntur.



Sit triangulum rectangulum A B C, rectum habens B A C angulum. Dico quadratum descriptum à recta B C æquale esse quadratis, quæ ab ipsis B A A C describuntur. Describatur enim à B C quidem quadratum B D E C, ab ipsis vero B A A C quadrata G B H C, perq; A alterutri ipsarum B D C E parallela ducatur A L; et A D F C iungatur. quoniam igitur vterque angulorum B A C B A G rectus est, ad aliquam rectam lineam B A, et ad datum in ea punctum A duæ rectæ lineæ A C A G non ad easdem partes positæ, angulos qui deinceps sunt duobus rectis æquales efficiunt. 14.huius. in directum igitur est C A ipsi A G. eadem ratione, et A B ipsi A H est in directum. Et quoniam angulus D B C est æqualis angulo F B A, rectus enim vterque est, communis apponatur A B C. totus igitur D B A angulus toti F B C est æqualis. Quòd cum duæ A B B D duabus F B B C æquales sint, altera alteri, et angulus D B A æqualis angulo F B C; 4.huius. erit et basis A D basi F C æqualis, et A B D triangulum triangulo F B C æquale. 41.huius. estq; trianguli quidem A B D duplum B L parallelogrammum; basim enim eandem habent B D, et in eisdem B D A L sunt parallelis: trianguli vero F B C duplum est G B quadratum. rursus enim basim habent eandem F B, et in eisdem sunt parallelis F B G C. Quæ autem æqualium dupla inter se æqualia sunt. ergo æquale est parallelogrammum B L ipsi G B quadrato. Similiter iunctis A E B K, ostendetur etiam C L parallelogrammum æquale quadrato H C. totum igitur D B E C quadratum duobus quadratis G B H C est æquale. et describitur quidem D B E C quadratum à recta linea B C, quadrata vero G B H C ab ipsis B A A C. quadratum igitur B E, à latere B C descriptum æquale est quadratis, quæ describuntur à lateribus B A A C. ergo in rectangulis triangulis, quadratum, quod describitur à latere rectum angulum

gulum ſubtendente æquale eſt quadratis, quæ à lateribus rectum angulum continentibus deſcribuntur. quod oportebat demonſtrare.

F. C. COMMENTARIVS.

Hoc theorema ad pythagoram referunt, dicuntq́, eum cum illud inueniſſet, bouem immolaſſe. Quod autem ab Euclide in ſexto libro conſcribitur multo vniuerſalius eſt. oſtendit enim in rectangulis triangulis figuram, quae fit à latere rectum angulum ſubtendente aequalem eſſe figuris, quae à lateribus rectum angulum continentibus, priori illi ſimiles, & ſimiliter poſitae, deſcribuntur.

THEOREMA XXXIIII. PROPOSITIO XLVIII.

Si quadratum, quod deſcribitur ab vno laterum trianguli æquale ſit quadratis, quæ à reliquis trianguli lateribus deſcribuntur; angulus reliquis duobus trianguli lateribus contentus rectus erit.

Trianguli enim A B C, quod ab vno latere B C deſcribitur quadratum æquale ſit quadratis, quæ à reliquis trianguli lateribus B A A C deſcribuntur. Dico angulum B A C rectum eſſe. Ducatur enim à puncto A ipſi A C ad rectos angulos A D; ponaturq́; A D ipſi B A æqualis, & D C iungatur. Quoniam igitur D A eſt æqualis A B, erit et quadratum, quod deſcribitur ex D A, æquale quadrato, quod ex A B. cõmune apponatur quadratum, quod ex A C. ergo quadrata, quæ ex D A A C æqualia ſunt quadratis, quæ ex B A A C deſcribuntur. Sed quadratis quidem, quæ ex D A A C, æquale eſt, quod ex D C quadratum; rectus enim angulus eſt D A C; quadratis vero, quæ ex B A A C æquale ponitur quadratum, quod ex B C. quadratum igitur, quod ex DC æquale eſt ei, quod ex B C quadrato. ergo et latus D C lateri C B eſt æquale. Et quoniam D A eſt æqualis A B, communis autem A C, duæ D A A C duabus B A A C æquales ſunt; et baſis D C eſt æqualis baſi C B. angulus igitur D A C angulo B A C eſt æqualis. rectus autem eſt D A C. ergo et B A C rectus erit. Si igitur quadratum, quod deſcribitur ab vno laterum trianguli, æquale ſit quadratis, quæ à reliquis trianguli lateribus deſcribuntur, angulus reliquis duobus trianguli lateribus contentus rectus erit. quod oportebat demonſtrare.



11. huius.

8. huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Conuertitur hoc theorema precedenti, & totum toti conuertitur. ſi enim triangulum rectangulum fuerit, quod à latere rectum angulum ſubtendente deſcribitur quadratum equale eſt quadratis, quae à reliquis trianguli lateribus deſcribuntur. & ſi quod ab hoc eis, quae à reliquis aequale fuerit, triangulum rectangulum erit, quippe quòd eum. qui reliquis continetur angulum rectum habeat.

LIBRI PRIMI FINIS.

EVCLI-

EVCLIDIS ELEMENTORVM

LIBER SECVNDVS

CVM SCHOLIIS ANTIQVIS, ET COMMENTARIIS *Federici Commandini Vrbinatis*.

DIFFINITIO I.

OMNE parallelogrammum rectangulum contineri dicitur duabus rectis lineis, quæ rectum angulum constituunt.

F. C. COMMENTARIVS.

Quid sit parallelogrammum rectangulum dictum est superius. dicitur autem contineri duabus rectis lineis, quae sunt circa rectum angulum, quoniam ex ductu alterius in alteram prouenit eius rectanguli area, quod non contingit in alijs parallelogrammis, quae rectangula non sunt. Sit enim parallelogrammum rectangulum A B C D: & sit, exempligratia, latus quidem A B pedum trium, latus vero B C quattuor erit totius rectanguli area pedum duodecim quadratorum. At in alijs parallelogrammis area nota efficitur ex area rectangulorum, quae eadem sunt altitudine, & bases, vel easdem, vel aequales habent. Sit parallelogrammum non rectangulum E F G H, cuius basis F G sit pedum quattuor, ducta vero à puncto E ad F G perpendicularis E K sit duorum pedum. producatur K G ad L, ita vt K L sit ipsi F G aequalis, & iungatur H L. erit E K L H parallelogrammum rectangulum. Quare parallelogramma E F G H E K L H cum aequales habeant bases F G K L, sintq; eadem altitudine, hoc est in eisdem parallelis, inter se aequalia sunt: sed parallelogrammi E K L H area est pedum octo. ergo & area parallelogrammi E F G H totidem pedum sit necesse est. Verum parallelogrammi rectanguli aream prouenire ex ductu laterum, quae circa rectum angulum sunt, in presentia ponatur, quo ad ita esse manifesto apparebit. Demonstratur autem hoc à Ioanne Regiomontano in principio primi libri de triangulis, & à nobis in cõmentarijs in librum Archimedis de dimensione circuli.





DIFFINITIO II.

Omnis parallelogrammi spacij vnum quodque eorum, quæ circa diametrum ipsius sunt, parallelogrammorum, cum duobus supplementis gnomon vocetur.

SCHOLIVM.

SCHOLIVM.

Sciendum est gnomonem breuitatis causſa à geometris inuentum fuiſſe, nomen vero ex accidente impoſitum eſt; ab ipſo enim forma cognoſcitur, vel totius ſpacij, vel reliqui, cum vel circumponitur, vel aufertur. & in horoſcopijs eius officium duntaxat eſt præſentes horas notas efficere. ſupplementa autem dicit, non vt quæ parallelogramma non ſint, ſed vt non ſimilia toti, complentia vero totius ad ipſum ſimilitudinem.

Gnomon a Geometris breuitatis causſa inuentus.

Gnomonis officium in horoſcopiis.

Supplementa.

F. C. COMMENTARIVS.

Quae parallelogramma dicantur proprie circa diametrum conſiſtere, ſuperius dictum eſt, ut quae ſe inuicem in puncto contingunt. Sit parallelogrammum ABCD, cuius diameter AC, parallelogramma vero circa diametrum ſint AEKH, KGCF: & ſupplementa BKKD. Itaque duo ſupplementa vnà cum alterutro parallelogrammorum, quae ſunt circa diametrum, gnomon appellatur. & ſi parallelogrammo quidem GF circumponatur gnomon, reddit totum parallelogrãmum AC ſimile ipſi GF. Si vero à parallelogrammo AC auferatur gnomõ BFH reliquũ eſt parallelogrãmũ EH ſimile toti. Quamobrẽ ab Ariſtotele dictum eſt, quadratũ circũpoſito gnomone creuit quidem, alteratum vero nihil factum eſt. Illud autem, quod in ſcholio additur ſupplementa non eſſe ſimilia toti, non omnino verum eſt, fieri enim poteſt ut quandoque etiam ſint ſimilia. Sit parallelogrammum AECD circa diametrum AC, & ſecetur AC bifariam in E, perq; E ducatur FG alterutri ipſarum AD BC parallela, & per idem punctum E ducatur HK parallela alterutri ipſarum AB DC. erunt ſupplementa BE ED ſimilia quidem toti, ipſis verò FH KG parallelogrammis, & ſimilia & æqualia, quod ex ijs, quae in ſequentibus tradentur, facilè demonſtrare poſſimus.





THEOREMA I. PROPO. I.

Si ſint duæ rectæ lineę, altera autem ipſarum ſecta fuerit in quot cumque partes; rectangulum duabus rectis lineis contentum æquale eſt eis rectangulis, quæ recta linea inſecta, et ſingulis partibus continentur.

Sint duæ rectæ lineæ A BC; et ſecta ſit B C vt cumque in punctis D E. Dico rectangulum rectis lineis A BC contentum, æquale eſſe rectangulo;, quod continetur A BD, et rectangulo, quod A DE, et ei, quod A EC continetur. Ducatur enim à puncto B ipſi B C ad rectos angulos B F: atque ipſi A ponatur æqualis B G: et per G quidem ipſi B C parallela ducatur G H; per D E C vero ducantur D K E L C H parallelæ ipſi B G. rectangulum igitur B H eſt æquale rectangulis BK DL E H: atque eſt B H quidem, quod A BC continetur; etenim continetur G B B C: et B G ipſi A eſt æqualis; rectangulum



15. primi.

3. primi.

31. primi.

autẽ B K eſt quod continetur ipſis A BD; continetur enim GB BD, quarũ GB eſt æqualis A:et rectangulum D L eſt quod continetur A DE,quoniam D K,hoc eſt B G ipſi A eſt æqualis:et ſimiliter rectangulum E H eſt quod A E C continetur.ergo rectangulum contentum A B C eſt æquale rectangulo; contento A BD, et contento A D E,et adhuc contento A E C. Si igitur ſint duę rectæ lineę,altera autem ipſarum ſecta fuerit in quotcumque partes ; rectangulum duabus rectis lineis contentum eſt æquale eis,quę recta linea inſecta,et ſingulis partibus continentur.quod oportebat demonſtrare.

F. C. COMMENTARIVS.

Sed & non nulla his ſimilia demonſtrare libuit, quae tum ad alia , tum ad ea,quae in decimo libro traduntur , vtilia erunt.

THEOREMA PRIMVM.

Si fuerint duę rectæ lineæ,quæ ſecentur in quotcumque partes;rectangulum duabus rectis lineis contentum eſt æquale rectangulis , quæ vnaquaque parte vnius ad vnamquamque partem alterius applicata continentur.



Sint duae rectae linae A B B C rectum angulum A B C continentes, & ſecetur A B quidem in punctis DE, B C vero in punctis F G. dico rectangulum contentum A B B C aequale eſſe rectangulis , quae ſingulis ipſarum A D D E E B ad ſingulas B F F G G C applicatis continentur . completo enim parallelogrammo A B CH, ducantur per D E puncta rectae linae D K EL, al
31. primi. *terutri ipſarum A H B C parallelae;& per F G ducãtur F M N O GPQR parallelae alterutri ipſarum A B H C. erit parallelogrammum A C aequale parallelogrammis A N D M E F O Q N P MG R K Q L P C : & ſunt parallelogramma A N D M E F,quae continentur ipſa B F , & ſingulis partibus rectae linae A B, videlicet A D D E E B: parallelogramma vero O Q N P M G ſunt, quae continentur F G, & ſingulis partibus A D D E E B:& denique parallelogramma R K Q L P C,quae continẽtur G C, & ſingulis partibus, eiuſdem rectae linae A B. Si igitur fuerint duae rectae linae , quae ſecentur in quotcunque partes;rectangulum duabus rectis lineis contentum eſt aequale rectangulis , quae vnaquaque parte vnius ad vnamquamque partem alterius applicata continentur.quod oportebat demonſtrare.*

THEOREMA II.

Si fuerint duę rectæ lineæ, quæ vtcumque ſecentur; rectangulum totis contentũ vnà cum eo, quod continetur duabus partibus ipſarum eſt æquale rectangulis, quæ continentur totis,et dictis partibus vnà cum eo,quod reliquis partibus continetur.



Sint duae rectae linae A B B C,rectum angulum A B C continentes: & ſecetur A B quidem in puncto D; B C vero in puncto E. Dico rectangulum A B C vnà cum rectangulo contento duabus partibus ipſarum, videlicet D B E C aequale eſſe & rectangulo contento tota A B, & dicta parte rectae linae B C, videlicet E C, & contento tota B C, & dicta parte D B vnà cum eo, quod reliquis partibus A D B E continetur.compleatur enim parallelogrãmum A B C F, & à puncto D alterutri ipſarum B C A
31. primi. *F parallela ducatur D G: à puncto autem E ducatur E H K parallela alterutri ipſarum A B F C. itaque conſtat rectangulum A B C aequale eſſe rectangulis A E K C.addatur vtrinque commune rectangulum H C , quod continetur duabus partibus*

D B E C. Rectangulum igitur A B C vnà cum rectangulo H C est aequale tribus rectangulis A E K C, & H C. quorum rectangulum quidem K C est quod continetur tota A B, hoc est K E, & parte E C: rectangulum vero D E vna cum rectangulo H C est quod continetur tota B C, & parte D B: & reliquum A H est quod continetur reliquis partibus A D B E, hoc est A D D H. ergo rectangulum A B C vnà cum rectangulo H C est aequale & rectangulo contento tota A B, & E C, & contento tota B C, & D B vnà cum eo, quod reliquis partibus A D B E continetur. Si igitur duae rectae lineae vtcumque secentur et reliqua, quod oportebat demonstrare. Eodem modo demonstrabitur & in alijs partibus.

THEOREMA II. PROPOSITIO II.

Si recta linea secta fuerit vtcumque; rectangula quæ tota, et singulis partibus cõtinẽtur æqualia sunt ei, quod à tota fit quadrato.

Recta enim linea A B secta sit vtcumque in pũcto C. Dico rectangulum, quod A B B C continetur, vnà cum contento B A A C æquale esse quadrato, quod fit ex A D. Describatur enim ex A B quadratũ A D E B, et per C ducatur alterutri ipsarum A D B E parallela C F. æquale igitur est A E rectãgulis A F C E. atque est A E quidem quadratum, quod ex A B; A F vero rectangulum cõtentum B A A C; etenim D A A C continetur, quarum A D ipsi A B est æqualis: et rectangulum C E continetur A B B C, cum B E sit æqualis A B. ergo rectangulum B A C vnà cum rectangulo A B C æquale est quadrato ex A B. Si igitur recta linea vtcumque secta fuerit, rectangula, quæ tota, et singulis partibus continentur, æqualia sunt ei, quod à tota fit quadrato. quod demonstrare oportebat.



46. primi. 31. huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Similiter vt superius demonstrabitur, si recta linea secetur in quotcumque partes, quadratum totius lineae aequale esse rectangulis, quae singulis partibus ad singulas applicatis continentur.



THEOREMA. III. PROPOSITO. III.

Si recta linea vtcumque secta fuerit; rectangulum tota, et vna eius parte contentum æquale est et rectangulo, quod partibus continetur, et ei quod à prædicta parte fit quadrato.

Recta enim linea A B secta sit vtcumque in puncto C. Dico A B C rectangulum æquale esse rectangulo A C B vnà cum quadrato, quod fit ex B C. Describatur enim ex B C quadratũ C D E B; producaturq; E D in F; et per A alterutri ipsarum C D B E parallela ducatur A F. æquale vtique erit rectangulũ A E ipsis A D C E: et est A E quidem rectãgulum contentum A B B C; etenim A B B E continetur, quarum B E est æqualis B C: rectangulum vero A D est quod continetur A C C B, cum D C



46. primi. 31. primi.

ipſi C B ſit æqualis:et D B eſt quadratum,quod fit ex B C.ergo rectangulum A B C eſt æquale rectangulo A C B vna cum quadrato quod ex B C. Si igitur recta linea vtcumque ſecta fuerit; rectangulum tota, et vna eius parte contentum æquale eſt rectangulo,quod partibus continetur,et ei, quod à prædicta parte fit quadrato.

THEOREMA IIII. PROPOSITIO IIII.

Si recta linea ſecta fuerit vtcumque, quadratum quod fit à tota æquale erit,et quadratis, quæ à partibus fiunt,et ei,quod bis partibus continetur rectangulo.



Recta enim linea A B ſecta ſit vtcumque in C. Dico quadratum, quod fit ex A B æquale eſſe, et quadratis ex A C C B, et ei rectangulo quod bis A C C B continetur. Deſcribatur enim ex A B quadratum A D E B, iungaturq; B D, et per C quidem alterutri ipſarum A D B E parallela ducatur C G F;per G vero alterutri ipſarum A B D E ducatur parallela H K. Et quoniam C F eſt parallela ipſi A D, et in ipſas incidit B D: erit exterior angulus B G C interiori et oppoſito A D B æqualis:angulus autem A D B eſt æqualis angulo A B D, quod et latus B A æquale eſt lateri A D. quare C G B angulus angulo G B C eſt æqualis: ac propterea latus B C lateri C G æquale.Sed et latus C B æquale eſt lateri G K, et C G ipſi B K.ergo et G K eſt æquale K B,et C G K B æquilaterum eſt. dico inſuper etiam rectangulum eſſe.quoniam enim C G eſt parallela ipſi B K, et in ipſas incidit C B;anguli K B C G C B duobus rectis ſunt æquales.rectus autem eſt K B C angulus.Ergo et rectus G C B,et anguli oppoſiti C G K G K B recti erunt. rectangulũ igitur eſt C G K B. Sed oſtenſum fuit et æquilaterum eſſe. quadratum igitur eſt C G K B,quod quidem fit ex B C.eadem ratione et H F eſt quadratum, quod fit ex H G.hoc eſt ex A C.ergo H F C K ex ipſis A C C B quadrata ſunt.et quoniam rectangulum A G eſt æquale rectangulo G E, atque eſt A G quod A C C B continetur, eſt enim G C ipſi C B æqualis:erit et G E æquale ei, quod continetur A C C B.quare rectangula A G G E æqualia ſunt ei quod bis A C C B continetur. Sunt autem et H F C K quadrata ex A C C B. quattuor igitur H F C K A G G E et quadratis ex A C C B,et ei quod bis A C C B continetur rectangulo ſunt æqualia.Sed H F C K A G G E ſunt totum A D E B quadratum, quod fit ex A B.quadratum igitur ex A B æquale eſt,et quadratis ex A C C B, et ei quod bis A C C B continetur rectangulo.quare ſi recta linea vtcumque ſecta fuerit; quadratum quod fit à tota æquale erit et quadratis, quæ à partibus fiunt,et ei rectangulo, quod bis partibus continetur,atque illud eſt,quod demonſtrare oportebat.

46.primi. 31.primi. 29.primi. 5.primi. 6.primi. 34.primi. 29.primi. 34.primi. 43.primi.

ALITER. Dico quadratum ex A B æquale eſſe,& quadratis ex A C C B. et ei rectangulo,quod bis A C C B continetur. quoniam enim in eadem figura æqualis eſt B A ipſi A D; et angulus A B D angulo A D B æqualis erit:et cum omnis trianguli tres anguli duobus rectis ſint æquales; erunt trianguli A B D tres anguli A B D A D B B A D æquales duobus rectis. rectus autem eſt angulus B A D.ergo reliqui A B D A D B ſunt vni recto æquales, et ſunt æquales inter ſe ſe. vterque igitur ipſorum A B D A D B eſt recti dimidius. Sed rectus eſt B C G,æqualis namque eſt angulo oppoſito, qui ad A. reliquus igitur C G B dimidius eſt recti:ac propterea C G B angulus angulo C B G eſt æqualis; et latus B C æquale lateri C G.Sed C B eſt æqualis G K,et C G ipſi B K.æquilaterum igitur eſt C K; et cum habeat rectum angulum C B K,etiam eſt quadratum;quod quidem fit ex C B.eadem ratione et H F

5.primi. 32.primi. 29.primi. 6.primi.

quadratum

quadratum eſt,et æquale quadrato quod ex A C. quadrata igitur ſunt C K H F, et quadratis ex A C C B æqualia.Rurſus quoniam rectangulum A G eſt æquale ipſi G E,atque eſt A G id quod A C C B continetur, eſt enim C G ipſi C B æqualis: erit et G E æquale contento A C C B.quare A G G E æqualia ſunt ei, quod bis A C C B continetur.Sunt autem et C K H F æqualia quadratis ex A C C B.ergo C K H F A G G E æqualia ſunt et quadratis ex A C C B,et ei quod bis A C C B cõtinetur. Sed C K H F et A G,G E ſunt totum A E,quod fit ex A B quadratum. quadratum igitur ex A B æquale eſt,quadratisq; ex A C C B,et ei quod bis A C C B continetur rectangulo. quod oſtendere oportebat. 34.primi. 43.primi.

COROLLARIVM.

Ex hoc perſpicue conſtat in quadratis ſpacijs parallelogramma, quæ ſunt circa diametrum,quadrata eſſe.

THEOREMA V. PROPOSITIO V.

Si recta linea ſecta fuerit in partes æquales,et in partes inæquales,rectangulum inæqualibus totius partibus contentum vnà cum quadrato lineæ, quæ inter ſectiones interijcitur, æquale eſt ei quod à dimidia fit quadrato.



Recta enim linea quædam A B ſecta ſit in partes æquales ad punctum C, et in partes inæquales ad D.Dico rectangulum contentum A D D B vnà cum quadrato quod fit ex C D æquale eſſe ei quod ex C B quadrato. Deſcribatur enim ex B C quadratum C E F B: iungaturq; B E;et per D quidem alterutri ipſarũ C E, B F parallela ducatur D H G;per H vero ducatur K L O parallela alterutri ipſarum C B E F:et rurſus per A ducatur alterutri C L, B O parallela A K.Et quoniã C H ſupplementum æquale eſt ſupplemento H F,commune apponatur D O.totum igitur C O toti D F eſt æquale: ſed C O eſt æquale A L, quoniam et A C ipſi C B.ergo et A L æquale eſt D F.commune apponatur C H.totum igitur A H ipſis F D D L æquale erit.Sed A H quidẽ eſt quod A D D B continetur, etenim D H ipſi D B eſt æqualis: F D D L vero eſt gnomon M N X. gnomon igitur M N X æqualis eſt ei,quod A D D B continetur.commune apponatur L G, æquale ſcilicet quadrato quod ex C D.ergo M N X gnomon, et L G æqualia ſunt rectangulo,quod continetur A D D B, et ei, quod fit ex C D quadrato. Sed M N X gnomon, et L G ſunt totum quadratum C E F B,quod quidem fit ex C B.ergo rectangulum A D B vnà cum quadrato quod ex C D æquale eſt ei,quod ex C B quadrato.Si igitur recta linea ſecta fuerit in partes æquales,et in partes inæquales,rectangulum inæqualibus totius partibus contẽtum vnà cum quadrato lineæ,quæ inter ſectiones interiicitur, æquale eſt ei,quod à dimidia fit quadrato.quod demonſtrare oportebat. 46.primi. 31.primi. 43.primi. 36.primi.

THEOREMA VI. PROPOSITIO. VI.

Si recta linea bifariam ſecetur, atque ipſi in rectum adijciatur quædam recta linea;rectangulum tota cum adiecta,et adiecta cõtentũ,vnà cum quadrato dimidiæ,æquale eſt quadrato,quod ab ea, quæ

quę ex dimidia, et adiecta cõſtat tãquã ab vna linea deſcribitur.

Recta enim linea quędam A B ſecetur bifariam in puncto C, adiiciaturq; ipſi in rectum B D. Dico rectangulum A D B vnà cũ quadrato ex B C æquale eſſe ei, quod fit ex C D quadrato. Deſcribatur enim ex C D quadratum C E F D, et iungatur D E; perq; B alterutri ipſarum C E D F parallela ducatur B H G: et per H ducatur K L M parallela alterutri ipſarum A D E F: et adhuc per A alterutri C L D M parallela A K. Itaque quoniã A C eſt æqualis C B, erit et rectangulum A L rectangulo C H æquale. ſed C H æquale eſt H F. ergo et A L ipſi H F æquale erit. commune apponatur C M. totum igitur A M gnomoni N X O eſt æquale: atq; eſt A M, quod A D D B cõtinetur, etenim D M eſt æqualis D B. ergo et gnomon N X O æqualis eſt rectãgulo A D B. rurſus commune apponatur L G, æquale ſcilicet quadrato, quod ex C B. rectangulum igitur A D B vnà cum quadrato quod ex B C æquale eſt gnomoni N X O, et ipſi L G. Sed gnomon N X O, et L G totum ſunt C E F D quadratum; quod quidem fit ex C D. ergo rectangulum A D B vnà cum quadrato ex B C æquale eſt ei, quod fit ex C D quadrato. Si igitur recta linea ſecetur bifariam, adiiciaturq; ipſi in rectum quædam recta linea; rectangulum tota cum adiecta, et adiecta contentum vnà cum quadrato dimidiæ æquale eſt quadrato, quod ab ea, quę ex dimidia, et adiecta conſtat, tamquàm ab vna linea deſcribitur. quod oportebat demonſtrare.

46. primi.
31. primi.
36. primi.
43. primi.



SCHOLIVM.

In hoc oſtenditur arithmetica analogia. quo enim A D ſuperat D C, videlicet ipſa C B, eo & C D ſuperat D B. quod per numeros manifeſtius cognoſcitur, cum medius ſemper æqualiter & excedatur, & excedat. Theorema autem eſt. Quadratum quod fit ab exceſſu vnà cum eo, quod extremis continetur, quadrato medij æquale eſſe.

THEOREMA VII. PROPOSITIO VII.

Si recta linea vtcumque ſecta fuerit, quæ à tota, et vna parte fiunt vtraque quadrata æqualia ſunt, et rectangulo, quod bis tota, ac dicta parte continetur, et ei, quòd à reliqua parte fit quadrato.

Recta enim linea quædam A B ſecta ſit vtcumque in pũcto C. Dico quadrata ex A B B C æqualia eſſe et rectangulo, quod bis A B B C continetur, et ei quod fit ex A C quadrato. Deſcribatur enim ex A B quadratum A D E B, et figura conſtruatur. itaque quoniam A G rectangulũ æquale eſt rectangulo G E. commune apponatur C F. quare totum A F toti C E eſt æquale. rectangula igitur A F C E dupla ſunt rectanguli A F. Sed A F C E ſunt K L M gnomon, et quadratum C F. ergo K L M gnomon, et quadratũ C F dupla erũt rectanguli A F. eſt autem id quod bis A B B C continetur duplum ipſius A F; etenim B F eſt

46. primi.
43. primi.



æqualis

æqualis BC. gnomon igitur KLM, et quadratum CF æqualia sunt ei, quod bis AB BC continetur. commune apponatur DG, quod est ex AC quadratum. Ergo gnomon KLM, et quadrata BG GD æqualia sunt ei, quod bis AB BC continetur, et quadrato ex AC. at gnomon KLM, et quadrata BG GD totum sunt AD EB, et CF; quæ sunt ex AB BC quadrata. quadrata igitur ex AB BC æqualia sunt rectangulo, quod bis AB BC cõtinetur vnà cum eo, quod fit ex AC quadrato. ergo si recta linea vtcumque secta fuerit; quæ à tota, et vna parte fiunt vtraque quadrata æqualia sunt rectangulo, quod bis tota, ac dicta parte continetur, et ei, quod à reliqua parte fit, quadrato; quod ostendere oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

Non alienum esse videtur hoc loco apponere theorema, quod etiam in commentarijs in Apollonij pergei conica demonstrauimus: eo enim ad sequentia vtemur.

Si recta linea in partes inæquales secetur; earum partium quadrata æqualia sunt rectangulo, quod bis dictis partibus continetur vnà cum quadrato eius lineæ, qua maior pars superat minorem.



46. primi.
31. primi.
34. primi.

Secetur recta linea AB in partes inæquales in C ita vt AC maior sit quàm CB; & ipsi CB æqualis ponatur AD. Dico quadrata ex AC CB æqualia esse rectangulo, quod bis AC CB continetur vnà cum quadrato rectae lineae DC, qua scilicet AC ipsam CB superat. constituantur enim ex AC CB quadrata ACEF CBGH: & per D ducta linea DK, ipsi CE parallela, producatur GH, vt se cet DK in L. Itaque quoniam AD est aequalis CB, addita vtrique communi DC; erit DB ipsi AC aequalis. Sed GL est aequalis BD, & CE aequalis AC. ergo & GL ipsi CE aequalis erit. est autem & LH aequalis HG. reliqua igitur EH reliqua HL est aequalis: ideoq; KH est quadratum, quod à linea KE, hoc est DC describitur. rectangula vero AK DG sunt quae continentur lineis AC CB; etenim AD est aequalis BC, & DB ipsi AC. quadrata igitur ex AC CB aequalia sunt rectangulo, quod bis AC CB continetur vnà cum ipsius DC quadrato. Si igitur recta linea in partes inæquales secetur; earum partium quadrata aequalia sunt rectangulo, quod bis dictis partibus continetur vnà cum quadrato eius lineae, qua maior pars superat minorem. quod demonstrare oportebat.

THEOREMA VIII. PROPOSITIO VIII.

Si recta linea vtcumque secta fuerit; et quod quater tota, et vna parte continetur rectangulum vnà cum quadrato reliquæ partis æquale est quadrato, quod ex tota, et dicta parte tamquam ex vna linea describitur.

Recta enim linea AB secta sit utcumque in C. Dico rectangulum quater AB BC contẽtum vnà cum quadrato quod ex AC æquale esse quadrato, quod ex AB BC, tamquam ex vna linea describitur. Producatur enim recta linea AB in D; et ipsi CB ponatur æqualis BD; describaturq; ex AD quadratum AEFD; et dupla figura construatur. Quoniam igitur CB est æqualis BD, atque est CB ipsi GK æqualis; BD vero ipsi KN: erit et GK æqualis KN. eadem ratione et PR ipsi RO est æqualis. et quoniam CB est æqualis BD, et GK ipsi KN; erit rectangulum



34. primi.
36 primi.

quidem

43.primi. quidem CK rectangulo KD; rectāgulū vero GR ipſi RN ęquale. Sed CK eſt æquale RN, ſupplemēta enim ſunt parallelogrāmi CO. ergo et KD æquale eſt GR, et quattuor rectāgula DK KC GR RN inter ſe æqualia; ideoq; quadrupla ſunt rectāguli CK. Rurſus quoniā CB eſt ęqualis BD, et BD quidē ipſi BK, hoc eſt ipſi CG æqualis; CB vero ipſi GK, hoc eſt GP: erit et CG æqualis GP. eſt autem et PR ipſi RO æqualis. rectangulum igitur AG rectangulo MP, et rectangulum PL ipſi RF æquale erit.
43.primi. Sed MP eſt æquale PL; ſupplementa enim ſunt ML parallelogrammi. quare et AG ipſi RF eſt æquale. quattuor igitur AG MP PL RF inter ſe æqualia ſunt. ac propterea ipſius AG quadrupla. Oſtenſum autem eſt et quattuor CK KD GR RN quadrupla eſſe CK. quare octo continentia gnomonem STY ipſius AK quadrupla ſunt. et quoniam AK eſt quod AB BC continetur; etenim BK eſt æqualis BC; erit contentum quater AB BC ipſius AK quadruplum. At demonſtratus eſt gnomon STY quadruplus AK. quod igitur quater AB BC continetur ęquale eſt gnomoni STY. commune apponatur XH, quod quidem quadrato ex AC eſt æquale. ergo quod quater AB BC continetur vnà cum quadrato ex AC ęquale eſt ipſi STY gnomoni, et quadrato XH. Sed STY gnomon, et YH totum ſunt AEFD quadratum, quod deſcribitur ex AD. rectangulum igitur quater AB BC contentum vnà cum quadrato ex AC æquale eſt ei, quod ex AD, hoc eſt ex AB BC tamquam ex vna linea deſcribitur, quadrato. ergo ſi recta linea vtcumque ſecta fuerit; quod quater tota, et vna parte continetur rectangulum, vnà cum quadrato reliquę partis æquale eſt quadrato, quod ex tota, et dicta parte tamquam ex vna linea deſcribitur. quod oſtendendum fuerat.

THEOREMA IX. PROPOSITIO IX.

Si recta linea in partes ęquales, et in partes inęquales ſecta fuerit, quadrata, quæ ab inæqualibus totius partibus deſcribuntur, dupla ſunt et quadrati dimidiæ, et quadrati linea eius, quę inter ſectiones interijcitur.

Recta enim linea quędam AB ſecta ſit in partes ęquales ad C, et in partes inęquales ad D. Dico quadrata ex AD DB, quadratorum ex AC
11.primi, CD dupla eſſe. Ducatur enim à puncto C ipſi AB ad rectos angulos CE, et vtrique ipſarum AC CB ęqualis ponatur, iungaturq; EA EB,
31.primi, ac per D quidem ipſi CE parallela ducatur DF; per F vero ipſi AB parallela FG; et AF iungatur. itaque quoniam AC eſt ęqualis CE; erit et
5.primi. 32.primi, angulus EAC angulo AEC ęqualis. Et cum rectus ſit angulus ad C, reliqui AEC, EAC vni recto ęquales erunt. et ſunt æquales inter ſeſe. vterque igitur ipſorum AEC EAC recti eſt dimidius. eadem ratione et recti dimidius eſt vterque ipſorum CEB EBC. ergo totus angulus AEB rectus eſt. et quoniam angulus GEF dimidius
29.primi, eſt recti, rectus autem EGF; ęqualis enim eſt interiori, et oppoſito ECB; erit et reliquus EFG recti dimidius: æqualis igitur eſt GEF angulus ipſi EFG. quare et latus
6.primi, EG lateri GF eſt ęquale. rurſus quoniam angulus ad B dimidius eſt recti, rectus autem FDB, quòd ſit æqualis interiori, et oppoſito ECB: reliquus BFD recti erit dimidius. angulus igitur ad B æqualis eſt angulo DFB; ideoq; latus DF lateri DB æquale, et quoniam AC eſt æqualis CE, erit et ex AC quadratum æquale quadrato ex CE. quadrata igitur ex AC CE dupla ſunt quadrati ex AC. quadratis autem ex
41.primi, AC CE ęquale eſt quadratum ex EA, ſiquidem rectus eſt angulus ACE. ergo quadratum ex EA quadrati ex AC eſt duplum. rurſus quoniam EG æqualis eſt GF; et quadratū ex EG quadrato ex GF eſt æquale. quadrata igitur ex EG GF dupla ſunt quadrati ex GF. at quadratis ex EG GF æquale eſt quod ex EF quadratum. Ergo



quadratum

quadratum ex EF quadrati ex GF duplum erit. æqualis autem est GF ipsi CD. quadratum igitur ex EF duplum est quadrati ex CD. Sed et quadratum ex AE quadrati ex AC est duplum. ergo quadrata ex AE EF dupla sunt quadratorũ ex AC CD. quadratis vero ex AE EF æquale est ex AF quadratum;quoniam angulus AEF rectus est. quadratum igitur ex AF quadratorum ex AC CD est duplum.Sed quadrato ex AF æqualia sunt ex AD DF quadrata. rectus enim est angulus qui ad D. ergo ex AD DF quadrata dupla sunt quadratorum ex AC CD. est autem DF ipsi DB æqualis. quadrata igitur ex AD DB quadratorum ex AC CD dupla erunt. Quare si recta linea in partes æquales, et in partes inæquales secta fuerit,quæ ab inæqualibus totius partibus describuntur quadrata dupla sunt,et quadrati dimidiæ, et quadrati lineæ eius,quæ inter sectiones interiicitur.quod ostendere oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

Possumus etiam illud aliter demonstrare hoc modo. Iisdem enim positis quoniam recta linea AB secatur in partes æquales ad punctum C, et in partes inæquales ad D; erit DB recta linea, qua AC ipsam CD superat. Ergo ex iis, quæ demonstrauimus ad septimam huius, quadrata ex AC CD æqualia sunt, & rectangulo, quod bis AC CD continetur, & ipsius DB quadrato: ideoq; quadrata ex AC CD una cum rectangulo, quod bis AC CD continetur, & quadrato ipsius DB, dupla sunt quadratorũ ex AC CD. Sed quadratum ex AD est æquale quadratis ex AC CD, & rectangulo bis AC CD contento. quadrata igitur ex AD DB quadratorum ex AC CD sunt dupla. quod oportebat demonstrare. 4.huius.

THEOREMA X. PROPOSITIO X.

Si recta linea secetur bifariam, et ipsi in rectum quædam recta linea adijciatur; quæ à tota cum adiecta, et adiecta fiunt vtraque quadrata dupla sunt, et quadrati dimidiæ, et quadrati, quod ab ea quæ ex dimidia, et adiecta constat, tamquam ab vna linea describitur.



Recta enim linea AB secetur bifariam in C, et ipsi in rectum adiiciatur quædam recta linea BD.Dico quadrata ex AD DB quadratorũ ex AC CD dupla esse.ducatur enim à puncto C ipsi AB ad rectos angulos CE,et vtrique ipsarum AC CB æqualis ponatur;iungantur; AE EB:et per E quidem ipsi AD parallela ducatur EF; per D vero ducatur DF parallela ipsi CE. et quoniã in parallelas EC FD recta quædam linea EF incidit,anguli CEF EFD æquales sunt duobus rectis.anguli igitur FEB EFD duobus rectis sunt minores.quæ autem à minoribus,quàm sunt duo recti in infinitum producuntur,conueniunt inter se se. Ergo EB FD productæ ad partes BD conuenient; producantur, et conueniant in puncto G,et AG iungatur. itaque quoniam AC est æqualis CE, et angulus AEC angulo EAC æqualis erit:atque est rectus qui ad C. vterque igitur ipsorum EAC AEC est recti dimidius.eadem ratione et recti dimidius est vterque CEB EBC.ergo AEB est rectus.et quoniam EBC est dimidius recti;erit et recti dimidius DBG;cùm sit aduerticem. Sed et BDG rectus est;etenim est æqualis ipsi DCE alterno.reliquus igitur DGB dimidius est recti, et ob id ipsi DBG æqualis.ergo et latus BD æquale lateri DG. rursus quoniam EGF est dimidius recti, rectus autem, qui ad F, est. 11.primi. 31.primi. 29.primi. Ex demonstratis ad. 29.primi. 5.primi. 15. primi. 29.primi.

enim angulo oppoſito qui ad C æqualis; erit et reliquus FEG recti dimidius, et æqualis ipſi E GF. quare et latus GF lateri EF eſt æquale. et cũ EC ſit æqualis CA; et quadratũ ex EC æquale eſt ei, quod ex CA, quadrato. ergo quadrata ex EC CA dupla ſũt quadrati ex C A. quadratis aũt ex EC CA æquale eſt quadratũ ex E A. quadratũ igitur ex EA quadrati ex AC eſt duplum. rurſus quoniã GF eſt æqualis F E,



æquale eſt et ex G F quadratũ quadrato ex F E. quadrata igitur ex GF FE quadrati ex EF ſũt dupla. at quadratis ex GF FE æquale eſt, quod ex EG quadratũ. ergo quadratũ ex E G duplum eſt quadrati ex E F. æqualis aũt eſt EF ipſi CD. quadratũ igitur ex EG quadrati ex CD duplum erit. Sed oſtenſum eſt quadratũ ex E A duplum quadrati ex AC. ergo ex AE EG quadrata quadratorũ ex AC C D ſũt dupla. quadratis vero ex AE EG æquale eſt quod ex A G quadratum. quadratum igitur ex A G duplũ eſt quadratorũ ex AC CD. at quadrato ex A G æqualia ſunt ex A D DG quadrata. ergo quadrata ex A D DG ſunt dupla quadratorum ex AC CD. Sed D G eſt æqualis DB. quadrata igitur ex AD DB quadratorũ ex A C C D ſunt dupla. Ergo ſi recta linea bifariam ſecetur, et ipſi in rectũ quædam recta linea adiiciatur; quę à tota cũ adiecta, et adiecta ſiunt vtraque quadrata dupla ſunt, et quadrati dimidię, et quadrati, quod ab ea, quæ ex dimidia, et adiecta conſtat tamquam ab vna linea deſcribitur. quod oſtendere oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

Hoc quoque aliter demonſtrabimus.

Quoniam enim recta linea A B ſecatur bifariam in C, & ipſi adijcitur B D, erit B D linea, qua D C ipſam C A ſuperat quare ex demonſtratis ad ſeptimã huius quadrata ex A C C D æqualia ſunt rectangulo, quod bis continetur A C C D, & quadrato ipſius B D. ergo quadrata ex A C C D vnà cum rectangulo, quod bis A C C D cõtinetur, & ipſius B D quadrato dupla ſunt quadratorum ex A C C D. at quadratum ex A D eſt æquale quadratis ex A C C D, & rectangulo bis A C C D contento. quadrata igitur ex A D D B quadratorum ex A C C D dupla erunt. quod demonſtrare oportuit.

PROBLEMA I. PROPOSITIO XI.

Datam rectam lineã ſecare, ita vt quod tota, et altera parte cõtinetur rectãgulũ æquale ſit ei, quod à reliqua parte fit, quadrato.

Sit data recta linea A B. oportet ipſam A B ita ſecare, vt quod tota, et altera parte continetur rectangulum æquale ſit ei, quod à reliqua parte fit, quadrato. Deſcribatur enim ex A B quadratum A B C D: ſeceturq; A C bifariam in E, et B E iungatur: deinde producta C A in F, ponatur ipſi B E æqualis E F: deſcribaturq; ex A E quadratum F G H A: et G H ad K producatur. Dico A B ſectam eſſe in H, ita vt A B H rectangulum æquale ſit quadrato ex A H. Quoniam enim recta linea A C bifariam ſecatur in E, adiiciturq; ipſi in rectum A F; rectãgulum C F A vnà cum quadrato ex A E æquale erit quadrato ex E F. Sed E F eſt æqualis E B. rectangulum igitur C F A vnà cum quadrato ex A E æquale eſt ei, quod fit ex E B, quadrato. quadrato autem ex E B æqualia ſunt quadrata ex B A A E. etenim angulus ad A rectus eſt. ergo rectangulum C F A vnà cum quadrato ex A E æquale eſt quadratis ex B A A E. commune auferatur, quod ex A E quadratum. reliquum igitur rectangu-



lum

lum C F A æquale est quadrato ex A B. est autem C F A quidem rectangulum F K. siquidem A F est æqualis F G: quadratum autem ex A B est ipsum A D. rectangulum igitur F K æquale est quadrato A D. commune auferatur A K. ergo reliquum F H reliquo H D est æquale. atque est H D rectangulum A B H, cum A B sit æqualis B D, et F H est quadratum ex A H. rectangulum igitur A B H quadrato ex A H æquale erit. quare data recta linea A B secta est in H, ita vt A B H rectangulum quadrato ex A H sit æquale. quod facere oportebat.

SCHOLIVM.

Ex hoc constat geometricam esse analogiam. quoniam enim A B secta est in H, & quod A B B H continetur quadrato A H est æquale. hoc autem soli geometricæ accidit medietati. Hanc in sequentibus extrema, ac media ratione secari dicit. nunc autem, quoniam de proportione nihil traditum est, non dicit extrema, ac media ratione secari.

THEOREMA XI. PROPOSITIO. XII.

In obtusiangulis triangulis, quod à latere obtusum angulum subtendente fit quadratum maius est quàm quadrata, quæ fiunt à lateribus obtusum angulum continentibus, rectangulo contento bis vno laterum, quę sunt circa obtusum angulum, in quod scilicet protractũ perpendicularis cadit, et linea assumpta exterius à perpendiculari ad angulum obtusum.



Sit obtusiangulum triangulum A B C. obtusum angulum habens B A C: et ducatur à puncto B ad C A protractam perpendicularis B D. Dico quadratum ex B C maius esse, quàm quadrata ex B A A C, rectãgulo, quod bis C A A D continetur. Quoniam enim recta linea C D secta est vtcumque in puncto A, erit quadratum ex C D æquale, et quadratis ex C A A D, et ei quod bis C A A D continetur rectangulo. commune apponatur ex D B quadratum. quadrata igitur ex C D D B æqualia sunt et quadratis ex C A A D D B, et rectangulo, quod bis C A A D continetur. Sed quadratis ex C D D B æquale est quadratum ex C B. rectus enim est angulus ad D, cum sit B D perpendicularis. quadratis vero ex A D D B æquale est quadratum ex A B. quadratum igitur ex C B æquale est et quadratis ex C A A B, et rectangulo bis C A A D contento. Ergo quadratum ex C B maius est, quàm quadrata ex C A A B, rectangulo quod bis C A A D continetur. In obtusiangulis igitur triangulis, quadratum, quod à latere obtusum angulum subtendente fit, maius est quàm quadrata, quæ fiunt à lateribus obtusum angulum continentibus, rectangulo contento bis vno laterum, quę sunt circa obtusum angulum, ad quod protractum perpendicularis cadit, et linea assumpta exterius à perpendiculari ad angulum obtusum. quod demonstrare oportebat.

12. primi.

4. huius.

47. primi.

F. C. COMMENTARIVS.

Ex his, quæ in hoc theoremate demõstrata sunt possumus cuiuslibet trianguli, obtusum angulum habentis aream dimetiri.

Sit triangulum obtusiangulum A B C, habens angulum A C B obtusum; sitq; latus A B exempli gratia pedum viginti, B C octo, & C A sex decim: & à puncto A ad B C protractum ducatur perpendicularis A D. Primum igitur quanta sit linea C D, quae adiungitur lateri, in quod perpendicularis cadit, hoc modo comperiemus. Quadrata vtrorumq; laterum A C C B, quae sunt circa obtusum angulum simul sumpta à quadrato lateris A B, quod obtuso angulo subtenditur, detrahemus; & quod reliquum fuerit, diuidemus per duplum lateris B C, ex hac enim diuisione prouenit linea, quam quærimus. est autem quadratum lateris A C 256, & quadratum ipsius B C 64, quae simul sumpta faciunt 320, demptis igitur 320 à 400, quod est quadratum lateris A B, relinquuntur 80, atque his diuisis per 16, videlicet per duplum ipsius B C prodibunt 5, & tot pedum erit



47. primi. *linea C D. Itaque quoniam triangulum A C D rectangulum est, quadratum lateris A C aequale erit quadratis, quae fiunt ex C D D A. quare dempto quadrato lineae C D, quod est 25 à quadrato ipsius A C 256, reliquum erit quadratum perpendicularis A D, quod est 231, cuius latus A D est 15 $\frac{1}{5}$ proximè. Quomodo autem numeri non quadrati propinquum latus inueniatur, docuimus in nostris commentarijs in librum Archimedis de circuli dimensione. Vt igitur trianguli A B C aream habeamus, secetur B D bifariam in puncto E, & ab eo ducatur E F ipsi D A parallela; rursusq; à puncto A ducatur parallela ipsi D B, & conueniens cum E F in F puncto. Erit parallelogrammum rectangulum A D E F aequale triangulo A B D: vtrumque enim dimidium est parallelogrammi, cuius basis est B D, & altitudo eadem A D. Ergo ducta E D, quae est 6 $\frac{1}{2}$ in A D 15 $\frac{1}{5}$ proueniet area rectanguli A D E F, & ob id etiam A B D trianguli 98 $\frac{4}{5}$ pedum quadratorum. Eadem ratione inuenietur area trianguli A C D esse eius modi pedum 38. Quare demptis 38 à 98 $\frac{4}{5}$ relinquentur 60 $\frac{4}{5}$ proximè, pro area trianguli A B C, quam nobis inquirendam proposuimus.*

THEOREMA XII. PROPOSITIO. XIII.

In acutiangulis triangulis, quod à latere acutum angulum subtendente fit quadratum minus est, quàm quadrata, quæ fiunt à lateribus acutum angulum continentibus, rectangulo contento bis vno laterum, quæ sunt circa acutum angulum, in quod perpẽdicularis cadit, et linea à perpẽdiculari intus assumpta ad angulũ acutũ.

12. primi. Sit acutiangulum triangulum A B C acutum habens angulum ad B: et ducatur à puncto A ad B C perpendicularis A D. Dico quadratum, quod fit ex A C minus esse, quàm quadrata, quę ex C B B A, rectangulo, quod bis C B B D continetur. Quoniam



7. huius. enim recta linea C B secta est vtcunque in D, erũt quadrata ex C B C D æqualia, et rectangulo quod bis C B B D continetur, et quadrato ex D C. commune apponatur quod ex A D quadratum. quadrata igitur ex C B B D D A æqualia sunt, et rectangulo bis C B B D contento.

47. primi. et quadratis ex A D D C. Sed quadratis ex B D D A æquale est quod ex A B quadratum; rectus enim angulus est qui ad D. quadratis vero ex A D D C æquale est quadratum ex A C. quadrata igitur ex C B B A sunt æqualia quadrato ex A C, et ei quod bis C B B D continetur, rectangulo. quare solum quadratum ex A C minus est quàm quadrata ex C B B A rectangulo, quod bis C B B D continetur. In acutiangulis igitur triangulis quadratum, quod à latere acutum angulum subtẽdẽte fit, minus est quàm quadrata, quæ fiunt à lateribus acutum angulum continentibus, rectangulo contento bis vno laterum, quę sunt circa acutum angulum, in quod perpendicularis cadit, et linea à perpẽdiculari intus assumpta ad angulum acutũ. quod demonstrare oportebat.

SCHOLIVM

SCHOLIVM.

Quoniam in diffinitionibus dixit Acutiangulum triangulum esse, quod tres acutos angulos habet, sciendum est hoc loco non ita dicere, sed triangula omnia appellare acutiangula, propterea quod omnia angulum habent acutum, & quamquam non omnes acutos, vnum tamen habent. propositio igitur huiusmodi est. Omnis trianguli latus, quod acutum subtendit angulum, minus potest, quàm latera acutum angulum continentia, rectangulo contento bis vno laterum, & reliqua quae sequuntur. Itaque si rectangulũ sit triangulum ex lateribus acutum angulum continentibus accipiemus illud, quod recto angulo subtenditur, vt in ipsum perpendicularis cadat. & similiter faciemus, si obtusiangulum sit. Conuersum vero theorematis est hoc.

Sit quadratũ ex AB minus quàm quadrata ex BC CA, eo, quod bis BC CE cõtinetur, et reliqua deinceps; atque à pũcto C ipsi C A ad rectos angulos ducatur C D, quæ ipsi C B sit æqualis. ergo quadrata ex BC C A æqualia sunt quadratis ex DC CA. Sed quadratis ex BC C A minus est quadratum ex A B. ergo & quadratis ex DC CA minus erit. quadratis autem ex DC CA æquale est quadratum ex D A. quadratum igitur ex DA quadrato ex AB maius, et ipsa DA maior, quàm A B. Itaque quoniam duæ D C C A duabus B C C A æquales sunt, et basis D A maior basi A B, erit et angulus D C A angulo A C B maior. rectus autem est D C A. ergo A C B acutus erit. quod oportebat demonstrare.



47. primi.

25. primi.

F. C. COMMENTARIVS.

Hoc non solum in triangulis acutiangulis verum est, sed etiam in obtusiangulis, & rectangulis, quę duos angulos necessariò habent acutos. Quare dicemus præsens theorema tres habere casus, vel enim ducta perpendiculari A D, punctum D cadit inter B C, vel extra, vel in ipsum C, ita vt A D sit eadem, quae A C. Euclidis demonstratio congruit primo casui in triangulis, quae acutiangula dicuntur; in alijs autem si modo perpendicularis cadat in latus, quod angulo recto, vel obtuso subtenditur. At si cadat in alterum latus eorum, quae acutis angulis subtenduntur, nihilominus idem sequetur, vt demonstrabimus.

Sit obtusiangulum triangulum A B C, obtusum habens A C B angulum, et ducatur à puncto A ad B C protractam perpendicularis A D. Dico quadratum, quod fit ex A C, acutum angulum A B C subtendente minus esse. quàm quadrata, quæ ex A B B C fiunt, rectangulo, quod bis C B B D continetur.



Quoniam enim A B D triangulum rectangulum est, quadratum, quod fit ex AB æquale est quadratis, quę ex BD D A. commune addatur quadratũ ex BC. ergo quadrata ex AB BC aequalia sunt quadratis ex BD D A BC. Sed quadrato ex BD

aequalia

æqualia sint quadrata ex BC CD vnà cum rectangulo, quod bis BC CD continetur. quadratis autem ex CD DA quadratum ex AC est æquale. Quadrata igitur ex AB BC æqualia sunt quadrato ex AC, & duplo quadrati, quod ex BC vnà cum rectangulo, quod bis BC CD continetur. sed quadrato ex BC, et rectangulo, quod BC CD continetur æquale est rectangulum CBD, ac 3. huius. *propterea duplo quadrati ex BC, & rectangulo, quod bis continetur BC CD æquale est rectangulum, quod bis CB BD continetur. ergo quadrata ex AB BC æqualia sunt quadrato ex AC vnà cum rectangulo, quod bis continetur CB BD. Quadratum igitur ex AC minus est, quàm quadrata ex AB BC, rectangulo, quod bis CB BD continetur.*

Sit triangulum rectangulum ABC rectum angulum habens ACB. Dico quadratum lateris AC, quod acutum angulum ABC subtendit minus esse, quàm quadrata ex AB BC, rectangulo, quod bis CB BD continetur.



Quoniam enim triangulum rectangulum est, erit perpendicularis AD eadem, quae latus trianguli AC, & punctum D idem, quod C. quadratum vero, quod fit ex AB æquale quadratis ex BC CA. cõmune addatur quadratum ex BC. Ergo quadrata ex AB BC æqualia sunt quadrato ex AC, & duplo quadrati eius, quod fit ex BC. hoc est rectangulo, quod bis cõtinetur CB BD. Quadratũ igitur ex AC minus est quàm quadrata ex AB BC rectangulo, quod bis CB BD continetur. quod demonstrare oportebat.

Ex proxime demonstratis licebit cuiusque trianguli, siue acutianguli, siue rectanguli, siue obtusianguli quod nota latera habeat, aream inuenire.



Sit triangulum ABC habens angulos ad BC acutos, & à puncto A ad BC perpendicularis ducatur AD, quae inter BC necessario cadet. Sit autem latus AB pedum 13, BC 14, & CA 15. Itaque primum quadratum lateris AC, quod angulo acuto B subtenditur, à quadratis reliquorum laterum AB BC simul iunctis auferemus, & quod reliquitur, diuidemus per duplum lateris BC, in quod perpendicularis cadit; & proueniet recta linea BD, quae à perpendiculari intus assimilatur ad angulum acutum. Deinde à quadrato lateris AB, quod subtenditur angulo ADB recto, auferemus quadratum ipsius BD, et eius, quod prouenerit quadrati latus erit perpendicularis AD magnitudo, ex qua denique totius ABC trianguli area nota efficietur. Quadratum igitur lateris AC est 225. quadratum vero ipsius AB 169, & quadratum BC 196, quae duo simul iuncta faciunt 365. ergo sublatis 225 à 365 relinquentur 140: atque his per 28 diuisis prouenient 5; ac propterea BD erit pedum quinque. Rursus si à quadrato lateris AB, hoc est à 169 auferatur quadratum BD, quod est 25, relinquetur 144, cuius quadrati latus est 12. ergo perpendicularis AD duodecim pedum erit. Itaque ductis 12 in basis BC dimidium, videlicet in 7 producentur 88, et totidem pedum quadratorum erit area trianguli ABC, quam à principio quærebamus.

PROBLEMA II.
ROPOSITIO XIIII.

Dato rectilineo æquale quadratum constituere.



Sit datum rectilineum A. oportet ipsi A rectilineo æquale quadratum constituere. constituatur rectilineo A æquale parallelogrammum rectangulum BCDE. Si igitur BE est æqualis ED factum iam erit, quod proponebatur, etenim rectilineo A æquale quadratum cõstitutum est BD: sin minus, vna ipsarum BE ED maior est. sit BE maior; et producatur ad F, ponaturq; ipsi ED æqualis EF. deinde secta FB bifariã in G, centro

45. primi.

centro quidem G, interuallo autem vna ipsarum GB GF semicirculus describatur BHF; producaturq; DE in H, et GH iungatur. quoniã igitur recta linea BF secta est in partes æquales ad G, et inæquales ad E; erit rectangulum BEF vnà cum quadrato, quod fit ex EG æquale quadrato ex GF. est autem GF æqualis GH. rectangulum igitur BEF vnà cum quadrato ex GE æquale est quadrato ex GH. Sed quadrato ex GH æqualia sunt ex HE EG quadrata. ergo rectangulum BEF vnà cum quadrato ex EG æquale est quadratis ex HE EG. commune auferatur ex EG quadratum. reliquum igitur rectangulum BEF est æquale quadrato ex EH. Sed rectangulum BEF est ipsum BD parallelogrammum, quoniam EF est æqualis ED. ergo BD parallelogrammũ quadrato ex EH est æquale. parallelogrammum autem BD est æquale rectilineo A. rectilineum igitur A quadrato ex EH descripto æquale erit. quare dato rectilineo A æquale quadratum constitutum est, quod videlicet ex ipsa EH describitur. quod facere oportebat. 5. huius

EC. COMMENTARIVS.

Hoc problemate multo vniuersalius est, quod in sexto libro demonstratur, nempe. Dato rectilineo [illegible], et alteri dato æquale atque [illegible]

LIBRI SECVNDI FINIS.

DIFFINITIONES.

I.

EQVALES circuli sunt, quorum diametri sunt æquales, vel quorum quæ ex centris sunt æquales.



II.

Recta linea circulum contingere dicitur, quæ contingens circulum, et producta ipsum non secat.

III.

Circuli contingere se se dicuntur, qui se contingentes se ipsos non secant.



Inscriptio

EVCLIDIS ELEMENTORVM LIBER TERTIVS

CVM SCHOLIIS ANTIQVIS, ET COMMENTARIIS *Federici Commandini Vrbinatis.*

SCHOLIVM.

Propoſitum Euclidi eſt hoc loco tractare de ijs, quæ circulis accidunt cum ad rectas lineas, & ad angulos comparantur.

DIFFINITIONES.

I.

EQVALES circuli ſunt, quorum diametri ſunt æquales, vel quorum quæ ex centris ſunt æquales.



II.

Recta linea circulum contingere dicitur, quæ contingens circulum, et producta ipſum non ſecat.



III.

Circuli contingere ſe ſe dicũtur, qui contingentes ſe ipſos non ſecant.



Incirculo

IIII.

In circulo æqualiter distare à centro rectæ lineæ dicuntur, quando à centro ad ipsas perpẽdiculares ductę sũt equales.



V.

Magis autem distare à centro dicitur ea, ad quam maior perpendicularis cadit.

VI.

Portio circuli est figura, quę recta linea, et circuli circumferẽtia continetur.



VII.

Portionis autẽ angulus est, qui recta linea, et circuli circũferentia cõprehẽditur.



VIII.

In portione angulus est, quando in circũferentia portionis sumatur aliquod punctum, atque ab ipso ad terminos lineæ eius, quæ basis est portionis, rectę lineæ ducantur, angulus vero ductis lineis sit cõtentus.



VIIII.

Quando autem continentes angulum rectæ lineæ assumunt circumferentiam, in illa consistere angulus dicitur.



X.

Sector circuli est, quando angulus ad centrum cõstiterit, figura contenta rectis lineis angulum comprehendentibus, et circumferentia ab ipsis assumpta.



XI.

Similes circulorum portiones sunt, quæ angulos suscipiunt æquales, vel in quibus anguli æquales consistunt.



XII.

A FED. COMMAN.

ADDIT.

Similes circumferentiæ circulorum sunt, in quibus anguli consistunt æquales.

PROBLEMA I. PROPOSITIO I.

Dati circuli centrum inuenire.

Sit datus circulus A B C. oportet circuli A B C centrum inuenire. ducatur in ipso quędam recta linea AB vtcũque, et in puncto D bifariam secetur. à puncto autem D ipsi A B ad rectos angulos ducta DC in E producatur; et secetur CE bifariam in F. Dico punctum F circuli A B C centrum esse. Non enim, sed si fieri potest, sit G, et G A GD GB iungantur. itaque quoniam AD est æqualis DB, communis autem DG, erunt duæ AD DG duabus GD DB æquales, altera alteri: et basis G A æqualis est basi G B. sunt enim ex centro G. angulus igitur ADG angulo GDB est æqualis. Cum autem recta linea super rectam lineam insistens angulos, qui deinceps sunt, æquales inter se fecerit, rectus est vterque æqualium angulorum. ergo angulus GDB est rectus. Sed et rectus FDB. æqualis igitur est angulus FDB angulo G D B, maior minori, quod fieri non potest. quare G non est circuli ABC centrum. Similiter ostendemus neque aliud esse, præter ipsum F. ergo F centrum est circuli ABC. quod facere oportebat.

10. primi. 11. primi. Diffi. 15. pri. 8. primi. diffi: 10. pri.



COROLLARIVM.

Ex hoc perspicuum est, si in circulo quędam recta linea rectam lineam quandam bifariam, et ad angulos rectos secet, in secante circuli centrum inesse.

SCHOLIVM.

Conuersum diffinitionis circuli. *Ex theoremate ostenditur conuersum diffinitionis circuli. Si enim in ambitum figuræ ab aliquo puncto eorum, quæ sunt intra, incidant æquales rectæ lineæ, ea circulus est.*

Non

Non enim, sed si fieri potest, sit rectilineum, et sit aliquod ipsius latus, in quod incidant duæ rectæ lineę ipsum determinantes. erit igitur æquicrure triangulum: atque eius basi bifariam secta, si ducatur recta linea rectos angulos faciet, et utroque latere trianguli minor erit. quod est absurdum, ponūtur enim omnes rectæ lineæ, quæ incidūt, æquales esse.



ALIVD.

Quemadmodum in primo libro figurarum elementarium triangulorum dico, eam, quæ maxime elementaris est, triangulum videlicet æquilaterum in factionē initio proposuit, ob constructiones earum, quæ deinceps sunt, demonstrationum, ita & hoc loco centrum inuenire proponit. hoc enim circuli ipsius ortus causſa est.

Triangulum æquilaterum figura maxime elementaris est.
Cētrum, circuli ipsius ortus causſa est.

ALIVD.

Omnis quidem circulus habet proprium centrum natura determinatum; quatenus vero ad nos pertinet, non omnis, sed is tantum, cuius ortum videmus. In prioribus igitur theorematibus, tamquam factis iam circulis, etiam centra manifesta sunt. at in his cum quæratur substantia, centrum etiam quæritur: quod quidem substantiam circuli complet. hoc autem primum, vt inquiunt, inter problemata, et theoremata mediū est. Quatenus enim quærere, etiam aliquo modo facere proponit; quatenus vero non in factionem, sed in inuentionem, ob id proponit contemplari. Itaque mihi videtur formatam habens propositionem theorema esse, vt si de quarto quis dixerit. Duorum triangulorum, quorum duo latera æqualia sunt, & anguli, inuenire si baſes sint æquales. quemadmodum enim illic ſymptoma quoddam inquirit, quod duorum triangulorum naturæ ineſt, ita & hoc loco, quod ineſt naturæ circuli. At si problematis proprium, & contrarium propositioni ſuſcipit, multo magis quod propositum est problematis denominationem effugiet.

Cētrum substantiam circuli cōplet.
Inter problemata, ac theorēmata medium.

THEOREMA I. PROPOSITIO. II.

Si in circumferentia circuli, duo quęuis puncta ſumantur, quæ ipſa coniungit recta linea intra circulum cadet.



Sit circulus ABC, et in circumferentia ipsius ſumantur duo quęuis puncta AB. Dico rectam lineam, quæ à puncto A ad B ducitur, intra circulum cadere, non enim, ſed ſi fieri poteſt, cadat extra, vt AEB, et ſumpto circuli ABC centro, quod ſit D, iungantur DA DB, et producatur DF in E. Quoniam igitur DA eſt æqualis DB; erit et angulus DAE angulo DBE æqualis. et quoniam trianguli DAE vnū

Ex antecedente.

5. primi.

16 primi. latus AEB protẽditur, angulus DEB angulo DAE maior erit. angulus autem DAE æqualis est angulo DBE.
18. primi. ergo DEB angulus angulo DBE est maior. Sed maiori angulo maius latus subtẽditur. maior igitur est DB ipsa DE. est aũt DB æqualis DF. Ergo DF est maior DE, minor maiore, quod fieri nõ potest. non igitur à pũcto A ad B ducta recta linea extra circulũ cadet. Similiter ostẽdemus neque in ipsam cadere circũferentiã. Ergo extra cadat necesse est. Si igitur in circũferentiã circuli duo quęuis pũcta sumãtur, quæ ipsa cõiũgit recta linea intra circulũ cadet. quod oportebat demõstrare.



F. C. COMMENTARIVS.

✠ Similiter ostendemus neque in ipsam cadere circumferentiam.

16. primi. 18. primi. *Si enim in ipsam circumferentiam caderet, eadem ratione sequeretur angulum DFB maiorem esse angulo DAF, hoc est angulo DBF, ac propterea latus DB latere DF maius esset. sed & æquale, quod fieri non potest. non igitur in ipsam circumferentiam cadet.*

THEOREMA II. PROPOSITIO III.

Si in circulo recta linea per centrum ducta rectam lineam quandam non ductã per cẽtrũ bifariã secet, et ad angulos rectos ipsam secabit. quòd si ad angulos rectos ipsam secet, et bifariam secabit.

Sit circulus ABC, et in ipso recta linea per centrum ducta CD rectam lineam quandam AB non ductam per centrum bifariam secet in puncto F. Dico et ad angulos rectos ipsam secare. Sumatur enim circuli ABC centrum, quod sit E, et EA EB iungantur. quoniam igitur AF est æqualis FB, communis autem FE, duæ duabus æquales sunt, et basis EA basi EB est æqualis. ergo et angulus AFE angulo BFE æqualis erit. Cum autem recta linea super rectam insistens angulos, qui deinceps sunt, æquales inter se fecerit, rectus est vterque æqualium angulorum. vterque igitur AFE BFE est rectus. quare recta linea CD per centrum ducta rectam lineã AB non ductam per centrum bifariam secans, et ad angulos rectos ipsam secabit. Sed CD secet AB ad rectos angulos. Dico et bifariam ipsam secare, hoc est AF ipsi FB æqualem esse. Iisdem enim constructis, quoniam EA, quæ ex centro est æqualis EB, et angulus EAF angulo EBF æqualis erit. est autem et AFE rectus æqualis recto BFE. duo igitur triangula EAF EBF duos angulos duobus angulis æquales habẽt, vnumq; latus vni lateri æquale EF, commune scilicet vtrisque, quod vni angulorũ æqualium subtenditur. ergo et reliqua latera reliquis lateribus æqualia habebunt. atque erit AF ipsi FB æqualis. Si igitur in circulo recta linea per centrum ducta rectam lineam quandam non ductam per centrum bifariam secet, et ad angulos rectos ipsam secabit. quòd si ipsam secet ad rectos angulos, et bifariam secabit. quod oportebat demonstrare.

1. huius. Diffi. 10. primi. 5 primi. 26. primi.



THEOREMA. III. PROPOSITO. IIII.

Si in circulo duę rectæ lineæ se inuicem secent non ductę per centrum, se se bifariam non secabunt.

Sit circulus ABCD; et in ipso duæ rectæ lineæ AC BD se inuicem secent in puncto E, non ductę per centrum. Dico eas se se bifariam nõ secare. Si enim fieri potest,

secent

secent se se bifariam, ita vt AE sit æqualis EC, et BE ipsi ED: sumaturq; centrum ABCD circuli, quod sit F; et EF iungatur. quoniam igitur recta linea FE per centrũ ducta rectam lineam quandam AC non ductam per centrum bifariam secat, et ad rectos angulos ipsam secabit. quare rectus est FEA angulus. rursus quoniã recta linea FE rectam lineam quandam BD non ductam per cẽtrum bifariam secat, et ad angulos rectos ipsam secabit. rectus igitur angulus est FEB. ostensus autem est rectus et FEA. ergo FEA angulus ipsi FEB æqualis erit, minor maiori, quod fieri non potest. non igitur AC BD se se bifariam secant. quare si in circulo duæ rectæ lineæ se inuicem secent, non ductæ per centrum, se se bifariam non secabunt. quod ostendere oportebat.



1. huius.

Ex antecedente.

SCHOLIVM.

Si rectæ lineæ per centrum transirent, quærendum vtique non esset, an bifariam se inuicem secent. ipsorum enim centrum bipartita sectio est. similiter & si altera per centrum transeunte, altera non sit per centrum. nam quæ per centrum transit bifariam non secatur.

THEOREMA IIII. PROPOSITIO V.

Si duo circuli se inuicem secent, non erit ipsorum idem centrũ.

Duo enim circuli se inuicem secent ABC CDG in punctis BC. Dico ipsorum idem cẽtrum nõ esse. Si enim fieri potest, sit centrum E, iũgaturq; EC, et EFG vtcunque ducatur. Et quoniam E cẽtrum est circuli ABC, erit CE ipsi EF æqualis. rursus quoniam E centrum est CDG circuli, æqualis est CE ipsi EG. Sed ostensa est CE æqualis EF. ergo EF ipsi EG æqualis erit, minor maiori, quod fieri non potest. non igitur punctum E centrum est circulorum ABC CDG, quare si duo circuli se inuicem secent, non erit ipsorum idem centrum, quod ostendendum fuit.



THEOREMA V. PROPOSITIO VI.

Si duo circuli se se intra contingant, ipsorum idem centrum non erit.

Duo enim circuli ABC CDE contingat se se intra in puncto C. Dico ipsorum non esse idem centrum. si enim fieri potest, sit F, iũgaturq; FC, et FEB vtcunque ducatur. quoniam igitur F centrum est circuli ABC, æqualis est CF ipsi FB. rursus quoniam F centrum est circuli CDE, erit CF æqualis FE. ostensa autem est CF æqualis FB. ergo et FE ipsi FB est æqualis, minor maiori; quod fieri non potest. non igitur F punctum centrum est circulorum ABC CDE. quare si duo circuli se se intra contingant, ipsorum idẽ centrum non erit. quod demonstrare oportebat.



THEO-

THEOREMA VI. PROPOSITIO VII.

Si in circuli diametro aliquod punctum ſumatur, quod non ſit centrum circuli: et ab eo in circulum cadant quędam rectæ lineæ: maxima quidem erit, in qua centrum, minima vero reliqua: aliarum autem propinquior ei, quę per centrum tranſit, ſemper remotiore maior eſt. at duæ tantum æquales ab eodem puncto in circulum cadent ad vtraſque partes minimę.



Sit circulus ABCD, cuius diameter AD: et in ipſa AD ſumatur aliquod punctum F, quod non ſit centrum circuli. Sit autem circuli centrum E: et à puncto F in circulum ABCD cadant quędam rectę lineę FB FC FG. Dico FA maximam eſſe, et FD minimam: aliarum vero FB quidē maiorem quàm FC, et FC maiorem quàm FG. Iungātur
20. primi. enim BE CE GE. Et quoniam omnis trianguli duo latera reliquo ſunt maiora; erunt BE EF maiores quàm BF. eſt aūt AE æqualis EB. Ergo BE EF ipſi AF sūt æquales. maior igitur eſt AF quàm FB. rurſus quoniā BE eſt æqualis EC, communis autem FE, duę BE EF duabus CE EF
24. primi. æquales ſunt. Sed BEF angulus maior eſt angulo CEF. baſis igitur BF baſi FC eſt maior. eadem ratione et CF maior eſt quàm FG. rurſus quoniam GF FE maiores ſunt quàm EG, æqualis autem GE ipſi ED; erunt GF FE maiores quam ED. communis auferatur EF. ergo reliqua GF maior eſt quàm reliqua FD. maxima igitur eſt FA, et FD minima: maior vero BF quàm FC, et CF quàm FG maior. dico et à puncto F duas tantum rectas lineas cadere in circulum ABCD ad vtraſque partes
23. primi. minimæ FD. conſtituatur enim ad lineam EF, atque ad datum in ea punctum E angulo GEF æqualis angulus FEH: et FH iungatur. quoniā igitur GE eſt æqualis EH, communis autem EF, duæ GE EF duabus HE EF æquales ſunt: et angulus G
4. primi. E F eſt æqualis angulo HEF. baſis igitur FG baſi FH æqualis erit. dico à puncto F in circulum non cadere aliam ipſi FG æqualem. Si enim fieri poteſt, cadat FK. et quoniam FK eſt æqualis FG, eſtq; ipſi FG æqualis FH; erit et FK ipſi FH æqualis, videlicet propinquior ei, quæ per centrum tranſit, æqualis remotiori, quod fieri non poteſt. Vel hoc modo. iungatur EK. et quoniam GE ipſi EK eſt æqualis, communis autem FE, et baſis GF æqualis baſi FK; erit et angulus GEF æqualis angulo KEF. Sed angulus GEF angulo HEF eſt æqualis. angulus igitur HEF ipſi KEF æqualis erit, minor maiori, quod fieri non poteſt. quare à puncto F in circulum non cadet alia recta linea æqualis ipſi GF. ergo vna tantum cadet. Si igitur in circuli diamtero aliquod punctum ſumatur, quod non ſit centrum circuli, et reliqua quę ſequuntur. quod demonſtrare oportebat.

SCHOLIVM.

CONVERSVM. Si intra circulum punctum ſumatur, atque à puncto in circulum cadant quotcumque rectæ lineæ, quarum vna quidem maxima ſit, vna vero minima, & reliquarum aliæ ſint æquales, aliæ inæquales; maxima quidem per centrum tranſibit; minima vero erit reliqua pars diametri; & aliarum maiores quidem ſunt centro propinquiores, æquales autem ab eo æqualiter diſtant.



Per punctum enim E, quod est intra circulum maxima quidem sit EC, minima vero ED; et FE quàm EB maior. Dico CE per centrum transire, et DE ipsi esse in directum; EF vero centro propinquiorem esse, quàm EB. Si enim CE non transit per centrum, sed alia quædam à pũcto E in circulum cadẽs, illa maxima erit per septimum theorema. est autem et EC maxima, quod fieri non potest. diameter igitur est CE, et ipsi in directum ED. Dico EF centro H propinquiorem esse, quàm EB. Si enim non est propinquior, vel remotior est, vel æqualiter distat: et siquidem remotior, maior erit BE, quàm EF, quod fieri non potest. non enim ponitur ita esse. Quòd si æqualiter distant, æquales sunt. sed neque hoc ponitur. propinquior igitur est FE ipsi H, quàm EB, et GE ipsi EB est æqualis. Ergo à centro H æqualiter distant, inæqualiter enim distantes inæquales sunt, per septimum theorema. quod ostendere oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

Illud quoque verum est, quod nos demonstrauimus in commentario in propositionem octauam libri Archimedis de lineis spiralibus.



Si in circumferentia circuli aliquod sumatur punctum, ab eoq; in circulum ducantur rectæ lineę; quæ per centrum transit, omnium erit maxima, aliarum verò quæ transeunti per cẽtrum propinquiores sunt, remotioribus erunt maiores; duę autem tantum æquales sunt ad vtrasque partes maximæ.

THEOREMA VII. PROPOSITIO VIII.

Si extra circulum aliquod punctum sumatur, atque ab eo ad circulum ducantur quædam rectę lineæ, quarum vna per centrum transeat, alię verò vtcumque: earum quidem, quæ in concauam circumferentiam cadunt, maxima est, quę per centrum transit; aliarum autem propinquior ei, quę per centrum, semper remotiore maior est. at earum, quæ in curuam circumferentiam cadunt minima est, quæ inter punctum, et diametrum interijcitur; aliarum vero quæ propinquior minimæ semper remotiore est minor. duæ autem tantum æquales à puncto in circulum cadunt ad vtrasque partes minimæ.

Sit circulus ABC, et extra circulum sumatur aliquod punctum D: ab eo autem in circulum ducantur rectę lineæ quędam DA DE DF DC: sitq; DA per cẽtrum. Dico earum quidem quæ in concauam AEFC circumferentiam cadunt, maximam esse DA, quæ per centrum transit; et minimam, quæ inter punctum D, et diametrum AG interiicitur, videlicet DG: maiorem autem DE quàm DF, et DF maiorẽ quàm DC. earum vero, quæ in curuam circumferentiam HLKG cadunt, quæ propinquior minimæ DG semper remotiore esse minorem, hoc est DK minorem, quàm DL, et DL minorem quàm DH. Sumatur enim centrum circuli ABC, quod sit M, et jungantur ME MF MC MK ML MH. et quoniam AM est æqualis ME, communis

nis apponatur MD. Ergo AD eſt æqualis ipſis EM MD.
20. primi. Sed EM MD ſunt maiores quàm ED. Ergo et AD quàm ED eſt maior. rurſus quoniam æqualis eſt ME ipſi MF, cõmunis apponatur MD. erũt EM MD ipſis MF MD æquales; et angulus EMD maior eſt angulo FMD. baſis igitur
24 primi. ED baſi FD maior erit. Similiter demonſtrabimus et FD maiorẽ eſſe quàm CD. ergo maxima eſt DA; maior aũt DE quàm DF, et DF quàm DC maior. præterea quoniam MK KD ſũt maiores quã MD, et MG eſt æqualis MK; erit reliqua KD quàm reliqua GD maior. quare GD minor quàm KD, et idcirco GD minima eſt. et quoniam trianguli MLD in vno latere MD, duæ rectæ lineæ MK KD intra conſtituuntur, erunt MK KD minores ipſis ML LD,
21. primi. quarum MK eſt æqualis ML. reliqua igitur DK minor eſt quàm reliqua DL. Similiter oſtendemus et DL quam DK minorẽ eſſe. Ergo DG minima eſt. minor vero DK quàm DL, et DL minor quàm DH. dico ẽt duas tantùm æquales à puncto D in circulum cadere ad vtraſque minimæ



34. primi. partes. conſtituatur ad rectam lineam MD, ad datumq; in ea punctum M angulo K MD æqualis angulus DMB, et DB iungatur. itaque quoniam MK eſt æqualis MB, cõ
3. primi. munis autem MD, duæ KM MD duabus BM MD æquales ſunt, altera alteri. et angulus KMD æqualis eſt angulo BMD. baſis igitur DK baſi DB eſt æqualis. dico à puncto D nullam aliam ipſi DB æqualem in circulum cadere. ſi enim fieri poteſt, cadat DN. et quoniam DK eſt æqualis DN, et DK ipſi DB eſt æqualis; erit et DB æqualis DN, propinquior ſcilicet minimæ æqualis remotiori, quod fieri non poſſe oſtenſum eſt, vel et aliter. iungatur MN. et quoniam æqualis eſt KM ipſi MN, communis autẽ MD; et baſis DK baſi DN æqualis erit, et propterea angulus KMD æqualis angulo DMN. Sed KMD angulus eſt æqualis angulo BMD. angulus igitur BMD angulo NMD æqualis erit, minor maiori, quod fieri non poteſt. quare, non plures quàm duæ rectæ lineæ à puncto D in circulum ABC ad vtraſque partes minimæ GD cadent. Si igitur extra circulum aliquod punctum ſumatur, et reliqua deinceps. quod oſtendere oportebat.

THEOREMA VIII. PROPOSITIO IX.

Si intra circulum ſumatur aliquod punctum, atque ab eo in circulum cadant plures quàm duæ rectæ lineæ æquales; punctũ quod ſumitur, circuli centrum erit.

Sit circulus ABC, et intra ipſum ſumatur punctum D, à quo in circulum cadant plures, quàm duæ rectæ lineæ æquales, videlicet DA DB DC. Dico punctum D circuli ABC centrum eſſe. Iungantur ẽnim AB BC, ſecenturq; bifariam in punctis EF: et iunctæ ED DF ad puncta GK HL producantur. quoniam igitur AE eſt



æqualis EB, communis autem ED, erunt duæ AE ED duabus BE ED æquales; et baſis DA eſt æqualis baſi DB. angulus igitur AED angulo BED æqualis erit, et idcir-
8. primi. co vterque angulorũ AED BED eſt rectus. Ergo GK bifariam ſecans AB, et ad an-
13 primi. gulos rectos ſecat. et quoniam ſi in circulo quædã recta linea, rectam lineam quandam

dam bifariã,et ad angulos rectos secet,in secante est circuli centrum;erit in GK centrum circuli ABC. Eadẽ ratione et in HL centrum est ABC circuli,et nullum aliud commune habent rectæ liueę GH HL,nisi punctum D.Ergo D circuli ABC est centrum.Si igitur intra circulum sumatur aliquod punctum, atque ab eo in circulum cadant plures quàm duæ rectæ lineæ ęquales; punctum, quod sumitur circuli centrum erit. Corol.1.huius.

ALITER.

Sumatur enim intra circulum A B C punctum aliquod D: atque à puncto D in circulum A B C cadant plures quàm duæ rectæ lineæ æquales DA DB DC. Dico punctum D, quod sumitur,circuli ABC esse centrum. non enim, sed si fieri potest, sit E, et iũcta DE in FG producatur.ergo FG diameter est ABC circuli.itaque quoniam in FG diametro citculi ABC sumptum est aliquod punctum D, quod non est centrum circuli; maxima quidem erit D G, maior autem D C quàm D B, et D B quàm D A maior. Sed et ęquales, quod fieri non potest. non igitur E centrum est circuli ABC. Similiter ostendemus neque aliud punctum centrum esse præter ipsum D. ergo D circuli ABC centrum erit.quod oportebat demonstrare. 7.huius.

THEOREMA IX. PROPO. X.

Circulus circulum in pluribus,quàm duobus punctis non secat.

Si enim fieri potest,circulus ABC circulum DEF secet in pluribus punctis,quàm duobus, videlicet in B G H F:et iunctæ BG BH bifariam secentur in KL. atque à punctis KL ipsis BG BH ad rectos angulos ductæ KC LM in puncta AE producantur. quoniã igitur in circulo ABC quędam recta linea AC rectam lineam quandam BH bifariam et ad angulos rectos secat,in ipsa AC circuli ABC erit centrum.rursus quoniam in eodẽ circulo ABC quædamrecta linea NX rectam lineam quãdam BG bifariam secat, et ad rectos angulos;in ipsa NX centrum erit circuli. ostensum autem est et in ipsa A C centrum esse,et in nullo alio puncto conueniunt inter se rectæ lineę A C NX,præterquàm in O. ergo O circuli ABC est centrum. Similiter.ostendemus punctum O centrum esse circuli DEF. ergo duorum circulorum se se secantium A B C DEF. idem erit centrum O. quod fieri non potest, non igitur circulus circulum secat in pluribus punctis,quàm duobus.



Corol.1.huius.

5.huius.

ALITER.

Circulus enim ABC rursus circulum DEF secet in pluribus punctis,quàm duobus; nempe in B G F H, et circuli A B C centrum sumatur, quod sit K;et KB KG KF iungãtur.qm igitur intra circulũ DEF sumptum est aliquod punctum K, à quo in circulum DEF incidant plures, quàm duæ rectæ lineæ KB KG KF;erit punctum K circuli D E F centrum. est autem et circuli ABC centrum K. duorũ igitur circulorum, qui se se secant,idem erit K centrum,quod fieri non potest. quare circulus circulum in pluribus, quàm duobus punctis non secat,quod oportebet demonstrare.



THEOREMA X. PROPOSITIO. XI.

Si duo circuli se se intus contingant, et sumantur centra ipso-

rum; recta linea ipsorum centra coniungens, et producta in circulorum contactum cadet.



Duo enim circuli ABC ADE se se intus contingant in puncto A, et sumatur circuli quidem ABC cẽtrum, quod sit F, circuli vero ADE centrum G. Dico rectam lineam à puncto G ad F ductam, si producatur in punctum A cadere. Non enim, sed si fieri potest, cadat vt F G D H. et
20. primi. AF AG iungantur. Itaque quoniã AG GF maiores sunt, quàm F A, hoc est quàm F H, communis auferatur F G. reliqua igitur AG maior est, quàm reliqua GH. Sed AG est æqualis GD. ergo GD ipsa GH est maior, minor maiore, quod fieri non potest. Non igitur à puncto F ad G ducta recta linea extra cõtactum A cadet. quare in ipsum cadat necesse est. Si igitur duo circuli se se intus contingant; recta linea ipsorum centra coniungens, si producatur in contactum circulorum cadet. quod oportebat demonstrare.

ALITER.



Sed cadat vt GFC, et producatur in directum CF G ad punctum H: iunganturq; AG AF. Quoniam igi
20. primi. tur AG GF maiores sunt quàm AF, et AF est æqualis FC, hoc est ipsi FH, communis auferatur FG. reliqua igitur AG reliqua GH est maior: hoc est DG maior ipsa GH, minor maiore, quod fieri non potest. Similiter et si extra circulum paruum sit centrum maioris circuli, idem sequi absurdum ostendemus.

THEOREMA XI. PROPOSITIO XII.

Si duo circuli se se extra contingant, recta linea ipsorũ centra coniungens per contactum transibit.



Duo enim circuli ABC ADE se se extra contingant in puncto A; et sumatur circuli quidem ABC centrum, quod sit F: circuli vero ADE cẽtrum G. Dico rectam lineam, quæ à puncto F ad G ducitur, per contactum A transire. Non enim sed si fieri potest, cadat, vt FCDG: et FA A G iungantur. Quoniam igitur F centrum est circuli ABC, erit AF æqualis FC. Rursus quoniam G centrum est ADE circuli, erit AG ipsi GD æqualis. ostensa est autem et AF æqualis FC. sunt igitur FA A
20. primi. G ipsis FC DG æquales. ergo tota FG maior est, quàm FA AG. Sed et minor, quod fieri non potest. Non igitur à puncto F ad G ducta recta linea per contactum A nõ transibit. quare per ipsum transeat necesse est. Si igitur duo circuli se se extra cõtingant, recta linea ipsorum centra coniungens per contactum transibit. quod oportebat demonstrare.

THEOREMA XII. PROPOSITIO XIII.

Circulus circulum non contingit in pluribus pũctis, quàm vno, siue intus, siue extra contingat.

Si enim fieri potest, circulus ABDC circulum EBF D contingat primum intus in pluribus punctis, quàm vno, videlicet in BD: et sumatur circuli quidē ABDC centrum G; circuli vero EBFD centrum H. ergo recta linea, quę à puncto G ad H ducitur, in puncta BD cadet. cadat vt BGHD. et quoniam G centrum est circuli ABDE, erit BG ipsi GD æqualis. maior igitur est BG, quàm HD: et BH quàm HD multo maior. Rursus quoniam H centrum est EBFD circuli, æqualis est BH ipsi HD. atqui ostensa est ipsa multo maior, quod fieri non potest. non igitur circulus circulum intus contingit in pluribus punctis, quàm vno. Dico etiam neque extra contingere. Si enim fieri potest, circulus ACK circulum ABDC extra cōtingat in pluribus pūctis, quàm vno, videlicet in AC, et AC iungatur. Itaque quoniam in circumferentia vtrorumque circulorum ABDC ACK sumpta sunt duo quæuis puncta A C; recta linea, quę ipsa coniungit intra vtrumque ipsorum cadet. Sed intra circulum quidem ABDC cadit, extra circulum vero ACK, quod est absurdum. non igitur circulus circulū extra cōtingit in pluribus punctis, quàm vno. ostensum autem est neque intus contingere. circulus igitur circulū non contingit in pluribus punctis; quàm vno, siue intus, siue extra contingat. quod oportebat demonstrare.



THEOREMA XIII. PROPOSITIO XIIII.

In circulo æquales rectæ lineæ æqualiter à centro distant, et quæ æqualiter à centro distant; inter se sunt æquales.

Sit circulus ABDC, et in ipso æquales rectę lineæ AB CD. Dico eas à centro æqualiter distare. Sumatur enim circuli ABDC centrum, quod sit E, et ab ipso ad AB CD perpendiculares ducantur EF EG, et AE EC iungantur. Quoniam igitur recta linea quędam per centrum ducta EF rectam lineam quandam AB non ductam per centrum ad rectos angulos secat, et bifariam ipsam secabit. quare AF est æqualis FB, ideoq; AB ipsius AF dupla. Eadem ratione et CD dupla est CG. atque est AB ipsi CD æqualis. æqualis igitur et AF ipsi CG. Et quoniam AE est æqualis EC, erit et quadratum ex AE quadrato ex EC æquale. Sed quadrato quidem ex AE æqualia sunt ex AF FE quadrata, rectus enim angulus est ad F: quadrato autem ex EC æqualia sunt quadrata ex EG GC, cum angulus ad G sit rectus. Quadrata igitur ex AF FE æqualia sunt quadratis ex CG GE, quorum quadratum ex AF quadrato ex CG est æquale, etenim æqualis est AF ipsi CG. reliquum igitur, quod fit ex FE quadratum æquale est reliquo, quod ex EG; ac propterea FE ipsi EG est æqualis. in circulo autem æqualiter distare à centro rectę lineę dicuntur, quando à centro ad ipsas perpendiculares ductæ æquales sunt. ergo AB CD à centro æqualiter distant. Sed AB CD æqualiter distent à centro, hoc est æqualis sit FE ipsi EG. Dico AB ipsi CD æqualem esse. Iisdem enim cōstructis, similiter ostendemus AB duplam esse ipsius AF, et CD duplā ipsius CG. Et quoniā æqualis est AE ipsi EC, erit et ex AE quadratū quadrato ex EC æquale. Sed quadrato quidē ex AE æqualia sunt quadrata ex EF FA: quadrato aūt ex EC æqualia quadrata ex EG GC. quadrata igitur ex EF FA quadratis ex EG GC æqualia sunt. quorum quadratū ex EG æquale est quadrato ex EF, est enim EG ipsi EF æqualis reliquum igitur ex AF quadratū æquale est reliquo ex CG, ergo AF ipsi CG est æqualis, atque est AB ipsius AF dupla, et CD dupla ipsius CG, quare AB ipsi CD æqualis erit. In circulo igitur



3. huius.

47. primi.

igitur æquales rectæ lineæ æqualiter à centro distant, et quæ æqualiter à centro distant, inter se sunt æquales. quod oportebat demonstrare.

THEOREMA XIIII. PROPOSITIO XV.

In circulo maxima quidem est diameter; aliarum vero semper propinquior ei, quæ per centrum transit, remotiore maior est.



Sit circulus ABCD, cuius diameter AD; centrum E; et propinquior quidem diametro AD sit BC; remotior vero FG. Dico AD maximam esse, et BC maiorem quàm FG. Ducantur enim à centro ad BC FG perpendiculares EH EK. Et quoniam BC propinquior est ei, quæ per centrum transit, remotior autem FG; erit EK, quàm EH maior. ponatur ipsi EH æqualis EL, et per L ipsi EK ad rectos angulos ducta LM in N producatur, et iungantur E M EN EF EG. Quoniam igitur EH est æqualis EL, erit et BC ipsi MN æqualis. Rursus quoniam æqualis est AE ipsi EM, et DE ipsi EN, erit et AD ipsis ME EN æqualis. Sed ME EN maiores sunt, quàm MN. ergo et AD maior est quàm MN. at MN est æqualis BC. est igitur AD quàm BC maior. Quòd cũ duæ EM EN duabus FE EG æquales sint, angulusq; MEN maior angulo FEG, et basis MN basi FG maior erit. ostensa autem est MN æqualis BC. ergo et BC quàm FG est maior. Maxima igitur est AD diameter, et BC maior, quàm FG. Quare in circulo maxima est diameter, aliarum vero semper propinquior ei, quæ per centrum transit remotiore est maior. quod demonstrare oportebat.

Ex antecedente.

24. primi.

THEOREMA XV. PROPOSITIO XVI.

Quę diametro circuli ad rectos angulos ab extremitate ducitur, cadit extra circulum: et in locum qui inter rectam lineam, et circumferentiam interijcitur altera recta linea non cadet: et semicirculi angulus omni angulo acuto rectilineo maior est; reliquus autem minor.



Sit circulus ABC circa centrum D, et diametrum AB. Dico rectam lineam, quæ à puncto A ipsi AB ad rectos angulos ducitur extra circulum cadere. non enim, sed si fieri potest, cadat intus, vt AC, et DC iungatur. Itaque quoniam æqualis est DA ipsi DC, erit et angulus DAC angulo ACD æqualis. rectus autem est DAC. ergo et ACD est rectus; ac propterea anguli DAC ACD duobus rectis æquales sunt. quod fieri non potest. Non igitur à puncto A ipsi BA ad rectos angulos ducta cadet intra circulum. Similiter ostendemus neque in circumferentiam cadere. extra igitur cadat necesse est. cadat vt AE. Dico in locum, qui inter rectam lineam AE, et circumferentiam CHA interiicitur, alteram rectam lineam non cadere. Si enim fieri potest, cadat vt FA, et à puncto D ad FA perpendicularis ducatur DG. Et quoniã rectus est angulus AGD, minor autem recto DAG, erit AD quàm DG maior. æqualis autem est DA ipsi DH. maior igitur est DH ipsa DG, minor maiore, quod fieri non potest. Non igitur in locum, qui inter rectam lineam, et circumferentiam interiicitur, altera recta linea cadet. Dico præterea angulum semicirculi, qui recta

5. primi.

17. primi.

19. primi.

linea

linea BA, et circumferentia CHA continetur, omni angulo acuto rectilineo maiorem esse; reliquum vero contentum circumferentia CHA, et recta linea AE omni angulo acuto rectilineo esse minorem. Si enim est aliquis angulus rectilineus maior quidem contento recta linea BA, et CHA circumferentia, minor autem contento CHA circumferentia, et recta linea AE, in locum, qui inter circumferentiam CHA, et rectam lineam AE interiicitur, cadet aliqua recta linea, quæ faciet angulum maiorem quidem contento recta linea BA, et CHA circumferentia, qui scilicet rectis lineis continetur, minorem vero contento circumferentia CHA, et AE recta linea. non cadit autem. non igitur erit angulus acutus, qui rectis lineis continetur, maior angulo contento recta linea BA, et CHA circumferentia, neque minor contento circumferentia CHA, et AE recta linea.

COROLLARIVM.

Ex hoc manifestum est, rectam lineam, quæ ab extremitate diametri circuli ad rectos angulos ducitur, circulum contingere: et rectam lineam contingere circulum in vno tantum puncto, quoniã quæ occurrit in duobus pũctis intra ipsũ cadit, vt ostẽsum est.

PROBLEMA II. PROPOSITIO XVII.

A dato puncto rectam lineam ducere, quæ datum circulum contingat.

Sit datum quidem punctum A, datus autem circulus BCD. oportet à puncto A rectam lineam ducere, quæ circulum BCD contingat. Sumatur enim centrum circuli E; et iuncta AE, centro quidem E, interuallo autem EA circulus AFG describatur: et à puncto D ipsi EA ad rectos angulos ducatur DF: iungaturq; EBF AB. Dico à puncto A ductam esse AB, quę circulum BCD contingit. Quoniam enim E centrum est circulorum BCD AFG, erit EA æqualis EF, et ED ipsi EB. Duæ igitur AE EB duabus FE ED æquales sunt, et angulum communem continent, qui est ad E. ergo basis DF basi AB est æqualis; triangulumq; D EF æquale triangulo EBA, et reliqui anguli reliquis angulis. æqualis igitur est angulus EBA angulo EDF. et EDF rectus est. quare et rectus EBA: atque est EB ex centro. quæ autem diametro circuli ab extremitate ad rectos angulos ducitur, circulũ contingit. ergo AB contingit circulum. A dato igitur puncto A ducta est recta linea AB, quæ circulum BCD contingit. quod facere oportebat.



4. primi.

Ex antecedente.

THEOREMA XVI. PROPOSITIO XVIII.

Si circulum contingat quædam recta linea, à centro autem in contactum recta linea ducatur, ea ad contingentem perpendicularis erit.

Circulum enim ABC contingat quædam recta linea DE in puncto C: et circuli ABC centrũ sumatur F, à quo ad C ducatur FC. Dico FC ad ipsam DE perpendicularem esse. Si enim non ita sit, ducatur à puncto F ad DE perpendicularis FG. Quoniam igitur angulus FGC rectus est, erit GCF acutus; ac propterea FGC angulus maior angulo FCG. maiorem autem angulum



11. primi.

19. primi.

angulum maius latus subtendit. maior igitur est FC, quàm FG. æqualis autem FC ipsi FB. ergo FB ipsa FC est maior, minor maiore, quod fieri non potest. non igitur FG est perpendicularis ad DE. Similiter ostendemus neque aliam quampiam esse præter ipsam FC. ergo FC ad DE est perpendicularis. Si igitur circulum contingat quædam recta linea, à centro autem in contactum recta linea ducatur, ea ad contingentem perpendicularis erit. quod oportebat demonstrare.

THEOREMA XVII. PROPOSITIO XIX.

Si circulum contingat quædam recta linea, à contactu autem ad rectos angulos contingenti recta linea ducatur; in ea circuli centrum erit.



Circulum enim ABC contingat quædam recta linea DE in C, et à puncto C ipsi DE ad rectos angulos ducatur CA. Dico in ipsa AC circuli centrũ esse. Non enim, sed si fieri potest, sit F centrum; et iungatur CF. Quoniam igitur circulum ABC cõtingit quędam recta linea DE, et à centro ad contactum ducta est FC; erit FC ad ipsam DE perpendicularis. rectus igitur angulus est FCE. est autẽ et ACE rectus. ergo FCE angulus est æqualis angulo ACE, minor maiori, quod fieri non potest. Non igitur F centrum est ABC circuli. Similiter ostendemus neque aliud aliquod esse, præterquàm in ipsa AC. Quare si circulum contingat quædam recta linea, à cõtactu autem ad rectos angulos contingenti recta linea ducatur; in ea circuli erit centrum. quod demonstrare oportebat.

SCHOLIVM.

CONVERSVM. Si circulum contingat quædam recta linea, à contactu autem ad rectos angulos contingenti recta linea extra circulum ducatur; producta ad eas partes, in quibus est circulus in circuli cẽtrum cadet.

THEOREMA XVIII. PROPOSITIO XX.

In circulo angulus, qui ad centrum duplus est eius, qui ad circumferentiam, quando circumferẽtiam eandem pro basi habeãt.



Sit circulus ABC, ad cuius centrum quidem angulus sit BEC, ad circumferentiam vero BAC, et eandẽ circumferentiam BC pro basi habeant. Dico BEC angulum anguli BAC duplum esse. Iungatur enim AE et ad F producatur. Itaque quoniam EA est æqualis
5. primi. EB, erit et angulus EAB angulo EBA æqualis. anguli igitur EAB EBA dupli sunt ipsius anguli EAB. Sed
32. primi. angulus BEF est æqualis angulis EAB EBA. ergo BEF angulus anguli EAB est duplus. Eadem ratione et angulus FEC duplus est ipsius EAC. totus igitur BEC totius BAC duplus erit. Rursus inflectatur, et sit alter angulus BDC, iũctaq; DE ad G producatur. Similiter ostendemus angulum GEC anguli EDC duplum esse; quorum GEB duplus est ipsius EDB. ergo reliquus BEC reliqui BDC est duplus

plus. In circulo igitur angulus, qui ad centrum duplus est eius, qui ad circumferē tiam, quando circumferentiā eandē pro basi habeant. quod oportebat demōstrare.

F. C. COMMENTARIVS.

Illud quoque verum est, spacium quod est ad cētrum duplum esse anguli, qui ad circumferentiam, quando circumferentiam eandem pro basi habuerint.



Sit enim circulus ABC, cuius cētrum E. Dico spacium BEC quod est ad centrum duplum esse anguli BAC. iuncta enim AE, & ad D producta, iunctisq; BD DC, similiter demonstrabitur angulus BED anguli BAE duplus, et angulus CED duplus anguli CAE, totum igitur spacium BEC quod est ad centrum, anguli BAC qui ad circumferentiā duplum erit. quod oportebat demonstrare.

THEOREMA XIX. PROPOSITIO XXI.

In circulo qui in eadem portione sunt anguli inter se æquales sunt.



Sit circulus ABCDE, & in eadem portione BAED anguli sint BAD BED. Dico eos inter se equales esse. Sumatur enim circuli ABCDE centrum quod sit F: iunganturq; BF FD. & quoniam angulus quidē BFD est ad centrum, angulus vero BAD ad circumferentiā, & circumferentiam eandem pro basi habent BCD; erit BFD angulus anguli BAD duplus. Eadem ratione angulus BFD duplus est etiam anguli BED. ergo angulus BAD angulo BED equalis erit. In circulo igitur qui in eadē portione sunt anguli, inter se æquales sunt. quod oportebat demonstrare.

F. C. COMMENTARIVS.

Euclidis demonstratio congruit in maiore tantum circuli portione, nisi fortasse spacium quodcūque ad cētrum pro angulo accipiatur, ex ijs quę nos proxime demonstrauimus, possumus autem & hoc modo demonstrare.



Sint in portione BAED circuli ABCDE, anguli BAD, & BED. Dico eos inter se equales esse. Sit enim primum BAED maior portio, vt in antecedenti figura sumaturq; circuli centrum quod sit F: & BF FD iungantur. quoniam igitur angulus BFD est ad centrum, angulus vero BAD ad circumferentiam, & eandem basim habent, nempe circumferentiam ECD; erit angulus BFD anguli BAD duplus: & eadem ratione duplus quoque anguli BED. angulus igitur BAD angulo BED aequalis erit. Sit deinde BAED portio minor: & iungantur BC AC EC DC. Itaque quoniam ex ijs, quae proxime demonstrauimus, angulus BAC est aequalis angulo BEC, itemq; angulus CAD angulo CED; erit et totus angulus BAD toti BED aequalis.

Ex antecedente.



A L I T E R.

Iungatur AE. erit angulus ABE aequalis angulo ADE. angulus autem AGB ad verticem angulo EGD est aequalis. ergo & reliquus angulus BAD reliquo BED aequalis erit. In circulo igitur

Ex demonstratis. 15. primi.

igitur, qui in eadem portione sunt anguli, inter se æquales sunt. quod demonstrare oportebat.



THEOREMA XX. PROPO. XXII.

Quadrilaterorum, quę in circulis describuntur, anguli oppositi duobus rectis ęquales sunt.

Sit circulus ABCD, et in ipso quadrilaterum ABCD. Dico angulos ipsius oppositos duobus rectis æquales esse. Iungantur AC BD. Quoniam igitur omnis trianguli tres anguli duobus rectis sunt æquales, erunt trianguli ABC tres anguli CAB ABC BCA æquales duobus rectis. Sed angulus CAB est ęqualis angulo β D C, in eadem enim sunt portione BADC, et angulus ACB æqualis ipsi ADB, quòd sint in eadem ADCB portione. totus igitur angulus ADC angulis BAC ACB est æqualis. communis apponatur ABC angulus duobus angulis, qui sunt ad A et C, et seorsum vni angulo, qui est ad D; erunt anguli ABC BAC ACB angulis ABC ADC æquales. Sed ABC BAC ACB sunt æquales duobus rectis. ergo et anguli ABC ADC duobus rectis ęquales erunt. Similiter ostendemus angulos quoque BAD DCB duobus rectis esse æquales. Quadrilaterorum igitur, quę in circulis describũtur, anguli oppositi duobus rectis æquales sunt. quod oportebat demonstrare.

32. primi.



THEOREMA XXI. PROPOSITIO. XXIII.

In eadem recta linea duæ circulorum portiones similes et inæquales ex eadem parte non constituentur.

* Si enim fieri potest, in eadem recta linea AB duæ circulorum portiones similes, et inęquales constituantur ex eadem parte A C B A D B; ducaturq; ACD, et CB BD iungantur. Itaque quoniam portio A C B similis est portioni A D B, similes autem circulorum portiones sunt, quæ angulos suscipiunt æquales; erit A C B angulus ęqualis angulo A D B, exterior interiori, quod fieri non potest. Non igitur in eadem recta linea, duę circulorum portiones similes, et inæquales ex eadem parte constituentur. quod demonstrare oportebat.

Diffi. 11.



F. C. COMMENTARIVS.

* Ex eadem parte. ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη.

In uetusto codice hęc non leguntur, quamquam ad demonstrationem necessaria sint, tamen neutra ex parte similes, & inęquales circulorum portiones constitui possunt in eadem recta linea. Si enim fieri potest, in eadem recta linea AB constituatur ex altera parte portio A E B similis; & inęqualis portioni A C B. Intelligatur autem ex eadem parte portio AFB similis & aequalis ipsi ACB; & ducta AFE, iunctisq; FB BE, similiter demonstrabitur angulus AFB aequalis an-



gulo

gulo AEB, exterior interiori, quod fieri non potest. Non igitur in eadem recta linea similes & inequales circulorum portiones constituentur. quod demonstrandum fuerat.

THEOREMA XXII. PROPOSITIO. XXIIII.

In æqualibus rectis lineis similes circulorum portiones inter se æquales sunt.



Sint enim in æqualibus rectis lineis AB CD similes circulorum portiones AEB CFD. Dico portionem AEB portioni CFD æqualem esse. congruente enim AEB portione portioni CFD, et posito puncto quidem A in C, recta vero linea AB in CD; congruet et B punctum puncto D, propterea quòd AB ipsi CD sit æqualis. congruente autem recta linea AB rectæ CD, congruet et AEB portio portioni CFD. Si.n. AB congruet ipsi CD, portio autē AEB portioni CFD non congruet, sed permutabitur, vt CGD, circulus circulum in pluribus quàm duobus punctis secabit. etenim circulus CGD circulum CFD secat in pluribus pūctis, quàm duobus, videlicet in punctis CGD, quod rursus fieri non potest. Non igitur congruente recta linea AB rectæ CD, non congruet et ACB portio portioni CFD. quare congruet et ipsi æqualis erit. In æqualibus igitur rectis lineis similes circulorū portiones inter se æquales sunt, quod oportebat demonstrare.

F. C. COMMENTARIVS.

Si enim AB congruet ipsi CD; portio autem AEB portioni CFD non congruet, sed permutabitur, vt CGD, etreliqua.



Si enim AB recta linea ipsi CD congruente, portio AEB portioni CFD non congruet, circūferentia eius vel extra ipsam AEB cadit, vel intra, vel partim extra partim intra. cadat primum extra, vel intra. ergo in eadem recta linea duae circulorum portiones similes & inequales ex eadem parte constituentur, quod fieri non posse in antecedēte demonstratum est. cadat deinde partim extra, partim intra, vt CGD. circulus igitur circulum in pluribus quàm duobus punctis secabit. quod itidem fieri nō potest, ex decima huius. Euclides autem primum casum velut nimis perspicuum omisisse videtur.

Sed & cuiusque praedictorum rectè fieri contrarium ostendemus, quod ita demonstrari potest.

In eadem recta linea, vel in æqualibus rectis lineis æqualēs circulorum portiones similes sunt.



Si enim fieri potest, sint primum in eadem recta linea AC portiones ABC AEC aequales, sed tamen dissimiles: necesse erit circumferentiam AEC neque congruere circumferentiae ABC, alioqui & aequales essent & similes: neque extra, vel intra ipsam cadere. aequales enim non essent, quare relinquitur vt partim intra, partim ex-

tra cadat. quòd si ita sit, circulus circulum in plur bus, quam duobus punctis secabit. quod fieri non potest. Similiter demonstrabitur neque ex altera parte, neque in aequalibus rectis lineis constitui posse aequales & dissimiles circulorum portiones; nempe altera portione alteri aptata; vt superius dictum est. In eadem igitur recta linea vel in aequalibus rectis lineis aequales circulorũ portiones similes sunt. quod demonstrare oportebat.

PROBLEMA III. PROPOSITIO XXV.

Circuli portione data describere circulum, cuius ea portio est.



Sit data circuli portio ABC. Itaque oportet portionis ABC describere circulũ, cuius est portio. Secetur AC bifariam in D; et à puncto D ipsi AC ad rectos angulos ducatur DB; et AB iungatur. vel igitur angulus ABD maior est angulo BAD, vel minor, vel ipsi æqualis. Sit primum maior et ad rectam lineam BA, atque ad datum in ea punctum A constituatur angulus BAE æqualis angulo ABD; et DB ad E producatur, iungatur q; EC. Quoniam igitur angulus ABE est æqualis angulo BAE, erit et BE recta linea ipsi EA æqualis. et quoniam AD est æqualis DC, communis autẽ DE, duæ AD DE duabus CD DE æquales sunt, altera alteri; et angulus ADE æqualis angulo CDE, rectus. n. vterque est. ergo et basis AE basi EC est æqualis. Sed ostensa est AE æqualis EB. quare et BE ipsi EC est æqualis, ac propterea tres rectæ lineæ AE EB EC inter se æquales sunt. centro igitur E, interuallo autem vna ipsarum AE EB EC circulus descriptus etiam per reliqua transibit puncta, et circulus descriptus erit. Quare circuli portione data descriptus est circulus, cuius ea portio est. Sed et illud constat, portionem ABC semicirculo minorem esse; propterea quòd centrum ipsius extra cadit. Similiter et si angulus ABD sit æqualis angulo BAD, facta AD æquali vtrique ipsarum BD DC, erunt tres rectæ lineæ AD DB DC inter se æquales, atque erit D circuli descripti centrum, et portio ABC semicirculus. Si vero angulus ABD minor sit angulo BAD, constituetur ad rectam lineam BA, & ad punctum in ea datum A, angulo ABD æqualis angulus intra portionem ABC. erit centrum in ipsa DB, atque erit ABC portio semicirculo maior. Circuli igitur portione data descriptus est circulus, cuius portio est. quod facere oportebat.

23. primi.

6. primi.

THEOREMA XXIII. PROPOSITIO XXVI.

In æqualibus circulis æquales anguli æqualibus insistunt circũferentijs, siue ad centra, siue ad circumferentias insistant.



Sint æquales circuli ABC DEF, & in ipsis æquales anguli ad centra quidem BGC EHF, ad circũferentias verò BAC EDF. Dico BKC circumferentiam circumferentiæ ELF æqualem esse. Iungantur enim BC EF. Et quoniã æquales sunt ABC DEF circuli, erũt et quæ ex cẽtris æquales. duæ igitur

BG GC duabus EH,HF ęquales ſunt:& angulus ad G æqualis angulo ad H . Ergo et baſis BC baſi EF eſt ęqualis.Rurſus quoniã æqualis eſt angulus ad A angulo ad D, portio BAC ſimilis erit portioni EDF.et ſunt in æqualibus rectis lineis BC E F. quę autem in æqualibus rectis lineis ſimiles ſunt circulorum portiones inter ſe æquales ſunt.portio igitur BAC portioni EDF eſt æqualis.Sed et totus ABC circulus ęqualis eſt toti DEF.ergo et reliqua circumferentia BKC reliquę ELF æqualis erit.In æqualibus igitur circulis æquales anguli æqualibus inſiſtunt circũferentiis ſiue ad centra ſiue ad circumferentias inſiſtãt.quod oportebat demonſtrare.

4.primi. Diffi.11. 24.huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Similiter demonſtrabitur in eiſdem circulis, & propoſitio magis vniuerſalis erit hoc modo.

In eiſdem vel æqualibus circulis æquales anguli æqualibus inſiſtunt circumferentiis,ſiue ad centra,ſiue ad circumferentias inſiſtant.

THEOREMA XXIIII. PROPOSITIO. XXVII.

In æqualibus circulis anguli, qui ęqualibus inſiſtunt circumferentijs inter ſe æquales ſunt; ſiue ad centra, ſiue ad circumferentias inſiſtant.



In æqualibus enim circulis ABC DEF, ęqualibus circumferentiis BC EF inſiſtant anguli ad centra quidem BGC EHF, ad circumferentias vero BAC EDF.Dico angulum BGC angulo EHF, et angulum BAC angulo EDF æqualem eſſe, Si quidem igitur angulus BGC æqualis ſit angulo EHF,manifeſtum eſt angulum quoque BAC angulo EDF eſſe ęqualem.Sin minus,vnus ipſorum eſt maior.ſit maior BGC,et conſtituatur ad rectam lineam BG, et ad punctum in ipſa G angulo EHF æqualis angulus BGK. æquales autem anguli æqualibus inſiſtunt circumferentiis, quando ad centra fuerint.Ergo circumferentia BK æqualis eſt circumferentię EF.Sed circumferentia EF ęqualis eſt ipſi BC.ergo et BK ipſi BC eſt ęqualis,minor maiori, quod fieri non pot. Non igitur inæqualis eſt angulus BGC angulo EHF. ergo eſt æqualis. atque eſt anguli quidem BGC dimidius angulus qui ad A; anguli vero EHF dimidius qui ad D. angulus igitur qui ad A angulo qui ad D eſt æqualis.In ęqualibus igitur circulis anguli, qui ęqualibus inſiſtunt circumferentiis inter ſe æquales ſunt ſiue ad centra,ſiue ad circumferentias inſiſtant.quod oportebat demonſtrare.

23.primi. Ex antecedente.

F. C. COMMENTARIVS.

Eadem demonſtratio erit, ſi anguli æqualibus circumferentijs eiuſdem circuli inſiſtant, vt propoſitio magis vniuerſalis fiat,hoc pacto.

In eiſdem vel ęqualibus circulis anguli, qui æqualibus inſiſtunt circumferentiis inter ſe æquales ſunt,ſiue ad centra,ſiue ad circumferentias inſiſtant.

THEOREMA XXV. PROPOSITIO XXVIII.

In ęqualibus circulis ęquales rectę lineę circumferentias ęquales auferunt, maiorem quidem maiori, minorem vero minori.



Sint æquales circuli ABC DEF; et in ipſis æquales rectę lineę BC EF, quæ circumferentias quidem BAC EDF maiores auferant, circumferentias vero BGC EHF minores. Dico circumferentiam BAC maiorem maiori circumferentiæ EDF, et minorem circumferentiam BGC minori EHF æqualem eſſe. Sumãtur enim centra circulorum K L, iunganturq́; BK KC EL LF. Et quoniam circuli æquales ſunt, erunt et quæ ex centris æquales. duæ igitur BK KC ſunt æquales duabus EL LF: et baſis BC æqualis eſt baſi EF. Ergo angulus BKC angulo ELF eſt æqualis: æquales autem anguli æqualibus inſiſtunt circumferentiis, quando ad centra fuerint. quare cirumferentia BGC æqualis eſt circumferentiæ EHF. Sed et totus ABC circulus toti DEF eſt æqualis. reliqua igitur circumferentia BAC reliqua EDF æqualis erit. Ergo in æqualibus circulis æquales rectæ lineæ circumferentias æquales auferunt, maiorem quidem maiori, minorem vero minori. quod demonſtrare oportebat.

1.huius. Diffi.1. 8.primi. 16.huius.

THEOREMA XXVI. PROPOSITIO XXIX.

In æqualibus circulis, æquales circumferentias æquales rectæ lineæ ſubtendunt.



Sint æquales circuli ABC DEF: et in ipſis æquales aſſumantur circũferentiæ BGC EHF: et BC EF iungantur. Dico rectam lineam BC rectæ EF æqualem eſſe. Sumantur enim centra circulorum K L, et iungantur BK KC EL LF. quoniam igitur circumferentia BGC eſt æqualis circumferentiæ EHF, erit et angulus BKC angulo ELF æqualis. Et quoniam circuli ABC DEF ſunt æquales, et quæ ex centris æquales erunt. duę igitur BK KC ſunt æquales duabus EL LF; et æquales angulos continent. quare baſis BC baſi EF eſt æqualis. In æqualibus igitur circulis æquales circumferentias æquales rectæ lineę ſubtendunt. quod oportebat demonſtrare.

3.huius. 27.huius. Diffi.1. 4.primi.

F. C. COMMENTARIVS.

Non aliter etiam in duabus antecedentibus cum demonſtrationes eędem ſint, propoſitiones magis vniuerſales fieri poterunt, in hunc modum.

In eiſdem vel æqualibus circulis æquales rectæ lineæ circumferentias æquales auferunt, maiorem quidem maiori, minorem vero minori.

In eiſdem vel æqualibus circulis æquales circumferentias æquales rectę lineę ſubtendunt.

Sed & harum quoddammodo conuerſas, atque alias his non diſſimiles demonſtrare hoc loco non inutile arbitrati ſumus.

PROPOSITIO

Si æquales rectæ lineæ æquales, et ſimiles circumferentias auferant, circuli æquales erunt, quorum illæ ſunt circumferentiæ.

Si enim

Si enim fieri potest, sint circuli inæquales, & in maiori circulo AEC, circa idem centrum G aequalis minori describatur DEF: & iungatur AG GC DG GF, ita vt punctum F cadat in rectã linea GC: & AG secet circulum DEF in H. Quoniam igitur rectae lineae AC DF aequales sunt, erit angulus AGC minor angulo DGF; quod deinceps demonstrabitur. quare circumferentia HF minor erit circumferentia DF. Sed circumferentia HF similis est circumferentiae AC, ex 12 diffinitione huius. in ipsis enim idem angulus AGC consistit. ergo circumferentia DF circumferentiae AC non est similis. atqui similis ponebatur. quod est absurdum. non igitur circuli inaequales sunt. ergo aequales esse necessarium est. At vero angulum AGC minorem esse angulo DGF, ita demonstrabimus.



Intelligatur triangulum AGC seorsum, & trianguli DGF punctum D in A statuatur; & punctum F in C. sunt enim AC DF inter se aequales. cadet triangulum DGF intra triangulum AGC. quare ex 21 primi libri angulus AGC minor est angulo DGF. quod demonstrare oportebat.



PROPOSITIO. II.

In circulis inęqualibus ęquales rectę lineę dissimiles circumferentias auferunt.

Hoc autem ex ijs, quae nos proxime demonstrauimus perspicue apparet. aequales enim rectae lineae AC DF dissimiles auferunt circumferentias.

PROPOSITIO. III.

In circulis inæqualibus similes circumferentias inæquales rectæ lineæ subtẽdũt.

Et hoc similiter apparet ex ante demonstratis. repetatur enim eadem figura, & iungatur HF. Itaque quoniam triangulum DGF duo latera DG GF aequalia habet duobus lateribus HG GF trianguli HGF, & angulum DGF maiorem angulo HGF, erit basis DF basi HF maior. Sed recta linea AC est aequalis ipsi DF. ergo AC HF inęquales sunt, & similes circumferentias subtendũt. quod oportebat demonstrare.

PROPOSITIO IIII.

Similes et inęquales circumferentias inæquales rectę lineę subtendunt.

Si enim rectae lineae aequales sint, & circuli item aequales, erunt circumferentiae, quas subtendunt, & aequales & similes. Si vero circuli sint inęquales, circumferentiae dissimiles erunt. quod non ponitur. Similes igitur & inęquales circumferentias, inęquales rectae lineae subtendunt. quod demonstrare oportebat.

PROBLEMA XIIII. PROPOSITIO. XV.

Datam circumferentiam bifariam secare.

Sit data circumferentia ADB. oportet ADB circumferentiam bifariam secare. Iungatur AB, & in C bifariam secetur: à puncto autem C ipsi AB ad rectos angulos ducatur CD, & iungantur AD DB. Quoniam igitur AC est æqualis CB, communis autem CD, duæ AC CD duabus



10. primi.

BC,

BC CD æquales sunt: et angulus ACD æqualis angulo
4.primi. BCD, rectus enim vterque est: ergo basis AD basi DB est
28.huius. æqualis. æquales autem rectæ lineæ circumferentias æquales auferunt, maiorem quidem maiori, minorem vero minori. et est vtraque ipsarum AD DB circumferentiarum semicirculo minor. quare circumferentia AD circumferentiæ DB æqualis erit. data igitur circumferentia bifariam secta est. quod facere oportebat.



THEOREMA XXVII. PROPOSITIO XXXI.

In circulo angulus, qui in semicirculo rectus est, qui vero in maiori portione minor est recto, & qui in minori maior recto; & insuper maioris quidem portionis angulus recto maior est, minoris vero portionis angulus recto minor.



Sit circulus A B C D cuius diameter B C, centrum autem E; et iungantur BA AC AD DC. Dico angulum quidem, qui est in semicirculo BAC rectum esse; qui vero in portione ABC maiore semicirculo, videlicet angulum ABC minorem esse recto, et qui in portione ADC minore semicirculo, hoc est angulū ADC recto maiorem. iungatur AE, et BA ad F producatur. Itaque quoniam BE est æqualis EA, erit et angulus EAB, angulo EBA æqualis. Rursus quoniam AE
5.primi. est æqualis EC, et angulus ACE angulo CAE æqualis erit. totus igitur angulus BAC est æqualis duobus ABC ACB angulis. est autem et
32 primi. angulus FAC extra triangulum ABC, duobus ABC ACB æqualis. angulus igitur
13.primi. BAC est æqualis angulo FAC. ac propterea vterque ipsorum rectus. Quare in semi
17.primi. circulo BAC angulus BAC rectus est. et quoniam trianguli ABC duo anguli ABC BAC duobus rectis sunt minores, rectus autem BAC, erit ABC angulus recto minor, atque est in portione ABC maiore semicirculo. Quòd cum in circulo quadri-
22.huius. laterum sit ABCD, quadrilaterorum vero, qui in circulis describuntur, anguli oppositi duobus rectis sint æquales: erunt ABC ADC anguli æquales duobus rectis. et angulus ABC minor est recto. reliquus igitur ADC recto maior erit, atque est in portione ADC minore semicirculo. Dico præterea maioris portionis angulum, qui continetur ABC circumferentia et recta linea AC recto maiorem esse; angulū vero minoris portionis contentum circumferentia ADC, et recta linea AC recto minorem. quod quidem perspicue apparet. Quoniam enim angulus, qui rectis lineis BA AC continetur rectus est, erit et contentus ABC circumferentia, et recta linea AC recto maior. Rursus quoniam angulus contentus rectis lineis CA AF rectus est, erit qui continetur recta linea CA, et ADC circumferentia minor recto. In circulo igitur angulus qui in semicirculo rectus est, qui vero in maiori portione minor est recto, et qui in minori maior recto. et insuper maioris quidem portionis angulus recto maior est: minoris vero recto minor. quod demonstrare oportebat.

ALITER demōstrabitur angulū BAC rectū esse. Quoniā enim angulus AEC duplus est anguli BAE, etenim duobus interioribus, et oppositis est æqualis: est autem et AEB duplus ipsius EAC: anguli AEB AEC anguli BAC dupli erunt. Sed et AEB AEC anguli duobus rectis sunt æquales. ergo angulus BAC rectus est. quod demonstrare oportebat.

COROLLARIVM.

Ex hoc manifestum est, si triāguli vnus angulus sit æqualis duo-

bus

bus, eum rectum esse; propterea quòd & qui deinceps est, ijsdem est æqualis. quando autem anguli deinceps sunt æquales, necessario recti sunt.

SCHOLIVM.

Si semicirculi omnes ob similitudinem æquales angulos suscipiunt, nempe rectos, maiores autem portiones suscipiunt rectis minores; perspicuum est cum similes sint æquales suscipere angulos: quo enim maiores sunt semicirculis, eo rectum angulũ diminuunt: similiter et minores semicirculis rectum proportione augent. Ergo similes portiones æquales suscipiant angulos necesse est. portionum autem anguli, quòd heterogenei sint, respectu rectilineorum, sunt enim mixti, cum illis non comparantur determinata magnitudine, nisi maioritate tantum, vt sic dicam, & minoritate. Quamobrem contingit maiore portione ad minorem procedente per medium circulum, angulum ipsius maiorem simpliciter recto ad minorem procedere, & non per rectum. rectus enim magnitudo determinata est. Videbitur autem hoc admirabile esse, nam quæ in contraria transmutantur, per media transire consueuerunt. Sed et in alijs inuenire licet hoc modo oppositæ absque medio. etenim quæ circulum comprehendit linea, cum conuexa sit, et caua, recta non est.

THEOREMA XXVIII. PROPOSITIO XXXII.

Si circulum contingat quædam recta linea, à contactu autem in circulum ducatur recta linea ipsum secans; anguli quos ad contingentem facit, æquales erunt ijs, qui in alternis circuli portionibus consistunt.



Circulum enim ABCD contingat quædam recta linea EF in B, et à puncto B ad circulum ABCD ducatur recta linea BD ipsum vtcunque secans. Dico angulos, quos BD, cum EF contingente facit, æquales esse iis, qui in alternis circuli portionibus consistunt, hoc est angulum FBD esse æqualem angulo, qui cõstituitur in DAB portione, videlicet ipsi DAB; angulum vero EBD æqualem angulo DCB, qui in portione DCB constituitur. Ducatur enim à puncto B ipsi EF ad rectos angulos BA: et in circumferentia BD sumatur quod vis punctum C, iungantur q; AD DC CB. Quoniam igitur circulum ABCD contingit quædam recta linea EF in puncto B: et à contactu B ad rectos angulos contingenti ducta est BA; erit in ipsa BA centrum ABCD circuli, quare BA eiusdẽ circuli diameter est, et angulus ADB in semicirculo est rectus. reliqui igitur anguli BAD ABD vni recto æquales sunt. Sed et ABF est rectus. ergo angulus ABF æqualis est angulis BAD ABD. communis auferatur ABD. reliquus igitur DBF ei, qui in alterna circuli portione consistit, videlicet angulo BAD est æqualis. Et quoniam in circulo quadrilaterum est ABCD, et anguli eius oppositi æquales

11. primi.

19. huius.

Ex antecedente.

32. primi.

32.huius. ti æquales sunt duobus rectis; erunt DBF DBE anguli angulis BAD BCD æquales. quorum BAD ostensus est æqualis ipsi DBF. ergo reliquus DBE ei, qui in alterna circuli portione DCB constituitur, videlicet ipsi DCB æqualis erit. Si igitur circulum contingat quædam recta linea, à contactu vero in circulum ducatur recta linea ipsum secans; anguli, quos facit ad contingentem, æquales erunt iis, qui in alternis circuli portionibus consistunt. quod oportebat demonstrare.

PROBLEMA V. PROPOSITIO XXXIII.

In data recta linea describere portionem circuli, quæ suscipiat angulum dato angulo rectilineo æqualem.



Sit data recta linea AB, datus autem angulus rectilineus, qui ad C. itaque oportet in data recta linea AB describere portionē circuli, quæ suscipiat angulum æqualem angulo, qui est ad C. vel igitur angulus ad C acutus est, vel rectus, vel obtusus. Sit primum acutus, vt in prima figura, et ad rectam lineam AB, et ad punctum in ea datum A, constituatur angulus BAD angulo qui est ad C æqualis. acutus igitur angulus est BAD, et à puncto A ipsi AD ad rectos angulos ducatur AE; secetur autē AB bifariam in F; atque à puncto F ducatur FG ad rectos angulos ipsi AB; et GB iungatur. Quoniam igitur AF est æqualis FB, communis autem FG, duæ AF FG duabus BF FG æquales sunt: et angulus AFG æqualis angulo GFB. ergo basis AG basi GB est æqualis. Itaque centro G, interuallo autem AG circulus descriptus transibit etiam per B. describatur et sit ABE, iungaturq; EB. Quoniam igitur ab extremitate diametri AE, et à puncto A ipsi AE ad rectos angulos ducta est AD; ipsa AD circulum continget. et quoniam circulum ABE contingit quædam recta linea AD, et à contactu, qui est ad A in circulum ABE ducta est recta linea AB: erit angulus DAB æqualis angulo, qui in alterna circuli portione constituitur, videlicet ipsi AEB. Sed angulus DAB angulo, qui ad C est æqualis. ergo et angulus ad C angulo AEB æqualis erit. In data igitur recta linea AB portio circuli descripta est AEB, suscipiens angulum AEB dato angulo, qui ad C æqualem. Sit deinde angulus, qui ad C rectus. et oporteat rursus in recta linea AB describere circuli portionem, quæ suscipiat angulum æqualem recto angulo, qui est ad C. constituatur enim rursus angulo recto, qui ad C æqualis angulus BAD, vt in secūda figura, secenturq; AB bifariā in F, et centro F, interuallo autem alterutra ipsarum AF FB circulus describatur AEB. ergo AD recta linea circulum ABE contingit, propterea quòd rectus est qui ad A angulus, et angulus BAD æqualis angulo, qui est in portione AEB: rectus enim et ipse est, in semicirculo consistēs. sed BAD æqualis est ei qui ad C. Ergo et qui in portione AEB ei, qui ad C est æqualis. descripta igitur est rursus in AB recta linea, portio circuli AEB, suscipiens angulum angulo recto, qui ad C æqualem. Denique sit angulus ad C obtusus, et ad rectam lineam AB, et ad punctum A constituatur ipsi æqualis angulus BAD, vt hēt in tertia figura, et ipsi AD rectæ lineae ad rectos angulos ducatur AE: secenturq; rursus AB bifariam in F. ipsi vero AB ducatur ad rectos angulos FG, et GB iungatur. Et quoniam AF est æqualis FB, communis autem FG. duæ AF FG duabus BF FG æquales sunt, et angulus AFG angulo BFG æqua-

lis,

23.primi, 11.primi. 10.primi. — 4.primi. — Corol.16.huius. — Ex antecedente. — 23.primi. — Corol.16.huius.

sis.basis igitur AG est æqualis basi GB.Quare centro G, interuallo autem AG circulus descriptus etiam per B transibit.transeat vt AEB. Et quoniam diametro AE ab extremitate ad rectos angulos ducta est AD,ipsa AD circulum AEB continget: et à contactu,qui ad A ducta est AB. quare angulus BAD ei, qui in alterna circuli portione AHB cõstituitur est æqualis.Sed BAD angulus æqualis est angulo, qui ad C.angulus igitur,qui in portione AHB angulo,qui ad C æqualis erit.Ergo in data recta linea AB descripta est AHB circuli portio,susciplens angulum æqualẽ ei, qui est ad C. quod facere oportebat. 4.primi. Corol.16.huius.

PROBLEMA VI. PROPOSITIO XXXIIII.

A dato circulo portionem abscindere, quæ suscipiat angulum dato angulo rectilineo æqualem.

Sit datus circulus ABC: datus autem angulus rectilineus.qui ad D.oportet à circulo ABC portionem abscindere, quę suscipiat angulum angulo qui ad D æqualem. Ducatur recta linea EF circulum ABC in puncto B contingens: et ad rectam lineam BF,et ad punctum in ea B cõstituatur angulus FBC angulo qui est ad D æqualis.Quoniam igitur circulum ABC contingit quædam recta linea EF in B puncto, et à cõtactu B ducta est BC, erit angulus FBC æqualis ei,qui in alterna circuli portione cõstituitur.Sed FBC angulus angulo qui ad D est æqualis.ergo et angulus,qui in portione BAC angulo qui ad D æqualis erit.A dato igitur circulo ABC abscissa est portio quædam BAC suscipiens angulum dato angulo rectilineo,qui est ad D,æqualem.quod facere oportebat.



17.huius. 23.primi.

THEOREMA XXIX. PROPOSITIO XXXV.

Si in circulo duæ rectæ lineæ se se mutuo secent rectangulum portionibus vnius contentum æquale est ei, quod alterius portionibus continetur.

In circulo enim ABCD duæ rectę lineæ AC BD se se mutuo in puncto E secent.Dico rectangulum contentum AE EC æquale esse ei, quod DE EB continetur. Si igitur AC BD per centrum transeant, ita vt E sit cẽtrum ABCD circuli; manifestum est æqualibus existentibus AE EC DE EB,et rectangulum contentum AE EC æquale esse ei,quod DE EB continetur.Itaque AC DB non transeant per centrum;et sumatur centrum circuli ABCD quod sit F:et ab F ad rectas lineas AC DB perpendiculares ducantur FG FH:iunganturq; FB FC FE.Quoniam igitur recta quędam linea GF per centrum ducta rectam lineam quandam AC non ductam per centrum ad rectos angulos secat,et bifariam ipsam secabit. quare AG ipsi GC est æqualis.Et quoniam recta linea AC secta est in partes æquales in puncto G, et in partes inæquales in E,erit rectangulum AE EC contentum vnà cum ipsius EG quadrato,æquale quadrato ex GC.commune addatur ex GF quadratum.ergo rectãgulum AEC vnà cum iis,quæ ex EG GF quadratis æquale est quadratis ex CG GF.Sed quadratis quidem ex EG



3.huius. 5.secundi.

47. primi. GF æquale est quadratũ ex FE: quadratis vero ex CG GF æquale quod ex FC quadratum. rectangulum igitur AEC vnà cũ quadrato ex FE æquale est quadrato ex FC. est autem CF æqualis F B. Ergo rectangulum AEC vnà cum quadrato ex EF æquale est ei, quod ex FB quadrato. Eadẽ ratione et rectangulum DEB vnà cũ quadrato ex FE æquale est quadrato ex FB. ostensum autẽ est et rectãgulum AEC vnà cum quadrato ex FE æquale ei, quod ex FB quadrato, ergo rectãgulum AEC vnà cum quadrato ex FE æquale est rectangulo DEB vnà cum quadrato ex FE. commune auferatur quod ex FE quadratum. reliquum igitur rectãgulum AEC reliquo DEB rectãgulo æquale erit. Quare si in circulo duę rectę lineę se se mutuo secẽt, rectangulũ portionibus vnius cõtentũ æquale est ei, quod alterius portionibus continetur, id quod demõstrare oportebat.



THEOREMA XXX. PROPOSITIO. XXXVI.

Si extra circulum aliquod punctum sumatur, et ab eo in circulum cadant duæ rectę lineæ, quarum altera quidem circulum secet, altera vero contingat; rectangulum, quod tota secante, et exterius assumpta inter punctum, et curuam circumferentiam continetur, æquale erit ei, quod à contingente fit quadrato.

Extra circulum enim ABC sumatur aliquod punctum D, et ab eo ad dictum circulum cadãt duæ rectę lineæ DCA DB: et DCA quidem circulum ABC secet; DB vero contingat. Dico rectãgulum ADC quadrato, quod fit ex DB æquale esse. Vel igitur DCA per centrum transit, vel non. transeat primum per centrum circuli ABC, quod sit F: et

18. huius. FB iungatur. erit angulus FBD rectus. Itaque quoniam recta linea AC bifariam secta est in F, et ipsi adiicitur CD; rectangulũ ADC vnà cum quadrato, quod

6. secundi. ex FC æquale erit ei, quod fit ex FD quadrato. æqualis autem est CF ipsi FB. ergo rectangulũ ADC vnà cum quadrato quod ex FB æquale est quadrato ex FD. Sed quadrarum ex FD est æquale quadratis ipsarum FB BD; rectus enim angulus est FBD. rectãgulum igitur ADC vnà cum quadrato ex FB æquale est ipsarum FB BD quadratis. commune auferatur quadratũ quod ex FB. ergo reliquum ADC rectangulum quadrato quod fit à contingente DB æquale erit. Sed DCA non transeat per centrum ABC circuli: sumaturq; centrũ E, et ab ipso E ad AC perpendicularis agatur EF: et iungantur EB EC ED. rectus igitur est EFD angulus. Et quoniam recta linea quædam EF per centrum ducta, rectam lineam quandam AC non ductam per

3. huius. centrum ad rectos angulos secat, et bifariam ipsam secabit. quare AF ipsi FC est æqualis. Rursus quoniam recta linea AC bifariam secta est in F, atque ipsi adiicitur

6. secundi. CD, erit rectangulum ADC vnà cum quadrato ex FC æquale quadrato, quod ex FD. commune apponatur quod ex FE quadratum. rectangulum igitur ADC vnà cum



cum quadratis ex CF FE est æquale quadratis ex DF FE. sed quadratis quidem ex DF FE æquale est, quod ex DE quadratũ; etenim rectus est angulus EFD: quadratis vero ex CF FE æquale est quadratum ex CE. ergo rectangulum ADC vnà cũ quadrato, quod ex CE est æquale quadrato ex ED. æqualis autem est CE ipsi EB. rectangulũm igitur ADC vnà cum quadrato ex EB æquale est ei, quod ex ED quadrato. sed quadrato ex ED æqualia sunt quadrata ex EB BD; si quidem rectus est angulus EBD. ergo rectangulum ADC vnà cũ quadrato ex EB æquale est eis, quæ ex EB BD quadratis. commune auferatur quadratum ex EB. reliquum igitur ADC rectangulum quadrato, quod fit ex DB æquale erit. Si igitur extra circulum aliquod punctum sumatur, et quę deinceps sunt. quod oportebat demonstrare.

PORISMA. COMMENTARIVS.

Ex proxime demonstratis duo corollaria sequuntur, vt ĕt adnotauit Campanus. nempe hęc.

Si à pũcto extra circulum sumpto ducãtur in circulum quotcumque rectę lineę, ipsum secantes; rectangula quæ totis, et earum portionibus extrinsecis cõtinentur, inter se æqualia sunt; quod singula quadrato lineæ contingentis sint æqualia.

A puncto extra circulum sumpto ductę duæ rectæ lineæ circulum contingentes inter se æquales sunt. etenim, vtriusque ipsarum quadrata sunt æqualia rectangulo, quod recta linea ab eodem puncto ducta, quę circulum secet, et eius portione extrinseca continetur. ergo et ipsæ lineę æquales sint necesse est. neque vero plures quàm duæ esse possunt, quod ex demonstratis in octauo huius perspicue apparet.

THEOREMA XXXI. PROPOSITIO. XXXVII.

Si extra circulum sumatur aliquod punctum, atque ab eo in circulum cadant duę rectę lineæ, quarum altera quidem circulum secet, altera vero incidat; sit autem quod tota secante, et exterius assumpta inter punctum, et curuam circumferentiam continetur, æquale ei, quod ab incidente fit quadrato: incidens linea circulum continget.



Extra circulum enim ABC sumatur aliquod punctum D, atque ab ipso in circulum cadant duæ rectæ lineæ DCA DB; et DCA quidem circulum secet, DB vero incidat, sitq; rectangulum ADC æquale quadrato, quod fit ex DB. Dico ipsam DB circulum ABC contingere. Ducatur enim recta linea DE contingens circulum ABC, et sumatur circuli ABC centrum quod sit F, jungantur q; FE FB FD. ergo angulus FED rectus est. Et quoniam DE circulum ABC contingit, secat autem DCA, rectangulum ADC æquale erit quadrato quod ex DE. sed rectangulum ADC ponitur æquale quadrato quod ex DB. quadratum igitur quod ex DE quadrato ex DB æquale erit, ac propterea linea DE ipsi DB æqualis. est autem et EE æqualis FB. duę igitur DE EF duabus DB BF æquales sunt; et basis ipsarum communis ED. angulus igitur DEF est æqualis angulo DBF. rectus autem DEF. ergo et DBF est rectus; atque est FB producta diameter. quę vero ab extremitate diametri circuli ad rectos angulos ducitur, circulum contingit. ergo DB circulum ABC contingat necesse est. Similiter demonstrabitur et si centrum sit in ipsa AC. Si igitur extra circulum sumatur aliquod punctum, et reliqua, quod demonstrare oportebat.

18. huius.

8. primi.

EVCLIDIS ELEMENTORVM

LIBER QVARTVS

CVM SCHOLIIS ANTIQVIS, ET COMMENTARIIS

Federici Commandini Vrbinatis.

DIFFINITIONES.

I.

FIGVRA rectilinea in figura rectilinea describi dicitur, quãdo vnusquisque figuræ descriptæ angulus vnũquodque latus eius, in qua describitur, contingit.



II.

Figura similiter circa figuram describi dicitur quando vnumquodque latus descriptę vnumquemque angulum eius, circa quam describitur, contingit.

III.

Figura rectilinea in circulo describi dicitur, quando vnusquisque descriptæ figuræ angulus circuli circumferentiam contingit.



IIII.

Figura rectilinea circa circulum describi dicitur, quando vnumquodque latus descriptę circuli circumferentiã cõtingit.



V.

Circulus similiter in figura rectilinea describi dicitur, quando circuli circumferentia vnumquodque latus eius, in qua describitur, contingit.

Circulus

VI.

Circulus circa figuram rectilineam describi dicitur, quando circuli circumferentia vnumquemque angulum eius, circa quam describitur, contingit.



VII.

Recta linea in circulo aptari dicitur, quando eius extrema ad circuli circumferentiam se applicant.



PROBLEMA I.
PROPOSITIO I.

In dato circulo datæ rectę lineæ, quæ diametro eius maior nō sit, æqualem rectam lineam aptare.



Sit datus circulus ABC, data autem recta linea nōn maior circuli diametro D. oportet in circulo ABC rectę lineę D æqualem rectam lineam aptare. Ducatur circuli ABC diameter BC. Si quidem igitur BC sit æqualis ipsi D, factum iam erit, quod proponebatur. etenim in circulo ABC aptata est AC rectæ lineæ D æqualis. Sin minus, maior est BC quàm D, ponaturq; ipsi D æqualis CE: et centro quidem C interuallo autem CE circulus describatur AEF; et CA iungatur. Itaque quoniam punctum C centrum est AEF circuli; erit CA ipsi CE æqualis. Sed D est æqualis CE. ergo et D ipsi AC æqualis erit. In dato igitur circulo ABC datæ rectę lineæ D, nōn maiori circuli diametro, æqualis aptata est AC. quod facere oportebat.

SCHOLIVM.

Cum varia sit circumscriptionum, et inscriptionum contemplatio, Euclides non multum admodum progressus est. nam perueniens ad hexagonum, & postremo quindecagoni angulos tradens, qui ad astrorum scientiam magis pertinent, finem dicendi fecit. Primum autem theorema lemma quoddam est, pentagoni constitutioni inseruiens: & quæcumque in hoc ordinantur, in illa præordinari oportebat. Sed quoniam simpliciorem habet constructionem, quàm trianguli constitutio, iure merito ante alia theoremata positum est. Sciendum autem si quidem data recta linea diametro sit æqualis, vno tantum modo, vel etiam absque vlla experientia fieri problema. Si vero minor, duobus modis. ab eodem namque puncto vt C ad AF ductæ rectæ lineæ inter se æquales sunt.

Problema

Problema hoc est ex eorum numero, quae determinata appellantur. posset enim & hoc modo explicari.

In dato circulo datæ rectę lineæ ęqualem rectam lineam aptare. oportet autem datam rectam lineam diametro circuli non esse maiorem.

Licet etiam problema aliud absoluere huiusmodi.

In dato circulo rectam lineam rectę lineæ datę, quę diametro maior non sit, ęqualem, et alteri datæ parallelam aptare.



Sit datus circulus ABC, cuius centrum D, & recta linea non maior diametro circuli EF: altera vero recta linea sit, in qua G. Itaque oportet in circulo ABC aptare rectam lineam aequalem ipsi EF, & ipsi G parallelam. Ducatur 3 1. primi. *per D recta linea AD C parallela ipsi G, quae circuli diameter erit. & si quidem AC sit ęqualis EF, factū iā erit quod proponebatur: si vero AC sit maior, quam EF, secetur AF bifariam in H: & ipsi HE ęqualis [illegible] indatur à semidiametro circuli DA, quae sit DK. ipsi vero HF aequali. fiat DL; perq; puncta KL ipsi AC ad rectos angulos* 11. primi. *ducantur MN OP; & MO iungatur. Quoniam igitur recta linea quędam AC per centrum ducta rectam lineam MN non ductam per centrum ad rectos angulos secat; & bifariam ipsam secabit. quare MK est aequalis KN. Et ob eandem caussam OL est aequalis LP. sunt autem MN OP inter se aequales, cum aequaliter à centro distēt: & sunt parallelae, anguli enim MKL OLK recti sunt. quare et earum dimidiae KM LO & aequales erunt, & parallelae. At quae aequales, & parallelas ad easdem partes coniungunt, & ipsae aequales, et parallelae sunt. ergo MO est* 30 primi. *aequalis KL, hoc est ipsi EF, & parallela ipsi G; sunt enim vtręque ipsi KL parallelae. Eadem ratione iuncta NP demonstrabitur aequalis eidē EF, & parallela ipsi G. In circulo igitur ABC aptata est MO vel NP aequalis EF, & ipsi G parallela. quod facere oportebat.*

Ex quibus constat si quidem AC sit aequalis rectæ lineæ datę, vno dumtaxat modo problema absolui; si vero sit maior, duobus modis, vt in antecedēti dictum est.

PROBLEMA II. PROPOSITIO. II.

In circulo dato, dato triangulo æquiangulum triangulum describere.

Sit datus circulus ABC, datum autem triangulū DEF. oportet in ABC circulo describere triangulū triangulo DEF ęquiangulum. Ducatur recta linea GAH contingens circulum ABC in puncto A: et ad rectam lineam AH, et ad punctum in ea A angulo DEF ęqualis angulus constituatur HAC, rursus ad rectam lineam AG, et ad punctum in ipsa A angulo DFE ęqualis cōstituatur angulus GAB; et BC iungatur.



17. tertii. 23. primi.

Quoniā igitur circulū ABC contingit quædā recta HAG, à contactu aūt in circulū ducta est AC: erit HAC angulus ęqualis ei, qui in alterna circuli portione cōsistit, videlicet ipsi ABC. Sed HAC angulus ęqualis est angulo DEF. ergo et angulus ABC

32 tertii

angulo

angulo DEF est æqualis. Eadem ratione et angulus ACB est æqualis angulo DFE. reliquus igitur B A C angulus reliquo E D F æqualis erit. Ergo triangulum A B C triangulo DEF est æquiangulum. et descriptum est in circulo ABC. In dato igitur circulo dato triangulo æquiangulũ triangulũ descriptũ est. quod facere oportebat.

PROBLEMA III. PROPOSITIO III.

Circa datum circulum triangulo dato æquiangulum triangulum describere.

Sit datus circulus A B C: datum autem triangulum DEF. oportet circa circulum ABC describere triãgulum triãgulo D E F æquiangulum. protrahatur ex vtraque parte EF ad puncta H G: et sumatur circuli ABC centrum K: et recta linea KB vt cumque ducatur: constituatur; ad rectam lineam K B, et ad punctum in ea K angulo quidem DEG æqualis angulus BKA; angulo aũt DFH æqualis angulus BKC. et per A B C puncta ducantur rectæ lineæ L A M M B N N C L circulum A B C, contingentes. Quoniam igitur circulũ A B C contingunt LM MN NL, in punctis A B C, à centro autem K ad A B C puncta ducuntur K A K B K C; erunt anguli ad puncta A B C recti. Et quoniam quadrilateri A M B K anguli quattuor quattuor rectis æquales sunt; etenim in duo triangula diuiditur; quorum anguli K A M K B M sunt recti; erunt reliqui A K B A M B duobus rectis æquales. Sunt autem et D E G D E F æquales duobus rectis. anguli igitur A K B A M B angulis D E G D E F æquales sunt; quorum A K B ipsi D E G est æqualis. ergo reliquus A M B reliquo D E F æqualis erit. Similiter demonstrabitur angulus L N B ipsi D F E æqualis. ergo et reliquus M L N est æqualis reliquo E D F. æquiangulum igitur est L M N triangulum triangulo D E F, et descriptum est circa circulum A B C. Quare circa datum circulum triangulo dato æquiangulum triangulum descriptum est. quod facere oportebat.



23. primi.

17. tertij.

18. tertij.

PROBLEMA IIII. PROPOSITIO IIII.

In dato triangulo circulum describere.

Sit datum triangulum ABC. oportet in triangulo ABC circulum describere. secentur anguli ABC BCA bifariam rectis lineis BD CD, quæ conueniant inter se in D puncto; et à puncto D ad rectas lineas AB BC CA perpendiculares ducantur DE DF DG. Et quoniam angulus A B D est æqualis angulo CBD: est autem et rectus BED recto BFD æqualis: erunt duo triangula EBD D B F, duos angulos duobus angulis æquales habentia, et vnum latus vni lateri æquale, et vtrique commune B D, quod scilicet vni æqualium angulorum subtẽditur. ergo et reliqua latera reliquis lateribus æqualia habebunt: atque erit DE æqualis D F. et eadem ratione D G æqualis D F. ergo et D E ipsi D G est æqualis. tres igitur rectæ lineæ DE DF DG inter se æquales sunt; quare centro D interuallo autem vna ipsarum DE DF DG circulus descriptus etiam per reliqua transibit puncta; et rectas lineas AB BC CA cõtinget; propterea quòd recti sunt ad EFG anguli. si enim ipsas secet, quæ ab extremitate diametri



9. primi.

12. primi.

26. primi.

16.tertij. metri circuli ad rectos angulos ducitur, intra circulũ cadet. quòd eſt abſurdũ. nõ igitur cẽtro D, interuallo aũt vna ipſarum DE DF DG circulus deſcriptus ſecabit rectas lineas AB BC CA. quare ipſas cõtinget; atque erit circulus deſcriptus in triãgulo ABC. In dato igitur triangulo ABC circulus EFG deſcriptus eſt. quod facere oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

Queſitum eſt à nonnullis, quomodo in triangulo quadratum deſcribi poſſit, quamquam fortaſſe improprie in eo dicatur deſcribi. Fuerunt qui in triangulo aequilatero tantum peoblema abſolnerunt. Nos autem vniuerſe in omnibus abſoluere aggrediemur, poſtea quàm nonnulla in quinto, ac ſexto libro demonſtrata fuerint.

THEOREMA V. PROPOSITIO V.

Circa datum triangulum circulum deſcribere.

Sit datũ triangulum ABC. oportet circa datum triangulũ ABC circulũ deſcribere. ſecentur AB AC bifariã



10.primi.

11.primi. in D E punctis: et à punctis D E ipſis AB AC ad rectos angulos ducantur DF EF; quæ quidem vel intra triangulum ABC conuenient, vel in recta linea BC, vel extra ipſam. Conueniant primum intra triangulum in puncto F: et BF FC FA iungantur. Quoniam igitur AD eſt æqualis DB, communis autem, et ad rectos angu-

4.primi. los DF; erit baſis AF baſi FB æqualis. Similiter oſtendetur et CF æqualis FA. ergo et BF eſt æqualis FC. tres igitur FA FB FC inter ſe æquales ſunt. quare centro F, interuallo autem vna ipſarum FA FB FC circulus deſcriptus etiam per reliqua puncta tranſibit: atque erit circulus deſcriptus circa triangulum ABC. et deſcribatur vt ABC. Sed DF EF conueniant in recta linea BC, in puncto F, vt habet in ſecunda figura, & AF iungatur. Similiter demonſtrabimus punctum F centrum eſſe circuli circa triangulum ABC deſcripti. Poſtremo DF EF conueniant extra triangulum ABC rurſus in F puncto, vt in tertia figura: et iungantur AF FB FC. Et quoniam rurſus AD eſt æqualis DB, communis autem, et ad rectos angulos DF; baſis AF baſi FB æqualis erit. Similiter demonſtrabimus et CF ipſi FA æqualem eſſe. quare et BF eſt æqualis FC. Rurſus igitur centro F, interuallo autem vna ipſarum FA FB FC circulus deſcriptus et per reliqua tranſibit puncta; atque erit circa triangulum ABC deſcriptus. et deſcribatur vt ABC. Circa datum igitur triangulum circulus deſcriptus eſt. quod facere oportebat.

Et manifeſtum eſt, quando centrum circuli intra triangulum cadit, angulum BAC exiſtentem in portione ſemicirculo maiore minorem eſſe recto. quando autem centrum circuli cadit in rectà linea BC, angulum BAC, quòd ſit in ſemicirculo, rectum eſſe. & quãdo extra BC, quòd ſit in portione minore ſemicirculo, recto eſſe maiorem. Quare et quando datus angulus minor ſit recto, DF EF intra triangulum conuenient: quãdo autem rectus in ipſa BC,

et

& quando maior recto, extra BC. quod oſtendere oportebat.

PROBLEMA VI. PROPOSITIO. VI.

In dato circulo quadratum deſcribere.

Sit datus circulus ABCD.oportet in ABCD circulo quadratum deſcribere.Ducantur circuli ABCD diametri ad rectos angulos inter ſe AC BD:et AB BC CD DA iungantur.Quoniam igitur BE eſt æqualis ED,etenim centrum eſt E,communis autem et ad rectos angulos EA; erit baſis BA æqualis baſi AD.Et eadem ratione vtraque ipſarum BC CD vtrique BA AD æqualis.æquilaterum igitur eſt ABCD quadrilaterum.Dico et rectangulum eſſe. Quoniam enim recta linea BD diameter eſt ABCD circuli, erit BAD ſemicirculus.quare angulus BAD rectus eſt. et eadem ratione vnuſquiſque ipſorum ABC BCD CDA eſt rectus. rectangulum igitur eſt ABCD quadrilaterum.oſtenſum autem eſt, et æquilaterum eſſe. ergo quadratum neceſſario erit,et deſcriptum eſt in circulo ABCD.In dato igitur ABCD circulo quadratum ABCD deſcriptum eſt.quod facere oportebat.



31.tertij.

PROBLEMA VII. PROPOSITIO VII.

Circa datum circulum quadratnm deſcribere.

Sit datus circulus ABCD.oportet circa ABCD circulũ quadratũ deſcribere.ducantur circuli ABCD duę diametri AC BD ad rectos inter ſe angulos, et per pũcta A BCD ducãtur circulũ ABCD cõtingentes FG GH HK KF. Quoniã igitur FG contingit circulũ ABCD,à centro aũt E ad cõtactũ qui eſt ad A ducitur EA;erũt anguli ad A recti.Eadem ratione et anguli ad puncta B C D recti ſunt. Et quoniam angulus AEB rectus eſt, eſt autem et rectus EBG; erit GH ipſi AC parallela. Eadẽ ratione et AC parallela eſt FK.Similiter demonſtrabimus et vtramque ipſarum GF HK ipſi BED parallelam eſſe.quare et GF eſt parallela HK. parallelogramma igitur ſunt GK GC AK FB BK, ac propterea GF quidem eſt æqualis HK, GH vero ipſi FK. Et quoniam AC æqualis eſt BD : Sed AC quidem vtrique ipſarum GH FK eſt æqualis; BD verò æqualis vtrique GF HK. et utraque GH FK vtrique GF HK æqualis erit. Aequilaterum igitur eſt FGHK quadrilaterum.Dico et rectangulum eſſe. Quoniam enim parallelogrammum eſt GBEA, atque eſt rectus AEB angulus,et ipſe AGB rectus erit.Similiter demonſtrabimus angulos etiã qui ad puncta HKF rectos eſſe.rectangulum igitur eſt quadrilaterum FGHK; demonſtratum autem eſt et æquilaterum.Ergo quadratum ſit neceſſe eſt.et deſcriptũ eſt circa circulũ ABCD.Circa datum igitur circulum quadratum deſcriptum eſt. quod facere oportebat.



17.tertij.

18.tertij.

28.primi.

34.primi.

PROBLEMA VIII. PROPOSITO VIII.

In dato quadrato circulum deſcribere.

Sit datum quadratum ABCD. oportet in quadrato ABCD circulũ deſcribere. Secetur vtraque ipſarũ AB AD bifariam in punctis F E. et per E quidem alterutri ipſarum AB CD parallela ducatur EH:per F vero ducatur FK parallela alterutri AD BC.parallelogrammum



10.primi.

31.primi.

igitur eſt vnũquodque ipſorum AK KB AH HD A
34. primi. G GC BG GD : et latera ipſorum quę ex oppoſito ſunt ęqualia. Et quoniam DA eſt æqualis AB:et ipſius quidẽ AD dimidia eſt AE;ipſius vero AB dimidia AF; erit AE ipſi AF ęqualis.quare et oppoſita latera ęqua lia ſunt.ergo FG eſt æqualis GE. Similiter demonſtrabimus et vtramque ipſarum GH HK vtrique FG GE æqualem eſſe. quattuor igitur GE GF GH GK inter ſe ſunt ęquales.Itaque centro quidem G,interuallo au tem vna ipſarum GE GF GH GK circulus deſcriptus etiam per reliqua tranſibit puncta;et rectas lineas AB BC CD DA continget, propterea quòd anguli ad E F H K recti ſunt.Si enim circulus ſecabit rectas lineas AB BC CD DA,quę ab extremitate diametri circuli ad rectos angulos duci
16. tertij. tur intra circulum cadet.quod eſt abſurdum.non igitur centro quidem G,interual lo autem vnà ipſarum GE GF GH GK circulus deſcriptus rectas lineas AB BC CD DA ſecabit.quare ipſas neceſſario continget: atque erit deſcriptus in quadrato ABCD.In dato igitur quadrato circulus deſcriptus eſt. quod facere oportebat.



PROBLEMA IX. PROPOSITIO IX.

Circa datum quadratum circulum deſcribere.

Sit datum quadratum ABCD. oportet circa ABCD quadratum circulum deſcribere. Iungãtur enim AC B D, quę ſe inuicem in puncto E ſecent.Et quoniam DA eſt æqualis AB,communis autem AC;duæ DA AC dua bus BA AC ęquales ſunt; et baſis DC æqualis baſi CB; erit angulus DAC angulo BAC æqualis.angulus igitur DAB bifariam ſectus eſt recta linea AC. Similiter demonſtrabimus vnumquemque angulorum ABC BCD CDA rectis lineis AC D B bifariam ſectum eſſe. Quoniam igitur angulus D A B angulo A B C eſt æqualis. atque eſt anguli quidem DAB dimidius angulus EAB, anguli vero ABC dimidius EBA; et EAB angulus angulo EBA æqualis erit.quare et latus EA lateri EB eſt ęquale. Similiter demonſtrabimus,et vtramque rectarum linearum EC ED vtrique EA EB æqualem eſſe. ergo quattuor rectæ lineæ EA EB EC ED inter ſe ſunt æquales.centro igitur E,interuallo autem vna ipſarum EA EB EC ED circulus deſcriptus etiam per reliqua puncta tranſibit.atque erit deſcriptus circa ABCD quadratum. deſcribatur vt AB CD.circa datum igitur quadratum circulus deſcriptus eſt. quod facere oportebat.



PROBLEMA X. PROPOSITIO X.

Aequicrure triangulum cõſtituere, habens vtrumque angulorum, qui ſunt ad baſim duplum reliqui.

Exponatur recta quędam linea AB, et ſecetur in
11. ſecundi. C puncto, ita vt rectangulum contentum AB BC æquale ſit ei, quod ex CA deſcribitur quadrato: et centro quidem A,interuallo autem AB circulus de
1. huius. ſcribatur BDE: apteturq; in BDE circulo recta linea BD æqualis ipſi AC,quæ non ſit maior diametro circuli BDE:et iunctis DA DC, circa ADC triã gulum circulus ACD deſcribatur. Itaque quoniam rectangulum ABC æquale eſt quadrato quod fit ex AC;æqualis autem eſt AC, ipſi BD, erit ABC rectangulum



quadrato

quadrato quod ex BD æquale. Et quoniam extra circulum ACD ſumptum eſt aliquod punctum B: et à puncto B in circulum ACD cadunt duę rectæ lineæ BCA BD, quarum altera quidem ſecat, altera vero incidit, atque eſt rectangulũ ABC æquale quadrato, quod ex BD; recta linea BD circulum ACD continget. Quoniam igitur BD contingit, et à contactu, qui ad D ducta eſt DC; erit BDC angulus æqualis ei, qui in alterna circuli portione conſtituitur, videlicet angulo DAC. Quòd cum angulus BDC æqualis ſit ipſi DAC, communis apponatur CDA. totus igitur BDA eſt æqualis duobus angulis CDA DAC. Sed ipſis CDA DAC exterior angulus BCD eſt ęqualis. ergo et BDA ęqualis eſt ipſi BCD. ſed BDA angulus eſt æqualis angulo CBD, quoniam et latus AD lateri AB eſt ęquale. ergo et DBA ipſi BCD æqualis erit. Tres igitur anguli BDA DBA BCD inter ſe æquales ſunt. Et quoniam angulus DBC æqualis eſt angulo BCD, et latus BD lateri DC eſt ęquale. Sed BD ponitur æqualis ipſi CA. ergo et AC eſt æqualis CD. quare et angulus CDA æqualis eſt angulo DAC. anguli igitur CDA DAC ipſius anguli DAC dupli ſunt. eſt autẽ et BCD angulus angulis CDA DAC æqualis. ergo et BCD duplus eſt ipſius DAC. Sed BCD eſt æqualis vtrique ipſorũ BDA DBA. quare et vterque BDA DBA ipſius DAB eſt duplus. Aequicrure igitur triãgulum conſtitutum eſt ADB, habens vtrumque eorum angulorum, qui ſunt ad baſim, duplum reliqui. quod facere oportebat.

Vlt. tertij.

32. tertij.

32. primi.

6. primi.

PROBLEMA XI. PROPOSITIO. XI.

In dato circulo pentagonum æquilaterum, & æquiangulum deſcribere.

Sit datus circulus ABCDE. oportet in ABCDE circulo pentagonũ æquilaterum, et ęquiãgulum deſcribere. Exponatur triangulum æquicrure FGH, habens vtrumque eorũ qui ſunt ad G H angulorum duplũ anguli qui eſt ad F: et deſcribatur in circulo ABCDE triangulo FGH æquiangulum triangulum ACD, ita vt angulo quidem, qui eſt ad F æqualis ſit angulus CAD: vtrique vero ipſorum, qui ad GH ſit æqualis vterque ACD CDA. et vterque igitur ACD CDA anguli CAD eſt duplus. Secetur vterque ipſorum ACD CDA bifariam rectis lineis CE DB: et AB BC CD DE EA iũgãtur. Quoniã igitur vterque ipſorũ ACD CDA duplus eſt ipſius CAD, et ſecti ſunt bifariã rectis lineis CE DB; quinque anguli DAC ACE ECD CDB BDA inter ſe ſunt æquales. æquales autẽ anguli in æqualibus circumferentiis inſiſtunt. quinque igitur circumferentię AB BC CD DE EA ęquales ſunt inter ſe. Sed ęquales circũferẽtias æquales rectę lineę ſubtendunt. ergo et quinque rectę lineę AB BC CD DE EA inter ſe æquales ſunt. æquilaterum igitur eſt AB CDE pentagonum. Dico et æquiangulum eſſe. Quoniam enim circumferentia AB æqualis eſt circumferentiæ DE, communis apponatur BCD. tota igitur ABCDE circumferentia toti circumferentię EDCB eſt æqualis, et in circumferentia quidẽ ABCD inſiſtit angulus AED, in circũferẽtia vero EDCB inſiſtit BAE. Ergo et BAE angulus eſt ęqualis angulo AED. Eadem ratione, et vnuſquiſque angulorum ABC BCD CDE vnicuique ipſorum BAE AED eſt æqualis. ęquiangulum igitur eſt ABCDE pentagonũ: oſtenſum autem eſt et ęquilaterũ eſſe. Quare in dato circulo pentagonum ęquilaterum, et æquiangulum deſcriptum eſt. quod facere oportebat.



Ex antecedente.

2. huius.

9. primi.

26. tertij.

29. tertij.

PROBELMA XII. PROPOSITIO. XII.

Circa datum circulum pentagonum æquilaterum, et æquiangulum deſcribere.



Sit datus circulus ABCDE. oportet circa circulum ABCDE pentagonum æquilaterum, et
Ex antece- dente. æquiangulum deſcribere. intelligantur pentagoni in circulo deſcripti angulorum puncta ABCDE, ita vt circũferentiæ AB BC CD DE
17. tertij. EA ſint æquales; et per puncta ABCDE ducantur circulum contingentes GH HK KL LM MG. et ſumpto circuli ABCDE centro F iungantur FB FK FC FL FD. quoniam igitur recta linea KL contingit circulum ABCDE in puncto
18. tertij. C, et à centro F ad contactum, qui eſt ad C ducta eſt FC: erit FC ad ipſam KL perpendicularis. rectus igitur eſt vterque angulorum qui ſunt ad C. Eadem ratione et anguli qui ad puncta B D recti ſunt. et quoniam rectus angnlus eſt FCK, quadratum quod fit ex FK æquale eſt quadratis quæ ex FC CK. Et ob eandem cauſſam quadratis ex FB, BK æquale eſt quod ex FK quadratũ. Quadrata igitur ex FC CK quadratis ex FB BK æqualia ſunt: quorum quod ex FC ei quod ex FB eſt æquale. Ergo reliquũ quod ex CK reliquo quod ex BK æquale erit, æqualis igitur eſt BK ipſi CK. Et quoniã FB
8. primi. eſt æqualis FC, communis autem FK, duæ BF FK duabus CF FK æquales ſunt: et baſis BK eſt æqualis baſi KC; erit angulus quidem BFK angulo KFC æqualis, angulus vero BKF angulo FKC. duplus igitur eſt angulus BFC anguli KFC, et angulus BKC duplus ipſius FKC. Eadem ratione et angulus CFD anguli CFL eſt duplus; angulus vero CLD duplus anguli CLF. et quoniam circumferentia BC circumfe-
27. tertij. rentiæ CD eſt æqualis, et angulus BFC angulo CFD æqualis erit. atque eſt angulus quidem BFC anguli KFC duplus: angulus vero DFC duplus ipſius LFC. æqualis igitur eſt angulus KFC angulo CFL. Itaque duo triangula ſũt FKC FLC, duos angulos duobus angulis æquales habentia, alterũ alteri, et vnum latus vni lateri æqua-
26. primi. le, quod ipſis commune eſt FC. Ergo et reliqua latera reliquis lateribus æqualia habebunt, et reliquum angulum reliquo angulo æqualem. recta igitur linea KC eſt æqualis rectæ CL, et angulus FKC angulo FLC. Et quoniã KC eſt æqualis CL, erit KL ipſius KC dupla. Eadem ratione et HK ipſius BK dupla oſtendetur. Rurſus quoniam BK oſtenſa eſt æqualis ipſi KC: atque eſt KL quidem dupla KC, HK vero ipſius BK dupla; erit HK ipſi KL æqualis. Similiter et vnaquæque ipſarum GH HM ML oſtendetur æqualis vtrique HK KL. Aequilaterum igitur eſt GHKLM pentagonum. Dico etiam æquiangulum eſſe. Quoniam enim angulus FKC eſt æqualis angulo FLC: et oſtenſus eſt ipſius quidem FKC duplus angulus HKL; ipſius vero FLC duplus KLM: erit et HKL angulus angulo KLM æqualis. Simili ratione oſtendetur et vnuſquiſque ipſorum KHG HGM GML vtrique HKL KLM æqualis. Quinque igitur anguli GHK HKL KLM LMG MGH inter ſe æquales ſunt. ergo æquiangulum eſt GHKLM pentagonũ. oſtenſum autem eſt etiam æquilaterum eſſe: et deſcriptum eſt circa ABCDE circulum. quod facere oportebat.

PROBLEMA XIII. PROPOSITIO. XIII.

In dato pentagono, quod æquilaterum, et æquiangulum ſit, circulum deſcribere.

Sit

Sit datum pentagonum æquilaterum, et æquiangulum ABCDE. oportet in ABCDE pentagono circulum describere. secetur uterque angulorum BCD CDE bifariam rectis lineis CF DF; et à puncto F, in quo conueniunt inter se CF DF, ducantur rectæ lineæ FB FA FE. Quoniam igitur BC est æqualis CD, communis autem CF, duæ BC CF duabus DC CF æquales sunt, et angulus BCF est æqualis angulo DCF. basis igitur BF basi FD est æqualis, et BFC triangulum æquale triãgulo DCF, et reliqui anguli reliquis angulis æquales, quibus æqualia latera subtenduntur. angulus igitur CBF angulo CDF æqualis erit. Et quoniam angulus CDE anguli CDF est duplus, et angulus quidem CDE angulo ABC, angulus vero CDF angulo CBF æqualis; erit et CBA angulus duplus anguli CBF; ac propterea angulus ABF angulo FBC æqualis. angulus igitur ABC bifariã sectus est recta linea BF. Similiter demonstrabitur et vnumquemque angulorum BAE AED rectis lineis AF FE bifariam sectum esse. Itaque à puncto F ad rectas lineas AB BC CD DE EA ducantur perpendiculares FG FH FK FL FM. Et quoniam angulus HCF est æqualis angulo KCF; est autem et rectus FHC recto FKC æqualis: erunt duo triangula FHC FKC, duos angulos duobus angulis æquales habentia, et vnum latus vni lateri æquale, commune scilicet vtrisque FC, quod vni æqualium angulorum subtenditur. ergo et reliqua latera reliquis lateribus æqualia habebunt, atque erit perpendicularis FH perpendiculari FK æqualis. Similiter ostẽ detur et vnaquæque ipsarum FL FM FG æqualis vtrique FH FK. quinque igitur rectæ lineæ FG FH FK FL FM inter se æquales sunt. quare centro F, interuallo autem vna ipsarum FG FH FK FL FM circulus descriptus, etiam per reliqua transibit pũcta, et rectas lineas AB BC CD DE EA cõtinget, propterea quòd anguli ad G H K L M recti sunt. Si enim non continget, sed ipsas secabit, quæ ab extremitate diametri circuli ad rectos angulos ducitur intra circulum cadet, quod absurdũ esse ostensum est. non igitur centro F, et interuallo vno ipsorum punctorum G H K L M circulus descriptus rectas lineas AB BC CD DE EA secabit. quare ipsas cõtingat necesse est. describatur vt GHKLM. In dato igitur pentagono quod est æquilaterum, et æquiangulum, circulus descriptus est. quod facere oportebat.



9. primi.

4. primi.

26. primi.

16. tertij.

PROBLEMA. XIIII. PROPOSITIO. XIIII.

Circa datum pentagonum, quod æquilaterum, et æquiangulum sit, circulum describere.

Sit datum pentagonum æquilaterum et æquiangulum ABCDE. oportet circa pentagonum ABCDE circulum describere, secatur vterque ipsorum BCD CDE angulorum bifariam rectis lineis CF FD: et à puncto F, in quo conueniunt rectæ lineæ ad puncta BAE ducantur FB FA FE. Similiter vt in antecedenti demonstrabitur vnumquemque angulorum CBA BAE AED rectis lineis BF FA FE bifariam sectum esse. Et quoniam angulus BCD angulo CDE est æqualis: atque est anguli quidem BCD dimidius angulus FCD, anguli vero CDE dimidius CDF; erit et FCD angulus æqualis angulo FDC. quare et latus CF lateri FD est æquale. Similiter demõstrabitur et vna quæque ipsarum FB FA FE æqualis vnicuique FC FD. quinque igitur rectæ lineæ FA FB FC FD



FC FD FE inter ſe æquales ſunt. ergo centro F, et interuallo vna ipſarũ FA FB F C FD FE circulus deſcriptus etiam per reliqua tranſibit puncta: atque erit deſcriptus circa pẽtagonum ABCDE, quod æquilaterum eſt, et æquiangulum. deſcribatur, et ſit ABCDE. Circa datum igitur pentagonum æquilaterum et ęquiangulum circulus deſcriptus eſt. quod facere oportebat.

PROBLEMA XV. PROPOSITIO. XV.

In dato circulo hexagonum æquilaterum, & ęquiangulum deſcribere.



Sit datus circulus ABCDEF. oportet in circulo ABCDEF hexagonum ęquilaterum, et æquiangulum deſcribere. Ducatur circuli ABCDEF diameter AD, ſumaturq́; centrum circuli G; et centro qui dem D, interuallo autem DG circulus deſcribatur EGCH, iunctæq́; EG CG ad puncta B F producãtur, et iungantur AB BC CD DE EF FA. Dico hexagonum ABCDEF æquilaterum, et æquiangu lum eſſe. Quoniam enim G punctum centrum eſt ABCDEF circuli, erit GE ipſi GD æqualis. Rurſus quoniam D cẽtrum eſt circuli EGCH, erit DE ęqua lis DG. Sed GE ipſi GD æqualis oſtenſa eſt. ergo G E ipſi ED eſt æqualis. æquilaterum igitur eſt EGD
5. primi. triãgulum, ideoq́; tres ipſius anguli EGD GDE D
EG inter ſe æquales ſunt, quoniam ęquicruriũ trian
32. primi. gulorum anguli ad baſim inter ſe ſunt æquales: et ſunt trianguli tres anguli ęquales duobus rectis. angulus igitur EGD duorum rectorum tertia pars eſt. Similiter oſtendetur et DGE duorum rectorum tertia. Et
15. primi. quoniam recta linea CG ſuper rectam EB inſiſtens angulos qui deinceps ſunt EG C CGB duobus rectis æquales efficit; erit et reliquus CGB tertia duorum rectorum. anguli igitur EGD DGC CGB inter ſe ſunt ęquales. ergo et qui ipſis ad ver
26. tertij. ticem ſunt anguli BGA AGF FGE æquales ſunt angulis EGD DGC CGB. quare ſex anguli EGD DGC CGB BGA AGF FGE inter ſe æquales ſunt. ſed æqua
29. tertij. les anguli ęqualibus circumferentiis inſiſtunt. Sex igitur circumferentiæ AB BC CD DE EF FA inter ſe ſunt ęquales. æquales autem circumferentias æquales rectæ lineæ ſubtendunt. ergo et ſex rectæ lineę inter ſe æquales ſint neceſſe eſt, ac propterea æquilaterum eſt ABCDEF hexagonum. Dico et æquiangulum eſſe. Quoniam enim circumferentia AF circumferentię ED eſt ęqualis, communis apponatur circumferentia ABCD. tota igitur FABCD circumferentia ęqualis eſt toti circumferentiæ EDCBA. et circumferentiæ quidem FABCD angulus FED inſiſtit, circumferentiæ vero EDCBA inſiſtit angulus AFE. angulus igitur AFE angulo D EF eſt æqualis. Similiter oſtẽdẽtur et reliqui anguli hexagoni ABCDEF ſigillatim æquales vtrique ipſorum AFE FED. ergo æquiangulum eſt ABCDEF hexagonũ. oſtenſum autem eſt et æquilaterum eſſe: et deſcriptum eſt in circulo ABCDEF. In dato igitur circulo hexagonum æquilaterum, et ęquiangulum deſcriptum eſt. quod facere oportebat.

COROLLARIVM.

Ex hoc manifeſtum eſt hexagoni latus ei, quę eſt ex centro circuli æquale eſſe. Et ſi per puncta ABCDEF contingentes circulum

ducamus

ducamus, circa circulū deſcribetur hexagonum ęquilaterum et ęquiangulum cō ſequenter ijs, quæ in pentagono dicta ſunt, & præterea ſimiliter in dato hexagono circulum deſcribemus, et circumſcribemus. quod facere oportebat.



PROBLEMA XVI.
PROPOSITIO. XVI.

In dato circulo quindecagonum æquilaterum, et æquiangulum deſcribere.

Sit datus circulus ABCD. oportet in ABCD circulo quindecagonum æquilaterum et ęquiangulum deſcribere. Deſcribatur in circulo ABCD trianguli quidē æquilateri in ipſo deſcripti latus AC; pentagoni vero æquilateri latus AB. Quarū igitur partium eſt ABCD circulus quindecim, earum circumferentia quidem ABCD tertia exiſtens circuli, erit quinque; circumferentia vero AB, quæ quinta eſt circuli; erit triū. ergo reliqua BC eſt duarum. ſecetur BC bifariā in puncto E. quare vtraque ipſarum BE EC circumferentiarum, quintadecima pars eſt ABCD circuli. Si igitur iungentes BE EC æquales ipſis in continuum rectas lineas in circulo ABCD aptabimus, in ipſo quindecagonum æquilaterum, et ęquiangulum deſcriptum erit. quod facere oportebat.



Similiter autem iis, quæ dicta ſunt in pentagono, ſi per circuli diuiſiones contingentes circulum ducamus, circa ipſum deſcribetur quindecagonum ęquilaterum, et ęquiangulum. Et inſuper in dato quindecagono æquilatero, et ęquiangulo circulum deſcribemus, et circumſcribemus.

QVARTI LIBRI FINIS.

SCHOLIVM.

In quinto libro propoſitum eſt de analogijs tractare; hic enim liber communis eſt geometriæ, arithmeticæ, muſicæ, & omni ſimpliciter mathematicæ diſciplinæ: nam quæ in ipſo demonſtrantur non ſolum geometricis theorematibus congruunt, ſed & omnibus, quæ ad mathematicas, vt dictum eſt, diſciplinas referuntur. propoſitum igitur huiuſmodi eſt. librum autem dicunt eſſe Eudoxi cuiuſdam, qui Platonis magiſter fuit.

Analogia.

Itaque quoniam propoſitum eſt de analogijs tractare, analogia vero eſt proportionum quarundam habitudo; neceſſe eſt prius cognoſcere, quæ nam ſint hæ proportiones: ſimplicium enim cognitio cognitionem compoſitorum præcedere debet. ſi igitur quædam inter ſe comparẽtur, verbi gratia duæ magnitudines, ipſæ quidem termini vocantur, & alterius ad alteram tranſitus, diſtantia: comparatio autem habitudo, quam antiqui proportionem appellarunt. at huius proportionis cum alia proportione iuxta ſimilitudinem quandam comparatio vel habitudo analogia nuncupatur. non enim vt magnitudo comparatur, ſed vt proportio cum proportione. hæc autem comparatio proportio proportionis dicitur; vt ſi ſint duæ rectæ lineæ, quarum altera ad reliquam duplam proportionem habeat, quadratum illius, quæ duplam habet proportionem, ad quadratum reliquæ quadruplam proportionem habebit eius, quam maior recta linea habet ad minorem; nam quæ longitudine ſunt dupla potentia quadrupla ſunt. quadratorum igitur proportio cum ſit quadrupla, dupla erit proportionis rectarum linearum, quæ eſt dupla: vocatur autem hæc proportionis proportio, quæ quidem ſub quantitate eſt; etenim proportio eſt duplex, alia in æſtimatione, alia in quantitate. & eius quidem, quæ in æſtimatione nulla ſpecies eſt, quæ ad præſentem contemplationem vtilis ſit; eius vero, quæ in quantitate ſpecies ſunt quinque, alia enim eſt multiplex vt ſex trium, alia ſuperparticularis vt quattuor trium, & alia ſuperpartiens, vt quinque trium, & hæ quidem ſimplices ſunt, quarum adhuc ſimplicior eſt multiplex, aliæ uero duæ ex harum compoſitione naſcuntur, videlicet multiplex ſuperparticularis, vt eſt ſeptem triũ, & multiplex ſuperpartiens, vt octo trium. ſub proportionales vero ſunt minores maiorum, vt ſub multiplex, ſubparticularis, & ſimiliter reliqua. ſciendum autem eſt hunc librum in duas partes diuidi. & prima quidem pars ſimpliciorum doctrinam continet, videlicet multiplicium. ſecunda vero vniuerſe de omnibus agit proportionibus. oportet enim in omni re, vt dictum eſt, ſimplicium cognitionem præcedere. quemadmodum aũt liber ipſe, ita & diffinitiones diuiduntur; primę enim ſunt de partibus, et multiplicibus, deinde ſequuntur vniuerſaliores de oĩbus proportionibus.

Simplicium cognitio cognitionẽ cõpoſitorũ præcedere debet Termini.

Comparatio eſt habitudo, quã antiqui proportionem appellarunt Analogia.

Proportio proportionis

Proportionis in quantitate ſpecies sũt quinque.

Quintus liber in duas partes diuidi tur.

EVCLIDIS ELEMENTORVM LIBER QVINTVS

CVM SCHOLIIS ANTIQVIS, ET COMMENTARIIS

Federici Commandini Vrbinatis.

DIFFINITIONES.

I.

PARS est magnitudo magnitudinis, minor maioris, quando minor maiorem metitur.

SCHOLIVM.

Pars, vt multi arbitrantur, est minor eo, quod est eiusdē speciei, vt 3 est pars 5. apud geometram vero est, quæ metitur maius, quando reliquum æquale sit ei, quod metitur: quando autem non sit æquale, non est pars, vt 3. 5; reliquuntur enim 2, quæ non sunt æqualia 3. quare 3 non sunt pars 5, sed partes, videlicet tres quintę $\frac{3}{5}$.

F. C. COMMENTARIVS.

Pars etiam apud geometram sumitur pro ea, quae simpliciter minor est maiore eiusdem speciei: vt cum dicitur, omne totum est maius sua parte. ergo pars quatenus multiplici opponitur, erit ea, quae metitur maius, videlicet ipsum multiplex, quae alio nomine sub multiplex, & à nonnullis pars aliquota appellatur; quatenus vero opponitur toti nulla est necessitas, vt totum metiatur.

II.

Multiplex est maior minoris, quando maiorem minor metitur.

III.

Proportio est duarum magnitudinum eiusdem generis, quatenus ad quantitatem pertinet, mutua quædam habitudo.

SCHOLIVM.

Proportionem] *dicit, vt significet habitudinem.* duarum magnitu-

dinum] *vt ſeparet ab alijs ſpeciebus quantitatis.* eiuſdem generis] *vt nequis lineam cum ſuperficie comparet. hæc enim inter ſe proportionem nullam habent.* quatenus ad quantitatem pertinet] *vt ſeparet ab infinitis magnitudinibus; quantitas enim continua eſt terminus continui nõ infiniti, & quantitas diſcreta eſt diſcreti non infiniti. ſed diſcretum nõ eſt magnitudo, multitudo enim eſt.* quædã habitudo] *quòd quinque ſint habitudinum ſpecies, vt dictum iam fuit.*

F. C. COMMENTARIVS.

Quatenus ad quantitatem pertinet] *vide ne hoc potius dictum ſit, vt intelligatur proportio, quae in quantitate, non item ea, quae in aeſtimatione conſiſtit.*

IIII.

Portionem habere inter ſe magnitudines dicuntur, quæ multiplicatæ ſe inuicem ſuperare poſſunt.

SCHOLIVM.

In numeris quidem omnis proportio rationalem habet quantitatem, in magnitudinibus autem eſt quædam proportio, quæ numero exprimi non poteſt; ſunt enim quædam, quorum dumtaxat cognoſcitur exceſſus, qua alterũ ſuperat alterũ; quantitas aũt exceſſus cognoſci nequit. hæc igitur proportionem habere dicuntur, nempe exceſſus, non adhuc eam, quam numerus habet ad numerum, hoc eſt rationalem; ac propterea in diffinitione proportionis magnitudinum appoſuit, quatenus ad quãtitatem pertinet, *videlicet continuam, non omnino autem quatenus ad quantitatem diſcretam, & rationalem. vniuerſalius igitur diffiniens, quæ nam ſint proportionem habentia dixit,* quæ multiplicatę ſe inuicem ſuperare poſſunt: *hoc enim & rationalibus, & irrationalibus congruit, velut diameter quadrati, vt in rationalibus quidem proportionem habet ad latus, vt in exceſſu vero proportionem habet, quam maius ad minus, & poteſt latus multiplicatum aliquando diametrum ſuperare.*

F. C. COMMENTARIVS.

Hoc idcirco dictum videtur, vt infinitae magnitudines à proportionibus excludantur. finita enim magnitudo quamtumlibet multiplicata tantum abeſt, vt infinitam magnitudinem exuperet, vt ne aequare quidem poſſit vnquam.

V.

In eadem proportione magnitudines eſſe dicuntur prima ad ſecundam, & tertia ad quartam, quando primæ, et tertiæ æquemultiplices,

tiplices, ſecundæ, et quartę æque multiplices iuxta quamuis multiplicationem vtraque vtramque vel vnà ſuperant, vel vnà æquales ſunt, vel vnà deficiunt inter ſe comparatæ.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit prima magnitudo A, ſecunda B, tertia C, & quarta D: ſumanturq; primae, ac tertiae, videlicet ipſarum A C aeque multiplices E F, vt ſit E aeque multiplex A, atque F ipſius C. rurſus ſumantur ipſarum B D, ſecundae ſcilicet, & quartae aeque multiplices GH; & ſiquidem maiori exiſtente E quàm G, etiam F ſit maior quàm H, vel ſi E aequali exiſtente ipſi G, ſit F aequalis H. vel ſi minori exiſtente, ſit minuor iuxta quamuis multiplicationẽ, tunc dicetur A ad B eandem habere proportionem, quam C ad D. exceſſum autem, ac defectum ſimpliciter intelligere oportet, non ſecundum proportionem, vt voluit Campanus; alioqui idem per idem explicaretur, quod eſt abſurdum. Propoſitis igitur quatuor magnitudinibus commenſurabilibus, ſi velimus ſtatim dignoſcere, an eandem proportionem habeant, multiplices ita aptabimus, vt multiplex primae multiplici ſecundae fiat aequalis; & ſi quidem multiplex tertiae ſit aequalis multiplici quartae, tunc prima ad ſecundam eandem proportionem habere deprehendetur, quam tertia ad quartam. Si vero multiplex tertiae ſit minor multiplici quartę, prima ad ſecundam maiorem proportionem habebit, quàm tertia ad quartam. quòd ſi multiplex tertiae ſit maior multiplici quartae, habebit prima ad ſecundam minorem proportionem, quàm tertia ad quartam.



VI.

Magnitudines, quæ eandem proportionem habent, proportionales vocentur.

VII.

Quando autem æque multiplicium multiplex quidem primæ ſuperauerit multiplicem ſecundę, multiplex vero tertiæ non ſuperauerit multiplicem quartæ; tunc prima ad ſecundam maiorem proportionem habere dicitur, quàm tertia ad quartam.



F. C. COMMENTARIVS.

Maneant eadem, quae ſupra: & ſumptis ipſarum AC aeque multiplicibus EF; itemq; ipſarum ED aeque multiplicibus GH, ſi quidem E ſuperet G, F vero non ſuperet H, vel ſi E ſit aequalis ipſi G, & F minor, quàm H, tunc A ad B maiorem proportionẽ habere dicitur, quàm C ad D.

VIII.

Analogia eſt proportionum ſimilitudo.



IX.

Analogia vero in tribus minimis terminis conſiſtit.



X.

Quando tres magnitudines proportionales ſint, prima ad tertiam duplam proportionem habere dicetur eius, quam habet ad ſecundam.

SCHOLIVM.



Non dicit duas proportiones vnius duplas eſſe, quod etiam eſt verum; ſed proportionem, quæ ex duabus conſtat, eſſe duplam, vt 8.4.2, & rurſus 9 3 1. proportio igitur, quæ ex duabus conſtat dupla eſt. magnitudo autem in duplis quidem magnitudinibus quadrupla eſt, in triplis vero nonupla, & in quadruplis ſexdecupla. demonſtrabitur enim deinceps quæ longitudine ſunt duplæ, potentia quadrupla eſſe. & quę longitudine tripla, potentia nonupla. quadratorum igitur proportio tum quadrupla ſit, dupla eſt proportionis laterum, quę eſt dupla, etenim dupli duplus quadruplus eſt.

XI.

Quando autem quattuor magnitudines ſint proportionales, prima ad quartam triplam habe re proportionem dicetur eius, quam habet ad ſecundam: & ſemper deinceps vna plus, quo ad analogia proceſſerit.



F. C. COMMENTARIVS.

Decima, & vndecima diffinitio terminos requirunt neceſſario inæquales, & primum ipſorũ maiorem. nam ſi æquales ſint eadem eſt primi ad ſecundum, & ad tertium proportio. Si vero primus ſit minor, non poteſt primus ad tertium duplam proportionem habere proprie eius, quam habet ad ſecundum, cum primi ad ſecundum maior ſit proportio, quàm ad tertium ex 8. huius.

XII.

Homologæ, vel ſimilis rationis magnitudines dicuntur antecedentes quidem antecedentibus, conſequentes vero conſequen tibus.

XIII.

Permutata ratio eſt ſumptio antecedentis ad antecedentem, et conſequentis ad conſequentem.



F. C. COMMENTARIVS.

Sit A ad B, vt C ad D. erit permutando A ad C, vt B ad D. hoc autem ita eſſe demonſtra bitur in 16 propoſitione huius libri.



XIIII.

Conuerſa ratio eſt ſumptio conſequentis, vt antecedentis ad antecedentem, vt ad conſe quentem.



F. C. COMMENTARIVS.

Sit rurſus A ad B, vt C ad D. erit cõuertendo B ad A, vt D ad C. quod demonſtratur in corollario quartæ huius.



Compoſitio

XV.

Compoſitio rationis eſt ſumptio antecedentis vnà cum conſequente tamquam vnius ad ipſam conſequentem.

SCHOLIVM.

Iuniores hanc proportionem appoſuerunt. neque enim compoſitio magnitudinum eadem eſt, quę compoſitio proportionum. hic autem antecedens vnà cum conſequente ſumptum totam magnitudinem efficit, quę ex magnitudinibus componitur: atque hęc eſt magnitudinum compoſitio. compoſitio enim proportionum aliam proportionẽ efficit, vt ipſe deinceps dicet. proportio, inquit ex proportionibus componi dicitur, cum proportionum quantitates inter ſe multiplicatę aliquam efficiunt proportionem. ipſe autem, vt in antiquioribus libris inuenitur, compoſitionem hanc συνθέντι, *hoc eſt componenti, vel componendo appellat; etenim in rationalibus non aliter dicit, quàm componendo; ſimiliter autem & diuiſio, vna enim proportio diuiditur. at diuiſio de qua hoc loco ſermo fit, magnitudinum eſt, exceſſus namque antecedentium ab antecedentibus diſſecatur. ipſe vero etiam in hoc dicit* διελόντι, *videlicet diuidenti, vel diuidendo. & ſimiliter quę hoc loco appellatur conuerſio rationis ipſe* ἀναστρέψαντι *dicit, conuertitur enim ad antecedentia.*

F. C. COMMENTARIVS.

Compoſitio rationis eſt proportio, quae oritur ex compoſitione terminorum ipſius proportionis, videlicet ex compoſitione antecedentis cum conſequente, cum totum conſequenti comparatur, quamquam improprie à iunioribus compoſitio proportionis, vel rationis appellata ſit; compoſitio enim proportionis longe alia eſt, vt in prędcedenti ſcholio adnotatur. ſit AE ad EB, vt CF ad FD. erit componendo AB ad BE, vt CD ad DF. illud vero in 18 huius demonſtratur.



XVI.

Diuiſio rationis eſt ſumptio exceſſus, quo antecedens ſuperat conſequentem, ad ipſam conſequentem.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit AB ad BE, vt CD ad DF. erit diuidendo AE ad EB, vt CF ad FD. quod in 17 huius demonſtrabitur.



XVII.

Conuerſio rationis eſt ſumptio antecedentis ad exceſſum, quo antecedens ipſam conſequentem ſuperat.

Sit

F. C. COMMENTARIVS.

Sit AB ad BE, vt CD ad DF. erit per conuersionem rationis BA ad AE, vt DC ad CE. hoc autem constat ex corollario 19 huius.



XVIII.

Aequa ratio, siue ex æquali est, cum plures magnitudines extiterint, et aliæ ipsis numero æquales, quæ binæ sumantur, et in eadem proportione, fueritq; vt in primis magnitudinibus prima ad vltimam, ita in secũdis magnitudinibus prima ad vltimam: vel aliter est sumptio extremarum per subtractionem mediarum.

F. C. COMMENTARIVS.

Hoc autem & in ordinata analogia fit, & in perturbata. in ordinata quidem hoc modo. sint tres magnitudines ABC, & aliae ipsis numero aequales DEF, sitq; vt A ad B, ita D ad E; & vt B ad C, ita D ad F. erit ex aequali vt A ad C, ita D ad F. quod demonstrabitur in 22 huius.

In perturbata vero hoc pacto. sint rursus tres magnitudines ABC, itemq; aliae tres DEF, & sit vt A ad B, ita E ad F, vt autem B ad C, ita D ad E. erit ex aequali vt A ad C, ita D ad F. hoc autem in 23 huius ostendetur. Idem sequitur etiam si plures sint, quàm tres magnitudines. sint enim quattuor magnitudines ABCD, & aliae ipsis numero aequales EFGH, & in ordinata quidem analogia vt A ad B, ita sit E ad F, vt autem B ad C, ita F ad G, & vt C ad D, ita G ad H. erit ex aequali vt A ad D, ita E ad H. In perturbata vero, sit vt A ad B, ita F ad G, vtq; B ad C, ita sit G ad H, & vt C ad D, ita E ad F. erit ex aequali vt A ad D, ita E ad H. & similiter continget in alijs magnitudinibus quotquot illae fuerint.





XIX.

Ordinata analogia est quãdo fuerit vt antecedens ad consequentem, ita antecedens ad consequentem; vt autem consequens ad aliã quãpiam, ita consequens ad aliam quampiam.

XX.

Perturbata vero analogia est, quando tribus existentibus magnitudinibus

gnitudinibus, & alij ipſis numero æqualibus; fuerit vt in primis magnitudinibus antecedens ad conſequentem, ita in ſecundis magnitudinibus antecedens ad conſequentem. vt autem in primis magnitudinibus conſequens ad aliam quampiam; ita in ſecundis alia quępiam ad antecedentem.

F. C. COMMENTARIVS.

Harum exempla ſuperius poſita ſunt, ſed prętęr diffinitiones ſunt etiam communes quędam notiones, quae in hoc libro ſumuntur nempe hae.

I.

Eiuſdem ſiue ęqualium æque multiplices inter ſe æquales ſunt.

II.

Quarum eadem æque multiplex eſt, vel quarum æquales ſunt æque multiplices & ipſæ inter ſe ſunt æquales.

THEOREMA I. PROPOSITIO I.

Si fuerint quotcumque magnitudines quotcumque magnitudinum æqualium numero ſingulę ſingularum æque multiplices; quotuplex eſt vna magnitudo vnius, totuplices erunt & omnes omnium.

Sint quotcumque magnitudines AB CD quotcumque magnitudinum EF æqualium numero, ſingulæ ſingularum ęque multiplices. Dico quotuplex eſt AB ipſius E, totuplices eſſe & AB CD ipſarum E F. Quoniam enim AB ęque multiplex eſt ipſius E, et CD ipſius F, quot magnitudines ſunt in AB æquales ipſi E, tot erũt et in CD æquales ipſi F. diuidatur AB quidem in partes ipſi E ęquales, quæ ſint AG GB: CD vero diuidatur in partes ęquales ipſi F, videlicet CH HD. erit igitur multitudo partium CH HD æqualis multitudini ipſarum AG GB. et quoniam AG eſt æqualis E, et CH æqualis F; erunt et AG CH æquales ipſis E F. eadem ratione quoniam GB eſt æqualis E, et HD ipſi F, erũt et GB HD æquales ipſis EF. quot igitur ſunt in AB æquales ipſi E, tot ſunt et in AB CD æquales ipſis E F. ergo quotuplex eſt A B ipſius E, totuplices erunt et AB CD ipſarum E F. ſi igitur fuerint quotcumque magnitudines quotcumque magnitudinum æqualium numero ſingulę ſingularum ęque multiplices; quotuplex eſt vna magnitudo vnius, totuplices erunt et omnes omnium. quod demonſtrare oportebat.



THEOREMA II. PROPOSITIO. II.

Si prima ſecundæ æque multiplex fuerit, ac tertia quartæ; fuerit autem et quinta ſecundæ ęque multiplex, ac ſexta quartæ: erit etiam compoſita prima, et quinta ſecundę æque multiplex, ac tertia, et ſexta quartæ.

Prima

Prima enim AB ſecundæ C æque multiplex ſit, ac tertia DE quartæ F. ſit autem et quinta BG ſecundæ C æque multiplex, ac ſexta EH quartę F. Dico et compoſitam primam, et quintam AG ſecundæ C æque multiplicem eſſe, ac tertiam et ſextã DH quartæ F. Quoniam enim AB æque multiplex eſt C, ac DE ipſius F; quot magnitudines ſunt in AB æquales C, tot erunt et in DE æquales F. eadem ratione et quot ſunt in BG æquales C, tot et in EH erunt æquales F. quot igitur ſunt in tota AG æquales C, tot erunt et in tota DH æquales F. ergo quotuplex eſt AG ipſius C, totuplex eſt et DH ipſius F. et compoſita igitur prima et quinta AG ſecundæ C æque multiplex erit, ac tertia et ſexta DH quartæ F: quare ſi prima ſecundæ æque multiplex fuerit, ac tertia quartæ: fuerit autem et quinta ſecundę æque multiplex, ac ſexta quartę: erit compoſita quoque prima et quinta æque multiplex ſecundæ, ac tertia, et ſexta quartę. quod oportebat demonſtrare.



THEOREMA III. PROPOSITIO III.

Si prima ſecundę æque multiplex fuerit, ac tertia quartę; ſumantur aũt æque multiplices primæ, & tertiæ: erit & ex æquali ſumptarum vtraque vtriuſque æque multiplex, altera quidem ſecundæ, altera vero quartæ.

Prima enim A ſecundæ B æque multiplex ſit, ac tertia C quartę D: et ſumantur ipſarum AC æque multiplices EF GH. Dico EF æque multiplicem eſſe ipſius B, ac GH ipſius D. Quoniã enim EF æque multiplex eſt ipſius A, ac GH ipſius C; quot magnitudines ſunt in EF æquales A, tot erunt et in GH æquales C. Diuidatur EF quidem in magnitudines ipſi A æquales EK KF; GH vero diuidatur in magnitudines æquales C, videlicet GL LH. erit igitur ipſarum EK KF multitudo æqualis multitudini ipſarum GL LH. et quoniam æque multiplex eſt A ipſius B, ac C ipſius D; æqualis autem EK ipſi A, et GL ipſi C; erit EK æque multiplex ipſius B, ac GL ipſius D. eadem ratione æque multiplex erit KF ipſius B, et LH ipſius D. quoniam igitur prima EK ſecundæ B æque multiplex eſt, ac tertia GL quartæ D; eſt autem et quinta KF ſecundæ B æque multiplex, ac ſexta LH quartę D: erit et compoſita prima et quinta EF ſecundæ B æque multiplex, ac tertia, et ſexta GH quartæ D. Si igitur prima ſecũdæ æque fuerit multiplex, ac tertia quartæ; ſumantur autem primæ, et tertiæ æque multiplices: erit et ex æquali ſumptarum vtraque vtriuſque æque multiplex, altera quidem ſecundæ, altera vero quartæ. quod oſtendiſſe oportuit. Ex antecedente.



THEOREMA IIII. PROPOSITIO IIII.

Si prima ad ſecundã eandem hẽt proportionem, quam tertia ad quartam, & æque multiplices primę, & tertię ad æque multiplices ſecundæ, & quartæ, iuxta quamuis multiplicationem, eandem proportionem habebunt, inter ſe comparatę.

Prima enim A ad ſecundam B eandem proportionem habeat, quam tertia C ad quartam D: et ſumantur ipſarũ quidem AC alię vtcumque æque multiplices E F; ipſarũ vero BD aliæ vtcumque æque multiplices GH. Dico E ad G ita eſſe, vt F ad H. ſumantur enim rurſus ipſarum EF æque multiplices KL, et ipſarum GH æque multiplices M N. Qm igitur E æque multiplex eſt ipſius A, atq; F ipſius C; ſumuntur aũt ipſarum EF æque multiplices KL: erit K æque multiplex ipſius A, atque L ipſius C. Eadem ratione M æque multiplex erit ipſius B, atque N ipſius D. et quoniam eſt vt A ad B. ita C ad D. ſumptæ autem ſunt ipſarũ AC æque multiplices KL; et ipſarum BD alię vtcumque æque multiplices MN: ſi K ſuperat M, ſuperabit et L ipſam N; et ſi æqualis, æqualis; et ſi minor, minor. ſuntq; KL quidem ipſarum EF æque multiplices; MN vero ipſarum G H aliæ vtcumque æque multiplices. vt igitur E ad G, ita erit F ad H. quare ſi prima ad ſecundam eandem habeat proportionem, quam tertia ad quartam, et æque multiplices primæ ac tertiæ ad æque multiplices ſecundę, ac quartæ iuxta quamuis multiplicationem eandem proportionem habebunt inter ſe comparatæ. quod demonſtrare oportebat.

Ex antecedente.

Per conuerſam quintæ diffinitionis.

5. diffinit.

Quoniam igitur demonſtratum eſt ſi K ſuperat M, et L ipſam N ſuperare; et ſi æqualis, æqualem eſſe, et ſi minor, minorem: conſtat etiam ſi M ſuperat K, et N ſuperare ipſam L; et ſi æqualis, æqualem eſſe; et ſi minor, minorem; ac propterea vt G ad E, ita eſſe H ad F.

5. diffinit.

COROLLARIVM.

Ex hoc manifeſtum eſt ſi quattuor magnitudines ſint proportionales, et contra proportionales eſſe.

SCHOLIVM.

Hoc theorema pertinet ad demonſtrationem diffinitionis magnitudinum, quæ ſunt in eadem proportione, vt eſt quando æque multiplices primæ, & tertiæ, videlicet antecedentium, æque multiplices ſecundæ, & quartæ, hoc eſt conſequentium, vel vnà ſuperant, vel vnà æquales ſunt, vel vnà deficiunt; hic enim demonſtrat & ipſas eandem inter ſe proportionem habere. reticuit autem hoc in principio; neque enim fieri poterat, vt diceretur illas in eadem proportione eſſe, quorum multiplicia ſunt in eadem proportione, quando nos idipſum quæreremus, quænam eſſent in eadem proportione. cum igitur dixiſſet in principio eas ſimul ſuperare, vel ſimul æquales eſſe, vel ſimul deficere; hic oſtendit & in eadem eſſe proportione, ſi inter ſe comparentur, vt appareat diffinitio earum, quæ ſunt in eadẽ proportione, quando ſcilicet æque multiplices primæ, & tertię ad ſecũdæ, & quartę æque multiplices eandẽ proportionem habeant. oſtendit aũt ipſas in eadẽ proportione per hoc, & per cõuerſionẽ.

THEO-

THEOREMA V. PROPOSITIO. V.

Si magnitudo magnitudinis æque multiplex sit, atque ablata ablatę; et reliqua reliquę æque multiplex erit, atque tota totius.



Magnitudo enim AB magnitudinis CD æque multiplex sit, atque ablata AE ablatę CF. Dico et reliquam EB reliquæ FD æque multiplicem esse, atque totam AB totius CD. quotuplex enim est AE ipsius CF, totuplex fiat et EB ipsius CG. et quoniam AE æque multiplex est CF, atque EB ipsius CG; erit AE æque multiplex CF, et AB ipsius GF. ponitur autem æque multiplex AE ipsius CF, et AB ipsius CD. æque multiplex igitur est AB vtriusque GF CD; ac propterea CF ipsi CD est æqualis. communis auferatur CF. reliqua igitur GC æqualis est reliquę D F. Itaque quoniam AE æque multiplex est CF, et EB ipsius CG, estq; CG æqualis DF; erit AE æque multiplex CF, et EB ipsius FD. æque multiplex autem ponitur AE ipsius CF, et A B ipsius C D. ergo E B est æque multiplex FD, et A B ipsius C D. et reliqua igitur E B reliquę F D æque multiplex est, atq; tota A B totius CD. quare si magnitudo magnitudinis æque multiplex sit, atque ablata ablatæ; et reliqua reliquę æque erit multiplex, atque tota totius. quod oportebat demonstrare.

1. huius.

2. Com. not.

THEOREMA VI. PROPOSITIO. VI.

Si duę magnitudines duarum magnitudinum æque multiplices sint, et ablatæ quędam sint earumdem æque multiplices; erunt et reliquæ uel eisdem æquales, vel ipsarum æque multiplices.



Duæ enim magnitudines AB CD duarum magnitudinum EF æque multiplices sint, et ablatæ A G C H earumdem sint æque multiplices. Dico et reliquas GB HD vel ipsis EF æquales esse, vel ipsarum æque multiplices. sit enim primum GB æqualis E. Dico et HD ipsi F esse æqualem. ponatur ipsi F æqualis CK. et quoniam AG æque multiplex est E, et CH ipsius F; estq; GB quidem æqualis E; CK vero æqualis F: erit AB æque multiplex E, et KH ipsius F. æque autem multiplex ponitur A B ipsius E, et CD ipsius F. ergo KH æque multiplex est F, et C D ipsius F. quoniam igitur vtraque ipsarum KH CD est æque multiplex F, erit KH æqualis CD. communis auferatur C H. ergo reliqua KC reliquę HD est æqualis. Sed KC est æqualis F. et HD igitur ipsi F est æqualis; ideoq; GB ipsi E, et HD ipsi F æquales erit. Similiter demonstrabimus si G B multiplex fuerit ipsius E, et H D ipsius F æque multiplicem esse. Si igitur duæ magnitudines duarum magnitudinum æque multiplices sint, et ablatę quædam sint earumdem æque multiplices, erunt et reliquæ vel eisdem æquales, vel ipsarum æque multiplices. quod demonstrare oportebat.

1. huius.

2. Com. not.

SCHOLIVM.

Non propositum est ostendere si à multiplici multiplex auferatur reli-

quum, vel æquale esse, vel multiplex; hoc enim manifestum est: sed duæ magnitudinibus ad duas magnitudines ita se habentibus, vt dictum est, si reliqua prioris sit multiplex, & reliquam alterius multiplicem esse; & si æqualis sit, esse æqualem, veluti si quadrupla existente tripla auferatur, reliqua æqualis erit, & in altera eodem modo.

THEOREMA VII. PROPOSITIO. VII.

Æquales ad eãdẽ, eãdẽ habẽt proportionẽ, & eadẽ ad æquales.

Sint æquales magnitudines A B, alia autem quæuis magnitudo C. Dico vtramque ipsarum A B ad C eandem proportionem habere: et C ad vtramque A B similiter eandem habere proportionem. sumantur enim ipsarum A B æque multiplices DE, et ipsius C alia vtcumque multiplex F. Quoniam igitur æque multiplex est D ipsius A, et E ipsius B, estq; A ipsi B æqua-
1. Com.not. lis; erit et D æqualis E; alia autem vtcumque est F. ergo si D superat F, et E ipsam F superabit; et si æqualis, æqualis; et si minor, minor. et sunt DE quidem ipsarum A B æqui multiplices: F ve-
5. diffi. ro alia vtcumque multiplex ipsius C. erit igitur vt A ad C, ita B ad C. dico insuper C ad vtramque ipsarum A B eandem habere proportionem. iisdem enim constructis similiter ostendemus D ipsi E æqualem esse, aliam vero quandam F. si igitur F superat D, ipsam quoque E superabit; et si æqualis, æqualis; et si minor, minor. atque est F quidẽ ipsius C multiplex; DE vero aliæ vtcũ-
5. diffi. que æque multiplices ipsarum A B. ergo vt C ad A, ita erit C ad B. æquales igitur ad eandem, eandem habent proportionem, et eadem ad æquales. quod ostendere oportebat.



F. C. COMMENTARIVS.

Eodem modo demonstrabimus, et æquales magnitudines ad alias inter se æquales eandem habere proportionem.

Sint enim magnitudines aequales A B; sintq; aliae magnitudines inter se aequales C D. dico A ad C eandem habere proportionem, quam B ad D. sumantur ipsarum A B aeque multiplices E F; & ipsarum C D aliae vtcumque aeque multiplices GH. Itaq; quoniam aeque multiplex est E ipsius A,
1. Com.not. *& F ipsius B; est autem A aequalis B: erit & E ipsi F aequalis. rursus quoniam aeque multiplex est G ipsius C, & H ipsius D; estq; C ipsi D aequalis:*
5. diffi. *& G ipsi H aequalis erit. Si igitur E superat G, & F ipsam H superabit; et si aequalis, aequalis; & si minor, minor. ergo A ad C eandem proportionẽ habet, quam B ad D. quod oportebat demonstrare.*

THEOREMA VIII. PROPOSITIO. VIII.

Inæqualium magnitudinum maior ad eandem maiorem habet proportionem, quàm minor: et eadem ad minorẽ maiorem proportionẽ habet, quàm ad maiorẽ.

Sint inæquales magnitudines AB C: et sit AB maior; alia vero vtcumque D. dico AB ad D maiorẽ habere proportionem, quàm C ad D: et D ad C maiorem habere, quàm ad AB. quoniam enim AB maior est, quàm C, ponatur ipsi C æqualis BE.
4. diffin. Itaque minor ipsarum AE EB multiplicata maior aliquando erit, quàm D. Sit primum

mum AE minor, quàm EB: et multiplicetur AE, quo ad fiat maior, quàm D: sitq; ipsius multiplex FG, quæ ipsa D sit maior: quotuplex autem est FG ipsius AE, totuplex fiat et GH ipsius EB, et K ipsius C. sumaturq; ipsius D dupla quidem L, tripla vero M, et deinceps vna plus, quo ad ea, quæ sumitur, multiplex fiat ipsius D, et primo maior, quàm K. sumatur, sitq; N ipsius D quadrupla, et primo maior quàm K. quoniam igitur K primo minor est, quàm N, non erit K minor, quàm M. et cum æque multiplex sit FG ipsius AE, et GH ipsius EB; erit et FG æque multiplex AE, et FH ipsius AB. æque autem multiplex est FG ipsius AE, et K ipsius C. ergo FH æque multiplex est AB, et K ipsius C; ac propterea FH K ipsarũ AB C æque multiplices erũt. rursus quoniã GH æque multiplex est EB, et K ipsius C; estq; EB æqualis C: erit et GH ipsi K æqualis. Sed K non est minor, quàm M. non igitur GH minor est, quàm M. maior autem FG quàm D. ergo tota FH vtrisque DM maior erit. Sed vtræque DM sunt æquales N; est enim M tripla ipsius D, et vtræque MD ipsius D quadruplæ. est autem et N quadrupla D. vtræque igitur MD ipsi N æquales sunt. sed FH maior est, quàm MD. quare FH superat N, K vero ipsam N non superat. et sunt FH K æque multiplices ipsarum AB C: et N ipsius D alia vtcũque multiplex. ergo AB ad D maiorem proportionem habet, quàm C ad D. dico præterea et D ad C maiorem habere proportionẽ, quàm D ad AB. iisdem enim constructis similiter ostendemus N superare K, ipsam vero FH non superare: atque est N multiplex ipsius D; et FH K aliæ vtcumque ipsarum AB C æque multiplices. ergo D ad C maiorem proportionẽ habet, quàm D ad AB. Sed sit AE maior, quàm EB. erit minor EB multiplicata aliquando maior, quàm D. multiplicetur, et sit GH multiplex quidẽ ipsius EB, maior vero, quã D. et quotuplex est GH ipsius EB, totuplex fiat et FG ipsius AE, et K ipsius C. simili rõne ostendemus FH K ipsarũ AB C æq; multiplices esse. sumatur deinde N multiplex D, primo aũt maior, quàm FG. ergo rursus FG nõ est minor, quàm M; maior autem FG, quàm D. tota igitur FH superat DM, hoc est N; et K ipsam N non superat: quoniam FG maior existens, quàm GH, hoc est quàm K, non superat N. et similiter vt in iis, quæ superius dicta sũt, demõstrationẽ absoluemus. Inæqualiũ igitur magnitudinum maior ad eandẽ maiorem habet proportionẽ, quàm minor: et eadem ad minorẽ maiorem proportionẽ habet, quàm ad maiorẽ. quod ostẽdere oportebat.



1. huius.

1. huius.

1. com. not.

7. diffin. ✻



SCHOLIVM.

Ergo AB ad D maiorem proportionem habet, quàm C ad D] *quattuor sunt magnitudines, prima quidem AB, secunda D, tertia autem C, et quarta D. bis enim sumitur D, & vt secunda & vt quarta. atque est primae quidem AB multiplex FH: secundae vero D multiplex N, & tertiae C multiplex K. est igitur FH maior, quàm N; quae quidem N multiplex est secundae D: K vero multiplex tertiae C, minor est, quàm N, quae est multiplex quartae D. Itaque quoniã multiplex primae maior est multiplici secundae, multiplex autem tertiae non maior multiplici quartae; habebit AB ad D maiorem proportionem, quàm C ad eandem D, per eam diffinitionem, quae dicit, quando aeque multiplicium multiplex quidem primae superauerit multiplicem secundae, multiplex autem tertiae non superauerit multiplicem quartae, tunc prima ad secundam maiorem proportionem habere dicetur, quàm tertia ad quartam.* ✻

THEOREMA IX. PROPOSITIO IX.

Quæ ad eandẽ, eandẽ proportionẽ habent, inter se æquales sunt; et ad quas eadẽ, eãdẽ hẽt proportionẽ, ipsæ inter se sunt æquales.

Habeat

Habeat enim vtraque ipsarum A B ad C eandem proportionẽ. Dico A ipsi B æqualem esse. nam si non esset æqualis, non haberet vtraque ipsarum A B ad C eãdem proportionem. habet autem. æqualis igitur est A ipsi B. Habeat rursus C ad vtramque ipsarum AB eandem proportionem. Dico A æqualem esse ipsi B. nisi enim ita sit, non habebit C ad vtramque A B eandem proportionem. habet autem. ergo A ipsi B necessario est æqualis. quæ igitur ad eandem, eandem proportionem habent, æquales inter se sunt: et ad quas eadem eandem habet proportionem, ipsæ inter se sunt æquales. quod demonstrare oportebat.

Ex antecedente.

Ex antecedente.



THEOREMA. X. PROPOSITIO. X.

Ad eãdẽ ꝓportionẽ habẽtiũ quę maiorẽ ꝓportionẽ hẽt, illa maior est; ad quã vero eadẽ maiorẽ habet proportionem, illa minor est.

Habeat enim A ad C maiorem proportionem, quàm B ad C. Dico A, quàm B maiorem esse. si enim non est maior, vel æqualis est, vel minor. æqualis autem non est A ipsi B, vtraque enim ipsarum AB ad C eãdem haberet proportionem. atqui eandem non habet. non igitur A ipsi B est æqualis. Sed neque minor est A quàm B; haberet enim A ad C minorem proportionem, quàm B. atqui non habet minorem. non igitur A minor est, quàm B. ostensum autem est neque esse æqualẽ. ergo A quàm B maior erit. Habeat rursus C ad B maiorem proportionem, quàm C ad A. Dico B minorem esse, quàm A. si enim non est minor, vel æqualis est, vel maior. æqualis vtique non est B ipsi A; etenim C ad vtramque ipsarũ A B eandẽ proportionem haberet. non habet autem. ergo A ipsi B non est æqualis. Sed neque maior est B, quàm A; haberet enim C ad B minorem proportionem, quàm ad A. atqui non habet. non igitur B quàm A est maior. Ostẽsum aũt est neque æqualẽ esse. ergo B minor erit, quàm A. Ad eandem igitur proportionẽ habẽtiũ quæ maiorẽ proportionẽ hẽt, illa maior est: et ad quam eadem maiorẽ habet proportionem, illa minor est. quod oportebat demonstrare.

7. huius.

8. huius.

7. huius.

8. huius.



THEOREMA XI. PROPOSITIO. XI.

Quæ eidem eędem sunt proportiones, et inter se eędem sunt.

Sit enim vt A ad B, ita C ad D: vt autem C ad D, ita E ad F. Dico vt A ad B, ita esse E ad F. sumantur enim ipsarum quidem A C E æque multiplices G H K; ipsarum vero B D F aliæ vtcumque æque multiplices L M N. Quoniam igitur est vt A ad B, ita C ad D, et sumptæ sunt ipsarum A C æque multiplices G H, et ipsarum BD aliæ vtcumque æque multiplices LM; si G superat L, et H ipsam M superabit; et si æqualis, æqualis; et si minor, minor. rursus quoniam est vt C ad D, ita E ad F, et sumptæ sunt ipsarũ CE æque multiplices HK; ipsarũ vero DF aliæ vtcũque æque multiplices MN, si H superat M, et K ipsam N superabit; et si æqualis, æqualis; et si minor, minor. sed si H superat M, et G superabit L; et si æqualis, æqualis; et si minor, minor. quare si G superat L, et K ipsã N superabit; et si æqualis, æqualis; et si minor, minor. et sunt GK quidem ipsarum AE æque multiplices; LN vero ipsarum BF aliæ vtcumque æque multiplices. ergo vt A ad B, ita erit E ad F. quæ igitur eidem eædem sunt proportiones, et inter se eædem sunt. quod ostendisse oportuit.

Ex cõuersa 5. diffi.

5. diffin.

THEO-

THEOREMA XII. PROPOSITIO. XII.

Si quotcũque magnitudines proportionales fuerint, vt vna antecedẽtiũ ad vnã cõſequẽtiũ, ita erũt antecedẽtes oẽs ad omnes cõſequẽtes.

Sint quotcũque magnitudines proportionales AB CD EF: et vt A ad B, ita ſit C ad D, et E ad F. Dico vt A ad B. ita eſſe ACE ad BDF. ſumantur enim ipſarum A C E ęque multiplices GHK, et ipſarũ BDF aliæ vtcumque æque multiplices LMN. Quoniam igitur vt A ad B, ita eſt C ad D, et E ad F: et ſumptę ſunt ipſarum quidem ACE æque multices GHK, ipſarum vero BDF aliæ vtcumque ęque multiplices LMN; ſi G ſuperat L, et H ipſam M ſuperabit, et K ipſam N; et ſi æqualis, æqualis; et ſi minor, minor. quare et ſi G ſuperat L, ſuperabunt et GHK ipſas LMN; et ſi ęqualis, ęquales; et ſi minor, minores. ſuntq; G, et GHK ipſarũ A, et A CE æque multiplices: quoniã ſi fuerint quotcũque magnitudines quotcũque magnitudinũ æqualiũ numero, ſingulæ ſingularũ æque multiplices; quotuplex eſt vna magnitudo vnius, totuplices erũt et oẽs omniũ. eadẽ ratione et L et LM N ipſarum B, et BDF ſunt æque multiplices. eſt igitur vt A ad B, ita ACE ad BDF. quare ſi quotcumque magnitudines proportionales fuerint, vt vna antecedentiũ ad vnã conſequentium, ita erunt antecedentes omnes ad omnes conſequentes. quod demonſtrare oportebat.



THEOREMA XIII. PROPOSITIO. XIII

Si prima ad ſecundam eandem habeat proportionem, quam tertia ad quartam; tertia autem ad quartam maiorem proportionẽ habeat, quàm quinta ad ſextã: et prima ad ſecundã maiorẽ habebit proportionẽ, quàm quinta ad ſextã.

Prima enim A ad ſecundam B eandem proportionem habeat, quam tertia C ad quartam D; tertia autem C ad quartã D maiorem habeat proportionem, quàm quinta E ad ſextã F. Dico et primam A ad ſecundam B maiorem proportionẽ habere, quàm quintam E ad ſextam F. Quoniam enim C ad D maiorem proportionem habet, quàm E ad F, ſunt quædã ipſarum CE æque multiplices, et ipſarum D F aliæ vtcumque æque multiplices: et multiplex quidem C ſuperat multiplicẽ D; multiplex vero E non ſuperat multiplicem F. Sumantur, et ſint ipſarum CE æquemultiplices GH, et ipſarum DF aliæ vtcumque æquemultiplices KL, ita vt G quidem ſuperet K; H vero ipſam L non ſuperet: et quotuplex eſt G ipſius C, totuplex ſit et M ipſius A; quotuplex autem K ipſius D, totuplex ſit et N ipſius B. et quoniam eſt vt A ad B, ita C ad D, et ſumptæ ſunt ipſarum AC æquemultiplices MG, et ipſarum BD aliæ vtcumque æque multiplices NK: ſi M ſuperat N, et G ipſam K ſuperabit; et ſi æqualis, æqualis; et ſi minor, minor Sed G ſuperat K. ergo & M ipſam N ſuperabit. H vero non ſuperat



ſuperat L.ſuntq; MH ipſarum AE æque multiplices;et NL ipſarum B F aliæ vtcum
7.diffi. quæ æque multiplices. ergo A ad B maiorem proportionem habebit, quàm E ad F. ſi igitur prima ad ſecundam eandem habeat proportionem, quam tertia ad quartam; tertia vero ad quartam maiorem proportionē habeat, quàm quinta ad ſextam: et prima ad ſecundam maiorem habebit proportionem, quàm quinta ad ſextam.quod oſtendere oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

Eodem modo demonſtrabitur ſi prima ad ſecundam eandem habeat proportionem,quam tertia ad quartam; tertia autem ad quartam minorem proportionem habeat, quàm quinta ad ſextam: et primam ad ſecundam minorem proportionem habere, quàm quintam ad ſextam.

Quòd ſi prima ad ſecundam maiorem habeat proportionē, quàm tertia ad quartam;tertia autem ad quartam maiorem habeat,quàm quinta ad ſextam: et prima ad ſecundam maiorem proportionem habebit,quàm quinta ad ſextam.

Habeat A ad B maiorem proportionem,quàm C ad D,& C ad D maiorem habeat, quàm E ad F. dico A ad B maiorem habere proportionem,
8.huius *quàm E ad F. fiat enim vt C ad D,ita G ad B. erit G minor, quàm A.& quoniam G ad B eandem proportionem habet,quàm C ad D, & C ad D maiorem habet proportionem,quam E ad F: habebit & G ad B maiorem proportionem,quàm E ad F. quare A ad B multo maiorem proportionem habebit,quàm E ad F.& ſimiliter demonſtrabitur ſi prima ad ſecundam minorem proportionem habeat,quàm tertia ad quartam; tertia vero ad quartā habeat minorem, quàm quinta ad ſextam: & primam ad ſecundam minorem habere proportionem,quàm quintam ad ſextam.*



THEOREMA XIIII. PROPOSITIO. XIIII.

Si prima ad ſecundam eandem habeat proportionem, quàm tertia ad quartam; prima autem maior ſit, quàm tertia: & ſecunda quàm quarta maior erit; & ſi æqualis, æqualis;et minor, minor.

Prima enim A ad ſecundam B eandem proportionem habeat,quam tertia C ad quartam D: maior autem ſit A quàm
8.huius. C.dico et B quàm D maiorem eſſe. quoniam enim A maior eſt quā C,et alia vtcūque magnitudo B; habebit A ad B maiorem proportionem, quàm C ad B. ſed vt A ad B,ita C ad
Ex antece- D.ergo et C ad D maiorem habebit proportionem,quàm C
dente, 10.huius. ad B.ad quam vero eadem maiorem proportionem habet,illa minor eſt.quare D eſt minor, quàm B:ac propterea B quā
A D maior erit.Similiter demonſtrabimus et ſi A æqualis ſit ipſi C;et B ipſi D eſſe æqualem: et ſi A ſit minor,quàm C; et B
B quàm D minorem eſſe.Si igitur prima ad ſecundam eandem habeat proportionem,quàm tertia ad quartam; prima autem maior ſit, quàm tertia;& ſecunda,quàm quarta maior erit; & ſi æqualis, æqualis; et ſi minor, minor, quod demonſtrare oportebat.



SCHOLIVM.

Hoc lemma eſt ſextidecimi theorematis, quemadmodum viceſi-
mum

mum est lemma vigesimi secundi, & vigesimum primum vigesimi tertij.

F. C. COMMENTARIVS.

Similiter demonstrabimus et si A æqualis sit ipsi C, et B ipsi D esse æqualem] *Quoniam enim A est aequalis C, habebit A ad B eandem proportionem, quam C ad B. vt autem A ad B, ita C ad D. ergo & C ad D eandem habebit, quam C ad B. ad quas autem eadem eandem habet proportionem ipsae aequales sunt. ergo B ipsi C est aequalis.* A 11.huius. 9.huius.

Et si A sit minor, quàm C, et B quàm D minorem esse,] *nam cum A minor sit, quàm C; habebit A ad B minorem proportionem quàm C ad B. sed vt A ad B, ita C ad D. quare ex antecedente & C ad D minorem habebit proportionem, quàm C ad B; ac propterea C ad B maiorem habebit, quam C ad D. ergo B quàm D minor erit.* 8.huius. B 10.huius.

TEOREMA XV. PROPOSITIO XV.

Partes eodem modo multiplicium inter se cõparatę eandem habent proportionem.

Sit enim AB æque multiplex C, et DE ipsius F. Dico vt C ad F, ita esse AB ad DE; Quoniam enim æque multiplex est AB ipsius C, et DE ipsius F; quot magnitudines sunt in AB æquales ipsi C, totidem erunt et in DE æquales F. diuidatur AB in magnitudines ipsi C æquales, quæ sint AG GH HB. et DE diuidatur in magnitudines æquales F, videlicet in DK KL LE. erit igitur ipsarum AG GH HB multitudo æqualis multitudini DK KL LE. et quoniam æquales sunt AG GH HB, suntq; DK KL LE inter se æquales; vt AG ad DK, ita erit GH ad KL, et HB ad LE. atque erit vt vnum antecedentium ad vnum consequentium, ita omnia antecedentia ad omnia consequentia. est igitur vt AG ad DK, ita AB ad DE. Sed AG ipsi C est æqualis, et DK ipsi F. ergo vt C ad F, ita erit AB ad DE. partes igitur eodem modo multiplicium inter se comparatæ eandem habent proportionem. quod ostendendum fuit.



F. C. COMMENTARIVS.

Vt AG ad DK, ita erit GH ad KL, et HB ad LE.] *Ex ea, quam nos ad septimam huius, addidimus.*

THEOREMA. XVI. PROPOSITIO XVI.

Si quattuor magnitudines proportionales fuerint, et permutatæ proportionales erunt.

Sint quattuor magnitudines proportionales ABCD, sitq; vt A ad B, ita C ad D. Dico et permutatas proportionales esse, videlicet vt A ad C, ita esse B ad D. sumantur enim ipsarũ quidem AB æque multiplices EF; ipsarum vero CD aliæ vtcumque æque multiplices GH. et quoniam æque multiplex est E ipsius A, et F ipsius B; partes autem eodem modo multiplicium inter se comparatæ eãdem habent proportionem: erit vt A ad B, ita E ad F: vt autem A ad B, ita C ad D. ergo & vt C ad D, ita E ad F. rursus quoniam GH sunt ipsarum CD æque multiplices; partes autem eodem modo multiplicium



R eandem

eandem proportionem habent inter ſe comparatæ, erit vt C ad D, ita G ad H. ſed
14.huius. vt C ad D, ita E ad F. ergo et vt E ad F, ita G ad H. Quòd ſi quattuor magnitudines proportionales ſint, prima autem maior ſit, quàm tertia; et ſecunda quàm quarta maior erit; et ſi æqualis, æqualis; et ſi minor, minor. Si igitur E ſuperat G, et F ipſam H ſuperabit, et ſi æqualis, æqualis; et ſi minor, minor; ſuntq; EF ipſarũ AB æque mul
5.diff. tiplices, et CH ipſarũ CD alię vtcumque æque multiplices. ergo vt A ad C, ita erit B ad D. Si igitur quattuor magnitudines proportionales fuerint, et permutatę proportionales erunt. quod oſtendere oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

Ex ijs, quæ demonſtrata ſunt, illud quoque demonſtrabitur.

Si prima ad ſecundam eandem proportionem habeat, quàm tertia ad quartam; ſitq; prima maior, quàm ſecunda; et tertia, quàm quarta maior erit; et ſi æqualis, æqualis; et ſi minor, minor.



Prima enim A ad ſecundam B eandem habeat proportionem, quàm tertia C ad quartam D: & ſit A maior, quàm B. Dico & C quàm D maiorem eſſe. Quoniam enim A ad B eandem proportionem habet, quam C ad D; habebit permutando ex antecedente A ad C eandem proportionem, quam B ad D. Rurſus quoniam A maior eſt quam B, alia vero vtcũque eſt C; habebit A ad C maiorem proportionem,
8.huius. *quàm B ad C. Sed vt A ad C, ita eſt B ad D, quod demonſtratum eſt. ergo B ad D maiorem proportionem*
10.huius. *habet, quàm ad C. Ad quam vero eadem maiorem habet proportionẽ, illa minor eſt. quare D minor eſt, quàm C; ideoq; C maior, quàm D. Sit deinde A æqualis ipſi B. dico & C ipſi D æqualem eſſe. nam cum A*
7.huius. *& B ſint æquales. habebit A ad C proportionem eãdem, quam B ad C. vt autem A ad C, ita B ad D. ergo B ad D eandem proportionem habet, quam ad C. Ad*
9.huius. *quas vero eadem proportionem eãdem habet, illæ æquales ſunt. ergo C ipſi D eſt æqualis. Sit poſtremo A minor, quàm B. Dico & C, quàm D minorem eſſe. quoniam enim A minor eſt quam B,*
8.huius. *habebit A ad C minorem proportionem, quàm B ad C. Sed vt A ad C, ita B ad D. habebit igitur B ad D minorem proportionem, quàm ad C, ideoq; B ad C maiorem proportionem habebit, quàm ad*
10.huius. *D. Ad quam vero eadem maiorem habebit proportionem, illa minor eſt. ergo C quàm D minor erit. ſi igitur prima ad ſecundam eandem proportioaem habeat, quàm tertia ad quartam: ſitq; prima maior, quàm ſecunda, & tertia, quàm quarta maior erit; & ſi æqualis, æqualis; & ſi minor, minor.*

ALITER. Habeat A ad B eandem proportionem, quam C ad D: ſitq; A maior, quàm B. Dico & C, quã D maiorẽ eſſe. Quoniã enim A ad B eandem proportionem habet quam C ad D; habebit permutando A ad C eandem proportionem, quam B ad D. ſed A maior eſt quàm B. ergo ex 14 huius & C, quàm D maior erit. Eodem modo demonſtrabimus ſi A ſit æqualis B, & C ipſi D eſſe æqualem. & ſi A ſit minor, quàm B, & C quàm D minorem eſſe. quod demonſtrare oportebat.

THEOREMA XVII. PROPOSITIO. XVII.

Si compoſitę magnitudines ſint proportionales, et diuiſæ proportionales erunt.

Sint compoſitę magnitudines proportionales AB, BE, CD, DF, ſitq; vt AB ad BE, ita CD ad DF. dico etiam diuiſas proportionales eſſe, videlicet vt AE ad EB,

ita esse CF ad FD: sumantur enim ipsarum quidem AE EB CF FD æque multiplices GH HK LM MN, ipsarum vero EB FD aliæ vtcumque æque multiplices KX NP. et quoniã æque multiplex est GH ipsius AE, et HK ipsius EB; erit GH ipsius AE æque multiplex, et GK ipsius AB. æque autem multiplex est GH ipsius AE, et LM ipsius CF: ergo GK æque multiplex est AB, et LM ipsius CF. rursus quoniam æque multiplex est LM ipsius CF, et MN ipsius FD; erit LM æque multiplex CF, et LN ipsius CD. Sed æque multiplex erat LM ipsius CF, & GK ipsius AB. æq; igitur multiplex est GK ipsius AB, et LN ipsius CD. quare GK LN ipsarum AB CD æque multiplices erunt. rursus quoniam æque multiplex est HK ipsius EB, et MN ipsius FD; est autem et KX ipsius EB æque multiplex, & NP ipsius FD: & composita HX ipsius EB æque multiplex est, et MP ipsius FD. quòd cum sit vt AB ad BE, ita CD ad DF, et sumptæ sint ipsarum quidem AB CD æque multiplices GK LN; ipsarum vero EB FD aliæ vtcumque æque multiplices HX MP; si GK superat HX, & LN superabit MP; & si æqualis, æqualis; & si minor, minor. superet igitur GK ipsam HX, communiq; ablata HK, et GH ipsam KX superabit. sed si GK superat HX, & LN superat MP. itaque superet LN ipsam MP, cõmuniq; MN ablata, & LM superabit NP. quare si GH superat KX, & LM ipsam NP superabit. Similiter demonstrabimus & si GH sit æqualis KX, & LM ipsi NP esse æqualem, & si minor, minorem. sunt autem GH LM ipsarum AE CF æque multiplices, & ipsarum EB FD aliæ vtcumque æque multiplices KX NP. ergo vt AE ad EB, ita erit CF ad FD. Si igitur compositæ magnitudines sint proportionales, & diuisæ proportionales erunt. quod demonstrare oportebat.



1.huius.
11.huius.
1.huius.
11.huius.
1.huius.
ex conuer. 5.diffi.
5.diffi.

THEOREMA XVIII. PROPOSITIO XVIII.

Si diuisæ magnitudines sint proportionales, & compositæ proportionales erunt.

Sint diuisæ magnitudines proportionales AE EB CF FD: & vt AE ad EB, ita CF ad FD. Dico etiam cõpositas proportionales esse, videlicet vt AB ad BE, ita esse CD ad DF. Si enim non est vt AB ad BE, ita CD ad DF; erit vt AB ad BE, ita CD vel ad minorem, quàm DF, vel ad maiorẽ. sit primũ ad minorẽ, nempe ad DG. & quoniam est vt AB ad BE, ita CD ad DG, cõpositæ magnitudines sunt proportionales. ergo et diuisæ proportionales erũt. est igitur vt AE ad EB, ita CG ad GD. ponitur aũt & vt AE ad EB, ita CF ad FD, quare & vt CG ad GD, ita CF ad FD. at CG prima maior est, quã tertia CF. ergo & secũda DG, quàm quarta DF maior erit. sed & minor, quod fieri non potest. non igitur est vt AB ad BE, ita CD ad DG, similiter ostendemus neque esse ad maiorem, quàm DF. ad ipsam igitur DF sit necesse est. quare si diuisæ magnitudines sint proportionales, & compositæ proportionales erunt. quod oportebat demonstrare.



Ex antecedente. 11.huius. 14.huius.

THEOREMA XIX. PROPOSITIO XIX.

Si fuerit vt tota ad totam, ita ablata ad ablatam; & reliqua ad reliquam erit, vt tota ad totam.

Sit enim vt tota AB ad totam CD, ita ablata AE ad ablatam CF. Dico et reliquã EB

EB ad reliquam FD ita esse,vt totam AB ad totam CD.quoniã enim
16.huius. est vt tota AB ad totam CD, ita AE ad CF;& permutando erit vt B
A ad AE, ita DC ad CF.et quoniam compositæ magnitudines sunt
17.huius. proportionales,& diuisæ proportionales erunt. vt igitur BE ad EA,
ita DF ad FC,rursusq; permutando vt BE ad DF, ita EA ad FC. sed
11.huius. vt AE ad CF,ita posita est AB ad CD:et reliqua igitur EB erit ad re
liquam FD,vt tota AB ad totam CD.quare si fuerit vt tota ad totã,
ita ablata ad ablatam; & reliqua ad reliquam,erit vt tota ad totam.
quod demonstrare oportebat.

Et quoniam ostensum est vt AB ad CD,ita esse EB ad FD,erit per
mutando vt AB ad BE,ita CD ad DF. ergo compositæ magnitudi-
nes proportionales sunt.ostẽsum autem est vt BA ad AE, ita DC ad
CF,quod est per conuersionem rationis.

COROLLARIVM.

Ex hoc igitur perspicuum est si compositæ magnitudines sint proportionales;& per cõuersionem rationis proportionales esse.

Facte autem sunt proportiones et in æque multiplicibus, et in analogijs.nam si prima secundæ æque multiplex sit, atque tertia quartę;erit et vt prima ad secundã, ita tertia ad quartam.sed non item ex contrario cõuertitur.Si enim sit vt prima ad secundam,ita tertia ad quartam;nõ omnino erit prima quidem secundę æque multiplex,tertia vero quartæ,velut in sesquialteris,vel in sesquitertijs proportionibus, vel alijs eiusmodi.quod demonstrare oportebat.

THEOREMA. XX. PROPOSITIO. XX.

Si sint tres magnitudines, et alię ipsis numero æquales, quæ binę sumantur, et in eadem proportione; ex æquali autem prima maior sit, quàm tertia: et quarta quàm sexta maior erit; & si æqualis,æqualis;et si minor,minor.

Sint tres magnitudines A B C, et aliæ ipsis numero æquales D E F binæ sumptę,et in eadem proportione, sitq; vt A ad B, ita D ad E;et vt B ad C,ita E ad F;ex æquali autem maior sit A, quã C.Dico et D quàm F maiorem esse;et si æqualis,æqualem;et si minor;minorem. Quoniam enim A maior est,quàm C,alia vero vtcumque B,et maior ad eandem maiorem habet proportionem,
8.huius. A quàm minor: habebit A ad B maiorem proportionem, quàm C ad B.Sed vt A ad B,ita D ad E: et conuertendo vt C ad B, ita F ad E. ergo et D ad E maiorem habet proportionem, quàm F ad
10.huius. E. Ad eandem vero proportionem habentium quæ maiorem
B habet proportionem,illa maior est.maior igitur est D quàm F. similiter ostendemus et si A sit æqualis C;et D ipsi F æqualem esse; et si minor,minorem.Si igitur tres magnitudines fuerint, et aliæ ipsis numero æquales,quæ binę sumantur, et in eadem proportione; ex æquali autem prima maior sit, quàm tertia: et quarta quàm sexta maior erit; et si æqualis, æqualis; et si minor, minor. quod ostendere oportebat.



F. C. COMMENTARIVS.

A Habebit A ad B maiorem proportionẽ, quàm C ad B.sed vt A ad B, ita D ad E]

Ex

Ex his sequitur per decimamtertiam huius D ad E maiorem proportionem habere, quàm C ad E. vt autem C ad E; ita F ad E. quare per eandem D ad E maiorem habet proportionem, quàm F ad E.

Similiter ostendemus et si A sit æqualis G, et D ipsi F æqualem esse; et si minor, minorem]

Si enim A sit aequalis C, habebit A ad B proportionem eandem, quam C ad B. Sed vt A ad B, ita D ad E, & vt C ad B, ita F ad E. quare D ad E eandem proportionem habebit, quam F ad E. quae vero ad eandē, eandem habent proportionem, inter se aequales sunt. ergo D ipsi F est aequalis. Quòd si A ponatur minor quàm C, habebit A ad B proportionem minorem, quàm C ad B. vt autem A ad B, ita D ad E. ergo D ad E minorem proportionem habet, quàm C ad B. Sed vt C ad B, ita F ad E. habebit igitur D ad E minorē proportionē, quàm F ad E; ac propterea D quàm F, minor erit.



B

7.huius.

11.huius. 9.huius.

8.huius.

13.huius.

10.huius.

THEOREMA XXI.
PROPOSITIO XXI.

Si sint tres magnitudines, et aliæ ipsis numero æquales, quę binę sumantur, et in eadem proportione; sit autem perturbata earum analogia, et ex æquali prima maior sit quàm tertia: et quarta quàm sexta maior erit; et si æqualis, æqualis; et si minor, minor.



Sint tres magnitudines proportionales A B C, et aliæ ipsis numero æquales D E F, binæ sumptæ, et in eadem proportione. sit autem perturbata earum analogia, videlicet vt A quidem ad B, ita E ad F; vt vero B ad C, ita D ad E; et ex æquali A maior sit, quàm C. Dico et D quàm F maiorem esse; et si æqualis, æqualem; et si minor, minorem. Quoniam enim maior est A, quàm C, alia vero B; habebit A ad B maiorem proportionem, quàm C ad B. Sed vt A ad B, ita E ad F, et conuertendo vt C ad B, ita E ad D. quare et E ad F maiorem habebit proportionem, quàm E ad D. ad quam vero eadem maiorem proportionem habet, illa minor est. minor igitur est F, quàm D; ac propterea D quàm F maior erit. Similiter ostendemus et si A sit æqualis C, et D ipsi F esse æqualem; et si minor, minorem. Si igitur sint tres magnitudines, et aliæ ipsis æquales numero, quæ binæ sumantur, et in eadem proportione; sit autem perturbata earū analogia, et ex æquali prima maior sit, quàm tertia; et quarta quàm sexta maior erit; et si æqualis, æqualis; et si minor, minor. quod demonstrare oportebat.

8.huius.

10.huius.

THEOREMA XXII. PROPOSITIO XXII.

Si sint quotcumque magnitudines, et aliæ ipsis numero æquales, quæ binæ sumantur in eadem proportione; et ex æquali in eadem proportione erunt.

Sint

Sint quotcumque magnitudines A B C, et aliæ ipſis numero ęquales DEF binę ſumptæ in eadem proportione, ſitq; ut A quidem ad B, ita D ad E; ut autem B ad C, ita E ad F. Dico et ex æquali in eadem proportione eſſe vt A ad C, ita D ad F. ſumantur enim ipſarum quidem A D æque multiplices G H; ipſarum vero BE alię vtcumque æque multiplices KL, et ipſarum CF aliæ vtcumque æque multiplices MN. Quoniã igitur eſt vt A ad B, ita D ad E, et ſumptę ſunt ipſarum AD ęque multiplices GH, et ipſa-
4.huius. rum BE alię vtcumque æque multiplices KL; erit vt G ad K, ita H ad L. eadem quoque ratione erit vt K ad M, ita L ad N. et cũ ſint tres magnitudines GKM, et alię ipſis numero ęquales H L N, binæ ſumptæ,
20.huius. et in eadem proportione; ex æquali ſi G ſuperat M, et H ipſã N ſuperabit; et ſi æqualis, æqualis; et ſi minor, minor; ſuntq; GH ipſarũ AD æq; multiplices, et MN ipſarum CF aliæ utcumque æque multiplices.
5.diff. vt igitur A ad C, ita erit D ad F. quare ſi ſint quotcumque magnitudines, et aliæ ipſis numero ęquales, quæ binę ſumantur, in eadem proportione; et ex ęquali in eadem proportione erunt. quod demonſtrare oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

Idem demonſtrabitur etiam ſi plures ſint, quàm tres magnitudines.

Sint enim quattuor magnitudines ABC D, & aliae ipſis numero ęquales EFGH binae ſumptae in eadem proportione, ſitq; vt A ad B, ita E ad F, ut aũt B ad C, ita F ad G, et vt C ad D, ita G ad H. Dico ex aequali ut A ad D, ita eſſe E ad H. Quoniam enim eſt vt A ad B, ita E ad F,
3 *et vt B ad C, ita F ad G; & ex aequali per ea, quae proxime oſtenſa ſunt, vt A ad C, ita erit F ad G, eſtq; vt C ad D, ita G ad H. Quare cum rurſus tres magnitudines ſint ACD, et aliae ipſis numero aequales EGH binae ſumptae in eadem proportione; erit ex aequali vt A ad D, ita E ad H. quod demonſtrare oportebat. & eodẽ modo demonſtrabitur in alijs eiuſmodi magnitudinibus quotquot fuerint, non ſolum in ordinata analogia, ſed et in perturbata. ſemper enim ad tres magnitudines eiuſdem ordinis ſimiliter reducentur.*



THEOREMA XXIII. PROPOSITIO XXIII.

Si ſint tres magnitudines, et aliæ ipſis numero æquales, quæ binæ ſumantur in eadem proportione, ſit autem perturbata earum analogia; et ex æquali in eadem proportione erunt.

Sint

Sint tres magnitudines A B C, et aliæ ipſis numero æquales binæ ſumptæ in eadem proportione D E F; ſit autem perturbata earum analogia, et ſit vt A ad B, ita E ad F, & vt B ad C, ita D ad E. Dico vt A ad C, ita eſſe D ad F. ſumantur ipſarum quidem A B D æque multiplices G H K; ipſarum vero C E F aliæ vtcumque æque multiplices L M N. & quoniam G H æque multiplices ſunt ipſarum A B, partes autem eodem modo multiplicium eãdem habent proportionem; erit vt A ad B; ita G ad H. & ſimili ratione vt E ad F, ita M ad N. atque eſt vt A ad B, ita E ad F. vt igitur G ad H, ita M ad N. rurſus quoniam eſt vt B ad C, ita D ad E, & ſumptæ ſunt ipſarũ B D æque multiplices H K; ipſarum vero C E aliæ vtcumque æque multiplices L M; erit vt H ad L, ita K ad M. oſtenſum autem eſt et vt G ad H, ita eſſe M ad N. Quoniam igitur tres magnitudines proportionales ſunt G H L, & aliæ ipſis numero æquales K M N binæ ſumptæ in eadem proportione, eſtq; ipſarum perturbata analogia; ex æquali ſi G ſuperat L, & K ipſam N ſuperabit; & ſi æqualis, æqualis; & ſi minor, minor. ſunt autem G K ipſarũ A D æque multiplices; & L N æque multiplices ipſarum C F. vt igitur A ad C, ita erit D ad F. quare ſi fuerint tres magnitudines, & aliæ ipſis numero æquales, quæ binæ ſumantur in eadem proportione, ſit aũt perturbata earum analogia; & ex æquali in eadem proportione erunt. quod demonſtrare oportebat.



15. huius.
11. huius.
4. huius.
21. huius.
5. diffi.

F. C. COMMENTARIVS.

Dico vt A ad C, ita eſſe D ad F] *in græco codice impreſſo hęc deſiderantur.* λέγω ὅτι ἐστὶν ὡς τὸ Α πρὸς τὸ Γ, οὕτω τὸ Δ πρὸς τὸ Ζ

Erit vt H ad L, ita K ad M. oſtenſum autem eſt vt G ad H, ita eſſe M ad N] *hoc loco in græco codice impeſſo, & in Zamberti verſione multa inſerantur ſupervacanea, quæ à nobis conſulto omiſſa ſunt.*

THEOREMA XXIIII. PROPOSITIO. XXIIII.

Si prima ad ſecundam eandem habeat proportionem, quam tertia ad quartam; habeat autem & quinta ad ſecundam proportionem eandem, quam ſexta ad quartam: & compoſita prima & quinta ad ſecundam eandem proportionem habebit, quam tertia, & ſexta ad quartam.

Prima enim A B ad ſecundam C eandem habeat proportionem, quam tertia D E ad quartam F. habeat autem & quinta B G ad ſecundam C proportionem eandem, quam ſexta E H ad quartam F. dico & compoſitam primam, & quintam A G ad ſecundam C eandem proportionem habere, quam tertiam, & quintam D H ad quartam

tam F.quoniam enim eſt vt BG ad C, ita EH ad F;erit conuertendo vt C ad BG, ita F ad EH. & quoniam vt AB ad C,ita eſt
22.huius. DE ad F, vt autem C ad BG,ita F ad EH; erit ex æquali vt AB ad BG,ita DE ad EH.quòd cum diuiſæ magnitudines ſint proportionales, & compoſitæ proportionales erunt. vt igitur AG ad GB,ita eſt DH ad HE. ſed & vt GB ad C, ita EH ad F. ergo ex æquali vt AG ad C, ita erit DH ad F.ſi igitur prima ad ſecũdam eandem habeat proportionem, quàm tertia ad quartam; habeat autem & quinta ad ſecundam proportionem eandem, quam ſexta ad quartam:& compoſita prima & quinta ad ſecundam eandem proportionem habebit, quam tertia & ſexta ad quartam.quod oſtendere oportebat.



THEOREMA XXV. PROPOSITIO. XXV.

Si quattuor magnitudines fuerint proportionales, maxima ipſarum, & minima duabus reliquis maiores erunt.

Sint quattuor magnitudines proportionales AB CD E F; & ſit vt AB ad CD,ita E ad F.ſit autem maxima ipſarum AB & F minima.Dico AB F ipſis CD E maiores eſſe.ponatur enim ipſi quidem E æqualis AG, ipſi vero F æqualis CH. Quoniam igitur eſt vt AB ad CD,ita E ad F;eſtq; AG æqualis E, & CH æqualis F;erit vt AB ad DC, ita AG ad CH. & quoniam vt tota AB
19.huius. ad totam CD, ita ablata AG ad ablatam CH; & reliqua GB ad reliquam HD erit vt tota AB ad CD totam. maior autem eſt AB,quàm CD.ergo & GB,quàm HD maior.quòd cum AG ſit æqualis ipſi E,& CH ipſi F;erunt AG F ipſis CH E æquales.ſi autem inæqualibus æqualia addantur, tota inæqualia erunt. ergo GB HD inæqualibus exiſtentibus,quippe cum GB ſit maior, ſi ipſi quidem GB addantur AG F, ipſi vero HD addantur CH E,fient AB F ipſis CD E neceſſario maiores.Si igitur quattuor magnitudines fuerint proportionales,maxima ipſarum & minima duabus reliquis maiores erunt.quod demonſtrare oportebat.



F. C. COMMENTARIVS.

Ex iis, quae proxime demonſtrata ſunt, poſſumus etiam illud theorema demonſtrare.

Sit tres magnitudines fuerint proportionales, maxima ipſarum & minima quàm dupla reliquæ maiores erunt.

Sint tres magnitudines propartionales AB CD E, quarum maxima AB, ſitq; vt AB ad CD,ita CD ad E. Dico AB E maiores eſſe, quàm duplam ipſius CD.ponatur AF aequalis ipſi CD,& CG ipſi E. Quoniam igitur vt AB ad CD,ita CD ad E;erit vt AB ad CD, ita AF ad CG,videlicet vt tota ad totam,& ablata ad ablatam. quare & reliqua FB ad reliquam GD eſt,vt AB
19.huius. *ad CD.ſed AB ponitur maior,quàm CD.ergo & FB, quàm GD eſt maior.aequalis autem eſt AF ipſi CD,& CG ipſi E. Sunt igitur AF E ipſis CD CG aequales.quòd ſi inęqualibus aequalia addantur, tota inaequalia erunt.itaque additis AF E ipſi FB,quę maior eſt,quàm GD, & additis CD CG ipſis GD, fient AB E maxima ſcilicet, & minima maiores, quàm dupla CD. Si igitur tres magnitudines fuerint proportionales maxima ipſarum & minima,quam dupla reliquae maiores erunt.quod demonſtrare oportebat.*



Aliter.

Aliter. Sint tres magnitudines proportionales ABC, & ipsi B ponatur aequalis D. Itaque quoniam est vt A ad B, ita B ad C, erit & vt A ad B, ita D ad C. Sunt igitur quattuor magnitudines proportionales ABDC. quare ex iam demonstratis AC maiores erunt, quàm BD, hoc est quàm ipsius AE dupla.



Hæc Euclides de proportionibus scripta reliquit. Sed quoniam Archimedes, Apollonius, & alij posteriores nonnullis theorematibus, quæ ad huiusmodi tractationem pertinent, tamquam demonstratis vtuntur; optimum fore iudicauimus, si ex collectionibus mathematicis Pappi ea in hunc locum transferremus, immutato tamen ordine, & quibusdam additis, datractisue, prout res ipsa exigere videbatur.

THEOREMA XXVI. PROPOSITIO. XXVI.

Si prima ad secundam maiorem habeat proportionem, quàm tertia ad quartam; & conuertendo secunda ad primam minorem proportionẽ habebit, quàm quarta ad tertiam.

Habeat AB ad BC maiorem proportionẽ, quàm DE ad EF. Dico CB ad BA minorem proportionem habere, quàm FE ad ED. vt enim AB ad BC, ita sit DE ad aliam aliquã, vt ad G. ergo DE ad G maiorem habebit proportionem, quàm DE ad EF: ac propterea G minor erit, quàm EF. ponatur ipsi G æqualis EH. Quoniam igitur est vt AB ad BC, ita DE ad EH; erit conuertendo vt CB ad BA, ita HE ad ED. sed HE ad ED minorem proportionem habet, quàm FE ad ED. ergo & CB ad BA minorem habebit proportionem, quàm FE ad ED. quod demonstrare oportebat.



8. huius.

8. huius.

Similiter autem & si AB ad BC minorem proportionem habeat, quàm DE ad EF; demonstrabimus conuertendo CB ad BA maiorem habere proportionem, quàm FE ad ED. sed vt AB ad BC, ita sit DE ad aliam, vt ad EG, quæ maior erit, quàm EF. quare conuertendo vt CB ad BA, ita GE ad ED. at GE ad ED maiorem habet proportionem, quàm FE ad ED. ergo CB ad BA maiorem proportionem habebit, quàm FE ad ED.



8. huius.

COROLLARIUM.

Ex his constat, si AB ad BC maiorem proportionem habeat, quàm DE ad EF; & FE ad ED maiorem habere proportionem, quàm CB ad BA. & si AB ad BC minorem habeat proportionem, quàm DE ad EF, & FE ad ED minorem proportionem habere, quàm CB ad BA.

THEOREMA XXVII. PROPOSITIO XXVII.

Si prima ad secundam maiorem proportionem habeat, quàm tertia ad quartam; & permutando prima ad tertiam maiorem habebit proportionem, quàm secunda ad quartam.

Habeat AB ad BC maiorem proportionem, quàm DE ad EF. Dico AB ad DE maiorem proportionem habere, quàm BC ad EF. vt enim AB ad BC, ita alia quædam GE



8.huius. sit ad EF. manifestum est eam maiorem esse,
8.huius. quàm DE. quare permutãdo vt AB ad GE, ita est BC ad EF. habet autem AB ad DE maiorem proportionem, quàm AB ad GE, hoc est quàm BC ad EF. ergo AB ad DE maiorem proportionem habebit, quàm BC ad EF. quod oportebat demonstrare.

Eadem ratione & si AB ad BC minorem habeat proportionem, quàm DE ad EF; sequetur permutando AB ad DE minorem proportionem habere, quàm BC ad EF. erit enim vt AB ad BC, ita alia quędam GE ad EF, quę minor sit, quam DE. Sed AB ad DE minorẽ habet proportionem, quàm AB ad GE, videlicet quàm BC ad EF. habebit igitur AB ad DE minorem, proportionem, quàm BC ad EF.



THEOREMA. XXVIII. PROPOSITIO. XXVIII.

Si prima ad secundam maiorem proportionem habeat, quàm tertia ad quartam; etiam componendo prima & secunda ad secundam maiorẽ proportionem habebit, quàm tertia & quarta ad quartam.

Habeat AB ad BC maiorem proportionem, quàm DE ad EF. Dico AC ad CB maiorem habere proportionem, quàm DF ad FE. vt enim AB ad BC, ita sit alia quędam



8.huius. GE ad EF. erit GE maior, quàm DE. quoniã
18.huius. igitur est vt AB ad BC, ita GE ad EF; erit componẽdo vt AC ad CB, ita GF ad FE.
8.huius. Sed GF ad FE maiorem proportionem habet, quàm DF ad FE. ergo & AC ad CB
13 huius. maiorem habebit proportionem, quàm DF ad FE. quod demonstrare oportebat.

Quòd si AB ad BC minorem proportionem habeat, quàm DE ad EF; habebit etiam componẽdo AC ad CB minorem proportionem, quàm DF ad FE. rursus enim quoniam AB ad BC minorem proportionem habet,



8.huius. quàm DE ad EF, si vt AB ad BC, ita sit alia quædam ad EF, velut GE, erit ea minor quàm DE; & vt AC ad CB, ita erit GF ad FE. Sed GF ad FE minorem habet proportionem, quàm DF ad FE. ergo & AC ad CB minorem proportionem habebit quàm DF ad FE.

THEOREMA XXIX. PROPOSITIO. XXIX.

Si prima & secunda ad secundam maiorem habeat proportionem, quàm tertia, & quarta ad quartam; & diuidendo prima ad secundam maiorem proportionem habebit, quàm tertia ad quartam.

Habeat AC ad CB maiorem proportionem, quàm DF ad FE. Dico AB ad BC maiorem proportionem habere, quàm DE ad EF. vt enim DF, ad FE, ita sit alia quędam GC ad CB. erit vtique GC minor,



8 huius.

quàm

quàm AC: & diuidendo GB ad BC, vt DE ad EF. at AB ad BC maiorem proportionem habet, quàm GB ad BC. ergo & AB ad BC maiorem habebit proportionem, quàm DE ad EF. 17.huius. 13.huius.

Si vero AC ad CB minorem habeat proportionem, quàm DF ad FE; & diuidendo AB ad BC minorem proportionem habebit, quàm DE ad EF. si enim rursus sit vt DF ad FE, ita alia quædam GC ad CB; erit GC quàm AC maior: atque erit diuidendo GB ad BC, vt DE ad EF. habet autem AB ad BC minorem proportionem, quàm GB ad BC. ergo & minorem proportionem habebit, quàm DE ad EF. 8.huius. 17.huius.



THEOREMA XXX. PROPOSITIO XXX.

Si prima & secunda ad secundam maiorem proportionem habeat, quàm tertia & quarta ad quartam; per conuersionem rationis prima & secunda ad primam minorem habebit proportionem, quàm tertia, & quarta ad tertiam.

Habeat AC ad CB maiorem proportionem, quàm DF ad FE. Dico CA ad AB minorem habere proportionem, quàm FD ad DE. sit enim vt AC ad CB, ita DF ad aliam quādam, erit vtique ad minorem quàm FE, velut ad FG. quare per conuersionem rationis vt CA ad AB, ita erit FD ad DG. sed FD ad DG minorem proportionem habet, quàm FD ad DE. ergo & CA ad AB minorem habebit proportionem, quàm FD ad DE. Corol. 9. huius.



Similiter autem & si AC ad CB minorem proportionem habeat, quam DF ad FE, habebit per conuersionem rationis CA ad AB maiorem proportionem, quàm FD ad DE. erit enim vt AC ad CB, ita DF ad maiorem quàm FE. reliqua vero manifesta erunt.



THEOREMA XXXI. PROPOSITIO XXXI.

Si prima ad tertiam maiorem proportionem habeat, quam secunda ad quartam, etiam prima ad tertiam habebit maiorem proportionem, quàm prima & secunda ad tertiam & quartam.

Habeat AB ad DE maiorem proportionem, quàm BC ad EF. Dico & AB ad DE maiorem proportionē habere, quàm AC ad DF. Sit enim vt AB ad DE, ita BC ad aliam. erit igitur ad minorem, quàm EF, velut ad EG. tota igitur AC ad totam DG est; vt AB ad DE. Sed AC ad DG maiorem proportionem habet, quàm ad DF. ergo AB ad DE maiorem habebit proportionem, quàm AC ad DF. et manifestum est totam AC ad totam DF minorem proportionem habere, quàm AB ad DE. & si minor sit proportio partis, totius maior erit. 12.huius. 8.huius.



THEOREMA XXXII. PROPOSITIO. XXXII.

Si tota ad totam maiorem habeat proportionem, quàm ablata ad abla-

tam, & reliqua ad reliquam maiorem proportionem habebit, quàm tota ad totam.

Habeat AC ad DF maiorem proportionẽ, quàm AB ad DE. Dico & reliquam BC ad reliquam EF maiorem proportionem habere, quàm AC ad DF. Sit enim vt AC ad DF, ita AB ad DG. ergo et reliqua BC ad reliquam GF eſt vt AC ad DF. Sed BC ad EF maiorem proportionem habet, quàm ad FG. ergo et BC ad EF maiorem habebit proportionem, quàm AC ad DF.



19.huius.

Si uero AC ad DF minorem proportionem habeat, quàm AB ad DE, et reliqua BC ad reliquam EF minorem proportionem habebit, quàm AC ad DF, quod eodem, quo ſupra, modo oſtendetur.

THEOREMA XXXIII. PROPOSITIO XXXIII.

Si ſint tres magnitudines, & aliæ ipſis numero æquales, habeatq́ue prima priorum ad ſecundam maiorem proportionem, quàm prima poſteriorum ad ſecundam; ſecunda vero priorum ad tertiam maiorem proportionem habeat, quàm ſecunda poſteriorum ad tertiam: etiam ex æquali prima priorum ad tertiam maiorem habebit proportionem, quàm prima poſteriorum ad tertiam.

Habeat A ad B maiorem proportionem, quàm D ad E, & B ad C maiorem proportionem habeat, quàm E ad F. Dico ex æquali A ad C maiorem habere proportionem, quàm D ad F. Quoniã enim A ad B maiorem proportionem habet, quàm D ad E; habebit permutando A ad D maiorem proportionem, quàm B ad E, et eadem ratione B ad E maiorem, quàm C ad F. ergo A ad D maiorem habet proportionem, quàm C ad F. et rurſus permutando A ad C maiorẽ habebit, quàm D ad F. quod oportebat demõſtrare.



27.huius.

Ex demonſtratis ad 13.huius. & 17.huius.

Quòd ſi prima priorum ad ſecundam minorem habeat proportionem, quàm prima poſteriorum ad ſecundam; ſecũda vero priorum ad tertiam minorem proportionem habeat, quàm ſecũda poſteriorum ad tertiam: ſimiliter demõſtrabitur etiam ex æquali primam priorum ad tertiam minorem proportionem habere, quàm primam poſteriorum ad tertiam.

QVINTI LIBRI FINIS.

EVCLIDIS ELEMENTORVM LIBER SEXTVS

CVM SCHOLIIS ANTIQVIS, ET COMMENTARIIS

Federici Commandini Vrbinatis.

DIFFINITIONES.

I.

IMILES figurę rectilineæ sunt, quę et singulos angulos æquales habent, et circa æquales angulos latera proportionalia.





II.

Reciprocę figuræ sunt, quãdo in vtraque figura antecedẽtes, et consequentes rationes fuerint.

F. C. COMMENTARIVS.





Per antecedentes, & consequentes rationes intellige antecedentes, & consequentes proportionis terminos: vt si sint duo rectangula ABC DBE, sitq́; vt AB ad BD, ita EB ad BC; dicentur hae figurae reciprocae, seu ex contraria parte sibi ipsis respondentes: quoniã in altera quidem est terminus antecedens primae proportionis, videlicet AB, et consequens secundae BC; in altera vero est consequens primae BD & antecedens secundae EB. sunt autem dictae figurae etiam inter se aequales, ut deinceps ostendetur.

Extrema

III.

Extrema ac media ratione secari recta linea dicitur, quando sit vt tota ad maiorem portionem, ita maior portio ad minorem.

F. C. COMMENTARIVS.

Extrema ac media ratione secari recta linea idcirco dicitur, quòd secetur in duas partes, quæ proportionis termini sunt, videlicet extremus et medius, nam tota primi termini locum obtinet. Sit enim recta linea AC ita diuisa in puncto B, erit AC primus terminus, AB medius, et BC extremus.



IIII.

Altitudo cuiusque figuræ est linea perpendicularis, quæ à vertice ad basim ducitur.



V.

Proportio ex proportionibus componi dicitur, quãdo proportionum quantitates inter se multiplicatę, aliquam efficiunt proportionem.

SCHOLIVM.

Proportio ex duabus proportionibus, vel ex pluribus componi dicitur, quando proportionum quantitates multiplicatæ faciunt aliquam proportionis quantitatem.

Habeat enim AB ad CD proportionem datam, vt duplam, vel triplam, vel aliam aliquam: CD vero ad EF similiter datam proportionem habeat. Dico proportionem AB ad EF compositam esse ex proportione AB ad CD, et proportione CD ad EF; vel si quantitas proportionis AB ad CD multiplicetur in proportionis CD ad EF quantitatem, facere quantitatem proportionis AB ad EF. Sit enim primũ AB maior, quàm CD, et CD quàm EF maior: Sitq; AB dupla CD, et CD ipsius EF tripla. Quoniã igitur CD quidem ipsius EF tripla est, ipsius autem CD dupla AB; erit AB ipsius EF sextupla: quoniã si triplum alicuius duplicabimus, fiet ipsius sextuplum. hoc enim propriè est compositio. vel hoc modo. Quoniam AB ipsius CD est dupla, diuidatur AB in partes æquales ipsi CD, quæ sint AG GB. et quoniam CD est tripla EF, æqualis autẽ AG ipsi CD; erit AG ipsius EF



tripla.

tripla.ideoq; tota AB ipsius EF sextupla est. quare proportio AB ad EF coniungitur per medium terminũ CD;composita ex proportione AB ad CD,& proportione CD ad EF.Similiter autem & si CD sit vtrisque AB EF minor,idẽ concludetur.Sit enim rursus AB quidem tripla ipsius CD, CD vero ipsius EF dimidia.& quoniam CD dimidia est ipsius EF,& ipsius CD tripla AB;erit AB sesquialtera ipsius EF. si enim dimidium alicuius triplicabimus,habebit ipsum semel, & eius dimidium. Et quoniã AB ipsius CD est tripla, CD vero dimidia EF;quarum partium ipsi CD æqualium AB est trium, earum est EF duarum.ergo AB sesquialtera est ipsius EF. proportio igitur AB ad EF connectitur per CD medium terminum,cõposita ex proportione AB ad CD, & proportione CD ad EF. Sed rursus sit CD vtrisque AB EF maior:& sit AB quidem ipsius CD dimidia, CD vero sesquitertia ipsius EF.Quoniã igitur quarum partium est AB duarum,earum CD est quattuor:quarum autem CD est quattuor,earum EF est trium:& quarum AB duarum,earumdem EF trium. Ergo proportio AB ad EF rursus connectitur per CD medium terminum;quę est duorum ad tria. Similiter et in pluribus,& in reliquis casibus.Et manifestum est,si à composita proportione vnus quiuis componentium auferatur, vno simplicium ejecto, reliquos componentium assumi.

FED. COMMANDINVS.

Lege Eutocium incommentarijs in quartam propositionem secundi libri Archimedis de sphęra & Cylindro, & in commentarijs in vndecimam propositionem primi libri conicorum Apollonij.

THEOREMA I. PROPOSITIO I.

Triangula & parallelogramma, quę eandem habent altitudinem,inter se sunt,vt bases.



Sint triangula quidẽ ABC ACD; parallelogramma vero EC CF, quæ eandem habeant altitudinem, videlicet perpendicularem à puncto A ad BD ductam.Dico vt basis BC ad CD basim, ita esse triangulum ABC ad triangulum ACD; & parallelogrammum EC ad CF parallelogrammum. producatur enim BD ex vtraque parte ad puncta H L,& ipsi quidem BC basi æquales quotcunque ponantur BG GH, ipsi vero basi CD ponãtur quotcũq; æquales DK KL, & AG AH AK AL iũgãtur. 38.huius primi Quoniam igitur CB BG GH inter se æquales sunt;erunt & triãgula AHG AGB ABC inter se æqualia.ergo quotuplex est basis HC ipsius BC basis, totuplex est AHC triangulum trianguli ABC.Eadem ratione quotuplex est LC basis, ipsius basis CD,totuplex est & triangulum ALC ipsius ACD trianguli:et si æqualis est HC basis basi CL,& triangulum AHC triangulo ALC est æquale:& si basis HC basim CL superat,& triangulum AHC superabit triangulum ALC:& si minor,minus. Quattuor igitur magnitudinibus existentibus,videlicet duabus basibus BC CD, & duobus triangulis ABC ACD,sumpta sunt æquemultiplicia,basis quidem BC,& ABC trianguli,videlicet basis HC,& AHC triãgulum: basis vero CD,& trianguli ACD, alia vtcunque æque multiplicia,nempe CL basis, & ALC triangulum:atque ostensum

ſum eſt ſi HC baſis baſim CL ſuperat,& triangulũ AHC ſuperare triangulũ AL C;
5.diffi. quinti. & ſi æqualis,æquale:& ſi minor,minus.eſt igitur vt BC baſis ad baſi n CD, ita trian
1.primi. gulũ ABC ad ACD triãgulũ. Et qñ triãguli ABC duplũ eſt parallelogrãmũ EC,
15.quinti. & triãguli ACD parallelogrammũ FC duplum; partes autem eodem modo multi
plicium eandem inter ſe proportionem habent: erit vt ABC triangulum ad trian-
gulum ACD,ita parallelogrammum EC ad CF parallelogrammum. Quoniam igi
tur oſtenſum eſt,vt baſis BC ad CD baſim,ita eſſe ABC triangulum ad triangulum
ACD;vt autem ABC triangulum ad triangulum ACD,ita parallelogrammum EC
11 quinti. ad CF parallelogrammum:erit vt BC baſis ad baſim CD,ita parallelogrammum E
C ad CF parallelogrammum. Quare triangula & parallelogramma, quæ eandem
habent altitudinem inter ſe ſunt,vt baſes.quod demonſtrare oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

Sed & theorema illud verum eſt,quod demonſtrare hoc loco non putaui eſſe alienum.

Triangula & parallelogramma in æqualibus baſibus conſtituta, eandem inter ſe proportionem habent,quam eorum altitudines.



Sint duo triangula ABC DEF,& duo parallelogramma CG EH, quae aequales baſes habeãt BC EF:trianguli autem ABC,& parallelogrammi CG altitudo ſit AK:& trianguli DEF,& parallelogrammi EH altitudo DL.Dico vt AK ad DL, ita eſſe & triangulum ABC ad triangulum DEF, & parallelogrammum CG ad EH parallelogrammum. producantur BC EF,& ponantur baſi BC aequales quotcumque BM MN: & baſi EF aequales quotcumque FO OP, iungantúr AM AN DO DP: quot vero magnitudines ſunt in CN aequales baſi CB, tot ſumantur in linea Q aequales ipſi AK altitudini; & quot ſunt in EP aequales baſi EF,tot ſumantur in linea R aequales altitudini DL. Itaque quoniam triangula ANM AMB ABC ſunt in aequalibus baſibus conſtituta,& aequali altitudine;etiam inter ſe aequalia erunt. & eadem ratione triangula DEF DFO DOP erunt inter ſe aequalia.Quotuplex igitur eſt linea Q ipſius AK,totuplex eſt triãgulum ANC trianguli ABC: & quotuplex eſt linea R ipſius DL, totuplex eſt triangulum DPE trianguli DEF:& ſi Q ſit aequalis R,& triangulum ANC triangulo DPE aequale erit, ex premiſſa;erit namque altitudo AK, cuius tripla eſt Q aequalis altitudini DL, cuius ipſa R eſt tripla: ſi vero Q ſit maior,quàm R,& triangulum ANC maius erit,quàm triangulum DPE; et ſi minor, minus. triangulorum enim aequales baſes habentium,quae maiori ſunt altitudine, etiam maiora ſunt,alioquin ſequeretur totum parti aequale eſſe. Cum igitur quattuor ſint magnitudines, videlicet duae altitudines AK DL,& duo triangula ABC DEF:& ſumpta ſint aeque multiplicia, altitudinis quidem AK, & trianguli ABC; altitudinis vero DL,& trianguli DEF; alia vtcumque multiplicia: & oſtenſum ſit ſi linea Q ſuperat R,& triangulum ANC ſuperare triangulum DPE,& ſi aequalis, aequale;& ſi minor,minus:erit vt altitudo HA ad altitudinẽ DL,ita triangulũ ABC ad triangulum DEF. Sed trianguli ABC duplum eſt CG parallelogrammum, & trianguli DEF duplum parallelogrammum EH; partes autem eodem modo multiplicium eandem habent proportionem:erit parallelogrammum CG ad parallelogrammum EH, vt ABC triangulum ad triangulum DEF. Sed oſtenſum eſt vt altitudo AK ad altitudinem DL, ita eſſe triangulum ABC ad triangulum DEF. Vt igitur AK ad DL,ita eſt paralelogrammum CG ad EH parallelogrammum. Quare triangula,& parallelogramma in aequalibus baſibus conſtituta eandem inter ſe proportionem habent,quam eorum altitudines.quod demonſtrare oportebat.

Ex antecedente.

5.dif.quinti. 41.primi. 15.quinti.

THEO-

THEOREMA II. PROPOSITIO. II.

Si vni laterum trianguli parallela quædam recta linea ducta fuerit, proportionaliter secabit ipsius trianguli latera: & si trianguli latera proportionaliter secta fuerint, quæ sectiones coniungit recta linea reliquo trianguli lateri parallela erit.

Trianguli enim ABC vni laterum BC parallela ducatur DE. Dico vt BD ad DA, ita esse CE ad EA. Iungantur enim BE CD. triangulum igitur BDE triangulo CDE est æquale; in eadem enim sunt basi DE, & in eisdem DE BC parallelis: aliud autem triangulum est ADE: sed æqualia ad idem eandem habet proportionem. ergo vt triangulum BDE ad triãgulum ADE, ita est CDE triangulum ad triangulum ADE. Vt autem triangulum BDE ad triangulum ADE, ita est BD ad DA. nam cum eandem altitudinem habeant, videlicet perpendicularem à puncto E ad AB ductam, inter se sunt vti bases. & ob eandem causam vt CDE triangulum ad triangulum ADE, ita CE ad EA. & vt igitur BD ad DA, ita est CE ad EA. Sed trianguli ABC latera AB AC proportionaliter secta sint, & vt BD ad DA, ita sit CE ad EA: & iungatur DE. Dico DE ipsi BC parallelam esse. iisdem enim constructis, quoniam est vt BD ad DA, ita CE ad EA; vt autẽ BD ad DA, ita est BDE triangulum ad triangulũ ADE; et vt CE ad EA, ita CDE triangulum ad triangulum ADE: erit ut triangulum BDE ad triangulum ADE, ita CDE triangulum ad triangulum ADE. Quod cum vtrumque triangulorum BDE CDE ad triangulum ADE eandem habeat proportionem; erit BDE triangulum triangulo CDE æquale; & sunt in eadem basi DE. æqualia autem triangula, & in eadem basi constituta, etiã in eisdem sunt parallelis. ergo DE ipsi BC parallela est. Si igitur vni laterum trianguli parallela quædam recta linea ducta fuerit, proportionaliter secabit ipsius triãguli latera: & si trianguli latera proportionaliter secta fuerint, quæ sectiones coniũgit recta linea reliquo triãguli lateri parallela erit. quod oportebat demonstrare.



37. primi.
7. quinti.
Ex antecedente.
11. quinti.
11. quinti.
9. quinti.
40. primi.

THEOREMA III. PROPOSITIO III.

Si trianguli angulus bifariam secetur, secans autem angulum recta linea, secet etiam basim; basis partes eandem proportionem habebunt, quam reliqua trianguli latera: & si basis partes eandem proportionem habeant, quam reliqua trianguli latera; quæ à vertice ad sectionem ducitur recta linea, trianguli angulum bifariam secabit.

Sit triangulum ABC, & secetur angulus BAC bifariam recta linea AD. Dico vt BD ad DC, ita esse BA ad AC. ducatur enim per C ipsi DA parallella CE, & producta BA conueniat cum ipsa in E puncto. Quoniam igitur in parallelas AD EC incidit recta linea quædã AC, erit ACE angulus angulo CAD æqualis. Sed CAD angulus ponitur æqualis angulo BAD. ergo & BAD ipsi ACE angulo æqualis erit. Rursus quoniam in parallelas AD EC recta linea BAE incidit, exterior angulus BAD æqualis est interiori AEC. ostensus aũt est & angulus ACE angulo BAD æqualis. ergo & ACE ipsi AEC



9. primi.
31. primi.
29. primi.

6.primi. Ex antecedente. 7.quinti. Ex antecedente. 9.quinti. 29.primi.

æqualis erit: ac propterea latus AE æquale lateri AC. Et quoniam vni laterum trianguli BCE, videlicet ipsi EC parallela ducta est AD; erit vt BD ad DC, ita BA ad AE: æqualis aũt est AE ipsi AC; est igitur vt BD ad DC, ita BA ad AC. Sed sit vt BD ad DC, ita BA ad AC: & AD iungatur. Dico angulũ BAC bifariã sectũ esse recta linea AD. ijsdem enim constructis quoniam est vt BD ad DC, ita BA ad AC; Sed & vt BD ad DC, ita BA ad AE, etenim vni laterum trianguli BCE, videlicet ipsi EC parallela ducta est AD: erit & vt BA ad AC, ita BA ad AE. ergo AC est æqualis AE, ac propterea & angulus AEC angulo ECA æqualis. Sed angulus quidem AEC est æqualis angulo exteriori BAD; angulus vero ACE æqualis alterno CAD. quare & BAD angulus ipsi CAD æqualis erit. angulus igitur BAC bifariam sectus est recta linea AD. Ergo si trianguli angulus bifariam secetur, secans autem angulum recta linea, etiam basim secet; basis partes eandem proportionem habebunt, quam reliqua trianguli latera: & si basis partes eãdem proportionem habeant, quam reliqua trianguli latera; quæ à vertice ad sectionem ducitur recta linea trianguli angulum bifariam secabit. quod oportebat demonstrare.

THEOREMA IIII. PROPOSITIO. IIII.

Aequiangulorum triangulorum latera, quæ circum æquales angulos, proportionalia sunt: et homologa siue eiusdẽ rationis sunt latera, quę æqualibus angulis subtenduntur.



Sint æquiangula triangula ABC DCE, quæ angulũ quidem ABC angulo DCE, angulum vero ACB angulo DEC æqualem habeant: et præterea angulũ BAC angulo CDE. Dico triangulorum ABC DCE proportionalia esse latera, quæ sunt circa æquales angulos, et homologa, siue eiusdem rationis latera esse, quæ æqualibus angulis subtenduntur. Ponatur enim BC in directum ipsi CE. Et quoniam anguli ABC ACB duobus rectis minores sunt: æqualis aũt est angulus ACB angulo DEC; erunt ABC DEC anguli duobus rectis minores. quare BA ED productæ inter se conuenient. producantur, et conueniant in puncto F. et quoniam angulus DCE est æqualis angulo ABC; erit BF ipsi DC parallela. Rursus quoniam æqualis est angulus ACB angulo DEC, parallela erit AC ipsi FE. parallelogrammum igitur est FACD; ac propterea FA quidem ipsi CD, AC vero ipsi FD est æqualis. Et quoniam vni laterũm trianguli FBE, videlicet ipsi FE parallela ducta est AC; erit vt BA ad AF, ita BC ad CE. æqualis autem est AF ipsi CD. Vt igitur BA ad CD, ita BC ad CE: et permutando vt AB ad BC, ita DC ad CE. Rursus quoniam CD parallela est BF, erit vt BC ad CE, ita FD ad DE. Sed DF est æqualis AC. ergo vt BC ad CE, ita AC ad ED. permutando igitur vt BC ad CA, ita CE ad ED. Itaque quoniam ostensum est, vt AB ad BC, ita DC ad CE, ut autem BC ad CA, ita CE ad ED; erit ex æquali vt BA ad AC, ita CD ad DE. æquiangulorum igitur triangulorum proportionalia sunt latera, quę circum æquales angulos: et homologa, siue eiusdem rationis latera sunt, quę æqualibus angulis subtenduntur. quod demonstrare oportebat.

27.primi. 28.primi. 34.primi. 6.huius. 7.quinti. 9.huius.

THEOREMA V. PROPOSITIO. V.

Si duo triangula latera proportionalia habeant, æquiangula erunt triangula, et æquales habebunt angulos, quibus homologa latera subtenduntur.

Sint

Sint duo triangula ABC DEF, quæ latera proportionalia habeant, sitq; ut AB quidem ad BC, ita DE ad EF; vt autem BC ad CA, ita EF ad FD: et adhuc vt BA ad AC, ita ED ad DF. Dico triangulum ABC triangulo DEF æquiangulũ esse, et æquales habere angulos, quibus homologa latera subtenduntur, angulum quidem ABC angulo DEF, angulum vero BCA angulo EFD; et præterea angulum BAC angulo EDF. constituatur enim ad rectam lineam EF, et ad puncta in ipsa EF, angulo quidem ABC æqualis angulus FEG; angulo autem BCA angulus EFG. quare reliquus BAC angulus reliquo EGF est æqualis. Ideoq; æquiangulum est triangulum ABC triangulo EGF. triangulorum igitur ABC EGF proportionalia sunt latera, quæ circum æquales angulos, et homologa latera sunt, quę æqualibus angulis subtenduntur. ergo vt AB ad BC, ita GE ad EF. Sed vt AB ad BC, ita DE ad EF. Vt igitur DE ad EF, ita GE ad EF. Quòd cum vtraque ipsarum DE EG ad EF eandem proportionem habeat, erit DE ipsi EG æqualis. Eadem ratione et DF æqualis FG. Itaque quoniam DE est æqualis EG, cõmunis autem EF; duæ DE EF duabus GE EF æquales sunt, et basis DF basi FG æqualis. angulus igitur DEF est æqualis angulo GEF, et DEF triangulum æquale triangulo GEF, et reliqui anguli reliquis angulis æquales, quibus æqualia latera subtenduntur. ergo angulus quidem DFE est æqualis angulo GFE, angulus vero EDF æqualis angulo EGF. Et quoniam angulus FED est æqualis angulo GEF, et angulus GEF angulo ABC; erit et angulus ABC angulo FED æqualis. Eadem ratione et angulus ACB æqualis est angulo DFE: et adhuc angulus ad A angulo ad D. ergo ABC triangulum triangulo DEF æquiangulum erit. Si igitur duo triangula latera proportionalia habeant, æquiangula erunt triangula; et æquales habebũt angulos, quibus homologa latera subtenduntur. quod oportebat demonstrare.



23. primi.

Ex antecedente.

11. quinti.

9. quinti.

8. primi.

THEOREMA VI. PROPOSITIO VI.

Si duo triangula vnum angulum vni angulo æqualem habeant, circa æquales autem angulos latera proportionalia; æquiangula erunt triangula, et æquales habebunt angulos, quibus æqualia latera subtenduntur.

Sint duo triangula ABC DEF vnum angulum BAC vni angulo EDF æquale habentia, circa æquales autem angulos latera proportionalia, sitq; ut BA ad AC, ita ED ad DF. Dico triangulum ABC triangulo DEF æquiangulum esse, et angulum quidem ABC habere æqualem angulo DEF; angulum uero ACB angulo DFE. constituatur enim ad rectã lineam DE, et ad puncta in ipsa DF, alterutri angulorum BAC EDF æqualis angulus FDG: angulo autem ACB æqualis DFG. reliquus igitur qui ad B reliquo qui ad G est æqualis. ergo triangulum ABC triangulo DGF æquiangulum est, ac propterea vt BA ad AC, ita est GD ad DF. ponitur autem & vt BA ad AC, ita ED ad DF. Vt igitur ED ad DF, ita GD ad DF. quare ED æqualis est ipsi DG: & communis DF. ergo duæ ED DF duabus GD DF



23. primi.

4. huius.

5. quinti.

9. quinti.

4.primi. æquales ſunt: & angulus EDF angulo G DF eſt æqualis. baſis igitur EF eſt æqualis baſi FG: triangulumq; DEF æquale triangulo GDF, & reliqui anguli reliquis angulis æquales, alter alteri, quibus æqualia latera ſubtenduntur. ergo angulus quidem DFG eſt æqualis angulo DFE; angulus vero ad G angulo ad E. ſed angulus DFG æqualis eſt angulo ACB. & angulus igitur ACB angulo DFE eſt æqualis. ponitur autem & BAC angulus æqualis angulo EDF. ergo & reliquus qui ad B æqualis reliquo qui ad E. æquiangulum igitur eſt triangulum ABC triangulo DEF. Quare ſi duo triangula vnum angulum vni angulo æqualem habeant, circa æquales autem angulos latera proportionalia; æquiangula erunt triangula, & æquales habebunt angulos, quibus homologa latera ſubtenduntur. quod oſtendere oportebat.



F. C. COMMENTARIVS.

Sunt qui hoc etiam aliter demonſtrẽt. Nam impoſito latere DE lateri AB, cadet DF in AC, quoniam angulus ad punctum D angulo ad A eſt aequalis. Vel igitur DE eſt aequale ipſi AB, vel inæquale. 4.primi. *& ſi quidem aequale, erit & DF aequale AC. ergo & baſis EF baſi BC, & reliqui anguli reliquis angulis aequales. Si vero DE ſit inæquale ipſi AE, ſit vtrumuis ipſorum maius; verbi cauſſa AB. tunc vt BA ad AC, ſic ED ad DF. ergo permutando vt BA ad AE; ſic CA ad AF:* 2.huius. *& diuidendo vt BE ad EA, ſic CF ad FA. quare latus EF* 29.primi. *parallelum eſt lateri BC, & idcirco angulus AEF angulo ABC, & angulus AFE angulo ACB eſt aequalis. quod oſtenſum oportuit.*



THEOREMA. VII. PROPOSITIO VII.

Si duo triangula vnum angulum vni angulo æqualem habeant, circa alios autem angulos latera proporrionalia, & reliquorum vtrumque ſimul, vel minorem, vel non minorem recto: æquiangula erunt triangula; & æquales habebunt angulos, circa quos latera ſunt proportionalia.

Sint duo triangula ABC DEF, vnum angulũ vni angulo æqualem habentia, videlicet angulũ BAC angulo EDF æqualem, circa alios autem angulos ABC DEF latera proportionalia, vt ſit DE ad EF, ſicut AB ad BC: & reliquornm qui ad CF. primum vtrumque ſimul minorem recto. Dico triangulum ABC triangulo DEF æquiangulum eſſe; angulumque ABC æqualem angulo DEF, & reliquum videlicet qui ad C reliquo qui ad F æqualem. Si enim inæqualis eſt angulus ABC angulo DEF, vnus ipſorum maior erit. Sit maior ABC: & conſtituatur ad rectam lineam AB, & ad punctum in ipſa B angulo DEF æqualis angulus ABG. Et quoniam angulus quidem A eſt æqualis angulo D, angulus vero ABG angulo DEF: erit reliquus AGB reliquo DFE æqualis. æquiangulum igitur eſt ABG triangulum triangulo DEF. quare vt AB ad BG, ſic DE ad EF: vtq; DE ad EF, ſic ponitur AB ad BC. & vt igitur AB ad BC, ſic AB ad BG. Quod cum AB ad vtramque BC. BG eandem habeat



23.primi.

4.huius.

beat proportionem, erit BC ipsi BG æqualis: ac propterea angulus ad C est æqualis angulo BGC. minor autē recto ponitur angulus, qui ad C. ergo & BGC minor est recto, & ob id qui ei deinceps est AGB maior recto. atque ostensus est angulus AGB æqualis angulo, qui ad F. angulus igitur qui ad F recto maior est. atqui ponitur minor recto, quod est absurdū. nō igitur inæqualis est angulus ABC angulo DEF. ergo ipsi est æqualis. est autē & angulus ad A æqualis ei, qui ad D. quare & reliquus qui ad C æqualis reliquo qui ad F. æquiangulum igitur est ABC triangulum triangulo DEF. Sed rursus ponatur vterque angulorum, qui ad C F non minor recto. Dico rursus & sic triangulum ABC triangulo DEF æquiangulum esse. ijsdem enim constructis similiter demonstrabimus BC æqualem ipsi BG, angulumq; ad C angulo BGC æqualem. sed angulus qui ad C non est minor recto. nō minor igitur recto est BGC. quare trianguli BGC duo anguli non sunt duobus rectis minores. quod fieri nō potest. nō igitur rursus inæqualis est ABC angulus angulo DEF. ergo æqualis necessario erit. est autē & qui ad A æqualis ei, qui ad D. reliquus igitur qui ad C reliquo qui ad F est æqualis. ac propterea triangulum ABC triangulo DEF æquiangulum est. Si igitur duo triangula vnum angulum vni angulo æqualem habeant, circa alios autem angulos latera proportionalia, & reliquorum vtrumque simul, vel minorem, vel non minorem recto: æquiangula erunt triangula, & æquales habebunt angulos, circa quos proportionalia sunt latera. quod oportebat demonstrare.

9. quinti. 5. primi. 13. primi. 17. primi.

THEOREMA VIII. PROPOSITIO. VIII.

Si in triangulo rectangulo ab angulo recto ad basim perpendicularis ducatur; quæ ad perpendicularem sunt triangula & toti & inter se similia sunt.



Sit triangulum rectangulum A B C, rectum habens angulum B A C: et à puncto A ad BC perpendicularis ducatur A D. Dico triangula A B D A D C toti triangulo A B C, et interse similia esse. Quoniam enim angulus B A C est æqualis angulo A D B, rectus enim vterque est: et angulus qui ad B communis duobus triāgulis A B C A B D: erit reliquus A C B reliquo B A D æqualis. æquiangulum igitur est triangulum A B C triangulo A B D. quare vt B C, quæ subtendit angulum rectum trianguli A B C, ad B A subtendentem angulum rectum trianguli A B D, sic ipsa A B subtendens angulum qui ad C trianguli A B C, ad B D subtendentem angulū æqualem angulo, qui ad C, videlicet B A D ipsius A B D trianguli: et adhuc A C ad A D subtendentem angulum qui ad B, communem duobus triangulis. ergo triangulum A B C triangulo A B D æquiangulum est; et circa æquales angulos latera habet proportionalia. Simile igitur est triangulum A B C triangulo A B D. Eadem ratione demonstrabimus etiam A D C triangulum triangulo A B C simile esse. Quare vtrumque ipsorum A B D A D C toti A B C triangulo est simile. Dico insuper triangula A B D A D C etiam inter se similia esse. Quoniam enim angulus B D A rectus, est æqualis recto A D C. Sed et B A D ostensus est æqualis ei, qui ad C; erit reliquus qui ad B reliquo D A C æqualis. æquiangulum igitur est triangulum A B D triangulo A D C. ergo vt B D trianguli A B D subtendens B A D angulum ad D A trianguli A D C subtendentem angulum, qui ad C, æqualem angulo B A D, sic ipsa A D trianguli A B D subtendens angulum, qui ad B, ad D C subtendentem angulum D A C ei, qui ad B, æqualem: et adhuc B A ad A C subtendentem angulum rectum A D C. Simile igitur est A B D triangulum triangulo A D C. Quare si in triangulo rectāgulo ab angulo recto ad basim perpendicularis ducatur; quę ad perpendicularem sunt triangula, et toti, et inter se, similia sunt. quod oportebat demonstrare.

4. huius.

1. diffi. huius

COROL-

COROLLARIVM.

Ex hoc manifeſtum eſt, ſi in triangulo rectangulo ab angulo recto ad baſim perpendicularis ducatur; ductam baſis partium mediam proportionalem eſſe: et adhuc baſis et vniuscuiuſque partium, latus quod ad partem, medium eſſe proportionale. quod demonſtrare oportebat.

PROBLEMA I. PROPOSITIO IX.

A data recta linea imperatam partem abſcindere.

Sit data recta linea AB. oportet ab ipſa AB imperatam partem abſcindere. Imperetur pars tertia: et ducatur à puncto A quædam recta linea AC, quæ cum ipſa AB angulum quemlibet contineat; ſumaturq; in AC quod vis punctum D, et ipſi AD æquales ponantur DE EC, deindę iungatur BC; et per D ipſi BC parallela ducatur DF. Itaque quoniã vni laterum triãguli ABC, videlicet ipſi BC parallela ducta eſt FD; erit vt CD ad DA, ita BF ad FA; dupla autem eſt CD ipſius DA. ergo et BF ipſius FA dupla erit. tripla igitur eſt BA ipſius AF. Quare à data recta linea AB imperata tertia pars AF abſciſſa eſt. quod facere oportebat.

a. huius.



PROBLEMA II. PROPOSITIO X.

Datam rectam lineam inſectam, datæ rectæ lineæ ſectæ ſimiliter ſecare.

Sit data quidem recta linea inſecta AB, ſecta vero AC. oportet rectam lineam AB inſectam ipſi AC ſectæ ſimiliter ſecare. Sit ſecta AC in punctis D E, & ponantur ita, ut angulũ quem vis contineant, iunctaq; BC. per puncta quidem DE ipſi BC parallelæ ducãtur DF EG: per D vero ipſi AB ducatur parallela DHK. parallelogrammum igitur eſt vtrumque ipſorum FH HB: ac propterea DH quidem eſt æqualis FG, HK vero ipſi GB. Et quoniam vni laterum trianguli DKC, ipſi ſcilicet KC parallela ducta eſt HE; erit vt CE ad ED, ita KH ad KD. æqualis autem eſt KH quidẽ ipſi BG, HD vero ipſi GF. eſt igitur vt CE ad ED, ita BG ad GF. Rurſus quoniam vni laterum trianguli AGE, nimirum ipſi EG parallela ducta eſt FD, vt ED ad DA, ita erit GF ad FA. Sed oſtenſum eſt ut CE ad ED, ita eſſe BG ad GF. vt igitur CE ad ED, ita eſt BG ad GF: & vt ED ad DA, ita GF ad FA. Ergo data recta linea inſecta AB datę rectæ lineę ſectæ AC ſimiliter ſecta eſt. quod facere opottebat.

34 primi.

a. huius.



F. C. COMMENTARIVS.

Huic non diſſimile eſt, quod docuit Pappus in ſeptimo libro mathematicarum collectionum.

Datam rectam lineam in datam proportionem ſecare.

Sit data quidem recta linea AB: data autem proportio quam habet C ad D: & oporteat ſecare AB in proportionem C ad D. Inclinetur ad AB in quouis angulo, recta linea AE: & ipſi quidem C æqualis abſcindatur AF; ipſi vero D æqualis FG: &

iuncta BG ducatur FH ei parallela. Quoniã igitur vt AH ad HB, ita est AF ad FG: est aũt AF æqualis C, & FG ipsi D: erit vt AH ad HB, ita C ad D. Ergo AB secta est ad punctum H in proportionem C ad D. quod facere oportebat. 2. huius.



Ex ijs, quæ tum in quinto libro tum hoc loco tradita sunt, licebit problema absoluere, quod ad quartam propositionẽ quarti libri nos facturos recepimus.

In dato triãgulo quadratũ describere.

Sit datum triangulum ABC, in quo oporteat quadratum describere. vel igitur datũ triangulum acutiangulum est, vel rectangulum, vel obtusiangulum. Sit primũ acutiangulum, atque à puncto B ad AC perpendicularis ducatur BD: & ex præmissa diuidatur BD in puncto E, ita vt DE ad EB eandẽ proportionem habeat, quam AC ad BD. deinde per E ducatur FG ipsi AC parallela, & à punctis F G ducantur FH, GK parallelæ ipsi BD.





Quoniam igitur in triangulo ABD ducta est FE ipsi AD parallela. erit angulus B E F angulo B D A æqualis; & angulus BFE æqualis angulo B A D: atque est angulus F B E vtrique communis. ergo F B E triangulum triangulo A B D æquiangulum est. 29. primi. *Similiter demonstrabimus triangulum E B G æquiangulum ipsi D B C. Vt igitur AD ad DB, ita est FE ad EB, & vt BD ad DC, ita B E ad E G. quare ex æquali vt AD ad DC, ita FE ad EG: & componendo vt AC ad CD, ita FG ad GE; conuertendoq; vt DC ad CA, ita EG ad GF. Sed ut BD ad DC, ita est BE ad EG. ergo ex æquali, vt BD ad AC, ita BE ad FG. Itaque cũ sit vt AC ad BD, ita DE ad EB, erit rursus ex æquali vt AC ad se ipsam, ita DE, hoc est HF ad FG. ergo HF ipsi FG est æqualis; ac propterea omnes HF FG GK KH inter se æquales sunt. Et quoniam FH est parallela ipsi BD: estq; angulus BDA rectus; & ipse KHF rectus erit. eadem ratione cum FG sit parallela AC, erit & HFG angulus rectus. Ergo & ipsis oppositi FGK GKH recti sint necesse est. quadratum igitur est ipsum FGKH: & descriptum est in triangulo ABC. Non aliter in triangulo rectangulo, vel obtusiangulo quadratum describemus, ab angulo recto, vel obtuso ad latus oppositum perpendicularem ducentes. Quòd si in triangulo rectangulo quadratum describere libeat, ita vt duo quadrati latera duobus lateribus trianguli nitantur; vt in subiecta figura, vtemur altera perpendiculari, quæ est trianguli latus, vi delicet BA, & similiter diuidetur AB in F, ita vt AF ad FB eandem proportionem habeat, quã* 4. huius. 22. quinti. 18. quinti. 4 quinti. 34 primi. 29. primi. 34. primi. 2. huius. *CA ad AB; ducaturq; FG parallela ipsi AC, & GK parallela BA. Et quoniam in triangulo BAC ducta est FG ipsi AC parallela; similiter demonstrabimus triangulum BFG triangulo BAC æquiangulum esse. quare vt BA ad AC, ita BF ad FG. est autem vt CA ad AB, ita AF ad FB. ex æquali igitur, vt CA ad se ipsam, ita AF ad FG; ideoq; AF FG inter se æquales sunt. Et ex ijs, quæ proxime diximus, sequetur AFGK quadratum esse, quod descriptum est in triangulo ABC, atque illud est, quod facisse oportuit.* 4. huius.

PROBLEMA III. PROPOSITIO XI.

Duabus datis rectis lineis tertiam proportionalem inuenire.

Sint datæ duæ rectæ lineæ AB AC, & ponantur ita, vt angulum quem uis contineant. oportet ipsarum AB AC tertiam proportionalem inuenire. producantur enim

enim AB AC ad pũcta DE: ponatur ipsi AC æqualis BD: & iuncta BC, ducatur per D ipsi BC parallela DE. Quoniam igitur uni laterum trianguli ADE, uidelicet ipsi DE parallela ducta est BC, erit vt AB ad BD, ita AC ad CE. æqualis autem est BD ipsi AC. vt igitur BA ad AC, ita est AC ad CE. Quare datis rectis lineis AB AC tertia proportionalis inuẽta est CE. quod facere oportebat.



PROBLEMA IIII. PROPOSITIO XII.

Tribus datis rectis lineis quartam proportionalem inuenire.

Sint datæ tres rectæ lineæ A B C. oportet ipsarum A B C quartam proportionalem inuenire. Exponãtur duæ rectæ lineę DE DF angulũ quemuis EDF continentes: & ponatur ipsi quidem A æqualis DG, ipsi vero B æqualis GE, & ipsi C æqualis DH: iunctaq; GH per E ipsi parallela ducatur EF. Itaque quoniam vni laterum triãguli DEF, nimirum ipsi EF parallela ducta est GH, erit vt DC ad GE, ita DH ad HF. est autem DG ipsi A aequalis, GE vero æqualis B: & DH æqualis C. Vt igitur A ad B, ita C ad HF. Quare datis tribus rectis lineis A. B. C. quarta proportionalis inuẽta est HF. quod facere oportebat.

2. huius.



FED. COMMANDINVS EX PAPPO.

Tribus datis rectis lineis AB BC & D, Inuenire vt AB ad BC, ita aliam quandam ad ipsam D.

Rursus inclinetur recta linea CH in quouis angulo & abscindatur CF aequalis D: iunctaque BF, ipsi parallela ducatur AG. ergo rursus vt AB ad BC, ita erit GF ad FC, hoc est ad D. Inuẽta igitur est FG. quod facere oportebat.



PROBLEMA V. PROPOSITIO. XIII.

Duabus datis rectis lineis mediam proportionalem inuenire.

Sint datæ duæ rectæ lineæ AB BC, oportet ipsarum AB BC mediam proportionalem inuenire. ponantur in directum, & in ipsa AC describatur semicirculus ADC, ducaturq; à puncto B ipsi AC ad rectos angulos BD, & AD DC iungãtur. Quoniam igitur in semicirculo est angulus ADC, is rectus est, & quoniam in triangulo rectangulo ADC ab angulo recto ad basim perpendicularis ducta est DB, erit DB basis partium AB BC media proportionalis. Duabus igitur datis rectis lineis AB BC media proportionalis inuenta est DB. quod facere oportebat.

31. tertij.

Cor. 8. huius



THEO-

THEOREMA. IX. PROPOSITIO. XIIII.

Aequalium et vnum vni ęqualem habentium angulum parallelogrammorum latera, quæ circum æquales angulos, ex contraria parte sibi ipsis respondent: et quorum parallelogrammorum vnum vni æqualem habentium angulum latera, quæ circum æquales angulos, ex contraria parte sibi ipsis respondent; ea inter se sunt æqualia.



Sint æqualia parallelogrãma AB BC, æquales habentia angulos ad B, et ponantur in directum DB BE. ergo et indirectum erunt FB BG. Dico parallelogrammorum AB BC latera, quæ sunt circum ęquales angulos ex contraria parte sibi ipsis respondere: hoc est ut DB ad BE, ita esse GB ad BF. compleatur enim parallelogrammum FE. et qm̃ parallelogrãmũ AB æquale est parallelogrãmo BC, aliud autem aliquod est FE parallelogrammum; erit vt AB ad FE, ita BC ad FE. Sed vt AB quidem ad FE, ita est DB ad BE; vt autem BC ad FE, ita GB ad BF. et ut igitur DB ad BE, ita GB ad BF. ergo parallelogrammorum AB BC latera, quę circũ ęquales angulos ex contraria parte sibi ipsis respondent. Sed ex contraria parte sibi ipsis respondeant latera, quæ circũ æquales angulos: sitq; vt DB ad BE, ita GB ad BF. Dico parallelogrãmum AB parallelogrãmo BC æquale esse. Qm̃ enim est vt DB ad BE, ita GB ad BF, ut autem DB ad BE, ita AB parallelogrammum ad parallelogrammum FE: et ut GB ad BF, ita BC parallelogrammum ad parallelogrammum FE; erit et vt AB ad FE, ita BC ad FE. ęquale igitur est AB parallelogrammum parallelogrammo BC. ergo ęqualium et vnum vni ęqualem habentium angulum parallelogrãmorũ latera, quę circum æquales angulos, ex contraria parte sibi ipsis respondent: et quorum parallelogrammorum vnum vni ęqualem habentium angulum latera, quæ circum ęquales angulos, ex contraria parte sibi ipsis respondent; ea inter se sunt æqualia. quod oportebat demonstrare.



7.quinti. 1.huius. 11.quinti. 1.huius. 11.quinti. 9.quinti.

F. C. COMMENTARIVS.

Ergo & indirectum erunt FB BG.] *Sunt enim anguli FBD FBE aequales duobus rectis; sed angulus EBG ponitur aequalis angulo FBD. anguli igitur FBE, EBG duobus rectis sunt ęquales, ac propterea rectae lineę FB BG in directum sibi ipsis erunt.* 14.primi.

THEOREMA X. PROPOSITIO. XV.

Aequalium, et vnum vni ęqualem habentium angulum triangulorum latera, quæ circum ęquales angulos, ex contraria parte sibi ipsis respondent: et quorum triangulorum vnum vni æqualem habentium angulum latera, quę circum æquales angulos, ex contraria parte sibi ipsis respondent, ea inter se sunt ęqualia.

Sint triangula ABC ADE vnum angulum vni angulo ęqualem habentia, angu-

lum ſcilicet BAC angulo DAE. Dico triangulorum ABC ADE latera, quę circum
æquales angulos ex contraria parte ſibi ipſis reſpondere, hoc eſt vt CA ad AD, ita
eſſe EA ad AB. ponantur enim ita vt in di
14.primi. rectum ſit CA ipſi AD. ergo et EA ipſi AB
in directum erit; et iungatur BD. Quoniã
igitur triangulum ABC æquale eſt trian-
7.quinti. gulo ADE, aliud autẽ eſt ABD; erit vt CAB
triangulum ad triangulum BAD, ita trian
gulum ADE ad triangulum BAD. Sed vt
triangulum quidem CAB ad BAD trian-
1.huius. gulum, ita CA ad AD: ut autem trianguu-
11.quinti. lum EAD ad ipſum BAD, ita EA ad AB. et ut igitur CA ad AD, ita EA ad AB.
Quare triangulorum ABC ADE latera, quæ circum æquales angulos ex contraria
parte ſibi ipſis reſpondent. Sed ex contraria parte ſibi ipſis reſpondeant latera triã
gulorum ABC ADE: et ſit vt CA ad AD, ita EA ad AB. Dico triangulum ABC
triangulo ADE æquale eſſe. Iuncta enim rurſus BD, quoniam vt CA ad AD, ita
1.huius. eſt EA ad AB; ut autem CA ad AD, ita ABC triangulum ad triangulum BAD;
11.quinti. et ut EA ad AB, ita triangulum EAD ad BAD triangulum: erit ut ABC trian-
gulum ad triangulum BAD, ita triangulum EAD ad BAD triãgulum. Vtrumque
igitur triangulorum ABC ADE ad triangulum BAD eandem habet proportionẽ;
9.quinti. ac propterea æquale eſt ABC triangulum triangulo ADE. æqualium igitur et vnũ
vni æqualem habentium angulum triangulorum latera, quæ circum æquales angu-
los, ex contraria parte ſibi ipſis reſpondent: et quorum triangulorum vnũ vni æqua
lem habentium angulum latera, quæ circum æquales angulos ex contraria parte ſi
bi ipſis reſpondent, ea inter ſe ſunt æqualia. quod demonſtrare oportebat.



SCHOLIVM.

Aequiangulis dumtaxat triangulis contingit proportionalia latera habere, non etiam latera ex contraria parte ſibi ipſis proportione reſpondentia. Aequalibus autem, et æquiangulis latera quoque ex cõtraria parte reſpondentia habere contingit; æqualia enim ſunt & latera: æqualitatis autem proportio ad ſe ipſam conuertitur, hoc eſt ex antecedente ſumpto & conſequente eadem eſt, & differens. At æqualibus quidem, & vnum angulum æqualem habentibus contingit ſolum latera habere ex cõtraria parte reſpondentia, non tamen omnia, ſed quæ circum æquales angulos conſiſtunt. Quare alia quidem ſolum proportionalia habent latera, alia vero & proportionalia, & ex contraria parte reſpondentia. & ſunt prima quidem æquiangula & non æqualia: ſecunda vero æqualia, & vnum angulum habentia æqualem, non tamen æquiangula: reliqua autem & æqualia, & æquiangula ſunt.

THEOREMA XI. PROPOSITIO. XVI.

Si quattuor rectæ lineæ proportionales fuerint, rectangulum extremis contentum æquale eſt ei rectangulo, quod medijs continetur: & ſi rectangulum extremis contentum æquale fuerit ei, quod medijs cõtinetur, quattuor rectę lineæ proportionales erũt.

Sint

Sint quattuor rectæ lineæ proportionales AB CD E F, sitque vt AB ad CD, ita E ad F. Dico rectangulum contentum rectis lineis AB F æquale esse ei, quod ipsis CD E continetur. Ducantur enim à punctis A C ipsis AB CD ad rectos angulos AG CH: ponaturq; ipsi quidem F æqualis AG: ipsi vero E æqualis CH: & compleantur BG DH parallelogramma. Quoniam igitur est vt AB ad CD, ita E ad F; est autem E æqualis CH, & F ipsi AG: erit vt AC ad CD, ita CH ad AG. parallelogrammorum igitur BG DH latera, quæ circum æquales angulos ex contraria parte sibi ipsis respondent. quoniam autem æquiangulorum parallelogrammorum latera, quæ circum æquales angulos ex contraria parte sibi ipsis respondent, ea inter se sunt æqualia. ergo parallelogrammum BG æquale est parallelogrammo DH. atque est parallelogrammum quidem BG, quod rectis lineis AB F continetur; est enim AG æqualis F: parallelogrammo vero DH quod cõtinetur ipsis CD E; cum CH ipsi E sit æqualis. rectangulum igitur contentum AB F est æquale ei, quod ipsis CD E continetur. Sed rectangulum contentum AB F sit æquale ei, quod CD E continetur. Dico quattuor rectas lineas proportionales esse, videlicet vt AB ad CD, ita E ad F. ijsdem enim constructis quoniam rectangulum contentum AB F est æquale ei, quod CD E continetur: atque est contentum quidem AB F rectangulum BG; etenim AG est æqualis F: contentum vero CD E est rectangulum DH, quod CH ipsi E sit æqualis: erit parallelogrammum BG æquale parallelogrammo DH: & sunt æquiangula. æqualium autem, & æquiangulorum parallelogrammorum latera, quæ circum æquales angulos ex contraria parte sibi ipsis respondent. quare vt AB ad CD, ita CH ad AG: æqualis autem est CH ipsi E, & AG ipsi F. Vt igitur AB ad CD, ita E ad F. Ergo si quattuor rectæ lineæ proportionales fuerint, rectangulũ extremis contentum æquale est ei, quod medijs continetur: & si rectangulum extremis contentum æquale fuerit ei, quod medijs continetur, quattuor rectæ lineæ proportionales erunt. quod oportebat demonstrare.



14. huius.

14. huius.

THEOREMA XII. PROPOSITIO XVII.

Si tres rectæ lineæ proportionales fuerint, rectangulum extremis contentum æquale est ei, quod à media fit, quadrato: & si rectangulum extremis contentum æquale fuerit ei, quod à media fit, quadrato, tres rectæ lineæ proportionales erunt.

Sint tres rectæ lineæ proportionales A B C: & sit vt A ad B, ita B ad C. Dico rectãgulum cõtentũ A C æquale esse ei, quod à media B fit, quadrato. ponatur ipsi B æqualis D. Et quoniam vt A ad B, ita B ad C, æqualis autem B ipsi D; erit vt A ad B, ita D ad C. Si autem quattuor rectæ lineæ proportionales fuerint rectangulum extremis cõtentum est æquale ei, quod medijs continetur. ergo rectangulum AC contentum est æquale ei, quod continetur BD. Sed rectangulum contentum BD est æquale quadrato, quod fit ex ipsa B; etenim B est æqualis D. rectangulum igitur contentum A C est æquale ei, quod ex B fit, quadrato. Sed rectangulum contentum AC æquale sit quadrato, quod fit ex B. Dico vt A ad B, ita esse B ad C. ijsdem enim constructis.



7. quinti. Ex antecedente.

quoniam rectangulum contentum AC æquale eſt quadrato, quod fit ex B; at quadratum, quod fit ex B eſt rectangulum, quod ipſis BD continetur, eſt enim B æqualis ipſi D: erit rectangulum contentum A C æquale ei, quod BD continetur. Si autem rectãgulum extremis contentum æquale fuerit ei, quod medijs cõtinetur, quattuor rectæ lineæ proportionales erunt. eſt igitur vt A ad B, ita C ad D. æqualis autem B ipſi D. ergo vt A ad B, ita B ad C. Si igitur tres rectæ lineę proportionales fuerint, rectangulum extremis contentum eſt æquale ei, quod à media fit, quadrato: & ſi rectangulum extremis contentum æquale fuerit ei, quod à media fit, quadrato, tres rectæ lineę proportionales erunt. quod oportebat demonſtrare.

Ex antecedente.



PROBLEMA VI. PROPOSITIO. XVIII.

A data recta linea dato rectilineo ſimile, & ſimiliter poſitum rectilineum deſcribere.

Sit data recta linea AB; datum autem rectilineũ CE. oportet à recta linea AB rectilineo CE ſimile, & ſimiliter poſitũ rectilineũ deſcribere. Iungatur DF, & ad rectam lineã AB, & ad pũcta in ipſa AB, angulo quidẽ C æqualis angulus conſtituatur GAB; angulo autem CDF angulus ABG. reliquus igitur CFD angulus reliquo AGB eſt æqualis. ergo æquiangulum eſt FCD triangulum triangulo GAB; ac propterea vt FD ad GB, ita FC ad GA, & CD ad AB. Rurſus cõſtituatur ad rectã lineam BG, & ad puncta in ipſa BG angulo quidem DFE æqualis angulus BGH; angulo autem FDE æqualis GBH. ergo reliquus qui ad E reliquo qui ad H eſt æqualis. æquiangulum igitur eſt triangulum FDE triangulo GBH. quare vt FD ad GB, ita FE ad GH, & ED ad HB. oſtenſum autem eſt & vt FD ad GB, ita FC ad GA, & CD ad AB. & vt igitur FC ad AG, ita CD ad AB; & FE ad GH, & adhuc ED ad HB. itaque quoniam angulus quidem CFD eſt æqualis angulo AGB; angulus autem DFE angulo BGH: erit totus CFE angulus toti AGH æqualis. Eadem ratione & CDE eſt æqualis ipſi ABH. & præterea angulus quidem ad C angulo ad A æqualis, angulus vero ad E angulo ad H. æquiangulum igitur eſt AH ipſi CE, & latera circum æquales ipſi angulos habet proportionalia. Ergo rectilineum AH rectilineo CE ſimile erit. A data igitur recta linea AB dato rectilineo CE ſimile & ſimiliter poſitum rectilineum AH deſcriptũ eſt. quod facere oportebat.

23. primi.

4. huius.

4 huius. 11. quinti.

Diffi. 1. huius.



THEOREMA XIII. PROPOSITIO. XIX.

Similia triangula inter ſe ſunt in dupla proportione laterum homologorum.

Sint ſimilia triangula ABC DEF habentia angulum ad B æqualẽ angulo ad E: & ſit vt AB ad BC, ita DE ad EF; ita vt latus BC homologũ ſit lateri EF. Dico ABC triangulum ad triangulum DEF duplam proportionem habere eius, quam habet BC ad

EF.

EF. Sumatur enim ipsarum BC EF tertia proportionalis BG, vt sit, sicut BC ad EF, ita EF ad BG: & iungatur GA. Quoniã igitur vt AB ad BC, ita est DE ad EF; erit permutando vt AB ad DE, ita BC ad EF. Sed vt BC ad EF, ita EF ad BG. & vt igitur AB ad DE, ita EF ad BG. quare triangulorum ABG DEF latera, quæ circum æquales angulos ex contraria parte sibi ipsis respondent. quorum autem triangulorum vnum vni æqualem habentium angulum latera, quæ circum æquales angulos ex contraria parte sibi ipsis respondent, ea inter se æqualia sunt. æquale igitur est ABG triangulum triangulo DEF. Et quoniam est vt BC ad EF, ita EF ad BG; si autem tres rectæ lineæ proportionales sint, prima ad tertiam duplam proportionem habet eius, quam habet ab secunda: habebit BC ad BG duplam proportionem eius, quam habet BC ad EF. Vt autem BC ad BG, ita ABC triangulum ad triangulum ABG. ergo & ABC triangulum ad triangulum ABG duplam proportionem habet eius, quam BC ad EF. est autem ABG triangulum triangulo DEF æquale. & triangulum igitur ABC ad triangulum DEF duplam proportionem habebit eius, quam habet BC ad EF. Quare similia triangula inter se in dupla sunt proportione laterum homologorum. quod ostendere oportebat.



11. huius.
11. quinti.
15. huius.
Diffinit. 10. quinti.
1. huius.

COROLLARIVM.

Ex hoc manifestum est, si tres rectæ lineæ proportionales fuerint, vt prima ad tertiam, ita esse triangulum, quod fit à prima ad triangulum, quod à secunda simile, & similiter descriptum: quoniam ostensum est vt CB ad BG, ita ABC triangulum ad triangulũ ABG, hoc est ad triangulũ DEF. quod ostendere oportebat.

THEOREMA XIIII. PROPOSITIO XX.

Similia polygona in similia triangula diuiduntur, & numero æqualia, & homologa totis: & polygonum ad polygonum duplam proportionem habet eius, quam latus homologum habet ad homologum latus.

Sint similia polygona ABCDE FGHKL, & sit AB homologum ipsi FG. Dico polygona ABCDE FGHKL in similia triangula diuidi, & numero æqualia, & homologa totis: & polygonum ABCDE ad polygonum FGHKL duplam proportionem habere eius, quam habet AB ad FG. Iungantur BE EG GL LH. & quoniam simile est ABCDE polygonum polygono FGHKL, angulus BAE angulo GFL est æqualis: atque est vt BA ad AE, ita GF ad FL. Quoniam igitur duo triangula sunt ABE FGL vnum angulum vni angulo æqualem habentia; circum æquales autem angulos latera proportionalia: erit triangulum ABE triangulo FGL æquiãgulum. ergo & simile. angulus igitur ABE æqualis est angulo FGL. est autem & totus ABC angulus



6. huius.



gulus æqualis toti FGH, propter ſimilitudinem polygonorum. ergo reliquus EBC reliquo LGH eſt æqualis. Et quoniam ob ſimilitudinem triangulorum ABE FGL, eſt vt EB ad BA, ita LG ad GF. Sed & propter ſimilitudinem polygonorum, vt AB ad BC, ita eſt FG ad GH; erit ex æquali vt EB ad BC, ita LG ad GH. & circum æquales angulos EBC LGH latera ſunt proportionalia. æquiangulum igitur eſt EBC triangulũ triangulo LGH. quare & ſimile. Eadem ratione & ECD triangulum ſimile eſt triangulo LHK. Similia igitur polygona ABCDE FGHKL in ſimilia triãgula diuiduntur, & numero æqualia. Dico & homologa totis, hoc eſt vt proportionalia ſint triangula, & antecedentia quidem eſſe ABE EBC ECD, conſequentia aũt ipſorum FGL LGH LHK & ABCDE polygonũ ad polygonũ FGHKL duplã proportionẽ habere eius, quã latus homologum habet ad homologum latus; hoc eſt AB ad FG. Iungantur enim AC FH. Et quoniam propter ſimilitudinem polygonorum angulus ABC eſt æqualis angulo FGH; atque eſt vt AB ad BC, ita FG ad GH: erit triangulum ABC triangulo FGH æquiangulum. æqualis igitur eſt angulus quidem BAC angulo GFH, angulus vero BCA angulo GHF. præterea qm̃ æqualis eſt BAM angulus angulo GFN, oſtenſus autem eſt & ABM angulus æqualis angulo FGN; erit & reliquus AMB reliquo FNG æqualis. ergo æquiangulum eſt ABM triangulum triangulo FGN. Similiter oſtendemus & triangulum BMC triangulo GNH æquiangulum eſſe. Vt igitur AM ad MB, ita eſt FN ad NG, & vt BM ad MC, ita GN ad NH. quare & ex æquali vt AM ad MC, ita FN ad NH. Sed vt AM ad MC, ita ABM triãgulũ ad triãgulũ MBC, & triãgulũ AME ad ipſũ EMC, inter ſe enim ſunt vt baſes. & vt vnũ antecedẽtiũ ad vnũ conſequentium, ita omnia antecedentia ad omnia conſequẽtia. Vt igitur AMB triãgulum ad triangulum BMC, ita triangulum ABE ad ipſum CBE. Sed vt AMB ad BMC, ita AM ad MC. & vt igitur AM ad MC, ita ABE triãgulũ ad triangulũ EBC. Eadẽ ratione & vt FN ad NH, ita FGL triãgulũ ad triãgulũ GLH. atq; eſt vt AM ad MC, ita FN ad NH. ergo & vt triãgulũ ABE ad triãgulũ BEC, ita triangulum FGL ad GHL triangulum: & permutando vt ABE triangulum ad triangulum FGL, ita triãgulum EBC ad triangulum GHL. Similiter oſtendemus iunctis BD GK, & vt BEC triangulum ad triangulum LGH, ita eſſe triangulum ECD ad triangulum LHK. Et qm̃ eſt vt ABE triãgulũ ad triãgulũ FGL, ita triãgulũ EBC ad triãgulũ LGH, & ad huc triangulum ECD ad ipſum LHK: erit & vt vnum antecedentium ad vnum conſequentium, ſic omnia antecedentia ad omnia conſequentia, ergo vt triangulum ABE ad triangulum FGL, ita ABCDE polygonum ad polygonum FGHKL. Sed ABE triangulum ad triangulum FGL duplam proportionem habet eius, quam latus homologum AB habet ad homologum latus FG; ſimilia enim triangula in dupla ſunt proportione laterum homologorum. ergo & ABCDE polygonum ad polygonum FGHKL duplam proportionem habet eius, quam AB latus homologum habet ad FG homologum latus. Similia igitur polygona in ſimilia triangula diuiduntur, & numero æqualia: & homologa totis, et polygonum ad polygonum duplam habet proportionem eius, quam habet latus homologum ad homologum latus. quod oportebat demonſtrare.

6.huius.

1.huius.

12.quinti.

1.huius.

12.quinti.

Ex antecedente.

Eodem modo & in ſimilibus quadrilateris oſtendetur ea eſſe in dupla proportione laterum homologorum. oſtenſum autem eſt & in triangulis.

COROLLARIVM PRIMVM.

Ergo vniuerſe ſimiles rectilineę figurę inter ſe ſunt in dupla propor-

proportione homologorum laterum. & ſi ipſarum A B FG tertiam proportionalem ſumamus, quę ſit X; habebit AB ad X duplam proportionem eius, quam habet AB ad FG. habet autem & polygonum ad polygonum, & quadrilaterum ad quadrilaterum duplam proportionem eius, quam latus homologum habet ad homologum latus, hoc eſt AB ad FG. atque oſtenſum eſt hoc in triangulis.



COROLLARIVM SECVNDVM.

Vniuerſe igitur manifeſtum eſt, ſi tres rectę lineę proportionales fuerint, vt prima ad tertiam, ita eſſe figuram, quæ fit à prima ad eam, quæ à ſecunda, ſimilem & ſimiliter deſcriptam: quod oſtendere oportebat.

Oſtẽdemus etiam aliter & expeditius homologa eſſe triãgula.



Exponãtur enim rurſus polygona ABCDE FGHKL, & iũgãtur BE EC GL LH. Dico vt ABE triãgulũ ad triãgulũ FGL, ita eſſe triãgulũ EBC ad triãgulũ LGH; & triãgulũ CDE ad ipſum HKL. Qm̃ enim ſimile eſt ABE triãgulũ triangulo FGL; habebit ABE triangulũ ad triangulũ FGL duplã proportionẽ eius, quam habet BE ad GL. Eadẽ ratione & triãgulũ BEC ad GLH triangulum duplam proportionem habet eius, quam BE ad GL. eſt igitur vt ABE triangulum ad triangulum FGL, ita triangulum BEC ad GLH triangulũ. Rurſus quoniam ſimile eſt triangulum EBC triangulo LGH, habebit EBC triangulum ad triangulum LGH duplam proportionem eius, quam recta linea CE habet ad rectam HL. Eadem ratione, & ECD triangulum ad triangulum LHK duplam proportionem habet eius, quam CE ad HL. eſt igitur vt triangulum BEC ad triangulum LGH, ita CED triangulum ad triangulum LHK. oſtenſum autem eſt & vt EBC triangulum ad triangulum LGH, ita triangulum ABE ad triangulum FGL. ergo & vt triangulum ABE ad triangulum FGL, ita triangulum BEC ad GLH triangulum, & triangulum ECD ad ipſum LHK. & vt igitur vnum antecedentium ad vnum conſequẽtium, ſic omnia antecedentia ad omnia conſequentia, & reliqua vt in priori demonſtratione. quod ipſum demonſtrare oportebat.

Ex antecedente.

11. quinti.

12. quinti.

THEOREMA XV. PROPOSITIO XXI.

Quæ eidem rectilineo ſunt ſimilia, & inter ſe ſimilia ſunt.

Sit enim vtrumque rectilineorum A B ſimile rectilineo C. Dico & rectilineum A rectilineo B ſimile eſſe. Quoniam enim ſimile eſt A rectilineum rectilineo C, & ipſi æquiangulum erit, & circum æquales angulos latera habebit proportionalia. Rurſus quoniam ſimile eſt rectilineum B rectilineo C, æquiangulum ipſi erit, & circum

cum æquales angulos latera proportionalia habebit. Vtrumque igitur rectilineorum A B ipsi C æquiangulum est, & circum æquales angulos latera habet proportionalia. Quare & rectilineum A ipsi B est æquiangulum, lateraq; circum æquales angulos proportionalia habet; ac propterea A ipsi B est simile. quod demonstrare oportebat.



THEOREMA XVI. PROPOSITIO. XXII.

Si quattuor rectæ lineæ proportionales fuerint, & rectilinea, quæ ab ipsis fiunt, similia & similiter descripta proportionalia erunt. Et si rectilinea, quæ ab ipsis fiunt, similia & similiter descripta proportionalia fuerint, & ipsæ rectæ lineæ proportionales erunt.

Sint quattuor rectæ lineæ proportionales AB CD EF GH; & vt AB ad CD, ita sit EF ad GH. de
18.huius. scribanturq; ab ipsis quidem AB CD similia & similiter posita rectilinea KAB LCD: ab ipsis verò EF GH describantur rectilinea similia, & similiter posita MF NH. Dico vt KAB rectilineum ad rectilineum LCD, ita esse rectilineũ MF ad ipsum NH rectilineũ.
11.huius. Sumatur enim ipsarum quidẽ AB CD tertia proportionalis X; ipsarum vero EF GH tertia proportionalis O. Et quoniam est vt AB ad CD, ita EF ad GH: vt autem CD ad X, ita GH ad O; erit ex æquali vt AB ad X, ita EF ad O. Sed vt



Coro.20.huius. AB quidem ad X, ita est rectilineum KAB ad LCD rectilineum: vt autem EF ad O;
11.quinti. ita rectilineum MF ad rectilineum NH. Vt igitur KAB rectilineum ad rectilineum LCD, ita est rectilineum MF ad NH rectilineum. Sed sit vt KAB rectilineum ad rectilineum LCD, ita rectilineũ MF ad rectilineũ NH. Dico vt AB ad CD, ita esse EF
12.huius. ad GH. fiat enim vt AB ad CD, ita EF ad PR. & describatur ab ipsa PR alterutri rectilineorum MF NH simile & similiter positum rectilineum SR. Quoniam igitur est vt AB ad CD, ita EF ad PR: & descripta sunt ab ipsis quidem AB CD similia & similiter posita KAB LCD rectilinea, ab ipsis vero EF PR similia & similiter posita rectilinea MF SR; erit vt KAB rectilineum ad rectilineum LCD, ita rectilineum MF ad RS rectilineum. ponitur autem & vt rectilineum KAB ad rectilineum LCD, ita MF rectilineum ad rectilineum NH. ergo vt rectilineũ MF ad rectilineum NH, ita MF rectilineum ad rectilineum SR. Quòd cum rectilineum MF ad vtrumque ipsorum NH SR eandem habeat proportionem, erit rectilineum NH ipsi SR æquale.
9.quinti. est autem ipsi simile, & similiter positum. Ergo GH est æqualis PR. Et quoniam vt AB ad CD, ita est EF ad PR, æqualis autem PR ipsi GH; erit vt AB ad CD, ita EF ad GH. Si igitur quattuor rectæ lineæ proportionales fuerint, & rectilinea, quæ ab ipsis fiunt, similia & similiter descripta proportionalia erunt. & si rectilinea, quæ

ab ipsis

ab ipsis fiunt, similia & similiter descripta proportionalia fuerint, & ipsæ rectæ lineę proportionales erunt. quod oportebat demonstrare.

LEMMA.

At vero si rectilinea æqualia & similia sint, homologa ipsorũ latera inter se ęqualia esse. hoc modo demonstrabimus.

Sint æqualia & similia rectilinea NH SR: & sit vt HG ad GN, ita RP ad PS. Dico RP ipsi HG esse ęqualem. Si enim inæquales sint, vna ipsarum maior erit. Sit RP maior, quàm HG. Et quoniam est vt RP ad PS, ita HG ad GN; & permutando erit vt RP ad HG, ita PS ad GN. maior autem est PR, quàm HG. ergo & PS quàm GN maior erit. quare & rectilineum RS rectilineo HN est maius. Sed & æquale, quod fieri non potest. non igitur inæqualis est PR ipsi GH. ergo æqualis sit necesse est. quod oportebat demonstrare.



F. C. COMMENTARIVS.

Ergo GH est æqualis PR] *Demonstrat hoc antecedens lemma ratione ducente ad id, quod fieri non potest. Sed tamen licet etiam recta demonstratione vti, in hunc modum.* ✱

LEMMA.

Sint æqualia & similia rectilinea NH SR: sitq; latus GH homologũ ipsi PR: Dico GH ipsi PR æquale esse.

Fiat enim vt GH ad PR, ita PR ad aliã quae sit T, erit GH ad T, vt rectilineũ NH ad rectilineũ SR. ergo GH est aequalis ipsi T. Sed cũ tres rectae linae GH PR T sint proportionales, erit rectangulũ contentum GH T, hoc est quadratum GH aequale quadrato PR; ac propterea recta linea GH ipsi PR est aequalis. quod oportebat demonstrare.



11 huius. Corol. 20 huius. 17. huius.

THEOREMA XVII. PROPOSITIO. XXIII.

Aequiangula parallelogramma inter se proportionem habent ex lateribus compositam.

Sint æquiangula parallelogramma AC CF æqualem habentia BCD angulum angulo ECG. Dico parallelogrãmum AC ad parallelogrammum CF proportionem habere compositam ex lateribus, videlicet compositam ex proportione, quam habet BC ad CG, & ex proportione quã DC habet ad CE. ponatur enim vt BC sit in directum ipsi CG. ergo & DC ipsi CE in directum erit: & compleatur DG parallelogrammum: exponaturq;, recta linea quędã K: & fiat vt BC quidẽ ad CG, ita K ad L; vt autem DC ad CE, ita L ad M. proportiones igitur ipsius K ad L: & L ad M eędem sunt, quę proportiones laterum, videlicet BC ad CG, & DC ad CE. Sed proportio K ad M composita est ex proportione K ad L, & proportione L ad M. quare & K ad M proportionem habet ex lateribus compositam. Et quoniam est vt BC ad CG, ita



14. primi. 12 huius. 1. huius.

AC parallelogrammum ad parallelogrammum CH; ſed
11.quinti. vt BC ad CG, ita K ad L: erit & vt K ad L, ita parallelogrã
mum AC ad CH parallelogrammum. Rurſus quoniam
eſt ut DC ad CE, ita CH parallelogrammum ad paralel
logrammum CF: vt autem DC ad CE, ita L ad M, & vt
11.quinti. L ad M, ita erit parallelogrammum CH ad CF paralle-
logrãmũ. Itaque cũ oſtenſum ſit, vt K quidẽ ad L, ita AC
parallelogrãmũ ad parallelogrãmũ CH: vt aũt L ad M, ita
parallelogrammũ CH ad CF parallelogrammum; erit ex
æquali vt K ad M, ita AC parallelogrammum ad ipſum C
F. habet autem K ad M proportionem ex lateribus com-
poſitam. ergo & AC parallelogrammum ad parallelo-
grammum CF proportionem habebit compoſitam ex la
teribus. æquiangula igitur parallelogramma inter ſe proportionem habent ex late
ribus compoſitam. quod oportebat demonſtrare.



F. C. COMMENTARIVS.

COROLLARIVM. Ex iam demõſtratis colligitur triangula, quæ vnum an gulum vni angulo æqualem habent, proportionem habere ex lateribus compoſitam; ſunt enim ea parallelogrammorum æquiangulorum dimidia.

Colligitur præterea quo modo ex duabus datis proportionibus, vel etiam pluri bus proportio componatur, ex proportionibus enim BC ad CG, & DC ad CE pro portio compoſita eſt K ad M. Quòd ſi ex tribus componenda ſit proportio, rurſus ex ea, quę ex duabus conſtat, & ex tertia aliam eodem modo componemus, quę qui dem ex tribus compoſita erit, & ita deinceps in alijs.

Proportio autem data ex data proportione maiori hoc modo auferetur.

Sint datae proportiones A ad B, & C ad D, quarũ proportio C ad
D ſit maior, & oporteat à proportione C ad D auferre proportionem
13. huius *A ad B. fiat vt A ad B, ita C ad aliam videlicet ad F, quae inter C &*
D media ſtatuatur. Dico proportionem A ad B iam ablatã eſſe à pro
portione C ad D, & proportionem, quę relinquitur eſſe eam, quam ha
bet F ad D. Quoniam enim proportio C ad D componitur ex propor-
tione C ad F, & proportione F ad D, ſi auferatur vna dictarum pro-
portionum, videlicet C ad F, quae eſt A ad B, relinquetur proportio
F ad D. atque illud eſt. quod facere oportebat.



Quomodo autem in numeris proportiones, & componantur & au-
ferantur ex iam dictis facile conſtare poteſt, & ex ijs, quae tradit Purbachius, vel Regiomonta-
nus in epitomate magnae conſtructionis Ptolemęi propoſitione XVIII. primi libri. Sed placuit
hoc loco apponere theoremata nonnulla à nobis elaborata, quae ab his non multum abhorrent: &
elementorum loco eſſe poſſunt.

THEOREMA. I.

Triangula, quorum vnus angulus vni angulo eſt æqualis, inter ſe proportionem habent eandem, quam rectangula, quæ lateribus æqualem angulum comprehendentibus, continentur.

Sint triangula ABC DEF, ſiq; angulus A angulo
D aequalis. Dico triangulum A B C ad triangulum
D E F eandem proportionem habere, quam B A C re-
ctangulum ad rectangulum EDF. Ducantur perpendi
culares B G E H. erit triangulum B A G triangulo
E D H ſimile; eſt enim angulus ad A aequalis angulo



ad D,

ad D, & angulus BCA rectus aequalis recto EHD. ergo & reliquus reliquo aequalis. Vt igitur GB ad BA, ita HE ad ED. Sed vt GB ad BA, ita rectangulum quod fit ex BG & AC ad rectangulum BAC, cum habeant eandem altitudinem, videlicet rectam lineam AC. & similiter vt HE ad ED, ita rectangulum ex EH, & DF ad rectangulum EDF. rectangulum igitur ex BG & AC ad rectangulum BAC est vt rectangulum ex EH, & DF ad rectangulum EDF; & permutando rectangulum ex BG & AC ad rectangulum ex EH & DF, vt BAC rectangulum ad rectangulum EDF. Sed rectanguli ex BG & AC dimidium est ABC triangulum ex 41 primi; habent enim eandem basim AC, & altitudinem eandem BC: & rectanguli ex EH & DF dimidium triangulum DEF. triangulum igitur ABC ad triangulum DEF eandem proportionem habet, quam rectangulum BAC ad rectangulum EDF. Quare triangula quorum vnus angulus vni angulo est aequalis inter se proportionem habent eandem, quam rectangula, quae lateribus aequalem angulum comprehendentibus continentur. quod demonstrare oportebat.

4.huius. 1.huius. 11.quinti. 15.quinti.

COROLLARIVM.

Ex hoc sequitur parallelogramma etiam æquiangula inter se proportionem habere eandem, quam rectangula, quæ ipsorum lateribus continentur, cum sint eiusmodi triangulorum dupla. 15.quinti.

THEOREMA II.

Triangula et parallelogramma inter se proportionem habent compositã ex proportione basium, et proportione altitudinum.



Sint triangula ABC DEF: & ducantur perpendiculares AG DH. Dico triangulum ABC ad triangulum DEF proportionem habere compositam ex proportione basis BC ad basim EF; & ex proportione altitudinis AG ad DH altitudinem. Vel igitur AG est aequalis DH, vel inaequalis, & rursus vel BC est aequalis EF vel inaequalis. Sit primum AG aequalis DH, & BC inaequalis ipsi EF, fiatq; vt BC ad EF, ita recta linea quædam K ad L: & vt AG ad DH, ita L ad M. Itaque triangulum ABC ad triangulum DEF est, vt basis BC ad EF basim ex prima huius, hoc est vt K ad L. & cum DH sit aequalis AG, erit M ipsi L aequalis: triangulumq; ABC ad ipsum DEF, vt K ad M: proportio autem K ad M composita est ex proportione K ad L, & proportione L ad M, hoc est ex proportione basis BC ad basim EF, & proportione altitudinis AG ad altitudinem DH. Eodem modo demonstrabitur, si basis BC sit aequalis basi EF, cum inaequales sint altitudines AG DH: erunt enim KL inter se aequales, & ex ijs, quae demonstrauimus ad primam huius, triangulum ABC ad triangulum DEF proportionem habebit eandem, quam L ad M, hoc est quam K ad M. triangulum igitur ABC ad triangulum DEF proportionem habet compositam ex proportione K ad L, hoc est basis BC ad basim EF, & ex proportione L ad M, hoc est altitudinis AG ad DH altitudinem. Quòd si bases BC EF aequales sint, itemq; altitudines aequales AG DH, nihilominus idem sequetur, nam K L M inter se aequales erunt, & triangulũ ad triangulũ proportionem habebit compositam ex proportione K ad L. & L ad M. hoc est ex proportione basium & proportione altitudinũ. Deniq; si bases BC EF inaequales sint, & similiter inæquales altitudines AG DH. Ponatur AG minor, quàm 12.huius. 7.quinti.



DH. & ab ipſa DH abſcindatur HN æqualis AG: iungantúrq; EN NF; & rurſus fiat vt baſis BC ad baſim EF, ita K ad L: vt autem NH ad HD, hoc eſt vt AG ad HD, ita L ad M. Quoniam igitur triangula ABC NEF eandem habent

1.huius. *altitudinem, inter ſe erunt vt baſes. quare triangulum ABC ad triangulum NEF eſt vt BC ad EF, hoc eſt vt K ad L. Sed triangulum NEF ad*

Ex demonſtratis 1. huius. *triangulum DEF eſt vt altitudo NH, vel AG ad DH altitudinem, videlicet vt L ad M. ex æquali igitur triangulum ABC ad triangulum DEF, eſt vt K ad M. habet aũt K ad M proportionẽ compoſitã ex proportione K ad L, & proportione L ad M. ergo & triangulũ ABC ad triangulũ DEF proportionẽ habet compoſitã ex proportione K ad L & proportione L ad M, hoc eſt ex proportione baſis BC ad baſim EF, & proportione altitudinis AG ad altitudinẽ DH. Sed cum trianguli ABC duplũ ſit parallelogrãmũ BO, & triangu-*

15.quinti. *li DEF duplum parallelogrammum EP; habebit parallelogrammum BO ad parallelogrammum EP proportionem compoſitam ex proportione baſis BC ad baſim EF, & proportione altitudinis AG ad DH altitudinem. triangula igitur & parallelogramma inter ſe proportionem habent cõpoſitam ex proportione baſium, & proportione altitudinum. quod oportebat demonſtrare.*

THEOREMA XVIII. PROPOSITIO. XXIIII.

Omnis parallelogrammi, quæ circa diametrum ſunt parallelogramma, et toti et inter ſe ſimilia ſunt.

Sit parallelogrammum ABCD, cuius diameter AC: circa diametrum vero AC parallelogrãma ſint EG HK. Dico parallelogramma EG HK, et toti ABCD, et inter ſe ſimilia eſſe. Quoniam enim vni laterum trianguli ABC, videli-

2.huius. cet ipſi BC parallela ducta eſt EF, erit vt BE ad EA, ita CF ad FA. Rurſus quoniam vni laterum trianguli ACD, nempe ipſi CD ducta eſt parallela FG, vt CF ad FA, ita erit DG ad GA. Sed vt

11.quinti. CF ad FA; ita oſtenſa eſt et BE ad EA. ergo et vt BE ad EA, ita DG ad GA, componendoq; vt BA ad AE, ita DA ad AG, et permutando vt BA ad AD, ita EA ad AG. parallegrammorum igitur ABCD EG latera, quę circa communem angulum BAD proportionalia ſunt. Et quoniam paralle-

29.primi. la eſt GF ipſi DC, angulus quidem AGF eſt æqualis angulo ADC; angulus uero GFA æqualis angulo DCA; et angulus DAC eſt communis duobus triãgulis ADC AGF; erit triangulum ADC triangulo AGF æquiangulum. Eadem ratione et triãgulum ACB æquiangulum eſt triangulo AFE. totum igitur parallelogrammum

4.huius. ABCD parallelogrãmo EG eſt æquiangulum. ergo ut AD ad DC, ita AG ad GF: vt autem DC ad CA, ita GF ad FA: et vt AC ad CB, ita AF ad FE: et præterea vt CB ad BA, ita FE ad EA. Itaque quoniam oſtenſum eſt vt DC ad CA, ita eſſe GF ad FA: vt autem AC ad CB, ita AF ad FE; erit ex æquali vt DC ad CB, ita GF ad FE. ergo parallelogrammorum ABCD EG proportionalia ſunt latera, quę circum æquales angulos; ac propterea parallelogrammum ABCD parallelogrammo EG eſt ſimile. Eadem ratione & parallelogrammum ABCD ſimile eſt parallelogrammo KH. Vtrumque igitur ipſorum EG HK parallelogrammorum parallelogram-

21.huius. mo ABCD eſt ſimile. quæ autem eidem rectilineo ſunt ſimilia, & inter ſe ſimilia ſunt. parallelogrammum igitur EG ſimile eſt parallelogrammo HK. Quare omnis parallelogrammi, quæ circa diametrum ſunt parallelogramma & toti & inter ſe ſunt ſimilia. quod oſtendere oportebat.

PRO-

PROBLEMA VII. PROPOSITIO XXV.

Dato rectilineo ſimile, & alteri dato æquale idem conſtituere.



Sit datum quidem rectilineum, cui oportet ſimile conſtituere ABC, cui autem æquale ſit D. oportet ipſi ABC ſimile, & ipſi D æquale idem conſtituere. applicetur enim ad rectam quidem lineam BC triãgulo ABC æquale parallelogrammum BE; ad rectam vero CE applicetur parallelogrammum CM æquale ipſi D, in angulo FCE, qui CBL angulo eſt æqualis. in directum igitur eſt BC ipſi CF, & LE ipſi EM. Sumatur ipſarum BC CF media proportionalis GH. & ab ipſa GH deſcribatur triangulum KGH ſimile & ſimiliter poſitum triangulo ABC. Et quoniam eſt vt BC ad GH, ita GH ad CF, ſi autem tres rectę lineæ proportionales ſint, vt prima ad tertiam, ita eſt figura, quæ fit à prima, ad eam, quæ à ſecunda, ſimilem & ſimiliter deſcriptam: erit vt BC ad CF, ita ABC triangulum ad triangulum KGH. Sed & ut BC ad CF, ita parallelogrammum BE ad EF parallelogrammum. & vt igitur triangulum ABC ad triangulum KGH, ita BE parallelogrammum ad parallelogrammum EF. quare permutando vt ABC triangulum ad parallelogrammum BE, ita triangulum KGH ad EF parallelogrammum. eſt autem triangulum ABC æquale parallelogrammo BE. æquale igitur eſt & KGH triangulũ parallelogrâmo EF. Sed EF parallelogrãmũ ęquale eſt rectilineo D. ergo & triangulum KGH ipſi D eſt ęquale. eſt autem KGH ſimile triangulo ABC. Dato igitur rectilineo ABC ſimile, & alteri dato æquale idem conſtitutum eſt KGH. quod facere oportebat.

44. primi.
14. primi.
13 huius.
18. huius.
Cor. 20. huius.
11. quinti.

THEOREMA XIX. PROPOSITIO XXVI.

Si à parallelogrammo parallelogrammum auferatur ſimile toti, & ſimiliter poſitum, communem ipſi angulum habens, circa eandem diametrum eſt toti.



A parallelogrammo enim ABCD parallelogrammum AF auferatur, ſimile ipſi ABCD, & ſimiliter poſitum, communemq; ipſi angulum habens DAB. Dico parallelogrammum ABDD circa eãdem eſſe diametrum parallelogrammo AF. non enim, ſed ſi fieri poteſt, ſit ipſorum diameter AHC & producatur GF vſque ad H; ducaturq; per H alterutri ipſarum AD BC parallela HK. Quoniam igitur circa eandem diametrum eſt ABCD parallelogrammum parallelogrammo KG; & erit parallelogrammum ABCD parallelogrammo KG ſimile. ergo vt DA ad AB, ita GA ad AK. eſt autem & propter ſimilitudinem parallelogrammorum ABCD EG, vt DA ad AB, ita GA ad AE. et vt igitur GA ad AE, ita GA ad AK. Quòd cum GA ad utramque ipſarum AK AE eandem proportionem habeat, erit AE ipſi AK ęqualis, minor maiori, quod fieri non poteſt. Non igitur circa eandem diametrum eſt ABCD parallelogrammum parallelogrammo AH. Quare circa eandem diametrum erit ipſi AF. Si igitur à parallelogrammo parallelogrammum auferatur ſimile toti, et ſimiliter poſitum, communem ipſi angulum habens, circa eandem diametrum eſt toti. quod demonſtrare oportebat.

24. huius.
1. diff. huius.
11. quinti.
9. quinti.

THEO-

THEOREMA XX. PROPOSITIO XXVII.

Omnium parallelogrammorum ad eandem rectam lineam applicatorum, et deficientium figuris parallelogrammis similibus et similiter positis ei quæ à dimidia describitur; maximũ est quod ad dimidiam est applicatum, simile existens defectui.



A Sit recta linea AB; secetur; bifariam in C; et ad AB rectam lineam applicetur parallelogrammũ AD deficiens figura parallelogramma DB, simili & similiter posita ei, quæ a dimidia ipsius AB descripta est, hoc est à CB. Dico omnium parallelogrammorum ad rectam lineam AB applicatorum, et deficientium figuris parallelogrammis similibus, et similiter positis ipsi DB, maximum esse AD. applicetur enim ad re
B ctam lineam AB parallelogrammum AF, deficiens figura parallelogramma FB simili et similiter posita ipsi DB. Dico AD parallelogrãmum parallelogrammo AF maius esse. Quoniam enim simile est parallelogrammum DB parallelogrammo FB, circa eãdem diametrum sunt. Ducatur eorum diameter DB, et describatur figura. Quoniam igitur CF est æquale ipsi FE, commune apponatur FB. totum igitur CH toti KE est æquale. Sed CH est æquale CG, quoniam et recta linea AC ipsi CB. ergo et GC ipsi EK æquale erit. commune apponatur CF. totum igitur AF est æquale gnomoni LMN, quare et DB hoc est AD parallelogrammum, parallelogrammo AF est maius. omnium igitur parallelogrammorum ad eandem rectam lineam applicatorum, et deficientium figuris parallelogrãmis similibus, et similiter positis ei, quæ à dimidia describitur; maximum est, quod ad dimidiam est applicatum. quod demonstrare oportebat.

Ex antecedente. 43. primi. 36. primi.

C ALITER. Sit enim rursus AB secta bifariã in pũcto C, et applicatum sit AL. deficiens figura LB. et rursus ad rectam lineam AB applicetur parallelogrãmum AE deficiens figura EB simili, et similiter posita ei, quæ à dimidia AB describitur, videlicet ipsi LB. Dico parallelogrammum AL, quod ad dimidiã est applicatum maius esse parallelogrammo AE. Quoniam enim simile est EB ipsi LB, circa eandem sunt diametrum. sit ipsorum diameter EB, et describatur figura. Et quoniã LF æquale est LH, etenim FG ipsi GH est æqualis: erit LF ipso EK maius. est aũt LF æquale DL. maius igitur est et DL ipso EK. commune apponatur KD. ergo totum AL toto AE est maius. quod oportebat demonstrare.



36. primi. 43. primi.

F. C. COMMENTARIVS.

A [Et ad AB rectam lineam applicetur parallelogrammum ad deficiens figura parallelogramma.]

Describatur à recta linea CB parallelogrammum quodcumque libuerit DB, et totum parallelogrammum ABE compleatur. erit ad rectam lineam AB applicatum parallelogrammum AD deficiens figura parallelogramma DB, simili & similiter posita ei, quæ à dimidia ipsius AB descripta est.

Applicetur enim ad rectam lineam AB parallelogrammum AF deficiens figura
B parallelogrammia FB, simili et similiter posita ipsi DB.

Sumatur in recta linea AB inter C B quoduis punctum K, & ab ipsa KB describatur parallelogrammum simile & similiter positum ipsi DB parallelogrammo, quod sit KBHF, et HF ad G producatur

producatur. erit rursus ad rectam lineam AB applicatum parallelogrammum AF deficiens figura parallelogramma FB, simili & similiter posita ipsi DB.

C



Sit enim rursus ab secta bifariam in puncto C. *Nō videtur hęc alia demonstratio, sed alius casus. quare theorema fortasse in hunc modū aptius, et manifestius explicabitur.*

Sit recta linea AB, secetur q; bifariam in C, et ab ipsa CB describatur parallelogrammum vtcunque DB, et totum parallelogrammum AB E compleatur. Iam ad rectam lineam AB applicatum erit parallelogrammum AD, deficiens figura parallelogramma DB simili & similiter posita ei, quę descripta est à dimidia ipsius AB, hoc est à CE. Dico omnium parallelogrammorum ad rectam lineam AB applicatorum, & deficientium figuris similibus et similiter positis ipsi DB, maximum esse AD. Iūgatur enim DB parallelogrammi DB diameter. erit recta linea ad quam alia parallelogramma applicanda sunt, vel maior quàm dimidia ipsius AC vel minor. Sumatur primo maior, & sit AK; atque à puncto K ipsi BE parallela ducatur KF, quae diametro DB in F occurrat; & per F ducatur GFH parallela ipsi AB & figura compleatur. erit ad AB applicatum aliud parallelogrammum AF deficiens figura parallelogramma FB, simili & similiter posita ipsi DB; quippe quae circa eandem diametrum consistat. Dico igitur AD maius esse quàm AF. Quoniam enim suplementum CF est aequale ipsi FE; communi apposito FB, erit totum CH toti KE aequale. at CH est aequale GC, quoniam & AC ipsi CB. ergo & GC aequale est KE. apponatur vtrique commune CF. totum igitur AF gnomoni LMN est aequale. quare & DB parallelogrammum, hoc est AD maius erit quàm AF. 43.primi.

Sumatur deinde AO minor, quàm dimidia AC, & per O ipsi BE parallela ducatur OP, quae cum diametro BD producta conueniat in P. denique per P ducatur QPR parallela ipsi AB, & secunda figura compleatur. Erit rursus ad AB applicatum aliud parallelogrammum AP deficiēs figura parallelogramma PB ipsi DB simili & similiter posita. Dico rursus AD quàm AP maius esse. Quoniam enim parallelogrāmum DR est aequale parallelogrammo DQ, erit DR maius quàm SQ. Sed OD est aequale DR. ergo et OD ipso SQ est maius. commune apponatur AS. totum igitur AD, quàm totum AP maius erit. Quare omnium parallelogrammorum ad eandem rectam lineam applicatorum, & deficientium figuris similibus, & reliqua, quae sequuntur. quod oportebat demonstrare.



36.primi.

43.primi.

PROBLEMA VIII. PROPOSITIO XXVIII.

Ad datam rectam lineam dato rectilineo æquale parallelogrammum applicare, deficiens figura parallelogramma, quæ similis sit alteri datę. oportet autem datum rectilineum, cui æquale applicandum est, non maius esse eo, quod ad dimidiam applicatur, similibus existentibus defectibus, et eo quod à dimidia, et eo, cui oportet simile deficere.

Sit data quidem recta linea AB: datum autem rectilineum, cui oportet æquale ad datam rectam lineam AB applicare, sit C, non maius existens eo, quod ad dimidiam applicatum est, similibus existētibus defectibus: cui autem oportet simile deficere sit D. oportet ad datam rectam lineam AB, dato rectilineo C æquale parallelogrammum applicare, deficiens figura parallelogramma, quæ similis sit ipsi D. Secetur AB bifariam in E, & ab ipsa EB describatur simile, & similiter positum ipsi D; quod sit EBFG, & compleatur AG parallellogrammum. Itaque AG vel æquale est ipsi 18.huius.

eſt ipſi C, vel eo maius, ob determinationem. & ſi quidem AG ſit ęquale C, factum iam erit, quod proponebatur: etenim ad rectam lineam A B dato rectilineo C æquale parallelogrammum AG applicatum eſt, deficiens figura parallelogramma GB, ipſi D ſimili. Si autem non eſt ęquale, erit H E maius quàm C; atque eſt H E æquale G B. ergo & G B quàm C eſt maius. quo autem G B ſuperat C, ei exceſſui æquale, ipſi vero D ſimile & ſimiliter poſitum



25.huius. idem conſtituatur KLMN. Sed D eſt ſimile GB. quare & K M ipſi G B ſimile erit. Sit igitur recta linea quidem KL homologa ipſi GE, LM vero ipſi GF. & quoniã æquale eſt GB ipſis C KM, erit GB ipſo KM maius. maior igitur eſt recta linea G E ipſa K L; et GF ipſa LM. ponatur GX æqualis KL, & G O æqualis LM, & compleatur X G O P parallelogrammum. ęquale igitur eſt & ſimile GP ipſi KM. Sed KM ſimile eſt GB. ergo & GP ipſi GB eſt ſimile. circa eandẽ igitur eſt diametrũ GP ipſi GB. Sit ipſorum diameter GPB, & figura deſcribatur. Itaque qm̃ GB eſt æquale ipſis C KM, quorũ GP eſt æquale KM, erit reliquus ΥΦΤ gnomon æqualis reliquo C. Et qm̃ OR eſt æquale XS, commune apponatur PB. totum igitur OB toti XB eſt ęquale. Sed XB eſt æquale T E, quoniam & latus AE lateri EB. quare & TE ipſi OB ęquale. cõmune apponatur XS. ergo totum TS eſt æquale toti gnomoni ΥΦΤ. At ΥΦΤ gnomon ipſi C oſtenſus eſt ęqualis. & TS igitur ipſi C æquale erit. Quare ad datam rectam lineam AB dato rectilineo C æquale parallelogrammum TS applicatum eſt, deficiens figura parallelogrãma PB ipſi D ſimili, quoniã & PB ſimile eſt ipſi GP. quod facere oportebat.

21.huius. 26.huius. 43.primi. 36.primi.

F. C. COMMENTARIVS.

Quo autem GB ſuperat C, ei exceſſui ęquale, ipſi vero D ſimile, & ſimiliter poſitum idem conſtituatur] *Vt autem exceſſus, quo alterum rectilineum alterum ſuperat, facile inueniatur libuit, ſequens problema apponere.*



Duorum rectilineorũ inæqualiũ exceſſum, quo maius ſuperat minus, inuenire.

Sint duo rectilinea inequalia A B, quorum maius ſit A. oportet inuenire exceſſum, quo rectilineum A ipſum B ſuperat. Dato enim rectilineo A in quouis angulo aequale parallelogrãmum conſtituatur CDEF: & ad rectam lineam DE in angulo aequali ipſi DCF, applicetur parallelogrammum DGHE aequale rectilineo B. erit recta linea DG in directum ipſi CD, & EH in directum FE. eſt igitur vt parallelogrammum FD ad parallelogrammum DH, hoc eſt vt rectilineum A ad rectilineum B, ita recta linea FE ad EH. atq; eſt rectilineum A rectilineo B maius, maior igitur eſt recta linea FE ipſa EH. Itaq; à recta linea FE abſcindatur EK ipſi EH aequalis, & à puncto K alterutri ipſarum FC ED parallela ducatur KL. erit parallelogrammum KD parallelogrammo DH aequale, & ob id parallelogrammum FL eſt exceſſus, quo parallelogrammum FD ſuperat parallelogrammum DH, hoc eſt quo rectilineum A ipſum B rectilineum ſuperat. Duorum igitur rectilineorum inequalium A B exceſſus inuentus eſt. quod feciſſe oportuit.

54.primi. 54.primi.

PRO-

PROBLEMA IX. PROPOSITIO. XXIX.

Ad datam rectam lineam dato rectilineo æquale parallelogrammum applicare, excedens figura parallelogramma, quæ similis sit alteri datę.



Sit data recta linea AB, datum vero rectilineum cui oportet æquale ad ipsam AB applicare, sit C; cui autem oportet simile excedere D. Itaq; oportet ad AB rectam lineam dato rectilineo C æquale parallelogrammum applicare, excedens figura parallelogrāma simili D. Secetur AB bifariam in E, atque ex EB ipsi D simile, & similiter positum parallelogrammum describatur BF. & vtrisque quidem BF. C æquale, ipsi vero D simile, & similiter positum idem constituatur GH. Simile igitur est GH ipsi FB. sitq; KH quidem latus homologum lateri FL, KG vero ipsi FE. Et quoniam parallelogrammum GH maius est ipso FB, erit recta linea KH maior quàm FL, & KG maior quàm FE. producantur FL FE: & ipsi quidē KH æqualis sit FLM; ipsi vero KG æqualis FEN: & compleatur MN parallelogrammum. ergo MN æquale est & simile ipsi GH. Sed GH est simile EL. & MN igitur ipsi EL simile erit; ac propterea circa eandem diametrum est EL ipsi MN. Ducatur ipsorum diameter FX, & figura describatur. Itaque quoniam GH ipsis EL C est æquale, sed GH est æquale MN; erit & MN æquale ipsis EL C. commune auferatur EL. reliquus igitur ΥΓΦ gnomon ipsi Ç est æqualis. Et quoniam AE est æqualis EB, æquale erit & AN parallelogrammum parallelogrammo NB, hoc est ipsi LO. commune apponatur EX. totum igitur AX æquale est gnomoni ΦΓΥ. Sed ΦΓΥ gnomon est æqualis C. ergo & AX ipsi C erit æquale. Ad datam igitur rectam lineam AB dato rectilineo C æquale parallelogrammum applicatum est AX, excedens figura parallelogrāma PO ipsi D simili; quoniā & ipsi EL simile est OP. quod fecisse oportebat.

18.huius. 21.huius. 26.huius. 24.huius.

PROBLEMA X. PROPOSITIO XXX.

Datam rectam lineam terminatam extrema ac media ratione secare.



Sit data recta linea terminata AB. oportet ipsam AB extrema, ac media ratione secare. Describatur enim ex AB quadratum BC, & ad AC ipsi BC æquale parallelogrammum applicetur CD, excedens figura AD ipsi BC simili. quadratum autem est BC. ergo & AD, quadratum erit. Et quoniā BC est æquale CD; commune auferatur CE. reliquum igitur BF reliquo AD est æquale. est autem & ipsi æquiangulū. ergo ipsorum BF AD latera, quæ circum æquales angulos ex contraria parte sibi ipsis respondent. vt igitur FE ad ED, ita est AE ad EB. est autem FE æqualis AC, hoc est ipsi AB, & ED ipsi AE. quare vt BA ad AE, ita AE ad EB. Sed AB maior

46.primi. Per antecedentem. 14.huius. 34.primi.

14. quinti. eſt quàm AE. ergo AE quàm EB eſt maior. Recta igitur linea AB extrema, ac media ratione ſecta eſt in E, & maior ipſius portio eſt AE. quod facere oportebat.

ALITER. Sit data recta linea AB. oportet ipsâ AB extrema ac media rõne ſecare. Secetur enim AB in C, ita vt rectangulum, quod continetur AB BC æquale ſit quadrato ex AC. Quoniam igitur rectangulum ABC æquale eſt quadrato ex AC, erit vt BA ad AC, ita AC ad CB. ergo AB recta linea extrema ac media ratione ſecta eſt. quod facere oportebat.

11. ſecundi.

17. huius.

THEOREMA XXI. PROPOSITIO. XXXI.

In rectangulis triangulis figura, quæ fit à latere rectum angulum ſubtendente, æqualis eſt eis, quę à lateribus rectum angulum continentibus fiunt, ſimilibus, & ſimiliter deſcriptis.



Sit triangulum rectangulum ABC, rectum habens angulum BAC. Dico figuram, quę fit ex BC æqualem eſſe eis, quæ ex BA AC fiunt, ſimilibus, & ſimiliter deſcriptis. Ducatur perpendicularis AD. Quoniam igitur in triangulo rectãgulo ABC ab angulo recto, qui eſt ad A ad BC baſim perpendicularis ducta eſt AD; erunt triãgula ABD ADC, quæ ſunt ad perpendiculare ſimilia toti ABC, & inter ſe ſe. Et quoniam ſimile eſt ABC triangulum triangulo ABD, erit vt CB ad BA, ita AB ad BD. Quòd cũ tres rectæ lineę proportionales ſint, vt prima ad tertiam, ita erit figura, quæ fit ex prima ad eam, quę ex ſecunda, ſimilem, & ſimiliter deſcriptam. Vt igitur CB ad BD, ita figura, quę fit ex CB ad eam, quæ ex BA, ſimilem, et ſimiliter deſcriptam. Eadem ratione et vt BC ad CD, ita figura, quæ fit ex BC ad eam, quę ex CA. quare et vt BC ad ipſas BD DC, ita figura, quæ ex BC ad eas, quæ ex BA AC, ſimiles, & ſimiliter deſcriptas. æqualis autem BC ipſis BD DC. ergo figura, quę fit ex BC æqualis eſt eis, quę ex BA AC fiunt, ſimilibus, & ſimiliter deſcriptis. In rectangulis igitur triangulis, figura, quæ fit à latere rectum angulnm ſubtendente, æqualis eſt eis, quæ à lateribus rectum angulum continentibus fiunt, ſimilibus, & ſimiliter deſcriptis, quod oſtendere oportebat.

8. huius.

Coro. 20. huius.

A

ALITER. Quoniam ſimiles figuræ ſunt in dupla proportione laterum homologorum; figura, quæ fit ex BC ad eam, quæ ex BA duplam proportionem habebit eius, quam habet BC ad BA. habet autem & quadratum ex BC ad quadratum ex BA duplam proportionem eius, quam BC ad BA. ergo & vt figura, quæ ex BC ad eam, quę ex BA, ita quadratum ex BC ad quadratum ex BA. Eadem ratione & vt figura, quæ ex BC ad eam, quæ ex CA, ita quadratum, quod ex BC ad illud, quod ex CA quadratum. & vt igitur figura quæ ex BC ad eas, quæ ex BA AC, ita quod ex BC quadratum ad quadrata, quę ex BA AC. quadratum autem, quod ex BC æquale eſt eis, quæ ex BA AC quadratis. ergo & figura, quæ fit ex BC eſt æqualis eis, quę ex BA AC fiunt, ſimilibus, & ſimiliter deſcriptis. quod oſtẽdere oportebat.

20. huius.

11. quinti.

47. primi.

F. C. COMMENTARIVS.

A Quare & vt BC ad ipſas BD DC, ita figura, quę ex fit BC ad eas, quæ ex BA AC ſimiles, & ſimiliter deſcriptas.] *Quoniã enim eſt vt CB ad BD, ita figura, quae fit à CB ad eam, quae à BA ſimilem, & ſimiliter deſcriptam; erit & conuertendo vt DB ad BC, ita figura, quae fit à EA ad eam, quae à BC ſimilem & ſimiliter deſcriptam. præterea cum ſit vt BC ad CD, ita figura, quae fit à BC ad eam, quae à CA: & conuertendo vt DC ad CB, ita erit figura, quae fit ab AC ad eam, quae à CB. Sit igitur figura, quae fit à BA magnitudo prima; figura, quae à BC magnitudo ſecunda; recta linea DB magnitudo tertia, & recta BC quarta; figura vero, quae fit ab*

AC

AC magnitudo quinta & recta linea DC sexta. Itaque prima magnitudo ad secundam, est vt tertia ad quartam; quinta vero ad secundam, vt sexta ad quartam. ergo ex vigesimaquarta quinti libri composita prima & quinta ad secundam erit, vt composita tertia & sexta ad quartam, hoc est figurae quae fiunt à BA AC ad eam, quae à BC erunt vt rectae lineae BD DC ad rectam BC & rursus conuertendo figura, quae fit à BC ad eas, quae à BA AC erit, vt recta linea BC ad rectas BD DC.

Et vt igitur figura, quę à BC ad eas, quę à BA AC, ita quod ex BC quadratum ad quadrata, quæ ex BA AC. B

Hoc similiter concludemus, vt proxime dictum est, ex vigesima quarta quinti. erit enim figura, quae fit à BA magnitudo prima; figura, quae à BC secunda; quadratum ex BA tertia; & quadratum ex BC quarta; figura vero, quae fit ab AC quinta; & quadratum ex AC sexta. Hoc theoremate multo vniuersalius est illud, quod à Pappo demonstratur in quarto libro mathematicarum collectionum.

Si sit triangulum ABC, & ab ipsis AB BC describantur quaeuis parallelogramma AB ED BCFG; & lineae DE FG producantur ad H, iungatur que HB: fient parallelogramma ABED BCFG aequalia parallelogrammo cõtento AC HB, in angulo qui vtrisque BAC DHB sit aequalis.



Producatur enim HB ad K, & per A C ipsi KH parallelæ ducantur AL CM, & LM iungatur. Itaque quoniam parallelogrammum est ALHB; erunt AL BH æquales, & parallelæ. Similiter æquales & parallelę MC HB. ergo & LA MC æquales & parallelæ sint necesse est; & propterea LM AC. parallelogrammum igitur est ALMC in angulo LAC, hoc est in angulo æquali vtrisque BAC DHB. est enim angulus DHB ipsi LAB æqualis. Et quoniam DABE parallelogrammum æquale est parallelogrammo LABH, etenim in eadem basi AB, & in eisdem parallelis AB DH consistit: parallelogrammum autem LABH parallelogrammo LAKN est æquale, cum sit in eadem basi LA, & in eisdem parallelis LA HK: erit parallelogrammũ ADEB æquale parallelogrammo LAKN. et ob eãdem caussam parallelogrammum BGFC parallelogrammo KNMC. parallelogramma igitur DABE BGFC parallelogrammo LACM æqualia sunt, hoc est ei, quod AC HB continetur, in angulo LAC, qui est æqualis vtrisque BAC BHL. Atque hoc multo vniuersalius est, quàm quod in triangulo rectangulo de quadratis in elementis demonstratur. 34. ptimi. 30. ptimi. 33 primi. 34. primi. 35. primi.

THEOREMA XXII. PROPOSITIO XXXII.

Si duo triangula componantur ad vnum angulum, quæ duo latera duobus lateribus proportionalia habeant, ita vt homologa latera ipsorum etiam sint parallela, reliqua triangulorum latera in directum sibi ipsis constituta erunt.



Sint duo triangula ABC DCE, quę duo latera BA AC duobus lateribus CD DE proportionalia habeant, vt sit sicut BA ad AC, ita CD ad DE; parallela autem sit AB ipsi DC, et AC ipsi DE. Dico BC ipsi CE in directũ esse. Quoniam enim AB parallela est DC, et in ipsas incidit recta linea AC; erunt anguli 29. primi.

alternĳ BAC ACD æquales inter ſe ſe. Eadē ratione et angulus CDE æqualis eſt angulo ACD. Quare et BAC ipſi CDE eſt ęqualis. Et quoniam duo triāgula ſunt ABC DCE, vnū angulū, qui ad A, vni angulo qui ad D æqualem habentia, circum ęquales autem angulos latera proportionalia, quòd ſit vt BA ad AC, ita CD ad DE; erit triangulum ABC triangulo DCE æquiangulum. ergo ABC angulus



6. huius.

eſt æqualis angulo DCE. oſtenſus autem eſt et angulus ACD ęqualis angulo BAC. totus igitur ACE duobus ABC BAC eſt æqualis. communis apponatur ACB. ergo anguli ACE ACB angulis BAC ACB CBA æquales ſunt. Sed BAC ACB CBA anguli duobus rectis ſunt ęquales. et anguli igitur ACE ACB duobus rectis æquales erunt. Itaque ad quandam rectam lineam AC, et ad punctum in ipſa C dúæ rectæ lineæ BC CE non ad eaſdem partes poſitæ angulos, qui deinceps ſunt ACE ACB duobus rectis æquales efficiunt. ergo BC ipſi CE in directum erit. Si igitur duo triangula componantur ad vnum angulum, quæ duo latera duobus lateribus proportionalia habeant, ita vt homologa latera ipſorum etiam ſint parallela; reliqua triangulorum latera in directum ſibi ipſis conſtituta erunt. quod demonſtrare oportebat.

4. primi.

THEOREMA XXIII. PROPOSITIO XXXIII.

In circulis æqualibus anguli eandem habent proportionem, quam circumferentiæ, quibus inſiſtunt, ſiue ad centra, ſiue ad circumferentias inſiſtant. Adhuc autem & ſectores, quippe qui ad centra ſunt conſtituti.

Sint ęquales circuli ABC DEF; et ad centra quidem ipſorum GH ſint anguli BGC EHF, ad circumferentias vero anguli BAC EDF. Dico vt circumferentia BC ad EF circumferentiam, ita eſſe et BGC angulum ad angulum EHF, et angulum BAC ad angulum EDF: et adhuc ſectorē BGC ad EHF ſectorem. Ponantur enim circumferentię quidem BC ęquales quotcumque deinceps CK KL; circumferentię vero EF, rurſus ęquales quotcumque FM MN: et iungantur GK GL HM HN. quoniam igitur circumferentiæ BC CK KL inter ſe ſunt ęquales, et anguli BGC CGK KGL inter ſe æquales erūt.



27. tertij.

quotuplex igitur eſt circumferentia BL circumfrentiæ BC, totuplex eſt et BGL angulus anguli BGC. Eadem ratione et quotuplex eſt circūferentia NE circūferentię EF, totuplex et EHN angulus anguli EHF. Si igitur æqualis eſt BL circumferentia circumferentiæ EN, et angulus BGL angulo EHN erit æqualis; et ſi circumferentia BL maior eſt circumferentia EN, maior erit et BGL angulus angulo EHN: et ſi minor, minor. Quattuor igitur exiſtentibus magnitudinibus, duabus nimirum circūferentijs BC EF: et duobus angulis BGC EHF, ſumpta ſunt circumferentiæ quidem BC, et BGC anguli æque multiplicia, videlicet circumferentia BL, et BGL angulus; circumferentiæ vero EF, et EHF anguli æque multiplicia, nempe circumferētia EN, et angulus EHN. atque oſtenſum eſt ſi circumferētia BL ſuperat circumferentiam EN, et BGL angulū ſuperare angulum EHN, et ſi æqualis, ęqualem, et ſi minor, minorem eſſe. Vt igitur circumferentia BC ad EF circumferentiam, ita angulus

Diffi. 5 quinti.

angulus BGC ad angulum EHF. Sed vt BGC angulus ad angulum EHF, ita angulus BAC ad EDF angulum. vterque enim vtriusque est duplus. et vt igitur BC circumferentia ad circumferentiam EF, ita et angulus BGC ad angulum EHF, et angulus BAC ad EDF angulum. Quare in circulis æqualibus anguli eandem habent proportionem, quam circumferentiæ, quibus insistūt, siue ad centra, siue ad circumferentiam insistant. Dico insuper, et vt BC circumferentia ad circumferentiam EF, ita esse sectorem GBC ad HFE sectorem. Iungantur enim BC, CK, et sumptis in circumferentijs BC CK: punctis X O, iungantur et BX XC CO OK. Itaque quoniam duæ BG GC duabus CG GK æquales sunt, et angulos æquales continēt; erit et basis BC basi CK æqualis. æquale igitur est et GBC triāgulum triangulo GCK. Et quoniam circumferentia BC circumferentiæ CK est æqualis, et reliqua circumferentia, quæ complet totum circulum ABC æqualis est reliquæ, quæ eundem circulum complet. quare et angulus BXC angulo COK est æqualis. similis igitur est BXC portio portioni COK: et sunt in æqualibus rectis lineis BC CK. quę autem in æqualibus rectis lineis similes circulorū portiones, et inter se æquales sunt. ergo portio BXC est æqualis portioni COK. est autem et BGC triangulum triangulo CGK æquale. et totus igitur sector BGC toti sectori CGK æqualis erit. Eadem ratione et GKL sector vtrique ipsorum GKC GCB est æqualis. Tres igitur sectores BGC CGK KGL æquales sunt inter se. Similiter et sectores HEF HFM HMN inter se sunt æquales. quotuplex igitur est LB circumferentia circumferentiæ BC, totuplex est et GBL sector sectoris GBC. Eadem ratione et quotuplex est circumferentia NE circumferentiæ EF, totuplex est et HEN sector sectoris HEF. quare si circumferentia BL circumferentię EN est æqualis, et sector BGL æqualis est sectori EHN. et si circumferentiæ BL superat circumferentiā EN, superat et BGL sector sectorem EHN, et si minor minor. Quattuor igitur existentibus magnitudinibus, duabus quidem BC EF circumferentijs, duobus uero sectoribus GBC EHF, sumpta sunt æque multiplicia, circumferentiæ quidem BC et GBC sectoris circumferentia BL et GBL sector. circumferentię vero EF, et sectoris HEF æquemultiplicia circumferentia EN, et HEN sector. atque ostensum est si BL circumferentia superat circumferentiam EN, et sectorem BGL superare sectorem EHN. et si æqualis æqualem esse; et si minor, minorem. est igitur vt BC circumferentia ad circumferentiam EF, ita sector GBC ad HEF sectorem. quod ostendere oportebat.



15.quinti. 20.tertij. 4.primi. 27.tertij. 11.dif. tertij. 24.tertij. 5.diffi.quinti.

COROLLARIVM

Perspicuum etiam est, et vt sector ad sectorem, ita esse angulum ad angulum. 11.quinti.

SEXTI LIBRI FINIS.

EVCLIDIS ELEMENTORVM LIBER SEPTIMVS

CVM SCHOLIIS ANTIQVIS, ET COMMENTARIIS

Federici Commandini Vrbinatis.

DIFFINITIONES.

I.



NITAS est, qua vnumquodque eorũ, quæ sunt vnum dicitur.

II.

Numerus autem ex vnitatibus constans multitudo.

III.

Pars est numerus numeri, minor maioris, quando maiorem metitur.

F. C. COMMENTARIVS.

Pars ea nomen inuenit à numero, per quem minor maiorem metitur. Si enim minor bis metiatur maiorem, dicetur pars dimidia, si ter dicetur tertia, si quater quarta. & ita in alijs.

IIII.

Partes autem, quando non metitur.

F. C. COMMENTARIVS.

Partes nomen trahunt ab ijs numeris, per quos communis duorum numerorum mensura vtrũque ipsorum metitur. nam si communis eorum mensura minorem numerum bis metiatur, & maiorem ter, dicentur hae partes duae tertiae; si vero minorem ter metiatur, & maiorem quater, dicentur tres quartae. Quòd si maiorem quinquies metiatur, dicentur tres quintae. & ita in reliquis. Recentiores numerum, per quem communis mensura minorem metitur, numerantem, uel numeratorem appellant, vtpote qui partium multitudinem definiat: numerum vero, per quem communis mensura maiorem metitur, denominantem, seu denominatorem dicunt, vt qui his partibus nomen imponat.

V.

Multiplex est maior minoris, quando minor eum metitur.

F. C.

F. C. COMMENTARIVS.

Multiplex autem nomen habet ab eo numero, per quem minor eum metitur. Si enim minor bis metiatur maiorem, dicetur maior minoris duplus; si ter, triplus; si quater, quadruplas, & eodem modo in alijs.

VI.

Par numerus est, qui bifariam diuiditur.

VII.

Impar vero, qui bifariam non diuiditur: vel qui à pari numero vnitate differt.

VIII.

Pariter par numerus est, quem par numerus per parem numerum metitur.

SCHOLIVM.

Si huic diffinitioni addamus tantum, vt pariter par numerus dicatur is, quem par numerus tantum per parem numerum metitur; faciemus pythagoreorum pariter parem, qui ad vnitatem vsque bifariam diuiditur; vt octo par numerus metitur per parem tantum. duodecim vero Euclidi est pariter par, quem & par numerus metitur per parem numerum; bis enim sex sunt duodecim; & impar numerus per parem metitur. nam si quattuor ter sumantur duodecim fient. Pariter vero imparem dicit, quem par numerus metitur per imparem numerum; vt decem, quem binarius per quinarium metitur. At περισσάρτιος, *hoc est impariter par est duodecim: etenim ternarius per quaternarium metitur. & simpliciter quod perfectum nomen est in compositione, per illud dicimus numerũ metiri alium numerum. Itaque sciendum est* περισσάρτιον, *hoc est impariter parem à pythagoreis sic dictum, plures diuisiones susci pere, quæ in partes æquales fiunt, nõ tamẽ ad vnitatẽ vsq; diuisionẽ procedere. Nouit autem hunc & in ipse Euclides, cuius mentionem facit in nono libro, pulchre ipsum neque pariter parem, neque pariter imparem dicens, per negationem duorum extremorum significauit, quemadmodum in contrarijs mediatis, media, quibus nomina imposita non sunt, per negationem extremorum explicamus. Huius autem mentionem facit Euclides in 34 noni libri.*

IX.

Pariter vero impar est, quem par numerus per numerum imparem metitur.

F. C.

F. C. COMMENTARIVS

Ex diffinitione octaua, & nona, & ex ijs, quae in nono libro traduntur, apparet Euclidem pariter parem numerũ appellare eũ, quẽ par numerus per numerum parem metitur, siue sit ex numeris à binario duplatis, siue non: & pariter imparem appellare eum, quem par numerus per numerum imparem metitur, siue dimidium habeat imparem, siue parem. numeros enim à binario duplatos ipse pariter pares tantum appellat, & eos, qui dimidium imparem habent vocat pariter impares tantum. eos vero, qui neque à binario duplati sunt, neque dimidium habent imparem, & pariter pares, & pariter impares dicit. At Nicomacho, Boetioq; paris numeri species tres sunt; Vnà quae dicitur pariter par, alia quae pariter impar, & tertia, quae impariter par. Pariter par numerus est, qui põt in duo paria diuidi, eiusq; pars in alia duo paria & rursus partis pars in alia duo paria; & hoc semper, quoad diuisio partium ad vnitatem perueniat, vt 64. Pariter impar numerus est, qui quoniam par est, in partes quidem aequales diuiditur, partes vero eius mox indiuisibiles sunt, vt 6.10.14.18.22. Impariter par numerus est, qui inter duos iam dictos quodammodo medius est, diuiditur enim in partes aequales, eiusq; pars rursus diuiditur in alias partes aequales, & interdum partes partium in alias aequales diuidi possunt; sed diuisio ad vnitatem vsque non perducitur. Qui igitur his est pariter par, Euclides pariter parem tantum vocat; qui vero his pariter impar est, Euclides pariter imparem tantum. & qui his impariter par Euclides & pariter parem, & impariter parem appellat. Quare illud, quod in extrema parte antecedentis scholij additur, verum non videtur, nisi fortasse intelligamus eum, qui pariter par est, & pariter impar eo modo, quo sumit Euclides, neque pariter parem esse tantum, neque pariter imparem tantum.

X.

Impariter vero impar numerus est, quẽ impar numerus per numerum imparem metitur.

XI.

Primus numerus est, quem vnitas sola metitur.

F. C. COMMENTARIVS.

Primum numerum nullus metitur numerus, præterquàm quòd ipse se ipsum metitur.

XII.

Primi inter se numeri sunt, quos sola vnitas communis mensura metitur.

XIII.

Compositus numerus est, quem numerus aliquis metitur.

XIIII.

Compositi inter se numeri sunt, quos numerus aliquis communis mensura metitur.

XV.

Numerus numerũ multiplicare dicitur, quando quot vnitates sunt in ipso, toties componitur multiplicatus, & aliquis gignitur.

Quando

XVI.

Quando duo numeri ſe ſe multiplicantes aliquem fecerint, qui factus eſt planus appellatur: latera vero ipſius ſunt numeri ſe ſe multiplicantes.

XVII.

Quando autem tres numeri ſe ſe multiplicantes aliquem fecerint, factus ſolidus appellatur: latera vero ipſius ſe ſe multiplicantes numeri.

XVIII.

Quadratus numerus eſt, qui æqualiter eſt æqualis, vel qui duobus æqualibus numeris continetur.

XIX.

Cubus vero, qui æqualiter eſt æqualis æqualiter, vel qui tribus æqualibus numeris continetur.

XX.

Numeri proportionales ſunt, quando primus ſecũdi, & tertius quarti eque multiplex fuerit, vel eadem pars, vel eædem partes.

F. C. COMMENTARIVS.

Vel igitur primus eſt maior ſecundo, vel minor. & ſi quidem maior, vel etiam minor metitur, vel non metitur. & ſi metitur erit primus ſecundi aeque multiplex, atque tertius quarti: ſi vero non metitur, quae partes eſt ſecundus primi, eædem partes erit & quartus tertij. vel etiam hoc modo. ſi primus eſt maior ſecundo, quae pars, vel partes eſt ſecundus primi, eadem pars, vel partes erit & quartus tertij. ſed ſi primus ſit minor, quae pars, vel quae partes eſt primus ſecundi, eadem pars, vel eædem partes erit & tertius quarti. Ponit autem nunc minorem numerum maioris partem eſſe, vel partes, quod poſtea in quarto theoremate huius demonſtratione confirmat.

XXI.

Similes plani, & ſolidi numeri ſunt, qui latera habent proportionalia.

XXII.

Perfectus numerus eſt, qui ſuis ipſius partibus eſt æqualis.

F. C. COMMENTARIVS.

Numerus autem qui ſuis ipſius partibus minor eſt abundans appellatur, qui vero maior, diminutos. His diffinitionibus nos aliam addidimus. ſed & petitiones quaſdam, & communes notiones apponere libuit, quibus Euclides in his libris uti uiſus eſt.

XXIII.

Cum fuerint quotcumque numeri deinceps proportionales, primus ad tertium duplam proportionem habere dicetur eius, quam habet ad ſecundum: & primus ad quartum triplam, & eodem modo in alijs.

PETITIONES.

1 *Cuilibet numero quotlibet ſumi poſſe æquales, vel multiplices.*
2 *Quolibet numero ſumi poſſe maiorem.*
3 *Numerus infinite augetur, ſed non infinite diminuitur.*

COMMVNES NOTIONES.

1 *Quicumque eiuſdem, vel ęqualium æque multiplices fuerint, & ipſi inter ſe ſunt æquales.*
2 *Quorum idem numerus æque multiplex fuerit, vel quorũ ęque multiplices fuerint æquales, & ipſi inter ſe æquales ſunt.*
3 *Quicumque eiuſdem numeri, vel æqualium eadem pars, vel eadem partes fuerint, & ipſi inter ſe ſunt æquales.*
4 *Quorum idem, vel æquales numeri eadem pars, vel ędem partes fuerint, inter ſe ſunt æquales.*
5 *Omnis numeri pars eſt vnitas ab eo denominata, binarij enim numeri vnitas pars eſt ab ipſo binario denominata, quæ dimidia dicitur, ternarij vero vnitas eſt pars, quæ à ternario denominata tertia dicitur, quaternarij quarta, & ita in alijs.*
6 *Vnitas omnem numerum metitur per vnitates, quę in ipſo ſunt.*
7 *Omnis numerus ſe ipſum metitur.*
8 *Si numerus metiatur numerum, & ille, per quem metitur, eundem metietur per eas, quę ſunt in metiente, vnitates.*
9 *Quicumque numerus alium metitur, multiplicans eum, vel multiplicatus ab eo, per quem metitur, illum ipſum producit.*
10 *Si numerus numerum alium multiplicans aliquem produxerit, multiplicans quidem productum metitur per vnitates, quæ ſunt in multiplicato; multiplicatus vero metitur eundem per vnitates, quæ ſunt in multiplicante.*
11 *Quicumque numerus metitur duos, vel plures, metietur quoque eũ, qui ex illis componitur.*
12 *Quicumque numerus metitur aliquem, metietur quoque eum, quem ille ipſe metitur.*
13 *Quicũque numerus metitur totũ & ablatum, etiã reliquũ metietur.*

THEO-

THEOREMA I. PROPOSITIO I.

Si duobus numeris inæqualibus expositis, detracto semper minore de maiore, reliquus minime metiatur præcedentem, quo ad assũpta fuerit vnitas; numeri à principio positi primi inter se erũt.

Duobus enim inęqualibus numeris expositis AB CD, detracto semper minore de maiore reliquus minime metiatur præcedentẽ, quoad assumpta fuerit vnitas. Dico numeros AB CD inter se primos esse, hoc est ipsos AB CD vnitatẽ solã metiri. Si enim AB CD nõ sint primi inter se, metietur eos aliquis numerus. metiatur, sitq; E: & CD quidem ipsum AB metiens relinquat se ipso minorẽ FA, AF vero metiens DC relinquat se ipso minorem GC; & GC metiẽs FH vnitatẽ HA relinquat. quoniam igitur numerus E ipsum CD metitur, CD vero metitur BF; & E ipsum BF metitur; metitur aũt & totũ BA. ergo & reliquũ AF metietur. Sed AF metitur DG. quare & E ipsum DG metietur. metitur autem & totum DC. ergo & reliquum metietur CG. at CG metitur FH: & E igitur ipsum FH metietur. sed & metitur totum FA; & reliquam igitur vnitatem AH metietur, numerus existens. quod fieri non potest. non igitur ipsos AB CD metietur aliquis numerus. ergo AB CD primi inter se sunt. quod oportebat demonstrare.



Per 12. cõm notionem. 13. com. not.

F. C. COMMENTARIVS.

Huius conuersam hoc modo demonstrabimus.

Expositis duobus numeris inter se primis; si de maiori semper minor detrahatur, non cessabit huiusmodi detractio antequam ad vnitatem deuentum fuerit.

Sint enim numeri inter se primi AB CD; & si fieri potest ijsdem manentibus, & detracto sẽper minore de maiore deuentũ sit ad numerũ HA, qui prę cedẽtẽ GC metiatur. Si igitur HA metitur GC, & ipsũ FH metietur. metitur aũt & se ipsũ, ergo & FA metietur; ac propterea ipsũ DG. sed & metiebatur GC. quare & totũ DC metietur. atq; ob id ipsum BF metitur. metitur aũt & FA, vt ostensum est. ergo & totũ BA metietur. Itaque quoniã HA numerus duos numeros AB CD metitur, erunt AB, CD inter se compositi. Sed & inter se primi ponuntur. quod fieri non potest. nõ igitur expositis duobus numeris inter se primis, si de maiori semper minor detrahatur, cessabit detractio, antequam ad vnitatem deuentum fuerit. quod oportebat demonstrare. Sed & illud constat.



12. com. not. 11. com. not. Diffi. 4.

Expositis duobus numeris inter se compositis, si de maiori semper detrahatur minor, detractio ad vnitatem vsque non perueniet.

Si enim ad vnitatem perueniat, erunt hi inter se primi, sed & compositi. quod est absurdum. 1. huius.

Ex iam demonstratis problema quoque illud perspicue apparere potest.

Duobus numeris expositis comperire an inter se primi sint, an compositi.

Facta namque detractione, vt dictum est, si deueniet ad vnitatem vsque, dicemus eos inter se primos esse, sin minus, compositos.

PROBLEMA I. PROPOSITIO II.

Duobus numeris datis non primis inter se, maximam eorum communem mensuram inuenire.

Sint dati duo numeri non primi inter se AB CD; quorũ minor sit CD. oportet ipsorum AB CD maximam communem mensuram inuenire. Si igitur CD metitur AB eum etiam se ipsum metiatur, erit CD ipsorum AB CD communis mensura. & perspicuum est eam maximam esse: nullus enim maior CD ipsum CD metietur:

si vero CD non metitur AB, ipsorum AB CD detracto semper minore de maiore, relinquetur aliquis numerus, qui metietur precedentem. vnitas quidem non relinquetur; essent enim AB CD primi inter se. quod nō ponitur. & CD quidem ipsum AB metiens relinquat se ipso minorem AE; AE vero metiens CD relinquat se ipso minorem CF: & CF ipsum AE metiatur. Itaque quoniā CF ipsum AE metitur, AE vero ipsum DF; & CF ipsum DF metietur. sed & metitur se ipsum. & totū igitur metietur CD. At CD ipsum BE metitur. ergo & CF metitur BE. metitur autem & EA. & totum igitur AB metietur. sed & metitur CD. ergo CF ipsos AB CD metitur; ac propterea CF ipsorum AB CD est cōmunis mēsura. dico etiam maximam esse. Si enim non est maxima, ipsos AB CD metietur aliquis numerus maior ipso CF. metiatur, sitq; G. & quoniam G ipsum CD metitur; CD vero ipsum BE: & G ipsum BE metitur. metitur autem & totum BA. & reliquum igitur AE metietur. Sed AE metitur DF. ergo & G ipsum DF metitur. metitur autem & totum DC. quare & reliquum CF metietur, maior minorem. quod fieri non potest. non igitur ipsos AB CD numeros numerus aliquis metietur, maior ipso CF. ergo CF ipsorum AB CD maxima erit communis mensura. Duobus igitur numeris datis non primis inter se, maxima eorum communis mensura inuenta est. quod facere oportebat.

Ex antecedente.

11.com.not.

11.com. not.



COROLLARIVM.

Ex hoc manifestum est, si numerus duos numeros metiatur, et maximam eorum communem mensuram metiri.

F. C. COMMENTARIVS.

Hoc corollarium apparet ex postrema parte demonstrationis. sit enim duorum numerorum AB CD communis mensura CF: & sit numerus aliquis G, qui ipsos AB CD metiatur. Dico etiam maximam eorum communem mensuram CF metiri. Quoniam enim G ipsum CD metitur: CD vero metitur BE: et G ipsum BE metitur. sed & metitur totum BA. ergo & reliquum AE metietur: metitur autem AE ipsum DF. ergo G ipsum DF metitur. Sed & metitur totum DC. Quare & reliquum CF, maximam scilicet eorum communem mensuram metietur. quod demonstrare oportebat.

12.com.not.

13.com.not.

PROBLEMA II. PROPOSITIO III.

Tribus numeris datis non primis inter se, maximam ipsorū cōmunem mensuram inuenire.

Sint dati tres numeri non primi inter se ABC. oportet ipsorum ABC maximam communem mensuram inuenire. Sumatur enim duorum AB maxima cōmunis mēsura D. itaque D vel ipsum C metitur, vel non metitur. metiatur primū. metitur autem et ipsos A B. ergo D numeros A B C metitur: et ob id ipsorum est communis mensura. dico et maximam esse. si enim D non est ipsorum A B C maxima communis mensura, metietur eos aliquis numerus maior ipso D. metiatur, et sit E. quoniam igitur E metitur numeros A B C, et ipsos AB metietur, et ipsorū AB maximam communē mēsuram, quæ est D. ergo E ipsum D metitur, maior minorem. quod fieri non pōt. non igitur ABC numeros numerus aliquis maior ipso D metietur. ergo D ipsorum ABC maxima est cōis mensura.



Non

Non metiatur autē D ipſum C. Dico primum numeros D C non eſſe primos inter ſe. Quoniam enim ABC non ſunt inter ſe primi, metietur eos aliquis numerus. et qui metitur ipſos ABC, & ipſos AB metietur, et ipſorum AB maximam communem menſurā, videlicet D. metitur autem et ipſum C. ergo ipſos DC numerus aliquis metietur; ideoq; DC non ſunt inter ſe primi. Sumatur ipſorum maxima communis menſura E. et quoniam E ipſum D metitur, et D metitur ipſos AB; et E ipſos AB metitur. metitur autē et C. ergo et ipſos ABC metietur; eritq; E ipſorum ABC communis menſura. Dico et maximam eſſe. ſi enim E non eſt ipſorum ABC maxima communis menſura, metietur ABC numeros numerus aliquis maior ipſo E. metiatur, ſitq; F. et quoniam F metitur numeros ABC, et ipſos AB, et ipſorum AB maximam communem menſuram metietur, videlicet ipſum D. ergo F ipſum D metitur. metitur autem et ipſum C. quare F et ipſos DC, et ipſorum DC maximam communem menſuram metietur, videlicet ipſum E. ergo F ipſum E metitur, maior minorem. quod fieri non poteſt. non igitur ABC numeros numerus aliquis maior ipſo E metietur. ergo ipſorum ABC maxima eſt communis mēſura. Tribus igitur numeris datis non primis inter ſe, eorum maxima communis menſura inuēta eſt. quod facere oportebat.

A 8
B 12
C 4
D 6
E ..2
F —

Ex coroll. anteced.

COROLLARIVM.

Ex his manifeſtum eſt, ſi numerus numeros tres metiatur, et ipſorum maximam communem menſuram metiri. A

Eodem modo et pluribus numeris datis maximā communem menſuram inueniemus. B

F. C. COMMENTARIVS.

Ex his manifeſtum eſt &c.] *Sequitur hoc, quemadmodum in antecedente demonſtrauimus.* A

Eodem modo &c.] *Sed & illud conſtat, ſi numerus plures numeros metiatur, & communem eorum menſuram metiri.* B

THEOREMA II. PROPOSITIO IIII.

Omnis numerus omnis numeri minor maioris, vel pars eſt, vel partes.

Sint duo numeri A BC, quorum BC ſit minor. Dico BC ipſius A vel partem eſſe, vel partes. Numeri enim A BC vel primi ſunt inter ſe, vel non. ſint prius inter ſe primi, & diuiſo B C in vnitates, quæ in ipſo ſunt, erit vnaquæque vnitas earum, quæ in B C, pars aliqua ipſius A. ergo B C ipſius A partes eſt. ſed non ſint A BC inter ſe primi. Itaque B C vel ipſum A metitur, vel non. et ſiquidem metitur, erit BC pars ipſius A: ſin minus, ſumatur ipſorum A BC maxima communis menſura D; et diuidatur BC in numeros ipſi D æquales BE EF FC. Quoniā igitur D numerum A metitur, erit D pars ipſius A. æqualis autem eſt D vnicuique ipſorum BE EF FC. ergo et vnuſquiſque ipſorum B E EF F C pars eſt ipſius A: ac propterea B C ipſius A partes eſt.

A 8
B 5C
A 8
B 4C
A 8
B. 2E. 2F. 2C
D. 2

Omnis

Omnis igitur numerus omnis numeri, minor maioris, vel pars eſt, vel partes. quod demonſtrare oportebat.

THEOREMA III. PROPOSITIO. V.

Si numerus numeri pars fuerit, et alter alterius eadem pars; et vterque vtriuſque eadem pars erit, quæ vnus vnius.

Numerus A numeri BC pars ſit: et alter D alterius EF eadem pars, quæ eſt A ipſius B C. Dico et vtrumque A D vtriuſque BC EF eãdem partem eſſe, quæ eſt A ipſius BC. Quoniam enim quæ pars eſt A ipſius B C, eadem eſt et D ipſius EF; quot numeri ſunt in BC æquales ipſi A, tot erũt et in EF numeri æquales ipſi D. Diuidatur BC quidem in numeros æquales ipſi A, videlicet in BG, GC; EF vero diuidatur in numeros ipſi D æquales, hoc eſt EH HF. erit vtique æqualis multitudo numerorũ BG GC multitudini ipſorum EH HF. & quoniam æqualis eſt BG ipſi A, & EH ipſi D, erunt BG EH ipſis A D æquales. Et eadem ratione cum GC ſit æqualis ipſi A, & HF ipſi D; & GC HF ipſis A D æquales erunt. quot igitur numeri ſunt in BC, æquales ipſi A, tot ſunt & in BC EF æquales ipſis A D. ergo quotuplex eſt BC ipſius A, totuplex erit et vterque BC EF vtriuſque A D. quę igitur pars eſt A ipſius BC, eadem pars erit et vterque A D vtriuſque BC EF. quod demonſtrare oportebat.



F. C. COMMENTARIVS.

Ex hoc autem licet illud etiam demonſtrare.

Si numerus numeri multiplex fuerit, et alter alterius æque multiplex; et vterque vtriuſque æque multiplex erit, atque vnus vnius.

Sit enim A numerus numeri B multiplex, et alter C alterius D aeque multiplex. Dico vtrumque AC vtriuſque BD aeque multiplicem eſſe, atque A ipſius B. quoniam enim A ipſius B multiplex eſt, & C ipſius D aeque multiplex; erit B ipſius A pars aliqua, & D ipſius C eadem pars. quare ex ijs, quae proxime tradita ſunt & vterque BD vtriuſque AC eadem pars erit, quae eſt B ipſius A. Vterque igitur AC vtriuſque BD aeque multiplex eſt, atque A ipſius B. quod demonſtrare oportebat.



Sed quod de duobus dicitur, poſſumus etiam ad quotcumque numeros amplificare. vt] Si fuerint quotcumque numeri quotcumque numerorum æqualium multitudine, ſinguli ſingulorum æque multiplices, quotuplex eſt vnus vnius, totuplices erunt & omnes omnium [*quod eodem modo demonſtrabimus. Hoc autem reſpondebit ei, quod in prima propoſitione quinti libri de omnibus magnitudinibus demonſtratur.*

THEOREMA IIII. PROPOSITIO. VI.

Si numerus numeri partes fuerit, & alter alterius eędem partes; & vterque vtriuſque eædem partes erit, quę vnus vnius.

Numerus enim AB numeri C partes ſit, & alter D alterius F eędem partes, quæ AB ipſius C. Dico & vtrumque AB DE vtriuſque C F easdẽ partes eſſe, quæ AB ipſius C. quoniam enim quę partes eſt AB ipſius C, eædem eſt DE ipſius F; quot partes ſunt in AB ipſius C, tot erunt & in DE



partes

partes ipſius F. Diuidatur AB quidem in partes ipſius C, videlicet AG GB; DE vero diuidatur in partes ipſius F, hoc eſt DH HE. erit ipſorum AG GB multitudo æqualis multitudini ipſorũ DH HE. & q̃m quæ pars eſt AG ipſius C, eadem eſt pars & DH ipſius F: quę pars eſt AG ipſius C, eadem pars erit & vterque AG DH vtriuſque C F. Simili ratione & quæ pars eſt GB ipſius C, eadem pars erit & vterque GB HE vtriuſque C F. Quę igitur partes eſt AB ipſius C, eędem partes eſt & vterque AB. DE vtriuſque C F. quod demonſtrare oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

Similiter & hanc, & antecedentem poſſumus ad quotcunque numeros transferre; ut Si quot cunque numeri minores ad totidem alios maiores referantur, ſintq́; ſinguli ſingulorum vel eadem pars, vel eædem partes; quę pars, vel partes eſt vnus vnius, eadem pars, vel eædem partes erunt & omnes omnium.

THEOREMA V. PROPOSITIO. VII.

Si numerus numeri pars fuerit, quæ ablatus ablati; & reliquus reliqui eadem pars erit, quæ totus totius.

Numerus enim AB numeri CD pars ſit, quæ ablatus AE ablati CF. Dico & reliquum EB reliqui FD eandem partem eſſe, quę eſt totus AB totius CD. quæ enim pars eſt AE ipſius CF, eadem pars ſit & EB ipſius CG. ergo quæ pars eſt AE ipſius CF, eadem pars eſt & AB ipſius GF. quæ autẽ pars eſt AE ipſius CF, eadem pars ponitur & AB ipſius CD. quæ igitur pars eſt AB ipſius GF, eadem eſt & AB ipſius CD. quare AB vtriuſque GF CD eadem eſt pars. æqualis igitur eſt GF ipſi C D. communis auferatur CF. ergo reliquus GC reliquo FD eſt æqualis. & quoniam quæ pars eſt AE ipſius CF, eadem eſt & EB ipſius GC. æqualis autem eſt GC ipſi FD: quę pars eſt AE ipſius CF, eadem erit & EB ipſius FD. ſed quæ pars eſt AE ipſius CF, eadem eſt & AB ipſius CD. ergo quæ pars eſt EB ipſius FD, eadem eſt & AB ipſius CD. & reliquus igitur EB reliqui FD eadem pars erit, quæ totus AB totius CD. quod demonſtrare oportebat.



5. huius.

4. com. not.

F. C. COMMENTARIVS.

Ex his autem illud quoque demonſtrare licebit.

Si numerus numeri æque multiplex fuerit, atque ablatus ablati, & reliquus reliqui æque multiplex erit, atque totus totius.

Iiſdem enim, quae ſupra, manentibus. ſit numerus CD aeque multiplex numeri AB, atque ablatus CF ablati AE. Dico & reliquum FD reliqui EB aeque multiplicem eſſe, atque totũ CD totius AB. quoniam enim CD ipſius AB aeque multiplex eſt, atque ablatus CF ablati AE; erit AB ipſius CD eadem pars, quae eſt AE ipſius CF. ergo ex iam demonſtratis & reliquus EB reliqui FD eadem pars eſt, quae totus AB totius CD. reliquus igitur FD reliqui EB aequemultiplex erit, atque totus CD totius AB. quod demonſtrandum fuerat.



THEOREMA VI. PROPOSITIO VIII.

Si numerus numeri partes fuerit, quæ ablatus ablati; & reliquus reliqui eædem partes erit, quę totus totius.

Numerus enim AB numeri CD partes ſit, quę ablatus AE ablati CF. Dico & reliquum EB reliqui FD eaſdem partes eſſe, quæ totus AB totius CD. ponatur enim ipſi

ipſi AB ęqualis GH.quæ igitur partes eſt GH ipſius CD,eędē eſt & EL ipſius CF.Diuidatur GH quidē in partes ipſius CD,videlicet GK KH:AE vero diuidatur in partes ipſius CF,videlicet AL LE.erit igitur ipſarū GK KH multitudo æqualis multitudini ipſarum AL LE.Et quoniā quæ pars eſt GK ipſius GD, eadem eſt & AL ipſius CF:maior aūt CD,quā CF.ergo & GK,quā AL eſt maior.ponatur ipſi AL ęqualis GM.quę igitur pars eſt GK ipſius CD, eadem eſt et GM ipſius CF.quare et reliquus MK reliqui FD eadē pars eſt, quę totus GK totius CD.Rurſus quoniā quæ pars KH ipſius CD, eadē eſt et EL ipſius CF; maior autem CD, quàm CF: erit & KH quàm EL maior. ponatur ipſi EL ęqualis KN.quę igitur pars eſt KH ipſius CD, eadē eſt & KN ipſius CF. ergo & reliquus NH reliqui FD eadē pars eſt, quæ totus KH totius CD. oſtēſum autem eſt & reliquum MK reliqui FD eandem partem eſſe; quæ totus GK totius DC. & vterque igitur MK NH ipſius DF eædem partes eſt, quę totus HG totius DC.æqualis autem vterque quidem MK NH ipſi EB; HG vero ipſi BA. & reliquus igitur EB reliqui FD eædem partes eſt, quæ totus AB totius CD.quod demonſtrare oportebat.



7.huius.

THEOREMA. VII. PROPOSITIO IX.

Si numerus numeri pars fuerit, & alter alterius eadem pars; & permutando quæ pars eſt, vel partes primus tertij, eadē erit pars, vel eædem partes & ſecundus quarti.

Numerus enim A numeri BC pars ſit,& alter D alterius EF eadem pars,quę A ipſius BC.minor autem ſit A,quàm D.Dico & permutādo quę pars eſt A ipſius D, vel partes, eādem partem eſſe & BC ipſius EF,vel eaſdem partes. Quoniam enim quę pars eſt A ipſius BC,eadem eſt & D ipſius EF;quot numeri ſunt in BC ęquales ipſi A,tot ſunt et in EF æquales ipſi D.diuidatur BC quidem in numeros ipſi A æquales,videlicet in BG GC: EF vero diuidatur in numeros ipſi D ęquales, EH HF.erit ipſorū BG GC multitudo qualis multitudini ipſorum EH HF. et quoniam numeri BG GC inter ſe ſunt ęquales;ſunt autem et ęquales EH HF;atque eſt ipſorum BG GC multitudo æqualis multitudini ipſorum EH HF:quæ pars eſt BG ipſius EH,vel partes,eadem pars erit et GC ipſius HF,vel eædem partes.ergo quæ pars eſt BG ipſius EH,vel partes, eadem pars erit et vterque BC vtriuſque EF, vel eædem partes. æqualis autem eſt BG ipſi A,et EH ipſi D.quæ igitur pars eſt A ipſius D, vel partes, eadem pars erit et BC ipſius EF,vel eædm partes.quod demonſtrare oportebat.



5.huius.
6.huius.

THEOREMA VIII. PROPOSITIO X.

Si numerus numeri partes fuerit, & alter alterius eædem partes; & permutando quę partes eſt primus tertij, vel pars, eędem partes erit & ſecundus quarti,vel eadem pars.

Numerus enim AB numeri C partes ſit, et alter DE alterius F eędem partes:ſit autem AB minor, quàm DE. Dico et permutando quæ partes eſt AB ipſius DE, vel pars, eaſdem partes eſſe et C ipſius F,vel eandem partem. quoniam enim quæ partes eſt AB ipſius C,eædem partes eſt et DE ipſius F; quot ſunt in AB partes ipſius C, tot erunt et



in DE partes ipsius F. diuidatur AB quidem in partes ipsius C, videlicet AG GB: DE vero diuidatur in partes ipsius F, hoc est DH HE. erit vtique ipsarum AG GB multitudo multitudini ipsarum DH HE æqualis. et quoniam quæ pars est AG ipsius C, eadem est pars et DH ipsius F. et permutando quæ pars est AG ipsius DH, vel partes, eadem pars erit et C ipsius F; vel eædē partes. simili ratione et quæ pars est GB ipsius HE, vel partes, eadem pars erit et C ipsius F, vel eadem partes. ergo quę pars est AG ipsius DH, vel partes; eadem pars erit et AB ipsius DE, vel eædem partes. sed quæ pars est AG ipsius DH, vel partes, eadem pars est et C ipsius F, uel eędem partes. Et quæ igitur partes est AB ipsius DE, vel pars, eædem partes est et C ipsius F, vel eadem pars. quod demonstrare oportebat.

THEOREMA IX. PROPOSITIO XI.

Si fuerit vt totus ad totum, ita ablatus ad ablatum, & reliquus ad reliquum erit, vt totus ad totum.

Sit vt totus AB ad totum CD, ita ablatus AE ad ablatum CF. Dico et reliquum EB ad reliquum FD ita esse, vt totus AB ad totum CD. Quoniam enim est vt AB ad CD, ita AE ad CF, quæ pars est AB ipsius CD, vel partes, eadē pars erit et AE ipsius CF, vel eædem partes. ergo et reliquus EB reliqui FD eadem pars erit, vel eædem partes, quę AB ipsius CD. est igitur ut EB ad FD, ita AB ad CD. quod demonstrare oportebat.

Diffi. 20.
7. 8. huius.
Per cõuers. 8.
Diffi. 20.

F. C. COMMENTARIVS.

Præcedens demonstratio congruit, cum AB fuerit minor, quàm CD. sed si AB maior sit, quàm CD, nihilominus idem demonstrabitur. nam vel CD metitur ipsum AB, vel non metitur. & si quidē metitur, quoniam est vt AB ad CD, ita AE ad CF; erit AB ipsius CD aeque multiplex, atque AE ipsius CF. quare ex iis, quae nos demōstrauimus ad septimā huius; & reliquus EB reliqui FB reliqui FD aeque multiplex est, atq; totus AB totius GD. reliquus igitur EB ad reliquum FD, erit vt totus AB ad totum CD. si vero CD non metitur ipsum AB, rursus quoniam vt AB ad CD, ita est AE ad CF, quae partes est CD ipsius AB, eędem partes erit CF ipsius AE. ergo & reliquus FD reliqui EB eędem partes est, quae totus CD totius AB. reliquus igitur EB ad reliquum FD ita erit, vt totus AB ad totum CD. quod oportebat demonstrare.

Diffi. 20.
Per cõuersā.
Diffi. 20.
D. ffi. 20.
8 huius.
Per cõuersā.
Diffi. 20.

THEOREMA X. PROPOSITIO. XII.

Si quotcumque numeri proportionales fuerint, vt vnus antecedentium ad vnum consequentium, ita erunt omnes antecedentes ad omnes consequentes.

Sint quotcumque numeri proportionales ABCD; sitq; vt A ad B, ita C ad D. Dico vt A ad B, ita esse AC ad BD. Quoniam enim est vt A ad B, ita C ad D, quæ pars est A ipsius B, uel partes, eadem pars erit et C ipsius D, vel partes. et uterque igitur AC vtriusque BD eadem pars est, uel partes, quæ A ipsius B. ergo ut A ad B, ita est AC ad BD. quod demonstrare oportebat.



Diffi. 20.
5. 6. huius.
Per conuers.
Diffi. 20.

SCHOLIVM.

Hoc quinto, & sexto vniuersalius est. quæ enim illic seorsum in partibus, & partibus, eadem hoc loco vnà demonstrantur.

F. C. COMMENTARIVS.

Et hæc demonstratio congruit tantum, tum antecedentes numeri minores fuerint consequentibus. quòd si maiores sint, rursus vel B metitur ipsum A, vel non metitur. si metitur, ita dicemus. Quoniam est vt A ad B, ita C ad D, æque multiplex erit A ipsius B, atque C ipsius D. ergo ex ijs, quæ demonstrauimus ad quintam huius, & vterque A C vtriusq;



Conuer. 20. diffi. *BD æque multiplex est, atque A ipsius B. Vt igitur A ad B, ita erit vterq; A C ad vtrũq; B D.*

Quòd si B non metitur ipsum A, ita argumentabimur. quoniam est vt A ad B, ita C ad D, quæ

6. huius. *partes est E ipsius A, eædem partes erit D ipsius C. ergo & uterq; A C vtriusque B D eædem par-*

Conuer. 20. diffi. *tes est, quæ A ipsius B. quare vt A ad B, ita erit A C ad B D.*

Idem demonstrabimus etiam si plures sint numeri proportionales, hoc, quod sequitur, præmissa.

Quæ eidem eædem sunt numerorum proportiones, et inter se eædem erunt.

Sit vt A ad B, ita C ad D: vt autem C ad D, ita E ad F. Dico vt A ad B, ita esse E ad F. Si enim numerus A sit maior, quàm E, quoniam est vt A ad B, ita C ad D, quæ pars, vel partes est B ipsius A, eadem pars erit, vel partes D ipsius C. Rursus quoniam vt C ad D, ita est E ad F, quæ pars est, vel partes D ipsius C, eadem pars, vel partes erit F ipsius E. quæ igitur pars, vel partes est B ipsius A, eadem pars erit, vel partes F



Conuer. 20. diffi. *ipsius E. ergo vt A ad B, ita est E ad F.*

Si vero A sit minor, quàm B, quoniam vt A ad B, ita est C ad D, quæ pars est, vel partes A ipsius B, eadem pars, vel partes erit C ipsius D. Rursus quoniam vt C ad D, ita E ad F, quæ pars, vel partes est C ipsius D, eadem pars, vel partes erit E ipsius F. ergo quæ pars, vel partes est A ipsius B, eadem est pars, vel par-

Conuer. 20. diffi. *tes E ipsius F. vt igitur A ad B, ita E ad F. quod demonstrandum proposuimus.*



Hoc demõstrato sint numeri proportionales A B C, D E F; sitq; vt A ad D, ita B ad E, & C ad F. Eadẽ ratione demonstrabimus vt A ad D, ita esse A B ad D E. Et quoniam vt A ad D, ita est C ad F, erit ex ijs, quæ nos proxime demõstrauimus, vt A B ad D E, ita C ad F. nõ aliter ostendemus vt A B ad D E, ita esse A B C ad D E F. vt igitur A ad D, ita erũt A B C ad D E F. et eodẽ modo in alijs, quotquot numeri proportionales fuerint. Hoc autem respondet ei, quod in 12 quinti vniuerse de magnitudinibus demonstratur.



THEOREMA XL. PROPOSITIO XIII.

Si quattuor numeri proportionales fuerint, & permutando proportionales erunt.

Sint quattuor numeri proportionales ABCD; sitq; vt A ad B, ita C ad D. Dico et per-

et permutãdo proportionales esse, videlicet vt A ad C, ita esse B ad D. quoniã enim est vt A ad B, ita C ad D, quę pars est A ipsius B, vel partes, eadẽ pars erit et C ipsius D, vel eædem partes. permutãdo igitur quæ pars est A ipsius C, vel partes, eadẽ pars est & B ipsius D, uel partes. ergo vt A ad C, ita est B ad D. quod demonstrare oportebat.



Diff. 10.

9. 10. huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Hęc demonstratio congruit, vbi antecedentes numeri minores sint consequentibus, sitq; A minor, quàm C. si vero sint maiores, & A maior sit quã B, & minor quàm C, ita dicemus. Quoniam est vt A ad B, ita C ad D; quae pars est, vel partes B ipsius A, eadem pars, vel partes erit D ipsius C. ergo permutando quae pars est, vel partes B ipsius D, eadem pars, vel partes erit A ipsius C. vt igitur A ad C, ita est B ad D.



Diff. 10.

9. 10. huius.

Cõu. dif. 10.

Quòd si A sit maior, quàm B, et maior, quàm C, ita argumẽtabimur. Quoniã vt A ad B, ita C ad D, quae pars, uel partes est D ipsius C, eadẽ pars, vel partes erit B ipsius A. ergo permutãdo quę pars, vel partes est D ipsius B, eadem pars, vel partes erit C ipsius A. est igitur vt A ad C, ita B ad D. Denique si A sit minor, quàm B, & maior, quàm C. hoc modo Quoniam vt A ad B, ita C ad D, quae pars, vel partes est C ipsius D, eadem pars, vel partes est A ipsius B, permutando igitur quae pars est, vel partes C ipsius A, eadem pars, vel partes est D ipsius B. ergo vt A ad C, ita erit B ad D.



9. 10. huius.

Cõu. dif. 10.

THEOREMA XII. PROPOSITIO XIIII.

Si fuerint quotcumque numeri, et alij ipsis multitudine æquales, qui bini sumantur, et in eadem proportione; etiam ex æquali in eadem proportione erunt.

Sint enim quotcumque numeri ABC, & alij ipsis multitudine æquales, qui bini sumantur, & in eadem proportione DEF; sitq; vt A ad B, ita D ad E; vt autem B ad C, ita E ad F. Dico etiam ex æquali vt A ad C, ita esse D ad F. Quoniam enim est vt A ad B, ita D ad E; erit permutãdo vt A ad D, ita B ad E. Rursus quoniam est vt B ad C, ita E ad F; permutando vt B ad E, ita erit C ad F. vt autem B ad E, ita erat A ad D. & vt igitur A ad D, ita C ad F. ergo permutando vt A ad C, ita D ad F. quod oportebat demonstrare.



Ex antecedentes

Ex demonstratis ad 13 huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Quòd si plures, quàm tres numeri proportionales fuerint ABCD EFGH; sitq; ut A ad B, ita E ad F: vt autem B ad C, ita F ad G; et vt C ad D, ita G ad H: similiter demonstrabimus ut A ad C, ita esse E ad G. et quoniã est vt C ad



D, ita G ad H, rursus demonstrabimus vt A ad D, ita E ad H. & eodem modo in alijs.
Sed quoniam Euclides conuersam rationem, compositam, & diuisam, conuersionemq; rationis in numeris omisit; nos eas, ne quid desideretur, hoc loco apponere curauimus.

PROPOSITIO I.

Si quattuor numeri proportionales sint, & conuertendo proportionales erunt.

Sint quattuor numeri proportionales AECD; sitq; ut A ad B, ita C ad D. Dico vt B ad A, ita esse D ad C. Si enim A sit minor, quàm B, quoniam est vt A ad B, ita C ad D, quae pars uel partes est A ipsius B, eadē pars, vel eadē partes erit C ipsius D, ergo ut B ad A, ita est D ad C.

Diffi. 10.

Cõu. dif. 10.

Si uero A sit maior, quàm B, rursus quoniam vt A ad B, ita C ad D, quę pars, vel partes est B ipsius A, eadem pars, uel partes erit D ipsius C. Vt igitur B ad A, ita est D ad C.



PROPOSITIO II.

Si quattuor numeri proportionales sint, & componendo proportionales erunt.

Sint quattuor numeri proportionales A B C D; & sit vt A ad B, ita C ad D. Dico ut A B ad B, ita esse C D ad D. nam cum sit ut A ad B, ita C ad D; & permutando vt A ad C, ita erit B ad D. quare ex duodecima huius vt A B ad C D, ita est B ad D. Rursus igitur permutando ut AB ad B, ita CD ad D.



PROPOSITIO III.

Si quattuor numeri proportionales sint, & diuidendo proportionales erunt.

Sint quattuor numeri proportionales AB B CD D; sitq; vt numerus AE, qui ex duobus numeris constat ad numerum B, ita C D ex duobus C D constans ad ipsum D. Dico vt A ad B, ita esse C ad D. Quoniam enim est vt AB ad B, ita CD ad D, erit permutando vt A B ad C D, ita B ad D. si autem fuerit ut totus ad totum, ita ablatus ad ablatum, & reliquus ad reliquum erit, vt totus ad totum. ergo A ad C est vt AB ad CD. sed ut AB ad C D, ita erat B ad D. Ex eo igitur, quod demonstrauimus ad 12 huius, vt A ad C, ita erit B ad D: & rursus permutando ut A ad B, ita C ad D.

8.huius.
11.huius.



PROPOSITIO IIII.

Si quattuor numeri proportionales sint, et per conuersionem rationis proportionales erunt.

Sint quattuor numeri proportionales AB B CD D; sitq; vt AB ad B, ita CD ad D. Dico ut AB ad A, ita esse CD ad C. Quoniam enim est ut AB ad B, ita CD ad D, erit permutando vt A B ad C D, ita B ad D. quòd cum sit vt totus ad totum, ita ablatus ad ablatum, erit & reliquus A ad reliquum C, vt A B ad CD: & rursus permutando, conuertendoq; ut AB ad A, ita CD ad C.

Sed & quod Euclides de magnitudinibus demonstrauit in vigesima quarta quinti libri, nos de numeris demonstrabimus in hunc modum.

13.huius.
11.huius.



PROPOSITIO V.

Si primus ad secundum eandem habeat proportionem, quam tertius ad quartum; habeat autem et quintus ad secundum proportionem eandem, quam sextus ad quartum; et compositus primus et quintus ad secundum eandem proportionem

nem habebit, quam tertius et ſextus ad quartum.

Primus enim numerus A B ad ſecundum C proportionem habeat eandem, quam tertius DE ad quartum F: habeatq́, quintus B G ad ſecundum C eandem proportionem, quam ſextus E H ad quartum F. Dico primum & quintum A G ad ſecundum C eandem proportionẽ habere, quam tertius, & ſextus DH ad quartum F. Quoniam enim eſt vt EG ad C, ita EH ad F; erit conuertendo vt C ad BG, ita F ad E H. et quoniam vt A B ad C, ita DE ad F: vt autem C ad BG, ita F ad EH; erit ex aequali vt AB ad BG, ita DE ad EH. quare componendo ut AG ad GB, ita erit DH ad H E. Sed vt G B ad C, ita eſt EH ad F. rurſus igitur ex aequali vt AG ad C, ita eſt DH ad F.



5. Additarũ.

14. huius.

2. Additarũ.

THEOREMA XIII. PROPOSITIO XV.

Si vnitas numerum aliquem metiatur, alter autem numerus æqualiter metiatur alium aliquem; et permutando unitas tertium numerum æqualiter metietur, atque ſecundus quartum.

Vnitas enim A numerum aliquem BC metiatur, alter autem numerus D æqualiter metiatur alium aliquem EF. Dico & permutando A vnitatem æqualiter metiri numerum D, atque BC ipſum EF. Quoniam enim A vnitas æqualiter metitur numerum BC, atque D ipſum EF; quot vnitates ſunt in BC, tot ſunt et in EF numeri ęquales ipſi D. diuidatur BC quidem in vnitates, quæ in ipſo ſunt, videlicet BG GH HC: EF vero diuidatur in numeros ipſi D æquales EK KL LF. erit igitur ipſorum BG GH HC multitudo ęqualis multitudini ipſorum EK KL LF. & quoniã BG GH HC vnitates inter ſe ęquales ſunt: ſuntq́; numeri EK KL LF inter ſe æquales, & vnitatum BG GH HC multitudo æqualis multitudini numerorum EK KL LF: erit vt BG vnitas ad numerum EK, ita GH vnitas ad numerum KL, & vnitas HC ad LF numerum; & vt vnus antecedentium ad vnum conſequentium, ita omnes antecedentes ad omnes cõſequentes. eſt igitur vt BG ad numerum E K, ita BC ad EF. æqualis autem eſt BG vnitas vnitati A: et EK numerus numero D. quare ut A vnitas ad numerum D, ita eſt BC ad EF. ęqualiter igitur A unitas numerum D metitur, atque BC ipſum EF. quod demonſtrare oportebat.

A.

B. G. H. C

D..

E..K..L..F

12. huius:

Diff. 20.

THEOREMA XIIII. PROPOSITIO. XVI.

Si duo numeri ſe ſe multiplicantes fecerint aliquos, facti ex ipſis inter ſe ęquales erunt.

Sint duo numeri A B, & A quidem ipſum B multiplicans faciat C; B vero multiplicans A faciat D. Dico C ipſi D ęqualem eſſe. Quoniam enim A ipſum B multiplicans fecit C, metietur B ipſum C per vnitates, quæ ſunt in A. metitur autem & E vnitas numerum A per vnitates, quę in ipſo ſunt. æqualiter igitur E vnitas numerum A metitur, atq; B ipſum C. quare permutando vnitas E numerum B ęqualiter metitur, atq; A ipſum C. Rurſus quoniam B ipſum A multiplicans fecit D; A metietur ipſum D per vnitates, quæ ſunt in B. metitur autem & E unitas numerum B per unitates, quæ in ipſo ſunt. ergô E unitas numerum B æqualiter metitur, atque A ipſum D. ſed E unitas numerũ

E. 1

A..a

B...5

C.....6

D.....6

ex com. not.

6. com. not.

Ex antecedente.

B æqualiter

B æqualiter metitur, atque A ipſum C. Cum igitur A vtrũque ipſorum C D æqua-
4.com. not. liter metiatur, erit C ipſi D æqualis. quod demonſtrare oportebat.

THEOREMA XV. PROPOSITIO XVII.

Si numerus duos numeros multiplicans fecerit aliquos, facti ex ipſis eandem proportionem habebunt, quam multiplicati.

Numerus enim A duos numeros B C multiplicans faciat ipſos D E. Dico vt B ad C, ita eſſe D ad E. quoniam enim A ipſum B mul-
10.com.not. tiplicans fecit D, metietur B ipſum D per unitates, quæ ſunt in A.
6.com.not. metitur autem et F unitas numerum A per vnitates, quæ in ipſo ſunt. æqualiter igitur F unitas numerum A metitur, atque B ipſum
Conuerſ.10. Diffi. D. ergo vt F unitas ad numerum A, ita eſt B ad D. eadem ratione et vt F unitas ad numerum A, ita C ad E. & vt igitur B ad D, ita C ad E; & permutando vt B ad C, ita D ad E. quod demõſtrare oportebat.

F . . . 1
A . . 2
B . . . 3
C 4
D 6
E 8

F. C. COMMENTARIVS.

Idem ſequetur etiam ſi numerus aliquis plures quàm duos numeros multiplicans fecerit totidem alios, facti namque eandem, quam multiplicati, proportionem habebunt.

Numerus enim A tres numeros BCD multiplicans faciat ipſos EFG. Dico vt B ad C, ita eſſe E ad F; & vt C ad D, ita F ad G. Similiter enim, vt ſupra, demonſtrabimus, vt H vnitas ad numerum A, ita eſſe B ad E, & C ad F, & D ad G. erit igitur vt B ad E, ita C ad F, & D ad G. itaque quoniam eſt vt B ad E, ita C ad F, erit permutando vt B ad C, ita E ad F. Rurſus quoniam vt C ad F, ita D ad G, & permutando erit vt C ad D, ita F ad G. vt igitur B ad C, ita eſt E ad F: & vt C ad D, ita F ad G. quod oportebat demonſtrare.

H . 1
A . . 2
B . . . 3
C 4
D 5
E 6
F 8
G 10

THEOREMA XVI. PROPOSITIO. XVIII.

Si duo numeri numerum aliquem multiplicantes fecerint aliquos, facti ex ipſis eandem proportionem habebunt, quam multiplicantes.

Duo enim numeri A B numerum aliquem C multiplicantes faciant ipſos D E. Dico vt A ad B, ita eſſe D ad E. Quoniam enim A
16.huius. ipſum C multiplicans fecit D, & C multiplicans A ipſum D fecit. Eadem ratione & C ipſum B multiplicans fecit E. Itaque numerus C
Ex antecedente. duos numeros A B multiplicans ipſos D E fecit. eſt igitur ut A ad B, ita D ad E. quod demonſtrare oportebat.

A . . . 3
B . . . 4
C . . 2
D 6
E 8

F. C. COMMENTARIVS.

Quòd ſi plures quàm duo numeri aliquem multiplicantes fecerint totidem alios, facti ſimiliter eandem, quam multiplicantes, proportionem habebunt. quod eodem modo demonſtrabimus.

THEOREMA XVII. PROPOSITIO. XIX.

Si quattuor numeri proportionales fuerint, qui ex primo, & quarto

quarto fit numerus æqualis erit ei, qui fit ex secundo, & tertio. & si numerus, qui fit ex primo, & quarto æqualis fuerit ei, qui ex secundo, & tertio, quattuor numeri proportionales erunt.

Sint quattuor numeri proportionales ABCD; sitq; vt A ad B, ita C ad D: & A quidē ipsū D multiplicans faciat E: B vero multiplicans C faciat F. Dico E ipsi F æqualem esse. multiplicās enim A ipsum C faciat G. & quoniam A ipsum quidem C multiplicans fecit G; ipsum uero D multiplicans E fecit: numerus A duos numeros CD multiplicans fecit ipsos G E. est igitur ut C ad D, ita G ad E. Vt autem C ad D, ita A ad B. quare & ut ad B, ita G ad E. Rursus quoniam A ipsum C multiplicans G fecit; sed & B ipsum C multiplicās fecit F: duo numeri A B numerum aliquem C multiplicantes fecerunt ipsos G F. vt igitur A ad B, ita est G ad F. Sed & vt A ad B, ita G ad E. ergo & ut G ad E, ita est G ad F. quòd cum G ad utrumque ipsorum E F eādem proportionem habeat, erit E ipsi F æqualis. Sed sit E æqualis ipsi F. Dico ut A ad B, ita esse G ad D. ijsdem enim constructis quoniam A ipsos C D multiplicans fecit G E, erit ut C ad D, ita G ad E. est autem E ipsi F æqualis. ut igitur G ad E, ita G ad F. sed ut G ad E, ita C ad D. ergo & ut C ad D, ita G ad F. ut autem G ad F, ita A ad B: & ut igitur A ad B, ita C ad D. quod demonstrare oportebat.



17. huius.

Ex antecedente.

A

17. huius.

B C

F. C. COMMENTARIVS.

Quòd cum G ad utrumque ipsorum E F eandem proportionem habeat, erit E ipsi F æqualis] *Hoc patet ex vigesima diffinitione. Si enim G sit maior, quàm E, vel F; erit vterque ipsorum E F vel eadem pars, vel eędem partes ipsius G; si vero G; sit minor, erit G vel eadem pars, vel eędem partes vtriusque ipsorum E F. quare E F inter se aequales sint necesse est.* A

3. 4. eo. not:

Est autem E ipsi F æqualis. ut igitur G ad E, ita G ad F.] *Per conuersam vigesimae diffinitionis. nam siue vterque ipsorum E F eadem pars, vel eędem partes sit ipsius G, siue G eadem pars sit, vel eędem partes vtriusque ipsorum E F, erit vt G ad E, ita G ad F.* B

Vt autem G ad F, ita A ad B.] *cum enim duo numeri A B ipsum C multiplicantes faciant G F, vt A ad B, ita erit G ad F.* C

THEOREMA. XVIII. PROPOSITIO XX.

Si tres numeri proportionales fuerint, qui ab extremis fit numerus æqualis erit ei, qui fit à medio. Si autem qui ab extremis fit æqualis fuerit ei, qui à medio; tres numeri proportionales erunt.

Sint tres numeri proportionales ABC; sitq; ut A ad B, ita B ad C: Dico numerum, qui fit ex AC. æqualem esse ei, qui fit ex B. ponatur enim ipsi B æqualis D. est igitur ut A ad B, ita D ad C. ergo qui fit ex AC æqualis est ei, qui ex B D. qui autem fit ex BD est æqualis ei, qui fit ex B; æqualis etenim est B ipsi D. qui igitur fit ex AC ipsi B est æqualis. Sed qui fit ex AC æqualis sit ei, qui ex B. Dico ut A ad B, ita esse B ad C. Quoniam enim qui ex AC fit æqualis est ei, qui fit ex B; qui autem fit ex B est æqualis ei, qui ex BD: erit ut A ad B, ita D ad C. sed B ipsi D est æqualis. ut igitur A ad B, ita est B ad C. quod demonstrare oportebat.



Ex antecedente.

Ex antecedente.

THEO-

THEOREMA XIX. PROPOSITIO. XXI.

Minimi numeri eandem, quam ipsi proportionem habentium, eos, qui eandem habent proportionem, æqualiter metiuntur, maior maiorem, & minor minorem.

Sint enim minimi numeri eandem, quam A B, proportionem habentium CD EF. Dico CD æqualiter metiri ipsum A, atque EF ipsum B. numerus enim CD ipsius A non est partes. Si enim fieri potest, sit CD partes ipsius A. ergo EF ipsius B eædem partes erit, quæ CD ipsius A. quot igitur in CD partes sunt ipsius A, tot erunt & in EF partes ipsius B. Diuidatur CD quidem in ipsius A partes CG GD: EF vero diuidatur in partes ipsius B, EH HF. erit igitur ipsarum CG GD multitudo æqualis multitudini ipsarum EH HF. & quoniam CG GD æquales inter se sunt; sunt autem & EH HF inter se æquales, atque est ipsarum CG GD multitudo multitudini ipsarum EH HF æqualis: erit ut CG ad EH, ita GD ad HF. erit igitur & ut unus antecedentium ad unum consequentium, ita omnes antecedentes ad omnes consequentes. quare ut CG ad EH, ita est CD ad EF; ac propterea CG EH in eadē sunt proportione, in qua CD EF, minores ipsis existentes. quod fieri non potest: ponuntur enim CD EF minimi numeri eandem, quam ipsi proportionem habentium. non igitur CD ipsius A partes est. ergo est pars. et EF ipsius B pars eadem est quę CD ipsius A. æqualiter igitur CD ipsum A, atque EF ipsum B metitur. quod oportebat demonstrare.

C, 2. G, 2. D
E, 2. H. F
A 8
B 6

10. diffi.

12. huius.

F. C. COMMENTARIVS.

✻ Erit vt CG ad EH, ita GD ad HF.] *Per conuersam vigesimae diffinitionis. nam cum CG GD inter se aequales sint, itemq; aequales inter se EH HF, si CG sit minor, quàm EH, quae pars, uel partes est CG ipsius EH, eadem pars, vel partes erit GD ipsius HF. si vero sit maior, quae pars, vel partes EH ipsius CG, eadem erit pars, vel partes HF ipsius GD. ergo vt CG ad EH, ita GD ad HF.*

THEOREMA XX. PROPOSITIO XXII.

Si sint tres numeri, & alij ipsis multitudine æquales, qui bini sumantur, et in eadem proportione; sit autem perturbata eorum analogia: etiam ex æquali in eadem proportione erunt.

Sint tres numeri A B C, et alij ipsis multitudine æquales qui bini sumantur, et in eadem proportione D E F; sitq; perturbata eorum analogia: et ut A quidem ad B, ita sit E ad F; vt autem B ad C, ita D ad E. Dico etiam ex æquali vt A ad C, ita esse D ad F. Quoniam enim est ut A ad B, ita E ad F; qui fit ex AF æqualis erit ei, qui ex BE. Rursus quoniam est vt B ad C, ita D ad E; qui fit ex CD æqualis erit ei, qui ex BE. ostensum autem est et qui fit ex AF æqualem esse ei, qui ex B E. ergo et qui fit ex A F æqualis est ei, qui fit ex C D. vt igitur A ad C, ita D ad F. quod demonstrare oportebat.



19. huius.

19. huius.

THEOREMA XXI. PROPOSITIO XXIII.

Primi inter se numeri minimi sunt eorum, qui eādem, quam ipsi proportionem habent.

Sunt

Sint primi inter ſe numeri A B. Dico eos minimos eſſe eorum, qui eandem, quam ipſi, proportionem habent. ſi enim non ita ſit, erunt aliqui numeri minores ipſis A B, qui eandē, quam A B proportionem habebunt. ſint C D. Quoniam igitur minimi numeri eandem, quam ipſi proportionem habentium eos, qui eandem habent proportionem, æqualiter metiuntur, maior maiorem, et minor minorem, hoc eſt antecedens antecedentem, et conſequens cō ſequentem; numerus C ipſum A æqualiter metietur, atque D ipſum B. quoties autem C metitur ipſum A, tot vnitates ſint in E. ergo et D ipſum B metitur per vnitates, quę ſunt in E. et quoniam C metitur ipſum A per vnitates quę ſunt in E, numerus E ipſum A per vnitates, quæ ſunt in C, metietur. et eadem ratione E metietur B per vnitates, quæ ſunt in D. ergo E ipſos A B metitur, primos inter ſe exiſtentes. quod fieri non poteſt. non igitur erunt aliqui numeri minores ipſis A B, qui eandē habeant proportionem. ergo A B minimi ſunt eorum, qui eandem, quam ipſi proportionem habent. quod oportebat demonſtrare.

A 5
B 4
E —
C —
D —

21. huius.
8. com. not.

THEOREMA XXII. PROPOSITIO XXIIII.

Minimi numeri eorum, qui eandem, quam ipſi proportionem habent, primi inter ſe ſunt.

Sint minimi numeri eorum qui eandem, quam ipſi proportionē habent A B. Dico A B primos inter ſe eſſe. ſi enim nō ſunt A B inter ſe primi, eos aliquis numerus metietur. metiatur; ſitq; C. et quoties C ipſum quidem A metitur, tot vnitates ſint in D. quoties vero C metitur ipſum B, tot vnitates ſint in E. et quoniam C ipſum A metitur per vnitates, quę ſunt in D, multiplicans C ipſum D fecit A. Eadem ratione et C multiplicans E ipſum B fecit. Itaque cum numerus C duos numeros DE multiplicans faciat A B, erit ut D ad E, ita A ad B. ergo DE in eadem ſunt proportione, in qua AB, minores ipſis exiſtentes. quod fieri non poteſt. non igitur A B numeros numerus aliquis metietur; ac propterea A B primi inter ſe ſunt. quod oportebat demonſtrare.

A 6
B 5
C —
D —
E —

*com. not.
17. huius.

THEOREMA XXIII. PROPOSITIO XXV.

Si duo numeri primi inter ſe fuerint, qui vnum ipſorum metitur numerus ad reliquum primus erit.

Sint duo numeri primi inter ſe A B, et aliquis numerus C ipſum A metiatur. Dico et B C inter ſe primos eſſe. Si enim B C nō ſint inter ſe primi, metietur eos aliquis numerus. metiatur, ſitq; D. et quoniam D ipſum C metitur, et C ipſum A; et D ipſum A metietur. metitur autem et ipſum B. ergo D numeros AB metitur primos inter ſe exiſtentes. quod fieri non poteſt. non igitur B C numeros numerus aliquis metietur. ideoq; B C inter ſe primi ſunt. quod oportebat demonſtrare.

A 6
B 5
C ... 3
D —

THEOREMA XXIIII. PROPOSITIO XXVI.

Si duo numeri ad aliquem numerum primi fuerint, et qui fit ex ipſis ad eum primus erit.

Duo enim numeri A B ad aliquem numerũ C primi sint: et A ipsum B multiplicans faciat D. Dico C D inter se primos esse. si enim C D non sint inter se primi, metietur eos aliquis numerus. metiatur; sitq; E. et quoniã C A primi inter se sunt, et ipsum C metitur aliquis numerus E; erunt E A inter se primi. quoties autem E ipsum D metitur, tot vnitates sint in F. quare et F metitur ipsum D per vnitates, quæ sunt in E. ergo E ipsum F multiplicans fecit D. sed et A multiplicas B ipsum D fecit. qui igitur fit ex E F est æqualis ei, qui ex A B. si uero qui fit ex extremis æqualis fuerit ei, qui ex medijs, quattuor numeri proportionales erunt. est igitur ut E ad A, ita B ad F. sunt autem A E inter se primi, et qui primi etiam minimi sunt. minimi vero eãdẽ, quam ipsi, proportionem habentium, eos, qui eandem habẽt proportionem, æqualiter metiuntur, maior maiorem, et minor minorem, hoc est antecedens antecedentem, et consequens consequentem. ergo E ipsum B metitur. metitur autẽ et ipsum C. quare E ipsos B C metitur, primos inter se existentes. quod fieri non potest. non igitur C D numeros numerus aliquis metietur; ac propterea C D inter se primi sunt. quod oportebat demonstrare.

A..2 B ...3
C.....5
D.——6
E.——.
F.——

Ex antecedente.
8. com. not.
9. com. not.
19. huius.
23. huius.
21. huius.

THEOREMA XXV. PROPOSITIO. XXVII.

Si duo numeri primi inter se fuerint, qui fit ab vno ipsorum ad reliquum primus erit.

Sint duo numeri inter se primi AB; & A se ipsum multiplicans faciat C. Dico B C inter se primos esse. ponatur enim ipsi A æqualis D & quoniam AB sunt primi inter se, æqualis autem A ipsi D; & DB inter se primi erunt. vterque igitur ipsorum A D ad B primus est. ergo & qui ex AD fit primus erit ad B. sed qui fit ex AD est numerus C. quare C B inter se primi sunt. quod demonstrare oportebat.

A..2B...3
C....4
D..8

Ex antecedente.

THEOREMA XXVI. PROPOSITIO XXVIII.

Si duo numeri ad duos numeros vterque ad vtrumque primi fuerint, & qui fiunt ex ipsis inter se primi erunt.

Duo enim numeri A B ad duos uumeros C D vterque ad vtrumque primi sint: & A quidem ipsum B multiplicans faciat E: C vero multiplicans D faciat F. Dico EF inter se primos esse. Quouiam enim vterque ipsorum A B ad C primus est, & qui fit ex A B ad C primus erit. qui autem fit ex A B est E. ergo E C primi inter se sunt. Eadẽ ratione & E D primi sunt inter se. vterque igitur ipsorum C D ad E primus est: ac propterea qui fit ex C D primus erit ad E. qui uero ex CD fit est numerus F. ergo E F primi inter se erunt. quod demonstrare oportebat.



16. huius.

THEOREMA XXVII. PROPOSITIO. XXIX.

Si duo numeri primi inter se fuerint, & vterque seipsum multiplicans faciat aliquos: facti ex ipsis primi erunt inter se. & si numeri à principio positi eos, qui facti sunt, multiplicantes aliquos

faciant

faciant, & ipſi inter ſe primi erunt: & ſemper circa extremos hoc continget.

Sint duo numeri inter ſe primi A B: & A ſe ipſum quidem multiplicans faciat C, multiplicans vero C faciat E: & B ſe ipsũ multiplicãs D faciat; multiplicans autem D faciat ipſum F. Dico C D, & E F inter ſe primos eſſe. Quoniam enim A B primi inter ſe ſunt; & A ſe ipſum multiplicans fecit C; erunt C B primi inter ſe. & quoniam C B inter ſe primi ſunt, & B ſe ipſum multiplicans fecit D; erũt C D inter ſe primi. Rurſus quoniam A B primi ſunt inter ſe, & B ſe ipſum multiplicans D fecit; A D inter ſe primi erunt. Cum igitur duo numeri A C ad duos numeros B D vterque ad vtrumque primi ſint, & qui ex A C fit ad eum, qui fit ex B D primus erit. ſed qui fit ex AC eſt numerus E, qui vero ex BD fit eſt F. ergo E F primi inter ſe ſunt. quod oportebat demonſtrare.



27. huius.

Ex antecedente.

THEOREMA XXVIII. PROPOSITIO. XXX.

Si duo numeri primi inter ſe fuerint, & vterque ſimul ad vtrũque ipſorum primus erit. quòd ſi vterque ſimul ad vnum aliquem ipſorum ſit primus, & numeri à principio poſiti inter ſe primi erunt.

Componantur enim duo numeri inter ſe primi AB BC. Dico & vtrumque ſimul, videlicet A C ad vtrumque ipſorum AB BC primum eſſe. Si enim non ſint CA AB inter ſe primi, metietur eos numerus aliquis. metiatur, & ſit D. Quoniam igitur D metitur ipſos CA AB; & reliquum BC metietur. metitur autem & BA. ergo D ipſos AB BC metitur, primos inter ſe exiſtentes; quod fieri non poteſt. non igitur CA AB numeros numerus aliquis metietur; ac propterea AB AC inter ſe primi ſunt. ergo CA ad vtrumque ipſorum eſt primus. Sint rurſus CA AB primi inter ſe. Dico & ipſos AB BC inter ſe primos eſſe. Si enim AB BC non ſint inter ſe primi, metietur eos aliquis numerus. metiatur, ſitq; D. & quoniam D metitur vtrumque ipſorum AB BC, & totum CA metietur; metitur autem & AB. ergo D ipſos CA AB metitur, primos inter ſe exiſtentes; quod fieri non poteſt. non igitur ipſos AB BC numeros numerus aliquis metietur. ideoq; AB BC inter ſe primi ſuut. quod oportebat demonſtrare.



13. com. not.

A

11. com. not.

B

F. C. COMMENTARIVS.

Ergo CA ad vtrumque ipſorum eſt primus] *eodem enim modo demonſtrabitur & AC CB inter ſe primos eſſe.* A

Ideoq; AB BC inter ſe primi ſunt] *idem etiam ſequetur ſi AC CB inter ſe primi ſint. quod eodem modo demonſtrabimus.* B

THEOREMA XXIX. PROPOSITIO XXXI.

Omnis primus numerus ad omnem numerum, quem non metitur, primus eſt.

Sit primus numerus A, qui numerum B non metiatur. Dico B A inter ſe primos

esse,si enim non sint B A inter se primi,metietur eos aliquis nu-
A merus.metiatur,et sit C.ergo C non est vnitas . et quoniam C ip
sum B metitur , A vero non metitur ipsum B ; non erit C idem
B qui A.et quoniam C ipsos B A metitur,et metietur ipsum A pri
mum existentem,cum non sit idem,qui A.quod fieri non potest.
non igitur ipsos B A numeros numerus aliquis metietur . quare A B inter se primi sunt.quod demonstrare oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

A Ergo C non est vnitas] *si enim eos vnitas sola metiretur, primi essent inter se . quod non ponitur.*

B Et quoniam C ipsos B A metitur,et metietur ipsum A primum existentem,cum
7. com.not. non sit idem,qui A.quod fieri non potest] *omnis enim numerus se ipsum metitur.*

THEOREMA XXX. PROPOSITIO XXXII.

Si duo numeri se se multiplicantes aliquem faciãt, eum vero, qui ex ipsis fit, metiatur aliquis numerus primus; & vnum ipsorum,qui à principio positi sunt,metietur.

Duo enim numeri A B se inuicem multiplicantes faciãt C, ipsum uero C metiatur aliquis numerus primus, qui sit D.Dico D vnũ ipsorum A B metiri. ipsum enim A non me
Ex ante- tiatur;atque est D numerus primus. ergo A D primi inter
cedente. se sunt . et quoties D ipsum C metitur , tot unitates sint in E.Quoniam igitur D metitur ipsum C per eas, quæ sunt in
Com.not.9. E unitates; numerus D ipsum E multiplicans fecit C. sed et A multiplicans B ipsum C fecit . ergo qui fit ex D E æqualis est ei , qui ex AB.est igitur ut D ad A, ita B ad E. et sunt
19.huius. A D primi inter se,primi vero et minimi . sed minimi eos,
23.huius. qui eandem habent proportionem , æqualiter metiuntur , maior maiorem , et minor minorem,hoc est antecedens antecedentem , et consequens consequentem.ergo D ipsum B metitur.similiter demonstrabimus,si D non metiatur B ipsum A metiri.quare D metitur vnum ipsorum A B.quod demonstrare oportebat.
21.huius.

THEOREMA XXXI. PROPOSITIO. XXXIII.

Omnem numerum compositum primus aliquis numerus metitur.

Sit compositus numerus A . Dico primum aliquem numerum
Diffi.13: ipsum A metiri.Quoniam enim compositus numerus est A , metietur ipsum aliquis numerus.metiatur ; et sit B. & si quidem primus est B,manifestum est,quod quæritur.si vero compositus , ipsum aliquis numerus metietur.metiatur; sitq; C . Et quoniam C
12.co.not: metitur ipsum B, B uero ipsum A;& C ipsum A metitur.& si quidem primus est C , manifestum est quod quęritur.Si vero compositus eum aliquis numerus metitur.& hac consideratione facta, relinquetur tandem aliquis numerus primus , qui præcedentem & ipsum A metietur.si enim nõ relinquitur primus,
3.postul. metientur ipsum A infiniti numeri , quorum alter altero est minor.quod in numeris fieri non potest.ergo relinquetur aliquis , qui et præcedentem metietur et ipsum A.omnem igitur numerum compositum primus aliquis numerus metitur. quod demonstrare oportebat.



ALITER

ALITER. Sit compoſitus numerus A. Dico primum aliquem numerum ipſum A metiri. Quoniam enim A compoſitus eſt, metietur ipſum aliquis numerus. & ſit B minimus eorum, qui ipſum A metiuntur. Dico B primum eſſe. ſi enim non ſit primus, compoſitus erit. ergo eum aliquis numerus metietur. metiatur; ſitq; C. erit C minor, quàm B. & quoniam C ipſum B metitur, ſed & B ipſum A; & C ipſum A metietur, minor exiſtens ipſo B, qui eſt minimus omnium, qui metiuntur. quod eſt abſurdũ. non igitur B compoſitus numerus eſt. ergo eſt primus. quod demonſtrandũ fuit.

A.....9
B...3
C

THEOREMA. XXXII. PROPOSITIO XXXIIII.

Omnis numerus vel primus eſt, vel eum primus aliquis numerus metitur.

Sit numerus A. Dico A vel primum eſſe, vel primum aliquem numerum ipſum A metiri. ſi quidem igitur primus eſt A, manifeſtum eſt quod quæritur. ſi vero compoſitus ipſum aliquis primus numerus metietur. Omnis igitur numerus vel primus eſt, vel cum primus aliquis numerus metitur. quod demonſtrare oportebat.

A...3
A.....6 Ex antecedente.
...3

PROBLEMA III. PROPOSITIO. XXXV.

Numeris quotcumque datis inuenire minimos eorum, qui eandem, quam ipſi, proportionem habeant.

Sint dati quotcũque numeri A B C. oportet inuenire minimos eorum, qui eandem, quam ipſi A B C, proportionem habeãt. vel igitur A B C primi inter ſe ſunt, vel non. ſi quidem primi, et minimi erunt eandem, quã ipſi proportionem habentium. ſi vero non primi, ſumatur ipſorum A B C maxima communis menſura D, et quoties D vnumquemque ipſorum A B C metitur, tot vnitates ſint in vnoquoque horum E F G. et vnuſquiſque igitur ipſorum E F G vnumquemque ipſorum A B C metitur per eas, quæ ſunt in D vnitates. ergo E F G ipſos A B C equaliter metiuntur, ac propterea E F G in eadem ſunt proportione, in qua ipſi A B C. Dico eos etiã minimos eſſe. ſi enim E F G non ſint minimi, eandem, quam ipſi A B C, proportionem habentium, erunt aliqui ipſis E F G minores in eadem proportione, in qua A B C. ſint H K L, æqualiter igitur H metitur ipſum A, ac vterque ipſorum K L vtrũque B C metitur. quoties autem H metitur ipſum A, tot vnitates ſint in M. et vterque igitur K L vtrumque B C metitur per eas, quæ ſunt in M vnitates. et quoniã H ipſum A metitur per vnitates, quæ ſunt in M, et M ipſum A per vnitates, quæ ſunt in H metietur. Eadem ratione et M vtrumque ipſorũ B C metietur per vnitates, quę ſunt in utroque K L. ergo M ipſos A B C metitur. Rurſus quoniam H ipſum A metitur per vnitates, quæ ſunt in M; H ipſum M multiplicans fecit A. Eadem ratione et E multiplicans D ipſum A fecit. ergo qui ex E D fit ei, qui fit ex H M eſt æqualis. vt igitur E ad H, ita M ad D. maior autem eſt E, quàm H. ergo et M quàm D eſt maior, et ipſos A B C metitur. quod fieri nõ poteſt. ponitur enim D ipſorum A B C maxima communis menſura. non igitur erunt aliqui numeri minores ipſis E F G, in eadem proportione, in qua A B C. ergo E F G minimi ſunt eorum, qui eandem, quam ipſi A B C proportionẽ habent. quod oportebat demonſtrare.

A.....6
B.....8
C.....10 23. huius.
D..2 2. huius.
E..3
F——4
G——5 18. huius.
H——
K——
L——
M—— 21. huius.

8. com. not.

9. com. not.

19. huius.

F. C.

Quoniam ſæpe vſu venit, vt duo minimi numeri in data proportione inueniendi ſint, libuit hoc loco ſequens problema adnectere.

Numeris quotcũque datis deinceps proportionalibus, inuenire duos minimos, qui eandem, quam ipſi, proportionem habeant.

Sint dati quotcumque numeri deinceps proportionales ABC. oportet inuenire duos minimos numeros, qui eandem, quam ipſi A B C proportionem habeant. Itaque vel A B primi ſunt inter ſe, vel non primi: et ſi quidem primi, & minimi erunt eorum, qui eandem proportionem habent; ſin minus, ſumatur ipſorum AB maxima communis menſura D: & quoties D metitur A, tot vnitates ſint in E; quoties vero idem metitur B, tot vnitates ſint in F. 23.huius. 2.huius. 18.huius. *ergo & E F ipſos A B aequaliter metiuntur: ideoq; E F in eadem ſunt proportione, in qua ipſi A B. Dico E F etiam minimos eſſe. ſi enim non ſint minimi, erunt alij qui numeri minores ipſis E F, qui eandem, quam A B proportionem habeant. ſint GH. ergo G aequaliter metitur A, atque H ipſum B. & quoties G metitur A, tot vnitates ſint in K. quare & H metietur B per eas, quae ſint in K vnitates. & ob id K metietur A per vnitates, quae ſunt in G, metieturq; B per vnitates, quae ſunt in H. ergo K ipſos A B metitur. & quoniam G ipſum A metitur per eas, quae ſunt in K vnitates, G multiplicans K fecit A. Rurſus quoniam E metitur A per vnitates, quae ſunt in D; & E multiplicans D fecit A. qui igitur fit ex E D eſt aequalis ei, qui ex GK; ac propterea vt E ad G, ita erit K ad D. eſt autem E maior, quàm C. ergo & K maior quàm D, & ipſos A B metitur. quod fieri non poteſt. erat enim D ipſorum AB maxima communis menſura. non igitur ſunt alij numeri minores ipſis E F, qui eandem, quam ipſi A B proportionem habeant. & quoniam vt A ad E, ita eſt B ad C, erunt E F minimi numeri in eadem proportione, in qua A B C. Inuenti igitur ſunt minimi numeri E F, qui eandem, quam ipſi ABC proportionem habeant. quod facere oportebat.*

A....4
B.....6
C.....9
D..2
E..2
F...3
G—
H—
K—
8. com. not. 19.huius.

PROBLEMA IIII. PROPOSITIO XXXVI.

Duobus numeris datis, inuenire quem minimum numerum metiantur.

Sint dati duo numeri A B. oportet inuenire quem minimum numerum metiantur. numeri enim A B uel primi inter ſe ſunt, vel non. ſint primum A B inter ſe primi: & A ipſum B multiplicãs faciat C. ergo & B multiplicans A ipſum C fecit. ac propterea numeri A B ipſum C metiuntur. Dico etiam C minimum eſſe. ſi enim non ita ſit, metientur A B numerum aliquem minorẽ, quàm C. metiantur ipſum D. & quoties A ipſum D metitur, tot vnitates ſint in E; quoties autem B metitur D, tot unitates ſint in F. ergo A quidem ipſum E multiplicans fecit D; B uero multiplicans F ipſum D fecit. quare numerus, qui ex AE fit eſt æqualis ei, qui fit ex BF. vt igitur A ad B, ita eſt F ad E. & ſunt A B primi. primi autem & minimi. ſed minimi eos, qui eandem habent proportionem æqualiter metiuntur, maior maiorem, & minor minorem. ergo B ipſum E metitur, & conſequens conſequentem. & quoniam A numeros B E multiplicans fecit C D, erit vt B ad E, ita C ad D. metitur autem B ipſum E. ergo & C ipſum D metitur, maior minorem. quod fieri non poteſt. non igitur A B metiuntur aliquem numerum minorem ipſo C, quando A B primi inter ſe fuerint. ergo A B ipſum C minimum exiſtentem metiuntur. Sed non ſint A B primi inter ſe: & ſumãtur minimi numeri eandem, quam A B proportionem habentium, qui ſint F E. æqualis igitur eſt, qui ex A E fit ei, qui ex BF. & A ipſum E multiplicãs faciat C. ergo & B multi-

A...3 B....4
C..... 12
D———
E———
F———
16.huius. 19.huius. 23.huius. 21.huius. 18.huius. 19.huius.

multiplicans F ipſum C fecit. quare A B ipſum C metiũtur.

Dico & minimum eſſe. niſi enim ita ſit, metientur A B aliquem numerum minorem, quam C. metiantur ipſum D. & quoties A ipſum D metitur, tot vnitates ſint in G. quoties autem B metitur D, tot vnitates ſint in H. ergo A quidem ipſum G multiplicans fecit D; B vero multiplicans H ipsũ D fecit. qui igitur ex A G fit eſt æqualis ei, qui fit ex B H. vt igitur A ad B, ita H ad G. ſed vt A ad B, ita F ad E. ergo & vt F ad E, ita H ad G: & ſunt F E minimi; minimi vero eos, qui eandem habent proportionem æqualiter metiuntur, maior maiorem, & minor minorem. quare E ipſum G metitur. & quoniam A numeros E G multiplicans ipſos C D fecit, vt E ad G, ita erit C ad D. Sed E metitur ipſum G. ergo & C ipſum D metitur, maior minorem. quod fieri nõ poteſt. non igitur metiuntur A B aliquem numerum minorem, quàm C. ergo A B ipſum C minimum exiſtentem metientur. quod demonſtrare oportebat.



9. com. not.

19. huius.

21. huius.

18. huius.

SCHOLIVM.

Minimum dicit, quo minorem duo numeri metiri non poſſunt. vt eſt 15. eo enim minorem duo numeri 3, & 5 non metiuntur.

THEOREMA XXXIII. PROPOSITIO XXXVII.

Si duo numeri metiantur numerum aliquem, & minimus, quem illi metiuntur, eundem metietur.

Duo enim numeri A B numerum aliquem C D metiantur, minimum autem ipſum E. Dico & E ipſum C D metiri. ſi enim E non metitur C D E, metiens F D relinquat ſe ipſo minorem CF. & quoniam A B ipſum E metiuntur, E vero ipſum DF: & A B metientur D F. ſed & metiuntur totum CD. ergo & reliquum C F minorem ipſo E metientur. quod fieri non poteſt. non igitur E ipſum CD non metitur. quare ipſum metiatur neceſſe eſt. quod demonſtrare oportebat.



12. com. not.

13. com. not.

PROBLEMA V. PROPOSITIO XXXVIII.

Tribus numeris datis inuenire quem minimum numerum metiantur.

Sint dati numeri A B C. oportet inuenire quem minimum metiantur numerum. ſumatur enim D, quem minimum duo A B metiuntur. itaque C vel metitur D, vel non metitur. metiatur primum. ſed & A B metiuntur ipſum D. ergo A B C ipſum D metientur. Dico & miuimum. ſi enim non, metientur A B C quendam numerum minorem ipſo D, metiantur E. Quoniam igitur A B C metiuntur ipſum E, & A B ipſum E metiuntur. ergo & minimus, quem metiuntur A B ipſum E metietur. minimus autem, quem metiuntur A B, eſt D. quare D metitur ipſum E, maior minorem. quod fieri non poteſt. non igitur A B C metiuntur aliquem numerum ipſo D minorem. ergo A B C minimum D metiuntur. non metiatur autem C ipſum D: & ſumatur minimus



Ex antecedente.

36. huius.

nimus numerus E, quē C D metiuntur. Itaque qm A B metiuntur ipsum D, D vero
12.cō.not. ipsum E; & A B ipsū E; metientur. metitur aūt & C ipsum E. ergo A B C ipsum E metiuntur. Dico & minimum. si enim non, metientur A B C numerum minorem ipso E. metiantur F. & quoniam A B C metiuntur F, & A B ipsum F metientur. ergo & minimus, quem A B metiuntur, metietur ipsum F; minimus autem, quem A B metiuntur, est D. quare D ipsum F metitur, & metitur C ipsum F. ergo D C ipsum F metientur; ac propterea minimus, quem metiuntur D C, metietur & F. sed minimus, quem metiuntur D C, est E ergo E ipsum F metitur, maior minorē. quod fieri non potest. non igitur A B C metiuntur aliquē numerum minorem ipso E. ergo numerum E minimum existentem ipsi A B C metiuntur. quod demonstrare oportebat.

Ex antecedente.



THEOREMA XXXIIII. PROPOSITIO. XXXIX.

Si numerum numerus aliquis metiatur, mensus partem habebit à metiente denominatam.

Numerum enim A numerus aliquis B metiatur. Dico A partem habere ab ipso B denominatam. quoties enim B ipsum A metitur, tot vnitates sint in C. Quoniam igitur B metitur ipsum A per eas, quę sunt in C, vnitates; metitur autem & D unitas ipsorum C per vnitates, quæ in ipso sunt: & D vnitas ipsum C numerum æqualiter metie
15.huius. tur, atque B ipsum A. quare permutando unitas D ipsum B numerum æqualiter metietur, atque C ipsum A. quæ igitur pars est unitas D ipsius B numeri, eadem est pars
3. com. not. & C ipsius A. sed unitas D ipsius B numeri pars est ab eo denominata. ergo & C ipsius A pars est denominata ab ipso B. quare A partem habet C ab ipso B denominatam. quod ostendere oportebat.

A 12
B . . . 3
C 4
D . 1

THEOREMA XXXV. PROPOSITIO. XL.

Si numerus partem quamcumque habeat, eum numerus à parte denominatus metietur.

Numerus enim A partem habeat quamcumque B; & ab ipso B denominatus sit numerus C. Dico C ipsum A metiri. Quoniam enim B ipsius
5. com. not. A pars est denominata ab ipso C. est autem & D vnitas ipsius C numeri pars ab eo denominata. quæ igitur pars est vnitas D ipsius C numeri, eadem pars est & B ipsius A. ergo vnitas D æqualiter metitur ipsum B numerum, atque B ipsum
15.huius. A. & permutando unitas D ipsum B numerum æqualiter metitur, atque C ipsum A. ergo C ipsum A metitur. quod oportebat demonstrare.

A 12
B . 2
C 6
D . 1

PROBLEMA. VI. PROPOSITIO XLI.

Numerum inuenire, qui minimus existens datas partes habeat.

Sint

Sint datæ partes A B C. oportet numerum inuenire, qui cum minimus sit, habeat partes A B C. sint ab ipsis A B C partibus denominati numeri D E F. & sumatur minimus numerus G, quem ipsi D E F metiuntur. Quoniam igitur D E F metiuntur ipsum G, habebit G partes ab ipsis D E F denominatas: partes autem denominatæ ab ipsis D E F sunt A B C. ergo G partes A B C habet. Dico & minimum esse. si enim G non existens minimus partes habet A B C, erit numerus aliquis minor ipso G, qui easdem partes habeat. sit H. Quoniam igitur H partes habet A B C, eum metientur numeri ab ipsis A B C partibus denominati; sunt autem hi numeri D E F. ergo D E F ipsum H metiẽtur; atque est H minor ipso G. quod fieri non potest. non igitur erit aliquis numerus minor ipso H, qui partes A B C habeat. quod oportuit demonstrare.



38. huius.

39. huius.

SEPTIMI LIBRI FINIS.

EVCLIDIS ELEMENTORVM LIBER OCTAVVS

CVM COMMENTARIIS,

Federici Commandini Vrbinatis.

THEOREMA I. PROPOSITIO. I.

SI sint quotcumque numeri deinceps proportionales, quorum extremi sint inter se primi; minimi erunt omnium qui eandem, quam ipsi proportionem habent.

Sint quotcumque numeri decinceps proportionales A B C D, quorũ extremi A D primi inter se sint. Dico A B C D minimos esse omnium, qui eandem, quam ipsi proportionem habent. si enim non, sint minores ipsis A B C D numeri E F G H, & in eadem proportione. Et quoniam A B C D sunt in eadem proportione, in qua E F G H; atque est ipsorũ A B C D multitudo æqualis multitudini ipsorum E F G H: erit ex æquali ut A ad D, ita E ad H: et sunt A D primi; primi autem, & minimi numeri æqualiter metiuntur eos, qui eandem proportionem habent, antecedens antecedentem, & consequens consequentem. ergo A ipsum E metitur, maior minorem. quod fieri non potest. non igitur E F G H minores ipsis A B C D existentes in eadẽ sunt, in qua ipsi, proportione; ac propterea A B C D minimi sunt omnium, qui eandẽ, quam ipsi proportionem habent. quod demonstrare oportebat.

14. septimi.

21. septimi.

A.....8
B.....12
C.....18
D.....27
E
F
G
H

PROBLEMA I. PROPOSITIO. II.

Numeros inuenire deinceps proportionales minimos, quotcumque quis imperauerit in data proportione.

Sit data proportio in minimis numeris, quam habet A ad B. oportet numeros inuenire deinceps proportionales minimos quotcumque quis imperauerit in proportione A ad B. imperentur quattuor: et A se ipsum multiplicans faciat C, multiplicans vero B faciat D, et B se ipsum multiplicans faciat E; & adhuc A multiplicans C D E ipsos F G H faciat, B vero multiplicans E faciat K. Quoniam igitur A se ipsum multiplicans fecit C, multiplicãs vero B ipsum D fecit; numerus A duos numeros A B multiplicans fecit C D. est igitur ut A ad B, ita C ad D. rursus quo-

17. septimi.

niam

niam A ipſum B multiplicans fecit D, & B ſeipſũ multiplicans fecit E; vterque ipſorum A B multiplicans B vtrumque ipſorum D E fecit. vt igitur A ad B, ita D ad E. ſed vt A ad B, ita C ad D. ergo & vt C ad D, ita D ad E. Et quoniam A numeros C D multiplicans ipſos F G fecit, ut C ad D, ita erit F ad G. vt autem C ad D, ita erat A ad B. & ut igitur A ad B, ita F ad C. rurſus quoniam A numeros D E multiplicans fecit G H, erit vt D ad E, ita G ad H. ſed vt D ad E, ita A ad B. ergo & vt A ad B, ità G ad H. quòd cum A B ipſum E multiplicantes faciant H K; erit vt A ad B, ita H ad K. oſtenſum autem eſt & ut A ad B, ita eſſe & F ad G, et G ad H. ergo & ut F ad G, ita G ad H, & H ad K. numeri igitur C D E, & F G H K proportionales ſunt in proportione, quã habet A ad B. Dico ẽt minimos eſſe. Quoniam enim A B minimi ſunt eorum, qui eandem, quam ipſi, proportionem habent; minimi vero, & primi ſunt inter ſe: erunt ipſi A B inter ſe primi. et vterque quidem ipſorum A B ſeipſum multiplicans vtrumque C E fecit; vterque vero C E multiplicans fecit vtrumque F K. ergo C E, & F K primi inter ſe ſunt. ſi autem ſint quotcumque numeri deinceps proportionales, & eorum extremi ſint inter ſe primi; minimi erunt omnium eandem, quam ipſi proportionem habentium. ergo C D E, & F G H K minimi ſunt omnium, qui eandem quam A B proportionẽ habẽt. quod oportebat demonſtrare.

A.....2
B.....3
C.....4
D.....6
E.....9
F.....8
G.....12
H.....18
K.....27

18. ſeptimi. 18. ſeptimi. 25. ſeptimi. 29. ſeptimi. Ex antecedente.

COROLLARIVM.

Ex hoc manifeſtum eſt ſi tres numeri deinceps proportionales minimi fuerint, eandem, quam ipſi proportionem habentium; extremos eorũ quadratos eſſe: ſi vero quattuor eſſe cubos.

A.....8
B.....12
C.....18
D.....27

THEOREMA II.
PROPOSITIO. III.

Si ſint quotcũque numeri deinceps proportionales, minimi omniũ, qui eãdem, quam ipſi, proportionem habent; eorum extremi primi inter ſe erunt.

E..2
F...3
G....4
H.....6
K.....9
L.....8
M.....12
N.....18
O.....27

Sint quotcumque numeri deinceps proportionales A B C D minimi omnium qui eandem, quã ipſi, proportionem habent. Dico eorum extremos A D inter ſe primos eſſe. ſumãtur enim duo numeri minimi in proportione ipſorum A B C D, qui ſint E F, tres vero G H K, & ſemper deinceps vno plures, quo ad aſſumpta multitudo æqualis fuerit multitudini ipſorum A B C D. ſumantur, & ſint L M M X. extremi igitur ipſorum L X primi inter ſe

Ex antecedente: 29. ſeptimi.

ter se sunt. Quoniam enim EF primi sunt,& vterque ipsorum se ipsum multiplicãs vtrumque GK fecit; vtrumque vero GK multiplicans fecit vtrumque LX: erunt & GK,& LX primi.& quoniam ABCD minimi sunt eorum, qui eandem, quam ipsi, proportionem habent; sunt autem & LMNX minimi in eadẽ proportione, in qua ABCD; estq; ipsorum ABCD multitudo æqualis multitudini ipsorum LMNX: erit vnusquisque ipsorum ABCD vnicuique ipsorum LMNX æqualis. Ergo A quidem est æqualis L, B vero ipsi M, C ipsi N,& D ipsi X. quòd cum LX primi sint inter se,& L ipsi A æqualis,& X ipsi D;& AD inter se primi erũt. quod oportebat demõstrare.

F. C. COMMENTARIVS.

Sumãtur enim duo minimi numeri in proportione ipsorum ABCD *per eo, quod ad 35 huius addidimus.*

PROBLEMA II. PROPOSITIO. IIII.

Proportionibus datis quotcumque in minimis numeris, numeros inuenire deinceps minimos in datis proportionibus.

Sint datæ proporriones in minimis numeris, videlicet proportio A ad B, & proportio C ad D, & E ad F. oportet numeros inuenire deinceps minimos in proportione A ad B,& in proportione C ad D; & adhuc in proportione E ad F. Sumatur enim minimus numerus, quem BC metiuntur; sitq; G.& quoties B metitur G, toties A ipsum H metiatur; quoties vero C ipsum G metitur, toties & D metiatur K, itaque E ipsum K vel metitur, vel non metitur. metiatur primum. & quoties E metitur K, toties F ipsum L metiatur.& quoniam A æqualiter metitur H, atque B ipsum G; erit vt A ad B, ita H ad G. Eadem ratione & vt C ad D, ita G ad K;& adhuc vt E ad F, ita K ad L. ergo HGKL deinceps proportionales sunt in proportione A ad B, & in proportione C ad D, & adhuc in proportione E ad F. Dico etiam minimos esse. Si enim non sint HGKL deinceps minimi in proportionibus A ad B, C ad D, & E ad F; erunt aliqui numeri minores ipsis HGKL deinceps minimi in eisdem proportionibus. sint N X M O. & quoniam est vt A ad B, ita N ad X;& sunt A B minimi; minimi autem eos, qui eandem habent proportionem, æqualiter metiuntur, maior maiorem,& minor minorem, hoc est antecedens antecedẽtem, & consequẽs consequentem: metietur B ipsum X. Eadem ratione & C ipsum X metietur. quare A B C metiuntur X, ac propterea minimus, quem metiuntur B C, ipsum X metietur. minimus autem, quem metiuntur B C, est G. ergo G metietur X, maior minorem. quod fieri non potest. non igitur erunt aliqui numeri minores ipsis H G K L deinceps minimi in proportione A ad B, C ad D, & E ad F. Sed non metiatur E ipsum K;& sumatur minimus numerus, quem ipsi E K metiuntur; sitq; M. quoties autem K metitur M, toties & vterque ipsorum HG vtrumque N X metiatur: & quoties E metitur M, toties & F metiatur O. Quoniam igitur H ipsũ N æqualiter metitur, atque G ipsum X; erit vt H ad G, ita N ad X. vt autem H ad G, ita A ad B. & vt igitur A ad B, ita N ad X. Eadem ratione & vt C ad D, ita X ad M, rursus quoniã E ipsum M æqualiter metitur, atque F ipsum O; erit vt E ad F, ita M ad O. quare NXMO deinceps proportionales sunt in proportionibus A ad B, C ad D,& E ad F. Dico minimos quoque esse. Si enim non sint NXMO deinceps minimi in

A...3 B....4
C..2 D...3
E....4 F.....5
H.....6
G 8
K.....12
L.....15
N
X
M
O

36. septimi.
37. septimi.
21. septimi.
36. septimi.
7. septimi.

in proportionibus A ab B, C ad D, & E ad F, erũt aliqui numeri minores ipſis NX MO deinceps minimi in eiſdem proportionibus. ſint PRST. & cum ſit vt P ad R, ita A ad B; ſintq; AB minimi; minimi vero eos, qui eãdẽ habẽt proportionẽ, æqualiter metiũtur, antecedẽs antecedẽtẽ, & cõſequẽs cõſequẽtẽ: numerus B ipſũ R metietur 21. ſeptimi.

Eadem ratione & C metietur ipſũ R. ergo B C ipſum R metiuntur: & ob id minimus, quem metiũtur B C, ipſum R metietur. minimus aũt, quẽ metiũtur B C, eſt G. ergo G metitur ipſum R. atque eſt vt G ad R, ita K ad S. quare & K ipſum S metitur: metitur autem & E ipſum S; ideoq; E K ipſum S metiuntur. & minimus igitur, quem metiuntur E K, metietur ipſum S. Sed minimus, quem metiũtur E K, eſt M. ergo M ipſum S metietur, maior minorem. quòd fieri non poteſt. non igitur erunt aliqui numeri minores ipſis N X M O deinceps minimi in proportionibus A ad B, C ad D, & E ad F. ergo N X M O deinceps minimi ſunt in eiſdem proportionibus. quod demonſtrare oportebat.

B

27. ſeptimi.

C



F. C. COMMENTARIVS.

Eadem ratione & C ipſum X metitur.] *Quoniam enim eſt vt C ad D, ita X ad M; & ſunt C D minimi; minimi vero eos, qui eandem habent proportionem, aequaliter metiuntur: numerus C ipſum X metietur.* A

Eadem ratione & C metietur ipſum R] *eſt enim vt C ad D, ita R ad S: ſuntq; C D minimi. ergo ob iam dictam cauſſam C ipſum R metietur.* B

Atque ut G ad R, ita K ad S] *eſt enim vt G ad K, ita R ad S. quare permutando vt G ad R, ita K ad S.* C

THEOREMA III. PROPOSITIO V.

Plani numeri inter ſe proportionẽ habẽt ex lateribus cõpoſitã.

Sint plani numeri A B, et ipſius quidem A latera ſint C D numeri; ipſius vero B latera ſint E F. Dico A ad B proportionẽ habere ex lateribus cõpoſitã. proportionibus enim datis, videlicet quã hẽt C ad E, & quã D ad F, ſumãtur numeri deinceps minimi G H K in proportionibus C ad E, & D ad F, ſitq; vt C ad E ita G ad H: vt aũt D ad F, ita H ad K. ergo G H K inter ſe proportiones habẽt laterũ. Sed proportio G ad K compoſita eſt ex proportione G ad H, et proportione H ad K. quare G ad K proportionem habet ex lateribus compoſitam. Dico igitur vt A ad B, ita eſſe G ad K; numerus enim D ipſum E multiplicans faciat L. & quoniam D multiplicans C ipſum A fecit; multiplicans vero E fecit L: erit vt C ad

Ex antecedente.



E, ita

E, ita A ad L. ut autem C ad E, ita G ad H. ergo & vt G ad H, ita A ad L. rursus quoniam E ipsum quidem D multiplicans fecit L, multiplicans vero F ipsum B fecit; vt D ad F, ita erit L ad B. sed vt D ad F, ita est H ad K. & ut igitur H ad K, ita L ad B. Ostensum autem est & vt G ad H, ita A ad L. quare ex æquali ut G ad K, ita A ad B. Sed G ad K proportionem habet compositam ex lateribus. ergo & A ad B proportionem habebit ex lateribus compositam. quod demonstrare oportebat.

THEOREMA IIII. PROPOSITIO VI.

Si fuerint quotcumque numeri deinceps proportionales, primus autem secundum non metiatur; neque alius aliquis ullum metietur.

Sint quotcumque numeri deinceps proportionales A B C D E, & A ipsum B non metiatur. Dico neque alium aliquem ullum metiri. At vero numeros A B C D E deinceps sese nō metiri, perspicuum est; neque enim A ipsum B metitur. Dico neque alium aliquem vllum metiri. Dico enim A non metiri ipsum C. nam quot sunt A B C, tot sumantur minimi numeri eandem, quam ipsi A B C proportionem habentes. & sint F G H. Quoniam igitur F G H in eadem sunt proportione, in qua A B C, atque est ipsorum A B C multitudo æqualis multitudini ipsorum F G H; erit ex æquali vt A ad C, ita F ad H. & quoniam est vt A ad B, ita F ad G, non metitur autem A ipsum B; neque F ipsum G metietur. non igitur F vnitas est; vnitas enim omnem numerum metitur. & sunt F H primi inter se. ergo neque F metitur ipsum H. atque est vt F ad H, ita A ad C. neq; igitur A ipsum C metietur. similiter demonstrabimus neque alium aliquem vllum metiri. quod demonstrare oportebat.



1 huius.

THEOREMA V. PROPOSITIO VII.

Si fuerint quotcumque numeri deinceps proportionales, primus autem metiatur extremum; & secundum metietur.

Sint quotcumque numeri deinceps proportionales A B C D; & A ipsum D metiatur. Dico A ipsum quoque B metiri. si enim A non metitur ipsum B, neque alius aliquis vllum metietur. quod est absurdū. ponitur enim A ipsum D metiri. metitur autem A ipsum D. ergo & A ipsum B metietur. quod demonstrasse oportuit.



THEOREMA VI. PROPOSITIO VIII.

Si inter duos numeros numeri deinceps proportionales cecid erint, quot inter eos cadunt numeri deinceps proportionales, totidem & inter alius eandem, quam ipsi, proportionem habentes, cadent.

Inter

Inter duos enim numeros A B cadant numeri C D deinceps proportionales; & fiat vt A ad B, ita E ad F. Dico quot numeri deinceps proportionales cadunt inter A B, totidem & inter E F deinceps proportionales cadere. quot enim numeri sunt AC D B, totidem sumantur minimi numeri eandem, quam ipsi ACDB proportionem habentium GH KL. ergo extremi ipsorum G L primi inter se sunt. & quoniam ACDB ad ipsos GHKL in eadem sunt proportione; atque est ipsorum ACDB multitudo æqualis multitudini ipsorum GHKL; erit ex æquali vt A ad B, ita G ad L. vt autem A ad B, ita E ad F. & vt igitur G ad L, ita E ad F; & sunt G L primi. sed primi, & minimi; minimi vero eos, qui eandem proportionem habent, æqualiter metiuntur, maior maiorem, & minor minorem. ergo G æqualiter metitur ipsum E, atque L ipsum F. quoties autem G metitur ipsum E, toties & vterque ipsorum H K vtrũque M N metiatur. numeri igitur GHKL ipsos EMNF æqualiter metiuntur. ideoq; GHKL in eadem sunt proportione, in qua ipsi EMNF. at GHKL similiter in eadem sunt proportione, in qua ACDB. ergo ACDB in eadem proportione erunt, in qua EMNF. Sed ACDB sunt deinceps proportionales. ergo & EMNF deinceps proportionales erunt. quot igitur deinceps proportionales cadunt inter A B, totidẽ deinceps proportionales & inter E F cadent. quod demonstrare oportebat.

A..2
C....4
D.....8
B.....16 — 35. septimi.
G.1
H..2 — 3. huius.
K....4
L.....8 — 14. septimi.
E...3
M.....6 — 23. septimi.
N.....12 — 21. septimi.
F.....24

18. septimi.

THEOREMA VII. PROPOSITIO IX.

Si duo numeri inter se primi fuerint, & inter ipsos numeri deinceps proportionales cecíderint, quot inter ipsos cadunt numeri deinceps proportionales, totidem & inter vtrumque ipsorum, & vnitatem deinceps proportionales cadent.

Sint duo numeri inter se primi A B: & inter ipsos deinceps proportionales cadant C D; exponaturq; vnitas E. Dico quot numeri deinceps proportionales cadunt inter ipsos A B, totidem & inter vtrumque ipsorum A B, & vnitatem E numeros deinceps proportionales cadere. sumantur enim duo quidem numeri minimi F G in eadem proportione, in qua sunt A C D B; tres vero H K L, & semper deinceps vno plures, quoad fiat ipsorum multitudo æqualis multitudini ipsorum A C D B. sumantur, & sint M N X O. itaque manifestum est F se ipsum quidem multiplicantem fecisse H, multiplicantem vero H fecisse M: & G se ipsum quidẽ multiplicantem fecisse L; multiplicantem vero L fecisse O. & quoniam M N X O minimi sunt qui eãdem, quam ipsi FG proportionem habent; sunt autem & A C D B minimi eandem, quam F G proportionem habentium; atque est ipsorum M N X O multitudo æqualis multitudini ipsorum A C D B: erit vnusquisque ipsorum M N X O vnicuique ipsorum A C D B æqualis. æqualis igitur est M ipsi A, & O ipsi B. & quoniã F se ipsum multiplicans fecit H, metitur F ipsum H per vnitates, quæ sunt in F. 10. com. not.

A.....8
M.....6
H....4 — A
C.....12 F..2
N.....12 — 2. huius.
K.....6
D.....18 G...3
X.....18
L.....9
O.....27
B.....27

metitur

6.com. not. metitur autem & E vnitas numerum F per vnitates, quæ in ipso sunt. ergo E vnitas numerum F æqualiter metitur, atque F ipsum H. Conuers. 20 diff. est igitur vt E vnitas ad numerum F, ita F ad H. rursus quoniam F multiplicans H fecit M, metitur H ipsum M per vnitates, quæ sunt in F; metitur autem & E vnitas numerum F per vnitates, quę in ipso sunt. æqualiter igitur E vnitas numerum F metitur, atque H ipsum M. ergo Conuer. 20 diff. vt E unitas ad numerum F, ita H ad M. ostensum est autem & ut E unitas ad numerum F, ita esse F ad H. & ut igitur E unitas ad numerum F, ita F ad H, & H ad M. sed M est ęqualis ipsi A. quare vt B E unitas ad numerum F, ita F ad H, & H ad M. Eadem ratione & ut E unitas ad numerum G, ita G ad L, & L ad B. quot igitur numeri deinceps proportionales cadunt inter A B, totidem & inter utrumque ipsorum A B, & vnitatem E numeri deinceps proportionales cadent. quod oportebat demonstrare.



F. C. COMMENTARIVS.

A Sumantur enim duo minimi numeri F G in eadem proportione, in qua sunt A C D B] *ex problemate, quod nos ad 35 septimi conscripsimus.*

B Eadem ratione, & vt E unitas ad numerum G, ita G ad L, et L ad B] *quoniam enim G se ipsum multiplicans fecit L, metitur G ipsum L per vnitates, quae sunt in ipso G: metitur autem & E vnitas ipsum G per vnitates, quae in ipso sunt. ergo E vnitas aequaliter metitur numerum G, atque G ipsum L. quare vt E vnitas ad numerum G, ita G ad L. rursus quoniam G multiplicans L fecit O, numerus L ipsum O metietur per vnitates, quae sunt in G. sed E vnitas metitur ipsum G per vnitates, quae in ipso sunt. aequaliter igitur E vnitas metitur G, atque L ipsum O. ergo vt E vnitas ad G, ita est L ad O. vt autem E vnitas ad G, ita erat G ad L. vt igitur E vnitas ad G, ita G ad L, & L ad O, hoc est ad B, qui ipsi O est aequalis. quod oportebat demonstrare.*

THEOREMA VIII. PROPOSITIO. X.

Si inter duos numeros, & vnitatem deinceps proportionales numeri ceciderint, quot inter vtrumque ipsorum, & vnitatem cadunt numeri deinceps proportionales; totidem & inter ipsos numeri deinceps proportionales cadent.



Inter duos enim numeros A B, & vnitatem C numeri deinceps proportionales cadant D E, & FG. Dico quot inter vtrumque ipsorum A B, & vnitatem C cadunt numeri deinceps proportionales, totidem & inter ipsos A B numeros deinceps proportionales cadere. numerus enim D ipsum F multipiicans faciat H: vterque autem ipsorum D F ipsum H multiplicans faciat vtrumque 20. diff. K L. & quoniam est ut C vnitas ad numerum D, ita D ad E, vnitas C ipsum D numerum

rum æqualiter metietur, atque D ipſum E. Sed unitas C numerum D metitur per vnitates, quæ ſunt in D. ergo & numerus D ipſum E per vnitates, quæ ſunt in D metitur: ac propterea numerus D ſeipſum multiplicans fecit E. rurſus quoniam vt vnitas C ad D numerum, ita eſt E ad A; vnitas C ipſum D numerum æqualiter metitur, atque E ipſum A. ſed vnitas C ipſum D numerum metitur per vnitates, quæ ſunt in D. quare et E ipſum A per unitates, quæ ſunt in D metietur: ideoq; D ipſũ E multiplicans fecit A. Eadem ratione & F ſe ipſum multiplicans fecit G, multiplicans vero G ipſum B fecit. et quoniam D ſe ipſum multiplicans fecit E, multiplicans vero F fecit H; erit vt D ad F, ita E ad H. & ob eandem cauſſam ut D ad F, ita H ad G. vt igitur E ad H, ita H ad G. rurſus quoniam D vtrumque ipſorum E H multiplicans fecit vtrumque A K, erit ut E ad H, ita A ad K. ſed vt E ad H, ita D ad F. & ut igitur D ad F, ita A ad K. Rurſus quoniam vterque D F ipſum H multiplicans vtrumque K L fecit, vt D ad F, ita eſt K ad L. vt autem D ad F, ita erat A ad K. & ut igitur A ad K, ita K ad L. præterea cum F vtrumque H G multiplicans vtrumque L B faciat, erit vt H ad G, ita L ad B. ſed vt H ad G, ita D ad F. ergo & vt D ad F, ita L ad B. oſtenſum autem eſt & vt D ad F, ita & A ad K, & K ad L, & L ad B. quare A K L B numeri deinceps proportionales ſunt. quot igitur inter vtrũque ipſorum A B, & vnitatem C cadunt numeri deinceps proportionales, totidem & inter A B numeri deinceps proportionales cadent. quod demõſtrare oportebat.

6. com. not. 9. com. not. 20. diffi. 9. com. not. 17. ſeptimi. 17. ſeptimi. 18. ſeptimi. 17. ſeptimi.

THEOREMA IX. PROPOSITIO. XI.

Inter duos numeros quadratos vnus medius proportionalis cadit: et quadratus ad quadratum duplam proportionẽ habet eius, quam latus habet latus.

Sint quadrati numeri A B; et ipſius quidem A latus ſit C, ipſius vero B latus D. Dico inter ipſos A B vnum medium proportionalem cadere, et A ad B duplam proportionem habere eius, quam habet C ad D. numerus enim C multiplicans D faciat E. et quoniam A numerus quadratus eſt, cuius latus C; numerus C ſeipſum multiplicans fecit A. eadem ratione et D ſe ipſum multiplicans fecit B. Quoniam igitur C utrumque ipſorum C D multiplicans vtrumque A E fecit, vt C ad D, ita erit A ad E. Rurſus quoniam C multiplicans D ipſum E fecit; et D ſe ipſum multiplicans fecit B; duo numeri C D vnum, & eundem numerum D multiplicantes ipſos E B fecerunt. eſt igitur vt C ad D, ita E ad B. ſed ut C ad D, ita erat A ad E. ergo et vt A ad E, ita E ad B. inter numeros igitur A B vnus medius proportionalis E cadit. Dico et A ad B duplam habere proportionem eius, quam habet C ad D. Quoniam enim tres numeri proportionales ſunt A E B, habebit A ad B duplam proportionem eius, quã habet A ad E. vt autem A ad E, ita C ad D. ergo A ad B duplam proportionem habet eius, quam C latus habet ad latus D. quod oportebat demonſtrare.

A....4
C..2
E.....6
D...3
B.....9

18. diffin. 17. ſeptimi. 18. ſeptimi. Diffi. 23.

THEOREMA X. PROPOSITIO. XII.

Inter duos numeros cubos duo medij proportionales cadunt, et cubus ad cubum triplam habet proportionem eius, quam latus habet ad latus.

Sint numeri cubi A B; & ipſius quidem A latus ſit C, ipſius vero B latus D. Dico inter ipſos A B duos medios proportionales cadere; et numerum A ad B triplam habere proportionem eius, quam C habet ad D. numerus enim C ſe ipſum multiplicans faciat E; multiplicans vero D ipſum F faciat, et D ſe ipſum multiplicans fa-

ciat G: et vterq; ipſorum C D multiplicãs F vtrumque H K faciat. Quoniam igitur cubus eſt A, & eius latus C, numerus C ſe ipſum multiplicans fecit E; multiplicans vero E ipſum A fecit. ſimiliter & D ſe ipſum multiplicans fecit G; multiplicans vero G fecit ipſum B. & quoniam C vtrũque ipſorum C D multiplicans vtrumque E F fecit, vt C ad D, ita eſt E ad F. eadem ratione & ut C ad D, ita F ad G. Rurſus quoniam C vtrumque ipſorum E F multiplicans fecit vtrumque A H, erit vt E ad F, ita A ad H. ut autem E ad F, ita C ad D. et vt igitur C ad D, ita A ad H. Rurſus quoniam vterque ipſorum C D multiplicans F vtrumque H K fecit, vt C ad D, ita erit H ad K. rurſus quoniam D vtrumque F G multiplicans fecit vtrumque K B, erit vt F ad G, ita K ad B. ut autem F ad G, ita C ad D. & ut igitur C ad D, ita K ad B. oſtenſum autem eſt vt C ad D, ita eſſe A ad H, & H ad K. ergo vt A ad H, ita H ad K, & K ad B: ac propterea inter ipſos A B duo H K medij proportionales cadunt. Dico & A ad B triplam proportionem habere eius, quam habet C ad D. Quoniam enim quattuor numeri proportionales ſunt A H K B, habebit A ad B triplam proportionem eius, quã habet A ad H. vt autem A ad H, ita C ad D. ergo A ad B triplam habet proportionem eius, quam C habet ad D. quod demonſtrare oportebat.

17. ſeptimi.

18. ſeptimi.

23. diffin.

A.....8
H.....12
K.....18
B.....27
C..2
D...3
E....4
F.....6
G.....9

THEOREMA XI. PROPOSITIO. XIII.

Si ſint quotcumque numeri deinceps proportionales, & vnuſquiſque ſe ipſum multiplicans faciat aliquos; facti ex ipſis proportionales erunt. et ſi poſiti à principio numeri factos multiplicantes alios faciant, et ipſi proportionales erunt. et ſemper circa extremos hoc contingit.

Sint quotcumque numeri proportionales A B C; ſitq; ut A ad B, ita B ad C. & ipſi A B C ſe ipſos multipli cantes faciant D E F: ipſos uero D E F multidlicantes faciant G H K. Dico nnmeros DEF & G H K deinceps proportionales eſſe. numerus enim A ipſum B multiplicans faciat L; vterque autem ipſorum A B multiplicans L faciat vtrumque M N. et rurſus B quidem multiplicans C ipſum X faciat; vterque vero ipſorum B C multiplicans X faciat vtrumque O P. ſimiliter ijs, quę dicta ſunt, oſtendemus D L E, & G M N H deinceps proportionales eſſe in proportione, quæ eſt A ad B: & adhuc E X F, & H O P K deinceps eſſe proportionales in proportione B ad C. atque eſt vt A ad B, ita B ad C. ergo & D L E in eadem ſunt proportione, in qua E X F: & præterea G M N H in eadem proportione, in qua H O P K. eſtq; ipſorum quidem D L E multitudo

A

B

A..2B...4C.....8
D....4
L.....8
E.....16
X.....32
F.....64
G.....8
M.....16
N.....32
H.....64
O.....128
P.....256
R.....512

multitudo multitudini ipsorum E X F æqualis. multitudo autē ipsorum G M N H æqualis multitudini ipsorum H O P K. ex æquali igitur vt D ad E, ita E ad F. vt autem G ad H, ita H ad K. quod demonstrare oportebat. 14. septimi.

F. C. COMMENTARIVS.

Similiter ijs, quæ dicta sunt, ostendemus D L E, & G M N H deinceps proportionales esse in proportione, quæ est A ad B] *quoniam enim A duos numeros A B multiplicãs fecit D L, erit vt A ad B, ita D ad L. rursus quoniam B duos numeros A B multiplicans ipsos L E fecit; vt A ad B, ita erit L ad E. sed vt A ad B, ita est D ad L. vt igitur A ad B, ita est & D ad L, & L ad E. quare sequitur D L E deinceps proportionales esse in eadem proportione, in qua est A ad B. & quoniam A duos numeros D L multiplicans fecit ipsos G M, erit vt D ad L, hoc est vt A ad B, ita G ad M. rursus, quoniam duo numeri A B multiplicantes L ipsos M N fecerunt, vt A ad B, ita erit M ad N. Præterea cũ B duos numeros L E multiplicans faciat N H, erit vt L ad E, videlicet vt A ad B, ita N ad H. Sed vt A ad B, ita erat & G ad M, & M ad N. vt igitur G ad M, ita M ad N, & N ad H. ergo G M N H deinceps proportionales sunt in eadẽ proportione, in qua est A ad B.* A. 17. septimi. 18. septimi.

Et adhuc E X F, & H O P K deinceps esse proportionales in proportione B ad C] *hoc eodem, quo supra, modo ostendemus. numerus enim B duos numeros B C multiplicans fecit ipsos N X, & numerus C duos numeros B C multiplicans ipsos X F fecit. ergo vt B ad C, ita est & E ad X, & X ad F. Præterea B duos numeros E X multiplicans fecit H O. & duo numeri B C multiplicantes X fecerunt ipsos O P. rursus C duos numeros X F multiplicans ipsos P K fecit. quare vt E ad X, hoc est vt C ad B, ita H ad O. & rursus vt C ad B, ita O ad P. præterea vt X ad F, hoc est vt B ad C, ita est P ad K. vt igitur B ad C, ita H ad O, & O ad P, & P ad K. ex quibus constat E X F, & H O P K deinceps proportionales esse in eaproportione, in qua est B ad C.* B. C. A.

THEOREMA XII. PROPOSITIO XIIII.

Si numerus quadratus metiatur quadratum numerum, & latus latus metietur; & si latus metiatur latus, & quadratus quadratum metietur.

Sint quadrati numeri A B, quorum latera C D, & A ipsum B metiatur. Dico & latus C ipsum D metiri. numerus enim C multiplicans D ipsum E faciat. ergo A E B deinceps proportionales sunt in proportione, quæ est C ad D. Quoniam igitur A E B deinceps sunt proportionales, metiturq; A ipsum B; & A ipsum E metietur. atque est vt A ad E, ita C ad D. ergo & C metitur ipsum D. sed C metiatur ipsum D. Dico & A ipsum B metiri. Ijsdem enim constructis similiter ostendemus A E B deinceps proportionales esse in proportione C ad D. & quoniam est vt C ad D, ita A ad E. metitur autem C ipsum D. & A ipsum E metietur. & sunt A E B deinceps proportionales, metitur igitur & A ipsum B, si igitur numerus quadratus. & reliqua. quod oportebat demonstrare. A. E. B. C. D. Ex demonstratis in 2. huius. 7. huius. *

F. C. COMMENTARIVS.

Metitur igitur & A ipsum B] *quoniam enim A E B deinceps proportionales sunt; metiturq; A ipsum E; & E ipsum B metietur; quare A ipsum B metiatur necesse est ex duodecima communi notione.* * 10. diffi.

THEOREMA XIII. PROPOSITIO XV.

Si numerus cubus metiatur cubum numerum, & latus latus metietur

tietur: & ſi latus metiatur latus, & cubus cubum metietur.

Numerus enim cubus A cubum numerum B metiatur: & ipſius quidem A latus ſit C, ipſius vero B latus D. Dico C ipſum D metiri. numerus enim C ſe ipſum multiplicans faciat E, & multiplicãs D faciat F: D veroſe ipſum multiplicãs faciat G, & vterque ipſorum C D multiplicans F vtrumque H K faciat. manifeſtum eſt E F G, & A H K B deinceps proportionales eſſe in proportione, quę eſt C ad D. & quoniã A H K B deinceps proportionales ſunt, metiturq; A ipſum B; & A ipſum H metietur. eſt aũt vt A ad H, ita C ad D. ergo C ipſũ D metietur. ſed C metiatur D. Dico & A ipſum B metiri. ijſdẽ enim cõſtructis ſimiliter oſtẽdemus A H K B deinceps proportionales eſſe in proportione C ad D. & quoniã C ipſum D metitur, eſtq; vt C ad D, ita A ad H; & A metitur ipſum H. quare & ipſum B metietur. quod demonſtrare oportebat.

A 8
H 16
K 32
B 64
C 2
D 4
E 8
F 16
G 32

7. huius.

F. C. COMMENTARIVS.

A Manifeſtum eſt E F G, & A H K B deinceps proportionales eſſe in proportione, quæ eſt C ad D] *hoc ſimiliter vt in 13 demonſtrabimus.*

B Et A metitur ipſum H. quare & ipſum B metietur] *quoniam enim eſt vt A ad H, ita H ad K; metiturq; A ipſum H; & H metietur ipſum K. quare & A ipſum K metietur. rurſus quoniam vt A ad H, ita eſt K ad B, & K ipſum B metietur. ergo & A ipſum B metiatur neceſſe eſt.*

20. diffi. 12. com. not.

THEOREMA XIIII. PROPOSITIO. XVI.

Si numerus quadratus non metiatur quadratum numerum, neque latus latus metietur: & ſi latus non metiatur latus, neque quadratus quadratum metietur.

Sint quadrati numeri A B, quorum latera C D. & A non metiatur ipſum B. Dico neque C ipſum D metiri. ſi enim metitur C ipſum D, & A ipſum B metietur. nõ metitur autem A ipſum B. non igitur C ipſum D metietur. ſed C non metiatur D. Dico neque A ipſum B metiri. Si enim A metitur ipſum B, & C ipſum D metietur: atqui C nõ metitur D; neque igitur A ipſum B metietur. quod demonſtrare oportebat.

A 9
B 16
C 3
D 4

14. huius.

THEOREMA XV. PROPOSITIO XVII.

Si numerus cubus non metiatur cubum numerum, neque latus latus metietur. & ſi latus non metiatur latus, neque cubus cubum metietur.

Numerus enim cubus A cubum numerum B non metiatur: & ipſius quidẽ A latus ſit C, ipſius vero B latus D. Dico C ipſum D nõ metiri.

A 8
B 27
C 2
D 3

ſi enim

ſi enim C metitur ipſum D, & A ipſum B metietur. atqui non metitur A ipſum B. non igitur C ipſum D metietur. Sed non metiatur C ipſum D. Dico neque A ipſum B meriri. ſi enim A ipſum B metitur, & C metietur ipſum D. non metitur autem C ipſum D. neque igitur A ipſum B metietur. quod demonſtrare oportebat.

THEOREMA XVI. PROPOSITIO XVIII.

Inter duos ſimiles planos numeros vnus medius proportionalis cadit: & planus ad planum duplam proportionem habet eius, quam latus homologum habet ad homologum latus.

Sint duo numeri plani inter ſe ſimiles A B; & ipſius quidem A latera ſint C D; ipſius vero B latera E F. & quoniam ſimiles plani ſunt, qui latera habent proportionalia; erit vt C ad D, ita E ad F. Dico inter ipſos A B vnum medium proportionalem cadere: & A ad B duplam proportionem habere eius, quam latus homologum C habet ad homologum latus E, vel D ad F. quoniam enim eſt vt C ad D, ita E ad F; & permutando vt C ad E, ita erit D ad F. & quoniam planus numerus eſt A, cuius latera CD, numerus D ipſum C multiplicans fecit A. Eadem ratione, & E multiplicans F ipſum B fecit. numerus autem D ipſum E multiplicans faciat G. & cum D ipſum quidem C multiplicans faciat A; multiplicans vero E faciat G, erit vt C ad E, ita A ad G. ſed vt C ad E, ita D ad F. & vt igitur D ad F, ita A ad G. rurſus quoniam E ipſum D multiplicans fecit G, multiplicans vero F ipſum B fecit, vt D ad F, ita erit G ad B. oſtenſum eſt autem & vt D ad F, ita eſſe A ad G. & vt igitur A ad G, ita G ad B. ergo A G B deinceps proportionales ſunt; ac propterea inter A B vnus medius proportionalis cadit. Dico & A ad B duplam proportionem habere eius, quam latus homologum habet ad homologum latus, hoc eſt quam C ad E, vel D ad F. Quoniam enim A G B deinceps proportionales ſunt, A ad B duplam proportionem habebit eius, quam habet ad G. atque eſt vt A ad G, ita C ad E, & D ad F. ergo & A ad B duplam proportionem habet eius, quam C habet ad E, vel D ad F. quod oportebat demõſtrare.

A 6
G 12
B 24
C 12
D 3
E 4
F 8

21. diſſi.

A

17. ſeptimi.

4

Diſſi. 3.

THEOREMA XVII. PROPOSITIO XIX.

Inter duos ſimiles ſolidos numeros duo medij proportionales cadunt; & ſolidus ad ſolidum triplam proportionem habet eius, quam latus homologum habet ad homologum latus.

Sint duo numeri ſolidi inter ſe ſimiles A B, & ipſius quidem A latera ſint C D E; ipſius vero B latera F G H, & quoniam ſimiles ſolidi ſunt, qui latera habent proportionalia, erit vt C ad D, ita F ad G. vt autem D ad E, ita G ad H. Dico inter ipſos A B duos medios proportionales cadere, & A ad B triplam proportionem habere eius, quam habet C ad F, & D ad G, & adhuc D ad H. numerus enim C ipſum D multiplicans faciat K, F vero multiplicans G ipſum L faciat. & quoniam C D in eadem ſunt proportione, in qua F G, & ex ipſis C D

A 8
N 12
X 18
B 27
C 2
D 3
E 2
F 3
G 3
H 3
K 4
M 6
L 9

A

21. diſſi.

A

fit

fit K; ex ipſis vero F G fit L, erunt K L ſimiles plani numeri. quare inter ipſos vnus medius proportionalis cadit. ſit is numerus M. ergo M fit ex D F, vt in præcedenti theoremate. eſt igitur vt K ad M, ita M ad L. & quoniam D ipſum C multiplicans fecit K, multiplicans vero F fecit M; erit vt C ad F, ita K ad M. ſed vt K ad M, ita M ad L. ergo K M L deinceps proportionales ſunt in proportione C ad F. & quoniã vt C ad D, ita F ad G, erit permutando vt C ad F, ita D ad G. rurſus quoniam vt D ad E, ita G ad H, & permutãdo erit vt D ad G, ita E ad H. ergo K M L deinceps proportionales ſunt in proportione C ad F, & D ad G, & E ad H. vterque autem ipſorum E H multiplicans M faciat vtrumq; N X. & quoniam ſolidus eſt A, latera autem ipſius C D E, numerus E eum, qui fit ex C D multiplicans fecit A: qui vero fit ex C D eſt K. ergo E multiplicans K ipſum A fecit. Eadem ratione & H multiplicans L, qui fit ex F G, fecit ipſum B. & quoniam E ipſum K multiplicans fecit A. ſed & multiplicans M fecit N; erit vt K ad M, ita A ad N. vt autem K ad M, ita C ad F, & D ad G, & adhuc E ad H. ergo vt C ad F, & D ad G, & E ad H, ita A ad N. rurſus quoniam vterque ipſorum E H multiplicans M fecit vtrumque N X, erit vt E ad H, ita N ad X. ſed vt E ad H, ita C ad F, & D ad G. eſt igitur vt C ad F, & D ad G, & E ad H, ita & A ad N, & N ad X. rurſus quoniam H multiplicans M fecit ipſum X; ſed & multiplicans L fecit B: erit vt M ad L, ita X ad B. ſed vt M ad L, ita C ad F, & D ad G, & E ad H. & vt igitur C ad F, & D ad G, & E ad H, ita non ſolum X ad B, ſed & A ad N, & N ad X. ergo A N X B deinceps proportionales ſunt in dictis laterum proportionibus. Dico & A ad B triplam proportionem habere eius, quam habet latus homologum ad homologum latus; hoc eſt quam habet numerus C ad F, vel D ad G, & E ad H. Quoniam enim quattuor numeri proportionales ſunt A N X B, habebit A ad B triplam proportionem eius, quam habet A ad N. ſed vt A ad N, ita oſtenſus eſt & C ad F, & D ad G, & E ad H. ergo A ad B triplam habet proportionem eius, quam latus homologum habet ad homologum latus, hoc eſt quã C habet ad F, & D ad G, & E ad H, quod demonſtrare oportebat.

Ex antecedente.

17 ſeptimi.

A

B

Diffi. 14.

F. C. COMMENTARIVS.

A Et quoniam E ipſum K multiplicans fecit A] *eſt enim K, qui fit ex C D, & E multiplicans eum, qui fit ex C D ipſum A fecit.*

B Rurſus quoniam H multiplicans M fecit ipſum X, ſed & multiplicans L fecit B] *eſt enim L, qui fit ex F G, & H eum, qui fit ex F G multiplicans ipſum B fecit.*

THEOREMA XVIII. PROPOSITIO. XX.

Si inter duos numeros vnus medius proportionalis cadat, numeri ſimiles plani erũt.

Inter duos enim numeros A B vnus medius proportionalis cadat C. Dico numeros A B ſimiles planos eſſe. Sumantur enim minimi numeri D E, eandem, quam ipſi A C B proportionem habentium. eſt igitur vt D ad E, ita A ad C. vt autem A ad C, ita C ad B. ergo & vt D ad E ita C ad B. æqualiter igitur D ipſum A metitur, atque E ipſum C. ergo quoties D metitur A, tot vnitates ſint in

A

C

B

D

E

F

G

20. diffi.

F; propterea q; F multiplicans D ipſum A fecit; multiplicans vero E fecit C. quare A planus numerus eſt, cuius latera D F. rurſus qm̃ D E minimi numeri ſunt, eandē quā C B proportionē habētiū; æqualiter D ipſum C metitur, & E ipſum B. quoties aũt E ipsū B metitur, tot vnitates ſint in G. ergo E ipsū B metitur per eas, quæ ſunt in G vnitates. quare G ipſum E multiplicās fecit B: ideoq; B numerus planus eſt, cuius latera E G. ergo numeri A B ſunt plani. Dico & ſimiles eſſe. Quoniam enim inter que ipſorum F G multiplicans E vtrumque C B fecit, ut F ad G, ita erit C ad B. ut aũt C ad B. ita D ad E. & ut igitur D ad E, ita F ad G. quare A B ſimiles plani ſunt; cum ipſorum latera ſint proportionalia. id quod demonſtrare oportebat.

9. com: not.
21. ſeptimi.
9. com. not:
18. ſeptimi.
B

F. C. COMMENTARIVS.

Sumantur enim minimi numeri DE, eandem, quam ipſi A C B proportionem habentium] *ex eo, quod additum eſt ad 35 ſeptimi.* A

Quare A B ſimiles plani ſunt, cum ipſorum latera ſint proportionalia] *quoniam enim eſt vt D ad E, ita F ad G, erit permutando vt D ad F, ita E ad G. & ſunt D F latera ipſius A, & E G latera ipſius B. cum igitur plani A B latera habeant proportionalia, ſimiles inter ſe erunt.* B

THEOREMA XIX. PROPOSITIO XXI.

Si inter duos numeros duo medij proportionales cadant, numeri ſimiles ſolidi erunt.

Inter duos enim numeros A D duo medij proportionales cadant C D. Dico ipſos A B ſimiles ſolidos eſſe. ſumantur enim minimi numeri tres, eandem quā A C D B proportionē habentiū, qui ſint E F G. extremi igitur ipſorum E G primi inter ſe ſunt. & quoniam inter E G unus medius proportionalis cecidit F, erunt numeri E G ſimiles plani. ſint ipſius quidem E latera H K; ipſius uero G latera L M. manifeſtum eſt ex antecedente E F G deinceps proportionales eſſe in proportione H ad L, & in proportione K ad M. & quoniam E F G minimi ſunt, eandem, quam A C D proportionem habentium, erit ex æquali ut E ad G, ita A ad D: & ſunt E G primi, ſed primi & minimi. minimi uero eos, qui eandem habent proportionem æqualiter metiuntur, maior maiorem, & minor minorē, hoc eſt antecedens antecedentem, & conſequens conſequentem. ergo E ipſum A æqualiter metitur, atque G ipſum D. quoties autem E metitur A, tot unitates ſint in N. ergo N ipſum E multiplicās fecit A. ſed E fit ex H K: ac propterea N eum, qui fit ex H K multiplicās ipſum A fecit. ſolidus igitur eſt A, cuius latera H K N. Rurſus quoniam E F G minimi ſunt, eandem quam ipſi C D B proportionem habentium, E ipſum C æqualiter metitur, atque G ipſum B. & quoties G metitur B, tot unitates ſint in X. ergo G ipſum B metitur per eas, quę ſunt in X unitatis; ideoq; X multiplicans G ipſum B fecit. at G fit ex L M. ergo X eum, qui fit ex L M multiplicans fecit B; multiplicans vero E ipſum C fecit. ſolidus igitur eſt B, & eius latera L M X. quare A B ſolidi ſunt. Dico etiam ſimiles eſſe. quoniam enim N X, C multiplicantes E ipſos A C fecerunt, ut N ad X, ita erit A ad C, hoc eſt E ad F. ſed vt E ad F, ita H ad L, & K ad M. & vt igitur H ad L, ita K ad M, & N ad X. ſunt autem

A 8
C 12
D 18
B 27
E 4
F 6
G 9
H .. 2
K .. 2
N .. 2
L ... 3
M ... 3
X ... 3

A
3. huius:
Ex antecedenti.
B
23 ſeptimi.
21. ſeptimi.
9. com. not.

HKN

HKN latera ipſius A, & L M X latera ipſius B. ergo A B ſimiles ſolidi erunt. quod demonſtrare oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

A Sumantur enim minimi numeri tres eandem, quam A C D B proportionem habentium] *inueniantur primum duo minimi numeri eandem quam A C D B proportionem habẽtium ex ijs, quae nos ad 35 ſeptimi tradidimus: deinde ex 2. huius inueniantur tres minimi numeri, qui eandem proportionem habeant; vel ex 35 ſeptimi ſumantur tres minimi numeri eandem, quam A C D proportionem habentium.*

B Manifeſtum eſt ex antecedente E F G deinceps proportionales eſſe in proportione H ad L, & in proportione K ad M] *quoniam enim E G ſimiles plani ſunt, ipſorum latera eandem habent proportionem. eſt igitur vt H ad K, ita L ad M: & permutando vt H ad L, ita K ad M. & K multiplicans L faciat F. itaque quoniam K ipſum H multiplicans fecit E; multiplicas vero L ipſum F fecit, vt H ad L, ita erit E ad F. rurſus quoniam L ipſum K multiplicans fecit F, multiplicans vero M ipſum G fecit, vt K ad M, ita eſt F ad G. oſtenſum eſt autem vt H ad L, ita eſſe K ad M. ergo & vt E ad F, ita F ad G: ac propterea E F G deinceps proportionales ſunt in proportione H ad L, & in proportione K ad M.*

17. ſeptimi.

C Quoniam enim N X multiplicantes E ipſos A C fecerunt, ut N ad X, ita erit A ad C] *etenim E ipſum C aequaliter metitur, atque G ipſum B, vt oſtenſum eſt. quoties autem G metitur B, tot vnitates ſunt in X. ergo X multiplicans E ipſum C fecit.*

THEOREMA XX. PROPOSITIO XXII.

Si tres numeri deinceps proportionales fuerint, primus autem ſit quadratus, & tertius quadratus erit.

Sint tres numeri deinceps proportionales A B C; ſitq; primus A quadratus. Dico & tertium C quadratum eſſe. Quoniã enim inter A C unus medius proportionalis cadit B, erũt A C ſimiles plani. ſed A eſt quadratus, ergo & C quadratus erit. quod oportebat demonſtrare.

20. huius.

A....4
B.....6
C.....9

THEOREMA XXI. PROPOSITIO. XXIII.

Si quattuor numeri deinceps proportionales fuerint, primus autem ſit cubus, & quartus cubus erit.

Sint quattuor numeri deinceps proportionales A B C D, & A ſit cubus. Dico & D cubum eſſe. Quoniam enim inter A D duo medij proportionales cadunt B C, erunt A D ſimiles ſolidi. eſt autem A cubus; ergo et D cubus erit, quod demonſtrare oportebat.

21. huius.

A.....8
B.....12
C.....18
D.....27

THEOREMA XXII. PROPOSITIO XXIIII.

Si duo uumeri inter ſe proportionem habeant, quam numerus quadratus ad quadratum numerum, primus autem ſit quadratus; & ſecundus quadratus erit.

Duo enim numeri A B inter ſe proportionem habeant, quam numerus quadratus C ad quadratum numerum D: ſitq; A quadratus. Dico & B quadratum eſſe.

quoniam

quoniam enim CD quadrati ſunt, erunt CD ſimiles plani; ideoq; inter ipſos CD vnus medius proportionalis cadit, eſt autem vt C ad D, ita A ad B, quare etiam inter A B cadit vnus medius proportionalis. itq; A quadratus. ergo & B quadratus erit. 18. huius. 8. huius. 21. huius.



THEOREMA XXIII. PROPOSITIO XXV.

Si duo numeri inter ſe proportionem habeant, quam numerus cubus ad cubum numerum, primus autem ſit cubus; & ſecundus cubus erit.

Duo enim numeri A B inter ſe proportionem habeant, quam cubus numerus C ad numerũ cubum D; ſitq; A cubus. Dico & B cubum eſſe. Quoniam enim CD cubi ſunt, erunt CD ſimiles ſolidi. idcircoq; inter ipſos duo medij proportionales cadent: quot autem inter C D cadunt medij proportionales, totidem cadent & inter eos, qui eandem, quam ipſi proportionem habent. ergo inter A B duo medij cadent proportionales. cadant E F. quoniam igitur quattuor numeri A E F B deinceps proportionales ſunt, eſtq; A cubus; & B cubus erit. quod oportebat demonſtrare. 23. huius. 8 huius. 23. huius.



THEOREMA XXIIII. PROPOSITIO XXVI.

Similes plani numeri inter ſe proportionem habent, quam numerus quadratus ad quadratum numerum.

Sint ſimiles plani numeri A B. Dico A ad B proportionem habere, quam numerus quadratus ad quadratum numerum. Quoniam enim A B ſimiles plani ſunt, inter eos vnus medius cadit proportionalis. cadat, ſitq; C: & ſumantur minimi numeri, eandem, quam A B C proportionẽ habentiũ D E F. ergo ipſorum extremi D F quadrati ſunt. & quoniam eſt vt D ad F, ita A ad B; et ſunt DF quadrati: habebit A ad B proportionem, quam numerus quadratus ad quadratum numerum. quod demonſtrare oportebat. 18. huius. 35. ſeptimi. Con. 2. huius.



F. C. COMMENTARIVS.

Sed & huius conuerſum verum eſt. quod hoc modo demonſtrabimus.

Plani numeri, qui proportionem habent, quam quadratus numerus ad quadratum numerum, inter ſe ſimiles ſunt.

Sint plani numeri A B, qui proportionem habeant, quã quadratus numerus C ad quadratum numerum D. Dico eos inter ſe ſimiles eſſe. Quoniam enim C D quadrati ſunt, erunt ſimiles plani. quare inter eos cadit vnus medius proportionalis: atque eſt vt C ad D, ita A ad B. ergo & inter ipſos A B vnus medius proportionalis cadit. numeri igitur A B ſimiles plani ſunt. quod demonſtrare oportebat.

18. huius. 8. huius. 20. huius.



THEOREMA XXV. PROPOSITIO. XXVII.

Similes ſolidi numeri inter ſe proportionem habent, quam numerus cubus ad cubum numerum.

Sint ſimiles ſolidi numeri A B. Dico A ad B proportionem habere, quam numerus cubus ad cubum numerum. Quoniã enim A B ſimiles ſolidi ſunt, inter ipſos duo medij cadent proportionales. cadãt C D; & ſumantur minimi numeri, qui eã dem, quam A C D B proportionem habeant, ipſis multitudine æquales E F G H. ergo eorum extremi E H cubi ſunt. atque eſt vt E ad H, ita A ad B. habet igitur A ad B proportionem, quam numerus cubus ad cubum numerum. quod demonſtrare oportebat.

19. huius. 35. ſeptimi. Corol. 2. huius.



F. C. COMMENTARIVS.

Huius etiam conuerſim verum eſt. quod ita demonſtratur.

Solidum numeri, qui proportionem habent, quam numerus cubus ad numerum cubum, inter ſe ſimiles ſunt.

Sint ſolidi numeri A B proportionem habentes, quam numerus cubus C ad numerum cubum D. Dico eos inter ſe ſimiles eſſe. Quoniã enim C D cubi ſunt, erũt ſimiles ſolidi; ac propterea inter eos cadũt duo medij proportionales. eſt autem vt C ad D, ita A ad B. quare etiam inter ipſos A B duo medij proportionales cadent. ſimiles igitur ſolidi ſunt numeri A B. quod demonſtrare oportebat.

19. huius. 8. huius. 21 huius.



OCTAVI LIBRI FINIS.

EVCLIDIS ELEMENTORVM

LIBER NONVS.

CVM SCHOLIIS ANTIQVIS ET COMMENTARIIS

Federici Commandini Vrbinatis.

THEOREMA I. PROPOSITIO. I.

SI DVO ſimiles plani numeri ſe ſe multiplicantes aliquem fecerint, factus quadratus erit.

Sint duo ſimiles plani numeri A B, & A ipſum B multiplicans faciat C. Dico C quadratum eſſe. numerus enim A ſe ipſum multiplicans faciat D. ergo D quadratus eſt. Quoniam igitur A ſe ipſum multiplicans fecit D, multiplicans vero B ipſum C fecit; vt A ad B, ita erit D ad C. Et quoniam A B ſimiles plani ſunt, inter ipſos vnus medius proportionalis cadet. ſi autem inter duos numeros numeri deinceps proportionales cecederint, quot inter ipſos cadunt, totidem cadent & inter eos, qui eandem habent proportionem. quare & inter D C vnus medius proportionalis cadit. atque eſt D quadratus. ergo & C quadratus erit. quod oportebat demonſtrare.

17. ſeptimi. 18. octaui. 8. octaui. 22. octaui.

A....4
E.....6
B.....9
D.....16
F——————24
C——————36

THEOREMA II. PROPOSITIO II.

Si duo numeri ſe multiplicantes quadratum numerum efficiant, ſimiles plani erunt.

Duo enim numeri A B ſe ſe multiplicantes quadratum numerum C efficiant. Dico A B ſimiles planos eſſe. numerus enim A ſe ipſum multiplicans faciat D. ergo D quadratus eſt. Quoniam igitur A ſe ipſum multiplicans fecit D, multiplicans vero B ipſum C fecit; vt A ad B, ita erit D ad C. & quoniam D quadratus eſt, ſed & C; erũt D C ſimiles plani. quare

A...3
.....6
B.....12
D.....8
——————18
C——————36

17. ſeptimi. 18. octaui.

8.octaui. Inter ipſos vnus medius proportionalis cadit. atque eſt vt D ad C, ita A ad B. ergo & inter A B cadet vnus medius proportionalis. ſi autem inter duos numeros vnus
20. octaui. medius proportionalis cadat, erunt ſimiles plani. ergo A B ſimiles plani ſunt. quod oportebat demonſtrare.

THEOREMA III. PROPOSITIO III.

Si cubus numerus ſe ipſum multiplicans faciat aliquem, factus cubus erit.

Cubus enim numerus A ſe ipſum multiplicans faciat B. Dico B cubum eſſe. ſumatur enim ipſius A latus C, & C ſe ipſum multiplicans faciat D. manifeſtū eſt C multiplicantem D facere ipſum A. & quoniam C ſe ipſum multiplicans fecit
10.com.not. D, metitur C ipſum D per vnitates, quæ in ipſo ſunt. ſed & vnitas
6. com. not. metitur C per eas, quę in ipſo ſunt vnitates. eſt igitur vt vnitas ad C,
Conuer. 20. diffi. ita C ad D. rurſus quoniam C multiplicans D ipſum A fecit, metitur D ipſum A per unitates, quæ ſunt in C. metitur autem & vnitas ipſum C per vnitates, quæ in ipſo ſunt. ergo vt unitas ad C, ita D ad A. ſed vt vnitas ad C, ita C ad D. vt igitur vnitas ad C, ita C ad D, & D ad A: ideoq; inter vnitatem, & numerum A duo medij deinceps proportionales cadunt CD. rurſus quoniã A ſe ipſum multiplicans fecit B & A ipſum B metitur per vnitates, quæ in ipſo ſunt. metitur autem & vnitas ipſum A per vnitates, quæ ſunt in ipſo. eſt igitur vt vnitas ad A, ita A ad B. ſed inter vnitatem, & A cadunt duo medij proportio
8.octaui. nales. ergo & inter A & B duo medij proportionales cadent. quòd ſi inter dnos nu
23. octaui. meros cadant duo medij proportionales, primus autem ſit cubus, & quartus cubus erit. atque eſt A cubus, ergo & B cubus erit. quod demonſtrare oportebat.



THEOREMA IIII. PROPOSITIO. IIII.

Si numerus cubus cubum numerum multiplicãs faciat aliquẽ, factus cubus erit.

Cubus enim numerus A cubum numerum B multiplicans ipſum C faciat. Dico C cubum eſſe. numerus enim A ſe ipſum
Ex antecedente. multiplicans faciat D. ergo D cubus eſt. & quoniam A ſe ipſum multiplicans fecit D;
17. ſeptimi. multiplicans vero B ipſum C fecit, vt A ad B, ita erit D ad C. & quoniam A B cubi ſunt, erunt ſimiles ſolidi; ac propterea in-
8.octaui. ter ipſos cadent duo medij proportionales. qua re & inter D C duo medij propor
23. octaui. tionales cadent. eſtq; D cubus. ergo & C cubus erit.



THEOREMA. V. PROPOSITIO V.

Si cubus numerus numerum aliquem multiplicans faciat cubum, & multiplicatus cubus erit.

Cubus

Cubus enim A numerũ aliquem B multiplicans faciat cubum C. Dico B cubum eſſe. numerus enim A ſe ipſum multiplicãs faciat D. ergo D cubus eſt. & quoniam A ſe ipſum quidem multiplicans fecit D; multiplicans vero B ipſum C fecit, vt A ad B, ita erit D ad C. & quoniam D C cubi ſunt, ſimiles ſunt ſolidi; ac propterea inter ipſos cadunt duo medij proportionales: atque eſt vt D ad C, ita A ad B. ergo & inter A B duo medij proportionales cadent eſtq; A cubus. Ergo & B cubus erit. quod oportebat demonſtrare.



Ex antecedente.
17. ſeptimi.
8. octaui.
23. octaui.

F. C. COMMENTARIVS.

Ex duobus precedentibus & illa ſequuntur.

Si cubus numerus numerum non cubum multiplicans faciat aliquem, factus nõ erit cubus.

Si enim factus ſit cubus, & multiplicatus cubus erit, ex antecedente. quod non ponitur.

Si cubus numerus numerum aliquem multiplicans faciat numerum non cubum & multiplicatus non erit cubus.

Si enim multiplicatus fuerit cubus, & factus cubus erit, ex 4. huius. quod non ponitur.

THEOREMA VI. PROPOSITIO VI.

Si numerus ſe ipſum multiplicans cubum faciat, & ipſe cubus erit.

Numerus enim A ſe ipſum multiplicãs cubum B faciat. Dico & A cubum eſſe. numerus enim A multiplicans B faciat C. Quoniam igitur A ſe ipſum multiplicans fecit B. multiplicans vero B ipſum C fecit, erit C cubus. & quoniam A ſe ipſum quidem multiplicans fecit B; multiplicãs uero B fecit C, vt A ad B, ita erit B ad C. quòd cum BC cubi ſint, ſimiles ſolidi erũt: ideoq; inter ipſos cadent duo medij proportionales. & eſt ut B ad C, ita A ad B. quare & inter A B duo medij proportionales cadunta. tque eſt B cubus, ergo & A cubus. ergo & A cubus erit. quod oportebat demonſtrare.



Diffi. 19.
17. ſeptimi.
19. octaui.
23. octaui.

THEOREMA VII. PROPOSITIO. VII.

Si compoſitus numerus numerum aliquem multiplicãs, quempiam faciat, factus ſolidus erit.

Cõpoſitus enim numerus A numerum aliquem B multiplicans ipſum C faciat. Dico C ſolidũ eſſe. Quoniã enim A cõpoſitus eſt, eũ numerus aliquis metietur. metiatur D. & quoties D ipſum A metitur, tot unitates ſint in E. ergo E multiplicans D fecit A. & quoniam A ipſum B multiplicans fecit C; eſtq; A, qui fit ex D E; numerus, qui fit ex D E, ipſum B multiplicans fecit C. ergo B multiplicans eum, qui fit ex D E, ipſum C fecit. ac propterea C ſolidus eſt, cuius latera DE. quod oportebat demonſtrare.



15. diffi.
9. com. not.
16. ſeptimi
Diffi. 17.

THEO-

THEOREMA VIII. PROPOSITIO VIII.

Si ab vnitate quotcumque numeri deinceps proportionales fuerint, tertius quidem ab vnitate quadratus est, & vnum intermittentes omnes: quartus aũt est cubus, & duos intermittẽtes omnes: septimus vero cubus simul, & quadratus, & quinque intermittentes omnes.



Sint ab vnitate quotcumque numeri deinceps proportionales A B C D E F. Dico tertium quidẽ ab vnitate B quadratum esse, & vnum intermittentes omnes: quartum autem C cubum, & duos intemittentes omnes; septimum vero F cubum simul, & quadratum, & quinque intermittentes omnes. Quoniam enim vt vnitas ad A, ita A ad B, vnitas ęqualiter metitur numerum A, atque A ipsum B. sed vnitas metitur A per vnitates, quæ in ipso sunt. Ergo & A ipsum B per vnitates, quę sunt in A metitur. quare A se ipsum multiplicans fecit B. quadratus igitur est B. & quoniam B C D deinceps proportionales sunt; estq́; B quadratus; & D quadratus erit. Eadem ratione erit & F quadratus. similiter demonstrabimus & vnum intermittentes omnes quadratos esse. Dico & quartum ab vnitate videlicet C esse cubum, & duos intermittentes omnes. Quoniam enim est vt vnitas ad A, ita B ad C; vnitas numerum A æqualiter metitur, atque B ipsum C. sed vnitas numerum A metitur per vnitates, quę in A sunt. Ergo & B metitur C per vnitates, quę sunt in A; & ob id A multiplicans B ipsum C fecit. Quoniam igitur A se ipsum multiplicans fecit B; multiplicans vero B fecit C; erit C cubus. quòd cum C D E F deinceps proportionales sint; sitq́; C cubus, & F cubus erit. ostẽsũ aũt est & quadratũ esse. septimus igitur ab vnitate F, & cubus est, & quadratus. Similiter quoque demonstrabimus quinque intermittentes omnes & cubos, & quadratos esse. quod demonstrare oportebat.

Diffin. 20. 6. com. not. 21. octaui. 20. diffin: 6. com: not. 9. com. not: 19. diff: 23. octaui:

THEOREMA IX. PROPOSITIO IX.

Si ab vnitate quotcumque numeri deinceps proportionales fuerint, qui uero post vnitatem sit quadratus; & reliqui omnes quadrati erunt. At si qui post vnitatem sit cubus, & reliqui omnes cubi erunt.



Sint ab vnitate numeri quotcumque deinceps proportionales A B C D E F, & qui post vnitatem A sit quadratus. Dico & reliquos omnes quadratos esse: tertiũ quidem ab vnitate

B esse quadratum,& vnum intermittentes omnes,demonstratum iam est.sed & reli qui omnes quadrati erunt. Quoniam enim A B C deinceps sunt proportionales; estq; A quadratus: & C quadratus erit. rursus quoniam B C D deinceps proportionales sunt; est autem B quadratus: & D quadratus erit.similiter ostendemus & reliquos omnes quadratos esse.sit autem A cubus.Dico & reliquos cubos esse.quartum quidem ab vnitate C esse cubum, & duos intermittentes omnes, iam demonstratum est.sed & reliqui omnes cubi erunt. Quoniam enim est vt vnitas ad A, ita A ad B,vnitas numerum A æqualiter metitur,atque A ipsum B. sed vnitas metitur numerum A per vnitates,quæ sunt in ipso. quare & A numerum B metitur per vnitates,quæ in ipso sunt.ergo A seipsum multiplicans fecit B,atque est A cubus.si autem cubus numerus se ipsum multiplicans fecerit aliquem,factus cubus erit. Ergo B est cubus.& quoniam quattuor numeri A B C D deinceps proportionales sunt, estq; A cubus;& D cubus erit. Eadem ratione & E est cubus,& similiter reliqui omnes cubi sunt.quod demonstrare oportebat.

A 20.diffin.

2 huius.

B

F. C. COMMENTARIVS.

Rursus quoniam BCD deinceps proportionales sunt,est autem B quadratus; et D quadratus erit] *videntur hęc superuacanea esse, cum superius demonstratum sit tertium ab vnitate quadratum esse, & vnum intermittentes omnes.*

A

Eadem ratione & E est cubus] *quattuor enim numeri B C D E deinceps proportionales sunt; atque est B cubus. ergo & E cubus sit necesse est.*

A 23.octaui.

THEOREMA X. PROPOSITIO. X.

Si ab vnitate quotcũque numeri deinceps proportionales fuerint, qui uero post unitatem non sit quadratus; neque alius vllus quadratus erit, præter tertium ab vnitate,& unum intermittentes omnes. At si qui post vnitatem non sit cubus; neque alius vllus cubus erit,præter quartum ab vnitate, & duos intermittentes oẽs.



Sint ab vnitate deinceps proportionales numeri A B C D E F, & qui post vnitatem A non sit quadratus. Dico neque alium vllum quadratum esse,præter tertium ab vnitate, & vnum intermittentes omnes. si enim fieri potest, sit C quadratus;est autem & quadratus B. ergo B C inter se proportionem habent, quam numerus quadratus ad quadratum numerũ: atque est vt B ad C, ita A ad B. habent igitur A B inter se proportionem eam,quam numerus quadratus ad quadratum numerum: ideoq; AB similes plani sunt. & est B quadratus. ergo & A quadratus est. quod non ponitur. non igitur C quadratus erit. similiter ostendemus neque alium ullum quadratum esse,præter tertium ab vnitate, & vnum intermittentes omnes. sed non sit A cubus. Dico neque alium vllum cubum esse, præter quartũ ab vnitate, & duos intermittentes omnes. si enim fieri potest, sit D cubus.est autem & cubus C; quartus enim est ab vnitate. & vt C ad D, ita est B ad C.ergo & B ad C proportionem habet,quam cubus ad cubum; ac propterea B C similes solidi sunt. atque est C cubus. ergo & B cubus erit. & quoniam est vt unitas ad numerum A, ita A ad B; unitas autem numerum A metitur per unitates,quæ sunt in ipso: & A metietur B per vnitates, quæ in ipso sunt.

16.octaui. A

27.octaui. B

ſunt. quare A ſe ipſum multiplicans cubum B fecit. ſi autẽ numerus ſe ipſum mul-
6.huius. tiplicans cubum faciat, & ipſe cubus erit. cubus igitur eſt A. quod non ponitur. ergo neque D eſt cubus. ſimiliter demonſtrabimus neque alium vllũ cubũ eſſe, præter quartũ ab vnitate, & duos intermittentes omnes. quod demõſtrare oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

A Ideoq; A B ſimiles plani ſunt. & eſt B quadratus; ergo & A quadratus erit] *quo-*
18.octaui: *niam enim A B ſimiles plani ſunt, inter eos unus medius proportionalis cadit. ſunt igitur tres nu-*
22 octaui. *meri deinceps proportionales; eſtq; primus quadratus. ergo & tertius quadratus erit.*

B Ac propterea B C ſimiles ſolidi ſunt; atque eſt C cubus; ergo & B cubus erit] *quo-*
19.octaui. *niam enim ſimiles ſolidi ſunt, inter eos cadent duo medij proportionales; & quattuor numeri dein-*
23.octaui. *ceps proportionales erunt. Quòd cum primus ſit cubus, & quartus cubus ſit neceſſe eſt.*

THEOREMA XI. PROPOSITIO. XI.

Si ab vnitate quotcũque numeri deinceps proportionales fuerint, minor maiorem metitur per aliquem eorum, qui ſunt in numeris proportionalibus.

Sint ab vnitate A quotcumque numeri deinceps proportionales B C D E. Dico horum B C D E minorem numerum B maiorem E metiri per aliquem ipſorum C D. Qm̃ enim eſt vt A vnitas ad B, ita D ad E; A vnitas nume-
15. ſeptimi. rũ B æqualiter metitur, atque D ipſum E. quare permutãdo A vnitas numerum æqualiter D metitur, atque B ipſum E. ſed A vnitas metitur D per eas, quę ſunt in ipſo D vnitates. ergo & B metitur E per vnitates, quæ ſunt in D. minor igitur B maiorem E metitur per aliquem eorũ, qui ſunt in numeris proportionalibus. quod demonſtrare oportebat.



THEOREMA XII. PROPOSITIO XII.

Si ab vnitate quotlibet numeri deinceps proportionales fuerint, quicumque primorum numerorum metiuntur ultimum, ijdẽ & eum, qui unitati proximus eſt, metientur.

Sint ab vnitate quotlibet numeri deinceps proportionales A B C D. Dico quicumque primorum numerorum metiuntur D; eoſdem & ipſũ A metiri. metiatur enim aliquis primus numerus E ipſum D. Dico E ipſum quoque A metiri. Non enim metiatur E ipſum A, atq; E eſt primus.
31.ſeptimi. omnis autem primus numerus ad omnem numerum, quem nõ metitur,
9. com. not. primus eſt. ergo E A numeri inter ſe primi ſunt. et quoniam E metitur ipſum D, metiatur per vnitates, quę



ſunt

ſunt in F. ergo E multiplicans F ipsũ D fecit. Rurſus quoniam A metitur ipſum D per eas, quæ ſunt in C vnitates, A multiplicans C ipſum D fecit. Sed & E multiplicans F fecit D. qui igitur fit ex A C ei, qui fit ex E F eſt æqualis. ergo vt A ad E, ita F ad C. ſuntq; AE primi: primi aũt, & minimi; minimi vero eos, qui eandẽ habẽt proportionem, æqualiter metiuntur, antecedens antecedentem, & conſequens conſequentem. metitur igitur E ipſum C. metiatur per G. ergo E ipſum G multiplicans fecit C. ſed ex antecedente & A multiplicans B ipſum C fecit. qui igitur fit ex A B æqualis eſt ei, qui ex E G. ergo vt A ad E, ita G ad B. & ſunt A E primi. ſed primi, & minimi; minimi vero eos, qui eandem habent proportionem, æqualiter metiuntur, antecedens antecedentem, & conſequens conſequentem. quare & E ipſum B metitur. metiatur per H. multiplicans igitur E ipſum H fecit B. ſed & A ſe ipſum multiplicans fecit B. ergo qui fit ex H E eſt æqualis ei, qui fit ab ipſo A. eſt igitur vt E ad A, ita A ad H. ſuntq; A E primi: ſed primi, & minimi; minimi vero æqualiter metiũtur eos, qui eandem, quam ipſi proportionem habent, maior maiorem, & minor minorem, hoc eſt antecedens antecedentem, & conſequens conſequentem. ergo E metitur ipſum A. ſed & non metitur. quod fieri non poteſt. non igitur A E ſunt inter ſe primi. ergo compoſiti erunt. compoſitos vero primus aliquis numerus metitur. quare ipſos A E metietur aliquis numerus primus. & quoniam E primus ponitur: primum autem non metitur alius numerus prẽter ſe ipſum. metitur igitur E ipſos A E: ideoq; E ipſum A metitur. metitur autem & ipſum D. ergo E ipſos A D metietur. ſimiliter demonſtrabimus quicumque primorum numerorum metiuntur ipſum D, eoſdem & ipſum A metiri. quod demonſtrare oportebat.

19.com.not. A
19. ſeptimi. 23. ſeptimi. 21. ſeptimi. B
19. ſeptimi. 23. ſeptimi. 21. ſeptimi.
20. ſeptimi.
14. diff.

F. C. COMMENTARIVS.

Rurſus quoniam A metitur ipſum D per eas, quæ ſunt in C vnitates] *hoc enim in antecedente demonſtratum fuit.* A

Sed ex antecedente & A multiplicans B ipſum C fecit] *quoniam enim, vt in antecedente demonſtratum eſt, A metitur ipſum C per B; & A multiplicans B fecit C.* B

THEOREMA XIII. PROPOSITIO. XIII.

Si ab vnitate quotcumque numeri deinceps proportionales fuerint; qui vero poſt vnitatem primus ſit: maximum nullus alius metietur prẽter eos, qui ſunt in numeris proportionalibus.



Sint quotcũque numeri ab vnitate deinceps proportionales A B C D, & qui poſt vnitatem, videlicet A ſit primus. Dico maximum D nullum alium numerum metiri, præter ipſos A B C. ſi enim fieri poteſt, metiatur E ipſum D, & non ſit E idem, qui aliquis ipſorum A B C; manifeſtum eſt E primum non eſſe. Si enim primus ſit, & metiatur D, ipſum quoque A metietur primum exiſtentem, cum non ſit idem, qui A. quod fieri non poteſt. non igitur E primus eſt. ergo compoſitus: omnem autem compoſitum numerum primus aliquis numerus metitur. Dico nullum alium primum metiri ipſum E præterquam A. ſi enim alius metitur E, & E metitur D, & ille ipſum D metietur. quare & ipſum A primum exiſtentem, cum non ſit idem, qui A. quod fieri non poteſt. ergo A ipſum E metitur. & quoniam E metitur D, metiatur ipſum per F. non erit F idem, qui aliquis ipſorum A B C. ſi enim eſt idem, metiturq; ipſum D per E; & vnus ipſorũ A B C ipſum D per E metietur. ſed vnus ipſorum

Ex antecedente. 13. diff. 12. com. not. Ex antecedente. 11 huius.

rum A B C metitur D per aliquem ipsorũ A B C. quare & E idem erit, qui vnus ipsorũ A B C. quod non ponitur. non igitur F est idem, qui vnus ipsorum A B C. similiter ostendemus A metiri ipsum F, rursus ostendentes non esse F primum numerũ. si enim est primus, & metitur ipsum D, ipsum quoque A metietur, primum existentem, cum non sit idem, qui A. quod fieri non potest. non igitur F primus est. ergo cõpositus, & eum aliquis primus metietur. Dico nullum alium metiri ipsum F præterquàm A. si enim alius metitur F, & F metitur D; & ille ipsum D metietur. quare & ipsum A, primum existentem, cum non sit idem, qui A. quod fieri non potest. ergo A ipsum F metitur. Et quoniam E metitur D per F, & E multiplicans F ipsum D fecit. Sed & A multiplicans C fecit D. qui igitur fit ex A C est æqualis ei, qui ex EF. ergo vt A ad E, ita est F ad C. sed A metitur E. quare & F ipsum C metietur. metiatur per G. similiter demonstrabimus G non esse eundem, qui vnus ipsorum A B, & A ipsum G metiri. & quoniam F ipsum C metitur per G, multiplicãs F ipsum G fecit C. sed & A multiplicans B ipsum C fecit. ergo qui fit ex A B ei, qui ex F G est æqualis. vt igitur A ad F, ita est G ad B. metitur autem A ipsum F. ergo & G ipsum B metietur. metiatur per H. similiter demonstrabimus H non esse eundẽ, qui A. & quoniam G ipsum B per H metitur, G multiplicans H ipsum B fecit. sed & A se ipsum multiplicans fecit B. qui igitur fit ex HG est æqualis quadrato, qui ex A. ergo vt H ad A, ita A ad G. metitur autẽ A ipsum G. quare & H ipsum A metietur, primum existentem, cùm non sit idem, qui A. quod est absurdum. non igitur aliquis alius metietur ipsum D maximum, præter ipsos A B C. quod demonstrandum fuerat.

Ex antecedenti.



19. septimi.

20. septimi.

THEOREMA. XIIII. PROPOSITIO XIIII.

Si minimum numerum primi numeri metiantur, nullus alius numerus metietur ipsum, præter eos, qui à principio metiebantur.

Minimum enim numerum A primi numeri B C D metiantur. Dico nullum alium primum numerũ metiri ipsum A, præter ipsos B C D. si enim fieri potest, metiatur E ipsum A; & non sit E idem, qui aliquis ipsorum B C D. & quoniã E metitur A, ipsum per F metiatur. ergo E multiplicans F ipsum A fecit. Et metiuntur A primi numeri B C D. si autem duo numeri se se multiplicantes aliquem faciant, & factum ex ipsis metiatur aliquis primus numerus; & vnum eorum, qui à principio positi sunt, metietur. ergo B C D metientur vnum ipsorum E F. ipsum quidem E non metientur; etenim E primus est; & nõ idem qui aliquis ipsorum B C D. ergo ipsum F metientur, qui est minor, quàm A. quod fieri nõ potest. ponitur enim A minimus eorum, quos B C D metiantur. non igitur ipsum A metietur aliquis primus numerus, præter ipsos B C D, quod demonstrare oportebat.



31. septimi.

THEOREMA XV. PROPOSITIO. XV.

Si tres numeri deinceps proportionales fuerint, minimi eorũ

qui

qui eandem, quam ipsi proportionem habeant; duo quilibet cõ positi ad reliquum primi erunt.

Sint tres numeri deinceps proportionales minimi eorum, qui eâdem, quam ipsi proportionem habent A B C. Dico duos quoslibet compositos ad reliquũ primos esse, videlicet A B ad C, & B C ad A, & A C ad B. sumantur enim duo minimi numeri qui eandem, quam ipsi A B C proportionem habeant D E E F. manifestum est D E se ipsum quidem multiplicantem facere A; multiplicantem vero E F facere B; & E F se ipsum multiplicantem facere C. & quoniam D E E F minimi sunt, primi erũt inter se. si autem duo numeri primi inter se fuerint, & vterque simul ad vtrumque primus erit. ergo D F ad vtrumque ipsorum D E E F primus est. Sed & D E ad E F est primus. quare & D F D E ad E F primi sunt: ac propterea qui fit ex F D D E primus est ad E F. si autem duo numeri primi inter se fuerint, qui fit ex vno ipsorum ad reliquum primus erit. ergo qui fit ex F D, D E ad eum, qui fit ex E F est primus. sed qui ex F D D E est qui fit ex D E vnà cum eo, qui ex D E E F. qui igitur ex D E vnà cum eo, qui ex D E E F primus est ad eum, qui ex E F. Sed qui fit ex D E est A; qui vero ex D E E F est B, & qui ex E F est C. ergo A B compositi ad ipsum C primi sunt, similiter ostendemus & B C ad A esse primos. Dico & A C ad B primos esse. Quoniam enim D F ad vtrumque ipsorum D E E F est primus, & qui fit ex D F ad eum, qui ex D E E F primus erit. Sed ei, qui fit ex D F æquales sunt qui ex D E, & E F fiunt vnà cum eo, qui bis fit ex D E E F. qui igitur ex D E, & E F fiunt vnà cum eo, qui bis ex D E E F primi sunt ad eum, qui ex D E E F. ergo & diuidendo qui fiunt ex D E, & E F vnà cum eo, qui semel fit ex D E E F primi sunt ad eum, qui ex D E E F, & rursus diuidendo qui fiunt ex D E, & E F ad eum, qui fit ex D E E F primi sunt. Sed qui fit ex D E est A; qui vero ex D E E F est B; & qui ex E F est C. ergo A C cõpositi ad ipsum B primi erunt. quod demonstrare oportebat.



A — 2. octaui. — 24. septimi. — 30. septimi. — 26. septimi. — 27. septimi. — B — C — D — E — F

F. C. COMMENTARIVS.

A Sumantur enim duo minimi numeri eandem, quam ipsi A B C proportionem habentium] *ex ijs, quae demonstrauimus ad 35 septimi.*

B Sed qui ex F D D E est qui fit ex D E vnà cum eo, qui ex D E E F] *Hoc in lineis demonstratur ab Euclide in secundo libro, propositione tertia. sed quoniam numeri propria habent principia, Barlaam monachus non solum hoc ex illis demonstrauit, sed & quęcumque in secundo libro tradita sunt, quae nos vtpote non aliena hoc loco apponenda censuimus. demonstrat autem hoc theoremate tertio.*

C Quoniam enim D F ad vtrumque ipsorum D E E F est primus, & qui fit ex D F ad eum, qui ex D E E F primus erit] *nam cum D F ad vtrumque ipsorum D E E F sit primus, erit D F primus ad eum, qui ex D E E F ex 26 septimi. quare ex 27 eiusdem & qui fit ex D F ad eum, qui ex D E E F est primus.*

D Sed ei, qui fit ex D F æquales sunt qui ex D E, & E F] *hoc in lineis demonstratur in secundo libro propositione 4. sed in numeris Barlaam demonstrauit theoremate quarto.*

E Ergo & diuidendo qui fiunt ex D E, & E F vnà cum eo, qui semel fit ex D E E F primi sunt ad eum, qui fit ex D E E F.] *si enim non sunt primi, compositi erunt. quare eos aliquis numerus communis mensura metietur. cum igitur is numerus metiatur vtrumque & compositum ex illis metietur, videlicet qui fiunt ex D E, & E F vnà cum eo, qui bis fit ex D E E F. sed & metitur eum, qui fit ex D E E F. ergo qui fiunt ex D E, & E F vnà cum eo, qui bis fit ex D E E F non sunt primi ad eum, qui ex D E E F. atqui primi sunt. quod est absurdum. non igitur sunt compositi. ergo qui fiunt ex D E, & E F vnà cum eo, qui semel fit ex D E E F primi sunt ad eum, qui fit ex D E E F.* — 11. com. not.

F Et

FEt rursus diuidendo qui fiunt ex DE, & EF ad eum, qui fit ex DE, EF primi sunt.

Si enim non sint primi, eodem, quo supra, modo ostendemus eos, qui fiunt ex DE, & EF vnd cum eo, qui fit ex DE EF non esse primos ad eum, qui ex DE EF, quod est absurdum: sunt enim primi, vt demonstratum iam fuit. ergo qui fiunt ex DE & EF ad eum, qui ex DE EF primi sint necesse est.

Barlaam Monachi arithmetica demonstratio eorum, quę Euclides libro secundo in lineis demonstrauit.

THEOREMA I.

Si duobus numeris propositis eorum alter in quotlibet numeros diuidatur, numerus planus, qui fit ex duobus numeris ab initio propositis æqualis erit numeris planis, qui ex numero indiuiso, & singulis partibus numeri diuisi fiunt.



Sint duo numeri AE C; & diuidatur AB in quotlibet numeros AD DE EB. Dico numerum planum, qui fit ex C AB numeris planis, qui fiunt ex C AD, & C DE, & C EB aequalem esse. sit enim numerus planus F, qui fit ex C AB: GH vero, qui fit ex C AD: & HI, qui fit ex C DE: & IK, qui ex C EB. Quoniam igitur AB multiplicans C ipsum F fecit, C
10. com. not. *metitur F per eas, quae sunt in AB vnitates. Eadem ratione C metitur GH per vnitates, quae sunt in AD: & metitur HI per vnitates, quae in DE: & IK per vnitates, quae in EB. ergo C metitur totum GK per vnitates, quae sunt in AB. metiebatur autem & ipsum F per eas, quae sunt in AB vnitates. vterque igitur ipsorum F GK aeque multiplex est*
1. com. not. *numeri C. qui vero eiusdem sunt aeque multiplices, inter se aequales sunt. ergo F ipsi GK est aequalis: atque est F quidem numerus planus, qui fit ex C AE: GK vero compositus ex numeris planis, qui fiunt ex C, & singulis ipsorum AD DE EB. qui igitur fit ex C AB numerus planus aequalis est planis numeris, qui ex C, & singulis ipsorum AD DE EB fiunt. quare si duobus numeris propositis eorum alter in quotlibet numeros diuidatur, numerus planus, qui fit ex duobus numeris ab initio propositis aequalis erit numeris, qui ex numero indiuiso, & singulis partibus numeri diuisi sunt. quod oportebat demonstrare.*

THEOREMA II.

Si numerus in duos numeros diuidatur, duo numeri plani, qui fiunt ex toto, & vtraque parte, inter se cōpositi æquales sunt numero quadrato, qui à toto efficitur.



Numerus enim AB diuidatur in duos numeros AC CB. Dico duos numeros planos, qui fiunt ex BA AC, & AB BC inter se compositos, quadrato, qui fit ex AB, aequales esse. numerus enim AB se ipsum multiplicans faciat D: AC vero multiplicans AB faciat EF: & CB eundem AB multiplicans fa-
10. com. not. *ciat FG. quoniam igitur AC multiplicans AB ipsum EF fecit, AB metitur EF per eas, quae sunt in AC vnitates. Rursus quoniam CB ipsum AB multiplicans fecit FG, AB metitur FG per vnitates, quae sunt in CB. metiebatur autem & EF per vnitates, quae in AC. ergo AB totum EG per vnitates, quae in se ipso sunt metitur. rursus quoniam AB se ipsum multiplicans fecit D, metitur AB ipsum quoque D per vnitates, quae in seipso sunt. ergo AB vtrumque ipsorum D, EG metitur per eas, quae in seipso sunt vni-*
1. com. no. *tates. quotuplex igitur est D ipsius AB, totuplex erit & EG ipsius AB. qui vero eiusdem numeri sunt aeque multiplices inter se aequales sunt. ergo D ipsi EG est aequalis. atque est D quidem numerus quadratus, qui fit ex AB, EG vero numerus compositus ex duobus planis, qui fiunt ex AB BC, & BA AC. quadratus igitur numerus ex AB est aequalis numero composito ex duobus planis, qui ex AB BC, & BA AC fiunt. quare si numerus in duos numeros diuidatur, duo numeri plani, qui fiunt ex toto, & utraque parte inter se compositi aequales sunt numero quadrato, qui à toto efficitur. atque illud est. quod oportebat demonstrare.*

THEO-

THEOREMA III.

Si numerus in duos numeros diuidatur, planus numerus, qui ex toto, & vna parte fit æqualis est plano, qui fit ex partibus vnà cum eo quadrato, qui à prædicta parte efficitur.

Numerus enim AB diuidatur in duos numeros AC CB. Dico planum numerum, qui fit ex AB BC plano, qui ex AC CB vnà cum quadrato, qui fit à CB aequalem esse. numerus enim A B multiplicans B C ipsum D faciat. A C vero multiplicans CB faciat EF: & CB se ipsum multiplicans faciat FG. itaq; quoniam AB ipsum BC multiplicans fecit D, metitur BC ipsum D per vnitates, quae sunt in AB. rursus quoniam AC multiplicans CB fecit EF, CB metitur EF per eas, quae sunt in AC vnitates. rursus quoniam CB seipsum multiplicans fecit FG, CB metitur FG per vnitates, quae in se ipso sunt: metiebatur autem & EF per vnitates, quae sunt in AC. totum igitur EG metitur CB per eas, quae sunt in AB vnitates: metiebatur autem & ipsum D per vnitates, quae in AB. ergo CB vtrumque D, EG aequaliter metitur: ij vero, quos idem numerus aequaliter metitur, inter se aequales sunt. quare D est aequalis ipsi FG. atque est D quidem planus numerus, qui fit ex AB BC: E G vero, qui ex AC CB vnà cum quadrato, qui à CB. ergo planus numerus, qui fit ex AB BC est aequalis ei, qui ex AC CB, & quadrato, qui à CB. si igitur numerus in duos numeros diuidatur, planus numerus, qui ex toto, & vna parte fit aequalis est plano, qui fit ex partibus vnà cum eo quadrato, qui à predicta parte efficitur. quod oportebat demonstrare.



10.com.not.

4.com. not.

THEOREMA IIII.

Si numerus diuidatur in duos numeros, qui à toto fit quadratus æqualis est quadratis, qui à partibus fiũt, & ei, qui bis ex dictis partibus fit numero plano.

Numerus enim AB diuidatur in duos numeros AC CB. Dico quadratum, qui fit ex AB quadratis, qui ex AC CB, & numero plano, qui bis ex AC CB fit, aequalem esse. sit enim D quadratus numerus, qui fit ex AB: EF vero quadratus, qui ex AC, & G H quadratus, qui ex C B: numerus autem planus, qui fit ex AC CB uterque ipsorum FG HK. quoniam igitur AC se ipsum multiplicans fecit EF, metitur AC numerum EF per vnitates, quae in se ipso sũt. rursus quoniam BC multiplicans CA fecit FC, metitur C A ipsum FG per vnitates, quae sunt in B C. metiebatur autem & E F per vnitates, quae in ipso sunt. ergo AC totum EG per vnitates, quae sunt in AB metitur. quare AB multiplicans AC ipsum EG fecit: ideoq; EG est numerus planus, qui fit ex B A A C. similiter ostendemus & G K numerum planum esse, qui fit ex AB BC. atque est D numerus quadratus, qui ex A B efficitur. si autem numerus in duos numeros diuidatur, qui à toto fit quadratus aequalis est duobus numeris planis, qui fiunt ex toto, & vtraque parte. ergo D ipsi E K est aequalis. sed EK constat ex quadratis, qui ex AC CB fiunt, & eo, qui bis ex AC CB numero plano. atque est D quadratus ex AB. quadratus igitur ex AB est aequalis quadratis, qui ex AC CB, & ei, qui bis ex AC, CB fit, numero plano. Ergo si numerus diuidatur in duos numeros, qui à toto fit quadratus aequalis est quadratis, qui ex partibus fiunt, & ei, qui bis ex dictis partibus fit numero plano. quod demonstrare oportebat.



10.com.not.

9.com.inot:

Ex 1.huius:

THEOREMA V.

Si par numerus bifariam diuidatur; diuidatur autem & in numeros inæquales; qui ex inæqualibus partibus fit numerus planus vnà cum quadrato numeri interiecti æqualis est ei, qui ex dimidio fit quadrato.

Sit par numerus AB: & bifariam in AC CB diuidatur: diuidatur autem in partes inæquales AD DB. Dico quadratum ex C B numero plano, qui



fit ex

fit ex AD DB unà cum quadrato, qui ex C D aequalem esse. sit enim E quadratus ex CB: numerus vero planus FG, qui fit ex AD DB. & ex DC quadratus sit GH. itaq; quoniam numerus B C diuiditur in duos numeros BD DC, erit quadratus ex B C, hoc est E aequalis quadratis ex BD DC unà cum eo; qui bis fit ex BD DC numero plano. sit igitur ex B D quidem quadratus K L, ex D C vero quadratus N X: & planus ex BD DC uterque ipsorum LM MN: totus igitur KX ipsi E est aequalis. et quoniam BD se ipsum multiplicans fecit KL, metitur BD ipsum KL per unitates, quae in se ipso sunt. rursus quoniam C D ipsum D B multiplicãs fecit L M; D B metitur L M per unitates, quae sunt in CD. metiebatur autem KL per eas, quae in se ipso sunt unitates. ergo D B totum K M metitur per unitates, quę sunt in C B. aequalis autem est C B ipsi C A. quare D B metitur K M per unitates, quae sunt in C A. rursus quoniam CD multiplicans DB fecit MN, DB metitur MN per eas, quae sunt in CD unitates. metiebatur autem & KM per unitates, quae sunt in AC. ergo DB totum KN per unitates, quae sunt in AD, metitur. sed & DB metitur FG per unitates, quae sunt in AD: ponitur enim F G, qui fit ex AD DB. aequalis igitur est F G ipsi KN. qui enim sunt eiusdem aeque multiplices inter se aequales sunt. est autem et GH aequalis NX, cum uterque quadratus ex CD ponatur. totus igitur KX toti FH est aequalis; estq; ipsi E aequalis KX. Ergo FH ipsi E aequalis erit. atque est F H quidem numerus planus ex AD D B unà cum quadrato, qui fit ex D C: E vero est qui fit ex C B quadratus. numerus igitur planus, qui fit ex AD DB unà cum quadrato ex DC aequalis est ei, qui fit ex CB quadrato. ergo si par numerus bifariam diuidatur; diuidatur autem & in numeros inaequales; qui ex inaequalibus partibus fit numerus planus unà cum quadrato numeri interiecti aequalis est ei, qui ex dimidio fit quadrato. quod oportebat demonstrare.

Ex antecedente.

10.com.not.

1.cõm not.



THEOREMA VI.

Si par numerus bifariam diuidatur, adijciaturq; ipsi numerus aliquis, qui fit ex toto cum adiecto, & adiecto planus numerus unà cum quadrato dimidij est aequalis quadrato eius, qui ex dimidio, & adiecto constat.

Par enim numerus AB diuidatur bifariam in numeros A C C B: & ipsi alius numerus BD adijciatur. Dico numerum planum qui fit ex AD DB unà cum quadrato ex CB aequalem esse ei, qui fit ex CD quadrato. Sit enim E quadratus ex CD: numerus autem planus, qui fit ex AD DB sit FG: & ex CB quadratus GH. & quoniam quadratus ex CD est aequalis quadratis ex DB BC unà cũ eo, qui bis fit ex DB BC; sit quadratus quidem ex BD numerus KL: planus vero numerus ex DB BC sit uterque ipsorum LM MN: & ex BC quadratus NX. totus igitur KX est aequalis quadrato ex CD: est autẽ E, qui fit ex CD quadratus. ergo KX ipsi E est aequalis. & quoniam BD se ipsum multiplicans fecit K L, B D metitur KL per unitates, quae in se ipso sunt. metitur autem & LM per unitates, quę sunt in CB. ergo DB metitur totum KM per eas, quae sunt in CD unitates. est autem CB ipsi C A aequalis, ut ponitur. quare DB totum KN metitur per unitates, quae sunt in AD. sed DB metitur quoque ipsum F G per unitates, quae sunt in AD; ponitur enim FG, qui fit ex AD DB. ergo FG ipsi KN est aequalis. est autem & HG aequalis NX. uterque enim est quadratus, qui fit ex CB. totus igitur FH est aequalis toti KX. sed KX ostensus est aequalis ipsi E. ergo & FH ipsi E est aequalis. atque est FH quidem planus numerus, qui fit ex AD DB unà cum quadrato, qui ex CB; E vero est quadratus, qui fit ex CD. qui igitur fit ex AD DB unà cum quadrato, qui ex CB est aequalis ei, qui fit ex C D quadrato. Ergo si par numerus bifariam diuidatur, adijciaturq; ipsi numerus aliquis, qui fit ex toto cum adiecto, & adiecto planus numerus unà cum quadrato dimidij est aequalis quadrato eius, qui ex dimidio, & adiecto constat. quod oportebat demonstrare.

4.antecedentium.

10 com.not.



THEO-

THEOREMA VII.

Si numerus in duos numeros diuidatur, qui à toto fit quadratus vnà cum quadrato vnius partis æqualis est numero plano, qui bis fit ex toto, & dicta parte vnà cum reliquæ partis quadrato.

Numerus enim AB diuidatur in numeros AC CB. Dico quadratos, qui fiunt ex BA AC aequales esse numero plano, qui bis fit ex BA AC vnà cum ipsius BC quadrato. Quoniam enim quadratus, qui ex AB, est aequalis quadratis, qui ex BC CA, & ei, qui bis fit ex EC CA numero plano. communis apponatur quadratus ex AC. quadratus igitur ex BA vnà cum quadrato ex AC est aequalis duobus quadratis, qui ex AC, & quadrato ex CB vnà cum eo, qui bis fit ex BC CA plano. et quoniam qui semel fit ex BA AC est aequalis ei, qui semel fit ex BC CA vnà cum ipsius CA quadrato; qui bis fit ex BA AC aequalis erit ei, qui bis fit ex BC CA vnà cum duobus quadratis ipsius CA. communis apponatur quadratus, qui ex BC. Duo igitur quadrati ex AC, & quadratus vnus ex CB vnà cum eo, qui bis fit ex BC CA aequales sunt ei, qui bis fit ex BA AC vnà cum ipsius CB quadrato. quadratus igitur ex AB vnà cum quadrato ex AC aequalis est ei, qui bis fit ex BA AC vnà cum quadrato reliquae partis CB. ergo si numerus in duos numeros diuidatur, qui à toto fit quadratus vnà cum quadrato vnius partis aequalis est numero plano, qui bis fit ex toto, & dicta parte vnà cum reliquae partis quadrato. quod oportebat demonstrare.

B 3 C 5 A — 4 antecedentium. — 3 antecedentium.

THEOREMA VIII.

Si numerus in duos numeros diuidatur, qui quater ex toto & vna parte fit numerus planus vnà cum quadrato reliquæ partis æqualis est quadrato, qui à toto, & dicta parte, tamquam ab vno efficitur.

Numerus enim AB diuidatur in duos numeros AC CB. Dico numerum planum, qui quater fit ex AB BC vnà cum quadrato ipsius AC aequalem esse ei, qui ex AB BC tamquam ex vno fit quadrato. ponatur enim ipsi BC aequalis BD. & quoniam quadratus ex AD aequalis est quadratis, qui ex AB BD, & ei, qui bis fit ex AB BD numero plano. atque est BD aequalis BC. ergo qui fit ex AD quadratus aequalis est quadratis, qui ex AB BC, & ei, qui bis fit ex AB EC numero plano. sed quadrati, qui ex AB BC aequales sunt numero plano, qui bis fit ex AB BC vnà cum ipsius AC quadrato. est igitur qui fit ex AD quadratus aequalis ei, qui quater fit ex AB BC, & quadrato ex AC. atque est quadratus ex AD, qui ex AB, & BC, tamquam ex vno efficitur: etenim BD ipsi EC est aequalis. ergo quadratus, qui ex AB BC fit tamquam ex vno est aequalis ei, qui quater fit ex AB BC, & ipsius AC quadrato. si igitur numerus in duos numeros diuidatur, qui quater ex toto, & vna parte fit numerus planus vnà cum quadrato reliquę partis aequalis est quadrato, qui à toto, & dicta parte tamquam ab vno efficitur. quod demonstrare oportebat.

D 2 B 2 C 6 A — Ex antecedente.

THEOREMA IX.

Si par numerus bifariam diuidatur; diuidatur autem & in numeros inæquales, quadrati, qui ab inæqualibus numeris fiunt, dupli sunt eius quadrati, qui fit à dimidio, vnà cum quadrato numeri inter ipsos interiecti.

Par enim numerus AB bifariam diuidatur in numeros AC CB: diuidatur etiam in numeros inæquales AD DB. Dico quadratos, qui fiunt ex AD DB quadratorum, qui ex AC CD duplos esse. Quoniam enim par numerus AB in numeros aequales diuiditur AC CB: & in numeros inaequales AD DB: qui fit ex AD DB vnà cũ quadrato ex CD aequalis est ei, qui fit ex AC quadrato. qui igitur bis fit ex AD DB vnà cùm duobus ex CD quadratis duplus est eius quadrati, qui fit ex AC. Quoniam igitur AB bifariam diuiditur in numeros AC CB, quadratus, qui fit ex AB quadruplus erit eius, qui ex AC quadrati. & quoniam qui bis fit ex AD DB vnà cum duobus quadratis ex CD duplus est quadrati, qui ex AC. si autem sint duo numeri, quorum alter eiusdem quadruplus sit, alter vero duplus, qui quadruplus est dupli est duplus,

B 2 D 3 C 5 A — 5. antecedentium.

plus; erit quadratus ex AB duplus eius, qui bis fit ex AD DB vnà cũ duobus qui ex CD quadratis. qui igitur bis fit ex AD DB minor eſt, quàm dimidius quadrati ex AB, duplo quadrati ex CD. rurſus quoniam qui bis fit ex AD DB vnà cum numero compoſito ex quadratis AD DB aequalis eſt ei, qui fit ex AB quadrato: erit compoſitus ex AD DB quadratis maior, quàm dimidius quadrati ex AB, duplo quadrati ex CD. atque eſt quadratus ex AB quadrati ex AC quadruplus. compoſitus igitur ex quadratis AD DB maior eſt, quàm duplus quadrati ex AC, duplo quadrati ex DC. ergo duplus eſt quadratorum, qui ex AC CD fiunt. ſi igitur par numerus bifariam diuidatur, diuidatur autem & in numeros inaequales; quadrati, qui ab inaequalibus numeris fiunt, dupli ſunt eius quadrati, qui fit à dimidio vnà cum quadrato numeri inter ipſos interiecti. quod demonſtrare oportebat.

4. antecedentium.



F. C. COMMENTARIVS.

Precedens demonſtratio obſcuriuſcula eſt, quare apertius hoc modo explicabitur. Quoniam enim numerus AD diuiditur in numeros AC CD, erit ex quarta huius quadratus, qui fit ex AD, aequalis quadratis ex AC CD vnà cum numero plano, qui bis fit ex AC CD. & cum numerus CB ſit aequalis ipſi AC, quadratus ex AD aequalis erit quadratis ex BC CD vnà cum eo, qui bis fit ex BC CD. addatur communis quadratus ex DB. quadrati igitur ex AD DB aequales ſunt quadratis ex BC CD DB vnà cum eo, qui bis fit ex BC CD. ſed quadrati ex BC CD ex 7. antecedentium ſunt aequales ei, qui bis fit ex BC CD vnà cum quadrato DB. ergo quadrati ex AD DB aequales ſunt duplis quadratorum ex BC CD, hoc eſt duplis quadratorum ex AC CD: ac propterea quadrati, ex AD DB quadratorum ex AC CD dupli erunt. quod demonſtrare oportebat.



THEOREMA X.

Si par numerus bifariam diuidatur, adijciaturq; ipſi alter numerus; qui fit ex toto cum adiecto, & qui ex adiecto vtrique quadrati dupli ſunt quadrati ex dimidio, & quadrati, qui ex dimidio, & adiecto, tamquam ex vno efficitur.

Sit enim par numerus AB, & in numeros AC CB bifariam diuidatur, adijciaturq; ipſi alter numerus BD. Dico quadratos ex AD DB quadratorum ex AC CD duplos eſſe. Quoniam enim numerus AD diuiditur in numeros AB ED, erunt quadrati ex AD DB aequales numero plano, qui bis fit ex AD DB vnà cum quadrato ex AB. quadratus autem ex AB eſt aequalis quattuor quadratis, qui fiunt ex AC CB; eſt enim AC ipſi CB aequalis. quadrati igitur ex AD DB ſũt aequales ei qui bis fit ex AD DB, & quattuor quadratis ex AC CB. & quoniam qui fit ex AD DB vnà cũ quadrato ex CB eſt aequalis quadrato ex CD: erit qui bis fit ex AD DB vnà cum duobus ex CB quadratis aequalis duobus quadratis, qui ex CD fiunt. ergo quadrati ex AD DB aequales ſunt duobus quadratis ex CD, & duobus quadratis ex AC. dupli igitur ſunt quadratorũ ex AC CD. atque eſt quadratus quidẽ ex AD, qui fit ex toto cũ adiecto; quadratus uero ex DB, qui fit ex adiecto, & quadratus ex CD, qui ex dimidio, & adiecto. quadratus igitur, qui fit ex toto cũ adiecto vnà cũ eo, qui ex adiecto, duplus eſt quadrati, qui fit ex dimidio vnà cũ quadrato eius, qui ex dimidio, & adiecto cõſtat. quare ſi par numerus bifariã diuidatur, adijciaturq; ipſi alter numerus; qui fit ex toto cum adiecto, & qui ex adiecto vtriq; quadrati dupli ſunt quadrati ex dimidio, & quadrati, qui ex dimidio, & adiecto, tamquam ex vno efficitur. quod demonſtrare oportebat.

9. antecedentium.



6. antecedentium.

F. C. COMMENTARIVS.

Illud autem, quod vndecimę ſecundi libri reſpondet, nempe numerum ita diuidere, vt qui ex toto, & altera parte fit numerus planus, æqualis ſit ei, qui à reliqua parte fit quadrato, nullo modo fieri poteſt.

Si enim fieri poſſit, diuidatur numerus AB in numeros AC CB. vt qui ex AB BC fit numerus

rus planus aequalis ſit quadrato ex AC. qui igitur quater ſit ex AB BC quadrati ex AC quadruplus eſt. ergo qui quater ſit ex AB BC vnà cum quadrato ex AC quintuplus eſt ipſius quadrati ex AC. ſed qui quater ſit ex AB BC vnà cum quadrato ex AC numerus quadratus eſt;



etenim aequalis eſt quadrato, qui à toto AB, et à parte BC tamquam ab vno efficitur ex octauo propoſitorum. eſt autem & qui fit AC quadratus. duo igitur quadrati numeri inter ſe proportionem habent, quam quinque ad vnum. quod fieri non poteſt. Ergo numerus non diuiditur ita, vt qui à toto, & altera parte ſit numerus planus aequalis ſit ei, qui à reliqua parte ſit, quadrato. quod demonſtrare oportebat.

THEOREMA XVI. PROPOSITIO. XVI.

Si duo numeri primi inter ſe fuerint, non erit vt primus ad ſecũdum, ita ſecundus ad alium vllum.

Duo enim numeri AB primi inter ſe ſint. Dico non eſſe ut A ad B, ita B ad alium vllum. ſi enim fieri poteſt, ſit vt A ad B, ita B ad C. & ſunt AB primi, ſed primi, & minimi, minimi vero eos, qui eandem habent proportionem, æqualiter metiuntur, antecedens antecedentem, & conſequens conſequentem. metitur igitur A ipſum B, vt antecedens antecedentem. ſed & ipſe ſe ipſum metitur. ergo A metitur ipſos AB primos inter ſe exiſtentes. quod eſt abſurdum. non igitur eſt vt A ad B, ita B ad C. quod oportebat demonſtrare.



23. ſeptimi.
21. ſeptimi.

THEOREMA XVII. PROPOSITIO XVII.

Si fuerint quotcumque numeri deinceps proportionales, extremi autem ipſorum primi inter ſe ſint, non erit vt primus ad ſecundum, ita vltimus ad alium vllum.

Sint quotcumque numeri deinceps proportionales A B C D, extremi autem ipſorum A D primi ſint inter ſe. Dico non eſſe vt A ad B, ita D ad alium vllum. ſi enim fieri poteſt, ſit vt A ad B, ita D ad E. quare permutando, vt A ad D, ita erit B ad E. & ſunt A D primi; ſed primi, & minimi; minimi vero eos, qui eandem habent proportionem, æqualiter metiuntur, antecedens antecedentem, & conſequens conſequentem. metitur igitur A ipſum B. atque eſt vt A ad B, ita B ad C. ergo & B metitur ipſum C; & ob id A quoque ipſum C metitur. & quoniam eſt vt B ad C, ita C ad D; metitur autem B ipſum C, & C: ipſum D metietur. Sed A metitur C. quare & ipſum D. metitur autem & ſe ipſum. Ergo A ipſos A D primos inter ſe exiſtentes metitur. quod fieri non poteſt. non igitur erit vt A ad B, ita D ad alium vllum. quod demonſtrare oportebat.



23. ſeptimi.
21. ſeptimi.
2. 6ſm. nos.

PROBLEMA I. PROPOSITIO. XVIII.

Duobus numeris datis conſiderare an tertius ipſis proportionalis inueniri poſsit.

Sint dati duo numeri A B; & oporteat conſiderare an poſſit tertius ipſis proportionalis inueniri. Itaque A B vel primi inter ſe ſunt, vel non primi. ſi quidem primi, iam oſtenſum eſt, fieri non poſſe, vt tertius ipſis proportionalis inueniatur. Sed non ſint A B inter ſe primi, & B ſe ipſum multiplicans faciat C. vel igitur A metitur C, vel non metitur. metiatur primum per D. ergo A multiplicans D ipſum C fecit. ſed & B ſe ipſum multiplicans fecit C. qui igitur fit ex A D eſt æqualis ei, qui ex B. ergo vt A ad B, ita B ad D; ac propterea ipſis A B tertius proportionalis D inuentus eſt.



Sed non metiatur A ipſum C. Dico fieri non poſſe, vt ipſis A B tertius proportionalis inueniatur. Si enim fieri poteſt, inuentus ſit D. ergo qui fit ex A D aequalis eſt ei, qui fit ex B. ſed qui fit ex B eſt C. qui igitur fit ex A D ipſi C eſt æqualis. ergo A ipſum D multiplicans fecit C. & ob id A ipſum C per D metitur. ſed & non metiri poſitum eſt, quod eſt abſurdum. non igitur fieri poteſt, vt ipſis A B tertius inueniatur proportionalis, quando A ipſum C non metitur. quod demonſtrare oportebat.



PROBLEMA II. PROPOSITIO XIX.

Tribus numeris datis conſiderare an quartus ipſis proportionalis inueniri poſſit.

Sint dati tres numeri A B C, & oporteat conſiderare an poſſit ipſis quartus proportionalis inueniri. ergo ipſi A B C vel deinceps ſunt proportionales, & eorum extremi primi inter ſe ſunt, vel non deinceps proportionales, & eorũ extremi ſunt primi inter ſe, vel proportionales quidẽ deinceps, non autem extremi ipſorum inter ſe primi, uel neque proportionales deinceps, neque eorum extremi primi inter ſe ſunt. ſi quidem igitur A B C deinceps ſunt proportionales, & eorum extremi A C primi inter ſe, iam demonſtratum eſt fieri non poſſe, vt quartus ipſis proportionalis inueniatur. ſi vero non ſunt deinceps proportionales, & extremi ipſorum ſunt primi. Dico quartum proportionalem inueniri non poſſe. ſi enim inueniri poteſt ſit D. vt igitur A ad B, ita C ad D: & vt B ad C, ita ſit D ad E. ergo ex æquali vt A ad C, ita C ad E: ſed ſunt A C primi; primi autem, & minimi; minimi vero eos, qui eandem proportionem habent, æqualiter metiuntur, antecedens antecedentem, & conſequens conſequentem. ergo A ipſum C metitur, antecedens antecedentem. metitur autem & ſe ipſum. quare A ipſos A C primos inter ſe exiſtentes metitur. quod fieri non poteſt. ipſis igitur A B C non poteſt quartus proportionalis inueniri.



17 huius.

23. septimi.

21. ſeptimi.



Rurſus A B C proportionales quidem ſint deinceps, nõ autem extremi eorum primi. Dico quartum proportionalem inueniri poſſe. multiplicans enim B ipſum C faciat D. itaque vel A metitur ipſum D, vel non metitur. metiatur primum per E. ergo A multiplicans E fecit D. ſed & B multiplicãs C ipſum D fecit. qui igitur fit eſt A E eſt æqualis ei, qui ex B C; proptereaq; vt A ad B, ita eſt C ad E. ipſis igitur A B C quartus proportionalis E inuentus eſt.

9. com. not.

19. ſeptimi.

Sed

Sed non metiatur A ipſum D. Dico fieri non poſſe, vt ipſis ABC inueniatur quartus proportionalis. ſi enim inueniri poteſt, inueniatur, ſitq; E. ergo qui fit ex A E eſt æqualis ei, qui ex BC. ſed qui fit ex BC eſt D. quare qui fit ex A E ipſi D eſt æqualis: & ob id A ipſum E multiplicans fecit D. metitur igitur A ipſum D per E. quare A ipſum D metitur. ſed & nõ metitur. quod eſt abſurdum. non igitur fieri poteſt, vt ipſis ABC inueniatur quartus proportionalis, quando A ipſum D non metitur.



Sed non ſint neque deinceps proportionales A B C, neque A C inter ſe primi, & B ipſum C multiplicans faciat D. ſimiliter demonſtrabimus, ſi A ipſum D metiatur, inueniri poſſe quartum proportionalem. ſin minus, inueniri nõ poſſe. quod demonſtrandum fuerat.

THEOREMA XVIII. PROPOSITIO XX.

Primi numeri plures ſunt, omni propoſita multitudine primorum numerorum.

Sint propoſiti primi numeri A B C. Dico ipſis A B C plures eſſe primos numeros. ſumatur enim minimus, quem ipſi A B C metiantur; ſitq; DE: & ipſi DE apponatur vnitas DF. ergo E F vel primus eſt, vel non. ſit primum primus. Inuenti igitur ſunt primi numeri A B C EF plures, quàm ipſi A B C. ſed non ſit EF primus. ergo eum primus aliquis metitur. metiatur G. Dico G nulli ipſorum A B C eundem eſſe. ſi enim G idem ſit, qui vnus ipſorũ A B C; ipſi autem A B C metiantur DE; & G ipſum DE metietur. metitur autem & EF. & reliquam igitur DF vnitatem mẽtietur numerus exiſtens. quod eſt abſurdum. ergo G non eſt idem, qui unus ipſorum A B C, & ponitur primus. Inuenti igitur ſunt primi numeri A B C G plures propoſita multitudine primorum numerorum A B C. quod oportebat demonſtrare.



SCHOLIVM.

In hoc theoremate vult oſtendere infinitos eſſe numeros primos; ſi enim omni propoſita numerorum multitudine primi plures ſint, infinitos eſſe primos manifeſtum eſt. ſi autem hoc, videtur obſiſtere philoſophorum dogmati, qui aſſerunt prima determinata eſſe, & numero minora.

quid igitur dicemus? primos numeros non esse principium numerorum, sed vnitatem ipsam, quæ & contracta est & sola. quare & in numeris hoc seruatur, principium non esse infinitum, sed determinatum.

THEOREMA XIX. PROPOSITIO XXI.

Si pares numeri quotcumque componantur, totus par erit.

Componantur enim pares numeri quotcumque AB BC CD DE. Dico totum AE parem esse. Quoniam enim vnusquisque ipsorum AB BC CD DE par est, habet partem dimidiam. quare & totus AE partem dimidiam habebit. par autem numerus est, qui bifariam diuiditur. ergo AE par est. quod demonstrare oportebat.



* 6. diffi.

F. C. COMMENTARIVS.

* Quare & totus AE partem dimidiam habebit.]
Quoniam enim vnusquisque eorum habet dimidium, sit ipsius AB dimidia AF, & ipsius BC dimidia BG, & ipsius CD dimidia CH, denique ipsius DE dimidia DK. vt igitur AB ad eius dimidiam AF, ita & vnusquisque reliquorum ad eius dimidiam. quare vt AB ad AF, ita & omnes AE ad omnes AF BG CH DK. sed AF dimidia est ipsius AB. ergo & AF BG CH DK sunt dimidia totius AE. cum igitur AE dimidiam habeat bifariam diuidetur. ideoq; etiam par erit.

12. septimi.

THEOREMA XX. PROPOSITIO XXII.

Si impares numeri quotcumque componantur, multitudo autem ipsorum sit par; totus par erit.

Componantur enim impares numeri quotcumque multitudine pares AB BC CD DE. Dico totum AE parem esse. Quoniam enim vnusquisque ipsorum AB BC CD DE impar est, detracta ab vno quoque vnitate, erit vnusquisque reliquorum par. quare & compositus ex ipsis par erit. est autem par & vnitatum multitudo. & totus igitur AE par est. quod oportebat demonstrare.

Ex antecedente.

THEOREMA XXI. PROPOSITIO. XXIII.

Si impares numeri quotcumque componãtur, & multitudo ipsorum sit impar, & totus impar erit.

Componantur enim numeri impares quotcumque, quorum multitudo sit impar AB BC CD. Dico & totum AD imparem esse. auferatur ab ipso CD vnitas DE. reliquus igitur AE par est. est autẽ & AC par. ergo & totus AE par erit. atque est DE vnitas. impar igitur AD. quod oportebat demonstrare.

21. huius.

F. C. COMMENTARIVS.

7. diffi. Atque est DE vnitas. impar igitur est AD] *impar enim numerus est, qui à pari vnitate differt.*

THEO-

THEOREMA XXII. PROPOSITIO. XXIIII.

Si à pari numero par auferatur, & reliquus par erit.

A pari enim numero AB par auferatur BC. Dico & reliquum CA parem esse. Quoniam enim AB par est, habet partem dimidiam. Eadem ratione & B C. quare & reliquus AC partem habet dimidiam. par igitur est AC. quod oportebat demonstrare.



F. C. COMMENTARIVS.

Quare & reliquus AC partem habet dimidiam] *Sit ipsius ab dimidia BD, & ipsius CB dimidia BE, erit AB ad BD, vt CB ad BE. & permutando AB ad BC, vt DB ad BE. & dividendo AC ad CB, vt DE ad EB. rursusq́, permutando AC ad DE, vt CB ad BE. sed BE est dimidia ipsius CB. ergo & DE ipsius AC dimidia erit. cum igitur AC partē habeat dimidiam bifariā diuiditur, ac propterea par est. quod demonstrandū proponebatur.*

THEOREMA XXIII. PROPOSITIO XXV.

Si pari numero impar auferatur, & reliquus impar erit.

A pari enim numero AB impar BC auferatur. Dico & reliquum CA imparem esse. auferatur ab ipso BC vnitas CD. ergo DB par est. est autem par & AB. & reliquus igitur AD est par. atque est CD vnitas. ergo CA impar est. quod demõstrare oportebat.



Ex antecedente.

THEOREMA. XXIIII. PROPOSITIO XXVI.

Si ab impari numero impar auferatur, & reliquus par erit.

Ab impari enim numero AB impar BC auferatur. Dico reliquum CA parem esse. Quoniam enim AB impar est, auferatur vnitas BD. reliquus igitur AD est par. Eadem ratione & CD est par. quare & reliquus AC par est. quod oportebat demonstrare.



24. huius.

THEOREMA XXV. PROPOSITIO. XXVII.

Si ab impari numero par auferatur, reliquus impar erit.

Ab impari enim numero AB par auferatur BC. Dico reliquum CA imparem esse. auferatur enim vnitas AD. ergo DB par est. est autem par & BC. & reliquus igitur CD est par. atque est D A vnitas. ergo C A impar est. quod oportebat demonstrare.



24. huius.

THEOREMA XXVI. PROPOSITIO. XXVIII.

Si impar numerus parem multiplicans faciat aliquem, factus par erit.

Impar enim numerus A parem numerum B multiplicans faciat C. Dico C parem esse. Quoniam enim A multiplicans B ipsum C fecit, componitur C ex tot numeris æqualibus ipsi B, quot vnitates sunt in A. atque est B par. ergo C ex paribus numeris componitur. si autem pares numeri quotcumque compouantur totus par erit. ergo C est par. quod demonstrare oportebat.



21. huius.

THEO-

THEOREMA XXVII. PROPOSITIO XXIX.

Si impar numerus imparem numerum multiplicans faciat aliquem, factus impar erit.

Impar enim numerus A numerum imparem B multiplicans faciat C. Dico C imparem esse. Quoniam enim A multiplicans B ipsum C fecit, componitur C ex tot numeris æqualibus ipsi B, quot sunt in A vnitates. atque est vterque ipsorum A B impar. ergo C ex imparibus numeris componitur, quorum multitudo est impar. qui autem componitur ex imparibus numeris, quorum multitudo impar, & ipse impar erit. ergo C est impar. quod demonstrare oportebat.



23. huius.

THEOREMA XXVIII. PROPOSITIO XXX

Si impar numerus parem numernm metiatur, & dimidium eius metietur.

Impar enim numerus A parem numerum B metiatur. Dico & dimidium eius metiri. Quoniam enim A metitur B, metiatur ipsũ per C. Dico C non esse imparem. nam si fieri potest, sit impar. & quoniam A ipsum B mẽtitur per C, A multiplicans ipsum C fecit B. ergo B componitur ex imparibus numeris, quorum multitudo est impar; ac propterea impar est. quod est absurdum. par enim ponitur. non igitur C est impar. ergo par. quare A ipsum B pariter metitur. & ob id eius quoque dimidium metitur. quod oportebat demonstrare.



9. com. not.

SCHOLIVM.

Et ob id eius quoque dimidium metitur] *quoniam enim A ipsum B metitur per C, & C ipsum B per A metietur. habet autem vterque ipsorum CB partem dimidiam. quare vt C ad B, ita erit dimidium ad dimidium. sed C metitur ipsum B per A. ergo & ipsius C dimidium dimidium ipsius B per A metietur; ideoq; A multiplicans ipsius C dimidium, dimidium ipsius B fecit. quare A ipsius B dimidium per dimidium ipsius C metitur.*

9. com. not.

10. com. not.

THEOREMA XXIX. PROPOSITIO XXXI.

Si impar numerus ad aliquem numerum sit primus, & ad ipsius duplum primus erit.

Impar enim numerus A ad aliquem numerũ B sit primus, & sit C ipsius B duplus. Dico A etiam ad C primũ esse. si enim non sint A C primi, eos aliquis numerus metietur. metiatur, sitq; D. & est A impar. impar igitur est & D. & quoniam D impar existens metitur ipsum C, atque est C par; & D ipsius C dimidium metietur. sed ipsius C dimidium est B. ergo D ipsum B metitur, metitur autem & ipsum A. quare D ipsos A B metitur, primos inter se existentes. quod fieri non potest. non igitur A ad C primus non est. ergo A C inter se primi sunt. quod oportebat demonstrare.



Ex antecedente.

SCHOLIVM.

Et est A impar. impar igitur est & D] *quoniam enim A impar est, metitur autem ipsum numerus D, vt positum est & D seipsum metitur, erit D impar. numeros enim impares impar numerus metitur.*

THEO-

THEOREMA XXX. PROPOSITIO XXXII.

Numerorum à binario duplatorum vnuſquiſque pariter par eſt tantum.

A binario enim A duplentur quotlibet numeri BCD. Dico BCD pariter pares eſſe tantum. at vero vnumquem ipſorum BCD pariter parem eſſe, manifeſto conſtat. à binario namque duplatus eſt. Dico & tantum, exponatur enim vnitas E. Quoniã igitur ab vnitate quotlibet numeri deinceps proportionales ſunt, & poſt vnitatem A primus eſt; maximum ipſorum numerorum ABCD, videlicet D, nullus alius metietur præter ipſos ABC. atque eſt vnuſquiſque ipſorum ABC par. ergo D pariter par eſt tãtum. ſimiliter demonſtrabimus & vnumquemque ipſorũ ABC pariter parẽ eſſe tãtũ. quod demõſtrare oportebat.



13. huius.

THEOREMA XXXI. PROPOSITIO. XXXIII.

Si numerus dimidium habeat imparem, pariter impar eſt tantum.

Numerus enim A dimidium imparem habeat. Dico A pariter imparem eſſe tantum, at vero pariter imparem eſſe perſpicuum eſt. dimidius enim ipſius impar exiſtens ipſum pariter metitur. Dico & tantum. nam ſi A ſit etiam pariter par, dimidius ipſius par erit; atque eum par numerus per parẽ numerũ metietur. ergo dimidium ipſius par numerus metitur, impar exiſtens. quod eſt abſurdum. quare A pariter impar eſt tantum.

A 10

THEOREMA XXXII. PROPOSITIO XXXIIII.

Si par numerus neque ſit à binario duplatus, neque dimidium imparem habeat; pariter par eſt, & pariter impar.

Numerus enim A neque ſit A binario duplatus, neque dimidium imparem habeat. Dico A & pariter parem, & pariter imparem eſſe. at vero A pariter eſſe parem, manifeſtum eſt; dimidium enim imparem non habet. Dico etiam pariter imparem eſſe. nam ſi A bifariã ſecemus, & dimidium ipſius bifariam, & hoc ſemper faciamus, tandem incidemus in aliquem imparem, qui ipſum A per numerum parem metietur. ſi enim non, incidemus in binarium, atque erit A à binario duplatus. quod non ponitur. quare A & pariter impar eſt. oſtenſum autem eſt & pariter eſſe parem. eſt igitur A & pariter par, & pariter impar. quod demonſtrare oportebat.

A 24

THEOREMA XXXIII. PROPOSITIO XXXV.

Si ſint quotcumque numeri deinceps proportionales: auferantur autem à ſecundo, & ultimo æquales primo; erit vt ſecundi exceſſus ad primum, ita ultimi exceſſus ad omnes ipſum antecedentes.

Sint

Sint quotcunque numeri deinceps proportionales A BC D EF, incipientes à minimo A: & auferatur ab ipſo BC, & ab EF æqualis ipſi A, videlicet GC FH. Dico vt BG ad A, ita eſſe EH ad A BC D; ponatur enim ipſi quidem B C æqualis F K; ipſi vero D æqualis FL. Quoniam igitur FK eſt æqualis ipſi BC, quorum FH eſt æqualis GC; erit reliquus HK reliquo GB æqualis. & quoniam eſt vt EF ad D, ita D ad BC, & BC ad A; æqualis autem eſt D ipſi FL, & BC ipſi FK, & A ipſi FH: erit vt EF ad FL ita LF ad FK, & KF ad FH. quare diuidendo vt EL ad LF, ita LK ad KF, & KH ad HF, & vt vnus antecedentium ad vnum conſequentium, ita omnes antecedentes ad omnes conſequentes. eſt igitur vt KH ad HF, ita EL LK KH ad LF KF HF. atque eſt K H quidem æqualis BG, FH vero ipſi A, & LF KF HF æquales ipſis D BC A. ergo vt BG ad A, ita eſt EH ad D BC A. eſt igitur vt ſecundi exceſſus ad primum, ita exceſſus ultimi ad omnes ipſum antecedentes. quod oportebat demonſtrare.

A..2
B..2 G..2 C
D.....8
E....8....L..4..K..2 H..2 F

F. C. COMMENTARIVS.

✻ Quare diuidendo vt EL ad LF] *ex iis, quae nos ad 14 ſeptimi demonſtrauimus.*

THEOREMA XXXIIII. PROPOSITIO. XXXVI.

Si ab vnitate quotcumque numeri deinceps proportionales exponãtur in dupla analogia, quoad totus compoſitus primus fiat, & totus in vltimum multiplicatus faciat aliquem; factus perfectus erit.



Ab vnitate enim exponantur quotcumque numeri deinceps proportionales in dupla analogia, quoad totus compoſitus primus fiat A B C D: & toti æqualis ſit E: & E ipſum D multiplicans faciat FG. Dico FG perfectum eſſe. quot enim ſunt A B, CD mul-

C D multitudine, tot ſumantur ab ipſo E in dupla analogia, qui ſint E HK L M. ergo ex æquali vt A ad D, ita erit E ad M: ac propterea qui fit ex E D eſt æqualis ei, qui ex A M. eſt autem qui ex E D ipſe FG. quare FG eſt, qui fit ex A M. multiplicãs igitur A ipſum M fecit FG. ergo M metitur F G per vnitates, quæ ſunt in A. atque eſt A binarius. duplus igitur eſt FG ipſius M. ſunt autem & M L HK E deinceps dupli inter ſe. ergo E HK L M FG deinceps proportionales ſunt in dupla analogia. auferatur à ſecundo HK, & ab vltimo FG ipſi primo E æqualis vterque HN, FX. eſt igitur vt ſecundi numeri exceſſus ad primum, ita exceſſus vltimi ad omnes ipſum antecedentes. quare vt NK ad E, ita XG ad M L HK E. atque eſt NK ipſi E æqualis. ergo & XG eſt æqualis ipſis M L HK E. eſt aũt & FX æqualis ipſi E; atque E ipſis A B C D, & vnitati æqualis. totus igitur FG æqualis eſt & ipſis E HK L M, & ipſis A B C D, & vnitati; omnesq; ipſum FG metiuntur. Dico FG nullum alium metiri præter ipſos A B C D E HK L M, & vnitatem. ſi enim fieri poteſt, metiatur aliquis numerus ipsũ FG, qui ſit O: ſitq; O nulli ipſorũ A B C D E HK L M idẽ. & quoties O ipſum FG metitur, tot vnitates ſint in P. ergo P ipſum O multiplicans fecit FG. ſed & E multiplicans D ipſum FG fecit. eſt igitur vt E ad P, ita O ad D. & quoniam ab vnitate deinceps proportionales ſunt A B C D, et poſt vnitatem A primus eſt, non metietur D aliquis alius numerus, præter ipſos A B C: & ponitur O nulli ipſorum A B C idem. non igitur O ipſum D metietur. vt autem O ad D, ita E ad P. ergo neque E metietur ipſum P. atque eſt E primus. omnis autem primus numerus ad omnem numerum, quem non metitur, primus eſt. quare E P primi inter ſe ſunt. ſed primi & minimi; minimi vero eos, qui eandem, quam ipſi, proportionem habent, æqualiter metiuntur, antecedens antecedentem, & conſequens conſequentẽ. atque eſt vt E ad P, ita O ad D. ergo E æqualiter metitur ipſum O, atque P ipſum D. ſed D nullus alius metitur præter ipſos A B C. quare P idẽ eſt, qui vnus ipſorum A B C. ſit idẽ, qui B. & quot ſunt B C D multitudine, tot ab ipſo E ſumantur E HK L: ſuntq; E HK L in eadem proportione, in qua B C D. ex æquali igitur vt B ad D, ita eſt E ad L. ergo qui fit ex B L eſt æqualis ei, qui ex D E. ſed qui fit ex D E eſt æqualis ei, qui ex P O. qui igitur fit ex P O ei, qui ex B L æqualis erit. quare vt P ad B, ita eſt L ad O. eſtq; P idem qui B. ergo & L idem erit, qui O. quod fieri non poteſt. etenim O nulli ipſorum expoſitorum idem ponitur. non igitur ipſum FG metitur aliquis numerus præter ipſos A B C D E HK L M, & vnitatẽ. atque oſtenſus eſt FG æqualis ipſis A B C D E HK L M, et vnitati. perfectus autem numerus eſt, qui ſuis ipſius partibus eſt æqualis. ergo FG perfectus erit. quod oportebat demonſtrare.

19. ſeptimi. 10. com. not. 9. cõis. not. 19. ſeptimi. 13. huius. 31. ſeptimi. 23. ſeptimi. 21. ſeptimi. 19. ſeptimi. 19. ſeptimi.

NONI LIBRI FINIS.

SCHOLIVM.

Propoſitum eſt Euclidi in decimo libro tractare de commenſurabilibus & incommenſurabilibus magnitudinibus, & de irrationalibus, & irrationalibus . non enim eadem ſunt incommenſurabilia , & irrationalia: quoniam illa quidem natura ſunt ; irrationalia vero & rationalia poſitione . ſi enim quadrati diametrum natura incommanſurabilem facit, vt eius latus , hoc non facit temere , ſed ex illius rationibus , quæ in ipſa ſunt. quare neque irrationale eſt eorum, quæ natura ſunt incommẽſurabilia, ſed incommenſurabile. etenim natura ipſa hoc facit iuxta omnem menſuram, quæ cum aliquo nihil commune habet . Primum igitur de commenſurabilibus, & incommenſurabilibus tractat , eorum naturã exquirens : poſtea vero de rationalibus , & irrationalibus , non tamen omnibus : quidam enim, velut obſiſtentes ipſa reprehendunt: ſed de maxime ſimplicibus ſpeciebus , quibus compoſitis infinitæ irrationales gignũtur. Earum nonnullas etiam Apollonius litteris mandauit. Ad ſcientiam autem attinet, cauſas, principia, & ſimplicia conſiderare , non ſingularia, & infinita. Itaque exponit irrationalium ſimplices ſpecies tredecim, quæ tribus modis inuentę ſunt, his enim aliæ ſimplices non inuenientur. Horum modorum vnus eſt iuxta analogiam, per quem Euclides inuenit vnam ſpeciem eorũ. alius iuxta compoſitionẽ, per quẽ ſex ſpecies; tertius iuxta diuiſionẽ, per quem reliquas ſex inuenit . Venerũt autem initio ad inquiſitionem ſymmetriæ, hoc eſt commenſurabilitatis Pythagoræi primi, ipſam ex numerorum cognitione inuenientes , cum vnitas ſit omnium numerorum communis menſura, & in magnitudinibus communis menſura inueniri non poſſit. Huius cauſſa eſt , quòd omnis numerus, iuxta quaſlibet ſectiones diuiſus relinquit particulam aliquam minimã, & quę ſectionem non admittit . Omnis autem magnitudo in infinitũ diuiſa non relinquit particulam , quæ propterea quòd minima ſit , ſecari non poſſit. ſed & illa in infinitum ſecta infinitas efficit particulas, quarũ ſingulę in infinitum ſecabuntur. & ſimpliciter magnitudo quatenus quidem diuiditur particeps eſt principij infiniti, quatenus vero ad totum attinet, termini eſt particeps. At numerus contra quatenus diuiditur termini, quatenus vero ad totum attinet. particeps eſt infiniti . Itaque quoniam oportet menſuras minores eſſe ijs, quæ menſurantur ; menſuratur autem omnis numerus, neceſſe eſt omnium minimam eſſe menſuram. quare & magnitudinum , ſi omnes menſura communi menſurantur , neceſſe eſt eam minimam eſſe. Sed in numeris quidem eſt communis menſura, terminatur enim, quemadmodum dictum eſt : in magnitudinibus vero

non item, non igitur communis quædam mensura est omnium magnitudinum. Cum hoc intelligerent pythagorei, vt fieri potuit, in magnitudinibus mensuram inuenerunt. omnes enim, quas eadem mensura metitur, commensurabiles appellarunt; eas uero, quas non metitur eadē mensura, incōmensurabiles. & harum rursus, quascumque alia quæpiam cōmunis mensura metitur inter se cōmensurabiles; quascumque vero non metitur illis incōmensurabiles. & ita sumptis mensuris, omnes possunt esse commensurabiles: rationales aūt omnes, & omnes irrationales esse possunt, vt ad aliquid; propterea quòd commensurabile quidem & incommensurabile natura illis inest: rationale autem, & irrationale positione. Inueniuntur autē commensurabiles & incōmensurabiles tripliciter iuxta tres dimensiones, nimirum lineæ, superficies, & solida, vt Theon demonstrauit & alij non nulli. At vero magnitudinem in infinitum diuidi posse, hoc theoremate ostenderunt.

Sumentes enim triangulum æquilaterum, basim bifariam secant: & vni portioni æqualem abscindentes in altero latere, per pūctum diuisionis ad basis partes parallelam ducunt: & rursus æquilaterum constitutum est triangulum, cuius basim eodem modo secantes similiter faciunt, & nūquam desinunt ad trianguli uerticē. si enim desinerent, sequeretur æquilateri trianguli duo latera reliquo æqualia esse, quod est absurdum.



Quod autem horum vtilis, nec superuacanea sit cognitio, vel ex veteri pythagoreorū sermone colligi potest, fabulantur enim eū, qui primus hanc irrationalium contemplationem in apertum tamquam ex adyto proferre est ausus, naufragio periisse. idq; ea factum de caussa, quòd omne irrationale, atque informe vbique occultari velit. Aiunt præterea, si quis forte alicui horum occurrerit, atque illud publicarit, fore statim, vt in generationis, hoc est profundi locum deferatur, perpetuisq; illic obruatur fluctibus, tanta veneratione hi viri irrationalium hanc cognitionem sunt prosecuti.

EVCLIDIS ELEMENTORVM LIBER DECIMVS.

CVM SCHOLIIS ANTIQVIS ET COMMENTARIIS.

Federici Commandini Vrbinatis.

DIFFINITIONES

I.

COMMENSVRABILES magnitudines dicuntur, quas eadem menſura metitur.

II.

Incommenſurabiles autem, quarum nullam eſſe communem menſuram contingit.

III.

Rectę lineæ potentia commenſurabiles ſunt, cum ea, quæ ab ipſis fiunt, quadrata idem ſpacium metitur.

F. C. COMMENTARIVS.

Rectas lineas longitudine commenſurabiles ſeorſum non diffiniuit, quòd in prima diffinitione magnitudinum commenſurabilium comprehendantur; ſunt enim rectę lineę longitudine commenſurabiles, quas eadem menſura metitur.

IIII.

Incommenſurabiles autem, cum quadratis, quę ab ipſis fiunt, nullum commune ſpacium eſſe contingit.

V.

His poſitis oſtenditur, cuicumque rectę lineæ propoſitę rectas lineas multitudine infinitas, & commenſurabiles eſſe, & incommenſurabiles: alias quidem longitudine & potentia; alias vero potentia ſolum. vocetur autem propoſita recta linea, rationalis.

Et

VI.

Et huic commenſurabiles ſiue longitudine & potentia, ſiue potentia ſolum, rationales.

VII.

Incommenſurabiles vero irrationales vocentur.

VIII.

Et quadratũ, quod à recta linea propoſita fit, dicatur rationale.

IX.

Et huic commenſurabilia quidem, rationalia.

X.

Incommenſurabilia vero, irrationalia dicantur.

XI.

Et rectæ lineę, quæ incommenſurabilia poſſunt, vocentur irrationales: ſi quidem ea quadrata ſint, ipſorum latera; ſi vero alia quæpiam rectilinea, quę ipſis æqualia quadrata deſcribunt.

P. C. COMMENTARIVS.

Sunt etiam quędam communes notiones, quibus Euclides in hoc libro utitur, nempe hę.

COMMVNES NOTIONES.

1 *Qualibet magnitudo multiplicata poteſt omnem propoſitam magnitudinem eiuſdem generis ſuperare.*

2 *Quæcumque magnitudo metitur aliquam, metitur quoque eam, quã illa ipſa metitur.*

3 *Quæcumque magnitudo metitur totam, & ablatam; etiam reliquam metietur.*

4 *Quęcumque magnitudo metitur duas, vel plures magnitudines, metitur quoque eam, quę ex ipſis componitur.*

THEOREMA I. PROPOSITIO. I.

Duabus magnitudinibus inæqualibus expoſitis, ſi à maiori auferatur maius, quàm dimidium; & ab eo, quod reliquum eſt rurſus auferatur maius, quam dimidium; & hoc ſemper fiat: relinquetur tandem quædam magnitudo, quæ minori magnitudine expoſita minor erit.

Sint

Sint duæ magnitudines inæquales A B C, quarum maior A B. Dico si ab ipsa AB auferatur maius, quàm dimidium, & ab eo, quod reliquum est, rursus auferatur maius, quàm dimidium, atque hoc semper fiat, relinqui tandem magnitudinem
1.com not. quandam, quæ magnitudine C minor erit. etenim C multiplicata fiet aliquando maior magnitudine AB. multiplicetur, & sit DE ipsius quidem C multiplex, maior autem, quàm AB, diuidaturq; DE in partes ipsi C æquales DF FG GE. & ab ipsa AB auferatur maius, quàm dimidium BH; ab ipsa vero AH rursus maius, quàm dimidium auferatur HK, atque hoc semper fiat, quoad diuisiones, quæ sunt in AB, multitudine æquales fiant diuisionibus, quę in DE: sint igitur diuisiones AK K H HB diuisionibus DF FG GE multitudine æquales. & quoniam maior est DE, quàm AB, & ablatum est ab ipsa quidem DE minus, quàm dimidium EG; ab ipsa verò AB maius, quàm dimidium BH; erit reliquum GD reliquo HA maius. rursus quoniam maior est GD, quàm HA, & ablatum est ab ipsa quidem GD dimidium GF; ab ipsa vero HA maius, quàm dimidium HK; reliquum FD reliquo AK maius erit. estq; FD æqualis ipsi C. ergo C quã AK est maior. minor igitur est AK, quàm C. Ergo ex magnitudine AB relicta est magnitudo AK exposita minori magnitudine C minor. quod demonstrare oportebat.



* similiter autem demonstrabitur etiam si dimidia ablata fuerint.

ALITER. Exponãtur duæ magnitudines inęquales A B C, sitq; C minor. & quoniam minor est C multiplicata erit aliquando magnitudine AB maior. fiat vt FM, diuidaturq; in partes ipsi C ęquales M H HG GF: & ab ipsa AB auferatur maius, quàm dimidium BE, & ab E A maius, quàm dimidium ED: atque hoc semper fiat, quoad diuisiones, quę sunt in FM, æquales fiant diuisionibus, quę in AB. fiant igitur vt BE ED DA. & ipsi DA vnaquæque ipsarum KL L N NX sit æqualis, atque hoc fiat, quoad diuisiones K X ęquales sint diuisionibus ipsius FM. & quoniam BE maior est, quàm dimidium ipsius AB, erit BE maior, quàm EA. multo igitur maior est BE, quàm DA. sed ipsi DA ęqualis est XN. ergo BE maior est, quàm XN. rursus quoniam ED maior est quàm dimidium EA, erit E D maior, quàm D A. sed ipsi DA est æqualis N L. quare E D, quàm N L est maior. tota igitur D B maior est, quàm X L. ipsi verò DA æqualis est LK. quare tota A B, quàm tota XK maior erit. sed & MF maior est, quam BA. multo igitur MF, quàm XK est maior. & quoniam XN NL LK inter se æquales sunt; sunt autem & MH HG GF inter se æquales: atque est multitudo earum, quæ sunt in MF æqualis multitudini ipsarum, quæ in XK: erit vt KL ad FG, ita K X ad F
11.quinti. M. maior autem est FM, quàm XK. ergo & GF quàm LK est maior. atque est F G ipsi
14.quinti. C æqualis; & KL ęqualis ipsi AD. ergo C quàm AD maior erit. quod oportebat demonstrare.



SCHOLIVM.

In magnitudinibus asymetriam inesse. *Ex hoc theoremate perspicuum fit in magnitudinibus asymetriam, hoc est incommensurabilitatem ineſſe. si enim exposita magnitudine minorem assumere licet, & rursus hac minorem, & semper minorem,*

magnitu-

magnitudines in infinitum ſecantur ; & non in minimam menſuram determinatam, vt in numeris eſt vnitas. ſi igitur non eſt determinata magnitudo minima, erunt quędam magnitudines incommenſurabiles, quas communis aliqua magnitudo, cum indeterminata ſit, non metietur.

F. C. COMMENTARIVS.

Similiter autem demonſtrabitur, etiam ſi dimidia ablata fuerint] *auferatur enim ab ipſa AB dimidium BH: & ab ipſa AH dimidium HK: idq; ſemper fiat. quo ad diuiſiones AB æquales ſint diuiſionibus ipſius DE: & quoniam DE maior eſt quàm AB, & ab ipſa quidem DE ablatum eſt minus quàm dimidium: ab ipſa vero AB ablatam eſt dimidium; erit reliquum GD maius reliquo HA. rurſus quoniam GD maior eſt quàm HA: & ab ipſa GD ablatum eſt dimidium GF; ab ipſa vero HA dimidium HK, reliquum FD reliquo KA maius erit. quae deinceps ſunt ſimiliter demonſtrabuntur.*



Sed in alia demonſtratione. auferatur ab ipſa AE dimidium BE, & ab EA dimidium ED: atque hoc fiat, quoad diuiſiones, quae ſunt in FM aequales ſint diuiſionibus, quae in AB: ſint autem BE ED DA. & ipſi DA aequalis ſit vnaquæque ipſarum KL LN NX. & quoniam BE eſt aequalis ipſi EA, & EA maior quàm AD, erit BE quàm DA maior. ſed ipſi DA eſt aequalis XN. ergo BE maior eſt quàm XN. rurſus quoniam ED DA ſunt aequales ipſis NL LK, tota AB quæ tota XK maior erit. reliqua vero ſimiliter demonſtrabuntur.

THEOREMA II. PROPOSITIO II.

Si duabus magnitudinibus inęqualibus expoſitis detracta ſem per minore de maiore, reliqua minime præcedentem metiatur magnitudines incommenſurabiles erunt.

Duabus enim magnitudinibus inęqualibus expoſitis AB CD, quarum minor ſit AB, & detracta ſemper minore de maiore, reliqua minime metiatur præcedentem. Dico magnitudines AB CD incommenſurabiles eſſe. ſi enim commenſurabiles ſint, eas magnitudo quædam metietur. metiatur, ſi fieri poteſt, ſitq; E: & AB quidem metiens DF relinquat ſe ipſa minorem CF: CF vero metiens BG relinquat ſe ipſa minorem AG; & hoc ſemper fiat, quoad relinquatur quædam magnitudo, quæ ſit minor ipſa E. itaque fiat, & relinquatur AG ipſa E minor. Quoniã igitur E metitur AB, AB vero metitur DF; & E ipſam DF metitur. ſed & metitur totã CD. ergo & reliquam CF metietur. at CF metitur BG. quare & E ipſam BG metitur. metitur autem



& totam

& totam AB. & reliquam igitur AG metietur, maior minorem, quod fieri non pot. non igitur magnitudines AB CD aliqua magnitudo metietur. ergo incommenſurabiles erunt AB CD magnitudines. Si igitur duabus magnitudinibus inæquali bus expoſitis, detracta ſemper minore de maiore, reliqua minime præcedentem metiatur, incommenſurabiles magnitudines erunt. quod oportebat demonſtrare.

SCHOLIVM.

Magnitudines quaſdam longitudine eſſe incommenſurabiles ex hoc theoremate docemur. etenim aliquas commenſurabiles eſſe perſpicue apparet. magnitudinum autem commenſurabilium maximam communem menſuram inuenire, non cuius vis eſt, ſed hominis eruditi: cuius quidem maximæ communis menſuræ inuentionem in ſequenti theoremate tradit.

ALIVD SCHOLIVM.

Cum in antecedenti theoremate cauſſam explicauerit incommenſurabilitatis, in hoc ſignum incommenſurabilium magnitudinum affert, quando ſcilicet incommenſurabiles ſunt. in ſextodecimo autem theoremate ipſarum proprium exponit, ita vt & cauſſa, & ſignum, & proprium habeatur. At in commenſurabilibus magnitudinibus cauſſam veluti manifeſtam prætermiſit; exponit autem & ſignum, & proprium.

F. C. COMMENTARIVS.

* Et hoc ſemper fiat, quoad relinquatur quædã magnitudo, quæ ſit minor ipſa E.] *quoniam enim AB quidem metiens DF relinquit ſe ipſa minorem CF; CF vero metiens BG relinquit ſe ipſa minorem AG: erit AG minor, quàm BG. ergo ex AB ablatum eſt maius, quàm dimidium ipſius, videlicet BG. & ita ſemper fiet. quòd cum ex AB ſemper auferatur maius, quàm dimidium, relinquetur tandem aliqua magnitudo, quae ipſa E minor erit.*

Ex antecedente.

PROBLEMA I. PROPOSITIO. III.

Duabus magnitudinibus commenſurabilibus datis, maximam earum communem menſuram inuenire.

Sint datæ duæ magnitudines commenſurabiles AB CD, quarum minor AB. oportet ipſarum AB CD maximam communem menſuram inuenire. vel igitur AB metitur CD, vel non metitur. & ſi quidem AB metitur CD, metitur autem & ſe ipſam; erit AB ipſarum AB CD communis menſura. & perſpicuũ eſt maximam eſſe; magnitudo enim maior magnitudine AB ipſam AB non metietur. ſi vero AB non metitur CD; detracta ſemper minore de maiore, relinquetur tandẽ quædam magnitudo, quę præcedentem metietur; propterea quòd AB CD non ſint incommenſurabiles. & AB quidem metiens ED relinquat ſe ipſa minorem EC: EC vero metiens FB relinquat ſe ipſa minorem AF; & AF ipſam CE metiatur. Quũ igitur AF metitur CE, ſed CE metitur FB: & AF ipſam FB metitur. metitur autem & ſe ipſam. & totam igitur AB metietur. ſed AB metitur DE. ergo AF ipſam DE metitur. metitur autem

2. com. not.
4. com. not.

tem & CE. & totã igitur CD metietur. ergo AF ipſas AB CD metitur; ac propterea ipſarum eſt communis menſura. Dico & maximam eſſe. niſi enim ita ſit, erit aliqua magnitudo maior ipſa A F, quę ipſas A B CD metietur. Itaque metiatur, & ſit G. & quoniam G metitur A B, A B vero metitur E D; & G ipſam E D metitur. metitur autem & totam C D. ergo & reliquam C E metietur. ſed C E metitur F B. quare G ipſam F B metitur. metitur autem & totam A B. & reliquam igitur metietur AF, maior minorem, quod fieri non poteſt. non igitur magnitudo quædam maior ipſa AF magnitudines AB CD metietur. ergo AF ipſarum AB CD maxima erit communis menſura. Duabus igitur magnitudinibus commenſurabilibus datis AB CD maxima ipſarum communis menſura inuenta eſt AF. quod facere oportebat.



9. com. not.

COROLLARIVM.

Ex hoc manifeſtum eſt, ſi magnitudo duas magnitudines metiatur, & maximam ipſarum communem menſuram metiri.

SCHOLIVM.

Tamquam manifeſtum ſit, eſſe magnitudines commenſurabiles, aggreditur hoc theorema, & non illud prius oſtendit, quemadmodum in ijs, quæ in commenſurabiles ſunt. conſtat enim magnitudines omnes alicuius multiplices, ſi comparentur cum ea, cuius ſunt multiplices, commenſurabiles eſſe.

F. C. COMMENTARIVS.

Ex hoc manifeſtum eſt ſi magnitudo duas magnitudines metiatur, & maximam ipſarum communem menſuram metiri] *ſequitur illud ex vltima parte demonſtrationis, vt ad ſecundam propoſitionem ſeptimi libri in numeris explicauimus.*

PROBLEMA. II. PROPOSITIO IIII.

Tribus magnitudinibus commenſurabilibus datis, maximam ipſarum communem menſuram inuenire.

Sint datæ tres magnitudines commenſurabiles A B C. oportet ipſarum A B C maximam communẽ menſuram inuenire. ſumatur enim duarum A B maxima cõis menſura, quę ſit D. itaque D ipſam C vel metitur, vel nõ metitur. metiatur primũ. & qm̃ D ipſam C metitur, metitur autem & AB; & ipſas A B C metietur. Quare D ipſarum A B C communis eſt menſura: & manifeſtum eſt maximam eſſe. magnitudo enim maior magnitudine D ipſas A B C non metietur. nam ſi fieri poteſt, metiatur eas magnitu-



Ex ante cedente.

do maior ipſa D, quæ ſit E. Quoniã igitur E magnitudines A B C metitur, & ipſas A B metietur, & ipſarum A B maximam communẽ menſuram D, maior minorẽ, quod fieri nõ poteſt. ſed non metiatur D ipſam C. Dico primã C D commenſurabiles eſſe. Quoniã enim commenſurabiles ſunt A B C, metitur eas aliqua magnitudo, quę ſcilicet & ipſas A B metitur. ergo & ipſarum A B maximã cõmunem menſurã D. metitur autem & ipſam C. quare dicta magnitudo ipſas C D metitur: ideoq; C D cõmenſurabiles ſunt. ſumatur ipſarum maxima cõmunis mẽſura; & ſit E. Quoniã igitur E metitur D, D vero metitur A B; & E ipſas A B metietur. metitur autem & C. ergo E ipſarum A B C communis eſt menſura. Dico & maximam eſſe. ſi enim fieri poteſt, ſit aliqua magnitudo F maior ipſa E, quæ magnitudines A B C metiatur. & quoniam F metitur A B C, & ipſas A B metietur, & ipſarum A B maximam communem menſuram, quæ eſt D. ergo F metitur D. metitur autem & C. quare F ipſas C D metitur, & ipſarum C D maximam communem menſuram, hoc eſt E. ergo F ipſam E metietur, maior minorem. quod fieri non poteſt. non igitur magnitudo quædam maior ipſa E magnitudines A B C D metietur. ergo E ipſarum A B C maxima erit communis menſura, ſi D ipſam C non metiatur; ſi vero metiatur erit ipſa D. tribus igitur magnitudinibus commenſurabilibus datis maxima ipſarum communis menſura inuẽta eſt. quod facere oportebat.

COROLLARIVM.

Ex hoc perſpicue conſtat, ſi magnitudo tres metiatur magnitudines, & ipſarum maximam communem menſuram metiri. ſimiliter & in pluribus magnitudinibus maxima communis menſura inuenietur, & corollarium procedet.

SCHOLIVM.

Quoniam incommenſurabiles magnitudines conſequitur proportionem non habere, quam numerus ad numerum, & eius conuerſum: vult oſtendere commenſurabiles magnitudines conſequi proportionem habere, quam numerus ad numerum, & contra. indiget autem ad hoc lemmate, quonam modo commenſurabilium magnitudinum duarum, vel trium maxima communis menſura inueniatur. ſic & in primo arithmeticorum libro fecit. poſtquam enim oſtendit quinam ſint incommenſurabiles, quos primos appellat, propterea quòd non omnino incommenſurabiles ſunt, vt magnitudines; oſtendere volens omnem numerum ad omnem numerum proportionem habere vel multiplicem, vel ſuperparticularem, vel ſuperpartientem, vel multiplicem ſuper-

particularem

particularem, vel multiplicem superpartientem, quos ipse breuitatis causa ex minori nominauit, vel partem, vel partes. per partem intelligens submultiplicem, vel subsuperparticularē, vel submultiplicem superparticularem. per partes vero subsuperpartientem, vel submultiplicem superpartientem. hoc igitur volens ostendere eo indigebat, quo modo commensurabilium maxima cōmunis mensura inueniatur. quod etiam hoc loco obseruauit. Postea in quinto theoremate ostēdet cōmēsurabiles magnitudines inter se proportionem habere, quam numerus ad numerum. immo vero omnem commensurabilem magnitudinem omnis commensurabilis magnitudinis, minorem maioris, vel partem esse, vel partes: hoc enim est proportionem habere, quam numerus ad numerum; non tamen contra: latius enim patet numerus. quamobrem eo vsus est. Sciendum autem & ipsas demonstrationes, quæ ex arithmeticis petuntur, incommutabiles esse.

ALIVD.

Postquam docuit, quæ sint magnitudines incommensurabiles, deinceps quid ipsas consequatur ostendet; & insuper quid consequatur commensurabiles in quinto, & sexto theoremate. & quoniam indigebat cō muni mensura earum, quæ sunt in symmetria, videlicet commensurabilium, hoc assumit in tertio, & quarto theorema e, quo pacto inueniendæ sint commensurabilium communes mensuræ. septimum autem theorema inquirit; quę consequantur incommensurabiles magnitudines non simpliciter, sed secundum speciem, vt incommensurabiles longitudine, vel potentia; nam de incommensurabilibus secundum priuationem nihil dixit; vt pote, quæ non sint ipsis vtiles ad tractationem de irrationalibus. In his tradit ortum earum, quę longitudine, & potentia commensurabiles sunt, & incommensurabiles: his enim indiget in nono theoremaoe, & sequentibus, in quibus iuxta analogiam, & iuxta compositionem, & diuisionem commensurabilitas, & incommensurabilitas inquiritur vsque ad tertium decimum theorema.

THEOREMA III. PROPOSITIO. V.

Commensurabiles magnitudines inter se proportionem habent, quam numerus ad numerum.

Sint commensurabiles magnitudines A B. Dico magnitudinem A ad B proportionem habere, quam numerus ad numerum. Quoniam enim A B commensurabiles sunt, metietur ipsas aliqua magnitudo. metiatur, & sit C. & quoties C ipsam A metitur, tot vnitates sint in D: quoties autem C metitur B, tot vnitates sint in E.

quoniam igitur C ipſam A metitur per vnitates, quę ſunt in D: metitur autem & vnitas D per vnitates, quæ in ipſo ſunt; vnitas æqualiter metietur numerum D, atque magnitudo C ipſam A. ergo vt C ad A, ita eſt vnitas ad D; & conuertendo vt A ad C, ita D ad vnitatem. Rurſus quoniam C ipſam B metitur per vnitates, quæ ſunt in E; metiturq; vnitas numerum E per vnitates, quę in ipſo ſunt: vnitas numerum E æqualiter metietur, atque C ipſam B. eſt igitur vt C ad B, ita vnitas ad E. oſtenſum autem eſt & vt A ad C, ita D eſſe ad vnitatẽ. quare ex æquali vt A ad B, ita numerus D ad E numerum. commẽſurabiles igitur magnitudines A B inter ſe proportionem habent, quam D numerus ad numerũ E. quod oportebat demonſtrare.



SCHOLIVM.

Hoc proprium eſt commenſurabilium magnitudinum, minor maioris vel pars eſt, vel partes. ſi quidem igitur pars, vel proportionem habebit, quam vnitas ad numerum, vel quam numerus ad numerum; ſi vero partes proportionem habebit, quam numerus ad numerum. pars enim ſubmultiplicem facit proportionem: partes vero vnam reliquarum ſubproportionalium. ſi igitur rectæ lineæ ſint, & plana, quæ ab ipſis fiunt, & ſolida proportionem habebunt, quam numerus ad numerum. ſi vero plana, & quæ ab ipſis ſolida, non item rectæ lineæ, niſi proportio numerorũ ſit quadrati ad quadratum. & ſi ſolida nõ omnino quę ipſa præcedunt, niſi proportio ſit cubi ad cubum. quòd ſi ſolida non habeant proportionem, quam numerus ad numerum, neque plana, neque rectæ lineæ habebunt: non enim ſunt commenſurabiles. In hoc autem theoremate & ſequenti de commenſurabilibus, & incommenſurabilibus ſimpliciter diſſerit; at in ſeptimo de incommenſurabilibus longitudine. ex quo manifeſtum eſt & de potentia incommenſurabilibus. In octauo denique ortum tradit commenſurabilium, & incommenſurabilium longitudine & potentia.

F. C. COMMENTARIVS.

Ex iam demonſtratis poſſumus illud quoque problema abſoluere.

Propoſitis duabus magnitudinibus commenſurabilibus, quam inter ſe proportionem habeant in numeris inueuire.

Sint propoſitae magnitudines commenſurabiles A B. quarum oporteat proportionem in numeris inuenire. inueniatur ex 3 huius maxima earum communis menſura, quae ſit C. & quoties C metitur A, tot vnitates ſint in D: quoties autem metitur ipſum B, tot vnitates ſint in E. habebit igitur A ad B proportionẽ eã, quã habet numerus D ad E numerum. itaque ſi A B rectae lineae ſint, & earum quadrata erunt cõmenſurabilia, & inter ſe proportionem habebunt, quam

numerus

numerus quadratus ad quadratum numerum. si vero sint superficies, vel numeri D E sint quadrati, vel non quadrati; & si non sint quadrati, vel proportionem habent, quam numerus quadratus ad quadratum numerum, vel non. & si quidem sint quadrati, vel proportionem habent, quam numerus quadratus ad quadratum numerum, rectae linae, quae ipsas superficies, vel superficies ipsis aequales possunt, erunt longitudine commensurabiles. si vero numeri non habent proportionem, quam quadratus numerus ad quadratum numerum, erunt longitudine incommensurabiles, quamquam potentia commensurabiles sint. quae omnia in nona propositione huius libri demonstrabuntur.



THEOREMA IIII. PROPOSITIO. VI.

Si duæ magnitudines inter se proportionem habeant, quam numerus ad numerum, commensurabiles magnitudines erunt.

Duæ enim magnitudines A B inter se proportionem habeant, quam D numerus ad numerum E. Dico A B magnitudines commẽsurabiles esse. quot enim vnitates sunt in D, in tot partes æquales diuidatur magnitudo A, & vni ipsarum æqualis sit C: quot autem vnitates sunt in E, ex tot magnitudinibus æqualibus ipsi C cõponatur magnitudo F. Quoniam igitur quot sunt in D vnitates, tot magnitudines sunt in A, ipsi C æquales; quæ pars est vnitas ipsius D, eadem pars erit & C ipsius A. vt igitur C ad A, ita est vnitas ad D. metitur autem vnitas ipsum D numerũ. ergo & C ipsam A metietur. & quoniam est vt C ad A, ita vnitas ad D numerum, erit conuertendo vt A ad C, ita D numerus ad vnitatem. rursus quoniam quot vnitates sunt in E, tot sunt & in F magnitudines ipsi C æquales; vt C ad F, ita erit vnitas ad E numerum. ostensum autem est & vt A ad C, ita D esse ad vnitatem. ergo ex æquali ut A ad F, ita est D ad E. sed ut D ad E, ita A ad B. & ut igitur A ad B, ita A ad F. quòd cum A ad utramque ipsarum B F eandem habeat proportionem, erit B ipsi F æqualis. metitur autem C ipsam F. ergo & ipsam B metietur. sed & metitur A. quare C ipsas A B metitur. commensurabilis igitur est A ipsi B. Quare si duæ magnitudines inter se proportionem habeant, quam numerus ad numerum, commensurabiles magnitudines erunt. quod oportebat demonstrare.



9. quinti.

ALITER.

Duæ enim magnitudines A B inter se proportionem habeant, quam numerus C ad numerum D. Dico magnitudines commensurabiles esse. quot enim unitates sunt in C, in tot partes æquales A diuidatur, & uni ipsarum æqualis sit E. est igitur ut unitas ad C numerum, ita E ad A. est autem & ut C ad D, ita A ad B. ergo ex

æquali

æquali ut unitas ad D numerum, ita E ad B. sed unitas metitur D. ergo & E ipsam B metitur. metitur autem & E ipsam A, quoniam & unitas metitur C. quare E utramque ipsarum A B metietur; ideoque A B commensurabiles sunt; atque est E communis ipsarum mensura.



COROLLARIVM.

Ex hoc manifestum est, si sint duo numeri, vt D. E, & recta linea vt A, fieri posse, vt D numerus ad numerum E, ita rectam lineam A ad aliam rectam lineam. si autem ipsarum A F media proportionalis sumatur, vt B, erit vt A ad F, ita quod fit ex A ad id, quod ex B, hoc est vt prima ad tertiam, ita figura, quæ fit à prima ad eam, quæ à secunda similem, & similiter descriptam. sed vt A ad F, ita D numerus ad numerum E. factum igitur est & vt D numerus ad numerum E, ita quod fit ex recta linea A ad id, quod ex recta linea B.

Cor. 20. sexti



SCHOLIVM.

Si quadrata vel parallelogramma, vel quæcunque spacia proportionem habeant, quam numerus ad numerum, commensurabiles erunt magnitudines: quando autem proportionem habeant, quam numerus quadratus ad quadratum numerum, & ipsæ commensurabiles sunt; & rectæ lineæ, quæ ipsas possunt, longitudine sunt commensurabiles. vel quando rectæ lineæ inter se proportionem habeant, quam numerus ad numerum, & ipsę commensurabiles sunt longitudine, & quæ ab ipsis fiunt quadrata, vel spacia quadratis ipsarum æqualia proportionem habere coguntur, quam quadratus numerus ad quadratum numerum. ad plura igitur se extendunt potentia commensurabiles, quàm commensurabiles longitudine; & continentiores sunt, vt ex sequentibus theorematibus fiet manifestum.

THEOREMA V. PROPOSITIO. VII.

Incommensurabiles magnitudines inter se proportionem non habent, quam numerus ad numerum.

Sint

Si ut incommensurabiles magnitudines A B. Dico A ad B proportionem non habere, quam numerus ad numerum. si enim A ad B proportionem habet, quam numerus ad numerum, commẽsurabilis erit A ipsi B. atqui non est commensurabilis. nõ igitur A ad B proportionem habet, quam numerus ad numerum. quare incommensurabiles magnitudines inter se proportionem non habent, quam numerus ad numerum. quod demonstrare oportebat.

THEOREMA VI. PROPOSITIO. VIII.

Si duæ magnitudines inter se proportionem non habeãt, quã numerus ad numerũ, incõmẽsurabiles erũt.

Duæ enim magnitudines A B inter se proportionem non habeãt quam numerus ad numerum. Dico magnitudines A B incommensurabiles esse. si enim commensurabilis est A ipsi B, proportionem habet, quam numerus ad numerum. atqui non habet, incommensurabiles igitur sunt A, B magnitudines. ergo si duę magnitudines inter se proportionem non habeant, quam numerus ad numerum, incommensurabiles erunt. quod oportebat demonstrare.

THEOREMA VII. PROPOSITIO. IX.

Quæ à rectis lineis longitudine commensurabilibus fiunt quadrata inter se proportionem habent, quam quadratus numerus ad quadratum numerum. & quadrata inter se proportionem habentia, quam quadratus numerus ad quadratum numerum, & latera habebunt longitudine commensurabilia. quadrata vero, quæ à longitudine incommensurabilibus rectis lineis fiunt, inter se proportionem non habent, quam quadratus numerus ad quadratum numerum: & quadrata inter se proportionem non habentia, quam quadratus numerus ad quadratum numerum, neque latera habebunt longitudine commensurabilia. A B

Sint rectæ lineæ A B longitudine cõmensurabiles. Dico quadratum quod fit ex A ad quadratum, quod ex B, eam proportionem habere, quam quadratus numerus ad quadratum numerum. Quoniam enim A ipsi B longitudine est commensurabilis, habebit A ad B proportionem, quam numerus ad numerum. habeat eam, quam numerus C ad numerũ D. Quoniam igitur est vt A ad B, ita C numerus ad numerum D; & proportionis quidem, quam habet A ad B, dupla est proportio quadrati, quod fit ex A ad quadratum, quod ex B; similes enim figuræ in dupla sunt proportione homologorum laterum: proportionis vero, quã habet numerus G ad numerum D dupla est proportio quadrati ipsius C ad ipsius D quadratum; etenim duorũ numerorũ quadratorum vnus medius proportionalis est numerus, & quadratus ad quadratum duplam proportionem habet eius, quam latus habet ad latus: erit vt quadratum, quod fit ex A ad quadratum, quod



5. huius.

Coroll. 20. sexti.

11. octaui.

quod ex B,ita quadratus numerus, qui fit ex C numero ad quadratum numerum, qui ex D.

ALITER.



Quoniam enim cõmenſurabilis eſt A ipſi B longitudine, proportionẽ hẽt quã numerus ad numerũ. habeat quã C ad D. & C ſe ipſum quidẽ multiplicans faciat E, multiplicans vero D faciat F: & D ſe ipſum multiplicans faciat G. itaque quoniã C ſe ipſum quidem multiplicans fecit E, multiplicãs vero D fecit F, erit vt C ad D, hoc eſt vt A ad B, ita E ad F. ſed vt A ad B, ita quadratum, quod fit ex A ad rectangulum, quod fit ex A B. eſt igitur vt quadratum, quod ex A ad rectangulũ, quod ex A B, ita E ad F. rurſus quoniam D ſe ipſum multiplicans fecit G, vt C ad D, hoc eſt vt A ad B, ita erit F ad G. vt autem A ad B, ita rectangulũ, quod fit ex A B ad quadratũ, quod fit ex B. ergo vt rectangulum, quod ex A B ad quadratum, quod ex B, ita F ad G. ſed vt quadratum, quod fit ex A ad rectangulum, quod ex A B, ita erat E ad F. ex æquali igitur vt quadratum ex A ad quadratum ex B, ita E ad G. eſt autem vterque ipſorum E G quadratus. & E quidem eſt à numero C; G uero ab ipſo D. quadratum igitur, quod fit ex A ad quadratum, quod ex B proportionem habet, quam quadratus numerus ad quadratum numerum. Sed ſit vt quadratum, quod fit ex A ad quadratũ, quod ex B, ita quadratus numerus, qui eſt à numero C ad quadratum numerum, qui à numero D. Dico A ipſi B longitudine commenſurabilem eſſe. Quoniam enim eſt vt quadratum, quod fit ex A ad quadratum, quod ex B, ita quadratus numerus, qui eſt à numero C ad quadtatum numerum, qui à numero D. ſed proportio quidem quadrati, quod fit ex A ad quadratum, quod ex B, dupla eſt proportionis, quã hẽt A ad B: proportio vero quadrati numeri, qui eſt à numero C ad quadratũ numerũ, qui à numero D itidẽ dupla eſt proportionis, quã hẽt C numerus ad numerum D. eſt igitur vt A ad B, ita C ad D. ergo A ad B proportionem habet, quam numerus C ad D numerum: ac propterea A ipſi B longitndine eſt commenſurabilis. quod oportebat demonſtrare.

1. ſexti.
1. ſexti.
Coroll. 20. ſexti.
11. octani.
6. huius.

ALITER.



Sed quadratũ, quod fit ex A, ad quadratum, quod ex B proportionem habeat, quam quadratus numerus E ad quadratum numerum G. Dico A ipſi B longitudinem commẽſurabilem eſſe, ſit enim ipſius quidem E latus C, ipſius vero G latus D; & C ipſum D multiplicans faciat F. ergo E F G deinceps proportionales ſũt in proportione, quæ eſt C ad D. & quoniam quadratorum, quæ fiunt ex A B, medium proportionale eſt rectangulum, quod ex A B: numerorum vero quadratorum E G medium proportionale eſt F, erit vt quadratum

17. ſeptimi.
17. ſeptimi.

dratum,quod fit ex A,ad rectangulum,quod ex A B,ita E ad F. vt autem rectangulum ex A B ad quadratum ex B, ita F ad G: ſed vt quadratum ex A ad rectangulũ ex A B, ita A ad B.ergo A B commenſurabiles ſunt; proportionem enim habent, quam numerus E ad numerum F,hoc eſt quam C ad D.vt enim C ad D,ita E ad F: nam C ſe ipſum quidem multiplicans fecit E,multiplicans autem D ipſum F fecit. eſt igitur vt C ad D,ita E ad F. 17.ſeptimi.

Sed incommenſurabilis ſit A ipſi B lõgitudine.Dico quadratum ex A ad quadratum ex B proportionem nõ habere, quã quadratus numerus ad quadratũ numerũ.ſi enim quadratũ ex A ad quadratũ ex B proportionẽ habeat, quã quadratus numerus ad quadratum numerum, commenſurabilis erit A ipſi B longitudine.non eſt autem. non igitur quadratum ex A ad quadratum ex B proportionem habet, quam quadratus numerus ad quadratum numerum.Rurſus quadratum ex A ad quadratum ex B proportionem non habeat, quam quadratus numerus ad quadratum numerum. Dico A ipſi B longitudine incommenſurabilem eſſe.ſi enim commenſurabilis ſit A ipſi B longitudine, habebit quadratum ex A ad quadratum ex B proportionem, quam quadratus numerus ad quadratum numerum. atqui non habet. non igitur A ipſi B longitudine eſt commenſurabilis. ergo quæ à rectis lineis longitudine commenſurabilibus fiunt quadrata inter ſe proportionem habent, quam numerus quadratus ad quadratum numerum, & quę deinceps ſunt.quod oportebat demonſtrare.

COROLLARIVM.

Et manifeſtum eſt ex iam demonſtratis rectas lineas, quæ longitudine ſunt commenſurabiles, omnino & potentia commenſurabiles eſſe: quæ vero potentia commenſurabiles, non omnino & longitudine. & quæ longitudine incommenſurabiles ſunt, non omnino & potentia incommenſurabiles: quæ vero potentia incommenſurabiles, omnino & longitudine incommenſurabiles eſſe.

Quoniam enim quadrata,quæ fiunt à rectis lineis longitudine commenſurabilibus proportionem habent, quam quadratus numerus ad quadratum numerum; quę vero proportionem habent, quam quadratus numerus ad quadratum numerum, commenſurabilia ſunt: erunt rectę lineę commenſurabiles longitudine, non ſolum longitudine,ſed & potentia commenſurabiles. C 6.huius.

Rurſus quoniam quæcunque quadrata inter ſe proportionem habent,quam quadratus numerus ad quadratum numerum,latera habent longitudine commenſurabilia, vt oſtenſum eſt, quæ etiam potentia commenſurabilia ſunt, cum eorum quadrata proportionẽ habeãt,quã quadratus numerus ad quadratũ numerũ:quęcunq; quadrata proportionẽ nõ habẽt, quã quadratus numerus ad quadratũ numerũ,ſed ſimpliciter quã aliquis alius numerus ad aliũ numerũ,cõmẽſurabilia ſunt,hoc eſt rectę lineæ à quibus ipſa deſcribũtur, cõmẽſurabiles ſunt potẽtia,nõ aũt & longitudine. ergo rectæ lineæ longitudine quidem commenſurabiles, omnino & potentia commenſurabiles ſunt: potentia vero commenſurabiles non omnino & longitudine, niſi earum quadrata proportionem habeant, quam quadratus numerus ad quadratum numerum. Dico & longitudine incommenſurabiles non omnino & potentia incõmenſurabiles eſſe,Quñ potentia cõmenſurabiles poſſunt proportionem non habere,quam numerus ad numerum, ideoq; cum potentia commenſurabiles ſint, longitudine ſunt incommenſurabiles. ergo non quæ longitudine incommenſurabiles ſunt, omnino & potentia:ſed longitudine incommenſurabiles exiſtentes poſ- D E F

G sunt potentiæ & incommensurabiles, & commẽsurabiles esse, potentia vero incommensurabiles omnino & longitudine incommensurabiles sunt. si enim longitudine sint commensurabiles, & potentia commensurabiles erunt. atqui ponuntur in cõmensurabiles. quòd est absurdum. potentia igitur in commensurabiles, omnino & longitudine incommensurabiles erunt.

SCHOLIVM.

Hoc theorema Theæteti est inuentum, cuius mentionem facit Plato in Theæteto. sed illic quidem particulatim magis exponitur, hic autem vniuersè. namq; illic quadrata, quæ à quadratis numeris mensurantur, commensurabilia etiam latera habere dicit. particularis autem est hæc propositio: neque enim omnia commensurabilia spacia, quorum & latera commensurabilia sunt, comprehendit; si quidem quadratorum spatiorum commensurabilium, videlicet 18 & 8 latera, & si non secundum mensuram numerorum inueniantur, aliter tamen commensurabilia sunt. at ipsa spacia à quadratis numeris minime mensurantur, quamquam etiam mensurari possint. merito igitur hoc loco non horum modum diffiniuit, sed quæ (vt inquit) proportionem habent, quam numerus quadratus ad quadratum numerum. & non frustra quadrati numeri mentio facta est. si enim tantum dixisset, quam numerus ad numerum, redundans esset diffinitio, quoniam quadrata, quæ inter se duplam proportionem habent, commensurabilia habere latera oporteret, non habent autem, est enim maioris latus ad latus minoris, vt quadrati diameter ad eius latus. si igitur ita dixisset, quam numerus ad numerum, redundaret diffinitio, comprehendens etiam ea, quæ latera commensurabilia non habent. Si vero dixisset, quæ à quadratis numeris mensurantur, diffinitio diminuta esset, non comprehendens ea, quę cum latera commensurabilia habeant, à quadratis numeris non mensurantur: & proportionem habent, quam numerus quadratus ad quadratum numerum. Quamobrem recte appositum est, quam numerus quadratus ad quadratum numerum; comprehenduntur enim omnia spacia, quæ & si à quadratis numeris non mensurantur, tamen cum sint commensurabilia, latera quoque commensurabilia habent. nam 18 & 8 commensurabilibus existentibus, propterea quòd à lateribus commensurabilibus describuntur, inueniemus eorum latera, cum proportionem habeant, quam numerus quadratus ad quadratum numerum. vt enim 9 ad 4, ita 18 ad 8. Itaque sumentes latera ipsorum 9 & 4, æqualiter secabimus propositorum quadratorum latera: & habebimus commensurabilitatẽ. namque vt quadrata ad quadrata, ita sunt latera ad latera.

F. C.

Quæ à rectis lineis longitudè commenſurabilibus fuerint quadrata] *intellige rectas lineas longitudine commenſurabiles inter ſe ſe, non expoſitae rationali: hoc enim non ſolum rationalibus contingit, ſed & irrationalibus, vt deinceps apparebit.* A

Et quadrata inter ſe proportionem habentia, quam quadratus numerus ad quadratum numerum, & latera habebunt longitudine commenſurabilia] *Per quadrata inter ſe proportionem habentia, quam quadratus numerus ad quadratum numerum non ſolum intelligenda ſunt ea, quae totidem quadratas menſuras continent, quot vnitates ſunt in numeris quadratis; ſed et quae inter ſe proportionem habent, quam quadratus numerus ad quadratum numerum. ſint enim duo numeri plani ſimiles E, G, & recta linea A. ſitq; F 6, & G, 24. & fiat ex corollario ſextę propoſitionis huius, vt F ad G, ita A ad aliam lineam, quae ſit E. & inter A E ſumpta media proportionali B, erit vt prima ad tertiam, videlicet vt A ad E, ita quadratum, quod ex prima ad quadratum, quod ex ſecunda, hoc eſt ita quadratum, quod ex A ad quadratum, quod ex B. ſed vt A ad E, ita erat numerus F ad numerum G. vt igitur numerus F ad G numerum, ita erit quadratum ex A ad quadratum ex B. ideoq; quadratum ex A continebit totidem menſuras quadratas, vt exempli gratia totidem pedes quadratos, quot vnitates ſunt in F, videlicet ſex, & quadratum ex B totidem pedes quadratos continebit, quot vnitates ſunt in G, hoc eſt 24. & quoniam numeri plani ſimiles F G inter ſe proportionem habent, quam quadratus numerus ad numerum quadratum; habebit etiam quadratum ex A ad quadratum ex B proportionem eam, quam quadratus numerus ad quadratum numerum, habeat quam quadratus numerus, qui fit ex C ad quadratum numerum, qui fit ex D. ſimiliter demonſtrabitur eorum quadratorum latera A B, quamquam certo numero exprimi non poſſint, tamen inter ſe longitudine commenſurabilia eſſe. & idcirco proportionem habere, quam numerus ad numerum. Iuniores eiuſmodi latera radices quadratas, vel radices ſimpliciter appellant; dicetur enim A radix 6, & B radix 24. atque eſt R 6 ad R 24, vt 1 ad 2. nam cum quadratum ex B quadruplum ſit quadrati ex A, erit B ipſius A dupla. ſimiles enim rectilineę figurae in dupla ſunt proportione homologorum laterum.* B



Coroll. 20. ſexti.

26. octaui.

Coroll. 20. ſexti.

Quoniam enim quadrata, quæ fiunt à rectis lineis longitudine commenſurabilibus] *Oſtendit quomodo prima corollarij pars ſequatur ex prima parte theorematis.* C

Rurſus quoniam quæcunque quadrata inter ſe proportionem habent, quam quadratus numerus ad quadratum numerum] *Rurſus oſtendit quomodo idem ex ſecunda parte theorematis ſequatur.* D

Quęcunque quadrata proportionem non habent, quam quadratus numerus ad quadratum numerum, ſed ſimpliciter quam aliquis alius numerus ad alium numerum] *Hoc ad ſecundam partē Corollarij attinet, & ſequitur ex vltima parte theorematis.* E

Dico & longitudine incommenſurabiles] *Hoc pertinet ad tertiam partem corollarij, & ex tertia parte theorematis explicatur.* F

Potentia vero incommenſurabiles omnino & longitudine incommenſurabiles ſunt] *Hęc eſt vltima corollarij pars, quae per deductionem ad id, quod fieri non poteſt ex prima parte theorematis demonſtratur.* G

THEOREMA VIII. PROPOSITIO X.

Si quattuor magnitudines proportionales fuerint, prima vero secundæ fuerit commensurabilis; & tertia quartę commensurabilis erit. & si prima secundę fuerit incommensurabilis, & tertia quartæ incommensurabilis erit.



Sint quattuor magnitudines proportionales. A B C D, sitq; vt A ad B, ita C ad D, & sit A ipsi B commensurabilis. Dico & C ipsi D commensurabilem esse. Quoniam enim A commensurabilis est ipsi B, habebit A ad B proportionem, quam numerus ad numerum: atque est vt A ad B, ita C ad D. ergo & C ad D proportionem habet, quam numerus ad numerum. commensurabilis igitur est C ipsi D. sed A ipsi B sit incommensurabilis. dico & C ipsi D incommensurabilem esse. Quoniam enim incommensurabilis est A ipsi B, non habebit A ad B proportionē, quam numerus ad numerum. est aūt vt A ad B, ita C ad D. ergo neque C ad D proportionem habet, quam numerus ad numerum. si enim C ad D proportionem habeat, quā numerus ad numerum; & A ad B eam, quā numerus ad numerū proportionē habebit; atq; erit A ipsi B cōmēsurabilis. quod est absurdū; incōmēsurabilis enim ponitur. ergo C ad D proportionē nō hēt, quā numerus ad numerum; ideoq; C ipsi D est incommensurabilis. Si igitur quattuor magnitudides proportionales fuerint; prima vero secundæ fuerit commensurabilis, & tertia quartæ commensurabilis erit. & si prima secundæ fuerit incommensurabilis, & tertia quartæ incommensurabilis erit. quod oportebat demonstrare.

5. huius.
6. huius.
7. huius.
8 huius.

LEMMA I.

Ostensum est in arithmeticis numeros planos similes inter se proportionem habere, quam quadratus numerus ad quadratum numerum: & si duo numeri inter se proportionem habeant, quam quadratus numerus ad quadratum numerum, eos similes planos esse. & manifestum est ex his, dissimiles planos numeros, hoc est non habentes latera inter sē proportionalia proportionem non habere, quam quadratus numerus ad quadratum numerum. si enim haberent, similes plani essent. quod non ponitur. ergo dissimiles plani inter se proportionem non habent, quam quadratus numerus ad quadratum numerum.

26. octaui.

A

LEMMA II.

Duobus datis numeris, & recta linea, facere vt numerus ad numerum, ita quadratum rectę lineæ ad alterius rectæ lineæ quadratum.

Sint dati quidem duo numeri A B; & data recta linea C. oportet inuenire alteram rectam lineam, ita vt quadratum, quod fit ex C ad quadratum ex altera recta linea eam proportionem habeat, quam numerus primus ad secundum numerum. quot enim vnitates sunt in A, in tot partes æquales diuidatur C recta linea, &

uni

vni ipsarum æqualis sit D. quot autem vnitates sunt in B, ex tot partibus ipsi D æqualibus cõponatur recta linea E. est igitur vt vnitas ad A, ita D ad C: & conuertendo vt A ad vnitatem, ita C ad D. est autem & vt vnitas ad B, ita D ad E. ergo ex æquali vt A ad B, ita recta linea C ad ipsam E. sumatur rectarum linearũ C E media proportionalis F. est igitur vt C ad E, ita quadratum, quod fit ex C ad id, quod ex F quadratum, nãque vt prima ad tertiam, ita quadratum, quod fit ex prima ad quadratum, quod ex secunda simile, & similiter descriptum. sed vt C ad E, ita est A ad B. & vt igitur A ad B, ita quadratum ex C ad quadratum ex F. quare C F sunt rectę lineæ, quas quærebamus. etenim F inuenta est.



Coroll. 20. sexti.

LEMMA III.

Duos numeros planos dissimiles inuenire, hoc est vt inter se proportionem non habeant, quam quadratus numerus ad quadratum numerum.

Exponantur quattuor numeri A B C D, ita vt non sit sicut A ad C, ita B ad D, & fiat ex A B numerus E, & C D numerus F. perspicuum est E F numeros planos esse, planos autem dissimiles, quoniam latera proportionalia non sunt. quod facere oportebat.



PROBLEMA III.
PROPOSITIO. XI.

Propositæ rectæ lineæ inuenire duas rectas lineas incommensurabiles, alteram quidem longitudine tantum, alteram vero etiam potentia.

Sit proposita recta linea A. oportet ipsi A inuenire duas rectas lineas incommensurabiles, alteram quidem longitudine tantum, alteram vero etiam potentia. exponantur enim duo numeri B C inter se proportionem non habentes, quam quadratus numerus ad quadratum numerum, hoc est dissimiles plani: & fiat vt B ad C, ita quadratum ex A ad quadratum ex D: hoc enim ante traditum est. ergo quadratum ex A commensurabile est quadrato ex D. & quoniam B ad C proportionem non habet, quam quadratus numerus ad quadratũ numerum, neque quadratum ex A ad quadratũ ex D proportionem habebit, quam quadratus numerus ad quadratũ numerum. incommensurabilis igitur est A ipsi D longitudine. sumatur ipsarum A D media proportionalis E. est igitur vt A ad D, ita quadratum ex A ad quadratum ex E. sed A ipsi D longitudine est incommensurabilis. ergo & quadratum ex A quadrato ex E incommensurabile erit. incommensu-



9. huius. Coroll. 20. sexti.

D

rabilis

rabilis igitur est A ipsi E potentia. ergo propositæ rectæ lineæ rationali, à qua dicebamus mensuras sumi, vt ipsi A potentia quidem commensurabilis inuenta est D, hoc est rationalis potentia tantum commensurabilis, irrationalis vero E. irrationales enim vniuersè appellantur, quæ rationali & longitudine, & potentia incommensurabiles sunt.

F. C. COMMENTARIVS.

A Et si duo numeri inter se proportionem habeant, quam quadratus numerus ad quadratum numerum, eos similes planos esse] *Hoc ab Euclide non demonstratur in arithmeticis, sed nos ad vigesimam sextam octaui libri demonstrauimus.*

B Exponantur enim duo numeri B C inter se proportionem non habentes, quã quadratus numerus ad quadratum numerum, hoc est dissimiles plani] *Hoc in promptu est, sed tamen quomodo fiat in tertio Scholio antecedentium explicatur.*

C Et fiat vt B ad C, ita quadratum ex A ad quadratum ex D, hoc enim ante traditũ est] *In corollario scilicet sexti theorematis, & quamquam hoc ex illo perspicue appareat, tamen secundum lemma, quod in græcis codicibus inuenitur hoc loco apponere non inutile iudicauimus.*

D Ergo & quadratum ex A quadrato ex E incommensurabile erit] *ex antecedenti theoremate.*

THEOREMA IX. PROPOSITIO XII.

Quæ eidem magnitudini sunt commensurabiles, & inter se commensurabiles sunt.

Vtraque enim ipsarum A B ipsi C sit commensurabilis. dico & A ipsi B commensurabilem esse. Quoniam enim A commensurabilis
5.huius. est ipsi C, habebit A ad C proportionem, quã numerus ad numerum. habeat quam numerus D ad ipsum E. Rursus quoniam commensurabilis est B ipsi C, habebit C ad B proportionem, quam numerus ad numerum. habeat quam F ad G. & proportionibus datis quibuscunque, videlicet quam habet D ad E, & quam
4.octaui: habet F ad G, sumantur numeri deinceps proportionales in datis proportionibus H K L; sitq; vt D ad E, ita H ad K: vt autem F ad G, ita K ad L. Quoniam igitur est vt A ad C, ita D ad
11.quinti. E; sed vt D ad E, ita H ad K: erit & vt A ad C, ita H ad K. Rursus quoniam est vt B ad C, ita F ad G, & vt F ad G, ita K ad L; erit & vt B ad C, ita K ad L. est autem & vt A ad C, ita H ad K. ex æquali igitur vt A ad B, ita H ad L. ergo A ad B proportionem habet. quam numerus H ad L numerum: ac propterea A ipsi B est commensurabilis. Quæ igitur eidẽ magnitudini sunt commensurabiles, & inter se commensurabiles sunt. quod oportebat demonstrare.



SCHOLIVM.

Hoc ab identitate non conuertitur. non enim quę inter se sunt commensurabiles, & eidem commensurabiles sunt; quemadmodum neque æquales inter se eidem sunt æquales, sed contra. nam contingit & incõ

mensurabiles

mensurabiles esse eidem, & commensurabiles; quod sequens theorema, & eius conuersum ostendet.

THEOREMA X. PROPOSITIO. XIII.

Si sint duæ magnitudines, & altera quidem eidem sit commensurabilis, altera vero incommensurabilis; magnitudines inter se incommensurabiles erunt.

Sint enim duę magnitudines A B, alia autem sit C: & A quidem ipsi C commensurabilis sit; B vero eidem C incommensurabilis. Dico & A ipsi B incommensurabilem esse. si enim commensurabilis est A ipsi B, est autem & C commensurabilis ipsi A; erit & C ipsi B cōmensurabilis. quod non ponitur.



Ex antecedente.

THEOREMA XI. PROPOSITIO. XIIII.

Si duę magnitudines commensurabiles sint, altera autem ipsarum alicui magnitudini sit incommensurabilis, & reliqua eidem incommensurabilis erit.

Sint duæ magnitudines commensurabiles A B; altera vero ipsarum A alicui magnitudini C sit incommensurabilis. Dico & reliquam B ipsi C incommensurabilem esse. si enim commensurabilis est B ipsi C, est autem & A commensurabilis ipsi B; & A ipsi C commensurabilis erit: sed & incommensurabilis. quod fieri non potest. non igitur commensurabilis est B ipsi C. ergo est incommensurabilis. si igitur duæ magnitudines cōmensurabiles sint, altera aūt ipsarum alicui magnitudini sit incommensurabilis; & reliqua eidem incommensurabilis erit. quod oportebat demonstrare.



Ex huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Ex ijs, quae proxime demonstrata sunt, licet illud etiam demonstrare.

Quæ incommensurabilibus sunt commensurabiles, & inter se incommensurabiles erunt.

Sint duae magnitudines incommensurabiles A B: sitq; C ipsi A commensurabilis: & D commensurabilis ipsi B. Dico C D inter se incommensurabiles esse. Quoniam enim A C commensurabiles sunt; atque est A ipsi B incommensurabilis; & C ipsi B incommensurabilis erit. Rursus quoniam B D commensurabiles sunt; est autem B incommensurabilis ipsi C; & D ipsi C incommensurabilis erit. quod oportebat demonstrare.



Ex antecedente.

LEMMA

Duabus datis rectis lineis inaequalibus inuenire id, quo maior plus potest, quàm minor.

Sint

Sint datæ duæ rectæ lineæ inæquales A B C, quarum maior sit A B. oportet inuenire id, quo A B plus potest, quàm C. Describatur in recta linea A B semicirculus A D B, & in eo aptetur recta linea A D, ipsi C æqualis, & D B iungatur. perspicuum est angulum A D B rectum esse, & ipsam A B plus posse, quàm A D, hoc est quàm C, quãtum est recta lineæ D B quadratum.



1 quarti. 31. tertij. 47. primi.

Similiter autem & datis duabus rectis lineis, quæ ipsas potest, hoc modo inuenietur.

Sint duæ datæ rectæ lineæ A D D B; & oporteat inuenire rectam lineam, quæ ipsas possit. exponantur enim A D D B, ita vt rectum angulum contineant A D B. & A B iungatur. rursus perspicuum est rectam lineam A B ipsas A D D B posse.

47. primi.

THEOREMA XII. PROPOSITIO. XV.

Si quattuor rectæ lineæ proportionales fuerint; prima vero tãto plus possit, quàm secunda, quãtum est quadratum rectæ lineæ sibi cõmensurabilis longitudine: & tertia tãto plus poterit, quàm quarta, quantum est quadratum rectæ lineæ sibi longitudine commensurabilis. Quòd si prima tanto plus possit, quàm secunda, quãtum est quadratum rectæ lineæ sibi incommensurabilis longitudine; & tertia, quàm quarta tánto plus poterit, quantum est quadratum rectæ lineæ sibi longitudine incommensurabilis.

Sint quattuor rectæ lineæ proportionales A B C D, sitq; ut A ad B, ita C ad D; & A quidẽ plus possit, quàm B, quadrato, quod fit ex E: C vero plus possit, quàm D, quadrato ex F. Dico si A ipsi E sit commensurabilis, & C ipsi F cõmensurabilem esse. si uero A ipsi E sit incommensurabilis, & C ipsi F incommensurabilem esse. quoniam enim est vt A ad B, ita C ad D, erit vt quadratum ex A ad quadratum ex B, ita quadratum ex C ad id, quod ex D quadratum. sed quadrato quidem, quod fit ex A æqualia sũt quadrata, quæ ex ipsis E B; quadrato autem ex C æqualia sunt quadrata ex F D. vt igitur quadrata, quæ ex E B ad quadratum ex B, ita quadrata, quæ ex F D ad quadratum ex D: & diuidẽdo vt quadratum ex E, ad quadratum ex B, ita quadratum ex F ad quadratũ ex D; quare vt E ad B, ita est F ad D: & conuertendo vt B ad E, ita D ad F. est autem & vt A ad B, ita C ad D. ex æquali igitur vt A ad E, ita est C ad F. ergo si A est commensurabilis ipsi E, & C ipsi F erit commensurabilis; si vero incommensurabilis est A ipsi E, & C ipsi F incommensurabilis erit. Si igitur quattuor rectæ lineæ proportionales sint, & reliqua, quod oportebat demonstrare.



22. sexti. 10. huius.

PROBLEMA XIII. PROPOSITIO. XVI.

Si duæ magnitudines commensurabiles componantur, & tota magnitudo

magnitudo vtrique ipſarum cõmenſurabilis erit. quòd ſi tota magnitudo uni ipſarum ſit commenſurabilis, & quę à principio magnitudines commenſurabiles erunt.



Componantur enim duæ magnitudines commenſurabiles A B B C. Dico & totam magnitudinem A C vtrique ipſarum A B B C commenſurabilem eſſe. Quoniam enim commenſurabiles ſunt A B B C, metietur eas aliqua magnitudo. metiatur, ſitq; D. & quoniam D metitur ipſas A B B C, & totam A C metietur: metitur autem & A B B C. Ergo D magnitudines A B B C, & ipſam A C metitur. commenſurabilis igitur eſt A C vtrique ipſarum A B B C. Sed A C vni ipſarum A B B C ſit commenſurabilis, videlicet ipſi A B. Dico & A B B C commenſurabiles eſſe. Quoniam enim commenſurabiles ſunt C A A B, metietur eas aliqua magnitudo. metiatur, & ſit D. Itaque quoniam D metitur ipſas C A A B, & reliquam B C metietur. metitur autem & A B. ergo D ipſas A B B C metitur: ac propterea A B B C commenſurabiles ſunt. Si igitur duæ magnitudines commenſurabiles componantur, & tota magnitudo vtrique ipſarum commenſurabilis erit, & reliqua. quod oportebat demonſtrare.

1. diff.
4. com. not.
3. com. not.

THEOREMA XIIII. PROPOSITIO XVII.

Si duæ magnitudines incommenſurabiles componãtur, & tota magnitudo vtrique ipſarum incommenſurabilis erit. quòd ſi tota magnitudo uni ipſarum ſit incõmẽſurabilis, et quæ à principio magnitudines incommenſurabiles erunt.



Componantur enim duæ magnitudines incommenſurabiles A B B C. Dico & totam magnitudinem A C vtrique ipſarum A B B C incommenſurabilem eſſe. ſi enim non ſunt incommenſurabiles C A A B, metietur eas aliqua magnitudo. metiatur, ſitq; D, ſi fieri poteſt. Quoniam igitur D metitur ipſas C A A B, & reliquam B C metietur. metitur autem & B A. ergo D ipſas A B B C metitur; ac propterea commenſurabiles ſunt A B B C. ponuntur autem & incommenſurabiles. quod fieri non poteſt. non igitur ipſas C A A B metietur aliqua magnitudo. quare C A A B incommenſurabiles ſunt. ſimiliter & A C C B incõmenſurabiles eſſe demõſtrabimus. ergo A C vtrique ipſarum A B B C eſt incõmenurabilis. ſed A C vni ipſarũ A B B C incõmenſurabilis ſit; & primũ ipſi A B. Dico & A B B C incõmẽſurabiles eſſe. ſi enim ſunt cõmenſurabiles, eas aliqua magnitudo metietur. metiatur, & ſit D. qm̃ igitur D metitur ipſas A B B C, & totã A C metietur. metitur autem & A B. ergo D ipſas C A A B metitur: ideoq; C A A B commenſurabiles ſunt. ponuntur autem & incommenſurabiles. quod fieri non poteſt. non igitur ipſas A B B C metietur aliqua magnitudo. quare A B B C incommẽſurabiles erũt. ſimiliter demonſtrabimus A C, & reliquæ B C eſſe incommenſurabilem. Si igitur duæ magnitudines incommenſurabiles componantur, & reliqua. quod oportebat demonſtrare.

4. com. not.

F. C. COMMENTARIVS.

Ex iam demonſtratis illud etiam conſtat.

Si tota magnitudo ex duabus magnitudinibus compoſita vni componentium ſit incommenſurabilis, & reliquæ incommenſurabilis erit.

Sit enim tota magnitudo AC incommenſurabilis magnitudini AB. Dico AC etiam reliquae BC incommenſurabilem eſſe. Quoniã enim CA eſt incommenſurabilis ipſi AB, erunt AB, BC incommenſurabiles. & quoniam AB BC incommenſurabiles ſunt, & AC vtrique ipſarum incommenſurabilis erit. quod oportebat demonſtrare.



Ex demonſtratis.

LEMMA. I.

Si ad aliquam rectam lineam applicetur parallelogrammum deficiẽs figura quadrata, parallelogrammum applicatum æquale eſt ei rectangulo, quod partibus rectæ lineæ ex applicatione factis continetur.

Ad aliquam enim rectam AB applicetur AD parallelogrammum, deficiẽs figura quadrata DB. Dico parallelogrammum AD rectangulo ACB æquale eſſe; quod quidem per ſeſe patet. quoniam enim quadratum eſt DB, erit DC ipſi CB æqualis, atque eſt parallelogrammum AD, quod AC CB continetur. ſi igitur ad aliquam rectam lineam applicetur parallelogrammum, & reliqua. quod oportebat demonſtrare.



LEMMA II.

Si duæ rectæ lineæ inæquales ſint, quarta autem pars quadrati, quod à minore fit, ad maiorem applicetur, deficiens figura quadrata; quod applicatum eſt per bipartitam ſectionem non tranſit.

Si enim fieri poteſt, ſint duæ rectæ lineę inęquales AB C: quarta autem pars quadrati, quod fit à minori C ad maiorem applicetur, deficiens figura quadrata; quæ ſcilicet, fit à DB ipſius AB dimidia, erit ex præcedenti lemmate id, quod applicatum eſt æquale ei, quod partibus AD DB continetur, hoc eſt æquale quadrato ex DB. etenim AB bifariã in puncto D ſecatur. quod igitur quater fit à DB ęquale eſt quadruplo eius, quod applicatum eſt. ſed quod quater fit à DB eſt ipſius AB quadratum; nam longitudine duplæ potentia quadruplę ſunt: quadruplum vero eius, quod applicatur eſt quadratum ipſius C. ergo quadratum, quod fit ex AB eſt æquale quadrato ex C, hoc eſt quadratum maioris æquale quadrato minoris. quod fieri non poteſt. non igitur quarta pars quadrati, quod fit à C applicata ad AB per bipartitam ſectionẽ trãſit.



LEMMA. III.

Duabus datis rectis lineis inæqualibus, quartam partem quadrati minoris ad maiorem applicare, ita vt deficiat figura quadrata.

Sint datę duæ rectæ lineæ inæquales AB CD, ſitq; maior AB. & oporteat facere quod propoſitum eſt. ſecetur CD bifariã in E. manifeſtum eſt quartam partem quadrati, quod fit à CD eſſe quadratum ex CE. & deſcribatur in recta linea AB ſemicirculus; ſeceturq; AB bifariã in F: & à puncto F ipſi AB ad rectos angulos

ducatur

ducatur F G. Quoniam igitur A B maior eſt, quàm C D, erit & ipſius A B dimidia maior, quàm dimidia ipſius C D, hoc eſt maior quàm C E. ponatur F H æqualis C E, & per H ipſi A B parallela ducatur H K, atque à puncto K ad A B perpẽdicularis ducatur K L. iungantur A K K B. rectangulum igitur eſt triangulum A K B, & ab angulo recto ad baſim perpendicularis ducta eſt K L. ergo rectangulum A L B eſt æquale quadrato, quod fit ex K L. producatur K L, & ponatur ipſi L B æqualis L M, & figura compleatur. quadratum igitur, quod fit ex K L, hoc eſt quod ex F H eſt æquale parallelogrammo A M. ſed quod fit ex F H eſt æquale quadrato ex C E, hoc eſt quartæ parti quadrati ex C D: eſtq; A M deficiens figura quadrata. quod ipſum facere oportebat.



8 & 19. huius.

THEOREMA XV. PROPOSITIO. XVIII.

Si duæ rectæ lineæ inæquales ſint, quartæ autem parti quadrati, quod fit à minori æquale parallelogrammum ad maiorem applicetur, deficiens figura quadrata, & in partes longitudine commenſurabiles ipſam diuidat; maior tanto plus poterit quàm minor, quantum eſt quadratum rectæ lineæ ſibi longitudine commenſurabilis. Quòd ſi maior tanto plus poſsit, quàm minor, quãtum eſt quadratum rectæ lineæ ſibi longitudine commenſurabilis, quartæ autem parti quadrati, quod fit à minori æquale parallelogrammum ad maiorem applicetur, deficiens figura quadrata; in partes longitudiue commenſurabiles ipſam diuidet.



Sint duæ rectæ lineæ inæquales A B C, quarum maior B C; quartæ autem parti quadrati, quod fit à minori A, hoc eſt ei, quod fit à dimidia ipſius A, æquale parallelogrãmum ad B C applicetur, deficiens figura quadrata, & ſit quod continetur B D D C, ſitq; B D ipſi D C commenſurabilis longitudine. Dico B C plus poſſe, quàm A, quadrato rectæ lineæ ſibi longitudine commenſurabilis. ſecetur enim B C bifariam in puncto E, & ipſi D E æqualis ponatur E F. reliqua igitur D C eſt æqualis B F. & quoniam recta linea B C ſecatur in partes quidem æquales ad E punctum, in partes vero inæquales ad punctum D; erit B D C rectangulum vnà cum quadrato ex E D æquale ei, quod fit ex E C quadrato, & eorum quadrupla quod igitur quater B D D C continetur vnà cum quadrato, quod fit ex E D quater æquale eſt quadrato quod quater fit ex E C. Sed ei quidem, quod quater B D D C continetur æquale eſt quadratum ex A: ei vero, quod quater fit ex D E æquale eſt quadratũ, quod ex D F; etenim D F ipſius D E eſt dupla: & ei quod quater fit ex E C æquale eſt quadratum quod ex B C; rurſus enim B C dupla eſt ipſius E C. ergo quadrata, quæ fiunt ex A D F æqualia ſunt ei, quod fit ex B C quadrato; ac propterea quadratum, quod fit ex B C maius eſt, quàm quadratũ, quod ex A, quadrato, quod ex D F. recta igitur linea B C tanto plus poteſt, quàm A, quantum eſt ipſius D F quadratum. oſtendendum eſt & B C ipſi D F commenſurabilem eſſe. Quoniam enim B D commenſurabilis eſt ipſi D C longitudine, erit & B C ipſi C D longitudine commenſurabilis. ſed D C ipſis C D B F eſt commenſurabilis longitudine. æqua-

5. ſecundi.

5. quinti.

B

C

D lis enim eſt C D ipſi B F. quare & B G ipſis B F C D longitudine eſt commenſurabi-
E lis, & reliquę igitur F D longitudine commenſurabilis erit. ergo B C plus poteſt, quàm A quadrato rectæ lineæ ſibi longitudine commenſurabilis. Sed B C plus poſſit quàm A, quadrato rectæ lineæ ſibi longitudine commenſurabilis, quartæ autem parti quadrati, quod fit ex A æquale parallelogrammũ ad B C applicetur, deficiens figura quadrata; & ſit quod continetur B D D C. oſtendendum eſt B D ipſi D C lõgitudine commẽſurabilem eſſe. Iiſdem enim conſtructis ſimiliter demonſtrabimus B C plus poſſe, quàm A, quadrato rectæ lineæ F D. ſed B C plus poteſt, quàm A, quadrato rectæ lineæ ſibi longitudine commenſurabilis. ergo B C commenſurabilis
F eſt ipſi F D longitudine. & rẽliquę igitur, vtrique ſcilicet B F D C longitudine eſt commenſurabilis, ſed vtraque B F D C ipſi D C commẽſurabilis eſt longitudine;
G etenim B F eſt æqualis D C. ergo & B G ipſi C D longitudine eſt commenſurabilis.
H ex quibus conſtat B D ipſi D C longitudine commenſurabilem eſſe. Si igitur duę rectæ lineę inæquales ſint, & reliqua quod demonſtrare oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

A Quartæ autem parti quadrati, quod fit à minori A, hoc eſt ei, quod fit à dimidia ipſius A æquale parallelogrammum ad B C applicetur, deficies figura quadrata] *ex antecedente lemmate. Hoc autem nihil aliud eſt, niſi rectam lineam maiorem, ita ſecare, vt rectangulum ipſius portionibus contentum quartæ parti quadrati minoris ſit æquale. ſed poſſumus illud idem vniuerſalius explicare in hunc modum.*

Datam rectam lineam ita ſecare, vt rectangulum, quod partibus cõtinetur, ſit æquale dato rectilineo. oportet autem datum rectilineũ minus eſſe quadrato, quòd à dimidia deſcribitur.

Sit data recta linea A B, diuiſa bifariàm in C; datumq; rectilineum D. & oporteat facere quod propoſitum eſt. Deſcribatur in A B ſemicirculus A E B; & à puncto C ipſi A B ad rectos angu-
25. ſexti. *los ducatur C E: deinde rectilineo D fiat æquale quadratum F G H K. erit eius latus F G minus*



ipſa A C, hoc eſt ipſa C E. quare à recta linea C E abſcindatur C L, quæ ſit æqualis F G: & per L quidem ducatur L M parallela ipſi A B: per M vero ducatur M N parallela C E. Dico rectam lineam A B ſectam eſſe in puncto N, vt oportebat, hoc eſt rectangulum A N B rectilineo D æquale eſſe. æquale etenim eſt quadrato ex M N. ſed cum M N ſit æqualis ipſi C L, hoc eſt ipſi F G, erit rectãgulũ A N B quadrato F G H K, hoc eſt rectilineo D æquale. quod facere oportebat.

Similiter & datum numerum in duas partes ita diuidemus, vt qui ex ipſis producitur dato numero ſit æqualis. oportet autem datum numerum, cui æqualis eſſe debet, quadrato dimidij minorem eſſe.

Sit datus numerus 20, quem oporteat ita diuidere, vt qui ex partibus producitur, ſit æqualis dato numero 75. Accipiatur ipſius 20 medietas, quæ eſt 10, & in ſe multiplicetur, faciet 100, à quo detrahemus datum numerum, videlicet 75, & relinquetur 25. huius igitur latus 5 additũ ipſi 10 conſtituit 15; & detractum ab eodem conſtituit 5. Dico 20 in has partes ita diuiſum eſſe, vt oportebat, hoc eſt eum, qui ex ipſis producitur, æqualem eſſe dato numero 75. Quoniam enim 20 diuiditur in duas partes æquales, & in duas partes inæquales, numerus planus, qui fit ex partibus inæqualibus vnà cum quadrato numeri interiecti æqualis eſt ei, qui fit à dimidio quadrato, quod demonſtratum eſt à Barlaam monacho in theoremate quinto eorum, quæ nos ad 15. noni

appoſuimus

appoſuimus. ergo quę fit ex 15, & 5 vnà cũ quadrato ipſius 5 eſt aequalis quadrato dimidij, vide licet 100: & detracto communi quadrato 25, erit qui producitur ex 15, & 5 aequalis dato numero 75. quod facere oportebat.

Sed ei quidem, quod quater DB BC continetur, æquale eſt quadratum ex A]*Ponitur enim parallelogrammum rectãgulum D B C aequale quartae parti quadrati, quod fit ex A.* B

Erit & BC ipſi CD longitudine cõmẽſurabilis]*Ex prima parte ſextae decimae huius.* C

Quare BC ipſis BF CD longitudine eſt commenſurabilis]*Ex 12 huius.* D

Et reliqua igitur F D longitudine commenſurabilis erit]*Ex eo, quod nos ad 17. huius demonſtrauimus. ſumantur enim BF DC ſimul, ac ſi vna linea eſſet.* E

Et reliquę igitur, vtrique ſcilicet B F D C longitudine eſt commenſurabilis]*Ex eodem theoremate, quod ad 17 huius appoſuimus.* F

Ergo & BC ipſi DC longitudine eſt commenſurabilis.]*Ex 12 huius.* G

Ex quibus conſtat BD ipſi DC longitudine commenſurabilem eſſe]*Ex ſecunda parte ſextae decimae huius.* H

THEOREMA XVI. PROPOSITIO. XIX.

Si duæ rectę lineæ inæquales ſint, quartę autem parti quadrati, quòd fit à minori æquale parallelogrammum ad maiorem applicetur, deficiens figura quadrata, & in partes incommenſurabiles longitudine ipſam diuidat; maior tanto plus poterit, quàm minor, quantum eſt quadratum rectæ lineæ ſibi longitudine incommenſurabilis. Quòd ſi maior tanto plus poſsit, quàm minor, quantum eſt quadratum rectę lineæ ſibi longitudine incommenſurabilis, quartę autem parti quadrati, quod fit à minori æquale parallelogrammum ad maiorem applicetur, deficiens figura quadrata, in partes longitudine incommenſurabiles ipſam diuidet.



Sint duæ rectæ lineæ inæquales A BC, quarum maior B C: quartæ autem parti quadrati, quòd fit à minori A, æquale parallelogrammum ad ipſam BC applicetur, deficiẽs figura quadrata; & ſit quod continetur B D D C; ſitq; BD ipſi DC longitudine incommenſurabilis. Dico B C plus poſſe, quàm A quadrato rectæ lineę ſibi longitudine incommẽſurabilis. ijſdem enim, quę ſupra, conſtructis, ſimiliter oſtendemus ipſam BC plus poſſe, quàm A, quadrato rectę lineæ D F. oſtendendum igitur eſt B C ipſi D F longitudine incommenſurabilem eſſe. Quoniam enim incommenſurabilis eſt B D ipſi D C, erit & BC ipſi C D longitudine incommenſurabilis. ſed DC incommenſurabilis eſt vtriſque BF DC. ergo & BC ipſis BF DC longitudine eſt incommenſurabilis. ac propterea reliquę F D incommenſurabilis eſt longitudine; & BC plus poteſt, quàm A. quadrato rectæ lineę ſibi longitudine incommẽſurabilis. Sed BC rurſus plus poſsit, quàm A, quadrato rectæ lineæ ſibi incommenſurabilis longitudine. quartæ autem parti quadrati, quod fit ex A æquale parallelogrammum ad BC applicetur, deficiens figura quadrata; & ſit quod BD DC continetur. oſtendendum eſt BD ipſi DC longitudine incommenſurabilem eſſe. Iiſdem enim conſtructis, ſimiliter demonſtrabimus BC plus poſſe quàm A, quadrato rectæ lineæ DF. ergo oſtendendum relinquitur BC plus poſſe, quàm A, quadrato rectę lineæ ſibi longitudine incommenſurabilis. incommenſurabilis igitur eſt BC ipſi DF longitudine. quare & reliquę, videlicet vtrique BF DC eſt incommenſurabilis. ſed vtraque BF DC commenſurabilis eſt longitudine ipſi DC. ergo & BC ipſi CD eſt incommenſurabilis longitudine; ac propterea diuidendo

17. huius. 14. huius. Ex demonſtratis ad 17. huiusſ

Ex demonſtratis ad 17. huius. 14. huius. 17. huius.

do BD ipsi DC longitudine incommensurabilis erit. Si igitur duę rectæ lineę inæquales sint, & reliqua. quod oportebat demonstrare.

SCHOLIVM.

Hactenus tractauit de commensurabilibus, & incommensurabilibus, nunc ad rationales & medias transit.

LEMMA. I.

Quoniam demonstratum est longitudine commensurabiles omnino & potentia commensurabiles esse. potentia vero commensurabiles non omnino & longitudine, sed posse & longitudine commensurabiles esse, & incommensurabiles: manifestum est, si expositæ rationali aliqua commensurabilis fuerit longitudine, illam rationalem vocari, & ipsi commensurabilem non solum longitudine, sed etiam potentia, longitudine enim commensurabiles omnino & potentia commensurabiles sunt. Si vero expositę rationali aliqua fuerit potentia commensurabilis, si quidem & longitudine, dicetur & sic rationalis, & commensurabilis ipsi longitudine, & potentia. Quòd si expositæ rationali rursus aliqua commensurabilis existens potentia, longitudine fuerit incommensurabilis, dicetur & sic rationalis potentia tantum commensurabilis.

Coroll. 9. huius.

PROCLI LEMMA. II.

Rationales vocat eas; quæ expositæ rationali vel longitudine & potentia commensurabiles sunt, vel potentia solum. sunt autem & aliæ rectæ lineæ, quæ longitudine quidem expositę rationali incommensurabiles sunt, potentia autem solum commensurabiles; atque ob id rursus dicuntur rationales, & commensurabiles inter se, quatenus rationales, sed commensurabiles inter se vel longitudine, & potentia, vel potentia solum. & si quidem longitudine, dicuntur & ipsæ rationales longitudine commensurabiles, vt intelligatur etiam potentia commensurabiles esse: si vero potentia solum, inter se sunt commensurabiles, dicuntur ipsæ quoque rationales potentia solum commensurabiles.

At vero rationales commensurabiles esse ex his constat.

Rationales commensurabiles sunt. 11. huius.

Quoniam enim rationales sunt, quæ expositę rationali sunt commensurabiles, quæ vero eidem commensurabiles etiam inter se commensurabiles sunt; sequitur rationales commensurabiles esse. quod demonstrare oportebat.

LEMMA III.

Inuenire duas rationales longitudine commensurabiles.

Exponatur

Exponatur rationalis A, & duo numeri C D vel quadrati, vel ſimpliciter proportionem habentes, quam quadratus numerus ad quadratum numerum, & fiat vt C ad D, ita quadratum ex A ad quadratum ex E: erunt per ea, quæ demonſtrata ſunt A E longitudine commenſurabiles.



Ex coroll. 8. huius.

In 9. huius.

THEOREMA XVII. PROPOSITIO. XX.

Quod rationalibus longitudine commenſurabilibus rectis lineis ſecundum aliquem prædictorum modorum continetur rectãgulum rationale eſt. A

Rationalibus enim longitudine commenſurabilibus rectis lineis A B B C contineatur rectangulum A C. Dico A C rationale eſſe. deſcribatur ex A B quadratum A D. ergo A D eſt rationale. Et quoniam A B commenſurabilis eſt ipſi B C longitudine, atque eſt A B æqualis BD; erit DB ipſi BC longitudine commenſurabilis. eſt autem & vt DB ad BC, ita DA ad AC: & commenſurabilis eſt DB ipſi BC. ergo & DA ipſi AC commenſurabile erit. eſtq; rationale DA. quare & AC eſt rationale. quod igitur rationalibus longitudine commenſurabilibus rectis lineis cõtinetur rectangulum rationale eſt. quod demonſtrare oportebat.



B

1. huius. C

D

F. C. COMMENTARIVS.

Secundum aliquem prædictorum modorum] *Rectarum enim linearum AB BC vel vtrꝙue ſunt expoſitae rationali longitudine commenſurabiles, vel vtrꝙue eidem commenſurabiles potentia ſolum, ſed inter ſe commenſurabiles longitudine. quocunque autem modo ſe habeãt, quod ex ipſis fit rectangulum rationale eſt, & eadem demonſtratio in omnibus congruit.* A

Ergo AD eſt rationale] *Ex diffinitione 9. ſiue enim longitudine ſint commenſurabiles expoſitae rationali, ſiue potentia ſolum, earum quadrata rationalia ſunt, quippe quae quadrato expoſitae rationalis ſint commenſurabilia.* B

Ergo & DA ipſi AC commenſurabilis erit] *Ex decima huius.* C

Eſtq; rationale DA. quare & AC eſt rationale] *rationali namque commenſurabile & ipſum rationale eſt. quod ita demonſtrabitur.* D

Sit expoſitae rationalis quadratum A, & ipſi commenſurabile ſit ſpacium B. erit B rationale ex 9 diffinitione. ſit rurſus aliud ſpacium C ipſi B commenſurabile. Dico & C rationale eſſe. Quoniam enim ſpacia A C eidem ſpacio B ſunt commenſurabilia, & inter ſe commenſurabilia ſunt ex 12 huius. Quod cum C ipſi A ſit commenſurabile, etiam rationale erit ex 9 diffinitione. quod demonſtrare oportebat.



Vt autem ea, quae hoc loco de rationalibus dicuntur, manifeſtiora ſint, & quaſi ante oculos ponantur, libuit nonnulla theoremata adiungere, quae ad ea etiam, quae ſequuntur, vtilia erunt.

THEOREMA I.

Quod duabus datis rectis lineis rationalibus continetur rectangulum datũ erit.

Duabus enim datis rectis lineis rationalibus AB AD contineatur rectangulum A C. Dico AC datum

datum esse. Exposita enim rationali E, vel vtraque AB AD ipsi E longitudine est commensurabilis, vel vtraque commensurabilis est potentia solum, vel altera quidem longitudine, altera potentia solum commensurabilis. & si quidem vtraque est commensurabilis longitudine, rectangulum, quod ipsis continetur datum erit ex ijs, quę Ioannes Regiomontanus in primo libro de triangulis propositione 16 demonstrauit; & ex ijs, quae nos demonstrauimus in commentarijs in 3 propositionē libri Archimedis de circuli dimensione. si vero vtraque expositae rationali potentia solum est commensurabilis, nihilominus rectangulum datum erit. fiant enim ex AB AD quadrata AF CG. & quoniam AB AD potentia sunt commensurabiles, earum quadrata commensurabilia erunt. ideoq; inter se proportionem habebunt, quam numerus ad numerum. sit autem quadratum AF ad quadratum CG, vt numerus H ad numerum K; & H ipsum K multiplicans faciat M, cuius radix sit N. erunt igitur tres magnitudines H N K deinceps proportionales; rectangulum enim contentum H K est aequale quadrato ex N, hoc est ipsi M. & quoniam quadratum F A ad rectangulum AC est vt FB ad BC, hoc est vt AB ad BC; vt autem AB ad BG, hoc est ad EC, ita rectangulum AC ad CG quadratum: erunt & tres hę magnitudines deinceps proportionales. quādo autem tres magnitudines deinceps proportionales fuerint, prima ad tertiam duplam habebit proportionem eius, quam habet ad secundam. quadratum igitur AF ad quadratum CG duplam proportionem habet eius, quam habet ad rectangulum AC. sed quadratum AF ad quadratum CG est, vt numerus H ad ipsum K. & cum H ad K similiter duplam proportionem habeat eius, quam habet ad N, erit quadratum FA ad rectangulum AC, vt H ad N. sunt autem magnitudines H N datae; ideoq; data ipsarum proportio: & datum est quadratum F A. quare & rectangulum AC datum erit. Eadem ratione demonstrabimus rectangulum datum esse, si altera datarum linearum sit longitudine commensurabilis, altera vero potentia solum. quod demonstrare oportebat.



M.....15

H..5..N B 15 K...9

A B 5 B

A B 3 D

5. huius.

27. sexti.

1. sexti.

11. quinti.

10. diffi. quinti.

1. datorum Euclid.

2. Datorum Euclid.

OPERATIO.

Si datae magnitudines numerorum radices fuerint, numeros ipsos inter se multiplicabimus; si vero earum altera numerus fuerit, altera numeri radix, quadratum numeri multiplicabimus per numerum, cuius altera est radix, & eius, qui producitur radicem dicemus esse rectangulum, quod duabus datis rectis lineis continetur. atque hęc nihil aliud est, nisi multiplicatio, quam dicunt, radicum quadratarū inter se. vt si AB sit radix 5, AD radix 3, multiplicabimus 5, per 3 fiet 15, cuius radix erit id, quod producitur ex B 5, & B 3 inter se ductis. si vero AB sit 2, AD B 5, multiplicabimus quadratum ipsius 2 videlicet 4 per 5, & fiet 20, cuius radix erit productum, quod queritur.

THEOREMA II.

Si ad datam rectam lineam rationalem applicetur spacium datum, & latitudo, quam facit, data erit.

Sit data recta linea rationalis AB, & spacium datum E. Dico si ad rectam lineam AB spacium E applicetur, latitudinem, quam facit, datam esse. vel igitur recta linea AB expositae rationali commensurabilis est longitudine, vel potentia solum; vel spacium E rationale est, vel irrationale, quod medium appellatur. & si quidem recta linea AB longitudine est commensurabilis, & spacium E rationale, illud manifestum erit ex ijs, quae Regiomontanus demonstrauit in primo libro de triangulis propositione 17. & ex ijs, quae nos eodem in loco, de quo proxime dictum est, demonstrauimus. si vero AB est commensurabilis potentia solum, & spacium E siue rationale, siue irrationale, vel AB est longitudine commensurabilis, & spacium E irrationale, latitudo, quā facit, data erit. Sit primum recta linea AB potentia solum commensurabilis, & spacium E rationale. Quoniam igitur AB rationalis est, & spacium E rationale, erit quadratum ipsius AB spacio

E commensu-



E commensurabile; ac propterea ad ipsum proportionem habebit, quam numerus ad numerum habeat quam numerus H ad numerum K; fiatq; ex corollario sextae propositionis huius libri vt H ad K, ita recta linea AB ad alium rectam lineam O: & inter AB & O sumpta media proportionali P, erit vt numerus H ad numerum K, ita quadratum rectae lineae AB ad rectę lineae P quadratum. sed & quadratū rectae lineae AB ad spacium E erat, vt numerus H ad numerū K. cum igitur quadratum ex AB ad spacium E eādem proportionem habeat, quam ad quadratum ex ipsa P; erit quadratū ex P spacio E aequale. Itaque ad rectam lineam AB applicetur parallelogrammum rectangulum AC aequale quadrato ex P, hoc est aequale spacio E; latitudinem faciens BC. & ex AB BC describātur quadrata AF CG. numerus autem K se ipsum multiplicans faciat M; & M per K diuiso exeat N. erunt tres magnitudines HKN deinceps proportionales; rectangulū enim ipsis KN contentum est aequale quadrato ex K. Quoniam igitur quadratum FA ad rectangulum AC est vt rectangulum AC ad CG quadratum, quod superius ostensum est. quadratum autem FA ad rectangulum AC est, vt numerus H ad numerum K; erit & rectangulum AC ad quadratum CG, vt K ad N. sed datum est quadratum FA, & rectangulum AC; quòd numeri K N sint dati. ergo & quadratum CG datum erit, & data ipsius radix BC, videlicet latitudo, quam facit spatium E ad rectam lineam AB applicatum. 9. quinti. 2. datorum Euclid.

Sit rursus recta linea AB potentia solum commensurabilis, & spacium E irrationale. ergo quadratum rectae lineae AB incommensurabile est spacio E. sit autem quadratum rectae lineae AB ad spacium E, vt H ad K, hoc est ad radicē numeri M: & H se ipsum multiplicans faciat L. cum igitur LM quadrati sint, & eorum latera HK, habebit L ad M duplam proportionem eius, quam habet H ad K. itaque fiat vt L ad M, ita recta linea AB ad rectam lineam Q: & inter AB & Q sumatur media proportionalis O. habebit igitur AB ad Q duplam proportionem eius, quam habet ad O. atque est vt L ad M, ita AB ad Q. ergo vt H ad K, ita AB ad O. Rursus inter AB & O inueniatur media proportionalis P; erit vt AB ad O, ita quadratum ex AB ad quadratum ex P. vt igitur H ad K, ita est quadratum ex AB ad quadratum ex P. sed erat vt H ad K, ita quadratum ex AB ad spacium E. Ergo quadratum ex AB ad quadracum ex P eandem habet proportionem, quam ad spacium E. ideoq; quadratum ex P spacio E aequale erit. Applicetur ad rectam lineam AB parallelogrammum rectangulum AC, aequale quadrato ex P, hoc est spacio E aequale, quod faciat latitudinem BC: deinde ex AB BC fiant AF CG quadrata; & rursus ipsarum H K magnitudinum inueniatur tertia proportionalis, nempe ducta K inter se se; & quod producitur diuiso per B, vt proxime dictum est. est autem tertia proportionalis N. Eadem ra- 9. quinti.



tione demonſtrabitur vt quadratum ex AB ad rectangulum AC, ita eſſe rectangulum AC ad CG quadratum. Quoniam igitur H K N deinceps proportionales ſunt, quadratum autem FA ad rectangulum AC eſt vt H ad K; erit & rectangulum AC ad CG quadratum, vt K ad N. ſed datum eſt quadratum AF, & rectangulum AC, cum dentur HK. ergo & quadratum CG dabitur, & eius radix BC, hoc eſt latitudo, quae ſit ſpacio E ad rectam lineam AB applicato. Non aliter demonſtrabitur ſi recta linea AB ſit longitudine commenſurabilis, et ſpacium E irrationale.

OPERATIO.

Si datae magnitudines radices numerorũ fuerint, numerus, qui ſpacium notum reddit, diuidatur per alterum numerum; ſi vero altera fuerit numeri radix, numerus, cuius ea eſt radix, diuidatur per quadratum alterius numeri; vel contra quadratum numeri, per numerum cuius eſt radix, diuidatur; & eius, quod exibit, radix erit latitudo, quam facit ſpacium ad rectã lineam applicatum. eſt autem hęc diuiſio radicum inter ſe ſe, quam dicunt. vt ſi Bꝛ 15 diuidenda ſit per Bꝛ 5, diuidemus 15 per 5, & exibit 3, cuius radix eſt quod fit Bꝛ 15 per Bꝛ 5 diuiſa: ſi vero Bꝛ 20 diuidere velimus per 2, diuidemus 20 per quadratum ipſius 2, videlicet per 4, & exibit 5, cuius radix eſt id, quod quęritur.

THEOREMA III.

Quae ex duabus rationalibus longitudine commenſurabilibus rectis lineis componitur recta linea data erit.

Ex duabus enim datis rationalibus longitudine commenſurabilibus rectis lineis AB BC componatur recta linea AC. Dico AC datam eſſe. vel igitur datae rectae lineae expoſitae rationali longitudine commenſurabiles ſunt, vel commenſurabiles potentia ſolum, ſed inter ſe lõgitudine commenſurabiles. Et ſi quidem expoſitae rationali ſint commenſurabiles longitudine, quae ex ipſis componitur recta linea data erit, ex demonſtratis à Ioanne Regiomontano in primo libro de triangulis, propoſitione tertia, & ex ijs, quae nos eodem in loco demonſtrauimus. ſi uero expoſitae raionali ſint commenſurabilis potentia ſolum, ſed inter ſe longitudine commenſurabiles, earum quadrata proportionem habebunt; quam quadratus numerus ad quadratum numerum. Itaque habeat recta e lineae AB quadratum ad quadratum rectae lineae BC proportionem eam, quam numerus L ad numerum M. erũt numeri L M ſimiles plani. ſi enim quadrati ſint, rectae lineae AB AC longitudine erunt commenſurabiles. quod non ponitur. ergo inter L & M cadet unus medius proportionalis. cadat, & ſit N. deſcribaturq́, ex recta linea AC quadratum ACDE; et iuncta AD ducatur per B quidem alterutri ipſarum AE CD parallela BGF: per G vero ducatur HGK alteruti ipſarum AC ED parallela. ſimiliter vt ſupra demonſtrabitur quadratum AG ad rectangulum GC ita eſſe, vt rectangulum GC ad GD quadratum. ſed quadratum AG ad quadratum GD eſt vt numerus L ad numerum M. ergo quadratum AG ad rectangulum GC eſt vt numerus L ad ipſum N; & rectangulum GC ad quadratum GD, vt N ad M. eſt autem rectangulum EG, quod eſt alterum ſupplementorum, aequale reliquo GC. Quadratum igitur AG ad gnomonem EKB eſt vt L ad M vnà cum duplo ipſius N: & conuertendo gnomon EKB ad quadratum AG, vt M vnà cum duplo ipſius N ad ipſum L. ergo componendo, rurſuſq́, conuertendo quadratum AG ad totum AD quadratum, vt L ad compoſitum ex L & M vnà cum duplo ipſius N. ſed compoſitum hoc eſt datum, quippe cum dati ſint numeri ipſum componentes. ergo et totum quadratum AD datum erit, et data eius radix, quae ex duabus datis rectis lineis conſtat. atque illud eſt, quod demonſtrandum proponebatur.

9. huius.



OPERATIO.

Numeros reſpondentes quadratis datarum linearum ſimul coacernabimus vnà cum duplo lateris

13. octaui.

teris quadrati eius, qui ex eorum inter se multiplicatione producitur, hoc est vnà cum duplo numeri proportionalis, qui inter ipsos medius interijcitur; et huius compositi radix erit recta linea, quę ex duabus datis rectis lineis constat. atque hęc est radicum inter se additio, quam dicunt: vt si radix 3 addenda sit radici 12, primum uniemus 3 cum 12, deinde multiplicantes 12 per 3, eius, qui producitur, videlicet 36 latus, quod est 6 duplabimus: et omnibus simul coacervatis fient 27, cuius radix est recta linea, quam quęrimus. Quemadmodum autem ex duabus rationalibus longitudine commensurabilibus, si inter se componantur, vna recta linea fit, sic ex duobus spacijs medijs commensurabilibus, si itidem inter se componantur vnum fiet medium. Quòd si duae rationales lõgitudine incommensurabiles inter se addendae sint, vt R 3. R 5, dicemus R 3 vnà cum R 5, vel R 3 additę R 5, vel vtemur hac voce plus, quod est in communi vsu; hoc modo R 3 plus R 5, et 3 plus R 8, et ita fiet etiam si plures sint, quam duae, vt 2 plus R 3 plus R 5. Quòd si duae sint, dicentur ex binis nominibus, seu binomia, vt Campanus, et recentiores. si vero tres dicentur ex tribus nominibus vel trinomia. et eodem modo in alijs.

THEOREMA IIII.

Duarum datarum rationalium, quæ inæquales sint, & longitudine commensurabiles, differentia data erit.

Sint duae datae rationales inęquales, & longitudine commensurabiles rectae lineae AB AC, quarum differentia sit BC. Dico BC datam esse. si enim AB AC sint expositae rationali longitudine commensurabiles, earum differentia data erit ex demonstratis à Ioanne Regiomontano in libro primo de triangulis propositione 4, & ex ijs, quae à nobis eodem in loco demonstrata sunt. si vero expositae rationali commensurabiles sint potentia solum, sed inter se longitudine commensurabiles, earum quadrata inter se proportionem habebunt, quam quadratus numerus ad quadratum numerum. habeat igitur rectae lineae AB quadratum ad quadratum rectae lineae AC proportionem eam, quam numerus L ad numerum M. erunt numeri LM similes plani; ideoq; inter eos cadet vnus medius proportionalis. cadat, sitq; N. & ex recta linea AC describatur quadratum ACDE, & figura compleatur, quemadmodum superius. producta vero CA vsque ad O, ita vt AO, sit aequalis AB, quadratum OH describatur, quod quidem quadrato rectae lineae AB, hoc est ipsi AC aequale erit. atque est quadratum quidem OH ad rectangulum HC, vt OA ad AC: rectangulum vero HC ad quadratũ CE, vt CK ad CD, hoc est vt OA ad AC. vt igitur quadratum OH ad rectangulum HC, ita est rectangulum HC ad CE quadratum. sed & numeri LNM deinceps proportionales sunt, & quadratum OH ad quadratum CE est vt L numerus ad numerum M. ergo quadratum OH ad rectangulum HC erit vt L ad N. & rectangulum HC ad quadratum CE, vt N ad M. quòd cum rectangulum EG sit aequale rectangulo GC, supplementa etenim sunt, addito vtrique aequali quadrato, erit rectangulum HC aequale rectangulo FH vnà cum quadrato HO. si igitur à duobus quibuslibet OH, AD auferatur duplum rectangulum HC, quod quidem rectis lineis CA AB continetur, reliquum erit quadratum FK; cuius latus GK rectae lineae BC est aequale: quod etiam in septima propositione secundi libri demonstratum est. & quoniam numeri LNM sunt dati, & quadrata OH HC E data erunt, & rectangulum HC, atque eius duplum. ergo & quadratum FK, & eius latus BC dabitur. quod demonstrare oportebat.



8. huius.

APPENDIX I.

Numeros respondentes quadratis datarum linearum simul iungemus, & ab eo, qui factus est, auferemus duplum numeri, qui inter ipsos medius proportionalis interijcitur. relinquetur enim

quadratum, cuius radix erit recta linea, quam querimus. atque hęc eſt radicum quadratarum ſubtractio, quam dicunt: Vt ſi à radice 27 auferenda ſit radix 3; iungemus 27 cum 3 fient 30, à quo auferemus duplum numeri medij proportionalis inter 3, et 27 qui eſt 9, videlice 18, & relinquentur 12, cuius radix eſt ea, quam querimus. eodem modo & ſpaciorum mediorum inęqualium, quae commenſurabilia ſint, differentia inuenietur. ſi uero ab aliqua rationali auferenda ſit alia minor, quae ipſi longitudine ſit incommenſurabilis. vt ſi à ℞ 5 auferre velimus ℞ 3, dicemus ℞ 5 dẽpta ℞ 3, vel vtemur hac voce minus, vt nunc ſolent, hoc modo ℞. 5 minus ℞ 3, & ℞ 6 minus ℞ 4, quas Euclides appellat apotomas, Campanus et recentiores reſidua, ſeu reciſa.

Si igitur recta linea AB ſit ℞ 3, & recta BC ℞ 12, erit ex ante demonſtratis in primo antecedentium theorematum, rectangulum AC ℞ 36, hoc eſt 6. & rurſus. ſi AB ſit ℞ 8, & BC ℞ 18, erit AC rectangulum ℞ 144, hoc eſt 12.

THEOREMA XVIII. PROPOSITIO XXI.

Si rationale ad rationalem applicetur, latitudinem efficit rationalem, & ei, ad quam applicatum eſt, lõgitudine cõmenſurabilẽ.





Rationale enim AC ad rationalem ſecũdum aliquem rurſus dictorum modorũ applicetur, latitudinem faciens BC. Dico BC rationalem eſſe, & ipſi ab longitudine commenſurabilẽ. Deſcribatur enim ex AB quadratum AD. ergo AD rationale eſt: ſed & rationale eſt AC. ergo AD ipſi AC eſt commenſurabile. atque eſt vt DA ad AC, ita DB ad BC. commenſurabilis igitur eſt DB ipſi BC. eſt autem DB æqualis BA. quare AB ipſi BC commenſurabilis eſt. ſed AB eſt rationalis. rationalis igitur eſt & BC, & ipſi BA longitudine commenſurabilis. ſi igitur rationale ad rationalem applicetur; & reliqua. quod oportebat demonſtrare.

45. primi.

Ex lẽma. 2. ad 20. huius 10. huius.

6. diffi.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit ſpacium AC 6. & recta linea AB ℞ 3. erit ex 2 theoremate premiſſorum CB ℞ 12, quae ipſi ℞ 3 longitudine eſt commenſurabilis. eſt enim ipſius dupla. rurſus ſit AC 12, & recta linea AB ℞ 8, erit CB ℞ 18. atque eſt ℞ 18 ad ℞ 8, ut 3 ad 2. nam ſi ℞ 18 dividatur per ℞ 8 proueniet ℞ 2 $\frac{1}{4}$, videlicet ℞ $\frac{2}{4}$, quae eſt. $\frac{1}{2}$

LEMMA. I.

Inuenire duas rationales potentia ſolum commenſurabiles.



Exponatur rationalis A, & duo numeri BC non habẽtes proportionem, quam quadratus ad quadratum: & fiat vt B ad C, ita quadratum ex A ad quadratum ex D, erunt igitur ex ijs, quę oſtenſa ſunt AD potentia ſolũ cõmenſurabiles.

Coroll. 6. huius.

LEMMA. II.

Recta linea, quae poteſt irrationale ſpacium, irrationalis eſt.

Poſsit

Posſit enim recta linea A ſpacium irrationale, hoc eſt quadratum, quod fit ab A irrationali ſpacio ſit æquale. Dico A irrationalem eſſe. ſi enim ſit rationalis, erit quod ab ipſa fit quadratum rationale; ſic enim in diffinitionibus ponitur. atqui rationale non eſt. ergo A irrationalis ſit neceſſe eſt. quod demonſtrare oportebat.



Diffi. 8.

THEOREMA XIX. PROPOSITIO. XXII.

Quod rationalibus potentia ſolum commenſurabilibus rectis lineis continetur rectangulum irrationale eſt: & recta linea ipſum potens eſt irrationalis. vocetur autem media.

Rationalibus enim potentia ſolum commenſurabilibus rectis lineis AB BC contineatur rectangulum AC. Dico rectam lineam, quæ ipſum poteſt, irrationalem eſſe. vocetur autem media, ſeu medialis. deſcribatur enim ex AB quadratum AD. ergo AD rationale eſt. Et quoniam AB incommenſurabilis eſt ipſi BC longitudine, potentia enim ſolum ponuntur commenſurabiles, atque eſt AB æqualis BD. incommenſurabilis igitur eſt DB ipſi BC longitudine. eſt autem vt DB ad BC, ita DA ad AC. ergo DA ipſi AC eſt incommenſurabile. ſed DA rationale eſt. irrationale igitur eſt AC. Quare & recta linea, quę ipſum AC poteſt, videlicet quę poteſt quadratum ipſi æquale eſt irrationalis. vocetur autem media; propterea quòd ipſius quadratum eſt æquale rectangulo, quod AB BC continetur, & ipſarum AB BC media ſit proportionalis. quod demonſtrare oportebat.



Diff. 10.

Diff. 11.

SCHOLIVM. I.

Media eſt irrationalis, quæ poteſt ſpacium contentum rationalibus potentia ſolum commenſurabilibus.

Rationalibus enim potentia ſolum commenſurabilibus rectis lineis A B ſpacium contineatur. oſtendendum eſt huiuſmodi ſpacium irrationale eſſe. ſumatur enim ipſarum A B media proportionalis C. ergo quod fit ex AB eſt æquale quadrato ex C; ac propterea C poteſt rectangulum, quod ipſis AB continetur. eſt igitur vt A ad B, ita quadratum ex A ad id, quod ex C quadratum. nam vt prima ad tertiam, ita quadratum, quod fit ex prima ad quadratum ex ſecunda, quod demonſtratum eſt in corollario 20 ſexti elementorum. incommenſurabilis autem eſt A ipſi B longitudine. ergo & quadratum ex A quadrato ex C eſt incommenſurabile. ſed quadratū ex A rationale eſt. irrationale igitur eſt quadratum ex C, hoc eſt rectāgulum, quod rectis lineis A B continetur. ergo C eſt irrationalis. media autem idcirco vocatur, quòd irrationalis exiſtens ipſarum A B media eſt proportionalis.



Diff. 11.

SCHOLIVM. II.

Ex hoc theoremate colligitur mediam, quæ vna eſt irrationalium, in geometrica analogia conſiderari: media enim eſt proportionalis iuxta geometricam analogiam inter rationales potentia ſolum commenſurabiles.

&

& recta linea ipsũ potẽs est media. si enim quod extremis cõtinetur æquale
17.sexti. *est quadrato, quod fit à media, tres rectæ lineæ proportionales sunt.*

F. C. COMMENTARIVS.

Sciendum est spacium illud irrationale, quod potest media linea, medium appellari.
Sit recta linea AB 2; & recta BC ℞ 8. erit rectangulum AC ℞ 32, quod irrationale est, & medium dicetur. recta autem linea ipsum potens est ℞ ℞ 32, quæ media appellatur.

LEMMA.

Si sint duæ rectæ lineæ, erit vt prima ad secundam, ita quadratum, quod fit à prima ad rectangulum, quod duabus rectis lineis continetur.



Sint duæ rectæ lineæ FE EG. Dico vt FE ad EG, ita esse quadratum ex FE ad FEG rectangulum. describatur ex FE quadratum DF, & GF cõ
1.sexti. pleatur. Quoniam igitur est vt FE ad EG, ita DF ad FG; atque est DF quidem quadratum ex FE; FG vero, quod DE EG continetur, hoc est rectangulum FEG: erit vt FE ad EG, ita quadratum ex FE ad FEG rectangulum. similiter autem & vt rectangulum GEF ad quadratum ex EF, hoc est vt GF ad FD, ita est GE ad EF.

THEOREMA XX. PROPOSITIO. XXIII.

Quod fit à media ad rationalem applicatum, latitudinem efficit rationalem, & ei, ad quam applicatum est, longitudine incommensurabilem.



Sit media quidem A, rationalis autem CB,
45.primi. & ad CB ei, quod fit ex A æquale spacium applicetur BD, latitudinem faciens CD. Dico CD rationalem esse, & ipsi BC longitudine incommensurabilem. Quoniam enim media est
Ex antecedenti. A, potest spacium contentum rationalibus potentia solum commensurabilibus. posit GF; sed potest & BD. æquale igitur est BD ipsi GF. atque est æquiangulum. æqualium autem, &
14.sexti. æquianguloru parallelogrãmorũ latera, quæ sunt circum æquales angulos ex contraria parte sibi ipsis respondent. ergo vt BC ad EG, ita
22.sexti. est EF ad CD. est igitur & vt quadratum ex BC ad quadratum ex EG, ita quadratum ex EF ad id, quod ex CD quadratum. sed quadratum ex BC commensurabile
1.pars 10.huius. est quadrato ex EG; vtraque enim ipsarum est rationalis. commensurabile igitur est & quadratum ex EF quadrato ex CD. est autem quadratum ex EF rationale. ergo & rationale est quadratum ex CD; ac propterea recta linea CD est rationalis. itaq; quoniam FE incommensurabilis est ipsi EG longitudine; potentia enim solum cõ-
Ex antecedente lemmate. mensurabiles sunt; vt autem FE ad EG, ita quadratum ex EF ad FEG rectangulũ: erit quadratum ex EF incommensurabile rectangulo FEG. sed quadrato quidem
* ex EF commensurabile est quadratum ex CD; rationales enim sunt potentia, vt ostensum est. ergo quadratum ex CD rectangulo FEG est incommensurabile. rectangulo autem FEG commensurabile est, quod DC CB continetur; sunt enim quadrato

ex A

ex A æqualis incommensurabile igitur est, & quadratum ex CD rectangulo DCB. 13.huius.
sed vt quadratum ex CD ad DCB rectangulum, ita est DC ad CB. ergo DC ipsi CB incommensurabilis est longitudine. & ob id DC est rationalis, & ipsi CB longitudine incommensurabilis. quod oportebat demonstrare.

EX COMMENTARIIS.

Rationales enim sunt potentia.] *hoc est potentia commensurabiles: rationales enim commensurabiles sunt, vt in Scholio ante vigesimam huius demonstratur. & quamquam hæ voces longitudine, & potentia magna ex parte referantur ad commensurabilitatem, & incommensurabilitatem, tamen aliquando etiam ad rationalitatem referri ex hoc loco perspicuum est. quod nonnulli negarunt.* *

Sit quadratum ex A ℞ 40, CB vero sit 2. si igitur ad CB applicetur ℞ 40, latitudinem faciet ℞ 10. rursus si CB sit ℞ 5. & ad ipsam applicetur ℞ 40, erit latitudo, quam facit ℞ 8 ex 2. theoremate præmissorum.

THEOREMA XXI. PROPOSITIO XXIIII.

Mediæ commensurabilis, media est.

Sit media A, & ipsi A commensurabilis sit B. Dico & B mediam esse. Expo natur enim rationalis CD, & qnadrato quidem ex A æquale ad CD applicetur spacium rectangulum CE, latitudinem effciens ED. rationalis igitur est ED, & ipsi CD longitudine incommensurabilis. quadrato autem ex B æquale ad CD applicetur spacium rectangulum CF, latitudinem efficiens DF. Quoniam igitur A commensurabilis est ipsi B, erit quadratum ex A quadrato ex B commensurabile. sed quadrato quidem ex A æquale est rectangulum EC; quadrato autem ex B æquale CF. commensurabile igitur est rectangulum EC rectangulo CF. atque est vt EC ad CF, ita ED ad DF. ergo ED ipsi DF longitudine est commensurabilis. est autem ED rationalis, & incommensurabilis ipsi DC longitudine. Ergo & DF rationalis est, & ipsi DC longitudine incommensurabilis. rationales igitur sunt CD DF potentia solum commensurabiles. quod autem rationalibus potentia solum commensurabilibus rectis lineis continetur rectangulum irrationale est; & recta linea ipsum potens est irrationalis: vocetur autem media. ergo recta linea, quæ potest rectangulum CDF est media. sed B potest rectangulum CDF. quare B media erit.



45.primi. Ex antecedente.

cor.9. huius

13.huius.

22.huius.

COROLLARIVM.

Ex hoc manifestum est spacium medio spacio commensurabile, medium esse. possunt enim ipsa rectæ lineæ, quæ sunt potentia commensurabiles, quarum altera media est. ergo & reliqua media erit. quemadmodum autem & in rationalibus dictum est, ita & in medijs dicemus, rectam lineam mediæ longitudine commensurabilem dici mediam, & ipsi commensurabilem non solum longitudine, sed & potentia; vniuerse enim quæ longitudine commensurabiles sunt, etiam potentia sunt commensurabiles. si vero mediæ commensurabilis quædam recta linea fuerit potentia, si- *

quidem

quidem etiam longitudine, dicuntur & ſic medię & longitudine & potentia commenſurabiles. ſi autem potentia ſolum, dicuntur mediæ potentia ſolum commenſurabiles.

F. C. COMMENTARIVS.

Ex hoc manifeſtum eſt ſpacium medio ſpacio commenſurabile medium eſſe.

Sit ſpacium medium A, & ipſi commenſurabile ſit alterum ſpacium B. Dico B medium eſſe. Exponatur enim rationalis CD, & ad ipſam applicetur ſpacium rectangulum C E ſpacio A aequale, quod latitudinem faciat ED. erit E D rationalis, & ipſi C D longitudine incommenſurabilis. Rurſus ad eadem C D applicetur aliud ſpacium rectangulum CF, aequale ſpacio B, latitudinemq; faciens DF. Quoniam igitur ſpacium A eſt cõmenſurabile ſpacio B, eſtq; ſpacio quidem A aequale rectangulum CE; ſpacio autem B aequale rectangulũ CF: rectangulum C E rectangulo C F commenſurabile erit. Vt autem EC ad CF, ita eſt ED ad DF. ergo & E D ipſi DF longitudine eſt commenſurabilis. ſed ED rationalis eſt, & ipſi CD incommenſurabilis longitudine. ergo & DF rationalis, & ipſi CD longitudine eſt incõmenſurabilis. ſunt igitur CD DF rationales, & potentia ſolum commenſurabiles. ergo rectangulum CF, quod ipſis continetur, irrationale eſt, & medium: ac propterea ſpacium B ipſi aequale, medium ſit neceſſe eſt. quod oportebat demonſtrare.



25. huius.

21. huius.

SCHOLIVM.

Media duplex eſt, videlicet potens quod rationalibus potentia ſolum commenſurabilibus continetur, & quæ mediæ eſt commenſurabilis. poſtquam autem oſtendiſſet mediam eſſe, quę poteſt id quod rationalibus potentia ſolum commenſurabilibus continetur, indigebat hoc theoremate ad ea, quę ſequuntur. oportet enim primum oſtendere aliquas eſſe commenſurabiles medias, deinde inquirere quale ſpacium illud ſit, quod ipſis comprehenditur.

THEOREMA XXII. PROPOSITIO XXV.



Quod mediis longitudine commenſurabilibus rectis lineis continetur rectangulũ medium eſt.



Mediis enim longitudine commenſurabilibus rectis lineis AB BC contineatur rectangulum AC. Dico A C medium eſſe. deſcribatur enim ex AB quadratum A D. ergo AD medium eſt. & quoniam commenſurabilis eſt AB ipſi BC longitudine, æqualis autem AB ipſi B D; erit DB ipſi BC longitudine commenſurabilis. quare & DA commenſurabile eſt ipſi AC. ſed A D eſt medium. ergo & AC medium erit. quod demonſtrare oportebat.

Ex antecedẽte corol.

F. C.

F. C. COMMENTARIVS.

Quae de rationalibus ſupra demonſtrata ſunt, eadem & de medijs demonſtrabuntur.

THEOREMA. I.

Quod datis duabus medijs, vel media & rationali cõtinetur rectãgulũ datũ erit.

Datis enim duabus medijs, vel data media, & rationali AB AD contineatur rectangulum AC. Dico AC datum eſſe. ſint primum AB AD mediae, & fiant ex ipſis quadrata AF CG. erunt ea irrationalia, quae media appellantur. habeant autem inter ſe proportionem, quam H ad K. & H quidem ſe ipſam multiplicans faciat L, K vero ſe ipſam multiplicans faciat M, & L multiplicans M ipſum N faciat, cuius N radix ſit O; & rurſus ipſius O ſit radix P. Quoniam igitur tres magnitudines LOM deinceps ſunt proportionales, ſunt & earũ radices HPK, & HPK deinceps proportionales erũt. Sed quadratum FA ad rectangulum AC eſt vt rectãgulum AC ad CG quadratum. quod ſuperius demonſtratum eſt. quadratum autem FA ad quadratum CG eſt, vt H ad K. ergo & quadratum FA ad rectangulum AC erit, vt H ad P. et ſunt HP datae, et datum FA quadratum. rectangulum igitur AC datum ſit. neceſſe eſt. ſi ſit AB media, et AD rationalis, vel contra AB rationalis, & AD media; et ex ipſis rurſus fiunt quadrata AF CG, quorum alterum medium erit, alterum rationale. et ijſdem conſtructis ſimile r demonſtrabitur rectangulum AC datum eſſe. quod demonſtrare oportebat.



L 5. O R 15. M 3.
H R 5. P R 3. R 15. K R 3.

2. Datorum Euclid.

OPERATIO.

Numeros ad quadratos quadratorum redactos inter ſe multiplicabimus, & eius qui producitur radix radicis erit rectãgulum, quod datis rectis lineis continetur. atque hoc eſt multiplicatio radicum radicum inter ſe, quam dicunt. Vt ſi AB ſit R R 5 AD R R 3, multiplicabimus 5 per 3 fient 15, & R R 15 erit id, quod ex datis rectis lineis inter ſe ductis producitur. ſi vero AB ſit R R 5, AD 2, quadratũ quadrati ipſius 2, videlicet 16 per 5 multiplicabimus, fient 80, & R R 80 erit ea, quae ex eorũ multiplicatione oritur. deniq; ſi AB ſit R 2, & AD R R 5, multiplicabimus quadratum ipſius 2, hoc eſt 4 per 5, & producti accipiemus radicẽ radicis, erit R R 20 ea, quam inquirimus.



THEOREMA. II.

Si ad datum mediam applicetur ſpacium datum, latitudo, quam facit, data erit.

Sit data media AB, et ſpacium datum E, quod ad ipſam AB applicatum latitudinem faciat BC. Dico BC datam eſſe. vel igitur ſpacium E rationale eſt, vel irrationale, quod

medium appellatur. ſit primum irrationale, ac medium, habeatq; quadratum ipſius AB ad ſpacium E proportionem eam, quã habet H ad K; et H quidem ſe ipſum multiplicans faciat L: K vero ſe ipſum multiplicans faciat M, habebit L ad M duplam proportionem eius, quiam habet latus ad latus, hoc eſt H ad K. Itaque fiat vt L ad M, ita recta linea AB ad aliam rectam P: et inter AB, et P ſumpta media proportionali, Q, habebit AB ad P duplam proportionem eius, quam habet ad Q. ergo AB ad Q ita erit, vt H ad K. rurſus inter AB et Q ſumatur media proportionalis R. quare vt AB ad Q, ita erit quadratum ex AB ad quadratum ex R. quadratum igitur ex AB ad quadratum ex R eſt vt H ad K. ſed vt H ad K, ita erat quadratum ex AB ad 9. quinti. *ſpacium E. ergo quadratum ex R ſpacio E eſt aequale. applicetur ad rectam lineam AB parallelogrammum rectãgulum AC, aequale quadrato ex R, quod et ſpacio E aequale erit. et ex AB AD fiant AF, CG quadrata; numerorum autem LM inueniatur tertius proportionalis N, cuius radix ſit O. Quoniam igitur numeri LMN deinceps ſint proportionales, et H K O deinceps proportionales erũt. atque eſt vt quadratum FA ad rectangulum AC, ita rectangulum AC ad CG quadratum. quare ſimiliter ac ſuperius demonſtrabitur rectangulum AC ad quadratum CG ita eſſe, vt K ad O. ergo et quadratum CG, et eius radix BC data erit, videlicet latitudo, quam quærimus. non alia ratione demonſtrabimus, ſi ſpacium E rationale fuerit, latitudinem BC datam eſſe. quod oportebat demonſtrare.*



OPERATIO.

Numeris ad quadratos quadratorum redactis, numerum à quo ſpacium denominatur, diuidemus per alterum numerum; et eius, qui exibit, radix radicis erit latitudo, quam facit ſpacium ad rectam lineam applicatum; et hęc eſt radicum inter ſe diuiſio, quam dicunt, vt ſi dividenda ſit Bꝛ 6 per Bꝛ Bꝛ 3, multiplicabimus 6 in ſe ipſum, fient 36, et diuidemus 36 per 3, exibunt 12, et Bꝛ Bꝛ 12 erit, quae ex earum diuiſione oritur. ſi vero diuidere oporteat 3 per Bꝛ Bꝛ 3, reducemus 3 ad quadratum quadrati, et fient 81, diuiſiſq; 81 per 3 exibunt 27, cuius radicis radix eſt ea, quam quærimus.



THEOREMA III.

Quæ ex duabus datis medijs lõgitudine cõmẽſurabilibus cõponitur recta linea, data erit.

Ex duabus enim datis medijs longitudine commenſurabilibus AB EC componatur recta linea AC. Dico AC datam eſſe. ſit quadratum rectae lineae AB ad quadratũ ipſius BC, vt L ad M, et L quidem ſe ipſum multiplicans faciat N; M vero ſe ipſum multiplicans faciat O. et quoniam AB BC longitudine commenſurabiles

ſunt,

sunt, earum quadrata L M, & rursus quadratorum quadrata N O inter se proportionem habebunt, quam quadratus numerus ad quadratum numerum. ergo inter ipsos N O cadet vnus medius proportionalis numerus. cadat, sitq; P, cuius radix Q. & ex AC descripto quadrato A C D E, & reliqua figura completa, quemadmodum superius, similiter demonstrabitur quadratum AG ad rectangulum GC esse, vt L ad Q, & rectangulum GE ad quadratum GD, vt Q ad M; & denique quadratum AG ad totum AD quadratum, vt L ad compositum ex L, & M vnà cum duplo ipsius Q. quòd cum dati sint L Q M, & compositum ex ipsis dabitur. ergo & AD quadratum, & eius radix AC data erit. quod oportebat demonstrare. 9 huius.

OPERATIO.

Magnitudines respondentes quadratis rectarum linearum simul coaceruabimus vnà cum duplo mediae proportionalis, & huius cõpositi radix erit recta linea, quę ex duabus datis constat; atque hęc est R̃ R̃ inter se additio, quam vocant, vt si R̃ R̃ 5 addenda sit R̃ R̃ 80, iungemus ex ante demonstratis R̃ 5 cum R̃ 80, & cum duplo R̃ 20, quae faciunt R̃ 405, cuius radix, videlicet R̃ R̃ 405 est recta linea, quae ex earum additione producitur. Quòd si duae, vel plures mediae longitudine incommensurabiles sibi ipsis addendae sint, vel etiam rationales, & mediae vtemur eadem voce plus, vt in rationalibus dictum est, hoc modo R̃ R̃ 5 plus R̃ R̃ 3, vel R̃ R̃ 2 plus R̃ R̃ 3, plus R̃ R̃ 5, vel R̃ 2 plus R̃ R̃ 6, vel 3 plus R̃ 5 plus R̃ R̃ 6. & sic in alijs.

THEOREMA IIII.

Duarum datarum mediarum, quæ inæquales sint, & longitudine commensurabiles, differentia data erit.

Sint duae datae mediae inęquales, & longitudine commensurabiles AB AC, quarum differentia sit BC. Dico BC datam esse. sit quadratum rectae lineae AB ad quadratum ipsius A C, vt L ad M. & sit rursus ipsius L quadratum N, & ipsius M quadratum sit O. habebunt N O inter se proportionem, quam quadratus numerus ad quadratum numerum. quare inter eos cadet vnus medius proportionalis. cadat, & sit P, cuius radix Q. & ex AB AC descriptis quadratis R H AD, & figura completa, quemadmodum superius, similiter demonstrabimus quadratum R H ad rectangulum H C esse, vt L ad Q, & rectangulum H C ad quadratum C E, vt Q ad M. & praeterea duo quadrata R H AD aequalia esse duplo rectanguli H C & quadrato F K. ergo si ab ipsis L N auferatur duplum ipsius Q, reliquum erit id, quod quadrato F K respondet. datae autem sunt L Q M magnitudines. ergo & quadratum F K, atque eius radix B C dabitur. quod demonstrare oportebat.



N 5. P 45. O 405.

L R̃ 5. Q R̃ 45. M R̃ 405.

A R̃ R̃ 5 B. A R̃ R̃ 405 C.

OPERATIO.

Magnitudines respondentes quadratis rectarum linearum simul iungemus, et ab ea, quae facta est, auferemus duplam mediae proportionalis, quae inter ipsas interijcitur: relinquetur enim quadratum, cuius radix erit differentia, quam quęrimus; atque hęc est R̃ R̃ subtractio, quam appellant. vt si à R̃ R̃ 405 auferenda sit R̃ R̃ 5, iungemus ex ante demonstratis R̃ 5 cum R̃ 405, fiunt R̃ 500, à qua auferemus duplum R̃ 45, hoc est R̃ 180, relinquetur R̃ 80. ergo BC erit R̃ R̃ 80. At si ab aliqua media auferenda sit alia minor, quae longitudine sit ipsi incommensurabilis, vel à media rationalis, vel contra à rationali media, vtemur eadem voce minus, vt in rationa-

libus dictũ eſt hoc modo R R 5 *minus* R R 3, *vel* R R 12 *minus* R R 3, *vel* R R 20 *minus* R R 5, *vel* R R 6 *minus* R R 30, *vel* 3 *minus* R R 40. *et ita in reliquis.*

Itaque ſi mediae lõgitudine lineæ cõmẽſurabiles ſint AB BC videlicet R R 32, *et* R R 2. *erit ex primo antecedentium rectangulum quod ipſis continetur* R R 64, *hoc eſt* R 8; *ſunt enim* R R 32 *et* R R 2 *longitudine commenſurabiles, videlicet vt* 2 *ad* 1. *nam ſi* R R 32 *diuidatur per* R R 2 *prouenit* R R 16, *hoc eſt* 2.

THEOREMA XXIII. PROPOSITIO. XXVI.

Quod medijs potentia ſolum commenſurabilibus rectis lineis continetur rectangulum, vel rationale eſt, vel medium.

Medijs enim potentia ſolum commenſurabilibus rectis lineis A B BC contineatur rectangulũ A C. Dico AC vel rationale eſſe, vel medium. deſcribantur enim ex AB BC quadrata AD BE. vtrumque igitur ipſorum A D BE medium eſt. exponatur ra-
21. huius. 45. primi. tionalis FG, & ipſi quidem AD æquale ad FG applicetur parallelogrammum rectangulum GH, latitudinem faciens FH; ipſi vero AC æquale ad HM applicetur rectangulum M K, latitudinem faciens HK; & inſuper ipſi BE æquale ſimiliter ad KN applicetur
14. primi. NL, latitudinẽ faciens KL. In recta igitur linea ſunt FH HK KL. Quoniam igitur medium eſt vtrũque ſpſorum AD BE; atque eſt AD quidem æquale ipſi GH, BE vero ipſi NL, erit & vtrumque ipſorum G H NL medium, & ad rationalẽ FG applicata ſunt.
23. huius. ergo & vtraque ipſarũ FH KL eſt rationalis, & ipſi FG longitudine incommenſurabilis. & quoniam cõ menſurabile eſt AD ipſi BE, erit & GH ipſi NL com
2. ſexti. 10. huius. menſurabile. eſt igitur & vt GH ad NL, ita FH ad K L. ergo FH ipſi K L eſt commenſurabilis longitudine; ac propterea FH KL rationales ſunt longitudi



ne commenſurabiles. rationale igitur eſt rectangulum, quod FH KL continetur. et quoniam BD quidem ipſi BA eſt æqualis; XB uero ipſi BC, erit vt DB ad BC, ita A
2. ſexti. Conuertendo. B ad BX: ſed vt DB ad BC, ita DA quadratum ad rectangulum A C: vt autem A B ad BX, ita AC rectãgulum ad quadratum CX. eſt igitur vt XC ad CA, ita CA ad A D: æquale autem eſt AD ipſi GH, & AC ipſi MK, & CX ipſi NL. quare vt GH ad M K, ita MK ad NL. & vt igitur FH ad HK, ita HK ad KL: ideoq; quod FH KL contiſ. ſexti. netur eſt æquale quadrato, quod fit ex HK. eſt autem quod continetur FH KL rationale. ergo & rationale eſt quadratum ex HK; ac propterea recta linea HK rationalis. & ſi quidem HK commenſurabilis eſt ipſi HM, hoc eſt ipſi FG longitudine,
20. huius. 21. huius. erit rectangulũ NH rationale; ſi vero HK eſt incõmenſurabilis ipſi FG lõgitudine, KH HM rationales erunt potentia ſolum commenſurabiles: & ob id rectangulum HN medium erit. ergo HN vel rationale eſt, vel medium. ſed HN eſt æquale ipſi A C. quare AC vel rationale, vel medium eſt. quod igitur medijs potentia ſolum commenſurabilibus rectis lineis continetur rectangulum vel rationale eſt, vel mediũ. quod oportebat demonſtrare.

SCHOLIVM.

Admiratione dignum eſt triadis vel ternarij vim, ac facultatem ita potentem eſſe, vt etiam irrationalium poteſtatem definiat, & ad illorum vſque extrema permeet. præterea & illud mirum eſt vnamquãque

irrationalitatis

irrationalitatis ſpeciem ab aliqua madietate omnino determinari vel Geometrica, vel Arithmetica, vel Muſica. porrò anima ipſa proxime accedens ad magnitudinum contemplationem pro ea, quam in ſe habet, rationis facultate videtur & omnia determinare, quæ in magnitudinibus determinata non ſunt, & ipſam analogiæ infinitatem his tribus vinculis cohercere. Sciendum & illud eſt, nomen commune mediæ in ea, quæ magis eſt particularis, natura poſitum eſſe. nam & quæ poteſt ſpacium contentum rationalibus longitudine commenſurabilibus, media omnino eſt rationalium illarum; & quæ poteſt ſpacium rationali, & irrationali contentum. attamen neutram harum appellat mediam, ſed Media.

quę poteſt ante dictum ſpacium. Illud quoque animaduertendum eſt, Euclidem vbique potentias denominatiue à potentibus appellare; rationales quidem à rationali, medium autem à media, & contemplationem, quæ circa medias verſatur, ſimilem facere rationalibus. etenim has vel longitudine, vel potentia ſolum commenſurabiles, quemadmodum illas eſſe dicit. & ſpacium quidem, quod medijs longitudine commenſurabilibus continetur, medium eſſe, quemadmodum illic ſpacium rationalibus contentum rationale. ſpacium vero contentum medijs potentia ſolum cõmenſurabilibus quandoque rationale, quandoque medium; & quod rationalibus potentia ſolum commenſurabilibus continetur, medium eſſe. quare medium quidem tripliciter, rationale vero dupliciter contingit. & videtur ea, quę inter medias longitudine commenſurabiles proportionalis interijcitur, & quæ inter rationales potentia ſolum commenſurabiles omnino media eſſe; quæ vero inter medias potentia ſolum commenſurabiles interdum quidem rationalis, interdum vero media. ideoq; & incommenſurabilis potentia interdum rationalis, interdum media eſt. duę enim mediæ potentia commenſurabiles eſſe poſſunt, quemadmodum & duę rationales potentia commenſurabiles. exiſtimandum igitur eſt analogiam cauſſam eſſe ortus contentorum ſpaciorum: vt potequæ inter extrema; hoc eſt vel inter duas rationales mediam, vel inter duas medias rationalem conſtituit; & totum nexum quandoque ſimilem facit extremis, quandoque ipſis diſſimilem interijcit.

Potentias denominatiue a potẽtibus appellat Euclides.

Cõtẽplatio quæ circa medias ſimilis eſt ei, quæ circa rõnales verſatur.

Medium tripliciter, rationale uero dupliciter continget.

P. C. COMMENTARIVS.

Sint mediae potentia ſolum commenſurabiles AB EC, & ſit AB ℞℞ 54, & BC ℞℞ 24, erit rectangulum ipſis contentum ℞℞ 1296, videlicet 6, quod eſt rationale. Rurſus ſint mediae potentia ſolum commenſurabiles ℞℞ 128, & ℞℞ 22, rectangulum, quod ipſis continetur, erit ℞℞ 9216, videlicet ℞ 96, quod eſt medium. At vero ℞℞ 54, & ℞℞ 24: itemq; ℞℞ 128, & ℞℞ 72 eſſe potentia ſolum commẽſurabiles patet tum ex 28, & 29, huius, tum ex eo, quòd ſi ℞℞ 54 per ℞℞ 24 diuidatur, proueniet ℞℞ $\frac{9}{4}$, hoc eſt ℞ $\frac{3}{2}$. erit igitur ℞℞ 54 ad ℞℞ 24, vt

24, vt R 3 ad R 2. Rursus si RR 128 dividatur per RR 72, proveniet RR $\frac{8}{9}$. quare RR 128 ad RR 72 erit vt R 4 ad R 3.

THEOREMA XXIIII. PROPOSITIO XXVII.

Medium non superat medium rationali.

Si enim fieri potest, medium AB superet medium AC rationali DB. & exponatur rationalis EF, atque ipsi quidem AB æquale ad EF applicetur parallelogrammum rectangulum FH, latitudinem faciens EH: ipsi vero AC æquale auferatur FG. reliquum igitur BD reliquo KH est æquale. rationale autē est BD. ergo & KH rationale. quoniam igitur medium est vtrumque ipsorum AB, AC; estq; AB æquale FH, & AC æquale FG: erit & vtrumque ipsorum FH FG medium: & ad rationalem EF applicata sunt. rationalis igitur est vtraque carum HE EG, & ipsi EF longitudine incommensurabilis. & quoniam rationale est DB, et ipsi KH æquale; & KH rationale erit. est autem ad EF applicatum. rationalis igitur est GH, & ipsi EF commensurabilis longitudine. sed & EG est rationalis, & ipsi EF longitudine incommensurabilis. ergo EG incommensurabilis est ipsi GH longitudine. atque est vt EG ad GH, ita quadratum ex EG ad rectangulum, quod EG, GH continetur. incommensurabile igitur est quadratum ex EG rectangulo EGH: sed quadrato quidem ex EG commensurabilia sunt ex EG, GH quadrata. vtraque enim sunt rationalia. rectangulo autem EGH commensurabile est quod bis EG GH continetur; est enim ipsius duplum. ergo quadrata ex EG, GH incommensurabilia sunt ei, quod bis EG, GH continetur. & vtraque igitur, videlicet quadrata ex EG GH, & quod bis continetur EG GH, hoc est quadratum ex EH, incommensurabilia sunt quadratis ex EG GH. sunt autē rationalia, quę ex EG GH quadrata. irrationale igitur est quadratum ex EH: ac propterea EH est irrationalis. sed & rationalis. quod fieri non potest. non igitur medium superat medium rationali. quod oportebat demonstrare.



23.huius.
21.huius.
Coro.13.huius.
10.huius.
6.huius.
14.huius.
4. secundi.
17.huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Rationale autem non superare rationale nisi rationali, hoc modo demonstrabitur.

Sint parallelogramma rectangula AB AC rationalia. Dico DB, quo parallelogrammum AB ipsum AC superat, rationale esse. quoniam enim AB AC sunt rationalia, & inter se commensurabilia sunt: atque est tota magnitudo AB ex magnitudinibus AC DB composita vni ipsarum AC commensurabilis. ergo & reliqua DB commensurabilis erit. sed AB est rationale. quare & DB rationale sit necesse est. quod nos ad 23 huius demonstrauimus.



16.huius.

PROBLEMA IIII. PROPOSITIO. XXVIII.

Medias inuenire potentia solum commensurabiles, quæ rationale contineant.

Exponantur

Exponatur duæ rationales potentia ſolum commenſurabiles AB; & ſumatur ipſarum AB media proportionalis C: fiatq; vt A ad B, ita C ad D. quoniã igitur AB rationales ſunt, potentia ſolum commenſurabiles, erit quod ipſis A B continetur rectãgulum, hoc eſt quadratum ex C medium. ergo recta linea C media eſt. & quoniam ut A ad B, ita eſt C ad D; ſuntq; AB potentia ſolũ commenſurabiles: & CD potentia ſolum commenſurabiles erunt. eſt autem recta linea C media. media igitur eſt & D. quare C D mediæ ſunt potentia ſolum cõmenſurabiles. Dico etiam ipſas rationale continere. quoniam enim eſt vt A ad B, ita C ad D, erit permutando vt A ad C, ita B ad D. ſed vt A ad C, ita C ad B. ergo & vt C ad B, ita B ad D. quod igitur ipſis C D continetur quadrato ex B eſt æquale. rationale autem eſt quadratum ex B. ergo & quod continetur C D rationale erit. Inuentæ igitur ſunt mediæ potentia ſolum commenſurabiles, quæ rationale continent. atque illud eſt quod facere oportebat.



12. ſexti. ✻ 22. huius. 10. huius, 24. huius. 17. ſexti.

F. C. COMMENTARIVS.

Fiatq; ut A ad B, ita C ad D] *Sit* A 3, *&* B ℞ 6, *erit rectangulum, quod ipſis continetur* ℞ 54, *&* *recta linea C inter ipſas A B media proportionalis, quae ipſum poteſt* ℞℞ 54. *itaque fiat ut A ad E, hoc eſt ut* ℞℞ 81 *ad* ℞℞ 36, *ita C videlicet* ℞℞ 54 *ad aliam, quae ſit D, hoc modo. multiplicetur* 54 *per* 36, *fiet* 1944. *ergo* ℞℞ 1944 *eſt rectangulum, quod continetur* ℞℞ 36, *&* ℞℞ 54 *ex primo antecedentium, quod quidem applicatum ad* ℞℞ 81 *latitudinem faciet* ℞℞ 24 *ex ſecundo eorundem. quare rectangulum contentũ* ℞℞ 81, *&* ℞℞ 24 *eſt aequale ei, quod continetur* ℞℞ 36, *&* ℞℞ 54. *eſt igitur ut* ℞℞ 81 *ad* ℞℞ 36, *ita* ℞℞ 54 *ad* ℞℞ 24. ✻ 16. ſexti.

PROBLEMA V. PROPOSITIO. XXIX.

Medias inuenire potentia ſolum commenſurabiles, quæ medium contineant.

Exponantur tres rationales potentia ſolum cõmenſurabiles A B C, ſumaturq; ipſarum A B media proportionalis D: & fiat vt B ad C, ita D ad E. Quoniam igitur A B rationales ſunt, potẽtia ſolum commenſurabiles, erit quod A B continetur rectãgulum, hoc eſt quadratum ex D medium. ergo D media eſt. & quoniam B C ſunt rationales potentia ſolum commenſurabiles, atque eſt vt B ad C, ita D ad E; rectę lineæ D E potẽtia ſolum commenſurabiles erunt. eſt autem D media. ergo & E media eſt; ac propterea D E mediæ ſunt potetia ſolum commenſurabiles. Dico ipſas etiam medium continere. Quoniam enim eſt vt B ad C, ita D ad E, erit permutando vt B ad D, ita C ad E. vt autem B ad D, ita eſt D ad A. ergo & vt D ad A, ita C ad E. quod igitur A C continetur rectangulum eſt æquale contento D E. eſt autem quod continetur A C medium. ergo & quod continetur D E medium erit. Inuentę igitur ſunt mediæ potentia ſolum cõmenſurabiles, quæ medium continent, vt facere oportebat.



✻ 22. huius. 10. huius. 24. huius. 16. ſexti. 22. huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Et fiat vt B ad C, ita D ad E] *Sit A* 4, *B* ℞ 8, *et C* ℞ 6, *erit rectangulum, quod A B continetur* ✻

tinetur R 128, & recta linea D inter ipsas A B media proportionalis R R 128. fiat igitur vt B ad C, hoc est vt R R 64 ad R R 36, ita D videlicet R R 128 ad aliam, quae sit E. eodem modo, quo supra, multiplicetur 128 per 36, fit 4608, & 4608 diuidatur per 64, exeunt 72. ergo R R 72 erit quarta proportionalis A, quam quærebamus.

LEMMA. I.

Inuenire duos numeros quadratos, ita vt qui ex ipsis cõponitur etiã quadratus sit.

Exponantur duo numeri AB BC, qui vel pares sint, vel impares. & quoniam siue à par par auferatur, siue ab impari impar, reliquus par est; erit AC numerus par. secetur AC bifariam in D. sint autem AB BC uel similes plani, vel quadrati, qui & ipsi similes plani sunt. ergo qui fit ex AB BC vnà cum quadrato ex CD est æqualis ei, qui fit ex BD quadrato. atque est quadratus, qui fit ex AB BC; ostensum enim est si duo similes plani se se multiplicantes aliquem faciãt, factum quadratum esse. Inuenti igitur sunt duo quadrati numeri, videlicet qui fit ex AB BC, & qui fit ex CD, qui quidem inter se compositi quadratum numerum faciunt, nempe eum, qui fit ex BD. quod ipsum facere oportebat.

A E D C B

A
B
C

COROLLARIVM.

Et manifestum est rursus inuentos esse duos numeros quadratos, & qui fit ex BD, & qui ex CD, ita vt ipsorum excessus, videlicet qui fit ex AB BC, sit quadratus; quando AB BC similes plani sint. Quãdo autem non sint similes plani, inuenti sunt duo quadrati & qui fit ex BD, & qui ex CD, quorũ excessus, qui ex AB BC nõ est quadratus.

D

F. C. COMMENTARIVS.

A Et quoniam siue à pari par auferatur, siue ab impari impar reliquus par est] *ex 24, & 26 noni libri.*

B Ergo qui fit ex AB BC vnà cũ quadrato ex CD est æqualis ei, qui fit ex BD quadrato] *Hoc demonstratur à Barlaam Monacho in theoremate 6 eorum, quae nos ad 15 noni libri apposuimus.*

C Ostensum est enim si duo similes plani se se multiplicantes aliquem faciant, factum planum esse] *in prima propositione noni libri.*

D Quando autem non sint similes plani, inuenti suut] *Sint enim duo numeri AB BC, qui non sint similes plani, & AC bifariam secetur in D. rursus qui fit ex AB BC vnà cum quadrato ex CD est aequalis ei, qui ex ED ex 6 Barlaam Monachi iam dicto. sed qui fit ex AB BD non est quadratus. si enim quadratus sit, erunt numeri AB BD similes plani. quod non ponitur. quadrati igitur numeri sint, qui fiunt ex BD, & DC, quorum excessus, qui fit ex AB BC non est quadratus.*

A C D C B

LEMMA II.

Inuenire duos quadratos numeros, ita vt qui ex ipsis componitur non sit quadratus.

Sit

Sit enim qui ex A B BC quadratus, vt dictum est, & par numerus C A; secetur; CA bifariam in D. perspicuum est quadratum ex AB BC vnà cum quadrato ex CD æqualem esse ei, qui fit ex BD quadrato. auferatur vnitas DE. ergo quadratus ex AB BC vnà cum quadrato ex CE minor est quadrato ex BD. Dico igitur quadratum ex AB BC vnà cum quadrato ex CF, quadratum non esse. si enim est quadratus vel æqualis est quadrato ex BE, vel eo minor, nō autem maior, vt ne vnitas secetur; neue qui ex AB BC vnà cum quadrato ex CD, qui est æqualis quadrato ex BD æqualis sit quadrato ex AB BC vnà cum quadrato ex CE. sit primum, si fieri potest, qui ex AB BC vnà cum quadrato ex CE æqualis quadrato ex BE; & sit GA duplus ipsius DE vnitatis. Quoniam igitur totus AC totius CD est duplus, quorum AG est duplus DE, erit & reliquus CG ipsius GE duplus. ergo GC in pūcto E bifariam secatur; ac propterea qui ex GB BC vnà cum quadrato ex CE æqualis est ei, qui fit ex BE quadrato. sed & qui ex AB BC vnà cum quadrato ex CE æqualis ponitur quadrato ex BE. ergo qui ex GB BC vnà cum quadrato ex CE est æqualis ei, qui ex AB BC unà cum quadrato ex CE; & communi detracto quadrato ex CE concludetur AB ipsi GB æqualis. quod est absurdum. non igitur qui ex A B BC vnà cum quadrato ex CE æqualis est quadrato ex BE. Dico neque quadrato ex BE minorē esse. si enim fieri potest, sit quadrato ex BF æqualis, & ipsius DF duplus ponatur HA. concludetur rursus HC duplus CF, ita ut & HC in F bifariam diuidatur; ac propterea qui ex HB BC unà cum quadrato ex CF æqualis sit quadrato ex BF. ponitur autem & qui ex AB BC unà cum quadrato ex CE æqualis quadrato ex FB. ergo sequitur qui ex AB BC uua cum quadrato ex CE æqualem esse ei, qui ex HB BC unà cum quadrato ex CF. quod est absurdum. non igitur qui ex A B B C unà cum quadrato ex C E est æqualis minori, quàm sit quadratus ex B E. ostensum est autem neque ipsi quadrato ex BE, neque maiori eo æqualem esse. ergo qui fit ex AB BC unà cum quadrato ex CE non est quadratus. & cum fieri possit, ut idem pluribus modis ostendatur, unus qui proxime dictus est nobis sufficiat, ne longàm tractationem longius producamus.



A B C D E F

F. C. COMMENTARIVS.

A Perspicuum est quadratum ex A B B C unà cum quadrato ex C D æqualem esse ei, qui fit ex BD quadrato] *Ex 6. Barlaam Monachi.*

B Non autem maior ut ne unitas secetur] *si enim fieri potest sit maior, vel igitur eius latus est BD, vel minus quàm BD. & si quidem BD, erit totum parti aequale. quod fieri non potest. si vero minus quàm BD, cum sit maius quàm BE, vnitas secabitur. quod itidem fieri non potest.*

C Erit & reliquus CG ipsius GE duplus] *Ex 7 vel 11 septimi libri.*

D Et communi detracto quadrato ex CE concludetur AB ipsi G B æqualis] *Relinquetur enim qui ex AB BC aequalis ei, qui ex GB BC. sed qui ex AB BC ad eum, qui ex GB BC est vt AB ad BG, ex 17 septimi. ergo AB ipsi BG est aequalis. quod est absurdum.*

E Concludetur rursus HC duplus CF.] *Quoniam enim AC ipsius CD est duplus, quorum AH ponitur duplus ipsius DF, erit & reliquus HC reliqui CF duplus.*

F Quod est absurdum] *Est enim qui ex AB BC maior eo, qui ex HB BC, quòd AB sit maior quàm BH. & similiter quadratus ex CE maior quadrato ex CF; quoniam AC quàm CF est maior.*

PROBLEMA VI. PROPOSITIO XXX.

Inuenire duas rationales potentia solum commensurabiles, ita vt maior plus possit, quàm minor quadrato rectæ lineæ sibi longitudine commensurabilis.

Ex corolla. primi lem. antecedentium.

Per Corol. 6. huius.

6. huius.

diffi. 9. huius

9. huius.

Ex 47. primi, uel ex coroll. antè 15. huius.

9. huius

47. primi.

Exponatur enim quædam rationalis AB, & duo quadrati numeri CD DE, ita vt ipſorum exceſſus CE non ſit quadratus. Deſcribatur autẽ in recta linea AB ſemicirculus AF B: fiatq; vt DC ad CE, ita ex AB quadratum ad quadratum ex AF; & FB iungatur. Quoniam igitur eſt, vt quadratum ex BA ad quadratum ex AF, ita DC ad CE; habebit quadratum ex BA ad quadratum ex AF proportionem eam, quã numerus DC ad CE numerum. ergo quadratum ex BA quadrato ex AF eſt commenſurabile. ſed rationale eſt quadratum ex AB. ergo & quadratum ex AF rationale erit; ac propterea recta linea AF eſt rationalis. & quoniam DC ad CE proportionem non habet, quam quadratus numerus ad quadratum numerum; neque quadratum ex BA ad quadratum ex AF proportionem habebit, quam quadratus numerus ad quadratum numerum. incommenſurabilis igitur eſt recta linea BA ipſi AF longitudine. ergo AB AF rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles, Quòd cum ſit vt DC ad CE, ita quadratum ex BA ad quadratum ex AF, erit per conuerſionem rationis vt CD ad DE, ita quadratum ex AB ad quadratum ex BF. ſed CD ad DE proportionem habet, quam quadratus numerus ad quadratum numerum. ergo & quadratum ex AB ad quadratũ ex BF proportionẽ habebit, quã quadratus numerus ad quadratũ numerũ; & ob id recta linea AB ipſi BF longitudine eſt commenſurabilis. atque eſt quadratum ex AB æquale quadratis ex AF FB. ergo AB plus poteſt, quàm AF quadrato rectæ lineę BF ſibi commenſurabilis longitudine, Inuentæ igitur ſunt duæ rationales potentia ſolum commenſurabiles BA AF, ita vt maior BA plus poſsit, quàm minor AF, quadrato ipſius FB, ſibi longitudine commenſurabilis. quod facere oportebat.



SCHOLIVM.

Ex hoc loco inuentionem aggreditur reliquarum irrationalium, ac primum earum, quę per compoſitionem fiunt; præmittit autem theoremata hęc, vtpote ex quibus eiuſmodi irrationalium natura appareat.

PROBLEMA VII. PROPOSITIO XXXI.

Inuenire duas rationales potentia ſolum commenſurabiles, ita ut maior plus poſsit, quàm minor quadrato rectæ lineæ ſibi longitudine incommenſurabilis.

Exponatur rationalis AB, & duo numeri quadrati CE ED, ita vt qui ex ipſis componitur nõ ſit quadratus. atque in recta linea AB ſemicirculus AFB deſcribatur: & fiat vt DC ad CE, ita quadratum ex AB ad quadratum ex AF: & iuncta FB, ſimiliter oſtendemus, vt in antecedente, BA AF rationales eſſe potentia ſolum commenſurabiles. Et quoniam eſt vt DC ad CE, ita quadratum ex BA ad id quod ex AF quadratum; erit per conuerſionem rationis vt CD ad DE, ita quadratum ex AB ad quadratum ex BF. ſed CD ad DE proportionem non habet, quam quadratus numerus ad quadratum numerum. nõ igitur quadratum ex AB ad quadratum ex BF proportionem habebit, quam quadratus numerus ad quadratum numerum



merum. ergo A B ipsi B F longitudine est incommensurabilis. & B A plus potest, quàm A F quadrato rectæ lineæ B F sibi incommensarabilis longitudine. quare A B B F rationales sunt potentia solum commensurabiles, & A B plus potest, quàm A F quadrato rectæ lineæ F B sibi longitudine incommensurabilis.

LEMMA.

Si sint duę rectę lineæ in proportione aliqua, erit vt recta linea ad rectam lineam, ita rectangulum duabus rectis lineis contentum ad quadratum minoris.

Sint duæ rectæ lineæ A B B C in proportione aliqua. Dico vt A B ad B C, ita esse rectangulum ex A B B C ad quadratū ex B C. describatur enim ex B C quadratum B D E C, & compleatur A D parallelogrammū. manifestum est ut A B ad B C, ita esse A D parallelogrammum ad parallelogrammum B E. atque est A D quidem, quod A B B C continetur; est enim B C ipsi B D æqualis. B E vero est quadratum ex B C. vt igitur A B ad B C, ita rectangulum ex A B B C ad id, quod ex B C quadratum. quod demonstrare oportebat.



1. sexti

PROBLEMA VIII. PROPOSITIO. XXXII.

Inuenire duas medias potentia solum commensurabiles, quæ rationale contineant, ita ut maior plus possit, quàm minor quadrato rectæ lineæ sibi longitudine commensurabilis.

Exponantur enim duæ rationales potentia solum commensurabiles A B, ita vt A maior plus possit, quàm B minor, quadrato rectę lineę sibi lōgitudine commensurabilis. & sit rectangulo ex A B æquale quadratum, quod fit à recta linea C. medium autem est quòd ex A B. ergo & quadratum ex C medium erit, & ipsa C media. at quadrato quod fit ex B æquale sit rectāgulum ex C D. rationale autem quod ex B. ergo & rectangulum ex C D est rationale. & quoniam est vt A ad B, ita rectangulum ex A B ad id, quod ex B quadratum; sed rectangulo quidem ex A B æquale est quadratum ex C; quadrato autem ex B æquale rectangulum ex C D: erit vt A ad B, ita quadratum ex C ad id, quod ex C D rectangulum. Sed vt quadratum ex C ad rectangulum ex C D, ita recta linea C ad ipsam D. vt igitur A ad B, ita C ad D. commensurabilis autem est A ipsi B potentia solum. ergo & C ipsi D potentia solū est commensurabilis. atque est C media. media igitur & D. & quoniam est vt A ad B, ita C ad D, & A plus potest, quàm B quadrato rectæ lineę sibi commensurabilis lōgitudine; & C plus poterit, quàm D quadrato rectæ lineæ sibi longitudine commensurabilis. Inuentę igitur sunt duæ mediæ potentia solum cōmensurabiles C D, quæ rationale continent, & C plus potest quàm D quadrato rectæ lineæ sibi commensurabilis longitudine. similiter autem ostenderur inueniri posse duas medias potentia solum commensurabiles, & continentes rationale, ita ut maior plus possit, quàm minor quadrato rectę lineę sibi incommensurabilis longitudine, quādo A plus possit, quàm B quadrato rectæ lineę sibi longitudine incommensurabilis.



30. huius.

22. huius.

Ex antecedēti lemmate.

1. sexti.

10. huius.

24. huius.

15. huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Similiter autem oſtendetur inueniri poſſe duas medias potentia ſolum commẽ-ſurabiles] *Maneant eadem quae ſupra, & A plus poſſit, quàm B quadrato rectae lineae ſibi longitudine incommenſurabilis. ſimiliter vt ante demonſtrabitur, rectam lineam D mediam eſſe. Et quoniam vt A ad B, ita C ad D, & A plus poteſt, quàm B quadrato rectae lineae ſibi incommenſurabilis longitudine, & C plus poterit, quàm D quadrato rectae lineae ſibi incommenſurabilis longitudine. ergo rurſus inuentae ſunt duae mediae potentia ſolum commenſurabiles C D, rationale continentes, & C plus poteſt quàm D quadrato rectae lineae ſibi longitudine incommenſurabilis.*

Sit A 8, B ℞ 28. erit rectangulũ, quod ipſis cõtinetur ℞ 1792, & recta linea C ℞℞ 1792, quae media eſt. fiat vt 8 ad ℞ 28, ita ℞℞ 1792 ad aliam, quae ſit D. erit ea ℞℞ 343. ergo ℞℞ 1792 & ℞℞ 343 duae mediae ſunt, potentia ſolum commenſurabiles, quae rationale continent, videlicet 28. & maior plus poteſt, quàm minor quadrato rectae lineae ſibi longitudine cõmenſurabilis. nam ſi à quadrato maioris auferatur quadratum minoris, hoc eſt ſi à ℞ 1792 auferatur ℞ 343, relinquetur ℞ 567. & ſunt duae mediae ℞℞ 1792 ℞℞ 567 inter ſe longitudine commenſurabiles, videlicet vt 4 ad 3. ſi enim ℞℞ 1792 diuidatur per ℞℞ 567, prouenit ℞℞ 3 $\frac{13}{81}$, quae eſt 1 $\frac{1}{3}$, hoc eſt $\frac{4}{3}$. Rurſus ſit A 8. B ℞ 20, erit rectangulum ipſis contentum ℞ 1280, & recta linea C ℞℞ 1280. fiat ut 8 ad ℞ 20, ita ℞℞ 1280 ad aliam, quae ſit D. erit ea ℞℞ 125. ſunt igitur R R 1280, & R R 125 duae mediae, quae rationale continent, videlicet 20, & maior plus poteſt, quàm minor quadrato rectae lineae ſibi longitudine incommenſurabilis. ſed ſit A 3 B ℞ 6, rectangulum ipſis contentum erit R 54, & recta linea C ℞℞ 54. Rurſus fiat ut 3 ad ℞ 6, ita R R 54 ad aliã, erit ea R R 24. quare R R 54, & R R 24 ſunt duae mediae potentia ſolum commenſurabiles, quae rationale continent, videlicet 6; & maior plus poteſt, quàm minor quadrato rectae lineae ſibi longitudine incommenſurabilis.

LEMMA

Si fuerint tres rectae lineę in proportione aliqua, erit ut prima ad tertiam, ita rectangulum contentum prima, & media ad id, quod media, & tertia continetur.



Sint tres rectę lineæ in proportione aliqua AB BC CD. Dico vt A B ad C D, ita eſſe rectangulum contentũ AB BC ad id quod B G CD continetur. Ducatur enim à pũcto A ipſi AB ad rectos angulos AE; ponaturq; AE ipſi BC æqualis; & per E quidem ipſi AD parallela ducatur EG; per BCD vero ducantur BF CH DG parallelæ ipſi A E. quoniam igitur eſt vt AB ad BC, ita AF parallelogrammum ad parallelogrammum B H; ut autem BC ad C D, ita parallelogrammum BH ad ipſum C G: erit ex æquali vt AB ad CD, ita AF parallelogrammum ad parallelogrammum C G. & eſt parallelogrãmum quidem A F, quod AB BC continetur; namque AE eſt æqualis BC; parallelogrammum vero CG eſt, quod continetur BC CD; etenim BC ipſi CH eſt æqualis. Si igitur fuerint tres rectæ lineæ in proportione aliqua, erit ut prima ad tertiam, ita rectangulum, quod continetur prima & media ad rectangulum media & tertia cõtentum. quod oportebat demonſtrare.

PROBLEMA IX. PROPOSITIO. XXXIII.

Inuenire duas medias potentia ſolum commenſurabiles, quæ medium contineant, ita ut maior plus poſſit, quàm minor, quadrato rectæ lineæ ſibi longitudine commenſurabilis.

Exponantur

Exponantur tres rationales A B C, potentia ſolum commenſurabiles, ita vt A plus poſsit, quàm C quadrato rectæ lineę ſibi commenſurabilis longitudine: & ſit rectangulo ex ipſis A B æquale quadratum, quod fit ex D. medium autem eſt rectangulum ex AB. ergo & quadratũ ex D medium erit; & recta linea D media. rectangulo autem ex BC æquale ſit rectangulum ex DE. Quoniam igitur eſt vt rectangulum ex AB ad rectangulum ex BC, ita recta linea A ad ipſam C; ſed rectangulo quidem ex A B æquale eſt quod fit ex D quadratum; rectangulo autem ex B C æquale rectangulum ex DE: erit vt A ad C, ita quadratum ex D ad id, quod ex D E rectangulum. ſed ut quadratum ex D ad rectangulum ex DE, ita D ad E. & ut igitur A ad C, ita D ad E. commenſurabilis autem eſt A ipſi C potentia ſolum. ergo & D ipſi E potentia ſolum eſt cõmenſurabilis. atque eſt D media. media igitur & E. itaque quũ eſt vt A ad C, ita D ad E; & A plus poteſt, quàm C quadrato rectę lineę ſibi lõgitudine commenſurabilis: & D plus poterit, quàm E quadrato rectę lineę ſibi cõmenſurabilis longitudine. Dico prętera rectangulum ex DE medium eſſe. Quoniam enim rectangulo ex B C æquale eſt, quod ex D E rectangulum; medium aũt eſt quod ex B C. ergo & quod ex D E medium erit. Inuentę igitur ſunt duę mediæ potentia ſolum commenſurabiles DE, quæ medium continẽt, ita vt maior plus poſſit, quàm minor quadrato rectę lineę ſibi longitudine commenſurabilis. Rurſus ſimiliter inuenientur duæ mediæ potentia ſolum commenſurabiles. & medium continentes, ita vt maior plus poſsit, quàm minor quadrato rectæ lineæ ſibi incommenſurabilis longitudine; quando ſcilicet A plus poſsit, quàm C quadrato rectæ lineæ ſibi longitudine incommenſurabilis. quod facere oportebat.



26.

22. huius.

Ex antecedente.

Lem. 25. huius.

24. huius.

15. huius.

22. huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit A 8 B Rx 48, C Rx 28, rectangulũ quod ipſis AB cõtinetur, erit Rx 3072. & recta linea D RxRx 3072, quae eſt media. fiat vt A ad C, ita D ad aliã, quae ſit E. erit E RxRx 588. ergo RxRx 3072, & RxRx 588 duae mediae ſunt potentia ſolũ commenſurabiles, quae medium continent, & maior plus poteſt, quàm minor quadrato rectae lineae ſibi longitudine commenſurabilis. ſi enim à quadrato maioris auferatur quadratum minoris, hoc eſt ſi à Rx 3072 auferatur Rx 588, reliqua erit Rx 972. ſuntq; RxRx 3072, & RxRx 972 duae mediae longitudine inter ſe commenſurabiles, vt 4 ad 3. nã ſi RxRx 3072 diuidatur per RxRx 972, exibit RxRx 3, $\frac{13}{81}$ quae eſt 1. $\frac{1}{3}$ hoc eſt $\frac{4}{3}$. rurſus ſit A 8, B Rx 48, C Rx 20, erit D cadẽ, quę ſupra, videlicet RxRx 3072. fiat vt A ad C, ita D ad aliam, quae ſit E. erit E RxRx 300. ſunt igitur RxRx 3072, & RxRx 300 duae mediae potentia ſolum commenſurabiles, quae medium continent, & maior plus poteſt, quàm minor quadrato rectae lineae ſibi longitudine incommenſurabilis. ſed ſit A Rx 6, B Rx 3, C Rx 2, erit D RxRx 18. fiatq; vt A ad C, ita RxRx 18 ad aliã, quae ſit E, erit E RxRx 2. ergo RxRx 18, & RxRx 2 ſunt duae mediae potentia ſolum commenſurabiles, & medium continentes, quarum maior plus poteſt, quã minor, quadrato rectae lineae ſibi incommenſurabilis longitudine.

LEMMA I.

Sit triangulum orthogonium ABC, rectum habens angulum BAC, & ducatur AD perpendicularis. Dico rectangulum quidem contentum CB BD ęquale eſſe quadrato, quod fit ex BA; cõtentum vero BC CD aequale quadrato ex CA; & contentum BD DC aequale quadrato ex

DA

DA: & denique contentum BC AD rectangulo, quod BA, AC continetur, æquale esse.

Quoniam enim in triangulo orthogonio ab angulo recto ad basim perpendicularis ducta est AD, triãgula ABD ADC similia sunt, & toti triangulo ABC, & inter se sẽ. et quoniam simile est ABC triangulum triangulo ABD, erit vt CB ad BA, ita AB ad BD. ergo rectangulũ, quod CB BD continetur quadrato ex AB est æquale. Eadem ratione et rectangulum contentum BC CD æquale est quadrato ex AC. rursus quoniã in triangulo orthogonio ab angulo recto ad basim perpendicularis ducitur, ducta basis partiũ media proportionalis est. quare ut BD ad DA, ita AD ad DC; ac propterea rectãgulum, quod BD DC continetur est æquale quadrato ex AD. Dico & rectangulum contentum BC AD ei, quod BA AC continetur, æquale esse. Quoniam enim, vt dixímus, triangulum ABC triangulo ACD est simile, vt BC ad CA, ita erit BA ad AD. si autem quattuor rectæ lineæ proportionales fuerint, rectangulum extremis contentum est æquale ei, quod medijs continetur. ergo rectangulum contentum BC AD contento BA AC æquale erit Dico præterea si describamus parallelogrammum rectangulum EC, & ipsum AF compleamus, rectangulum EC ipsi AF æquale esse. vtrũque enim ipsorum duplum est triãguli ABC. atque est rectangulũ quidem EC id, quod BC AD continetur; rectangulum vero AF quod continetur BA AC. At rectãgulum, quod cõtinetur BC AD rectangulo BA AC contento est æquale.

8 sexti.
4. sexti.
27. sexti.
8. sexti.
4. sexti.
16. sexti.



LEMMA II.

Si recta linea in partes inæquales secetur, erit vt maior pars ad minorem, ita rectangulum contentum tota, et maiori parte ad rectangulũ, quod tota, & minori continetur.

Recta enim quædam linea AB secetur in partes inæquales ad E. Dico vt AE ad EB, ita esse rectangulum contentum BA AC ad id, quod AB BE continetur. describatur enim ex AB quadratum ACDB; & per E quidem alterutri ipsarum AC DB parallela ducatur EF. perspicuum est vt AE ad EB, ita esse AF parallelogrãmum ad parallelogrammum FB. atque est AF quidẽ parallelogrammum quod BA AE continetur; etenim CA ipsi AB est æqualis: parallelogrammum vero FB est quod continetur AB BE; æqualis enim est DB ipsi BA. vt igitur AE ad EB, ita rectangulum contentum BA AE ad id, quod AB BE cõtinetur. quod oportebat demonstrare.



LEMMA III.

Si sint duæ rectæ lineæ inæquales, minor autem ipsarum in partes æquales secetur, rectangulum contentum duabus rectis lineis duplum est eius, quod maiori, & dimidia minoris continetur.

Sint

Sint duæ rectæ lineæ inęquales AB BC, quarum maior AB: & secetur BC bifariam in puncto D. Dico rectangulum contentum AB BC duplum esse eius, quod AB BD continetur. ducatur enim à puncto B ipsi BC ad rectos angulos BE; ponaturq; BE ipsi BA æqualis, & figuræ describatur. Quoniam igitur est vt BD ad DC, ita parallelogrammum BF ad DC parallelogrammum; erit componendo vt BC ad CD, ita parallelogrammum BG ad ipsum GD. est autem BC dupla ipsius CD. ergo & parallelogrammum BG parallelogrammi GD est duplum. atque est BG quidem, quod AB BC continetur; etenim AB est ęqualis BE: DG vero est quod continetur AB BD: nam BD ipsi DC, & AB ipsi DF est ęqualis. quod oportebat demonstrare.



1. sexti.

PROBLEMA X. PROPOSITIO. XXXIIII.

Inuenire duas rectas lineas potentia incommensurabiles, quæ faciant compositum quidem ex ipsarum quadratis rationale; rectangulum vero, quod ipsis continetur, medium.

Exponantur duæ rationales potentia solum commensurabiles AB BC, ita vt maior AB plus possit, quã minor BC quadrato rectę lineæ sibi longitudine incommensurabilis. & secta BC, bifariam in D, quadrato, quod fit ab alterutra ipsarum BD DC æquale parallelogrammum ad rectam lineã AB applicetur, deficiens figura quadrata: & sit quod continetur AE EB. describatur in recta linea AB semicirculus AFB; ducaturq; ipsi AB ad rectos angulos EF, & AF FB iungantur. Quoniam igitur duę rectæ lineę AB BC inæquales sunt, & AB plus potest, quàm BC quadrato rectę lineæ sibi longitudine incommensurabilis; quartæ autem parti quadrati, quod fit à minori BC, hoc est quadrato dimidiæ ipsius æquale parallelogrammum applicatum est ad AB, deficiens figura quadrata, quod quidem AE EB continetur: erit AE ipsi EB incommensurabilis. atque est vt AE ad EB, ita BAE rectangulum ad rectangulum ABE. rectangulum autem BAE quadrato ex AF est æquale; & rectangulum ABE ęquale quadrato ex BF. quadratũ igitur ex AF incommensurabile est quadrato ex FB: ideoq; rectæ lineæ AF FB potentia sunt incommensurabiles. & quoniam AB rationalis est, & quadratum, quod fit ex AB erit rationale. ergo & rationale compositum ex quadratis ipsarum AF FB. rursus quoniam rectangulum AEB est ęquale quadrato ex EF: ponitur autem rectangulum AEB quadrato etiam ex BD æquale. ergo FE est ęqualis BD; ac propterea BC ipsius EF est dupla. rectangulũ igitur ABC duplum est rectãguli, quod AB EF continetur. sed rectangulum ABC est medium. ergo & medium quod continetur AB EF. est autem quod AB EF continetur æquale contento AF FB. contentum igitur AF FB medium est. sed & ostensum est rationale, quod componitur ex ipsarum AF FB quadratis. Inuentę igitur sunt duæ rectæ lineæ potentia incommensurabiles AF FB, quę faciunt compositũ quidem ex ipsarum quadratis rationale; rectangulum vero, quod ipsis continetur, medium. quod facere oportebat.



31. huius.

Per lemma ante 19. huius uel per 28. sexti.

19. huius: Per 2. lemma ex antecedentibus. Per 1. lemma Per 9. diffi.

Per 3. lemma 22. huius. Cor. 24. huius. Per 1. lemma

SCHOLIVM.

At vero ex duobus spacijs irrationalibus inter se compositis totum fieri rationale, ex hoc cognoscemus.

Exponatur

Exponatur rationalis AB, & duo numeri CD non habentes proportionem, quam quadratus numerus ad quadratum numerum: fiatq; vt C ad D, ita quadratum ex AB ad id quod ex BE quadratum: & descripto quadrato ex AB per E ducatur alterutri laterum parallela EF. Quoniam igitur est vt C ad D, ita quadratum ex AB ad quadratum ex BE; & C ad D proportionem non habet, quam quadratus numerus ad quadratum numerum: erit AB ipsi BE longitudine incommensurabilis. ergo & BA reliquę AE incommensurabilis est longitudine. vt autē AB est ad vtram quę ipsarum AE EB, ita quadratum ex AB ad vtrumque parallelogrammorū. quadratum igitur ipsis parallelogrammis incommensurabile erit. sed quadratum est rationale. irrationalia igitur sunt parallelogramma, quæ rationalis sunt partes, & ipsum rationale cōplēt.



Corol. 10. huius.

9. huiue. Ex demonstratis ad 17 huius.

1. sexti.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit recta linea AE 8, BC ℞ 20. erit BD, vel DC ℞ 5: & quadrato ipsius BD, quod est 5 aequale parallelogrammum ad AB applicetur, deficiens figura quadrata. illud autem facile assequemur, si quę tradita sunt in lemmate ante 18. huius repetantur. Itaque in recta linea AB descripto semicirculo AFB; & secta AB bifariam in G, ipsi ad rectos angulos ducatur GH; ponaturq; GK æqualis BD. est enim GH maior, quàm BD. nam cum AB sit maior, quàm BC, erit etiam ipsius AB dimidia maior, quàm dimidia BC. deinde per K ipsi AB parallela ducatur KF: atque à puncto F agatur FE ad AB perpendicularis, quae protendatur in L, ita vt EL sit aequalis EB; & parallelogrammum AL compleatur. erit igitur parallelogrammum AL illud, quod AE EB continetur, & aequale quadrato ipsius FE, hoc est quadrato BD. quare ad rectam lineam AB applicatum est parallelogrammum AL quadrato ipsius BD aequale, & deficiens figura quadrata. & quoniam recta linea AB secatur in partes aequales ad G, & in partes inæquales ad E, erit rectangulum contentum AE EB vnà cum quadrato ipsius GE aequale quadrato dimidiae AB, hoc est ipsius AG: quadratum autem AG est 16, & rectangulum AEB 5; est enim FE ℞ 5, & eius quadratum 5, quod quidem rectangulo AEB est aequale. reliquum igitur quadratum ipsius GE est 11, & recta linea GE ℞ 11. ergo AE constans ex AG GE est 4 vnà cum ℞ 11, vel 4 plus ℞ 11. & EB 4 demptа ℞ 11, vel 4 minus ℞ 11. vt autē sciamus, quae sint AF FB, necesse erit prius inuenire quadrata ipsarum AE EB. quare non inutile visum est theoremata nonnulla hic apponere, attinentia ad eas, quae ex binis, vel pluribus nominibus constant, & ad apotomas.



5. secundi.

THEOREMA. I.

Data recta linea, quæ sit ex binis, vel pluribus nominibus, & quadratum eius datum erit.

Sit AB ex binis nominibus AC CB: sitq; AC 4, CB ℞ 11. Dico quadratum eius datum esse. Quoniam enim AB vtcunque secatur in puncto C, erit ex quarta propositione secundi libri, quadratum totius aequale quadratis partium, & rectangulo, quod bis dictis partibus continetur. itaque quadratum AC est 16, & quadratum CB 11. rectangulum vero contentum AC CB est ℞ 176, cuius duplum ℞ 704. ergo quadratum AB est 27 plus ℞ 704.

Sit

Sit AD ex tribus nominibus AB BC CD: ſitq; AB 6, BC R 10, & CD R 3. Dico et quadratum ipſius dari. nã cum AD ſecetur in duobus punctis B C, erit quadratum totius aequale rectangulis, quae ſingulis partibus ad ſingulas applicatis cõtinentur, ex ijs, quae à nobis demõſtrata ſunt ad ſecundã propoſitionẽ ſecũdi libri. quadratum igitur AB eſt 36, & rectangulũ contentũ AB BC eſt R 360; contentum vero AB CD eſt R 108. & rurſus contentum AB BC eſt R 360, & quadratum BC eſt 10. preterea rectangulum, quod continetur BC CD eſt R 30, & quod rurſus continetur AB CD R 108; & quod continetur BC CD R 30. & denique quadratũ CD eſt 3. ſed duplum R 360 eſt R 1440, & duplum R 108 eſt R 432; duplum vero R 30 eſt R 120. quare ſumma totius erit 49 plus R 1440 plus R 432 plus R 120, quod eſt ipſius AD quadratum. Et eodem modo in alijs facie mus quot cunque nomina habeant.

A B C D

THEOREMA II.

Datis duabus rectis lineis, quæ ex binis, vel pluribus nominibus conſtent, & rectangulum ipſis contentum datum erit.

Sint rectae linee AB CD; conſtetq; AB ex binis nominibus AE EB; & ſit AE 5, EB R 12; CD vero conſtet ex CF FD, & ſit CF 4 FD R 7. Dico rectangulum, quod ipſis continetur, datum eſſe. Quoniam enim duae rectae lineae A B CD vtcunque ſecantur in punctis E F, rectangulum ipſis cõtẽtũ eſt aequale rectãgulis, quae vnaquaq; parte vnius ad vnãquãq; partẽ alterius applicata, continentur, ex ijs quae nos demõſtrauimus ad primã propoſitionẽ ſecũdi libri theoremate primo. rectãgulũ igitur contentũ 4 & 5 eſt 20, & contẽtũ 4, & R 12 eſt R 192. quod aũt cõtinetur R 7, & 5 eſt R 175, & quod continetur R 7, & R 12 eſt R 84. totius ergo ſumma eſt 20 plus R 192 plus R 175 plus R 84. quod eſt rectangulum ipſis AB CD contentum. non aliter inuenietur rectangulum contentum duabus rectis lineis, quae ex pluribus nominibus conſtent.

A 5 E R 12 B

C 4 F R 7 D

THEOREMA III.

Datę apotomes quadratum datum erit.

Sit apotome AC, & recta linea ipſi congruens ſit CB; ſitq; tota AB 4, BC R 11. erit AC 4 minus R 11. Dico & quadratum ipſius datum eſſe. vt autem hoc inueniamus, non vtemur quarta propoſitione ſecundi libri, vt ante, ſed ſeptima eiuſdem. non enim 4, & R 11 ſunt partes dictae lineae, ſed 4 eſt tota linea, et R 11 eſt pars, quae ab ea auferitur. Itaque quoniam AB ſecatur vtcunque in punctο C, erit quadratum totius AB vnà cum quadrato vnius partis BC aequale ei, quod bis continetur tota AB, et BC vnà cum alterius partis AC quadrato. eſt igitur quadratum ipſius AB 16, et quadratum BC 11; rectangulum autem, quod tota AB, et BC continetur eſt R 176, cuius duplum R 704. ergo R 704 vnà cum quadrato ex AC eſt aequale 27; ac propterea quadratum ex AC eſt 27 minus R 704. qui vero ex quarta propoſitione ſecundi id quadratum ſibi inueniendum propoſuit, coguntur dicere ſi minus per minus multiplicetur produci plus. quod verum non eſſe primus animaduertit Hieronymus Cardanus non ſolum mathematicus, ſed et Philoſophus, ac medicus preſtantiſsimus, vt apparet in libro de regula alixa, quem nuper edidit. Verũ quoniam ex eorum operatione error non ſequitur, hoc ipſis condonandum eſt.

A Ç B

THEOREMA IIII.

Datis duabus rectis lineis earum, quas apotomas appellamus, & rectangulum, quod ipſis continetur, datum erit.

Sint duae apotomae datae AC DF: et ipſi quidem AC cõgruat CB; ipſi vero DF congruat FE: ſitq; tota AB 8, BC R 12: et ſit DE 4, EF R 3. erit AC 8 minus R 12, et DF 4 minus R 3. Dico



et rectãgulum, quod ipſis continetur, datum eſſe. Quoniam enim duæ rectae lineae AB DE vtcunque ſecantur in punctis C F, erit rectangulũ, quod continetur totis AB DE vnà cum rectãgulo contento partibus CB FE aequale rectangulo contento tota AB, et parte FE vnà cum contento tota DE, et parte CB, et eo, quod reliquis partibus AC DF continetur, ex iis, quae demonſtrata ſunt à nobis ad primã propoſitionem ſecundi libri theoremate ſecundo. itaque rectangulum contentum AB DE eſt 32, & contentum CB FE eſt Rx 36, hoc eſt 6; rectangulum vero, quod continetur AB FE eſt Rx 192, et quod continetur DE CB eſt Rx 192, quae duae radices inter ſe iunctae faciunt Rx 768. quare 38 eſt aequalis Rx 768 vnà cum eo, quod AC DF continetur. ex quibus ſequitur rectangulum contentum AC DF eſſe 38 minus Rx 768. at recentiores ad hoc inueniendum vtuntur 1 theoremate; et ob id aſſerunt ſi minus per minus multiplicetur produci plus, ſed non recte, cum vtendum ſit theoremate ſecundo; neque enim 8, et Rx 12 ſunt partes vnius rectae lineae; immo vero 8 eſt tota linea, et eius pars Rx 12, et ſimiliter dicendũ de 4 minus Rx 3. ex ipſorum tamen operatione nullus ſequitur error.

THEOREMA V.

Data recta linea, quæ ſit ex binis, vel pluribus nominibus, & data apotoma, rectãgulum, quod ipſis continetur, datum erit.



Sit data quidem recta linea AB, quae conſtet ex binis nominibus AC CB, vt ſit AC 6, CB Rx 20. data autem apotome ſit DF, et ipſi congruens FE, vt tota DE ſit 4, et EF Rx 12. erit DF 4 minus Rx 12. Dico rectãgulũ, quod ipſis AB DF cõtinetur datum eſſe. Quoniam enim duae rectae lineae AB DE vtcunque ſecantur in punctis CF, erit ex ſecundo theoremate iam dicto rectangulum, quod ipſis AB DE continetur, aequale rectangulis, quae fiunt vnaquaque parte vnius ad vnamquamque partem alterius applicata; videlicet rectangulo contento DF AC, et contento DF CB: et præterea rectangulo, quod continetur FE AC, et quod continetur FE CB. rectangulum autem contentum DE AC vnà cum contento DE CB eſt aequale rectangulo quod totis AB DE continetur, ex prima ſecundi libri. Itaque rectangulum contentum DE AC eſt 24, et contentum DE CB eſt Rx 320. rectangulũ vero, quod cõtinetur FE AC eſt Rx 432, et quod continetur FE CB Rx 240. ergo rectangula, quae continẽtur DF AC, et DF CB, hoc eſt rectangulum contentum DF AB eſt 24 plus Rx 320, minus Rx 432, et minus Rx 240. Eodem modo procedemus, ſi rectae lineae AB DE ex pluribus nominibus conſtent.

Ex quibus apparet ſi plus per minus, vel minus per plus multiplicetur, produci minus.

His ita demonſtratis conſtat, quadratum ipſius AE eſſe 27 plus Rx 704, et quadratum EB eſſe 27 minus Rx 704. quare addito vtrique communi quadrato ex EF, quod eſt 5, erit quadratum ex AF 32 plus Rx 704, et quadratum ex FB 32 minus Rx 704, rectaq; linea AF radix huius ſummae 32 plus Rx 704, quam radicem vniuerſalem appellant, et ita notant, videlicet Rx V. 32 plus Rx 704: et ſimiliter BF Rx V. 32 minus Rx 704, quarum quidem quadrata inter ſe iuncta videlicet 32 plus Rx 704, et 32 minus Rx 704 faciunt 64, quod eſt ipſius AB quadratum. præterea quoniam rectangulum, quod continetur rectis lineis AF FB eſt aequale contẽto ipſis AB EF, vt demonſtratum iam fuit in primo lemmate; contentum autem AB EF eſt Rx 320: erit etiam rectangulum, quod his lineis Rx V. 32 plus Rx 704, et Rx V. 32 minus Rx 704 continetur Rx 320. Hoc autem ita eſſe ex earum quoque inter ſe multiplicatione manifeſto apparere poteſt. diſpoſitis enim his radicibus videlicet Rx V. 32 plus Rx 704, et Rx V. 32 minus Rx 704, ut quid ex earum multiplicatione proueniat cognoſcamus, operandum eſt, quemadmodum in ſimplicibus rãdicibus; nimirũ multiplicãdo eatũ quadrata inter ſe, et eius, quod producitur radix erit id, quod quæritur. eſt aũt quadrata utriuſq; cõſtẽt ex duabus partibus, erit rectãgulũ, quod totis cõtinetur, ac ſi lineæ eſſent, æquale rectãgulis, quæ fiũt ſingulis partibus unius ad ſingulas alterius applicatis, ut demonſtratũ eſt. ſi igitur 32 in ſe multiplicentur fiunt 1024; rurſus ſi 32, hoc eſt Rx 1024 multiplicet Rx 704 fit Rx 720896. et ita ſi 32 multiplicet minus R 704 fit minus R 720896. poſtrema ſimultiplicetur Rx 704 per minus Rx 704 fiunt minus 704. totũ igitur ex his compoſitũ eſt 1024 plus

R 720896

R 720896 *minus* R 720896 *minus* R 704, *hoc est* 1024 *minus* 704. *itaq; detractis* 704 *de* 1024 *relinquetur* 320, *& eius radix erit id quod quæritur. ergo si multiplicemus* R *V.* 32 *plus* R 704 *per* R *V.* 32 *minus* R 704 *producetur* R 320. *Quatenus vero ad scholiũ pertinet, sit AB* 10 *& numeri CD* 543. *& sint vt* 5 *ad* 3 *ita quadratũ ex AB, hoc est* 100 *ad quadratũ ex BE, erit ad* 60. *ergo ipsa BE est* R 60, *& AE* 10 *minus* R 60. *rectãgulum autem BF est* R 6000, *& rectangulum AF* 100 *minus* R 6900.

PROBLEMA XI. PROPOSITIO. XXXV.

Inuenire duas rectas lineas potentia incommensurabiles, quæ faciant compositum quidem ex ipsarum quadratis medium, rectãgulum vero quod ipsis continetur rationale.



Exponantur duæ mediæ potentia solum commensurabiles AB BC, quæ rationale contineant, ita vt AB plus possit quam BC quadrato rectæ lineæ sibi longitudine incõmensurabilis. & in ipsa AB describatur semicirculus DB: sectaq; BC bifariam in E, applicetur ad AB parallelogrammum æquale quadrato ipsius BE, deficiens figura quadrata; & sit quod continetur AF FB. incommensurabilis igitur est AF ipsi FB longitudine. à puncto autem F ipsi AB ad rectos angulos ducatur FD; & AD DB iungantur. itaque quoniam AF est incommensurabilis FB; erit & BAF rectangulum rectangulo ABF incommensurabile. est autem rectangulũ quidem BAF quadrato ipsius AD æquale; rectangulum vero ABF æquale quadrato ipsius DB incommensurabile igitur est quadratum AD ipsius DB quadrato; ac propterea rectæ lineæ ad AD DB potentia sunt incommensurabiles. & quoniam medium est quadratum ipsius AB, erit & compositum ex quadratis ipsarum AD DB medium. quòd cum dupla sit BC ipsius DF, & rectangulum ABC rectanguli ex AB DF duplum erit. quare & commensurabile. rationale autem est rectangulum ABC, ita enim ponitur. ergo & rectangulum ex AB FD est rationale. sed rectangulo ex AB FD æquale est rectangulum ADB quare & ipsum ADB rectangulum rationale erit. Inuentæ igitur sunt duæ rectæ lineæ potentia incommẽsurabiles AD DB, quæ faciunt compositũ quidem ex ipsarum quadratis medium, rectangulum uero, quod ipsis continetur rationale.

2. huius. Lemma 2. 19. huius. 19. huius. Lemma. 2. Lemma. 1. Lemma. 3. Lemma 1. ante. 34. huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit recta linea AB R R 54, *BC* R R 24. *& diuisa* R R 24 *bifariam, erit eius dimidia BE* R R 1 $\frac{1}{2}$. *applicetur ad AB parallelogrammum aequale quadrato ipsius BE, hoc est aequale* R R $\frac{1}{2}$, *deficiens figura quadrata. quod similiter, atque supra fiet. diuisa enim rursus AB. hoc est* R R 54 *bifariam, erit eius dimidia* R R 3 $\frac{1}{8}$. *& si ab ipsius quadrato, videlicét à* R 3 $\frac{3}{8}$ *auferatur* R 1 $\frac{1}{2}$, *reliqua erit* R $\frac{7}{8}$. *ergo recta linea AF est* RR 3 $\frac{1}{8}$ *plus* RR $\frac{3}{8}$, *& FB* RR 3 $\frac{1}{8}$. *minus* RR $\frac{3}{8}$. *quadratũ aũt ipsius AF eodẽ modo inuenietur esse* R 6 *plus* R 4 $\frac{1}{2}$. *& quadratũ ex FB* R 6. *minus* R 4 $\frac{1}{2}$, *quibus addito cõi quadrato ipsius FD, videlicet* R 1 $\frac{1}{2}$, *erit quadratum ex AD* R R 13 $\frac{1}{2}$ *plus* R 4 $\frac{1}{2}$, *& quadratum ex DB* R 13 $\frac{1}{2}$ *minus* R 4 $\frac{1}{2}$. *ideoq; rectæ linea AD* R *V* R 13 $\frac{1}{2}$ *plus* R 4 $\frac{1}{2}$, *& DB* R *V*. R 13 $\frac{1}{2}$ *minus* R 4 $\frac{1}{2}$, *quarũ quadrata simul iuncta faciunt* R 54, *videlicet rectæ lineae AB quadratum. quod est medium. At rectangulum, quod AD DB continetur est æquale contento AE DF. contentum vero AB DF, hoc est* RR 54, *& RR* 1 $\frac{1}{2}$ *est* RR 81, *hoc est* 3. *ergo quod continetur AD DB est* 3. *sed et idem aliter constat multiplicando* R *V*. R 13 $\frac{1}{2}$ *plus* R 4 $\frac{1}{2}$ *plus* R *V* R 13 $\frac{1}{2}$ *minus* R 4 $\frac{1}{2}$; *fit enim* R 9

quae est 3. sunt igitur hę rectae lineae potentia incommensurabiles, & faciunt compositum ex ipsarum quadratis medium: rectangulum vero, quod ipsis continetur, rationale, vt oportebat.

PROBLEMA XII. PROPOSITIO. XXXVI.

Inuenire duas rectas lineas potentia incommensurabiles, quæ faciant & compositum ex ipsarum quadratis medium, & rectāgulum, quod ipsis continetur, medium, incommensurabileq́ue composito ex ipsarum quadratis.



Exponantur duæ medię potentia solū commensurabiles AB BC, quæ medium contineant, ita vt AB plus possit, quàm BC quadrato rectæ lineæ sibi longitudine incommēsurabilis. & in AB semicirculus ADB describatur, & reliqua fiant, quēadmodū in ijs, quæ superius dicta sunt. Quoniam igitur AF incommensurabilis est ipsi FB longitudine, erit & AD ipsi DB potentia incommensurabilis. & quoniam medium est quod fit ex AB, & compositum ex quadratis AD DB est medium. Quòd cum rectangulū AFB ęquale sit quadrato alterutrius ipsarū BE DF, erit DF ęqualis BE; ac propterea BC ipsius FD dupla. rectangulum igitur ABC duplū est eius, quod AB FD continetur. medium autem est rectangulum ABC. ergo & quod continetur AB FD est mediū, atque est ęquale contento AD DB. quare & ipsum medium erit. & quoniam incommensurabilis est AB ipsi BC longitudine; commensurabilis autem CB ipsi BE: erit & AB ipsi BE lōgitudine incommensurabilis. ergo & quadratum ex AB incommensurabile est rectangulo ABE. sed quadrato quidem ex AB ęqualia sunt quę ex AD DB quadrata: rectangulo autem ABE est æquale rectangulum contentum AB FD, hoc est rectangulum ADB. compositum igitur ex quadratis ipsarum AD DB rectangulo ADB est incommensurabile. ergo inuentæ sunt duę rectæ lineæ potentia incommensurabiles, quæ faciunt compositum ex ipsarum quadratis medium: & rectangulum, quod ipsis continetur, medium, & adhuc composito ex ipsarum quadratis incommensurabile.

6 huius.

Coroll. 24 huius. 1. lemma ad 34. huius. 13. huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit recta linea AB ℞℞ 18, & BC ℞℞ 2. diuidatur q; BC bifariam in E, erit BE ℞℞ $\frac{1}{8}$. et fiat ad AB applicetur parallelogrammum aequale quadrato ipsius BE, hoc est ℞ $\frac{1}{8}$, deficiens figura quadrata, erit recta linea AF ℞℞ $1\frac{1}{8}$ plus ℞℞ $\frac{1}{2}$ & FB ℞℞ $1\frac{1}{8}$ minus ℞℞ $\frac{1}{2}$: quadratum autem ipsius AF ℞ $3\frac{1}{8}$ plus ℞ 3, & quadratum FE ℞ $3\frac{1}{8}$ minus ℞ 3. & addito utrique quadrato ipsius BE, erit quadratum ex AD ℞ $4\frac{1}{2}$ plus ℞ 3, & quadratum ex DB ℞ $4\frac{1}{2}$ minus ℞ 3, ergo recta linea AD est ℞ V. ℞ $4\frac{1}{2}$ plus ℞ 3, & DB ℞ V ℞ $4\frac{1}{2}$ minus ℞ 3, quarū quadrata simul iuncta faciunt ℞ 18, quantum est quadratum ex AB. rectangulum vero ipsis contentum est ℞ $1\frac{1}{2}$. quod est medium, & incommensurabile composito ex ipsarum quadratis.

THEOREMA XXV. PROPOSITIO XXXVII.

Si duæ rationales potentia solum commensurabiles componantur, tota irrationalis erit, vocetur autem ex binis nominibus,

Componantur enim duæ rationales potentia solum commensurabiles AB BC. Dico AC irrationalem esse. Quoniam enim incommensurabilis est AB ipsi BC longitudine, potētia enim solū



commensu-

commensurabiles sunt, & vt AB ad BC, ita rectãgulum ABC ad id, quod fit ex BC quadratum: erit rectangulum ABC quadrato ex BC incommensurabile. Sed recta gulo quidem ABC commensurabile est id, quod bis AB BC continetur: quadrato autem ex BC commensurabilia sunt quadrata ex AB BC. quod igitur bis AB BC continetur incommensurabile est quadratis ex A B B C. & componendo quod bis AB BC continetur vnà cum quadratis ex AB BC, hoc est quadratum ex AC incõmensurabile est composito ex ipsarum AB BC quadratis. rationale autem est compositum ex quadratis AB BC. ergo quadratum ex AC irrationale est: & ob id recta linea AC est irrationalis, vocetur autem ex binis nominibus. 1. sexti; 10. huius. 6. huius. 13. huius. 4. secundi. 10. diffi. 11. diffi.

SCHOLIVM.

Quæ inter has rationales media est proportionalis, ea media est, neutra autem harum, neque vtraque est media, sed quæ ex ipsis constat ex binis nominibus appellatur. vtrarumque igitur irrationalium sunt procreatrices, iuxta tamen differentes procreationis modos.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit recta linea AB 2, & BC Rx 3. erit AC 2 plus Rx 3. & eius quadratum 7 plus Rx 48. est enim quadratum ipsius AC 4, & quadratum BC 3. rectangulum vero, quod AB BC continetur Rx 12, cuius duplum est Rx 48.

THEOREMA XXVI. PROPOSITIO. XXXVIII.

Si duæ mediæ potentia solum commensurabiles componantur quæ rationale contineant, tota irrationalis erit. vocetur autem ex binis medijs prima.

Componantur enim duę mediæ potentia solum commensurabiles AB BC, quę rationale contineãt. dico totam AC irrationalem esse. Quoniam enim in commensurabilis est AB ipsi BC longitudine, & quadrata ex AB BC incommensurabilia erunt rectangulo, quod bis AB BC continetur. ergo componendo quadrata ex AB BC vnà cum eo, quod bis AB BC continetur, quod est ipsius AC quadratum incommensurabile est rectangulo ABC. sed A B C rectangulum rationale ponitur. ergo quadratum ex A C irrationale est, & recta linea AC irrationalis. vocetur autem ex binis medijs prima.

A Rx 54 B Rx 24 C

A B C

F. C. COMMENTARIVS.

Componantur enim duæ mediæ potentia solum commensurabiles AB BC, quæ rationale contineant] *Quomodo hę inueniantur docuit in 28 huius. sit autem AB Rx 54, BC Rx 24, erit tota AC Rx 54 plus Rx 24.* A

Et quadrata ex A B B C incommensurabilia erunt rectangulo, quod bis AB BC continetur] *Hoc eodem modo, quo supra, sequitur ex 13 huius bis repetita.* B

Quod est ipsius AC quadratum] *Ex 4 secundi.* C

Ergo quadratum ex AC irrationale est, & recta linea AC irrationalis] *Ex 10 & 11 diffinitione huius.* D

THEOREMA XXVII. PROPOSITIO XXXIX.

Si duę medię potentia solum commensurabiles componantur.

quæ medium

quæ medium contineant, tota irrationalis erit. vocetur autem ex binis medijs secunda.

A Componantur enim duæ mediæ potentia solum commensurabiles, AB BC, quæ medium
B contineant. Dico AC irrationalem esse. exponatur rationalis DE: & quadrato ex AC æquale parallelogrammum rectangulum DF ad ipsam DE applicetur, quod latitudinē faciat DG:
C itaque quoniam quadratum ex AC æquale est
4. secundi quadratis ex AB BC, & rectangulo, quod bis
D AB BC continetur. applicetur ad ipsam DE quadratis ex AB BC æquale parallelogrammū
E rectangulum EH. reliquum igitur FH æquale est ei, quod bis AB BC continetur. & quoniam media est utraque ipsarum AB BC, erūt & quadrata ex AB BC media. medium autem ponitur & quod bis continetur AB BC. atque est
F quadratis quidem ex AB BC æquale parallelogrammum EH. rectangulo autem bis AB BC contento æquale est ipsum HF. medium igitur est vtrumque ipsorum EH HF: & ad rationalē applicantur. ergo vtraque recta linea DH HG est rationalis, & ipsi DE longitudine incommensurabilis.
H & quoniam incommensurabilis est AB ipsi BC lōgitudine; atque est vt AB ad BC,
K ita quadratum ex AB ad ABC rectangulum: erit quadrato ex AB rectangulum
L ABC incommensurabile. sed quadrato quidem ex AB commensurabile est compositum ex quadratis ipsarum AB BC: rectangulo autem ABC est commensurabile,
M quòd bis AB BC continetur. ergo compositum ex quadratis AB BC incommensurabile erit ei, quod bis continetur AB BC. sed quadratis ex AB BC æquale est parallelogrammum EH: & rectangulo, quod bis AB BC continetur æquale HF pa-
N rallelogrammum. quare EH ipsi HF est incommensurabile; & ob id recta linea DH ipsi HG incommensurabilis longitudine. ostensæ autem sunt rationales. ergo DH
O HG rationales sunt potentia solum commensurabiles; ac propterea DG est irratio-
P nalis; rationalis autem DE; & quod rationali, & irrationali continetur rectangulū
Q irrationale est. spacium igitur DF est irrationale, & quę ipsum potest irrationalis. potest autem ipsum DF recta linea AC. ergo AC irrationalis erit. vocetur autem ex binis medijs secunda.



SCHOLIVM.

Vocauit illam ex binis medijs secundam, quoniam medium est non rationale, quod ipsis AB BC continetur; medium enim rationali posterius est. At vero quod rationali, & irrationali continetur irrationale esse perspicuè constat.

21 huius Nam si rationale sit, & ad rationalem applicetur, erit latitudo, quam facit, rationalis; sed & irrationalis. quod est absurdum. illud igitur quod rationali, & irrationali continetur est irrationale. quod oportebat demonstrare.

F. C. COMMENTARIVS.

A Componantur enim duæ mediæ potentia solum commensurabiles AB BC, quę medium contineant] *Quomodo autem hę inueniantur docet in 29 huius: sit AB* RR 18, *et BC* RR 8, *erit AC* RR 18 & *plus* RR 8, *cuius quadratum* R 50 *plus* R 48.

B Exponatur rationalis DE, & quadrato ex AC æquale parallelogrammum rectan-

gulum

gulum DF ad ipſam DE applicetur, quod latitudinem faciat DG] *Sit rationalis DE 4, ad quam ſi applicetur illud medium* R 50, *latitudinem faciet* R 3 $\frac{1}{8}$, *quae ſit DH: et ſi ad eãdem applicetur* R 48, *faciet latitudinem* R 3, *quae ſit HG. ergo tota latitudo DG erit* R 3 $\frac{1}{8}$ *plus* R 3.

Itaque quoniam quadratum ex AC æquale eſt quadratis] *Ex quarta ſecundi, vel 4. Barlaam monachi.* C

Applicetur ad ipſum DE quadratis ex AB BC æquale parallelogrammum rectangulum EH] *Quadratum ipſius AB eſt* R 18, *et quadratum BC* R 8, *quae inter ſe iunctę faciunt* R 50. *ergo parallelogrammum EH eſt* R 50, *et recta linea DH* R 3 $\frac{1}{8}$. D

Reliquum igitur FH eſt æquale ei, quod bis AB BC continetur] *Hoc eſt* R 48, *et recta linea HG* R 3, *vt dictum eſt.* E

Medium autem ponitur & quod bis AB BC continetur] *Medium ponitur, quod AB BC continetur. et quoniam illud, quod bis AB BC continetur eſt ei commenſurabile, videlicet duplum ex 6. huius, et ipſum medium erit, ex corollario 24. huius.* F

Ergo vtraque recta linea DH HG eſt rationalis, & ipſi DE longitudine incommenſurabilis] *Ex 23. huius.* G

Atque eſt vt AB ad BC, ita quadratum ex AB ad ABC rectangulum] *Ex lemmate ad 23 huius appoſito, vel ex 1. ſexti.* H

Erit quadrato ex AB rectangulum ABC incommenſurabile] *Ex 10. huius.* K

Sed quadrato quidem ex AB commenſurabile eſt compoſitum ex quadratis ipſarum AB BC] *Ponuntur enim AB BC potentia commenſurabiles. ergo & earum quadrata commenſurabilia erunt, et compoſitum ex ipſis commenſurabile vtrique quadrato ex 16. huius.* L

Ergo compoſitum ex quadratis AB BC incommenſurabile erit ei, quod bis continetur AB BC] *Ex 14. huius.* M

Et ob id recta linea DH ipſi HG incommenſurabilis longitudine] *Ex 1. ſexti, et 10. huius.* N

Ac propterea DG eſt irrationalis] *Ex 37. huius.* O

Et quod rationali, & irrationali continetur rectangulum irrationale eſt] *Quomodo hoc ſequatur in antecedenti ſcholio dictum fuit.* P

Et quę ipſum poteſt irrationalis] *Ex 11. diffinitione.* Q

THEOREMA XXVIII. PROPOSITIO. XL.

Si duæ rectæ lineæ potentia incommenſurabiles componãtur, quæ faciãt compoſitum quidem ex ipſarum quadratis rationale, quod autem ipſis continetur medium: tota recta linea irrationalis erit, vocetur autem maior. S

Componantur enim duæ rectæ lineæ potentia incommenſurabiles AB BC, facientes ea, quæ propoſita ſunt. Dico AC irrationalem eſſe. Quoniam enim id, quod AB BC continetur, medium eſt, & quod bis continetur AB BC medium erit. compoſitum autem ex ipſarum AB BC quadratis eſt rationale. ergo quod bis AB BC continetur incommenſurabile eſt compoſito ex quadratis ipſarum AB BC. & ob id quadrata ex AB BC vnà cum eo, quod bis AB BC continetur, quod eſt quadratum ex AC, incommenſurabile eſt quadratis ex AB BC. rationale autem eſt compoſitum ex quadratis AB BC. ergo & quadratum ex AC irrationale erit, ac propterea recta linea AC eſt irrationalis. vocetur autem maior.



A

B

C

SCHOLIVM.

Vocatur autem ipſam maiorem, propterea quod rationalia ex AB BC maiora

BC maiora ſint medio, quod bis AB BC continetur: oporteatq; ue à rationalium proprietate nomen imponere. At vero quæ fiunt ex AB BC maiora eſſe eo, quod bis AB BC continetur, ſic oſtendemus.

Manifeſtum igitur eſt AB BC inter ſe inęquales eſſe. ſi enim ſint æquales, & quæ fiunt ex AB BC æqualia erunt ei, quod bis AB BC continetur, & rectangulum ABC rationale erit. quod nō ponitur. Inæquales igitur ſunt AB BC. ponatur maior AB, & ipſi BC



7. ſecundi. ęqualis BD. ergo quadrata ex AB BD æqualia ſunt ei, quod bis AB BD cōtinetur vnà cum quadrato ex DA. æqualis autem eſt DB ipſi BC. quadrata igitur ex AB BC ęqualia ſunt ei, quod bis AB BC continetur, vnà cum quadrato ex AD. ideoq; quadrata ex AB BC maiora ſunt, quàm id, quod bis AB BC continetur, quadrato ipſius DA.

F. C. COMMENTARIVS.

A Componantur enim duę rectę lineæ potentia incommenſurabiles AB BC, facientes ea, quæ propoſita ſunt] *Inueniuntur autē hæ ex 34 huius. ſit AB R V. 34 plus R 704; et*
B *BC R V. 32 minus R 704. erit tota AC R V. 32 plus R 704 plus R V. 32 minus R 704.*
C Et quod bis AB BC continetur medium erit] *Ex corollario 24 huius.*
Et ob id quadrata ex AB BC vnà cum eo, quod bis AB BC continetur, quod eſt quadratum ex AC incommenſurabile eſt quadratis ex AB BC] *Ex 17. huius.*

THEOREMA XXIX. PROPOSITIO XLI.

Si duæ rectæ lineæ potentia incommenſurabiles componantur, quæ faciant compoſitum quidem ex ipſarum quadratis medium, quod autem ipſis continetur, rationale; tota recta linea irrationalis erit. vocetur autem rationale, ac medium potens.

A Componantur enim duę rectæ lineę potentia incommēſurabiles AB BC, faci-



B entes ea, quæ propoſita ſunt. Dico AC irrationalem eſſe. Quoniam enim cō poſitum ex ipſarum AB BC quadratis medium eſt; quod autem bis AB BC cōtinetur rationale: erit compoſitum ex ipſarum AB BC quadratis incommenſurabile eſt, quod bis AB BC continetur. quare componēdo quadratum ex AC eſt incommenſurabile ei, quod bis continetur ABBC. eſt autem rationale, quod bis AB BC continetur, quadratum igitur ex AC irrationale eſt; ideoq; recta lineā AC eſt irrationalis. vocetur autem rationale, ac medium potens.

SCHOLIVM.

Rationale autem, ac medium potentem ipſam idcirco appellauit, quòd poſſit bina ſpacia, vnum quidem rationale, alterum vero medium. & quoniam rationale præcedit irrationale, ipſius rationalis prius mentionem fecit.

F. C. COMMENTARIVS.

Componātur enim duæ rectę lineæ potentia incommenſurabiles AB BC, facientes ea quæ propoſita ſunt] *Hæ autem inueniuntur ex 35 huius. ſit AB R V. R 1 1/2 plus*

Rr 4 $\frac{1}{2}$, BC Rr V. Rr 13 $\frac{1}{2}$ minus Rr 4 $\frac{1}{2}$, vt tota AC sit Rr V. Rr 13 $\frac{1}{2}$ plus Rr 4 $\frac{1}{2}$ plus Rr V. Rr. 13 $\frac{1}{2}$ minus Rr 4 $\frac{1}{2}$.

Quod autem bis AB BC continetur rationale] *Sequitur hoc ex corollario 24 huius, ponitur enim eius dimidium rationale, videlicet quod AB BC continetur.* B

Quare componendo quadratum ex AC est incommensurabile ei, quod bis continetur AB BC] *Quoniam enim compositum ex ipsarum AB BC quadratis incommensurabile est ei, quod bis AB BC continetur, erit ex 17. huius compositum ex quadratis AB BC vna cum eo, quod bis AB BC continetur, hoc est quadratum ex AC incommensurabile ei, quod bis continetur AB BC.* C 4. secundi.

THEOREMA XXX. PROPOSITIO. XLII.

Si duæ rectæ lineæ potentia incommensurabiles componantur, quæ faciant compositum ex ipsarum quadratis medium, & quod ipsis cõtinetur medium, incommensurabileq; compositio ex quadratis ipsarum, tota recta linea irrationalis erit. vocetur autem bina media potens.



Componantur enim duæ rectæ lineæ potẽtia incõmensurabiles AB BC, quę faciant compositum quidẽ ex ipsarum AB BC quadratis medium; quod autem ipsis continetur medium, & adhuc incommensurabile composito ex ipsarum quadratis. Dico AC irrationalẽ esse. Exponatur enim rationalis DE, & ad ipsam applicetur parallelogrammum rectangulum DF, æquale quadratis ipsarum AB BC: & parallelogrammum GH æquale ei, quod bis AB BC continetur. totum igitur DH quadrato ipsius AC est æquale. & quoniam medium est compositum ex quadratis ipsarum AB BC, & æquale parallelogrammo DF, erit ipsum quoque DF medium; & ad rationalem DE applicatũ est. rationalis igitur est DG, & ipsi DE lõgitudine incommensurabilis. ob eandem causam & GK est rationalis, & incommensurabilis longitudine ipsi FG, hoc est ipsi DE. & quoniam compositum ex quadratis ipsarum AB BC incommensurabile est ei, quod bis AB BC continetur; erit & parallelogrammum DF ipsi GH incommensurabile. ergo & recta linea DG incommensurabilis est ipsi GK; & sunt rationales. quare DG GK rationales sunt potentia solum commensurabiles; ac propterea DK est irrationalis, quæ ex binis nominibus appellatur. rationalis autem DE. ergo parallelogrammum DH irrationale est, & ipsum potens irrationalis. sed ipsum DH potest recta linea AC. quare AC irrationalis est. vocetur autem bina media potens. A B C D E F G

SCHOLIVM.

Vocauit ipsam bina media potẽtem, propterea quod potest bina spacia media, videlicet compositum ex ipsarum AB BC quadratis; & illud, quod bis AB BC continetur.

F. C. COMMENTARIVS.

Componantur.n. duæ rectę lineę potentia incõmensurabiles AB BC, quæ faciãt A

compoſitum quidem ex ipſarum AB BC quadratis medium, quod autem ipſis cõtinetur medium] *Qua vero ratione hae inueniri poſsint, tradit in 36. huius. Sit AB* R *V.* R 4 $\frac{1}{2}$ *plus* R 3, *& BC* R *V.* R 4 $\frac{1}{2}$ *minus* R 3. *eruut earum quadrata ſimul iuncta* R 18, *& rectangulum ipſis contentum* R 1 $\frac{1}{2}$ *cuius duplum eſt* R 6.

B Exponatur enim rationalis DE, & ad ipſam applicetur parallelogrammum rectangulum DF æquale quadratis ipſarum AB BC: & parallelogrammum GH æquale ei, quod bis AB BC continetur] *Sit rationalis DE* 3, *ad quam ſi applicetur parallelogrammum DF, aequale compoſito ex ipſarum AB BC quadratis, videlicet* R 18, *latitudinem faciet* R 2, *quae ſit DG: & ſi ad eandem applicetur parallelogrammum GH aequale ei, quod bis AB BC continetur, videlicet* R 6, *latitudinẽ faciet* R $\frac{2}{3}$, *quae ſit GK. tota igitur latitudo DK erit* R 2 *plus* R $\frac{2}{3}$, *quae eſt irrationalis ex binis nominibus appellata: & totum parallelogrammum DH erit aequale quadrato ipſius AC, ex* 4 *ſecundi.*

C Rationalis igitur eſt DG ipſi DE longitudine incommenſurabilis] *Ex* 23 *huius.*

D Ergo & recta linea DG incommenſurabilis eſt ipſi GK] *Ex* 10 *huius, eſt enim vt D F ad GH, ita DG ad GK, ex* 1. *ſexti.*

E Ac propterea DK eſt irrationalis, quæ ex binis nominibus appellatur.] *Ex* 37 *huius.*

F Ergo parallelogrammum DH irrationale eſt] *Nam quod rationali, & irrationali continetur eſt irrationale, vt in ſcholio* 39. *huius demonſtratum fuit.*

G Et ipſum potens irrationalis] *Ex* 11. *diffinitione.*

SCHOLIVM.

At vero dictas irrationales vno tantum modo diuidi in rectas lineas, ex quibus componuntur, & quę propoſitas ſpecies conſtituunt, mox demonſtrabimus, ſi prius lemma quoddam expoſuerimus, quod huiuſmodi eſt.

LEMMA.

Exponatur recta linea AB, & ſecetur tota in partes inæquales ad vtrumque punctorum CD: ponatur autem AC quàm DB maior. Dico quadrata ipſarum AC CB quadratis AD DB maiora eſſe.



Secetur enim AB bifariam in E. & quoniam maior eſt AC, quàm DB, communis auferatur DC. reliqua igitur AD maior erit, quàm reliqua CB eſt autem AE ipſi EB æqualis. ergo D E. quàm EC eſt minor: & puncta CD non æqualiter diſtant à bipartita ſectione. & quoniam rectangulum ACB vnà cum quadrato rectę lineæ CE eſt æquale quadrato ipſius EB; ſed & rectangulum ADB vnà cum quadrato rectæ lineę DE eſt æquale ipſius EB quadrato: erit rectangulum ACB vnà cum quadrato ipſius EC æquale rectangulo ADB vnà cum quadrato ipſius DE. Quorum quadratum ipſius DE eſt minus quadrato EC. & reliquum igitur rectangulum ACB minus eſt rectangulo ADB. quare & quod bis AC CB continetur minus eſt eo, quod bis continetur AD DB. ſed compoſitum ex quadratis rectarum linearum AC CB vnà cum eo, quod bis AC CB continetur, eſt æquale compoſito ex quadratis ipſarum AD DB vnà cum eo, quod bis continetur AD DB. eſt enim vtrumque eorum quadrato ipſius AB æquale. & reliquum igitur compoſitum ex quadratis AC CB maius erit compoſito ex quadratis AD DB. quod demonſtrare oportebat.

5. ſecundi.

4. ſecundi

ALITER

ALITER.

Exponatur quædam recta linea AB, diuisa in partes quidem æquales ad punctum D, in partes vero inæquales ad C. Dico quadrata ex AC CB maiora esse quadratis ex AB DB.



Quoniã enim quadrata ex AC CB dupla sunt quadratorum ex AD DC, quod demonstratum est in nono theoremate secundi libri elementorum; & sunt quadrata quidem ex AD DB dupla quadrati ex AD; propterea quòd AB in D bifariam secatur; quod autem bis fit ex DC duplum est quadrati ex DC: erunt quadrata ex AC CB æqualia quadratis ex AD DB vnà cum eo, quod bis fit ex DC. quadrata igitur ex AC CB maiora sunt quàm quadrata ex AD DB, eo, quod bis fit ex DC. Nõ secetur autem AB bifariam, sed vtcunque in punctis CD, ita vt AD sit maior, quàm CB. similiter demonstrabitur quadrata ex AC CB quadratis ex AD DB maiora esse. Quoniam enim recta linea AB vtcũque secatur in C, quadratum ex AB est æquale quadratis ex AC CB vnà cum eo, quod bis continetur AC CB. Eadem ratione & quadratũ ex AB est æquale quadratis ex AD DB vnà cũ eo, quod bis AD DB continetur. quorũ quod bis continetur AD DB maius est eo quod bis AC CB continetur. est enim rectangulum ADB rectangulo ACB maius. ergo quæ relinquuntur quadrata ex AD DB quadratis ex AC CB minora sunt. quod demonstrare oportebat.



4 secundi.

Ex proxime demõstratis.

F. C. COMMENTARIVS.

Ex iam dictis perspicue apparet excessum, quo compositum ex quadratis rectarum linearum AC CB superat compositum ex quadratis ipsarum AD DB, æqualẽ, vel potius eundem esse excessui, quo rectãgulum bis contentum AD DB superat rectangulum, quod bis AC CB continetur.

Fiat enim ex AB quadratum AFGB; & ad ipsam AF applicetur parallelogrammum FH æquale composito ex quadratis AC CB. erit reliquum parallelogrammum HG æquale rectangulo bis contento AC CB. Rursus ad eandem AF applicetur parallelogrammum FK æquale composito ex quadratis AD DB. reliquum igitur parallelogrammum KG est æquale ei, quod bis AD DB continetur. Itaque quoniam parallelogrammum quidem FH est æquale composito ex quadratis AC CB; parallelogrammum vero FK est æquale composito ex quadratis AD DB: erit parallelogrammum LH excessus, quo alterum alterum superat. Sed idem LH est excessus, quo rectangulum bis contentum AD DB superat id, quod bis AC CB continetur. constat igitur verum esse, quod nos demonstrandum proposuimus.



4 secundi.

THEOREMA XXXI. PROPOSITIO XLIII.

Quæ ex binis nominibus ad unum dumtaxat punctum diuiditur in nomina.

Sit ex binis nominibus AB diuisa in nomina ad punctum C. ergo AC CB rationales sunt potentia solum commensurabiles. Dico AB ad aliud punctũ non diuidi in duas rationales potentia solum commensurabiles. si enim fieri potest, diuidatur in D, ita vt AD DB rationales sint potẽtia solũ cõmẽsurabiles. Itaq; mãnifestũ est A B C non esse eandem, quæ D B. si enim fieri potest, sit eadem. erit igitur & AD ea- C

dem, quæ CB : atque erit vt AC ad CB, ita BD ad DA: & AB in D similiter diuisa erit, atque in
D puncto C. quod non ponitur. ergo AC non est eadē, quę DB. simili ratione & puncta CD non æquali
E ter distant à bipartita sectione. quo igitur differunt quadrata rectarum linearum
F AC CB ab ipsarum AD DB quadratis, hoc differt & quod bis AD DB continetur ab eo, quod bis continetur AC CB: quoniam & quadrata rectarum linearū AC CB vnà cum eo, quod bis continetur AC CB; & quadrata ipsarum AD DB vnà cū
G eo, quod bis AD DB continetur, æqualia sunt quadrato ipsius AB. sed quadrata AC CB à quadratis AD DB differunt rationali; etenim rationalia vtraque sunt. ergo & quod bis AD DB continetur à contento bis AC CB rationali differt, cum ip
H sa media sint. atqui medium non superat medium rationali. nō igitur quæ ex binis nominibus ad aliud, atque aliud punctum diuiditur. quare ad vnum dumtaxat diuiditur in nomina. quod oportebat demonstrare.



F. C. COMMENTARIVS.

A Ergo AC CB rationales sunt potentia solum commensurabiles] *Ex 37 huius.*

B Itaque manifestum est AC non esse eandem, quæ DB] *Hoc est AC non esse aequalem ipsi DB; sumitur enim hoc loco idem pro aequali.*

C Erit igitur & AD eadem, quæ CB] *Si enim AC sit aequalis ipsi DB, dempta BC vtrique communi, erit reliqua AD reliquae CB æqualis.*

D Quod non ponitur] *Ponitur enim recta linea AB in puncto D aliter diuisa, atque in ipso C.*

Simili ratione & puncta CD non æqualiter distant à bipartita sectione] *Nā si AD CB inter se æquales non sint, neque puncta CD aequaliter distabunt ab eo puncto, quod rectam lineam AD bifariam diuidit.*

F Quo igitur differunt quadrata rectarum linearum AC CB ab ipsarum AD DB quadratis, hoc differt & quod bis AD DB continetur ab eo, quod bis cōtinetur AC CB] *Quomodo hoc sequatur in antecedenti scholio dictum est.*

G Sed quadrata AC CB à quadratis AD DB differunt rationali, etenim rationalia vtraque sunt] *Nam rationale non superat rationale, nisi rationali. quod nos demonstrauimus ad 27 huius.*

H Atqui medium non superat medium rationali] *Ex 27 huius.*

THEOREMA XXXII. PROPOSITIO. XLIIII.

Quę ex binis medijs prima ad vnum dumtaxat punctum diuiditur in nomina.

Sit ex binis medijs prima AB diuisa in puncto C, ita vt AC CB medię sint potentia solum com mensurabiles, quæ rationale contineāt. Dico AB in alio puncto non diuidi. si enim fieri potest, diuidatur etiam in D, ita vt AD DB sint medię potentia solum cōmensurabiles, quæ rationale contineant. Quoniam igitur quo differt rectangulum contentum bis AD DB ab eo, quod bis AB CB continetur, hoc differunt etiam quadrata rectarum li-
Ex demonstratis ad 21 huius. neatum AC CB ab ipsarum AD DB quadratis; rationali autem differt contentum AD DB ab eo, quod bis AC CB continetur, utraque enim sunt rationalia: sequitur vt etiam quadrata ipsarum AC CB rationali differant à quadratis AD DB, quæ
27. huius. vtraque media sunt. illud autem fieri non potest. non igitur quæ ex binis medijs prima in alio, atque alio puncto diuiditur in nomina. quare in vno dumtaxat diuiditur necesse est.



THEO-

THEOREMA XXXIII. PROPOSITIO. XLV.

Quæ ex binis medijs ſecunda ad vnum dumtaxat punctum diuiditur in nomina.

Sit ex binis medijs ſecũda AB diuiſa in C, ita vt AC CB mediæ ſint potentia ſolum commenſurabiles, quę medium contineant. manifeſtum eſt punctum C non eſſe in bipartita ſectione, quoniam nõ ſunt longitudine commenſurabiles. Dico ipſam A B in alio puncto non diuidi. ſi enim fieri poteſt, diuidatur in D, ita vt AC non ſit eadem, quæ DB. ſed maior A C poſitione. Itaque conſtat quadrata ex AC CB quadratis ex AD DB maiora eſſe, vt ſupra oſtendimus; & AD DB medias eſſe potentia ſolum commenſurabiles, quæ medium contineant. Exponatur rationalis EF: & quadrato quidem ex AB æquale parallelogrammum EK ad ipſam EF applicetur; quadratis vero ex AC CB æquale auferatur EG. reliquum igitur HK æquale eſt ei, quod bis AC CB continetur. rurſus quadratis ex AD DB, quæ minora ſunt quadratis ex AC CB, vt oſtenſum eſt, æquale parallelogrammum auferatur EL. ergo reliquum MK eſt æquale ei, quod bis cõtinetur AD DB. et quoniam media ſunt quæ ex AC CB quadrata, erit EG medium, & ad rationalem EF applicatum eſt. quare EH rationalis eſt, & ipſi EF longitudine incommenſurabilis. Eadem ratione & HN eſt rationalis, & ipſi EF incommenſurabilis lõgitudine. Quòd cum AC CB mediæ ſint potentia ſolum commenſurabiles, erit AC ipſi C B incommenſurabilis longitudine. vt autem AC ad CB, ita quadratum ex AC ad id, quod AC CB continetur. quadratum igitur ex A C incommenſurabile eſt ei, quod continetur AC CB. ſed quadrato quidem ex AC commenſurabilia ſunt quadrata ex A C C B, etenim AC CB potentia ſunt commenſurabiles; ei uero, quod continetur AC CB, commẽ ſurabile eſt illud, quod bis AC CB continetur. ergo et quadrata ex AC CB incommenſurabilia ſunt ei, quod bis AC CB continetur: quadratis autẽ ex AC CB æquale eſt parallelogrammum EG, & ei, quod bis continetur AC CB eſt æquale HK. ergo EG ipſi HK eſt incommenſurabile; & ob id recta linea EH ipſi HN incommenſurabilis longitudine; ſuntq; rationales. ergo EH HN rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles. ſi autem duæ rationales potentia ſolum commenſurabiles componantur, tota irrationalis eſt, quę ex binis nominibus appellatur. quare EN ex binis nominibus eſt diuiſa in puncto H. eadem ratione & EM MN oſtendentur rationales potentia ſolum cõmenſurabiles, & erit EN ex binis nominibus ad aliud, atque aliud punctum diuiſa, uidelicet ad H, & ad M. & non eſt EH eadem, quæ MN: quoniam quadrata ex AC CB quadratis ex AD DB ſunt maiora; quadrata autẽ ex AD DB maiora ſunt eo, quod bis AD DB continetur. ergo quadrata ex AC CB, hoc eſt parallelogramnium EG multo maius eſt eo, quod bis continetur AD DB, hoc eſt parallelogrammo MK. quare & EH, quàm MN eſt maior. non igitur E H eadem eſt, quę MN. quod demonſtrare oportebat.



A B C D E F G H K

F. C. COMMENTARIVS.

Sed maior AC poſitione] *Hoc eſt ponatur nunc AC maior, quam DB.* A
Vt ſupra oſtendimus] *In lemmate, quod poſitum eſt ante 43. huius.* B
Reliquum igitur HK æquale eſt ei, quod bis AC CB cõtinetur.] *Ex 4. ſecundi libri.* C
Et quoniam media ſunt, quæ ex AC CB quadrata, erit EG medium.] *Rectæ enim li* D

neæ

nede AC CB ponuntur mediae potentia ſolum commenſurabiles. quare & media erunt ipſarum quadrata, atque inter ſe commenſurabilia; & ſi componantur vnum fiet medium, quemadmodũ ex duabus rationalibus, ſi longitudine commenſurabiles ſint, vna fit rationalis.

At vero ſpacium ex medijs compoſitum irrationale eſſe ſic demonſtrabimus.]

Cõponantur duo media ſpacia AE BC. Dico totum AD eſſe irrationale. ſit enim rationale, ſi fieri poteſt; exponaturq́, rationalis quedam recta linea EF; & ad ipſam applicetur parallelogrammum EG ipſi AD aequale, latitudinẽ faciens EH: à parallelogrammo autem EG auferatur EK aequale ipſi AB, quod latitudinem faciat EL. reliquum igitur LG reliquo BC eſt æquale. & quoniam medium eſt vtrumque ipſorum AB BC; atque eſt EK quidem ipſi AE aequale; LG vero ipſi BC: erit & vtrumque ipſorum EK LG medium; & ad rationalem EF applicata ſunt. rationalis igitur eſt vtraque ipſarum EL LH, & ipſi EF incommenſurabilis longitudine. Rurſus quoniam AD rationale ponitur, eſtq́, ipſi EG aequale, & applicatur ad rationalem EF; recta linea EH rationalis erit, & ipſi EF longitudine commenſurabilis. eſt autem EL eidem EF incommenſurabilis longitudine. ergo EH ipſi LL longitudine incommenſurabilis erit. ſed vt EH ad EL, ita & quadratum ex EH ad rectangulum, quod HE EL continetur. quadratum autem ex EH commenſurabile eſt quadratis ex HE EL; vtrumque enim ipſorum eſt rationale. & rectangulum contentum HE EL eſt commenſurabile ei, quod bis HE EL continetur. ergo ex his, quae ad 14. huius demonſtrauimus, quadrata ex HE EL incommenſurabilia ſunt ei, quod bis continetur HE EL. ſed quadratis ex HE EL aequale eſt id, quod bis HE EL continetur vnà cum quadrato ipſius LH, ex 7 ſecundi libri. ſi autem magnitudo ex duabus magnitudinibus compoſita vni componentium ſit incommenſurabilis, & reliquae incommenſurabilis erit. quod à nobis demonſtratum eſt ad 17. huius. quadrata igitur ex HE EL incommenſurabilia ſunt quadrato ex LH. rationalia autem ſunt quadrata ex HE EE. ergo quadratum ex LH irrationale eſt: & ob id recta linea LH eſt irrationalis; ſed & rationalis, vt demonſtratum fuit; quod fieri non poteſt. non igitur ſpacium AD eſt rationale. quare irrationale ſit neceſſe eſt. quod demonſtrare oportebat.



23. huius

21. huius, 13. huius.

E Quare EH rationalis eſt, & ipſi EF longitudine incommenſurabilis.] *Ex 23 huius.*

F Ergo EC ipſi HK eſt incommenſurabile] *Ex demonſtratis ad 14 huius.*

G Tota irrationalis eſt, quæ ex binis nominibus appellatur] *Ex 37. huius.*

H Et erit EA ex binis nominibus ad aliud, atque aliud punctum diuiſa, videlicet ad H, & ad M] *Quod fieri non poſſe in 43 huius demonſtratum eſt. non igitur quae ex binis medijs ſecunda ad aliud, atque aliud punctum diuiditur in nomina. ergo ad vnum dumtaxat diuidi neceſſarium eſt.*

K Et non eſt EH eadem, quæ MN] *Oſtendit EH ipſi MN non eſſe aequalem.*

THEOREMA XXXIIII. PROPOSITIO XLVI.

Maior ad idem dumtaxat punctum diuiditur in nomina.

Sit maior AB diuiſa in C, ita ut AC CB potentia incommenſurabiles ſint, facientes compoſitum quidem ex ipſarum AC CB quadratis rationale; rectangulum vero, quod ipſis continetur, mediũ. Dico AB in alio puncto non diuidi. ſi enim fieri poteſt, diuidatur in D, ita vt AD DB potentia incõmenſurabiles ſint, facientes compoſitum quidem ex ipſarum quadratis rationale; quod autem ipſis continetur, medium. & quoniam quo differunt quadrata ex AC CB à quadratis ex AD DB, hoc differt & id, quod bis continetur AD DB ab eo, quod bis AC CB continetur,



ſed

sed quadrata ex AC CB superant quadrata ex AD DB rationali; etenim utraque rationalia sunt. ergo quod bis cõtinetur AD BD rationali superat id, quod bis AC CB cõtinetur, cũ media sint. quod est absurdũ. nõ igitur maior ad aliud, atq; aliud punctum diuiditur. ergo ad idem dumtaxat diuidatur necesse est. Ex demonstratis ad 27 huius. Ex 27. huius.

THEOREMA XXXV. PROPOSITIO XLVII.

Rationale, ac medium potens ad vnum dumtaxat punctum diuiditur in nomina.



Sit rationale, ac medium potens AB, diuisa in C; ita vt AC CB potentia incõmensurabiles sint; faciantq; compositũ quidem ex ipsarum AC CB quadratis medium; quod autem ipsis continetur, rationale. Dico AB in alio puncto non diuidi. si enim fieri potest, diuidatur in D, ita vt etiam AD DB potentia incommensurabiles sint, facientes compositum ex ipsarum quadratis medium: quod autem ipsis continetur, rationale. Quoniam igitur quo differt rectangulum bis contentum AD DB ab eo, quod bis AC CB continetur; hoc differunt & quadrata ex AC CB à quadratis ex AD DB. rectangulum autem bis contentum AD DB rationali superat id, quod bis AC CB continetur. ergo & quadrata ex AC CB superant quadrata ex AD DB rationali, cum media sint. quod est absurdum. non igitur rationale, ac mediũ potens diuiditur ad aliud, atque aliud punctum. quare ad vnum dumtaxat punctum diuidetur.

THEOREMA XXXVI. PROPOSITIO XLVIII.

Binâ media potens ad vnum dumtaxat punctum diuiditur in nomina.



Sit bina media potens AB, diuisa in C, ita vt AC CB potentia incommensurabiles sint, facientes etiam compositum ex ipsarum AC CB quadratis medium; & quod ipsis continetur, medium, incommensurabileq; composito ex quadratis ipsarum AC CB. Dico AB ad aliud punctum non diuidi, ita vt faciat quæ proposita sunt. Si enim fieri potest, diuidatur in D, ita vt rursus AC non sit eadem, quæ DB, sed sit AC positione maior; exponaturq; rationalis EF, & ad ipsam quadratis quidẽ ex AC CB æquale parallelogrammum EG applicetur; rectangulo autem bis contento AC CB æquale applicetur HK. totum igitur EK est æquale ei, quod fit ex AB, quadrato. Rursus ad EF applicetur parallelogrammũ EL, æquale quadratis ex AD DB. ergo reliquum, quod bis AD DB continetur, reliquo MK est æquale. & quoniam compositum ex quadratis ipsarum AC CB medium ponitur, erit & parallelogrammum EG medium: & ad rationalem EF applicatum est. rationalis igitur est HE, & ipsi EF longitudine incommensurabilis. Eadem ratione & HN est rationalis, ipsiq; EF incommensurabilis longitudine. & quoniam compositum ex quadratis ipsarum AC CB incommensurabile est ei, quod bis AC CB continetur, erit & parallelogrammũ EG ipsi HK incommensurabile. ergo & recta linea EH est incommensurabilis rectę HN. & sunt rationales. quare EH HN rationales sunt potentia solum commensurabiles 4. secundi. 23. huius.

biles. & ob id EN ex binis nominibus est diuisa in puncto H. similiter ostendemus ipsam EN in puncto quoque M diuidi: & non est H eadem, quæ MN. ergo quæ ex binis nominibus ad aliud, atque aliud punctum diuiditur; quod est absurdum. non igitur bina media potens diuiditur ad aliud, atque aliud punctum. quare ad vnum dumtaxat punctum diuidetur.

Ex 43. huius.

DIFFINITIONES SECVNDAE.

1 Exposita rationali, & quæ ex binis nominibus, diuisa in nomina, cuius maius nomen plus possit, quàm minus, quadrato rectæ lineæ sibi longitudine commensurabilis, siquidem maius nomen expositæ rationali commensurabile sit longitudine, tota dicatur ex binis nominibus prima.

2 Si vero minus nomen expositæ rationali longitudine sit commensurabile, dicatur ex binis nominibus secunda.

3 Quòd si neutrum ipsorum nominum sit longitudinè commensurabile expositæ rationali, vocetur ex binis nominibus tertia.

4 Rursus si maius nomen plus possit, quàm minus, quadrato rectę lineæ sibi lõgitudine incõmmensurabilis, siquidem maius nomen expositæ rationali sit commensurabile longitudine, dicatur ex binis nominibus quarta.

5 Si vero minus, dicatur quinta.

6 Quòd si neutrum, dicatur sexta.

SCHOLIVM.

Cum igitur sex rectæ lineę ita sumantur, primas ordine facit tres, in quibus maior plus potest, quàm minor, quadrato rectę lineæ sibi longitudine commensurabilis; secundas uero tres reliquas, in quibus maior plus potest, quàm minor, quadrato rectæ lineæ sibi incommensurabilis longitudine; propterea quòd commensurabile antecedit incommensurabile: & adhuc primam quidem, in qua maius nomen commensurabile est expositę rationali; secundam, in qua minus nomen, quoniam rursus maius antecedit minus, cum ipsum contineat; tertiam uero, in qua neutrum expositæ rationali est commensurabile; & in reliquis tribus eodem modo, primam dicti secundi ordinis quartam appellans, secundam quintam, & tertiam sextam.

PROBLEMA XIII. PROPOSITIO. XLIX.

Inuenire ex binis nominibus primam.

A Exponantur duo numeri AC CB, ita vt compositus ex ipsis, videlicet AB ad ipsum quidem BC proportionem habeat, quam quadratus numerus ad quadratum numerum;

numerum; ad ipsum vero CA proportionem non habeat, quã quadratus numerus ad quadratum numerum. & exponatur quędam rationalis D; & ipsi D longitudine commensurabilis sit EF. ergo EF est rationalis. fiat autẽ vt BA numerus ad numerum AC, ita ipsius EF quadratum ad quadratũ FG. Sed BA ad AC proportionem habet, quam numerus ad numerum. ergo & quadratum ipsius EF ad quadratũ FG proportionẽ habebit, quã numerus ad numerũ. cõmensurabile igitur est quadratũ ex EF quadrato ex FG; atq; est EF rationalis. ergo & rationalis FG. & cui BA ad AC proportionem non habet, quam quadratus numerus ad quadratum numerum neque quadratum ex EF ad quadratum ex FG proportionem habebit, quam quadratus numerus ad quadratum numerum. ergo EF ipsi FG incommensurabilis est longitudine. & ob id EF FG rationales sunt potentia solum cõmensurabiles. ex binis igitur nominibus est EG. Dico & primam esse. Quoniã enim est vt BA numerus ad numerum AC, ita quadratum ex EF ad id quod ex FG quadratum. maior autem est BA, quàm AC. ergo & quadratum ex EF quadrato ex FG est maius. sint quadrato ex EF æqualia quadrata ex FG H. Quoniam igitur est vt BA ad AC, ita quadratum ex EF ad quadratum ex FG, erit per conuersionem rationis vt AB ad BC, ita quadratum ex EF ad quadratum ex H. sed AB ad BC proportionem habet, quam numerus quadratus ad quadratum numerum. & quadratum igitur ex EF ad quadratum ex H proportionem habebit quam quadratus numerus ad quadratum numerum. quare EF ipsi H longitudine est commẽsurabilis. ideoq; EF plus potest, quàm FG quadrato rectæ lineæ sibi commensurabilis longitudine. sunt autem EF FG rationales, & EF ipsi D longitudine est commensurabilis. ergo EG ex binis nominibus est prima.



D E F G H K L

F. C. COMMENTARIVS.

Exponantur duo numeri AC CB, ita vt compositus ex ipsis videlicet AB ad ipsum quidem BC proportionem habeat, quam quadratus numerus ad quadratum numerum; ad ipsum vero CA proportionem non habeat] *Inuenientur aũt hi ex corollario primi lemmatis ante 30 huius.* A

Ergo EF est rationalis] *Ex 6 diffinitione.* B

Fiat autem vt BA numerus ad numerum AC, ita ipsius EF quadratum ad quadratum FG] *Ex corollario 6 huius.* C

Commensurabile igitur est quadratum ex EF quadrato ex FG] *Ex sexta huius.* D

Ergo & rationalis FG] *Ex 6 diffinitione.* E

Ergo EF ipsi FG incommensurabilis est longitudine] *Ex 9 huius.* F

Ex binis igitur nominibus est EG] *Ex 37 huius.* G

Sint quadrato ex EF æqualia quadrata ex FG H] *Inuenietur quadratum ipsius H ex lemmate ante 15 huius.* H

Quare EF ipsi H longitudine est commensurabilis] *Ex 9 huius.* K

Ergo EG ex binis nominibus est prima] *Ex prima secundarum diffinitionum.* L

Sit AC numerus 12, CB 4, & EF 6. fiatq; vt 16 ad 12, ita 36 ad aliũ. erit ad 27, ergo 6 plus 27 est ex binis nominibus prima.

PROBLEMA XIIII. PROPOSITIO L.

Inuenire ex binis nominibus secundam.

Exponantur duo numeri AC CB, ita vt compositus ex ipsis AB ad ipsum BC quidem proportionem habeat, quam numerus quadratus ad quadratum numerũ. ad AC vero proportionem non habeat, quam numerus quadratus ad quadratum

numerum:& exponatur rationalis D:& ſit FG ipſi D longitudine commenſurabilis.ergo FG rationalis eſt.fiatq; vt CA numerus ad numerum AB, ita quadratum ex GF ad quadratum ex FE.commenſurabile igitur eſt quadratum ex GF quadrato ex FE. ergo & EF eſt rationalis. & quoniã CA numerus ad ipſum AB proportionem non habet, quam numerus quadratus ad quadratum numerum; neque quadratum ex GF ad quadratum ex FE proportionẽ habebit,quàm numerus quadratus ad quadratum numerum.incommenſurabilis igitur eſt GF ipſi FE longitudine. quare EF FG rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles;ac propterea ex binis nominibus eſt EG. Oſtendendum eſt & ſecundam eſſe. Quoniam enim conuertendo eſt vt BA numerus ad numerũ AC,ita quadratum ex EF ad quadratum ex FG:maior autẽ eſt BA,quàm AC.ergo & quadratum ex EF quadrato ex FG eſt maius.ſint quadrato ex EF æqualia quadrata ex FG, H.eſt igitur per conuerſionem rationis vt AB ad BC, ita quadratum ex EF ad quadratum ex H. ſed AB ad BC proportionem habet, quam quadratus numerus ad quadratum numerum.ergo & quadratum ex EF ad quadratum ex H proportionẽ habebit,quam quadratus numerus ad quadratum numerum;& ob id EF ipſi H longitudine eſt commenſurabilis.quare EF plus poteſt, quàm FG quadrato rectæ lineę ſibi commenſurabiles longitudine.ſuntq; rationales EF FG potentia ſolum cõmenſurabiles:& FG minus nomen longitudine commenſurabile eſt ipſi D expoſitæ rationali.ergo EG ex binis nominibus eſt ſecunda.



6.diffi. Coroll. 6. huius. 6.huius. 6.diffi. 9.huius. 9.huius. 2.diffi. ſecundarum.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit AC 9 CB 3.& FG 6.fiat autem vt 9 ad 12,ita 36 ad aliũ erit ad 48.quare ☐ *48 plus 6 eſt ex binis nominibus ſecunda.*

PROBLEMA XV. PROPOSITIO LI.

Inuenire ex binis nominibus tertiam.

Exponantur duo numeri AC CB, ita vt compoſitus ex ipſis AB ad BC quidem proportionem habeat, quam numerus quadratus ad quadratum numerum; ad AC vero proportionem non habeat, quam numerus quadratus ad quadratum numerum. Exponatur etiam alius numerus D non quadratus, qui ad vtrumque ipſorum BA AC proportionem non habeat,quam quadratus numerus ad quadratum numerum.denique exponatur rationalis quędam recta linea E; fiatq; vt D ad AB, ita quadratum ex E ad quadratum ex FG.quadratum igitur ex E quadrato ex FG eſt commenſurabile.rationalis autem eſt E.ergo & FG eſt rationalis.& quoniam D ad AB proportionem non habet,quam quadratus numerus ad quadratum numerum, neque quadratum ex E ad quadratum ex FG proportionem habebit,quã quadratus numerus ad quadratum numerum.incommenſurabilis igitur eſt E ipſi FG longitudine. Rurſus fiat vt BA numerus ad numerum AC,ita quadratum ex FG ad quadratum ex GH. ergo quadratum ex FG quadrato ex GH eſt commenſurabile. rationalis autem eſt FG.quare & GH eſt rationalis.& quoniam BA ad AC proportionem non habet,quẽ quadratus numerus ad quadratum numerum, neque quadratum ex FG ad quadratum



Coroll.6.huius. 6.huius. Diffi.6. 9.huius. 6.huius.

tum ex GH proportionem habebit, quam quadratus numerus ad quadratum numerum. incommensurabilis igitur est FG ipsi GH longitudine. quare FG GH rationales sunt potentia solum commensurabiles. ideoq; FH ex binis nominibus est. Dico & tertiam esse. Qm enim est vt D numerus ad AB, ita quadratum ex E ad quadratum ex FG; vt autem BA ad AC, ita quod fit ex FG quadratum ad quadratum ex GH: erit ex æquali vt D ad AC, ita quadratum ex E ad quadratum ex GH. sed D ad AC proportionem non habet, quàm numerus quadratus ad quadratum numerum. ergo E ipsi GH incommensurabilis est longitudine. Et quoniam vt BA ad AC, ita quadratum ex FG ad id, quod ex GH quadratum; erit quadratum ex FG maius quadrato ex GH. sint quadrato ex FG æqualia quadrata ex GH, K. per conuersionem igitur rationis est vt AB ad BC, ita quadratum ex FG ad quadratum ex K. sed AB ad BC proportionem habet, quam numerus quadratus ad quadratum numerum. ergo & quadratum ex FG ad quadratum ex K proportionem habebit, quam numerus quadratus ad quadratum numerum. commensurabilis igitur est FG ipsi K longitudine: & ob id FG plus potest, quam GH, quadrato rectæ lineæ sibi longitudine commensurabilis. suntq; FG GH, rationales potentia solum commensurabiles: & neutra ipsarum commensurabilis est ipsi E longitudine. ergo FH ex binis nominibus est tertia.

9.huius. 9.huius. 9.huius. 3 diffi. secundarum.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit numerus AC 15, CB 5; & D 30, rationalis autē E sit 6, fiatq; vt 30 ad 20, ita 36 ad alium. erit ad 24. rursus fiat vt 20 ad 15, ita 24 ad alium, hoc est ad 18. ergo R 24 plus R 18 est ex binis nominibus tertia.

PROBLEMA XVI. PROPOSITIO. LII.

Inuenire ex binis nominibus quartam.

Exponantur duo numeri AC CB, ita vt AB ad utrũque ipsorum proportionem non habeat, quã numerus quadratus ad quadratum numerum; exponaturq; rationalis D: & ipsi D commensurabilis sit EF longitudine. ergo EF est rationalis. fiat autem vt BA numerus ad numerum AC, ita quadratum ex EF ad quadratum ex FG. commensurabile igitur est quadratum ex EF quadrato ex FG: ideoq; recta linea FG est rationalis. Et quoniam BA ad AC proportionem non habet, quam numerus quadratus ad quadratum numerum, erit EF ipsi FG longitudine incommensurabilis. ergo EF FG rationales sunt potentia solum commensurabiles: & ob id EG ex binis nominibus est. Dico eam & quartam esse. Quoniam enim est vt BA ad AC, ita quadratum ex EF ad quadratum ex FG; maior autem est BA, quàm AC: erit quadratum ex EF quadrato ex FG maius. sint quadrato ex EF æqualia quadrata ex FG, H. per conuersionem igitur rationis est vt AB numerus ad numerum BC, ita quadratum ex EF ad id, quod fit ex H quadratum. sed AB ad BC proportionem non habet, quam numerus quadratus ad quadratum numerum. ergo EF ipsi H longitudine est incommensurabilis; ac propterea EF plus potest, quàm FG quadrato rectę lineæ sibi incommensurabilis longitudine. suntq; EF FG rationales potentia solum commensurabiles; & EF ipsi D commensurabilis est longitudine. ergo EG ex binis nominibus est quarta.



diffi. 6. 6.huius. 9.huius. 37.huius. 9.huius. 4.diffi.secundarum.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit AC numerus 10, CB 6. rationalis autem D sit 6, & EF 4; fiatq; ut 16 ad 10, ita 16 ad alium, nempe ad 10, erit 4 plus R 10 ex binis nominibus quarta.

PROBLEMA XVII. PROPOSITIO. LIII.

Inuenire ex binis nominibus quintam.



Exponantur duo numeri A C C B, ita vt AB ad vtrumque ipsorum proportionem non habeat, quam numerus quadratus ad quadratum numerum. exponaturq; recta linea quædam rationalis D; & ipsi D longitudine commensurabilis sit FG. ergo FG est rationalis; & fiat vt C A ad AB, ita quadratum ex GF ad id, quod fit ex FE quadratum. rationalis igitur est FE. Et quoniam CA numerus ad AB proportionem nō habet, quam numerus quadratus ad quadratū numerum; neque quadratum ex GF ad quadratum ex FE proportionem habebit, quam numerus quadratus ad quadratum numerum. ergo EF FG rationales sunt potentia solum commensurabiles: & ob id EG ex binis nominibus est. itaque dico & quintam esse. Quoniam enim est vt CA ad AB, ita quadratū ex GF ad quadratum ex FE; erit conuertendo vt BA ad AC, ita quadratum ex EF ad quadratum ex FG. ergo quadratum ex EF quadrato ex FG est maius. sint quadrato ex EF æqualia quadrata ex FG, H. per cōuersionem igitur rationis est vt AB numerus ad numerum BC, ita quadratum ex EF ad id, quod ex H quadratum. sed AB ad BC proportionem non habet, quam quadratus numerus ad quadratum numerum. ergo neque quadratum ex EF ad quadratum ex H proportionem habebit, quam numerus quadratus ad quadratum numerum. ac propterea E F ipsi H longitudine est incommēsurabilis. quare EF plus potest, quàm FG, quadrato rectæ lineæ sibi incommensurabilis longitudine. suntq; EF FG rationales potentia solum commensurabiles: & FG minus nomen exposite rationali D commensurabilis est longitudine. ergo EG ex binis nominibus est quinta.

8. diff.

37 huius.

5. diffi. secundarum.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit AC 16, CB 4, & FG 2; fiatq; vt 16 ad 20, ita 4 ad alium, videlicet ad 5. erit R 5 plus 2 ex binis nominibus quinta.

PROBLEMA XVIII. PROPOSITIO LIIII.

Inuenire ex binis nominibus sextam.



Exponantur duo numeri AC CB, ita vt AB ad vtrumque ipsorum proportionem non habeat, quam numerus quadratus ad quadratum numerum. sit etiam alius numerus D non quadratus, qui ad vtrumque ipsorum BA AC proportionem non habeat, quam numerus quadratus ad quadratum numerum: & exponatur rationalis quedā recta linea E: fiatq; vt D ad AB, ita quadratum ex E ad quadratum ex FG. commēsurabilis igitur est E ipsi F G potentia, atque est E rationalis. quare & rationalis est F G. Et quoniam D ad AB proportionem non habet, quam numerus quadratus ad quadratum numerum; neque quadratum ex E ad quadratum ex FG proportionem habebit, quam numerus quadratus ad quadratum numerum. ergo E ipsi F G longitudine est incommensurabilis. itaque rursus fiat ut BA ad AC, sic quadratum ex FG ad quadratum ex GH. quadratum igitur ex FG quadrato ex GH est commensurabile. rationale autem est quadratum ex FG. ergo & quadratum ex GH est rationale: ob idq; recta linea GH est rationalis. Et quoniam BA ad AC proportionē nō habet,

9. huius.

2. diffi.

bet,

bet,quam numerus quadratus ad quadratum numerum; neque quadratum ex FG ad quadratum ex GH proportionem habebit, quam numerus quadratus ad quadratum numerum.incommensurabilis igitur est FG ipsi GH longitudine: & ideo FG GH rationales sunt potentia solum commensurabiles. quare ex binis nominibus est FH. ostendendum est & sextã esse. Quoniam enim vt D ad AB,ita est quadratũ ex E ad quadratũ ex FG; est aũt & vt BA ad AC,ita quadratũ ex FG ad quadratũ ex GH:erit ex æquali vt D ad AC,ita quadratũ ex E ad quadratũ ex GH. sed D ad AC proportionem non habet,quam numerus quadratus ad quadratum numerum. ergo neque quadratum ex E ad quadratum ex GH proportionem habebit, quam numerus quadratus ad quadratum numerum.incommensurabilis igitur est E ipsi GH longitudine. ostensum autem est & ipsi FG incommẽsurabilem esse. quare utraque ipsarum FG GH ipsi E longitudine est incommensurabilis. & quoniam est vt BA ad AC, ita quadratum ex FG ad quadratum ex GH; erit quadratũ ex FG quadrato ex GH maius. sint quadrato ex FG æqualia quadrata ex GH, K. ergo per conuersionem rationis vt AB ad BC,ita est quadratum ex FG ad quadratum ex K. Sed AB ad BC proportionem non habet,quã numerus quadratus ad quadratum numerum.neque igitur quadratum ex FG ad quadratum ex K proportionem habebit, quam numerus quadratus ad quadratum numerum: ac propterea FG ipsi K longitudine est incommensurabilis. ergo FG plus potest,quàm GH quadrato rectæ lineæ sibi incommensurabilis longitudine: suntq; FG GH rationales potentia solum commensurabiles: & neutra ipsarum longitudine commensurabilis est expositæ rationali E. quare FH ex binis nominibus est sexta.

9.huius: 37.huius. 9.huius. 6.diffi.secundarum.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit AC 10, CB 6 & D 20. rationalis autem E sit 5, & fiat vt 20 ad 16, ita 25 ad aliud, nempe ad 20. rursus fiat vt 16 ad 10, ita 20 ad aliũ, erit ad 12 ½. ergo ℞ 20 plus ℞ 12 ½ est ex binis nominibus sexta.

LEMMA

Sint duo quadrata AB BC: & ponantur ita, vt DB sit in directum ipsi B E. ergo & FB ipsi B G in directum erit; & compleatur AC parallelogrammum. Dico AC quadratum esse: & quadratorum A B B C rectangulum DG medium esse proportionale; itemq; ipsorum AC CB medium proportionale esse DC.



Quoniam enim D B quidem est æqualis B F, E B vero ipsi B G; erit tota D E toti FG æqualis. sed DE æqualis est vtrique ipsarum AK H C.ergo & vtraque AH KC vtrique AK HC est æqualis. æquilaterũ igitur,est AC parallelogrãmum.est autem & rectangulum. ergo quadratum est AC.Et quoniam est vt FB ad BG,ita DB ad BE: vt autem FB ad BG, ita AB ad DG: & vt DB ad BE, ita DG ad BC. vt igitur AB ad DG, ita est DG ad BC:ideoq; ipsorum AB BC medium proportionale est DG. Dico præterea ipsorum AC CB medium proportionale esse DC. nam cũ sit vt AD ad DK, ita KG ad GC: est enim vtraque vtrique æqualis: & componendo erit vt AK ad KD, ita KC ad CG. sed vt AK ad KD,ita AC ad CD;& vt KC ad CG, ita DC ad CB. & vt igitur AC ad CD,ita est DC ad CB. ac propterea ipsorum AC CB medium proportionale est CD. quod ostendendum proponebatur.

14.primi. 1.sexti.

THEOREMA XXXVII. PROPOSITIO LV.

Si spacium cõtineatur rationali, & ex binis nominibus prima, recta

recta linea ſpacium potens irrationalis eſt, quæ ex binis nominibus appellatur.

Spaciũ enim ABCD contineatur rationali AB, & ex binis nominibus prima AD. Dico rectam lineam, quę poteſt ſpacium AC irrationalem eſſe, quę ex binis nominibus appellatur. Quoniã enim AD eſt ex binis nominibus prima, diuidatur in nomina ad punctum E: & ſit AE maius nomen. manifeſtum eſt AE ED rationales eſſe potentia ſolũ commenſurabiles, & AE plus poſſe, quàm ED quadrato rectæ lineæ ſibi commenſurabilis longitudine: & præterea AE expoſitæ rationali AB longitudine commenſurabilem eſſe. Secetur ED bifariam in F. Quoniam igitur AE plus poteſt, quàm ED quadrato rectæ lineæ ſibi commenſurabilis longitudine, ſi quartę parti quadrati, quod fit à minori, hoc eſt quadrato ex EF æquale parallelogrammũ ad maiorem AE applicetur, deficiens figura quadrata, in partes commenſurabiles ipſam diuidet. itaque applicetur, & ſit AGE. ergo AG ipſi GE longitudine eſt commenſurabilis. Deinde per pũcta G E F alterutri ipſarum AB DC parallelæ ducantur GH EK FL: & parallelogrammo quidem AH æquale quadratum conſtituatur SN; parallelogrammo autem GK æquale quadratum NP: & ponatur ita, vt MN ſit in directum ipſi NX. ergo RN ipſi NO in directum erit: & parallelogrammum SP compleatur. quadratum igitur eſt SP. & quoniam rectangulum AGE eſt æquale quadrato ex EF, erit vt AG ad EF, ita FE ad EG. quare & vt AH ad EL, ita eſt EL ad KG: ac propterea parallelogrammorum AH KG mediũ proportionale eſt EL. Sed parallelogrammo AH æquale eſt quadratum SN, & parallelogrammo GK æquale quadratum NP. ergo quadratorum SN NP medium proportionale eſt EL. ſed & eorumdem SN NP medium proportionale eſt & MR. æquale igitur eſt MR ipſi EL. ſed MR eſt æquale OX, & EL ipſi FC. ergo totũ EC ipſis MR OX eſt æquale. ſũt autem & AH GK æqualia ipſis SN NP. totũ igitur AC eſt æquale toti SP, hoc eſt quadrato ex MX; ideoq; ipſa MX poteſt parallelogrammum AC. Dico MX ex binis nominibus eſſe. quoniam enim AG commenſurabilis eſt ipſi GE, erit AE utrique ipſarum AG GE commenſurabilis; ponitur autem & AE commenſurabilis ipſi AB longitudine. ergo & AG GE ipſi AB commenſurabiles; ſunt; atque eſt AB rationalis. rationalis igitur & vtraque ipſarũ AG GE: & ob id rationale vtriusque ipſorum AH GK: & AH ipſi GK eſt commenſurabile. ſed AH eſt æquale ipſi SN, & GH ipſi NP. ergo & quadrata SN NP, videlicet quæ fiunt ex MN NX rationalia ſunt, & commenſurabilia. Et quoniam incommenſurabilis eſt AE ipſi ED longitudine, & AE quidem eſt commenſurabilis ipſi AG; DE vero ipſi EF: erit & AG ipſi EF longitudine incommenſurabilis. ergo & AH eſt incommenſurabile ipſi EL. ſed AH eſt æquale SN, & EL ipſi MR. quare SN eſt incommenſurabile ipſi MR: vt autem SN ad MR, ita ON ad NR. incommenſurabilis igitur eſt ON ipſi NR: eſt autem ON æqualis MN, & NR ipſi NX. ergo MN ipſi NX eſt incommenſurabilis. atque eſt quadratum ex MN commenſurabile quadrato ex NX: & vtrumque rationale. quare MN NX rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles. ideoq; MX ex binis nominibus eſt, & poteſt parallelogrammum AC, quod demonſtrare oportebat.



1. Secundarũ diffin.

A
B
14. ſecundi.
Ex antecedẽti lemmate.
C
1. ſexti.
43. Primi.
D
E
F
G
H
K L
M
N
37. huius.

F. C. COMMENTARIVS.

A In partes commenſurabiles ipſam diuidet] *Ex 3 parte 18 huius.*

Itaque

Itaque applicetur, & ſit AGE] *Ex 3 lemmate ante 18 huius.* B
Erit vt AG ad EF, ita FE ad EG] *Ex 14 ſexti.* C
Erit AE vtrique ipſarum AG GE commenſurabilis] *Ex 16 huius.* D
Ergo & AG GE ipſi AB commenſurabiles ſunt] *Ex 12 huius.* E
Et ob id rationale vtrumque ipſorum AH GK] *Ex 20 huius.* F
Et AH ipſi GK eſt commenſurabile] *Eſt enim ex 1 ſexti vt AG ad GE, ita AH parallelogrammum ad parallelogramum GK. ergo ex 10 huius parallelogrammum AH ipſi GK eſt commenſurabile.* G
Et quoniam incommenſurabilis eſt AE ipſi ED longitudine] *Ponitur enim AD eſſe ex binis nominibus prima, quae conſtat ex duabus rationalibus potentia ſolum commenſurabilibus.* H
Erit & AG ipſi EF longitudine incommenſurabilis] *Ex ijs, quae ad 14 huius demonſtrauimus.* K
Ergo & AH eſt incommenſurabile ipſi EL] *Nam vt AG ad EF, ita & AH parallelogrammum ad ipſum EL. quare ex 10 huius propoſitum concludetur.* L
Incommenſurabilis igitur eſt ON ipſi NR] *Ex 10 huius, vt dictum iam eſt.* M
Atque eſt quadratum ex MN commenſurabile quadrato ex NX, & vtrumque rationale.] *Hoc enim ſupra demonſtratum eſt.* N

Sit AB 5, & AD 4 plus ℞ 12. erit EF, vel FD ℞ 3. & ſi ad rectam lineam AE applicetur parallelogrammum aequale quadrato ipſius EF, deficiens figura quadrata, erit ex demonſtratis ad 18 huius AG 3, GE 1. quare parallelogrammũ AH eſt 15, GK 5, & EL vel FC ℞ 75: ideoq; totum AC parallelogrammum erit 20 plus ℞ 300. Huiuſmodi vero ſpacia iuniores etiam binomialia, ſeu ex binis nominibus appellant, quorum latera quadrata, vel radices ex ijs, quae tradita ſunt, facile inuenire licebit in hunc modum.

Binomialis ſpacij latus quadratum, vel radicem inuenire.

Sit binomiale ſpacium 20 plus ℞ 300, cuius oporteat latus quadratum inuenire. diuidatur maius nomen, videlicet 20 in duas partes, ita vt quod ex ipſis producitur ſit aequale quartae parti quadrati minoris nominis, hoc eſt aequale 75. erit ex ijs, quae nos tradidimus ad 18 huius, maior pars 15, & minor 5. dico ℞ 15 plus ℞ 5 eſſe latus quadratum eius ſpacij 20 plus ℞ 300. Quoniam enim recta linea, quae ex binis nominibus cõſtat, videlicet ℞ 15 plus ℞ 5, diuiditur in duas partes, erit quadratum totius aequale quadratis partiũ vnà cum rectangulo, quod bis dictis partibus continetur. itaque quadratum ℞ 15 eſt 15; & quadratum ℞ 5 eſt 5: rectangulum autem, quod continetur ℞ 15 & ℞ 5 eſt ℞ 75, & eius duplum eſt ℞ 300. quae omnia ſi componantur facient 20 plus ℞ 300, et idem erit quadratũ, quod fit ex recta linea ℞ 15 plus ℞ 5. ergo ℞ 15 plus ℞ 5 eſt latus quadratum, vel radix huius ſpacij binomialis 20 plus ℞ 300. Eodem modo & aliorum ſpaciorum binomialium radices inueniemus. quod facere oportebat.

THEOREMA XXXVIII. PROPOSITIO LVI.

Si ſpacium contineatur rationali, & ex binis nominibus ſecunda, recta linea ſpacium potens irrationalis eſt, quæ ex binis medijs prima appellatur.

Spacium enim ABCD contineatur rationali AB, & ex binis nominibus ſecunda AD. Dico rectam lineam, quæ ſpacium AC poteſt, ex binis medijs primam eſſe. Quoniam enim AD eſt ex binis nominibus ſecunda, diuidatur in nomina ad punctum E, ita vt AE ſit maius nomen. ergo AE ED rationales ſunt potẽtia ſolum cõmenſurabiles: & AE plus poteſt quàm ED quadrato rectę lineę ſibi longitudine cõmenſurabilis: & minus nomen ED commenſurabile eſt ipſi AB longitudine. ſecetur ED bifariam in F: & quadrato ipſius EF æquale parallelogrammum ad rectam lineam AE applicetur, deficiens figura quadrata, quod ſit AGE. commenſurabilis igitur eſt AG ipſi GE lõgitudine. & per puncta G E F ipſis AB DC parallelę ducantur GH EK FL. parallelogrammo autẽ AH æquale quadratum SN conſtituatur, & parallelogrammo GK æquale quadratum NP: & ponatur ita, vt MN ſit in directum

2. diffi ſecũdarum.

18. huius.

ipſi

ipſi NX.ergo & RN ipſi NO in directum erit; & compleatur SP quadratum.manifeſtum iam eſt ex ijs,quæ demõſtrata ſunt,parallelogrammum MR medium eſſe proportionale quadratorum SN NP:& parallelogrammo EL æquale. & præterea rectã lineam MX poſſe ſpacium AC. oſtendendum igitur eſt ipſam MX ex binis medijs primam eſſe. Quoniam enim incommenſurabilis eſt AE ipſi ED longitudine, cõmenſurabilis aũt ED ipſi AB; erit AE ipſi AB longitudine incommenſurabilis. Et quoniam AG commenſurabilis eſt longitudine ipſi GE,erit AE vtrique ipſarũ AG GE lõgitudine cõmẽſurabilis.atque eſt AE rationalis.rationalis igitur & vtraque AG GE. Quòd cũ AE ſit incommenſurabilis quidem ipſi AB lõgitudine, commenſurabilis autẽ vtrique ipſarum AG GE, erunt AG GE ipſi AB longitudine incommenſurabiles. quare BA, AG, GE rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles. medium igitur eſt vtrumque parallelogrammorum AHGK. & ob id vtrumque quadratorum SN NP eſt medium.ergo rectæ lineæ MN NX mediæ ſunt.



rurſus quoniam commenſurabilis eſt AG ipſi GE longitudine, erit parallelogrammum AH parallelogrammo GK commenſurabile, hoc eſt quadratum SN ipſi NP, hoc eſt quadratum ex MN quadrato ex NX.ergo MN NX potentia commenſurabiles ſunt.& quoniam incommenſurabilis eſt AE ipſi ED longitudine: & AE quidem eſt commenſurabilis ipſi AG;ED vero ipſi EF:erit AG ipſi EF longitudine incommenſurabilis.quare & parallelogrammum AH incommenſurabile parallelogrammo EL,hoc eſt SN ipſi MR,hoc eſt ON ipſi NR, hoc eſt MN ipſi NX incommenſurabilis eſt longitudine.oſtenſæ autem ſunt MN NX & mediæ,& potentia commenſurabiles.ergo MN NX mediæ ſunt,potentia ſolum commenſurabiles.Dico & rationale continere.Quoniam enim DE ponitur commẽſurabilis vtrique ipſarum AB EF. erit FE ipſi EK longitudine commenſurabilis:atque eſt rationalis vtraque ipſarum, rationale igitur eſt & parallelogrammum EL, hoc eſt MR. eſtq; MR,quod MN NX continetur. ſi autem duæ mediæ potentia ſolum commenſurabiles componantur, quæ rationale contineant;tota irrationalis eſt, quæ ex binis medijs prima appellatur.ergo MX ex binis medijs eſt prima,quod demonſtrare oportebat.

In antecedẽti lemmate.

Ex demonſtratis in antecedente.

37. huius.

14. huius.

16. huius.

6. diffi.

24. huius.

22. huius.

Ex demonſtratis ad 14 huius.

2. huius.

20 huius.

38. huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit AB 6, AD ℞ 12 plus 3. erit EF vel FD 1 $\frac{1}{2}$: & ſi ad AE applicetur parallelogrammũ æquale quadrato ipſius EF, deficiens figura quadrata; erit AG ℞ 6 $\frac{3}{4}$ GE ℞ $\frac{3}{4}$. parallelogrammum igitur AH eſt ℞ 243, GK ℞ 27, & EL 9: & totum AC parallelogrammum ℞ 432 plus 18. vt autem inueniatur eius radix, diuidemus ℞ 432 in duas partes, ita vt quod ex ipſis producitur ſit æquale quartæ parti quadrati 18, hoc eſt æquale 81. erit ex iam dictis maior pars ℞ 108 plus ℞ 27: quæ duæ radices ſi inter ſe componantur facient ℞ 243. minor autem pars erit ℞ 108 minus ℞ 27. & detracta ℞ 27 à ℞ 108 relinquitur ℞ 27. maior igitur pars eſt ℞ 243, & minor ℞ 27. quare ſpacij binomialis ℞ 432 plus 18 radix erit ℞℞ 243 plus ℞℞ 27.

THEOREMA XXXIX. PROPOSITIO LVII.

Si ſpacium contineatur rationali,& ex binis nominibus tertia, recta linea ſpacium potens irrationalis eſt, quæ appellatur ex binis medijs ſecunda.

Spacium

Spacium enim ABCD contineatur rationali AB, & ex binis nominibus tertia AD. diuidatur in nomina ad punctum E, quorum maius sit AE. Dico rectam lineam, quę potest spacium AC irrationalem esse, quę ex binis medijs secũda appellatur. construantur enim eadem, quæ supra. & quoniam AD ex binis nominibus tertia est, erunt AE ED rationales potentia solum commensurabiles, & AE plus poterit, quàm ED quadrato rectę lineæ sibi commensurabilis longitudine: neutraq; ipsarum AE, ED ipsi AB longitudine erit commensurabilis. similiter ostẽdemus MX eam esse, quæ spacium AC potest, & MN NX ex binis esse medijs. itaque ostendendum est & secundam esse. Quoniam enim DE incommensurabilis est longitudine ipsi AB, hoc est ipsi EK; atque est DE commensurabilis EF: erit EF ipsi EK longitudine incommensurabilis. & sunt rationales. ergo FE EK rationales sunt potentia solum commensurabiles: & ob id EL, hoc est MR medium est, quod MN NX continetur. quare MX ex binis medijs est secunda.



diffi. 3 secundarum.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit AB 6, AD ℞ 18 plus ℞ 10. erit EF ℞ 2 ½: & si ad AE applicetur parallelogrammũ AGE aequale quadrato ipsius EF, deficiens figura quadrata, erit AG ℞ 12½ GE ½. quare parallelogrammum AH est ℞ 450, GK ℞ 18, & EL ℞ 90: & totum parallelogrammum AC est 648 plus ℞ 360. Diuidatur ℞ 648 in duas partes, ita vt quod ipsis continetur sit aequale quartę parti quadrati ℞ 360, hoc est 90. erit maior pars ℞ 450, & minor ℞ 18. spacij igitur bino mialis ℞ 648 plus ℞ 360 radix est ℞℞ 450 plus ℞℞ 18.

THEOREMA XL. PROPOSITIO LVIII.

Si spacium contineatur rationali, & ex binis nominibus quarta, recta linea spacium potens irrationalis est, quæ vocatur maior.

Spacium enim AC contineatur rationali AB, & ex binis nominibus quarta AD, diuisa in nomina ad punctum E, quorum AE sit maius: Dico rectam lineam, quæ spacium AC potest, irrationalem esse, quæ maior appellatur. Quoniam enim AD ex binis nominibus est quarta, erunt AE ED rationales potentia solum commensurabiles: & AE plus poterit, quàm ED quadrato rectæ lineæ sibi longitudine incommensurabilis: & AE ipsi AB commensurabilis erit longitudine. diuidatur DE bifariam in F: & quadrato ipsius EF æquale parallelogrammum ad AE applicetur, deficiens figura quadrata, quod sit AGE. erit igitur AG ipsi GE longitudine incommen-



diffi. 4. secundarum.

19. huius.

ſurabilis. Ducãtur ipſi AB parallelę GH EK FL. & eadem fiãt, quę ſupra. conſtat igitur MX poſſe ſpacium AC. itaque oſtendendum eſt MX irrationalem eſſe, quæ vocatur maior. Quoniã enim AG ipſi GE incommenſurabilis eſt lõgitudine, erit & AH parallelogrammum ipſi GK incommẽſurabile, hoc eſt SN ipſi NP. ergo MN NX potentia incommenſurabiles ſunt. & quoniam AE ipſi AB longitudine eſt commenſurabilis, parallelogrammum AK rationale eſt. atque eſt æquale quadratis ipſarum MN NX. ergo compoſitũ ex quadratis MN NX eſt rationale. quòd cum DE ſit incommenſurabilis longitudine ipſi AB, hoc eſt ipſi EK; ſit autem commenſurabilis ipſi EF: erit EF ipſi EK incommenſurabilis longitudine. quare KE EF rationales ſunt potentia ſolũ commenſurabiles: & ob id medium eſt parallelogrammum EL, hoc eſt MR, & MN NX continetur: eſtq; compoſitum ex quadratis ipſarum MN NX rationale: & MN ipſi NX potentia incommenſurabilis. ſi autem duæ rectæ lineæ potentia incommenſurabiles componantur, facientes compoſitum quidem ex ipſarum quadratis rationale, quod autem ipſis continetur medium; tota irrationalis erit. vocetur autem maior. ergo MX irrationalis eſt, quæ maior appellatur, & poteſt ſpacium AC. quod demonſtrare oportebat.





20. huius.

40. huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit AB 6. AD 6 plus R 24. erit EF R 6. ſi autem ad AE applicetur parallelogrammum AG E æquale quadrato ipſius EF, et deficiẽs figura quadrata; erit AG 3 plus R 3, & GE 3 minus R 3. ergo AH parallelogrammũ eſt 18 plus R 108, GK 18 minus R 108, & EL vel FC R 216, totumq; parallelogrammum AC 36 plus R 864. itaque ſi diuidamus 36 in duas partes, ita vt productum ex ipſis ſit æquale 216, erit maior pars 18 plus R 108, & minor 18 minus R 108. quare ſpacij binomialis 36 plus R 864 radix eſt R V. 18 plus R 108 plus R V. 18 minus R 108.

THEOREMA XLI. PROPOSITIO LIX.

Si ſpacium contineatur rationali, & ex binis nominibus quinta, quæ ſpacium poteſt recta linea irrationalis eſt, vocatúrq; rationale, & medium potens.





Spacium. m AC cõtineatur rationali AB, & AD exbinis nominibus quinta, quę diuidatur in nomina ad pũctũ E, ita vt maius nomẽ ſit AE. Dico rectam lineã, quę põtſpaciũ AC, irrationalẽ eſſe, quę vocatur rationale, ac mediũ potens. conſtruãtur enim eadem, quæ ſupra. manifeſtũ eſt MX poſſe ſpacium AC. itaque oſtẽdere oportet MX irrationalem eſſe, quæ rationale, ac medium poteſt. Quoniã enim AG ipſi GE incommenſurabilis eſt longitudine, & parallelogrammum AH eſt incommenſurabile

19. huius.

mensurabile parallelogrammo HE, hoc est quadratū ex MN quadrato ex NX. ergo MN NX potentia incōmensurabiles sunt. Quòd cū AD sit ex binis nominibus quinta; sitq; minor ipsius portio ED; erit ED ipsi AB cōmēsurabilis longitudine. sed AE ipsi ED est incommensurabilis. ergo & AB incommensurabilis est longitudine ipsi AE; ac propterea BA AE rationales sunt potentia solum commensurabiles. medium igitur est AK, hoc est compositum ex quadratis ipsarum MN NX. & quoniam DE commensurabilis est longitudine ipsi AB, hoc est ipsi EK; estq; DE commensurabilis ipsi EF: erit & FE ipsi EK commensurabilis. rationalis autem est EK. ergo & FE est rationalis, & parallelogrammum EL rationale, hoc est MR, hoc est quod MN NX continetur. quare MN NX potentia incommensurabiles sunt, facientes compositum quidem ex ipsarum quadratis medium: quod autem ipsis continetur, rationale. ergo MX potens est rationale, ac medium, & potest spacium AC. quod demōstrare oportebat.

Diff. 5. secundarum.

21. huius.

22. huius.

20. huius.

P. C. COMMENTARIVS.

Sit AB 6, AD R 24 plus 4, erit EF 2. applicetur ad AE parallelogrammum AGE aequale quadrato ipsius EF, deficiēs figura quadrata; erit AG R 6 plus R 2, GE R 6 minus R 2; parallelogrammumq; AH R 216 plus R 72; GK R 216 minus R 72; EL 12: & totum AC parallelogrammum R 864 plus 24. si igitur diuidamus R 864 in duas partes, vt id, quod ex ipsis producitur, sit æquale 144, erit maior pars R 216 plus R 72, & minor R 216 minus R 72. quare spacij binomialis R 864 plus 24 radix est R V. R 216 plus R 72 plus R V. R 216 minus R 72.

THEOREMA XLII. PROPOSITIO. LX.

Si spacium contineatur rationali, & ex binis nominibus sexta, quæ spacium potest recta linea irrationalis est: vocaturq; bina media potens.

Spacium enim ABCD contineatur rationali AB, & ex binis nominibus sexta AD; quæ diuidatur in nomina ad punctum E, ita vt AE sit maius nomen. Dico rectam lineam, quæ potest spacium AC, irrationalem esse, quæ vocatur bina media potens. construantur enim eadem, quę supra, manifestū est MX posse spacium AC. & MN ipsi NX potentia incommensurabilem esse. Et quoniam EA ipsi AB incommensurabilis est longitudine, erunt EA AB rationales potentia solum commensurabiles. medium igitur est AK, hoc est compositum ex quadratis ipsarū MN NX. Rursus quoniam incōmensurabilis est ED ipsi AB longitudine, erit & FE ipsi EK longitudine incommensurabilis. ergo & FE EK rationales sunt potentia solum commensurabiles; ac propterea medium est EL, hoc est MR, hoc est quod MN NX continetur. Quòd cum AE sit incommensurabilis ipsi EF, & parallelogrammum AK parallelogrammo EL incōmensurabile erit. Sed AK quidem est cōpositū ex quadratis ipsarū MN NX; EL vero est quod MN, NX continetur. incommensurabile igitur est compositum ex quadratis ipsarum MN NX ei, quod MN NX continetur. atque est vtrumque ipsorum medium; & MN NX potentia sunt incommensurabiles. ergo MX est bina media potens, & potest spacium AC. quod demonstrare oportebat.



A

B

C

D

F. C. COMMENTARIVS.

A Rursus quoniam incõmensurabilis est ED ipsi ab longitudine, erit & FE ipsi EK longitudine incommensurabilis] *Quoniam enim ED ipsi AB incommensurabilis est longitudine; atque est FE commensurabilis ED; erit ex 13 huius etiam FE ipsi AB, hoc est ipsi EK longitudine incommensurabilis.*

B Quòd cum AE sit incommensurabilis ipsi EF] *Ex 13 huius. est enim AE ipsi ED incommensurabilis, & EF commensurabilis ipsi ED.*

C Et MN NX potentia sunt incommensurabiles] *Nam cum AG sit incommensurabilis ipsi GE longitudine, erit AH parallelogrammum parallelogrammo HE, hoc est quadratũ ex MN quadrato ex NX incommensurabile. ergo MN NX potentia incommensurabiles sunt.*

C Ergo MX est bina media potens] *Ex 42 huius.*

D *Sit AB* 5, *AD* R 10 *plus* R 8. *erit EF* R 2. *si igitur ad AE applicetur parallelogrammum AGE, aequale quadrato ipsius EF, quod deficiat figura quadrata, erit AG* R 2 $\frac{1}{2}$ *plus* R $\frac{1}{2}$, *GE* R 2 $\frac{1}{2}$ *minus* R $\frac{1}{2}$ *& parallelogrammum AH* R 62 $\frac{1}{2}$ *plus* R 12 $\frac{1}{2}$, *GK* R 62 $\frac{1}{2}$ *minus* R 12 $\frac{1}{2}$, *et EL* R 50: *totumq; AC parallelogrammum* R 250 *plus* R 200. *Diuidatur* R 250 *in duas partes, ita vt quod ex ipsis producitur sit aequale* 50; *erit maior pars* R 62 $\frac{1}{2}$ *plus* R 12 $\frac{1}{2}$, *& minor* R 62 $\frac{1}{2}$ *minus* R 12 $\frac{1}{2}$. *Eius igitur spacij binomialis* R 250 *plus* R 200 *radix est V.* R 62 $\frac{1}{2}$ *plus* R 12 $\frac{1}{2}$ *plus* R 62 $\frac{1}{2}$ *minus* R 12 $\frac{1}{2}$.

LEMMA.

Si recta linea in partes inæquales secetur, ipsarum partium quadrata maiora sunt rectangulo, quod bis dictis partibus continetur.



Sit recta linea AB, & secetur in puncto C, ita vt AC sit maior, quàm CB. Dico quadrata ex AC CB maiora esse rectangulo, quod bis AC CB continetur. secetur enim AB bifariam in D. & quoniam recta linea AB in partes quidem æquales secatur ad D; in partes vero inæquales ad C, rectangulum, quod AC CB continetur vnà cum quadrato ipsius CD est æquale ei, quod fit ex AD quadrato. ergo rectangulũ ACB quadrato ex AD est minus. quod igitur bis continetur AC CB minus est quàm duplum quadrati ex AD. sed quadrata ex AC CB dupla sunt quadratorum ex AD DC. ergo quadrata ex AC CB maiora sunt eo, quod bis AC CB continetur. quod demonstrare oportebat.

5. secundi.

F. C. COMMENTARIVS.

✻ Ergo quadrata ex AC CB maiora sunt eo, quod bis AC CB continetur] *Quoniam enim quadrata ex AC CB dupla sunt quadratorum ex AD DC, erunt quadrata ex AC CB maiora, quàm dupla quadrati ex AD. sed quod bis continetur AC CB minus est, quàm duplum quadrati ex AD. quadrata igitur ex AC CB multo maiora sunt eo, quod bis AC CB continetur.*

THEOREMA XLIII. PROPOSITIO. LXI.

Quadratum eius, quæ est ex binis nominibus ad rationalem applicatum latitudinem facit ex binis nominibus primam.

Sit ex binis nominibus AB, diuisa in nomina ad punctum C, ita vt AC sit maius nomen: exponaturq; rationalis DE; & quadrato rectæ lineæ AB æquale ad ipsam DE applicetur parallelogrammum DEFG, latitudinem faciens DG. Dico DG ex binis nominibus primam esse. Applicetur enim ad rationalem DE quadrato quidem ipsius AC æquale parallelogrammum DH: quadrato autem ipsius BC æquale KL.

reliquum

reliquum igitur, quod bis AC CB continetur eſt æquale parallelogrammo MF. ſecetur MG bifariã in N: & alterutri ipſarum ML GF parallela ducatur NX. vtrumque igitur parallelogrammorum MX NF eſt æquale ei, quod ſemel AC CB continetur. Et quoniam ex binis nominibus eſt AB, diuiſa in nomina ad punctum C, erunt AC CB rationales potentia ſolum commenſurabiles. ergo quadrata ex AC CB rationalia ſunt, & commenſurabilia inter ſe ſe: & ob id compoſitum ex quadratis ipſarum AC CB commenſurabile eſt earumdem AC CB quadratis. rationale igitur eſt compoſitũ ex quadratis AC CB, atque eſt æquale parallelogrammo DL. ergo & DL eſt rationale, & ad rationalem DE applicatum eſt. rationalis igitur eſt DM, & ipſi DE commenſurabilis longitudine. Rurſus quoniam AC CB rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles, medium eſt, quod bis AC CB continetur, hoc eſt MF, & ad rationalem ML applicatum eſt. rationalis igitur eſt MG, & ipſi ML hoc eſt ipſi ED longitudine incommenſurabilis. eſt autem & MD rationalis, & ipſi DE commenſurabilis longitudine. ergo DM ipſi MG longitudine eſt incommenſurabilis. ſuntq; rationales. ergo DM MG rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles, ac propterea DG eſt ex binis nominibus. oſtendendum eſt & primam eſſe. Quoniam enim quadratorum ex AC CB medium proportionale eſt, quod AC CB continetur; erit etiam parallelogrammorum DH KL medium proportionale MX. eſt igitur vt DH ad MX, ita MX ad KL, hoc eſt vt recta linea DK ad MN, ita MN ad MK. ergo rectangulum DKM quadrato ex MN eſt æquale. Et quoniam quadratum ex AC commẽſurabile eſt quadrato ex CB, erit & parallelogrammum DH parallelogrammo KL commenſurabile. ergo & DK ipſi KM longitudine eſt commenſurabilis. quòd cum quadrata ex AC CB maiora ſint eo, quod bis AC CB continetur; erit & parallelogrammum DL maius parallelogrammo MF: ideoq; recta linea DM ipſa MG eſt maior. atque eſt rectangulum DKM æquale quadrato ex MN, hoc eſt quartæ parti quadrati ex MG. & DK ipſi KM longitudine eſt commenſurabilis. ſi autem ſint duæ rectæ lineę inæquales, & quartæ parti quadrati minoris æquale parallelogrammum ad maiorem applicetur, deficiens figura quadrata, & in partes cõmenſurabiles ipſam diuidat, maior plus poterit, quàm minor quadrato rectæ lineæ ſibi commenſurabilis longitudine. ſuntq; rationales DM MG, & DM, quæ eſt maius nomen expoſitæ rationali DE longitudine eſt commenſurabilis. ergo DG eſt ex binis nominibus prima. quod demonſtrare oportebat.



4. ſecundi
37. huius.
16. huius.
6. diffi.
23. huius.
13. huius.
Ex lemmate ad 55. huius.
1. ſexti.
17. ſexti.
1. ſexti.
10. huius.
Ex antecedentium.
1. ſexti.
14. quinti.
19. huius.
1. diffi. ſecũdarum.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit AB R 15 plus R 5, & DE 5. erit DH 15 KL 5, & MX R 75 & NF R 75. quare ſi ad DE applicetur DH latitudinem faciet DK 3: & ſi applicetur KL faciet KM 1. Quòd ſi ad eandẽ applicetur MX, videlicet R 75 faciet latitudinẽ MN R 3 ex 2 theoremate eorum, quæ ad 20 huius conſcripſimus. et ſimiliter NG erit R 3. ergo tota DG eſt 4 plus R 12, quæ eſt ex binis nominibus prima.

THEOREMA XLIIII. PROPOSITIO LXII.

Quadratum eius, quę eſt ex binis medijs prima ad rationalem applicatum latitudinem facit ex binis nominibus ſecundam.

Sit ex binis medijs prima AB, diuiſa in medias ad pũctum C, quarum AC ſit maior: exponaturq; rationalis DE, & ad ipſam applicetur parallelogrammum æquale quadrato

quadrato ipſius AB, quod ſit DF, latitudinem faciēs DG. Dico DG ex binis nominibus ſecundā eſſe. Cōſtruantur enim eadem, quę ſupra. & quoniam AB ex binis medijs eſt prima, diuiſa ad pūctum C, erunt AC CB mediæ potentia ſolum cōmenſurabiles, quæ rationalem continent. quare & quę fiunt ex AC CB media ſunt; ideoq; DL eſt medium, quod ad rationalem applicatū eſt. rationalis igitur eſt MD, & ipſi DE longitudine incommenſurabilis. Rurſus quoniam rationale eſt quod bis AC CB continetur, erit & MF rationale, & ad rationalem ML applicatum eſt. ergo & MG eſt rationalis; & ipſi ML, hoc eſt ipſi DE commenſurabilis longitudine. incommenſurabilis igitur eſt DM ipſi MG, & ſunt rationales. quare DM MG rationales ſunt potētia ſolum commenſurabiles; ac propterea DG eſt ex binis nominibus. oſtendēdum eſt & ſecundam eſſe. Quoniam enim quadrata ex AC CB maiora ſunt eo, quod bis AC CB continetur, erit & DL parallelogrammum parallelogrammo MF maius. ergo & recta linea DM maior eſt ipſa MG. Quòd cum quadratum ex AC quadrato ex CB ſit commenſurabile, & DH parallelogrammum parallelogrammo KL commenſurabile erit. quare & DK commenſurabilis ipſi KM: atque eſt quod DK KM cōtinetur quadrato ipſius MN æquale. ergo DM plus poteſt, quàm MG quadrato rectæ lineæ ſibi longitudine commenſurabilis. eſtq; MG commenſurabilis longitudine ipſi DE. quare DG ex binis nominibus eſt ſecunda.



38. huius.
83. huius.
21. huius.
23. huius,
37. huius.
Ex lem. ad 61. huius.
1. sexti
14. quinti
39. huius,
2. diffi. secūdarum.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit AB RR 48 *plus* RR 27, *et DE erit DH* R 48, *KL* R 27, *MX, et NF* 6. *ergo ſi ad DE applicetur DH, faciet DK* R 3 *ex* 2 *theoremate iam dicto, et eadem ratione ſi ad eandem applicetur KL, erit KM* R 1 $\frac{11}{16}$ *et ſi applicetur MX vel NF, erit MN, vel NG* 1 $\frac{1}{2}$ *et quoniam DK-KM hoc eſt* R 3, R 1 $\frac{11}{16}$ *longitudine cōmenſurabiles ſunt, ſi inter ſe componantur, erit ex tertio theoremate eorum, quae nos ad* 20 *huius apposuimus, DM* R 9 $\frac{3}{16}$ *ergo tota DG eſt* R 9 $\frac{3}{16}$ *plus* 3 *videlicet ex binis nominibus ſecunda.*

THEOREMA XLV. PROPOSITIO. LXIII.

Quadratum eius, quę eſt ex binis medijs ſecunda ad rationalem applicatum latitudinem facit ex binis nominibus tertiam.

Sit ex binis medijs ſecunda AB, diuiſa in medias ad C, ita vt AC ſit maior portio. rationalis autem ſit DE: & ad ipſam DE quadrato ex AB æquale parallelogrammum DF applicetur, latitudinem faciens DG. Dico DG ex binis nominibus tertiam eſſe. Conſtruantur enim eadem, quę ſupra. & quoniā AB eſt ex binis medijs ſecūda, diuiſa ad punctū C, erunt AC CB mediæ potentia ſolum commenſurabiles, quæ medium contineant. ergo & compoſitum ex ipſarum AC CB quadratis medium eſt, & ipſi DL æquale. medium igitur eſt DL, & ad rationalem DE applicatur. ergo rationalis eſt MD, & ipſi DE longitudine incommenſurabilis. Eadem ratione, & MG eſt rationalis, & incommenſurabilis ipſi ML, hoc eſt ipſi DE. vtraque igitur ipſarum



39. huius. A
23. huius.

DM

DM MG rationalis est, & ipsi DE longitudine incommensurabilis. & quoniam incommensurabilis est AC ipsi CB longitudine; vt autem AC ad CB, ita quadratum ex AC ad rectangulum ACB: erit & quadratum ex AC rectangulo ACB incommensurabile. ergo & compositum ex quadratis AC CB incommensurabile est ei, quod bis AC CB connetur; hoc est DL incommensurabile ipsi MF. et ob id recta linea DM ipsi MG est incommensurabilis: suntq; rationales. ergo DG est ex binis nominibus. ostendendū est et tertiā esse. similiter enim concludemus DM ipsa MG maiorem esse, et DK ipsi KM commensurabilem. atque est rectangulum DKM quadrato ipsius MN æquale. ergo DM plus potest, quàm MG, quadrato rectę lineæ sibi incommensurabilis longitudine; et neutra ipsarum DM MG est longitudine commensurabilis ipsi DE. quare DG est ex binis nominibus tertia.



1. sexti, uel ex lemm. ad 23. huius: B

1. sexti. & 10. huius.

37 huius.

19. huius.

3. diffi. secundarum.

F. C. COMMENTARIVS.

Ergo et compositum ex ipsarum AC CB quadratis medium est.] *Ex duobus enim mediis commensurabilibus, si inter se componantur, vnum fit medium, vt in 45 huius diximus.* A

Ergo et compositum ex quadratis AC CB incommensurabile est ei, quod bis AC CB continetur.] *Nam cum quadrata ex AC CB commensurabilia sint, si inter se componantur, erit compositum commensurabile quadrato ex AC per 16 huius. quod autem bis continetur AC CB rectangulo ACB est incōmensurabile, vt pote eius duplum. ergo ex ijs, quae nos ad 14 huius demonstrauimus, compositum ex quadratis AC CB incommensurabile est ei, quod bis AC CB continetur.* B

Sit AB RR 72 *plus* RR 8, *et DE* 4. *erit DH* R 72, *KL* R 8, *MX, vel NF* R 24. *quare si ad DE applicetur DH, latitudinem faciet DK* R 4 $\frac{1}{2}$: *si vero applicetur KL faciet KM* R $\frac{1}{2}$. *et si MX, vel NF faciet MN, vel NG* R 1 $\frac{1}{2}$. *At si DK KM componantur, hoc est* R 4 $\frac{1}{2}$, *&* R $\frac{1}{2}$ *fiet DM* R 8. *tota igitur DG est* R 8 *plus* R 6, *quae est ex binis nominibus tertia.*

THEOREMA XLVI. PROPOSITIO LXIIII.

Quadratum maioris ad rationalem applicatum latitudinem facit ex binis nominibus quartam.

Sit maior AB, diuisa in puncto C, ita vt AC maior sit quā CB. rationalis autem quędam sit DE: & quadrato ex AB æquale ad ipsam DE applicetur parallelogrammum DF, latitudinem faciens DG. Dico DG ex binis nominibus quartā esse. Construantur enim eadem, quæ supra. Et quoniam maior est AB, diuisa in C, erunt AC CB potentia incommensurabiles, quæ faciunt cōpositum quidem ex ipsarum quadratis rationale, quod autem ipsis continetur medium. itaque quoniam rationale est compositum ex quadratis ipsarum AC CB, erit & parallelogrammum DL rationale. ergo & rationalis est recta linea DM, ipsiq; DC longitudine commensurabilis. Rursus quoniam medium est quod bis AC CB continetur, hoc est MF, & ad rationalē ML est applicatum; erit et MG rationalis, & ipsi DE incommensurabilis longitudine. ergo & DM ipsi MG longitudine incommensurabilis est; ac propterea DM MG rationales



40. huius.

41. huius.

23 huius.

37.huius. rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles. quare ex duobus nominibus eſt DG. oſtendendum eſt & quartam eſſe. ſimiliter enim ſuperioribus cõcludemus DM maiorem eſſe, quàm MG: et rectãgulum DKM quadrato ex MN æquale. Quoniam igitur quadratum ex AC incõmenſurabile eſt quadrato ex CB, erit et DH parallelogrammum incõmenſurabile parallelogrãmo KL. et ob id recta linea DK ipſi KM incõmenſurabilis. ſi aũt ſint duæ rectæ lineę inæquales, & quartæ parti quadrati minoris æquale parallelogrãmũ ad maiorẽ applicetur, deficiens figura quadrata, quod in partes incommenſurabiles longitudine ipſam diuidat; maior plus poterit, quàm minor quadrato rectę lineæ ſibi longitudine incommenſurabilis. ergo DM plus poteſt, quàm MG, quadrato rectæ lineę ſibi incommenſurabilis longitudine. ſuntq; DM MG rationales potentia ſolum commenſurabiles: atque eſt DM commenſurabilis expoſitæ rationali DE. quare DG eſt ex binis nominibus quarta.

1. ſexti & 10. huius.

19 huius.

4. diffi. ſecundarum.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit AE ℞ V. 10 plus ℞ 37 ½ plus ℞ V. 10 minus ℞ 37 ½: et DE ſit 5. erit DH 10 plus ℞ 37 ½: KL 10 minus ℞ 37 ½: MX, vel NF ℞ 62 ½. itaque ſi ad DE applicetur DH latitudinem faciẽs DK, erit DK 2 plus ℞ 1 ½: ſi vero applicetur KL faciens KM, erit ea 2 minus ℞ 1 ½: & ſi applicetur MX, vel NF, erit MN, vel NG ℞ 2 ½. Quòd ſi componantur DK KM, hoc eſt 2 plus ℞ 1 ½, & 2 minus ℞ 1 ½, ſiet DM 4. ergo tota DG eſt 4 plus ℞ 10. videlicet ex binis nominibus quarta.

THEOREMA XLVII. PROPOSITIO. LXV.

Quadratum eius, quæ rationale, ac medium poteſt ad rationalem applicatum latitudinem facit ex binis nominibus quintam.



Sit rationale, ac medium potens A B, diuiſa in rectas lineas ad punctum C, ita vt AC ſit maior. exponaturq; rationalis DE, & quadrato ipſius A B æquale parallelogrammum D F ad ipſã DE applicetur, latitudinem faciens D G. Dico DG ex binis nominibus quintam eſſe. Conſtruãtur enim eadem, quæ ſupra. Et quoniam rationale, ac medium potens eſt AB, diuiſa ad C punctum, erunt AC CB potentia incommenſurabiles, quę faciunt compoſitum quidem ex ipſarum quadratis medium, quod autem ipſis continetur rationale. quoniam igitur medium eſt compoſitum ex ipſarum AC CB quadratis, erit & parallelogrãmum DL medium: ideoq; recta linea DM rationalis eſt, & ipſi DE longitudine incommenſurabilis. Rurſus quoniam rationale eſt, quod bis AC CB continetur, hoc eſt parallelogrammum MF; erit MG rationalis, & ipſi DE longitudine commenſurabilis. incommenſurabilis igitur eſt DM ipſi MG. quare DM MG rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles; ac propterea DG eſt ex binis nominibus. Dico & quintam eſſe. ſimiliter enim demõſtrabitur, rectangulum DKM quadrato ex MN eſſe æquale; & DK ipſi KM longitudine eſſe incommenſurabilem. quare DM plus poteſt, quàm M G quadrato rectæ lineę ſibi incommenſurabilis longitudine: ſuntq; DM MG rationales, potẽtia ſolum commenſurabiles; & minor MG commenſurabilis eſt ipſi DE lõgitudine. ergo DG eſt ex binis nominibus quinta.

61. huius.

23. huius.

21. huius.

13. huius.

5. diffi ſecundarum.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit ab R *V.* R 125 *plus* 5, *plus* R *V.* R 125 *minus* 5; *& DE sit* 5. *erit parallelogrammũ DH* R 125 *plus* 5; *KL* R 125 *minus* 5; *MX vel NF* 10: *& si ad DE applicetur parallelogrammum DH latitudinem faciens DK, erit DK* R 5 *plus* 1. *si vero applicetur KL latitudinẽ faciens KM, erit KM* R 5 *minus* 1. *& si applicetur MX uel NF, erit MN, vel N G* 2. *quòd si componantur DK KM videlicet* R 5 *plus* 1, R 5 *minus* 1, *fiet DM* R 20. *tota igitur DG est* R 20 *plus* 4. *nimirum ex binis nominibus quint..*

THEOREMA XLVIII. PROPOSITIO LXVI.

Quadratum eius, quæ bina media potest, ad rationalem applicatum latitudinem facit ex binis nominibus sextam.

Sit bina media potens A B, diuisa ad punctum C: rationalis autem sit D E: & ad ipsam DE quadrato ex AB æquale parallelogrammum DF applicetur, latitudinem faciens DG. Dico DG ex binis nominibus sextam esse. Construantur enim eadem quę supra. Et quoniam bina media potens est AB, diuisa ad C, erũt AC CB potentia incommensurabiles, facientes & compositum ex ipsarum quadratis medium: & quod ipsis continetur medium; & adhuc incommẽsurabile composito ex quadratis ipsarum. ergo ex iam demonstratis medium est vtrumque parallelogrammorum DL MF: & ad rationalem DE applicata sunt. rationalis igitur est & vtraquę DM MG, & ipsi DE longitudine incommensurabilis. & quoniam compositum ex ipsarum AC CB quadratis incommensurabile est ei, quod bis AC CB continetur; erit & DL parallelogrammum parallelogrammo MF incommensurabile: & idcirco DM incommensurabilis MG. quare DM MG rationales sunt potentia solum commensurabiles, & ex binis nominibus est D G. Dico & sextam esse. similiter enim prædictis rursus ostendemus rectãgulum DKM quadrato ex M N æquale, & DK ipsi KM longitudine incommensurabilem esse. ergo DM plus potest, quàm MG quadrato rectæ lineę sibi incommensurabilis longitudine: & neutra ipsarum DM MG longitudine commensurabilis est expositę rationali DE. quare DG ex binis nominibus est sexta.



42. huius.

43. huius.

19. huius.

6. diffi. secundarum.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit AB R *V.* R 252 *plus* R 72, *plus* R *V.* R 252 *minus* R 72: *& DE sit* 6. *erit DH* R 252 *plus* R 72: *KL* R 252 *minus* R 72: *MX, vel NF* R 180. *applicetur ad DE parallelogrammũ DH latitudinem faciens D K. erit D K* R 7 *plus* R 2. *Rursus applicetur K I faciens latitudinem KM. erit KM* R 7 *minus* R 2. *denique applicetur MX, vel NF. erit MN, vel NG* R 5. *ergo tota DG est* R 28 *plus* R 20 *ex binis nominibus sexta.*

THEOREMA XLIX. PROPOSITIO LXVII.

Ei, quæ est ex binis nominibus longitudine commensurabilis, & ipsa ex binis nominibus est, atque ordine eadem.



Sit ex binis nominibus AB, & ipſi AB longitudine commenſurabilis ſit CD. Dico CD ex binis nominibus eſſe, & ordine eandem ipſi AB. quoniam enim ex binis nominibus eſt AB, diuidatur in nomina ad punctum E, & ſit AE maius nomen. ergo AE EB rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles. fiat vt AB ad CD, ita AE ad CF: & reliqua igitur EB ad reliquam FD eſt, ut AB ad CD. commenſurabilis autem eſt AB ipſi CD longitudine. ergo & AE ipſi CF, & EB ipſi FD longitudine eſt commenſurabilis. ſuntq; rationales AE EB. rationales igitur ſunt & CF FD. & quoniam eſt vt AE ad CF, ita EB ad FD, erit permutando ut AE ad EB, ita CF ad FD: ſunt autem AE EB potentia ſolum commenſurabiles. ergo & CF FD potentia ſolum cõmenſurabiles erunt. & ſunt rationales. ex binis igitur nominibus eſt CD. Dico & ipſi AB ordine eandẽ eſſe. uel enim AE plus poteſt, quàm EB quadrato rectæ lineæ ſibi longitudine commenſurabilis, uel incommenſurabilis. ſi quidem commenſurabilis, & CF plus poterit, quàm FD quadrato rectę lineæ ſibi commenſurabilis longitudine. Quòd ſi AE ſit commenſurabilis expoſitæ rationali, & CF eidem commenſurabilis erit. & ob id vtraque ipſarum A B CD ex binis nominibus eſt prima; hoc eſt ordine eadem. Si vero EB ſit commenſurabilis expoſitę rationali, & FD eidem erit commẽſurabilis. ob eamq; cauſſam CD ipſi AB ordine eadem eſt; vtraque enim eſt ex binis nominibus ſecunda. quòd ſi neutra ipſarum AE EB ſit expoſitę rationali commenſurabilis, & neutra CF FD eidem commenſurabilis erit; & eſt vtraque tertia. At ſi AE plus poſſit, quàm EB quadrato rectæ lineæ ſibi incommenſurabilis longitudine, & CF plus poterit, quàm FD quadrato rectæ lineę ſibi longitudine incommenſurabilis: & ſi AE ſit commenſurabilis expoſitæ rationali, & CF eidem commenſurabilis erit, & eſt vtraque quarta. quòd ſi EB, & ipſa FD, & eſt vtraque quinta. ſi vero neutra ipſarũ AE EB, & neutra CF FD expoſitę rationali erit cõmenſurabilis, & eſt vtraque ſexta. ergo ei, quę eſt ex binis nominibus longitudine commenſurabilis, & ipſa ex binis nominibus eſt, & ordine eadem.

11.ſexti. 19.quinti. 10.huius. 8.diffi. 10.huius. 15.huius. 12.huius. 15.huius.

THEOREMA L. PROPOSITIO LXVIII.

Ei, quę eſt ex binis medijs longitudine commenſurabilis, & ipſa ex binis medijs eſt, atque ordine eadem.



Sit ex binis medijs AB, & ipſi AB commenſurabilis longitudine ſit CD. Dico CD ex binis medijs eſſe, & ipſi AB ordine eandẽ. quoniam enim AB ex binis medijs eſt, diuiſa in medias ad punctum E, erunt AE EB mediæ potentia ſolum commenſurabiles. Itaque fiat vt AB ad CD, ita AE ad CF. ergo & reliqua EB ad reliquam FD eſt vt AB ad CD. commẽſurabilis autem eſt AB ipſi CD longitudine. quare & AE ipſi CF longitudine commenſurabilis erit, & EB ipſi FD. ſuntq; mediæ AE EB. mediæ igitur & CF FD. Et quoniã eſt vt AE ad EB, ita CF ad FD, & ſunt AE EB commenſurabiles potentia ſolum; erunt & CF FD potentia ſolum commenſurabiles. oſtenſę autem ſunt & mediæ. ergo CD eſt ex binis medijs. Dico & ipſi AB ordine eandem eſſe. Quoniam enim eſt vt AE ad EB, ita CF ad FD, erit & vt quadratum ex AE ad rectangulum AEB, ita quadratũ ex CF ad rectangulum CFD: quare permutando vt quadratum ex AE ad quadratum ex CF, ita rectangulum AEB ad CFD rectangulum. commenſurabile autem eſt quadratum ex AE quadrato ex CF. ergo & rectangulum AEB rectangulo CFD eſt commenſurabile. ſi igitur rationale eſt rectangulum AEB, & rectãgulum CFD rationale erit: atque eſt ex binis medijs prima. ſi vero medium eſt rectangulum AEB

38.huius. 12.ſexti. 19.quinti 10.huius. 24.huius.

AEB, & ipſum CFD erit medium: & eſt vtraque ex binis medijs ſecunda. ergo CD ipſi AB ordine eadem eſt. quod demonſtrare oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

Quoniam enim eſt vt AE ad EB, ſic CF ad FD, erit & ut quadratum ex AE ad rectangulum AEB, ita quadratum ex CF ad rectangulum C F D] *Nam cum ſit ut AE ad EB, ita CF ad FD; ut autem AE ad EB, ita quadratum ex AE ad AEB rectangulum ex 1 ſexti, vel ex lemmate ante 23 huius: erit ut quadratum ex AE ad AEB rectangulum, ita CF ad FD. ſed vt C F ad FD, ita quadratum ex CF ad rectangulum CFD. vt igitur quadratum ex AE ad AEB rectangulum, ita quadratum ex CF ad rectangulum CFD.* ✻ 11. quinti.

THEOREMA LI. PROPOSITIO LXIX.

Maiori commenſurabilis, & ipſa maior eſt.

Sit maior A B: & ipſi A B commenſurabilis ſit CD. Dico CD maiorem eſſe. diuidatur AB in E. ergo AE EB potentia ſunt incommenſurabiles, quę faciunt compoſitũ quidem ex ipſarum quadratis rationale; quod autem ipſis cõtinetur, medium. & fiant eadem, quæ ſupra. quoniam igitur eſt vt AB ad CD, ita AE ad CF, & EB ad FD; erit vt AE ad CF, ita EB ad FD. commenſurabilis autẽ eſt A B ipſi CD. ergo & vtraque ipſarum AE EB vtrique CF FD eſt commenſurabilis. & quoniam eſt vt AE ad CF, ita EB ad FD: permutandoq; vt AE ad EB, ita CF ad FD: & componendo vt AB ad BE, ita CD ad DF. vt igitur quadratum ex A B ad quadratũ ex B E, ita quadratum ex C D ad quadratum ex D F. ſimiliter demonſtrabimus & vt quadratum ex AB ad quadratum ex AE, ita eſſe quadratum ex C D ad quadratum ex CF. ergo & vt quadratum ex AB ad quadrata ex AE EB, ita quadratum ex CD ad quadrata ex CF FD: permutando igitur ut quadratum ex AB ad quadratum ex CD, ita quadrata ex AE EB ad quadrata ex CF FD. commenſurabile autẽ eſt quadratum ex A B quadrato ex C D. ergo & quadrata ex AE EB quadratis ex CF FD ſunt commenſurabilia. atque eſt compoſitum ex quadratis ipſarum AE EB rationale. ergo & rationale erit compoſitum ex quadratis CF FD. ſimiliter aũt & quod bis continetur AE EB commenſurabile eſt ei, quod bis CF FD continetur. atque eſt medium, quod bis continetur AE EB. medium igitur & quod bis CF FD continetur. ergo CF FD potentia ſunt incommenſurabiles, facientes compoſitum ex ipſarum quadratis rationale: quod autem ipſis cõtinetur medium. tota igitur CD irrationalis eſt, quæ vocatur maior. ergo maiori commenſurabilis & ipſa maior eſt. quod demonſtrare oportebat.



40. huius.

A B

F. C. COMMENTARIVS.

Vt igitur quadratum ex AB ad quadratum ex BE, ita quadratum ex CD ad quadratum ex DF] *Ex 22 ſexti libri.* A

Similiter demonſtrabimus & vt quadratum ex AB ad quadratum ex AE, ita eſſe quadratum ex CD ad quadratum ex CF] B

Quoniam enim eſt vt AB ad BE, ita CD ad DF, erit per conuerſionẽ rationis vt BA ad AE, ita DC ad CF. ergo ut quadratum ex AB ad quadratum ex AE, ita quadratum ex CD ad quadratum ex CF. 14. ſexti.

Ergo & quadratum ex AB ad quadrata ex AE EB, ita quadratũ ex CD ad quadrata ex CF FD] *Eſt enim vt AE ad EB, ita CF ad FD. quare vt quadratum ex AE ad quadratum ex EB, ita quadratum ex CF ad quadratum ex FD: & componendo vt quadrata ex AE EB ad quadratum ex EB, ita quadrata ex CF FD ad quadratum ex FD: conuertendoq; vt quadratum ex EB ad quadrata ex AE EB, ita quadratum ex FD ad quadrata ex CF FD. erat autẽ* C

ut quadratum ex AB ad quadratum ex BE, ita quadratum ex CD ad quadratum ex DF. ergo ex aequali ut quadratum ex AB ad quadrata ex AE EB, ita quadratum ex CD ad quadrata ex CF FD.

D Similiter autem & quod bis continetur AE EB commensurabile est ei, quod bis CF FD continetur] *Nam ex 4 secundi quadratum ex AB est aequale quadratis ex AE EB una cum eo, quod bis continetur AE EB: & eadem ratione quadratum ex CD est aequale quadratis ex CF FD una cum eo, quod bis CF FD continetur. Cum igitur sit ut totum ad totum, ita ablatum ad ablatum, videlicet ut quadratum ex AB ad quadratum ex CD, ita quadrata ex AE EB ad quadrata ex CF FD; erit & reliquum ad reliquum, ut totum ad totum, hoc est quod bis continetur AE EB ad id, quod bis CF FD continetur, ut quadratum ex AB ad quadratum ex CD, sed quadratum ex AB commensurabile est quadrato ex CD. ergo ex 10 huius & quod bis continetur AE EB commensurabile est ei, quod bis CF FD continetur.*

E Medium igitur & quod bis CF FD continetur] *Ex corollario 24 huius. quare & medium est, quod semel continetur CF FD.*

F Ergo CF FD potentia sunt incommensurabiles] *Ut enim AE ad EB, ita est CF ad FD. sed AE est potentia incommensurabilis ipsi EB. ergo & CF ipsi FD potentia incommensurabilis erit. sunt igitur CF FD potentia incommensurabiles.*

10. huius.

THEOREMA LII. PROPOSITIO. LXX.

Rationale, ac medium potenti commensurabilis, & ipsa rationale, ac medium potens est.

Sit rationale, ac medium potens AB: & ipsi AB commensurabilis sit CD, ostendendum est & CD rationale, ac medium potentem esse. diuidatur AB in rectas lineas ad punctum E. ergo AE EB potentia incommensurabiles sunt facientes compositum ex ipsarum quadratis medium: quod autem ipsis continetur rationale. & eadem, quae prius construantur. Similiter demonstrabimus CF FD potentia esse incommensurabiles: & compositum ex quadratis ipsarum AE EB commensurabile esse composito ex quadratis CF FD. Quod autem continetur AE EB commensurabile est ei, quod CF FD continetur. ergo & compositum ex quadratis ipsarum CF FD est medium. Quod autem continetur CF FD rationale. rationale igitur, ac medium potens est CD, quod ostendere oportebat.



40. huius.

THEOREMA LIII. PROPOSITIO. LXXI.

Bina media potenti commensurabilis, & ipsa bina media potens est.

Sit bina media potens AB, & ipsi AB commensurabilis CD. ostendendum est CD bina media potentem esse. Quoniam enim bina media potens est AB, diuidatur in rectas lineas ad punctum E. quare AE EB potentia sunt incommensurabiles, quae faciunt compositum ex ipsarum quadratis medium, quod autem ipsis continetur medium incommensurabile: compositum ex quadratis ipsarum. & construantur eadem, quae supra. similiter demonstrabimus CF FD potentia incommensurabiles esse: & compositum ex quadratis ipsarum AE EB commensurabile compositum ex quadratis CF FD. quod autem AE EB continetur commensurabile est ei, quod continetur CF FD. quare & compositum ex quadratis ipsarum CF FD medium est: item quod CF FD continetur medium; & adhuc incommensurabile composito ex quadratis CF FD. ergo bina media potens est CD. quod ostendendum fuit.



41. huius.

THEO-

THEOREMA LIIII. PROPOSITIO. LXXII.

Si rationale, & medium componantur, quattuor irrationales fiunt, vel ea, quę ex binis nominibus, vel quę ex binis medijs prima, vel maior, vel rationale ac medium potens.

Sit rationale quidem ſpacium AB, medium autem CD. Dico eam, quę poteſt ſpacium AD, vel eſſe ex binis nominibus, vel ex binis medijs primam, vel maiorem, vel rationale, ac medium potentem. etenim AB vel maius eſt, quàm CD, vel minus. ſit primum maius, expoſaturq; rationalis EF, & ad ipſam applicetur parallelogrammũ EG ipſi AB æquale, quod latitudinem faciat EH: ipſi vero CD æquale ad EF, hoc eſt ad HG applicetur HI latitudinem faciens HK. & quoniam rationale eſt AB, & ipſi eſt æquale EG, erit & EG rationale; & ad rationalem EF applicatum eſt, latitudinem faciens EH. ergo EH eſt rationalis, & ipſi EF longitudine commenſurabilis. Rurſus quoniam medium eſt CD, & ipſi eſt æquale HI; erit & HI medium; & ad rationalem EF, hoc eſt HG applicatum eſt, latitudinem faciens HK. quare HK eſt rationalis, & incommenſurabilis ipſi EF longitudine. quòd cum medium ſit CD, rationale autem AB; erit AB ipſi CD incommenſurabile. ergo & EG incõmenſurabile eſt ipſi HI. vt autem EG ad HI, ita eſt recta linea EH ad HK. ergo EH ipſi HK longitudine eſt incommenſurabilis. & ſunt vtræq; rationales. quare EH HK rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles; & ob id ex binis nominibus eſt EK, diuiſa ad pũctum H, & quoniam maius eſt AB, quàm CD, æquale autem AB ipſi EG, & CD ipſi HI; erit & EG, quàm HI maius. ergo & EH maior eſt quàm HK. vel igitur EH plus poteſt, quàm HK quadrato rectæ lineæ ſibi commenſurabilis longitudine, vel incommenſurabilis. poſsit primum quadrato rectæ lineæ ſibi commenſurabilis longitudine; & ſit maior HE expoſitæ rationali EF commenſurabilis. ergo EK ex binis nominibus eſt prima, atque eſt EF rationalis. Si autem ſpacium cõtineatur rationali, & ex binis nominibus prima, recta linea ſpacium potens ex binis nominibus eſt. ergo quæ poteſt ſpacium EI eſt ex binis nominibus. quare & ea quæ poteſt ſpacium AD. ſed EH plus poſsit, quàm HK, quadrato rectæ lineæ ſibi longitudine incommenſurabilis; & ſit maior EH expoſitæ rationali EF commenſurabilis longitudine. ergo EK ex binis nominibus eſt quarta, & eſt EF rationalis. ſi autem ſpacium contineatur rationali, & ex binis nominibus quarta, recta linea ſpacium potens irrationalis eſt, quæ maior appellatur. potens igitur ſpacium EI maior eſt. ergo & potẽs ſpacium AD maior. ſit deinde ſpacium AB minus quàm CD. erit & EG quàm HI minus. & ob id recta linea EH minor, quàm recta HK. vel igitur KH plus poteſt, quàm HE quadrato rectæ lineę ſibi longitudine commenſurabilis, vel incommenſurabilis. poſsit primum quadrato rectæ lineæ commenſurabilis longitudine, & ſit minor EH commenſurabilis expoſitæ rationali EF longitudine. ergo EK ex binis nominibus eſt ſecunda: rationalis autem EF. quod ſi ſpacium contineatur rationali, & ex binis nominibus ſecunda, recta linea ſpacium potens eſt ex binis mediis primam:



21. huius.

23. huius.

1. ſexti.

10. huius.

1. Diffi. ſecundarum.

55. huius.

4. diffi.

58. huius.



56. huius.

prima. potens igitur ſpacium EI prima eſt ex binis medijs. ergo & potẽs ſpaciũ AD. Sed KH plus poſsit, quàm HE quadrato rectę lineæ ſibi longitudine incommenſurabilis; ſitq; minor EH expoſitæ rationali EF commenſurabilis longitudine. quare EK ex binis nominibus eſt quinta; atque eſt rationalis EF. ſi autem ſpacium contineatur rationali, & ex binis nominibus quinta, quæ ſpacium poteſt recta linea rationale ac medium potẽs eſt. quæ igitur poteſt ſpacium EI rationale & medium potens eſt; ideoq; rationale & mediũ potẽs eſt quæ põt ſpaciũ AD. Si igitur rationale, & medium componantur, quattuor irrationales fiunt, vel ea quæ ex binis nominibus, vel quæ ex binis medijs prima, vel maior, vel rationale, ac medium potens. quod demonſtrare oportebat.

19. huius.

THEOREMA LV. PROPOSITIO LXXIII.

Si duo media inter ſe incommenſurabilia componantur duæ reliquæ irrationales fiunt, vel ex binis medijs ſecunda, vel bina media potens.

Componantur enim duo media incõmenſurabilia inter ſe AB CD. Dico rectam lineam, quæ ſpaciũ AD poteſt vel ex binis medijs ſecundam eſſe, vel bina media potentem. ſpacium enim AB vel maius eſt, quàm CD, vel minus. ſit primum maius; exponaturq; rationalis EF: & ad EF ſpacio quidem AB æquale applicetur EG, latitudinem faciens EH. ipſi vero CD æquale applicetur HI, latitudinem faciens HK. & quoniam medium eſt vtrumq; ipſorũ AB CD, erit & vtrũq; EG HI medium, & ad rationalem EF applicata ſunt, quæ latitudinem faciunt EH HK. ergo vtraque EH HK rationalis eſt, & ipſi EF longitudine incommenſurabilis. quòd cum AB incõmenſurabile ſit ipſi CD; ſitq; AB quidem æquale EG; CD vero ipſi HI: erit & EG ipſi HI incõmẽſurabile. ſed vt EG ad HI, ita eſt EH ad HK. incommenſurabilis igitur eſt EH ipſi HK lõgitudine: ideoq; EH HK rationales ſũt potentia ſolum commenſurabiles. quare ex binis nominibus eſt EK. Itaque vel EH plus poteſt, quàm HK quadrato rectę lineę ſibi commenſurabilis longitudine, vel incommenſurabilis. poſsit primum quadrato rectæ lineę ſibi commenſurabilis longitudine; & neutra ipſarum EH HK longitudine commenſurabilis eſt expoſitæ rationali EF. ergo EK ex binis nominibus eſt tertia, & eſt FE rationalis. ſi autem ſpacium contineatur rationali, & ex binis nominibus tertia, recta linea ſpaciũ potens eſt ex binis medijs ſecũda. ergo quę poteſt ſpacium EI, hoc eſt AD eſt ex binis medijs ſecunda. ſed EH plus poſsit quàm HK quadrato rectæ lineæ ſibi incommenſurabilis longitudine; & vtraque ipſarum EH HK longitudine incõmenſurabilis eſt expoſitę rationali EF. quare EK ſexta eſt ex binis nominibus. At ſi ſpacium contineatur rationali, & ex binis nominibus ſexta, quæ ſpacium poteſt recta linea eſt bina media potẽs. ergo quę poteſt ſpacium AD bina me-





dia

dia potens est. Similiter demonstrabimus & si AB sit minus, quàm CD, rectam lineam, quæ spacium potest AD, vel ex binis medijs secundam esse, vel rationale, ac medium potentem. si igitur duo media inter se incommensurabilia componantur reliquæ duæ irrationales fiunt, vel ex binis medijs secunda, vel bina media potens. quod demonstrandum fuit.

Quæ ex binis nominibus & quæ post ipsam sunt, irrationales neq; mediæ, neque inter se eædem sunt. quadratum enim, quod fit à media, ad rationalem applicatum latitudinem efficit rationalem, et ei ad quam applicatur, longitudine incommensu rabilem. quòd autem fit ab ea, quæ ex binis nominibus ad rationalem applicatum latitudinem efficit ex binis nominibus primam. quod ab ea, quę est ex binis medijs prima ad rationalem applicatum latitudinem efficit ex binis nominibus secundã. Quod ab ea, quæ est ex binis medijs secunda ad rationalem applicatum latitudinẽ efficit ex binis nominibus tertiam. Quod à maiori ad rationalem applicatum latitudinem efficit ex binis nominibus quartam. Quod ab ea, quæ rationale, ac mediũ potest ad rationalem applicatum latitudinem efficit ex binis nominibus quintam. Quod ab ea, quæ bina media potest ad rationalem applicatum latitudinem efficit ex binis nominibus sextam. Quoniam igitur dictę latitudines differunt et à prima & inter se se: à prima quidem, quòd rationalis sit; inter se se verò, quod ordine non sint eædem, constat & ipsas irrationales inter se differentes esse. 23. huius. 61. huius. 62. huius. 63. huius. 64. huius. 65 huius. 66. huius.

SCHOLIVM.

Septem sunt senarij, de quibus hactenus dictum est. eorum primus quidem ostendit ortum linearum irrationalium: secundus autem diuisionem, nempe quòd ad vnum duntaxat punctum diuiduntur. tertius earum, quæ ex binis nominibus inuentionem, videlicet primę, secundę, tertiæ, quartæ, quintæ, & sextę. deinceps sequitur quartus senarius, ostendens quomodo hæ lineæ inter se differant. namque vsus ijs, quæ ex binis nominibus, ostendit differentiam sex irrationalium. Quintum, & sextum exposuit, ostendens in quinto quidem applicationes quadratorum, quę ex irrationalibus, videlicet quales irrationales faciant, latitudines applicatorũ spaciorũ. In sexto aũt quomodo irrationalibus commensurabiles eiusdem speciei sint. Rursus in septimo manifeste ostendit differentiam ipsarum. Apparet autem & in his irrationalibus arithmetica analogia: & quæ media sumitur proportionalis inter portiones cuiusque lineę irrationalis iuxta arithmeticam analogiam, & ipsa eiusdem speciei cũ ijs, inter quarũ portiones media interijcitur. itaq primum arithmeticam medietatem in his esse, sic apparet.

Ponatur enim exempli gratiâ ex binis nominibus AB, & in nomina ad punctum C diuidatur. manifestum est AC maiorem esse, quàm CB. auferatur à recta linea AC ipsi BC æqualis AD, & CD bifariam in E secetur. constat igitur AE ipsi EB æqualem esse. ponatur alterutri ipsarum æqualis FG. manifestum est quo differt AC ab ipsa FG, eo differre EB ab ipsa BC; etenim AC ab ipsa FG differt magnitudine EC: & eadem magnitudine differt FG ab ipsa BC, quod est arithmeticæ analogiæ proprium. cõmensurabilis autem est FG ipsi AB; est enim eius dimidię æqualis. ergo FG ex binis nominibus est. similiter ostendetur & in alijs. 67. huius.



PRIN-

PRINCIPIVM SENARIORVM

PER APHAERESIM HOC EST

Per detractionem.

THEOREMA LVI. PROPOSITIO LXXIIII.

Si à rationali rationalis auferatur potentia ſolum commenſura bilis exiſtēs toti, reliqua irrationalis eſt. vocetur autem apotome.

A rationali enim AB rationalis auferatur BC, potentia ſolum cōmenſurabilis exiſtens toti. Dico reliquā AC irrationalem eſſe, quæ vocatur apotome. Quoniā enim incommenſurabilis eſt AB ipſi BC longitudine; atq; eſt vt AB ad BC, ita quadratum ex AB ad id quod continetur AB BC: erit quadratū ex AB incommenſurabile ei, quod AB BC continetur. ſed quadrato quidem ex AB commenſurabilia ſunt quadrata ex AB BC: ei vero, quod continetur AB BC, commenſurabile eſt quod bis AB BC continetur. quadrata igitur ex AB BC ei, quod bis continetur AB BC ſunt incommenſurabilia. ergo reliquo, nempe quadrato ex AC incommenſurabilia ſunt quadrata ex AB BC; quoniam quadrata ex AB BC æqualia ſunt ei, quod bis AB BC continetur vnà cum quadrato ex AC. rationalia autem ſunt quadrata ex AB BC. ergo recta linea AC eſt irrationalis. vocetur autem apotome.



A
B
C
D
E

P. C. COMMENTARIVS.

A Atque eſt vt AB ad BC, ita quadratum ex AB ad id, quod continetur AB BC] *Ex 1. ſexti, vel ex lemmate, quod 23 huius inſeruit.*

B Quadrata igitur ex AB BC ei, quod bis continetur AB BC ſunt incommenſurabilia] *Ex demonſtratis à nobis ad 14 huius.*

C Ergo reliquo, nempe quadrato ex AC incommenſurabilia ſunt quadrata ex AB BC] *Ex demonſtratis ad 17 huius.*

D Quoniam quadrata ex AB BC æqualia ſunt ei, quod bis AB BC cōtinetur, vnà cum quadrato ex AC] *Ex ſeptima 2 libri.*

E Ergo recta linea AC eſt irrationalis] *Quoniam enim quadrata ex AB BC incommenſurabilia ſunt quadrato ex AC, & ſunt quadrata ex AB BC rationalia, ſequitur quadratum ex AC irrationale eſſe, ideoque ex 11 diffinitione rectam lineam AC eſſe irrationalem.*

Sit recta linea AB 2, BC R 3. erit AC 2 minus R 3. reſpondet autem tota linea AB maiori nomini eius, quae eſt ex binis nomibus, de qua in 37 huius agitur; & BC reſpondet minori. atque eſt AC reliqua portio maioris nominis, nempe minori nomine ex eo detracto.

THEOREMA LVII. PROPOSITIO LXXV.

Si à media media auferatur potentia ſolum commenſurabilis exiſtens toti, quæ cum tōta rationale cōtineat; reliqua irrationalis eſt. vocetur autem mediæ apotome prima.

A media enim AB auferatur media BC, potentia ſolum commenſurabilis exiſtens ipſi AB, & cum ea rationale faciens, videlicet quod AB BC continetur. Dico reliquam AC irrationalē eſſe. vocetur autem mediæ apotome prima. Quoniam enim AB BC mediæ ſunt,
A erunt & quæ ex AB BC quadrata media. rationale autem eſt quod bis continetur



AB

AB BC.quadrata igitur ex AB BC incommensurabilia sunt ei, quod bis AB BC, continetur.ergo & reliquo,videlicet quadrato ex AC incõmensurabile est id,quod B
bis AB BC continetur,quoniam si tota magnitudo vni componentium sit incom- C
mensurabilis,& quæ à principio magnitudines incommensurabiles erunt. Irratio- D
nalis igitur est AC.vocetuŕq; medię apotome prima.

F. C. COMMENTARIVS.

Rationale autem est,quod bis continetur AB BC] *Ponitur enim rationale, quod semel AB BC continetur.* A

Ergo & reliquo,videlicet quadrato ex AC incommensurabile est id, quod bis A B BC continetur] *Namque ex 7 secundi quadrata ex AB BC sunt aequalia ei,quod bis AB BC continetur vnà cum quadrato,quod fit ex AC.* B

Quoniam si tota magnitudo vni componentium sit incommensurabilis] *Ex 17 huius.* C

Irrationalis igitur est AC] *Nam cum id,quod bis AB BC continetur sit rationale,& incõmensurabile quadrato ex AC,erit quadratum ex AC irrationale: idcircoq; recta linea AC irrationalis ex 11.diffinitione.* D

Sit recta linea AB ℞℞ 54,BC ℞℞ 24.erit AC ℞℞ 54 minus ℞℞ 24.respondet autem tota linea AB maiori nomini eius, quae est ex binis mediis prima,de qua in 38 huius, & BC minori,est igitur AC reliqua portio maioris nominis,minori ex eo detracto.

THEOREMA LVIII. PROPOSITIO. LXXVI.

Si à media media auferatur, potentia solum commensurabilis existens toti,quæ cum tota medium contineat; & reliqua irrationalis est.vocetur autem mediæ apotome secunda.



A media enim AB auferatur media BC potẽtia solum commensurabilis existens toti AB,& cum ea medium continens, videlicet quod continetur AB BC. Dico reliquam AC irrationalem esse. vocetur autem mediæ apotome secunda. exponatur enim rationalis DI: & quadratis quidem ex AB BC æquale parallelogrammum DE ad ipsam DI applicetur,latitudinem faciens DG:ei vero quod bis AB BC continetur æquale parallelogrammum DH ad eandem DI applicetur,latitudinem faciens DF.reliquum igitur FE est æquale quadrato ex AC. & quoniam media sunt,quæ ex AB BC quadrata; erit & parallelogrammum DE medium.& ad rationalem DI applicatum est, latitudinem faciens DG.ergo DG est rationalis,& ipsi DI longitudine incommensurabilis. Rursus quoniam medium est quod AB BC continetur,erit & quod bis continetur AB BC medium: atque est æquale parallelogrammo DH. ergo & DH est medium, & ad rationalem DI applicatum est latitudinem faciens DF. rationalis igitur est DF, & ipsi DI longitudine incommensurabilis.& quoniam AB BC potentia solum cõmensurabiles sunt,erit AB ipsi BC incommensurabilis longitudine. ergo quadratum ex AB incommensurabile est ei,quod AB BC continetur.sed quadrato quidẽ ex AB commensurabilia sunt quæ ex AB BC quadrata;ei vero,quod AB BC continetur commensurabile est id,quod bis continetur AB BC.quadrata igitur ex AB BC incommensurabilia sunt ei,quod bis AB BC continetur. parallelogrammum autem DE est æquale quadratis ex AB BC; & parallelogrammum DH æquale est ei,quod bis continetur AB BC.ergo DE ipsi DH est incommensurabile.sed vt DE

A
B
C
D
E
Coroll. 24. huius.
F

1. sexti. 10. huius. ad DH, ita recta linea GD ad DF. incommensurabilis igitur est GD ipsi DF longitudine. & sunt vtræque rationales, quare GD DF rationales sunt, potentia solum cõmensurabiles. ergo FG apotome est; & DI est rationalis. quod autem rationali, & irrationali continetur rectangulum irrationale est, & ipsum potens est irrationalis. sed recta linea AC potest FE parallelogrammum. ergo AC est irrationalis. vocetur autem mediæ apotome secunda.

G H K

F. C. COMMENTARIVS.

A Reliquum igitur FE est æquale quadrato ex AC] *Ex 7 secundi libri.*

B Ergo DG est irrationalis, & ipsi DI longitudine incommensurabilis] *Ex 23 huius.*

C Erit & quod bis continetur AB BC medium] *Ex corolario 24 huius.*

D Ergo quadratum ex AB incommensurabile est ei, quod AB BC continetur] *Est enim vt AB ad BC, ita quadratum ex AB ad rectangulum ABC. & cum AB ipsi BC longitudine sit incommensurabilis, erit & quadratum ex AB incommensurabile ei, quod AB BC continetur; ex 10 huius.*

Lemma. ad 23. huius.

E Sed quadrato quidem ex AB commensurabilia sunt quæ ex AB BC quadrata] *Nam rectae lineae AB BC potentia commensurabiles ponuntur.*

F Quadrata igitur ex AB BC incommensurabilia sunt ei, quod bis AB BC continetur] *Ex demonstratis ad 17 huius.*

G Ergo FG apotome est] *Ex 74 huius.*

H Quod autem rationali, & irrationali continetur rectangulum irrationale est] *Ex scholio ad 39 huius apposito, quare sequitur parallelogrammum FE irrationale esse.*

K Ergo AC est irrationalis] *Ex 11 diffinitione.*

Sit AB ℞℞ 18, BC ℞℞ 8. erit AC ℞℞ 18 minus ℞℞ 8. respondet autem ipsa AB maiori nomini eius, quae est ex binis medijs secunda; & BC respondet minori. de qua in 39 huius.

THEOREMA LIX. PROPOSITIO LXXVII.

Si à recta linea recta linea auferatur, potentia incommensurabilis existens toti, quæ cum tota faciat compositum quidem ex ipsarum quadratis rationale, quod autem ipsis continetur medium; reliqua irrationalis est. vocetur autem minor.



A recta linea AB auferatur recta BC potentia incommensurabilis existens toti, faciẽsq; cum tota AB compositum quidem ex ipsarũ AB CB quadratis rationale; quod autem bis AB BC continetur medium. Dico reliquam AC irrationalem esse, quę vocatur minor. Quoniam enim cõpositum quidem ex ipsarum AB BC quadratis rationale est: quod autem bis AB BC continetur medium, erunt AB BC quadrata incommensurabilia ei, quod bis continetur AB BC. ergo per conuersionem rationis quadrata ex AB BC quadrato ex AC sunt incommensurabilia. sed quadrata ex AB BC rationalia sunt. irrationale igitur est quadratum ex AC; ideoq; recta linea AC est irrationalis. vocetur autem minor.

A B C

F. C. COMMENTARIVS.

A Ergo per conuersionem rationis quadrata ex AB BC quadrato ex AC sunt incommensurabilia] *Ex demonstratis ad 17 huius.*

B Irrationale igitur est quadratum ex AC] *Ex 10 diffinitione.*

C Ideoq; recta linea AC est irrationalis] *Ex vndecima diffinitione.*

Sit AB ℞ V. 32 plus ℞ 704, BC ℞ V. 32 minus ℞ 704. erit AC ℞ V. 32 plus ℞ 704 minus ℞ V. 32 minus ℞ 704. respondet autem AB maiori nomini eius, quae dicitur maior, & BC respondit minori nomini eiusdem; de qua in 40 huius.

THEO-

THEOREMA LX. PROPOSITIO. LXXVIII.

Si à recta linea recta linea auferatur potentia incommensurabilis existens toti, & cum tota faciens compositum quidem ex ipsarum quadratis medium, quod autem ipsis bis continetur rationale; reliqua irrationalis est; vocetúrque cum rationali medium totum efficiens.

A recta enim linea AB recta linea BC auferatur, potentia incommensurabilis existens toti AB, faciensq; compositum quidem ex ipsarum AB BC quadratis medium; quod autem bis AB BC continetur, rationale. Dico reliquam AC irrationalem esse: vocetur autem cum rationali medium totum efficiens. Quoniam enim compositum ex ipsarum AB BC quadratis medium est: quod autem bis continetur AB BC rationale; erunt ex AB BC quadrata incommensurabilia ei, quod bis AB BC continetur. & reliquum igitur quadratum ex AC incommensurabile est ei, quod bis continetur AB BC. atque est quod bis continetur AB BC rationale. ergo quadratum ex AC irrationale est: & ob id recta linea AC irrationalis. vocetur aũt cũ rationali medium totum efficiẽs.



ex huius

10. diffi.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit AB Ɽ V, Ɽ 13 ½ plus Ɽ 4 ½ BC Ɽ V. Ɽ 13 ½ minus Ɽ 4 ½. erit AC Ɽ V. Ɽ 13 ½ plus Ɽ 4 ½ minus Ɽ V. Ɽ 13 ½. minus Ɽ 4 ½, respondetq; AB maiori nomini eius, quae vocatur rationale, ac medium potens, & BC respondet minori. de qua in 41 huius.

THEOREMA LXI. PROPOSITIO. LXXIX.

Si à recta linea recta linea auferatur potentia incommensurabilis existens toti: & cum tota faciens compositum quidem ex ipsarum quadratis medium, quod autem ipsis bis cõtinetur medium, incommensurabileq; composito ex quadratis ipsarum; reliqua irrationalis est. vocetur autem cum medio medium totum efficiẽs.

A recta enim linea AB, recta linea BC auferatur, potẽtia incommensurabilis existens toti AB, faciensq; cõpositum quidem ex ipsarum AB BC quadratis mediũ; quod autem bis AB BC continetur medium, & adhuc incommensurabile composito ex quadratis ipsarum. Dico reliquam AC irrationalem esse. vocetur autem cum medio medium totum efficiens. exponatur enim rationalis D I: & quadratis quidem ex AB BC æquale parallelogrammum DE ad ipsam D I applicetur, latitudinem faciens DG. ei vero, quod bis continetur AB, BC æquale auferatur DH, latitudinem faciens D F. ergo reliquum FE est æquale quadrato ex A C. & ob id recta linea AC ipsum FE potest. itaque quoniam compositum ex ipsarum AB BC quadratis medium est, & parallelogrammo DE æquale, erit ipsum DE medium: & ad rationalẽ DI applicatũ est, latitudinẽ faciẽs DG. quare D G est rationalis, & ipsi DI longitudine incõmensurabilis. Rursus qm̃ id quod bis AB B C cõtinetur mediũ est, & æquale parallelogrãmo DH, erit DH mediũ, & ad rationalẽ D I applicatũ



13. huius.

25.huius: est, latitudinem faciens DF. ergo DF est rationalis, ipsiq; D E incommensurabilis longitudine. Quòd cum quadrata ex A B BC incommensurabilia sint ei, quod bis AB
1.sexti. BC continetur, & parallelogrammum D E ipsi D H est incommensurabile. vt autem
10.huius. DE ad DH, ita est recta linea DG ad ipsam DF. incommensurabilis igitur est DG ipsi DF, & sunt vtreque rationales. ergo GD DF rationales sunt, potentia solum commen
A surabiles. apotome igitur est FG: & FH est rationalis. quod autem rationali, & apo
B toma continetur rectangulum irrationale est, ipsumq; potens est irrationalis. sed A
C C potest parallelogrammum FE. ergo AC irrationalis est. vocetur autem cum medio medium totum efficiens,

F. C. COMMENTARIVS.

A Apotome igitur est F G] *Ex 74 huius.*

B Quod autem rationali, & apotoma continetur rectangulum irrationale est] *Etenim in scholio ad 39 huius appositio demonstratur, quod rationali, & irrationali continetur irrationale esse.*

C Ipsumq; potens est irrationalis] *Ex 11 diffinitione.*

Sit AB ℞ V. ℞ 13 ½ plus 3, BC ℞ V. ℞ 13 minus 3. erit AC ℞ V. ℞ 13 ½ plus 3 minus ℞ V. ℞ 13 ½ minus 3. & respondet AB maiori nomini eius, quae vocatur bina media potens; & BC respondet minori, de qua in 42 huius.

THEOREMA LXII. PROPOSITIO LXXX.

Apotomæ vna tantum congruit recta linea potentia solum cõmensurabilis existens toti.

A Sit apotome A B: congruens autem ipsi sit BC. ergo AC CB rationales sunt potẽtia solum commensurabiles. Dico ipsi AB alteram non congruere rationalem, quæ potentia solum sit comensurabilis toti. si enim fieri potest, congruat BD. ergo AD DB rationales sunt potentia solum commensurabiles. & quoniam quo excessu quadrata ex AD DB excedunt id, quod bis continetur AD DB, eo & quadrata ex AC
B CB excedunt quod bis AC CB continetur; vtraque enim excedunt eodem quadra
C to, quod fit ex AB. & permutando quo excessu quadrata ex AD DB excedunt quadrata ex AC CB, eodem & quod bis continetur AD DB excedet id, quod bis AC
D CB continetur. sed quadrata ex AD DB excedunt quadrata ex AC CB rationali; etenim vtraque rectarum linearum rationalis est. quod igitur bis continetur AD
E DB excedit id, quod bis AC CB continetur rationali. quod fieri non potest; vtraq;
F enim media sunt. medium autem medium non superat rationali. ergo rectæ lineæ AB altera non congruit rationalis, potentia solum commensurabilis existens toti. vna igitur tantum ipsi congruit.



F. C. COMMENTARIVS.

A Ergo AC CB rationales sunt potentia solum commensurabiles] *Ex 74 huius.*

B Vtraque enim excedunt eodem quadrato, quod fit ex AB] *Quadrata enim ex AD DB aequalia sunt ei, quod bis AD DB continetur vnà cum quadrato ex AB, ex 7 secundi; & eadem ratione quadrata ex AC CB sunt aequalia ei, quod bis continetur AC CB vnà cum quadrato ex AB.*

C Et permutando quo excessu quadrata ex AD DB excedunt quadrata ex AC CB] *Hoc sequenti lemmate demonstrabimus.*

LEMMA.

Sint quattuor magnitudines AB C EF G; & AB excedat ipſam C eodem exceſſu, quo EF excedit G. Dico & permutando AB eodem exceſſu excedere ipſam EF, vel excedi ab ea, quo C excedit G, vel ab ea exceditur.

Sit enim DB exceſſus, quo AB excedit C: & HF exceſſus quo EF excedit G. erunt DB HF æquales; itemq; æqua es inter ſe AD C; & EH G. ergo AD excedit EH, vel ab ea exceditur eodem exceſſu, quo C ipſam G. & additis vtrinque æqualibus DE HF, excedet AB ipſam EF, vel ab ea excedetur eodem exceſſu, quo AD ipſam EH, hoc eſt quo C ipſam G. atque illud eſt, quod demonſtrare oportebat.



Sed quadrata ex AD DB excedunt quadrata ex AC CB rationali] *Rationale enim non ſuperat rationale, niſi rationali. quod nos ad 27 huius demonſtrauimus.* D

Vtraque enim media ſunt] *Nam quod rationalibus potentia ſolũ commenſurabilibus conti netur rectangulum irrationale eſt, quod medium appellatur, ex 22 huius. mediũ igitur eſt id, quod continetur AD DB: & ideo medium quod bis continetur AD DB, vt pote eius duplum ex corol lario 24 huius. eadem ratione & medium eſt, quod bis AC CB continetur.* E

Medium autem medium non ſuperat rationali] *Ex 27 huius.* F

THEOREMA LXIII. PROPOSITIO. LXXXI.

Mediæ apotomæ primæ vna tantum congruit recta linea media, potentia ſolum commenſurabilis exiſtens toti, & cum tota rationale continens.

Sit enim media apotome prima AB, & ipſi AB cõgruat BC. ergo AC CB mediæ ſunt potentia ſolum commenſurabiles, quę rationale continent. Dico ipſi AB alteram non congruere mediam, quæ potentia ſolum ſit commenſurabilis toti, & cum tota medium contineat. ſi enim fieri poteſt, congruat BD. ergo AD DB mediæ ſunt potentia ſolum commenſurabiles, quæ rationale continent, quod AD DB continetur. & quoniam quo exceſſu quadrata ex AD DB excedunt id, quod bis continetur AD DB, eodẽ & quadrata ex AC CB excedunt quod bis AC CB continetur; eodem enim rurſus excedunt quadrato ex AB; & permutando quo exceſſu quadrata ex AD DB excedunt quadrata ex AC CB, eodem & quod bis continetur AD DB excedit id, quod bis AC CB continetur. ſed quod bis continetur AD DB excedit id, quod bis AC CB continetur rationali: vtraque enim rationalia ſunt. ergo & quadrata ex AD DB excedunt quadrata ex AC CB rationali. quod fieri nõ poteſt; vtraque enim ſunt media. medium autem medium non ſuperat rationali: quare mediæ apotomæ primæ vna tantum congruit recta linea media, quę potentia ſolum toti ſit commẽſurabilis, & cum tota rationale contineat.



75 huius.

7. ſecundi.

Ex antecedẽti lemmate.

Ex demonſtratis ad 17. huius.

27. huius.

THEOREMA LXIIII. PROPOSITIO LXXXII.

Mediæ apotomæ ſecundę vna tantum congruit recta linea, potentia ſolum commenſurabilis exiſtens toti, & cum tota medium continens.

Sit mediæ apotome ſecunda AB, & ipſi AB congruat BC. ergo AC CB mediæ ſunt potentia ſolum commenſurabiles, mediumq; continentes ACB. Dico ipſi AB alteram

76. huius.

alteram non congruere mediam quæ potentia ſolum ſit cõmenſurabilis toti, & cum tota medium contineat. ſi enim fieri poteſt, congruat BD. quare AD DB mediæ ſunt potentia ſolum commenſurabiles, quæ medium ADB continent: & exponatur rationalis EF: quadratiſq; ex AC CB æquale parallelogrammum EG ad ipſam EF applicetur, latitudinem faciens EM, & ei, quod bis continetur AC CB æquale auferatur parallelogrammum HG, latitudinem faciens HM. reliquum igitur EL eſt æquale ei, quod fit ex AB quadrato. ergo AB ipſum EL poteſt. Rurſus quadratis ex AD DB æquale parallelogrammum EI ad ipſam EF applicetur, latitudinem faciens EN. eſt autem & EL æquale quadrato ex AB. reliquum igitur HI eſt æquale ei, quod bis AD DB continetur. & quoniã mediæ ſunt AC CB, erunt & quadrata ex AC CB media, ſuntq; æqualia parallelogrammo EG. quare EG eſt me-



23. huius. dium, & ad rationalem EF applicatum eſt, latitudinem faciens EM. ergo EM eſt rationalis, & ipſi EF longitudine incommenſurabilis. rurſus quoniam mediũ eſt quod continetur AC CB, & quod bis AC CB continetur medium erit. atque eſt æquale parallelogrammo HG. ergo & HG eſt medium, & ad rationalem EF applicatum

23. huius. eſt, latitudinem faciens HM. rationalis igitur eſt HM, & ipſi EF incommenſurabilis longitudine. & quoniam AC CB potentia ſolum ſunt commenſurabiles, erit AC in

Ex lemm. ad 23. huius. commenſurabilis ipſi CB longitudine. vt autem AC ad CB, ita quadratum ex AC ad id, quod continetur AC CB. incommenſurabile igitur eſt & quadratum ex AC ei, quod AC CB continetur. ſed quadrato quidem ex AC commenſurabilia ſunt quadrata ex AC CB; ei vero, quod continetur AC CB commenſurabile eſt, quod

Ex demonſtratis in 14. huius. bis AC CB continetur. ergo quadrata ex AC CB incommẽſurabilia ſunt ei, quod bis AC CB continetur. atque eſt quadratis ex AC CB æquale parallelogrammum EG; ei vero, quod bis AC CB continetur æquale ipſum HG. ergo EG ipſi GH eſt in-

1. sexti. commenſurabile. ſed vt EG ad GH, ita eſt recta linea EM ad ipſam MH: quare EM

10. huius. ipſi MH eſt incommenſurabilis longitudine. & ſunt vtræque rationales. ergo EM

74. huius. MH rationales ſunt, potentia ſolum commenſurabiles; ac propterea apotome eſt EH; & ipſi congruens HM. ſimiliter demonſtrabimus & HN ipſi congruere. apotomæ igitur alia, atque alia congruit recta linea, potentia ſolum commenſurabilis exiſtens toti. quod fieri non poteſt. ergo mediæ apotomę ſecundæ una tantum con-

Ex 80. huius gruit recta linea media, quæ potentia ſolum ſit commenſurabilis toti, & cum tota medium contineat.

THEOREMA LXV. PROPOSITIO LXXXIII.

Minori vna tantum congruit recta linea, potentia incommenſurabilis exiſtens toti, & cum tota faciens compoſitum quidem ex ipſarum quadratis rationale; quod aũt bis ipſis continetur mediũ.

77. huius. Sit minor AB, & ipſi AB congruat BC. ergo AC CB potentia ſunt incommenſurabiles, facientes compoſitum quidem ex ipſarum quadratis rationale: quod autem bis ipſis continetur medium.



Dico ipſi AB alteram non congruere rectam lineam, quę eadem faciat. ſi enim fieri poteſt, congruat BD. ergo AD DB potentia ſunt incommenſurabiles, facientes cõ-

Ex lemmate ad 80. huius poſitum quidem ex ipſarum quadratis rationale: quod autem bis ipſis continetur medium. & quoniam quo exceſſu quadrata ex AD DB excedunt quadrata ex AC CB, eodem

CB,eodem & quod bis continetur AD DB excedit id,quod bis AC CB continetur;quadrata autem ex AD DB excedunt quadrata ex AC CB rationali; vtraque enim rationalia sunt:& quod bis continetur AD DB id,quod bis AC CB continetur,rationali excedet.quod fieri non potest.etenim vtraque sunt media.ergo minori vna tantum congruit recta linea, potentia incommensurabilis existens toti,& cũ tota faciens compositum quidem ex ipsarum quadratis rationale;quod vero bis ipsis continetur medium. 27 huius.

THEOREMA LXVI. PROPOSITIO LXXXIIII.

Ei,quæ cũ rationali mediũ totũ facit, vna tantum congruit recta linea,potentia incommensurabilis existens toti,& cum tota faciens compositum quidem ex ipsarum quadratis medium; quod autem bis ipsis continetur,rationale.



78.huius.

Sit cum rationali medium totum faciens AB,congruens autem ipsi BC.ergo AC CB potentia sunt incommensurabiles, facientes compositum quidem ex ipsarum AC CB quadratis medium;quod autem bis ipsis continetur,rationale. Dico ipsi AB alterã non congruere eadem facientem.si enim fieri potest, congruat. BD.ergo AD DB potẽtia sunt incõmensurabiles,facientes cõpositum quidem ex ipsarũ AD DB quadratis medium;quod autem bis ipsis continetur,rationale. Quoniam igitur quo excessu,quadrata ex AD DB excedunt quadrata ex AC CB,eodem quod bis continetur AD DB excedit id,quod bis AC CB continetur: quod autem bis continetur AD DB excedit id quod bis AC CB continetur rationali; etenim vtraque rationalia sunt:& quadrata ex AD DB rationali excedẽt quadrata ex AC CB. quod fieri non potest,cum vtraque sint media.non igitur ipsi AB altera congruit,potentia incommensurabilis existens toti,& cum tota faciens compositum quidem ex ipsarum quadratis medium; quod autem bis ipsis cõtinetur rationale.quare ei, quæ cum rationali medium totum facit,vna tantum congruet recta linea.

THEOREMA LXVII. PROPOSITIO. LXXXV.

Ei, quę cum medio medium totum facit, vna tantum congruit recta linea,potentia incommensurabilis existens toti, & cum tota faciens compositum quidem ex ipsarum quadratis medium, quod autem bis ipsis continetur,medium, & adhuc incommensurabile composito ex quadratis ipsarum.



79.huius.

Sit cum medio medium totum faciens AB, ipsi vero congruens BC. ergo AC CB potentia sunt incommensurabiles, facientes compositum quidem ex ipsarum quadratis medium; quod autem bis ipsis continetur medium,& adhuc incõmensurabile composito ex quadratis ipsarum. Dico ipsi AB alteram non congruere potentia incommensurabilem toti,& cum tota facientem ea, quæ propõsita sunt. si enim fieri potest, cõgruat BD, ita vt AD DB potentia incommensu

rabiles

rabiles ſint, faciantq; compoſitum quidem ex ipſarum quadratis medium; quod autem ipſis continetur medium, & incomenſurabile compoſito ex quadratis ipſarum. & exponatur rationalis EF; & quadratis ipſarum AC CB æquale parallelogrammum EG ad ipſam EF applicetur, latitudinẽ facens EM: ei vero, quod bis continetur AC CB æquale parallelogrammum auferatur HG, latitudinem faciens HM. reliquum igitur quadratum ex AB eſt æquale parallelogrammo EL. ergõ AB ipſum EL pôt. rurſus quadratis ex AD DB æquale parallelogrammum EI ad ipſam EF applicetur, latitudinem faciens EN. eſt autem & quadratum ex AB æquale parallelogrammo EL. ergo reliquum, quod bis AD DB continetur ipſi HI eſt quale. & quoniam compoſitum ex quadratis AC CB medium eſt, & æquale parallelogrãmo EG, erit & EG medium, quod ad rationalem EF applicatum eſt, latitudinem



25. huius. faciens EM. quare EM eſt rationalis, & ipſi EF longitudine incommẽſurabilis. Rurſus quoniam quod bis AC CB continetur eſt medium, & æquale ipſi HG, erit & HG medium, & ad rationalem EF applicatum eſt, latitudinem faciens HM. rationalis igitur eſt HM, & ipſi EF incommenſurabilis longitudine. quòd cum quadrata ex AC CB incommenſurabilia ſint ei, quod bis AC CB continetur, erit & EC in-

10. huius. commenſurabile ipſi GH; ideoq; recta linea EM rectæ MH longitudine eſt incommenſurabilis. & ſunt vtræque rationales. cum igitur EM MH rationales ſint, potẽ-

74. huius. tia ſolum commenſurabiles, recta linea EH apotome eſt, & ipſi congruens HM. ſimiliter demonſtrabimus EH rurſus apotomen eſſe, ipſiq; congruentem HN. ergo apotomæ alia, atque alia congruit rationalis, potentia ſolum commenſurabilis exi-

73. huius. ſtens toti. quod fieri non poſſe oſtenſum eſt. non igitur ipſi AB altera congruet recta linea. quare vna tantum congruet, potentia incommenſurabilis exiſtens toti, & cum tota faciens compoſitum quidem ex ipſarum quadratis medium; quod autem bis ipſis continetur medium, & adhuc incommenſurabile compoſito ex quadratis ipſarum.

DIFFINITIONES TERTIAE.

1 Expoſita rationali, & apotoma, ſi quidẽ tota plus poſſit, quàm congruens quadrato rectæ lineæ ſibi commenſurabilis longitudine; ſitq; tota expoſitæ rationali longitudine commenſurabilis: vocetur apotome prima.

2 Si vero congruens ſit longitudine commenſurabilis expoſitæ rationali, & tota plus poſſit, quàm congruens quadrato rectę lineæ ſibi cõmenſurabilis longitudine; vocetur apotome ſecunda.

3 Quòd ſi neutra ſit longitudine commenſurabilis expoſitę rationali, & tota plus poſſit, quàm congruens quadrato rectæ lineę ſibi commenſurabilis longitudine; dicatur apotome tertia.

4 Rurſus ſi tota plus poſſit, quàm congruens quadrato rectæ lineæ ſibi incommenſurabilis longitudine, ſi quidem tota ſit longitudine commenſurabilis expoſitæ rationali; vocetur apotome quarta.

Si vero congruens expositę rationali sit longitudine commensurabilis, vocetur apotome quinta. 5

Quòd si neutra, dicatur apotome sexta. 6

PROBLEMA XVIII. PROPOSITIO LXXXVI.

Inuenire primam apotomen.

Exponatur rationalis A; & ipsi A longitudine commensurabilis sit BG. ergo & BG est rationalis. & exponantur duo quadrati numeri DE EF, quorum excessus DF nō sit quadratus. neque igitur ED ad DF proportionem habebit, quam numerus quadratus ad quadratum numerum. & fiat vt E D ad D F, ita quadratum ex BG ad quadratum ex GC. commē surabile igitur est quadratum ex BG quadrato ex G C; rationale autē est quadratū ex BC. ergo & quadratum ex GC est rationale; ideoq; recta linea GC rationalis est. & quoniam ED ad DF proportionem non habet, quam quadratus numerus ad quadratum numerum; neque quadratum ex BG ad quadratum ex GC proportionem habebit, quam numerus quadratus ad quadratum numerum. incommensurabilis igitur est BG ipsi GC longitudine; & sunt vtræque rationales. ergo BG GC rationales sunt potentia solum commensurabiles, & ob id BC apotome est. Dico & primam esse. sit enim quadratum ex H id, quo quadratū ex BG plus potest, quàm quadratum ex GC. & quoniam est vt ED ad DF, ita quadratum ex BG ad quadratum ex GC; erit per conuersionem rationis vt DE ad EF, ita quadratum ex BG ad quadratum ex H. sed DE ad EF proportionem habet, quā quadratus numerus ad quadratum numerum; vterque enim quadratus est. ergo & quadratum ex BG ad quadratum ex H proportionem habebit, quam quadratus numerus ad quadratum numerum. commensurabilis igitur est BG ipsi H lōgitudine. & BG plus potest, quàm GC quadrato ex H. ergo BG plus poterit, quàm GC quadrato rectæ lineę sibi longitudine commensurabilis. atque est tota BG expositę rationali A commensurabilis lōgitudine. ergo BG apotome est prima. Inuēta igitur est prima apotome. quod facere oportebat.



6. Diffi.
Coroll. 1. le. ad 30. huius
9. huius.
74. huius.
9. huius.
3. diffi. tertiarum.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit A 6, BG 4. numerus autem DE sit 16, EF 9. erit DF 7. si igitur fiat vt 16 ad 7, ita quadratum ex BG, videlicet 16 ad quadratum ex GC. erit quadratum ex GC 7, & recta linea GC Bx 7, ergo BC est 4 minus Bx 7, quae est apotome prima.

PROBLEMA XIX. PROPOSITIO LXXXVII.

Inuenire secundam apotomen.

Exponatur rationalis A; & ipsi A longitudine commensurabilis sit CG. ergo CG est rationalis. & exponantur duo numeri quadrati D E EF, quorū excessus DF, nō sit quadratus fiatq; vt F D ad D E, ita quadratum ex CG ad quadratum ex G B. commensurabile igitur est quadratum ex CG quadrato ex G B. sed quadratum ex



6. Diffi.
Corol. 1. lemma ad 30. huius.

CG eſt rationale. ergo & rationale eſt quadratum ex GB; ac propterea ipſa GB eſt rationalis. & quoniam quadratum ex CG ad quadratum ex GB proportionem non habet, quam numerus quadratus ad quadratum numerum,
9.huius. erit CG ipſi GB incommenſurabilis longitudine; & vtræque ſunt ra-
74.huius. tionales. ergo CG GB rationales ſunt, potentia ſolum commenſurabiles, & ob id BC eſt apotome. Dico & ſecundam eſſe. quo enim quadratum ex BG excedit quadratum ex GC, ſit ex H quadratum. Quoniam igitur eſt vt quadratum ex BG ad quadratum ex GC, ita DE numerus ad numerum DF, erit per conuerſionem rationis, vt quadratum ex BG ad quadratum ex H, ita DE ad EF. atque eſt vterque ipſorum DE EF quadratus. quadratũ igitur ex BG ad quadratum ex H proportionem ha-
9. huius. bet, quam numerus quadratus ad quadratum numerum; ideoq; BG ipſi H longitudine eſt commenſurabilis. & plus poteſt BG, quàm GC quadrato ex H. ergo BG plus poteſt, quàm GC quadrato rectæ lineæ ſibi longitudine commenſurabilis. atque eſt congruens CG expoſitæ rationali A commenſurabilis longitudine. ergo BC apotome eſt ſecunda. inuenta igitur eſt ſecunda apotome BC. quod facere oportebat.



F. C. COMMENTARIVS.

Sit A 6, CG 3; numerus autem DE ſit 36, & EF 9. erit DF 27, itaque fiat vt 27 ad 36, ita 9 ad alium, erit ad 12. ergo GE eſt ℞ 12, & EC ℞ 12 minus 3, quae eſt apotome ſecunda.

PROBLEMA XX. PROPOSITIO LXXXVIII.

Inuenire tertiam apotomen.

Exponatur rationalis A, & exponãtur tres numeri E BC CD non habentes inter ſe proportionem, quam numerus quadratus habet ad quadratum numerum; BC vero ad BD proportionem habeat, quam quadratus numerus
Corol.6.huius. ad quadratum numerum: & fiat vt E ad BC, ita quadratum ex A ad quadratum ex FG: vt autem BC ad CD, ita quadratum ex FG ad
6.huius. quadratum ex GH. commẽſurabile igitur eſt quadratum ex A quadrato ex FG. atque eſt quadratum ex A rationale. ergo & rationale eſt quadratum ex FG; ac propterea recta linea FG eſt rationalis. & quoniam E ad BC proportionem non habet, quam numerus quadratus ad quadratum numerum; neque quadratum ex A ad quadratum ex FG proportionem habebit, quam numerus quadratus ad quadratum numerum. in
9.huius. cõmenſurabilis igitur eſt A ipſi FG longitudine. rurſus quũ eſt vt BC ad CD, ita
6.huius. quadratum ex FG ad quadratum ex GH; erit quadratum ex FG quadrato ex GH commenſurabile. rationale autẽ eſt quadratum ex FG. ergo & quadratũ ex GH eſt rationale, & ob id recta linea GH rationalis. quòd cum BC ad CD proportionem non habeat, quam numerus quadratus ad quadratum numerum; neque quadratũ ex FG ad quadratum ex GH proportionem habebit, quam quadratus numerus ad
9.huius. quadratum numerum. incommenſurabilis igitur eſt FG ipſi GH longitudine: & ſunt vtræque rationales. ergo FG GH rationales ſunt potentia ſolum commenſu-
94.huius. rabiles; ac propterea apotome eſt FH. Dico & tertiam eſſe. Quoniam enim eſt vt E



quidem

quidem ad BC,ita quadratum ex A ad quadratum ex FG; vt autem BC ad CD,ita quadratum ex FG ad quadratum ex GH;erit ex æquali vt E ad CD,ita quadratum ex A ad quadratum ex GH. sed E ad GD proportionem non habet,quam numerus quadratus ad quadratum numerum.neque igitur quadratum ex A ad quadratum ex GH proportionem habebit, quam numerus quadratus ad quadratum numerũ. ergo A ipsi GH longitudine est incommẽsurabilis. neutra igitur ipsarum FG GH expositę rationali A commensurabilis est longitudine. quo autem quadratum ex FG plus potest,quàm quadratum ex GH,sit ex K quadratum. Quoniam igitur est vt BC ad CD,ita quadratum ex FG ad quadratum ex GH;erit per conuersionem rationis vt CB ad BD, ita quadratum ex FG ad quadratum ex K. at CB ad BD proportionem habet,quam numerus quadratus ad quadratum numerum. ergo & quadratum ex FG ad quadratum ex K proportionem habebit, quam numerus quadratus ad quadratum numerum.commensurabilis igitur est FG ipsi K longitudine: & plus potest FG,quàm GH quadrato ex K. ergo FG plus potest,quàm GH quadrato rectæ lineę sibi commensurabilis longitudine.& neutra ipsarum FG GH longitudine commensurabilis est expositę rationali A. quare FH apotome est tertia. Inuenta igitur est tertia apotome FH.quod facere oportebat.

9. huius. 9. huius. 33. diff.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit A 16,numerus E 18,BC 16,& CD 7.erit BD 9.fiat vt 18 ad 16, ita 36 ad alium, erit ad 32.ergo FG est ℞ 32.rursus fiat vt 16 ad 7, ita 32 ad alium.erit ad 14 quare GH est ℞ 14 & FH ℞ 32 minus ℞ 14,quae est apotome tertia.

PROBLEMA XXI. PROPOSITIO. LXXXIX.

Inuenire quartam apotomen.



Exponatur rationalis A: & ipsi A longitudine commensurabilis sit BG. ergo BG est rationalis.exponantur præterea duo numeri D F FE, ita vt totus DE ad vtrumque ipsorum DF FE proportionem non habeat,quam numerus quadratus ad quadratum numerum: & fiat vt DE ad EF, ita quadratum ex BG ad quadratum ex GC. commensurabile igitur est quadratum ex BG quadrato ex GC. est autem quadratum ex BG rationale.quare & rationale est quadratũ ex GC; ideoq; recta linea GC est rationalis.& quoniam DE ad EF proportionem non habet, quam numerus quadratus ad quadratum numerum;neque quadratum ex BG ad quadratum ex GC proportionem habebit, quam numerus quadratus ad quadratum numerum.incommensurabilis igitur est BG ipsi GC longitudine,& sunt vtræque rationales. ergo BG GC rationales sunt potentia solum commensurabiles. & ob id apotome est BC. Dico & quartam esse. Quo igitur plus potest BG, quàm GC, sit quadratum ex H.& quoniam est vt DE ad EF,ita quadratum ex BG ad quadratum ex GC;erit per conuersionem rationis vt ED ad DF,ita quadratum ex BG ad quadratum ex H. sed ED ad DF proportionem non habet, quam numerus quadratus ad quadratum numerum.neque igitur quadratum ex BG ad quadratum ex H proportionem habebit,quam numerus quadratus ad quadratum numerum.incommẽsurabilis igitur est BG ipsi H longitudine: & plus potest BG, quam GC quadrato ex H.ergo BG plus potest,quàm GC quadrato rectę lineæ sibi longitudine incommensurabilis.atque est tota BG commẽsurabilis expositę rationali A.ergo BC apotome est quarta. Inuenta igitur est quarta apotome BC. quod facere oportebat.

6. huius. 9. huius. 74. huius. 4. diff. tertiarum.

P. C. COMMENTARIVS.

Sit A 6, BG 4, numerus autem DF 6, & FE 10. itaq; si fiat vt 16 ad 10, ita 16 ad alium, erit GC R 10 & BC 4 minus R 10, quae est apotome quarta.

PROBLEMA XXII. PROPOSITIO XC.

Inuenire quintam apotomen.



Exponatur rationalis A, & ipsi A commensurabilis sit CG. ergo CG est rationalis. & exponantur duo numeri DF FE, ita vt DE ad vtrumque ipsorum DF FE proportionem rursus nō habeat, quā numerus quadratus ad quadratū numerum; fiatq; vt FE ad ED, ita quadratum ex CG ad quadratum ex GB. ergo quadratum ex CG commensurabile est quadrato ex GB. est autem quadratum ex CG rationale. ergo & rationale est quadratum ex GB: & idcirco recta linea GB est rationalis. & quoniam vt DE ad EF, ita est quadratum ex BG ad quadratum ex GC: & DE ad EF proportionem non habet, quam numerus quadratus ad quadratum numerum; neque quadratum ex BG ad quadratum ex GC proportionem habebit, quam numerus quadratus ad quadratum numerum. incommensurabilis igitur est BG ipsi GC longitudine; & sunt vtraeque rationales. ergo BG GC rationales sunt potentia solum commensurabiles; & BC apotome est. Dico & quintam esse. Quo enim plus potest quadratum ex BG, quàm quadratum ex GC, sit quadratum ex H. Quoniam igitur quadratum ex BG ad quadratum ex GC est vt DE ad EF, erit per conuersionem rationis vt ED ad DF, ita quadratum ex BG ad id, quod fit ex H quadratū. sed ED ad DF proportionem non habet, quam numerus quadratus ad quadratum numerum. neque igitur quadratum ex BG ad quadratum ex H proportionem habebit, quam numerus quadratus ad quadratum numerum; ideoq; recta linea BG ipsi H longitudine est incommensurabilis. & plus potest BG, quàm GC quadrato ex H. ergo BG plus potest, quàm GC quadrato rectae lineę sibi incommensurabilis longitudine. atque est congruens CG expositę rationali A longitudine commensurabilis. quare BC apotome est quinta. Inuenta est igitur quinta apotome BC. quod facere oportebat.

6. huius.

9. huius.

P. C. COMMENTARIVS.

Sit A 6, CG 3. numerus autem DF sit 25, FE 9: & fiat vt 9 ad 34, ita quadratum ex CG, quod est 9 ad alium, erit BG R 34, & BC R 34 minus 3, quę est apotome quinta.

PROBLEMA XXIII. PROPOSITIO XCI.

Inuenire sextam apotomen.



Exponatur rationalis A, & tres numeri E BC CD proportionem non habentes inter se, quā quadratus numerus ad quadratū numerū. & fiat vt E ad BC, ita quadratū ex A ad quadratū ex FG: ut aūt BC ad CD, ita quadratū ex FG ad quadratū ex GH. qm̄ igitur est vt E ad BC ita, quadratū ex A ad quadratū ex FG; erit quadratum ex A quadrato ex FG cō

6. huius.

mensurabile.

menſurabile.rationale autem eſt quadratum ex A. ergo & quadratum ex FG rationale erit; & ob id recta linea FG rationalis. & quoniam E ad BC proportionem nõ habet, quam numerus quadratus ad quadratum numerum; neque quadratum ex A ad quadratum ex FG proportionem habebit,quam numerus quadratus ad quadratum numerum. Incommẽſurabilis igitur eſt A ipſi FG longitudine. rurſus quo 9 huius.
niam eſt vt BC ad CD,ita quadratum ex FG ad quadratum ex GH,erit quadratum 6. huius.
ex FG commenſurabile quadrato ex GH. eſt autem quadratum ex FG rationale.rationale igitur eſt & quadratum ex GH; & ipſa GH rationalis. quòd cũ BC ad CD proportionem non habeat, quam numerus quadratus ad quadratum numerũ; neque quadratum ex FG ad quadratum ex GH proportionem habebit, quàm numerus quadratus ad quadratum numerum.ergo F G ipſi G H longitudine eſt incom- 9.huius.
menſurabilis: & ſunt vtræque rationales. quare FG GH rationales ſunt potentia ſolum commẽſurabiles,& FH apotome eſt. Dico & ſextam eſſe. Quoniam enim eſt 74.huius.
vt E ad BC, ita quadratum ex A ad quadratum ex FG;vt autem BC ad CD,ita quadratum ex FG ad quadratum ex GH: erit ex æquali vt E ad CD, ita quadratum ex A ad quadratum ex GH. ſed E ad CD proportionem non habet, quã numerus quadratus ad quadratum numerum. neque igitur quadratum ex A ad quadratum ex GH proportionem habebit, quam numerus quadratus ad quadratum numetum. ergo A ipſi GH longitudine eſt incommenſurabiiis: & neutra ipſarum FG GH expoſitæ rationali A commenſurabilis eſt longitudine.quo igitur plus poteſt quadratum ex FG, quàm quadratum ex GH,ſit quadratum ex K. & quoniam eſt vt BC ad C D, ita quadratum ex F G ad quadratum ex G H, erit per conuerſionem rationis vt CB ad BD, ita quadratum ex F G ad quadratum ex K. at C B ad B D proportionem non habet,quam numerus quadratus ad quadratum numerum. neque igitur quadratum ex FG ad quadratum ex K proportionem habebit, quam numerus quadratus ad quadratum numerum. ergo incommenſurabilis eſt FG ipſi K longitudi- 9 huius.
ne.& FG plus poteſt,quã GH quadrato ex K. plus igitur poteſt FG,quàm GH quadrato rectæ lineæ ſibi longitudine incommenſurabilis: & neutra ipſarum FG GH
eſt commenſurabilis longitudine expoſitæ rationali A.ergo FH apotome eſt ſexta. 6. tertiarum diffi.
Inuenta eſt igitur ſexta apotome F H. ſed & expeditius ſex dictarum linearum inuentionem oſtendere licet.

Si enim oporteat inuenire primam apotomẽ, exponatur ex binis nominibus prima A C, cuius maius nomẽ ſit AB.& ponatur B D ipſi BC æqualis.ergo AB BC, hoc eſt AB BD rationales ſũt, potentia ſolum commenſurabiles: & AB plus poteſt,quàm BC, hoc eſt quàm B D quadrato rectę lineæ ſibi longitudine commenſurabilis: & AB eſt commenſurabilis lõgitudine expoſitę rationali.apotome igitur prima eſt AD.ſimiliter & reliquas apotomas inueniemus,eas, quæ ex binis nominibus eiuſdem ordinis exponentes.

A D B C

F. C. COMMENTARIVS.

Sit A 6. numerus autem E ſit 15,BC 25, & CD 10. fiat igitur ut 15 ad 25, ita 36 ad aliũ, erit ad 60. Rurſus fiat ut 25 ad 10,ita 60 ad alium,erit ad 24. ergo F G eſt R *60, & G H* R *24. ãc propterea FH eſt* R *60 minus* R *24, quę eſt apotome ſexta.*

THEOREMA LXVIII. PROPOSITIO XCII.

Si ſpacium cõtineatur rationali,& apotoma prima, recta linea ſpacium potens apotome eſt.

Contineatur





Contineatur enim ſpacium AB rationali AC,& apotoma prima AD. Dico rectam lineam, quæ poteſt ſpacium AB apotomen eſſe. Quoniã enim AD prima apotome eſt, ſit ipſi congruens
1.diff.tertiæ DG. ergo AG GD rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles, & tota AG longitudine commenſurabilis eſt expoſitæ rationali AC. & præterea AG plus poteſt, quàm GD quadrato rectæ lineę ſibi commenſurabilis longitudine. ſi igitur quartæ parti quadrati, quod fit ex DG, ęquale parallelogrammũ ad AG applicetur, de-
18.huius: ficiens figura quadrata, in partes longitudine cõmenſurabiles ipſam diuidet. ſecetur DG bifariã in E,& quadrato ex EG æquale parallelogrammum ad ipſam AG applicetur, deficiens figura quadrata, quod ſit AFG. commenſurabilis igitur eſt AF ipſi FG longitudine: & per E F G puncta ipſi AC parallelæ ducantur EH FI GK. & qm̃ AF ipſi FG lõgitudine eſt commenſurabi
16.huius. lis, erit & tota AG vtrique ipſarum AF FG cõmenſurabilis longitudine. ſed AG commenſurabilis eſt ipſi AC. vtraque igitur AF FG ipſi AC longitudine eſt commenſurabilis. atque eſt AC rationalis. ergo & rationalis vtra-
20.huius. que AF FG; ac propterea vtrumque parallelogrammorum AI FK eſt rationale. &
16.huius. quoniam DE ipſi EG longitudine eſt commenſurabilis, erit & DG vtrique DE EG commenſurabilis longitudine: eſtq; rationalis DG, & ipſi AC longitudine incõ-
14.huius. menſurabilis. ergo & vtraque DE EG rationalis eſt, & incommenſurabilis ipſi AC
22.huius. longitudine: & ob id vtrumque parallelogrammorum DH EK medium eſt. ponatur ipſi quidem AI parallelogrammo æquale quadratum LM; parallelogrammo autem FK æquale quadratum auferatur NX, communem ipſi angulum habens LO
26.sexti. M. ergo quadrata LM NX circa eandem ſunt diametrum. ſit ipſorum diameter O R, & figura deſcribatur. itaque quoniam rectãgulum AFG eſt æquale quadrato ex
14.sexti. EG, erit vt AF ad EG, ita EG ad GF: ſed vt AF ad EG, ita eſt parallelogrammum AI ad ipſum EK: & vt EG ad GF, ita parallelogrammum EK ad ipſum KF. parallelogrammorum igitur AI KF medium proportionale eſt EK. eſt autem & quadratorũm LM NX medium proportionale MN, vt ſuperius oſtenſum eſt. parallelogrammumq; AI eſt æquale quadrato LM; & parallelogrammum KF quadrato NX æquale. ergo & parallelogrammum MN eſt æquale ipſi EK. ſed parallelogrammum quidem EK eſt æquale parallelogrammo DH; parallelogrammum vero MN ipſi LX. parallelogrammum igitur DX eſt æquale gnomoni YVQ, quadrato NX. eſt autẽ & parallelogrãmũ AK quadratis LM NX ęquale. ergo & reliquũ AB eſt ęquale quadrato ST. at quadratũ ST eſt id, quod fit ex LN. quadratum igitur ex LN eſt æquale parallelogrammo AB; ideoq; recta linea LN ipſum AB poteſt. Dico LN apotomen eſſe. Quoniam enim rationale eſt vtrumque parallelogrammorum AI FK, & ſunt ęqualia quadratis LM NX, erit & vtrumque LM NX rationale; hoc eſt vtrumque ipſorum, quæ fiunt ex LO ON; & vtraque igitur LO ON rationalis eſt. rurſus Qm̃ medium eſt parallelogrammum DH, atque eſt æquale ipſi LX; erit & LX mediũ. cũ igitur LX quidẽ medium ſit, NX vero rationale, incõmenſurabile eſt LX ipſi
10.huius: NX; vtq; LX ad XN, ita eſt recta linea LO ad ON. ergo LO ipſi ON longitudine eſt incommenſurabilis. & ſunt vtręque rationales. quare LO ON rationales ſunt potẽ-
74.huius. tia ſolum commenſurabiles. & idcirco apotome eſt LN; & ſpacium AB poteſt. quę igitur poteſt ſpacium AB eſt apotome. ergo ſi ſpacium contineatur rationali, & apotoma prima, recta linea ſpacium potens apotome eſt.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit AC 6, AD 7 minus R 13. *erit DG* R 13, *& DE, uel EG* R 3 $\frac{1}{2}$. *quòd ſi ad rectam lineã AG applicetur parallelogrammum AFG æquale quadrato ipſius EG, deficiensq; figura quadrata, erit ex demonſtratis ad 18 huius AF 6* $\frac{1}{2}$ *FG* $\frac{1}{2}$. *ergo parallelogrammum AI eſt 39, & FK 3, totumq; AK parallelogrammum 42. parallelogrammum uero DK eſt* R 468, *DH, uel EK* R 117, *EI* R 117 *minus 3, & FK 3. quare parallelogrammum AB eſt 42 minus* R 468. *Huiuſmodi autem ſpacium iuniores etiam apotomen primam, uel reſiduum primum appellare conſueuerunt, cuius latus quadratum, uel radicem inueniemus, quemadmodum ad 55. huius dictum eſt in ſpacijs binomialibus, præterquã quòd loco uocis plus, utemur minus. Diuidatur enim 42 in duas partes; ita ut quod ex ipſis producitur, ſit æquale quartæ parti 468, hoc eſt 117. erit maior pars 39, minor 3: idcoq; R 39 minus R 3 erit latus quadratum, uel radix huius ſpacij reſidui 42 minus* R 468.

THEOREMA LXIX. PROPOSITIO. XCIII.

Si ſpacium contineatur rationali, & apotoma ſecunda, recta linea ſpacium potens mediæ eſt apotome prima.



2. diff. terriarum.



18. huius.

Spacium enim AB cõtineatur rationali AC, & apotoma ſecunda AD. Dico rectam lineam, quæ ſpacium AB poteſt mediæ apotomen eſſe primam. fit enim ipſi AD congruens DG. ergo AG GD rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles, & congruẽs DG commenſurabilis eſt expoſitæ rationali AC; totaq; AG plus poteſt, quàm GD quadrato rectæ lineæ ſibi commenſurabilis longitudine. quoniam igitur AG plus poteſt, quàm GD quadrato rectę lineæ ſibi longitudine commenſurabilis, ſi quartæ parti quadrati ipſius GD æquale parallelogrammum ad AG applicetur, deficiens figura quadrata, in partes commenſurabiles ipſam diuidet. Itaque ſecetur DG bifariam in E: & quadrato ipſius EG æquale parallelogrammum ad AG applicetur, deficiens figura quadrata, quod ſit AFG. ergo commenſurabilis eſt AF ipſi FG longitudine; & per puncta EFG ipſi AC parallelæ ducantur EH FI GK. quoniam igitur AF ipſi FG lõgitudine eſt commenſurabilis, erit AG vtrique ipſarum AF FG commenſurabilis longitudine. rationalis autem eſt AG, & ipſi AC longitudine incommenſurabilis. ergo & vtraque AF FG eſt rationalis, ipſiq; AC incommenſurabilis longitudine; & ob id vtrumque parallelogrammorum AI FK medium eſt. Rurſus quoniam DE commenſurabilis eſt ipſi EG, erit & DG vtrique DE EG commẽſurabilis. ſed DG commenſurabilis eſt ipſi AC longitudine. ergo & vtraque DE EG rationalis eſt, & ipſi AC longitudine commenſurabilis: ac propterea vtrumque parallelogrammorum DH EK eſt rationale. conſtituatur igitur parallelogrammo quidem AI æquale quadratum LM; parallelogrammo autem FK æquale quadratum auferatur NX, communem ipſi angulum habens LOM, ergo circa eandem diametrum ſunt quadrata LM NX, ſit ipſorum diameter OR, & figura deſcribatur. Cum igitur parallelogramma AI FK media ſint, & ſibi ipſis commenſurabilia, & æqualia quadratis ex LO ON, erunt & quadrata ex LO ON media. ergo rectæ lineę LO ON mediæ ſũt, potentia ſolum commenſurabiles. & quoniam rectangulum AFG eſt æquale quadrato

16. huius.

22 huius.

16. huius.

20 huius

16. ſexti.

14.sexti drato ex EG, erit vt AF ad EG, ita EG ad GF: sed vt AF ad EG, ita est parallelogrā mum AC ad ipsum E K. vt autem E G ad GF, ita parallelogrammum EK ad KF: parallelogrammorum igitur AI F K mediū proportionale est EK. est autē & quadratorum LM NX medium proportionale MN: et parallelogrammum A I quidē est æquale quadrato L M; parallelogrāmum vero FK æquale quadrato N X. ergo M N ipsi EK est æquale. sed DH est æquale EK, & LX ipsi MN. totum igitur DK gnomoni YVQ, & quadrato NX æquale erit. itaq; quoniam totum AK æquale est quadratis LM NX, quorum DK est æquale gnomoni Y V Q, & quadrato NX; erit reliquum AB æquale quadrato ST, hoc est ei, quod fit ex LN. quadratū igitur ex LN est æquale spacio A B; ideoq; recta linea L N spacium AB potest. Dico L N mediæ apotomen esse primam. quoniam enim rationale est E K, & æquale ipsi MN, hoc est ipsi LX, erit & LX rationale, videlicet quod LO ON continetur. medium autem ostensum est NX. quare LX est incommensurabile ipsi XN: & vt LX ad XN, ita LO ad ON. ergo LO ON longitudine sunt incommensurabiles; ac propterea LO ON mediæ sunt commensurabiles potentia solum, quæ
75.huius rationale continent. quare LN mediæ apotome prima est, & potest spacium AB. recta igitur linea spacium AB potens mediæ est apotome prima.



F. C. COMMENTARIVS.

Sit AC 4, & AD Rx 48 minus 6: erit DG 6. & DE, vel EG 3 & si ad AG applicetur parallelogrammum AFG aequale quadrato ipsius EG, deficiensq; figura quadrata: erit AF Rx 27, FG Rx 3. & ob id parallelogrammum AI Rx 432, FK Rx 48, & totum AK parallelogrā-
mum Rx 768; parallelogrammum vero DK 24, DH, vel EK 12, & EI 12 minus Rx 48. ergo AB est Rx 768 minus 24, quod spacium etiam apotomen secundam, vel residuum secundum vocāt. Vt autem eius latus quadratum, vel radicem inueniamus, diuidetur Rx 768 in duas partes, ita vt productum ex ipsis sit aequale quartae parti quadrati 24, hoc est aequale 144, erit maior pars Rx 432, minor Rx 48. quare Rx Rx 432 minus Rx Rx 48 est latus quadratum, seu radix eius spacij residui Rx 768 minus 24.

THEOREMA LXX. PROPOSITIO XCIIII.

Si spacium cōtineatur rationali, & apotome tertia, recta linea, spacium potens mediæ est apotome secunda.

Spacium enim AB contineatur rationali AC, & apotoma tertia AD. Dico rectā lineam, quæ potest spacium AB, mediæ esse apotomen secundam. fit enim ipsi AD congruens DG. ergo AG GD rationales sunt, potētia solum commensurabiles, & neutra ipsarum A G GD longitudinę commensurabilis est expositæ rationali AC, totaq; AG plus potest, quàm congruens DG quadrato rectæ lineæ sibi commensurabiles longitudine. si igitur quartæ parti quadrati ipsius DG æquale parallelogrāmum ad AG applicetur, deficiens figura quadrata, in partes commensurabiles ip-
18.huius. sam diuidet. Itaque secetur DG bifariam in E, & quadrato ipsius EG æquale ad AG applicetur, deficiens figura quadrata, quod sit AFG: & per puncta EFG

ipsi

ipsi AC parallelę ducantur EH FI GK. ergo AF FG commensurabiles sunt: atque ob id parallelogrammũ AI parallelogrammo FK est commensurabile. & quoniã AF FG commensurabiles sunt longitudine, erit & AG vtrique ipsarum AF FG longitudine commensurabilis. est autem rationalis AG, & ipsi AC incommensurabilis longitudine. & vtraque igitur AF FG rationalis est, & ipsi AC longitudine incommensurabilis; ac propterea vtrumque parallelogrammorum AI FK est medium. Rursus quoniam DE commensurabilis est ipsi EG longitudine, erit & DG vtrique DE EG cõmensurabilis. sed DG rationalis est, & ipsi AC incõmensurabilis longitudine. rationalis igitur est & vtraque DE EG, & ipsi AC lõgitudine incommensurabilis. ergo vtrumque parallelogrammorũ DH EK medium est. quòd cum AG GD potentia solum commẽsurabiles sint, AG ipsi GD longitudine erit incommẽsurabilis. sed AG commensurabilis est ipsi AF longitudine, & DG ipsi GE. est igitur AF ipsi EG longitudine incommensurabilis. vt autem AF ad EG, ita parallelogrammum AI ad EK parallelogrammum. ergo incõmensurabilis est AI ipsi EK. constituatur ipsi quidem AI æquale quadratum LM; ipsi vero FK æquale auferatur NX, angulum habens eundem, quem LM. ergo quadrata LM NX circa eandem sunt diametrum. sit ipsorum diameter OR, & figura describatur. Quoniam igitur rectangulum AFG est æquale quadrato ex EG, erit vt AF ad EG, ita EG ad GF. vt autem AF ad EG, ita parallelogrammum AI ad EK parallelogrammum; & vt EG ad GF, ita EK ad KF. ergo & vt AI ad EK, ita EK ad KF. parallelogrammorum igitur AI FK medium proportionale est EK. est autem & quadratorum LM NX medium proportionale MN; & parallelogrammum AI quidem æquale est quadrato LM; FK vero ipsi NX. ergo & EK est æquale MN. sed MN æquale est LX, & EK ipsi DH. totum igitur DK gnomoni YVQ, & quadrato NX est æquale. est autem & parallelogrammũ AK æquale quadratis LM NX. ergo reliquum AB est æquale ipsi ST, hoc est quadrato ex LN. & ob id recta linea LN ipsum AB spacium potest. Dico LN mediæ apotomen esse secundam. Quoniam enim media ostensa sunt parallelogramma AI FK, & sunt æqualia quadrãtis ex EO ON, erit & vtrumque quadratorum ex LO ON medium; & idcirco vtraque LO ON media est. & quoniam commensurabile est AI ipsi FK, erit & quadratum ex LO quadrato ex ON commensurabile. Rursus quoniam ostensum est AI incommensurabile ipsi EK, & LM ipsi MN incommensurabile erit, hoc est quadratum ex LO rectangulo LON. quare & recta linea LO ipsi ON longitudine est incommensurabilis. sunt igitur LO ON mediæ commensurabiles potentia solum. Dico eas etiam medium continere. Quoniam enim medium demonstratum est FK, atque est rectãgulo LON æquale, erit & LON medium. ergo LO ON mediæ sunt potentia solum commensurabiles, quæ medium continent; ac propterea LN mediæ apotome secunda est, & potest spacium AB. recta igitur linea spacium AB potens mediæ apotome est secunda.



16. huius.

22. huius.

16. huius.

22. huius.

Ex demonstratis ad 14 huius.

26. sexti.

14. sexti.

Lem. ad 23. huius.

76. huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit AC 6, & AD R 27 minus R 15. erit DG R 15, & DE, vel EG R 3 $\frac{1}{4}$. quòd si ad AG applicetur parallelogrammum æquale quadrato ex EG, deficiensq; figura quadrata, quod sit AF G, erit AF R 18 $\frac{3}{4}$, FG R $\frac{1}{4}$. ideoq; parallelogrammum AI est R 675, FK R 27, & totum AK parallelogrammum R 972. parallelogrammum autem DK R 540, EK R 135, & EI R 135. minus R 27. est igitur AB R 972 minus R 540. quod spacium est apotome tertia, vel tertium residuum. Itaque dimidatur R 972 in duas partes, ita vt quod ex ipsis producitur sit æquale

R 135. *erit maior pars* R 675, *& minor* R 27. *ergo* RR 675 *minus* RR 27 *eſt latus quadratum, vel radix ſpacij illius reſidui* R 972 *minus* R 540.

THEOREMA LXXI. PROPOSITIO XCV.

Si ſpacium contineatur rationali, & apotoma quarta, recta linea ſpacium potens minor eſt.



Spacium enim AB contineatur rationali AC, & apotoma quarta AD. Dico rectam lineam, quę ſpacium AB poteſt, minorem eſſe. ſit enim
4. diffi. tertiarum. ipſi AD congruens DG. ergo AG GD rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles, & AG commenſurabilis eſt expoſitę rationali AC lõgitudine, totaq; AG plus poteſt, quàm GD, quadrato rectę lineæ ſibi longitudine incommenſurabilis. ſi igitur quartę parti quadrati ex DG æquale parallelogrammum ad AG applicetur, de
16. huius. ficiens figura quadrata, in partes incommenſurabiles ipſam diuidet. Itaque ſecetur DG bifariã in E, & quadrato ex EG æquale ad ipſam AG applicetur, deficiens figura quadrata, quod ſit AFG. ergo AF ipſi FG longitudine eſt incommenſurabilis. Ducantur per puncta EFG ipſis AC BD parallelæ EH FI GK. Quoniam igitur AG rationalis eſt, & ipſi AC longitudine commenſurabilis,
20. huius. erit totum parallelogrammum AK rationale. Rurſus quoniam incommenſurabilis eſt DG ipſi AC longitudine, & ſunt vtraque rationales,
21. huius. erit parallelogrammum DK medium. quòd cum AF ipſi FG longitudine ſit incommenſurabilis, erit & parallelogrammum AI incommenſurabile parallelogrammo FK. conſtituatur parallelogrammo quidem AI æquale quadratum LM; parallelogrammo autem FK æquale quadratum NX auferatur, angulum habens eundem,
26. ſexti. quem LM, videlicet LOM. quadrata igitur LM NX circa eandem ſunt diametrum. ſit ipſorum diameter OR, & figura deſcribatur. itaque quoniã rectangulum AFG
24. ſexti. eſt æquale quadrato ex EG, vt AF ad EG, ita erit EG ad GF. ſed vt AF quidem ad EG, ita eſt parallelogrammum AI ad ipſum EK: vt autem EG ad GF, ita EK ad KF. parallelogrammorum igitur AI FK medium proportionale eſt EK. eſt autem & quadratorum LM NX medium proportionale MN. atque eſt parallelogrammum AI æquale quadrato LM, & parallelogrammum FK æquale NX. ergo & FK æquale eſt MN. ſed EK quidem eſt æquale parallelogrammo DH, MN vero ipſi LX. totum igitur DK parallelogrammum gnomoni YVQ, & quadrato NX eſt æquale. & quoniam totum AK æquale eſt quadratis LM NX, quorum DK eſt æquale gnomoni YVQ, & NX quadrato; erit reliquum AB æquale quadrato ST, hoc eſt quadrato ex LN. ergo LN ſpacium AB poteſt. Dico LN irrationalem eſſe, quę minor appellatur. Quoniam enim parallelogrammum AK rationale eſt, & æquale quadratis ipſorum LO ON, erit & compoſitum ex quadratis LO ON rationale. Rurſus quoniam parallelogrammum DK medium eſt, atque eſt æquale ei, quod bis continetur LO ON: erit & quod LO ON cõtinetur mediũ: oſtenſũ aũt eſt parallelogrãmũ AI incõmẽſurabile ipſi FK. ergo & quadratũ ex LO incõmenſurabile eſt quadrato ex ON; ac propterea LO ON potentia ſunt incommenſurabiles, quę faciunt compoſitum qui
77. huius. dẽm ex ipſarum quadratis rationale, quod autem ipſis continetur medium. quare LN irrationalis eſt, quæ minor appellatur, & poteſt ſpacium AB. recta igitur linea ſpacium AB potens minor eſt.

F. C.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit AC 6. AB 7 minus R 14. *erit DG* R 14, *& DE, vel EG* R $3\frac{1}{2}$. *Si vero ad AG applicetur parallelogrammum AFG æquale quadrato ipsius EG, deficiens q; figura quadrata, erit AF* $3\frac{1}{2}$ *plus* R $8\frac{1}{4}$: *FG* $3\frac{1}{2}$ *minus* R $8\frac{1}{4}$, *& parallelogrammum AI est* R 21 *plus* R 315, *FK* 21 *minus* R 315, *& totum AK* 42. *parallelogrammum vero DK est* R 504, *CK* R 126. *& AB* 42 *minus* R 504. *quod spacium est apotome quarta, vel residuum quartum. si igitur* 42 *dividatur in duas partes, ita ut productum ex ipsis sit æquale quartæ parti* R 504, *hoc est* R 126, *erit maior pars* 21 *plus* R 126, *& minor* 21 *minus* R 126. *ergo* R *V.* 21 *plus* R 126 *minus* R *V.* *minus* R 126 *est latus quadratum, seu radix spacij residui* 42 *minus* R 504.

THEOREMA LXXXII. PROPOSITIO. XCVI.

Si spacium contineatur rationali, & apotoma quinta, recta linea spacium potens est, quæ cum rationali medium totum efficit.



Spacium enim AB contineatur rationali AC, & apotoma quinta AD. Dico rectã lineam, quæ spacium AB potest, esse eam, quæ cum rationali medium totum efficit. sit enim ipsi AD congruens DG. ergo AG GD rationales sunt potentia solum cũmensurabiles; & congruens DG longitudine commensurabilis est expositę rationali AC; totaq; AG plus potest, quàm GD quadrato rectæ lineæ sibi incommensurabilis longitudine. si igitur quartæ parti quadrati ex DG æquale parallelogrammum ad AG applicetur, deficiens figura quadrata, in partes incommensurabiles ipsam diuidet. Itaque secetur DG bifariam in puncto E, & quadrato ex EG æquale ad ipsam AG applicetur, deficiens figura quadrata, quod sit AFG. ergo AF incommensurabilis est ipsi FG longitudine. Ducantur per puncta EFG ipsi AC parallelę EH FI GK. & quoniam AG incommensurabilis est ipsi AC lõgitudine, & sunt vtręque rationales; erit parallelogrammum AK medium. Rursus quoniam rationalis est DG, & ipsi AC longitudine commensurabilis; parallelogrammum DK rationale erit. Constituatur igitur parallelogrammo quidem AI æquale quadratum LM; ipsi vero FK æquale quadratum auferatur NX, angulum habens eundem; quem LM, videlicet LOM. ergo quadrata LM NX circa eandem sunt diametrum. sit diameter ipsorum OR, & figura describatur. Similiter osti ẽdemus rectam lineam LN spacium AB posse. Dico LN esse eam, quæ cum rationali medium totum efficit. Quoniam enim ostendimus parallelogrammum AK medium esse; atque est æquale quadratis ipsarum LO ON: erit & compositum ex quadratis LO ON medium. Rursus quoniam DK rationale est, & æquale ei, quod bis continetur LO ON; erit & quod bis LO ON continetur rationale. est autem AI incommensurabile ipsi FK. incommensurabile igitur est quadratum ex LO quadrato ex NO; ideoque LO ON potentia incommensurabiles sunt, facientes compositum quidem ex ipsorum quadratis medium; quod autem ipsis bis continetur rationale. ergo reliqua LN irrationalis est, quæ vocatur cum rationali medium totum efficiens, & potest spacium AB. recta igitur linea spacium AB potens est, quæ cum rationali medium totum efficit.

69. huius.

21. huius.

20. huius

21. huius

F. C. COMMENTARIVS.

Sit AC 6, AD R 36 minus 4, erit DG 4, & DE, vel EG 2. quòd ſi ad AG applicetur parallelogrammum AFG æquale quadrato ex CG, deficiensq; figura quadrata, erit AF R 14 plus R 10; FG R 14 minus R 10. & parallelogrammum AI eſt R 504 plus R 360, FK R 504 minus R 360: totumq; AK R 2016. At vero DK eſt 24, EK 12, & AB R 2016 minus 24. quod ſpacium eſt apotome quinta, vel reſiduum quintum. Dimidatur R 2016 in duas partes, ita vt productum ex ipſis ſit æquale 144, erit maior pars R 504 plus R 360, & minor R 504 minus R 360. quare R V. R 504 plus R 360 minus R V. R 504 minus R 360 eſt latus quadratum dicti ſpacij reſidui R 2016 minus 24.

THEOREMA LXXIII. PROPOSITIO XCVII.

Si ſpacium contineatur rationali, & apotoma ſexta, recta linea ſpacium potens eſt, quæ cum medio medium totum efficit.



Spacium enim AB contineatur rationali AC, & apotoma ſexta AD. Dico rectam lineam, quę ſpacium AB poteſt, eſſe eam, quæ cum medio medium totum efficit. ſit enim ipſi AD congruens DG. ergo AG GD rationales
6. diffin. tertiarum. ſunt potentia ſolum commenſurabiles; & neutra ipſarum commenſurabilis eſt expoſitę rationali AC longitudine. totaq; AG plus poteſt, quàm congruens DG quadrato rectæ lineæ ſibi longitudine incõmenſurabilis. ſi igitur quartæ parti quadrati ex DG ęquale ad rectam lineam AG ap
19. huius. plicetur, deficiens figura quadrata, in partes incommenſurabiles ipſam diuidet. Itaque ſecetur DG bifariam in E, & quadrato ex CG æquale parallelogrammum ad AG applicetur, deficiens figura quadrata, quod ſit AFG. incommenſurabilis igitur eſt AF ipſi FG longitudine. ut autem AF ad FG, ita eſt parallelogrammum AI ad ipſum FK. ergo AI ipſi FK eſt incommenſurabile. & quoniam AG AC
10. huius: 22. huius rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles, erit parallelogrammum AK medium. ſunt autem AC DG rationales, & incommenſurabiles longitudine. medium igitur eſt & DK. quòd cum AG GD potentia ſolum commenſurabiles ſint, erit AG ipſi GD longitudine incommenſurabilis. ſed ut AG ad GD, ita eſt AK ad KD. incom-
10. huius: menſurabile igitur eſt AK ipſi KD. itaque conſtituatur parallelogrammo AI ęquale quadratum LM; parallelogrammo autem FK æquale auferatur quadratum NX,
14. ſexti. angulum habens eundem, quem LM. ergo quadrata LM NX circa eãdem ſunt diametrum. ſit eorum diameter OR, & figura deſcribatur. ſimiliter vt ſupra, oſtendemus rectam lineam LN ſpacium AB poſſe. Dico LN eſſe eam, quæ cum medio medium totum efficit. Quonã enim medium oſtenſum eſt AK, atque eſt æquale quadratis ipſarum LO ON, erit & compoſitum ex quadratis LO ON medium. Rurſus quoniam medium oſtenſum eſt DK, & eſt ęquale ei, quod bis continetur LO ON; & quod bis LO ON continetur medium erit. Incommenſurabile autem oſtenſum eſt AK ipſi KD. ergo & quadrata ex LO ON incommenſurabilia ſunt ei, quod bis LO ON continetur. & quoniam incommenſurabile eſt AI ipſi FK, erit & quadratum ex LO quadrato ex ON incommenſurabile. ergo LO ON potentia ſolum commenſurabiles ſunt, facientes compoſitum quidem ex quadratis ipſarum medium. quod autem ipſis bis continetur medium, & incommenſurabile compoſito ex ipſa-
79. huius. rum quadratis. ergo LN irrationalis eſt, quæ vocatur, cum medio medium totum efficiens, & poteſt AB ſpacium. recta igitur linea ſpacium AB potens eſt, quæ cum medio medium totum efficit.

F. C.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit AC 6, AD R 32 minus R 20, erit DG R 20, & DE vel EG R 5. ſi autem ad AG applicetur parallelogrammum AFG, æquale quadrato ex EG, & deficiens figura quadrata, erit AF R 8 plus R 3, FG R 8 minus R 3: & idcirco parallelogrammum AI R 288 plus R 108, FK R 288 minus R 108, & totum parallelogrammum AK R 1152. parallelogrammum vero DK eſt R 720, DH R 18, & AB R 1152 minus R 720. quod ſpacium eſt apotome ſexta, vel ſextæ reſiduum, & eius latus quadratum, vel radix inuenietur eſſe R V. R 288 plus R 108 minus R V. 288 minus R 108.

THEOREMA LXXIIII. PROPOSITIO. XCVIII.

Quadratum apotomæ ad rationalem applicatum latitudinem facit apotomen primam.

Sit apotome AB, rationalis autem CD, & quadrato ex AB æquale parallelogrammum CE ad ipſam CD applicetur latitudinẽ faciens CF. Dico CF apotomen eſſe primam. ſit enim ipſi AB congruens BG. ergo AG GB rationales ſunt potentia ſolum cõmenſurabiles: & quadrato quidẽ ex AG æquale ad ipſam CD applicetur CH: quadrato autem ex BG æquale applicetur KL. totum igitur CL eſt æquale quadratis ex AG GB, quorum parallelogrammum CE æquale eſt quadrato ex AB. ergo reliquum FL ei, quod bis AG GB continetur eſt æquale. ſecetur FM biſariam in N: & per N ipſi CD parallela ducatur NX: vtrumque igitur ipſorum FX LN eſt æquale ei, quod AG GB continetur. & quoniam quadrata ex AG GB rationalia ſunt, atque eſt quadratis ex AG GB æquale parallelogrammum DM; erit ipſum DM rationale; & ad rationalẽ CD applicatum eſt, latitudinẽ faciens CM. ergo CM eſt rationalis, & ipſi CD commenſurabilis longitudine. Rurſus quoniam medium eſt, quod bis continetur AG GB, eſtq; ei, quod bis AG GB continetur; æquale parallelogrammum LF; erit ipſum LF medium: & applicatum eſt ad rationalem CD, latitudinem faciens FM. quare FM eſt rationalis, ipſiq; CD longitudine incommenſurabilis. & ſunt quadrata quidem ex AG GB rationalia: quod autem bis continetur AG GB medium. quadrata igitur ex AG GB incommẽſurabilia ſunt ei, quod bis AG GB continetur. ſed quadratis ex AG GB æquale eſt parallelogrammum CL. ei verò, quod bis continetur AG GB eſt æquale FL. ergo CL ipſi LF eſt incõmenſurabile. vt autem CL ad LF, ita eſt recta linea CM ad MF. incommẽſurabilis igitur eſt CM ipſi MF longitudine: & ſunt vtræque rationales. ergo CM MF rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles; ac propterea CF eſt apotome. Dico & primam eſſe. Quoniam enim quadratorum ex AG GB medium proportionale eſt quod AG GB continetur; atque eſt quadrato quidem ex AG æquale parallelogrãmum CH; ei vero, quod AG GB continetur æquale NL, & quadrato ex GB æquale KF. erit ipſorum CH KL medium proportionale NL. vt igitur CH ad NL, ita NL ad LK. ſed vt CH ad NL, ita eſt recta linea CK ad ipſam NM. vt autem NL ad LK, ita recta linea NM ad MK. ergo vt CK ad NM, ita eſt NM ad MK. & ob id rectangulum CKM eſt æquale ei, quod fit ex MN quadrato, hoc eſt quartę parti quadrati ex FM. & quoniam quadratum ex AG commenſurabile eſt quadrato ex GB, erit & parallelogrammum CH parallelogrammo KL commenſurabile. ſed vt CH ad KL, ita eſt recta linea CK ad ipſam KM. commenſurabilis igitur eſt CK ipſi KM. itaque cum duæ rectæ lineę inæquales ſint CM MF, & quartę parti quadrati ex FM æquale parallelogramum ad ipſam CM applicatum ſit, deficiens figura quadrata, quod ſcilicet



74. huius.

7. secundi.

21. huius.

23. huius.

1. sexti.

74. huius.

Lem. ad 55. huius.

11. quinti.

17. sexti.

16.huius. scilicet CK KM continetur; sitq; CK commensurabilis ipsi KM: recta linea CM plus
poterit, quam MF quadrato rectę lineę sibi longitudine commensurabilis. atque est
1.diffi. tertiarum. CM commensurabilis longitudine expositæ rationali CD. ergo CF est prima apotome. quadratum igitur apotomæ ad rationalem applicatum latitudinem facit apotomen primam.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit AB R 33 *minus* R 3, *BG* R 3. *rationalis autem CD sit 6; & si ad ipsam CD applicetur parallelogrammum CH aequale quadrato ex AG, quod est 33, latitudinem faciens CK, erit CK* 5 $\frac{1}{2}$. *& si ad eandem applicetur KL aequale quadrato ex GB, quod est 3, latitudinem faciens KM, erit KM* $\frac{1}{2}$, *& tota CM 6. Rursus si ad eandem CD applicetur parallelogrammum FX, quod est* R 99, *latitudinem faciens FN, erit FN* R 2 $\frac{1}{4}$, *& eadem ratione NM est* R 2 $\frac{1}{4}$, *& tota FM* R 11. *ergo CF est 6 minus* R 11, *quę est apotome prima.*

THEOREMA LXXV. PROPOSITIO. XCIX.

Quadratum medię apotomæ primę ad rationalem applicatum latitudinem facit apotomen secundam.

Sit apotome mediæ prima AB; rationalis autē CD: & quadrato ex AB æquale parallelogrammū CE ad ipsam CD applicetur, latitudinem faciens CF. Dico CF apotomē esse secundam. sit enim ipsi AB congruens BG. ergo AG GB mediæ sunt
77.huius. potentia solum commensurabiles, quæ rationale continent: & quadrato quidem ex AG æquale parallelogrammum CH ad CD applicetur, latitudinem faciens CK: quadrato autem ex GB ęquale KL ad eandem applicetur, latitudinem faciens KM. totum igitur CL est ęquale quadratis ex AG GB medijs existētibus. quare & CL est medium; & ad rationalem CD applicatum est, latitudinem
23.huius. faciens CM. rationalis igitur est CM, & ipsi CD longitudine incommensurabilis, itaque quoniam CL est æquale quadratis ex AG GB, quorum quadratum ex AB ęquale est parallelogrammo CE; erit reliquum, quod bis continetur AG GB æqua
7 secundi. 21.huius. le ipsi FL. est autem rationale, quod bis AG GB continetur. rationale igitur est & FL; & ad rationalem FE applicatum est, latitudinem faciens FM. quare FM est rationalis, & ipsi CD commensurabilis longitudine. & quoniam quadrata quidem ex AG GB, hoc est parallelogrammum CL medium est; quod autem bis continetur AG GB, videlicet FL est rationale: erit CL incommēsurabile ipsi LF. vt autem CL ad
1.sexti. 10.huius. LF, ita recta linea CM ad MF. ergo CM ipsi MF longitudine est incōmensurabilis. & sunt vtræque rationales. sunt igitur CM MF rationales potentia solum commensu
74.huius. rabiles. ideoq; CF apotome est. Dico & secundam esse. secetur enim FM bifariam in puncto N: & per N ipsi CD parallela ducatur NX. vtrumque igitur parallelogrammorum FX NL est ęquale ei, quod continetur AG GB. & quoniam quadratorum
Lem. ad 55. huius. ex AG GB medium proportionale est, quod AG GB continetur; estq; quadratū ex AG æquale parallelogrammo CH; quod autem continetur AG GB æquale parallelogrammo NL; & quadratum ex GB æquale ipsi KL: erit parallelogrammorū CH KL medium proportionale NL. est igitur vt CH ad NL, ita NL ad LK. Sed vt CH ad NL, ita est recta linea CK ad ipsam NM; & vt NL ad LK, ita NM ad MK. ergo vt
17.quinti. 17.sexti. CK ad NM, ita est NM ad MK; ac propterea rectāgulum CKM est æqnale quadrato ex NM, hoc est quartæ parti quadrati ex FM. & quoniam quadratum ex AG commensurabile est quadrato ex CB, erit & CH parallelogrammum parallelogrammo KL commensurabile, hoc est recta linea CK commensurabilis ipsi KM. quòd cum



duæ

dnę rectæ lineę inæquales sint CM MF;quartæ autem parti quadrati ex MF æquale parallelogrammum CKM ad maiorem CM applicatum sit, deficiens figura quadrata,& in partes commensurabiles ipsam diuidit: recta linea CM plus poterit, quàm MF quadrato rectæ lineæ sibi commensurabilis longitudine:atque est congruens FM expositę rationali CD commensurabilis.quare CF est apotome secunda. quadratum igitur mediæ apotomę primæ ad rationalem applicatum latitudinem facit apotomen secundam. 18.huius: 2. Diffi. tertiarum.

F. C. COMMENTARIVS.

Ex iam demonstratis perspicuum fit, vt apotomę quadratū inueniamus, nos vti septima propositione 2 libri, non autem quarta, vt ad 34 huius dictum est.

Sit AB RR 972 *minus* RR 108, *BG* RR 108, *rationalis autem CD sit 6. & si ad ipsam CD applicetur parallelogrammum CH aequale quadrato ex AG, quod est* R 972, *latitudinem faciens CK; erit CK* R 27: *& si ad eadem applicetur KL aequale quadrato ex GB, quod est* R 108 *latitudinem faciens KM; erit KM* R 3. *& tota CM* R 48. *Rursus si ad CD applicetur parallelogrammum FX aequale rectangulo AGB, quod est* 18, *latitudinem faciens FN; erit FN* 3, *itemq; NM* 3, *& tota FM* 6. *ergo CF est* R 48 *minus* 6, *quae est apotome secunda.*

THEOREMA LXXVI. PROPOSITIO C.

Quadratum mediæ secundæ apotomæ ad rationalem applicatum latitudinem facit apotomen tertiam.

Sit medię apotome secunda AB; rationalis autem CD & quadrato ex AB æquale parallelogrammum CE ad ipsam CD applicetur,latitudinem faciēs CF. Dico CF apotomen esse tertiam. sit enim ipsi AB congruens BG. ergo AG GB mediæ sunt potentia solum commensurabiles, quæ medium continent: & quadrato quidem ex AG æquale ad CD applicetur CH,latitudinem faciens CK:quadrato autem ex GB æquale ad KH applicetur KL,latitudinem faciens KM. totum igitur CL est æquale quadratis ex AG GB:& sunt quadrata ex AG GB media. ergo & CL est medium,& ad rationalem CD applicatum est, latitudinem faciens CM. ergo CM est rationalis, & ipsi CD incommensurabilis longitudine. & quoniam totum CL est æquale quadratis ex AG GB, quorum CE æquale est quadrato ex AB; erit reliquum FL æquale ei,quod bis continetur AG GB. secetur FM bifariam in N;& per N ipsi CD parallela ducatur NX. Vtrumque igitur parallelogrammorum FX NL est æquale ei, quod AG GB continetur. est autem quod continetur AG GB medium. ergo & medium est FL,& ad rationalem EF applicatum est,latitudinem faciens FM. quare & FM est rationalis; & ipsi CD longitudine incommensurabilis. & quoniam AG GB potentia solum commensurabiles sunt, erit AG ipsi GB incommensurabilis longitudine. ideoq; quadratum ex AG rectangulo AGB est incommensurabile. sed quadrato quidem ex AG commensurabilia sunt ex AG GB quadrata; rectangulo autem AGB commensurabile est quod bis AG GB continetur. ergo quadrata ex AG GB ei,quod bis AG GB continetur, sunt incommensurabilia. at quadratis ex AG GB æquale est parallelogrammum CL;ei vero, quod bis continetur AG GB est æquale FL. incommensurabile igitur est CL ipsi LF. Vt autem CL ad LF, ita est recta linea CM ad MF. ergo CM ipsi MF incommensurabilis est longitudine;& sunt vtręque rationales. quare CM MF rationales sunt potentia solum commensurabilis. & ob id apotome est CF. Dico & tertiam esse. Quoniam enim quadratum ex AG commensurabile est quadrato ex GB, erit



76.huius: 23.huius. 7.secundi: 23.huius. Lem. ad 23. huius. Ex demonstratis in 24 huius. 1.sexti. 10.huius. 74 huius.

erit parallelogrammum CH parallelogrammo KL commensurabile. ergo & recta linea CK est cõmensurabilis ipsi KM. & quoniam quadratorum ex AG GB mediũ proportionale est rectangulũ AGB; atque est quadrato quidem ex AG æquale parallelogrammum CH; quadrato autem ex GB æquale KL, & rectangulo AGB æquale NL: erit parallelogrammorum CH KL medium proportionale NL. est igitur vt CH ad NL, ita NL ad LK. sed vt CH ad NL, ita est recta linea CK ad NM: vt autem NL ad LK, ita NM ad MK. ergo & vt CK ad NM, ita NM ad MK; ac propterea rectangulum CKM est æquale quadrato ex NM, hoc est quartæ parti quadrati ex FM. Quoniam igitur duæ rectæ lineæ inæquales sunt CM MF; & quartæ parti quadrati ex FM æquale ad CM applicatum est, deficiens figura quadrata, quod in partes cõmensurabiles ipsam diuidit: recta linea CM plus poterit, quam MF quadrato rectæ lineæ sibi longitudine commensurabilis. & neutra ipsarum CM MF longitudine commensurabilis est expositæ rationali CD. ergo CF tertia est apotome. quadratum igitur mediæ apotomæ secundæ ad rationalem applicatum, latitudinem facit apotomen tertiam.



Lem. ad 55. huius

1. sexti.

11. quinti; 27. sexti.

18. huius.

3. diffin. tertiarum.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit AB RR 882 *minus* RR 18, *BG* RR 18, *& rationalis CD sit 6. quòd si ad CD applicetur parallelogrammum CH æquale quadrato ex AG, latitudinem faciens CK, erit CK* R 24 $\frac{1}{2}$. *& si applicetur KL æquale quadrato ex GB, quòd latitudinem faciat KM, erit KM* R $\frac{1}{2}$; *& tota CM* R 32. *præterea si ad eandem CD applicetur FX æquale rectangulo AGB, quod est* R 126, *latitudinem faciens FN, erit FN* R 3 $\frac{1}{2}$; *& tota FM* R 14. *ergo CF est* R 32 *minus* R 14, *quæ est apotome tertia.*

THEOREMA LXXVII. PROPOSITIO CI.

Quadratum minoris ad rationalem applicatum latitudinem facit apotomen quartam.

Sit minor AB, rationalis autem CD: & quadrato ex AB æquale parallelogrãmum CE ad ipsam CD applicetur, latitudinem faciens CF. Dico CF apotomen esse quartam. sit enim ipsi AB congruẽs BG. ergo AG GB potentia incommensurabiles sunt, faciẽtes compositum quidem ex ipsarum AC GB quadratis rationale; quod autem bis ipsis continetur medium: & quadrato ex AG æquale ad CD applicetur CH, latitudinem faciens CK: quadrato autem ex GB æquale ad KH applicetur KL, latitudinẽ faciens KM. totum igitur CL quadratis ex AG GB est æquale. atque est compositum ex quadratis AG GB rationale. ergo & rationale est CL; & ad rationalem CD applicatum est, latitudinem faciẽs CM. quare CM est rationalis, & ipsi CD longitudine commensurabilis. & quoniam totum CL est æquale quadratis ex AG GB, quorum CE æquale est quadrato ex AB: erit reliquum FL æquale ei, quod bis AG GB cõtinetur. Itaque secetur FM bifariam in N; & per N alterutri ipsarum CD ML parallela ducatur NX. vtrumque igitur parallelogrammorum FX NL est æquale ei, quod continetur AG GB. & quoniam quod bis continetur AG GB medium est, & æquale parallelogrammo LF. erit & LF medium.



77. huius.

21. huius.

7. secundi.

dium. & ad rationalem FE applicatum eſt, latitudinem faciens FM. ergo FM eſt ra- 23.huius
tionalis, & ipſi CD longitudine incommenſurabilis. & quoniam compoſitũ ex quadratis ipſarum AG GB eſt rationale; quod autem bis AG GB continetur mediũ: erunt quadrata ex AG GB ei, quod bis continetur AG GB incommenſurabilia. quadratis autem ex AG GB æquale eſt parallelogrammum CL; & ei quod bis AG GB continetur eſt æquale FL. incommenſurabile igitur eſt CL ipſi LF. ſed vt CL ad LF, ita eſt CM ad MF. quare CM ipſi MF longitudine eſt incommenſurabilis: & ſunt 1.ſexti:
vtræque rationales. ergo CM MF rationales ſunt potentia ſolum commenſurabi- 10.huius:
les. & eam ob cauſſam apotome eſt CF. Dico & quartam eſſe. Quoniam enim AG 74.huius.
GB potentia ſunt iucommenſurabiles, erit quadratum ex AG incommenſurabile quadrato ex GB. & quadrato quidem ex AG æquale eſt parallelogrammum CH; quadrato autem ex GB eſt æquale KL. incommenſurabile igitur eſt CH ipſi KL. ſed vt CH ad KL, ita eſt CK ad KM. ergo CK ipſi KM eſt incommenſurabilis longitudi- 1.ſexti.
ne. & quoniam quadratorum ex AG GB medium proportionale eſt AGB rectan- 10.huius.
gulum; atque eſt quadrato quidem ex AG æquale parallelogrammum CH; quadra- Lem. ad 55.
to autem ex GB æquale KL; & rectangulo AGB æquale NL: erit NL medium pro- huius.
portionale parallelogrammorum CH KL. eſt igitur vt CH ad NL, ita NL ad LK. ſed vt CH ad NL, ita CK ad MN; & vt NL ad LK, ita NM ad MK. ergo vt CK ad MN 1.ſexti.
ita NM ad MK; ac propterea rectangulum CKM eſt æquale quadrato ex NM, hoc 11.quinti.
eſt quartę parti quadrati ex FM. Itaque quoniam duę rectæ lineæ inæquales ſunt C 27.ſexti.
M MF; & quartæ parti quadrati ex FM æquale ad CM applicatum eſt, deficiens figu
ra quadratá, quod eſt CKM, & in partes incommenſurabiles ipſam diuidit: recta li- 19.huius.
nea CM plus poterit, quàm MF quadrato rectę lineę ſibi incommẽſurabilis longitu
dine. & eſt tota CM longitudine commenſurabilis expoſitę rationali CD. ergo CF 4.Diffi. ter-
quartá eſt apotome: quadratum igitur minoris ad rationalem applicatum latitu- tiarum.
dinem facit apotomen quartam.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit AB R *V.21 plus* R *315, minus* R *V.21 plus* R *315; BG* R *V.21 minus* R *315: rationalis autem CD ſit 6. & ſi ad CD applicetur parallelogrammum CH aequale quadrato ex AG, latitudinem faciens CK, erit CK 3* $\frac{1}{2}$ *plus* R *8* $\frac{3}{4}$. *& ſi applicetur KL aequale quadrato ex G B, quod latitudinem faciat KM, erit KM 3* $\frac{1}{2}$ *minus* R *8* $\frac{1}{4}$: *& tota CM 7. Quòd ſi ad eandem CD applicetur FX aequale rectangulo AGB, videlicet* R *126, latitudinem faciens FN, erit FM* R *3* $\frac{1}{2}$; *& tota FM* R *14. eſt igitur CF 7 minus* R *14, quae eſt apotome quarta.*

THEOREMA LXXVIII. PROPOSITIO CII.

Quadratum eius, quę cum rationali mediũ totum efficit ad rationalem applicatum latitudinem facit apotomen quintam.

Sit quę cum rationali medium totum efficit AB; rationalis autem CD; & quadrato ex AB æquale ad CD applicetur parallelogrammum CE, latitudinem faciens CF. Dico CF apotomen eſſe quintam. ſit enim ipſi AB congruens BG. ergo AG GB rectæ lineæ potentia ſunt incõmenſurabiles, quæ faciunt compoſitum quidem ex quadratis ipſarum medium; quod autem bis ipſis continetur rationale. & quadrato ex AG æquale parallelogrammũ CH ad ipſam CD applicetur, latitudinem faciens CK: quadrato autem ex GB æquale applicetur KL latitudinẽ faciens KM. totum igitur CL eſt æquale quadratis ex AG GB. ſed compoſitum ex quadratis ipſarum AG GB eſt medium. ergo & medium eſt parallelogrammum CL; &



98.huius.

ad rationalem CD applicatum eſt, latitudinem faciens
23. huius CM. quare CM eſt rationalis, & ipſi CD longitudine incommenſurabilis. & quoniam totum CL eſt æquale quadratis ex AG GB, quorum CE æquale eſt quadrato ex A
7 secundi. B; erit reliquum FL æquale ei, quod bis AG GB continetur. Itaque ſecetur FM bifariam in puncto N, & ab ipſo N alterutri ipſarum CD ML parallela ducatur NX. vtrumque igitur FX NL eſt æquale ei, quod AG GB continetur. & quoniam quod bis continetur AG GB rationale eſt, & æquale parallelogrammo FL; erit & FL rationale; &
21. huius. ad rationalem EF applicatum eſt, latitudinem faciens FM. ergo FM eſt rationalis, & ipſi CD commenſurabilis lõgitudine. eſt autem parallelogrammum CL medium, &
1. sexti. FL rationale. incommenſurabile igitur eſt CL ipſi LF. & vt CL ad LF, ita CM ad MF. ergo CM ipſi MF longitudine eſt incommenſurabilis. & ſunt vtraque rationales.
10. huius. 74. huius. quare CM MF rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles; ob idque apotome eſt CF. Dico & quintam eſſe. ſimiliter enim demonſtrabimus rectangulum CK M eſſe æquale quadrato ex NM, hoc eſt quartę parti quadrati ex FM, quòd cum quadratum ex AG incommenſurabile ſit quadrato ex GB; ſitq; quadratum ex AC parallelogrammo CH æquale; quadratum autem ex GB parallelogrammo KL: erit CH ipſi KL incommenſurabile. ſed vt CH ad KL, ita CK ad KM. ergo CK ipſi KM longitudine eſt incommenſurabilis. Quoniam igitur duę rectæ lineæ CM MF inæ-
1. sexti. 10. huius. quales ſunt: & quartæ parti quadrati ex FM æquale ad ipſam CM applicatum eſt, deficiens figura quadrata, & in partes incommenſurabiles ipſam diuidit; recta linea CM plus poterit, quàm MF quadrato rectę lineæ ſibi longitudine incommẽſurabilis.
99. huius. atque eſt congruens FM commenſurabilis longitudine expoſitæ rationali CD. ergo
5. diffi. tertia huius. CF quinta apotome eſt. quadratum igitur eius, quæ cum rationali medium totum efficit ad rationalem applicatum latitudinem facit apotomen quintam.



F. C. COMMENTARIVS.

Sit AB R *V.* R 288 *plus* R 207 *minus* R *V.* 288 *minus* R 207. *BG* R *V.* R 288 *minus* R 207: *rationalis autem CD ſit 6. quòd ſi ad CD applicetur parallelogrammum CH aequale quadrato ex AG, latitudinem faciens CK; erit CK* R 8 *plus* R 5 $\frac{1}{4}$. *& ſi applicetur KL aequale quadrato ex GB, latitudinẽ faciens KM erit KM* R 8 *minus* R 5 $\frac{1}{4}$, *& tota CM* R 32. *Rurſus ſi ad eandem CD applicetur FX aequale rectangulo AGB, latitudinem faciens FN; erit FN* 1 $\frac{1}{2}$. *& tota FM* 3. *quare CF eſt* R 32 *minus* 3, *quae eſt apotome quinta.*

THEOREMA LXXIX. PROPOSITIO CIII.

Quadratum eius, quæ cum medio medium totum efficit ad rationalem applicatum latitudinem facit apotomen ſextam.

Sit quę cum medio medium totum efficit AB; rationalis autem CD: & quadrato ex AB æquale parallelogrammum CE ad ipſam CD applicetur, latitudinem faciens CF. Dico CF apotomen eſſe ſextam. ſit enim ipſi AB congruens BG. ergo AG GB potentia ſunt incommenſurabiles, facientes compoſitum quidem ex ipſarum quadratis medium: quod autem bis ipſis AG GB continetur medium, & adhuc quadratis ipſarum incommenſurabile. Itaq; ad CD applicetur quadrato ex AG æquale parallelogrãmũ CH, latitudinem faciens



CK.

CK:quadrato aũt ex BG ęquale applicetur KL,latitudinem faciens KM. totũ igitur CL eſt ęquale quadratis ex AG GB:ac propterea CL eſt mediũ,& ad rationalẽ CD applicatum eſt, latitudinem faciens CM.ergo CM rationalis eſt,& ipſi CD longitudine incommenſurabilis. Quoniam igitur CL eſt æquale quadratis ex AG GB,quorum CE æquale eſt quadrato ex AB; erit reliquum FL æquale ei,quod bis AG GB continetur. atque eſt quod bis cõtinetur AG GB medium.ergo & FL eſt medium, & ad rationalem FE applicatum eſt,latitudinem faciens FM. eſt igitur FM rationalis, & ipſi C D longitudine incommenſurabilis. & quoniam quadrata ex AG GB incommenſurabilia ſunt ei, quod bis AG GB continetur; atque eſt quadratis quidem AG GB ęquale parallelogrammum CL; ei vero,quod bis continetur AG GB æquale FL: erit CL ipſi LF incommenſurabile. ſed vt CL ad LF, ita eſt CM ad MF. quare CM ipſi MF incommenſurabilis eſt longitudine: & ſunt vtręque rationales. ergo CM MF rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles.& ob id CF eſt apotome. Dico & ſextam eſſe. Quoniã enim FL eſt ęquale ei, quod bis continetur AG GB, ſecetur FM bifariã in puncto N; & per N ipſi CD parallela ducatur NX. vtrũq; igitur parallelogrammorum FX NL eſt æquale rectangulo AGB. & quoniam AG GB potentia ſunt incommenſurabiles; erit quadratum ex AG incommenſurabile quadrato ex BG. ſed quadrato quidem ex AG eſt æquale parallelogrammum CH; quadrato autem ex BG æquale KL. ergo CH ipſi KL eſt incommenſurabile. vt autem CH ad KL,ita eſt CK ad KM. incommenſurabilis igitur eſt CK ipſi KM. quòd cum quadratorum ex AG GB medium proportionale ſit rectangulum AGB;ſitq; quadrato ex AG æquale CH, & quadrato ex G B æquale KL; rectangulo; A G B æquale NL: erit & parallelogrammorum CH KL medium proportionale NK. & eadem ratione C M plus poterit, quàm M F quadrato rectæ lineæ ſibi longitudine incommenſurabilis: & neutra ipſarum eſt commenſurabilis lõgitudine expoſitę rationali CD.ergo CF ſexta eſt apotome. quadratum igitur eius,quę cum medio medium totum efficit ad rationalem applicatum latitudinem facit apotomen ſextam.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit AB R V. R 396 *plus* R 288 *minus* R *V.* R 396 *minus* R 288; *BG* R *V.* R 396 *minus* R 288; *& rationalis C D ſit* 6. *ſi vero ad C D applicetur parallelogrammum C H, latitudinem faciens CK; erit CK* R 11 *plus* R 8, *& ſi applicetur KL aequale quadrato ex G B, latitudinem faciens KM; erit KM* R 11 *minus* R 8, *& tota CM* R 44. *Rurſus ſi ad C D applicetur FX ęquale rectangulo AGB, quod latitudinem faciat F N, erit ea* R 3, *& tota FM* R 12. *ergo CF eſt* R 44 *minus* R 12, *quae eſt apotome ſexta.*

THEOREMA LXXX. PROPOSITIO. CIIII.

Recta linea apotomę longitudine cõmenſurabilis, & ipſa apotome eſt,atque ordine eadem.



Sit apotome AB; et ipſi A B longitudine cõmenſurabilis ſit CD. Dico CD apotomen eſſe, atque ordine eandem,quæ AB.quoniam enim apotome eſt A B, ſit ipſi congruens B E. ergo AE EB rationales ſunt potentia ſolum commẽſurabiles. & fiat proportio BE ad D F eadem, quę eſt AB ad C D. quare vt vna ad vnam,ita erunt omnes ad omnes. eſt igitur vt A B ad CD,ita A E ad CF. commenſurabilis autem eſt AB ipſi CD longitudine. ergo & AE ipſi C F longitudine commenſurabilis erit, & BE ipſi DF. ſunt autem AE EB rationales potentia ſolum cõmenſurabiles. ergo & EF FD rationales erunt potentia ſolum commẽſurabiles: ac propterea CD apotome eſt. Diço & ordine eandem eſſe. Quoniam enim eſt vt AE ad CF,ita BE ad FD,erit permutãdo vt AE ad EB,ita CF ad FD.vel igitur AE plus

74. huius.

11. quinti.

10. huius.

A

B

74. huius.



poteſt,quàm EB quadrato rectę lineę ſibi longitudine commenſurabilis, vel incommenſurabilis:& ſiquidem commenſusabilis, & C F plus poterit,quàm FD quadrato rectæ lineę ſibi lõgitudine cõmenſurabilis:& ſi quidem AE commenſurabilis eſt longitudine expoſitę rationali;& CF expoſitæ rationali lõgitudine commenſurabilis erit:ſi vero EB eſt cõmenſurabilis,& DF cõmenſurabilis erit: & ſi neutra ipſarũ AE EB cõmenſurabilis eſt expoſitæ rationali longitudine, & neutra ipſarũ CF FD eidẽ longitudine erit cõmenſurabilis.quòd ſi AE plus poſſit,quã EB quadrato rectę lineæ ſibi incõmenſurabilis longitudine; & CF plus poterit,quã FD quadrato rectę lineę ſibi lõgitudine incõmenſurabilis: & ſiquidem AE ſit cõmenſurabilis expoſitæ rationali lõgitudine,& CF eidẽ longitudine cõmenſurabilis erit: ſi uero BE, & DF: & ſi neutra ipſarũ AE EB,& neutra ipſarũ CF FD erit expoſitæ rationali lõgitudine cõmẽſurabilis.ergo CD apotome eſt,& ordine eadẽ, quę AB.

F. C. COMMENTARIVS.

A 80. huius. Et BE ipſi DF.] *Quoniam enim eſt vt AE ad CF,ita AB ad CD; erit & reliqua BE ad DF, vt AE ad CF, hoc eſt vt AB ad CD. commenſurabilis igitur eſt & BE ipſi DF longitudine.*

B 90. huius. Ergo & CF FD rationales erunt potentia ſolum commenſurabiles] *Nam cum ſit vt AE ad CF, ita BE ad DF,erit permutãdo vt AE ad EB, ita CF ad FD: ſintq; AE EB rationales potentia ſolũ cõmenſurabiles. ergo & CF FD rationales potentia ſolũ cõmenſurabiles erũt.*

THEOREMA LXXXI. PROPOSITIO. CV.

Recta linea mediæ apotomæ commenſurabilis, & ipſa mediæ apotome eſt,atque ordine eadem.



Sit mediæ apotome AB, & ipſi A B lõgitudine commenſurabilis ſit CD: Dico CD mediæ apotomen eſſe, & ordine eandem. Quoniam enim mediæ apotome eſt AB, ſit BE ipſi AB congruens. ergo AE EB medię ſunt potentia ſolum commenſurabiles:& fiat vt AB ad CD,ita B E ad DF. ſunt autem AE EB mediæ potentia ſolum commenſurabiles.ergo & CF FD mediæ potẽtia ſolũ cõmẽſurabiles erũt;ac propterea mediæ apotome eſt CD. oſtendendum eſt & ordine eandem eſſe, quę AB. Quoniam enim vt AE ad EB ,ita CF ad FD;vt autem AE ad EB,ita quadratum ex AE ad rectangulum AEB; & vt C F ad FD, ita quadratum ex CF ad CFD rectangulum :erit & vt quadratum ex AE ad rectangulum AEB,ita quadratum ex CF ad rectangulum CFD. ſed quadratum ex AE cõmẽſurabile eſt quadrato ex CF.rectangulum igitur AEB rectangulo CFD eſt commenſurabile.& ſi quidem rationale eſt rectangulum AEB, & rectangulum CFD rationale erit.ſi vero rectangulum AEB medium eſt, & medium erit rectangulum CFD.mediæ igitur apotome eſt CD,atque ordine eadem,quæ AB.

75.76.huius

Lem. ad 25. huius.

THEOREMA LXXXII. PROPOSITIO. CVI.

Recta linea minori commenſurabilis,& ipſa minor eſt.



Sit minor AB, & ipſi AB commenſurabilis ſit C D. Dico & CD minorem eſſe.fiant enim eadem quæ prius.& quoniam AE EB potentia ſunt incõmenſurabiles,& CF FD potentia incõmẽſurabiles erũt. eſt aũt vt AE ad EB,ita CF ad FD.quare & vt quadratũ ex AE ad quadratũ ex EB, ita quadratũ ex CF ad

77.huius.

22.ſexti.

quadratum

quadratum ex FD : & componendo, vt quadrata ex AE EB ad quadratum ex EB, ita quadrata ex CF FD ad quadratum ex FD; & permutando. commensurabile autem est quadratum ex BE quadrato ex DF. ergo & compositum ex quadratis ipsarum AE EB composito ex quadratis CF FD commensurabile erit. sed compositū ex quadratis AE EB est rationale. ergo & rationale erit compositum ex quadratis CF FD. Rursus quoniam est vt quadratum ex AE ad rectangulum AEB, ita quadratum ex CF ad rectangulum CFD, & permutando; commensurabile autem est quadratum ex AE quadrato ex CF: erit & rectangulum AEB rectangulo CFD commensurabile. sed rectangulum AEB medium est. medium igitur & rectangulum CFD. quare CF FD potentia incommensurabiles sunt, facientes compositum quidem ex ipsarum quadratis rationale: quod autem ipsis continetur medium. ergo C D est minor. 77. huius.

ALITER. Sit minor A, & ipsi A commensurabilis sit B. Dico B minorem esse. Exponatur enim CD rationalis: & quadrato ex A æquale parallelogrammum CE ad ipsam CD applicetur latitudine faciens CF. apotome igitur quarta est CF. quadrato autem ex B æquale ad FE applicetur FG, latitudinem faciens FH. Quoniam igitur A commensurabilis est ipsi B, erit & quadratum ex A quadrato ex B commensurabile. sed quadrato quidem ex A æquale est parallelogrammum CE; quadrato autem ex B æquale FG. ergo CE commensurabile est ipsi FG. vt autem CE ad FG, ita CF ad FH. commensurabilis igitur est CF ipsi FH longitudine. sed CF est apotome quarta. ergo & FH apotome quarta est; et spacium FG rationali, et apotoma quarta continetur. recta igitur linea spacium potens minor est. potest autem spacium FG ipsa B. ergo B est minor.



101. huius.

104: huius.
95. huius.

THEOREMA LXXXIII. PROPOSITIO CVII.

Recta linea commensurabilis ei, quæ cum rationali medium totum efficit, & ipsa cum rationali medium totum efficiens est.

Sit cum rationali medium totum efficiens AB: et ipsi AB commensurabilis sit CD. Dico CD esse eam, quę cum rationali medium totum efficit. sit enim ipsi AB congruens BE. ergo AE EB potentia incommensurabiles sunt, facientes cōpositum quidem ex ipsarum quadratis medium; quod autem ipsis continetur rationale. et eadem constituantur. similiter demonstrabitur, vt prius CF FD in eadem esse proportione, in qua AE EB: et compositum ex quadratis ipsarum AE EB commensurabile esse composito ex quadratis CF FD: rectangulum autem AEB rectangulo CFD commensurabile. quare et CF FD potentia incommensurabiles sunt, facientes compositum quidem ex quadratis CF FD, medium; quod autem ipsis continetur, rationale. ergo CD est quæ cum rationali medium totum efficit.



78. huius.

ALITER. Sit cum rationali medium totum efficiēs A, et ipsi A commensurabilis B. Dico B esse eam, quę cū rationali medium totum efficit. Exponatur enim rationalis CD: et quadrato quidem ex A æquale parallelogrammum CE ad ipsam CD applicetur latitudinem faciens CF. ergo CF est apotome quinta: quadrato aūt ex B æquale



78. huius.

101. huius.

FG ad

FG ad ipſam FE applicetur, latitudinem faciens FH. Quoniam igitur A commenſurabilis eſt ipſi B, erit & quadratum ex A quadrato ex B commenſurabile. ſed quadrato ex A æquale eſt parallelogrammum CE; quadrato autem ex B æquale FG. ergo CE eſt commenſurabile ipſi FG; ob idque recta linea CF ipſi FH longitudine eſt commenſu-
104. huius. rabilis. apotome autem quinta eſt CF. ergo & FH eſt apo-
tome quinta; eſtq; FE rationalis. ſi autem ſpacium conti-
96. huius. neatur rationali, & apotoma quinta, recta linea ſpacium potens eſt, quæ cum rationali medium totum efficit. ſed ipſa B poteſt ſpacium FG. ergo B cum rationali medium totum efficiens eſt.



THEOREMA LXXXIIII. PROPOSITIO CVIII.

Recta linea commenſurabilis ei, quæ cum medio medium totum efficit, & ipſa cum medio medium totum efficiens eſt.

Sit cum medio medium totum efficiens AB: & ipſi AB commenſurabilis ſit CD. Dico CD eſſe eã, quę cum medio medium totum efficit. ſit ipſi AB
99. huius. congruës BE, & eadem cõſtruantur. ergo AE EB potentia incommenſurabiles ſunt, facientes compoſitum quidem ex quadratis ipſarum medium; quod autem ipſis continetur medium, incommenſurabileq; compoſito ex ipſarum quadratis. & ſunt AE EB commenſurabiles ipſis CF FD, vt oſtenſum eſt: & compoſitum ex quadratis AE EB commenſurabile compoſito ex quadratis CF FD: rectangulumque AEB rectangulo CFD. ergo CF FD potentia incommenſurabiles ſunt, facientes compoſitum quidem ex quadratis ipſarum medium; quod autem ipſis continetur medium, & incommenſurabile compoſito ex ipſarum quadratis.
99. huius. ergo CD eſt quę cum medio medium totum efficit.



THEOREMA LXXXV. PROPOSITIO CIX.

Medio de rationali detracto, recta linea, quæ reliquum ſpacium poteſt, vna ex duabus irrationalibus fit, vel apotome, vel minor.

De rationali enim BC medium BD detrahatur. Dico eam, quæ reliquum ſpacium EC poteſt, vnam fieri ex duabus irrationalibus, vel apotomẽ vel minorem. Exponatur enim rationalis FG: & parallelogrammo quidem BC æquale GH ad FG applicetur; parallelogrammo autem BD æquale auferatur GK. reliquum igitur CE eſt æquale LH. Itaque quoniam rationale eſt BC, medium autem BD: atque eſt BC æquale GH, & BD ipſi GK; erit GH rationale; medium autem GK, & ad ra-
20. huius. tionalem FG applicatum eſt. rationalis igitur eſt
23. huius. FH, & ipſi FG longitudine commenſurabilis: FK vero rationalis, & incommenſurabilis ipſi FG lõ-
13. huius. gitudine. ergo FH ipſi FK longitudine incommenſurabilis eſt, & HF FK rationa-
74 huius. les ſunt, potentia ſolum commenſurabiles; ac propterea HK eſt apotome. ipſi vero congruens



congruens KF. vel igitur HF plus poteſt, quàm FK quadrato rectę lineę ſibi commẽ ſurabilis longitudine, vel incommenſurabilis. poſsit primum quadrato rectæ lineæ commenſurabilis. atque eſt tota HF commenſurabilis longitudine expoſitę rationali FG. ergo HK prima eſt apotome. recta autem linea, quæ poteſt ſpacium rationali, & apotoma prima contentum eſt apotome. Ergo quæ poteſt LH hoc eſt CE apotome eſt. quòd ſi HF plus poſsit, quàm FK quadrato rectę lineæ ſibi incommenſurabilis longitudine; eſtq; tota HF expoſitæ rationali FG longitudine commenſurabilis; erit HK apotome quarta. & quę poteſt ſpacium rationali, & apotoma quarta contentum minor eſt. quæ igitur poteſt ſpacium LH, videlicet EC eſt minor.

1. tertiarum. diffin.
92. huius.
4 diffin. tertiarum.
95. huius.

THEOREMA LXXXVI. PROPOSITIO CX.

Rationali de medio detracto alię duę irrationales fiunt; vel mediæ apotome prima, vel cum rationali medium totum efficiens.

De medio enim BC rationale BD detrahatur. Dico rectã lineã, quæ reliquũ ſpaciũ EC poteſt, vnã duarum irrationalium fieri vel mediæ apotomen primam, vel eam, quę cum rationali medium totum efficit. Exponatur enim rationalis FG, & ad ipſum ſimiliter ſpacia applicentur; erit rationalis quidẽ FH, & ipſi FG longitudine incommenſurabilis; rationalis autem FK, & incommenſurabilis ipſi FG longitudine. ergo HF FK rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles; ac propterea apotome eſt HK, & ipſi congruẽs KF. vel igitur HF plus poteſt, quàm FK quadrato rectæ lineæ ſibi longitudine commenſurabilis, vel incommenſurabilis. & ſi quidẽ commenſurabilis; atque eſt congruens FK commenſurabilis expoſitæ rationalis FG longitudine: erit HK apotome ſecunda. eſt autem FG rationalis. ergo quæ poteſt ſpacium LH, hoc eſt CE, mediæ eſt apotome prima. quòd ſi HF plus poteſt, quàm FK quadrato rectæ lineę ſibi longitudine incommenſurabilis; atque eſt congruens FK commenſurabilis expoſitę rationali FG longitudine: erit HK apotome quinta. recta igitur linea potens ſpacium EC eſt quæ cum rationali medium totum efficit.



23. huius.
21. huius.
74. huius.
1. diffi. tertiarum.
93. huius.
5. diffi. tertiarum.
99. huius.

THEOREMA LXXXVII. PROPOSITIO. CXI.

Medio de medio detracto, quod ſit incommenſurabile toti, reliquę duæ irrationales fiunt, vel mediæ apotome ſecunda, vel cum medio medium totum efficiens.

Detrahatur enim, vt in propoſitis figuris, de medio BC medium BD, quod ſit incommenſurabile toti. Dico rectam lineam, quæ poteſt ſpacium CE, vnã eſſe ex duabus irrationalibus, vel mediæ apotomen ſecundam, vel eam, quæ cum medio medium totum efficit. Quoniam enim medium eſt vtrumque ipſorũ BC BD, & BC incommenſurabile eſt ipſi BD, hoc eſt GH ipſi GK; erit HF ipſi FK incommenſurabilis longitudine. ergo HF FK rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles; & obid apotome eſt HK, & ipſi congruens KF. itaque vel HF plus



23. huius.
74. huius.

HF plus poteſt, quàm FK quadrato rectæ lineę ſibi longitudine commenſurabilis, vel incommenſurabilis: & ſi quidem commenſurabilis, & neutra ipſarum HF FK commenſurabilis eſt expoſitæ rationali FG longitudine; erit HK apotome tertia. rationalis autem eſt KL: & rectangulum rationali, & apotoma tertia contętum irrationale eſt. ergo recta linea, quę ipſum poteſt, eſt irrationalis, & vocatur mediæ apotome ſecunda. ſi vero HF plus poteſt, quàm FK quadrato rectæ lineæ ſibi incommenſurabilis longitudine, & neutra ipſarum HF FK longitudine commenſurabilis eſt expoſitæ rationali FG; erit HK apotome ſexta. at recta linea potens quod rationali, & apotoma ſexta cõtinetur eſt quæ cum medio medium totum efficit. ergo quæ poteſt ſpacium LH, hoc eſt EC eſt cum medio medium totum efficiens.



5. diff. tertiarum.
94. huius.
6. diff. tertium.
97. huius.

THEOREMA LXXXVIII. PROPOSITIO. CXII.

Apotome non eſt eadem, quæ ex binis nominibus.

Sit apotome AB. Dico AB non eſſe eandem, quæ ex binis nominibus. ſit enim, ſi fieri poteſt; ex ponaturque rationalis DC, & quadrato ex AB æquale rectangulum CE ad ipſam DC applicetur latitudinem faciens DE. Quoniam igitur apotome eſt AB, erit DE apotome prima. ſit ipſis congruens EF. ergo DF FE rationales ſunt potentia ſolum commẽſurabiles: & DF plus poteſt, quàm FE quadrato rectæ lineę ſibi longitudine commẽſurabilis: atq; eſt DF cõmẽſurabilis expoſitę rationali CD lõgitudine. Rurſus qm̃ ex binis nominibus eſt AB, erit DE ex binis nominibus prima. Diuidatur in nomina ad pũctũ G; ſitq; DG maius nomẽ. ergo DG GE rationales ſunt, potẽtia ſolũ cõmẽſurabiles: & DG plus põt, quã GE quadrato rectæ lineæ ſibi cõmẽſurabilis lõgitudine: & maior DG longitudine commenſurabilis eſt expoſitę rationali DC. quare DF ipſi DG longitudine eſt commenſurabilis. & reliquę igitur FG commenſurabilis erit. Itaq; quoniam DF commenſurabilis eſt ipſi FG, atque eſt rationalis DF; erit & FG rationalis. Rurſus quoniam DF commenſurabilis eſt ipſi FG longitudine, atque eſt DF ipſi FE incommenſurabilis longitudine; erit & FG ipſi FE longitudine incommenſurabilis: & ſunt rationales. ergo GF FE rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles; ac propterea apotome eſt EG. ſed & rationalis. quod fieri non poteſt. ergo apotome non eſt eadem, quæ ex binis nominibus.



96. huius.
1. diff. tertiarum.
61. huius.
37. huius.
12. huius
Ex demonſtratis ad 17 huius.
94. huius.

Apotome, & quę poſt ipſam ſunt irrationales, neque medię, neque inter ſe eædẽ ſunt: quadratum enim, quod à media fit, ad rationalem applicatum, latitudinem facit rationalem, & ei, ad quam applicatur, longitudine incommenſurabilem. quod autem ab apotoma fit ad rationalem applicatum, latitudinem facit apotomen primam. quod fit à mediæ apotoma prima ad rationalem applicatum latitudinem facit apotomen ſecundam. quod fit à mediæ apotoma ſecunda ad rationalem applicatum latitudinem facit apotomen tertiam. quod fit à minori ad rationalem applicatum latitudinem facit apotomen quartam. quod ab ea, quæ cum rationali mediũ totũ efficit ad rationalẽ applicatũ latitudinẽ facit apotomẽ quintã. quod ab ea, quæ cum medio medium totum efficit ad rationalem applicatum latitudinem facit apotomen ſextam. Quoniam igitur dictę latitudines differunt tum à prima, tum inter ſe ſe, à prima quidem, quòd rationalis ſit, inter ſe vero, quod ordine non ſint eædẽ; manifeſtum eſt & ipſa irrationales inter ſe differentes eſſe. & oſtenſum eſt apotomẽ

23. huius.
98. huius.
99. huius.
100. huius.
101. huius.
102. huius.
103. huius.

non

non esse eandem,quæ ex binis nominibus.quadrata autem apotomæ & earum quę sunt post apotomen ad rationalem applicata latitudines faciunt apotomas eiusdē ordinis, cuius & illæ sunt, quarum quadrata applicantur. Similiter & quadrata eius,quæ est ex binis nominibus,& earum, quæ post ipsam sunt ad rationalem applicata latitudines faciunt eas,quæ ex binis nominibus eiusdem ordinis,cuius & illę sunt.ergo rectę lineæ,quæ sequuntur apotomen, & quæ sequuntur eam, quæ ex binis nominibus,inter se differunt,ita vt omnes sint numero tredecim,videlicet.

1 Media.
2 Quæ ex binis nominibus
3 Quę ex binis medijs prima
4 Quæ ex binis medijs secunda
5 Maior
6 Rationale ac medium potens
7 Bina media potens
8 Apotome
9 Mediæ apotome prima.
10 Mediæ apotome secunda.
11 Minor.
12 Cum rationali medium totum efficiens.
13 Cum medio medium totum efficiens.

THEOREMA LXXXIX. PROPOSITIO. CXIII.

Quadratum rationalis ad eam, quæ ex binis nominibus applicatum latitudinem facit apotomen, cuius nomina commensurabilia sunt nominibus eius, quæ est ex binis nominibus,& in eadem proportione; & adhuc apotome, quæ fit,eundem habet ordinem,quem ea,quæ est ex binis nominibus.



Sit rationalis A;ea, quę elt ex binis nominibus BC, cuius maius nomen CD:& quadrato ex A æquale rectangulum sit quod BC EF continetur. Dico EF apotomen esse, cuius nomina commensurabilia sunt ipsis CD DB, & in eadem proportione, & adhuc EF eundem ordinem habere,quam habet BC. Sit enim rursus quadrato ex A æquale rectangulum, quod BD & G continetur. Itaque quoniam rectangulum contentum BC EF est æquale ei,quod BD G continetur, erit vt CB ad BD, ita G ad EF: A
maior autem est CB, quàm BD. ergo & G quàm EF maior erit.sit ipsi G æqualis E B
H.est igitur vt CB ad BD,ita HE ad EF. & diuidendo vt CD ad DB, ita HF ad FE,
fiat vt HF ad FE,ita FK ad KE.ergo & tota HK ad totam KF est vt FK ad KE.vt enim C
vnum antecedentium ad vnum consequentium, ita antecedentia omnia ad omnia
consequentia.sed vt FK ad KE,ita CD ad DB.& vt igitur HK ad KF,ita CD ad DB. D
cōmēsurabile aūt est quadratū ex CD quadrato ex DB.ergo & quadratū ex HK qua E
drato ex KF est commensurabile. atque est vt quadratum ex HK ad quadratum ex F

KF, ita recta linea HK ad KE, quoniam tres rectæ lineæ HK KF KE deinceps proportiones sunt. commensurabilis igitur est HK ipsi
G KE longitudine. ergo & HE ipsi EK longitudine est commensurabilis. & quoniã quadratum ex A est æquale ei, quod HE BD continetur; rationale autem est quadratum ex A: erit & quod HE BD continetur rationale: & ad rationalem BD applicatum est.



21. huius rationalis igitur est HE, & ipsi BD longitudine commensurabilis; ideoq; & EK, quæ est incommensurabilis ipsi HE rationalis erit, & ipsi BD commensurabilis longitudine. Quoniam igitur est vt CD ad DB, ita FK ad KE; sunt autẽ CD DB potentia solum cõmensurabiles: & FK KE potentia solum commensurabiles erunt. rationalis autem est KE, & ipsi BD commensurabi-
H lis longitudine. quare & FK est rationalis, ipsiq; CD longitudine commensurabilis. sunt igitur FK KE rationales, & potentia solum commensurabiles: & idcirco EF apotome est. itaque vel CD plus potest, quàm DB quadrato rectæ lineę sibi commensurabilis longitudine, vel incommensurabilis. & si quidem commensurabilis,
23. huius. etiam FK plus poterit, quàm KE quadrato rectæ lineæ sibi longitudine commensurabilis. & si CD commensurabilis est expositæ rationali longitudine, & FK eidem commensurabilis erit: si autem BD, & KE. & si neutra ipsarum CD DB, & neutra ipsarum FK KE. Quòd si CD plus potest, quàm DB quadrato rectæ lineę sibi incommensurabilis longitudine, & FK plus poterit, quàm KE quadrato rectæ lineæ sibi lõgitudine incommensurabilis. & si BD, & KE. at si neutra ipsarum CD DB, & neutra ipsarum FK KE. ergo EF apotome est, cuius nomina FK KE commensurabilia sunt nominibus CD DB eius, quę est ex binis nominibus, & in eadem proportione, & eundem habet ordinem, quem CB.

F. C. COMMENTARIVS.

A Erit vt CB ad BD, ita G ad EF] *Ex 14 sexti.*

B Ergo & G, quàm EF maior erit] *Ex iis, quae à nobis demonstrata sunt ad 16 quinti.*

C Ergo & tota HK ad totam KF est vt FK ad KE] *Ex 12 quinti.*

D Commensurabile autem est quadratum ex CD quadrato ex DB] *Ex 37 huius, ponitur enim CB ea, quae ex binis nominibus.*

E Ergo et quadratum ex HK quadrato ex KF est commensurabile] *Ex 22 sexti, & decima huius.*

F Atque est vt quadratum ex HK ad quadratum ex KF, ita recta linea HK ad KE] *Ex corollario secundo 20 sexti.*

G Ergo & HE ipsi EK longitudine est commensurabilis] *Ex 16. huius.*

H Quare & FK est rationalis, ipsiq; CD longitudine commensurabilis] *Quoniam igitur est vt CD ad DB, ita FK ad KE, erit permutando vt KE ad DB, ita FK ad CD. sed KE est longitudine commensuraailis ipsi BD. ergo & FK ipsi CD commensurabilis erit longitudine. quòd cum FK KE potentia commensurabiles sint, sitq; rationalis KE, erit & FK rationalis, & ipsi CD longitudine commensurabilis.*

K Et idcirco EF apotome est] *Ex 74 huius.*

Sit A 2, CB R 12 plus 3, vt CD sit R 12, DB 3. & si quadratum ex A, quod est 4, applicetur ad DB latitudinẽ faciẽs G, erit G 1 $\frac{1}{3}$, cui æqualis sit HE. fiat vt CB ad BD, ita HE, ad EF videlicet vt R 12 plus 3 ad 3, ita 1 $\frac{1}{3}$ ad aliũ. multiplicabimus igitur 3 per 1 $\frac{1}{3}$ producetur 4, & 4 diuidemus per R 12 plus 3, hoc est applicabimus 4 ad R 12 plus 3. quod quidẽ hoc modo fiet. multiplicetur R 12 plus 3 per apotomen ipsi respondentem, hoc est per R 12 minus 3. producitur 3. rursus multiplicetur 4 per eandem R 12 minus 3. producitur R 192 minus 12. quare ex 17 septimi 3 ad R 192 minus 12 proportionem habebit eandem, quam R 12 plus 3 ad 4. & ob id R 192 minus 12 ad 3 applicata latitudinem faciet eandem, quã 4, si applicetur ad R 12 plus 3. sed

3. ſed R 192 minus 12 applicata ad 3 latitudinem facit R 21 $\frac{1}{3}$ minus 4. quadratum igitur rationalis 2, videlicet 4 ad eam, quae eſt ex binis nominibus ſecunda, hoc eſt ad R 12 plus 3 applicatum latitudinem facit R 21 $\frac{1}{3}$ minus 4, quae eſt ſecunda apotome, cuius nomina commenſurabilia ſunt ipſis nominibus CD DB, & in eadem proportione.

PROBLEMA XC. PROPOSITIO CXIIII.

Quadratum rationalis ad apotomen applicatum latitudinem facit eam, quę ex binis nominibus, cuius nomina commenſurabilia ſunt apotomæ nominibus, & in eadem proportione, & adhuc quæ ex binis nominibus fit eundem habet ordinem, quæ ipſa apotome.



Sit rationalis quidem A, apotome autem B D: & quadrato ex A æquale ſit quod BD KH continetur, ita vt quadratum rationalis A ad BD applicatum latitudinem faciat KH. Dico KH ex binis nominibus eſſe, cuius nomina commẽſurabilia ſunt nominibus ipſius BD, & in eadem proportione: & K H eundem habere ordinem, quem habet B D. ſit enim ipſi BD congruens DC. ergo BC CD rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles: & quadrato ex A æquale ſit, quod BC, & G continetur. rationale autem eſt quadratum ex A. ergo quod BC G continetur eſt rationale; & ad rationalem BC applicatum eſt. rationalis igitur eſt recta linea G, ipſiq; BC longitudine commenſurabilis. itaque quoniam rectangulum contentum BC G eſt æquale ei, quod BD KH continetur, erit vt CB ad BD, ita KH ad G. maior autem eſt CB, quàm BD. ergo & KH, quàm G eſt maior. ponatur ipſi G æqualis KE. commẽſurabilis igitur eſt KE ipſi BC longitudine. & quoniam eſt vt CB ad BD, ita HK ad KE, erit per cõuerſionem rationis vt BC ad CD, ita KH ad HE. fiat ut KH ad HE, ita HF ad FE. & reliqua igitur KF ad FH eſt ut KH ad HE, hoc eſt vt BC ad CD. ſed BC CD potentia ſolum ſunt commenſurabiles. ergo & KF FH potentia ſolum cõmenſurabiles erũt. & cum ſit vt KH ad HE, ita KF ad FH: vt autem KH ad HE, ita HF ad FE, erit & ut KF ad FH, ita HF ad FE, quare & vt prima ad tertiam, ita quadratum ex prima ad quadratum ex ſecunda. vt igitur KF ad FE, ita quadratum ex KF ad id, quod ex FH quadratum. commenſurabile autem eſt quadratum ex KF quadrato ex F H; ſunt enim KF FH potentia ſolum commenſurabiles. ergo & KF ipſi FE commenſurabilis eſt longitudine: ac propterea FK ipſi KE longitudine commenſurabilis. ſed KE rationalis eſt, & ipſi B C longitudine commenſurabilis. ergo & K F rationalis erit, & commenſurabilis ipſi BC longitudine. & quoniã eſt vt BC ad CD, ita KF ad FH, erit permutando vt BC ad KF, ita DC ad FH. commenſurabilis autem eſt B C ipſi KF. quare & CD ipſi FH eſt commenſurabilis: ſuntq; B C C D rationales potentia ſolum commenſurabiles. ergo & KF FH rationales potentia ſolum commenſurabiles erũt. ex binis igitur nominibus eſt KH. & ſi quidem BC plus poteſt, quàm CD quadrato rectę lineæ ſibi lõgitudine commenſurabilis, & KF plus poterit, quàm FH quadrato rectæ lineæ ſibi commenſurabilis longitudine. & ſi BC longitudine commenſurabilis eſt expoſitę rationali, & KF eidem commenſurabilis erit. ſi vero CD eſt commenſurabilis longitudine expoſitę rationali, erit & ipſa FH eidem commẽſurabilis; & ſi neutra ipſarum BC CD, & neutra ipſarum KF FH. at ſi BC plus poteſt, quàm CD quadrato rectę lineę ſibi longitudine incommenſurabilis, & KF plus poterit, quàm FH quadrato rectæ lineæ ſibi incommenſurabilis longitudine. & ſiquidem BC longitudine commenſurabilis eſt expoſitę rationali, & KF eidem commenſurabilis erit. ſi vero CD, & ipſa FH. quòd ſi neutra ipſarum BC CD, & neu-

74 huius.

21. huius.

14. ſexti: Ex demonſtratis ad 16. quinti.

19. quinti:

ſi. quinti.

Corr. 2. 20. ſexti.

trâ ipſarum KF FH. ex binis igitur nominibus eſt KH, cuius nomina KF FH commenſurabilia ſunt nominibus apotomæ BC CD; & in eadem proportione; & KH eundem tenet ordinem, quem ipſa BC.

F. Ç. COMMENTARIVS.

Sit A 2, ED Rx 18 minus R 10. & multiplicetur R 18 minus Rx 10 per eam, quę ex binis nominibus ipſi reſpondet, videlicet per R 18 plus R 10 producitur 8, rurſus multiplicetur ipſius A rationalis quadratum, quod eſt 4 per eandem, producitur R 288 plus Rx 160. habebit igitur 8 ad Rx 288 plus Rx 160 proportionem eandem, quam Rx 18 minus Rx 10 ad 4 ex 17 ſeptimi. quare ſi Rx 288 plus R 160 applicetur ad 8 latitudinem faciet Rx 4 1/2 plus Rx 2 1/2, & eandem latitudinem faciet 4, ſi ad R 18 minus Rx 10 applicetur. quadratum igitur rationalis 4 applicatum ad tertiam apotomen, videlicet ad Rx 18 minus R 10 latitudinem facit eam, quae eſt ex binis nominibus tertia, hoc eſt Rx 4 1/2 plus R 2 1/2 cuius nomina commenſurabilia ſunt apotomae nominibus, & in eadem proportione.

THEOREMA XCI. PROPOSITIO. CXV.

Si ſpacium cõtinetur apotoma, & ea, quæ ex binis nominibus, cuius nomina commenſurabilia ſint nominibus apotomę, & in eadem proportione; recta linea ſpacium potens eſt rationalis.



Spacium enim contineatur AB CD, videlicet apotoma AB, & CD, quę ſit ex binis nominibus, cuius maius nomen CE: & ſint nomina eius, quæ ex binis nominibus CE ED commenſurabilia nominibus apotomæ AF FB: & in eadẽ proportione; ſitq; recta linea G potens ſpacium contentum AB CD. Dico ipſam G rationalem eſſe. exponatur enim rationalis H: & quadrato ex H æquale ad ipſam CD applicetur, latitudinem faciens KL. apotome igitur eſt KL, cuius nomina KM ML commenſurabilia ſint nominibus eius, quę eſt ex binis nominibus CE ED, & in aedem proportione. ſed CE ED commenſurabiles ſunt ipſis AF FB, atque in eadem proportione. eſt igitur vt AF ad FB, ita KM ad ML. & permutando vt AF ad KM, ita FB ad LM. quare & reliqua AB ad reliquam KL eſt vt AF ad KM. commenſurabilis autem eſt AF ipſi KM. ergo & AB ipſi KL eſt cõmenſurabilis. eſtq; vt AB ad KL, ita rectangulum contentum CD AB ad id, quod continetur CD KL. commenſurabile igitur eſt rectangulum contentum CD AB rectangulo, quod CD KL continetur. ſed rectangulum contentum CD KL eſt ęquale quadrato ex H. ergo rectangulum, quod continetur CD AB quadrato ex H eſt commenſurabile. rectangulum autem, quod continetur CD AB eſt æquale quadrato ex G. ergo quadratũ ex G commenſurabile eſt quadrato ex H. atque eſt quadratum ex H rationale. rationale igitur eſt quadratum ex G; & idcirco ipſa G eſt rationalis; & poteſt quod CD AB continetur. Si igitur ſpacium contineatur apotoma, & ea, quæ ex binis nominibus, cuius nomina commenſurabilia ſint nominibus apotomæ, & in eadẽ proportione, recta linea ſpacium potens eſt rationalis.

iij. huius

19. quinti.
10. huius.
1. sexti.

COROLLARIVM.

Ex ijs manifeſto conſtat fieri poſſe, vt ſpaciũ rationale irrationalibus rectis lineis contineatur.

F. C.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit apotome AB R 21 ½ *minus* 4. *ea vero, quae ex binis nominibus CD sit* 12 *plus* 3. *& multiplicetur* R 21 ½ *minus* 4 *plus* R 12 *plus* 3. *fit* R 256, *quae est* 16 *minus* 12, *hoc est* 4, *quod est rationale, & eius radix* 2 *rationalis.*

THEOREMA XCII. PROPOSITIO. CXVI.

A media infinitæ irrationales fiunt, & nulla alicui antecedentium est eadem.

Sit media A. Dico ex ipsa A infinitas irrationales fieri, & nullam alicui antecedentium eandem esse. expo natur enim rationalis B. & rectangulo contento A B æquale sit quadratum ex C. irrationalis igitur est ipsa C nam quod rationali, & irrationali continetur irrationale est, & nulli earum, quę prius est eadem: non enim quadratum alicuius antecedentium ad rationalem applicatum latitudinem efficit mediam. rursus rectāgulo, quod BC continetur, æquale fit quadratum ex D. irrationale igitur est, quod fit ex D: & idcirco ipsa D est irrationalis, & nulli antecedentium eadem. neque enim quadratum alicuius earum, quæ prius sunt ad rationalem applicatum latitudinem efficit ipsam C. Similiter & eodem ordine infinite protracto, manifestum est à media infinitas irrationales fieri, & nullam alicui antecedentium eandem esse.



In scholio ad 39. huius.

ALITER. Sit media AC. Dico ex ipsa AC infinitas irrationales fieri, & nullam alicui priorum eandē esse. ducatur ipsi AC ad rectos angulos AB: sitque A B rationalis, & BC cōpleatur. irrationale igitur est BC, & quæ ipsum potest est irrationalis. posit autē ipsum recta linea CD. ergo CD irrationalis est, & nulli priorum eadem. non enim quadratum alicuius priorum ad rationalem applicatum latitudinem efficit mediam. rursus compleatur ED; erit ED irrationale; & recta linea ipsum potens irrationalis. posit ipsum recta linea DF. ergo DF irrationalis est, & nulli priorum eadem. nullius enim priorum quadratum, si ad rationalem applicetur, latitudinem efficit ipsam CD, ergo à media infinitę irrationales fiunt, & nulla alicui priorum est eadem.



THEOREMA XCIII. PROPOSITIO CXVII.

Propositum sit nobis ostendere in quadratis figuris diametrū lateri incommensurabilem esse longitudine.

Sit quadratum ABCD, cuius diameter AC. Dico AC ipsi AB longitudine incōmensurabilem esse. si enim fieri potest, sit commensurabilis. Dico ex hoc sequi eundem numerum parem esse, & imparem. itaque manifestum est quadratum ex AC duplum esse quadrati ex AB. & quoniam AC commensurabilis est ipsi AB, habebit AC ad AB proportionem eam, quam habet numerus ad numerū. habeat, quam EF ad

A
B

EF ad G: sintq; EF. G numeri minimi eorum, qui eandem habent proportionem. non igitur vnitas est EF. si enim est vnitas, & habet ad G proportionem eam, quam AC ad AB; estq; AC maior, quàm AB: & EF vnitas, quàm G numerus maior erit. quod est absurdum. ergo EF non est vnitas. quare numerus sit necesse est. & quoniam vt AC ad AB, ita est EF ad G, erit & vt quadratum ex AC ad quadratum ex AB, ita quadratus ex EF ad eum, qui fit ex G quadratum. duplum autem est quadratum ex CA quadrati ex AB. ergo & quadratus ex EF quadrati ex G est duplus: ac propterea quadratus ex EF par est, & ipse EF par. si enim esset impars, & qui fit ab ipso quadratus impar esset, quoniam si impares numeri quomodocunque componantur, multitudo autem ipsorum sit impar; & totus impar erit. ergo EF est par. secetur bifariam in H. & quoniam numeri EF G minimi sunt eorum, qui eandem habent proportionem, inter se primi sunt: & est EF par. impar igitur est G: si enim esset par, numeros EF G binarius metiretur; omnis enim par dimidiam partem habet. atqui primi inter se sunt. quod fieri non potest. non igitur G est impar. ergo par. & quoniam FE duplus est ipsius EH, erit quadratus ex FE quadrati ex EH quadruplus. est autem quadratus ex EF duplus quadrati ex G. duplus igitur est quadratus ex G quadrati ex EH. ideoq; par est qui fit ex G quadratus. & ex iam dictis ipse G est par; sed & impar. quod fieri non potest. non igitur AC commensurabilis est ipsi AB longitudine. ergo est incommensurabilis.



ALITER. Sed & aliter ostendendum est incommensurabile esse quadrati diametrum ipsius lateri. sit enim pro diametro quidem A, pro latere autem B. Dico A ipsi B lõgitudine incommensurabilem esse. si enim fieri potest, sit commensurabilis. & rursus fiat vt A ad B, ita EF numerus ad ipsum G: sintq; minimi eorum, qui eandem habent proportionem. ergo EF G primi inter se sunt. Dico primum, 24. septimi. G non esse vnitatem. si enim fieri potest, sit G vnitas. & quoniam est vt A ad B, ita EF ad G, erit & vt quadratum ex A ad quadratum ex B, ita quadratus ex EF ad eum, qui fit ex G quadratum: duplum autem est quadratum ex A quadrati ex B. ergo & quadratus ex EF quadrati ex G est duplus: atq; est G vnitas. binarius igitur est quadratus ex EF. quod fieri non potest. ergo G non est vnitas. numerus igitur. & quoniam est vt quadratũ ex A ad quadratum ex B, ita quadratus ex EF ad quadratum ex G. & conuertendo vt quadratum ex B ad quadratum ex A, ita quadratus ex G ad quadratum ex EF. sed quadratum ex B metitur quadratum ex A. ergo & qui fit ex G quadratus metitur eum, qui fit ex EF; & propterea latus G ipsum EF latus metitur. metitur autem & se ipsum. ergo G numeros EF G metitur, primos inter se existentes. quod fieri minime potest. non igitur A ipsi B longitudine est commensurabilis. quare incommensurabilis sit necesse est.



Itaque inuentis longitudine incommensurabilibus rectis lineis, vt AB, inuenientur & aliæ quam plurimæ magnitudines ex duabus dimensionibus, nimirum superficies incommensurabiles inter se se. si enim ipsarum AB mediam proportionalem sumamus rectam lineam C, erit vt A ad B, ita figura, quæ fit ex A ad eam, quæ ex C similem, & similiter descriptam, siue quadrata, siue alia rectilinea similia, siue circuli, qui circa diametros AC describantur. quando quidem circuli inter se sunt, vt diametrorum quadrata. Inuenta igitur sunt spacia plana inter se incommensurabilia. ostensis autem his ostendemus etiam ex solidorum



rum contemplatione ipsa solida esse commensurabilia, & incommensurabilia inter se. nam si in quadratis ex AB, vel in rectilineis, quæ ipsis æqualia sint solida æque O
alta constituamus, siue parallelepipeda, siue pyramides, siue prismata, erunt ea inter se, vti bases. & si quidem bases commensurabiles sint, erunt solida commensu-
rabilia; si vero incommensurabiles, & ipsa incommensurabilia erunt. sed & duobus P
circulis existentibus AB, si in ipsis conos æque altos, siue Cylindros constituamus, erunt inter se, vti ipsorum bases, hoc est vt AB circuli, & si quidem circuli commen
surabiles sint, cõmensurabiles erunt & coni inter se se, & Cylindri; si vero incommẽ
surabiles, & coni, & Cylindri incommensurabiles erunt. ex quibus perspicuum est non solum in lineis, & superficiebus esse commensurabilitatem, & incommensurabi
litatem, sed & in solidis figuris.

F. C. COMMENTARIVS.

Manifestum est quadratum ex AC duplum esse quadrati ex AB] *Ex 47 primi.* A

Habebit AC ad AB proportionem eam, quam numerus habet ad numerum] *Ex* B
5. huius.

Et quoniam vt AC ad AB, ita est EF ad G; erit & vt quadratum ex AC ad quadra- C
tum ex AB, ita quadratus ex EF ad eum, qui fit ex G quadratum] *Quoniam enim est vt AC ad AB, ita EF ad G, erit et vt proportio AC ad AB duplicata, ita proportio EF ad G du-
plicata. sed vt proportio quidem AC ad AB duplicata, ita est quadratum ex AC ad quadratum ex AB ex corollario secundo 20. sexti; vt autem proportio EF ad G duplicata, ita est quadratum ex EF ad quadratum, ex G ex 11 octaui. ergo ex 11 quinti vt quadratum ex AC ad quadratum ex AB, ita erit quadratus ex EF ad eum, qui fit ex G quadratum.*

Quoniam si impares numeri quomodocunque componantur, multitudo autem D
ipsorum sit impar, & totum impar erit] *Ex 23 noni. sequitur enim hoc ex 29 eiusdem.*

Inter se primi sunt] *Ex 24 septimi.* E

Erit quadratus ex FE quadrati ex EH quadruplus] *Ex 11. octaui.* F

Duplus igitur est quadratus ex G quadrati ex EH] *Proportio enim quadrati ex FE* G
ad quadratum ex EH, interiecto quadrato ex G, composita est ex proportione quadrati ex FE ad quadratum ex G, & proportione quadrati ex G ad quadratum ex EH. sed proportio quadrati ex FE ad quadratum ex EH est quadrupla: proportio autem quadrati ex FE ad quadratũ ex G est dupla. ergo & proportio quadrati ex G ad quadratum ex EH dupla erit.

Ideoq; par est, qui fit ex G quadratus] *Quoniam enim quadratus ex G duplus est qua-* H
drati ex FH, partem habet dimidiam, quare par necessario erit.

Et ex iam dictis ipse G est par] *Si enim sit impar, & quadratus ex ipso impar est ex 29* K
noni. sed & par. quod fieri nou potest.

Et propterea latus G ipsum EF latus metitur] *Ex 14 octaui,* L

Erit vt A ad B, ita figura, quę fit ex A ad eam, quæ ex C similem, & similiter de- M
scriptam] *Ex corollario secundo vigesimae sexti.*

Quandoquidem circuli iuter se sunt, vt diametrorum quadrata] *Ostenditur id in se* N
*cunda propositione duodecimi libri. vnde colligi potest hac siue sint Euclidis, siue alterius alieno lo
co posita esse.*

Nam si in quadratis ex AB, vel in rectilineis, quę ipsis æqualia sint, solida æque al O
ta constituamus, siue parallelepipeda, siue pyramides, siue prismata, erunt ea inter se vti bases] *Ex 32 vndecimi, & ex 5. & 6. duodecimi,*

Sed & duobus circulis existẽtibus AB, si in ipsis conos æque altos, siue Cylindros P
constituamus, erunt inter se, vti ipsorum bases] *Ex 11. duodecimi.*

DECIMI LIBRI FINIS.

SCHO-

SCHOLIVM.

Antiqui planorum cognitionem à ſcientia ſolidorum diſtinxerunt. etenim illam geometriam appellarunt, vt etiam Plato oſtendit in politicis; hanc autem ſtereometriam. At vero Iuniores cum utriuſque ſcientiæ communis ſit cognitio, quæ circa magnitudines verſatur, etiam communi nomine geometriam dixerunt, eas velut unam coniungentes. Et quemadmodum in planis alia quidem erant rectilinea, alia uero circularia, & alia mixta, ut helices, ita in ſolidis, alia conſtant ex planis rectilineis, alia ex ſphæricis, alia ex mixtis, ut cylindrus & conus. Et ſphærica quidem ad terminum & finem pertinent; rectilinea uero, uel quæ ex rectilineis ſunt ad infinitum; mixta ad id, quod occultum eſt. & ſi aliquod eſt corpus, hoc & ſolidum eſt, non autem contra, ut in ijs, quæ dicta ſunt: hęc enim imaginabilia ſunt ſolida, non antitypa, hoc eſt dura, & reſiſtentia.

EVCLIDIS ELEMENTORVM

LIBER VNDECIMVS ET SOLIDORVM PRIMVS.

CVM SCHOLIIS ANTIQVIS ET COMMENTARIIS

Federici Commandini Vrbinatis.

DIFFINITIONES

I.

SOLIDVM est, quod longitudinem, latitudinem, & crassitudinem habet.

II.

Solidi terminus est superficies.

III.

Recta linea ad planum recta est, quando ad omnes rectas lineas, quæ ipsam contingunt, & in subiecto sunt plano rectos angulos efficit.

SCHOLIVM.

Si posset planum in rectas lineas resolui, ita dixisset. Quando ad omnes rectas lineas, ex quibus planum constat, rectos facit angulos, tunc & ad ipsum recta erit. Sed quoniam planum etiam infinite rectis lineis sectum in ipsas non resoluitur, contentus fuit linearum infinitate pro toto plano. contingentes autem addit, ut non parallelæ sint.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit recta linea AB ad subiectum planum CDEF perpendicularis, siue recta, & à puncto B ducantur quotcumque rectae lineae in eodē plano BC BD BE BF & fiāt anguli CBA DBA EBA FBA recti. Quòd si anguli CBA DBA EBA FBA recti sint, dicemus rectam lineam AB ad subiectum planum CDEF perpendicularem, sibi rectum esse.



IIII.

Planum ad planum rectum est, quando communi planorum sectioni ad rectos angulos ductæ rectæ lineæ in vno plano, alteri plano ad rectos angulos fuerint.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit planum ABCD ad planum BEFC rectũ, sitq; eorũ cõis sectio BC, & in plano BEFC ducatur recta linea GH perpẽdicularis ad ipsã BG. erit recta linea GH ad planũ ABCD perpẽdicularis, siue recta. Si si recta GH, vel planũ ABCD perpẽdicularis sit, siue recta, erit ea ad BC cõem duorũ planorũ sectionem perpẽdicularis. Et similiter cõtinget, si in alio plano ducatur KH perpẽdicularis ad ipsa BC. ponatur autẽ nũc cõem duorũ planorũ sectionẽ recta lineã esse, quod in sequentibus demonstrabitur.



V.

Rectæ lineæ ad planum inclinatio est, quando à sublimi termino lineę ad planum perpendiculari acta, à puncto facto ad terminum lineæ, qui est in plano, recta linea ducta fuerit, angulus acutus, qui ducta linea & stante continetur.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit recta linea AB inclinata ad subiectum planũ CDEF: atque à puncto sublimi A ad idem planum perpendicularis ducatur AG, & BG iungatur. erit angulus ABG acutus, rectae lineae AB ad planum CDEF inclinatio.



VI.

Plani ad planum inclinatio est angulus acutus rectis lineis cõtentus, quę ad rectos angulos communi planorum sectioni ad vnum ipsius punctum in vtroque planorum ducuntur.

F. C. COMMENTARIVS.

Sint duo plana inter se inclinata ABCD EADF, quorum cõmunis sectio AD, & sumpto in ipsa AD quouis puncto G ab eo ad rectos angulos in vtroque plano ducantur GH GK, erit angulus HGK inclinatio plani ABCD ad EADF planum.



VII.

Planum ad planum similiter inclinari dicitur, & alterum ad alterum, quando dicti inclinationum anguli inter se fuerint æquales.

F. C.

Sint duo plana inter se inclinata ABCD EADF, de quibus proxime dictum est: sintq; alia duo plana inclinata LMNO PLOQ, quorum inclinatio angulus SRT: & sint anguli HGK SRT aequales. dicitur planum ABCD ad planum EADF similiter inclinatum, atque planum LMNO ad planum PLOQ.



VIII.

Plana parallela sunt, quę inter se non conueniunt.

IX.

Similes solidæ figurę sunt, quę similibus planis multitudine æqualibus continetur.

X.

Aequales & similes solidæ figuræ sunt, quæ similibus planis multitudine & magnitudine æqualibus continentur.

XI.

Solidus angulus est, plurium, quàm duarum linearum, quæ se se contingant, & non in eadem sint superficie, ad omnes lineas inclinatio. vel solidus angulus est, qui pluribus, quàm duobus planis angulis comprehenditur, non existentibus in eodem plano, & ad vnum punctum constitutis.

SCHOLIVM.

Euclides quidem in inclinatione angulum vult esse: Stoici vero dicunt inclinationem esse angulum. sed recte Euclides. omnis enim angulus magnitudinum inclinatio est ad vnum punctum. hac autem diffinitio imperfecta est. angulus enim quartę partis sphæræ pluribus quidem, quàm duabus superficiebus comprehenditur, sed non planis: & dimidius conus ad verticem angulum solidum non efficit. nam si is est angulus: & coni uertex angulus erit. quare & ex duabus superficiebus & ex vna solidus angulus constabit. quod quidem verum est. melius igitur erit solidum angulum diffinire, inclinationem magnitudinis, vel magnitudinum ad vnum punctum.

ἐν τῇ κλίσει. σύνευσις. σύνευσιν.

XII.

Pyramis est figura solida planis comprehensa, quæ ab vno plano ad vnum punctum constituitur.

XIII.

Prisma est figura solida planis comprehensa, quorum duo, quæ opponuntur æqualia, & similia & parallela sunt; reliqua vero parallelogramma.

F. C. COMMENTARIVS.

Prismata dicuntur non solum, quae bases habent triangulares, vt opinatur Campanus, qui ea corpora seratilia appellat, sed quecumque plana, quae opponuntur, siue triangula, siue quadrilatera, siue pentagona, siue plurilatera, & aequalia, & similia habent, reliqua vero parallelogramma. quod ex ijs, quae tum in hoc libro, tum in sequenti traduntur, manifestissime apparet. Alia autem prismata Campanus improprie columnas lateratas vocat, quemadmodum & conos, pyramides rotundas, & Cylindros columnas rotundas.

XIIII.

Sphera est figura comprehensa, quando circa manentem diametrum semicirculus conuersus restituatur rursus in eundem locum, à quo moueri cœpit.

XV.

Axis sphæræ est recta linea manens, circa quam semicirculus conuertitur.

XVI.

Centrum sphæræ est idem, quod & semicirculi centrum.

XVII.

Diameter sphæræ est recta linea quædam per centrum ducta, & ex vtraque parte à superficie sphæræ terminata.

XVIII.

Conus est comprehensa figura, quando orthogonij trianguli manente vno latere eorum, quæ circa rectum angulum sunt, triangulum conuertatur, quoad rursus in eundem restituatur locum, à quo moueri cœpit. & si quidem manens recta linea æqualis fuerit reliquo lateri, quod circa rectũ angulũ cõuertitur, conus orthogonius erit; si vero minor, ambligonius; & si maior, oxigonius.

XIX.

Axis coni est recta linea manens, circa quam triangulum conuertitur.

Basis

XX.

Basis vero circulus à conuersa recta linea descriptus.

SCHOLIVM.

Ostendendum quomodo conus orthogonius sit, vel angulum rectum ad verticem habeat.



Exponatur triangnlum orthogonium ABC rectũ habens ABC angulum; & rectam lineam BC rectę AB æqualem. Dico ad punctum A rectum angulum constitui. producatur enim CB vsque ad D: ponaturq; BD ipsi CB æqualis, & AD iungatur. Itaque quoniam AB est æqualis BC, erit & angulus BCA angulo BAC æqualis, & vterque ipsorũ dimidius recti, quòd rectus ponatur ABC: Eadem ratione & BAD est recti dimidius. totus igitur DAC angulus rectus est; & idcirco conus circa ABC descriptus est orthogonius; nimirũ recta linea AB manente: & circumducta AC quoad in eũdem locum restituatur, à quo moueri cœpit. circumductis igitur AC & CB, manente autem AB necesse est in conuersione rectam lineam AC congruere rectæ AD, cum CB ipsi BD sit æqualis: & circulus à puncto C descriptus basis erit coni, qui à triangulo ABC constituitur, & eius circuli diameter erit basis trianguli ADC, rectum habentis DAC angulum. Quòd si conus à vertice A ad basim vsque bifariam diuidatur, portionum superficies non aliud erunt, nisi triangulum ADC, quod est orthogonium. quare & coni uertex orthogonius erit. si vero angulus BAC sit maior dimidio recti, erit ob eandem caussam angulus quoque DAB dimidio recti maior, & DAC maior recto, videlicet obtusus; & conus ambligonius erit, vel ad verticem angulum obtusum habebit. si denique BC sit minor, quàm AB, erit angulus BAC minor dimidio recti. ergo ex ijs, quæ ostensa sunt, DAC angulus recto minor, hoc est acutus, & conus oxygonius erit.

F. C. COMMENTARIVS.

Euclides conos, & cylindros dumtaxat rectos diffiniuit, vel potius eorum ortum tradidit, nobis vero omnium vniuerse ex Apollonio, Serenoq; ortum explicare visum est.

EX APOLLONIO.

Si ab aliquo puncto ad circumferentiam circuli, qui non sit in eodem plano, in quo punctum, coniuncta recta linea in vtramque partem producatur, & manente puncto cõuertatur circa circuli circũferentiã, quousque ad eum locum redeat, à quo cepit moueri; superficiem à recta linea descriptam, constantemq; ue ex duabus superficiebus ad verticem inter se aptatis, quarum vtraque in infinitum augetur, nimirum recta linea, quæ eam describit in infinitum producta; uoco Conicam superficiem, Verticem ipsius manens punctum, Axem rectam lineam, quæ per punctũ, et centrum circuli ducitur: Conum autem voco figuram contentam circulo

&

& conica ſuperficie, quę inter verticem, & circuli circumferentiam interijcitur. Verticem coni punctum, quod et ſuperficiei conicæ vertex eſt. Axem rectam lineam, quæ à vertice ad circuli centrum perducitur. Baſim circulum ipſum.

Conorũ rectos quidẽ voco, qui axes habẽt ad rectos angulos ipſis baſibus. Scalenos vero, qui non ad rectos angulos ipſis baſibus axes habẽt.

Quem locum explicans Futocius ita ſcribit.

Sit circulus A B, cuius centrum C: & punctum aliquod ſublime D: iunctaque D B in infinitum ex vtraque parte producatur ad puncta E F. Si igitur recta linea D B feratur eo vſque in circuli A B circumferentia, quouſque punctum B rurſus in eum locum reſtituatur, à quo cœpit moueri: deſcribet ſuperficiem quandam, quę quidem conſtat ex duabus ſuperficiebus, ad D punctum ſe ſe tangentibus. eam voco conicam ſuperficiem; quę & augetur in infinitum, cum recta linea D B, ipsã deſcribens in infinitum producitur. verticem ſuperficiei dicit, punctum D; axem, rectam D C. conum vero appellat figuram cõtentam circulo A B, & ea ſuperficie, quam D B ſola deſcribit: coni verticem punctum D: axẽ D C: & baſim, A B circulum. At ſi D C ad circulum, fuerit perpendicularis, rectum vocat conum; ſin minus, ſcalenum.

Deſcribetur autem conus ſcalenus, quando à centro circuli linea erigatur, quae non ſit perpendicularis ad circuli planum: à puncto vero lineae, quod eſt in ſublimi ad circuli circumferentiam recta linea ducatur: & manente puncto circa ipſam conuertatur: comprehenſa etenim figura conus erit ſcalenus. conſtat igitur lineam circumductam in conuerſione quandoque maiorem; quandoque minoram, & quandoque aequalem fieri, ad aliud atque aliud circuli punctum.



XXI.

Cylindrus eſt comprehenſa figura, quando orthogonij parallelogrammi manente vno latere eorum, quæ circa rectum angulum ſunt, parallelogrammum conuertatur, quouſque rurſus reſtituatur in eundem locum, à quo moueri cœpit.

XXII.

Axis Cylindri eſt manens recta linea, circa quam parallelogrammum conuertitur.

XXIII.

Baſis autem, circuli, qui à duobus è regione lateribus conuerſis deſcibuntur.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit parallelogrammum rectangulum ABCD, & latere AB manente intelligatur latus CD conuerti, quousq; ad eum locum redeat, à quo capit moueri. erit iã descripta figura, cuius axis est AB recta linea manens, & basis circuli ipsi à punctis CD circa centra BA descripti.



EX SERENO.

Si duorum circulorum æqualium, & parallelorũ diametri semper inter se sẽ parallelæ, & ipsa in circulorum planis circa manens centrum circumferantur, & vnà circumferatur recta linea diametrorũ terminos ex eadem parte coniungens, quousque rursus in eum locum restituatur, à quo moueri cœpit: superficies, quæ à circumlata recta linea describitur, Cylindrila superficies vocetur; quæ quidem & in infinitum augeri potest, recta linea describente in infinitum producta. Cylindrus, figura, quæ circulis parallelis, & Cylindrica superficie inter ipsos interiecta continetur. Cylindri, basis circuli ipsi. Axis recta linea, quæ per circulorum centra ducitur. latus autem Cylindri linea, quæ cum recta sit, & in superficie ipsius Cylindri, bases vtrasque contingit: quam & circumlatam describere superficiem Cylindri antea diximus. Cylindrorum recti quidem dicuntur, qui axem habent ad rectos angulos existentem ipsis basibus. Scaleni autem, qui non ad rectos angulos existentem ipsis basibus axem habent.

XXIIII.

Similes coni, & Cylindri sunt, quorum, & axes, & basium diametri eandem inter se proportionem habent.

F. C. COMMENTARIVS.

Similes conos & Cylindros omnes tum rectos, tum scalenos hoc modo diffiniemus.

Similes coni, & Cylindri sunt, quando per axes ductis planis ad rectos angulos basibus, communes sectiones eorum & basium cum axibus æquales angulos continentes, eandem inter se, quam axes, proportionem habent.

XXV.

Cubus est figura solida, sex quadratis æqualibus contenta.

XXVI.

Tetraedrum est figura solida quatuor triangulis æqualibus & æquilateris comprehensa.

Octaedrum

XXVII.

Octaedrum eſt figura ſolida octo triangulis æqualibus & æquilateris comprehenſa.

XXVIII.

Dodecaedrum eſt figura ſolida, quæ duodecim pentagonis æqualibus, & æquilateris, & æquiangulis continetur.

XXIX.

Icoſaedrum eſt figura ſolida, quę viginti triangulis æqualibus, & æquilateris comprehenditur.

THEOREMA I. PROPOSITIO I.

Rectæ lineæ pars quædam non eſt in ſubiecto plano, quędam vero in ſublimi.



Si enim fieri poteſt rectæ lineę AB pars quidem AB ſit in ſubiecto plano, pars vero BC in ſublimi. erit vtique recta linea quædam ipſi AB in directum continuata in ſubiecto plano. A ſitq; BD. duabus igitur datis rectis lineis AB C ABD communis portio eſt AB, quod fieri non poteſt; recta enim linea cum recta linea non conuenit in pluribus punctis, quàm vno. B alioqui rectæ lineę ſibi ipſis congruęt. non igitur rectæ lineæ pars quædam eſt in ſubiecto plano, quędam vero in ſublimi.

SCHOLIVM.

A Duabus igitur datis rectis lineis ABC ABD cõmunis portio eſt AB, quod fieri non poteſt.] *Duabus enim rectis lineis non eſt communis portio. ſi enim fieri poteſt, ſit duabus rectis lineis ABC ABD communis portio AB; & ſumatur in recta linea ABC centrum quidem B, interuallum vero BA, & circulus AEF deſcribatur. Quoniam igitur punctum B centrum eſt circuli AEF, & per B ducta eſt quędam recta linea ABC, erit AEF circuli diameter ABC. diameter autem circulum bifariam ſecat. ergo AEC ſemicirculus eſt. Rurſus quoniam B centrum eſt AEF circuli, & per B recta linea quędam ducta eſt ABD, erit ABD circuli AEF diameter. oſtẽſa autem eſt & ABC diameter eiuſdem circuli, & ſemicirculi eiuſdem circuli ſunt aequales inter ſe. ergo AEC ſemicirculus ſemicirculo AED eſt aequalis, minor maiori, quod fieri non poteſt. non igitur duabus rectis lineis communis portio eſt, ſed differens; ac propterea neque fieri poteſt, vt terminatae rectae lineae alia recta linea in directum continuata ſit ex iis, quae ante oſtenſa ſunt; quoniam duabus rectis lineis communis portio non eſt recta linea.*



B Alioqui rectę lineę ſibi ipſis congruent.] *Manifeſtum eſt congruentibus rectis lineis, & earum fines inter ſe congruere. ſi autem hoc, duae rectae lineę eoſdem fines habentes ſpacium cõtinebunt. quod fieri non poteſt.*

THEO-

THEOREMA II. PROPOSITIO II.

Si duę rectæ lineæ se inuicem secent, in vno sunt plano, & omne triangulum in vno plano consistit.

Duę enim rectæ lineę AB CD se inuicem in puncto E secent. Dico ipsas AB CD in vno esse plano, & omne triangulum in vno plano consistere. Sumantur enim in ipsis EB EC quæuis puncta FG; iunganturq; CB FG, & FH GK ducantur. Dico primum EBC triangulum consistere in vno plano. Si enim trianguli EBC pars quidem FHC, vel GBK in subiecto plano est, reliqua vero in alio plano; erit & vnius linearum EB EC pars in subiecto plano, & pars in alio. Quòd si triangli ECB pars FG BG sit in subiecto plano, reliqua vero in alio, vtrarũq; rectarum linearum EC EB quędam pars erit in subiecto plano, quædam vero in alio. quod absurdũ esse ostendimus. Triangulum igitur EBC in vno est plano. in quo autem plano est BCE triangulum, in hoc est vtraque ipsarum EC EB: in quo autem vtraque ipsarum EC EB, in hoc & AB CD. ergo rectę lineę AB CD in vno sunt plano, & omne triangulum in vno plano consistit.



SCHOLIVM.

Propositum est ostendere rectas lineas, quę se mutuo secant in vno plano esse. quoniam autem hoc per triangulum ostenditur, illud apposuit, & omne triangulum in vno plano consistit.

THEOREMA III. PROPOSITIO III.

Si duo plana se inuicem secent, cõmunis ipsorum sectio recta linea erit.

Duo enim plana AB BC se inuicem secent, communis autem ipsorum sectio sit DB linea. Dico lineam DB rectam esse. si enim non ita sit, ducatur à puncto D ad B in plano quidem AB recta linea DEB; in plano autem BC recta linea DFB. erunt vtique duarum rectarum linearum DEB DFB idem termini, & ipsę spacium cõtinebunt, quod est absurdum. non igitur DEB DFB rectæ lineæ sunt. Similiter ostendemus neque aliam quãpiam, quæ à puncto D ad B ducitur rectam esse, præter ipsam DB, communem scilicet planorum AB BC sectionem. si igitur duo plana se inuicem secent, communis ipsorum sectio recta linea erit.



THEOREMA IIII. PROPOSITIO IIII.

Si recta linea duabus rectis lineis se inuicem secantibus in cõmuni sectione ad rectos angulos insistat, etiã ductõ per ipsas plano ad rectos angulos erit.

Recta enim linea quædam EF duabus rectis lineis AB CD se inuicem secãtibus in E puncto, ab ipso E ad rectos angulos insistat. Dico EF etiam plano per AB CD

ducto ad rectos angulos esse. sumantur enim rectæ lineæ AE EB CE ED inter se æquales: perq; E ducatur recta linea GEH vtcumque, & iungantur A D CB; deindè à quouis puncto F ducantur FA F G FD FC FH FB. Et quoniam duæ rectę lineæ A E ED duabus rectis lineis CE EB æquales sunt, & 4. primi. angulos æquales continent, erit AD basis basi CB æqualis, & triangulum AED triangulo CEB æquale. ergo & angulus DAE æqualis est angulo EBC. est aũt & angulus AEG æqualis angulo BEH. Duo igitur triangula sunt AGE BEH duos angulos duobus angulis æquales habẽtia, alterũ alteri, & vnũ latus AE vni lateri EB æquale. quòd est 26. primi. ad æquales angulos. quare & reliqua latera reliquis lateribus æqualia habebũt, ergo GE quidem est æqualis EH; AG vero ipsi BH. Quòd cum AE sit æqualis EB, com- 4. primi. munis autem & ad rectos angulos FE; erit basis AF basi FB æqualis. Eadem quoq; ratione & CF æqualis erit FD. Præterea quoniam AD est æqualis CB, & AF ipsi FB; erunt duæ FA AD duabus FB BC æquales, altera alteri; & ostẽsa est basis DF æqua- 8. primi. lis basi FC. angulus igitur FAD angulo FBC est æqualis. Rursus ostensa est AG æqualis BH. sed & AF ipsi FB est æqualis. duæ igitur FA AG duabus FB BH æqua- 4. primi. les sunt, & angulus FAG æqualis est angulo FBH, vt demonstratum fuit. basis igitur GF basi FH est æqualis. Rursus quoniam GE ostensa est æqualis EH, communis autem FE; erunt duæ GE EF æquales duabus HE EF; & basis HF est æqualis basi FG. angulus igitur GEF angulo HEF est æqualis, & idcirco rectus est vterque angulorum GEF HEF. ergo FE ad GH vtcumque per E ductam rectos efficit angulos. Similiter ostendemus FE etiam ad omnes rectas lineas, quæ ipsam contingunt, & 3. diff. in subiecto sunt plano, rectos angulos efficere. recta autẽ ad planum recta est, quando ad omnes rectas lineas ipsam contingentes, & in eodem existentes plano rectos efficit angulos. quare FE subiecto plano ad rectos angulos insistit. at subiectum planum est quod per AB CD rectas lineas ducitur. ergo FE ad rectos angulos erit ducto per AB CD plano. Si igitur recta linea duabus rectis lineis se inuicem secantibus in communi sectione ad rectos angulos insistat, etiam ducta per ipsas plano ad rectos angulos erit.



THEOREMA V. PROPOSITIO V.

Si recta linea tribus rectis lineis se se tangentibus in communi sectione ad rectos angulos insistat, tres illæ rectæ lineę in vno plano erunt.

Recta enim linea quædam AB tribus rectis lineis BC BD BE in cõtactu B ad rectos angulos insistat. Dico BC BD BE in vno plano esse. non enim, sed si fieri potest, sint BD BE quidẽ in subiecto plano, BC vero in sublimi, 3. huius. & planum per AB BC producatur, cõmune vtique sectionem in subiecto plano faciet rectam lineam. faciat BF. in vno igitur sunt plano per AB BC ducto tres rectę lineæ AB BC BF, & quoniam AB vtrique ipsarum BD BE ad rectos angulos insistit, & ducto per ipsas DB BE plano ad rectos angulos erit. planum autem DB BE est subiectum planum. ergo A B ad subiectum planum recta est. quare & ad omnes rectas lineas ipsam contingentes,

Ex antecedente.

3. diff.



tes,quæ in eodem plano sunt,rectos faciet angulo; sed ipsam tangit BF in subiecto existens plano. ergo angulus ABF rectus est. ponitur autem & ABC angulus rectus,equalis igitur est angulus ABF angulo ABC,& in eodem sunt plano; quod fieri non potest.recta igitur linea BC non est in plano sublimi. quare tres rectæ lineæ BC BD BE in vno sunt plano. Si igitur recta linea tribus rectis lineis se se tangentibus in cõmuni sectione ad rectos angulos insistat,tres illæ rectæ lineæ in vno plano erunt.

THEOREMA VI. PROPOSITIO VI.

Si duę rectæ lineę eidem plano ad rectos angulos fuerint, illę inter se se parallelæ erunt.

Duæ enim rectæ lineæ AB CD subiecto plano sint ad rectos angulos. Dico AB ipsi CD parallelam esse. occurrant enim subiecto plano in punctis BD,iungaturq; BD recta linea,cui ad rectos angulos in subiecto plano ducatur DE, & posita DE ipsi AB æquali,iungantur BE AE AD.Qm igitur AB recta est ad subiectum planum, & ad omnes rectas lineas,quę ipsam cõtingunt, & in subiecto sunt plano, rectos angulos efficiet.contingit autem AB vtraque ipsarum BD BE existens in subiecto plano. ergo vterque angulorum ABD ABE rectus est. Eadem ratione rectus etiam est vterq; ipsorum CDB CDE.& quoniam AB æqualis est ipsi DE,cõmunis autem BD, erunt duæ AB BD duabus ED DB æquales,& rectos angulos continent.basis igitur AD basi BE est æqualis. rursus quoniam AB est æqualis DE, & AD ipsi BE,duę AB BE duabus ED DA æquales sunt,& basis ipsarum AE communis.ergo angulus ABE angulo EDA est æqualis.sed ABE rectus est.rectus igitur & EDA; & idcirco ED ad DA est perpendicularis. sed & perpendicularis est ad vtramque ipsarum BD DC.quare ED tribus rectis lineis BD DA DC in contactu ad rectos insistit angulos.tres igitur rectæ lineę BD DA DC in vno sunt plano. in quo autem sunt BD DA,in hoc & AB:omne enim triangulum in vno est plano. ergo AB BD DC in vno plano sint necesse est,atque est vterque angulorum ABD BDC rectus.parallela igitur est AB ipsi CD. quare si duæ rectæ lineæ eidē plano ad rectos angulos fuerint, illæ inter se se parallelæ erunt.



Diffi. 5

4.primi.

8.primi.

Ex antecedente 2.huius.

28.primi.

THEOREMA VII. PROPOSITIO VII.

Si duę rectæ lineę parallelæ sint,sumantur autem in vtraque ipsarum quælibet puncta; quę dicta puncta coniungit recta linea in eodem erit plano,in quo & parallelę.

Sint duæ rectę lineæ parellelæ AB CD, & in vtraque ipsarum sumantur quælibet puncta EF. Dico rectam lineam quæ puncta E F cõiungit,in eodem plano esse,in quo sunt parallelę.non enim,sed si fieri potest,sit in sublimi,vt EGF, & per EGF planũ ducatur, quod in subiecto plano sectionem faciet, rectam lineam.faciat vt EF.ergo duæ rectæ lineæ EGF E F spacium continebunt,quod fieri non potest. non igitur quæ à puncto E ad F ducitur recta linea in sublimi est plano, quare erit in eo,quod per AB CD parallelas transit.si igitur duæ rectæ lineæ parallelę sint, & reliqua, quæ sequuntur.quod oportebat demonstrare.



5.huius.

10 com. no. primi libri.

THEOREMA VIII. PROPOSITIO VIII.

Si duę rectę lineæ parallelę ſint, altera autem ipſarum plano alicui ſit ad rectos angulos; & reliqua eidem plano ad rectos angulos erit.



Sint duę rectę lineæ parallelę AB CD, & altera ipſarum AB ſubiecto plano ſit ad rectos angulos. Dico & reliquam CD eidem plano ad rectos angulos eſſe. occurrāt enim AB CD ſubiecto plano in punctis BD, & BD iungatur. ergo A B CD BD in vno ſunt plano. Ducatur ipſi BD ad rectos angulos in ſubiecto plano DE: & ponatur DE ipſi AB æqualis: iunganturq; BE AE AD. Et quoniam AB perpendicularis eſt ad ſubiectum planum, & ad omnes rectas lineas, quæ ipſam contingunt, ſuntq; in ſubiecto plano, perpendicularis erit. rectus igitur eſt vterque angulorum ABD ABE. Quòd cū in parallelas rectas lineas AB CD incidat BD, erūt anguli ABD CDB duobus rectis ęquales. rectus autem eſt ABD. ergo & CDB eſt rectus; ac propterea CD perpendicularis eſt ad BD. Et quoniam AB eſt ęqualis DE, communis autem BD, duæ AB BD duabus ED DB æquales ſunt; & angulus ABD eſt æqualis angulo EDB, rectus enim vterq; eſt. baſis igitur AD baſi BE eſt ęqualis. Rurſus quoniam AB æqualis eſt DE, & BE ipſi AD; erunt duę AB BE duabus ED DA æquales, altera alteri; & baſis earum communis AE. quare angulus ABE eſt æqualis angulo EDA. rectus autem eſt ABE. ergo & EDA eſt rectus, & ED ad DA perpendicularis. ſed & perpendicularis eſt ad BD. ergo ED ēt ad planum per BD DA perpendicularis erit, & ad omnes rectas lineas, quę in eodem exiſtentes plano ipsā contingunt, rectos faciet angulos. At in plano per BA AD eſt DC, quoniam in plano per BD DA ſunt AB BD: in quo autem ſunt AB BD in eodem eſt ipſa DC. quare ED ipſi DC eſt ad rectos angulos; ideoq; CD ad rectos angulos eſt ipſi DE. ſed & CD ipſi DB. ergo CD duabus rectis lineis DE DB ſe mutuo ſecantibus in cōmuni ſectione D ad rectos angulos inſiſtit; ac propterea plano per DE DB eſt ad rectos angulos. planum autem per DE DB eſt ſubiectum planum. ergo CD ſubiecto plano ad rectos angulos erit.

Ex antecedente.

8.diffi.

29.primi.

4.primi.

8.primi.

4.huius.

3.diffi.

2.huius.

4.huius.

THEOREMA IX. PROPOSITIO. IX.

Quæ eidem rectę lineę ſunt parallelę, non exiſtentes in eodem, in quo ipſa, plano; etiam inter ſe parallelæ erunt.



Sit enim vtraque ipſarum AB CD parallela ipſi EF, non exiſtentes in eodem, in quo ipſa, plano. Dico AB ipſi CD parallelā eſſe. ſumatur in EF quod uis punctum G, à quo ipſi EF in plano quidem per EF AB tranſeunte ad rectos angulos ducatur GH; in plano autem tranſeunte per FE CD rurſus ducatur ipſi EF ad rectos angulos GK. Et quoniam EF ad vtramque ipſarum GH GK eſt perpendicularis, erit EF etiam ad rectos angulos plano per GH GK tranſeunte. atque eſt EF ipſi AB parallela. ergo & AB plano per HGK ad rectos angulos eſt. eadem ratione & CD plano per HGK eſt ad rectos angulos. vtraq; igitur ipſarum AB CD plano per HGK ad rectos angulos erit. Si autem duę rectæ lineę eidem plano ad rectos angulos fuerint, parallelæ erunt inter ſe ſe. ergo AB ipſi CD eſt parallela.

4.huius.

Ex antecedente.

6.huius.

THEO-

THEOREMA X. PROPOSITIO. X.

Si duæ rectæ lineæ ſe ſe contingentes duabus rectis lineis ſe ſe contingentibus ſint parallelæ, non autem in eodem plano; æquales angulos continebunt.

Duæ enim rectę lineæ ſe ſe contingentes AB BC duabus rectis lineis DE EF ſe ſe contingentibus ſint parallelæ, non autem in eodem plano. Dico angulum ABC angulo DEF ęqualem eſſe. Aſſumantur enim BA BC ED EF inter ſe æquales: & iungantur AD CF BE AC DF. Quoniam igitur BA ipſi ED æqualis eſt & parallela, erit & AD æqualis & parallela ipſi BE. Eadē ratione & CF ipſi BE ęqualis & parallela erit. Vtraque igitur ipſarum AD CF ipſi BE ęqualis eſt & parallela. Quę autem eidem rectę lineę ſunt parallelę, nō exiſtentes in eodem, in quo ipſa plano; & inter ſe parallelę erūt. ergo AD parallela eſt ipſi CF, & æqualis. atque ipſas coniungunt AC DF; & AC igitur ipſi DF æqualis eſt & parallela.



33. primi.

Ex antecedente.

& quoniā duæ rectæ lineę AB BC duabus DE EF æquales ſunt, & baſis AC eſt æqualis baſi DF; erit angulus ABC angulo DEF ęqualis. ſi igitur duæ rectæ lineæ ſe ſe contingentes duabus rectis lineis ſe ſe contingētibus ſint parallelę, non autem in eodem plano; ęquales angulos continebunt. quod ōportebat demonſtrare.

33. primi.

8. primi.

SCHOLIUM.

CONVERSUM. Si fuerint duo anguli æquales, contenti rectis lineis in eodem plano non exiſtentibus, & earum vna parallella ſit uni continentium ęqualem angulum; & reliqua reliquæ parallela erit.

F. C. COMMENTARIVS.

Sint duo anguli aequales ABC DEF: & rectae lineae AB BC angulum ABC continentes nō ſint in eodem plano, in quo DEF. ſit autem DE parallela ipſi AB. Dico & EF ipſi BC parallelam eſſe. Si enim nō eſt EF parallela ipſi BC, erit alia ipſi parallela, ſit EG. Itaque quoniam duae rectae lineae ſeſe contingentes AB BC duabus rectis lineis ſeſe cō tingentibus DE EG ſunt parallelae, nō autem in eodem plano; aequales angulos continebunt. ergo angulus DEG angulo ABC eſt aequalis. Sed et angulus DEF ponitur aequalis angulo ABC. angulus igitur DEF angulo DEG aequalis erit, minor maiori, quod fieri non poteſt. non igitur EG parallela eſt ipſi BC. ſimiliter oſtendemus neque aliam vllam eidem BC parallelam eſſe prēter ipſam EF. ergo EF ipſi BC eſt parallela. quod demonſtrare oportebat.



PROBLEMA I. PROPOSITIO XI.

A dato puncto ſublimi ad ſubiectum planum perpendicularem rectam lineam ducere.

Sit datum quidem pūctum ſublime A, datum autem ſubiectum planum. oportet à puncto A ad ſubiectum planum perpendicularem rectam lineā ducere. In ſubiecto enim plano ducatur quędam recta linea vt cumq; BC, & à puncto A ad B

C per

C perpendicularis agatur A D. Si quidem igitur AD perpẽdicularis ſit etiam ad ſubiectum planum; factum iam erit, quod proponebatur: ſin minus, ducatur à puncto D ipſi B C in ſubiecto plano ad rectos angulos D E: & à pũcto A ad DE perpendicularis ducatur AF. deniq; per F ducatur GH ipſi BC parallela. Et qm̃ BC vtriq; ipſarum DA DE eſt ad rectos angulos, erit & B C ad rectos angulos plano per ED DA tranſeunti, atq; eſt ipſi parallela GH. Si aũt ſint duæ rectæ lineę parallelæ, quarum vna plano alicui ſit ad rectos angulos, & reliqua eidẽ plano ad rectos angulos erit. quare & GH plano per ED DA tranſeunti ad rectos angulos eſt: ac propterea ad omnes rectas lineas, quę in eodem plano exiſtentes ipſam contingunt, eſt perpendicularis. contingit aũt ipſam AF exiſtẽs in plano per ED DA. ergo G H perpendicularis eſt ad F A. & ob id F A eſt perpẽdicularis ad GH: eſt autem AF & ad DE perpẽdicularis. ergo AF perpendicularis eſt ad vtrãq; ipſarum HG DE. ſi autem recta linea duabus rectis lineis ſeſe contingentibus in cõmuni ſectione ad rectos angulos inſiſtat, etiam plano per ipſas ducto ad rectos angulos erit. quare F A plano per E D GH ducto eſt ad rectos angulos. planum autem per ED GH eſt ſubiectum planum. ergo AF ad ſubiectum planum eſt perpẽdicularis. A dato igitur puncto ſublimi A ad ſubiectum planum perpendicularis recta linea ducta eſt AF. quod facere oportebat.



11. primi.
12 primi.
4. huius.
8 huius.
3. diffi.
4. huius.

PROBLEMA II. PROPOSITIO. XII.

Dato plano à puncto, quod in ipſo datum, eſt ad rectos angulos rectam lineam conſtituere.

Sit datum quidem planum ſubiectum, punctum autẽ, quod in ipſo ſit A. oportet à puncto A ſubiecto plano ad rectos angulos rectã lineam conſtituere. Intelligatur aliquod punctũ ſublime B, à quo ad ſubiectũ planum agatur perpendicularis B C; & per A ipſi BC parallela ducatur AD. Qm̃ igitur duę rectæ lineæ parallelæ ſunt A D C B, vna autem ipſarum B C ſubiecto plano eſt ad rectos angulos; & reliqua AD ſubiecto plano ad rectos angulos erit. Dato igitur plano à puncto, quod in ipſo eſt datum ad rectos angulos recta linea conſtituta eſt. quod facere oportebat.



Ex antecedente.
8 huius.

THEOREMA XI. PROPOSITIO XIII.

Dato plano à pũcto, quod in ipſo eſt, duæ rectę lineæ ad rectos angulos non conſtituentur ex eadem parte.

Si enim fieri poteſt, dato plano à puncto quod in ipſo eſt A, duæ rectę lineę AB AC ad rectos angulos conſtituantur ex eadem parte: & ducatur planũ per BA AC, quod faciet ſectionem per A in ſubiecto plano rectam lineam. faciat D AE. ergo rectæ lineæ AB AC DAE in vno ſunt plano. Et quoniam CA ſubiecto plano ad rectos angulos eſt, & ad omnes rectas lineas, quę in ſubie-



3. huius.
A
3. diffi.

ſto plano

cto plano existentes ipsam contingunt, recto s faciet angulos. contingit autem ipsam DAE, quę est in subiecto plano. angulus igitur CAE rectus est. Eadem ratione & rectus est BAE. ergo angulus CAE ipsi BAE est æqualis, & in vno sunt plano, quod fieri non potest. Non igitur dato plano à puncto, quod in ipso est, duæ rectæ B
lineæ ad rectos angulos constituentur ex eadē parte. quod demonstrare oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

Et ducatur planum per BA AC] *Sunt enim ex secunda huius rectae lineae BA AC in vno plano.* A

SCHOLIVM.

Quod fieri non potest] *Essent enim & parallelae, eidem plano ad rectos angulos existentes; & inter se conuenirent. quod est absurdum, parallelae autem essent ex sexta huius.* B

THEOREMA XII. PROPOSITIO XIIII.

Ad quæ plana eadem recta linea est perpendicularis, ea parallela sunt.



Recta enim linea quædam AB ad vtrumque ipsorum planorum CD EF sit perpendicularis. Dico ea plana parallela esse. si enim non ita sit, producta conuenient inter se, conueniāt; & cōem sectionē faciāt rectā lineā GH; & in ipsa GH sumpto quouis pūcto K, jungantur AK, BK. Qm igitur AB perpēdicularis est ad EF planū, erit & perpēdicularis ad ipsā BK rectā lineā in plano EF producto existētē. quare angulus ABK rectus est. Eadē ratione & BAK est rectus: ideoque trianguli ABK duo anguli ABK BAK duobus rectis sunt æquales, quod fieri non potest. non igitur plana CD EF producta inter se conuenient. quare CD EF parallela sint necesse est. Ad quę igitur plana eadem recta linea est perpendicularis, ea parallela sunt. quod demonstrare oportebat.

SCHOLIVM.

CONVERSVM. Si duo plana parallela fuerint, recta linea, quae ad vnum ipsorum est perpendicularis, etiam ad reliquum perpendicularis erit.

F. C. COMMENTARIVS.



Sint duo plana parallela CD EF, & recta quædam linea AB ad planum CD sit perpendicularis. Dico AB etiam ad planum EF perpendicularem esse. Si enim non est perpendicularis, ducatur in plano EF recta linea BG ad eas partes in quibus angulum facit recto minorem: & per AB BG aliud planum ducatur, cuius & plani CD communis sectio sit recta linea AH. Et quoniam angulus ABG est acutus, productis planis conuenient tandem inter sese rectae lineae BG AH. quare & ipsa plana conuenient. atqui parallela ponuntur. quod fieri non potest. non igitur AB ad planum EF non est perpendicularis. ergo perpendicularis sit necesse est. quod demonstrandum proposuimus.

THEO-

THEOREMA XIII. PROPOSITIO. XV.

Si duæ rectæ lineæ ſeſe tangentes duabus rectis lineis ſeſe tangentibus ſint parallelæ, non autem in eodem plano; & quæ per ipſas tranſeunt plana parallela erunt.



Duæ enim rectæ lineę ſeſe tangẽtes AB BC duabus rectis lineis ſeſe tangẽtibus DE EF parallelæ ſint, & non in eodem plano. Dico plana quæ per AB BC DE EF tranſeunt, ſi producantur, inter ſe non conuenire. Ducatur enim à puncto B ad planum, quod per DE EF tranſit perpendicularis BG, quę plano in puncto G occurrat; & per G ducatur ipſi quidem ED parallela GH; ipſi vero EF parallela GK. Itaque quoniam BG perpẽdicularis eſt ad planum per DE EF, & ad omnes rectas lineas, quæ ipſam contingunt, & in eodem ſunt plano, rectos faciet angulos. contingit autem ipſam vtrãque earum GH GK, quę eſt in eodem plano. rectus igitur eſt vterque angulorum BGH BGK. Et quoniam BA parallela eſt ipſi GH, anguli GBA, BGH duobus rectis ſunt æquales, rectus autem eſt BGH, ergo et GBA rectus erit; ideoq; G B ad B A eſt perpẽdicularis. Eadem ratione & G B eſt perpendicularis ad BC. cùm igitur recta linea BG duabus rectis lineis BA BC ſe inuicem ſecantibus ad rectos angulos inſiſtat, erit BG etiam ad planum per AB BC ductum perpendicularis. & ob eandem cauſſam BG eſt perpendicularis ad planum per HG GK. ſed planum per HG GK eſt illud, quod per DE EF tranſit. quare BG ad planũ, quod tranſit per DE EF eſt perpendicularis. oſtenſa autem eſt BG etiam perpendicularis ad planũ per AB BC: atq; eſt ad planũ per DE EF perpẽdicularis. ergo BG perpẽdicularis eſt ad vtrũq; planorũ, quæ per AB BC DE EF trãſeũt. Ad quæ vero plana eadẽ recta linea eſt perpendicularis, ea parallela ſunt. parallelũ igitur eſt planũ per AB BC plano per DE EF. Quare ſi duæ rectæ lineæ ſeſe tangentes duabus rectis lineis ſeſe tangentibus ſint parallelæ, non autem in eodem plano, & quæ per ipſas tranſeunt plana parallela erunt. quod demonſtrare oportebat.

3. diff.

29. primi.

8. huius.

Ex antecedente.

THEOREMA XIIII. PROPOSITIO XVI.

Si duo plana parallela ab aliquo plano ſecentur, communes ipſorum ſectiones parallelę erunt.



Duo enim plana parallela AB CD à plano aliquo EFGH ſecentur; communes autem ipſorũ ſectiones ſint EF GH. Dico EF ipſi GH parallelam eſſe. ſi enim non eſt parallela, productæ EF GH inter ſe conuenient, vel ad partes FH, vel ad partes EG. producantur prius, vt ad FH; & conueniant in K. Quoniam igitur EFK eſt in plano AB, & omnia quæ in EFK ſumuntur puncta in eodem plano erunt. vnum autem punctorum, quæ ſunt in EFK, eſt ipſum K punctum. ergo K eſt in plano AB. Eadem ratione & K eſt in CD plano. ergo plana AB CD producta inter ſe cõuenient. non conueniunt autem, cum parallela ponantur. non igitur EF GH rectę lineę producte conuenient ad partes FH. ſimiliter demonſtrabimus neque ad partes EG conuenire, ſi producantur

ducantur. quæ autem neutra ex parte conueniunt parallelę sunt. ergo EF ipsi GH est parallela. si igitur duo plana parallela ab aliquo plano secentur, communes ipsorum sectiones parallelæ erunt. quod demonstrare oportebat.

THEOREMA XV. PROPOSITIO. XVII.

Si duæ rectę lineę à parallelis secentur planis, in easdem proportiones secabuntur.

Duæ enim rectæ lineę AB CD à parallelis planis GH KL MN secentur in punctis A E B C F D. Dico vt AE recta linea ad ipsam EB, ita esse CF ad FD. Iungantur enim AC BD AD: & occurat AD plano KL in puncto X: & EX XF iungantur. Quoniam igitur duo plana parallela KL MN à plano EBDX secantur, communes ipsorum sectiones EX BD parallelę sunt. Eadem ratione quoniam duo plana parallela GH KL à plano AEFC secantur, communes ipsorum sectiones AC FX sunt parallelæ. Et quoniã vni laterum trianguli ABD, videlicet ipsi BD parallela ducta est EX, vt AE ad EB, ita erit AX ad XD. Rursus quoniam vni laterum trianguli ADC, nempe ipsi AC parallela ducta est XF, erit vt AX ad XD, ita CF ad FD. ostensum autem est & vt AX ad XD, ita esse AE ad EB. & vt igitur AE ad EB, ita est CF ad FD. Quare si duę rectę lineæ à parallelis secentur planis, in easdem proportiones secabuntur. quod demonstrare oportebat.



Ex antecedente.

2. sexti.

11. quinti.

THEOREMA XVI. PROPOSITIO. XVIII.

Si recta linea plano alicui sit ad rectos angulos, & omnia quæ per ipsam transeunt plana eidem plano ad rectos angulos erunt.

Recta enim linea quædam AB subiecto plano sit ad rectos angulos. Dico & omnia plana, quæ per ipsam AB transeunt, subiecto plano ad rectos angulos esse. producatur enim per AB planum DE, sitq; plani DE, & subiecti plani communis sectio CE: & sumatur in CE quodvis punctum F, à quo ipsi CE ad rectos angulos in DE plano ducatur FG. Quoniam igitur AB ad subiectum planum est perpendicularis, & ad omnes rectas lineas, quę ipsam contingunt, & in eodem sunt plano perpendicularis erit. quare et ad CE est perpendicularis. angulus igitur ABF rectus est. sed & GFB est rectus: ergo AB parallela est ipsi FG. est autem AB subiecto plano ad rectos angulos. & FG igitur eidē plano ad rectos angulos erit. At planum ad planum rectum est, quando communi planorum sectioni ad rectos angulos ductę rectæ lineæ in vno planorum reliquo plano ad rectos angulos sint: & communi planorum sectioni CE, in vno plano DE ad rectos angulos ductæ FG, ostensa est subiecto plano ad rectos esse angulos. ergo planum DE rectum est ad subiectum planum. similiter demonstrabuntur, & omnia quę per AB transeunt plana subiecto plano recta esse. si igitur recta linea plano alicui sit ad rectos angulos, & omnia quæ per ipsam transeunt plana eidem plano ad rectos angulos erunt.



3. diffi.

8. huius.

4. diffi.

THEOREMA XVII. PROPOSITIO XIX.

Si duo plana ſe inuicem ſecantia plano alicui ſint ad rectos angulos, & communis ipſorum ſectio eidem plano ad rectos angulos erit.



Duo enim plana ſe inuicem ſecantia AB BC ſubiecto plano ſint ad rectos angulos: communis autem ipſorum ſectio ſit BD. Dico BD ſubiecto plano ad rectos angulos eſſe. Non enim, ſed ſi fieri poteſt; non ſit BD ad rectos angulos ſubiecto plano; & à puncto D ducatur in plano quidem AB, ipſi AD rectæ lineæ ad rectos angulos DE: in plano autẽ BC ducatur ipſi CD ad rectos angulos DF. Et quoniam planum AB ad ſublectum planum rectum eſt, & communi ipſorum ſectioni AD ad rectos angulos in plano AB ducta eſt DE, erit DE ad ſubiectum planum perpendicularis. ſimiliter oſtendemus & DF perpendicularem eſſe ad ſubiectum planũ. quare ab eodẽ puncto D ſubiecto plano duę rectæ lineę ad rectos angulos conſtitutę ſunt ex eadem parte, quod fieri non poteſt. non igitur ſubiecto plano à puncto D ad rectos angulos conſtituentur aliæ rectæ lineæ, præter ipſam DB, communem planorum AB BC ſectionem. Ergo ſi duo plana ſe inuicem ſecantia plano alicui ſint ad rectos angulos, & communis ipſorum ſectio eidẽ plano ad rectos angulos erit. quod oportebat demonſtrare.

11. huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Ex proxime demonſtratis apparet conuerſum antecedentis theorematis, nempe hoc.

Si omnia, quæ per aliquam rectam lineam plana producuntur, cuipiam plano ad rectos fuerint angulos, & recta linea eidem plano ad rectos angulos erit.

Fit enim recta linea dictorum planorum communis ſectio: quare cum ea plana plano cuipiam ad rectos angulos eſſe ponantur, & recta linea quæ ipſorum communis ſectio eſt eidem plano ad rectos angulos erit.

Conuerſum vero præſentis theorematis apparet ex antecedente, quod huiuſmodi eſt.

Quorum planorum ſe ſe mutuo ſecantium communis ſectio alicui plano ad rectos fuerit angulos, & ſecantia plana eidem plano ad rectos angulos erunt.

Communis enim planorum ſectio eſt recta linea, per quam dicta plana tranſeunt, quod cum recta linea plano cuipiam ad rectos fuerit angulos, & ipſa plana eidem ad rectos angulos erunt.

THEOREMA XVIII. PROPOSITIO XX.

Si ſolidus angulus tribus angulis planis contineatur, duo quilibet reliquo maiores ſunt, quomodocumq; ſumpti.



Solidus enim angulus ad A tribus angulis planis BAC CAD DAB contineatur. Dico angulorum BAC CAD DAB duos quoslibet reliquo maiores eſſe, quomodocumque ſumptos. ſi enim BAC CAD DAB anguli inter ſe æquales ſint, perſpicuum eſt duos quoslibet reliquo maiores eſſe, quomodocumque ſumptos. Sit

minus

minus,sit maior BAC.& ad rectam lineam AB,& ad punctum in ipsa A constituatur angulo DAB in plano per BA AC transeũte,æqualis angulus BAE; ponaturq; ipsi AD æqualis AE;& per E ducta BEC secet rectas lineas AB AC in punctis BC & DB DC iungantur.Itaque quoniam DA est æqualis AE, communis autem AB, duę DA AB duabus BA AE æquales sunt:& angulus DAB æqualis est angulo BAE.basis igitur DB basi BE est æqualis.Et quoniam duę DB DC ipsa BC maiores sunt,quarum DB æqualis ostensa est ipsi BE;erit reliqua DC quàm reliqua EC maior.Quòd cum DA sit æqualis AE, communis autem AC & basis DC maior, basi EC;erit angulus DAC angulo EAC maior. ostensus autem est & DAB angulus æqualis ipsi BAE.quare DAB DAC anguli angulo BAC maiores sunt. similiter demonstrabimus & si duo quilibet alij sumantur;eos reliquo esse maiores.si igitur solidus angulus tribus angulis planis cõtineatur, duo quilibet reliquo maiores sunt, quomodocunque sumpti.quod demonstrare oportebat. 22.primi. 4.primi. 2.primi.

THEOREMA XIX. PROPOSITIO XXI.

Omnis solidus angulus minoribus,quàm quattuor rectis angulis planis continetur.



Sit solidus angulus ad A planis angulis BAC CAD DAB cõtẽtus. Dico angulos BAC CAD DAB quattuor rectis esse minores.sumãtur enim in vnaquaq; ipsarũ AB AC AD quęuis pũctæ B C D;& BC CD DB iũgãtur.Quoniam igitur solidus angulus ad B tribus angulis planis cõtinetur CBA ABD CBD, duo quilibet reliquo maiores sunt.anguli igitnr CBA ABD angulo CBD sunt maiores. Eadem ratione & anguli quidẽ BCA ACD maiores sunt angulo BCD; anguli vero CDA ADB maiores angulo CDB.quare sex anguli CBA ABD BCA ACD ADC ADB tribus angulis CBD BCD CDB sunt maiores. sed tres anguli CBD BDC DCB sunt æquales duobus rectis.Sex igitur anguli CBA ABD BCA ACD ADC ADB duobus rectis maiores sunt.Quòd cũ singulorũ triãgulorum ABC ACD ADB tres anguli sint æquales duobus rectis,erunt triũ triangulorum nouem anguli CBA ACD BAC ACD DAC CDA ADB DBA.BAD æquales sex rectis.quorũ sex anguli ABC BCA ACD CDA ADB DBA duobus rectis sunt maiores.reliqui igitur BAC CAD DAB tres anguli,qui solidum continent ãgulum quattuor rectis minores erunt.Quare omnis solidus angulus minoribus, quàm quattuor rectis angulis planis continetur.quod oportebat demonstrare.

THEOREMA XX. PROPOSITIO XXII.

Si sint tres anguli plani,quorum duo reliquo sint maiores, quomodocumque sumpti,contineant autem ipsos rectæ lineæ æquales fieri potest, vt ex ijs, quæ rectas æquales coniungunt triangulum constituatur.

Sint tres anguli plani ABC DEF GHK, quorum duo reliquo sint maiores,quomodocunque sumpti,videlicet anguli quidem ABC DEF maiores angulo GHK; anguli vero DEF GHK maiores angulo ABC;& præterea anguli GHK ABC angulo DEF: maiores sintq; æquales rectæ lineę AB BC DE EF GH HK, & AC DF GK iungãtur.Dico fieri posse, vt ex æqualibus rectis AC DF GK triangulũ cõstituatur;hoc est ipsarũ AC DF GK duas quaslibet reliqua esse maiores, quomodocunq; sumptas. si quidẽ igitur anguli ABC DEF GHK inter se æquales sint; manifestũ



est & æqualibus factis AC DF GK ex æqualibus ipsis triangulum constitui posse.
23.primi. sin minus, sint inæquales, & ad rectam lineam HK, atque ad punctum in ipsa H, angulo ABC æqualis angulus constituatur KHL, & ponatur vni ipsarum AB BC DE EF GH HK æqualis HL: & GL KL iungantur. Itaque quoniam duæ AB BC duabus KH HL æquales sunt, & angulus ad B angulo KHL æqualis, erit basis AC æqua-
4.primi. lis basi KL. Et quoniam anguli ABC GHK angulo DEF sunt maiores; æqualis autem est angulus ABC angulo KHL: erit GHL angulo DEF maior. Quòd cum duæ GH HL duabus DE EF æquales sint, & angulus GHL angulo, qui ad E maior,
24.primi. basis GL basi DF maior erit. Sed GK KL ipsa GL sunt maiores. multo igitur maio-
20.primi. res sunt GK KL ipsa DF. est autem KL æqualis AC. ergo AC GK reliqua DF sunt maiores. similiter demonstrabimus, & ipsas quidem AC DF maiores esse GK, ipsas uero GK DF maiores AC. fieri igitur potest vt ex æqualibus ipsis AC DF GK triangulum constituatur.



ALITER. Sint dati tres anguli plani ABC DEF GHK, quorum duo reliquo sint maiores, quomodocumque sumpti: cõtineant autem ipsos æquales rectæ lineæ AB BC DE EF GH HK, & AC DF GK iungantur. Dico fieri posse, vt ex æqualibus ipsis AC DF GK triangulum constituatur: hoc est rursus duas reliqua maiores esse, quomodocumque sumptas. si igitur rursus anguli ad B E H sint æquales, & AC DF GK æquales erunt, & duæ reliqua maiores. sin minus, sint inæquales an-
24.primi guli ad B E H, & maior qui est ad B vtroque ipsorum qui ad E H. maior igitur est & recta linea AC vtraque ipsarum DF GK. & manifestum est ipsam AC vnà cũ altera ipsarum DF GK reliqua esse maiorem. Dico & DF GK ipsa AC maiores es-
23.primi. se. constituatur ad rectam lineam AB, & ad punctum in ea B, angulo GHK æqualis angulus ABL, & vni ipsarum AB BC DE EF GH HK ponatur æqualis BL, & AL LC iungantur. Quoniam igitur duæ AB BL duabus GH HK æquales sunt, altera alteri, & angulos æquales continent; erit basis AL basi GK æqualis. & quoniam anguli ad E H angulo ABC maiores sunt, quorum angulus GHK est æqualis ipsi ABL; erit reliquus qui ad E angulo LBC maior. Quòd cum duæ LB BC duabus DE EF
24.primi. æquales sint, altera alteri; & angulus DEF angulo LBC maior; basis DF basi LC maior erit. ostensa est autem GK æqualis AL. ergo DF GK ipsis AL LC sunt maiores. sed AL LC maiores sunt ipsa AC. multo igitur DF GK ipsa AC maiores erũt. quare rectarum linearum AC DF GK duæ reliquæ maiores sunt, quomodocumque sumptæ; ac propterea fieri potest, vt ex æqualibus ipsis AC DF GK triangulum constituatur. quod oportebat demonstrare.

PRO-

PROBLEMA III. PROPOSITIO. XXIII.

Ex tribus angulis planis, quorum duo reliquo ſint maiores, quomodocumque ſumpti, ſolidum angulum conſtituere. oportet autem tres angulos quattuor rectis eſſe minores.



Sint dati tres anguli plani ABC DEF GHK; quorum duo reliquo ſint maiores, quomodocumq; ſumpti, ſintq; tres anguli quattuor rectis minores. oportet ex æqualibus ipſis ABC DEF GHK ſolidum angulum conſtituere. abſcindãtur æquales AB BC DE EF GH HK; & AC DF GK iungãtur. fieri igitur pôt, vt ex æqualibus ipſis AC DF GK conſtituatur triangulum. Itaque conſtituatur LMN, ita vt AC quidem ſit æqualis LM, DF vero ipſi MN: & præterea GK ipſi LN: & circa LMN triangulum circulus LMN deſcribatur: ſumaturq; ipſius cẽtrum X; quod vel erit intra triangulũ LMN, vel in vno eius latere, vel extra. Sit primũ intra: ſitq; X: & LX MX NX iungãtur. Dico AB maiorem eſſe ipſa LX. Si enim non ita ſit, vel AB erit æqualis LX, vel ea minor. Sit primum æqualis. Quoniam igitur AB eſt æqualis LX, atque eſt AB ipſi BC æqualis; erit LX æqualis BC; eſt autem LX æqualis XM. duæ igitur AB BC duabus LX XM æquales ſunt: altera alteri; & AC baſis baſi LM æqualis ponitur. quare angulus ABC angulo LXM eſt æqualis. Eadem ratione & angulus quidẽ DEF eſt æqualis angulo MXN, angulus vero GHK angulo NXL. Tres igitur anguli ABC DEF GHK tribus LXM MXN NXL æquales ſunt. Sed tres LXM MXN NXL quattuor rectis ſunt æquales. ergo & tres ABC DEF GHK æquales erunt quattuor rectis. atqui ponuntur quattuor rectis minores, quod eſt abſurdum. non igitur AB ipſi LX eſt æqualis. Dico præterea neque AB minorem eſſe ipſa LX. ſi enim fieri poteſt, ſit minor; & ponatur ipſi quidem AB æqualis XO, ipſi vero BC æqualis XP, & OP iungatur. Quoniam igitur AB eſt æqualis BC, & XO ipſi XP æqualis erit. ergo & reliqua OL reliquæ PM eſt æqualis; ac propterea LM parallela eſt ipſi OP; & LMX triangulum triangulo OPX æquiangulum. eſt igitur vt XL ad LM, ita XO ad OP; & permutando vt LX ad XO, ita LM ad OP. maior autem eſt LX, quàm XO. ergo & LM quàm OP eſt maior. Sed LM poſita eſt æqualis AC. & AC igitur quàm OP maior erit. Itaque quoniam duæ rectæ lineæ AB BC duabus OX XP æquales ſunt, & baſis AC maior baſi OP; erit angulus ABC angulo OXP maior. Similiter demonſtrabimus & DEF angulum maiorẽ eſſe angulo MXN, & angulum GHK angulo NXL. Tres igitur anguli ABC DEF GHK tribus LXM MXN



Ex antecedente. 22. primi.

5. quarti.

8. primi.

Coroll. 15. primi.

2. sexti.

4. ſexti.

25 primi.

MXN NXL ſunt maiores. At anguli ABC DEF GHK quattuor rectis minores ponuntur. multo igitur anguli LXM MXN NXL minores erunt quattuor rectis. Sed & æquales. quod eſt abſurdum. non igitur AB minor eſt, quàm LX. oſtenſum autẽ eſt neque eſſe æqualem. ergo maior ſit neceſſe eſt. conſtituatur à puncto X circuli LMN plano ad rectos angulos XR, & exceſſui, quo quadratum ex AB ſuperat quadratum ex LX, ponatur æquale quadratum quod ſit ex RX, & RL RM RN iungantur. Quoniam igitur RX perpendicularis eſt ad planum LMN circuli, & ad vnamquamque ipſarum LX MX NX erit perpendicularis. Et quoniam LX eſt æqualis XM, communis autem & ad rectos angulos XR, erit baſis LR æqualis baſi RM. Eadem ratione & RN vtrique ipſarum RL RM eſt æqualis. Tres igitur rectæ lineæ RL RM RN inter ſe æquales ſunt. Et quoniam quadratum XR ponitur æquale exceſſui, quo quadratum ex AB ſuperat quadratum ex LX; erit quadratum ex AB quadratis ex LX XR æquale. quadratis autem ex LX XR æquale eſt quadratũ ex RL; rectus enim angulus eſt LXR. ergo quadratum ex AB quadrato ex RL æquale erit; ideoq; AB ipſi RL eſt æqualis. ſed ipſi quidem AB æqualis eſt vnaquæque ipſarum BC DE EF GH HK; ipſi vero RL æqualis vtraque ipſarum RM RN. vnaquæque igitur ipſarum AB BC DE EF GH HK vnicuique ipſarum RL RM RN eſt æqualis. Quòd cum duæ LR RM duabus AB BC æquales ſint, & baſis LM ponatur æqualis baſi AC; erit angulus LRM æqualis angulo ABC. Eadem ratione & angulus quidem MRN angulo DEF, angulus autem LRN angulo GHK eſt æqualis. ex tribus igitur angulis planis LRM MRN LRN, qui æquales ſunt tribus datis ABC DEF GHK ſolidus angulus conſtitutus eſt ad R, qui angulis LRM MRN LRN cõtinetur.

Coro. 15. primi.

12. huius.

5. diffi.

4 primi.

47. primi.

8. primi.

Sed ſit centrum circuli in vno laterum trianguli, videlicet in MN, quod ſit X, & XL iungatur. Dico rurſus AB maiorem eſſe ipſa LX. Si enim non ita ſit, vel AB eſt æqualis LX, vel ipſa minor. ſit primum æqualis. duæ igitur AB BC, hoc eſt DE EF



duabus MX XL, hoc eſt ipſi MN æquales ſunt. ſed MN ponitur æqualis DF. ergo DE EF ipſi DF ſunt æquales. quod fieri non poteſt. non igitur AB eſt æqualis LX. ſimiliter neq; minor. multo enim magis id quod fieri non poteſt, ſequeretur. ergo AB ipſa LX maior eſt. & ſimiliter ſi exceſſui quo quadratũ ex AB ſuperat quadratũ ex LX æquale ponatur, vt quadratum ex RX, & ipſa RX circuli plano ad rectos angulos conſtituatur, fiet problema.

20. primi.



Sed ſit centrum circuli extra triangulum LMN, quod ſit X, & LX MX NX iungantur. Dico & ſic AB ipſa LX maiorem eſſe. ſi enim non ita ſit, vel æqualis eſt, vel minor. ſit primum æqualis. ergo duæ AB BC duabus MX XL æquales ſunt, altera alteri; & baſis AC eſt æqualis baſi ML. angulus igitur ABC æqualis eſt angulo MXL. Eadem

8. primi



dem ratione & GHK angulus ipſi LXN eſt æqualis; ac propterea totus MXN æqualis duobus ABC GHK. ſed & anguli ABC GHK angulo DEF maiores ſunt. & angulus igitur MXN ipſo DEF eſt maior. Et quoniam duæ DE EF duabus MX XN æquales ſunt, & baſis DF æqualis baſi MN, erit MXN angulus angulo DEF æqualis. oſtenſus autem eſt maior, quod eſt abſurdum. non igitur AB eſt æqualis LX. deinceps vero oſtendemus neque minorem eſſe. quare maior neceſſario erit. & ſi rurſus circuli plano ad rectos angulos cõſtituamus XR, & ipſi æqualẽ ponamus lateri quadrati eius, quo quadratum ex AB ſuperat quadratum ex LX, problema conſtituetur. Itaque dico neque minorem eſſe AB ipſa LX. ſi enim fieri poteſt, ſit minor; & ipſi quidem AB æqualis ponatur XO, ipſi vero BC æqualis XP, & OP iungatur. Quoniam igitur AB ipſi BC eſt æqualis, erit ex XO æqualis XP. ergo & reliqua OL reliquæ PM æqualis. parallela igitur eſt LM ipſi PO, & triangulum LMX triangulo PXO æquiangulum. quare vt XL ad LM, ita XO ad OP: & permutando vt LX ad XO, ita LM ad OP. maior autem eſt LX quàm XO. ergo LM quàm OP eſt maior. ſed LM eſt æqualis AC. & AC igitur quàm OP maior erit. Itaque quoniam duæ AB BC duabus OX XP ſunt æquales, altera alteri; & baſis AC maior eſt baſi OP; erit angulus ABC angulo OXP maior. ſimiliter & ſi XR ſumatur æqualis vtriq; ipſarum XO XP, & iungatur OR, oſtendemus angulum GHK angulo OXR maiorem. conſtituatur ad rectam lineam LX, & ad punctum in ipſa X angulo quidem ABC æqualis angulus LXS, angulo autem GHK æqualis LXT, & ponatur vtraque XS XT ipſi OX æqualis: iungantúrq; OS OT ST. Et quoniam duæ AB BC duabus OX XS æquales ſunt, & angulus ABC æqualis angulo OXS, erit baſis AC, hoc eſt LM baſi OS æqualis. Eadem ratione & LN eſt æqualis ipſi OT. Quod cum duæ ML LN duabus OS ST ſint æquales, & angulus MLN maior angulo SOT, erit et baſis MN baſi ST maior. ſed MN eſt æqualis DF. ergo et DF quam ST maior erit. Quoniam igitur duæ DE EF duabus SX XT æquales ſunt, et baſis DF maior baſi ST; erit angulus DEF angulo SXT maior. æqualis autẽ eſt angulus SXT angulis ABC GHK. ergo DEF angulus angulis ABC GHK maior eſt. ſed et minor, quod fieri non poteſt.





2. eiusd. 4. huius.



32. primi.

4 primi.

42. prima.

25. primi.

LEMMA.

Quo autem modo ſumatur quadratum ex RX æquale ei, quo quadratum ex AB ſuperat quadratum ex LX, ita oſtendemus.



Exponãtur rectę lineæ AB LX, ſitq; maior AB, & in ipſa deſcribatur ſemicirculus A C B; in quo aptetur recta linea AC ipſi LX æqualis, & BC iungatur. Itaque quoniam in ſemicirculo ABC angulus eſt AGB, erit A C B rectus. quadratum igitur quod fit ex AB æquale eſt, & quadrato quod ex A C, & ei, quod ex C B. ergo quadratum ex A B ſuperat quadratum ex AC, quadrato ex CB. æqualis autem eſt AC ipſi LX. quadratum igitur ex AB ſuperat quadratum ex LX, quadrato ex CB. Quare ſi ipſi C B æqualem ſumamus XR, quadratum ex AB ſuperabit quadratum ex LX, eo quod fit ex R X quadrato.

31. tertii.
47. primi.

SCHOLIUM.

PROPOSITIO I.

Si fuerint quotlibet anguli plani, quorũ vno reliqui ſint maiores quomodocunque ſumpti, contineant autem ipſos rectæ lineę æquales. Dico & rectarum linearum angulos ſubtendentium, vna reliquas maiores eſſe quomodocũque ſumptas: hoc eſt fieri poſſe, vt ex ijs, quæ rectas lineas coniungunt multorum laterum figura conſtituatur.



Vt ſi dati fuerint quattuor anguli ad puncta A D G L, quorum tres reliquo ſint maiores quomodocumq; ſumpti: æquales autem ſint rectæ lineæ BA AC ED DF HG GK ML LN. & iungantur BC EF HK MN. Dico ipſarum BC EF HK MN tres reliqua maiores eſſe, quomodocunque ſumptas. ſi enim æquales ſint anguli ad puncta A D G L, & latera BC EF HK MN æqualia erunt, & manifeſtum eſt tres vna reliqua eſſe maiores, quomodocumque accipiãtur. ſi vero inæquales ſint, ſit maior qui ad A. baſis igitur BC ſingulis ipſarum EF HK MN maior eſt. quare BC eſt vna earum reliquis quibuslibet eſt maior: & cum duabus reliqua multo maior erit. Dico etiam EF HK MN ipſa BC maiores eſſe. Quoniam enim angulus ad A maior eſt ſingulis ipſorum D G L, conſtituatur ad BA rectam lineam, & ad pũctum in ipſa A angulo, qui ad D æqualis angulus BAX, & ad rectam lineam AX, & ad pũctũ in ipſa A angulo, qui ad G æquali cõſtituto angulo XAO, vel AO cadet intra lineã AC, vel in ipſam, vel extra ipſam. Cadat primũ intra, & ad rectam lineam OA, & ad

24. primi.
23. primi.

& ad punctum in ipſa A angulo qui ad L æqualis fiat angulus OAP. cadet AP extra lineam AC, propterea quòd tres anguli D G L reliquo ſunt maiores. & ipſis AB AC æquales ponatur AX AO AP: iungāturq́; BX XO BO OP BP. Qm̃ igitur duæ BA AP duabus BA AC ſunt æquales, angulus aũt BAP maior eſt angulo BAC; erit & BP baſis baſi AC maior. Sed ipſa BP maiores ſunt BO OP. quare BO OP ipſa BC ſunt multo maiores. ſuntq́; BX XO maiores, quàm BO. ergo BX XO OP mul- 24. primi.



to maiores ſunt ipſa BC. atque eſt BX quidem æqualis ipſi EF, quoniam & angulus BAX æqualis eſt angulo EDF; XO vero eſt æqualis HK, & OP ipſi MN. quare EF HK MN ipſa BC multo maiores erunt. Sed recta linea, quæ cum AX continet angulum æqualem angulo G cadat in ipſam AC, vt in ſecunda figura: & BX XC CP iungantur. Itaque quoniam BX XC ipſa BC maiores ſunt, & ſunt BX XC CP æquales ipſis EF HK MN; erunt EF HK MN ipſa BC multo maiores. Denique recta linea AO, quæ cum AX continet angulum angulo G æqualem, cadat extra AC, ut in tertia figura: ponaturq́; æqualis ipſi AP: & iungantur BP BO OP BX XO. Quoniam 4. primi.



ſigitur duæ BA AP duabus BA AC æquales ſunt, angulus autem BAP maior eſt angulo BAC; erit BP quàm BC maior. Rurſus quoniam BO OP maiores ſunt quã BP; & BX XO maiores quàm BO; erunt BX XO OP quàm BP multo maiores. Sed BP eſt maior BC. quare BX XO OP multo maiores ſunt ipſa BC: ſũtq́; BX XO OP ipſis EF HK MN æquales. ergo EF HK MN ipſa BC multo maiores ſunt. Et quoniam tres reliqua maiores ſunt, quomodocumque ſumptæ, fieri poteſt, vt ex ipſis quadrilaterum ipſam conſtituatur. 24. primi.

PROPOSITIO II.

Si in aliquod planũ à quodam ſublimi puncto æquales rectæ lineæ cadant, in circuli erunt circumferentia, & quæ à dicto puncto ad centrum circuli ducitur ad circulum perpendicularis erit.

A' puncto enim A in ſubiectum planum æquales rectæ lineę cadãt AB AC AD AE ad puncta B C D E. Dico ea puncta in circuli circumferentia eſſe. Iungantur enim in ſubiecto plano BC CD DE EB, & circa BCD triãgulum circulus deſcribatur BCDF. ergo puncta BCD in circuli circumferentia ſunt. Dico etiam ipſum E in circumferẽtia eſſe. non enim, ſed ſi fieri poteſt, vel extra vel intra cadat. & primum cadat extra, & ſumpto circuli centro G, ab eo ad puncta B C D E rectę lineæ ducantur GB GC GD GE, vt GE circulum in puncto F ſecet, & iungantur AE AG. Quoniã igitur AB ipſi AC eſt æqualis, eſt autem & BG æqualis CG: duæ AB BG duabus AC CG æquales ſunt. & baſis AG eſt vtrique communis.



8. primi. angulus igitur ABG angulo ACG eſt æqualis, triangulumq; triangulo, & reliqui anguli reliquis angulis æquales. ergo angulus AGB æqualis eſt angulo AGC. Eadem ratione & angulus AGC angulo AGD æqualis erit. Quòd cum AG ad plures quàm duas rectas lineas in eodem exiſtentes 4. huius. plano rectos angulos efficiat, ad planum quod per ipſas ducitur perpendicularis erit. quare ad circulum ipſum. Itaque quoniam GD ipſi GF eſt æqualis, communis 4. primi. autem & ad rectos angulos GA; erit baſis AD baſi AF æqualis. ergo & vnaqueque 26. primi. ipſarum AB AC AE æqualis eſt ipſi AF. Et quoniam angulus AFE maior eſt recto AGF, quòd exterior ſit, erit angulus AEF recto minor. trianguli igitur AEF an- 19. primi. gulus qui eſt ad F maior eſt angulo qui ad E. quare & latus AE maius eſt latere AF. ſed & oſtenſum eſt æquale. quod eſt abſurdum. non igitur punctum E extra circuli circumferentiam cadit. ſimiliter oſtendemus neque cadere intra. ducentes enim ad ipſum rectam lineam, & ad circumferentiam protendentes, rurſuſq; ab A ad dictũ punctum rectam lineam iungentes, oſtẽdemus ipſam & æqualem eſſe, & minorem. quod eſt abſurdum. At ſi neque extra cadit, neq; intra; relinquitur vt in ipſam circumferentiam cadat. ergo AB AC AD AE in circuli ſunt circumferentia, & AG ad ipſum circulum eſt perpendicularis. quod demonſtrare oportebat.

COROLLARIUM.

Ex hoc manifeſtum eſt omnis anguli ſolidi, qui æquicruribus planis continetur, baſim ipſam in circulo deſcribi.

PROPOSITIO XXI.

Ex planis quotlibet datis angulis, quorum vno reliqui ſint maiores quomodocũq; ſumpti, ſolidũ angulũ cõſtituere. oportet aũt datos angulos quatuor rectis eſſe minores.

Sint dicti anguli BAC ED F HGK MLN. oportet ex angulis qui ſunt ad puncta A D G L ſolidum angulum conſtituere. ſumantur æquales rectæ



lineæ

lineæ, quę ipſos angulos continent,& iungantur BC EF HK MN. æquicruria igitur ſunt triangula, quæ vnoquouis angulo reliquos maiores habent, quomodocumque ſumptos. ergo BC EF HK MN quadrilaterum efficiẽt. fiat & ſit X O P R. Et quoniã oportet ex æquicruribus triangulis BAC EDF HGK MLN ſolidum angulum conſtituere: omnis autem ſolidi



Ex coral. 22 ſecundi.

anguli, qui æquicruribus triangulis continetur baſim circumſcribit circulus; & anguli ſolidi contenti triangulis BAC EDF HGK MLN, baſim circulus circumſcribet. dicti vero anguli baſis conſtat ex baſibus ipſorum triangulorum, videlicet XO PR. ergo quadrilaterum XOPR circulus circũſcribit. Et deinceps eadem conſtruentes ijs, quę dicta ſunt in angulo ſolido pro baſi triangulum habente propoſitum efficiemus.

THEOREMA XXI. PROPOSITIO XXIIII.

Si ſolidum parallelis planis contineatur, oppoſita ipſius plana, & æqualia & parallelogramma erunt.

Solidum enim CDGH parallelis planis AC GF AH DF FB AE contineatur. Dico oppoſita eius plana, & æqualia & parallelogramma eſſe. Quoniam enim duo plana parallela BG CE, à plano AC ſecantur, communes ipſorum ſectiones parallelæ ſunt. ergo AB ipſi CD eſt parallela. Rurſus quoniã duo plana parallela BF AE ſecantur à plano AC, cõmunes ipſorum ſectiones parallelæ ſunt. parallela igitur eſt AD ipſi BC: oſtẽſa autem eſt & AB parallela CD. ergo AC parallelogrammum erit. ſimiliter demonſtrabimus, & vnumquodque ipſorum DF FG GB BF AE parallelogrammum eſſe. Iũgantur AH DF. Et quoniam parallela eſt AB quidem ipſi DC; BH vero ipſi CF, erunt duę AB BC ſe ſe tangentes duabus DC CF ſe ſe tangentibus parallelæ, & non in eodem plano. quare æquales angulos continebunt. angulus igitur ABH an-



34. huius.

10. huius.

gulo DCF eſt æqualis. Et quoniam duæ AB
34. primi. BH duabus DC CF æquales ſunt, & angu-
4. primi. lus ABH æqualis angulo DCF, erit baſis A
H baſi DF æqualis: & ABH triangulum æqua
le triangulo DCF. Quòd cum ipſius quidem
41. primi. ABH triāguli duplū ſit BG parallelogrāmū;
ipſius vero DCF trianguli duplum paralle-
logrāmū CE: erit BG parallelogrāmū æqual
le parallelogrāmo CE. ſimiliter demonſtra
bimus & AC parallelogrammum parallelo-
grammo GF, & parallelogrammum AE pa
rallelogrammo BF æquale eſſe. Si igitur ſoli
dum parallelis planis contineatur, oppoſita
ipſius plana, & æqualia & parallelogramma
ſunt, quod oportebat demonſtrare.



F. C. COMMENTARIVS.

COROLLARIVM.

Ex iam demonſtratis conſtat, ſi ſolidum parallelis planis contineatur oppoſita
7. vndi. ſexti. ipſius plana, & æqualia eſſe, & ſimilia, quippe quę & ſingulos angulos æquales, & circa æquales angulos latera proportionalia habeant.

THEOREMA XXII. PROPOSITIO XXV.

Si ſolidum parallelepipedum plano ſecetur oppoſitis planis parallelo, erit vt baſis ad baſim, ita ſolidum ad ſolidum.

Solidū enim parallelepipedum AB CD plano YE ſecetur, oppoſitis planis RA DH parallelo. Dico vt AEFΦ baſis ad baſim EH CF, ita eſſe ABFY ſolidum ad ſolidū E GCD. producatur enim AH ex vtraq; parte, & ponantur ipſi quidem EH æ-



quales quotcumque HM MN; ipſi uero AE æquales quotcumque AK KL, & compleantur parallelogramma LO KΦ HX MS, & ſolida LP KR DM MT. Quoniã igitur æquales inter ſe ſunt LK KA AE rectæ lineæ; erunt & parallelogramma LO
1. ſexti. KΦ AF inter ſe æqualia: itemq; æqualia inter ſe parallelogramma KX KB AG, &
Ex antecedente. adhuc parallelogramma LT KP AR inter ſe æqualia; oppoſita enim ſunt. Eadem ratione & parallelogramma EC HX MS æqualia inter ſe; itemq; parallelogrāma HG HI IN inter ſe æqualia: & inſuper parallelogramma DH MΩ NT. tria igitur plana ſolidorum LP KR AY tribus planis æqualia ſunt. ſed tria tribus oppoſitis ſunt æqualia. ergo tria ſolida LP KR AY inter ſe æqualia erunt. Eadem ratione & tria ſolida ED DM MT ſunt æqualia inter ſe. quotuplex igitur eſt baſis LF ipſius AF baſis, totuplex eſt & LY ſolidum ſolidi AY. Et eadem ratione quotuplex eſt NF baſis ipſius baſis HF, totuplex eſt & ſolidum NY ipſius HY ſolidi: & ſi baſis LF

eſt

eſt æqualis baſi NF, & ſolidum LY ſolido NY æquale erit. & ſi baſis LF ſuperet NF baſim, & LY ſolidum ſolidum NY ſuperabit, & ſi minor, minus. quatuor igitur magnitudinibus exiſtentibus, duabus ſcilicet baſibus AF FH, & duobus ſolidis AY Y H ſumpta ſunt æque multiplicia, baſis quidem AF, & AY ſolidi, videlicet baſis LF, & ſolidum LY: baſis vero HF, & HY ſolidi, nempe baſis NF & ſolidum NY. & demõſtratum eſt, ſi baſis LF ſuperat baſim NF, & LY ſolidum ſolidum NY ſuperare, & ſi æqualis æquale, & ſi minor minus. eſt igitur vt AF baſis ad baſim FH, ita AY ſolidũ ad ſolidum YH. Quare ſi ſolidum parallelepipedum plano ſecetur, oppoſitis planis parallelo; erit vt baſis ad baſim, ita ſolidũ ad ſolidũ. quod oportebat demonſtrare.

F. C. COMMENTARIVS.

Quod ſi ſolidum parallelepipedum ſecetur plano baſibus parallelo, erit ſolidum ad ſolidum, vt altitudo ad altitudinem.

Hoc enim nos demonſtrauimus in libro de centro grauitatis ſolidorum propoſitione XVIII.

PROBLEMA III. PROPOSITIO. XXVI.

Ad datam rectam lineam, & ad datum in ipſa punctum dato angulo ſolido æqualem ſolidum angulum conſtituere.





Sit data quidem recta linea AB, datum autem in ipſa pũctum A, & datus ſolidus angulus ad D, qui EDC EDF FDC angulis planis cõtineatur. oportet ad datam rectam lineã AB, & ad datum in ipſa punctũm A, dato angulo ſolido ad D æqualẽ ſolidum angulum conſtituere. ſumatur enim in linea DF quod vis punctum F, à quo ad planum per ED DC tranſiens ducatur perpendicularis FG, & plano in puncto G occurrat; iungaturq; DG, & ad rectam lineam AB, & ad datum in ipſa punctum A, angulo quidem EDC æqualis angulus conſtituatur BAL, angulo autem EDG conſtituatur æqualis BAK. deinde ipſi DG ponatur æqualis AK, & à puncto K plano per BAL ad rectos angulos erigatur KH; ponaturq; ipſi GF æqualis KH, & HA iungatur. Dico angulum ſolidum ad A, qui angulis BAL BAH HAL continetur, æqualem eſſe ſolido angulo ad D angulis EDC EDF FDC contẽto. ſumantur enim æquales rectæ lineæ AB DE, & iungantur HB KB FE GE. Quoniam igitur FG perpendicularis eſt ad ſubiectũ planum; & ad omnes rectas lineas, quæ ipſam contingunt, ſuntq; in ſubiecto plano rectos facit angulos. Vterque igitur angulorũ FGA FGD FGE rectus eſt. Eadẽ ratione, & vterq; ipſorum HKA HKB eſt rectus. Et quoniam duæ KA AB duabus GD DE æquales ſunt altera alteri, & angulos æquales continent; erit baſis BK baſi EG æqualis. eſt autem & KH æqualis GF, atque angulos rectos continent. æqualis igitur et HB ipſi FE. Rurſus quoniam duæ AK KH duabus DG GF æquales ſunt; et rectos continent angulos; erit baſis AH baſi DF æqualis, eſtq; AB æqualis DE. duæ igitur HA AB duabus FD DE ſunt æquales; et baſis HB eſt æqualis baſi FE. ergo angulus BAH angulo EDF æqualis erit. Eadem ratione et angulus HAL angulo FDC eſt æqualis, quandoquidem ſi aſſumamus æquales AL DC, et iungamus KL HL GC FC, quoniam totus BAL eſt

11. huius.

23. primi.

11. huius.

3. huius.

4. primi.

4. primi.

8. primi.

æqualis

æqualis toti EDC, quorum BAK ipsi EDG ponatur æqualis; erit reliquus KAL æqualis reliquo GDC. Et quoniã duæ KA AL duabus GD DC æquales sunt, et angulos æquales continent; basis KL basi GC æqualis erit. est autem et KH æqualis GF. duæ igitur LK KH duabus DC GF sunt æquales; angulosq; rectos continent. ergo basis HL æqualis est basi FC. Rursus quoniam duæ HA AL duabus FD DC æquales sunt, & basis HL æqualis basi FC; erit angulus HAL æqualis angulo FDC. atque est angulus BAL angulo EDC æqualis. Ad datam igitur rectam lineam, & ad datum in ipsa punctum dato angulo solido æqualis angulus solidus constitutus est, quod facere oportebat.



4 primi.

8 primi.

PROBLEMA V. PROPOSITIO XXVII.

A data recta linea dato solido parallelepipedo simile & similiter positum solidum parallelepipedum describere.

Sit recta quidẽ linea AB; datum vero solidũ parallelepipedum CD. oportet à data recta linea AB dato solido parallelepipedo CD simile, & similiter positũ solidum parallelepipedum describere. constituatur enim ad rectam lineam AB, & ad datum in ipsa punctum A angulo solido ad C æqualis angulus, qui angulis BAH HAK KAB contineatur, ita vt angulus quidem BAH æqualis sit angulo ECF, angulus vero BAK angulo ECG, & adhuc angulus KAH angulo GCF, & fiat vt EC ad CG, ita BA ad AK; vt autem GC ad CF, ita KA ad AH. ergo ex æquali vt EC ad CF, ita erit BA ad AH. compleatur parallelogrammum BH, & AL solidum. Quoniam igitur est vt EC ad CG, ita BA ad AK, & circa æquales angulos ECG BAK latera sunt proportionalia; erit parallelogrammum KB parallelogrammo GE simile. Eadem quoque ratione parallelogrammum KH simile est parallelogrammo GF, & parallelogrammum HB parallelogrammo FE. tria igitur parallelogramma solidi AL tribus parallelogrãmis solidi CD similia sunt. sed tria tribus oppositis sunt æqualia, & similia. Ergo totũ AL solidum toti solido CD simile erit. A data igitur recta linea AB dato solido parallelepipedo CD simile, & similiter positum solidum parallelepipedum AL descriptum est. quod facere oportebat.



Ex antecedente.

22. sexti.

8. diffi. sexti.

24. huius.

THEOREMA XXIII. PROPOSITIO XXVIII.

Si solidum parallelepipedum plano secetur per diagonales oppositorum

positorum planorum ab ipso plano bifariam secabitur.

Solidum enim parallelepipedum AB plano CDEF secetur per diagonales oppositorũ planorum, videlicet CF DE. Dico solidum AB à plano CDEF bifariam secari. Quoniam enim æquale est CGF triangulum triangulo CBF, triangulum vero ADE triangulo DEH; est autem & CA parallelogrammum parallelogrammo BE æquale, oppositum enim est, & parallelogrammum GE æquale parallelogrammo CH: erit prisma contentum duobus triangulis CGF ADE, & tribus parallelogrammis GE AC CE æquale prismati, quod continetur duobus triangulis CFB DEH, & tribus parallelogrammis CH BE CE; etenim æqualibus planis, & numero & magnitudine continentur. ergo totum AB solidum à plano CDEF bifariam secatur. quod demonstrare oportebat.



THEOREMA XXIIII. PROPOSITIO XXIX.

Solida parallelepipeda, quę in eadem sunt basi, & eadem altitudine, quorum stantes sunt in eisdem rectis lineis, inter se sunt æqualia.

Sint enim in eadem basi AB solida parallelepipeda CM CN & eadem altitudine, quorum stãtes AF AG LM LN CD CE BH BK sint in eisdem rectis lineis FN DK. Dico solidum CM solido CN æquale esse. Quoniam enim parallelogrammum est vtrumque ipsorum CH CK; erit CB vtrique ipsarum DH EK æqualis, ergo & DH est æqualis EK. communis auferatur EH. reliqua igitur DE æqualis est reliquæ HK. quare & DEC triangulum est æquale triangulo HKB. parallelogrammum autẽ DG est æquale parallelogrammo HN. Eadem ratione & AFG triangulum æquale est triangulo LMN. est autem parallelogrammum CF parallelogrammo BM, & parallelogrammũ CG parallelogrammo BN æquale: oppositа enim sunt. ergo & prisma contentum duobus triangulis AFG DEC, & tribus parallelogrammis AD DG GC est æquale prismati, quod duobus triangulis LMN HBK, & tribus parallelogrammis BM NH BN continetur. commune apponatur solidum, cuius basis quidem parallelogrammum AB, oppositum autem ipsi GEHM. ergo totum CM solidum parallelepipedum toti solido parallelepipedo CN est æquale. solida igitur parallelepipeda, quæ in eadem sunt basi, & eadem altitudine, quorum stantes sunt in eisdem rectis lineis, inter se sunt æqualia. quod demonstrare oportebat.



34. primi.

1. sexti.

24. huius.

THEOREMA XXV. PROPOSITIO XXX.

Solida parallelepipeda, quæ in eadem sunt basi, & eadem altitudine, quorum stantes non sunt in eisdem rectis lineis, inter se sunt æqualia.

Sint

Sint in eadem baſi AB ſolida parallelepipeda CM CN,& eadem altitudine, quorum ſtantes AF AG LM LN CD CE BH BK non ſint in eiſdem rectis lineis. Dico ſolidũ CM ſolido CN æquale eſſe. producãtur enim NK DH & GE FM,cõueniantq; inter ſe in punctis RX; & adhuc producantur FM GE ad O P puncta: & AX LO CP BR iungantur. ſolidum CM, cuius baſis quidẽ ACBL parallelogrammum,oppoſitum autem ipſi FDHM eſt æquale ſolido CO,cuius baſis parallelogrammum ACBL, & ei oppoſitũ X P R O; in eadem enim ſunt baſi ACBL,& ipſorum ſtantes AF AX LM LO CD CP BH BR ſunt in eiſdem rectis lineis FO DR. Sed ſolidum CO, cuius baſis quidem parallelogrãmum ACBL, oppoſitum autem ipſi XPRO eſt æquale ſolido CN, cuius baſis ACBL parallelogrãmum, & ipſi oppoſitum GE KN. etenim in eadem ſunt baſi ACBL, & eorum ſtantes AG AX CE CP LN LO BK BR ſunt in eiſdem rectis lineis GP NR. quare & CM ſolidum ſolido CN æquale erit. Solida igitur parallelepipeda,quæ in eadẽ ſunt baſi,& eadem altitudine,quorum ſtantes non ſunt in eiſdẽ rectis lineis,inter ſe ſunt æqualia. quod demonſtrare oportebat.



Ex antecedente.

THEOREMA XXVI. PROPOSITIO. XXXI.

Solida parallelepipeda,quæ in æqualibus ſunt baſibus,& eadẽ altitudine inter ſe ſunt æqualia.



Sint in æqualibus baſibus AB CD ſolida parallelepipeda AE CF,& eadẽ altitudine. Dico ſolidum AE ſolido CF æquale eſſe. ſint autem primum ſtantes HK BE AG LM OP DF CΞ RS ad rectos angulos baſibus AB CD: angulus autem ALB angulo CRD ſit inæqualis,& producatur ipſi CR in directum RT: conſtituaturq; ad rectam lineam RT, & ad punctum in ipſa R, angulo ALB æqualis angulus RTY: & ponatur ipſi quidem AL æqualis RT, ipſi vero LB æqualis RY, & ad punctum Y ipſi RT parallela ducatur XY, compleaturq; baſis RX, & ϯY ſolidum. quoniam igitur duæ TR RY duabus AL LB æquales ſunt, & angulos continent æquales; erit parallelogrammum RX æquale & ſimile parallelogrammo HL. Et quoniam rurſus AL eſt æqualis RT, & LM ipſi RS, angulosq; æquales continẽt, parallelogrammum Rϯ parallelogrammo AM æquale & ſimile erit. Eadem ratione LE parallelogrammum ipſi SY æquale eſt & ſimile. tria igitur parallelogrãma ſolidi AE tribus parallelogrammis ſolidi ϯY æqualia & ſimilia ſunt. Sed & tria tribus

34. primi:

1. diffi. ſexti.

bus oppoſita & æqualia ſunt & ſimilia. totum igitur AE ſolidum parallelepipedũ toti ſolido parallelepipedo τY eſt æquale. producantur DR XY, cõueniantq; inter ſe in puncto Φ, & per T ipſi DΦ parallelæ ducantur TQ, & producãtur TQ, OD, & cõueniant in V, compleanturq; ſolida Ωτ RI. ſi idũm igitur ΦΩ cuius baſis eſt Rτ parallelogrammum, oppoſitum autem ipſi Ωτ eſt æquale ſolido τY, cuius baſis eſt Rτ parallelogrammum, & oppoſitum ipſi γΦ, in eadem enim ſunt baſi Rτ, & eadem altitudine, & eorum ſtantes RΩ, RY TQ, TX SZ, SN ΦΓ, τΦ, in eiſdẽ ſunt rectis lineis ΩXZΦ. Sed ſolidum τγ æquale eſt ſolido AE. ergo & τΩ ſolido AE eſt

14. huius

29. huius



æquale. præterea quoniam parallelogrammum RYXT eſt æquale parallelogrammo ΩT, etenim in eadem eſt baſi RT, & in eiſdem parallelis RT ΩX. Sed parallelogrammum RYXT parallelogrammo CD eſt æquale, quoniam & ipſi AB; parallelogrammumq; ΩT æquale parallelogrammo CD: aliud autem parallelogrammum DT. eſt igitur vt CD baſis ad baſim DT, ita ΩT ad ipſam DT. Et quoniam ſolidum parallelepipedum CI plano RF ſecatur planis oppoſitis parallelo, erit vt CD baſis ad baſim DT, ita ſolidum CF ad RI ſolidum. Eadem ratione quoniam ſolidum parallelepipedum ΩI ſecatur plano Rτ oppoſitis planis parallelo, vt ΩT baſis ad baſim CD, ita erit ſolidum Ωτ ad RI ſolidum. ſed vt CD baſis ad baſim DT, ita baſis ΩT ad ipſam TD. Vt igitur ſolidum CF ad RI ſolidum, ita ſolidum Ωτ ad ſolidum RI. Quod cum vtrumque ſolidorum CF Ωτ ad ſolidum RI eandem habeat proportionem, ſolidum CF ſolido Ωτ eſt æquale. ſolidum autem Ωτ oſtenſum eſt æquale ſolido AE. ergo & AE ipſi CF æquale erit. ſed non ſint ſtantes AQ HK BE LM CN OP DF RS ad rectos angulos ipſis AB CD baſibus. Dico rurſus ſolidum AE æquale eſſe ſolido CF. Ducãtur à punctis K E G M P F N S ad ſubiectum planum perpendiculares KΣ ET GΥ, MΦ, PX, Fτ, NΩ, SI, & plano in punctis ΣTΥΦXτΩI occurrãt; & iungantur ΣTΥΦ, ΥΧ, ΤΦ, Χτ, ΧΩ, Ωτ, τI. æquale igitur eſt KΦ ſolidum ſolido PI; in æqualibus enim ſunt baſibus KM PS, & eadem altitudine; quorum ſtantes ad rectos angulos ſunt baſibus. ſed KΦ ſolidum ſolido AE eſt æquale: ſolidum vero PI æquale ſolido CF. ſi quidem in eadem ſunt baſi, & eadem altitudine, quorum ſtantes non ſunt in eiſdem rectis lineis. ergo & ſolidum AE ſolido CF æquale erit. Solida igitur parallelepipeda, quę in æqualibus ſunt baſibus, & eadem altitudine, inter ſe ſunt æqualia. quod demonſtrare oportebat.

9. quinti

8. huius



Ex proxima demõſtratis.

30. huius.

THEOREMA XXVII. PROPOSITIO. XXXII.

Solida parallelepipeda, quę eandem habent altitudinem inter ſe ſunt vt baſes.



Sint ſolida parallelepipeda AB GD, quæ eadem altitudinem habeant. Dico inter ſe eſſe vt baſes. hoc eſt vt AE baſis ad baſim CF, ita ſolidum AB ad CD ſolidum. applicetur enim ad rectam lineam FG parallelogrammo AE ęquale FH, & à baſi FH eadem altitudine ipſi CD ſolidum parallelepipedum GK compleatur. ſolidum igitur AB ſolido GK eſt æquale; in ęqualibus enim ſunt baſibus AE FH, & eadem altitudine. Itaque quoniam ſolidum parallelepipedum CK plano DG ſecatur, oppoſitis planis parallelo; erit vt HF baſis ad baſim FC, ita ſolidum HD ad DC ſolidum, atque eſt baſis quidem FH baſi AE æqualis: ſolidum vero GK æquale ſolido AB. eſt igitur & vt AE baſis ad baſim CF, ita ſolidum AB ad ſolidum CD. Quare ſolida parallelepipeda, quæ eandem habent altitudinem inter ſe ſunt vt baſes. quod demonſtrare oportebat.

Ex antecedente.

25. huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Conſtat etiam ſolida parallelepipeda in eadem baſi, vel in ęqualibus baſibus conſtituta eam inter ſe proportionem habere, quam altitudines.

Quod nos demonſtrauimus in libro de centro grauitatis ſolidorum, propoſitione XIX.

COROLLARIVM.

Ex his igitur & iam demonſtratis ſequitur priſmata triãgulares baſes habentia, quę vel in eiſdem, vel æqualibus baſibus conſtituũtur, & eadem altitudine inter ſe æqualia eſſe. Et inſuper quæ eandem habent altitudinem inter ſe eſſe, vt baſes. Et quę vel in eiſdem vel æqualibus baſibus conſtituuntur, inter ſe eſſe, vt altitudines.

28. huius.

Sunt enim ea ſolidorum parallelepipedorum dimidia. per baſes autem priſmatis intelligimus non quaſcunque, ſed alterum duntaxat oppoſitorum planorum ſimilium & parallelorum, vt nũc in priſmate triangularem baſim habente, alterum triangulum, alioquin obſtarent, quae in vltima propoſitione huius traduntur.

THEOREMA XXVIII. PROPOSITIO XXXIII.

Similia ſolida parallelepipeda inter ſe ſunt in tripla proportione homologorum laterum.

Sint ſimilia ſolida parallelepipeda AB CD; latus autem AE homologum ſit lateri CF. Dico ſolidum AB ad CD ſolidum triplam proportionem habere eius, quã habet AE ad CF. producantur enim EK EL EM in directum ipſis AE GE HE: & ipſi quidem CF æqualis ponatur EK, ipſi vero FN ęqualis EL; & adhuc ipſi FR ęqualis EM, & KL parallelogrammum, & KO ſolidum compleatur. Quoniam igitur duę KE EL duabus CF FN æquales ſunt; ſed & angulus KEL angulo CFN eſt ęqualis; quod & angulus AEG ipſi CFN ob ſimilitudinem ſolidorum AB CD: erit & KL parallelogrammum ſimile parallelogrammo CN. Eadem ratione & parallelogrammum



mum KM æquale eſt & ſimile parallelogrammo CR, & adhuc parallelogrammum OE ipſi DF parallelogrammo. tria igitur parallelegramma ſolidi KO tribus parallelogrammis CD ſolidi æqualia & ſimilia ſunt. Sed tria tribus oppoſitis æqualia ſũt & ſimilia. totum igitur KO ſolidum æquale eſt & ſimile toti ſolido CD. compleatur GK parallelogrãmũ; & à baſibus quidẽ GK KL parallelogrãmis, altitudine vero eadẽ ipſi AB ſolida cõpleãtur AX LP. Et qm̃ ob ſimilitudinẽ ſolidorũ AB CD eſt vt AE ad CF, ita EG ad FN, & EH ad FR; æqualis aũt FC ipſi EK, & FN ipſi EL, & FR ipſi EM: erit vt AE ad EK, ita GE ad EL, & HE ad EM. ſed vt AE quidẽ ad EK, ita AG parallelogrammum ad parallelogrammum GK: vt autem GE ad EL, ita GK ad KL: & vt HE ad EM, ita PE ad KM. & vt igitur AG parallelogrammum ad parallelogrammum GK, ita GK ad KL, & PE ad KM. ſed vt AG quidem ad GK, ita AB ſolidum ad ſolidũ EX: vt autem GK ad KL, ita ſolidum XE ad PL ſolidum: & vt PE ad KM, ita PL ſolidum ad ſolidum KO. & vt igitur ſolidum AB ad ſolidum EX, ita EX ad PL, & PL ad KO. ſi autem quattuor ſint magnitudines deinceps proportionales prima ad quartam triplam proportionem habet eius, quàm ad ſecundam. ergo & AB ſolidum ad ſolidum KO triplam habet proportionem eius, quam AB ad EX. ſed vt AB ad EX, ita AG parallelogrammum ad parallelogrammum GK; & AE recta linea ad ipſam EK. quare & AB ſolidum ad ſolidum KO triplam proportionem habebit eius, quã AE habet ad EK. æquale autem eſt ſolidum KO ſolido CD, & recta linea EK rectæ CF eſt æqualis. ergo & AB ſolidum ad ſolidum CD triplam habet proportionẽ eius, quam latus ipſius homologum AE habet ad CF homologum latus. quod demonſtrare oportebat.

24 huius.

1. ſexti.

Ex antecedente.

11. quinti.

11. diffi. quinti.

Ex antecedente.

1. ſexti.

COROLLARIVM.

Ex hoc manifeſtum eſt, ſi quattuor rectæ lineæ proportionales fuerint, vt prima ad quartam, ita eſſe ſolidum parallelepipedum, quod fit à prima ad ſolidum, quod à ſecunda ſimile, & ſimiliter deſcriptum; quoniam & prima ad quartam triplam proportionẽ habet eius, quam ad ſecundam.

F. C. COMMENTARIVS.

Ex proxime demonſtratis, ſequitur priſmata ſimilia, quę triangulares baſes habent in tripla eſſe proportione homologorum laterum.

Sint ſimilia priſmata triangulares baſes habentia, & ſimiliter poſita AF GN, & priſmatis quidem AF baſis ſit triangulum ABC, & quod ipſi opponitur DEF: priſmatis uero GN baſis ſit triangulum GHK, & ipſi oppoſitum LMN. Sit autem latus AB homologum lateri GH. Dico priſma AF ad priſma GN triplam habere proportionem eius, quam habet AB ad GH. Com-

pleantur enim ſolida parallelepipeda, & ſit ſolidi quidē parallelepipedi AF baſis quadrilaterum ABCO, & ipſi oppoſitum quadrilaterū DEFP ſolidi vero parallelepipedi GN baſis ſit quadrilaterū GHKQ, & quod ipſi opponitur LMNR. Itaque qm̄ priſma AF ponitur ſimile priſmati GN, erit parallelogrāmum ABED ſimile parallelogrammo GHML. quare & ipſi oppoſitum parallelogrāmum OCFP ſimile erit parallelogrammo QKNR. & eadem ratione demonſtrabitur parallelogrammum AOPD ſimile ipſi GQRL. ſolidum igitur parallelepipedum AF ſimile eſt ſolido parallelepipedo GN. ſimilia autem ſolida parallelepipeda in tripla ſunt proportione homologorū laterū. quare & ipſorum dimidia in eadē proportione erūt. priſma igitur AF ad priſma GN triplā proportionē habebit eius, quam habet AB ad GH. quod oportebat demonſtrare.

9.diff.huius
24.huius.



THEOREMA XXIX.
PROPOSITIO XXXIIII.

Aequalium ſolidorum parallelepipedorum baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent: & quorum ſolidorum parallelepipedorum baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent, ea inter ſe ſunt æqualia.



Sint æqualia ſolida parallelepipeda AB CD. Dico ipſorum baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondere: hoc eſt vt EH baſis ad baſim NP, ita eſſe altitudinem ſolidi CD ad ſolidi AB altitudinem. Sint enim primū ſtantes AG EF LB HK CM NX OD PR ad rectos angulos baſibus ipſ rū. Dico ut EH baſis ad baſim NP, ita eſſe CM ad AG. Si igitur baſis EH baſi NP ſit æqualis, eſt autem & AB ſolidum æquale ſolido CD, erit & CM æqualis ipſi AG. ſi enim baſibus EH NP æqualibus exiſtentibus non ſint AG CM altitudines æquales, neque AB ſolidum ſolido CD æquale erit. ponitur autem æquale. non igitur inæqualis eſt altitudo CM altitudini AG. ergo æqualis ſit neceſſe eſt. ac propterea vt EH baſis ad baſim NP, ita erit CM ad AG. ex quibus conſtat ſolidorum parallelepipedorum AB CD baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondere. At vero non ſit baſis EH æqualis baſi NP. Sed EH ſit maior. eſt autem & AB ſolidum ſolido CD æquale. ergo maior eſt CM ipſa AG; alioquī rurſus ſequeretur ſolida AB CD æqualia non eſſe, quæ ponuntur æqualia. Itaque ponatur CT æqualis ipſi AG: & à baſi quidem NP, altitudine autem CT ſolidum parallelepipedum VC compleatur. Quoniam igitur ſolidum AB ſolido CD eſt æquale, aliud autem aliquod eſt VC, & æqualia ad idem eandem habēt proportionem; erit vt AB ſolidum ad ſolidum CV, ita CD ſolidum ad ſolidum CV. ſed vt AB ſolidum ad ſolidum CV, ita baſis EH ad NP baſim. æqualia enim ſunt AB CV ſolida. Vt autem ſolidum CD ad ipſum CV, ita MP baſis ad baſim PT, & MC ad CT. & vt igitur baſis EH ad NP baſim, ita MC ad CT. eſt autem CT æqualis AG. ergo & vt EH baſis ad baſim NP, ita

7.quinti.
32.huius.
25 huius.
1.ſexti.

NP, ita MC ad AG. quare ſolidorum parallelepipedorum AG CD baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent. Rurſus ſolidorum parallelepipedorum AB CD baſes ex contraria parte reſpondeant altitudinibus: ſitq; vt EH baſis ad baſim MP, ita ſolidi CD altitudo ad altitudinẽ ſolidi AB. Dico ſolidum AB ſolido CD æquale eſſe. Sint enim rurſus ſtãtes ad rectos angulos baſibus. & ſi quidem baſis EH ſit æqualis baſi NP, eſtq; vt EH baſis ad baſim NP, ita



altitudo ſolidi CD ad ſolidi AB altitudinem: erit ſolidi CD altitudo altitudini ſolidi AB æqualis. ſolida autem parallelepipeda, quæ ſunt in æqualibus baſibus, & eadem altitudine inter ſe æqualia ſunt. ergo ſolidum AB ſolido CD eſt æquale. ſed nõ ſit EH baſis æqualis baſi NP, & ſit EH maior. maior igitur eſt & ſolidi CD altitudo altitudine ſolidi AB, hoc eſt CM ipſa AG. ponatur ipſi AG æqualis rurſus CT, & ſimiliter ſolidum CV compleatur. Itaque quoniam eſt vt EH baſis ad baſim NP, ita MC ad ipſam AC; æqualis autem eſt AG ipſi CT: erit vt baſis EH ad NP baſim, ita MC ad CT. ſed vt baſis EH ad NP baſim, ita AB ſolidum ad ſolidum CV; æquealta enim ſunt ſolida AB CA. vt autem MC ad CT, ita & MP baſis ad baſim PT, & ſolidum CD ad CV ſolidum & vt igitur ſolidum AB ad ſolidum CV, ita CD ſolidum ad ſolidum CV. Quòd cum vtrumque ſolidorum AB CD ad ipſum CV eandẽ proportionẽ habeat; erit AB ſolidũ ſolido CD æquale. quod demonſtrare oportebat. 30. huius.

Non ſint autem ſtãtes FE BL GA KH XN DO MC RP ad rectos angulos baſibus ipſorum: & à punctis F G B K X M D R ad plana baſium EH NP ducantur perpẽdiculares, quę planis in punctis S T Y V Q Z Ω Φ occurant & cõpleantur ſolida FVXΩ. Dico & ſic æqualibus exiſtentibus ſolidis AB CD,



baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondere, & vt EH baſis ad baſim NP, ita eſſe altitudinem ſolidi CD ad ſolidi AB altitudinem. Quoniam enim ſolidum AB ſolido CD eſt æquale; ſolido autem AB æquale eſt ſolidum BT; in eadem namq; ſunt baſi FK, & eadem altitudine; quorum ſtantes non ſunt in eiſdem rectis lineis: & ſolidum DC eſt æquale ſolido D Z, quòd in eadem ſint baſi XR, & eadem altitudine, quorum ſtantes non ſunt in eiſdem rectis lineis; erit & ſolidum BT ſolido D Z æquale. æqualium autem ſolidorum parallelepipedorum, quorum altitudines baſibus ipſorum ſunt ad rectos angulos; baſes altitudinibus ex contraria parte reſpondent. eſt igitur vt FK baſis ad baſim XR, ita ſolidi DZ altitudo ad altitudinem ſolidi BT. atque eſt baſis quidem FK baſi EH æqualis, baſis vero XR æqualis baſi NP. quare vt EH baſis ad baſim NP, ita eſt altitudo ſolidi D Z ad ſolidi BT altitudinem. eędem autem ſunt altitudines ſolidorum DZ BT, itemq; ſolidorum DC BA. eſt igitur vt EH baſis ad baſim NP, ita ſolidi DC altitudo ad altitudinem ſolidi AB: ergo ſolidorum parallelepipedorum AB CD baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent. Rurſus ſolidorum parallelepipedorum AB CD baſes ex cõtraria parte reſpõdeant altitudinibus: ſitq; vt EH baſis ad baſim NP, ita altitudo ſolidi CD ad ſolidi AB altitudinem. Dico ſolidum AB ſolido CD æquale eſſe. Iiſdem namque conſtruc- 31. huius. Ex ante demonſtratis.



Gis, quoniam vt EH baſis ad baſim NP, ita ſolidi CD altitudo ad altitudiné ſolidi AB; & baſis quidem EH eſt æqualis baſi FK; NP vero ipſi XR: erit vt FK baſis ad baſim XR, ita altitudo ſolidi CD ad ſolidi AB altitudinem. eædē autem ſunt altitudines ſolidorum AB CD, & ipſorū BT DZ. eſt igitur vt FK baſis ad baſim XR, ita ſolidi DZ altitudo ad altitudinem ſolidi BT. quare ſolidorū BT DZ parallelepipedorū baſes ex contraria parte reſpondent altitudinibus; quorum autem ſolidorum parallelepipedorum altitudines ſunt ad rectos angulos baſibus ipſorum, & baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent, ea inter ſe ſunt æqualia. ergo BT ſolidum ſolido DZ eſt æquale. ſed ſolidū quidem BT æquale eſt ſolido BA, etenim in eadem ſunt baſi FK, & eadem altitudine, quorum ſtantes non ſunt in eiſdem rectis lineis: ſolidum vero DZ eſt æquale ſolido DC, ſi quidem in eadem ſunt baſi XR, & eadem altitudiue, & non in eiſdem rectis lineis. ergo & ſolidū AB ſolido CD eſt æquale. quod demonſtrare oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

Ex ijs, quę ante dicta ſunt, illud etiam demonſtrari poteſt.

Aequalium priſmatum & triangulares baſes habentium baſes ex cōtraria parte altitudinibus reſpondent: & quorum priſmatum triangulares baſes habentium, baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent, ea inter ſe ſunt æqualia.



Sint priſmata, quae triangulares baſes habent AF GN inter ſe aequalia. Dico baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondere, hoc eſt vt triangulum ABC ad triangulum GHK, ita eſſe priſmatis GN altitudinem ad altitudinem priſmatis AF. Compleantur enim ſolida parallelepipeda, quę etiam inter ſe æqualia erūt, cum ſint priſmatum dupla: æqualium autem ſolidorum parallelepipedorum baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent. ergo vt ſolidi parallelepipedi AF baſis ad baſim ſolidi parallelepipedi GN, hoc eſt vt quadrilaterum ABCO ad quadrilaterum GHKQ, ita eſt ſolidi parallelepipedi GN altitudo ad altitudinem. ſolidi parallelepipedi AF. ſed vt quadrilaterum ABCO ad quadrilaterum GHKQ, ita triangulum ABC ad triangulum GHK. Vt igitur triangulum ABC ad triangulum GHK, ita altitudo ſolidi parallelepipedi GN ad altitudinē ſolidi parallelepipedi AF, hoc eſt ita priſmatis GN altitudo ad altitudinē priſmatis AF. Rurſus priſmatum AF GN baſes ex cōtraria parte reſpondeant altitudinibus, hoc eſt vt triangulū ABC ad triangulū GHK, ita ſit priſmatis GN altitudo ad altitudinem priſmatis AF. Dico priſmata AF GN inter ſe aequalia eſſe. compleantur enim rurſus ſolida parallelepipeda, erit quadrilaterum ABCO ad quadrilaterum GHKQ, vt triangulum ABC ad

11. quinti.

ad triangulum GHK. quare vt ſolidi parallelepipedi AF baſis ad baſim ſolidi parallelepipedi GN, ita erit priſmatis GN altitudo ad altitudinẽ priſmatis AF, hoc eſt, ita ſolidi parallelepipedi GN altitudo ad altitudinem ſolidi parallelepipedi AF. quorum autem ſolidorum parallelepipedorum baſes ex cõtraria parte altitudinibus reſpondent, ea inter ſe ſunt æqualia. ergo et æqualia erunt eo rum dimidia. priſma igitur AF priſmati GN eſt æquale. quod demonſtrare oportebat.

THEOREMA XXX. PROPOSITIO XXXV.

Si ſint duo anguli plani æquales, & in verticibus ipſorum ſublimes rectæ lineæ conſtituantur, quæ cum rectis lineis à principio poſitis angulos contineant æquales, alterum alteri; in ſublimibus autem ſumantur quæuis puncta, atque ab ipſis ad plana in quibus ſunt anguli primi perpendiculares ducantur; & à punctis, quæ à perpendicularibus fiunt in planis ad primos angulos iungantur rectæ lineæ: cum ſublimibus æquales angulos continebunt.



Sint duo anguli rectilinei æquales BAC EDF: & à punctis AD ſublimes rectæ lineæ AG DM conſtituantur, quæ cum rectis lineis à principio poſitis æquales angulos contineãt, alterum alteri: angulum quidem MDE æqualem angulo GAB, angulum vero MDF angulo GAC æqualem: & ſumantur in ipſis AG DM quæuis puncta G M, à quibus ad plana per BAC EDF ducantur perpendiculares GL MN, occurrentes planis in punctis L N; & L A ND iungantur. Dico angulum GAL angulo MDN æqualem eſſe. ponatur ipſi DM æqualis AH, & per H ipſi GL parallela ducatur HK. eſt autem GL perpendicularis ad planum per BAC. ergo & HK ad planum per BAC perpendicularis erit. Ducantur à punctis K N ad rectas lineas AB AG DF DE perpendiculares KC NF KB NE, & HC CB MF FE iungantur. Quoniam igitur quadratum ex HA æquale eſt quadratis ex HK KA; quadrato autem ex HA æqualia ſunt ex KC CA quadrata; erit quadratum ex HA quadratis ex HK KC CA æquale. quadratis autem ex HK KC æquale eſt quadratum ex HC. quadratum igitur ex HA quadratis ex HC CA æquale erit: & idcirco angulus HCA eſt rectus. Eadem ratione & angulus DFM rectus eſt. ergo angulus ACH ipſi DFM eſt æqualis. eſt autem & HAC angulus æqualis angulo MDF. duo igitur triangula ſunt MDF HAC duos angulos duobus angulis æquales habentia, alterum alteri, & vnum latus vni lateri æquale, quod vni æqualium angulorum ſubtenditur; uidelicet HA ipſi DM. ergo & reliqua latera reliquis lateribus æqualia habebunt, alterum alteri. quare AC eſt æqualis DF. Similiter demonſtrabimus & AB ipſi DE æquale eſſe. iungantur HB ME. Et quoniam quadratum ex AH eſt æquale quadratis ex AK KH; quadrato autem ex AK æqualia ſunt quadrata ex AB BK; erunt quadrata ex AB BK KH quadrato ex AH æqualia. Sed quadratis

8. huius.

47. primi.

47. primi.

48. primi.

26. primi.

dratis ex BK KH æquale eſt ex BH quadratum, rectus enim angulus eſt HKB, propterea quòd & HK perpendicularis eſt ad ſubiectum planum. quadratũ igitur ex
48.primi. AH æquale eſt quadratis ex AB BH. quare angulus ABH rectus eſt. Eadem ratione & angulus DEM eſt rectus. eſt autem & BAH angulus æqualis angulo EDM, ita
26.primi. enim ponitur. atque eſt AH ęqualis DM. ergo & AB ipſi DE eſt æqualis. Quoniam igitur AC quidem eſt æqualis DF, AB vero ipſi DE; erunt duæ CA AB duabus FD DE æquales. Sed & angulus BAC angulo FDE
4.primi. eſt æqualis. baſis igitur BC baſi EF, & triangulum triangulo, & reliqui anguli reliquis ęquales ſunt. ergo angulus ACB angulo DFE. eſt autem & rectus ACK ęqualis recto DFN. quare & reliquus BCK reliquo EFN æqualis. Eadem ratione & CBK angulus eſt æqualis angulo FEN. Itaque duo triangula ſunt BCK EFN duos angulos duobus angulis æquales habentia, alterum alteri, & vnum latus vni lateri ęquale, quod eſt ad æquales angu-
26.primi. los, videlicet BC ipſi EF. ergo & reliqua latera reliquis lateribus æqualia habebũt. æqualis igitur eſt CK ipſi FN. eſt autem & AC ipſi DF æqualis. quare duæ AC CK
4.primi. duabus DF FN ęquales ſunt, & rectos continent angulos. baſis igitur AK eſt æqualis baſi DN. Et cum AH ſit æqualis DM, erit & quod fit ex AH quadratum quadrato ex DM æquale.
47.primi. Sed quadrato ex AH æqualia ſunt ex AK KH quadrata; etenim rectus eſt angulus AKH. quadrato autem ex DM ęqualia ſunt quadrata ex DN NM, quòd angulus DNM rectus ſit. quadrata igitur ex AK KH quadratis ex DN NM ſunt æqualia; quorum quadratum ex AK æquale eſt quadrato ex DN. ergo reliquum ex KH quadratum reliquo quadrato ex NM eſt æquale. & ideo recta linea HK ipſi MN æqualis. quòd cum duæ HA AK duabus MD DN ęquales ſint, altera alteri, & baſis HK baſi NM oſtenſa ſit ęqualis; angulus HAK angulo MDN æqualis
8.primi. erit. quod oportebat demonſtrare.



COROLLARIVM.

Ex hoc manifeſtum eſt, ſi ſint duo anguli plani rectilinei æquales, ab ipſis autem conſtituantur ſublimes rectæ lineæ æquales, quę cum rectis lineis à principio poſitis æquales contineant angulos, alterum alteri; perpendiculares, quę ab ipſis ad plana in quibus ſunt primi anguli ducantur, inter ſe ęquales eſſe.

THEOREMA XXXI. PROPOSITIO XXXVI.

Si tres rectę lineę proportionales ſint, ſolidum parallelepipedũ, quod à tribus fit ęquale eſt ſolido parallelepipedo, quod fit à media, ęquilatero quidem, æquiangulo autem antedicto.

Sint

Sint tres rectæ lineæ proportionales A B C, sitq; vt A ad B, ita B ad C. Dico solidum, quod fit ex ipsis ABC æquale esse solido, quod fit ex B, æquilatero quidem, æquiangulo autem antedicto. Exponatur solidus angulus ad E contentus tribus an-



gulis planis DEG GEF FED; & ipsi quidem B ponatur æqualis vnaquæque ipsarum DE GE EF, & solidum parallelepipedum EK compleatur: ipsi vero A ponatur æqualis LM; & ad rectam lineam LM, & ad punctum in ipsa L constituatur angulo solido ad E æqualis angulus contentus NLX XLM MLN, & ponatur ipsi quidē B æqualis LX, ipsi vero C æqualis LN. Quoniam igitur est vt A ad B, ita B ad C, æqualis autem est A ipsi LM, & B vnicuique ipsarum LX EF EG ED, & C ipsi LN; erit vt LM ad EF, ita DE ad LN: & circum æquales angulos MLN DEF, latera ex cōtraria parte sibi ipsis respondent. ergo MN parallelogrammum parallelogrammo DF est æquale. Et quoniam duo anguli plani rectilinei æquales sunt DEF NLM, & in ipsis sublimes rectæ lineæ constituuntur LX EG æquales inter se, & cum rectis lines à principio positis æquales continentes angulos, alterum alteri; erunt perpendiculares, quæ à punctis G X ad plana per NLM DEF ducuntur, inter se æquales. ergo solida LH EK eadem sunt altitudine. Quæ vero in æqualibus basibus sunt solida parallelepipeda, & eadem altitudine inter se sunt æqualia. ergo solidum HL æquale est solido EK: atque est solidum quidem HL, quod fit à tribus ABC, solidum verò EK quod fit ex B. Si igitur tres rectæ lineæ proportionales sint, solidum parallelepipedum, quod à tribus fit æquale est solido parallelepipedo, quod fit à media, æquilatero quidem, æquiangulo autem antedicto. quod demonstrare oportebat.

26. huius

14. unde.

Ex antecedenti.

31. huius.

THEOREMA XXXII. PROPOSITIO. XXXVII.

Si quattuor rectæ lineæ proportionales sint, & quæ ab ipsis fiūt solida parallelepipeda similia & similiter descripta proportionalia erunt. Et si quæ ab ipsis fiunt solida parallelepipeda similia & similiter descripta pportionalia sint; & ipsæ rectæ lineæ proportionales erunt.



Sint quattuor rectæ lineæ proportionales A B CD EF GH, sitque vt A B ad C D, ita EF GH, & describātur ab ipsis AB CD EF GH similia & similiter posita solida parallelepipeda K A L C M E N G. Dico vt K A ad LC, ita esse ME ad N G. Quo-



32.huius. niam enim ſolidum parallelepipedum KA ſimile eſt ipſi LC, habebit KA ad LC triplam proportionem eius, quam AB habet ad CD. Eadē ratione & ſolidum ME ad ipſum NG triplam proportionem habebit eius, quam habet EF ad GH: atque eſt vt AB ad CD, ita EF ad GH. Vt igitur AK ad LC, ita ME ad NG. Sed ſit ut ſolidum AK ad ſolidum LC, ita ME ſolidum ad ſolidum NG. Dico ut recta linea AB ad rectam CD, ita eſſe rectam EF ad ipſam GH. Quoniam enim rurſus AK ad LC triplam proportionem habet eius, quam AB habet ad CD; habet autem & ME ad NG triplam proportionem eius, quam EF ad GH; atque ut AK ad LC, ita ME ad NG: erit ut AB ad CD, ita EF ad GH. Si igitur quattuor rectæ lineæ proportionales ſint & reliqua. quod oportebat demonſtrare.



THEOREMA XXXIII. PROPOSITIO XXXVIII.

Si planum ad planum rectum ſit, & ab aliquo puncto eorum, quæ ſunt in vno plano ad alterum planum perpendicularis ducatur, ea in communem planorum ſectionem cadet.

Planum enim CD ad planum AB rectum ſit; eōis aũt eorum ſectio ſit AD; & in ipſo CD plano quod uis punctum E ſumatur. Dico perpendicularem, quæ à puncto E ad planum AB ducitur, cadere in ipſam AD. Non enim, ſed ſi fieri poteſt, cadat extra, ut EF; & plano AB in puncto F occurrat: à puncto autem F ad DA in plano AB perpendicularis ducatur FG, quæ quidem & plano CD ad rectos angulos erit; & EG iũgatur. qm̃ igitur FG plano CD eſt ad rectos angulos; contingit autem ipſam recta linea EG, quæ eſt in eodem CD plano: erit angulus FGE rectus. ſed & EF plano AB ad rectos angulos eſt. rectus igitur eſt angulus EFG. quare trianguli EFG duo anguli duobus rectis ſunt æquales; quod eſt abſurdum. non igitur à puncto E ad AB planum perpendicularis ducta extra rectam lineam DA cadet. ergo in ipſam cadat neceſſe eſt. Si igitur planum ad planum rectum ſit, & reliqua. quod oportebat demonſtrare.



17.primi.

F. C. COMMENTARIVS.

Poſſumus & recta demõſtratione vti hoc modo. Sit rurſus CD planum ad planum AB rectum: communis autem ipſorum ſectio ſit AD; & in plano CD quod vis punctum E ſumatur. Dico perpendicularem, quę à puncto E ad planum AB ducitur cadere in rectam lineam AD. Ducatur à puncto E ad ipſam AD perpendicularis EF. Quoniam igitur planum CD ad planum AB rectum eſt, & commu-



ſi planorum

ni planorum ſectioni ad rectos angulos in vno plano CD ducta eſt EF; erit EF reliquo plano AB ad rectos angulos. Quare à puncto E ad AB perpendicularis ducta in communem planorum ſectionem AD cadit. quod oportebat demonſtrare.

THEOREMA XXXIIII. PROPOSITIO XXXIX.

Si in ſolido parallelepipedo oppoſitorum planorum latera ſecẽtur bifariam, per ſectiones vero plana ducantur, cõis planorum ſectio, & ſolidi parallelepipedi diameter ſeſe bifariam ſecabunt.



In ſolido enim parallelepipedo AF oppoſitorum planorum CF AH latera bifariã ſecentur in punctis KLMNXPOR. & per ſectiones plana ducantur KN XR communis autem planorum ſectio YS, & ſolidi parallelepipedi diameter ſit DG. Dico YS DG ſeſe bifariam ſecare, hoc eſt YT quidem ipſi TS DT vero ipſi TG æqualem eſſe. Iungantur enim DY YE BS SG. Quoniam igitur DX parallela eſt ipſi OE, alterni anguli DXY YOE inter ſe æquales ſunt. Et quoniam DX quidem eſt æqualis OE XY vero ipſi YO, & angulos æquales continent; erit baſis DY æqualis baſi YE, & triangulum DXY triangulo YOE, & reliqui anguli reliquis angulis æquales. angulus igitur XYD eſt æqualis angulo OYE, & ob id recta linea eſt DYE. Eadem ratione & BSG recta eſt. atque eſt BS æqualis SG. Et quoniã CA ipſi DB æqualis eſt & parallela, ſed CA eſt æqualis & parallela ipſi EG; erit & DB ipſi EG æqualis & parallela & ipſas coniungũt rectæ lineæ DE GB. parallela igitur eſt DE ipſi BG. & ſumpta ſunt in vtraque ipſarum quæuis puncta DYGS, & iunctæ ſunt DG YS. ergo DG YS in vno ſunt plano. Quod cum DE ſit parallela BG, erit & EDT angulus angulo BGT æqualis, alterni enim ſunt. eſt autem & DTY angulus æqualis ipſi GTS. duo igitur ſunt triangula DTY GTS duos angulos duobus angulis æquales habentia, & unum latus uni lateri æquale, quod uni æqualium angulorum ſubtenditur, uidelicet DY ipſi GS: dimidia enim ſunt ipſorum DE BG. ergo & reliquos augulos reliquis angulis æquales habebunt. quare DT quidem eſt æqualis TG, YT uero ipſi TS. Si igitur in ſolido parallelepipedo, & reliqua. quod oportebat demonſtrare.

69. primi.
4. primi.
14. primi.
9. huius.
33 primi.
7. huius.
29. primi.
15. primi.
26. primi.

THEOREMA XXXV. PROPOSITIO. XL.

Si ſint duo priſmata æquealta, quorũ vnũ quidẽ baſim habeat parallelogrãmũ, alterum vero triangulũ, & parallelogrammũ duplum ſit trianguli; ea inter ſe æqualia erunt.





Sint priſmata æquealta ABCDEF GHKLMN, &

unum quidem baſim habeat parallelogrammum AF, alterum uero GHK triangulum, & duplum ſit AF parallelogrammũ triãguli GHK. Dico priſma ABCDEF priſmati GHKLMN æquale eſſe. compleãtur enim AX GO ſolida. Et quoniam parallelo grãmum AF trianguli GHK



eſt duplum; eſt autem & HK parallelogrammum duplum triãguli GHK; erit AF pa-
34. huius. rallelogrammum parallelogrammo HK æquale. Quæ uero in æqualibus ſunt baſibus ſolida parallelepipeda, & eadem altitudine inter ſe æqualia ſunt. æquale igitur AX ſolidum ſolido GO. atque eſt ſolidi quidem AX dimidium ABCDEF priſma, ſolidi uero GO dimidium priſma GHKLMN. ergo ABCDEF priſma priſmati GHKLMN eſt æquale. ſi igitur ſint duo priſmata æquealta, & reliqua. quod demonſtrare oportebat.

FINDECIMI LIBRI FINIS.

EVCLIDIS ELEMENTORVM

LIBER DVODECIMVS

ET SOLIDORVM SECVNDVS.

CVM SCHOLIIS ANTIQVIS ET COMMENTARIIS.

Federici Commandini Vrbinatis.

THEOREMA I. PROPOSITIO I.

IMILIA polygona, quæ in circulis deſcribuntur, inter ſe ſunt, vt diametrorum quadrata.

Sint circuli ABCDE FGHKL, & in ipſis ſimilia polygona ABCDE FGHKL; diametri autem circulorum ſint BM GN. Dico vt quadratum ex BM ad quadratum ex GN, ita eſſe ABCDE polygonum ad polygonum FGHKL. Iungantur enim BE AM GL FN. Et quoniam polygonum ABCDE ſimile eſt polygono FGHKL; & BAE angulus angulo GFL eſt æqualis: atque eſt vt BA ad AE, ita GF ad FL. duo igitur triangula ſunt BAE GFL vnum angulum vni angulo æqualem habentia, videlicet angulum BAE angulo GFL: circa æquales autẽ angulos latera proportionalia. quare triangulum ABE triangulo FGL æquiangulum eſt; ac propterea angulus AEB æqualis eſt angulo FLG. Sed angulus quidem AEB angulo AMB eſt æqualis; in eadem enim circumferentia conſiſtũt. angulus autem FLG æqualis eſt angulo FNG. ergo & AMB angulus eſt æqualis angulo FNG. eſt autem & rectus angulus BAM æqualis recto GFN. quare & reliquus reliquo æqualis. æquiangulum igitur eſt triãgulum AMB triangulo FGN. ergo vt BM ad GN ita BA ad GF. Sed proportionis quidem BM ad GN dupla eſt proportio quadrati ex BM ad quadratũ ex GN; proportionis vero BA ad GF dupla eſt proportio ABCDE polygoni ad polygonum FGHKL: & vt igitur quadratum ex BM ad quadratum ex GN, ita polygonum ABCDE ad FGHKL polygonum. Quare ſimilia polygona, quæ in circulis deſcribuntur, inter ſe ſunt, vt diametrum quadrata.





21. tertii.

21. tertii.

THEOREMA II. PROPOSITIO. II.

Circuli inter ſe ſunt vt diametrorum quadrata.

Sint circuli ABCD EFGH: diametri autem ipſorũ ſint BD FH. Dico vt quadratum ex BD ad quadratum ex FH, ita eſſe circulum ABCD ad EFGH circulum. Si enim non ita eſt; erit vt quadratum ex BD ad quadratum ex FH, ita circulus ABCD vel ad ſpacium aliquod minus circulo EFGH, vel ad maius. Sit primum ad minus quod ſit S: & in circulo EFGH deſcribatur quadratum EFGH. Itaque deſcriptum in circulo quadratum maius eſt dimidio circuli EFGH; quoniam ſi per puncta EFGH contingentes circulum ducamus, erit deſcripti circa circulum quadrati dimidium quadratum EFGH. deſcripto autem circa circulum quadrato, minor eſt circulus. ergo quadratum EFGH maius eſt dimidio circuli EFGH. ſecentur bifariam circumferentiæ EF FG GH HE in punctis KLMN: & EK KF FL LG GM MH HN NE iungantur. Vnum quodque igitur triangulorum EKF FLG GMH HNE maius eſt dimidio portionis circuli in qua conſiſtit, quoniam ſi per puncta KLMN contingentes circulum ducamus, & parallelogramma, quę ſunt in rectis lineis EF FG GH HE cõpleamus; erit vnumquodque triangulorum EKF FLG GMH HNE dimidium parallelogrammi, quod ad ipſum eſt: ſed portio minor eſt parallelogrammo. quare vnumquodque triangulorum EKF FLG GMH HNE maius eſt dimidio portionis circuli, in qua conſiſtit. reliquas igitur circumferentias bifariam ſecantes, & iungentes rectas lineas: atque hoc ſemper facientes relinquemus tandẽ quaſdã circuli portiones, quę minores erũt exceſſu, quo circulus EFGH ipſum S ſpacium ſuperat. etenim oſtenſum eſt in primo theoremate decimi libri, duabus magnitudinibus inæqualibus expoſitis ſi à maiori auferatur maiuſquã dimidium, & ab eo, quod relinquitur, rurſus maiuſquàm dimidium, & hoc ſemper fiat; reliqui tandem magnitudinem aliquam, quę minori magnitudine expoſita ſit minor. Itaque relictæ ſint portiones circuli EFGH in rectis lineis EK KF FL LG GM MH HN NE, quæ maiores ſint exceſſu, quo circulus EFGH ipſum S ſpacium ſuperat. ergo reliquum EKFLGMHN polygonum maius erit ſpacio S. Deſcribatur etiam in circulo ABCD polygono EKFLGMHN ſimile polygonum AXBOCPDR. eſt igitur vt quadratum ex BD ad quadratum ex FH, ita polygonum AXBOCPDR ad EKFLGMHN polygonum. ſed & vt quadratum ex BD ad quadratum ex FH, ita ABCD circulus ad ſpacium S. ergo & vt circulus ABCD ad ſpacium S, ita polygonum AXBOCPDE ad EKFLGMHN polygonum; & permutando vt circulus ABCD ad polygonum, quod in ipſo eſt, ita ſpacium S ad polygonum EKFLGMHN. maior autem eſt circulus ABCD eo, quod in ipſo eſt polygono. quare & ſpacium S maius eſt polygono EKFLGMHN. ſed & minus, quod fieri non poteſt. Non igitur eſt vt quadratum ex BD ad quadratum ex FH, ita ABCD circulus ad ſpacium aliquod minus circulo EFGH. ſimiliter oſtendemus neque eſſe vt quadratum ex FH ad quadratum ex BD, ita circulum EFGH ad aliquod ſpacium minus circulo ABCD. Dico igitur neque eſſe vt quadratum ex BD ad quadratum ex FH, ita circulum ABCD ad aliquod ſpacium maius circulo EFGH. ſi enim fieri poteſt, ſit ad maius ſpaciũ S. erit igitur conuertendo vt quadratum ex FH ad quadratum ex BD, ita ſpacium S ad ABCD circulum. ſed vt ſpacium S ad ABCD circulum, ita circulus EFGH ad aliquod ſpacium minus circulo ABCD, vt demonſtrabitur. ergo & vt quadratum



A

B

C

Ex antecedenti, & 11. quinti.

ex

ex FH ad quadratum ex BD, ita EFGH circulus ad aliquod ſpacium minus circulo ABCD, quod fieri non poſſe oſtenſum eſt. Nó igitur vt quadratum ex BD ad quadratũ ex FH, ita eſt circulus ABCD ad ſpacium aliquod maius EFGH circulo. oſtenſum autem eſt neque ad minus. quare vt quadratum ex BD ad quadratum ex FH, ita erit ABCD circulus ad circulum EFGH. Circuli igitur inter ſe ſunt, vt diametrorum quadrata. quod oſtendere oportebat.



LEMMA

Itaque dico ſi ſpacium S ſit maius circulo EFGH, eſſe vt ſpacium S ad circulum ABCD, ita circulum EFGH ad ſpacium aliquod circulo ABCD minus.

Fiat enim, vt ſpacium S ad circulum ABCD, ita EFGH circulus ad ſpacium T. Dico ſpacium T circulo ABCD minus eſſe. Quoniam enim eſt vt ſpacium S ad circulum ABCD, ita EFGH circulus ad ſpacium T; erit permutando vt ſpacium S ad circulum EFGH, ita ABCD circulus ad ſpacium T. maius autem eſt ſpacium S circulo EFGH. ergo & ABCD circulus ſpacio T eſt maior; ac propterea vt ſpaciũ S ad circulum ABCD, ita eſt EFGH circulus ad ſpacium aliquod circulo ABCD minus.

F. C. COMMENTARIVS.

Erit deſcripti circa circulum quadrati dimidium quadratum EFGH] A

Deſcribatur circa circulum EFGH quadratum TVZY, nempe ductis per EFGH puncta rectis lineis, quae circulum contingant, vt ex 9. quarti libri apparet. erit TV ipſius TE dupla. Iungantur enim EG FH ſe ſe in puncto Q ſecantes, quae circuli diametri erunt: atque erit Q circuli cẽtrum. anguluſ igitur QEV eſt rectus. 18. tertij. *ſed & rectus EQH; ſi quidẽ duae FQ QE aequales ſunt duabus HQ QE; & baſis EF aequalis baſi EH. ergo angulus FQE angulo HQE eſt aequalis: & ob id vterque rectus. ex quibus ſequitur* 8. primi: 28. primi. *rectam lineam TEV ipſi FQH parallelam eſſe. & eadem ratione oſtendentur TFY, VHZ parallelae ipſi EQG: & inter ſe ſe. parallelogramma igitur ſunt FV VG FE EH. Quòd cum FQ ſit aequalis QH, erit ẽt TE ipſi EV aequalis: ideoq; TV eſt dupla ipſius TE. ſimiliter demonſtrabimus & TY ipſius TF duplam. cumq; TY TV aequales ſint, erunt & earum dimidiae FT TE aequales. Et quoniam TV dupla eſt ipſius TE, quadratum ex TV quadrati ex TE quadruplũ erit. ſimiles enim rectilineae figurae in dupla ſunt proportione homologorũ laterũ. ſed quadratũ ex EF eſt aequale quadratis ex FT TE, quae quidem ſunt dupla quadrati ex TE. ergo quadratum ex EF, hoc eſt quadratum EFGH quadrati TVZY dimidium erit. quod oportebat demonſtrare.* 34. primi. Coroll. 20 ſexti. 47. primi. B



Erit vnum quodque triangulorum CKF FLG GMH HNE dimidium parallelogrammi, quod ad ipſum eſt [*Ex 41 primi.*

SCHOLIVM.

Deſcribatur etiam in circulo ABCD polygono EKFLGMHN ſimile polygonum AXBOCPDR. C

In dato circulo, deſcripto in circulo polygono ſimile polygonum deſcribere.





Sint duo circuli, quorũ centra FG, & in circulo A B C D E polygonũ quoduis deſcribatur ABCDE, iũgãturq; AF BF CF DF EF: in altero autem circulo ducatur à cẽtro G quędam recta linea vtcunque GH: & angulo quidem A FB cõſtituatur æqualis angulus HGK; angulo autem BFC angulus KGL, & angulo CFD angulus LGM, denique angulo DFE æqualis angulus MGN cõſtituatur. ergo reliquus AFE reliquo HGN eſt æqualis. & iungantur HK KL LM MN NH. eſt autem vt A F ad F B, ita HG ad GK; ſimilia enim ſunt AFB LGK triangula, quod oſtenſum eſt in theoremate ſexto ſexti libri elementorum. Vt igitur ſemidiameter circuli ad circuli ſemidiametrum, ita BA ad HK. ſimiliter oſtendemus & vnamquamque ipſarũ BC CD DE EA ad vnamquamque KL, LM MN NH eandem habere proportionem. & ſũt æquales anguli polygonorum, quoniam & triangulorum anguli æquales ſunt. polygona igitur ABCDE HKLMN ſingulos angulos ſingulis angulis æquales habẽt: & circa æquales angulos latera proportionalia. ergo polygonũ ABCDE ſimile eſt polygono HKLMN. In dato igitur circulo HKLMN polygono ABCDE ſimile polygonum deſcriptum eſt. quod facere oportebat.

23.primi. 4.ſexti. 1.diffi. tertia

THEOREMA III. PROPOSITIO III.

Omnis pyramis triangularem habens baſim diuiditur in duas pyramides, æquales & ſimiles inter ſe, quæ triangulares baſes habent, ſimilesq; toti; & in duo priſmata æqualia, quæ quidem priſmata dimidio totius pyramidis ſunt maiora.



Sit pyramis, cuius baſis quidem ABC triangulum; vertex autem punctum D. Dico pyramidem ABCD diuidi in duas pyramides æquales & ſimiles inter ſe, triangulares q; baſes habentes, & ſimiles toti, & in duo priſmata æqualia; & duo priſmata dimidio totius pyramidis eſſe maiora. ſecentur enim AB BC CA AD DB DC bifariam in punctis E F G H K L, & EH EG GH HK KL LH EK KF FG iungantur. Quoniam igitur AE quidem eſt æqualis EB, AH vero ipſi HD; erit EH ipſi DB parallela. Eadem ratione & HK eſt parallela ipſi AB. parallelogrammum igitur eſt HEBK. quare HK eſt æqualis EB. Sed EB ipſi A E eſt æqualis. ergo & A E ipſi H K æqualis erit. eſt autẽ & AH æqualis HD. duæ igitur AE AH duabus KH H D æquales ſunt, altera alteri, & angulus E A H æqualis angulo KHD. baſis igitur E H baſi K D eſt æqualis. quare triangulum AEH æquale eſt & ſimile triangulo HKD. Eadem ratione & triangulum AHG triangulo HLD æquale eſt & ſimile. Et quoniam duæ rectæ lineæ ſe ſe tangentes EH HG duabus rectis lineis ſeſe tangentibus KD DL parallelæ ſunt, non autem in eodẽ plano, æquales angulos continebunt. ergo angulus EHG eſt æqualis angulo KDL.

9.ſexti. 34.primi. 29.primi. 4.primi. 10.undecimi

KDL. Rursus quoniam duæ rectæ lineæ EH HG duabus KD DL æquales sunt, alte-
tera alteri, & angulus EHG est æqualis angulo KDL; erit basis EG basi KL æqualis' 4. primi.
æquale igitur est & simile triangulum EHG triangulo KDL. Eadem ratione & AE
G triangulum est æquale & simile triangulo HKL. quare pyramis, cuius basis quidē
est AEG triangulum, vertex autem punctum H æqualis & similis est pyramidi, cu-
ius basis est triangulum HKL & vertex D punctum. Et quoniam vni laterum trian-
guli ADB, videlicet ipsi AB parallela ducta est HK; erit triāgulū ADB triāgulo DH
K æquiāgulū, & latera habēt proportionalia. Simile igitur est ADB triāgulū triāgu-
lo DHK: & eadē ratione triangulū quidē DBC simile est triangulo DKL; triangulū
vero ADC triangulo DHL. quod cum duæ rectę lineę se se tangentes BA AC duo
bus rectis lineis se se tangentibus KH HL parallelæ sint, non existentes in eodem
plano, æquales angulos continebunt, angulus igitur BAC, angulo KHL est æqua-
lis: atque est ut BA ad AC, ita KH ad HL. ergo ABC triangulum simile est triangu 10. undeci-
lo HKL; idcoq; pyramis, cuius basis quidem triangulum ABC, uertex autem pūc- mi.
tum D similis est pyramidi, cuius basis triangulum HKL, & uertex punctum D; sed
pyramis, cuius basis quidem HKL triangulum, uertex autem punctum D, ostensa
est similis pyramidi, cuius basis triangulum AEG, & uertex H punctum. Quare &
pyramis cuius basis triangulum ABC & uertex punctum D similis est pyramidi,
cuius basis AEG triangulum, & uertex punctum H. Vtraque igitur ipsarum AEG
H HKLD pyramidum similis est toti pyramidi ABCD. Et quoniam BF est equa-
lis FC, erit EBFG parallelogrammum duplum triāguli GFC. & quoniam duo pris- A
mata æquealta sunt, quorum vnum quidem basim habet parallelogrammum, alte-
terum vero triangulum, estq; parallelogrammum duplum trianguli; erunt ea pris- B
mata inter se æqualia. ergo prisma contentum duobus triangulis BKF EHG, & tri
bus parallelogrāmis EBFG EBKH KHFG est equale prismati, quod duobus trian
gulis GFC HKL, & tribus parallelogrammis KFCL LCGH HKFG continetur. &
manifestum est vtrumque ipsorum prismatum, & cuius basis est EBGF parallelo-
grammum, opposita autem ipsi HK recta linea: & cuius basis est GFC triangulum,
& oppositum ipsi triangulum KLH, maius esse vtraque pyramidum, quarum bases
quidem AEG HKL triangula, uertices autem puncta H D; quoniam si iungamus
EF EH rectas lineas, prisma quidem, cuius basis est EBFG parallelogrammum, &
opposita ipsi recta linea HK maius est pyramide, cuius basis EBF triangulum, ver-
tex autem punctum K. sed pyramis, cuius basis triangulum EBF, & uertex K punc- C
tū est æqualis pyramidi, cuius basis AEG triangulum, & uertex punctum H; equalibus
enim & similibus planis continentur. quare & prisma, cuius basis parallelogrammū 10 diffi. un-
EBFG, opposita autē ipsi recta linea HK maius est pyramide, cuius basis AEG trīā- decimi.
gulum, & uertex punctum H. prisma vero cuius basis parallelogrāmnum EBF
G & opposita ipsi recta linea HK est equale prismati, cuius basis GFC triangulum,
& ipsi oppositum triangulum HKL. & pyramis cuius basis triangulum AEG, vertex
autem H punctum, est æqualis pyramidi, cuius basis HKL triangulum & uertex pū
ctū D. ergo duo prismata de quibus dictū est, sunt maiora duabus dictis pyramidi-
bus quorū bases triāgula AEG HKL, uertices autem H D puncta. tota igitur pyra
mis cuius basis ABC triangulum, uertex autem punctum D, diuisa est in duas pyra
mides æquales, & similes inter se, & similes toti: & in duo prismata æqualia: sunt q;
duo prismata dimidio totius pyramidis maiora. quod ostendere oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

Et quoniam BF est æqualis FC, erit EBFG parallelogrammum duplum triangu A
li GFC.] *Iuncta enim EF quoniam BF est aequalis FC, & EG parallela ipsi BC, erit triangulum* 28. primi.
BEF aequales triāgulo FGC. sed parallelogrammum EBFC duplum est trianguli BEF. ergo & ip 41. primi.
sius FGC trianguli duplum erit.

Erunt in prismata inter se æqualia] *Ex vlt. vndecimi libri.* B

C Prisma quidē cuius basis est EBFG parallelogrāmū. & opposita ipsi recta linea HK, maius est pyramide, cuius basis EBF triangulum, vertex autem punctum K] *Velut totum est sua parte maius; est enim pyramis ipsius prismatis pars quędam. sed inferius ex ijs, quae in 7. huius demonstrantur, apparebit tertiam partē esse, cum sit tertia pars prismatis, cuius basis GFC triangulum, & oppositum ipsi triangulum KLH.*

THEOREMA IIII. PROPOSITIO IIII.

Si sint duę pyramides æquealtæ, quæ triangulares bases habeant, diuidatur autem vtraque ipsarum, & in duas pyramides æquales inter se, similesq; toti, & in duo prismata æqualia, & factarum pyramidum vtraque eodem modo diuidatur, atque hoc semper fiat; erit vt vnius pyramidis basis ad basim alterius, ita & in vna pyramide prismata omnia ad prismata omnia in altera pyramidem, altitudine æqualia.



Sint duæ pyramides æquealtæ, quæ triangulares bases habeāt ABC DEF, uertices autem sint puncta GH, & diuidatur vtraque ipsarum in duas pyramides æquales inter se, similesq; toti, & in duo prismata æqualia, & factarum pyramidum vtraque eodem modo diuisa intelligatur: atq; hoc sēper fiat. Dico vt ABC basis ad basim DEF ita esse prismata oia, quę sunt in pyramide ABC ad prismata omnia, quæ in pyramide DEF multitudine æqualia. Quoniam enim BX quidem est æqualis XC, AL vero æqualis LC; erit XL ipsi AB parallela, & triangulum ABC triangulo LXC simile. Eadem ratione & triangulum DEF simile est triangulo RQF. Et quoniam BC quidem est dupla CX; EF vero dupla ipsius FQ, vt BC ad CX, ita erit EF ad FQ. & descripta sunt ab ipsis BC CX similia & similiter posita rectilinea ABC LXC; ab ipsis vero EF FQ similia & similiter posita rectilinea DEF RQF. est igitur vt BAC triangulum ad triangulum LXC, ita triangulum DEF ad RQF triangulum; & permutando vt triangulum ABC ad triangulum DEF, ita LXC triangulum ad triangulum RQF. sed vt LXC triangulum ad triangulum RQF, ita prisma cuius basis est triangulum LXC, oppositum autem ipsi OMN ad prisma cuius basis RQF triangulum, & oppositum ipsi STY. & vt igitur ABC triangulum ad triangulum DEF, ita prisma, cuius basis est triangulum LXC, oppositum autem ipsi OMN ad prisma, cuius basis RQF triangulum, & oppositum ipsi STY. Et quoniam duo prismata, quæ in pyramide ABCG inter se æqualia sunt, sed & quæ in pyramide DEFH prismata inter se sunt æqualia; erit vt prisma, cuius basis parallelogrammum KLXB, oppositum uero ipsi recta linea MO ad prisma cuius basis LXC triangulum, & oppositum ipsi OMN, ita prisma cuius basis parallelogrammum EPRQ & oppositum ipsi recta linea ST ad prisma cuius basis RQF triangulum, oppositum uero ipsi STY. quare cōponēdo vt prismata KBXLMO LXCMNO ad prisma LXCMNO, ita prismata PEQRST RQFSTY ad prisma RQFSTY. & permutando ut prismata KBXLOMN LXCOMN ad prismata PEQRST RQFSTY, ita prisma LXCMNO

2. sexti.

22. sexti.

32. quinti.

MNO ad priſma RQFSTY. Vt autem priſma LXCMNO ad priſma RQFSTY, ita oſtenſa eſt baſis LXC ad RQF baſim, & ABC baſis ad baſim DEF. ergo & ut triangulum ABC ad triãgulum DEF, ita quę in pyramide ABCG duo priſmata ad duo priſmata, quæ in pyramide DEFH. ſimiliter autẽ & ſi factas pyramides diuidamus eodem modo velut OMNG STYH, erit ut OMN baſis ad baſim STY, ita quæ in pyramide OMNG duo priſmata ad duo priſmata, quæ in pyramide STYH. ſed ut OMN baſis ad baſim STY, ita baſis ABC ad DEF baſim. & ut igitur ABC baſis ad baſim DEF, ita quę in pyramide ABCG duo priſmata ad duo priſmata quæ in pyramide DEFH; & quæ in pyramide OMNG duo priſmata ad duo priſmata, quę in pyramide STYH; & quattuor ad quattuor. eadem autem oſtendentur & in factis priſmatibus ex diuiſione pyramidum AKLO, & DPRS & omnium ſimpliciter multitudine æqualium.

LEMMA.

At vero vt LXC triangulum ad triangulum RQF, ita eſſe priſma, cuius baſis triangulum LXC, oppoſitum autem ipſi OMN ad priſma, cuius baſis RQF triangulum, & oppoſitum ipſi STY, hoc modo oſtendemus.

In eadẽ enim figura intelligãtur ab ipſis G H punctis perpendiculares ductæ ad ABC DEF triangulorũ plana, quę inter ſe æquales erunt; propterea quod pyramides ipſæ æquealtę ponuntur. Et quoniam duę rectæ lineæ GC, & perpendicularis à puncto G ducta ſecantur à parallelis planis ABC OMN, in eaſdem proportiones ſecabuntur. & ſecatur GC bifariam à plano OMN in puncto N. ergo & à puncto G ducta perpendicularis ad ABC planum bifariam ſecabitur à plano OMN. Eadẽ ratione & quæ à puncto H ducitur perpendicularis ad DEF planum à plano STY biſariam ſecabitur. & ſunt æquales perpendiculares, quę ab ipſis GH ducuntur ad plana ABC DEF. ergo & æquales quę à triangulis OMN STY ad ipſa ABC DEF perpendiculares ducuntur, æquealta igitur ſunt priſmata, quorum baſes triangula LXC RQF. oppoſita autem ipſis OMN STY. quare & ſolida parallelepipeda, quæ à dictis priſmatibus deſcribuntur æquealta, inter ſe ſunt ut baſes, & eorũ dimidia ut LXC baſis ad baſim RQF, ita inter ſe dicta priſmata erũt. quod demonſtrare oportebat. 15. quinti

F. C. COMMENTARIVS.

Sed ut LXC triangulum ad triangulum RQF, ita priſma cuius baſis eſt triangulum LXC, oppoſitum autem ipſi OMN ad priſma cuius baſis RQF triãgulum & oppoſitum ipſi STY] *Hoc ĕt cõſtare põt ex corollario, quod nos ad 32 vndecimi conſcripſimus.*

THEOREMA V. PROPOSITIO. V.

Pyramides, quæ eadem ſunt altitudine, & triangulares baſes habent, inter ſe ſunt vt baſes.

Sint enim eadem altitudine pyramides, quarum baſes quidem triãgula ABC DEF, uertices autem puncta G H. Dico ut ABC baſis ad baſim DEF, ſic eſſe pyramidem ABCG ad DEFH pyramidem. Si enim non ita ſit, erit ut ABC baſis ad baſim DEF, ſic ABCG pyramis, uel ad ſolidum minus pyramide DEFH, uel ad maius. Sit primum ad ſolidum minus, ſitq; Z: & diuidatur pyramis DEFH in duas pyramides æquales inter ſe, & ſimiles toti, & in duo priſmata æqualia. ſunt igitur duo priſmata dimidio totius pyramidis maiora. & rurſus pyramides ex diuiſione factæ ſimiliter diuidantur, atque hoc ſemper fiat, quo ad ſumantur quædam pyramides à pyrami

de DEFH,quæ ſint minores exceſſu,quo pyramis DEFH ſolidum Z ſuperat. Itaque ſumantur,& ſint exempli cauſſa pyramides DPRS STYH. erunt igitur reliquæ in



pyramide DEFH priſmata ſolido Z maiora. Diuidatur etiam ABCG pyramis in to-
Ex ante-cedenti. tidem partes ſimiliter pyramidi DEFH. ergo vt ABC baſis ad baſim DEF, ita quæ in pyramide ABCG priſmata ad priſmata quæ in pyramide DEFH; ſed vt ABC baſis ad baſim DEF,ita pyramis ABCG ad ſolidum Z. & ut igitur ABCG pyramis ad ſolidum Z,ita quæ in pyramide ABCG priſmata ad priſmata,quæ in pyramide DEFH:& permutando ut ABCG pyramis ad priſmata, quæ in ipſa ſunt, ita ſolidum Z ad priſmata, quę in pyramide DEFH. maior autem eſt pyramis ABCG priſmatibus,quæ in ipſa ſunt.ergo & ſolidum Z priſmatibus, quæ ſunt in pyramide DEFH eſt maius.ſed & minus,quod fieri non poteſt. Non igitur vt ABC baſis ad baſim DEF,ita eſt pyramis ABCG ad ſolidum aliquod minus pyramide DEFH. ſimiliter oſtendemus neque ut DEF baſis ad baſim ABC,ita eſſe pyramidem DEFH ad ſolidum aliquod pyramide ABCG minus. Dico igitur neque eſſe vt ABC baſis ad baſim DEF,ita ABCG pyramidem ad aliquod ſolidũ maius pyramide DEFH.ſi enim fieri poteſt,ſit ad maius,uidelicet ad ſolidum I.erit igitur conuertendo vt DEF baſis ad baſim ABC,ita ſolidum I ad ABCG pyramidem. Vt autem ſolidum I ad ABCG pyramidem, ita DEFH pyramis ad ſolidum aliquod minus pyramide ABCG, vt proxime oſtenſum fuit.& ut igitur DEF baſis ad baſim ABC,ita pyramis DEFH ad ſolidum aliquod pyramide ABCG minus. quod eſt abſurdum. non igitur ut ABC baſis ad baſim DEF,ita eſt ABCG pyramis ad ſolidum aliquod maius pyramide DEFH.oſtenſum autem eſt,neque ad minus. quare vt ABC baſis ad baſim DEF, ita eſt pyramis ABCG ad DEFH pyramidem. Pyramides igitur,quæ eadem ſunt altitudine,& triangulares baſes habent inter ſe ſunt vt baſes.quod demonſtrare oportebat.

THEOREMA VI. PROPOSITIO VI.

Pyramides,quæ eadem ſunt altitudinę, & multiangulas baſes habent,inter ſe ſunt, vt baſes.

Sint eadem altitudine pyramides, quæ multiangulas baſes habeant ABCDE FGHKL:uertices autem MN puncta.Dico vt ABCDE baſis ad baſim FGHKL, ita eſſe ABCDEM pyramidem ad pyramidem FGHKLM.Diuidatur enim baſis quidem ABCDE in triangula ABC ACD ADE; baſis uero FGHKL diuidatur in triangula FGH FHK FKL.et in uno quoque triangulo intelligantur pyramides eiuſdem altitudinis ac pyramides,quę à principio. Quoniam igitur eſt ut triangulum ABC ad triangu-

lum

lum ACD, ita ABCM pyramis ad pyramidē ACDM: & componendo ut ABCD trapeziū ad triangulum ACD, ita ABCDM pyramis ad pyramidē ACDM. ſed & ut ACD triangulum ad triangulum ADE, ita pyramis ACDM ad ADEM pyramidem. ergo ex æquali ut ABCD baſis ad baſim ADE, ita ABCDM pyramis ad pyramidem ADEM: & rurſus componendo ut ABCDE baſis ad baſim ADE, ita ABCDEM pyramis ad pyramidem ADEM. Eadem ratione & ut FGHKL baſis ad baſim FKL, ita & FGHKLN pyramis ad FKLN pyramidem. & quoniam duæ pyramides ſunt ADEM FKLN, quæ triangulares baſes habent & eadem ſunt altitudine; erit ut ADE baſis ad baſim FKL, ita ADEM pyramides ad pyramidem FKLN. Quòd cū ſit ut ABCDE baſis ad baſim ADE, ita ABCDEM pyramis ad pyramidē ADEM; ut aūt ADE baſis ad baſim FKL, ita ADEM pyramis ad pyramidē FKLN: erit ex æquali ut baſis ABCDE ad FKL baſim, ita ABCDEM pyramis ad pyramidem FKLN. ſed et ut FKL baſis ad baſim FGHKL, ita erat et FKLN pyramis ad pyramidem FGHKLN. quare rurſus ex æquali ut ABCDE baſis ad baſim FGHKL, ita eſt ABCDEM pyramis ad pyramidē FGHKLN. Pyramides igitur, quæ eadem ſunt altitudine, et multiangulas baſes habent inter ſe ſunt, ut baſes. quod oportebat demonſtrare.





Ex antecedente.

F. C. COMMENTARIVS.

Idem etiam demonſtrabitur, ſi baſes inæqualibus numero lateribus contineantur. Sint enim pyramides aequealtae ABCDL EFGHKM, ſitq; pyramidis ABCDL baſis quadrilaterum ABCD, & vertex L; pyramidis vero EFGHKM baſis ſit pentagonum EEGHK, & vertex L. Dico vt quadrilaterum ABCD ad pentagonum EFGHK, ita eſſe ABCDL pyramidem ad pyramidem EFGHKM. Iungantur AC EG EH. erit quadrilaterum ABCD diuiſum in duo triangula ABC ACD, & pentagonum diuiſum in tria triangula EFG EGH EHK. Itaque intelligentur ab vnoquoque triangulo pyramides aequealtę primis pyramidibus. Et quoniam eſt ut triangulum ABC ad triangulum ACD, ita pyramis ABCL ad pyramidem ACDL; erit componendo vt quadrilaterum ABCD ad triangulum ACD, ita pyramis ABCDL ad pyramidem ACDL. Eadem ratione demonſtrabimus in altera pyramide ut quadrilaterum EFGH ad triangulum EGH, ita eſſe pyramidem EFGHM ad pyramidem EGHM: vt autem triangulum EGH ad triangulum EHK, ita eſt pyramis EGHM ad pyramidem EHKM. quare ex æquali vt quadrilaterum EFGH ad triangulum EHK, ita eſt pyramis EFGHM ad piramidem EHKM: & rurſus componendo vt pentagonum EFGHK ad triangulum EHK, ita tota pyramis EFGHKM ad pyramidem EHKM: conuertendoq; vt triangulum EHK ad pentagonum EFGHK, ita pyramis EHKM ad totam pyramidem EFGHKM. Sed vt triangulum ACD ad triangulum EHK, ita eſt pyramis ACDL ad pyramidem EHKM. erat autem ut quadrilaterum ABCD ad triangulū ACD ita pyramis ABCDL ad pyramidem ACDL. Quare rurſus ex æquali vt quadrilaterum ABCD ad pentagonum EFGHK, ita erit pyramis ABCDL





Ex antecedente.

Ex antecedenti.

BCDL ad pyramidem EFGH KM. Et eodem modo in alijs demonſtrabitur, quotcunque lateribus baſes earum contineantur.

THEOREMA VII. PROPOSITIO. VII.

Omne priſma triangularem habens baſim diuiditur in tres pyramides æquales inter ſe, quę triangulares baſes habent.



Sit priſma cuius baſis quidem triangulum ABC, oppoſitũ autem ipſi DEF. Dico priſma ABCDEF diuidi in tres pyramides æquales inter ſe, quæ triangulares habent baſes. Iungantur enim BD EC CD. Et quoniam parallelogrammum eſt A
34 primi. BED, cuius diameter BD, erit ABD triangulum triangulo E BD ęquale. ergo pyramis cuius baſis triangulum ABD, ver-
5. huius. tex autem punctum C æqualis eſt pyramidi, cuius baſis E D B triangulum & vertex punctum C. Sed pyramis cuius baſis ED B triangulum & vertex punctum C, eadem eſt pyramidi, cuius baſis triangulum EBC, & vertex D punctum, ijſdem enim planis continentur. Ergo & pyramis cuius baſis triangulũ ABD, vertex autem punctũ C æqualis eſt pyramidi, cuius baſis EBC triangulum, & vertex pũctum D. Rurſus quoniam FCBE parallelogrammum eſt, cuius diameter CE, triangulum ECF triangulo CBE eſt ęquale. ergo & pyramis, cuius baſis BEC triangulum, vertex autem punctum D æqualis eſt pyramidi, cuius baſis triãgulum ECF, & vertex punctum D. Sed pyramis, cuius baſis quidem BCE triangulum, vertex autem punctum D oſtenſa eſt æqualis pyramidi, cuius baſis triãgulum ABD, & vertex C punctum. quare & pyramis cuius baſis triangulum CEF, & vertex punctum D, æqualis eſt pyramidi cuius baſis triangulum ABD, & vertex C punctum. Priſma igitur ABCDEF diuiditur in tres pyramides inter ſe ęquales, quæ triangulares baſes habent. Et quoniam pyramis, cuius baſis ABD triangulum, vertex autem punctum C, eadem eſt pyramidi, cuius baſis triangulum CAB, & vertex D punctum, ijſdem namque planis continentur: pyramis aũt, cuius baſis triangulum ABD, & vertex punctum C, tertia pars oſtenſa eſt priſmatis, cuius baſis ABC triangulum, & oppoſitum ipſi DEF. & pyramis igitur, cuius baſis triangulum ABC, vertex autem D punctum tertia pars eſt priſmatis eandem baſim habentis, videlicet ABC triangulum, & oppoſitum ipſi triangulum DEF.

COROLLARIVM.

Ex hoc manifeſtum eſt omnem pyramidem tertiam partem eſſe priſmatis baſim habentis eandem, & altitudinem æqualẽ; quoniam etiam ſi baſis priſmatis aliam quandam figuram rectilineam obtineat, & oppoſitam ipſi eandẽ, diuiditur in priſmata, quę triangulares baſes habent, & quę ipſis opponuntur.

F. C. COMMENTARIVS.

Ex hoc corollario, & antecedentibus ſequitur priſmata omnia, quę eadem ſunt altitudine inter ſe eſſe, vt baſes: ſunt enim ea pyramidum eiuſdẽ altitudinis tripla.

Sed & hęc uera ſunt, quę nos demonſtrauimus in libro de centro grauitatis ſolidorum propoſitione. XX. & XXI.

Priſmata omnia, & pyramides, quę in eiſdem, vel ęqualibus baſibus conſtituuntur eam inter ſe proportionem habent, quam altitudines.

Et insuper prismata omnia & pyramides inter se proportionem habent compositam ex proportione basium & proportione altitudinum.

THEOREMA VIII. PROPOSITIO VIII.

Similes pyramides, quę triangulares bases habent in tripla sũt proportione homologorum laterum.

Sint similes, & similiter positæ pyramides, quarum bases quidem triangula ABC DEF, vertices autem GH puncta. Dico ABCG pyramidẽ ad pyramidem DEFH triplam proportionem habere eius, quam BC habet ad EF. compleãtur enim BGML EHPO solida parallelepipeda. Et quoniam pyramis AB CG similis est pyramidi DEFH, erit angulus ABC angulo DEF æqualis, angulusq; GBC æqualis angulo HEF, & angulus ABG angulo DEH. atque est vt AB ad DE, ita BC ad EF, & BG ad EH. Quoniam igitur est vt AB ad DE, ita BC ad EF, & circum æquales angulos latera sunt proportionalia, parallelogrammum BM parallelogrammo EP simile erit. Eadem ratione & parallelogrammum BN simile est parallelogrammo ER, & parallelogrammum BK ipsi EX parallelogrãmo. Tria igitur parallelogramma BM KB BN, tribus EP EX ER sunt similia. Sed tria quidem MB BK BN tribus oppositis æqualia, & similia sunt, tria vero EP EX ER tribus oppositis æqualia, & similia. quare solida BGML EHPO similibus planis & numero æqualibus continentur; ac propterea simile est BGML solidum solido EHPO. Similia autem solida parallelepipeda in tripla sunt proportione homologorum laterum. ergo solidum BGML ad solidum EHPO triplã habet proportionem eius, quam habet latus homologum BC ad EF homologum latus. sed vt BGML solidum ad solidum EHPO, ita ABCG pyramis ad pyramidem DEFH; pyramis enim sexta pars est ipsius solidi, cum prisma quod est dimidium solidi parallelepipedi, sit pyramidis triplum. quare & pyramis ABCG ad pyramidem DEFH triplam proportionem habebit eius, quam BC habet ad EF.

9. diffi. Vndecimi. 1. diffi. sexti.

14. Vndecimi.

COROLLARIVM.

Ex hoc perspicuum est, & similes pyramides, quæ multiangulas bases habent inter se esse in tripla proportione homologorum laterum. ipsis enim diuisis in pyramides triangulares bases habẽtes, quoniam & similia polygona, quæ sunt in basibus in similia triangula diuiduntur, & numero æqualia, & homologa totis; erit vt vna pyramis in altera pyramide triangularem habens basim ad pyramidem in altera triangularem basim habentem, ita & omnes pyramides in pyramide altera triãgulares habentes bases ad omnes in altera triangulares bases habentes; hoc est ita pyramis ipsa multiangulam habens basim ad pyramidem, quæ multiangulam basim habet. Sed pyramis triangularem habens basim ad py-

ramidem

ramidem, quæ triangularem baſim habet eſt in tripla proportione homologorum laterum. & pyramis igitur multiangulam habes baſim ad pyramidem ſimilem baſim habentem, triplam proportionem habebit eius, quam latus homologam habet ad homologum latus.

F. C. COMMENTARIVS.



Sint enim pyramides ſimiles & ſimiliter poſitae, quae pro baſibus pentagona habeant ABCDEM FGHKLN, ſitq; pyramidis quidem ABCDEM baſis pentagonum ABCDE, & uertex punctum M, pyramidis uero FGHKLN baſis pentagonum FGHKL, & uertex N punctum, & ſit latus AB homologum lateri FG. Dico pyramidẽ ABCDEM ad pyramidem FGHKLN triplam proportionem habere eius, quam habet AB ad FG. Iungantur enim AC CE FH IL. & quoniam polygona ſimilia in ſimilia triangula diuiduntur, numeroq; aequalia, & homologa totis; erit triangulum ABC ſimile triangulo FGH, triangulumq; ACE triangulo FHL ſimile, & triangulum CDE triangulo HKL. eſt autem ob pyramidum ſimilitudinem triangulum AMB ſimile triangulo FNG. quare ut MA ad AB, ita NF ad FG, ut autem BA ad AC, ita GF ad FH. ex aequali igitur ut MA ad AC, ita LF ad FH. non aliter demonſtrabitur ut MC ad CA, ita NH ad HF. ergo triangulum MAC ſimile eſt triangulo NFH. eſt autem & triangulum MBC ſimle triangulo NGH ob ſimilitudinem pyramidum. pyramis igitur, cuius baſis triangulum ABC & uertex M punctum, ſimilis eſt pyramidi, cuius baſis triangulum FGH, & uertex punctum N: quippe quod ſimilibus triangulis contineantur. Eadem ratione demonſtrabitur pyramis ACEM ſimilis pyramidi FHLN, & pyramis CDEM pyramidi HKLN. ſed pyramis quidem ABCM ad pyramidem FGHN triplam habet proportionem eius, quam habet AB ad FG, & pyramis ACEM ad pyramidem FHLN triplam proportionem habet eius, quam AE habet ad FL, hoc eſt quam AB habet ad FG, eſt enim ut BA ad AE, ita GF ad FL, & permutãdo ut BA ad GF, ita AE ad FL. pyramis autem CDEM ad pyramidem HKLN triplam proportionem habet eius, quam CD ad HK, hoc eſt quam AB ad FG. Quoniã enim ut AB ad BC, ita eſt FG ad GH, ut autem BC ad CD, ita GH ad HK; erit ex aequali ut AB ad CD, ita FG ad HK, & permutando ut AB ad FG, ita CD ad HK. Vt igitur una antecedentium ad unam conſequentium, hoc eſt pyramis ABCM ad pyramidem FGHN, ita omnes antecedentes ad omnes conſequentes, hoc eſt ita tota pyramis ABCDEM ad totam pyramidem FGHKLN. ergo, & pyramis ABCDEM ad pyramidem FGHKLN triplam habebit proportionem eius, quam habet AB ad FG. quod demonſtrare oportebat.

ex. xxi.

9. diff. und.

COROLLARIVM.

Ex his colligitur pyramides ſimiles, quæ multiangulas baſes habent diuidi in pyramides triangulares baſes habentes ſimiles, & numero æquales & homologas totis.

Sed

Sed quod Euclides demonſtrauit in pyramidibus ſimilibus, nos etiam in ſimilibus priſmatibus demouſtrare aggrediemur. & quamquam in antecedente libro à nobis demonſtratũ ſit priſmata ſimilia, quae triangulares baſes habent in tripla eſſe proportione homologorum laterum, tamen hoc loco placuit illud etiam aliter demonſtrare in hunc modum.

THEOREMA. I.

Priſmata ſimilia, quæ triangulares baſes habẽt in pyramides ſimiles, numeroq; æquales diuiduntur, & priſma ad priſma triplam habet proportionem eius, quam latus homologum habet ad homologum latus.

Sint priſmata ſimilia, & ſimiliter poſita AE GM & priſmatis quidem AE baſis ſit triangulum ABC, & quod ipſi opponitur triangulum DEF: priſmatis vero GM baſis ſit GHK triangulum & oppoſitum ipſi LMN: ſitq; latus AB lateri GH homologum. Dico priſmata AE GM diuidi in pyramides ſimiles, numeroq; aequales, & priſma AE ad priſma GM triplã habere proportionem eius, quam habet AB ad GH. Iungantur enim BD EC CD HL MK KL. erit ex iam demonſtratis priſma AE diuiſum in tres pyramides æquales inter ſe, & priſma GM ſimiliter diuiſum in totidem pyramides aequales, quae pyramidibus priſmatis AE ſimiles erunt. Quoniam enim ob priſmatum ſimilitudinem parallelogrammum ABED ſimile eſt parallelogrammo GHML, erit vt DA ad AB, ita LG ad GH: atque eſt angulus DAB æqualis angulo LGH. triangulum igitur DAB triangulo LHG eſt ſimile. Eadem ratione & triangulum DEB triangulo LMH, & alia triangula, quae ſunt parallelogrammorum dimidia alijs triangulis, quibus reſpondent ſimilia demonſtrabuntur. Et quoniam vt DC ad CA, ita eſt LK ad KG; vt autem AC ad CB, ita GK ad KH: erit ex aequali ut DC ad CB, ita LK ad LH. Et ſimiliter demonſtrabitur vt DB ad BC, ita eſſe LH ad HK. quare triangulum DBC ſimile eſt triangulo LHK. Quòd cum triangulum DAB ſimile ſit triangulo LGH, triangulumq; DBC ſimile triangulo LHK, & triangulum DAC ipſi LGK; erit pyramis, cuius baſis triangulum ABC, vertex autem D punctum ſimilis pyramidi, cuius baſis triangulum GHK, & uertex punctum L. Eandem ob cauſſam erit pyramis cuius baſis triangulum EBC, & vertex D punctum, ſimilis pyramidi cuius baſis MHK triangulum, uertex autem punctum L, & adhuc pyramis, cuius baſis triangulum ECF, & uertex punctum D ſimilis pyramidi, cuius baſis triangulum MKN, & uertex L punctum. Quoniam igitur pyramis ABCD ſimilis eſt pyramidi GHKL, ſimiles autem pyramides ſunt in tripla proportione homologorum laterum; habebit pyramis ABCD ad pyramidem GHKL triplam proportionem eius, quam habet AB ad GH. Pyramis autem EBCD ad pyramidem MHKL triplam habet proportionem eius, quam BC habet ad HK, hoc eſt quam AB habet ad GH; eſt enim vt AB ad BC, ita GH ad HK: & permutando vt AB ad GH, ita BC ad HK. & ſimiliter pyramis ECFD ad pyramidem MKNL proportionem habet triplam eius, quam EF habet ad MN, hoc eſt BC ad HK, hoc eſt AB ad GH. Vt igitur vnum antecedentium ad vnum conſequentium, ita omnia antecedentia ad omnia conſequentia. Quare vt pyramis ABCD ad pyramidem GHKL, ita totum priſma AE ad totum priſma GN. ſed pyramis ABCD ad pyramidem GHKL triplam habet proportionem eius, quam habet AB ad GH. Ergo & priſma AE ad priſma GM triplam proportionem habebit eius, quam AB ad GH.



9. diff. undecimi.

6. ſexti.

9. diff. undecimi.

11. quinti.

ALITER. Quoniã igitur pyramis ABCD ſimilis eſt pyramidi GHKL; ſimiles autem pyramides ſunt in tripla proportione homologorum laterum: habebit pyramis ABCD ad pyramidẽ GHKL triplam proportionẽ eius, quam AB habet ad GH. ſed vt pyramis ABCD ad pyramidem GHKL, ita priſma AE ad priſma GM, ſunt enim priſmata pyramidum tripla. ergo & priſma AE

ad prisma GM triplam proportionem habebit eius, quam habet AE ad GH. Prismata igitur similia, quae triangulares bases habent, diuiduntur in pyramides similes, numeroq; aequales, & prisma ad prisma triplam habet proportionem eius, quam latus homologum habet ad homologum latus, quod demonstrare oportebat.

THEOREMA. II.

Prismata similia, quę multiāgulas habent bases in similia prismata triangulares bases habentia diuiduntur, numeroq; æqualia, & homologa totis: & prisma ad prisma triplam proportionem habet eius, quam latus homologum habet ad homologum latus.



Sint duo prismata similia, & similiter posita AK MV, & prismatis quidem AK basis sit pentagonum ABCDE, & ipsi oppositum FGHKL; prismatis uero MV basis sit pentagonum MNOPQ, & oppositum ipsi RSTVX: sitq; latus AB lateri MV homologum. Dico prismata AK MV diuidi in prismata, quae triangulares bases habent, similia & numero aequalia, & homologa totis; & prisma AK ad prisma MV triplam proportionem habere eius, quam habet AB ad MN. Iungantur EB EC LG LH QN QO XS XT. pētagonū igitur ABCDE diuisum erit in tria triangula ABE EBC ECD; pentagonumq; FGHKL diuisum in tria triangula FGL LGH LHK: & similiter pentagonum MNOPQ diuisum erit in tria triangula MNQ QNO QOP: & pentagonum RSTVX in totidem triangula RSX XST XTV. Intelligatur unumquodque prismatū AK MV diuisū in tria prismata triangulares bases habentia ductis planis per LG GB, perq; LH HC, & per XS SN, & per XT TO. Quoniam igitur similia polygona in similia triangula diuiduntur, numeroq; aequalia, & homologa totis; erunt triangula ABE FGL similia triangulis MNQ RSX, & triangula EBC LGH triangulis QNO XST, triangulaq; ECD LHK ipsis QOP XTV similia. Et quōm prisma AK ponitur simile prismati MV, parallelogrāmū ABGF simile erit parallelogrāmo MNSR, & parallelogrāmū AELF simile ipsi MQXR. quare vt LE ad EA, ita XQ ad QM: vt aūt AE ad EB, ita MQ ad QN. ex æquali igitur ut LE ad EB, ita XQ ad QN; ideoq; vt BG ad GL, ita NS ad SX, angulus autem LEB est aequalis angulo XQN ob similitudinē prismatum. si enim similibus existentibus prismatibus AK MV, angulus LEB non est aequalis angulo XQN, alter eorum maior erit. sit maior XQN, & ad rectam lineam BE, & ad punctum in ipsa E angulo NQX constituatur aequalis angulus BEY, vt recta linea EY terminetur à plano pentagoni FGHKB in puncto Y; & iungantur FY YK. erit pentagonum FGHKY simile pentagono RSTVX. sed & pentagonum FGHKL ponitur eidem simile. pentagonum igitur FGHKL simile est pentagono FGHKY. quare angulus FLK aequalis est angulo FYK. sed & maior. quod fieri nō potest. Non igitur similibus existentibus prismatibus angulus LEE inæqualis est angulo XQN. quare necessario est aequalis; & ob id angulus EBG aequalis est angulo QNS. ergo & qui ipsis opponuntur LGB GLE angulis XSN SXQ sunt aequales. parallelogrammum igitur BELG simile est parallelogrammo NQXS. Eadem ratione demonstrabitur parallelogrammum LECH simile parallelogrammo XQOT. ergo prisma AL, cuius basis triangulum ABE, & ipsi oppositum FGL simile est prismati MX, cuius basis triangulum MNQ, & oppositum ipsi RSX; similibus enim planis continentur. est autem ob prismatum similitudinem, & parallelogrammum BCHG simile parallelogrammo NOTS, & parallelogrammum EDKL simile ipsi QPKX. ergo & prisma BH, cuius basis triangulum EBC, & ipsi oppositum LGH est simile prismati NT, cuius basis triangulum QNO, et ipsi oppositum XST, & denique prisma CL cuius basis triangulum ECD, & oppositum ipsi LSK, simile est prismati QX, cuius basis triangulum QOP, & quod ipsi opponitur XTV. similia autem,

10. sexti.

9. diffi. undecimi.

2. diffi. sexti.

14. primi.

prismata

priſmata, quæ triangulares baſes habent ſunt in tripla proportione homologorũ laterũ, quod nos & ad 34 propoſitionem antecedentis libri, & proxime aliter demonſtrauimus. priſma igitur AL ad priſma MX triplam proportionem habet eius, quam habet AB ad MN, & priſma BH ad priſma NΓ triplam habet proportionem eius, quam BC habet ad NO, hoc eſt AB ad MN. priſma autem CL ad priſma OX triplam proportionem habet eius, quàm habet CD ad OP, hoc eſt AB ad MN. ut ſupra demonſtrauimus. homologa enim latera omnia inter ſe eandem habent proportionem. Quare vt vnum antecedentium ad vnum conſequentium, ita omnia antecedẽtia ad omnia cõſequentia. Vt igitur priſma AL ad priſma MX, ita omnia priſmata ad omnia priſmata, hoc eſt totum priſma AK ad totum priſma MV. priſma autem AL ad priſma MX triplam habet proportionem eius, quam habet AB ad MN. ergo & priſma AK ad priſma MV triplam proportionem habebit eius, quam AB ad MN. Similia igitur priſmata, quæ multiangulas habent baſes in ſimilia priſmata triangulares baſes habentia diuidũtur, numeroq; æqualia, & homologa totis; & priſmo ad priſma triplam proportionem habet eius, quam habet latus homologum ad homologum latus. quod oportebat demonſtrare.

THEOREMA IX. PROPOSITIO IX.

Æqualium pyramidum, & triangulares baſes habentium baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent: & quarum pyramidum triangulares baſes habentium baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent, illæ ſunt æquales.



Sint enim pyramides æquales, quæ triangulares baſes habeant ABC DEF, vertices vero GH puncta. Dico pyramidum ABCG DEFH baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondere, & vt ABC baſis ad baſim DEF, ita eſſe pyramidis DEFH altitudinem ad altitudinem pyramidis ABCG. Cõpleantur enim BGML EHPO ſolida parallelepipeda. Et quoniam pyramis ABCG eſt æqualis pyramidi DEFH, atque eſt pyramidis quidem ABCG ſextuplum BGML ſolidum, pyramidis vero DEFH ſextuplum ſolidum EHPO; erit ſolidum BGML ſolido EHPO æquale. æqualium autem ſolidorum parallelepipedorum baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent. eſt igitur vt BM baſis ad baſim EP, ita EHPO ſolidi altitudo ad altitudinem ſolidi BGML. Sed vt BM baſis ad baſim EP, ita ABC triangulum ad triangulum DEF. ergo & vt ABC triangulum ad triangulum DEF, ita ſolidi EHPO altitudo ad altitudinem ſolidi BGML. Sed ſolidi quidem EHPO altitudo eadem eſt altitudini pyramidis DEFH; ſolidi vero BGML altitudo eadem eſt altitudini pyramidis ABCG. eſt igitur vt ABC baſis ad baſim DEF, ita pyramidis DEFH altitudo ad altitudinem pyramidis ABCG. quare pyramidum ABCG DEFH baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent. Sed pyramidum ABCG DEFH baſes ex contraria parte reſpondeant altitudinibus, ſitq; vt ABC baſis ad baſim DEF, ita pyramidis DEFH altitudo ad altitudinem pyramidis ABCG. Dico ABCG pyramidem pyramidi DEFH æqualem eſſe. iiſdem enim conſtructis, quoniam vt ABC baſis ad baſim DEF, ita eſt DEFH pyramidis altitudo ad altitudinem pyramidis ABCG; vt autem ABC baſis ad baſim DEF, ita BM parallelogrãmũ ad parallelogrãmũ EP: erit & vt parallelogrãmũ BM ad EP parallelogrãmũ, ita pyramidis DEFG altitudo ad altitudinẽ pyra-

15. quint. 14. undecimi. 15. quinti. 15. quinti.

midis ABCG. Sed pyramidis quidē DEFH altitudo eadē eſt altitudini ſolidi parallelepipedi EH: O; pyramidis vero ABCG altitudo eadem eſt altitudini ſolidi parallelepipedi BGML. eſt igitur vt BM baſis ad baſim EP, ita EHPO ſolidi parallelepipedi altitudo ad altitudinem ſolidi parallelepipedi BGML. Quorum autem ſolidorum parallelepipedorum baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent, ea ſunt æqualia. ſolidum igitur parallelepipedum BGML æquale eſt ſolido parallelepipedo EHPO atque eſt ſolidi quidem BGML ſexta pars pyramis ABCG; ſolidi vero EHPO itidem ſexta pars pyramis DEFH. ergo pyramis ABCG pyramidi DEFK eſt æqualis. Aequalium igitur pyramidum, & triangulares baſes habentium, baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent, & quarum pyramidum triangulares baſes habentium baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent illæ ſunt æquales. quod oportebat demonſtrare.



F. C. COMMENTARIVS.

Sed & in pyramidibus, quae multiangulas baſes habent idem demonſtrabitur hoc modo.

Aequalium pyramidum & multiangulas baſes habentium, baſes ex cōtraria parte altitudinibus reſpondent: & quarum pyramidum multiangulas baſes habentiū baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent, illæ ſunt æquales.

Sint pyramides aequales ABCDL EFGHKM, & pyramidis quidem ABCDL baſis ſit quadrilaterum ABCD, & vertex punctum L; pyramidis vero EFGHKM ſit baſis pentagonum EFGHK, & vertex M. Dico baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondere: hoc eſt quadrilaterum ABCD ad pentagonum EFGHK, ita eſſe vt pyramidis EFGHKM altitudo ad altitudinē pyramidis ABCDL. Fiat enim ex xxv. ſexti triangulum in quo N aequale quadrilatero ABCD: & rurſus fiat aliud triangulum in quo O aequale pentagono EFGHK, et à triangulo N erigatur pyramis æquealta pyramidi ABCDL: à triangulo autem O erigatur alia pyramis aequealta pyramidi EFGHKM. erit igitur pyramis N aequalis pyramidi ABCDL: ſunt enim in baſibus aequalibus, & æquelem habent altitu

6. huius.



dem: & simili ratione pyramis O aequalis erit pyramidi EFGHKM. ergo pyramis N pyramidi O est aequalis. aequalium autem pyramidum, & triangulares bases habentium, bases ex contraria parte altitudinibus respondent. Vt igitur triangulum N ad triangulum O, ita pyramidis O altitudo ad altitudinem pyramidis N. Sed vt triangulum N ad O triangulum, ita quadrilaterum ABCD ad pentagonum EFGHK, vtrumque enim vtrique est aequale. ergo vt quadrilaterum ABCD ad pentagonum EFGHK, ita pyramidis O altitudo ad altitudinem pyramidis N; hoc est altitudo pyramidis EFGHKM ad pyramidis ABCDL altitudinem. Sed ijsdem stantibus sit ut quadrilaterum ABCD ad pentagonum EFGHK, ita pyramis EFGHKM altitudo ad altitudinem pyramidis ABCDL. Dico pyramidem ABCDL pyramidi EFGHKM aequalem esse. est enim ut quadrilaterum ABCD ad pentagonum EFGHK, ita triangulum N ad O triangulum. quare vt triangulum N ad triangulum O, ita pyramidis EFGHKM altitudo ad altitudinem pyramidis ABCDL, hoc est ita pyramidis O altitudo ad altitudinem pyramidis N. quarum autem pyramidum triangulares bases habentium, bases ex contraria parte altitudinibus respondent, illae sunt aequales. aequalis igitur est pyramis N pyramidi O; ac propterea pyramis ABCDL pyramidi EFGHKM est aequalis. Aequalium igitur pyramidum & multiangulas bases habentium, & reliqua. quod demonstrare oportebat.

COROLLARIVM.

Ex prædictis colligitur prismatum omnium æqualium bases ex contraria parte altitudinibus respondere: & quorum prismatum bases ex contraria parte altitudinibus respondent, ea esse æqualia; prismata enim in eisdem basibus constituta, & eadem altitudine sunt pyramidum tripla.

THEOREMA X. PROPOSITIO. X.

Omnis conus tertia pars est cylindri, qui eandem basim habet & altitudinem æqualem.



Habeat enim conus eandem basim, quam cylindrus, videlicet circulum ABCD, & altitudinem æqualem. Dico conum tertiam partem esse cylindri, hoc est cylindrum coni triplum esse. Si enim cylindrus nõ sit triplus coni, vel maior erit, quàm triplus, uel minor. Sit primũ maior quàm triplus; & describatur in ABCD circulo quadratum ABCD. ergo quadratum ABCD maius est, quàm dimidium A B C D circuli. & à quadrato ABCD erigatur prisma æquealtũ cylindro, quod quidem prisma maius erit, quàm cylindri dimidium; quoniam si circa circulum ABCD quadratum describatur, erit inscriptum quadratum dimidium circumscripti: & sunt ab eisdem basibus erecta solida parallelepipeda æquealta, nimirum prismata ipsa. quare prismata inter se sunt vt bases, & prisma igitur erectum à quadrato A B C D dimidium est prismatis erecti à quadrato quod circa circulũ ABCD describitur, atq; est cylindrus minor prismate erecto à quadrato quod describitur circa circulũ ABCD. prisma igitur erectũ à quadrato ABCD æquealtũ cylindro dimidio cylindri est maius. secentur circũferentiæ AB BC CD DA bifariã in punctis E F G H; & AE EB BF FC CG GD DH HA iungantur. Vnũquodq; igitur triangulorũ AEB BFC CGD DHA maius est dimidio portionis circuli ABCD, in qua cõsistit, vt superius demonstratũ est. erigantur ab vnoquoq; triangulorũ AEB BFC CGD DHA prismata æquealta cylindro. ergo & vnumquodque erectorum prismatum maius est dimidio portionis cylindri quæ ad ipsum est, quoniam si per puncta E F G H parallelę ipsis AB BC CD DA ducãtur, & compleãtur in ipsis AB BC CD DA parallelogramma: à quibus solida parallele-

Ex coroll. 7. huius.

parallelepipeda æquealta cylindro erigantur: erunt vniuſcuiuſque erectorum dimidia priſmata ea, quæ ſunt in triangulis AEB BFC CGD DHA. & ſunt cylindri portiones erectis ſolidis parallelepipedis minores. ergo & priſmata quæ in triangulis AEB BFC CGD DHA maiora ſunt dimidio portionum cylindri, qui ad ipſa ſunt. Itaque reliquas circumferentias ſecantes bifariam, iungentesq; rectas lineas, & ab vnoquoque triangulorum erigentes priſmata æquealta cylindro, & hoc ſemper facientes quoad tandem relinquantur quædam portiones cylindri, quæ ſint minores exceſſu quo cylindrus ipſius coni triplum ſuperat. reliquantur iam & ſint AE EB BF FC CG GD DH HA. reliquum igitur priſma, cuius baſis quidem polygonū AEBFCGDH, altitudo autem eadem, quę cylindri, maius eſt, quàm triplum coni. Sed priſma cuius baſis AEBFCGDH polygonum, & altitudo eadem, quæ cylindri triplum eſt pyramidis, cuius baſis polygonum AEBFCGDH, uertex autem idem, qui coni. & pyramis igitur, cuius baſis polygonum AEBFCGDH, uertex autem idē qui coni, maior eſt cono, qui baſim habet ABCD circulum. Sed & minor; ab ipſo enim comprehenditur, quod fieri non poteſt. Non igitur cylindrus maior erit, quàm triplus coni. Dico inſuper neq; cylindrum minorem eſſe, quàm triplum coni, ſi enim fieri poteſt, ſit cylindrus minor, quàm triplus coni. erit conuertendo conus maior, quàm tertia pars cylindri. Deſcribatur in ABCD circulo quadratum ABCD, ergo quadratum ABCD maius eſt quā dimidiū ABCD circuli; & à quadrato ABCD erigatur pyramis, uerticē habēs eundē quē conus. pyramis igitur erecta maior eſt quàm coni dimidium: quoniam, vt ante demonſtrauimus, ſi circa circulum quadratum deſcribatur, erit quadratum ABCD dimidium eius, quod circa circulum deſcriptum eſt: & ſi à quadratis erigantur ſolida parallelepipeda æquealta cono, quæ & priſmata appellantur, erit quod à quadrato ABCD erigitur dimidium eius, quod erectum eſt à quadrato circa circulum deſcripto, etenim inter ſe ſunt vt baſes. quare & tertiæ partes ipſarum. pyramis igitur, cuius baſis quadratum ABCD, dimidia eſt eius pyramidis, quæ à quadrato circa circulum deſcripto erigitur. Sed pyramis erecta à quadrato deſcripto circa circulum, maior eſt cono, ipſum namque comprehendit. ergo pyramis cuius baſis ABCD quadratum, vertex autem idē qui coni, maior eſt, quàm coni dimidium. ſecentur circumferentię AB BC CD DA bifariā in punctis EFGH. & iungātur AE EB BF FC CG GD DH HA. & vnum quodque igitur triangulorum AEB BFC CGD DHA maius eſt, quàm dimidium portionis circuli ABCD, in qua conſiſtit. erigantur ab vnoquoque triangulorum AEB BFC CGD DHA pyramides verticem habentes eundem, quem conus. ergo & vnaquaque pyramidum eodem modo erectarum, maior eſt, quàm dimidium coni portionis, quæ eſt ad ipſam. Itaque reliquas circumferentias ſecantes bifariam, iungentesq; rectas lineas, & ab vnoquoque triangulorum erigentes pyramidem uerticem habentem eundem, quem conus, & hoc ſemper facientes, relinquemus tandē quaſdam coni portiones, quę maiores erunt exceſſu, quo conus tertiam cylindri partem ſuperat. Relinquantur & ſint, quę in ipſis AE EB BF FC CG GD DH HA. reliqua igitur pyramis cuius baſis polygonum AEBFCGH, & uertex idem qui coni, maior eſt, quam tertia cylindri pars. ſed pyramis cuius baſis polygonum AEBFCDH, uertex autem idem qui coni, tertia pars eſt priſmatis, cuius baſis polygonū AEBFCDH, altitudo autem eadem quę cylindri. priſma igitur, cuius baſis AEBFCGH polygonum, & altitudo eadem, quę cylindri, maius eſt cylindro, cuius baſis

eſt

Ex 1. decimi.

Ex corol 7. huius.



5. quinti.



eſt circulus ABCD. ſed & minus, ab ipſo enim comprehenditur, quod fieri non poteſt. Non igitur cylindrus minor eſt, quàm triplus coni. oſtenſum autem eſt neque maiorem eſſe, quàm triplum. ergo cylindrus coni triplus ſit neceſſe eſt; ac propterea conus eſt tertia pars cylindri. Omnis igitur conus tertia pars eſt cylindri, eādē, quam ipſe baſim habentis, & altitudinem æqualem. quod demonſtrare oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

Eodem modo illud etiam demonſtrabitur in conis & cylindris ſcalenis.

COROLLARIVM.

Ex quibus conſtat omnem conum ſiue rectum, ſiue ſcalenum tertiam partem eſſe cylindri ſiue recti ſiue ſcaleni, qui eandem baſim habet, & æqualem altitudinem.

THEOREMA XI. PROPOSITIO XI.

Coni & cylindri, qui eandem habent altitudinem inter ſe ſunt vt baſes.



Sint eadem altitudine coni, & cylindri, quorum baſes circuli ABCD EFGH axes autem KL, MN, & diametri baſium AC EG. Dico vt ABCD circulus ad circulum EFGH, ita eſſe conum AL ad EN conum. ſi enim non ita ſit; erit vt ABCD circulus ad circulum EFGH, ita conus AL ad aliquod ſolidū minus cono EN, vel ad maius, ſit primū ad minus, quod ſit X, & quo minus eſt ſolidum X cono EN, ei æquale ſit I ſolidum. conus igitur EN, ipſis ſolidis X I eſt æqualis. Deſcribatur in EFGH circulo quadratū EFGH, ergo quadratum maius eſt, quàm dimidium circuli, erigatur à quadrato EFGH pyramis æqualta cono. pyramis igitur erecta maior eſt, quàm coni dimidium; nam ſi circa circulum quadratum deſcribamus, & ab ipſo erigamus pyramidem æqualtam cono, erit inſcripta pyramis pyramidis circumſcriptę dimidia; etenim inter ſe ſunt vt baſes: conus autem circumſcripta pyramide eſt minor. ergo pyramis, cuius baſis quadratum EFGH, uertex autem





autem idem qui coni, maior eſt quàm coni di midium. ſecentur circumferentiæ EF. FG. GH HE bifariam in punctis OPRS; & OE EP PF FR RG GS SH iungantur. Vnumquodque igitur triangulorum HOE EPF FRG GSH maius eſt, quàm dimidiũ porrionis circuli, in qua conſiſtit. erigatur ab vnoquoque triangulorum HOE EPF FEG GSH pyramis æquealta cono. ergo & vnaquæque erectarum pyramidum maior eſt, quàm dimidium portionis coni, quæ eſt ad ipſam. Itaque reliquas circumferentias ſecantes bifariam; & iũgentes rectas lineas, & ab vnoquoque triãgulorum erigentes pyramides æquealtas cono,



atque hoc ſemper facientes, relinquemus tandem aliquas portiones coni, quæ ſolido I minores erunt. relinquantur & ſint quę in ipſis HO OE EP PF FR RG GS SH. reliqua igitur pyramis, cuius baſis polygonũ HOEPFRGS, altitudo autẽ eadẽ, quę coni, maior eſt ſolido X. Deſcribatur in circulo ABCD polygono HOEPFRGS ſimile & ſimiliter poſitum polygonum DTAYBQCV, & ab ipſo erigatur pyramis æquealta cono AL. Quoniam igitur eſt vt quadratum ex AC ad quadratum ex EG ita DTAYBQCV polygonum ad polygonum HOEPFRGS; vt autem quadratum ex AC ad quadratũ ex EG, ita ABCD circulus ad circulũ EFGH: erit vt ABCD circulus ad circulum EFGH, ita polygonum DTAYBQCV ad polygonum HOEPFRGS. ſed ut ABCD circulus ad circulum EFGH, ita conus AL ad X ſolidum: & vt polygonũ DTAYBQCV ad polygonũ HOEPFRGS, ita pyramis cuius baſis DTAYBQCV polygonũ, uertex autem punctum L ad pyramidem, cuius baſis polygonum HOEPFRGS, & uertex punctum N. Vt igitur conus AL ad X ſolidum, ita pyramis, cuius baſis polygonum DTAYBQCV, & vertex punctum L ad pyramidem, cuius baſis polygonum HOEPFRGS, & uertex N punctum. quare permutando vt conus AL ad pyramidem, quæ in ipſo eſt, ita ſolidum X ad pyramidẽ, quę in cono EN. conus autem AL maior eſt pyramide, quæ in ipſo. maius igitur eſt ſolidum X pyramide, quæ in cono EN. ſed & minus, quod fieri non poteſt. Non igitur vt ABCD circulus ad circulum EFGH, ita eſt AL conus ad ſolidum aliquod minus cono EN. Similiter demonſtrabitur neque vt EFGH circulus ad circulum ABCD, ita eſſe conum EN ad aliquod ſolidum minus cono AL. Dico præterea neque eſſe vt ABCD circulus ad circulum EFGH, ita AL conum ad aliquod ſolidum maius cono EN. Si enim fieri poteſt, ſit ad ſolidum maius, quod ſit Z. ergo conuertendo vt EFGH circulus ad circulum ABCD, ita erit ſolidum Z ad AL conum. ſed ut ſolidum Z ad AL conum, ita conus EN ad aliquod ſolidum minus cono AL. & ut igitur EFGH circulus ad circulũ ABCD, ita conus EN ad aliquod ſolidum

minus

v. huius.

2. huius.

minus cono AL, quod fieri non posse ostensum est. Non igitur vt ABCD circulus ad circulum EFGH, ita conus AL ad aliquod solidum maius cono EN. ostensum autem est neque esse ad minus. ergo vt ABCD circulus ad circulum EFGH, ita est conus AL ad EN conum. sed vt conus ad conum, ita est cylindrus ad cylindrum, est enim vterque vtriusque triplus. & vt igitur ABCD circulus ad circulum EFGH, ita in ipsis cylindri æquealti conis. ergo coni & cylindri qui eandem habent altitudinem inter se sunt vt bases. quod demonstrare oportebat. 11. quinti. Ex antecedente.

F. C. COMMENTARIVS.

Et hoc in conis & cylindris scalenis similiter demonstrabitur.

THEOREMA XII. PROPOSITIO. XII.

Similes coni & cylindri inter se sunt in tripla proportione diametrorum, quæ sunt in basibus.



Sint similes coni & cylindri, quorum bases quidem circuli ABCD EFGH; diametri vero basium BD FH: & axes conorum, vel cylindorum HK MN. Dico conum cuius basis ABCD circulus, vertex autem punctum L ad conum, cuius basis circulus EFGH, vertex autem N punctum, triplam habere proportionem eius, quam habet BD ad FH. Si enim non habet conus ABCDL ad conum EFGHN triplam proportionem eius, quam BD habet ad FH, habebit ABCDL conus ad aliquod solidum minus cono EFGHN triplam proportionem, vel ad maius. habeat primum ad minus, quod sit X; & describatur in EFGH circulo quadratum EFGH, quadratum igitur EFGH maius est, quam dimidium EFCH circuli. & erigatur a quadrato EFGH pyramis æquealta cono. ergo erecta pyramis maior est, quam coni dimidia. Itaque secetur EF FG GH HE circumferentiæ bifariam in punctis OPRS & iungantur EO OF FP PG GR RH HS SE. Vnumquodque igitur triangulorum EOF FPG GRH HSE maius est quàm dimidium portionis circuli EFGH, in qua consistit. & erigatur ab vnoquoque triangulorum EOF FPG GRH HSE pyramis eundem vertice habens, quem conus. ergo & vnaquæque erectarum pyramidum maior est quàm dimidia portionis coni, quæ est ad ipsam. secantes igitur reliquas circumferentias bifariam, iungentesq; rectas lineas, & ab vnoquoque triangulorum erigentes pyramides eundem habentes verticem, quem conus; atque hoc semper facientes tandem relinquemus quasdam coni portiones, quæ minores erunt excessu, quo conus EFGHN ipsum X solidum superat. Relinquantur & sint quæ in ipsis EO OF FP PG GR RH HS SE.



HS SE. Reliqua igitur pyramis, cuius basis quidem polygonum EOFPGRHS, uertex autem N punctum, maior est solido X. Describatur etiam in circulo ABCD polygono EOFPGRHS simile, & similiter positum polygonum ATBYCVDQ: à quo erigatur pyramis eundem uerticem habens, quem conus: & triangulorum continẽ tiem pyramidem, cuius basis quidem est polygonum ATBYCVDQ, uertex autem punctum L, unũ sit LBT; triangulorũ uero continentiũ pyramidem, cuius basis EOFPGRHS polygonũ, & uertex punctũ N, unum sit NFO, & iũgãtur KT, MO. Qm̃ igitur conus ABCD similis est cono EFGH, erit ut BD ad FH, ita KL axis adaxẽ MN. ut aũt BD ad FH, ita BK ad FM. ergo & ut BK ad FM, ita KL ad MN, & permutãndo ut BK ad KL, ita FM ad MN. perpẽdicularis enim utraque est, & circa æquales angulos BKLFMN latera sũt proportionalia. Simile igitur est BKL triangulum triangulo FMN. Rursus quoniam est ut BK ad KT, ita FM ad MO, & circa æquales angulos BKT FMO latera sunt proportionalia; etenim quę pars est angulus BKT quattuor rectorum, qui sunt ad K centrũ, eadem est pars & angulus FMO quattuor rectorum, qui sunt ad centrum M: erit triangulum BKT triãgulo FMO simile. Et quoniã ostensum est ut BK ad KL ita esse FM ad MN; æqualis aũt est BK ipsi KT, & FM ipsi MO: erit ut TK ad KL, ita OM ad MN: & circa æquales angulos TKL OMN latera sunt proportionalia; recta enim sunt. triangulum igitur LKT simile est triangulo NMO. Quòd cum ob similitudinem triangulorum BKL FMN, sit ut LB ad BK, ita NF ad FM; ob similitudinem uero triangulorum BKT FMO, ut KB ad BT, ita MF ad FO: erit ex æquali ut LB ad BT, ita NF ad FO. Rursus cum ob similitudinem triangulorum LTK NOM, sit ut LT ad TK, ita NO ad OM; & ob similitudinem triangulorum KBT OMF, ut KT ad TB, ita MO ad OF: ex æquali erit ut LT ad TB, ita NO ad OF. ostensum autem est & ut TB ad BL, ita OF ad FN. quare rursus ex æquali ut TL ad LB, ita ON ad NF. triangulorum igitur LTB NOF proportionalia sunt latera, ideoque æquiangula sunt LTB NOF triangula, & inter se similia. quare & pyramis, cuius basis triangulum BKT, uertex autem L punctum, similis est pyramidi, cuius basis FMO triangulum, & uertex punctum N; similibus enim planis continentur, & multitudine æqualibus. pyramides autem similes, & quę triãgulares bases habent in tripla sunt proportione homologorum laterum. ergo pyramis BKTL ad pyramidem FMON triplam habet proportionem eius, quam BK habet ad FM. Similiter à punctis quidem AQDVCY ad K, à punctis uero ESHRGP ad M ducentes rectas lineas, & à triangulis erigentes pyramides uertices eosdẽ habentes, quoo coni, ostendemus & unãquamque pyramidũ eiusdẽ ordinis ad unaquãq; alterius ordinis triplã proportionẽ habere eius, quã hẽt BK latus homologũ ad homologũ latus FM, hoc est quã BD ad FH. Sed ut unũ antecedentium ad unum consequentium, ita omnia antecedentia ad omnia consequentia





quentia.est igitur & vt BKTL pyramis ad pyramidem FMON,ita tota pyramis,cuius basis ATBYCVDQ polygonum,uertex autem punctum L ad totam pyramidē cuius basis polygonum EOFPGRHS & uertex punctum N.quare & pyramis, cuius basis ATBYCVDQ polygonum,uertex autem punctum L ad pyramidem cuius basis polygonum EOFPGRHS & uertex punctum N, triplam proportionem habet eius,quam BD habet ad FH.ponitur autem conus,cuius basis circulus ABCD uertex autem punctum L ad solidum X triplam proportionem habere eius,quam BD ad FH.Vt igitur conus,cuius basis circulus ABCD,uertex autem punctum L ad solidum X, ita est pyramis,cuius basis ATBYCVDQ polygonum, uertex autem punctum L ad pyramidem, cuius basis polygonum EOFPRHS & uertex punctum N, & permutando,ut conus cuius basis circulus ABCD, uertex autem punctum L ad pyramidem,quę in ipso est,cuius basis ATBYCVDQ polygonū, uertex aūt punctū L;ita solidum X ad pyramidem cuius basis polygonum EOFPGRHS, & uertex punctum N.dictus autem conus maior est pyramide,quę in ipso; etenim eam comprehendit.maius igitur est & solidum X pyramide,cuius basis polygonum EOFPGRHS,uertex autem punctum N. sed & minus,quod fieri non potest. non igitur conus, cuius basis ABCD circulus,& uertex punctum L ad aliquod solidum minus cono, cuius basis circulus EFGH & uertex N punctum, triplam proportionē habet eius quam BD habet ad FH. similiter demonstrabimus neque conum EFGHN ad aliquod solidum minus cono ABCDL triplam proportionem habere eius, quam habet FH ad BD.Itaque dico neque ABCDL conum ad solidum maius cono EFGH N triplam habere proportionem eius, quam BD habet ad FH. si enim fieri potest habeat ad aliquod solidum maius, quod sit Z. conuertendo igitur solidum Z ad conum ABCDL triplam proportionem habet eius, quam FH ad BD: ut autem solidum Z ad conum ABCDL,ita EFGHN conus ad aliquod solidum minus cono ABCDL.ergo & conus EFGHN ad solidum aliquod minus cono ABCDL triplā proportionem habebit eius,quam FH habet ad BD, quod fieri non posse demonstratum est.non igitur ABCDL conus ad solidum aliquod maius cono EFGHN triplam proportionem habet eius,quam BD ad FH.ostensum autem est neque ad minus.quare conus ABCDL ad EFGHN conum triplam proportionem habet eius, quam BD ad FH.Vt autem conus ad conum,ita cylindrus ad cylindrum.cylindrus enim in eadem existēs basi,in qua conus,& ipsi æqualtus coni triplus est. cum ostēsum sit omnem conum tertiam partem esse cylindri,eandem quam ipse basim habētis,& aequalem altitudinem.ergo & cylindrus ad cylindrum triplam proportionē habebit eius,quam BD habet ad FH.similes igitur coni, & cylindri inter se sunt in tripla proportione diametrorū,quæ sunt in basibus.quod demonstrare oportebat. 15.quinti. 10.huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Præcedens demonstratio In conis & cylindris tantum rectis; congruit, quam nos uniuerse ad omnes tam rectos quam scalenos accōmodabimus hoc pacto.

Similes coni & cylindri omnes interse in tripla sunt proportionem diametrorū, quę sunt in basibus.

Sint similes coni & cylindri, quorum bases quidem circuli ABCD EFGH, et axes KL MN: & per axes ducantur plana ad rectos angulos basibus,quae bases secent, sintq; eorum planorum & basium communes sectiones BD FH,quae circulorū diametri erunt. Dico conum cuius basis ABCD circulus, et vertex punctum L ad conum cuius basis circulus EFGH,vertex autem N punctum triplam proportionem habere eius,quam habet ED ad FH. si enim non ita sit, habebit conus ABCDL ad aliquod solidum minus cono EFGHN triplam proportionem eius,quam BD habet ad FH,vel ad maius.Habeat primum ad solidum minus,quod sit X, & describatur in EFGH circulo quadratum EFGH.erit igitur quadratum EFGH maius, quàm dimidium EFGH circuli. Erigatur à quadrato EFGH pyramis aequealta cono, quae maior erit,quàm coni dimidia,& secentur EF FG GH HE circumferentiae bifariam in punctis OPRS, iungantur q; EO OF FP PG GR RH HS SE. Vnumquodque igitur triangulorum EOF FPG GRH HSE maius est, quàm

dimidiũ portionis circuli EFGH, in qua cõſiſtit: & erigatur ab vnoquoque triangulorũ EOF FPG GRH HSE pyramis eundem, quem conus vertirem habens. ergo et vnaquęque erectarũ pyramidũ maior eſt, quã dimidia coni portionis, q ae eſt ad ipſam. ſecãtes igitur reliquas circũferentias bifariam, inngẽteſq; rectas lineas, & ab vnoquoq; triangulorum erigẽtes pyramides, eundem habentes verticem, quem conus: atque hoc ſemper facientes tandem relinquemus quaſdã coni portiones, quę minores erunt exceſſu, quo conus EFG HN ipſum X ſolidum ſuperat. relinquantur, & ſint quae in ipſis EO OF FP PG GR RH HS SR. reliqua igitur pyramis, cuius baſis polygonum EOFPGRHS, vertex autem punctum N ſolido X eſt maior.







Deſcribatur etiam in circulo ABCD ipſi EOFPGRHS polygono ſimile & ſimiliter poſitum polygonum ATBYCVDQ. atque ab eo erigatur pyramis eundem, quem conus verticem habens: & triangulorum quidem continentium pyramidem, cuius baſis polygonum ATBYCVDQ; & vertex punctum L, vnum aliquod ſit LBT: triangulorũ vero continentium pyramidem, cuius baſis EOFPGRHS polygonum, & vertex punctum N, vnum ſit NFO: & KT MO iungantur. Quoniã igitur conus ABCD ſimilis eſt cono EFGH, erit ex diffinitione conorum ſimilium, quã nos in principio antecedentis libri attulimus, vt diameter BD ad diametrum FH, ita axis KL ad MN axẽ: vt autem BD ad FH, ita BK ad FM. ergo & vt BK ad FM, ita KL ad MN; & permutando vt BK ad KL, ita FM ad MN. atque eſt angulus BKL aequalis angulo FMN ex eadem diffinitione conorum ſimilium. cum igitur circa aequales angulos BKL FMN latera ſint proportionalia; erit BKL triangulum ſimile triangulo FMN. Et quoniam vt BK ad KT, ita eſt FM ad MO; angulus autem BKT eſt aequalis angulo FMO: etenim quę pars eſt angulus BHT quattuor rectorũ, qui ſunt ad centrum K, eadem eſt pars angulus FMO quattuor rectorum, qui ſunt ad M centrum. rurſus erunt circa aequales angulos BKT FMO latera proportionalia. triangulum igitur BKT triangulo FMO eſt ſimile. Itaque quoniam oſtenſum eſt vt BK ad KL, ita FM ad MN; aequalis autem eſt BK ipſi KT, & FM ipſi MO: erit vt TK ad KL, ita OM ad MN. & ſunt in conis rectis anguli TKL OMN inter ſe aequales, quòd recti ſint. ergo in ipſis eum circa aequales angulos TKL OMN latera ſint proportionalia; erit triangulum LKT ſimile triangulo NMO. At in conis ſcalenis hoc modo demonſtrabitur. Ducantur à verticibus eorum LN ad rectos angulos planis baſium rectae lineae LΦ NΥ, quae cadent in communes planorum & baſium ſectiones BD FH ex 38. antecedentis libri. & iungantur TΦ OΥ. Cum igitur ex diffinitione conorum ſimilium angulus LKΦ ſit æqualis angulo NMΥ, & anguli LΦK NΥM utrique recti: erit & reliquus KLΦ reliquo MNΥ aequalis, & triangulum LΦK ſimile triangulo NΥM. rurſus cum angulus BKT ſit æqualis angulo FMO; & reliquus ex duobus rectis TKΦ aequalis erit reliquo OMΥ. eſt autem ob ſimilitudinem triangulorum LΦK NΥM, ut ΦK ad KL, ita ΦM ad MN, & ob ſimilitudinem triangulorũ BKL FMN, ut LK ad KB, hoc eſt ad KT ipſi aequalem, ita NM ad MF, hoc eſt ad MO. ergo ex aequali vt ΦK ad KT, ita ΥM ad MO. & cum circa aequales angulos TKΦ OMΥ latera ſint proportionalia, erit & triangulum KTΦ triangulo MOΥ ſimile: ergo vt LΦ ad ΦK, ita NΥ ad ΥM: & vt ΦK ad ΦT, ita ΥM ad MO. quare ex aequali vt LΦ ad ΦT, ita NΥ ad ΥO. & ſunt anguli LΦT NΥO

6. eucli.

inter

inter se aequales, quòd vtrique recti ex diffinitione rectae lineae, quae ad planum recta est cum igitur circa aequales angulos LΦT NΥO latera sint proportionalia, sequitur triãgula quoq; LTΦ NOΥ inter se similia esse. ideoq́, vt LT ad TΦ, ita NO ad OΥ. & vt TΦ ad TK, ita OΥ ad OM. ex aequali igitur vt LT ad TK, ita est NO ad OM. demonstratum autem est vt LK ad KT, ita esse NM ad MO. quare conuertendo vt TK ad KL, ita OM ad MN. rursus igitur ex aequali vt TL ad LK, ita est ON ad NM. quòd cum triangula LKT. NMO latera habeant proportionalia, aequiangula sunt, & ob inter se similia. Itaq; quoniam ob similitudinem triangulorum BKL FMN est vt LB ad BK. ita NF ad FM, & ob similitudinem triangulorum BKT FMO, vt KB ad BT, ita MF ad FO, erit ex aequali vt LB ad BT, ita NF ad FO. & conuertendo vt TB ad BL, ita OF ad FN. Rursus quoniam ob similitudinem triangulorum LKT. NMO, vt LT ad TK, ita est NO ad OM, & ob similitudinem triangulorum KBT MFO, vt KT ad TB, ita MO ad OF; ex aequali erit vt LT ad TB, ita NO ad OF. ostensum autem est & vt TB ad BL, ita OF ad FM. rursus igitur ex aequali vt TL ad LB, ita erit ON ad NF. quare triangulorum LTB NOF latera sunt proportionalia, ob eamq́, causſam & aequiangula & inter se similia erunt. pyramis igitur, cuius basis triangulum BKT, vertex autem punctum L similis est pyramidi, cuius basis triangulum FMO, & vertex N punctum, similibus enim planis continentur & numero aequalibus. pyramides autem similes in tripla sunt proportione humologorum laterum. ergo pyramis BKTL ad pyramidem FMON triplam habet proportionem eius, quam BK habet ad FM. Reliqua similiter vt in antecedente demonstrabimus. 6. sexti.

THEOREMA XIII. PROPOSITIO. XIII.

Si cylindrus plano secetur oppositis planis parallelo, erit vt cylindrus ad cylindrum, ita axis ad axem.



Cylindrus enim AD plano GH secetur oppositis planis AB CD parallelo, & occurat axi EF in K puncto. Dico vt BG cylindrus ad cylindrum GD, ita esse EK axem ad axem KF. producatur enim EF axis ex vtraque parte ad puncta LM: & ipsi quidē EK axi exponantur æquales quotcumq; EN NL; ipsi vero FK æquales quotcumque FX XM: & per puncta LNXM ducantur plana ipsis AB CD parallela; atque in planis per LNXM circa centra LNXM intelligantur circuli OP RS TY VQ æquales ipsis AB CD; & cylindri PR RB DT TQ intelligãtur. Quoniam igitur axes LN NE EK inter se sunt æquales, erunt cylindri PR RB BG inter se vt bases: bases autem æquales sunt. ergo & cylindri PR RB BG sunt æquales. Quòd cum axes LN NE EK inter se æquales sint, itēq́; cylindri PR RB BG inter se æquales; sitq́; ipsorum LN NE EK multitudo æqualis multitudini ipsorum PR RB BG: quotuplex est axis KL ipsius EK axis, totuplex erit & PG cylindrus cylindri GB. Eadem ratione & quotuplex est MK axis ipsius axis KF, totuplex est & QG cylindrus cylindri GD. & si quidem axis LK sit æqualis axi KM, erit & PG cylindrus cylindro GQ æqualis. Si autem axis LK maior sit axe KM, & cylindrus PG maior erit cylindro GQ, & si minor minor. quattuor igitur existentibus magnitudinibus, uidelicet axibus EK KF, & cylindris BG GD sumpta sunt æquemultiplicia, axis quidem EK & BG cylindri, nēpe axis KL, & cylindrus PG; axis uero KF; & cylindri GD æquemultiplicia, axis scilicet KM, & GQ cylindrus, & demonstratum est si LK axis superat axem KM & PG cylindrum superare cylindrum GQ, & si æqualis æqualis, & si minor minor. est igitur axis EK ad axem KF, ut BG cylindrus ad cylindrum GD. Quare si cylindrus plano secetur oppositis planis parallelo, erit ut cylindrus ad cylindrum, ita axis ad axem. quod demonstrare oportebat. 11. huius.

F. C.

F. C. COMMENTARIVS.

Illud etiam contingit in cylindro ſcaleno; quod eadem ratione demonſtrabitur.

Ex quibus conſtat ſi quilibet cylindrus ſecetur plano baſibus parallelo, ut cylindrus ad cylindrum, ita eſſe altitudinem cylindri ad cylindri altitudinem.

In cylindris enim rectis illud perſpicuum eſt, eum eorum altitudines ab axibus determinentur. in ſcalenis vero facile apparebit ducta recta linea EL a puncto E ad baſis planum perpendiculari, quae plano per GH ducto in M occurrat. Quoniam enim duę rectę lineę EF EL ſecantur à planis parallelis, in eaſdem proportiones ſecabuntur. quare vt EK ad KF, ita erit EM ad ML; ac propterea ut B G cylindrus ad cylindrum G D, ita cylindri E G altitudo EM ad ML altitudinem cylindri G D, quod propoſitum fuerat demonſtrandum.

vj. undecimi



THEOREMA XIIII. PROPOSITIO. XIIII.

In æqualibus baſibus exiſtentes coni, & cylindri inter ſe ſunt vt altitudines.

Sint enim in æqualibus baſibus AB CD cylindri EB FD. Dico vt EB cylindrus ad cylindrum FD, ita eſſe G H axem ad axem K L. producatur enim KL axis ad punctum N; ponaturq; ipſi GH axi æqualis LN; & circa axem LN intelligatur cylindrus C M. Quoniam igitur cylindri EB CM eandem habent altitudinem, inter ſe ſunt vt baſes: baſes autem ſunt æquales. ergo & cylindri EB CM inter ſe æquales erunt. Et quoniam cylindrus FM plano ſecatur CD, oppoſitis planis parallelo, erit ut CM cylindrus ad cylindrum FD, ita axis LN ad KL axem. æqualis autem eſt cylindrus quidem CM cylindro EB; axis vero LN axi G H. eſt igitur vt EB cylindrus ad cylindrū F D, ita axis GH ad KL axem: vt autem EB cylindrus ad cylindrum FD, ita ABG conus ad conū CDK; cylindri enim ſunt conorum tripli. ergo & vt GH axis ad axem KL, ita eſt ABG conus ad conum C D K, & cylindrus EB ad F D cylindrum. In baſibus igitur æqualibus exiſtentes coni & cylindri inter ſe ſunt, ut altitudines. quod oportebat demonſtrare.

✻ vt. huius.

Ex antecedente.

xj. quint. 2. huius.



F. C. COMMENTARIVS.

✻ Dico vt EB cylindrus ad cylindrum FD, ita eſſe GH axem ad axem KL] *Hoc eſt ita eſſe altitudinem GH ad KL altitudinem. in rectis enim conis, de quibus Euclides loquitur, altitudo ipſa axis eſt, ſiue ab axe determinatur; in ſcalenis uero non item. ſed tamen nihilominus demonſtrabitur conos & cylindros in aequalibus baſibus conſtitutos inter ſe eſſe vt axes, & ob id, vt eorum altitudines ex iis, quae nos proxime diximus.*

THEOREMA XV. PROPOSITIO XV.

Aequalium conorum, & cylindrorum baſes ex contraria parte altitudinibus

altitudinibus reſpondent, & quorum conorum & cylindrorũ baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent, illi inter ſe ſunt æquales.

Sint æquales coni & cylindri, quorum baſes quidem ABCD EFGH circuli, & diametri ipſorum AC EG; axes autem KL MN; qui quidem & conorum vel cylindrorum ſunt altitudines. & compleantur cylindri AX EO. Dico cylindrorum AX EO baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondere, hoc eſt vt ABCD baſis ad baſim EFGH, ita eſſe altitudinẽ MN ad altitudinem KL. altitudo enim KL vel æqualis eſt altitudini MN, vel non æqualis. Sit primum æqualis: atque eſt AX cylindrus æqualis cylindro EO. qui autem eandem habent altitudinem coni, & cylindri inter ſe ſunt vt baſes. æqualis igitur eſt baſis ABCD baſi EFGH, ac propterea ex contraria parte ſibi ipſis reſpondent. eſtq́; vt baſis ABCD ad EFGH baſim, ita MN altitudo ad altitudinem KL. Non ſit autem altitudo KL altitudini MN æqualis, ſed maior ſit MN, & auferatur ab ipſa MN altitudini LK æqualis PM, & per P ſecetur EO cylindrus plano TYS oppoſitis planis circulorum EFGH RO parallelo, intelligaturq́; cylindrus ES, cuius baſis quidem, EFGH circulus, altitudo autem PM. Quoniam igitur AX cylindrus æqualis eſt cylindro EO, alius autem aliquis eſt cylindrus ES; erit vt AX cylindrus ad cylindrũ ES, ita cylindrus EO ad ES cylindrũ. Sed vt AX cylindrus ad cylindrum ES, ita baſis ABCD ad EFGH baſim; cylindri enim AX ES eandem habent altitudinem. vt autem cylindrus EO ad ES cylindrũ, ita MN altitudo ad altitudinẽ MP. nam cylindrus EO ſecatur plano TYS oppoſitis planis parallelo. eſt igitur vt ABCD baſis ad baſim EFGH, ita altitudo MN ad MP altitudinem, æqualis autẽ eſt MP altitudo altitudini KL. quare vt baſis ABCD ad EFGH baſim, ita MN altitudo ad altitudinem KL. æqualium igitur cylindrorum AX EO baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent.



5. huius

13. huius.

Sed cyiindrorũ AX EO baſes ex contraria parte reſpondeant altitudinibus: ſitq́; vt ABCD baſis ad baſim EFGH, ita altitudo MN ad KL altitudinẽ. Dico AX cylindrũ cylindro EO æqualẽ eſſe. ijſdẽ enim cõſtructis quoniã vt ABCD baſis ad baſim EFGH, ita altitudo MN ad KL altitudinem; altitudo autem KL æqualis eſt altitudini MP: erit vt ABCD baſis ad baſim EFGH, ita MN altitudo ad altitudinem MP. Sed vt ABCD baſis ad baſim EFGH, ita A X cylindrus ad cylindrum E S; eandem enim habent altitudinem. vt autem MN altitudo ad altitudinem MP, ita cylindrus E O ad ES cylindrum. eſt igitur vt A X cylindrus ad cylindrũ ES, ita cylindrus EO ad ES cylindrum. cylindrus igitur AX cylindro EO eſt æqualis. ſimiliter autem & in conis. quod demonſtrare oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

Hoc in conis, & cylindris rectis tantum Euclides demonſtrauit. Sed & in omnibus demonſtratur hoc modo.

Sint æquales coni, & cylindri ſiue recti ſiue ſcaleni, quorum baſes circuli ABCD EFGH; altitudines autem LK NM; & compleantur AX EO cylindri. Dico cylindrorum AX EO baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondere; hoc eſt vt ABCD baſis ad baſim EFGH, ita eſſe altitudinem NM ad LK altitudinem. Nam vel altitudines LK NM ſunt æquales vel inæquales; ſi æquales, cum æquales ſint cylindri, erunt & baſes æquales inter ſe: cylindri enim & coni qui eandem

eandem habẽt altitudinẽ, inter ſe ſunt vt baſes. quæ re baſes ex contraria parte altitudinibus reſpõdẽt. Si vero altitudines nõ ſint æquales, Sit maior NM altitudo; à qua auferatur PM æqualis altitudini LK, & per P ducatur planum cylindrum ſecans, oppoſitis planis parallelum TYS, intelligaturq́, cylindrus ES, cuius baſis circulus EFGH; & altitudo PM. Itaque quoniam cylindrus AX eſt æqualis cylindro EO, & alius cylindrus eſt ES; erit ut AX cylindrus ad cylindrum ES, ita cylindrus EO ad ES cylindrum. Sed



11. huius. vt AX cylindrus ad cylindrum ES, ita baſis ABCD ad EFGH baſim, cum eandem habeant altitudinem. Vt autem cylindrus EO ad ES cylindrum, ita NM altitudo ad altitudinem MP; cylindrus enim EO ſecatur plano TYS oppoſitis planis parallelo. quare vt cylindrus RS ad cylindrum SE, ita eſt NP altitudo ad altitudinem PM: & componendo vt cylindrus EO ad ES cylindrum, ita NM altitudo ad altitudinem MP. Vt igitur baſis ABCD ad EFGH baſim, ita NM altitudo ad altitudinem MP. æqualis autem eſt altitudo MP altitudini LK. ergo ut ABCD baſis ad baſim EFGH, ita eſt altitudo NM ad LK altitudinem.

Sed cylindrorum AX EO baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondeant, ſitq́, vt ABCD baſis ad baſim EFGH, ita altitudo NM ad LK altitudinem. Dico cylindrum AX cylindro EO æqualem eſſe. ijſdem enim conſtructis quoniam vt ABCD baſis ad baſim EFGH, ita altitudo NM ad LK altitudinem, altitudo autem LK eſt æqualis ipſi PM altitudini; erit vt ABCD baſis ad

11. huius. baſim EFGH, ita NM altitudo ad altitudinem MP. Sed vt ABCD baſis ad baſim EFGH, ita cylindrus AX ad ES cylindrum, quòd eandem altitudinem habeat: & ut NM altitudo ad altitudinem MP, ita EO cylindrus ad cylindrum ES. Vt igitur cylindrus AX ad ES cylindrum, ita cylindrus EO ad cylindrum ES. quare AX cylindrus cylindro EO eſt æqualis. ſimiliter autem & in conis. Æqualium igitur conorum, & cylindrorum baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent, & quorum conorum, & cylindrorum baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent, illi inter ſe ſunt æquales. quod demonſtrare oportebat.

Sed & illud uerum eſt, quod nos demonſtrauimus in commentarijs in librum Archimedis de conoidibus, & ſphæroidibus ad propoſitionem XI.

Cylindri omnes, et coni inter ſe proportionem habent compoſitam ex proportione baſium & ex proportione altitudinum.

PROBLEMA I. PROPOSITIO. XVI.

Duobus circulis circa idem centrum exiſtẽtibus in maiori polygonum æqualium, & numero parium laterum deſcribere, quod minorem circulum non tangat.

Sint dati duo circuli ABCD EFGH circa idem centrum K. oportet in maiori circulo ABCD polygonum æqualium, & numero parium laterum deſcribere, non tangens minorem circulum EFGH. Ducatur enim per K centrum recta linea BD: atque à puncto G ipſi BD ad rectos angulos ducatur AG: & ad C producatur. ergo AC circulum EFGH tangit. Itaque circumferentiam BAD bifariam ſecantes; & eius dimidium rurſus bifariam, & hoc ſemper facientes tandem relinquemus

circumferentiam

circumferentiam minorem ipſa AB. Relinquatur, ſitq; LD,& à puncto L ad BD perpendicularis agatur LM, & ad N producatur, iunganturq; LD DN LN. ergo LD ipſi DN eſt æqualis.Et quoniam LN parallela eſt AC, & AC tangit circulum EFGH; ipſa LN circulum EFGH non tanget, & multo minus tangent circulum EFGH rectæ lineæ LD DN Quòd ſi ipſi LD æquales deinceps circulo ABCD aptabimus, deſcribetur in eo polygonũ æqualium & numero parium laterum non tangens minorem circulum EFGH.quod facere oportebat.



F. C. COMMENTARIVS.

Ergo LD ipſi DN eſt æqualis] *Recta enim linea BD per centrum ducta rectam lineam quandam LN, non ductam per centrum ad rectos angulos ſecat, quare & bifariam ipſam ſecabit. atque erit LM æqualis MN. cum igitur duæ LM MD duabus NM MD æquales ſint & angulos æquales contineant, nempe rectos: erit baſis LD baſi LN æqualis.* ✻ 3. tertij. 4. primi.

PROBLEMA II. PROPOSITIO XVII.

Duabus ſphæris circa idem centrum exiſtentibus in maiori ſolidum polyhedrum deſcribere, quod minoris ſphæræ ſuperficiem non tangat.



Intelligantur duæ ſphæræ circa idem centrum A. oportet in maiori ſphæra deſcribere ſolidum polyhedrum minoris ſphæræ ſuperficiem non tangens. ſecentur ſphæræ plano aliquo per centrum ducto. erunt ſectiones circuli, quoniam diametro manẽte, & ſemicirculo circumducto, ſphæra facta eſt. ergo in quacumque poſitione ſemicirculum intelligamus, quod per ipſum producitur planũ in ſuperficie ſphæræ circulum efficiet, & conſtat circulum maximum eſſe, cum diame-

16. tertij.

ter ſphæræ,quæ & ſemicirculi,& circuli diameter eſt, maior ſit omnibus rectis lineis,quæ in circulo vel ſphæra ducũtur.ſit igitur in maiori quidem ſphęra circulus BCDE;in minori autem circulus FGH:& ducantur ipſorum duæ dimetri ad rectos inter ſe angulos BD CE: & duobus circulis circa idem centrum exiſtentibus B CDE FGH, in maiori BCDE polygonum æqualium & parium numero laterum deſcribatur,nõ tãgẽs minorẽ circulũ FGH;cuius latera ſint in BE circuli quadrãte BK KL LM ME: & iuncta KA producatur ad N:& à puncto A plano circuli BCD E ad rectos angulos cõſtituatur AX; quæ ſuperficiei ſphærę in puncto X occurrat: & per AX,& vtramque ipſarum BD KN plana ducantur, quæ ex iam dictis efficiẽt in ſuperficie ſphæræ maximos circulos.Itaque efficiant,& ſint in diametris BD K N eorum ſemicirculi BXD KXN.Quoniam igitur XA recta eſt ad planum circuli B CDE,erunt omnia plana,quæ per ipſam XA tranſeunt ad planum circuli BCDE re cta.quare & ſemicirculi BXD KXN recti ſunt ad idem planum. Et quoniam ſemicirculi; BED BXD KXN æquales ſunt,in ęqualibus enim cõſiſtũt BD KN diametris;erũt & eorũ quadrantes BE BX KX inter ſe æquales.quot igitur latera polygoni ſunt in quadrante BE,tot erunt & in quadrantibus BX KX æqualia ipſis BK KL LM ME. Deſcribantur & ſint BO OP PR RX KS ST TY YX: iunganturq; SO TP YR,& ab ipſis OS ad planum circuli BCDE perpendiculares ducantur. cadẽt hæ in communes planorum ſectiones BD KN,quoniam & plana ſemicirculorum BXD KXN ad planum circuli BCDE recta ſunt.Itaque cadant,ſintque OVSQ:& V Q iungatur.Cum igitur in æqualibus ſemicirculis BXD KXN æquales circumferẽ tiæ ſumptę ſint BO KS,& ductę perpendiculares OV SQ;erit OV quidem ipſi SQ æqualis,BV vero ęqualis KQ.eſt autem & tota BA æqualis toti KA. ergo & reliqua VA reliquæ QA eſt ęqualis.Vt igitur BV ad VA,ita KQ ad QA,ideoq; VQ ipſi BK parallela eſt.Quòd cum vtraque ipſarum OV SQ recta ſit ad circuli BCDE planũ, erit OV ipſi SQ parallela. oſtenſa autem eſt & ipſi ęqualis. ergo QV SO æquales

Ex antecedente.

B

8.sexti.

6.undecimi.

33.primi.



ſunt & parallelæ. Et quoniam QV parallelaeſt ipſi SO,ſed & parallela ipſi KB; erit & SO ipſi KB parallela:& ipſas coniungnnt BO KS.ergo & KBOS quadrilaterũ eſt in uno plano:nã ſi duæ rectæ lineæ parallelæ ſint, & in vtraque ipſarum quæuis pũcta ſumantur,quæ dicta puncta coniungit recta linea in eodem eſt plano, in quo parallelę. Et eadem ratione vtraque ipſorum quadrilaterorum SOPT TPRY in vno ſunt plano.eſt autem in vno plano & triangulum YRX.Si igitur à pũctis OSPTRYad A ductas rectas lineas intelligamus, conſtituetur quædam figura ſolida

9.undecimi.

C

A

6.undecimi.

ſolida polyhedra inter circumferentias BX KX, ex pyramidibus compoſita, quarũ baſes quidem KBOS SOPT TPRY quadrilatera, & triangulum YRX; vertex autẽ punctum A. quòd ſi in vno quoque laterum KL LM ME, quemadmodum in KB eadem conſtruamus, & in reliquis tribus quadrãtibus, & in reliquo hemiſphęrio conſtituetur figura quædam polyhedra in ſphęra deſcripta, & compoſita ex pyramidibus, quarum baſes ſunt quadrilatera iam dicta, & YRX triãgulum; & quæ eiuſdem ordinis ſunt; vertex autem A punctum. Dico dictam figuram polyhedram non tãgere ſuperficiem minoris ſphæræ, in qua eſt circulus FGH. Ducatur à puncto A ad planum quadrilateri KBSO perpendicularis AZ, cui in puncto Z occurrat, & BZ ZK iungantur. Itaque quoniam AZ recta eſt ad quadrilateri KBSO planum, et ad omnes rectas lineas, quę ipſam contingunt, & in eodem ſunt plano rectos angulos faciet. ergo AZ ad utramque ipſarum BZ ZK eſt perpendicularis. et quoniam AB eſt æqualis AK, erit et quadratum ex AB quadrato ex AK ęquale, et ſunt quadrato quidem ex AB æqualia quadrata ex AZ ZB; etenim angulus ad Z rectus eſt: quadrato autem ex AK ęqualia ex AZ ZK quadrata. ergo quadrata ex AZ ZB quadratis ex AZ ZK æqualia ſunt. commune auferatur quadratum ex AZ. reliquum igitur quod ex BZ reliquo quod ex ZK eſt ęquale; ideoq; recta linea BZ rectę ZK æqualis. Similiter oſtendemus, & quæ à puncto Z ad OS ducuntur vtrique ipſarum BZ ZK ęquales eſſe. circulus igitur centro Z & interuallo vna ipſarum ZB ZK deſcriptus, etiam per puncta OS trãſibit, atque erit in circulo KBOS quadrilaterum. Et quoniã KB maior eſt, quàm QV, æqualis autem QV ipſi SO; erit & KB, quàm SO maior. Sed KB eſt æqualis vtrique ipſarũ KS BO. ergo vtraque KS BO, quàm SO eſt maior. cum igitur in circulo quadrilaterum ſit KBOS, & ęquales ſint KB BO KS, & minor OS; ſitq; ex centro circuli BZ: erit quadratum ex KB maius, quàm duplum quadrati ex BZ. Ducatur à puncto K ad BV perpendicularis KΩ. Et quoniam BD minor eſt, quã dupla ipſius DΩ; atq; eſt vt BD ad DΩ, ita rectãgulũ cõtẽtũ DB BΩ ad rectangulum, quod DΩ ΩB cõtinetur, nempe deſcripto ex BΩ quadrato, & completo parallelogrãmo in ipſo ΩD. quare & rectangulũ contẽtũ DB. BΩ minus eſt, quã duplum eius, quod DΩ ΩB continetur: & iuncta KD, quod DB BΩ continetur eſt æquale quadrato ex KB; & quod continetur DΩ ΩB æquale quadrato ex KΩ. quadratum igitur ex KB minus eſt, quàm duplum quadrati ex KΩ. ſed quadratum ex KB maius eſt, quàm duplum quadrati ex BZ. ergo quadratum ex KΩ quadrato ex BZ eſt maius. Et quoniam BA eſt æqualis AK, erit quadratum ex BA quadrato ex AK æquale. & ſunt quadrato quidem ex BA æqualia quadrata ex BZ ZA; quadrato autem ex AK æqualia quadrata ex KΩ ΩA. quadrata igitur ex BZ ZA quadratis ex KΩ ΩA ſunt æqualia; quorum quadratum ex KΩ maius eſt quadrato ex BZ. ergo reliquum ex ΩA quadratum quadrato ex ZA eſt minus; ac propterea recta linea AZ maior, quàm recta AΩ. multo igitur maior eſt AZ, quàm AG: atque eſt AZ quidem ad vnam polyhedri baſim, AG vero ad ſuperficiem minoris ſphęræ. quare polyhedrum minoris ſphæræ ſuperficiem non tangit.

5 diffi. nudæ cimi. 49. primi. D E F G H K

Oſtendendum autem aliter & expeditius, maiorem eſſe AZ, quàm AG. Ducatur à puncto G ipſi AG ad rectos angulos GL, & AL iungatur. Itaque circumferentiã EB bifariam ſecantes, & dimidiam ipſius bifariam, atque hoc ſemper facientes tandem relinquemus quandam circumferentiam minorem circumferentia circuli BCD, quæ ſubtenditur æquali ipſi GL. relinquatur, ſitq; circumferentia KB. minor igitur eſt recta linea KB, quàm GL. Et quoniã in circulo eſt BKSO quadrilaterum, & ſunt æquales OB BK KS, & minor OS; erit angulus BZK obtuſus: ideoq; BK maior, quàm BZ. ſed GL quàm BK eſt maior. multo igitur maior eſt GL, quàm BZ, & quadratum ex GL quadrato ex BZ maius. & cum æqualis ſit AL ipſi AB, erit & quadratum ex AL quadrato ex AB æquale. ſed quadrato quidem ex AL ęqualia ſunt quadrata ex AG GL; quadrato autem ex AB æqualia quadrata ex BZ ZA. quadrata igitur ex AG GL quadratis ex BZ ZA æqualia ſunt; quorum quadratum ex BZ minus eſt quadrato ex GL. ergo reliquum ex ZA quadratum maius eſt quadrato ex AG: & obid recta linea ZA, quã recta AG eſt maior. Duabus igitur ſphæris circa idẽ

centrum existentibus, in maiori solidum polyhedrum descriptum est, minoris sphæræ superficiem non tangens. quod facere oportebat.

COROLLARIVM.

Quod si etiam in altera sphæra, solido polyhedro descripto in sphæra ABCDE simile solidũ polyhedrum describatur, habebit solidũ polyhedrum in sphæra BCDE ad solidum polyhedrum in altera sphæra triplam proportionem eius, quam diameter sphæræ BCDE habet ad alterius sphęrę diametrũ. diuisis enim solidis in pyramides numero æquales, & eiusdem ordinis; erunt pyramides similes. similes autem pyramides inter se in tripla sunt proportione homologorum laterum. ergo pyramis, cuius basis est KBOS quadrilaterum, vertex autem punctum A ad pyramidem in altera sphæra eiusdem ordinis triplam proportionem habet eius, quam latus homologum habet ad homologum latus; hoc est, quam habet AB ex centro sphærę circa centrum A existentis ad eam, quę est ex centro alterius sphęræ. Similiter & vnaquæque pyramis earum, quæ sunt in sphæra circa centrum A ad vnamquamque pyramidem eiusdem ordinis, quę sunt in altera sphæra, triplam proportionem habebit eius, quam habet AB ad eam, quę est ex cẽtro alterius sphærę. Et vt vnũ antecedentium ad vnũ consequentium, ita antecedentia omnia ad omnia consequentia. quare totum solidum polyhedrum, quod est in sphæra circa centrum A ad totum solidum polyhedrum, quod in altera sphæra triplam proportionem habebit eius, quam habet AB ad eam, quæ est ex centro alterius sphęrę, hoc est quam habet BD diameter ad alterius sphærę diametrum.

F. C. COMMENTARIVS.

A Erunt sectiones circuli.] *Hoc vniuerse à Theodosio demonstratur in prima propositione sphęricorum, nempe quomodocunque plano sphęra secetur, semper sectiones fieri circulos.*

B Erit OV quidem ipsi SQ æqualis. BV vero æqualis KQ]. *Sint enim duo semicirculi æquales ABC DEF, sumanturq́, æquales circumferentiae AB DE: & à punctis B E perpendiculares ducantur BG EH. Dico BG ipsi EH, & AG ipsi DH æqualem esse. Quoniam enim circumferentia AB est æqualis circumferentiae DE, quae sunt æqualium circulorum, erunt rectae lineae AB DE inter se æquales. & eadem ratione æquales BC EF. ergo & vt AB ad BC, ita DE ad EF: atque est angulus ABC in semicirculo rectus æqualis recto DEF. cum igitur circa æquales angulos latera sint proportionalia*



29. huius.

lia, erit triangulum ABC ſimile triangulo DEF. ſed triangulum AEG eſt ſimile triangulo ABC, ergo & ipſi DEF. triangulum autem DEH eſt ſimile triangulo DEF. triangulum igitur ABG triangulo DEH eſt ſimile. ergo vt AE ad BG, ita DE ad EH, & permutando vt AB ad DE, ita BG ad EH. aequalis autem eſt AB ipſi DE. ergo & BG ipſi EH eſt aequalis. & eodem modo demonſtrabitur AG aequalis ipſi DH, quod demonſtrare oportebat. ſed & illud vniuerſe in omnibus portionibus demonſtratur ſequenti lemmate. 6.sexti. 8.sexti. 9.sexti. 14.quinti.

Sint ęquales portiones ęqualiũ circulorũ ABC DEF; ſumanturq; circumferẽtiæ ęquales AB DE: & à pũctis BE ad AC DF perpendiculares ducantur BG EH. Dico BG quidem ipſi EH æqualem eſſe; AC vero ipſi DH.



Iungantur AB DE. & quoniam aequales ſunt circumferentiae AB DE, erunt & reliquae BC EF inter ſe aequales. ergo & aequales anguli, qui in ipſis conſiſtunt. quare angulus BAC eſt aequalis angulo EDF. ſed & recti ſunt anguli, qui ad G H. duo igitur triangula ſunt ABG DEH, quae duos angulos duobus angulis aequales habent, alterum alteri, & vnum latus BA vni lateri DE aequale, quod vni aequalium angulorum ſubtenditur. ergo omnia omnibus ſunt aequalia. aequalis igitur eſt AG ipſi DH, & BG ipſi EH. quod demonſtrare oportebat. 27.tertij. 6.primi.

C

Nam ſi duæ rectæ lineæ parallelę ſint, & in vtraque ipſarum quæuis puncta ſumãtur, quæ dicta puncta coniungit in eodem eſt plano in quo parallelæ] *Ex VII. vndecimi.*

D

Et quoniam KB maior eſt, quam QV] *Eſt enim triangulum AQV triangulo AKB ſimile, cum angulus ad A ſit vtrique communis, anguluſq; AQV angulo AKB, & angulus AVQ angulo ABK aequalis. vt igitur AK ad KB, ita AQ ad QV, & permutando vt AK ad AQ, ita KB ad QV. eſt autem AK maior, quàm AQ. ergo & KB, quàm QV maior erit.* 29.primi. 4.sexti.

Erit quadratum ex KB maius, quàm duplum quadrati ex BZ.] *Nam cum rectae lineae KB BO KS aequales ſint, & minor ipſis OS; erunt circumferentiae, quas auferunt KB BO KS inter ſe aequales, & reliqua circumferentia OS maiores. quare & anguli KZS KZB BZO ęquales, & maiores angulo OZS. ſunt autem quattuor anguli quattuor rectis aequales. ergo OZS eſt minor recto, videlicet acutus; & vnuſquiſque reliquorum trium obtuſus; ac propterea quadratum quod fit ex KB maius eſt duobus quadratis, quae ex KZ ZB, hoc eſt maius, quàm duplũ quadrati, quod ex BZ. ſunt enim KZ ZB inter ſe aequales, vt demonſtratum eſt. ſed & hoc ſequenti lemmate planius demonſtratur.* E

Sit in circulo quadrilaterum KBOS, cuius tria latera SK KB BO, inter ſe ſint ęqualia: ſitq; BO maior, quàm OS; & ſumpto circuli centro Z, iungatur BZ. Dico quadratum ex KB quadrati ex BZ maius eſſe, quàm duplum.



Iungantur enim OZ SZ KZ. Quoniam igitur BZ eſt aequalis ZS, & communis ZO; erunt duae BZ ZO duabus SZ ZO aequales, altera alteri, & baſis BO baſi OS maior. angulus igitur BZO angulo OZS eſt maior. & quoniam angulus OZB vnicuique ipſorum BZK KZS eſt ęqualis; in aequalibus namque circumferentijs conſiſtunt OB BK KS; quòd rectae lineę ęquales ſint: erit & vterque angulorum BZK KZS maior angulo OZS. ſed quattuor anguli OZS SZK KZB BZO quattuor rectis ſunt aequales; etenim circa vnum punctum Z conſiſtunt. vnuſquiſque igitur angulorum OZB BZK KZS eſt obtuſus. ideoq; obtuſiangulum eſt triangulum BZO. At in obtuſiangulis triangulis, quod à latere obtuſum angulum ſubtendente ſit quadratum maius eſt quadratis, quae à lateribus obtuſum angulum continentibus fiunt. ergo quadratum, quod ex BK maius eſt quadratis, quae ex KZ ZB. ſed quadrata ex KZ ZB dupla ſunt quadrati Coroll. 15. primi.

drati ex BZ; aequalis enim eſt KZ ipſi ZB. quadratũ igitur ex KB, maius eſt, quàm duplum quadrati ex BZ. quod oportebat demonſtrare.

F Et quoniam BD minor eſt quàm dupla ipſius DΩ] *Perpendicularis enim à puncto K ducta ad BD, cadit inter G & B, quod circulum FGH non tangit, vt ex antecedente conſtat: & cum BD dupla ſit ipſius DA, erit ipſius DΩ minor, quàm dupla.*

G Atque eſt vt BD ad DΩ, ita rectangulum contentum DB BΩ ad rectãgulum quod DΩ ΩB continetur.] *Deſcribatur ex ΩB quadratum quod ſit ΩEΥΞ, & compleatur DΞ parallelogrammum. erit ut BD ad LΩ, ita rectangulum DΥ ad rectangulum DΞ. ex prima ſexti, hoc eſt ita rectangulum, quod continetur DB BΩ ad rectangulum contentum DΩ ΩB.*



H Et iuncta KD, quod DB BΩ continetur eſt æquale quadrato KB.] *Eſt enim angulus in ſemicirculo DKB rectus, & ab eo ad baſim perpendicularis ducitur KΩ. quare ex corollario octauæ ſexti libri KΩ eſt proportionalis media inter DB BΩ: & KΩ media inter DΩ ΩB: & ob id quadratum quidem ex KB æquale eſt rectangulo contento DB BΩ; quadratum uero ex KΩ æquale ei, quod DΩ ΩB continetur.*

K Multo igitur maior eſt AZ quàm AG] *Quoniam enim polygonum BKLME in maiori circulo BCDE deſcriptum eſt, non tangens minorem circulum FGH, perpendicularis à puncto K ducta ad BD, videlicet KΩ circumferentiam eius non tanget ex ijs, quae in antecedente demonſtrata ſunt. quare AΩ maior erit, quàm AG; & idcirco AZ longe maior, quàm quae à centro minoris ſphæræ ad eius ſuperficiem pertinet.*

L Et quoniam in circulo eſt ΓKSO quadrilaterum] *Intelligatur enim deſcriptum quadrilaterum BKSO, vt in antecedentibus.*

M Et ſunt æquales OB BK KS, & minor OS] *Hæc proxime demonſtrata ſunt.*

N Et cum æqualis ſit AL ipſi AB.] *Sunt enim à centro ad circumferentiam maioris circuli BCDE.*

THEOREMA XVI. PROPOSITIO. XVIII.

Sphæræ inter ſe in tripla ſunt proportione ſuarum diametrorũ.



Intelligantur ſphæræ ABC DEF; quarum diametri BC EF. Dico ABC ſphærã ad ſphęram DEF triplam proportionem habere eius, quã habet BC ad EF. Si enim non ita eſt, ſphęra ABC ad ſphæram minorem ipſa DEF, vel ad maiorem triplam proportionem habebit eius, quam habet BC ad EF. Habeat primo ad minorem, videlicet ad GHK. & intelligatur ſphæra DEF circa idem centrũ, circa quod eſt ſphæra GHK; deſcribaturq; in maiori ſphæra DEF ſolidum polyhedrum non tangẽs minorem ſphæram GHK in ſuperficie; & in ſphæra ABC deſcribatur ſolidum polyhedrum ſimile ei, quod in ſphęra DEF deſcriptum eſt. ſolidum igitur polyhedrum, quod in ſphęra ABC ad ſolidum polyhedrum, quod in ſphęra DEF triplam proportionem habet eius, quam BC ad EF. habet autem ABC ſphęra ad ſphæram GHK triplam proportionem eius, quam BC ad EF. ergo vt ABC ſphęra ad ſphęram GHK,

Ex antecedente.

Ex corel an tecedente.

HK, ita ſolidum polyhedrum in ſphęra A B C ad ſolidum polyhedrum in ſphæra DEF; & permutando, vt ABC ſphęra ad ſolidum polyhedrum, quod in ipſa eſt, ita GHK ſphæra ad ſolidum polyhedrum, quod in ſphæra DEF. maior autem eſt ſphæra ABC ſolido polyhedro, quod eſt in ipſa. ergo & GHK ſphærę polyhedro, quod in ſphęra DEF eſt maior. ſed & minor, ab ipſo enim comprehenditur, quod fieri non poteſt. non igitur ABC ſphæra ad ſphæram minorem ipſa DEF triplam proportionem habet eius, quam BC ad EF. ſimiliter oſtendemus neque D E F ſphærā ad ſphæram minorem ipſa ABC triplam habere proportionem eius, quam habet EF ad BC. Dico inſuper ſphæram ABC neque ad maiorem ſphæram ipſa DEF triplam proportionem habere eius, quā BC ad EF. Si enim fieri poteſt, habeat ad maiorem LMN. conuertendo igitur ſphęra LMN ad ABC ſphæram triplam proportionē habet eius, quam diameter EF ad BC diametrum. Vt autem ſphæra LMN ad ABC ſphęram, ita ſphæra DEF ad ſphæram quādam minorem ipſa ABC, vt ante demonſtratum fuit; quoniam ſphæra LMN maior eſt ipſa DEF. ergo & DEF ſphæra ad ſphęram minorem ipſa ABC triplam proportionem habet eius, quam EF ad BC, quod fieri non poſſe oſtenſum eſt. non igitur ABC ſphæra ad ſphęram maiorē ipſa DEF triplam proportionem habet eius, quam BE ad E F. oſtenſum autem eſt neque ad minorem. ergo ABC ſphæra ad ſphęram DEF triplam proportionem habebit eius, quam BC ad EF. quod demonſtrare oportebat.

DVODECIMI LIBRI FINIS.



EVCLIDIS ELEMENTORVM

LIBER TERTIVSDECIMVS ET SOLIDORVM TERTIVS.

CVM SCHOLIIS ANTIQVIS ET COMMENTARIIS.

Federici Commandini Vrbinatis.

THEOREMA I. PROPOSITIO I.

A

B

I recta linea extrema, ac media ratione secta fuerit, maior portio assumens dimidiã totius, quintuplum potest eius, quod à dimidia fit, quadrati.

Recta enim linea AB extrema, ac media ratione secetur in puncto C; & sit AC maior portio: producaturq; in directum ipsi CA recta linea AD; & ponatur AD ipsius AB dimidia. Dico quadratum ex CD quadrati ex DA quintuplum esse. describantur ex AB DC quadrata AE DF, & in DF describatur figura, & FC ad G producatur. Itaque quoniam AB extrema, ac media ratione secatur in C, erit quod AB BC continetur æquale quadrato ex AC. atque est rectãgulum quidem CE quod continetur AB BC: quadratum vero ex AC est FH. ergo rectangulum CE quadrato FH est æquale. & quoniam BA dupla est ipsius AD; æqualis autem BA ipsi AK; & DA ipsi AH: erit & KA ipsius AH dupla. ut autem KA ad AH, ita est rectangulum KC ad ipsum CH. duplum igitur est KC rectangulum rectanguli CH:

5. secti.

C & sunt rectangula LH HC ipsius CH dupla. ergo rectangulum KC rectãgulis LH HC est æquale. ostensum autem autem est & rectangulum CE æquale quadrato FH. totum igitur AE quadratũ est æquale gnomoni MNX. Rursus quoniam BA

D dupla est ipsius AD, erit quadratum ex BA quadrati ex ad quadruplum, hoc est quadratum AE quadrati DH. æquale autem est quadratum AE gnomoni MNX. ergo & MNX gnomon quadruplus est quadrati DH. & ob id totum DF ipsius DH est quintuplum. atque est DF quidem quadratum ex CD, DH vero quadratum ex DA. quadratum igitur ex CD quadrati ex DA quintuplũ erit. ergo si recta linea extrema, ac media ratione secta fuerit, maior portio assumens totius dimidiam quintuplum potest eius, quòd à dimidia fit quadrati. quod demonstrare oportebat.



SCHOLIVM.

SCHOLIUM.

Resolutio est sumptio quæsiti tãquam concessi per ea, quæ consequuntur in aliquod uerum conceſſum.

Compositio est sumptio concessi per ea, quę consequuntur in quæsiti conclusionem, seu deprehensionem.

Antecedentis theorematis resolutio.

Recta enim linea quædam A B extrema, ac media ratione secetur in C, sitq; he maior portio A C, & ponatur A D ipsius AB dimidiæ æqualis. Dico quadratum ex CD quadrati ex DA quintuplũ esse. Quo



niam enim quintuplum est quadratum ex CD quadrati ex DA; quadrato autem ex CD æqualia sunt quadrata ex CA AD vnà cum eo, quod bis CA AD continetur: erunt quadrata ex CA AD vnà cum eo, quod bis CA AD continetur, quadrati ex AD quintupla. ergo diuidendo quadratum ex CA vnà cum eo, quod bis continetur CA AD quadruplum est quadrati ex AD. Sed ei quidem, quod bis CA AD continetur æquale est rectangulum BAC. est enim BA ipsius AD dupla. quadrato autem ex AC est æquale rectangulum ABC; namque A B extrema, ac media ratione secta est in C. rectangulum igitur BAC vnà cum rectangulo ABC quadruplum est quadrati ex AD. sed rectangulum B A C vnà cum rectangulo ABC est id, quod fit ex AB quadratum. ergo quadratum ex BA quadruplum est quadrati ex AD. quod quidem ita se habet. est enim BA ipsius AD dupla. 4. secundi. 2. secundi. Cor. 10. sexti

Compositio.

Quoniam igitur quadruplum est quadratum ex BA quadrati ex AD; quadratũ autem ex AB est rectangulum BAC: vnà cum rectangulo ABC: erit rectangulum BAC vnà cum rectangulo ABC quadrati ex AD quadruplum. sed rectangulum quidem BAC est æquale ei, quod bis DA AC continentur; rectangulum autem ABC est æquale quadrato ex AC. ergo quadratum ex AC vnà cum eo, quod bis continetur DA AC quadruplum est quadrati ex DA; & ob id quadrata ex DA AC vnà cũ eo, quod bis DA AC continetur quintuplum est quadrati ex DA. sed quadrata ex DA AC vnà cum eo, quod bis continetur DA AC est id, quod fit ex DC quadratum. quadratum igitur ex CD quadrati ex DA quintuplum erit. quod oportebat demonstrare.

F. C. COMMENTARIVS.

Recta enim linea AB extrema, ac media ratione secetur in pũcto C] *Quomodo hoc fiat, docuit in vndecima propositione secundi libri, & in 30 sexti.* A

Describantur ex AB DC quadrata AE DF, & in DF describatur figura] *Sit ex AB quadratum AKEB, & ex DC quadratum DLHC; & iuncta DF, ducatur per A recta linea AH parallela alterutri ipsarum DL CF, quae diametrum DF in puncto H secet. rursus per H ducatur recta linea alterutri ipsarum LF DC parallela.* B

Et sunt rectangula LH HC ipsius HC dupla] *Supplementa enim LH HC inter se sunt aequalia ex 43 primi libri.* C

Erit quadratum ex BA quadrati ex AD quadruplum] *Ex 20 sexti.* D

Quadratum igitur ex CD quadrati ex DA quintuplum erit] *Possimus etiam aliter, & fortasse expeditius idem demonstrare in hunc modum.* E

Sit recta linea AC, quae extrema, ac media ratione secetur in C, & ex AB fiat quadratũ ADEB; sectaq; AD bifariã in F, & iuncta FB, producatur FA in G, ita vt FG ipsi FB sit aequalis, erit AG equalis AC ex demõstratis i vndecima secũdi libri. quare FG cõstat ex maiori portione, et ex dimidia totius AB. Dico quadratũ ex FG quin

20. sexti. *tuplũ esse quadrati ex FA. Quoniam enim AB dupla est ipsius AF, erit quadratũ ex AB quadrati ex AF quadruplũ. sed quadratum ex FB est aequale quadratis ipsarum FA AB, ex 47 primi. quadratũ igitur ex FB, hoc est quadratum ex FG quadrati. ex FA quintuplũ erit. quod oportebat demonstrare. sed & alia nonnulla demonstranda sunt, quae ad hanc sectionem attinent.*



PROPOSITIO I.

Data recta linea extrema, ac media ratione secta, & vtra que ipsius portio data erit.

Sit data recta linea AB 10, quae extrema, ac media ratione secetur in C. Dico ipsas AC CB datas esse. Constituantur enim eadem, quę supra. & quoniam AB est 10, erit eius dimidia AF 5, cuius quadratũ est 25: quadratũ aũt ipsius AB est 100. ergo quadratũ ex FB est 125, & ipsa FB, hoc est FG ℞ 125. sed FA est 5. erit igitur AG, hoc est AC ℞ 125 minus. Quòd cũ 5. sit vt BA ad AC, ita AC ad CB, re

17. sexti. *ctangulum contentum AB BC, videlicet rectangulum CE aequale erit quadrato ex AC. quadratum autem ex AC, hoc est quadratum ℞ 125 minus 5 est 150 minus ℞ 12500. si igitur ad CH applicetur 150 minus ℞ 12500 latitudinem faciẽs CB, erit CB 15 minus ℞ 125. ergo AC CB datae sunt, vt oportebat.*



Ex quibus manifestum est si recta linea rationalis, expositæ rationali longitudine commẽsurabilis extrema ac media ratione secta fuerit, maiorem eius portionẽ apotomen esse quintam, & minorem esse apotomen primam.

Est enim quadratum ex AB quadrati ex AF quadruplum. ergo quadratum ex FB ad quadratum ex BA proportionem habet, quam 5 ad 4. & quoniam quadratum ex FB ad quadratum ex

9. decimi. *BA proportionem non habet, quam quadratus numerus ad quadratum numerum; erit FB ipsi BA longitudine incommensurabilis; ac propterea FB plus potest, quàm FA quadrato rectae lineae sibi incommensurabilis longitudine. est autem AF, quae ipsi AG congruit, expositae rationali longi-*

5. diffi. tertiarum. *tudine commensurabilis. quare AC est apotome quinta. At vero CB esse apotomen primam, manifesto constat; quadratum enim apotomes ad rationalem applicatum latitudinem facit apotomen primam ex 98 decimi libri.*

PROPOSITIO. II.

Data maiori portione, totam rectam lineam, quæ extrema, ac media ratione secta sit, inuenire.

Sit maior portio AB, & exponantur rectae lineae CD E, ita vt CD sit ipsius E quintupla: inter CD vero, & E media proportionalis sit F: & ex CD abscindatur DG ipsi F aequalis; fiatq; vt CG ad GD, ita AB ad BH. erit igitur componendo vt CD ad DG hoc est ad F, ita AH ad HB. et quoniam tres rectae lineae CD F E deinceps proportio-

Cor. 20. sexti *nales sunt, erit vt CD ad E, ita quadratum ex CD ad quadratum ex F. est autem CD quintupla ipsius E. quadratũ igitur ex CD quintuplum est quadrati ex F. ergo quadratum ex AH quadrati ex HB est quintuplũ. estq; AB ma-*



ior portio

ior portio rectae lineae, quae extrema, ac media ratione secatur. quare BH est totius dimidia, & dupla ipsius BH est tota recta linea, quam nobis inueniendam proposuimus.

Itaque constat, Data maiori portione rectæ lineæ, quæ extrema, ac media ratione secetur, & maiorem portionem, & totam lineam datam esse.

Sit enim maior portio AB 4, sitq; CD 5, & E 1. erit F, hoc est GD Rx 5, & CG 5 minus Rx 5. fiat vt 5 minus Rx 5 ad Rx 5, ita 4 ad aliam. multiplicabimus igitur primum Rx 5 per 4, producetur Rx 80. deinde multiplicabimus 5 minus Rx 5 per eam, quae ex binis nominibus ipsi respondet, videlicet per 5 plus Rx 5, producetur 20. & per eandem multiplicabimus Rx 80 fiet Rx 2000 plus Rx 400. quare si ad 20 applicabimus Rx 2000 plus Rx 400, latitudinem faciet Rx 5 plus 1, cuius duplum est Rx 20 plus 2. tota igitur recta linea est Rx 20 plus 2, & minor portio Rx 20 minus 2.

THEOREMA II. PROPOSITIO. II.

Si recta linea partis ipsius quintuplum possit, dupla dictæ partis extrema, ac media ratione secta, maior portio reliqua pars est eius, quæ à principio rectæ lineæ.

Recta enim linea AB partis ipsius AC quintuplum possit: & ipsius AC dupla sit CD. Dico si CD extrema, ac media ratione secetur, CB maiorem esse portionem. Describatur enim ex vtraque ipsarum AB CD quadrata AF CG: & in AF figura descripta, producatur FB in E. Quoniam igitur quadratum AF quintuplum est ipsius AH, erit MNX gnomō ipsius AH quadruplus. & quoniam DC dupla est CA, quadratum ex DC quadrati ex CA quadruplum est, videlicet quadratum CG quadruplum quadrati AH. ostensus est autem MNX gnomon quadruplus ipsius AH quadrati, ergo gnomon MNX quadrato CG est æqualis. Rursus quoniam DC dupla est CA, æqualis autem est DC ipsi CK, & AC ipsi CH; erit KC ipsius CH dupla. parallelogrammum igitur KB duplum est parallelogrammi BH. & sunt parallelogramma LH HB ipsius HB dupla. ergo KB æquale est ipsis LH HB. sed & totus MNX gnomō toti CG est æqualis. & reliquum igitur HF æquale est reliquo BG. atque est BG quidem quod CD DB cōtinetur; etenim CD est æqualis DG: ipsum vero HF est quadratum ipsius BC. ergo quod continetur CD DB quadrato ex CB est æquale. vt igitur DC ad CB, ita est CB ad BD. maior autem est DC, quàm CB. ergo & CB quàm BD est maior. Itaque recta linea CD extrema, ac media ratione secta, maior portio est CB. si igitur recta linea partis ipsius quintuplum possit, dupla dictæ partis extrema, ac media ratione secta, maior portio reliqua pars est eius, quæ à principio rectæ lineæ. quod demonstrare oportebat.



A 20. sexti.
B 19. sexti.

At vero duplam ipsius AC maiorem esse, quàm CB, sic demonstrabitur.

Si enim nō, sit, si fieri potest, BC ipsius CA dupla. quadratum igitur ex BC quadruplum est quadrati ex CA; & ob id vtrumque quadratorum, quæ fiunt ex BC CA quadrati ex CA quintuplum est. sed & quadratum ex BA quadrati ex AC quintuplum ponitur. ergo quadratum ex BA æquale est quadratis ex BC CA. quod fieri non potest. non igitur BC dupla est ipsius CA. similiter demonstrabimus neque minorem BC ipsius CA duplam esse. multo enim maius absurdum sequetur. ergo ipsius AC dupla maior est quàm BC. quod demonstrandum fuit.

SCHOLIVM.

Antecedentis theorematis reſolutio.



Recta enim linea quædam CD partis ipſius DA quintuplũ poſſit,& ipſius DA dupla ponatur AB.Dico AB extrema, ac media ratione ſectam eſſe in puncto C,& maiorem portionem eſſe AC, quæ quidem eſt reliqua pars eius,quę à principio rectæ lineę.Quoniam enim AB extrema,ac media ratione ſecta eſt in C,& AC eſt maior portio ; erit rectangulum ABC quadrato ex AC ęquale.eſt autem & rectangulum BAC ęquale ei, quod bis DA AC continetur. etenim BA ipſius AD eſt dupla.ergo rectangulum ABC vnà cum rectangulo BA C,quod quidem eſt ipſius AB quadratũ,æquale eſt ei,quod bis DA AC continetur vnà cum quadrato ex AC. quadratum autem ex AB quadruplum eſt quadrati ex AD.ergo quod bis DA AC continetur vnà quadrato ex AC quadruplum eſt eius, quod fit ex AD quadrati.ergo & quadrata ex DA AC vnà cum eo, quod bis continetur DA AC;hoc eſt quadratũ ex CD,quintupla ſunt quadrati ex AD. quod quidem ita ſe habet.

3.ſecundi.
10. ſexti.
4. ſecundi.

Compoſitio.

Qm̃ igitur quadratũ ex CD quintuplũ eſt quadrati ex DA; quadrato aũt ex CD ęqualia ſunt quadrata ex DA AC vnà cũ eo,quod bis DA AC cõtinetur; erũt quadrata ex DA, AC vnà cũ eo,quod bis cõtinetur DA AC quintupla ipſius quadrati ex DA.& diuidendo quod bis DA AC cõtinetur vnà cũ quadrato ex AC quadrupla sũt quadrati ex AD.eſt aũt &quadratũ ex AB quadrati ex AD quadruplũ.ergo quod bis cõtinetur DA AC,quod eſt rectãgulũ BAC vnà cũ quadrato ex AC eſt ęquale quadrato ex AB.ſed quadratũ ex AB eſt rectãgulũ ABC unà cũ rectãgulo BAC.rectãgulũ igitur BAC vnà cũ rectãgulo ABC eſt æquale rectangulo BAC vnà cũ quadrato ex AC. & ablato communi rectangulo BAC, erit reliquũ rectangulũ ABC quadrato ex AC æquale.eſt igitur vt BA ad AC,ita AC ad CB. maior autem eſt BA, quam AC.ergo & AC quam CB eſt maior.quare AB extrema, ac media ratione ſecta eſt in C,& AC eſt maior portio.quod demonſtrare oportebat.

6.ſecundi.
14.ſexti.

F. C. COMMENTARIVS.

A Recta enim linea AB partis ipſius AC quintuplum poſsit] *Hoc eſt quadratum rectę lineę AB quintuplum ſit quadrati partis ipſius AC.*

B Maior autem eſt DC,quam CB]*Hoc eſt dupla ipſius AC maior eſt, quam BC, illud uero ipſe mox demonſtrabit.ſed & aliter idẽ demõſtrari poteſt hoc pacto.*

Recta enim linea AB partis ipſius BC quintuplum poſsit, & producatur AB ad D, ita vt DC ipſius CB ſit dupla. Dico ſi CD extrema,ac media ratione ſecetur,maiorem eius portionem eſſe AC. fiãt enim ex AC CD quadrata ACEF CDGH, & BH iungatur.itaq; quoniam DC,hoc eſt HC dupla eſt ipſius CB, erit quadratum ex HC quadrati ex CB quadruplum.ſed quadratum ex BH eſt aequale duobus quadratis,quae fiunt ex HC CE.quadratum igitur ex BH quintuplum eſt quadrati ex CB ; ideoq; BH ipſi BA eſt aequalis.ergo ex ijs,quae demonſtrata ſunt in vndecima ſecundi libri recta linea CH, extrema,ac media ratione ſecatus in E, & CE eſt maior portio. eſt autem CH ipſi CD aequalis, & CE aequalis ipſi CA.ſi igitur recta linea partis ipſius quintuplum poſsit, & reliqua. quod oportebat demonſtrare.



THEO-

THEOREMA III. PROPOSITIO. III.

Si recta linea extrema, ac media ratione secta fuerit, portio minor assumens dimidiam maioris portionis quintuplũ potest eius, quod à dimidia maioris portionis fit, quadrati.



Recta enim linea quædã AB extrema, ac media ratione secetur in C; sitq; AC maior portio, & secetur bifariam in D. Dico quadratum ex BD quadrati ex DC quintuplũ esse. Describatur enim ex AB quadratum AE, & figura compleatur. Quoniam igitur AC dupla est CD, erit quadratum ex AC quadrati ex CD quadruplum, hoc est quadratum RS quadrati FG. & quoniã rectangulum, quod AB BC continetur est æquale quadrato ex AC; atque est rectangulum quidem contẽtũ AB BC ipsum GE; quadratum vero ex AC est RS: erit rectangulum CE quadrato RS æquale. quadruplum autem est quadratũ RS quadrati FG. ergo & CE rectangulum quadrati FG quadruplum est. rursus quoniam AD. æqualis est DC, erit & HK ipi KF æqualis. ideoq; quadratum GF est æquale quadrato HL. æqualis igitur est GK ipsi KL, hoc est MN ipsi NE. ergo & parallelogrammum MF parallelogrammo FE est æquale. sed MF est æquale CG. quare & CG ipsi FE æquale erit. commune apponatur CN. gnomon igitur XOP est æqualis parallelogrammo CE. ostensum autem est CE quadruplum GF quadrati. & gnomon igitur XOP ipsius GF est quadruplus. & ob id quadratum DN quintuplũ est ipsius GF. est autem quadratum quidem DN, quod fit ex DB; GF vero, quod ex DC. quadratum igitur ex BD quadrati ex DC est quintuplum. **quod demonstrare oportebat.**

SCHOLIVM.

Antecedentis theorematis resolutio.



Recta enim linea AB extrema, ac media ratione secetur in C: & sit AC maior portio, cuius dimidia CD. Dico quadratum ex BD quadrati ex DC quintuplum esse. Quoniam enim quadratum ex BD quintuplum est quadrati ex DC; quadratum autem ex BD est quod continetur AB BC vna cum quadrato ex DC. ergo qnod AB BC continetur vnà cum quadrato ex DC quintuplũ est quadrati ex DC: & dividendo quod AB BC continetur quadrati ex DC quadruplum est. Ei vero, quod continetur AB BC est æquale quadratum ex AC; etenim AB extrema, ac media ratione secta est in C. ergo quadratum ex AC quadrati ex CD quadruplum est. quod quidem ita se habet est enim AC ipsius CD dupla. 6 secundi.

Compositio.

Quoniam dupla est AC ipsius CD, erit quadratũ ex AC quadrati ex CD quadruplum. sed quadratum ex AC est æquale ei, quod AB BC continetur. quod igitur AB BC continetur quadruplum est quadrati ex CD: & componendo quod continetur AB BC vnà cum quadrato ex CD, quod quidem est quadratum ex BD, quintuplum est quadrati, quod fit ex DC. atque hoc est, quod demonstrare oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

Ex iam dictis & alia constare possumus.

Data minori portione totam rectam lineam, quæ extrema, ac media ratione secta sit, inuenire.



Sit minor portio AB: & exponantur rectae lineae CD E; sitq; CD ipsius E quintupla: & inter CD E media proportionalis sumatur F, & alia construatur, quemadmodum superius dictum est in propositione secunda earum, quas nos ad primam huius apposuimus. similiter demonstrabitur quadratum ex AH quadrati ex HB quintuplum esse. atque est AB minor portio rectas lineae, quae extrema, ac media ratione secatur. ergo BH est maioris portionis dimidia, & eius dupla BK portio maior. tota igitur linea est AK, cuius maior portio KB, & minor BA.

Patet igitur data minori portione rectæ lineę, quæ extrema ac media ratione secatur, & maiorem portionem & totam lineam datam esse.

Sit enim minor portio AB 4, & sit CD 5, & E 1. similiter, vt supra eodem in loco, demonstrabimus, maiorem portionem esse Ɛ 20 plus 2 quare tota recta linea erit 6 plus Ɛ 20.

THEOREMA IIII. PROPOSITIO IIII.

Si recta linea extrema, ac media ratione secta fuerit, totius & minoris portionis vtraq; quadrata tripla sunt quadrati eius, quod à maiori fit portione.



Sit recta linea AB, quę extrema, ac media ratione secetur in C, & sit AC maior portio. Dico quadrata ex AB BC quadrati ex AC tripla esse. Describatur enim ex AB quadratū ADEB, & figura compleatur. itaque quoniam AB extrema, ac media ratione secta est in C, & maior portio est AC; erit rectangulum contentū AB BC quadrato ex AC æquale. atque est rectangulum quidem AK, quod AB BC continetur: quadratum vero HG est quod fit ex A. C. æquale igitur est AK ipsi HG. & quoniam rectangulum AF est æquale FE, commune apponatur CK, erit totum AK toti CE æquale. ergo rectāgula CE AK ipsius AK sunt dupla. sed rectāgula AK CE sunt gnomon LMN, & quadratum CK. gnomon igitur LMN, & quadratum CK dupla sunt ipsius AK. rectangulum autem AK ostensum est æquale quadrato HG. ergo gnomon LMN, & quadratum CK ipsius HG sunt dupla; ac propterea gnomon LMN, & quadrata CK HG tripla sunt quadrati HG. & gnomon quidem LMN, & quadrata CK HG sunt totum AE quadratum, & quadratum CK, quę quidem sunt quadrata ex AB BC. quadratum autem GH est quod fit ex AC. quadrata igitur ex AB BC quadrati ex AC sunt tripla. quod demonstrare oportebat.

SCHOLIVM.

Antecedentis theorematis resolutio.

Recta enim linea AB extrema, ac media ratione secetur in C, & sit AC maior portio

portio. Dico quadrata ex AB BC tripla esse quadrati ex AC. Quoniam enim quadrata ex AB BC tripla sunt quadrati ex AC; suntque quadrata ex AB BC æqualia rectãgulo, quod bis AB BC continetur vnà cum quadrato ex AC: erit rectangulum, quod bis continetur AB BC vnà cum quadrato ex AC triplum quadrati ex AC: & diuidendo quod bis cõtinetur AB BC duplũ quadrati ex AC. ergo quod semel AB BC continetur quadrato ex AC est æquale. quod quidem ita se habet. recta enim linea AB extrema, ac media ratione secta est in puncto C.



Compositio.

Itaque quoniam AB extrema, ac media ratione secta est in C, atque est AC maior portio; erit rectangulum, quod AB BC continetur quadrato ex AC æquale. ergo quod bis continetur AB BC duplum est quadrati ex AC: & cõponendo quod bis continetur AB BC vnà cum quadrato ex AC triplum est quadrati ex AC. sed quod bis AB BC continetur vnà cum quadrato ex AC est æquale quadratis, quæ ex AB BC fiunt. quadrata igitur ex AB BC quadrati ex AC sunt tripla.

THEOREMA V. PROPOSITIO. V.

Si recta linea extrema, ac media ratione secetur, adijciaturque ipsi æqualis maiori portioni; erit tota linea extrema, ac media ratione secta, & maior portio erit ea, quæ à principio posita est recta linea.



Recta enim linea AB extrema, ac media ratione secetur in C, & sit AC portio maior: ponaturq; ipsi CA æqualis AD. Dico rectam lineam DB extrema, ac media ratione secari in puncto A: & maiorem portionem esse AB, quę à principio posita est. Describatur enim ex AB quadratum AE, & figura compleatur. Quoniam igitur AB extrema, ac media ratione secta est in C, erit rectangulum quod continetur AB BC quadrato ex AC æquale. & rectangulum quidem quod continetur AB BC est CE: quadratum vero ex AC est CH. ergo EC ipsi CH est æquale. sed CE est æquale EH, & CH ipsi HD. quare & DH ipsi HE æquale erit. cõmune apponatur HB. totum igitur DK toti AE est æquale. atque est DK quidem, quod BD DA continnetur; est enim AD æqualis DL: quadratũ aũt AE est quod fit ex AB. ergo quod BD DA cõtinetur est æquale quadrato ex AB. & ob id vt DB ad BA, ita est BA ad AD. sed BD est maior, quam BA. maior igitur est BA quàm AD. ergo DB extrema, ac media ratione secta est in A, & AB est maior portio. quod demonstrare oportebat. 14. secti.

SCHOLIVM.

Antecedentis theorematis resolutio.

Recta .n. linea AB extrema, ac media ratione secetur in C: & sit maior portio AC: pona-

C:ponaturq; AD ipsi AC æqualis. Dico DB extrema ac media ratione secari in puncto A: & BA maiorem esse portionem. Quoniã enim

DB extrema,ac media ratione secta est in A, & maior portio est AB; erit vt DB ad BA,ita BA ad AD.æqualis autem est DA ipsi AC.vt igitur DB ad BA,ita BA ad AC:& per conuersionem rationis vt BD ad DA, ita AB ad BC. quare diuidendo ut BA ad AD,ita AC ad CB.æqualis autem est DA ipsi AC. est igitur vt BA ad AC, ita AC ad CB. quod quidem ita se habet,etenim AB extrema, ac media ratione secatur in C puncto.

Compositio.

Itaque quoniam AB extrema,ac media ratione secatur in C, erit vt BA ad AC ita AC ad CB.æqualis autem est CA ipsi AD.ergo ut BA ad AD,ita AC ad CB: cõponendoque vt BD ad DA, ita AB ad BC; & per conuersionem rationis vt DB ad BA,ita BA ad AC.atque est CA æqualis AD. est igitur vt DB ad BA, ita BA ad AD.quare DB extrema,ac media ratione secatur in pũcto A,& BA est portio maior.

F. C. COMMENTARIVS.

Sed non inutile uisum est hoc loco demonstrare theorema aliud quo utitur Pappus in quinto libro,quamquam eius demonstrationem nullam afferat.

Si recta linea extrema,ac media ratione secetur,abscindaturque à maiori portione linea,quę minori sit æqualis;erit etiam ea extrema, ac media ratione secta,& maior portiõ erit quæ abscissa est recta linea



Sit recta linea AB, quae extrema,ac media rõne secetur in C, sitq; AC maior portio:& ab ipsa AC abscindatur CD, quae ipsi CB sit aequalis. Dico AC extrema, & media rõne secari in D:& CD maiorem esse portionẽ.fiat enim ex AB quadratũ AE: & iuncta AE ducantur per CD rectae lineae CFK DL ipsi BE parallelae, quae diametrum AE secent in punctis FL: & per FL ducantur GFH ML parallelae ipsi AB.Itaque quoniam AB extrema,ac media ratione secatur in C; rectangulũ, quod AB BC continetur, hoc est rectangulum CE est aequale quadrato AF.sed ipsi CE aequale est rectangulum GE; etenim supplementa CH GK inter se aequalia sunt;& quadratum FE est commune vtrique.ergo rectangulum GE quadrato AF est aequale.si igitur à rectangulo GE auferatur FE quadratum;& à quadrato AF auferatur quadratum LF, quod quidem est aequale quadrato FE,cum DE CB sint aequales, reliquum GK rectangulum,hoc est rectangulum MF,hoc est ipsum DF gnomoni NXO aequale erit, à quibus sublato communi LC,erit reliquum DG rectangulum aequale quadrato LF. at rectangulum quidem DG est quod CA AD continetur:quadratum vero LF est quod fit ex DC. vt igitur AC ad CD,ita CD ad DA.sed AC maior est,quàm CD.ergo & CB quàm DA maior erit. recta igitur linea AC extrema,ac media rõne secta est in D,& maior eius portio est CD. quod demõstrare oportebat.

14. huius.

THEOREMA VI. PROPOSITIO. VI.

Si recta linea rationalis extrema,ac media ratione secta fuerit, vtraque portio irrationalis est,quæ apotome appellatur.

Sit recta linea rationalis AB;& secetur extrema,ac media ratione in C, sitque AC maior portio.Dico vtramque portionem AC CB irrationalẽ



esse.

esse, quæ apotome appellatur. producatur enim BA in D, & sit ipsius BA dimidia AD. Itaque quoniam recta linea AB extrema, ac media ratione secatur in C, & maiori portioni CA adijcitur AD, quę est ipsius AB dimidia; erit quadratum ex CD quadrati ex DA quintuplum. quadratum igitur ex CD ad quadratum ex DA proportionem habet, quam numerus ad numerum; ideoq; quadratum ex CD commensurabile est quadrato ex DA. rationale autem est quadratum ex DA; etenim DA est rationalis, cum sit ipsius AB rationalis dimidia. ergo & quadratum ex CD est rationale; ac propterea ipsa CD rationalis. & quoniam quadratum ex CD ad quadratum ex DA proportionem non habet, quam quadratus numerus ad quadratum numerum, recta linea CD ipsi DA incommensurabilis est longitudine. quare CD DA rationales sunt potentia solum commensurabiles; & idcirco AC apotome est. Rursus quoniam AB extrema, ac media ratione secta est, & maior portio est AC; erit AB G rectangulum æquale quadrato ex AC. quod igitur fit ex apotoma AC ad rationalem AB applicatum latitudinem facit BC. sed quadratum apotomes ad rationalem applicatum latitudinem facit apotomen primam. ergo BC est apotome prima. ostensa est autem & AC apotome. si igitur recta linea rationalis extrema, ac media ratione secta fuerit, vtraque portio irrationalis est, quæ apotome appellatur. atque illud est, quod demonstrare oportebat.

ex 1. huius

6. decimi

6. dif. decimi

9. decimi

74. decimi

98. decimi

F. C. COMMENTARIVS.

Hoc nos supra etiam aliter demonstrauimus. sed & alia ab his non abhorrentia demonstrare aggrediemur, quae eiusmodi sunt.

PROPOSITIO I.

Si maior portio rectæ lineæ extrema, ac media ratione sectæ sit rationalis, expositę rationali longitudine commensurabilis, erit minor portio apotome quinta, & tota ex binis nominibus quinta.

Sit recta linea AB, quae extrema, ac media ratione secetur in C, & sit maior portio AC rationalis, expositae rationali longitudine commensurabilis. Dico minorem portionẽ CB esse apotomen quintam, & totam ex binis nominibus quintam.



Diuidatur enim AC bifariam in D. & quoniam AB extrema, ac media ratione secatur in C, & minori portioni BC adijcitur CD, quae est dimidia portionis maioris; quadratum ex BD quintuplum est quadrati ex DC; ac propterea ad ipsum proportionem habebit, quam numerus ad numerum, atque ipsi commensurabile erit. rationale autem est quadratum ex DC, quòd ipsa AC rationalis ponitur. ergo & quadratum ex BD est rationale, & ipsa BD rationalis. cum igitur quadratum ex BD ad quadratum ex DC proportionem non habeat, quam numerus quadratus ad quadratum numerum, recta linea BD ipsi DC incommensurabilis erit longitudine. quare BD DC rationales sunt potentia solum commensurabiles: ideoque CE apotome est. Dico & quintam esse. sit enim quadratum ex EF, quo quadratum ex BD superat quadratum ex DC. habebit quadratum ex BD ad quadratum ex EF proportionem eam, quam 5 ad 4. & cum proportionem non habeat, quam numerus quadratus ad quadratum numerum, recta linea BD ipsi EF longitudine est incommensurabilis. quare BD plus potest, quàm DC quadrato rectae lineae sibi incommensurabilis longitudine. atque est DC longitudine commensurabilis expositae rationali AC. ergo CB est apotome quinta. rursus quoniam AB extrema, ac media ratione secatur in C; & AC est maior portio, erit rectangulum ABC aequale quadrato ex AC. quadratũ igitur ex AC ad CB applicatum latitudinem faciet AB. sed quadratum rationalis ad apotomen applicatum latitudinem facit eã, quę ex binis nominibus; & eundem ordinem habet, quem ipsa apotome ex 114 decimi. ergo AB ex binis nominibus est quinta. si igitur maior portio rectae lineae extrema, ac media ratione sectae sit rationalis, expositae rationali longitudine commen-

6. decimi

6. dif. decimi

9. decimi

9. decimi

5. dif. tertiarum.

mensurabilis, erit maior portio apotome quinta, & tota ex binis nominibus quinta. quod demonstrare oportebat.

PROPOSITIO II.

Si minor portio rectæ lineæ extrema ac media ratione sectæ sit rationalis, expositæq; rationali longitudine commensurabilis, erit maior portio ex binis nominibus quinta, & tota ex binis nominibus prima.



Sit recta linea AB, quæ extrema, ac media ratione secetur in C, & sit minor portio CB rationalis, expositæq; rationali longitudine commensurabilis. Dico maiorem portionem AC esse ex binis nominibus quintam; & totam AB ex binis nominibus primam. secetur enim AC bifariam in D. Eadem ratione, qua supra, demonstrabitur quadratum ex ED quadrati ex DC quintuplum esse. itaque secetur DC in E, ita ut DE ad EC eandem proportionem habeat, quam ED ad DC. erit quadratum ex DE quadrati ex EC quintuplum, & ipsi commensurabile. & quoniam est vt tota BD ad totam DC, ita pars DE ad partem EC, erit & reliqua BE ad reliquam ED, vt BD ad DC, hoc est vt DE ad EC. ergo cum tres rectæ lineæ proportionales sint BE ED EC; erit BE ad EC, vt quadratum ex BE ad quadratum ex ED. sed quadratum ex BE quintuplum est quadrati ex ED; est enim BE ad ED, vt BD ad DC. quare BE ipsius EC quintupla est; & idcirco BC est quadrupla ipsius CE; estq; BC rationalis. ergo & rationalis CE, & ipsi CB longitudine commensurabilis. & quoniam quadratum ex DE commensurabile est quadrato ex EC, atque est quadratum ex EC rationale; erit etiam rationale quadratum ex DE, ipsaq; DE rationalis. quòd cum quadratum ex DE ad quadratum ex EC proportionem non habeat, quam quadratus numerus ad quadratum numerum; erit DE ipsi EC incommensurabilis longitudine. sunt igitur DE EC rationales, & inter se potentia solum commensurabiles; & ob id DC ex binis nominibus est, cuius maius nomen DE. Dico & quintam esse. sit enim quadratum ex FG, quo quadratum ex DE superat quadratum ex EC. habebit quadratum ex DE ad quadratum ex FG proportionem eam, quam habet 5 ad 4. ergo FG ipsi DE longitudine est incommensurabilis. itaque quoniam DE plus potest quàm EC quadrato rectæ lineæ sibi incommensurabilis longitudine; estq; EC expositæ rationali CB longitudine commensurabilis: erit DC ex bis nominibus quinta. est autem AC ipsius CD dupla. ergo & AE est quinta ex binis nominibus. recta enim linea commensurabilis ei, quæ est ex binis nominibus, & ipsa ex binis nominibus est, atque ordine eadem ex 67 decimi libri. Et cum quadratum ex AC sit æquale rectangulo ABC, si ad rationalem BC applicetur, latitudinem faciet ipsam AB. ergo AB ex binis nominibus est prima. quadratum namque eius, quæ ex binis nominibus ad rationalem applicatum latitudinem facit ex binis nominibus primam ex 98 decimi. si igitur minor portio rectæ lineæ extrema, ac media ratione sectæ sit rationalis, expositæ rationali longitudine commensurabilis, erit maior portio ex binis nominibus quinta, & tota ex binis nominibus prima. quod demonstrare oportebat.

19. quinti

Cor. 20. sexti

6. dif. decimi

9. dif. decimi

9. decimi

37. decimi

9. decimi

THEOREMA VII. PROPOSITIO VII.

Si pentagoni æquilateri tres anguli siue continuati, siue non cõtinuati fuerint æquales, æquiangulum erit pentagonum.



Pentagoni enim æquilateri ABCDE tres anguli primum cõtinuati, qui ad puncta ABC æquales inter se sint. Dico pẽtagonum ABCDE æquiãgulum esse. Iungantur enim AC BE FD. & quoniam duæ CB BA duabus BA AE æquales sunt, altera alteri, & angulus CBA est æqualis angulo BAE, erit basis AC æqualis basi BE, & triangulum ABC triangulo ABE æquale, & reliqui anguli reliquis angulis æquales, quibus æqualia latera subtenduntur.

4. primi

subtenduntur: angulus quidem BGA angulo BEA, angulus vero ABE angulo GAB. quare & latus AF est æquale lateri BF. ostensa autem est & tota AG toti AE æqualis. ergo & reliqua FC est æqualis reliquæ FE. atque est CD æqualis DE. duæ igitur FC CD duabus FE ED æquales sunt, & basis ipsorum est communis FD. quare angulus FCD angulo FED est æqualis. ostensus autem est & angulus BCA æqualis angulo AEB. totus igitur BCD æqualis. est toti AED. sed angulus BCD positus est æqualis angulis, qui sunt ad puncta AB. ergo & AED angulus angulis, qui sunt ad AB æqualis erit. similiter demonstrabimus & angulum CDE angulis, qui sunt ad AB esse æqualem. æquiangulum igitur est ABCDE pentagonum. sed non sint anguli continuati sibi ipsis æquales, sed qui sunt ad puncta ACD. Dico & sic æquiangulum esse ABCDE pentagonum. Iungatur enim BD. & quoniam duæ BA AE duabus BC CD æquales sunt, & angulos æquales continent, erit basis BE æqualis basi BD, & ABE triangulum triangulo BCD, & reliqui anguli reliquis angulis æquales, quibus æqualia latera subtenduntur. æqualis igitur est angulus AEB angulo CDB. est autem & BED angulus angulo BDE æqualis, quoniam & latus BE est æquale lateri BD. totus igitur angulus AED toti CDE est æqualis. Sed angulus CDE angulis, qui sunt ad puncta AC æqualis ponitur. ergo & AED angulus angulis, qui sunt ad AC est æqualis. Eadem ratione & angulus ABC æqualis est angulis, qui sunt ad ACD puncta. æquiangulum igitur est ABCDE pentagonum. quod demonstrare oportebat.

8. primi

THEOREMA VIII. PROPOSITIO VIII.

Si pentagoni æquilateri, & æquianguli duos continuatos angulos subtendant rectæ lineæ, extrema, ac media ratione se mutuo secant, & maiores ipsarum portiones pentagoni lateri sunt æquales.



Pentagoni enim æquilateri, & æquianguli ABCDE duos continuatos angulos, qui sunt ad puncta AB subtendant rectæ lineæ AC, BE, quæ sese in puncto H secent. Dico vtramque ipsarum extrema, ac media ratione secari in puncto H, & maiores earum portiones pentagoni lateri æquales esse. describatur enim circa ABCDE pentagonum circulus ABCDE, & quoniam duæ rectæ lineæ EA AB duabus AB BC æquales sunt, & angulos æquales continent, erit basis BE basi AC æqualis, & ABE triangulum æquale triangulo ABC, & reliqui anguli reliquis angulis æquales, alter alteri, quibus æqualia latera subtenduntur. æqualis igitur est BAC angulus angulo ABE. ergo AHE angulus anguli BAH est duplus; etenim extra triangulum est ABH. est autem & angulus EAC duplus anguli BAC, quòd & circumferentia EDC circumferentiæ CB est dupla. ergo HAE angulus æqualis est angulo AHE; & ob id recta linea HE est æqualis ipsi EA, hoc est ipsi AB. et quoniam BA est æqualis AE, erit & angulus ABE angulo AEB æqualis. sed angulus ABE ostensus est æqualis angulo BAH. ergo & BEA angulus æqualis est angulo BAH. & communis duobus triangulis, videlicet triangulo ABE, & triangulo ABH est angulus ABE. reliquus igitur BAE reliquo AHB est æqualis. ergo triangulum ABE æquiangulum est triangulo ABH; ideoque vt EB ad BA, ita est AB ad BH: æqualis autem est BA ipsi EH. vt igitur BE ad EH, ita EH ad HB. Sed BE maior est quàm EH. ergo & EH quàm HB est maior. recta igitur linea BE extrema, ac media ratione secta est in H, & maior portio HE pentagoni lateri est

31. primi
33. sexti.
6. primi
21. tertij

4. primi

æqualis. Similiter demonſtrabimus & A C extrema, ac media ratione ſecari in H, & maiorem eius portionem C H pentagoni lateri æqualem eſſe. quod demonſtrare oportebat.

THEOREMA IX. PROPOSITIO. IX.

Si hexagoni & decagoni latera in circulo deſcripta componantur, erit tota recta linea extrema, ac media ratione ſecta, & maior ipſius portio erit hexagoni latus.



Sit circulus ABC, & deſcriptis in dicto circulo figuris, ſit decagoni quidem latus BC, hexagoni vero CD, & in directum ſibi ipſis conſtituantur. Dico totam rectam lineam BD extrema, ac media ratione ſecari in C, & maiorem eius portionem eſſe CD. Sumatur enim centrum circuli, quod ſit E; iungantur; EB EC ED, & BE ad A producatur. quoniã igitur decagoni æquilateri latus eſt BC, erit ACB circumferentia circumferentiæ BC quintupla; & ob id circumferentia AC. quadrupla eſt circumferentiæ CB. vt autem circumferentia A C ad ipſam C B, ita A E C angulus ad angulum CEB. angulus igitur AEC anguli CEB quadruplus eſt, & quoniã EBC angulus eſt æqualis angulo E CB, erit angulus AEC. anguli ECB duplus. eſt autem recta linea EC æqualis ipſi C D; vtraque enim eſt æqualis lateri hexagoni, quòd in circulo A B C deſcribitur. quare & angulus C E D æqualis eſt angulo CDE. eſt igitur angulus ECB anguli EDC duplus. ſed & angulus AEC duplus oſtenſus eſt anguli ECB. angulus igitur AEC anguli EDC eſt quadruplus. oſtenſus autem eſt & angulus AEC quadruplus anguli BEC. ergo EDC angulus angulo BEC æqualis erit. atque eſt angulus E B D communis duobus triangulis BEC BED. & reliquus igitur BED reliquo ECB eſt æqualis. ideoq; triangulum E B D triangulo EBC æquiangulum. ergo vt DB ad BE, ita EB ad BC. æqualis autẽ eſt EB ipſi CD. vt igitur BD ad DC, ita DC ad CB. atq; eſt BD maior quàm DC. ergo & DC quã CB eſt maior; ac propterea recta linea B D extrema, ac media ratione ſecta eſt in C, & CD eſt maior ipſius portio. quod demonſtrare oportebat.

Vlt. ſexti.
5. primi.
32. primi.
5. primi.
32. primi.
32. primi.
4. ſexti.

F. C. COMMENTARIVS.

Ex iam demonſtratis & alia demonſtrare licet, nempe hęc.

PROPOSITIO I.

Si latus hexagoni extrema, ac media ratione ſecetur, erit maior eius portio decagoni latus.



Sit recta linea AB, quae ſecetur in C, ita vt AC ſit hexagoni latus, & CB latus decagoni in eodem circulo deſcripti. ergo AB extrema, ac media ratione ſecatur in C: atque eſt AC maior portio. abſcindatur ab AC linea CD ipſi CB aequalis. erit AC quoq; extrema, ac media ratione ſecta in D: atque erit CD portio maior ex iis, quae à nobis demonſtrata ſunt ad quintam huius. eſt autem A C hexagoni latus, & CD latus decagoni. ſi igitur hexagoni latus extrema, ac media ratione ſecetur. erit maior eius portio decagoni latus. quod demonſtrare oportebat.

Ex antecedente.

PROPOSITIO II.

Si in circulo rationalem diametrum habente decagonum æquilaterum describatur, erit decagoni latus apotome quinta.



Maneant enim eadem, quae supra; & sit diameter AB rationalis. Dico decagoni latus BC esse apotomen quintam. Quoniam enim diameter AB est rationalis, erit quoque eius dimidia EC, hoc est CD rationalis. atq; est DC maior portio rectae lineae DB extrema, ac media ratione sectae; & CB minor portio eiusdem. Quando autem maior portio rectę lineę, quae extrema, ac media ratione secatur sit rationalis, minor portio est apotome quinta. quod à nobis supra demonstratum fuit. ergo latus decagoni BC est apotome quinta. quod oportebat demonstrare. ad 6. huius. Propo. 2.

PROPOSITIO. III.

Si latus decagoni æquilateri in circulo descripti, sit rationale, erit circuli diameter ex binis nominibus quinta.

Iisdem enim manentibus sit latus decagoni BC rationale. Dico diametrum AB esse ex binis nominibus, quintam. Quoniam enim BC, videlicet minor portio rectae lineae extrema, ac media ratione sectae est rationalis, erit maior portio CD ex binis nominibus quinta. quod etiam à nobis demonstratum est: ipsius autem CD dupla est AB; & quae longitudine commensurabilis est ei, quae ex binis nominibus, & ipsa ex binis nominibus est, atque ordine eadem ex 67 decimi libri. ergo et AB ex binis nominibus est quinta. quod demonstrare oportebat. ad 6. huius. Propo. 2.

THEOREMA X. PROPOSITIO. X.

Si in circulo pentagonum æquilaterum describatur, latus pentagoni potest, & hexagoni & decagoni latus in eodem circulo descriptorum.



Sit circulus ABCDE, & in ipso pentagonum æquilaterum ABCDE describatur. Dico pentagoni ABCDE latus posse latus, & hexagoni, & decagoni in eodem circulo descriptorum. Sumatur enim centrum circuli F, iunctaq; AF ad G producatur, & iũgatur FB; deinde à puncto F ad AB perpendicularis agatur FH, & ad K producatur; iunganturque AK KB. & rursus à pũcto F ad AK perpendicularis agatur FB, & producatur ad M, & KN iungatur. Quoniam igitur circumferentia ABCG est æqualis circumferẽtiæ AEDG, quarum ABC æqualis est ipsi AED, erit reliqua CG reliquæ GD æqualis. Sed CD est pentagoni. ergo CG decagoni erit. quòd cum AF sit æqualis FB & FH perpendicularis, erit & angulus AFK æqualis angulo KFB, quare & circũferẽtia AK circũferẽtiæ KB est æqualis. dupla igitur est circũferẽtia AB circũferẽtię BK; & ob id recta linea AK est decagoni latus. Eadẽ rõne & AK est dupla KM. & quoniã circumferentia AB dupla est circumferentię BK, æqualis autem CD circumferentia circumferentiæ AB, erit circumferentia CD circumferentiæ BK dupla, estque DC dupla ipsius CG. ergo CG est æqualis BK, sed BK ipsius KM est dupla, quoniam & AK

3. primi. 26. tertij.

AK. & CG igitur ipsius KM dupla erit. est autem & CB circumferentia circumferentiæ BK dupla: etenim CB est æqualis BA, ergo & tota GB dupla est ipsius BM, & angulus GFB duplus anguli BFM. sed & angulus GFB est duplus anguli FAB: quandoquidem FAB angulus æqualis est angulo ABF. ergo & angulus BFN angulo FAB est æqualis. communis autem duobus triangulis ABF, BFN est KBF angulus. reliquus igitur AFB est æqualis reliquo BNF, & triangulum ABF triangulo BFN æquiangulum. ergo vt AB ad BF, ita FB ad BN. rectangulum igitur ABN æquale quadrato ex FB. Rursus quoniam AL est æqualis LK, communis autem, & ad rectos angulos LN; erit basis KN æqualis basi NA. ergo & angulus LKN angulo LAN est æqualis. sed angulus LAN est æqualis angulo KBN. & angulus igitur LKN est æqualis angulo KBN. angulus autem NAK est communis duobus triangulis AKB, & AKN. ergo reliquus AKB reliquo KNA est æqualis; & triangulum KAB triangulo KNA æquiangulum. vt igitur BA ad AK, ita KA ad AN. ac propterea rectangulum BAN est æquale quadrato ex AK. ostensum est autem & rectangulum ABN quadrato ex BF æquale. rectangulum igitur ABN vna cum rectangulo BAN, quod est quadratum ex AB est æquale quadrato ex BF vna cum quadrato ex AK. atque est AB quidem pentagoni latus, BF vero latus hexagoni, & AK decagoni. ergo pentagoni latus potest & latus hexagoni & decagoni in eodem circulo descriptorum. quod demonstrare oportebat.

Vltimo sexti & 12 primi, uel ex 20 terij.

4. sexti.

A 7. sexti.

B 1. eiusd.

4. primi.

5. primi.

4 sexti.

A 7. sexti.

2. secundi.



THEOREMA. XI. PROPOSITIO. XL

Si in circulo rationalem diametrum habente pentagonum æquilaterum describatur, pentagoni latus est linea irrationalis, quæ minor appellatur.

In circulo enim ABCDE rationalem diametrum habentem pentagonum æquilaterum describatur ABCDE. Dico pentagoni ABCDE latus irrationalem esse lineam, quæ minor appellatur. sumatur enim circuli centrum F; & iunctæ AF, BF ad puncta GH producantur, & iungatur AC; ponaturque FK ipsius AF pars quarta. rationalis autem est AF. ergo & FK est rationalis. sed & rationalis BF. tota igitur BK rationalis erit. & quoniam circumferentia ACG æqualis est circumferentiæ ADG, quarum ABC est æqualis ipsi AED, erit reliqua CG reliquæ GD æqualis. quod si iungamus AG, fient anguli ad L recti, & DC dupla ipsius CL. eadem ratione & anguli ad M recti sunt, & AC dupla CM. Quoniam igitur angulus ALC est æqualis angulo AMF, communis autem duobus triangulis ALC, & AMF est angulus LAC, reliquus ACL reliquo MFA æqualis erit; ideoque triangulum ACL triangulo AMF æquiangulum. ergo ut LC ad CA, ita MF ad FA; & antecedentium dupla. quare vt dupla ipsius LC ad CA, ita ipsius MF dupla ad FA. sed vt ipsius MF dupla ad FA, ita est MF ad dimidiam ipsius FA. & vt igitur dupla ipsius LC ad CA, ita MF ad ipsius FA dimidiam. & consequentium dimidia. quare ut dupla LC ad dimidiam ipsius CA, ita MF ad quartam partem ipsius FA. atque est ipsius quidem LC dupla CD, ipsius vero CA dimidia

6. diffi. decimi.

4. sexti.

B



dimidia CM;& ipsius FA quarta pars FK.est igitur vt DC ad CM,ita MF ad FK: & componendo vt vtraque DCM ad CM, ita MK ad KF.ergo vt quadratum, quod fit ex vtraque DCM ad quadratum ex CM,ita quadratum ex MK ad id,quod fit ex KF quadratum.& quoniam recta linea,quæ duo pentagoni latera subtendit,vt AC extrema,ac media ratione secta,maior portio est æqualis lateri pentagoni,hoc est ipsi DC; & maior portio assumens dimidium totius quintuplum potest eius,quod fit à totius dimidia;atq; est totius AC dimidia CM:erit quadratum ex DCM tanquam ex vna linea,quintuplum eius,quod fit ex CM. vt autem quadratum ex DCM tanquam ex vna linea ad quadratum ex CM, ita ostendimus esse quadratum ex MK ad quadratum ex KF.quintuplum igitur est quadratum ex MK quadrati ex KF: estque quadratū ex KF rationale; quippe cum diameter rationalis sit.ergo & rationale est quadratum ex MK;& ipsa MK rationalis. quadratum enim ex MK ad quadratum ex KF proportionem habet,quam numerus ad numerum. & quoniam BF quadrupla est ipsius FK,erit BK ipsius KF quintupla, & quadratum ex BK vigintiquintuplum quadrati ex KF.quadratum autem ex MK quintuplum est quadrati ex KF, ergo quadratum ex BK quadrati ex KM est quintuplum; ac propterea ad illud proportionē non habet,quam numerus quadratus ad quadratum numerum, incommensurabilis igitur est BK ipsi KM longitudine.atque est vtraque ipsarum rationalis.ergo BK KM rationales sunt potentia solum commensurabiles. si autem à rationali rationalis auferatur potentia solum commensurabilis existens toti,reliqua irrationalis est, quę apotome appellatur.quare MB est apotome,& ipsi congruēs MK. Dico & quartam esse.quo enim quadratum ex BK superat quadratum ex KM,illi sit æquale quadratum ex N.ergo BK plus potest,quàm KM quadrato ex N,& quoniam commensurabilis est KF ipsi FB,& componendo KB commensurabilis ipsi BF; sed & BF cōmensurabilis ipsi BH longitudine,erit & KB ipsi BH commensurabilis. quòd cum quadratum ex BK quintuplum sit quadrati ex KM, habebit quadratum ex BK ad quadratum ex KM proportionem eam,quam habet quinque ad vnum. Ergo per cōuersionem rationis quadratum ex BK ad quadratum ex N proportionem habet, quam quinque ad quattuor,& non eam, quam quadratus numerus ad quadratum numerum.incommensurabilis igitur est BK ipsi N:idcircoq; BK plus potest, quàm KN quadrato rectę lineæ sibi incommensurabilis,itaque quoniam tota BK plus potest,quàm congruens MK,quadrato rectę lineæ sibi incommensurabilis, & tota BK commensurabilis est expositæ rationali BH, erit MB apotome quarta.quod autem rationali,& apotome quarta continetur rectangulum irrationale est, & ipsum potens est irrationalis, quæ minor appellatur. sed AB potest id,quod continetur HB BM,propterea quòd iuncta AH triangulum ABH est æquiangulum triangulo ABM:atque est vt HB ad BA,ita AB ad BM.ergo AB pentagoni latus est linea irrationalis,quę minor appellatur.quod oportebat demonstrare.

C D E F G H K L M N O P Q R S T

9. undecimi

F. C. COMMENTARIVS.

Quòd si iungamus AG, fient anguli ad L recti, & DC dupla ipsius CL] *Iunctis enim AC ALG,si etiam intelligatur iuncta AD, quoniam circumferentia CG est aequalis circumferentiae GD,erit angulus CAG aequalis angulo GAD. duae igitur CA AL duabus DA AL aequales sunt,& angulus CAL est aequalis angulo DAL.ergo & basis CL basi LD est aequalis, & reliqui anguli reliquis angulis aequales, quibus aequalia latera subtenduntur, anguli igitur ALC est aequalis angulo ALD.& ob id vterque rectus est.& cum CL sit æqualis LD,erit DC ipsius CL dupla.*

A 27. tertij. 4. primi. Diff. 10. primi.

Et antecedentium dupla] *Quoniam enim est vt LC ad CA ita MF ad FA, vt autem dupla ipsius LC ad LC,ita dupla ipsius MF ad MF;erit ex aequali vt dupla ipsius LC ad CA, ita dupla ipsius MF ad FA.*

B

Ergo vt quadratum, quod fit ex vtraque DCM ad quadratum ex CM] *Ex 22. sexti libri.*

C

Maior portio est æqualis lateri pentagoni, hoc est ipsi DC] *Ex 8. huius.*

D

totius

E

E Et maior portio assumens dimidiam totius quintuplum potest eius, quod fit à totius dimidia] *Ex 1. huius.*

F Ergo & rationale est quadratum ex MK] *Rationali enim commensurabile, & ipsum rationale est ex nona diffinitione decimi libri.*

C Et ipsa MK rationalis] *Ex 8. diffinitione eiusdem libri.*

H Et quadratum ex BK vigintiquintuplum quadrati ex KF] *Ex 20 sexti libri. est enim 25 ad 5, vt 5 ad 1. quare 25 ad 1. proportionem duplam habet eius, quam 5 habet ad 1. ex 10 diffinitione quint. libri.*

K Ergo quadratum ex BK quadtati ex KM est quintuplum] *Nam cum quadratum ex BK ad quadratum ex KF sit vt 25 ad 1, quadratum vero ex MK ad idem quadratum ex KF sit vt 5 ad 1; erit quadratum ex BK ad quadratum ex MK, vt 25 ad 5, hoc est vt 5 ad 1.*

L Incommensurabilis igitur est BK ipsi KM longitudine] *Ex nona decimi libri.*

M Si autem à rationali rationalis auferatur potentia solum commensurabilis existens toti, reliqua irrationalis est, quę apotome appellatur] *Ex 74 decimi libri.*

N Et quoniam commensurabilis est KF ipsi FB] *Intellige commensurabilis longitudine, quemadmodum & inferius; posita est enim KF quarta pars ipsius FA, hoc est ipsius FB.*

O Et componendo KB commensurabilis ipsi BF] *Ex 16 decimi.*

P Sed & BF commensurabilis ipsi BH longitudine] *Est enim BF ipsius BH dimidia.*

Q Erit & BK ipsi BH commensurabilis] *Ex 12 decimi.*

R Erit MB apotome quarta] *Ex quarta tertiarum diffinitionum.*

S Quod autem rationali, & apotoma quarta continetur rectangulum irrationale est & ipsum potens est irrationalis, quæ minor appellatur] *Ex 95 decimi.*

T Sed AB potest id, quod continetur HB BM] *Ex corollario 8 sexti, & 17 eiusdem.*

THEOREMA XII. PROPOSITIO. XII.

Si in circulo triangulum æquilaterum describatur, trianguli latus potentia triplum est eius, quę ex circuli centro.



Sit circulus ABC, & in ipso triangulum æquilaterum describatur ABC. Dico trianguli ABC latus potentia triplũ esse eius, quę est ex circuli ABC cẽtro. sumatur enim circuli cẽtrum D, & iuncta AD producatur ad E, & BE iũgatur. Itaque quoniam æquilaterum est ABC triangulum, erit BEC circumferentia tertia pars circumferentiæ circuli ABC. ergo circumferentia BE est sexta pars circuli circumferentiæ; ideoq; recta linea BE est latus hexagoni, & æqualis ipsi DE, quę est ex circuli centro. & quoniam AE est dupla ipsius ED, erit quadratũ ex AE quadrati ex ED, hoc est quadrati ex EB quadruplũ. quadratũ autem ex AE est æquale quadratis ex AB BE. ergo quadrata ex AB BE quadrupla sunt quadrati ex BE. & diuidendo quadratum ex AB quadrati ex BE triplum: atque est BE æqualis ED. quadratum igitur ex AB triplum est quadrati ex DE. ergo trianguli latus est potentia triplum eius, quæ ex circuli centro. quod demonstrare oportebat.

Corol. 15. quarti. 20. sexti. 47 primi.

F. C. COMMENTARIVS.

Constat etiam latus trianguli æquilateri ad rectam lineam, quæ ab angulo ad basim perdendicularis ducitur, eam potentia proportionem habere, quam habet 4 ad 3.

Sit enim triangulum aequilaterum ABC, cuius basis BC bifariam secetur in D, & AD iungatur. erit AD ad ipsam AC perpendicularis; sunt enim duo latera AD DB duobus lateribus AD DC

DC aequalia, & basis AB est aequalis basi AC. angulus igitur ADB est aequalis angulo ADC. & ideo vterque ipsorum rectus, & AD ad BC est perpendicularis. Dico quadratum ex BA ad quadratum ex AD proportionem habere eandem, quam 4 ad 3. Quoniam enim AB dupla est ipsius BD, erit quadratum ex AB quadrati ex BD quadruplum: atque est quadratum ex AB aequale quadratis ex AD DB. quadratum igitur ex BA ad quadratum ex AD eam proportionem habet, quã 4 ad 3. quod oportebat demonstrare.



20. sexti.
47 primi.

PROBLEMA I. PROPOSITIO. XIII.

Pyramidem constituere, & sphęrę comprehendere data, ac demonstrare sphærę diametrum potentia sesquialteram esse lateris ipsius pyramidis.

Exponatur enim datæ sphærę diameter AB, & secetur in C, ita vt AC ipsius CB sit dupla: describaturque in AB semicirculus ADB: & à puncto C ipsi AB ad rectos angulos ducatur CD, & DA iungatur. exponatur pręterea circulus EFG æqualem habens eam, quæ ex centro ipsi DC, in quo describatur triangulum æquilaterum EFG: sumaturque centrum circuli H, & iungantur EH HF HG: atque à puncto H ipsi plano circuli EFG ad rectos angulos erigatur HK, ita vt HK ipsi AC sit æqualis, & KE KF KG iungantur. Quoniam igitur HK recta est ad planum circuli EFG, & ad omnes rectas lineas, quæ in eodem circuli plano existentes ipsam cõtingunt, rectos angulos faciet. contingit autem ipsam vnaquæque linearum HE HF HG. ergo HK ad vnamquamque ipsarum HE HF HG est perpendicularis. & quoniam AC quidem est æqualis HK, CD vero ipsi HE, & rectos angulos continent; erit basis DA æqualis basi KE. Eadem ratione & vtraque KF KG ipsi DA est æqualis. tres igitur KE KF KG inter se æquales sunt. quòd cum AC sit dupla CB, erit AB ipsius BC tripla. vt autem AB ad BC, ita quadratum ex AD ad quadratum ex DC, vt deinceps demonstrabitur. triplum igitur est quadratum ex AD quadrati ex DC. est autem & quadratum ex FE quadrati ex EH triplum. atque est DC æqualis EH. ergo & AD ipsi EF est æqualis. sed AD ostensa est æqualis vnicuique ipsarum KE KF KG. & vnaquæque igitur ipsarum EF FG GE vnicuique KE KF KG est æqualis. & ob id æquilatera sunt quattuor triangula EFG KEF KFG KGE. pyramis igitur cõstituta est ex quattuor triangulis æqualibus & æquilateris, cuius basis quidem est triangulum EFG, uertex autem K punctum. Iraq; oportet ipsam & sphæra data comprehẽdere, & ostendere, sphęræ diametrum potentia sesquialteram esse lateris pyramidis. producatur enim recta linea HL in directum ipsi HK; ponaturque HL





3 diffinitio undecimi.

4 primi.

A
B
C



ipſi BC æqualis. & quoniam eſt vt AC ad CD, ita DC ad CB; æqualis autem AC quidem ipſi KH, CD vero ipſi HE, & CB ipſi KL: erit vt KH ad HE, ita EH ad HL. rectangulum igitur KHL eſt æquale quadrato ex EH. atque eſt rectus vterque angulorum KHE EHL. ergo in KL deſcriptus ſemicirculus & per punctum E tranſibit. nam ſi coniungamus EL, angulus LEK fiet rectus, cum triangulum ELK æquiangulum ſit vnicuiq; triangulorum ELH EKH. ſi igitur manente KL ſemicirculus cõuerſus in eundem rurſus locum reſtituatur, à quo cœpit moueri, etiã per puncta FG tranſibit, iunctis FL LG; & rectis ſimiliter factis ad puncta FG angulis: atque erit pyramis comprehenſa data ſphæra; etenim KL ſphæræ diameter eſt æqualis diametro datæ ſphæræ AB, quoniam ipſi quidem AC ponitur æqualis KH; ipſi vero CB æqualis HL. Dico igitur ſphæræ diametrum potentia ſeſquialteram eſſe lateris pyramidis. Quoniam enim AC dupla eſt ipſius CB, erit AB ipſius BC tripla. ergo per conuerſionem rationis BA ſeſquialtera eſt ipſius AC. vt autem BA ad AC, ita eſt quadratum ex BA ad quadratum ex AD, quoniam iuncta BD, eſt vt BA ad AD, ita DA ad AC ob ſimilitudinem triangulorum DAB, DAC, & quòd vt prima ad tertiam, ita quadratum ex prima ad quadratum ex ſecunda. ergo quadratum ex BA ſeſquialterum eſt quadrati ex AD. atque eſt BA quidem datæ ſphæræ diameter, AD vero æqualis lateri pyramidis. ſphæræ igitur diameter ſeſquialtera eſt lateris pyramidis. quod demonſtrare oportebat.

17. ſexti.

8. ſexti.

Cor. 8 ſexti. Cor. 20. ſexti.







Itaque demonſtrandum eſt vt AB ad BC, ita eſſe quadratum ex AD ad quadratum ex DC.

Exponatur enim ſemicirculi figura; iungatur q; DB: & ex AC deſcribatur quadratum EC, & parallelogrammum FB compleatur. Quoniã igitur eſt vt BA ad AD, ita DA ad AC, propterea quòd triãgulum DAB æquiangulum eſt triãgulo DAC; erit rectangulum contentum BAC quadrato ex AD æquale. & quoniam eſt vt AB ad BC, ita parallelogrammum EB ad parallelogrammum BF; atque eſt parallelogrammũ quidem EB, quod continetur BA AC, eſt enim EA æqualis AC; parallelogrammum uero BF æquale eſt ei, quòd AC CB continetur: erit ut AB ad BC, ita rectangulum contentum BA AC ad cõtentum AC CB. eſt autem contentum BA AC æquale quadrato ex AD: & contentum AC CB quadrato ex DC. æquale: perpendicularis enim DC media eſt proportionalis inter baſis portio-

A

Cor. 8. ſexti. 17. ſexti. 8. ſexti.

17. ſexti. Cor. 8. ſexti



nes AC CB, cum angulus ADB ſit rectus. ex quibus ſequitur vt AB ad BC, ita eſſe quadratum ex AD ad quadratum ex DC. quod demonſtrare oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

Vt autem AB ad BC, ita quadratum ex AD ad quadratum ex DC] *Quod deinceps demonſtrabitur, videlicet ad finem huius, ſed in ſcholio aliter demonſtratur, hoc modo.* A

Quoniam enim eſt vt BA ad AC, ita quadratum ex DA ad quadratum ex AC, erit per conuerſionem rationis vt AB ad BC, ita quadratum ex AD ad quadratum ex DC] *Nam tres rectae lineae BA. AD. AC deinceps proportionales ſunt ex corollario 8. ſexti, & quadratum ex AD ſuperat quadratum ex AC, quadrato ex DC, ex 47 primi.*

Eſt autem & quadratum ex FE quadrati ex EH triplum] *ex antecedente.* B

Ergo & DA ipſi EF eſt æqualis] *Qm enim quadratum ex AD triplũ eſt quadrati ex DC, et quadratũ DC ex FE triplum quadrati ex EH; eſtq; quadratũ ex DC æquale quadrato ex EH, quod DC ipſi EH ſit aequalis: erit quadratũ ex AD æquale quadrato ex EF; ideoq; AD ipſi EF æqualis.* C

PROBLEMA II. PROPOSITIO. XIIII.

Octaedrum conſtituere, & ſphæra comprehendere, qua & pyramidem: demonſtrareq; ſphæræ diametrum potentia duplam eſſe lateris octaedri.



Exponatur data ſphæræ diameter AB, & in C bifariam ſecetur; deſcribaturq; in AB ſemicirculus ADB; & à puncto C ipſi AB ad rectos angulos ducatur CD: & DB iungatur. exponatur preterea quadratum EFGH habens vnumquodque latus æquale ipſi BD: & iunctis HF EG, erigatur à puncto K ipſi EFGH quadrati plano ad rectos angulos KL; producaturq; ad alteras partes plani, vt KM; & auferatur ab vtraque rectarum linearum KL KM vni ipſarum KE KF KG KH æqualis vtraque KL KM: & iungantur LE LF LG LH ME MF MG MH. qum igitur KE eſt æqualis KH, atq; eſt rectus angulus EKH, erit quadratũ ex HE quadrati ex EK duplum: Rurſus quoniam LK eſt æqualis KE, & rectus LKE angulus; erit quadratum ex EL duplum quadrati ex EK. oſtenſum eſt autem & quadratum ex HE quadrati ex EK duplum. ergo quadratum ex LE æquale eſt quadrato ex EH, & LE ipſi EH æqualis. Eadẽ ratione & LH eſt æqualis HE. æquilaterũ igitur eſt LEH triangulum. ſimiliter oſtendemus & vnumquodque reliquorum triangulorum, quorum baſes ſunt latera quadrati EFGH, vertices autem LM puncta, æquilaterum eſſe. octaedrum igitur conſtitutum eſt, quod octo triãgulis æquilateris continetur. itaq; oportet ipſum & data ſphæra comprehendere: demonſtrareq; ſphęrę diametrum potentia duplam eſſe lateris octahedri. quoniam enim tres rectę lineæ LK KM KE inter ſe æquales ſunt, ſemicirculus in LM deſcriptus, & per punctum E tranſibit. & ob eandem cauſſam ſi manente LM conuerſus ſemicirculus in eundem locum reſtituatur, à quo cœpit



47. primi



moueri, transibit etiam per puncta FGH: atque erit octaedrum sphæra comprehensum. Dico etiam comprehensum esse data sphæra. quoniam enim LK est æqualis KM, communis autem KE, & angulos æquales cõtinent; erit basis LE basi EM æqualis. & quoniam rectus est LEM angulus, in semicirculo enim, erit quadratum ex LM quadrati ex LE duplum. rursus quoniam AC est æqualis CB, erit AB dupla ipsius BC. vt autem AB ad BC, ita quadratum ex AB ad quadratum ex BD. duplum igitur est quadratum ex AB quadrati ex BD. ostensum est autem & quadratum ex LM quadrati ex LE duplum. atque est quadratum ex BD æquale quadrato ex LE; posita est enim EH ipsi DB æqualis. ergo quadratum ex AB est æquale quadrato ex LM; ac propterea ipsa AB est æqualis LM. est autem AB diameter datæ sphæræ: quare LM est æqualis datæ sphæræ diametro. octaedrum igitur comprehensum est data sphæra: & simul demonstratum est sphæræ diametrum lateris octaedri potentia duplam esse.

47.primi.

Cor. 8.& 20 sexti.





PROBLEMA III. PROPOSITIO. XV.

Cubum constituere, & sphæra comprehendere, qua & priores, demonstrareque sphæræ diametrum lateris cubi potentia triplam esse.



Exponatur enim datæ sphæræ diameter AB: & secetur in C, ita ut AC ipsius CB sit dupla: describaturq; in AB semicirculus ADB, & à puncto C ipsi AB ad rectos angulos ducatur CD, & DB iungatur. deinde exponatur quadratum EFGH, habens unumquodque latus æquale ipsi DB: & à punctis EFGH quadrati EFGH plano ad rectos angulos ducantur EK FL GM HN, & auferatur ab unaquaque rectarum linearum EK FL GM HN uni ipsarum EF FG GH HE æqualis unaquæque EK FL GM HN: & KL LM MN NK iungantur. cubus igitur constitutus est FN, qui sex quadratis æqualibus continetur. Itaque oportet ipsum & sphæra data comprehendere, demonstrareque sphæræ diametrum potentia triplam esse lateris cubi. Iungantur enim KG EG. & quoniam rectus est KEG angulus, propterea quòd & KE perpẽdicularis sit ad EG planũ uidelicet, & ad rectam lineam EG: semicirculus in KG descriptus & per pũctum E transibit. Rursus quoniam FG perpẽdicularis ad utramque ipsarum FL FE, & ad FK planum est perpendicularis. quare si iungamus FK ipsa FG, & ad FK perpendicularis erit; ac propterea rursus in KG descriptus semicirculus transibit & per punctum F. similiter autem & per reliqua cubi puncta transibit. si igitur manente KG, conuersus semicirculus in eũdem rursus locum restituatur, à quo cœpit moueri, erit cubus sphæ-



8.diff. undecimi.

4.Vndecimi

ra comprehensus. Dico & data sphæra. Quoniam enim GF est æqualis FE, atque est rectus qui ad F angulus; erit quadratum ex EG quadrati ex EF duplum. æqualis autem est EF ipsi EK. quadratum igitur ex EG duplum est quadrati ex EK. ergo quadrata ex GE EK, hoc est quadratum ex GK triplum est quadrati ex KE. & quoniam AB est ipsius BC tripla: & ut AB ad BC, ita quadratum ex AB ad quadratum ex BD; erit quadratum ex AB quadrati ex BD triplum. ostensum est autem & quadratum ex GK triplum quadrati ex KE: & posita est KE ipsi BD æqualis. ergo & KG est æqualis AB. atque est AB datæ sphæræ diameter. quare & KG æqualis erit diametro datæ sphæræ. cubus igitur data sphæra est comprehensus. & simul demonstratum est sphæræ diametrum lateris cubi potentia triplam esse. quod demonstrare oportebat.



47 primi.

Coroll. 20 sexti.

PROBLEMA V. PROPOSITIO XVI.

Icosaedrum constituere & sphæra comprehendere, qua & prædictas figuras; demonstrareque icosaedri latus irrationalem esse lineam quæ minor appellatur.

Exponatur datæ sphæræ diameter AB; secetur que in C, ita ut AC ipsius DB sit quadrupla: & in AB descripto semicirculo ADB, ducatur à puncto C ipsi AB ad rectos angulos recta linea CD. & DB iungatur. deinde exponatur circulus EFGHK, cuius ea, quæ à centro sit æqualis ipsi DB: describaturq; in circulo EFGHK pentagonum æquilaterũ & æquiangulum EFGHK. & circumferentiæ EF FG GH HK KE bifariam secentur in LMNXO punctis; & iungantur EL LF FM MG GN NH HX XK KO OE. & similiter LM MN NX XO OL. æquilaterum igitur est LMNXO pentagonum; & recta linea EO est decagoni latus. deinde à punctis EFGHK ipsi plano circuli ad rectos angulos erigantur EP FR GS HT KY æquales existentes ei, quæ ex centro circuli EFGHK, & iungatur FR RS ST TY YP PL LR RM MS SN NT TX XY YO OP. Quoniam igitur utraque ipsarum EP KY eidem plano est ad rectos angulos, erit EP ipsi KY





parallela

parallela; atque eſt i pſi æqualis. quę autem æquales, & parallelas ad eaſdem partes
33. primi. coniungunt rectæ linræ, & ipſæ æquales, & parallelæ ſunt. ergo PY ipſi EK & æqualis eſt, & parallela. ſed EK eſt latus pentagoni æquilateri. ergo & PY eſt pentagoni æquilateri latus, in circulo EFGHK deſcripti. Eadem ratione & unaquæque ipſarũ PR RS ST TY eſt latus pentagoni æquilateri in eodem circulo deſcripti. æquilaterum igitur eſt PRSTY pentagonum. & quoniam hexagoni quidem latus eſt PE, de
B goni uero EO, atque eſt rectus PEO angulus; erit PO latus pentagoni. etenim latus pentagoni poteſt & hexagoni, & decagoni latus in eodem circulo deſcriptorum. Eadem ratione & OY eſt pentagoni latus; eſt autem & PY latus pentagoni. ergo æquilaterum eſt triangulum POY. & ob eandem cauſſam vnumquodque triangulorum PLR RMS SNT TXY eſt æquilaterum. & quoniam pentagoni oſtenſa eſt vtraque ipſarum PL PO, atque eſt LO pentagoni; erit PLO æquilaterum triangulum. Eadem ratione & vnumquoq; triãgulorum LRM MSN NTX XYO æquilaterum eſt, ſumatur cẽtrum circuli EFGHK, quod ſit punctum V; & à puncto V ipſi circuli plano ad rectos angulos erigatur VΩ, & ad alteras partes producatur, vt Vτ: & auferatur hexagoni quidem latus VQ: decagoni vero vtraque ipſarum V τ QΩ, & iungantur PΩ PQ Y Ω EV LV Lτ τM. & quoniam vtraque ipſarum VQ PE circuli plano eſt ad rectos angulos,
6 undecimi erit VQ ipſi PE parallela. ſunt autem & æquales. ergo EV PQ & æquales sũt, & parallelæ: eſtq; EV hexagoni latus. hexagoni igitur & PQ quòd cum hexagoni quidem latus ſit PQ, decagoni vero QΩ, & rectus
30. huius: PQΩ angulus; erit PΩ latus pentagoni. Eadem ratione & YΩ pentagoni eſt latus; quoniam ſi iungamus VK QY & æquales, & ex oppoſito erunt. atque eſt VK ex centro circuli, uidelicet hexagoni latus. ergo & QY eſt latus hexagoni. decagoni autẽ QΩ, & rectus angulus eſt YQΩ. pentagoni igitur eſt YΩ: eſtque PY pentagoni. quare æquilaterum eſt PYΩ triangulum. Eadem ratione & æquilaterum eſt vnumquodque reliquorum triangulorum, quorum baſes ſunt PR RS ST TY rectæ lineę, uertex autem Ω punctum. Rurſus quoniam hexagoni eſt VL; decagoni vero Vτ, & angulus LVτ rectus; erit Lτ pentagoni. Eadem ratione ſi iungamus MV, quæ eſt hexagoni, concludetur & Mτ pentagoni eſſe. eſt autem & LM pentagoni. æquilaterum igitur eſt LMτ triangulũ. ſimiliter oſtendetur & æquilaterum eſſe unumquodque reliquorũ triãgulorũ quorũ baſes ſunt MN NX XO OL, uertex aũt τ punctũ. cõſtitutum igitur eſt icoſaedrum, uiginti triangulis æquilateris contentum. Itaq; oportet ipſum ſphęra data comprehendere, demonſtrareq; icoſaedri latus lineam irrationalem eſſe, quæ minor appellatur. Quoniam enim hexagoni latus eſt VQ, decagoni vero QΩ; recta linea VΩ extrema, ac media ratione ſecta eſt in Q, & VQ eſt maior portio. eſt igitur ut ΩV ad VQ, ita VQ ad QΩ. atque eſt VQ ipſi VL æqualis, &





QΩ

QΩ ipsi V☥.quare ut ΩV ad VL,ita LV ad V☥. & sunt anguli ΩVL. LV☥ recti.si igitur iungamus rectam lineam LΩ,erit ☥LΩ rectus angulus, ob similitudinem triangulorum ☥LΩ VLΩ.ergo semicirculus in ☥Ω descriptus etiam per L transibit. Eadem ratione quoniam est ut ΩV ad VQ,ita VQ ad QΩ; & æqualis est ΩV quidem ipsi ☥Q. VQ uero ipsi QP:erit vt ☥Q ad QP,ita PQ ad QΩ:ideoque si rursus iungamus P☥,erit angulus,qui ad P rectus.semicirculus igitur descriptus in ☥Ω transibit & per P. Quòd si manente ☥Ω conuersus semicirculus in eundem rursus locum restituatur, à quo cœpit moueri ,etiam per P, & per reliqua icosaedri puncta transibit: atque erit icosaedrum sphæra comprehensum. Dico & data.secetur enim VQ bifariam in Z.& quoniam recta linea VΩ extrema, ac media ratione secta est in Q, & ΩQ est minor ipsius portio,ipsa ΩQ assumens dimidiam maioris portionis,videlicet QZ quintuplum poterit quadrati eius,quod à dimidia maioris portionis describitur.quadratum igitur ex ΩZ quadrati ex ZQ quintuplum est. & ipsius quidē ZΩ dupla est Ω☥;ipsius vero AQ dupla QV.ergo quadratum ex Ω☥ quintuplum est quadrati ex VQ.& quoniam AC quadrupla est ipsius CB, erit AB ipsius BC quintupla.ut autem AB ad BC,ita quadratum ex AB ad quaratum ex BD. quadratum igitur ex AB quadrati ex BD est quintuplum.ostensum autem est & quadratum ex Ω☥ quintuplum quadrati ex VQ; atque est DB æqualis VQ: vtraque enim ipsarum est æqualis ei quæ ex centro circuli EFGHK.quare & AB est æqualis ☥Ω,estq; AB datæ sphęræ diameter. & ☥Ω igitur erit diameter datę sphęrę. ergo icosaedrum est data sphæra comprehensum.Dico icosaedri latus irrationlem esse lineam, quæ minor appellatur. Quoniā enim rationalis est sphærę diameter,atque est potētia quintupla eius, quæ ex centro EFGHK circuli; erit & quæ ex centro circuli EFGHK rationalis.quare & diameter ipsius rōnalis erit.si aūt in circulo rationalē diametrū habente pentagonū æquilaterū describatur, erit latus pētagoni linea irrationalis,quæ minor appellatur. sed pentagoni EFGHK latus est icosaedri. ergo icosaedri latus est linea irrationalis, quę minor appellatur.

6.sexti.

E F G H K L

COROLLARIVM.

Ex hoc manifestum est sphæræ diametrum potentia quintuplā esse eius, quæ ex centro circuli, à quo icosaedrum describitur: & sphærę diametrum compositam esse ex latere hexagoni, & duobus decagoni lateribus,quę in eodem circulo describuntur.

F. C. COMMENTARIVS.

Quoniam igitur utraq; ipsarum EP KY eidem plano est ad angulos rectos, erit EP ipsi KY parallela.] *Ex 6 vndecimi.* A

Erit ☥O latus pentagoni] *Ex 10 huius.* B

Quoniam enim hexagoni est VQ,decagoni uero QΩ,recta linea VΩ extrema,ac media ratione secta est in Q] *Ex 9 huius.* C

Quare ut ΩV ad VL,ita LV ad V☥: & sunt anguli ΩVL LV☥ recti. si igitur iungamus rectam lineam LΩ,erit ☥LΩ angulus rectus ob similitudinem triangulorum ☥LΩ VLΩ] *Quoniam enim est vt ΩV ad VL, ita LV ad V☥, erit vt ΩV ad V☥, videlicet vt prima ad tertiam, ita quadratum primae ΩV ad quadratum VL secundae: componendoq; vt Ω☥ ad ☥V, ita quadrata ex ΩV VL, hoc est quadratum ex ΩL ad quadratum ex LV: & per conuersionem rationis vt ☥Ω ad ΩV, ita quadratum ex LΩ ad quadratum ex ΩV. quare LΩ est media proportionalis inter ☥Ω ΩV, quod deinceps demonstrabimus. vt igitur ☥Ω ad ΩL, ita LΩ ad ΩV, atque est angulus LΩ☥ vtrique communis. ergo triangulum ☥ΩL simile est triangulo LΩV, & angulus LVΩ rectus est aequalis angulo ☥LΩ. angulus igitur ☥LΩ rectus erit. At vero LΩ inter ☥Ω ΩV mediam esse proportionalem ex his apparebit.* D

Si sint tres rectæ lineæ,sitq; vt prima ad tertiam,ita quadratum secundæ ad quadratum tertiæ,erunt dictæ lineæ deinceps proportionales.

Sint tres rectae lineae A B C; sitq; vt A ad C, ita quadratum ex B ad quadratum ex C. Dico

ABC deinceps proportionales eſſe. Sumatur enim inter AC media proportionalis D, erit vt A ad C, ita quadratũ ex A ad quadratum ex D, hoc eſt quadratum ex D ad quadratum ex C. ſed vt A ad C, ita poſitum eſt quadratum ex B ad quadratum ex C. ergo quadratum ex D aequale eſt quadrato ex B; ac propterea D ipſi B eſt aequalis. tres igitur rectae lineae ABC deinceps proportionales ſunt. ſed licet expeditius demonſtrare angulum ϒLΩ rectum, eſſe hoc modo. Quoniã enim eſt vt ΩV ad VL, ita LV ad Vϒ; ſuntq; anguli ΩVL LVϒ recti, erit triangulum ΩVL triangulo LVϒ ſimile, & angulus LΩV æqualis angulo VLϒ. ſunt autem anguli VLΩ LΩV aequales vni recto, cum rectus ſit LVΩ: ergo & anguli ΩLV VLϒ vni recto ſunt aequales: & ob id angulus ϒLΩ eſt rectus. quod ovo rtebat demonſtrare.



E Ipſa ΩQ aſſumens dimidiam maioris portionis videlicet QZ quintuplum poterit quadrati eius, quod à dimidia maioris portionis deſcribitur] *Ex 3. huius.*

F Ergo quadratum ex Ωϒ quintuplum eſt quadrati ex VQ] *Ex 15. quinti.*

G Vt autem AB ad BC, ita quadratum ex AB ad quadratum ex BD] *Ex corollario 20 ſexti. eſt enim vt AB ad BD, ita DB ad BC ex 8. eiuſdem.*

H Erit & quæ ex centro circuli EFGHK rationalis. quare & diameter ipſius rationalis erit] *Quoniam enim ſphęrę diameter eſt potentia quintupla eius, quae ex centro circuli, habebit quadratum diametri ſphęrę ad quadratum eius, quae ex centro circuli proportionem eam, quã numerus habet ad numerum: & idcirco ipſi commenſurabile erit. rationale autem eſt quadratum diametri ſphęrę, cum ipſa ſit rationalis. ergo & quadratum eius, quae ex centro circuli, eſt rationale: idcoq; ea, quae ex centro circuli, & eius diameter rationalis erit; nam quae rationali commenſurabilis eſt, & ipſa eſt rationalis.*

6. decimi.

6. diffi. dec.

K Si autem in circulo rationalem diametrum habente pentagonum æquilaterum deſcribatur, erit latus pentagoni linea irrationalis, quæ minor appellatur] *Ex 11. huius.*

L Sed pentagoni EFGHK latus eſt icoſaedri] *Illud vero ex iis dictis manifeſtiſſime cõſtat,*

PROBLEMA VI. PROPOSITIO XVII.

Dodecahedrum conſtituere, & ſphæra comprehendere, qua & prędictas figuras; demonſtrare que dodecahedri latus eſſe irrationalem lineam, quæ apotome appellatur.

Exponãtur prędicti cubi duo plana ad rectos angulos inter ſe ſe AB CD CBEF; & ſecetur vnumquodq; ipſorum laterum AB BC CD DA EF EB FC bifariam in punctis GH KLMNX, & GK HL MH NX iungantur: deinde ſecentur rectæ lineæ NO OX HP extrema, ac media ratione in RST punctis: ſintque ipſorũ maiores portiones RO OS TP: & à punctis RST ad rectos angulos cubi planis erigantur RY SV TQ ad exteriores partes cubi, quæ ipſis RO OS TP æquales ponãntur; iunganturq; YB BQ QC CV VY. Dico pẽtagonum YBQCV æquilaterũ eſſe, &



se,& in uno plano,& præterea æquiã gulum. Iungantur enim RB SB V B.& quoniam recta linea NO extrema, ac media ratione secta est in R, & OR est maior ipsius portio, erunt quadrata ex ON NR tripla quadrati ex OR. æqualis autem est ON ipsi NB,& OR ipsi RY. quadrata igitur ex BN NR quadrati ex RY sunt tripla.sed quadratis ex BN NR æquale est quadratum ex BR. ergo quadratum ex BR triplum est quadrati ex RY:ac propterea quadrata ex BR RY quadrati ex RY sunt quadrupla. quadratis aũt ex BR RY æquale est quadratũ ex BY.ergo quadratũ ex B Y quadruplũ est quadrati ex YR. & ob id BY est dupla ipsius YR.atq; est VY ipsius YR dupla,qm̃ & RS est dupla ipsius RO,hoc est ipsius RY.ergo BY est æqualis YV.similiter demõstrabitur & unaquæq; ipsarũ BQ QC CV utriq; BY YV æqualis.æquilaterũ igitur est BYVCQ pentagonũ. Dico & in uno esse plano. ducatur.n.à puncto O ipsa OZ utriq; ipsarũ RY SV parallela ad exteriores cubi partes:& iungantur ZH HQ. Dico ZHQ rectã lineam esse.nã cum HP extrema;ac media ratione secetur in T, & PT sit maior ipsius portio, erit ut HP ad PT, ita PT ad TH.æqualis autem est HP quidem ipsi HO, PT vero utrique ipsarum TQ OZ.est igitur vt HO ad OZ, ita QT ad TH.atque est HO parallela ipsi TQ:utraque enim ipsarum plano BD est ad rectos angulos: TH uero est parallela OZ,quòd vtraque ipsarum sit ad rectos angulos plano BF. si autẽ duo triangula componantur ad unum angulum,ut ZOH, HTQ,quæ duo latera duobus lateribus proportionalia habeant,ita ut homologa latera etiam sint parallela,reliqua ipsorum latera in directum sibi ipsis constituta erunt. ergo ZH est in directum ipsi HQ.omnis autem recta linea est in uno plano.In uno igitur plano est YBQCV pentagonum.Dico & æquiangulum.Quoniam enim recta linea NO extrema,ac media ratione secta est in R,& OR est maior portio,erit vt utraque NO OR ad ON,ita NQ ad OR.æqualis autem est RO ipsi OS.quare ut SN ad NO,ita NO ad OS.& ob id NS extrema, ac media ratione secta est in O; & maior portio est NO. quadrata igitur ex NS SO quadrati ex ON sunt tripla.æqualis autem est ON ipsi N B,& OS ipsi SV.ergo quadrata ex NS SV tripla sunt quadrati ex NB; ac propterea quadrata ex NS SV NB quadrati ex NB sunt quadrupla. sed quadratis ex SN NB est æquale quadratum ex BS.quadrata igitur ex BS SV,hoc est quadratum ex VB, quòd angulus VSB sit rectus, quadruplum est quadrati ex NB: ideoq; ipsa VB ipsius BN est dupla.est autem & BC dupla BN.ergo VB est æqualis BC. & quoniam duæ BY YV duabus BQ QC æquales sunt. & basis VB æqualis basi BC, erit angulus BYV angulo BQC æqualis.similiter ostendemus & YVC angulum æqualem angulo BQC.tres igitur anguli BQC BYV YVC inter se æquales sunt. si autem pentagoni æquilateri tres anguli sint æquales,pentagonum æquiangulum erit.æquiangulum igitur est pentagonum BYVCQ. ostensum est autem & æquilaterum. ergo pentagonum BYVCQ æquilaterum est,& æquiangulum.atque est in uno cubi latere BC.si igitur in unoquoque duodecim cubi laterum eadem construamus, figura solida constituetur duodecim pentagonis æquilateris,& æquiangulis contenta.Itaque oportet ipsum & data sphæra comprehendere; demonstrareque dodecahedri latus esse irrationalem lineam,quæ apotome appellatur:producatur enim ZO,& sit Zω. occurrit igitur Zω diametro cubi,& bifariam se mutuo secant.hoc enim ostensum est in penultimo theoremate undecimi libri, secent in ω. ergo ω est centrum



47.primi

20.tertij

A

B

C

32.secũdi

D

E

47.primi

20.tertij

8.primi

F

A

B

C

D

G

ſphæræ, quæ cubum comprehendit, & OΩ dimidium lateris cubi. iungatur YΩ. & quoniam recta libea NS extrema, ac media ratione ſecta eſt in O, & NO eſt ipſius portio maior, erũt quadrata ex NS SO, tripla eius quod fit ex NO. ęqualis aũt eſt NS ipſi ZΩ, quoniam & NO ipſi OΩ eſt æqualis, & ZO ipſi OS. ſed & OS eſt æqualis ZY, quoniã & RO. quadrata igitur ex ΩZ ZY tripla ſunt quadrati, quod fit ex NO. ſed quadratis ex ΩZ ZY æquale eſt quadratum ex YΩ. ergo quadratum ex YΩ triplum eſt quadrati ex NO. eſt autem quę ex cẽtro ſphæræ cubũ cõprehendentis potentia tripla dimidij lateris cubi. prius enim oſtenſum eſt cubum conſtituere, & ſphæra comprehendere, demõſtrareq; ſphęrę diametrum potentia triplam eſſe lateris cubi. ſi autem tota totius, & dimidia dimidiæ. atque eſt NO dimidia lateris cubi. ergo YΩ eſt æqualis ei, quæ ex centro ſphæræ cubum comprehendentis: eſtque Ω centrum ſphæræ comprehendentis cubum. quare punctum Y eſt ad ſphęrę ſuperficiem. ſimiliter demonſtrabimus & unumquemque reliquorum angulorum dodecaedri eſſe ad ſuperficiẽ ſphæræ. dodecaedrum igitur eſt data ſphęra comprehenſum. Dico dodecaedri latus irrationalem eſſe lineam, quæ apotome appellatur. Quoniam enim recta linea NO extrema, ac media ratione ſecta, maior portio eſt RO; erit tota NX extrema, ac media ratione ſecta, maior portio RS. nam cum ſit ut NO ad OR, ita OR ad RN: & earum duplæ: partes enim eodem modo multiplicium eandem habent proportionem, erit vt NX ad RS, ita RS ad vtramque NR SX. maior autem eſt NX, quàm RS. ergo & RS eſt maior, quàm vtraque NR SX. eſt igitur NX extrema, ac media ratione ſecta; & RS eſt ipſius maior portio. æqualis autem eſt RS ipſi YV. ergo NX extrema, ac media ratione ſecta, maior portio eſt YV. & quoniam rationalis eſt ſphæræ diameter, atque eſt potentia tripla lateris cubi; erit NX rationalis, quę eſt cubi latus. ſi autem recta linea rationalis extrema, ac media ratione ſecta fuerit, vtraque portio irrationalis eſt, quæ apotome appellatur. ergo YV, quæ eſt latus dodecaedri, irrationalis eſt, quæ apotome appellatur.



A
G
H
K
5. quinti.

COROLLARIVM.

Ex hoc manifeſtum eſt latere cubi extrema, ac media ratione ſecto maiorem portionem eſſe dodecaedri latus.

F. Ç. COMMENTARIVS.

A Erunt quadrata ex ON NR tripla quadrati ex OR] *Ex 4. huius.*

B Atque eſt HO parallela ipſi TQ: vtraque enim ipſarum plano BD eſt ad rectos angulos] *Ex 6. vndecimi.*

C Reliqua ipſorum latera in directum ſibi ipſis conſtituta erunt] *Ex 32 ſexti.*

D Quoniam enim recta linea NO extrema, ac media ratione ſecta eſt in R, & OR eſt maior portio, erit vt vtraque NO OR ad ON, ita NO ad OR] *Ex 5. huius. ſi enim recta linea extrema, ac media ratione ſecetur, adiiciaturq; ipſi aequalis maiori portioni, erit tota extrema, ac media ratione ſecta, & maior portio erit ea, quae à principio recta linea. quare vt vtra-*

que

que NO OR, hoc eſt ut tota NO ad totam NO, ita eſt NO ad OR; ſit enim tota NO maior portio, & OR minor.

Quadrata igitur ex NS SO quadrati ex ON ſunt tripla] *Ex 4. huius.* E

Si autem pentagoni æquilateri tres anguli ſint æquales pentagonum æquiangulum erit [*Ex 7. huius.* F

Prius enim oſtenſum eſt cubum conſtituere, & ſphæra comprehendere] *In quinta decima huius.* G

Erit NX rationalis, quę eſt cubi latus] *Nam cum ſphęrae diameter ſit potentia tripla lateris cubi, habebit ad ipſum proportionem, quam numerus habet ad numerum, & ipſi commenſurabile erit. quae autem rationali ſunt commenſurabiles ſiue longitudine & potentia, ſiue potentia ſolum, rationales ſunt, per ſextam diffinitionem decimi libri.* H

Si autem recta linea rationalis extrema, ac media ratione ſecta fuerit, vtraque portio irrationalis eſt, quæ apotome appellatur] *Ex 6. huius.* K

PROBLEMA VII. PROPOSITIO. XVIII.

Latera quinque figurarum exponere, & inter ſe comparare.

Exponatur datæ ſphęrę diameter A B, & ſecetur in C quidem, ita vt AC ſit æqualis CB; in D vero ita, vt A D ipſius D B ſit dupla: deſcribaturq; in AB ſemicirculus AEB: & à punctis CD ipſi AD ad rectos angulos ducãtur CE DF: & A F FB EB iungantur. Itaq; quoniam A D dupla eſt ipſius DB, erit AB ipſius BD tripla: & per cõuerſionem rationis B A ſeſquialtera ipſius A D. vt autem B A ad A D, ita quadratum ex B A ad quadratum ex A F. eſt enim triangulum A F B triangulo AFD æquiangulum. ergo quadratum ex BA ſeſquialterum eſt quadrati ex AF. eſt autem & ſphærę diameter potentia ſeſquialtera lateris pyramidis; eſtque A B ſphæræ diameter. ergo A F pyramidis lateri eſt æqualis. Rurſus quoniam AD dupla eſt DB, erit AB ipſius BD tripla. Sed ut AB ad BD, ita quadratum ex A B ad quadratum ex FB. quadratum igitur ex AB triplum eſt quadrati ex BF. eſt autem & ſphæræ diameter potentia tripla lateris cubi: atque eſt AB ſphæræ diameter. ergo BF eſt cubi latus. & quoniam AC eſt æqualis CB, erit AB ipſius BC dupla. ut autem AB ad BC, ita quadratum ex AB ad quadratum ex BE. quadratum igitur ex AB quadrati ex BE eſt duplum. atque eſt ſphęrę diameter potentia dupla lateris octaedri: & AB eſt diameter datę ſphæræ. quare BE eſt octaedri latus. ducatur à puncto A ipſi AB ad rectos angulos AG: ponaturq; AG æqualis AB: & iuncta GC à puncto H ad AB perpendicularis ducatur HK. quoniam igitur AG dupla eſt ipſius AC; etenim GA eſt æqualis AB; ut autem GA ad AC, ita HK ad KC: erit HK ipſius KC dupla. ergo quadratum ex HK quadruplum eſt quadrati ex KC. quadrata igitur ex HK KC, quod eſt quadratum ex HC quintuplum eſt quadrati ex KC. æqualis autem eſt H C ipſi CB. ergo quadratum ex B C quintuplum eſt quadrati ex CK. & quoniam A B eſt dupla ipſius BC, quarum AD dupla eſt DB; erit reliqua B D dupla ipſius D C: ideoque B C ipſius CD eſt tripla. nonuplum igitur eſt quadratum ex BC quadrati ex CD. ſed quadratum ex B C quadrati ex C K eſt quintuplum. ergo quadratum ex K C maius eſt quadrato ex C D. & K C ipſa C D maior. ponatur ipſi K C æqualis C L; & à puncto L ipſi A B ad rectos angulos ducatur L M, & M B iungatur. & quoniam quadratum ex B C quintuplum eſt quadrati ex K C; atque eſt ipſius quidem C B dupla B A; ipſius uero C K dupla K L: erit quadratum ex A B qua-



8 huius

13. huius

15. huius

14. huius

4. sexti.

20. sexti.

19 quinti

20. sexti.

15. quinti.

Corol.16.huius. drati ex KL quintupluꝝ.ſed & ſphęrę diameter potentia quintupla eſt eius,quæ ex centro circuli, à quo icoſaedrum deſcribitur. atque eſt AB diameter ſphęræ. ergo Corol.16.huius. KL eſt hexagoni latus dicti circuli. Præterea quoniam ſphærę diameter compoſita eſt ex latere hexagoni, & duobus lateribus decagoni in dicto circulo deſcriptorũ; atque eſt AB quidem diameter ſphæræ, KL vero hexagoni latus, & AK eſt ęqualis LB: erit vtraque ipſarum AK LB latus decagoni deſcripti in eodem circulo, à quo 14.tertij. icoſaedrum deſcribitur.& quoniam decagoni eſt L B, hexagoni vero M L; eſt enim æqualis ipſi KL, quòd & ipſi HK; namque æqualiter à centro diſtant;& eſt vtraque 10.huius. HK KL dupla ipſius HC: erit MB latus pentagoni. quod autem pentagoni idẽ eſt, 16.huiut. & icoſaedri. ergo MB eſt icoſaedri latus.& quoniam FB eſt lâtus cubi,ſecetur extre Ex corol. antecedentis. ma, ac media ratione in N,& BN ſit maior portio; erit NB dodecaedri latus.quòd cum ſphæræ diameter oſtenſa ſit ipſius quidem A F lateris pyramidis potentia ſeſquialtera; ipſius vero BE octaedri potẽtia dupla, & ipſius FB cubi potentia tripla, quarum partium ſphæræ diameter potentia eſt ſex,earum pyramidis quidem latus erit quattuor;octaedri vero trium,& cubi duarũ. ergo latus pyramidis octaedri quidem lateris potentia eſt ſeſquitertium,cubi vero potentia duplum: & octaedri latus lateris cubi potentia eſt ſeſquialterum.latera igitur trium figurarum iam dicta, videlicet pyramidis,octaedri,& cubi inter ſe ſunt in proportionibus rationalibus: reliqua vero duo,dico autem icoſaedri, & dodecaedri,neque inter ſe,neque ad iam dicta ſunt in rationalibus proportionibus,nempe minor,& apotome.

At vero M B latus icoſaedri maius eſſe dodecaedri latere B N, ita demonſtrabimus.

8.ſexti Quoniam enim triangulum FDB ęquiangulum eſt triangulo FAB, erit vt D B ad B F, ita FB ad BA: & cum tres rectæ lineæ proportionales ſint, vt prima ad tertiam, ita erit quadratum primæ ad quadratum ſecundę. eſt igitur vt DB ad BA,ita quadratum ex DB ad quadratum ex BF: & conuertendo vt A B ad B D, ita quadratum ex FB ad quadratum ex BD.tripla autem eſt AB ipſius BD. ergo quadratum ex 20.ſexti. FB quadrati ex BD eſt triplum. atque eſt quadratum ex AD quadruplum quadrati ex DB; eſt.n. AD ipſius DB dupla. ergo quadratũ ex AD maius eſt quadrato ex FB;propterea quòd AD quàm FB eſt maior.multo igitur maior eſt



9.huius. AL quàm FB. & ipſa quidem AL extrema, ac media ratione ſecta, maior portio eſt LK, quoniam KL eſt hexagoni latus,& KA decagoni. ipſa uero FB extrema, ac media ratione ſecta,maior portio eſt BN. maior igitur eſt KL quàm BN, eſt autem KL 19.primi ipſi LM æqualis. ergo L M quàm B N eſt maior.ſed B M eſt maior quàm ML. ergo MB, quę eſt latus icoſaedri maior erit ipſa BN, dodecaedri latere.

ALITER. Quoniam enim AD dupla eſt DB,erit AB ipſius BD tripla. ut au-Cor.20.ſexti. tem AB ad BD,ita quadratum ex AB ad quadratum ex BF, propterea quod trian-8.ſexti. gulum FAB triangulo FBD ęquiangulum eſt.triplum igitur eſt quadratum ex AB quadrati ex BF. Oſtenſum eſt autem quadratum ex AB quadrati ex KL quintuplũ. ergo quinque quadrata ex KL tribus quadratis ex BF ſunt æqualia. ſed tria ex FB maiora ſunt quàm ſex eorum,quæ fiunt ex BN. & quinque igitur ex KL, quàm ſex eorum,quæ ex BN ſunt maiora.ergo & unum ex KL maius eſt vno ex BN;ac propterea KL quàm BN maior:æqualis autem KL ipſi LM. maior igitur eſt LM,quam BN; multo igitur MB quàm BN eſt maior.quod demonſtrare oportebat.

Tria vero, ex FB maiora eſſe,quàm ſex earum,quæ ex BN,hoc modo oſtendemus.

Quoniam

Quoniam enim maior est BN quàm NF, erit rectangulum, quod continetur FB BN maius contento BF FN. quod igitur continetur FB BN vnà cum contento BF FN maius est, quàm duplum eius, quod BF FN continetur. sed quod quidem continetur FB BN vnà cum contento BF FN est quadratum ex FB. contentum autem BF FN est æquale quadrato ex BN; etenim FB extrema, ac media ratione secta est in N, & quod extremis continetur est æquale ei, quod fit à media. quadratum igitur ex FB maius est, quàm duplum quadrari ex BN. quare vnum ex FB duobus ex BN est maius; & idcirco tria, quæ ex FB maiora sunt, quàm sex eorum, quæ fiunt ex BN. quod demonstrare oportebat. 2. secundi. 17. sexti.

Dico præter iam dictas quinque figuras non constitui aliam figuram, quæ æquilateris, & æquiangulis inter se æqualibus contineatur.

Ex duobus enim triangulis, vel ex alijs duobus planis non constituetur angulus solidus. ex tribus autem triangulis cõstituitur angulus pyramidis, ex quattuor octaedri, ex quinque icosaedri: at ex sex triangulis æquilateris, & æquiãgulis ad vnum punctum constitutis, non est angulus solidus. cum enim trianguli æquilateri angulus sit duæ tertiæ recti, erunt sex quattor rectis æquales. quod fieri non potest. omnis enim solidus angulus minoribus, quàm quattuor rectis continetur. Eadem ratione neque ex pluribus, quàm sex angulis planis coustituitur solidus angulus. itaque quadratis tribus angulus cubi continetur. ut autem quattuor contineatur fieri non potest; essent enim rursus quattuor recti. pentagonis autẽ æquilateris, & æquiãgulis, tribus quidem continetur angulus dodecaedri, sed vt quattuor contineatur fieri non potest. nam cum pentagoni æquilateri angulus constet ex recto, & quinta recti parte, erunt quattuor anguli quattuor rectis maiores. quod fieri non potest. neque uero alijs polygonis figuris constituetur angulus solidus propter absurda, quæ consequuntur. non igitur præter iam dictas figuras alia figura solida constituitur æquilateris, & æquiangulis contenta. quod oportebat demonstrare. 21 undecimi

Verum enim vero pentagoni æquilateri, & æquianguli angulũ constare ex recto, & recti quinta parte, hoc modo ostendemus.



Sit enim pentagonum æquilaterum, & æquiangulum ABCDE, & circa ipsum circulus ABCDE describatur: sumaturque ipsius centrum, quod sit F; & iungantur FA FB FC FD FE, quæ pẽtagoni ABCDE angulos bifariam secabunt. & quoniam quinque anguli, qui ad F quattuor rectis æquales sunt, & inter se sũt æquales, erit unus ipsorum, ut AFB unius recti, dempta quinta recti parte. ergo reliqui FAB ABF sunt unius recti, & quintæ partis. æqualis aũt est angulus FBA angulo FBC. & totus igitur ABC pentagoni angulus constat ex recto, & quinta recti parte. quod oportebat demonstrare.

TERTIIDECIMI LIBRI FINIS.

EVCLIDIS ELEMENTORVM

LIBER QVARTVSDECIMVS ET SOLIDORVM QVARTVS.

vt quidam arbitrantur.

VT VERO ALII HYPSICLIS ALEXANDRINI DE QVINQVE CORPORIBVS LIBER PRIMVS.

Cum Commentarijs Federici Commandini Vrbinatis.

BASILIDES tyrius, Protarche, cum alexandriam veniſſet, patriq́ue noſtro ob mathematicarum diſciplinarum ſocietatem commendatus fuiſſet, ipſo peregrinationis tempore, cum eo diu, multumq́ue uerſatus eſt. & aliquando expendentes id quod ab Apollonio ſcriptum eſt de dodecaedri, & icoſaedri in eadem ſphæra deſcriptorum comparatione, quam ſcilicet hęc inter ſe proportionem habeant, arbitrati ſunt ea non recte tradidiſſe Apollonium; quæ à ſe emendata, ut pater meus dicebat, memoriæ, ac litteris prodiderunt. Ego vero poſtea incidi in aliũ librum ab Apollonio editum, qui propoſitę rei demonſtrationem recte complectebatur; atque ex eius problematis indagatione magnam cœpi voluptatem. Illud quidem, quod ab Apollonio editũ eſt, quilibet facile perſpicere poteſt, cũ in omnium manibus verſetur. quod autem nos poſtea ſummo, quantum conijci licet, ſtudio lucubraſſe videmur, id litteris mandatum tibi dedicandũ cenſuimus, vtpote qui ob excellentem in omnibus diſciplinis mathematicis, & præſertim in geometria cognitionem prudenter iudices ea, quę dicturi ſumus: ob eam uero, quę tibi cum patre meo fuit conſuetudinem, & ob beneuolentiam, qua nos complecteris, tractationem ipſam libenter audias. ſed iam tempus eſt ut proœmio finem imponentes id, quod propoſitum eſt, aggrediamur.

THEO-

THEOREMA I. PROPOSITIO I.

Quæ à centro circuli alicuius ad pentagoni latus in eodem circulo deſcripti, perpendicularis ducitur, dimidia eſt vtriuſque & hexagoni lateris, & decagoni, quæ in eodem circulo deſcribuntur.



Sit circulus ABC, & in eo deſcribatur pentagoni æqui lateri latus BC; ſumaturque circuli centrum D: & ad BC ducta DE perpendicularis, producatur in directum ipſi DE recta linea EF. Dico DE dimidiam eſſe vtriuſque & hexagoni lateris, & decagoni in eodem circulo deſcriptorum. Iungantur enim DC CF: ponaturque EG ipſi EF æqualis: & à puncto G ad C ducatur GC. Quoniam igitur circumferentia totius circuli quintupla eſt circumferentiæ BFC: atque eſt totius quidem circuli circumferentiæ dimidia ACF, ipſius vero BFC dimidia FC, erit & circumferentia ACF quintupla circumferentiæ FC. ideoq́, circumferentia AC ipſius CF eſt quadrupla. vt autem AC ad CF, ita eſt ADC angulus ad angulum CDF. angulus igitur ADC quadruplus eſt anguli CDF. duplus autem eſt angulus ADC anguli EFC. ergo & angulus EFC anguli GDC eſt duplus. eſt autem & EFC angulus æqualis angulo EGC. duplus igitur eſt angulus EGC anguli GDC: & idcirco DG ipſi GC eſt æqualis. ſed GC æqualis eſt GF. ergo & DG ipſi CF. eſt autem & GE æqualis EF. æqualis igitur eſt DE utrique EF FC. communis apponatur DE. vtraque igitur DF FC ipſius DE eſt dupla: atque eſt DF quidem hexagoni lateri æqualis; FC vero æqualis lateri decagoni. ergo DE eſt dimidia & lateris hexagoni, & decagoni in eodem circulo deſcriptorum. A B C D E

Itaque manifeſtum eſt ex theorematibus tertij decimi libri eã, quæ à centro circuli ad latus trianguli æquilateri perpendicularis ducitur, dimidiam eſſe eius, quæ ex centro circuli. F

F. C. COMMENTARIVS.

A Erit & circumferentia ACF quintupla circumferentiæ FC] *Ex 15 quinti.*

B Vt autem AC ad CF, ita eſt ADC angulus ad angulum CDF] *Ex vltima ſexti.*

C Duplus autem eſt angulus ADC anguli EFC] *Ex 20 tertij.*

D Eſt autem & EFC angulus æqualis angulo EGC] *Poſita enim eſt FE aequalis EG, & EC eſt vtrique communis: anguliq́, ad E recti. baſis igitur FC eſt aequalis baſi CG, & triangulum triangulo aequale; & reliqui anguli reliquis angulis aequales, quibus aequalia latera ſubtenduntur ex 4. primi.*

E Et idcirco DG ipſi GC eſt æqualis] *Nam cum angulus EGC exterior ſit aequalis duobus interioribus, & oppoſitis GDC GCD, ſitq́, duplus ipſius GDC, erit angulus GCD aequalis angulo GDC: & ob id latus DG lateri GC aequale.* 32. primi. 6. primi.

F Itaque manifeſtum eſt ex theorematibus tertij decimi libri eam, quæ à centro circuli ad latus trianguli æquilateri perpendicularis ducitur, dimidiam eſſe eius, quæ ex centro circuli.

Sit circulus ABC, & in ipſo deſcribatur triangulum aequilaterum ABC; ſumptoq́, circuli centro D, ab eo ad BC agatur perpendicularis DF, & ad E producatur. Dico DF dimidiam eſſe ipſius DE. iungantur enim DB BE. & quoniam BE eſt latus hexagoni, quod ex 12 tertij decimi libri apparet: & ideo aequalis ei, quae ex centro: erunt DB BE inter ſe aequales, & ipſarum quadrata

47.primi *ta æqualia. ſed quadratum quidem ex DB eſt æquale quadratis ex EF FD. quadratum vero ex BE æquale quadratis ex BF FE. ergo quadrata ex BF FD quadratis ex BF FE ſunt æqualia; & dempto communi quadrato ex BF, erit quadratum ex DF æquale quadrato ex FE: ac propterea recta linea DF ipſi FE eſt æqualis, & DF ipſius DE dimidia. quod demonſtrare oportebat.*



THEOREMA II. PROPOSITIO. II.

Idem circulus comprehendit dodecaedri pentagonum, & icoſaedri triangulum in eadē ſphæra deſcriptorum.

Hoc autem conſcribitur ab Ariſtero in libro de quinque figurarum comparatione; & ab Apollonio in ſecunda editione comparationis dodecaedri cum icoſaedro, videlicet vt dodecaedri ſuperficies eſt ad ſuperficiem icoſaedri, ita eſſe & ipſum dodecaedrum ad icoſaedrum, quòd perpendicularis ducta à centro ſphæræ ad dodecaedri pentagonum eadem ſit, quæ ad icoſaedri triangulum ducitur. Itaque demōſtrandum eſt eundem circulum comprehendere, & dodecaedri pentagonum, & icoſaedri triangulum in eadem ſphæra deſcriptorum, hoc præmiſſo.

Si in circulo pentagonum æquilaterum deſcribatur, quod fit ex latere pentagoni, & ex recta linea, quæ duobus pentagoni lateribus ſubtenditur, quintuplum erit eius, quòd fit ab ea, quę ex circuli centro.

Sit ABC circulus, & in eo pentagoni latus AC: ſumatur que circuli centrum D, & ad AC perpendicularis ducta DF in puncta BE producatur, & iungatur AB. Dico quadrata ex BA AC quadrati ex DE quintupla eſſe. iuncta enim AE eſt decagoni latus. & quoniā BE dupla eſt ipſius ED; erit quadratum ex BE quadrati ex ED quadruplum. quadrato autem ex BE æqualia ſunt quadrata ex BA AE. ergo quadrata ex BA AE quadrupla ſunt quadrati ex ED: & ob id quadrata ex BA AE & ED ſunt quintupla quadrati ex ED. ſed quadrata ex DE EA æqualia ſunt quadrato ex AC. quadrata igitur ex BA AC quadrati ex ED ſunt quintupla.

47.primi

A



Hoc demonſtrato, demonſtrandum eſt eundem circulum comprehendere & dodecaedri pentagonum, & icoſaedri triangulum in eadem ſphæra deſcriptorum.

Exponatur ſphæræ diameter AB, & in ipſa ſphęra deſcribatur dodecaedrum, & icoſaedrū: ſitque unum quidem dodecaedri pentagonum CDEFG: icoſaedri uero triangulum KLH. Dico eundem circulum comprehendere pentagonum CDEFG, & KLH triangulum. Iungatur DG. ergo DG eſt cubi latus. & exponatur recta linea quædam MN, ita ut quadratum ex AB quadrati ex MN ſit quintuplum. eſt autem & ſphæ-

B



ra diameter potentia quintupla eius, quæ est ex centro circuli, à quo icosaedrum describitur. secetur MN extrema, ac media ratione in X: & sit MX portio maior. ergo MX est decagoni latus. & quoniam quadratum ex AB quintuplum est quadrati ex MN, & triplũ quadrati ex DG; erunt tria quadrata ex DG quadratis quinque ex MN æqualia. ut autem tria quadrata ex DG ad quadrata quinque ex MN, ita tria quadrata ex CG ad quinque quadrata ex MX. tria igitur quadrata ex CG quinque quadratis ex MX sunt æqualia. quinque autẽ quadrata ex KL æqualia sũt quinq; quadratis ex MN, & quinque quadratis ex MX. ergo quinq; quadrata ex KL tribus quadratis ex DG, & tribus quadratis ex GC sunt æqualia. sed tria quadrata ex DG, & tria quadrata ex GC æqualia sunt quindecim quadratis eius, quæ ex centro circuli descripti circa pentagonum CDEFG. antea enim demõstratum est quadrata ex DG GC quintupla esse quadrati eius, quæ est ex centro circuli circa pentagonum CDEFG descripti. quinque autem quadrata ex KL sunt æqualia quindecim quadratis eius, quę est ex centro circuli descripti circa triangulũ KLH. etenim demonstratum est quadratum ex KL triplum esse quadrati eius, quæ est ex centro circuli circa triangulum KLH descripti. quindecim igitur quadrata eius, quę est ex centro circuli quindecim quadratis eius, quæ est ex centro circuli sunt æqualia; ac propterea diameter diametro est æqualis. ergo idem circulus comprehendit & dodecaedri pentagonum, & icosaedri triangulum in eadem sphæra descriptorum.



C D E F G

F. C. COMMENTARIVS.

Sed quadrata ex DE EA æqualia sunt quadrato ex AC] *Ex decima tertij decimi.* A

Ergo DG est cubi latus] *Secta enim DG extrema DG extrema, ac media ratione, maior portio erit aequalis lateri pentagoni CD ex 8 tertijdecim. si aũt latus cubi extrema, ac media rõne secetur, maior portio erit dodecaedri latus, ex corollario 17 tertijdecimi. sed CD ponitur latus dodecaedri. ergo DG est cubi latus. nam si duę rectę lineę extrema, ac media ratione secentur, erit tota ad totam, vt portio maior ad maiorem portionem. quod ad finem huius libri demonstrabitur.* B

Secetur MN extrema, ac media ratione in X, & sit MX portio maior. ergo MX est decagoni latus] *Ex ante dictis sequitur MN esse eam, quae ex centro circuli, à quo icosaedrum describitur, hoc est hexagoni latus. si autem hexagoni latus extrema, ac media ratione secetur, erit maior portio latus decagoni. quod nos supra ad nonam tertij decimi demonstrauimus.* C

Et triplum quadrati ex DG] *Ex 15 tertij decimi libri.* D

Vt autem tria quadrata ex DG ad quadrata quinque ex MN, ita tria quadrata ex CG ad quinque quadrata ex MX] *Est enim CG maior portio ipsius DG extrema, ac media ratione sectae. & similiter MX maior portio ipsius MN: & vt tota DG ad totam MN, ita est ipsius DG maior portio ad maiorem portionem ipsius MN. quod deinceps demonstrabitur.* E

Quinque autem quadrata ex KL æqualia sunt & quinq; quadratis ex MN, & quinque quadratis ex MX] *Ex 10 tertij decimi. est enim KL latus pentagoni descripti in circulo, à quo icosaedrum describitur, & cuius ea, quae ex centro est MN.* F

Antea enim demonstratum est] *Videlicet proxime ad principium huius theorematis.* G

Etenim demonstratum est quadratum ex KL triplum esse quadrati eius, quę ex centro circuli] *In duodecima tertij decimi libri.* M

THEOREMA III. PROPOSITIO. III.

Si fuerit pentagonum æquilaterum, & æquiangulum, & circa ipsum circulus; à centro autem ad vnum latus perpendicularis ducta fuerit: quod tricies vno latere, & perpendiculari continetur superficiei dodecaedri est æquale.

Sit pentagonum æquilaterum, & æquiangulum ABCDE, & circa ipsum circulus: sumatur autem centrum F, & ab F ad CD perpendicularis ducatur FG. Dico quod tricies CD FG continetur duodecim pentagonis ABCDE æquale esse. Iungatur enim CF FD. & quoniam quod CD FG continetur duplum est trianguli FCD, erit quod quinquies continetur CD FG decem triangulis æquale. decem autem triangula duo pentagona sunt, & eorum sextupla æqualia. ergo quod tricies CD FG continetur est æquale duodecim pentagonis. sed duodecim pentagona sunt dodecaedri superficies. ergo quod tricies continetur CD FG superficiei dodecaedri æquale erit.



Similiter demonstrabimus, si fuerit triangulum æquilaterum, vt ABC, & circa ipsum circulus, cuius centrum D, & ab eo perpendicularis DE, quod tricies BC DE continetur superficiei icosaedri æquale esse.

Quoniam enim rursus quod BC DE continetur duplum est trianguli DBC, erunt duo triangula æqualia ei, quod continetur BC DE, & eorum tripla. sex igitur triangula DBC æqualia sunt tribus, quæ BC DE continentur. at sex triangula vt DBC sunt æqualia duobus ABC triangulis. & eorum decupla. ergo quod tricies BC DE continetur est æquale viginti triangulis ABC, hoc est icosaedri superficiei. erit igitur vt dodecaedri superficies ad superficiem icosaedri, ita quod continetur CD FG ad id, quod BC DE continetur.



COROLLARIVM.

Ex hoc perspicuum est vt dodecaedri superficies ad superficiem icosaedri, ita esse quod continetur latere pentagoni, & recta linea, quæ à centro circuli circa pentagonum descripti, in ipsum latus perpendicularis ducitur, ad id, quod continetur latere icosaedri, & perpendiculari, quæ à centro circuli circa triangulum descripti in ipsum latus ducta fuerit, nimirum dodecaedro, & icosaedro in eadem sphæra descriptis.

F. C. COMMENTARIVS.

A Et quoniam quod CD FG continetur duplum est trianguli FCD] *Ex 41 primi, ex quo sequitur duo triangula FCD æqualia esse ei, quod CD FG continetur.*

B Decem autem triangula duo pentagona sunt] *Vnumquodque enim pentagonum quinque eiusmodi triangula continet.*

C At sex triangula vt DBC sunt æqualia duobus ABC triangulis] *Nam triangulum ABC ex tribus triangulis DBC constat.*

D Erit igitur vt dodecaedri superficies ad superficiem icosaedri, ita quod continetur CD FG ad id, quod BC DE continetur] *Quoniam enim quod tricies cõtinetur CD FG est æquale superficiei dodecaedri; & quod tricies continetur BC DE æquale superficiei icosaedri,*

ſaedri, erit vt ſuperficies dodecaedri ad id, quod tricies continetur CD FG, ita ſuperficies icoſaedri ad id, quod tricies continetur BC DE: & permutando vt dodecaedri ſuperficies ad ſuperficiem icoſaedri, ita quod tricies continetur CD FG ad id, quod tricies BC DE continetur. ſed vt quod tricies continetur CD FG ad id, quod tricies BC DE continetur, ita quod ſemel continetur CD FG ad id, quod ſemel BC DE continetur ex 15 quinti. vt igitur dodecaedri ſuperficies ad ſuperficiem icoſaedri, ita quod continetur CD FG ad id, quod BC DE continetur.

THEOREMA IIII. PROPOSITIO. IIII.

Hoc probato demonſtrandum erit, vt dodecaedri ſuperficies ad ſuperficiem icoſaedri, ita eſſe latus cubi ad icoſaedri latus.

Exponatur circulus ABC comprehendens & dodecaedri pentagonum, & icoſaedri triangulum in eadem ſphæra deſcriptorum: & in ipſo deſcribatur trianguli quidem æquilateri latus CD: pentagoni vero AC: ſumptoq; circuli centro E, ab eo ad DC CA perpendiculares ducantur EF EG, & producatur in directum ipſi EG recta linea GB: iungaturq; BC, & exponatur cubi latus H. Dico vt dodecaedri ſuperficies ad ſuperficiem icoſaedri, ita eſſe H ad ipſam CD. quoniam enim vtraque ſimul EB BC extrema, ac media ratione ſecta, maior portio eſt EB, & eſt vtriuſque quidem dimidia EG, ipſius vero BE dimidia EF: erit & ipſius EG extrema, ac media ratione ſectæ maior portio EF. eſt autem & ipſius H extrema, ac media ratione ſectæ maior portio CA, vt in dodecaedro oſtenſum fuit. vt igitur H ad CA, ita eſt GE ad EF; ideòq; contentum H FE eſt æquale ei, quod CA EG continetur. & quoniam eſt vt H ad CD, ita quod cõtinetur H EF ad contentum CD EF; ei uero, quod H EF continetur eſt æquale cõtentum CA EG: erit vt H ad CD, ita contentum CA EG ad id, quod CD EF continetur, hoc eſt vt dodecaedri ſuperficies ad ſuperficiem icoſaedri, ita H ad CD.



A B C D E F G H K L

Aliter demonſtrare ut dodecaedri ſuperficies ad ſuperficiem icoſaedri, ita eſſe latus cubi ad icoſaedri latus, hoc præmiſſo.

Sit circulus A B C, & in eo deſcribantur æquilateri pentagoni latera AB AC: & iungatur B C; ſumatur autem circuli centrum D, & iuncta AD producatur ad E: ponaturq; ipſius A D dimidia DF, & GC ipſius CH tripla. Dico quod AF BH continetur pentagono æquale eſſe.

Iungatur enim BD. & quoniam AD dupla eſt ipſius DF, erit FA ipſius AD ſeſquialtera. rurſus quoniam G C tripla eſt ipſius C H, erit G H ipſius H C dupla. ſeſquialtera igitur eſt CG ipſius GH. quare vt FA ad AD, ita CG ad GH. ideoq; contentũ AF GH eſt æquale ei, quod AD CG cõtinetur: ſed CG eſt æqualis GB. ergo contentum AD BG eſt æquale ei, quod AF G H continetur. contentum autem AD BG eſt duo triangula, ut A B D. quod igitur AF G H continetur & duo triangula A B D. ergo quinque rectangula contenta AF GH decem ſunt triangula. decem autem triangula duo pentagona ſunt. quinque igitur rectangula



16. quinti

M

contenta AF GH duobus pentagonis ſunt æqualia. & quoniam GH eſt dupla HC, erit contentum AF GH duplum eius, quod AF HC continetur. ergo duo rectangula contenta AF HC ſunt æqualia vni, quod continetur AF GH, & eorum quintupla. decem igitur rectangula contenta AF HC ſunt æqualia quinque, quę AF GH continentur, hoc eſt duobus pentagonis. ergo quinque contenta AF HC vni pentagono ſunt æqualia. quinque autem contenta AF HC ſunt æqualia ei, quod continetur AF BH, quoniam B H quintupla eſt ipſius H C, & communis altitudo eſt AF. quod igitur AF BH continetur uni pentagono eſt ęquale.

Hoc demonſtrato nunc exponatur circulus cõpreheudens & dodecaedri pentagonum, & icoſaedri triangulum in eadem ſphęra deſcriptorum; & in circulo ABC deſcribantur æquilateri pentagoni latera BA AC: & iungatur BC. ſumatur præterea circuli centrum E, & iuncta A E ad F producatur: ſitq; AE quidem dupla ipſius EG; KC vero ipſius CH tripla: & per G ipſi AF ad rectos angulos ducatur DM. ergo DM eſt latus trianguli æquilateri; & æquilaterum eſt ADM triangulum. & quoniam rectangulum quidem contentum AG BH eſt ęquale pentagono, contentum vero AGD æquale triangulo ADM; erit vt rectangulum contentum AG BH ad rectangulum AGD, ita pentagonum ad triangulum. vt autem rectangulum contentum AG BH ad rectangulum AGD, ita BH ad DG. & vt igitur duodecim BH ad viginti DG, ita duodecim pentagona ad viginti triangula, hoc eſt dodecaedri ſuperficies ad ſuperficiem icoſaedri. & duodecim quidē BH ſunt decem B C: etenim BH quintupla eſt ipſius H C; & B C ipſius C H ſextupla: ideoq; duodecim BH ſunt æquales decem B C: viginti autem DG ſunt decem DM; dupla enim eſt D M ipſius D G. vt igitur decem BC ad decem DM, hoc eſt vt BC ad DM, ita dodecaedri ſuperficies ad ſuperficiem icoſaedri. atque eſt BC quidem cubi latus; DM vero latus icoſaedri. & vt igitur dodecaedri ſuperficies ad ſuperficiem icoſaedri, ita BC ad DM, hoc eſt cubi latus ad latus icoſaedri.



F. C. COMMENTARIVS.

A Quoniam enim vtraque ſimul EB BC extrema, ac media ratione ſecta maior portio eſt EB] *Ex nona tertij decimi.*

B Et eſt vtriuſque dimidia EG] *Ex prima huius.*

C Ipſius vero BE dimidia EF] *Ex ijs, quae nos demonſtrauimus ad finem primae huius.*

D Erit & ipſius EF extrema, ac media ratione ſectæ maior portio EF] *Ex 15 quinti.*

E Eſt autem & ipſius H extrema, ac media ratione ſectæ maior portio CA, vt in dodecaedro oſtenſum fuit] *In 17 tertij decimi.*

F Vt igitur H ad CA, ita eſt GE ad EF.] *Hoc autem ita eſſe ad finem huius libri demonſtrabitur.*

G Ideoque contentum H FE eſt ęquale ei, quod CA EG continetur] *Ex 16 ſexti.*

H Et quoniam eſt vt H ad CD, ita quod continetur H EF ad contentum CD EF] *Ex prima ſexti.*

K Ei vero quod H EF continetur eſt æquale contentum CA EG] *Quod proxime demonſtratum fuit.*

L Hoc eſt vt dodecaedri ſuperficies ad ſuperficiem icoſaedri, ita H ad CD] *Superius enim demonſtratum eſt vt dodecaedri ſuperficies ad ſuperficiem icoſaedri, ita eſſe quod continetur CA EG ad id, quod CD EF continetur.*

M Contentum autem AD BG eſt duo triangula vt ABD] *Hoc eſt contentum AD BG eſt aequale duobus triangulis ABD. eſt enim trianguli ABD duplum ex 41 primi libri.*

N Quinque autem contenta AF HC ſunt ęqualia ei, quod continetur AF BH, quoniam BH eſt quintupla ipſius HC: & communis altitudo eſt AF] *Ex prima ſexti.*

Ergo

Ergo DM eſt latus trianguli æquilateri] *Perpendicularis enim ducta à centro circuli ad* O
trianguli aequilateri latus eſt dimidia eius, quae ex circuli centro, ut nos demonſtrabimus ad fi-
nem primae huius.

Et quoniam rectangulum quidem contentum AG BH eſt æquale pentagono] P
Ex iis, quae proxime demonſtrauit.

Contentum vero AGD æquale triangulo ADM] *Ex demonſtratis in 42 primi.* Q

Vt autem rectangulum contentum AG BH ad rectangulum AGD, ita BH ad R
DG] *Parallelogramma enim, quae eandem habent altitudinem inter ſe ſunt vt baſes, ex pri-*
ma ſexti.

Et vt igitur duodecim BH ad uiginti DG, ita duodecim pentagona ad uiginti S
triangula] *Sequitur enim ex antedictis vt BH ad DG, ita eſſe pentagonum ad triangulum.*

Et duodecim quidem BH ſunt decem BC, etenim BH quintupla eſt ipſius HC, T
& BC ipſius CH ſextupla] *Quoniam enim BH eſt quintupla ipſius HC, & BC eſt eiuſdem H*
C ſextupla, habebit HB ad BC peoportionem eam, quam habet quinque ad ſex. ſed quinque multi
plicans duodecim producit 60, & ſex multiplicans decem producit ſimiliter 60. ergo duodecim
BH ſunt aequales decem BC.

Hoc eſt vt BC ad DM] *Ex 15 quinti.* V

Atque eſt BC quidem cubi latus] *Hoc à nobis ſuperius demonſtratũ eſt in ſecundã huius.* X

THEOREMA V. PROPOSITIO V.

Oſtendendum eſt & qualibet recta linea extrema, ac media ratione ſecta, quam proportionem habet potens quadratum totius & quadratum maioris portionis ad eam, quę poteſt quadratum totius & minoris portionis, eandem habere cubi latus ad latus icoſaedri.



A

B

C

D

Sit circulus AB comprehendens & dodecaedri pentagonum & icoſaedri triangulum in eadẽ ſphæra deſcriptorum: ſumaturque circuli centrum C; & & ab eo producatur recta linea vtcumque CB: & ſecetur extrema, ac media ratione in D, ita vt CD ſit maior portio. quare CD eſt latus decagoni in eodẽ circulo deſcripti. exponatur icoſaedri latus E, dodecaedri F, & cubi G. ergo E eſt trianguli æquilateri latus, F pentagoni in eodem circulo deſcripti: atque eſt F ipſius G maior portio. & quoniam E eſt æqualis lateri trianguli æquilateri: trianguli autem æquilateri latus eſt potentia triplum ipſius BC. ergo quadratum ex E quadrati ex BC eſt triplum: ſuntq; quadrata ex CB BD quadrati ex CD tripla, & permutãdo. vt igitur quadratum ex E ad quadrata ex CB BD, ita quadratum ex BC ad quadratum ex CD. ſed vt quadratum ex BC ad quadratum ex CD, ita eſt quadratum ex G ad quadratum ex F; eſt enim F maior portio ipſius G. & ut igitur quadratum ex E, ad quadrata ex CB BD, ita quadratum ex G ad quadratum ex F: & permutando; conuertendoque. ergo vt quadratum ex G ad quadratum ex E, ita quadratum ex F ad quadrata ex CB BD. quadrato autem ex F æqualia ſunt quæ ex BC CD quadrata; etenim latus pentagoni poteſt & hexagoni, & decagoni latus. ut igitur quadratum ex G ad quadratum ex E, ita quadrata ex BC CD ad quadrata ex CB BD. ſed vt quadrata ex BC CD ad quadrata ex CB BD, ita qualibet recta linea extrema, ac media ratione ſecta, quadratum totius, & maioris portionis ad quadratum totius, & minoris portionis. & ut igitur quadratum ex G ad quadratum ex E, ita qualibet recta linea extrema

E

F

extrema, ac media ratione secta quadratum totius & maioris portionis ad quadratum totius, & minoris portionis. atque est G quidem cubi latus, E vero icosaedri. si igitur recta linea extrema, ac media ratione secetur, erit vt potens totam & maiorem portionem ad eam, quæ potest totam & minorem portionem, ita cubi latus ad latus icosaestri, in eadem sphæra descriptorum.

F. C. COMMENTARIVS.

A Quare CD est latus decagoni] *Si enim latus hexagoni extrema, ac media ratione secetur maior portio est decagoni latus, in eodem circulo descripti, vt nos supra demonstrauimus ad nonam tertij decimi.*

B Atque est F ipsius G maior portio] *Ex corollario 17 tertij decimi, nimirum ipsa G extrema, ac media ratione secta.*

C Trianguli autem æquilateri latus est potentia triplum ipsius BC] *Ex duodecima tertij decimi.*

D Suntque quadrata ex CB BD quadrati ex CD tripla] *Ex 4. tertij decimi.*

E Etenim latus pentagoni pot & hexagoni & decagoni latus] *Ex decima tertij decimi.*

F Sed vt quadrata ex BC CD ad quadrata ex CB BD, ita qualibet recta linea extrema, ac media ratione secta quadratum totius, & maioris portionis ad quadratum totius & minoris portionis] *Græcus codex corruptus est qui sic hēt* ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ ἡ πρὸς τὸ ἀπὸ ε, οὕτω τὰ ἀπὸ βγ γδ πρὸς τὰ ἀπὸ γδβ. ὡς δὲ τὸ ἀπὸ βγδ πρός τὰ ἀπὸ γδβ, οὕτως εὐθείας ἧς δλη σοτ' οὖν ἄκρον καὶ μέσον λόγον τεμνομένης, ἡ δλυναμένη τὸ ἀπὸ τῆς ὅλης, καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ μείζονος τμήματος πρὸς τὴν δλυναμένην τὸ ἀπὸ τῆς ὅλης καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ ἐλάσσονος τμήματος. corrige ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ ἡ πρὸς τὸ ἀπὸ ε, οὕτω τὰ ἀπὸ βγ γδ πρὸς τὰ ἀπὸ γβ βδ. ὡς δὲ τὰ ἀπὸ βγ γδ πρὸς τὰ ἀπὸ γβ βδ, οὕτως εὐθείας ἧς δλη σοτ' οὖν ἄκρον καὶ μέσον λόγον τεμνομένης τὸ ἀπὸ τῆς ὅλης καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ μείζονος τμήματος πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ὅλης, καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ ἐλάσσονος τμήματος. & ita corrige paulo post. etenim hæ voces ἡ δλυναμένη. & τὴν δλυναμένην hoc loco superuacaneæ sunt.

THEOREMA VI. PROPOSITIO. VI.

Ostendendum nunc est vt latus cubi ad icosaedri latus, ita esse dodecaedri solidum ad solidum icosaedri.

2 huius. Quoniam enim æquales circuli comprehendunt & dodecaedri pentagonum, &
A icosaedri triangulum in eadem sphæra descriptorum; in sphæris autem æquales circuli æqualiter à centro distant. nam quę à centro sphæræ ad plana circulorum per-
B pendiculares ducuntur & æquales sunt, & in centra circulorum cadunt. ergo quæ à centro sphæræ ducuntur ad centrum circuli comprehendentis & dodecaedri pentagonum & icosaedri triangulum æquales sunt, videlicet perpendiculares ipsæ: & eb id pyramides, quę bases habent dodecaedri pentagona, & icosaedri triangula æ-
C que altę sunt. pyramides autem æque altæ inter se sunt vti bases. vt igitur pentagonum ad triangulum ita pyramis, cuius basis est dodecaedri pentagonum, & vertex centrum sphęræ ad pyramidem, cuius basis est icosaedri triangulum, vertex autem sphæræ centrum. ergo & vt duodecim pentagona ad uiginti triangula, ita duodecim pyramides pentagonales bases habentes ad viginti pyramides, quæ triangulares habent bases. sed duodecim pentagona sunt dodecaedri superficies, & uiginti triangula superficies icosaedri. est igitur vt dodecaedri superficies ad superficiem icosaedri, ita duodecim pyramides pentagonales bases habentes ad viginti pyramides, quę triangulares bases habent. & duodecim pyramides pentagonales bases habentes sunt dodecaedri solidum: uiginti autem pyramides, quę triangulares habēt bases sunt solidum icosaedri. quare & vt dodecaedri superficies ad superficiem icosaedri, ita solidum dodecaedri ad icosaedri solidum. ut autem dodecaedri superficies ad superficiem icosaedri, ita ostensum est esse latus cubi ad icosaedri latus & vt

igitur

igitur latus cubi ad icoſaedri latus, ita dodecaedri ſolidum ad ſolidum icoſaedri.

F. C. COMMENTARIVS.

In ſphæris autem æquales circuli æqualiter à centro diſtant] *Ex 6. propoſitione primi libri ſphæricorum Theodoſii.* A

Et in centra circulorum cadunt] *Ex 2 corollario primae eiuſdē libri ſphæricorū Theodoſii.* B

Pyramides autem æque altæ ſunt inter ſe, vti baſes] *Ex quinta & ſexta duodecimi.* C

THEOREMA VII. PROPOSITIO VII.

At vero duas rectas lineas ſi extrema, ac media ratione ſectæ fuerint, in ſubiecta eſſe anologia, ita demonſtrabimus.



Secetur enim AB extrema, ac media ratione in C, cuius maior portio ſit AC: & ſimiliter DE extrema, ac media ratione ſecetur in F, vt DF ſit portio maior. Dico vt tota AB ad maiorem portionem AC, ita eſſe totam DE ad DF maiorem portionem. Quoniam enim rectangulum quidem ABC eſt æquale quadrato ex AC; rectangulum vero DEF æquale quadrato ex DF: erit vt rectangulum ABC ad quadratum ex AC, ita rectangulum DEF ad quadratum ex DF; & ut rectāgulum, quod quater cōtinetur AB BC ad quadratum ex AC, ita quod quater continetur DE EF ad quadratū ex DF: componendoque vt quod quater cōtinetur AB BC vnà cum quadrato ex AC ad quadratum ex AC, ita quod quater continetur DE EF vnà cū quadrato ex DF ad quadratum ex DF. ergo & vt quadratum ex vtraque AB BC ad quadratum ex AC, ita quadratum ex vtraque DE EF ad quadratum ex DF: & longitudine vt vtraque AB BC ad AC, ita vtraque DE EF ad DF: & componendo vt vtraque AB BC vnà cum AC ad AC, hoc eſt duę AB ad AC, ita utraque DE EF vnà cum DF ad DF, hoc eſt duę DE ad DF. & antecedētium dimidia, videlicet vt AB ad AC, ita DE ad DF. A B

COROLLARIVM.

Itaque hoc demonſtrato videlicet qualibet recta linea extrema, ac media ratione ſecta, quam proportionem habet potens quadratum totius, & maioris portionis ad eam, quæ poteſt quadratum totius & minoris portionis, eandem habere cubi latus ad latus icoſaedri. atque hoc demonſtrato vt latus cubi ad icoſaedri latus, ita eſſe dodecaedri ſuperficiem ad ſuperficiem icoſaedri in eadem ſphæra deſcriptorum. & inſuper hoc cognito vt dodecaedri ſuperficies ad ſuperficiem icoſaedri, ita eſſe dodecaedrum ad ipſum icoſaedrum, propterea quòd idem circulus comprehendit, & dodecaedri pentagonum, & icoſahedri triangulū: conſtat, ſi in ipſa ſphęra deſcribatur & dodecaedrum, & icoſaedrum, eandem inter ſe proportionem habere, quam ſi recta linea extrema, ac media ratione ſecetur, habet potens quadratum totius & maioris portionis ad eam, quæ poteſt quadratum totius, ac minoris portionis. C D E

Quoniam

Quoniam enim eſt vt dodecaedrum ad icoſaedrum, ita dodecaedri ſuperficies ad ſuperficiem icoſaedri, hoc eſt latus cubi ad icoſaedri latus. vt autem latus cubi ad icoſaedri latus, ita qualibet recta linea extrema, ac media ratione ſecta, potens quadratum totius & maioris portionis ad eam, quæ poteſt quadratum totius & minoris portionis. ergo vt dodecaedrum ad icoſaedrum, quæ in eadem ſphæra deſcribuntur, ita qualibet recta linea extrema, ac media ratione ſecta, potens quadratum totius, & maioris portionis ad eã, quę poteſt quadratũ totius & minoris portionis.

P. C. COMMENTARIVS.

A Ergo & ut quadratum ex utraq; AB BC ad quadratum ex AC, ita quadratum ex utraque DE EF ad quadratũ ex DF]*Ex 8 ſecundi, eſt enim quod quater continetur AB BC vnà cũm quadrato ex AC aequale quadrato ex AB BC tamquam ex vna linea. & ſimiliter quod quater continetur DE EF vnà cũ quadrato ex DF aequale quadrato ex DE EF tamquam ex vna linea.*

B Et longitudine ut utraque AB BC ad AC, ita utraque DE EF ad DF]*Ex 22 ſexti.*

C Eãdem habere cubi latus ad latus icoſaedri]*Ex 5 huius.*

D Ita eſſe dodecaedri ſuperficiem ad ſuperficiem icoſaedri in eadem ſphæra deſcriptorum]*Ex quarta huius.*

E Ita eſſe dodecaedrum ad ipſum icoſaedrum] *Ex 6 huius.*

QVARTIDECIMI LIBRI FINIS.

EVCLIDIS ELEMENTORVM

LIBER QVINTVSDECIMVS

ET SOLIDORVM QVINTVS.

vt quidam arbitrantur.

VT AVTEM ALII HYPSICLIS ALEXANDRINI
DE QVINQVE CORPORIBVS LIBER SECVNDVS.

Cum Scholijs antiquis, & Commentarijs Federici Commandini Vrbinatis.

PROBLEMA I. PROPOSITIO. I.

IN dato cubo pyramidem deſcribere.

Sit datus cubus ABCDEFGH, in quo oporteat pyramidem deſcribere. iungantur AC AE CE AH EH HC. itaque perſpicuum eſt triangula AEC AHE AHC CHE æquilatera eſſe. quadratorum enim diametri ſunt latera. pyramis igitur eſt AECH, & deſcripta eſt in dato cubo.



PROBLEMA II. PROPOSITIO II.

In data pyramide octaedrum deſcribere.

Sit data pyramis ABCD, cuius latera ſecentur bifariã in pũctis EFGHKL, & HK HL EF FG iungantur, & reliquæ. quoniam igitur AB dupla eſt vtriuſque HK FG, erit HK ipſi GF æqualis, & parallela. Similiter & HG æqualis, & parallela ipſi FK. æquilaterum igitur eſt HKFG. Dico & rectangulum eſſe. ſi enim ab ipſa KL perpendiculares ducantur ad plana EFBG FCEG EFHG HKFG ſimiliter demonſtrabimus quæ in quadrato HKFG æquilatera eſſe[illegible]



FED. COMMENTARIVS.

Quoniam igitur AB dupla eſt vtriuſque HK GF, erit HK ipſi GF æqualis & parallela] *Eſt enim HK ipſi AB parallela; namque ut DH ad HA, ita eſt DK ad KB. & eadem ratio* A 2. ſexti

9.undecimi. tione demonſtrabitur GF parallela ipſi AB. quae autem uni, & eidem ſunt parallelę, & inter ſe parallelae ſunt. ergo HK ipſi GF eſt parallela. triangula autem D A B D H K aequiangula ſunt. 29.primi & 4.ſexti. namque angulus quidem DHK eſt aequalis angulo DAB; angulus vero DKH aequalis ipſi DBA, & BAD utrique communis. vt igitur AD ad DH, ita AB ad HK. eſtq; AD dupla ipſius DH. 9.quinti. ergo & AB ipſius HK eſt dupla. & eadem ratione erit AE dupla ipſius GF. quare HK ipſi GF 33.primi. eſt aequalis, atque eſt parallela, vt demonſtratum fuit. quae autem aequales & parallelas coniungunt & ipſae aequales ſunt, & parallelae. aequalis igitur & parallela eſt HG ipſi KF. ſuntq; HK KF inter ſe aequales, cum aequalium ſint dimidiae, ergo HKFG aequilaterum eſt.

Dico & rectangulum eſſe] *Vt hoc facile demonſtretur duo lemmata premittenda ſunt.*

LEMMA PRIMVM.

Si à vertice pyramidis ad baſim perpendicularis ducatur, cadet ea in centrum circuli, qui circa baſis triangulum deſcribitur.

Sit pyramis ABCD, cuius baſis triangulum ABC, & vertex D punctum: ducaturq; à puncto D ad baſim perdendicularis DE. Dico E centrum eſſe circuli circa triangulum ABC deſcripti. Iungantur enim AE BE CE. & quoniam DE perpendicularis eſt ad planum trianguli ABC, & ad omnes rectas lineas, quae ipſam contingunt, quęq; in eodem ſunt plano rectos angulos faciet. recti igitur anguli ſunt DEA DEB DEC; ac propterea quadratum ex 47.primi *AD eſt aequale quadratis ex AE ED. & quadratum ex BD aequale quadratis ex BE ED. ſunt autem quadrata ex AD DB aequalia, quòd aequales ſint AD DB. ergo quadrata ex AE ED aequalia ſunt quadratis ex BE ED. & dempto communi quadrato ex ED, relinquentur quadrata ex AE EB inter ſe aequalia. ideoq; rectae lineae AE EB* 9.tertij. *aequales ſunt. ſimiliter demonſtrabimus CE aequalem eſſe ipſis AE EB. quare punctum E centrum eſt circuli circa triangulum ABC deſcripti. quod demonſtrare oportebat.*



LEMMA SECVNDVM.

Recta linea ab angulo trianguli æquilateri ducta per centrum circuli, qui circa triangulum deſcribitur, baſim bifariam ſecat.

Sit triangulum aequilaterum ABC, & circa ipſum circulus ABC, cuius centrum D: & ducta AD ſecet baſim in puncto E. Dico BE ipſi EC aequalem eſſe: producatur enim AE vſque ad circuli circumferentiam in F. quoniam igitur AF per centrum tranſit, circuli erit diameter: ideoq; circumferentia ABF circumferentiae ACF eſt aequa- 28.tertij. *lis. circumferentia autem AB aequalis eſt circumferentiae AC, quòd recta linea AB ſit aequalis ipſi AC. ergo & reliqua circumferentia* 27.tertij. *BF reliquae circumferentiae FC, & angulus BAE angulo EAC aequalis erit. itaque trianguli ABE duo latera BA AE aequalia ſunt duobus lateribus CA AE trianguli AEC; & angulus BAE aequa-* 8.primi. *lis eſt angulo EAC. ergo & baſis BE baſi EC eſt aequalis. quod oportebat demonſtrare.*

Poteſt etiam hoc probari ex tertia ſexti libri, cum BA ſit aequalis ipſi AC.



COROLLARIVM.

Ex quibus, & ex tertia tertij conſtat rectam lineam ab angulo trianguli æquilateri ductam per centrum circuli, qui circa triangulum deſcribitur, ad baſim perpendicularem eſſe.



His demonſtratis ducatur à vertice pyramidis ABCD ad baſis planũ perpendicularis, quae ſit DO. erit O centrum circuli circa triangulum ABC deſcripti, ex primo lemmate eorum, quae nos prȩmiſimus. Itaque per latus pyramidis BD, et per DO ducatur planum pyramidem ſecans. erit illud rectum ad planum baſis ABC, atque erit eius, & trianguli ABC communis ſectio BO, quae vlterius protracta cadet in G ex ſecũdo lemmate prȩmiſſorum; & erit ad ipſam AC perpendicularis. Eadem ratione ſi per latus pyramidis AD, & per DO intelligatur ductum aliud planum, ad baſim rectum erit, & communis ipſorum ſectio erit recta linea AOF ad ipſam BC perpendicularis. ducantur à punctis KH ad planum trianguli ABC perpendiculares KM HN. cadent hae in communes planorum ſectiones ex 38 vndecimi, hoc eſt KM cadet in BO, & HN in ipſam AO: & BO AO in punctis MN bifariam diuidentur. Quoniam enim DO KM perpendiculares ſunt ad idem planum inter ſe parallelȩ erunt. quare vt BK ad KD, ita eſt BM ad MO. ſed BK eſt aequalis KD. ergo & BM ipſi MO aequalis erit. Eadem ratione demonſtrabitur AN aequalis NO. & quoniam perpendicularis à circuli centro ducta ad latus trianguli aequilateri dimidia eſt eius, quae ex centro circuli, vt ad primam quartidecimi libri demonſtrauimus; erit OF dimidia ipſius OA, & OG dimidia ipſius OB. & cum FO OG ſint aequales, quoniã et ipſae AO OB quȩ ex circuli cẽtro; omnes AN NO OF BM MO OG inter ſe ęquales erunt. centro igitur O, & interuallo vna ipſarum EO OG circulus deſcriptus etiam per puncta MN tranſibit. deſcribatur, & NM MF iungantur. quòd cum triangula BDO BKM ſint aequiangula, propterea quòd linea KM parallela eſt ipſi DO; erit vt DB ad BK, ita DO ad KM: eſtq; DB dupla ipſius BK. ergo & DO ipſius KM dupla erit. & ita demonſtrabitur DO dupla ipſius HN. quare KM HN inter ſe aequales ſunt. & ſunt parallelae, quippe quòd ad idem planum ſint perpendiculares. quae autem aequales, & parallelas coniungunt, & ipſae aequales, & parallelae ſunt. aequalis igitur eſt & parallela MN ipſi KH. ſed FG demonſtrata eſt aequalis, & parallela eidem KH. ergo MN, FG aequales ſunt, & parallelae. angulus autem NMK eſt rectus: & ſimiliter rectus NMF, quod in ſemicirculo. quare cũ NM duabus rectis lineis KM MF ſe inuicẽ ſecantibus in cõi ſectione ad rectos angulos iſiſtat, ẽt ducto per ipſas plano ad rectos angulos erit. ergo NM perpendicularis eſt ad planũ trianguli KMF. ſed demonſtrata eſt FG parallela ipſi MN. quare & FG ad idem planũ perpendicularis erit, ideoq; angulus GFK eſt rectus. ſunt autem anguli GFK FGH duobus rectis aequales. ergo & rectus eſt FGH: & ſimiliter recti, qui ipſis opponũtur. ex quibus ſequitur HK FG & aequilaterum eſſe, & rectangulum. quod oportebat demonſtrare.

29.undecimi

6.undecimi. 2.ſexti.

4.ſexti.

9.quinti. 6.undecimi. 13.primi.



4. undecimi

8.undecimi.

29.primi.

34.primi.

ALITER. Ductis KM HN perpendicularibus, ut in antecedẽti figura, iungantur HF KG. & quoniam perpendicularis BG eſt aequalis ipſi AF; eſt enim AB ad vtramq; ipſarũ, vt 4 ad 3, quod nos demonſtrauimus ad 12

tertijdecimi libri. ſed & BM eſt æqualis AN: erit & reliqua MG reliquæ NF æqualis: atque eſt KM æqualis HN. trianguli igitur KMG duo latera GM MK æqualia ſunt duobus lateribus FN NH trianguli HNF: & angulus GMK rectus eſt æqualis recto FNH. ergo et baſis KG baſi FH eſt æqualis. rurſus. quoniam duo latera FK KH æqualia ſunt duobus lateribus GH HK, & baſis FH eſt æqualis baſi GK; erit angulus FKH æqualis angulo GHK. & ſunt duobus rectis æquales. vterque igitur ipſorum eſt rectus, itemq; recti, qui ipſis opponuntur. ergo HKFG rectangulum eſt. quod oportebat demonſtrare.



PROBLEMA III. PROPOSITIO. III.

In dato cubo octaedrum deſcribere.

A Sit datus cubus ABCDEFGH: & ſumantur centra inſiſtentium quadratorum KLMN. Dico
B KLMN quadratum eſſe. ducantur per KLMN
C parallelæ PO OX XT TP, Quoniam igitur PO quidem dupla eſt ipſius OK, XO autem du-
D pla ipſius OL, ſuntq; æquales PO OX; erunt
E & KO OL inter ſe æquales. quadratum igitur ex KL duplum eſt quadrati ex OL. eadem ratione & quadratum ex ML duplum eſt quadrati
F ex LX. ergo quadratum ex KL quadrato ex LM eſt æquale. æquilaterum igitur eſt KLMN, & cõ
H ſtat rectangulum eſſe. ſumantur duo quadrata BD EG; ipſorũq; centra R S, & iungantur RK RL RM RN SK SL SM SN.
K perſpicuum eſt triangula, quæ octaedrum efficiunt æquilatera eſſe. quod eadem ratione demonſtrabimus.



F. C. COMMENTARIVS.

A Et ſumãtur centra inſiſtentium quadratorum] *videlicet quadratorum CA AE EC CG; centra autem quadratorum dicit centra circulorum, qui circa quadrata deſcribuntur.*

B Ducãtur per KLMN parallelę PO OX XT TP] *Hoc eſt ducatur PO parallela alteruitri ipſarum DA GH: & OX parallela alteruitri ipſarum AB HE, & ſic in alijs.*

C Quoniam igitur PO quidem dupla eſt ipſius OK, XO autem dupla ipſius OL] *Centrum enim eas bifariam ſecat, vt monſtrabitur.*

Sit quadratum ABCD, & ducantur diametri AC BD conuenientes in puncto E: perq; E ducatur FG alterutri ipſarum AD BC parallela. Dico FE ipſi EG æqualem eſſe.

29. primi 15. primi. *Angulus enim FAE eſt æqualis angulo GCE, et angulus AEF angulo CEG: ad verticem enim ſunt. reliquus igitur reliquo æqualis, & triangulum triangulo ſimile. quare vt AE ad EF, ita eſt CE, ad EG: & permutando vt AE ad EC, ita FE ad EG.*



æquæ

atque eſt AE aequalis EC, quòd AE ſit circuli diameter, & E centrum eiuſdem. ergo FE ipſi EG. æqualis erit. centrum autem non ſolum ipſam FG bifariam ſecat, ſed & alias omnes, quae in quadrato per ipſum ducuntur. quod eodem modo demonſtrabimus.

Suntq; æquales PO OX] *Eſt enim PO aequalis DA, & OX aequalis AB ex 34 primi. quare PO ad OX eſt vt DA ad AB: & ſunt DA AB inter ſe aequales. ergo & PO OX aequales erunt.* D

Quadratum igitur ex KL duplum eſt quadrati ex OL] *Eſt enim quadratum ex KL æquale quadratis ex KO OL ex 47 primi.* E

Ergo quadratum ex KL quadrato ex LM eſt æquale] *Ex quo ſequitur & rectam lineã KL ipſi LM aequalem eſſe. ſed & aliter demonſtrare poſſumus. Quoniam enim duo latera KO OL ſunt aequalia duobus lateribus LX XM, & angulus ad O rectus eſt aequalis recto ad X; erit & baſis KL baſi LM aequalis ex 4 primi. et eodem modo demonſtrabitur LM aequalis MN, et OK aequalis KN. quare omnes inter ſe aequales ſint neceſſe eſt.* F

Et conſtat rectangulum eſſe] *Quoniam enim KO eſt aequalis OL, & angulus KOL eſt rectus, erit angulus KLO recti dimidius; & ob eandem cauſſam angulus MLX eſt dimidius recti. reliquus igitur K L M rectus eſt. ſunt enim tres anguli duobus rectis aequales. Eadem ratione & vnuſquiſque aliorum angulorum LMN MNK NKL rectus demonſtrabitur.* G

Perſpicuum eſt triangula, quæ octaedrum efficiunt æquilatera eſſe. quod eadem ratione demonſtrabimus] *Iiſdem enim argumentis probabimus KSMR NSLR aequilatera eſſe, & latera eorum ipſis KLMN aequalia.* H

PROBLEMA IIII. PROPOSITIO. IIII.

In dato octaedro cubum deſcribere.



A B C D E F

Sumantur centra circulorum, quæ ſunt circa triangula ABE ABC ACD ADE, quæ ſint G HKL, & GH GK LK LH iungantur. Dico GH KL quadratum eſſe. ducantur per GHKL ipſis EB BC CD DE parallelæ OM MN NX XO. quoniam igitur æquilaterum eſt ABC triangulum, recta linea, quæ à puncto A ducitur ad H centrum circuli circa triangulum ABC deſcripti bifariam ſecat trianguli angulum, qui eſt ad A. æqualis igitur eſt MH ipſi HN. Eadem ratione & MG eſt æqualis GO. quoniam autem MN eſt æqualis MO, & MO ipſi OX; erit & HM æqualis MG, & GO ipſi OK; ſuntq; anguli HMG GOK recti. ergo HG ipſi GK eſt æqualis. Eadem ratione & reliquæ æquales erunt. cum igitur parallelogrammum ſit GHKL in uno erit plano. & cũ vterque angulorum MGH OGK ſit dimidius recti, reliquus HGK rectus erit. ſimiliter & reliqui. quadratum igitur eſt GHKL. poſſumus autem à principio ſumentes centra GHKL, ducentesq; parallelas MN NX XO OM iungere GH HL LK KG, & dicere GHKL quadratum eſſe. quòd ſi ſumentes reliquorum triangulorum centra, ipſa iungamus, oſtendentur & reliqua quadrata eſſe, habebimusq; in dato octaedro deſcriptum cubum. quod facere oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

Quoniam igitur æquilaterum eſt ABC triangulum, recta linea, quæ à puncto A ducitur ad H centrum circuli circa triangulum ABC deſcripti bifariam ſecat trianguli angulum, qui eſt ad A. æqualis igitur eſt MH ipſi HN] *Superius enim demonſtratũ eſt rectam lineam ab angulo trianguli æquilateri ductam per centrum circuli, qui circa triangulum deſcribitur* A

tnp

deſcribitur baſim bifariam ſecare. ſequitur etiam hoc ex demonſtratis in decima primi libri. quod ſi per centrum H ducatur MN ipſi BC parallela, demonſtrabitur eadem ratione MH aequalem eſſe ipſi HN, cum MA ipſi AN ſit aequalis, fiunt enim triangula BAC MAN inter ſe ſimilia.

B Quoniam autem NM eſt æqualis MO, & MO ipſi OX, erit & HM æqualis MG, & GO ipſi OK] *Cum enim rectae lineae NM MO parallelae ſint ipſis CB BE, erit triangulum AMN triangulo ABC ſimile, & triaugulum AMO ſimile triangulo AEE. vt igitur CB ad BA, ita eſt NM ad MA. & vt AB ad BE, ita AM ad MO. quare ex aequali vt CB ad BE, ita NM ad MO. ſed CB eſt aequalis ipſi BE; ponitur enim BCDE quadratum. ergo & MN ipſi MO eſt æqualis. & eadem ratione MO ipſi OX aequalis demonſtrabitur. eſt autem HM dimidia ipſius MN, & MG dimidia ipſius MO. quare ſequitur HM ipſi MG aequalem eſſe, & ita GO æqualem ipſi OK.*

C Suntq; anguli HMG GOK recti] *Quoniam enim rectae lineae NM MO parallelae ſunt ipſis CB BE, atque eſt angulus CBE rectus; & NMO angulus rectus erit, ex 10 vndecimi.*

D Ergo HG ipſi GK eſt æqualis [*Ex 4 primi.*

E Cum igitur parallelogrammum ſit GHKL in vno erit plano] Omne enim parallelogrammum eſt in vno plano.

Sit parallelogrammum ABCD, & iungantur AC BD, quae ſe ſe in puncto E ſecent. erit triangulum ABC in vno plano ex 2 unde 11. itemq; in vno plano. triangulum ACD. ſed et triangulum BCD eſt in vno plano. quare triangulum DEC, hoc eſt totum triangulum ACD eſt in eodem plano, in quo triangulum DEC, hoc eſt ipſum ABC. totum igitur parallelogrammum ABCD in uno plano erit. quod oportebat demonſtrare.



F Et cum vterque angulorum MGH, OGK ſit dimidius recti, reliquus HGK rectus erit] *Sunt enim triangula HMG GOK aequicruria, et anguli ad M, et O recti; ut demonſtratum iam eſt.*

Ex iam demonſtratis apparet quomodo in dato octaedro pyramis deſcribatur.

Si enim in dato octaedro cubum, et rurſus in cubo pyramidem deſcribamus, et pyramis in dato octaedro deſcripta erit.

PROBLEMA V. PROPOSITIO V.

In dato icoſaedro dodecaedrum deſcribere.

A Exponatur pentagonum icoſaedri ABCDE, & ſumantur centra circulorũ, qui ſunt circa triãgula AFE AFB BFC CFD DFE, uidelicet GHKLM, iungantq; GH HK KL LM MG. & rurſus iũctæ FG FH FK producãtur ad pũcta XNO, quæ rectas lineas EA AB BC in XNO punctis bifariam ſecabũt: atq; erit vt XN ad NO, ita GH ad HK. æqualis igitur eſt & HN ipſi KO. ſimiliter autem & reli-



quæ

qua pentagoni GHKLM latera æqualia oſtendentur. Dico & æquiangulum eſſe. Quoniam enim duæ XN NO parallelæ duabus GH HK æquales angulos continent, & reliqua manifeſta ſunt. Intelligatur à puncto F ad planum pẽtagoni ABCDE ducta perpẽdicularis, quæ cadet in centrũ circuli circa pẽtagonũ deſcripti. ſi igitur à pũcto N ad punctum, in quod dicta perpendicularis cadit, rectam lineã ducamus, & per H ducamus ipſi parallelam, perſpicuum eſt eam perpendiculari occurrere, & cum ipſa rectum angulum continere. Rurſus ſi à punctis XO ad cẽtrum circuli circa pentagonum deſcripti rectas lineas iungamus, & à puncto, in quo linea per H ducta perpendicularis occurrit ad G. K rectas lineas ducamus, manifeſtũ eſt ipſas cum eadem perpendiculari rectos angulos continere. Ex quo perſpicue cõſtat pentagonum GHKLM in vno eſſe plano.



E F G H K

F. C. COMMENTARIVS.

Exponatur pentagonum icoſaedri ABCDE] *Hoc eſt pentagonum deſcriptum in circulo, à quo icoſaedrum ortum habet, vt in 16 tertij decimi.* A

Quę rectas lineas EA AB, BC in X N O punctis bifariam ſecabunt] *Ex ijs, quae nos in antecedente demonſtrauimus.* B

Atque erit vt XN ad NO, ita GH ad HK] *Quoniam enim triangula AFE AFB BFC aequilatera ſunt, & aequalia; erunt perpendiculares, quae ab angulo F ad baſim ducuntur; videlicet FX FN FO inter ſe aequales. latus enim trianguli aequilateri ad perpendicularem, quae ab angulo ad baſim ducitur, eam proportionem habet, quam 4 ad 3, vt nos demonſtrauimus ad 12 tertij decimi. Rurſus quoniam GHK ſunt centra circulorum, qui circa triangula deſcribuntur, erũt & ipſae, quae ex centris FG FH FK aequales. ergo & reliquae aequales ſunt, nempe GX HN KO. ſunt autem aequales EA AB BC: & earum dimidiae EX XA AN NB BO OC. cũ igitur duo latera trianguli ANX, videlicet XA AN aequalia ſint duobus lateribus NB BO trianguli BON; & anguli ad AB ſint aequales, ponitur enim pentagonum ABCDE aequilaterum, & aequiangulum: erit & baſis XN baſi NO aequalis. ſed vt FG ad GX, ita eſt FH ad HN: eſt enim vtraque vtriuſque dupla, vt ad primam quartidecimi demonſtratum eſt. ergo GH parallela eſt ipſi XN. & eadem ratione HK ipſi NO eſt parallela. triangulum igitur FGH ſimile eſt triangulo FXN, & triangulum FHK ſimile ipſi FNO: ideoq; vt NX ad HG, ita eſt NF ad FH. vt autem NF ad FH, ita NO ad HK. quare vt NX ad HG, ita NO ad HK: & permutando vt XN ad NO, ita GH ad HK. ſunt autem aequales XN NO. ergo & GH HK aequales ſint neceſſe eſt.* C

Aequalis igitur eſt & HN ipſi KO] *Vide ne potius legendum ſit aequalis igitur eſt & GH ipſi HK propter ea, quae ſequuntur.* D

Quoniam enim duæ XN NO parallelæ duabus GH HK æquales augulos continent: & reliqua manifeſta ſunt] *Nam cum duae XN NO ſeſe contingentes duabus GH HK ſeſe contingentibus ſint parallelae, non autem in eodem plano; aequales angulos continebunt. ergo angulus GHK eſt aequalis angulo XNO. & ſimiliter bifariam ſecta CD in T, & iuncta OT, erit angulus HKL aequalis angulo NOT. ſed anguli XNO NOT ſunt aequales, ut monſtrabitur. ergo & GHK HKL anguli aequales erunt. & ſimiliter reliqui. Quoniam enim triangula AXN BON CTO aequicruria ſunt ſimilia, & aequalia, erũt anguli AXN ANX BNO BON COT inter ſe aequales. ergo reliquus ex duobus rectis XNO eſt aequalis reliquo NOT; itemq; reliqui aequales oſtendentur.* E 10. undecimi

Quæ cadet in centrum circuli circa pentagonũ deſcripti] *Cadat enim in punctum V,* F

&

& intelligãtur iunctae AV BV CV. Quoniã igitur FV perpẽdicularis eſt ad planũ pentagoni,
3 dif. undecimi. *erunt anguli AVF BVF CVF recti; & ob id quadratum exi. AF aequale duobus quadratis ex*
47. primi. *AV VF: & quadratum ex BF æquale duobus ex BV VF. ſed quadratum ex AF eſt aequale quadrato ex BF, quòd AF ipſi FB ſit aequalis. ergo qnadrata ex AV VF quadratis ex BV VF ſunt aequalia, & dempto communi quadrato ex FV, erit reliquum quadratum ex AV aequale reliquo ex VB, & recta linea AV ipſi VB aequalis. Eadem ratione & recta linea CV aequalis*
9. tertij. *oſtendetur ipſis AV VB. ergo V eſt centrum circuli circa pentagonum deſcripti. quod demonſtrare oportebat.*

G Perſpicuum eſt eam perpendiculari occurrere, & cum ipſa rectum angulum con
8. undecimi. tinere] *Nam cum triangulum FNV ſit in vno plano, ſi recta linea à puncto H ducta non occureret perpendiculari, parallela non eſſet ipſi NV, quod non ponitur. ſunt enim parallele in eodem plano ex 35 diffinitione primi libri. Occurrat autem perpendiculari in puncto Z. cum igitur angulus NVF ſit rectus ex 3. diffi. vndecimi, erit ex 29 primi & HZF rectus.*

H Manifeſtum eſt ipſas cum eadem perpendiculari rectos angulos continere] *Quo-*
8. sexti. *niam n. HZ eſt parallela ipſi NV; erit ut FZ ad ZV, ita FH ad HN. ſed vt FH ad HN, ita FG ad*
11. quinti. *GX. vt igitur FZ ad ZV, ita FG ad GX. quare GZ eſt parallela ipſi XV; anguluſq; GZF eſt rectus, nempe ipſi recto XVF aequalis. & eadem ratione angulus KZF rectus erit: iunctiſq; LZ MZ ſimiliter demonſtrabitur angulos LZF MZF eſſe rectos.*

K Ex quo perſpicue conſtat pentagonum GHKLM in vno eſſe plano] *Ex quinta undecimi. nã recta linea FZ tribus rectis lineis ſe ſe tangentibus ZG ZH ZK ad rectos angulos inſiſtit. Si igitur reliquis icoſaedri angulis eodem modo pentagona ſubtendemus in dato icoſaedro dodecaedrum deſcriptum erit.*

De quinque figurarum lateribus, & angulis.

Oportet autem ſcire, ſi quis interroget nos, quot latera icoſaedrum habeat; ita reſpondendum eſſe. Patet icoſaedrum contineri viginti triangulis, & vnumquodque triangulum ex tribus rectis lineis conſtare. multiplicabimus igitur viginti triangula per numerum laterum trianguli. fient ſexaginta; cuius dimidium triginta. ſimiliter autem & in dodecaedro. quoniam enim duodecim pentagona dodecaedrum continent, & vnumquodque pentagonum habet quinque rectas lineas, multiplicabimus decies quinque, & erunt ſexaginta, cuius rurſus dimidium triginta. dimidium autem idcirco accipimus, quòd ſingula latera ſiue ſit triangulum, ſiue pẽtagonum, ſiue quadratum, vt in cubo, bis ſumuntur. Eadem via, & ratione vtentes & in cubo, & in pyramide, & in octaedro latera inueniemus. ſi vero ſingularum quinque figurarum anguli inueniendi ſint, rurſus eadem facientes partiemur per numerum planorum, quæ vnum ſolidi angulum continent; vt quoniam icoſaedri angulum continent quinque triangula, partiemur per quinque. erunt duodecim anguli in icoſaedro. quoniam autem tria pentagona dodecaedri continent angulum, partiemnr per tria, & habebimus angulos viginti in dodecaedro. ſimiliter in reliquis figuris anguli inuenientur.

De

De inclinatione planorum, quæ ſingulas quinque figuras continent.

Quęſitum eſt quo modo in vnaquaque ſolidarum quinque figurarum quolibet plano dato eorum, quæ ipſam continent, inclinatio inueniatur. Inuentio autem, vt narrauit Iſidorus magnus præceptor noſter, hoc modo ſe habet. In cubo quidem plana, quæ ipſum continent, ad rectos inter ſe angulos inclinari manifeſtum eſt. In pyramide vero expoſito vno triangulo centris quidem terminis vnius lateris, interuallo autem recta linea, quę à vertice trianguli ad baſim perpendicularis ducitur, circumferentiæ deſcriptæ ſe mutuo ſecent; & à ſectione ad centra iunctę rectæ lineæ continebunt inclinationem planorum, quę pyramidem comprehendunt. At in octaedro à latere trianguli deſcripto quadrato, & centris quidem terminis diametri, interuallo autem ſimiliter perpendiculari, quæ à uertice trianguli ad baſim ducitur; deſcribantur circumferentiæ; & rurſus rectæ lineę à communi ſectione ad centra iunctæ continebunt angulum, qui ex duobus rectis relinquitur, inclinationis eius, quam inquirimus. In icoſaedro autem à latere trianguli deſcripto pentagono, iungatur recta linea, quę duobus lateribus ſubtenditur: & centris quidē terminis eius, interualloq; perpendiculari ipſius trianguli deſcriptis circumferentijs rectæ lineę à communi ſectione ad centra iunctę continebunt ſimiliter angulum, qui ex duobus rectis relinquitur, inclinationis planorum ipſius icoſaedri. Denique in dodecaedro expoſito vno pentagono, & iuncta ſimiliter recta linea, quę duobus lateribus ſubtenditur, centris quidem terminis ipſius, interuallo autem perpendiculari, quæ à bipartita ſectione ad latus pē tagoni ipſi parallelum ducitur; deſcribantur circumferentiæ; & à puncto, in quo conueniunt ad centra ſimiliter iunctæ rectæ lineę continebunt reliquum ex duobus rectis, inclinationis planorum dodecaedri.

Cubi planorum inclinatio.

Pyramidis.

Octaedri planorum inclinatio.

Icoſaedri planorum inclinatio.

Dodecaedri planorum inclinatio.

Hunc quidem vir ille clariſsimus de prędictis ſermonem habuit, cum demonſtratio eorum ſibi manifeſta videretur. ſed vt contemplatio demonſtratiua perſpicue appareat, ſermonem in vnoquoque explicabo, & primum in pyramide.

Intelligatur pyramis quattuor triangulis æquilateris contenta ABCD, cuius baſis ABC, & vertex D punctum. ſecto autem latere AD bifariam in E, iungantur BE EC. Et quoniam æquilatera ſunt ADB ADC triangula, & bifariam ſecta eſt AD, erunt BE EC ad ipſam AD perpendiculares. Dico angulum BEC acutum eſſe.



Quoniam enim AC dupla est ipsius AE, erit quadratum ex AC quadrati ex AE quadruplum. Sed quadra
47.primi. tum ex AC æquale est quadratis ex AE EC, quorum
B quadratum ex AC ad quadratū ex CE proportionem
C habet, quam 4 ad 3: atque est CE ipsi EB æqualis. quadratum igitur ex BC minus est quadratis ex BE EC; ideoque angulus BEC est acutus. quòd cum duorum planorum ABD ADC communis sectio sit AD, & communi sectioni ad rectos angulos occurrant in vtroque planorum rectę lineæ BE EC, quæ acutum angu-
D lum continent. erit angulus BEC planorum inclinatio, atque est data; datur enim BC latus existens trian-
E guli, & utraque ipsarum BE EC est perpendicularis trianguli æquilateri. centris igitur BC, hoc est terminis vnius lateris, & interuallo trianguli perpendiculari descriptę circumferentiæ se inuicem secent in puncto E: & ab eo ad BC iunctæ rectæ lineæ planorum inclinationem continebunt. hoc autem est, quod dicebatur. atque illud (centris quidem BC, interuallo autem trianguli perpendiculari descripti circuli se mutuo secent,) manifestum est. vtraque enim BE EC maior est, quàm dimidia ipsius BC: & centris BC, & interuallo ipsius BC dimidia descripti circuli se se tangunt. si autem minor sit, neque se tangunt, neque secant: quòd si maior omnino secant; & ita de pyramide sermo & manifestus, & demonstrationibus cohgruens apparet.



Intelligatur rursus in quadrato ABCD pyramis verticem habens punctum E, & continentia ipsam præter basim triangula æquilatera. erit autem ABCDE pyramis dimidia octaedri. secerur latus vnius trianguli AE bifariam in F: & BF FD iungantur. sunt igitur BF FD & æquales inter se, & ad ipsam AE perpendiculares. Dico angulum BFD obtusum esse. iungatur enim BD; & quoniam quadratum est AC, cuius diameter BD, erit quadratum ex BD quadrari ex DA duplum. quadratum autem ex DA ad quadratum ex DF proportionem habet, vt proximè dictum est, quam 4 ad 3. ergo & quadratum ex BD ad quadratum ex DF proportiouem ha-
F bebit, quam 8 ad 3. est autem DF æqualis FB. quadratum igitur ex BD maius est quadratis ex BF FD, ac propterea angulus BFD est obtusus. & quoniam duorum planorum ABE ADE se inuicem secantium communis sectio est AE, & ipsi ad rectos angulos in vtroque plano ductæ sunt BF FD, angulum obtusum continentes; erit an-
G gulus BFD reliquus ex duobus rectis, inclinationis planorum ABE ADE. si igitur angulus BFD datus sit, & dicta inclinatio dabitur. Itaque quoniam triangulū octae-
H dri datum est, & unum eius latus est AD, à quo quadratum AC describitur; datur & BD diameter existens quadrati: sed & BF FD trianguli perpendiculares datæ sunt. ergo & angulus BFE dabitur. descripto igitur quadrato à latere trianguli, ut AC, & iuncta diametro BD, si centris quidem BD; interuallo autem perpendiculari trianguli circulos describamus, se mutuo secabunt in F: & rectę lineæ à puncto F ad centra ductæ continebunt inclinationem BFD, quæ quidem est reliqua ex duobus rectis, vt dictum est, inclinationis planorum. & hoc loco patet vtramque ipsarum BF FD maiorem esse, quàm ipsius BD dimidiam. ideoque in constructione organica necesse est circulos se mutuo secare. constat etiam ex demonstratione ipsam BD ad DF potentia proportionem habere. quam habet 8 ad 3. & dimidiæ eius potentia esse quadruplam. ergo utraque ipsarum BF FD maior





ior est quàm dimidia ipsius BD. & hęc quidem de octaedro dicta sint.

In icosaedro autem intelligatur pentagonum æquilaterum ABCDE, & in hoc pyramis uerticē habens punctum F; ita vt continentia ipsam triangula sint æquilatera. erit ABCDE pyramis figuræ icosaedri pars. secetur latus unius trianguli FC bifariam in G, & BG GD iungantur. erunt utique & æquales, & ad ipsam FC perpendiculares. Dico angulum BGD obtusum esse, quod per se se manifesto constat. Iuncta enim BD obtusum angulum BCD pentagoni subtēdit: hoc autem maior est angulus BGD: nam BG GD ipsis BC CD sunt minores. similiter ijs, quę proxime dicta sunt, patet angulum BGD esse eum, qui relinquitur ex duobus rectis inclinationis BFC CFD triangulorum. hoc autem dato, dabitur & planorum icosaedri inclinatio. à latere enim trianguli icosaedri descripto pentagono, & recta linea, quæ duobus pentagoni lateribus subtenditur, vt in figura est BD data: & similiter datis BG GC perpendicularibus triangulorum, dabitur & BGD angulus. nam si centris quidem terminis ipsius BD, quę duobus pentagoni lateribus subtenditur, interuallo autem perpendiculari trianguli circuli describantur, se inuicem secabunt, vt in G: & rectæ lineę à puncto G ad centra BD ductæ continebunt angulum, qui ex duobus rectis relinquitur, inclinationis planorum. & hoc loco ex figura manifestum est vtramque BG GD maiorem esse, quàm dimidiam ipsius BD. quamquam ita esse ex constructione organica demonstrari potest. intelligatur enim seorsum triangulum æquilaterum HKL, & ab ipsa KL pentagonum describatur KMNXL: iunctaque ML ducatur HO perpendicularis trianguli HKL. Dico HO maiorem esse dimidia ipsius ML, quæ inclinationē planorum subtendit. ducta enim à puncto K ad ML perpendiculari KP, quoniā angulus KLP maior est tertia parte recti, hoc est maior angulo KHO; constituatur angulo KHO æqualis angulus PLR. ergo PL est perpendicularis æquilateri trianguli, cuius latus est RL; ac propterea quadratum ex RL ad quadratum ex LP proportionem habet, quam 4 ad 3. sed maior est KL quàm LR. ergo quadratum ex KL ad quadratū ex LP maiorem habet proportionem, quam 4 ad 3. habet autem & ad quadratum ex HO proportionem eam, quam 4 ad 3. ergo KL ad LP maiorem proportionem habet, quā ad HO. maior igitur est HO quàm LP.

In dodecaedro autem hoc modo intelligatur unum cubi quadratum, à quo dodecaedrum describitur ABCD, & duo plana dodecaedri AEBFG GDHCF. Dico & sic datam esse duorum pentagonorum inclinationem: secetur FG bifariam in K; & à puncto K ipsi FG ad rectos angulos ducantur in vtroque planorum KL KM: & ML iungatur. Itaque primum dico angulum MKL obtusum esse. ostensum enim est in tertiodecimo libro elementorum, & in constitutione do-

decaedri, rectam lineam, quæ à puncto K ad quadratum ABCD perpendicularis ducitur, dimidiam esse lateris pentagoni. quare minor est quàm dimidia ipsius ML. ideoque angulus MKL est obtusus. simul autem demonstratum est in eodem theoremate, quadratum quidē ex KL æquale esse & dimidij lateris cubi quadrato, & quadrato dimidij lateris pē tagoni, ita vt KL, & KM inter se æquales maiores sint, quàm dimidia ipsius ML. angulo igitur MKL dato reliquus ex duobus rectis, hoc est inclinatio planorum data erit. Itaque quoniam latus quadrati ABCD duobus lateribus pentagoni subtenditur, & datū est pentagonum; erit & ML data. data autem est & vtraque ipsarum MK KL; perpendiculares enim sunt à bipartita sectione rectæ lineæ AB, quæ duobus lateribus subtenditur ad latus pentagoni ipsi paralleinm, ut ad FG. ergo angulus LKM datus est, nempe reliquus ex duobus rectis, vt dictū est, inclinationis eius, quā inquirimus. pulchre igitur in constructione organica dixit, oportere dato pentagono iungere rectam lineam duobus lateribus subtensam, quæ lateri cubi est æqualis: & centris quidem terminis ipsius, interuallo autem perpendiculari, quę à bipartita sectione ad latus pentagoni parallelum agitur, vt in figura sunt KL KM, describere circumferentias, atque à pūcto, in quo conueniunt ad centra rectas lineas ducere, quę continent angulum reliquum ex duobus rectis, inclinationis planorum. at uero perpendicularem KM maiorem esse dimidia ipsius ML iam dictum est, vt in elemētis simul est demonstratū.



F. C. COMMENTARIVS.

A Et quoniam æquilatera sunt ADB ADC triangula, & bifariam secta est AD, erūt BE EC ad ipsam AD perpendiculares] *Ex ijs, quae nos ad 12 tertijdecimi libri demonstrauimus.*

B Quorum quadratum ex AC ad quadratum ex CE proportionem habet, quam 4 ad 3] *Ex demonstratis in eodem loco.*

C Quadratum igitur ex BC minus est quadratis ex BE EC] *Est enim quadratum ex BC ad quadrata ex BE EC, vt 4 ad 6.*

D Erit angulus BEC planorum inclinatio] *Ex 6. diffinitione vndecimi libri.*

E Et vtraqu[e] ipsarum BE EC est perpendicularis trianguli æquilateri] *Dato autem latere trianguli æquilateri, & perpendicularis dabitur ex secunda libri datorum. est enim latus trianguli aequilateri ad perpendicularem, vt 4 ad 3.*

F Quadratum igitur ex BD maius est quadratis ex BF FD] *Est enim quadratum ex BD ad quadrata ex BF FD, vt 8 ad 6.*

G Erit angulus BFD reliquus ex duobus rectis inclinationis planorum ABE ADE] *Est enim plani ad planum inclinatio acutus angulus rectis lineis contentus, quae ad rectos angulos communi planorum sectioni ad vnum ipsius punctum in vtroque planorum ducuntur. quare dempto BFD angulo obtuso ex duobus rectis relinquetur acutus angulus, qui est inclinationis planorum ABE ADE. & cum angulus BFD datus sit, & inclinatio planorum detur necesse est ex quarta libri datorum.*

H Datur & BD diàmeter existens quadrati] *Ex 26 libri datorum.*

K Iuncta enim BD obtusum angulum BCD pentagoni subtendit] *Angulus namque pentagoni constat ex recto, & quinta recti parte.*

L Hoc autem maior est angulus BGD, nam BG GD ipsis BC CD sunt minores] *Ex 21 primi. sunt enim BG GD minores, sed maiorem angulum continent.*

M Quoniam angulus KLP maior est tertia parte recti] *Angulus enim pentagoni MKL continet rectum, & recti quintam, vt dictum est. ergo anguli KML KLM sunt quattuor quin-*

tae

tae recti, & ipſe KLM duae quintae. duae autem quintae ad tertiam recti proportionem habent eam, quam 6 ad 5.

Sed maior eſt KL quàm LR] *Iuncta enim MR, erunt duae MK KL maiores MR RL ex* N
21 *primi ergo & dimidia KL quàm dimidia LR maior erit.*

Maior igitur eſt HO quàm LP] *Ex 10 quinti.* O

Intelligatur unum cubi quadratum, à quo dodecaedrum deſcribitur] *Ad conſtitu* P
tionem enim dodecaedri vtitur ipſius cubi quadratis, vt in 17 tertiidecimi apparet.

Ex ijs aũt quæ proxime tradita ſunt, & ex demonſtratis in 17 tertiidecimi libri cõ
ſtat, quomodo in dato dodecaedro cubus deſcribatur.

Quoniam enim in dodecaedri conſtitutione cubi planis vtimur, & ad ſingula eius latera ſingula pentagona dodecaedri deſcribimus, ſi in dodecaedro iam facto appoſitæ ducamus rectas lineas, quae duobus cuiuſque pentagoni lateribus ſubtendantur, cubus ipſe conſtitutus erit, vt in ſequenti figura apparere poteſt.

Ex quibus iam perſpicuum eſt quomodo in dato dodecaedro tum pyramis ipſa, tum octaedrum deſcribatur.

Nam ſi in dodecaedro cubum, & rurſus in cubo pyramidem vel octaedrum deſcribamus, & pyramis, & octaedrum in dato dodecaedro deſcripta ſint neceſſe eſt.



In dato icoſaedro cubum deſcribere.

Primum in icoſahedro dodecaedrum deſcribemus, vt in 5 huius dictum eſt; deinde in dodecaedro cubum, & ita cubus in dato icoſaedro deſcriptus erit.

In dato icoſaedro pyramidem deſcribere.

Si enim deſcribamus ex antecedenti in icoſaedro cubum, & in cubo pyramidem ex prima huius, erit pyramis quoque in icoſaedro deſcripta.



In dato dodecaedro icoſaedrum deſcribere.

Exponatur dodecaedri angulus aliquis A, contentus tribus pentagonis ABCDE, AFGHE, AFKLB: ſumanturq́; centra circulorum, qui circa pentagona deſcribuntur MNO, & ab ipſis ad latera pentagonorum perpendiculares ducantur MP OP NQ OQ MR NR: & MN NO OM iungantur. erunt ex iam demonſtratis MPO OQN NRM anguli inclinationis planorum ipſius dodecaedri, & idcirco inter ſe aequales:

item

itemq́, aequales perpendiculares ipſae. quare trianguli MOP duo latera MP PO aequalia ſunt duobus lateribus MR RN trianguli MNR: & angulus MPO eſt aequalis angulo MRN. baſis igitur OM. eſt aequalis baſi OMN. & ita demonſtrabitur baſis ON ipſi NM aequalis. ex quibus conſtat triangulum MNO aequiangulum eſſe. ergo ſi reliquis dodecaedri angulis triangula aequilatera eodem modo ſubtendantur, deſcriptum erit icoſaedrum. ſunt enim omnes anguli ipſius dodecaedri numero viginti, quot ſunt icoſaedri triangula. In dato igitur dodecaedro icoſaedrum deſcriptum eſt. quod facere oportebat.

4. primi.



EVCLIDIS ELEMENTORVM FINIS.

BIBLIOTECA NAZIONALE

PISAVRI.

CVM LICENTIA SVPERIORVM.

APVD CAMILLVM FRANCISCHINVM.

M. D. LXXII.