Notes du mont Royal

www.notesdumontroyal.com

Cette œuvre est hébergée sur « *Notes du mont Royal* » dans le cadre d'un exposé gratuit sur la littérature.


SOURCE DES IMAGES

Google Livres

Del Colegio de Alcala

UNIVERSIDAD CENTRAL
BIBLIOTECA
DERECHO

Rel.
27.5-67



EVCLIDIS
ELEMENTORVM
LIBRI XV.

Vnà cum Scholijs antiquis.

A FEDERICO
COMMANDINO
VRBINATE

NVPER IN LATINVM
conuersi, commentarijsque
quibusdam illustrati.

PISAVRI, M D LXXII.
Cum Priuilegio Pont. Max.

IACOBVS Christober German'.

Biblioteca del Colegio de Jesus de Alcala

UNIVERSIDAD BIBLIOTECA DERECHO

GREGORII XIII. PONT. MAX. PRIVILEGIVM.

MOTV PROPRIO &c. Cum, sicut accepimus, dilectus filius Federicus Commandinus Laicus Vrbinatensis nonnulla noua opera hactenus non impressa, videlicet Euclidis elementorum libros quindecim è greco nuper conuersos, & Aristarchi librum de magnitudinibus & distantijs Solis & Lunæ, necnon Pappi Alexandrini mathematicarum collectionũ libros sex. Heronis Alexandrini spiritalium librum. Euclidis opera reliqua. Theodosii de habitationibus librum, eiusdem de diebus & noctibus libros duos. Autolyci de ortu & occasu libros duos. eiusdem de sphæra, quæ mouetur, librum, & Archimedis opera omnia, ad publicam & communem omnium studiosorum vtilitatem imprimere seu imprimi facere intendat, dubitetq; ue ne eiusmodi opera postmodum ab alijs sine eius licentia imprimantur, quod in maximum suum tenderet præiudicium, Nos propterea eius indemnitati consulere uolentes, eidem Federico, ne prędicta opera omnia & singula uel quolibet ipsorum per ipsum Federicum, seu de eius ordine postquam per ordinarios locorum, & Inquisitores hęreticę prauitatis partium illarum examinata fuerint, imprimenda, per decem annos, post eorundem operum uel cuiuslibet ipsorum impressionem, à quocunque vel quibuscunque sine ipsius Federici licentia imprimi, aut ab ipsis uel alijs uendi, seu in eorum apothecis uel aliàs uenalia, præter quàm à dicto Federico, uel de eius ordine impressa, aut imprimenda teneri possint, concedimus & indulgemus. Inhibentes omnibus & singulis Christi fidelibus tam in Italia, quàm extra eam existentibus, præsertim bibliopolis & librorum impressoribus, sub excommunicationis latæ sententiæ, in terris uerò Sanctę Ro. Ecclesiæ mediate, uel immediate subiectis, etiam quingentorum ducatorum auri Camerę Apostolicę applicandorum, & insuper ammissionis librorum pœnis toties ipso facto, & absque alia declaratione incurrendis, quoties contrauentum fuerit. ne intra decem annos prædictos ab impressione dictorum, uel cuiuslibet ipsorum respectiue computandos dicta opera, uel quodlibet ipsorum sine eiusdem Federici expressa licentia dictis decem annis durantibus

imprimere

imprimere, ſeu ab ipſis, uel alijs præter, quàm à dicto Federico impreſſa & imprimenda uendere; ſeu uenalia habere, uel proponere, uel ea, ut ſupra, habere audeant. Mandantes uniuerſis uenerabilibus fratribus noſtris Epiſcopis, Archiepiſcopis, eorumq; ue Vicarijs in ſpiritualibus generalibus & in ſtatu temporali Sanctæ Ro. Eccleſiæ etiam Legatis et Vicelegatis Sedis Apoſtolicæ, aut ipſius ſtatus Gubernatoribus, ut quoties pro ipſius Federici parte fuerint requiſiti, vel eorum aliquis fuerit requiſitus, eidem Federico efficacis defenſionis preſidio adſiſtentes, præmiſſa ad omnem dicti Federici requiſitionẽ contra inobedientes & rebelles per cenſuras Eccleſiaſticas, etiam ſæpius aggrauando, & per alia iuris remedia, auctoritate Apoſtolica exequantur, inuocato etiam ad hoc, ſi opus fuerit, auxilio brachij ſecularis. Et inſuper quia difficile admodum eſſet præſentes ad quodlibet forum deferri, uolumus & Apoſtolica auctoritate decernimus ipſarum tranſumptis uel exemplis in ipſis operibus impreſſis plenam & eandem prorſus fidem ubique tam in iudicio, quàm extra haberi, quæ præſenti originali haberetur. Et cum abſolutione à cenſuris ad effectum preſentium. et quod ſola ſignatura ſufficiat, premiſſis omnibus conſtitutionibus & ordinationibus Apoſtolicis, ceteriſq; ue in contrarium facientibus non obſtantibus quibuſcunque.

Placet V.

Datum Romæ apud Sanctum Marcum Non. Septembr. Anno primo.

ILLVSTRISSIMO ATQVE EXCELLENTISSIMO FRANCISCO MARIAE II VRBINATVM PRINCIPI.



CVM mihi in mentem venit Illuſtriſſime Princeps quanta mathematicę facultatis olim apud veteres illos felicioris certe ſeculi, atque ingenij homines, & celebritas, & dignitas fuerit; non poſſum non vehementer dolere temporũ noſtrorũ conditionem, qua nobilis diſciplinę cultus, & ſplendor ſqualore immenſo, ac tenebris penitus contabeſcit, dum vnuſquiſque deteſtanda auri cupiditate quicquid certam in ſe lucri non habet occaſionem, ſtatim inſolenter abijcit, temereque aſpernatur. Exulat iam, publiciſque ferè excluſum eſt gymnaſiis nobile hoc, & pulcherrimum matheſeos ſtudium, quo nihil iucundius, ac magis domeſticum vniuerſa quondam habuit gracia. Non eſt ſanè quòd his temporibus vereare, ne triangulis, tetragoniſque, aut circulis depictas porticus intueri, aut de huiuſmodi rebus loquentes audire cogaris. Iacet omnino, iacet hoc diſciplinæ genus, et quod in delitijs olim habebatur, nunc quaſi rude, & obſcurũ paſſim reijcitur, vſq; adeo auaritia, cacaq; diuitiarum libido apud noſtræ ætatis homines increbuit. minuitur tamen in dies hic dolor meus, tum quòd ab externis magnæ doctrinæ uiris has artes amanter excitatas, ſcio diligentiſſime promoueri: tũ quòd aliquot imperio, ac dignitate florentes iã hęc ſtudia benigne complecti, liberaliterq; fouere uideo: uerum enim illud eſſe quouis tempore homines ſunt experti, qualia fuerint eorum, qui ſummæ rerum præſunt, eadem & reliquorũ fore ſtudia. quam ob rem ſi non ad priſtinum dignitatis faſtigium, ad honeſtiorem certe gradũ eas breui peruenturas minime deſpero. idq; ea præſertim ratione, quòd te Princeps Illuſtriſſime, eximia mentis probitate, ſingulariq; ornatum prudentia, præclaros omnes animi tui conatus ad compenſanda literarum incommoda iam diu conuertiſſe lætus intueor. neque id iniuria profecto. nam vt illuſtria, & nunquam interitura memoriæ exempla tuæ gentis omittam, Patrem habes incomparabilis iuſtitiæ, magnanimitatis, & prudentiæ Ducem, qui artes ingenuas benignitate fouet, auctoritate defendit, & præmijs ornat. huic te ſimilẽ, ac parem vt præſtes neceſſe eſt. Age vero quanti eſt illud ad confirmandã, augendamque indies per egregiam hanc voluntatem, quòd non ſolum

literas diligis, veram etiam quo ſemper fuiſti mentis acumine, tantos in illis progreſſus facis, ut omnes qui te noſcunt, admiratione, ac gaudio afficiantur incredibili. Vt enim de me dicam, quoties ſummam ingenij tui præſtantiam, atque ſolertiam in percipiendis Euclidis elementis magna cum voluptate ſum admiratus? Hoc tu honeſtiſſimo, nec vnquam ſatis laudato bonarum artium ſtudio inflammatus nuper vertendi, explanandiq'ue Euclidis onus mihi iniunxiſti, quòd geometrarum omnium facile principem, tu Princeps optime iniquo patiebare animo, nec rectè multis in locis conuerſum, nec ſcite figuris ornatum fuiſſe. præterea vero typographorum ita corruptum negligentia, vt non ſine maxima ſtudioſorum offenſione legi, nedum intelligi poſſet. Ego vero prouinciam hanc tot difficultatibus impeditam alacri animo ſuſcepi, tum vt optime tuę voluntatis mandato, quod ſemper obnixe ſtudui, obtemperarem; tum etiam, vt pro ueteri meo inſtituto amatores huius diſcipline quacunque liceret ratione iuuarem. haud enim multis abhinc annis medicinæ, cui me totum dederam, ſalutem plurimam dixi, vt his me tantum oblectarer ſtudijs, & in eorum cognitione parum de alijs ſolicitus, conquieſcerem; veterumq'ue præſtantiſſima in hoc genere ſcripta, pro ingenij tenuitate à ſitu, ac tenebris uindicarem; & meis illuſtrata commentarijs in lucem, & omnium conſpectum non ſine aliqua ſtudioſorum gratia proferrem. quod partim iam ſumus aſſecuti, partim ſummis uigilijs diu, noctuq'ue contendimus. Archimedis enim, Ptolemæi, Apollonij, Sereniq'ue excellentium virorum opera nonnulla ſuperioribus annis conuerſa à nobis, & explicata quàm accuratiſſime emiſimus. Hoc autem tempore multum laboris, ac diligentiæ in Pappo, Herone, Theodoſio, Autolyco, Ariſtarcho, & alijs, quorum magna pars nec græce, nec latinè habetur, ponebamus, cum tuo iuſſu his depoſitis ſtudium, operam, laborem, & curam denique omnem ad unum Euclidem conuertimus, ut rem à multis tentatam, Deo iuuante ad finem perduceremus. Nam ut pauca de hac re loquar, Orontius quidem Phinæus haud obſcuri nominis auctor priores tantum ſex libros nulla græci codicis ratione habita edidit. Iacobi uero Peletarij in eadē re labor eo etiā minus probatur, quòd Cāpani editionem ex arabica conuerſam lingua, magis, quàm græcam ſequi uoluerit. Alij autem peracuti ſanè ingenij homines ἀναλύσεις geometricas in priores ſex libros conſcripſerunt, cetera tamen non ſunt proſecuti. At Candalla uir & generis nobilitate, & rerum cognitione inſignis, licet omnes Elementorum libros, qui poſtulari à latinis uidebātur, latinos fecerit, locupletauerit q'ue, parum tamen (vt ſtudio) eo nomine commenda-

tur,

tur, quod longius iter ab Euclide auerterit; & demonſtrationes, quę in græcis codicibus habentur, uelut inelegantes, & mancas ſuis appoſitis reiecerit. An uero, quod ab omnibus requiri dicimus, noſtra opera præſtiterimus, aliorum erit iudicium. Illud quidem uere affirmare poſſumus, nullam à nobis nec impẽſę, nec laboris, nec ualetudinis habitam fuiſſe rationem, ut hoc geometriæ columen, ac decus non ſolum expurgatum à mẽdis, & figuris eleganter excultum haberent ſtudioſi, uerum etiam ſumma fide conuerſum, & ſcholijs antiquis, commentarijſq́ue quibuſdam noſtris illuſtratũ. Hoc igitur qualecumq́ue eſt meę induſtriæ teſtimoniũ, nunc tibi magnanime Princeps, cui plurimum debeo, & cupio omnia, dono, dicoq́ue, ut quibus poſſum officijs meam in te fidem, perpetuamque obſeruantiam, non modo noſtrę ætatis hominibus declarem, ſed ipſi etiã poſteritati teſtatam literarum monumentis relinquam. & quod ſemper uehementiſſime conatus ſum, uere perſuadeam, neminem te habere, qui præſtantem animi tui uirtutem, egregiamq́ue doctrinam memoria ſempiterna apud omnes propagare magis ſtuduerit, ac ſemper ſit ueneratus, uale, & nos, liberalesq́ue diſciplinas, quod facis, tuere, & adiuua.

Federicus Commandinus.



QVOD plerique interpretum, atque eorum præsertim, qui maxime laudantur, facere solent, vt antequam reuoluendi clarorum virorum monumenta, ac scripta, quę sibi pro reipublicæ literariæ commodo explicanda, exornandaq; sumpsere, initium faciant, quædam primo loco differant: idem & mihi huius tam præclari operis initio faciendum putaui. neque enim dubium est, quin rudis adhuc lectoris animus de re vniuersa à principio admonitus, minori postea cum labore, ac breuiori tempore conformetur ad vnumquodque intelligendum. Primum igitur non nulla summatim de hac tam nobili mathematicarum artium facultate dicemus, quæ nam subiecta illis materia sit, tum generatim, tum particulatim, quis ordo, ac dignitatis gradus, quae sit earundem diffinitio, quis ortus. Deinde vero mirum ipsarum ad humanos vsus opportunitatem paucis ad modum enarrabimus. Post de Auctore, videlicet de Euclide ipso, de operis inscriptione, de scopo, ac de ipsius demonstrationibus, deq; eorum, quæ in his libris complexus est, dispositione, & methodo quedam minime inutilia attingemus. Denique summam vniuersa συγκεφαλαίωσιν eo consilio adiungemus, vt non solum facilius quicquid de hoc genere præcipit Euclides intelligatur, verum etiam vt fidelius memoriæ mandatum custodiatur. Itaque philosophiam omnem, quæ in contemplatione versatur, ita clarissimi philosophorum in tres partes distributam nobis ea ducti ratione tradiderunt, quòd rerum alia prorsus materiæ quasi labe, ac omni carentes sola per se subsistunt, atque intelliguntur: aliæ vero diuersam penitus materiam ab his sortita, sic materiæ immiscentur, vt nullo pacto absque illa possint consistere: aliæ denique medium inter has naturæ, ac dignitatis locum obtinent; tum quòd omni vacant materia, si accuratiori studio veram illarum conditionem inspexeris, tum quòd materia præditæ quodam modo videantur, quia sine aliqua eius adiunctione ob ingenij nostri imbecillitatem cognosci nequeunt. Hinc triplex illud philosophiæ genus, Diuinum, quod quidem vt nomine, ita & re duo reliqua supra quàm dici potest, antecellit; Naturale, quod tertium est, ac postremas ordine, ac dignitate habet partes; & medium, quod mathematicum appellatur: quoniam solum vere disci, ac sciri potest, ob summam rei subiectæ constantiam, & certam demonstrandi rationem: Hoc quidem vt diuinis substantijs inferius est (quid enim tam eximium, vt cum illis comparetur?) ita naturalibus præstat, atque superius est; quæ materiæ funditus immersa, variam, & mutabilem eius sequuntur naturam. Hoc primum ab ijs inuentum est hominibus, qui ante orbis terrarum eluuiem cum feliciori fruerentur & cælo, & ingenio, sapientiam rerum cælestium, admirabilemq; mundi ornatum animaduerterunt; ac duabus columnis erectis, quarum altera quidem lapidea, altera vero lateritia, quæ inuenerat, diligentissime inscripserunt, ne aut aquarum inundatione, aut incendio, quorum alterum euenturum prædictione veterum nouerant, tantarum rerum notitia dilaberetur. quare nec primis illis temporibus, quæ tam inculta creduntur, nobile matheseos studium incultum iacuit. Hoc post terrarum eluuionem apud chaldæos summo præsertim Abrahami diuini propè hominis studio ornatum, & auctum viguit. Idem Aegyptij homines cum ob perpetuam cæli serenitatem, tum ob magnam locorum planitiem ad hoc genus scientiæ nati à Chaldæis acceptum summopere excoluerunt. Ab Aegyptijs ad græcos, quibus nec ingenij acumine, nec sciendi cupiditate quemque merito antepoueris, translatum est, Thaletis Milesij, Pytagoræ Samij, aliorumq; excellentium hominum industria, quos scientiæ amor & vasta maria trãsire, & longinquas peragrare regiones coegit, & præcipue Aegyptum, vbi, si græcis credimus, natæ & altæ sunt mathematicæ disciplinæ. quas postea & exercitatione, & scriptis illustrarunt Anaxagoras, Oenopides, Zenodotus, Brito, Antipho, Hippocrates, Theodorus, Plato, Theætetus, Architas, Euclides, Aristarcus, Archimedes, aliiq; innumerabiles, qui hac eximia, præstantiq; matheseos disciplina mortales propè cunctos in sui admirationem conuerterunt. Verum de his hactenus, neque enim historiam hic contexere propositum est. sed hac pauca attigimus, vt antiquam huius studij nobilitatem obiter quasi digito ostenderemus. Nunc de materia & præcipuis Mathematicæ facultatis partibus

tibus, illarumq; ordine breuiter dicatur. Mathematicę omnes circa quantitatem versantur, atque illius præsidio quicquid moliuntur efficiunt. hinc facile est cognoscere, quot, & quæ sint huius disciplinę partes. Quis enim ignorat quantitatem aliam esse continuam, aliam vero discretam? & harum vtramque bifariam diuidi, quòd continua sit mutabilis, et immutabilis. discreta vero per se & ad aliquid, ita ut quadruplex quoque sit matheseos genus. scientia igitur, quæ magnitudines, et figuras continuas, non mobiles contemplatur, Geometrię sibi nomen vindicat. & est scientia quantitatis continuæ, atque immobilis positione. quæ vero mobilem, & continuam contemplatur quantitatem Astronomia dicitur. & est cognitio quantitatis continuæ semper mobilis, & eorum, quæ illius motu accidũt. Eodem modo quantitatem discretam Arithmetica obtinet, quæ numerum aut parem, aut imparem non ad alium comparando, sed per se considerat. estq; scientia discretę quantitatis, ac per se cognitæ. Musica circa mutuam sonorum uersatur habitudinem, ex quibus harmonia efficitur, ob discretam quidem, sed tamen alia ratione coniunctam quantitatem: & est discretæ quantitatis inuicem comparatæ atque ad aliquid cognitio. sed antequã ceteras matheseos species enumeremus, explicanda nobis est ratio, & modus aperiendus, quo mathematicis quantitatem & continuam, & discretam pro subiecto, eruditorum auctoritate substerni dicimus: neque enim de quoto, quod in sensilibus ipsis est, nec de quanto, quod circa corpora excogitatur, est absolute intelligendum; physici enim potius, quàm mathematici finibus continetur hęc contemplatio. Eorum igitur quæ naturali corpori insunt, nec ab eo separãtur, alia quidem nec re, nec cogitatione remoueri queunt, ut calor frigus, siccitas, quòd illa qua naturale est corpus, obtineat, alia vero etiam si re ipsa disiungi minime queant, animi tamen cogitatione fingimus abesse, eò quòd per accidens, non aũt per se, nec quatenus natura præditum est corpus, hęc habeat, qualia sunt rectũ, curuũ, inflexũ, ceteraq; id genus. Mathematicus igitur hoc pacto ἐκ τῆς ἀφαιρέσεως circa quantitatem, formasq; à materia separabiles uersatur: & earum diffinitiones tradit, materiam non attingens. Quid est linea? μῆκος ἀπλατὲς, longitudo latitudinis expers. quid est triangulum? figura, quæ tribus rectis lineis continetur. & circulus figura, quæ ab vna comprehenditur linea. nulla hic materiæ mentio est, nullum eius vestigium ob allatam modo rationem. nemo tamen suspicetur mathematicas aliquo errore labi, quòd ita infirmo, ac debilis nitantur subiecto, quòd sola cogitatione conceptum possidetur. nam imaginatione quidem Geometra tamquam abaco vtitur, magnitudines diuidendo, interualla dimetiendo, & lineas describendo. hæc tamen omnia, non vt figmenta quædam, sed vt res quasdam, quę non nullam habent cum natura connexionem, nec mera somnia dici possunt; nec illarum imaginatione aliquo contaminantur mendacio mathematicæ disciplinæ. quæ vt subiectę materiei conditione à Diuinis distant, sic illas constanti, certaq; rationum demonstratione longe antecellunt. Sed recensemus iam reliquas mathematicæ species. Altera igitur facta diuisione. dicimus mathematicam facultatẽ, aut in intellectilibus dũtaxat aut in sensilibus versari; intellectilia vtrique appellantes, quascumque inspectiones anima ipsa per se ipsam excitat, à materialibus, sese vindicans formis. atque huius sanè generis duas principes, longeq; præstantes ponimus species, Arithmeticam & Geometriam. Eius vero generis, quod in sensilibus officium, atque opus, exercet suum, sex fieri solent partes. Mechanica, Astrologia, Optica, Geodesia, Canonica, vel Musica, & supputatrix. Geometria rursus diuiditur in planorum, & solidorum contemplationem, quæ stereometria appellatur. si quidem circa puncta, & lineas peculiaris quædam non est tractatio, quoniam neq; figura in his vlla sine planis, vel solidis fieri posset. Geometria enim nihil aliud vbique agit, nisi vt plana, & solida vel constituat, vel iam constituta inter se comparet, aut diuidat. Arithmetica similiter diuiditur in numerorum linearium, & planorum, & solidorum contemplationem; etenim species numeri per se considerat ab vnitate procedentes, ortusq; planorum numerorum, tum similium, tum dissimilium; & ad tertiam vsque auctionem progressus. Geodesia, & supputatrix congruenter his non de intellectilibus numeris, vel figuris, sed de sensilibus tractant. non enim ad Geodesiam attinet cylindrum, vel conum metiri, sed aceruos, vt conos metitur, & puteos vt cylindros, neque id rectis lineis intellectilibus, sed sensilibus efficit, interdum quidem certoribus quodammodo, vt radijs solaribus, interdum vero crassioribus, vt spartis, & perpendiculo. neque supputator ipsas per se se numerorum passiones considerat, sed vt sunt in sensilibus inuoluti. Rursus Optica, & Canonica à Geometria, & Arithmetica ortum habent. nam Optica quidem radijs visorijs tamquam lineis vtitur & angulis, qui ex his constant. diuiditur autem in tres partes,

im

in Opticam, quę generis nomen obtinuit, catoptricam, & ſcenographicam. Optica reddit cauſas eorum, quæ aliter quàm ſint, ſeſe nobis offerunt, ob alios, atque alios rerum viſarum ſitus, ac diſtantias. Catoptrica circa varias, multipliceſq; verſatur reflexiones, & coniecturali cognitioni implicatur. Scenographrica oſtendit, quo pacto ea, quæ apparent in imaginibus, non inconcinna videantur, vel deformia, iuxta diſtantias, atque altitudines eorum, quæ deſignantur. non igitur veram æqualitatem, & concinnitatem imitandam præcipit, ſed eam, quæ aſpectum noſtrum concinne, & appoſite feriat, ita vt cum circuli repręſentandi ſint, interdum non circuli, ſed ellipſes deſcribantur, & quadrata altera parte longiora fiant. Canonica, vel Muſica apparentes harmoniarum conſiderat proportiones, regularũ ſectiones adinueniẽs, et ſenſus vbique vtens adminiculo. Mechanica circa res ſenſiles, ac materiæ coniũctas verſatur, dum aut bellica parat inſtrumenta, qualia Archimedes excogitauit, cum Marcellus Syracuſas graui premeret obſidione: aut admirabilia quædam ſummo cum artificio conſtruit ſpiritu, ponderibus, & ſpartis, qualia Cteſibius, Hero, & Archimedes non ſine maximo ſtupore ſuorum temporum hominibus ſpectanda propoſuerunt. Quis enim non admiretur, vt alia omittam vitreum illum Archimedis orbem? atque vel hac vna re mathematicas facultates, quæ talia præſtare poſſunt, non ſummopere veneretur? Percurrit propriũ mentitus ſignifer annum, Et ſimulata nouo cynthia menſe redit. ita ut eleganter exclamet Iuppiter apud Claudianum. Huccine mortalis progreſſa potentia curæ. Iam meus in fragili luditur arte labor. Quid quod aiũt Architam hac in re tantum potuiſſe, ut columbam ligneam in aere uolantẽ, quaſi anima præditam, ac ſeſe ſuſtentantẽ fecerit. Aſtrologia de mundanis ediſſerit motibus, de cœleſtium corporum magnitudine figura, atque illuminandi ui, nec non de eorundem à nobis diſtantia. Huius partes ſunt Gnomonica, Meteoroſcopica, Dioptrica. Gnomonica circa horarum dimenſionem per gnomonum poſitiones uerſatur, de quibus Ptolemæus in libro, qui de Analemmate inſcribitur, diffuſe pertractat. Meteoroſcopica eleuationum differentias, & diſtantias ſyderum ex quirit, atque alia multa, & uaria, quę ad Aſtrologiam attinent theoremata docet. Dioptrica diſtantias ſolis, & lunæ, aliorumq; aſtrorum, per eiuſmodi inſtrumenta inueſtigat. Ceterum de his hactenus ſummatim dixiſſe ſatis ſit. Sed quoniam plerique his præſertim temporibus ſola utilitate ad optimarum artium ſtudia excitantur, liberaleſq; colunt diſciplinas, uideamus obſecro, an mathematicæ nullius ſint commodi ad iuuandos humanæ uitę uſus, uti cęca quorundam turpiſſimi lucri cupiditas falſa iam prædicatione diuulgauit, ita ut qui hanc amplectuntur facultatem ab imperitis, uel alio ſtudio occupatis hominibus palàm derideantur, tamquam in re inutili, atque uana oleum, & operem perdant. Agamus igitur pingui, quod aiunt, Minerua, quando nobis negocium eſt cum ijs, qui ſola quæſtus ratione perſuaderi poſſint, & iuramus hanc notam ingenuæ, ac nobili diſciplinæ, ut lucrum, & diuitias pollicendo huiuſmodi hominum ſibi ſtudia, & gratiam comparet. Negent iſti primum, ſi poſſint, mathematicas artes popularem utilitatem nullam habere, ſi mercatura cuius exercitatione tam multi diſtinentur ob magnam quæſtus occaſionem, ſine arithmetica tractari poteſt. Experiantur deinde ſiquid dimetiri queunt abſque Geodeſiæ adiumento. ſulcent maria, & longinquas petant regiones, nouum perquirant orbem nullo aſtrologiæ nauticæ fulti præſidio. Quid medicus? quantum uel unius Hipocratis iudicio debet Aſtronomiæ, cuius ductu ſyderum curſus & lunæ præſertim cognoſcit. Vnde uniuerſa dierum, quos criticos uocant, dependet ratio, quam diligenter cauendum eſt, ne grauiori aliqua curatione uexet ęgrotantem, dum luna, idq; præcipue morbi initio, à combuſtione, ut nunc loquuntur, ad oppoſitionis gradum proficiſcitur? Quantum denique commodi, atque utilitatis affert Geometria, Arithmetica, & reliquę omnes in publicos, & priuatos uſus? cum nulla uel infimarum artium, ut finem conſequatur, matheſeos ope non egeat. quod ſingulas accuratius intuenti facile patet; & à nobis nullo negocio probaretur, niſi longam de re certa uitaremus diſputationem. colore, umbra, ſitu, raritate, ac denſitate mediorum, & refractione, quã uarios ornatus, admirabileſq; rerum figuras quotidie cernimus? & magna cum uoluptate ſpectando decipimur? ſed erramus, ſola enim vtilitate cum illis agendum eſt. quare omiſſis opticis, & pictoribus mera afferantur commoda. Quonam pacto igitur diffiteri poſſunt, quin mathematicæ ad uniuerſam ciuitatum utilitatum mirabiliter ualeant, tum actionum tempora dimetiendo, tum uarias uniuerſi reuolutiones demonſtrãdo? Ars uero militaris, quę politices dextra manus eſt, qua ratione uolens, quæ numeroſa eſt, pauciſſimam oſtendere multitudinem, caſtra, aciesue ad figuram circuli; ubi uero copias oſtentare cupit, ad figuram quadranguli formet, niſi unius Geometriæ auxilio? Quomodo aut hoſtiũ vrbes oppugnat, & capit, aut proprias tuetur, niſi

ipſius

ipſius Mechanices adiumento, quæ admirabiles ad oppugnandum, aut reſiſtendum fabricatur machinas, vti Archimedes aduerſus Marcellum, qui (nam Cteſibios, Architas, Priſcos, Eudoxos, Dionetos miſſos facio) cum hanc adeo miram artem aliquando apud Hieronem prædicaret, Rex Geometram admiratus rogauit, vt tantæ fiduciæ periculum faceret. Quare Archimedes emptam è regijs nauibus vnam, & in ſiccum eductam, grauiusq; oneratam ſolus machinis ſuis ad ſe pertraxit, non ſecus ac ſi in mari remis, ac uelis agitaretur. contra poſtea Alexandriam regis eiuſdem nauem è littore in Mare deduxit, quod omnes ſiciliæ vires non potuerunt. Hac igitur arte qui inſtructi ſunt, vrbis mœnia tueri, & hoſtium oppugnationes eludere queunt. & habuiſſet tanto impetu res cœpta fortunam (ait Liuius, cum de Marcello Syracuſas oppugnante loquitur) niſi vnus homo Syracuſis ea tempeſtate fuiſſet. Archimedes is erat, vnicus ſpectator cœli, Syderumq;, mirabilior tamen inuentor, ac machinator bellicorum tormentorum, operumq;, è quibus ea quae hoſtes ingenti mole agerent, ipſe perleui momento ludificaret. libuit tam inſigne illuſtris hiſtorici de Archimede teſtimonium afferre, vt huius exemplo, quantum vtilitatis, ac commodi ſibi ac patriæ homines comparare poſſunt, intelligant, ſi nobilem Matheſeos facultatem diligenti cura, ſtudioq; exco luerint. ceterum diſſimulare nequeo, me multo grauius perturbari quorundam philoſophorũ, (vt ſibi videntur) impudenti audacia (Cur enim grauius non ferã mathematicas ab ijs calumniari, quorũ eſset munus eas colere, ac tueri, quàm ab hominibus, quos mala diuitiarũ cupiditas arctiſſimis deuinctos laqueis tenet) Sed aduerſus hoc philoſophorum genus nihil aliud dicã nũc, quòd ſciã Ariſtippos iſtos, & Epicureos, vt vere, & eleganter eos nominat Petrus Ramus vir multæ eruditionis, potius dolore quodã, ſtudioq; ſuam tegendi ignorantiam talia dicere, quàm quòd reuera putẽt matheſeos cognitionem nihil vtilitatis, nihil adiumenti afferre ad omnes liberalium artium diſcinas, præſertimq; ad Platonis Ariſtoteliſq; monumenta, quos hoc doctrinæ genere plurimũ delectatos fuiſſe planè conſtat. Qui enim hoc putent, cum multa quotidie neceſſaria imprimis, ſcituq; pulcherrima apud hos inueniant, quę quoniam mathematico more tradita ſunt, quaſi ſcopulos quoſdam eũitare coguntur. Hinc Timæum non attingunt tãquã fabuloſum, & nullius pretij librũ. Hinc ſeptimum phyſicæ auſcultationis librum, multaq; alia Ariſtotelea ſuis diſcipulis, quòd, vt aiũt, inutilia ſint, explanare grauantur. ſed plura fortaſſe dicta ſunt de hac re, quàm oportuit. nam vera matheſeos vtilitas, eximij fructus, incredibileſq; voluptates in ſola veritatis cognitione, ad quam nati ſumus, poſitæ ſunt. hac via nos vere homines, uereq; diuini luminis participes oſtendimus. cetera terrenam & fragilem præſeferunt conditionem. Age vero accedamus ad ea, quæ ad Geometram noſtrum ſpectant. Et primum de ipſo Euclide; deinde de inſcriptione, et ſcopo dicamus. poſtremo de illius demonſtrationibus, quemadmodum à principio promiſeramus. Liberemus igitur, multos ab eo errore, quo perſuaſi credunt Euclidem noſtrum eundem eſſe & philoſophum megarenſem, & geometram, totamq; hanc rem breuiter explanemus. Fuit ſenior Euclides ex Megaris oppido, quod iſthmo adiacet, Parmenidis librorum in primis ſtudioſus, ac megaricæ ſectæ princeps, ad quem mortuo Socrate Plato ac plerique omnes ſocratici, triginta tyrannorum metu cõfugerũt. Hic dialogos ſex conſcripſit, quos enumerat Laertius. vſus eſt probationibus non ijs, quę per aſſumptiones, ſed quę per concluſiones fiunt, ac magis dialecticę ſunt. ſucceſſorem habuit Eubulidem. Iunior autem Euclides qui στοιχειώτης ac geometra, dictus eſt, tempore Primi Ptolemæi floruit, academiam diligenter coluit, & quotidiana ferè Platonis diſcipulorum conſuetudine egregie eruditus, Matheſim, quæ in Academia præceptoris inſtituto tunc maxime vigebat, ita præclaro animi impetu eſt aggreſſus, vt progreſſus admirabiles, ac ſempiterna cui memoria dignißimos in ea fecerit; conſtantiq; omnium doctorum teſtimonio principem locum ſibi vendicarit. nemo autem mihi ignotum eſſe arbitretur, Valerium Maximum ſcribere Platonem ſacrę aræ conductores ad Euclidem, tamquam ad primarium mathematicum reiecißſe. ſed nos Heronem, & Proclum matheſeos ſtudio inſignes ſequimur, vel potius Eudemum ac Theophraſtum ex peripateticis poſt præceptorem nobiliſſimos. hi namque hoc tradiderunt memoriæ in ijs libris, quos de hiſtoria geometrica conſcriptos magno cum dolore, ac literatorum incommodo periiſſe non ignoramus. Euclides igitur noſter poſt Hippocratem, Leontem, Teudium, & Hermotimum, qui geometrica elementa, alius poſt aliũ conſcripſerant, opus hoc vere aureũ, ſummo cum labore, præſtantiq; mentis iudicio contexuit. Multa quidẽ inuenerant ſuperiores illi hominẽs excellenti quodã, ac propè diuino ingenij acumine. non pauca addiderant Theætetus atque Eudoxus, qui cum Platone verſati ſunt. Itaque Euclides

diſperſa

diſperſa collegit, collecta diſpoſuit, & quæ pinguius, negligentiuſq; demonſtrata fuerant, ipſe ad ab ſolutas, ἀνελέκτους ἀποδείξεις demonſtrationes redegit. magna profecto laus ſuperiorũ, multo tamen maior Euclidis, qui indigeſta eo compoſuit ordine, vt vel hac vna re perpetuam ſibi apud ſanę mentis homines laudem compararit. inchoata ita abſoluit, incerta ita firmiſſimis rationibus certiſſima effecit, vt nihil amplius propè in eo deſideretur. Iam duo ferè annorum millia abierunt, ex quo Euclides inter viuos cõnumeratus eſt. multos habuit aduerſarios, qui inuidiæ potius morbo, quàm veritatis amore illius ſcripta omni ſtudio labefactare ſunt conati; nullam tamẽ adhuc in illis ψευδολογίαν, nullum errorem, nullum paralogiſmum ſeueri inquiſitores deprehendere potuerunt. Cetera vero præſtantiſſimi huius viri monumenta hęc habentur. Optica, Catoptrica, Muſica, Data, phænomena, ſcripſit etiam librum de diuiſionibus, conicorum libros quattuor, poriſmatum tres, vt ex Proclo, Pappoq; conſtat, qui quidem ad manus noſtras non peruenerunt. Atque hæc ſunt, quæ inuenire potuimus de Euclide noſtro, cuius immortali beneficio Matheſis, quæ græcũ mare ex Aegypto tranſgreſſa iam ducentos annos, ac paulo plures Græciam incoluerat, ſuam dignitatem, ſuoſq; honores non ſine deorum voluntate eſt conſecuta. Nunc quæ ſtudioſorum mentes haud leuiter perturbat opinio de elementorum demonſtrationibus, paucis referatur. quamuis enim hæc diſceptatio nullam futuro geometræ afferat vtilitatem, maxime tamen ſolicitos habet, neſcio quo pacto huius diſciplinæ amatores; quippe quòd ſcire percupiant, cui nam tantum beneficij, atque adeo ſingulare munus acceptum referant. Inter ceteros igitur, qui hac de re diſputarunt, Ioannes Buteo, & Petrus Ramus acerrimi iudicij homines in contrarias prorſus abiere ſententias. hic enim in ſuo Matheſeos proœmio non ſolum demonſtrationes Theoni (quod etiam alij dixerunt) aſcribendas putat, verum etiã ipſa elementa, tum quia στοιχειώτης vltimus fuerit, nullius q; propoſitionis inuentio inter Euclidis laudes à Proclo referatur, tum etiam quia Theon ipſe ſuas editiones in elementa nominatim laudarit in primo commentario ſuper Ptolemæi magnam conſtructionem, ita vt elementa ſibi eo iure vindicare poſſit Theon, quo antea Euclides. Idipſum ea quoq; probat ratione, quòd Euclidis demonſtrationes, quæ in Procli commentarijs leguntur, minime cum ijs conueniant, quas in elementis habemus. Ille autem (de Buteone loquor) in ſuis annotationibus in Euclidem hoc diſerte negat; veteremq; præclariſſimi hominis laudem tuetur; quoniam apud antiquos numquam ſine demonſtratione theoremata proferãtur; vt qua nullã, ſi nuda fuerint, habeant vtilitatẽ, ac dignitatẽ; quodq; vero ſimile ſit, verba illa ἐκ τῶν θεωνος συνουσιῶν, ex quibus omnis effluxit diſputãdi occaſio, ita poſſint intelligi, vt dicamus, Theonem conſcripſiſſe quidem commentarios in elementa, ſed illos temporum calamitate periiſſe, quemadmodum & quæ in eundem Pappus Alexandrinus ſcripſerat, conſeruato tamen titulo, qui poſtea Euclidi ipſi negligentur adiectus eſt. Nos autem medium ſecuti credimus libros de elementis ſuis ornatos demonſtrationibus ab Euclide nobis fuiſſe relictos. qui enim de hoc dubitare poſſumus, cum Proclus in commentarijs in X. propoſitionem, poſt recitatam Apollonij pergæi demonſtrationem hęc verba ſubiungat? πολλὰ δὲ καὶ οὐν κρεῖττον ἢ τοῦ στοιχειωτοῦ ἀποδείξις hoc eſt lõge igitur melior eſt ſtichiotę (ita enim Euclidem appellat) demonſtratio, & ſimplicior, magiſq; ex principijs. vt autem hoc vere aſſerimus, ita illud merito concedemus, Theonem excellentis ingenij virum Euclidis demonſtrationes fuſius, planiuſq; explicatas in lucẽ protuliſſe: quod apud Proclum obſeruari poteſt. Sic data nõ eo prorſus habentur modo, quo apud Pappum in ſeptimo mathematicarum collectionum libro. nec optica, catoprica, quæ nos vidimus Romę in vaticana bibliotheca. Quamobrem ſi hæc omnium conſenſu Euclidi concedimus, etiam elementa concedenda ſunt, præſertim cum verbis potius, quàm re ipſa Theon ab eo diſcrepet in demonſtrandi ratione. ſunt igitur illę quidem demonſtrationes Euclidis, ſed eo modo conſcriptæ, quo olim Theon Euclidem ſecutus ſuis diſcipulis explicauit. Non inutile autem, nec iniucundum illud legentibus fore crediderim, ſi Platonis, Xenocratis, nec non Euclidis noſtri inſignes huic diſputationi ſententias, tamquam coronidem addidero. poterunt enim Geometriæ candidatis eſſe loco orationis copioſæ, atque elegantis. Plato igitur vt neceſſariam prorſus facultatis huius cognitionem futuro philoſopho palam oſtenderet, verba hęc pro foribus gymnaſij poſuit. ὀυδεὶς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω. nemo rudis Geometrię huc pedem inferat. Xenocrates vero, qui poſt præceptorem tertius in academia docuit, cuidam Mathematum, ac Geometrię ignaro gymnaſium ingredienti, Abi, inquit, λαβὰς γὰρ οὐκ ἔχεις φιλοσοφίας. anſas enim philoſophia non habes. Quid vero de noſtro Geometra habemus dicere? Hic Ptolomeo Regi primo interroganti,

an alia

an alia facilior, atque commodior esset, discenda Geometriæ methodus, ac ratio. Nulla, inquit, ô Rex est via regia, quæ ducat ad Geometriam. Quàm constantem igitur animi diligentiam, alacremq; discendi voluntatem innenes ad hæc studia afferre oporteat, non solum Geometriæ, quæ per se nobilissima est, sed & totius philosophiæ caussa, nos tantorum virorum testimonijs declarasse sit satis. Dicamus iã de operis inscriptione, simulq; de Auctoris proposito. Nã quoties illa ab operis argumento desumpta est, explicatione vnius, & alterum fermè cognoscitur. Proclus meo quidem iudicio, videtur legisse Εὐκλείδου στοιχείωσις. qui vero ex Theonis sententia hoc opus nobis exortum reliquit Εὐκλείδου στοιχείων βιβ. ιε. Idem tamen vtraque significat, sive illa sit Elementaris institutio, sive elementorum libri XV. Dixi autem non Theonem, quod multi credunt, sed illius familiarem quendam, virum planè eruditum, quicunque ille fuerit, Euclidem nobis, eo, quo nunc habetur, modo legendum cõcessisse, verborum illorum ἐκ τῶν θέωνος συνουσιῶν permotus testimonio. nam & Ioannes cognomento Philoponus, quos in Aristotelem commentarios ipse composuit, se ex Hamonij Hermiæ colloquijs, ac disputationibus collegisse, ingenue prorsus grati animi exemplo professus est. Haud tamen negaverim Theonis auditorẽ, cum nomẽ suum suppresserit, voluisse non totum hunc laboris, ac industriæ fructum Theoni diutaxat acceptum referre. At enim quæret fortasse aliquis, nec iniuria profecto, cur Auctor hoc nomen elementum, an elementare, quod de multis dicitur, solum protulerit. cum enim & de literarum principijs, & de rebus naturalibus, aliisq; dici soleat, adiungendum erat omnino, cuiusnam rei illa essent elementa, elementorum ne institutio, vt à latinis postea factum est, qui Geometricorum addiderunt. Nos ita dubitanti, hoc eã omissum dicerenus ratione, quia statim idipsum ex primis verbis de puncti notione cognoscitur; aut Hamonium secuti, qui Porphyrianam inscriptionem ab eadem culpa defendit, affirmaverimus hanc inscriptionem κατ' ἐξοχήν, ac quandam Geometriæ excellentiam; & si ex nomine, quod multis commune est, factum sit, de Geometricis tantum elementis intelligi posse, sit Poetam dicentes de Homero, aut Virgilio intelligimus; frequens enim ac percelebre erat tunc Geometriæ studium. Elementa vero hic dicuntur de Theorematibus, quæ principij rationem habent. Theorematum enim (vt Proclus scribit) alia quidem elementa appellare consueuerunt, alia elementaria, alia vero extra horum vim determinantur. Elementa igitur dicuntur, quorum contemplatio ad eliorum pertinet scientiam, & ex quibus apparet solutio eorum, quæ in ipsis dubitare contingit. Vt enim vocis literata sunt principia prima, & simplicia, & indivisibilia, quibus elementorum nomen imponimus: & omnis dictio, oratioq; ex his constat, sic & totius Geometriæ sunt quædam Theoremata principalia, & rationem habentia principij ad ea, quæ sequuntur, perq; omnia peruadentia, & multorum accidentium præbentia demonstrationes, quæ elementa appellant. Elementaria vero dicuntur, quæcumque ad plura pertinent & simplicē quandam suauitatem habent, non tamen eam, quæ est elementorum; propterea quòd eorum contemplatio non sit communis omni scientiæ. Quæcumque demum cognitionem non habent ad plura pertinentem, neque scitum aliquod, aut elegans demonstrant, hæc extra elementarium vim eadunt. Rursus elementum dupliciter dicitur, vt ait Menæchmus. illud enim, quod cõfirmat, eius quod confirmatur elementum est, vt primum secundi apud Euclidem, & quartũ quinti; sic & alia multa inter sese elementa esse dicentur, quippe cum alterum ex altero confirmetur. nam ex eo, quòd extrinseci rectilineorum anguli quattuor rectis sint æquales, intrinsecorum recto æqualium multitudo, & contra ex hoc illud ostenditur. est q, huiusmodi elementum lemmati assimile. Aliter præterea dicitur elementum, in quod, cum sit magis simplex, compositum resoluitur. Ita vero non omne rursus elementum dicetur, sed quę principalissima sunt eorum, quæ in rei effectæ ratione sunt cõstituta, quemadmodum Petitiones, & Dignitates Theorematum sunt elementa. iuxta hoc elementi significatum & ab Euclide elementa constructa sunt, alia quidem illius Geometriæ, quę circa plana versatur; alia vero eius, quæ circa solida. sic & in Arithmeticis, & in Astronomicis elementa res institutiones multi conscripserũt. Propositũ igitur fuit Euclidi in his libris tradere elemẽta ad vniuersã Geometriã necessaria, hoc est principalissima, simplicissimaq;, at primis principijs maxime affinia theoremata, sine quibus reliquæ huius scientiæ partes cõprehẽdi nõ pũt. Euclides. n. ipse in aliis libris Aristæus, Archimedes, Apollonius, Theodosius, Autolycus, Menelaus, Ptolemæus, Pappus, Serenus, et reliqui ad eorum demonstrationes his tamquam notissimis vbique vtuntur. Quod vero ad dispositionẽ, ac methodum Geometricorũ sermonũ attinet, sciendum est (vt inquit

Proclus) Geometriam, quemadmodum, & alias ſcientias certa quædam, & definita principia habere, ex quibus ea, quę ſequuntur, demonſtrat. quare neceſſe eſt ſeorſum quidem de principijs, ſeorſum vero de ijs, quæ à principijs fluunt pertractare. & principiorum nullam reddere rationem, quæ autem principia conſequuntur, rationibus confirmare. nulla enim ſcientia ſua demonſtrat principia, verum circa ea per ſeſe ſibi fidem facit, cum magis euidentia ſint, quàm quæ ex ipſis deriuãtur: & illa quidem per ſeſe, hæc vero deinceps per illa cognoſcit. Ita & naturalis philoſophus à determinato principio rationes producit, matum eſſe ponens; ita & medicus, & aliarum ſcientiarum, atq; artium peritus. Quòd ſi quis principia cum ijs, quæ à principijs fluunt, in idem commiſceat, is totam perturbat cognitionem: eaq; conglutinat, quæ nullo pacto inter ſe conueniunt. Primum igitur principia, deinde ea, quę conſequuntur, ſunt diſtinguenda. quod ſanè Euclides in vnoquoque ſuorum librorum obſeruauit; quippe qui ante omnem tractationem communia huius ſcientię principia exponit: et ipſa in ſuppoſitiones, ſeu diffinitiones, poſtulata, et axiomata diuidit. differunt autẽ hæc omnia inter ſe, nec idem eſt axioma, & poſtulatum, & ſuppoſitio, vt Ariſtoteles aſſerit. Cum enim is, qui audit propoſitionem aliquam, ſtatim ſine doctore vt veram admittit, eiue certeſſimam fidem adhibet, hoc Axioma appellatur, vt quæ eidem æqualia, & inter ſe æqualia ſunt. Cum vero audiens dicente aliquo, eius, quod dicitur, notionem non habuerit, quæ per ſe ſe fidem faciat; verum tamen ſupponit, & eo vtenti aſſentitur, ea ſuppoſitio eſt, verbi gratia, circulum eiuſmodi eſſe figuram, communi quadam notione non percepimus, ſed audientes abſque vlla demonſtratione approbamus. Cum autem rurſus & ignotum ſit addiſcenti, quod dicitur, & tamen eo aſſentiente aſſumatur, tunc id poſtulatum appellamus, vt omnes rectos angulos æquales eſſe. Quæ autẽ à principijs enaſcũtur, ea ſunt vel Problemata, vel Theoremata. Problema illud eſt, in quo quippiam, cum primum non ſit proponitur inueniendum, ac conſtruendum. Theorema autẽ in quo quippiam in conſtituta iam figura ita eſſe uel non eſſe demonſtratur. In hac igitur elementa vi inſtitutione Euclidem quis non ſummopere admiretur propter ordinem, & electionem eorum, quæ per elementa diſtribuit, theorematũ, atque problematũ? non enim oĩa aſſumpſit, quæ poterat dicere, ſed ea duntaxat, quæ elementari tradere potuit ordine. adhuc autem varios ſyllogiſmorũ modos vſurpauit, alios quidem à cauſis fidem accipientes, alios vero à ſignis profectos, omnes neceſſarios & certos, atque ad ſcientiam accõmodatos. omnes præterea dialecticas vias, ac rationes; diuidentem in formarum inuentionibus; diffinientem in eſſentialibus rationibus; demonſtrãtem vero in progreſſibus, qui à principijs ad quæſita fiunt. denique reſoluentem in ijs, qui à quæſitis ad principia fiunt regreſſibus. Quin etiam varias conuerſionum ſpecies tum ſimplicium, tum compoſitarum in hac tractatione intueri licet. & quę tota totis conuerti poſſint, quæ vero tota partibus, & contra, & quæ vt partes partibus. Poſtremo admirabilem omnium diſpoſitionem, antecedentiũq; & conſequentiũ ordinẽ, ac coherentiã, vt nihil prorſus addi, aut detrahi poſſe videatur.

In primo igitur libro tractat de rectilineis figuris, videlicet de triangulis, ac parallelogrammis. Et primum triangulorum ortus, proprietateſq; tradit, tum iuxta angulos, tum iuxta latera; ipſa inter ſe ſe comparans. Deinde parallelarum proprietates interijciens ad parallelogramma tranſit, eorumq; ortum declarat, & ſymptomata, quę in ipſis ſunt, demonſtrat. poſtea triangulorum, parallelogrammorumq; communicationem oſtendit, & quo nam pacto parallelogrammum fiat æquale triangulo. Denique de ijs, quę in triãgulis rectangulis à lateribus deſcribuntur, quadratis, quam habeat proportionem quòd à ſubtendente rectum angulum deſcribitur ad ea, quæ comprehendentibus ipſum fiunt.

In ſecundo libro parallelogrammum rectangulum, & gnomon definitur. deinde parallelogrammorum rectangulorum, & quadratorum, quę ex rectarum linearum ſectionibus fiunt, proport. ones declarantur. poſtea de quadratis, quæ à lateribus obtuſiangulorum, & acutiangulorum triangulorum deſcribuntur, quam habeant proportionem, quæ à ſubtendentibus obtuſum & acutum angulum fiunt ad ea, quę à comprehendentibus deſcribuntur. Denique qua ratione dato rectilineo æquale quadratum conſtituatur.

In tertio libro agitur de ijs, quæ circulis accidunt, & de rectis lineis in circulo, vel ad circulum ductis, itemq; de angulis, qui ad circulorum centra, vel ad circumferentias conſiſtunt.

In quarto libro de figurarum planarum inſcriptionibus & circumſcriptionibus.

In quinto de Analogijs.

In ſexto de proportionibus figurarum inter ſeſe, de figuris ſimilibus, & reciprocis. de rectis lineis proportionalibus, de parallelorum applicationibus ad rectas lineas, quę vel deficiant parallelogrammis ſimilibus, vel excedant. quomodo recta linea terminata extremo, ac media ratione ſecetur, de proportionibus circumferentiarum & angulorum, itemq; ſectorũ in circulis æqualibus.

Septimus, Octauus, & Nonus ad Arithmeticam pertinent.

In ſeptimo agitur de numeris primis, & compoſitis; & quo pacto numerorum non primorum maxima communis menſura inueniatur. de numerorum parte, et partibus. de numeris multiplicibus, de proportionalibus, & quæcunque in quinto libro de magnitudinibus generatim, eadem ferè & de numeris particulatim hic demonſtrantur.

In octauo de numeris deinceps proportionalibus, de numeris planis, de quadratis, de cubis, & ſolidis. de ſimilibus planis, & ſimilibus ſolidis.

In nono item de ſimilibus planis, de cubis, & ſolidis, & de numeris deinceps proportionalibus ſiue ab vnitate, ſiue ſimpliciter, de numeris primis, de numeris paribus, de imparibus, de pariter paribus, de pariter imparibus, de pariter paribus & pariter imparibus. de numeris perfectis.

In decimo de commenſurabilibus, & incommenſurabilibus magnitudinibus, itẽq; de rationalibus & irrationalibus.

Vndecimus, duodecimus, & reliqui ad ſtereometriam ſpectant, hoc eſt ad ſolidorum corporum contemplationem.

Et in vndecimo quidem primum agitur de rectis lineis quatenus ad ſolida corpora referũtur, videlicet quando ſint in vno plano, quando rectæ, ſeu perpendiculares ad planum, quando parallelę, quomodo à puncto in ſublimi dato ad planum perpendiculares ducantur. Deinde vero de planis ſimul deſſerit, tũ de ſolidis angulis, poſtremo de ſolidis parallelepipedis, & nõnulla de priſmatibus.

In duodecimo de pyramidibus, et priſmatibus; poſtea de conis et cylindris, demum de ſphęris.

In tertiodecimo de conſtitutione quinque figurarum mundanarum, quas corpora regularia appellãt; videlicet tetraedri vel pyramidis; hexaedri vel cubi; octaedri, dodecaedri, et icoſaedri, ad quorum euidentiam præmittit nonnulla de ijs, quæ accidunt rectæ lineæ extremæ, ac mediæ rationis ſectæ, de pentagono æquilatero, de hexagoni, & decagoni lateribus, & de triangulo æquilatero.

In quartodecimo de dodecaedri, & icoſaedri in eadem ſphęra deſcriptorum comparatione.

In quintodecimo & vltimo de inſcriptione quinque figurarum iam dictarum, & de earundẽ lateribus, & angulis.

FINIS.

INDEX EORVM, QVAE IN HIS LIBRIS demonstrantur præter ea, quę Euclidis sunt.

IN PRIMO LIBRO.



CIRCVLI diameter bifariam circulum secat. 3.b

In data recta linea triangulum æquicrure, & scalenum constituere. 8

Si ad aliquam rectam lineam duæ rectæ lineę non ad easdem partes sumptæ angulos ad verticem æquales fecerint, ipsæ rectæ lineæ in directum sibi inuicem erunt. 14.b

Si alteram parallelarum secuerit recta quędam linea, reliquam quoque secabit. 19.b

Rectæ lineæ, quę à minoribus, quàm sint duo recti, in infinitum producuntur, inter se conuenient. 20

Omnis rectilinea figura, angulos, qui extra cõstituuntur, quatuor rectis æquales habet. 21

Omne quadrilaterum, quod latera ex opposito, & angulos æqualia habet, parallelogrãmũ est. 22

Omne quadrilaterum, quod ab vtrisque diametris bifariam secatur, parallelogrammum est. 24

Si trianguli parallelogrammum duplum fuerit, eandemq; basim, aut æquales habuerint, & fuerint ad easdem partes: in eisdem etiam parallelis erunt. 25

Si trianguli parallelogrammum duplum fuerit, in eisdemq; ambo fuerint parallelis; aut in vna eademq; basi, aut in æqualibus erunt. 25

Quomodo ad datam rectam lineam, dato rectilineo æquale parallelogrammum applicari possit in dato angulo rectilineo. 26.b

Quadrata ab æqualibus rectis lineis descripta, etiam inter se æqualia sunt. 27

Quadrata æqualia ab æqualibus rectis lineis descripta sunt.

Ex duabus rectis lineis, quæ duabus datis æquales sint, & in dato angulo rectilineo parallelogrãmum constituere. 27.b

IN SECVNDO LIBRO.

SI fuerint duæ rectæ lineæ, quæ secentur in quotcunque partes, rectangulum duabus rectis lineis contentum est æquale rectangulis, quæ vnaquæque pàrte vnius ad vnamquamque partem alterius applicata continentur. 29.b

Si fuerint duæ rectæ lineæ, quæ vtcunque secentur, rectangulum totis contẽtum vnà cum eo, quod continetur duabus partibus ipsarum est æquale rectangulis, quæ continentur totis, & dictis partibus vnà cum eo, quod reliquis partibus continetur.

Arithmeticę analogę demonstratio. Theorema autem est.

Quadratũ, qđ fit ab excessu vnà cũ eo, quod extremis cõtinetur, quadrato medij æquale esse. 31.b

Si recta linea in partes inæquales secetur, earũ partiũ quadrata æqualia sunt rectãgulo, quod bis dictis partibus continetur, vnà cum quadrato eius lineę, qua maior pars superat minorem. 32

Propositio IX aliter demonstratur. 33

Propositio X aliter demonstratur. 33.b

Cuiuslibet trianguli obtusum angulum habentis, aream dimetiri. 34

Propositionis XIII conuersa. 35

Cuiuslibet trianguli, siue acutianguli, siue rectanguli, siue obtusianguli, quod nota latera habeat, aream inuenire. 35.b

IN TERTIO LIBRO.

CONuersum diffinitionis circuli. si in ambitũ figuræ ab aliquo puncto eorum, quę sunt intra, incidant æquales rectę lineę, ea circulus est. 37.b.38

Propositionis VII conuersa. 39.b

Si in circumferentia circuli aliquod punctum sumatur, ab eoq; in circulũ ducãtur rectę lineę; quæ per centrum transit, omnium erit maxima, aliarum verò quæ trãseũti per cẽtrũ propinquiores sunt, remotioribus erunt maiores, duæ aũt tantum æquales sunt ad vtrasque partes maximæ. 40

Propositionis XIX. conuersa 43.b

Spacium

Spacium quod eſt ad centrum duplum eſt anguli, qui ad circumferẽtiã, quando circumferentiã eãdem pro baſi habuerint. 44

Propoſitio XXI aliter demonſtratur

In eadem recta linea neutra ex parte ſimiles & in æquales circulorum portiones conſtitui poſſunt. 44.b

In eadem recta linea, vel in æqualibus rectis lineis æquales circulorum portiones ſimiles ſunt. 45

Si æquales rectæ lineæ æquales, & ſimiles circumferentias auferant, circuli æquales erunt, quorum illæ ſunt circumferentiæ. 46.b.47.

In circulis inæqualibus æquales rectæ lineæ diſſimiles circumferentias auferunt. 47

In circulis inæqualibus ſimiles circumferentias inæquales rectæ lineæ ſubtendunt.

Similes & inæquales circumferentias inæquales rectæ lineæ ſubtendunt.

Si à puncto extra circulum ſumpto ducantur in circulum quotcunque rectæ lineæ ipſum ſecantes, rectangula, quæ totis, & earum portionibus extrinſecis continentur, inter ſe æqualia ſunt. 50.

A puncto extra circulum ſumpto ductæ duæ rectæ lineæ circulum contingentes, inter ſe æquales ſunt.

IN QVARTO LIBRO.

IN dato circulo rectam lineam rectæ lineæ datæ, quæ diametro maior non ſit, æqualem, & alteri datæ parallelam aptare.

IN QVINTO LIBRO.

SI prima ad ſecundam eandem habeat proportionem, quam tertia ad quartam, tertia autem, ad quartam minorem proportionem habeat quàm quinta ad ſextam, & prima ad ſecundam minorem proportionem habebit, quàm quinta ad ſextam. 64.b

Si prima ad ſecundam maiorem habeat proportionem, quàm tertia ad quartã, tertia autẽ ad quartam maiorem habeat, quàm quinta ad ſextam, & prima ad ſecundam maiorem proportionem habebit, quàm quinta ad ſextam. 64.b

Si prima ad ſecundam eandem proportionem habeat, quam tertia ad quartam ſitq; prima maior quàm ſecunda: & tertia quàm quarta maior erit, et ſi æqualis, æqualis, & ſi minor, minor. 65.b

Si tres magnitudines fuerint proportionales, maxima ipſarum & minima quam dupla reliquæ maiores erunt. 68.b

Si prima ad ſecundam maiorem habeat proportionem, quàm tertia ad quartam, & conuertendo ſecunda ad primam minorem proportionem habebit, quàm quarta ad tertiam. 69

Si prima ad ſecundam maiorem proportionem habeat, quàm tertia ad quartam, & permutando prima ad tertiam maiorem habebit proportionem, quàm ſecunda ad quartam. 69

Si prima ad ſecundam maiorem proportionem habeat, quàm tertia ad quartam, etiam componendo prima, & ſecunda ad ſecundam maiorem proportionem habebit, quàm tertia, & quarta ad quartam. 69.b

Si prima, & ſecunda ad ſecundam maiorem habeat proportionẽ, quàm tertia, & quarta ad quartam, & diuidendo prima ad ſecundam maiorem proportionem habebit, quàm tertia ad quartã.

Si prima, & ſecunda ad ſecundam maiorem proportionem habeat, quam tertia & quarta ad quartam, per conuerſionem rationis prima & ſecunda ad primam minorem habebit proportionem, quàm tertia, & quarta ad tertiam. 70

Si prima ad tertiam maiorem proportionem habeat, quàm ſecunda ad quartam, etiã prima ad tertiam habebit maiorem proportionem, quàm prima & ſecunda ad tertiam & quartam.

Si tota ad totam maiorem habeat proportionem, quàm ablata ad ablatam, & reliqua ad reliquã maiorem proportionem habebit, quàm tota ad totam

Si ſint tres magnitudines, & aliæ ipſis numero æquales, habeatq; prima priorum ad ſecundam maiorem proportionem, quàm prima poſteriorum ad ſecundã, ſecunda vero priorũ ad tertiã maiorem proportionẽ habeat, quã ſecunda poſteriorum ad tertiam; etiam ex æquali prima priorum ad tertiam maiorem habebit proportionem, quam prima poſteriorum ad tertiam. 70.b

IN SEXTO LIBRO.

TRiangula & parallelogramma in æqualibus baſibus conſtituta, eãdem inter ſe proportionem habent, quam eorum altitudines. 72. b
Propoſitio VI. aliter demonſtratur. 74. b
Datam rectam lineam in datam proportionem ſecare. 75. b
In dato triangulo quadratum deſcribere. 76
Tribus datis rectis lineis AB. BC. & D. Inuenire vt AB ad BC, ita aliam quandam ad ipſam D. 76. b
Si rectilinea æqualia, & ſimilia ſint, homologa ipſorum latera inter ſe æqualia erunt. 81
Triangula, quę vnum angulum vni angulo æqualem habent, proportionem habere ex lateribus compoſitam. 81. b
Quomodo ex duabus datis proportionibus, vel etiam pluribus proportio componatur.
Proportio data ex data proportione maiori quo pacto auferatur.
Quomodo in numeris proportiones & componantur, & auferantur.
Triangula, quorum vnus angulus vni angulo æſt æqualis inter ſe proportionem habent eandem, quam rectangula, quæ lateribus æqualem angulum comprehendentibus continentur.
Parallelogramma æquiangula inter ſe proportionem habere eandem, quam rectangula, quę ipſorum lateribus continentur. 82
Triangula, & parallelogramma inter ſe proportionem habent compoſitam ex proportione baſiũ, & proportione altitudinum.
Propoſitio XXVII aliter explicatur. 84
Duorum rectilineorum inæqualium exceſſum, quo maius ſuperat minus inuenire. 84. b
Theorema Pappi, quod multo vniuerſalius eſt, quàm XXXI Euclidis.

IN SEPTIMO LIBRO.

EXpoſitis duobus numeris inter ſe primis, ſi de maiori ſemper minor detrahatur, non ceſſabit huiuſmodi detractio antequam ad vnitatem deuentum fuerit. 90
Expoſitis duobus numeris inter ſe compoſitis, ſi de maiori ſemper detrahatur minor, detractio ad vnitatem vſque non perueniet.
Duobus numeris expoſitis, comperire an inter ſe primi ſint, an compoſiti.
Si numerus plures numeros metiatur, & communem eorum menſuram metiri. 91
Si numerus numeri multiplex fuerit, et alter alterius æque multiplex; & vterque vtriuſque æque multiplex erit, atque vnus vnius. 91. b
Si fuerint quotcunque numeri quotcunque numerorum æqualium multitudine ſinguli ſingulorum æque multiplices; quotuplex eſt vnus vnius, totuplices erunt & omnes omnium.
Si quotcunque numeri minores ad totidem alios maiores referãtur, ſintq́, ſinguli ſingulorum, vel eadem pars, vel eædem partes; quæ pars, vel partes eſt vnus vnius, eadem pars, vel eędem partes erunt & omnes omnium. 92
Si numerus numeri æque multiplex fuerit, atque ablatus ablati; & reliquus reliqui æque multiplex erit, atque totus totius.
Quę eidem eædem ſunt numerorum proportiones, & inter ſe eędem erunt. 93. b
Si quattuor numeri proportionales ſint, & conuertendo proportionales erunt. 94. b
Si quattuor numeri proportionales ſint, & componendo proportionales erunt.
Si quattuor numeri proportionales ſint, & diuidendo proportionales erunt.
Si quattuor numeri proportionales ſint, & per conuerſionem rationis proportionales erunt.
Si primus ad ſecundum eandem habeat proportionem, quam tertius ad quartum; habeat autem & quintus ad ſecundum proportionem eandem, quam ſextus ad quartum: & compoſitus primus, & quintus ad ſecundum eandem proportionem habebit, quã tertius & ſextus ad quartũ.
Si numerus aliquis plures numeros multiplicans fecerit totidem alios, facti eandem, quam multiplicati proportionem habebunt. 95. b

Si plures numeri numerum aliquem multiplicantes fecerint totidem alios, facti eandem, quam multiplicantes proportionem habebunt. 95.b

Numeris quotcunque datis deinceps proportionalibus, inuenire duos minimos, qui eandem, quam ipſi proportionem habeant. 99.b

IN OCTAVO LIBRO.

PLani numeri, qui proportionem habent, quam quadratus numerus ad quadratum numerum, inter ſe ſimiles ſunt. 109

Solidi numeri, qui proportionem habent, quam numerus cubus ad numerum cubum, inter ſe ſimiles ſunt. 109.b

IN NONO LIBRO.

SIcubus numerus numerum non cubum multiplicans faciat aliquem, factus non erit cubus: 111

Si cubus numerus numerum aliquem multiplicans faciat numerum non cubum, & multiplicatus non erit cubus.

Si duobus numeris propoſitis, eorum alter in quotlibet numeros diuidatur, numerus planus, qui fit ex duobus numeris ab initio propoſitis, æqualis erit numeris planis, qui ex numero indiuiſo, & ſingulis partibus numeri diuiſi fiunt. 114

Si numerus in duos numeros diuidatur, duo numeri plani, qui fiunt ex toto, & vtraque parte inter ſe compoſiti æquales ſunt numero quadrato, qui à toto efficitur.

Si numerus in duos numeros diuidatur, planus numerus, qui ex toto, & vna parte fit, æqualis eſt plano, qui fit ex partibus vnà cum eo quadrato, qui à prædicta parte efficitur. 115

Si numerus diuidatur in duos numeros, qui à toto fit quadratus æqualis eſt quadratis, qui à partibus fiunt, & ei, qui bis ex dictis partibus fit numero plano.

Si par numerus bifariã diuidatur, diuidatur autem & in numeros inæquales; qui ex inæqualilibus partibus fit numerus planus, vnà cum quadrato numeri interiecti, æqualis eſt ei, qui ex dimidio fit quadrato.

Si par numerus bifariam diuidatur, adijciatur q, ipſi numerus aliquis; qui fit ex toto cum adiecto, & adiecto planus numerus vnà cum quadrato dimidij eſt æqualis quadrato eius, qui ex dimidio & adiecto conflat. 115.b

Si numerus in duos numeros diuidatur, qui à toto fit quadratus vnà cum quadrato vnius partis æqualis eſt numero plano, qui bis fit ex toto, et dicta parte vnà cũ reliquę partis quadrato. 116

Si numerus in duos numeros diuidatur, qui quater ex toto, et vna parte fit numerus planus vnà cũ quadrato reliquę partis æqualis eſt quadrato, qui à toto, et dicta parte tamquam ab vno efficitur. 116

Si par numerus bifariam diuidatur, diuidatur autem & in numeros inæquales; quadrati, qui ab inæqualibus numeri fiunt, dupli ſunt eius quadrati, qui fit à dimidio vnà cum quadrato numeri inter ipſos interiecti.

Si par numerus bifariam diuidatur, adijciatur q, ipſi alter numerus, qui fit ex toto cum adiecto, & qui ex adiecto vtrique quadrati, dupli ſunt quadrati ex dimidio, & quadrati qui ex dimidio et adiecto tamquam ex vno efficitur. 116.b

Illud autem, quod vndecimę ſecundi libri reſpondet, nempe numerum ita diuidere, vt qui ex toto & altera parte fit numerus planus, æqualis ſit ei, qui à reliqua parte fit quadrato, nullo modo fieri poteſt.

IN DECIMO LIBRO.

PRopoſitis duabus magnitudinibus commenſurabilibus, quàm inter ſe proportionem habeant in numeris inuenire. 126.b

Duobus datis numeris, & recta linea, facere vt numerus ad numerum ita quadratum rectæ lineæ ad alterius rectę lineæ quadratum. 130.b

Duos numeros planos diſſimiles inuenire. 131

Magnitudines, quæ incõmenſurabilibus ſunt cõmẽſurabiles, & inter ſe incõmenſurabiles erũt. 132

Datis

Duabus datis rectis lineis inæqualibus inuenire id, quo maior plus potest, quam minor. 132
Datis duabus rectis lineis, quæ ipsas potest, quo pacto inueniatur.
Si tota magnitudo ex duabus magnitudinibus composita vni componentium sit incommensurabilis & reliquæ incommensurabilis erit. 133
Si ad aliquam rectam lineam applicetur parallelogrammum deficiens figura quadrata, parallelogrammum applicatum æquale est ei rectangulo, quod partibus rectæ lineæ ex applicatione factis continetur. 133.b
Si duæ rectæ lineæ inæquales sint, quarta autem pars quadrati, quod à minori fit, ad maiorem applicetur, deficiens figura quadrata; quod applicatum est per bipartitam sectionem non transit.
Duabus datis rectis lineis inæqualibus, quartam partem quadrati minoris ad maiorem applicare, ita vt deficiat figura quadrata.
Datam rectam lineam ita secare, vt rectangulum, quod partibus continetur sit æquale dato rectilineo. oportet autem datum rectilineum minus esse quadrato, quod à dimidia describitur. 134.b
Datum numerum in duas partes ita diuidere, vt qui ex ipsis producitur dato numero sit æqualis. oportet autem datum numerum, cui æqualis esse debet, quadrato dimidij minorem esse.
Rationales magnitudines commensurabiles esse: 135.b
Inuenire duas rationales potentia commensurabiles.
Rationali commensurabile & ipsum rationale esse. 136
Quod duabus datis rectis lineis rationalibus continetur rectangulum datum erit. 136
Si ad datã rectã lineã rationalem applicetur spaciũ datũ, & latitudo quã facit, data erit. 136.b
Quæ ex duabus rationalibus longitudine commensurabilibus rectis lineis componitur recta linea data erit. 137.b
Duarum datarum rationalium, quæ inæquales sint, & longitudine commensurabiles differentia data erit. 138
Inuenire duas rationales potentia solum commensurabiles. 138.b
Recta linea, quæ potest irrationale spacium, irrationalis est. 138.b
Media est irrationalis, quæ potest spacium contentum rationalibus potentia solum commensurabilibus. 139
Mediam, quæ vna est irrationalium in geometrica analogia considerari.
Si sint duæ rectæ lineæ, erit vt prima ad secundam, ita quadratum, quod fit à prima ad rectangulum, quod duabus rectis lineis continetur. 136.b
Spacium medio spacio commensurabile medium est. 140.b
Quod datis duabus mediis, vel media, & rationali continetur rectangulum datum erit. 141
Si ad datam mediam applicetur spacium datum, latitudo quam facit, data erit.
Quæ ex duabus datis mediis longitudine. cõmensurabilibus cõponitur recta linea data erit. 141.b
Duarũ datarũ mediarũ, quæ inæquales sint, & longitudine cõmẽsurabiles differẽtia data erit. 142
Rationale non superat rationale nisi rationali. 143.b
Inuenire duos numeros quadratos, ita vt qui ex ipsis componitur, etiam quadratus sit 144.b
Inuenire duos numeros quadratos, ita vt ipsorum excessus sit quadratus. 144.b
Inuenire duos numeros quadratos, ita vt ipsorum excessus non sit quadratus.
Si sint duæ rectæ lineæ in proportione aliqua, erit vt recta linea ad rectam lineam, ita rectangulũ duabus rectis lineis contentum ad quadratum minoris. 146
Si fuerint tres rectæ lineæ in proportione aliqua, erit vt prima ad tertiam, ita rectangulum contentum prima, & media ad id, quod à media & tertia continetur. 146.b
Ex duobus spacijs irrationalibus inter se compositis, totum fieri rationale. 148
Data recta linea, quæ sit ex binis, vel pluribus nominibus, & quadratum eius datum erit. 148.b
Datis duabus rectis lineis, quæ ex binis, vel pluribus nominibus constant & rectangulum ipsius contentum datum erit. 149
Datæ apotomes quadratum datum erit.
Datis duabus rectis lineis earum, quas apotomas appellamus, & rectangulum quod ipsis continetur, datum erit.
Data recta linea, quæ sit ex binis, vel pluribus nominibus, & data apotoma, rectangulum, quod ipsis

ſis continetur datum erit. 149.b
Si plus per minus, vel minus per plus multiplicetur, produci minus.
Spacium ex medijs compoſitum irrationale eſt. 155.b
Binomialis ſpacij latus quadratum, vel radicem inuenire. 160
Si recta linea in partes inæquales ſecetur, ipſarum partium quadrata maiora ſunt rectãgulo, quod bis dictis partibus continetur. 162.b
Sint quattuor magnitudines AB C EF G & AB excedat ipſam C eodem exceſſu, quo EF excedit G. Dico & permutando AB eodem exceſſu excedere ipſam EF, vel excedi ab ea, quo C excedit G, vel ab ea exceditur. 171

IN VNDECIMO LIBRO.

Conuerſa X. Si fuerint duo anguli æquales, contenti rectis lineis in eodẽ plano nõ exiſtentibus, & earum vna parallela ſit vni continentium æqualem angulum; & reliqua reliquæ parallela erit. 195
Conuerſa XIIII. Si duo plana parallela fuerint, recta linea, quæ ad vnum ipſorum eſt perpendicularis, etiam ad reliquum perpendicularis erit. 196
Conuerſa. XVIII. Si omnia, quæ per aliquam rectam lineam plana producuntur, cuipiam plano ad rectos fuerint angulos; & recta linea eidem plano ad rectos angulos erit. 197.b
Conuerſa XIX. Quorum planorum ſeſe mutuo ſecantium communis ſectio alicui plano ad rectos fuerit angulos, & ſecantia plana eidem plano ad rectos angulos erunt.
Si fuerint quotlibet anguli plani, quorum vno reliqui ſint maiores, quomodocunque ſumpti; contineant autem ipſos rectę lineę æquales. Dico & rectarum linearum angulos ſubtendẽtium, vna reliquas maiores eſſe quomodocunque ſumptas, hoc eſt fieri poſſe, vt ex ijs, quæ rectas lineas coniungunt, multorum laterum figura conſtituatur. 200.b
Si in aliquod planũ à quodam ſublimi puncto æquales rectæ lineæ cadant, in circuli erunt circumferentia: & quæ à dicto puncto ad centrũ circuli ducitur, ad circulũ perpendicularis erit. 201
Omnis anguli ſolidi, qui æquicruribus planis continetur, baſim ipſam in circulo deſcribi. 201.b
Ex planis quotlibet datis angulis quorum vno reliqui ſint maiores, quomodocunque ſumpti, ſolidum angulum conſtituere, oportet autem datos angulos quattuor rectis eſſe minores.
Si ſolidum parallelis planis contineatur, oppoſita ipſius plana & æqualia eſſe, & ſimilia. 202.b
Si ſolidum parallelepipedum ſecetur plano baſibus parallelo, erit ſolidum ad ſolidum, vt altitudo ad altitudinem. 203
Solida parallelepipeda in eadem baſi, vel in æqualibus baſibus conſtituta, eam inter ſe proportionem habere, quam altitudines. 205.b
Priſmata triangulares baſes habentia, quę vel in eiſdem, vel æqualibus baſibus conſtituuntur, & eadem altitudine, inter ſe æqualia eſſe. Et inſuper quæ eandem habent altitudinem inter ſe eſſe, vt baſes. Et quæ vel in eiſdem vel æqualibus baſibus conſtituuntur, inter ſe eſſe, vt altitudines.
Æqualium priſmatum, & triangulares baſes habentium, baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent. Et quorum priſmatum triangulares baſes habentium, baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent ea inter ſe ſunt æqualia. 207.b
Propoſitio XXXVIII aliter demonſtratur. 209.b

IN DVODECIMO LIBRO.

IN datо circulo, deſcripto in circulo polygono ſimile polygonum deſcribere. 212.b
Priſmata omnia, quæ eadem ſunt altitudine inter ſe eſſe, vt baſes. 215.b
Priſmata omnia, & pyramides, quę in eiſdem, vel æqualibus baſibus conſtituuntur eam inter ſe proportionem habent, quam altitudines.
Priſmata omnia, & pyramides inter ſe proportionem habent compoſitam ex proportione baſium & proportione altitudinum. 216
Pyramides ſimiles, quæ multiangulas baſes habent, diuidi in pyramides triangulares baſes habentes ſimiles, & numero æquales, & homologas totis. 216.b

Priſmata

Priſmata ſimilia, quæ triangulares baſes habent in pyramides ſimiles, numeroq́; æquales diuidun tur: & priſma ad priſma triplam habet proportionem eius, quam latus homologum habet ad homologum latus. 217.

Priſmata ſimilia, quæ multiangulas habent baſes in ſimilia priſmata, triangulares baſes habentia diuiduntur, numeroq́; æqualia, & homologa totis: & priſma ad priſma triplam proportionem habet eius, quam latus homologum habet ad homologum latus. 217.b

Æqualium pyramidum & multiangulas baſes habentium, baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent: & quarum pyramidum multiangulas baſes habentium, baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent, illæ ſunt æquales. 218.b

Priſmatum omnium æqualium baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondere, & quorum priſmatum baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent, ea eſſe æqualia. 219

Omnem conum ſiue rectum, ſiue ſcalenum tertiam partem eſſe cylindri ſiue recti, ſiue ſcaleni, qui eandem baſim habet, & eandem altitudinem. 220

Similes coni & cylindri omnes inter ſe in tripla ſunt proportione diametrorum, quæ ſunt in baſibus. 222

Si cylindrus ſcalenus plano ſecetur oppoſitis planis parallelo, erit vt cylindrus ad cylindrum, ita axis ad axem. 223.b

Si quilibet cylindrus ſecetur plano baſibus parallelo, vt cylindrus ad cylindrum, ita eſſe altitudinem cylindri ad cylindri altitudinem.

Conorum omnium & cylindrorum æqualium baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent, & quorum conorum & cylindrorum baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent, illi inter ſe ſunt æquales. 224

Cylindri omnes, & coni inter ſe proportionem habent compoſitam ex proportione baſium, et proportione altitudinum. 224.b

IN TERTIO DECIMO LIBRO.

PRopoſitio prima aliter demonſtratur. 229.b

Data recta linea extrema, ac media ratione ſecta, & vtraque ipſius portio data erit.

Si recta linea rationalis, expoſitæ rationali longitudine commenſurabilis, extrema ac media ratione ſecta fuerit, maiorẽ eius portionẽ apotomen eſſe quintam, & minorẽ eſſe apotomen primã.

Data maiori portione, totam rectam lineam, quæ extrema, ac media ratione ſecta ſit, inuenire.

Data maiori portione rectæ lineę, quæ extrema, ac media ratione ſecetur, & minorem portionem & totam lineam datam eſſe. 230

Propoſitio ſecunda aliter demonſtratur. 230.b

Data minori portione totam rectã lineã, quę extrema, ac media ratione ſecta ſit, inuenire. 231.b

Data minori portione rectæ lineę quæ extrema, ac media ratione ſecatur, & maiorem portionẽ, & totam lineam datam eſſe.

Si recta linea extrema, ac media ratione ſecetur, abſcindaturq́; à maiori portione linea, quæ minori ſit æqualis, erit etiam ea extrema, ac media ratione ſecta, & maior portio erit quę abſciſſa eſt recta linea. 232.b

Si maior portio rectę lineę extrema, ac media ratione ſectæ ſit rationalis, expoſitæ rationali longitudine commenſurabilis; erit minor portio apotome quinta, & tota ex binis nominibus quinta. 233

Si minor portio rectę lineæ extrema; ac media ratione ſectæ ſit rationalis, expoſitæq́; rationali longitudine commenſurabilis, erit maior portio ex binis nominibus quinta, & tota ex binis nominibus prima. 233.b

Si latus hexagoni extrema, ac media ratione ſecetur, erit maior eius portio decagoni latus. 234.b

Si in circulo rationalem diametrum habente decagonum æquilaterum deſcribatur, erit decagoni latus apotome quinta. 235

Si latus decagoni æquilateri in circulo deſcripti ſit rationale, erit circuli diameter ex binis nominibus quinta. 235

Latus

Latus trianguli æquilateri ad rectam lineam, quæ ab angulo ad baſim perpendicularis ducitur, eam potentia proportionem habere quam 4 ad 3. 236.b
Si ſint tres rectæ lineæ, ſitq; vt prima ad tertiam, ita quadratum ſecundæ ad quadratum tertiæ, erunt dictæ lineæ deinceps proportionales. 240

IN QVARTODECIMO LIBRO.

EAm, quæ à centro circuli ad latus trianguli æquilateri perpendicularis ducitur, dimidiam eſſe eius, quæ ex centro circuli: 244

IN QVINTODECIMO LIBRO.

SI à vertice pyramidis ad baſim perpendicularis ducatur, cadet ea in centrum circuli, qui circa baſis triangulum deſcribitur. 249.b
Recta linea ab angulo trianguli æquilateri ducta per centrum circuli, qui circa triangulum deſcribitur, baſim bifariam ſecat:
Rectam lineam ab angulo trianguli æquilateri ductam per centrum circuli, qui circa triangulum deſcribitur, ad baſim perpendicularem eſſe.
Propoſitio ſecunda planius demonſtratur. 250
Omne parallelogrammum eſt in vno plano. 251.b
In dato dodecaedro cubum deſcribere. 255
In dato dodecaedro pyramidem, & octaedrum deſcribere.
In dato Icoſaedro cubum deſcribere.
In dato Icoſaedro pyramidem deſcribere.
In dato dodecaedro Icoſaedrum deſcribere.

FINIS.

UNIVERSIDAD CENTRAL
BIBLIOTECA
DERECHO

EVCLIDIS ELEMENTORVM LIBER PRIMVS

CVM COMMENTARIIS FEDERICI COMMANDINI VRBINATIS.

UNIVERSIDAD CENTRAL BIBLIOTECA DERECHO

DIFFINITIONES.

I.



PVNCTVM EST, cuius nulla eſt pars, vel quod magnitudinem nullam habet.

F. C. COMMENTARIVS.

Euclides per negationem partium ſignificauit nobis punctum, quod eſt principium totius propoſitę contemplationis. cum enim principia aliam rationem habeant ab ijs, quorum ſunt principia, & eorum negationes illorum quodammodo naturam oſtendant; non immerito negantes ſermones principijs ipſis conuenire comperti ſunt: quod etiam aſſerit Proclus auctoritate Parmenidis. Pythagorici vero per proportionem, & tranſlationem quandam, punctum diffinierunt eſſe vnitatem poſitionem habentem: punctum enim poſitionem habet, vnitas non habet. Ariſtoteles in quarto diuinę phyloſophię libro. vbique, inquit, ipſum vnum aut forma, aut quantitate indiuiſibile. eorum autem, quae quantitate, & vt quantitas eſt, diuidi non poſſunt, id quidem, quod penitus eſt tale, & ſine poſitione, dicitur vnitas; quod vero penitus eſt tale, poſitionemq́, habet, dicitur punctũ; & id quod vno modo diuidi poteſt, linea nuncupatur; & id quod duabus ex partibus, ſuperficies: quod vero omni ex parte, & trinam dimenſionẽ habet, dicitur corpus.

Punctum ſecundum Pythagoricos eſt unitas poſitionem habens.

II.

Linea vero eſt longitudo latitudinis expers.

F. C. COMMENTARIVS.

Poſt punctum linea ſecundum obtinet locum: namque vt punctum ad lineam, ita linea ad ſuperficiem, de qua mox dicetur, rationem habet principij. punctum quidem ipſum, vt magnitudinum omnium principium per ſolam negationem, lineam vero partim per affirmationem, partim per negationem ſignificauit cum dixit, longitudinem eſſe latitudinis expertem. fuerunt qui lineam aliter diffinirent: alij enim σημείου ῥύσιν hoc eſt puncti fluxum dixerunt; alij vt Ariſtoteles τὸ μέγεθος μονοχῆ διαιρετὸν ἢ ἐφ' ἓν διαιρετὸν hoc eſt magnitudinem, quae vno modo diuidi poteſt, nempe ſecundum longitudinem. lineae autem notionem habemus, vt Apollonius inquit, cum longitudines tantum vel viarum, vel parietum dimetiri volumus; non enim tunc latitudinem, & craſſitudinem adiungimus, ſed vnicam duntaxat dimenſionem conſideramus; quemadmodum & cum agros metimur, ſuperficiem reſpicimus; cum autem puteos, ſolidum: omnes enim dimenſiones ſimul colligentes dicimus tantum eſſe ſpacium putei ſecundum longitudinem, latitudinem, & craſſitudinem. ſenſum vero ipſius lineae habebimus, ſi diſiunctiones locorum illuminatorum ab vmbroſis inſpexerimus, tum in luna, tum in terra; hoc enim medium iuxta latitudinem, dimenſionem non habet, ſed iuxta longitudinem, quae vnà cum lumine, & vmbra pro-

Punctũ magnitudinum omniũ principium.

Lineæ notio.

Superficiei notio.

Solidi.

Lineæ ſenſus unde habeatur.

Lineæ simplices. Mixtæ.

ducitur. linearum aliae simplices, aliae mixtae. simplices sunt recta, & circularis, quamquam recta simplicior sit, reliquae vero omnes mixtae, quales sunt coni sectiones, helices, conchoides, cissoides, & aliae.

III.

Lineæ fines sunt puncta.


F. C. COMMENTARIVS.

Linea tribus modis vtitur Euclides

Circularis linea per se nullos habet fines.

Ellipsis.

Cum linea tribus modis vtatur Euclides, vel enim terminata, & finita ex vtraque parte, vel infinita, vel ex altera quidem parte finita, ex altera vero infinita; hoc loco de ea, quae vtrinque finita est, sermo habetur; cuius fines dicit esse duo puncta. Circularis autem linea per se nullos habet fines; sed si aliquod in ea punctum accipiatur, idem erit & principium, & finis, diuersa tamen ratione. quod diximus de circulari linea, idem & de ellipsi dici potest, quae ipsa in se ipsam vergit sicuti circulus: si autem sumatur portio circularis lineae, seu ellipsis, eius non aliter, quàm rectae lineae fines erunt duo puncta. Eodem modo & de alijs curuis lineis intelligendum est.



IIII.


Recta linea est, quæ ex æquali suis interijcitur punctis.

F. C. COMMENTARIVS.

Plato q. rectã lineam diffiniat.

Archimedis diffinitio rectæ lineæ.

Hoc est recta linea est, quae aequalem continet distantiam, eam scilicet, quae inter sua interijcitur puncta. quantum enim alterum punctorum ab altero distat, tanta est magnitudo rectae lineae ab ijs terminatae. atque hoc est ex aequali suis interijci punctis. si autem in circumferentia circuli, aut alia quauis linea duo puncta sumantur; eius portio, quae interijcitur, longe maior erit, quàm sit dictorum punctorum distantia. ad hunc quidem modũ rectae lineae diffinitionem exponere mihi videtur Proclus. Plato autem rectam lineã diffinit esse eam ἣς τὰ μέσα τοῖς ἄκροις ἐπικεῖται, hoc est cuius media extremis obsistunt. illud. n. ijs, quę in recta linea sunt, necessario contingit; ijs vero, quae in circulari, aut alia quapiam linea, non item. Vnde & astrologi dicunt solem deficere, cum in eadem recta linea constituitur ipse, luna, et oculus noster: obsistit enim ei tunc luna media existens. At Archimedes, vt Proclus auctor est, dixit rectam lineam esse breuissimam omnium, quae eosdem habent fines. quae quidem diffinitio recepta est in Campani editione. linea, inquit, recta est ab vno puncto ad alium breuissima extensio in extremitates suas eos recipiens.



V.

Superficies est id, quod longitudinem, et latitudinem tantum habet.

F. C. COMMENTARIVS.

Superficiei variæ diffinitiones.

Superficiei cognitio & sensus.

Superficiem dixit longitudinem, & latitudinem tantum habere, propterea quòd crassitudinis expers sit. alij corporis terminum ipsam esse diffinierunt; alij magnitudinem binis distantem inter, nullis. superficiei vero cognitionem nos habere dicunt, quando agros dimetimur, & eorum terminos iuxta longitudinem, ac latitudinem distinguimus. sensum vero quendam capere, quando vmbras aspicimus, cum enim ipsae crassitudinis sint expertes, quòd partes terrae interiores penetrare non possint; latitudinem, & longitudinem tantum habent. superficierum aliae simplices sunt, aliae

alię mixtę. ſimplices ſunt plana, & ſphęrica, reliquę vero mixtę, vt Cylindrica, conica, & quę à coni ſectionibus ortum habent, videlicet conoidum, & ſphęroidum figurarum, & alię.


Superficies ſimplices & Mixtæ.

VI.

Superficiei fines ſunt lineæ.

F. C. COMMENTARIVS.

Quemadmodum non omnis lineæ fines ſunt puncta, ita non omnis ſuperficiei fines ſunt lineæ; ſuperficies enim ſphęræ, vel ſphęroidis per ſe nullos habet huiuſmodi fines, niſi planis abſcindatur, nam tunc fines habet lineas ipſas, quę ex ſectione oriuntur. ſuperficiei autem circuli, & eius, quę ellipſi continetur, finis eſt linea vna, videlicet circunferentia, & ellipſis. quòd ſi ſecentur tunc pro finibus lineas habebunt.



Superficies Sphæræ, & Sphæroidis.


Superficies circuli, & ellipſi cõtẽta.

VII.


Plana ſuperficies eſt quæ ex æqua li ſuis interijcitur lineis.

F. C. COMMENTARIVS.

Antiquiores philoſophi (vt teſtatur Proclus,) τὴν ἐπιφάνειαν καὶ τὸ ἐπίπεδον hoc eſt ſuperficiem, & planum pro vno, eodemq; accipiebant. At Euclides, & qui eum ſecuti ſunt, genus quidem ſuperficiem faciunt, eius vero ſpeciem planum, vel planam ſuperficiem, quemadmodum lineę ſpeciem rectam lineam. & idcir co planum diffiniunt ex quadam ad rectam lineam proportione. vt enim recta linea eſt, qua ex æquali ſuis interijcitur punctis, vel cuius media extremis obſiſtunt, vel breuiſſima omnium, quę eoſ dem habent fines, ita planam ſuperficiem dixerunt eſſe eam, quę ex æquali ſuis interijcitur lineis, vel cuius media extremis obſiſtunt, vel breuiſſimam omnium ſuperficierum eoſdem fines habentium, & omnino quecunque ſunt rectę lineę diffinitiones, omnes ad planam ſuperficiem commodiſſime transferri poſſunt. Quòd cum multę ſint ſuperficierum ſpecies, Euclides planam tantum diffiniuit, atque in hac figuras, & earum affectiones contemplatur.



Superficiē, & planū Antiqui pro eodem accipiebant.



Planæ superficiei uariæ diffinitiones

Euclides superficiē planam tãtum diffiniuit.

VIII.

Planus angulus eſt duabus lineis in plano ſe ſe contingentibus, & non in directum iacentibus, alterius ad alteram inclinatio.

IX.

Quando autem quę angulum continent rectæ lineæ fuerint, rectilineus angulus appellatur.

F. C. COMMENTARIVS.

Angulum alij quidem in prędicamento eorum quę ſunt ad aliquid ponentes, inclinationem eſſe dixerunt, vel linearum, vel planorum, quę ad ſe inuicem inclinata ſunt. alij in qualitatè ipſum comprehendentes, vt rectum, & inflexum, talem quandam affectionem dixerunt eſſe ſuperficiei, vel ſolidi. alij autem ad quantitatem referentes vel ſuperficiem, vel ſolidum eſſe aſſeuerarunt. diuiditur, inquiunt, is, qui in ſuperficie eſt angulus linea; qui in ſolidis ſuperficie. quod

autem his diuiditur nihil aliud eſt, niſi magnitudo; & hęc non linearis, namque lineam punctum diuidit. quare relinquitur, vt ſit ſuperficies, vel ſolidum. Quid igitur in tanta controuerſia dicendum? aut quid eorum dicemus eſſe angulum? Reſpondet Proclus angulum nihil eſſe eorum per ſe ſe, ſed ex concurſu omnium conſtitui. contingere autem hoc non ſolum angulo, ſed & ipſi triangulo, quod quidem particeps eſt quantitatis; & idcirco ęquale dicitur, & inęquale, vt pote materię rationem habens. particeps quoque eſt qualitatis eius, quę ad figuram pertinet, quoniam & ſimilia dicuntur triangula, & inęqualia. Ita igitur angulus quoque omnino quidem indiget quantitate, indiget autem & qualitate, per quam veluti propriam habet formam, & exiſtentię figuram. indiget denique & determinantium ipſum linearum, vel planorum comprehendentium habitudine. atque ex his omnibus angulus conſtat. non tamen eſt vnum aliquod eorum. & eſt quidem diuiſibilis, & ęqualitatem, & inęqualitatem ſuſcipere poteſt, iuxta eam, quę in ipſo eſt, quantitatem.

Angulorū diuiſio.



Angulorum alij quidem in ſuperficiebus, alij vero in ſolidis conſiſtunt: & eorum qui in ſuperficiebus alij in ſimplicibus, alij in mixtis. Eorum qui in planis ſunt alij ſimplicibus lineis comprehenduntur, alij mixtis, alij vtriſque. omnes autem qui rectis comprehenduntur lineis rectilinei appellantur.

X.

Cum vero recta linea ſuper rectam lineam inſiſtens eos, qui deinceps ſunt angulos æquales inter ſe fecerit, rectus eſt vterque ęqualium angulorum: et quæ inſiſtit recta linea perpendicularis vocatur ad eam, cui inſiſtit.

XI.

Obtuſus angulus eſt, qui maior eſt recto.


XII.

Acutus autem, qui recto eſt minor.

F. C. COMMENTARIVS.

In diffinitione anguli obtuſi, & acuti genus ſubintelligi oportet, eſt enim vterque ipſorum rectilineus; hic quidem minor recto, ille autem maior. Sed non ſimpliciter quicunque minor eſt recto, is eſt acutus; neque quicunque maior recto eſt obtuſus. nam qui græce κερατοειδὴς dicitur, hoc eſt cornicularis, qui continetur recta linea circulum contingente, & circumferentia ipſa, non tantum recto, ſed etiam omni acuto eſt minor, acutus autem non eſt. & ſemicirculi angulus omni recto eſt minor, ſed tamen non eſt acutus. quorum quidem cauſa eſt, quod ſint mixti, & non rectilinei. & eorum, qui lineis circularibus, aut alioqui curuis continentur multi recto maiores apparent, non tamen ſunt obtuſi. Cum igitur rectum angulum diffinire propoſuiſſet Euclides rectã aſſumpſit lineam ſuper aliam rectam inſiſtentem; & angulos, qui ex vtraque parte ſunt, quos angulos deinceps appellat, inter ſe aequales facientem. Obtuſum autem, & acutum diffiniens non item aſſumpſit rectam lineam ad alterutram partem

Angulus cornicularis. Semicirculi angulus.



Anguli deinceps qui ſit.

partem inclinatam, ſed per comparationem ad rectum explicauit. ipſe enim etiam non rectorum menſura eſt, quemadmodum & inæqualium æqualitas. lineæ vero ad alterutram partem inclinatę infinitę ſunt, & non vna tantum, vt perpendicularis. Illud autem meminiſſe oportet Euclidem hoc loco de iis ſermonem habere, quę in eodem plano conſiſtunt. quare neque perpendicularem omnem diffiniuit, neque omnem angulum. ſolida enim perpendicularis non ad vnam tantum rectam lineam angulos rectos facit, ſed ad omnes, quę ipſam tangunt, in ſubiecto exiſtentes plano, de qua in vndecimo libro agetur.

Angulus rectus eſt non rectarũ mẽſura, quemadmodum inæqualium æqualitas.

XIII.

Terminus eſt, qui alicuius eſt finis.

F. C. COMMENTARIVS.

Terminum non ad omnem magnitudinem referri oportet, vt ſcribit Proclus, lineę namque terminus eſt, & finis, ſed ad ſpacia, quę ſunt in ſuperficiebus, & ad ſolida. nunc enim terminum vocat ambitum, qui ſpacium vnumquodque determinat; & huiuſmodi terminum, finem eſſe dicit, non vt punctum dicitur lineę finis, ſed vt includit, & ſeiungit ab iis, quę circumpoſita ſunt. eſt autem hoc nomen priſcę illi geometriæ proprium, per quam agros metiebantur, & eorum terminos diſtinctos ſeruabant, ex qua huius ſcientię cognitionem aſſecuti ſunt. huiuſmodi igitur ambitum exteriorem terminum vocans Euclides iure, & merito ipſum finem determinauit ſpaciorum. per hunc enim vnumquodque contentorum præfinitur, veluti in circulo, circumferentia quidem terminus eſt, & finis; ipſum vero planum aliquod ſpacium eſt, & ſimiliter in triangulo tria latera, & in quadrilatero quattuor latera termini ſunt, & fines; ſpacium vero, quod his lateribus continetur.

Terminus, & finis.

XIIII.

Figura eſt, quæ aliquo, vel aliquibus terminis continetur.

F. C. COMMENTARIVS.

Figurarum aliae planae, aliae ſolidę. planarum figurarum circulus quidem, & ellipſis, ſolidarum ſphæra, & ſphæroides vnico termino, alię pluribus terminis continentur.

Figurarum aliæ planæ, aliæ ſolidæ.

XV.

Circulus eſt figura plana vna linea contenta, quæ circumferentia appellatur: ad quam ab vno puncto intra figuram exiſtente omnes rectæ lineæ pertinentes ſunt æquales.


XVI.

Hoc autem punctum centrum circuli nuncupatur.

F. C. COMMENTARIVS.

Circulus planarum figurarum prima eſt, ſimplicitate quidem ſolidis præſtans; vnitatis vero ad planas rationem habens.

Figura] *loco generis*. Plana] *ad differentiam figurarum ſolidarum*. Vna linea contenta] *vt differat ab iis, quę pluribus lateribus continentur*. quæ circumferentia appellatur] *per hoc differt ab ellipſi, quę & ipſa vna linea continetur, ſed eam ellipſim vocant. liceat enim mihi nunc ſpacium ellipſi contentum etiam ellipſim appellare.* Ad quam] *ab ellipſis autem centro non plures, quam quattuor rectę lineę æquales ad ambitum duci poſſunt.* ab vno puncto] *ex infinitis punctis, quę intra figuram ſunt, vnum duntaxat hoc præſtare poteſt.* intra figuram exiſtente] *eſt etiam punctum extra figuræ planum, à quo omnes rectę lineę ad circumferentiam ductę ſunt æquales, quod non centrum, ſed circuli polus in ſphæricis appellatur.*



Ellipſis.

Circuli polus.

Diameter


XVII.

Diameter circuli eſt recta quædam linea per centrum ducta, & ex vtraque parte à circumferentia circuli terminata, quæ quidem et bifariam circulum ſecat.

F. C. COMMENTARIVS.

Diametri parallelogrammorum.

Diameter circuli] *ſunt enim parallelogrammorum quoque diametri, ſed hę interdum* διαγώνιοι *hoc eſt diagonij appellantur. ſunt & diametri ellipſis, quarum duę axes dicuntur. præterea etiam ſphęrę diametri ſunt, quę axes nuncupantur. circuli igitur propria eſt diameter.* recta quadam linea per centrum ducta] *poſſunt namque in circulo duci infinitæ rectæ lineę, quę per centrum non tranſeunt.* & ex vtraque parte à circumferentia circuli terminata.] *rectę lineę etiam per centrum ductę, quę vel citra, vel vltra circumferentiam terminantur, diametri non ſunt.* quæ & bifariam circulum ſecat.] *ſit enim circulus A B C D, cuius diameter A C: et ſtante diametro intelligatur circumferẽtia A B C eleuari, ac ſuperponi circumferentię A D C. Dico circumferentiam A B C ipſi A D C congruere. ſi enim non congruit, vel cadet extra, vel intra, vel partim extra, partim intra. cadat primum extra ſi fieri poteſt: & ex centro circuli, quod ſit E, ducatur E B ſecans circumferentiam A D C in F. quoniam igitur rectę lineę à centro ad circumferentiam ductę inter ſe ſunt æquales, erit recta linea E B æqualis ipſi E F, hoc eſt totum parti quod fieri non poteſt. quare circumferentia A B C extra ipſam A D C non cadet. ſimiliter demonſtrabimus neque eam cadere intra, neque partim extra partim intra. in ipſam igitur cadat. neceſſe eſt: & circumferentia A B C congruet ipſi A D C. Quòd ſi circumferentia circumferentię congruit, & ſuperficies contenta recta linea A C, & circumferentia A B C congruet ſuperficiei, quę eadem A C, & circumferentia A D C continetur. ex quibus ſequitur per octauam communem notionem & circumferentiam circumferentię, & ſuperficiem ſuperficiei æqualem eſſe. diameter igitur A C circulum A B C D bifariam ſecat. quod oportebat demonſtrare.*




XVIII

Semicirculus eſt figura, quæ continetur diametro, & ea quæ ex ipſa circuli circumferentia intercipitur.

XIX.

Portio circuli eſt figura, quę recta linea, & circuli circumferentia continetur.

F. C. COMMENTARIVS.



Ex circuli quidem diffinitione centri naturam inuenit, ab omnibus alijs punctis quę in circulo ſunt differentem; à centro autem diametrum diffiniuit, & ab omnibus alijs rectis lineis, quę intra circulum deſcribuntur, ſeiunxit. nunc autem à diametro quid nam ſit ſemicirculus tradit, cum dicat ipſum contineri duobus terminis, ijſq; ſemper differentibus, videlicet recta linea, & circumferentia: & rectam

& rectam lineam non esse quamlibet, sed circuli diametrum, si quidem & minor portio circuli, & maior continetur recta linea, & circumferentia; quae tamen semicirculi non sunt, quoniam circuli diuisio non est facta per centrum. omnes autem huiusmodi figurae biformes sunt, & ex dissimilibus constant. figurae enim contentae duobus terminis, vel duabus circumferentijs continentur, vt lunularis, vel recta linea, & circumferentia, vt iam dictae, vel duabus lineis mixtis, vt si duae ellipses se inuicem secent, figuram continebunt, quae inter ipsas intericitur, vel mixta & recta, vt ellipsis dimidium. itaque semicirculus duabus quidem lineis dissimilibus, sed tamen simplicibus, atque ad se se applicatis continetur. antequam igitur triadicas figuras definiat, iure merito post circulum ad Conicas accessit, quoniam duae rectae lineae spacium concludere nunquam possunt; recta autem linea & circumferentia possunt. & duae circumferentiae similiter vel angulum facientes, vt in lunulari, vel figuram angulis expertem, vt si duos intelligas circulos idem centrum habentes. quod enim medium intericitur spacium duabus circumferentijs continetur interiori, & exteriori, & nullus fit angulus, cum se inuicem non secent, vt in lunulari, & vtrinque conuexa figura. At vero centrum semicirculi idem esse, quod & circuli centrum, manifeste constat. diameter enim centrum in se habens complet semicirculum. Illud autem notatione dignum solam hanc figuram ex planis in ambitu centrum habere. vnde colligitur centri tres esse locos, vel enim intra figuram, vt in circulo & ellipsi, vel in ambitu vt in semicirculo, vel extra, vt in vna sectionum conicarum, videlicet in hyperbola. Centrū tres habet locos.

XX.

Rectilineæ figuræ sunt, quæ rectis continentur lineis.

XXI.

Trilateræ quidem, quæ tribus.


XXII.

Quadrilateræ, quæ quattuor.

XXIII.


Multilateræ vero, quæ pluribus, quàm quattuor rectis lineis comprehenduntur.

F. C. COMMENTARIVS.



Post circulum, semicirculum, & circuli portiones, transit ad figuras rectilineas, quae quidē ordinatim per numeros in infinitum procedunt, initium ducentes à ternario, quoniam duae rectae lineae spacium concludere non possunt, vti dictum est. Meminit autem trilaterarum, & quadrilaterarum duntaxat figurarum, vtpote quae magis elementares sunt; in primo enim libro de triangulis, & parallelogrammis agit, reliquas communi nomine multilateras appellans. Porrò figurarum planarum aliae simplicibus continentur lineis, aliae mixtis, aliae vtrisque. & earū, quae simplicibus, aliae quidem similibus specie continentur, vt rectilinea, aliae specie dissimilibus, vt semicirculi, & circulorum portiones. earum insuper, quae specie similibus aliae circulari cōprehenduntur linea, aliae recta. At earū quae circulari, aliae duabus, aliae pluribus continentur & vna quidem circulus ipse, quae vero duabus, aliae angulorum expertes, sunt, Figurarum planarum diuisio.

Corona. *ſunt, vt corona, quae concentricis circulis terminatur, aliq; angulares ut meniſcus. earum quae pluribus, quàm duabus continentur, proceſſus eſt in infinitum: tribus namque, & quattuor, et quae deinceps ſunt circumferentijs quędam figurae comprehendũtur. ſi enim tres circuli ſe ſe contingant, ſpacium concludũt trilaterum, quod tribus circumferẽtijs terminatur, ſi vero quattuor, quattuor circumferentijs, & deinceps ſimiliter. poſtremo earum, quae rectis lineis, aliae quidem tribus, aliae quattuor, aliae pluribus continentur.*



XXIIII.

Trilaterarum figurarum æquilaterum eſt triangulum, quod tria latera habet æqualia.

XXV.

Iſoſceles, ſiue æquicrure, quod duo tantũ æqualia latera habet.

XXVI.

Scalenum vero eſt, quod tria inæqualia habet latera.

XXVII.

Adhæc, trilaterarum figurarum, rectangulum quidem eſt triangulum, quod rectum angulum habet.

XXVIII.


Obtuſiangulum eſt, quod obtuſum habet angulum.

XXIX.

Acutiangulum vero, quod tres acutos angulos habet.

F. C. COMMENTARIVS.


Triangulorum diuiſio interdum quidem à lateribus, interdum vero ab angulis ortum habet: & prędit ea, quae à lateribus tamquam nota, ſequitur autem ea quae ab angulis tamquam propria, quoniam & tres ipſi anguli, videlicet rectus, obtuſus, & acutus ſolis rectilineis figuris conueniunt: aequalitas verò laterum, & inequalitas inuenitur etiam in ijs, quae rectilineae non ſunt. dicit igitur triangulorũ alia eſſe aequilatera, alia acquicruria, alia ſcalena, vel enim omnia latera aequalia ſunt, vel omnia inęqualia, vel duo tantũ aequalia.



Rurſus triangulorum alia rectangula, alia obtuſiangula, alia acutiangula, & rectangulum quidem diffinit, quod vnum angulum rectum habet, quemadmodum obtuſiangulum, quod vnum

habet

habet obtusum, fieri enim non potest, vt triangulum plures vno, vel rectos, vel obtusos angulos habeat; acutiangulum vero, quod omnes habet acutos; non enim satis est vnicum acutum habere, omnia si quidem triangula hoc modo acutiangula essent, namque omne triangulum duos habeat acutos necesse est, tres autem acutos acutiangulum solum. ex his diuisionibus colligitur septem tantum esse triangulorum rectilineorum species, & neque plures, neque pauciores. aequilaterum enim acutiangulum tantum est; reliquorum vero vnumquodque est triplex; nam aequicrure vel rectangulum est, vel obtusiangulum, vel acutiangulum: & similiter scalenum vel rectangulum, vel obtusiangulum, vel acutiangulum.




Septem triangulorum rectilineorum species.

XXX.

Quadrilaterarum figurarum quadratum est quod & æquilaterum est, & rectangulum.

XXXI.

Altera parte longior figura est, quæ rectangula quidem, æquilatera vero non est.




XXXII.

Rhombus, quæ æquilatera quidem, sed rectangula non est.

XXXIII.

Rhomboides, quæ & opposita latera, & oppositos angulos inter se æquales habet, neque æquilatera est, neque rectangula.




XXXIIII.

Præter has autem reliquæ quadrilateræ figuræ trapezia vocentur.

F. C. COMMENTARIVS.

Quadrilaterarum figurarum aliae aequilaterae sunt, aliae non aequilaterae. rursus aliae rectangulae; aliae non rectangulae. quae igitur aequilaterae, & rectangulae sunt quadrata appellantur. quae vero rectangulae & non aequilaterae, altera parte longiores: & quae aequilaterae, & non rectangulae, rhombi. & postremo quae neque aequilaterae, neque rectangulae latera habent, & angulos, qui è regione sunt inter se aequales, rhomboides vocantur. alij in hunc modum diuidunt. Quadrilaterarum figurarum aliae parallelogramma sunt, quae latera



Quadrilaterarum figurarum diuisio.

Quadratum.

Altera pars longius.

Rhombus.

Rhomboides.

Quadrata. τετράγωνα

Rhomboidea.

Rhombus.

Trapezia.

Trapezoidea.


Trapezia aequicruria, & Scalena.

tera ex oppoſito parellela habent, non parallelogramma vero, quae latera parallela non habent. parallelogrammorum autem alia quidem & rectangula, & aequilatera ſunt vt quadrata, quae à graecis τετράγωνα appellantur, alia neque rectangula, neque aequilatera, vt rhombo idea, quae figuram rhombo ſimilem habent. alia rectangula quidem, ſed non aequilatera, vt altera parte longiora; alia è contrario aequilatera quidem, non autem rectangula, vt rhombus. non parallelogrammorum vero alia duo latera tantum habent parallela; alia nulla prorſus parallela habent: & illa quidem vocantur trapezia, haec vero trapezoidea. Trapeziorum alia quidem latera, quae parallelas lineas coniungunt, aequalia habent, alia vero inaequalia. & illa aequicruria trapezia, haec ſcalena trapezia appellantur. quadrilatera igitur figura ſeptem modis conſtituitur. nam prima quidem quadratum eſt, ſecunda altera parte longius, tertia rhombus, quarta rhomboides, quinta aequicruro trapezium, ſexta ſcalenum trapezium, ſeptima trapezoides. Euclides autem figuras quadrilateras in parallelogramma, & non parallelogramma diuidere minime potuit, quippe qui neque de parallelis, neque de parallelogrammo prius tractarit: trapezia autem, & trapezoidea omnia communi nomine appellauit trapezia ad eorum quattuor differentiam, in quibus parallelogrammorum ineſt proprietas, nempe ex oppoſito latera & angulos habere aequales; quod ipſe in rhomboide tantum poſuit, ne ſolis negationibus ipſum diffiniret; cum dixit, neque aequilaterum, neque rectangulum; in quibus enim propriis caremus rationibus, communibus vti neceſſarium eſt. videtur autem rhombus dimotum eſſe quadratum, & rhomboides dimotum altera parte longius, propterea quòd iuxta latera quidem hęc ab illis non differunt, ſed iuxta angulorum duntaxat obtuſitates, & acumina, cum illa rectangula ſint.

In quibus propriis rõnibus caremus, cõmunibus vtendum.

XXXV.

Parallelæ, ſeu æquidiſtantes rectæ lineę ſunt, quę cum in eodem ſint plano, & ex vtraque parte in infinitum producãtur, in neutram partem inter ſe conueniunt.



F. C. COMMENTARIVS.

Quae nam ſint parallelarum, ſeu aequidiſtantium rectarum linearum elementa, & quibus accidentibus dignoſcantur, poſtea diſcemus. nunc quae ſint parallelae his verbis diffinit. Quę cum in eodem ſint plano] ſi enim altera quidem ſit in ſubiecto plano, altera autem in ſublimi iuxta quamuis poſitionem, inter ſe non conueniũt, non tamẽ propterea parallelae ſunt. Et ex vtraque parte in infinitum producantur, in neutram partem inter ſe conueniunt] nam rectae lineae non parallelae, ſi aliquatenus producantur, non conuenient; in infinitum autem produci, & non conuenire, parallelas deſignat, neque hoc ſimpliciter, ſed ex vtraque parte, in infinitum produci, & non conuenire. fieri namque poteſt, vt non parallelae etiam ex vna quidẽ parte in infinitum producantur, ex altera vero minime. annuentes enim in hac parte, in altera plurimum diſtant, cauſſa autem haec eſt, quoniam duae rectae lineae ſpatium aliquod comprehẽdere non poſſunt, quòd ſi ex vtraque parte annuant hoc non continget. & Euclides quidem rectas lineas parallelas in hunc modum diffinit. Poſſidonius vero parallelas, inquit, ſunt, quae neque annuũt, neque abnuunt in vno plano, ſed aequales habent omnes perpendiculares, quae à punctis alterius ad alteram ducuntur; quęcunque vero minores faciunt perpendiculares inter ſe conueniunt. perpendicularis enim, & ſpaciorum altitudines, & linearum interualla determinare poteſt. quamobrem cum perpendiculares ſint aequales, & rectarum linearum interualla aequalia erunt: cum vero minores, & interuallum minuitur, & conueniunt inter ſe ad eas partes, in quibus perpendiculares ſunt minores. Pitho geometra parallelas rectas lineas explicans non contentus iis, quae ſcripſit Euclides, eas aptiſſime exemplo declarauit. dixit enim rectas lineas parallelas eſſe, quales in parietibus, vel pauimento columnarum vmbras à lampade è regione ardente, vel lucerna factas videmus, quod quomodo intelligendum ſit vide apud Serenum.

Poſſidonius parallelas alter diffinit.

Perpendicularis ſpaciorum altitudines et linearũ interualla determinat.

rerum in fine libri de ſectione Cylindri. Poſt diffinitiones ſequuntur poſtulata, deinde exiomata, ſeu communes notiones. poſtulata autem & axiomata, vt refert Proclus ex Gemino il, lud habent commune, vt non indigeant demonſtratione aliqua, aut geometrica fide, ſed ſumatur tamquam nota, & principia fiant eorum, quae ſequuntur. at differunt axiomata à poſtulatis eodem prorſus modo, quo theoremata à problematibus. vt enim in theorematibus quidem id, quod ſubiecta conſequitur, perſpicere & cognoſcere proponimus; in problematibus vero excogitare aliquid, & facere iubemur: ita & in axiomatibus ea ſumuntur, per quae ſeſe manifeſta ſiunt, noſtriſq; inſitis notionibus ſunt in promptu; in poſtulatis vero ea ſumere quærimus, quae facilia, parabiliaq; ſunt, & in quibus ſumendis cogitatio non defatigatur, quæq; nulla neque varietate, neque conſtructione indigent.

Axiomata a poſtulatis differunt eodē modo, quo theoremata a problematibus.

POSTVLATA.

I

Poſtuletur à quouis puncto ad quoduis punctum rectam lineam ducere.


II.

Rectam lineam terminatam in continuum, & directum producere.

III.

Quouis centro, & interuallo circulum deſcribere.

F. C. COMMENTARIVS.



Tria hęc & ob facilitatem, & quod aliquod comparare nobis imperant in poſtulatis neceſſario collocanda ſunt, ex Geminii ſententia. nam illud quidem, A quouis puncto ad quoduis punctum rectam lineam ducere, ſequitur eam diffinitionem, quae tradit lineam eſſe puncti fluxum, & rectam lineam aequabilem, & non decliuem fluxum. ſi igitur intelligamus punctum aequabili, & breuiſsimo motu ferri in alterum punctum incidemus, & primum poſtulatum factum erit, nihil vtique varium intelligentibus nobis. ſi vero recta linea puncto terminata, ſimiliter intelligamus eius terminum breuiſſimo, & aequabili motu ferri, ſecundum poſtulatum facili, ſimpliciq; aggreſſione comparatum erit. Quòd ſi rurſus terminatam rectam lineam manere quidem ex altera parte, ex altera autem moueri circa manens punctum intelligamus, tertium fiet poſtulatum; centrum namque erit punctum manens, interuallum vero recta linea; & quanta ea fuerit, tantum erit interuallum à centro ad omnes circumferentiae partes.

IIII.


Omnes angulos rectos inter ſe æquales eſſe.

F. C. COMMENTARIVS.

Hoc quamquam vt manifeſtum, & nulla indigens demonſtratione à nobis concedatur, poſtulatum tamen non eſt ex ſententia Geminii, ſed axioma. accidens enim quoddam per ſe rectis angulis dicit, nihil ſimplici notione facere iubens. ſi cui vero non ſatis conſtet rectos angulos omnes inter ſe aequales eſſe, is petat demonſtrationem à Proclo, quam affert in commentarijs. Pappus recte animaduertit huius conuerſum non etiam verum eſſe, nempe angulum recto aequalem omnino eſſe rectum, niſi rectilineus ſit; poteſt enim curuilineus quoque angulus recto aequalis eſſendi.

V.

Et ſi in duas rectas lineas recta linea incidẽs interiores, & ex eadem parte angulos duobus rectis minores fecerit, rectas lineas illas in infinitum productas, inter ſe conuenire ex ea parte, in qua sũt anguli duobus rectis minores.



F. C. COMMENTARIVS.

Hoc à poſtulatis penitus reijciendum cenſet Proclus, cum theorema ſit, quod multas habet & dubitationes, quas Ptolemæus in quodam libro ſoluere ſibi propoſuit. multis vero & diffinitionibus, & theorematibus in demonſtratione indiget, cuius conuerſum Euclides etiam tanquam theorema oſtendit. ſed de hoc inferius ſuo loco agetur.

AXIOMATA, SEV COMMVNES NOTIONES.

I.

Quę eidem æqualia, et inter ſe ſunt æqualia.

II.

Et ſi æqualibus æqualia adijcianturtota ſunt æqualia.

III.

Et ſi ab æqualibus æqualia auferantur, reliqua ſunt æqualia.

IIII.

Et ſi inæqualibus æqualia adijciantur, tota ſunt inæqualia.

V.

Et ſi ab inæqualibus æqualia auferãtur, reliqua ſunt inæqualia.

VI.

A Et quę eiuſdem dupla, inter ſe ſunt æqualia.

VII.

Et quę eiuſdem dimidia inter ſe ſunt æqualia:

VIII.

B Et quę ſibi ipſis congruunt, inter ſe ſunt æqualia.

IX.

Totum eſt ſua parte maius

X.

C Duę rectæ lineæ ſpacium non comprehendunt.

F. C. COMMENTARIVS.

Axiomata mathematicis ſcientijs communia.

Axiomata ferè omnia mathematicis ſcientijs communia ſunt: neque ſolum in magnitudinibus, ſed & in numeris, & motibus, & temporibus vera eſſe deprehenduntur. æquale enim & inæquale, totum & pars, maius, & minus, quantitatibus continuis, & diſcretis communia ſunt. contemplatio igitur quae circa tempora, & quae circa motus, & quae circa numeros, & quae circa magnitudines verſatur, his omnibus tamquam manifeſtis indiget. communibus autem exiſtentibus vnuſquiſque vtitur ſecundum propriam materiam, quoad ipſa requirit: & alius quidem ut in magnitudinibus, alius ut in numeris, alius uero ut in temporibus ipſis utitur, & hoc modo propriae in unaquaque ſcietia cõcluſiones fiunt, licet axiomata communia fuerint.

Et

Et quæ eiusdem dupla inter se sunt æqualia. A

Hoc ex illo sequitur, Si æqualibus æqualia adiiciantur tota æqualia esse, nam quæ dimidio sunt æqualia, cum ipsum dimidium assumpserint eiusdem dupla fiunt, & inter se æqualia ob æquale additamentum: & hac ratione non solum dupla, sed & tripla & eiusdem etiam multiplicia omnia æqualia apparebunt.

Et quæ sibi ipsis congruunt inter se sunt æqualia] *hoc geometriæ proprium est.* B

Duæ rectæ lineę spacium non comprehendunt] *Hoc non admodum manifestum videtur, quare in editione Campani inter petitiones locum obtinuit.* C

His axiomatibus nonnulla alia adiicienda censuit Pappus, vt videre licet apud Proclum. Cum autẽ omnis scientia duplex sit, alia quidem circa immediatas propositiones versatur, alia vero circa ea quę ex illis demonstrantur, comparanturq́;, & omnino circa ea, quæ principia consequuntur, suam perficit tractationem. hęc rursus in geometricis rationibus se ipsam in problematum per actionem, & in theorematum inuentionem distribuit; problemata quidem appellans ea, in quibus, quæ non sint quodammodo comparare proponit, in apertumq́; proferre; & machinaris: theoremata vero, in quibus id, quod inest, vel non inest perspicere, cognoscereq́;, ac demonstrare instituit, & illa quidem ortus, & positiones, & applicationes, & descriptiones, & circunscriptiones, & bipartitiones, atque alia huiusmodi constituere iubent; hęc vero symptomata, & quæ subiectis geometriæ per se insunt, persuadere, demonstrationibusq́; firmare contendunt. Omne autem problema, & omne theorema perfectum, expletumq́; suis partibus, hęc omnia in se ipso habere debet, Propositionem, Expositionem, Determinationem, Constructionem, Demonstrationem, & Conclusionem. harum autem Propositio dicit quo dato quid quęsitum sit, perfecta enim propositio ex vtrisque constat. Expositio ipsum per se datum assumens præparat quæstioni. Determinatio seorsum quæsitum quodnam sit explicat. Constructio ea, quæ dato desunt ad quæsiti uenationem adiicit. Demonstratio perite ex concessis quod propositum est colligit. Conclusio rursus ad propositionem regreditur confirmans id, quod ostensum est. & omnes quidem problematum, & theorematum partes tot sunt. maxime autem necessariæ, & quæ in omnibus insunt Propositio, Demonstratio, & Conclusio: oportet enim ante cognoscere quæsitum, perq́; media ostendere. & quod ostensum est concludere. Harum autem trium, vt aliqua desit, fieri non potest. at reliquæ sæpe assumuntur, sæpe vero, cum nullam afferant vtilitatem, omittuntur. Determinatio enim, & Expositio non sunt in illo problemate. Æquicrure triangulum constituere, quod habeat vtrumque eorum, qui ad basim sunt, angulorum duplum reliqui. Constructio autem in compluribus theorematibus non est, cum satis sit expositio absque alia additione, vt ex datis propositum ostendatur. Quando igitur deficere expositionem dicimus? cum in propositione nullum fuerit datum. quamquam enim propositio diuidatur in datum & quæsitum, non tamen hoc semper fit, sed aliquando solum dicit quæsitum, quod cognoscere, vel comparare oportet, vt in iam dicto problemate. non enim ante dicit, quo dato oporteat æquicrure triangulum constituere, habens vtrumque æqualium angulorum duplum reliqui, sed tantum quod oportet illud comparare. & fit quidem etiam hoc loco ex ante cognitis propositi sumptio. etenim quid æquicrure, & quid æquale, vel duplum sit cognoscimus. hoc autem omni dianoeticæ disciplinæ proprium esse dicit Aristoteles, nihil tamen nobis subiicitur, quemadmodum in alijs problematibus, vt quando dicit, Datam rectam lineam terminatam bifariam secare. hic enim recta linea data est, iubemur autem ipsam bifariam diuidere. seorsum igitur ponitur datum, & seorsum quæsitum. Cum autem propositio vtrumque habuerit, tum & determinatio inuenitur, & expositio; sed cum deficit datum, & hæc deficiant necesse est. expositio etenim est dati, & determinatio, quæ propositioni eadem erit. nam quid aliud dicas determinans in iam dicto problemate, nisi quod æquicrure triangulum inuenire oportet? hoc autem erat propositio. si igitur propositio non habeat datum, & quæsitum, expositio quidem tacetur, quòd non sit datum; determinatio vero prętermittitur, ne eadem fiat, quæ propositio. multa autem alia inueniet huiusmodi problemata, præsertim in arithmeticis, & in decimo libro, vt inuenire duas rectas lineas potentia commensurabiles, quæ medium comprehendant, & bina, quæ eiusmodi sunt. Animaduertendum tamen Archimedem quidem sæpe, vt in libro de quadratura parabolæ, Pappum vero ferè semper propositionem ipsam omittere, contentos ex positione, ac determinatione, loco propositionis. Datum autem vnum, vno horum modorum datur vel positione, vel proportione, vel magnitudine, vel specie: punctum enim dumtaxat positione datur, linea vero, & alia

Omne problema, & omne theorema perfectũ sex habet partes.

Propositio, demonstratio & cõclusio maxime necessariæ.

Cõstructio deest, cum expositio satis sit.

Archimedes & Pappus aliquãdo propositionem omittunt.

Specie, *alia omnibus. nam cum dicimus datum angulum rectilineum bifariam secare, speciem anguli, quae data est, significamus, nempe rectilineam, vt ne quęramus eisdem methodis etiam curuilineum angulum bifariam secare. Cum vero dicimus, Datis duabus rectis lineis inęqualibus a maiori aequalẽ minori abscindere, magnitudine datae sunt. maius enim, & minus, terminatum, & infinitum ad magnitudinem referuntur. At cum dicimus, Si quattuor magnitudines proportionales*

Magnitudine

Proportione *sint, & permutando proportionales erunt, datur eadem proportio in quattuor magnitudinibus, & cum dicimus. Ad datum punctum oportet datae lineae aequalem rectam lineam ponere, punctum positione datur. quare cum positio varia esse possit, & constructio variabitur; datur enim punctum vel extra rectam lineam, vel in recta linea, & in extremitate, vel inter ipsius termi-*

Cum positio uaria sit, & constructio uariabitur. *nos. itaque cum datum quadrupliciter sumatur, & expositio quadrupliciter fit, & quandoque duos etiam, & tres modos complectitur. demonstratio vero interdum quidem quae demonstrationis propria sunt habere inuenietur, ex diffinitionibus medijs quęsitum ostendens; hęc enim demonstrationis perfectio est: interdum uero ex certis notis arguens; quod diligenter attendere oportet, ubique enim geometricae rationes necessitatem habent ob subiectam materiam, non ubique*

Demonstratio perfecta.

Geometricæ rationes necessitatẽ habent ob subiectam materiam. *uero demonstrantibus methodis perficiuntur. denique conclusio duplex esse solet, particularis, & uniuersalis. nam cum in dato conclusionem fecerimus, ne uideamur particularia proposuisse, ad uniuersalem transimus conclusionem. Verum cum hęc ita determinata sint, de ijs quae ipsis adnectuntur, breuiter differemus, nempe quid sit lemma, quid casus, quid corollarium, quid*

Cõclusio duplex. *instantia, quid deductio. lemma uel sumptio proprie in geometricis est propositio fide indigens. cũ enim uel in constructione, uel in demonstratione aliquod sumimus eorum, quae ostensa non sunt, sed ratione indigent, tunc id quod sumptum est, veluti per se ambiguum inquisitione dignum esse arbitrati, lemma ipsum appellamus, à postulato, & axiomate differens quatenus de-*

Lemma.

Casus. *monstrari potest, cum illa absque demonstratione ad aliorum fidem faciendam per se sumantur. Casus autem differentes constructionis modos, & positionis mutationem indicat, nimirum transpositis punctis, uel lineis, uel planis, uel solidis, & omnino ipsius uarietas circa descriptionem*

Corollarium. *uersatur; ac propterea dicitur casus, quòd sit constructionis transpositio. Corollarium uero dicitur quidem & de quibusdam problematibus, qualia sunt corollaria Euclidi ascripta. sed proprie dicitur corollarium, quando ex demonstratis aliquod aliud theorema apparet, quod à nobis propositum non est; & corollarium ob id uocant, quòd sit tanquam lucrum quoddam accedens preter*

Instantia. *demonstrationis propositum. Instantia uero totum orationis impedit cursum, uel constructioni, uel demonstrationi occurrens, quam tamen non oportet ut ueram admittere, sed remouere, &*


Deductio. *ostendere falsam esse. Deductio autem est transitus ab alio problemate, uel theoremate ad aliud,*

Cubi duplicatio. *quo cognito, uel comparato etiam illud, quod propositum est, apparet, ut cum quęreretur cubi duplicatio transtulerunt quęsitum in aliud, quod hoc consequitur, uidelicet in duarum mediarum inuentionem. & deinceps quęsierunt quo nam pacto datis duabus rectis lineis duae mediae proportionales inueniantur.*

PROBLEMA I. PROPOSITIO I.

In data recta linea terminata, triangulũ æquilaterũ constituere.


Sit data recta linea terminata A B. oportet in ipsa A B triangulum æquilaterum constituere. centro quidem A interuallo autem A B circulus describatur B C D. & rursus centro B, interualloq; B A describatur circulus A C E, & à puncto C, in quo circuli se inuicem secant ad A B ducantur rectæ lineæ C A C B. Quoniam igitur A centrum est circuli C B D, erit A C ipsi A B æqualis. rursus quoniã B circuli C A E est centrum, erit B C æqualis B A. ostensa est autem et C A æqualis A B. vtraque igitur ipsarum C A C B ipsi A B est æqualis. quæ autem eidẽ sunt æqualia, et inter se æqualia sunt. ergo C A ipsi C B est æqualis. tres igitur C A A B B C inter



se sint æquales; ac propterea triangulum æquilaterum est A B C, & constitutum est in data recta linea terminata A B, quod facisse oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

Ea omnia, quae ante dicta sunt, in hoc primo problemate contemplari licet. nam problema esse manifesto apparet; imponit enim nobis trianguli aequilateri ortum machinari. & propositio ex dato; & quesito constat, datur enim recta linea terminata, quæritur autem quo pacto in ipsa triangulum aequilaterum constituatur. & precedit quidem datum, sequitur autem quæsitum, vt coniunctum etiam texere possis, si est recta linea terminata, fieri potest vt in ipsa constituatur triangulum aequilaterum. neque enim non recta existente triangulum constituetur, quod ex rectis lineis constat, neque non terminata; angulus enim fieri non potest, nisi ad vnum punctum, infinitae autem extremum punctum non est. post propositionem sequitur expositio. Sit data recta linea terminata A B] *& vides expositionem datum solum explicare, non etiam quæsitum adiungere, post quam determinatio* [oportet in data recta linea triangulum æquilaterũ constituere] *determinatio autem quoddammodo attentionis est causa, attentiores enim ad demonstrationem nos reddit quæsitum pronunciando, quemadmodum expositio dociliores efficit, datum ante oculos ponendo. post determinationem constructio sequitur* [centro quidem altero rectæ lineæ termino; interuallo autem reliquo circulus describatur, rursusq; centro quidem reliquo, interuallo autem eo, quod prius centrum erat, describatur circulus, et à communi sectionis circulorum puncto ad lineæ terminos rectæ lineæ ducantur] *& vides me ad constructionem vti postulatis, videlicet à quouis puncto ad quoduis punctum rectam lineam ducere, & quouis centro & interuallo circulum describere. vniuersæ enim postulata constructionibus, axiomata vero demonstrationibus vtilitatem afferunt. deinde sequitur demonstratio, quae ex circuli diffinitione, & illo axiomate. Quae eidem aequalia, & inter se sunt aequalia, concludit tres rectas lineas C A A B B C inter se esse aequales. vnde colligitur triangulum A B C aequilaterum esse, atque hæc est prima conclusio, quae expositionem consequitur; post hanc est ipsa vniuersalis.* [In data igitur recta linea triangulum æquilaterum constitutum est.] *siue enim duplam eius, quae nunc exposita est, feceris datam, siue triplam, siue aliam quamlibet maiorem, vel minorem; eadem constructiones, & demonstrationes congruent. his apposuit particulam* [quod facisse oportebat] *ostendens conclusionem problematicam esse; etenim in theorematibus apponit* [quod ostendisse oportebat] *namq; illa factionem alicuius, hæc demonstrationem, & inuentionem denuntiant. In vno igitur hoc primo problemate omnia examinare voluimus, ac perspicua facere, oportet autem illos, qui hæc legent, in reliquis eadem quærere, & quæ nam eorum assumantur, quenamnè omittantur, & id, quod datum est, quotupliciter detur; & ex quibus principijs vel constructiones, vel demonstrationes pendeant; horum enim perspicax contemplatio non paruam exercitationem, geometricarumq; rationum meditationem affert. sed fortasse non inutile erit reliqua eiam triangula constituere. & primum aequicrure. Sit igitur A B, in qua oportet aequicrure triangulum constituere. & describantur circuli, vt in aequilatero, producatur q; A B ex vtraque parte ad C D puncta. aequalis igitur est C B ipsi A D. quare centro quidem B, interuallo autem C B circulus C E describatur, & rursus centro A, & interuallo D A describatur circulus D E, & à puncto E, in quo se se circuli secant ad A B puncta ducantur E A E B. quoniam igitur E A aequalis est ipsi A D, & E B ipsi B C: aequalis autem A D ipsi B C: erit & E A ipsi E B aequalis. sed & maiores sunt quam A B. aequicrure igitur triangulum est A B E, quod facisse oportebat. At propositum sit scalenum constituere triangulum in data recta linea A B, & describantur circuli centris, interuallisq;, vt in superioribus, & sumatur in circumferentia circuli, A centrum habentis, punctum F, & ducta A F producatur ad G; & G B iungatur. quoniam*



Propositio, quæ ex dato & quæsito constat.

Expositio.

Determinatio.

Constructio.

Postulata constructionib⁹ utilia

Demonstratio.

Conclusio prima, & particularis.

Cõclusio uniuersalis.

Quod facisse oportebat.

Quod ostendisse oportebat.

Aequicruris trianguli cõstitutio.

Scaleni trianguli constitutio.

quoniam igitur A cẽtrum eſt circuli D E, erit A F ipſi A D aequalis. maior igitur eſt A G quàm A D, hoc eſt quàm G B. centrum enim eſt ipſum B circuli C E. ergo G B eſt aequalis B C, ac propterea G B quàm B A maior. at G A maior quàm G B. tres igitur C B B A A G inęquales ſunt. quare ſcalenum triangulum eſt. tria igitur triangula ſunt conſtituta. ſed hęc diuulgata ſunt.

Aequilaterũ triangulum unico modo cõſtituitur.

Illud vero in his pulchrum inuenitur. Triangulum ſcilicet aequilaterum vndequaque aequale exiſtens vnico modo conſtitui, Aequicrure autem in duobus tantum lateribus aequalitatem habens, conſtitui dupliciter; data namque recta linea, vel ambabus aequalibus minor eſt, vt nos poſuimus, vel maior: ſcalenum vero vndique inęquale exiſtens tripliciter conſtitui. vel enim data recta linea maxima eſt, vel minima trium, vel altera quidem maior, altera vero minor. & licet in vna quaque harum poſitionum vel protendenti, vel contrahenti ſe exercere. nobis autem quae ſunt expoſita ſufficiant. At ſi vniuerſe contemplabimur dicemus, problematum alia quidem ſimpliciter, alia vero multipliciter, & alia infinite conſtitui, & ea, quae ſimpliciter conſtituuntur (vt inquit amphinomus) ordinata appellantur, & quae conſtituuntur multipliciter, media, quae vero finite, inordinata vocantur. Vide reliqua apud Proclum, fortaſſe enim hęc ſatis ſuperq;.

Aequicrure dupliciter.

Scalenum tripliciter.

Problemata ordinata.


Media.

Inordinata.

PROBLEMA II. PROPOSITIO II.

Ad datum punctũ datæ rectæ lineę ęqualẽ rectam lineã ponere.

Sit datum quidem punctum A, data vero recta linea B C. oportet ad A punctum ipſi B C rectæ lineæ æqualem rectam lineam ponere. ducatur à puncto A ad B recta linea A B: et in ipſa conſtituatur triangulum ęquilaterum D A B, producanturq; in directum ipſis D A D B rectæ lineæ A E B F. et centro quidem B, interuallo autem B C circulus C G H deſcribatur. rurſuſq; centro D, et interuallo D G deſcribatur circulus G K L. Quoniam igitur punctum B cẽtrum eſt C G H circuli, erit B C ipſi B G æqualis. & rurſus quoniam D centrum eſt circuli G K L, erit D L æqualis D G: quarum D A eſt æqualis D B. reliqua igitur A L reliquę B G eſt æqualis. oſtenſa autẽ eſt B C æqualis B G. quare vtraque ipſarum A L B C eſt æqualis ipſi B G. quæ autem eidem æqualia ſunt, et inter ſe ſunt æqualia. ergo & A L eſt æqualis B C. ad datum igitur punctũ A datę rectę lineę B C ęqualis poſita eſt A L. quod facere oportebat.



Poſtul. 1.

Prima huius

Poſtul. 2.

Diffin. 15.

Com. no. 3.


Com. no. 1.

F. C. COMMENTARIVS.

Problematum, & theorematum alia quidem ſine caſu ſunt, alia vero multos habent caſus. quęcunque igitur eandem vim habent per plures deſcriptiones peruadentem, & poſitiones permutantia eandem demonſtrationis rationem ſeruant, hęc caſum habere dicuntur. quęcunque vero iuxta vnam duntaxat poſitionem, vnamq; conſtructionem procedunt, ea ſunt ſine caſu. ſimpliciter enim caſus circa conſtructionem tum theorematum, tum problematum conſideratur. ſecundum igitur problema multos habet caſus. datur autem in ipſo proiectum quidem poſitione, eo enim tantum modo dari poteſt; linea vero ſpecie, & magnitudine datur. quęritur autem rectae lineae aequalem rectam lineam ponere ad datum punctum, vbicunque ſitum fuerit, & conſtat omnino punctum illud in eo-


Problematum, & theorematum. alia ſunt ſine caſu, alia multos habent caſus.


Secundũ problema multos habet caſus.



dem

dem esse plano, in quo & recta linea, non autem in sublimi. omnibus si quidem planorum problematibus, & theorematibus vnum subijci planum existimare oportet. at vero huius problematis casus fieri iuxta puncti dati differentem positionem manifestum est. aut enim punctum extra rectam lineam ponitur, aut in ipsa. & siquidem in ipsa, vel in altero eius termino, vel intra terminos. si vero extra rectam lineam, vel à lateribus ponitur, ita vt ab eo ad terminum rectae lineae ducta angulum faciat; vel in directum ipsi siue à fronte, siue à tergo, ita vt producta linea ad dictum punctum pertineat. Euclides autem punctum datum extra rectam lineam sumpsit, atque à lateribus. si enim in ipsa, frustra duceretur à puncto A ad B recta linea, quippe quae iam ducta esset. at si in recta linea B C punctum sumatur inter B C, vel in directum ipsi, producta nimirum B C ad A, similiter in ipsa B A constituetur triangulum aequilaterum D A B: latera autem eodem protendentur modo, & demonstratio eadem erit. Quòd si loco trianguli aequilateri, aequicruri vti libeat, nihilo minus eadem sequentur. denique si punctum datum fuerit in altero rectae lineae termino, non opus erit neque triangulo, neque altero circulo, sed sola descriptio vnius circuli satis erit. centro enim dicto termino, in quo est punctum datum, interuallo autem reliquo, si circulus describatur, quot quot ab eo ad circumferentiam rectae lineae ductae fuerint, problema efficient.







Aequicruri triangulo proposito aequilatero vti licet.

PROBLEMA III.
PROPOSITIO III.

Duabus datis rectis lineis inæqualibus à maiori minori æqualem abscindere.



Sint datæ duæ rectæ lineæ inæquales A B C; quarum maior sit A B. oportet à maiori A B minori C æqualem rectam lineam abscindere. ponatur ad A punctum ipsi C æqualis recta linea A D: & centro quidem A, interuallo autem A D circulus describatur D E F. et quoniam A centrũ est D E F circuli, erit A E ipsi A D æqualis. sed & C est æqualis AD. vtraque igitur ipsarum A E C ipsi A D æqualis erit. Quare & A E ipsi C est æqualis. Duabus igitur datis rectis lineis inæqualibus A B C à maiori A B minori C æqualis Abscissa est A E. quod faciſſe oportebat.



Ex antecedente.

post. 3.

Com. no. 1.

THEOREMA. I. PROPOSITIO. IIII.

A Si duo triangula duo latera duobus lateribus æqualia habeant, alterum alteri; habeant autem et angulum angulo æqualem, qui æqualibus rectis lineis continetur: & baſim baſi æqualem habebunt; & triangulum triangulo æquale erit; et reliqui anguli reliquis angulis æquales, alter alteri; quibus æqualia latera ſubtenduntur.



Sint duo triangula A B C D E F, quæ duo latera A B A C duobus lateribus D E D F æqualia habeant, alterum alteri, videlicet latus quidem A B lateri D E æquale, latus vero A C ipſi D F; et angulum B A C angulo E D F æqualem. Dico & baſim B C baſi E F æqualem eſſe, et triangulum A B C æquale triangulo D E F, et reliquos angulos reliquis angulis æquales, alterum alteri; quibus æqualia latera ſubtenduntur; nempe angu-

B lum A B C angulo D E F: et angulum A C B angulo D F E. triangulo enim A B C congruente ipſi D E F, et puncto quidem A poſito in D, recta vero linea A B in ipſa D E: et punctum B puncto E congruet; quòd A B ipſi D E ſit æqualis. congruente autem A B ipſi D E; congruet & A C recta linea rectæ lineæ D F, cum angulus B A C ſit æqualis angulo E D F. quare et C congruet ipſi F: eſt enim rurſus recta linea A C æqualis rectæ D F. ſed et punctum B congruebat puncto E. ergo et baſis B C baſi E F congruet. nã ſi puncto quidẽ B congruẽte ipſi E, C vero ipſi F;

Com. ad 10 baſis B C baſi E F non congruit; duæ rectæ lineæ ſpacium comprehendent: quòd fieri non poteſt. congruet igitur B C baſis baſi E F, & ipſi æqualis erit. quare et totum A B C triangulum congruet toti triangulo D E F, et ipſi erit æquale; et reliqui anguli reliquis angulis congruent, et ipſis æquales erunt. videlicet angulus A B C angulo D E F, et angulus A C B angulo D F E. ſi igitur duo triangula duo latera duobus lateribus æqualia habeant, alterum alteri, habeant autem et angulũ angulo æqualem, qui æqualibus rectis lineis continetur: & baſim baſi æqualem habebunt; et triangulum triangulo æquale erit; et reliqui anguli reliquis angulis æquales, alter alteri; quibus æqualia latera ſubtenduntur: quod oſtẽdere oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

A Si duo triangula duo latera duobus lateribus æqualia habeant alterum alteri] *in hac propoſitione duo ſunt, quę dantur, videlicet duorum laterum æqualitas, & æqualitas eorum angulorum, qui æqualibus lateribus continentur. quae quidem proportione dari manifeſtum eſt. quęruntur autem tria, aequalitas baſium, aequalitas triangulorum, & aequalitas reliquorum angulorum. ſed quoniam fieri poteſt vt duo quidem latera duobus lateribus ſint aequalia, theorema autem verum non ſit, quòd non alterum alteri eſt aequale, ſed vtraque ſimul: propterea addidit, aequalia eſſe latera non ſimpliciter, ſed alterum alteri.*

B Triangulo enim A B C congruente ipſi D E F, et puncto quidem A poſito in D, recta vero linea A B in ipſa D E: et punctum B puncto E congruet, quòd A B ipſi D E ſit æqualis, et reliqua.


Demonſtratio per ſuperpoſitionẽ figurarũ mathematicis uſitata.

Hic demonſtrationis modus, qui fit per ſuperpoſitionem figurarum prętęrquam quod approbatur à Proclo mathematicarum ſcientiarum peritiſſimo, eſt etiam maximo vſui mathematicis. Archimedes enim eum vſurpat non ſolum in planis figuris, vt in libro de centro granitatis planorum, ſed etiam in ſolidis, vt in libro de conoidibus, & ſphęroidibus.

THEO-

THEOREMA II. PROPOSITIO. V.

Aequicrurium triangulorum qui ad baſim anguli inter ſe ſunt æquales: & productis æqualibus rectis lineis anguli qui ſunt ſub baſi inter ſe æquales erunt.



Sit æquicrure triangulum A B C; habens A B latus lateri A C æquale, et producantur indirectum ipſis A B A C rectæ lineæ B D C E. Dico angulum quidem A B C angulo A C B; angulum vero C B D angulo B C E æqualem eſſe. ſumatur enim in linea B D, quod vis punctum F: atque à maiori A E minori A F æqualis auferatur A G: iunganturq; F C, G B. Quoniam igitur A F quidem eſt æqualis A G; A B vero ipſi A C; duæ F A A C, duabus G A A B æquales ſunt, altera alteri; et angulum F A G communem continent. baſis igitur F C baſi G B eſt æqualis; et triangulum A F C æquale triangulo A G B; et reliqui anguli reliquis angulis æquales erunt, alter alteri; quibus æqualia latera ſubtenduntur: Videlicet angulus quidem A C F æqualis angulo A B G; angulus vero A F C; angulo A G B. Et quoniam tota A F, toti A G eſt æqualis; quarum A B eſt æqualis A C; erit et reliqua B F reliquæ C G æqualis. oſtenſa eſt autem F C æqualis G B. duæ igitur B F, F C duabus C G G B æquales ſunt, altera alteri; et angulus B F C æqualis angulo C G B: eſtq; baſis ipſorum B C communis. ergo et triangulum B F C triangulo C G B æquale erit; et reliqui anguli reliquis angulis æquales, alter alteri: quibus æqualia latera ſubtenduntur. angulus igitur F B C eſt æqualis angulo G C B: et angulus B C F angulo C B G. Itaque quoniam totus A B G angulus toti angulo A C F æqualis oſtenſus eſt, quorum angulus C B G eſt æqualis ipſi B C F: erit reliquus A B C reliquo A C B æqualis: et ſunt ad baſim A B C trianguli: oſtenſus autem eſt & F B C angulus æqualis angulo G C B; qui ſunt ſub baſi. æquicrurium igitur triangulorum, qui ad baſim anguli inter ſe ſunt æquales; et productis æqualibus rectis lineis anguli, qui ſunt ſub baſi inter ſe æquales erunt. quod oſtendiſſe oportebat.

3. Huius.

Ex præcedente.

Axioma. 3.

Ex præcedente.

Axioma. 3.

F. C. COMMENTARIVS.

Theorematum alia ſimplicia ſunt, alia compoſita. dico autem ſimplicia quæcunque iuxta poſitiones, & concluſiones indiuidua ſunt, vnum habentia datum, et vnum quæſitum. vt ſi Euclides ita dixiſſet. omne triangulum aequicrure aequales habet, qui ad baſim ſunt, angulos. compoſita verò ſunt, quae ex pluribus conſtantia, vel poſitiones habẽt compoſitas, vel concluſiones, vel etiam vtraſque. compoſitorum autem alia ſunt complexa, alia incomplexa. incomplexa ſunt quæcunque in ſimplicia theoremata diuidi non poſſunt, cuiuſmodi eſt quartum theorema; in eo enim & datum componitur, & quæſitum, ſed datum in ſimplicia diuidi minime poteſt, vt plura fiant theoremata: non enim ſi triangula aequales habeant angulos, vel eum duntaxat, qui eſt ad verticem, reliqua contingunt. complexa vero ſunt quæcunque in ſimplicia diuiduntur, vt illud theorema, Triangula, & parallelogramma quae eandem habent altitudinem inter ſe ſint, vt baſes. fieri enim poteſt, vt diuidentes ita dicamus. Triangula quae eandem habent altitudinem inter ſe ſunt, vt baſes; & in parallelogrammis ſimiliter. Omnium autem compoſitorum alia quidem iuxta concluſionem componuntur, ab eadem poſitione ortum habentia; alia vero iuxta poſitiones, & eandem omnibus concluſionem inferunt; & alia iuxta concluſiones, & poſitiones componuntur. Itaque iuxta concluſionem compoſitio eſt in quarto theoremate. in eo enim tria ſunt quae concluduntur, videlicet baſes aequales eſſe, & triangula aequalia, & reliquos angulos reliquis angulis aequales; quibus aequalia latera ſubtenduntur. iuxta poſitiones compoſitio inuenitur in theoremate, quod triangulis, & parallelogrammis, eandem habentibus altitudinem commune eſt. iuxta vtraſque autem in illo.

Theoremata ſimplicia.

Theoremata cõpoſita.

Compoſit. Theo. alia cõplexa, alia incomplexa.

Complexa theoremata.

Theorema compoſitũ iuxta concluſionem.

Theo. cõpo. iuxta poſitiones.


in illo. Diametri circulorum & ellipſium tum ſpacia, tum lineas ſpacia continentes bifariam diuidunt. Rurſus complexorum theorematum alia vniuerſalia ſunt, alia ex particularibus vniuerſale concludunt, omnino autem has compoſitiones geometrae ob breuitatem, ac reſolutiones excogitarunt. multa enim cum incompoſita ſint, non reſoluuntur: compoſita vero ſolum commoditates præbent ad reſolutionem, quae in principia tendit. his igitur conſideratis apparet quintum theorema compoſitum eſſe, tum iuxta datum, tum iuxta queſitum, & vtrumque eorum, quae componuntur perfectum eſt ac verum. quamobrem reſolutio quoque vera eſt in vtroque. ſiue enim qui ad baſim anguli, ſiue productis aequalibus rectis lineis anguli ſub baſi aequales ſint, aequicrure triangulum erit. Huius theorematis inuentor fuit Thales, vt refert Proclus. is enim primus dicitur animaduertiſſe omnis aequicruris angulos qui ad baſim eſſe aequales, ac more antiquorum aequales ſimiles appellaſſe.

Complexorum theorematũ alia, uniuerſalia, alia ex particularibus uniuerſale cõcludunt.

Thales quinti Theorematis inuẽtor.

THEOREMA III. PROPO. VI.

Si trianguli duo anguli inter ſe ſint æquales, et æquales angulos ſubtendentia latera inter ſe æqualia erunt.



Sit triangulum A B C, habens angulum A B C angulo A C B æqualem. Dico et A B latus lateri A C æquale eſſe; ſi enim inæqualis eſt A B ipſi A C; altera ipſarum eſt maior. ſit maior A B; atque à maiori A B minori A C æqualis auferatur D B; et D C iungatur. Quoniam igitur D B eſt æqualis ipſi A E; communis autem B C: erunt duæ D B B C duabus A C C B æquales, altera alteri; et angulus D B C æqualis angulo A C B. baſis igitur D C baſi A B eſt æqualis; et triangulum D B C æquale triangulo A C B, minus maiori; quod eſt abſurdum. non igitur inæqualis eſt A B ipſi A C. ergo æqualis erit. Si igitur trianguli duo anguli inter ſe ſint æquales, et æquales angulos ſubtendentia latera inter ſe æqualia erunt: quod demonſtraſſe oportuit.

3. huius.

4. huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Præſens theorema duo hęc in primis oſtendit, theorematum ſcilicet conuerſionem, & deductionem ad id, quod fieri non poteſt. conuertitur enim precedenti theoremati, & per deductionem ad id, quod fieri non poteſt, demonſtratur. conuerſio autem apud Geometras proprie dicitur, quando concluſiones, & poſitiones viciſſim in theorematibus tranſmutantur, & quod prioris eſt concluſio, in poſteriori poſitio fit: & contra poſitio tanquam concluſio infertur. vt in illo, Aequicrurium triangulorum, qui ad baſim anguli æquales ſunt, poſitio quidem eſt aequicrure triangulum: concluſio autem triangulorum, qui ad baſim ſunt, aequalitas. Et quorum anguli qui ad baſim aequales; ea aequicruria ſunt, vt in hoc theoremate, in quo poſitio quidem eſt, angulorum, qui ab baſim, aequalitas; concluſio autem aequalitas laterum, quae aequalibus angulis ſubtenduntur. eſt etiam alia conuerſio iuxta quandam duntaxat compoſitorum tranſmutationẽ. Si enim ſit theorema compoſitum à pluribus poſitionibus incipiens, & in concluſionem deſinens, ſumentes concluſionem, & vnam ex poſitionibus, vel etiam plures; concluſionem faciunt aliquã reliquarum poſitionum. & hoc modo quarto theoremati octauum conuertitur. In illo enim ponuntur quidem duo latera aequalia; & angulus angulo aequalis, qui aequalibus lateribus continetur: cõcluditur aũt baſim baſi aequalẽ eſſe. At in octauo ponuntur duo latera aequalia; baſis baſi aequalis: & concluditur angulum, qui aequalibus lateribus continetur, aequalem eſſe. Cum igitur duae ſint conuerſiones, ea quae proprie ſic dicitur, vniformis eſt, & determinata; altera vero varia, & non in vno, ſed in multis conuertens ob multitudinem poſitionum, quae in compoſitis theorematibus ſunt. Theorematum vero, quae conuertuntur, alia precedentia vocare conſueuerunt; alia conuerſa. Cum enim genus quoddam ponentes, aliquod de ipſo ſymptoma demõſtrãt, hoc precedens appellatur: & cum è contrario poſitionem quidem faciunt ſymptoma; concluſionẽ vero genus, cui illud accidit, conuerſum vocatur. vt omne triangulum aequicrure angulos qui ad

Hoc theorema præcedẽti cõuertitur

Conuerſio apud Geometras quæ proprie dicatur.

Conuerſio alia.

Quarto octauum conuertitur.

Theorematũ q̃ cõuertũtur, alia precedentia sũt alia cõuerſa.

ad baſim ſint, aequales habet. hoc præcedens eſt. Omne triangulum duos angulos aequales habẽs, latera quoque aequales angulos ſubtendentia habet aequalia, & eſt aequicrure. hoc cõuerſum eſt. & hęc de cõuerſionibus geometricis dicta ſufficiant. deductiones vero id, quod fieri non põt, in cui dens abſurdum deſinunt, & cuius oppoſitã omnes fatentur. accidit autem ipſarũ alias deſinere in ea, quae cõmunibus notionibus, vel poſtulatis, vel poſitionibus opponũtur; alias in ea, quae prius demonſtratis contradicunt. Nam ſextum hoc theorema, quod accidit fieri non poſſe oſtendit, cum deſtruat communem notionem illam: Omne totum eſt maius ſua parte. octauum vero deſinit quidem in id, quod fieri non poteſt; non tamen deſtruit communem notionem, ſed id quod per ſeptimum theorema oſtenſum eſt. quod enim ſeptimum fieri poſſe negauit, hoc illud affirmans conſe qui oſtendit ijs, qui quęſitum non concedunt. omnis autem deductio ad id, quod fieri non poteſt, ſu mens quod cum quęſito pugnat, & hoc ponens progreditur, donec euidenti abſurdo occurat, perq; illud poſitionem deſtruens, cõfirmat id quod à principio quærebatur. omnino enim ſcire oportet ma thematicas probationes omnes vel à principijs eſſe, vel ad principia: vt etiã inquit Porphyrius. & quae à principijs ſunt, itidem duplices eſſe. aut enim ex cõmunibus notionibus, & ſola euiden tia per ſe fidem faciente emanant; aut ex ijs, quae ante oſtenſa fuere. Quae vero ad principia aut principia ponunt, aut deſtruunt. quae principia ponunt reſolutiones vocantur; atque his opponun tur compoſitiones. fieri enim poteſt, vt à principijs illis ad quęſitum ordinate procedamus, & hoc nihil aliud eſt, niſi compoſitio. quae vero principia deſtruunt, deductiones ad id, quod fieri non po teſt nuncupantur. aliquid enim eorum, quae conceſſa, manifeſtaq; ſunt deſtruere huius ipſius viae munus eſt: atque eſt hac ſyllogiſmus quidam, ſed non idem, qui in reſolutione. Nam in deductioni bus ad id, quod fieri non poteſt iuxta ſecundum hypotheticarum ratiocinationum modum comple xio eſt. vt ſi triangulorum aequales angulos habentium latera aequales illos angulos ſubtenden tia aequalia non ſint; totum parti eſt aequale. atqui hoc fieri non poteſt. triangulorum igitur duos angulos aequales habentium latera quoque aequales angulos ſubtendentia aequalia erunt. Vtitur autem Euclides conuerſione quidem in propoſitione ipſa; vtpote qui concluſionem quinti theore tis, vt datum accipiens, poſitionem illius adiunxit, vt quęſitum; deductione autem ad id, quod fie ri non poteſt in conſtructione, & demonſtratione vtitur. hęc ex Proclo.


Deductiones ad id, qđ fieri non poteſt in cui dens abſurdũ deſinunt.

Mathematicæ probationes uel a prĩcipijs sũt uel ad principia. Reſolutiones. Compoſitiones.

Deductiones ad id, ꝙ fieri non poteſt.

THEOREMA. IIII. PROPOSITIO. VII.

In eadem recta linea, duabus eiſdem rectis lineis aliæ duæ rectæ lineæ æquales, altera alteri non conſtituentur ad aliud, atque aliud punctum, ad eaſdem partes, eoſdem, quos primæ rectæ lineæ, terminos habentes.



Si enim fieri poteſt, in eadem recta linea A B duabus eiſdem rectis lineis A C C B aliæ duæ rectæ lineæ A D D B æquales, altera alteri conſtituantur ad aliud, atque aliud punctum C D; ad eaſdem partes vt ad C D, eoſdem habentes terminos A B, quos primæ rectæ lineæ; ita vt C A quidem ſit æqualis D A, eundem, quem ipſa terminum, habens A; C B vero ſit æqualis D B, eundem habens B terminum; & C D iungatur. Itaque quoniam A C eſt æqualis A D; erit et angulus A C D angulo A D C æqualis. maior igitur eſt A D C angulus angulo D C B. quare angulus C D B angulo D C B multo maior erit. Rurſus quoniam C B eſt æqualis D B; et angulus C D B æqualis erit angulo D C B: oſtenſus autem eſt ipſo multo maior; quod fieri non poteſt. Non igitur in eadem recta linea duabus eiſdem rectis lineis aliæ duæ rectæ lineæ æquales, altera alteri conſtituentur ad aliud, atque aliud punctum, ad eaſdem partes, eoſdem, quos primę rectæ lineæ, terminos habentes; quod oſtendiſſe oportebat. 5. huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Hoc Theorema rarum quiddam habet; quod haud frequenter propoſitionibus, quae ſcientiam pariunt

Propoſitiones theorematum geometricorũ, arithmeticorũq; ut plurimũ affirmationes sunt.

pariunt euenire conſueuit. per negationem enim, & non per affirmationem formari haud quaquam ipſarum proprium eſt, cum propoſitiones geometricorum, arithmeticorumq; theorematum magna ex parte affirmationes ſint. Cauſſa autem eſt (vt inquit Ariſtoteles) quod vniuerſale affirmans ſcientijs maxime conuenit, tanquam magis idoneum, & non indigens negatione. at vniuerſale negans etiam affirmatione indiget. ex negantibus enim tantum neque demonſtratio, neque ratiocinatio aliqua conſtat: ac propterea demonſtrantes ſcientiae plurima affirmantia oſtendunt: raro autem negantibus concluſionibus utuntur. hęc Proclus.

Theorematis uarij caſus.

Theorema uero multos habet caſus. Nam punctum D vel cadit extra lineas A C C B, vel intra, vel in ipſis. & ſiquidem extra, hoc duobus modis fit; aut enim altera linearum A C C B ſecat alteram ipſarum A D D E, aut neutra neutram ſecat. cadat primum extra, ſecetq; A D ipſam C B, vt apparet in prima figura, & iungatur C D. cui quidem conſtructioni Euclidis demonſtratio conuenit. Sed cum ea breuis, & quodammodo obſcura quibuſdam viſa ſit, planius, & apertius ſic explicabitur. Itaque quoniam A C eſt aequalis ipſi A D,

5. huius.

erit angulus A C D angulo A D C aequalis. angulus autem A C D

9 com. not.


maior eſt angulo D C B; quippe quòd totum maius ſit ſua parte. angulus igitur A D C angulo D C B eſt maior. Sed C D B angulus eadem ratione maior eſt angulo A D C. Quare angulus C D B angulo D C B multo maior ſit neceſſe eſt. Rurſus quoniam B C eſt aequalis E D; erit & angulus C D B aequalis angulo D C B. atqui oſtenſus eſt multo maior; quod fieri non poteſt. ſimiliter demonſtrabitur idem ſequi abſurdum ſi recta linea B D ſecet ipſam A C. cadat deinde punctum D extra lineas A C C B, ita vt neutra neutram ſecet; & producantur rectae linae A C A D in puncta E F. Quoniam


5. huius.


igitur A C eſt aequalis A D, angulus A C D ad baſim angulo A D C aequalis erit; & productis A C A D, erit angulus F D C ſub baſi aequalis angulo D C E. Rurſus cum B C ſit aequalis ipſi B D, angulus B C D angulo B D C eſt aequalis. ſed F D C angulus maior eſt angulo C D B. quare & D C E ipſo D C B eſt maior, pars ſcilicet toto; quod fieri non poteſt. Non aliter demonſtrabimus ſequi abſurdum, ſi punctum D intra dictas lineas cadere ponatur. denique in ipſis cadere non poſſe manifeſto conſtat. totum enim parti eſſet aequale. Videtur autem hoc, ut inquit Proclus,

Theorema hoc ſequentis lemma eſſe uidetur.

lemma eſſe octaui Theorematis: ſiquidem ad illius demonſtrationem confert, & neque ſimpliciter elementum eſt, neque elementare: non enim ad plura ſuam extendit vtilitatem. rariſſimum igitur ipſius vſum apud geometram inueniemus.








THEOREMA V. PROPOSITIO VIII.

Si duo triangula duo latera duobus lateribus æqualia habeant, alterũ alteri; habeant autem, et baſim baſi æqualẽ: angulũ quoque, qui æqualibus lateribus continetur angulo æqualẽ habebunt.

Sint duo triangula A B C, D E F, quæ duo latera A B, A C duobus lateribus D E D F æqualia habeant alterum alteri; vt ſit A B quidẽ æquale D E; A C uero ipſi D F: habeant autem et baſim B C baſi E F æqua-



lem. Dico

lem. Dico angulum quoque B A C angulo E D F æqualem esse. Triangulo enim A B C congruente ipsi D E F triangulo; et puncto quidem B posito in E; recta vero linea B C in E F: congruet, et C punctum puncto F, quoniam B C ipsi E F est æqualis. Itaque congruente B C ipsi E F; congruent et B A A C ipsis E D D F, si enim basis quidem B C basi E F congruit; latera autem B A A C lateribus E D D F non congruunt, sed permutantur; vt E G G F: constituentur in eadem recta linea, duabus eisdem rectis lineis, aliæ duæ rectæ lineæ æquales, altera alteri; ad aliud atque aliud punctum; ad easdem partes; eosdem habentes terminos. non constituuntur autem; vt demonstratum est. non igitur, si basis B C congruit basi E F, non congruent et B A A C latera lateribus E D D F. congruent igitur. Quare et angulus B A C angulo E D F congruet, et ipsi erit æqualis. Si igitur duo triangula duo latera duobus lateribus æqualia habeant, alterum alteri; habeant autem et basim basi æqualem: angulum quoque æqualibus lateribus contentum angulo æqualem habebunt: quod demonstrare oportebat.

In antecedente.

F. C. COMMENTARIVS.

Octauum Theorema quarti conuersum est, vt supra diximus, non tamen iuxta propriam conuersionem, non enim totam illius positionem, conclusionem, totamq́, conclusionem positionem facit. Sed aliquam quidem ex positionibus, aliquam vero ex conclusionibus quarti theorematis contexens, vnum quid eorum, quae in illo data fuerunt, ostendit.


Octauum Theorema quarti conuersum est.

PROBLEMA IIII. PROPOSITIO IX.

Datum angulum rectilineum bifariam secare.

A

Sit datus angulus rectilineus B A C. Itaque oportet ipsum bifariā secare. Sumatur in linea A B quod vis punctum D; & à linea A C ipsi A D æqualis auferatur A E; iunctaq́; D E constituatur in ea triangulum æquilaterum D E F; & A F iungatur. Dico angulum B A C à recta linea A F bifariam secari. Quoniam enim A D est æqualis A E; communis autem A F: duæ D A A F duabus E A A F æquales sunt, altera alteri; & basis D F æqualis basi E F. angulus igitur D A F angulo E A F est æqualis. Quare datus angulus rectilineus B A C à recta linea A F bifariam sectus est: quod facere oportebat.



3. huius.

B

1. huius.

Ex antecedente.

F. C. COMMENTARIVS.

A

Datum angulum rectilineum bifariam secare] *Angulus hoc loco specie datur, quippe qui rectilineus sit, & non quilibet. namque angulum omnē bifariam secare ex elementari institutione non licet; quandoquidem ambiguum etiam est, num omnis angulus bifariam secari possit. Sectionis autem ratio non ab re distincta fuit: in quamlibet enim proportionem secare præsentem constructionem trāsgreditur, verbi gratia in tres, vel quattuor, vel quinque partes aequales. nam rectum quidem angulum trifariam secare possumus, paucis eorum, quae posterius tradentur, vtentes: acutū vero minime, nisi ad alias lineas, quae mixtae sunt, transcendamus. Datum enim angulum rectilineum trifariam secare docuit Nicomedes ex conchoidibus. alij vero ex alijs lineis mixtis idem fecerunt, nimirū ijs, quae à græcis τετραγωνίζουσαι dicūtur, nos quadrātes appellare possumus. alij ex lineis conicis, vt Pappus tradit in quarto libro collectionum mathematicarum. alij denique ex lineis spiralibus, de quibus Archimedes, incitati in datam proportionem datum angulum rectilineum secuerunt. Quorum contemplationes cum difficiles sint, præsertim ijs qui instituuntur, in præsentia omittemus.*

Omnem angulum bifariam secare ex elementari institutione non licet. Rectum angulum trifariam secare possumus, acutū uero minime, nisi ad lineas mixtas transcendamus.

Iunctaq́; D E constituetur in ea triangulum æquilaterum D E F.

B

Idem

Loco æquilateri trianguli æquicrure constituti potest.


Idem etiam sequetur si loco aequilateri tum in hoc, tum in sequentibus aequicrure triangulum constituamus, & demonstratio eadem erit.

PROBLEMA V. PROPOSITIO X.

Datam rectam lineam terminatam bifariam secare.

1. huius. Ex antecedente.

Sit data recta linea terminata A B. oportet ipsam A B bifariam secare. constituatur in ea triangulum æquilaterum A B C; & secetur A C B angulus bifariam recta linea C D. Dico A B rectam lineam in puncto D bifariam secari. Quoniam enim A C est æqualis C B; communis autem C D; duæ A C C D duabus B C C D æquales sunt; altera alteri: et angulus A C D æqualis angulo B C D. basis igitur A D basi B D est æqualis. et ob id recta linea terminata A B bifariam secta est in puncto D: quod facere oportebat.




4. huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Hoc etiam Theorema est, quod rectam lineam terminatam ponit. Si quidem ex vtraque parte infinitam terminare non possumus. Infinitae vero ex altera parte tantum, vbicunque punctum accipiatur, in partes inequales fit sectio. etenim quae in eisdem partibus est, in quibus recta linea infinita existit, reliqua finita existente necessario est maior. relinquitur igitur, vt ex vtraque parte finita accipiatur, quae bifariam secari debet. Apollonius vero Pergeus rectam lineam terminatam bifariam secat in hūc modum. Sit, inquit, recta linea terminata A B, quam bifariam secare debemus. & centro quidem A, interuallo autem A B circulus describatur: & rursus centro B, & interuallo B A describatur alius circulus; & ducatur C D communes circulorum sectiones coniungens, quae rectam lineam A B bifariam secabit. Iungantur enim A C C B, quae inter se aequales sunt, cum vtraque ipsi A B sit aequalis. communis autem C D; & D A est aequalis D B ob eandem causam. angulus igitur A C D est aequalis angulo B C D. quare A B per quartum bifariam secta est.

Rectā lineā terminatam quō Apollonius bifariā secat.



PROBLEMA VI. PROPOSITIO XI.

Datæ rectæ lineę à pūcto in ipsa dato ad rectos angulos rectam lineam ducere.


Sit data recta linea A B, et datum in ipsa pūctum C. oportet à puncto C ipsi A B ad rectos angulos rectam lineam ducere. Sumatur in A C quoduis punctum D: ipsiq; C D æqualis ponatur C E, et in D E constituatur triangulū æquilaterum F D E, et E F iungatur. Dico datæ rectę lineę A B à puncto C in ipsa dato, ad rectos angulos ductam esse F C. Quoniam enim D C est æqualis C E, et F C communis; erunt duæ D C C F duabus E C C F æquales, altera alteri: et basis D F est æqualis basi F E. angulus igitur D C F angulo E C F est æqualis: et sunt deinceps. Quando autem recta linea super rectam lineam insistens, eos qui deinceps sunt, angulos æquales inter se fecerit: rectus est vterque æqualium angulorum. ergo vterque ipsorum D C F F C E est

11. a.

1. huius.

8. huius.


Diffi. 10.



est rectus. datæ igitur rectæ lineę A B à puncto in ipsa dato C ad rectos angulos ducta est F C recta linea. quod fecisse oportuit.

F. C. COMMENTARIVS.

Datæ rectæ lineę à puncto in ipsa dato.] *linea specie datur; punctum vero positione: quod vel in medio erit rectae linae, vel in altera eius extremitate. Euclides in medio rectae linae sumpsit. Quòd si in extremitate altera sumatur, vel ipsam producentes, reliqua eodem modo construemus; vel aliter propositum assequemur. Appollonius autem rectam lineam ad rectos angulos ducit hoc pacto. Sit data quidem recta linea A B, datum vero in ea punctum C, & in linea A C sumpto quouis puncto D, ab ipsa C B auferatur C E aequalis ipsi C D: & centro quidem D, interuallo autem D E circulus describatur. Rursusq; centro E, & interuallo E D alius circulus describatur: & à puncto F, in quo circuli se inuicem secant, ducatur F C. Dico eam ad rectos angulos esse. si enim iungatur F D, F E aequales inter se erunt. sed & D C C E aequales; & cõmunis F C. Quare ex octauo anguli qui ad C etiam inter se aequales sint necesse est. Si vero punctum in extremitate rectae lineae sumatur, ita faciendum censet Proclus. Sit recta linea A B, datumq; punctum A, & sumatur in A B quod vis punctum C, à quo ipsi A B, quemadmodum nos docuit, ad rectos angulos ducatur C E: & ab ea ipsi A C aequalis abscindatur C D, angulus vero qui est ad C per rectam lineam C F bifariam secetur: atque à puncto D ipsi E C ad rectos angulos ducta occurat rectae lineae C F in F puncto; & F A iungatur. Dico angulum, qui ad A rectum esse. Quoniam enim D C est aequalis C A, communis autem C F, & angulos aequales continent, quòd angulus ad C bifariam sectus est: erit & D F ipsi F A aequalis, & omnia similiter per quartum theorema omnibus aequalia. quare & angulus ad A aequalis est angulo ad D. angulus igitur ad A rectus erit; quod facere oportebat.*




✻ Problematis casus.

Qũo Apollonius rectã lineam ad rectos angulos ducit.

3.huius.

Postul.3.




Quãdo pũctum in extremitate lineæ sumitur qũo faciẽdum sit.
3.huius.
9.huius.

4.huius.

PROBLEMA VII. PROPOSITIO XII.

Super datam rectam lineam infinitam, à dato pũcto, quod in ea non est, perpendicularem rectam lineam ducere.

Sit data quidem recta linea infinita A B, datum vero punctum C, quod in ea uon est. oportet super datam rectam lineam infinitam A B, à dato puncto C, quod in ea non est, perpendicularem rectam lineam ducere. Sumatur enim ad alteras partes ipsius A B rectæ lineę quod vis punctum D: et centro quidem C, interuallo autem C D circulus describatur E F G: et E G in H bifariam secetur: iunganturq; C G C H C E. Dico super datam rectam lineam infinitam A B, à dato puncto C; quod in ea non est, perpendicularem C H ductam esse. Quoniam enim æqualis est G H ipsi H E, communis autem H C, duę G H H C, duabus E H H C æquales sunt, altera alteri; & basis C G est æqualis basi C E.



Postul.3.
10.huius.

D angulus

8.huius. angulus igitur CHG angulo EHC est æqualis; & sunt deinceps. cum autem recta linea super rectam lineam insistens eos, qui deinceps sunt angulos, æquales inter se fecerit; rectus est vterque æqualium angulorum; et quę insistit recta linea perpendicularis appellatur ad eam, cui insistit. ergo super datam rectam lineam infinitam AB à dato puncto C, quod in ea non est, perpendicularis ducta est CH, quod facere oportebat.

Diffi.10.

F. C. COMMENTARIVS.

Oenopides hoc problema inuenit.


Hoc problema, vt refert Proclus, Oenopides primus indagauit, vtile ipsum ad astrologiam existimans. perpendicularem vero antiquorum more, gnomonem appellat, quoniam & gnomon horizonti ad angulos rectos est. quae autem ad angulos rectos, eadem est perpendicularis, habitudine tantum ab ea differens, cum subiecto eadem sit, quemadmodum et gnomon. Rursus perpendicularis duplex est, alia plana, alia solida. quando enim punctum, à quo perpendicularis recta linea ducitur in subiecto plano sit, plana appellatur: quando autem punctum sit sublime, atque extra subiectum planum, solida. & plana quidem ad rectam lineam ducitur, solida vero ad planum. Quare necessarium est illam non ad vnam rectam lineam angulos rectos facere, sed ad omnes, quae in subiecto existentes plano ipsam contingunt. In hoc igitur problemate Euclides perpendicularem planam ducere proponit, quippe cum ad rectam lineam ducatur: & quatenus in vno plano omnia consistant, sermo procedat. At in linea quae est ad angulos rectos quoniam punctum in ipsa sumptum est, nulla erit infinitatis necessitas: datam vero rectam lineam infinitam ponit, cum punctum, à quo perpendicularis duci debet, extra ipsam statuatur. si enim non esset infinita, poterat ita punctum sumi; vt extra quidem rectam lineam esset, indirectum autem ipsi, adeo vt protracta recta linea in ipsum incideret, & non fieret problema. Adde, quod nisi esset infinita, possemus etiam punctum ita sumere, vt si duceretur perpendicularis, non in ipsam, sed extra ipsam necessario caderet. His igitur de caussis recta linea, ad quam perpendicularis ducēda est, infinita ponitur.

Perpendicularē antiqui gnomonem appellarunt.

Perpendicularis plana, & solida.

THEOREMA VI. PROPOSITIO XIII.

* Cum recta linea super rectam cōsistens lineam angulos fecerit, vel duos rectos, vel duobus rectis æquales efficiet.



Recta enim linea quædam AB super rectam CD consistens angulos faciat CBA ABD. Dico CBA ABD angulos; vel duos rectos esse, vel duobus rectis æquales. si enim CBA est æqualis ipsi ABD, duo recti sunt; sin minus, ducatur à puncto B ipsi CD ad rectos angulos BE. anguli igitur CBE EBD sunt duo recti. Et quoniam CBE, duobus CBA ABE est æqualis, communis apponatur EBD. ergo anguli CBE EBD tribus angulis CBA ABE EBD sunt æquales. Rursus quoniam DBA angulus est æqualis duobus DBE EBA, communis apponatur ABC. anguli igitur DBA ABC tribus DBE EBA ABC æquales sunt. At ostensum est angulos quoque CBE EBD eisdem tribus æquales esse: quę vero eidem sunt æqualia, et inter se æqualia sunt. ergo et anguli CBE EBD ipsis DBA ABC sunt æquales. suntq; CBE EBD duo recti. anguli igitur DBA ABC duobus rectis æquales erunt. ergo cum recta linea super rectam lineam consistens angulos fecerit, vel duos rectos, vel duobus rectis æquales efficiet. quod oportebat demonstrare.

diffi.10.

Axioma.1.

F. C. COMMENTARIVS.


* Cum recta linea super rectam lineam consistens angulos fecerit.] *Animaduertendum est, vt inquit Proclus, Euclidem in hac propositione maximam diligentiam adhibuisse. non enim*

enim ſimpliciter dixit. Omnis recta linea ſuper rectã lineã conſiſtẽs, vel duos rectos facit, vel duobus rectis aequales, ſed ſi angulos fecerit. quid enim ſi in rectae lineae extremitate cõſiſtens vnum efficit angulum? accidit ne quandoque hunc duobus rectis aequalem eſſe? hoc certe fieri non poteſt. Omnis ſi quidem rectilineus angulus duobus rectis eſt minor, quemadmodum omnis ſolidus minor eſt quattuor rectis. Quòd ſi angulum, qui maxime obtuſus eſſe videatur, accipias, hunc quoque augebis, tanquam eum qui duorum rectorum menſuram adhuc non recipit. Oportet igitur rectam lineam ſic conſiſtere, vt angulos efficiat.

Omnis angulus rectilineus duobus rectis eſt minor.

THEOREMA VII. PROPO. XIIII.

Si ad aliquam rectam lineam, atque ad punctum in ea duę rectę lineæ non ad eaſdem partes poſitę, angulos qui deinceps ſunt, duobus rectis ęquales fecerint; ipſę rectæ lineæ indirectum ſibi inuicem erunt.



Ad aliquam enim rectam lineam A B, atque ad punctum in ea B, duę rectę lineę B C B D non ad eaſdem partes poſitę angulos, qui deinceps ſunt, A B C A B D duobus rectis ęquales faciant. Dico B D ipſi C B indirectũ eſſe. ſi enim B D non eſt in directũ ipſi C B, ſit ipſi C B in directum B E. Quoniã igitur recta linea A B ſuper rectam C B E conſiſtit; anguli A B C A B E duobus rectis ſunt ęquales. Sed et anguli A B C A B D ſunt ęquales duobus rectis. anguli igitur C B A A B E ipſis C B A A B D ęquales erunt. cõis auferatur A B C. ergo reliquus A B E reliquo A B D eſt ęqualis, minor maiori, quod fieri non põt. non igitur B E eſt indirectũ ipſi B C. Similiter oſtendemus neque aliam quampiam eſſe, prętęr B D. ergo C B ipſi B D indirectum erit. Si igitur ad aliquam rectam lineam, atque ad punctum in ea duę rectę lineę non ad eaſdem partes poſitę angulos, qui deinceps ſunt, duobus rectis ęquales fecerint, ipſę rectę lineę indirectum ſibi inuicem erunt. quod demonſtrare oportebat.

Ex antecedente.

F. C. COMMENTARIVS.

Hoc Theorema prȩcedentis conuerſum eſt, & per deductionem ad id, quod fieri non poteſt, oſtenditur. ſic enim conuerſa theorematum oſtendi debent, vt inquit Proclus.

Conuerſa theoremata per deductiõnẽ ad id, qđ fieri nõ põt, oſtendũtur.

THEOREMA. VIII. PROPOSITIO. XV.

Si duę rectę lineæ ſe inuicem ſecuerint, angulos qui ad uerticẽ ſunt, inter ſe ęquales efficient.



Duæ enim rectæ lineæ A B C D ſe inuicem ſecent in puncto E. Dico angulum quidem A E C angulo D E B; angulum vero C E B angulo A E D æqualem eſſe. Quoniam enim recta linea A E ſuper rectã C D conſiſtens angulos facit C E A A E D; erunt hi duobus rectis æquales. Rurſus quoniam recta linea D C ſuper rectam A B cõſiſtens facit angulos A E D D E B; erunt A E D D E B anguli æquales duobus rectis. Oſtenſum autẽ eſt angulos quoque C E A A E D duobus rectis eſſe æquales. anguli igitur C E A A E D angulis A E D D E B æquales ſunt. communis auferatur A E D. ergo reliquus C E A reliquo B E D eſt

13. huius.

1. com. not.

æqualis. Simili ratione, & anguli C E B D E A æquales oſtendentur. Si igitur duę rectæ lineæ ſe inuicem ſecuerint, angulos, qui ad verticem ſunt, æquales efficient. quod oſtendere oportebat.

COROLLARIVM.

* Ex hoc manifeſte conſtat rectas lineas quot quot ſe inuicem ſecant, facere angulos ad ſectionem quattuor rectis æquales.

F. C. COMMENTARIVS.

Anguli deinceps. Anguli ad uerticem.

Anguli qui deinceps ſunt ab angulis, qui ad verticem, differunt; horum enim ortus ex duarum rectarum ſectione fit; illorũ uero ex altera tãtũ ab altera ſecta. Nã ſi recta linea ipſa inſecta manẽs, alteramq; ſuo extremo ſecãs, duos angulos fecerit; hos deinceps angulos vocamus. Si uero duae rectae linae, ſe inuicẽ ſecuerint, anguli ad uerticẽ efficiuntur, ſic dicti, quòd vertices in eodẽ puncto coniunctos habeant. Vertices autem ipſorum ſunt puncta, ad quae plana dum contrahuntur, angulos efficiunt. Itaque hoc theorema oſtendit duabus rectis lineis ſe inuicem ſecantibus, angulos ad verticem aequales eſſe: inuentum quidem à Thalete primo, vt inquit Eudemus, ab Euclide vero demonſtratum; in quo deeſt conſtructio, vtpote minus neceſſaria: demonſtratio enim expoſitione contenta conſtructione aliqua non indiget.


Angulorum uertices. Theorema a Thalete inuentũ.

* Corollaria quæ nã ſint in elementari inſtitutione.

Ex hoc manifeſtum eſt.] *Corollarium eſt quod ex precedenti demõſtratione apparet. corollaria enim in elementari inſtitutione ſunt, vt inquit Proclus, quae ſimul cum aliorum demonſtrationibus apparent, ipſa vero non precipue quęruntur: veluti id quod in preſentia propoſitum eſt, nam quęrebatur quidem ſi duabus rectis lineis ſe inuicem ſecantibus, anguli ad verticem ęquales eſſent. dum autem hoc oſtenditur, ſimul etiam oſtẽſum eſt, quattuor, qui fiunt, angulos, quattuor rectis aequales eſſe. Corollarium igitur eſt theorema, quod ex alterius problematis, uel theorematis demonſtratione ex improuiſo emergit. nam ueluti caſu quodam in corollaria incidere uidemur, neque enim proponentibus nobis, neque etiam quęrentibus obuiam ſe ſe offerunt. Corollariorum uero alia geometrica ſunt, alia arithmetica, & rurſus alia problematibus conſequentia ſunt, alia theorematibus; & alia directis oſtenſionibus, alia deductionibus ad id, quod fieri non poteſt, oſtẽduntur. Huius autem theorematis conuerſum à Pròclo ita demonſtratur.*

Corollaria geometrica, et arithmet. Huius theorematis conuerſũ a Proclo demonſtratur.

Si ad aliquam rectam lineam duæ rectæ lineæ non ad eaſdem partes ſumptæ angulos ad uerticem æquales fecerint, ipſæ rectæ lineæ indirectũ ſibi inuicem erunt.



Sit enim recta linea quędam A B, & in ipſa quod vis punctum C; & ad C duae rectae lineae C D C E non ad eaſdẽ partes ſumptae, quae angulos A C D B C E aequales faciant. Dico ipſas C D C E in directum ſibi ipſis eſſe. Quoniam enim recta linea C D ſuper rectam lineã A B inſiſtit, duos angulos duobus rectis efficit aequales; videlicet D C A D C B. Sed angulus D C A angulo B C E eſt aequalis. anguli igitur D C B B C E duobus rectis aequales ſunt. Itaque quoniam ad aliquam rectam lineam B C duae rectae lineae conſequenter C D C E non ad eaſdem partes ſumptae, angulos deinceps duobus rectis aequales efficiunt: indirectum ſibi inuicem erunt.


13. huius.

14. huius.

THEOREMA IX. PROPOSITIO XVI.

Omnis trianguli vno latere producto exterior angulus vtroque interiore, & oppoſito eſt maior.

Sit triangulum A B C, et vnum ipsius latus B C ad D producatur. Dico exteriorem angulum A C D vtroque interiore, et opposito, videlicet C B A et B A C maiorem esse. Secetur enim A C bifariam in E, et iuncta B E producatur ad F; ponaturq; ipsi B E æqualis E F. iungatur præterea F C, et ducta A C ad G producatur. Quoniam igitur A E quidem est æqualis E C, B E vero ipsi E F, duæ A E E B duabus C E E F æquales sunt, altera alteri: et angulus A E B angulo F E C est æqualis, ad verticem enim sunt. basis igitur A B æqualis est basi F C; et A B E triangulum triangulo F E C, et reliqui anguli reliquis angulis æquales, alter alteri, quibus æqualia latera subtenduntur. ergo angulus B A E est æqualis angulo E C F. Sed E C D angulus maior est ipso E C F. maior igitur est angulus A C D angulo B A E. Similiter recta linea B C bifariam secta, ostendetur etiã B C G angulus, hoc est A C D angulo A B C maior. Omnis igitur trianguli vno latere producto exterior angulus vtroque interiore et opposito maior est, quod oportebat demonstrare.




4.h uius.

THEOREMA X. PROPOSITIO XVII.

Omnis trianguli duo anguli duobus rectis minores sunt, quomodocumque sumpti.

Sit triangulum A B C. Dico ipsius A B C triãguli duos angulos quomodocumque sumptos duobus rectis minores esse. producatur enim B C ad D. et quoniam trianguli A B C exterior angulus A C D maior est interiore, et opposito A B C: cõmunis apponatur A C B. anguli igitur A C D A C B angulis A B C B C A maiores sunt. Sed A C D A C B sunt æquales duobus rectis. ergo A B C B C A duobus rectis sunt minores. Similiter demõstrabimus angulos quoque B A C A C B, itemq; C A B A B C duobus rectis minores esse. Omnis igitur trianguli duo anguli duobus rectis minores sunt; quomodocumque sumpti. quod demonstrare oportebat.



13.huius.


F. C. COMMENTARIVS.

Nunc quidem, vt inquit Proclus, indeterminate ostenditur, trianguli duos quoslibet angulos duobus rectis minores esse, in sequentibus vero determinabitur etiam quanto sint minores, nempe reliquo trianguli angulo: tres enim ipsius anguli duobus rectis æquales sunt. quare duo tanto minores sunt duobus rectis, quantus est reliquus trianguli angulus.

THEOREMA XI. PROPOSITIO XVIII.

Omnis trianguli maius latus maiorem angulum subtendit.

Sit triangulum A B C habens latus A C latere A B maius. Dico et A B C angulum angulo B C A maiorem esse. Quoniam enim A C maior est, quàm A B, ponatur ipsi A B æqualis A D; et B D iungatur. Et quoniam trianguli B D C exterior angulus est A D B, erit is maior interiore, et oppositoposito




16.huius.

5.huius. posito D C B. Sed A D B æqualis est ipsi A B D, quòd et latus A B lateri A D sit æquale. maior igitur est et A B D angulus angulo A C B. quare A B C ipso A C B multo maior erit. Omnis igitur trianguli maius latus maiorem angulum subtendit: quod oportebat demonstrare.

THEOREMA XII. PROPOSITIO. XIX.

Omnis trianguli maiorem angulum maius latus subtendit.

Sit triangulum A B C maiorem habens A B C angulum angulo B C A. Dico et latus A C latere A B maius esse. Si enim non est maius, vel A C est æquale ipsi A B, vel ipso minus. æquale igitur non est, nam et angulus A B C angulo A C B æqualis esset. non est autem. non igitur A C ipsi A B est æquale. Sed neque minus. esset enim et angulus A B C angulo A C B minor. atqui non est. non igitur A C minus est ipso A B. ostensum autem est neque æquale esse. ergo A C ipso A B est maius. Omnis igitur trianguli maiorem angulum maius latus subtendit. quod oportebat demonstrare.




F. C. COMMENTARIVS.

Hoc precedentis theorematis conuersum est, quare & per deductionem ad id, quod fieri non potest, demonstratur.

THEOREMA XIII. PROPOSITIO XX.

Omnis trianguli duo latera reliquo maiora sunt, quomodocumque sumpta.

Sit enim triangulum A B C. Dico ipsius A B C triãguli duo latera reliquo maiora esse, quomodocũque sumpta: videlicet latera quidem B A A C maiora latere B C; latera vero A B B C maiora latere A C: et latera B C C A maiora ipso A B. producatur enim B A ad punctum D; ponaturq; ipsi C A æqualis A D; et D C iungatur. Quoniam igitur D A est
5.huius. æqualis A C, erit et angulus A D C angulo A C D æqualis. Sed B C D angulus maior est angulo A C D. angulus igitur B C D angulo A D C est maior. Et quoniam triangulum est D C B, habens B C D angu-
Ex antecedente. lum maiorem angulo B D C: maiorem autem angulum maius latus subtendit: erit latus D B latere B C maius. Sed D B est æquale ipsis B A A C. quare latera B A A C ipso B C maiora sũt. Similiter ostendemus et latera quidem A B B C maiora esse latere C A: latera vero B C C A ipso A B maiora. Omnis igitur trianguli duo latera reliquo maiora sunt, quomodocumque sumpta. quod ostendere oportebat.



F. C. COMMENTARIVS.

Hoc theorema Epicurei impugnarũt tamquam. Asino manifestum.


Præsens theorema, vt scribit Proclus, Epicurei impugnare consueuerunt, tum Asino ipsum manifestum esse dicentes, tum nulla egere probatione. Asino autem manifestum esse, ostendunt ex eo, quòd herba in altero laterũ extremo posita, Asinus pabulũ expetens, vnũ latus peragrat, & non duo. Aduersus hec dicendum. Theorema sensu quidem manifestum esse, non autem & scientiam gignente ratione. multis enim rebus hoc accidit. exempli gratia ignis calefacit. hoc quoque sensui indubitatum

dubitatum eſt, ſed quo nam pacto calefaciat, conuincere ſcientiae officium eſt. Sic igitur duo trianguli latera reliquo eſſe maiora, ſenſui manifeſtum, quo aut hoc fiat dicere ad ſcientiã pertinet. Alij aliter hoc theorema demonſtrarunt, recta linea minime producta; vt videre licet apud Proclũ.

THEOREMA XIIII. PROPOSITIO XXI.

Si à terminis vnius lateris trianguli duę rectæ lineæ intra conſtituantur, hę reliquis duobus trianguli lateribus minores quidem erunt, maiorem vero angulum continebunt.

Trianguli enim A B C in vno latere B C à terminis B C duæ rectæ lineæ intra conſtituantur B D D C. Dico B D D C reliquis duobus trianguli lateribus B A A C minores quidem eſſe, maiorem vero continere angulum B D C angulo B A C. producatur enim B D ad E. Et quoniam omnis triãguli duo latera reliquo ſunt maiora, erunt trianguli A B E duo latera B A A E maiora latere B E. communis apponatur E C. ergo B A A C ipſis B E E C maiora ſunt. Rurſus quoniam C E D triãguli duo latera C E E D ſunt maiora latere C D, communis apponatur D B. quare C E E B ipſis C D D B ſunt maiora. Sed oſtenſum eſt B A A C maiora eſſe B E E C. multo igitur B A A C ipſis B D D C maiora ſunt. Rurſus quoniam omnis trianguli exterior angulus interiore, et oppoſito eſt maior: erit trianguli C D E exterior angulus B D C maior ipſo C E D. Eadem ratione et trianguli A B E exterior angulus C E B ipſo B A C eſt maior. Sed angulus B D C oſtenſus eſt maior angulo C E B. multo igitur B D C angulus angulo B A C maior erit. Quare ſi à terminis vnius lateris trianguli duæ rectę lineæ intra conſtituantur, hę reliquis duobus trianguli lateribus minores quidem erunt, maiorem vero angulum continebunt. quod demonſtrare oportebat.




Ex antecedẽte.

15. huius.

PROBLEMA VIII. PROPOSITIO XXII.

Ex tribus rectis lineis, quę tribus rectis lineis datis æquales ſint, triangulum conſtituere. oportet autem duas reliqua maiores eſſe, quomodocumque ſumptas; quoniam omnis trianguli duo latera reliquo maiora ſunt, quomodocumque ſumpta. *

Sint tres datæ rectę lineæ A B C, quarum duæ reliqua maiores ſint, quomodocũque ſumptæ, vt ſcilicet A B quidem ſint maiores quàm C, A C vero maiores quàm B, et præterea B C maiores quàm A. Itaq; oportet ex rectis lineis æqualibus ipſis A B C triãgulũ cõſtituere. exponatur aliqua recta linea D E, terminata quidem ad D, infinita vero ad E; et ponatur ipſi quidem A æqualis D F, ipſi vero B æqualis F G, et ipſi C æqualis G H: et centro



3.postul. centro F, interuallo autem F D circulus describatur D K L. Rursusq; centro G, et interuallo G H alius circulus K L H describatur, et iungantur K F K G. Dico ex tribus rectis lineis æqualibus ipsis A B C triangulum K F G constitutum esse. Quoniam enim punctum F centrum est D K L circuli; erit F D æqualis F K. Sed F D est æqualis A. ergo et F K ipsi A est æqualis. Rursus quoniam punctum G centrum est circuli L K H, erit G H æqualis G K. Sed G K est æqualis C. ergo et G H ipsi C æqualis erit. est autem et F G æqualis B. tres igitur rectæ lineæ K F F G G K tribus A B C æquales sunt. Quare ex tribus rectis lineis K F F G G K, quæ sunt æquales tribus datis rectis lineis A B C, triangulum constitutum est K F G. quod facere oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

Problematũ alia indeterminata, alia terminata.

Determinatio duplex.


Præsens problema determinatum est. problematum enim quemadmodum & theorematum alia quidem indeterminata sunt, alia vero determinata. Si enim hoc modo simpliciter dixerimus, ex tribus rectis lineis, quæ tribus datis rectis lineis æquales sint, triangulum constituere. problema indeterminatum erit, & fieri non poterit. Si autem addiderimus, quarum duæ reliquæ sint maiores, quomodocumque sumptæ, determinatum erit, & fieri poterit. determinatio enim duplex est, altera quidem pars problematis, vel theorematis, quæ post expositionem ponitur, significans quid sit illud, quod quæritur; altera uero, quæ propositionem vniuersalem esse prohibet, explicans quando, & qua ratione, & quot modis id quod propositum est fieri possit, vt hoc loco, [oportet autem duas reliquas maiores esse, quomodocumque sumptas. quoniam omnis trianguli duo latera reliquo sunt maiora, quomodocumque sumpta] *& in sexto libro*] Ad datam rectam lineam dato rectilineo æquale parallelogrãmum applicare, deficiens figura parallelogramma, quæ similis sit alteri datæ. oportet autem datum rectilineum, cui æquale applicandum est, non maius esse eo, quod ad dimidiam applicatur, similibus existentibus defectibus, et eo, quod à dimidia, et eo, cui oportet simile deficere.] *Quemadmodum autem theorematum iuxta verum, & falsum diuisio fit, ita & problematum iuxta id, quod fieri, & quod non fieri potest. Proclus in commentarijs citat Eucl. dis verba, quae à verbis huiusce demonstrationis discrepant, vt luce clarius sit Euclidis demonstrationes aliquibus in locis à Theone immutatas esse, & eas, quas nunc habemus Theonis esse, non Euclidis.*

Theorematum diuisio iuxta uerum & falsum.

Problematũ diuisio iuxta id, quod fieri, & qđ non fieri potest.

PROBLEMA IX. PROPOSITIO XXIII.

Ad datam rectam lineam, & ad datum in ea punctum, dato angulo rectilineo æqualem angulum rectilineum constituere.




Sit data quidem recta linea A B, datum vero in ipsa punctum A, et datus angulus rectilineus D C E. oportet igitur ad datam rectam lineam A B, et ad datum in ea punctum A dato angulo rectilineo D C E, æqualem angulum rectilineum constituere. Sumãtur in vtraque ipsarum C D C E quæuis puncta D E, iungaturq; D E, et ex tribus rectis lineis, quæ æquales sint tribus C D D E E C triangulum constituatur A F G, ita ut C D sit æqualis A F, et C E ipsi A G, et D E ipsi F G. Itaque quoniam duæ D C C E duabus F A A G æquales sunt, altera alteri; et basis D E est æqualis basi F G: erit et angulus D C E angulo F A G æqualis. Ad datam igitur rectam lineam A B, et ad datum in ea punctum A, dato angulo rectilineo D C E æqualis angulus rectilineus constitutus est F A G. quod facere oportebat.

8.huius.

F. C.

F. C. COMMENTARIVS.

Et ex tribus rectis lineis, quę æquales ſint tribus CD DE EC triangulum conſtituatur AFG.] *A recta linea AB abſcindatur AG æqualis ipſi CE: & centro quidem A, interuallo autem ipſi CD æquali deſcribatur circulus: & rurſus centro G & interuallo æquali ipſi ED alius circulus deſcribatur, vt circuli ſe inuicem in puncto F ſecent: & iungantur AF FG. Dico iam factum eſſe, quod proponebatur: & demonſtratio eadem erit. Hoc autem problema ab Oenopide inuentum eſſe tradit Eudemus.*




* 3. Huius.
3. Poſtul.
Hoc theorema ab Oenopide inuentum eſt.

THEOREMA. XV. PROPOSITIO. XXIIII.

Si duo triangula duo latera duobus lateribus ęqualia habeant, alterum alteri, angulum autem angulo maiorem, qui æqualibus rectis lineis continetur; et baſim baſi maiorem habebunt.

Sint duo triangula ABC DEF, quæ duo latera AB AC duobus lateribus DE DF æqualia habeant, alterum alteri, videlicet latus quidem AB æquale lateri DE; latus vero AC æquale DF: & angulus BAC angulo EDF ſit maior. Dico et baſim BC baſi EF maiorem eſſe. Quoniam enim angulus BAC maior eſt angulo EDF, conſtituatur ad rectam lineam DE, et ad punctũ in ea D, angulo BAC ęqualis angulus EDG, ponaturq; alterutri ipſarum AC DF æqualis DG, et GE FG iungantur. Itaque quoniam AB quidem eſt æqualis DE, AC vero ipſi DG; duæ BA AC duabus ED DG æquales ſunt, altera alteri; et angulus BAC eſt æqualis angulo EDG. ergo baſis BC baſi EG eſt æqualis. Rurſus quoniam æqualis eſt DG ipſi DF; et angulus DFG angulo DGF: erit DFG angulus angulo EGF maior. multo igitur maior eſt EFG angulus ipſo EGF. Et quoniam triangulum eſt EFG, angulum EFG maiorem habens angulo EGF; maiori autem angulo maius latus ſubtenditur; erit et latus EG latere EF maius. Sed EG latus eſt æquale lateri BC. ergo et BC ipſo EF maius erit. Si igitur duo triangula duo latera duobus lateribus æqualia habeant, alterum alteri, angulum autem angulo maiorem, qui æqualibus rectis lineis continetur: et baſim baſi maiorem habebunt. quod oportebat demonſtrare.




Ex antecedente.
*
4. huius.
5. huius.
19. huius.

F. C. COMMENTARIVS.


Hoc theorema quarto oppoſitum eſt, illud enim angulos qui ſunt ad vertices triangulorũ ęquales ponit, hoc inęquales; illud baſes aequales, hoc inęquales eſſe demonſtrat.

Et GE FG iungantur] *rectalinea EG, vel cadit ſupra EF, vel in ipſam, vel infra ipſam. Euclides vt ſupra cadentẽ accepit. Quòd ſi in ipſam cadat, vt in ſecunda figura, idẽ oſtendetur. Sunt enim duę BA AC duabus ED DG aequales: & cũ aequales contineant angulos, & baſis BC baſi EG aequalis erit. Sed EG*



Hoc theorema quarto oppoſitum.
*
4. Huius.


est maior, quàm E F, vt totum est maius, quàm ipsius pars. ergo & B C quàm E F est maior. Cadat postremo infra ipsam. ut in tertia figura. Similiter demonstrabimus basim B C basi E G aequalem esse. Cum aũt duae 21. huius. *E F, F D intra triangulum E D G constitutae minores sint, quàm duae E G, G D; sitq; D G ipsi D F aequalis; erit reliqua E G maior, quàm reliqua E F. Sed B C est æqualis E G. ergo et B C quàm E F maior sit necesse est.*



THEOREMA XVI. PROPOSITIO XXV.

Si duo triangula duo latera duobus lateribus æqualia habeant, alterum alteri, basim vero basi maiorem; & angulum angulo, qui æqualibus lateribus continetur, maiorem habebunt.

Sint duo triangula A B C D E F, quæ duo latera A B A C duobus lateribus D E D F æqualia habeant, alterum alteri, videlicet latus A B æquale lateri D E, et latus A C lateri D F. basis autem B C basi E F sit maior. Dico et angulum B A C angulo E D F maiorem esse. si enim non est maior, vel æqualis est, vel minor. æqualis autẽ non est angulus B A C angulo E D F: esset enim et basis B C basi E F æqualis. non est aũt. nõ igitur æqualis est B A C angulus angulo E D F. sed neque minor. nã nor enim esset et basis B C basi E F. atqui nõ est. non igitur angulus B A C angulo E D F est minor. ostensum autẽ est, neque esse æqualem. ergo angulus B A C angulo E D F necessario maior erit. Si igitur duo triangula duo latera duobus lateribus æqualia habeant, alterum alteri, basim vero basi maiorem; et angulum angulo, qui æqualibus lateribus continetur, maiorem habebunt. quod demonstrare oportebat.



4. huius.

Ex antecedenti.

F. C. COMMENTARIVS.


Hoc theorema octauo quidem oppositum est, præcedentis vero conuersum, quod alij aliter demonstrarunt, vt tradit Proclus.

Hoc theorema octauo oppositũ est et præcedentis conuersum.

THEOREMA XVII. PROPOSITIO XXVI.

Si duo triangula duos angulos duobus angulis æquales habeat, alterum alteri, vnumq; latus vni lateri æquale, vel quod æqualibus adiacet angulis, vel quod vni æqualium angulorum subtenditur; et reliqua latera reliquis lateribus æqualia, alterum alteri, et reliquum angulum reliquo angulo æqualem habebunt.

Sint duo triangula A B C D E F, quæ duos angulos A B C B C A duobus angulis D E F E F D æquales habeant, alterum alteri, videlicet angulum quidem A B C æqualem angulo D E F; angulum vero B C A angulo E F D. habeant autem et vnum latus vni lateri æquale, et primum quod æqualibus adiacet angulis; nempe latus B C lateri E F. Dico et reliqua latera reliquis lateribus æqualia habere, alterũ alteri, latus scilicet A B lateri D E; et latus A C



ipſi D F, et reliquum angulum B A C reliquo angulo E D F æqualem. Si enim inęqualis eſt A B ipſi D E, vna ipſarum maior eſt. Sit maior A B, ponaturq; G B ęqualis D E; et G C iungatur. Quoniam igitur B G quidem eſt ęqualis D E, B C vero ipſi E F, duę G B B C duabus D E E F ęquales ſunt, altera alteri: et angulus G B C æqualis angulo D E F. baſis igitur G C baſi D F eſt æqualis: et G B C triangulũ 4. huius. triãgulo D E F, et reliqui anguli reliquis angulis ęquales, alter alteri, quibus ęqualia latera ſubtẽdũtur. ergo G C B angulus eſt ęqualis angulo D F E. Sed angulus D F E angulo B C A ęqualis ponitur. quare et B C G angulus angulo B C A eſt æqualis, minor maiori, quod fieri nõ pôt. non igitur inæqualis eſt A B ipſi D E. ergo ęqualis erit. eſt autem et B C æqualis E F. Itaque duę A B B C duabus D E E F æquales ſunt, altera alteri, et angulus A B C æqualis angulo D E F. baſis igitur A C baſi D 4. huius. F, et reliquus angulus B A C reliquo angulo E D F eſt ęqualis. Sed rurſus ſint latera, quæ æqualibus angulis ſubtenduntur ęqualia, vt A B ipſi D E. Dico rurſus et reliqua latera reliquis lateribus ęqualia eſſe; A C quidem ipſi D F, B C vero ipſi E F: et adhuc reliquum angulum B A C reliquo angulo E D F ęqualem. Si enim inæqualis eſt B C ipſi E F, vna ipſarum maior eſt. Sit maior B C, ſi fieri poteſt; ponaturq; B H ęqualis E F, et A H iungatur. Quoniam igitur B H quidem eſt æqualis E F, A B vero ipſi D E; duæ A B B H duabus D E E F æquales ſunt, altera alteri, et angulos æquales continent. ergo baſis A H baſi D F eſt ęqualis: et A B H triangulum 4. huius. triangulo D E F, et reliqui anguli reliquis angulis æquales erunt, alter alteri, quibus æqualia latera ſubtenduntur. ęqualis igitur eſt angulus B H A angulo E F D. Sed E F D eſt æqualis angulo B C A. ergo et B H A angulus angulo B C A eſt æqualis. Trianguli igitur A H C exterior angulus B H A ęqualis eſt interiori; et oppoſito B C A, quod fieri non poteſt. quare non inęqualis eſt B C ipſi E F. ęqualis igitur. eſt autem et A B æqualis D E. duæ igitur A B B C duabus D E E F æquales ſunt, altera alteri: anguloſq; æquales continent. quare baſis A C æqualis eſt baſi D F, et A B C triangulum æquale triangulo D E F, et reliquus angulus B A C reliquo angulo E D F eſt æqualis. Si igitur duo triangula duos angulos duobus angulis æquales habeant, alterum alteri, vnumq; latus vni lateri æquale, vel quod æqualibus adiacet angulis, vel qnod vni ęqualium angulorum ſubtenditur; et reliqua latera reliquis lateribus æqualia, alterum alteri, et reliquum angulum reliquo angulo æqualem habebunt. quod oportebat demonſtrare.

F. C. COMMENTARIVS.

Hoc theorema ad Thaletem refertur, vt Proclus ex Eudemo tradit. De triangulorum quidem ortu, & aequalitate, vel inęqualitate quęcunque in elementari inſtitutione dici poterant, ex ſuperioribus didicimus. De quadrilateris deinceps Euclides agit; præcipue vero de parallelogrammis: ſimul cum horum contemplatione de trapezijs diſſerens. diuiditur enim quadrilaterum, vt ſuperius dictum eſt in parallelogrammum, & trapezium: rurſuſq;, parallelogrammum in alias ſpecies: & trapezium ſimiliter. Verum quoniam parallelogrammum quidem ob ęqualitatis participationem ordinatum eſt: trapezium vero neque eiusdem, neque ſimilem ſeruat ordinem: non immerito præcipue quidem de parallelogrammis ſermonem habet; ſimul vero cum his trapezium contemplatur. ex parallelorum enim ſectione ortus trapeziorum apparebit, vt procedentibus nobis fiet manifeſtum. Sed quoniam rurſus fieri non poteſt, vt de parallelogrammorum, vel conſtructione, vel aequalitate aliquid dicatur abſque parallelarum conſideratione; vt enim ex ipſo quoque nomine apparet parallelogrammum eſt, quod à parallelis rectis lineis è regione poſitis deſcribitur: neceſſario à parallelis doctrinae initium facit. paulum vero progreſſus ab his ad parallelogrammorum tractationem accedit, vno vſus theoremate medio inter harum, illorumq; inſtitutionem elementarem, quod quidem videtur ſymptoma quoddam, quod parallelis ineſt, contemplari: primum autem ortum parallelogrammorum tradit. tale enim eſt. [Rectæ lineæ, quæ æquales, et parallelas ad eaſdem partes coniungunt, et ipſæ æquales, et parallelæ ſunt.] *nam in hoc conſideratur quidem ſymptoma quoddam aequalibus, ac parallelis; ex coniunctione autem apparet parallelogrammum, quod latera aequalia, et parallela è regione poſita habet. Parallelarum*

Hoc theorema ad Thaletem refertur.

Parallelogrãmum ordinatum eſt, trapeziũ uero minime.

Parallelogrãmum eſt q̃ a parallelis deſcribitur.


Parallelogrãmorum ortus.

Parallelis tria per se insunt.

igitur sermonem necessario præassumptum esse, ex his constat. Tria autem assumere oportet, quæ parallelis per se insint, ipsaq; explicant: & cum ipsis cõuertuntur. neque solum tria simul, sed & vnum quodque seorsum ab alijs sumptum. quorum vnum hoc est. recta linea parallelas secante, alternos angulos inter se æquales esse: aliud, recta linea parallelas secante angulos interiores duobus rectis esse æquales. reliquum vero, recta linea parallelas secante, angulum exteriorem interiori; & opposito æqualem esse. horum autem symptomatum vnumquodque demonstratum parallelas esse rectas lineas affirmare potest. Hoc modo & alij mathematici de lineis differere consueuerunt, vniuscuiusque speciei symptoma tradentes. Apollonius de conicis lineis ager. *Apollonius enim in qualibet conicarum linearum, quid symptoma sit ostendit:* Nicomedes de cõchoid. *& Nicomedes in conchoidibus,* Hippias de quadrãtibus. *& Hippias in quadrantibus.* Perseus de spiricis. *& Perseus in spiricis. nam post earum ortum, quod ipsis per se, & quatenus ipsum inest, assumptum, constitutam nobis formam ab omnibus alijs distinguit. Eodem igitur modo, & elementorum institutor parallelarum symptomata primum inuestigat. Hæc ex Proclo.*

THEOREMA XVIII. PROPOSITIO XXVII.

Si in duas rectas lineas recta linea incidens alternos angulos inter se æquales fecerit, parallelæ erunt rectæ lineæ.




In duas enim rectas lineas A B C D, recta linea E F incidens alternos angulos A E F E F D æquales inter se faciat. Dico rectam lineam A B ipsi C D parallelam esse. Si enim non est parallela, productæ A B C D, vel ad partes B D conuenient, vel ad partes A C. producantur, conueniantq; ad partes B D in pũcto G. Itaque G E F trianguli exterior angulus A E F maior est interiore et opposito E F C. Sed et æqualis, quod fieri nõ põt, non igitur A B C D productę ad partes B D conuenient. Similiter demonstrabitur neque conuenire ad partes A C. quę vero in neutras partes conueniunt, parallelę inter se sunt. parallela igitur est A B ipsi C D. Quare si in duas rectas lineas recta linea incidens alternos angulos inter se æquales fecerit, parallelę inter se erunt rectę lineæ, quod ostendere oportebat.

16. huius.

dist. 35.

F. C. COMMENTARIVS.



Si in duas rectas lineas recta linea incidens alternos angulos] *Alternos angulos appellat eos, qui neque ad easdem partes, neque deinceps sunt, sed ab incidente linea distinguuntur, cum vtrique intra parallelas existant, differunt autem quòd alter sursum alter deorsum ponatur. Vt exempli gratia, rectis lineis A B, & C D existentibus, incidentęq; in ipsas recta linea E F, angulos A E F D F E; itemq; angulos C F E B E F alternos esse dicit. vt pote alterno, commutatóue ordine iuxta positionem se habentes. Illud autem sciendum est, cum talis sit rectarum linearum situs, omnia symptomata ex diuisione sex fieri, quorum tria tantum Geometra accepit, tria vero omisit. vel enim ad easdem partes angulos sumemus, vel non ad easdem: & si ad easdem, vel vtrosque intra rectas lineas, quas parallelas ostendit, vel vtrosque extra, vel vnum quidem intra, alterum vero extra. Si vero non ad easdem partes, similiter vel vtrosque intra, vel extra, vel vnum intra, & alterum extra. Sint enim rursus rectæ lineæ A B C D, in quas incidat recta linea E F: & ad H G pũcta producatur. Si igitur ad easdẽ partes angulos accipias, vel vtrosq; intra pones, vt B E F, & E F D, vel ipsos, A E F, & E F C, vel vtrosq; extra, vt H E B D F G, vel H E A C F G, vel vnum quidem intra, alterum vero extra, vt H E B E F D, vel G F D F E B; vel H E A E F C, vel G F C A E F.*


quadrupliciter

quadrupliciter enim hi accipiuntur. Si vero non ad eaſdem partes, vel vtroſque intra, vt A E F E F D, vel C F E F E B: vel vtroſque extra, vt A E H D F G, vel H E B C F G, vel vnum quidem intra, alterum vero extra; atque hoc rurſus quadrupliciter, vel enim A E H E F D, vel H E B E F D, vel G F C F E B, vel G F D F E A. Cum igitur anguli ſex modis ſumatur, Euclides tres ſolas ſumptiones elegit, nam quidem ex ijs angulis, qui non ad eaſdem ſunt partes, et qui intra tantum ſumuntur; quos alternos appellauit; duas vero ex ijs, qui ad eaſdem partes vel vtrique intra ſumuntur, quos duobus rectis aequales eſſe dicit: vel vnus quidem extra, alter vero intra ſumitur, quos dicit inter ſe aequales eſſe. Tres vero reliquas omiſit, vt pote quos eadem omnino conſequatur. Sint enim ad eaſdem partes vtrique extra anguli H E B D F G. Dico hos duobus rectis aequales eſſe. angulus enim D F E angulo H E B, & angulus B E F angulo D F G eſt aequalis. Si autem anguli B E F E F D duobus rectis ſint aequales, anguli etiam D F G H E B duobus rectis aequales erunt. Sint rurſus non ad eaſdem partes anguli A E H E F D, quorum alter ſit extra, alter intra; ipſi quoque duobus rectis ſunt aequales. Quoniam enim angulus A E H aequalis eſt angulo B E F, anguli vero B E F E F D duobus rectis aequales ſunt; erunt & anguli A E H E F D duobus rectis aequales. Sint poſtremo non ad eaſdem partes vtrique extra anguli A E H D F G. Dico eos etiam inter ſe aequales eſſe. Nam cum angulus A E H aequalis ſit angulo B E F, & angulus D F G angulo E F C, ſintq́, anguli B E F E F C alterni inter ſe aequales: anguli etiam A E H D F G inter ſe aequales ſint neceſſe eſt.

Cum anguli ſex modis ſumantur. Euclides tres ſolas ſumptiones elegit, reliquas omiſit.

THEOREMA XIX. PROPOSITIO XXVIII.

Si in duas rectas lineas recta linea incidens exteriorem angulũ interiori, et oppoſito, et ad eaſdem partes æqualem fecerit, vel interiores, et ad eaſdem partes duobus rectis æquales; parallelæ erũt inter ſe rectæ lineæ.



In duas enim rectas lineas A B C D recta linea E F incidens exteriorem angulum E G B interiori et oppoſito G H D æqualem faciat; vel interiores, et ad eaſdem partes B G H G H D, duobus rectis æquales. Dico rectam lineam A B rectæ C D parallelam eſſe. Quoniam enim E G B angulus æqualis eſt angulo G H D, angulus autem E G B angulo A G H, erit et angulus A G H angulo G H D æqualis: et ſunt alterni. parallela igitur eſt A B ipſi C D. Rurſus quoniam anguli B G H G H D duobus rectis ſunt æquales, et ſunt A G H B G H æquales duobus rectis: erunt anguli A G H B G H angulis B G H G H D æquales. communis auferatur B G H. reliquus igitur A G H eſt æqualis reliquo G H D: et ſunt alterni. ergo A B ipſi C D parallela erit. Si igitur in duas rectas lineas recta linea incidens exteriorem angulum interiori et oppoſito, et ad eaſdem partes æqualem fecerit, vel interiores, et ad eaſdem partes duobus rectis æquales; parallelæ erunt inter ſe rectæ lineæ. quod demonſtrare oportebat.

29. huius.

Ex antecedente. 13. huius.

F. C. COMMENTARIVS.


Hoc theorema à Ptolemæo aliter demonſtratur, vt tradit Proclus.

Theorema a Ptolemæo aliter demonſtratur.

THEOREMA XX. PROPOSITIO XXIX.

In parallelas rectas lineas recta linea incidens, et alternos angulos inter ſe æquales, et exteriorem interiori et oppoſito, et ad eaſdem

eaſdem partes ęqualem, et interiores et ad eaſdem partes duobus rectis æquales efficiet.



In parallelas enim rectas lineas A B C D recta linea incidat E F. Dico alternos angulos A G H G H D inter ſe æquales efficere, et exterioré E G B interiori et oppoſito, et ad eaſdé partes G H D æqualé: et interiores et ad eaſdem partes B G H G H D duobus rectis æquales. Si enim inæqualis eſt A G H ipſi G H D, vnus ipſorum maior eſt. Sit maior A G H. et quoniam A G H angulus maior eſt angulo G H D; communis apponatur B G H. anguli igitur A G H B G H angulis B G H G H D maiores ſunt. Sed anguli A G H B G H ſunt æquales duobus rectis. ergo B G H G H D anguli ſunt duobus rectis minores. Quæ vero à minoribus, quàm ſint duo recti in infinitum producuntur rectæ lineæ inter ſe conueniunt. ergo rectæ lineæ A B C D in infinitum productæ conuenient inter ſe. atqui non conueniunt, cum parallelę ponantur. non igitur inæqualis eſt A G H angulus angulo G H D. quare neceſſario eſt ęqualis. angulus autem A G H ęqualis eſt angulo E G B. ergo et E G B ipſi G H D ęqualis erit. communis apponatur B G H. anguli igitur E G B B G H ſunt ęquales angulis B G H G H D. Sed E G B B G H ęquales ſunt duobus rectis. ergo et B G H G H D duobus rectis æquales erunt. In parallelas igitur rectas lineas recta linea incidens, et alternos angulos inter ſe æquales, et exterioré interiori et oppoſito, et ad eaſdem partes æqualem; et interiores et ad eaſdem partes duobus rectis ęquales efficiet. quod oportebat demonſtrare.

13. huius.

✻ Poſt. 5.

15. huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Hoc theorema, vt inquit Proclus, vtriſque precedentibus conuertitur. quod enim in vtroque illorum eſt queſitum, poſitionem facit; & quae in illis data ſunt, demonſtrare proponit. atque hęc conuerſorũ differentia ſilentio prętereunda non eſt. nam omne quod conuertitur, aut vnum vni conuertitur, vt quinto ſextum, aut pluribus vnum, vt precedentibus, quod nunc proponitur: aut plura vni, vt paulo poſt manifeſtum erit.

✻ Quæ vero à minoribus, quàm ſint duo recti in infinitum producuntur rectæ lineę inter ſe conueniunt] *Poſtulatum quintum eſt, quod tamen cum euidens non ſit, & demõſtratione indigere videatur, Proclus ita demoſtrandum cenſuit, duobus pręmiſſis, nimirum axiomate quopiam, quo etiam Ariſtoteles vſus eſt, & lemmate.*


A X I O M A.

Si ab vno puncto duæ rectæ lineæ angulum facientes in infinitum producantur, ipſarum diſtantia omnem finitam magnitudinem excedit.

L E M M A.


Si alteram parallelarum ſecuerit recta quædam linea; reliquam quoque ſecabit.

Sint parallelae A B C D; ſecetq́, ipſam A B recta linea E F G. Dico E F G reliquam quoque C D ſecare. Quoniam enim duae rectae lineae ſunt, quae ab vno puncto F in infinitum producuntur, B F, E G; omni finita magnitudine maiorem habebunt diſtantiam: quare & maiorem ea magnitudine, quae tanta eſt, quantum eſt interuallum inter parallelas interiectum. cum igitur harum linearum diſtantia maior fuerit, quàm diſtantia parallelarum, recta linea F G ſecabit ipſam C D. Quare ſi alteram parallelarum ſe-



cueris


cuerit quædam recta linea, reliquum quoque secabit.



Hoc ante demonstrato consequenter propositum demonstrabitur. Sint enim duae rectae lineae A B C D, & in ipsas incidat recta linea E F, angulos B E F D F E duobus rectis minores efficiens. Dico rectas lineas inter se conuenire ad eas partes, in quibus sunt anguli duobus rectis minores. Cum enim anguli B E F D F E duobus rectis minores sint, sit excessus duorum rectorum aequalis H E B angulus, & H E ad K producatur. Itaque quoniam in rectas lineas H K C D recta linea E F incidit, interiores q; angulos H E F D F E duobus rectis efficit aequales, rectae lineae H K C D parallelae erunt. & A B secat ipsam H K, ergo reliquam quoque C D secabit per antecedens lemma. conuenient igitur inter se rectae lineae A B C D ad eas partes, in quibus sunt anguli duobus rectis minores, quod demonstrare oportebat.

THEOREMA XXI. PROPOSITIO XXX.

Quæ eidem rectæ lineæ sunt parallelæ, & inter se parallelæ erunt.




Sit vtraque ipsarum A B C D ipsi E F parallela. Dico et A B ipsi C D parallelam esse. Incidat enim in ipsas recta linea G K. Et quoniam in parallelas rectas lineas A B E F, recta linea G K incidit, angulus A G H angulo G H F est æqualis. Rursus quoniam in parallelas rectas lineas E F C D, recta linea incidit G K, æqualis est G H F angulus angulo G K D. ostensus autem est & angulus A G K angulo G H F æqualis. ergo et A G K ipsi G K D æqualis erit. et sunt alterni. parallela igitur est A B ipsi C D. ergo quæ eidem rectæ lineæ sunt parallelæ, & inter se parallelæ erunt, quod oportebat demonstrare.

F. C. COMMENTARIVS.

Quæ eidem rectæ lineæ sunt parallelæ, et inter se parallelæ erunt] *Contingit autem* * *hoc, vt inquit Proclus, non in omnibus respectibus verum esse. non enim quæ eiusdem dupla, & inter se dupla sunt, nec quae eiusdem sesquialtera, inter se sunt sesquialtera, sed in illis solis locum habere videtur, quæcunque vnioce conuertuntur, ut in æqualitate, in similitudine, in identitate, & in parallela positione. Quae enim parallelae parallela, & ipsa parallela est, quemadmodum, & quod aequali aequale, & ipsum est aequale; & quod simili simile, & ipsum simile. parallelarum enim ad se se respectus similitudo positionis est.*

PROBLEMA X. PROPOSITIO XXXI.

Per datum punctum datæ rectæ lineæ parallelam rectam lineam ducere. *



Sit datum quidem punctum A, data vero recta linea B C. oportet per A punctum ipsi B C rectæ lineæ parallelam rectam lineam ducere. Sumatur in B C quod uis punctum D, & iungatur A D: constituatur q; ad rectam lineam D A, & ad punctum in ipsa A, angulo A D C æqualis angulus D A E: & in directum ipsi E A recta linea A F producatur. Quoniã igitur in duas rectas lineas B C E F recta linea A D incidens alternos angulos E A D A D C inter se æquales efficit, E F ipsi B C parallela erit. Per datum igitur punctum A datæ rectæ lineæ B C parallela ducta est recta linea E A F. quod facere oportebat. 23. Huius. 27. Huius.

F. C.


F. C. COMMENTARIVS.

* Per datum punctum datæ rectæ lineæ parallelam rectam lineam ducere.] *Videtur hoc problema parallelarũ ortũ tradere. At datum punctũ extra rectam lineam sumere oportet, ita ut à puncto ad ipsam ducta recta linea angulum faciat, alioqui nulla alia præter iam dictã, duci poterit. differunt autem per datum punctum, & à dato puncto rectam lineam ducere. Quando enim punctum rectæ lineæ, quae ducitur, principium est; ab ipso fit deductio, vt in illo problemate,* [super datam rectam lineam infinitam à puncto, quod in ea non est, perpendicularem rectam lineam ducere] *Quando autem punctum in recta linea est, per ipsum deductio fieri dicitur, vt nunc in parallelis.* [per datum punctum datæ rectæ lineæ parallelã rectam lineam ducere.] *& quemadmodum non licet ab eodem puncto super datam rectam lineam duas perpendiculares, vel plures ducere, ita neque per idem punctum datae rectæ linae duas, uel plures parallelas ducere. parallelae enim in dicto puncto inter se conuenirent. quod est absurdum.*

Per datum punctum, & a dato pũcto lineã ducere.

THEOREMA XXII. ROPOSITIO XXXII.

Omnis trianguli vno latere producto exterior angulus duobus interioribus, et oppositis est æqualis; et trianguli tres interiores anguli duobus rectis æquales sunt.



Sit triangulum A B C: et vnum ipsius latus B C in D producatur. Dico angulum exteriorem A C D duobus interioribus et oppositis C A B A B C æqualem esse; et trianguli tres interiores angulos A B C B C A C A B duobus rectis esse æquales. Ducatur enim per punctũ C ipsi A B rectæ lineę parallela C E. Et quoniam A B ipsi C E parallela est, et in ipsas incidit A C, alterni anguli B A C A C E inter se æquales sunt. Rursus quoniã A B parallela est C E, et in ipsas incidit rectæ linea B D, exterior angulus E C D interiori et opposito A B C est æqualis. Ostensus autem est angulus A C E æqualis angulo B A C. Quare totus A C D exterior angulus æqualis est duobus interioribus et oppositis B A C A B C. communis apponatur A C B. anguli igitur A C D A C B tribus A B C B C A C A B æquales sunt. Sed anguli A C D A C B sunt æquales duobus rectis. Ergo et A C B C B A C A B duobus rectis æquales erunt. Omnis igitur trianguli uno latere producto exterior angulus duobus interioribus & oppositis est æqualis; et trianguli tres interiores anguli duobus rectis æquales sunt. quod demonstrare oportebat.

Ex antecedente.


29. huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Quantum deficiebat in sextodecimo, & septimodecimo theoremate, tantum in hoc addit, vt notat Proclus. non solum enim ex hoc discimus, trianguli exteriorem angulum vtroque interiore & opposito maiorem esse, sed & quanto maiorem. nam cum vtrisque sit aequalis, maior quàm alteruter reliquo est. nec trianguli duos quoslibet angulos duobus rectis minores esse solum ex hoc cognoscimus, sed quanto etiam minores: reliquo enim trium. illa igitur quodam modo magis indefinita fuerunt theoremata, hoc vero scientiae terminum vtrisque attulit. eius theorematis, triangulum scilicet interiores angulos duobus rectis aequales habere, inuentionem ad Pythagoricos refert. Eudemus, quod ipsi aliter demonstrarunt, vt Proclus tradit: qui etiam huius theorematis duo ostendit conuersa, ex quibus apparere potest, quomodo vni duo conuertantur. Cum igitur ex hoc constet, trianguli tres interiores angulos duobus rectis esse aequales, aperta est nobis via, per quã ceterarum quoque figurarum rectilinearum angulos inuenimus, quot rectis aequales sint. vt puta

la quadrilaterae, quinquelaterae,& aliarum, quae ſequuntur. Itaque primo ſciendum eſt omnem rectilineam figuram in triangula reſolui; omnium ſi quidem conſtitutionis principium eſt trian gu'um. vnaquaque autem in triangula binario pauciora, quàm ſint propria latera, reſoluitur, vt ſi


Omnis recti linea figura in triangula binario pauciora quam ſit propria latera reſoluitur.



quattuor latera habeat, in duo reſoluitur triangula; ſi quinque in tria, ſi ſex in quattuor, & ſimiliter reliquae. Quòd cum omnis trianguli tres interiores anguli duobus rectis ſint aequales, numerus triangulorum, ex quibus vnaquaque figura conſtat, duplicatus multitudinem prębebit rectorum, quibus ea aequales angulos habet. Quapropter omnis quadrilatera figura ex duobus triangulis conſtans angulos habet quattuor rectis aequales. & omnis quinquelatera habet angulos aequales ſex rectis, & deinceps eodem modo, Sed & illud ſciendum eſt, [omnem rectilineam figuram vnoquoque ex eius lateribus ſemel producto, angulos qui extra conſtituũtur, quattuor rectis æquales habere] *quod nos hoc modo demonſtrabimus.*

Omnis recti linea figura angulos qui extra conſtituũtur quattuor rectis æquales habet.

Sit triangulum A B C, et producantur latera A B B C C A ad puncta D E F. Dico angulos C B D B A E A C E, qui extra conſtituuntur, quattuor rectis æquales eſſe.




Sumatur enim intra triangulum, quod vis punctum G, & iungãtur G A G B G C. erunt triangulorum A G B B G C C G A omnes anguli ſex rectis aequales; Sed & anguli C B A C B D B A C B A F A C B A C E ſunt aequales ſex rectis. Ergo dictorum triangulorum anguli angulis C B A C B D B A C B A F A C B A C E aequales ſunt. communes auferantur C B A B A C A C B. reliqui igitur, qui ſiunt ad G ſunt aequales angulis extra figuram conſtitutis. anguli autem ad G quattuor rectis ſint aequales. ergo & anguli, qui extra figuram conſtituuntur, videlicet C B D B A F A C E quattuor rectis aequales erunt. quod demonſtrare oportebat. eodẽ modo demonſtrabimus in reliquis figuris, angulos qui extra ipſas conſtituuntur, quattuor rectis eſſe aequales.

Corol. 15.

THEOREMA. XXIII. PROPOSITIO. XXXIII.

Quę æquales, et parallelas ad eaſdem partes coniungunt rectę lineę, et ipſæ æquales, et parallelæ ſunt.

Sint ęquales et parallelę A B C D: et ipſas cõiungant ad eaſdem partes rectę lineę A C B D. Dico A C B D æquales, et parallelas eſſe. iungatur enim B C. et quoniam A B parallela eſt C D: in ipſaſq; incidit B C, alterni anguli A B C B C D æquales ſunt. Rurſus quoniam A B eſt æqualis C D, communis autẽ B C, duæ A B B C duabus B C C D ſunt ęquales; et angulus A B C ęqualis angulo B C D. baſis igitur A C baſi B D eſt ęqualis: triangulumq; A B C trian



29. huius.

4. huius.

gulo B C D:et reliqui anguli reliquis angulis æquales erũt,alter alteri,quibus æqua lia latera ſubtenduntur.ergo angulus A C B angulo C B D eſt ęqualis.Et quoniam in duas rectas lineas A C B D recta linea B C incidens,alternos angulos A C B C B D ęquales inter ſe efficit,parallela eſt A C ipſi B D. oſtenſa autem eſt et ipſi ęqua lis.Quæ igitur ęquales et parallelas ad eaſdem partes coniungunt rectæ lineæ,et ip ſæ æquales et parallelæ ſunt.quod oportebat demonſtrare.

27.huius.


F. C. COMMENTARIVS.

Hoc theorema veluti confinium parallelarum,parallelogrammorumq́, conſiderationis eſſe dicebamus.aequalium namque & parallelarum rectarum linearum ſymptoma quoddam dicere videtur,parallelogrammorumq́, ortum latenter tradit. parallelogrammum enim fit ex aequalibus, & parallelis, quae initio ductae ſunt, & ex ijs,quae ipſas coniungunt rectis lineis: quae etiam aequales & parallelae oſtenduntur. Qua propter quod ſtatim ſequitur, veluti conſtituto iam parallelogrammo, quae per ſe inſunt eiuſmodi ſpacijs, contemplatur. Quanta autem diligentia in hac propoſitione adhibita ſit,accurate & diligenter notauit Proclus.

Parallelogrãmum quomodo fiat.

THEOREMA XXIIII. PROPO. XXXIIII.

Parallelogrammorum ſpaciorum latera, quæ ex oppoſito,et anguli,inter ſe ęqualia ſunt; et diameter ea bifariam ſecat.



Sit parallelogrammum A C D B, cuius diameter BC. Dico A C D B parallelogrammi latera, quæ ex oppoſito,et angulos inter ſe æqualia eſſe; et diametrum B C ipſum bifariam ſecare. Quoniam enim parallela eſt A B ipſi C D, et in ipſas incidit recta linea B C; anguli alterni A B C B C D inter ſe ęquales ſunt. Rurſus quoniam A C ipſi B D parallela eſt, et in ipſas incidit B C; alterni angu li A C B C B D ęquales ſunt inter ſe. duo igitur triangu la ſunt A B C C B D,quę duos angulos A B C B C A duobus angulis B C D C B D æquales habent,alterum alteri: et vnum latus vni lateri æquale,quod eſt ad ęqua les angulos,vtrique commune B C. ergo et reliqua latera reliquis lateribus æqualia habebunt,alterum alteri,et reliquum angulum reliquo angulo æqualem. ęquale igitur eſt latus quidem A B lateri C D; latus vero A C ipſi B D; et angulus B A C angulo B D C ęqualis. Et quoniam angulus A B C eſt ęqualis angulo B C D; et angulus C B D angulo A C B; erit totus angulus A B D æqualis toti A C D. oſtenſus autem eſt,et angulus B A C angulo B D C ęqualis. parallelogrammorũ igitur ſpaciorum latera, quę ex oppoſito,et anguli, inter ſe ęqualia ſunt. Dico etiam diametrum ea bifariam ſecare. Quoniam enim æqualis eſt A B ipſi C D,communis autem B C,duæ A B B C duabus D C C B ęquales ſunt, altera alteri, et angulus A B C æqualis eſt angulo B C D. baſis igitur A C baſi D B ęqualis. quare et triangulum A B C triangulo B C D æquale erit. ergo diameter B C parallelogramum A C D B bifariam ſecat. quod oportebat demonſtrare.

F. C. COMMENTARIVS.

Theorematum,vt inquit Proclus, alia vniuerſalia ſunt, alia non vniuerſalia. quomodo autem vtrumque horum dicamus, commemorabimus, cum queſitum pertinet, quod vnam partem habet vniuerſalem, alteram vero non vniuerſalem. quamuis enim omne theorema vniuerſale quidem eſſe fortaſſe videretur, & omne, quod ab Euclide oſtenditur huiuſmodi eſſe (quemadmodum in præſentia quoque non ſolum latera, quae ex oppoſito ſunt, & angulos aequales habere vniuerſe de omnibus parallelogrammis dici videtur, verum etiam diametrum vnumquodque bifariam ſecare) attamen alia quidem vniuerſe oſtendi dicimus, alia uero non vniuerſe. aliter enim vniuerſale appellari conſueuit, quod de omnibus verum dicit, de quibus prædicatur; aliter autem quod omnia comprehendit,

Theorematum alia uniuerſalia, alia non uniuerſalia.


Vniuerſale duobus modis appellari conſueuit.

comprehendit, quibus idem ſymptoma ineſt. vniuerſale ſiquidem eſt, & quod omne aequicrure tres angulos duobus rectis aequales habet, quoniam de omnibus aequicruribus verum eſt; vniuerſale autem, & quod omne triangulum habet tres angulos duobus rectis aequales, quoniam omnia comprehendit, quibus hoc per ſe ineſt. Quocirca primum quoque hoc de triangulo oſtendi dicimus, tres angulos duobus rectis aequales habere. Itaque iuxta hanc ſignificationem alia quidem vniuerſalia theorematum dicentes, alia vero non vniuerſalia, præſens theorema dicimus vnum quidem queſitorum vniuerſale habere: alterum vero non vniuerſale. nam hoc quidem latera, quae ex oppoſito ſunt, & angulos aequales habere vniuerſale eſt. ſolis enim parallelogrammis ineſt. hoc vero, diametrum bifariam ſpacium ſecare, non vniuerſale, quoniam non omnia comprehendit, in quibus ſymptoma hoc inſpicitur. etenim circulis, & ellipſibus hoc etiam ineſt. & videntur primae quidem rerum huiuſcemodi notiones eſſe magis particulares, progreſſae autem totum comprehendere. Cum enim antiqui contemplati fuiſſent, diametrum bifariam ſecare circulum, ellipſim, & parallelogrammum, commune in his poſtea contemplati fuere. Hallucinatur autem, inquit Ariſtoteles, quidã nõ vniuerſale tamquã vniuerſale oſtendens, eò quod commune eſt innominatũ, cui primum ſymptoma ineſt. nam quid commune ſit numeris, & magnitudinibus, & motibus, & ſonis, quibus omnibus ineſt permutata proportio, dicere non licet. quid præterea cõmune ſit circulo, ellipſi, & parallelogrammo, difficile eſt exprimere, nã vna quidem figura rectilinea eſt, altera circularis, altera vero mixta. Quapropter vniuerſale eũ oſtẽdere opinamur, qui demonſtrat, omne parallelogrãmũ à diametro bifariã ſecari, eo quòd commune ſimul nõ cernimus, propter quod hoc verum eſt. Hoc igitur in parallelogrammis etiam huiuſcemodi vniuerſale non eſt propter iam dictam cauſſam. illud vero eſt, omne parallelogrammum latera, quae ex oppoſito ſunt & angulos habere aequalia. Etenim ſi aliqua figura poſita fuerit, quae ex oppoſito ſunt latera, & angulos aequalia habere, parallelogrammum hęc eſſe oſtendetur. hęc Proclus. Huius autem theorematis conuerſum, quatenus ad primam partem attinet, tale eſt.

Tres angulos duobus rectis æquales habere primũ de triangulo oſtenditur.

Diametrum bifariam ſecare ſpaciũ, ineſt non ſolum parallelogramo ſed circulis, et ellipſibus.

Omne quadrilaterum, quod latera ex oppoſito, et angulos æqualia habet, parallelogrammum eſt.




Sit quadrilaterum A B C D, habens latus quidem A B aequale lateri D C; latus vero A D lateri B C; angulumq́, A B C angulo A D C aequalem; & angulum B A D angulo B C D. Dico quadrilaterum A B C D parallelogrammum eſſe. Ducatur diameter B D. Et quoniam A B eſt aequalis D C, & A D ipſi B C, duae D A A B duabus B C C D aequales ſunt, angulosq́, aequales cõtinẽt, & baſis B D vtrique cõis. triangulũ igitur A B D triãgulo C D B aequale erit, et reliqui anguli reliquis angulis aequales, videlicet angulus A B D angulo C D B, & angulus A D B angulo C B D, qui ſunt alterni. ergo A B parallela eſt in ipſi D C & A D ipſi B C, ideoq́, A B C D parallelogrammum eſt. quod demonſtrare oportebat. 17. huius.

Conuerſum vero vt ad ſecundam partem huiuſmodi erit [omne quadrilaterum, quod ab vtriſque diametris bifariam ſecatur, parallelogrammum eſt. *quod nos Paulo poſt demonſtrabimus.*

THEOREMA XXV. PROPOSITIO. XXXV.

Parallelogramma in eadem baſi, et in eiſdem parallelis conſtituta, inter ſe æqualia ſunt.




Sint parallelogramma A B C D E B C F in eadem baſi B C, et in eiſdem parallelis A F B C conſtituta. Dico A B C D parallelogrammũ parallelogrammo E B C F æquale eſſe. Quoniã enim parallelogrammum eſt A B C D, æqualis eſt A D ipſi B C. Eadem quoque ratione, et E F eſt æqualis B C. Quare et A D ipſi E F æqualis erit: et communis D E. tota igitur A E totæ D F eſt æqualis. eſt autem et A B æqualis D C. ergo duę E A A B duabus F D D C æquales ſunt, altera alteri, et angulus F D C æqualis angulo E A B, exterior interiori. baſis igitur E B baſi F C eſt æqualis; et E A B triangulum 4. huius.


triangulum æquale triangulo FDC. commune auferatur D G E. reliquum igitur trapezium A B G D reliquo trapezio E G C F eſt æquale. commune apponatur G B C triangulum. ergo totum parallelogrammum A B C D toti parallelogrammo E B C F æquale erit. parallelogramma igitur in eadem baſi; et in eiſdem parallelis cõſtituta inter ſe æqualia ſunt. quod oportebat demonſtrare.

F. Ç. COMMENTARIVS.

Theoremata localia.
Locus lineæ, uel ſuperficiei ſitus, qui idẽ ſymptoma efficit.
Linearum aliæ planæ aliæ ſolidæ.
Localium theorematũ alia planum habent locũ, alia ſolidũ.
localia theoremata, quæ ſolida appellantur.
Hyperbole ſolida linea.
Localia plana in rectis lineis.
Localia plana in circumferentijs.
Theoremata quæ in mathematicis admirabilia dicuntur.
Angulorum æqualitas, et inæqualitas maximam uim habent ad augenda minuendaq; ſpacia.
Theorematis caſus.
4. huius.

Quemadmodum theorematum, vt inquit Proclus, alia quidem vniuerſalia, alia vero particularia eſſe dicebamus, & quemadmodum hæc diuidentes ſubiungebamus, alia eſſe ſimplicia, alia compoſita, & quid vnumquodque horum eſſet oſtendebamus, ita ſanè iuxta aliã diſtinctionem, alia quidem localia eſſe dicimus, alia vero non localia. Voco autem localia, quibuſcumque idem ſymptoma in toto quodam loco accidit, locum uero lineae, vel ſuperficiei ſitum, qui vnum, idemq; ſymptoma efficiat. localium enim alia in lineis conſtituuntur, alia in ſuperficiebus. Et quoniam linearum aliae ſunt planae, aliae ſolidae. & planae quidem, quarum ſimplex eſt in plano intelligentia, vt ipſius rectae: ſolidae uero quarum ortus ex quadam ſolidae figurae ſectione apparet. vt Cylindricae helicis, canonicarumque linearum, dicerem utique eorum etiam, quae in lineis conſtituuntur, localium theorematum, alia quidem planum habere locum, alia uero ſolidum. Preſens igitur theorema & locale eſt, & in lineis locale, & planum. totum enim ſpacium, quod inter parallelas interijcitur, locus eſt parallelogrammorum, quae in eadem baſi conſtituuntur. quae ſanè aequalia quoque inter ſe Euclides oſtendit. eorum uero localium theorematum, quae ſolida uocantur, tale ſit exemplum, [parallelogramma, quæ in aſymptotis, et hyperbola deſcribuntur æqualia ſunt.] *nam hyperbolen ſolidam eſſe lineam, manifeſtum eſt, quòd ſit una ex coni ſectionibus. Cum autem in preſentia de rectilineis ſermo ſit, localia plana in rectis lineis tradit; in tertio autem libro, cũ de circulis, eorumq; ſymptomatibus pertractet, ea etiam, quae in circumferentijs conſtituuntur localium ſimul, & planorum theorematum docebit, tale ſiquidem in illis eſt, quod ait* [Qui in eadem portione ſunt anguli inter ſe ſunt æquales] *nec non illud* [Anguli qui in ſemicirculo recti ſunt] *nam ſi infiniti quidẽ anguli in circũferentia conſtituti fuerint, eadẽ exiſtẽte baſi, omnes aequales eſſe oſtenduntur. & illa quidem proportione reſpondent triangulis, & parallelogrammis, quae in eadem baſi, & in eiſdem ſunt parallelis. Species igitur theorematum, quae mox ſequuntur talis eſt, quae apud antiquos mathematicos localis nuncupatur. Sunt preterea hæc theoremata ex eorum numero, quae admirabilia in mathematicis diſciplinis appellantur. ſtupet enim uulgus ſtatim ſi longitudo multiplicata ſpaciorum aequalitatem non deſtruit, eadem exiſtẽte baſi, quantum enim parallelas producimus, tantum parallelogrammorum quoque longitudines augentur. Sciendum autem eſt angulorum aequalitatem, & inæqualitatem maximam uim habere ad augenda minuendaq; ſpacia. quo enim magis angulos inæquales efficimus, eò ſpacium magis diminuimus, ſi longitudo latitudoq; eadem ſit. Hoc theorema plures habet caſus, uel igitur latus B E ſecat C D, uel non ſecat. & ſi non ſecat, uel E cadit inter A D uel in D. Euclides autem difficiliorem caſum elegit, cum ſcilicet latus BE ipſum CD ſecat. ſi uero E cadit inter AD ita argumentabimur. Quoniam enim A D eſt aequalis E F, quòd utraque ipſi BC ſit aequalis, communi ablata E D, erit reliqua A E aequalis reliquae D F. eſt autem D C aequalis A B. Itaque duae F D D C duabus E A A B aequales ſunt, & angulos aequales continent. baſis igitur F C baſi E B eſt aequalis. & F D C triangulum triangulo E A B. addatur cõmune trapezium E B C D. erit totum A E C D parallelogrammum toti E B C F parallelogrammo aequale. Quòd ſi E cadat in D, ſimiliter demonſtrabimus triangulum F D C aequale triangulo D A B. quare addito utrique communi D B C triangulo, totum A B C D parallelogrammum toti parallelogrammo D B C F, hoc eſt E B C F aequale erit.*






THEOREMA XXVI. PROPOSITIO XXXVI.

Parallelogramma in æqualibus baſibus,

et in eiſdem parallelis conſtituta inter ſe ęqualia ſunt.




Sint parallelogramma ABCD EFGH in æqualibus baſibus B C F G, et in eiſdē parallelis AH BG conſtituta. Dico paral lelogrammum A B C D parallelogrammo E F G H æquale eſſe. coniungantur enim BE C H. Et quoniam æqualis eſt BC ipſi FG, & FG ipſi EH; erit et BC ipſi EH æqualis. ſuntq; parallelæ, et ipſas cō iungunt BE CH. quæ autem æquales, et parallelas ad eaſdem partes coniungunt, æquales, et parallelæ ſunt. Ergo E B, C H et æquales ſunt, et parallelæ: quare E B CH parallelogrammum eſt, et æquale parallelogrammo ABCD; baſim enim eandem habet B C, et in eiſdem parallelis B C, A D conſtituitur. ſimili ratione, et EFGH parallelogrammum eidem parallelogrammo EBCH eſt ęquale. ergo paral lelogrammum ABCD parallelogrammo EFGH ęquale erit. Parallelogramma igitur in æqualibus baſibus, et in eiſdem parallelis conſtituta inter ſe ſunt æqualia. quod oportebat demonſtrare.

33.huius.


Ex antecedente.

F. C. COMMENTARIVS.




Parallelogrāma in eiſdē parallelis, quæ ſint. Theorematis caſus.

Præcedens theorema eaſdem baſes accipiebat, hoc vero æquales. commune autem vtriſque eſt in eiſdem eſſe parallelis. oportet igitur ipſa neque intra ſubiectas cadere parallelas, neque extra. parallelogramma enim in eiſdem dicuntur eſſe parallelis, cum baſes ipſorum, & quæ his ex oppoſito ſunt, latera eiſdem parallelis aptantur. Caſus huius theorematis plures ſunt. Nam vel baſes omnino ſeiunctæ ſunt, vel ſe ſe contingunt, uel aliquam partem habent communem, vtcunque ſe habeant latera, quæ baſibus opponuntur. & quamquam Proclus dicat Euclidem cum baſim ſeiunctam accepiſſet, theorema demonſtraſſe, attamen demonſtratio, quam habemus omnibus caſibus congruere mihi videtur, vt etiam ex hoc loco colligi poſſit demonſtrationes Euclidis à Theone in meliorem formam redactas eſſe.



THEOREMA XXVII.
PROPOSITIO XXXVII.

Triangula in eadem baſi, & in eiſdem parallelis conſtituta inter ſe æqualia ſunt.



Sint triangula ABC DBC in eadem baſi BC, et in eiſdem parallelis AD BC conſtituta. Dico ABC triangulum triangulo DBC ęquale eſſe. producatur AD ex utraque parte in E F pūcta: et per B quidem ipſi CA parallela ducatur BE, per C vero ipſi BD parallela CF. parallelogrammū igitur eſt vtrūque ipſorū EBCA DBCF, et parallelogrammum E B C A eſt ęquale parallelogrammo D B C F, etenim in eadem ſunt baſi BC, et eiſdem parallelis BC EF, eſtq; parallelogrammi quidem EBCA dimidium ABC triangulum, cum diameter AB ipſum bifariam ſecet: parallelogrammi vero DBCF dimidium triangulum DBC; diameter enim DC ipſum bifariā ſecat. Quæ autem æqualium dimidia, inter ſe ęqualia ſunt. ergo triangulum A B C triangulo DBC eſt æquale. Triangula igitur in eadem baſi, et in eiſdem parallelis conſtituta inter ſe ęqualia ſunt. quod oportebat demonſtrare.

31.huius.

35.huius.

34.huius.

7.com.no.

F. C.


F. C. COMMENTARIVS.

Theoremata de triangulis localia, & in lineis localia & plana

Sint etiam hęc theoremata de triangulis, quae in eadem baſi, vel in aequalibus baſibus, & in eiſdem parallelis conſtituuntur localia, & in lineis localia, & plana. dicuntur autem triangula in eiſdem eſſe parallelis, quae cum baſes habeant in vna parallelarum, in reliqua vertices figũt.

THEOREMA XXVIII. PROPOSITIO XXXVIII.

Triangula in baſibus, ęqualibus et in eiſdem parallelis conſtituta, inter ſe ſunt ęqualia.



Sint triangula ABC DEF in æqualibus baſibus, B C E F, et in eiſdem parallelis BF AD conſtituta. Dico ABC triangulum triangulo D E F æquale eſſe. producatur enim AD ex vtraq; parte in GH puncta: et per B quidem ipſi CA parallela ducatur B G: per F vero ducatur FH parallela ipſi DE. parallelogrammum igitur eſt utrumque ipſorum GBCA DEFH. atque eſt parallelogrammum GB CA ęquale parallelogrammo DEFH: in æqualibus enim ſunt baſibus BC EF, et in eiſdem BF GH parallelis. parallelogrammi vero G B C A dimidium eſt ABC triangulum, nam diameter AB ipſum bifariam ſecat. et parallelogrammi DEFH dimidium eſt triangulum DEF, diameter enim D F ipſum ſecat bifariam. quę autem ęqualiũ dimidia, inter ſe æqualia ſunt. ergo ABC triangulum triangulo DEF eſt ęquale. triangula igitur in ęqualibus baſibus, et in eiſdem parallelis conſtituta, inter ſe ſunt æqualia. quod demonſtrare oportebat.

31. huius.

35. huius.

34. huius.


7 com. not.

F. C. COMMENTARIVS.

Caſus in hoc theoremate tot ſunt, quot in xxvi. videtur autem Euclides quod in his quattuor theorematibus oſtendit, vno illo theoremate comprehendiſſe, in principio ſexti libri. [triangula. et parallelogramma, quę eandem habent altitudinem inter ſe ſunt, ut baſes.] *eadem enim altitudo nihil aliud eſt, niſi in eiſdem eſſe parallelis. nã figurae oẽs quę in eiſdẽ ſunt parallelis, eandẽ altitudinẽ habent, & contra, altitudo ſiquidem eſt perpendicularis, quae ab altera parallelarũ ad reliquã pertinet. illic igitur per proportionem oſtenſum eſt, ita ſe ſe habere triangula, et parallelogramma, quae eandem altitudinem habent, hoc eſt quae in eiſdẽ ſunt parallelis, vt baſes: & aequalibus exiſtentibus baſibus aequalia eſſe ſpacia, & dupla duplis, & aliam proportionẽ habentibus, eandem habere & ſpatia inter ſe proportionem: in preſentia uero, quoniam non decebat proportione uti, qui nondũ de ipſa docuerat, contentus fuit aequalitate ſola, atque identitate.*

THEOREMA XXIX. PROPOSITIO XXXIX.

Triangula æqualia in eadem baſi, et ad eaſdem partes conſtituta, in eiſdem quoque ſunt parallelis.



Sint æqualia triangula A B C D B C in eaſdem baſi B C conſtituta, et ad eaſdem partes. Dico et in eiſdem parallelis eſſe. Iungatur enim A D. Dico A D parallelam eſſe ipſi B C. Si enim non eſt parallela, ducatur per A punctum ipſi B C parallela recta linea A E, et B C iungatur. æquale igitur eſt A B C triangulum triangulo E B C, in eadem enim eſt baſi B C, et in eiſdem BC, AE parallelis. Sed A BC triangulũ triangulo D B C eſt ęquale. ergo et triangulum

DBC


D B C æquale eſt ipſi E B C triangulo, maius minori, quod fieri non poteſt. non igitur A E ipſi B C parallela eſt. Similiter oſtendemus neque aliam quampiam parallelam eſſe, præter ipſam A D. ergo A D ipſi B C eſt parallela. Triangula igitur æqualia in eadem baſi, et ad eaſdem partes conſtituta in eiſdem quoque ſunt parallelis. quod oportebat demonſtrare.

F. C. COMMENTARIVS.

Hoc theorema vigeſimi ſeptimi conuerſum eſt, & quod ſequitur eſt conuerſum vigeſimi octaui. nam, vt inquit Proclus, cum triplex ſit theorematum conuerſio, aut enim totum toti conuertitur, vt duodecimum theorema vndecimo; aut pars toti, vt tertium ſecũdo; aut pars parti, vt quintum primo. non enim totum in altero datum, quæſitum in altero eſt, nec quæſitum, datum, ſed pars: talia videntur eſſe hęc quoque theoremata in triangulis. erat ſiquidem quæſitum in præcedentibus, triangula æqualia eſſe. hoc autem non ſolum in his datum eſt, quippe cum partem inſuper ſumpſerit eius, quae in illis erat, poſitionis: hoc enim, in eadem baſi eſſe, & in æqualibus baſibus tum in his, tum in illis datum eſt, præterquam quòd in hiſce poſitionibus quoddam adiecit, quod quidem nec quæſitum, nec datum in illis erat. particula enim illa, ad eaſdem partes, extrinſecus inſuper ſuit aſſumpta. conuerſa vero vigeſimi quinti, & vigeſimi ſexti in parallelogrammis conſulto omiſit, quod eadem ſit in vtriſque demonſtratio. Theorematũ conuerſio triplex.

Et ad eaſdem partes.] *Quae his reſpondent, videlicet καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη in aliquibus græcis exẽplaribus, tum in hoc theoremate, tum in ſequenti nõ legũtur, ſed neceſſario addita ſunt. fieri enim poteſt vt in eadem baſi aequalia triangula ſignentur, vnum quidẽ ad partes ſuperiores, aliud vero ad inferiores, quae tamen non ſunt in eiſdem parallelis, & quandoque non eadem altitudine.* A


Maius minori quod fieri non põt.] *Idẽ abſurdũ ſequetur, ſi recta linea A E ſumatur extra ipſam A D, vt notat Proclus. Ex his, quae hoc loco demonſtrata ſunt, patebit cõuersũ ſe cũdę partis vigeſimi quarti theorematis, quod erat huiuſmodi.*



B

Omne quadrilaterum, quod ab utriſque diametris bifariam ſecatur, parallelogrammum eſt.


Sit quadrilaterum A B C D, cuius diametri A C E D ipſum bifariam ſecent. Dico A B C D parallelogrammum eſſe. Quoniam enim triangula A B C D B C eiuſdem ſunt dimidia, inter ſe aequalia ſunt: & eandem habent baſim B C. quare in eiſdem ſunt parallelis. parallela igitur eſt A D ipſi B C. ſimiliter cum triangulum A B C aequale ſit triangulo A B D, & ſint in eadem baſi A B, demonſtrabitur rectam lineam D C ipſi A B parallelam eſſe. Ergo A B C D parallelogrammum erit. quod oportebat demonſtrare.



THEOREMA XXX. PROPOSITIO XL.

Triangula æqualia in baſibus æqualibus, et ad eaſdem partes conſtituta, in eiſdem quoque ſunt parallelis.

Sint æqualia triangula A B C C D E in æqualibus baſibus B C C E conſtituta. Dico etiam in eiſdem eſſe parallelis. cõiungatur enim A D. Dico A D ipſi B E parallellam eſſe. Nam ſi non eſt, ducatur per A ipſi B E parallela A F, et F E iungatur. triangulum igitur A B C triangulo F C E eſt æquale, cum in æqualibus baſibus, et in eiſdem parallelis B E A F conſtituantur. Sed triangulũ A B C æquale eſt triangulo D C E.



38. huius.


ergo

ergo et triangulum D C E triangulo F C E æquale erit, maius minori, quod fieri nõ potest. non igitur A F ipsi B E est parallela. similiter demonstrabimus neque aliam quampiam parallelam esse, praeter A D. ergo A D ipsi B E parallela erit. Aequalia igitur triangula in basibus æqualibus, et ad easdem partes constituta, etiam in eisdem sunt parallelis. quod demonstrare oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

Cum tria sint in iam dictis propositionibus, videlicet in aequalibus, vel eisdem basibus esse, in eisdem parallelis, & aequalia esse triangula, & parallelogramma; nos duo semper contexentes, vnum vero relinquentes varie conuertemus. aut enim bases easdem, vel aequales ponemus, in eisdemq; parallelis triangula, & parallelogramma, & quattuor faciemus theoremata: aut aequalia ipsa suscipiemus, & bases easdem, vel aequeles, & faciemus alia quattuor; quorum duo quidem omisit Euclides, nimirum ea, quae sunt in parallelogrammis; reliqua vero duo ostendit, videlicet ea, quae in triangulis sunt: aut etiam cum aequalia sumpserimus, & in eisdẽ parallelis, reliquum ostendemus, vel in eisdem basibus esse, vel in aequalibus, & faciemus alia quattuor, quae etiam Euclides omisit. in his namque eadem est demonstratio, nisi quòd duo ex his quattuor per se vera non sunt. non enim aequalia parallelogramma, vel triangula, & quae in eisdem sunt parallelis, necessario in eadem basi sunt. Sed totum hoc in hisce positionibus verum est, vel in eisdem esse basibus, vel in æqualibus; alterum autem, non omnino sumptas positiones consequitur. Quapropter cũ decem sint omnia theoremata, sex quidem geometra conscripsit, quattuor vero omisit, ne rursus eadem ratione frustra laboret, cum eadem sit demõstratio. ostẽdetur enim in triangulis hoc modo.

Triangula æqualia, et in eisdem parallelis constituta, vel in eisdem, vel in æqualibus basibus erunt.




Sint aequalia triangula A B C D E F in eisdem parallelis A D B F constituta. Dico in aequalibus quoque basibus esse. Non enim, sed si fieri potest, sint bases B C E F inæquales, & sit B C maior, abscindaturq; B H aequalis ipsi E F; & 38. huius. *A H iungatur. Itaque quoniam triangula A B H D E F in aequalibus sunt basibus B H E F, & in eisdem parallelis, inter se aequalia sunt. Sed & ipsa A B C D E F triangula posita sunt aequalia. ergo triangulum A B C triangulo A B H est aequale; sed & maius, quod fieri non potest. Non igitur inequales sunt triangulorum A D C D E F bases. Idem demonstrabitur, & in parallelogrammis. Quare cum modus demonstrandi idem sit, & id, quod fieri non potest, idem, totum, scilicet suae parti aequale esse: non immerito ab Euclide prætermissum fuit. hæc ex Proclo.*

THEOREMA XXXI. PROPOSITIO XLI.

Si parallelogrammum, et triangulum eandem basim habeant, in eisdemq; sint parallelis; parallelogrammum ipsius trianguli duplum erit.

Parallelogrammum enim A B C D, et triãgulum E B C, basim habeant eandem B C, et in eisdem sint parallelis B C A E. Dico parallelogrammum A B C D trianguli E B C duplum esse. Iũgatur enim A C. triangulum igi-
37. huius. tur A B D triangulo E B C est æquale; namque in eadem basi B C, et in eisdem B C A E
34. huius. parallelis cõstituitur. Sed A B C D parallelogrammum duplum est trianguli A B C, cum diameter A C ipsum bifariam secet. Quare et ipsius E B C trianguli duplum erit. Si igitur parallelogrammum, et triangulum



gulum eandem baſim habeant, et in eiſdem ſint perallelis; duplum erit parallelogrammum ipſius trianguli. quod demonſtrare oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

Huius theorematis duo ſunt caſus, vel enim triangulum verticem habet intra parallelogrammum, vel extra. Sed in vtriſque demonſtratio eadem eſt. Quòd ſi baſes aequales ſint, eodem modo oſtendemus, parallelogrammi diametrum ducentes. nam cum triangula in baſibus aequalibus conſtituta inter ſe aequalia ſint, parallelogrammum, quod alterius eſt duplum, reliqui quoque duplum erit. Sed duo eius conuerſa ſimiliter demonſtrabuntur, quorum vnum eſt.

Si trianguli parallelogrammum duplum fuerit, eandemq; baſim, aut æquales habuerint, et fuerint ad eaſdem partes: in eiſdem etiam parallelis erunt.


Si enim non ita ſit, totũ parti erit aequale, eademq; ratio vigebit. neceſſe enim eſt, aut intra parallelas trianguli verticem cadere, aut extra: vtro autem modo ſe ſe habuerit, idem ſequetur abſurdum, parallela ipſi baſi per trianguli verticem ducta. alterum vero eſt.

Si trianguli parallelogrammum duplum fuerit, in eiſdemq; ambo fuerint parallelis; aut in vna eademq; baſi, aut in æqualibns erunt.

Si enim in baſibus inaequalibus ſint, cum aequales ſumpſerimus, totum parti aequale erit. In hoc igitur commune abſurdum omnia hęc theoremata deſinunt. Quare elementorum inſtitutor nobis reliquit eam, quae in his eſt, veritatem inueſtigare, cum in ſimplicioribus ipſe, & principalioribus contemplationem contraxerit. ex Procl.

PROBLEMA XI. PROPOSITIO XLII.

Dato triangulo ęquale parallelogrammum conſtituere in dato angulo rectilineo.



Sit datum triangulum A B C, datus autem rectilineus angulus D. Itaq; oportet, dato triangulo ABC ęquale parallelogrãmum conſtituere in angulo rectilineo ipſi Dæ quali. ſecetur B C bifariam in E, et iuncta A E ad rectam lineam E C, atque ad pũctum in ea E, conſtituatur angulus C E F ęqualis ipſi D: et per A quidē ipſi E C parallela ducatur A G; per C vero ipſi F E ducatur parallela C G. parallelogrāmum igitur eſt F E C G. Et quoniam B E eſt ęqualis E C, erit et A B E triangulum triangulo A E C ęquale; in ęqualibus enim ſunt baſibus B E E C, et in eiſdem B C A G parallelis. Ergo triangulum A B C trianguli A E C eſt duplum. eſt autem et parallelogrammum F E C G duplum trianguli A E C; baſim enim eandem habet, et in eiſdē eſt parallelis. ęquale igitur eſt F E C G parallelogrammum triangulo A B C, habetq; C E F angulum ęqualem angulo D dato. Dato igitur triangulo A B C æquale parallelogrammum F E C G conſtitutum eſt, in angulo C E F, qui angulo D eſt æqualis. quod quidem facere oportebat.

23. huius.
31. huius.
38. huius.
34 huius.


THEOREMA XXXII. ROPOSITIO XLIII.

Omnis parallelogrammi ſpacij eorum, quæ circa diametrum ſunt, parallelogrammorum ſupplementa inter ſe ſunt æqualia.

Sit parallelogrammum A B C D, cuius diameter A C: et circa ipſam A C parallelogramma quidem ſint E H F G, quæ vero ſupplementa dicuntur B K K D. Dico B K ſuplementum ſupplemento K D æquale eſſe. Quoniam enim parallelogrammum eſt A B C D, et eius diameter A C, ęquale eſt A B C triangulum triangulo


34. huius.

A D C. Rurſus quoniam E K H A parallelogrammum eſt, cuius diameter A K, triangulum A E K triangulo A H K æquale erit. Eadem ratione, et triangulum K G C triangulo K F C eſt æquale. Cum igitur triangulum quidem A E K æquale ſit triangulo A H K: triangulum vero K G C ipſi K F C; erit triangulum A E K vnà cum triangulo K G C æquale triangulo A H K vna cum H F C triangulo. eſt autem et totum triãgulum A B E æquale toti A D E. reliquum igitur B G ſupplementum reliquo ſupplemento K D eſt æquale. Ergo omnis parallelogrammi ſpacii eorum, quę circa diametrum ſunt, parallelogrãmorum ſuppleměta inter ſe æqualia ſunt. quod oportebat demonſtrare.




F. C. COMMENTARIVS.


Huius theorematis tres ſunt caſus. vel enim parallelogramma, quae circa eandem conſiſtunt diametrum, ſe ſe in puncto contingunt, vel ſe ſe ſecant, vel quadam diametri parte à ſe diſiunguntur. In omnibus autem eadem congruit demonſtratio, quamquam non ſemper quadrilatera ſint ſupplementa. Euclides ſumpſit ea parallelogramma, quae proprie circa diametrum conſiſtere dicuntur, videlicet quae ſe ſe in puncto contingunt, in quo caſu ſupplementa B K K D quadrilatera ſunt, vt apparet in prima figura. Sit rurſus parallelogrammum A B C D, cuius diameter B D, & circa B D parallelogromma ſint E F G D H B L K, quae ſe ſe in punctis M N ſecent. Dico quadrilatera A H M E N L C G inter ſe aequalia eſſe. Quoniam enim triangulum quidem A B D eſt aequale triangulo D B C; triangulum vero E F D 34. huius. *triãgulo D F G; erit reliquum quadrilaterum A B F E æquale reliquo quadrilatero C B F G. Rurſus quoniam triangulũ H B K eſt aequale triangulo K B L, triangulumq; M F K triãgulo K F N; erit reliquum quadrilaterum H B F M aequale reliquo L B F N. erat autem & totum A B F E aequale toti C B F G. reliquum igitur A H M E quadrilaterum reliquo quadrilatero N L C G aequale ſit neceſſe eſt; & hęc quidem quadrilatera ſunt, quae ſupplementa dicuntur.*



Sit denique parallelogrammum A B C D, & eius diameter B D, circa quam parallelogramma E L F D G B H K, quae à ſe inuicem diſiunguntur parte ipſius diametri K L. Et quoniam triangulum A B D eſt aequale triangulo D B C, & triangula E L D G B K aequalia ſunt triangulis D L F K B H; erit reliquum quinquelaterum A G K L E aequale reliquo H K L F C. atque hęc quidem parallelogrammorum ſupplementa ſunt. At nomen ſupplementorum à re ipſa ſumptũ eſt, quatenus hęc quo que pręter duo parallelogramma, quae ſint circa diametrum, totum parallelogrammum complent. Illa autem parallelogramma circa eãdem diametrum ſunt, quęcumque partem totius diametri pro ſua etiam diametro habent. Sed cum totius parallelogrammi diameter aliquod ex lateribus interni parallelogrammi ſecat, tunc parallelogrãmum hoc toti parallelogrammo circa eandem diametrum non eſt, vt in parallelogrammo A B C D diameter B D ſecat E F latus ipſius E F G D parallelogrammi. quare E F G D parallelogrammum non eſt circa eandem diametrum.

Supplementorũ nomen a re ipſa sũptum.





PROBLEMA XII. PROPOSITIO. XLIIII.

Ad datam rectam lineam dato triangulo æquale parallelogrammum applicare in dato angulo rectilineo.

Sit data quidem recta linea A B; datum vero triangulum C; et datus angulus rectilineus D. oportet igitur ad datam rectam lineam A B, dato triangulo C æquale parallelogrammum applicare in angulo ipsi D æquali. constituatur triangulo C æquale parallelogrammum B E F G, in angulo E B G, qui est æqualis D. et ponatur B E in directum ipsi A B, producaturq; F G ad H: et per A alterutri ipsarum B G E F parallela ducatur A H, et H B iungatur. Quoniã igitur in parallelas A H E F recta linea HF incidit, anguli AHF HFE duobus rectis æquales sunt. quare BHG GFE duobus rectis sunt minores. Quæ vero à minoribus, quàm sint duo recti, in infinitum producuntur, cõueniunt inter se. Ergo H B F E productæ conuenient. producantur, et cõueniant in K: perq; K alterutri ipsarum E A F H parallela ducatur K L, et A H G B ad L M puncta producantur. parallelogrammum igitur est H L K F, cuius diameter H K, et circa H K parallelogramma quidem sunt A G M E; ea vero, quæ supplementa dicuntur L B B F: ergo L B ipsi B F est æquale. Sed et B F æquale est triangulo C. quare et L B triangulo C æquale erit. Et quoniã G B E angulus æqualis est angulo A B M, sed et æqualis angulo D; erit et angulus A B M angulo D æqualis. Ad datam igitur rectam lineam A B, dato triangulo C æquale parallelogrammum constitutum est L B, in angulo A B M, qui est æquaiis angulo D. quod facere oportebat.

42. huius.

29. huius.

5. postul.

31. huius.

Ex antecedẽte.

15. huius.

P. C. COMMENTARIVS.

Antiqua hæc sunt, vt ait Eudemus, & pythagoreorum inuenta, applicatio spaciorum, exceſſus, & defectus. cum enim proposita recta linea, datum spacium tuæ rectae lineae coaptaueris, tunc spacium illud applicari dicunt; cum vero spacij longitudinem ipsa recta linea maiorem feceris, tunc excedere; cum autem minorem, ita vt spacio descripto aliqua rectae lineae pars extra sit, tunc deficere. & hoc modo Euclides in sexto libro, tum exceſſus, tum defectus mentionem facit. in præsentia vero applicatione indiguit ad datam rectam lineam dato triangulo aequale parallelogrammum applicare uolens, vt non solum parallelogrammi dato triangulo aequalis constitutionem habeamus, sed etiam ad terminatam rectam lineam, applicationem. ex Proclo.

PROBLEMA XIII. PROPOSITIO XLV.


Rectilineo dato æquale parallelogrammum constituere in dato angulo rectilineo.

Sit datum rectilineum ABCD: datus vero angulus rectilineus E. Itaque oportet rectilineo ABCD æquale parallelogrammum constituere in angulo ipsi E æquali. coniungatur enim DB, et constituatur triangulo ADB æquale parallelogrammum FH; in angulo HKF, qui est æqualis angulo E. deinde ad rectam lineam GH applicetur triangulo DBC æquale parallelogrammum GM, in angulo GHM, qui angulo E est æqualis. Et quoniam angulus E æqualis est vtrique ipsorum HKF GHM; erit et HKF angulo GHM æqualis. communis apponatur KHG. anguli igitur FKH

42. huius.

Ex antecedente.

29.huius. KHG angulis KHG GHM æquales sunt. Sed BKH KHG sunt æquales duobus rectis. ergo et KHG GHM duobus rectis æquales erunt. Itaque ad aliquam rectam lineam GH, et ad datum in ea punctum H duæ rectæ lineæ KH HM non ad easdem partes positę angulos deinceps duobus rectis æquales efficiunt. 14.huius. in directum igitur est KH ipsi HM. Et quoniam in parallelas KM FG 29.huius. recta linea HG incidit, alterni anguli MHG HGF æquales sunt, communis apponatur HGL. anguli igitur MHG HGL angulis HGF HGL sunt æquales. at anguli MHG HGL æquales sunt duobus rectis. quare et anguli HGF HGL duobus rectis æquales erunt. In directum igitur 34.huius. est FG ipsi GL. Et quoniam KF ipsi HG et æqualis est, et parallela; sed et HG ipsi 30.huius. ML; erit KF ipsi ML et æqualis, et parallela: ipsasq; coniungunt rectæ lineæ KM FL, 33.huius. ergo et KM FL æquales et parallelæ sunt. parallelogrammum igitur est KFLM. Quòd cum triangulum quidem ABD æquale sit parallelogrammo HF: triangulum vero DBC parallelogrammo GM; erit totum ABCD rectilineum toti parallelogrammo KFLM æquale. Dato igitur rectilineo ABCD æquale parallelogrammum constitutum est KFLM in angulo FKM, qui est æqualis angulo E dato. quod facere oportebat.



F. C. COMMENTARIVS.

Duobus problematibus, in quibus & constitutionem inuenit, & applicationem aequalium dato triangulo parallelogrammorum, hoc vtiuersalius est. siue enim triangulum, siue quadratum, siue omnino quadrilaterum, siue aliquod aliud multilaterum datum fuerit, per hoc problema aequale ipsi parallelogrammum constituemus. Omne enim rectilineum, vt prius diximus, per se in triangula resoluitur, & methodum inueniendae triangulorum multitudinis tradidimus. resoluentes igitur datum rectilineum in triangula, & vni quidem ipsorum aequale parallelogrammum constituentes, reliquis uero ad datam rectam lineam aequalia applicantes parallelogramma, nempe ad illam, ad quam prima applicatio facta est, habebimus ex his parallelogrammum aequale rectilineo, quod ex illis triangulis constat; et factum iam erit, quod proponebatur. Hęc Proclus.


COROLLARIVM.

Ex iam dictis manifestum est, quomodo ad datam rectam lineam, dato rectilineo æquale parallelogrammum applicari possit in dato angulo rectilineo.

PROBLEMA XIIII. PROPOSITIO XLVI.

A data recta linea quadratum describere.

Sit data recta linea AB. oportet ab ipsa AB quadratũ describere. Ducatur rectę lineę AB à pũcto in ea dato A ad rectos angulos AC: & ipsi AB æqualis ponatur AD; perq; punctum D ducatur DE ipsi AB parallela: et per B ipsi AD parallela ducatur BE. parallelogrammum igitur est ADEB. et AB quidem est æqualis DE, AD vero ipsi BE. Sed et BA ipsi AD est æqualis. quattuor igitur BA, AD DE EB inter se æquales sunt, ideoq; æquilaterum est ADEB parallelogrammum. Dico etiam rectangulum esse. Quoniam enim in parallelas AB DE recta linea incidit AD, anguli BAD ADE duobus rectis sunt æquales. 29.huius. rectus autem est BAD. ergo et ADE rectus erit. 34.huius. parallelogrammorum vero spaciorum, quæ ex opposito sunt latera, et anguli inter se æqualia sunt. rectus igitur est vterque oppositorum ABE BED angulorum: et ob id rectangulum est ADEB. ostensum autem est, et æquilaterum esse. quadratum igitur sit necesse est. atque est à recta linea AB descriptum. quod ipsum facere oportebat.




F. C.

F. C. COMMENTARIVS.

Hoc problemate indigemus potissimum in sequentis theorematis constructionem. Videtur autem Euclides duorum in rectilineis optimorum ortus tradere voluisse. nimirum trianguli equilateri, & quadrati, quoniam ad constitutionem quoque mundanarum figurarum, & precipue earum quattuor, quarum & ortus est & resolutio, hisce rectangulis opus est. nam icosaedrum quidem, & octaedrum, & pyramis ex aequilateris triangulis constant; cubus vero ex quadratis. Proclus hoc loco duo theoremata demonstrat, quibus mathematici tanquam demonstratis passim vtuntur, nempe hęc.

Quadrata ab equalibus rectis lineis descripta, etiam inter se equalia sunt.


Sint enim aequales rectae lineae AB CD, & ab ipsa quidem AB describatur ABEG quadratum; ab ipsa vero CD quadratum CDFH. Dico hęc quadrata inter se aequalia esse. Quoniam enim rectae linae AB CD aequales sunt, erunt & ipsae AG CH aequales, angulosq; aequales continent. ergo & basis GB est aequalis basi HD, & triangulum ABG aequale triangulo CDH, & ipsorum dupla sunt aequalia. quadratum igitur ABEG quadrato CDFH aequale erit. Sed & huius ipsius conuersum.



4. huius.


Quadrata equalia ab equalibus rectis lineis descripta sũt.


Sint enim quadrata aequalia AFCG: & ponatur ita, vt latus AB sit in directum ipsi BC. Cum igitur anguli recti sint, recta quoque linea FE rectae BG in directum erit. iungantur FC GB & AF rectae linae. Et quoniam AF quadratum est aequale quadrato CG, & AFB triangulum aequale erit triangulo CBG. commune apponatur BCF triangulum: totum igitur triangulum ACF toti CFG est aequale; ideoq; parallela est AG ipsi FC. Rursus quoniam angulus AFG est aequalis angulo CGB, cum vterque sit dimidia pars recti; erit AF ipsi CG parallela. aequalis igitur est recta linea AF rectae linae CG, parallelogrammi siquidem latera ex opposito iacentia sunt. Itaque quoniam duo sunt triangula ABF BCG, quae alternos angulos aequales habent, quippe quòd AF CG parallelae sint, & latus vnum AF est aequale lateri CG; erit & latus AB lateri BC, & latus BF lateri BG aequale. Ostensum igitur est latera etiam à quibus descripta sunt AF CG quadrata inter se aequalia esse, cum illa aequalia sint, possumus etiam aliter propositum demonstrare per deductionem ad id, quod fieri non potest in hunc modum. Sint aequalia quadrata ABCD EFGH. Dico rectas lineas AB EF à quibus ea describuntur inter se aequales esse. Si enim AB EF aequales non sint, altera earum est maior, sit maior AB, & abscindatur AK, quae ipsi EF sit aequalis, & ex AK quadratum AKLM describatur. Quoniam igitur AK est aequalis EF, erit & quadratũ AKLM, ex ante demõstratis, aequale quadrato EFGH; sed & quadratum ABCD aequale erit eidem EFGH quadrato. ergo quadratum ABCD quadrato AKLM est aequale, totum parti, quod fieri non potest. non igitur aequalibus existentibus quadratis ABCD EFGH rectae lineae AB EF à, quibus ea describũtur, inaequales sunt. ergo inter se aequales sint necesse est.



39. huius.

28. huius.
34. huius.






Non

Non inutile autem erit ad parallelogrammorum etiam conſtitutionem problema, quod ſequitur.


Ex duabus rectis lineis, quæ duabus datis æquales ſint, et in dato angulo rectilineo parallelogrammum conſtituere.



Sint datae quidem rectae linae A B, datus autem angulus rectilineus C. oportet ex duabus rectis lineis, quae ipſis A B aequales ſint, & in angulo ipſi C aequali, parallelogrammum conſtituere. exponatur recta linea D E, 23.huius. *quae ipſi A ſit aequalis. Itaque ad datam rectam lineam D E, & ad datum in ea punctum D, dato angulo rectilineo C aequalis angulus conſtituatur F D E: ita vt F D ſit aequalis ipſi B rectae linae datae. poſtea per F ducatur F G parallela ipſi D E, & per E ducatur parallela ipſi D F, quae cum F G in puncto G conueniat. parallelogrammum igitur eſt F D E G, ex rectis lineis D E D F conſtitutum, quae datis rectis lineis A B ſunt aequales, & angulum continent F D E dato angulo C aequalem. quod facere oportuit.*

THEOREMA XXXIII. PROPOSITIO XLVII.

In rectangulis triangulis, quod à latere rectum angulum ſubtendente deſcribitur quadratum æquale eſt quadratis, quæ à lateribus rectum angulum continentibus deſcribuntur.



Sit triangulum rectangulum A B C, rectum habens B A C angulum. Dico quadratum deſcriptum à recta B C æquale eſſe quadratis, quæ ab ipſis B A A C deſcribuntur. Deſcribatur enim à B C quidem quadratum B D E C, ab ipſis vero B A A C quadrata G B H C, perq; A alterutri ipſarum B D C E parallela ducatur A L; et A D F C iungãtur. quoniam igitur vterque angulorum B A C B A G rectus eſt, ad aliquam rectam lineam B A, et ad datum in ea punctum A duę rectæ lineæ A C A G non ad eaſdem partes poſitę, angulos qui deinceps ſunt duobus rectis æquales efficiunt. 14.huius. in directum igitur eſt C A ipſi A G. eadem ratione, et A B ipſi A H eſt in directum. Et quoniam angulus D B C eſt æqualis angulo F B A, rectus enim vterque eſt, communis apponatur A B C. totus igitur D B A angulus toti F B C eſt æqualis. Quòd cum duæ A B B D duabus F B B C æquales ſint, altera alteri, et angulus D B A æqualis angulo F B C; erit 4 huius. et baſis A D baſi F C æqualis, et A B D triangulum triangulo F B C æquale. eſtq; 41.huius. trianguli quidem A B D duplum B L parallelogrammum; baſim enim eandem habent B D, et in eiſdem B D A L ſunt parallelis: trianguli vero F B C duplum eſt G B quadratum. rurſus enim baſim habent eandem F B, et in eiſdem ſunt parallelis F B G C. Quæ autem æqualium dupla inter ſe æqualia ſunt. ergo æquale eſt parallelogrammum B L ipſi G B quadrato. Similiter iunctis A E B K, oſtendetur etiam C L parallelogrammum æquale quadrato H C. totum igitur D B E C quadratum duobus quadratis G B H C eſt æquale. et deſcribitur quidem D B E C quadratum à recta linea B C, quadrata vero G B H C ab ipſis B A A C. quadratum igitur B E, à latere B C deſcriptum æquale eſt quadratis, quæ deſcribuntur à lateribus B A A C. ergo in rectangulis triangulis, quadratum, quod deſcribitur à latere rectum angulum

gulum ſubtendente æquale eſt quadratis, quæ à lateribus rectum angulum continentibus deſcribuntur. quod oportebat demonſtrare.


F. C. COMMENTARIVS.

Hoc theorema ad pythagoram referunt, dicuntq; eum cum illud inueniſſet, bouem immolaſſe. Quod autem ab Euclide in ſexto libro conſcribitur multo vniuerſalius eſt, oſtendit enim in rectangulis triangulis figuram, quae fit à latere rectum angulum ſubtendente aequalem eſſe figuris, quae à lateribus rectum angulum continentibus, priori illi ſimiles, & ſimiliter poſitae, deſcribuntur.

THEOREMA XXXIIII. PROPOSITIO XLVIII.

Si quadratum, quod deſcribitur ab vno laterum trianguli æquale ſit quadratis, quæ à reliquis trianguli lateribus deſcribuntur; angulus reliquis duobus trianguli lateribus contentus rectus erit.

Trianguli enim A B C, quod ab vno latere B C deſcribitur quadratum æquale ſit quadratis, quæ à reliquis trianguli lateribus B A A C deſcribuntur. Dico angulum B A C rectum eſſe. Ducatur enim à puncto A ipſi A C ad rectos angulos A D; ponaturq; A D ipſi B A æqualis, & D C iungatur. Quoniam igitur D A eſt æqualis A B, erit et quadratum, quod deſcribitur ex D A, æquale quadrato, quod ex A B. cõmune apponatur quadratum, quod ex A C. ergo quadrata, quæ ex D A A C æqualia ſunt quadratis, quæ ex B A A C deſcribuntur. Sed quadratis quidem, quæ ex D A A C, æquale eſt, quod ex D C quadratum; rectus enim angulus eſt D A C; quadratis vero, quæ ex B A A C æquale ponitur quadratum, quod ex B C. quadratum igitur, quod ex DC æquale eſt ei, quod ex B C quadrato. ergo et latus D C lateri C B eſt æquale. Et quoniam D A eſt æqualis A B, communis autem A C, duæ D A A C duabus B A A C æquales ſunt; et baſis D C eſt æqualis baſi C B. angulus igitur D A C angulo B A C eſt æqualis. rectus autem eſt D A C. ergo et B A C rectus erit. Si igitur quadratum, quod deſcribitur ab vno laterum trianguli, æquale ſit quadratis, quæ à reliquis trianguli lateribus deſcribuntur, angulus reliquis duobus trianguli lateribus contentus rectus erit. quod oportebat demonſtrare.



11. huius.

8. huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Conuertitur hoc theorema precedenti, & totum toti conuertitur. ſi enim triangulum rectangulum fuerit, quod à latere rectum angulum ſubtendente deſcribitur quadratum equale eſt quadratis, quae à reliquis trianguli lateribus deſcribuntur. & ſi quod ab hoc eis, quae à reliquis aequale fuerit, triangulum rectangulum erit, quippe quòd eum. qui reliquis continetur angulum rectum habeat.

LIBRI PRIMI FINIS.

EVCLI-

EVCLIDIS ELEMENTORVM

LIBER SECVNDVS

CVM SCHOLIIS ANTIQVIS, ET COMMENTARIIS *Federici Commandini Vrbinatis.*


DIFFINITIO. I.




OMNE parallelogrammum rectangulum contineri dicitur duabus rectis lineis, quæ rectum angulum constituunt.

F. C. COMMENTARIVS.

Quid sit parallelogrammum rectangulum dictum est superius. dicitur autem contineri duabus rectis lineis, quae sunt circa rectum angulum, quoniam ex ductu alterius in alteram prouenit eius rectanguli area, quod non contingit in aliis parallelogrammis, quae rectangula non sunt. Sit enim parallelogrammum rectangulum A B C D: & sit, exempligratia, latus quidem A B pedum trium, latus vero B C quattuor erit totius rectanguli area pedum duodecim quadratorum. At in aliis parallelogrammis area nota efficitur ex area rectangulorum, quae eadem sunt altitudine, & bases, vel easdem, vel aequales habent. Sit parallelogrammum non rectangulum E F G H, cuius basis F G sit pedum quattuor, ducta vero à puncto E ad F G perpendicularis E K sit duorum pedum. producatur K G ad L, ita vt K L sit ipsi F G aequalis, & iungatur H L. erit E K L H parallelogrammum rectangulum. Quare parallelogramma E F G H E K L H cum aequales habeant bases F G K L, sintq; eadem altitudine, hoc est in eisdem parallelis, inter se aequalia sunt: sed parallelogrammi E K L H area est pedum octo. ergo & area parallelogrammi E F G H totidem pedum sit necesse est. Verum parallelogrammi rectanguli aream prouenire ex ductu laterum, quae circa rectum angulum sunt, in presentia ponatur, quo ad ita esse manifesto apparebit. Demonstratur autem hoc à Ioanne Regiomontano in principio primi libri de triangulis, & à nobis in cõmentarijs in librum Archimedis de dimensione circuli.





DIFFINITIO II.

Omnis parallelogrammi spacij vnum quodque eorum, quæ circa diametrum ipsius sunt, parallelogrammorum, cum duobus supplementis gnomon vocetur.

SCHOLIVM.

SCHOLIVM.

Sciendum eſt gnomonem breuitatis cauſſa à geometris inuentum fuiſſe. nomen vero ex accidente impoſitum eſt; ab ipſo enim forma cognoſcitur, vel totius ſpacij, vel reliqui, cum vel circumponitur, vel aufertur. & in horoſcopijs eius officium dumtaxat eſt præſentes horas notas efficere. ſupplementa autem dicit, non vt quæ parallelogramma non ſint, ſed vt non ſimilia toti, complentia vero totius ad ipſum ſimilitudinem.


Gnomon a Geometris breuitatis cauſſa inuentus.


Gnomonis officium in horoſcopijs.

Supplementa.

F. C. COMMENTARIVS.

Quae parallelogramma dicantur proprie circa diametrum conſiſtere, ſuperius dictum eſt, ut quae ſe inuicem in puncto contingunt. Sit parallelogrammum ABCD, cuius diameter AC, parallelogramma vero circa diametrum ſint AEKH, KGCF: & ſupplementa BK KD. Itaque duo ſupplementa vnà cum alterutro parallelogrammorum, quae ſunt circa diametrum, gnomon appellatur. & ſi parallelogrammo quidem GF circumponatur gnomon, reddit totum parallelogrammum AC ſimile ipſi GF. Si vero à parallelogrammo AC auferatur gnomõ BFH reliquũ eſt parallelogrãmũ EH ſimile toti. Quamobrẽ ab Ariſtotele dictum eſt, quadratũ circũpoſito gnomone creuit quidem, alteratum vero nihil factum eſt. Illud autem, quod in ſcholio additur ſupplementa non eſſe ſimilia toti, non omnino verum eſt, fieri enim poteſt ut quandoque etiam ſint ſimilia. Sit parallelogrammum ABCD circa diametrum AC, & ſecetur AC bifariam in E, perq; E ducatur FG alterutri ipſarum AD BC parallela, & per idem punctum E ducatur HK parallela alterutri ipſarum AB DC. erunt ſupplementa BE ED ſimilia quidem toti, ipſis vero FH KG parallelogrammis, & ſimilia & æqualia, quod ex ijs, quae in ſequentibus tradentur, facile demonſtrare poſſumus.






THEOREMA I. PROPO. I.

Si ſint duæ rectæ lineæ, altera autem ipſarum ſecta fuerit in quot cumque partes; rectangulum duabus rectis lineis contentum æquale eſt eis rectangulis, quæ recta linea inſecta, et ſingulis partibus continentur.

Sint duæ rectæ lineæ A B C; et ſecta ſit B C vt cumque in punctis D E. Dico rectangulum rectis lineis A B C contentum æquale eſſe rectangulo; quod continetur A BD, et rectangulo, quod A DE, et ei, quod A EC continetur. Ducatur enim à puncto B ipſi B C ad rectos angulos B F: atque ipſi A ponatur æqualis B G: et per G quidem ipſi B C parallela ducatur GH; per D E C vero ducantur DK E L CH parallelæ ipſi B G. rectangulum igitur B H eſt æquale rectangulis BK DL E H: atque eſt B H quidem, quod A B C continetur; etenim continetur G B B C: et B G ipſi A eſt æqualis; rectangulum



15. primi.

3. primi.

31 primi.


autẽ B K eſt quod continetur ipſis A BD; continetur enim GB BD, quarũ GB eſt æqualis A:et rectangulum D L eſt quod continetur A DE,quoniam D K,hoc eſt B G ipſi A eſt æqualis:et ſimiliter rectangulum E H eſt quod A E C continetur.ergo rectangulum contentum A B C eſt æquale rectangulo; contento A BD, et contento A D E,et adhuc contento A E C. Si igitur ſint duę rectæ lineę,altera autem ipſarum ſecta fuerit in quotcumque partes ; rectangulum duabus rectis lineis contentum eſt æquale eis,quę recta linea inſecta,et ſingulis partibus continentur.quod oportebat demonſtrare.

F. C. COMMENTARIVS.

Sed & non nulla his ſimilia demonſtrare libuit,quae tum ad alia , tum ad ea,quae in decimo libro traduntur , vtilia erunt.

THEOREMA PRIMVM.


Si fuerint duę rectæ lineæ,quæ ſecentur in quotcumque partes;rectangulum duabus rectis lineis contentum eſt æquale rectangulis , quæ vnaquaque parte vnius ad vnamquamque partem alterius applicata continentur.



Sint duae rectae linae A B B C rectum angulum A B C continentes,& ſecetur A B quidem in punctis DE, E C vero in punctis F G. dico rectangulum contentum A B B C aequale eſſe rectangulis , quae ſingulis ipſarum A D D E E B ad ſingulas B F F G G C applicatis continentur . completo enim parallelogrammo A B CH, ducantur per D E puncta rectae linae D K EL, al
1. primi. *terutri ipſarum A H B C parallelae;& per F G ducãtur F M N O GPQR parallelae alterutri ipſarum A B H C. erit parallelogrammum A C aequale parallelogrammis A N D M E F O Q N P M G R K Q L P C: & ſunt parallelogramma A N D M E F,quae continentur ipſa B F , & ſingulis partibus rectae linae A B,videlicet A D D E E B: parallelogramma vero O Q N P M G ſunt, quae continentur F G, & ſingulis partibus A D D E E B:& denique parallelogramma R K Q L P C,quae continẽtur G C, & ſingulis partibus eiuſdem rectae linae A B. Si igitur fuerint duae rectae linae , quae ſecentur in quotcunque partes;rectangulum duabus rectis lineis contentum eſt aequale rectangulis , quae vnaquaque parte vnius ad vnamquamque partem alterius applicata continentur.quod oportebat demonſtrare.*

THEOREMA II.

Si fuerint duę rectæ lineæ, quæ vtcumque ſecentur; rectangulum totis contentũ vnà cum eo, quod continetur duabus partibus ipſarum eſt æquale rectangulis, quæ continentur totis,et dictis partibus vnà cum eo,quod reliquis partibus continetur;



Sint duae rectae linae A B B C,rectum angulum A B C continentes: & ſecetur A B quidem in puncto D; B C vero in puncto E. Dico rectangulum A B C vnà cum rectangulo contento duabus partibus ipſarum,videlicet D B E C aequale eſſe & rectangulo contento tota A B, & dicta parte rectae linae B C,videlicet E C,& contento tota B C,& dicta parte D B vnà cum eo, quod reliquas partibus A D B E continetur.compleatur enim parallelogrãmum A B C F, & à puncto D alterutri ipſarum B C A
1. primi. *F parallela ducatur D G: à puncto autem E ducatur E H K parallela alterutri ipſarum A B F C. itaque conſtat rectangulum A B C aequale eſſe rectangulis A E K C.addatur vtrinque commune rectangulum H C, quod continetur duabus partibus*


D B

D B E C. Rectangulum igitur A B C vnà cum rectangulo H C est aequale tribus rectangulis A E K C, & H C. quorum rectangulum quidem K C est quod continetur tota A B, hoc est K E, & parte E C: rectangulum vero D E vna cum rectangulo H C est quod continetur tota B C, & parte D B: & reliquum A H est quod continetur reliquis partibus A D B E, hoc est A D D H. ergo rectangulum A B C vnà cum rectangulo H C est aequale & rectangulo contento tota A B, & E C, & contento tota B C, & D B vnà cum eo, quod reliquis partibus A D B E continetur. Si igitur duae rectae lineae vtcumque secentur et reliqua, quod oportebat demonstrare. Eodem modo demonstrabitur & in alys partibus.

THEOREMA II. PROPOSITIO II.

Si recta linea secta fuerit vtcumque; rectangula quæ tota, et singulis partibus cõtinẽtur æqualia sunt ei, quod à tota fit quadrato.


Recta enim linea A B secta sit vtcumque in pũcto C. Dico rectangulum, quod A B B C continetur, vnà cùm contento B A A C æquale esse quadratõ, quod fit ex A D. Describatur enim ex A B quadratũ ADEB, et per C ducatur alterutri ipsarum A D B E parallela C F. æquale igitur est A E rectãgulis A F C E. atque est A E quidem quadratum, quod ex A B; A F vero rectangulum cõtentum B A A C; etenim D A A C continetur, quarum A D ipsi A B est æqualis: et rectangulum C E continetur A B B C, cum B E sit æqualis A B. ergo rectangulum B A C vnà cum rectangulo A B C æquale est quadrato ex A B. Si igitur recta linea vtcumque secta fuerit, rectangula, quę tota, et singulis partibus continentur, æqualia sunt ei, quod à tota fit quadrato. quod demonstrare oportebat.



46. primi. 31. huius.

F. C. COMMENTARIVS.


Similiter vt superius demonstrabitur, si recta linea secetur in quotcumque partes, quadratum totius lineae aequale esse rectangulis, quae singulis partibus ad singulas applicatis continentur.



THEOREMA. III. PROPOSITO. III.

Si recta linea vtcumque secta fuerit; rectangulum tota, et vna eius parte contentum æquale est et rectangulo, quod partibus continetur, et ei quod à prædicta parte fit quadrato.

Recta enim linea A B secta sit vtcumque in puncto C. Dico A B C rectangulum æquale esse rectangulo A C B vnà cum quadrato, quod fit ex B C. Describatur enim ex B C quadratũ C D E B; producaturq; E D in F; et per A alterutri ipsarum C D B E parallela ducatur A F. æquale vtique erit rectangulũ A E ipsis A D C E: et est A E quidem rectãgulum contentum A B B C; etenim A B B E continetur, quarum B E est æqualis B C: rectangulum vero A D est quod continetur A C C B, cum D C




46. primi. 31. primi.

ipſi C B ſit æqualis: et D B eſt quadratum, quod fit ex B C. ergo rectangulum A B C eſt æquale rectangulo A C B vnà cum quadrato quod ex B C. Si igitur recta linea vtcumque ſecta fuerit; rectangulum tota, et vna eius parte contentum æquale eſt rectangulo, quod partibus continetur, et ei, quod à prædicta parte fit quadrato.

THEOREMA IIII. PROPOSITIO IIII.

Si recta linea ſecta fuerit vtcumque, quadratum quod fit à tota æquale erit, et quadratis, quę à partibus fiunt, et ei, quod bis partibus continetur rectangulo.



Recta enim linea A B ſecta ſit vtcumque in C. Dico quadratum, quod fit ex A B æquale eſſe, et quadratis ex A C C B, et ei rectangulo quod bis A C C B continetur. Deſcribatur enim ex A B quadratum A D E B, iungaturq; B D, et per C quidem alterutri ipſarum A D B E parallela ducatur C G F; per G vero alterutri ipſarum A B D E ducatur parallela H K. Et quoniam C F eſt parallela ipſi A D, et in ipſas incidit B D: erit exterior angulus B G C interiori et oppoſito A D B æqualis: angulus autem A D B eſt æqualis angulo A B D, quòd et latus B A æquale eſt lateri A D. quare C G B angulus angulo G B C eſt æqualis: ac propterea latus B C lateri C G æquale. Sed et latus C B æquale eſt lateri G K, et C G ipſi B K. ergo et G K eſt æquale K B, et C G K B æquilaterum eſt. dico inſuper etiam rectangulum eſſe. quoniam enim C H eſt parallela ipſi B K, et in ipſas incidit C B; anguli K B C G C B duobus rectis ſunt æquales. rectus autem eſt K B C angulus. Ergo et rectus G C B, et anguli oppoſiti C G K, G K B recti erunt. rectangulũ igitur eſt C G K B. Sed oſtenſum fuit et æquilaterum eſſe. quadratum igitur eſt C G K B, quod quidem fit ex B C. eadem ratione et H F eſt quadratum, quod fit ex H G, hoc eſt ex A C. ergo H F C K ex ipſis A C C B quadrata ſunt. et quoniam rectãgulum A G eſt æquale rectangulo G E, atque eſt A G quod A C C B continetur, eſt enim G C ipſi C B æqualis: erit et G E æquale ei, quod continetur A C C B. quare rectangula A G G E æqualia ſunt ei quod bis A C C B continetur. Sunt autem et H F C K quadrata ex A C C B. quattuor igitur H F C K A G G E et quadratis ex A C C B, et ei quod bis A C C B continetur rectangulo ſunt æqualia. Sed H F C K A G G E ſunt totum A D E B quadratum, quod fit ex A B. quadratum igitur ex A B æquale eſt, et quadratis ex A C C B, et ei quod bis A C C B continetur rectangulo. quare ſi recta linea vtcumque ſecta fuerit; quadratum quod fit à tota æquale erit et quadratis, quę à partibus fiunt, et ei rectangulo, quod bis partibus continetur, atque illud eſt, quod demonſtrare oportebat.

46. primi. 31. primi. 29. primi. 5. primi. 6. primi. 34. primi. 29. primi. 34. primi. 43. primi.

ALITER. Dico quadratum ex A B æquale eſſe, & quadratis ex A C C B. et ei rectangulo, quod bis A C C B continetur. quoniam enim in eadem figura æqualis eſt B A ipſi A D; et angulus A B D angulo A D B æqualis erit: et cum omnis trianguli tres anguli duobus rectis ſint æquales; erunt trianguli A B D tres anguli A B D A D B B A D æquales duobus rectis. rectus autem eſt angulus B A D. ergo reliqui A B D A D B ſunt vni recto æquales, et ſunt æquales inter ſe ſe. vterque igitur ipſorum A B D A D B eſt recti dimidius. Sed rectus eſt B C G, æqualis namque eſt angulo oppoſito, qui ad A. reliquus igitur C G B dimidius eſt recti: ac propterea C G B angulus angulo C B G eſt æqualis; et latus B C æquale lateri C G. Sed C B eſt æqualis G K, et C G ipſi B K. æquilaterum igitur eſt C K; et cum habeat rectum angulum C B K, etiam eſt quadratum; quod quidem ſit ex C B. eadem ratione et H F

5. primi. 32. primi. 29. primi. 6. primi.

quadratum


quadratum est, et æquale quadrato quod ex A C. quadrata igitur sunt C K H F, et quadratis ex A C C B æqualia. Rursus quoniam rectangulum A G est æquale ipsi G E, atque est A G id quod A C C B continetur, est enim C G ipsi C B æqualis: erit et G E æquale contento A C C B. quare A G G E æqualia sunt ei, quod bis A C C B continetur. Sunt autem et C K H F æqualia quadratis ex A C C B. ergo C K H F A G G E æqualia sunt et quadratis ex A C C B, et ei quod bis A C C B cõtinetur. Sed C K H F et A G, G E sunt totum A E, quod fit ex A B quadratum. quadratum igitur ex A B æquale est, quadratisq; ex A C C B, et ei quod bis A C C B continetur rectangulo. quod ostendere oportebat. 34. primi. 43. primi.

COROLLARIVM.

Ex hoc perspicue constat in quadratis spacijs parallelogramma, quæ sunt circa diametrum, quadrata esse.

THEOREMA V. PROPOSITIO V.

Si recta linea secta fuerit in partes æquales, et in partes inæquales, rectangulum inæqualibus totius partibus contentum vnà cum quadrato lineæ, quæ inter sectiones interijcitur, æquale est ei quod à dimidia fit quadrato.



Recta enim linea quædam A B secta sit in partes æquales ad punctum C, et in partes inæquales ad D. Dico rectangulum contentum A D D B vnà cum quadrato quod fit ex C D æquale esse ei quod ex C B quadrato. Describatur enim ex B C quadratum C E F B: iungaturq; B E; et per D quidem alterutri ipsarũ C E B F parallela ducatur D H G; per H vero ducatur K L O parallela alterutri ipsarum C B E F: et rursus per A ducatur alterutri C L B O parallela A K. Et quoniã C H supplementum æquale est supplemento H F, commune apponatur D O. totum igitur C O toti D F est æquale, sed C O est æquale A I, quoniam et A C ipsi C B. ergo et A L æquale est D F. commune apponatur C H. totum igitur A H ipsis F D D L æquale erit. Sed A H quidẽ est quod A D D B continetur, etenim D H ipsi D B est æqualis: F D D L vero est gnomon M N X. gnomon igitur M N X æqualis est ei, quod A D D B continetur. commune apponatur L G, æquale scilicet quadrato quod ex C D. ergo M N X gnomon, et L G æqualia sunt rectangulo, quod continetur A D D B, et ei, quod fit ex C D quadrato. Sed M N X gnomon, et L G sunt totum quadratum C E F B, quod quidem fit ex C B. ergo rectangulum A D B vnà cum quadrato quod ex C D æquale est ei, quod ex C B quadrato. Si igitur recta linea secta fuerit in partes æquales, et in partes inæquales, rectangulum inæqualibus totius partibus contẽtum vnà cum quadrato lineæ, quæ inter sectiones interiicitur, æquale est ei, quod à dimidia fit quadrato. quod demonstrare oportebat. 46. primi. 31. primi. 43. primi. 36. primi.


THEOREMA VI. PROPOSITIO VI.

Si recta linea bifariam secetur, atque ipsi in rectum adijciatur quædam recta linea; rectangulum tota cum adiecta, et adiecta cõtentũ, vnà cum quadrato dimidiæ, æquale est quadrato, quod ab ea,

quæ

quę ex dimidia, et adiecta cõſtat tãquã ab vna linea deſcribitur.

Recta enim linea quędam A B ſecetur bifariam in puncto C, adiiciaturq; ipſi in rectum B D. Dico rectangulum A D B vnà cũ quadrato ex B C æquale eſſe ei, quod fit ex C D quadrato. Deſcribatur enim ex C D quadratum C E F D, et iungatur D E; perq; B alterutri ipſarum C E D F parallela ducatur B H G: et per H ducatur K L M parallela alterutri ipſarum A D E F: et adhuc per A alterutri C L D M parallela A K. Itaque quoniã A C eſt æqualis C B, erit et rectangulum A L rectangulo C H æquale. ſed C H æquale eſt H F. ergo et A L ipſi H F æquale erit. commune apponatur C M. totum igitur A M gnomoni N X O eſt æquale: atq; eſt A M, quod A D D B cõtinetur, etenim D M eſt æqualis D B. ergo et gnomon N X O æqualis eſt rectãgulo A D B. rurſus commune apponatur L G, æquale ſcilicet quadrato, quod ex C B. rectangulum igitur A D B vnà cum quadrato quod ex B C æquale eſt gnomoni N X O, et ipſi L G. Sed gnomon N X O, et L G totum ſunt C E F D quadratum; quod quidem fit ex C D. ergo rectangulum A D B vnà cum quadrato ex B C æquale eſt ei, quod fit ex C D quadrato. Si igitur recta linea ſecetur bifariam, adiiciaturq; ipſi in rectum quædam recta linea; rectangulum tota cum adiecta, et adiecta contentum vnà cum quadrato dimidiæ æquale eſt quadrato, quod ab ea, quę ex dimidia, et adiecta conſtat, tamquàm ab vna linea deſcribitur. quod oportebat demonſtrare.



46. primi.
31 primi.
36. primi.
43. primi.


SCHOLIVM.

In hoc oſtenditur arithmetica analogia. quo enim A D ſuperat D C, videlicet ipſa C B, eo & C D ſuperat D B. quod per numeros manifeſtius cognoſcitur, cum medius ſemper æqualiter & excedatur, & excedat. Theorema autem eſt. Quadratum quod fit ab exceſſu vnà cum eo, quod extremis continetur, quadrato medij æquale eſſe.

THEOREMA VII. PROPOSITIO VII.

Si recta linea vtcumque ſecta fuerit; quæ à tota, et vna parte fiunt vtraque quadrata æqualia ſunt, et rectangulo, quod bis tota, ac dicta parte continetur, et ei, quòd à reliqua parte fit quadrato.

Recta enim linea quædam A B ſecta ſit vtcumque in pũcto C. Dico quadrata ex A B B C æqualia eſſe et rectangulo, quod bis A B B C continetur, et ei quod fit ex A C quadrato. Deſcribatur enim ex A B quadratum A D E B, et figura conſtruatur. itaque quoniam A G rectangulũ æquale eſt rectangulo G E. commune apponatur C F. quare totum A F toti C E eſt æquale. rectangula igitur A F C E dupla ſunt rectanguli A F. Sed A F C E ſunt K L M gnomon, et quadratum C F. ergo K L M gnomon, et quadratũ C F dupla erũt rectanguli A F. eſt autem id quod bis A B B C continetur duplum ipſius A F, etenim B F eſt



46. primi.
43. primi.


æqualis

æqualis BC. gnomon igitur KLM, et quadratum CF æqualia ſunt ei, quod bis AB BC continetur. commune apponatur DG, quod eſt ex AC quadratum. Ergo gnomon KLM, et quadrata BG GD ęqualia ſunt ei, quod bis AB BC continetur, et quadrato ex AC. at gnomon KLM, et quadrata BG GD totum ſunt AD EB, et CF; quæ ſunt ex AB BC quadrata. quadrata igitur ex AB BC ęqualia ſunt rectãgulo, quod bis AB BC cõtinetur vnà cum eo, quod fit ex AC quadrato. ergo ſi recta linea vtcumque ſecta fuerit; quæ à tota, et vna parte ſiunt vtraque quadrata æqualia ſunt rectangulo; quod bis tota, ac dicta parte continetur, et ei, quod à reliqua parte fit, quadrato; quod oſtendere oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

Non alienum eſſe videtur hoc loco apponere theorema, quod etiam in commentarijs in Apollonij pergei conica demonſtrauimus: eo enim ad ſequentia vtemur.

Si recta linea in partes inęquales ſecetur; earum partium quadrata æqualia ſunt rectangulo, quod bis dictis partibus continetur vnà cum quadrato eius lineæ, quæ maior pars ſuperat minorem.




46. primi.
31. primi.
34. primi.

Secetur recta linea AB in partes inęquales in C ita vt AC maior ſit quàm CB; & ipſi CB aequalis ponatur AD. Dico quadrata ex AC CB aequalia eſſe rectangulo, quod bis AC CB continetur vnà cum quadrato rectae lineae DC, qua ſcilicet AC ipſam CB ſuperat. conſtituantur enim ex AC CB quadrata ACEF CBGH: & per D ducta linea DK, ipſi CE parallela, producatur GH, vt ſecet DK in L. Itaque quoniam AD eſt aequalis CB, addita vtrique communi DC; erit DB ipſi AC aequalis. Sed GL eſt aequalis BD, & CE aequalis AC: ergo & GL ipſi CE aequalis erit, eſt autem & CH aequalis HG. reliqua igitur EH reliqua HL eſt aequalis: ideoq; KH eſt quadratum, quod à linea KE, hoc eſt DC deſcribitur. rectangula vero AK DG ſunt quae continentur lineis AC CE; etenim AD eſt aequalis BC, & DB ipſi AC. quadrata igitur ex AC CB aequalia ſunt rectangulo, quod bis AC CB continetur vnà cum ipſius DC quadrato. Si igitur recta linea in partes inęquales ſecetur; earum partium quadrata aequalia ſunt rectangulo, quod bis dictis partibus continetur vnà cum quadrato eius lineae, qua maior pars ſuperat minorem, quod demonſtrare oportebat.

THEOREMA VIII. PROPOSITIO VIII.

Si recta linea vtcumque ſecta fuerit; et quod quater tota, et vna parte continetur rectangulum vnà cum quadrato reliquę partis ęquale eſt quadrato, quod ex tota, et dicta parte tamquam ex vna linea deſcribitur.

Recta enim linea AB ſecta ſit utcumque in C. Dico rectangulum quater AB BC contẽtum vnà cum quadrato quod ex AC æquale eſſe quadrato, quod ex AB BC, tamquam ex vna linea deſcribitur. Producatur enim recta linea AB in D; et ipſi CB ponatur æqualis BD; deſcribaturq; ex AD quadratum AEFD; et dupla figura conſtruatur. Quoniam igitur CB eſt æqualis BD, atque eſt CB ipſi GK ęqualis; BD vero ipſi KN: erit et GK ęqualis KN. eadem ratione et PR ipſi RO eſt æqualis. et quoniam CB eſt ęqualis BD, et GK ipſi KN; erit rectangulum



34. primi.
36. primi.


quidem

43.primi. quidem CK rectangulo KD; rectāgulū vero GR ipſi RN ęquale. Sed CK eſt æquale RN, ſupplemēta enim ſunt parallelogrāmi CO. ergo et KD æquale eſt GR, et quattuor rectāgula DK KC GR RN inter ſe æqualia; ideoq; quadrupla ſunt rectāguli C K. Rurſus quoniā C B eſt ęqualis BD, et BD quidē ipſi BK, hoc eſt ipſi CG æqualis; CB vero ipſi GK, hoc eſt GP: erit et CG æqualis GP. eſt autem et PR ipſi RO æqualis. rectangulum igitur AG rectangulo MP, et rectangulum PL ipſi RF æquale erit.
43.primi. Sed MP eſt æquale PL; ſupplementa enim ſunt ML parallelogrammi. quare et AG ipſi RF eſt æquale. quattuor igitur AG MP PL RF inter ſe æqualia ſunt, ac propterea ipſius AG quadrupla. Oſtenſum autem eſt et quattuor CK KD GR RN quadrupla eſſe CK. quare octo continentia gnomonem STY ipſius AK quadrupla ſunt, et quoniam AK eſt quod AB BC continetur; etenim BK eſt æqualis B C; erit contentum quater AB BC ipſius AK quadruplum. At demonſtratus eſt gnomon STY quadruplus AK. quod igitur quater AB BC continetur ęquale eſt gnomoni STY. commune apponatur XH, quod quidem quadrato ex AC eſt æquale. ergo quod quater AB BC continetur vnà cum quadrato ex AC ęquale eſt ipſi STY gnomoni, et quadrato XH. Sed STY gnomon, et YH totum ſunt AEFD quadratum, quod deſcribitur ex AD. rectangulum igitur quater AB BC contentum vnà cum quadrato ex AC æquale eſt ei, quod ex AD, hoc eſt ex AB BC tamquam ex vna linea deſcribitur, quadrato. ergo ſi recta linea vtcumque ſecta fuerit; quod quater tota, et vna parte continetur rectangulum, vnà cum quadrato reliquę partis æquale eſt quadrato, quod ex tota, et dicta parte tamquam ex vna linea deſcribitur. quod oſtendendum fuerat.

THEOREMA IX. PROPOSITIO IX.

Si recta linea in partes ęquales, et in partes inęquales ſecta fuerit, quadrata, quæ ab inæqualibus totius partibus deſcribuntur, dupla ſunt et quadrati dimidiæ, et quadrati linea eius, quę inter ſectiones interijcitur.

Recta enim linea quędam AB ſecta ſit in partes ęquales ad C, et in partes inęquales ad D. Dico quadrata ex AD DB, quadratorum ex AC
11.primi. CD dupla eſſe. Ducatur enim à puncto C ipſi AB ad rectos angulos CE, et vtrique ipſarum AC CB ęqualis ponatur, iunganturq; EA, EB,
31.primi, ac per D quidem ipſi CE parallela ducatur DF;
5.primi. per F vero ipſi AB parallela FG, et AF iungatur. itaque quoniam AC eſt ęqualis CE; erit et
32.primi, angulus EAC angulo AEC ęqualis. Et cum rectus ſit angulus ad C, reliqui AEC, EAC vni recto ęquales erunt. et ſunt æquales inter ſeſe. vterque igitur ipſorum AEC EAC recti eſt dimidius. eadem ratione et recti dimidius eſt vterque ipſorum CEB EBC. ergo totus angulus AEB rectus eſt. et quoniam angulus GEF dimidius



29.primi, eſt recti, rectus autem EGF; ęqualis enim eſt interiori, et oppoſito ECB; erit et
6.primi, reliquus EFG recti dimidius: æqualis igitur eſt GEF angulus ipſi EFG. quare et latus EG lateri GF eſt ęquale. rurſus quoniam angulus ad B dimidius eſt recti, rectus autem FDB, quòd ſit æqualis interiori, et oppoſito ECB: reliquus BFD recti erit dimidius. angulus igitur ad B æqualis eſt angulo DFB; ideoq; latus DF lateri DB æquale, et quoniam AC eſt æqualis CE, erit et ex AC quadratum æquale quadrato ex CE. quadrata igitur ex AC CE dupla ſunt quadrati ex AC. quadratis autem ex
41.primi, AC CE ęquale eſt quadratum ex EA, ſiquidem rectus eſt angulus ACE. ergo quadratum ex EA quadrati ex AC eſt duplum. rurſus quoniam EG æqualis eſt GF; et quadratū ex EG quadrato ex GF eſt æquale. quadrata igitur ex EG GF dupla ſunt quadrati ex GF. at quadratis ex EG GF æquale eſt quod ex EF quadratum. Ergo

quadratum


quadratum ex EF quadrati ex GF duplum erit. æqualis autem est GF ipsi CD. quadratum igitur ex EF duplum est quadrati ex CD. Sed et quadratum ex AE quadrati ex AC est duplum. ergo quadrata ex AE EF dupla sunt quadratorũ ex AC CD. quadratis vero ex AE EF æquale est ex AF quadratum; quoniam angulus AEF rectus est. quadratum igitur ex AF quadratorum ex AC CD est duplum. Sed quadrato ex AF æqualia sunt ex AD DF quadrata. rectus enim est angulus qui ad D. ergo ex AD DF quadrata dupla sunt quadratorum ex AC CD. est autem DF ipsi DB æqualis. quadrata igitur ex AD DB quadratorum ex AC CD dupla erunt. Quare si recta linea in partes æquales, et in partes inæquales secta fuerit, quæ ab inæqualibus totius partibus describuntur quadrata dupla sunt, et quadrati dimidiæ, et quadrati lineæ eius, quæ inter sectiones interiicitur. quod ostendere oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

Possumus etiam illud aliter demonstrare hoc modo. Iisdem enim positis quoniam recta linea AB secatur in partes aequales ad punctum C, et in partes inæquales ad D; erit DB recta linea, qua AC ipsam CD superat. Ergo ex ijs, quę demonstrauimus ad septimam huius, quadrata ex AC CD aequalia sunt, & rectangulo, quod bis AC CD continetur, & ipsius DB quadrato: ideoq; quadrata ex AC CD una cum rectangulo, quod bis AC CD continetur, & quadrato ipsius DB, dupla sunt quadratorũ ex AC CD. Sed quadratum ex AD est aequale quadratis ex AC CD, & rectangulo bis AC CD contento. quadrata igitur ex AD DB quadratorum ex AC CD sunt dupla, quod oportebat demonstrare. 4. huius.


THEOREMA X. PROPOSITIO X.

Si recta linea secetur bifariam, et ipsi in rectum quædam recta linea adijciatur; quæ à tota cum adiecta, et adiecta fiunt vtraque quadrata dupla sunt, et quadrati dimidiæ, et quadrati, quod ab ea quæ ex dimidia, et adiecta constat, tamquam ab vna linea describitur.



Recta enim linea AB secetur bifariam in C, et ipsi in rectum adiiciatur quędam recta linea BD. Dico quadrata ex ad DB quadratorum ex AC CD dupla esse. ducatur enim à puncto C ipsi AB ad rectos angulos CE, et vtrique ipsarum AC CB æqualis ponatur; iunganturq; AE EB: et per E quidem ipsi AD parallela ducatur EF; per D vero ducatur DF parallela ipsi CE. et quoniã in parallelas EC FD recta quædam linea EF incidit, anguli CEF EFD æquales sunt duobus rectis. anguli igitur FEB EFD duobus rectis sunt minores. quæ autem à minoribus, quàm sint duo recti in infinitum producuntur, conueniunt inter se se. Ergo EB FD productæ ad partes BD conuenient; producantur, et conueniant in puncto G, et AG iungatur. itaque quoniam AC est æqualis CE, et angulus AEC angulo EAC æqualis erit: atque est rectus qui ad C. vterque igitur ipsorum EAC AEC est recti dimidius. eadem ratione et recti dimidius est vterque CEB EBC. ergo AEB est rectus. et quoniam EBC est dimidius recti; erit et recti dimidius DBG; cum sit aduerticem. Sed et BDG rectus est; etenim est æqualis ipsi DCE alterno. reliquus igitur DGB dimidius est recti, et ob id ipsi DBG æqualis. ergo et latus BD æquale lateri DG. rursus quoniam EGF est dimidius recti, rectus autem, qui ad F, est

11. primi.
31. primi.
29. primi.
Ex demonstratis ad 29. primi.
5. primi.
15. primi.
29. primi.



enim angulo oppoſito qui ad C ęqualis;erit et reliquus FEG recti dimidius,et æqualis ipſi E GF. quare et latus GF lateri EF eſt ęquale. et cũ EC ſit ęqualis CA;et quadratũ ex EC ęqua le eſt ei,quod ex CA,quadrato.ergo quadrata ex EC CA dupla sũt quadrati ex C A. quadratis aũt ex EC CA ęquale eſt quadratũ ex E A. quadratũ igitur ex EA quadrati ex AC eſt duplum.rurſus quoniã GF eſt ęqualis F E, æquale eſt et ex G F quadratũ quadrato ex F E.quadrata igitur ex GF FE quadrati ex EF sũt dupla.at quadratis ex GF FE æquale eſt,quod ex EG quadratũ.ergo quadratũ ex E G duplum eſt quadrati ex E F.æqualis aũt eſt EF ipſi CD. quadratũ igitur ex EG quadrati ex CD duplum erit. Sed oſtenſum eſt quadratũ ex E A duplum quadrati ex AC.ergo ex AE EG quadrata quadratorũ ex AC C D sũt dupla . quadratis vero ex AE EG æquale eſt quod ex A G quadratum.quadratum igitur ex A G duplũ eſt quadratorũ ex AC CD.at quadrato ex A G æqualia ſunt ex A D D G quadrata.ergo quadrata ex A D DG ſunt dupla quadratorum ex AC CD. Sed D G eſt æqualis DB.quadrata igitur ex AD DB quadratorũ ex A C C D ſunt dupla. Ergo ſi recta linea bifariam ſecetur,et ipſi in rectũ quædam recta linea adiiciatur; quę à tota cũ adiecta,et adiecta fiunt vtraque quadrata dupla ſunt, et quadrati dimidię, et quadrati,quod ab ea,quæ ex dimidia,et adiecta conſtat tamquam ab vna linea deſcribitur. quod oſtendere oportebat.


F. Ç. COMMENTARIVS.

Hoc quoque aliter demonſtrabimus.

Quoniam enim recta linea A B ſecatur bifariam in C, & ipſi adijcitur B D, erit B D linea, qua D C ipſam C A ſuperat quare ex demõſtratis ad ſeptimã huius quadrata ex A C C D aequalia ſunt rectangulo, quod bis continetur A C C D, & quadrato ipſius B D. ergo quadrata ex A C C D vnà cum rectangulo,quod bis A C C D cõtinetur,& ipſius B D qnadrato dupla ſunt quadratorum ex A C C D.at quadratum ex A D eſt aequale quadratis ex A C C D, & rectangulo bis A C C D contento.quadrata igitur ex A D D B quadratorum ex A C C D dupla erunt, quod demonſtrare oportuit.

PROBLEMA I. PROPOSITIO XI.

Datam rectam lineã ſecare, ita vt quod tota,et altera parte cõtinetur rectãgulũ ęquale ſit ei,quod à reliqua parte fit, quadrato.



Sit data recta linea A B. oportet ipſam A B ita ſecare, vt quod tota, et altera parte continetur rectangulum æquale ſit ei,quod à reliqua parte fit,quadrato.Deſcribatur enim ex A B quadratum A B C D:ſeceturq; A C bifariam in E,et B E iungatur: deinde producta C A in F,ponatur ipſi B E ęqualis E F : deſcribaturq; ex A E quadratum F G H A:et G H ad K producatur. Dico A B ſectam eſſe in H, ita vt A B H rectangulum æquale ſit quadrato ex A H.Quoniam enim recta linea A C bifariam ſecatur in E, adiicituręq; ipſi in rectum A F; rectãgulum C F A vnà cum quadrato ex A E ęquale erit quadrato ex E F. Sed E F eſt æqualis E B. rectangulum igitur C F A vnà cum quadrato ex A E æquale eſt ei, quod fit ex E B,quadrato.quadrato autem ex E B æqua lia ſunt quadrata ex B A A E etenim angulus ad A rectus eſt.ergo rectangulum C F A vnà cum quadrato ex A E æquale eſt quadratis ex B A A E.commune auferatur, quod ex A E quadratum.reliquum igitur rectangulum

ſ. huius.
47 primi.

lum C F A æquale eſt quadrato ex A B. eſt autem C F A quidem rectangulum F K. ſiquidem A F eſt æqualis F G: quadratum autem ex A B eſt ipſum A D. rectangulum igitur F K æquale eſt quadrato A D. commune auferatur A K. ergo reliquum F H reliquo H D eſt æquale. atque eſt H D rectangulum A B H, cum A B ſit æqualis B D, et F H eſt quadratum ex A H. rectangulum igitur A B H quadrato ex A H æquale erit. quare data recta linea A B ſecta eſt in H, ita vt A B H rectangulum quadrato ex A H ſit æquale. quod facere oportebat.


SCHOLIVM.

Ex hoc conſtat geometricam eſſe analogiam. quoniam enim A B ſecta eſt in H, & quod A B B H continetur quadrato A H eſt æquale. hoc autem ſoli geometricæ accidit medietati. Hanc in ſequentibus extrema, ac media ratione ſecari dicit. nunc autem, quoniam de proportione nihil traditum eſt, non dicit extrema, ac media ratione ſecari.

THEOREMA XI. PROPOSITIO. XII.

In obtuſiangulis triangulis, quod à latere obtuſum angulum ſubtendente fit quadratum maius eſt quàm quadrata, quæ fiunt à lateribus obtuſum angulum continentibus, rectangulo contento bis vno laterum, quę ſunt circa obtuſum angulum, in quod ſcilicet protractũ perpendicularis cadit, et linea aſſumpta exterius à perpendiculari ad angulum obtuſum.

Sit obtuſiangulum triangulum A B C. obtuſum angulum habens B A C: et ducatur à puncto B ad C A protractam perpendicularis B D. Dico quadratum ex B C maius eſſe, quàm quadrata ex B A AC, rectãgulo, quod bis C A A D continetur. Quoniam enim recta linea C D ſecta eſt vtcumque in puncto A, erit quadratum ex C D æquale, et quadratis ex C A A D, et ei quod bis C A A D continetur rectangulo. commune apponatur ex D B quadratum. quadrata igitur ex C D D B æqualia ſunt et quadratis ex C A A D D B, et rectangulo, quod bis C A A D continetur. Sed quadratis ex C D D B æquale eſt quadratum ex C B. rectus enim eſt angulus ad D, cum ſit B D perpendicularis. quadratis vero ex A D D B æquale eſt quadratum ex A B. quadratum igitur ex C B æquale eſt et quadratis ex C A A B, et rectangulo bis C A A D contento. Ergo quadratum ex C B maius eſt, quàm quadrata ex C A A B, rectangulo quod bis C A AD continetur. In obtuſiangulis igitur triangulis, quadratum, quod à latere obtuſum angulum ſubtendente fit, maius eſt quàm quadrata, quæ fiunt à lateribus obtuſum angulum continentibus, rectangulo contento bis vno laterum, quę ſunt circa obtuſum angulum, ad quod protractum perpendicularis cadit, et linea aſſumpta exterius à perpendiculari ad angulum obtuſum. quod demonſtrare oportebat.



11. primi.


4. huius.

47. primi.

F. C. COMMENTARIVS.

Ex iis, quæ in hoc theoremate demõſtrata ſunt poſſumus cuiuſlibet trianguli; obtuſum angulum habentis aream dimetiri.

Sit triangulum obtusiangulum A B C, habens angulum A C B obtusum; sitq; latus A B exempli gratia pedum viginti, B C octo, & C A sex decim: & à puncto A ad B C protractam ducatur perpendicularis A D. Primum igitur quanta sit linea C D, quae adiungitur lateri, in quod perpendicularis cadit, hoc modo comperiemus. Quadrata vtrorumq; laterum A C C B, quae sunt circa obtusum angulum simul sumpta à quadrato lateris A B, quod obtuso angulo subtenditur, detrahemus; & quod reliquum fuerit, diuidemus per duplum lateris B C. ex hac enim diuisione prouenit linea, quam quærimus. est autem quadratum lateris A C 256, & quadratum ipsius B C 64, quae simul sumpta faciunt 320. demptis igitur 320 à 400, quod est quadratum lateris A B, relinquuntur 80, atque his diuisis per 16, videlicet per duplum ipsius B C prodibunt 5, & tot pedum erit



47. primi. *linea C D. Itaque quoniam triangulum A C D rectangulum est, quadratum lateris A C aequale erit quadratis, quae fiunt ex C D D A. quare dempto quadrato lineae C D, quod est 25 à quadrato ipsius A C 256, reliquum erit quadratum perpendicularis A D, quod est 231, cuius latus A D est 15 $\frac{1}{2}$ proximè. Quomodo autem numeri non quadrati propinquum latus inueniatur, docuimus in nostris commentarijs in librum Archimedis de circuli dimensione. Vt igitur trianguli A B C aream habeamus, secetur B D bifariam in puncto E, & ab eo ducatur E F ipsi D A parallela; rursusq;, à puncto A ducatur parallela ipsi D B, & conueniens cum E F in F puncto. Erit parallelogrammum rectangulum A D E F aequale triangulo A B D: vtrumque enim dimidium est parallelogrammi, cuius basis est B D, & altitudo eadem A D. Ergo ducta E D, quae est 6 $-\frac{1}{2}$ in A D 15 $\frac{1}{2}$ proueniet area rectanguli A D E F, & ob id etiam A B D trianguli 98 $\frac{4}{5}$ pedum quadratorum. Eadem ratione inuenietur area trianguli A C D esse eius modi pedum 38. Quare demptis 38 à 98 $\frac{4}{5}$ relinquentur 60 $-\frac{4}{5}$ proximè, pro area trianguli A B C, quam nobis inquirendam proposuimus.*


THEOREMA XII. PROPOSITIO. XIII.

In acutiangulis triangulis, quod à latere acutum angulum subtendente fit quadratum minus est, quàm quadrata, quæ fiunt à lateribus acutum angulum continentibus, rectangulo contento bis vno laterum, quæ sunt circa acutum angulum, in quod perpẽdicularis cadit, et linea à perpẽdiculari intus assumpta ad angulũ acutũ.

Sit acutiangulum triangulum A B C acutum habens angulum ad B: et ducatur à puncto A ad B C

12. primi. perpendicularis A D. Dico quadratum, quod fit ex A C minus esse, quàm quadrata, quę ex C B B A, rectangulo, quod bis C B B D continetur. Quoniam

7. huius. enim recta linea C B secta est vtcumque in D, erũt quadrata ex C B C D æqualia, et rectangulo quod bis C B B D continetur, et quadrato ex D C. commune apponatur quod ex A D quadratum, quadrata igitur ex C B B D D A æqualia sunt, et rectangulo bis C B B D contento.




47. primi. et quadratis ex A D D C. Sed quadratis ex B D D A æquale est quod ex A B quadratum; rectus enim angulus est qui ad D. quadratis vero ex A D D C æquale est quadratum ex A C. quadrata igitur ex C B B A sunt æqualia quadrato ex A C, et ei quod bis C B B D continetur, rectangulo. quare solum quadratum ex A C minus est quàm quadrata ex C B B A rectangulo, quod bis C B B D continetur. In acutiangulis igitur triangulis quadratum, quod à latere acutum angulum subtẽdẽte fit, minus est quàm quadrata, quæ fiunt à lateribus acutum angulum continentibus, rectangulo contento bis vno laterum, quę sunt circa acutum angulum, in quod perpendicularis cadit, et linea à perpendiculari intus assumpta ad angulum acutũ. quod demonstrare oportebat.

SCHOLIVM

SCHOLIVM.

Quoniam in diffinitionibus dixit Acutiangulum triangulum esse, quod tres acutos angulos habet, sciendum est hoc loco non ita dicere, sed triangula omnia appellare acutiangula, propterea quod omnia angulum habent acutum, & quamquam non omnes acutos, vnum tamen habent. propositio igitur huiusmodi est. Omnis trianguli latus, quod acutum subtendit angulum, minus potest, quàm latera acutum angulum continentia, rectangulo contento bis vno laterum, & reliqua quæ sequuntur. Itaque si rectangulũ sit triangulum ex lateribus acutum angulum conti nentibus accipiemus illud, quod recto angulo subtenditur, vt in ipsum perpendicularis cadat. & similiter faciemus, si obtusiangulum sit. Conuersum vero theorematis est hoc.

Sit quadratũ ex AB minus quàm quadrata ex BC CA, eo, quod bis BC CE cõtinetur, et reliqua deinceps; atque à pũcto C ipsi C A ad rectos angulos ducatur C D, quæ ipsi C B sit æqualis. ergo quadrata ex BC C A æqualia sunt quadratis ex DC CA. Sed quadratis ex BC C A minus est quadratum ex A B. ergo & quadratis ex DC CA minus erit. quadratis autem ex DC CA æquale est quadratum ex D A. quadratum igitur ex DA quadrato ex AB maius, et ipsa DA maior, quàm A B. Itaque quoniam duæ D C C A duabus B C C A æquales sunt, et basis D A maior basi A B, erit et angulus D C A angulo A C B maior. rectus autem est D C A. ergo A C B acutus erit. quod oportebat demonstrare.




47. primi.

25. primi.

F. C. COMMENTARIVS.

Hoc non solum in triangulis acutiangulis verum est, sed etiam in obtusiangulis, & rectangulis, quę duos angulos necessariò habent acutos. Quare dicemus presens theorema tres habere casus, vel enim ducta perpendiculari A D, punctum D cadit inter B C, vel extra, vel in ipsum C, ita vt A D sit eadem, quae A C. Euclidis demonstratio congruit primo casui in triangulis, quae acutiangula dicuntur; in alijs autem si modo perpendicularis cadat in latus, quod angulo recto, vel obtuso subtenditur. At si cadat in alterum latus eorum, quae acutis angulis subtenduntur, nihilominus idem sequetur, vt demonstrabimus.

Sit obtusiangulum triangulum A B C, obtusum habens A C B angulum, et ducatur à puncto A ad B C protractam perpendicularis A D. Dico quadratum, quod fit ex A C, acutum angulum A B C subtendente minus esse. quàm quadrata, quæ ex A B B C fiunt, rectangulo, quod bis C B B D continetur.




Quoniam enim A B D triangulum rectangulum est, quadratum, quod fit ex AB aequale est quadratis, quę ex BD D A. commune addatur quadratũ ex BC. ergo quadrata ex AB BC aequalia sunt quadratis ex BD D A BC. Sed quadrato ex BD.

aequalia

æqualia ſint quadrata ex BC CD vnà cum rectangulo, quod bis BC CD continetur. quadratis autem ex CD DA quadratum ex AC eſt æquale. Quadrata igitur ex AB BC æqualia ſunt quadrato ex AC, & duplo quadrati, quod ex BC vnà cum rectangulo, quod bis BC CD continetur. Sed quadrato ex BC, et rectangulo, quod BC CD continetur æquale eſt rectangulum CBD, ac propterea duplo quadrati ex BC, & rectangulo, quod bis continetur BC CD æquale eſt rectangulum, quod bis CB BD continetur. ergo quadrata ex AB BC æqualia ſunt, quadrato ex AC vnà cum rectangulo, quod bis continetur CB BD. Quadratum igitur ex AC minus eſt, quàm quadrata ex AB BC, rectangulo, quod bis CB BD continetur.


3. huius.

Sit triangulum rectangulum ABC rectum angulum habens ACB. Dico quadratum lateris AC, quod acutum angulum ABC ſubtendit minus eſſe, quàm quadrata ex AB BC, rectangulo, quod bis CB BD continetur.



Quoniam enim triangulum rectangulum eſt, erit perpendicularis AD eadem, quae latus trianguli AC, & punctum D idem, quod C. quadratum vero, quod fit ex AB æquale quadratis ex BC CA. communi addatur quadratum ex BC. Ergo quadrata ex AB BC æqualia ſunt quadrato ex AC, & duplo quadrati eius, quod fit ex BC. hoc eſt rectangulo, quod bis cõtinetur CB BD. Quadratũ igitur ex AC minus eſt quàm quadrata ex AB BC rectangulo, quod bis CB BD continetur. quod demonſtrare oportebat.


Ex proxime demonſtratis licebit cuiuſque trianguli, ſiue acutianguli, ſiue rectanguli, ſiue obtuſianguli quod nota latera habeat, aream inuenire,



Sit triangulum ABC habens angulos ad BC acutos, & à puncto A ad BC perpendicularis ducatur AD, quae inter BC neceſſario cadet. Sit autem latus AB pedum 13, BC 14, & CA 15. Itaque primum quadratum lateris AC, quod angulo acuto B ſubtenditur, à quadratis reliquorum laterum AB BC ſimul iunctis auferemus, & quod reliquitur, diuidemus per duplum lateris BC, in quod perpendicularis cadit; & proueniet recta linea BD, quae à perpendiculari intus aſſumitur ad angulum acutum. Deinde à quadrato lateris AB, quod ſubtenditur angulo ADB recto, auferemus quadratum ipſius BD, et eius, quod prouenerit quadrati latus erit perpendicularis AD magnitudo, ex qua denique totius ABC trianguli area nota efficietur. Quadratum igitur lateris AC eſt 225. quadratum vero ipſius AB 169, & quadratum BC 196, quae duo ſimul iuncta faciunt 365. ergo ſublatis 225 à 365 relinquentur 140: atque his per 28 diuiſis prouenient 5: ac propterea BD erit pedum quinque. Rurſus ſi à quadrato lateris AB, hoc eſt à 169 auferatur quadratum BD, quod eſt 25, relinquẽtur 144, cuius quadrati latus eſt 12. ergo perpendicularis AD duodecim pedum erit. Itaque ductis 12 in baſis BC dimidium, videlicet in 7 producentur 88, et totidem pedum quadratorum erit area triãguli ABC, quam à principio quærebamus.

PROBLEMA II.
ROPOSITIO XIIII.

Dato rectilineo æquale quadratum conſtituere.



Sit datum rectilineum A. oportet ipſi A rectilineo æquale quadratum conſtituere. conſtituatur rectilineo A æquale parallelogrammum rectangulum BCDE. Si igitur BE eſt æqualis ED factum iam erit, quod proponebatur, etenim rectilineo A æquale quadratum cõſtitutum eſt BD: ſin minus, vna ipſarum BE ED maior eſt. ſit BE maior; et producatur ad F, ponaturq; ipſi ED æqualis EF. deinde ſecta FB bifariã in G,

45. primi.

centro

centro quidem G, interuallo autem vna ipsarum GB GF semicirculus describatur BHF; producaturq; DE in H, et GH iungatur. quoniã igitur recta linea BF secta est in partes æquales ad G, et inæquales ad E; erit rectangulum BEF vnà cum quadrato, quod fit ex EG æquale quadrato ex GF. est autem GF æqualis GH. rectangulum igitur BEF vnà cum quadrato ex GE æquale est quadrato ex GH. Sed quadrato ex GH æqualia sunt ex HE EG quadrata. ergo rectangulum BEF vnà cum quadrato ex EG æquale est quadratis ex HE EG. commune auferatur ex EG quadratum. reliquum igitur rectangulum BEF est æquale quadrato ex EH. Sed rectãgulum BEF est ipsum BD parallelogrammum, quoniam EF est æqualis ED. ergo BD parallelogrammũ quadrato ex EH est æquale. parallelogrammum autem BD est æquale rectilineo A. rectilineum igitur A quadrato ex EH descripto æquale erit. quare dato rectilineo A æquale quadratum constitutum est, quod videlicet ex ipsa EH describitur. quod facere oportebat. 5. huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Hoc problemate multo vniuersalius est, quod in sexto libro demonstratur, nempe. Dato rectilineo simile, et alteri dato æquale idem constituere.

LIBRI SECVNDI FINIS.

EVCLIDIS ELEMENTORVM

LIBER TERTIVS

CVM SCHOLIIS ANTIQVIS, ET COMMENTARIIS

Federici Commandini Vrbinatis.

SCHOLIVM.


Propoſitum Euclidi eſt hoc loco tractare de ijs, quæ circulis accidunt cum ad rectas lineas, & ad angulos comparantur.

DIFFINITIONES.

I.




EQVALES circuli ſunt, quorum diametri ſunt æquales, vel quorum quæ ex centris ſunt æquales.




II.

Recta linea circulum contingere dicitur, quæ contingens circulum, et producta ipſum non ſecat.



III.


Circuli contingere ſe ſe dicũtur, qui contingentes ſe ipſos non ſecant.



Incirculo

IIII.

In circulo æqualiter distare à centro rectæ lineæ dicuntur, quando à centro ad ipsas perpẽdiculares ductę sũt ęquales.



V.

Magis autem distare à centro dicitur ea, ad quam maior perpendicularis cadit.


VI.

Portio circuli est figura, quę recta linea, et circuli circumferẽtia continetur.




VII.

Portionis autẽ angulus est, qui recta linea, et circuli circũferentia cõprehẽditur.




VIII.

In portione angulus est, quando in circũferentia portionis sumatur aliquod punctum, atque ab ipso ad terminos lineæ eius, quæ basis est portionis, rectę lineæ ducantur, angulus vero ductis lineis sit cõtentus.




VIIII.

Quando autem continentes angulum rectæ lineæ assumunt circumferentiam, in illa consistere angulus dicitur.




X.

Sector circuli est, quando angulus ad centrum cõstiterit, figura contenta rectis lineis angulum comprehendentibus, et circumferentia ab ipsis assumpta.



XI.

Similes circulorum portiones ſunt, quæ angulos ſuſcipiunt æquales, vel in quibus anguli æquales conſiſtunt.



XII.

A FED. COMMAN.

ADDITA.


Similes circumferentiæ circulorum ſunt, in quibus anguli conſiſtunt æquales.

PROBLEMA I. PROPOSITIO I.

Dati circuli centrum inuenire.

Sit datus circulus A B C. oportet circuli A B C centrum inuenire. ducatur in ipſo quędam recta linea AB vtcũque, et in puncto D bifariam ſecetur. à puncto autem D ipſi AB ad rectos angulos ducta DC in E producatur; et ſecetur CE bifariam in F. Dico punctum F circuli A B C centrum eſſe. Non enim, ſed ſi fieri poteſt, ſit G, et GA GD GB iungantur. itaque quoniam AD eſt æqualis DB, communis autem DG, erunt duæ AD DG duabus GD DB ęquales, altera alteri: et baſis G A ęqualis eſt baſi G B. ſunt enim ex centro G. angulus igitur ADG angulo GDB eſt ęqualis. Cum autem recta linea ſuper rectam lineam inſiſtens angulos, qui deinceps ſunt, æquales inter ſe fecerit, rectus eſt vterque æqualium angulorum. ergo angulus GDB eſt rectus. Sed et rectus FDB. ęqualis igitur eſt angulus FDB angulo GDB, maior minori, quod fieri non poteſt. quare G non eſt circuli ABC centrum. Similiter oſtendemus neque aliud eſſe, præter ipſum F. ergo F centrum eſt circuli ABC. quod facere oportebat.

10. primi, 11. primi, Diffi. 15. pri. 8. primi. diffi. 10. pri,




COROLLARIVM.

Ex hoc perſpicuum eſt, ſi in circulo quędam recta linea rectam lineam quandam bifariam, et ad angulos rectos ſecet, in ſecante circuli centrum ineſſe.

SCHOLIVM.

Conuerſum diffinitionis circuli. *Ex theoremate oſtenditur conuerſum diffinitionis circuli: Si enim in ambitum figuræ ab aliquo puncto eorum, quæ ſunt intra, incidant æquales rectæ lineæ, ea circulus eſt.*

Non enim,sed si fieri potest,sit rectilineum, et sit aliquod ipsius latus, in quod incidant duæ rectæ lineę ipsum determinantes.erit igitur æquicrure triangulum: atque eius basi bifariam secta, si ducatur recta linea rectos angulos faciet, et utroque latere trianguli minor erit. quod est absurdum, ponũtur enim omnes rectæ lineæ, quæ incidũt,æquales esse.



ALIVD.

Quemadmodum in primo libro figurarum elementarium triangulorum dico,eam,quæ maxime elementaris est,triangulum videlicet æquilaterum in factionē initio proposuit, ob constructiones earum, quæ deinceps sunt,demonstrationum, ita & hoc loco centrum inuenire proponit. hoc enim circuli ipsius ortus causſa est.

Triangulum æquilaterum figura máxime elementaris est.
Cẽtrum, circuli ipsius ortus causſa est.

ALIVD.


Omnis quidem circulus habet proprium centrum natura determinatum;quatenus vero ad nos pertinet, non omnis,sed is tantum, cuius ortum videmus. In prioribus igitur theorematibus, tamquam factis iam circulis,etiam centra manifesta sunt.at in his cum quæratur substantia, centrum etiam quæritur: quod quidem substantiam circuli complet. hoc autem primum,vt inquiunt,inter problemata,et theoremata mediũ est. Quatenus enim quærere, etiam aliquo modo facere proponit; quatenus vero non in factionem,sed in inuentionem, ob id proponit contemplari. Itaque mihi videtur formatam habens propositionem theorema esse, vt si de quarto quis dixerit. Duorum triangulorum, quorum duo latera æqualia sunt, & anguli, inuenire si bases sint æquales. quemadmodum enim illic symptoma quoddam inquirit, quod duorum triangulorum naturæ inest,ita & hoc loco, quod inest naturæ circuli. At si problematis proprium, & contrarium propositioni suscipit, multo magis quod propositum est problematis denominationem effugiet.

Cẽtrum substantiam circuli cõplet.
Inter problemata, ac theoremata medium.

THEOREMA I. PROPOSITIO. II.

Si in circumferentia circuli, duo quęuis puncta sumantur, quæipsa coniungit recta linea intra circulum cadet.

Sit circulus ABC, et in circumferentia ipsius sumantur duo quęuis puncta AB. Dico rectam lineam,quæ à puncto A ad B ducitur, intra circulum cadere. non enim, sed si fieri potest, cadat extra, vt AEB, et sumpto circuli ABC centro,quod sit D, iungantur DA DB,et producatur DF in E. Quoniam igitur DA est æqualis DB; erit et angulus DAE angulo DBE æqualis.et quoniam trianguli DAE vnũ




Ex antecedente.

5.primi.

latus AEB protẽditur, angulus DEB angulo DAE maior erit. angulus autem DAE ęqualis eſt angulo DBE. ergo DEB angulus angulo DBE eſt maior. Sed maiori angulo maius latus ſubtẽditur. maior igitur eſt DB ipſa DE. eſt aũt DB æqualis DF. Ergo DF eſt maior DE, minor maiore, quod fieri nõ poteſt. non igitur à pũcto A ad B ducta recta linea extra circulũ cadet. Similiter oſtẽdemus neque in ipſam cadere circũferentiã. Ergo extra cadat neceſſe eſt. Si igitur in circũferentiã circuli duo quęuis pũcta ſumãtur, quæ ipſa cõiũgit recta linea intra circulũ cadet. quod oportebat demõſtrare.

16 primi.
18. primi.



F. C. COMMENTARIVS.

✻ Similiter oſtendemus neque in ipſam cadere circumferentiam.


16. primi. 18. primi. *Si enim in ipſam circumferentiam caderet, eadem ratione ſequeretur angulum DFB maiorem eſſe angulo DAF, hoc eſt angulo DBF, ac propterea latus DB latere DF maius eſſet. ſed & aequale, quod fieri non poteſt. non igitur in ipſam circumferentiam cadet.*

THEOREMA II. PROPOSITIO III.

Si in circulo recta linea per centrum ducta rectam lineam quandam non ductã per cẽtrũ bifariã ſecet, et ad angulos rectos ipſam ſecabit. quòd ſi ad angulos rectos ipſam ſecet, et bifariam ſecabit.

Sit circulus ABC, et in ipſo recta linea per centrum ducta CD rectam lineam quandam AB non ductam per centrum bifariam ſecet in puncto F. Dico et ad angulos rectos ipſam ſecare. Sumatur enim circuli ABC centrum, quod ſit E, et EA EB iungantur. quoniam igitur AF eſt æqualis FB, communis autem FE, duæ duabus æquales ſunt, et baſis EA baſi EB eſt ęqualis. ergo et angulus AFE angulo BFE æqualis erit. Cum autem recta linea ſuper rectam inſiſtens angulos, qui deinceps ſunt, æquales inter ſe fecerit, rectus eſt vterque æqualium angulorum. vterque igitur AFE BFE eſt rectus. quare recta linea CD per centrum ducta rectam lineã AB non ductam per centrum bifariam ſecans, et ad angulos rectos ipſam ſecabit. Sed CD ſecet AB ad rectos angulos. Dico et bifariam ipſam ſecare, hoc eſt AF ipſi FB ęqualem eſſe. Iiſdem enim conſtructis, quoniam EA, quæ ex centro eſt ęqualis EB, et angulus EAF angulo EBF æqualis erit. eſt autem et AFE rectus æqualis recto BFE. duo igitur triangula EAF EBF duos angulos duobus angulis æquales habẽt, vnumq; latus vni lateri æquale EF, commune ſcilicet vtriſque, quod vni angulorũ æqualium ſubtenditur. ergo et reliqua latera reliquis lateribus ęqualia habebunt. atque erit AF ipſi FB æqualis. Si igitur in circulo recta linea per centrum ducta rectam lineam quandam non ductam per centrum bifariam ſecet, et ad angulos rectos ipſam ſecabit. quòd ſi ipſam ſecet ad rectos angulos, et bifariam ſecabit. quod oportebat demonſtrare.

1. huius.
Diffi. 10. primi.
5 primi.
26. primi.




THEOREMA. III. PROPOSITO. IIII.

Si in circulo duę rectæ lineæ ſe inuicem ſecent non ductę per centrum, ſe ſe bifariam non ſecabunt.

Sit circulus ABCD; et in ipſo duæ rectæ lineæ AC BD ſe inuicem ſecent in puncto E, non ductę per centrum. Dico eas ſe ſe bifariam nõ ſecare. Si enim fieri poteſt,

ſecent

secent se se bifariam, ita vt AE sit æqualis EC, et BE ipsi ED: sumaturq; centrum ABCD circuli, quod sit F; et EF iungatur. quoniam igitur recta linea FE per centrũ ducta rectam lineam quandam AC non ductam per centrum bifariam secat, et ad rectos angulos ipsam secabit. quare rectus est FEA angulus. rursus quoniã recta linea FE rectam lineam quandam BD non ductam per cẽtrum bifariam secat, et ad angulos rectos ipsam secabit. rectus igitur angulus est FEB. ostensus autem est rectus et FEA. ergo FEA angulus ipsi FEB æqualis erit, minor maiori, quod fieri non potest. non igitur AC BD se se bifariam secant. quare si in circulo duæ rectæ lineæ se inuicem secent, non ductæ per centrum, se se bifariam non secabunt. quod ostendere oportebat.



1. huius.

Ex antecedente.


SCHOLIVM.

Si rectæ lineæ per centrum transirent, quærendum vtique non esset, an bifariam se inuicem secent. ipsorum enim centrum bipartita sectio est. similiter & si altera per centrum transeunte, altera non sit per centrum. nam quæ per centrum transit bifariam non secatur.

THEOREMA IIII. PROPOSITIO V.

Si duo circuli se inuicem secent, non erit ipsorum idem centrũ.


Duo enim circuli se inuicem secent ABC CDG in punctis BC. Dico ipsorum idem cẽtrum nõ esse. Si enim fieri potest, sit centrum E; iũgaturq; EC, et EFG vtcumque ducatur. Et quoniam E cẽtrum est circuli ABC, erit CE ipsi EF æqualis. rursus quoniam E centrum est CDG circuli, æqualis est CE ipsi EG. Sed ostensa est CE æqualis EF. ergo EF ipsi EG æqualis erit, minor maiori, quod fieri non potest. non igitur punctum E centrum est circulorum ABC CDG. quare si duo circuli se inuicem secent, non erit ipsorum idem centrum. quod ostendendum fuit.



THEOREMA V. PROPOSITIO. VI.

Si duo circuli se se intra contingant, ipsorum idem centrum non erit.


Duo enim circuli ABC CDE contingat se se intra in puncto C. Dico ipsorum non esse idem centrum. si enim fieri potest, sit F, iũgaturq; FC, et FEB vtcumque ducatur. quoniam igitur F centrum est circuli ABC, æqualis est CF ipsi FB. rursus quoniam F centrum est circuli CDE, erit CF æqualis FE. ostensa autem est CF æqualis FB. ergo et FE ipsi FB est æqualis, minor maiori; quod fieri non potest. non igitur F punctum centrum est circulorum ABC CDE. quare si duo circuli se se intra contingant, ipsorum idẽ centrum non erit. quod demonstrare oportebat.



THEO-

THEOREMA VI. PROPOSITIO VII.

Si in circuli diametro aliquod punctum ſumatur, quod non ſit centrum circuli: et ab eo in circulum cadant quędam rectæ lineæ: maxima quidem erit, in qua centrum, minima vero reliqua: aliarum autem propinquior ei, quę per centrum tranſit, ſemper remotiore maior eſt. at duæ tantum æquales ab eodem puncto in circulum cadent ad vtraſque partes minimę.




Sit circulus ABCD, cuius diameter AD: et in ipſa AD ſumatur aliquod punctum F, quod non ſit centrum circuli. Sit autem circuli centrum E: et à puncto F in circulum ABCD cadant quędam rectę lineę FB FC FG. Dico FA maximam eſſe, et FD minimam: aliarum vero FB quidē maiorem quàm FC, et FC maiorem quàm FG. Iungātur
20. primi. enim BE CE GE. Et quoniam omnis trianguli duo latera reliquo ſunt maiora; erunt BE EF maiores quàm BF. eſt autē AE æqualis EB. Ergo BE EF ipſi AF sūt æquales. maior igitur eſt AF quàm FB. rurſus quoniā BE eſt æqualis EC, communis autem FE, duę BE EF duabus CE EF
24. primi. æquales ſunt. Sed BEF angulus maior eſt angulo CEF. baſis igitur BF baſi FC eſt maior. eadem ratione et CF maior eſt quàm FG. rurſus quoniam GF FE maiores ſunt quàm EG, æqualis autem GE ipſi ED; erunt GF FE maiores quam ED. communis auferatur EF. ergo reliqua GF maior eſt quàm reliqua FD. maxima igitur eſt FA, et FD minima: maior vero BF quàm FC, et CF quàm FG maior. dico et à puncto F duas tantum rectas lineas cadere in circulum ABCD ad vtraſque partes
23. primi. minimæ FD. conſtituatur enim ad lineam EF, atque ad datum in ea punctum E angulo GEF æqualis angulus FEH: et FH iungatur. quoniā igitur GE eſt æqualis EH, communis autem EF, duæ GE EF duabus HE EF æquales ſunt: et angulus GE F eſt æqualis angulo HEF. baſis igitur FG baſi FH æqualis erit. dico à puncto F in
4. primi. circulum non cadere aliam ipſi FG ęqualem. Si enim fieri poteſt, cadat FK. et quoniam FK eſt æqualis FG, eſtq; ipſi FG æqualis FH; erit et FK ipſi FH æqualis, videlicet propinquior ei, quæ per centrum tranſit, æqualis remotiori, quod fieri non poteſt. Vel hoc modo. iungatur EK. et quoniam GE ipſi EK eſt ęqualis, communis autem FE, et baſis GF ęqualis baſi FK; erit et angulus GEF ęqualis angulo KEF. Sed angulus GEF angulo HEF eſt æqualis. angulus igitur HEF ipſi KEF æqualis erit, minor maiori, quod fieri non poteſt. quare à puncto F in circulum non cadet alia recta linea æqualis ipſi GF. ergo vna tantum cadet. Si igitur in circuli diamtero aliquod punctum ſumatur, quod non ſit centrum circuli, et reliqua quę ſequuntur. quod demonſtrare oportebat.

SCHOLIVM.

CONVERSVM. Si intra circulum punctum ſumatur, atque à puncto in circulum cadant quotcumque rectæ lineæ, quarum vna quidem maxima ſit, vna vero minima, & reliquarum aliæ ſint æquales, aliæ inæquales; maxima quidem per centrum tranſibit, minima vero erit reliqua pars diametri; & aliarum maiores quidem ſunt centro propinquiores, æquales autem ab eo æqualiter diſtant.


Per



Per punctum enim E,quod eſt intra circulum maxima quidem ſit EC,minima vero ED;et FE quàm EB maior.Dico CE per centrum tranſire, et DE ipſi eſſe in directum;EF vero centro propinquiorem eſſe, quàm EB. Si enim CE non tranſit per centrum,ſed alia quædam à pũcto E in circulum cadẽs,illa maxima erit per.ſeptimum theorema.eſt autem et EC maxima, quod fieri non poteſt.diameter igitur eſt CE,et ipſi in directum ED.Dico EF centro H propinquiorem eſſe,quàm EB.Si enim non eſt propinquior,vel remotior eſt,vel æqualiter diſtat: et ſiquidem remotior,maior erit BE,quàm EF,quod fieri non poteſt.non enim ponitur ita eſſe. Quòd ſi æqualiter diſtant, ęquales ſunt. ſed neque hoc ponitur.propinquior igitur eſt FE ipſi H, quàm EB,et GE ipſi EB eſt æqualis.Ergo à centro H æqualiter diſtant, inæqualiter enim diſtantes inęquales ſunt, per ſeptimum theorema.quod oſtendere oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

Illud quoque verum eſt, quod nos demonſtrauimus in commentario in propoſitionem octauam libri Archimedis de lineis ſpiralibus.




Si in circumferentia circuli aliquod ſumatur punctum, ab eoq; in circulum ducantur rectæ lineę; quæ per centrum tranſit, omnium erit maxima,aliarum verò quæ tranſeunti per cẽtrum propinquiores ſunt, remotioribus erunt maiores; duę autem tantum ęquales ſunt ad vtraſque partes maximæ.

THEOREMA VII. PROPOSITIO VIII.

Si extra circulum aliquod punctum ſumatur, atque ab eo ad circulum ducantur quædam rectę lineæ, quarum vna per centrum tranſeat, alię verò vtcunque: earum quidem, quæ in concauam circumferentiam cadunt, maxima eſt, quę per centrum tranſit; aliarum autem propinquior ei, quę per centrum, ſemper remotiore maior eſt.at earum, quæ in curuam circumferentiam cadunt minima eſt, quæ inter punctum, et diametrum interijcitur; aliarum vero quæ propinquior minimæ ſemper remotiore eſt minor. duæ autem tantum ęquales à puncto in circulum cadunt ad vtraſque partes minimæ.

Sit circulus ABC,et extra circulum ſumatur aliquod punctum D: ab eo autem in circulum ducantur rectę lineæ quędam DA DE DF DC:ſitq; DA per cẽtrum. Dico earum quidem quæ in concauam AEFC circumferentiam cadunt, maximam eſſe DA, quæ per centrum tranſit; et minimam, quæ inter punctum D, et diametrum AG interiicitur, videlicet DG: maiorem autem DE quàm DF, et DF maiorem quàm DC; earum vero, quæ in curuam circumferentiam HLKG cadunt, quæ propinquior minimę DG ſemper remotiore eſſe minorem, hoc eſt DK minorem, quàm DL, et DL minorem quàm DH. Sumatur enim centrum circuli ABC, quod ſit M, et iungantur ME MF MC MK ML MH. et quoniam AM eſt æqualis ME, communis

nis apponatur MD. Ergo AD eſt æqualis ipſis EM MD.
20.primi. Sed EM MD ſunt maiores quàm ED. Ergo et AD quàm ED eſt maior. rurſus quoniam æqualis eſt ME ipſi MF, cõmunis apponatur MD. erũt EM MD ipſis MF MD æquales; et angulus EMD maior eſt angulo FMD. baſis igitur
24 primi. ED baſi FD maior erit. Similiter demonſtrabimus et FD maiorẽ eſſe quàm CD. ergo maxima eſt DA; maior aũt DE quàm DF, et DF quàm DC maior. præterea quoniam MK KD sũt maiores quã MD, et MG eſt æqualis MK; erit reliqua KD quàm reliqua GD maior. quare GD minor quàm KD, et idcirco GD minima eſt. et quoniam trianguli MLD in vno latere MD, duæ rectæ lineæ MK KD in-
21. primi. tra conſtituuntur, erunt MK KD minores ipſis ML LD, quarum MK eſt æqualis ML. reliqua igitur DK minor eſt quàm reliqua DL. Similiter oſtendemus et DL quam DK minorẽ eſſe. Ergo DG minima eſt. minor vero DK quàm DL, et DL minor quàm DH. dico ẽt duas tantum æquales à puncto D in circulum cadere ad vtraſque minimæ




34.primi. partes. conſtituatur ad rectam lineam MD, ad datumq; in ea punctum M angulo K MD æqualis angulus DMB, et DB iungatur. itaque quoniam MK eſt æqualis MB, cõ
2.primi. munis autem MD, duæ KM MD duabus BM MD æquales ſunt, altera alteri. et angulus KMD æqualis augulo BMD. baſis igitur DK baſi DB eſt æqualis. dico à puncto D nullam aliam ipſi DB æqualem in circulum cadere. ſi enim fieri poteſt, cadat DN. et quoniam DK eſt æqualis DN, et DK ipſi DB eſt æqualis; erit et DB æqualis DN, propinquior ſcilicet minimæ æqualis remotiori, quod fieri non poſſe oſtenſum eſt, vel et aliter. iungatur MN. et quoniam æqualis eſt KM ipſi MN, communis autẽ MD; et baſis DK baſi DN æqualis erit, et propterea angulus KMD æqualis angulo DMN. Sed KMD angulus eſt æqualis angulo BMD. angulus igitur BMD angulo NMD æqualis erit, minor maiori, quod fieri non poteſt. quare, non plures quàm duæ rectæ lineæ à puncto D in circulum ABC ad vtraſque partes minimæ GD cadent. Si igitur extra circulum aliquod punctum ſumatur, et reliqua deinceps. quod oſtendere oportebat.

THEOREMA VIII. PROPOSITIO IX.

Si intra circulum ſumatur aliquod punctum, atque ab eo in circulum cadant plures quàm duæ rectæ lineæ æquales; punctũ quod ſumitur, circuli centrum erit.

Sit circulus ABC, et intra ipſum ſumatur punctum D, à quo in circulum cadant plures, quàm duæ rectæ lineæ æquales, videlicet DA DB DC. Dico punctum D circuli ABC centrum eſſe. Iungantur enim AB BC, ſecenturq; bifariam in punctis EF: et iunctæ ED DF ad puncta GK HL producantur. quoniam igitur AE eſt



æqualis EB, communis autem ED, erunt duæ AE ED duabus BE ED æquales; et baſis DA eſt æqualis baſi DB. angulus igitur AED angulo BED æqualis erit, et idcir-
8.primi. co vterque angulorũ AED BED eſt rectus. Ergo GK bifariam ſecans AB, et ad an-
13 primi. gulos rectos ſecat. et quoniam ſi in circulo quædã recta linea, rectam lineam quandam

dam bifariã,et ad angulos rectos ſecet,in ſecante eſt circuli centrum;erit in GK centrum circuli ABC. Eadẽ ratione et in HL centrum eſt ABC circuli,et nullum aliud commune habent rectæ lineę GH HL,niſi punctum D.Ergo D circuli ABC eſt centrum.Si igitur intra circulum ſumatur aliquod punctum, atque ab eo in circulum cadant plures quàm duæ rectæ lineæ æquales; punctum, quod ſumitur circuli centrum erit. Corol.1.huius.


ALITER.

Sumatur enim intra circulum ABC punctum aliquod D: atque à puncto D in circulum ABC cadant plures quàm duæ rectæ lineæ æquales DA DB DC. Dico punctum D, quod ſumitur,circuli ABC eſſe centrum. non enim, ſed ſi fieri poteſt, ſit E, et iũcta DE in FG producatur.ergo FG diameter eſt ABC circuli.itaque quoniam in FG diametro citculi ABC ſumptum eſt aliquod punctum D, quod non eſt centrum circuli; maxima quidem erit DG, maior autem DC quàm DB, et DB quàm DA maior. Sed et æquales, quod fieri non poteſt. non igitur E centrum eſt circuli ABC. Similiter oſtendemus neque aliud punctum centrum eſſe præter ipſum D. ergo D circuli ABC centrum erit.quod oportebat demonſtrare. 7.huius.

THEOREMA IX. PROPO. X.

Circulus circulum in pluribus,quàm duobus punctis non ſecat.


Si enim fieri poteſt,circulus ABC circulum DEF ſecet in pluribus punctis,quàm duobus, videlicet in B G H F:et iunctæ BG BH bifariam ſecentur in KL. atque à punctis KL ipſis BG BH ad rectos angulos ductæ KC LM in puncta AE producantur. quoniã igitur in circulo ABC quędam recta linea AC rectam lineam quandam BH bifariam et ad angulos rectos ſecat,in ipſa AC circuli ABC erit centrum.rurſus quoniam in eodẽ circulo ABC quædamrecta linea NX rectam lineam quãdam BG bifariam ſecat, et ad rectos angulos;in ipſa NX centrum erit circuli. oſtenſum autem eſt et in ipſa AC centrum eſſe,et in nullo alio puncto conueniunt inter ſe rectæ lineę AC NX,præterquàm in O. ergo O circuli ABC eſt centrum. Similiter oſtendemus punctum O centrum eſſe circuli DEF. ergo duorum circulorum ſe ſe ſecantium ABC DEF. idem erit centrum O. quod fieri non poteſt. non igitur circulus circulum ſecat in pluribus punctis,quàm duobus.



Corol.1.huius. 5.huius.

ALITER.


Circulus enim ABC rurſus circulum DEF ſecet in pluribus punctis,quàm duobus; nempe in B G F H, et circuli ABC centrum ſumatur, quod ſit K:et KB KG KF iungãtur.qm igitur intra circulũ DEF ſumptum eſt aliquod punctum K, à quo in circulum DEF incidant plures, quàm duæ rectæ lineæ KB KG KF;erit punctum K circuli DEF centrum. eſt autem et circuli ABC centrum K. duorũ igitur circulorum, qui ſe ſe ſecant,idem erit K centrum,quod fieri non poteſt. quare circulus circulum in pluribus, quàm duobus punctis non ſecat,quod oportebet demonſtrare.



THEOREMA X. PROPOSITIO. XI.


Si duo circuli ſe ſe intus contingant, et ſumantur centra ipſo-

rum; recta linea ipsorum centra coniungens, et producta in circu lorum contactum cadet.



Duo enim circuli ABC ADE se se intus contingant in puncto A, et sumatur circuli quidem ABC cẽtrum,quod sit F, circuli vero ADE centrum G. Dico rectam lineam à puncto G ad F ductam,si producatur in punctum A cadere. Non enim, sed si fieri potest, cadat vt F G D H. et
20. primi. AF AG iungantur. Itaque quoniã AG GF maiores sunt, quàm F A, hoc est quàm F H, communis auferatur F G. reliqua igitur AG maior est, quàm reliqua GH. Sed AG est æqualis GD. ergo GD ipsa GH est maior, minor maiore, quod fieri non potest. Non igitur à puncto F ad G ducta recta linea extra cõtactum A cadet.quare in ipsum cadat necesse est. Si igitur duo circuli se se intus contingant;recta linea ipsorum centra coniungens, si producatur in contactum circulorum cadet. quod oportebat demonstrare.


ALITER.



Sed cadat vt GFC, et producatur in directum CF G ad pũctum H: iunganturq; AG AF. Quoniam igi
20. primi. tur AG GF maiores sunt quàm AF,et AF est æqualis FC, hoc est ipsi FH, communis auferatur FG. reliqua igitur AG reliqua GH est maior: hoc est DG maior ipsa GH,minor maiore,quod fieri non potest. Similiter et si extra circulum paruum sit centrum maioris circuli,idem sequi absurdum ostendemus.

THEOREMA XI. PROPOSITIO XII.

Si duo circuli se se extra contingant, recta linea ipsorũ centra coniungens per contactum transibit.




Duo enim circuli ABC ADE se se extra contingant in puncto A; et sumatur circuli quidem ABC centrum, quod sit F: circuli vero ADE cẽtrum G. Dico rectam lineam, quæ à puncto F ad G ducitur, per contactum A transire. Non enim sed si fieri potest, cadat, vt FCDG: et FA A G iungantur. Quoniam igitur F centrum est circuli ABC,erit AF æqualis FC. Rursus quoniam G centrum est ADE circuli,erit AG ipsi GD æqualis. ostensa est autem et AF æqualis FC. sunt igitur FA A
20. primi. G ipsis FC DG æquales. ergo tota FG maior est, quàm FA AG. Sed et minor,quod fieri non potest. Non igitur à puncto F ad G ducta recta linea per contactum A nõ transibit. quare per ipsum transeat necesse est. Si igitur duo circuli se se extra cõtingant,recta linea ipsorum centra coniungens per contactum transibit. quod oportebat demonstrare.

THEOREMA XII. PROPOSITIO XIII.

Circulus circulum non contingit in pluribus pũctis, quàm vno, siue intus, siue extra contingat.

Si


Si enim fieri poteſt, circulus ABDC circulum EBF D contingat primum intus in pluribus punctis, quàm vno, videlicet in BD: et ſumatur circuli quidē ABDC centrum G; circuli vero EBFD centrum H. ergo recta linea, quę à puncto G ad H ducitur, in puncta BD cadet. cadat vt BGHD. et quoniam G centrum eſt circuli ABDE, erit BG ipſi GD æqualis. maior igitur eſt BG, quàm HD: et BH quàm HD multo maior. Rurſus quoniam H centrum eſt EBFD circuli, æqualis eſt BH ipſi HD. atqui oſtenſa eſt ipſa multo maior, quod fieri non poteſt. non igitur circulus circulum intus contingit in pluribus punctis, quàm vno. Dico etiam neque extra contingere. Si enim fieri poteſt, circulus ACK circulum ABDC extra cōtingat in pluribus pūctis, quàm vno, videlicet in AC, et AC iungatur. Itaque quoniam in circumferentia vtrorumque circulorum ABDC ACK ſumpta ſunt duo quæuis puncta A C; recta linea, quę ipſa coniungit intra vtrumque ipſorum cadet. Sed intra circulum quidem ABDC cadit, extra circulum vero ACK, quod eſt abſurdum. non igitur circulus circulū extra cōtingit in pluribus punctis, quàm vno. oſtenſum autem eſt neque intus contingere. circulus igitur circulū non contingit in pluribus punctis; quàm vno, ſiue intus, ſiue extra contingat. quod oportebat demonſtrare.



THEOREMA XIII. PROPOSITIO XIIII.

In circulo æquales rectæ lineæ æqualiter à centro diſtant, et quę æqualiter à centro diſtant; inter ſe ſunt æquales.

Sit circulus ABDC, et in ipſo æquales rectę lineæ AB CD. Dico eas à centro æqualiter diſtare. Sumatur enim circuli ABDC centrum, quod ſit E, et ab ipſo ad AB CD perpendiculares ducantur EF EG, et AE EC iungantur. Quoniam igitur recta linea quędam per centrum ducta EF rectam lineam quandam AB non ductam per centrum ad rectos angulos ſecat, et bifariam ipſam ſecabit. quare AF eſt æqualis FB, ideoq; AB ipſius AF dupla. Eadem ratione et CD dupla eſt CG. atque eſt AB ipſi CD æqualis. æqualis igitur et AF ipſi CG. Et quoniam AE eſt æqualis EC, erit et quadratum ex AE quadrato ex EC æquale. Sed quadrato quidem ex AE æqualia ſunt ex AF FE quadrata, rectus enim angulus eſt ad F: quadrato autem ex EC æqualia ſunt quadrata ex EG GC, cum angulus ad G ſit rectus. Quadrata igitur ex AF FE æqualia ſunt quadratis ex CG GE, quorum quadratum ex AF quadrato ex CG eſt æquale, etenim æqualis eſt AF ipſi CG. reliquum igitur, quod fit ex FE quadratum æquale eſt reliquo, quod ex EG; ac propterea FE ipſi EG eſt æqualis. in circulo autem æqualiter diſtare à centro rectę lineę dicuntur, quando à centro ad ipſas perpendiculares ductæ æquales ſunt. ergo AB CD à centro æqualiter diſtant. Sed AB CD æqualiter diſtent à centro, hoc eſt æqualis ſit FE ipſi EG. Dico AB ipſi CD æqualem eſſe. Iiſdem enim cōſtructis, ſimiliter oſtēdemus AB duplam eſſe ipſius AF, et CD duplā ipſius CG. Et quoniā æqualis eſt AE ipſi EC, erit et ex AE quadratū quadrato ex EC æquale. Sed quadrato quidē ex AE æqualia ſunt quadrata ex EF FA: quadrato aūt ex EC æqualia quadrata ex EG GC. quadrata igitur ex EF FA quadratis ex EG GC æqualia ſunt. quorum quadratū ex EG æquale eſt quadrato ex EF; eſt enim EG ipſi EF æqualis reliquum igitur ex AF quadratū æquale eſt reliquo ex CG. ergo AF ipſi CG eſt æqualis, atque eſt AB ipſius AF dupla, et CD dupla ipſius CG. quare AB ipſi CD æqualis erit. In circulo




3. huius.

47. primi.

igitur æquales rectæ lineę æqualiter à centro distant, et quę æqualiter à centro distant, inter se sunt æquales. quod oportebat demonstrare.

THEOREMA XIIII. PROPOSITIO. XV.

In circulo maxima quidem est diameter; aliarum vero semper propinquior ei, quæ per centrum transit, remotiore maior est.




Sit circulus ABCD, cuius diameter AD; centrum E; et propinquior quidem diametro AD sit BC; remotior vero FG. Dico AD maximam esse, et BC maiorem quàm FG. Ducantur enim à centro ad BC FG perpendiculares EH EK. Et quoniam BC propinquior est ei, quæ per centrum transit, remotior autem FG; erit EK, quàm EH maior. ponatur ipsi EH æqualis EL, et per L ipsi EK ad rectos angulos ducta LM in N producatur, et iungantur E M EN EF EG. Quoniam igitur EH est æqualis EL, erit et BC ipsi MN æqualis. Rursus quoniam æqualis est AE ipsi EM, et DE ipsi EN, erit et AD ipsis ME EN æqualis. Sed ME EN maiores sunt, quàm MN. ergo et AD maior est quàm MN. at MN est æqualis BC. est igitur AD quàm BC maior. Quòd cũ duæ EM EN duabus FE EG æquales sint, angulusq; MEN maior angulo FEG, et basis MN basi FG maior erit. ostensa autem est MN æqualis BC. ergo et BC quàm FG est maior. Maxima igitur est AD diameter, et BC maior, quàm FG. Quare in circulo maxima est diameter, aliarum vero semper propinquior ei, quæ per centrum transit remotiore est maior. quod demonstrare oportebat.

Ex antecedente.

24. primi.

THEOREMA XV. PROPOSITIO XVI.

Quę diametro circuli ad rectos angulos ab extremitate ducitur, cadit extra circulum: et in locum qui inter rectam lineam, et circumferentiam interijcitur altera recta linea non cadet: et semicirculi angulus omni angulo acuto rectilineo maior est; reliquus autem minor.



Sit circulus ABC circa centrum D, et diametrum AB. Dico rectam lineam, quæ à puncto A ipsi AB ad rectos angulos ducitur extra circulum cadere. non enim, sed si fieri potest, cadat intus, vt AC, et DC iungatur. Itaque quoniam æqualis est DA ipsi DC, erit et angulus DAC angulo ACD æqualis. rectus autem est DAC. ergo et ACD est rectus; ac propterea anguli DAC ACD duobus rectis æquales sunt. quod fieri non potest. Non igitur à puncto A ipsi BA ad rectos angulos ducta cadet intra circulum. Similiter ostendemus neque in circumferentiam cadere. extra igitur cadat necesse est. cadat vt AE. Dico in locum qui inter rectam lineam AE, et circumferentiam CHA interiicitur, alteram rectam lineam non cadere. Si enim fieri potest, cadat vt FA, et à puncto D ad FA perpendicularis ducatur DG. Et quoniã rectus est angulus AGD, minor autem recto DAG, erit AD quàm DG maior. æqualis autem est DA ipsi DH. maior igitur est DH ipsa DG, minor maiore, quod fieri non potest. Non igitur in locum qui inter rectam lineam, et circumferentiam interiicitur, altera recta linea cadet. Dico præterea angulum semicirculi, qui recta linea

5. primi.

17. primi.

19. primi.


linea BA, et circumferentia CHA continetur, omni angulo acuto rectilineo maiorem esse; reliquum vero contentum circumferentia CHA, et recta linea AE omni angulo acuto rectilineo esse minorem. Si enim est aliquis angulus rectilineus maior quidem contento recta linea BA, et CHA circumferentia, minor autem contento CHA circumferentia, et recta linea AE, in locum, qui inter circumferentiam CHA, et rectam lineam AE interiicitur, cadet aliqua recta linea, quæ faciet angulum maiorem quidem contento recta linea BA, et CHA circumferentia, qui scilicet rectis lineis continetur; minorem vero contento circumferentia CHA, et AE recta linea. non cadit autem. non igitur erit angulus acutus, qui rectis lineis continetur, maior angulo contento recta linea BA, et CHA circumferentia; neque minor contento circumferentia CHA, et AE recta linea.

COROLLARIVM.

Ex hoc manifestum est, rectam lineam, quæ ab extremitate diametri circuli ad rectos angulos ducitur, circulum contingere: et rectam lineam contingere circulum in vno tantum puncto, quoniã quæ occurrit in duobus pũctis intra ipsũ cadit, vt ostẽsum est.

PROBLEMA II. PROPOSITIO XVII.

A dato puncto rectam lineam ducere, quæ datum circulum contingat.




Sit datum quidem punctum A, datus autem circulus BCD. oportet à puncto A rectam lineam ducere, quæ circulum BCD contingat. Sumatur enim centrum circuli E; et iuncta AE, centro quidem E, interuallo autem EA circulus AFG describatur: et à puncto D ipsi EA ad rectos angulos ducatur DF: jungantur q; EBF AB. Dico à puncto A ductam esse AB, quę circulum BCD contingit. Quoniam enim E centrum est circulorum BCD AFG, erit EA æqualis EF, et ED ipsi EB. Duæ igitur AE EB duabus FE ED æquales sunt, et angulum communem continent, qui est ad E. ergo basis DF basi AB est æqualis; triangulumq; D EF æquale triangulo EBA, et reliqui anguli reliquis angulis. æqualis igitur est angulus EBA angulo EDF. et EDF rectus est. quare et rectus EBA: atque est EB ex centro. quæ autem diametro circuli ab extremitate ad rectos angulos ducitur, circulũ contingit. ergo AB contingit circulum. A dato igitur puncto A ducta est recta linea AB, quæ circulum BCD contingit. quod facere oportebat.

4. primi.

Ex antece-dente.

THEOREMA XVI. PROPOSITIO XVIII.

Si circulum contingat quædam recta linea, à centro autem in contactum recta linea ducatur, ea ad contingentem perpendicularis erit.



Circulum enim ABC contingat quædam recta linea DE in puncto C: et circuli ABC centrũ sumatur F, à quo ad C ducatur FC. Dico FC ad ipsam DE perpendicularem esse. Si enim non ita sit, ducatur à puncto F ad DE perpendicularis FG. Quoniam igitur angulus FGC rectus est, erit GCF acutus; ac propterea FGC angulus maior angulo FCG. maiorem autem angulum


12. primi.

19. primi.

angulum maius latus ſubtendit. maior igitur eſt FC, quàm FG. æqualis autem FC ipſi FB. ergo FB ipſa FC eſt maior, minor maiore, quod fieri non poteſt. non igitur FG eſt perpendicularis ad DE. Similiter oſtendemus neque aliam quampiam eſſe præter ipſam FC. ergo FC ad DE eſt perpendicularis. Si igitur circulum contingat quædam recta linea, à centro autem in contactum recta linea ducatur, ea ad contingentem perpendicularis erit. quod oportebat demonſtrare.

THEOREMA XVII. PROPOSITIO XIX.

Si circulum contingat quædam recta linea, à contactu autem ad rectos angulos contingenti recta linea ducatur; in ea circuli centrum erit.




Circulum enim ABC contingat quædam recta linea DE in C, et à puncto C ipſi DE ad rectos angulos ducatur CA. Dico in ipſa AC circuli centrũ eſſe. Non enim, ſed ſi fieri poteſt, ſit F centrum; et iungatur CF. Quoniam igitur circulum ABC cõtingit quędam recta linea DE, et à centro ad contactum ducta eſt FC, erit FC ad ipſam DE perpendicularis. rectus igitur angulus eſt FCE. eſt autẽ et ACE rectus. ergo FCE angulus eſt æqualis angulo ACE, minor maiori, quod fieri non poteſt. Non igitur F centrum eſt ABC circuli. Similiter oſtendemus neque aliud aliquod eſſe, præterquàm in ipſa AC. Quare ſi circulum contingat quædam recta linea, à cõtactu autem ad rectos angulos contingenti recta linea ducatur; in ea circuli erit centrum. quod demonſtrare oportebat.

SCHOLIVM.

CONVERSVM. Si circulum contingat quædam recta linea, à contactu autem ad rectos angulos contingenti recta linea extra circulum ducatur; producta ad eas partes, in quibus eſt circulus in circuli cẽtrum cadet.

THEOREMA XVIII. PROPOSITIO XX.

In circulo angulus, qui ad centrum duplus eſt eius, qui ad circumferentiam, quando circumferẽtiam eandem pro baſi habeãt.




Sit circulus AB C, ad cuius centrum quidem angulus ſit BEC, ad circumferentiam vero BAC, et eandẽ circumferentiam BC pro baſi habeant. Dico BEC angulum anguli BAC duplum eſſe. Iungatur enim AE et ad F producatur. Itaque quoniam EA eſt æqualis
5. primi. EB, erit et angulus EAB angulo EBA æqualis. anguli igitur EAB EBA dupli ſunt ipſius anguli EAB. Sed
32. primi. angulus BEF eſt æqualis angulis EAB EBA. ergo BEF angulus anguli EAB eſt duplus. Eadem ratione et angulus FEC duplus eſt ipſius EAC. totus igitur BEC totius BAC duplus erit. Rurſus inflectatur, et ſit alter angulus BDC, iũctaq; DE ad G producatur. Similiter oſtendemus angulum GEC anguli EDC duplum eſſe; quorum GEB duplus eſt ipſius EDB. ergo reliquus BEC reliqui BDC eſt duplus

plus. In circulo igitur angulus, qui ad centrum duplus eſt eius, qui ad circumferē tiam, quando circumferentiā eandē pro baſi habeant. quod oportebat demōſtrare.

F. C. COMMENTARIVS.


Illud quoque verum eſt, ſpacium quod eſt ad cētrum duplum eſſe anguli, qui ad circumferentiam, quando circumferentiam eandem pro baſi habuerint.



Sit enim circulus ABC, cuius cētrum E. Dico ſpacium BEC quod eſt ad centrum duplum eſſe anguli BAC. iuncta enim AE, & ad D producta, iunctiſq; BD DC, ſimiliter demonſtrabitur angulus BED anguli BAE duplus, et angulus CED duplus anguli CAE, totum igitur ſpacium BEC quod eſt ad centrum, anguli BAC qui ad circumferentiā duplum erit. quod oportebat demonſtrare.

THEOREMA XIX. PROPOSITIO XXI.


In circulo qui in eadem portione ſunt anguli inter ſe æquales ſunt.



Sit circulus ABCDE, & in eadem portione BAED anguli ſint BAD BED. Dico eos inter ſe æquales eſſe. Sumatur enim circuli ABCDE centrum quod ſit F: iunganturq; BF FD. & quoniam angulus quidē BFD eſt ad centrum, angulus vero BAD ad circumferentiā, & circumferentiam eandem pro baſi habent BCD; erit BFD angulus anguli BAD duplus. Eadem ratione angulus BFD duplus eſt etiam anguli BED. ergo angulus BAD angulo BED æqualis erit. In circulo igitur qui in eadē portione ſunt anguli, inter ſe æquales ſunt. quod oportebat demonſtrare.


F. C. COMMENTARIVS.

Euclidis demonſtratio congruit in maiore tantum circuli portione, niſi fortaſſe ſpacium quodcūque ad cētrum pro angulo accipiatur, ex iis quę nos proxime demonſtrauimus. poſſumus autem & hoc modo demonſtrare.



Sint in portione BAED circuli ABCDE, anguli BAD, & BED. Dico eos inter ſe æquales eſſe. Sit enim primum BAED maior portio, vt in antecedenti figura ſumaturq; circuli centrum quod ſit F: & BF FD iungantur. quoniam igitur angulus BFD eſt ad centrum, angulus vero BAD ad circumferentiam, & eandem baſim habent, nempe circumferentiam ECD; erit angulus BFD anguli BAD duplus: & eadem ratione duplus quoque anguli BED. angulus igitur BAD angulo BED æqualis erit. Sit deinde BAED portio minor: & iungantur BC AC EC DC. Itaque quoniam ex iis, quae proxime demonſtrauimus, angulus BAC eſt æqualis angulo BEC, itemq; angulus CAD angulo CED; erit et totus angulus BAD toti BED æqualis.

Ex antecedente.




ALITER.

Iungatur AE. erit angulus ABE æqualis angulo ADE. angulus autem AGB ad verticem angulo EGD eſt æqualis. ergo & reliquus angulus BAD reliquo BED æqualis erit. In circulo igitur


Ex demonſtratis. 15. primi.

igitur, qui in eadem portione ſunt anguli, inter ſe aequales ſunt. quod demonſtrare oportebat.



THEOREMA XX. PROPO. XXII.

Quadrilaterorum, quę in circulis deſcribuntur, anguli oppoſiti duobus rectis ęquales ſunt.




Sit circulus ABGD, et in ipſo quadrilaterum ABCD. Dico angulos ipſius oppoſitos duobus rectis æquales eſſe. Iungantur AC BD. Quoniam igitur omnis trianguli tres anguli duobus rectis ſunt æquales, erunt trianguli ABC tres anguli CAB ABC BCA æquales duobus rectis. Sed angulus CAB eſt ęqualis angulo B D C, in eadem enim ſunt portione BADC, et angulus ACB æqualis ipſi ADB, quòd ſint in eadem ADCB portione. totus igitur angulus ADC angulis BAC ACB eſt æqualis. communis apponatur ABC angulus duobus angulis, qui ſunt ad A et C, et ſeorſum vni angulo, qui eſt ad D; erunt anguli ABC BAC ACB angulis ABC ADC æquales. Sed ABC BAC ACB ſunt æquales duobus rectis. ergo et anguli ABC ADC duobus rectis ęquales erunt. Similiter oſtendemus angulos quoque BAD DCB duobus rectis eſſe æquales. Quadrilaterorum igitur, quę in circulis deſcribũtur, anguli oppoſiti duobus rectis æquales ſunt. quod oportebat demonſtrare.

32. primi.

THEOREMA XXI. PROPOSITIO. XXIII.

In eadem recta linea duæ circulorum portiones ſimiles et inæquales ex eadem parte non conſtituentur.

* Si enim fieri poteſt, in eadem recta linea AB duæ circulorum portiones ſimiles, et inęquales conſtituantur ex eadem parte A C B A D B; ducaturq; ACD, et CB BD iungantur. Itaquè quoniam portio A C B ſimilis eſt portioni A D B, ſimiles autem circulorum portiones ſunt, quæ angulos ſuſcipiunt æquales; erit A C B angulus ęqualis angulo A D B, exterior interiori, quod fieri non poteſt. Non igitur in eadem recta linea, duę circulorum portiones ſimiles, et inæquales ex eadem parte conſtituentur. quod demonſtrare oportebat.




Diſſ. 11.

F. C. COMMENTARIVS.

* Ex eadem parte. ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη.

In uetuſto codice hęc non leguntur, quamquam ad demonſtrationem neceſſaria ſint, tamen neutra ex parte ſimiles, & inęquales circulorum portiones conſtitui poſſunt in eadem recta linea. Si enim fieri poteſt, in eadem recta linea AB conſtituatur ex altera parte portio A E B ſimilis, & inęqualis portioni A C B. Intelligatur autem ex eadem parte portio AFB ſimilis & aequalis ipſi ACB; & ducta AFE, iunctisq; FB BE, ſimiliter demonſtrabitur angulus AFB aequalis an-




gulo

gulo AEB, exterior interiori, quod fieri non potest. Non igitur in eadem recta linea similes & inæquales circulorum portiones constituentur. quod demonstrandum fuerat.

THEOREMA XXII. PROPOSITIO. XXIIII.


In æqualibus rectis lineis similes circulorum portiones inter se æquales sunt.




Sint enim in æqualibus rectis lineis AB CD similes circulorum portiones AEB CFD. Dico portionem AEB portioni CFD æqualem esse. congruente enim AEB portioue portioni CFD, et posito puncto quidem A in C, recta vero linea AB in CD; congruet et B punctum puncto D, propterea quòd AB ipsi CD sit æqualis. congruente autem recta linea AB rectæ CD, congruet et AEB portio portioni CFD. Si.n. AB congruet ipsi CD, portio autẽ AEB portioni CFD non congruet, sed permutabitur, vt CGD, circulus circulum in pluribus quàm duobus punctis secabit. etenim circulus CGD circulum CFD secat in pluribus pũctis, quàm duobus, videlicet in punctis CGD, quod rursus fieri non potest. Non igitur congruente recta linea AB rectę CD, non congruet et AĘB portio portioni CFD. quare congruet et ipsi æqualis erit. In æqualibus igitur rectis lineis similes circulorũ portiones inter se æquales sunt. quod oportebat demonstrare.

F. C. COMMENTARIVS.

Si enim AB congruet ipsi CD; portio autem AEB portioni CFD non congruet, sed permutabitur, vt CGD, etreliqua.




Si enim AE recta linea ipsi CD congruente, portio AEB portioni CFD non congruet, circũferentia eius vel extra ipsam AEB cadit, vel intra, vel partim extra partim intra. cadat primum extra, vel intra. ergo in eadem recta linea duae circulorum portiones similes & inæquales ex eadem parte constituentur, quod fieri non posse in antecedẽte demonstratum est. cadat deinde partim extra, partim intra, vt CGD. circulus igitur circulum in pluribus quàm duobus punctis secabit. quod itidem fieri nõ potest, ex decima huius. Euclides autem primum casum velut nimis perspicuum omisisse videtur.



Sed & eiusque prædictorum conuersum etiam verum est, quod ita demonstrari potest.

In eadem recta linea, vel in æqualibus rectis lineis æquales circulorum portiones similes sunt.




Si enim fieri potest, sint primum in eadem recta linea AC portiones ABC AEC aequales, sed tamen dissimiles: necesse erit circumferentiam AEC neque congruere circumferentiae ABC, alioqui & aequales essent & similes; neque extra, vel intra ipsam cadere. aequales enim non essent. quare relinquitur vt partim intra, partim ex-

ra cadat. quòd si ita sit, circulus circulum in pluribus, quàm duobus punctis secabit. quod fieri non potest. Similiter demonstrabitur neque ex altera parte, neque in aequalibus rectis lineis constitui posse aequales & dissimiles circulorum portiones; nempe altera portione alteri aptata; vt superius dictum est. In eadem igitur recta linea vel in aequalibus rectis lineis aequales circulorũ portiones similes sunt. quod demonstrare oportebat.

PROBLEMA III. PROPOSITIO XXV.

Circuli portione data describere circulum, cuius ea portio est.



Sit data circuli portio ABC. itaque oportet portionis ABC describere circulũ, cuius est portio. Secetur AC bifariam in D: et à puncto D ipsi AC ad rectos angulos ducatur DB; et AB iungatur. vel igitur angulus ABD maior est angulo BAD, vel minor, vel ipsi æqualis. Sit primum maior et ad rectam lineam BA, atque ad datum in ea punctum A constituatur angulus BAE æqualis angulo ABD; et DB ad E producatur, iungaturq; EC. Quoniam igitur angulus ABE est æqualis angulo BAE, erit et BE recta linea ipsi EA æqualis. et quoniam AD est æqualis DC, communis autẽ DE, duæ AD DE duabus CD DE æquales sunt, altera alteri; et angulus ADE æqualis angulo CDE, rectus. n. vterque est. ergo et basis AE basi EC est æqualis. Sed ostensa est AE æqualis EB. quare et BE ipsi EC est æqualis, ac propterea tres rectæ lineæ AE EB EC inter se æquales sunt. centro igitur E, interuallo autem vna ipsarum AE EB EC circulus descriptus etiam per reliqua transibit puncta, et circulus descriptus erit. Quare circuli portione data descriptus est circulus; cuius ea portio est. Sed et illud constat, portionem ABC semicirculo minorem esse; propterea quòd centrum ipsius extra cadit. Similiter et si angulus ABD sit æqualis angulo BAD, facta AD æquali vtrique ipsarum BD DC, erunt tres rectæ lineæ AD DB DC inter se æquales, atque erit D circuli descripti centrum, et portio ABC semicirculus. Si vero angulus ABD minor sit angulo BAD, constituetur ad rectam lineam BA, & ad punctum in ea datum A, angulo ABD æqualis angulus intra portionem ABC. erit centrum in ipsa DB, atque erit ABC portio semicirculo maior. Circuli igitur portione data descriptus est circulus, cuius portio est. quod facere oportebat.


23. primi.

8. primi.

THEOREMA XXIII. PROPOSITIO XXVI.

In æqualibus circulis æquales anguli æqualibus insistunt circũferentijs, siue ad centra, siue ad circumferentias insistant.

Sint æquales circuli ABC DEF, & in ipsis æquales anguli ad centra quidem BGC EHF, ad circũferentias vero BAC EDF. Dico BKC circumferentiam circumferentiæ ELF æqualem esse. Iungantur enim BC EF. Et quoniã æquales sunt ABC DEF circuli, erũt et quæ ex cẽtris æquales. duæ igitur



BC

BG GC duabus FH,HF æquales sunt:& angulus ad G æqualis angulo ad H. Ergo et basis BC basi EF est æqualis.Rursus quoniã æqualis est angulus ad D, portio BAC similis erit portioni EDF.et sunt in æqualibus rectis lineis BC E F. quæ autem in æqualibus rectis lineis similes sunt circulorum portiones inter se æquales sunt.portio igitur BAC portioni EDF est æqualis.Sed et totus ABC circulus æqualis est toti DEF.ergo et reliqua circumferentia BKC reliquæ ELF æqualis erit.In æqualibus igitur circulis æquales anguli æqualibus insistunt circũferentiis, siue ad centra siue ad circumferentias insistãt.quod oportebat demonstrare.


4.primi. Diffi.11. 24.huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Similiter demonstrabitur in eisdem circulis, & propositio magis vniuersalis erit hoc modo.
In eisdem vel æqualibus circulis æquales anguli æqualibus insistunt circumferentiis,siue ad centra,siue ad circumferentias insistant.

THEOREMA XXIIII. PROPOSITIO. XXVII.

In æqualibus circulis anguli, qui æqualibus insistunt circumferentijs inter se æquales sunt; siue ad centra, siue ad circumferentias insistant.



In æqualibus enim circulis ABC DEF, æqualibus circumferentiis BC EF insistant anguli ad centra quidem BGC EHF, ad circumferentias vero BAC EDF.Dico angulum BGC angulo EHF, et angulum BAC angulo EDF æqualem esse, Si quidem igitur angulus BGC æqualis sit angulo EHF,manifestum est angulum quoque BAC angulo EDF esse æqualem.Sin'minus,vnus ipsorum est maior.sit maior BGC,et constituatur ad rectam lineam BG, et ad punctum in ipsa G angulo EHF æqualis angulus BGK. æquales autem anguli æqualibus insistunt circumferentiis, quando ad centra fuerint.Ergo circumferentia BK æqualis est circumferentiæ EF.Sed circumferentia EF æqualis est ipsi BC.ergo et BK ipsi BC est æqualis,minor maiori, quod fieri non pôt. Non igitur inæqualis est angulus BGC angulo EHF. ergo est æqualis. atque est anguli quidem BGC dimidius angulus qui ad A; anguli vero EHF dimidius qui ad D. angulus igitur qui ad A angulo qui ad D est æqualis.In æqualibus igitur circulis anguli, qui æqualibus insistunt circumferentiis inter se æquales sunt siue ad centra,siue ad circumferentias insistant.quod oportebat demonstrare.


23.primi. Ex antecedente.

F. C. COMMENTARIVS.

Eadem demonstratio erit, si anguli aequalibus circumferentijs eiusdem circuli insistant, vt propositio magis vniuersalis fiat,hoc pacto.
In eisdem vel æqualibus circulis anguli, qui æqualibus insistunt circumferentiis inter se æquales sunt,siue ad centra,siue ad circumferentias insistant.

THEOREMA XXV. PROPOSITIO XXVIII.

In æqualibus circulis æquales rectæ lineæ circumferentias æquales auferunt, maiorem quidem maiori, minorem vero minori.




Sint æquales circuli ABC DEF; et in ipſis æquales rectæ lineæ BC EF, quæ circumferentias quidem BAC EDF maiores auferant, circumferentias vero BGC EHF minores. Dico circumferentiam BAC maiorem maiori circumferentiæ EDF, et minorem circumferentiam BGC minori EHF æqualem eſſe. Sumãtur enim centra circulorum K L, iunganturq; BK KC EL LF. Et quoniam circuli æquales ſunt, erunt et quæ ex centris æquales. duæ igitur BK KC ſunt æquales duabus EL LF: et baſis BC æqualis eſt baſi EF. Ergo angulus BKC angulo ELF eſt æqualis: æquales autem anguli æqualibus inſiſtunt circumferentiis, quando ad centra fuerint. quare cirumferentia BGC æqualis eſt circumferentiæ EHF. Sed et totus ABC circulus toti DEF eſt æqualis. reliqua igitur circumferentia BAC reliqua EDF æqualis erit. Ergo in æqualibus circulis æquales rectæ lineæ circumferentias æquales auferunt, maiorem quidem maiori, minorem vero minori. quod demonſtrare oportebat.

1. huius. Diffi. 1. 8. primi. 16. huius.

THEOREMA XXVI. PROPOSITIO XXIX.

In æqualibus circulis, æquales circumferentias æquales rectæ lineæ ſubtendunt.



Sint æquales circuli ABC DEF: et in ipſis æquales aſſumantur circũferentiæ BGC EHF: et BC EF iungantur. Dico rectam lineam BC rectæ EF æqualem eſſe. Sumantur enim centra circulorum K L, et iungantur BK KC EL LF. quoniam igitur circumferentia BGC eſt æqualis circumferentiæ EHF, erit et angulus BKC angulo ELF æqualis. Et quoniam circuli ABC DEF ſunt æquales, et quæ ex centris æquales erunt. duæ igitur BK KC ſunt æquales duabus EL LF; et æquales angulos continent. quare baſis BC baſi EF eſt æqualis. In æqualibus igitur circulis æquales circumferentias æquales rectæ lineæ ſubtendunt. quod oportebat demonſtrare.

1 huius. 16. huius. Diffi. 1. 4. primi.

F. C. COMMENTARIVS.

Non aliter etiam in duabus antecedentibus eum demonſtrationes eædem ſint, propoſitiones magis vniuerſales fieri poterunt, in hunc modum.

In eiſdem vel æqualibus circulis æquales rectæ lineæ circumferentias æquales auferunt, maiorem quidem maiori, minorem vero minori.

In eiſdem vel æqualibus circulis æquales circumferentias æquales rectæ lineæ ſubtendunt.


Sed & harum quoddammodo conuerſas, atque alias his non diſſimiles demonſtrare hoc loco non inutile arbitrati ſumus.

PROPOSITIO PRIMA.

Si æquales rectæ lineæ æquales, et ſimiles circumferentias auferant, circuli æquales erunt, quorum illæ ſunt circumferentiæ.

Si enim

Si enim fieri poteſt, ſint circuli inęquales, & in maiori circulo ABC, circa idem centrum G aequalis minori deſcribatur DEF: & iũgãtur AG GC DG GF, ita vt punctum F cadat in recta linea GC: & AG ſecet circulum DEF in H. Quoniam igitur rectae lineae AC DF aequales ſunt, erit angulus AGC minor angulo DGF; quod deinceps demonſtrabitur. quare circumferentia HF minor erit circumferentia DF. Sed circumferentia HF ſimilis eſt circumferentiae AC, ex 12 diffinitione huius. in ipſis enim idem angulus AGC conſiſtit. ergo circumferentia DF circumferentiae AC non eſt ſimilis. atqui ſimilis ponebatur. quod eſt abſurdum. non igitur circuli inaequales ſunt. ergo aequales eſſe neceſſarium eſt. At vero angulum AGC minorem eſſe angulo DGF, ita demonſtrabimus.



Intelligatur triangulum AGC ſeorſum, & trianguli DGF punctum D in A ſtatuatur; & punctum F in C. ſunt enim AC DF inter ſe aequales. cadet triangulum DGF intra triangulum AGC. quare ex 21 primi libri angulus AGC minor eſt angulo DGF. quod demonſtrare oportebat.

PROPOSITIO. II.

In circulis inęqualibus ęquales rectę lineę diſsimiles circumferentias auferunt.

Hoc autem ex ijs, quae nos proxime demonſtrauimus perſpicue apparet. aequales enim rectae lineae AC DF diſsimiles auferunt circumferentias.

PROPOSITIO. III.

In circulis inæqualibus ſimiles circumferentias inæquales rectæ lineæ ſubtẽdũt.

Et hoc ſimiliter apparet ex ante demonſtratis. repetatur enim eadem figura, & iungatur HF. Itaque quoniam triangulum DGF duo latera DG GF aequalia habet duobus lateribus HG GF trianguli HGF, & angulum DGF maiorem angulo HGF, erit baſis DF baſi HF maior. Sed recta linea AC eſt aequalis ipſi DF. ergo AC HF inęquales ſunt, & ſimiles circumferentias ſubtendũt. quod oportebat demonſtrare.

PROPOSITIO IIII.


Similes et inęquales circumferentias inæquales rectę lineę ſubtendunt.

Si enim rectae lineae aequales ſint, & circuli item aequales, erunt circumferentiae, quas ſubtendunt, & aequales & ſimiles. Si vero circuli ſint inęquales, circumferentiae diſsimiles erunt. quod non ponitur. Similes igitur & inęquales circumferentias, inęquales rectae lineae ſubtendunt. quod demonſtrare oportebat.

PROBLEMA XIIII. PROPOSITIO. XV.

Datam circumferentiam bifariam ſecare.


Sit data circumferentia ADB. oportet ADB circumferentiam bifariam ſecare. Iungatur AB, & in C bifariam ſecetur: à puncto autem C ipſi AB ad rectos angulos ducatur CD, & iungantur AD DB. Quoniam igitur AC eſt æqualis CB, communis autem CD, duæ AC CD duabus



10. primi.


BC,

BC CD æquales ſunt: et angulus ACD æqualis angulo
4.primi. BCD, rectus enim vterque eſt: ergo baſis AD baſi DB eſt
23.huius. æqualis. æquales autem rectæ lineæ circumferentias æquales auferunt, maiorem quidem maiori, minorem vero minori. et eſt vtraque ipſarum AD DB circumferentiarum ſemicirculo minor. quare circumferentia AD circumferentiæ D B æqualis erit. data igitur circumferentia bifariam ſecta eſt. quod facere oportebat.



THEOREMA XXVII. PROPOSITIO XXXI.

In circulo angulus, qui in ſemicirculo rectus eſt, qui vero in maiori portione minor eſt recto, & qui in minori maior recto; & inſuper maioris quidem portionis angulus recto maior eſt, minoris vero portionis angulus recto minor.



Sit circulus A B C D cuius diameter B C, centrum autem E; et iungantur BA AC AD DC. Dico angulum quidem, qui eſt in ſemicirculo BAC rectum eſſe; qui vero in portione ABC maiore ſemicirculo, videlicet angulum ABC minorem eſſe recto, et qui in portione ADC minore ſemicirculo, hoc eſt angulū ADC recto maiorem. iungatur A E, et B A ad F producatur. Itaque quoniam BE eſt æqualis EA, erit et angulus EAB, angulo EBA æqualis. Rurſus quoniam AE
5.primi. eſt æqualis EC, et angulus ACE angulo CAE æqualis erit. totus igitur angulus BAC eſt æqualis duobus ABC ACB angulis. eſt autem et
32 primi. angulus FAC extra triangulum ABC, duobus ABC ACB æqualis. angulus igitur
15.primi. BAC eſt æqualis angulo FAC. ac propterea vterque ipſorum rectus. Quare in ſemi
17.primi. circulo BAC angulus BAC rectus eſt. et quoniam trianguli ABC duo anguli ABC BAC duobus rectis ſunt minores, rectus autem BAC, erit ABC angulus recto minor, atque eſt in portione ABC maiore ſemicirculo. Quòd cum in circulo quadri-
22.huius. laterum ſit ABCD, quadrilaterorum vero, qui in circulis deſcribuntur, anguli oppoſiti duobus rectis ſint æquales: erunt ABC ADC anguli æquales duobus rectis. et angulus ABC minor eſt recto. reliquus igitur A D C recto maior erit, atque eſt in portione ADC minore ſemicirculo. Dico præterea maioris portionis angulum, qui continetur ABC circumferentia et recta linea A C recto maiorem eſſe; angulū vero minoris portionis contentum circumferentia A D C, et recta linea A C recto minorem. quod quidem perſpicue apparet. Quoniam enim angulus, qui rectis lineis BA AC continetur rectus eſt, erit et contentus A B C circumferentia, et recta linea AC recto maior. Rurſus quoniam angulus contentus rectis lineis CA AF rectus eſt, erit qui continetur recta linea C A, et A D C circumferentia minor recto. In circulo igitur angulus qui in ſemicirculo rectus eſt, qui vero in maiori portione minor eſt recto, et qui in minori maior recto. et inſuper maioris quidem portionis angulus recto maior eſt: minoris vero recto minor. quod demonſtrare oportebat.

ALITER demoſtrabitur angulū BAC rectū eſſe. Quoniā enim angulus AEC duplus eſt anguli BAE, etenim duobus interioribus, et oppoſitis eſt æqualis: eſt autem et AEB duplus ipſius EAC: anguli AEB AEC anguli BAC dupli erunt. Sed et AEB AEC anguli duobus rectis ſunt æquales. ergo angulus BAC rectus eſt. quod demonſtrare oportebat.

COROLLARIVM.

Ex hoc manifeſtum eſt, ſi triāguli vnus angulus ſit æqualis duo-

bus


bus, eum rectum esse; propterea quòd & qui deinceps est, ijsdem est æqualis. quando autem anguli deinceps sunt æquales, necessario recti sunt.

SCHOLIVM.

Si semicirculi omnes ob similitudinem æquales angulos suscipiunt, nempe rectos, maiores autem portiones suscipiunt rectis minores; perspicuum est cum similes sint æquales suscipere angulos. quo enim maiores sunt semicirculis, eo rectum angulū diminuunt: similiter et minores semicirculis rectum proportione augent. Ergo similes portiones æquales suscipiant angulos necesse est. portionum autem anguli, quòd heterogenei sint, respectu rectilineorum, sunt enim mixti, cum illis non comparantur determinata magnitudine, nisi maioritate tantum, vt sic dicam, & minoritate. Quamobrem contingit maiore portione ad minorem procedente per medium circulum, angulum ipsius maiorem simpliciter recto ad minorem procedere, & non per rectum. rectus enim magnitudo determinata est. Videbitur autem hoc admirabile esse, quam quæ in contraria transmutantur, per media transire consueuerunt. Sed et in alijs inuenire licet hoc modo oppositæ absque medio. etenim quæ circulum comprehendit linea, cum conuexa sit, et caua, recta non est.

THEOREMA XXVIII. PROPOSITIO XXXII.

Si circulum contingat quædam recta linea, à contactu autem in circulum ducatur recta linea ipsum secans; anguli quos ad contingentem facit, æquales erunt ijs, qui in alternis circuli portionibus consistunt.



Circulum enim ABCD contingat quædam recta linea EF in B, et à puncto B ad circulum ABCD ducatur recta linea BD ipsum vtcumque secans. Dico angulos, quos BD, cum EF contingente facit, æquales esse iis, qui in alternis circuli portionibus consistunt, hoc est angulum FBD esse æqualem angulo, qui cōstituitur in DAB portione, videlicet ipsi DAB; angulum vero EBD æqualem angulo DCB, qui in portione DCB constituitur. Ducatur enim à puncto B ipsi EF ad rectos angulos BA: et in circumferentia BD sumatur quod vis punctum C; iungantur q; AD DC CB. Quoniam igitur circulum ABCD contingit quædam recta linea EF in puncto B: et à contactu B ad rectos angulos contingenti ducta est BA; erit in ipsa BA centrum ABCD circuli, quare BA eiusdē circuli diameter est, et angulus ADB in semicirculo est rectus. reliqui igitur anguli BAD ABD vni recto æquales sunt. Sed et ABF est rectus. ergo angulus ABF æqualis est angulis BAD ABD. communis auferatur ABD. reliquus igitur DBF ei, qui in alterna circuli portione consistit, videlicet angulo BAD est æqualis. Et quoniam in circulo quadrilaterum est ABCD, et anguli eius oppositi æquales

11. primi.

19. huius.


Ex antecedente.

32. primi.

32.huius, ſi æquales ſunt duobus rectis; erunt DBF DBE anguli angulis BAD BCD æquales. quorum BAD oſtenſus eſt æqualis ipſi DBF. ergo reliquus DBE ei, qui in alterna circuli portione DCB conſtituitur, videlicet ipſi DCB æqualis erit. Si igitur circulum contingat quædam recta linea, à contactu vero in circulum ducatur recta linea ipſum ſecans; anguli, quos facit ad contingentem, æquales erunt iis, qui in alternis circuli portionibus conſiſtunt. quod oportebat demonſtrare.

PROBLEMA V. PROPOSITIO XXXIII.

In data recta linea deſcribere portionem circuli, quæ ſuſcipiat angulum dato angulo rectilineo æqualem.



Sit data recta linea AB, datus autem angulus rectilineus, qui ad C. itaque oportet in data recta linea AB deſcribere portionẽ circuli, quæ ſuſcipiat angulum æqualem angulo, qui eſt ad C. vel igitur angulus ad C acutus eſt, vel rectus, vel obtuſus. Sit primum acutus, vt in prima figura, et ad rectam lineam AB, et ad punctum in ea datum A, conſtituatur angulus BAD angulo qui eſt ad C æqualis. acutus igitur angulus eſt BAD, et à puncto A ipſi AD ad rectos angulos ducatur AE; ſecetur autẽ AB bifariam in F; atque à puncto F ducatur FG ad rectos angulos ipſi AB. et GB iungatur. Quoniam igitur AF eſt æqualis FB, communis autem FG, duæ AF FG duabus BF FG æquales ſunt: et angulus AFG æqualis angulo GFB. ergo baſis AG baſi GB eſt æqualis. Itaque centro G, interuallo autem AG circulus deſcriptus tranſibit etiam per B. deſcribatur et ſit ABE, iungaturq; EB. Quoniam igitur ab extremitate diametri AE, et à pnncto A ipſi AE ad rectos angulos ducta eſt AD; ipſa AD circulum continget. et quoniam circulum ABE contingit quædam recta linea AD, et à contactu, qui eſt ad A. in circulum ABE ducta eſt recta linea AB: erit angulus DAB æqualis angulo, qui in alterna circuli portione conſtituitur, videlicet ipſi AEB. Sed angulus DAB angulo, qui ad C eſt æqualis. ergo et angulus ad C angulo AEB æqualis erit. In data igitur recta linea AB portio circuli deſcripta eſt AEB, ſuſcipiens angulum AEB dato angulo, qui ad C æqualem. Sit deinde angulus, qui ad C rectus. et oporteat rurſus in recta linea AB deſcribere circuli portionem, quæ ſuſcipiat angulum æqualem recto angulo, qui eſt ad C. conſtituatur enim rurſus angulo recto, qui ad C æqualis angulus BAD, vt in ſecũda figura, ſeceturq; AB bifariã in F, et centro F, interuallo autem alterutra ipſarum AF FB circulus deſcribatur AEB. ergo AD recta linea circulum ABE contingit, propterea quòd rectus eſt qui ad A angulus, et angulus BAD æqualis angulo, qui eſt in portione AEB: rectus enim et ipſe eſt, in ſemicirculo conſiſtẽs. ſed BAD æqualis eſt ei qui ad C. Ergo et qui in portione AEB ei, qui ad C eſt æqualis. deſcripta igitur eſt rurſus in AB recta linea, portio circuli AEB, ſuſcipiens angulum angulo recto, qui ad C æqualem. Demique ſit angulus ad C obtuſus, et ad rectam lineam AB, et ad punctum A conſtituatur ipſi æqualis angulus BAD, vt hẽt in tertia figura, et ipſi AD rectæ lineæ ad rectos angulos ducatur AE: ſeceturq; rurſus AB bifariam in F. ipſi vero AB ducatur ad rectos angulos FG, et GB iungatur. Et quoniam AF eſt æqualis FB, communis autem FG. duæ AF FG duabus BF FG æquales ſunt, et angulus AFG angulo BFG æqualis.


23.primi, 11.primi. 10.primi. — 4.primi. — Corol.16.huius. — Ex antecedente, — 23.primi, — Corol.16.huius.

lis.basis igitur AG est æqualis basi GB. Quare centro G, intervallo autem AG circulus descriptus etiam per B transibit. transeat vt AEB. Et quoniam diametro AE ab extremitate ad rectos angulos ducta est AD, ipsa AD circulum AEB continget: et à contactu, qui ad A ducta est AB. quare angulus BAD ei, qui in alterna circuli portione AHB cōstituitur est æqualis. Sed BAD angulus æqualis est angulo, qui ad C. angulus igitur, qui in portione AHB angulo, qui ad C æqualis erit. Ergo in data recta linea AB descripta est AHB circuli portio, susciens angulum æqualē ei, qui est ad C. quod facere oportebat. 4. primi. Corol. 16. huius.

PROBLEMA VI. PROPOSITIO XXXIIII.

A dato circulo portionem abscindere, quæ suscipiat angulum dato angulo rectilineo æqualem.

Sit datus circulus ABC: datus autem angulus rectilineus. qui ad D. oportet à circulo ABC portionem abscindere, quę suscipiat angulum angulo qui ad D æqualem. Ducatur recta linea EF circulum ABC in puncto B contingens: et ad rectam lineam BF, et ad punctum in ea B cō stituatur angulus FBC angulo qui est ad D æqualis. Quoniam igitur circulum ABC contingit quædam recta linea EF in B puncto, et à cōtactu B ducta est BC, erit angulus FBC æqualis ei, qui in alterna circuli portione cōstituitur. Sed FBC angulus angulo qui ad D est æqualis. ergo et angulus, qui in portione BAC angulo qui ad D æqualis erit. A dato igitur circulo ABC abscissa est portio quædam BAC suscipiens angulum dato angulo rectilineo, qui est ad D, æqualem. quod facere oportebat.




17. huius. 23. primi.

THEOREMA XXIX. PROPOSITIO XXXV.


Si in circulo duæ rectæ lineæ se se mutuo secent rectangulum portionibus vnius contentum æquale est ei, quod alterius portionibus continetur.

In circulo enim ABCD duæ rectę lineæ AC BD se se mutuo in puncto E secent. Dico rectangulum contentum AE EC æquale esse ei, quod DE EB continetur. Si igitur AC BD per centrum transeant, ita vt E sit centrum ABCD circuli; manifestum est æqualibus existentibus AE EC DE EB, et rectangulum contentum AE EC æquale esse ei, quod DE EB continetur. Itaque AC DB non transeant per centrum; et sumatur centrum circuli ABCD quod sit F: et ab F ad rectas lineas AC DB perpendiculares ducantur FG FH: iunganturq; FB FC FE. Quoniam igitur recta quędam linea GF per centrum ducta rectam lineam quandam AC non ductam per centrum ad rectos angulos secat, et bifariam ipsam secabit. quare AG ipsi GC est æqualis. Et quoniam recta linea AC secta est in partes æquales in puncto G, et in partes inęquales in E, erit rectangulum AE EC contentum vnà cum ipsius EG quadrato, æquale quadrato ex GC. commune addatur ex GF quadratum. ergo rectāgulum AEC vnà cum iis, quæ ex EG GF quadratis æquale est quadratis ex CG GF. Sed quadratis quidem ex EG



3. huius. 5. secundi.

47.primi. GF æquale eſt quadratũ ex FE: quadratis vero ex CG GF æquale quod ex FC quadratum. rectangulum igitur AEC vnà cũ quadrato ex FE æquale eſt quadrato ex FC. eſt autem CF æqualis F B. Ergo rectangulum AEC vnà cum quadrato ex EF æquale eſt ei, quod ex FB quadrato. Eadẽ ratione et rectangulum DEB vnà cũ quadrato ex FE æquale eſt quadrato ex FB. oſtenſum autẽ eſt et rectãgulum AEC vnà cum quadrato ex FE æquale ei, quod ex FB quadrato. ergo rectãgulum AEC vnà cum quadrato ex FE æquale eſt rectangulo DEB vnà cum quadrato ex FE. commune auferatur quod ex FE quadratum. reliquum igitur rectãgulum AEC reliquo DEB rectãgulo æquale erit. Quare ſi in circulo duę rectę lineę ſe ſe mutuo ſecẽt, rectangulũ portionibus vnius cõtentũ æquale eſt ei, quod alterius portionibus continetur, id quod demõſtrare oportebat.



THEOREMA XXX. PROPOSITIO. XXXVI.

Si extra circulum aliquod punctum ſumatur, et ab eo in circulum cadant duæ rectę lineæ, quarum altera quidem circulum ſecet, altera vero contingat; rectangulum, quod tota ſecante, et exterius aſſumpta inter punctum, et curuam circumferentiam continetur, æquale erit ei, quod à contingente fit quadrato.


Extra circulum enim ABC ſumatur aliquod punctum D, et ab eo ad dictum circulum cadãt duæ rectę lineæ DCA DB: et DCA quidem circulum ABC ſecet; DB vero contingat. Dico rectãgulum ADC quadrato, quod fit ex DB æquale eſſe. Vel igitur DCA per centrum tranſit, vel non. tranſeat primum per centrum circuli ABC, quod ſit F: et

18.huius. FB iungatur. erit angulus FBD rectus. Itaque quoniam recta linea AC bifariam ſecta eſt in F, et ipſi adiicitur CD; rectangulũ ADC vnà cum quadrato, quod

6.ſecundi. ex FC æquale erit ei, quod fit ex FD quadrato. æqualis autem eſt CF ipſi FB. ergo rectangulũ ADC vnà cum quadrato quod ex FB æquale eſt quadrato ex FD. Sed quadrarum ex FD eſt æquale quadratis ipſarum FB, BD; rectus enim angulus eſt FBD. rectãgulum igitur ADC vnà cum quadrato ex FB æquale eſt ipſarum FB, BD quadratis. commune auferatur quadratũ quod ex FB. ergo reliquum ADC rectangulum quadrato quod fit à contingente DB æquale erit. Sed DCA non tranſeat per centrum ABC circuli: ſumaturq; centrũ E, et ab ipſo E ad AC perpendicularis agatur EF: et iungantur EB EC ED. rectus igitur eſt EFD angulus. Et quoniam recta linea quædam EF per centrum ducta, rectam lineam quandam AC non ductam per

3.huius. centrum ad rectos angulos ſecat, et bifariam ipſam ſecabit. quare AF ipſi FC eſt æqualis. Rurſus quoniam recta linea AC bifariam ſecta eſt in F, atque ipſi adiicitur

4.ſecundi. CD, erit rectangulum ADC vnà cum quadrato ex FC æquale quadrato, quod ex FD. commune apponatur quod ex FE quadratum. rectangulum igitur ADC vnà



cum

cum quadratis ex CF FE eſt ęquale quadratis ex DF FE. ſed quadratis quidem ex DF FE æquale eſt, quod ex DE quadratũ; etenim rectus eſt angulus EFD: quadratis vero ex CF FE æquale eſt quadratum ex CE. ergo rectangulum ADC vnà cũ quadrato, quod ex CE eſt ęquale quadrato ex ED. æqualis autem eſt CE ipſi EB. rectangulum igitur ADC vnà cum quadrato ex EB ęquale eſt ei, quod ex ED quadrato. ſed quadrato ex ED æqualia ſunt quadrata ex EB BD; ſi quidem rectus eſt angulus EBD. ergo rectangulum ADC vnà cũ quadrato ex EB æquale eſt eis, quæ ex EB BD quadratis. commune auferatur quadratum ex EB. reliquum igitur AD C rectangulum quadrato, quod fit ex DB æquale erit. Si igitur extra circulum aliquod punctum ſumatur, et quę deinceps ſunt. quod oportebat demonſtrare.

F. C. COMMENTARIVS.


Ex proxime demonſtratis duo corollaria ſequuntur, vt ĕt adnotauit Campanus. nempe hęc.

Si à pũcto extra circulum ſumpto ducãtur in circulum quotcumque rectę lineę, ipſum ſecantes; rectangula quæ totis, et earum portionibus extrinſecis cõtinentur, inter ſe æqualia ſunt; quod ſingula quadrato lineæ contingẽntis ſint æqualia.

A puncto extra circulum ſumpto ductę duæ rectæ lineæ circulum contingentes inter ſe æquales ſunt. etenim vtriuſque ipſarum quadrata ſunt ęqualia rectangulo, quod recta linea ab eodem puncto ducta, quę circulum ſecet, et eius portione extrinſeca continetur. ergo et ipſæ lineę æquales ſint neceſſe eſt. neque vero plures quàm duæ eſſe poſſunt, quod ex demonſtratis in octauo huius perſpicue apparet.

THEOREMA XXXI. PROPOSITIO. XXXVII.

Si extra circulum ſumatur aliquod punctum, atque ab eo in circulum cadant duę rectę lineæ, quarum altera quidem circulum ſecet, altera vero incidat; ſit autem quod tota ſecante, et exterius aſſumpta inter punctum, et curuam circumferentiam continetur, ęquale ei, quod ab incidente fit quadrato: incidens linea circulum continget.



Extra circulum enim ABC ſumatur aliquod punctum D, atque ab ipſo in circulum cadant duæ rectæ lineæ DC A DB; et DCA quidem circulum ſecet, DB vero incidat, ſitq; rectangulum ADC ęquale quadrato, quod fit ex D B. Dico ipſam DB circulum ABC contingere. Ducatur enim recta linea DE contingens circulum ABC, et ſumatur circuli ABC centrum quod ſit F, iunganturq; FE FB FD. ergo angulus FED rectus eſt. Et quoniam DE circulum ABC contingit, ſecat autem DCA, rectangulum A DC æquale erit quadrato quod ex DE. ſed rectangulum ADC ponitur æquale quadrato quod ex DB. quadratum igitur quod ex DE quadrato ex DB æquale erit, ac propterea linea DE ipſi DB æqualis. eſt autem et FE ęqualis FB. duę igitur DE EF duabus DB BF æquales ſunt; et baſis ipſarum communis FD. angulus igitur DEF eſt æqualis angulo DBF. rectus autem DEF. ergo et DBF eſt rectus; atque eſt FB producta diameter. quę vero ab extremitate diametri circuli ad rectos angulos ducitur circulum contingit. ergo DB circulum ABC contingat neceſſe eſt. Similiter demonſtrabitur et ſi centrum ſit in ipſa AC. Si igitur extra circulum ſumatur aliquod punctum, et reliqua, quod demonſtrare oportebat.

17. huius.

8. primi.

TERTII LIBRI FINIS.

EVCLIDIS ELEMENTORVM LIBER QVARTVS

CVM SCHOLIIS ANTIQVIS, ET COMMENTARIIS


Federici Commandini Vrbinatis.

DIFFINITIONES.

I.



FIGVRA rectilinea in figura rectilinea descri bi dicitur, quãdo vnus quisque figuræ descriptæ angulus vnũquod que latus eius, in qua describitur, contingit.




II.

Figura similiter circa figuram describi dicitur quando vnumquodque latus descriptę vnumquemque angulum eius, circa quam describitur, contingit.


III.

Figura rectilinea in circulo describi dici tur, quando vnusquisque descriptæ figuræ angulus circuli circumferentiam contingit.



IIII.

Figura rectilinea circa circulum descri bi dicitur, quando vnumquodque latus descriptę circuli circumferentiã cõtingit.




V.

Circulus similiter in figura rectilinea describi dicitur, quando circuli circumferentia vnumquodque latus eius, in qua describitur, contingit.

Circulus


VI.

Circulus circa figuram rectilineam describi dicitur, quando circuli circumferentia vnumquemque angulum eius, circa quam describitur, contingit.



VII.


Recta linea in circulo aptari dicitur, quando eius extrema ad circuli circumferentiam se applicant.



PROBLEMA I.
PROPOSITIO I.

In dato circulo datæ rectę lineæ, quæ diametro eius maior nō sit, æqualem rectam lineam aptare.

Sit datus circulus A B C, data autem recta linea non maior circuli diametro D. oportet in circulo ABC rectę lineę D ęqualem rectam lineam aptare. Ducatur circuli ABC diameter BC. Si quidem igitur BC sit ęqualis ipsi D, factum iam erit, quod proponebatur. etenim in circulo A B C aptata est A C rectæ lineæ D ęqualis. Sin minus, maior est BC quàm D, ponaturq; ipsi D æqualis C E: et centro quidem C interuallo autem C E circulus describatur A E F: et C A iungatur.



Itaque quoniam punctum C centrum est AEF circuli; erit CA ipsi CE æqualis. Sed D est æqualis CE. ergo et D ipsi AC æqualis erit. In dato igitur circulo ABC datæ rectę lineæ D, non maiori circuli diametro, æqualis aptata est AC. quod facere oportebat.

SCHOLIVM.


Cum varia sit circumscriptionum, et inscriptionum contemplatio, Euclides non multum admodum progressus est. nam perueniens ad hexagonum, & postremo quindecagoni angulos tradens, qui ad astrorum scientiam magis pertinent, finem dicendi fecit. Primum autem theorema lemma quoddam est, pentagoni constitutioni inseruiens: & quæcumque in hoc ordinantur, in illa præordinari oportebat. Sed quoniam simpliciorem habet constructionem, quàm trianguli constitutio, iure merito ante alia theoremata positum est. Sciendum autem si quidem data recta linea diametro sit æqualis, vno tantum modo, vel etiam absque vlla experientia fieri problema; Si vero minor, duobus modis. ab eodem namque puncto vt C ad AF ductæ rectæ lineæ inter se æquales sunt.

Problema hoc eſt ex eorum numero, quae determinata appellantur. poſſet enim & hoc modo explicari.

In dato circulo datæ rectę lineæ ęqualem rectam lineam aptare. oportet autem datam rectam lineam diametro circuli non eſſe maiorem.

Licet etiam problema aliud abſoluere huiuſmodi.

In dato circulo rectam lineam rectę lineæ datę, quę diametro maior non ſit, ęqualem, et alteri datæ parallelam aptare.




Sit datus circulus ABC, cuius centrum D, & recta linea non maior diametro circuli EF: altera vero recta linea ſit, in qua G. Itaque oportet in circulo ABC aptare rectam lineam aequalem ipſi EF, & ipſi G parallelam. Ducatur 31.primi. *per D recta linea AD C parallela ipſi G, quae circuli diameter erit. & ſi quidem AC ſit ęqualis EF, factũ iã erit quod proponebatur: ſi vero AC ſit maior, quàm EF, ſecetur EF biſariam in H: & ipſi HE aequalis abſcindatur à ſemidiametro circuli* 11.primi. *DA, quae ſit DK. ipſi vero HF aequali. fiat DL; perq; pũcta KL ipſi AC ad rectos angulos ducantur MN OP; & MO iungatur. Quoniam igitur recta linea quędam AC per centrum ducta rectam lineam MN non ductam per centrum ad rectos angulos ſecat; & biſariam ipſam ſecabit. quare MK eſt aequalis KN. Et ob eandem cauſſam OL eſt aequalis LP. ſunt autem MN OP inter ſe aequales, cum aequaliter à centro diſtẽt: & ſunt parallelae, anguli enim MKL OLK* 3.tertij. 14.tertij. 28.primi. 33.primi. *recti ſunt. quare et earum dimidiae KM LO & aequales erunt, & parallelae. At quae aequales, & parallelas ad eaſdem partes coniungunt, & ipſae aequales, et parallelae ſunt. ergo MO eſt* 30 primi. *aequalis KL, hoc eſt ipſi EF, & parallela ipſi G; ſunt enim vtręque ipſi KL parallelae. Eadem ratione iuncta NP demonſtrabitur aequalis eidẽ EF, & parallela ipſi G. In circulo igitur ABC aptata eſt MO vel NP aequalis EF, & ipſi G parallela. quod facere oportebat.*

Ex quibus conſtat ſi quidem AC ſit aequalis rectæ lineæ datę, vno dumtaxat modo problema abſolui; ſi vero ſit maior, duobus modis, vt in antecedẽti dictum eſt.

PROBLEMA II. PROPOSITIO. II.

In circulo dato, dato triangulo æquiangulum triangulum deſcribere.

Sit datus circulus ABC, datum autem triangulũ DEF. oportet in ABC circulo deſcribere triangulũ triangulo DEF ęquiangulum. Ducatur recta linea GAH contingens circulum ABC in puncto A: et ad rectam lineam AH, et ad punctum in ea A angulo DEF ęqualis angulus conſtituatur HAC. rurſus ad rectam lineam AG, et ad punctum in ipſa A angulo DFE ęqualis cõſtituatur angulus GAB; et BC iungatur.



17.tertij. 23.primi.

Quoniã igitur circulũ ABC contingit quædã recta HAC; à contactu aũt in circulũ ducta eſt AC: erit HAC angulus ęqualis ei, qui in alterna circuli portione cõſiſtit, videlicet ipſi ABC. Sed HAC angulus ęqualis eſt angulo DEF. ergo et angulus ABC

32 primi.


angulo

angulo DEF eſt æqualis. Eadem ratione et angulus ACB eſt æqualis angulo DFE. reliquus igitur BAC angulus reliquo EDF æqualis erit. Ergo triangulum ABC triangulo DEF eſt ęquiangulum. et deſcriptum eſt in circulo ABC. In dato igitur circulo dato triangulo æquiangulũ triangulũ deſcriptũ eſt. quod facere oportebat.

PROBLEMA III. PROPOSITIO III.

Circa datum circulum triangulo dato ęquiangulum triangulum deſcribere.

Sit datus circulus ABC: datum autem triangulum DEF. oportet circa circulum ABC deſcribere triãgulum triãgulo DEF æquiangulum. protrahatur ex vtraque parte EF ad puncta HG: et ſumatur circuli ABC centrum K: et recta linea KB vt cumque ducatur: conſtituaturq; ad rectam lineam KB, et ad punctum in ea K angulo quidem DEG æqualis angulus BKA; angulo aũt DFH æqualis angulus BKC. et per ABC puncta ducantur rectæ lineę LAM MBN NCL circulum ABC, contingentes. Quoniam igitur circulũ ABC contingunt LM MN NL, in punctis ABC, à centro autem K ad ABC puncta ducuntur KA KB KC; erunt anguli ad puncta ABC recti. Et quoniam quadrilateri AMBK anguli quattuor quattuor rectis æquales ſunt; etenim in duo triangula diuiditur; quorum anguli KAM KBM ſunt recti; erunt reliqui AKB AMB duobus rectis æquales. Sunt autem et DEG DEF ęquales duobus rectis. anguli igitur AKB AMB angulis DEG DEF æquales ſunt; quorum AKB ipſi DEG eſt æqualis. ergo reliquus AMB reliquo DEF ęqualis erit. Similiter demonſtrabitur angulus LNB ipſi DFE æqualis. ergo et reliquus MLN eſt æqualis reliquo EDF. æquiangulum igitur eſt LMN triangulum triangulo DEF, et deſcriptum eſt circa circulum ABC. Quare circa datum circulum triangulo dato æquiangulum triangulum deſcriptum eſt. quod facere oportebat.



23. primi.


17. tertij.

18. tertij.

PROBLEMA IIII. PROPOSITIO IIII.

In dato triangulo circulum deſcribere.

Sit datum triangulum ABC. oportet in triangulo ABC circulum deſcribere. ſecentur anguli ABC BCA bifariam rectis lineis BD CD, quæ conueniant inter ſe in D puncto; et à puncto D ad rectas lineas AB BC CA perpendiculares ducantur DE DF DG. Et quoniam angulus ABD eſt æqualis angulo CBD: eſt autem et rectus BED recto BFD ęqualis; erunt duo triangula EBD DBF, duos angulos duobus angulis æquales habentia, et vnum latus vni lateri ęquale, et vtrique commune BD, quod ſcilicet vni æqualium angulorum ſubtẽditur. ergo et reliqua latera reliquis lateribus æqualia habebunt: atque erit DE ęqualis DF. et eadem ratione DG ęqualis DF. ergo et DE ipſi DG eſt ęqualis. tres igitur rectæ lineæ DE DF DG inter ſe æquales ſunt; quare centro D interuallo autem vna ipſarum DE DF DG circulus deſcriptus etiam per reliqua tranſibit puncta; et rectas lineas AB BC CA cõtinget; propterea quòd recti ſunt ad EFG anguli. ſi enim ipſas ſecet, quæ ab extremitate diametri



9. primi.

12. primi.

26. primi.


16.tertij. metri circuli ad rectos angulos ducitur, intra circulū cadet. quòd eſt abſurdū. nō igitur cētro D, interuallo aūt vna ipſarum DE DF DG circulus deſcriptus ſecabit rectas lineas AB BC CA. quare ipſas cōtinget; atque erit circulus deſcriptus in triāgulo ABC. In dato igitur triangulo ABC circulus EFG deſcriptus eſt. quod facere oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

Queſitum eſt à nonnullis, quomodo in triangulo quadratum deſcribi poſſit, quamquam fortaſſe improprie in eo dicatur deſcribi. Fuerunt qui in triangulo aequilatero tantum peoblema abſoluerunt. Nos autem vniuerſe in omnibus abſoluere aggrediemur, poſtea quam nonnulla in quinto, ac ſexto libro demonſtrata fuerint.

THEOREMA V. PROPOSITIO V.

Circa datum triangulum circulum deſcribere.



Sit datū triangulum ABC. oportet circa datum triangulū ABC circulū de-
10.primi. ſcribere. ſecentur AB AC bifariā
11.primi. in D E punctis: et à punctis D E ipſis AB AC ad rectos angulos ducantur DF EF; quæ quidem vel intra triangulum ABC conuenient, vel in recta linea BC, vel extra ipſam. Conueniant primum intra triangulum in puncto F: et BF FC FA iungantur. Quoniam igitur AD eſt æqualis DB, communis autem, et ad rectos angu-
4.primi. los DF; erit baſis AF baſi FB æqualis. Similiter oſtendetur et CF æqualis FA. ergo et BF eſt æqualis FC. tres igitur FA FB FC inter ſe æquales ſunt. quare centro F, interuallo autem vna ipſarum FA FB FC circulus deſcriptus etiam per reliqua puncta tranſibit: atque erit circulus deſcriptus circa triangulum ABC. et deſcribatur vt ABC. Sed DF EF conueniant in recta linea BC, in puncto F, vt habet in ſecunda figura, & AF iungatur. Similiter demonſtrabimus punctum F centrum eſſe circuli circa triangulum ABC deſcripti. Poſtremo DF EF conueniant extra triangulum ABC rurſus in F puncto, vt in tertia figura: et iungantur AF FB FC. Et quoniam rurſus AD eſt æqualis DB, communis autem, et ad rectos angulos DF; baſis AF baſi FB æqualis erit. Similiter demonſtrabimus et CF ipſi FA æqualem eſſe. quare et BF eſt æqualis FC. Rurſus igitur centro F, interuallo autem vna ipſarum FA FB FC circulus deſcriptus et per reliqua tranſibit puncta; atque erit circa triangulum ABC deſcriptus. et deſcribatur vt ABC. Circa datum igitur triangulum circulus deſcriptus eſt. quod facere oportebat.

Et manifeſtum eſt, quando centrum circuli intra triangulum cadit, angulum BAC exiſtentem in portione ſemicirculo maiore minorem eſſe recto, quando autem centrum circuli cadit in rectā linea BC, angulum BAC, quòd ſit in ſemicirculo, rectum eſſe. & quādo extra BC, quòd ſit in portione minore ſemicirculo, recto eſſe maiorem. Quare et quando datus angulus minor ſit recto, DF EF intra triangulum conuenient: quādo autem rectus in ipſa BC,


et

& quando maior recto, extra BC. quod oſtendere oportebat.

PROBLEMA VI. PROPOSITIO. VI.

In dato circulo quadratum deſcribere.

Sit datus circulus ABCD. oportet in ABCD circulo quadratum deſcribere. Ducantur circuli ABCD diametri ad rectos angulos inter ſe AC BD: et AB BC CD DA iungantur. Quoniam igitur BE eſt æqualis ED, etenim centrum eſt E, communis autem et ad rectos angulos EA; erit baſis BA æqualis baſi AD. Et eadem ratione vtraque ipſarum BC CD vtrique BA AD æqualis. æquilaterum igitur eſt ABCD quadrilaterum. Dico et rectangulum eſſe. Quoniam enim recta linea BD diameter eſt ABCD circuli, erit BAD ſemicirculus. quare angulus BAD rectus eſt. et eadem ratione vnuſquiſque ipſorum ABC BCD CDA eſt rectus. rectangulum igitur eſt ABCD quadrilaterum. oſtenſum autem eſt, et æquilaterum eſſe. ergo quadratum neceſſario erit, et deſcriptum eſt in circulo ABCD. In dato igitur ABCD circulo quadratum ABCD deſcriptum eſt. quod facere oportebat.




31. tertij.

PROBLEMA VII. PROPOSITIO VII.

Circa datum circulum quadratum deſcribere.

Sit datus circulus ABCD. oportet circa ABCD circulũ quadratũ deſcribere. ducantur circuli ABCD duę diametri AC BD ad rectos inter ſe angulos, et per pũcta A BCD ducãtur circulũ ABCD cõtingentes FG GH HK KF. Quoniã igitur FG contingit circulũ ABCD, à centro aũt E ad cõtactũ qui eſt ad A ducitur EA; erũt anguli ad A recti. Eadem ratione et anguli ad puncta B C D recti ſunt. Et quoniam angulus AEB rectus eſt, eſt autem et rectus EBG; erit GH ipſi AC parallela. Eadẽ ratione et AC parallela eſt FK. Similiter demonſtrabimus et vtramque ipſarum GF HK ipſi BED parallelam eſſe. quare et GF eſt parallela HK. parallelogramma igitur ſunt GK GC AK FB BK, ac propterea GF quidem eſt æqualis HK, GH vero ipſi FK. Et quoniam AC æqualis eſt BD: Sed AC quidem vtrique ipſarum GH FK eſt æqualis; BD vero æqualis vtrique GF HK. et vtraque GH FK vtrique GF HK æqualis erit. Aequilaterum igitur eſt FGHK quadrilaterum. Dico et rectangulum eſſe. Quoniam enim parallelogrammum eſt GBEA, atque eſt rectus AEB angulus, et ipſe AGB rectus erit. Similiter demonſtrabimus angulos etiã qui ad puncta HKF rectos eſſe. rectangulum igitur eſt quadrilaterum FGHK; demonſtratum autem eſt et æquilaterum. Ergo quadratum ſit neceſſe eſt. et deſcriptũ eſt circa circulũ ABCD. Circa datum igitur circulum quadratum deſcriptum eſt, quod facere oportebat.



17. tertij.

18. tertij.


28. primi.

34. primi.

PROBLEMA VIII. PROPOSITO VIII.

In dato quadrato circulum deſcribere.


Sit datum quadratum ABCD. oportet in quadrato ABCD circulũ deſcribere. Secetur vtraque ipſarũ AB AD bifariam in punctis F E. et per E quidem alterutri ipſarum AB CD parallela ducatur EH: per F vero ducatur FK parallela alterutri AD BC. parallelogrammum



10. primi.

31. primi.


igitur eſt vnũquodque ipſorum AK KB AH HD A
34 primi. G GC BG GD : et latera ipſorum quę ex oppoſito ſunt ęqualia. Et quoniam DA eſt æqualis AB:et ipſius quidẽ AD dimidia eſt AE;ipſius vero AB dimidia AF; erit AE ipſi AF ęqualis.quare et oppoſita latera ęqua lia ſunt.ergo FG eſt æqualis GE. Similiter demonſtrabimus et vtramque ipſarum GH HK vtrique FG GE æqualem eſſe. quattuor igitur GE GF GH GK inter ſe ſunt ęquales.Itaque centro quidem G,interuallo au tem vna ipſarum GE GF GH GK circulus deſcriptus etiam per reliqua tranſibit puncta;et rectas lineas AB BC CD DA continget, propterea quòd anguli ad E F H K recti ſunt.Si enim circulus ſecabit rectas lineas AB BC CD DA,quę ab extremitate diametri circuli ad rectos angulos duci
16.tertij. tur intra circulum cadet.quod eſt abſurdum.non igitur centro quidem G,interual lo autem vnà ipſarum GE GF GH GK circulus deſcriptus rectas lineas AB BC CD DA ſecabit.quare ipſas neceſſario continget: atque erit deſcriptus in quadrato ABCD.In dato igitur quadrato circulus deſcriptus eſt. quod facere oportebat.



PROBLEMA IX. PROPOSITIO IX.

Circa datum quadratum ęirculum deſcribere.


Sit datum quadratum ABCD. oportet circa ABCD quadratum circulum deſcribere. Iungãtur ęnim AC B D, quę ſe inuicem in puncto E ſecent.Et quoniam DA eſt æqualis AB,communis autem AC;duæ DA AC dua bus BA AC ęquales ſunt; et baſis DC æqualis baſi CB; erit angulus DAC angulo BAC æqualis.angulus igitur DAB bifariam ſectus eſt recta linea A C. Similiter demonſtrabimus vnumquemque angulorum ABC BCD CDA rectis lineis AC D B bifariam ſectum eſſe. Quoniam igitur angulus D A B angulo A B C eſt æqualis. atque eſt anguli quidem DAB dimidius angulus EAB, anguli vero ABC dimidius EBA; et EAB angulus angulo EBA æqualis erit.quare et latus EA lateri EB eſt ęquale. Similiter demonſtrabimus,et vtramque rectarum linearum EC ED vtrique EA EB æqualem eſſe. ergo quattuor rectæ lineæ EA EB EC ED inter ſe ſunt æquales.centro igitur E,in teruallo autem vna ipſarum EA EB EC ED circulus deſcriptus etiam per reliqua puncta tranſibit.atque erit deſcriptus circa ABCD quadratum. deſcribatur vt AB CD.circa datum igitur quadratum circulus deſcriptus eſt. quod facere oportebat.



PROBLEMA X. PROPOSITIO X.

Aequicrure triangulum cõſtituere, ha bens vtrumque angulorum, qui ſunt ad baſim duplum reliqui.

Exponatur recta quędam linea AB, et ſecetur in
11.ſecundi. C puncto, ita vt rectangulum contentum AB BC, æquale ſit ei, quod ex CA deſcribitur quadrato: et centro quidem A,interuallo autem AB circulus de
1.huius. ſcribatur BDE: apteturq; in BDE circulo recta li nea BD æqualis ipſi AC,quæ non ſit maior diametro circuli BDE:et iunctis DA DC, circa ADC triã gulum circulus ACD deſcribatur. Itaque quoniam rectangulum ABC æquale eſt quadrato,quod fit ex AC;æqualis autem eſt AC, ipſi BD, erit ABC rectangulum



quadrato

quadrato quod ex BD æquale.Et quoniam extra circulum ACD ſumptum eſt aliquod punctum B:et à puncto B in circulum ACD cadunt duę rectæ lineæ BCA BD,quarum altera quidem ſecat,altera vero incidit,atque eſt rectangulũ ABC æquale quadrato,quod ex BD;recta linea BD circulum ACD continget. Quoniam igitur BD contingit,et à contactu,qui ad D ducta eſt DC; erit BDC angulus æqualis ei,qui in alterna circuli portione conſtituitur, videlicet angulo DAC. Quòd cum angulus BDC æqualis ſit ipſi DAC, communis apponatur CDA. totus igitur BDA eſt æqualis duobus angulis CDA DAC. Sed ipſis CDA DAC exterior angulus BCD eſt ęqualis. ergo et BDA ęqualis eſt ipſi BCD. ſed BDA angulus eſt æqualis angulo CBD, quoniam et latus AD lateri AB eſt ęquale.ergo et DBA ipſi BCD æqualis erit. Tres igitur anguli BDA DBA BCD inter ſe æquales ſunt. Et quoniam angulus DBC æqualis eſt angulo BCD, et latus BD lateri DC eſt ęquale. Sed BD ponitur æqualis ipſi CA. ergo et AC eſt æqualis CD.quare et angulus CDA æqualis eſt angulo DAC.anguli igitur CDA DAC ipſius anguli DAC dupli ſunt.eſt autẽ et BCD angulus angulis CDA DAC æqualis.ergo et BCD duplus eſt ipſius DAC. Sed BCD eſt æqualis vtrique ipſorũ BDA DBA.quare et vterque BDA DBA ipſius DAB eſt duplus.Aequicrure igitur triãgulum conſtitutum eſt ADB,habens vtrumque eorum angulorum,qui ſunt ad baſim,duplum reliqui.quod facere oportebat.

Vlt. tertij.

32.tertij.


32.primi.

6.primi.

PROBLEMA XI. PROPOSITIO. XI.

In dato circulo pentagonum æquilaterum, & æquiangulum deſcribere.

Sit datus circulus ABCDE.oportet in ABCDE circulo pentagonũ æquilaterum,et ęquiãgulum deſcribere.Exponatur triangulum æquicrure FGH,habens vtrumque eorũ qui ſunt ad G H angulorum duplũ anguli qui eſt ad F: et deſcribatur in circulo ABCDE triangulo FGH æquiangulum triangulum ACD, ita vt angulo quidem, qui eſt ad F æqualis ſit angulus CAD: vtrique vero ipſorum,qui ad GH ſit æqualis vterque ACD CDA.et vterque igitur ACD CDA anguli CAD eſt duplus. Secetur vterque ipſorum ACD CDA bifariam rectis lineis CE DB: et AB BC CD DE EA iũgãtur.Quoniã igitur vterque ipſorũ ACD CDA duplus eſt ipſius CAD, et ſecti ſunt bifaria rectis lineis CE DB;quinque anguli DAC ACE ECD CDB BDA inter ſe ſunt æquales. æquales autẽ anguli in æqualibus circumferentiis inſiſtunt.quinque igitur circumferentię AB BC CD DE EA ęquales ſunt inter ſe. Sed ęquales circũferẽtias æquales rectę lineę ſubtendunt. ergo et quinque rectę lineę AB BC CD DE EA inter ſe æquales ſunt. æquilaterum igitur eſt ABCDE pentagonum.Dico et æquiangulum eſſe.Quoniam enim circumferentia AB æqualis eſt circumferentiæ DE,communis apponatur BCD. tota igitur ABCDE circumferentia toti circumferentię EDCB eſt æqualis, et in circumferentia quidẽ ABCD inſiſtit angulus AED, in circũferẽtia vero EDCB inſiſtit BAE.Ergo et BAE angulus eſt ęqualis angulo AED.Eadem ratione,et vnuſquiſque angulorum ABC BCD CDE vnicuique ipſorum BAE AED eſt æqualis.ęquiangulum igitur eſt ABCDE pentagonũ: oſtenſum autem eſt et ęquilaterũ eſſe.Quare in dato circulo pentagonum ęquilaterum,et æquiangulum deſcriptum eſt.quod facere oportebat.



Ex antecedente.

1.huius.


29.tertij.

26.tertij.

9.primi.

PROBLEMA XII. PROPOSITIO. XII.

Circa datum circulum pentagonum æquilaterum, et ęquiangulum deſcribere.




Sit datus circulus ABCDE. oportet circa circulum ABCDE pentagonum æquilaterum, et
Ex antecedente. æquiangulum deſcribere. intelligantur pentagoni in circulo deſcripti angulorum puncta ABCDE, ita vt circũferentiæ AB BC CD DE
17.tertij. EA ſint ęquales; et per puncta ABCDE ducantur circulum contingentes GH HK KL LM MG. et ſumpto circuli ABCDE centro F iungantur FB FK FC FL FD. quoniam igitur recta linea KL contingit circulum ABCDE in puncto C, et à centro F ad contactum, qui eſt ad C ducta eſt FC: erit FC ad ipſam KL perpendicularis. rectus igitur eſt vterque angulorum qui ſunt ad C. Eadem ratione et anguli qui
18.tertij. ad puncta B D recti ſunt. et quoniam rectus angnlus eſt FCK, quadratum quod fit ex FK ęquale eſt quadratis quæ ex FC CK. Et ob eandem cauſſam quadratis ex FB, BK ęquale eſt quod ex FK quadratũ. Quadrata igitur ex FC CK quadratis ex FB BK æqualia ſunt: quorum quod ex FC ei quod ex FB eſt ęquale. Ergo reliquũ quod ex CK reliquo quod ex BK æquale erit. æqualis igitur eſt BK ipſi CK. Et quoniã FB eſt æqualis FC, communis autem FK, duæ BF FK duabus CF FK ęquales ſunt: et
8.primi. baſis BK eſt ęqualis baſi KC; erit angulus quidem BFK angulo KFC æqualis, angulus vero BKF angulo FKC. duplus igitur eſt angulus BFC anguli KFC, et angulus BKC duplus ipſius FKC. Eadem ratione et angulus CFD anguli CFL eſt duplus: angulus vero CLD duplus anguli CLF. et quoniam circumferentia BC circumfe-
27.tertij. rentię CD eſt æqua lis, et angulus BFC angulo CFD ęqualis erit. atque eſt angulus quidem BFC anguli KFC duplus: angulus vero DFC duplus ipſius LFC. æqualis igitur eſt angulus KFC angulo CFL. Itaque duo triangula sũt FKC FLC, duos angulos duobus angulis æquales habentia, alterũ alteri, et vnum latus vni lateri æqua-
26.primi. le, quod ipſis commune eſt FC. Ergo et reliqua latera reliquis lateribus æqualia habebunt, et reliquum angulum reliquo angulo æqualem. recta igitur linea KC eſt æqualis rectæ CL, et angulus FKC angulo FLC. Et quoniã KC eſt æqualis CL, erit KL ipſius KC dupla. Eadem ratione et HK ipſius BK dupla oſtendetur. Rurſus quoniam BK oſtenſa eſt ęqualis ipſi KC: atque eſt KL quidem dupla KC, HK vero ipſius BK dupla: erit HK ipſi KL æqualis. Similiter et vnaquęque ipſarum GH HM ML oſtendetur æqualis vtrique HK KL. Aequilaterum igitur eſt GHKLM pentagonum. Dico etiam ęquiangulum eſſe. Quoniam enim angulus FKC eſt æqualis angulo FLC: et oſtenſus eſt ipſius quidem FKC duplus angulus HKL; ipſius vero FLC duplus KLM: erit et HKL angulus angulo KLM æqualis. Simili ratione oſtendetur et vnuſquiſque ipſorum KHG HGM GML vtrique HKL KLM æqualis. Quinque igitur anguli GHK HKL KLM LMG MGH inter ſe ęquales ſunt. ergo ęquiangulum eſt GHKLM pentagonũ. oſtenſum autem eſt etiam æquilaterum eſſe: et deſcriptum eſt circa ABCDE circulum. quod facere oportebat.

PROBLEMA XIII. PROPOSITIO. XIII.

In dato pentagono, quod æquilaterum, et ęquiangulum ſit, circulum deſcribere.

Sit

Sit datum pentagonum æquilaterum, et æquiangulum ABCDE. oportet in ABCDE pentagono circulum describere. secetur uterque angulorum BCD CDE bifariam rectis lineis CF DF; et à puncto F, in quo conueniunt inter se CF DF, ducantur rectæ lineæ FB FA FE. Quoniam igitur BC est æqualis CD, communis autem CF, duæ BC CF duabus DC CF æquales sunt, et angulus BCF est æqualis angulo DCF. basis igitur BF basi FD est æqualis, et BFC triangulum æquale triangulo DCF, et reliqui anguli reliquis angulis æquales, quibus æqualia latera subtenduntur. angulus igitur CBF angulo CDF æqualis erit. Et quoniam angulus CDE anguli CDF est duplus, et angulus quidem CDE angulo ABC, angulus vero CDF angulo CBF æqualis; erit et CBA angulus duplus anguli CBF; ac propterea angulus ABF angulo FBC æqualis. angulus igitur ABC bifariam sectus est recta linea BF. Similiter demonstrabitur et vnumquemque angulorum BAE AED rectis lineis AF FE bifariam sectum esse. Itaque à puncto F ad rectas lineas AB BC CD DE EA ducantur perpendiculares FG FH FK FL FM. Et quoniam angulus HCF est æqualis angulo KCF; est autem et rectus FHC recto FKC æqualis: erunt duo triangula FHC FKC, duos angulos duobus angulis æquales habentia, et vnum latus vni lateri æquale, commune scilicet vtrisque FC, quod vni æqualium angulorum subtenditur. ergo et reliqua latera reliquis lateribus æqualia habebunt, atque erit perpendicularis FH perpendiculari FK æqualis. Similiter ostendetur et vnaquæque ipsarum FL FM FG æqualis vtrique FH FK. quinque igitur rectæ lineæ FG FH FK FL FM inter se æquales sunt. quare centro F, interuallo autem vna ipsarum FG FH FK FL FM circulus descriptus, etiam per reliqua transibit puncta, et rectas lineas AB BC CD DE EA cõtinget, propterea quòd anguli ad G H K L M recti sunt. Si enim non continget, sed ipsas secabit, quæ ab extremitate diametri circuli ad rectos angulos ducitur intra circulum cadet, quod absurdũ esse ostensum est. non igitur centro F, et interuallo vno ipsorum punctorum G H K L M circulus descriptus rectas lineas AB BC CD DE EA secabit. quare ipsas cõtingat necesse est. describatur vt GHKLM. In dato igitur pentagono quod est æquilaterum, et æquiangulum, circulus descriptus est. quod facere oportebat.



9. primi.

4. primi.


26. primi.

16. tertij.

PROBLEMA. XIIII. PROPOSITIO. XIIII.

Circa datum pentagonum, quod æquilaterum, et æquiangulum sit, circulum describere.


Sit datum pentagonum æquilaterum et æquiangulum ABCDE. oportet circa pentagonum ABCDE circulum describere, secetur vterque ipsorum BCD CDE angulorum bifariam rectis lineis CF FD: et à puncto F, in quo conueniunt rectæ lineæ ad puncta BAE ducantur FB FA FE. Similiter vt in antecedenti demonstrabitur vnumquemque angulorum CBA BAE AED rectis lineis BF FA FE bifariam sectum esse. Et quoniam angulus BCD angulo CDE est æqualis: atque est anguli quidem BCD dimidius angulus FCD, anguli vero CDE dimidius CDF; erit et FCD angulus æqualis angulo FDC. quare et latus CF lateri FD est æquale. Similiter demõstrabitur et vna quæque ipsarum FB FA FE æqualis vnicuique FC FD. quinque igitur rectæ lineæ FA FB FC FD



FC FD FE inter ſe æquales ſunt. ergo centro F, et interuallo vna ipſarũ FA FB F C FD FE circulus deſcriptus etiam per reliqua tranſibit puncta: atque erit deſcriptus circa pẽtagonum ABCDE, quod æquilaterum eſt, et æquiangulum. deſcribatur, et ſit ABCDE. Circa datum igitur pentagonum æquilaterum et ęquiangulum circulus deſcriptus eſt. quod facere oportebat.

PROBLEMA XV. PROPOSITIO. XV.

In dato circulo hexagonum æquilaterum, & ęquiangulum deſcribere.



Sit datus circulus ABCDEF. oportet in circulo ABCDEF hexagonum ęquilaterum, et æquiangulum deſcribere. Ducatur circuli ABCDEF diameter AD, ſumaturq́; centrum circuli G; et centro qui dem D, interuallo autem DG circulus deſcribatur EGCH, iunctæq́; EG CG ad puncta B F producãtur, et iungantur AB BC CD DE EF FA. Dico hexagonum ABCDEF æquilaterum, et æquiangulum eſſe. Quoniam enim G punctum centrum eſt ABCDEF circuli, erit GE ipſi GD æqualis. Rurſus quoniam D cẽtrum eſt circuli EGCH, erit DE ęqualis DG. Sed GE ipſi GD æqualis oſtenſa eſt. ergo GE ipſi ED eſt æqualis. æquilaterum igitur eſt EGD triãgulum, ideoq́; tres ipſius anguli EGD GDE DEG inter ſe æquales ſunt, quoniam ęquicruriũ trian gulorum anguli ad baſim inter ſe ſunt æquales: et ſunt trianguli tres anguli ęquales duobus rectis. angulus igitur EGD duorum rectorum tertia pars eſt. Similiter oſtendetur et DGE duorum rectorum tertia. Et quoniam recta linea CG ſuper rectam EB inſiſtens angulos qui deinceps ſunt EGC CGB duobus rectis æquales efficit; erit et reliquus CGB tertia duorum rectorum. anguli igitur EGD DGC CGB inter ſe ſunt ęquales. ergo et qui ipſis ad verticem ſunt anguli BGA AGF FGE æquales ſunt angulis EGD DGC CGB. quare ſex anguli EGD DGC CGB BGA AGF FGE inter ſe æquales ſunt. ſed æquales anguli ęqualibus circumferentiis inſiſtunt. Sex igitur circumferentiæ AB BC CD DE EF FA inter ſe ſunt ęquales. æquales autem circumferentias æquales rectæ lineæ ſubtendunt. ergo et ſex rectæ lineę inter ſe æquales ſint neceſſe eſt, ac propterea æquilaterum eſt ABCDEF hexagonum. Dico et æquiangulum eſſe. Quoniam enim circumferentia AF circumferentię ED eſt ęqualis, communis apponatur circumferentia ABCD. tota igitur FABCD circumferentia ęqualis eſt toti circumferentiæ EDCBA. et circumferentiæ quidem FABCD angulus FED inſiſtit, circumferentiæ vero EDCBA inſiſtit angulus AFE. angulus igitur AFE angulo DEF eſt æqualis. Similiter oſtẽdẽtur et reliqui anguli hexagoni ABCDEF ſigillatim æquales vtrique ipſorum AFE FED. ergo æquiangulum eſt ABCDEF hexagonũ. oſtenſum autem eſt et æquilaterum eſſe. et deſcriptum eſt in circulo ABCDEF. In dato igitur circulo hexagonum æquilaterum, et ęquiangulum deſcriptum eſt. quod facere oportebat.


5. primi.
32. primi.
13. primi.
26. tertij.
29. tertij.

COROLLARIVM.

Ex hoc manifeſtum eſt hexagoni latus ei, quę eſt ex centro circuli æquale eſſe. Et ſi per puncta ABCDEF contingentes circulum

ducamus


ducamus, circa circulū deſcribetur hexagonum ęquilaterum et ęquiangulum cō ſequenter ijs, quæ in pentagono dicta ſunt, & præterea ſimiliter in dato hexagono circulum deſcribemus, et circum ſcribemus. quod facere oportebat.



PROBLEMA XVI.
PROPOSITIO. XVI.

In dato circulo quindecagonum æquilaterum, et æquiangulum deſcribere.

Sit datus circulus ABCD. oportet in ABCD circulo quindecagonum æquilaterum et ęquiangulum deſcribere. Deſcribatur in circulo ABCD trianguli quidē æquilateri in ipſo deſcripti latus AC; pentagoni vero æquilateri latus AB. Quarū igitur partium eſt ABCD circulus quindecim, earum circumferentia quidem ABCD tertia exiſtens circuli, erit quinque; circumferentia vero AB, quæ quinta eſt circuli; erit triū. ergo reliqua BC eſt duarum. ſecetur BC bifariā in puncto E. quare vtraque ipſarum BE EC circumferentiarum, quintadecima pars eſt ABCD circuli. Si igitur iungentes BE EC æquales ipſis in continuum rectas lineas in circulo ABCD aptabimus, in ipſo quindecagonum æquilaterum, et ęquiangulum deſcriptum erit. quod facere oportebat.



Similiter autem iis, quæ dicta ſunt in pentagono, ſi per circuli diuiſiones contingentes circulum ducamus, circa ipſum deſcribetur quindecagonum ęquilaterum, et ęquiangulum. Et inſuper in dato quindecagono æquilatero, et ęquiangulo circulum deſcribemus, et circumſcribemus.

QVARTI LIBRI FINIS.

SCHOLIVM.

In quinto libro propoſitum eſt de analogijs tractare; hic enim liber communis eſt geometriæ, arithmeticæ, muſicæ, & omni ſimpliciter mathematicæ diſciplinæ: nam quæ in ipſo demonſtrantur non ſolum geometricis theorematibus congruunt, ſed & omnibus, quæ ad mathematicas, vt dictum eſt, diſciplinas referuntur. propoſitum igitur huiuſmodi eſt. librum autem dicunt eſſe Eudoxi cuiuſdam, qui Platonis magiſter fuit.

Analogia.

Itaque quoniam propoſitum eſt de analogijs tractare, analogia vero eſt proportionum quarundam habitudo; neceſſe eſt prius cognoſcere, quæ nam ſint hæ proportiones. ſimplicium enim cognitio cognitionem compoſitorum præcedere debet. ſi igitur quædam inter ſe comparẽtur, verbi gratia duæ magnitudines, ipſæ quidem termini vocantur, & alterius ad alteram tranſitus, diſtantia: comparatio autem habitudo, quam antiqui proportionem appellarunt. at huius proportionis cum alia proportione iuxta ſimilitudinem quandam comparatio vel habitudo analogia nuncupatur. non enim vt magnitudo comparatur, ſed vt proportio cum proportione. hæc autem comparatio proportio proportionis dicitur; vt ſi ſint duæ rectæ lineæ, quarum altera ad reliquam duplam proportionem habeat, quadratum illius, quæ duplam habet proportionem, ad quadratum reliquæ quadruplam proportionem habebit eius, quam maior recta linea habet ad minorem; nam quæ longitudine ſunt dupla potentia quadrupla ſunt. quadratorum igitur proportio cum ſit quadrupla, dupla erit proportionis rectarum linearum, quæ eſt dupla: vocatur autem hæc proportionis proportio; quæ quidem ſub quantitate eſt; etenim proportio eſt duplex, alia in æſtimatione, alia in quantitate. & eius quidem, quæ in æſtimatione nulla ſpecies eſt, quæ ad præſentem contemplationem vtilis ſit; eius vero, quæ in quantitate ſpecies ſunt quinque, alia enim eſt multiplex vt ſex trium, alia ſuperparticularis vt quattuor trium, & alia ſuperpartiens, vt quinque trium, & hæ quidem ſimplices ſunt, quarum adhuc ſimplicior eſt multiplex, aliæ uero duæ ex harum compoſitione naſcuntur, videlicet multiplex ſuperparticularis, vt eſt ſeptem triũ, & multiplex ſuperpartiens, vt octo trium. ſub proportionales vero ſunt minores maiorum, vt ſub multiplex, ſubparticularis, & ſimiliter reliqua. ſciendum autem eſt hunc librum in duas partes diuidi. & prima quidem pars ſimpliciorum doctrinam continet, videlicet multiplicium. ſecunda vero vniuerſe de omnibus agit proportionibus. oportet enim in omni re, vt dictum eſt, ſimplicium cognitionem præcedere. quemadmodum aũt liber ipſe, ita & diffinitiones diuiduntur; primę enim ſunt de partibus, et multiplicibus, deinde ſequuntur vniuerſaliores de oĩbus proportionibus.

Simplicium cognitio cognitionẽ eõ poſitorũ præcedere debet Termini.

Comparatio eſt habitudo, quã antiqui proportionem appellarunt Analogia.

Proportio proportionis

Proportionis in quantitate ſpecies sũt quinque.

Quintus liber in duas partes diuidi tur.

EVCLIDIS

EVCLIDIS ELEMENTORVM LIBER QVINTVS

CVM SCHOLIIS ANTIQVIS, ET COMMENTARIIS

Federici Commandini Vrbinatis.

DIFFINITIONES.

I.



PARS est magnitudo magnitudinis, minor maioris, quando minor maiorem metitur.

SCHOLIVM.

Pars, vt multi arbitrantur, est minor eo, quod est eiusdē speciei, vt 3 est pars 5. apud geometram vero est, quae metitur maius, quando reliquum æquale sit ei, quod metitur: quando autem non sit æquale, non est pars, vt 3. 5; reliquuntur enim 2, quae non sunt æqualia 3. quare 3 non sunt pars 5, sed partes, videlicet tres quintę $\frac{3}{5}$.

F. C. COMMENTARIVS.

Pars etiam apud geometram sumitur pro ea, quae simpliciter minor est maiore eiusdem speciei, vt sum dicitur, omne totum est maius sua parte. ergo pars quatenus multiplici opponitur, erit ea, quae metitur maius, videlicet ipsum multiplex, quae alio nomine sub multiplex, & à nonnullis pars aliquota appellatur; quatenus vero opponitur toti nulla est necessitas, vt totum metiatur.

II.

Multiplex est maior minoris, quando maiorem minor metitur.

III.

Proportio est duarum magnitudinum eiusdem generis, quatenus ad quantitatem pertinet, mutua quædam habitudo.

SCHOLIVM.

Proportionem *dicit, vt significet habitudinem* duarum magnitu-

dinum] *vt ſeparet ab alijs ſpeciebus quantitatis.* eiuſdem generis] *vt nequis lineam cum ſuperficie comparet. hæc enim inter ſe proportionem nullam habent.* quatenus ad quantitatem pertinet] *vt ſeparet ab infinitis magnitudinibus; quantitas enim continua eſt terminus continui nõ infiniti, & quantitas diſcreta eſt diſcreti non infiniti. ſed diſcretum nõ eſt magnitudo, multitudo enim eſt.* quædã habitudo] *quòd quinque ſint habitudinum ſpecies, vt dictum iam fuit.*

F. C. COMMENTARIVS.

Quatenus ad quantitatem pertinet] *videtur hoc potius dictum ſit, vt intelligatur proportio, quae in quantitate, non item ea, quae in aeſtimatione conſiſtit.*

III.

Portionem habere inter ſe magnitudines dicuntur, quæ multiplicatæ ſe inuicem ſuperare poſſunt.

SCHOLIVM.

In numeris quidem omnis proportio rationalem habet quantitatem, in magnitudinibus autem eſt quædam proportio, quæ numero exprimi non poteſt; ſunt enim quædam, quorum dumtaxat cognoſcitur exceſſus, quo alterũ ſuperat alterũ; quantitas aũt exceſſus cognoſci nequit. hæc igitur proportionem habere dicuntur, nempe exceſſus, non adhuc eam, quam numerus habet ad numerum, hoc eſt rationalem; ac propterea in diffinitione proportionis magnitudinum appoſuit, quatenus ad quãtitatem pertinet, *videlicet continuam, non omnino autem quatenus ad quantitatem diſcretam, & rationalem. vniuerſalius igitur diffiniens, quæ nam ſint proportionem habentia dixit,* quæ multiplicatę ſe inuicem ſuperare poſſunt: *hoc enim & rationalibus, & irrationalibus congruit, velut diameter quadrati, vt in rationalibus quidem proportionem habet ad latus, vt in exceſſu vero proportionem habet, quam maius ad minus, & poteſt latus multiplicatum aliquando diametrum ſuperare.*

F. C. COMMENTARIVS.

Hoc idcirco dictum videtur, vt infinitae magnitudines à proportionibus excludantur. finita enim magnitudo quantumlibet multiplicata tantum abeſt, vt infinitam magnitudinem exuperet, vt ne aequare quidem poſſit vnquam.

V.

In eadem proportione magnitudines eſſe dicuntur prima ad ſecundam, & tertia ad quartam, quando primæ, & tertiæ æquemultiplices,

tiplices, ſecundæ, et quartę æque multiplices iuxta quamuis multiplicationem vtraque vtramque vel vnà ſuperant, vel vnà æquales ſunt, vel vnà deficiunt inter ſe comparatæ.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit prima magnitudo A, ſecunda B, tertia C, & quarta D: ſumanturq; primae, ac tertiae, videlicet ipſarum A C aeque multiplices E F, vt ſit E aeque multiplex A, atque F ipſius C. rurſus ſumantur ipſarum B D, ſecundae ſcilicet, & quartae aeque multiplices GH; & ſiquidem maiori exiſtente E quàm G, etiam F ſit maior quàm H, vel ſi E aequali exiſtente ipſi G, ſit F aequalis H. vel ſi minori exiſtente, ſit minor iuxta quamuis multiplicationẽ, tunc dicetur A ad B eandem habere proportionem, quam C ad D. exceſſum autem, ac defectum ſimpliciter intelligere oportet, non ſecundum proportionem, vt voluit Campanus; alioqui idem per idem explicaretur, quod eſt abſurdum. Propoſitis igitur quatuor magnitudinibus commenſurabilibus, ſi velimus ſtatim dignoſcere, an eandem proportionem habeant, multiplices ita aptabimus, vt multiplex primae multiplici ſecundae fiat aequalis; & ſi quidem multiplex tertiae ſit aequalis multiplici quartae, tunc prima ad ſecundam eandem proportionem habere deprehendetur, quam tertia ad quartam. Si vero multiplex tertiae ſit minor multiplici quartę, prima ad ſecundam maiorem proportionem habebit, quàm tertia ad quartam. quòd ſi multiplex tertiae ſit maior multiplici quartae, habebit prima ad ſecundam minorem proportionem, quàm tertia ad quartam.




VI.

Magnitudines, quæ eandem proportionem habent, proportionales vocentur.


VII.

Quando autem æque multiplicium multiplex quidem primæ ſuperauerit multiplicem ſecundę, multiplex vero tertiæ non ſuperauerit multiplicem quartæ; tunc prima ad ſecundam maiorem proportionem habere dicitur, quàm tertia ad quartam.




F. C. COMMENTARIVS.

Maneant eadem, quae ſupra: & ſumptis ipſarum AC aeque multiplicibus EF; itemq́, ipſarum ED aeque multiplicibus GH, ſi quidem E ſuperet G, F vero non ſuperet H, vel ſi E ſit aequalis ipſi G, & F minor, quàm H, tunc A ad B maiorem proportionẽ habere dicitur, quàm C ad D.




VIII.

Analogia eſt proportionum ſimilitudo.



IX.


Analogia vero in tribus minimis terminis conſiſtit.



X.

Quando tres magnitudines proportionales ſint, prima ad tertiam duplam proportionem habere dicetur eius, quam habet ad ſecundam.

SCHOLIVM.




Non dicit duas proportiones vnius duplas eſſe, quod etiam eſt verum; ſed proportionem, quæ ex duabus conſtat, eſſe duplam, vt 8. 4. 2, & rurſus 9 3 1. proportio igitur, quæ ex duabus conſtat dupla eſt. magnitudo autem in duplis quidem magnitudinibus quadrupla eſt, in triplis vero nonupla, & in quadruplis ſexdecupla. demonſtrabitur enim deinceps quæ longitudine ſunt dupla, potentia quadrupla eſſe: & quę longitudine tripla, potentia nonupla. quadratorum igitur proportio cum quadrupla ſit, dupla eſt proportionis laterum, quę eſt dupla, etenim dupli duplus quadruplus eſt.

Quando

XI.

Quando autem quattuor magnitudines ſint proportionales, prima ad quartam triplam habere proportionem dicetur eius, quam habet ad ſecundam: & ſemper deinceps vna plus, quo ad analogia proceſſerit.



F. C. COMMENTARIVS.


Decima, & vndecima diffinitio terminos requirunt neceſſario inæquales, & primum ipſorũ maiorem. nam ſi aequales ſint eadem eſt primi ad ſecundum, & ad tertium proportio. Si vero primus ſit minor, non poteſt primus ad tertium duplam proportionem habere proprie eius, quam habet ad ſecundum, cum primi ad ſecundum maior ſit proportio, quàm ad tertium ex 8. huius.

XII.

Homologæ, vel ſimilis rationis magnitudines dicuntur antecedentes quidem antecedentibus, conſequentes vero conſequentibus.


XIII.

Permutata ratio eſt ſumptio antecedentis ad antecedentem, et conſequentis ad conſequentem.




F. C. COMMENTARIVS.

Sit A ad B, vt C ad D. erit permutando A ad C, vt B ad D. hoc autem ita eſſe demonſtrabitur in 16 propoſitione huius libri.




XIIII.

Conuerſa ratio eſt ſumptio conſequentis, vt antecedentis ad antecedentem, vt ad conſequentem.



F. C. COMMENTARIVS.

Sit rurſus A ad B, vt C ad D. erit cõuertendo B ad A, vt D ad C. quod demonſtratur in corollario quartae huius.



Compoſitio

XV.


Compoſitio rationis eſt ſumptio antecedentis vnà cum conſequente tamquàm vnius ad ipſam conſequentem.

SCHOLIVM.

Iuniores hanc proportionem appoſuerunt. neque enim compoſitio magnitudinum eadem eſt, quę compoſitio proportionum. hic autem antecedens vnà cum conſequente ſumptum totam magnitudinem efficit, quę ex magnitudinibus componitur: atque hęc eſt magnitudinum compoſitio. compoſitio enim proportionum aliam proportionẽ efficit, vt ipſe deinceps dicet. proportio, inquit ex proportionibus componi dicitur, cum proportionum quantitates inter ſe multiplicatę aliquam efficiunt proportionem. ipſe autem, vt in antiquioribus libris inuenitur, compoſitionem hanc συνθέντι, *hoc eſt componenti, vel componendo appellat; etenim in rationalibus non aliter dicit, quàm componendo; ſimiliter autem & diuiſio, vna enim proportio diuiditur. at diuiſio de qua hoc loco ſermo fit, magnitudinum eſt, exceſſus namque antecedentium ab antecedentibus diſſecatur. ipſe vero etiam in hoc dicit* διελόντι *videlicet diuidenti, vel diuidendo. & ſimiliter quę hoc loco appellatur conuerſio rationis ipſe* ἀναστρέψαντι *dicit, conuertitur enim ad antecedentia.*

F. C. COMMENTARIVS.

Compoſitio rationis eſt proportio, quae oritur ex compoſitione terminorum ipſius proportionis, videlicet ex compoſitione antecedentis cum conſequente, cum totum conſequenti comparatur, quamquam improprie à iunioribus compoſitio proportionis, vel rationis appellata ſit; compoſitio enim proportionis longe alia eſt, vt in precedenti ſcholio adnotatur. ſit AE ad EB, vt CF ad FD. erit componendo AB ad BE, vt CD ad DF. illud vero in 18 huius demonſtratur.




XVI.

Diuiſio rationis eſt ſumptio exceſſus, quo antecedens ſuperat conſequentem, ad ipſam conſequentem.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit AB ad BE, vt CD ad DF. erit diuidendo AE ad EB, vt CF ad FD. quod in 17 huius demonſtrabitur.




XVII.

Conuerſio rationis eſt ſumptio antecedentis ad exceſſum, quo antecedens ipſam conſequentem ſuperat.

Sit

F. C. COMMENTARIVS.

Sit AB ad BE, vt CD ad DF. erit per conuersionem rationis BA ad AE, vt DC ad CF. hoc autem constat ex corollario 19 huius.




XVIII.


Aequa ratio, siue ex æquali est, cum plures magnitudines extiterint, et aliæ ipsis numero æquales, quæ binæ sumantur, et in eadem proportione, fueritq; vt in primis magnitudinibus prima ad vltimam, ita in secũdis magnitudinibus prima ad vltimam: vel aliter est sumptio extremarum per subtractionem mediarum.

F. C. COMMENTARIVS.

Hoc autem & in ordinata analogia fit, & in perturbata. in ordinata quidem hoc modo. sint tres magnitudines ABC, & aliae ipsis numero aequales DEF, sitq; vt A ad B, ita D ad E; & vt B ad C, ita D ad F. erit ex aequali vt A ad C, ita D ad F. quod demonstrabitur in 22 huius.

In perturbata vero hoc pacto. sint rursus tres magnitudines ABC, itemq; aliae tres DEF, & sit vt A ad B, ita E ad F, vt autem B ad C, ita D ad E. erit ex aequali vt A ad C, ita D ad F. hoc autem in 23 huius ostendetur. Idem sequitur etiam si plures sint, quàm tres magnitudines. sint enim quattuor magnitudines ABCD, & aliae ipsis numero aequales EFGH, & in ordinata quidem analogia vt A ad B, ita sit E ad F, vt autem B ad C, ita F ad G, & vt C ad D, ita G ad H. erit ex aequali vt A ad D, ita E ad H. In perturbata vero, sit vt A ad B, ita F ad G, vtq; B ad C, ita sit G ad H, & vt C ad D, ita E ad F. erit ex aequali vt A ad D, ita E ad H. & similiter continget in alijs magnitudinibus quotquot illae fuerint.





XIX.

Ordinata analogia est quã do fuerit vt antecedens ad consequentem, ita antecedens ad consequentem: vt autem consequens ad aliã quãpiam, ita consequens ad aliam quampiam.

XX.

Perturbata vero analogia est, quando tribus existentibus ma-

gnitudinibus

gnitudinibus, & alij ipſis numero æqualibus; fuerit vt in primis magnitudinibus antecędens ad conſequentem, ita in ſecundis magnitudinibus antecędens ad conſequentem. vt autem in primis magnitudinibus conſequens ad aliam quampiam; ita in ſecundis alia quępiam ad antecedentem.

F. C. COMMENTARIVS.

Harum exempla ſuperius poſita ſunt, ſed prętęr diffinitiones ſunt etiam communes quędam notiones, quae in hoc libro ſumuntur nempe hae.

I.


Eiuſdem ſiue ęqualium æque multiplices inter ſe æquales ſunt.

II.

Quarum eadem æque multiplex eſt, vel quarum æquales ſunt æque multiplices & ipſæ inter ſe ſunt æquales.

THEOREMA I. PROPOSITIO I.

Si fuerint quotcumque magnitudines quotcumque magnitudinum æqualium numero ſingulę ſingularum æque multiplices; quotuplex eſt vna magnitudo vnius, totuplices erunt & omnes omnium.




Sint quotcumque magnitudines AB CD quotcumque magnitudinum EF æqualium numero, ſingulæ ſingularum ęque multiplices. Dico quotuplex eſt AB ipſius E, totuplices eſſe & AB CD ipſarum EF. Quoniam enim AB ęque multiplex eſt ipſius E, et CD ipſius F, quot magnitudines ſunt in AB æquales ipſi E, tot erũt et in CD æquales ipſi F. diuidatur AB quidem in partes ipſi E ęquales, quæ ſint AG GB: CD vero diuidatur in partes ęquales ipſi F, videlicet CH HD. erit igitur multitudo partium CH HD æqualis multitudini ipſarum AG GB. et quoniam AG eſt æqualis E, et CH æqualis F; erunt et AG CH æquales ipſis E F. eadem ratione quoniam GB eſt æqualis E, et HD ipſi F, erũt et GB HD æquales ipſis EF. quot igitur ſunt in AB æquales ipſi E, tot ſunt et in AB CD æquales ipſis E F. ergo quotuplex eſt AB ipſius E, totuplices erunt et AB CD ipſarum E F; ſi igitur fuerint quotcumque magnitudines quotcumque magnitudinum æqualium numero ſingulę ſingularum ęque multiplices; quotuplex eſt vna magnitudo vnius, totuplices erunt et omnes omnium. quod demonſtrare oportebat.

THEOREMA II. PROPOSITIO II.

Si prima ſecundæ æque multiplex fuerit, ac tertia quartæ; fuerit autem et quinta ſecundæ ęque multiplex, ac ſexta quartæ: erit etiam compoſita prima, et quinta ſecundę æque multiplex, ac tertia, et ſexta quartæ.

Prima

Prima enim AB ſecundæ C æque multiplex ſit, ac tertia DE quartæ F. ſit autem et quinta BG ſecundæ C æque multiplex, ac ſexta EH quartę F. Dico et compoſitam primam, et quintam AG ſecundæ C æque multiplicem eſſe, ac tertiam et ſextã DH quartæ F. Quoniam enim AB æque multiplex eſt C, ac DE ipſius F; quot magnitudines ſunt in AB æquales C, tot erunt et in DE æquales F. eadem ratione et quot ſunt in BG æquales C, tot et in EH erunt æquales F. quot igitur ſunt in tota AG æquales C, tot erunt et in tota DH æquales F. ergo quotuplex eſt AG ipſius C, totuplex eſt et DH ipſius F. et compoſita igitur prima et quinta AG ſecundæ C æque multiplex erit, ac tertia et ſexta DH quartæ F: quare ſi prima ſecundæ: æque multiplex fuerit, ac tertia quartæ: fuerit autem et quinta ſecundę æque multiplex, ac ſexta quartę: erit compoſita quoque prima et quinta æque multiplex ſecundæ, ac tertia, et ſexta quartę. quod oportebat demonſtrare.



THEOREMA III. PROPOSITIO III.

Si prima ſecundę æque multiplex fuerit, ac tertia quartę; ſumantur aũt æque multiplices primæ, & tertiæ: erit & ex æquali ſumptarum vtraque vtriuſque æque multiplex, altera quidem ſecundæ, altera vero quartæ.

Prima enim A ſecundæ B æque multiplex ſit, ac tertia C quartę D: et ſumantur ipſarum AC æque multiplices EF GH. Dico EF æque multiplicem eſſe ipſius B, ac GH ipſius D. Quoniã enim EF æque multiplex eſt ipſius A, ac GH ipſius C; quot magnitudines ſunt in EF æquales A, tot erunt et in GH æquales C. Diuidatur EF quidem in magnitudines ipſi A æquales EK KF; GH vero diuidatur in magnitudines æquales C, videlicet GL LH. erit igitur ipſarum EK KF multitudo æqualis multitudini ipſarum GL LH. et quoniam æque multiplex eſt A ipſius B, ac C ipſius D; æqualis autem EK ipſi A, et GL ipſi C; erit EK æque multiplex ipſius B, ac GL ipſius D. eadem ratione æque multiplex erit KF ipſius B, et LH ipſius D. quoniam igitur prima EK ſecundæ B æque multiplex eſt, ac tertia GL quartæ D; eſt autem et quinta KF ſecundæ B æque multiplex, ac ſexta LH quartę D: erit et compoſita prima et quinta EF ſecundæ B æque multiplex, ac tertia, et ſexta GH quartæ D. Si igitur prima ſecũdæ æque fuerit multiplex, ac tertia quartæ; ſumantur autem primæ, et tertiæ æque multiplices: erit et ex æquali ſumptarum vtraque vtriuſque æque multiplex, altera quidem ſecundæ, altera vero quartæ. quod oſtendiſſe oportuit.

Ex antecedente.



THEOREMA IIII. PROPOSITIO IIII.


Si prima ad ſecundã eandem hẽt proportionem, quam tertia ad quartam, & æque multiplices primę, & tertię ad æque multiplices ſecundæ, & quartæ, iuxta quamuis multiplicationem, eandem proportionem habebunt, inter ſe comparatę.

Prima enim A ad ſecundam B eandem proportionem habeat, quam tertia C ad quartam D: et ſumantur ipſarũ quidem AC alię vtcumque æque multiplices E F; ipſarũ vero BD aliæ vtcumque æque multiplices GH. Dico E ad G ita eſſe, vt F ad H. ſumantur enim rurſus ipſarum EF æque multiplices KL, et ipſarum GH æque multiplices M N. Qm̃ igitur E æque multiplex eſt ipſius A, atq; F ipſius C; ſumuntur aũt ipſarum EF æque multiplices KL: erit K æque multiplex ipſius A, atque L ipſius C. Eadem ratione M æque multiplex erit ipſius B, atque N ipſius D. et quoniam eſt vt A ad B. ita C ad D. ſumptæ autem ſunt ipſarũ AC æque multiplices KL; et ipſarum BD aliæ vtcumque æque multiplices MN: ſi K ſuperat M, ſuperabit et L ipſam N; et ſi æqualis, æqualis; et ſi minor, minor. ſuntq; KL quidem ipſarum EF æque multiplices; MN vero ipſarum G H aliæ vtcumque æque multiplices. vt igitur E ad G, ita erit F ad H. quare ſi prima ad ſecundam eandem habeat proportionem, quam tertia ad quartam, et æque multiplices primæ ac tertiæ ad æque multiplices ſecundę, ac quartæ iuxta quamuis multiplicationem eandem proportionem habebunt inter ſe comparatæ. quod demonſtrare oportebat.

Ex antecedente.

Per conuerſam quintæ diffinitionis.

5. diffinit.



Quoniam igitur demonſtratum eſt ſi K ſuperat M, et L ipſam N ſuperare; et ſi æqualis, æqualem eſſe, et ſi minor, minorem: conſtat etiam ſi M ſuperat K, et N ſuperare ipſam L; et ſi æqualis, æqualem eſſe; et ſi minor, minorem; ac propterea vt G ad E, ita eſſe H ad F.

5. diffinit.

COROLLARIVM.


Ex hoc manifeſtum eſt ſi quattuor magnitudines ſint proportionales, et contra proportionales eſſe.

SCHOLIVM.

Hoc theorema pertinet ad demonſtrationem diffinitionis magnitudinum, quæ ſunt in eadem proportione, vt eſt quando æque multiplices primæ, & tertiæ, videlicet antecedentium, æque multiplices ſecundæ, & quartæ, hoc eſt conſequentium, vel vnà ſuperant, vel vnà æquales ſunt, vel vnà deficiunt; hic enim demonſtrat & ipſas eandem inter ſe proportionem habere. reticuit autem hoc in principio; neque enim fieri poterat, vt diceretur illas in eadem proportione eſſe, quorum multiplicia ſunt in eadem proportione, quando nos idipſum quæreremus, quænam eſſent in eadem proportione. cum igitur dixiſſet in principio eas ſimul ſuperare, vel ſimul æquales eſſe, vel ſimul deficere; hic oſtendit & in eadem eſſe proportione, ſi inter ſe comparentur, vt appareat diffinitio earum, quæ ſunt in eadẽ proportione, quando ſcilicet æque multiplices primæ, & tertię ad ſecũdæ, & quartę æque multiplices eandẽ proportionem habeant. oſtendit aũt ipſas in eadẽ proportione per hoc, & per cõuerſionẽ;

THEOREMA V. PROPOSITIO. V.

Si magnitudo magnitudinis æque multiplex ſit, atque ablata ablatę; et reliqua reliquę ęque multiplex erit, atque tota totius.




Magnitudo enim AB magnitudinis CD ęque multiplex ſit, atque ablata AE ablatę CF. Dico et reliquam EB reliquæ FD æque multiplicem eſſe, atque totam AB totius CD. quotuplex enim eſt AE ipſius CF, totuplex fiat et EB ipſius CG. et quoniam AE æque multiplex eſt CF, atque EB ipſius CG; erit AE ęque multiplex CF, et AB ipſius GF. ponitur autem ęque multiplex AE ipſius CF, et AB ipſius CD. æque multiplex igitur eſt AB vtriuſque GF CD; ac propterea CF ipſi CD eſt æqualis. communis auferatur CF. reliqua igitur GC ęqualis eſt reliquę D F. Itaque quoniam AE æque multiplex eſt CF, et EB ipſius CG, eſtq; CG ęqualis DF; erit AE æque multiplex CF, et EB ipſius FD. æque multiplex autē ponitur AE ipſius CF, et A B ipſius C D. ergo E B eſt ęque multiplex FD, et A B ipſius C D. et reliqua igitur E B reliquę F D æque multiplex eſt, atq; tota A B totius CD. quare ſi magnitudo magnitudinis æque multiplex ſit, atque ablata ablatæ; et reliqua reliquę ęque erit multiplex, atque tota totius. quod oportebat demonſtrare.

1. huius.

2. Com. not.


THEOREMA VI. PROPOSITIO. VI.

Si duę magnitudines duarum magnitudinum æque multiplices ſint, et ablatæ quędam ſint earumdem æque multiplices; erunt et reliquæ uel eiſdem æquales, vel ipſarum ęque multiplices.



Duæ enim magnitudines AB CD duarum magnitudinum EF ęque multiplices ſint, et ablatæ A G C H earumdem ſint æque multiplices. Dico et reliquas GB HD vel ipſis EF æquales eſſe, vel ipſarum æque multiplices. ſit enim primum GB ęqualis E. Dico et HD ipſi F eſſe æqualem. ponatur ipſi F æqualis CK. et quoniam AG æque multiplex eſt E, et CH ipſius F; eſtq; GB quidem ęqualis E; CK vero æqualis F: erit AB ęque multiplex E, et KH ipſius F. ęque autem multiplex ponitur A B ipſius E, et CD ipſius F. ergo KH ęque multiplex eſt F, et C D ipſius F. quoniam igitur vtraque ipſarum KH CD eſt ęque multiplex F, erit KH æqualis CD. communis auferatur C H. ergo reliqua KC reliquę HD eſt ęqualis. Sed KC eſt ęqualis F. et HD igitur ipſi F eſt æqualis; ideoq; GB ipſi E, et HD ipſi F æquais erit. Similiter demonſtrabimus ſi G B multiplex fuerit ipſius E, et H D ipſius F ęque multiplicem eſſe. Si igitur duæ magnitudines duarum magnitudinum æque multiplices ſint, et ablatę quædam ſint earumdem æque multiplices, erunt et reliquæ vel eiſdem æquales, vel ipſarum æque multiplices. quod demonſtrare oportebat.

2. huius.



3. Com. not.

SCHOLIVM.

Non propoſitum eſt oſtendere ſi à multiplici multiplex auferatur reli-

quum, vel æquale esse, vel multiplex; hoc enim manifestum est: sed duarum magnitudinibus ad duas magnitudines ita se habentibus, vt dictum est, si reliqua prioris sit multiplex, & reliquam alterius multiplicem esse; & si æqualis sit, esse æqualem, veluti si quadrupla existentes tripla auferatur, reliqua æqualis erit, & in altera eodem modo.

THEOREMA VII. PROPOSITIO. VII.


Æquales ad eãdẽ, eãdẽ habẽt proportionẽ, & eadẽ ad æquales.

Sint æquales magnitudines A B, alia autem quæuis magnitudo C. Dico vtramque ipsarum A B ad C eandem proportionem habere: et C ad vtramque A B similiter eandem habere proportionem. sumantur enim ipsarum A B æque multiplices DE, et ipsius C alia vtcumque multiplex F. Quoniam igitur æque multiplex est D ipsius A, et E ipsius B, estq; A ipsi B æqua-

a Com.not. lis; erit et D æqualis E; alia autem vtcumque est F. ergo si D superat F, et E ipsam F superabit; et si æqualis, æqualis; et si minor, minor. et sunt DE quidem ipsarum A B æqui multiplices: F vero alia vtcumque multiplex ipsius C. erit igitur vt A ad C, ita B

5. diffi. ad C. dico insuper C ad vtramque ipsarum A B eandem habere proportionem. iisdem enim constructis similiter ostendemus D ipsi E æqualem esse, aliam vero quandam F. si igitur F superat D, ipsam quoque E superabit; et si æqualis, æqualis; et si minor, minor. atque est F quidẽ ipsius C multiplex; DE vero alię vtcũ-

5. diffi. que æque multiplices ipsarum A B. ergo vt C ad A, ita erit C ad B. æquales igitur ad eandem, eandem habent proportionem; et eadem ad æquales. quod ostendere oportebat.



F. C. COMMENTARIVS.

Eodem modo demonstrabimus, et æquales magnitudines ad alias inter se æquales eandem habere proportionem.

Sint enim magnitudines aequales A B; sintq; aliae magnitudines inter se aequales C D. dico A ad C eandem habere proportionem, quam B ad D. sumantur ipsarum A B aeque multiplices E F; & ipsarum C D aliae vtcumque aeque multiplices GH. Itaq; quoniam aeque multiplex est E ipsius A,

1. Com. not. *& F ipsius B; est autem A aequalis B: erit & E ipsi F aequalis. rursus quoniam aeque multiplex est G ipsius C, & H ipsius D; estq; C ipsi D aequalis: & G ipsi H aequalis erit. Si igitur E superat G, & F ipsam H superabit; et*

5. diffi. *si aequalis, aequalis; & si minor, minor. ergo A ad C eandem proportionẽ habet, quam B ad D. quod oportebat demonstrare.*




THEOREMA VIII. PROPOSITIO. VIII.

Inæqualium magnitudinum maior ad eandem maiorem habet proportionem, quàm minor: et eadem ad minorẽ maiorem proportionẽ habet, quàm ad maiorẽ.

Sint inęquales magnitudines AB C: et sit AB maior; alia vero vtcumque D. dico AB ad D maiorẽ habere proportionem, quàm C ad D: et D ad C maiorem habere, quàm ad AB. quoniam enim AB maior est, quàm C, ponatur ipsi C æqualis B E.

4. diffin. Itaque minor ipsarum AE EB multiplicata maior aliquando erit, quàm D. Sit primum


mum AE minor, quàm EB: et multiplicetur AE, quo ad fiat maior, quàm D: ſitq́; ipſius multiplex FG, quæ ipſa D ſit maior: quotuplex autem eſt FG ipſius AE, totuplex fiat et GH ipſius EB, et K ipſius C. ſumaturq́; ipſius D dupla quidem L, tripla vero M, et deinceps vna plus, quo ad ea, quæ ſumitur, multiplex fiat ipſius D, et primo maior, quàm K. ſumatur, ſitq́; N ipſius D quadrupla, et primo maior quàm K. quoniam igitur K primo minor eſt, quàm N, non erit K minor, quàm M. et cum æque multiplex ſit FG ipſius AE, et GH ipſius EB; erit et FG æque multiplex AE, et FH ipſius AB. æque autem multiplex eſt FG ipſius AE, et K ipſius C. ergo FH æque multiplex eſt AB, et K ipſius C; ac propterea FH K ipſarũ AB C æque multiplices erũt. rurſus quoniã GH æque multiplex eſt EB, et K ipſius C; eſtq́; EB æqualis C: erit et GH ipſi K æqualis. Sed K non eſt minor, quàm M. non igitur GH minor eſt, quàm M. maior autem FG quàm D. ergo tota FH vtriſque DM maior erit. Sed vtræque DM ſunt æquales N; eſt enim M tripla ipſius D, et vtræque M D ipſius D quadruplæ. eſt autem et N quadrupla D. vtræque igitur M D ipſi N æquales ſunt. ſed FH maior eſt, quàm MD. quare FH ſuperat N, K vero ipſam N non ſuperat. et ſunt FH K æque multiplices ipſarum AB C: et N ipſius D alia vtcũque multiplex. ergo AB ad D maiorem proportionem habet, quàm C ad D. dico præterea et D ad C maiorem habere proportionẽ, quàm D ad AB. iiſdem enim conſtructis ſimiliter oſtendemus N ſuperare K, ipſam vero FH non ſuperare: atque eſt N multiplex ipſius D; et FH K aliæ vtcumque ipſarum AB C æque multiplices. ergo D ad C maiorem proportionẽ habet, quàm D ad AB. Sed ſit AE maior, quàm EB. erit minor EB multiplicata aliquando maior, quàm D. multiplicetur, et ſit GH multiplex quidẽ ipſius EB, maior vero, quã D. et quotuplex eſt GH ipſius EB, totuplex fiat et FG ipſius AE, et K ipſius C. ſimili rõne oſtendemus FH K ipſarũ AB C æq; multiplices eſſe. ſumatur deinde N multiplex D, primo aũt maior, quàm FG. ergo rurſus FG nõ eſt minor, quàm M; maior autem FG, quàm D. tota igitur FH ſuperat DM, hoc eſt N; et K ipſam N non ſuperat: quoniam FG maior exiſtens, quàm GH, hoc eſt quàm K, non ſuperat N. et ſimiliter vt in iis, quæ ſuperius dicta ſũt, demõſtrationẽ abſoluemus. Inæqualiũ igitur magnitudinum maior ad eandẽ maiorem habet proportionẽ, quàm minor: et eadem ad minorẽ maiorem proportionẽ habet, quàm ad maiorẽ. quod oſtẽdere oportebat.



1. huius.

1. huius.

1. com. not.



7. diffin. ✻

SCHOLIVM.

Ergo AB ad D maiorem proportionem habet, quàm C ad D] *quattuor ſint magnitudines, prima quidem AB, ſecunda D, tertia autem C, et quarta D. bis enim ſimitur D, & vt ſecunda & vt quarta. atque eſt primae quidem AB multiplex FH: ſecundae vero D multiplex N, & tertiae C multiplex K. eſt igitur FH maior, quàm N; quae quidem N multiplex eſt ſecundae D: K vero multiplex tertiae C, minor eſt, quàm N, quae eſt multiplex quartae D. Itaque quoniã multiplex primae maior eſt multiplici ſecundae, multiplex autem tertiae non maior multiplici quartae; habebit AB ad D maiorem proportionem, quàm C ad eandem D, per eam diffinitionem, quae dicit, quando aeque multiplicium multiplex quidem primae ſuperauerit multiplicem ſecundae, multiplex autem tertiae non ſuperauerit multiplicem quartae, tunc prima ad ſecundam maiorem proportionem habere dicetur, quàm tertia ad quartam.* ✻

THEOREMA IX. PROPOSITIO IX.


Quæ ad eandẽ, eandẽ proportionẽ habent, inter ſe æquales ſunt; et ad quas eadẽ, eãdẽ hẽt proportionẽ, ipſæ inter ſe ſunt æquales.

Habeat

Habeat enim vtraque ipſarum A B ad C eandem proportionẽ. Dico A ipſi B ęqualem eſſe. nam ſi non eſſet ęqualis, non haberet vtraque ipſarum A B ad C eãdem proportionem. habet autem. æqualis igitur eſt A ipſi B. Habeat rurſus C ad vtramque ipſarum AB eandem proportionem. Dico A æqualem eſſe ipſi B. niſi enim ita ſit, non habebit C ad vtramque A B eandem proportionem. habet autem. ergo A ipſi B neceſſario eſt æqualis. quæ igitur ad eandem, eandem proportionem habent, æquales inter ſe ſunt: et ad quas eadem eandem habet proportionem, ipſæ inter ſe ſunt æquales. quod demonſtrare oportebat.

Ex antecedente.

Ex antecedente.



THEOREMA. X. PROPOSITIO. X.

Ad eãdẽ ꝓportionẽ habẽtiũ quę maiorẽ ꝓportionẽ hẽt, illa maior eſt; ad quã vero eadẽ maiorẽ habet proportionem, illa minor eſt.


Habeat enim A ad C maiorem proportionem, quàm B ad C. Dico A, quàm B maiorem eſſe. ſi enim non eſt maior, vel æqualis eſt, vel minor. ęqualis autem non eſt A ipſi B, vtraque enim ipſarum AB ad C eãdem haberet proportionem. atqui eandem non habet. non igitur A ipſi B eſt ęqualis. Sed neque minor eſt A quàm B; haberet enim A ad C minorem proportionem, quàm B. atqui non habet minorem. non igitur A minor eſt, quàm B. oſtenſum autem eſt neque eſſe æqualẽ. ergo A quàm B maior erit. Habeat rurſus C ad B maiorem proportionem, quàm C ad A. Dico B minorem eſſe, quàm A. ſi enim non eſt minor, vel æqualis eſt, vel maior. ęqualis vtique non eſt B ipſi A; etenim C ad vtramque ipſarũ A B eandẽ proportionem haberet. non habet autem. ergo A ipſi B non eſt ęqualis. Sed neque maior eſt B, quàm A; haberet enim C ad B minorem proportionem, quàm ad A. atqui non habet. non igitur B quàm A eſt maior. Oſtẽſum aũt eſt neque ęqualẽ eſſe. ergo B minor erit, quàm A. Ad eandem igitur proportionẽ habẽtiũ quæ maiorẽ proportionẽ hẽt, illa maior eſt: et ad quam eadem maiorẽ habet proportionem, illa minor eſt. quod oportebat demonſtrare.

7. huius.

8. huius.

9. huius.

8. huius.



THEOREMA XI. PROPOSITIO. XI.

Quæ eidem ęędem ſunt proportiones, et inter ſe ęędem ſunt.

Sit enim vt A ad B, ita C ad D: vt autem C ad D, ita E ad F. Dico vt A ad B, ita eſſe E ad F. ſumantur enim ipſarum quidem A C E æque multiplices G H K; ipſarum vero B D F alię vtcumque æque multiplices L M N. Quoniam igitur eſt vt A ad B, ita C ad D, et ſumptæ ſunt ipſarum A C ęque multiplices G H, et ipſarum BD aliæ vtcumque æque multiplices LM; ſi G ſuperat L, et H ipſam M ſuperabit; et ſi æqualis, ęqualis; et ſi minor, minor. rurſus quoniam eſt vt C ad D, ita E ad F, et ſumptę ſunt ipſarũ CE ęque multiplices HK; ipſarũ vero DF aliæ vtcũque ęque multiplices MN, ſi H ſuperat M, et K ipſam N ſuperabit; et ſi ęqualis, æqualis; et ſi minor, minor. ſed ſi H ſuperat M, et G ſuperabit L; et ſi æqualis, æqualis; et ſi minor, minor. quare ſi G ſuperat L, et K ipſã N ſuperabit; et ſi æqualis, æqualis; et ſi minor, minor. et ſunt GK quidem ipſarum AE æque multiplices; LN vero ipſarum BF aliæ vtcumque ęque multiplices. ergo vt A ad B, ita erit E ad F. quæ igitur eidem eædem ſunt proportiones, et inter ſe eædem ſunt. quod oſtendiſſe oportuit.

Ex cõuerſa 5. diffi.


5. diffin.

THEO-

THEOREMA XII. PROPOSITIO. XII.

Si quotcũque magnitudines proportionales fuerint, vt vna antecedẽtiũ ad vnã cõſequẽtiũ, ita erũt antecedẽtes oẽs ad omnes cõſequẽtes.


Sint quotcũque magnitudines proportionales AB CD EF: et vt A ad B, ita ſit C ad D, et E ad F. Dico vt A ad B. ita eſſe ACE ad BDF. ſumantur enim ipſarum A C E ęque multiplices GHK, et ipſarũ BDF aliæ vtcumque æque multiplices LMN. Quoniam igitur vt A ad B, ita eſt C ad D, et E ad F: et ſumptę ſunt ipſarum quidem ACE æque multices GHK, ipſarum vero BDF aliæ vtcumque ęque multiplices LMN; ſi G ſuperat L, et H ipſam M ſuperabit, et K ipſam N; et ſi æqualis, æqualis; et ſi minor, minor. quare et ſi G ſuperat L, ſuperabunt et GHK ipſas LMN; et ſi ęqualis, ęquales; et ſi minor, minores. ſuntq; G, et GHK ipſarũ A, et ACE æque multiplices: quoniã ſi fuerint quotcũque magnitudines quotcũque magnitudinũ æqualiũ numero, ſingulæ ſingularũ æque multiplices; quotuplex eſt vna magnitudo vnius, totuplices erũt et oẽs omniũ. eadẽ ratione et L et LM N ipſarum B, et BDF ſunt æque multiplices. eſt igitur vt A ad B, ita ACE ad BDF. quare ſi quotcumque magnitudines proportionales fuerint, vt vna antecedentiũ ad vnã conſequentium, ita erunt antecedentes omnes ad omnes conſequentes. quod demonſtrare oportebat.



THEOREMA XIII. PROPOSITIO. XIII.

Si prima ad ſecundam eandem habeat proportionem, quam tertia ad quartam; tertia autem ad quartam maiorem proportionẽ habeat, quàm quinta ad ſextã: et prima ad ſecundã maiorẽ habebit proportionẽ, quàm quinta ad ſextã.

Prima enim A ad ſecundam B eandem proportionem habeat, quam tertia C ad quartam D; tertia autem C ad quartã D maiorem habeat proportionem, quàm quinta E ad ſextã F. Dico et primam A ad ſecundam B maiorem proportionẽ habere, quàm quintam E ad ſextam F. Quoniam enim C ad D maiorem proportionem habet, quàm E ad F, ſunt quædã ipſarum CE æque multiplices, et ipſarum D F aliæ vtcumque æque multiplices: et multiplex quidem C ſuperat multiplicẽ D; multiplex vero E non ſuperat multiplicem F. Sumantur, et ſint ipſarum CE æquemultiplices GH, et ipſarum DF aliæ vtcumque æquemultiplices KL, ita vt G quidem ſuperet K; H vero ipſam L non ſuperet: et quotuplex eſt G ipſius C, totuplex ſit et M ipſius A; quotuplex autem K ipſius D, totuplex ſit et N ipſius B. et quoniam eſt vt A ad B, ita C ad D, et ſumptæ ſunt ipſarum AC æquemultiplices MG, et ipſarum BD aliæ vtcumque æque multiplices NK: ſi M ſuperat N, et G ipſam K ſuperabit; et ſi æqualis, æqualis; et ſi minor, minor ſed G ſuperat K. ergo & M ipſam N ſuperabit. H vero non ſuperat




ſuperat L. ſuntq; MH ipſarum AE æque multiplices; et NL ipſarum B F aliæ vt cum
7. diffi. que æque multiplices. ergo A ad B maiorem proportionem habebit, quàm E ad F. ſi igitur prima ad ſecundam eandem habeat proportionem, quam tertia ad quartam; tertia vero ad quartam maiorem proportionē habeat, quàm quinta ad ſextam: et prima ad ſecundam maiorem habebit proportionem, quàm quinta ad ſextam. quod oſtendere oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

Eodem modo demonſtrabitur ſi prima ad ſecundam eandem habeat proportionem, quam tertia ad quartam; tertia autem ad quartam minorem proportionem habeat, quàm quinta ad ſextam: et primam ad ſecundam minorem proportionem habere, quàm quintam ad ſextam.

Quòd ſi prima ad ſecundam maiorem habeat proportionē, quàm tertia ad quartam; tertia autem ad quartam maiorem habeat, quàm quinta ad ſextam: et prima ad ſecundam maiorem proportionem habebit, quàm quinta ad ſextam.

Habeat A ad B maiorem proportionem, quàm C ad D, & C ad D maiorem habeat, quàm E ad F. dico A ad B maiorem habere proportionem,
8. huius. *quàm E ad F. fiat enim vt C ad D, ita G ad B. erit G minor, quàm A. & quoniam G ad B eandem proportionem habet, quàm C ad D, & C ad D maiorem habet proportionem, quam E ad F: habebit & G ad B maiorem proportionem, quàm E ad F. quare A ad B multo maiorem proportionem habebit, quàm E ad F. & ſimiliter demonſtrabitur ſi prima ad ſecundam minorem proportionem habeat, quàm tertia ad quartam; tertia vero ad quartā habeat minorem, quàm quinta ad ſextam: & primam ad ſecundam minorem habere proportionem, quàm quintam ad ſextam.*



THEOREMA XIIII. PROPOSITIO. XIIII.

Si prima ad ſecundam eandem habeat proportionem, quàm tertia ad quartam; prima autem maior ſit, quàm tertia: & ſecunda quàm quarta maior erit; & ſi æqualis, æqualis; et minor, minor.

Prima enim A ad ſecundam B eandem proportionem habeat, quam tertia C ad quartam D: maior autem ſit A quàm C. dico et B quàm D maiorem eſſe. quoniam enim A maior
8. huius. eſt quā C, et alia vtcũque magnitudo B; habebit A ad B maiorem proportionem, quàm C ad B. ſed vt A ad B, ita C ad
Ex antecedente. 10. huius. D. ergo et C ad D maiorem habebit proportionem, quàm C ad B. ad quam vero eadem maiorem proportionem habet, illa minor eſt. quare D eſt minor, quàm B: ac propterea B quā D maior erit. Similiter demonſtrabimus et ſi A æqualis ſit ipſi C; et B ipſi D eſſe æqualem: et ſi A ſit minor, quàm C; et B quàm D minorem eſſe. Si igitur prima ad ſecundam eandem habeat proportionem, quàm tertia ad quartam; prima autem maior ſit, quàm tertia: & ſecunda, quàm quarta maior erit; & ſi æqualis, æqualis; et ſi minor, minor. quod demonſtrare oportebat.

A
B



SCHOLIVM.

Hoc lemma eſt. ſextidecimi theorematis, quemadmodum vigeſi-

mum

mum eſt lemma vigeſimi ſecundi, & vigeſimum primum vigeſimi tertij.

F. C. COMMENTARIVS.


Similitet demonſtrabimus et ſi A æqualis ſit ipſi C, et B ipſi D eſſe æqualem] *Quoniam enim A eſt aequalis C, habebit A ad B eandem proportionem, quam C ad B. vt autem A ad B, ita C ad D. ergo & C ad D eandem habebit, quam C ad B. ad quas autem eadem eandem habet proportionem ipſae aequales ſunt. ergo B ipſi C eſt aequalis.* A 11.huius. 9.huius.

Et ſi A ſit minor, quàm C, et B quàm D minorem eſſe,] *nam cum A minor ſit, quàm C; habebit A ad B minorem proportionem quàm C ad B. ſed vt A ad B, ita C ad D. quare ex antecedente & C ad D minorem habebit proportionem, quàm C ad B; ac propterea C ad B maiorem habebit, quam C ad D. ergo B quàm D minor erit.* 8.huius. B 10.huius.

TEOREMA XV. PROPOSITIO XV.

Partes eodem modo multiplicium inter ſe cõparatę eandem habent proportionem.


Sit enim AB æque multiplex C, et DE ipſius F. Dico vt C ad F, ita eſſe AB ad DE; Quoniam enim æque multiplex eſt AB ipſius C, et DE ipſius F; quot magnitudines ſunt in AB æquales ipſi C, totidem erunt et in DE æquales F. diuidatur AB in magnitudines ipſi C æquales, quæ ſint AG GH HB. et DE diuidatur in magnitudines æquales F, videlicet in DK KL LE. erit igitur ipſarum AG GH HB multitudo æqualis multitudini DK KL LE. et quoniam æquales ſunt AG GH HB, ſuntq; DK KL LE inter ſe æquales; vt AG ad DK, ita erit GH ad KL, et HB ad LE; atque erit vt vnum antecedentium ad vnum conſequentium, ita omnia antecedentia ad omnia conſequentia. eſt igitur vt AG ad DK, ita AB ad DE. Sed AG ipſi C eſt æqualis, et DK ipſi F. ergo vt C ad F, ita erit AB ad DE. partes igitur eodem modo multiplicium inter ſe comparatæ eandem habent proportionem. quod oſtendendum fuit.



* 21.huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Vt AG ad DK, ita erit GH ad KL, et HB ad LE.] *Ex ea, quam nos ad ſeptimam huius, addidimus.*




*

THEOREMA. XVI. PROPOSITIO XVI.

Si quattuor magnitudines proportionales fuerint, et permutatæ proportionales erunt.

Sint quattuor magnitudines proportionales ABCD, ſitq; vt A ad B, ita C ad D. Dico et permutatas proportionales eſſe, videlicet vt A ad C, ita eſſe B ad D. ſumantur enim ipſarũ quidem AB, æque multiplices EF; ipſarum verò CD aliæ vtcumque æque multiplices GH. et quoniam æque multiplex eſt E ipſius A, et F ipſius B; partes autem eodem modo multiplicium inter ſe comparatæ eãdem habent proportionem: erit vt A ad B, ita E ad F: vt autem A ad B, ita C ad D. ergo & vt C ad D, ita E ad F. rurſus quoniam GH ſunt ipſarum CD æque multiplices; partes autem eodem modo multiplicium




* Ex antecedente. 21.huius.

eandem proportionem habent inter ſe comparatæ, erit vt C ad D, ita G ad H. ſed
14.huius. vt C ad D, ita E ad F. ergo et vt E ad F, ita G ad H. Quòd ſi quattuor magnitudines proportionales ſint, prima autem maior ſit, quàm tertia; et ſecunda quàm quarta maior erit; et ſi æqualis, æqualis; et ſi minor, minor. Si igitur E ſuperat G, et F ipſam H ſuperabit, et ſi æqualis, æqualis; et ſi minor, minor; ſuntq; EF ipſarũ AB æque mul
5.diff. tiplices, et GH ipſarũ CD aliæ vtcumque æque multiplices. ergo vt A ad C, ita erit B ad D. Si igitur quattuor magnitudines proportionales fuerint, et permutatæ proportionales erunt. quod oſtendere oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

Ex ijs, quae demonſtrata ſunt, illud quoque demonſtrabitur.

Si prima ad ſecundam eandem proportionem habeat, quàm tertia ad quartam, ſitq; prima maior, quàm ſecunda; et tertia, quàm quarta maior erit; et ſi æqualis, æqualis; et ſi minor, minor.



Prima enim A ad ſecundam B eandem habeat proportionem, quàm tertia C ad quartam D: & ſit A maior, quàm B. Dico & C quàm D maiorem eſſe. Quoniam enim A ad B eandem proportionem habet, quam C ad D; habebit permutando ex antecedente A ad C eandem proportionem, quam B ad D. Rurſus quoniam A maior eſt quam B, alia vero vtcũque eſt C; habebit A ad C maiorem proportionem,
8.huius. *quàm B ad C. Sed vt A ad C, ita eſt B ad D, quod demonſtratum eſt. ergo B ad D maiorem proportionem*
10.huius. *habet, quàm ad C. Ad quam vero eadem maiorem habet proportionẽ, illa minor eſt. quare D minor eſt, quàm C; ideoq; C maior, quàm D. Sit deinde A aequalis ipſi B. dico & C ipſi D aequalem eſſe. nam cum A*
7.huius. *& B ſint aequales. habebit A ad C proportionem eãdem, quam B ad C. vt autem A ad C, ita B ad D. ergo B ad D eandem proportionem habet, quam ad C. Ad*
9.huius. *quas vero eadem proportionem eãdem habet, illae aequales ſunt. ergo C ipſi D eſt aequalis. Sit poſtremo A minor, quàm B. Dico & C, quàm D minorem eſſe. quoniam enim A minor eſt quàm B,*
8.huius. *habebit A ad C minorem proportionem, quàm B ad C. Sed vt A ad C, ita B ad D. habebit igitur B ad D minorem proportionem, quàm ad C, ideoq; B ad C maiorem proportionem habebit, quàm ad*
10.huius. *D. Ad quam vero eadem maiorem habebit proportionem, illa minor eſt. ergo C quàm D minor erit. Si igitur prima ad ſecundam eandem proportioaem habeat, quam tertia ad quartam: ſitq; prima maior, quàm ſecunda, & tertia, quàm quarta maior erit; & ſi aequalis, aequalis; & ſi minor, minor.*

ALITER. Habeat A ad B eandem proportionem, quam C ad D: ſitq; A maior, quàm B. Dico & C, quã D maiorẽ eſſe. Quoniã enim A ad B eandem proportionem habet quam C ad D; habebit permutando A ad C eandem proportionem, quam B ad D. ſed A maior eſt quàm B. ergo ex 14 huius & C, quàm D maior erit. Eodem modo demonſtrabimus ſi A ſit aequalis B, & C ipſi D eſſe aequalem. & ſi A ſit minor, quàm B, & C quàm D minorem eſſe. quod demonſtrare oportebat.


THEOREMA XVII. PROPOSITIO. XVII.

Si compoſitę magnitudines ſint proportionales, et diuiſæ proportionales erunt.

Sint compoſitę magnitudines proportionales AB BE CD DF. ſitq; vt AB ad BE, ita CD ad DF. dico etiam diuiſas proportionales eſſe, videlicet vt AE ad EB,

ita

ita esse CF ad FD. sumantur enim ipsarum quidem AE EB CF FD æque multiplices GH HK LM MN, ipsarum vero EB FD aliæ vtcumque æque multiplices KX NP. et quoniã æque multiplex est GH ipsius AE, et HK ipsius EB; erit GH ipsius AE æque multiplex, et GK ipsius AB. æque autem multiplex est GH ipsius AE, et LM ipsius CF. ergo GK æque multiplex est AB, et LM ipsius CF. rursus quoniam æque multiplex est LM ipsius CF, et MN ipsius FD; erit LM æque multiplex CF, et LN ipsius CD. Sed æque multiplex erat LM ipsius CF, & GK ipsius AB. æq; igitur multiplex est GK ipsius AB, et LN ipsius CD. quare GK LN ipsarum AB CD æque multiplices erunt. rursus quoniam æque multiplex est HK ipsius EB, et MN ipsius FD; est autem et KX ipsius EB æque multiplex, & NP ipsius FD: & composita HX ipsius EB æque multiplex est, et MP ipsius FD. quòd cum sit vt AB ad BE, ita CD ad DF, et sumptæ sint ipsarum quidem AB CD æque multiplices GK LN, ipsarum vero EB FD aliæ vtcumque æque multiplices HX MP; si GK superat HX, & LN superabit MP; & si æqualis, æqualis; & si minor, minor. superet igitur GK ipsam HX, communiq; ablata HK, et GH ipsam KX superabit. sed si GK superat HX, & LN superat MP. itaque superet LN ipsam MP, cõmuniq; MN ablata, & LM superabit NP. quare si GH superat KX, & LM ipsam NP superabit. Similiter demonstrabimus & si GH sit æqualis KX, & LM ipsi NP esse æqualem, & si minor, minorem. sunt autem GH LM ipsarum AE CF æque multiplices, & ipsarum EB FD aliæ vtcumque æque multiplices KX NP. ergo vt AE ad EB, ita erit CF ad FD. Si igitur compositæ magnitudines sint proportionales, & diuisæ proportionales erunt. quod demonstrare oportebat.




1. huius.
11. huius.
3. huius.
11. huius.
3. huius.
ex conuer. 5. diffi.
5. diffi.

THEOREMA XVIII. PROPOSITIO XVIII.

Si diuisæ magnitudines sint proportionales, & compositæ proportionales erunt.

Sint diuisæ magnitudines proportionales AE EB CF FD: & vt AE ad EB, ita CF ad FD. Dico etiam cõpositas proportionales esse, videlicet vt AB ad BE, ita esse CD ad DF. Si enim non est vt AB ad BE, ita CD ad DF; erit vt AB ad BE, ita CD vel ad minorem, quàm DF, vel ad maiorẽ. sit primũ ad minorẽ, nẽpe ad DG. & qm est vt AB ad BE, ita CD ad DG, cõpositæ magnitudines sunt proportionales. ergo et diuisæ proportionales erũt. est igitur vt AE ad EB, ita CG ad GD. ponitur aũt & vt AE ad EB, ita CF ad FD. quare & vt CG ad GD, ita CF ad FD. at CG prima maior est, quã tertia CF. ergo & secũda DG, quàm quarta DF maior erit. sed & minor, quod fieri non potest. non igitur est vt AB ad BE, ita CD ad DG. similiter ostendemus neque esse ad maiorem, quàm DF. ad ipsam igitur DF fit necesse est. quare si diuisæ magnitudines sint proportionales, & compositæ proportionales erunt. quod oportebat demonstrare.



Ex antecedente. 11. huius. 14. huius.

THEOREMA XIX. PROPOSITIO. XIX.

Si fuerit vt tota ad totam, ita ablata ad ablatam; & reliqua ad reliquam erit, vt tota ad totam.

Sit enim vt tota AB ad totam CD, ita ablata AE ad ablatam CF. Dico et reliquã

EB ad reliquam FD ita esse,vt totam AB ad totam CD.quoniã enim
16.huius. est vt tota AB ad totam CD, ita AE ad CF;& permutando erit vt B
A ad AE, ita DC ad CF.et quoniam compositæ magnitudines sunt
17.huius. proportionales,& diuisæ proportionales erunt. vt igitur BE ad EA,
ita DF ad FC,rursusq; permutando vt BE ad DF, ita EA ad FC. sed
11.huius. vt AE ad CF,ita posita est AB ad CD.et reliqua igitur EB erit ad re
liquam FD,vt tota AB ad totam CD.quare si fuerit vt tota ad totã,
ita ablata ad ablatam; & reliqua ad reliquam,erit vt tota ad totam.
quod demonstrare oportebat.

Et quoniam ostensum est vt AB ad CD,ita esse EB ad FD,erit per
mutando vt AB ad BE,ita CD ad DF. ergo compositæ magnitudi-
nes proportionales sunt.ostẽsum autem est vt BA ad AE, ita DC ad
CF,quod est per conuersionem rationis.



COROLLARIVM.


Ex hoc igitur perspicuum est si compositæ magnitudines sint proportionales;& per cõuersionem rationis proportionales esse.

Factę autem sunt proportiones et in æque multiplicibus, et in analogijs.nam si prima secundæ æque multiplex sit, atque tertia quartę;erit et vt prima ad secundã, ita tertia ad quartam.sed non item ex contrario cõuertitur.Si enim sit vt prima ad secundam,ita tertia ad quartam;nõ omnino erit prima quidem secundę æque multiplex,tertia vero quartæ,velut in sesquialteris,vel in sesquitertijs proportionibus, vel alijs ciusmodi.quod demonstrare oportebat.

THEOREMA. XX. PROPOSITIO. XX.

Si sint tres magnitudines, et alię ipsis numero æquales, quæ binę sumantur, et in eadem proportione; ex æquali autem prima maior sit, quàm tertia: et quarta quàm sexta maior erit; & si æqualis,æqualis;et si minor,minor.

Sint tres magnitudines A B C, et aliæ ipsis numero æquales D E F binæ sumptę,et in eadem proportione, sitq; vt A ad B, ita D ad E;et vt B ad C,ita E ad F;ex æquali autem maior sit A, quã C.Dico et D quàm F maiorem esse;et si æqualis,æqualem;et si minor,minorem. Quoniam enim A maior est,quàm C,alia vero vt-
8.huius. cumque B,et maior ad eandem maiorem habet proportionem,
A quàm minor: habebit A ad B maiorem proportionem, quàm C ad B.Sed vt A ad B,ita D ad E: et conuertendo vt C ad B, ita F ad E. ergo et D ad E maiorem habet proportionem, quàm F ad
10.huius. E. Ad eandem vero proportionem habentium quæ maiorem
B habet proportionem,illa maior est.maior igitur est D quàm F. si militer ostendemus et si A sit æqualis C,et D ipsi F æqualem esse; et si minor,minorem.Si igitur tres magnitudines fuerint, et aliæ ipsis numero æquales,quæ binę sumantur, et in eadem proportione; ex æquali autem prima maior sit, quàm tertia: et quarta quàm sexta maior erit; et si æqualis,æqualis; et si minor, minor. quod ostendere oportebat.



F. C. COMMENTARIVS.


A Habebit A ad B maiorem proportionẽ, quàm C ad B.sed vt A ad B, ita D ad E]

Ex

Ex his ſequitur per decimamtertiam huius D ad E maiorem proportionem habere, quàm C ad B. vt autem C ad B; ita F ad E. quare per eandem D ad E maiorem habet proportionem, quàm F ad E.

Similiter oſtendemus et ſi A ſit ęqualis C, et D ipſi F æqualem eſſe; et ſi minor, minorem.

Si enim A ſit aequalis C, habebit A ad B proportionem eandem, quam C ad B. Sed vt A ad B, ita D ad E, & vt C ad B, ita F ad E. quare D ad E eandem proportionem habebit, quam F ad E. quae vero ad eandē, eandem habent proportionem, inter ſe aequales ſunt. ergo D ipſi F eſt aequalis. Quòd ſi A ponatur minor quàm C, habebit A ad B proportionem minorem, quàm C ad B. vt autem A ad B, ita D ad E. ergo D ad E minorem proportionem habet, quàm C ad B. Sed vt C ad B, ita F ad E. habebit igitur D ad E minorē proportionē, quàm F ad E; ac propterea D quàm F, minor erit.




7.huius.
11.huius.
9.huius.
8.huius.
13.huius.
10.huius.

THEOREMA XXI.
PROPOSITIO XXI.

Si ſint tres magnitudines, et aliæ ipſis numero æquales, quę binę ſumantur, et in eadem proportione; ſit autem perturbata earum ànàlogía, et ex æquali prima maior ſit quàm tertia: et quarta quàm ſexta maior erit; et ſi æqualis, æqualis; et ſi minor, minor.

Sint tres magnitudines proportionales A B C, et aliæ ipſis numero æquales D E F, binæ ſumptæ, et in eadem proportione. ſit autem perturbata earum analogia, videlicet vt A quidem ad B, ita E ad F; vt vero B ad C, ita D ad E; et ex æquali A maior ſit, quàm C. Dico et D quàm F maiorem eſſe; et ſi æqualis, æqualem; et ſi minor, minorem. Quoniam enim maior eſt A, quàm C, alia vero B; habebit A ad B maiorem proportionem, quàm C ad B. Sed vt A ad B, ita E ad F, et conuertendo vt C ad B, ita E ad D. quare et E ad F maiorem habebit proportionem, quàm E ad D. ad quam vero eadem maiorem proportionem habet, illa minor eſt. minor igitur eſt F, quàm D; ac propterea D quàm F maior erit. Similiter oſtendemus et ſi A ſit æqualis C, et D ipſi F eſſe æqualem; et ſi minor, minorem. Si igitur ſint tres magnitudines, et aliæ ipſis æquales numero, quæ binæ ſumantur, et in eadem proportione; ſit autem perturbata earū analogia, et ex æquali prima maior ſit, quàm tertia: et quarta quàm ſexta maior erit; et ſi æqualis, æqualis; et ſi minor, minor. quod demonſtrare oportebat.



8.huius.
10.huius.

THEOREMA XXII. PROPOSITIO. XXII.

Si ſint quotcunque magnitudines, et aliæ ipſis numero æquales, quæ binæ ſumantur in eadem proportione; et ex æquali in eadem proportione erunt.


Sint

Sint quotcumque magnitudines A B C, et aliæ ipſis numero æquales DEF binę ſumptæ in eadem proportione, ſitq; ut A quidem ad B, ita D ad E; ut autem B ad C, ita E ad F. Dico et ex æquali in eadem proportione eſſe vt A ad C, ita D ad F. ſumantur enim ipſarum quidem A D æque multiplices G H; ipſarum vero BE alię vtcumque æque multiplices KL, et ipſarum CF aliæ vtcumque æque multiplices MN. Quoniã igitur eſt vt A ad B, ita D ad E, et ſumptę ſunt ipſarum AD æque multiplices G H, et ipſarum BE alię vtcumque æque multiplices K L; erit vt G ad K, ita H ad L. eadem quoque ratione erit vt K ad M, ita L ad N. et cũ ſint tres magnitudines GKM, et alię ipſis numero æquales H L N, binæ ſumptæ, et in eadem proportione; ex æquali ſi G ſuperat M, et H ipſã N ſuperabit; et ſi æqualis, æqualis; et ſi minor, minor; ſuntq; GH ipſarũ AD æq; multiplices, et MN ipſarum CF aliæ utcumque æque multiplices. vt igitur A ad C, ita erit D ad F. quare ſi ſint quotcumque magnitudines, et aliæ ipſis numero æquales, quæ binę ſumantur, in eadem proportione; et ex æquali in eadem proportione erunt. quod demonſtrare oportebat.

4. huius.

e.o. huius.


5. diffi.



F. C. COMMENTARIVS.

Idem demonſtrabitur etiam ſi plures ſint, quàm tres magnitudines.

Sint enim quattuor magnitudines ABC D, & aliae ipſis numero æquales E F G H binae ſumptae in eadem proportione, ſitq; vt A ad B, ita E ad F, ut aũt B ad C, ita F ad G, et vt C ad D, ita G ad H. Dico ex aequali ut A ad D, ita eſſe E ad H. Quoniam enim eſt vt A ad B, ita E ad F, et vt B ad C, ita F ad G; & ex aequali per ea, quae proxime oſtenſa ſunt, vt A ad C, ita erit F ad G. eſtq; vt C ad D, ita G ad H. Quare cum rurſus tres magnitudines ſint ACD, et aliae ipſis numero aequales EGH binae ſumptae in eadem proportione; erit ex aequali vt A ad D, ita E ad H. quod demonſtrare oportebat. & eodẽ modo demonſtrabitur in alijs eiuſmodi magnitudinibus quotquot fuerint, non ſolum in ordinata analogia, ſed et in perturbata. ſemper enim ad tres magnitudines eiuſdem ordinis ſimiliter reducentur.




THEOREMA XXIII. PROPOSITIO XXIII.

Si ſint tres magnitudines, et aliæ ipſis numero æquales, quæ binæ ſumantur in eadem proportione, ſit autem perturbata earum analogia; et ex æquali in eadem proportione erunt.

Sint

Sint tres magnitudines A B C, et aliæ ipſis numero æquales binæ ſumptæ in eadem proportione D E F; ſit autem perturbata earum analogia, et ſit vt A ad B, ita E ad F, & vt B ad C, ita D ad E. Dico vt A ad C, ita eſſe D ad F. ſumantur ipſarum quidem A B D æque multiplices G H K; ipſarum vero C E F aliæ vtcumque æque multiplices L M N. & quoniam G H æque multiplices ſunt ipſarum A B, partes autem eodem modo multiplicium eãdem habent proportionem; erit vt A ad B; ita G ad H. & ſimili ratione vt E ad F, ita M ad N. atque eſt vt A ad B, ita E ad F. vt igitur G ad H, ita M ad N. rurſus quoniam eſt vt B ad C, ita D ad E, & ſumptæ ſunt ipſarũ B D æque multiplices H K; ipſarum vero C E aliæ vtcumque æque multiplices L M; erit vt H ad L, ita K ad M. oſtenſum autem eſt et vt G ad H, ita eſſe M ad N. Quoniam igitur tres magnitudines proportionales ſunt G H L, & aliæ ipſis numero æquales K M N binæ ſumptæ in eadem proportione, eſtq; ipſarum perturbata analogia; ex æquali ſi G ſuperat L, & K ipſam N ſuperabit; & ſi æqualis, æqualis; & ſi minor, minor. ſunt autem G K ipſarũ A D æque multiplices: & L N æque multiplices ipſarum C F. vt igitur A ad C, ita erit D ad F. quare ſi fuerint tres magnitudines, & aliæ ipſis numero æquales, quæ binæ ſumantur in eadem proportione, ſit aũt perturbata earum analogia; & ex æquali in eadem proportione erunt. quod demonſtrare oportebat.



15.huius.

11.huius.

4.huius.

21.huius.

5.diff.

F. C. COMMENTARIVS.

Dico vt A ad C, ita eſſe D ad F] *in græco codice impreſſo hæc deſiderantur.* λέγω ὅτι ἐστὶν ὡς τὸ Α πρὸς τὸ Γ, οὕτω τὸ Δ πρὸς τὸ Ζ


Erit vt H ad L, ita K ad M. oſtenſum autem eſt vt G ad H, ita eſſe M ad N] *hoc loco in græco codice impeſſo, & in Zamberti verſione multa inſeruntur ſuperuacanea, quæ à nobis conſulto omiſſa ſunt.*

THEOREMA XXIIII. PROPOSITIO. XXIIII.

Si prima ad ſecundam eandem habeat proportionem, quam tertia ad quartam; habeat autem & quinta ad ſecundam proportionem eandem, quam ſexta ad quartam: & compoſita prima & quinta ad ſecundam eandem proportionem habebit, quam tertia, & ſexta ad quartam.

Prima enim A B ad ſecundam C eandem habeat proportionem, quam tertia D E ad quartam F. habeat autem & quinta B G ad ſecundam C proportionem eandem, quam ſexta E H ad quartam F. dico & compoſitam primam, & quintam A G ad ſecundam C eandem proportionem habere, quam tertiam, & quintam D H ad quartam


tam F.quoniam enim eſt vt BG ad C, ita EH ad F;erit conuertendo vt C ad BG, ita F ad EH. & quoniam vt AB ad C,ita eſt
22.huius. DE ad F, vt autem C ad BG,ita F ad EH; erit ex æquali vt AB ad BG,ita DE ad EH.quòd cum diuiſæ magnitudines ſint proportionales, & compoſitæ proportionales erunt. vt igitur AG
A. ad GB,ita eſt DH ad HE. ſed & vt GB ad C, ita EH ad F. ergo ex æquali vt AG ad C, ita erit DH ad F.ſi igitur prima ad ſecundam eandem habeat proportionem, quàm tertia ad quartam; habeat autem & quinta ad ſecundam proportionem eandem, quam ſexta ad quartam:& compoſita prima & quinta ad ſecundam eandem proportionem habebit, quam tertia & ſexta ad quartam.quod oſtendere oportebat.



THEOREMA XXV. PROPOSITIO. XXV.

Si quattuor magnitudines fuerint proportionales,maxima ipſarum, & minima duabus reliquis maiores erunt.

Sint quattuor magnitudines proportionales AB CD E F; & ſit vt AB ad CD,ita E ad F.ſit autem maxima ipſarum AB & F minima.Dico AB F ipſis CD E maiores eſſe.ponatur enim ipſi quidem E æqualis AG, ipſi vero F æqualis CH. Quoniam igitur eſt vt AB ad CD,ita E ad F;eſtq; AG æqualis E, & CH æqualis F;erit vt AB ad DC, ita AG ad CH. & quoniam vt tota AB
19.huius. ad totam CD, ita ablata AG ad ablatam CH; & reliqua GB ad reliquam HD erit vt tota AB ad CD totam. maior autem eſt AB,quàm CD.ergo & GB,quàm HD maior.quòd cum AG ſit æqualis ipſi E,& CH ipſi F;erunt AG F ipſis CH E æquales.ſi autem inæqualibus æqualia addantur, tota inæqualia erunt. ergo GB HD inæqualibus exiſtentibus,quippe cum GB ſit maior, ſi ipſi quidem GB addantur AG F, ipſi vero HD addantur CH E,fient AB F ipſis CD E neceſſario maiores.Si igitur quattuor
A. magnitudines fuerint proportionales,maxima ipſarum & minima duabus reliquis maiores erunt.quod demonſtrare oportebat.




F. C. COMMENTARIVS.

Ex iis, quae proxime demonſtrata ſunt, poſſumus etiam illud theorema demonſtrare.


Sit tres magnitudines fuerint proportionales, maxima ipſarum & minima quàm dupla reliquæ maiores erunt.

Sint tres magnitudines propartionales AB CD E, quarum maxima AB, ſitq; vt AB ad CD,ita CD ad E. Dico AB E maiores eſſe, quàm duplam ipſius CD.ponatur AF aequalis ipſi CD,& CG ipſi E. Quoniam igitur vt AB ad CD,ita CD ad E;erit vt AB ad CD, ita AF,ad CG,videlicet vt tota ad totam,&
19.huius. *ablata ad ablatam. quare & reliqua FB ad reliquam GD eſt, vt AB ad CD.ſed AB ponitur maior,quàm CD.ergo & FB, quàm GD eſt maior.aequalis autem eſt AF ipſi CD,& CG ipſi E. Sunt igitur AF. E ipſis CD CG aequales.quòd ſi inæqualibus aequalia addantur, tota inaequalia erunt.itaque additis AF. E ipſi FB,quę maior eſt,quàm GD, & additis CD CG ipſis GD, fient AB E maxima ſcilicet, & minima maiores, quàm dupla CD. Si igitur tres magnitudines fuerint proportionales maxima ipſarum & minima,quam dupla reliquae maiores erunt.quod demonſtrare oportebat.*



Aliter.

Aliter. Sint tres magnitudines proportionales ABC, & ipſi B ponatur æqualis D. Itaque quoniam eſt vt A ad B, ita B ad C, erit & vt A ad B, ita D ad C. ſunt igitur quattuor magnitudines proportionales ABDC. quare ex iam demonſtratis AC maiores erunt, quàm BD, hoc eſt quàm ipſius AB dupla.




Hæc Euclides de proportionibus ſcripta reliquit. Sed quoniam Archimedes, Apolloniuſq́, & alij poſteriores nonnullis theorematibus, quæ ad huiuſmodi tractationem pertinent, tamquam demonſtratis vtuntur; optimum fore iudicauimus, ſi ex collectionibus mathematicis Pappi ea in hunc locum transferremus, immutato tamen ordine, & quibuſdam additis, detractiſue, prout res ipſa exigere videbatur.

THEOREMA XXVI. PROPOSITIO. XXVI.

Si prima ad ſecundam maiorem habeat proportionem, quàm tertia ad quartam; & conuertendo ſecunda ad primam minorem proportionẽ habebit, quàm quarta ad tertiam.


Habeat AB ad BC maiorem proportionẽ, quàm DE ad EF. Dico CB ad BA minorem proportionem habere, quàm FE ad ED. vt enim AB ad BC, ita ſit DE ad aliam aliquã, vt ad G. ergo DE ad G maiorem habebit proportionem, quàm DE ad EF: ac propterea G minor erit, quàm EF. ponatur ipſi G æqualis EH. Quoniam igitur eſt vt AB ad BC, ita DE ad EH; erit conuertendo vt CB ad BA, ita HE ad ED. ſed HE ad ED minorem proportionem habet, quàm FE ad ED. ergo & CB ad BA minorem habebit proportionem, quàm FE ad ED. quod demonſtrare oportebat.



8. huius.

8. huius.

Similiter autem & ſi AB ad BC minorem proportionem habeat, quàm DE ad EF; demonſtrabimus conuertendo CB ad BA maiorem habere proportionem, quàm FE ad ED. ſed vt AB ad BC, ita ſit DE ad aliam, vt ad EG, quæ maior erit, quàm EF. quare conuertendo vt CB ad BA, ita GE ad ED. at GE ad ED maiorem habet proportionem, quàm FE ad ED. ergo CB ad BA maiorem proportionem habebit, quàm FE ad ED.



8. huius.


COROLLARIUM.

Ex his conſtat, ſi AB ad BC maiorem proportionem habeat, quàm DE ad EF, & FE ad ED maiorem habere proportionem, quàm CB ad BA. & ſi AB ad BC minorem habeat proportionem, quàm DE ad EF, & FE ad ED minorem proportionem habere, quàm CB ad BA.

THEOREMA XXVII. PROPOSITIO XXVII.


Si prima ad ſecundam maiorem proportionem habeat, quàm tertia ad quartam; & permutando prima ad tertiam maiorem habebit proportionem, quàm ſecunda ad quartam.

Habeat AB ad BC maiorem proportionem, quàm DE ad EF. Dico AB ad DE maiorem proportionem habere, quàm BC ad EF. vt enim AB ad BC, ita alia quædam GE



8.huius. sit ad EF. manifestum est eam maiorem esse,
8.huius. quàm DE. quare permutãdo vt AB ad GE, ita est BC ad EF. habet autem AB ad DE maiorem proportionem, quàm AB ad GE, hoc est quàm BC ad EF. ergo AB ad DE maiorem proportionem habebit, quàm BC ad EF. quod oportebat demonstrare.

Eadem ratione & si AB ad BC minorem habeat proportionem, quàm DE ãd EF; sequetur permutando AB ad DE minorem proportionem habere, quàm BC ad EF. erit enim vt AB ad BC, ita alia quędam GE




ad EF, quę minor sit, quam DE. Sed AB ad DE minorẽ habet proportionem, quàm AB ad GE, videlicet quàm BC ad EF. habebit igitur AB ad DE minorem, proportionem, quàm BC ad EF.

THEOREMA. XXVIII. PROPOSITIO. XXVIII.


Si prima ad secundam maiorem proportionem habeat, quàm tertia ad quartam; etiam componendo prima & secunda ad secundam maiorẽ proportionem habebit, quàm tertia & quarta ad quartam.

Habeat AB ad BC maiorem proportionem, quàm DE ad EF. Dico AC ad CB maiorẽ habere proportionem, quàm DF ad



8.huius. FE. vt enim AB ad BC, ita sit alia quędam
18.huius. GE ad EF. erit GE maior, quàm DE. quoniã
8.huius. igitur est vt AB ad BC, ita GE ad EF; erit componẽdo vt AC ad CB, ita GF ad FE.
13 huius. Sed GF ad FE maiorem proportionem habet, quàm DF ad FE. ergo & AC ad CB maiorem habebit proportionem, quàm DF ad FE. quod demonstrare oportebat.

Quòd si AB ad BC minorem proportionem habeat, quàm DE ad EF; habebit etiam componẽdo AC ad CB minorem proportionem, quàm DF ad FE. rursus enim quoniam




8.huius. AB ad BC minorem proportionem habet, quàm DE ad EF, si vt AB ad BC, ita sit alia quædam ad EF, velut GE, erit ea minor quàm DE; & vt AC ad CB, ita erit GF ad FE. Sed GF ad FE minorem habet proportionem, quàm DF ad FE. ergo & AC ad CB minorem proportionem habebit quàm DF ad FE.

THEOREMA XXIX. PROPOSITIO. XXIX.

Si prima & secunda ad secundam maiorem habeat proportionem, quàm tertia, & quarta ad quartam; & diuidendo prima ad secundam maiorem proportionem habebit, quàm tertia ad quartam.

Habeat AC ad CB maiorem proportionem, quàm DF ad FE. Dico AB ad BC maiorem proportionem habere, quàm D




8 huius. E ad EF. vt enim DF, ad FE, ita sit alia quę dam GC ad CB. erit vtique GC minor,

quàm

quàm AC: & diuidendo GB ad BC, vt DE ad EF. at AB ad BC maiorem proportionem habet, quàm GB ad BC. ergo & AB ad BC maiorem habebit proportionem, quàm DE ad EF. 17.huius. 13.huius.

Si vero AC ad CB minorem habeat proportionem, quàm DF ad FE; & diuidendo AB ad BC minorem proportionem habebit, quàm DE ad EF. si enim rursus sit vt DF ad FE, ita alia quædam GC ad CB; erit GC quàm AC maior: atque erit diuidendo GB ad BC, vt DE ad EF. habet autem AB ad BC minorem proportionem, quàm GB ad BC. ergo & minorem proportionem habebit, quàm DE ad EF.




8.huius. 17.huius.

THEOREMA XXX. PROPOSITIO XXX.


Si prima & secunda ad secundam maiorem proportionem habeat, quàm tertia & quarta ad quartam; per conuersionem rationis prima & secunda ad primam minorem habebit proportionem, quàm tertia, & quarta ad tertiam.

Habeat AC ad CB maiorem proportionem, quàm DF ad FE. Dico CA ab AB minorem habere proportionem, quàm FD ad DE. sit enim vt AC ad CB, ita DF ad aliam quādam, erit vtique ad minorem, quàm FE, velut ad FG. quare per conuersionem rationis vt CA ad AB, ita erit FD ad DG. sed FD ad DG minorem proportionem habet, quàm FD ad DE. ergo & CA ad AB minorem habebit proportionem, quàm FD ad DE.



Coiol.19.huius.


Similiter autem & si AC ad CB minorem proportionem habeat, quam DF ad FE; habebit per conuersionem rationis CA ad AB maiorem proportionem, quàm FD ad DE. erit enim vt AC ad CB, ita DF ad maiorem quàm FE. reliqua vero manifesta erunt.



THEOREMA XXXI. PROPOSITIO XXXI.

Si prima ad tertiam maiorem proportionem habeat, quàm secunda ad quartam, etiam prima ad tertiam habebit maiorem proportionem, quàm prima & secunda ad tertiam & quartam.

Habeat AB ad DE maiorem proportionem, quàm BC ad EF. Dico & AB ad DE maiorem proportionē habere, quàm AC ad DF. Sit enim vt AB ad DE, ita BC ad aliam. erit igitur ad minorem, quàm EF, velut ad EG. tota igitur AC ad totam DG est; vt AB ad DE. Sed AC ad DG maiorem proportionem habet, quàm ad DF. ergo AB ad DE maiorem habebit proportionem, quàm AC ad DF. et manifestum est totam AC ad totam DF minorem proportionem habere, quàm AB ad DE. & si minor sit proportio partis, totius maior erit.




12.huius. 8.huius.

THEOREMA XXXII. PROPOSITIO. XXXII.

Si tota ad totam maiorem habeat proportionem, quàm ablata ad ablatum

tam, & reliqua ad reliquam maiorem proportionem habebit, quàm tota ad totam.




Habeat AC ad DF maiorem proportionẽ, quàm AB ad DE. Dico & reliquam BC ad reliquam EF maiorem proportionem habere, quàm AC ad DF. Sit enim vt AC ad DF, ita AB ad DG. ergo et reliqua BC ad reliquam
19.huius. GF eſt vt AC ad DF. Sed BC ad EF maiorem proportionem habet, quàm ad FG. ergo et BC ad EF maiorem habebit proportionem, quàm AC ad DF.

Si uero AC ad DF minorem proportionem habeat, quàm AB ad DE, et reliqua BC ad reliquam EF minorem proportionem habebit, quàm AC ad DF, quod eodem, quo ſupra, modo oſtendetur.

THEOREMA XXXIII. PROPOSITIO XXXIII.

Si ſint tres magnitudines, & aliæ ipſis numero æquales, habeatque prima priorum ad ſecundam maiorem proportionem, quàm prima poſteriorum ad ſecundam; ſecunda vero priorum ad tertiam maiorem proportionem habeat, quàm ſecunda poſteriorum ad tertiam: etiam ex æquali prima priorum ad tertiam maiorem habebit proportionem, quàm prima poſteriorum ad tertiam.



Habeat A ad B maiorem proportionem, quàm D ad E, & B ad C maiorem proportionem habeat, quàm E ad F. Dico ex æquali A ad C maiorem habere proportionem, quàm D ad F. Quoniã enim A ad B maiorem proportionem habet, quàm D ad E; habe-
23.huius. bit permutando A ad D maiorem proportionem, quàm B ad E, et eadem ratione B ad E maiorem, quàm C ad F. ergo A ad D maiorem habet proportionem, quàm C ad F. et rurſus permutando A
Ex demonſtratis ad 23.huius. 23.huius. ad C maiorẽ habebit, quàm D ad F. quod oportebat demõſtrare.

Quòd ſi prima priorum ad ſecundam minorem habeat proportionem, quàm prima poſteriorum ad ſecundam; ſecũda vero priorum ad tertiam minorem proportionem habeat, quàm ſecũda poſteriorum ad tertiam: ſimiliter demõſtrabitur etiam ex æquali primam priorum ad tertiam minorem proportionem habere, quàm primam poſteriorum ad tertiam.

QVINTI LIBRI FINIS.

EVCLIDIS ELEMENTORVM LIBER SEXTVS

CVM SCHOLIIS ANTIQVIS, ET COMMENTARIIS


Federici Commandini Vrbinatis.


DIFFINITIONES.

I.




IMILES figurę rectilineæ ſunt, quę et ſingulos angulos æquales habent, et circa æquales angulos latera proportionalia.






II.

Reciprocę figuræ ſunt, quãdo in vtraque figura antecedẽtes, et conſequentes rationes fuerint.



F. C. COMMENTARIVS.

Per antecedentes, & conſequentes rationes intellige antecedentes, & conſequentes proportionis terminos: vt ſi ſint duo rectangula ABC DBE, ſitq; vt AB ad BD, ita EB ad BC; dicentur hae figurae reciprocae, ſeu ex contraria parte ſibi ipſis reſpondentes: quoniã in altera quidem eſt terminus antecedens primae proportionis, videlicet AB, et conſequens ſecundae BC; in altera vero eſt conſequens primae BD & antecedens ſecundae EB. ſunt autem dictae figurae etiam inter ſe aequales, vt deinceps oſtendetur.




Extrema

III.

Extrema ac media ratione secari recta linea dicitur, quando sit vt tota ad maiorem portionem, ita maior portio ad minorem.


F. C. COMMENTARIVS.

Extrema ac media ratione secari recta linea idcirco dicitur, quòd secetur in duas partes, quæ proportionis termini sunt, videlicet extremus et medius, nam tota primi termini locum obtinet. Sit enim recta linea AC ita diuisa in puncto B, erit AC primus terminus, AB medius, et BC extremus.



IIII.

Altitudo cuiusque figuræ est linea perpendicularis, quæ à vertice ad basim ducitur.




V.

Proportio ex proportionibus componi dicitur, quãdo proportionum quantitates inter se multiplicatę, aliquam efficiunt proportionem.

SCHOLIVM.


Proportio ex duabus proportionibus, vel ex pluribus componi dicitur, quando proportionum quantitates multiplicatæ faciunt aliquam proportionis quantitatem.

Habeat enim AB ad CD proportionem datam, vt duplam, vel triplam, vel aliam aliquam: CD vero ad EF similiter datam proportionem habeat. Dico proportionem AB ad EF compositam esse ex proportione AB ad CD, et proportione CD ad EF; vel si quantitas proportionis AB ad CD multiplicetur in proportionis CD ad EF quantitatem, facere quantitatem proportionis AB ad EF. Sit enim primũ AB maior, quàm CD, et CD quàm EF maior: Sitq; AB dupla CD, et CD ipsius EF tripla. Quoniã igitur CD quidem ipsius EF tripla est, ipsius autem CD dupla AB; erit AB ipsius EF sextupla: quoniã si triplum alicuius duplicabimus, fiet ipsius sextuplum. hoc enim proprie est compositio, vel hoc modo. Quoniam AB ipsius CD est dupla, diuidatur AB in partes æquales ipsi CD, quæ sint AG GB. et quoniam CD est tripla EF, æqualis autẽ AG ipsi GD; erit AG ipsius EF



tripla.

tripla. ideoq; tota AB ipsius EF sextupla est. quare proportio AB ad EF coniungitur per medium terminũ CD; composita ex proportione AB ad CD, & proportione CD ad EF. Similiter autem & si CD sit vtriusque AB EF minor, idẽ concludetur. Sit enim rursus AB quidem tripla ipsius CD, CD vero ipsius EF dimidia. & quoniam CD dimidia est ipsius EF, & ipsius CD tripla AB; erit AB sesquialtera ipsius EF. si enim dimidium alicuius triplicabimus, habebit ipsum semel, & eius dimidium. Et quoniã AB ipsius CD est tripla, CD vero dimidia EF; quarum partium ipsi CD æqualium AB est trium, earum est EF duarum. ergo AB sesquialtera est ipsius EF. proportio igitur AB ad EF connectitur per CD medium terminum, cõposita ex proportione AB ad CD, & proportione CD ad EF. Sed rursus sit CD vtriusque AB EF maior: & sit AB quidem ipsius CD dimidia, CD vero sesquitertia ipsius EF. Quoniã igitur quarum partium est AB duarum, earum CD est quattuor: quarum autem CD est quattuor, earum EF est trium: & quarum AB duarum, earumdem EF trium. Ergo proportio AB ad EF rursus connectitur per CD medium terminum; quę est duorum ad tria. Similiter et in pluribus, & in reliquis casibus. Et manifestum est, si à composita proportione vnus quiuis componentium auferatur, vno simplicium ejecto, reliquos componentium assumi.






FED. COMMANDINVS.

Lege Eutocium in commentarijs in quartam propositionem secundi libri Archimedis de sphæra & Cylindro, & in commentarijs in vndecimam propositionem primi libri conicorum Apollonij.

THEOREMA I. PROPOSITIO I.

Triangula & parallelogramma, quę eandem habent altitudinem, inter se sunt, vt bases.

Sint triangula quidẽ ABC ACD; parallelogramma vero EC CF, quæ eandem habeant altitudinem, videlicet perpendicularem à puncto A ad BD ductam. Dico vt basis BC ad CD basim, ita esse triangulum ABC ad triangulum ACD; & parallelogrammum EC ad CF parallelogrammum. producatur enim BD ex vtraque parte ad puncta H L, & ipsi quidem BC basi æquales quotcumque ponantur BG GH, ipsi vero basi CD ponãtur quotcũq; æquales DK KL, & AG AH AK AL iũgãtur. 38.huius. Quoniam igitur CB BG GH inter se æquales sunt; erunt & triãgula AHG AGB ABC inter se æqualia. ergo quotuplex est basis HC ipsius BC basis, totuplex est AHC triangulum trianguli ABC. Eadem ratione quotuplex est LC basis, ipsius basis CD, totuplex est & triangulum ALC ipsius ACD trianguli: et si æqualis est HC basis basi CL, & triangulum AHC triangulo ALC est æquale: & si basis HC basim CL superat, & triangulum AHC superabit triangulum ALC: & si minor, minus. Quattuor igitur magnitudinibus existentibus, videlicet duabus basibus BC CD, & duobus triangulis ABC ACD, sumpta sunt æquemultiplicia, basis quidem BC, & ABC trianguli, videlicet basis HC, & AHC triãgulum: basis vero CD, & trianguli ACD, alia vtcunque æque multiplicia, nempe CL basis, & ALC triangulum: atque ostensum




ſum eſt ſi HC baſis baſim CL ſuperat,& triangulũ AHC ſuperare triangulũ ALC;
5.diffi. quinti. & ſi æqualis,æquale;& ſi minor,minus.eſt igitur vt BC baſis ad baſim CD, ita triangulũ ABC ad ACD triãgulũ. Et qm̃ triãguli ABC duplũ eſt parallelogrãmũ EC,
41.primi. & triãguli ACD parallelogrammũ FC duplum; partes autem eodem modo multiplicium eandem inter ſe proportionem habent: erit vt ABC triangulum ad triangulum ACD,ita parallelogrammum EC ad CF parallelogrammum. Quoniam igitur oſtenſum eſt,vt baſis BC ad CD baſim,ita eſſe ABC triangulum ad triangulum ACD;vt autem ABC triangulum ad triangulum ACD,ita parallelogrammum EC
11 quinti. ad CF parallelogrammum:erit vt BC baſis ad baſim CD,ita parallelogrammum EC ad CF parallelogrammum. Quare triangula & parallelogramma, quæ eandem habent altitudinem inter ſe ſunt,vt baſes.quod demonſtrare oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

Sed & theorema illud verum eſt,quod demonſtrare hoc loco non putaui eſſe alienum.

Triangula & parallelogramma in æqualibus baſibus conſtituta, eandem inter ſe proportionem habent,quam eorum altitudines.



Sint duo triangula ABC DEF,& duo parallelogramma CG EH, quae aequales baſes habeãt BC EF:trianguli autem ABC,& parallelogrammi CG altitudo ſit AK:& trianguli DEF,& parallelogrammi EH altitudo DL.Dico vt AK ad DL, ita eſſe & triangulum ABC ad triangulum DEF, & parallelogrammum CG ad EH parallelogrammum. producantur BC EF,& ponantur baſi BC aequales quotcumque BM MN: & baſi EF aequales quotcumque FO OP, iungantúrq; AM AN DO DP: quot vero magnitudines ſunt in CN aequales baſi CB, tota ſumantur in linea Q aequales ipſi AK altitudini; & quot ſunt in EP aequales baſi EF,tot ſumantur in linea R aequales altitudini DL. Itaque quoniam triangula ANM AMB ABC ſunt in aequalibus baſibus conſtituta,& aequali altitudine;etiam inter ſe aequalia erunt. & eadem ratione triangula DEF DFO DOP erunt inter ſe aequalia.Quotuplex igitur eſt linea Q ipſius AK,totuplex eſt triãgulum ANC trianguli ABC: & quotuplex eſt linea R ipſius DL, totuplex eſt triangulum DPE trianguli DEF:& ſi Q ſit aequalis R,& triangulum ANC triangulo DPE aequale erit, ex premiſſa;erit namque altitudo AK, cuius tripla eſt Q aequalis altitudini DL, cuius ipſa R eſt tripla: ſi vero Q ſit maior,quàm R,& triangulum ANC maius erit,quàm triangulum DPE; et ſi minor, minus. triangulorum enim aequales baſes habentium,quae maiori ſunt altitudine, etiam maiora ſunt,alioquin ſequeretur totum parti aequale eſſe. Cum igitur quattuor ſint magnitudines, videlicet duae altitudines AK DL,& duo triangula ABC DEF:& ſumpta ſint aeque multiplicia, altitudinis quidem AK, & trianguli ABC; altitudinis vero DL,& trianguli DEF; alia vtcumque multiplicia: & oſtenſum ſit ſi linea Q ſuperat R,& triangulum ANC ſuperare triangulum DPE,& ſi aequalis, aequale;& ſi minor,minus:erit vt altitudo HA ad altitudinẽ DL,ita triangulũ ABC ad triangulum DEF. Sed trianguli ABC duplum eſt CC parallelogrammum, & trianguli DEF duplum parallelogrammum EH; partes autem eodem modo multiplicium eandem habent proportionem:erit parallelogrammum CG ad parallelogrammum EH, vt ABC triangulum ad triangulum DEF. Sed oſtenſum eſt vt altitudo AK ad altitudinem DL, ita eſſe triangulum ABC ad triangulum DEF.Vt igitur AK ad DL,ita eſt paralelogrammum CG ad EH parallelogrammum.Quare triangula,& parallelogramma in aequalibus baſibus conſtituta eandem inter ſe proportionem habent,quam eorum altitudines.quod demonſtrare oportebat.

Ex antecedente.


5.dif.quinti. 41.primi. 15.quinti.

THEO-

THEOREMA II. PROPOSITIO. II.

Si vni laterum trianguli parallela quædam recta linea ducta fuerit, proportionaliter secabit ipsius trianguli latera: & si trianguli latera proportionaliter secta fuerint, quæ sectiones coniungit recta linea reliquo trianguli lateri parallela erit.

Trianguli enim ABC vni laterum BC parallela ducatur DE. Dico vt BD ad DA, ita esse CE ad EA. Iungantur enim BE CD. triangulum igitur BDE triangulo CDE est æquale; in eadem enim sunt basi DE, & in eisdem DE BC parallelis: aliud autem triangulum est ADE: sed æqualia ad idem eandem habẽt proportionem. ergo vt triangulum BDE ad triãgulum ADE, ita est CDE triangulum ad triangulum ADE. Vt autem triangulum BDE ad triangulum ADE, ita est BD ad DA. nam cum eandem altitudinem habeant, videlicet perpendicularem à puncto E ad AB ductam, inter se sunt vti bases. & ob eandem caussam vt CDE triangulum ad triangulum ADE, ita CE ad EA. & vt igitur BD ad DA, ita est CE ad EA. Sed trianguli ABC latera AB AC proportionaliter secta sint, & vt BD ad DA, ita sit CE ad EA: & iungatur DE. Dico DE ipsi BC parallelam esse. ijsdem enim constructis, quoniam est vt BD ad DA, ita CE ad EA; vt autẽ BD ad DA, ita est BD E triangulum ad triangulũ ADE; et vt CE ad EA, ita CDE triangulum ad triangulum ADE: erit ut triangulum BDE ad triangulum ADE, ita CDE triangulum ad triangulum ADE. Quòd cum vtrumque triangulorum BDE CDE ad triangulum ADE eandem habeat proportionem; erit BDE triangulum triangulo CDE æquale; & sunt in eadem basi DE. æqualia autem triangula, & in eadem basi constituta, etiã in eisdem sunt parallelis. ergo DE ipsi BC parallela est. Si igitur vni laterum trianguli parallela quædam recta linea ducta fuerit, proportionaliter secabit ipsius triãguli latera: & si trianguli latera proportionaliter secta fuerint, quæ sectiones coniũgit recta linea reliquo triãguli lateri parallela erit. quod oportebat demonstrare.




37. primi.
7. quinti.
Ex antecedente.
11. quinti.
11. quinti.
9. quinti.
40. primi.

THEOREMA III. PROPOSITIO III.

Si trianguli angulus bifariam secetur, secans autem angulum recta linea, secet etiam basim; basis partes eandem proportionem habebunt, quam reliqua trianguli latera: & si basis partes eandem proportionem habeant, quam reliqua trianguli latera; quæ à vertice ad sectionem ducitur recta linea, trianguli angulum bifariam secabit.

Sit triangulum ABC, & secetur angulus BAC bifariam recta linea AD. Dico vt BD ad DC, ita esse BA ad AC. ducatur enim per C ipsi DA parallella CE, & producta BA conueniat cum ipsa in E puncto. Quoniam igitur in parallelas AD EC incidit recta linea quædã AC, erit ACE angulus angulo CAD æqualis. Sed CAD angulus ponitur æqualis angulo BAD. ergo & BAD ipsi ACE angulo æqualis erit. Rursus quoniam in parallelas AD EC recta linea BA E incidit, exterior angulus B A D æqualis est interiori A E C. ostensus aũt est & angulus ACE angulo BAD æqualis. ergo & ACE ipsi AEC




9. primi.
31. primi.
29. primi.

6.primi. Ex antecedente. 7.quinti. Ex antecedente. 9.quinti. 29.primi.

æqualis erit:ac propterea latus AE æquale lateri AC.Et quoniam vni laterum trianguli BCE,videlicet ipsi EC parallela ducta est AD; erit vt BD ad DC, ita BA ad AE: æqualis aũt est AE ipsi AC. est igitur vt BD ad DC,ita BA ad AC. Sed sit vt BD ad DC,ita BA ad AC:& AD iungatur. Dico angulũ BAC bifariã sectũ esse recta linea AD.ijsdem enim constructis quoniam est vt BD ad DC, ita BA ad AC; Sed & vt BD ad DC,ita BA ad AE,etenim vni laterum trianguli BCE, videlicet ipsi EC parallela ducta est AD:erit & vt BA ad AC,ita BA ad AE. ergo AC est æqualis AE, ac propterea & angulus AEC angulo ECA æqualis. Sed angulus quidem AEC est æqualis angulo exteriori BAD; angulus vero ACE æqualis alterno CAD.quare & BAD angulus ipsi CAD æqualis erit. angulus igitur BAC bifariam sectus est recta linea AD.Ergo si trianguli angulus bifariam secetur, secans autem angulum recta linea,etiam basim secet; basis partes eandem proportionem habebunt, quam reliqua trianguli latera: & si basis partes eãdem proportionem habeant,quam reliqua trianguli latera; quæ à vertice ad sectionem ducitur recta linea trianguli angulum bifariam secabit.quod oportebat demonstrare.

THEOREMA IIII. PROPOSITIO. IIII.

Aequiangulorum triangulorum latera,quæ circum æquales angulos,proportionalia sunt: et homologa siue eiusdẽ rationis sunt latera,quę æqualibus angulis subtenduntur.




Sint æquiangula triangula ABC DCE, quæ angulũ quidem ABC angulo DCE, angulum vero ACB angulo DEC æqualem habeant:et præterea angulũ BAC angulo CDE. Dico triangulorum ABC DCE proportionalia esse latera, quæ sunt circa æquales angulos, et homologa,siue eiusdem rationis latera esse, quæ æqualibus angulis subtenduntur. Ponatur enim BC in directum ipsi CE. Et quoniam anguli ABC ACB duobus 17.primi. rectis minores sunt:æqualis aũt est angulus ACB angulo DEC;erunt ABC DEC anguli duobus rectis minores. quare BA ED productæ inter se conuenient. producantur, et conueniant in puncto F. et quoniam angulus 28.primi. DCE est æqualis angulo ABC; erit BF ipsi DC parallela. Rursus quoniam æqualis est angulus ACB angulo DEC, parallela erit AC ipsi FE: parallelogrammum igi- 34.primi. 2.huius. tur est FACD; ac propterea FA quidem ipsi CD, AC vero ipsi FD est æqualis.Et quoniam vni laterũ trianguli FBE, videlicet ipsi FE parallela ducta est AC; erit 7.quinti. vt BA ad AF, ita BC ad CE. æqualis autem est AF ipsi CD. Vt igitur BA ad CD, ita BC ad CE: et permutando vt AB ad BC, ita DC ad CE. Rursus quoniam CD 2.huius. parallela est BF, erit vt BC ad CE, ita FD ad DE. Sed DF est æqualis AC. ergo vt BC ad CE, ita AC ad ED. permutando igitur vt BC ad CA, ita CE ad ED.Itaque quoniam ostensum est, vt AB ad BC, ita DC ad CE, ut autem BC ad CA, ita CE ad ED; erit ex æquali vt BA ad AC, ita CD ad DE. æquiangulorum igitur triangulorum proportionalia sunt latera, quę circum æquales angulos: et homologa, siue eiusdem rationis latera sunt, quę æqualibus angulis subtenduntur. quod demonstrare oportebat.

THEOREMA V. PROPOSITIO. V.

Si duo triangula latera proportionalia habeant, æquiangula erunt triangula, et æquales habebunt angulos, quibus homologa latera subtenduntur.

Sint



Sint duo triangula ABC DEF, quæ latera proportionalia habeant, ſitq́; ut AB quidem ad BC, ita DE ad EF; vt autem BC ad CA, ita EF ad FD: et adhuc vt BA ad AC, ita ED ad DF. Dico triãgulum ABC triangulo DEF æquiangulũ eſſe, et æquales habere angulos, quibus homologa latera ſubtenduntur, angulum quidem ABC angulo DEF, angulum vero BCA angulo EFD; et præterea angulum BAC angulo EDF. conſtituatur enim ad rectam lineam EF, et ad puncta in ipſa EF, angulo quidem ABC æqualis angulus FEG; angulo autem BCA angulus EFG. quare reliquus BAC angulus reliquo EGF eſt æqualis. Ideoq́; æquiangulum eſt triangulum A B C triangulo EGF. triãgulorum igitur ABC EGF proportionalia ſunt latera, quæ circum æquales angulos, et homologa latera ſunt, quę æqualibus angulis ſubtenduntur. ergo vt AB ad BC, ita GE ad EF. Sed vt A B ad B C, ita D E ad EF. Vt igitur DE ad EF, ita GE ad EF. Quòd cum vtraque ipſarum D E EG ad EF eandem proportionem habeat, erit DE ipſi EG æqualis. Eadem ratione et D F æqualis F G. Itaque quoniam DE eſt æqualis EG, cõmunis autem EF; duæ DE EF duabus GE EF æquales ſunt, et baſis DF baſi FG æqualis. angulus igitur DEF eſt æqualis angulo GEF, et DEF triangulum æquale triangulo GEF, et reliqui anguli reliquis angulis æquales, quibus æqualia latera ſubtenduntur. ergo angulus quidem DFE eſt æqualis angulo GFE, angulus vero EDF æqualis angulo EG F. Et quoniam angulus FED eſt æqualis angulo G EF, et angulus G E F angulo ABC; erit et angulus ABC angulo FED æqualis. Eadem ratione et angulus ACB æqualis eſt angulo DFE: et adhuc angulus ad A angulo ad D. ergo ABC triãgulum triangulo DEF æquiangulum erit. Si igitur duo triangula latera proportionalia habeant, æquiangula erunt triangula; et æquales habebũt angulos, quibus homologa latera ſubtenduntur. quod oportebat demonſtrare.

23. primi.

Ex antecedente.


11. quinti.

9. quinti.

8. primi.

THEOREMA VI. PROPOSITIO VI.

Si duo triangula vnum angulum vni angulo æqualem habeant, circa æquales autem angulos latera proportionalia; æquiangula erunt triangula, et æquales habebunt angulos, quibus æqualia latera ſubtenduntur.



Sint duo triangula ABC DEF vnum angulum BAC vni angulo EDF æqualẽ habentia, circa æquales autem angulos latera proportionalia, ſitq́; ut BA ad AC, ita ED ad DF. Dico triangulum ABC triangulo DEF æquiangulum eſſe, et angulum quidem ABC habere æqualem angulo DEF; angulum uero ACB angulo DFE. conſtituatur enim ad rectã lineam DF, et ad puncta in ipſa DF, alterutri angulorum BAC EDF æqualis angulus F D G: angulo autem A C B æqualis DFG. reliquus igitur qui ad B reliquo qui ad G eſt æqualis. ergo triangulum A BC triangulo DGF æquiangulum eſt, ac propterea vt BA ad AC, ita eſt GD ad DF. ponitur autem & vt BA ad AC, ita ED ad DF. Vt igitur ED ad DF, ita GD ad DF. quare ED æqualis eſt ipſi DG: & communis DF. ergo duę ED DF duabus GD DF


23. primi.

4. huius.

11. quinti.


9. quinti.

æquales ſunt: & angulus EDF angulo G
4.primi. DF eſt æqualis. baſis igitur EF eſt æqualis baſi FG: triangulumq; DEF æquale triangulo GDF, & reliqui anguli reliquis angulis æquales, alter alteri, quibus æqualia latera ſubtenduntur. ergo angulus quidem DFG eſt æqualis angulo DFE; angulus vero ad G angulo ad E. ſed angulus DFG æqualis eſt angulo ACB. & angulus igitur ACB angulo DFE eſt æqualis. ponitur autem & BAC angulus æqualis angulo EDF. ergo & reliquus qui ad B æqualis reliquo qui ad E. æquiangulum igitur eſt triangulum ABC triangulo DEF. Quare ſi duo triangula vnum angulum vni angulo æqualem habeant, circa æquales autem angulos latera proportionalia; æquiangula erunt triangula, & æquales habebunt angulos, quibus homologa latera ſubtenduntur. quod oſtendere oportebat.



F. C. COMMENTARIVS.


Sunt qui hoc etiam aliter demonſtrẽt. Nam impoſito latere DE lateri AB, cadet DF in AC, quoniam angulus ad punctum D angulo ad A eſt aequalis. Vel igitur DE eſt aequale ipſi AB, vel inæquale. & ſi quidem aequale, erit & DF aequale AC. ergo & baſis
4.primi. *EF baſi BC, & reliqui anguli reliquis angulis acquales. Si vero DE ſit inæquale ipſi AB, ſit vtrumuis ipſorum maius; verbi cauſſa AE. tunc vt BA ad AC, ſic ED ad DF. ergo permutando vt BA ad AE; ſic C*
4.huius. *A ad AF: & dividendo vt BE ad EA, ſic CF ad FA. quare latus EF*
29.primi. *parallelum eſt lateri BC, & idcirco angulus AEF angulo ABC, & angulus AFE angulo ACB eſt aequalis. quod oſtenſum oportuit.*



THEOREMA. VII. PROPOSITIO VII.

Si duo triangula vnum angulum vni angulo æqualem habeant, circa alios autem angulos latera proporrionalia, & reliquorum vtrumque ſimul, vel minorem, vel non minorem recto: æquiangula erunt triangula; & æquales habebunt angulos, circa quos latera ſunt proportionalia.

Sint duo triangula ABC DEF, vnum angulũ vni angulo æqualem habentia, videlicet angulũ BAC angulo EDF æqualem, circa alios autem angulos ABC DEF latera proportionalia, vt ſit DE ad EF, ſicut AB ad BC: & reliquornm qui ad CF. primum vtrumque ſimul minorem recto. Dico triangulum ABC triangulo DEF æquiangulum eſſe; angulumque ABC æqualem angulo DEF, & reliquum videlicet qui ad C reliquo qui ad F æqualem. Si enim inæqualis eſt angulus ABC angu-
23.primi. lo DEF, vnus ipſorum maior erit. Sit maior ABC: & conſtituatur ad rectam lineam AB, & ad punctum in ipſa B angulo DEF æqualis angulus ABG. Et quoniam angulus quidem A eſt æqualis angulo D, angulus vero ABG angulo DEF: erit reliquus AGB reliquo DFE æqualis. æquiangulum igitur eſt ABG triangulum triangulo D
4.huius. EF. quare vt AB ad BG, ſic DE ad EF: vtq; DE ad EF, ſic ponitur AB ad BC. & vt igitur AB ad BC, ſic AB ad BG. Quòd cum AB ad vtramque BC. BG eandem habeat




beat proportionem,erit BC ipſi BG æqualis:ac propterea angulus ad C eſt ęqualis angulo BGC.minor aũt recto ponitur angulus, qui ad C.ergo & BGC minor eſt recto,& ob id qui ei deinceps eſt AGB maior recto. atque oſtenſus eſt angulus AGB æqualis angulo,qui ad F.angulus igitur qui ad F recto maior eſt. atqui ponitur minor recto,quod eſt abſurdũ.nõ igitur inęqualis eſt angulus ABC angulo DEF.ergo ipſi eſt æqualis.eſt autẽ & angulus ad A ęqualis ei, qui ad D. quare & reliquus qui ad C æqualis reliquo qui ad F. æquiangulum igitur eſt ABC triangulum triangulo DEF.Sed rurſus ponatur vterque angulorum,qui ad C F non minor recto. Dico rurſus & ſic triangulum ABC triangulo DEF æquiangulum eſſe. ijſdem enim conſtructis ſimiliter demonſtrabimus BC æqualem ipſi BG,angulumq; ad C angulo BGC æqualem.ſed angulus qui ad C non eſt minor recto. nõ minor igitur recto eſt BGC .quare trianguli BGC duo anguli non ſunt duobus rectis minores. quod fieri nõ poteſt.nõ igitur rurſus inæqualis eſt ABC angulus angulo DEF.ergo æqualis neceſſario erit.eſt autẽ & qui ad A æqualis ei, qui ad D. reliquus igitur qui ad C reliquo qui ad F eſt ęqualis.ac propterea triangulum ABC triangulo DEF æquiangulum eſt. Si igitur duo triangula vnum angulum vni angulo æqualem habeant, circa alios autem angulos latera proportionalia, & reliquorum vtrumque ſimul, vel minorem,vel non minorem recto: æquiangula erunt triangula,& æquales habebunt angulos,circa quos proportionalia ſunt latera. quod oportebat demonſtrare.

9.quinti. 5.primi. 13.primi. 17.primi.

THEOREMA VIII. PROPOSITIO. VIII.

Si in triangulo rectangulo ab angulo recto ad baſim perpendicularis ducatur; quæ ad perpendicularem ſunt triangula & toti & inter ſe ſimilia ſunt.



Sit triangulum rectangulum A B C, rectum habens angulum B A C: et à puncto A ad BC perpendicularis ducatur A D. Dico triangula ABD A D C toti triangulo A B C, et interſe ſimilia eſſe. Quoniam enim angulus B A C eſt ęqualis angulo A D B, rectus enim vterque eſt: et angulus qui ad B communis duobus triãgulis ABC ABD: erit reliquus ACB reliquo BAD æqualis. ęquiangulum igitur eſt triangulum ABC triangulo ABD. quare vt BC, quæ ſubtendit angulum rectum trianguli ABC,ad BA ſubtendentem angulum rectum trianguli ABD, ſic ipſa AB ſubtendens angulum qui ad C trianguli ABC, ad BD ſubtendentem angulũ ęqualem angulo, qui ad C, videlicet BAD ipſius ABD trianguli: et adhuc AC ad AD ſubtendentem angulum qui ad B, communem duobus triangulis. ergo triangulum ABC triangulo ABD ęquiangulum eſt; et circa æquales angulos latera habet proportionalia. Simile igitur eſt triangulum ABC triangulo ABD. Eadem ratione demonſtrabimus etiam ADC triangulum triangulo ABC ſimile eſſe. Quare vtrumque ipſorum ABD ADC toti ABC triangulo eſt ſimile. Dico inſuper triangula ABD ADC etiam inter ſe ſimilia eſſe. Quoniam enim angulus B D A rectus, eſt æqualis recto ADC. Sed et BAD oſtenſus eſt æqualis ei, qui ad C; erit reliquus qui ad B reliquo DAC æqualis. æquiangulum igitur eſt triangulum ABD triangulo ADC.ergo vt B D trianguli ABD ſubtendens B A D angulum ad D A trianguli ADC ſubtendentem angulum,qui ad C,æqualem angulo BAD, ſic ipſa AD trianguli ABD ſubtendens angulum, qui ad B, ad D C ſubtendentem angulum D A C ei, qui ad B,æqualem: et adhuc BA ad A C ſubtendentem angulum rectum ADC. Simile igitur eſt A B D triangulum triangulo A D C. Quare ſi in triangulo rectãgulo ab angulo recto ad baſim perpeudicularis ducatur; quę ad perpendicularem ſunt triangula, et toti, et inter ſe, ſimilia ſunt. quod oportebat demonſtrare.

4.huius. 1.diffi.huius

COROLLARIVM.

COROLLARIVM.


Ex hoc manifeſtum eſt, ſi in triangulo rectangulo ab angulo recto ad baſim perpendicularis ducatur; ductam baſis partium mediam proportionalem eſſe: et adhuc baſis et vniuscuiuſque partium, latus quod ad partem, medium eſſe proportionale. quod demonſtrare oportebat.

PROBLEMA I. PROPOSITIO IX.

A data recta linea imperatam partem abſcindere.

Sit data recta linea AB. oportet ab ipſa AB imperatam partem abſcindere. Imperetur pars tertia: et ducatur à puncto A quædam recta linea AC, quæ cum ipſa AB angulum quemlibet contineat; ſumaturq; in AC quod vis punctum D, et ipſi AD æquales ponantur DE EC. deinde iungatur BC; et per D ipſi BC parallela ducatur DF. Itaque quoniã vni laterum triãguli ABC, videlicet ipſi BC parallela ducta eſt FD; erit vt CD ad DA, ita BF ad FA; dupla autem eſt CD ipſius DA. ergo et BF ipſius FA dupla erit. tripla igitur eſt BA ipſius AF. Quare à data recta linea AB imperata tertia pars AF abſciſſa eſt. quod facere oportebat.

2. huius.




PROBLEMA II. PROPOSITIO X.

Datam rectam lineam inſectam, datæ rectæ lineæ ſectæ ſimiliter ſecare.

Sit data quidem recta linea inſecta AB, ſecta vero AC. oportet rectam lineam AB inſectam ipſi AC ſectæ ſimiliter ſecare. Sit ſecta AC in punctis D E, & ponantur ita, ut angulũ quem vis contineant, iunctaq; BC per puncta quidem DE ipſi BC parallelæ ducãtur DF EG: per D vero ipſi AB ducatur parallela DHK. parallelogrammum igitur eſt vtrumque ipſorum FH HB: ac propterea DH quidem eſt æqualis FG, HK vero ipſi GB. Et quoniam vni laterum trianguli DKC, ipſi ſcilicet KC parallela ducta eſt HE; erit vt CE ad ED, ita KH ad KD. æqualis autem eſt KH quidẽ ipſi BG, HD vero ipſi GF. eſt igitur vt CE ad ED, ita BG ad GF. Rurſus quoniam vni laterum trianguli AGE, nimirum ipſi EG parallela ducta eſt FD, vt ED ad DA, ita erit GF ad FA. Sed oſtenſum eſt ut CE ad ED, ita eſſe BG ad GF. vt igitur CE ad ED, ita eſt BG ad GF: & vt ED ad DA, ita GF ad FA. Ergo data recta linea inſecta AB datæ rectæ lineæ ſectæ AC ſimiliter ſecta eſt. quod facere opottebat.

34 primi.

2. huius.



F. C. COMMENTARIVS.


Huic non diſſimile eſt, quod docuit Pappus in ſeptimo libro mathematicarum collectionum.

Datam rectam lineam in datam proportionem ſecare.

Sit data quidem recta linea AB: data autem proportio quam habet C ad D: & oporteat ſecare AB in proportionem C ad D. Inclinetur ad AB in quouis angulo recta linea AE: & ipſi quidem C æqualis abſcindatur AF; ipſi vero D æqualis FG: &


iuncta

iuncta BC ducatur FH ei parallela. Quoniã igitur vt AH ad HB, ita eſt AF ad FG: eſt aũt AF æqualis C, & FG ipſi D: erit vt AH ad HB, ita C ad D. Ergo AB ſecta eſt ad punctum H in proportionem C ad D. quod facere oportebat. 2.huius.



Ex ijs, quæ tum in quinto libro tum hoc loco tradita ſunt, licebit problema abſoluere, quod ad quartam propoſitionẽ quarti libri nos facturos recepimus.

In dato triãgulo quadratũ deſcribere.



Sit datum triangulum ABC, in quo oporteat quadratum deſcribere. vel igitur datũ triangulum acutiangulum eſt, vel rectangulum, vel obtuſiangulum. Sit primũ acutiangulum, atque à puncto B ad AC perpendicularis ducatur BD: & ex præmiſſa diuidatur BD in puncto E, ita vt DE ad EB eandẽ proportionem habeat, quam AC ad BD. deinde per E ducatur FG ipſi AC parallela, & à punctis FG ducantur FH GK parallelae ipſi BD. Quoniam igitur in triangulo ABD ducta eſt FE ipſi AD parallela. erit angulus BEF angulo BDA æqualis; & angulus BFE æqualis angulo BAD: atque eſt angulus FBE vtrique communis. ergo FBE triangulum triangulo ABD æquiangulum eſt. Similiter demonſtrabimus triangulum EBG æquiangulum ipſi DBC. Vt igitur AD ad DB, ita eſt FE ad EB, & vt BD ad DC, ita BE ad EG. quare ex æquali vt AD ad DC, ita FE ad EG: & componendo vt AC ad CD, ita FG ad GE; conuertendoq; vt DC ad CA, ita EG ad GF. Sed vt BD ad DC, ita eſt BE ad EG. ergo ex æquali, vt BD ad AC, ita BE ad FG. Itaque cũ ſit vt AC ad BD, ita DE ad EB, erit rurſus ex æquali vt AC ad ſe ipſam, ita DE, hoc eſt HF ad FG. ergo HF ipſi FG eſt æqualis; ac propterea omnes HF FG GK KH inter ſe æquales ſunt. Et quoniam FH eſt parallela ipſi BD: eſtq; angulus BDA rectus; & ipſe KHF rectus erit. eadem ratione cum FG ſit parallela AC, erit & HFG angulus rectus. Ergo & ipſis oppoſiti FGK GKH recti ſint neceſſe eſt. quadratum igitur eſt ipſum FGKH: & deſcriptum eſt in triangulo ABC. Non aliter in triangulo rectangulo, vel obtuſiangulo quadratum deſcribemus, ab angulo recto, vel obtuſo ad latus oppoſitum perpendicularem ducentes. Quòd ſi in triangulo rectangulo quadratum deſcribere libeat, ita vt duo quadrati latera duobus lateribus trianguli nitantur, vt in ſubiecta figura, vtemur altera perpendiculari, quæ eſt trianguli latus, vi delicet BA, & ſimiliter diuidetur AB in F, ita vt AF ad FB eandem proportionem habeat, quã CA ad AB; ducaturq; FG parallela ipſi AC, & GK parallela BA. Et quoniam in triangulo BAC ducta eſt FG ipſi AC parallela; ſimiliter demonſtrabimus triangulum BFG triangulo BAC æquiangulum eſſe. quare vt BA ad AC, ita BF ad FG. eſt autem vt CA ad AB, ita AF ad FB. ex æquali igitur, vt CA ad ſe ipſam, ita AF ad FG; ideoq; AF FG inter ſe æquales ſunt. Et ex ijs, quæ proxime diximus, ſequetur AFGK quadratum eſſe, quod deſcriptum eſt in triangulo ABC, atque illud eſt, quod feciſſe oportuit.


29.primi. 4.huius. 22.quinti. 18.quinti. 4.quinti. 34 primi. 29.primi. 34.primi. 2.huius. 4.huius.

PROBLEMA III. PROPOSITIO XI.

Duabus datis rectis lineis tertiam proportionalem inuenire.

Sint datæ duæ rectæ lineæ AB AC, & ponantur ita, vt angulum quem uis contineant. oportet ipſarum AB AC tertiam proportionalem inuenire. producantur enim


enim AB AC ad puncta DE: ponaturq; ipsi AC æqualis BD. & iuncta BC, ducatur per D ipsi BC parallela DE. Quoniam igitur uni laterum trianguli ADE, uidelicet ipsi DE parallela ducta est BC, erit vt AB ad BD, ita AC ad CE. æqualis autem est BD ipsi AC. vt igitur BA ad AC, ita est AC ad CE. Quare datis rectis lineis AB AC tertia proportionalis inuenta est CE. quod facere oportebat.



PROBLEMA IIII. PROPOSITIO XII.

Tribus datis rectis lineis quartam proportionalem inuenire.

Sint datæ tres rectæ lineæ A B C. oportet ipsarum A B C quartam proportionalem inuenire. Exponantur duæ rectæ lineæ DE DF angulum quemuis EDF continentes: & ponatur ipsi quidem A æqualis DG, ipsi vero B æqualis GE, & ipsi C æqualis DH: iunctaq; GH per E ipsi parallela ducatur EF. Itaque quoniam uni laterum trianguli DEF, nimirum ipsi EF parallela ducta est GH, erit vt DC ad GE, ita DH ad HF. est autem DG ipsi A aequalis, GE vero æqualis B: & DH æqualis C. Vt igitur A ad B, ita C ad HF. Quare datis tribus rectis lineis A B C quarta proportionalis inuenta est H F. quod facere oportebat.




a. huius.

FED. COMMANDINVS EX PAPPO.

Tribus datis rectis lineis AB BC & D, Inuenire vt AB ad BC, ita aliam quandam ad ipsam D.

Rursus inclinetur recta linea CH in quouis angulo & abscindatur CF aequalis D: iunctaque BF, ipsi parallela ducatur AG. ergo rursus vt AB ad BC, ita erit GF ad FC, hoc est ad D. Inuenta igitur est FG. quod facere oportebat.




PROBLEMA. V. PROPOSITIO. XIII.

Duabus datis rectis lineis mediam proportionalem inuenire.

Sint datæ duæ rectæ lineæ AB BC, oportet ipsarum AB BC mediam proportionalem inuenire. ponantur in directum, & in ipsa AC describatur semicirculus ADC, ducatur; à puncto B ipsi AC ad rectos angulos BD, & AD DC iungãtur. Quoniam igitur in semicirculo est angulus ADC, is rectus est. & quoniam in triangulo rectangulo ADC ab angulo recto ad basim perpendicularis ducta est DB, erit DB basis partium AB BC media proportionalis. Duabus igitur datis rectis lineis AB BC media proportionalis inuenta est DB. quod facere oportebat.

31. tertij.

Cor. 8. huius





THEO-

THEOREMA. IX. PROPOSITIO. XIIII.

Aequalium et vnum vni ęqualem habentium angulum parallelogrammorum latera, quæ circum æquales angulos, ex contraria parte ſibi ipſis reſpondent: et quorum parallelogrammorum vnum vni æqualem habentium angulum latera, quæ circum æquales angulos, ex contraria parte ſibi ipſis reſpondent; ea inter ſe ſunt æqualia.

Sint æqualia parallelogrāma AB BC, æquales habentia angulos ad B, et ponantnr in directum DB B E. ergo et indirectnm erunt FB BG. Dico parallelogrammorum AB BC latera, quæ ſunt circumęquales angulos ex contraria parte ſibi ipſis reſpondere: hoc eſt ut D B ad B E, ita eſſe G B ad B F. compleatur enim parallelogrammum FE. et qm̃ parallelogrāmū A B æquale eſt parallelogrāmo B C, aliud autem aliquod eſt FE parallelogrammum; erit vt AB ad FE, ita BC ad F E. Sed vt AB quidem ad F E, ita eſt DB ad BE; vt autem BC ad FE, ita GB ad BF. et ut igitur DB ad BE, ita GB ad BF. ergo parallelogrammorum AB BC latera, quę circū ęquales angulos ex contraria parte ſibi ipſis reſpondent. Sed ex contraria parte ſibi ipſis reſpondeant latera, quæ circū æquales angulos: ſitq; vt D B ad BE, ita G B ad BF. Dico parallelogrāmum A B parallelogrāmo BC æquale eſſe. Qm̃ enim eſt vt DB ad BE, ita GB ad BF, ut autem DB ad B E, ita A B parallelogrammum ad parallelogrammum F E: et ut GB ad BF, ita BC parallelogrammum ad parallelogrammum FE; erit et vt AB ad F E, ita BC ad F E. ęquale igitur eſt A B parallelogrammum parallelogrammo BC. ergo ęqualium et vnum vni ęqualem habentium angulum parallelogrāmorū latera, quę circum æquales angulos, ex contraria parte ſibi ipſis reſpondent: et quorum parallelogrammorum vnum vni ęqualem habentium angulum latera, quæ circum ęquales angulos, ex contraria parte ſibi ipſis reſpondent; ea inter ſe ſunt æqualia. quod oportebat demonſtrare.





7.quinti. 1.huius. 11.quinti.

1.huius. 11.quinti. 9.quinti.

F. C. COMMENTARIVS.

Ergo & indirectum erunt FB BG.] *Sunt enim anguli FBD FBE aequales duobus rectis; ſed angulus EBG ponitur aequalis angulo FBD. anguli igitur FBE, EBG duobus rectis ſunt ęquales, ac propterea rectae lineę FB BG in directum ſibi ipſis erunt.* 14.primi.

THEOREMA X. PROPOSITIO. XV.


Aequalium, et vnum vni ęqualem habentium angulum triangulorum latera, quæ circum ęquales angulos, ex contraria parte ſibi ipſis reſpondent: et quorum triangulorum vnum vni æqualem habentium angulum latera, quę circum æquales angulos, ex contraria parte ſibi ipſis reſpondent, ea inter ſe ſunt ęqualia.

Sint triangula ABC ADE vnum angulum vni angulo ęqualem habentia, angu-

lum ſcilicet BAC angulo DAE. Dico triangulorum ABC ADE latera, quę circum æquales angulos ex contraria parte ſibi ipſis reſpondere, hoc eſt vt CA ad AD, ita eſſe EA ad A B. ponantur enim ita vt in di

14.primi. rectum ſit CA ipſi AD. ergo et EA ipſi AB in directum erit; et iungatur B D. Quoniã igitur triangulum A B C æquale eſt trian-

7.quinti. lo ADE, aliud autẽ eſt ABD; erit vt CAB triangulum ad triangulum BAD, ita trian gulum ADE ad triangulum B A D. Sed vt



triangulum quidem CAB ad BAD trian-

1.huius. gulum, ita C A ad A D: ut autem trian-

11.quinti. gulum EAD ad ipſum BAD, ita E A ad A B. et ut igitur CA ad AD, ita EA ad AB. Quare triangulorum ABC ADE latera, quæ circum æquales angulos ex contraria parte ſibi ipſis reſpondent. Sed ex contraria parte ſibi ipſis reſpondeant latera triã gulorum ABC ADE: et ſit vt CA ad AD, ita EA ad AB. Dico triangulum ABC triangulo ADE æquale eſſe. Iuncta enim rurſus BD, quoniam vt C A ad A D, ita

1.huius. eſt EA ad AB; ut autem C A ad A D, ita ABC triangulum ad triangulum B A D;

11.quinti. et ut EA ad AB, ita triangulum EAD ad BAD triangulum: erit ut ABC triangulum ad triangulum BAD, ita triangulum EAD ad BAD triãgulum. Vtrumque igitur triangulorum ABC ADE ad triangulum BAD eandem habet proportionẽ;

9.quinti. ac propterea æquale eſt ABC triangulum triangulo ADE. æqualium igitur et vnũ vni æqualem habentium angulum triangulorum latera, quæ circum æquales angulos, ex contraria parte ſibi ipſis reſpondent: et quorum triangulorum vnũ vni æqua lem habentium angulum latera, quæ circum æquales angulos ex contraria parte ſi bi ipſis reſpondent, ea inter ſe ſunt æqualia. quod demonſtrare oportebat.

SCHOLIVM.


Aequiangulis dumtaxat triangulis contingit proportionalia latera habere, non etiam latera ex contraria parte ſibi ipſis proportione reſpondentia. Aequalibus autem, et æquiangulis latera quoque ex cõtraria parte reſpondentia habere contingit; æqualia enim ſunt & latera: æqualitatis autem proportio ad ſe ipſam conuertitur, hoc eſt ex antecedente ſumpto & conſequente eadem eſt, & differens. At æqualibus quidem, & vnum angulum æqualem habentibus contingit ſolum latera habere ex cõtraria parte reſpondentia, non tamen omnia, ſed quæ circum æquales angulos conſiſtunt. Quare alia quidem ſolum proportionalia habent latera, alia vero & proportionalia, & ex contraria parte reſpondentia. & ſunt prima quidem æquiangula & non æqualia: ſecunda vero æqualia, & vnum angulum habentia æqualem, non tamen æquiangula: reliqua autem & æqualia, & æquiangula ſunt.

THEOREMA XI. PROPOSITIO. XVI.

Si quattuor rectæ lineæ proportionales fuerint, rectangulum extremis contentum æquale eſt ei rectangulo, quod medijs continetur: & ſi rectangulum extremis contentum æquale fuerit ei, quod medijs cõtinetur, quattuor rectæ lineæ proportionales erũt.

Sint

Sint quattuor rectæ lineæ proportionales AB CD E F, ſitque vt AB ad CD, ita E ad F. Dico rectangulum contentum rectis lineis AB F æquale eſſe ei, quod ipſis CD E continetur. Ducantur enim à punctis A C ipſis AB CD ad rectos angulos AG CH: ponaturq; ipſi quidem F æqualis AG: ipſi vero E æqualis CH: & compleantur BG DH parallelogramma. Quoniam igitur eſt vt AB ad CD, ita E ad F; eſt autem E æqualis CH, & F ipſi AG: erit vt AC ad CD, ita CH ad AG. parallelogrammorum igitur BG DH latera, quæ circum æquales angulos ex contraria parte ſibi ipſis reſpondent. quoniam autem æquiangulorum parallelogrammorum latera, quę circum æquales angulos ex contraria parte ſibi ipſis reſpondent, ea inter ſe ſunt æqualia. ergo parallelogrammum BG æquale eſt parallelogrammo DH. atque eſt parallelogrammum quidem BG, quod rectis lineis AB F continetur: eſt enim AG æqualis F: parallelogramũ vero DH quod cõtinetur ipſis CD E; cum CH ipſi E ſit æqualis. rectangulum igitur contentum AB F eſt æquale ei, quod ipſis CD E continetur. Sed rectangulum contentum AB F ſit æquale ei, quod CD E continetur. Dico quattuor rectas lineas proportionales eſſe, videlicet vt AB ad CD, ita E ad F. ijſdem enim conſtructis quoniam rectangulum contentum AB F eſt æquale ei, quod CD E continetur: atque eſt contentum quidem AB F rectangulum BG; etenim AG eſt æqualis F: contentum vero CD E eſt rectangulum DH, quod CH ipſi E ſit æqualis: erit parallelogrammum BG æquale parallelogrammo DH: & ſunt æquiangula. æqualium autem, & æquiangulorum parallelogrammorum latera, quæ circum æquales angulos ex contraria parte ſibi ipſis reſpondent. quare vt AB ad CD, ita CH ad AG: æqualis autem eſt CH ipſi E, & AG ipſi F. Vt igitur AB ad CD, ita E ad F. Ergo ſi quattuor rectæ lineę proportionales fuerint, rectangulũ extremis contentum æquale eſt ei, quod medijs continetur: & ſi rectangulum extremis contentum æquale fuerit ei, quod medijs continetur, quattuor rectæ lineę proportionales erunt. quod oportebat demonſtrare.




14. huius.

14. huius.

THEOREMA XII. PROPOSITIO XVII.

Si tres rectæ lineæ proportionales fuerint, rectangulum extremis contentum æquale eſt ei, quod à media fit, quadrato: & ſi rectangulum extremis contentum æquale fuerit ei, quod à media fit, quadrato; tres rectę lineæ proportionales erunt.


Sint tres rectæ lineæ proportionales A B C: & ſit vt A ad B, ita B ad C. Dico rectãgulum cõtentũ A C æquale eſſe ei, quod à media B fit, quadrato. ponatur ipſi B æqualis D. Et quoniam vt A ad B, ita B ad C, æqualis autem B ipſi D; erit vt A ad B, ita D ad C. Si autem quattuor rectę lineę proportionales fuerint rectangulum extremis cõtentum eſt æquale ei, quod medijs continetur. ergo rectangulum AC contentum eſt æquale ei, quod continetur BD. Sed rectangulum contentum BD eſt æquale quadrato, quod fit ex ipſa B; etenim B eſt æqualis D. rectangulum igitur contentum A C eſt æquale ei, quod ex B fit, quadrato. Sed rectangulum contentum AC æquale ſit quadrato, quod fit ex B. Dico vt A ad B, ita eſſe B ad C. ijſdem enim conſtructis



7. quinti. Ex antecedente.

quoniam rectangulum contentum AC æquale eſt quadrato; quod fit ex B; at quadratum, quod fit ex B eſt rectangulum, quod ipſis BD continetur, eſt enim B æqualis ipſi D: erit rectangulum contentum A C æquale ei, quod BD continetur. Si autem rectãgulum extremis contentum æquale fuerit ei, quod medijs cõtinetur, quattuor rectæ lineæ proportionales erunt. eſt igitur vt A ad B, ita C ad D. æqualis autem B ipſi D. ergo vt A ad B, ita B ad C. Si igitur tres rectæ lineę proportionales fuerint, rectangulum extremis contentum eſt æquale ei, quod à media fit, quadrato: & ſi rectangulum extremis contentum æquale fuerit ei, quod à media fit, quadrato, tres rectæ lineę proportionales erunt. quod oportebat demonſtrare.

Ex antecedente.



PROBLEMA VI. PROPOSITIO. XVIII.

A data recta linea dato rectilineo ſimile, & ſimiliter poſitum rectilineum deſcribere.


Sit data recta linea AB; datum autem rectilineũ CE. oportet à recta linea AB rectilineo CE ſimile, & ſimiliter poſitũ rectilineũ deſcribere. Iungatur DF, & ad rectam lineã AB, & ad pũcta in ipſa AB, angulo quidẽ C æqualis angulus conſtituatur GAB; angulo autem CDF angulus ABG. reliquus igitur CFD angulus reliquo AGB eſt æqualis. ergo æquiangulum eſt FCD triangulum triangulo GAB; ac propterea vt FD ad GB, ita FC ad GA, & CD ad AB. Rurſus cõſtituatur ad rectã lineam BG, & ad puncta in ipſa BG angulo quidem DFE æqualis angulus BGH; angulo autem FDE æqualis GBH. ergo reliquus qui ad E reliquo qui ad H eſt æqualis. æquiangulum igitur eſt triangulum FDE triangulo GBH. quare vt FD ad GB, ita FE ad GH, & ED ad HB. oſtenſum autem eſt & vt FD ad GB, ita FC ad GA, & CD ad AB. & vt igitur FC ad AG, ita CD ad AB; & FE ad GH, & adhuc ED ad HB. itaque quoniam angulus quidem CFD eſt æqualis angulo AGB; angulus autem DFE angulo BGH: erit totus CFE angulus toti AGH æqualis. Eadem ratione & CDE eſt æqualis ipſi ABH; & præterea angulus quidem ad C angulo ad A æqualis, angulus vero ad E angulo ad H. æquiangulum igitur eſt AH ipſi CE, & latera circum æquales ipſi angulos habet proportionalia. Ergo rectilineum AH rectilineo GE ſimile erit. A data igitur recta linea AB dato rectilineo CE ſimile & ſimiliter poſitum rectilineum AH deſcriptũ eſt. quod facere oportebat.

23. primi.

4. huius.

4 huius. 11. quinti.

Diffi. 11 huius.




THEOREMA XIII. PROPOSITIO. XIX.

Similia triangula inter ſe ſunt in dupla proportione laterum homologorum.

Sint ſimilia triangula ABC DEF habentia angulum ad B æqualẽ angulo ad E. & ſit vt AB ad BC, ita DE ad EF; ita vt latus BC homologũ ſit lateri EF. Dico ABC triãgulum ad triangulum DEF duplam proportionem habere eius, quam habet BC ad EF.

EF. Sumatur enim ipſarum BC EF tertia proportionalis BG, vt ſit, ſicut BC ad EF, ita EF ad BG: & iũgatur GA. Quoniã igitur vt AB ad BC, ita eſt DE ad EF; erit permutando vt AB ad DE, ita BC ad EF. Sed vt BC ad EF, ita EF ad BG. & vt igitur AB ad DE, ita EF ad BG. quare triangulorum ABG DEF latera, quæ circum æquales angulos ex contraria parte ſibi ipſis reſpondent. quorum autem triangulorum vnum vni æqualem habentium angulum latera, quæ circum æquales angulos ex contraria parte ſibi ipſis reſpondent, ea inter ſe æqualia ſunt. æquale igitur eſt ABG triangulum triangulo DEF. Et quoniam eſt vt BC ad EF, ita EF ad BG; ſi autem tres rectæ lineæ proportionales ſint, prima ad tertiam duplam proportionem habet eius, quam habet ab ſecundam: habebit BC ad BG duplam proportionem eius, quam habet BC ad EF. Vt autem BC ad BG, ita ABC triangulum ad triangulum ABG. ergo & ABC triangulum ad triangulum ABG duplam proportionem habet eius, quam BC ad EF. eſt autem ABG triangulum triangulo DEF æquale. & triangulum igitur ABC ad triangulum DEF duplam proportionem habebit eius, quam habet BC ad EF. Quare ſimilia triangula inter ſe in dupla ſunt proportione laterum homologorum. quod oſtendere oportebat.



11. huius.
11. quinti.
15. huius.
Diffinit. 10. quinti.
1 huius.


COROLLARIVM.

Ex hoc manifeſtum eſt, ſi tres rectæ lineæ proportionales fuerint, vt prima ad tertiam, ita eſſe triangulum, quod fit à prima ad triangulum, quod à ſecunda ſimile, & ſimiliter deſcriptum: quoniam oſtenſum eſt vt CB ad BG, ita ABC triangulum ad triangulũ ABG, hoc eſt ad triangulũ DEF. quod oſtendere oportebat.


THEOREMA XIIII. PROPOSITIO XX.

Similia polygona in ſimilia triangula diuiduntur, & numero æqualia, & homologa totis: & polygonum ad polygonum duplam proportionem habet eius, quam latus homologum habet ad homologum latus.

Sint ſimilia polygona ABCDE FGHKL, & ſit AB homologum ipſi FG. Dico polygona ABCDE FGHKL in ſimilia triangula diuidi, & numero æqualia, & homologa totis: & polygonum ABCDE ad polygonum FGHKL duplam proportionem habere eius, quam habet AB ad FG. Iungantur BE EG GL LH. & quoniam ſimile eſt ABCDE polygonum polygono FGHKL, angulus BAE angulo GFL eſt æqualis: atque eſt vt BA ad AE, ita GF ad FL. Quoniam igitur duo triangula ſunt ABE FGL vnum angulum vni angulo æqualem habentia; circum æquales autem angulos latera proportionalia: erit triangulum ABE triangulo FGL æquiãgulum. ergo & ſimile. angulus igitur ABE æqualis eſt angulo FGL. eſt autem & totus ABC angulus



6. huius.



gulus æqualis toti FGH, propter ſimilitudinem polygonorum. ergo reliquus EBC reliquo LGH eſt æqualis. Et quoniam ob ſimilitudinem triangulorum ABE FGL, eſt vt EB ad BA, ita LG ad GF. Sed & propter ſimilitudinem polygonorum, vt AB ad BC, ita eſt FG ad GH; erit ex æquali vt EB ad BC, ita LG ad GH. & circum æquales angulos EBC LGH latera ſunt proportionalia. æquiangulum igitur eſt EBC triangulũ triangulo LGH. quare & ſimile. Eadem ratione & ECD triangulum ſimile eſt triangulo LHK. Similia igitur polygona ABCDE FGHKL in ſimilia triãgula diuiduntur, & numero æqualia. Dico & homologa totis, hoc eſt vt proportionalia ſint triangula, & antecedentia quidem eſſe ABE EBC ECD, conſequentia aũt ipſorum FGL LGH LHK: & ABCDE polygonũ ad polygonũ FGHKL duplã proportionẽ habere eius, quã latus homologum habet ad homologum latus; hoc eſt AB ad FG. Iungantur enim AC FH. Et quoniam propter ſimilitudinem polygonorum angulus ABC eſt æqualis angulo FGH; atque eſt vt AB ad BC, ita FG ad GH: erit triangulum ABC triangulo FGH æquiangulum. æqualis igitur eſt angulus quidem BAC angulo GFH, angulus vero BCA angulo GHF. præterea qm̃ æqualis eſt BAM angulus angulo GFN, oſtenſus autem eſt & ABM angulus æqualis angulo FGN; erit & reliquus AMB reliquo FNG æqualis. ergo æquiangulum eſt ABM triangulum triangulo FGN. Similiter oſtendemus & triangulum BMC triãgulo GNH æquiangulum eſſe. Vt igitur AM ad MB, ita eſt FN ad NG, & vt BM ad MC, ita GN ad NH. quare & ex æquali vt AM ad MC, ita FN ad NH. Sed vt AM ad MC, ita ABM triãgulũ ad triãgulũ MBC, & triãgulũ AME ad ipſũ EMC, inter ſe enim ſunt vt baſes. & vt vnũ antecedẽtiũ ad vnũ conſequentium, ita omnia antecedentia ad omnia conſequẽtia. Vt igitur AMB triãgulum ad triangulum BMC, ita triangulum ABE ad ipſum CBE. Sed vt AMB ad BMC, ita AM ad MC. & vt igitur AM ad MC, ita ABE triãgulũ ad triangulũ EBC. Eadẽ ratione & vt FN ad NH, ita FGL triãgulũ ad triãgulũ GLH. atq; eſt vt AM ad MC, ita FN ad NH. ergo & vt triãgulũ ABE ad triãgulũ BEC, ita triangulum FGL ad GHL triangulum: & permutando vt ABE triangulum ad triangulum FGL, ita triãgulum EBC ad triangulum GHL. Similiter oſtendemus iunctis BD GK, & vt BEC triangulum ad triangulum LGH, ita eſſe triangulum ECD ad triangulum LHK. Et qm̃ eſt vt ABE triãgulũ ad triãgulũ FGL, ita triãgulũ EBC ad triãgulũ LGH, & ad huc triangulum ECD ad ipſum LHK: erit & vt vnum antecedentium ad vnum conſequentium, ſic omnia antecedentia ad omnia conſequentia. ergo vt triangulum ABE ad triangulum FGL, ita ABCDE polygonum ad polygonum FGHKL. Sed ABE triangulum ad triangulum FGL duplam proportionem habet eius, quam latus homologum AB habet ad homologum latus FG; ſimilia enim triangula in duplã ſunt proportione laterum homologorum. ergo & ABCDE polygonum ad polygonum FGHKL duplam proportionem habet eius, quam AB latus homologum habet ad FG homologum latus. Similia igitur polygona in ſimilia triangula diuiduntur, & numero æqualia: & homologa totis, et polygonum ad polygonum duplam habet proportionem eius, quam habet latus homologum ad homologum latus: quod oportebat demonſtrare.


6. huius. 1. huius. 22. quinti. 2. huius. 12. quinti. Ex antecedente.

Eodem modo & in ſimilibus quadrilateris oſtendetur ea eſſe in dupla proportione laterum homologorum. oſtenſum autem eſt & in triangulis.

COROLLARIVM PRIMVM.

Ergo vniuerſe ſimiles rectilineæ figuræ inter ſe ſunt in duplã propor-


proportione homologorum laterum. & ſi ipſarum A B FG tertiam proportionalem ſumamus, quę ſit X; habebit AB ad X duplam proportionem eius, quam habet AB ad FG. habet autem & polygonum ad polygonum, & quadrilaterum ad quadrilaterum duplam proportionem eius, quam latus homologum habet ad homologum latus, hoc eſt AB ad FG. atque oſtenſum eſt hoc in triangulis.



COROLLARIVM SECVNDVM.

Vniuerſe igitur manifeſtum eſt, ſi tres rectę lineę proportionales fuerint, vt prima ad tertiam, ita eſſe figuram, quæ fit à prima ad eam, quæ à ſecunda, ſimilem & ſimiliter deſcriptam. quod oſtendere oportebat.

Oſtēdemus etiam aliter & expeditius homologa eſſe triāgula.



Ex antecedente.

Exponātur enim rurſus polygona ABCDE FGHKL, & iūgātur BE EC GL LH. Dico vt ABE triāgulū ad triāgulū FGL, ita eſſe triāgulū EBC ad triāgulū LGH; & triāgulū CDE ad ipſum HKL. Quū enim ſimile eſt ABE triāgulū triāgulo FGL; habebit ABE triangulū ad triangulū FGL duplā proportionē eius, quam habet BE ad GL. Eadē ratione & triāgulū BEC ad GLH triangulum duplam proportionem habet eius, quam BE ad GL. eſt igitur vt ABE triangulum ad triangulum FGL, ita triangulum BEC ad GLH triangulū. Rurſus quoniam ſimile eſt triangulum EBC triangulo LGH, habebit EBC triangulum ad triangulum LGH duplam proportionem eius, quam recta linea CE habet ad rectam HL. Eadem ratione, & ECD triangulum ad triangulum LHK duplam proportionem habet eius, quam CE ad HL. eſt igitur vt triangulum BEC ad triangulum LGH, ita CED triangulum ad triangulum LHK. oſtenſum autem eſt & vt EBC triangulum ad triangulum LGH, ita triangulum ABE ad triangulum FGL. ergo & vt triangulum ABE ad triangulum FGL, ita triangulum BEC ad GLH triangulum, & triangulum ECD ad ipſum LHK. & vt igitur vnum antecedentium ad vnum conſequentium, ſic omnia antecedentia ad omnia conſequentia, & reliqua vt in priori demonſtratione. quod ipſum demonſtrare oportebat.

11. quinti.


12. quinti.

THEOREMA XV. PROPOSITIO XXI.

Quæ eidem rectilineo ſunt ſimilia, & inter ſe ſimilia ſunt.

Sit enim vtrumque rectilineorum A B ſimile rectilineo C. Dico & rectilineum A rectilineo B ſimile eſſe. Quoniam enim ſimile eſt A rectilineum rectilineo C, & ipſi æquiangulum erit, & circum æquales angulos latera habebit proportionalia. Rurſus quoniam ſimile eſt rectilineum B rectilineo C, æquiangulum ipſi erit, & circum


cum æquales angulos latera pruportionalia habebit. Vtrumque igitur rectilineorum A B ipsi C æquiangulum est, & circum æquales angulos latera habet proportionalia. Quare & rectilineum A ipsi B est æquiangulum, lateraq; circum æquales angulos proportionalia habet; ac propterea A ipsi B est simile. quod demonstrare oportebat.



THEOREMA XVI. PROPOSITIO. XXII.

Si quattuor rectæ lineæ proportionales fuerint, & rectilinea, quæ ab ipsis fiunt, similia & similiter descripta proportionalia erunt. Et si rectilinea, quæ ab ipsis fiunt, similia & similiter descripta proportionalia fuerint, & ipsæ rectæ lineæ proportionales erunt.

Sint quattuor rectæ lineæ proportionales AB CD EF GH; & vt AB ad CD, ita sit EF ad GH. describanturq; ab ipsis quidem AB CD similia & similiter posita rectilinea KAB LCD: ab ipsis verò EF GH describantur rectilinea similia, & similiter posita MF NH. Dico vt KAB rectilineum ad rectilineum LCD, ita esse rectilineũ MF ad ipsum NH rectilineũ. Sumatur enim ipsarum quidẽ AB CD tertia proportionalis X; ipsarum vero EF GH tertia proportionalis O. Et quoniam est vt AB ad CD, ita EF ad GH: vt autem CD ad X, ita GH ad O; erit ex æquali vt AB ad X, ita EF ad O. Sed vt AB quidem ad X, ita est rectilineum KAB ad LCD rectilineum: vt autem EF ad O, ita rectilineum MF ad rectilineum NH. Vt igitur KAB rectilineum ad rectilineum LCD, ita est rectilineum MF ad NH rectilineum. Sed sit vt KAB rectilineum ad rectilineum LCD, ita rectilineũ MF ad rectilineũ NH. Dico vt AB ad CD, ita esse EF ad GH. fiat enim vt AB ad CD, ita EF ad PR. & describatur ab ipsa PR alterutri rectilinearum MF NH simile & similiter positum rectilineum SR. Quoniam igitur est vt AB ad CD, ita EF ad PR: & descripta sunt ab ipsis quidem AB CD similia & similiter posita KAB LCD rectilinea, ab ipsis vero EF PR similia & similiter posita rectilinea MF SR; erit vt KAB rectilineum ad rectilineum LCD, ita rectilineum MF ad RS rectilineum. ponitur autem & vt rectilineum KAB ad rectilineum LCD, ita MF rectilineum ad rectilineum NH. ergo vt rectilineũ MF ad rectilineum NH, ita MF rectilineum ad rectilineum SR. Quod cum rectilineum MF ad vtrumque ipsorum NH SR eandem habeat proportionem, erit rectilineum NH ipsi SR æquale. est autem ipsi simile, & similiter positum. Ergo GH est æqualis PR. Et quoniam vt AB ad CD, ita est EF ad PR, æqualis autem PR ipsi GH; erit vt AB ad CD, ita EF ad GH. Si igitur quattuor rectæ lineæ proportionales fuerint, & rectilinea, quæ ab ipsis fiunt, similia & similiter descripta proportionalia erunt. & si rectilinea, quæ ab ipsis




22. huius.
21. huius.
Coro. 20. huius.
11. quint.
22. huius.
9. quint.
*

ab ipſis fiunt, ſimilia & ſimiliter deſcripta proportionalia fuerint, & ipſæ rectæ lineę proportionales erunt. quod oportebat demonſtrare.

LEMMA.

At vero ſi rectilinea æqualia & ſimilia ſint, homologa ipſorũ latera inter ſe ęqualia eſſe, hoc modo demonſtrabimus.




Sint æqualia & ſimilia rectilinea NH, SR: & ſit vt HG ad GN, ita RP ad PS. Dico RP ipſi HG eſſe ęqualem. Si enim inæquales ſint, vna ipſarum maior erit. Sit RP maior, quàm HG. Et quoniam eſt vt RP ad PS, ita HG ad GN; & permutando erit vt RP ad HG, ita PS ad GN. maior autem eſt PR, quàm HG. ergo & PS quàm GN maior erit. quare & rectilineum RS rectilineo HN eſt maius. Sed & æquale, quod fieri non poteſt. non igitur inæqualis eſt PR ipſi GH. ergo æqualis ſit neceſſe eſt. quod oportebat demonſtrare.

F. C. COMMENTARIVS.

Ergo GH eſt æqualis PR] *Demonſtrat hoc antecedens lemma ratione ducente ad id, quod fieri non poteſt. Sed tamen licet etiam recta demonſtratione vti, in hunc modum.* *


LEMMA.



Sint æqualia & ſimilia rectilinea NH SR: fitq; latus GH homologũ ipſi PR: Dico GH ipſi PR æquale eſſe. *Fiat enim vt GH ad PR, ita PR ad aliã quae ſit T, erit GH ad T, vt rectilineũ NH ad rectilineũ SR. ergo GH eſt aequalis ipſi T. Sed cũ tres rectae linae GH PR T ſint proportionales, erit rectangulũ contentum GH T, hoc eſt quadratum GH aequale quadrato PR; ac propterea recta linea GH ipſi PR eſt aequalis. quod oportebat demonſtrare.* 21 huius. Corol. 20 huius. 17. huius.


THEOREMA XVII. PROPOSITIO. XXIII.

Aequiangula parallelogramma inter ſe proportionem habent ex lateribus compoſitam.



Sint æquiangula parallelogramma AC CF æqualem habentia BCD angulum angulo ECG. Dico parallelogrãmum AC ad parallelogrammum CF proportionem habere compoſitam ex lateribus, videlicet compoſitam ex proportione, quam habet BC ad CG, & ex proportione quã DC habet ad CE. ponatur enim vt BC ſit in directum ipſi CG. ergo & DC ipſi CE in directum erit: & compleatur DG parallelogrammum: exponaturq; recta linea quędã K: & fiat vt BC quidẽ ad CG, ita K ad L; vt autem DC ad CE, ita L ad M. proportiones igitur ipſius K ad L: & L ad M eędem ſunt, quę proportiones laterum, videlicet BC ad CG, & DC ad CE. Sed proportio K ad M compoſita eſt ex proportione K ad L, & proportione L ad M. quare & K ad M proportionem habet ex lateribus compoſitam. Et quoniam eſt vt BC ad CG, ita 14. primi. 22 huius. 1. huius.

AC parallelogrammum ad parallelogrammum CH; ſed
11.quinti. vt BC ad CG, ita K ad L: erit & vt K ad L, ita parallelogrãmum AC ad CH parallelogrammum. Rurſus quoniam eſt ut DC ad CE, ita CH parallelogrammum ad paralel logrammum CF: vt autem DC ad CE, ita L ad M, & vt
11.quinti. L ad M, ita erit parallelogrammum CH ad CF parallelogrãmũ. Itaque cũ oſtenſum ſit, vt K quidẽ ad L, ita AC parallelogrãmũ ad parallelogrãmũ CH: vt aũt L ad M, ita parallelogrammũ CH ad CF parallelogrammum; erit ex æquali vt K ad M, ita AC parallelogrammum ad ipſum CF. habet autem K ad M proportionem ex lateribus compoſitam. ergo & AC parallelogrammum ad parallelogrammum CF proportionem habebit compoſitam ex lateribus. æquiangula igitur parallelogramma inter ſe proportionem habent ex lateribus compoſitam. quod oportebat demonſtrare.



F. C. COMMENTARIVS.

COROLLARIVM. Ex iam demõſtratis colligitur triangula, quæ vnum angulum vni angulo æqualem habent, proportionem habere ex lateribus compoſitam; ſunt enim ea parallelogrammorum æquiangulorum dimidia.

Colligitur præterea quo modo ex duabus datis proportionibus, vel etiam pluribus proportio componatur, ex proportionibus enim BC ad CG, & DC ad CE proportio compoſita eſt K ad M. Quòd ſi ex tribus componenda ſit proportio, rurſus ex ea, quę ex duabus conſtat, & ex tertia aliam eodem modo componemus, quę quidem ex tribus compoſita erit, & ita deinceps in alijs.

Proportio autem data ex data proportione maiori hoc modo auferetur.

Sint datae proportiones A ad B, & C ad D, quarũ proportio C ad D ſit maior, & oporteat à proportione C ad D auferre proportionem
12. huius. *A ad E. fiat vt A ad B, ita C ad aliam videlicet ad F, quae inter C & D media ſtatuatur. Dico proportionem A ad B iam ablatã eſſe à proportione C ad D, & proportionem, quę relinquitur eſſe eam, quam habet F ad D. Quoniam enim proportio C ad D componitur ex proportione C ad F, & proportione F ad D, ſi auferatur vna dictarum proportionum, videlicet C ad F, quae eſt A ad B, relinquetur proportio F ad D. atque illud eſt. quod facere oportebat.*




Quomodo autem in numeris proportiones, & componantur & auferantur ex iam dictis facile conſtare poteſt, & ex ijs, quae tradit Purbachius, vel Regiomontanus in epitomate magnae conſtructionis Ptolemęi propoſitione XVIII. primi libri. Sed placuit hoc loco apponere theoremata nonnulla à nobis elaborata, quae ab his non multum abhorrent; & elementorum loco eſſe poſſunt.

THEOREMA. I.

Triangula, quorum vnus angulus vni angulo eſt æqualis, inter ſe proportionem habent eandem, quam rectangula, quæ lateribus æqualem angulum comprehendentibus, continentur.

Sint triangula ABC DEF, ſitq; angulus A angulo D aequalis. Dico triangulum A B C ad triangulum D E F eandem proportionem habere, quam B A C rectangulum ad rectangulum EDF. Ducantur perpendiculares B G E H. erit triangulum B A G triangulo E D H ſimile; eſt enim angulus ad A aequalis angulo



ad D,


ad D, & angulus BGA rectus aequalis recto EHD. ergo & reliquus reliquo aequalis. Vt igi- 4.huius.
tur GB ad BA, ita HE ad ED. Sed vt CB ad BA, ita rectangulum quod fit ex BG & AC ad 1.huius.
rectangulum BAC, cum habeant eandem altitudinem, videlicet rectam lineam AC. & simili-
ter vt HE ad ED, ita rectangulum ex EH, & DF ad rectangulum EDF. rectangulum igi- 11.quinti.
tur ex BG & AC ad rectangulum BAC est vt rectangulum ex EH, & DF ad rectan-
gulum EDF; & permutando rectangulum ex BG & AC ad rectangulum ex EH & DF,
vt BAC rectangulum ad rectangulum EDF. Sed rectanguli ex BG & AC dimidium est
ABC triangulum ex 41 primi; habent enim eandem basim AC, & altitudinem eandem BG:
& rectanguli ex EH & DF dimidium triangulum DEF. triangulum igitur ABC ad trian- 15.quinti.
gulum DEF eandem proportionem habet, quam rectangulum BAC ad rectangulum EDF.
Quare triangula quorum vnus angulus vni angulo est aequalis inter se proportionem habent
eandem, quam rectangula, quae lateribus aequalem angulum comprehendentibus continentur.
quod demonstrare oportebat.

COROLLARIVM.

Ex hoc sequitur parallelogramma etiam equiangula inter se proportionem ha- 15.quinti.
bere eandem, quam rectangula, quae ipsorum lateribus continentur, cum sint eiusmodi triangulorum dupla.

THEOREMA II.

Triangula et parallelogramma inter se proportionem habent compositā ex proportione basium, et proportione altitudinum.




Sint triangula ABC DEF: & ducantur perpendiculares AG DH. Dico triangulum ABC ad triangulum DEF proportionem habere compositam ex proportione basis BC ad basim EF; & ex proportione altitudinis AG ad DH altitudinem. Vel igitur AG est aequalis DH, vel inaequalis, & rursus vel BC est aequalis EF vel inaequalis. Sit primum AG aequalis DH, & 1.huius.
BC inaequalis ipsi EF, fiatq; vt BC ad EF, ita recta linea quedam K ad L: & vt AG ad 12.huius.
DH, ita L ad M. Itaque triangulum ABC ad triangulum DEF est, vt basis BC ad EF
basim ex prima huius, hoc est vt K ad L. & cum DH sit aequalis AG, erit M ipsi L
aequalis: triangulumq; ABC ad ipsum DEF, vt K ad M: proportio autem K ad M composita 7.quinti.
est ex proportione K ad L, & proportione L ad M, hoc est ex proportione basis BC ad ba-
sim EF, & proportione altitudinis AG ad altitudinem DH. Eodem modo demonstrabitur,
si basis BC sit aequalis basi EF, cum inaequales sint altitudines AG DH: erunt enim K L
inter se aequales, & ex iis, quae demonstrauimus ad primam huius, triangulum ABC
ad triangulum DEF proportionem habebit eandem, quam L ad M, hoc est quam K ad M.
triangulum igitur ABC ad triangulum DEF proportionem habet compositam ex proportione K ad L, hoc est basis BC ad basim EF, & ex proportione L ad M, hoc est altitudinis AG ad DH altitudinem. Quod si bases BC EF aequales sint, itemq; altitudines aequales AG DH, nihilominus idem sequetur, nam K L M inter se aequales erunt, & triangulū ad triangulū proportionem habebit compositam ex proportione K ad L. & L ad M. hoc est ex proportione basium & proportione altitudinū. Denique si bases EC EF inaequales sint, & similiter inaequales altitudines AG DH. Ponatur AG minor, quam

DH. & ab ipſa DH abſcindatur HN aequalis AG: iungaturq; EN NF; & rurſus fiat vt baſis BC ad baſim EF, ita K ad L: vt autem NH ad HD, hoc eſt vt AG ad HD, ita L ad M. Quoniam igitur triangula AEC NEF eandem habent altitudinem, inter ſe erunt vt baſes. quare triangulum ABC ad triangulum NEF eſt vt BC ad EF, hoc eſt vt K ad L. Sed triangulum NEF ad triangulum DEF eſt vt altitudo NH, vel AG ad DH altitudinem, videlicet vt L ad M. ex aequali igitur triangulum ABC ad triangulum DEF, eſt vt K ad M. habet aũt K ad M proportionẽ compoſitã ex proportione K ad L, & proportione L ad M. ergo & triangulũ ABC ad triangulũ DEF proportionẽ habet compoſitã ex proportione K ad L & proportione L ad M, hoc eſt ex proportione baſis BC ad baſim EF, & proportione altitudinis AG ad altitudinẽ DH. Sed cum trianguli ABC duplũ ſit parallelogrãmũ BO, & triangu li DEF duplum parallelogrammum EP; habebit parallelogrammum BO ad parallelogrammum EP proportionem compoſitam ex proportione baſis BC ad baſim EF, & proportione altitudinis AG ad DH altitudinem. triangula igitur & parallelogramma inter ſe proportionem habent cõpoſitam ex proportione baſium, & proportione altitudinum. quod oportebat demonſtrare.

1. huius.

Ex demonſtratis 1. huius.

15. quinti.



THEOREMA XVIII. PROPOSITIO. XXIIII.

Omnis parallelogrammi, quæ circa diametrum ſunt parallelogramma, et toti et inter ſe ſimilia ſunt.

Sit parallelogrammum ABCD, cuius diameter AC: circa diametrum vero AC parallelogrãma ſint EG HK. Dico parallelogramma EG HK, et toti ABCD, et inter ſe ſimilia eſſe. Quoniam enim vni laterum trianguli ABC, videlicet ipſi BC parallela ducta eſt EF, erit vt BE ad EA, ita CF ad FA. Rurſus quoniam vni laterum trianguli ACD, nempe ipſi CD ducta eſt parallela FG, vt CF ad FA, ita erit DG ad GA. Sed vt CF ad FA; ita oſtenſa eſt et BE ad EA. ergo et vt BE ad EA, ita DG ad GA, componendoq; vt BA ad AE, ita DA ad AG, et permutando vt BA ad AD, ita EA ad AG. parallegrammorum igitur ABCD EG latera, quę circa communem angulum BAD proportionalia ſunt. Et quoniam parallela eſt GF ipſi DC, angulus quidem AGF eſt æqualis angulo ADC; angulus uero GFA æqualis angulo DCA; et angulus DAC eſt communis duobus triãgulis ADC AGF; erit triangulum ADC triangulo AGF æquiangulum. Eadem ratione et triãgulum ACB æquiangulum eſt triangulo AFE. totum igitur parallelogrammum ABCD parallelogrãmo EG eſt æquiangulum. ergo ut AD ad DC, ita AG ad GF: vt autem DC ad CA, ita GF ad FA: et vt AC ad CB, ita AF ad FE: et præterea vt CB ad BA, ita FE ad EA. Itaque quoniam oſtenſum eſt vt DC ad CA, ita eſſe GF ad FA: vt autem AC ad CB, ita AF ad FE; erit ex æquali vt DC ad CB, ita GF ad FE. ergo parallelogrammorum ABCD EG proportionalia ſunt latera, quę circum æquales angulos; ac propterea parallelogrammum ABCD parallelogremmo EG eſt ſimile. Eadem ratione & parallelogrammum ABCD ſimile eſt parallelogrammo KH. Vtrumque igitur ipſorum EG HK parallelogrammorum parallelogrammo ABCD eſt ſimile. quæ autem eidem rectilineo ſunt ſimilia, & inter ſe ſimilia ſunt. parallelogrammum igitur EG ſimile eſt parallelogrammo HK. Quare omnis parallelogrammi, quæ circa diametrum ſunt parallelogramma & toti & inter ſe ſunt ſimilia. quod oſtendere oportebat.


8. huius.

11. quinti.

29. primi.

4. huius.

21. huius.




PRO-

PROBLEMA VII. PROPOSITIO XXV.

Dato rectilineo ſimile, & alteri dato æquale idem conſtituere.

Sit datum quidem rectilineum, cui oportet ſimile conſtituere ABC, cui autem æquale ſit D. oportet ipſi ABC ſimile, & ipſi D æquale idem conſtituere. applicetur enim ad rectam quidem lineam BC triãgulo ABC æquale parallelogrammum BE; ad rectam vero CE applicetur parallelogrammum CM æquale ipſi D, in angulo FCE, qui CBL angulo eſt æqualis. in directum igitur eſt BC ipſi CF, & LE ipſi EM. Sumatur ipſarum BC CF media proportionalis GH. & ab ipſa GH deſcribatur triangulum KGH ſimile & ſimiliter poſitum triangulo ABC. Et quoniam eſt vt BC ad GH, ita GH ad CF, ſi autem tres rectę lineæ proportionales ſint, vt prima ad tertiam, ita eſt figura, quæ fit à prima, ad eam, quæ à ſecunda, ſimilem & ſimiliter deſcriptam: erit vt BC ad CF, ita ABC triangulum ad triangulum KGH. Sed & ut BC ad CF, ita parallelogrammum BE ad EF parallelogrammum. & vt igitur triangulum ABC ad triangulum KGH, ita BE parallelogrammum ad parallelogrammum EF. quare permutando vt ABC triangulum ad parallelogrammum BE, ita triangulum KGH ad EF parallelogrammum. eſt autem triangulum ABC æquale parallelogrammo BE. æquale igitur eſt & KGH triangulũ parallelogrãmo EF. Sed EF parallelogrãmũ ęquale eſt rectilineo D. ergo & triangulum KGH ipſi D eſt ęquale. eſt autem KGH ſimile triangulo ABC. Dato igitur rectilineo ABC ſimile, & alteri dato æquale idem conſtitutum eſt KGH. quod facere oportebat.




44. primi.
14. primi.
13. huius.
18. huius.
Cor. 20. huius.
11. quinti.

THEOREMA XIX. PROPOSITIO XXVI.

Si à parallelogrammo parallelogrammum auferatur ſimile toti, & ſimiliter poſitum, communem ipſi angulum habens, circa eandem diametrum eſt toti.

A parallelogrammo enim ABCD parallelogrammum AF auferatur, ſimile ipſi ABCD, & ſimiliter poſitum, communemq; ipſi angulum habens DAB. Dico parallelogrammum ABDD circa eãdem eſſe diametrum parallelogrammo AF. non enim, ſed ſi fieri poteſt, ſit ipſorum diameter AHC & producatur GF vſque ad H; ducaturq; per H alterutri ipſarum AD BC parallela HK. Quoniam igitur circa eandem diametrum eſt ABCD parallelogrammum parallelogrammo KG; & erit parallelogrammum ABCD parallelogrammo KG ſimile. ergo vt DA ad AB, ita GA ad AK. eſt autem & propter ſimilitudinem parallelogrammorum ABCD EG, vt DA ad AB, ita GA ad AE. et vt igitur GA ad AE, ita GA ad AK. Quòd cum GA ad utramque ipſarum AK AE eandem proportionem habeat, erit AE ipſi AK ęqualis, minor maiori, quod fieri non poteſt. Non igitur circa eandem diametrum eſt ABCD parallelogrammum parallelogrammo AH. Quare circa eandem diametrum erit ipſi AF. Si igitur à parallelogrammo parallelogrammum auferatur ſimile toti, et ſimiliter poſitum, communem ipſi angulum habens, circa eandem diametrum eſt toti. quod demonſtrare oportebat.




24. huius.
1. diff. huius.
11. quinti.
9. quinti.

THEO-


THEOREMA XX. PROPOSITIO XXVII.

Omnium parallelogrammorum ad eandem rectam lineam applicatorum, et deficientium figuris parallelogrammis similibus et similiter positis ei quæ à dimidia describitur; maximũ est quod ad dimidiam est applicatum, simile existens defectui.



A Sit recta linea AB; secetur; bifariam in C; et ad AB rectam lineam applicetur parallelogrammũ AD deficiens figura parallelogramma DB, simili & similiter posita ei, quæ a dimidia ipsius AB descripta est, hoc est à CB. Dico omnium parallelogrammorum ad rectam lineam AB applicatorum, et deficientium figuris parallelogrammis similibus, et similiter positis ipsi DB, maximum esse AD. applicetur enim ad re
B ctam lineam AB parallelogrammum AF, deficiens figura parallelogramma FB simili et similiter posita ipsi DB. Dico AD parallelogrãmum parallelogrammo AF maius esse. Quoniam enim simile est parallelogrammum DB parallelogrammo FB, circa eãdem diametrum sunt. Ducatur eorum diameter DB, et describatur figura. Quoniam igitur CF est æquale ipsi FE, commune apponatur FB. totum igitur CH toti KE est æquale. Sed CH est æquale CG, quoniam et recta linea AC ipsi CB. ergo et GC ipsi EK æquale erit. commune apponatur CF. totum igitur AF est æquale gnomoni LMN, quare et DB hoc est AD parallelogrammum, parallelogrammo AF est maius. omnium igitur parallelogrammorum ad eandem rectam lineam applicatorum, et deficientium figuris parallelogrãmis similibus, et similiter positis ei, quæ à dimidia describitur; maximum est, quod ad dimidiam est applicatum. quod demonstrare oportebat.

Ex antecedente. 43. primi. 36. primi.



C ALITER. Sit enim rursus AB secta bifariã in pũcto C, et applicatum sit AL. deficiens figura LB. et rursus ad rectam lineam AB applicetur parallelogrãmum AE deficiens figura EB simili, et similiter posita ei, quæ à dimidia AB describitur, videlicet ipsi LB. Dico parallelogrammum AL, quod ad dimidiã est applicatum maius esse parallelogrammo AE. Quoniam enim simile est EB ipsi LB, circa eandem sunt diametrum. sit ipsorum diameter EB, et describatur figura. Et quoniã LF æquale est LH, etenim FG ipsi GH est æqualis. erit LF ipso EK maius. est aũt LF æquale DL. maius igitur est et DL ipso EK. commune apponatur KD. ergo totum AL toto AE est maius. quod oportebat demonstrare.

36. primi. 43 primi.

F. C. COMMENTARIVS.

A Et ad AB rectam lineam applicetur parallelogrammum ad deficiens figura parallelogramma.]


Describatur à recta linea CB parallelogrammum quodcumque libuerit DB, et totum parallelogrammum ABE compleatur. erit ad rectam lineam AB applicatum parallelogrammum AD deficiens figura parallelogramma DB, simili & similiter posita ei, quae à dimidia ipsius AB descripta est.

Applicetur enim ad rectam lineam AB parallelogrammum AF deficiens figura
B parallelogrammia FB, simili et similiter posita ipsi DB.

Sumatur in recta linea AB inter C B quodvis punctum K, & ab ipsa KB describatur parallelogrammum simile & similiter positum ipsi DB parallelogrammo, quod sit KLHF, et HF ad G producatur


producatur. erit rursus ad rectam lineam AB applicatum parallelogrammum AF deficiens figura parallelogramma FE, simili & similiter posita ipsi DB.

Sit enim rursus ab secta bifariam in puncto C. *Nõ videtur hec alia demonstratio, sed alius casus. quare theorema fortasse in hunc modũ aptius, et manifestius explicabitur.*



Sit recta linea AB, secetuŕq; bifariam in C, et ab ipsa CB describatur parallelogrammum vtrumque DB, et totum parallelogrammum AE compleatur. Iam ad rectam lineam AB applicatum erit parallelogrammum AD, deficiens figura parallelogramma DB simili & similiter posita ei, quę descripta est à dimidia ipsius AB, hoc est à CB. Dico omnium parallelogrammorum ad rectam lineam AB applicatorum, & deficientium figuris similibus et similiter positis ipsi DB, maximum esse AD. Iũgatur enim DB parallelogrammi DB diameter. erit recta linea ad quam alia parallelogramma applicanda sunt, vel maior quàm dimidia ipsius AC vel minor. Sumatur primo maior, & sit AK; atque à puncto K ipsi BE parallela ducatur KF, quae diametro DB in F occurrat; & per F ducatur GFH parallela ipsi AB & figura compleatur. erit ad AB applicatum aliud parallelogrammum AF deficiens figura parallelogramma FE, simili & similiter posita ipsi DB; quippe quae circa eandem diametrum consistat. Dico igitur AD maius esse quàm AF. Quoniam enim suplementum CF est aequale ipsi FE; communi appositio FB, erit totum CH toti KE aequale. at CH est aequale GC, quoniam & AC ipsi CB. ergo & GC aequale est KE. apponatur vtrique commune CF. totum igitur AF gnomoni LMN est aequale. quare & DB parallelogrammum, hoc est AD maius erit quàm AF. 43. primi.

Sumatur deinde AO minor, quàm dimidia AC, & per O ipsi BE parallela ducatur OP, quae cum diametro BD producta conueniat in P. denique per P ducatur QPR parallela ipsi AB, & secunda figura compleatur. Erit rursus ad AB applicatum aliud parallelogrammum AP deficiẽs figura parallelogramma PB ipsi DB simili & similiter posita. Dico rursus AD quàm AP maius esse. Quoniam enim parallelogrãmum DR est aequale parallelogrammo DQ, erit DR maius quàm SQ. Sed OD est aequale DR. ergo et OD ipso SQ est maius. commune apponatur AS. totum igitur AD, quàm totum AP maius erit. Quare omnium parallelogrammorum ad eandem rectam lineam applicatorum, & deficientium figuris similibus, & reliqua, quae sequuntur. quod oportebat demonstrare.



36. primi.


43. primi.

PROBLEMA VIII. PROPOSITIO XXVIII.

Ad datam rectam lineam dato rectilineo ęquale parallelogrammum applicare, deficiens figura parallelogramma, quæ similis sit alteri datę. oportet autem datum rectilineum, cui æquale applicandum est, non maius esse eo, quod ad dimidiam applicatur, similibus existentibus defectibus, et eo quod à dimidia, et eo, cui oportet simile deficere.

Sit data quidem recta linea AB: datum autem rectilineum, cui oportet æquale ad datam rectam lineam AB applicare, sit C, non maius existens eo, quod ad dimidiam applicatum est, similibus existẽtibus defectibus: cui autem oportet simile deficere sit D. oportet ad datam rectam lineam AB, dato rectilineo C ęquale parallelogrammum applicare, deficiens figura parallelogramma, quæ similis sit ipsi D. Secetur AB bifariam in E, & ab ipsa EB describatur simile, & similiter positum ipsi D; quod sit EBFG, & compleatur AG parallelogrammum. Itaque AG vel ęquale est ipsi 18. huius.

est ipsi C, vel eo maius, ob determinationem. & si quidem AG sit æquale C, factum iam erit, quod proponebatur: etenim ad rectam lineam A B dato rectilineo C æquale parallelogrammum AG applicatum est, deficiens figura parallelogramma GB, ipsi D simili. Si autem non est æquale, erit H E maius quàm C; atque est H E æquale G B. ergo & G B quàm C est maius. quo autem G B superat C, ei excessui æquale, ipsi vero D simile & similiter positum idem constituatur KLMN. Sed D est simile GB. quare & K M ipsi G B simile erit. Sit igitur recta linea quidem KL homologa ipsi GE, LM vero ipsi GF. & quoniã æquale est GB ipsis C KM, erit GB ipso KM maius. maior igitur est recta linea G E ipsa K L; et GF ipsa LM. ponatur GX æqualis KL, & G O æqualis LM, & compleatur X G O P parallelogrammum. æquale igitur est & simile GP ipsi KM. Sed KM simile est GB. ergo & GP ipsi GB est simile. circa eandẽ igitur est diametrũ GP ipsi GB. Sit ipsorum diameter GPB, & figura describatur. Itaque qm̃ GB est æquale ipsis C KM, quorũ GP est æquale KM, erit reliquus ϒφτ gnomon æqualis reliquo C. Et qm̃ OR est æquale XS, commune apponatur PB. totum igitur OB toti XB est æquale. Sed XB est æquale T E, quoniam & latus AE lateri EB. quare & TE ipsi OB æquale. cõmune apponatur XS. ergo totum TS est æquale toti gnomoni ϒφτ. At ϒφτ gnomon ipsi C ostensus est æqualis. & TS igitur ipsi C æquale erit. Quare ad datam rectam lineam AB dato rectilineo C æquale parallelogrammum TS applicatum est, deficiens figura parallelogrãma PB ipsi D simili, quoniã & PB simile est ipsi GP. quod facere oportebat.




25. huius.
21. huius.
26. huius.
43. primi.
36. primi.

F. C. COMMENTARIVS.

Quo autem GB superat C, ei excessui æquale, ipsi vero D simile, & similiter positum idem constituatur] *Vt autem excessus, quo alterum rectilineum alterum superat, facile inueniatur libuit, sequens problema apponere.*

Duorum rectilineorũ inæqualiũ excessum, quo maius superat minus, inuenire.

Sint duo rectilinea inæqualia A B, quorum maius sit A. oportet inuenire excessum, quo rectilineum A ipsum B superat. Dato enim rectilineo A in quouis angulo aequale parallelogrãmum constituatur CDEF: & ad rectam lineam DE in angulo aequali ipsi DCF, applicetur parallelogrammum DGHE aequale rectilineo B. erit recta linea DG in directum ipsi CD, & EH in directum FE. est igitur vt parallelogrammum FD ad parallelogrammum DH, hoc est vt rectilineum A ad rectilineum B, ita recta linea FE ad EH. atq; est rectilineum A rectilineo B maius. maior igitur est recta linea FE ipsa EH. Itaq; à recta linea FE abscindatur EK ipsi EH aequalis, & à puncto K alterutri ipsarum FC ED parallela ducatur KL. erit parallelogrammum KD parallelogrammo DH aequale, & ob id parallelogrammum FL est excessus, quo parallelogrammum FD superat parallelogrammum DH, hoc est quo rectilineum A ipsum B rectilineum superat. Duorum igitur rectilineorum inæqualium A B excessus inuentus est. quod facisse oportuit.




54. primi.
14. primi.

PRO-

PROBLEMA IX. PROPOSITIO. XXIX.

Ad datam rectam lineam dato rectilineo æquale parallelogrammum applicare, excedens figura parallelogramma, quæ similis sit alteri datæ.




Sit data recta linea AB, datum vero rectilineum cui oportet æquale ad ipsam AB applicare, sit C; cui autem oportet simile excedere D. Itaq; oportet ad AB rectam lineam dato rectilineo C æquale parallelogrammum applicare, excedens figura parallelogrāma simili D. Secetur AB bifariam in E, atque ex EB ipsi D simile, & similiter positum parallelogrammum describatur BF. & vtrisque quidem BF. C æquale, ipsi vero D simile, & similiter positum idem constituatur GH. Simile igitur est GH ipsi FB. sitq; KH quidem latus homologum lateri FL, KG vero ipsi FE. Et quoniam parallelogrammum GH maius est ipso FB, erit recta linea KH maior quàm FL, & KG maior quàm FE. producantur FL FE: & ipsi quidē KH æqualis sit FLM; ipsi vero KG æqualis FEN: & compleatur MN parallelogrammum. ergo MN æquale est & simile ipsi GH. Sed GH est simile EL. & MN igitur ipsi EL simile erit; ac propterea circa eandem diametrum est EL ipsi MN. Ducatur ipsorum diameter FX, & figura describatur. Itaque quoniam GH ipsis EL C est æquale, sed GH est æquale MN; erit & MN, æquale ipsis EL C. commune auferatur EL. reliquus igitur ΤΥΦ gnomon ipsi C est æqualis. Et quoniam AE est æqualis EB, æquale erit & AN parallelogrammum parallelogrammo NB, hoc est ipsi LO. commune apponatur EX. totum igitur AX æquale est gnomoni ΦΥΤ. Sed ΦΥΤ gnomon est æqualis C. ergo & AX ipsi C erit æquale. Ad datam igitur rectam lineam AB dato rectilineo C æquale parallelogrammum applicatum est AX, excedens figura parallelogrāma PO ipsi D simili; quoniā & ipsi EL simile est OP. quod fecisse oportebat.

18. huius.
25. huius.
21. huius.
26. huius.
24. huius.

PROBLEMA X. PROPOSITIO XXX.

Datam rectam lineam terminatam extrema ac media ratione secare.



Sit data recta linea terminata AB. oportet ipsam AB extrema, ac media ratione secare. Describatur enim ex AB quadratum BC, & ad AC ipsi BC æquale parallelogrammum applicetur CD, excedens figura AD ipsi BC simili. quadratum autem est BC. ergo & AD, quadratum erit. Et quoniā BC est æquale CD; commune auferatur CE. reliquum igitur BF reliquo AD est æquale. est autem & ipsi æquiangulū. ergo ipsorum BF AD latera, quæ circum æquales angulos ex contraria parte sibi ipsis respondent. vt igitur FE ad ED, ita est AE ad EB. est autem FE æqualis AC, hoc est ipsi AB. & ED ipsi AE. quare vt BA ad AE, ita AE ad EB: Sed AB maior

46. primi. Ex antecedente.
14. huius.
34. primi.


14. quinti. est quàm AE. ergo AE quàm EB est maior. Recta igitur linea AB extrema, ac media ratione secta est in E, & maior ipsius portio est AE. quod facere oportebat.

ALITER. Sit data recta linea AB. oportet ipsã AB extrema ac media rõne secare. Secetur enim AB in C, ita vt rectangulum, quod continetur AB BC æquale sit quadrato ex AC. Quoniam igitur rectangulum ABC æquale est quadrato ex AC,

11. secundi. 17. huius. erit vt BA ad AC, ita AC ad CB, ergo AB recta linea extrema ac media ratione secta est. quod facere oportebat.

THEOREMA XXI. PROPOSITIO. XXXI.

In rectangulis triangulis figura, quæ fit à latere rectum angulum subtendente, æqualis est eis, quę à lateribus rectum angulum continentibus fiunt, similibus, & similiter descriptis.



Sit triangulum rectangulum ABC, rectum habens angulum BAC. Dico figuram, quę fit ex BC æqualem esse eis, quæ ex BA AC fiunt, similibus, & similiter descriptis. Ducatur perpendicularis AD. Quoniam igitur in triangulo rectãgulo ABC ab angulo recto, qui est ad A ad BC

8. huius. basim perpendicularis ducta est AD; erunt triãgula ABD ADC, quæ sunt ad perpendiculare similia toti ABC, & inter se se. Et quoniam simile est ABC triangulum triangulo ABD, erit vt CB ad BA, ita AB ad BD. Quòd cũ

Coro. 20. huius. tres rectæ lineę proportionales sint, vt prima ad tertiam, ita erit figura, quæ fit ex prima ad eam, quę ex secunda, similem, & similiter descriptam. Vt igitur CB ad BD, ita figura, quę fit ex CB ad eam, quæ ex BA, similem, et similiter descriptam. Eadem

A ratione et vt BC ad CD, ita figura, quæ fit ex BC ad eam, quę ex CA. quare et vt BC ad ipsas BD DC, ita figura, quæ ex BC ad eas, quæ ex BA AC, similes, & similiter descriptas. æqualis autem BC ipsis BD DC. ergo figura, quę fit ex BC æqualis est eis, quę ex BA AC fiunt, similibus, & similiter descriptis. In rectangulis igitur triangulis, figura, quæ fit à latere rectum angulum subtendente, æqualis est eis, quæ à lateribus rectum angulum continentibus fiunt, similibus, & similiter descriptis. quod ostendere oportebat.

ALITER. Quoniam similes figuræ sunt in dupla proportione laterum homo-

20. huius. logorum; figura, quæ fit ex BC ad eam, quæ ex BA duplam proportionem habebit eius, quam habet BC ad BA. habet autem & quadratum ex BC ad quadratum ex

11. quinti. BA duplam proportionem eius, quam BC ad BA. ergo & vt figura, quæ ex BC ad eam, quę ex BA, ita quadratum ex BC ad quadratum ex BA. Eadem ratione & vt figura, quæ ex BC ad eam, quæ ex CA, ita quadratum, quod ex BC ad illud, quod ex CA quadratum. & vt igitur figura quæ ex BC ad eas, quæ ex BA AC, ita quod

47. primi. ex BC quadratum ad quadrata, quę ex BA AC. quadratum autem, quod ex BC æquale est eis, quæ ex BA AC quadratis. ergo & figura, quæ fit ex BC est æqualis eis, quę ex BA AC fiunt, similibus, & similiter descriptis. quod ostẽdere oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

A Quare & vt BC ad ipsas BD DC, ita figura, quę ex fit BC ad eas, quæ ex BA AC similes, & similiter descriptas.] *Quoniã enim est vt CB ad BD, ita figura, quae fit à CB ad eam, quae à BA similem, & similiter descriptam; erit & conuertendo vt DB ad BC, ita figura, quae fit à BA ad eam, quae à BC similem & similiter descriptam. præterea cum sit vt BC ad CD, ita figura, quae fit à BC ad eam, quae à CA: & conuertendo vt DC ad CB, ita erit figura, quae fit ab AC ad eam, quae à CB. Sit igitur figura, quae fit à BA magnitudo prima; figura, quae à EC magnitudo secunda; recta linea DB magnitudo tertia, & recta EC quarta; figura vero, quae fit ab*


AC

AC magnitudo quinta & recta linea DC sexta. Itaque prima magnitudo ad secundam, est vt tertia ad quartam; quinta vero ad secundam, vt sexta ad quartam. ergo ex vigesima quarta quinti libri composita prima & quinta ad secundam erit, vt composita tertia & sexta ad quartam, hoc est figurae quae fiunt à B.A AC ad eam, quae à BC erunt vt rectae lineae BD DC ad rectam BC & rursus conuertendo figura, quae fit à EC ad eas, quae à BA AC erit, vt recta linea BC ad rectas BD DC.

Et vt igitur figura, quę à BC ad eas, quę à BA AC, ita quod ex BC quadratum ad quadrata, quæ ex BA AC. B

Hoc similiter concludemus, vt proxime dictum est, ex vigesima quarta quinti. erit enim figura, quae fit à B.A magnitudo prima; figurà, quae à BC secunda; quadratum ex B.A tertia; & quadratum ex BC quarta; figura vero, quae fit ab AC quinta; & quadratum ex AC sexta. Hoc theoremate multo vniuersalius est illud, quod à Pappo demonstratur in quarto libro mathematicarum collectionum.

Si sit triangulum ABC, & ab ipsis AB BC describantur quaeuis parallelogramma AB ED BCFG; & lineae DE FG producantur ad H, iungatur que HB: fient parallelogramma ABED BCFG æqualia parallelogrammo cõtento AC HB, in angulo qui vtrisque BAC DHB sit æqualis.




Producatur enim HB ad K, & per A C ipsi KH parallelæ ducantur AL CM; & LM iungatur. Itaque quoniam parallelogrammum est ALHB; erunt AL BH æquales, & parallelæ. Similiter æquales & parallelę MC HB. ergo & LA MC æquales & parallelæ sint necesse est; & propterea LM AC. parallelogrammum igitur est ALMC in angulo LAC, hoc est in angulo æquali vtrisque BAC DHB. est enim angulus DHB ipsi LAB æqualis. Et quoniam DABE parallelogrammum æquale est parallelogrammo LABH, etenim in eadem basi AB, & in eisdem parallelis AB DH consistit: parallelogrammum autem LABH parallelogrammo LAKN est æquale, cum sit in eadem basi LA, & in eisdem parallelis LA HK: erit parallelogrammũ ADEB æquale parallelogrammo LAKN. et ob eãdem caussam parallelogrammum BGFC parallelogrammo KNMC. parallelogramma igitur DABE. BGFC parallelogrammo LACM æqualia sunt, hoc est ei, quod AC HB continetur, in angulo LAC, qui est æqualis vtrisque BAC BHL. Atque hoc multo vniuersalius est, quàm quod in triangulo rectangulo de quadratis in elementis demonstratur.

54. primi. 30. primi. 33 primi. 34. primi. 35. primi.


THEOREMA XXII. PROPOSITIO XXXII.

Si duo triangula componantur ad vnum angulum, quæ duo latera duobus lateribus proportionalia habeant, ita vt homologa latera ipsorum etiam sint parallela, reliqua triangulorum latera in directum sibi ipsis constituta erunt.



Sint duo triangula ABC DCE, quę duo latera BA AC duobus lateribus CD DE proportionalia habeant, vt sit sicut BA ad AC, ita CD ad DE; parallela autem sit AB ipsi DC, et AC ipsi DE. Dico BC ipsi CE in directũ esse. Quoniam enim AB parallela est DC, et in ipsas incidit recta linea AC; erunt anguli 29. primi.

alterni BAC ACD æquales inter ſe ſe. Eadē ratione et angulus CDE æqualis eſt angulo ACD. Quare et BAC ipſi CDE eſt æqualis. Et quoniam duo triāgula ſunt ABC DCE, vnū angulū, qui ad A, vni angulo qui ad D æqualem habentia, circum æquales autem angulos latera proportionalia, quòd ſit vt BA ad AC, ita CD ad DE; erit triangulum ABC triangulo DCE æquiangulum. ergo ABC angulus eſt æqualis angulo DCE. oſtenſus autem eſt et angulus ACD æqualis angulo BAC. totus igitur ACE duobus ABC BAC eſt æqualis. communis apponatur ACB. ergo anguli ACE ACB angulis BAC ACB CBA æquales ſunt. Sed BAC ACB CBA anguli duobus rectis ſunt æquales. et anguli igitur ACE ACB duobus rectis æquales erunt. Itaque ad quandam rectam lineam AC, et ad punctum in ipſa C duæ rectæ lineæ BC CE non ad eaſdem partes poſitæ angulos, qui deinceps ſunt ACE ACB duobus rectis æquales efficiunt. ergo BC ipſi CE in directum erit. Si igitur duo triangula componantur ad vnum angulum, quæ duo latera duobus lateribus proportionalia habeant, ita vt homologa latera ipſorum etiam ſint parallela; reliqua triangulorum latera in directum ſibi ipſis conſtituta erunt. quod demonſtrare oportebat.




6. huius.

4. primi.

THEOREMA XXIII. PROPOSITIO XXXIII.

In circulis æqualibus anguli eandem habent proportionem, quam circumferentiæ, quibus inſiſtunt, ſiue ad centra, ſiue ad circumferentias inſiſtant. Adhuc autem & ſectores, quippe qui ad centra ſunt conſtituti.


Sint æquales circuli ABC DEF; et ad centra quidem ipſorum GH ſint anguli BGC EHF, ad circumferentias vero anguli BAC EDF. Dico vt circumferentia BC ad EF circumferentiam, ita eſſe et BGC angulum ad angulum EHF, et angulum BAC ad angulum EDF: et adhuc ſectorē BGC ad EHF ſectorem. Ponantur enim circumferentię quidem BC æquales quotcumque deinceps CK KL; circumferentię verò EF, rurſus æquales quotcumque FM MN: et iungantur GK GL HM HN. quoniam igitur circumferentiæ BC CK KL inter ſe ſunt æquales, et anguli BGC CGK KGL inter ſe æquales erūt. quotuplex igitur eſt circumferentia BL circumfrentiæ BC, totuplex eſt et BGL angulus anguli BGC. Eadem ratione et quotuplex eſt circūferentia NE circūferentię EF, totuplex et EHN angulus anguli EHF. Si igitur æqualis eſt BL circumferentia circumferentiæ EN, et angulus BGL angulo EHN erit æqualis; et ſi circumferentia BL maior eſt circumferentia EN, maior erit et BGL angulus angulo EHN: et ſi minor, minor. Quattuor igitur exiſtentibus magnitudinibus, duabus nimirum circūferentijs BC EF: et duobus angulis BGC EHF, ſumpta ſunt circumferentiæ quidem BC, et BGC anguli æque multiplicia, videlicet circumferentia BL, et BGL angulus; circumferentiæ vero EF, et EHF anguli æque multiplicia, nempe circumferētia EN, et angulus EHN. atque oſtenſum eſt ſi circumferētia BL ſuperat circumferentiam EN, et BGL angulū ſuperare angulum EHN, et ſi æqualis, æqualem, et ſi minor, minorem eſſe. Vt igitur circumferentia BC ad EF circumferentiam, ita angulus



27. tertij.

Diff. 5 quinti.

angulus BGC ad angulum EHF. Sed vt BGC angulus ad angulum EHF, ita angulus BAC ad EDF angulum. vterque enim vtriusque est duplus. et vt igitur BC circumferentia ad circumferentiam EF, ita et angulus BGC ad angulum EHF, et angulus BAC ad EDF angulum. Quare in circulis æqualibus anguli eandem habent proportionem, quam circumferentiæ, quibus insistūt, siue ad centra, siue ad circunferentiam insistant. Dico insuper, et vt BC circumferentia ad circumferentiam EF, ita esse sectorem GBC ad HFE sectorem. Iungantur enim BC CK, et sumptis in circumferentijs BC CK: punctis X O, iungantur et BX XC CO OK. Itaque quoniam duæ BG GC duabus CG GK æquales sunt, et angulos æquales continēt; erit et basis BC basi CK æqualis. æquale igitur est et GBC triangulum triangulo GCK. Et quoniam circumferentia BC circumferentiæ CK est æqualis, et reliqua circumferentia, quæ complet totum circulum ABC æqualis est reliquæ, quæ eundem circulum complet. quare et angulus BXC angulo COK est æqualis. similis igitur est BXC portio portioni COK: et sunt in æqualibus rectis lineis BC CK. quæ autem in æqualibus rectis lineis similes circulorū portiones, et inter se æquales sunt. ergo portio BXC est æqualis portioni COK. est autem et BGC triangulum triangulo CGK æquale. et totus igitur sector BGC toti sectori CGK æqualis erit. Eadem ratione et GKL sector vtrique ipsorum GKC GCB est æqualis. Tres igitur sectores BGC CGK KGL æquales sunt inter se. Similiter et sectores HEF HFM HMN inter se sunt æquales. quotuplex igitur est LB circumferentia circumferentiæ BC, totuplex est et GBL sector sectoris GBC. Eadem ratione et quotuplex est circumferentia NE circūferentiæ EF, totuplex est et HEN sector sectoris HEF. quare si circumferentia BL circumferentiæ EN est æqualis, et sector BGL æqualis est sectori EHN. et si circumferentiæ BL superat circumferentiā EN, superat et BGL sector sectorem EHN, et si minor minor. Quattuor igitur existentibus magnitudinibus, duabus quidem BC EF circumferentijs, duobus uero sectoribus GBC EHF, sumpta sunt æque multiplicia, circumferentiæ quidem BC et GBC sectoris circumferentia BL et GBL sector. circumferentię vero EF, et sectoris HEF æquemultiplicia circumferentia EN, et HEN sector. atque ostensum est si BL circumferentia superat circumferentiam EN, et sectorem BGL superare sectorem EHN. et si æqualis æqualem esse; et si minor, minorem. est igitur vt BC circumferentia ad circumferentiam EF, ita sector GBC ad HEF sectorem. quod ostendere oportebat.



15.quint. 20.tertij. 4.primi. 27.tertij. 11.dif. tertij. 24.tertij. 5.diffi.quinti.

COROLLARIVM

Perspicuum etiam est, et vt sector ad sectorem, ita esse angulum ad angulum. 11.quinti.

SEXTI LIBRI FINIS.

EVCLIDIS ELEMENTORVM LIBER SEPTIMVS

CVM SCHOLIIS ANTIQVIS, ET COMMENTARIIS

Federici Commandini Vrbinatis.

DIFFINITIONES.

I.



NITAS est, qua vnumquodque eorũ, quæ sunt vnum dicitur.

II.

Numerus autem ex vnitatibus constans multitudo.

III.

Pars est numerus numeri, minor maioris, quando maiorem metitur.

F. C. COMMENTARIVS.

Pars ea nomen inuenit à numero, per quem minor maiorem metitur. Si enim minor bis metitur maiorem, dicetur pars dimidia, si ter dicetur tertia, si quater quarta. & ita in alijs.

IIII.

Partes autem, quando non metitur.

F. C. COMMENTARIVS.

Partes nomen trahunt ab ijs numeris, per quos communis duorum numerorum mensura vtriusque ipsorum metitur. nam si communis eorum mensura minorem numerum bis metiatur, & maiorem ter, dicentur hae partes duae tertiae; si vero minorem ter metiatur, & maiorem quater, dicentur tres quartae. Quòd si maiorem quinquies metiatur, dicentur tres quintae. & ita in reliquis. Recentiores numerum, per quem communis mensura minorem metitur, numerantem, uel numeratorem appellant, vtpote qui partium multitudinem definiat: numerum vero, per quem communis mensura maiorem metitur, denominantem, seu denominatorem dicunt, vt qui his partibus nomen imponat.

V.

Multiplex est maior minoris, quando minor eum metitur.

F. C.

F. C. COMMENTARIVS.

Multiplex autem nomen habet ab eo numero, per quem minor eum metitur. Si enim minor bis metiatur maiorem, dicetur maior minoris duplus; si ter, triplus; si quater, quadruplas, & eodem modo in alijs.

VI.

Par numerus est, qui bifariam diuiditur.

VII.

Impar vero, qui bifariam non diuiditur: vel qui à pari numero vnitate differt.

VIII.

Pariter par numerus est, quem par numerus per parem numerum metitur.

SCHOLIVM.

Si huic diffinitioni addamus tantum, vt pariter par numerus dicatur is, quem par numerus tantum per parem numerum metitur; faciemus pythagoreorum pariter parem, qui ad vnitatem vsque bifariam diuidi tur; vt octo par numerus metitur per parem tantum. duodecim vero Euclidi est pariter par, quem & par numerus metitur per parem numerum; bis enim sex sunt duodecim; & impar numerus per parem metitur. nam si quattuor ter sumantur duodecim fient. Pariter vero imparem dicit, quem par numerus metitur per imparem numerum; vt decem, quem bi narius per quinarium metitur. At περισσάκτιος, hoc est impariter par est duodecim: etenim ternarius per quaternarium metitur. & simpliciter quod perfectum nomen est in compositione, per illud dicimus numerũ metiri alium numerum. Itaque sciendum est περισσάκτιον, hoc est impariter parem à pythagoreis sic dictum, plures diuisiones sũscipere, quæ in partes æquales fiunt, nõ tamẽ ad vnitatẽ vsq; diuisionẽ procedere. Nouit aũtem hunc & in ipse Euclides; cuius mentionem facit in nono libro, pulchre ipsum neque pariter parem, neque pariter imparem dicens, per negationem duorum extremorum significauit, quemadmodum in contrarijs mediatis, media, quibus nomina imposita non sunt, per negationem extremorum explicamus. Huius autem mentionem facit Euclides in 34 noni libri.

IX.

Pariter vero impar est, quem par numerus per numerum imparem metitur.

F. C.

F. C. COMMENTARIVS

Ex diffinitione octaua, & nona, & ex ijs, quae in nono libro traduntur, apparet Euclidem pariter parem numerũ appellare eũ, quẽ par numerus per numerum parem metitur, siue sit ex numeris à binario duplatis, siue non: & pariter imparem appellare eum, quem par numerus per numerum imparem metitur, siue dimidium habeat imparem, siue parem. numeros enim à binario duplatos ipse pariter pares tantum appellat, & eos, quidimidium imparem habent vocat pariter impares tantum. eos vero, qui neque à binario duplati sunt, neque dimidium habent impare, & pariter pares, & pariter impares dicit. At Nicomacho, Boetioq; paris numeri species tres sunt; Vnà quae dicitur pariter par, alia quae pariter impar, & tertia, quae impariter par. Pariter par numerus est, qui põt in duo paria diuidi, eiusq; pars in alia duo paria & rursus partis pars in alia duo paria; & hoc semper, quoad diuisio partium ad vnitatem perueniat, vt 64. Pariter impar numerus est, qui quoniam par est, in partes quidem aequales diuiditur, partes vero eius mox indiuisibiles sunt, vt 6. 10. 14. 18. 22. Impariter par numerus est, qui inter duos iam dictos quodammodo medius est, diuiditur enim in partes aequales, eiusq; pars rursus diuiditur in alias partes aequales, & interdum partes partium in alias aequales diuidi possunt; sed diuisio ad vnitatem vsque non perducitur. Qui igitur his est pariter par, Euclides pariter parem tantum vocat; qui vero his pariter impar est, Euclides pariter imparem tantum. & qui his impariter par Euclides & pariter parem, & impariter parem appellat. Quare illud, quod in extrema parte antecedentis scholij additur, verum non videtur, nisi fortasse intelligamus eum, qui pariter par est, & pariter impar eo modo, quo sumit Euclides, neque pariter parem esse tantum, neque pariter imparem tantum.

X.

Impariter vero impar numerus est, quẽ impar numerus per numerum imparem metitur.

XI.

Primus numerus est, quem vnitas sola metitur.

F. C. COMMENTARIVS.

Primum numerum nullus metitur numerus, praeterquàm quòd ipse se ipsum metitur.

XII.

Primi inter se numeri sunt, quos sola vnitas communis mensura metitur.

XIII.

Compositus numerus est, quem numerus aliquis metitur.

XIIII.

Compositi inter se numeri sunt, quos numerus aliquis communis mensura metitur.

XV.

Numerus numerũ multiplicare dicitur, quando quot vnitates sunt in ipso, toties componitur multiplicatus, & aliquis gignitur.

Quando

XVI.

Quando duo numeri ſe ſe multiplicantes aliquem fecerint, qui factus eſt planus appellatur: latera vero ipſius ſunt numeri ſe ſe multiplicantes.

XVII.

Quando autem tres numeri ſe ſe multiplicantes aliquem fecerint, factus ſolidus appellatur: latera vero ipſius ſe ſe multiplicantes numeri.

XVIII.

Quadratus numerus eſt, qui æqualiter eſt æqualis, vel qui duobus æqualibus numeris continetur.

XIX.

Cubus vero, qui æqualiter eſt æqualis æqualiter, vel qui tribus æqualibus numeris continetur.

XX.

Numeri proportionales ſunt, quando primus ſecũdi, & tertius quarti æque multiplex fuerit, vel eadem pars, vel eædem partes.

F. C. COMMENTARIVS.

Vel igitur primus eſt maior ſecundo, vel minor: & ſi quidem maior, vel eam minor metitur, vel non metitur. & ſi metitur erit primus ſecundi æque multiplex, atque tertius quarti: ſi vero non metitur, quae partes eſt ſecundus primi, eædem partes erit & quartus tertij. vel etiam hoc modo. ſi primus eſt maior ſecundo, quae pars, vel partes eſt ſecundus primi, eadem pars, vel partes erit & quartus tertij. ſed ſi primus ſit minor, quae pars, vel quae partes eſt primus ſecundi, eadem pars, vel eædem partes erit & tertius quarti. Ponit autem nunc minorem numerum maioris partem eſſe, vel partes, quod poſtea in quarto theoremate huius demonſtratione confirmat.

XXI.

Similes plani, & ſolidi numeri ſunt, qui latera habent proportionalia.

XXII.

Perfectus numerus eſt, qui ſuis ipſius partibus eſt æqualis.

F. C. COMMENTARIVS.

Numerus autem qui ſuis ipſius partibus minor eſt abundans appellatur, qui vero maior, diminutos. His diffinitionibus nos aliam addidimus. ſed & petitiones quaſdam, & communes notiones apponere libuit, quibus Euclides in his libris vti viſus eſt.

XXIII.

Cum fuerint quotcunque numeri deinceps proportionales, primus ad tertium duplam proportionem habere dicetur eius, quam habet ad ſecundum: & primus ad quartum triplam, & eodem modo in alijs.

PETITIONES.

1 *Cuilibet numero quotlibet ſumi poſſe æquales, vel multiplices.*
2 *Quolibet numero ſumi poſſe maiorem.*
3 *Numerus infinite augetur, ſed non infinite diminuitur.*


COMMVNES NOTIONES.

1 *Quicumque eiuſdem, vel æqualium æque multiplices fuerint, & ipſi inter ſe ſunt æquales.*
2 *Quorum idem numerus æque multiplex fuerit, vel quorũ æque multiplices fuerint æquales, & ipſi inter ſe æquales ſunt.*
3 *Quicumque eiuſdem numeri, vel æqualium eadem pars, vel eædem partes fuerint, & ipſi inter ſe ſunt æquales.*
4 *Quorum idem, vel æquales numeri eadem pars, vel eædem partes fuerint, inter ſe ſunt æquales.*
5 *Omnis numeri pars eſt vnitas ab eo denominata, binarij enim numeri vnitas pars eſt ab ipſo binario denominata, quæ dimidia dicitur, ternarij vero vnitas eſt pars, quæ à ternario denominata tertia dicitur, quaternarij quarta, & ita in alijs.*
6 *Vnitas omnem numerum metitur per vnitates, quæ in ipſo ſunt.*
7 *Omnis numerus ſe ipſum metitur.*
8 *Si numerus metiatur numerum, & ille, per quem metitur, eundem metietur per eas, quæ ſunt in metiente, vnitates.*
9 *Quicumque numerus alium metitur, multiplicans eum, vel multiplicatus ab eo, per quem metitur, illum ipſum producit.*
10 *Si numerus numerum alium multiplicans aliquem produxerit, multiplicans quidem productum metitur per vnitates, quæ ſunt in multiplicato; multiplicatus vero metitur eundem per vnitates, quæ ſunt in multiplicante.*
11 *Quicumque numerus metitur duos, vel plures, metietur quoque eũ, qui ex illis componitur.*
12 *Quicumque numerus metitur aliquem, metietur quoque eum, quem ille ipſe metietur.*
13 *Quicũque numerus metitur totũ & ablatum, etiã reliquũ metietur.*

THEO-

THEOREMA I. PROPOSITIO I.

Si duobus numeris inæqualibus expositis, detracto semper minore de maiore, reliquus minime metiatur præcedentem, quo ad assumpta fuerit vnitas; numeri à principio positi primi inter se erũt.




Duobus enim inæqualibus numeris expositis AB CD, detracto semper minore de maiore reliquus minime metiatur præcedentẽ, quoad assumpta fuerit vnitas. Dico numeros AB CD inter se primos esse, hoc est ipsos AB CD vnitatẽ solã metiri. Si enim AB CD nõ sint primi inter se, metietur eos aliquis numerus. metiatur, sitq; E: & CD quidem ipsum AB metiens relinquat se ipso minorẽ FA, AF vero metiens DC relinquat se ipso minorem GC; & GC metiẽs FH vnitatẽ HA relinquat. quoniam igitur numerus E ipsum CD metitur, CD vero metitur BF; & E ipsum BF metitur; metitur aũt & totũ BA. ergo & reliquũ AF metietur. Sed AF metitur DG. quare & E ipsum DG metietur. metitur autem & totum DC. ergo & reliquum metietur CG. at CG metitur FH. & E igitur ipsum FH metietur. sed & metitur totum FA; & reliquam igitur vnitatem AH metietur, numerus existens. quod fieri non potest. non igitur ipsos AB CD metietur aliquis numerus. ergo AB CD primi inter se sunt. quod oportebat demonstrare.

Per 11. eiusdem notionem. 13. com. not.

P. C. COMMENTARIVS.

Huius conuersam hoc modo demonstrabimus.

Expositis duobus numeris inter se primis; si de maiori semper minor detrahatur, non cessabit huiusmodi detractio antequam ad vnitatem deuentum fuerit.



Sint enim numeri inter se primi AB CD; & si fieri potest ijsdem manentibus, & detracto sẽper minore de maiore deuentũ sit ad numerũ HA, qui præcedẽtẽ GC metiatur. Si igitur HA metitur GC, & ipsũ FH metietur. metitur aũt & se ipsũ, ergo & FA metietur; ac propterea ipsũ DG. sed & metiebatur GC. quare & totũ DC metietur. atq; ob id ipsum BF metitur. metitur aũt & FA, vt ostensum est. ergo & totũ BA metietur. Itaque quoniã HA numerus duos numeros AB CD metitur, erunt AB, CD inter se compositi. Sed & inter se primi ponuntur. quod fieri non potest. nõ igitur expositis duobus numeris inter se primis, si de maiori semper minor detrahatur, cessabit detractio, antequam ad vnitatem deuentum fuerit. quod oportebat demonstrare. Sed & illud constat.

11. com. not. 11. com. not. Diffi. 14.

Expositis duobus numeris inter se compositis, si de maiori semper detrahatur minor, detractio ad vnitatem vsque non perueniet.

Si enim ad vnitatem perueniat, erunt hi inter se primi, sed & compositi. quod est absurdum. 1. huius.

Ex iam demonstratis problema quoque illud perspicue apparere potest, Duobus numeris expositis comperire an inter se primi sint, an compositi.


Facta namque detractione, vt dictum est, si deueniet ad vnitatem vsque, dicemus eos inter se primos esse, sin minus, compositos.

PROBLEMA I. PROPOSITIO II.

Duobus numeris datis non primis inter se, maximam eorum communem mensuram inuenire.

Sint dati duo numeri non primi inter se AB CD; quorũ minor sit CD. oportet ipsorum AB CD maximam communem mensuram inuenire. Si igitur CD metitur AB cum etiam se ipsum metiatur, erit CD ipsorum AB CD communis mensura. & perspicuum est eam maximam esse. nullus enim maior CD ipsum CD metietur. si vero

si vero CD non metitur AB, ipsorum AB CD detracto semper minore de maiore, relinquetur aliquis numerus, qui metietur precedentem. vnitas quidem non relinquetur; essent enim AB CD primi inter se. quod nō ponitur. & CD quidem ipsum AB metiens relinquat se ipso minorem AE; AE vero metiens CD relinquat se ipso minorem CF: & CF ipsum AE metiatur. Itaque quoniā CF ipsum AE metitur, AE vero ipsum DF; & CF ipsum DF metietur. sed & metitur se ipsum. & totū igitur metietur CD. At CD ipsum BE metitur. ergo & CF metitur BE. metitur autem & EA. & totum igitur AB metietur. sed & metitur CD. ergo CF ipsos AB CD metitur; ac propterea CF ipsorum AB CD est cōmunis mēsura. dico etiam maximam esse. Si enim non est maxima, ipsos AB CD metietur aliquis numerus maior ipso CF. metiatur, sitq; G. & quoniam G ipsum CD metitur; CD vero ipsum BE: & G ipsum BE metitur. metitur autem & totum BA. & reliquum igitur AE metietur. Sed AE metitur DF. ergo & G ipsum DF metitur. metitur autem & totum DC. quare & reliquum CF metietur, maior minorem. quod fieri non potest. non igitur ipsos AB CD numeros numerus aliquis metietur, maior ipso CF. ergo CF ipsorum AB CD maxima erit communis mensura. Duobus igitur numeris datis non primis inter se, maxima eorum communis mensura inuenta est. quod facere oportebat.



Ex antecedente.

12.com.not.

11.com. not.

COROLLARIVM.

Ex hoc manifestum est, si numerus duos numeros metiatur, et maximam eorum communem mensuram metiri.

F. C. COMMENTARIVS.

Hoc corollarium apparet ex postrema parte demonstrationis. sit enim duorum numerorum AB CD communis mensura CF: & sit numerus aliquis G, qui ipsos AB CD metiatur. Dico etiam maximam eorum communem mensuram CF metiri. Quoniam enim G ipsum CD metitur: CD vero metitur BE: et G ipsum BE metitur. sed & metitur totum BA. ergo & reliquum AE metietur: metitur autem AE ipsum DF. ergo G ipsum DF metitur. Sed & metitur totum DC. Quare & reliquum CF, maximam scilicet eorum communem mensuram metietur. quod demonstrare oportebat.


12. com. not.

11. com. not.

PROBLEMA II. PROPOSITIO III.

Tribus numeris datis non primis inter se, maximam ipsorū cōmunem mensuram inuenire.

Sint dati tres numeri non primi inter se, ABC. oportet ipsorum ABC maximam communem mensuram inuenire. Sumatur enim duorum AB maxima cōmunis mēsura D. itaque D vel ipsum C metitur, vel non metitur. metiatur primū: metitur autem et ipsos A B. ergo D numeros A B C metitur: et ob id ipsorum est communis mensura. dico et maximam esse. si enim D non est ipsorum A B C maxima communis mensura, metietur eos aliquis numerus maior ipso D. metiatur, et sit E. quoniam igitur E metitur numeros A B C, et ipsos AB metietur, et ipsorū AB maximam communē mēsuram, quæ est D. ergo E ipsum D metitur, maior minorem. quod fieri non pōt. non igitur ABC numeros numerus aliquis maior ipso D metietur. ergo D ipsorum ABC maxima est cōis mensura.



Non

Non metiatur autē D ipſum C. Dico primum numeros D C non eſſe primos inter ſe. Quoniam enim ABC non ſunt inter ſe primi, metietur eos aliquis numerus. et qui metitur ipſos ABC, & ipſos AB metietur, et ipſorum AB maximam communem menſurā, videlicet D. metitur autem et ipſum C. ergo ipſos DC numerus aliquis metietur; ideoq; DC non ſunt inter ſe primi. Sumatur ipſorum maxima communis menſura E. et quoniam E ipſum D metitur, et D metitur ipſos AB; et E ipſos AB metitur. metitur autē et C. ergo et ipſos ABC metietur; eritq; E ipſorum ABC communis menſura. Dico et maximam eſſe. ſi enim E non eſt ipſorum ABC maxima communis menſura, metietur ABC numeros numerus aliquis maior ipſo E. metiatur, ſitq; F. et quoniam F metitur numeros ABC, et ipſos AB, et ipſorum AB maximam communem menſuram metietur, videlicet ipſum D. ergo F ipſum D metitur. metitur autem et ipſum C. quare F et ipſos DC, et ipſorum DC maximam communem menſuram metietur, videlicet ipſum E. ergo F ipſum E metitur, maior minorem. quod fieri non poteſt. non igitur ABC numeros numerus aliquis maior ipſo E metietur. ergo ipſorum ABC maxima eſt communis mēſura. Tribus igitur numeris datis non primis inter ſe, eorum maxima communis menſura inuēta eſt. quod facere oportebat.

A.....18
B.....12
C....4
D.....6
E..2
F—

Ex corol. anteced.

COROLLARIVM.

Ex his manifeſtum eſt, ſi numerus numeros tres metiatur, et ipſorum maximam communem menſuram metiri. A

Eodem modo et pluribus numeris datis maximā communem menſuram inueniemus. B

F. C. COMMENTARIVS.

Ex his manifeſtum eſt &c.] *Sequitur hoc, quemadmodum in antecedente demonſtrauimus.* A
Eodem modo &c.] *Sed & illud conſtat, ſi numerus plures numeros metiatur, & communem eorum menſuram metiri.* B

THEOREMA II. PROPOSITIO IIII.

Omnis numerus omnis numeri minor maioris, vel pars eſt, vel partes.

Sint duo numeri A BC, quorum BC ſit minor. Dico BC ipſius A vel partem eſſe, vel partes. Numeri enim A BC vel primi ſunt inter ſe, vel non. ſint prius inter ſe primi, & diuiſo B C in vnitates, quæ in ipſo ſunt, erit vnaquæque vnitas earum, quæ in B C, pars aliqua ipſius A. ergo B C ipſius A partes eſt. ſed non ſint A BC inter ſe primi. Itaque B C vel ipſum A metitur, vel non. et ſiquidem metitur, erit BC pars ipſius A: ſin minus, ſumatur ipſorum A BC maxima communis menſura D; et diuidatur BC in numeros ipſi D æquales BE EF FC. Quoniā igitur D numerum A metitur, erit D pars ipſius A. æqualis autem eſt D vnicuique ipſorum BE EF FC. ergo et vnuſquiſque ipſorum BE EF FC pars eſt ipſius A: ac propterea B C ipſius A partes eſt.


A.....8
B.....5C
A.....8
B....4C
A.....8
B..2E..2F..2C
D..2

Omnis

Omnis igitur numerus omnis numeri, minor maioris, vel pars est, vel partes. quod demonstrare oportebat.

THEOREMA III. PROPOSITIO. V.

Si numerus numeri pars fuerit, et alter alterius eadem pars; et vterque vtriusque eadem pars erit, quæ vnus vnius.




Numerus A numeri BC pars sit: et alter D alterius EF eadem pars, quæ est A ipsius BC. Dico et vtrumque AD vtriusque BC EF eãdem partem esse, quæ est A ipsius BC. Quoniam enim quæ pars est A ipsius BC, eadem est et D ipsius EF; quot numeri sunt in BC æquales ipsi A, tot erũt et in EF numeri æquales ipsi D. Diuidatur BC quidem in numeros æquales ipsi A, videlicet in BG, GC; EF vero diuidatur in numeros ipsi D æquales, hoc est EH HF. erit vtique æqualis multitudo numerorũ BG GC multitudini ipsorum EH HF. & quoniam æqualis est BG ipsi A, & EH ipsi D, erunt BG EH ipsis A D æquales. Et eadem ratione cum GC sit æqualis ipsi A, & HF ipsi D; & GC HF ipsis A D æquales erunt. quot igitur numeri sunt in BC, æquales ipsi A, tot sunt & in BC EF æquales ipsis A D. ergo quotuplex est BC ipsius A, totuplex erit et vterque BC EF vtriusque A D. quæ igitur pars est A ipsius BC, eadem pars erit et vterque A D vtriusque BC EF. quod demonstrare oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

Ex hoc autem licet illud etiam demonstrare.

Si numerus numeri multiplex fuerit, et alter alterius æque multiplex; et vterque vtriusque æque multiplex erit, atque vnus vnius.




Sit enim A numerus numeri B multiplex, et alter C alterius D aeque multiplex. Dico vtrumque AC vtriusque BD aeque multiplicem esse, atque A ipsius B. quoniam enim A ipsius B multiplex est, & C ipsius D aeque multiplex; erit B ipsius A pars aliqua, & D ipsius C eadem pars. quare ex ijs, quae proxime tradita sunt & vterque BD vtriusque AC eadem pars erit, quae est B ipsius A. Vterque igitur AC vtriusque BD aeque multiplex est, atque A ipsius B. quod demonstrare oportebat.

Sed quod de duobus dicitur, possumus etiam ad quotcumque numeros amplificare. vt Si fuerint quotcumque numeri quotcumque numerorum æqualium multitudine, singuli singulorum æque multiplices, quotuplex est vnus vnius, totuplices erunt & omnes omnium [*quod eodem modo demonstrabimus. Hoc autem respondebit ei, quod in prima propositione quinti libri de omnibus magnitudinibus demonstratur.*

THEOREMA IIII. PROPOSITIO. VI.

Si numerus numeri partes fuerit, & alter alterius eędem partes; & vterque vtriusque eædem partes erit, quę vnus vnius.



Numerus enim AB numeri C partes sit, & alter D alterius F eędem partes; quæ AB ipsius C. Dico & vtrumque AB DE vtriusque C F easdẽ partes esse, quæ AB ipsius C. quoniam enim quę partes est AB ipsius C, eædem est DE ipsius F; quot partes sunt in AB ipsius C, tot erunt & in DE

partes

partes ipſius F.Diuidatur AB quidem in partes ipſius C, videlicet AG GB;DE vero diuidatur in partes ipſius F,hoc eſt DH HE.erit ipſorum AG GB multitudo æqualis multitudini ipſorũ DH HE.& qm̃ quæ pars eſt AG ipſius C, eadem eſt pars & DH ipſius F:quę pars eſt AG ipſius C,eadem pars erit & vterque AG DH vtriuſque C F.Simili ratione & quæ pars eſt GB ipſius C, eadem pars erit & vterque GB HE vtriuſque C F.Quę igitur partes eſt AB ipſius C,eędem partes eſt & vterque AB DE vtriuſque C F.quod demonſtrare oportebat.


F. C. COMMENTARIVS.

Similiter & hanc,& antecedentem poſſumus ad quotcunque numeros transferre;ut Si quotcunque numeri minores ad totidem alios maiores referantur, ſintq; ſinguli ſingulorum vel eadem pars,vel eædem partes;quę pars,vel partes eſt vnus vnius, eadem pars,vel eædem partes erunt & omnes omnium.

THEOREMA V. PROPOSITIO. VII.

Si numerus numeri pars fuerit, quæ ablatus ablati; & reliquus reliqui eadem pars erit,quæ totus totius.

Numerus enim AB numeri CD pars ſit,quæ ablatus AE ablati CF. Dico & reliquum EB reliqui FD eandem partem eſſe, quę eſt totus AB totius CD.quæ enim pars eſt AE ipſius CF,eadem pars ſit & EB ipſius CG.ergo quæ pars eſt AE ipſius CF, eadem pars eſt & AB ipſius CF.quæ autẽ pars eſt AE ipſius CF, eadem pars ponitur & AB ipſius CD.quæ igitur pars eſt AB ipſius GF, eadem eſt & AB ipſius CD.quare AB vtriuſque GF CD eadem eſt pars.æqualis igitur eſt GF ipſi CD.communis auferatur CF.ergo reliquus GC reliquo FD eſt æqualis. & quoniam quæ pars eſt AE ipſius CF, eadem eſt & EB ipſius GC. æqualis autem eſt GC ipſi FD: quę pars eſt AE ipſius CF, eadem erit & EB ipſius FD.ſed quæ pars eſt AE ipſius CF, eadem eſt & AB ipſius CD.ergo quæ pars eſt EB ipſius FD,eadem eſt & AB ipſius CD, & reliquus igitur EB reliqui FD eadem pars erit,quæ totus AB totius CD. quod demonſtrare oportebat.



5.huius.


4.com. not.

F. C. COMMENTARIVS.

Ex his autem illud quoque demonſtrare licebit.

Si numerus numeri æque multiplex fuerit, atque ablatus ablati, & reliquus reliqui æque multiplex erit, atque totus totius.

Iiſdem enim,quae ſupra,manentibus. ſit numerus CD aeque multiplex numeri AB,atque ablatus CF ablati AE,Dico & reliquum FD reliqui EB aeque multiplicem eſſe,atque totũ CD totius AB. quoniam enim CD ipſius AB aeque multiplex eſt,atque ablatus CF ablati AE; erit AB ipſius CD eadem pars,quae eſt AE ipſius CF. ergo ex iam demonſtratis & reliquus EB reliqui FD eadem pars eſt,quae totus AB totius CD.reliquus igitur FD reliqui EB aequemultiplex erit, atque totus CD totius AB.quod demonſtrandum fuerat.




THEOREMA VI. PROPOSITIO VIII.

Si numerus numeri partes fuerit, quæ ablatus ablati; & reliquus reliqui eædem partes erit, quę totus totius.

Numerus enim AB numeri CD partes ſit, quę ablatus AE ablati CF,Dico & reliquum EB reliqui FD eaſdem partes eſſe,quæ totus AB totius CD. ponatur enim

ipſi AB ęqualis GH.quæ igitur partes eſt GH ipſius CD,eędē eſt & AE ipſius CF.Diuidatur GH quidē in partes ipſius CD,videlicet GK KH:AE vero diuidatur in partes ipſius CF,videlicet AL LE.erit igitur ipſarū GK KH multitudo æqualis multitudini ipſarum AL LE.Et quoniā quæ pars eſt GK ipſius GD, eadem eſt & AL ipſius CF:maior aūt CD,quā CF.ergo & GK,quā AL eſt maior.ponatur ipſi AL ęqualis GM.quę igitur pars eſt GK ipſius CD, eadem eſt et GM ipſius CF.quare et reliquus MK reliqui FD eadē pars eſt, quę totus GK totius CD.Rurſus quoniā quæ pars KH ipſius CD, eadē eſt et EL ipſius CF; maior autem CD, quàm CF: erit & KH quàm EL maior. ponatur ipſi EL ęqualis KN.quę igitur pars eſt KH ipſius CD, eadē eſt & KN ipſius CF. ergo & reliquus NH reliqui FD eadē pars eſt, quæ totus KH totius CD. oſtēſum autem eſt & reliquum MK reliqui FD eandem partem eſſe; quæ totus GK totius DC. & vterque igitur MK NH ipſius DF eædem partes eſt, quę totus HG totius DC.æqualis autem vterque quidem MK NH ipſi EB; HG vero ipſi BA. & reliquus igitur EB reliqui FD eædem partes eſt, quæ totus AB totius CD.quod demonſtrare oportebat.




7.huius.

THEOREMA VII. PROPOSITIO IX.

Si numerus numeri pars fuerit, & alter alterius eadem pars; & permutando quæ pars eſt, vel partes primus tertij, eadē erit pars, vel eædem partes & ſecundus quarti.

Numerus enim A numeri BC pars ſit,& alter D alterius EF eadem pars,quę A ipſius BC.minor autem ſit A,quàm D.Dico & permutādo quę pars eſt A ipſius D, vel partes, eādem partem eſſe & BC ipſius EF,vel eaſdem partes. Quoniam enim quę pars eſt A ipſius BC,eadem eſt & D ipſius EF;quot numeri ſunt in BC ęquales ipſi A,tot ſunt et in EF æquales ipſi D.diuidatur BC quidem in numeros ipſi A æquales,videlicet in BG GC: EF vero diuidatur in numeros ipſi D ęquales, EH HF.erit ipſorū BG GC multitudo qualis multitudini ipſorum EH HF. et quoniam numeri BG GC inter ſe ſunt ęquales;ſunt autem et ęquales EH HF;atque eſt ipſorum BG GC multitudo æqualis multitudini ipſorūm EH HF:quæ pars eſt BG ipſius EH,vel partes,eadem pars erit et GC ipſius HF,vel eædem partes.ergo quæ pars eſt BG ipſius EH,vel partes, eadem pars erit et vterque BC vtriuſquè EF, vel eædem partes. æqualis autem eſt BG ipſi A,et EH ipſi D.quæ igitur pars eſt A ipſius D, vel partes, eadem pars erit et BC ipſius EF,vel eædm partes.quod demonſtrare oportebat.




5.huius.
6.huius.

THEOREMA VIII. PROPOSITIO X.

Si numerus numeri partes fuerit, & alter alterius eædem partes; & permutando quę partes eſt primus tertij, vel pars, eędem partes erit & ſecundus quarti, vel eadem pars.

Numerus enim AB numeri C partes ſit, et alter DE alterius F eędem partes: ſit autem AB minor, quàm DE. Dico et permutando quæ partes eſt AB ipſius DE, vel pars, eaſdem partes eſſe et C ipſius F,vel eandem partem. quoniam enim quæ partes eſt AB ipſius C,eædem partes eſt et DE ipſius F; quot ſunt in AB partes ipſius C, tot erunt et




in

in DE partes ipsius F. diuidatur. AB quidem in partes ipsius C, videlicet AG GB: DE vero diuidatur in partes ipsius F, hoc est DH HE. erit vtique ipsarum AG GB multitudo multitudini ipsarum DH HE æqualis. et quoniam quæ pars est AG ipsius C, eadem est pars et DH ipsius F. et permutando quæ pars est AG ipsius DH, vel partes, eadem pars erit et C ipsius F, vel eędē partes. simili ratione et quæ pars est GB ipsius HE, vel partes, eadem pars erit et C ipsius F, vel eadem partes. ergo quę pars est AG ipsius DH, vel partes, eadem pars erit et AB ipsius DE, vel eædem partes. sed quæ pars est AG ipsius DH, vel partes, eadem pars est et C ipsius F, uel eędem partes. Et quæ igitur partes est AB ipsius DE, vel pars, eædem partes est et C ipsius F, vel eadem pars. quod demonstrare oportebat.

THEOREMA IX. PROPOSITIO XI.

Si fuerit vt totus ad totum, ita ablatus ad ablatum, & reliquus ad reliquum erit, vt totus ad totum.


Sit vt totus AB ad totum CD, ita ablatus AE ad ablatum CF. Dico et reliquum EB ad reliquum FD ita esse, vt totus AB ad totum CD. Quoniam enim est vt AB ad CD, ita AE ad CF, quæ pars est AB ipsius CD, vel partes, eadē pars erit et AE ipsius CF, vel eædem partes. ergo et reliquus EB reliqui FD eadem pars erit, vel eædem partes, quę AB ipsius CD. est igitur ut EB ad FD, ita AB ad CD. quod demonstrare oportebat.



Diffi. 20.
7. 8. huius.
Per cõuersã.
Diffi. 20.

F. C. COMMENTARIVS.

Precedens demonstratio congruit, cum AB fuerit minor, quàm CD. sed si AB maior sit, quàm CD, nihilominus idem demonstrabitur. nam vel CD metitur ipsum AB, vel non metitur. & si quidē metitur, quoniam est vt AB ad CD, ita AE ad CF; erit AB ipsius CD aeque multiplex, atque AE ipsius CF. quare ex ijs, quae nos demōstrauimus ad septimā huius; & reliquus EB reliqui FB reliqui FD aeque multiplex est, atq; totus AB totius GD. reliquus igitur EB ad reliquum FD, erit vt totus AB ad totum CD. si vero CD non metitur ipsum AB, rursus quoniam vt AB ad CD, ita est AE ad CF, quae partes est CD ipsius AB, eędem partes erit CF ipsius AE. ergo & reliquus FD reliqui EB eędem partes est, quae totus CD totius AB. reliquus igitur EB ad reliquum FD ita erit, vt totus AB ad totum CD. quod oportebat demonstrare.




Diffi. 20.
Per cõuersã.
Diffi. 20.
D. ffi. 20.
8. huius
Per cõuersã.
Diffi. 20.

THEOREMA X. PROPOSITIO XII.

Si quotcumque numeri proportionales fuerint, vt vnus antecedentium ad vnum consequentium, ita erunt omnes antecedentes ad omnes consequentes.

Sint quotcumque numeri proportionales AB CD; sitq; vt A ad B, ita C ad D. Dico vt A ad B, ita esse AC ad BD. Quoniam enim est vt A ad B, ita C ad D, quæ pars est A ipsius B, uel partes, eadem pars erit et C ipsius D, vel partes. et uterque igitur AC utrumque BD eadem pars est, uel partes, quæ A ipsius B. ergo ut A ad B, ita est AC ad BD. quod demonstrare oportebat.




Diffi. 20.
5. 6. huius.
Per conuers.
Diffi. 20.

SCHOLIVM.

Hoc quinto, & sexto vniuersalius est. quæ enim illic seorsum in partes, & partibus, eadem hoc loco vnà demonstrantur.

F. C. COMMENTARIVS.

Et hęc demonstratio congruit tantum, cum antecedentes numeri minores fuerint consequentibus. quòd si maiores sint, rursus vel B metitur ipsum A, vel non metitur. si metitur, ita dicemus. Quoniam est vt A ad B, ita C ad D, aeque multiplex erit A ipsius B, atque C ipsius D. ergo ex ijs, quae demonstrauimus ad quintum huius, & vterque A C vtriusq;




Conuer. 10. diffi. *BD aeque multiplex est, atque A ipsius B. Vt igitur A ad B, ita erit vterq; A C ad vtrũq; B D.*

6. huius. *Quòd si B non metitur ipsum A, ita argumentabimur. quoniam est vt A ad B, ita C ad D, quae partes est E ipsius A, eędem partes erit D ipsius C. ergo & uterq; A C vtriusque B D eędem partes est, quae A ipsius B. quare vt A ad B, ita erit A C ad B D.*

Conuer. 20. diffi. *Idem demonstrabimus etiam si plures sint numeri proportionales, hoc, quod sequitur, prœmisso.*

Quæ eidem eædem sunt numerorum proportiones, et inter se eædem erunt.


Sit vt A ad B, ita C ad D: vt autem C ad D, ita E ad F. Dico vt A ad B, ita esse E ad F. Si enim numerus A sit maior, quàm E, quoniam est vt A ad B, ita C ad D, quae pars, vel partes est B ipsius A, eadem pars erit, vel partes D ipsius C. Rursus quoniam vt C ad D, ita est E ad F, quae pars est, vel partes D ipsius C, eadem pars, vel partes erit F ipsius E. quae igitur pars, vel partes est B ipsius A, eadem pars erit, vel partes F




Conuer. 10. diffi. *ipsius E. ergo vt A ad B, ita est E ad F.*

Si vero A sit minor, quàm B, quoniam vt A ad B, ita est C ad D, quae pars est, vel partes A ipsius B, eadem pars, vel partes erit C ipsius D. Rursus quoniam vt C ad D, ita E ad F, quae pars, vel partes est C ipsius D, eadem pars, vel partes erit E ipsius F. ergo quae pars, vel partes est A ipsius B, eadem est pars, vel partes E ipsius F. vt igitur A ad B, ita E ad F. quod demonstrandum

Conuer. 10. diffi. *proposuimus.*



Hoc demõstrato sint numeri proportionales A B C, D E F; sitq; vt A ad D, ita B ad E, & C ad F. Eadẽ ratione demonstrabimus vt A ad D, ita esse A B ad D E. Et quoniam vt A ad D, ita est C ad F, erit ex ijs, quae nos proxime demõstrauimus, vt A B ad D E, ita C ad F. nõ aliter ostendemus vt A B ad D E, ita esse A B C ad D E F. vt igitur A ad D, ita erũt A B C ad D E F. et eodẽ modo in alijs, quotquot numeri proportionales fuerint. Hoc autem respondet ei, quod in 12 quinti vniuerse de magnitudinibus demonstratur.




THEOREMA XI. PROPOSITIO XIII.

Si quattuor numeri proportionales fuerint, & permutando proportionales erunt.

Sint quattuor numeri proportionales ABCD; sitq; vt A ad B, ita C ad D. Dico et per-

et permutãdo proportionales eſſe, videlicet vt A ad C, ita eſſe B ad D. quoniã enim eſt vt A ad B, ita C ad D, quę pars eſt A ipſius B, vel partes, eadẽ pars erit et C ipſius D, vel eædem partes. permutãdo igitur quæ pars eſt A ipſius C, vel partes, eadẽ pars eſt & B ipſius D, uel partes. ergo vt A ad C, ita eſt B ad D. quod demonſtrare oportebat.




Diff. 10.

9. 10. huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Hęc demonſtratio congruit, vbi antecedentes numeri minores ſint conſequentibus, ſitq; A minor, quàm C. ſi vero ſint maiores, & A maior ſit quã B, & minor quàm C, ita dicemus. Quoniam eſt vt A ad B, ita C ad D; quae pars eſt, vel partes B ipſius A, eadem pars, vel partes erit D ipſius C. ergo permutando quae pars eſt, vel partes B ipſius D, eadem pars, vel partes erit A ipſius C. vt igitur A ad C, ita eſt B ad D.




Diff. 10.

9. 10. huius.

Cõu. dif. 10.

Quòd ſi A ſit maior, quàm B, et maior, quàm C, ita argumẽtabimur. Quoniã vt A ad B, ita C ad D, quae pars, uel partes eſt D ipſius C, eadẽ pars, vel partes erit B ipſius A. ergo permutãdo quę pars, vel partes eſt D ipſius B, eadem pars, vel partes erit C ipſius A. eſt igitur vt A ad C, ita B ad D. Denique ſi A ſit minor, quàm B, & maior, quàm C. hoc modo. Quoniam vt A ad B, ita C ad D, quae pars, vel partes eſt C ipſius D, eadem pars, vel partes eſt A ipſius B. permutando igitur quae pars eſt, vel partes C ipſius A, eadem pars, vel partes eſt D ipſius B. ergo vt A ad C, ita erit B ad D.




9. 10. huius.

Cõu. dif. 10.

THEOREMA XII. PROPOSITIO XIIII.

Si fuerint quotcumque numeri, et alij ipſis multitudine æquales, qui bini ſumantur, et in eadem proportione; etiam ex æquali in eadem proportione erunt.

Sint enim quotcumque numeri ABC, & alij ipſis multitudine æquales, qui bini ſumantur, & in eadem proportione DEF; ſitq; vt A ad B, ita D ad E; vt autem B ad C, ita E ad F. Dico etiam ex æquali vt A ad C, ita eſſe D ad F. Quoniam enim eſt vt A ad B, ita D ad E; erit permutãdo vt A ad D, ita B ad E. Rurſus quoniam eſt vt B ad C, ita E ad F; permutando vt B ad E, ita erit C ad F. vt autem B ad E, ita erat A ad D. & vt igitur A ad D, ita C ad F. ergo permutando vt A ad C, ita D ad F. quod oportebat demonſtrare.




Ex antecedentia

Ex demonſtratis ad 13 huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Quòd ſi plures, quàm tres numeri prportionales fuerint ABCD EFGH; ſitq; ut A ad B, ita E ad F: vt autem B ad C, ita F ad G; et vt C ad D, ita G ad H: ſimiliter demonſtrabimus ut A ad C, ita eſſe E ad G. et quoniã eſt vt C ad



A ad D, ita

D, ita G ad H, rursus demonstrabimus vt A ad D, ita E ad H. & eodem modo in alijs.


Sed quoniam Euclides conuersam rationem, compositam, & diuisam, conuersionemq; rationis in numeris omisit; nos eas, ne quid desideretur, hoc loco apponere curauimus.

PROPOSITIO I.

Si quattuor numeri proportionales sint, & conuertendo proportionales erunt.

Sint quattuor numeri proportionales ABCD; sitq; ut A ad B, ita C ad D. Dico vt B ad A, ita esse D ad C. Si enim A sit minor, quàm B, quo-
Diffi. 10. *niam est vt A ad B, ita C ad D, quae pars uel partes est A ipsius B, eadē pars, vel eędē partes*
Cōu. dif. 10. *erit C ipsius D. ergo ut B ad A, ita est D ad C.*


Si uero A sit maior, quàm B, rursus quoniam vt A ad B, ita C ad D, quę pars, vel partes est B ipsius A, eadem pars, uel partes erit D ipsius C. Vt igitur B ad A, ita est D ad C.



PROPOSITIO II.

Si quattuor numeri proportionales sint, & componendo proportionales erunt.


Sint quattuor numeri proportionales A B C D; & sit vt A ad B, ita C ad D. Dico ut A B ad B, ita esse C D ad D. nam cum sit ut A ad B, ita C ad D; & permutando vt A ad C, ita erit B ad D. quare ex duodecima huius vt A B ad C D, ita est B ad D. Rursus igitur permutando ut AB ad B, ita CD ad D.



PROPOSITIO III.

Si quattuor numeri proportionales sint, & diuidendo proportionales erunt.

Sint quattuor numeri proportionales AB B CD D; sitq; vt numerus AB, qui ex duobus numeris constat ad numerum B, ita C D ex duobus C D constans ad ipsum D. Dico vt A ad B, ita esse C ad D. Quoniam enim est vt AB ad B, ita
13. huius. *CD ad D, erit permutando vt A B ad C D, ita B ad D. si autem fuerit ut totus*
11. huius. *ad totum, ita ablatus ad ablatum, & reliquus ad reliquum erit, vt totus ad totum. ergo A ad C est vt AB ad CD. sed ut AB ad C D, ita erat B ad D. Ex eo igitur, quod demonstrauimus ad 12 huius, vt A ad C, ita erit B ad D: & rursus permutando ut A ad B, ita C ad D.*




PROPOSITIO IIII.

Si quattuor numeri proportionales sint, et per conuersionem rationis proportionales erunt.

Sint quattuor numeri proportionales AB B CD D; sitq; vt AB ad B, ita CD ad D. Dico ut AB ad A, ita esse CD ad C. Quoniam enim est ut AB ad B, ita
13. huius. *CD ad D, erit permutando vt A B ad C D, ita B ad D. quòd cum sit vt totus ad*
12. huius. *totum, ita ablatus ad ablatum, erit & reliquus A ad reliquum C, vt AB ad CD: & rursus permutando, conuertendoq; ut AB ad A, ita CD ad C.*

Sed & quod Euclides de magnitudinibus demonstrauit in vigesima quarta quinti libri, nos de uumeris demonstrabimus in hunc modum.




PROPOSITIO V.

Si primus ad secundum eandem habeat proportionem, quam tertius ad quartum; habeat autem et quintus ad secundum proportionem eandem, quam sextus ad quartum; et compositus primus et quintus ad secundum eandem proportionem

nem habebit, quam tertius et ſextus ad quartum.

Primus enim numerus A B ad ſecundum C proportionem habeat eandem, quam tertius DE ad quartum F: habeatq́, quintus B G ad ſecundum C eandem proportionem, quam ſextus E H ad quartum F. Dico primum & quintum A G ad ſecundum C eandem proportionẽ habere, quam tertius, & ſextus DH ad quartum F. Quoniam enim eſt vt EG ad C, ita I H ad F; erit conuertendo vt C ad BG, ita F ad E H. et quoniam vt A B ad C, ita DE ad F: vt autem C ad BG, ita F ad I H; erit ex aequali vt AB ad BG, ita DE ad EH. quare componendo ut AG ad GB, ita erit DH ad H E. Sed vt G B ad C, ita eſt EH ad F. rurſus igitur ex aequali vt AG ad C, ita eſt DH ad F.



2. Additarũ.

14. huius.

2. Additarũ.

THEOREMA XIII. PROPOSITIO XV.

Si vnitas numerum aliquem metiatur, alter autem numerus æqualiter metiatur alium aliquem; et permutando unitas tertium numerum æqualiter metietur, atque ſecundus quartum.

Vnitas enim A numerum aliquem BC metiatur, alter autem numerus D æqualiter metiatur alium aliquem EF. Dico & permutando A vnitatem æqualiter metiri numerum D, atque BC ipſum EF. Quoniam enim A vnitas æqualiter metitur numerum BC, atque D ipſum EF; quot vnitates ſunt in BC, tot ſunt et in EF numeri æquales ipſi D. diuidatur BC quidem in vnitates, quæ in ipſo ſunt, videlicet BG GH HC: EF vero diuidatur in numeros ipſi D æquales EK KL LF. erit igitur ipſorum BG GH HC multitudo æqualis multitudini ipſorum EK KL LF. & quoniã BG GH HC vnitates inter ſe æquales ſunt: ſuntq́; numeri EK KL LF inter ſe æquales, & vnitatum BG GH HC multitudo æqualis multitudini numerorum EK KL LF: erit vt BG vnitas ad numerum EK, ita GH vnitas ad numerum KL, & vnitas HC ad LF numerum; & vt vnus antecedentium ad vnum conſequentium, ita omnes antecedentes ad omnes cõſequentes. eſt igitur vt BG ad numerum E K, ita BC ad EF. æqualis autem eſt BG vnitas vnitati A: et EK numerus numero D. quare ut A vnitas ad numerum D, ita eſt BC ad EF. æqualiter igitur A unitas numerum D metitur, atque BC ipſum EF. quod demonſtrare oportebat.

A.

B. G. H. C

D..

E..K..L..F

12. huius:

Diſſi. 2p.

THEOREMA XIIII. PROPOSITIO. XVI.

Si duo numeri ſe ſe multiplicantes fecerint aliquos, facti ex ipſis inter ſe æquales erunt.

Sint duo numeri A B, & A quidem ipſum B multiplicans faciat C; B vero multiplicans A faciat D. Dico C ipſi D æqualem eſſe. Quoniam enim A ipſum B multiplicans fecit C, metietur B ipſum C per vnitates, quæ ſunt in A. metitur autem & E vnitas numerum A per vnitates, quę in ipſo ſunt. æqualiter igitur E vnitas numerum A metitur, atq; B ipſum C. quare permutando vnitas E numerum B æqualiter metitur, atq; A ipſum C. Rurſus quoniam B ipſum A multiplicans fecit D; A metietur ipſum D per vnitates, quæ ſunt in B. metitur autem & E unitas numerum B per unitates, quæ in ipſo ſunt. ergo E unitas numerum B æqualiter metitur, atque A ipſum D. ſed E unitas numerũ B æqualiter

E. 1

A.. 2

B... 3

C..... 6

D..... 6

10. com. not.

6. com. not.

Ex antecedente.

B æqualiter metitur, atque A ipſum C. Cum igitur A vtrũque ipſorum C D æqua-
4.com. not. liter metiatur, erit C ipſi D æqualis. quod demonſtrare oportebat.

THEOREMA XV. PROPOSITIO XVII.

Si numerus duos numeros multiplicans fecerit aliquos, facti ex ipſis eandem proportionem habebunt, quam multiplicati.

1 Numerus enim A duos numeros B C multiplicans faciat ipſos D E. Dico ut B ad C, ita eſſe D ad E. quoniam enim A ipſum B mul-
10.com.not. tiplicans fecit D, metietur B ipſum D per unitates, quæ ſunt in A.
6.com.not. metitur autem et F unitas numerum A per vnitates, quæ in ipſo ſunt. ęqualiter igitur F unitas numerum A metitur, atque B ipſum
Conuerſ.ac. Diffi. D. ergo ut F unitas ad numerum A, ita eſt B ad D. eadem ratione et ut F unitas ad numerum A, ita C ad E. & ut igitur B ad D, ita C ad E; & permutando ut B ad C, ita D ad E. quod demõſtrare oportebat.

F. 1
A..2
B...3
C....4
D.....6
E.....8

F. C. COMMENTARIVS.

Idem ſequetur etiam ſi numerus aliquis plures quàm duos numeros multiplicans fecerit totidem alios, facti namque eandem, quam multiplicati, proportionem habebunt.

Numerus enim A tres numeros BCD multiplicans faciat ipſos EFG. Dico vt B ad C, ita eſſe E ad F; & vt C ad D, ita F ad G. Similiter enim, vt ſupra, demonſtrabimus, vt H vnitas ad numerum A, ita eſſe B ad E, & C ad F, & D ad G. erit igitur vt B ad E, ita C ad F, & D ad G. itaque quoniam eſt vt B ad E, ita C ad F, erit permutando vt B ad C, ita E ad F. Rurſus quoniam vt C ad F, ita D ad G, & permutando erit vt C ad D, ita F ad G. vt igitur B ad C, ita eſt E ad F: & vt C ad D, ita F ad G. quod oportebat demonſtrare.

H.1
A..2
B...3
C....4
D.....5
E.....6
F.....8
G..... 10

THEOREMA XVI. PROPOSITIO. XVIII.

Si duo numeri numerum aliquem multiplicantes fecerint aliquos, facti ex ipſis eandem proportionem habebunt, quam multiplicantes.

Duo enim numeri A B numerum aliquem C multiplicantes faciant ipſos D E. Dico vt A ad B, ita eſſe D ad E. Quoniam enim A
16.huius. ipſum C multiplicans fecit D, & C multiplicans A ipſum D fecit. Eadem ratione & C ipſum B multiplicans fecit E. Itaque numerus C
Ex antecedente. duos numeros A B multiplicans ipſos D E fecit, eſt igitur ut A ad B, ita D ad E. quod demonſtrare oportebat.

A...3
B....4
C..2
D.....6
E.....8

F. C. COMMENTARIVS.

Quòd ſi plures quàm duo numeri aliquem multiplicantes fecerint totidem alios, facti ſimiliter eandem, quam multiplicantes, proportionem habebunt. quod eodem modo demonſtrabimus.


THEOREMA XVII. PROPOSITIO. XIX.

Si quattuor numeri proportionales fuerint, qui ex primo, &

quarto

quarto fit numerus æqualis erit ei, qui fit ex ſecundo, & tertio. & ſi numerus, qui fit ex primo, & quarto ęqualis fuerit ei, qui ex ſecundo, & tertio, quattuor numeri proportionales erunt.

Sint quattuor numeri proportionales ABCD; ſitq; vt A ad B, ita C ad D: & A quidē ipsū D multiplicans faciat E: B vero multiplicans C faciat F. Dico E ipſi F ęqualem eſſe. multiplicās enim A ipſum C faciat G. & quoniam A ipſum quidem C multiplicans fecit G; ipſum uero D multiplicans E fecit: numerus A duos numeros CD multiplicans fecit ipſos G E. eſt igitur ut C ad D, ita G ad E. Vt autem C ad D, ita A ad B. quare & ut ad B, ita G ad E. Rurſus quoniam A ipſum C multiplicans G fecit; ſed & B ipſum C multiplicās fecit F: duo numeri A B numerum aliquem C multiplicantes fecerunt ipſos G F. vt igitur A ad B, ita eſt G ad F. Sed & vt A ad B, ita G ad E. ergo & ut G ad E, ita eſt G ad F. quòd cum G ad utrumque ipſorum E F eādem proportionem habeat, erit E ipſi F æqualis. Sed ſit E ęqualis ipſi F. Dico ut A ad B, ita eſſe C ad D. ijſdem enim conſtructis quoniam A ipſos C D multiplicans fecit G E, erit ut C ad D, ita G ad E. eſt autem E ipſi F ęqualis. ut igitur G ad E, ita G ad F. ſed ut G ad E, ita C ad D. ergo & ut C ad D, ita G ad F. ut autem G ad F, ita A ad B: & ut igitur A ad B, ita C ad D. quod demonſtrare oportebat.



17. huius.

Ex antecedente. A

17. huius. B C

F. C. COMMENTARIVS.

A. Quòd cum G ad utrumque ipſorum E F eandem proportionem habeat, erit E ipſi F æqualis] *Hoc patet ex vigeſima diffinitione. Si enim G ſit maior, quàm F, vel F; erit vterque ipſorum E F vel eadem pars, vel eędem partes ipſius G ſi vero G; ſit minor, erit G vel eadem pars, vel eędem partes vtriuſque ipſorum E F. quare E F inter ſe aequales ſint neceſſe eſt.* 3. 4. co. not.


B. Eſt autem E ipſi F æqualis. ut igitur G ad E, ita G ad F.] *Per conuerſam vigeſimae diffinitionis. nam ſiue vterque ipſorum E F eadem pars, vel eędem partes ſit ipſius G, ſiue G eadem pars ſit, vel eędem partes vtriuſque ipſorum E F, erit vt G ad E, ita G ad F.*

C. Vt autem G ad F, ita A ad B.] *cum enim duo numeri A B ipſum C multiplicantes faciant G F, vt A ad B, ita erit G ad F.*

THEOREMA. XVIII. PROPOSITIO XX.

Si tres numeri proportionales fuerint, qui ab extremis fit numerus æqualis erit ei, qui fit à medio. Si autem qui ab extremis fit æqualis fuerit ei, qui à medio; tres numeri proportionales erunt.

Sint tres numeri proportionales ABC; ſitq; ut A ad B, ita B ad C. Dico numerum, qui fit ex AC. æqualem eſſe ei, qui fit ex B. ponatur enim ipſi B æqualis D. eſt igitur ut A ad B, ita D ad C. ergo qui fit ex AC æqualis eſt ei, qui ex B D. qui autem fit ex BD eſt æqualis ei, qui fit ex B; ęqualis etenim eſt B ipſi D. qui igitur fit ex AC ipſi B eſt æqualis. Sed qui fit ex AC æqualis ſit ei, qui ex B. Dico ut A ad B, ita eſſe B ad C. Quoniam enim qui ex AC fit ęqualis eſt ei, qui fit ex B; qui autem fit ex B eſt æqualis ei, qui ex BD: erit ut A ad B, ita D ad C. ſed B ipſi D eſt ęqualis. ut igitur A ad B, ita eſt B ad C. quod demonſtrare oportebat.



Ex antecedente.

Ex antecedente.

THEO-

THEOREMA XIX. PROPOSITIO. XXI.

Minimi numeri eandem, quam ipſi proportionem habentium, eos, qui eandem habent proportionem, æqualiter metiuntur, maior maiorem, & minor minorem.

Sint enim minimi numeri eandem, quam A B, proportionem habentium CD EF. Dico CD æqualiter metiri ipſum A, atque EF ipſum B. numerus enim CD ipſius A non eſt partes. Si enim fieri poteſt, ſit CD partes ipſius A. ergo EF ipſius B eædem partes erit, quæ CD ipſius A. quot igitur in CD partes ſunt ipſius A, tot erunt & in EF partes ipſius B. Diuidatur CD quidem in ipſius A partes CG GD: EF vero diuidatur in partes ipſius B, EH HF. erit igitur ipſarum CG GD multitudo æqualis multitudini ipſarum EH HF. & quoniam CG GD æquales inter ſe ſunt; ſunt autem & EH HF inter ſe æquales, atque eſt ipſarum CG GD multitudo multitudini ipſarum EH HF æqualis: erit ut CG ad EH, ita GD ad HF. erit igitur & ut unus antecedentium ad unum conſequentium, ita omnes antecedentes ad omnes conſequentes. quare ut CG ad EH, ita eſt CD ad EF; ac propterea CG EH in eadē ſunt proportione, in qua CD EF, minores ipſis exiſtentes. quod fieri non poteſt: ponuntur enim CD EF minimi numeri eandem, quam ipſi proportionem habentium. non igitur CD ipſius A partes eſt. ergo eſt pars. et EF ipſius B pars eadem eſt quę CD ipſius A. æqualiter igitur CD ipſum A, atque EF ipſum B metitur. quod oportebat demonſtrare.

C.G.D
E.H.F
A.....
B.....

20. diffi.

12. huius.


F. C. COMMENTARIVS.

Erit vt CG ad EH, ita GD ad HF.] *Per conuerſam vigeſimae diffinitionis. nam cum CG GD inter ſe aequales ſint, itemq; aequales inter ſe EH HF, ſi CG ſit minor, quàm EH, quae pars, vel partes eſt CG ipſius EH, eadem pars, vel partes erit GD ipſius HF. ſi vero ſit maior, quae pars, vel partes EH ipſius CG, eadem erit pars, vel partes HF ipſius GD. ergo vt CG ad EH, ita GD ad HF.*

THEOREMA XX. PROPOSITIO XXII.

Si ſint tres numeri, & alij ipſis multitudine æquales, qui bini ſumantur, et in eadem proportione; ſit autem perturbata eorum analogia: etiam ex æquali in eadem proportione erunt.

Sint tres numeri A B C, et alij ipſis multitudine æquales qui bini ſumantur, et in eadem proportione D E F; ſitq; perturbata eorum analogia: et ut A quidem ad B, ita ſit E ad F; vt autem B ad C, ita D ad E. Dico etiam ex æquali vt A ad C, ita eſſe D ad F. Quoniam enim eſt ut A ad B, ita E ad F; qui fit ex AF æqualis erit ei, qui ex BE. Rurſus quoniam eſt vt B ad C, ita D ad E; qui fit ex CD æqualis erit ei, qui ex BE. oſtenſum autem eſt et qui fit ex AF æqualem eſſe ei, qui ex BE. ergo et qui fit ex AF æqualis eſt ei, qui fit ex CD. vt igitur A ad C, ita D ad F. quod demonſtrare oportebat.



19. huius.

19. huius.

THEOREMA XXI. PROPOSITIO XXIII.

Primi inter ſe numeri minimi ſunt eorum, qui eādem, quam ipſi proportionem habent.

Sunt

Sint primi inter ſe numeri A B. Dico eos minimos eſſe eorum, qui eandem, quam ipſi, proportionem habent. ſi enim non ita ſit, erunt aliqui numeri minores ipſis A B, qui eandē, quam A B proportionem habebunt. ſint C D. Quoniam igitur minimi numeri eandem, quam ipſi proportionem habentium eos, qui eandem habent proportionem, æqualiter metiuntur, maior maiorem, et minor minorem, hoc eſt antecedens antecedentem, et conſequens cō ſequentem; numerus C ipſum A æqualiter metietur, atque D ipſum B. quoties autem C metitur ipſum A, tot vnitates ſint in E. ergo et D ipſum B metitur per vnitates, quę ſunt in E. et quoniam C metitur ipſum A per vnitates quę ſunt in E, numerus E ipſum A per vnitates, quæ ſunt in C, metietur. et eadem ratione E metietur B per vnitates, quæ ſunt in D. ergo E ipſos A B metitur, primos inter ſe exiſtentes. quod fieri non poteſt. non igitur erunt aliqui numeri minores ipſis AB, qui eandē habeant proportionem. ergo AB minimi ſunt eorum, qui eandem, quam ipſi proportionem habent. quod oportebat demonſtrare.

A.....5
B....4
E——
C——
D——

21.huius.

8.com.not.

THEOREMA XXII. PROPOSITIO XXIIII.

Minimi numeri eorum, qui eandem, quam ipſi proportionem habent, primi inter ſe ſunt.

Sint minimi numeri eorum qui eandem, quam ipſi proportionē habent A B. Dico A B primos inter ſe eſſe. ſi enim nō ſunt A B inter ſe primi, eos aliquis numerus metietur. metiatur; ſitq; C. et quoties C ipſum quidem A metitur, tot vnitates ſint in D. quoties vero C metitur ipſum B, tot vnitates ſint in E. et quoniam C ipſum A metitur per vnitates, quę ſunt in D, multiplicans C ipſum D fecit A. Eadem ratione et C multiplicans E ipſum B fecit. Itaque cum numerus C duos numeros DE multiplicans faciat A B, erit ut D ad E, ita A ad B. ergo DE in eadem ſunt proportione, in qua AB, minores ipſis exiſtentes. quod fieri non poteſt. non igitur A B numeros numerus aliquis metietur; ac propterea A B primi inter ſe ſunt. quod oportebat demonſtrare.

A.....6
B....5
C——
D——
E——

9.com.not.

17.huius.

THEOREMA XXIII. PROPOSITIO. XXV.

Si duo numeri primi inter ſe fuerint, qui vnum ipſorum metitur numerus ad reliquum primus erit.

Sint duo numeri primi inter ſe A B, et aliquis numerus C ipſum A metiatur. Dico et B C inter ſe primos eſſe. Si enim B C nō ſint inter ſe primi, metietur eos aliquis numerus. metiatur, ſitq; D. et quoniam D ipſum C metitur, et C ipſum A; et D ipſum A metietur; metitur autem et ipſum B. ergo D numeros AB metitur primos inter ſe exiſtentes. quod fieri non poteſt. non igitur B C numeros numerus aliquis metietur. ideoq; B C inter ſe primi ſunt. quod oportebat demonſtrare.

A.....6
B.....5
C...3
D—

THEOREMA XXIIII. PROPOSITIO XXVI.

Si duo numeri ad aliquem numerum primi fuerint, et qui fit ex ipſis ad eum primus erit.

Duo enim numeri A B ad aliquem numerũ C primi ſint: et A ipſum B multiplicaus faciat D. Dico C D inter ſe primos eſſe. ſi enim C D non ſint inter ſe primi, metietur eos aliquis numerus. metiatur; ſitq; E. et quoniã C A primi inter ſe ſunt, et ipſum C metitur aliquis numerus E; erunt E A inter ſe primi. quoties autem E ipſum D metitur, tot vnitates ſint in F. quare et F metitur ipſum D per vnitates, quæ ſunt in E. ergo E ipſum F multiplicans fecit D. ſed et A multiplicas B ipſum D fecit. qui igitur fit ex E F eſt æqualis ei, qui ex A B. ſi uero qui fit ex extremis æqualis fuerit ei, qui ex medijs, quattuor numeri proportionales erunt. eſt igitur ut E ad A, ita B ad F. ſunt autem A E inter ſe primi, et qui primi etiam minimi ſunt. minimi vero eãdẽ, quam ipſi, proportionem habentium, eos, qui eandem habẽt proportionem, æqualiter metiuntur, maior maiorem, et minor minorem, hoc eſt antecedens antecedentem, et conſequens conſequentem. ergo E ipſum B metitur. metitur autẽ et ipſum C. quare E ipſos B C metitur, primos inter ſe exiſtentes. quod fieri non poteſt. non igitur C D numeros numerus aliquis metietur; ac propterea C D inter ſe primi ſunt. quod oportebat demonſtrare.

A..2 B ...3
C.....3
D.——6
E.——
F.——

Ex antecedente.
8. com. not.
9. com. not.
19. huius.
23. huius.
21. huius.

THEOREMA XXV. PROPOSITIO. XXVII.

Si duo numeri primi inter ſe fuerint, qui fit ab vno ipſorum ad reliquum primus erit.

Sint duo numeri inter ſe primi AB; & A ſe ipſum multiplicans faciat C. Dico B C inter ſe primos eſſe. ponatur enim ipſi A æqualis D & quoniam AB ſunt primi inter ſe, æqualis autem A ipſi D; & DB inter ſe primi erunt. vterque igitur ipſorum A D ad B primus eſt. ergo & qui ex AD fit primus erit ad B. ſed qui fit ex AD eſt numerus C. quare C B inter ſe primi ſunt. quod demonſtrare oportebat.


A..2B..3
C....4
D..6

Ex antecedente.

THEOREMA XXVI. PROPOSITIO XXVIII.

Si duo numeri ad duos numeros vterque ad vtrumque primi fuerint, & qui fiunt ex ipſis inter ſe primi erunt.

Duo enim numeri A B ad duos uumeros C D vterque ad vtrumque primi ſint: & A quidem ipſum B multiplicans faciat E: C vero multiplicans D faciat F. Dico EF inter ſe primos eſſe. Quouiam enim vterque ipſorum A B ad C primus eſt, & qui fit ex A B ad C primus erit. qui autem fit ex A B eſt E. ergo E C primi inter ſe ſunt. Eadẽ ratione & E D primi ſunt inter ſe. vterque igitur ipſorum C D ad E primus eſt: ac propterea qui fit ex C D primus erit ad E. qui uero ex CD fit eſt numerus F. ergo E F primi inter ſe erunt. quod demonſtrare oportebat.



26. huius.


THEOREMA XXVII. PROPOSITIO. XXIX.

Si duo numeri primi inter ſe fuerint, & vterque ſeipſum multiplicans faciat aliquos: facti ex ipſis primi erunt inter ſe. & ſi numeri à principio poſiti eos, qui facti ſunt, multiplicantes aliquos

faciant

faciant, & ipſi inter ſe primi erunt: & ſemper circa extremos hoc continget.

Sint duo numeri inter ſe primi A B: & A ſe ipſum quidem multiplicans faciat C, multiplicans vero C faciat E: & B ſe ipſũ multiplicãs D faciat; multiplicans autem D faciat ipſum F. Dico C D, & E F inter ſe primos eſſe. Quoniam enim A B primi inter ſe ſunt; & A ſe ipſum multiplicans fecit C; erunt C B primi inter ſe. & quoniam C B inter ſe primi ſunt, & B ſe ipſum multiplicans fecit D; erũt C D inter ſe primi. Rurſus quoniam A B primi ſunt inter ſe, & B ſe ipſum multiplicans D fecit; A D inter ſe primi erunt. Cum igitur duo numeri A C ad duos numeros B D vterque ad vtrumque primi ſint, & qui ex A C fit ad eum, qui fit ex B D primus erit. ſed qui fit ex AC eſt numerus E, qui vero ex BD fit eſt F. ergo E F primi inter ſe ſunt. quod oportebat demonſtrare.




27. huius.

Ex antecedente.

THEOREMA XXVIII. PROPOSITIO. XXX.

Si duo numeri primi inter ſe fuerint, & vterque ſimul ad vtrũque ipſorum primus erit: quòd ſi vterque ſimul ad vnum aliquem ipſorum ſit primus, & numeri à principio poſiti inter ſe primi erunt.

Componantur enim duo numeri inter ſe primi AB BC. Dico & vtrumque ſimul, videlicet A C ad vtrumque ipſorum AB BC primum eſſe. Si enim non ſint CA AB inter ſe primi, metietur eos numerus aliquis. metiatur, & ſit D. Quoniam igitur D metitur ipſos CA AB; & reliquum BC metietur. metitur autem & BA. ergo D ipſos AB BC metitur, primos inter ſe exiſtentes; quod fieri non poteſt. non igitur CA AB numeros numerus aliquis metietur; ac propterea AB AC inter ſe primi ſunt. ergo CA ad vtrumque ipſorum eſt primus. Sint rurſus CA AB primi inter ſe. Dico & ipſos AB BC inter ſe primos eſſe. Si enim AB BC non ſint inter ſe primi, metietur eos aliquis numerus. metiatur, ſitq; D. & quoniam D metitur vtrumque ipſorum AB BC, & totum CA metietur; metitur autem & AB. ergo D ipſos CA AB metitur, primos inter ſe exiſtentes; quod fieri non poteſt. non igitur ipſos AB BC numeros numerus aliquis metietur. ideoq; AB BC inter ſe primi ſunt. quod oportebat demonſtrare.



13. com. not.

A

11. com. not.

B

P. C. COMMENTARIVS.

Ergo CA ad vtrumque ipſorum eſt primus] *eodem enim modo demonſtrabitur & AC CB inter ſe primos eſſe.* A

Ideoq; AB BC inter ſe primi ſunt] *idem etiam ſequetur ſi AC CB inter ſe primi ſint. quod eodem modo demonſtrabimus.* B

THEOREMA XXIX. PROPOSITIO XXXI.

Omnis primus numerus ad omnem numerum, quem non metitur, primus eſt.

Sit primus numerus A, qui numerum B non metiatur. Dico B A inter ſe primos

esse, si enim non sint B A inter se primi, metietur eos aliquis numerus. metiatur, et sit C. ergo C non est vnitas. et quoniam C ipsum B metitur, A vero non metitur ipsum B; non erit C idem qui A. et quoniam C ipsos B A metitur, et metietur ipsum A primum existentem, cum non sit idem, qui A. quod fieri non potest. non igitur ipsos B A numeros numerus aliquis metietur. quare A B inter se primi sunt. quod demonstrare oportebat.

A ... 5 B 8
C —

A
B

F. C. COMMENTARIVS.

A Ergo C non est vnitas] *si enim eos vnitas sola metiretur, primi essent inter se. quod non ponitur.*

B Et quoniam C ipsos B A metitur, et metietur ipsum A primum existentem, cum non sit idem, qui A. quod fieri non potest] *omnis enim numerus se ipsum metitur.*

7. com. not.

THEOREMA XXX. PROPOSITIO XXXII.

Si duo numeri se se multiplicantes aliquem faciãt, eum vero, qui ex ipsis fit, metiatur aliquis numerus primus; & vnum ipsorum, qui à principio positi sunt, metietur.



Duo enim numeri A B se inuicem multiplicantes faciãt C, ipsum uero C metiatur aliquis numerus primus, qui sit D. Dico D vnũ ipsorum A B metiri. ipsum enim A non metiatur; atque est D numerus primus. ergo A D primi inter se sunt. et quoties D ipsum C metitur, tot unitates sint in E. Quoniam igitur D metitur ipsum C per eas, quæ sunt in E unitates; numerus D ipsum E multiplicans fecit C. sed et A multiplicans B ipsum C fecit. ergo qui fit ex D E æqualis est ei, qui ex A B. est igitur ut D ad A, ita B ad E. et sunt A D primi inter se, primi vero et minimi. sed minimi eos, qui eandem habent proportionem, æqualiter metiuntur, maior maiorem, et minor minorem, hoc est antecedens antecedentem, et consequens consequentem. ergo D ipsum B metitur. similiter demonstrabimus, si D non metiatur B ipsum A metiri. quare D metitur vnum ipsorum A B. quod demonstrare oportebat.

Ex antecedente.

Com. not. 9.

19. huius.

23. huius.

21. huius.

THEOREMA XXXI. PROPOSITIO. XXXIII.

Omnem numerum compositum primus aliquis numerus metitur.

Sit compositus numerus A. Dico primum aliquem numerum ipsum A metiri. Quoniam enim compositus numerus est A, metietur ipsum aliquis numerus. metiatur; et sit B. & si quidem primus est B, manifestum est, quod quæritur. si vero compositus, ipsum aliquis numerus metietur. metiatur; sitq; C. Et quoniam C metitur ipsum B, B uero ipsum A; & C ipsum A metitur. & si quidem primus est C, manifestum est quod quæritur. Si vero compositus eum aliquis numerus metitur. & hac consideratione facta, relinquetur tandem aliquis numerus primus, qui præcedentem & ipsum A metietur. si enim nõ relinquitur primus, metientur ipsum A infiniti numeri, quorum alter altero est minor. quod in numeris fieri non potest. ergo relinquetur aliquis, qui et præcedentem metietur et ipsum A. omnem igitur numerum compositum primus aliquis numerus metitur, quod demonstrare oportebat.

A 6
B 3
C .. 2

Diffi. 13.

12. co. not.

3. postul.

ALITER

ALITER. Sit compoſitus numerus A. Dico primum aliquem numerum ipſum A metiri. Quoniam enim A compoſitus eſt, metietur ipſum aliquis numerus. & ſit B minimus eorum, qui ipſum A metiuntur. Dico B primum eſſe. ſi enim non ſit primus, compoſitus erit. ergo eum aliquis numerus metietur. metiatur; ſitq; C. erit C minor, quàm B. & quoniam C ipſum B metitur, ſed & B ipſum A; & C ipſum A metietur, minor exiſtens ipſo B, qui eſt minimus omnium, qui metiuntur. quod eſt abſurdū. non igitur B compoſitus numerus eſt. ergo eſt primus. quod demonſtrandū fuit.

A.....9
B...3
C

THEOREMA. XXXII. PROPOSITIO XXXIIII.

Omnis numerus vel primus eſt, vel eum primus aliquis numerus metitur.

Sit numerus A. Dico A vel primum eſſe, vel primum aliquem numerum ipſum A metiri. ſi quidem igitur primus eſt A, manifeſtum eſt quod quæritur. ſi vero compoſitus ipſum aliquis primus numerus metietur. Omnis igitur numerus vel primus eſt, vel eum primus aliquis numerus metitur. quod demonſtrare oportebat.

A...3
A.....6 Ex antecedente
...3

PROBLEMA III. PROPOSITIO. XXXV.

Numeris quotcumque datis inuenire minimos eorum, qui eandem, quam ipſi, proportionem habeant.

Sint dati quotcūque numeri A B C. oportet inuenire minimos eorum, qui eandem, quam ipſi A B C, proportionem habeāt. vel igitur A B C primi inter ſe ſunt, vel non. ſi quidem primi, et minimi erunt eandem, quā ipſi proportionem habentium. ſi vero non primi, ſumatur ipſorum A B C maxima communis menſura D, et quoties D vnumquemque ipſorum A B C metitur, tot vnitates ſint in vnoquoque horum E F G. et vnuſquiſque igitur ipſorum E F G vnumquemque ipſorum A B C metitur per eas, quæ ſunt in D vnitates. ergo E F G ipſos A B C equaliter metiuntur, ac propterea E F G in eadem ſunt proportione, in qua ipſi A B C. Dico eos etiā minimos eſſe. ſi enim E F G non ſint minimi, eandem, quam ipſi A B C, proportionem habentium, erunt aliqui ipſis E F G minores in eadem proportione, in qua A B C. ſint H K L, æqualiter igitur H metitur ipſum A, ac vterque ipſorum K L. vtrūque B C metitur. quoties autem H metitur ipſum A, tot vnitates ſint in M. et vterque igitur K L vtrumque B C metitur per eas, quæ ſunt in M vnitates. et quoniā H ipſum A metitur per vnitates, quæ ſunt in M, et M ipſum A per vnitates, quæ ſunt in H metietur. Eadem ratione et M vtrumque ipſorū B C metietur per vnitates, quę ſunt in utroque K L. ergo M ipſos A B C metitur. Rurſus quoniam H ipſum A metitur per vnitates, quæ ſunt in M; H ipſum M multiplicans fecit A. Eadem ratione et E multiplicans D ipſum A fecit. ergo qui ex E D fit ei, qui fit ex H M eſt æqualis. vt igitur E ad H, ita M ad D maior autem eſt E, quàm H. ergo et M quàm D eſt maior, et ipſos A B C metitur. quod fieri nō poteſt. ponitur enim D ipſorum A B C maxima communis menſura. non igitur erunt aliqui numeri minores ipſis E F G, in eadem proportione, in qua A B C. ergo E F G minimi ſunt eorum, qui eandem, quam ipſi A B C proportionē habent. quod oportebat demodſtrare.

A.....6
B.....8
C.....10 23. huius.
D.. 2 2. huius.
E...3
F——4
G——5 18. huius.
H——
K——
L——
M—— 21. huius.

8. com. not.

9. com. not.

19. huius.

F. C.

F. C. COMMENTARIVS.

Quoniam ſæpe vſu venit, vt duo minimi numeri in data proportione inueniendi ſint, libuit hoc loco ſequens problema adnectere.

Numeris quotcũque datis deinceps proportionalibus, inuenire duos minimos, qui eandem, quam ipſi, proportionem habeant.

Sint dati quotcumque numeri deinceps proportionales ABC. oportet inuenire duos minimos numeros, qui eandem, quam ipſi A B C proportionem habeant. Itaque vel A B primi ſunt inter ſe, vel non primi: et ſi quidem primi, 23.huius. *& minimi erunt eorum, qui eandem proportionem habent; ſin minus, ſumatur ipſorum AB maxima communis menſura D:* 2.huius. *& quoties D metitur A, tot vnitates ſint in E; quoties vero idem metitur B, tot vnitates ſint in F. ergo & E F ipſos A B aequaliter metiuntur: ideoq; E F in eadem ſunt proportione, in qua ipſi A B. Dico E F etiam minimos eſſe.* 18.huius. *ſi enim non ſint minimi, erunt aliqui numeri minores ipſis E F, qui eandem, quam A B proportionem habeant. ſint GH. ergo G aequaliter metitur A, atque H ipſum B. &* 21.huius. *quoties G metitur A, tot vnitates ſint in K. quare & H metietur B per eas, quae ſunt in K vnitates. & ob id K metietur A per vnitates, quae ſunt in G, metieturq; B per vnitates, quae ſunt in H. ergo K ipſos A B metitur. & quo-*

A....4
B.....6
C.....9
D..2
E..2
F...3
G—
H—
K—

8. com. not. *niam G ipſum A metitur per eas, quae ſunt in K vnitates, G multiplicans K fecit A. Rurſus quoniam E metitur A per vnitates, quae ſunt in D; & E mul-*
19.huius. *tiplicans D fecit A. qui igitur fit ex E D eſt aequalis ei, qui ex GK; ac propterea vt E ad G, ita erit K ad D. eſt autem E maior, quàm C. ergo & K maior quàm D, & ipſos A B metitur. quod fieri non poteſt. erat enim D ipſorum AB maxima communis menſura. non igitur ſunt aliqui numeri minores ipſis E F, qui eandem, quam ipſi A B proportionem habeant. & quoniam vt A ad B, ita eſt B ad C, erunt E F minimi numeri in eadem proportione, in qua A B C. Inuenti igitur ſunt minimi numeri E F, qui eandem, quam ipſi ABC proportionem habeant. quod facere oportebat.*

PROBLEMA IIII. PROPOSITIO XXXVI.

Duobus numeris datis, inuenire quem minimum numerum metiantur.


Sint dati duo numeri A B. oportet inuenire quem minimum numerum metiantur. numeri enim A B uel primi inter ſe ſunt, vel non. ſint primum A B inter ſe primi: & A ipſum B multiplicãs faciat C. ergo & B multiplicans A ipſum C fecit. ac propterea numeri A B ipſum C metiuntur. Dico etiam C minimum eſſe. ſi enim non ita ſit, metientur A B numernm aliquem minorẽ, quàm C. metiantur ipſum D. & quoties A ipſum D metitur, tot vnitates ſint in E; quoties autem B metitur D, tot unitates ſint in F. ergo A quidem ipſum E multiplicans fecit D; B uero multiplicans F ipſum D fecit. quare numerus, qui ex AE fit eſt æqualis ei, qui fit ex BF. vt igitur A ad B, ita eſt F ad E. & ſunt A B primi. primi autem & minimi. ſed minimi eos, qui eandem habent proportionem æqualiter metiuntur, maior maiorem, & minor minorem. ergo B ipſum E metitur, & conſequens conſequentem. & quoniam A numeros B E multiplicans fecit C D, erit vt B ad E, ita C ad D. metitur autem B ipſum E. ergo & C ipſum D metitur, maior minorem. quod fieri non poteſt. non igitur A B metiuntur aliquem numerum minorem ipſo C, quando A B primi inter ſe fuerint. ergo A B ipſum C minimum exiſtentem metiuntur. Sed non ſint A B primi inter ſe: & ſumãtur minimi numeri eandem, quam A B proportionem habentium, qui ſint F E. æqualis igitur eſt, qui ex A E fit ei, qui ex BF. & A ipſum E multiplicãs faciat C. ergo & B multi-

A...3 B....4
C.....12
D———
E———
F———

23.huius. 21.huius. 18.huius. 19.huius.

multiplicans F ipſum C fecit.quare A B ipſum C metiũtur.

Dico & minimum eſſe. niſi enim ita ſit, metientur A B aliquem numerum minorem,quam C. metiantur ipſum D. & quoties A ipſum D metitur,tot vnitates ſint in G.quoties autem B metitur D, tot vnitates ſint in H. ergo A quidem ipſum G multiplicans fecit D; B vero multiplicans H ipsũ D fecit.qui igitur ex A G fit eſt æqualis ei,qui fit ex B H.vt igitur A ad B,ita H ad G.ſed vt A ad B,ita F ad E.ergo & vt F ad E,ita H ad G:& ſunt F E minimi;minimi vero eos, qui eandem habent proportionem æqualiter metiuntur, maior maiorem, & minor minorem. quare E ipſum G metitur. & quoniam A numeros E G multiplicans ipſos C D fecit,vt E ad G, ita erit C ad D. Sed E metitur ipſum G.ergo & C ipſum D metitur, maior minorem. quod fieri nõ poteſt.non igitur metiuntur A B aliquem numerum minorem,quàm C. ergo A B ipſum G minimum exiſtentem metientur. quod demonſtrare oportebat.



9. com. not.

19.huius.
21.huius.

18.huius.


SCHOLIVM.

Minimum dicit, quo minorem duo numeri metiri non poſſunt. vt eſt 15. eo enim minorem duo numeri 3, & 5 non metiuntur.

THEOREMA XXXIII. PROPOSITIO XXXVII.

Si duo numeri metiantur numerum aliquem, & minimus, quem illi metiuntur, eundem metietur.

Duo enim numeri A B numerum aliquem C D metiantur,minimum autem ipſum E. Dico & E ipſum C D metiri. ſi enim E non metitur C D E,metiens F D relinquat ſe ipſo minorem CF. & quoniam A B ipſum E metiuntur,E vero ipſum DF: & A B metientur D F.ſed & metiuntur totum CD. ergo & reliquum C F minorem ipſo E metientur. quod fieri non poteſt. non igitur E ipſum CD non metitur.quare ipſum metiatur neceſſe eſt.quod demonſtrare oportebat.




12.com. not.

13.com. not.

PROBLEMA V. PROPOSITIO XXXVIII.

Tribus numeris datis inuenire quem minimum numerum metiantur.


Sint dati numeri A B C. oportet inuenire quem minimum metiantur numerum. ſumatur enim D, quem minimum duo A B metiuntur.itaque C vel metitur D, vel non metitur. metiatur primum. ſed & A B metiuntur ipſum D.ergo A B C ipſum D metientur. Dico & miuimum. ſi enim non, metientur A B C quendam numerum minorem ipſo D,metiantur E. Quoniam igitur A B C metiuntur ipſum E,& A B ipſum E metiuntur. ergo & minimus, quem metiuntur A B ipſum E metietur. minimus autem, quem metiuntur A B,eſt D.quare D metitur ipſum E, maior minorem.quod fieri non poteſt.non igitur A B C metiuntur aliquem numerum ipſo D minorem. ergo A B C minimum D metiuntur.non metiatur autem C ipſum D:& ſumatur minimus



Ex antecedente.

36.huius.

nimus numerus E, quẽ C D metiuntur. Itaque qm̃ A B metiuntur ipſum D, D vero
12.co.not. ipſum E; & A B ipsũ E; metientur. ꝛnetitur aũt & C ipſum E. ergo A B C ipſum E
metiuntur. Dico & minimum. ſi enim non, metien
tur A B C numerum minorem ipſo E. metiantur
F. & quoniam A B C metiuntur F, & A B ipſum
Ex ante- F metientur. ergo & minimus, quem A B metiun
cedente, tur, metietur ipſum F: minimus autem, quem A
B metiuntur, eſt D. quare D ipſum F metitur, &
metitur C ipſum F. ergo D C ipſum F metientur;
ac propterea minimus, quem metiuntur D C, me
tietur & F. ſed minimus, quem metiuntur D C, eſt
E ergo E ipſum F metitur, maior minorẽ. quod fie
ri non poteſt. non igitur A B C metiuntur aliquẽ
numerum minorem ipſo E. ergo numerum E minimum exiſtentem ipſi A B C me-
tiuntur. quod demonſtrare oportebat.



THEOREMA XXXIIII. PROPOSITIO. XXXIX.

Si numerum numerus aliquis metiatur, menſus partem habebit à metiente denominatam.

Numerum enim A numeru s aliquis B metiatur. Dico
A partem habere ab ipſo B denominatam. quoties enim
B ipſum A metitur, tot vnitates ſint in C. Quoniam igi-
tur B metitur ipſum A per eas, quę ſunt in C, vnitates; me
titur autem & D unitas ipſorum C per vnitates, quæ in
ipſo ſunt: & D vnitas ipſum C numerum æqualiter metie
15.huius. tur, atque B ipſum A. quare permutando unitas D ipſum
B numerum æqualiter metietur, atque C ipſum A. quæ
igitur pars eſt unitas D ipſius B numeri, eadem eſt pars
3. com. not. & C ipſius A. ſed unitas D ipſius B numeri pars eſt ab eo denominata. ergo & C ip
ſius A pars eſt denominata ab ipſo B. quare A partem habet C ab ipſo B denomina
tam. quod oſtendere oportebat.

A 12
B . . . 3
C 4
D . 1

THEOREMA XXXV. PROPOSITIO. XL.

Si numerus partem quamcumque habeat, eum numerus à parte denominatus metietur.

Numerus enim A partem habeat quamcum-
que B; & ab ipſo B denominatus ſit numerus C.
Dico C ipſum A metiri. Quoniam enim B ipſius
5. com. not. A pars eſt denominata ab ipſo C. eſt autem & D
vnitas ipſius C numeri pars ab eo denominata.
quæ igitur pars eſt vnitas D ipſius C numeri, ea-
dem pars eſt & B ipſius A. ergo vnitas D æquali-
ter metitur ipſum B numerum, atque B ipſum
15.huius. A. & permutando unitas D ipſum B numerum
æqualiter metitur, atque C ipſum A. ergo C ipſum A metitur. quod oportebat de-
monſtrare.

A 12
B . . 2
C 6
D . 1

PROBLEMA. VI. PROPOSITIO XLI.

Numerum inuenire, qui minimus exiſtens datas partes habeat.

Sint

Sint datæ partes A B C. oportet numerum inuenire, qui cum minimus sit, habeat partes A B C. sint ab ipsis A B C partibus denominati numeri D E F. & sumatur minimus numerus G, quem ipsi D E F metiuntur. Quoniam igitur D E F metiuntur ipsum G, habebit G partes ab ipsis D E F denominatas: partes autem denominatæ ab ipsis D E F sunt A B C. ergo G partes A B C habet. Dico & minimum esse. si enim G non existens minimus partes habet A B C, erit numerus aliquis minor ipso G, qui easdem partes habeat. sit H. Quoniam igitur H partes habet A B C, eum metientur numeri ab ipsis A B C partibus denominati; sunt autem hi numeri D E F. ergo D E F ipsum H metientur; atque est H minor ipso G. quod fieri non potest. non igitur erit aliquis numerus minor ipso H, qui partes A B C habeat. quod oportuit demonstrare.

A $\frac{1}{2}$ D..2
B $\frac{1}{3}$ E...3
C $\frac{1}{4}$ F....4
G.....12
H

58. huius.
59. huius.

SEPTIMI LIBRI FINIS.

UNIVERSIDAD CENTRAL BIBLIOTECA DERECHO

EVCLIDIS ELEMENTORVM LIBER OCTAVVS

CVM COMMENTARIIS,

Federici Commandini Vrbinatis.


THEOREMA I. PROPOSITIO. I.

SI ſint quotcumque numeri deinceps proportionales, quorum extremi ſint inter ſe primi; minimi erunt omnium qui eandem, quam ipſi proportionem habent.

Sint quotcumque numeri decinceps proportionales A B C D, quorũ extremi A D primi inter ſe ſint. Dico A B C D minimos eſſe omnium, qui eandem, quam ipſi proportionem habent. ſi enim non, ſint minores ipſis A B C D numeri E F G H, & in eadem proportione. Et quoniam A B C D ſunt in eadem proportione, in qua E F G H; atque eſt ipſorũ A B C D multitudo æqualis multitudini ipſorum E F G H: erit ex æquali ut A ad D, ita E ad H: et ſunt A D primi; primi autem, & minimi numeri æqualiter metiuntur eos, qui eandem proportionem habent, antecedens antecedentem, & conſequens conſequentem. ergo A ipſum E metitur, maior minorem. quod fieri non poteſt. non igitur E F G H minores ipſis A B C D exiſtentes in eadẽ ſunt, in qua ipſi, proportione; ac propterea A B C D minimi ſunt omnium, qui eandẽ, quam ipſi proportionem habent. quod demonſtrare oportebat.

14. ſeptimi.

21. ſeptimi.



PROBLEMA I. PROPOSITIO. II.

Numeros inuenire deinceps proportionales minimos, quotcumque quis imperauerit in data proportione.

Sit data proportio in minimis numeris, quam habet A ad B. oportet numeros inuenire deinceps proportionales minimos quotcumque quis imperauerit in proportione A ad B. imperentur quattuor: et A ſe ipſum multiplicans faciat C, multiplicans vero B faciat D, et B ſe ipſum multiplicans faciat E; & adhuc A multiplicans C D E ipſos F G H faciat, B vero multiplicans E faciat K. Quoniam igitur A ſe ipſum multiplicans fecit C, multiplicãs vero B ipſum D fecit; numerus A duos numeros A B multiplicans fecit C D. eſt igitur ut A ad B, ita C ad D. rurſus quo-

17. ſeptimi.

niam

niam A ipſum B multiplicans fecit D, & B ſeipſũ multiplicans fecit E; vterque ipſorum A B multiplicans B vtrumque ipſorum D E fecit. vt igitur A ad B, ita D ad E. ſed vt A ad B, ita C ad D. ergo & vt C ad D, ita D ad E. Et quoniam A numeros C D multiplicans ipſos F G fecit, ut C ad D, ita erit F ad G. vt autem C ad D, ita erat A ad B. & ut igitur A ad B, ita F ad C. rurſus quoniam A numeros D E multiplicans fecit G H, erit vt D ad E, ita G ad H. ſed vt D ad E, ita A ad B. ergo & vt A ad B, ita G ad H. quòd cum A B ipſum E multiplicantes faciant H K; erit vt A ad B, ita H ad K. oſtenſum autem eſt & ut A ad B, ita eſſe & F ad G, et G ad H. ergo & ut F ad G, ita G ad H, & H ad K. numeri igitur C D E, & F G H K proportionales ſunt in proportione, quã habet A ad B. Dico ẽt minimos eſſe. Quoniam enim A B minimi ſunt eorum, qui eandem, quam ipſi, proportionem habent; minimi vero, & primi ſunt inter ſe: erunt ipſi A B inter ſe primi. et vterque quidem ipſorum A B ſeipſum multiplicans vtrumque C E fecit; vterque vero C E multiplicans fecit vtrumque F K. ergo C E, & F K primi inter ſe ſunt. ſi autem ſint quotcumque numeri deinceps proportionales, & eorum extremi ſint inter ſe primi; minimi erunt omnium eandem, quam ipſi proportionem habentium. ergo C D E, & F G H K minimi ſuut omnium, qui eandem quam A B proportionẽ habẽt. quod oportebat demonſtrare.

A..2
B...3
C....4
D.....6
E.....9
F.....8
G.....12
H.....18
K——————27

18. ſeptimi.

18. ſeptimi.

15. ſeptimi.

29. ſeptimi.

Ex antecedente.

COROLLARIVM.

Ex hoc manifeſtum eſt ſi tres numeri deinceps proportionales minimi fuerint, eandem, quam ipſi proportionem habentium; extremos eorũ quadratos eſſe: ſi vero quattuor eſſe cubos.

A.....8
B.....12
C.....18
D——————27

THEOREMA II.

PROPOSITIO. III.

Si ſint quotcũque numeri deinceps proportionales, minimi omniũ, qui eãdem, quam ipſi, proportionem habent; eorum extremi primi inter ſe erunt.

Sint quotcumque numeri deinceps proportionales A B C D minimi omnium qui eandem, quã ipſi, proportionem habent. Dico eorum extremos A D inter ſe primos eſſe. ſumãtur enim duo numeri minimi in proportione ipſorum A B C D, qui ſint E F, tres vero G H K, & ſemper deinceps vno plures, quo ad aſſumpta multitudo æqualis fuerit multitudini ipſorum A B C D. ſumantur, & ſint L M M X. extremi igitur ipſorum L X primi inter ſe

E..2
F...3
G....4
H.....6
K.....9
L.....8
M.....12
N.....18
O——————27

Ex antecedente.

29. ſeptimi.

ter ſe ſunt. Quouiam enim EF primi ſunt,& vterque ipſorum ſe ipſum multiplicãs vtrumque GK fecit; vtrumque vero GK multiplicans fecit vtrumque LX: erunt & GK,& LX primi. & quoniam ABCD minimi ſunt eorum, qui eandem, quam ipſi, proportionem habent; ſunt autem & LMNX minimi in eadẽ proportione, in qua ABCD; eſtq́; ipſorum ABCD multitudo æqualis multitudini ipſorum LMNX: erit vnuſquiſque ipſorum ABCD vnicuique ipſorum LMNX æqualis. Ergo A quidem eſt ęqualis L, B vero ipſi M, C ipſi N,& D ipſi X. quòd cum LX primi ſint inter ſe,& L ipſi A æqualis,& X ipſi D; & AD inter ſe primi erũt. quod oportebat demõſtrare.

F. C. COMMENTARIVS.

Sumãtur enim duo minimi numeri in proportione ipſorum ABCD] *ex eo, quod ad 35 huius addidimus.*

PROBLEMA II. PROPOSITIO. IIII.

Proportionibus datis quotcumque in minimis numeris, numeros inuenire deinceps minimos in datis proportionibus.


Sint datæ proporriones in minimis numeris, videlicet proportio A ad B, & proportio C ad D, & E ad F. oportet numeros inuenire deinceps minimos in proportione A ad B,& in proportione C ad D; & adhuc in proportione E ad F. Sumatur enim minimus numerus, quem BC metiuntur; ſitq́; G. & quoties B metitur G, toties A ipſum H metiatur; quoties vero C ipſum G metitur, toties & D metiatur K. itaque E ipſum K vel metitur, vel non metitur. metiatur primum. & quoties E metitur K, toties F ipſum L metiatur. & quoniam A æqualiter metitur H, atque B ipſum G; erit vt A ad B, ita H ad G. Eadem ratione & vt C ad D, ita G ad K; & adhuc vt E ad F, ita K ad L. ergo HGKL deinceps proportionales ſunt in proportione A ad B, & in proportione C ad D, & adhuc in proportione E ad F. Dico etiam minimos eſſe. Si enim non ſint HGKL deinceps minimi in proportionibus A ad B, C ad D, & E ad F; erunt aliqui numeri minores ipſis HGKL deinceps minimi in eiſdem proportionibus. ſint N X M O. & quoniam eſt vt A ad B, ita N ad X; & ſunt A B minimi; minimi autem eos, qui eandem habent proportionem, æqualiter metiuntur, maior maiorem, & minor minorem, hoc eſt antecedens antecedẽtem, & conſequẽs conſequentem: metietur B ipſum X. Eadem ratione & C ipſum X metietur. quare B C metiuntur X, ac propterea minimus, quem metiuntur B C, ipſum X metietur. minimus autem, quem metiuntur B C, eſt G. ergo G metietur X, maior minorem. quod fieri non poteſt. non igitur erunt aliqui numeri minores ipſis H G K L deinceps minimi in proportione A ad B, C ad D, & E ad F. Sed non metiatur E ipſum K; & ſumatur minimus numerus, quem ipſi E K metiuntur; ſitq́; M. quoties autem K metitur M, toties & vterque ipſorum HG vtrumque N X metiatur: & quoties E metitur M, toties & F metiatur O. Quoniam igitur H ipſũ N æqualiter metitur, atque G ipſum X; erit vt H ad G, ita N ad X. vt autem H ad G, ita A ad B. & vt igitur A ad B, ita N ad X. Eadem ratione & vt C ad D, ita X ad M. rurſus quoniã E ipſum M æqualiter metitur, atque F ipſum O; erit vt E ad F, ita M ad O. quare NXMO deinceps proportionales ſunt in proportionibus A ad B, C ad D, & E ad F. Dico minimos quoque eſſe. Si enim non ſint NXMO deinceps minimi in

A...3 B....4
C..2 D...5
E....4 F.....5
H.....6
G 8
K.....12
L.....15
N
X
M
O

36. ſeptimi.
37. ſeptimi.
21. ſeptimi.
A
37. ſeptimi.
36. ſeptimi.
7. ſeptimi.

in proportionibus A ab B, C ad D, & E ad F, erũt aliqui numeri minores ipſis NX MO deinceps minimi in eiſdem proportionibus. ſint PRST. & cum ſit vt P ad R, ita A ad B; ſintq; AB minimi; minimi vero eos, qui eãdẽ habẽt proportionẽ, æqualiter metiũtur, antecedẽs antecedẽtẽ, & cõſequẽs cõſequẽtẽ: numerus B ipſũ R metietur. 21. ſeptimi.

Eadem ratione & C metietur ipſũ R. ergo B C ipſum R metiuntur: & ob id minimus, quem metiũtur B C, ipſum R metietur. minimus aũt, quẽ metiũtur B C, eſt G. ergo G metitur ipſum R. atque eſt vt G ad R, ita K ad S. quare & K ipſum S metitur: metitur autem & E ipſum S; ideoq; E K ipſum S metiuntur. & minimus igitur, quem metiuntur E K, metietur ipſum S. Sed minimus, quem metiũtur E K, eſt M. ergo M ipſum S metitur, maior minorem. quòd fieri non poteſt. non igitur erunt aliqui numeri minores ipſis N X M O deinceps minimi in proportionibus A ad B, C ad D, & E ad F. ergo N X M O deinceps minimi ſunt in eiſdem proportionibus. quod demonſtrare oportebat.



B

17. ſeptimi.

C

F. C. COMMENTARIVS.

Eadem ratione & C ipſum X metitur.] *Quoniam enim eſt vt C ad D, ita X ad M; & ſunt C D minimi; minimi vero eos, qui eandem habent proportionem, æqualiter metiuntur: numerus C ipſum X metietur.* A


Eadem ratione & C metietur ipſum R] *eſt enim vt C ad D, ita R ad S: ſintq; C D minimi. ergo ob iam dictam cauſſam C ipſum R metietur.* B

Atque ut G ad R, ita K ad S] *eſt enim vt G ad K, ita R ad S. quare permutando vt G ad R, ita K ad S.* C

THEOREMA III. PROPOSITIO V.

Plani numeri inter ſe proportionẽ habẽt ex lateribus cõpoſitã.

Sint plani numeri A B, et ipſius quidem A latera ſint C D numeri; ipſius vero B latera ſint E F. Dico A ad B proportionẽ habere ex lateribus cõpoſitã. proportionibus enim datis, videlicet quã hẽt C ad E, & quã D ad F, ſumãtur numeri deinceps minimi G H K in proportionibus C ad E, & D ad F, ſitq; vt C ad E ita G ad H: vt aũt D ad F, ita H ad K. ergo G H K inter ſe proportiones habẽt laterũ. Sed proportio G ad K compoſita eſt ex proportione G ad H, et proportione H ad K. quare G ad K proportionem habet ex lateribus compoſitam. Dico igitur vt A ad B, ita eſſe G ad K; numerus enim D ipſum E multiplicans faciat L. & quoniam D multiplicans C ipſum A fecit; multiplicans vero E fecit L: erit vt C ad



Ex antecedente.


E, ita

E, ita A ad L. ut autem C ad E, ita G ad H. ergo & vt G ad H, ita A ad L. rursus quoniam E ipsum quidem D multiplicans fecit L, multiplicans vero F ipsum B fecit; vt D ad F, ita erit L ad B. sed vt D ad F, ita est H ad K. & ut igitur H ad K, ita L ad B. Ostensum autem est & vt G ad H, ita A ad L. quare ex æquali ut G ad K, ita A ad B. Sed G ad K proportionem habet compositam ex lateribus. ergo & A ad B proportionem habebit ex lateribus compositam. quod demonstrare oportebat.

THEOREMA IIII. PROPOSITIO VI.

Si fuerint quotcumque numeri deinceps proportionales, primus autem secundum non metiatur; neque alius aliquis ullum metietur.

Sint quotcumque numeri deinceps proportionales A B C D E, & A ipsum B non metiatur. Dico neque alium aliquem ullum metiri. At vero numeros A B C D E deinceps sese nō metiri, perspicuum est; neque enim A ipsum B metitur. Dico neque alium aliquem vllum metiri. Dico enim A non metiri ipsum C. nam quot sunt A B C, tot sumantur minimi numeri eandem, quam ipsi A B C proportionem habentes. & sint F G H. Quoniam igitur F G H in eadem sunt proportione, in qua A B C, atque est ipsorum A B C multitudo æqualis multitudini ipsorum F G H; erit ex æquali vt A ad C, ita F ad H. & quoniam est vt A ad B, ita F ad G, non metitur autem A ipsum B; neque F ipsum G metietur. non igitur F vnitas est; vnitas enim omnem numerum metitur. & sunt F H primi inter se. ergo neque F metitur ipsum H. atque est vt F ad H, ita A ad C. neq; igitur A ipsum C metietur. similiter demonstrabimus neque alium aliquem vllum metiri. quod demonstrare oportebat.




1. huius.

THEOREMA V. PROPOSITIO VII.

Si fuerint quotcumque numeri deinceps proportionales, primus autem metiatur extremum; & secundum metietur.

Sint quotcumque numeri deinceps proportionales A B C D; & A ipsum D metiatur. Dico A ipsum quoque B metiri. si enim A non metitur ipsum B, neque alius aliquis vllum metietur. quod est absurdū. ponitur enim A ipsum D metiri. metitur autem A ipsum D. ergo & A ipsum B metietur. quod demonstrasse oportuit.



THEOREMA VI. PROPOSITIO. VIII.

Si inter duos numeros numeri deinceps proportionales ceciderint, quot inter eos cadunt numeri deinceps proportionales, totidem & inter alius eandem, quam ipsi, proportionem habentes, cadent.

Inter

Inter duos enim numeros A B cadant numeri C D deinceps proportionales; & fiat vt A ad B, ita E ad F. Dico quot numeri deinceps proportionales cadunt inter A B, totidem & inter E F deinceps proportionales cadere. quot enim numeri ſunt AC D B, totidem ſumantur minimi numeri eandem, quam ipſi ACDB proportionem habentium GH KL. ergo extremi ipſorum G L primi inter ſe ſunt. & quoniam ACDB ad ipſos GHKL in eadem ſunt proportione; atque eſt ipſorum ACDB multitudo æqualis multitudini ipſorum GHKL; erit ex æquali vt A ad B, ita G ad L. vt autem A ad B, ita E ad F, & vt igitur G ad L, ita E ad F; & ſunt G L primi. ſed primi, & minimi; minimi vero eos, qui eandem proportionem habent, æqualiter metiuntur, maior maiorem, & minor minorem. ergo G æqualiter metitur ipſum E, atque L ipſum F. quoties autem G metitur ipſum E, toties & vterque ipſorum H K vtrũque M N metiatur. numeri igitur GHKL ipſos EMNF æqualiter metiuntur. ideoq; GHKL in eadem ſunt proportione, in qua ipſi EMNF. at GHKL ſimiliter in eadem ſunt proportione, in qua ACDB. ergo ACDB in eadem proportione erunt, in qua EMNF. Sed ACDB ſunt deinceps proportionales. ergo & EMNF deinceps proportionales erunt. quot igitur deinceps proportionales cadunt inter A B, totidẽ deinceps proportionales & inter E F cadent. quod demonſtrare oportebat.

A..2
C....4
D.....8
B.....16 — 35. ſeptimi.
G.1
H..2 — 3. huius.
K....4
L.....8 — 14. ſeptimi.
E...3
M.....6 — 33. ſeptimi.
N.....12 — 31. ſeptimi.
F.....24

18. ſeptimi.

THEOREMA VII. PROPOSITIO IX.


Si duo numeri inter ſe primi fuerint, & inter ipſos numeri deinceps proportionales ceciderint, quot inter ipſos cadunt numeri deinceps proportionales, totidem & inter vtrumque ipſorum, & vnitatem deinceps proportionales cadent.

Sint duo numeri inter ſe primi A B: & inter ipſos deinceps proportionales cadant C D; exponaturq; vnitas E. Dico quot numeri deinceps proportionales cadunt inter ipſos A B, totidem & inter vtrumque ipſorum A B, & vnitatem E numeros deinceps proportionales cadere. ſumantur enim duo quidem numeri minimi F G in eadem proportione, in qua ſunt A C D B; tres vero H K L, & ſemper deinceps vno plures, quo ad fiat ipſorum multitudo æqualis multitudini ipſorum A C D B. ſumantur, & ſint M N X O. itaque manifeſtum eſt F ſe ipſum quidem multiplicantem feciſſe H, multiplicantem vero H feciſſe M: & G ſe ipſum quidẽ multiplicantem feciſſe L; multiplicantem vero L feciſſe O. & quoniam M N X O minimi ſunt qui eãdem, quam ipſi FG proportionem habent: ſunt autem & A C D B minimi eandem, quam F G proportionem habentium; atque eſt ipſorum M N X O multitudo æqualis multitudini ipſorum A C D B: erit vnuſquiſque ipſorum M N X O vnicuique ipſorum A C D B æqualis. æqualis igitur eſt M ipſi A, & O ipſi B. & quoniã F ſe ipſum multiplicans feçit H, metitur F ipſum H per vnitates, quæ ſunt in F. metitur

A.....8
M.....8
H....4 — A
C.....12 F..2
N.....12 — 2. huius.
K.....6
D.....18 G...3
X.....18
L.....9
O——————27
B——————27

10. com. not.

6.com. not. metitur autem & E vnitas numerum F per vnitates, quæ in ipso sunt. ergo E vnitas numerum F æqualiter metitur, atque F ipsum H, Conuers. 20 diff. est igitur vt E vnitas ad numerum F, ita F ad H. rursus quoniam F multiplicans H fecit M, metitur H ipsum M per vnitates, quæ sunt in F; metitur autem & E vnitas numerum F per vnitates, quę in ipso sunt, æqualiter igitur E vnitas numerum F metitur, atque H ipsum M. ergo Conuer. 20 diff. vt E unitas ad numerum F, ita H ad M. ostensum est autem & ut E unitas ad numerum F, ita esse F ad H. & ut igitur E unitas ad numerum F, ita F ad H, & H ad M. sed M est ęqualis ipsi A. quare vt B E unitas ad numerum F, ita F ad H, & H ad M. Eadem ratione & ut E unitas ad numerum G, ita G ad L, & L ad B. quot igitur numeri deinceps proportionales cadunt inter A B, totidem & inter utrumque ipsorum A B, & vnitatem E numeri deinceps proportionales cadent. quod oportebat demonstrare.




F. C. COMMENTARIVS.

A Sumantur enim duo minimi numeri F G in eadem proportione, in qua sunt A C D B] *ex problemate, quod nos ad 35 septimi conscripsimus.*

B Eadem ratione, & vt E unitas ad numerum G, ita G ad L, et L ad B] *quoniam enim G se ipsum multiplicans fecit L, metitur G ipsum L per vnitates, quae sunt in ipso G: metitur autem & E vnitas ipsum G per vnitates, quae in ipso sunt. ergo E vnitas aequaliter metitur numerum G, atque G ipsum L. quare vt E vnitas ad numerum G, ita G ad L. rursus quoniam G multiplicans I fecit O, numerus L ipsum O metietur per vnitates, quae sunt in G. sed E vnitas metitur ipsum G per vnitates, quae in ipso sunt. aequaliter igitur E vnitas metitur G, atque L ipsum O. ergo vt E vnitas ad G, ita est L ad O. vt autem E vnitas ad G, ita erat G ad L. vt igitur E vnitas ad G, ita G ad L, & L ad O, hoc est ad B, qui ipsi O est aequalis. quod oportebat demonstrare.*

THEOREMA VIII. PROPOSITIO. X.

Si inter duos numeros, & vnitatem deinceps proportionales numeri eciderint, quot inter vtrumque ipsorum, & vnitatem cadunt numeri deinceps proportionales; totidem & inter ipsos numeri deinceps proportionales cadent.



Inter duos enim numeros A B, & vnitatem C numeri deinceps proportionales cadant D E, & F G. Dico quot inter vtrumque ipsorum A B, & vnitatem C cadunt numeri deinceps proportionales, totidem & inter ipsos A B numeros deinceps proportionales cadere. numerus enim D ipsum F multiplicans faciat H: vterque autem ipsorum D F ipsum H multiplicans faciat vtrumque

20. diff. K L. & quoniam est ut C vnitas ad numerum D, ita D ad E, vnitas C ipsum D numerum

rum æqualiter metietur, atque D ipsum E. Sed unitas C numerum D metitur per vnitates, quæ sunt in D. ergo & numerus D ipsum E per vnitates, quæ sunt in D metitur: ac propterea numerus D seipsum multiplicans fecit E. rursus quoniam vt vnitas C ad D numerum, ita est E ad A; vnitas C ipsum D numerum æqualiter metitur, atque E ipsum A. sed vnitas C ipsum D numerum metitur per vnitates, quæ sunt in D. quare et E ipsum A per unitates, quæ sunt in D metietur: ideoq; D ipsũ E multiplicans fecit A. Eadem ratione & F se ipsum multiplicans fecit G, multiplicans vero G ipsum B fecit. et quoniam D se ipsum multiplicans fecit E, multiplicans vero F fecit H; erit vt D ad F, ita E ad H. & ob eandem causam ut D ad F, ita H ad G. vt igitur E ad H, ita H ad G. rursus quoniam D vtrumque ipsorum E H multiplicans fecit vtrumque A K, erit ut E ad H, ita A ad K. sed vt E ad H, ita D ad F. & ut igitur D ad F, ita A ad K. Rursus quoniam vterque D F ipsum H multiplicans vtrumque K L fecit, vt D ad F, ita est K ad L. vt autem D ad F, ita erat A ad K. & ut igitur A ad K, ita K ad L. præterea cum F vtrumque H G multiplicans vtrumque L B faciat, erit vt H ad G, ita L ad B. sed vt H ad G, ita D ad F. ergo & vt D ad F, ita L ad B. ostensum autem est & vt D ad F, ita & A ad K, & K ad L, & L ad B. quare A K L B numeri deinceps proportionales sunt, quot igitur inter vtrũque ipsorum A B, & vnitatem C cadunt numeri deinceps proportionales, totidem & inter A B numeri deinceps proportionales cadent. quod demõstrare oportebat.

6. com. not. 9. com. not. 10. diffi. 9. com. not. 17. septimi. 17. septimi. 18. septimi. 17. septimi.

THEOREMA IX. PROPOSITIO. XI.

Inter duos numeros quadratos vnus medius proportionalis cadit: et quadratus ad quadratum duplam proportionẽ habet eius, quam latus habet latus.

Sint quadrati numeri A B; et ipsius quidem A latus sit C, ipsius vero B latus D. Dico inter ipsos A B vnum medium proportionalem cadere, et A ad B duplam proportionem habere eius, quam habet C ad D. numerus enim C multiplicans D faciat E. et quoniam A numerus quadratus est, cuius latus C; numerus C seipsum multiplicans fecit A. eadem ratione et D se ipsum multiplicans fecit B. Quoniam igitur C utrumque ipsorum C D multiplicans vtrumque A E fecit, vt C ad D, ita erit A ad E. Rursus quoniam C multiplicans D ipsum E fecit, et D se ipsum multiplicans fecit B; duo numeri C D vnum, & eundem numerum D multiplicantes ipsos E B fecerunt. est igitur vt C ad D, ita E ad B. sed ut C ad D, ita erat A ad E. ergo et vt A ad E, ita E ad B. inter numeros igitur A B vnus medius proportionalis E cadit. Dico et A ad B duplam habere proportionem eius, quam habet C ad D. Quoniam enim tres numeri proportionales sunt A E B, habebit A ad B duplam proportionem eius, quã habet A ad E. vt autem A ad E, ita C ad D. ergo A ad B duplam proportionem habet eius, quam C latus habet ad latus D. quod oportebat demonstrare.

A....4
C...2
E.....6
D...3
B.....9

18. diffin. 17. septimi. 18. septimi. Diffi. 13.

THEOREMA X. PROPOSITIO. XII.

Inter duos numeros cubos duo medij proportionales cadunt, et cubus ad cubum triplam habet proportionem eius, quam latus habet ad latus.


Sint numeri cubi A B; & ipsius quidem A latus sit C, ipsius vero B latus D. Dico inter ipsos A B duos medios proportionales cadere; et numerum A ad B triplam habere proportionem eius, quam C habet ad D. numerus enim C se ipsum multiplicans faciat E; multiplicans vero D ipsum F faciat, et D se ipsum multiplicans faciat

ciat G: et vterq; ipsorum C D multiplicãs F vtrumque H K faciat. Quoniam igitur cubus est A, & eius latus C, numerus C se ipsum multiplicans fecit E; multiplicans vero E ipsum A fecit. similiter & D se ipsum multiplicans fecit G; multiplicans vero G fecit ipsum B. & quoniam C vtrũque ipsorum C D multiplicans vtrumque E F fecit, vt C ad D, ita est E ad F. eadem ratione & ut C ad D, ita F ad G. Rursus quoniam C vtrumque ipsorum E F multiplicans fecit vtrumque A H, erit vt E ad F, ita A ad H. ut autem E ad F, ita C ad D. et vt igitur C ad D, ita A ad H. Rursus quoniam vterque ipsorum C D multiplicans F vtrumque H K fecit, vt C ad D, ita erit H ad K. rursus quoniam D vtrumque F G multiplicans fecit vtrumque K B, erit vt F ad G, ita K ad B. ut autem F ad G, ita C ad D. & ut igitur C ad D, ita K ad B. ostensum autem est vt C ad D, ita esse A ad H, & H ad K. ergo vt A ad H, ita H ad K, & K ad B: ac propterea inter ipsos A B duo H K medij proportionales cadunt. Dico & A ad B triplam proportionem habere eius, quam habet C ad D. Quoniam enim quattuor numeri proportionales sunt A H K B, habebit A ad B triplam proportionem eius, quã habet A ad H. vt autem A ad H, ita C ad D. ergo A ad B triplam habet proportionem eius, quam C habet ad D. quod demonstrare oportebat.

19. septimi.

18. septimi.

23. diffin.




THEOREMA XI. PROPOSITIO. XIII.

Si sint quotcumque numeri deinceps proportionales, & vnusquisque se ipsum multiplicans faciat aliquos; facti ex ipsis proportionales erunt. et si positi à principio numeri factos multiplicantes alios faciant, et ipsi proportionales erunt. et semper circa extremos hoc contingit.

Sint quotcumque numeri proportionales A B C; sitq; ut A ad B, ita B ad C. & ipsi A B C se ipsos multipli cantes faciant D E F: ipsos uero D E F multidlicantes faciant G H K. Dico nnmeros DEF & G H K deinceps proportionales esse. numerus enim A ipsum B multiplicans faciat L; vterque autem ipsorum A B multipli cans L faciat vtrumque M N. et rursus B quidem multiplicans C ipsum X faciat; vterque vero ipsorum B C multiplicans X faciat vtrumque O P. similiter ijs, quę dicta sunt, ostendemus D L E, & G M N H deinceps proportionales esse in proportione, quæ est A ad B: & adhuc E X F, & H O P K deinceps esse proportionales in proportione B ad C. atque est vt A ad B, ita B ad C. ergo & D L E in eadem sunt proportione, in qua E X F: & preterea G M N H in eadem proportione, in qua H O P K. estq; ipsorum quidem D L E multitudo

A

B



multitudo multitudini ipsorum m E X F æqualis. multitudo autẽ ipsorum G M N H æqualis multitudini ipsorum H O P K. ex æquali igitur vt D ad E, ita E ad F. vt autem G ad H, ita H ad K. quod demonstrare oportebat. 14. septimi.

F. C. COMMENTARIVS.

Similiter ijs, quæ dicta sunt, ostendemus D L E, & G M N H deinceps proportionales esse in proportione, quæ est A ad B] *quoniam enim A duos numeros A B multiplicãs fecit D L, erit vt A ad B, ita D ad L. rursus quoniam B duos numeros A B multiplicans ipsos L E fecit; vt A ad B, ita erit L ad E. sed vt A ad B, ita est D ad L. vt igitur A ad B, ita est & D ad L, & L ad E. quare sequitur D L E deinceps proportionales esse in eadem proportione, in qua est A ad B. & quoniam A duos numeros D L multiplicans fecit ipsos G M, erit vt D ad L, hoc est vt A ad B, ita G ad M. rursus quoniam duo numeri A B multiplicantes L ipsos M N fecerunt, vt A ad B, ita erit M ad N. Præterea cũ E duos numeros L E multiplicans faciat N H, erit vt L ad E, vt dictum est vt A ad B, ita N ad H. Sed vt A ad B, ita erat & G ad M, & M ad N. vt igitur G ad M, ita M ad N, & N ad H. ergo C M N H deinceps proportionales sunt in eadẽ proportione, in qua est A ad B.* A 17. septimi. 18. septimi.

Et adhuc E X F, & H O P K deinceps esse proportionales in proportione B ad C] *hoc eodem, quo supra, modo ostendemus. numerus enim B duos numeros B C multiplicans fecit ipsos N X, & numerus C duos numeros B C multiplicans ipsos X F fecit. ergo vt B ad C, ita est & E ad X, & X ad F. Præterea B duos numeros F X multiplicans fecit H O. & duo numeri B C multiplicantes X fecerunt ipsos O P. rursus C duos numeros X F multiplicans ipsos P K fecit. quare vt E ad X, hoc est vt C ad B, ita H ad O. & rursus vt C ad B, ita O ad P. præterea vt X ad F, hoc est vt B ad C, ita est P ad K. vt igitur B ad C, ita H ad O, & O ad P, & P ad K. ex quibus constat E X F, & H O P K deinceps proportionales esse in ea proportione, in qua est B ad C.* B C

THEOREMA XII. PROPOSITIO XIIII.

Si numerus quadratus metiatur quadratum numerum, & latus latus metietur; & si latus metiatur latus, & quadratus quadratum metietur.

Sint quadrati numeri A B, quorum latera C D, & A ipsum B metiatur. Dico & latus C ipsum D metiri. numerus enim C multiplicans D ipsum E faciat. ergo A E B deinceps proportionales sunt in proportione, quæ est C ad D. Quoniam igitur A E B deinceps sunt proportionales, metiturq; A ipsum B; & A ipsum E metietur. atque est vt A ad E, ita C ad D. ergo & C metitur ipsum D. sed C metiatur ipsum D. Dico & A ipsum B metiri. Ijsdem enim constructis similiter ostendemus A E B deinceps proportionales esse in proportione C ad D. & quoniam est vt C ad D, ita A ad E. metitur autem C ipsum D. & A ipsum E metietur. & sunt A E B deinceps proportionales, metitur igitur & A ipsum B, si igitur numerus quadratus. & reliqua. quod oportebat demonstrare.

A....4
E.....8
B.....16
C..2
D... 4

Ex definitis huius. 7. huius. *

F. C. COMMENTARIVS.

Metitur igitur & A ipsum B] *quoniam enim A E B deinceps proportionales sunt; metiturq; A ipsum E; & E ipsum B metietur. quare A ipsum B metiatur necesse est ex duodecima communi notione.* * 20 diff.

THEOREMA XIII. PROPOSITIO XV.

Si numerus cubus metiatur cubum numerum, & latus latus me

tietur: & ſi latus metiatur latus, & cubus cubum metietur.

Numerus enim cubus A cubum numerum B metiatur: & ipſius quidem A latus ſit C, ipſius vero B latus D. Dico C ipſum D metiri. numerus enim C ſe ipſum multiplicans faciat E, & multiplicãs D faciat F: D vero ſe ipſum multiplicãs faciat G, & vterque ipſorum C D multiplicans F vtrumque HK faciat. manifeſtum A eſt E F G, & A H K B deinceps proportionales eſſe in proportione, quę eſt C ad D. & quoniã A H K B deinceps proportionales ſunt, metiturq; A ipſum B; & A ipſum H metietur. eſt aũt vt A ad H, ita C ad D. ergo C ipsũ D metietur. ſed C metiatur D. Dico & A ipſum B metiri. ijſdẽ enim cõſtructis ſimiliter oſtẽdemus A H K B deinceps proportionales eſſe in proportione C ad D. & quoniã C ipſum D metitur, eſtq; vt C ad D, ita A ad H; & A metitur ipſum H. quare & ipſum B metietur. quod demonſtrare oportebat.

9.huius.

A

B

A.....8
H.....16
K.....32
B.....64
C..2
D....4
E....4
F.....8
G.....16

F. C. COMMENTARIVS.

A Manifeſtum eſt E F G, & A H K B deinceps proportionales eſſe in proportione, quæ eſt C ad D] *hoc ſimiliter vt in 13 demonſtrabimus.*

B Et A metitur ipſum H. quare & ipſum B metietur] *quoniam enim eſt vt A ad H, ita H ad K; metiturq; A ipſum H; & H metietur ipſum K. quare & A ipſum K metietur. rurſus quoniam vt A ad H, ita eſt K ad B, & K ipſum B metietur. ergo & A ipſum B metiatur neceſſe eſt.*

20.diffi. 11.com.not.

THEOREMA XIIII. PROPOSITIO. XVI.

Si numerus quadratus non metiatur quadratum numerum, neque latus latus metietur: & ſi latus non metiatur latus, neque quadratus quadratum metietur.

Sint quadrati numeri A B, quorum latera C D. & A non metiatur ipſum B. Dico neque C ipſum D metiri. ſi enim metitur C ipſum D, & A ipſum B metietur. nõ metitur autem A ipſum B. non igitur C ipſum D metietur. ſed C non metiatur D. Dico neque A ipſum B metiri. Si enim A metitur ipſum B, & C ipſum D metietur: atqui C nõ metitur D; neque igitur A ipſum B metietur. quod demonſtrare oportebat.

14.huius.

A.....9
B.....16
C...3
D... 4

THEOREMA XV. PROPOSITIO XVII.

Si numerus cubus non metiatur cubum numerum, neque latus latus metietur. & ſi latus non metiatur latus, neque cubus cubum metietur.

Numerus enim cubus A cubum numerum B non metiatur: & ipſius quidẽ A latus ſit C, ipſius vero B latus D. Dico C ipſum D nõ metiri.

A.....8
B.....27
C..2
D...3

ſi enim

ſi enim C metitur ipſum D,& A ipſum B metietur. atqui non metitur A ipſum B. non igitur C ipſum D metietur.Sed non metiatur C ipſum D.Dico neque A ipſum B meriri.ſi enim A ipſum B metitur, & C metietur ipſum D. non metitur autem C ipſum D.neque igitur A ipſum B metietur. quod demonſtrare oportebat.

THEOREMA XVI. PROPOSITIO XVIII.

Inter duos ſimiles planos numeros vnus medius proportionalis cadit: & planus ad planum duplam proportionem habet eius, quam latus homologum habet ad homologum latus.

Sint duo numeri plani inter ſe ſimiles A B;& ipſius quidem A latera ſint C D; ipſius vero B latera E F. & quoniam ſimiles plani ſunt, qui latera habent proportionalia;erit ut C ad D,ita E ad F. Dico inter ipſos A B vnum medium proportionalem cadere: & A ad B duplam proportionem habere eius,quam latus homologum C habet ad homologum latus E, vel D ad F.quoniam enim eſt vt C ad D,ita E ad F ; & permutando vt C ad E,ita erit D ad F.& quoniam planus numerus eſt A,cuius latera CD , numerus D ipſum C multiplicans fecit A.Eadem ratione,& E multiplicans F ipſum B fecit.numerus autem D ipſum E multiplicans faciat G. & cum D ipſum quidem C multiplicans faciat A;multiplicans vero E faciat G,erit vt C ad E,ita A ad G.ſed vt C ad E,ita D ad F.& vt igitur D ad F,ita A ad G.rurſus quoniam E ipſum D multiplicans fecit G, multiplicas vero F ipſum B fecit,vt D ad F,ita erit G ad B.oſtenſum eſt aũt & vt D ad F,ita eſſe A ad G.& vt igitur A ad G, ita G ad B. ergo A G B deinceps proportionales ſunt; ac propterea inter A B vnus medius proportionalis cadit. Dico & A ad B duplam proportionem habere eius, quam latus homologum habet ad homologum latus, hoc eſt quam C ad E,vel D ad F. Quoniam enim A G B deinceps proportionales ſunt,A ad B duplam proportionem habebit eius, quam habet ad G. atque eſt vt A ad G,ita C ad E,& D ad F.ergo & A ad B duplam proportionem habet eius, quam C habet ad E,vel D ad F. quod oportebat demõſtrare.

A.....6
C.....12
B.....24
C.2
D.3
E.4
F.....6

11.diffi.

A

17. ſeptimi.

Diffi.3.

THEOREMA XVII. PROPOSITIO XIX.

Inter duos ſimiles ſolidos numeros duo medij proportionales cadunt; & ſolidus ad ſolidum triplam proportionem habet eius, quam latus homologum habet ad homologum latus.

Sint duo numeri ſolidi inter ſe ſimiles A B,& ipſius quidem A latera ſint C D E; ipſius uero B latera FG H,& quoniam ſimiles ſolidi ſunt,qui latera habent proportionalia,erit vt C ad D,ita F ad G.vt autem D ad E, ita G ad H.Dico inter ipſos A B duos medios proportionales cadere,& A ad B triplam proportionem habere eius,quam habet C ad F,& D ad G,& adhuc D ad H. numerus enim C ipſum D multiplicans faciat K, F uero multiplicans G ipſum L faciat . & quoniam C D in eadem ſunt proportione, in qua F G : & ex ipſis C D

A.....8
N.....12
X.....18
B.....27
C..2
D..2
E..2
F..3
G..3
H..3
K....4
M.....6
L.....9

21.diffi.

A

fit

fit K; ex ipſis vero F G fit L, erunt K L ſimiles plani
Ex anteced. numeri. quare inter ipſos vnus medius proportionalis cadit. ſit is numerus M. ergo M fit ex D F, vt in præcedenti theoremate. eſt igitur vt K ad M, ita M ad L. & quoniam D ipſum C multiplicans fecit K, multiplicans vero F fecit M; erit vt C ad F, ita K ad M. ſed vt K
17. ſeptimi. ad M, ita M ad L. ergo K M L deinceps proportionales ſunt in proportione C ad F. & quoniã vt C ad D, ita F ad G, erit permutando vt C ad F, ita D ad G. rurſus quoniam vt D ad E, ita G ad H, & permutãdo erit vt D ad G, ita E ad H. ergo K M L deinceps proportionales ſunt in proportione C ad F, & D ad G, & E ad H. vterque autem ipſorum E H multiplicans M faciat vtrumq; N X. & quoniam ſolidus eſt A, latera autem ipſius C D E, numerus E eum, qui fit ex C D multiplicans fecit A: qui vero fit ex C D eſt K. ergo E multiplicans K ipſum A fecit. Eadem ratione & H multi-
A plicans L, qui fit ex F G, fecit ipſum B. & quoniam E ipſum K multiplicans fecit A. ſed & multiplicans M fecit N. erit vt K ad M, ita A ad N. vt autem K ad M, ita C ad F, & D ad G, & adhuc E ad H. ergo vt C ad F, & D ad G, & E ad H, ita A ad N. rurſus quoniam vterque ipſorum E H multiplicans M fecit vtrumque N X, erit vt E ad H, ita N ad X. ſed vt E ad H, ita C ad F, & D ad
B G. eſt igitur vt C ad F, & D ad G, & E ad H, ita & A ad N, & N ad X. rurſus quoniam H multiplicans M fecit ipſum X; ſed & multiplicans L fecit B: erit vt M ad L, ita X ad B. ſed vt M ad L, ita C ad F, & D ad G, & E ad H. & vt igitur C ad F, & D ad G, & E ad H, ita non ſolum X ad B, ſed & A ad N, & N ad X. ergo A N X B deinceps proportionales ſunt in dictis laterum proportionibus. Dico & A ad B triplam proportionem habere eius, quam habet latus homologum ad homologum latus, hoc eſt quam habet numerus C ad F, vel D ad G, & E ad H. Quoniam enim quattuor numeri proportionales ſunt A N X B, habebit A ad B triplam proportionem eius, quam
Diff. 24. habet A ad N. ſed vt A ad N, ita oſtenſus eſt & C ad F, & D ad G, & E ad H. ergo A ad B triplam habet proportionem eius, quam latus homologum habet ad homologum latus, hoc eſt qua C habet ad F, & D ad G, & E ad H. quod demonſtrare oportebat.

A 8
N 12
X 18
B 27
C 2
D 3
E 2
F 3
G 3
H 3
K 4
M 6
L 9

F. C. COMMENTARIVS.

A Et quoniam E ipſum K multiplicans fecit A] *eſt enim K, qui fit ex C D, & E multiplicans eum, qui fit ex C D ipſum A fecit.*

B Rurſus quoniam H multiplicans M fecit ipſum X, ſed & multiplicans L fecit B] *eſt enim L, qui fit ex F G, & H eum, qui fit ex F G multiplicans ipſum B fecit.*

THEOREMA XVIII. PROPOSITIO. XX.

Si inter duos numeros vnus medius proportionalis cadat, numeri ſimiles plani erũt.

Inter duos enim numeros A B vnus medius proportionalis cadat C. Dico numeros A B ſimiles planos eſſe.
A Sumantur enim minimi numeri D E, eandem, quam ipſi A C B proportionem habentium. eſt igitur vt D ad E, ita A ad C. vt autem A ad C, ita C ad B. ergo & vt D ad E
20. diffi. ita C ad B. æqualiter igitur D ipſum A metitur, atque E ipſum C. ergo quoties D metitur A, tot vnitates ſint in-

A 8
C 12
B 18
D 4
E 6
F 2
G 3

F; propterea; F multiplicans D ipſum A fecit; multiplicans vero E fecit C. quare A planus numerus eſt, cuius latera D F. rurſus qm̃ D E minimi numeri ſunt, eandē quā C B proportionē habētiū; æqualiter D ipſum C metitur, & E ipſum B. quoties aūt E ipsū B metitur, tot vnitates ſint in G. ergo E ipsū B metitur per eas, quæ ſunt in G vnitates. quare G ipſum E multiplicās fecit B: ideoq; B numerus planus eſt, cuius latera E G. ergo numeri A B ſunt plani. Dico & ſimiles eſſe. Quoniam enim uterque ipſorum F G multiplicans E vtrumque C B fecit, ut F ad G, ita erit C ad B. ut aūt C ad B. ita D ad E. & ut igitur D ad E, ita F ad G. quare A B ſimiles plani ſunt; cum ipſorum latera ſint proportionalia. id quod demonſtrare oportebat.

9. com. not.
21. ſeptimi.
9. com. not.
A
18. ſeptimi.
B

F. C. COMMENTARIVS.

Sumantur enim minimi numeri DE, eandem, quam ipſi A C B proportionem habentium] *ex eo, quod additum eſt ad 35 ſeptimi.* A

Quare A B ſimiles plani ſunt, cum ipſorum latera ſint proportionalia] *quoniam enim eſt vt D ad E, ita F ad G, erit permutando vt D ad F, ita E ad G. & ſunt D F latera ipſius A, & E G latera ipſius B. cum igitur plani A B latera habeant proportionalia, ſimiles inter ſe erunt.* B

THEOREMA XIX. PROPOSITIO XXI.

Si inter duos numeros duo medij proportionales cadant, numeri ſimiles ſolidi erunt.

Inter duos enim numeros A D duo medij proportionales cadant C D. Dico ipſos A B ſimiles ſolidos eſſe. ſumantur enim minimi numeri tres, eandem quā A C D B proportionē habentiū, qui ſint E F G. extremi igitur ipſorum E G primi inter ſe ſunt. & quoniam inter E G unus medius proportionalis cecidit F, erunt numeri E G ſimiles plani. ſint ipſius quidem E latera H K; ipſius uero G latera L M. manifeſtum eſt ex antecedente E F G deinceps proportionales eſſe in proportione H ad L, & in proportione K ad M. & quoniam E F G minimi ſunt, eandem, quam A C D proportionem habentium, erit ex æquali ut E ad G, ita A ad D: & ſunt E G primi, ſed primi & minimi. minimi uero eos, qui eandem habent proportionem æqualiter metiuntur, maior maiorem, & minor minorē, hoc eſt antecedens antecedentem, & conſequens conſequentem. ergo E ipſum A æqualiter metitur, atque G ipſum D. quoties autem E metitur A, tot unitates ſint in N. ergo N ipſum E multiplicās fecit A. ſed E fit ex H K: ac propterea N eum, qui fit ex H K multiplicās ipſum A fecit. ſolidus igitur eſt A, cuius latera H K N. Rurſus quoniam E F G minimi ſunt, eandem quam ipſi C D B proportionem habentium, E ipſum C æqualiter metitur, atque G ipſum B. & quoties G metitur B, tot unitates ſint in X. ergo G ipſum B metitur per eas, quę ſunt in X unitatis; ideoq; X multiplicans G ipſum B fecit. at G fit ex L M. ergo X eum, qui fit ex L M multiplicans fecit B; multiplicans vero E ipſum C fecit. ſolidus igitur eſt B, & eius latera L M X. quare A B ſolidi ſunt. Dico etiam ſimiles eſſe. quoniam enim N X multiplicantes E ipſos A C fecerunt, ut N ad X, ita erit A ad C, hoc eſt E ad F. ſed vt E ad F, ita H ad L, & K ad M. & vt igitur H ad L, ita K ad M, & N ad X. ſunt autem C

A.....8
C.....12
D.....18
B.....27

A
3. huius.
Ex antecedenti.
B

E....4
F.....6
G.....9

23 ſeptimi.
21. ſeptimi.

H..2
K..2
N..2
L...3
M..3
X...3

9. com. not.

HKN

HKN latera ipsius A, & L M X latera ipsius B. ergo A B similes solidi erunt. quod demonstrare oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

A Sumantur enim minimi numeri tres eandem, quam ACDB proportionem habentium] *inueniantur primum duo minimi numeri eandem quam A C D B proportionem habẽtium ex iis, quae nos ad 35 septimi tradidimus: deinde ex 2. huius inueniantur tres minimi numeri, qui eandem proportionem habeant; vel ex 35 septimi sumantur tres minimi numeri eandem, quam ACD proportionem habentium.*

B Manifestum est ex antecedente E F G deinceps proportionales esse in proportione H ad L, & in proportione K ad M] *quoniam enim E G similes plani sunt, ipsorum latera eandem habent proportionem. est igitur vt H ad K, ita L ad M: & permutando vt H ad L, ita K ad M. & K multiplicans L faciat F. itaque quoniam K ipsum H multiplicans fecit E; multiplicãs vero L ipsum F fecit, vt H ad L, ita erit E ad F. rursus quoniam L ipsum K multiplicans fecit F, multiplicans vero M ipsum G fecit, vt K ad M, ita est F ad G. ostensum est autem vt H ad L, ita esse K ad M. ergo & vt E ad F, ita F ad G: ac propterea E F G deinceps proportionales sunt in proportione H ad L, & in proportione K ad M.*

17. septimi.

C Quoniam enim N X multiplicantes E ipsos A C fecerunt, ut N ad X, ita erit A ad C] *etenim E ipsum C aequaliter metitur, atque G ipsum B, vt ostensum est. quoties autem G metitur B, tot vnitates sunt in X. ergo X multiplicans E ipsum C fecit.*

THEOREMA XX. PROPOSITIO XXII.

Si tres numeri deinceps proportionales fuerint, primus autem sit quadratus, & tertius quadratus erit.

A Sint tres numeri deinceps proportionales A B C; sitq; primus A quadratus. Dico & tertium C quadratum esse. Quoniã enim inter A C unus medius proportionalis cadit B, erũt A C similes plani. sed A est quadratus, ergo & C quadratus erit. quod oportebat demonstrare.

10. huius.

A ....4.
B 6
C 9

THEOREMA XXI. PROPOSITIO. XXIII.

Si quattuor numeri deinceps proportionales fuerint, primus autem sit cubus, & quartus cubus erit.

Sint quattuor numeri deinceps proportionales A B C D, & A sit cubus. Dico & D cubum esse. Quoniam enim inter A D duo medij proportionales cadunt B C, erunt A D similes solidi. est autem A cubus; ergo et D cubus erit. quod demonstrare oportebat.

21. huius.


A 8
B 12
C 18
D 27

THEOREMA XXII. PROPOSITIO XXIIII.

Si duo numeri inter se proportionem habeant, quam numerus quadratus ad quadratum numerum, primus autem sit quadratus; & secundus quadratus erit.

Duo enim numeri A B inter se proportionem habeant, quam numerus quadratus C ad quadratum numerum D: sitq; A quadratus. Dico & B quadratum esse. quoniam

quoniam enim CD quadrati ſunt, erunt C D ſimiles plani; ideoq; inter ipſos CD vnus medius proportionalis cadit. eſt autem vt C ad D, ita A ad B. quare etiam inter A B cadit vnus medius proportionalis. eſtq; A quadratus. ergo & B quadratus erit.



18. huius.


8. huius.

22. huius.

THEOREMA XXIII. PROPOSITIO XXV.

Si duo numeri inter ſe proportionem habeant, quam numerus cubus ad cubum numerum, primus autem ſit cubus; & ſecundus cubus erit.

Duo enim numeri A B inter ſe proportionem habeant, quam cubus numerus C ad numerũ cubum D; ſitq; A cubus. Dico & B cubum eſſe. Quoniam enim CD cubi ſunt, erunt CD ſimiles ſolidi. idcircoq; inter ipſos duo medij proportionales cadent: quot autem inter C D cadunt medij proportionales, totidem cadent & inter eos, qui eandem, quam ipſi proportionem habent. ergo inter A B duo medij cadent proportionales. cadant E F. quoniam igitur quatuor numeri A E F B deinceps proportionales ſunt, eſtq; A cubus; & B cubus erit. quod oportebat demonſtrare.



19. huius.


8 huius.

23. huius.

THEOREMA XXIIII. PROPOSITIO XXVI.

Similes plani numeri inter ſe proportionem habent, quam numerus quadratus ad quadratum numerum.

Sint ſimiles plani numeri A B. Dico A ad B proportionem habere, quam numerus quadratus ad quadratum numerum. Quoniam enim A B ſimiles plani ſunt, inter eos vnus medius cadit proportionalis. cadat, ſitq; C: & ſumantur minimi numeri, eandem, quam A B C proportionem habentiũ D E F. ergo ipſorum extremi D F quadrati ſunt. & quoniam eſt vt D ad F, ita A ad B; et ſunt DF quadrati: habebit A ad B proportionem, quam numerus quadratus ad quadratum numerum. quod demonſtrare oportebat.



18. huius.

35. ſeptimi.

Cor. 2. huius.


F. C. COMMENTARIVS.

Sed & huius conuerſum verum eſt. quod hoc modo demonſtrabimus.

Plani numeri, qui proportionem habent, quam quadratus numerus ad quadratum numerum, inter ſe ſimiles ſunt.

Sint plani numeri A B, qui proportionem habeant, quã quadratus numerus C ad quadratum numerum D. Dico eos inter ſe ſimiles eſſe. Quoniam enim C D quadrati ſunt, erunt ſimiles plani. quare inter eos cadit vnus medius proportionalis: atque eſt vt C ad D, ita A ad B. ergo & inter ipſos A B vnus medius proportionalis cadit. numeri igitur A B ſimiles plani ſunt. quod demonſtrare oportebat.

22. huius.
8. huius.
20. huius.




THEOREMA XXV. PROPOSITIO. XXVII.

Similes ſolidi numeri inter ſe proportionem habent, quam numerus cubus ad cubum numerum.

Sint ſimiles ſolidi numeri A B. Dico A ad B proportionem habere, quam numerus cubus ad cubum numerum. Quoniã enim A B ſimiles ſolidi ſunt, inter ipſos duo medij cadent proportionales. cadãt C D; & ſumantur minimi numeri, qui eãdem, quam A C D B proportionem habeant, ipſis multitudine æquales E F G H. ergo eorum extremi E H cubi ſunt. atque eſt vt E ad H, ita A ad B. habet igitur A ad B proportionem, quam numerus cubus ad cubum numerum. quod demonſtrare oportebat.

19. huius.
35. ſeptimi.
Corol. 2. huius.




F. C. COMMENTARIVS.

Huius etiam conuerſum verum eſt. quod ita demonſtratur.

Solidum numeri, qui proportionem habent, quam numerus cubus ad numerum cubum, inter ſe ſimiles ſunt.

Sint ſolidi numeri A B proportionem habentes, quam numerus cubus C ad numerum cubum D. Dico eos inter ſe ſimiles eſſe. Quoniã enim C D cubi ſunt, erũt ſimiles ſolidi; ac propterea inter eos cadũt duo medij proportionales. eſt autem vt C ad D, ita A ad B. quare etiam inter ipſos A B duo medij proportionales cadent. ſimiles igitur ſolidi ſunt numeri A B. quod demonſtrare oportebat.

19. huius.
8. huius.
21 huius.



OCTAVI LIBRI FINIS.

EVCLIDIS ELEMENTORVM

LIBER NONVS.

CVM SCHOLIIS ANTIQVIS ET COMMENTARIIS.

Federici Commandini Vrbinatis.

THEOREMA I. PROPOSITIO. I.

SI DVO ſimiles plani numeri ſe ſe multiplicantes aliquem fecerint, factus quadratus erit.

Sint duo ſimiles plani numeri A B, & A ipſum B multiplicans faciat C. Dico C quadratum eſſe. numerus enim A ſe ipſum multiplicans faciat D. ergo D quadratus eſt. Quoniam igitur A ſe ipſum multiplicans fecit D, multiplicans vero B ipſum C fecit; vt A ad B, ita erit D ad C. Et quoniam A B ſimiles plani ſunt, inter ipſos vnus medius proportionalis cadet. ſi autem inter duos numeros numeri deinceps proportionales cecide rint, quot inter ipſos cadun t, totidem cadent & inter eos, qui eandem habent proportionem. quare & inter D C vnus medius proportionalis cadit. atque eſt D quadratus. ergo & C quadratus erit. quod oportebat demonſtrare.

17. ſeptimi. 18. octaui.

A....4
E.....6 8. octaui.
B.....9
D.....16 22. octaui.
F——————64
C——————————————96

THEOREMA II. PROPOSITIO II.

Si duo numeri ſe multiplicantes quadratum numerum efficiant, ſimiles plani erunt.


Duo enim numeri A B ſe ſe multiplicantes quadratum numerum C efficiant. Dico A B ſimiles planos eſſe. numerus enim A ſe ipſum multiplicans faciat D. ergo D quadratus eſt. Quoniam igitur A ſe ipſum multiplicans fecit D, multiplicans vero B ipſum C fecit; vt A ad B, ita erit D ad C. & quoniam D quadratus eſt, ſed & C; erũt D C ſimiles plani. quare

A...3
.....6
B.....12
D.....9
——————18 17. ſeptimi
C——————————————36 18. octaui.

8.octaui. inter ipſos vnus medius proportionalis cadit. atque eſt vt D ad C, ita A ad B. ergo & inter A B cadet vnus medius proportionalis. ſi autem inter duos numeros vnus
20. octaui. medius proportionalis cadat. erunt ſimiles plani. ergo A B ſimiles plani ſunt. quod oportebat demonſtrare.

THEOREMA III. PROPOSITIO III.


Si cubus numerus ſe ipſum multiplicans faciat aliquem, factus cubus erit.



Cubus enim numerus A ſe ipſum multiplicans faciat B. Dico B cubum eſſe. ſumatur enim ipſius A latus C, & C ſe ipſum multiplicans faciat D. manifeſtū eſt C multiplicantem D facere ipſum A. & quoniam C ſe ipſum multiplicans fecit
10.com.not. D, metitur C ipſum D per vnitates, quæ in ipſo ſunt. ſed & vnitas
6. com. not. metitur C per eas, quę in ipſo ſunt
Conuer. 20. diffi. vnitates. eſt igitur vt vnitas ad C, ita C ad D. rurſus quoniam C multiplicans D ipſum A fecit, metitur D ipſum A per unitates, quæ ſunt in C. metitur autem & vnitas ipſum C per vnitates, quæ in ipſo ſunt. ergo vt unitas ad C, ita D ad A. ſed vt vnitas ad C, ita C ad D. vt igitur vnitas ad C, ita C ad D, & D ad A: ideoq; inter vnitatem, & numerum A duo medij deinceps proportionales cadunt CD. rurſus quoniã A ſe ipſum multiplicans fecit B & A ipſum B metitur per vnitates, quæ in ipſo ſunt. metitur autem & vnitas ipſum A per vnitates, quæ ſunt in ipſo. eſt igitur vt vnitas ad A, ita A ad B. ſed inter vnitatem, & A cadunt duo medij proportio
8.octaui. nales. ergo & inter A & B duo medij proportionales cadent. quòd ſi inter duos nu
23. octaui. meros cadant duo medij proportionales, primus autem ſit cubus, & quartus cubus erit. atque eſt A cubus, ergo & B cubus erit. quod demonſtrare oportebat.

THEOREMA IIII. PROPOSITIO. IIII.

Si numerus cubus cubum numerum multiplicãs faciat aliquẽ, factus cubus erit.




Cubus enim numerus A cubum numerum B multiplicans ipſum C faciat. Dico C cubum eſſe. numerus enim A ſe ipſum
Ex antecedente. multiplicans faciat D. ergo D cubus eſt. & quoniam A ſe ipſum multiplicans fecit D;
17. ſeptimi. multiplicans vero B ipſum C fecit, vt A ad B, ita erit D ad C. & quoniam A B cubi ſunt, erunt ſimiles ſolidi; ac propterea in-
8.octaui. ter ipſos cadent duo medij proportionales. qua re & inter D C duo medij propor
23. octaui. tionales cadent. eſtq; D cubus. ergo & C cubus erit.

THEOREMA. V. PROPOSITIO V.

Si cubus numerus numerum aliquem multiplicans faciat cubum, & multiplicatus cubus erit.

Cubus

Cubus enim A numerũ aliquem B multiplicans faciat cubum C. Dico B cubum eſſe. numerus enim A ſe ipſum multiplicãs faciat D. ergo D cubus eſt. & quoniam A ſe ipſum quidem multiplicans fecit D; multiplicans vero B ipſum C fecit, vt A ad B, ita erit D ad C. & quoniam D C cubi ſunt, ſimiles ſunt ſolidi; ac propterea inter ipſos cadunt duo medij proportionales: atque eſt vt D ad C, ita A ad B. ergo & inter A B duo medij proportionales cadent eſtq; A cubus. Ergo & B cubus erit. quod oportebat demonſtrare.



Ex antecedente. 17. ſeptimi. 8. octaui. 23. octaui.

F. C. COMMENTARIVS.

Ex duobus præcedentibus & illa ſequuntur.

Si cubus numerus numerum non cubum multiplicans faciat aliquem, factus nõ erit cubus.

Si enim factus ſit cubus, & multiplicatus cubus erit, ex antecedente. quod non ponitur.


Si cubus numerus numerum aliquem multiplicans faciat numerum non cubum & multiplicatus non erit cubus.

Si enim multiplicatus fuerit cubus, & factus cubus erit, ex 4. huius. quod non ponitur.

THEOREMA VI. PROPOSITIO VI.

Si numerus ſe ipſum multiplicans cubum faciat, & ipſe cubus erit.

Numerus enim A ſe ipſum multiplicãs cubum B faciat. Dico & A cubum eſſe. numerus enim A multiplicans B faciat C. Quoniam igitur A ſe ipſum multiplicans fecit B. multiplicans vero B ipſum C fecit, erit C cubus. & quoniam A ſe ipſum quidem multiplicans fecit B; multiplicãs uero B fecit C, vt A ad B, ita erit B ad C. quòd cum B C cubi ſint, ſimiles ſolidi erũt: ideoq; inter ipſos cadent duo medij proportionales. & eſt ut B ad C, ita A ad B. quare & inter A B duo medij proportionales cadunta. tque eſt B cubus, ergo & A cubus. ergo & A cubus erit. quod oportebat demonſtrare.




Diffi. 19. 17. ſeptimi. 19. octaui: 23. octaui.

THEOREMA VII. PROPOSITIO. VII.

Si compoſitus numerus numerum aliquem multiplicãs, quempiam faciat, factus ſolidus erit.

Cõpoſitus enim numerus A numerum aliquem B multiplicans ipſum C faciat. Dico C ſolidũ eſſe. Quoniã enim A cõpoſitus eſt, eũ numerus aliquis metietur. metiatur D. & quoties D ipſum A metitur, tot unitates ſint in E. ergo E multiplicans D fecit A. & quoniam A ipſum B multiplicans fecit C; eſtq; A, qui fit ex D E; numerus, qui fit ex D E, ipſum B multiplicans fecit C. ergo B multiplicans eum, qui fit ex D E, ipſum C fecit. ac propterea C ſolidus eſt, cuius latera DE. quod oportebat demonſtrare.




15. diffi. 9. com. not: 16. ſeptimi Diffi. 17.

THEO-

THEOREMA VIII. PROPOSITIO VIII.

Si ab vnitate quotcumque numeri deinceps proportionales fuerint, tertius quidem ab vnitate quadratus eſt, & vnum intermittentes omnes: quartus aũt eſt cubus, & duos intermittẽtes omnes: ſeptimus vero cubus ſimul, & quadratus, & quinque intermittentes omnes.




Sint ab vnitate quotcumque numeri deinceps proportionales A B C D E F. Dico tertium quidẽ ab vnitate B quadratum eſſe, & vnum intermittentes omnes: quartum autem C cubum, & duos intemittentes omnes; ſeptimum vero F cubum ſimul, & quadratum, & quinque intermittentes omnes.

Diffin. 10. 6. com. not. Quoniam enim vt vnitas ad A, ita A ad B, vnitas æqualiter metitur numerum A, atque A ipſum B. ſed vnitas metitur A per vnitates, quæ in ipſo ſunt. Ergo & A ipſum B per vnitates, quę ſunt in A metitur. quare A ſe ipſum multiplicans fecit B. quadratus igitur eſt B. & quoniam B C D deinceps proportionales ſunt; eſtq; B quadratus; & D quadratus erit. Eadem ratione erit & F quadratus. ſimiliter demonſtrabimus & vnum intermittentes omnes quadratos eſſe. Dico & quartum ab vnitate videlicet C eſſe cubum, & duos intermittentes omnes. Quoniam enim eſt vt vnitas ad A, ita B ad C; vnitas numerum A æqualiter metitur, atque B ipſum C. ſed vnitas numerum A metitur per vnitates, quę in A ſunt. Ergo & B metitur C per vnitates, quę ſunt in A; & ob id A multiplicans B ipſum C fecit. Quoniam igitur A ſe ipſum multiplicans fecit B; multiplicans vero B fecit C; erit C cubus. quòd cum C D E F deinceps proportionales ſint; ſitq; C cubus; & F cubus erit. oſtẽsũ aũt eſt & quadratũ eſſe. ſeptimus igitur ab vnitate F, & cubus eſt, & quadratus. Similiter quoque demonſtrabimus quinque intermittentes omnes & cubos, & quadratos eſſe. quod demonſtrare oportebat.

22. octaui. 6. com. not. 9. com. not. 19. diffi. 23. octaui.

THEOREMA IX. PROPOSITIO IX.

Si ab vnitate quotcumque numeri deinceps proportionales fuerint, qui uero poſt vnitatem ſit quadratus; & reliqui omnes quadrati erunt. At ſi qui poſt vnitatem ſit cubus, & reliqui omnes cubi erunt.



Sint ab vnitate numeri quotcumque deinceps proportionales A B C D E F, & qui poſt vnitatem A ſit quadratus. Dico & reliquos omnes quadratos eſſe: tertiũ quidem ab vnitate

B eſſe

B esse quadratum,& vnum intermittentes omnes,demonstratum iam est.sed & reli qui omnes quadrati erunt. Quoniam enim A B C deinceps sunt proportionales; estq́; A quadratus: & C quadratus erit. rursus quoniam B C D deinceps proportionales sunt; est autem B quadratus: & D quadratus erit.similiter ostendemus & reliquos omnes quadratos esse.sit autem A cubus.Dico & reliquos cubos esse.quantum quidem ab vnitate C esse cubum, & duos intermittentes omnes, iam demonstratum est.sed & reliqui omnes cubi erunt. Quoniam enim est vt vnitas ad A, ita A ad B,vnitas numerum A æqualiter metitur,atque A ipsum B. sed vnitas metitur numerum A per vnitates,quæ sunt in ipso. quare & A numerum B metitur per vnitates,quæ in ipso sunt.ergo A seipsum multiplicans fecit B,atque est A cubus.si autem cubus numerus se ipsum multiplicans fecerit aliquem,factus cubus erit. Ergo B est cubus.& quoniam quattuor numeri A B C D deinceps proportionales sunt, estq́; A cubus;& D cubus erit. Eadem ratione & E est cubus,& similiter reliqui omnes cubi sunt.quod demonstrare oportebat.

A 20.diffin. A 2 huius. B

F. C. COMMENTARIVS.

Rursus quoniam BCD deinceps proportionales sunt,est autem B quadratus; et D quadratus erit] *videntur hæc supervacanea esse, cum superius demonstratum sit tertium ab vnitate quadratum esse, & vnum intermittentes omnes.*


A

Eadem ratione & E est cubus] *quattuor enim numeri B C D E deinceps proportionales sunt; atque est B cubus. ergo & E cubus sit necesse est.*

A 23.octaui.

THEOREMA X. PROPOSITIO. X.

Si ab vnitate quotcũque numeri deinceps proportionales fuerint, qui uero post unitatem non sit quadratus; neque alius vllus quadratus erit, præter tertium ab vnitate,& unum intermittentes omnes. At si qui post vnitatem non sit cubus; neque alius vllus cubus erit,præter quartum ab vnitate, & duos intermittentes oẽs.



Sint ab vnitate deinceps proportionales numeri A B C D E F, & qui post vnitatem A non sit quadratus. Dico neque alium vllum quadratum esse, prẽter tertium ab vnitate, & vnum intermittentes omnes. si enim fieri potest, sit C quadratus; est autem & quadratus B. ergo B C inter se proportionem habent, quam numerus quadratus ad quadratum numerũ: atque est vt B ad C, ita A ad B. habent igitur A B inter se proportionem eam,quam numerus quadratus ad quadratum numerum: ideoq; AB similes plani sunt. & est B quadratus. ergo & A quadratus est. quod non ponitur. non igitur C quadratus erit. similiter ostendemus neque alium ullum quadratum esse, prẽter tertium ab vnitate, & vnum intermittentes omnes. sed non sit A cubus. Dico neque alium vllum cubum esse, prẽter quartũ ab vnitate, & duos intermittentes omnes. si enim fieri potest, sit D cubus.est autem & cubus C; quartus enim est ab vnitate. & vt C ad D, ita est B ad C.ergo & B ad C proportionem habet,quam cubus ad cubum; ac propterea B C similes solidi sunt. atque est C cubus. ergo & B cubus erit. & quoniam est vt unitas ad numerum A, ita A ad B; unitas autem numerum A metitur per unitates,quæ sunt in ipso: & A metietur B per vnitates, quæ in ipso sunt.

A 26.octaui. A 27.octaui. B

ſunt. quare A ſe ipſum multiplicans cubum B fecit. ſi autẽ numerus ſe ipſum multiplicans cubum faciat, & ipſe cubus erit. cubus igitur eſt A. quod non ponitur. ergo neque D eſt cubus. ſimiliter demonſtrabimus neque alium vllũ cubũ eſſe, præter quartũ ab vnitate, & duos intermittentes omnes. quod demõſtrare oportebat.

6. huius.

F. C. COMMENTARIVS.

A Ideoq; A B ſimiles plani ſunt. & eſt B quadratus; ergo & A quadratus erit] *quoniam enim A B ſimiles plani ſunt, inter eos unus medius proportionalis cadit. ſunt igitur tres numeri deinceps proportionales; eſtq; primus quadratus. ergo & tertius quadratus erit.*

18 octaui. 22 octaui.

B Ac propterea B C ſimiles ſolidi ſunt; atque eſt C cubus; ergo & B cubus erit] *quoniam enim ſimiles ſolidi ſunt, inter eos cadent duo medij proportionales; & quattuor numeri deinceps proportionales erunt. Quòd cum primus ſit cubus, & quartus cubus ſit neceſſe eſt.*


19. octaui. 23. octaui.

THEOREMA XI. PROPOSITIO. XI.

Si ab vnitate quotcũque numeri deinceps proportionales fuerint, minor maiorem metitur per aliquem eorum, qui ſunt in numeris proportionalibus.

Sint ab vnitate A quotcumque numeri deinceps proportionales B C D E. Dico horum B C D E minorem numerum B maiorem E metiri per aliquem ipſorum C D. Quũ enim eſt vt A vnitas ad B, ita D ad E; A vnitas numerũ B æqualiter metitur, atque D ipſum E. quare permutãdo A vnitas numerum æqualiter D metitur, atque B ipſum E. ſed A vnitas metitur D per eas, quę ſunt in ipſo D vnitates. ergo & B metitur E per vnitates, quæ ſunt in D. minor igitur B maiorem E metitur per aliquem eorũ, qui ſunt in numeris proportionalibus. quod demonſtrare oportebat.

15. ſeptimi.




THEOREMA XII. PROPOSITIO XII.

Si ab vnitate quotlibet numeri deinceps proportionales fuerint, quicumque primorum numerorum metiuntur ultimum, ijdẽ & eum, qui unitati proximus eſt, metientur.

Sint ab vnitate quotlibet numeri deinceps proportionales A B C D. Dico quicumque primorum numerorum metiuntur D, eoſdem & ipſũ A metiri. metiatur enim aliquis primus numerus E ipſum D. Dico E ipſum quoque A metiri. Non enim metiatur E ipſum A, atq; E eſt primus. omnis autem primus numerus ad omnem numerum, quem nõ metitur, primus eſt. ergo E A numeri inter ſe primi ſunt. et quoniam E metitur ipſum D, metiatur per vnitates, quę

31. ſeptimi. 9. com. not.



ſunt

ſunt in F. ergo E multiplicans F ipsũ D fecit. Rurſus quoniam A metitur ipſum D per eas, quæ ſunt in C vnitates, A multiplicans C ipſum D fecit. Sed & E multiplicans F fecit D. qui igitur fit ex A C ei, qui fit ex E F eſt æqualis. ergo vt A ad E, ita F ad C. ſuntq; AE primi: primi aũt, & minimi; minimi vero eos, qui eandẽ habẽt proportionem, æqualiter metiuntur, antecedens antecedentem, & conſequens conſequentem. metitur igitur E ipſum C. metiatur per G. ergo E ipſum G multiplicans fecit C. ſed ex antecedente & A multiplicans B ipſum C fecit. qui igitur fit ex A B æqualis eſt ei, qui ex E G. ergo vt A ad E, ita G ad B. & ſunt A E primi: ſed primi, & minimi; minimi vero eos, qui eandem habent proportionem, æqualiter metiuntur, antecedens antecedentem, & conſequens conſequentem. quare & E ipſum B metitur. metiatur per H. multiplicans igitur E ipſum H fecit B. ſed & A ſe ipſum multiplicans fecit B. ergo qui fit ex H E eſt æqualis ei, qui fit ab ipſo A. eſt igitur vt E ad A, ita A ad H. ſuntq; A E primi: ſed primi, & minimi; minimi vero æqualiter metiũtur eos, qui eandem, quam ipſi proportionem habent, maior maiorem, & minor minorem, hoc eſt antecedens antecedentem, & conſequens conſequentem. ergo E metitur ipſum A. ſed & non metitur. quod fieri non poteſt. non igitur A E ſunt inter ſe primi. ergo compoſiti erunt. compoſitos vero primus aliquis numerus metitur. quare ipſos A E metietur aliquis numerus primus. & quoniam E primus ponitur: primum autem non metitur alius numerus prẽter ſe ipſum. metitur igitur E ipſos A E: ideoq; E ipſum A metitur. metitur autem & ipſum D. ergo E ipſos A D metietur. ſimiliter demonſtrabimus quicumque primorum numerorum metiuntur ipſum D, eoſdem & ipſum A metiri. quod demonſtrare oportebat.

19. com. not. A
19. ſeptimi. 23. ſeptimi. 21. ſeptimi. B
19. ſeptimi. 23. ſeptimi. 21. ſeptimi.
20. ſeptimi.
14. diff.

F. C. COMMENTARIVS.


Rurſus quoniam A metitur ipſum D per eas, quæ ſunt in C vnitates] *hoc enim in antecedente demonſtratum fuit.* A

Sed ex antecedente & A multiplicans B ipſum C fecit] *quoniam enim, vt in antecedente demonſtratum eſt, A metitur ipſum C per B; & A multiplicans B fecit C.* B

THEOREMA XIII. PROPOSITIO XIII.

Si ab vnitate quotcumque numeri deinceps proportionales fuerint; qui vero poſt vnitatem primus ſit: maximum nullus alius metietur prẽter eos, qui ſunt in numeris proportionalibus.

Sint quotcũque numeri ab vnitate deinceps proportionales A B C D, & qui poſt vnitatem, videlicet A ſit primus. Dico maximum D nullum alium numerum metiri, præter ipſos A B C. ſi enim fieri poteſt, metiatur E ipſum D, & non ſit E idem, qui aliquis ipſorum A B C; manifeſtum eſt E primum non eſſe. Si enim primus ſit, & metiatur D, ipſum quoque A metietur primum exiſtentem, cum non ſit idem, qui A. quod fieri non poteſt. non igitur E primus eſt. ergo compoſitus: omnem autem compoſitum numerum primus aliquis numerus metitur. Di



Ex antecedente.
13. diff.

co nullum alium primum metiri ipſum E præterquam A. ſi enim alius metitur E, & E metitur D, & ille ipſum D metietur. quare & ipſum A primum exiſtentem, cum non ſit idem, qui A. quod fieri non poteſt. ergo A ipſum E metitur. & quoniam E metitur D, metiatur ipſum per F. non erit F idem, qui aliquis ipſorum A B C. ſi enim eſt idem, meti

12. com. not. Ex antecedente. 11 huius.


turq; ipſum D per E; & vnus ipſorũ A B C ipſum D per E metietur. ſed vnus ipſo

rum A B C metitur D per aliquem ipsorũ A B C. quare & E idem erit, qui vnus ipsorũ A B C. quod non ponitur. non igitur F est idem, qui vnus ipsorum A B C. similiter ostendemus A metiri ipsum F, rursus ostendentes non esse F primum numerũ. si enim est primus, & metitur ipsum D, ipsum quoque A metietur, primum existentem, cum non sit idem, qui A. quod fieri non potest. non igitur F primus est. ergo cõpositus, & eum aliquis primus metietur. Dico nullum alium metiri ipsum F præterquàm A. si enim alius metitur F, & F metitur D; & ille ipsum D metietur. quare & ipsum A, primum existentem, cum non sit idem, qui A. quod fieri non potest. ergo A ipsum F metitur. Et quoniam E metitur D per F, & E multiplicans F ipsum D fecit. Sed & A multiplicans C fecit D. qui igitur fit ex A C est æqualis ei, qui ex EF. ergo vt A ad E, ita est F ad C. sed A metitur E. quare & F ipsum C metietur. metiatur per G. similiter demonstrabimus G non esse eundem, qui vnus ipsorum A B, & A ipsum G metiri. & quoniam F ipsum C metitur per G, multiplicãs F ipsum G fecit C. sed & A multiplicans B ipsum C fecit. ergo qui fit ex A B ei, qui ex F G est æqualis. vt igitur A ad F, ita est G ad B. metitur autem A ipsum F. ergo & G ipsum B metietur. metiatur per H. similiter demonstrabimus H non esse eundẽ, qui A. & quoniam G ipsum B per H metitur, G multiplicans H ipsum B fecit. sed & A se ipsum multiplicans fecit B. qui igitur fit ex HG est æqualis quadrato, qui ex A. ergo ut H ad A, ita A ad G. metitur autẽ A ipsum G. quare & H ipsum A metietur, primum existentem, cum non sit idem, qui A. quod est absurdum. non igitur alius alius metietur ipsum D maximum, præter ipsos A B C. quod demonstrandum fuerat.

Ex antecedenti.

19. Septimi.

20. Septimi.




THEOREMA. XIIII. PROPOSITIO XIIII.

Si minimum numerum primi numeri metiantur, nullus alius numerus metietur ipsum, præter eos, qui à principio metiebantur.

Minimum enim numerum A primi numeri B C D metiantur. Dico nullum alium primum numerũ metiri ipsum A, præter ipsos B C D. si enim fieri potest, metiatur E ipsum A; & non sit E idem, qui aliquis ipsorum B C D. & quoniã E metitur A, ipsum per F metiatur. ergo E multiplicans F ipsum A fecit. Et metiuntur A primi numeri B C D. si autem duo numeri se se multiplicantes aliquem faciant, & factum ex ipsis metiatur aliquis primus numerus; & vnum eorum, qui à principio positi sunt, metietur. ergo B C D metientur vnum ipsorum E F. ipsum quidem E non metientur; etenim E primus est; & nõ idem qui aliquis ipsorum B C D. ergo ipsum F metientur, qui est minor, quàm A. quod fieri nõ potest. ponitur enim A minimus eorum, quos B C D metiantur. non igitur ipsum A metietur aliquis primus numerus, præter ipsos B C D. quod demonstrare oportebat.

20. Septimi.



THEOREMA XV. PROPOSITIO. XV.

Si tres numeri deinceps proportionales fuerint, minimi eorũ

qui

qui eandem, quam ipſi proportionem habeant; duo quilibet cõpoſiti ad reliquum primi erunt.

Sint tres numeri deinceps proportionales minimi eorum, qui eãdem, quam ipſi proportionem habent A B C. Dico duos quoſlibet compoſitos ad reliquũ primos eſſe, videlicet A B ad C, & B C ad A, & A C ad B. ſumantur enim duo minimi numeri qui eandem, quam ipſi A B C proportionem habeant D E E F. manifeſtum eſt D E ſe ipſum quidem multiplicantem facere A; multiplicantem vero E F facere B; & E F ſe ipſum multiplicantem facere C. & quoniam D E E F minimi ſunt, primi erũt inter ſe. ſi autem duo numeri primi inter ſe fuerint, & vterque ſimul ad vtrumque primus erit. ergo D F ad vtrumque ipſorum D E E F primus eſt. Sed & D E ad E F eſt primus. quare D F D E ad E F primi ſunt: ac propterea qui fit ex F D D E primus eſt ad E F. ſi autem duo numeri primi inter ſe fuerint, qui fit ex vno ipſorum ad reliquum primus erit. ergo qui fit ex F D D E ad eum, qui fit ex E F eſt primus. ſed qui ex F D D E eſt qui fit ex D E vnà cum eo, qui ex D E E F. qui igitur ex D E vnà cum eo, qui ex D E E F primus eſt ad eum, qui ex E F. Sed qui fit ex D E eſt A; qui vero ex D E E F eſt B, & qui ex E F eſt C. ergo A B compoſiti ad ipſum C primi ſunt. ſimiliter oſtendemus & B C ad A eſſe primos. Dico & A C ad B primos eſſe. Quoniam enim D F ad vtrumque ipſorum D E E F eſt primus, & qui fit ex D F ad eum, qui ex D E E F primus erit. Sed ei, qui fit ex D F æquales ſunt qui ex D E, & E F fiunt vnà cum eo, qui bis fit ex D E E F. qui igitur ex D E, & E F fiunt vnà cum eo, qui bis ex D E E F primi ſunt ad eum, qui ex D E E F. ergo & diuidendo qui fiunt ex D E, & E F vnà cum eo, qui ſemel fit ex D E E F primi ſunt ad eum, qui ex D E E F. & rurſus diuidendo qui fiunt ex D E, & E F ad eum, qui fit ex D E E F primi ſunt. Sed qui fit ex D E eſt A; qui vero ex D E E F eſt B; & qui ex E F eſt C. ergo A C cõpoſiti ad ipſum B primi erunt. quod demonſtrare oportebat.

A .... 4 B 6
C 9
B ..... 6 C 9
A 4
C ..... 9 A 4
B 6
D .. E ... F

A
8. octaui.
24. ſeptimi.
30. ſeptimi.
26. ſeptimi.
27. ſeptimi.
B
C
D
E
F

F. C. COMMENTARIVS.

Sumantur enim duo minimi numeri eandem, quam ipſi A B C proportionem habentium] *ex ijs, quae demonſtrauimus ad 35 ſeptimi.* A

Sed qui ex F D D E eſt qui fit ex D E vnà cum eo, qui ex D E E F] *Hoc in lineis demonſtratur ab Euclide in ſecundo libro, propoſitione tertia. ſed quoniam numeri propria habent principia, Barlaam monachus non ſolum hoc ex illis demonſtrauit, ſed & quæcumque in ſecundo libro tradita ſunt, quae nos vtpote non aliena hoc loco apponenda cenſuimus. demonſtrat autem hoc theoremate tertio.* B

Quoniam enim D F ad vtrumque ipſorum D E E F eſt primus, & qui fit ex D F ad eum, qui ex D E E F primus erit] *nam cum D F ad vtrumque ipſorum D E E F ſit primus, erit D F primus ad eum, qui ex D E E F ex 26 ſeptimi. quare ex 27 eiuſdem & qui fit ex D F ad eum, qui ex D E E F eſt primus.* C

Sed ei, qui fit ex D F æquales ſunt qui ex D E, & E F] *hoc in lineis demonſtratur in ſecundo libro propoſitione 4. ſed in numeris Barlaam demonſtrauit theoremate quarto.* D

Ergo & diuidendo qui fiunt ex D E, & E F vnà cum eo, qui ſemel fit ex D E E F primi ſunt ad eum, qui fit ex D E E F.] *ſi enim non ſunt primi, compoſiti erunt. quare eos alius quis numerus communis menſura metietur. cum igitur is numerus metiatur vtrumque & compoſitum ex illis metietur, videlicet qui fiunt ex D E, & E F vnà cum eo, qui bis fit ex D E E F: ſed & metitur eum, qui fit ex D E E F. ergo qui fiunt ex D E, & E F vnà cum eo, qui bis fit ex D E E F non ſunt primi ad eum, qui ex D E E F. atqui primi ſunt. quod eſt abſurdum. non igitur ſunt compoſiti. ergo qui fiunt ex D E, & E F vnà cum eo, qui ſemel fit ex D E E F primi ſunt ad eum, qui fit ex D E E F.* E 11. com. not.


F Et rurſus diuidendo qui fiunt ex DE,& EF ad eum,qui fit ex DE, EF primi ſunt]
Si enim non ſint primi, eodem,quo ſupra,modo oſtendemus eos,qui fiunt ex D E, & E F vnà cum eo, qui fit ex DE EF non eſſe primos ad eum, qui ex DE EF, quod eſt abſurdum: ſunt enim primi, vt demonſtratum iam fuit. ergo qui fiunt ex DE & EF ad eum, qui ex DE EF primi ſint neceſſe eſt.

Barlaam Monachi arithmetica demonſtratio eorum, quę Euclides libro ſecundo in lineis demonſtrauit.

THEOREMA I.

Si duobus numeris propoſitis eorum alter in quotlibet numeros diuidatur, numerus planus,qui fit ex duobus numeris ab initio propoſitis æqualis erit numeris planis, qui ex numero indiuiſo,& ſingulis partibus numeri diuiſi fiunt.

Sint duo numeri AB C; & diuidatur AB in quotlibet numeros AD DE EB. Dico numerum planum, qui fit ex C AB numeris planis, qui fiũt ex C AD,& C DE,& C EB æqualem eſſe. ſit enim numerus planus F, qui fit ex C AB: GH vero, qui fit ex C AD: & HI, qui fit ex C DE: & IK, qui ex C EB. Quoniam igitur AB multiplicans C ipſum F fecit, C




12.com.not. *metitur F per eas, quae ſunt in AB vnitates. Eadem ratione C metitur G H per vnitates, quae ſunt in A D: & metitur H I per vnitates, quae in D E: & I K per vnitates, quae in E B. ergo C metitur totum G K per vnitates, quae ſunt in AB. metiebatur autem & ipſum F per eas, quae ſunt in AB vnitates. vterque igitur ipſorum F GK aeque multiplex eſt*

1.com. not. *numeri C. qui vero eiuſdem ſunt aeque multiplices, inter ſe aequales ſũt. ergo F ipſi GK eſt aequalis: atque eſt F quidem numerus planus, qui fit ex C AB: GK vero compoſitus ex numeris planis, qui fiunt ex C, & ſingulis ipſorũ AD DE EB. qui igitur fit ex C AB numerus planus aequalis eſt planis numeris, qui ex C, & ſingulis ipſorum AD DE EB fiunt. quare ſi duobus numeris propoſitis eorum alter in quotlibet numeros diuidatur, numerus planus, qui fit ex duobus numeris ab initio propoſitis aequalis erit numeris, qui ex numero indiuiſo, & ſingulis partibus numeri diuiſi fiunt. quod oportebat demonſtrare.*

THEOREMA II.

Si numerus in duos numeros diuidatur, duo numeri plani, qui fiunt ex toto, & vtraque parte, inter ſe cõpoſiti æquales ſunt numero quadrato, qui à toto efficitur.

Numerus enim A B diuidatur in duos numeros AC CB. Dico duos numeros planos, qui fiunt ex B A AC, & AB BC inter ſe compoſitos, quadrato, qui fit ex AB, aequales eſſe. numerus enim AB ſe ipſum multiplicans faciat D: AC vero multiplicans AB faciat EF: & CB eundem A B multiplicans faciat FG. quoniam igitur AC multiplicans AB ipſum EF fecit, AB metitur



12.com.not. *EF per eas, quae ſunt in AC vnitates. Rurſus quoniam CB ipſum AB multiplicans fecit FG, AB metitur FG per vnitates, quae ſunt in C B. metiebatur autem & E F per vnitates, quae in A C. ergo A B totum E G per vnitates, quae in ſe ipſo ſunt metitur. rurſus quoniam A B ſe ipſum multiplicans fecit D, metitur A B ipſum quoque D per vnitates, quae in ſeipſo ſunt. ergo A B vtrumque ipſorum D, E G metitur per eas, quae in ſeipſo ſunt vni-*


1. com. no. *tates. quotuplex igitur eſt D ipſius A B, totuplex erit & E G ipſius A B. qui vero eiuſdem numeri ſunt aeque multiplices inter ſe aequales ſunt. ergo D ipſi E G eſt aequalis. atque eſt D quidem numerus quadratus, qui fit ex AB, EG vero numerus compoſitus ex duobus planis, qui fiunt ex AB BC, & B A AC. quadratus igitur numerus ex AB eſt aequalis numero compoſito ex duobus planis, qui ex AB BC, & B A AC fiunt. quare ſi numerus in duos numeros diuidatur, duo numeri plani, qui fiunt ex toto, & utraque parte inter ſe compoſiti aequales ſunt numero quadrato, qui à toto efficitur. atque illud eſt. quod oportebat demonſtrare.*

THEO-

THEOREMA III.

Si numerus in duos numeros diuidatur, planus numerus, qui ex toto, & vna parte fit æqualis eſt plano, qui fit ex partibus vnà cum eo quadrato, qui à prædicta parte efficitur.

Numerus enim AB diuidatur in duos numeros AC CB. Dico planum numerum, qui fit ex AB BC plano, qui ex AC CB vnà cum quadrato, qui fit à CB aequalem eſſe. numerus enim AB multiplicans BC ipſum D faciat. AC vero multiplicans CB faciat EF: & CB ſe ipſum multiplicans faciat FG. itaq; quoniam AB ipſum BC multiplicans fecit D, metitur BC ipſum D per vnitates, quae ſunt in AB. rurſus quoniam AC multiplicans CB fecit EF, CB metitur EF per eas, quae ſunt in AC vnitates. rurſus quoniam CB ſeipſum multiplicans fecit FG, CB metitur FG per vnitates, quae in ſe ipſo ſunt: metiebatur autem & EF per vnitates, quae ſunt in AC. totum igitur EG metitur CB per eas, quae ſunt in AB vnitates: metiebatur autem & ipſum D per vnitates, quae in AB. ergo CB vtramque D, EG aequaliter metitur: ij vero, quos idem numerus aequaliter metitur, inter ſe aequales ſunt. quare D eſt aequalis ipſi FG. atque eſt D quidem planus numerus, qui fit ex AB BC: EG vero, qui ex AC CB vnà cum quadrato, qui à CB. ergo planus numerus, qui fit ex AB BC eſt aequalis ei, qui ex AC CB, & quadrato, qui à CB. ſi igitur numerus in duos numeros diuidatur, planus numerus, qui ex toto, & ima parte fit aequalis eſt plano, qui fit ex partibus vnà cum eo quadrato, qui à prædicta parte efficitur. quod oportebat demonſtrare.




10.com.not.

4.com. nor.

THEOREMA IIII.

Si numerus diuidatur in duos numeros, qui à toto fit quadratus æqualis eſt quadratis, qui à partibus fiũt, & ei, qui bis ex dictis partibus fit numero plano.

Numerus enim AB diuidatur in duos numeros AC CB. Dico quadratum, qui fit ex AB quadratis, qui ex AC CB, & numero plano, qui bis ex AC CB fit, aequalem eſſe. ſit enim D quadratus numerus, qui fit ex AB: EF vero quadratus, qui ex AC, & GH quadratus, qui ex CB: numerus autem planus, qui fit ex AC CE uterque ipſorum FG HK. quoniam igitur AC ſe ipſum multiplicans fecit EF, metitur AC numerum EF per vnitates, quae in ſe ipſo ſũt. rurſus quoniam BC multiplicans CA fecit FC, metitur CA ipſum FG per vnitates, quae ſunt in BC. metiebatur autem & EF per vnitates, quae in ipſo ſunt. ergo AC totum EG per vnitates, quae ſunt in AB metitur. quare AB multiplicans AC ipſum EG fecit: ideoq; EG eſt numerus planus, qui fit ex BA AC. ſimiliter oſtendemus & GK numerum planum eſſe, qui fit ex AB BC. atque eſt D numerus quadratus, qui ex AB efficitur. ſi autem numerus in duos numeros diuidatur, qui à toto fit quadratus aequalis eſt duobus numeris planis, qui fiunt ex toto, & vtraque parte. ergo D ipſi EK eſt aequalis. ſed EK conſtat ex quadratis, qui ex AC CB fiunt, & eo, qui bis ex AC CB numero plano. atque eſt D quadratus ex AB. quadratus igitur ex AB eſt aequalis quadratis, qui ex AC CB, & ei, qui bis ex AC, CB fit, numero plano. Ergo ſi numerus diuidatur in duos numeros, qui à toto fit quadratus aequalis eſt quadratis, qui ex partibus fiunt, & ei, qui bis ex dictis partibus fit numero plano. quod demonſtrare oportebat.



10.com.not.


9.com.inot.

Ex 2.huius.

THEOREMA V.

Si par numerus bifariam diuidatur; diuidatur autem & in numeros inæquales; qui ex inæqualibus partibus fit numerus planus vnà cum quadrato numeri interiecti æqualis eſt ei, qui ex dimidio fit quadrato.

Sit par numerus AB: & bifariam in AC CB diuidatur: diuidaturq; in partes inæquales AD DB. Dico quadratum ex CB numero plano, qui




fit ex

fit ex AD DB unà cum quadrato, qui ex C D aequalem esse. sit enim E quadratus ex CB: numerus vero planus FG, qui fit ex AD DB. & ex DC quadratus sit GH. itaq; quoniam numerus B C diuiditur in duos numeros BD DC, erit quadratus ex B C, hoc est E aequalis quadratis ex BD DC vnà cum eo, qui bis fit ex BD DC numero plano. sit igitur ex B D quidem quadratus K L, ex D C vero quadratus N X: & planus ex BD DC uterque ipsorum LM MN: totus igitur KX ipsi E est aequalis. et quoniam BD se ipsum multiplicans fecit KL, metitur BD ipsum KL per vnitates, quae in se ipso sunt. rursus quoniam C D ipsum D B multiplicãs fecit L M; D B metitur L M per vnitates, quae sunt in CD. metiebatur autem KL per eas, quae in se ipso sunt vnitates. ergo D B totum K M metitur per vnitates, quę sunt in C B. aequalis autem est C B ipsi C A. quare D B metitur K M per vnitates, quae sunt in C A. rursus quoniam CD multiplicans DB fecit MN, DB metitur MN per eas, quae sunt in CD vnitates. metiebatur autem & KM per vnitates, quae sunt in AC. ergo DB totum KN per vnitates, quae sunt in AD, metitur. sed & DB metitur FG per vnitates, quae sunt in AD: ponitur enim F G, qui fit ex AD DB. aequalis igitur est F G ipsi KN. qui enim sunt eiusdem aeque multiplices inter se aequales sunt. est autem et GH aequalis NX, cum vterque quadratus ex CD ponatur. totus igitur KX toti FH est aequalis; estq; ipsi E aequalis KX. Ergo FH ipsi E aequalis erit. atque est F H quidem numerus planus ex AD D B vnà cum quadrato, qui fit ex D C. E vero est qui fit ex C B quadratus. numerus igitur planus, qui fit ex AD DB vnà cum quadrato ex DC aequalis est ei, qui fit ex CB quadrato. ergo si par numerus bifariam diuidatur; diuidatur autem & in numeros inęquales; qui ex inęqualibus partibus fit numerus planus vnà cum quadrato numeri interiecti aequalis est ei, qui ex dimidio fit quadrato. quod oportebat demonstrare.

Ex antecedente.

2a. com. not.

1. com. not.




THEOREMA VI.

Si par numerus bifariam diuidatur, adijciaturq; ipsi numerus aliquis, qui fit ex toto cum adiecto, & adiecto planus numerus vnà cum quadrato dimidij est æqualis quadrato eius, qui ex dimidio, & adiecto constat.

Par enim numerus AB diuidatur bifariam in numeros A C C B: & ipsi alius numerus BD adijciatur. Dico numerum planum qui fit ex AD DB vnà cum quadrato ex CB aequalem esse ei, qui fit ex CD quadrato. Sit enim E quadratus ex CD: numerus autem planus, qui fit ex AD DB sit FG: & ex CB quadratus CH. & quoniam quadratus ex CD est aequalis quadratis ex DB BC vnà cũ eo, qui bis fit ex DB BC; sit quadratus qui dem ex BD numerus KL: planus vero numerus ex DB BC sit vterque ipsorum LM MN: & ex BC quadratus NX. totus igitur KX est aequalis quadrato ex CD: est aũt E, qui fit ex CD quadratus. ergo KX ipsi E est aequalis. & quoniam BD se ipsum multiplicans fecit K L, B D metitur KL per vnitates, quae in se ipso sunt. metitur autem & LM per vnitates, quę sunt in CB. ergo DB metitur totum KM per eas, quae sunt in CD vnitates. est autem CB ipsi CA aequalis, vt ponitur. quare DB totum KN metitur per vnitates, quae sunt in AD. sed DB metitur quoque ipsum F G per vnitates, quae sunt in AD; ponitur enim FG, qui fit ex AD DB. ergo FG ipsi KN est aequalis. est autem & HG aequalis NX. vterque enim est quadratus, qui fit ex CB. totus igitur FH est aequalis toti KX. sed KX ostensus est aequalis ipsi E. ergo & FH ipsi E est aequalis. atque est FH quidem planus numerus, qui fit ex AD DB vnà cum quadrato, qui ex CB; E vero est quadratus, qui fit ex CD. qui igitur fit ex AD DB vnà cum quadrato, qui ex CB est aequalis ei, qui fit ex C D quadrato. Ergo si par numerus bifariam diuidatur, adijciaturq; ipsi numerus aliquis, qui fit ex toto cum adiecto, & adiecto planus numerus vnà cum quadrato dimidij est aequalis quadrato eius, qui ex dimidio, & adiecto constat. quod oportebat demonstrare.

4. antecedentium.

2a. com. not.



THEO-

THEOREMA VII.

Si numerus in duos numeros diuidatur, qui à toto fit quadratus vnà cum quadrato vnius partis æqualis est numero plano, qui bis fit ex toto, & dicta parte vnà cum reliquæ partis quadrato.

Numerus enim AB diuidatur in numeros AC CB. Dico quadratos, qui fiunt ex BA AC aequales esse numero plano, qui bis fit ex BA AC vnà cum ipsius BC quadrato. Quoniam enim quadratus, qui ex AB, est aequalis quadratis, qui ex BC CA, & ei, qui bis fit ex EC CA numero plano. communis apponatur quadratus ex AC. quadratus igitur ex BA vnà cum quadrato ex AC est aequalis duobus quadratis, qui ex AC, & quadrato ex CB vnà cum eo, qui bis fit ex BC CA plano. et quoniam qui semel fit ex BA AC est aequalis ei, qui semel fit ex BC CA vnà cum ipsius CA quadrato; qui bis fit ex BA AC aequalis erit ei, qui bis fit ex BC CA vnà cum duobus quadratis ipsius CA. communis apponatur quadratus, qui ex BC. Duo igitur quadrati ex AC, & quadratus vnus ex CB, vnà cum eo, qui bis fit ex BC CA aequales sunt ei, qui bis fit ex BA AC vnà cum ipsius CB quadrato. quadratus igitur ex AB vnà cum quadrato ex AC aequalis est ei, qui bis fit ex BA AC vnà cum quadrato reliquae partis CB. ergo si numerus in duos numeros diuidatur, qui à toto fit quadratus vnà cum quadrato vnius partis aequalis est numero plano, qui bis fit ex toto, & dicta parte vnà cum reliquae partis quadrato. quod oportebat demonstrare.

B
3 C — 4 antecedentium.
5 A

5 antecedentium.

THEOREMA VIII.

Si numerus in duos numeros diuidatur, qui quater ex toto & vna parte fit numerus planus vnà cum quadrato reliquæ partis æqualis est quadrato, qui à toto, & dicta parte, tamquam ab vno efficitur.

Numerus enim AB diuidatur in duos numeros AC CB. Dico numerum planum, qui quater fit ex AB BC vnà cum quadrato ipsius AC aequalem esse ei, qui ex AB BC tamquam ex vno fit quadrato. ponatur enim ipsi BC aequalis BD. & quoniam quadratus ex AD aequalis est quadratis, qui ex AB BD, & ei, qui bis fit ex AB BD numero plano. atque est BD aequalis BC. ergo qui fit ex AD quadratus aequalis est quadratis, qui ex AB BC, & ei, qui bis fit ex AB EC numero plano. sed quadrati, qui ex AB BC aequales sunt numero plano, qui bis fit ex AB BC vnà cum ipsius AC quadrato. est igitur qui fit ex AD quadratus aequalis ei, qui quater fit ex AB BC, & quadrato ex AC. atque est quadratus ex AD, qui ex AB, & BC, tamquam ex vno efficitur: cet iam BD ipsi EC est aequalis. ergo quadratus, qui ex AB BC fit tamquam ex vno est aequalis ei, qui quater fit ex AB BC, & ipsius AC quadrato. si igitur numerus in duos numeros diuidatur, qui quater ex toto, & vna parte fit numerus planus vnà cum quadrato reliquæ partis aequalis est quadrato, qui à toto, & dicta parte tamquam ab vno efficitur. quod demonstrare oportebat.

D
2 B
2 C
6 A

Ex antecedente.

THEOREMA IX.

Si par numerus bifariam diuidatur; diuidatur autem & in numeros inæquales, quadrati, qui ab inæqualibus numeris fiunt, dupli sunt eius quadrati, qui fit à dimidio, vnà cum quadrato numeri inter ipsos interiecti.

Par enim numerus AB bifariam diuidatur in numeros AC CB: diuidatur etiam in numeros inæquales AD DB. Dico quadratos, qui fiunt ex AD DB quadratorum, qui ex AC CD duplos esse. Quoniam enim par numerus AB in numeros aequales diuiditur AC CB: & in numeros inaequales AD DB: qui fit ex AD DB vnà cũ quadrato ex CD aequalis est ei, qui fit ex AC quadrato. qui igitur bis fit ex AD DB vnà cùm duobus ex CD quadratis duplus est eius quadrati, qui fit ex AC. Quoniam igitur AB bifariam diuiditur in numeros AC CB, quadratus, qui fit ex AB quadruplus erit eius, qui ex AC quadrati. & quoniam qui bis fit ex AD DB vnà cùm duobus quadratis ex CD duplus est quadrati, qui ex AC. si autem sint duo numeri, quorum alter eiusdem quadruplus sit, alter vero duplus, qui quadruplus est dupli est du-

B
2 D — 5 antecedentium.
3 C
5 A

plus,

plus; erit quadratus ex AB duplus eius, qui bis fit ex AD DB vnà cũ duobus qui ex CD quadratis. qui igitur bis fit ex AD DB minor est, quàm dimidius quadrati ex AB, duplo quadrati ex CD. rursus quoniam qui bis fit ex AD DB vnà cum numero composito ex quadratis AD DB aequalis est ei, qui fit ex AB quadrato: erit compositus ex AD DB quadratis maior, quàm dimidius quadrati ex AB, duplo quadrati ex CD. atque est quadratus ex AB quadrati ex AC quadruplus. compositus igitur ex quadratis AD DB maior est, quàm duplus quadrati ex AC, duplo quadrati ex DC. ergo duplus est quadratorum, qui ex AC CD fiunt. si igitur par numerus bifariam diuidatur, diuidatur autem & in numeros inaequales; quadrati, qui ab inaequalibus numeris fiunt, dupli sunt eius quadrati, qui fit à dimidio vnà cum quadrato numeri inter ipsos interiecti. quod demonstrare oportebat.

4. antecedentium.

B 2 D 3 C 5 A

F. C. COMMENTARIVS.

Precedens demonstratio obscuriuscula est, quare apertius hoc modo explicabitur. Quoniam enim numerus AD diuiditur in numeros AC CD, erit ex quarta huius quadratus, qui fit ex AD, aequalis quadratis ex AC CD vnà cum numero plano, qui bis fit ex AC CD. & cum numerus CB sit aequalis ipsi AC, quadratus ex AD aequalis erit quadratis ex BC CD vnà cum eo, qui bis fit ex BC CD. addatur communis quadratus ex DB. quadrati igitur ex AD DB aequales sunt quadratis ex BC CD DB vnà cum eo, qui bis fit ex BC CD. sed quadrati ex BC CD ex 7. antecedentium sunt aequales ei, qui bis fit ex BC CD vnà cum quadrato DB. ergo quadrati ex AD DB aequales sunt duplis quadratorum ex BC CD, hoc est duplis quadratorum ex AC CD: ac propterea quadrati, ex AD DB quadratorum ex AC CD dupli erunt. quod demonstrare oportebat.

B 2 D 5 C 5 A

THEOREMA X.

Si par numerus bifariam diuidatur, adijciaturq́; ipsi alter numerus; qui fit ex toto cum adiecto, & qui ex adiecto vtrique quadrati dupli sunt quadrati ex dimidio, & quadrati, qui ex dimidio, & adiecto, tamquam ex vno efficitur.

Sit enim par numerus AB, & in numeros AC CB bifariam diuidatur, adijciaturq́, ipsi alter numerus BD. Dico quadratos ex AD DB quadratorum ex AC CD duplos esse. Quoniam enim numerus AD diuiditur in numeros AB BD, erunt quadrati ex AD DB aequales numero plano, qui bis fit ex AD DB vnà cum quadrato ex AB. quadratus autem ex AB est aequalis quattuor quadratis, qui fiunt ex AC CB; est enim AC ipsi CB aequalis. quadrati igitur ex AD DB sũt aequales ei qui bis fit ex AD DB, & quattuor quadratis ex AC CB. & quoniam qui fit ex AD DB vnà cũ quadrato ex CB est aequalis quadrato ex CD: erit qui bis fit ex AD DB vnà cum duobus ex CB quadratis aequalis duobus quadratis, qui ex CD fiunt. ergo quadrati ex AD DB aequales sunt duobus quadratis ex CD, & duobus quadratis ex AC. dupli igitur sunt quadratorũ ex AC CD. atque est quadratus quidẽ ex AD, qui fit ex toto cũ adiecto; quadratus uero ex DB, qui fit ex adiecto, & quadratus ex CD, qui ex dimidio, & adiecto. quadratus igitur, qui fit ex toto cũ adiecto vnà cũ eo, qui ex adiecto, duplus est quadrati, qui fit ex dimidio vnà cũ quadrato eius, qui ex dimidio, & adiecto cõstat. quare si par numerus bifariã diuidatur, adijciaturq́, ipsi alter numerus; qui fit ex toto cum adiecto, & qui ex adiecto vtriq; quadrati dupli sunt quadrati ex dimidio, & quadrati, qui ex dimidio, & adiecto, tamquam ex vno efficitur. quod demonstrare oportebat.

7. antecedentium.

6. antecedentium.


D 2 B 3 C 1 A

F. C. COMMENTARIVS.

Illud autem, quod vndecimę secundi libri respondet, nempe numerum ita diuidere, vt qui ex toto, & altera parte fit numerus planus, aequalis sit ei, qui à reliqua parte fit quadrato, nullo modo fieri potest.

Si enim fieri possit, diuidatur numerus AB in numeros AC CB. vt qui ex AB BC fit numerus


rus planus aequalis sit quadrato ex AC. qui igitur quater fit ex AB BC quadrati ex AC quadruplus est. ergo qui quater sit ex AB BC vnà cum quadrato ex AC quintuplus est ipsius quadrati ex AC. sed qui quater fit ex AB BC vnà cum quadrato ex AC numerus quadratus est; etenim aequalis est quadrato, qui à toto AB, et à parte BC tamquam ab vno efficitur ex octauo premissorum. est autem & qui fit AC quadratus. duo igitur quadrati numeri inter se proportionem habent, quam quinque ad vnum. quod fieri non potest. Ergo numerus non diuiditur ita, vt qui à toto, & altera parte sit numerus planus aequalis sit ei, qui à reliqua parte fit, quadrato. quod demonstrare oportebat.



THEOREMA XVI. PROPOSITIO. XVI.

Si duo numeri primi inter se fuerint, non erit vt primus ad secũdum, ita secundus ad alium vllum.

Duo enim numeri AB primi inter se sint. Dico non esse ut A ad B, ita B ad alium vllum. si enim fieri potest, sit vt A ad B, ita B ad C. & sunt AB primi, sed primi, & minimi, minimi vero eos, qui eandem habent proportionem, æqualiter metiuntur, antecedens antecedentem, & consequens consequentem. metitur igitur A ipsum B, vt antecedens antecedentem. sed & ipse se ipsum metitur. ergo A metitur ipsos AB primos inter se existentes. quod est absurdum. non igitur est vt A ad B, ita B ad C. quod oportebat demonstrare.




23. septimi.
21. septimi.

THEOREMA XVII. PROPOSITIO XVII.

Si fuerint quotcumque numeri deinceps proportionales, extremi autem ipsorum primi inter se sint, non erit vt primus ad secundum, ita vltimus ad alium vllum.

Sint quotcumque numeri deinceps proportionales A B C D, extremi autem ipsorum A D primi sint inter se. Dico non esse vt A ad B, ita D ad alium vllum. si enim fieri potest, sit vt A ad B, ita D ad E. quare permutando, vt A ad D, ita erit B ad E. & sunt A D primi; sed primi, & minimi; minimi vero eos, qui eandem habent proportionem, æqualiter metiuntur, antecedens antecedentem, & consequens consequentem. metitur igitur A ipsum B. atque est vt A ad B, ita B ad C. ergo & B metitur ipsum C; & ob id A quoque ipsum C metitur. & quoniam est vt B ad C, ita C ad D; metitur autem B ipsum C, & C ipsum D metietur. Sed A metitur C. quare & ipsum D. metitur autem & se ipsum. Ergo A ipsos A D primos inter se existentes metitur. quod fieri non potest. non igitur erit vt A ad B, ita D ad alium vllum. quod demonstrare oportebat.




23. septimi.
21. septimi.
2. cõm. not.


PROBLEMA I. PROPOSITIO. XVIII.

Duobus numeris datis considerare an tertius ipsis proportionalis inueniri possit.

Sint dati duo numeri A B; & oporteat conſiderare an poſſit tertius ipſis proportionalis inueniri. Itaque AB vel primi inter ſe ſunt, vel non primi. ſi quidem primi, iam oſtenſum eſt, fieri non poſſe, vt tertius ipſis proportionalis inueniatur. Sed non ſint A B inter ſe primi, & B ſe ipſum multiplicans faciat C. vel igitur A metitur C, vel non metitur. metiatur primum per D. ergo A multiplicans D ipſum C fecit. ſed & B ſe ipſum multiplicans fecit C. qui igitur fit ex A D eſt ęqualis ei, qui ex B. ergo vt A ad B, ita B ad D; ac propterea ipſis A B tertius proportionalis D inuentus eſt.



Sed non metiatur A ipſum C. Dico fieri non poſſe, vt ipſis A B tertius proportionalis inueniatur. Si enim fieri poteſt, inuentus ſit D. ergo qui fit ex A D aequalis eſt ei, qui fit ex B. ſed qui fit ex B eſt C. qui igitur fit ex A D ipſi C eſt ęqualis. ergo A ipſum D multiplicans fecit C. & ob id A ipſum C per D metitur. ſed & non metiri poſitum eſt, quod eſt abſurdum. non igitur fieri poteſt, vt ipſis A B tertius inueniatur proportionalis, quando A ipſum C non metitur. quod demonſtrare oportebat.



PROBLEMA II. PROPOSITIO XIX.


Tribus numeris datis conſiderare an quartus ipſis proportionalis inueniri poſsit.

Sint dati tres numeri A B C, & oporteat conſiderare an poſsit ipſis quartus proportionalis inueniri. ergo ipſi A B C vel deinceps ſunt proportionales, & eorum extremi primi inter ſe ſunt, vel non deinceps proportionales, & eorũ extremi ſunt primi inter ſe, vel proportionales quidẽ deinceps, non autem extremi ipſorum inter ſe primi, uel neque proportionales deinceps, neque eorum extremi primi inter ſe ſunt. ſi quidem igitur A B C deinceps ſunt proportionales, & eorum extremi A C primi inter ſe, iam demonſtratum eſt fieri non poſſe, vt quartus ipſis proportionalis inueniatur. ſi vero non ſunt deinceps proportionales, & extremi ipſorum ſunt primi. Dico quartum proportionalem inueniri non poſſe. ſi enim inueniri poteſt ſit D. vt igitur A ad B, ita C ad D: & vt B ad C, ita ſit D ad E. ergo ex ęquali vt A ad C, ita C ad E: ſed ſunt A C primi; primi autem, & minimi; minimi vero eos, qui eandem proportionem habent, æqualiter metiuntur, antecedens antecedentem, & conſequens conſequentem. ergo A ipſum C metitur, antecedens antecedentem. metitur autem & ſe ipſum. quare A ipſos A C primos inter ſe exiſtentes metitur. quod fieri non poteſt. ipſis igitur A B C non poteſt quartus proportionalis inueniri.

17 huius.

23. ſeptimi.

21. ſeptimi.






Rurſus A B C proportionales quidem ſint deinceps, nõ autem extremi eorum primi. Dico quartum proportionalem inueniri poſſe. multiplicans enim B ipſum C faciat D. itaque vel A metitur ipſum D, vel non metitur. metiatur primum per E. ergo A multiplicans E fecit D. ſed & B multiplicãs C ipſum D fecit. qui igitur fit eſt A E eſt æqualis ei, qui ex B C; propterea q; vt A. ad B, ita eſt C ad E. ipſis igitur A B C quartus proportionalis E inuentus eſt.

9. com. not.

19. ſeptimi.

Sed

Sed non metiatur A ipſum D. Dico fieri non poſſe, vt ipſis ABC inueniatur quartus proportionalis. ſi enim inueniri poteſt, inueniatur, ſitq; E. ergo qui fit ex A E eſt æqualis ei, qui ex BC. ſed qui fit ex BC eſt D. quare qui fit ex A E ipſi D eſt æqualis: & ob id A ipſum E multiplicans fecit D. metitur igitur A ipſum D per E. quare A ipſum D metitur. ſed & nõ metitur. quod eſt abſurdum. non igitur fieri poteſt, vt ipſis ABC inueniatur quartus proportionalis, quando A ipſum D non metitur.




19. ſeptimi.


Sed non ſint neque deinceps proportionales A B C, neque A C inter ſe primi, & B ipſum C multiplicans faciat D. ſimiliter demonſtrabimus, ſi A ipſum D metiatur, inueniri poſſe quartum proportionalem. ſin minus, inueniri nõ poſſe. quod demonſtrandum fuerat.

THEOREMA XVIII. PROPOSITIO XX.

Primi numeri plures ſunt, omni propoſita multitudine primorum numerorum.



Sint propoſiti primi numeri A B C. Dico ipſis A B C plures eſſe primos numeros. ſumatur enim minimus, quem ipſi A B C metiantur; ſitq; DE: & ipſi DE apponatur vnitas DF. ergo E F vel primus eſt, vel non. ſit primum primus. Inuenti igitur ſunt primi numeri A B C EF plures, quàm ipſi A B C. ſed non ſit EF primus. ergo eum primus aliquis metitur. metiatur G. Dico C nulli ipſorum A B C eundem eſſe. ſi enim G idem ſit, qui vnus ipſorũ A B C; ipſi autem A B C metiantur DE; & G ipſum DE metietur. metitur autem & EF. & reliquam igitur DF vnitatem metietur numerus exiſtens. quod eſt abſurdum. ergo G non eſt idem, qui unus ipſorum A B C, & ponitur primus. Inuenti igitur ſunt primi numeri A B C G plures propoſita multitudine primorum numerorum A B C. quod oportebat demonſtrare.



11. com. not.

SCHOLIVM.


In hoc theoremate vult oſtendere infinitos eſſe numeros primos; ſi enim omni propoſita numerorum multitudine primi plures ſint, infinitos eſſe primos manifeſtum eſt. ſi autem hoc, videtur obſiſtere philoſophorum dogmati, qui aſſerunt prima determinata eſſe, & numero minora.

quid igitur dicemus? primos numeros non esse principium numerorum, sed vnitatem ipsam, quæ & contracta est & sola. quare & in numeris hoc seruatur, principium non esse infinitum, sed determinatum.

THEOREMA XIX. PROPOSITIO XXI.

Si pares numeri quotcumque componantur, totus par erit.

Componantur enim pares numeri quotcumque AB BC CD DE. Dico totum AE parem esse. Quoniam enim vnusquisque ipsorum AB BC CD DE par est, habet partem dimidiam. quare & totus AE partem dimidiam habebit. par autem numerus est, qui bifariam diuiditur. ergo AE par est. quod demonstrare oportebat.



* 6. diffi.

F. C. COMMENTARIVS.


* Quare & totus AE partem dimidiam habebit.] *Quoniam enim vnusquisque eorum habet dimidium, sit ipsius AB dimidia AF, & ipsius BC dimidia BG, & ipsius CD dimidia CH, denique ipsius DE dimidia DK. vt igitur AB ad eius dimidiam AF, ita & vnusquisque reliquorum ad eius dimidiam. quare vt AB ad AF, ita & omnes AE ad omnes AF BG CH DK. sed AF dimidia est ipsius AE. ergo & AF BG CH DK sunt dimidia totius AE. cum igitur AE dimidiam habeat bifariam diuidetur. ideoq; etiam par erit.*

12. septimi.

THEOREMA XX. PROPOSITIO XXII.

Si impares numeri quotcumque componantur, multitudo autem ipsorum sit par; totus par erit.

Componantur enim impares numeri quotcumque multitudine pares AB BC CD DE. Dico totum AE parem esse. Quoniam enim vnusquisque ipsorum AB BC CD DE impar est, detracta ab vno quoque vnitate, erit vnusquisque reliquorum par. quare & compositus ex ipsis par erit. est autem par & vnitatum multitudo. & totus igitur AE par est. quod oportebat demonstrare.




Ex antecedente.

THEOREMA XXI. PROPOSITIO. XXIII.

Si impares numeri quotcumque componãtur, & multitudo ipsorum sit impar, & totus impar erit.

Componantur enim numeri impares quotcumque, quorum multitudo sit impar AB BC CD. Dico & totum AD imparem esse. auferatur ab ipso CD vnitas DE. reliquus igitur AE par est. est autẽ & AC par. ergo & totus AE par erit. atque est DE vnitas. impar igitur AD. quod oportebat demonstrare.



21. huius.

F. C. COMMENTARIVS.

7. diffi. Atque est DE vnitas, impar igitur est AD.] *impar enim numerus est, qui à pari vnitate differt.*

THEO-

THEOREMA XXII. PROPOSITIO. XXIIII.

Si à pari numero par auferatur, & reliquus par erit.

A pari enim numero AB par auferatur BC. Dico & reliquum CA parem esse. Quoniam enim AB par est, habet partem dimidiam. Eadem ratione & B C. quare & reliquus AC partem habet dimidiam. par igitur est AC. quod oportebat demonstrare.



F. C. COMMENTARIVS.

Quare & reliquus AC partem habet dimidiam] Sit ipsius ab dimidia BD, & ipsius CB dimidia BE, erit AB ad BD, vt CB ad BE. & permutando AB ad BC, vt DB ad BE. & diuidendo AC ad CB, vt DE ad EB. rursusq́, permutando AC ad DE, vt CB ad BE. sed BE est dimidia ipsius CB. ergo & DE ipsius AC dimidia erit. cum igitur AC partẽ habeat dimidiam bifariã diuiditur, ac propterea par est. quod demonstrandũ proponebatur.



THEOREMA XXIII. PROPOSITIO XXV.

Si pari numero impar auferatur, & reliquus impar erit.

A pari enim numero AB impar BC auferatur. Dico & reliquum CA imparem esse. auferatur ab ipso BC vnitas CD. ergo DB par est. est autem par & AB. & reliquus igitur AD est par. atque est CD vnitas. ergo CA impar est. quod demõstrare oportebat.

Ex antecedente.

THEOREMA. XXIIII. PROPOSITIO XXVI.

Si ab impari numero impar auferatur, & reliquus par erit.

Ab impari enim numero AB impar BC auferatur. Dico reliquum CA parem esse. Quoniam enim AB impar est, auferatur vnitas BD. reliquus igitur AD est par. Eadem ratione & CD est par. quare & reliquus AC par est. quod oportebat demonstrare.

24. huius.

THEOREMA XXV. PROPOSITIO. XXVII.

Si ab impari numero par auferatur, reliquus impar erit.


Ab impari enim numero AB par auferatur BC. Dico reliquum CA imparem esse. auferatur enim vnitas AD. ergo DB par est. est autem par & BC. & reliquus igitur CD est par. atque est D A vnitas. ergo C A impar est. quod oportebat demonstrare.

24. huius.

THEOREMA XXVI. PROPOSITIO. XXVIII.

Si impar numerus parem multiplicans faciat aliquem, factus par erit.

Impar enim numerus A parem numerum B multiplicans faciat C. Dico C parem esse. Quoniam enim A multiplicans B ipsum C fecit, componitur C ex tot numeris æqualibus ipsi B, quot vnitates sunt in A. atque est B par. ergo C ex paribus numeris componitur. si autem pares numeri quotcumque componantur totus par erit. ergo C est par. quod demonstrare oportebat.




21. huius.

THEO-

THEOREMA XXVII. PROPOSITIO XXIX.

Si impar numerus imparem numerum multiplicans faciat aliquem, factus impar erit.

Impar enim numerus A numerum imparem B multiplicans faciat C. Dico C imparem esse. Quoniam enim A multiplicans B ipsum C fecit, componitur C ex tot numeris æqualibus ipsi B, quot sunt in A vnitates. atque est vterque ipsorum A B impar. ergo C ex imparibus numeris componitur, quorum multitudo est impar. qui autem componitur ex imparibus numeris, quorum multitudo impar, & ipse impar erit. ergo C est impar. quod demonstrare oportebat.




23. huius.

THEOREMA XXVIII. PROPOSITIO XXX

Si impar numerus parem numerum metiatur, & dimidium eius metietur.

Impar enim numerus A parem numerum B metiatur. Dico & dimidium eius metiri. Quoniam enim A metitur B, metiatur ipsũ per C. Dico C non esse imparem. na si fieri potest, sit impar. & quoniam A ipsum B metitur per C, A multiplicans ipsum C fecit B. ergo B componitur ex imparibus numeris, quorum multitudo est impar; ac propterea impar est. quod est absurdum. par enim ponitur. non igitur C est impar. ergo par. quare A ipsum B pariter metitur.

✻ & ob id eius quoque dimidium metitur. quod oportebat demonstrare.



9. com. not.

SCHOLIVM.

✻ Et ob id eius quoque dimidium metitur] *quoniam enim A ipsum B metitur per C, & C ipsum B per A metietur. habet autem vterque ipsorum CB partem dimidiam. quare vt C ad B, ita erit dimidium ad dimidium. sed C metitur ipsum B per A. ergo & ipsius C dimidium dimidium ipsius B per A metietur; ideoq; A multiplicans ipsius C dimidium, dimidium ipsius B fecit. quare A ipsius B dimidium per dimidium ipsius C metitur.*


9. com. not.

10. com. not.

THEOREMA XXIX. PROPOSITIO XXXI.

Si impar numerus ad aliquem numerum sit primus, & ad ipsius duplum primus erit.

Impar enim numerus A ad aliquem numerũ B sit primus, & sit C ipsius B duplus. Dico A etiam ad C primũ esse. si enim non sint AC primi, eos aliquis numerus metietur. metiatur, sitq; D: & est A impar. impar igitur est & D. & quoniam D impar existens metitur ipsum C, atque est C par; & D ipsius C dimidium metietur. sed ipsius C dimidium est B. ergo D ipsum B metitur, metitur autem & ipsum A. quare D ipsos AB metitur, primos inter se existentes. quod fieri non potest. non igitur A ad C primus non est. ergo AC inter se primi sunt. quod oportebat demonstrare.



✻ Ex antecedente.

SCHOLIVM.


Et est A impar. impar igitur est & D] *quoniam enim A impar est, metitur autem ipsum numerus D, vt positum est & D seipsum metitur, erit D impar. numeros enim impares impar numerus metitur.*

THEO-

THEOREMA XXX. PROPOSITIO XXXII.

Numerorum à binario duplatorum vnuſquiſque pariter par eſt tantum.

A binario enim A duplentur quotlibet numeri BCD. Dico BCD pariter pares eſſe tantum. at vero vnumquem ipſorum BCD pariter parem eſſe, manifeſto conſtat. à binario namque duplatus eſt. Dico & tantum. exponatur enim vnitas E. Quoniã igitur ab vnitate quotlibet numeri deinceps proportionales ſunt, & poſt vnitatem A primus eſt; maximum ipſorum numerorum ABCD, videlicet D, nullus alius metietur præter ipſos ABC. atque eſt vnuſquiſque ipſorum ABC par. ergo D pariter par eſt tãtum. ſimiliter demonſtrabimus & vnumquemque ipſorũ ABC pariter parẽ eſſe tãtũ. quod demõſtrare oportebat.



13. huius.

THEOREMA XXXI. PROPOSITIO. XXXIII.

Si numerus dimidium habeat imparem, pariter impar eſt tantum.

Numerus enim A dimidium imparem habeat. Dico A pariter imparem eſſe tantum. at vero pariter imparem eſſe perſpicuum eſt. dimidius enim ipſius impar exiſtens ipſum pariter metitur. Dico & tantum. nam ſi A ſit etiam pariter par, dimidius ipſius par erit; atque eum par numerus per parẽ numerũ metietur. ergo dimidium ipſius par numerus metitur, impar exiſtens. quod eſt abſurdum. quare A pariter impar eſt tantum.

A 10

THEOREMA XXXII. PROPOSITIO XXXIIII.

Si par numerus neque ſit à binario duplatus, neque dimidium imparem habeat; pariter par eſt, & pariter impar.

Numerus enim A neque ſit A binario duplatus, neque dimidium imparem habeat. Dico A & pariter parem, & pariter imparem eſſe. at vero A pariter eſſe parem, manifeſtum eſt; dimidium enim imparem non habet. Dico etiam pariter imparem eſſe. nam ſi A bifariã ſecemus, & dimidium ipſius bifariam, & hoc ſemper faciamus, tandem incidemus in aliquem imparem, qui ipſum A per numerum parem metietur. ſi enim non, incidemus in binarium, atque erit A à binario duplatus. quod non ponitur. quare A & pariter impar eſt. oſtenſum autem eſt & pariter eſſe parem. eſt igitur A & pariter par, & pariter impar. quod demonſtrare oportebat.

A 24

THEOREMA XXXIII. PROPOSITIO XXXV.

Si ſint quotcumque numeri deinceps proportionales: auferantur autem à ſecundo, & ultimo æquales primo; erit vt ſecundi exceſſus ad primum, ita ultimi exceſſus ad omnes ipſum antecedentes.

Sint

Sint quotcumque numeri deinceps proportionales A BC D EF, incipientes à minimo A: & auferatur ab ipſo BC;& ab EF æqualis ipſi A, videlicet GC FH. Dico vt BG ad A,ita eſse EH ad A BC D;ponatur enim ipſi quidem B C æqualis F K; ipſi vero D æqualis FL. Quoniam igitur FK eſt æqualis ipſi BC, quorum FH eſt æqualis GC;erit reliquus HK reliquo GB æqualis.& quoniam eſt vt EF ad D, ita D ad BC, & BC ad A;æqualis autem eſt D ipſi FL,& BC ipſi FK,& A ipſi FH:erit vt EF ad FL ita LF ad FK,& KF ad FH.quare diuidendo vt EL ad LF,ita LK ad KF,& KH ad HF, & vt vnus antecedentium ad vnum conſequentium, ita omnes antecedentes ad omnes conſequentes.eſt igitur vt KH ad HF,ita EL LK KH ad LF KF HF.atque eſt K H quidem æqualis BG,FH vero ipſi A,& LF KF HF æquales ipſis D BC A. ergo vt BG ad A,ita eſt EH ad D BC A.eſt igitur vt ſecundi exceſsus ad primum, ita exceſsus ultimi ad omnes ipſum antecedentes.quod oportebat demonſtrare.


A..2
B.2.G.2.C
D.....8
E....8....L..4..K.2.H.2.F

F. C. COMMENTARIVS.

* Quare diuidendo vt EL ad LF] *ex ijs,quae nos ad 14 ſeptimi demonſtrauimus.*

THEOREMA XXXIIII. PROPOSITIO. XXXVI.

Si ab vnitate quotcumque numeri deinceps proportionales exponãtur in dupla analogia, quoad totus compoſitus primus fiat, & totus in vltimum multiplicatus faciat aliquem; factus perfectus erit.



Ab vnitate enim exponantur quotcumque numeri deinceps proportionales in dupla analogia, quoad totus compoſitus primus fiat A B C D: & toti æqualis ſit E: & E ipſum D multiplicans faciat FG. Dico FG perfectum eſſe.quot enim ſunt A B CD mul-

CD multitudine, tot ſumantur ab ipſo E in dupla analogia, qui ſint E HK L M. ergo ex æquali vt A ad D, ita erit E ad M: ac propterea qui fit ex E D eſt æqualis ei, qui ex A M. eſt autem qui ex E D ipſe FG. quare FG eſt, qui fit ex A M. multiplicãs igitur A ipſum M fecit FG. ergo M metitur F G per vnitates, quæ ſunt in A. atque eſt A binarius. duplus igitur eſt FG ipſius M. ſunt autem & M L HK E deinceps dupli inter ſe. ergo E HK L M FG deinceps proportionales ſunt in dupla analogia. auferatur à ſecundo HK, & ab vltimo FG ipſi primo E æqualis vterque HN, FX. eſt igitur vt ſecundi numeri exceſſus ad primum, ita exceſſus vltimi ad omnes ipſum antecedentes. quare vt NK ad E, ita XG ad M L HK E. atque eſt NK ipſi E æqualis. ergo & XG eſt æqualis ipſis M L HK E. eſt aũt & FX æqualis ipſi E; atque E ipſis A B C D, & vnitati æqualis. totus igitur FG æqualis eſt & ipſis E HK L M, & ipſis A B C D, & vnitati; omnesq; ipſum FG metiuntur. Dico FG nullum alium metiri præter ipſos A B C D E HK L M, & vnitatem. ſi enim fieri poteſt, metiatur aliquis numerus ipsũ FG, qui ſit O: ſitq; O nulli ipſorũ A B C D E HK L M idẽ. & quoties O ipſum FG metitur, tot vnitates ſint in P. ergo P ipſum O multiplicans fecit FG. ſed & E multiplicans D ipſum FG fecit. eſt igitur vt E ad P, ita O ad D. & quoniam ab vnitate deinceps proportionales ſunt A B C D, et poſt vnitatem A primus eſt, non metietur D aliquis alius numerus, præter ipſos A B C: & ponitur O nulli ipſorum A B C idem. non igitur O ipſum D metietur. vt autem O ad D, ita E ad P. ergo neque E metietur ipſum P. atque eſt E primus. omnis autem primus numerus ad omnem numerum, quem non metitur, primus eſt. quare E P primi inter ſe ſunt. ſed primi & minimi; minimi vero eos, qui eandem, quam ipſi, proportionem habent, æqualiter metiuntur, antecedens antecedentem, & conſequens conſequentẽ. atque eſt vt E ad P, ita O ad D. ergo E æqualiter metitur ipſum O, atque P ipſum D. ſed D nullus alius metitur præter ipſos A B C. quare P idẽ eſt, qui vnus ipſorum A B C. ſit idẽ, qui B. & quot ſunt B C D multitudine, tot ab ipſo E ſumantur E HK L: ſuntq; E HK L in eadem proportione, in qua B C D. ex æquali igitur vt B ad D, ita eſt E ad L. ergo qui fit ex B L eſt æqualis ei, qui ex D E. ſed qui fit ex D E eſt æqualis ei, qui ex P O. qui igitur fit ex P O ei, qui ex B L æqualis erit. quare vt P ad B, ita eſt L ad O. eſtq; P idem qui B. ergo & L idem erit, qui O. quod fieri non poteſt. etenim O nulli ipſorum expoſitorum idem ponitur. non igitur ipſum FG metitur aliquis numerus præter ipſos A B C D E HK L M, & vnitatẽ. atque oſtenſus eſt FG æqualis ipſis A B C D E HK L M, et vnitati. perfectus autem numerus eſt, qui ſuis ipſius partibus eſt æqualis. ergo FG perfectus erit. quod oportebat demonſtrare.

19. ſeptimi. 10. com. not. 9. cõis. not. 19. ſeptimi. 13. huius. 31. ſeptimi. 23. ſeptimi. 21. ſeptimi. 19. ſeptimi. 19. ſeptimi.


NONI LIBRI FINIS.

SCHOLIVM.

Propositum est Euclidi in decimo libro tractare de commensurabilibus & incommensurabilibus magnitudinibus, & de irrationalibus, & irrationalibus. non enim eadem sunt incommensurabilia, & irrationalia: quoniam illa quidem natura sunt; irrationalia vero & rationalia positione. si enim quadrati diametrum natura incommansurabilem facit, vt eius latus, hoc non facit temere, sed ex illius rationibus, quæ in ipsa sunt. quare neque irrationale est eorum, quæ natura sunt incommensurabilia, sed incommensurabile. etenim natura ipsa hoc facit iuxta omnem mensuram, quæ cum aliquo nihil commune habet. Primum igitur de commensurabilibus, & incommensurabilibus tractat, eorum naturã exquirens: postea vero de rationalibus, & irrationalibus, non tamen omnibus: quidam enim, velut obsistentes ipsa reprehendunt: sed de maxime simplicibus speciebus, quibus compositis infinitæ irrationales gignũtur. Earum nonnullas etiam Apollonius litteris mandauit. Ad scientiam autem attinet, causas, principia, & simplicia considerare, non singularia, & infinita. Itaque exponit irrationalium simplices species tredecim, quæ tribus modis inuentę sunt, his enim aliæ simplices non inuenientur. Horum modorum vnus est iuxta analogiam, per quem Euclides inuenit vnam speciem eorũ. alius iuxta compositionẽ, per quẽ sex species; tertius iuxta diuisionẽ, per quem reliquas sex inuenit. Venerũt autem initio ad inquisitionem symmetriæ, hoc est commensurabilitatis Pythagorai primi, ipsam ex numerorum cognitione inuenientes, cum vnitas, sit omnium numerorum communis mensura, & in magnitudinibus communis mensura inueniri non possit. Huius caussa est, quòd omnis numerus, iuxta quaslibet sectiones diuisus relinquit particulam aliquam minimã, & quę sectionem non admittit. Omnis autem magnitudo in infinitũ diuisa non relinquit particulam, quæ propterea quòd minima sit, secari non possit. sed & illa in infinitum secta infinitas efficit particulas, quarũ singulę in infinitum secabuntur. & simpliciter magnitudo quatenus quidem diuiditur particeps est principij infiniti, quatenus vero ad totum attinet, termini est particeps. At numerus contra quatenus diuiditur termini, quatenus vero ad totum attinet. particeps est infiniti. Itaque quoniam oportet mensuras minores esse ijs, quæ mensurantur; mensuratur autem omnis numerus, necesse est omnium minimam esse mensuram. quare & magnitudinum, si omnes mensura communi mensurantur, necesse est eam minimam esse. Sed in numeris quidem est communis mensura, terminatur enim, quemadmodum dictum est: in magnitudinibus vero

non item. non igitur communis quædam mensura est omnium magnitudinum. Cum hoc intelligerent pythagorai, vt fieri potuit, in magnitudinibus mensuram inuenerunt. omnes enim, quas eadem mensura metitur, commensurabiles appellarunt; eas uero, quas non metitur eadē mensura, incōmensurabiles. & harum rursus, quascumque alia quapiam cōmunis mensura metitur inter se cōmensurabiles; quascumque vero non metitur illis incōmensurabiles. & ita sumptis mensuris, omnes possunt esse commensurabiles: rationales aūt omnes, & omnes irrationales esse possunt, vt ad aliquid; propterea quòd commensurabile quidem & incommensurabile natura illis inest: rationale autem, & irrationale positione. Inueniuntur autē commensurabiles & incōmensurabiles tripliciter iuxta tres dimensiones, nimirum lineæ, superficies, & solida, vt Theon demonstrauit & alij non nulli. At vero magnitudinem in infinitum diuidi posse, hoc theoremate ostenderunt.

Sumentes enim triangulum æquilaterum, basim bifariam secant: & vni portioni æqualem abscindentes in altero latere, per punctum diuisionis ad basis partes parallelam ducunt: & rursus æquilaterum constitutum est triangulum. cuius basim eodem modo secantes similiter faciunt, & nūquam desinunt ad trianguli uerticē. si enim desinerent, sequeretur æquilateri trianguli duo latera reliquo æqualia esse, quod est absurdum.



Quod autem horum vtilis, nec superuacanea sit cognitio, vel ex veteri pythagoreorū sermone colligi potest. fabulantur enim eū, qui primus hanc irrationalium contemplationem in apertum tamquam ex adyto proferre est ausus, naufragio perijsse. idq; ea factum de caussa, quòd omne irrationale, atque informe vbique occultari velit. Aiunt præterea, si quis forte alicui horum occurrerit, atque illud publicarit, fore statim, vt in generationis, hoc est profundi locum deferatur, perpetuisq; illic obruatur fluctibus, tanta veneratione hi viri irrationalium hanc cognitionem sunt prosecuti.

EVCLIDIS ELEMENTORVM LIBER DECIMVS.

CVM SCHOLIIS ANTIQVIS ET COMMENTARIIS.

Federici Commandini Vrbinatis.

DIFFINITIONES

I.



OMMENSVRABILES magnitudines dicuntur, quas eadem menſura metitur.

II.

Incommenſurabiles autem, quarum nullam eſſe communem menſuram contingit.

III.

Rectę lineæ potentia commenſurabiles ſunt, cum ea, quæ ab ipſis fiunt, quadrata idem ſpacium metitur.

F. C. COMMENTARIVS.

Rectas lineas longitudine commenſurabiles ſeorſum non diffiniuit, quòd in prima diffinitione magnitudinum commenſurabilium comprehendantur; ſunt enim rectę lineę longitudine commenſurabiles, quas eadem menſura metitur.

IIII.

Incommenſurabiles autem, cum quadratis, quę ab ipſis fiunt, nullum commune ſpacium eſſe contingit.

V.

His poſitis oſtenditur, cuicumque rectę lineæ propoſitę rectas lineas multitudine infinitas, & commenſurabiles eſſe, & incommenſurabiles: alias quidem longitudine & potentia; alias vero potentia ſolum. vocetur autem propoſita recta linea, rationalis.

Et

VI.

Et huic commenſurabiles ſiue longitudine & potentia, ſiue potentia ſolum, rationales.

VII.

Incommenſurabiles vero irrationales vocentur.

VIII.

Et quadratũ, quod à recta linea propoſita fit, dicatur rationale.

IX.

Et huic commenſurabilia quidem, rationalia.

X.

Incommenſurabilia vero, irrationalia dicantur.

XI.

Et rectæ lineę, quæ incommenſurabilia poſſunt, vocentur irrationales: ſi quidem ea quadrata ſint, ipſorum latera; ſi vero alia quæpiam rectilinea, quę ipſis æqualia quadrata deſcribunt.

F. C. COMMENTARIVS.

Sunt etiam quędam communes notiones, quibus Euclides in hoc libro utitur, nempe hę.

COMMVNES NOTIONES.

1 *Quælibet magnitudo multiplicata poteſt omnem propoſitam magnitudinem eiuſdem generis ſuperare.*

2 *Quæcumque magnitudo metitur aliquam, metitur quoque eam, quã illa ipſa metitur.*

3 *Quæcumque magnitudo metitur totam, & ablatam; etiam reliquam metietur.*


4 *Quęcumque magnitudo metitur duas, vel plures magnitudines, metitur quoque eam, quę ex ipſis componitur.*

THEOREMA I. PROPOSITIO. I.

Duabus magnitudinibus inæqualibus expoſitis, ſi à maiori auferatur maius, quàm dimidium; & ab eo, quod reliquum eſt rurſus auferatur maius, quam dimidium; & hoc ſemper fiat: relinquetur tandem quædam magnitudo, quæ minori magnitudine expoſita minor erit.


Sint

Sint duæ magnitudines inæquales AB, C, quarum maior AB. Dico si ab ipsa AB auferatur maius, quàm dimidium, & ab eo, quod reliquum est, rursus auferatur maius, quàm dimidium, atque hoc semper fiat, relinqui tandem magnitudinem
1.com. not. quandam, quæ magnitudine C minor erit. etenim C multiplicata fiet aliquando maior magnitudine AB. multiplicetur, & sit DE ipsius quidem C multiplex, maior autem, quàm AB, diuidaturq; DE in partes ipsi C æquales DF FG GE. & ab ipsa AB auferatur maius, quàm dimidium BH; ab ipsa vero AH rursus maius, quàm dimidium auferatur HK, atque hoc semper fiat, quoad diuisiones, quæ sunt in AB, multitudine æquales fiant diuisionibus, quę in DE: sint igitur diuisiones AK KH HB diuisionibus DF FG GE multitudine æquales. & quoniam maior est DE, quàm AB, & ablatum est ab ipsa quidem DE minus, quàm dimidium EG; ab ipsa vero AB maius, quàm dimidium BH; erit reliquum GD reliquo HA maius. rursus quoniam maior est GD, quàm HA, & ablatum est ab ipsa quidem GD dimidium GF; ab ipsa vero HA maius, quàm dimidium HK; reliquum FD reliquo AK maius erit. estq; FD æqualis ipsi C. ergo C quã AK est maior. minor igitur est AK, quàm C. Ergo ex magnitudine AB relicta est magnitudo AK expositæ minori magnitudini C minor. quod demonstrare oportebat.



* similiter autem demonstrabitur etiam si dimidia ablata fuerint.

ALITER. Exponãtur duæ magnitudines inæquales AB C, sitq; C minor. & quoniam minor est C multiplicata erit aliquando magnitudine AB maior. fiat vt FM, diuidaturq; in partes ipsi C æquales MH HG GF: & ab ipsa AB auferatur maius, quàm dimidium BE, & ab EA maius, quàm dimidium ED: atque hoc semper fiat, quoad diuisiones, quę sunt in FM, æquales fiant diuisionibus, quę in AB. fiant igitur vt BE ED DA. & ipsi DA vnaquæque ipsarum KL LN NX sit æqualis; atque hoc fiat, quoad diuisiones KX æquales sint diuisionibus ipsius FM. & quoniam BE maior est, quàm dimidium ipsius AB, erit BE maior, quàm EA. multo igitur maior est BE, quàm DA, sed ipsi DA æqualis est XN. ergo BE maior est, quàm XN, rursus quoniam ED maior est quàm dimidium EA, erit ED maior, quàm DA. sed ipsi DA est æqualis NL. quare ED, quàm NL est maior, tota igitur DB maior est, quàm XL. ipsi vero DA æqualis est LK. quare tota AB, quàm tota XK maior erit. sed & MF maior est, quam BA. multo igitur MF, quàm XK est maior. & quoniam XN NL LK inter se æquales sunt; sunt autem & MH HG GF inter se æquales: atque est multitudo earum, quæ sunt in MF æqualis multitudini ipsarum, quæ in XK: erit vt KL ad FG, ita KX ad FM. maior autem est FM, quàm XK. ergo & GF quàm LK est maior. atque est FG ipsi C æqualis; & KL æqualis ipsi AD. ergo C quàm AD maior erit. quod oportebat demonstrare.



12.quinti, 14.quinti.

SCHOLIVM.


In magnitudinibus asymetriam inesse.

Ex hoc theoremate perspicuum fit in magnitudinibus asymetriam, hoc est incommensurabilitatem inesse. si enim expositæ magnitudini minorem assumere licet, & rursus hac minorem, & semper minorem, magnitu-

magnitudines in infinitum ſecantur ; & non in minimam menſuram determinatam, vt in numeris eſt vnitas. ſi igitur non eſt determinata magnitudo minima, erunt quędam magnitudines incommenſurabiles, quas communis aliqua magnitudo, cum indeterminata ſit, non metietur.

F. C. COMMENTARIVS.

Similiter autem demonſtrabitur, etiam ſi dimidia ablata fuerint] *auferatur enim ab ipſa AB dimidium BH: & ab ipſa AH dimidium HK: idq; ſem per fiat. quo ad diuiſi ones AB ęquales ſint diuiſionibus ipſius D E : & quoniam D E maior eſt quàm AB, & ab ipſa quidem D E ablatum eſt minus quàm dimidium: ab ipſa vero AB ablatam eſt dimidium ; erit reliquum GD maius reliquo HA. rurſus quoniam G D maior eſt quàm HA: & ab ipſa G D ablatum eſt dimidium GF; ab ipſa vero HA dimidium HK, reliquum FD reliquo KA maius erit. quae deinceps ſunt ſimiliter demonſtrabuntur.*




Sed in alia demonſtratione. auferatur ab ipſa AE dimidium BE, & ab EA dimidium ED : atque hoc fiat, quoad diuiſiones, quae ſunt in FM aequales ſint diuiſionibus, quae in AB: ſint autem BE ED DA. & ipſi DA aequalis ſit vnaquęque ipſarum KL LN NX. & quoniam BE eſt aequalis ipſi EA, & EA maior quàm AD, erit BE quàm DA maior. ſed ipſi DA eſt aequalis XN. ergo EE maior eſt quàm XN. rurſus quoniam ED DA ſunt aequales ipſis NL LK, tota AB quæ tota XK maior erit. reliqua vero ſimiliter demonſtrabuntur.

THEOREMA II. PROPOSITIO II.

Si duabus magnitudinibus inęqualibus expoſitis detracta ſem per minore de maiore, reliqua minime præcedentem metiatur; magnitudines incommenſurabiles erunt.

Duabus enim magnitudinibus inęqualibus expoſitis AB C D, quarum minor ſit AB, & detracta ſemper minore de maiore, reliqua minime metiatur præcedentem. Dico magnitudines A B CD incommenſurabiles eſſe. ſi enim commenſurabiles ſint, eas magnitudo quædam metietur. metiatur, ſi fieri poteſt, ſitq; E: & AB quidem metiens DF relinquat ſe ipſa minorem C F: C F vero metiens BG relinquat ſe ipſa minorem AG ; & hoc ſemper fiat, quoad relinquatur quædam magnitudo, quæ ſit minor ipſa E. itaque fiat, & relinquatur AG ipſa E minor. Quoniã igitur E metitur AB, AB vero metitur DF ; & E ipſam DF metitur. ſed & metitur totã CD. ergo & reliquam C F metietur. at C F metitur BG. quare & E ipſam BG metitur. metitur autem



& totam

& totam AB, & reliquam igitur AG metietur, maior minorem, quod fieri non pôt. non igitur magnitudines AB CD aliqua magnitudo metietur. ergo incommensurabiles erunt AB CD magnitudines. Si igitur duabus magnitudinibus inæqualibus expositis, detracta semper minore de maiore, reliqua minime præcedentem metiatur, incommensurabiles magnitudines erunt. quod oportebat demonstrare.

SCHOLIVM.

Magnitudines quasdam longitudine esse incommensurabiles ex hoc theoremate docemur. etenim aliquas commensurabiles esse perspicue apparet. magnitudinum autem commensurabilium maximam communem mensuram inuenire, non cuius vis est, sed hominis eruditi: cuius quidem maximæ communis mensuræ inuentionem in sequenti theoremate tradit.

ALIVD SCHOLIVM.

Cum in antecedenti theoremate causſam explicauerit incommensurabilitatis, in hoc signum incommensurabilium magnitudinum affert, quando scilicet incommensurabiles sunt. in sextodecimo autem theoremate ipsarum proprium exponit, ita vt & causſa, & signum, & proprium habeatur. At in commensurabilibus magnitudinibus causſam veluti manifestam prætermisit; exponit autem & signum, & proprium.

F. C. COMMENTARIVS.

Et hoc semper fiat, quoad relinquatur quædã magnitudo, quæ sit minor ipsa E.] *quoniam enim AB quidem metiens DF relinquit se ipsa minorem CF; CF vero metiens BG relinquit se ipsa minorem AG: erit AG minor, quàm BG. ergo ex AB ablatum est maius, quàm dimidium ipsius, videlicet BG. & ita semper fiet. quòd cum ex AB semper auferatur maius, quàm dimidium, relinquetur tandem aliqua magnitudo, quæ ipsa E minor erit.*

Ex antecedente.

PROBLEMA I. PROPOSITIO. III.

Duabus magnitudinibus commensurabilibus datis, maximam earum communem mensuram inuenire.

Sint datæ duæ magnitudines commensurabiles AB CD, quarum minor AB. oportet ipsarum AB CD maximam communem mensuram inuenire. vel igitur AB metitur CD, vel non metitur. & si quidem AB metitur CD, metitur autem & se ipsam; erit AB ipsarum AB CD communis mensura. & perspicuũ est maximam esse; magnitudo enim maior magnitudine AB ipsam AB non metietur. si vero AB non metitur CD; detracta semper minore de maiore, relinquetur tandẽ quædam magnitudo, quæ præcedentem metietur; propterea quòd AB CD non sint incommensurabiles. & AB quidem metiens ED relinquat se ipsa minorem EC: EC vero metiens FB relinquat se ipsa minorem AF; & AF ipsam CE metiatur. Quũ igitur AF metitur CE; sed CE metitur FB: & AF ipsam FB metitur. metitur autem & se ipsam. & totam igitur AB metietur. sed AB metitur DE. ergo AF ipsam DE metitur. metitur autem



2. com not.
4. com. not.

tem

tem & CE. & totã igitur CD metietur. ergo AF ipſas AB CD metitur; ac propterea ipſarum eſt communis menſura. Dico & maximam eſſe. niſi enim ita ſit, erit aliqua magnitudo maior ipſa A F, quę ipſas A B CD metietur. Itaque metiatur, & ſit G. & quoniam G metitur A B, A B vero metitur E D; & G ipſam E D metitur. metitur autem & totam C D. ergo & reliquam C E metietur. ſed C E metitur F B. quare G ipſam F B metitur. metitur autem & totam A B. & reliquam igitur metietur AF, maior minorem, quod fieri non poteſt. non igitur magnitudo quædam maior ipſa AF magnitudines AB CD metietur. ergo AF ipſarum AB CD maxima erit communis menſura. Duabus igitur magnitudinibus commenſurabilibus datis AB CD maxima ipſarum communis menſura inuenta eſt AF. quod facere oportebat.



5. comm. mes.

COROLLARIVM.

Ex hoc manifeſtum eſt, ſi magnitudo duas magnitudines metiatur, & maximam ipſarum communem menſuram metiri. *

SCHOLIVM.

Tamquam manifeſtum ſit, eſſe magnitudines commenſurabiles, aggreditur hoc theorema, & non illud prius oſtendit, quemadmodum in ijs, quæ in commenſurabiles ſunt. conſtat enim magnitudines omnes alicuius multiplices, ſi comparentur cum ea, cuius ſunt multiplices, commenſurabiles eſſe.


F. C. COMMENTARIVS.

Ex hoc manifeſtum eſt ſi magnitudo duas magnitudines metiatur, & maximam ipſarum communem menſuram metiri] *ſequitur illud ex vltima parte demonſtrationis, vt ad ſecundam propoſitionem ſeptimi libri in numeris explicauimus.* *


PROBLEMA. II. PROPOSITIO IIII.

Tribus magnitudinibus commenſurabilibus datis, maximam ipſarum communem menſuram inuenire.

Sint datæ tres magnitudines commenſurabiles A B C. oportet ipſarum A B C maximam communẽ menſuram inuenire. ſumatur enim duarum A B maxima cõis menſura, quę ſit D. itaque D ipſam C vel metitur, vel nõ metitur. metiatur primũ. & qm̃ D ipſam C metitur, metitur autem & AB; & ipſas A B C metietur. Quare D ipſarum A B C communis eſt menſura: & manifeſtum eſt maximam eſſe. magnitudo enim maior magnitudine D ipſas A B C non metietur. nam ſi fieri poteſt, metiatur eas magnitu-



Ex antecedente.



do maior ipſa D, quæ ſit E. Quoniã igitur E magnitudines A B C metitur, & ipſas A B metietur, & ipſarum A B maximam communẽ menſuram D, maior minorẽ, quod fieri nõ poteſt. ſed non metiatur D ipſam C. Dico primũ C D commenſurabiles eſſe. Quoniã enim commenſurabiles ſunt A B C, metitur eas aliqua magnitudo, quę ſcilicet & ipſas A B metitur. ergo & ipſarum A B maximã cõmunem menſurã D. metitur autem & ipſam C. quare dicta magnitudo ipſas C D metitur: ideoq; C D cõmenſurabiles ſunt: ſumatur ipſarum maxima cõmunis mẽſura; & ſit E. Quoniã igitur E metitur D, D vero metitur A B; & E ipſas A B metietur. metitur autem & C. ergo E ipſarum A B C communis eſt menſura. Dico & maximam eſſe. ſi enim fieri poteſt, ſit aliqua magnitudo F maior ipſa E, quæ magnitudines A B C metiatur. & quoniam F metitur A B C, & ipſas A B metietur, & ipſarum A B maximam communem menſuram, quæ eſt D. ergo F metitur D. metitur autem & C. quare F ipſas C D metitur, & ipſarum C D maximam communem menſuram, hoc eſt E. ergo F ipſam E metietur, maior minorem. quod fieri non poteſt. non igitur magnitudo quædam maior ipſa E magnitudines A B C D metietur. ergo E ipſarum A B C maxima erit communis menſura, ſi D ipſam C non metiatur; ſi vero metiatur erit ipſa D. tribus igitur magnitudinibus commenſurabilibus datis maxima ipſarum communis menſura inuẽta eſt. quod facere oportebat.

COROLLARIVM.

Ex hoc perſpicue conſtat, ſi magnitudo tres metiatur magnitudines, & ipſarum maximam communem menſuram metiri. ſimiliter & in pluribus magnitudinibus maxima communis menſura inuenietur, & corollarium procedet.

SCHOLIVM.

Quoniam incommenſurabiles magnitudines conſequitur proportionem non habere, quam numerus ad numerum, & eius conuerſum: vult oſtendere commenſurabiles magnitudines conſequi proportionem habere, quam numerus ad numerum, & contra. indiget autem ad hoc lemmate, quonam modo commenſurabilium magnitudinum duarum, vel trium maxima communis menſura inueniatur. ſic & in primo arithmeticorum libro fecit. poſtquam enim oſtendit quinam ſint incommenſurabiles, quos primos appellat, propterea quòd non omnino incommenſurabiles ſunt, vt magnitudines; oſtendere volens omnem numerum ad omnem numerum proportionem habere vel multiplicem, vel ſuperparticularem, vel ſuperpartientem, vel multiplicem ſuper-

particularem

particularem, vel multiplicem ſuperpartientem, quos ipſe breuitatis cauſ ſa ex minori nominauit, vel partem, vel partes. per partem intelligens ſubmultiplicem, vel ſubſuperparticularẽ, vel ſubmultiplicem ſuperparti cularem. per partes vero ſubſuperpartientem, vel ſubmultiplicem ſuperpartientem. hoc igitur volens oſtendere eo indigebat, quo modo commenſurabilium maxima cõmunis menſura inueniatur. quod etiam hoc loco obſeruauit. Poſtea in quinto theoremate oſtẽdet cõmẽſurabiles magnitudines inter ſe proportionem habere, quam numerus ad numerum. immo vero omnem commenſurabilem magnitudinem omnis commenſurabilis magnitudinis, minorem maioris, vel partem eſſe, vel partes: hoc enim eſt proportionem habere, quam numerus ad numerum; non tamen contra: latius enim patet numerus. quamobrem eo vſus eſt. Sciendum autem & ipſas demonſtrationes, quæ ex arithmeticis petuntur, incommutabiles eſſe.

ALIVD.


Poſtquam docuit, quæ ſint magnitudines incommenſurabiles, deinceps quid ipſas conſequatur oſtendet; & inſuper quid conſequatur commenſurabiles in quinto, & ſexto theoremate. & quoniam indigebat cõmuni menſura earum, quæ ſunt in ſymmetria, videlicet commenſurabilium, hoc aſſumit in tertio, & quarto theoremate, quo pacto inueniendæ ſint commenſurabilium communes menſuræ. ſeptimum autem theorema inquirit; quę conſequantur incommenſurabiles magnitudines non ſimpliciter, ſed ſecundum ſpeciem, vt incommenſurabiles longitudine, vel potentia; nam de incommenſurabilibus ſecundum priuationem nihil dixit; vt pote, quæ non ſint ipſis vtiles ad tractationem de irrationalibus. In his tradit ortum earum, quę longitudine, & potentia commenſurabiles ſunt, & incommenſurabiles: his enim indiget in nono theoremaoe, & ſequentibus, in quibus iuxta analogiam, & iuxta compoſitionem, & diuiſionem commenſurabilitas, & incommenſurabilitas inquiritur vſque ad tertium decimum theorema.

THEOREMA III. PROPOSITIO. V.

Commenſurabiles magnitudines inter ſe proportionem habent, quam numerus ad numerum.

Sint commenſurabiles magnitudines A B. Dico magnitudinem A ad B proportionem habere, quam numerus ad numerum. Quoniam enim A B commenſurabiles ſunt, metietur ipſas aliqua magnitudo. metiatur, & ſit C. & quoties C ipſam A metitur, tot vnitates ſint in D: quoties autem C metitur B, tot vnitates ſint in E.

quoniam igitur C ipſam A metitur per vnitates, quę ſunt in D: metitur autem & vnitas D per vnitates, quæ in ipſo ſunt; vnitas æqualiter metietur numerum D, atque magnitudo C ipſam A. ergo vt C ad A, ita eſt vnitas ad D; & conuertendo vt A ad C, ita D ad vnitatem. Rurſus quoniam C ipſam B metitur per vnitates, quæ ſunt in E; metitur & vnitas numerum E per vnitates, quę in ipſo ſunt: vnitas numerum E æqualiter metietur, atque C ipſam B. eſt igitur vt C ad B, ita vnitas ad E. oſtenſum autem eſt & vt A ad C, ita D eſſe ad vnitatẽ. quare ex æquali vt A ad B, ità numerus D ad E numerum. commẽſurabiles igitur magnitudines A B inter ſe proportionem habent, quam D numerus ad numerũ E. quod oportebat demonſtrare.



SCHOLIVM.

Hoc proprium eſt commenſurabilium magnitudinum, minor maioris vel pars eſt, vel partes. ſi quidem igitur pars, vel proportionem habebit, quam vnitas ad numerum, vel quam numerus ad numerum; ſi vero partes proportionem habebit, quam numerus ad numerum. pars enim ſubmultiplicem facit proportionem: partes vero vnam reliquarum ſubproportionalium. ſi igitur rectæ lineæ ſint, & plana, quæ ab ipſis fiunt, & ſolida proportionem habebunt, quam numerus ad numerum. ſi vero plana, & quæ ab ipſis, ſolida, non item rectæ lineæ, niſi proportio numerorũ ſit quadrati ad quadratum. & ſi ſolida nõ omnino quę ipſa præcedunt, niſi proportio ſit cubi ad cubum. quòd ſi ſolida non habeant proportionem, quam numerus ad numerum, neque plana; neque rectæ lineæ habebunt: non enim ſunt commenſurabiles. In hoc autem theoremate & ſequenti de commenſurabilibus, & incommenſurabilibus ſimpliciter diſſerit; at in ſeptimo de incommenſurabilibus longitudine. ex quo manifeſtum eſt & de potentia incommenſurabilibus. In octauo denique ortum tradit commenſurabilium, & incommenſurabilium longitudine & potentia.

F. C. COMMENTARIVS.


Ex iam demonſtratis poſſumus illud quoque problema abſoluere.

Propoſitis duabus magnitudinibus commenſurabilibus, quam inter ſe proportionem habeant in numeris inueuire.

Sint propoſitæ magnitudines commenſurabiles A B. quarum oporteat proportionem in numeris inuenire. inueniatur ex 3 huius maxima earum communis menſura, quae ſit C. & quoties C metitur A, tot vnitates ſint in D: quoties autem metitur ipſam B, tot vnitates ſint in E. habebit igitur A ad B proportionẽ eã, quã habet numerus D ad E numerum. itaque ſi A B rectæ lineæ ſint, & earum quadrata erunt commenſurabilia, & inter ſe proportionem habebunt, quam

numerus


numerus quadratus ad quadratum numerum. si vero sint superficies, vel numeri D E sint quadrati, vel non quadrati; & si non sint quadrati, vel proportionem habent, quam numerus quadratus ad quadratum numerum, vel non. & si quidem sint quadrati, vel proportionem habent, quam numerus quadratus ad quadratum numerum, rectae linae, quae ipsas superficies, vel superficies ipsis aequales possunt, erunt longitudine commensurabiles. si vero numeri non habent proportionem, quam quadratus numerus ad quadratum numerum, erunt longitudine incommensurabiles, quamquam potentia commensurabiles sint. quae omnia in nona propositione huius libri demonstrabuntur.



THEOREMA IIII. PROPOSITIO. VI.

Si duæ magnitudines inter se proportionem habeant, quam numerus ad numerum, commensurabiles magnitudines erunt.

Duæ enim magnitudines A B inter se proportionem habeant, quam D numerus ad numerum E. Dico A B magnitudines commensurabiles esse. quot enim vnitates sunt in D, in tot partes æquales diuidatur magnitudo A, & vni ipsarum æqualis sit C: quot autem vnitates sunt in E, ex tot magnitudinibus æqualibus ipsi C cõponatur magnitudo F. Quoniam igitur quot sunt in D vnitates, tot magnitudines sunt in A, ipsi C æquales; quæ pars est vnitas ipsius D, eadem pars erit & C ipsius A. vt igitur C ad A, ita est vnitas ad D. metitur autem vnitas ipsum D numerũ. ergo & C ipsam A metietur. & quoniam est vt C ad A, ita vnitas ad D numerum, erit conuertendo vt A ad C, ita D numerus ad vnitatem. rursus quoniam quot vnitates sunt in E, tot sunt & in F magnitudines ipsi C æquales; vt C ad F, ita erit vnitas ad E numerum. ostensum autem est & vt A ad C, ita D esse ad vnitatem. ergo ex æquali vt A ad F, ita est D ad E. sed vt D ad E, ita A ad B. & vt igitur A ad B, ita A ad F. quòd cum A ad vtramque ipsarum B F eandem habeat proportionem, erit B ipsi F æqualis. metitur autem C ipsam F. ergo & ipsam B metietur. sed & metitur A. quare C ipsas A B metitur. commensurabilis igitur est A ipsi B. Quare si duæ magnitudines inter se proportionem habeant, quam numerus ad numerum, commensurabiles magnitudines erunt. quod oportebat demonstrare.




9. quinti.

ALITER.

Duæ enim magnitudines A B inter se proportionem habeant, quam numerus C ad numerum D. Dico magnitudines commensurabiles esse. quot enim unitates sunt in C, in tot partes æquales A diuidatur, & uni ipsarum æqualis sit E. est igitur ut unitas ad C numerum, ita E ad A. est autem & ut C ad D, ita A ad B. ergo ex

æquali


æquali ut unitas ad D numerum, ita E ad B. sed unitas metitur D. ergo & E ipsam B metitur. metitur autem & E ipsam A, quoniam & unitas metitur C. quare E utramque ipsarum A B metietur; ideoque A B commensurabiles sunt; atque est E communis ipsarum mensura.



COROLLARIVM.

Ex hoc manifestum est, si sint duo numeri, vt D E, & recta linea vt A, fieri posse, vt D numerus ad numerum E, ita rectam lineam A ad aliam rectam lineam. si autem ipsarum A F media proportionalis sumatur, vt B, erit vt A ad F, ita quod fit ex A ad id, quod ex B, hoc est vt prima ad tertiam, ita figura, quæ fit à prima ad eam, quæ à secunda similem, & similiter descriptam. sed vt A ad F, ita D numerus ad numerum E. factum igitur est & vt D numerus ad numerum E, ita quod fit ex recta linea A ad id, quod ex recta linea B.

Cōuersa.



SCHOLIVM.

Si quadrata vel parallelogramma, vel quacunque spacia proportionem habeant, quam numerus ad numerum, commensurabiles erunt magnitudines: quando autem proportionem habeant, quam numerus quadratus ad quadratum numerum, & ipsa commensurabiles sunt; & rectæ lineæ, quæ ipsas possunt, longitudine sunt commensurabiles. vel quando rectæ lineæ inter se proportionem habeant, quam numerus ad numerum, & ipsæ commensurabiles sunt longitudine, & quæ ab ipsis fiunt quadrata, vel spacia quadratis ipsarum æqualia proportionem habere coguntur, quam quadratus numerus ad quadratum numerum. ad plura igitur se extendunt potentia commensurabiles, quàm commensurabiles longitudine; & continentiores sunt, vt ex sequentibus theorematibus fiet manifestum.

THEOREMA V. PROPOSITIO. VII.

Incommensurabiles magnitudines inter se proportionem non habent, quam numerus ad numerum.

Sint


Sint incommenſurabiles magnitudines A B. Dico A ad B proportionem non habere, quam numerus ad numerum. ſi enim A ad B proportionem habet, quam numerus ad numerum, commẽſurabilis erit A ipſi B. atqui non eſt commenſurabilis. nõ igitur A ad B proportionem habet, quam numerus ad numerum. quare incommenſurabiles magnitudines inter ſe proportionem non habent, quam numerus ad numerum. quod demonſtrare oportebat.



THEOREMA VI. PROPOSITIO. VIII.

Si duæ magnitudines inter ſe proportionem non habeãt, quã numerus ad numerũ, incõmẽſurabiles erũt.

Duæ enim magnitudines A B inter ſe proportionem non habeãt *quam* numerus ad numerum. Dico magnitudines A B incommenſurabiles eſſe. ſi enim commenſurabilis eſt A ipſi B, proportionem habet, quam numerus ad numerum. atqui non habet. incommenſurabiles igitur ſunt A B magnitudines. ergo ſi duę magnitudines inter ſe proportionem non habeant, quam numerus ad numerum, incommenſurabiles erunt. quod oportebat demõnſtrare.




THEOREMA VII. PROPOSITIO. IX.

Quæ à rectis lineis longitudine commenſurabilibus fiunt quadrata inter ſe proportionem habent, quam quadratus numerus ad quadratum numerum. & quadrata inter ſe proportionem habentia, quam quadratus numerus ad quadratum numerum, & latera habebunt longitudine commenſurabilia. quadrata vero, quæ à longitudine incommenſurabilibus rectis lineis fiunt, inter ſe proportionem non habent, quam quadratus numerus ad quadratum numerum: & quadrata inter ſe proportionem non habentia, quam quadratus numerus ad quadratum numerum, neque latera habebunt longitudine commenſurabilia.

A

B

Sint rectæ lineæ A B longitudine cõmenſurabiles. Dico quadratum quod fit ex A ad quadratum, quod ex B, eam proportionem habere, quam quadratus numerus ad quadratum numerum. Quoniam enim A ipſi B longitudine eſt commenſurabilis, habebit A ad B proportionem, quam numerus ad numerum. habeat eam, quam numerus C ad numerũ D. Quoniam igitur eſt vt A ad B, ita C numerus ad numerum D; & proportionis quidem, quam habet A ad B, dupla eſt proportio quadrati, quod fit ex A ad quadratum, quod ex B; ſimiles enim figuræ in dupla ſunt proportione homologorum laterum: proportionis vero, quã habet numerus C ad numerum D dupla eſt proportio quadrati ipſius C ad ipſius D quadratum; etenim duorũ numerorũ quadratorum vnus medius proportionalis eſt numerus, & quadratus ad quadratum duplam proportionem habet eius, quam latus habet ad latus: erit vt quadratum, quod fit ex A ad quadratum, quod




5. huius.

Coroll. 20. sexti.

11 octaui.


quod ex B, ita quadratus numerus, qui fit ex C numero ad quadratum numerum qui ex D.

ALITER.



Quoniam enim cõmensurabilis est A ipsi B longitudine, proportionẽ hẽt quã numerus ad numerũ. habeat quã C ad D. & C se ipsum quidẽ multiplicans faciat E, multiplicans vero D faciat F: & D se ipsum multiplicans faciat G. itaque quoniã C se ipsum quidem multiplicans fecit E, multiplicas vero D fecit F; erit vt C ad D, hoc est
1. sexti. vt A ad B, ita E ad F. sed vt A ad B, ita quadratum, quod fit ex A ad rectãgulum, quod fit ex A B. est igitur vt quadratum, quod ex A ad rectangulũ, quod ex A B, ita E ad F. rursus quoniam D se ipsum multiplicans fecit G, vt C ad D, hoc est vt A ad B, ita erit F
1. sexti. ad G. vt autem A ad B, ita rectangulũ, quod fit ex A B ad quadratũ, quod fit ex B. ergo vt rectangulum, quod ex A B ad quadratum, quod ex B, ita F ad G. sed vt quadratum, quod fit ex A ad rectangulum, quod ex A B, ita erat E ad F. ex æquali igitur ut quadratum ex A ad quadratum ex B, ita E ad G. est autem vterque ipsorum E G quadratus. & E quidem est à numero C; G uero ab ipso D. quadratum igitur, quod fit ex A ad quadratum, quod ex B proportionem habet, quam quadratus numerus ad quadratum numerum. Sed sit vt quadratum, quod fit ex A ad quadratũ, quod ex B, ita quadratus numerus, qui est à numero C ad quadratum numerum, qui à numero D. Dico A ipsi B longitudine commensurabilem esse. Quoniam enim est vt quadratum, quod fit ex A ad quadratum, quod ex B, ita quadratus numerus, qui est à numero C ad quadratum numerum, qui à numero D. sed proportio quidem quadrati, quod fit ex A ad quadratum, quod ex B, dupla est proportionis, quã
Corell. 20. sexti. 11. octaui. hẽt A ad B: proportio vero quadrati numeri, qui est à numero C ad quadratũ numerũ, qui à numero D itidẽ dupla est proportionis, quã hẽt C numerus ad numerum D. est igitur vt A ad B, ita C ad D. ergo A ad B proportionem habet, quam numerus C ad D numerum: ac propterea A ipsi B longitudine est commensurabilis.
6. huius. quod oportebat demonstrare.


ALITER.



Sed quadratũ, quod fit ex A, ad quadratum, quod ex B proportionem habeat, quam quadratus numerus E ad quadratum numerum G. Dico A ipsi B longitudinem commẽsurabilem esse. sit enim ipsius quidem E latus C, ipsius vero G latus D; & C ipsum
17. septimi. D multiplicans faciat F. ergo E F G deinceps proportionales sũt in proportione, quæ est C ad D. & quoniam quadratorum, quæ
17. septimi. fiunt ex A B, medium proportionale est rectangulum, quod ex A B: numerorum vero quadratorum E G medium proportionale est F, erit vt quadratum

dratum, quod fit ex A, ad rectangulum, quod ex A B, ita E ad F. vt autem rectangulum ex A B ad quadratum ex B, ita F ad G: sed vt quadratum ex A ad rectangulum ex A B, ita A ad B. ergo A B commensurabiles sunt; proportionem enim habent, quam numerus E ad numerum F, hoc est quam C ad D. vt enim C ad D, ita E ad F. 17. septimi. nam C se ipsum quidem multiplicans fecit E, multiplicans autem D ipsum F fecit. est igitur vt C ad D, ita E ad F.

Sed incommensurabilis sit A ipsi B longitudine. Dico quadratum ex A ad quadratum ex B proportionem nō habere, quā quadratus numerus ad quadratū numerū. si enim quadratū ex A ad quadratū ex B proportionē habeat, quā quadratus numerus ad quadratum numerum, commensurabilis erit A ipsi B longitudine. non est autem. non igitur quadratum ex A ad quadratum ex B proportionem habet, quam quadratus numerus ad quadratum numerum. Rursus quadratum ex A ad quadratum ex B proportionem non habeat, quam quadratus numerus ad quadratum numerum. Dico A ipsi B longitudine incommensurabilem esse. si enim commensurabilis sit A ipsi B longitudine, habebit quadratum ex A ad quadratum ex B proportionem, quam quadratus numerus ad quadratum numerum. atqui non habet. non igitur A ipsi B longitudine est commensurabilis. ergo quæ à rectis lineis longitudine commensurabilibus fiunt quadrata inter se proportionem habent, quam numerus quadratus ad quadratum numerum, & quę deinceps sunt. quod oportebat demonstrare.



COROLLARIVM.

Et manifestum est ex iam demonstratis rectas lineas, quæ longitudine sunt commensurabiles, omnino & potentia commensurabiles esse: quæ vero potentia commensurabiles, non omnino & longitudine. & quæ longitudine incommensurabiles sunt, non omnino & potentia incommensurabiles: quæ vero potentia incommensurabiles, omnino & longitudine incommensurabiles esse.

Quoniam enim quadrata, quæ fiunt à rectis lineis longitudine commensurabilibus proportionem habent, quam quadratus numerus ad quadratum numerum; quę vero proportionem habent, quam quadratus numerus ad quadratum numerum, commensurabilia sunt: erunt rectę lineę commensurabiles longitudine, non solum longitudine, sed & potentia commensurabiles. C 6. huius.

Rursus quoniam quæcunque quadrata inter se proportionem habent, quam quadratus numerus ad quadratum numerum, latera habent longitudine commensurabilia, vt ostensum est, quæ etiam potentia commensurabilia sunt, cum eorum quadrata proportionē habeāt, quā quadratus numerus ad quadratū numerū: quęcunq; quadrata proportionē nō habęt, quā quadratus numerus ad quadratū numerū, sed simpliciter quā aliquis alius numerus ad aliū numerū, cōmēsurabilia sunt, hoc est rectę lineæ à quibus ipsa describūtur, cōmēsurabiles sunt potētia, nō aūt & longitudine. ergo rectæ lineæ longitudine quidem commensurabiles, omnino & potentia commensurabiles sunt: potentia vero commensurabiles non omnino & longitudine, nisi earum quadrata proportionem habeant, quam quadratus numerus ad quadratum numerum. Dico & longitudine incommensurabiles non omnino & potentia incōmensurabiles esse. Qm̄ potentia cōmensurabiles possunt proportionem non habere, quam numerus ad numerum, ideoq; cum potentia commensurabiles sint, longitudine sunt in commensurabiles. ergo non quæ longitudine incommensurabiles sunt, omnino & potentia: sed longitudine incommensurabiles existentes pos- D E F

G sunt potentia & incommensurabiles, & commensurabiles esse. potentia vero in commensurabiles. omnino & longitudine incommensurabiles sunt. si enim longitudine sint commensurabiles, & potentia commensurabiles erunt. atqui ponuntur incommensurabiles. quod est absurdum. potentia igitur incommensurabiles, omnino & longitudine incommensurabiles erunt.

SCHOLIVM.


Hoc theorema Theæteti est inuentum, cuius mentionem facit Plato in Theæteto. sed illic quidem particulatim magis exponitur, hic autem uniuerse. namq; illic quadrata, quæ à quadratis numeris mensurantur, commensurabilia etiam latera habere dicit. particularis autem est hæc propositio: neque enim omnia commensurabilia spacia, quorum & latera commensurabilia sunt, comprehendit, si quidem quadratorum spaciorum commensurabilium, videlicet 18 & 8 latera, & si non secundum mensuram numerorum inueniantur, aliter tamen commensurabilia sunt. at ipsa spacia à quadratis numeris minime mensurantur, quamquam etiam mensurari possint. merito igitur hoc loco non horum modum diffiniuit, sed quæ (vt inquit) proportionem habent, quam numerus quadratus ad quadratum numerum. & non frustra quadrati numeri mentio facta est. si enim tantum dixisset, quam numerus ad numerum, redundans esset diffinitio, quoniam quadrata, quæ inter se duplam proportionem habent, commensurabilia habere latera oporteret, non habent autem, est enim maioris latus ad latus minoris, vt quadrati diameter ad eius latus. si igitur ita dixisset, quam numerus ad numerum, redundaret diffinitio, comprehendens etiam ea, quæ latera commensurabilia non habent. Si vero dixisset, quæ à quadratis numeris mensurantur, diffinitio diminuta esset, non comprehendens ea, quę cum latera commensurabilia habeant, à quadratis numeris non mensurantur: & proportionem habent, quam numerus quadratus ad quadratum numerum. Quamobrem recte appositum est, quam numerus quadratus ad quadratum numerum; comprehenduntur enim omnia spacia, quæ & si à quadratis numeris non mensurantur, tamen cum sint commensurabilia, latera quoque commensurabilia habent. nam 18 & 8 commensurabilibus existentibus, propterea quòd à lateribus commensurabilibus describuntur, inueniemus eorum latera, cum proportionem habeant, quam numerus quadratus ad quadratum numerum. vt enim 9 ad 4, ita 18 ad 8. Itaque sumentes latera ipsorum 9 & 4, æqualiter secabimus, propositorum quadratorum latera: & habebimus commensurabilitatẽ. namque vt quadrata ad quadrata, ita sunt latera ad latera.

F. C.

F. C. COMMENTARIVS.

Quæ à rectis lineis longitude commensurabilibus fuerint quadrata] *intellige rectas lineas longitudine commensurabiles inter se se, non expositae rationali: hoc enim non solum rationalibus contingit, sed & irrationalibus, vt deinceps apparebit.* A

Et quadrata inter se proportionem habentia, quam quadratus numerus ad quadratum numerum, & latera habebunt longitudine commensurabilia] *Per quadrata inter se proportionem habentia, quam quadratus numerus ad quadratum numerum non solum intelligenda sunt ea, quae totidem quadratas mensuras continent, quot vnitates sunt in numeris quadratis; sed et quae inter se proportionem habent, quam quadratus numerus ad quadratum numerum. sint enim duo numeri plani similes F G, & recta linea A. sit autem F 6, & G, 24 & fiat ex corollario sextę propositionis huius, vt F ad G, ita A ad aliam lineam, quae sit E. & inter A E sumpta media proportionali B, erit vt prima ad tertiam, videlicet vt A ad E, ita quadratum, quod ex prima ad quadratum, quod ex secunda, hoc est ita quadratum, quod ex A ad quadratum, quod ex B. sed vt A ad E, ita erat numerus F ad numerum G. vt igitur numerus F ad G numerum, ita erit quadratum ex A ad quadratum ex B. ideoq; quadratum ex A continebit totidem mensuras quadratas, vt exempli gratia totidem pedes quadratos, quot vnitates sunt in F, videlicet sex, & quadratum ex B totidem pedes quadratos continebit, quot vnitates sunt in G, hoc est 24. & quoniam numeri plani similes F G inter se proportionem habent, quam quadratus numerus ad numerum quadratum; habebit etiam quadratum ex A ad quadratum ex B proportionem eam, quam quadratus numerus ad quadratum numerum. habeat quam quadratus numerus, qui fit ex C ad quadratum numerum, qui fit ex D. similiter demonstrabitur eorum quadratorum latera A B, quamquam certo numero exprimi non possint, tamen inter se longitudine commensurabilia esse. & idcirco proportionem habere, quam numerus ad numerum. Iuniores eiusmodi latera radices quadratas, vel radices simpliciter appellant; dicetur enim A radix 6, & E radix 24. atque est ℞ 6 ad ℞ 24, vt 1 ad 2. nam cum quadratum ex B quadruplum sit quadrati ex A, erit B ipsius A dupla. similes enim rectilineę figurae in dupla sunt proportione homologorum laterum.* B



Coroll. 20. sexti.

16. octaui.

Coroll. 20. sexti.

Quoniam enim quadrata, quæ fiunt à rectis lineis longitudine commensurabilibus] *Ostendit quomodo prima corollarij pars sequatur ex prima parte theorematis.* C

Rursus quoniam quæcunque quadrata inter se proportionem habent, quam quadratus numerus ad quadratum numerum] *Rursus ostendit quomodo idem ex secunda parte theorematis sequatur.* D


Quęcunque quadrata proportionem non habent, quam quadratus numerus ad quadratum numerum, sed simpliciter quam aliquis alius numerus ad alium numerum] *Hoc ad secundam partē Corollarij attinet, & sequitur ex vltima parte theorematis.* E

Dico & longitudine incommensurabiles] *Hoc pertinet ad tertiam partem corollarij, & ex tertia parte theorematis explicatur.* F

Potentia vero incommensurabiles omnino & longitudine incommensurabiles sunt] *Hęc est vltima corollarij pars, quae per deductionem ad id, quod fieri non potest ex prima parte theorematis demonstratur.* G

THEOREMA VIII. PROPOSITIO. X.

Si quattuor magnitudines proportionales fuerint, prima vero ſecundæ fuerit commenſurabilis; & tertia quartę commenſurabilis erit. & ſi prima ſecundę fuerit incommenſurabilis, & tertia quartæ incommenſurabilis erit.



Sint quattuor magnitudines proportionales. A B C D, ſitq; vt A ad B, ita C ad D, & ſit A ipſi B commenſurabilis. Dico & C ipſi D commenſurabilem eſſe. Quoniam enim A commenſurabilis eſt ipſi B, habebit A ad B proportionem, quam numerus ad numerum: atque eſt vt A ad B, ita C ad D. ergo & C ad D proportionem habet, quam numerus ad numerum. commenſurabilis igitur eſt C ipſi D. ſed A ipſi B ſit incommenſurabilis. dico & C ipſi D incommenſurabilem eſſe. Quoniam enim incommenſurabilis eſt A ipſi B, non habebit A ad B proportionē, quam numerus ad numerum. eſt aũt vt A ad B, ita C ad D. ergo neque C ad D proportionem habet, quam numerus ad numerum. ſi enim C ad D proportionem habeat, quã numerus ad numerum; & A ad B eam, quã numerus ad numerũ proportionē habebit; atq; erit A ipſi B cōmēſurabilis. quod eſt abſurdũ; in cōmēſurabilis enim ponitur. ergo C ad D proportionē nō hēt, quã numerus ad numerum; ideoq; C ipſi D eſt incommenſurabilis. Si igitur quattuor magnitudides proportionales fuerint; prima vero ſecundæ fuerit commenſurabilis, & tertia quartæ commenſurabilis erit. & ſi prima ſecundæ fuerit incommenſurabilis, & tertia quartæ incommenſurabilis erit. quod oportebat demonſtrare.

5. huius.
6. huius.
7. huius.
8. huius.

LEMMA. I.

Oſtenſum eſt in arithmeticis numeros planos ſimiles inter ſe proportionem habere, quam quadratus numerus ad quadratum numerum: & ſi duo numeri inter ſe proportionem habeant, quam quadratus numerus ad quadratum numerum, eos ſimiles planos eſſe. & manifeſtum eſt ex his, diſſimiles planos numeros, hoc eſt non habentes latera inter ſe proportionalia proportionem non habere, quam quadratus numerus ad quadratum numerum. ſi enim haberent; ſimiles plani eſſent. quod non ponitur. ergo diſſimiles plani inter ſe proportionem non habent, quam quadratus numerus ad quadratum numerum.

A 8. octaui.


LEMMA. II.

Duobus datis numeris, & recta linea, facere vt numerus ad numerum, ita quadratum rectę lineæ ad alterius rectæ lineæ quadratum.

Sint dati quidem duo numeri A B; & data recta linea C. oportet inuenire alteram rectam lineam, ita vt quadratum, quod fit ex C ad quadratum ex altera recta linea eam proportionem habeat, quam numerus primus ad ſecundum numerum. quot enim vnitates ſunt in A, in tot partes ęquales diuidatur C recta linea, &

uni

vni ipſarum æqualis ſit D. quot autem vnitates ſunt in B, ex tot partibus ipſi D æqualibus cõponatur recta linea E: eſt igitur vt vnitas ad A, ita D ad C: & conuertendo vt A ad vnitatem, ita C ad D. eſt autem & vt vnitas ad B, ita D ad E. ergo ex æquali vt A ad B, ita recta linea C ad ipſam E. ſumatur rectarum linearũ C E media proportionalis F. eſt igitur vt C ad E, ita quadratum, quod fit ex C ad id, quod ex F quadratum, nãque vt prima ad tertiam, ita quadratum, quod fit ex prima ad quadratum, quod ex ſecunda ſimile, & ſimiliter deſcriptum. ſed vt C ad E, ita eſt A ad B. & vt igitur A ad B, ita quadratum ex C ad quadratum ex F. quare C F ſunt rectę lineæ, quas quærebamus. etenim F inuenta eſt.




Coroll. 20. sexti.

LEMMA III.

Duos numeros planos diſſimiles inuenire, hoc eſt vt inter ſe proportionem non habeant, quam quadratus numerus ad quadratum numerum.


Exponantur quattuor numeri A B C D, ita vt non ſit ſicut A ad C, ita B ad D, & fiat ex A B numerus E, & C D numerus F. perſpicuum eſt E F numeros planos eſſe, planos autem diſsimiles, quoniam latera proportionalia non ſunt. quod facere oportebat.



PROBLEMA III.
PROPOSITIO. XI.

Propoſitæ rectæ lineæ inuenire duas rectas lineas incommenſurabiles, alteram quidem longitudine tantum, alteram vero etiam potentia.

Sit propoſita recta linea A. oportet ipſi A inuenire duas rectas lineas incommenſurabiles, alteram quidem longitudine tantum, alteram vero etiam potentia. exponantur enim duo numeri B C inter ſe proportionem non habentes, quam quadratus numerus ad quadratum numerum, hoc eſt diſsimiles plani: & fiat vt B ad C, ita quadratum ex A ad quadratum ex D: hoc enim ante traditum eſt. ergo quadratum ex A commenſurabile eſt quadrato ex D. & quoniam B ad C proportionem non habet, quam quadratus numerus ad quadratũ numerum, neque quadratum ex A ad quadratũ ex D proportionem habebit, quam quadratus numerus ad quadratũ numerum. incommenſurabilis igitur eſt A ipſi D longitudine. ſumatur ipſarum A D media proportionalis E. eſt igitur vt A ad D, ita quadratum ex A ad quadratum ex E. ſed A ipſi D longitudine eſt in commenſurabilis. ergo & quadratum ex A quadrato ex E incommenſurabile erit. incommenſurabilis



9. huius. Coroll. 20. sexti.

D

rabilis igitur eſt A ipſi E potentia. ergo propoſitæ rectæ lineæ rationali, à qua dicebamus menſuras ſumi, vt ipſi A potentia quidem commenſurabilis inuenta eſt D, hoc eſt rationalis potentia tantum commenſurabilis, irrationalis vero E. irrationales enim vniuerſe appellantur, quæ rationali & longitudine, & potentia incommenſurabiles ſunt.

F. C. COMMENTARIVS.

A Et ſi duo numeri inter ſe proportionem habeant, quam quadratus numerus ad quadratum numerum, eos ſimiles planos eſſe] *Hoc ab Euclide non demonſtratur in arithmeticis, ſed nos ad vigeſimam ſextam octaui libri demonſtrauimus.*

B Exponantur enim duo numeri B C inter ſe proportionem non habentes, quã quadratus numerus ad quadratum numerum, hoc eſt diſsimiles plani] *Hoc in promptu eſt, ſed tamen quomodo fiat in tertio Scholio antecedentium explicatur.*


C Et fiat vt B ad C, ita quadratum ex A ad quadratum ex D, hoc enim ante traditũ eſt] *In corollario ſcilicet ſexti theorematis, & quamquam hoc ex illo perſpicue appareat, tamen ſecundum lemma, quod in græcis codicibus inuenitur hoc loco apponere non inutile iudicauimus.*

D Ergo & quadratum ex A quadrato ex E incommenſurabile erit] *ex antecedenti theoremate.*

THEOREMA IX. PROPOSITIO XII.

Quæ eidem magnitudini ſunt commenſurabiles, & inter ſe commenſurabiles ſunt.

Vtraque enim ipſarum A B ipſi C ſit commenſurabilis. dico & A ipſi B commenſurabilem eſſe. Quoniam enim A commenſurabilis
5.huius. eſt ipſi C, habebit A ad C proportionem, quã numerus ad numerum. habeat quam numerus D ad ipſum E. Rurſus quoniam commenſurabilis eſt B ipſi C, habebit C ad B proportionem, quam numerus ad numerum. habeat quam F ad G. & proportionibus datis quibuſcunque, videlicet quam habet D ad E, & quam
4.octaui. habet F ad G; ſumantur numeri deinceps proportionales in datis proportionibus H K L; ſitq; vt D ad E, ita H ad K: vt autem F ad G, ita K ad L. Quoniam igitur eſt vt A ad C, ita D ad
11.quinti. E; ſed vt D ad E, ita H ad K: erit & vt A ad C, ita H ad K. Rurſus quoniam eſt vt B ad C, ita F ad G, & vt F ad G, ita K ad L; erit & vt B ad C, ita K ad L. eſt autem & vt A ad C, ita H ad K. ex æquali igitur vt A ad B, ita H ad L. ergo A ad B proportionem habet. quam numerus H ad L numerum: ac propterea A ipſi B eſt
6.huius. commenſurabilis. Quæ igitur eidẽ magnitudini ſunt commenſurabiles, & inter ſe commenſurabiles ſunt. quod oportebat demonſtrare.



SCHOLIVM.

Hoc ab identitate non conuertitur. non enim quę inter ſe ſunt commenſurabiles, & eidem commenſurabiles ſunt; quemadmodum neque æquales inter ſe eidem ſunt æquales, ſed contra. nam contingit & incõ


menſurabiles

mensurabiles esse eidem, & commensurabiles; quod sequens theorema, & eius conuersum ostendet.

THEOREMA X. PROPOSITIO. XIII.

Si sint duæ magnitudines, & altera quidem eidem sit commensurabilis, altera vero incommensurabilis; magnitudines inter se incommensurabiles erunt.

Sint enim duę magnitudines A B, alia autem sit C: & A quidem ipsi C commensurabilis sit; B vero eidem C incommensurabilis. Dico & A ipsi B incommensurabilem esse. si enim commensurabilis est A ipsi B, est autem & C commensurabilis ipsi A; erit & C ipsi B cõmensurabilis. quod non ponitur.




Ex antecedente.

THEOREMA XI. PROPOSITIO. XIIII.

Si duę magnitudines commensurabiles sint, altera autem ipsarum alicui magnitudini sit incommensurabilis, & reliqua eidem incommensurabilis erit.

Sint duæ magnitudines commensurabiles A B; altera vero ipsarum A alicui magnitudini C sit incommensurabilis. Dico & reliquam B ipsi C incommensurabilem esse. si enim commensurabilis est B ipsi C, est autem & A commensurabilis ipsi B; & A ipsi C commensurabilis erit: sed & incommensurabilis. quod fieri non potest. non igitur commensurabilis est B ipsi C. ergo est incommensurabilis. si igitur duæ magnitudines cõmensurabiles sint, altera aũt ipsarum alicui magnitudini sit incommensurabilis; & reliqua eidem incommensurabilis erit. quod oportebat demonstrare.




Ex huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Ex ijs, quae proxime demonstrata sunt; licet illud etiam demonstrare.

Quæ incommensurabilibus sunt commensurabiles, & inter se incommensurabiles erunt.

Sint duae magnitudines incommensurabiles A B: sit autem C ipsi A commensurabilis: & D commensurabilis ipsi B. Dico C D inter se incommensurabiles esse. Quoniam enim A C commensurabiles sunt, atque est A ipsi B incommensurabilis; & C ipsi B incommensurabilis erit. Rursus quoniam & D commensurabilis ipsi B est; est autem B incommensurabilis ipsi C; & D ipsi C incommensurabilis erit. quod oportebat demonstrare.




Ex antecedente.

LEMMA

Duabus datis rectis lineis inaequalibus inuenire id, quo maior plus potest, quàm minor.

Sint

Sint datæ duæ rectæ lineæ inæquales A B C, quarum maior sit AB. oportet inuenire id, quo AB plus potest, quàm C. Describatur in recta linea AB semicirculus ADB, & in eo aptetur recta linea AD, ipsi C æqualis, & D B iungatur. perspicuum est angulum ADB rectum esse, & ipsam AB plus posse, quàm A D, hoc est quàm C, quãtum est rectæ lineæ DB quadratum.



1. quarti.
31. tertij.
47. primi.

Similiter autem & datis duabus rectis lineis, quæ ipsas possit, hoc modo inuenietur.


Sint duæ datæ rectę lineę AD DB; & oporteat inuenire rectam lineam, quæ ipsas possit. exponantur enim AD DB, ita vt rectum angulum contineant ADB, & AB iungatur. rursus perspicuum est rectam lineam AB ipsas AD DB posse.

47. primi.

THEOREMA XII. PROPOSITIO. XV.

Si quattuor rectæ lineę proportionales fuerint; prima vero tãto plus possit, quàm secunda, quãtum est quadratum rectæ lineæ sibi cõmensurabilis longitudine: & tertia tãto plus poterit, quàm quarta, quantum est quadratum rectę lineæ sibi longitudine commensurabilis. Quòd si prima tanto plus possit, quàm secunda, quãtum est quadratum rectę lineæ sibi incommensurabilis longitudine; & tertia, quàm quarta tanto plus poterit, quantum est quadratum rectę lineæ sibi longitudine incommensurabilis.

Sint quattuor rectæ lineæ proportionales A B C D, sitq; ut A ad B, ita C ad D; & A quidẽ plus possit, quàm B, quadrato, quod fit ex E: C vero plus possit, quàm D, quadrato ex F. Dico si A ipsi E sit commensurabilis, & C ipsi F cõmensurabilem esse. si uero A ipsi E sit incommensurabilis, & C ipsi F incommensurabilem esse. quoniam enim est vt A ad B, ita C ad D, erit vt quadratum ex A ad quadratum ex B, ita quadratum ex C ad id, quod ex D quadratum. sed quadrato quidem, quod fit ex A æqualia sũt quadrata, quæ ex ipsis E B; quadrato autem ex C æqualia sunt quadrata ex F D. vt igitur quadrata, quæ ex E B ad quadratum ex B, ita quadrata, quæ ex F D ad quadratum ex D: & diuidẽdo vt quadratum ex E, ad quadratum ex B, ita quadratum ex F ad quadratũ ex D. quare vt E ad B, ita est F ad D: & conuertendo vt B ad E, ita D ad F. est autem & vt A ad B, ita C ad D. ex æquali igitur vt A ad E, ita est C ad F. ergo si A est commensurabilis ipsi E, & C ipsi F erit commensurabilis; si vero incommensurabilis est: A ipsi E, & C ipsi F incommensurabilis erit. Si igitur quattuor rectæ lineæ proportionales sint, & reliqua. quod oportebat demonstrare.




42. sexti.
22. sexti.
10. huius.

PROBLEMA XIII. PROPOSITIO. XVI.

Si duæ magnitudines commensurabiles componantur, & tota magnitudo

magnitudo vtrique ipſarum cõmenſurabilis erit. quòd ſi tota magnitudo uni ipſarum ſit commenſurabilis, & quę à principio magnitudines commenſurabiles erunt.




Cõponantur enim duæ magnitudines commenſurabiles A B B C. Dico & totam magnitudinem A C vtrique ipſarum A B B C commenſurabilem eſſe. Quoniam enim commenſurabiles ſunt A B B C, metietur eas aliqua magnitudo. metiatur, ſitq; D. & quoniam D metitur ipſas A B B C, & totam A C metietur: metitur autem & A B B C. Ergo D magnitudines A B B C, & ipſam AC metitur. commenſurabilis igitur eſt A C vtrique ipſarum A B B C. Sed A C vni ipſarum A B. B C ſit commenſurabilis, videlicet ipſi A B. Dico & A B B C commenſurabiles eſſe. Quoniam enim commenſurabiles ſunt C A A B, metietur eas aliqua magnitudo. metiatur, & ſit D. Itaque quoniam D metitur ipſas C A AB, & reliquam B C metietur. metitur autem & A B. ergo D ipſas A B B C metitur; ac propterea A B B C commenſurabiles ſunt. Si igitur duæ magnitudines commenſurabiles componantur, & tota magnitudo vtrique ipſarum commenſurabilis erit, & reliqua. quod oportebat demonſtrare.

1. diff.
4. com. not.
3. com. not.

THEOREMA XIIII. PROPOSITIO XVII.

Si duæ magnitudines incommenſurabiles componãtur, & tota magnitudo vtrique ipſarum incommenſurabilis erit. quòd ſi tota magnitudo uni ipſarum ſit incõmẽſurabilis, et quæ à principio magnitudines incommenſurabiles erunt.



Componantur enim duæ magnitudines incommenſurabiles A B B C. Dico & totam magnitudinem A C vtrique ipſarum AB BC incommenſurabilem eſſe. ſi enim non ſunt incommenſurabiles CA AB, metietur eas aliqua magnitudo. metiatur, ſitq; D, ſi fieri poteſt. Quoniam igitur D metitur ipſas CA AB, & reliquam B C metietur. metitur autem & B A. ergo D ipſas A B B C metitur; ac propterea commenſurabiles ſunt AB BC. ponuntur autem & incommenſurabiles. quod fieri non poteſt. non igitur ipſas C A AB metietur aliqua magnitudo. quare C A A B incommenſurabiles ſunt. ſimiliter & AC CB incõmenſurabiles eſſe demõſtrabimus. ergo AC vtrique ipſarum AB BC eſt incõmenurabilis. ſed AC vni ipſarũ AB BC incõmenſurabilis ſit; & primũ ipſi A B. Dico & AB BC incõmẽſurabiles eſſe. ſi enim ſunt cõmenſurabiles, eas aliqua magnitudo metietur, metiatur, & ſit D. qm̃ igitur D metitur ipſas AB BC, & totã AC metietur. metitur autem & AB. ergo D ipſas CA AB metitur: ideoq; C A A B commenſurabiles ſunt. ponuntur autem & incommenſurabiles. quod fieri non poteſt. non igitur ipſas AB BC metietur aliqua magnitudo. quare AB BC incommẽſurabiles erũt. ſimiliter demonſtrabimus A C, & reliquæ B C eſſe incommenſurabilem. Si igitur duæ magnitudines incommenſurabiles componantur, & rẽliqua. quod oportebat demonſtrare.

4. com. not.

F. C. COMMENTARIVS.

Ex iam demonſtratis illud etiam conſtat.

Si tota magnitudo ex duabus magnitudinibus compoſita vni componentium ſit incommenſurabilis, & reliquæ incommenſurabilis erit.


Sit enim tota magnitudo AC incommensura bilis magnitudini AB. Dico AC etiam reliquae BC incommensurabilem esse. Quoniã enim CA est incommensurabilis ipsi AB, erunt AB, BC incommensurabiles. & quoniam AB BC incommensurabiles sunt, & AC utrique ipsarum incommensurabilis erit. quod oportebat demonstrare.



Ex demonstratis.

LEMMA. I.


Si ad aliquam rectam lineam applicetur parallelogrammum deficiẽs figura quadrata, parallelogrammum applicatum æquale est ei rectangulo, quod partibus rectæ lineæ ex applicatione factis continetur.



Ad aliquam enim rectam AB applicetur AD parallelogrammum, deficiẽs figura quadrata DB. Dico parallelogrammum AD rectangulo ACB æquale esse; quod quidem per seſe patet. quoniam enim quadratum est DB, erit DC ipsi CB æqualis, atque est parallelogrammum AD, quod AC CB continetur. si igitur ad aliquam rectam lineam applicetur parallelogrammum, & reliqua. quod oportebat demonstrare.

LEMMA. II.

Si duæ rectæ lineæ inæquales sint, quarta autem pars quadrati, quod à minore fit, ad maiorem applicetur, deficiens figura quadrata; quod applicatum est per bipartitam sectionem non transit.




Si enim fieri potest, sint duæ rectæ lineę inæquales AB C: quarta autem pars quadrati, quod fit à minori C ad maiorem applicetur, deficiens figura quadrata; quæ scilicet, fit à DB ipsius AB dimidia, erit ex præcedenti lemmate id, quod applicatum est æquale eĩ, quod partibus AD DB continetur, hoc est æquale quadrato ex DB. etenim AB bifariã in puncto D secatur. quod igitur quater fit à DB æquale est quadruplo eius, quod applicatum est. sed quod quater fit à DB est ipsius AB quadratum; nam longitudine duplæ potentia quadruplę sunt: quadruplum vero eius, quod applicatur est quadratum ipsius C. ergo quadratum, quod fit ex AB est æquale quadrato ex C, hoc est quadratum maioris æquale quadrato minoris. quod fieri non potest. non igitur quarta pars quadrati, quod fit à C applicata ad AB per bipartitam sectionẽ trãsit.

LEMMA. III.

Duabus datis rectis lineis inæqualibus, quartam partem quadrati minoris ad maiorem applicare, ita ut deficiat figura quadrata.

Sint datę duæ rectæ lineæ inæquales AB CD; sitq; maior AB. & oporteat facere quod propositum est. secetur CD bifariã in E. manifestum est quartam partem quadrati, quod fit à CD esse quadratum ex CE. & describatur in recta linea AB semicirculus; secenturq; AB bifariã in F: & à puncto F ipsi AB ad rectos angulos ducatur

ducatur F G. Quoniam igitur A B maior eſt, quàm C D, erit & ipſius A B dimidia maior, quàm dimidia ipſius C D, hoc eſt maior quàm C E. ponatur F H æqualis C E, & per H ipſi A B parallela ducatur H K, atque à puncto K ad A B perpẽdicula ris ducta K L. iungantur A K K B. rectangulum igitur eſt triangulum A K B, & ab angulo recto ad baſim perpendicularis ducta eſt K L. ergo rectangulum A L B eſt æquale quadrato, quod fit ex K L. producatur K L, & ponatur ipſi L B æqualis L M, & figura compleatur. quadratum igitur, quod fit ex K L, hoc eſt quod ex F H eſt æquale parallelogrammo A M. ſed quod fit ex F H eſt æquale quadrato ex C E, hoc eſt quartæ parti quadrati ex C D: eſtq; A M deficiens figura quadrata. quod ipſum facere oportebat.




8 & 17. ſexti.

THEOREMA XV. PROPOSITIO. XVIII.

Si duæ rectæ lineæ inæquales ſint, quartæ autem parti quadrati, quod fit à minori æquale parallelogrammum ad maiorem applicetur, deficiens figura quadrata, & in partes longitudine commenſurabiles ipſam diuidat; maior tanto plus poterit quàm minor, quantum eſt quadratum rectæ lineæ ſibi longitudine commenſurabilis. Quòd ſi maior tanto plus poſsit, quàm minor, quãtum eſt quadratum rectæ lineæ ſibi longitudine commenſurabilis, quartæ autem parti quadrati, quod fit à minori æquale parallelogrammum ad maiorem applicetur, deficiens figura quadrata; in partes longitudiue commenſurabiles ipſam diuidet.

Sint duæ rectæ lineæ inæquales A B C, quarum maior B C; quartæ autem parti quadrati, quod fit à minori A, hoc eſt ei, quod fit à dimidia ipſius A, æquale parallelogrãmum ad B C applicetur, deficiens figura quadrata, & ſit quod continetur B D D C, ſitq; B D ipſi D C commenſurabilis longitudine. Dico B C plus poſſe, quàm A, quadrato rectæ lineæ ſibi longitudine commenſurabilis. ſecetur enim B C bifariam in puncto E, & ipſi D E æqualis ponatur E F. reliqua igitur D C eſt æqualis B F. & quoniam recta linea B C ſecatur in partes quidem æquales ad E pũctum, in partes vero inæquales ad punctum D; erit B D C rectangulum vna cum quadrato ex E D æquale ei, quod fit ex E C quadrato, & eorum quadrupla quod igitur quater B D D C continetur vnà cum quadrato, quod fit ex E D quater æquale eſt quadrato quod quater fit ex E C. Sed ei quidem, quod quater B D D C continetur æquale eſt quadratum ex A: ei vero, quod quater fit ex D E æquale eſt quadratũ, quod ex D F, etenim D F ipſius D E eſt dupla: & ei quod quater fit ex E C æquale eſt quadratum quod ex B C; rurſus enim B C dupla eſt ipſius E C. ergo quadrata, quæ fiunt ex A D F æqualia ſunt ei, quod fit ex B C quadrato; ac propterea quadratum, quod fit ex B C maius eſt, quàm quadratũ, quod ex A, quadrato, quod ex D F. recta igitur linea B C tanto plus poteſt, quàm A, quantum eſt ipſius D F quadratum. oſtendendum eſt & B C ipſi D F commenſurabilem eſſe. Quoniam enim B D commenſurabilis eſt ipſi D C longitudine, erit & B C ipſi C D longitudine commenſurabilis. ſed D C ipſis C D B F eſt commenſurabilis longitudine. æqualis enim



5. ſecundi.

5. quinti.


D lis enim eſt C D ipſi B F. quare & BG ipſis B F CD longitudine eſt commenſurabi-
E lis, & reliquę igitur F D longitudine commenſurabilis erit. ergo B C plus poteſt, quàm A quadrato rectæ lineæ ſibi longitudine commenſurabilis. Sed BC plus poſſit quàm A, quadrato rectæ lineæ ſibi longitudine commenſurabilis, quartæ autem parti quadrati, quod fit ex A æquale parallelogrammũ ad B C applicetur, deficiens figura quadrata; & ſit quod continetur BD DC. oſtendendum eſt B D ipſi D C lõgitudine commẽſurabilem eſſe. Iiſdem enim conſtructis ſimiliter demonſtrabimus B C plus poſſe, quàm A, quadrato rectæ lineæ FD. ſed B C plus poteſt, quàm A, qua
F drato rectæ lineæ ſibi longitudine commenſurabilis. ergo B C commenſurabilis eſt ipſi F D longitudine. & reliquę igitur, vtrique ſcilicet B F D C longitudine eſt commenſurabilis, ſed vtraque B F D C ipſi D C commẽſurabilis eſt longitudine;
G etenim B F eſt ęqualis D C. ergo & B C ipſi C D longitudine eſt commenſurabilis.
H ex quibus conſtat B D ipſi D C longitudine commenſurabilem eſſe. Si igitur duę rectæ lineę inęquales ſint, & reliqua quod demonſtrare oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

A Quartæ autem parti quadrati, quod fit à minori A, hoc eſt ei, quod fit à dimidia ipſius A æquale parallelogrammum ad B C ąpplicetur, deficies figura quadrata] *ex antecedente lemmate. Hoc autem nihil aliud eſt, niſi rectam lineam maiorem, ita ſecare, vt rectangulum ipſius portionibus contentum quartae parti quadrati minoris ſit aequale. ſed poſſumus illud idem vniuerſalius explicare in hunc modum.*

Datam rectam lineam ita ſecare, vt rectangulum, quod partibus cõtinetur, ſit ęquale dato rectilineo. oportet autem datum rectilineũ minus eſſe quadrato, quòd à dimidia deſcribitur.

Sit data recta linea A B, diuiſa bifariam in C; datumq; rectilineum D. & oporteat facere quod propoſitum eſt. Deſcribatur in A B ſemicirculus A E B; & à puncto C ipſi A B ad rectos angu-
25. ſexti. *los ducatur C E: deinde rectilineo D fiat aequale quadratum F G H K. erit eius latus F G minus*



ipſa A C, hoc eſt ipſa C E. quare à recta linea C E abſcindatur C L, quae ſit aequalis F G: & per L quidem ducatur L M parallela ipſi A B: per M vero ducatur M N parallela C E. Dico rectam lineam A B ſectam eſſe in puncto N, vt oportebat, hoc eſt rectangulum A N B rectilineo D aequale eſſe. aequale etenim eſt quadrato ex M N. ſed cum M N ſit aequalis ipſi C L, hoc eſt ipſi F G, erit rectãgulũ A N B quadrato F G H K, hoc eſt rectilineo D ęquale. quod facere oportebat.

Similiter & datum numerum in duas partes ita diuidemus, vt qui ex ipſis producitur dato numero ſit ęqualis. oportet autem datum numerum, cui ęqualis eſſe debet, quadrato dimidij minorem eſſe.

Sit datus numerus 20, quem oporteat ita diuidere, vt qui ex partibus producitur, ſit aequalis dato numero 75. Accipiatur ipſius 20 medietas, quae eſt 10, & in ſe multiplicetur, faciet 100, à quo detrahemus datum numerum, videlicet 75, & relinquetur 25. huius igitur latus 5 additũ ipſi 10 conſtituit 15; & detractum ab eodem conſtituit 5. Dico 20 in has partes ita diuiſum eſſe, vt oportebat, hoc eſt eum, qui ex ipſis producitur, aequalem eſſe dato numero 75. Quoniam enim 20 diuiditur in duas partes aequales, & in duas partes inęquales, numerus planus, qui fit ex partibus inaequalibus vnà cum quadrato numeri interiecti aequalis eſt ei, qui fit à dimidio quadrato, quod demonſtratum eſt à Barlaam monacho in theoremate quinto eorum, quae nos ad 15 noni

appoſuimus

appoſuimus. ergo qui fit ex 15, *&* 5 *vnà cũ quadrato ipſius* 5 *eſt aequalis quadrato dimidij, vide licet* 100: *& detracto communi quadrato* 25, *erit qui producitur ex* 15, *&* 5 *aequalis dato numero* 75. *quod facere oportebat.*

Sed ei quidem, quod quater DB BC continetur ęquale eſt quadratum ex A]*Po* B
nitur enim parallelogrammum rectãgulum D B C aequale quartae parti quadrati, quod fit ex A.

Erit & BC ipſi CD longitudine cõmẽſurabilis]*Ex prima parte ſextae decimae huius.* C

Quare BC ipſis BF CD longitudine eſt commenſurabilis]*Ex* 12 *huius.* D

Et reliqua igitur F D longitudine commenſurabilis erit]*Ex eo, quod nos ad* 17. *huius demonſtrauimus. ſumantur enim BF DC ſimul, ac ſi vna linea eſſet.* E


Et reliquę igitur, vtrique ſcilicet, B F D C longitudine eſt commenſurabilis]*Ex* F
eodem theoremate, quod ad 17 *huius appoſuimus.*

Ergo & BC ipſi DC longitudine eſt commenſurabilis.]*Ex* 12 *huius.* G

Ex quibus conſtat BD ipſi DC longitudine commenſurabilem eſſe] *Ex ſecunda* H
parte ſextae decimae huius.

THEOREMA XVI. PROPOSITIO. XIX.

Si duæ rectę lineæ inæquales ſint, quartę autem parti quadrati, quòd fit à minori æquale parallelogrammum ad maiorem applicetur, deficiens figura quadrata, & in partes incommenſurabiles longitudine ipſam diuidat; maior tanto plus porerit, quàm minor, quantum eſt quadratum rectæ lineæ ſibi longitudine incommenſurabilis. Quòd ſi maior tanto plus poſsit, quàm minor, quantum eſt quadratum rectę lineæ ſibi longitudine incommenſurabilis, quartę autem parti quadrati, quod fit à minori ęquale parallelogrammum ad maiorem applicetur, deficiens figura quadrata; in partes longitudine incommenſurabiles ipſam diuidet.



Sint duæ rectæ lineæ inæquales A BC, quarum maior B C: quartæ autem parti quadrati, quòd fit à minori A, æquale parallelogrammum ad ipſam BC applicetur, deficiẽs figura quadrata; & ſit quod continetur B D D C; ſitq; BD ipſi DC longitudine incommenſurabilis. Dico B C plus poſſe, quàm A quadrato rectæ lineę ſibi longitudine incommẽſurabilis. ijſdem enim, quę ſupra, conſtructis, ſimiliter oſtendemus ipſam BC plus poſſe, quàm A, quadrato rectę lineæ D F. oſtendendum igitur eſt B C ipſi D F longitudine incommenſurabilem eſſe. Quoniam enim incommenſurabilis eſt B D ipſi D C, erit & BC ipſi C D longitudine incommenſurabilis. ſed DC incommenſurabilis eſt vtriſque BF DC. ergo & BC ipſis BF DC longitudine eſt incommenſurabilis. ac propterea reliquę F D incommenſurabilis eſt longitudine; & BC plus poteſt; quàm A. quadrato rectæ lineę ſibi longitudine incommẽſurabilis. Sed BC rurſus plus poſsit, quàm A, quadrato rectæ lineæ ſibi incommenſurabilis longitudine. quartæ autem parti quadrati, quod fit ex A æquale parallelogrammum ad BC applicetur, deficiens figura quadrata; & ſit quod BD DC continetur. oſtendendum eſt BD ipſi DC longitudine incommenſurabilem eſſe. Ijſdem enim conſtructis, ſimiliter demonſtrabimus BC plus poſſe quàm A, quadrato rectæ lineæ DF. ergo oſtendendum relinquitur BC plus poſſe, quàm A, quadrato rectę lineæ ſibi longitudine incommenſurabilis. incommenſurabilis igitur eſt BC ipſi DF longitudine. quare & reliquę, videlicet vtrique BF DC eſt incommenſurabilis. ſed vtraque BF DC commenſurabilis eſt longitudine ipſi DC. ergo & BC ipſi CD eſt incommenſurabilis longitudine; ac propterea diuiden-

17. huius.
14. huius.
Ex demonſtratis ad 17. huiust
Ex demonſtratis ad 17. huius.
14. hũius.
17. huius.

do

do BD ipſi DC longitudine incommenſurabilis erit. Si igitur duę rectæ lineę inæquales ſint, & reliqua. quod oportebat demonſtrare.

SCHOLIVM.

Hactenus tractauit de commenſurabilibus, & incommenſurabilibus, nunc ad rationales & medias tranſit.

LEMMA. I.

Quoniam demonſtratum eſt longitudine commenſurabiles omnino & potentia commenſurabiles eſſe. potentia vero commenſurabiles non omnino & longitudine, ſed poſſe & longitudine commenſurabiles eſſe, & incommenſurabiles: manifeſtum eſt, ſi expoſitæ rationali aliqua commenſurabilis fuerit longitudine, illam rationalem vocari, & ipſi commenſurabilem non ſolum longitudine, ſed etiam potentia, longitudine enim commenſurabiles omnino & potentia commenſurabiles ſunt. Si vero expoſitę rationali aliqua fuerit potentia commenſurabilis, ſi quidem & longitudine, dicetur & ſic rationalis, & commenſurabilis ipſi longitudine, & potentia. Quòd ſi expoſitæ rationali rurſus aliqua commenſurabilis exiſtens potentia, longitudine fuerit incommenſurabilis, dicetur & ſic rationalis potentia tantum commenſurabilis.

Coroll. 9. huius.

PROCLI LEMMA. II.

Rationales vocat eas, quæ expoſitæ rationali vel longitudine & potentia commenſurabiles ſunt, vel potentia ſolum. ſunt autem & alię rectæ lineæ, quæ longitudine quidem expoſitę rationali incommenſurabiles ſunt, potentia autem ſolum commenſurabiles; atque ob id rurſus dicuntur rationales, & commenſurabiles inter ſe, quatenus rationales, ſed commenſurabiles inter ſe vel longitudine, & potentia, vel potentia ſolum. & ſi quidem longitudine, dicuntur & ipſæ rationales longitudine commenſurabiles, vt intelligatur etiam potentia commenſurabiles eſſe: ſi vero potentia ſolum, inter ſe ſunt commenſurabiles, dicuntur ipſæ quoque rationales potentia ſolum commenſurabiles.

Rationales commenſurabiles ſunt. 11. huius.

At vero rationales commenſurabiles eſſe ex his conſtat.


Quoniam enim rationales ſunt, quæ expoſitę rationali ſunt commenſurabiles, quæ vero eidem commenſurabiles etiam inter ſe commenſurabiles ſunt; ſequitur rationales commenſurabiles eſſe. quod demonſtrare oportebat.

LEMMA III.

Inuenire duas rationales longitudine commenſurabiles.

Exponatur

Exponatur rationalis A, & duo numeri C D vel quadrati, vel ſimpliciter proportionem habentes, quam quadratus numerus ad quadratum numerum, & fiat vt C ad D, ita quadratum ex A ad quadratum ex E: erunt per ea, quæ demonſtrata ſunt A E longitudine commenſurabiles.




Ex corol. 2. huius.

In 9. huius.

THEOREMA XVII. PROPOSITIO. XX.

Quod rationalibus longitudine commenſurabilibus rectis lineis ſecundum aliquem prædictorum modorum continetur rectãgulum rationale eſt. A

Rationalibus enim longitudine commenſurabilibus rectis lineis A B B C contineatur rectangulum A C. Dico A C rationale eſſe. deſcribatur ex A B quadratum A D. ergo A D eſt rationale. Et quoniam A B commenſurabilis eſt ipſi B C longitudine, atque eſt A B æqualis BD; erit DB ipſi BC longitudine commenſurabilis. eſt autem & vt DB ad BC, ita DA ad AC: & commenſurabilis eſt DB ipſi BC. ergo & DA ipſi AC commenſurabile erit. eſtq; rationale DA. quare & AC eſt rationale. quod igitur rationalibus longitudine commenſurabilibus rectis lineis cõtinetur rectangulum rationale eſt. quod demonſtrare oportebat.



B

1. huius. C

D

F. C. COMMENTARIVS.


Secundum aliquem prædictorum modorum] *Rectarum enim linearum A B B C vel vtreque ſunt expoſitae rationali longitudine commenſurabiles, vel vtreque eidem commenſurabiles potentia ſolum, ſed inter ſe commenſurabiles longitudine. quocunque autem modo ſe habeãt, quod ex ipſis fit rectangulum rationale eſt, & eadem demonſtratio in omnibus congruit.* A

Ergo AD eſt rationale] *Ex diffinitione 9. ſiue enim longitudine ſint commenſurabiles expoſitae rationali, ſiue potentia ſolum, earum quadrata rationalia ſiant, quippe quae quadrato expoſitae rationalis ſint commenſurabilia.* B

Ergo & DA ipſi AC commenſurabilis erit] *Ex decima huius.* C

Eſtq; rationale DA. quare & AC eſt rationale] *rationali namque commenſurabile & ipſum rationale eſt. quod ita demonſtrabitur.* D

Sit expoſitae rationalis quadratum A, & ipſi commenſurabile ſit ſpacium B, erit B rationale ex 9 diffinitione. ſit rurſus aliud ſpacium C ipſi B commenſurabile. Dico & C rationale eſſe. Quoniam enim ſpacia A C eidem ſpacio B ſunt commenſurabilia, & inter ſe commenſurabilia ſunt ex 12 huius. Quòd cum C ipſi A ſit commenſurabile, etiam rationale erit ex 9 diffinitione. quod demonſtrare oportebat.




Vt autem ea, quae hoc loco de rationalibus dicuntur, manifeſtiora ſint, & quaſi ante oculos ponantur, libuit nonnulla theoremata adiungere, quae ad ea etiam, quae ſequuntur, vtilia erunt.

THEOREMA I.

Quod duabus datis rectis lineis rationalibus continetur rectangulum datũ erit.

Duabus enim datis rectis lineis rationalibus A B A D contineatur rectangulum A C. Dico A C datum

datum esse. Exposita enim rationali E, vel vtraque AB AD ipsi E longitudine est commensurabilis, vel vtraque commensurabilis est potentia solum, vel altera quidem longitudine, altera potentia solum commensurabilis. & si quidem vtraque est commensurabilis longitudine, rectangulum, quod ipsis continetur datum erit ex ijs, quę Ioannes Regiomontanus in primo libro de triangulis propositione 16 demonstrauit; & ex ijs, quae nos demonstrauimus in commentarijs in 3 propositionē libri Archimedis de circuli dimensione. si vero vtraque expositae rationali potentia solum est commensurabilis, nihilominus rectangulum datum erit. fiant enim ex AB AD quadrata AF CG. & quoniam AB AD potentia sunt commensurabiles, earum quadrata commensurabilia erunt. ideoq́, inter se proportionem habebunt, quam numerus ad numerum. sit autem quadratum AF ad quadratum CG, vt numerus H ad numerum K; & H ipsum K multiplicans faciat M, cuius radix sit N. erunt igitur tres magnitudines H N K deinceps proportionales; rectangulum enim contentum H K est aequale quadrato ex N, hoc est ipsi M. & quoniam quadratum F A ad rectangulum AC est vt FB ad BC, hoc est vt AB ad BC; vt autem AB ad BG, hoc est ad BC, ita rectangulum AC ad CG quadratum: erunt & tres hę magnitudines deinceps proportionales. quādo autem tres magnitudines deinceps proportionales fuerint, prima ad tertiam duplam habebit proportionem eius, quam habet ad secundam. quadratum igitur AF ad quadratum CG duplam proportionem habet eius, quam habet ad rectangulum AC. sed quadratum AF ad quadratum CG est, vt numerus H ad ipsum K. & cum H ad K similiter duplam proportionem habeat eius, quam habet ad N, erit quadratum F A ad rectangulum AC, vt H ad N. sunt autem magnitudines H N datae; ideoq́, data ipsarum proportio: & datum est quadratum F A. quare & rectangulum AC datum erit. Eadem ratione demonstrabimus rectangulum datum esse, si altera datarum linearum sit longitudine commensurabilis, altera vero potentia solum. quod demonstrare oportebat.



5. huius.

17. sexti.

1. sexti.

11. quinti.

10. diffi. quinti.

1. datorum Euclid.

2. Datorum Euclid.

OPERATIO.


Si datae magnitudines numerorum radices fuerint, numeros ipsos inter se multiplicabimus; si vero earum altera numerus fuerit, altera numeri radix, quadratum numeri multiplicabimus per numerum, cuius altera est radix, & eius, qui producitur radicem dicemus esse rectangulum, quod duabus datis rectis lineis continetur. atque hęc nihil aliud est, nisi multiplicatio, quam dicunt, radicum quadratarū inter se se. vt si AB sit radix 5, AD radix 3, multiplicabimus 5, per 3 fiet 15, cuius radix erit id, quod producitur ex B 5, & B 3 inter se ductis. si vero AB sit 2, AD B 5, multiplicabimus quadratum ipsius 2 videlicet 4 per 5, & fiet 20, cuius radix erit productum, quod quęritur.

THEOREMA II.

Si ad datam rectam lineam rationalem applicetur spacium datum, & latitudo, quam facit, data erit.


Sit data recta linea rationalis AB, & spacium datum E. Dico si ad rectam lineam AB spacium E applicetur, latitudinem, quam facit, datam esse. vel igitur recta linea A B expositae rationali commensurabilis est longitudine, vel potentia solum; vel spacium E rationale est, vel irrationale, quod medium appellatur. & si quidem recta linea AB longitudine est commensurabilis, & spacium E rationale, illud manifestum erit ex ijs, quae Regiomontanus demonstrauit in primo libro de triangulis propositione 17. & ex ijs, quae nos eodem in loco, de quo proxime dictum est, demonstrauimus. si vero AB est commensurabilis potentia solum, & spacium E siue rationale, siue irrationale, vel A B est longitudine commensurabilis, & spacium E irrationale, latitudo, quā facit, data erit. Sit primum recta linea AB potentia solum commensurabilis, & spacium E rationale. Quoniam igitur AB rationalis est, & spacium E rationale, erit quadratum ipsius AB spacio

E commensu-



E commensurabile;ac propterea ad ipsum proportionem habebit, quam numerus ad numerum. habeat quam numerus H ad numerum K;fiatq; ex corollario sextae propositionis huius libri vt H ad K,ita recta linea AB ad aliam rectam lineam O:& inter AB & O sumpta media proportionali P,erit vt numerus H ad numerum K,ita quadratum rectae lineae AB ad rectę lineae P quadratum.sed & quadratū rectae lineae AB ad spaciū E erat,vt numerus H ad numerū K.Cum igitur quadratum ex AB ad spacium E eādem proportionem habeat, quam ad quadratum ex ipsa P;erit quadratū ex P spacio E aequale.Itaque ad rectam lineam AB applicetur parallelogrammum rectangulum AC aequale quadrato ex P,hoc est aequale spacio E; latitudinem faciens BC. & ex AB BC describātur quadrata AF CG. numerus autem K se ipsum multiplicans faciat M, & M per K diuiso exeat N.erunt tres magnitudines HKN deinceps proportionales; rectangulū enim ipsis KN contentum est aequale quadrato ex K.Quoniam igitur quadratum FA ad rectangulum AC est vt rectangulum AC ad CG quadratum,quod superius ostensum est.quadratum autem FA ad rectangulum AC est,vt numerus H ad numerum K;erit & rectangulum AC ad quadratum CG,vt K ad N.sed datum est quadratum FA, & rectangulum AC; quòd numeri K N sint dati.ergo & quadratum CG datum erit,& data ipsius radix BC,videlicet latitudo, quam facit spacium E ad rectam lineam AB applicatum. 9. quinti. 1. datorum Euclid.

Sit rursus recta linea AB potentia solum commensurabilis, & spacium E irrationale. ergo quadratum rectae lineae AB incommensurabile est spacio E.sit autem quadratum rectae lineae AB ad spacium E,vt H ad K,hoc est ad radicē numeri M:& H se ipsum multiplicans faciat L. cum igitur LM quadrati sint,& eorum latera HK,habebit L ad M duplam proportionem eius, quam habet H ad K. itaque fiat vt L ad M,ita recta linea AB ad rectam lineam Q:& inter AB & Q sumatur media proportionalis O.habebit igitur AB ad Q duplam proportionem eius, quam habet ad O. atque est vt L ad M,ita AB ad Q.ergo vt H ad K,ita AB ad O. Rursus inter AB & O inueniatur media proportionalis P;erit vt AB ad O, ita quadratum ex AB ad quadratum ex P.vt igitur H ad K,ita est quadratum ex AB ad quadratum ex P. sed erat vt H ad K,ita quadratum ex AB ad spacium E.Ergo quadratum ex AB ad quadratum ex P eandem habet proportionem, quam ad spacium E.ideoq; quadratum ex P spacio E aequale erit.Applicetur ad rectam lineam AB parallelogrammum rectangulum AC,aequale quadrato ex P, hoc est spacio E aequale,quod faciat latitudinem BC:deinde ex AB BC fiant AF CG quadrata; & rursus ipsarum H K magnitudinum inueniatur tertia proportionalis, nempe ducta K inter se se; & quod producitur diuiso per B,vt proxime dictum est.Sit autem tertia proportionalis N.Eadem ra- 9. quinti.



tione demonſtrabitur vt quadratum ex A B ad rectangulum AC, ita eſſe rectangulum AC ad C G quadratum. Quoniam igitur H K N deinceps proportionales ſunt, quadratum autem F A ad rectangulum AC eſt vt H ad K; erit & rectangulum AC ad CG quadratum, vt K ad N. ſed datum eſt quadratum AF, & rectangulum AC, cum detur HK. ergo & quadratum CG dabitur, & eius radix BC, hoc eſt latitudo, quae fit ſpacio E ad rectam lineam AB applicato. Non aliter demonſtrabitur ſi recta linea AB ſit longitudine commenſurabilis, et ſpacium E irrationale.


OPERATIO.

Si datae magnitudines radices numerorũ fuerint, numerus, qui ſpacium notum reddit, diuidatur per alterum numerum; ſi vero altera fuerit numeri radix, numerus, cuius ea eſt radix, diuidatur per quadratum alterius numeri; vel contra quadratum numeri, per numerum cuius eſt radix, diuidatur; & eius, quod exibit, radix erit latitudo, quam facit ſpacium ad rectã lineam applicatum. eſt autem hęc diuiſio radicum inter ſe ſe, quam dicunt. vt ſi Bꝛ 15 diuidenda ſit per Bꝛ 5, diuidemus 15 per 5, & exibit 3, cuius radix eſt quod fit Bꝛ 15 per Bꝛ 5 diuiſa: ſi vero Bꝛ 20 diuidere velimus per 2, diuidemus 20 per quadratum ipſius 2, videlicet per 4, & exibit 5, cuius radix eſt id, quod quæritur.

THEOREMA III.

Quae ex duabus rationalibus longitudine commenſurabilibus rectis lineis componitur recta linea data erit.

Ex duabus enim datis rationalibus longitudine commenſurabilibus rectis lineis AB BC componatur recta linea AC. Dico AC datam eſſe. vel igitur datae rectae lineae expoſitae rationali longitudine commenſurabiles ſunt, vel commenſurabiles potentia ſolum, ſed inter ſe lõgitudine commenſurabiles. Et ſi quidem expoſitae rationali ſint commenſurabiles longitudine, quae ex ipſis componitur recta linea data erit, ex demonſtratis à Ioanne Regiomontano in primo libro de triangulis, propoſitione tertia, & ex ijs, quae nos eodem in loco demonſtrauimus. ſi uero expoſitae rationali ſint commenſurabilis potentia ſolum, ſed inter ſe longitudine commenſurabiles, earum quadrata proportionem habebunt; quam quadratus numerus ad quadratum numerum. Itaque habeat recta e lineae A B quadratum ad quadratum rectae lineae BC proportionem eam, quam numerus L ad numerum M. erũt numeri L M ſimiles plani. ſi enim quadrati ſint, rectae lineae AB AC longitudine erunt commenſurabiles. quod non ponitur. ergo inter L & M cadet unus medius proportionalis. cadat, & ſit N. deſcribaturq́, ex recta linea AC quadratum ACDE; et iuncta AD ducatur per B quidem alterutri ipſarum AE CD parallela B G F: per G vero ducatur H G K alteruti ipſarum AC ED parallela. ſimiliter vt ſupra demonſtrabitur quadratum AG ad rectangulum GC ita eſſe, vt rectangulum GC ad GD quadratum. ſed quadratum AG ad quadratum G D eſt vt numerus L ad numerum M. ergo quadratum AG ad rectangulum GC eſt vt numerus L ad ipſum N; & rectangulum GC ad quadratum GD, vt N ad M. eſt autem rectangulum EG, quod eſt alterum ſupplementorum, aequale reliquo GC. Quadratum igitur AG ad gnomonem EKB eſt vt L ad M vnà cum duplo ipſius N: & conuertendo gnomon EKB ad quadratum AG, vt M vnà cum duplo ipſius N ad ipſum L. ergo componendo, rurſuſq́, conuertendo quadratum AG ad totum AD quadratum, vt L ad compoſitum ex L & M vnà cum duplo ipſius N. ſed compoſitum hoc eſt datum, quippe cum dati ſint numeri ipſum componentes. ergo et totum quadratum AD datum erit, et data eius radix, quae ex duabus datis rectis lineis conſtat. atque illud eſt, quod demonſtrandum proponebatur.



9. huius.

28. octaui.

OPERATIO.


Numeros reſpondentes quadratis datarum linearum ſimul coacernabimus vnà cum duplo lateris

teris quadrati eius, qui ex eorum inter se multiplicatione producitur, hoc est vnà cum duplo numeri proportionalis, qui inter ipsos medius interijcitur; et huius compositi radix erit recta linea, quę ex duabus datis rectis lineis constat. atque hęc est radicum inter se additio, quam dicunt: vt si radix 3 addenda sit radici 12, primum iungemus 3 cum 12, deinde multiplicantes 12 per 3, eius, qui producitur, videlicet 36 latus, quod est 6 duplabimus: et omnibus simul coaceruatis fient 27, cuius radix est recta linea, quam quęrimus: Quemadmodum autem ex duabus rationalibus longitudine commensurabilibus, si inter se componantur, vna recta linea fit, sic ex duobus spacijs medijs commensurabilibus, si itidem inter se componantur vnum fiet medium. Quòd si duae rationales lõgitudine incommensurabiles inter se addendae sint, vt ℞ 3. ℞ 5, dicemus ℞ 3 vnà cum ℞ 5, vel ℞ 3 addita ℞ 5, vel vtemur hac voce plus, quod est in communi vsu, hoc modo ℞ 3 plus ℞ 5, et 3 plus ℞ 8, et ita fiet etiam si plures sint, quam duae, vt 2 plus ℞ 3 plus ℞ 5. Quòd si duae sint, dicentur ex binis nominibus, seu binomia, vt Campanus, et recentiores. si vero tres dicentur ex tribus nominibus vel trinomia. et eodem modo in alijs.

THEOREMA IIII.

Duarum datarum rationalium, quæ inæquales sint, & longitudine commensurabiles, differentia data erit.

Sint duae datae rationales inequales, & longitudine commensurabiles rectae lineae AB AC, quarum differentia sit EC. Dico BC datam esse. si enim AB AC sint expositae rationali longitudine commensurabiles, earum differentia data erit ex demonstratis à Ioanne Regiomontano in libro primo de triangulis propositione 4, & ex ijs, quae à nobis eodem in loco demonstrata sunt. si vero expositae rationali commensurabiles sint potentia solum, sed inter se longitudine commensurabiles, earum quadrata inter se proportionem habebunt, quam quadratus numerus ad quadratum numerum. habeat igitur rectae lineae AB quadratum ad quadratum rectae lineae AC proportionem eam, quam numerus L ad numerum M. erunt numeri LM similes plani; ideoq; inter eos cadet vnus medius proportionalis. cadat, sitq; N: & ex recta linea AC describatur quadratum ACDF, & figura compleatur, quemadmodum superius. producta vero CA vsque ad O, ita vt AO, sit aequalis AB, quadratum OH describatur, quod quidem quadrato rectae lineae AB, hoc est ipsi AG aequale erit. atque est quadratum quidem OH ad rectangulum HC, vt OA ad AC: rectangulum vero HC ad quadratũ CE, vt CK ad CD, hoc est vt OA ad AC. vt igitur quadratum OH ad rectangulum HC, ita est rectangulum HC ad CE quadratum. sed & numeri LNM deinceps proportionales sunt, & quadratum OH ad quadratum CE est vt L numerus ad numerum M. ergo quadratum OH ad rectangulum HC erit vt L ad N; & rectangulum HC ad quadratum CE, vt N ad M. quòd cum rectangulum EG sit aequale rectangulo GC, supplementa etenim sunt, addito vtrique aequali quadrato, erit rectangulum HC aequale rectangulo FH vnà cum quadrato HQ. si igitur à duobus quadratis OH, AD auferatur duplum rectanguli HC, quod quidem rectis lineis CA AB continetur, reliquum erit quadratum FK; cuius latus GK rectae lineae EC est aequale. quod etiam in septima propositione secundi libri demonstratum est. & quoniam numeri LNM sunt dati, & quadrata OH CE data erunt, & rectangulum HC, atque eius duplum. ergo & quadratum FK, & eius latus EC dabitur. quod demonstrare oportebat.



9. huius.

8. octaui.

OPERATIO.

Numeros respondentes quadratis datarum linearum simul iungemus, & ab eo, qui factus est, auferemus duplum numeri, qui inter ipsos medius proportionalis interijcitur. relinquetur enim


quadratum, cuius radix erit recta linea, quam querimus. atque hęc eſt radicum quadratarum ſubtractio, quam dicunt. Vt ſi à radice 27 auferenda ſit radix 3; iungemus 27 cum 3 fient 30, à quo auferemus duplum numeri medij proportionalis inter 3, et 27 qui eſt 9, videlice 18, & relinquentur 12, cuius radix eſt ea, quam quęrimus. eodem modo & ſpaciorum mediorum inęqualium, quae commenſurabilia ſint, differentia inuenietur. ſi uero ab aliqua rationali auferenda ſit alia minor, quae ipſi longitudine ſit incommenſurabilis. vt ſi à Ɽ 5 auferre velimus Ɽ 3, dicemus Ɽ 5 dēpta Ɽ 3, vel vtemur hac voce minus, vt nunc ſolent, hoc modo Ɽ. 5 minus Ɽ 3, & Ɽ 6 minus Ɽ 4, quas Euclides appellat apotomas, Campanus et recentiores reſidua, ſeu reciſa.


Si igitur recta linea AB ſit Ɽ 3, & recta BC Ɽ 12, erit ex ante demonſtratis in primo antecedentium theorematum, rectangulum AC Ɽ 36, hoc eſt 6. & rurſus ſi AB ſit Ɽ 8, & BC Ɽ 18, erit AC rectangulum Ɽ 144, hoc eſt 12.

THEOREMA XVIII. PROPOSITIO XXI.

Si rationale ad rationalem applicetur, latitudinem efficit rationalem, & ei, ad quam applicatum eſt, lōgitudine cōmenſurabilē.

Rationale enim AC ad rationalem ſecūdum aliquem rurſus dictorum modorū applicetur, latitudinem faciens B C. Dico BC rationalem eſſe, & ipſi ab longitudine commenſurabilē. Deſcribatur enim ex AB quadratum A D. ergo A D rationale eſt: ſed & rationale eſt A C. ergo A D ipſi AC eſt commenſurabile. atque eſt vt D A ad AC, ita DB ad BC. commenſurabilis igitur eſt DB ipſi BC. eſt autem DB æqualis BA. quare AB ipſi BC commenſurabilis eſt. ſed AB eſt rationalis. rationalis igitur eſt & BC, & ipſi BA longitudine commenſurabilis. ſi igitur rationale ad rationalem applicetur; & reliqua. quod oportebat demonſtrare.





45. primi.

Ex lēma. 2. ad 20. huius 10. huius.


6. diffi.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit ſpacium AC 6. & recta linea AB Ɽ 3. erit ex 2 theoremate premiſſorum CB Ɽ 12, quae ipſi Ɽ 3 longitudine eſt commenſurabilis. eſt enim ipſius dupla. rurſus ſit AC 12, & recta linea AB Ɽ 8, erit CB Ɽ 18. atque eſt Ɽ 18 ad Ɽ 8, ut 3 ad 2. nam ſi Ɽ 18 diuidatur per Ɽ 8 proueniet Ɽ 2 $\frac{1}{4}$, videlicet Ɽ $\frac{9}{4}$, quae eſt. $\frac{1}{2}$

LEMMA. I.

Inuenire duas rationales potentia ſolum commenſurabiles.



Exponatur rationalis A, & duo numeri B C non habētes proportionem, quam quadratus ad quadratum: & fiat vt B ad C, ita quadratum ex A ad quadratum ex D. erunt igitur ex ijs, quę oſtenſa ſunt A D potentia ſolū cōmenſurabiles.


Corol. 6. huius.

LEMMA. II.

Recta linea, quæ poteſt irrationale ſpacium, irrationalis eſt.

Poſsit

Posſit enim recta linea A ſpacium irrationale, hoc eſt quadratum, quod fit ab A irrationali ſpacio ſit æquale. Dico A irrationalem eſſe. ſi enim ſit rationalis, erit quod ab ipſa fit quadratum rationale; ſic enim in diffinitionibus ponitur. atqui rationale non eſt. ergo A irrationalis ſit neceſſe eſt. quod demonſtrare oportebat.




Diffi. 8.

THEOREMA XIX. PROPOSITIO. XXII.

Quod rationalibus potentia ſolum commenſurabilibus rectis lineis continetur rectangulum irrationale eſt: & recta linea ipſum potens eſt irrationalis. vocetur autem media.

Rationalibus enim potentia ſolum commenſurabilibus rectis lineis AB BC contineatur rectangulum AC. Dico rectam lineam, quæ ipſum poteſt, irrationalem eſſe. vocetur autem media, ſeu medialis. deſcribatur enim ex A B quadratum AD. ergo AD rationale eſt. Et quoniam AB incommenſurabilis eſt ipſi BC longitudine, potentia enim ſolum ponuntur commenſurabiles, atque eſt AB æqualis B D. incommenſurabilis igitur eſt DB ipſi BC longitudine. eſt autem vt DB ad BC, ita DA ad AC. ergo DA ipſi A C eſt incommenſurabile. ſed DA rationale eſt. irrationale igitur eſt AC. Quare & recta linea, quę ipſum AC poteſt, videlicet quę poteſt quadratum ipſi æquale eſt irrationalis. vocetur autem media; propterea quòd ipſius quadratum eſt æquale rectangulo, quod AB BC continetur, & ipſarum AB BC media ſit proportionalis. quod demonſtrare oportebat.




Diffi. 10.

Diffi. 11.

SCHOLIVM. I.

Media eſt irrationalis, quæ poteſt ſpacium contentum rationalibus potentia ſolum commenſurabilibus.

Rationalibus enim potentia ſolum commenſurabilibus rectis lineis A B ſpacium contineatur. oſtendendum eſt huiuſmodi ſpacium irrationale eſſe. ſumatur enim ipſarum A B media proportionalis C. ergo quod fit ex AB eſt æquale quadrato ex C; ac propterea C poteſt rectangulum, quod ipſis AB continetur. eſt igitur vt A ad B, ita quadratum ex A ad id, quod ex C quadratum. nam vt prima ad tertiam, ita quadratum, quod fit ex prima ad quadratum ex ſecunda, quod demonſtratum eſt in corollario 20 ſexti elementorum. incommenſurabilis autem eſt A ipſi B longitudine. ergo & quadratum ex A quadrato ex C eſt incommenſurabile. ſed quadratū ex A rationale eſt. irrationale igitur eſt quadratum ex C, hoc eſt rectāgulum, quod rectis lineis A B continetur. ergo C eſt irrationalis. media autem idcirco vocatur, quòd irrationalis exiſtens ipſarum A B media eſt proportionalis.



Diffi. 11.

SCHOLIVM. II.

Ex hoc theoremate colligitur mediam, quæ una eſt irrationalium, in geometrica analogia conſiderari: media enim eſt proportionalis iuxta geometricam analogiam inter rationales potentia ſolum commenſurabiles.

&


& recta linea ipsũ potẽs est media. si enim quod extremis cõtinetur æqua
17.sexti. *le est quadrato, quod fit à media, tres rectæ lineæ proportionales sunt.*

F. C. COMMENTARIVS.

Sciendum est spacium illud irrationale, quod potest media linea, medium appellari.
Sit recta linea AB 2; & recta BC Rx 8. erit rectangulum AC Rx 32, quod irrationale est, & medium dicetur. recta autem linea ipsum potens est Rx Rx 32, quæ media appellatur.

LEMMA.


Si sint duæ rectæ lineæ, erit vt prima ad secundam, ita quadratum, quod fit à prima ad rectangulum, quod duabus rectis lineis continetur.



Sint duæ rectæ lineæ FE EG. Dico vt FE ad EG, ita esse quadratum ex FE ad FEG rectangulum. describatur ex FE quadratum DF, & GF cõ
1.sexti. pleatur. Quoniam igitur est vt FE ad EG, ita DF ad FG; atque est DF quidem quadratum ex FE; FG vero, quod DE EG continetur, hoc est rectangulum FEC: erit vt FE ad EG, ita quadratum ex FE ad FEG rectangulum. similiter autem & vt rectangulum GEF ad quadratum ex EF, hoc est vt GF ad FD, ita est GE ad EF.

THEOREMA XX. PROPOSITIO. XXIII.

Quod fit à media ad rationalem applicatum, latitudinem efficit rationalem, & ei, ad quam applicatum est, longitudine incommensurabilem.



Sit media quidem A, rationalis autem CB,
45.primi. & ad CB ei, quod fit ex A æquale spacium applicetur BD, latitudinem faciens CD. Dico CD rationalem esse, & ipsi BC longitudine incommensurabilem. Quoniam enim media est
Ex antecedenti. A, potest spacium contentum rationalibus potentia solum commensurabilibus. posit GF: sed potest & BD. æquale igitur est BD ipsi GF. atque est æquiangulum. æqualium autem, &
14.sexti. æquiangulorum parallelogrãmorũ latera, quæ sunt circum æquales angulos ex contraria parte sibi ipsis respondent. ergo vt BC ad EG, ita
11.sexti. est EF ad CD. est igitur & vt quadratum ex BC ad quadratum ex EG, ita quadratum ex EF ad id, quod ex CD quadratum. sed quadratum ex BC commensurabile
1.pars 10.huius. est quadrato ex EG; vtraque enim ipsarum est rationalis. commensurabile igitur est & quadratum ex EF quadrato ex CD. est autem quadratum ex EF rationale. ergo & rationale est quadratum ex CD; ac propterea recta linea CD est rationalis. itaq; quoniam FE incommensurabilis est ipsi EG longitudine; potentia enim solum cõ
Ex antecedente lemmate. mensurabiles sunt; vt autem FE ad EG, ita quadratum ex EF ad FEG rectangulũ: erit quadratum ex EF incommensurabile rectangulo FEG. sed quadrato quidem
* ex EF commensurabile est quadratum ex CD; rationales enim sunt potentia, vt ostẽsum est. ergo quadratum ex CD rectangulo FEG est incommensurabile. rectangulo autem FEG commensurabile est, quod DC CB continetur; sunt enim quadrato

ex A

ex A æqualia.incommenſurabile igitur eſt,& quadratum ex CD rectangulo DCB. 13.huius.
ſed vt quadratum ex CD ad DCB rectangulum,ita eſt DC ad CB.ergo DC ipſi CB incommenſurabilis eſt longitudine.& ob id DC eſt rationalis,& ipſi C B longitudine incommenſurabilis.quod oportebat demonſtrare.

F. C. COMMENTARIVS.


Rationales enim ſunt potentia] *hoc eſt potentia commenſurabiles: rationales enim commenſurabiles ſunt,vt in Scholio ante vigeſimam huius demonſtratur. & quamquam hæ voces longitudine,& potentia magna ex parte referantur ad commenſurabilitatem, & incommenſurabilitatem,tamen aliquando etiam ad rationalitatem referri ex hoc loco perſpicuum eſt. quod nonnulli negarunt.* *

Sit quadratum ex A ℞ 40,CB vero ſit 2.ſi igitur ad CB applicetur ℞ 40,latitudinem faciet ℞ 10.rurſus ſi CB ſit ℞ 5.& ad ipſam applicetur ℞ 40, erit latitudo, quam facit ℞ 8 ex 2. theoremate præmiſſorum.

THEOREMA XXI. PROPOSITIO XXIIII.

Mediæ commenſurabilis,media eſt.

Sit media A, & ipſi A commenſurabilis ſit B.Dico & B mediam eſſe.Expo natur enim rationalis CD,& qnadrato quidem ex A æquale ad CD applicetur ſpacium rectangulum CE, latitudinem efficiens ED. rationalis igitur eſt ED,& ipſi CD longitudine incommenſurabilis.quadrato autem ex B æquale ad CD applicetur ſpacium rectangulum CF, latitudinem efficiens D F. Quoniam igitur A commenſurabilis eſt ipſi B,erit quadratum ex A quadrato ex B commenſurabile. ſed quadrato quidem ex A æquale eſt rectangulum EC; quadrato autem ex B æquale CF. commenſurabile igitur eſt rectangulum EC rectangulo CF.atque eſt vt EC ad CF, ita ED ad DF.ergo ED ipſi DF longitudine eſt commenſurabilis. eſt autem ED rationalis,& incommenſurabilis ipſi DC longitudine. Ergo & DF rationalis eſt, & ipſi DC longitudine incommenſurabilis, rationales igitur ſunt CD DF potentia ſolũ commenſurabiles.quod autem rationalibus potentia ſolum commenſurabilibus rectis lineis continetur rectangulum irrationale eſt; & recta linea ipſum potens eſt irrationalis: vocetur autem media.ergo recta linea, quę poteſt rectangulum C D F eſt media. ſed B poteſt rectangulum CDF.quare B media erit.



45.primi. Ex antecedente. cor.9.huius 13.huius. 22.huius.

COROLLARIVM.

Ex hoc manifeſtum eſt ſpacium medio ſpacio commenſurabile, medium eſſe.poſſunt enim ipſa rectæ lineæ, quæ ſunt potentia commenſurabiles, quarum altera media eſt. ergo & reliqua media erit. quemadmodum autem & in rationalibus dictum eſt, ita & in medijs dicemus,rectam lineam mediæ longitudine commenſurabilem dici mediam, & ipſi commenſurabilem non ſolum longitudine, ſed & potentia; vniuerſe enim quę longitudine commenſurabiles ſunt, etiam potentia ſunt commenſurabiles.ſi vero mediæ commenſurabilis quædam recta linea fuerit potentia, ſi- *


quidem

quidem etiam longitudine, dicuntur & ſic medię & longitudine, & potentia commenſurabiles. ſi autem potentia ſolum, dicuntur mediæ potentia ſolum commenſurabiles.

F. C. COMMENTARIVS.

Ex hoc manifeſtum eſt ſpacium medio ſpacio commenſurabile medium eſſe.

Sit ſpacium medium A, & ipſi commenſurabile ſit alterum ſpacium B. Dico B medium eſſe. Exponatur enim rationalis CD, & ad ipſam applicetur ſpacium rectangulum C E ſpacio A aequale, quod latitudinem 25. huius. *faciat ED. erit E D. rationalis, & ipſi C D longitudine incommenſurabilis. Rurſus ad eãdem C D applicetur aliud ſpacium rectangulum C F, aequale ſpacio B, latitudinemq; faciens D F. Quoniam igitur ſpacium A eſt cõmenſurabile ſpacio B; eſtq; ſpacio quidem A aequale rectangulum C E; ſpacio autem B aequale rectangulũ C F: rectangulum C E rectangulo C F commenſurabile erit. Vt autem E C ad C F, ita eſt E D ad D F. ergo & E D ipſi D F longitudine eſt commenſurabilis. ſed E D rationalis eſt, & ipſi C D incommenſurabilis longitudine. ergo & D F rationalis, & ipſi C D longitudine eſt incõmenſurabilis. ſunt igitur C D D F rationales, & poten-*




25. huius. *tia ſolum commenſurabiles. ergo rectangulum C F, quod ipſis continetur, irrationale eſt, & medium: ac propterea ſpacium B ipſi aequale, medium ſit neceſſe eſt. quod oportebat demonſtrare.*

SCHOLIVM.


Media duplex eſt, videlicet potens quod rationalibus potentia ſolum commenſurabilibus continetur, & quæ mediæ eſt commenſurabilis. poſtquam autem oſtendiſſet mediam eſſe, quę poteſt id quod rationalibus potentia ſolum commenſurabilibus continetur, indigebat hoc theoremate ad ea, quę ſequuntur. oportet enim primum oſtendere aliquas eſſe commenſurabiles medias, deinde inquirere quale ſpacium illud ſit, quod ipſis comprehenditur.

THEOREMA XXII. PROPOSITIO XXV.



Quod medijs longitudine commenſurabilibus rectis lineis continetur rectangulũ medium eſt.

Medijs enim longitudine commenſurabilibus rectis lineis AB BC contineatur rectangulum AC. Dico A C medium eſſe, deſcribatur enim ex AB quadratum A D. ergo AD medium eſt. & quoniam commenſurabilis eſt AB ipſi BC longitudine, æqualis autem AB ipſi B D; erit DB ipſi BC longitudine commenſurabilis. quare & DA commenſurabile eſt ipſi AC. ſed A D eſt medium. ergo & AC medium erit. quod demonſtrare oportebat.



Ex antecedẽte coroll.

F. C.


F. C. COMMENTARIVS.

Quæ de rationalibus ſupra demonſtrata ſunt, eadem & de mediis demonſtrabuntur.

THEOREMA. I.

Quod datis duabus mediis, vel media & rationali cõtinetur rectãgulũ datũ erit.


Datis enim duabus mediis, vel data media, & rationali AB AD contineatur rectangulum AC. Dico AC datum eſſe. ſint primum AB AD mediae, & ſint ex ipſis quadrata AF CG. erunt ea irrationalia, quæ media appellantur, habeant autem inter ſe proportionem, quam H ad K. & H quidem ſe ipſum multiplicans faciat L, K vero ſe ipſum multiplicans faciat M, & L multiplicans M ipſum N faciat, cuius N radix ſit O; & rurſus ipſius O ſit radix P. Quoniam igitur tres magnitudines LOM deinceps ſunt proportionales, ſunt & earũ radices HPK, & HPK deinceps proportionales erũt. Sed quadratum FA ad rectangulum AC eſt vt rectãgulum AC ad CG quadratum. quod ſuperius demonſtratum eſt: quadratum autem FA ad quadratum CG eſt, vt H ad K. ergo & quadratum FA ad rectangulum AC erit, vt H ad P. et ſunt HP datæ, et datum FA quadratum. rectangulum igitur AC datum ſit neceſſe eſt. ſed ſit AB media, et AD rationalis, vel contra AB rationalis, & AD media; et ex ipſis rurſus fiunt quadrata AF CG, quorum alterum medium erit, alterum rationale. et iiſdem conſtructis ſimiliter demonſtrabitur rectangulum AC datum eſſe. quod demonſtrare oportebat.



2. Datorum Euclid.

OPERATIO.


Numeros ad quadratos quadratorum reductos inter ſe multiplicabimus, & eius quæ producitur radix radicis erit rectãgulum, quod datis rectis lineis continetur: atque hoc eſt multiplicatio radicum radicum inter ſe, quam dicunt. Vt ſi AB ſit Bx Bx 5 AD Bx Bx 3, multiplicabimus 5 per 3 fient 15, & Bx Bx 15 erit id, quod ex datis rectis lineis inter ſe ductis producitur. ſi vero AB ſit Bx Bx 5, AD 2, quadratũ quadratipſius 2, videlicet 16 per 5 multiplicabimus, fient 80, & Bx Bx 80 erit ea, quæ ex eorũ multiplicatione oritur. denique ſi AB ſit Bx 2, & AD Bx Bx 5, multiplicabimus quadratum ipſius 2, hoc eſt 4 per 5, & producti accipiemus radicẽ radicis, erit Bx Bx 20 ea, quam inquirimus.




THEOREMA II.

Si ad datum mediam applicetur ſpacium datum, latitudo, quam facit, data erit.

Sit data media AB, et ſpacium datum E, quod ad ipſum AB applicatum latitudinem faciat BC. Dico BC datam eſſe. vel igitur ſpacium E rationale eſt, vel irrationale, quod




medium appellatur. ſit primum irrationale, ac medium, habeatq́; quadratum ipſius AE ad ſpacium E proportionem eam, quã habet H ad K; et H quidem ſe ipſum multiplicans faciat L: K vero ſe ipſum multiplicans faciat M, habebit L ad M duplam proportionem eius, quam habet latus ad latus, hoc eſt H ad K. Itaque fiat vt L ad M, ita recta linea AB ad aliam rectam P: et inter AB, et P ſumpta media proportionali, Q, habebit AB ad P duplam proportionem eius, quam habet ad Q. ergo AB ad Q ita erit, vt H ad K. rurſus inter AB et Q ſumatur media proportionalis R. quare vt AB ad Q, ita erit quadratum ex AB ad quadratum ex R. quadratum igitur ex AB ad quadratum ex R eſt vt H ad K. ſed vt H ad K, ita erat quadratum ex AB ad 9. quinti. *ſpacium E. ergo quadratum ex R ſpatio E eſt aequale. applicetur ad rectam lineam AB parallelogrammum rectãgulum AC, aequale quadrato ex R, quod et ſpacio E aequale erit. et ex AB AD fiant AF, CG quadrata; numerorum autem LM inueniatur tertius proportionalis N, cuius radix ſit O. Quoniam igitur numeri LMN deinceps ſunt proportionales, et H K O deinceps proportionales erũt. atque eſt vt quadratum FA ad rectangulum AC, ita rectangulum AC ad CG quadratum. quare ſimiliter ac ſuperius demonſtrabitur rectangulum AC ad quadratum CG ita eſſe, vt K ad O. ergo et quadratũ CG, et eius radix BC data erit, videlicet latitudo, quam quærimus. non alia ratione demonſtrabimus, ſi ſpacium E rationale fuerit, latitudinem BC datam eſſe. quod oportebat demonſtrare.*



OPERATIO.

Numeris ad quadratos quadratorum redactis, numerum à quo ſpacium denominatur, diuidemus per alterum numerum; et eius, qui exibit, radix radicis erit latitudo, quam facit ſpacium ad rectam lineam applicatum; et hęc eſt radicum inter ſe diuiſio, quam dicunt, vt ſi dividenda ſit Rꝛ 6 per Rꝛ Rꝛ 3, multiplicabimus 6 in ſe ipſum, fient 36, et diuidemus 36 per 3, exibunt 12, et Rꝛ Rꝛ 12 erit, quae ex earum diuiſione oritur. ſi vero diuidere oporteat 3 per Rꝛ Rꝛ 3, reducemus 3 ad quadratum quadrati, et fient 81, diuiſiſq́; 81 per 3 exibunt 27, cuius radicis radix eſt ea, quam quærimus.



THEOREMA III.

Quæ ex duabus datis medijs lõgitudine cõmẽſurabilibus cõponitur recta linea, data erit.

Ex duabus enim datis medijs longitudine commenſurabilibus AB BC componatur recta linea AC. Dico AC datam eſſe. ſit quadratum rectae linae AB ad quadratũ ipſius BC, vt L ad M, et L quidem ſe ipſum multiplicans faciat N; M vero ſe ipſum multiplicans faciat O. et quoniam AB BC longitudine commenſurabiles

ſunt,

ſunt, earum quadrata L M, & rurſus quadratorum quadrata N O inter ſe proportionem habebunt, quam quadratus numerus ad quadratum numerum. ergo inter ipſos N O cadet vnus medius proportionalis numeris. cadat, ſitq; P, cuius radix Q. & ex AC deſcripto quadrato A C D E, & reliqua figura completa, quemadmodum ſuperius, ſimiliter demonſtrabitur quadratum AG ad rectangulum GC eſſe, vt L ad Q, & rectangulum GE ad quadratum GD, vt Q ad M; & denique quadratum AG ad totum AD quadratum, vt L ad compoſitum ex L, & M vnà cum duplo ipſius Q. quòd cum dati ſint L Q M, & compoſitum ex ipſis dabitur. ergo & AD quadratum, & eius radix AC data erit. quod oportebat demonſtrare. 9 huius.


OPERATIO.

Magnitudines reſpondentes quadratis rectarum linearum ſimul coaceruabimus vnà cum duplo mediae proportionalis, & huius cõpoſiti radix erit recta linea, quę ex duabus datis conſtat; atque hęc eſt Bx Bx inter ſe additio, quam vocant, vt ſi Bx Bx 5 addenda ſit Bx Bx 80, iungemus ex ante demonſtratis Bx 5 cum Bx 80, & cum duplo Bx 20, quae faciunt Bx 405, cuius radix, videlicet Bx Bx 405 eſt recta linea, quae ex earum additione producitur. Quòd ſi duae, vel plures mediae lnngitudine incommenſurabiles ſibi ipſis addendae ſint, vel etiam rationales, & mediae vtemur eadem voce plus, vt in rationalibus dictum eſt, hoc modo Bx Bx 5 plus Bx Bx 3, vel Bx Bx 2 plus Bx Bx 3, plus Bx Bx 5, vel Bx 2 plus Bx Bx 6, vel 3 plus Bx 5 plus Bx Bx 6. & ſic in alijs.

THEOREMA IIII.

Duarum datarum mediarum, quæ inæquales ſint, & longitudine commenſurabiles, differentia data erit.

Sint duae datae mediae inęquales, & longitudine commenſurabiles AB AC, quarum differentia ſit BC. Dico BC datam eſſe. ſit quadratum rectae lineae AB ad quadratum ipſius AC, vt L ad M. & ſit rurſus ipſius L quadratum N, & ipſius M quadratum ſit O. habebunt N O inter ſe proportionem, quam quadratus numerus ad quadratum numerum. quare inter eos cadet vnus medius proportionalis. cadat, & ſit P, cuius radix Q. & ex AB AC deſcriptis quadratis R H AD, & figura completa, quemadmodum ſuperius, ſimiliter demonſtrabimus quadratum R H ad rectangulum H C eſſe, vt L ad Q; & rectangulum H C ad quadratum C E, vt Q ad M. & preterea duo quadrata R H AD aequalia eſſe duplo rectanguli H C & quadrato F K. ergo ſi ab ipſis L N auferatur duplum ipſius Q, reliquum erit id, quod quadrato F K reſpondet. datae autem ſunt L Q M magnitudines, ergo & quadratum F K, atque eius radix B C dabitur. quod demonſtrare oportebat.



N 5. P 45. O 405.

L Bx 5. Q Bx 45. M Bx 405.

A Bx Bx 5 B. A Bx Bx 405 C.

OPERATIO.

Magnitudines reſpondentes quadratis rectarum linearum ſimul iungemus, et ab ea, quae facta eſt, auferemus duplam mediae proportionalis, quae inter ipſas interijcitur: relinquetur enim quadratum, cuius radix erit differentia, quam quęrimus; atque hec eſt Bx Bx ſubtractio, quam appellant. vt ſi à Bx Bx 405 auferenda ſit Bx Bx 5, iungemus ex ante demonſtratis Bx 5 cum Bx 405, fient Bx 500, à qua auferamus duplum Bx 45, hoc eſt Bx 180, relinquetur Bx 80. ergo BC erit Bx Bx 80. At ſi ab aliqua media auferenda ſit alia minor, quae longitudine ſit ipſi incommenſurabilis, vel à media rationalis, vel contra à rationali media, vtemur eadem voce minus, vt in rationa-


libus dicta est hoc modo R R 5 *minus* R R 3, *vel* R R 11 *minus* R R 3, *vel* R R 20 *minus* 2, *vel* R 6 *minus* R R 30, *vel* 3 *minus* R R 40. *et ita in reliquis.*


Itaque si mediae lõgitudine cõmẽ sũrabiles sint AB BC videlicet R R 32, *et* R R 2. *erit ex prima antecedentium rectangulum quod ipsis continetur* R R 64, *hoc est* R 8; *sunt enim* R R 32 *et* R R 2 *longitudine commensurabiles, videlicet vt 2 ad 1. nam si* R R 32 *dividatur per* R R 2 *prouenit* R R 16, *hoc est 2.*

THEOREMA XXIII. PROPOSITIO. XXVI.

Quod medijs potentia solum commensurabilibus rectis lineis continetur rectangulum, vel rationale est, vel medium.

Medijs enim potentia solum commensurabilibus rectis lineis A B BC contineatur rectangulũ A C, Dico AC vel rationale esse, vel medium. describantur enim ex AB BC quadrata AD BE. vtrumque igitur ipsorum A D BE medium est. exponatur rationalis FG, & ipsi quidem AD æquale ad FG applicetur parallelogrammum rectangulum GH, latitudinem faciens FH; ipsi vero AC æquale ad HM applicetur rectangulum M K, latitudinem faciens HK; & insuper ipsi BE æquale similiter ad KN applicetur NL, latitudinẽ faciens KL. In recta igitur linea sunt FH HK KL. Quoniam igitur medium est vtrũque ipsorum AD BE; atque est AD quidem æquale ipsi GH, BE vero ipsi NL, erit & vtrumque ipsorum G H NL medium, & ad rationalẽ FG applicata sunt. ergo & vtraque ipsarũ FH KL est rationalis, & ipsi FG longitudine incommensurabilis. & quoniam cõmensurabile est AD ipsi BE, erit & GH ipsi NL commensurabile. est igitur & vt GH ad NL, ita FH ad K L. ergo FH ipsi K L est commensurabilis longitudine; ac propterea FH KL rationales sunt longitudine commensurabiles. rationale igitur est rectangulum, quod FH KL continetur. et quoniam BD quidem ipsi B A est æqualis; X B uero ipsi B C, erit vt D B ad BC, ita A B ad BX. sed vt D B ad BC, ita DA quadratum ad rectangulum A C: vt autem A B ad BX, ita AC rectãgulum ad quadratum C X. est igitur vt XC ad CA, ita CA ad A D: æquale autem est AD ipsi GH, & AC ipsi MK, & CX ipsi NL. quare vt GH ad M K, ita MK ad NL. & vt igitur FH ad HK, ita HK ad KL; ideoq; quod FH KL continetur est æquale quadrato, quod fit ex HK. est autem quod continetur FH KL rationale. ergo & rationale est quadratum ex HK; ac propterea recta linea HK rationalis. & si quidem HK commensurabilis est ipsi HM, hoc est ipsi FG longitudine, erit rectangulũ NH rationale. si vero HK est incõmensurabilis ipsi FG lõgitudine, KH HM rationales erunt potentia solum commensurabiles: & ob id rectangulum HN medium erit. ergo HN vel rationale est, vel medium. sed HN est æquale ipsi A C. quare AC vel rationale, vel medium est. quod igitur medijs potentia solum commensurabilibus rectis lineis continetur rectangulum vel rationale est, vel mediũ, quod oportebat demonstrare.





21. huius. 45. primi. 24. primi. 23. huius. 7. sexti. 10. huius. 7. sexti. Conuertendo. 17. sexti. 20. huius. 21. huius.

SCHOLIVM.

Admirationẽ dignum est triadis vel ternarij vim, ac facultatem ita potentem esse, vt etiam irrationalium potestatem definiat, & ad illorum vsque extrema permeet. præterea & illud mirum est vnamquãque

irrationalitatis

irrationalitatis ſpeciem ab aliqua madietate omnino determinari vel Geometrica, vel Arithmetica, vel Muſica. porrò anima ipſa proxime accedens ad magnitudinum contemplationem pro ea, quam in ſe habet, rationis facultate videtur & omnia determinare, quæ in magnitudinibus determinata non ſunt, & ipſam analogiæ infinitatem his tribus vinculis cohercere. Sciendum & illud eſt, nomen commune mediæ in ea, quæ magis eſt particularis, natura poſitum eſſe. nam & quæ poteſt ſpacium contentum rationalibus longitudine commenſurabilibus, media omnino eſt rationalium illarum; & quæ poteſt ſpacium rationali, & irrationali contentum. attamen neutram harum appellat mediam, ſed Media.

quę poteſt ante dictum ſpacium. Illud quoque animaduertendum eſt, Euclidem vbique potentias denominatiue à potentibus appellare; rationales quidem à rationali, medium autem à media, & contemplationem, quæ circa medias verſatur, ſimilem facere rationalibus. etenim has vel longitudine, vel potentia ſolum commenſurabiles, quemadmodum illas eſſe dicit. & ſpacium quidem, quod mediis longitudine commenſurabilibus continetur, medium eſſe, quemadmodum illic ſpacium rationalibus contentum rationale. ſpacium vero contentum mediis potentia ſolum cõmenſurabilibus quandoque rationale, quandoque medium; & quod rationalibus potentia ſolum commenſurabilibus continetur, medium eſſe. quare medium quidem tripliciter, rationale vero dupliciter contingit, & videtur ea, quę inter medias longitudine commenſurabiles proportionalis interijcitur, & quæ inter rationales potentia ſolum commenſurabiles omnino media eſſe; quæ vero inter medias potentia ſolum commenſurabiles interdum quidem rationalis, interdum vero media. ideoq; & incommenſarabilis potentia interdum rationalis, interdum media eſt. duę enim mediæ potentia commenſurabiles eſſe poſſunt, quemadmodum & duę rationales potentia commenſurabiles. exiſtimandum igitur eſt analogiam cauſſam eſſe ortus contentorum ſpaciorum: vt poteque inter extrema; hoc eſt vel inter duas rationales mediam, vel inter duas medias rationalem conſtituit; & totum nexum quandoque ſimilem facit extremis, quandoque ipſis diſſimilem interijcit.

Potentias denominatiue a potẽtibus appellat Euclides.

Contẽplatio quæ circa medias ſimilis eſt ei, quæ circa rõnales verſatur.

Medium tripliciter, rationale uero dupliciter contingit.

F. C. COMMENTARIVS.


Sint mediae potentia ſolum commenſurabiles AE EC, & ſit AB ℞℞ 54, & BC ℞℞ 24, erit rectangulum ipſis contentum ℞℞ 1296, videlicet 6, quod eſt rationale. Rurſus ſint mediae potentia ſolum commenſurabiles ℞℞ 128, & ℞℞ 22, rectangulum, quod ipſis continetur, erit ℞℞ 9216, videlicet ℞ 96, quod eſt medium. At vero ℞℞ 54, & ℞℞ 24: itemq; ℞℞ 128, & ℞℞ 72 eſſe potentia ſolum commenſurabiles patet tum ex 28, & 29, huius, tum ex eo, quòd ſi ℞℞ 54 per ℞℞ 24 diuidatur, proueniet ℞℞ $\frac{9}{4}$, hoc eſt ℞ $\frac{3}{2}$. erit igitur ℞℞ 54 ad ℞℞ 24, vt

24, vt ℞ 3 ad ℞ 2. Rursus si ℞℞ 128 diuidatur per ℞℞ 72, prouenit ℞℞ $\frac{4}{1}$. quare ℞℞ 128 ad ℞℞ 72 erit vt ℞ 4 ad ℞ 3.

THEOREMA XXIIII. PROPOSITIO XXVII.

Medium non superat medium rationali.

Si enim fieri potest, medium AB superet medium AC rationali DB. & exponatur rationalis EF, atque ipsi quidem AB æquale ad EF applicetur parallelogrammum rectangulum FH, latitudinem faciens EH: ipsi vero AC æquale auferatur FG. reliquum igitur BD reliquo KH est æquale. rationale autē est BD. ergo & KH rationale. quoniam igitur medium est vtrumque ipsorum AB, AC; estq; AB æquale FH, & AC æquale FG: erit & vtrumque ipsorum FH FG medium: & ad rationalem EF applicata sunt. rationalis igitur est vtraque earum HE EG, & ipsi EF longitudine incommensurabilis. & quoniam rationale est DB, et ipsi KH æquale; & KH rationale erit. est autem ad EF applicatum. rationalis igitur est GH, & ipsi EF commensurabilis longitudine. sed & EG est rationalis, & ipsi EF longitudine incommensurabilis. ergo EG incommensurabilis est ipsi GH longitudine. atque est vt EG ad GH, ita quadratum ex EG ad rectangulum, quod EG, GH continetur. incommensurabile igitur est quadratum ex EG rectangulo EGH. sed quadrato quidem ex EG commensurabilia sunt ex EG, GH quadrata. vtraque enim sunt rationalia. rectangulo autem EGH commensurabile est quod bis EG GH continetur; est enim ipsius duplum. ergo quadrata ex EG, GH incommensurabilia sunt ei, quod bis EG, GH continetur. & vtraque igitur, videlicet quadrata ex EG GH, & quod bis continetur EG GH, hoc est quadrātum ex EH, incommensurabilia sunt quadratis ex EG GH. sunt autē rationalia, quę ex EG GH quadrata. irrationale igitur est quadratum ex EH: ac propterea EH est irrationalis. sed & rationalis. quod fieri non potest. non igitur medium superat medium rationali. quod oportebat demonstrare.




23. huius.
21. huius.
Coro. 23. huius.
10. huius.
6. huius.
24. huius.
4. secundi,
17. huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Rationale autem non superare rationale nisi rationali, hoc modo demonstrabitur.

Sint parallelogramma rectangula AB AC rationalia. Dico DB, quo parallelogrammum AB ipsum AC superat, rationale esse. quoniam enim AB AC sunt rationalia, & inter se commensurabilia sunt. atque est tota magnitudo AB ex magnitudinibus AC DB composita vni ipsarum AC commensurabilis. ergo & reliqua DB commensurabilis erit. sed AB est rationale. quare & DB rationale sit necesse est. quod nos ad 23 huius demonstrauimus.




16. huius.

PROBLEMA IIII. PROPOSITIO. XXVIII.

Medias inuenire potentia solum commensurabiles, quæ rationale contineant.

Exponantur

Exponatur duæ rationales potentia ſolum commenſurabiles AB; & ſumatur ipſarum AB media proportionalis C: fiatq; vt A ad B, ita C ad D. quoniã igitur AB rationales ſunt, potentiaſolum commenſurabiles, erit quod ipſis A B continetur rectãgulum,hoc eſt quadratum ex C medium. ergo recta linea C media eſt. & quoniam ut A ad B, ita eſt C ad D; ſuntq; AB potentia ſolũ commenſurabiles: & CD potentia ſolum commenſurabiles erunt. eſt autem recta linea C media.media igitur eſt & D. quare C D mediæ ſunt potentia ſolum cõmenſurabiles. Dico etiam ipſas rationale continere. quoniam enim eſt vt A ad B, ita C ad D, erit permutando vt A ad C, ita B ad D. ſed vt A ad C, ita C ad B. ergo & vt C ad B, ita B ad D. quod igitur ipſis C D continetur quadrato ex B eſt ęquale. rationale autem eſt quadratum ex B. ergo & quod continetur C D rationale erit. Inuentæ igitur ſunt mediæ potentia ſolum commenſurabiles,quæ rationale continent. atque illud eſt.quod fa cere oportebat.



12.sexti. ✻ 22. huius. 10. huius. 14. huius. 17.sexti.


F. C. COMMENTARIVS.

Fiatq; ut A ad B, ita C ad D] *Sit* A 3, *&* B ℞ 6, *erit rectangulum, quod ipſis continetur* ℞ 54, *&* *recta linea C inter ipſas A B media proportionalis, quae ipſum poteſt* ℞℞ 54. *itaque fiat ut A ad B, hoc eſt ut* ℞℞ 81 *ad* ℞℞ 36, *ita C videlicet* ℞℞ 54 *ad aliam, quae ſit D, hoc modo. multiplicetur* 54 *per* 36, *fiet* 1944. *ergo* ℞℞ 1944 *eſt rectangulum, quod continetur* ℞℞ 36, *&* ℞℞ 54 *ex primo antecedentium, quod quidem applicatum ad* ℞℞ 81 *latitudinem faciet* ℞℞ 24 *ex ſecundo eorundem. quare rectangulum contentũ* ℞℞ 81, *&* ℞℞ 24 *eſt aequale ei, quod continetur* ℞℞ 36, *&* ℞℞ 54 *eſt igitur ut* ℞℞ 81 *ad* ℞℞ 36, *ita* ℞℞ 54 *ad* ℞℞ 24. ✻ 16.sexti.

PROBLEMA V. PROPOSITIO. XXIX.

Medias inuenire potentia ſolum commenſurabiles, quæ medium contineant.

Exponantur tres rationales potentia ſolum cõmenſurabiles A B C, ſumaturq; ipſarum A B media proportionalis D: & fiat vt B ad C, ita D ad E. Quoniam igitur A B rationales ſunt, potẽtia ſolum commenſurabiles, erit quod A B continetur rectãgulum,hoc eſt quadratnm ex D medium.ergo D media eſt.& quoniam B C ſunt rationales potentia ſolum commenſurabiles,atque eſt vt B ad C,ita D ad E, rectę lineæ D E potẽtia ſolum commenſurabiles erunt. eſt autem D media.ergo & E media eſt;ac propterea D E mediæ ſunt potetia ſolum commenſurabiles. Dico ipſas etiam medium continere.Quoniam enim eſt vt B ad C,ita D ad E,erit permutando vt B ad D,ita C ad E.vt autem B ad D,ita eſt D ad A.ergo & vt D ad A, ita C ad E.quod igitur A C continetur rectangulum eſt æquale contento D E. eſt autem quod continetur A C medium.ergo & quod continetur D E medium erit. Inuentę igitur ſunt mediæ potentia ſolum commenſurabiles,quæ medium continent, vt facere oportebat.



✻ 22.huius. 19. huius. 24 huius. 16.sexti. 22. huius.

F. C. COMMENTARIVS.


Et fiat vt B ad C,ita D ad E] *Sit A* 4, *B* ℞ 8, *et C* ℞ 6, *erit rectangulum, quod A B continetur* ✻

tinetur ℞ 128, & recta linea D inter ipſas A B media proportionalis ℞℞ 128. fiat igitur vt B ad C, hoc eſt vt ℞℞ 64 ad ℞℞ 36, ita D videlicet ℞℞ 128 ad aliam, quae ſit E. eodem modo, quo ſupra, multiplicetur 128 per 36, fit 4608, & 4608 diuidatur per 64, exeunt 72. erge ℞℞ 72 erit quarta proportionalis A, quam quærebamus.

LEMMA. I.

Inuenire duos numeros quadratos, ita vt qui ex ipſis cõponitur etiã quadratus ſit.

Exponantur duo numeri AB BC, qui vel
A pares ſint, vel impares. & quoniam ſiue à par par auferatur, ſiue ab impari impar, reliquus par eſt; erit AC numerus par. ſecetur AC bifariam in D. ſint autem AB BC uel ſimiles pla-



B ni, vel quadrati, qui & ipſi ſimiles plani ſunt. ergo qui fit ex AB BC vnà cum quadrato ex C D eſt æqualis ei, qui fit ex BD quadrato. atque eſt quadratus, qui fit ex
C AB BC; oſtenſum enim eſt ſi duo ſimiles plani ſe ſe multiplicantes aliquem faciãt, factum quadratum eſſe. Inuenti igitur ſunt duo quadrati numeri, videlicet qui fit ex AB BC, & qui fit ex CD, qui quidem inter ſe compoſiti quadratum numerum faciunt, nempe eum, qui fit ex BD. quod ipſum facere oportebat.

COROLLARIVM.

Et manifeſtum eſt rurſus inuentos eſſe duos numeros quadratos, & qui fit ex BD, & qui ex CD, ita vt ipſorum exceſſus, videlicet qui
D *fit ex AB BC, ſit quadratus; quando AB BC ſimiles plani ſint. Quãdo autem non ſint ſimiles plani, inuenti ſunt duo quadrati & qui fit ex BD, & qui ex CD, quorũ exceſſus, qui ex AB BC nõ eſt quadratus.*


F. C. COMMENTARIVS.

A Et quoniam ſiue à pari par auferatur, ſiue ab impari impar reliquus par eſt] ex 24, & 26 noni libri.

B Ergo qui fit ex AB BC vnà cũ quadrato ex CD eſt æqualis ei, qui fit ex BD quadrato] *Hoc demonſtratur à Barlaam Monacho in theoremate 6 eorum, quae nos ad 15 noni libri appoſuimus.*

C Oſtenſum eſt enim ſi duo ſimiles plani ſe ſe multiplicantes aliquem faciant, factum planum eſſe] *in prima propoſitione noui libri.*

D Quando autem non ſint ſimiles plani, inuenti ſuut] *Sint enim duo numeri AB BC, qui non ſint ſimiles plani, & AC bifariam ſecetur in D. rurſus qui fit ex AB BC vnà cum quadrato ex CD eſt aequalis ei, qui ex BD ex 6 Barlaam Monachi iam dicto. ſed qui fit ex AB BD, non eſt quadratus. ſi enim quadratus ſit, erunt numeri AB BD ſimiles plani. quod non ponitur. quadrati igitur numeri ſunt, qui fiunt ex BD, & DC, quorum exceſſus, qui fit ex AB BC non eſt quadratus.*




LEMMA. II.

Inuenire duos quadratos numeros, ita vt qui ex ipſis componitur non ſit quadratus.

Sit

Sit enim qui ex A B BC quadratus, vt dictum est, & par numerus CA; secetur q; CA bifariam in D. perspicuũ est quadratum ex AB BC vnà cum quadrato ex CD æqualem esse ei, qui fit ex BD quadrato. auferatur vnitas DE. ergo quadratus ex AB BC vnà cum quadrato ex CE minor est quadrato ex BD. Dico igitur quadratum ex AB BC vnà cum quadrato ex CF, quadratum non esse. si enim est quadratus vel æqualis est quadrato ex BE, vel eo minor, nõ autem maior, vt ne vnitas secetur; neue qui ex AB BC vnà cum quadrato ex CD, qui est æqualis quadrato ex BD æqualis sit quadrato ex AB BC vnà cum quadrato ex CE. sit primum, si fieri potest, qui ex AB BC vnà cum quadrato ex CE æqualis quadrato ex BE; & sit GA duplus ipsius DE vnitatis. Quoniam igitur totus AC totius CD est duplus, quorum AG est duplus DE; erit & reliquus CG ipsius GE duplus. ergo GC in pũcto E bifariam secatur; ac propterea qui ex GB BC vnà cum quadrato ex CE æqualis est ei, qui fit ex BE quadrato. sed & qui ex AB BC vnà cum quadrato ex CE æqualis ponitur quadrato ex BE. ergo qui ex GB BC vnà cum quadrato ex CE est æqualis ei, qui ex AB BC unà cum quadrato ex CE; & communi detracto quadrato ex CE concludetur AB ipsi GB æqualis. quod est absurdum. non igitur qui ex AB BC vnà cum quadrato ex CE æqualis est quadrato ex BE. Dico neque quadrato ex BE minorẽ esse. si enim fieri potest, sit quadrato ex BF æqualis, & ipsius DF duplus ponatur HA. concludetur rursus HC duplus CF, ita ut & HC in F bifariam diuidatur; ac propterea qui ex HB BC unà cum quadrato ex CF æqualis sit quadrato ex BF. ponitur autem & qui ex AB BC unà cum quadrato ex CE æqualis quadrato ex FB. ergo sequitur qui ex AB BC unà cum quadrato ex CE æqualem esse ei, qui ex HB BC unà cum quadrato ex CF. quod est absurdum. non igitur qui ex AB BC unà cum quadrato ex CE est æqualis minori, quàm sit quadratus ex BE. ostensum est autem neque ipsi quadrato ex BE, neque maiori eo æqualem esse. ergo qui fit ex AB BC unà cum quadrato ex CE non est quadratus. & cum fieri possit, ut idem pluribus modis ostendatur, unus qui proxime dictus est nobis sufficiat, ne longam tractationem longius producamus.



A

B

C

D

E

F

F. C. COMMENTARIVS.

A Perspicuum est quadratum ex AB BC unà cum quadrato ex CD æqualem esse ei, qui fit ex BD quadrato] *Ex 6. Barlaam Monachi.*

B Non autem maior ut ne unitas secetur] *si enim fieri potest sit maior, vel igitur eius latus est BD, vel minus quàm BD. & si quidem BD, erit totum parti aequale. quod fieri non potest. si vero minus quàm BD, cum sit maius quàm BE, vnitas secabitur. quod itidem fieri non potest.*

C Erit & reliquus CG ipsius GE duplus] *Ex 7 vel 11 septimi libri.*

D Et communi detracto quadrato ex CE concludetur AB ipsi GB æqualis] *Relinquetur enim qui ex AB BC aequalis ei, qui ex GB BC, sed qui ex AB BC ad eum, qui ex GB BC est vt AB ad BG, ex 17 septimi. ergo AB ipsi BG est aequalis. quod est absurdum.*


E Concludetur rursus HC duplus CF.] *Quoniam enim AC ipsius CD est duplus, quorum AH ponitur duplus ipsius DF, erit & reliquus HC reliqui CF duplus.*

F Quod est absurdum] *Est enim qui ex AB BC maior eo, qui ex HB BC, quòd AB sit maior quam BH. & similiter quadratus ex CE maior quadrato ex CF; quoniam AC quàm CF est maior.*

PROBLEMA VI. PROPOSITIO XXX.

Inuenire duas rationales potentia solum commensurabiles, ita vt maior plus possit, quàm minor quadrato rectæ lineæ sibi longitudine commensurabilis.

Exponatur enim quædam rationalis AB, & duo quadrati numeri CD DE, ita vt ipſorum exceſſus CE non ſit quadratus. Deſcribatur autẽ in recta linea AB ſemicirculus AFB: fiatq; vt DC ad CE, ita ex AB quadratum ad quadratum ex AF; & FB iungatur. Quoniam igitur eſt, vt quadratum ex BA ad quadratum ex AF, ita DC ad CE; habebit quadratum ex BA ad quadratum ex AF proportionem eam, quã numerus DC ad CE numerum. ergo quadratum ex BA quadrato ex AF eſt commenſurabile. ſed rationale eſt quadratum ex AB. ergo & quadratum ex AF rationale erit; ac propterea recta linea AF eſt rationalis. & quoniam DC ad CE proportionem non habet, quam quadratus numerus ad quadratum numerum; neque quadratum ex BA ad quadratum ex AF proportionem habebit, quam quadratus numerus ad quadratum numerum. incommenſurabilis igitur eſt recta linea BA ipſi AF longitudine. ergo AB AF rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles. Quòd cum ſit vt DC ad CE, ita quadratum ex BA ad quadratum ex AF, erit per conuerſionem rationis vt CD ad DE, ita quadratum ex AB ad quadratum ex BF. ſed CD ad DE proportionem habet, quam quadratus numerus ad quadratum numerum. ergo & quadratum ex AB ad quadratũ ex BF proportionẽ habebit, quã quadratus numerus ad quadratũ numerũ; & ob id recta linea AB ipſi BF longitudine eſt commenſurabilis. atque eſt quadratum ex AB æquale quadratis ex AF FB. ergo AB plus poteſt, quàm AF quadrato rectæ lineę BF ſibi commenſurabilis longitudine. Inuentæ igitur ſunt duæ rationales potentia ſolum commenſurabiles BA AF, ita vt maior BA plus poſſit, quàm minor AF, quadrato ipſius FB, ſibi longitudine commenſurabilis. quod facere oportebat.



Ex corolla. primi lem. antecedentium.
Per Corol. 6. huius.
6. huius.
diffi. 9. huius
9. huius:
Ex 47. primi, uel ex coroll. ante 15. huius.
9. huius.
47. primi.


SCHOLIVM.

Ex hoc loco inuentionem aggreditur reliquarum irrationalium, ac primum earum, quę per compoſitionem fiunt; præmittit autem theoremata hęc, vtpote ex quibus eiuſmodi irrationalium natura appareat.

PROBLEMA VII. PROPOSITIO XXXI.

Inuenire duas rationales potentia ſolum commenſurabiles, ita ut maior plus poſſit, quàm minor quadrato rectæ lineæ ſibi longitudine incommenſurabilis.

Exponatur rationalis AB, & duo numeri quadrati CE ED, ita vt qui ex ipſis componitur nõ ſit quadratus. atque in recta linea AB ſemicirculus AFB deſcribatur: & fiat vt DC ad CE, ita quadratum ex AB ad quadratum ex AF: & iuncta FB, ſimiliter oſtendemus, vt in antecedente, BA AF rationales eſſe potentia ſolum commenſurabiles. Et quoniam eſt vt DC ad CE, ita quadratum ex BA ad id quod ex AF quadratum; erit per conuerſionem rationis vt CD ad DE, ita quadratum ex AB ad quadratum ex BF. ſed CD ad DE proportionem non habet, quam quadratus numerus ad quadratum numerum. nõ igitur quadratum ex AB ad quadratum ex BF proportionem habebit, quam quadratus numerus ad quadratum numerum




merum. ergo A B ipsi B F longitudine est incommensurabilis. & B A plus potest, quàm A F quadrato rectæ lineæ B F sibi incommensarabilis longitudine. quare A B B F rationales sunt potentia solum commensurabiles, & A B plus potest, quàm A F quadrato rectæ lineæ F B sibi longitudine incommensurabilis.

LEMMA.

Si sint duę rectę lineæ in proportione aliqua, erit vt recta linea ad rectam lineam, ita rectangulum duabus rectis lineis contentum ad quadratum minoris.

Sint duæ rectæ lineæ A B B C in proportione aliqua. Dico vt A B ad B C, ita esse rectangulum ex A B B C ad quadratũ ex B C. describatur enim ex B C quadratum B D E C, & compleatur A D parallelogrammũ. manifestum est ut A B ad B C, ita esse A D parallelogrammum ad parallelogrammum B E. atque est A D quidem, quod A B B C continetur; est enim B C ipsi B D æqualis. B E vero est quadratum ex B C. vt igitur A B ad B C, ita rectangulum ex A B B C ad id, quod ex B C quadratum. quod demonstrare oportebat.




1. sexti.

PROBLEMA VIII. PROPOSITIO. XXXII.

Inuenire duas medias potentia solum commensurabiles, quæ rationale contineant, ita ut maior plus possit, quàm minor quadrato rectæ lineæ sibi longitudine commensurabilis.

Exponantur enim duæ rationales potentia solum commensurabiles A B, ita vt A maior plus possit, quàm B minor, quadrato rectę lineę sibi lõgitudine commensurabilis. & sit rectangulo ex A B æquale quadratum, quod fit à recta linea C. medium autem est quòd ex A B. ergo & quadratum ex C medium erit, & ipsa C media. at quadrato quod fit ex B æquale sit rectãgulum ex C D. rationale autem quod ex B. ergo & rectangulum ex C D est rationale. & quoniam est vt A ad B, ita rectangulum ex A B ad id, quod ex B quadratum; sed rectangulo quidem ex A B æquale est quadratum ex C; quadrato autem ex B æquale rectangulum ex C D: erit vt A ad B, ita quadratum ex C ad id, quod ex C D rectangulum. Sed vt quadratum ex C ad rectangulum ex C D, ita recta linea C ad ipsam D. vt igitur A ad B, ita C ad D. commensurabilis autem est A ipsi B potentia solum. ergo & C ipsi D potentia solũ est commensurabilis. atque est C media. media igitur & D. & quoniam est vt A ad B, ita C ad D, & A plus potest, quàm B quadrato rectæ lineę sibi commensurabilis lõgitudine; & C plus poterit, quàm D quadrato rectæ lineæ sibi longitudine commensurabilis. Inuentę igitur sunt duæ mediæ potentia solum cõmensurabiles C D, quæ rationale continent, & C plus potest quàm D quadrato rectæ lineæ sibi commensurabilis longitudine. similiter autem ostendetur inueniri posse duas medias potentia solum commensurabiles, & continentes rationale, ita ut maior plus possit, quàm minor quadrato rectę lineę sibi incommensurabilis longitudine, quãdo A plus possit, quàm B quadrato rectæ lineę sibi longitudine incommensurabilis.



20. huius.

22. huius.

Ex antecedẽti lemmate.

1. sexti.

10. huius.

24. huius.

15. huius.

*


F. C. COMMENTARIVS.

Similiter autem oſtendetur inueniri poſſe duas medias potentia ſolum commẽ-ſurabiles] *Maneant eadem quae ſupra, & A plus poſſit, quàm B quadrato rectae lineae ſibi longitudine incommenſurabilis. ſimiliter vt ante demonſtrabitur, rectam lineam D mediam eſſe. Et quoniam vt A ad B, ita C ad D, & A plus poteſt, quàm B quadrato rectae lineae ſibi incommenſurabilis longitudine, & C plus poterit, quàm D quadrato rectae lineae ſibi incommenſurabilis longitudine. ergo rurſus inuentae ſunt duae mediae potentia ſolum commenſurabiles C D, rationale continentes, & C plus poteſt quàm D quadrato rectae lineae ſibi longitudine incommenſurabilis.*

Sit A 8, *B* ℞ 28. *erit rectangulũ, quod ipſis cõtinetur* ℞ 1792, *& recta linea C* ℞℞ 1792, *quae media eſt. fiat vt* 8 *ad* ℞ 28, *ita* ℞℞ 1792 *ad aliam, quae ſit D. erit ea* ℞℞ 343. *ergo* ℞℞ 1792 *&* ℞℞ 343 *duae mediae ſunt, potentia ſolum commenſurabiles, quae rationale continent, videlicet* 28. *& maior plus poteſt, quàm minor quadrato rectae lineae ſibi longitudine cõmenſurabilis. nam ſi à quadrato maioris auferatur quadratum minoris, hoc eſt ſi à* ℞ 1792 *auferatur* ℞ 343, *relinquetur* ℞ 567. *& ſunt duae mediae* ℞℞ 1792 ℞℞ 567 *inter ſe longitudine commenſurabiles, videlicet vt* 4 *ad* 3. *ſi enim* ℞℞ 1792 *diuidatur per* ℞℞ 567, *prouenit* ℞℞ 3 $\frac{19}{81}$, *quae eſt* 1 $\frac{1}{3}$, *hoc eſt* $\frac{4}{3}$. *Rurſus ſit A* 8. *B* ℞ 20, *erit rectangulum ipſis contentum* ℞ 80, *& recta linea C* ℞℞ 1280. *fiat ut* 8 *ad* ℞ 20, *ita* ℞℞ 1280 *ad aliam, quae ſit D. erit ea* ℞℞ 125. *ſunt igitur* R R 1280, *&* R R 125 *duae mediae, quae rationale continent, videlicet* 20, *& maior plus poteſt, quàm minor quadrato rectae lineae ſibi longitudine incommenſurabilis. ſed ſit A* 3 *B* ℞ 6, *rectangulum ipſis contentum erit* R 54, *& recta linea C* ℞℞ 54. *Rurſus fiat ut* 3 *ad* ℞ 6, *ita* R R 54 *ad aliã, erit ea* R R 24. *quare* R R 54, *&* R R 24 *ſunt duae mediae potentia ſolum commenſurabiles, quae rationale continent, videlicet* 6; *& maior plus poteſt, quàm minor quadrato rectae lineae ſibi longitudine incommenſurabilis.*

LEMMA

Si fuerint tres rectæ lineę in proportione aliqua, erit ut prima ad tertiam, ita rectangulum contentum prima, & media ad id, quod media, & tertia continetur.




Sint tres rectę lineæ in proportione aliqua AB BC CD. Dico vt A B ad C D, ita eſſe rectangulum contentũ AB BC ad id quod B G CD continetur. Ducatur enim à pũcto A ipſi AB ad rectos angulos AE; ponaturq; AE ipſi BC æqualis; & per E quidem ipſi AD parallela ducatur EG; per BCD vero ducantur BF CH DG parallelæ ipſi A E. quoniam igitur eſt vt AB ad BC, ita AF parallelogrammum ad parallelogrammum B H; ut autem BC ad C D, ita parallelogrammum BH ad ipſum C G: erit ex æquali vt AB ad CD, ita AF parallelogrammum ad parallelogrammum C G. & eſt parallelogrãmum quidem A F, quod AB BC continetur; namque AE eſt æqualis BC; parallegrammum vero CG eſt, quod continetur BC CD; etenim BC ipſi CH eſt æqualis. Si igitur fuerint tres rectæ lineæ in proportione aliqua, erit ut prima ad tertiam, ita rectangulum, quod continetur prima & media ad rectangulum media & tertia cõtentum. quod oportebat demonſtrare.

PROBLEMA IX. PROPOSITIO. XXXIII.

Inuenire duas medias potentia ſolum commenſurabiles, quæ medium contineant, ita ut maior plus poſſit, quàm minor, quadrato rectæ lineæ ſibi longitudine commenſurabilis.

Exponantur

Exponantur tres rationales A B C, potentia ſolum commenſurabiles, ita vt A plus poſsit, quàm C quadrato rectæ lineę ſibi commenſurabilis longitudine: & ſit rectangulo ex ipſis A B æquale quadratum, quod fit ex D. medium autem eſt rectangulum ex AB. ergo & quadratũ ex D medium erit; & recta linea D media. rectangulo autem ex B C æquale ſit rectangulum ex DE. Quoniam igitur eſt vt rectangulum ex AB ad rectangulum ex BC, ita recta linea A ad ipſam C; ſed rectangulo quidem ex A B æquale eſt quod fit ex D quadratum; rectangulo autem ex B C æquale rectangulum ex DE: erit vt A ad C, ita quadratum ex D ad id, quod ex D E rectangulum. ſed ut quadratum ex D ad rectangulum ex DE, ita D ad E. & ut igitur A ad C, ita D ad E. commenſurabilis autem eſt A ipſi C potentia ſolum. ergo & D ipſi E potentia ſolum eſt cõmenſurabilis. atque eſt D media. media igitur & E. itaque qm̃ eſt vt A ad C, ita D ad E; & A plus poteſt, quàm C quadrato rectę lineę ſibi lõgitudine commenſurabilis: & D plus poterit, quàm E quadrato rectę lineę ſibi cõmenſurabilis longitudine. Dico prętera rectangulum ex DE medium eſſe. Quoniam enim rectangulo ex B C æquale eſt, quod ex D E rectangulum; medium aũt eſt quod ex B C. ergo & quod ex D E medium erit. Inuentę igitur ſunt duę mediæ potentia ſolum commenſurabiles DE, quæ medium continẽt, ita vt maior plus poſſit, quàm minor quadrato rectę lineę ſibi longitudine commenſurabilis. Rurſus ſimiliter inuenientur duæ mediæ potentia ſolum commenſurabiles. & medium continentes, ita vt maior plus poſsit, quàm minor quadrato rectæ lineæ ſibi incommenſurabilis longitudine; quando ſcilicet A plus poſsit, quàm C quadrato rectæ lineæ ſibi longitudine incommenſurabilis. quod facere oportebat.



22. huius.

Ex antecedente.

Lem. 25. huius.

24. huius.

15. huius.

22. huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit A 8 B ℞ 48, C ℞ 28, rectangulũ. quod ipſis AB cõtinetur, erit ℞ 3072. & recta linea D ℞℞ 3072, quae eſt media. fiat vt A ad C, ita D ad aliã, quae ſit E. erit E ℞℞ 588. ergo ℞℞ 3072, & ℞℞ 588 duae mediae ſunt potentia ſolũ commenſurabiles, quae medium continent, & maior plus poteſt, quàm minor quadrato rectae lineae ſibi longitudine commenſurabilis. ſi enim à quadrato maioris auferatur quadratum minoris, hoc eſt ſi à ℞ 3072 auferatur ℞ 588, reliqua erit ℞ 972. ſintq; ℞℞ 3072, & ℞℞ 972 duae mediae longitudine inter ſe commenſurabiles, vt 4 ad 3. nã ſi ℞℞ 3072 diuidatur per ℞℞ 972, exibit ℞℞ 3, $\frac{13}{81}$ quae eſt 1. $\frac{1}{3}$ hoc eſt $\frac{4}{3}$. rurſus ſit A 8, B ℞ 48, C ℞ 20, erit D cadẽ, quę ſupra, videlicet ℞℞ 3072. fiat vt A ad C, ita D ad aliam, quae ſit E. erit E ℞℞ 300. ſunt igitur ℞℞ 3072, & ℞℞ 300 duae mediae potentia ſolum commenſurabiles, quae medium continent, & maior plus poteſt, quàm minor quadrato rectae lineae ſibi longitudine incommenſurabilis. ſed ſit A ℞ 6, B ℞ 3, C ℞ 2, erit D ℞℞ 18. fiatq; vt A ad C, ita ℞℞ 18 ad aliã, quae ſit E, erit E ℞℞ 2. ergo ℞℞ 18, & ℞℞ 2 ſunt duae mediae potentia ſolum commenſurabiles, & medium continentes, quarum maior plus poteſt, quã minor, quadrato rectae lineae ſibi incommenſurabilis longitudine.


LEMMA I.

Sit triangulum orthogonium ABC, rectum habens angulum B A C, & ducatur AD perpendicularis. Dico rectangulum quidem contentum C B B D ęquale eſſe quadrato, quod fit ex B A; cõtentum vero B C C D aequale quadrato ex C A; & contentum B D D C aequale quadrato ex

DA: & denique contentum BC AD rectangulo, quod BA, AC continetur, æquale esse.

Quoniam enim in triangulo orthogonio ab angulo recto ad basim perpendicularis ducta est AD, triãgula ABD ADC similia sunt, & toti triangulo ABC, & inter se se. et quoniam simile est ABC triangulum triangulo ABD, erit vt CB ad BA, ita AB ad BD. ergo rectangulũ, quod CB BD continetur quadrato ex AB est æquale. Eadem ratione et rectangulum contentum BC CD æquale est quadrato ex AC, rursus quoniã in triangulo orthogonio ab angulo recto ad basim perpendicularis ducitur, ducta basis partiũ media proportionalis est. quare vt BD ad DA, ita AD ad DC; ac propterea rectãgulum, quod BD DC continetur est æquale quadrato ex AD. Dico & rectangulum contentum BC AD ei, quod BA AC continetur, æquale esse. Quoniam enim, vt dixímus, triangulum ABC triangulo ACD est simile, vt BC ad CA, ita erit BA ad AD. si autem quattuor rectę lineę proportionales fuerint, rectangulum extremis contentum est æquale ei, quod medijs continetur. ergo rectangulum contentum BC AD contento BA AC æquale erit Dico præterea si describamus parallelogrammum rectangulum EC, & ipsum AF compleamus, rectangulum EC ipsi AF æquale esse. vtrũque enim ipsorum duplum est triãguli ABC. atque est rectangulũ quidem EC id, quod BC AD continetur; rectangulum vero AF quod continetur BA AC. At rectãgulum, quod cõtinetur BC AD rectangulo BA AC contento est æquale.


8 sexti. 4. sexti. 17. sexti. 8. sexti. 4. sexti. 16. sexti.



LEMMA II.

Si recta linea in partes inæquales secetur, erit vt maior pars ad minorem, ita rectangulum contentum tota, et maiori parte ad rectangulũ, quod tota, & minori continetur.

Recta enim quædam linea AB secetur in partes inæquales ad E. Dico vt AE ad EB, ita esse rectangulum contentum BA AC ad id, quod AB BE continetur. describatur enim ex AB quadratum ACDB; & per E quidem alterutri ipsarum AC DB parallela ducatur EF. perspicuum est vt AE ad EB, ita esse AF parallelogrãmum ad parallelogrammum FB. atque est AF quidẽ parallelogrammum quod BA AE continetur; etenim CA ipsi AB est æqualis: parallelogrammum vero FB est quod continetur AB BE; æqualis enim est DB ipsi BA. vt igitur AE ad EB, ita rectangulum contentum BA AE ad id, quod AB BE cõtinetur. quod oportebat demonstrare.




LEMMA III.

Si sint duæ rectæ lineæ inæquales, minor autem ipsarum in partes æquales secetur, rectangulum contentum duabus rectis lineis duplum est eius, quod maiori, & dimidia minoris continetur.

Sint

Sint duæ rectæ lineæ inæquales AB BC, quarum maior AB: & secetur BC bifariam in puncto D. Dico rectangulum contentum AB BC duplum esse eius, quod AB BD continetur. ducatur enim à puncto B ipsi BC ad rectos angulos BE; ponaturq; BE ipsi BA æqualis, & figura describatur. Quoniam igitur est vt BD ad DC, ita parallelogrammum BF ad DC parallelogrammum; erit componendo vt BC ad CD, ita parallelogrammum BG ad ipsum GD. est autem BC dupla ipsius CD. ergo & parallelogrammum BG parallelogrammi GD est duplum. atque est BG quidem, quod AB BC continetur; etenim AB est æqualis BE: DG vero est quod continetur AB BD: nam BD ipsi DC, & AB ipsi DF est æqualis. quod oportebat demonstrare.




1. sexti.

PROBLEMA X. PROPOSITIO. XXXIIII.

Inuenire duas rectas lineas potentia incommensurabiles, quæ faciant compositum quidem ex ipsarum quadratis rationale; rectangulum vero, quod ipsis continetur, medium.

Exponantur duæ rationales potentia solum commensurabiles AB BC, ita vt maior AB plus possit, quã minor BC quadrato rectę lineæ sibi longitudine incommensurabilis. & secta BC, bifariam in D, quadrato, quod fit ab alterutra ipsarum BD DC æquale parallelogrammum ad rectam lineã AB applicetur, deficiens figura quadrata: & sit quod continetur AE EB. describatur in recta linea AB semicirculus AFB; ducaturq; ipsi AB ad rectos angulos EF, & AF FB iungantur. Quoniam igitur duę rectæ lineę AB BC inæquales sunt, & AB plus potest, quàm BC quadrato rectę lineæ sibi longitudine incommensurabilis; quartæ autem parti quadrati, quod fit à minori BC, hoc est quadrato dimidiæ ipsius æquale parallelogrammum applicatum est ad AB, deficiens figura quadrata, quod quidem AE EB continetur: erit AE ipsi EB incommensurabilis. atque est vt AE ad EB, ita BAE rectangulum ad rectangulum ABE. rectangulum autem BAE quadrato ex AF est æquale; & rectangulum ABE æquale quadrato ex BF. quadratũ igitur ex AF incommensurabile est quadrato ex FB: ideoq; rectæ lineæ AF FB potentia sunt incommensurabiles. & quoniam AB rationalis est, & quadratum, quod fit ex AB erit rationale. ergo & rationale compositum ex quadratis ipsarum AF FB. rursus quoniam rectangulum AEB est æquale quadrato ex EF: ponitur autem rectangulum AEB quadrato etiam ex BD æquale. ergo FE est æqualis BD; ac propterea BC ipsius EF est dupla. rectangulũ igitur ABC duplum est rectãguli, quod AB EF continetur. sed rectangulum ABC est medium. ergo & medium quod continetur AB EF. est autem quod AB EF continetur æquale contento AF FB. contentum igitur AF FB medium est. sed & ostensum est rationale, quod componitur ex ipsarum AF FB quadratis. Inuentę igitur sunt duæ rectæ lineæ potentia incommensurabiles AF FB, quę faciunt compositũ quidem ex ipsarum quadratis rationale; rectangulum vero, quod ipsis continetur, medium. quod facere oportebat.



31. huius.

Per lemma ante 19. huius uel per 28. sexti.

19. huius: Per 2. lemma ex antecedentibus. Per 1. lemma Per 9. diffi.


Per 3. lemma 22. huius. Cor. 24. huius. Per 1. lemma

SCHOLIVM.

At vero ex duobus spacijs irrationalibus inter se compositis totum fieri rationale, ex hoc cognoscemus.

Exponatur

Exponatur rationalis AB, & duo numeri CD non habentes proportionem, quam quadratus numerus ad quadratum numerum: fiatq; vt C ad D, ita quadratum ex AB ad id quod ex BE quadratum: & descripto quadrato ex AB per E ducatur alterutri laterum parallela EF. Quoniam igitur est vt C ad D, ita quadratum ex AB ad quadratum ex BE; & C ad D proportionem non habet, quam quadratus numerus ad quadratum numerum: erit AB ipsi BE longitudine incommensurabilis. ergo & BA reliquæ AE incommensurabilis est longitudine. vt autē AB est ad vtramque ipsarum AE EB, ita quadratum ex AB ad vtrumque parallelogrammorū. quadratum igitur ipsis parallelogrammis incommensurabile erit. sed quadratum est rationale. irrationalia igitur sunt parallelogramma, quæ rationalis sunt partes, & ipsum rationale cōplēt.




C . . 5 . . D . . 3

Corol. 10. huius.

9. huiue. Ex demonstratis ad 17 huius. 1. sexti.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit recta linea AB 8, BC Ɽ 20. erit BD, vel DC Ɽ 5: & quadrato ipsius BD, quod est 5 aequale parallelogrammum ad AB applicetur, deficiens figura quadrata. illud autem facile assequemur, si quę tradita sunt in lemmate ante 18. huius repetantur. Itaque in recta linea AB descripto semicirculo AFB; & secta AB bifariam in G, ipsi ad rectos angulos ducatur GH; ponaturq; GK æqualis BD. est enim GH maior, quàm BD. nam cum AB sit maior, quàm BC, erit etiam ipsius AB dimidia maior, quàm dimidia BC. deinde per K ipsi AB parallela ducatur KF: atque à puncto F agatur FE ad AB perpendicularis, quae protendatur in L, ita vt EL sit aequalis EB; & parallelogrammum AL compleatur. erit igitur parallelogrammum AL illud, quod AE EB continetur, & aequale quadrato ipsius FE, hoc est quadrato BD. quare ad rectam lineam AB applicatum est parallelogrammum AL quadrato ipsius BD aequale, & deficiens figura quadrata. & quoniam recta linea AB secatur in partes aequales ad G, & in partes inæquales ad E, erit rectangulum contentum AE EB vnà cum quadrato ipsius GE aequale quadrato dimidiae AB, hoc est ipsius AG: quadratum autem AG est 16, & rectangulum AEB 5; est enim FE Ɽ 5, & eius quadratum 5, quod quidem rectangulo AEB est aequale. reliquum igitur quadratum ipsius GE est 11, & recta linea GE Ɽ 11. ergo AE constans ex AG GE est 4 vnà cum Ɽ 11, vel 4 plus Ɽ 11. & EB 4 dempta Ɽ 11, vel 4 minus Ɽ 11. vt autē sciamus, quae sint AF FB, necesse erit prius inuenire quadrata ipsarum AE EB. quare non inutile visum est theoremata nonnulla hic apponere, attinentia ad eas, quae ex binis, vel pluribus nominibus constant, & ad apotomas.



5. secundi.

THEOREMA. I.

Data recta linea, quæ fit ex binis, vel pluribus nominibus, & quadratum eius datum erit.

Sit AB ex binis nominibus AC CB: sitq; AC 4, CB Ɽ 11. Dico quadratum eius datum esse. Quoniam enim AB vtcunque secatur in puncto C, erit ex quarta propositione secundi libri, quadratum totius aequale quadratis partium, & rectangulo, quod bis dictis partibus continetur. itaque quadratum AC est 16, & quadratum CB 11. rectangulum vero contentum AC CB est Ɽ 176, cuius duplum Ɽ 704. ergo quadratum AB est 27 plus Ɽ 704.

A 4 C Ɽ 11 B

Sit

Sit AD ex tribus nominibus AB BC CD: ſitq; AB 6, BC R 10, & CD R 3. Dico et quadratum ipſius dari. nã cum AD ſecetur in duobus punctis B C, erit quadratum totius aequale rectangulis, quae ſingulis partibus ad ſingulas applicatis cõtinentur, ex ijs, quae à nobis demõſtrata ſunt ad ſecundã propoſitionẽ ſecũdi libri. quadratum igitur AB eſt 36, & rectangulũ contentũ AB BC eſt R 360; contentum vero AB CD eſt R 108. & rurſus contentum AB BC eſt R 360, & quadratum BC eſt 10. preterea rectangulum, quod continetur BC CD eſt R 30, & quod rurſus continetur AB CD R 108; & quod continetur BC CD R 30. & denique quadratũ CD eſt 3. ſed duplum R 360 eſt R 1440, & duplum R 108 eſt R 432; duplum vero R 30 eſt R 120. quare ſumma totius erit 49 plus R 1440 plus R 432 plus R 120, quod eſt ipſius AD quadratum. Et eodem modo in alijs facimus quotcunque nomina habeant.

A B C D

THEOREMA II.

Datis duabus rectis lineis, quæ ex binis, vel pluribus nominibus conſtent, & rectangulum ipſis contentum datum erit.

Sint rectae linee AB CD; conſtetq; AB ex binis nominibus AE EB; & ſit AE 5, EB R 12; CD vero conſtet ex CF FD, & ſit CF 4 FD R 7. Dico rectangulum, quod ipſis continetur, datum eſſe. Quoniam enim duae rectae lineae A B CD vtcunque ſecantur in punctis E F, rectangulum ipſis cõtẽtũ eſt aequale rectãgulis, quae vnaquaq; partevnius ad vnãquãq; partẽ alterius applicata, continentur, ex ijs quae nos demõſtrauimus ad primã propoſitionẽ ſecũdi libri theoremate primo. rectãgulũ igitur contentũ 4 & 5 eſt 20, & contẽtũ 4, & R 12 eſt R 192. quod aũt cõtinetur R 7, & 5 eſt R 175, & quod continetur R 7, & R 12 eſt R 84. totius ergo ſumma eſt 20 plus R 192 plus R 175 plus R 84. quod eſt rectangulum ipſis AB CD contentum. non aliter inuenietur rectangulum contentum duabus rectis lineis, quae ex pluribus nominibus conſtent.

A 5 E B 12 B

C 4 F B 7 D

THEOREMA III.

Datę apotomes quadratum datum erit.

Sit apotome AC, & recta linea ipſi congruens ſit CB; ſitq; tota AB 4, BC R 11. erit AC 4 minus R 11. Dico & quadratum ipſius datum eſſe. vt autem hoc inueniamus, non vtemur quarta propoſitione ſecundi libri, vt ante, ſed ſeptima eiuſdem. non enim 4, & R 11 ſunt partes dictae lineae, ſed 4 eſt tota linea, et R 11; eſt pars, quae ab ea aufertur. Itaque quoniam AB ſecatur vtcunque in puncto C, erit quadratum totius AB vnà cum quadrato vnius partis BC aequale ei, quod bis continetur tota AB, et BC vnà cum alterius partis AC quadrato. eſt igitur quadratum ipſius AB 16, et quadratum BC 11; rectangulum autem, quod tota AB, et BC continetur eſt R 176, cuius duplum R 704. ergo R 704 vnà cum quadrato ex AC eſt aequale 27; ac propterea quadratum ex AC eſt 27 minus R 704. qui vero ex quarta propoſitione ſecundi id quadratum ſibi inueniendum proponunt, cogũtur dicere ſi minus per minus multiplicetur produci plus. quod verum non eſſe primus animaduertit Hieronymus Cardanus non ſolum mathematicus, ſed et Philoſophus, ac medicus preſtantiſsimus, vt apparet in libro de regula aliza, quem nuper edidit. Verũ quoniam ex eorum operatione error non ſequitur, hoc ipſis condonandum eſt.


A C B

THEOREMA IIII.

Datis duabus rectis lineis earum, quas apotomas appellamus, & rectangulum, quod ipſis continetur, datum erit.

Sint duae apotomae datae AC DF: et ipſi quidem AC cõgruat CB; ipſi vero DF congruat FE: ſitq; tota AB 8, BC R 12: et ſit DE 4, EF R 3. erit AC 8 minus R 12, et DF 4 minus R 3. Dico


et rectãgulum, quod ipsis continetur, datum esse. Quoniam enim duę rectae lineae AB DE vtcunque secantur in punctis C F, erit rectangulũ, quod continetur totis AB DE vnà cum rectãgulo contento partibus CB FE aequale rectangulo contento tota AB, et parte FE vnà cum contento tota DE, et parte CB, et eo, quod reliquis partibus AC DF continetur, ex ijs, quae demonstrata sunt à nobis ad primã propositionem secundi libri theoremate secundo. itaque rectangulum contentum AB DE est 32, & contentum CB FE est Rx 36, hoc est 6; rectangulum vero, quod continetur AB FE est Rx 192, et quod continetur DE CB est Rx 192, quae duae radices inter se iunctae faciunt Rx 768. quare 38 est aequalis Rx 768 vnà cum eo, quod AC DF continetur. ex quibus sequitur rectangulum contentum AC DF esse 38 minus Rx 768. at recentiores ad hoc inueniendum vtuntur 1 theoremate; et ob id asserunt si minus per minus multiplicetur produci plus, sed non recte, cum vtendum sit theoremate secundo; neque enim 8, et Rx 12 sunt partes vnius rectae lineae; immo vero 8 est tota linea, et eius pars Rx 12, et similiter dicendũ de 4 minus Rx 3. ex ipsorum tamen operatione nullus sequitur error.



THEOREMA V.

Data recta linea, quae sit ex binis, vel pluribus nominibus, & data apotoma, rectãgulum, quod ipsis continetur, datum erit.

Sit data quidem recta linea AB, quae constet ex binis nominibus AC CB, vt sit AC 6; CB Rx 20. data autem apotome sit DF, et ipsi congruens FE, vt tota DE sit 4, et EF Rx 12. erit DF 4 minus Rx 12. Dico rectãgulũ, quod ipsis AB DF cõtinetur datum esse. Quoniam enim duae rectae lineae AB DE vtcunque secantur in punctis CF, erit ex secundo theoremate iam dicto rectangulum, quod ipsis AB DE continetur, aequale rectangulis, quae fiunt vnaquaque parte vnius ad vnamquamque partem alterius applicata; videlicet rectangulo contento DF AC, et contento DF CB: et preterea rectangulo, quod continetur FE AC, et quod continetur FE CB. rectangulum autem contentum DE AC vnà cum contento DE CB est aequale rectangulo quod totis AB DE continetur, ex prima secundi libri. Itaque rectangulum contentum DE AC est 24, et contentum DE CB est Rx 320. rectangulũ vero, quod cõtinetur FE AC est Rx 432, et quod continetur FE CB Rx 240. ergo rectangula, quae continẽtur DF AC, et DF CB, hoc est rectangulum contentum DF AB est 24 plus Rx 320, minus Rx 432, et minus Rx 240. Eodem modo procedemus, si rectae lineae AB DE ex pluribus nominibus constent.



Ex quibus apparet si plus per minus, vel minus per plus multiplicetur, produci minus.

His ita demonstratis constat, quadratum ipsius AE esse 27 plus Rx 704, et quadratum EB esse 27 minus Rx 704. quare addito vtrique communi quadrato ex EF, quod est 5, erit quadratum ex AF 32 plus Rx 704, et quadratum ex FB 32 minus Rx 704, rectaq; linea AF radix huius summae 32 plus Rx 704, quam radicem vniuersalem appellant, et ita notant, videlicet Rx V. 32 plus Rx 704: et similiter BF Rx V. 32 minus Rx 704, quarum quidem quadrata inter se iuncta videlicet 32 plus Rx 704, et 32 minus Rx 704 faciunt 64, quod est ipsius AB quadratum. preterea quoniam rectangulum, quod continetur rectis lineis AF FB est aequale contẽto ipsis AB EF, vt demonstratum iam fuit in primo lemmate; contentum autem AB EF est Rx 320: erit etiam rectangulum, quod his lineis Rx V. 32 plus Rx 704, et Rx V. 32 minus Rx 704 continetur Rx 320. Hoc autem ita esse ex earum quoque inter se multiplicatione manifesto apparere potest. dispositis enim his radicibus videlicet Rx V. 32 plus Rx 704, et Rx V. 32 minus Rx 704, ut quid ex earum multiplicatione proueniat cognoscamus, operandum est, quemadmodum in simplicibus radicibus; nimirũ multiplicãdo earũ quadrata inter se, et eius, quod producitur radix erit id, quod quaeritur. cũ aũt quadrata utriusq; cõstẽt ex duabus partibus, erit rectãgulũ, quod totis cõtinetur, ac si lineę essent, equale rectãgulis, quę fiũt singulis partibus unius ad singulas alterius applicatis, ut demonstratũ est. si igitur 32 in se multiplicentur fiunt 1024; rursus si 32, hoc est Rx 1024 multiplicet Rx 704 fit Rx 720896. et ita si 32 multiplicet minus R 704 fit minus R 720896. postremo simul tiplicetur Rx 704 per minus Rx 704 fiunt minus 704. totũ igitur ex his compositũ est 1024 plus


R 720896

Rx 720896 minus Rx 720896 minus Rx 704, hoc est 1024 minus 704. itaq; detractis 704 de 1024 relinquetur 320, & eius radix erit id quod quæritur. ergo si multiplicemus Rx V. 32 plus Rx 704 per Rx V. 32 minus Rx 704 producetur Rx 320. Quatenus vero ad scholiũ pertinet, sit AB 10 & numeri CD. 5. 3. & fiat vt 5 ad 3. ita quadratũ ex AB, hoc est 100 ad quadratũ ex BE, erit ad 60. ergo ipsa BE est Rx 60, & AE 10 minus Rx 60. rectãgulum autem BF est Rx 6000, & rectangulum AF 100 minus Rx 6000.

PROBLEMA XI. PROPOSITIO. XXXV.

Inuenire duas rectas lineas potentia incommensurabiles, quæ faciant compositum quidem ex ipsarum quadratis medium, rectãgulum vero quod ipsis continetur rationale.

Exponantur duæ mediæ potentia solum commensurabiles AB BC, quæ rationale contineant, ita vt AB plus posit quàm BC quadrato rectæ lineæ sibi longitudine incõmensurabilis, & in ipsa AB describatur semicirculus DB: sectaq; BC bifariam in E, applicetur ad AB parallelogrammum æquale quadrato ipsius BE, deficiens figura quadrata; & sit quod continetur AF FB. incommensurabilis igitur est AF ipsi FB longitudine. à puncto autem F ipsi AB ad rectos angulos ducatur FD; & AD DB iungantur. itaque quoniam AF est incommensurabilis FB; erit & BAF rectangulum rectangulo ABF incommensurabile. est autem rectangulũ quidem BAF quadrato ipsius AD æquale; rectangulum vero ABF æquale quadrato ipsius DB incommensurabile igitur est quadratum AD ipsius DB quadrato; ac propterea rectæ lineæ ad AD DB potentia sunt incommensurabiles. & quoniam medium est quadratum ipsius AB, erit & compositum ex quadratis ipsarum AD DB medium. quòd cum dupla sit BC ipsius DF, & rectangulum ABC rectanguli ex AB DF duplum erit. quare & commensurabile. rationale autem est rectangulum ABC, ita enim ponitur. ergo & rectangulum ex AB FD est rationale. sed rectangulo ex AB FD æquale est rectangulum ADB quare & ipsum ADB rectangulum rationale erit: Inuentæ igitur sunt duæ rectæ lineæ potentia incommẽsurabiles AD DB, quæ faciunt compositũ quidem ex ipsarum quadratis medium, rectangulum uero, quod ipsis continetur rationale.



e. huius.

Lemma ad 19. huius.

19. huius.

Lemma 2.

Lemma. 1.

Lemma. 3.

Lemma 1. aut 2. 34. huius.


F. C. COMMENTARIVS.

Sit recta linea AB Rx R 54, BC Rx R 24. & diuisa Rx R 24 bifariam, erit eius dimidia BE Rx R 1 $\frac{1}{2}$. applicetur ad AB parallelogrammum aequale quadrato ipsius BE, hoc est aequale Rx R 1 $\frac{1}{2}$, deficiens figura quadrata. quod similiter, atque supra fiet. diuisa enim rursus AB. hoc est Rx R 54 bifariam, erit eius dimidia Rx R 3 $\frac{1}{8}$. & si ab ipsius quadrato, videlicet à Rx 3 $\frac{1}{8}$ auferatur Rx 1 $\frac{1}{2}$, reliqua erit Rx $\frac{1}{8}$. ergo recta linea AF est RR 3 $\frac{1}{8}$ plus RR $\frac{1}{8}$, & FB RR 3 $\frac{1}{8}$. minus RR $\frac{1}{8}$. quadratũ aũt ipsius AF eodẽ modo inuenietur esse R 6 plus R 4 $\frac{1}{2}$. & quadratũ ex FB R 6 minus R 4 $\frac{1}{2}$, quibus addito cõi quadrato ipsius FD, videlicet R 1 $\frac{1}{2}$, erit quadratum ex AD Rx R 13 $\frac{1}{2}$ plus R 4 $\frac{1}{2}$, & quadratum ex DB R 13 $\frac{1}{2}$ minus R 4 $\frac{1}{2}$. ideoq; recta linea AD Rx V R 13 $\frac{1}{2}$ plus R 4 $\frac{1}{2}$, & DB R V. R 13 $\frac{1}{2}$ minus R 4 $\frac{1}{2}$, quarũ quadrata simul iuncta faciunt R 54, videlicet rectae lineae AB quadratum. quod est medium. At rectangulum, quod AD DB continetur est aequale contento AB DF. contentum vero AB DF, hoc est RR 54, & RR 1 $\frac{1}{2}$ est RR 81, hoc est 3. ergo quod continetur AD DB est 3. sed et idem aliter constat multiplicando R V. R 13 $\frac{1}{2}$ plus R 4 $\frac{1}{2}$ plus R V R 13 $\frac{1}{2}$ minus R 4 $\frac{1}{2}$; fit enim R 9,

quae eſt 3. ſunt igitur hę rectae lineae potentia incommenſurabiles, & faciunt compoſitum ex earum quadratis medium; rectangulum vero, quod ipſis continetur, rationale, vt oportebat.

PROBLEMA XII. PROPOSITIO. XXXVI.

Inuenire duas rectas lineas potentia incommenſurabiles, quæ faciant & compoſitum ex ipſarum quadratis medium, & rectãgulum, quod ipſis continetur, medium, incommenſurabileq́ue compoſito ex ipſarum quadratis.



Exponantur duæ medię potentia ſolũ commenſurabiles AB BC, quæ medium
38 huius: contineant, ita vt AB plus poſsit, quàm BC quadrato rectæ lineæ ſibi longitudine incommẽſurabilis. & in AB ſemicirculus ADB deſcribatur, & reliqua fiant, quẽadmodũ in ijs, quæ ſuperius dicta ſunt. Quoniam igitur AF incommenſurabilis eſt ipſi FB longitudine, erit & AD ipſi DB potentia incommenſurabilis. & quoniam medium eſt quod fit ex AB, & compoſitum ex quadratis AD DB eſt medium. Quòd cum rectangulũ AFB ęquale ſit quadrato alterutrius ipſarũ BE DF, erit DF ęqualis BE; ac propterea BC ipſius FD dupla. rectangulum igitur ABC duplũ eſt eius, quod AB FD continetur. medium autem
Corol. 24 huius. eſt rectangulum ABC. ergo & quod continetur AB FD eſt mediũ, atque eſt ęquale
1. lemma ad 34. huius. contento AD DB. quare & ipſum medium erit. & quoniam incommenſurabilis eſt
23. huius. AB ipſi BC longitudine; commenſurabilis autem CB ipſi BE: erit & AB ipſi BE lõgitudine incommenſurabilis. ergo & quadratum ex AB incommenſurabile eſt rectangulo ABE. ſed quadrato quidem ex AB ęqualia ſunt quę ex AD DB quadrata: rectangulo autem ABE eſt æquale rectangulum contentum AB FD, hoc eſt rectangulum ADB. compoſitum igitur ex quadratis ipſarum AD DB rectangulo ADB eſt incommenſurabile. ergo inuentæ ſunt duę rectæ lineæ potentia incommenſurabiles, quæ faciunt compoſitum ex ipſarum quadratis medium: & rectangulum, quod ipſis continetnr, medium, & adhuc compoſito ex ipſarum quadratis incommenſurabile.


F. C. COMMENTARIVS.

Sit recta linea AB ℞℞ 18, & BC ℞℞ 2. diuidaturq́, BC bifariam in E, erit BE ℞℞ $\frac{1}{8}$. eſt ad AB applicetur parallelogrammum aequale quadrato ipſius BE, hoc eſt ℞ $\frac{1}{8}$, deficiens figura quadrata, erit recta linea AF ℞℞ $1\frac{1}{8}$ plus ℞℞ $\frac{1}{2}$ & FB ℞℞ $1\frac{1}{8}$ minus ℞℞ $\frac{1}{2}$: quadratum autem ipſius AF ℞ $3\frac{1}{8}$ plus ℞ 3, & quadratum FB ℞ $3\frac{1}{8}$ minus ℞ 3. & addito utrique quadrato ipſius BE, erit quadratum ex AD ℞ $4\frac{1}{2}$ plus ℞ 3. & quadratum ex DB ℞ $4-\frac{1}{2}$ minus ℞ 3, ergo recta linea AD eſt ℞ V. ℞ $4\frac{1}{2}$ plus ℞ 3, & DB ℞ V ℞ $4\frac{1}{2}$ minus ℞ 3, quarũ quadrata ſimul iuncta faciunt ℞ 18, quantum eſt quadratum ex AB. rectangulum vero ipſis contentum eſt ℞ $1\frac{1}{2}$. quod eſt medium, & incommenſurabile compoſito ex ipſarum quadratis.

THEOREMA XXV. PROPOSITIO XXXVII.

Si duæ rationales potentia ſolum commenſurabiles componantur, tota irrationalis erit, vocetur autem ex binis nominibus,

Componantur enim duæ rationales potentia ſolum commenſurabiles AB BC. Dico AC irrationalem eſſe. Quoniam enim incommenſurabilis eſt AB ipſi BC longi tudine, potẽtia enim ſolũ



commenſu-

commenſurabiles ſunt; & vt AB ad BC, ita rectãgulum ABC ad id, quod fit ex BC quadratum: erit rectangulum ABC quadrato ex BC incommenſurabile. Sed recta gulo quidem ABC commenſurabile eſt id, quod bis AB BC continetur: quadrato autem ex BC commenſurabilia ſunt quadrata ex AB BC. quod igitur bis AB BC continetur incommenſurabile eſt quadratis ex A B B C. & componendo quod bis AB BC continetur vnà cum quadratis ex AB BC, hoc eſt quadratum ex AC incõmenſurabile eſt compoſito ex ipſarum AB BC quadratis. rationale autem eſt compoſitum ex quadratis AB BC. ergo quadratum ex AC irrationale eſt: & ob id recta linea AC eſt irrationalis, vocetur autem ex binis nominibus. 1. ſexti. 10. huius. 6. huius. 13. huius. 4. ſecundi. 10. diffi. 11. diffi.

SCHOLIVM.

Quæ inter has rationales media eſt proportionalis, ea media eſt, neutra autem harum, neque vtraque eſt media, ſed quæ ex ipſis conſtat ex binis nominibus appellatur. Vtrarumque igitur irrationalium ſunt procreatrices, iuxta tamen differentes procreationis modos.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit recta linea AB 2, & BC ℞ 3. erit AC 2 plus ℞ 3. & eius quadratum 7 plus ℞ 48. eſt enim quadratum ipſius AC 4, & quadratum BC 3. rectangulum vero, quod AB BC continetur ℞ 12, cuius duplum eſt ℞ 48.

THEOREMA XXVI. PROPOSITIO. XXXVIII.

Si duæ mediæ potentia ſolum commenſurabiles componantur quæ rationale contineant, tota irrationalis erit. vocetur autem ex binis medijs prima.

Componantur enim duę mediæ potentia ſolum commenſurabiles AB BC, quę rationale contineãt. dico totam AC irrationalem eſſe. Quoniam enim incommenſurabilis eſt AB ipſi BC longitudine, & quadrata ex AB BC incommenſurabilia erunt rectangulo, quod bis AB BC continetur. ergo componendo quadrata ex AB BC vnà cum eo, quod bis AB BC continetur, quod eſt ipſius AC quadratum incommenſurabile eſt rectangulo ABC. ſed A B C rectangulum rationale ponitur. ergo quadratum ex A C irrationale eſt, & recta linea AC irrationalis. vocetur autem ex binis medijs prima.

A ℞ 54 B ℞ 24 C

A B C

F. C. COMMENTARIVS.

Componantur enim duæ mediæ potentia ſolum commenſurabiles AB BC, quæ rationale contineant] *Quomodo hę inueniantur docuit in 28 huius. ſit autem AB ℞℞ 54, BC ℞℞ 24, erit tota AC ℞℞ 54 plus ℞℞ 24.* A

Et quadrata ex A B B C incommenſurabilia erunt rectangulo, quod bis A B BC continetur] *Hoc eodem modo, quo ſupra, ſequitur ex 13 huius bis repetita.* B

Quod eſt ipſius AC quadratum] *Ex 4 ſecundi.* C

Ergo quadratum ex AC irrationale eſt, & recta linea AC irrationalis] *Ex 10 & 11 diffinitione huius.* D


THEOREMA XXVII. PROPOSITIO XXXIX.

Si duę medię potentia ſolum commenſurabiles componantur.

quæ medium

quæ medium contineant, tota irrationalis erit. vocetur autem ex binis medijs ſecunda.

A Componantur enim duæ mediæ potentia ſolum commenſurabiles, AB BC, quæ medium
B contineant. Dico AC irrationalem eſſe. exponatur rationalis DE: & quadrato ex AC æquale parallelogrammum rectangulum DF ad ipſam DE applicetur, quod latitudinẽ faciat DG.
C itaque quoniam quadratum ex AC æquale eſt
4. ſecundi quadratis ex AB BC, & rectangulo, quod bis
D AB BC continetur. applicetur ad ipſam DE quadratis ex AB BC æquale parallelogrammũ
E rectangulum EH. reliquum igitur FH æquale eſt ei, quod bis AB BC continetur. & quoniam media eſt utraque ipſarum AB BC, erũt & qua
F drata ex AB BC media. medium autem ponitur & quod bis continetur AB BC. atque eſt quadratis quidem ex AB BC æquale parallelogrammum EH. rectangulo autem bis AB BC contento æquale eſt ipſum HF. me-
G dium igitur eſt vtrumque ipſorum EH HF: & ad rationalẽ applicantur. ergo vtraque recta linea DH HG eſt rationalis, & ipſi DE longitudine incommenſurabilis.
H & quoniam incommenſurabilis eſt AB ipſi BC lõgitudine; atque eſt vt AB ad BC,
K ita quadratum ex AB ad ABC rectangulum: erit quadrato ex AB rectangulum
L ABC incommenſurabile. ſed quadrato quidem ex AB commenſurabile eſt compoſitum ex quadratis ipſarum AB BC: rectangulo autem ABC eſt commenſurabile,
M quòd bis AB BC continetur. ergo compoſitum ex quadratis AB BC incommenſurabile erit ei, quod bis continetur AB BC. ſed quadratis ex AB BC æquale eſt parallelogrammum EH: & rectangulo, quod bis AB BC continetur æquale HF pa-
N rallelogrammum. quare EH ipſi HF eſt incommenſurabile; & ob id recta linea DH ipſi HG incommenſurabilis longitudine. oſtenſæ autem ſunt rationales: ergo DH
O. HG rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles; ac propterea DG eſt irratio-
P nalis; rationalis autem DE; & quod rationali, & irrationali continetur rectangulũ
Q irrationale eſt. ſpacium igitur DF eſt irrationale, & quę ipſum poteſt irrationalis. poteſt autem ipſum DF recta linea AC. ergo AC irrationalis erit. vocetur autem ex binis medijs ſecunda.



SCHOLIVM.

Vocauit illam ex binis medijs ſecundam, quoniam medium eſt non rationale, quod ipſis AB BC continetur; medium enim rationali poſterius eſt. At vero quod rationali, & irrationali continetur irrationale eſſe perſpicue conſtat.

1 huius Nam ſi rationale ſit, & ad rationalem applicetur, erit latitudo, quam facit, rationalis; ſed & irrationalis. quod eſt abſurdum. illud igitur quod rationali, & irrationali continetur eſt irrationale. quod oportebat demonſtrare.

F. C. COMMENTARIVS.

A Componantur enim duæ medię potentia ſolum commenſurabiles AB BC, quę medium contineant] *Quomodo autem hę inueniantur docet in 29 huius. ſit AB* RR 18, *et BC* RR 8, *erit AC* RR 18 *plus* RR 8, *cuius quadratum* R 50 *plus* R 48.

B Exponatur rationalis DE, & quadrato ex AC æquale parallelogrammum rectangulum

gulum DF ad ipſam DE applicetur, quod latitudinem faciat DG] *Sit rationalis DE 4, ad quam ſi applicetur illud medium* R 50, *latitudinem faciet* R 3 $\frac{1}{8}$, *quae ſit DH: et ſi ad eadem applicetur* R 48, *faciet latitudinem* R 3, *quae ſit HG. ergo tota latitudo DG erit* R 3 $\frac{1}{8}$ *plus* R 3.

Itaque quoniam quadratum ex AC æquale eſt quadratis] *Ex quarta ſecundi, vel 4. Barlaam monachi.* C

Applicetur ad ipſum DE quadratis ex AB BC æquale parallelogrammum rectangulum EH] *Quadratum ipſius AB eſt* R 18, *et quadratum BC* R 8, *quae inter ſe iunctę faciunt* R 50. *ergo parallelogrammum EH eſt* R 50, *et recta linea DH* R 3 $\frac{1}{8}$. D

Reliquum igitur FH eſt æquale ei, quod bis AB BC continetur] *Hoc eſt* R 48, *et recta linea HG* R 3, *vt dictum eſt.* E

Medium autem ponitur & quod bis AB BC continetur] *Medium ponitur, quod AB BC continetur. et quoniam illud, quod bis AB BC continetur eſt ei commenſurabile, videlicet duplum ex 6. huius, et ipſum medium erit, ex corollario 24. huius.* F

Ergo vtraque recta linea DH HG eſt rationalis, & ipſi DE longitudine incommenſurabilis] *Ex 23. huius.* G

Atque eſt vt AB ad BC, ita quadratum ex AB ad ABC rectangulum] *Ex lemmate ad 23 huius appoſito, vel ex 1. ſexti.* H

Erit quadrato ex AB rectangulum ABC incommenſurabile] *Ex 10. huius.* K

Sed quadrato quidem ex AB commenſurabile eſt compoſitum ex quadratis ipſarum AB BC] *Ponuntur enim AB BC potentia commenſurabiles. ergo & earum quadrata commenſurabilia erunt, et compoſitum ex ipſis commenſurabile vtrique quadrato ex 16. huius.* L

Ergo compoſitum ex quadratis AB BC incommenſurabile erit ei, quod bis continetur AB BC] *Ex 14. huius.* M

Et ob id recta linea DH ipſi HG incommenſurabilis longitudine] *Ex 1. ſexti, et 10. huius.* N

Ac propterea DG eſt irrationalis] *Ex 37. huius.* O


Et quod rationali, & irrationali continetur rectangulum irrationale eſt] *Quomodo hoc ſequatur in antecedenti ſcholio dictum fuit.* P

Et quę ipſum poteſt irrationalis] *Ex 11. diffinitione.* Q

THEOREMA XXVIII. PROPOSITIO. XL.

Si duæ rectæ lineæ potentia incommenſurabiles componãtur, quæ faciãt compoſitum quidem ex ipſarum quadratis rationale; quod autem ipſis continetur medium: tota recta linea irrationalis erit. vocetur autem maior.

Componantur enim duæ rectæ lineæ potentia incommenſurabiles AB BC, facientes ea, quæ propoſita ſunt. Dico AC irrationalem eſſe. Quoniam enim id, quod AB BC continetur, medium eſt; & quod bis continetur AB BC medium erit. compoſitum autem ex ipſarum AB BC quadratis eſt rationale. ergo quod bis AB BC continetur incommenſurabile eſt compoſito ex quadratis ipſarum AB BC. & ob id quadrata ex AB BC vnà cum eo, quod bis AB BC continetur, quod eſt quadratum ex AC, incommenſurabile eſt quadratis ex AB BC. rationale autem eſt compoſitum ex quadratis AB BC. ergo & quadratum ex AC irrationale erit; ac propterea recta linea AC eſt irrationalis. vocetur autem maior.




A B C

SCHOLIVM.

Vocauit autem ipſam maiorem, propterea quòd rationalia ex AB BC maiora

BC maiora ſint medio, quod bis AB BC continetur: oporteatq; ue à rationalium proprietate nomen imponere. At vero quæ fiunt ex AB BC maiora eſſe eo, quod bis AB BC continetur, ſic oſtendemus.

Manifeſtum igitur eſt AB BC inter ſe inęquales eſſe. ſi enim ſint æquales, & quæ fiunt ex AB BC æqualia erunt ei, quod bis AB BC continetur, & rectangulum ABC rationale erit. quod nō ponitur. Inæquales igitur ſunt AB BC. ponatur maior AB, & ipſi BC



7. ſecundi ęqualis BD. ergo quadrata ex AB BD æqualia ſunt ei, quod bis AB BD cōtinetur vnà cum quadrato ex DA. ęqualis autem eſt DB ipſi BC. quadrata igitur ex AB BC ęqualia ſunt ei, quod bis AB BC continetur, vnà cum quadrato ex AD. ideoq; quadrata ex AB BC maiora ſunt, quàm id, quod bis AB BC continetur, quadrato ipſius DA.


F. C. COMMENTARIVS.

A Componantur enim duę rectę lineæ potentia incommenſurabiles AB BC, facientes ea, quæ propoſita ſunt] *Inueniuntur autē hæc ex 34 huius. ſit AB R V. 34 plus R 704; et*
B *BC R V. 32 minus R 704. erit tota AC R V. 32 plus R 704 plus R V. 32 minus R 704.*
C Et quod bis AB BC continetur medium erit] *Ex corollario 24 huius.*
Et ob id quadrata ex AB BC vnà cum eo, quod bis AB BC continetur, quod eſt quadratum ex AC incommenſurabile eſt quadratis ex AB BC] *Ex 17. huius.*

THEOREMA XXIX. PROPOSITIO XLI.

Si duæ rectæ lineæ potentia incommenſurabiles componantur, quæ faciant compoſitum quidem ex ipſarum quadratis medium, quod autem ipſis continetur, rationale; tota recta linea irrationalis erit. vocetur autem rationale, ac medium potens.

A Componantur enim duę rectæ lineę potentia incommēſurabiles AB BC, facientes ea, quæ propoſita ſunt. Dico A



B C irrationalem eſſe. Quoniam enim cō poſitum ex ipſarum AB BC quadratis medium eſt; quod autem bis AB BC cōtinetur rationale: erit compoſitum ex ipſarum AB BC quadratis incommenſurabile ei, quod bis AB BC continetur. quare componēdo quadratum ex AC eſt incommen
A ſurabile ei, quod bis continetur ABBC, eſt autem rationale, quod bis AB BC continetur. quadratum igitur ex AC irrationale eſt; ideoq; recta lineā AC eſt irrationalis. vocetur autem rationale, ac medium potens.

SCHOLIVM.

Rationale autem, ac medium potentem ipſam idcirco appellauit, quòd poſſit bina ſpacia, vnum quidem rationale, alterum vero medium. & quoniam rationale præcedit irrationale, ipſius rationalis prius mentionem fecit.

F. C. COMMENTARIVS.

Componātur enim duæ rectę lineæ potentia incommenſurabiles AB BC, facientes ea quæ propoſita ſunt] *Hæ autem inueniuntur ex 35 huius ſit AB R V. R 13 + ½ plus*


$\sqrt{4\frac{1}{2}}$, BC $\sqrt{V}$. $\sqrt{13\frac{1}{2}}$ *minus* $\sqrt{4\frac{1}{2}}$, *vt tota* AC *ſit* $\sqrt{V}$. $\sqrt{13\frac{1}{2}}$ *plus* $\sqrt{4\frac{1}{2}}$ *plus* $\sqrt{V}$. $\sqrt{13\frac{1}{2}}$ *minus* $\sqrt{4\frac{1}{2}}$.

Quod autem bis AB BC continetur rationale] *Sequitur hoc ex corollario 24 huius.* B *ponitur enim eius dimidium rationale, videlicet quod AB BC continetur.*

Quare componendo quadratum ex AC eſt incommenſurabile ei, quod bis con- C
tinetur AB BC] *Quoniam enim compoſitum ex ipſarum AB BC quadratis incommenſurabile eſt ei, quod bis AB BC continetur, erit ex 17. huius compoſitum ex quadratis AB BC vna cum ea, quod bis AE BC continetur, hoc eſt quadratum ex AC incommenſurabile ei, quod bis conti-* 4. ſecundi.
netur AE BC.

THEOREMA XXX. PROPOSITIO. XLII.

Si duæ rectę lineę potentia incommenſurabiles componantur, quæ faciant compoſitum ex ipſarum quadratis medium, & quod ipſis cõtinetur medium, incommenſurabileq; compoſito ex quadratis ipſarum, tota recta linea irrationalis erit. vocetur autem bina media potens.



Componantur enim duæ rectæ lineę potẽtia incõmenſurabiles AB BC, quę faciant compoſitum quidẽ ex ipſarum AB BC quadratis medium; quod autem ipſis continetur medium, & adhuc incommenſurabile compoſito ex ipſarum quadratis. Dico AC irrationalẽ eſſe. Exponatur enim rationalis DE, & ad ipſam applicetur parallelogrammum rectangulum DF, æquale quadratis ipſarum AB BC: & parallelogrammum GH æquale ei, quod bis AB BC continetur. totum igitur DH quadrato ipſius AC eſt æquale. & quoniam medium eſt compoſitum ex quadratis ipſarum AB BC, & æquale parallelogrammo DF; erit ipſum quoque DF medium; & ad rationalem DE applicatũ eſt. rationalis igitur eſt DG, & ipſi DE lõgitudine incommenſurabilis. ob eandem cauſam & GK eſt rationalis, & incommenſurabilis longitudine ipſi FG, hoc eſt ipſi DE. & quoniam compoſitum ex quadratis ipſarum AB BC incommenſurabile eſt ei, quod bis AB BC continetur; erit & parallelogrammum DF ipſi GH incommenſurabile. ergo & recta linea DG incommenſurabilis eſt ipſi GK; & ſunt rationales. quare DG GK rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles; ac propterea DK eſt irrationalis, quæ ex binis nominibus appellatur. rationalis autem DE. ergo parallelogrammum DH irrationale eſt, & ipſum potens irrationalis. ſed ipſum DH poteſt recta linea AC. quare AC irrationalis eſt. vocetur autem bina media potens.

A
B
C
D
E
F
G

SCHOLIVM.

Vocauit ipſam bina media potẽtem, propterea quod poteſt bina ſpacia media, videlicet compoſitum ex ipſarum AB BC quadratis; & illud, quod bis AB BC continetur.

F. C. COMMENTARIVS.

Componantur. n. duæ rectę lineę potentia incõmenſurabiles AB BC, quæ faciãt A

compoſitum quidem ex ipſarum AB BC quadratis medium, quod autem ipſis cõtinetur medium] *Qua vero ratione hae inueniri poſsint, tradit in 36. huius. Sit AB Rx V. Rx 4 + 1/2 plus Rx 3, & EC Rx V. Rx 4 + 1/2 minus Rx 3. eruut earum quadrata ſimul iuncta* R 18, *& rectangulum ipſis contentum* R 1 + 1/2, *cuius duplum eſt* R 6.

B Exponatur enim rationalis DE, & ad ipſam applicetur parallelogrammum rectangulum DF æquale quadratis ipſarum AB BC: & parallelogrammum GH æquale ei, quod bis AB BC continetur] *Sit rationalis DE 3, ad quam ſi applicetur parallelogrãmum DF, aequale compoſito ex ipſarum AB BC quadratis, videlicet* R 18, *latitudinem faciet* R 2, *quae ſit DG: & ſi ad eandem applicetur parallelogrammum GH aequale ei, quod bis AB BC continetur, videlicet* R 6, *latitudinẽ faciet* R 1/2, *quae ſit GK. tota igitur latitudo DK erit* R 2 *plus* R 1/2, *quae eſt irrationalis ex binis nominibus appellata: & totum parallelogrammum DH erit aequale quadrato ipſius AC, ex 4 ſecundi.*

C Rationalis igitur eſt DG ipſi DE longitudine incommenſurabilis] *Ex 23 huius.*

D Ergo & recta linea DG incommenſurabilis eſt ipſi GK] *Ex 10 huius, eſt enim vt D F ad GH, ita DG ad GK, ex 1. ſexti.*

E Ac propterea DK eſt irrationalis, quæ ex binis nominibus appellatur.] *Ex 37 huius.*

F Ergo parallelogrammum DH irrationale eſt] *Nam quod rationali, & irrationali continetur eſt irrationale, vt in ſcholio 39. huius demonſtratum fuit.*


G Et ipſum potens irrationalis] *Ex 11. diffinitione.*

SCHOLIVM.

At vero dictas irrationales vno tantum modo diuidi in rectas lineas, ex quibus componuntur, & quę propoſitas ſpecies conſtituunt, mox demonſtrabimus, ſi prius lemma quoddam expoſuerimus, quod huiuſmodi eſt.

LEMMA.

Exponatur recta linea AB, & ſecetur tota in partes inæquales ad vtrumque punctorum CD: ponatur autem AC quàm DB maior. Dico quadrata ipſarum AC CB quadratis AD DB maiora eſſe.



Secetur enim AB bifariam in E. & quoniam maior eſt AC, quàm DB, communis auferatur DC. reliqua igitur AD maior erit, quàm reliqua CB eſt autem AE ipſi EB æqualis. ergo D E. quàm EC eſt minor: & puncta CD non æqualiter diſtant à bipartita ſectione. & quoniam rectangulum ACB vnà cum quadrato rectę lineæ CE eſt æquale quadrato ipſius EB; ſed & rectangulum ADB vnà cum quadrato rectæ lineę DE eſt æquale ipſius EB quadrato: erit rectangulum ACB vnà cum quadrato ipſius EC æquale rectangulo ADB vnà cum quadrato ipſius DE. Quorum quadratum ipſius DE eſt minus quadrato EC. & reliquum igitur rectangulum ACB minus eſt rectangulo ADB. quare & quod bis AC CB continetur minus eſt eo, quod bis continetur AD DB, ſed compoſitum ex quadratis rectarum linearum AC CB vnà cum eo, quod bis AC CB continetur, eſt æquale compoſito ex quadratis ipſarum AD DB vnà cum eo, quod bis continetur AD DB. eſt enim vtrumque eorum quadrato ipſius AB æquale. & reliquum igitur compoſitum ex quadratis AC CB maius erit compoſito ex quadratis AD DB. quod demonſtrare oportebat.

5. ſecundi.


4. ſecundi

ALITER

ALITER.

Exponatur quædam recta linea AB, diuisa in partes quidem æquales ad punctum D, in partes vero inæquales ad C. Dico quadrata ex AC CB maiora esse quadratis ex AD DB.

Quoniã enim quadrata ex AC CB dupla sunt quadratorum ex AD DC, quod demonstratum est in nono theoremate secundi libri elementorum; & sunt quadrata quidem ex AD DB dupla quadrati ex AD; propterea quòd AB in D bifariam secatur; quod autem bis fit ex DC duplum est quadrati ex DC: erunt quadrata ex AC CB æqualia quadratis ex AD DB vnà cum eo, quod bis fit ex DC. quadrata igitur ex AC CB maiora sunt quàm quadrata ex AD DB, eo, quod bis fit ex DC. Nõ secetur autem AB bifariam, sed vtcunque in punctis CD, ita vt AD sit maior, quàm CB. similiter demonstrabitur quadrata ex AC CB quadratis ex AD DB maiora esse. Quoniam enim recta linea AB vtcũque secatur in C, quadratum ex AB est æquale quadratis ex AC CB vnà cum eo, quod bis continetur AC CB. Eadem ratione & quadratũ ex AB est æquale quadratis ex AD DB vnà cũ eo, quod bis AD DB continetur. quorũ quod bis continetur AD DB maius est eo quod bis AC CB continetur. est enim rectangulum ADB rectangulo ACB maius: ergo quæ relinquuntur quadrata ex AD DB quadratis ex AC CB minora sunt. quod demonstrare oportebat.




4. secundi.

Ex proxime demõstratis.

F. C. COMMENTARIVS.

Ex iam dictis perspicue apparet excessum, quo compositum ex quadratis rectarum linearum AC CB superat compositum ex quadratis ipsarum AD DB, æqualẽ, vel potius eundem esse excessui, quo rectangulum bis contentum AD DB superat rectangulum, quod bis AC CB continetur.

Fiat enim ex AB quadratum AFGB; & ad ipsam AF applicetur parallelogrammum FH æquale composito ex quadratis AC CB. erit reliquum parallelogrammum HG æquale rectangulo bis contento AC CB. Rursus ad eandem AF applicetur parallelogrammum FK æquale composito ex quadratis AD DB. reliquum igitur parallelogrammum KG est æquale ei, quod bis AD DB continetur. Itaque quoniam parallelogrammum quidem FH est æquale composito ex quadratis AC CB; parallelogrammum vero FK est æquale composito ex quadratis AD DB: erit parallelogrammum LH excessus, quo alterum alterum superat. Sed idem LH est excessus, quo rectangulum bis contentum AD DB superat id, quod bis AC CB continetur. constat igitur verum esse, quod nos demonstrandum proposuimus.




4. secundi.

THEOREMA XXXI. PROPOSITIO XLIII.

Quæ ex binis nominibus ad unum dumtaxat punctum diuiditur in nomina.

Sit ex binis nominibus AB diuisa in nomina ad punctum C, ergo AC CB rationales sunt potentia solum commensurabiles. Dico AB ad aliud punctũ non diuidi in duas rationales potentia solum commensurabiles: si enim fieri potest, diuidatur in D, ita vt AD DB rationales sint potẽtia solũ cõmẽsurabiles. Itaq; manifestũ est A B C non esse eandem, quæ D B. si enim fieri potest, sit eadem. erit igitur & AD ea- A C

dem, quæ CB : atque erit vt AC ad CB, ita BD ad DA : & AB in D similiter diuisa erit, atque in



D puncto C. quod non ponitur, ergo AC non est eadē, quę DB. simili ratione & puncta CD non æquali
E ter distant à bipartita sectione. quo igitur differunt quadrata rectarum linearum
F AC CB ab ipsarum AD DB quadratis, hoc differt & quod bis AD DB continetur ab eo, quod bis continetur AC CB: quoniam & quadrata rectarum linearū AC CB vnà cum eo, quod bis continetur AC CB; & quadrata ipsarum AD DB vnà cū
G eo, quod bis AD DB continetur, æqualia sunt quadrato ipsius AB. sed quadrata AC CB à quadratis AD DB differunt rationali; etenim rationalia vtraque sunt. ergo & quod bis AD DB continetur à contento bis AC CB rationali differt, cum ip
H sa media sint. atqui medium non superat medium rationali. nō igitur quæ ex binis nominibus ad aliud, atque aliud punctum diuiditur. quare ad vnum dumtaxat diuiditur in nomina. quod oportebat demonstrare.

F. C. COMMENTARIVS.

A Ergo AC CB rationales sunt potentia solum commensurabiles] *Ex 37 huius.*

B Itaque manifestum est AC non esse eandem, quæ DB] *Hoc est AC non esse aequalem ipsi DB; sumitur enim hoc loco idem pro aequali.*

C Erit igitur & AD eadem, quæ CB] *Si enim AC sit aequalis ipsi DB, dempta BC vtrique communi, erit reliqua AD reliquae CB æqualis.*

D Quod non ponitur] *Ponitur enim recta linea AB in puncto D aliter diuisa, atque in ipso C.*

E Simili ratione & puncta CD non æqualiter distant à bipartita sectione] *Nā si AD CB inter se æquales non sint, neque puncta CD aequaliter distabunt ab eo puncto, quod rectam lineam AD bifariam diuidit.*

F Quo igitur differunt quadrata rectarum linearum AC CB ab ipsarum AD DB quadratis, hoc differt & quod bis AD DB continetur ab eo, quod bis cōtinetur AC CB] *Quomodo hoc sequatur in antecedenti scholio dictum est.*


G Sed quadrata AC CB à quadratis AD DB differunt rationali, etenim rationalia vtraque sunt] *Nam rationale non superat rationale, nisi rationali. quod nos demonstrauimus ad 27 huius.*

H Atqui medium non superat medium rationali] *Ex 27 huius.*

THEOREMA XXXII. PROPOSITIO. XLIIII.

Quę ex binis medijs prima ad vnum dumtaxat punctum diuiditur in nomina.

Sit ex binis medijs prima AB diuisa in puncto C, ita vt AC CB medię sint potentia solum com




mensurabiles, quæ rationale contineāt. Dico AB in alio puncto non diuidi. si enim fieri potest, diuidatur etiam in D, ita vt AD DB sint medię potentia solum cōmensurabiles, quæ rationale contineant. Quoniam igitur quo differt rectangulum contentum bis AD DB ab eo, quod bis AB CB continetur, hoc differunt etiam quadrata rectarum li-
Ex demonstratis ad 21 huius. neārum AC CB ab ipsarum AD DB quadratis; rationali autem differt contentum AD DB ab eo, quod bis AC CB continetur, utraque enim sunt rationalia: sequitur vt etiam quadrata ipsarum AC CB rationali differant à quadratis AD DB, quæ
27. huius. vtraque media sunt. illud autem fieri non potest. non igitur quæ ex binis medijs prima in alio, atque alio puncto diuiditur in nomina, quare in vno dumtaxat diuidatur necesse est.

THEO-

THEOREMA XXXIII. PROPOSITIO. XLV.

Quæ ex binis medijs ſecunda ad vnum dumtaxat punctum diuiditur in nomina.

Sit ex binis medijs ſecũda AB diuiſa in C, ita vt AC CB mediæ ſint potentia ſolum commenſurabiles, quę medium contineant. manifeſtum eſt punctum C non eſſe in bipartita ſectione, quoniam nõ ſunt longitudine commenſurabiles. Dico ipſam A B in alio puncto non diuidi. ſi enim fieri poteſt, diuidatur in D, ita vt AC non ſit eadem, quæ DB. ſed maior A C poſitione. Itaque conſtat quadrata ex AC CB quadratis ex AD DB maiora eſſe, vt ſupra oſtendimus; & AD DB medias eſſe potentia ſolum commenſurabiles, quæ medium contineant. Exponatur rationalis EF: & quadrato quidem ex AB æquale parallelogrammum EK ad ipſam EF applicetur; quadratis vero ex AC CB æquale auferatur EG. reliquum igitur HK æquale eſt ei, quod bis AC CB continetur. rurſus quadratis ex AD DB, quæ minora ſunt quadratis ex AC CB, ut oſtenſum eſt, æquale parallelogrammum auferatur EL. ergo reliquum MK eſt æquale ei, quod bis cõtinetur A D DB. et quoniam media ſunt quæ ex AC CB quadrata, erit EG medium, & ad rationalem EF applicatum eſt. quare EH rationalis eſt, & ipſi EF longitudine incommenſurabilis. Eadem ratione & HN eſt rationalis, & ipſi EF incommenſurabilis lõgitudine. Quòd cum AC CB mediæ ſint potentia ſolum commenſurabiles, erit AC ipſi C B incommenſurabilis longitudine. ut autem AC ad CB, ita quadratum ex AC ad id, quod AC CB continetur. quadratum igitur ex A C incommenſurabile eſt ei, quod continetur AC CB. ſed quadrato quidem ex AC commenſurabilia ſunt quadrata ex A C C B, etenim AC CB potentia ſunt commenſurabiles; ei uero, quod continetur AC CB, commẽſurabile eſt illud, quod bis AC CB continetur. ergo et quadrata ex AC CB incommenſurabilia ſunt ei, quod bis AC CB continetur: quadratis autẽ ex AC CB æquale eſt parallelogrammum EG, & ei, quod bis continetur AC CB eſt æquale HK. ergo EG ipſi HK eſt incommenſurabile; & ob id recta linea EH ipſi HN incommenſurabilis longitudine; ſuntq; rationales. ergo EH HN rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles. ſi autem duæ rationales potentia ſolum commenſurabiles componantur, tota irrationalis eſt, quę ex binis nominibus appellatur. quare EN ex binis nominibus eſt diuiſa in puncto H. eadem ratione & EM MN oſtendentur rationales potentia ſolum cõmenſurabiles, & erit EN ex binis nominibus ad aliud, atque aliud punctum diuiſa, uidelicet ad H, & ad M. & non eſt EH eadem, quæ MN: quoniam quadrata ex AC CB quadratis ex AD DB ſunt maiora; quadrata autẽ ex AD DB maiora ſunt eo, quod bis AD DB continetur. ergo quadrata ex AC CB, hoc eſt parallelogrammum EG multo maius eſt eo, quod bis continetur AD DB, hoc eſt parallelogrammo MK. quare & EH, quàm MN eſt maior. non igitur E H eadem eſt, quę MN. quod demonſtrare oportebat.



A
B
C
D
E
F
G
H
K

F. C. COMMENTARIVS.

Sed maior AC poſitione] *Hoc eſt ponatur nunc AC maior, quam DB.* A

Vt ſupra oſtendimus] *In lemmate, quod poſitum eſt ante 43. huius.* B

Reliquum igitur HK æquale eſt ei, quod bis AC CB cõtinetur.] *Ex 4. ſecundi libri.* C


Et quoniam media ſunt, quæ ex AC CB quadrata, erit EG medium.] *Rectae enim li* D

neae

neae AC CB ponuntur mediae potentia solum commensurabiles. quare & media erunt ipsarum quadrata, atque inter se commensurabilia; & si componantur vnum fiet medium, quemadmodũ ex duabus rationalibus, si longitudine commensurabiles sint, vna fit rationalis.

At vero spacium ex medijs compositum irrationale esse sic demonstrabimus.]

Componantur duo media spacia AE BC. Dico totum AD esse irrationale. sit enim rationale, si fieri potest; exponaturq; rationalis quędam recta linea EF; & ad ipsam applicetur parallelogrammum EG ipsi AD aequale, latitudinẽ faciens EH: à parallelogrammo autem EG auferatur EK aequale ipsi AB, quod latitudinem faciat EL. reliquum igitur LG reliquo BC est aequale. & quoniam medium est vtrumque ipsorum AB BC; atque est EK quidem ipsi AB aequale; LG vero ipsi BC: erit & vtrumque ipsorum EK LG medium; & ad rationalem EF applicata sunt. rationalis igitur est vtraque ipsarum EL LH, & ipsi EF incommensurabilis longitudine. Rursus quoniam AD rationale ponitur, estq; ipsi EG aequale, & applicatur ad rationalem EF; recta linea EH rationali: erit, & ipsi EF longitudine commensurabilis. est autem EL eidem EF incommensurabilis longitudine. ergo EH ipsi EL longitudine incommensurabilis erit. sed vt EH ad EL, ita & quadratum ex EH ad rectangulum, quod HE EL continetur. quadratum autem ex EH commensurabile est quadratis ex HE EL; vtrumque enim ipsorum est rationale. & rectangulum contentum HE EL est commensurabile ei, quod bis HE EL continetur. ergo ex his, quae ad 14. huius demonstrauimus, quadrata ex HE EL incommensurabilia sunt ei, quod bis continetur HE EL. sed quadratis ex HE EL aequale est id, quod bis HE EL continetur vnà cum quadrato ipsius LH, ex 7 secundi libri. si autem magnitudo ex duabus magnitudinibus composita vni componentium sit incommensurabilis, & reliquae incommensurabilis erit. quod à nobis demonstratum est ad 17. huius. quadrata igitur ex HE EL incommensurabilia sunt quadrato ex LH. rationalia autem sunt quadrata ex HE EL. ergo quadratum ex LH irrationale est: & ob id recta linea LH est irrationalis; sed & rationalis, vt demonstratum fuit; quod fieri non potest. non igitur spacium AD est rationale. quare irrationale sit necesse est. quod demonstrare oportebat.



23. huius
21. huius.
23. huius

E Quare EH rationalis est, & ipsi EF longitudine incommensurabilis.] *Ex 23 huius.*

F Ergo EC ipsi HK est incommensurabile] *Ex demonstratis ad 14 huius.*

G Tota irrationalis est, quae ex binis nominibus appellatur] *Ex 37. huius.*


H Et erit EA ex binis nominibus ad aliud, atque aliud punctum diuisa, videlicet ad H, & ad M] *Quod fieri non posse in 43 huius demonstratum est. non igitur quae ex binis nominibus secunda ad aliud, atque aliud punctum diuiditur in nomina. ergo ad vnum dumtaxat diuidi necessarium est.*

K Et non est EH eadem, quae MN] *Ostendit EH ipsi MN non esse aequalem.*

THEOREMA XXXIIII. PROPOSITIO XLVI.

Maior ad idem dumtaxat punctum diuiditur in nomina.

Sit maior AB diuisa in C, ita ut AC CB potentia incommensurabiles sint, facientes compositum quidem ex ipsarum AC CB quadratis rationale; rectangulum vero, quod ipsis continetur, mediũ. Dico AB in alio puncto non diuidi. si enim fieri potest, diuidatur in D, ita vt AD DB potentia incõmensurabiles sint, faciẽtes compositum quidem ex ipsarum quadratis rationale; quod autem ipsis continetur, medium. & quoniam quo differunt quadrata ex AC CB à quadratis ex AD DB, hoc differt & id, quod bis continetur AD DB ab eo, quod bis AC CB continetur.




sed

ſed quadrata ex AC CB ſuperant quadrata ex AD DB rationali; etenim utraque rationalia ſunt. ergo quod bis cõtinetur AD BD rationali ſuperat id, quod bis AC CB cõtinetur, cũ media ſint. quod eſt abſurdũ. nõ igitur maior ad aliud, atq; aliud punctum diuiditur. ergo ad idem dumtaxat diuidatur neceſſe eſt. Ex demonſtratis ad 27 huius. Ex 27. huius.

THEOREMA XXXV. PROPOSITIO XLVII.

Rationale, ac medium potens ad vnum dumtaxat punctum diuiditur in nomina.


Sit rationale, ac medium potens AB, diuiſa in C; ita vt AC CB potentia incõmenſurabiles ſint; faciantq; compoſitũ quidem ex ipſarum AC CB quadratis medium; quod autem ipſis continetur, rationale. Dico AB in alio puncto non diuidi. ſi enim fieri poteſt, diuidatur in D, ita vt etiam AD DB potentia incommenſurabiles ſint, facientes compoſitum ex ipſarum quadratis medium: quod autem ipſis continetur, rationale. Quoniam igitur quo differt rectangulum bis contentum AD DB ab eo, quod bis AC CB continetur, hoc differunt & quadrata ex AC CB à quadratis ex AD DB. rectangulum autem bis contentum AD DB rationali ſuperat id, quod bis AC CB continetur. ergo & quadrata ex AC CB ſuperant quadrata ex AD DB rationali, cum media ſint. quod eſt abſurdum. non igitur rationale, ac mediũ potens diuiditur ad aliud, atque aliud punctum. quare ad vnum dumtaxat punctum diuidetur.



THEOREMA XXXVI. PROPOSITIO XLVIII.

Bina media potens ad vnum dumtaxat punctum diuiditur in nomina.

Sit bina media potens AB, diuiſa in C, ita vt AC CB potentia incommenſurabiles ſint, facientes etiam compoſitum ex ipſarum AC CB quadratis medium; & quod ipſis continetur, medium, incommenſurabileq; compoſito ex quadratis ipſarum AC CB. Dico AB ad aliud punctum non diuidi, ita vt faciat quæ propoſita ſunt. Si enim fieri poteſt, diuidatur in D, ita vt rurſus AC non ſit eadem, quæ DB, ſed ſit AC poſitione maior; exponaturq; rationalis EF, & ad ipſam quadratis quidẽ ex AC CB æquale parallelogrammum EG applicetur; rectangulo autem bis contento AC CB æquale applicetur HK. totum igitur EK eſt æquale ei, quod fit ex AB, quadrato. Rurſus ad EF applicetur parallelogrammũ EL, æquale quadratis ex AD DB. ergo reliquum, quod bis AD DB continetur, reliquo MK eſt æquale. & quoniam compoſitum ex quadratis ipſarum AC CB medium ponitur, erit & parallelogrammum EG medium: & ad rationalem EF applicatum eſt. rationalis igitur eſt HE, & ipſi EF longitudine incommenſurabilis. Eadem ratione & HN eſt rationalis, ipſiq; EF incommenſurabilis longitudine. & quoniam compoſitum ex quadratis ipſarum AC CB incommenſurabile eſt ei, quod bis AC CB continetur, erit & parallelogrammũ EG ipſi HK incommenſurabile. ergo & recta linea EH eſt incommenſurabilis rectę HN. & ſunt rationales. quare EH HN rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles



4. ſecundi. 23. huius.

biles. & ob id EN ex binis nominibus est diuisa in puncto H. similiter ostendemus ipsam EN in puncto quoque M diuidi: & non est H eadem, quæ MN. ergo quæ ex binis nominibus ad aliud, atque aliud punctum diuiditur; quod est absurdum. non igitur bina media potens diuiditur ad aliud, atque aliud punctum. quare ad vnum dumtaxat punctum diuidetur.

Ex 43. huius.

DIFFINITIONES SECVNDAE.

1 Exposita rationali, & quæ ex binis nominibus, diuisa in nomina, cuius maius nomen plus possit, quàm minus, quadrato rectæ lineæ sibi longitudine commensurabilis, siquidem maius nomen expositæ rationali commensurabile sit longitudine, tota dicatur ex binis nominibus prima.

2 Si vero minus nomen expositæ rationali longitudine sit commensurabile, dicatur ex binis nominibus secunda.

3 Quòd si neutrum ipsorum nominum sit longitudine commensurabile expositæ rationali, vocetur ex binis nominibus tertia.

4 Rursus si maius nomen plus possit, quàm minus, quadrato rectę lineæ sibi lōgitudine incommensurabilis, siquidem maius nomen expositæ rationali sit commensurabile longitudine, dicatur ex binis nominibus quarta.

5 Si vero minus, dicatur quinta.

6 Quòd si neutrum, dicatur sexta.

SCHOLIVM.


Cum igitur sex rectæ lineę ita sumantur, primas ordine facit tres, in quibus maior plus potest, quàm minor, quadrato rectę lineæ sibi longitudine commensurabilis; secundas uero tres reliquas, in quibus maior plus potest, quàm minor, quadrato rectæ lineæ sibi incommensurabilis longitudine; propterea quòd commensurabile antecedit incommensurabile: & adhuc primam quidem, in qua maius nomen commensurabile est expositæ rationali; secundam, in qua minus nomen, quoniam rursus maius antecedit minus, cum ipsum contineat; tertiam uero, in qua neutrum expositæ rationali est commensurabile; & in reliquis tribus eodem modo, primam dicti secundi ordinis quartam appellans, secundam quintam, & tertiam sextam.

PROBLEMA XIII. PROPOSITIO. XLIX.

Inuenire ex binis nominibus primam.

A Exponantur duo numeri AC CB, ita vt compositus ex ipsis, videlicet AB ad ipsum quidem BC proportionem habeat, quam quadratus numerus ad quadratum numerum;

numerum;ad ipſum vero CA proportionem non habeat, quã quadratus numerus ad quadratum numerum.& exponatur quędam rationalis D;& ipſi D longitudine commenſurabilis ſit EF. ergo EF eſt rationalis.fiat autẽ vt BA numerus ad numerum AC, ita ipſius EF quadratum ad quadratũ FG. Sed BA ad AC proportionem habet,quam numerus ad numerum. ergo & quadratum ipſius EF ad quadratũ FG proportionẽ habebit,quã numerus ad numerũ.cõmenſurabile igitur D eſt quadratũ ex EF quadrato ex FG;atq; eſt EF rationalis.ergo & rationalis FG. & E qm̃ BA ad AC proportionem non habet, quam quadratus numerus ad quadratum numerum neque quadratum ex EF ad quadratum ex FG proportionem habebit, quam quadratus numerus ad quadratum numerum. ergo EF ipſi FG incommenſurabilis eſt longitudine.& ob id EF FG rationales ſunt potentia ſolum cõmenſurabiles.ex binis igitur nominibus eſt EG.Dico & primam eſſe.Quoniã enim G eſt vt BA numerus ad numerum AC, ita quadratum ex EF ad id quod ex FG quadratum.maior autem eſt BA,quàm AC. ergo & quadratum ex EF quadrato ex FG eſt maius.ſint quadrato ex EF æqualia quadrata ex FG H.Quoniam igitur eſt vt B H A ad AC,ita quadratum ex EF ad quadratum ex FG, erit per conuerſionem rationis vt AB ad BC,ita quadratum ex EF ad quadratum ex H. ſed AB ad BC proportionem habet,quam numerus quadratus ad quadratum numerum. & quadratum igitur ex EF ad quadratum ex H proportionem habebit quam quadratus numerus ad quadratum numerum.quare EF ipſi H longitudine eſt commẽſurabilis. ideoq; K EF plus poteſt, quàm FG quadrato rectæ lineæ ſibi commenſurabilis longitudine. ſunt autem EF FG rationales,& EF ipſi D longitudine eſt commenſurabilis. ergo L EG ex binis nominibus eſt prima.



F. C. COMMENTARIVS.

Exponantur duo numeri AC CB,ita vt compoſitus ex ipſis videlicet AB ad ipſum quidem BC proportionem habeat,quam quadratus numerus ad quadratum numerum;ad ipſum vero CA proportionem non habeat] *Inuenientur aũt hi ex corollario primi lemmatis ante 30 huius.* A

Ergo EF eſt rationalis] *Ex 6 diffinitione.* B

Fiat autem vt BA numerus ad numerum AC, ita ipſius EF quadratum ad quadratum FG] *Ex corollario 6 huius.* C

Commenſurabile igitur eſt quadratum ex EF quadrato ex FG] *Ex ſexta huius.* D

Ergo & rationalis FG] *Ex 6 diffinitione.* E

Ergo EF ipſi FG incommenſurabilis eſt longitudine] *Ex 9 huius.* F

Ex binis igitur nominibus eſt EG]*Ex 37 huius.* G

Sint quadrato ex EF æqualia quadrata ex FG H]*Inuenietur quadratum ipſius H ex lẽmate ante 15 huius.* H

Quare EF ipſi H longitudine eſt commenſurabilis]*Ex 9 huius.* K

Ergo EG ex binis nominibus eſt prima]*Ex prima ſecundarum diffinitionum.* L


Sit AC numerus 12,CB 4,& EF 6.fiatq; vt 16 ad 12,ita 36 ad aliũ.erit ad 27,ergo 6 plus 27 eſt ex binis nominibus prima.

PROBLEMA XIIII. PROPOSITIO L.

Inuenire ex binis nominibus ſecundam.

Exponantur duo numeri AC CB, ita vt compoſitus ex ipſis AB ad ipſum BC quidem proportionem habeat,quam numerus quadratus ad quadratum numerũ: ad AC vero proportionem non habeat, quam numerus quadratus ad quadratum

numerum:& exponatur rationalis D:& ſit FG ipſi D longitudine commenſurabilis.ergo FG rationalis eſt.fiatq; vt CA numerus ad numerum AB, ita quadratum ex GF ad quadratum ex FE.commenſurabile igitur eſt quadratum ex GF quadrato ex FE. ergo & EF eſt rationalis. & quoniã CA numerus ad ipſum AB proportionem non habet, quam numerus quadratus ad quadratum numerum; neque quadratum ex GF ad quadratum ex FE proportionẽ habebit,quàm numerus quadratus ad quadratum numerum.incommenſurabilis igitur eſt GF ipſi FE longitudine. quare EF FG rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles;ac propterea ex binis nominibus eſt EG. Oſtendendum eſt & ſecundam eſſe. Quoniam enim conuertendo eſt vt BA numerus ad numerũ AC,ita quadratum ex EF ad quadratum ex FG: maior autẽ eſt BA,quàm AC.ergo & quadratum ex EF quadrato ex FG eſt maius.ſint quadrato ex EF æqualia quadrata ex FG, H.eſt igitur per conuerſionem rationis vt AB ad BC, ita quadratum ex EF ad quadratum ex H. ſed AB ad BC proportionem habet, quam quadratus numerus ad quadratum numerum.ergo & quadratum ex EF ad quadratum ex H proportionẽ habebit,quam quadratus numerus ad quadratum numerum;& ob id EF ipſi H longitudine eſt commenſurabilis.quare EF plus poteſt, quàm FG quadrato rectæ lineę ſibi commenſurabiles longitudine.ſuntq; rationales EF FG potentia ſolum cõmenſurabiles:& FG minus nomen longitudine commenſurabile eſt ipſi D expoſitæ rationali.ergo EG ex binis nominibus eſt ſecunda.



6.diffi. Corol. 6. huius. 6.huius. 6.diffi. 9.huius. 9.huius. 2.diffi. ſecũdarum.


F. C. COMMENTARIVS.

Sit AC 9 CB 3.& FG 6.fiat autem vt 9 ad 12,ita 36 ad aliũ erit ad 48.quare ☐ 48 plus 6 eſt ex binis nominibus ſecunda.

PROBLEMA XV. PROPOSITIO LI.

Inuenire ex binis nominibus tertiam.

Exponantur duo numeri AC CB, ita vt compoſitus ex ipſis AB ad BC quidem proportionem habeat, quam numerus quadratus ad quadratum numerum; ad AC vero proportionem non habeat, quam numerus quadratus ad quadratum numerum. Exponatur etiam alius numerus D non quadratus, qui ad vtrumque ipſorum BA AC proportionem non habeat,quam quadratus numerus ad quadratum numerum.denique exponatur rationalis quędam recta linea E; fiatq; vt D ad AB, ita quadratum ex E ad quadratum ex FG.quadratum igitur ex E quadrato ex FG eſt commenſurabile.rationalis autem eſt E.ergo & FG eſt rationalis.& quoniam D ad AB proportionem non habet,quam quadratus numerus ad quadratum numerum, neque quadratum ex E ad quadratum ex FG proportionem habebit,quã quadratus numerus ad quadratum numerum.incommenſurabilis igitur eſt E ipſi FG longitudine.Rurſus fiat vt BA numerus ad numerum AC,ita quadratum ex FG ad quadratum ex GH. ergo quadratum ex FG quadrato ex GH eſt commenſurabile. rationalis autem eſt FG.quare,& GH eſt rationalis.& quoniam BA ad AC proportionem non habet,quã quadratus numerus ad quadratum numerum,neque quadratum ex FG ad quadratum



Corol.6.huius. 6.huius. Diffi.6. 9.huius. 6.huius.

tum ex GH prōportionem habebit,quam quadratus numerus ad quadratum numerum.incommensurabilis igitur est FG ipsi GH longitudine. quare FG GH rationales sunt potentia solum commensurabiles. ideoq; FH ex binis nominibus est. Dico & tertiam esse.Qm enim est vt D numerus ad AB,ita quadratum ex E ad quadratum ex FG;vt autem BA ad AC,ita quod fit ex FG quadratum ad quadratum ex GH:erit ex æquali vt D ad AC, ita quadratum ex E ad quadratum ex GH. sed D ad AC proportionem non habet,quàm numerus quadratus ad quadratum numerum.ergo E ipsi GH incommensurabilis est longitudine. Et quoniam vt BA ad AC,ita quadratum ex FG ad id, quod ex GH quadratum; erit quadratum ex FG maius quadrato ex GH.sint quadrato ex FG æqualia quadrata ex GH, K.per conuersionem igitur rationis est vt A B ad B C, ita quadratum ex FG ad quadratum ex K.sed AB ad BC proportionem habet,quam numerus quadratus ad quadratū numerum. ergo & quadratum ex FG ad quadratum ex K proportionem habebit, quam numerus quadratus ad quadratum numerum. commensurabilis igitur est F G ipsi K longitudine: & ob id FG plus potest,quam GH,quadrato rectæ lineæ sibi longitudine commensurabilis.suntq; FG GH,rationales potentia solum commensurabiles:& neutra ipsarum commensurabilis est ipsi E longitudine. ergo FH ex binis nominibus est tertia.

9.huius.

9.huius.

9.huius.

3 diffi. secundarum.


F. C. COMMENTARIVS.

Sit numerus AC 15,CB 5;& D 30,rationalis autē E sit 6, fiatq; vt 30 ad 20,ita 36 ad aliū. erit ad 24.rursus fiat vt 20 ad 15,ita 24 ad alium,hoc est ad 18. ergo ℞ 24 plus ℞ 18 est ex binis nominibus tertia.

PROBLEMA XVI. PROPOSITIO. LII.

Inuenire ex binis nominibus quartam.

Exponantur duo numeri AC CB, ita vt AB ad vtrūque ipsorum proportionem non habeat, quā numerus quadratus ad quadratum numerum; exponaturq; rationalis D: & ipsi D commensurabilis sit E F longitudine. ergo EF est rationalis. fiat autem vt B A numerus ad numerum A C, ita quadratum ex EF ad quadratum ex FG. commensurabile igitur est quadratum ex EF quadrato ex FG: ideoq; recta linea FG est rationalis. Et quoniam BA ad AC proportionem non habet,quam numerus quadratus ad quadratum numerum, erit EF ipsi F G longitudine incommensurabilis. ergo EF FG rationales sunt potentia solum commensurabiles:& ob id EG ex binis nominibus est. Dico eam & quartam esse. Quoniam enim est vt BA ad AC, ita quadratum ex EF ad quadratum ex FG; maior autem est BA, quàm AC: erit quadratum ex EF quadrato ex FC maius. sint quadrato ex EF aqualia quadrata ex FG, H. per conuersionem igitur rationis est vt AB numerus ad numerum BC, ita quadratum ex EF ad id,quod fit ex H quadratum. sed A B ad B C proportionem non habet,quam numerus quadratus ad quadratum numerum. ergo EF ipsi H longitudine est incommēsurabilis; ac propterea EF plus potest,quàm FG quadrato rectę lineæ sibi incommensurabilis longitudine.suntq; EF FG rationales potentia solum commensurabiles;& EF ipsi D commensurabilis est longitudine. ergo EG ex binis nominibus est quarta.



diffi.6.

6.huius.

9.huius.

37.huius.

9.huius.


4.diffi.secundarum.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit AC numerus 10, CB 6. rationalis autem D sit 6, & EF 4; fiat q ut 16 ad 10, ita 16 ad alium,nempe ad 10.erit 4 plus ℞ 10 ex binis nominibus quarta.

PROBLEMA XVII. PROPOSITIO. LIII.

Inuenire ex binis nominibus quintam.



Exponantur duo numeri A C C B, ita vt AB ad vtrumque ipſorum proportionem non habeat, quam numerus quadratus ad quadratum numerum. exponaturq; recta linea quædam rationalis D; & ipſi D longitudine commenſurabilis ſit FG. ergo FG eſt rationalis: & fiat vt C A ad AB, ita quadratum ex GF ad id, quod fit ex FE quadratum. rationalis igitur eſt FE. Et quoniam CA numerus ad AB proportionem nō habet, quam numerus quadratus ad quadratū numerum; neque quadratum ex G F ad quadratum ex FE proportionem habebit, quam numerus quadratus ad quadratum numerum. ergo EF FG rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles: & ob id EG ex binis nominibus eſt. itaque dico & quintam eſſe. Quoniam enim eſt vt CA ad AB, ita quadratū ex GF ad quadratum ex FE; erit conuertendo vt BA ad AC, ita quadratum ex E F ad quadratum ex FG. ergo quadratum ex EF quadrato ex FG eſt maius. ſint quadrato ex EF æqualia quadrata ex FG, H. per cōuerſionem igitur rationis eſt vt AB numerus ad numerum BC, ita quadratum ex EF ad id, quod ex H quadratum. ſed AB ad BC proportionem non habet, quam quadratus numerus ad quadratum numerum. ergo neque quadratum ex EF ad quadratum ex H proportionem habebit, quam numerus quadratus ad quadratum numerum. ac propterea E F ipſi H longitudine eſt incommēſurabilis. quare EF plus poteſt, quàm FG, quadrato rectæ lineæ ſibi incommenſurabilis longitudine. ſuntq; EF FG rationales potentia ſolum commenſurabiles: & FG minus nomen expoſitę rationali D commenſurabilis eſt longitudine. ergo EG ex binis nominibus eſt quinta.

6. diffi.

37 huius.


5. diffi. ſecundum.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit AC 16, CB 4, & FG 2; fiatq; vt 16 ad 20, ita 4 ad alium, videlicet ad 5. erit R 5 plus 2 ex binis nominibus quinta.

PROBLEMA XVIII. PROPOSITIO LIIII.

Inuenire ex binis nominibus ſextam.



Exponantur duo numeri AC CB, ita vt AB ad vtrumque ipſorum proportionem non habeat, quam numerus quadratus ad quadratum numerum. ſit etiam alius numerus D non quadratus, qui ad vtrumque ipſorum BA AC proportionem non habeat, quam numerus quadratus ad quadratum numerum: & exponatur rationalis quędā recta linea E: fiatq; vt D ad AB, ita quadratum ex E ad quadratum ex FG. commēſurabilis igitur eſt E ipſi F G potentia, atque eſt E rationalis. quare & rationalis eſt F G. Et quoniam D ad AB proportionem non habet, quam numerus quadratus ad quadratum numerum; neque quadratum ex E ad quadratum ex FG proportionem habebit, quam numerus quadratus ad quadratum numerum. ergo E ipſi F G longitudine eſt incommenſurabilis. itaque rurſus fiat ut BA ad AC, ſic quadratum ex FG ad quadratum ex GH. quadratum igitur ex FG quadrato ex GH eſt commenſurabile. rationale autem eſt quadratum ex FG. ergo & quadratum ex GH eſt rationale: ob idq; recta linea GH eſt rationalis. Et quoniam BA ad AC proportionē nō habet,

9. huius.

9. diffi.

bet;quam numerus quadratus ad quadratum numerum, neque quadratum ex FG ad quadratum ex G H proportionem habebit, quam numerus quadratus ad quadratum numerum.incommenſurabilis igitur eſt F G ipſi G H longitudine: & ideo FG GH rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles: quare ex binis nominibus eſt FH. oſtẽdendum eſt & ſextã eſſe. Quoniam enim vt D ad AB,ita eſt quadratũ ex E ad quadratũ ex F G; eſt aũt & vt B A ad A C,ita quadratũ ex F G ad quadratũ ex GH:erit ex æquali vt D ad AC,ita quadratũ ex E ad quadratũ ex GH. ſed D ad A C proportionem non habet,quam numerus quadratus ad quadratum numerum. ergo neque quadratum ex E ad quadratum ex G H proportionem habebit, quam numerus quadratus ad quadratum numerum.incommenſurabilis igitur eſt E ipſi GH longitudine. oſtenſum autem eſt & ipſi FG incommẽſurabilem eſſe. quare utraque ipſarum FG GH ipſi E longitudine eſt incommenſurabilis. & quoniam eſt vt B A ad AC, ita quadratum ex FG ad quadratum ex GH; erit quadratũ ex FG quadrato ex GH maius. ſint quadrato ex FG æqualia quadrata ex GH, K. ergo per conuerſionem rationis vt A B ad BC,ita eſt quadratum ex FG ad quadratum ex K. Sed A B ad B C proportionem non habet,quã numerus quadratus ad quadratum numerum,neque igitur quadratum ex FG ad quadratum ex K proportionem habebit, quam numerus quadratus ad quadratum numerum: ac propterea FG ipſi K longitudine eſt incommenſurabilis. ergo FG plus poteſt,quàm GH quadrato rectæ lineæ ſibi incommenſurabilis longitudine: ſuntq; FG GH rationales potentia ſolum commenſurabiles: & neutra ipſarum longitudine commenſurabilis eſt expoſitę rationali E. quare EH ex binis nominibus eſt ſexta.


9.huius: 37.huius. 9.huius. 6.diffi.ſecundarum.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit AC 10, CB 6 & D 20. rationalis autem E ſit 5, & fiat vt 20 ad 16, ita 25 ad alium, nempe ad 20. rurſus fiat vt 16 ad 10, ita 20 ad aliũ, erit ad 12 $\frac{1}{2}$. ergo ℞ 20 plus ℞ 12 $\frac{1}{2}$ eſt ex binis nominibus ſexta.

LEMMA

Sint duo quadrata AB BC: & ponantur ita, vt DB ſit in directum ipſi B E. ergo & FB ipſi B G in directum erit; & compleatur AC parallelogrammum. Dico AC quadratum eſſe: & quadratorum A B B C rectangulum DG medium eſſe proportionale; itemq; ipſorum AC CB medium proportionale eſſe DC.



Quoniam enim D B quidem eſt æqualis B F, E B vero ipſi B G; erit tota D E toti FG æqualis. ſed DE æqualis eſt vtrique ipſarum AK H C.ergo & vtraque AH KC vtrique AK HC eſt æqualis. æquilaterũ igitur,eſt AC parallelogrãmum.eſt autem & rectangulum. ergo quadratum eſt AC.Et quoniam eſt vt FB ad BG,ita DB ad BE: vt autem FB ad BG, ita AB ad DG: & vt DB ad BE, ita DG ad BC. vt igitur AB ad DG, ita eſt DG ad BC:ideoq; ipſorum AB BC medium proportionale eſt DG. Dico præterea ipſorum AC CB medium proportionale eſſe DC. nam cũ ſit vt AD ad DK, ita KG ad GC: eſt enim vtraque vtrique æqualis: & componendo erit vt AK ad KD, ita KC ad CG. ſed vt AK ad KD,ita A C ad CD;& vt KC ad CG, ita DC ad CB. & vt igitur AC ad CD,ita eſt DC ad CB. ac propterea ipſorum AC CB medium proportionale eſt CD. quod oſtendendum proponebatur.


34.primi. 1.ſexti.

THEOREMA XXXVII. PROPOSITIO LV.

Si ſpacium cõtineatur rationali, & ex binis nominibus prima,

recta

recta linea ſpacium potens irrationalis eſt, quæ ex binis nominibus appellatur.



Spaciũ enim ABCD contineatur rationali AB, & ex binis nominibus prima AD. Dico rectam lineam, quę poteſt ſpacium AC irrationalem eſſe, quę ex binis nominibus appellatur. Quoniã enim AD eſt ex binis nominibus prima, diuidatur in nomina ad punctum E: & ſit AE maius nomen. manifeſtum eſt AE ED rationales eſſe potentia ſolũ commenſurabiles, & AE plus poſſe, quàm ED quadrato rectæ lineæ ſibi commenſurabilis longitudine: & præterea AE expoſitæ rationali AB longitudine commenſurabilem eſſe. Secetur ED bifariam in F. Quoniam igitur AE plus poteſt, quàm ED quadrato rectæ lineæ ſibi commenſurabilis longitudine, ſi quartę parti quadrati, quod fit à minori, hoc eſt quadrato ex EF æquale parallelogrammũ ad maiorem AE applicetur, deficiens figura quadrata, in partes commenſurabiles ipſam diuidet. itaque applicetur, & ſit AGE. ergo AG ipſi GE longitudine eſt commenſurabilis. Deinde per pũcta G E F alterutri ipſarum AB DC parallelæ ducantur GH EK FL: & parallelogrammo quidem AH æquale quadratum conſtituatur SN; parallelogrammo autem GK æquale quadratum NP: & ponatur ita, vt MN ſit in directum ipſi NX. ergo RN ipſi NO in directum erit: & parallelogrammum SP compleatur. quadratum igitur eſt SP. & quoniam rectangulum AGE eſt æquale quadrato ex EF, erit vt AG ad EF, ita FE ad EG. quare & vt AH ad EL, ita eſt EL ad KG: ac propterea parallelogrammorum AH KG mediũ proportionale eſt EL. Sed parallelogrammo AH ęquale eſt quadratum SN, & parallelogrammo GK æquale quadratum NP. ergo quadratorum SN NP medium proportionale eſt EL. ſed & eorumdem SN NP medium proportionale eſt & MR. æquale igitur eſt MR ipſi EL. ſed MR eſt æquale OX, & EL ipſi FC. ergo totũ EC ipſis MR OX eſt æquale. ſunt autem & AH GK ęqualia ipſis SN NP. totũ igitur AC eſt æquale toti SP, hoc eſt quadrato ex MX; ideoq; ipſa MX poteſt parallelogrammum AC. Dico MX ex binis nominibus eſſe. quoniam enim AG commenſurabilis eſt ipſi GE, erit AE utrique ipſarum AG GE commenſurabilis; ponitur autem & AE commenſurabilis ipſi AB longitudine. ergo & AG GE ipſi AB commenſurabiles; ſunt; atque eſt AB rationalis. rationalis igitur & vtraque ipſarũ AG GE: & ob id rationale vtrũq; ipſorum AH GK: & AH ipſi GK eſt commenſurabile. ſed AH eſt ęquale ipſi SN, & GH ipſi NP. ergo & quadrata SN NP, videlicet quæ fiunt ex MN NX rationalia ſunt, & commenſurabilia. Et quoniam incommenſurabilis eſt AE ipſi ED longitudine, & AE quidem eſt commenſurabilis ipſi AG; DE vero ipſi EF: erit & AG ipſi EF longitudine incommenſurabilis. ergo & AH eſt incommenſurabile ipſi EL. ſed AH eſt æquale SN, & EL ipſi MR. quare SN eſt incommenſurabile ipſi MR: vt autem SN ad MR, ita ON ad NR. incommenſurabilis igitur eſt ON ipſi NR: eſt autẽ ON ęqualis MN, & NR ipſi NX. ergo MN ipſi NX eſt incommẽſurabilis. atque eſt quadratum ex MN commenſurabile quadrato ex NX: & vtrumque rationale. quare MN NX rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles: ideoq; MX ex binis nominibus eſt, & poteſt parallelogrammum AC. quod demonſtrare oportebat.

1. Secundæ diffin.

14. ſecundi.

Ex antecedẽti lemmate.

1. ſexti.

43. Primi.

57. huius.

A
B
C
D
E
F
G
H
K L
M
N

F. C. COMMENTARIVS.

A In partes commenſurabiles ipſam diuidet] *Ex 2 parte 18 huius.*

Itaque

Itaque applicetur, & ſit AGE] *Ex 3 lemmate ante 18 huius.* B
Erit vt AG ad EF, ita FE ad EG] *Ex 14 ſexti.* C
Erit AE vtrique ipſarum AG GE commenſurabilis] *Ex 16 huius.* D
Ergo & AG GE ipſi AB commenſurabiles ſunt] *Ex 12 huius.* E
Et ob id rationale vtrumque ipſorum AH GK]*Ex 20 huius.* F
Et AH ipſi GK eſt commenſurabile] *Eſt enim ex 1 ſexti vt AG ad GE, ita AH parallelogrammum ad parallelogrammum GK. ergo ex 10 huius parallelogrammum AH ipſi GK eſt commenſurabile.* G
Et quoniam incommenſurabilis eſt AE ipſi ED longitudine] *Ponitur enim AD eſſe ex binis nominibus prima, quae conſtat ex duabus rationalibus potentia ſolum commenſurabilibus.* H
Erit & AG ipſi EF longitudine incommenſurabilis] *Ex ijs, quae ad 14 huius demonſtrauimus.* K
Ergo & AH eſt incommenſurabile ipſi EL]*Nam vt AG ad EF, ita & AH parallelogrammum ad ipſum EL. quare ex 10 huius propoſitum concludetur.* L
Incommenſurabilis igitur eſt ON ipſi NR] *Ex 10 huius, vt dictum iam eſt.* M
Atque eſt quadratum ex MN commenſurabile quadrato ex NX, & vtrumque rationale.] *Hoc enim ſupra demonſtratum eſt.* N

Sit AB 5, & AD 4 plus ℞ 12. erit EF, vel FD ℞ 3. & ſi ad rectam lineam AE applicetur parallelogrammum aequale quadrato ipſius EF, deficiens figura quadrata, erit ex demonſtratis ad 18 huius AG 3, GE 1. quare parallelogrammũ AH eſt 15, GK 5, & EL vel FC ℞ 75: ideoq; totum AC parallelogrammum erit 20 plus ℞ 300. Huiuſmodi vero ſpacia iuniores etiam binomialia, ſeu ex binis nominibus appellant, quorum latera quadrata, vel radices ex ijs, quae tradita ſunt, facile inuenire licebit in hunc modum.

Binomialis ſpacij latus quadratum, vel radicem inuenire.

Sit binomiale ſpacium 20 plus ℞ 300, cuius oporteat latus quadratum inuenire. diuidatur maius nomen, videlicet 20 in duas partes, ita vt quod ex ipſis producitur ſit aequale quartae parti quadrati minoris nominis, hoc eſt aequale 75. erit ex ijs, quae nos tradidimus ad 18 huius, maior pars 15, & minor 5. dico ℞ 15 plus ℞ 5 eſſe latus quadratum eius ſpacij 20 plus ℞ 300. Quoniam enim recta linea, quae ex binis nominibus cõſtat, videlicet ℞ 15 plus ℞ 5, diuiditur in duas partes, erit quadratum totius aequale quadratis partiũ vnà cum rectangulo, quod bis dictis partibus continetur. itaque quadratum ℞ 15 eſt 15; & quadratum ℞ 5 eſt 5: rectangulum autem, quod continetur ℞ 15 & ℞ 5 eſt ℞ 75, & eius duplum eſt ℞ 300. quae omnia ſi componantur facient 20 plus ℞ 300, et idem erit quadratũ, quod fit ex recta linea ℞ 15 plus ℞ 5. ergo ℞ 15 plus ℞ 5 eſt latus quadratum, vel radix huius ſpacij binomialis 20 plus ℞ 300. Eodem modo & aliorum ſpaciorum binomialium radices inuenietnus. quod facere oportebat.


THEOREMA XXXVIII. PROPOSITIO LVI.

Si ſpacium contineatur rationali, & ex binis nominibus ſecunda, recta linea ſpacium potens irrationalis eſt, quæ ex binis medijs prima appellatur.

Spacium enim ABCD contineatur rationali AB, & ex binis nominibus ſecunda AD. Dico rectam lineam, quæ ſpacium AC poteſt, ex binis medijs primam eſſe. Quoniam enim AD eſt ex binis nominibus ſecunda, diuidatur in nomina ad punctum E, ita vt AE ſit maius nomen. ergo AE ED rationales ſunt potẽtia ſolum cõmenſurabiles: & AE plus poteſt quàm ED quadrato rectę lineę ſibi longitudine cõ 2. diffi ſecũ.
menſurabilis: & minus nomen ED commenſurabile eſt ipſi AB longitudine. ſecetur ED bifariam in F: & quadrato ipſius EF æquale parallelogrammum ad rectam darum.
lineam AE applicetur, deficiens figura quadrata, quod ſit AGE. commenſurabilis 18. huius.
igitur eſt AG ipſi GE lõgitudine. & per puncta G E F ipſis AB DC parallelę ducantur GH EK FL. parallelogrammo autẽ AH æquale quadratum SN conſtituatur, & parallelogrammo GK æquale quadratum NP: & ponatur ita, vt MN ſit in directum

ipſi

ipſi NX.ergo & RN ipſi NO in directum erit; & compleatur SP quadratum.manifeſtum iam eſt ex ijs,quæ demõſtrata ſunt,parallelogrammum MR medium eſſe proportionale quadratorum SN NP:& parallelogrammo EL æquale. & præterea rectã lineam MX poſſe ſpacium AC. oſtendendum igitur eſt ipſam MX ex binis medijs primam eſſe. Quoniam enim incommenſurabilis eſt AE ipſi ED longitudine, cõmenſurabilis aũt ED ipſi AB; erit AE ipſi AB longitudine incommenſurabilis. Et quoniam AG commenſurabilis eſt longitudine ipſi GE,erit AE vtrique ipſarũ AG GE lõgitudine cõmẽſurabilis.atque eſt AE rationalis.rationalis igitur & vtraque AG GE. Quòd cũ AE ſit incommenſurabilis quidem ipſi AB lõgitudine, commenſurabilis autẽ vtrique ipſarum AG GE, erunt AG GE ipſi AB longitudine incommenſurabiles. quare BA, AG, GE rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles. medium igitur eſt vtrumque parallelogrammorum AH GK. & ob id vtrumque quadratorum SN NP eſt medium.ergo rectæ lineę MN NX medię ſunt. rurſus quoniam commenſurabilis eſt AG ipſi GE longitudine, erit parallelogrammum AH parallelogrammo GK commenſurabile, hoc eſt quadratum SN ipſi NP, hoc eſt quadratum ex MN quadrato ex NX.ergo MN NX potentia commenſurabiles ſunt.& quoniam incommenſurabilis eſt AE ipſi ED longitudine: & AE quidem eſt commenſurabilis ipſi AG;ED vero ipſi EF:erit AG ipſi EF longitudine incommenſurabilis.quare & parallelogrammum AH incommenſurabile parallelogrammo EL,hoc eſt SN ipſi MR,hoc eſt ON ipſi NR, hoc eſt MN ipſi NX incommenſurabilis eſt longitudine.oſtenſæ autem ſunt MN NX & mediæ,& potentia commenſurabiles.ergo MN NX medię ſunt,potentia ſolum commenſurabiles.Dico & rationale continere.Quoniam enim DE ponitur commẽſurabilis vtrique ipſarum AB EF. erit FE ipſi EK longitudine commenſurabilis:atque eſt rationalis vtraque ipſarum, rationale igitur eſt & parallelogrammum EL, hoc eſt MR. eſtq; MR,quod MN NX continetur. ſi autem duę mediæ potentia ſolum commenſurabiles componantur, quę rationale contineant;tota irrationalis eſt, quæ ex binis medijs prima appellatur.ergo MX ex binis medijs eſt prima,quod demonſtrare oportebat.



In antecedẽti lemmate.

Ex demonſtratis in antecedente.

37. huius.

14. huius.

16. huius.

6. diffi.

24. huius.

22. huius.

Ex demonſtratis ad 14 huius.

2. huius.

20 huius.

38. huius.

F. C. COMMENTARIVS.


Sit AB 6, AD Rx 12 plus 3. erit EF vel FD 1 $\frac{1}{2}$: & ſi ad AE applicetur parallelogrammũ æquale quadrato ipſius FF, deficiens figura quadrata; erit AG Rx 6 $\frac{1}{4}$ GE Rx $\frac{1}{4}$. parallelogrammum igitur AH eſt Rx 243, GK Rx 27, & EL 9: & totum AC parallelogrammum Rx 432 plus 18. vt autem inueniatur eius radix, diuidemus Rx 432 in duas partes, ita vt quod ex ipſis producitur ſit æquale quartæ parti quadrati 18, hoc eſt æquale 81. erit ex iam dictis maior pars Rx 108 plus Rx 27: quæ duæ radices ſi inter ſe componantur facient Rx 243. minor autem pars erit Rx 108 minus Rx 27. & detracta Rx 27 à Rx 108 relinquitur Rx 27. maior igitur pars eſt Rx 243, & minor Rx 27. quare ſpacij binomialis Rx 432 plus 18 radix erit Rx Rx 243 plus Rx Rx 27.

THEOREMA XXXIX. PROPOSITIO LVII.

Si ſpacium contineatur rationali, & ex binis nominibus tertia, recta linea ſpacium potens irrationalis eſt, quæ appellatur ex binis medijs ſecunda.

Spacium

Spacium enim ABCD contineatur rationali AB, & ex binis nominibus tertia AD, diuidatur in nomina ad punctum E, quorum maius sit AE. Dico rectam lineam, quę potest spacium AC irrationalem esse, quę ex binis medijs secũda appellatur. constituantur enim eadem, quæ supra. & quoniam AD ex binis nominibus tertia est, erunt AE ED rationales potentia solum commensurabiles, & AE plus poterit, quàm ED quadrato rectę lineæ sibi commensurabilis longitudine: neutra; ipsarum AE, ED ipsi AB longitudine erit commensurabilis. similiter ostẽdemus MX eam esse, quæ spacium AC potest, & MN NX ex binis esse medijs. itaque ostendendum est & secundam esse. Quoniam enim DE incommensurabilis est longitudine ipsi AB, hoc est ipsi EK; atque est DE commensurabilis EF: erit EF ipsi EK longitudine incommensurabilis. & sunt rationales. ergo FE EK rationales sunt potentia solum commensurabiles: & ob id EL, hoc est MR medium est, quod MN NX continetur. quare MX ex binis medijs est secunda.



diffi. 3. secundarum.


F. C. COMMENTARIVS.

Sit AB 6, AD Rx 18 plus Rx 10. erit EF Rx 2 $\frac{1}{2}$: & si ad AE applicetur parallelogrammũ AGE æquale quadrato ipsius EF, deficiens figura quadrata, erit AG Rx 12 $\frac{1}{2}$ GE $\frac{1}{2}$. quare parallelogrammum AH est Rx 450, GK Rx 18, & EL Rx 90: & totum parallelogrammum AC est 648 plus Rx 360. Diuidatur Rx 648 in duas partes, ita vt quod ipsis continetur sit æquale quartæ parti quadrati Rx 360, hoc est 90. erit maior pars Rx 450, & minor Rx 18. spacij igitur binomialis Rx 648 plus Rx 360 radix est Rx Rx 450 plus Rx Rx 18.

THEOREMA XL. PROPOSITIO LVIII.

Si spacium contineatur rationali, & ex binis nominibus quarta, recta linea spacium potens irrationalis est, quæ vocatur maior.


Spacium enim AC contineatur rationali AB & ex binis nominibus quarta AD, diuisa in nomina ad punctum E, quorum AE sit maius: Dico rectam lineam, quæ spacium AC potest, irrationalem esse, quæ maior appellatur. Quoniam enim AD ex binis nominibus est quarta, erunt AE ED rationales potentia solum commensurabiles: & AE plus poterit, quàm ED quadrato rectæ lineæ sibi longitudine incommensurabilis: & AE ipsi AB commensurabilis erit longitudine. diuidatur DE bifariam in F: & quadrato ipsius EF æquale parallelogrammum ad AE applicetur, deficiens figura quadrata, quod sit AGE. erit igitur AG ipsi GE longitudine incommen-




diffi. 4. secundarum.

19. huius.

ſurabilis. Ducãtur ipſi AB parallelę GH EK FL, & eadem fiãt, quę ſupra. conſtat igitur MX poſſe ſpacium AC. itaque oſtendendum eſt MX irrationalem eſſe, quæ vocatur maior. Quoniã enim AG ipſi GE incommenſurabilis eſt lõgitudine, erit & AH parallelogrammum ipſi GK incommẽſurabile, hoc eſt SN ipſi NP. ergo MN NX potentia incommenſurabiles ſunt. & quoniam AE ipſi AB longitudine eſt commenſurabilis, parallelogrammum AK rationale eſt. atque eſt æquale quadratis ipſarum MN NX. ergo compoſitũ ex quadratis MN NX eſt rationale. quòd cum DE ſit incommenſurabilis longitudine ipſi AB, hoc eſt ipſi EK; ſit autem commenſurabilis ipſi EF: erit EF ipſi EK incommenſurabilis longitudine. quare KE EF rationales ſunt potentia ſolũ commenſurabiles: & ob id medium eſt parallelogrammum EL, hoc eſt MR, & MN NX continetur: eſtq; compoſitum ex quadratis ipſarum MN NX rationale: & MN ipſi NX potentia incommenſurabilis. ſi autem duæ rectæ lineæ potentia incommenſurabiles componantur, facientes compoſitum quidem ex ipſarum quadratis rationale, quod autem ipſis continetur medium; tota irrationalis erit. vocetur autem maior. ergo MX irrationalis eſt, quæ maior appellatur, & poteſt ſpacium AC. quod demonſtrare oportebat.





40. huius.


40. huius.


F. C. COMMENTARIVS.

Sit AB 6, AD 6 plus R 24. *erit EF* R 6. *ſi autem ad AE applicetur parallelogrammum AG E aequale quadrato ipſius EF, et deficiẽs figura quadrata; erit AG 3 plus* R 3, *& GE 3 minus* R 3. *ergo AH parallelogrammũ eſt 18 plus* R 108, *GK 18 minus* R 108, *& EL vel FC* R 216, *totumq́, parallelogrammum AC 36 plus* R 864. *itaque ſi diuidamus 36 in duas partes, ita vt productum ex ipſis ſit aequale 216, erit maior pars 18 plus* R 108, *& minor 18 minus* R 108. *quare ſpacij binomialis 36 plus* R 864 *radix eſt* R *V*. 18 *plus* R 108 *plus* R *V*. 18 *minus* R 108.

THEOREMA XLI. PROPOSITIO LIX.

Si ſpacium contineatur rationali, & ex binis nominibus quinta, quæ ſpacium poteſt recta linea irrationalis eſt, vocaturq́; rationale, & medium pótens.





Spacium. n. AC cõtineatur rationali AB, & AD ex binis nominibus quinta, quę diuidatur in nomina ad pũctũ E, ita vt maius nomẽ ſit AE. Dico rectam lineã, quę põtſpaciũ AC, irrationalẽ eſſe, quę vocatur rationale, ac mediũ potens. conſtruãtur enim eadem, quæ ſupra. manifeſtũ eſt MX poſſe ſpacium AC. itaque oſtẽdere oportet MX irrationalem eſſe, quæ rationale, ac medium poteſt.

19. huius. Quoniã enim AG ipſi GE incommenſurabilis eſt longitudine, & parallelogrammum AH eſt incommenſurabile

menſurabile parallelogrammo HE, hoc eſt quadratũ ex MN quadrato ex NX. ergo MN NX potentia incõmenſurabiles ſunt. Quòd cũ AD ſit ex binis nominibus quinta; ſitq; minor ipſius portio ED; erit ED ipſi AB cõmẽſurabilis longitudine. ſed AE ipſi ED eſt incommenſurabilis. ergo & AB incommenſurabilis eſt longitudine ipſi AE; ac propterea BA AE rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles. medium igitur eſt AK, hoc eſt compoſitum ex quadratis ipſarum MN NX. & quoniam DE commenſurabilis eſt longitudine ipſi AB, hoc eſt ipſi EK; eſtq; DE commenſurabilis ipſi EF: erit & FE ipſi EK commenſurabilis. rationalis autem eſt EK. ergo & FE eſt rationalis, & parallelogrammum EL rationale, hoc eſt MR, hoc eſt quod MN NX continetur. quare MN NX potentia incommenſurabiles ſunt, facientes compoſitum quidem ex ipſarum quadratis medium: quod autem ipſis continetur, rationale. ergo MX potens eſt rationale, ac medium, & poteſt ſpacium AC. quod demõſtrare oportebat.

Diffi. 5. ſecũdarum.

21. huius.

11. huius.


20. huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit AB 6, AD R 24 plus 4, erit EF 2. applicetur ad AE parallelogrammum AGE aequale quadrato ipſius EF, deficiẽs figura quadrata; erit AG R 6 plus R 2, GE R 6 minus R 2; parallelogrammumq; AH R 216 plus R 72; GK R 216 minus R 72; FL 12: & totum AC parallelogrammum R 864 plus 24. ſi igitur diuidamus R 864 in duas partes, vt id, quod ex ipſis producitur, ſit æquale 144, erit maior pars R 216 plus R 72, & minor R 216 minus R 72. quare ſpacij binomialis R 864 plus 24 radix eſt R V. R 216 plus R 72 plus R V. R 216 minus R 72.

THEOREMA XLII. PROPOSITIO. LX.

Si ſpacium contineatur rationali, & ex binis nominibus ſexta, quæ ſpacium poteſt recta linea irrationalis eſt: vocaturq; bina media potens.



Spacium enim ABCD contineatur rationali AB, & ex binis nominibus ſexta AD; quæ diuidatur in nomina ad punctum E, ita vt AE ſit maius nomen. Dico rectam lineam, quæ poteſt ſpacium AC, irrationalem eſſe, quæ vocatur bina media potens. conſtruantur enim eadem, quę ſupra, manifeſtũ eſt MX poſſe ſpacium AC: & MN ipſi NX potentia incommenſurabilem eſſe. Et quoniam EA ipſi AB incommenſurabilis eſt longitudine, erunt EA AB rationales potentia ſolum commenſurabiles. medium igitur eſt AK, hoc eſt compoſitum ex quadratis ipſarũ MN NX. Rurſus quoniam incõmenſurabilis eſt ED ipſi AB longitudine, erit & FE ipſi EK longitudine incommenſurabilis. ergo & FE EK rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles; ac propterea medium eſt EL, hoc eſt MR, hoc eſt quod MN NX continetur. Quòd cum AE ſit incommenſurabilis ipſi EF, & parallelogrammum AK parallelogrammo EL incõmenſurabile erit. Sed AK quidem eſt cõpoſitũ ex quadratis ipſarũ MN NX: EL vero eſt quod MN, NX continetur. incommenſurabile igitur eſt compoſitum ex quadratis ipſarum MN NX ei, quod MN NX continetur. atque eſt vtrumque ipſorum medium; & MN NX potentia ſunt incommenſurabiles. ergo MX eſt bina media potens, & poteſt ſpacium AC. quod demonſtrare oportebat.

21. huius.

A

B

C

D

F. C. COMMENTARIVS.

A Rursus quoniam incõmensurabilis est ED ipsi ab longitudine, erit & FE ipsi EK longitudine incommensurabilis] *Quoniam enim ED ipsi AB incommensurabilis est longitudine; atque est FE commensurabilis ED; erit ex 13 huius etiam FE ipsi AB, hoc est ipsi EK longitudine incommensurabilis.*

B Quòd cum AE sit incommensurabilis ipsi EF] *Ex 13 huius. est enim AE ipsi ED incommensurabilis, & EF commensurabilis ipsi ED.*

C Et MN NX potentia sunt incommensurabiles] *Nam cum AG sit incommensurabilis ipsi GE longitudine, erit AH parallelogrammum parallelogrammo HE, hoc est quadratũ ex MN quadrato ex NX incommensurabile. ergo MN NX potentia incommensurabiles sunt.*


C Ergo MX est bina media potens] *Ex 42 huius.*

D *Sit AB 5, AD* R 10 *plus* R 8. *erit EF* R 2. *si igitur ad AE applicetur parallelogrammum AGE, aequale quadrato ipsius EF, quod deficiat figura quadrata, erit AG* R 2 $\frac{1}{2}$ *plus* R $\frac{1}{2}$, *GE* R 2 $\frac{1}{2}$ *minus* R $\frac{1}{2}$ *& parallelogrammum AH* R 62 $\frac{1}{2}$ *plus* R 12 $\frac{1}{2}$, *GK* R 62 $\frac{1}{2}$ *minus* R 12 $\frac{1}{2}$, *et EL* R 50: *totumq; AC parallelogrammum* R 250 *plus* R 200. *Diuidatur* R 250 *in duas partes, ita vt quod ex ipsis producitur sit aequale* 50; *erit maior pars* R 62 $\frac{1}{2}$ *plus* R 12 $\frac{1}{2}$, *& minor* R 62 $\frac{1}{2}$ *minus* R 12 $\frac{1}{2}$. *Eius igitur spacij binomialis* R 250 *plus* R 200 *radix est V.* R 62 $\frac{1}{2}$ *plus* R 12 $\frac{1}{2}$ *plus* R 62 $\frac{1}{2}$ *minus* R 12 $\frac{1}{2}$.

LEMMA.

Si recta linea in partes inæquales secetur, ipsarum partium quadrata maiora sunt rectangulo, quod bis dictis partibus continetur.

Sit recta linea AB, & secetur in puncto C, ita vt AC sit maior, quàm CB. Dico quadrata ex AC CB maiora esse rectangulo, quod bis AC CB continetur. secetur enim AB bifariam in D. & quoniam recta linea AB in partes quidem æquales secatur ad D; in partes vero inæquales ad C;



5. secundi. rectangulum, quod AC CB continetur vnà cum quadrato ipsius CD est æquale ei, quod fit ex AD quadrato. ergo rectangulũ ACB quadrato ex AD est minus. quod igitur bis continetur AC CB minus est quàm duplum quadrati ex AD. sed quadrata ex AC CB dupla sunt quadratorum ex AD DC. ergo quadrata ex AC CB maiora sunt eo, quod bis AC CB continetur. quod demonstrare oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

✻ Ergo quadrata ex AC CB maiora sunt eo, quod bis AC CB continetur] *Quoniam enim quadrata ex AC CB dupla sunt quadratorum ex AD DC, erunt quadrata ex AC CB maiora, quàm dupla quadrati ex AD. sed quod bis continetur AC CB minus est, quàm duplum quadrati ex AD. quadrata igitur ex AC CB multo maiora sunt eo, quod bis AC CB continetur.*


THEOREMA XLIII. PROPOSITIO LXI.

Quadratum eius, quæ est ex binis nominibus ad rationalem applicatum latitudinem facit ex binis nominibus primam.

Sit ex binis nominibus AB, diuisa in nomina ad punctum C, ita vt AC sit maius nomen: exponaturq; rationalis DE; & quadrato rectæ lineæ AB æquale ad ipsam DE applicetur parallelogrammum DEFG, latitudinem faciens DG. Dico DG ex binis nominibus primam esse. Applicetur enim ad rationalem DE quadrato quidem ipsius AC æquale parallelogrammum DH: quadrato autem ipsius BC æquale KL.

reliquum

reliquum igitur, quod bis AC CB continetur eſt æquale parallelogrammo MF. ſecetur MG bifariã in N: & alterutri ipſarum ML GF parallela ducatur NX. vtrumque igitur parallelogrammorum MX NF eſt æquale ei, quod ſemel AC CB continetur. Et quoniam ex binis nominibus eſt AB, diuiſa in nomina ad punctum C, erunt AC CB rationales potentia ſolum commenſurabiles. ergo quadrata ex AC CB rationalia ſunt, & commenſurabilia inter ſe ſe: & ob id compoſitum ex quadratis ipſarum AC CB commenſurabile eſt earumdem AC CB quadratis. rationale igitur eſt compoſitũ ex quadratis AC CB, atque eſt æquale parallelogrammo DL. ergo & DL eſt rationale, & ad rationalem DE applicatum eſt. rationalis igitur eſt DM, & ipſi DE commenſurabilis longitudine. Rurſus quoniam AC CB rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles, medium eſt, quod bis AC CB continetur, hoc eſt MF, & ad rationalem ML applicatum eſt. rationalis igitur eſt MG, & ipſi ML hoc eſt ipſi ED longitudine incommenſurabilis. eſt autem & MD rationalis, & ipſi DE commenſurabilis longitudine. ergo DM ipſi MG longitudine eſt incommenſurabilis. ſuntq; rationales. ergo DM MG rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles; ac propterea DG eſt ex binis nominibus. oſtendendum eſt & primam eſſe. Quoniam enim quadratorum ex AC CB medium proportionale eſt, quod AC CB continetur; erit etiam parallelogrammorum DH KL medium proportionale MX. eſt igitur vt DH ad MX, ita MX ad KL, hoc eſt vt recta linea DK ad MN, ita MN ad MK. ergo rectangulum DKM quadrato ex MN eſt æquale. Et quoniam quadratum ex AC commẽſurabile eſt quadrato ex CB, erit & parallelogrammum DH parallelogrammo KL commenſurabile. ergo & DK ipſi KM longitudine eſt commenſurabilis. quòd cum quadrata ex AC CB maiora ſint eo, quod bis AC CB continetur; erit & parallelogrammum DL maius parallelogrammo MF: ideoq; recta linea DM ipſa MG eſt maior. atque eſt rectangulum DKM æquale quadrato ex MN, hoc eſt quartæ parti quadrati ex MG: & DK ipſi KM longitudine eſt commenſurabilis. ſi autem ſint duæ rectæ lineę inæquales, & quartæ parti quadrati minoris æquale parallelogrammum ad maiorem applicetur, deficiens figura quadrata, & in partes cõmenſurabiles ipſam diuidat, maior plus poterit, quàm minor quadrato rectæ lineæ ſibi commenſurabilis longitudine. ſuntq; rationales DM MG, & DM, quæ eſt maius nomen expoſitę rationali DE longitudine eſt commenſurabilis. ergo DG eſt ex binis nominibus prima. quod demonſtrare oportebat.



4. ſecundi
37. huius.
16. huius. 6. diffi.
23. huius.
13. huius.
Ex lemmate ad 55. huius. 1. ſexti. 17. ſexti.
1. ſexti. 10 huius. Ex antecedentium. 1. ſexti. 14. quinti.
19. huius.
1. diffi. ſecundarum.

F. C. COMMENTARIVS.


Sit AB R 15 plus R 5, & DE 5. erit DH 15 KL 5, & MX R 75 & NF R 75. quare ſi ad DE applicetur DH latitudinem faciet DK 3: & ſi applicetur KL faciet KM 1. Quòd ſi ad eandẽ applicetur MX videlicet R 75 faciet latitudinẽ MN R 3 ex 2 theoremate eorum, quae ad 20 huius conſcripſimus. et ſimiliter NG erit R 3. ergo tota DG eſt 4 plus R 12, quae eſt ex binis nominibus prima.

THEOREMA XLIIII. PROPOSITIO LXII.

Quadratum eius, quę eſt ex binis medijs prima ad rationalem applicatum latitudinem facit ex binis nominibus ſecundam.

Sit ex binis medijs prima AB, diuiſa in medias ad pũctum C, quarum AC ſit maior: exponaturq; rationalis DE; & ad ipſam applicetur parallelogrammum æquale quadrato

quadrato ipſius AB,quod ſit DF,latitudinem faciẽs DG.Dico DG ex binis nominibus ſecundã eſſe.Cõſtruantur enim eadem,quę ſupra. & quoniam AB ex binis medijs eſt prima,diuiſa ad pũctum C,erunt AC CB mediæ potentia ſolum cõmenſurabiles,quæ rationalem continent. quare & quę fiunt ex AC CB media ſunt; ideoq; DL eſt medium, quod ad rationalem applicatũ eſt. rationalis igitur eſt MD, & ipſi DE longitudine incommenſurabilis. Rurſus quoniam rationale eſt quod bis AC CB continetur,erit & MF rationale,& ad rationalem ML applicatum eſt. ergo & MG eſt rationalis; & ipſi ML, hoc eſt ipſi DE commenſurabilis longitudine. incommenſurabilis igitur eſt DM ipſi MG,& ſunt rationales.quare DM MG rationales ſunt potẽtia ſolum commenſurabiles;ac propterea DG eſt ex binis nominibus. oſtendẽdum eſt & ſecundam eſſe. Quoniam enim quadrata ex AC CB maiora ſunt eo,quod bis AC CB continetur,erit & DL parallelogrammum parallelogrammo MF maius. ergo & recta linea DM maior eſt ipſa MG. Quòd cum quadratum ex AC quadrato ex CB ſit commenſurabile,& DH parallelogrammum parallelogrammo KL commenſurabile erit.quare & DK commenſurabilis ipſi KM:atque eſt quod DK KM cõtinetur quadrato ipſius MN æquale.ergo DM plus poteſt, quàm MG quadrato rectæ lineæ ſibi longitudine commenſurabilis.eſtq; MG commenſurabilis longitudine ipſi DE.quare DG ex binis nominibus eſt ſecunda.



28.huius.
23.huius.
21.huius.
13.huius.
37. huius.
Ex lem. ad 61.huius.
1.sexti
14. quinti.
19. huius.
2.diffi.secũdarum.


F. C. COMMENTARIVS.

Sit AB RR 48 *plus* RR 27,*et DE* 4;*erit DH* R 48,*KL* R 27,*MX, et NF* 6. *ergo ſi ad DE applicetur DH,faciet DK* R 3 *ex* 2 *theoremate iam dicto,et eadem ratione ſi ad eandem applicetur KL,erit KM* R 1 $\frac{11}{16}$ *et ſi applicetur MX vel NF,erit MN,vel NG* 1 $\frac{1}{2}$ *et quoniam DK KM hoc eſt* R 3,R 1 $\frac{11}{16}$ *longitudine cõmenſurabiles ſunt,ſi inter ſe componantur, erit ex tertio theoremate eorum,quae nos ad* 20 *huius appoſuimus,DM* R 9 $\frac{3}{16}$ *ergo tota DG eſt* R 9 $\frac{3}{16}$ *plus* 3 *videlicet ex binis nominibus ſecunda.*

THEOREMA XLV. PROPOSITIO. LXIII.

Quadratum eius, quę eſt ex binis medijs ſecunda ad rationalem applicatum latitudinem facit ex binis nominibus tertiam.


Sit ex binis medijs ſecunda AB, diuiſa in medias ad C,ita vt AC ſit maior portio. rationalis autem ſit DE:& ad ipſam DE quadrato ex AB æquale parallelogrammum DF applicetur, latitudinem faciens DG.Dico DG ex binis nominibus tertiam eſſe.Conſtruantur enim eadem, quę ſupra. & quoniã AB eſt ex binis medijs ſecũda,diuiſa ad punctũ C,erunt AC CB mediæ potentia ſolum commenſurabiles,quæ medium contineant.ergo & compoſitum ex ipſarum AC CB quadratis medium eſt, & ipſi DL æquale.medium igitur eſt DL, & ad rationalem DE applicatur. ergo rationalis eſt MD, & ipſi DE longitudine incommenſurabilis.Eadem ratione,& MG eſt rationalis, & incommenſurabilis ipſi ML,hoc eſt ipſi DE. vtraque igitur ipſarum



39.huius.
A
25. huius.

DM

DM MG rationalis est, & ipsi DE longitudine incommensurabilis. & quoniam incommensurabilis est AC ipsi CB longitudine; vt autem AC ad CB, ita quadratum ex AC ad rectangulum ACB: erit & quadratum ex AC rectangulo ACB incommensurabile. ergo & compositum ex quadratis AC CB incommensurabile est ei, quod bis AC CB continetur; hoc est DL, incõmensurabile ipsi MF. et ob id recta linea DM ipsi MG est incommensurabilis: suntq; rationales. ergo DG est ex binis nominibus. ostendendũ est et tertiã esse. similiter enim concludemus DM ipsa MG maiorem esse, et DK ipsi KM commensurabilem. atque est rectangulum DKM quadrato ipsius MN æquale. ergo DM plus potest, quàm MG, quadrato rectę lineæ sibi incommensurabilis longitudine; et neutra ipsarum DM MG est longitudine commensurabilis ipsi DE. quare DG est ex binis nominibus tertia.



1. sexti, uel ex lemm. ad 23. huius: B

1. sexti. & 10. huius.

57. huius.

19. huius.

3. diffi. secundarum.

F. C. COMMENTARIVS.

Ergo et compositum ex ipsarum AC CB quadratis medium est.] *Ex duobus enim mediis commensurabilibus, si inter se componantur, vnum fit medium, vt in 45 huius diximus.* A


Ergo et compositum ex quadratis AC CB incommensurabile est ei, quod bis A B C CB continetur.] *Nam cum quadrata ex AC CB commensurabilia sint, si inter se componantur, erit compositum commensurabile quadrato ex AC per 16 huius. quod autem bis continetur AC CB rectãgulo ACB est incõmẽsurabile, vt pote eius duplum. ergo ex ijs, quae nos ad 14 huius demonstrauimus, compositum ex quadratis AC CB incommensurabile est ei, quod bis AC CB continetur.*

Sit AB RR 72 *plus* RR 8, *et DE* 4. *erit DH* R 72, *KL* R 8, *MX, vel NF* R 24. *quare si ad DE applicetur DH, latitudinem faciet DK* R 4 $\frac{1}{2}$: *si vero applicetur KL faciet KM* R $\frac{1}{2}$. *et si MX, vel NF faciet MN, vel NG* R 1 $\frac{1}{2}$. *At si DK KM componantur, hoc est* R 4 $\frac{1}{2}$, *&* R $\frac{1}{2}$ *fiet DM* R 8. *tota igitur DG est* R 8 *plus* R 6, *quae est ex binis nominibus tertia.*

THEOREMA XLVI. PROPOSITIO LXIIII.

Quadratum maioris ad rationalem applicatum latitudinem facit ex binis nominibus quartam.

Sit maior AB, diuisa in puncto C, ita vt AC maior sit quã CB. rationalis autem quędam sit DE: & quadrato ex AB æquale ad ipsam DE applicetur parallelogrammum DF, latitudinem faciens DG. Dico DG ex binis nominibus quartã esse. Constituantur enim eadem, quæ supra. Et quoniam maior est AB, diuisa in C, erunt AC CB potentia incommensurabiles, quæ faciunt cõpositum quidem ex ipsarum quadratis rationale, quod autem ipsis continetur medium. itaque quoniam rationale est compositum ex quadratis ipsarum AC CB, erit & parallelogrammum DL rationale. ergo & rationalis est recta linea DM, ipsiq; DC longitudine commensurabilis. Rursus quoniam medium est quod bis AC CB continetur, hoc est MF, & ad rationalẽ ML est applicatum; erit et MG rationalis, & ipsi DE incommensurabilis longitudine. ergo & DM ipsi MG longitudine incommensurabilis est; ac propterea DM MG rationales



40. huius.

41. huius.

23. huius.

17.huius. rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles. quare ex duobus nominibus eſt DG. oſtendendum eſt & quartam eſſe. ſimiliter enim ſuperioribus cõcludemus DM maiorem eſſe, quàm MG: et rectãgulum DKM quadrato ex MN æquale. Quoniam igitur quadratum ex AC incõmenſurabile eſt quadrato ex CB, erit et DH parallelogrammum incõmenſurabile parallelogrãmo KL. et ob id recta linea DK ipſi KM incõmenſurabilis. ſi aũt ſint duæ rectæ lineę inæquales, & quartæ parti quadrati minoris æquale parallelogrãmũ ad maiorẽ applicetur, deficiens figura quadrata, quod in partes incommenſurabiles longitudine ipſam diuidat; maior plus poterit, quàm minor quadrato rectę lineæ ſibi longitudine incommenſurabilis. ergo DM plus poteſt, quàm MG, quadrato rectæ lineę ſibi incommenſurabilis longitudine. ſuntq; DM MG rationales potentia ſolum commenſurabiles: atque eſt DM commenſurabilis expoſitæ rationali DE. quare DG eſt ex binis nominibus quarta.


1.ſexti & 10. huius. 19 huius. 4.diffi.ſecũdarum.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit AB Rx V. 10 plus Rx 37 ½ plus Rx V. 10 minus Rx 37 ½: et DE ſit 5. erit DH 10 plus Rx 37 ½: KL 10 minus Rx 37 ½: MX, vel NF Rx 62 ½. itaque ſi ad DE applicetur DH latitudinem faciẽs DK, erit DK 2 plus Rx 1 ½: ſi vero applicetur KL faciens KM, erit ea 2 minus Rx 1 ½: & ſi applicetur MX, vel NF, erit MN, vel NG Rx 2 ½. Quòd ſi componantur DK KM, hoc eſt 2 plus Rx 1 ½, & 2 minus Rx 1 ½, fiet DM 4. ergo tota DG eſt 4 plus Rx 10. videlicet ex binis nominibus quarta.

THEOREMA XLVII. PROPOSITIO. LXV.

Quadratum eius, quæ rationale, ac medium poteſt ad rationalem applicatum latitudinem facit ex binis nominibus quintam.



Sit rationale, ac medium potens AB, diuiſa in rectas lineas ad punctum C, ita vt AC ſit maior. exponaturq; rationalis DE, & quadrato ipſius AB æquale parallelogrammum DF ad ipſã DE applicetur, latitudinem faciens DG. Dico DG ex binis nominibus quintam eſſe. Conſtruãtur enim eadem, quæ ſupra. Et quoniam rationale, ac medium potens eſt AB, diuiſa ad C punctum, erunt AC CB potentia incommenſurabiles, quę faciunt compoſitum quidem ex ipſarum quadratis medium, quod autem ipſis continetur rationale. quoniam igitur medium eſt compoſitum ex ipſarum AC CB quadratis, erit & parallelogrãmum DL medium: ideoq; recta linea DM rationalis eſt, & ipſi DE longitudine incommenſurabilis. Rurſus quoniam rationale eſt, quod bis AC CB continetur, hoc eſt parallelogrammum MF; erit MG rationalis, & ipſi DE longitudine commenſurabilis. incommenſurabilis igitur eſt DM ipſi MG. quare DM MG rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles; ac propterea DG eſt ex binis nominibus. Dico & quintam eſſe. ſimiliter enim demõſtrabitur, rectangulum DKM quadrato ex MN eſſe æquale; & DK ipſi KM longitudine eſſe incommenſurabilem. quarę DM plus poteſt, quàm MG quadrato rectæ lineę ſibi incommenſurabilis longitudine: ſuntq; DM MG rationales, potẽtia ſolum commenſurabiles; & minor MG commenſurabilis eſt ipſi DE lõgitudine. ergo DG eſt ex binis nominibus quinta.

41.huius. 23.huius. 21.huius. 13.huius. 5.diffi ſecundarum.

F. C.


F. C. COMMENTARIVS.

Sit ab R *V*. R 125 *plus* 5, *plus* R *V* R 125 *minus* 5; *& DE sit* 5. *erit parallelogrammũ DH* R 125 *plus* 5; *KL* R 125 *minus* 5; *MX vel NF* 10: *& si ad DE applicetur parallelogrammum DH latitudiuem faciens DK, erit DK* R 5 *plus* 1. *si vero applicetur KL latitudinẽ faciens KM, erit KM* R 5 *minus* 1. *& si applicetur MX uel NF, erit MN, vel NG* 2. *quòd si componantur DK KM videlicet* R 5 *plus* 1, R 5 *minus* 1, *fiet DM* R 20. *tota igitur DG est* R 20 *plus* 4. *nimirum ex binis nominibus quinta.*

THEOREMA XLVIII. PROPOSITIO LXVI.

Quadratum eius, quæ bina media potest, ad rationalem applicatum latitudinem facit ex binis nominibus sextam.

Sit bina media potens A B, diuisa ad punctum C: rationalis autem sit D E: & ad ipsam DE quadrato ex AB æquale parallelogrammum DF applicetur, latitudinem faciens DG. Dico DG ex binis nominibus sextam esse. Construantur enim eadem quę supra. Et quoniam bina media potens est AB, diuisa ad C, erũt AC. CB potentia incommensurabiles, facientes & compositum ex ipsarum quadratis medium: & quod ipsis continetur medium; & adhuc incommẽsurabile composito ex quadratis ipsarum. ergo ex iam demonstratis medium est vtrumque parallelogrammorum DL MF: & ad rationalem DE applicata sunt. rationalis igitur est & vtraque DM MG, & ipsi DE longitudine incommensurabilis. & quoniam compositum ex ipsarum AC CB quadratis incommensurabile est ei, quod bis AC CB continetur; erit & DL parallelogrammum parallelogrammo MF incommensurabile: & idcirco DM incommensurabilis MG. quare DM MG rationales sunt potentia solum commensurabiles, & ex binis nominibus est D G. Dico & sextam esse. similiter enim prædictis rursus ostendemus rectãgulum DKM quadrato ex M N æquale, & DK ipsi KM longitudine incommensurabilem esse. ergo DM plus potest, quàm MG quadrato rectæ lineę sibi incommensurabilis longitudine: & neutra ipsarum DM MG longitudine commensurabilis est expositę rationali DE. quare DG ex binis nominibus est sexta.



42. huius.

23. huius.

19. huius.

6. diffi. secũdarum.


F. C. COMMENTARIVS.

Sit AB R *V*. R 252 *plus* R 72, *plus* R *V*. R 252 *minus* R 72: *& DE sit* 6. *erit DH* R 252 *plus* R 72: *KL* R 252 *minus* R 72: *MX, vel NF* R 180. *applicetur ad DE parallelogrammũ DH latitudinem faciens D K. erit D K* R 7 *plus* R 2. *Rursus applicetur K L faciens latitudinem KM. erit KM* R 7 *minus* R 2. *denique applicetur MX, vel NF, erit MN, vel NG* R 5. *ergo tota DG est* R 28 *plus* R 20 *ex binis nominibus sexta.*

THEOREMA XLIX. PROPOSITIO LXVII.

Ei, quæ est ex binis nominibus longitudine commensurabilis, & ipsa ex binis nominibus est, atque ordine eadem.

Sit ex binis nominibus AB, & ipſi AB longitudine commenſurabilis ſit CD. Dico CD ex binis nominibus eſſe, & ordine eandem ipſi AB. quoniam enim ex binis nominibus eſt AB, diuidatur in nomina ad punctum E, & ſit AE maius nomen. ergo AE EB rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles. fiat vt AB ad CD, ita AE ad CF: & reliqua igitur EB ad reliquam FD eſt, ut AB ad CD. commenſurabilis autem eſt AB ipſi CD longitudine. ergo & AE ipſi CF, & EB ipſi FD longitudine eſt commenſurabilis. ſuntq; rationales AE EB. rationales igitur ſunt & CF FD. & quoniam eſt vt AE ad CF, ita EB ad FD, erit permutando ut AE ad EB, ita CF ad FD: ſunt autem AE EB potentia ſolum commenſurabiles. ergo & CF FD potentia ſolum cõmenſurabiles erunt. & ſunt rationales. ex binis igitur nominibus eſt CD. Dico & ipſi AB ordine eandẽ eſſe. uel enim AE plus poteſt, quàm EB quadrato rectæ lineæ ſibi longitudine commenſurabilis, uel incommenſurabilis. ſi quidem commenſurabilis, & CF plus poterit, quàm FD quadrato rectę lineæ ſibi commenſurabilis longitudine. Quòd ſi AE ſit commenſurabilis expoſitæ rationali, & CF eidem commenſurabilis erit. & ob id vtraque ipſarum AB CD ex binis nominibus eſt prima; hoc eſt ordine eadem. Si vero EB ſit commenſurabilis expoſitę rationali, & FD eidem erit commẽſurabilis. ob eamq; cauſſam CD ipſi AB ordine eadem eſt; vtraque enim eſt ex binis nominibus ſecunda. quòd ſi neutra ipſarum AE EB ſit expoſitę rationali commenſurabilis, & neutra CF FD eidem commenſurabilis erit; & eſt vtraque tertia. At ſi AE plus poſſit, quàm EB quadrato rectæ lineæ ſibi incommenſurabilis longitudine, & CF plus poterit, quàm FD quadrato rectæ lineę ſibi longitudine incommenſurabilis: & ſi AE ſit commenſurabilis expoſitæ rationali, & CE eidem commenſurabilis erit, & eſt vtraque quarta. quòd ſi EB, & ipſa FD, & eſt vtraque quinta. ſi vero neutra ipſarũ AE EB, & neutra GF FD expoſitę rationali erit cõmenſurabilis, & eſt vtraque ſexta. ergo ei, quę eſt ex binis nominibus longitudine commenſurabilis, & ipſa ex binis nominibus eſt, & ordine eadem.




12.sexti. 19.quinti. 10.huius. 8.diffi. 10.huius. 15.huius. 12.huius. 15.huius.

THEOREMA L. PROPOSITIO. LXVIII.

Ei, quę eſt ex binis medijs longitudine commenſurabilis, & ipſa ex binis medijs eſt, atque ordine eadem.

Sit ex binis medijs AB, & ipſi AB commenſurabilis longitudine ſit CD. Dico CD ex binis medijs eſſe, & ipſi AB ordine eandẽ. quoniam enim AB ex binis medijs eſt, diuiſa in medias ad punctum E, erunt AE EB mediæ potentia ſolum commenſurabiles. Itaque fiat vt AB ad CD, ita AE ad CF. ergo & reliqua EB ad reliquam FD eſt vt AB ad CD. commẽſurabilis autem eſt AB ipſi CD longitudine. quare & AE ipſi CF longitudine commenſurabilis erit, & EB ipſi FD. ſuntq; mediæ AE EB. mediæ igitur & CF FD. Et quoniã eſt vt AE ad EB, ita CF ad FD, & ſunt AE EB commenſurabiles potentia ſolum; erunt & CF FD potentia ſolum commenſurabiles. oſtenſę autem ſunt & mediæ. ergo CD eſt ex binis medijs. Dico & ipſi AB ordine eandem eſſe. Quoniam enim eſt vt AE ad EB, ita CF ad FD, erit & vt quadratum ex AE ad rectangulum AEB, ita quadratũ ex CF ad rectangulum CFD. quare permutando vt quadratum ex AE ad quadratum ex CF, ita rectangulum AEB ad CFD rectangulum. commenſurabile autem eſt quadratum ex AE quadrato ex CF. ergo & rectangulum AEB rectangulo CFD eſt commenſurabile. ſi igitur rationale eſt rectangulum AEB, & rectangulum CFD rationale erit: atque eſt ex binis medijs prima. ſi vero medium eſt rectangulum AEB



23.huius. 12.ſexti. 19.quinti 10.huius. 24.huius.

AEB, & ipsum CFD erit medium: & est vtraque ex binis medijs secunda. ergo CD ipsi AB ordine eadem est. quod demonstrare oportebat.


F. C. COMMENTARIVS.

Quoniam enim est vt AE ad EB, sic CF ad FD, erit & ut quadratum ex AE ad rectangulum AEB, ita quadratum ex CF ad rectangulum C F D] *Nam cum sit ut AE ad EB, ita CF ad FD; ut autem AE ad EB, ita quadratum ex AE ad AEB rectangulum ex 1 sexti, vel ex lemmate ante 23 huius: erit ut quadratum ex AE ad AEB rectangulum, ita CF ad F D. sed vt C F ad FD, ita quadratum ex CF ad rectangulum CFD. vt igitur quadratum ex AE ad AEB rectangulum, ita quadratum ex CF ad rectangulum CFD.* * 11. quint.

THEOREMA LI. PROPOSITIO LXIX.

Maiori commensurabilis, & ipsa maior est.

Sit maior A B: & ipsi A B commensurabilis sit CD. Dico CD maiorem esse. diuidatur AB in E. ergo AE EB potentia sunt incommensurabiles, quę faciunt compositū quidem ex ipsarum quadratis rationale; quod autem ipsis cōtinetur, medium. & fiant eadem, quæ supra. quoniam igitur est vt AB ad CD, ita AE ad CF, & EB ad FD; erit vt AE ad CF, ita EB ad FD. commensurabilis autē est A B ipsi CD. ergo & vtraque ipsarum AE EB vtrique CF FD est commensurabilis. & quoniam est vt AE ad CF, ita EB ad FD: permutandoq; vt AE ad EB, ita CF ad FD: & componendo vt AB ad BE, ita CD ad DF. vt igitur quadratum ex A B ad quadratū ex B E, ita quadratum ex C D ad quadratum ex D F. similiter demonstrabimus & vt quadratum ex AB ad quadratum ex AE, ita esse quadratum ex C D ad quadratum ex CF. ergo & vt quadratum ex AB ad quadrata ex AE EB, ita quadratum ex CD ad quadrata ex CF FD: permutando igitur ut quadratum ex AB ad quadratum ex CD, ita quadrata ex AE EB ad quadrata ex CF FD. commensurabile autē est quadratum ex A B quadrato ex C D. ergo & quadrata ex AE EB quadratis ex CF FD sunt commensurabilia. atque est compositum ex quadratis ipsarum AE EB rationale. ergo & rationale erit compositum ex quadratis CF FD. similiter aūt & quod bis continetur AE EB commensurabile est ei, quod bis CF FD continetur. atque est medium, quod bis continetur AE EB. medium igitur & quod bis CF FD continetur. ergo CF FD potentia sunt incommensurabiles, facientes compositum ex ipsarum quadratis rationale: quod autem ipsis cōtinetur medium. tota igitur CD irrationalis est, quæ vocatur maior. ergo maiori commensurabilis & ipsa maior est. quod demonstrare oportebat.



40. huius.

A B E F C D

F. C. COMMENTARIVS.

Vt igitur quadratum ex AB ad quadratum ex BE, ita quadratum ex CD ad quadratum ex DF] *Ex 22 sexti libri.* A

Similiter demonstrabimus & vt quadratum ex AB ad quadratum ex AE, ita esse quadratum ex CD ad quadratum ex CF] B

Quoniam enim est vt AB ad BE, ita CD ad DF, erit per conuersionē rationis vt BA ad AE, ita DC ad C F. ergo vt quadratum ex A B ad quadratum ex A E, ita quadratum ex C D ad quadratum ex CF. 22. sexti.

Ergo & quadratum ex AB ad quadrata ex AE EB, ita quadratū ex CD ad quadrata ex CF FD] C

Est enim vt AE ad EB, ita CF ad FD. quare vt quadratum ex AE ad quadratum ex EB, ita quadratum ex CF ad quadratum ex FD: & componendo vt quadrata ex AE EB ad quadratum ex EB, ita quadrata ex CF FD ad quadratum ex FD: conuertendoq; vt quadratum ex EB ad quadrata ex AE EB, ita quadratum ex FD ad quadrata ex CF FD. erat autē

ut quadratum ex AB ad quadratum ex BE, ita quadratum ex CD ad quadratum ex BF. ergo ex aequali ut quadratum ex AB ad quadrata ex AE EB, ita quadratum ex CD ad quadrata ex CF FD.

D Similiter autem & quod bis continetur AE EB commensurabile est ei, quod bis CF FD continetur] *Nam ex 4 secundi quadratum ex AB est aequale quadratis ex AE EB unà cum eo, quod bis continetur AE EB: & eadem ratione quadratum ex CD est aequale quadratis ex CF FD unà cum eo, quod bis CF FD continetur. Cum igitur sit ut totum ad totum, ita ablatũ ad ablatũ, uidelicet ut quadratum ex AB ad quadratũ ex CD, ita quadrata ex AE EB ad quadrata ex CF FD; erit & reliquũ ad reliquũ, ut totum ad totũ; hoc est quod bis continetur AE EB ad id, quod bis CF FD continetur, ut quadratum ex AB ad quadratum ex CD. sed quadratum ex AB commensurabile est quadrato ex CD. ergo ex 10 huius & quod bis continetur AE EB commensurabile est ei, quod bis CF FD continetur.*

E Medium igitur & quod bis CF FD continetur.] *Ex corollario 24 huius. quare & medium est, quod semel continetur CF FD.*


F Ergo CF FD potentia sunt incommensurabiles] *Vt enim AE ad EB, ita est CF ad FD. sed AE est potentia incommensurabilis ipsi EB. ergo & CF ipsi FD potẽtia incommensurabilis erit. sunt igitur CF FD potentia incommensurabiles.*

10. huius.

THEOREMA LII. PROPOSITIO. LXX.

Rationale, ac medium potenti commensurabilis, & ipsa rationale, ac medium potens est.

Sit rationale, ac medium potens AB: & ipsi AB commensurabilis sit CD. ostendendum est & CD rationale, ac medium potẽtem esse. diuidatur AB in rectas lineas ad punctum E. ergo AE EB potentia incommensurabiles sunt, facientes compositum ex ipsarum quadratis medium: quod autem ipsis continetur rationale. & eadem, quæ prius construantur. Similiter demonstrabimus CF FD potentia esse incommensurabiles: & compositum ex quadratis ipsarum AE EB commensurabile esse composito ex quadratis CF FD. Quod autẽ continetur AE EB cõmẽsurabile est ei, quod CF FD continetur. ergo & compositum ex quadratis ipsarum CF FD est medium. Quod autem continetur CF FD rationale. rationale igitur, ac medium potens est CD. quod ostendere oportebat.




40. huius.

THEOREMA LIII. PROPOSITIO. LXXI.

Bina media potenti commensurabilis, & ipsa bina media potens est.

Sit bina media potens AB, & ipsi AB commẽsurabilis CD. ostendendũ est CD bina media potentem esse; Quoniam enim bina media potens est AB, diuidatur in rectas lineas ad punctum E. quare AE EB potentia sunt incommensurabiles, quæ faciunt cõpositum ex ipsarum quadratis medium, quod autem ipsis continetur medium, incommensurabileq; composito ex quadratis ipsarum. & constituantur eadem, quę supra. similiter demonstrabimus CF FD potentia incommensurabiles esse: & compositum ex quadratis ipsarum AE EB commẽsurabile composito ex quadratis CF FD. quod autem AE EB continetur commeusurabile est ei, quod continetur CF FD. quare & compositum ex quadratis ipsarum CF FD medium est: itemq; medium quod CF FD continetur; & adhuc incommensurabile composito ex quadratis CF FD. ergo bina media potens est CD. quod ostendendum fuit.




41. huius.

THEO-

THEOREMA LIIII. PROPOSITIO. LXXII.

Si rationale,& medium componantur, quattuor irrationales fiunt, vel ea,quę ex binis nominibus, vel quę ex binis medijs prima,vel maior,vel rationale ac medium potens.

Sit rationale quidem ſpacium AB, medium autem CD. Dico eam, quę poteſt ſpacium AD, vel eſſe ex binis nominibus, vel ex binis medijs primam, vel maiorem,vel rationale, ac medium potentem.etenim AB vel maius eſt, quã CD, vel minus.ſit primum maius,expona turq; rationalis EF: & ad ipſam applicetur parallelogrammũ EG ipſi AB æquale, quod latitudinem faciat EH: ipſi vero CD æquale ad EF, hoc eſt ad HG applicetur HI latitudinem faciens HK.& quoniam rationale eſt AB, & ipſi eſt æquale EG,erit & EG rationale;& ad rationalem EF applicatum eſt,latitudinem faciens EH. ergo EH eſt rationalis, & ipſi EF longitudine commenſurabilis. Rurſus quoniam medium eſt CD, & ipſi eſt æquale HI;erit & HI medium;& ad rationalem EF,hoc eſt HG applicatum eſt,latitudinem faciens HK.quare HK eſt rationalis,& incommenſurabilis ipſi EF longitudine.quòd cum medium ſit CD,rationale autem AB;erit AB ipſi CD incommẽſurabile.ergo & EG incõmenſurabile eſt ipſi HI.vt autem EG ad HI, ita eſt recta linea EH ad HK.ergo EH ipſi HK longitudine eſt incommenſurabilis. & ſunt vtræq; rationales.quare EH HK rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles; & ob id ex binis nominibus eſt EK,diuiſa ad pũctum H.& quoniam maius eſt AB, quàm CD,æquale autem AB ipſi EG,& CD ipſi HI;erit & EG,quàm HI maius. ergo & EH maior eſt quàm HK.vel igitur EH plus poteſt, quàm HK quadrato rectæ linæ ſibi commenſurabilis longitudine,vel incommenſurabilis. poſsit primum quadrato rectæ lineæ ſibi commenſurabilis longitudine; & ſit maior HE expoſitę rationali EF commenſurabilis.ergo EK ex binis nominibus eſt prima, atque eſt EF rationalis. Si autem ſpacium cõtineatur rationali,& ex binis nominibus prima,recta linea ſpacium potens ex binis nominibus eſt.ergo quæ poteſt ſpacium EI eſt ex binis nominibus.quare & ea quæ poteſt ſpacium AD.Sed EH plus poſsit,quàm HK, quadrato rectæ lineæ ſibi longitudine incommenſurabilis: & ſit maior EH expoſitę rationali EF commenſurabilis longitudine.ergo EK ex binis nominibus eſt quarta, & eſt EF rationalis.ſi autem ſpacium contineatur rationali, & ex binis nominibus quarta,recta linea ſpacium potens irrationalis eſt,quæ maior appellatur. potens igitur ſpacium EI maior eſt.ergo & potẽs ſpacium AD maior.ſit deinde ſpacium AB minus, quàm CD. erit & EG quàm HI minus; & ob id recta linea EH minor, quàm recta HK. vel igitur KH plus poteſt, quàm HE quadrato rectæ lineę ſibi longitudine commenſurabilis, vel incommenſurabilis. poſsit primum quadrato rectæ lineæ commenſurabilis longitudine, & ſit minor EH commenſurabilis expoſitæ rationali EF longitudine. ergo EK ex binis nominibus eſt ſecunda: rationalis autem EF. quod ſi ſpacium contineatur rationali, & ex binis nominibus ſecunda, recta linea ſpacium potens eſt ex binis medijs primam:



21.huius.

23.huius.

1.sexti.


10.huius.

1.Diffi. facta datum.

55. huius.

4.diffi.

58.huius.




56. huius.


prima. potens igitur ſpacium EI prima eſt ex binis medijs. ergo & potẽs ſpaciũ AD. Sed KH plus poſsit, quàm HE quadrato rectę lineæ ſibi longitudine incommenſurabilis; ſitq́; minor EH expoſitæ rationali EF commenſurabilis longitudine. quare EK ex binis nominibus eſt quinta; atque eſt rationalis EF. ſi autem ſpacium con-
59. huius. tineatur rationali, & ex binis nominibus quinta, quæ ſpacium poteſt recta linea rationale ac medium potẽs eſt. quæ igitur poteſt ſpacium EI rationale & medium potens eſt; ideoq́; rationale & mediũ potẽs eſt quæ põt ſpaciũ AD. Si igitur rationale, & medium componantur, quattuor irrationales fiunt, vel ea quæ ex binis nominibus, vel quæ ex binis medijs prima, vel maior, vel rationale, ac medium potens. quod demonſtrare oportebat.

THEOREMA LV. PROPOSITIO LXXIII.

Si duo media inter ſe incommenſurabilia componantur duæ reliquæ irrationales fiunt, vel ex binis medijs ſecunda, vel bina media potens.



Componantur enim duo media incõmenſurabilia inter ſe AB CD. Dico rectam lineam, quæ ſpaciũ AD poteſt vel ex binis medijs ſecundam eſſe, vel bina media potentem. ſpacium enim AB vel maius eſt, quàm CD, vel minus. ſit primum maius; exponaturq́; rationalis EF: & ad EF ſpacio quidem AB æquale applicetur EG, latitudinem faciens EH. ipſi vero CD æquale applicetur HI, latitudinem faciens HK. & quoniam medium eſt vtrumq́; ipſorũ AB CD, erit & vtrũq; EG HI medium, & ad rationalem EF applicata ſunt, quæ latitudinem faciunt E
23. huius. H HK. ergo vtraque EH. HK rationalis eſt, & ipſi EF longitudine incommenſurabilis. quòd cum AB incõmenſurabile ſit ipſi CD; ſitq́; AB quidem æquale EG; CD
1. decimi. vero ipſi HI: erit & EG ipſi HI incõmẽſurabile. ſed vt EG ad HI, ita eſt EH ad HK.
10. huius. incommenſurabilis igitur eſt EH ipſi HK lõgitudine: ideoq́; EH HK rationales sũt
37. huius. potentia ſolum commenſurabiles. quare ex binis nominibus eſt EK. Itaque vel EH plus poteſt, quàm HK quadrato rectę lineę ſibi commenſurabilis longitudine, vel incommenſurabilis. poſsit primum quadrato rectæ lineę ſibi commenſurabilis longitudine; & neutra ipſarum EH HK longitudine commenſurabilis eſt expoſitæ rationali EF. ergo EK ex binis nominibus eſt tertia, & eſt FE rationalis. ſi autem ſpacium contineatur rationali, & ex binis



47. huius. nominibus tertia, recta linea ſpaciũ potens eſt ex binis medijs ſecũda. ergo quę poteſt ſpacium EI, hoc eſt AD eſt ex binis medijs ſecunda. ſed EH plus poſsit quàm HK quadrato rectæ lineæ ſibi incommenſurabilis longitudine; & vtraque ipſarum EH HK longitudine incõmenſurabilis eſt expoſitę rationali EF. quare EK ſexta eſt ex binis nominibus. At ſi ſpacium contineatur rationali, &
60. huius. ex binis nominibus ſexta, quæ ſpacium poteſt recta linea eſt bina media potẽs. ergo quę poteſt ſpacium AD bina me-

dia

dia potens est. Similiter demonstrabimus & si AB sit minus, quàm CD, rectam lineam, quæ spacium potest AD, vel ex binis medijs secundam esse, vel rationale, ac medium potentem. si igitur duo media inter se incommensurabilia componantur reliquæ duæ irrationales fiunt, vel ex binis medijs secunda, vel bina media potens. quod demonstrandum fuit.


Quæ ex binis nominibus & quæ post ipsam sunt, irrationales neq; mediæ, neque inter se eædem sunt. quadratum enim, quod fit à media, ad rationalem applicatum latitudinem efficit rationalem, et ei ad quam applicatur, longitudine incommensurabilem. quòd autem fit ab ea, quæ ex binis nominibus ad rationalem applicatum latitudinem efficit ex binis nominibus primam. quod ab ea, quę est ex binis medijs prima ad rationalem applicatum latitudinem efficit ex binis nominibus secundã. Quod ab ea, quæ est ex binis medijs secunda ad rationalem applicatum latitudinẽ efficit ex binis nominibus tertiam. Quod à maiori ad rationalem applicatum latitudinem efficit ex binis nominibus quartam. Quod ab ea, quæ rationale, ac mediũ potest ad rationalem applicatum latitudinem efficit ex binis nominibus quintam. Quod ab ea, quæ bina media potest ad rationalem applicatum latitudinem efficit ex binis nominibus sextam. Quoniam igitur dictę latitudines differunt et à prima & inter se se: à prima quidem, quòd rationalis sit; inter se se vero, quod ordine non sint eædem, constat & ipsas irrationales inter se differentes esse.

23. huius. 61. huius. 62. huius. 63. huius. 64. huius. 65 huius. 66. huius.

SCHOLIVM.

Septem sunt senarij, de quibus hactenus dictum est. eorum primus quidem ostendit ortum linearum irrationalium: secundus autem diuisionem, nempe quòd ad vnum duntaxat punctum diuiduntur. tertius earum, quæ ex binis nominibus inuentionem, videlicet primę, secundę, tertiæ, quartæ, quintæ, & sextę. deinceps sequitur quartus senarius, ostendens quomodo hæ lineæ inter se differant. namque vsus ijs, quæ ex binis nominibus, ostendit differentiam sex irrationalium. Quintum, & sextum exposuit, ostendens in quinto quidem applicationes quadratorum, quę ex irrationalibus, videlicet quales irrationales faciant, latitudines applicatorũ spaciorũ. In sexto aũt quomodo irrationalibus commensurabiles eiusdem speciei sint. Rursus in septimo manifeste ostendit differentiam ipsarum. Apparet autem & in his irrationalibus arithmetica analogia: & quæ media sumitur proportionalis inter portiones cuiusque lineę irrationalis iuxta arithmeticam analogiam, & ipsa eiusdem speciei cũ ijs, inter quarũ portiones media interijcitur. itaq primum arithmeticam medietatem in his esse, sic apparet.

Ponatur enim exempli gratia ex binis nominibus AB, & in nomina ad punctum C diuidatur. manifestum est AC maiorem esse, quàm CB. auferatur à recta linea AC ipsi BC æqualis AD, & CD bifariam in E secetur. constat igitur AE ipsi EB æqualem esse. ponatur alterutri ipsarum æqualis FG. manifestum est quo differt AC ab ipsa FG, eo differre EB ab ipsa BC; etenim AC ab ipsa FG differt magnitudine EC: & eadem magnitudine differt FG ab ipsa BC, quod est arithmeticæ analogiæ proprium. cõmensurabilis autem est FG ipsi AB; est enim eius dimidię æqualis. ergo FG ex binis nominibus est. similiter ostendetur & in alijs.



67. huius.

PRIN-

PRINCIPIVM SENARIORVM


PER APHAERESIM HOC EST

Per detractionem.

THEOREMA LVI. PROPOSITIO LXXIIII.

Si à rationali rationalis auferatur potentia ſolum commenſurabilis exiſtẽs toti, reliqua irrationalis eſt. vocetur autem apotome.

A rationali enim AB rationalis auferatur BC, potentia ſolum cõmenſurabilis exiſtens toti. Dico reliquã AC irrationalem eſſe, quæ vocatur apotome. Quoniã enim incommenſura-



A bilis eſt AB ipſi BC longitudine; atq; eſt vt AB ad BC, ita quadratum ex AB ad id quod continetur AB BC: erit quadratũ ex AB incommenſurabile ei, quod AB BC continetur, ſed quadrato quidem ex AB commenſurabilia ſunt quadrata ex AB BC: ei vero, quod continetur AB BC, commenſurabile eſt quod bis AB BC contine-
B tur. quadrata igitur ex AB BC ei, quod bis continetur AB BC ſunt incommenſu-
C rabilia. ergo reliquo, nempe quadrato ex AC incommenſurabilia ſunt quadrata ex
D AB BC; quoniam quadrata ex AB BC æqualia ſunt ei, quod bis AB BC contine-
E tur vnà cum quadrato ex AC. rationalia autem ſunt quadrata ex AB BC. ergo recta linea AC eſt irrationalis. vocetur autem apotome.

F. C. COMMENTARIVS.

A Atque eſt vt AB ad BC, ita quadratum ex AB ad id, quod continetur AB BC] *Ex 1. ſexti, vel ex lemmate, quod 23 huius inſeruit.*

B Quadrata igitur ex AB BC ei, quod bis continetur AB BC ſunt incommenſurabilia] *Ex demonſtratis à nobis ad 14 huius.*

C Ergo reliquo, nempe quadrato ex AC iucommenſurabilia ſunt quadrata ex AB BC] *Ex demonſtratis ad 17 huius.*

D Quoniam quadrata ex AB BC æqualia ſunt ei, quod bis AB BC cõtinetur, vnà cum quadrato ex AC] *Ex ſeptima 2 libri.*


E Ergo recta linea AC eſt irrationalis] *Quoniam enim quadrata ex AB BC incommenſurabilia ſunt quadrato ex AC, & ſunt quadrata ex AB BC rationalia, ſequitur quadratum ex AC irrationale eſſe, ideoque ex 11 diffinitione rectam lineam AC eſſe irrationalem.*

Sit recta linea AB 2, BC R 3. erit AC 2 minus R 3. reſpondet autem tota linea AB maiori nomini eius, quae eſt ex binis nomibus, de qua in 37 huius agitur; & BC reſpondet minori. atque eſt AC reliqua portio maioris nominis, nempe minori nomine ex eo detracto.

THEOREMA LVII. PROPOSITIO LXXV.

Si à media media auferatur potentia ſolum commenſurabilis exiſtens toti, quæ cum tota rationale contineat; reliqua irrationalis eſt. vocetur autem mediæ apotome prima.

A media enim AB auferatur media BC, potentia ſolum commenſurabilis exiſtens ipſi AB, & cum ea rationale faciens, videlicet quod AB BC continetur. Dico reliquam AC irrationalẽ



eſſe. vocetur autem mediæ apotome prima. Quoniam enim AB BC mediæ ſunt,
A erunt & quæ ex AB BC quadrata media. rationale autem eſt quod bis continetur

AB

AB BC.quadrata igitur ex AB BC incommensurabilia sunt ei, quod bis AB BC continetur.ergo & reliquo,videlicet quadrato ex AC incōmensurabile est id,quod bis AB BC continetur,quoniam si tota magnitudo vni componentium sit incommensurabilis,& quæ à principio magnitudines incommensurabiles erunt. Irrationalis igitur est AC.vocetur; mediæ apotome prima. B C D

F. C. COMMENTARIVS.

Rationale autem est,quod bis continetur AB BC] *Ponitur enim rationale, quod semel AB BC continetur.* A

Ergo & reliquo,videlicet quadrato ex AC incommensurabile est id, quod bis A B BC continetur] *Namque ex 7 secundi quadrata ex AB BC sunt aequalia ei,quod bis AB BC continetur vnà cum quadrato,quod fit ex AC.* B

Quoniam si tota magnitudo vni componentium sit incommensurabilis] *Ex 17 huius.* C


Irrationalis igitur est AC] *Nam cum id,quod bis AB BC continetur sit rationale,& incōmensurabile quadrato ex AC,erit quadratum ex AC irrationale: idcircoq; recta linea AC irrationalis ex 11.diffinitione.* D

Sit recta linea AB ℞℞ 54,BC ℞℞ 24.erit AC ℞℞ 54 minus ℞℞ 24.respondet autem tota linea AB maiori nomini eius, quae est ex binis medijs prima,de qua in 38 huius, & BC minori,est igitur AC reliqua portio maioris nominis,minori ex eo detracto.

THEOREMA LVIII. PROPOSITIO. LXXVI.

Si à media media auferatur, potentia solum commensurabilis existens toti,quæ cum tota medium contineat; & reliqua irrationalis est.vocetur autem mediæ apotome secunda.

A media enim AB auferatur media BC potētia solum commensurabilis existens toti AB,& cum ea medium continens, videlicet quod continetur AB BC. Dico reliquam AC irrationalem esse. vocetur autem mediæ apotome secunda. exponatur enim rationalis DI: & quadratis quidem ex AB BC æquale parallelogrammum DE ad ipsam DI applicetur,latitudinem faciens DG:ei vero quod bis AB BC continetur æquale parallelogrammum DH ad eandem DI applicetur,latitudinem faciens DF.reliquum igitur FE est æquale quadrato ex AC. & quoniam media sunt,quæ ex AB BC quadrata; erit & parallelogrammum DE medium.& ad rationalem DI applicatum est, latitudinem faciens DG.ergo DG est rationalis,& ipsi DI longitudine incommensurabilis. Rursus quoniam medium est quod AB BC continetur,erit & quod bis continetur AB BC medium: atque est æquale parallelogrammo DH. ergo & DH est medium, & ad rationalem DI applicatum est latitudinem faciens DF. rationalis igitur est DF, & ipsi DI longitudine incommensurabilis.& quoniam AB BC potentia solum cōmensurabiles sunt,erit AB ipsi BC incommensurabilis longitudine. ergo quadratum ex AB incommensurabile est ei,quod AB BC continetur.sed quadrato quidē ex AB commensurabilia sunt quæ ex AB BC quadrata;ei vero,quod AB BC continetur commensurabile est id,quod bis continetur AB BC.quadrata igitur ex AB BC incommensurabilia sunt ei,quod bis AB BC continetur. parallelogrammum autem DE est æquale quadratis ex AB BC; & parallelogrammum DH æquale est ei,quod bis continetur AB BC.ergo DE ipsi DH est incommensurabile.sed vt DE



A B C D E Coroll. 24. huius. F

ad DH, ita recta linea GD ad DF. incommensurabilis igitur est GD ipsi DF longitudine. & sunt vtraque rationales. quare GD DF rationales sunt, potentia solum cõmensurabiles. ergo FG apotome est; & DI est rationalis. quod autem rationali, & irrationali continetur rectangulum irrationale est, & ipsum potens est irrationalis. sed recta linea AC potest FE parallelogrammum. ergo AC est irrationalis. vocetur autem mediæ apotome secunda.

1. 6 huius. G H K

F. C. COMMENTARIVS.

A Reliquum igitur FE est æquale quadrato ex AC] *Ex 7 secundi libri.*

B Ergo DG est irrationalis, & ipsi DI longitudine incommensurabilis] *Ex 23 huius.*

C Erit & quod bis continetur AB BC medium] *Ex corolario 24 huius.*

D Ergo quadratum ex AB incommensurabile est ei, quod AB BC continetur] *Est enim vt AB ad BC, ita quadratum ex AB ad rectangulum ABC. & cum AB ipsi BC longitudine sit incommensurabilis, erit & quadratum ex AB incommensurabile ei, quod AB BC continetur. ex 10 huius.*

Lemma. ad 23 huius.

E Sed quadrato quidem ex AB commensurabilia sunt quæ ex AB BC quadrata] *Nam rectae lineae AB BC potentia commensurabiles ponuntur.*

F Quadrata igitur ex AB BC incommensurabilia sunt ei, quod bis AB BC continetur] *Ex demonstratis ad 17 huius.*

G Ergo FG apotome est] *Ex 74 huius.*

H Quod autem rationali, & irrationali continetur rectangulum irrationale est] *Ex scholio ad 39 huius apposito, quare sequitur parallelogrammum FE irrationale esse.*

K Ergo AC est irrationalis] *Ex 11 diffinitione.*

Sit AB ℞℞ 18, BC ℞℞ 8. erit AC ℞℞ 18 minus ℞℞ 8. respondet autem ipsa AB maiori nomini eius, quae est ex binis mediis secunda; & BC respondet minori. de qua in 39 huius.

THEOREMA LIX. PROPOSITIO LXXVII.

Si à recta linea recta linea auferatur, potentia incommensurabilis existens toti, quæ cum tota faciat compositum quidem ex ipsarum quadratis rationale, quod autem ipsis continetur medium; reliqua irrationalis est. vocetur autem minor.



A recta linea AB auferatur recta BC potentia incommensurabilis existens toti, faciēsq; cum tota AB compositum quidem ex ipsarũ AB CB quadratis rationale; quod autem bis AB BC continetur medium. Dico reliquam AC irrationalem esse, quę vocatur minor. Quoniam enim cõpositum quidem ex ipsarum AB BC quadratis rationale est: quod autem bis AB BC continetur medium, erunt AB BC quadrata incommensurabilia ei, quod bis continetur AB BC. ergo per conuersionem rationis quadrata ex AB BC quadrato ex AC sunt incommensurabilia. sed quadrata ex AB BC rationalia sunt. irrationale igitur est quadratum ex AC; ideoq; recta linea AC est irrationalis. vocetur autem minor.

A B C

F. C. COMMENTARIVS.

A Ergo per conuersionem rationis quadrata ex AB BC quadrato ex AC sunt incommensurabilia] *Ex demonstratis ad 17 huius.*

B Irrationale igitur est quadratum ex AC] *Ex 10 diffinitione.*


C Ideoq; recta linea AC est irrationalis] *Ex vndecima diffinitione.*

Sit AB ℞ V. 32 plus ℞ 704, BC ℞ V. 32 minus ℞ 704. erit AC ℞ V. 32 plus ℞ 704 minus ℞ V. 32 minus ℞ 704. respondet autem AB maiori nomini eius, quae dicitur maior, & BC respondit minori nomini eiusdem; de qua in 40 huius.

THEO-

THEOREMA LX. PROPOSITIO. LXXVIII.

Si à recta linea recta linea auferatur potentia incommensurabilis existens toti, & cum tota faciens compositum quidem ex ipsarum quadratis medium, quod autem ipsis bis continetur rationale; reliqua irrationalis est; vocetuŕque cum rationali medium totum efficiens.




A recta enim linea AB recta linea BC auferatur, potentia incommensurabilis existens totiꝰ AB; faciensq́; compositum quidem ex ipsarum AB BC quadratis medium; quod autem bis AB BC continetur, rationale. Dico reliquam AC irrationalem esse: vocetur autem cum rationali medium totum efficiens. Quoniam enim compositum ex ipsarum AB BC quadratis medium est: quod autem bis continetur AB BC rationale; erunt ex AB BC quadrata incommensurabilia ei, quod bis AB BC continetur. & reliquum igitur quadratum ex AC incommensurabile est ei, quod bis continetur AB BC. atque est quod bis continetur AB BC rationale. ergo quadratum ex AC irrationale est: & ob id recta linea AC irrationalis. vocetur aũt cũ rationali medium totum efficiẽs. (ϛ huius 10. diff.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit AB Ꝛ V. Ꝛ 13 ½ plus Ꝛ 4 ½: BC Ꝛ V. Ꝛ 13 ½ minus Ꝛ 4 ½. erit AC Ꝛ V. Ꝛ 13 ½ plus Ꝛ 4 ½ minus Ꝛ V. Ꝛ 13 ½. minus Ꝛ 4 ½, respondetq́, AB maiori nomini eius, quae vocatur rationale, ac medium potens, & BC respondet minori. de qua in 41 huius.

THEOREMA LXI. PROPOSITIO. LXXIX.

Si à recta linea recta linea auferatur potentia incommensurabilis existens toti: & cum tota faciens compositum quidem ex ipsarum quadratis medium, quod autem ipsis bis cõtinetur medium, incommensurabileq́; composito ex quadratis ipsarum; reliqua irrationalis est. vocetur autem cum medio medium totum efficiẽs.



A recta enim linea AB, recta linea BC auferatur, potẽtia incommensurabilis existens toti AB, faciensq́; cõpositum quidem ex ipsarum AB BC quadratis mediũ; quod autem bis AB BC continetur medium, & adhuc incommensurabile composito ex quadratis ipsarum. Dico reliquam AC irrationalem esse. vocetur autem cum medio medium totum efficiens. exponatur enim rationalis D I: & quadratis quidem ex AB BC æquale parallelogrammum DE ad ipsam D I applicetur, latitudinem faciens DG. ei vero, quod bis continetur AB, BC æquale auferatur DH, latitudinem faciens D F. ergo reliquum FE est æquale quadrato ex A C. & ob id recta linea AC ipsum FE potest. itaque quoniam compositum ex ipsarum AB BC quadratis medium est, & parallelogrammo DE ęquale, erit ipsum DE medium: & ad rationalẽ DI applicatũ est, latitudinẽ faciẽs DG. quare D G est rationalis, & ipsi DI longitudine incõmensurabilis. Rursus qm̃ id quod bis AB B C cõtinetur mediũ est, & æquale parallelogrãmo DH, erit DH mediũ, & ad rationalẽ D I applicatũ (21. huiꝰ.

43.huius: est, latitudinem faciens DF. ergo DF est rationalis, ipsiq; DE incõmensurabilis longitudine. Quòd cum quadrata ex A B BC incommensurabilia sint ei, quod bis AB
1.sexti. BC continetur, & parallelogrãmum DE ipsi DH est incommensurabile, vt autem
10.huius. DE ad DH, ita est recta linea DG ad ipsam DF. incõmensurabilis igitur est DG ipsi DF, & sunt vtrꝙque rationales. ergo GD DF rationales sunt, potentia solum cõmen
A surabiles. apotome igitur est FG: & FH est rationalis. quod autem rationali, & apo
B toma continetur rectangulum irrationale est, ipsumq; potens est irrationalis. sed A
C C poteſt parallelogrammum FE. ergo AC irrationalis est. vocetur autem cum medio medium totum efficiens,

F. C. COMMENTARIVS.

A Apotome igitur est F G] *Ex 74 huius.*

B Quod autem rationali, & apotoma continetur rectangulum irrationale est] *Etenim in scholio ad 39 huius appositio demonstratur, quod rationali, & irrationali continetur irrationale esse.*


C Ipsumq; potens est irrationalis] *Ex 11 diffinitione.*

Sit AB Ꝛ V. Ꝛ 13 ½ plus 3, BC Ꝛ V. Ꝛ 13 minus 3. erit AC Ꝛ V. Ꝛ 13 ½ plus 3 minus Ꝛ V. Ꝛ 13 ½ minus 3. & respondet AB maiori nomini eius, quae vocatur bina media potens; & BC respondet minori, de qua in 42 huius.

THEOREMA LXII. PROPOSITIO LXXX.

Apotomæ vna tantum congruit recta linea potentia solum cõmensurabilis existens toti.

A Sit apotome A B: congruens autem ipsi sit BC. ergo AC CB rationales sunt potẽtia solum commensurabiles. Dico ipsi AB alteram non congruere rationalem, quæ



potentia solum sit comensurabilis toti. si enim fieri potest, congruat BD. ergo AD DB rationales sunt potentia solum commensurabiles. & quoniam quo excessu quadrata ex AD DB excedunt id, quod bis continetur AD DB, eo & quadrata ex AC
B CB excedunt quod bis AC CB continetur; vtraque enim excedunt eodem quadra
C to, quod fit ex AB. & permutando quo excessu quadrata ex AD DB excedunt quadrata ex AC CB, eodem & quod bis continetur AD DB excedet id, quod bis AC
D CB continetur. sed quadrata ex AD DB excedunt quadrata ex AC CB rationali; etenim vtraque rectarum linearum rationalis est. quod igitur bis continetur AD
E DB excedit id, quod bis AC CB continetur rationali. quod fieri non potest; vtraq;
F enim media sunt. medium autem medium non superat rationali. ergo rectæ lineæ AB altera non congruit rationalis, potentia solum commensurabilis existens toti, vna igitur tantum ipsi congruit.

F. C. COMMENTARIVS.

A Ergo AC CB rationales sunt potentia solum commensurabiles] *Ex 74 huius.*


B Vtraque enim excedunt eodem quadrato, quod fit ex AB] *Quadrata enim ex AD DB aequalia sunt ei, quod bis AD DB continetur vnà cum quadrato ex AB, ex 7 secundi; & eadem ratione quadrata ex AC CB sunt aequalia ei, quod bis continetur AC CB vnà cum quadrato ex AB.*

C Et permutando quo excessu quadrata ex AD DB excedunt quadrata ex AC CB] *Hoc sequenti lemmate demonstrabimus.*

LEMMA

LEMMA.

Sint quattuor magnitudines AB C EF G; & AB excedat ipſam C eodem exceſſu, quo EF excedit G. Dico & permutando AB eodem exceſſu excedere ipſam EF, vel excedi ab ea, quo C excedit G, vel ab ea excedituꝛ.



Sit enim DB exceſſus, quo AB excedit C: & HF exceſſus quo EF excedit G. erunt DB HF æquales; itemq; æquales inter ſe AD C; & EH G. ergo AD excedit EH, vel ab ea exceditur eodem exceſſu, quo C ipſam G. & additis vtrinque æqualibus DE HF, excedet AB ipſam EF, vel ab ea excedetur eodem exceſſu, quo AD ipſam EH, hoc eſt quo C ipſam G. atque illud eſt, quod demonſtrare oportebat.

Sed quadrata ex AD DB excedunt quadrata ex AC CB rationali]*Rationale enim non ſuperat rationale, niſi rationali. quod nos ad 27 huius demonſtrauimus.* D


Vtraque enim media ſunt]*Nam quod rationalibus potentia ſolũ commenſurabilibus continetur rectangulum irrationale eſt, quod medium appellatur, ex 22 huius. mediũ igitur eſt id, quod continetur AD DB: & ideo medium quod bis continetur AD DB, vt pote eius duplum ex corollario 24 huius. eadem ratione & medium eſt, quod bis AC CB continetur.* E

Medium autem medium non ſuperat rationali]*Ex 27 huius.* F

THEOREMA LXIII. PROPOSITIO. LXXXI.

Mediæ apotomæ primæ vna tantum congruit recta linea media, potentia ſolum commenſurabilis exiſtens toti, & cum tota rationale continens.

Sit enim media apotome prima AB, & ipſi AB cõgruat BC. ergo AC CB mediæ ſunt potentia ſolum commenſurabiles, quę rationale continent. Dico ipſi AB alteram non congruere mediam, quæ potentia ſolum ſit commenſurabilis toti, & cum tota medium contineat. ſi enim fieri poteſt, congruat BD. ergo AD DB mediæ ſunt potentia ſolum commenſurabiles, quæ rationale continent, quod AD DB continetur, & quoniam quo exceſſu quadrata ex AD DB excedunt id, quod bis continetur AD DB, eodẽ & quadrata ex AC CB excedunt quod bis AC CB continetur; eodem enim rurſus excedunt quadrato ex AB; & permutando quo exceſſu quadrata ex AD DB excedunt quadrata ex AC CB, eodem & quod bis continetur AD DB excedit id, quod bis AC CB continetur. ſed quod bis continetur AD DB excedit id, quod bis AC CB continetur rationali: vtraque enim rationalia ſunt. ergo & quadrata ex AD DB excedunt quadrata ex AC CB rationali. quod fieri nõ poteſt; vtraque enim ſunt media. medium autem medium non ſuperat rationali: quare mediæ apotomæ primæ vna tantum congruit recta linea media, quę potentia ſolum toti ſit commẽſurabilis, & cum tota rationale contineat.



75 huius.

7. ſecundi.

Ex antecedenti lemmate.

Ex demonſtratis ad 17. huius.

27. huius.


THEOREMA LXIIII. PROPOSITIO LXXXII.

Mediæ apotomæ ſecundę vna tantum congruit recta linea, potentia ſolum commenſurabilis exiſtens toti, & cum tota medium continens.

Sit mediæ apotome ſecunda AB, & ipſi AB congruat BC. ergo AC CB mediæ ſunt potentia ſolum commenſurabiles, mediumq; continentes ACB. Dico ipſi AB alteram

76. huius.

alteram non congruere mediam quæ potentia ſolum ſit commenſurabilis toti, & cum tota medium contineat. ſi enim fieri poteſt, congruat BD. quare AD DB mediæ ſunt potentia ſolum commenſurabiles, quæ medium ADB continent: & exponatur rationalis EF: quadratiſq; ex AC CB æquale parallelogrammum EG ad ipſam EF applicetur, latitudinem faciens EM, & ei, quod bis continetur AC CB æquale auferatur parallelogrammum HG, latitudinem faciens HM. reliquum igitur EL eſt æquale ei, quod fit ex AB quadrato. ergo AB ipſum EL poteſt. Rurſus quadratis ex AD DB æquale parallelogrammum EI ad ipſam EF applicetur, latitudinem faciens EN. eſt autem & EL æquale quadrato ex AB. reliquum igitur HI eſt æquale ei, quod bis AD DB continetur. & quoniã mediæ ſunt AC CB, erunt & quadrata ex AC CB media, ſuntq; æqualia parallelogrammo EG. quare EG eſt me-



23. huius. dium, & ad rationalem EF applicatum eſt, latitudinem faciens EM. ergo EM eſt rationalis, & ipſi EF longitudine incommenſurabilis. rurſus quoniam mediũ eſt quod continetur AC CB, & quod bis AC CB continetur medium erit. atque eſt æquale parallelogrammo HG. ergo & HG eſt medium, & ad rationalem EF applicatum

23. huius. eſt, latitudinem faciens HM. rationalis igitur eſt HM, & ipſi EF incommenſurabilis longitudine. & quoniam AC CB potentia ſolum ſunt commenſurabiles, erit AC in

Ex lemm. ad 23. huius. commenſurabilis ipſi CB longitudine, vt autem AC ad CB, ita quadratum ex AC ad id, quod continetur AC CB. incommenſurabile igitur eſt & quadratum ex AC ei, quod AC CB continetur. ſed quadrato quidem ex AC commenſurabilia ſunt quadrata ex AC CB; ei vero, quod continetur AC CB commenſurabile eſt, quod

Ex demonſtratis in 14. huius. bis AC CB continetur. ergo quadrata ex AC CB incommenſurabilia ſunt ei, quod bis AC CB continetur. atque eſt quadratis ex AC CB æquale parallelogrammum EG; ei vero, quod bis AC CB continetur æquale ipſum HG. ergo EG ipſi GH eſt in

1. ſexti. commenſurabile. ſed vt EG ad GH, ita eſt recta linea EM ad ipſam MH. quare EM

10. huius. ipſi MH eſt incommenſurabilis longitudine. & ſunt vtræque rationales. ergo EM MH rationales ſunt, potentia ſolum commenſurabiles; ac propterea apotome eſt


74. huius. EH; & ipſi congruens HM. ſimiliter demonſtrabimus & HN ipſi congruere. apotomæ igitur alia, atque alia congruit recta linea, potentia ſolum commenſurabilis exiſtens toti. quod fieri non poteſt. ergo mediæ apotomę ſecundæ una tantum con-

Ex 80. huius gruit recta linea media, quæ potentia ſolum ſit commenſurabilis toti, & cum tota medium contineat.

THEOREMA LXV. PROPOSITIO LXXXIII.

Minori vna tantum congruit recta linea, potentia incommenſurabilis exiſtens toti, & cum tota faciens compoſitum quidem ex ipſarum quadratis rationale; quod aũt bis ipſis continetur mediũ.

77. huius. Sit minor A B, & ipſi A B congruat B C. ergo A C C B potentia ſunt incommenſurabiles, facientes compoſitum quidem ex ipſarum quadratis rationale: quod autem bis ipſis continetur medium.



Dico ipſi AB alteram non congruere rectam lineam, quę eadem faciat. ſi enim fieri poteſt, congruat BD. ergo AD DB potentia ſunt incommenſurabiles, facientes cõ-

Ex lemmate ad 80. huius poſitum quidem ex ipſarum quadratis rationale: quod autem bis ipſis continetur medium, & quoniam quo exceſſu quadrata ex AD DB excedunt quadrata ex AC

CB, eodem

CB, eodem & quod bis continetur AD DB excedit id, quod bis AC CB continetur; quadrata autem ex AD DB excedunt quadrata ex AC CB rationali; vtraque enim rationalia sunt: & quod bis continetur AD DB id, quod bis AC CB continetur, rationali excedet. quod fieri non potest. etenim vtraque sunt media. ergo minori vna tantum congruit recta linea, potentia incommensurabilis existens toti, & cũ tota faciens compositum quidem ex ipsarum quadratis rationale; quod vero bis ipsis continetur medium. 17 huius.

THEOREMA LXVI. PROPOSITIO LXXXIIII.

Ei, quæ cũ rationali mediũ totũ facit, vna tantum congruit recta linea, potentia incommensurabilis existens toti, & cum tota faciens compositum quidem ex ipsarum quadratis medium; quod autem bis ipsis continetur, rationale.

Sit cum rationali medium totum faciens AB, congruens autem ipsi BC. ergo AC CB potentia sunt incommensurabiles, facientes compositum quidem ex ipsarum AC CB quadratis medium; quod autem bis ipsis continetur, rationale. Dico ipsi AB alterã non congruere eadem facientem. si enim fieri potest, congruat. BD. ergo AD DB potẽtia sunt incõmensurabiles, facientes cõpositum quidem ex ipsarũ AD DB quadratis medium; quod autem bis ipsis continetur, rationale. Quoniam igitur quo ex excessu, quadrata ex AD DB excedunt quadrata ex AC CB, eodem quod bis continetur AD DB excedit id, quod bis AC CB continetur: quod autem bis continetur AD DB excedit id quod bis AC CB continetur rationali; etenim vtraque rationalia sunt: & quadrata ex AD DB rationali excedẽt quadrata ex AC CB. quod fieri non potest, cum vtraque sint media. non igitur ipsi AB altera congruit, potentia incommensurabilis existens toti, & cum tota faciens compositum quidem ex ipsarum quadratis medium; quod autem bis ipsis cõtinetur rationale. quare ei, quæ cum rationali medium totum facit, vna tantum congruet recta linea.




78. huius.

THEOREMA LXVII. PROPOSITIO. LXXXV.

Ei, quę cum medio medium totum facit, vna tantum congruit recta linea, potentia incommensurabilis existens toti, & cum tota faciens compositum quidem ex ipsarum quadratis medium, quod autem bis ipsis continetur, medium, & adhuc incommensurabile compositio ex quadratis ipsarum.


Sit cum medio medium totum faciens AB, ipsi vero congruens BC. ergo AC CB potentia sunt incommensurabiles, facientes compositum quidem ex ipsarum quadratis medium; quod autem bis ipsis continetur medium, & adhuc incõmensurabile compositio ex quadratis ipsarum. Dico ipsi AB alteram non congruere potentia incommensurabilem toti, & cum tota facientem ea, quæ proposita sunt. si enim fieri potest, congruat BD, ita vt AD DB potentia incommensu



79. huius.

rabiles

rabiles sint, faciantq; compositum quidem ex ipsarum quadratis medium; quod autem ipsis continetur medium, & incomensurabile composito ex quadratis ipsarum. & exponatur rationalis EF; & quadratis ipsarum AC CB æquale parallelogrammum EG ad ipsam EF applicetur, latitudinẽ facens EM: ei vero, quod bis continetur AC CB æquale parallelogrammum auferatur HG, latitudinem faciens HM. reliquum igitur quadratum ex AB est æquale parallelogrammo EL. ergõ AB ipsum EL põt. rursus quadratis ex AD DB æquale parallelogrammum EI ad ipsam EF applicetur, latitudinem faciens EN. est autem & quadratum ex AB æquale parallelogrammo EL. ergo reliquum, quod bis AD DB continetur ipsi HI est quale. & quoniam compositum ex quadratis AC CB medium est, & æquale parallelogrãmo EG, erit & EG medium, quod ad rationalem EF applicatum èst, latitudinem



25. huius. faciens EM. quare EM est rationalis, & ipsi EF longitudine incommẽsurabilis. Rursus quoniam quod bis AC CB continetur est medium, & æquale ipsi HG, erit & HG medium, & ad rationalem EF applicatum est, latitudinem faciens HM. rationalis igitur est HM, & ipsi EF incommensurabilis longitudine. quòd cum quadrata ex AC CB incommensurabilia sint ei, quod bis AC CB continetur, erit & EC in-

26. huius. commensurabile ipsi GH; ideoq; recta linea EM rectæ MH longitudine est incommensurabilis. & sunt vtræque rationales. cum igitur EM MH rationales sint, potẽtia solum commensurabiles, recta linea EH apotome est, & ipsi congruens HM. similiter demonstrabimus EH rursus apotomen esse, ipsiq; congruentem HN. ergo

73. huius. apotomæ alia, atque alia congruit rationalis, potentia solum commensurabilis existens toti. quod fieri non posse ostensum est. non igitur ipsi AB altera congruet recta linea. quare vna tantum congruet, potentia incommensurabilis existens toti, & cum tota faciens compositum quidem ex ipsarum quadratis medium; quod autem bis ipsis continetur medium, & adhuc incommensurabile composito ex quadratis ipsarum.

DIFFINITIONES TERTIAE.

1 Exposita rationali, & apotoma, si quidẽ tota plus possit, quàm congruens quadrato rectæ lineæ sibi commensurabilis longitudine; sitq; tota expositæ rationali longitudine commensurabilis: vocetur apotome prima.

2 Si vero congruens sit longitudine commensurabilis expositæ rationali, & tota plus possit, quàm congruens quadrato rectę lineæ sibi cõmensurabilis longitudine; vocetur apotome secunda.

3 Quòd si neutra sit longitudine commensurabilis expositę rationali, & tota plus possit, quàm congruens quadrato rectæ lineę sibi commensurabilis longitudine; dicatur apotome tertia.

4 Rursus si tota plus possit, quàm congruens quadrato rectæ lineæ sibi incommensurabilis longitudine, si quidem tota sit longitudine commensurabilis expositæ rationali; vocetur apotome quarta.


Si vero congruens expositę rationali sit longitudine commen- 5
surabilis, vocetur apotome quinta.

Quòd si neutra, dicatur apotome sexta. 6

PROBLEMA XVIII. PROPOSITIO LXXXVI.

Inuenire primam apotomen.

Exponatur rationalis A; & ipsi A longitudine commensurabilis sit BG. ergo & BG est rationalis. & exponantur duo quadrati numeri DE EF, quorum excessus DF nō sit quadratus. neque igitur ED ad DF proportionem habebit, quam numerus quadratus ad quadratum numerum. & fiat vt E D ad D F, ita quadratum ex BG ad quadratum ex GC. commensurabile igitur est quadratum ex BG quadrato ex G C; rationale autē est quadratū ex BC. ergo & quadratum ex GC est rationale; ideoq; recta linea GC rationalis est. & quoniam ED ad DF proportionem non habet, quam quadratus numerus ad quadratum numerum; neque quadratum ex BG ad quadratum ex GC proportionem habebit, quam numerus quadratus ad quadratum numerum. incommensurabilis igitur est BG ipsi GC longitudine; & sunt vtraque rationales. ergo BG GC rationales sunt potentia solum commensurabiles, & ob id BC apotome est. Dico & primam esse. sit enim quadratum ex H id, quo quadratū ex BG plus potest, quam quadratum ex GC. & quoniam est vt ED ad DF, ita quadratum ex BG ad quadratum ex GC; erit per conuersionem rationis vt DE ad EF, ita quadratum ex BG ad quadratum ex H. sed DE ad EF proportionem habet, quā quadratus numerus ad quadratum numerum; vterque enim quadratus est. ergo & quadratum ex BG ad quadratum ex H proportionem habebit, quam quadratus numerus ad quadratum numerum. commensurabilis igitur est BG ipsi H lōgitudine. & BG plus potest, quam GC quadrato ex H. ergo BG plus poterit, quàm GC quadrato rectæ lineę sibi longitudine commensurabilis. atque est tota BG expositę rationali A commensurabilis lōgitudine. ergo BG apotome est prima. Inuēta igitur est prima apotome. quod facere oportebat.



6. Diffi.
Coroll. 1. lem. ad 30. huius
9. huius.
74. huius.
9. huius.
3. diff. tertium.


F. C. COMMENTARIVS.

Sit A 6, BG 4. numerus autem DE sit 16, EF 9; erit DF 7. si igitur fiat vt 16 ad 7, ita quadratum ex BG, videlicet 16 ad quadratum ex GC. erit quadratum ex GC 7, & recta linea GC Ɛ 7. ergo BC est 4 minus Ɛ 7, quae est apotome prima.


PROBLEMA XIX. PROPOSITIO LXXXVII.

Inuenire secundam apotomen.

Exponatur rationalis A; & ipsi A longitudine commensurabilis sit CG. ergo CG est rationalis. & exponantur duo numeri quadrati D E EF, quorū excessus DF, nō sit quadratus fiatq; vt F D ad D E; ita quadratum ex CG ad quadratum ex G B. commensurabile igitur est quadratum ex CG quadrato ex G B. sed quadratum ex



6. Diff.
Corol. 1. lemma ad 30. huius.



CG est rationale, ergo & rationale est quadratum ex GB; ac propterea ipsa GB est rationalis, & quoniam quadratum ex CG ad quadratum ex GB proportionem non habet, quam numerus quadratus ad quadratum numerum, erit CG ipsi GB incommensurabilis longitudine; & vtræque sunt rationales. ergo CG GB rationales sunt, potentia solum commensurabiles, & ob id BC est apotome. Dico & secundam esse. quo enim quadratum ex BG excedit quadratum ex GC, sit ex H quadratum. Quoniam igitur est vt quadratum ex BG ad quadratum ex GC, ita DE numerus ad numerum DF, erit per conuersionem rationis, vt quadratum ex BG ad quadratum ex H, ita DE ad EF. atque est vterque ipsorum DE EF quadratus. quadratū igitur ex BG ad quadratum ex H proportionem habet, quam numerus quadratus ad quadratum numerum; ideoq; BG ipsi H longitudine est commensurabilis. & plus potest BG, quàm GC quadrato ex H. ergo BG plus potest, quàm GC quadrato rectæ lineæ sibi longitudine commensurabilis. atque est congruens CG expositæ rationali A commensurabilis longitudine. ergo BC apotome est secunda. inuenta igitur est secunda apotome BC. quod facere oportebat.


9. huius. 74. huius. 9. huius. 19. diff.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit A 6, CG 3; numerus autem DE sit 36, & EF 9. erit DF 27. itaque fiat vt 27 ad 36, ita 9 ad alium, erit ad 12. ergo GB est Ɓ 12, & BC Ɓ 12 minus 3, quae est apotome secunda.

PROBLEMA XX. PROPOSITIO LXXXVIII.

Inuenire tertiam apotomen.



Exponatur rationalis A, & exponãtur tres numeri E BC CD non habentes inter se proportionem, quam numerus quadratus habet ad quadratum numerum; BC vero ad BD proportionem habeat, quam quadratus numerus ad quadratum numerum: & fiat vt E ad BC, ita quadratum ex A ad quadratum ex FG: vt autem BC ad CD, ita quadratum ex FG ad quadratum ex GH. commẽsurabile igitur est quadratum ex A quadrato ex FG. atque est quadratum ex A rationale. ergo & rationale est quadratum ex FG; ac propterea recta linea FG est rationalis. & quoniam E ad BC proportionem non habet, quam numerus quadratus ad quadratum numerum; neque quadratum ex A ad quadratum ex FG proportionem habebit, quam numerus quadratus ad quadratum numerum. incõmensurabilis igitur est A ipsi FG longitudine. rursus qm̃ est vt BC ad CD, ita quadratum ex FG ad quadratum ex GH; erit quadratum ex FG quadrato ex GH commensurabile. rationale autẽ est quadratum ex FG. ergo & quadratũ ex GH est rationale, & ob id recta linea GH rationalis. quòd cum BC ad CD proportionem non habeat, quam numerus quadratus ad quadratum numerum; neque quadratũ ex FG ad quadratum ex GH proportionem habebit, quam quadratus numerus ad quadratum numerum. incommensurabilis igitur est FG ipsi GH longitudine: & sunt vtræque rationales. ergo FG GH rationales sunt potentia solum commensurabiles; ac propterea apotome est FH. Dico & tertiam esse. Quoniam enim est vt E quidem

Cor. 6. huius. 6. huius. 9. huius. 6. huius. 9. huius. 74. huius.

quidem ad BC,ita quadratum ex A ad quadratum ex FG; vt autem BC ad CD,ita quadratum ex FG ad quadratum ex GH;erit ex æquali vt E ad CD,ita quadratum ex A ad quadratum ex GH.sed E ad GD proportionem non habet,quam numerus quadratus ad quadratum numerum.neque igitur quadratum ex A ad quadratum ex GH proportionem habebit, quam numerus quadratus ad quadratum numerũ. ergo A ipsi GH longitudine est incommẽsurabilis. neutra igitur ipsarum FG GH expositę rationali A commensurabilis est longitudine. quo autem quadratum ex FG plus potest,quàm quadratum ex GH,sit ex K quadratum. Quoniam igitur est vt BC ad CD,ita quadratum ex FG ad quadratum ex GH;erit per conuersionem rationis vt CB ad BD, ita quadratum ex FG ad quadratum ex K. at CB ad BD proportionem habet,quam nnmerus quadratus ad quadratum numerum. ergo & quadratum ex FG ad quadratum ex K proportionem habebit, quam numerus quadratus ad quadratum numerum.commensurabilis igitur est FG ipsi K longitudine: & plus potest FG,quàm GH quadrato ex K. ergo FG plus potest,quàm GH quadrato rectæ lineę sibi commensurabilis longitudine.& neutra ipsarum FG GH longitudine commensurabilis est expositę rationali A. quare FH apotome est tertia. Inuenta igitur est tertia apotome FH.quod facere oportebat.

9.huius. 9.huius. 33.diffi.


F. C. COMMENTARIVS.

Sit A 6,numerus E 18,BC 16,& CD 7.erit BD 9.fiat vt 18 ad 16, ita 36 ad alium, erit ad 32.ergo FG est ℞ 32.rursus fiat vt 16 ad 7,ita 32 ad alium.erit ad 14 quare GH est ℞ 14 & FH ℞ 32 minus ℞ 14,quae est apotome tertia.

PROBLEMA XXI. PROPOSITIO. LXXXIX.

Inuenire quartam apotomen.

Exponatur rationali A :& ipsi A longitudine commensurabilis sit BG. ergo BG est rationalis.exponantur præterea duo numeri D F FE, ita vt totus DE ad vtrumque ipsorum DF FE proportionem non habeat,quam numerus quadratus ad quadratum numerum: & fiat vt DE ad EF, ita quadratum ex BG ad quadratum ex GC. commensurabile igitur est quadratum ex BG quadrato ex GC.est autem quadratum ex BG rationale.quare & rationale est quadratũ ex GC; ideoq; recta linea GC est rationalis.& quoniam DE ad EF proportionem non habet, quam numerus quadratus ad quadratum numerum;neque quadratum ex BG ad quadratum ex GC proportionem habebit, quam numerus quadratus ad quadratum numerum.incommensurabilis igitur est BG ipsi GC longitudine,& sunt vtræque rationales. ergo BG GC rationales sunt potentia solum commensurabiles. & ob id apotome est BC. Dico & quartam esse. Quo igitur plus potest BG, quàm GC,sit quadratum ex H.& quoniam est vt DE ad EF,ita quadratum ex BG ad quadratum ex GC;erit per conuersionem rationis vt ED ad DF,ita quadratum ex BG ad quadratum ex H.sed ED ad DF proportionem non habet, quam numerus quadratus ad quadratum numerum.neque igitur quadratum ex BG ad quadratum ex H proportionem habebit,quam numerus quadratus ad quadratum numerum.incommẽsurabilis igitur est BG ipsi H longitudine: & plus potest BG, quam GC quadrato ex H.ergo BG plus potest,quàm GC quadrato rectę lineæ sibi longitudine incommensurabilis.atque est tota BG commẽsurabilis expositę rationali A.ergo BC apotome est quarta. Inuenta igitur est quarta apotome BC. quod facere oportebat.




6.huius. 9.huius. 74.huius. 4.diffi. tertiarum.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit A 6, BG 4, numerus autem DF 6, & FE 10. itaq; si fiat vt 16 ad 10, ita 16 ad alium, erit GC R 10 & BC 4 minus R 10, quae est apotome quarta.

PROBLEMA XXII. PROPOSITIO XC.

Inuenire quintam apotomen.



Exponatur rationalis A, & ipsi A commensurabilis sit CG. ergo CG est rationalis. & exponantur duo numeri DF FE, ita vt DE ad vtrumque ipsorum DF FE proportionem rursus nõ habeat, quã numerus quadratus ad quadratũ numerum; fiatq; vt FE ad ED, ita quadratum ex CG ad quadratum ex GB. ergo quadratum ex CG commensurabile est quadrato ex GB. est autem quadratum ex CG rationale. ergo & rationale est quadratum ex GB: & idcirco recta linea GB est rationalis. & quoniam vt DE ad EF, ita est quadratum ex BG ad quadratum ex GC: & DE ad EF proportionem non habet, quam numerus quadratus ad quadratum numerum; neque quadratum ex BG ad quadratum ex GC proportionem habebit, quam numerus quadratus ad quadratum numerum. incommensurabilis igitur est BG ipsi GC longitudine; & sunt vtræque rationales. ergo BG GC rationales sunt potentia solum commensurabiles; & BC apotome est. Dico & quintam esse. Quo enim plus potest quadratum ex BG, quàm quadratum ex GC, sit quadratum ex H. Quoniam igitur quadratum ex BG ad quadratum ex GC est vt DE ad EF, erit per conuersionem rationis vt ED ad DF, ita quadratum ex BG ad id, quod fit ex H quadratũ. sed ED ad DF proportionem non habet, quam numerus quadratus ad quadratum numerum. neque igitur quadratum ex BG ad quadratum ex H proportionem habebit, quam numerus quadratus ad quadratum numerum; ideoq; recta linea BG ipsi H longitudine est incommensurabilis. & plus potest BG, quàm GC quadrato ex H. ergo BG plus potest, quàm GC quadrato rectæ lineę sibi incommensurabilis longitudine. atque est congruens CG expositę rationali A longitudine commensurabilis. quare BC apotome est quinta. Inuenta est igitur quinta apotome BC. quod facere oportebat.

4. huius.


9. huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit A 6, CG 3. numerus autem DF sit 25, FE 9: & fiat vt 9 ad 34, ita quadratum ex CG, quod est 9 ad alium, erit BG R 34, & BC R 34 minus 3, quę est apotome quinta.

PROBLEMA XXIII. PROPOSITIO. XCI.

Inuenire sextam apotomen.




Exponatur rationalis A, & tres numeri E BC CD proportionem non habentes inter se, quã quadratus numerus ad quadratũ numerũ. & fiat vt E ad BC, ita quadratũ ex A ad quadratũ ex FG: ut aũt BC ad CD, ita quadratũ ex FG ad quadratũ ex GH. qm̃ igitur est vt E ad BC ita, quadratũ ex A ad quadratũ ex FG; erit quadratum ex A quadrato ex FG cõmensurabile.

6. huius.

menſurabile. rationale autem eſt quadratum ex A. ergo & quadratum ex F G rationale erit; & ob id recta linea F G rationalis. & quoniam E ad BC proportionem nō habet, quam numerus quadratus ad quadratum numerum; neque quadratum ex A ad quadratum ex FG proportionem habebit, quam numerus quadratus ad quadratum numerum. Incommēſurabilis igitur eſt A ipſi FG longitudine. rurſus quoniam eſt vt BC ad CD, ita quadratum ex FG ad quadratum ex GH, erit quadratum ex FG commenſurabile quadrato ex GH. eſt autem quadratum ex FG rationale. rationale igitur eſt & quadratum ex GH; & ipſa GH rationalis. quòd cū BC ad CD proportionem non habeat, quam numerus quadratus ad quadratum numerū; neque quadratum ex FG ad quadratum ex GH proportionem habebit, quam numerus quadratus ad quadratum numerum. ergo F G ipſi G H longitudine eſt incommenſurabilis: & ſunt vtræque rationales. quare FG GH rationales ſunt potentia ſolum commēſurabiles, & FH apotome eſt. Dico & ſextam eſſe. Quoniam enim eſt vt E ad BC, ita quadratum ex A ad quadratum ex FG; vt autem BC ad CD, ita quadratum ex FG ad quadratum ex GH: erit ex æquali vt E ad CD, ita quadratum ex A ad quadratum ex GH. ſed E ad CD proportionem non habet, quā numerus quadratus ad quadratum numerum. neque igitur quadratum ex A ad quadratum ex GH proportionem habebit, quam numerus quadratus ad quadratum numetum. ergo A ipſi GH longitudine eſt incommenſurabiiis: & neutra ipſarum FG GH expoſitæ rationali A commenſurabilis eſt longitudine. quo igitur plus poteſt quadratum ex FG, quàm quadratum ex GH, ſit quadratum ex K. & quoniam eſt vt BC ad C D, ita quadratum ex F G ad quadratum ex G H, erit per conuerſionem rationis vt CB ad BD, ita quadratum ex F G ad quadratum ex K. at C B ad B D proportionem non habet, quam numerus quadratus ad quadratum numerum. neque igitur quadratum ex FG ad quadratum ex K proportionem habebit, quam numerus quadratus ad quadratum numerum. ergo incommenſurabilis eſt FG ipſi K longitudine. & FG plus poteſt, quā GH quadrato ex K. plus igitur poteſt FG, quàm GH quadrato rectæ lineæ ſibi longitudine incommenſurabilis: & neutra ipſarum FG GH eſt commenſurabilis longitudine expoſitæ rationali A. ergo FH apotome eſt ſexta. Inuenta eſt igitur ſexta apotome F H. ſed & expeditius ſex dictarum linearum inuentionem oſtendere licet.

9 huius. 6. huius. 9. huius. 74. uuius. 9 huius. 6. tertiarum diffi.

Si enim oporteat inuenire primam apotomē, exponatur ex binis nominibus prima A C, cuius maius nomē ſit AB. & ponatur B D ipſi BC æqualis. ergo AB BC, hoc eſt AB BD rationales ſūt, potentia ſolum commenſurabiles: & AB plus poteſt, quàm BC, hoc eſt quàm B D quadrato rectę lineæ ſibi longitudine commenſurabilis: & AB eſt commenſurabilis lōgitudine expoſitę rationali. apotome igitur prima eſt AD. ſimiliter & reliquas apotomas inueniemus, eas, quæ ex binis nominibus eiuſdem ordinis exponentes.



F. C. COMMENTARIVS.


Sit A 6. numerus autem E ſit 15, BC 25, & CD 10. fiat igitur ut 15 ad 25, ita 36 ad aliū, erit ad 60. Rurſus fiat ut 25 ad 10, ita 60 ad alium, erit ad 24. ergo F G eſt R 60, & G H R 24. ac propterea FH eſt R 60 minus R 24, quę eſt apotome ſexta.

THEOREMA LXVIII. PROPOSITIO XCII.

Si ſpacium cōtineatur rationali, & apotoma prima, recta linea ſpacium potens apotome eſt.

Contineatur

Contineatur enim ſpacium AB rationali AC,& apotoma prima AD .Dico rectam lineam, quæ poteſt ſpacium AB apotomen eſſe. Quoniã enim AD prima apotome eſt, ſit ipſi congruens DG. ergo AG GD rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles, & tota AG longitudine commenſurabilis eſt expoſitæ rationali AC. & præterea AG plus poteſt, quàm GD quadrato rectæ lineę ſibi commenſurabilis longitudine. ſi igitur quartæ parti quadrati, quod fit ex DG, ęquale parallelogrammũ ad AG applicetur, deficiens figura quadrata, in partes longitudine cõmenſurabiles ipſam diuidet. ſecetur DG bifariã in E,& quadrato ex EG æquale parallelogrammum ad ipſam AG applicetur, deficiens figura quadrata, quod ſit AFG. commenſurabilis igitur eſt AF ipſi FG longitudine: & per E F G puncta ipſi AC parallelæ ducantur EH FI GK. & qm̃ AF ipſi FG lõgitudine eſt commenſurabilis, erit & tota AG vtrique ipſarum AF FG cõmenſurabilis longitudine. ſed AG commenſurabilis eſt ipſi AC. vtraque igitur AF FG ipſi AC longitudine eſt commenſurabilis. atque eſt AC rationalis. ergo & rationalis vtraque AF FG; ac propterea vtrumque parallelogrammorum AI FK eſt rationale. & quoniam DE ipſi EG longitudine eſt commenſurabilis, erit & DG vtrique DE EG commenſurabilis longitudine: eſtq; rationalis DG, & ipſi AC longitudine incõmenſurabilis. ergo & vtraque DE EG rationalis eſt, & incommenſurabilis ipſi AC longitudine: & ob id vtrumque parallelogrammorum DH EK medium eſt. ponatur ipſi quidem AI parallelogrammo æquale quadratum LM; parallelogrammo autem FK æquale quadratum auferatur NX, communem ipſi angulum habens LOM. ergo quadrata LM NX circa eandem ſunt diametrum. ſit ipſorum diameter OR, & figura deſcribatur. itaque quoniam rectãgulum AFG eſt æquale quadrato ex EG, erit vt AF ad EG, ita EG ad GF: ſed vt AF ad EG, ita eſt parallelogrammum AI ad ipſum EK: & vt EG ad GF, ita parallelogrammum EK ad ipſum KF. parallelogrammorum igitur AI KF medium proportionale eſt EK. eſt autem & quadratorum LM NX medium proportionale MN, vt ſuperius oſtenſum eſt. parallelogrammumq; AI eſt æquale quadrato LM; & parallelogrammum KF quadrato NX æquale. ergo & parallelogrammum MN eſt æquale ipſi EK. ſed parallelogrammum quidem EK eſt æquale parallelogrammo DH; parallelogrammum vero MN ipſi LX. parallelogrammum igitur DX eſt æquale gnomoni YVQ, quadrato NX. eſt autẽ & parallelogrãmũ AK quadratis LM NX ęquale. ergo & reliquũ AB eſt ęquale quadrato ST. at quadratũ ST eſt id, quod fit ex LN. quadratum igitur ex LN eſt æquale parallelogrammo AB; ideoq; recta linea LN ipſum AB poteſt. Dico LN apotomen eſſe. Quoniam enim rationale eſt vtrumque parallelogrammorum AI FK, & ſunt ęqualia quadratis LM NX, erit & vtrumque LM NX rationale; hoc eſt vtrumque ipſorum, quæ fiunt ex LO ON; & vtraque igitur LO ON rationalis eſt. rurſus Qm̃ medium eſt parallelogrammum DH, atque eſt æquale ipſi LX, erit & LX mediũ. cũ igitur LX quidẽ medium ſit, NX vero rationale, incõmenſurabile eſt LX ipſi NX; vtq; LX ad XN, ita eſt recta linea LO ad ON. ergo LO ipſi ON longitudine eſt incommenſurabilis. & ſunt vtręque rationales. quare LO ON rationales ſunt potẽtia ſolum commenſurabiles. & idcirco apotome eſt LN; & ſpacium AB poteſt. quę igitur poteſt ſpacium AB eſt apotome. ergo ſi ſpacium contineatur rationali, & apotoma prima, recta linea ſpacium potens apotome eſt.



1. diffi. tertiarum.
18. huius.
16. huius.
20. huius.
16. huius.
14. huius.
22. huius.
20. sexti.
14. sexti.
10. huius.
74. huius.


F. C. COMMENTARIVS.

Sit AC 6, AD 7 minus R 13. *erit DG* R 13, *& DE, uel EG* R 3 + . *quòd ſi ad rectam lineã AG applicetur parallelogrammum AFG aequale quadrato ipſius EG, deficiensq́, figura quadrata, erit ex demonſtratis ad 18 huius AF* 6 − $\frac{1}{2}$ *FG* $\frac{1}{2}$. *ergo parallelogrammum AI eſt* 39, *& FK* 3, *totumq́, AK parallelogrammum* 42. *parallelogrammum uero DK eſt* R 468, *DH, uel EK* R 117, *EI* R 117 *minus* 3, *& FK* 3. *quare parallelogrammum AB eſt* 42 *minus* R 468. *Huiuſmodi autem ſpacium iuniores etiam apotomen primam, uel reſiduum primum appellare conſueuerunt, cuius latus quadratum, uel radicem inueniemus, quemadmodum ad* 55. *huius dictum eſt in ſpacijs binomialibus, praeterquã quòd loco uocis plus, utemur minus. Diuidatur enim* 42 *in duas partes; ita ut quod ex ipſis producitur, ſit aequale quartę parti* 468, *hoc eſt* 117. *erit maior pars* 39, *minor* 3 : *idcoq́,* R 39 *minus* R 3 *erit latus quadratum, uel radix huius ſpacij reſidui* 42 *minus* R 468.

THEOREMA LXIX. PROPOSITIO. XCIII.

Si ſpacium contineatur rationali, & apotoma ſecunda, recta linea ſpacium potens mediæ eſt apotome prima.

Spacium enim AB cõtineatur rationali AC, & apotoma ſecunda AD. Dico rectam lineam, quæ ſpacium AB poteſt mediæ apotomen eſſe primam. fit enim ipſi AD congruens DG. ergo AG GD rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles, & congruẽs DG commenſurabilis eſt expoſitę rationali AC; totaq́; AG plus poteſt, quàm GD quadrato rectæ lineæ ſibi commenſurabilis longitudine. quoniam igitur AG plus poteſt, quàm GD quadrato rectę lineæ ſibi longitudine commenſurabilis, ſi quartæ parti quadrati ipſius GD æquale parallelogrammum ad AG applicetur, deficiens figura quadrata, in partes commenſurabiles ipſam diuidet. Itaque ſecetur DG bifariam in E; & quadrato ipſius EG æquale parallelogrammum ad AG applicetur, deficiens figura quadrata, quod ſit AFG. ergo commenſurabilis eſt AF ipſi FG longitudine; & per puncta EFG ipſi AC parallelæ ducantur EH FI GK. quoniam igitur AF ipſi FG lõgitudine eſt commenſurabilis, erit AG vtrique ipſarum AF FG commenſurabilis longitudine. rationalis autem eſt AG, & ipſi AC longitudine incommenſurabilis. ergo & vtraque AF FG eſt rationalis, ipſiq́; AC incommenſurabilis longitudine; & ob id vtrumque parallelogrammorum AI FK medium eſt. Rurſus quoniam DE commenſurabilis eſt ipſi EG, erit & DG vtrique DE EG commẽſurabilis. ſed DG commenſurabilis eſt ipſi AC longitudine. ergo & vtraque DE EG rationalis eſt, & ipſi AC longitudine commenſurabilis: ac propterea vtrumque parallelogrammorum DH EK eſt rationale. conſtituatur igitur parallelogrammo quidem AI æquale quadratum LM; parallelogrammo autem FK æquale quadratum auferatur NX, communem ipſi angulum habens LOM. ergo circa eandem diametrum ſunt quadrata LM NX. ſit ipſorum diameter OR, & figura deſcribatur. Cum igitur parallelogramma AI FK media ſint, & ſibi ipſis commenſurabilia, & æqualia quadratis ex LO ON, erunt & quadrata ex LO ON media. ergo rectæ lineę LO ON medię sũt, potentia ſolum commenſurabiles. & quoniam rectangulum AFG eſt æquale quadrato



a. diff. ternariarum.

18. huius.

16. huius.

21 huius.


16. huius.

20. huius

16. ſexti.

14.sexti. drato ex EG, erit vt AF ad EG, ita EG ad GF: sed vt AF ad EG, ita est parallelogrā mum AC ad ipsum EK. vt autem EG ad GF, ita parallelogrammum EK ad KF: parallelogrammorum igitur AI FK mediū proportionale est EK. est autē & quadratorum LM. NX medium proportionale MN: et parallelogrammum AI quidē est æquale quadrato LM; parallelogrāmum vero FK æquale quadrato NX. ergo MN ipsi EK est æquale. sed DH est æquale EK, & LX ipsi MN. totum igitur DK gnomoni YVQ, & quadrato NX æquale erit. itaq; quoniam totum AK æquale est quadratis LM NX, quorum DK est æquale gnomoni YVQ, & quadrato NX; erit reliquum AB æquale quadrato ST, hoc est ei, quod fit ex LN. quadratū igitur ex LN est æquale spacio AB; ideoq; recta linea LN spacium AB potest. Dico LN mediæ apotomen esse primam. quoniam enim rationale est EK, & æquale ipsi MN, hoc est ipsi LX, erit & LX rationale, videlicet quod LO ON continetur. medium autem ostensum est NX. quare LX est incommensurabile ipsi XN: & vt LX ad XN, ita LO ad ON. ergo LO ON longitudine sunt incommensurabiles; ac propterea LO ON mediæ sunt commensurabiles potentia solum, quæ

75.huius rationale continent. quare LN mediæ apotome prima est, & potest spacium AB. recta igitur linea spacium AB potens mediæ est apotome prima.



F. C. COMMENTARIVS.

Sit AC 4, & AD Ɽ 48 minus 6: erit DG 6. & DE, vel EG 3 & si ad AG applicetur parallelogrammum AFG aequale quadrato ipsius EG, deficiensq; figura quadrata: erit AF Ɽ 27, FG Ɽ 3. & ob id parallelogrammum AI Ɽ 432, FK Ɽ 48, & totum AK parallelogrāmum Ɽ 768; parallelogrammum vero DK 24, DH, vel EK 12, & EI 12 minus Ɽ 48. ergo AB est Ɽ 768 minus 24, quod spacium etiam apotomen secundam, vel residuum secundum vocāt. Vt autem eius latus quadratum, vel radicem inueniamus, diuidetur Ɽ 768 in duas partes, ita vt productum ex ipsis sit aequale quartae parti quadrati 24, hoc est aequale 144, erit maior pars Ɽ 432, minor Ɽ 48. quare Ɽ Ɽ 432 minus Ɽ Ɽ 48 est latus quadratum, seu radix eius spacij residui Ɽ 768 minus 24.

THEOREMA LXX. PROPOSITIO XCIIII.


Si spacium cōtineatur rationali, & apotome tertia, recta linea spacium potens mediæ est apotome secunda.

Spacium enim AB contineatur rationali AC, & apotoma tertia AD. Dico rectā lineam, quæ potest spacium AB, mediæ esse apotomen secundam. sit enim ipsi AD congruens DG. ergo AG GD rationales sunt, potētia solum commensurabiles, & neutra ipsarum AG GD longitudinę commensurabilis est expositæ rationali AC, totaq; AG plus potest, quàm congruens DG quadrato rectæ lineæ sibi commensurabiles longitudine. si igitur quartæ parti quadrati ipsius DG æquale parallelogrāmum ad AG applicetur, deficiens figura quadrata, in partes commensurabiles ip-

18.huius. sam diuidet. Itaque secetur DG bifariam in E, & quadrato ipsius EG æquale ad AG applicetur, deficiens figura quadrata, quod sit AFG: & per puncta EFG

ipsi

ipſi AC parallelę ducantur EH FI GK. ergo AF FG commenſurabiles ſunt: atque ob id parallelogrammũ AI parallelogrammo FK eſt commenſurabile. & quoniã AF FG commenſurabiles ſunt longitudine, erit & AG vtrique ipſarum AF FG longitudine commenſurabilis. eſt autem rationalis AG, & ipſi AC incommenſurabilis longitudine. & vtraque igitur AF FG rationalis eſt, & ipſi AC longitudine incommenſurabilis; ac propterea vtrumque parallelogrammorum AI FK eſt medium. Rurſus quoniam DE commenſurabilis eſt ipſi EG longitudine, erit & DG vtrique DE EG cõmenſurabilis. ſed DG rationalis eſt, & ipſi AC incõmenſurabilis longitudine. rationalis igitur eſt & vtraque DE EG, & ipſi AC lõgitudine incommenſurabilis. ergo vtrumque parallelogrammorũ DH EK medium eſt. quòd cum AG GD potentia ſolum commẽſurabiles ſint, AG ipſi GD longitudine erit incommẽſurabilis. ſed AG commenſurabilis eſt ipſi AF longitudine, & DG ipſi GE. eſt igitur AF ipſi EG longitudine incommenſurabilis. vt autem AF ad EG, ita parallelogrammum AI ad EK parallelogrammum. ergo incõmenſurabilis eſt AI ipſi EK, conſtituatur ipſi quidem AI æquale quadratum LM; ipſi vero FK ęquale auferatur NX, angulum habens eundem, quem LM. ergo quadrata LM NX circa eandem ſunt diametrum. ſit ipſorum diameter OR, & figura deſcribatur. Quoniam igitur rectangulum AFG eſt æquale quadrato ex EG, erit vt AF ad EG, ita EG ad GF. vt autem AF ad EG, ita parallelogrammum AI ad EK parallelogrammum; & vt EG ad GF, ita EK ad KF. ergo & vt AI ad EK, ita EK ad KF. parallelogrammorum igitur AI FK medium proportionale eſt EK. eſt autem & quadratorum LM NX medium proportionale MN; & parallelogrammum AI quidem æquale eſt quadrato LM; FK vero ipſi NX. ergo & EK eſt æquale MN. ſed MN æquale eſt LX, & EK ipſi DH. totum igitur DK gnomoni YVQ, & quadrato NX eſt æquale. eſt autem & parallelogrammũ AK æquale quadratis LM NX. ergo reliquum AB eſt æquale ipſi ST, hoc eſt quadrato ex LN. & ob id recta linea LN ipſum AB ſpacium poteſt. Dico LN mediæ apotomen eſſe ſecundam. Quoniam enim media oſtenſa ſunt parallelogramma AI FK, & ſunt ęqualia quadrãtis ex LO ON, erit & vtrumque quadratorum ex LO ON medium; & idcirco vtraque LO ON media eſt. & quoniam commenſurabile eſt AI ipſi FK, erit & quadratum ex LO quadrato ex ON commenſurabile. Rurſus quoniam oſtenſum eſt AI incommenſurabile ipſi EK, & LM ipſi MN incommenſurabile erit, hoc eſt quadratum ex LO rectangulo LON. quare & recta linea LO ipſi ON longitudine eſt incommenſurabilis. ſunt igitur LO ON mediæ commenſurabiles potentia ſolum. Dico eas etiam medium continere. Quoniam enim medium demonſtratum eſt EK, atque eſt rectãgulo LON æquale, erit & LON medium. ergo LO ON mediæ ſunt potentia ſolum commenſurabiles, quę medium continent; ac propterea LN mediæ apotome ſecunda eſt, & poteſt ſpacium AB. recta igitur linea ſpacium AB potens mediæ apotome eſt ſecunda.



16. huius.

62. huius.

16. huius.

22. huius.

Ex demonſtratis ad 14 huius.

26. ſexti.

14. ſexti.

Lem. ad 23. huius.

76. huius.


F. C. COMMENTARIVS.

Sit AC 6, & AD R 27 *minus* R 15. *erit DG* R 15, *& DE, vel EG* R 3 $\frac{1}{4}$. *quòd ſi ad AG applicetur parallelogrammum aequale quadrato ex EG, deficienſq; figura quadrata, quod ſit AF C, erit AF* R 18 $\frac{3}{4}$, *FG* R $\frac{1}{4}$. *ideoq; parallelogrammum AI eſt* R 675, *FK* R 27, *& totum AK parallelogrammum* R 972. *parallelogrammum autem DK* R 540, *EK* R 135, *& EI* R 135 *minus* R 27. *eſt igitur AB* R 972 *minus* R 540. *quod ſpacium eſt apotome tertia, vel tertium reſiduum. Itaque diuidatur* R 972 *in duas partes, ita vt quod ex ipſis producitur ſit ęquale*

R 135. *erit maior pars* R 675, *& minor* R 27. *ergo* RR 675 *minus* RR 27 *eſt latus quadratum, vel radix ſpacij illius reſidui* R 972 *minus* R 540.

THEOREMA LXXI. PROPOSITIO XCV.

Si ſpacium contineatur rationali, & apotoma quarta, recta linea ſpacium potens minor eſt.



Spacium enim AB contineatur rationali AC, & apotoma quarta AD. Dico rectam lineam, quę ſpacium AB poteſt, minorem eſſe. ſit enim ipſi AD congruens DG. ergo AG GD rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles, & AG commenſurabilis eſt expoſitę rationali AC lõgitudine, totaq́; AG plus poteſt, quàm GD, quadrato rectę lineæ ſibi longitudine incommenſurabilis. ſi igitur quartę parti quadrati ex DG æquale parallelogrammum ad AG applicetur, deficiens figura quadrata, in partes incommenſurabiles ipſam diuidet. Itaque ſecetur DG bifariã in E, & quadrato ex EG æquale ad ipſam AG applicetur, deficiens figura quadrata, quod ſit AFG. ergo AF ipſi FG longitudine eſt incommenſurabilis. Ducantur per puncta EFG ipſis AC BD parallelæ EH FI GK. Quoniam igitur AG rationalis eſt, & ipſi AC longitudine commenſurabilis, erit totum parallelogrammum AK rationale. Rurſus quoniam incommenſurabilis eſt DG ipſi AC longitudine, & ſunt vtræque rationales, erit parallelogrammum DK medium. quòd cum AF ipſi FG *longitudine ſit incommenſurabilis*, erit & parallelogrammum AI incommenſurabile parallelogrammo FK. conſtituatur parallelogrammo quidem AI æquale quadratum LM; parallelogrammo autem FK ęquale quadratum NX auferatur, angulum habens eundem, quem LM, videlicet LOM. quadrata igitur LM NX circa eandem ſunt diametrum. ſit ipſorum diameter OR, & figura deſcribatur. itaque quoniã rectangulum AFG eſt ęquale quadrato ex EG, vt AF ad EG, ita erit EG ad GF. ſed vt AF quidem ad EG, ita eſt parallelogrammum AI ad ipſum EK: vt autem EG ad GF, ita EK ad KF. parallelogrammorum igitur AI FK medium proportionale eſt EK. eſt autem & quadratorum LM NX medium proportionale MN. atque eſt parallelogrammum AI æquale quadrato LM, & parallelogrammum FK æquale NX. ergo & EK æquale eſt MN. ſed EK quidem eſt æquale parallelogrammo DH; MN vero ipſi LX. totum igitur DK parallelogrammum gnomoni YVQ, & quadrato NX eſt æquale. & quoniam totum AK æquale eſt quadratis LM NX, quorum DK eſt æquale gnomoni YVQ, & NX quadrato; erit reliquum AB æquale quadrato ST, hoc eſt quadrato ex LN. ergo LN ſpacium AB poteſt. Dico LN irrationalem eſſe, quę minor appellatur. Quoniam enim parallelogrammum AK rationale eſt, & æquale quadratis ipſorum LO ON, erit & compoſitum ex quadratis LO ON rationale. Rurſus quoniam parallelogrammum DK medium eſt, atque eſt æquale ei, quod bis continetur LO ON erit & quod LO ON cõtinetur mediũ: oſtenſũ aũt eſt parallelogrãmũ AI incõmẽſurabile ipſi FK. ergo & quadratũ ex LO incõmenſurabile eſt quadrato ex ON; ac propterea LO ON potentia ſunt incommenſurabiles, quę faciunt compoſitum quidem ex ipſarum quadratis rationale, quod autem ipſis continetur medium. quare LN irrationalis eſt, quæ minor appellatur, & poteſt ſpacium AB. recta igitur linea ſpacium AB potens minor eſt.

4. diffi. tertiarum.
16. huius.
20. huius.
22. huius.
26. ſexti.
14. ſexti.
17. huius.

F. C.


F. C. COMMENTARIVS.


Sit AC 6. AB 7 minus R 14. *erit DG* R 14, *& DE, vel EG* R 3 ½. *Si vero ad AG applicetur parallelogrammum AFG æquale quadrato ipsius EG, deficiens q; figura quadrata, erit AF* 3 ½ *plus* R 8 ¼: *FG* 3 ½ *minus* R 8 ¼, *& parallelogrammum AI est* R 21 *plus* R 315, *FK* 21 *minus* R 315, *& totum AK* 42. *parallelogrammum vero DK est* R 504, *CK* R 126. *& AB* 42 *minus* R 504. *quod spacium est apotome quarta, vel residuum quartum. si igitur* 42 *diuidatur in duas partes, ita ut productum ex ipsis sit æquale quartæ parti* R 504, *hoc est* R 126, *erit maior pars* 21 *plus* R 126, *& minor* 21 *minus* R 126. *ergo* R *V.* 21 *plus* R 126 *minus* R *V.* *minus* R 126 *est latus quadratum, seu radix spacij residui* 42 *minus* R 504.

THEOREMA LXXII. PROPOSITIO. XCVI.

Si spacium contineatur rationali, & apotoma quinta, recta linea spacium potens est, quæ cum rationali medium totum efficit.

Spacium enim AB contineatur rationali AC, & apotoma quinta AD. Dico rectã lineam, quæ spacium AB potest, esse eam, quæ cum rationali medium totum efficit. sit enim ipsi AD congruens DG. ergo AG GD rationales sunt potentia solum cũmensurabiles; & congruens DG longitudine commensurabilis est expositę rationali AC; totaq; AG plus potest, quàm GD quadrato rectæ lineæ sibi incommensurabilis longitudine. si igitur quartæ parti quadrati ex DG æquale parallelogrammum ad AG applicetur, deficiens figura quadrata, in partes incommensurabiles ipsam diuidet. Itaque secetur DG bifariam in puncto E, & quadrato ex EG æquale ad ipsam AG applicetur, deficiens figura quadrata, quod sit AFG. ergo AF incommensurabilis est ipsi FG longitudine. Ducantur per puncta EFG ipsi AC parallelę EH FI GK. & quoniam AG incommensurabilis est ipsi AC lõgitudine, & sunt vtręque rationales; erit parallelogrammum AK medium. Rursus quoniam rationalis est DG, & ipsi AC longitudine commensurabilis; parallelogrammum DK rationale erit. Constituatur igitur parallelogrammo quidem AI æquale quadratum LM; ipsi vero FK æquale quadratum auferatur NX, angulum habens eundem; quem LM, videlicet LOM. ergo quadrata LM NX circa eandem sunt diametrum. sit diameter ipsorum OR, & figura describatur. Similiter osteudemus rectam lineam LN spacium AB posse. Dico LN esse eam, quæ cum rationali medium totum efficit. Quoniam enim ostendimus parallelogrammum AK medium esse; atque est æquale quadratis ipsarum LO ON: erit & compositum ex quadratis LO ON medium. Rursus quoniam DK rationale est, & æquale ei, quod bis continetur LO ON; erit & quod bis LO ON continetur rationale. est autem AI incommensurabile ipsi FK. incommensurabile igitur est quadratum ex LO quadrato ex NO; ideoque LO ON potentia incommensurabiles sunt, facientes compositum quidem ex ipsorum quadratis medium; quod autem ipsis bis continetur rationale. ergo reliqua LN irrationalis est, quæ vocatur cum rationali medium totum efficiens, & potest spacium AB. recta igitur linea spacium AB potens est, quæ cum rationali medium totum efficit.





29. huius.

21. huius.

30. huius

26. huius


F. C. COMMENTARIVS.


Sit AC 6, AD R 36 minus 4, erit DG 4, & DE, vel EG 2. quòd ſi ad AG applicetur parallelogrammum AFG aequale quadrato ex CG, deficiens q. figura quadrata, erit AF R 14 plus R 10; FG R 14 minus R 10. & parallelogrammum AI eſt R 504 plus R 360, FK R 504 minus R 360: totum q. AK R 2016. At vero DK eſt 24, EK 12, & AB R 2016 minus 24. quod ſpacium eſt apotome quinta, vel reſiduum quintum. Diuidatur R 2016 in duas partes, ita vt productum ex ipſis ſit aequale 144 q. erit maior pars R 504 plus R 360, & minor R 504 minus R 360. quare R V. R 504 plus R 360 minus R V. R 504 minus R 360 eſt latus quadratum dicti ſpacij reſidui R 2016 minus 24.

THEOREMA LXXIII. PROPOSITIO XCVII.

Si ſpacium contineatur rationali, & apotoma ſexta, recta linea ſpacium potens eſt, quæ cum medio medium totum efficit.

Spacium enim AB contineatur rationali AC, & apotoma ſexta AD. Dico rectam lineam, quę ſpacium AB poteſt, eſſe eam, quæ cum medio medium totum efficit. ſit enim ipſi AD congruens DG. ergo AG GD rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles; & neutra ipſarum commenſurabilis eſt expoſitę rationali AC longitudine. totaq; AG plus poteſt, quàm congruens DG quadrato rectæ lineæ ſibi longitudine incõmenſurabilis. ſi igitur quartæ parti quadrati ex DG æquale ad rectam lineam AG applicetur, deficiens figura quadrata, in partes incommenſurabiles ipſam diuidet. Itaque ſecetur DG bifariam in E, & quadrato ex CG æquale parallelogrammum ad AG applicetur, deficiens figura quadrata, quod ſit AFG. incommenſurabilis igitur eſt AF ipſi FG longitudine. ut autem AF ad FG, ita eſt parallelogrammum AI ad ipſum FK. ergo AI ipſi FK eſt incommenſurabile. & quoniam AG AC rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles, erit parallelogrammum AK medium. ſunt autem AG DG rationales, & incommenſurabiles longitudine. medium igitur eſt & DK. quòd cum AG GD potentia ſolum commenſurabiles ſint, erit AG ipſi GD longitudine incommenſurabilis. ſed ut AG ad GD, ita eſt AK ad KD. incommenſurabile igitur eſt AK ipſi KD. itaque conſtituatur parallelogrammo AI ęquale quadratum LM; parallelogrammo autem FK æquale auferatur quadratum NX, angulum habens eundem, quem LM. ergo quadrata LM NX circa eãdem ſunt diametrum. ſit eorum diameter OR, & figura deſcribatur. ſimiliter vt ſupra, oſtendemus rectam lineam LN ſpacium AB poſſe. Dico LN eſſe eam, quæ cum medio medium totum efficit. Quonã enim medium oſtenſum eſt AK, atque eſt æquale quadratis ipſarum LO ON, erit & compoſitum ex quadratis LO ON medium. Rurſus quoniam medium oſtenſum eſt DK, & eſt ęquale ei, quod bis continetur LO ON; & quod bis LO ON continetur medium erit. Incommenſurabile autem oſtenſum eſt AK ipſi KD. ergo & quadrata ex LO ON incommenſurabilia ſunt ei, quod bis LO ON continetur. & quoniam incommenſurabile eſt AI ipſi FK, erit & quadratum ex LO quadrato ex ON incommenſurabile. ergo LO ON potentia ſolum commenſurabiles ſunt, facientes compoſitum quidem ex quadratis ipſarum medium. quod autem ipſis bis continetur medium, & incommenſurabile compoſito ex ipſarum quadratis. ergo LN irrationalis eſt, quæ vocatur, cum medio medium totum efficiens, & poteſt AB ſpacium. recta igitur linea ſpacium AB potens eſt, quæ cum medio medium totum efficit.





6. diffin. tertiarum.

29. huius.

16. huius: 21. huius

10. huius

14. ſexti.

79. huius.


F. C.

I. C. COMMENTARIVS.

Sit AC 6, AD R 32 minus R 20. erit DG R 20, & DE vel EG R 5. ſi autem ad AG applicetur parallelogrammum AFG, æquale quadrato ex EG, & deficiens figura quadrata, erit AF R 8 plus R 3, FG R 8 minus R 3: & idcirco parallelogrammum AI R 288 plus R 108, FK R 288 minus R 108, & totum parallelogrammum AK R 1152. parallelogrammum vero DK eſt R 720, DH R 18, & AB R 1152 minus R 720. quod ſpacium eſt apotome ſexta, vel ſextæ reſiduum, & eius latus quadratum, vel radix inuenietur eſſe R V. R 288 plus R 108 minus R V. 288 minus R 108.

THEOREMA LXXIIII. PROPOSITIO. XCVIII.

Quadratum apotomæ ad rationalem applicatum latitudinem facit apotomen primam.



Sit apotome AB, rationalis autem CD, & quadrato ex AB æquale parallelogrammum CE ad ipſam CD applicetur latitudinẽ faciens CF. Dico CF apotomen eſſe primam. ſit enim ipſi AB congruens BG. ergo AG GB rationales ſunt potentia ſolum cõmenſurabiles: & quadrato quidẽ ex AG æquale ad ipſam D applicetur CH: quadrato autem ex BG æqu... pplicetur KL. totum igitur CL eſt æquale quadratis ex AG GB, quorum parallelogrammum CE æquale eſt quadrato ex AB. ergo reliquum FL ei, quod bis AG GB continetur eſt æquale. ſecetur FM bifariam in N: & per N ipſi CD parallela ducatur NX: vtrumque igitur ipſorum FX LN eſt æquale ei, quod AG GB continetur. & quoniam quadrata ex AG GB rationalia ſunt, atque eſt quadratis ex AG GB æquale parallelogrammum DM; erit ipſum DM rationale; & ad rationalẽ CD applicatum eſt, latitudinẽ faciens CM. ergo CM eſt rationalis, & ipſi CD commenſurabilis longitudine. Rurſus quoniam medium eſt, quod bis continetur AG GB, eſtq; ei, quod bis AG GB continetur; æquale parallelogrammum LF; erit ipſum LF medium: & applicatum eſt ad rationalem CD, latitudinem faciens FM. quare FM eſt rationalis, ipſiq; CD longitudine incommenſurabilis. & ſunt quadrata quidem ex AG, GB rationalia: quod autem bis continetur AG GB medium. quadrata igitur ex AG GB incommẽſurabilia ſunt ei, quod bis AG GB continetur. ſed quadratis ex AG GB æquale eſt parallelogrammum CL, ei vero, quod bis continetur AG GB eſt æquale FL. ergo CL ipſi LF eſt incommenſurabile. vt autem CL ad LF, ita eſt recta linea CM ad MF. incommẽſurabilis igitur eſt CM ipſi MF longitudinę: & ſunt vtræque rationales. ergo CM MF rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles; ac propterea CF eſt apotome. Dico & primam eſſe. Quoniam enim quadratorum ex AG GB medium proportionale eſt quod AG GB continetur; atque eſt quadrato quidem ex AG æquale parallelogrãmum CH; ei vero, quod AG GB continetur æquale NL, & quadrato ex GB æquale KF. erit ipſorum CH KL medium proportionale NL. vt igitur CH ad NL, ita NL ad LK. ſed vt CH ad NL, ita eſt recta linea CK ad ipſam NM. vt autem NL ad LK, ita recta linea NM ad MK. ergo vt CK ad NM, ita eſt NM ad MK. & ob id rectangulum CKM eſt æquale ei, quod fit ex MN quadrato, hoc eſt quartę parti quadrati ex FM. & quoniam quadratum ex AG commenſurabile eſt quadrato ex GB, erit & parallelogrammum CH parallelogrammo KL commenſurabile. ſed vt CH ad KL, ita eſt recta linea CK ad ipſam KM. commenſurabilis igitur eſt CK ipſi KM. itaque cum duæ rectæ lineę inæquales ſint CM MF, & quartę parti quadrati ex FM æquale parallelogramum ad ipſam CM applicatum ſit, deficiens figura quadrata, quod ſcilicet

74. huius.

7. ſecundi.

21. huius.

23. huius.

1. ſexti.

74. huius. Lem. ad 55. huius.

11. quinti. 17. ſexti.

scilicet CK KM continetur; sitq; CK commensurabilis ipsi KM: recta linea CM plus poterit, quam MF quadrato rectę lineę sibi longitudine commensurabilis. atque est CM commensurabilis longitudine expositæ rationali CD. ergo CF est prima apotome. quadratum igitur apotomæ ad rationalem applicatum latitudinem facit apotomen primam.

16. huius.


1. diffi. tertiæ sum.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit AB R 33 minus R 3, BG R 3. rationalis autem CD sit 6; & si ad ipsam CD applicetur parallelogrammum CH aequale quadrato ex AG, quod est 33, latitudinem faciens CK, erit CK 5 1/2. & si ad eandem applicetur KL aequale quadrato ex GB, quod est 3, latitudinem faciens KM, erit KM 1/2, & tota CM 6. Rursus si ad eandem CD applicetur parallelogrammum FX, quod est R 99, latitudinem faciens FN, erit FN R 2 1/4, & eadem ratione NM est R 2 1/4, & tota FM R 11. ergo CF est 6 minus R 11, quę est apotome prima.

THEOREMA LXXV. PROPOSITIO. XCIX.

Quadratum mediæ apotomæ primę ad rationalem applicatum latitudinem facit apotomen secundam.



Sit apotome mediæ prima AB; rationalis autē CD: & quadrato ex AB æquale parallelogrammū CE ad ipsam CD applicetur, latitudinem faciens CF. Dico CF apotomē esse secundam. sit enim ipsi AB congruens BG. ergo AG GB mediæ sunt potentia solum commensurabiles, quæ rationale continent: & quadrato quidem ex AG æquale parallelogrammum CH ad CD applicetur, latitudinem faciens CK: quadrato autem ex GB æquale KL ad eandem applicetur, latitudinem faciens KM. totum igitur CL est æquale quadratis ex AG GB medijs existētibus. quare & CL est medium; & ad rationalem CD applicatum est, latitudinem faciens CM. rationalis igitur est CM, & ipsi CD longitudine incommensurabilis, itaque quoniam CL est æquale quadratis ex AG GB, quorum quadratum ex AB æquale est parallelogrammo CE; erit reliquum, quod bis continetur AG GB æquale ipsi FL. est autem rationale, quod bis AG GB continetur. rationale igitur est & FL; & ad rationalem FE applicatum est, latitudinem faciens FM. quare FM est rationalis, & ipsi CD commensurabilis longitudine. & quoniam quadrata quidem ex AG GB, hoc est parallelogrammum CL medium est; quod autem bis continetur AG GB, videlicet FL est rationale: erit CL incommensurabile ipsi LF. vt autem CL ad LF, ita recta linea CM ad MF. ergo CM ipsi MF longitudine est incōmensurabilis. & sunt vtræque rationales. sunt igitur CM MF rationales potentia solum commensurabiles. ideoq; CF apotome est. Dico & secundam esse. secetur enim FM bifariam in puncto N: & per N ipsi CD parallela ducatur NX. vtrumque igitur parallelogrammorum FX NL est æquale ei, quod continetur AG GB. & quoniam quadratorum ex AG GB medium proportionale est, quod AG GB continetur; estq; quadratū ex AG æquale parallelogrammo CH, quod autem continetur AG GB æquale parallelogrammo NL; & quadratum ex GB æquale ipsi KL: erit parallelogrammorū CH KL medium proportionale NL. est igitur vt CH ad NL, ita NL ad LK. Sed vt CH ad NL, ita est recta linea CK ad ipsam NM; & vt NL ad LK, ita NM ad MK. ergo vt CK ad NM, ita est NM ad MK; ac propterea rectāgulum CKM est æquale quadrato ex NM, hoc est quartæ parti quadrati ex FM. & quoniam quadratum ex AG commensurabile est quadrato ex GB, erit & CH parallelogrammum parallelogrammo KL commensurabile, hoc est recta linea CK commensurabilis ipsi KM. quod cum

93. huius.

7 secundi.

21. huius.

2. tertii.

10. huius.

94. huius.

Lem. ad 55. huius.

21. quinti.

17. sexti.

duę rectæ lineę inæquales sint CM MF; quartæ autem parti quadrati ex MF æquale parallelogrammum CKM ad maiorem CM applicatum sit, deficiens figura quadrata, & in partes commensurabiles ipsam diuidit: recta linea CM plus poterit, quàm MF quadrato rectæ lineæ sibi commensurabilis longitudine: atque est congruens FM expositę rationali CD commensurabilis. quare CF est apotome secunda. quadratum igitur mediæ apotomę primæ ad rationalem applicatum latitudinem facit apotomen secundam. 18. huius: 2. Diffi. tertiarum.

F. C. COMMENTARIVS.


Ex iam demonstratis perspicuum fit, vt apotomę quadratũ inueniamus, nos vti septima propositione 2 libri, non autem quarta, vt ad 34 huius dictum est.

Sit AB RR 972 *minus* RR 108, *BG* RR 108, *rationalis autem CD sit 6. & si ad ipsam CD applicetur parallelogrammum CH aequale quadrato ex AG, quod est* R 972, *latitudinem faciens CK; erit CK* R 27: *& si ad eãdem applicetur KL aequale quadrato ex GB, quod est* R 108 *latitudinem faciens KM; erit KM* R 3. *& tota CM* R 48. *Rursus si ad CD applicetur parallelogrammum FX aequale rectangulo AGB, quod est* 18, *latitudinem faciens FN; erit FN* 3, *itemq; NM* 3, *& tota FM* 6. *ergo CF est* R 48 *minus* 6, *quae est apotome secunda.*

THEOREMA LXXVI. PROPOSITIO C.

Quadratum mediæ secundæ apotomæ ad rationalem applicatum latitudinem facit apotomen tertiam.

Sit medię apotome secunda AB; rationalis autem CD & quadrato ex AB æquale parallelogrammum CE ad ipsam CD applicetur, latitudinem faciẽs CF. Dico CF apotomen esse tertiam. sit enim ipsi AB congruens BC. ergo AG GB mediæ sunt potentia solum commensurabiles, quæ medium continent: & quadrato quidem ex AG æquale ad CD applicetur CH, latitudinem faciens CK: quadrato autem ex GB æquale ad KH applicetur KL, latitudinem faciens KM. totum igitur CL est æquale quadratis ex AG GB: & sunt quadrata ex AG GB media. ergo & CL est medium, & ad rationalem CD applicatum est, latitudinem faciens CM. ergo CM est rationalis, & ipsi CD incommensurabilis longitudine. & quoniam totum CL est æquale quadratis ex AG GB, quorum CE æquale est quadrato ex AB; erit reliquum FL æquale ei, quod bis continetur AG GB. secetur FM bifariam in N: & per N ipsi CD parallela ducatur NX. Vtrumque igitur parallelogrammorum FX NL est æquale ei, quod AG GB continetur. est autem quod continetur AG GB medium. ergo & medium est FL, & ad rationalem EF applicatum est, latitudinem faciens FM. quare & FM est rationalis; & ipsi CD longitudine incommensurabilis. & quoniam AG GB potentia solum commensurabiles sunt, erit AG ipsi GB incommensurabilis longitudine. ideoq; quadratum ex AG rectangulo AGB est incommensurabile. sed quadrato quidem ex AG commensurabilia sunt ex AG GB quadrata; rectangulo autem AGB commensurabile est quod bis AG GB continetur. ergo quadrata ex AG GB ei, quod bis AG GB continetur, sunt incommensurabilia. at quadratis ex AG GB æquale est parallelogrammum CL; ei vero, quod bis continetur AG GB est æquale FL. incommensurabile igitur est CL ipsi LF. Vt autem CL ad LF, ita est recta linea CM ad MF. ergo CM ipsi MF incommensurabilis est longitudine; & sunt vtręque rationales. quare CM MF rationales sunt potentia solum commensurabilis. & ob id apotome est CF. Dico & tertiam esse. Quoniam enim quadratum ex AG commensurabile est quadrato ex GB, erit



74. huius: 23. huius. 7. secundi. 23. huius. Lem. ad 23. huius. Ex demonstratis in 24 huius. 1. sexti. 10. huius. 74. huius.

erit parallelogrammum CH parallelogrammo KL commensurabile. ergo & recta linea CK est cōmensurabilis ipsi KM. & quoniam quadratorum ex AG GB mediū proportionale est rectangulū AGB; atque est quadrato quidem ex AG æquale parallelogrammum CH; quadrato autem ex GB æquale KL, & rectangulo AGB æquale NL: erit parallelogrammorum CH KL medium proportionale NL. est igitur vt CH ad NL, ita NL ad LK. sed vt CH ad NL, ita est recta linea CK ad NM: vt autem NL ad LK, ita NM ad MK. ergo & vt CK ad NM, ita NM ad MK; ac propterea rectangulum CKM est æquale quadrato ex NM, hoc est quartæ parti quadrati ex FM. Quoniam igitur duæ rectę lineæ inæquales sunt CM MF; & quartæ parti quadrati ex FM æquale ad CM applicatum est, deficiens figura quadrata, quod in partes cōmensurabiles ipsam diuidit: recta linea CM plus poterit, quam MF quadrato rectę lineę sibi longitudine commensurabilis. & neutra ipsarum CM MF longitudine commensurabilis est expositæ rationali CD. ergo CF tertia est apotome. quadratum igitur mediæ apotomæ secundę ad rationalem applicatum, latitudinem facit apotomen tertiam.

Lem. ad 55. huius.


1. sexti.

11. quinti.

27. sexti.

18. huius.

3. diffin. tertiarum.



F. C. COMMENTARIVS.

Sit AB RR 882 *minus* RR 18, *BG* RR 18, *& rationalis CD sit 6. quòd si ad CD applicetur parallelogrammum CH aequale quadrato ex AG, latitudinem faciens CK, erit CK* R 24 $\frac{1}{2}$. *& si applicetur KL aequale quadrato ex GB, quod latitudinem faciat KM, erit KM* R $\frac{1}{2}$; *& tota CM* R 32. *praeterea si ad eandem CD applicetur FX aequale rectangulo AGB, quod est* R 126, *latitudinem faciens FN, erit FN* R 3 $\frac{1}{2}$; *& tota FM* R 14. *ergo CF est* R 32 *minus* R 14, *quae est apotome tertia.*

THEOREMA LXXVII. PROPOSITIO CI.


Quadratum minoris ad rationalem applicatum latitudinem facit apotomen quartam.

Sit minor AB, rationalis autem CD: & quadrato ex AB æquale parallelogrammum CE ad ipsam CD applicetur, latitudinem faciens CF. Dico CF apotomen esse quartam. sit enim ipsi AB congruēs BG. ergo AG GB potentia incommensurabiles sunt, facientes compositum quidem ex ipsarum AG GB quadratis rationale; quod autem bis ipsis continetur medium: & quadrato ex AG æquale ad CD applicetur CH, latitudinem faciens CK: quadrato autem ex GB æquale ad KH applicetur KL, latitudinē faciens KM. totum igitur CL quadratis ex AG GB est æquale. atque est compositum ex quadratis AG GB rationale. ergo & rationale est CL; & ad rationalem CD applicatum est, latitudinem faciēs CM. quare CM est rationalis, & ipsi CD longitudine commensurabilis. & quoniam totum CL est æquale quadratis ex AG GB, quorum CE æquale est quadrato ex AB: erit reliquum FL æquale ei, quod bis AG GB cōtinetur. Itaque secetur FM bifariam in N; & per N alterutri ipsarum CD ML parallela ducatur NX. vtrumque igitur parallelogrammorum FX NL est æquale ei, quod continetur AG GB. & quoniam quod bis continetur AG GB medium est, & æquale parallelogrammo LF. erit & LF medium.

77. huius.

31. huius.

9. secundi.



dium.& ad rationalem FE applicatum eſt, latitudinem faciens FM.ergo FM eſt rationalis,& ipſi CD longitudine incommenſurabilis.& quoniam compoſitũ ex quadratis ipſarum AG GB eſt rationale;quod autem bis AG GB continetur mediũ: erunt quadrata ex AG GB ei, quod bis continetur AG GB incommenſurabilia. quadratis autem ex AG GB æquale eſt parallelogrammum CL;& ei quod bis AG GB continetur eſt æquale FL.incommenſurabile igitur eſt CL ipſi LF. ſed vt CL ad LF,ita eſt CM ad MF.quare CM ipſi MF longitudine eſt incommenſurabilis:& ſunt vtræque rationales.ergo CM MF rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles.& eam ob cauſſam apotome eſt CF.Dico & quartam eſſe. Quoniam enim AG GB potentia ſunt iucommenſurabiles, erit quadratum ex AG incommenſurabile quadrato ex GB. & quadrato quidem ex AG æquale eſt parallelogrammum CH; quadrato autem ex GB eſt æquale KL.incommenſurabile igitur eſt CH ipſi KL.ſed vt CH ad KL,ita eſt CK ad KM.ergo CK ipſi KM eſt incommenſurabilis longitudine.& quoniam quadratorum ex AG GB medium proportionale eſt AGB rectangulum;atque eſt quadrato quidem ex AG æquale parallelogrammum CH;quadrato autem ex GB æquale KL; & rectangulo AGB æquale NL: erit NL medium proportionale parallelogrammorum CH KL. eſt igitur vt CH ad NL, ita NL ad LK. ſed vt CH ad NL, ita CK ad MN;& vt NL ad LK, ita NM ad MK.ergo vt CK ad MN ita NM ad MK; ac propterea rectangulum CKM eſt æquale quadrato ex NM, hoc eſt quartę parti quadrati ex FM. Itaque quoniam duę rectæ lineæ inæquales ſunt CM MF;& quartæ parti quadrati ex FM æquale ad CM applicatum eſt, deficiens figura quadrata,quod eſt CKM,& in partes incommenſurabiles ipſam diuidit: recta linea CM plus poterit,quàm MF quadrato rectę lineę ſibi incommẽſurabilis longitudine.& eſt tota CM longitudine commenſurabilis expoſitę rationali CD. ergo CF quarta eſt apotome. quadratum igitur minoris ad rationalem applicatum latitudinem facit apotomen quartam.


25.huius. 1.ſexti. 10.huius. 74.huius. 1.ſexti. 10.huius. Lem. ad 55. huius. 1.ſexti. 11.quinti. 17.ſexti. 19.huius. 4.Diffi. ſuarum.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit AB Rx V.21 plus Rx 315, minus Rx V.21 plus Rx 315; BG Rx V.21 minus Rx 315: rationalis autem CD ſit 6. & ſi ad CD applicetur parallelogrammum CH aequale quadrato ex AG, latitudinem faciens CK, erit CK 3 1/2 plus Rx 8 1/4. & ſi applicetur KL aequale quadrato ex GB, quod latitudinem faciat KM, erit KM 3 1/4 minus Rx 8 1/4: & tota CM 7. Quòd ſi ad eandem CD applicetur FX aequale rectangulo AGB, videlicet Rx 126, latitudinem faciens FN, erit FN Rx 3 1/2; & tota FM R 14. eſt igitur CF 7 minus R 14, quae eſt apotome quarta.

THEOREMA LXXVIII. PROPOSITIO CII.


Quadratum eius,quę cum rationali mediũ totum efficit ad rationalem applicatum latitudinem facit apotomen quintam.



Sit quę cum rationali medium totum efficit AB;rationalis autem CD;& quadrato ex AB æquale ad CD applicetur parallelogrammum CE, latitudinem faciens CF. Dico CF apotomen eſſe quintam. ſit enim ipſi AB congruens BG.ergo AG GB rectæ lineæ potentia ſunt incõmenſurabiles, quæ faciunt compoſitum quidem ex quadratis ipſarum medium,quod autem bis ipſis continetur rationale. & quadrato ex AG æquale parallelogrammũ CH ad ipſam CD applicetur, latitudinem faciens CK: quadrato autem ex GB æquale applicetur KL latitudinẽ faciens KM.totum igitur CL eſt æquale quadratis ex AG GB. ſed compoſitum ex quadratis ipſarum AG GB eſt medium.ergo & medium eſt parallelogrammum CL; &

95.huius.

ad rationalem CD applicatum eſt, latitudinem faciens
23. huius CM. quare CM eſt rationalis, & ipſi CD longitudine incommenſurabilis. & quoniam totum CL eſt æquale quadratis ex AG GB, quorum CE æquale eſt quadrato ex A
7 secundi. B; erit reliquum FL æquale ei, quod bis AG GB continetur. Itaque ſecetur FM bifariam in puncto N, & ab ipſo N alterutri ipſarum CD ML parallela ducatur NX. vtrumque igitur FX NL eſt æquale ei, quod AG GB continetur. & quoniam quod bis continetur AG GB rationale eſt, & æquale parallelogrammo FL; erit & FL rationale; &
21. huius. ad rationalem EF applicatum eſt, latitudinem faciens F M. ergo FM eſt rationalis, & ipſi CD commenſurabilis lõgitudine. eſt autem parallelogrammum CL medium, &
2. sexti. FL rationale. incommenſurabile igitur eſt CL ipſi LF. & vt CL ad LF, ita CM ad M
10. huius. F. ergo CM ipſi MF longitudine eſt incommenſurabilis. & ſunt vtræque rationales.
74. huius. quare CM MF rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles; ob idque apotome eſt CF. Dico & quintam eſſe. ſimiliter enim demonſtrabimus rectangulum CK M eſſe æquale quadrato ex NM, hoc eſt quartæ parti quadrati ex FM, quòd cum quadratum ex AG incommenſurabile ſit quadrato ex GB; ſitq; quadratum ex AG parallelogrammo CH æquale; quadratum autem ex GB parallelogrammo KL: erit C H ipſi KL incommenſurabile. ſed vt CH ad KL, ita CK ad KM. ergo CK ipſi KM longitudine eſt incommenſurabilis. Quoniam igitur duæ rectæ lineæ CM MF inæ-
2. sexti. 10. huius. quales ſunt: & quartæ parti quadrati ex FM æquale ad ipſam CM applicatum eſt, de
19. huius. ficiens figura quadrata, & in partes incommenſurabiles ipſam diuidit; recta linea C M plus poterit, quàm MF quadrato rectæ lineæ ſibi longitudine incommẽſurabilis. atque eſt congruens FM commenſurabilis longitudine expoſitæ rationali CD. ergo
5. diffi. tertium. CF quinta apotome eſt. quadratum igitur eius, quæ cum rationali medium totum efficit ad rationalem applicatum latitudinem facit apotomen quintam.




F. C. COMMENTARIVS.

Sit AB R *V.* R 288 *plus* R 207 *minus* R *V.* 288 *minus* R 207. *BG* R *V.* R 288 *minus* R 207: *rationalis autem C D ſit 6. quòd ſi ad C D applicetur parallelogrammum C H aequale quadrato ex AG, latitudinem faciens CK; erit CK* R 8 *plus* R 5 $\frac{1}{4}$. *& ſi applicetur K L aequale quadrato ex GB, latitudinẽ faciens KM erit KM* R 8 *minus* R 5 $\frac{1}{4}$, *& tota CM* R 32. *Rurſus ſi ad eandem CD applicetur FX aequale rectangulo AGB, latitudinem faciens FN; erit FN* 1 $\frac{1}{4}$, *& tota FM* 3. *quare CF eſt* R 32 *minus* 3, *quae eſt apotome quinta.*

THEOREMA LXXIX. PROPOSITIO CIII.

Quadratum eius, quæ cum medio medium totum efficit ad rationalem applicatum latitudinem facit apotomen ſextam.

Sit quę cum medio medium totum efficit A B;
1. huius rationalis autem C D: & quadrato ex AB æquale parallelogrammum CE ad ipſam CD applicetur, latitudinem faciens C F. Dico CF apotomen eſſe ſextam. ſit enim ipſi AB congruens BG. ergo AG G B potentia ſunt incommenſurabiles, facientes compoſitum quidem ex ipſarum quadratis medium: quod autem bis ipſis AG GB continetur medium, & adhuc quadratis ipſarum incommenſurabile. Itaq; ad CD applicetur quadrato ex AG æquale parallelogrãmũ C H, latitudinem faciens



CK.

CK:quadrato aũt ex BG ęquale applicetur KL,latitudinem faciens KM. totũ igitur CL eſt ęquale quadratis ex AG GB:ac propterea CL eſt mediũ,& ad rationalẽ CD applicatum eſt, latitudinem faciens CM.ergo CM rationalis eſt,& ipſi CD longitudine incommenſurabilis. Quoniam igitur CL eſt æquale quadratis ex AG GB,quorum CE æquale eſt quadrato ex AB; erit reliquum FL æquale ei,quod bis AG GB continetur. atqne eſt quod bis cõtinetur AG GB medium.ergo & FL eſt medium; & ad rationalem FE applicatum eſt,latitudinem faciens FM. eſt igitur FM rationalis, & ipſi CD longitudine incommenſurabilis. & quoniam quadrata ex AG GB incommenſurabilia ſunt ei, quod bis AG GB continetur; atque eſt quadratis quidem AG GB ęquale parallelogrammum CL; ei vero,quod bis continetur AG GB æquale FL: erit CL ipſi LF incommenſurabile. ſed vt CL ad LF, ita eſt CM ad MF. quare CM ipſi MF incommenſurabilis eſt longitudine: & ſunt vtręque rationales. ergo CM MF rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles.& ob id CF eſt apotome. Dico & ſextam eſſe. Quoniã enim FL eſt ęquale ei, quod bis continetur AG GB, ſecetur FM bifariã in puncto N; & per N ipſi CD parallela ducatur NX. vtrũq; igitur parallelogrammorum FX NL eſt æquale rectangulo AGB. & quoniam AG GB potẽtia ſunt incommenſurabiles; erit quadratum ex AG incommenſurabile quadrato ex BG. ſed quadrato quidem ex AG eſt æquale parallelogrammum CH; quadrato autem ex BG æquale KL. ergo CH ipſi KL eſt incommenſurabile. vt autem CH ad KL,ita eſt CK ad KM. incommenſurabilis igitur eſt CK ipſi KM. quòd cum quadratorum ex AG GB medium proportionale ſit rectangulum AGB;ſitq; quadrato ex AG æquale CH, & quadrato ex GB æquale KL; rectangulo; AGB æquale NL: erit,& parallelogrammorum CH KL medium proportionale NK. & eadem ratione CM plus poterit, quàm MF quadrato rectæ lineæ ſibi longitudine incommenſurabilis:& neutra ipſarum eſt commenſurabilis lõgitudine expoſitę rationali CD.ergo CF ſexta eſt apotome. quadratum igitur eius,quę cum medio medium totum efficit ad rationalem applicatum latitudinem facit apotomen ſextam.


F. C. COMMENTARIVS.

Sit AB R *V.* R 396 *plus* R 288 *minus* R *V.* R 396 *minus* R 288; *BG* R *V.* R 396 *minus* R 288; *& rationalis CD ſit* 6. *ſi vero ad CD applicetur parallelogrammum CH, latitudinem faciens CK; erit CK* R 11 *plus* R 8, *& ſi applicetur KL aequale quadrato ex GB, latitudinem faciens KM; erit KM* R 11 *minus* R 8, *& tota CM* R 44. *Rurſus ſi ad CD applicetur FX ęquale rectangulo AGB, quod latitudinem faciat FN, erit ea* R 3, *& tota FM* R 12. *ergo CF, eſt* R 44 *minus* R 12, *quae eſt apotome ſexta.*

THEOREMA LXXX. PROPOSITIO. CIIII.

Recta linea apotomę longitudine cõmenſurabilis, & ipſa apotome eſt,atque ordine eadem.

Sit apotome AB; et ipſi A B longitudine cõ menſurabilis ſit CD. Dico CD apotomen eſſe, atque ordine eandem,quæ AB.quoniam enim apotome eſt A B, ſit ipſi congruens B E. ergo AE EB rationales ſunt potentia ſolum commẽ ſurabiles. & fiat proportio BE ad D F eadem, quę eſt AB ad C D. quare vt vna ad vnam,ita erunt omnes ad omnes. eſt igitur vt A B ad CD,ita A E ad CF. commenſurabilis autem eſt A B ipſi CD longitudine. ergo & AE ipſi C F longitudine commenſurabilis erit, & BE ipſi DF. ſunt autem AE EB rationales potentia ſolum cõmenſurabiles. ergo & EF FD rationales erunt potentia ſolum commẽſurabiles: ac propterea CD apotome eſt. Dico & ordine eandem eſſe. Quoniam enim eſt vt AE ad CF,ita BE ad FD,erit permutãdo vt AE ad EB,ita CF ad FD. vel igitur AE plus




74. huius.

11. quinti.

10. huius.

A
B

74. huius.



poteſt, quàm EB quadrato rectę lineę ſibi longitudine commenſurabilis, vel incommenſurabilis: & ſiquidem commenſusabilis, & CF plus poterit, quàm FD quadrato rectæ lineę ſibi lõgitudine cõmenſurabilis: & ſi quidem AE commenſurabilis eſt longitudine expoſitę rationali; & CF expoſitæ rationali lõgitudine commenſurabilis erit: ſi vero EB eſt cõmenſurabilis, & DF cõmenſurabilis erit: & ſi neutra ipſarũ AE EB cõmenſurabilis eſt expoſitæ rationali longitudine, & neutra ipſarũ CF FD eidẽ longitudine erit cõmenſurabilis. quòd ſi AE plus poſſit, quã EB quadrato rectę lineæ ſibi incõmenſurabilis longitudine; & CF plus poterit, quã FD quadrato rectę lineę ſibi lõgitudine incõmenſurabilis: & ſiquidem AE ſit cõmenſurabilis expoſitæ rationali lõgitudine, & CF eidẽ longitndine cõmenſurabilis erit: ſi uero BE, & DF: & ſi neutra ipſarũ AE EB, & neutra ipſarũ CF FD erit expoſitæ rationali lõgitudine cõmẽſurabilis. ergo CD apotome eſt, & ordine eadẽ, quę AB.

F. C. COMMENTARIVS.

A Et BE ipſi DF.] *Quoniam enim eſt vt AE ad CF, ita AB ad CD, erit & reliqua BE ad DF, vt AE ad CF, hoc eſt vt AB ad CD. commenſurabilis igitur eſt & BE ipſi DF longitudine.*


19. huius

B Ergo & CF FD rationales erunt potentia ſolum commenſurabiles.] *Nam cum ſit vt AE ad CF, ita BE ad DF, erit permutãdo vt AE ad EB, ita CF ad FD: ſuntq; AE EB rationales potentia ſolũ cõmenſurabiles. ergo & CF FD rationales potentia ſolũ cõmenſurabiles erũt.*

20. huius

THEOREMA LXXXI. PROPOSITIO. CV.

Recta linea mediæ apotomæ commenſurabilis, & ipſa mediæ apotome eſt, atque ordine eadem.




Sit mediæ apotome AB, & ipſi AB lõgitudine commenſurabilis ſit CD. Dico CD mediæ apotomen eſſe, & ordine eandem. Quoniam enim mediæ apotome eſt AB, ſit BE ipſi AB congruens. ergo AE EB medię ſunt potentia ſolum commenſurabiles: & fiat vt AB ad CD, ita BE ad DF. ſunt autem AE EB mediæ potentia ſolum commenſurabiles. ergo & CF FD mediæ potẽtia ſolũ cõmẽſurabiles erũt; ac propterea mediæ apotome eſt CD. oſtendendum eſt & ordine eandem eſſe, quę AB. Quoniam enim vt AE ad EB, ita CF ad FD; vt autem AE ad EB, ita quadratum ex AE ad rectangulum AEB; & vt CF ad FD, ita quadratum ex CF ad CFD rectangulum: erit & vt quadratum ex AE ad rectangulum AEB, ita quadratum ex CF ad rectangulum CFD. ſed quadratum ex AE cõmẽſurabile eſt quadrato ex CF. rectangulum igitur AEB rectangulo CFD eſt commenſurabile. & ſi quidem rationale eſt rectangulum AEB, & rectangulum CFD rationale erit. ſi vero rectangulum AEB medium eſt, & medium erit rectangulum CFD. mediæ igitur apotome eſt CD, atque ordine eadem, quæ AB.

75. 76. huius

Lem. ad 25. huius.

THEOREMA LXXXII. PROPOSITIO. CVI.

Recta linea minori commenſurabilis, & ipſa minor eſt.



Sit minor AB, & ipſi AB commenſurabilis ſit CD. Dico & CD minorem eſſe. fiant enim eadem quæ prius. & quoniam AE EB potentia ſunt incõmenſurabiles, & CF FD potentia incõmẽſurabiles erũt. eſt aũt vt AE ad EB, ita CF ad FD. quare & vt quadratũ ex AE ad quadratũ ex EB, ita quadratũ ex CF ad


77. huius.

22. ſexti.

quadratum

quadratum ex FD : & componendo, vt quadrata ex AE EB ad quadratum ex EB, ita quadrata ex CF FD ad quadratum ex FD; & permutando. commensurabile autem est quadratum ex BE quadrato ex DF. ergo & compositum ex quadratis ipsarum AE EB composito ex quadratis CF FD commensurabile erit. sed compositū ex quadratis AE EB est rationale. ergo & rationale erit compositum ex quadratis CF FD. Rursus quoniam est vt quadratum ex AE ad rectangulum AEB, ita quadratum ex CF ad rectangulum CFD, & permutando; commensurabile autem est quadratum ex AE quadrato ex CF: erit & rectangulum AEB rectangulo CFD commensurabile. sed rectangulum AEB medium est. medium igitur & rectangulum CFD. quare CF FD potentia incommensurabiles sunt, facientes compositum quidem ex ipsarum quadratis rationale: quod autem ipsis continetur medium. ergo C D est minor. 77. huius.

ALITER. Sit minor A, & ipsi A commensurabilis sit B. Dico B minorem esse. Exponatur enim CD rationalis: & quadrato ex A æquale parallelogrammum CE ad ipsam CD applicetur latitudine faciens CF. apotome igitur quarta est CF. quadrato autem ex B æquale ad FE applicetur FG, latitudinem faciens FH. Quoniam igitur A commensurabilis est ipsi B, erit & quadratum ex A quadrato ex B commensurabile. sed quadrato quidem ex A æquale est parallelogrammum CE; quadrato autem ex B æquale FG. ergo CE commensurabile est ipsi FG. vt autem CE ad FG, ita CF ad FH. commēsurabilis igitur est CF ipsi FH longitudine. sed CF est apotome quarta. ergo & FH apotome quarta est; et spacium FG rationali, et apotoma quarta continetur. recta igitur linea spacium potens minor est. potest autem spacium FG ipsa B. ergo B est minor.




ex. huius. 104: huius. 95. huius.

THEOREMA LXXXIII. PROPOSITIO CVII.


Recta linea commensurabilis ei, quæ cum rationali medium totum efficit, & ipsa cum rationali medium totum efficiens est.

Sit cum rationali medium totum efficiens AB: et ipsi AB commensurabilis sit CD. Dico CD esse eam, quę cum rationali medium totum efficit. sit enim ipsi AB congruens BE. ergo AE EB potentia incommensurabiles sunt, facientes cōpositum quidem ex ipsarum quadratis medium; quod autem ipsis continetur rationale. et eadem construantur. similiter demonstrabitur, vt prius CF FD in eadem esse proportione, in qua AE EB: et compositum ex quadratis ipsarum AE EB commensurabile esse composito ex quadratis CF FD: rectangulum autem AEB rectangulo CFD commensurabile. quare et CF FD potentia incommensurabiles sunt, facientes compositum quidem ex quadratis CF FD, medium; quod autem ipsis continetur, rationale. ergo CD est quæ cum rationali medium totum efficit.



78. huius.


ALITER. Sit cum rationali medium totum efficiē A, et ipsi A commensurabilis B. Dico B esse eam, quę cū rationali medium totum efficit. Exponatur enim rationalis CD: et quadrato quidem ex A æquale parallelogrammum CE ad ipsam CD applicetur latitudinem faciens CF. ergo CF est apotome quinta: quadrato aūt ex B æquale



78. huius. 102. huius.

FG ad


FG ad ipſam FE applicetur, latitudinem faciens FH. Quoniam igitur A commenſurabilis eſt ipſi B, erit & quadratum ex A quadrato ex B commenſurabile. ſed quadrato ex A æquale eſt parallelogrammum CE; quadrato autem ex B æquale FG. ergo CE eſt commenſurabile ipſi FG; obidque recta linea CF ipſi FH longitudine eſt commenſu-
104. huius. rabilis. apotome autem quinta eſt CF. ergo & FH eſt apotome quinta; eſtq; FE rationalis. ſi autem ſpacium con-
96. huius. tineatur rationali, & apotoma quinta, recta linea ſpacium potens eſt, quæ cum rationali medium totum efficit. ſed ipſa B poteſt ſpacium FG. ergo B cum rationali medium totum efficiens eſt.



THEOREMA LXXXIIII. PROPOSITIO CVIII.

Recta linea commenſurabilis ei, quæ cum medio medium totum efficit, & ipſa cum medio medium totum efficiens eſt.


Sit cum medio medium totum efficiens AB: & ipſi AB commenſurabilis ſit CD. Dico CD eſſe eã, quę cum medio medium totum efficit. ſit ipſi AB
79. huius. congruës BE, & eadem cõſtruantur. ergo AE EB potentia incommenſurabiles ſunt, facientes compoſitum quidem ex quadratis ipſarum medium; quod autem ipſis continetur medium, incommenſurabileq; compoſito ex ipſarum quadratis. & ſunt AE EB commenſurabiles ipſis CF FD, vt oſtenſum eſt: & compoſitum ex quadratis AE EB commenſurabile compoſito ex quadratis CF FD: rectangulumque AEB rectangulo CFD. ergo CF FD potentia incommenſurabiles
79. huius. ſunt, facientes compoſitum quidem ex quadratis ipſarum medium; quod autem ipſis continetur medium, & incommenſurabile compoſito ex ipſarum quadratis. ergo CD eſt quę cum medio medium totum efficit.



THEOREMA LXXXV. PROPOSITIO CIX.

Medio de rationali detracto, recta linea, quæ reliquum ſpacium poteſt, vna ex duabus irrationalibus fit, vel apotome, vel minor.

De rationali enim BC medium BD detrahatur. Dico eam, quæ reliquum ſpacium EC poteſt, vnam fieri ex duabus irrationalibus, vel apotomẽ vel minorem. Exponatur enim rationalis FG: & parallelogrammo quidem BC æquale GH ad FG applicetur; parallelogrammo autem BD æquale auferatur GK. reliquum igitur CE eſt æquale LH. Itaque quoniam rationale eſt BC, medium autem BD: atque eſt BC æquale GH, & BD ipſi GK; erit GH rationale; medium autem GK, & ad rationalem FG applicatum eſt. rationalis igitur eſt
21. huius. 23. huius. FH, & ipſi FG longitudine commenſurabilis: FK vero rationalis, & incommenſurabilis ipſi FG lõ-
13. huius. gitudine. ergo FH ipſi FK longitudine incommenſurabilis eſt, & HF FK rationales ſunt, potentia ſolum commenſurabiles; ac propterea HK eſt apotome. ipſi vero
74 huius. congruens




congruens KF. vel igitur HF plus poteſt, quàm FK quadrato rectę lineę ſibi commẽ ſurabilis longitudine, vel incommenſurabilis. poſsit primum quadrato rectæ lineæ commenſurabilis. atque eſt tota HF commenſurabilis longitudine expoſitę rationali FG. ergo HK prima eſt apotome. recta autem linea, quæ poteſt ſpacium rationali, & apotoma prima contentum eſt apotome. Ergo quæ poteſt LH hoc eſt CE apotome eſt. quòd ſi HF plus poſsit, quàm FK quadrato rectę lineæ ſibi incommenſurabilis longitudine; eſtq́; tota HF expoſitæ rationali F G longitudine commenſurabilis; erit HK apotome quarta. & quę poteſt ſpacium rationali, & apotoma quarta contentum minor eſt. quæ igitur poteſt ſpacium LH, videlicet EC eſt minor.

1. tertiarum. diffin. 92. huius. 4 diffin. tertiarum. 95. huius.

THEOREMA LXXXVI. PROPOSITIO CX.

Rationali de medio detracto alię duę irrationales fiunt, vel medię apotome prima, vel cum rationali medium totum efficiens.

De medio enim BC rationale BD detrahatur. Dico rectã lineã, quæ reliquũ ſpaciũ EC poteſt, vnã duarum irrationalium fieri vel mediæ apotomen primam, vel eam, quę cum rationali medium totum efficit. Exponatur enim rationalis FG, & ad ipſam ſimiliter ſpacia applicentur; erit rationalis quidẽ FH, & ipſi FG longitudine incommenſurabilis; rationalis autem FK, & incommenſurabilis ipſi FG longitudine. ergo HF FK rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles; ac propterea apotome eſt HK, & ipſi congruẽs KF. vel igitur HF plus poteſt, quàm FK quadrato rectæ lineæ ſibi longitudine commenſurabilis, vel incommenſurabilis. & ſi quidẽ commenſurabilis; atque eſt congruens FK commenſurabilis expoſitæ rationalis F G longitudine: erit HK apotome ſecunda. eſt autem FG rationalis. ergo quæ poteſt ſpacium LH, hoc eſt CE, mediæ eſt apotome prima. quòd ſi HF plus poteſt, quàm FK quadrato rectæ lineę ſibi longitudine incommenſurabilis; atque eſt congruens FK commenſurabilis expoſitę rationali FG longitudine: erit HK apotome quinta. recta igitur linea potens ſpacium EC eſt quæ cum rationali medium totum efficit.




23. huius. 21. huius. 74. huius. 1. diffi. tertiarum. 93. huius. 5. diffi. tertiarum. 99. huius.

THEOREMA LXXXVII. PROPOSITIO. CXI.


Medio de medio detracto, quod ſit incommenſurabile toti, reliquę duæ irrationales fiunt, vel medię apotome ſecunda, vel cum medio medium totum efficiens.

Detrahatur enim, vt in propoſitis figuris de medio BC medium BD, quod ſit incommenſurabile toti. Dico rectam lineam, quæ poteſt ſpacium CE, vnã eſſe ex duabus irrationalibus, vel medię apotomen ſecundam, vel eam, quæ cum medio medium totum efficit. Quoniam enim medium eſt vtrumque ipſorũ BC BD, & BC incommenſurabile eſt ipſi BD, hoc eſt GH ipſi GK; erit HF ipſi FK incommenſurabilis longitudine. ergo HF FK rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles; & ob id apotome eſt HK, & ipſi congruens KF. itaque vel HF plus



23. huius. 74. huius.

HF plus poteſt, quàm FK quadrato rectæ lineę ſibi longitudine commenſurabilis, vel incommenſurabilis:& ſi quidem commenſurabilis, & neutra ipſarum HF FK commenſurabilis eſt expoſitæ rationali FG longitudine; erit HK apotome tertia. rationalis autem eſt KL:& rectangulum rationali, & apotoma tertia contẽtum irrationale eſt. ergo recta linea, quę ipſum poteſt, eſt irrationalis, & vocatur medię apotome ſecunda. ſi vero HF plus poteſt, quàm FK quadrato rectæ lineæ ſibi incommenſurabilis longitudine, & neutra ipſarum HF FK longitudine commenſurabilis eſt expoſitæ rationali FG; erit HK apotome ſexta. at recta linea potens quod rationali, & apotoma ſexta cõtinetur eſt quæ cum medio medium totum efficit. ergo quæ poteſt ſpacium LH, hoc eſt EC eſt cum medio medium totum efficiens.




5. diffi. tertiarum.
94. huius.
6. diffi. tertium.
97. huius.

THEOREMA LXXXVIII. PROPOSITIO. CXII.

Apotome non eſt eadem, quæ ex binis nominibus.

Sit apotome AB. Dico AB non eſſe eandem, quæ ex binis nominibus. ſit enim, ſi fieri poteſt; ex ponaturque rationalis DC, & quadrato ex AB æquale rectangulum CE ad ipſam DC applicetur latitudinem faciens DE. Quoniam igitur apotome eſt AB, erit DE apotome prima. ſit ipſis congruens EF. ergo DF FE rationales ſunt potentia ſolum commẽſurabiles: & DF plus poteſt, quàm FE quadrato rectæ lineę ſibi longitudine commẽſurabilis: atq; eſt DF cõmẽſurabilis expoſitę rationali CD lõgitudine. Rurſus qñ ex binis nominibus eſt AB, erit DE ex binis nominibus prima. Diuidatur in nomina ad pũctũ G; ſitq; DG maius nomẽ. ergo DG GE rationales ſunt, potẽtia ſolũ cõmẽſurabiles: & DG plus põt, quã GE quadrato rectæ lineæ ſibi cõmẽſurabilis lõgitudine: & maior DG longitudine commenſurabilis eſt expoſitę rationali DC. quare DF ipſi DG longitudine eſt commenſurabilis. & reliquę igitur FG commenſurabilis erit. Itaq; quoniam DF commenſurabilis eſt ipſi FG, atque eſt rationalis DF; erit & FG rationalis. Rurſus quoniam DF commenſurabilis eſt ipſi FG longitudine, atque eſt DF ipſi FE incommenſurabilis longitudine; erit & FG ipſi FE longitudine incommenſurabilis: & ſunt rationales. ergo GF FE rationales ſunt potentia ſolum commenſurabiles; ac propterea apotome eſt EG. ſed & rationalis. quod fieri non poteſt. ergo apotome non eſt eadem, quæ ex binis nominibus.



98. huius.
1. diffi. tertium.
61. huius.
37. huius.
12. huius.
Ex demonſtratis ad 17. huius.
74. huius.

Apotome, & quę poſt ipſam ſunt irrationales, neque medię, neque inter ſe eadẽ ſunt: quadratum enim, quod à media fit, ad rationalem applicatum, latitudinem facit rationalem, & ei, ad quam applicatur, longitudine incommenſurabilem. quod autem ab apotoma fit ad rationalem applicatum, latitudinem facit apotomen primam. quod fit à mediæ apotoma prima ad rationalem applicatum latitudinem facit apotomen ſecundam. quod fit à mediæ apotoma ſecunda ad rationalem applicatum latitudinem facit apotomen tertiam. quod fit à minori ad rationalem applicatum latitudinem facit apotomen quartam. quod ab ea, quæ cum rationali mediũ totũ efficit ad rationalẽ applicatũ latitudinẽ facit apotomẽ quintã. quod ab ea, quæ cum medio medium totum efficit ad rationalem applicatum latitudinem facit apotomen ſextam. Quoniam igitur dictę latitudines differunt tum à prima, tum inter ſe ſe, à prima quidem, quòd rationalis ſit, inter ſe vero, quod ordine non ſint eadẽ; manifeſtum eſt & ipſa irrationales inter ſe differentes eſſe. & oſtenſum eſt apotomẽ


23. huius.
98. huius.
99. huius.
100. huius.
101. huius.
102. huius.
103. huius.

non esse eandem, quæ ex binis nominibus. quadrata autem apotomæ & earum quę sunt post apotomen ad rationalem applicata latitudines faciunt apotomas eiusdē ordinis, cuius & illæ sunt, quarum quadrata applicantur. Similiter & quadrata eius, quæ est ex binis nominibus, & earum, quæ posti ipsam sunt ad rationalem applicata latitudines faciunt eas, quæ ex binis nominibus eiusdem ordinis, cuius & illę sunt. ergo rectę lineæ, quæ sequuntur apotomen, & quæ sequuntur eam, quæ ex binis nominibus, inter se differunt, ita vt omnes sint numero tredecim, videlicet.

1 Media.
2 Quæ ex binis nominibus
3 Quę ex binis medijs prima
4 Quæ ex binis medijs secunda
5 Maior
6 Rationale ac medium potens
7 Bina media potens
8 Apotome
9 Mediæ apotome prima.
10 Mediæ apotome secunda.
11 Minor.
12 Cum rationali medium totum efficiens.
13 Cum medio medium totum efficiens.

THEOREMA LXXXIX. PROPOSITIO. CXIII.


Quadratum rationalis ad eam, quæ ex binis nominibus applicatum latitudinem facit apotomen, cuius nomina commensurabilia sunt nominibus eius, quæ est ex binis nominibus, & in eadem proportione; & adhuc apotome, quæ fit, eundem habet ordinem, quem ea, quæ est ex binis nominibus.



Sit rationalis A; ea, quę est ex binis nominibus BC, cuius maius nomen CD: & quadrato ex A æquale rectangulum sit quod BC EF continetur. Dico EF apotomen esse, cuius nomina commensurabilia sunt ipsis CD DB, & in eadem proportione, & adhuc EF eundem ordinem habere, quam habet BC. Sit enim rursus quadrato ex A æquale rectangulum, quod BD & G continetur. Itaque quoniam rectangulum contentum BC EF est æquale ei, quod BD G continetur, erit vt CB ad BD, ita G ad EF: maior autem est CB, quàm BD. ergo & G quàm EF maior erit. sit ipsi G æqualis EH. est igitur vt CB ad BD, ita HE ad EF. & diuidendo vt CD ad DB, ita HF ad FE, fiat vt HF ad FE, ita FK ad KE. ergo & tota HK ad totam KF est vt FK ad KE. vt enim vnum antecedentium ad vnum consequentium, ita antecedentia omnia ad omnia consequentia. sed vt FK ad KE, ita CD ad DB. & vt igitur HK ad KF, ita CD ad DB. cōmēsurabile aūt est quadratū ex CD quadrato ex DB. ergo & quadratū ex HK quadrato ex KF est commensurabile. atque est vt quadratum ex HK ad quadratum ex KF

A
B
C
D
E
F

KF, ita recta linea HK ad KE, quoniam tres rectæ lineæ HK KF KE deinceps proportiones sunt. commensurabilis igitur est HK ipsi
G KE longitudine. ergo & HE ipsi EK longitudine est commensurabilis. & quoniã quadratum ex A est æquale ei, quod HE BD continetur; rationale autem est quadratum ex A: erit & quod HE BD continetur rationale: & ad rationalem BD applicatum est.
21. huius rationalis igitur est HE, & ipsi BD longitudine commensurabilis; ideoq; & EK, quæ est incommensurabilis ipsi HE rationalis erit, & ipsi BD commensurabilis longitudine. Quoniam igitur est vt CD ad DB, ita FK ad KE; sunt autẽ CD DB potentia solum cõmensurabiles: & FK KE potentia solum commensurabiles erunt. rationalis autem est KE, & ipsi BD commensurabi-
H lis longitudine. quare & FK est rationalis, ipsiq; CD longitudine commensurabilis. sunt igitur FK KE rationales, & potentia solum commensurabiles: & idcirco EF apotome est. itaque vel CD plus potest, quàm DB quadrato rectæ lineę sibi commensurabilis longitudine, vel incommensurabilis. & si quidem commensurabilis,
es. huius. etiam FK plus poterit, quàm KE quadrato rectæ lineæ sibi longitudine commensurabilis. & si CD commensurabilis est expositæ rationali longitudine, & FK eidem commensurabilis erit: si autem BD, & KE. & si neutra ipsarum CD DB, & neutra ipsarum FK KE. Quòd si CD plus potest, quàm DB quadrato rectæ lineę sibi incommensurabilis longitudine, & FK plus poterit, quàm KE quadrato rectæ lineæ sibi lõgitudine incommensurabilis. & si BD, & KE. at si neutra ipsarum CD DB, & neutra ipsarum FK KE. ergo EF apotome est, cuius nomina FK KE commensurabilia sunt nominibus CD DB eius, quę est ex binis nominibus, & in eadem proportione, & eundem habet ordinem, quem CB.



F. C. COMMENTARIVS.

A Erit vt CB ad BD, ita G ad EF] *Ex 14 sexti.*

B Ergo & G, quàm EF maior erit] *Ex iis, quae à nobis demonstrata sunt ad 16 quinti.*

C Ergo & tota HK ad totam KF est vt FK ad KE] *Ex 12 quinti.*

D Commensurabile autem est quadratum ex CD quadrato ex DB] *Ex 37 huius, ponitur enim CB ea, quae ex binis nominibus.*

E Ergo et quadratum ex HK quadrato ex KF est commensurabile] *Ex 22 sexti, & decima huius.*

F Atque est vt quadratum ex HK ad quadratum ex KF, ita recta linea HK ad KE] *Ex corollario secundo 20 sexti.*

G Ergo & HE ipsi EK longitudine est commensurabilis] *Ex 16. huius.*

H Quare & FK est rationalis, ipsiq́ue CD longitudine commensurabilis] *Quoniam igitur est vt CD ad DB, ita FK ad KE, erit permutando vt KE ad DB, ita FK ad CD. sed KE est longitudine commensurabilis ipsi BD. ergo & FK ipsi CD commensurabilis erit longitudine. quòd cum FK KE potentia commensurabiles sint, sitq́; rationalis KE, erit & FK rationalis, & ipsi CD longitudine commensurabilis.*

K Et idcirco EF apotome est] *Ex 74 huius.*


Sit A 2, CB R 12 plus 3, vt CD sit R 12, DB 3. & si quadratum ex A, quod est 4, applicetur ad DB latitudinẽ faciẽs G, erit G 1 $\frac{1}{3}$, cui æqualis sit HE. fiat vt CB ad BD, ita HE, ad EF videlicet vt R 12 plus 3 ad 3, ita 1 $\frac{1}{3}$ ad aliũ. multiplicabimus igitur 3 per 1 $\frac{1}{3}$ producetur 4, & 4 diuidemus per R 12 plus 3, hoc est applicabimus 4 ad R 12 plus 3. quod quidẽ hoc modo fiet. multiplicetur R 12 plus 3 per apotomen ipsi respondentem, hoc est per R 12 minus 3. producitur 3. rursus multiplicetur 4 per eandem R 12 minus 3. producitur R 192 minus 12. quare ex 17 septimi 3 ad R 192 minus 12 proportionem habebit eandem, quam R 12 plus 3 ad 4. & ob id R 192 minus 12 ad 3 applicata latitudinem faciet eandem, quæ 4, si applicetur ad R 12 plus

3. *sed*

3. sed R 192 minus 12 applicata ad 3 latitudinem facit R 21 $\frac{1}{3}$ minus 4. quadratum igitur rationalis 2, videlicet 4 ad eam, quae est ex binis nominibus secunda, hoc est ad R 12 plus 3 applicatum latitudinem facit R 21 $\frac{1}{3}$ minus 4, quae est secunda apotome, cuius nomina commensurabilia sunt ipsis nominibus CD DB, & in eadem proportione.

PROBLEMA XC. PROPOSITIO CXIIII.

Quadratum rationalis ad apotomen applicatum latitudinem facit eam, quę ex binis nominibus, cuius nomina commensurabilia sunt apotomæ nominibus, & in eadem proportione, & adhuc quæ ex binis nominibus fit eundem habet ordinem, quæ ipsa apotome.



Sit rationalis quidem A, apotome autem B D: & quadrato ex A æquale sit quod BD KH continetur, ita vt quadratum rationalis A ad BD applicatum latitudinem faciat KH. Dico KH ex binis nominibus esse, cuius nomina commẽsurabilia sunt nominibus ipsius BD, & in eadem proportione: & K H eundem habere ordinem, quem habet B D. sit enim ipsi BD congruens DC. ergo BC CD rationales sunt potentia solum commensurabiles: & quadrato ex A æquale sit, quod BC, & G continetur. rationale autem est quadratum ex A. ergo quod BC G continetur est rationale; & ad rationalem BC applicatum est. rationalis igitur est recta linea G, ipsiq; BC longitudine commensurabilis. itaque quoniam rectangulum contentum BC G est æquale ei, quod BD KH continetur, erit vt CB ad BD, ita KH ad G. maior autem est CB, quàm BD. ergo & KH, quàm G est maior. ponatur ipsi G æqualis KE. commẽsurabilis igitur est KE ipsi BC longitudine. & quoniam est vt CB ad BD, ita HK ad KE, erit per cõuersionem rationis vt BC ad CD, ita KH ad HE. fiat ut KH ad HE, ita HF ad FE. & reliqua igitur KF ad FH est ut KH ad HE, hoc est vt BC ad CD. sed BC CD potentia solum sunt commensurabiles. ergo & KF FH potentia solum cõmensurabiles erũt. & cum sit vt KH ad HE, ita KF ad FH: vt autem KH ad HE, ita HF ad FE, erit & ut KF ad FH, ita HF ad FE. quare & vt prima ad tertiam, ita quadratum ex prima ad quadratum ex secunda. vt igitur KF ad FE, ita quadratum ex KF ad id, quod ex FH quadratum. commensurabile autem est quadratum ex KF quadrato ex FH; sunt enim KF FH potentia solum commensurabiles. ergo & KF ipsi FE commensurabilis est longitudine: ac propterea FK ipsi KE longitudine commensurabilis. sed KE rationalis est, & ipsi B C longitudine commensurabilis. ergo & K F rationalis erit, & commensurabilis ipsi BC longitudine. & quoniã est vt BC ad CD, ita KF ad FH, erit permutando vt BC ad KF, ita DC ad FH. commensurabilis autem est B C ipsi KF. quare & CD ipsi FH est commensurabilis: suntq; B C C D rationales potentia solum commensurabiles. ergo & KF FH rationales potentia solum commensurabiles erunt. ex binis igitur nominibus est KH. & si quidem BC plus potest, quàm CD quadrato rectę lineæ sibi lõgitudine commensurabilis, & KF plus poterit, quàm FH quadrato rectæ lineæ sibi commensurabilis longitudine. & si BC longitudine commensurabilis est expositę rationali, & KF eidem commensurabilis erit. si vero CD est commensurabilis longitudine expositę rationali, erit & ipsa FH eidem commẽsurabilis; & si neutra ipsarum BC CD, & neutra ipsarum KF FH. at si BC plus potest, quàm CD quadrato rectę lineę sibi longitudine incommensurabilis, & KF plus poterit, quàm FH quadrato rectæ lineæ sibi incommensurabilis longitudine. & siquidem BC longitudine commensurabilis est expositę rationali, & KF eidem commensurabilis erit. si vero CD, & ipsa FH. quòd si neutra ipsarum BC CD, & neu-

74. huius.

21. huius.

14. sexti: Ex demonstratis ad 16. quinti.

19. quinti:

11. quinti.

Corr. 2. 20. sexti.


tra ipſarum KF FH. ex binis igitur nominibus eſt KH, cuius nomina KF FH cõmenſurabilia ſunt nominibus apotomæ BC CD; & in eadem proportione; & KH eundem tenet ordinem, quem ipſa BC.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit A 2, BD Rx 18 minus R 10. & multiplicetur R 18 minus Rx 10 per eam, quę ex binis nominibus ipſi reſpondet, videlicet per R 18 plus R 10 producitur 8, rurſus multiplicetur ipſius A rationalis quadratum, quod eſt 4 per eandem, producitur R 288 plus Rx 160. habebit igitur 8 ad Rx 288 plus Rx 160 proportionem eandem, quam Rx 18 minus Rx 10 ad 4 ex 17 ſeptimi. quare ſi Rx 288 plus R 160 applicetur ad 8 latitudinem faciet Rx 4 $\frac{1}{2}$ plus Rx 2 $\frac{1}{2}$, & eandem latitudinem faciet 4, ſi ad R 18 minus Rx 10 applicetur. quadratum igitur rationalis 4 applicatum ad tertiam apotomen, videlicet ad Rx 18 minus R 10 latitudinem facit eam, quae eſt ex binis nominibus tertia, hoc eſt Rx 4 $\frac{1}{2}$ plus R 2 $\frac{1}{2}$ cuius nomina commenſurabilia ſunt apotomae nominibus, & in eadem proportione.

THEOREMA XCI. PROPOSITIO. CXV.

Si ſpacium cõtinetur apotoma, & ea, quæ ex binis nominibus, cuius nomina commenſurabilia ſint nominibus apotomę, & in eadem proportione; recta linea ſpacium potens eſt rationalis.



Spacium enim contineatur AB CD, videlicet apotoma AB, & CD, quę ſit ex binis nominibus, cuius maius nomen CE: & ſint nomina eius, quæ ex binis nominibus CE ED commenſurabilia nominibus apotomæ AF FB: & in eadẽ proportione; ſitq; recta linea G potens ſpacium contentum AB CD. Dico ipſam G rationalem eſſe. exponatur enim rationalis H: & quadrato ex H æquale ad ipſam CD applicetur, latitudinem faciens KL. apotome igitur eſt KL, cuius nomina KM ML commenſurabilia ſint nominibus eius, quę eſt ex binis nominibus CE ED, & in eadem proportione. ſed CE ED commenſurabiles ſunt ipſis AF FB, atque in eadem proportione. eſt igitur vt AF ad FB, ita KM ad ML. & permutando vt AF ad KM, ita FB ad LM. quare & reliqua AB ad reliquam KL eſt vt AF ad KM. commenſurabilis autem eſt AF ipſi KM. ergo & AB ipſi KL eſt cõmenſurabilis. eſtq; vt AB ad KL, ita rectangulum contentum CD AB ad id, quod continetur CD KL. commenſurabile igitur eſt rectangulum contentum CD AB rectangulo, quod CD KL continetur. ſed rectangulum contentum CD KL eſt ęquale quadrato ex H. ergo rectangulum, quod continetur CD AB quadrato ex H eſt commenſurabile. rectangulum autem, quod continetur CD AB eſt æquale quadrato ex G. ergo quadratũ ex G commenſurabile eſt quadrato ex H. atque eſt quadratum ex H rationale. rationale igitur eſt quadratum ex G; & idcirco ipſa G eſt rationalis; & poteſt quod CD AB continetur. Si igitur ſpacium contineatur apotoma, & ea, quæ ex binis nominibus, cuius nomina commenſurabilia ſint nominibus apotomæ, & in eadẽ proportione, recta linea ſpacium potens eſt rationalis.

hỹ. huius.

19. quinti.
10. huius.
1. ſexti.

COROLLARIVM.

Ex ijs manifeſto conſtat fieri poſſe, vt ſpaciũ rationale irrationalibus rectis lineis contineatur.

F. C.


F. C. COMMENTARIVS.

Sit apotome AB R 21 ½ *minus* 4. *ea vero, quae ex binis nominibus CD sit* 12 *plus* 3. *& multiplicetur* R 21 ½ *minus* 4 *plus* R 12 *plus* 3. *fit* R 256, *quae est* 16 *minus* 12, *hoc est* 4, *quod est rationale, & eius radix* 2 *rationalis.*

THEOREMA XCII. PROPOSITIO. CXVI.


A media infinitæ irrationales fiunt, & nulla alicui antecedentium est eadem.

Sit media A. Dico ex ipsa A infinitas irrationales fieri, & nullam alicui antecedentium eandem esse. exponatur enim rationalis B. & rectangulo contento A B æquale sit quadratum ex C. irrationalis igitur est ipsa C nam quod rationali, & irrationali continetur irrationale est, & nulli earum, quę prius est eadem: non enim quadratum alicuius antecedentium ad rationalem applicatum latitudinem efficit mediam. rursus rectāgulo, quod BC continetur, æquale sit quadratum ex D. irrationale igitur est, quod fit ex D: & idcirco ipsa D est irrationalis, & nulli antecedentium eadem. neque enim quadratum alicuius earum, quæ prius sunt ad rationalem applicatum latitudinem efficit ipsam C. Similiter & eodem ordine infinite protracto, manifestum est à media infinitas irrationales fieri, & nullam alicui antecedentium eandem esse.



In scholio ad 39. huius.

ALITER. Sit media AC. Dico ex ipsa AC infinitas irrationales fieri, & nullam alicui priorum eandē esse. ducatur ipsi AC ad rectos angulos AB: sitque A B rationalis, & BC cōpleatur. irrationale igitur est BC, & quæ ipsum potest est irrationalis. posit autē ipsum recta linea CD. ergo CD irrationalis est, & nulli priorum eadem. non enim quadratum alicuius priorum ad rationalem applicatum latitudinem efficit mediam. rursus compleatur ED; erit ED irrationale; & recta linea ipsum potens irrationalis. posit ipsum recta linea DF. ergo DF irrationalis est, & nulli priorum eadem. nullius enim priorum quadratum, si ad rationalem applicetur, latitudinem efficit ipsam CD. ergo à media infinitę irrationales fiunt, & nulla alicui priorum est eadem.




THEOREMA XCIII. PROPOSITIO CXVII.

Propositum sit nobis ostendere in quadratis figuris diametrū lateri incommensurabilem esse longitudine.

Sit quadratum ABCD, cuius diameter AC. Dico AC ipsi AB longitudine incōmensurabilem esse. si enim fieri potest, sit commensurabilis. Dico ex hoc sequi eundem numerum parem esse, & imparem. itaque manifestum est quadratum ex AC duplum esse quadrati ex AB. & quoniam AC commensurabilis est ipsi AB, habebit AC ad AB proportionem eam, quam habet numerus ad numerū. habeat, quam EF ad


A
B

EF ad G: sintq; EF. G numeri minimi eorum, qui eandem habent proportionem. non igitur vnitas est EF. si enim est vnitas, & habet ad G proportionem eam, quam AC ad AB; estq; AC maior, quàm AB: & EF vnitas, quàm G numerus maior erit. quod est absurdum. ergo EF non est vnitas. quare numerus sit necesse est. & quoniam vt AC ad AB, ita est EF ad G, erit & vt quadratum ex AC ad quadratum ex AB, ita quadratus ex EF ad eum, qui fit ex G quadratum. duplum autem est quadratum ex CA quadrati ex AB. ergo & quadratus ex EF quadrati ex G est duplus: ac propterea quadratus ex EF par est, & ipse EF par. si enim esset impars, & qui fit ab ipso quadratus impar esset, quoniam si impares numeri quomodocumque componantur, multitudo autem ipsorum sit impar; & totus impar erit. ergo EF est par. secetur bifariam in H. & quoniam numeri EF G minimi sunt eorum, qui eandem habent proportionem, inter se primi sunt: & est EF par. impar igitur est G: si enim esset par, numeros EF G binarius metiretur; omnis enim par dimidiam partem habet. atqui primi inter se sunt. quod fieri non potest. non igitur G est impar. ergo par. & quoniam FE duplus est ipsius EH, erit quadratus ex FE quadrati ex EH quadruplus. est autem quadratus ex EF duplus quadrati ex G. duplus igitur est quadratus ex G quadrati ex EH. ideoq; par est qui fit ex G quadratus. & ex iam dictis ipse G est par; sed & impar. quod fieri non potest. non igitur AC commensurabilis est ipsi AB longitudine. ergo est incommensurabilis.




ALITER. Sed & aliter ostendendum est incommensurabile esse quadrati diametrum ipsius lateri. sit enim pro diametro quidem A, pro latere autem B. Dico A ipsi B lõgitudine incommensurabilem esse. si enim fieri potest, sit commensurabilis. & rursus fiat vt A ad B, ita EF numerus ad ipsum G: sintq; minimi eorum, qui eandem habent proportionem. ergo EF G primi inter se sunt. Dico primum, G non esse vnitatem. si enim fieri potest, sit G vnitas. & quoniam est vt A ad B, ita EF ad G, erit & vt quadratum ex A ad quadratum ex B, ita quadratus ex EF ad eum, qui fit ex G quadratum: duplum autem est quadratum ex A quadrati ex B. ergo & quadratus ex EF quadrati ex G est duplus: atq; est G vnitas. binarius igitur est quadratus ex EF. quod fieri non potest. ergo G non est vnitas. numerus igitur. & quoniam est vt quadratũ ex A ad quadratum ex B, ita quadratus ex EF ad quadratum ex G. & conuertendo vt quadratum ex B ad quadratum ex A, ita quadratus ex G ad quadratum ex EF. sed quadratum ex B metitur quadratum ex A. ergo & qui fit ex G quadratus metitur eum, qui fit ex EF; & propterea latus G ipsum EF latus metitur. metitur autem & se ipsum. ergo G numeros EF G metitur, primos inter se existentes. quod fieri minime potest. non igitur A ipsi B longitudine est commensurabilis. quare incommensurabilis sit necesse est.

24. septimi.



Itaque inuentis longitudine incommensurabilibus rectis lineis, vt AB, inuenientur & aliæ quam plurimæ magnitudines ex duabus dimensionibus. nimirum superficies incommensurabiles inter se se. si enim ipsarum AB mediam proportionalem sumamus rectam lineam C, erit vt A ad B, ita figura, quæ fit ex A ad eam, quæ ex C similem, & similiter descriptam, siue quadrata, siue alia rectilinea similia, siue circuli, qui circa diametros AC describantur. quando quidem circuli inter se sunt, vt diametrorum quadrata. Inuenta igitur sunt spacia plana inter se incommensurabilia. ostensis autem his ostendemus etiam ex solidorum



rum contemplatione ipſa ſolida eſſe commenſurabilia, & incommenſnrabilia inter ſe ſe.nam ſi in quadratis ex AB,vel in rectilineis, quæ ipſis æqualia ſint ſolida æque alta conſtituamus, ſiue parallelepipeda, ſiue pyramides, ſiue priſmata, erunt ea inter ſe,vti baſes.& ſi quidem baſes commenſurabiles ſint, erunt ſolida commenſurabilia;ſi vero incommenſurabiles, & ipſa incommenſurabilia erunt.ſed & duobus circulis exiſtentibus AB,ſi in ipſis conos ęque altos, ſiue Cylindros conſtituamus, erunt inter ſe,vti ipſorum baſes,hoc eſt vt AB circuli, & ſi quidem circuli commenſurabiles ſint,cõmenſurabiles erunt & coni inter ſe ſe, & Cylindri;ſi vero incommẽſurabiles,& coni, & Cylindri incommenſurabiles erunt.ex quibus perſpicuum eſt non ſolum in lineis,& ſuperficiebus eſſe commenſurabilitatem,& incommenſurabilitatem,ſed & in ſolidis figuris. O P

F. C. COMMENTARIVS.

Manifeſtum eſt quadratum ex AC duplum eſſe quadrati ex AB]*Ex 47 primi.* A

Habebit AC ad AB proportionem eam,quam numerus habet ad numerum]*Ex 5.huius.* B

Et quoniam vt AC ad AB,ita eſt EF ad G;erit & vt quadratum ex AC ad quadratum ex AB,ita quadratus ex EF ad eum, qui fit ex G quadratum]*Quoniam enim eſt vt AC ad AB,ita EF ad G,erit et vt proportio AC ad AB duplicata, ita proportio EF ad G duplicata.ſed vt proportio quidem AC ad AB duplicata, ita eſt quadratum ex AC ad quadratum ex AB ex corollario ſecundo 20.ſexti; vt autem proportio EF ad G duplicata,ita eſt quadratum ex EF ad quadratum,ex G ex 11 octaui.ergo ex 11 quinti vt quadratum ex AC ad quadratum ex AB,ita erit quadratus ex EF ad eum,qui fit ex G quadratum.* C

Quoniam ſi impares numeri quomodocunque componantur, multitudo autem ipſorum ſit impar,& totum impar erit]*Ex 23 noni. ſequitur enim hoc ex 29 eiuſdem.* D

Inter ſe primi ſunt]*Ex 24 ſeptimi.* E

Erit quadratus ex FE quadrati ex EH quadruplus]*Ex 11.octaui.* F

Duplus igitur eſt quadratus ex G quadrati ex EH]*Proportio enim quadrati ex FE ad quadratum ex EH,interiecto quadrato ex G,compoſita eſt ex proportione quadrati ex FE ad quadratum ex G,& proportione quadrati ex G ad quadratum ex EH.ſed proportio quadrati ex FE ad quadratum ex EH eſt quadrupla : proportio autem quadrati ex FE ad quadratũ ex G eſt dupla.ergo & proportio quadrati ex G ad quadratum ex EH dupla erit.* G

Ideoq; par eſt,qui fit ex G quadratus]*Quoniam enim quadratus ex G duplus eſt quadrati ex EH,partem habet dimidiam, quare par neceſſario erit.* H

Et ex iam dictis ipſe G eſt par]*Si enim ſit impar, & quadratus ex ipſo impar eſt ex 29 noni.ſed & par.quod fieri non poteſt.* K

Et propterea latus G ipſum EF latus metitur]*Ex 14 octaui,* L

Erit vt A ad B, ita figura, quę fit ex A ad eam,quæ ex C ſimilem, & ſimiliter deſcriptam]*Ex corollario ſecundo vigeſimae ſexti.* M

Quandoquidem circuli iuter ſe ſunt,vt diametrorum quadrata] *Oſtenditur id in ſecunda propoſitione duodecimi libri.vnde colligi poteſt hæc ſiue ſint Euclidis,ſiue alterius alieno loco poſita eſſe.* N

Nam ſi in quadratis ex AB,vel in rectilineis,quę ipſis æqualia ſint, ſolida ęque alta conſtituamus,ſiue parallelepipeda,ſiue pyramides, ſiue priſmata, erunt ea inter ſe vti baſes]*Ex 32 vndecimi,& ex 5.& 6.duodecimi,* O

Sed & duobus circulis exiſtẽtibus AB,ſi in ipſis conos æque altos,ſiue Cylindros conſtituamus,erunt inter ſe,vti ipſorum baſes]*Ex 11.duodecimi.* P

DECIMI LIBRI FINIS.

SCHO-

SCHOLIUM.

Antiqui planorum cognitionem à ſcientia ſolidorum diſtinxerunt. etenim illam geometriam appellarunt, vt etiam Plato oſtendit in politicis; hanc autem ſtereometriam. At vero Iuniores cum utriuſque ſcientiæ communis ſit cognitio, quæ circa magnitudines verſatur, etiam communi nomine geometriam dixerunt, eas uelut unam coniungentes. Et quemadmodum in planis alia quidem erant rectilinea, alia uero circularia, & alia mixta, ut helices, ita in ſolidis, alia conſtant ex planis rectilineis, alia ex ſphæricis, alia ex mixtis, ut cylindrus & conus. Et ſphærica quidem ad terminum & finem pertinent; rectilinea uero, uel quæ ex rectilineis ſunt ad infinitum; mixta ad id, quod occultum eſt. & ſi aliquod eſt corpus, hoc & ſolidum eſt, non autem contra, ut in ijs, quæ dicta ſunt: hęc enim imaginabilia ſunt ſolida, non antitypa, hoc eſt dura, & reſiſtentia.

EVCLIDIS ELEMENTORVM

LIBER VNDECIMVS ET SOLIDORVM PRIMVS.

CVM SCHOLIIS ANTIQVIS ET COMMENTARIIS

Federici Commandini Vrbinatis.

DIFFINITIONES

I.



OLIDVM est, quod longitudinem, latitudinem, & crassitudinem habet.

II.

Solidi terminus est superficies.

III.


Recta linea ad planum recta est, quando ad omnes rectas lineas, quæ ipsam contingunt, & in subiecto sunt plano rectos angulos efficit.

SCHOLIVM.

Si posset planum in rectas lineas resolui, ita dixisset. Quando ad omnes rectas lineas, ex quibus planum constat, rectos facit angulos, tunc & ad ipsum recta erit. Sed quoniam planum etiam infinite rectis lineis sectum in ipsas non resoluitur, contentus fuit linearum infinitate pro toto plano. contingentes autem addit, ut non parallelæ sint.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit recta linea AB ad subiectum planum CDEF perpendicularis, siue recta, & à puncto B ducantur quotcunque rectae lineae in eodē plano BC BD BE BF. erūt anguli CBA DBA EBA FBA recti. Quòd si anguli CBA DBA EBA FBA recti sint, dicemus rectam lineam AB ad subiectum planum CDEF perpendicularem, siue rectam esse.




IIII.

Planum ad planum rectum eſt, quando communi planorum ſectioni ad rectos angulos ductæ rectæ lineę in vno plano, alteri plano ad rectos angulos fuerint.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit planum ABCD ad planum BEFC rectũ, ſitq; eorũ cõis ſectio BC, & in plano BEFC ducatur recta linea GH perpẽdicularis ad ipsã BC. erit recta linea GH ad planũ ABCD perpẽdicularis, ſiue recta. At ſi recta GH, vel planũ ABCD perpẽdicularis ſit, ſiue recta, erit ea ad BC cõem duorũ planorũ ſectionẽ perpẽdicularis. Et ſimiliter cõtinget, ſi in alio plano ducatur KH perpẽdicularis ad ipsã BC, ponatur autẽ nũc cõem duorũ planorũ ſectionẽ recta linea eſſe, quod in ſequentibus demonſtrabitur.




V.

Rectæ lineæ ad planum inclinatio eſt, quando à ſublimi termino lineę ad planum perpendiculari acta, à puncto facto ad terminum lineæ, qui eſt in plano, recta linea ducta fuerit, angulus acutus, qui ducta linea & ſtante continetur.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit recta linea AB inclinata ad ſubiectum planũ CDEF: atque à puncto ſublimi A ad idem planum perpendicularis ducatur AG, & BG iungatur. erit angulus ABG acutus, rectae lineae AB ad planum CDEF inclinatio.




VI.

Plani ad planum inclinatio eſt angulus acutus rectis lineis cõtentus, quę ad rectos angulos communi planorum ſectioni ad vnum ipſius punctum in vtroque planorum ducuntur.

F. C. COMMENTARIVS.

Sint duo plana inter ſe inclinata ABCD EADF, quorum cõmunis ſectio AD, & ſumpto in ipſa AD quouis puncto G ab eo ad rectos angulos in vtroque plano ducantur GH GK, erit angulus HGK inclinatio plani ABCD ad EADF planum.




VII.

Planum ad planum ſimiliter inclinari dicitur, & alterum ad alterum, quando dicti inclinationum anguli inter ſe fuerint æquales.

F. C.

F. C. COMMENTARIVS.

Sint duo plana inter se inclinata ABCD EADF, de quibus proxime dictum est: sintq́, alia duo plana inclinata LMNO PLOQ, quorum inclinatio angulus SRT: & sint anguli HGK SRT aequales. dicetur planum ABCD ad planum EADF similiter inclinatum, atque planum LMNO ad planum PLOQ.



VIII.

Plana parallela sunt, quę inter se non conueniunt.

IX.

Similes solidæ figurę sunt, quę similibus planis multitudine æqualibus continetur.

X.

Aequales & similes solidæ figuræ sunt, quæ similibus planis multitudine & magnitudine æqualibus continentur.

XI.

Solidus angulus est, plurium, quàm duarum linearum, quæ se se contingant, & non in eadem sint superficie, ad omnes lineas inclinatio. vel solidus angulus est, qui pluribus, quàm duobus planis angulis comprehenditur, non existentibus in eodem plano, & ad vnum punctum constitutis.

SCHOLIVM.

Euclides quidem in inclinatione angulum vult esse: Stoici vero dicunt inclinationem esse angulum. sed recte Euclides. omnis enim angulus magnitudinum inclinatio est ad vnum punctum. hæc autem diffinitio imperfecta est. angulus enim quartę partis sphæræ pluribus quidem, quàm duabus superficiebus comprehenditur, sed non planis: & dimidius conus ad verticem angulum solidum non efficit. nam si is est angulus: & coni uertex angulus erit. quare & ex duabus superficiebus & ex vna solidus angulus constabit. quod quidem verum est. melius igitur erit solidum angulum diffinire, inclinationem magnitudinis, Vel magnitudinum ad vnum punctum. ἐν τῇ κλίσει. σύνευσις. σύνευσιν.

XII.

Pyramis est figura solida planis comprehensa, quæ ab vno plano ad vnum punctum constituitur.

XIII.

Priſma eſt figura ſolida planis comprehenſa, quorum duo, quæ opponuntur æqualia, & ſimilia & parallela ſunt; reliqua vero parallelogramma.

F. Ç. COMMENTARIVS.

Priſmata dicuntur non ſolum, quae baſes habent triangulares, vt opinatur Campanus, qui ea corpora ſeratilia appellat, ſed quęcumque plana, quae opponuntur, ſiue triangula, ſiue quadrilatera, ſiue pentagona, ſiue plurilatera, & aequalia, & ſimilia habent, reliqua vero parallelogrãma. quod ex ijs, quae tum in hoc libro, tum in ſequenti traduntur, manifeſtiſſime apparet. Alia autem priſmata Campanus improprie columnas lateratas vocat, quemadmodum & conos, pyramides rotundas, & Cylindros columnas rotundas.

XIIII.

Sphęra eſt figura comprehenſa, quando circa manentem diametrum ſemicirculus conuerſus reſtituatur rurſus in eundem locum, à quo moueri cœpit.

XV.

Axis ſphæræ eſt recta linea manens, circa quam ſemicirculus conuertitur.

XVI.

Centrum ſphæræ eſt idem, quod & ſemicirculi centrum.

XVII.

Diameter ſpęrę eſt recta linea quędam per centrum ducta, & ex vtraque parte à ſuperficie ſphærę terminata.

XVIII.

Conus eſt comprehenſa figura, quando orthogonij trianguli manente vno latere eorum, quæ circa rectum angulum ſunt, triangulum conuertatur, quoad rurſus in eundem reſtituatur locum, à quo moueri cœpit. & ſi quidem manens recta linea ęqualis fuerit reliquo lateri, quod circa rectũ angulũ cõuertitur, conus orthogonius erit; ſi vero minor, ambligonius; & ſi maior, oxigonius.

XIX.

Axis coni eſt recta linea manens, circa quam triangulum conuertitur.


Baſis

XX.

Basis vero circulus à conuersa recta linea descriptus.

SCHOLIVM.

Ostendendum quomodo conus orthogonius sit, vel angulum rectum ad verticem habeat.



Exponatur triangulum orthogonium ABC rectũ habens ABC angulum; & rectam lineam BC rectę AB æqualem. Dico ad punctum A rectum angulum constitui. producatur enim CB vsque ad D: ponaturq; BD ipsi CB æqualis, & AD iungatur. Itaque quoniam AB est æqualis BC, erit & angulus BCA angulo BAC æqualis, & vterque ipsorũ dimidius recti, quòd rectus ponatur ABC: Eadem ratione & BAD est recti dimidius. totus igitur DAC angulus rectus est; & idcirco conus circa ABC descriptus est orthogonius; nimirũ recta linea AB manente: & circumducta AC quoad in eũdem locum restituatur, à quo moueri cœpit. circumductis igitur AC & CB, manente autem AB necesse est in conuersione rectam lineam AC congruere rectæ AD, cum CB ipsi BD sit æqualis: & circulus à puncto C descriptus basis erit coni, qui à triangulo ABC constituitur, & eius circuli diameter erit basis trianguli ADC, rectum habentis DAC angulum. Quòd si conus à vertice A ad basim vsque bifariam diuidatur, portionum superficies non aliud erunt, nisi triangulum ADC, quod est orthogonium. quare & coni uertex orthogonius erit. si vero angulus BAC sit maior dimidio recti, erit ob eandem caussam angulus quoque DAB dimidio recti maior, & DAC maior recto, videlicet obtusus; & conus ambligonius erit, vel ad verticem angulum obtusum habebit. si denique BC sit minor, quàm AB, erit angulus BAC minor dimidio recti. ergo ex ijs, quæ ostensa sunt, DAC angulus recto minor, hoc est acutus, & conus oxygonius erit.

F. C. COMMENTARIVS.

Euclides conos, & cylindros dumtaxat rectos definiuit, vel potius eorum ortum tradidit, nobis vero omnium vniuerse ex Apollonio, Serenoq; ortum explicare visum est.

EX APOLLONIO.

Si ab aliquo puncto ad circumferentiam circuli, qui non sit in eodem plano, in quo punctum, coniuncta recta linea in vtramque partem producatur, & manente puncto cõuertatur circa circuli circũferentiã, quousque ad eum locum redeat, à quo cœpit moueri; superficiem à recta linea descriptam, constantemq; ex duabus superficiebus ad verticem inter se aptatis, quarum vtraque in infinitum augetur, nimirum recta linea, quæ eam describit in infinitum producta, uoco Conicam superficiem, Verticem ipsius manens punctum, Axem rectam lineam, quæ per punctũ, et centrum circuli ducitur: Conum autem voco figuram contentam circulo


&

& conica ſuperficie, quę inter verticem, & circuli circumferentiam interijcitur. Verticem coni punctum, quod et ſuperficiei conicæ vertex eſt. Axem rectam lineam, quæ à vertice ad circuli centrum perducitur. Baſim circulum ipſum.

Conorũ rectos quidẽ voco, qui axes habẽt ad rectos angulos ipſis baſibus. Scalenos vero, qui non ad rectos angulos ipſis baſibus axes habẽt.

Quem locum explicans Futocius ita ſcribit.

Sit circulus A B, cuius centrum C: & punctum aliquod ſublime D: iunctaque D B in infinitum ex vtraque parte producatur ad puncta E F. Si igitur recta linea D B feratur eo vſque in circuli A B circumferentia, quouſque punctum B rurſus in eum locum reſtituatur, à quo cepit moueri: deſcribet ſuperficiem quandam, quę quidem conſtat ex duabus ſuperficiebus, ad D punctum ſeſe tangentibus. eam voco conicam ſuperficiem; quę & augetur in infinitum, cum recta linea D B, ipsã deſcribens in infinitum producitur. verticem ſuperficiei dicit, punctum D: axem, rectam D C. conum vero appellat figuram cõtentam circulo A B, & ea ſuperficie, quam D B ſola deſcribit: coni verticem punctum D: axẽ D C: & baſim, A B circulum. At ſi D C ad circulum, fuerit perpendicularis, rectum vocat conum; ſin minus, ſcalenum.



Deſcribetur autem conus ſcalenus, quando à centro circuli linea erigatur, quae non ſit perpendicularis ad circuli planum: à puncto vero lineae, quod eſt in ſublimi ad circuli circumferentiam recta linea ducatur: & manente puncto circa ipſam conuertatur: comprehenſa etenim figura conus erit ſcalenus. conſtat igitur lineam circumductam in conuerſione quandoque maiorem; quandoque minorem, & quandoque aequalem fieri, ad aliud atque aliud circuli punctum.

XXI.

Cylindrus eſt comprehenſa figura, quando orthogonij parallelogrammi manente vno latere eorum, quæ circa rectum angulum ſunt, parallelogrammum conuertatur, quouſque rurſus reſtituatur in eundem locum, à quo moueri cœpit.

XXII.


Axis Cylindri eſt manens recta linea, circa quam parallelogrammum conuertitur.

XXIII.

Baſis autem, circuli, qui à duobus è regione lateribus conuerſis deſcibuntur.

F. C. COMMENTARIVS.

Sit parallelogrammum rectangulum ABCD, & latere AB manẽte intelligatur latus CD conuerti, quousq; ad eum locum redeat, à quo capit moueri. erit iã descripta figura, cuius axis est AB recta linea manens, & basis circuli ipsi à punctis CD circa centra B A descripti.



EXERCITIVM.

Si duorum circulorum æqualium, & parallelorũ diametri semper inter se sese parallelæ, & ipsæ in circulorum planis circa manens centrum circumferantur, & vnà circumferatur recta linea diametrorũ terminos ex eadem parte coniungens, quousque rursus in eum locum restituatur, à quo mouer ĩcæpit: superficies, quę à circumlata recta linea describitur, Cylindrila superficies vocetur; quæ quidem & in infinitum augeri potest, recta linea describente in infinitum producta. Cylindrus, figura, quæ circulis parallelis, & Cylindrica superficie inter ipsos interiecta continetur. Cylindri basis circuli ipsi. Axis recta linea, quæ per circulorum centra ducitur. latus autem Cylindri linea, quæ cum recta sit, & in superficie ipsius Cylindri, bases vtrasque contingit: quam & circumlatam describere superficiem Cylindri antea diximus. Cylindrorum recti quidem dicuntur, qui axem habent ad rectos angulos existentem ipsis basibus. Scaleni autem, qui non ad rectos ængulos existentem ipsis basibus axem habent.

XXIIII.

Similes coni, & Cylindri sunt, quorum, & axes, & basium diametri eandem inter se proportionem habent.

F. C. COMMENTARIVS.

Similes conos & Cylindros omnes tum rectos, tum scalenos hoc modo diffiniemus.

Similes coni, & Cylindri sunt, quando per axes ductis planis ad rectos angulos basibus, communes sectiones eorum & basium cum axibus æquales angulos continentes, eandem inter se, quam axes, proportionem habent.

XXV.

Cubus est figura solida, sex quadratis æqualibus contenta.

XXVI.

Tetraedrum est figura solida quattuor triangulis æqualibus & æquilateris comprehensa.

Octaedrum

XXVII.

Octaedrum eſt figura ſolida octo triangulis æqualibus & æquilateris comprehenſa.

XXVIII.


Dodecaedrum eſt figura ſolida, quæ duodecim pentagonis æqualibus, & æquilateris, & æquiangulis continetur.

XXIX.

Icoſaedrum eſt figura ſolida, quę viginti triangulis æqualibus & æquilateris comprehenditur.


THEOREMA I. PROPOSITIO I.

Rectæ lineæ pars quædam non eſt in ſubiecto plano, quędam vero in ſublimi.



Si enim fieri poteſt rectæ lineę AB pars quidem AB ſit in ſubiecto plano, pars vero BC in ſublimi. erit vtique recta linea quædam ipſi AB in directum continuata in ſubiecto plano. ſitq; BD. duabus igitur datis rectis lineis AB
A CABD communis portio eſt AB, quod fieri non poteſt; recta enim linea cum recta linea non conuenit in pluribus punctis, quàm vno.
B alioqui rectæ lineę ſibi ipſis congruēt. non igitur rectæ lineæ pars quædam eſt in ſubiecto plano, quędam vero in ſublimi.

SCHOLIVM.



A Duabus igitur datis rectis lineis ABC ABD cōmunis portio eſt AB, quod fieri non poteſt.] *Duabus enim rectis lineis non eſt communis portio. ſi enim fieri poteſt, ſint duabus rectis lineis ABC ABD communis portio AB; & ſumatur in recta linea ABC centrum quidem B, interuallum vero BA, & circulus AEF deſcribatur. Quoniam igitur punctum B centrum eſt circuli AEF, & per B ducta eſt quędam recta linea ABC, erit AEF circuli diameter ABC. diameter autem circulum bifariam ſecat. ergo AEC ſemicirculus eſt. Rurſus quoniam B centrum eſt AEF circuli, & per B recta linea quędam ducta eſt ABD, erit ABD circuli AEF diameter. oſtēſa autem eſt & ABC diameter eiuſdem circuli, & ſemicirculi eiuſdem circuli ſunt aequales inter ſe. ergo AEC ſemicirculus ſemicirculo AED eſt aequalis, minor maiori, quod fieri non poteſt. non igitur duabus rectis lineis communis portio eſt, ſed differens; ac propterea neque fieri poteſt, vt terminatae rectae lineae alia recta linea in directum continuata ſit ex iis, quae ante oſtenſa ſunt; quoniam duabus rectis lineis communis portio non eſt recta linea.*


B Alioqui rectę lineę ſibi ipſis congruent.] *Manifeſtum eſt congruentibus rectis lineis, & earum fines inter ſe congruere. ſi autem hoc, duae rectae lineę eoſdem fines habentes ſpacium cōtinebunt. quod fieri non poteſt.*

THEO-

THEOREMA II. PROPOSITIO II.

Si duę rectæ lineæ se inuicem secent, in vno sunt plano, & omne triangulum in vno plano consistit.

Duę enim rectæ lineę AB CD se inuicem in puncto E secent. Dico ipsas AB CD in vno esse plano, & omne triangulum in vno plano consistere. Sumantur enim in ipsis EB EC quæuis puncta FG, iungantur quę GB FG, & FH GK ducantur. Dico primum EBC triangulum consistere in vno plano. Si enim trianguli EBC pars quidem FHC, vel GBK in subiecto plano est, reliqua vero in alio plano; erit & vnius linearum EB EC pars in subiecto plano, & pars in alio. Quòd si trianguli ECB pars FGBG sit in subiecto plano, reliqua vero in alio, vtrarúq; rectarum linearum EC EB quędam pars erit in subiecto plano, quædam vero in alio. quod absurdũ esse ostendimus. Triangulum igitur EBG in vno est plano. in quo autem plano est BCE triangulum, in hoc est vtraque ipsarum EC EB: in quo autem vtraque ipsarum EC EB, in hoc & AB CD. ergo rectę lineę AB CD in vno sunt plano, & omne triangulum in vno plano consistit.




SCHOLIVM.

Propositum est ostendere rectas lineas, quę se mutuo secant in vno plano esse. quoniam autem hoc per triangulum ostenditur, illud apposuit, & omne triangulum in vno plano consistit.

THEOREMA III. PROPOSITIO III.

Si duo plana se inuicem secent, cómunis ipsorum sectio recta linea erit.

Duo enim plana AB BC se inuicem secent, communis autem ipsorum sectio sit DB linea. Dico lineam DB rectam esse. si enim non ita sit, ducatur à puncto D ad B in plano quidem AB recta linea DEB, in plano autem BC recta linea DFB. erunt vtique duarum rectarũ linearum, DEB DFB ijdem terminini, & ipsę spacium cõtinebunt, quod est absurdum. non igitur DEB DFB rectæ lineæ sunt. Similiter ostendemus neque aliam quãpiam, quæ à puncto D ad B ducitur rectam esse, præter ipsam DB, communem scilicet planorum AB BC sectionem. si igitur duo plana se inuicem secent, communis ipsorum sectio recta linea erit.



THEOREMA IIII. PROPOSITIO IIII.

Si recta linea duabus rectis lineis se inuicem secantibus in cõmuni sectione ad rectos angulos insistat, etiã ducto per ipsas plano ad rectos angulos erit.

Recta enim linea quædam EF duabus rectis lineis AB CD se inuicem secantibus in E puncto, ab ipso E ad rectos angulos insistat. Dico EF etiam plano per AB CD ducto

ducto ad rectos angulos esse. Iungantur enim rectæ lineæ AE EB CE ED inter se æquales: perq; E ducatur recta linea GEH vtcunque, & iungantur A D CB; deinde à quouis puncto F ducantur FA F G FD FC FH FB. Et quoniam duæ rectæ lineæ A E ED duabus rectis lineis CE EB æquales sunt, & angulos æquales continent, erit AD basis basi CB æqualis, & triangulum AED triangulo CEB æquale. ergo & angulus DAE æqualis est angulo EBC. est aũt & angulus AEG æqualis angulo BEH. Duo igitur triangula sunt AGE BEH duos angulos duobus angulis æquales habẽtia, alterũ alteri, & vnum latus AE vni lateri EB æquale, quod est ad æquales angulos. quare & reliqua latera reliquis lateribus æqualia habebũt, ergo GE quidem est æqualis EH; AG vero ipsi BH. Quod cum AE sit æqualis EB, communis autem & ad rectos angulos FE; erit basis AF basi FB æqualis. Eadem quoq; ratione & CF æqualis erit FD. Præterea quoniam AD est æqualis CB, & AF ipsi FB; erunt duæ FA AD duabus FB BC æquales, altera alteri; & ostẽsa est basis DF æqualis basi FC. angulus igitur FAD angulo FBC est æqualis. Rursus ostensa est AG æqualis BH. sed & AF ipsi FB est æqualis. duæ igitur FA AG duabus FB BH æquales sunt, & angulus FAG æqualis est angulo FBH, vt demonstratum fuit. basis igitur GF basi FH est æqualis. Rursus quoniam GE ostensa est æqualis EH, communis autem FE; erunt duæ GE EF æquales duabus HE EF; & basis HF est æqualis basi FG. angulus igitur GEF angulo HEF est æqualis, & idcirco rectus est vterque angulorum GEF HEF. ergo FE ad GH vtcunque per E ductam rectos efficit angulos. Similiter ostendemus FE etiam ad omnes rectas lineas, quæ ipsam contingunt, & in subiecto sunt plano, rectos angulos efficere. recta autẽ ad planum recta est, quando ad omnes rectas lineas ipsam contingentes, & in eodem existentes plano rectos efficit angulos. quare FE subiecto plano ad rectos angulos insistit. at subiectum planum est quod per AB CD rectas lineas ducitur. ergo FE ad rectos angulos erit ducto per AB CD plano. *Si igitur recta linea duabus rectis lineis se inuicem secantibus in communi sectione ad rectos angulos insistat, etiam ducto per ipsas plano ad rectos angulos erit.*

4. primi.

26. primi.

4. primi.

8. primi.

4. primi.

3. diffi.

THEOREMA V. PROPOSITIO V.

Si recta linea tribus rectis lineis se se tangentibus in communi sectione ad rectos angulos insistat, tres illæ rectæ lineæ in vno plano erunt.

Recta enim linea quædam AB tribus rectis lineis BC BD BE in contactu B ad rectos angulos insistat. Dico BC BD BE in vno plano esse. non enim, sed si fieri potest, sint BD BE quidẽ in subiecto plano, BC vero in sublimi, & planum per AB, BC producatur, cõmunẽ vtique sectionem in subiecto plano faciet rectam lineam. faciat BF. in vno igitur sunt plano per AB BC ducto tres rectæ lineæ AB BC BF. & quoniam AB vtrique ipsarum BD BE ad rectos angulos insistit, & ducto per ipsas DB BE plano ad rectos angulos erit. planum autem DB BE est subiectum planum. ergo A B ad subiectum planum recta est. quare & ad omnes rectas lineas ipsam contingentes,

3. huius.


Ex antecedente.

3. diffi.

tes,quæ in eodem plano ſunt,rectos faciet angulo; ſed ipſam tangit BF in ſubiecto exiſtens plano. ergo angulus ABF rectus eſt. ponitur autem & ABC angulus rectus.ęqualis igitur eſt angulus ABF angulo ABC,& in eodem ſunt plano; quod fieri non poteſt.recta igitur linea BC non eſt in plano ſublimi. quare tres rectæ lineæ BC BD BE in vno ſunt plano. Si igitur recta linea tribus rectis lineis ſe ſe tangẽtibus in cõmuni ſectione ad rectos angulos inſiſtat,tres illæ rectæ lineæ in vno plano erunt.

THEOREMA VI. PROPOSITIO VI.

Si duę rectæ lineę eidem plano ad rectos angulos fuerint, illę inter ſe ſe parallelæ erunt.



Diffi. 3.

Duæ enim rectæ lineæ AB CD ſubiecto plano ſint ad rectos angulos. Dico AB ipſi CD parallelam eſſe. occurrant enim ſubiecto plano in punctis BD,iungaturq; BD recta linea,cui ad rectos angulos in ſubiecto plano ducatur DE, & poſita DE ipſi AB ęquali,iũgantur BE AE AD.Qm igitur AB recta eſt ad ſubiectum planum, & ad omnes rectas lineas,quę ipſam cõtingunt,& in ſubiecto ſunt plano, rectos angulos efficiet.contingit autem AB vtraque ipſarum BD BE exiſtens in ſubiecto plano. ergo vterque angulorum A BD ABE rectus eſt. Eadem ratione rectus etiam eſt vterq; ipſorum CDB CDE.& quoniam AB ęqualis eſt ipſi DE,cõmunis autem BD, erunt duæ AB BD duabus ED DB æquales,& rectos angulos continent.baſis igitur AD baſi BE eſt æqualis. rurſus quoniam AB eſt æqualis DE, & AD ipſi BE,duę AB BE duabus ED DA æquales ſunt,& baſis ipſarum AE communis.ergo angulus ABE angulo EDA eſt ęqualis.ſed ABE rectus eſt.rectus igitur & EDA; & idcirco ED ad DA eſt perpendicularis. ſed & perpendicularis eſt ad vtramque ipſarum BD DC.quare ED tribus rectis lineis BD DA DC in contactu ad rectos inſiſtit angulos.tres igitur rectæ lineę BD DA DC in vno ſunt plano. in quo autem ſunt BD DA,in hoc & AB:omne enim triangulum in vno eſt plano. ergo AB BD DC in vno plano ſint neceſſe eſt,atque eſt vterque angulorum ABD,BDC rectus.parallela igitur eſt AB ipſi CD. quare ſi duæ rectæ lineæ eidẽ plano ad rectos angulos fuerint, illæ inter ſe ſe parallelæ erunt.

4. primi.

8. primi.


Ex antecedente.

2. huius.

28. primi.

THEOREMA VII. PROPOSITIO VII.

Si duę rectæ lineę parallelæ ſint,ſumantur autem in vtraque ipſarum quælibet puncta; quę dicta puncta coniungit recta linea in eodem erit plano,in quo & parallelę.




3. huius.

Sint duæ rectę lineæ parellelæ AB CD, & in vtraque ipſarum ſumantur quælibet puncta EF. Dico rectam lineam quæ puncta E F cõiungit,in eodem plano eſſe,in quo ſunt parallelę.non enim,ſed ſi fieri poteſt,ſit in ſublimi,vt EGF, & per EGF planũ ducatur, quod in ſubiecto plano ſectionem faciet, rectam lineam.faciat vt EF.ergo duæ rectæ lineæ EGF E F ſpacium continebunt,quod fieri non poteſt. non igitur quæ à puncto E ad F ducitur recta linea in ſublimi eſt plano, quare erit in eo,quod per AB CD parallelas tranſit.ſi igitur duæ rectæ lineæ parallelę ſint, & reliqua, quæ ſequuntur.quod oportebat demonſtrare.

10. com. no. primi libri.

THEOREMA VIII. PROPOSITIO VIII.

Si duę rectę lineæ parallelę ſint, altera autem ipſarum plano alicui ſit ad rectos angulos; & reliqua eidem plano ad rectos angulos erit.




Sint duę rectę lineæ parallelę AB CD, & altera ipſarum AB ſubiecto plano ſit ad rectos angulos. Dico & reliquam CD eidem plano ad rectos angulos eſſe. occurrāt enim AB CD ſubiecto plano in punctis BD, & BD iungatur. ergo A B CD BD in vno ſunt plano. Ducatur ipſi BD ad rectos angulos in ſubiecto plano DE: & ponatur DE ipſi AB æqualis: iunganturq; BE AE AD. Et quoniam AB perpendicularis eſt ad ſubiectum planum, & ad omnes rectas lineas, quæ ipſam contingunt, ſuntq; in ſubiecto plano, perpendicularis erit. rectus igitur eſt vterque angulorum ABD ABE. Quòd cū in parallelas rectas lineas AB CD incidat BD, erūt anguli ABD CDB duobus rectis æquales. rectus autem eſt ABD. ergo & CDB eſt rectus; ac propterea CD perpendicularis eſt ad BD. Et quoniam AB eſt æqualis DE, communis autem BD, duæ AB BD duabus ED DB æquales ſunt; & angulus ABD eſt æqualis angulo EDB, rectus enim vterq; eſt. baſis igitur AD baſi BE eſt æqualis. Rurſus quoniam AB æqualis eſt DE, & BE ipſi AD; erunt duę AB BE duabus ED DA æquales, altera alteri; & baſis earum communis AE. quare angulus ABE eſt æqualis angulo EDA. rectus autem eſt ABE. ergo & EDA eſt rectus, & ED ad DA perpendicularis. ſed & perpendicularis eſt ad BD. ergo ED ēt ad planum per BD DA perpendicularis erit, & ad omnes rectas lineas, quę in eodem exiſtentes plano ipſā contingunt, rectos faciet angulos. At in plano per BA AD eſt DC, quoniam in plano per BD DA ſunt AB BD: in quo autem ſunt AB BD in eodem eſt ipſa DC. quare ED ipſi DC eſt ad rectos angulos; ideoq; CD ad rectos angulos eſt ipſi DE. ſed & CD ipſi DB. ergo CD duabus rectis lineis DE DB ſe mutuo ſecantibus in cōmuni ſectione D ad rectos angulos inſiſtit; ac propterea plano per DE DB eſt ad rectos angulos. planum autem per DE DB eſt ſubiectum planum. ergo CD ſubiecto plano ad rectos angulos erit.

Ex antecedente.
3.diffi.
29.primi.
4.primi.
8.primi.
4.huius.
3.diffi.
2.huius.
4.huius.

THEOREMA IX. PROPOSITIO. IX.

Quæ eidem rectę lineę ſunt parallelę, non exiſtentes in eodem, in quo ipſa, plano; etiam inter ſe parallelæ erunt.



Sit enim vtraque ipſarum AB CD parallela ipſi EF, non exiſtentes in eodem, in quo ipſa, plano. Dico AB ipſi CD parallelā eſſe. ſumatur in EF quod uis punctum G, à quo ipſi EF in plano quidem per EF AB tranſeunte ad rectos angulos ducatur GH; in plano autem tranſeunte per FE CD rurſus ducatur ipſi EF ad rectos angulos GK. Et quoniam EF ad vtramque ipſarum GH GK eſt perpendicularis, erit EF etiam ad rectos angulos plano per GH GK tranſeunte. atque eſt EF ipſi AB parallela. ergo & AB plano per HGK ad rectos angulos eſt. eadem ratione & CD plano per HGK eſt ad rectos angulos. vtraq; igitur ipſarum AB CD plano per HGK ad rectos angulos erit. Si autem duę rectæ lineę eidem plano ad rectos angulos fuerint, parallelæ erunt inter ſe ſe. ergo AB ipſi CD eſt parallela.


4.huius.
Ex antecedente.
6.huius.

THEO·

THEOREMA X. PROPOSITIO. X.

Si duæ rectæ lineæ ſe ſe contingentes duabus rectis lineis ſe ſe contingentibus ſint parallelæ, non autem in eodem plano; æquales angulos continebunt.

Duæ enim rectę lineæ ſe ſe contingentes AB BC duabus rectis lineis DE EF ſe ſe contingentibus ſint parallelæ, non autem in eodem plano. Dico angulum ABC angulo DEF ęqualem eſſe. Aſſumantur enim BA BC ED EF inter ſe æquales: & iungantur AD CF BE AC DF. Quoniam igitur BA ipſi ED æqualis eſt & parallela, erit & AD æqualis & parallela ipſi BE. Eadē ratione & CF ipſi BE ęqualis & parallela erit. Vtraque igitur ipſarum AD CF ipſi BE ęqualis eſt & parallela. Quę autem eidem rectę lineę ſunt parallelę, nō exiſtentes in eodem, in quo ipſa plano; & inter ſe parallelę erūt. ergo AD parallela eſt ipſi CF, & æqualis. atque ipſas coniungunt AC DF. & AC igitur ipſi DF æqualis eſt & parallela. & quoniā duæ rectę lineę AB BC duabus DE EF æquales ſunt, & baſis AC eſt æqualis baſi DF; erit angulus ABC angulo DEF ęqualis. ſi igitur duæ rectæ lineæ ſe ſe contingentes duabus rectis lineis ſe ſe contingētibus ſint parallelę, non autem in eodem plano; ęquales angulos continebunt. quod oportebat demonſtrare.



32. primi.

Ex antecedente.

33. primi.


8. primi.

SCHOLIVM.

CONVERSVM. Si fuerint duo anguli æquales, contenti rectis lineis in eodem plano non exiſtentibus, & earum vna parallella ſit uni continentium ęqualem angulum; & reliqua reliquæ parallela erit.

F. C. COMMENTARIVS.

Sint duo anguli aequales ABC DEF: & rectae lineae AB BC angulum ABC continentes nō ſint in eodem plano, in quo DEF. ſit autem DE parallela ipſi AB. Dico & EF ipſi BC parallelam eſſe. Si enim nō eſt EF parallela ipſi BC, erit alia ipſi parallela, ſit EG. Itaque quoniam duae rectae lineae ſeſe contingentes AB BC duabus rectis lineis ſeſe cō tingentibus DE EG ſunt parallelae, nō autem in eodem plano; aequales angulos continebunt. ergo angulus DEG angulo ABC eſt aequalis. Sed et angulus DEF ponitur aequalis angulo ABC. angulus igitur DEF angulo DEG aequalis erit, minor maiori, quod fieri non poteſt. non igitur EG parallela eſt ipſi BC. ſimiliter oſtendemus neque aliam vllam eidem BC parallelam eſſe prēter ipſam EF. ergo EF ipſi BC eſt parallela. quod demonſtrare oportebat.




PROBLEMA I. PROPOSITIO XI.

A dato puncto ſublimi ad ſubiectum planum perpendicularem rectam lineam ducere.

Sit datum quidem pūctum ſublime A, datum autem ſubiectum planum. oportet à puncto A ad ſubiectum planum perpendicularem rectam lineā ducere. In ſubiecto enim plano ducatur quędam recta linea vt cumq; BC, & à puncto A ad B

C per

C perpendicularis agatur A D. Si quidem igitur AD perpẽdicularis ſit etiam ad ſubiectum planum; factum iam erit, quod proponebatur: ſin minus, ducatur à puncto D ipſi B C in ſubiecto plano ad rectos angulos D E: & à pũcto A ad DE perpendicularis ducatur AF. deniq; per F ducatur GH ipſi BC parallela. Et qm̃ BC vtri que ipſarum DA DE eſt ad rectos angulos, erit & B C ad rectos angulos plano per ED DA tranſeunti, atq; eſt ipſi parallela GH. Si aũt ſint duæ rectæ lineę parallelæ, quarum vna plano alicui ſit ad rectos angulos; & reliqua eidẽ plano ad rectos angulos erit. quare & GH plano per ED DA tranſeunti ad rectos angulos eſt: ac propterea ad omnes rectas lineas, quę in eodem plano exiſtentes ipſam contingunt, eſt perpendicularis. contingit aũt ipſam AF exiſtẽs in plano per ED DA. ergo G H perpendicularis eſt ad F A. & ob id F A eſt perpẽdicularis ad GH: eſt autem AF & ad DE perpẽdicularis. ergo AF perpendicularis eſt ad vtrâq; ipſarum HG DE. ſi autem recta linea duabus rectis lineis ſeſe contingentibus in cõmuni ſectione ad rectos angulos inſiſtat, etiam plano per ipſas ducto ad rectos angulos erit. quare FA plano per E D GH ducto eſt ad rectos angulos. planum autem per ED GH eſt ſubiectum planum. ergo AF ad ſubiectum planum eſt perpẽdicularis. A dato igitur puncto ſublimi A ad ſubiectum planum perpendicularis recta linea ducta eſt AF. quod facere oportebat.




11. primi.
12 primi.
4. huius.
8 huius.
3 diffi.
4. huius.

PROBLEMA II. PROPOSITIO. XII.

Dato plano à puncto, quod in ipſo datum, eſt ad rectos angulos rectam lineam conſtituere.

Sit datum quidem planum ſubiectum, punctum autẽ, quod in ipſo ſit A. oportet à puncto A ſubiecto plano ad rectos angulos rectã lineam conſtituere. Intelligatur aliquod punctũ ſublime B, à quo ad ſubiectũ planum agatur perpendicularis B C; & per A ipſi BC parallela ducatur AD. Qm̃ igitur duę rectæ lineæ parallelæ ſunt A D C B, vna autem ipſarum B C ſubiecto plano eſt ad rectos angulos; & reliqua AD ſubiecto plano ad rectos angulos erit, Dato igitur plano à puncto, quod in ipſo eſt datum ad rectos angulos recta linea conſtituta eſt. quod facere oportebat.




Ex antecedente.
8 huius.

THEOREMA XI. PROPOSITIO XIII.

Dato plano à pũcto, quod in ipſo eſt, duæ rectę lineæ ad rectos angulos non conſtituentur ex eadem parte.

Si enim fieri poteſt, dato plano à puncto quod in ipſo eſt A, duæ rectę lineę AB AC ad rectos angulos conſtituantur ex eadem parte: & ducatur planũ per BA AC, quod faciet ſectionem per A in ſubiecto plano rectam lineam. faciat DAE. ergo rectæ lineæ AB AC DAE in vno ſunt plano. Et quoniam CA ſubiecto plano ad rectos angulos eſt, & ad omnes rectas lineas, quę in ſubie-



8. huius.
A
3. diffi.

cto plano existentes ipsam contingunt, rectos faciet angulos. contingit autem ipsam DAE, quę est in subiecto plano. angulus igitur CAE rectus est. Eadem ratione & rectus est BAE. ergo angulus CAE ipsi BAE est æqualis, & in vno sunt plano, quod fieri non potest. Non igitur dato plano à puncto, quod in ipso est, duæ rectæ lineæ ad rectos angulos constituentur ex eadē parte. quod demonstrare oportebat. B

F. C. COMMENTARIVS.


Et ducatur planum per BA AC] *Sunt enim ex secunda huius rectae lineae BA AC in vno plano.* A

SCHOLIVM.

Quod fieri non potest] *Essent enim & parallelae, eidem plano ad rectos angulos existentes; & inter se conuenirent. quod est absurdum, parallelae autem essent ex sexta huius.* B

THEOREMA XII. PROPOSITIO XIIII.

Ad quæ plana eadem recta linea est perpendicularis, ea parallela sunt.




Recta enim linea quædam AB ad vtrumque ipsorum planorum CD EF sit perpendicularis. Dico ea plana parallela esse. si enim non ita sit, producta conuenient inter se, cōueniāt; & cōem sectionē faciāt rectā lineā GH; & in ipsa GH sumpto quouis pūcto K, iungantur AK BK. Qm igitur AB perpēdicularis est ad EF planū, erit & perpēdicularis ad ipsā BK rectā lineā in plano EF producto existētē. quare angulus ABK rectus est. Eadē ratione & BAK est rectus: ideoque trianguli ABK duo anguli ABK BAK duobus rectis sunt æquales, quod fieri non potest. non igitur plana CD EF producta inter se conuenient. quare CD EF parallela sint necesse est. Ad quę igitur plana eadem recta linea est perpendicularis, ea parallela sunt. quod demonstrare oportebat. 3 diffi.

SCHOLIVM.

CONVERSVM. Si duo plana parallela fuerint, recta linea, quæ ad vnum ipsorum est perpendicularis, etiam ad reliquum perpendicularis erit.

F. C. COMMENTARIVS.




Sint duo plana parallela CD EF, & recta quædam linea AB ad planum CD sit perpendicularis. Dico AB etiam ad planum EF perpendicularem esse. Si enim non est perpendicularis, ducatur in plano EF recta linea BG ad eas partes in quibus angulum facit recto minorem: & per AB BG aliud planum ducatur, cuius & plani CD communis sectio sit recta linea AH. Et quoniam angulus ABG est acutus, productis planis conuenient tandem inter sese rectae lineae BG AH. quare & ipsa plana conuenient. atqui parallela ponuntur. quod fieri non potest. non igitur AB ad planum EF non est perpendicularis. ergo perpendicularis sit necesse est. quod demonstrandum proposuimus.

THEO-

THEOREMA XIII. PROPOSITIO XV.

Si duæ rectæ lineæ ſeſe tangentes duabus rectis lineis ſeſe tangentibus ſint parallelæ, non autem in eodem plano; & quæ per ipſas tranſeunt plana parallela erunt.



Duæ enim rectæ linęę ſeſe tangẽtes AB BC duabus rectis lineis ſeſe tangẽtibus DE EF parallelæ ſint, & non in eodem plano. Dico plana quæ per AB BC DE EF tranſeunt, ſi producantur, inter ſe non conuenire. Ducatur enim à puncto B ad planum, quod per DE EF tranſit perpendicularis BG, quę plano in puncto G occurrat; & per G ducatur ipſi quidem ED parallela GH; ipſi vero EF parallela GK. Itaque quoniam BG perpendicularis eſt ad planum per DE EF; & ad omnes rectas lineas, quæ ipſam contingunt, & in eodem ſunt plano, rectos faciet angulos. contingit autem ipſam vtraque earum GH GK, quę eſt in eodem plano. rectus igitur eſt vterque angulorum BGH BGK. Et quoniam BA parallela eſt ipſi GH, anguli GBA BGH duobus rectis ſunt æquales. rectus autem eſt BGH. ergo et GBA rectus erit; ideoq; GB ad BA eſt perpendicularis. Eadem ratione & GB eſt perpendicularis ad BC. cum igitur recta linea BG duabus rectis lineis BA BC ſe inuicem ſecantibus ad rectos angulos inſiſtat, erit BG etiam ad planum per AB BC ductum perpendicularis. & ob eandem cauſſam BG eſt perpendicularis ad planum per HG GK. ſed planum per HG GK eſt illud, quod per DE EF tranſit. quare BG ad planũ, quod tranſit per DE EF eſt perpendicularis. oſtenſa autem eſt BG etiam perpendicularis ad planũ per AB BC; atq; eſt ad planũ per DE EF perpẽdicularis. ergo BG perpẽdicularis eſt ad vtrũq; planorũ, quæ per AB BC DE EF trãſeũt. Ad quæ vero plana eadẽ recta linea eſt perpendicularis, ea parallela ſunt. parallelũ igitur eſt planũ per AB BC plano per DE EF. Quare ſi duæ rectæ lineæ ſeſe tangentes duabus rectis lineis ſeſe tangentibus ſint parallelæ, non autem in eodem plano, & quæ per ipſas tranſeunt plana parallela erunt. quod demonſtrare oportebat.

5. diff.


19. primi.

2. huius.

Ex antecedente.

THEOREMA XIIII. PROPOSITIO XVI.

Si duo plana parallela ab aliquo plano ſecentur, communes ipſorum ſectiones parallelę erunt.




Duo enim plana parallela AB CD à plano aliquo EFGH ſecentur: communes autem ipſorũ ſectiones ſint EF GH. Dico EF ipſi GH parallelam eſſe. ſi enim non eſt parallela, productæ EF GH inter ſe conuenient, vel ad partes FH, vel ad partes EG. producantur prius, vt ad FH; & conueniant in K. Quoniam igitur EFK eſt in plano AB, & omnia quæ in EFK ſumuntur puncta in eodem plano erunt. vnum autem punctorum, quæ ſunt in EFK, eſt ipſum K punctum. ergo K eſt in plano AB. Eadem ratione & K eſt in CD plano. ergo plana AB CD producta inter ſe cõuenient. non conueniunt autem, cum parallela ponantur. non igitur EF GH rectę lineę productę conuenient ad partes FH. ſimiliter demonſtrabimus neque ad partes EG conuenire, ſi producantur

ducantur: quæ autem neutra ex parte conueniunt parallelę sunt. ergo EF ipsi GH est parallela. si igitur duo plana parallela ab aliquo plano secentur, communes ipsorum sectiones parallelæ erunt. quod demonstrare oportebat.

THEOREMA XV. PROPOSITIO. XVII.

Si duæ rectę lineę à parallelis secentur planis, in easdem proportiones secabuntur.

Duæ enim rectæ lineę AB CD à parallelis planis GH KL MN secentur in punctis A E B C F D. Dico vt AE recta linea ad ipsam EB, ita esse CF ad FD. Iungantur enim AC BD A D: & occurat AD plano KL in puncto X: & EX XF iungantur. Quoniam igitur duo plana parallela KL MN à plano EBDX secantur, communes ipsorum sectiones EX BD parallelę sunt. Eadem ratione quoniam duo plana parallela GH KL à plano AEFC secantur, communes ipsorũ sectiones AC FX sunt parallelæ. Et quoniã vni laterum trianguli ABD, videlicet ipsi BD parallela ducta est EX, vt AE ad EB, ita erit AX ad XD. Rursus quoniam vni laterum trianguli AD C, nempe ipsi AC parallela ducta est XF, erit vt AX ad XD, ita CF ad FD. ostensum autem est & vt AX ad XD, ita esse AE ad EB. & vt igitur AE ad EB, ita est CF ad FD. Quare si duę rectę lineæ à parallelis secentur planis, in easdem proportiones secabuntur. quod demonstrare oportebat.



Ex antecedente.


2. huius.

31. quinti.

THEOREMA XVI. PROPOSITIO. XVIII.

Si recta linea plano alicui sit ad rectos angulos, & omnia quæ per ipsam transeunt plana eidem plano ad rectos angulos erunt.

Recta enim linea quædam AB subiecto plano sit ad rectos angulos. Dico & omnia plana, quæ per ipsam AB transeunt, subiecto plano ad rectos angulos esse. producatur enim per AB planum DE, sitq; plani DE, & subiecti plani communis sectio CE: & sumatur in CE quod vis punctum F; à quo ipsi CE ad rectos angulos in DE plano ducatur FG. Quoniam igitur AB ad subiectũ planum est perpendicularis; & ad omnes rectas lineas, quę ipsam contingunt, & in eodem sunt plano perpendicularis erit. quare et ad CE est perpendicularis. angulus igitur ABF rectus est. sed & GFB est rectus. ergo AB parallela est ipsi FG. est autem AB subiecto plano ad rectos angulos. & FG igitur eidẽ plano ad rectos angulos erit. At planum ad planum rectum est, quando communi planorum sectioni ad rectos angulos ductę rectæ lineæ in vno planorum reliquo plano ad rectos angulos sint: & communi planorum sectioni CE in vno plano DE ad rectos angulos ducta FG, ostensa est subiecto plano ad rectos esse angulos. ergo planum DE rectũ est ad subiectum planum. similiter demonstrabuntur, & omnia quę per AB trãseũt plana subiecto plano recta esse. si igitur recta linea plano alicui sit ad rectos angulos, & omnia quæ per ipsam transeunt plana eidem plano ad rectos angulos erunt.




3. diffi.

8 huius.

4. diffi.

THEOREMA XVII. PROPOSITIO XIX.

Si duo plana ſe inuicem ſecantia plano alicui ſint ad rectos angulos, & communis ipſorum ſectio eidem plano ad rectos angulos erit.



Duo enim plana ſe inuicem ſecantia AB BC ſubiecto plano ſint ad rectos angulos: communis autem ipſorum ſectio ſit BD. Dico BD ſubiecto plano ad rectos angulos eſſe. Non enim, ſed ſi fieri poteſt; non ſit BD ad rectos angulos ſubiecto plano; & à puncto D ducatur in plano quidem AB, ipſi AD rectæ lineæ ad rectos angulos DE: in plano autẽ BC ducatur ipſi CD ad rectos angulos DF. Et quoniam planum AB ad ſublectum planum rectum eſt, & communi ipſorum ſectioni AD ad rectos angulos in plano AB ducta eſt DE, erit DE ad ſubiectum planum perpendicularis. ſimiliter oſtendemus & DF perpendicularem eſſe ad ſubiectum planũ. quare ab eodẽ puncto D ſubiecto plano duę rectæ lineę ad rectos angulos conſtitutę ſunt ex eadem parte, quod fieri non poteſt. non igitur ſubiecto plano à puncto D ad rectos angulos conſtituentur aliæ rectæ lineæ, pręter ipſam DB, communem planorum AB BC ſectionem. Ergo ſi duo plana ſe inuicem ſecantia plano alicui ſint ad rectos angulos, & communis ipſorum ſectio eidẽ plano ad rectos angulos erit. quod oportebat demonſtrare.

11. huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Ex proxime demonſtratis apparet conuerſum antecedentis theorematis, nempe hoc.

Si omnia, quæ per aliquam rectam lineam plana producuntur, cuipiam plano ad rectos fuerint angulos, & recta linea eidem plano ad rectos angulos erit.

Fit enim recta linea dictorum planorum communis ſectio. quare cum ea plana plano cuipiam ad rectos angulos eſſe ponantur, & recta linea quæ ipſorum communis ſectio eſt eidem plano ad rectos angulos erit.


Conuerſum vero præſentis theorematis apparet ex antecedente. quod huiuſmodi eſt.

Quorum planorum ſe ſe mutuo ſecantium communis ſectio alicui plano ad rectos fuerit angulos, & ſecantia plana eidem plano ad rectos angulos erunt.

Communis enim planorum ſectio eſt recta linea, per quam dicta plana tranſeunt. quod cum recta linea plano cuipiam ad rectos fuerit angulos, & ipſa plana eidem ad rectos angulos erunt.

THEOREMA XVIII. PROPOSITIO. XX.

Si ſolidus angulus tribus angulis planis contineatur, duo quilibet reliquo maiores ſunt, quomodocumq; ſumpti.



Solidus enim angulus ad A tribus angulis planis BAC CAD DAB contineatur. Dico angulorum BAC CAD DAB duos quoslibet reliquo maiores eſſe, quomodocumque ſumptos. ſi enim BAC CAD DAB anguli inter ſe æquales ſint, perſpicuum eſt duos quoslibet reliquo maiores eſſe, quomodocumque ſumptos. Sin


minus

minus, sit maior BAC. & ad rectam lineam AB, & ad punctum in ipsa A constituatur angulo DAB in plano per BA AC transeũte, æqualis angulus BAE; ponaturq; ipsi AD æqualis AE; & per E ducta BEC secet rectas lineas AB AC in punctis BC & DB DC iungantur. Itaque quoniam DA est æqualis AE, communis autem AB, duę DA AB duabus BA AE æquales sunt: & angulus DAB æqualis est angulo BAE. basis igitur DB basi BE est æqualis. Et quoniam duę DB DC ipsa BC maiores sunt, quarum DB æqualis ostensa est ipsi BE; erit reliqua DC quàm reliqua EC maior. Quòd cum DA sit æqualis AE, communis autem AC & basis DC maior, basi EC; erit angulus DAC angulo EAC maior. ostensus autem est & DAB angulus æqualis ipsi BAE. quare DAB DAC anguli angulo BAC maiores sunt. similiter demonstrabimus & si duo quilibet alij sumantur, eos reliquo esse maiores. si igitur solidus angulus tribus angulis planis cõtineatur, duo quilibet reliquo maiores sunt, quomodocumque sumpti. quod demonstrare oportebat. 23. primi. 4. primi. 8. primi.

THEOREMA XIX. PROPOSITIO XXI.

Omnis solidus angulus minoribus, quàm quattuor rectis angulis planis continetur.


Sit solidus angulus ad A planis angulis BAC CAD DAB cõtẽtus. Dico angulos BAC CAD DAB quattuor rectis esse minores. sumãtur enim in vnaquaq; ipsarũ AB AC AD quęuis pũcta B C D; & BC CD DB iũgãtur. Quoniam igitur solidus angulus ad B tribus angulis planis cõtinetur CBA ABD CBD, duo quilibet reliquo maiores sunt. anguli igitur CBA ABD angulo CBD sunt maiores. Eadem ratione & anguli quidẽ BCA ACD maiores sunt angulo BCD; anguli vero CDA ADB maiores angulo CDB. quare sex anguli CBA ABD BCA ACD ADC ADB tribus angulis CBD BCD CDB sunt maiores. sed tres anguli CBD BDC DCB sunt æquales duobus rectis. Sex igitur anguli CBA ABD BCA ACD ADC ADB duobus rectis maiores sunt. Quòd cũ singulorũ triãgulorum ABC ACD ADB tres anguli sint æquales duobus rectis, erunt triũ triangulorum nouem anguli CBA ACD BAC ACD DAC CDA ADB DBA BAD æquales sex rectis. quorũ sex anguli ABC BCA ACD CDA ADB DBA duobus rectis sunt maiores. reliqui igitur BAC CAD DAB tres anguli, qui solidum continent angulum quattuor rectis minores erunt. Quare omnis solidus angulus minoribus, quàm quattuor rectis angulis planis continetur. quod oportebat demonstrare.




THEOREMA XX. PROPOSITIO XXII.

Si sint tres anguli plani, quorum duo reliquo sint maiores, quomodocumque sumpti, contineant autem ipsos rectæ lineæ æquales fieri potest, vt ex ijs, quæ rectas æquales coniungunt triangulum constituatur.

Sint tres anguli plani ABC DEF GHK, quorum duo reliquo sint maiores, quomodocumque sumpti, videlicet anguli quidem ABC DEF maiores angulo GHK; anguli vero DEF GHK maiores angulo ABC; & præterea anguli GHK ABC angulo DEF: maiores sintq; æquales rectæ lineę AB BC DE EF GH HK, & AC DF GK iungãtur. Dico fieri posse, vt ex æqualibus ipsis AC DF GK triangulũ cõstituatur; hoc est ipsarũ AC DF GK duas quaslibet reliqua esse maiores, quomodocumq; sumptas. si quidẽ igitur anguli ABC DEF GHK inter se æquales sint; manifestũ



est & æqualibus factis AC DF GK ex æqualibus ipsis triangulum constitui posse.
23.primi. sin minus, sint inæquales, & ad rectam lineam HK, atque ad punctum in ipsa H, angulo ABC æqualis angulus constituatur KHL, & ponatur vni ipsarum AB BC DE EF GH HK æqualis HL: & GL KL iungantur. Itaque quoniam duæ AB BC duabus KH HL æquales sunt, & angulus ad B angulo KHL æqualis, erit basis AC æqualis basi KL. Et quoniam anguli ABC GHK angulo DEF sunt maiores; æqualis autem est angulus ABC angulo KHL: erit GHL angulo DEF maior. Quòd cum duæ GH HL duabus DE EF æquales sint, & angulus GHL angulo, qui ad E maior,
24.primi. basis GL basi DF maior erit. Sed GK KL ipsa GL sunt maiores. multo igitur maio-
20.primi. res sunt GK KL ipsa DF. est autem KL æqualis AC. ergo AC GK reliqua DF sunt maiores. similiter demonstrabimus, & ipsas quidem AC DF maiores esse GK, ipsas uero GK DF maiores AC. fieri igitur potest vt ex æqualibus ipsis AC DF GK triangulum constituatur.




ALITER. Sint dati tres anguli plani ABC DEF GHK, quorum duo reliquo sint maiores, quomodocumque sumpti: cõtineant autem ipsos æquales rectæ lineæ AB BC DE EF GH HK, & AC DF GK iungantur. Dico fieri posse, vt ex æqualibus ipsis AC DF GK triangulum constituatur: hoc est rursus duas reliqua maiores esse, quomodocumque sumptas. si igitur rursus anguli ad B E H sint æquales, & AC DF GK æquales erunt, & duæ reliqua maiores. sin minus, sint inæquales an-
24.primi. guli ad B E H, & maior qui est ad B vtroque ipsorum qui ad E H. maior igitur est & recta linea AC vtraque ipsarum DF GK. & manifestum est ipsam AC vnà cũ altera ipsarum DF GK reliqua esse maiorem. Dico & DF GK ipsa AC maiores es-
23.primi. se. constituatur ad rectam lineam AB, & ad punctum in ea B, angulo GHK æqualis angulus ABL, & vni ipsarum AB BC DE EF GH HK ponatur æqualis BL, & AL LC iungantur. Quoniam igitur duæ AB BL duabus GH HK æquales sunt, altera alteri, & angulos æquales continent; erit basis AL basi GK æqualis. & quoniam anguli ad E H angulo ABC maiores sunt, quorum angulus GHK est æqualis ipsi ABL; erit reliquus qui ad E angulo LBC maior. Quòd cum duæ LB BC duabus DE EF
24.primi. æquales sint, altera alteri; & angulus DEF angulo LBC maior; basis DF basi LC maior erit. ostensa est autem GK æqualis AL. ergo DF GK ipsis AL LC sunt maiores. sed AL LC maiores sunt ipsa AC. multo igitur DF GK ipsa AC maiores erũt. quare rectarum linearum AC DF GK duæ reliqua maiores sunt, quomodocumque sumptæ; ac propterea fieri potest, vt ex æqualibus ipsis AC DF GK triangulum constituatur. quod oportebat demonstrare.


PRO-

PROBLEMA III. PROPOSITIO. XXIII.

Ex tribus angulis planis, quorum duo reliquo ſint maiores, quomodocunque ſumpti, ſolidum angulum conſtituere. oportet autem tres angulos quattuor rectis eſſe minores.



Sint dati tres anguli plani ABC DEF GHK; quorum duo reliquo ſint maiores, quomodocunq; ſumpti. ſintq; tres anguli quattuor rectis minores. oportet ex æqualibus ipſis ABC DEF GHK ſolidum angulum conſtituere. abſcindãtur æquales AB BC DE EF GH HK; & AC DF GK iungãtur. fieri igitur põt, vt ex æqualibus ipſis AC DF GK conſtituatur triangulum. Itaque conſtituatur LMN, ita vt AC quidem ſit æqualis LM, DF vero ipſi MN: & prꝛterea GK ipſi LN: & circa LMN triangulum circulus LMN deſcribatur: ſumaturq; ipſius cẽtrum X; quod vel erit intra triangulũ LMN, vel in vno eius latere, vel extra. Sit primũ intra: ſitq; X: & LX MX NX iungãtur. Dico AB maiorem eſſe ipſa LX. Si enim non ita ſit, vel AB erit æqualis LX, vel ea minor. Sit primum æqualis. Quoniam igitur AB eſt æqualis LX, atque eſt AB ipſi BC æqualis; erit LX æqualis BC; eſt autem LX æqualis XM. duæ igitur AB BC duabus LX XM æquales ſunt: altera alteri; & AC baſis baſi LM æqualis ponitur. quare angulus ABC angulo LXM eſt æqualis. Eadem ratione & angulus quidẽ DEF eſt æqualis angulo MXN, angulus vero GHK angulo NXL. Tres igitur anguli ABC DEF GHK tribus LXM MXN NXL æquales ſunt. Sed tres LXM MXN NXL quattuor rectis ſunt æquales. ergo & tres ABC DEF GHK æquales erunt quattuor rectis. atqui ponuntur quattuor rectis minores, quod eſt abſurdum. non igitur AB ipſi LX eſt æqualis. Dico prꝛterea neque AB minorem eſſe ipſa LX. ſi enim fieri poteſt, ſit minor; & ponatur ipſi quidem AB æqualis XO, ipſi vero BC æqualis XP, & OP iungatur. Quoniam igitur AB eſt æqualis BC, & XO ipſi XP æqualis erit. ergo & reliqua OL reliquæ PM eſt æqualis; ac propterea LM parallela eſt ipſi OP; & LMX triangulum triangulo OPX æquiangulum. eſt igitur vt XL ad LM, ita XO ad OP; & permutando vt LX ad XO, ita LM ad OP. maior autem eſt LX, quàm XO. ergo & LM quàm OP eſt maior. Sed LM poſita eſt æqualis AC. & AC igitur quàm OP maior erit. Itaque quoniam duæ rectæ lineæ AB BC duabus OX XP æquales ſunt, & baſis AC maior baſi OP; erit angulus ABC angulo OXP maior. Similiter demonſtrabimus & DEF angulum maiorẽ eſſe angulo MXN, & angulum GHK angulo NXL. Tres igitur anguli ABC DEF GHK tribus LXM MXN



Ex antecedente. 22. primi.

5. quarti.

8. primi.

Corol. 15. primi.


2. sexti.

4. sexti.


25 primi.

MXN NXL ſunt maiores. At anguli ABC DEF GHK quattuor rectis minores pe-
Coro.15.primi. nuntur. multo igitur anguli LXM MXN NXL minores erunt quattuor rectis. Sed
12.huius. & æquales. quod eſt abſurdum. non igitur AB minor eſt, quàm LX. oſtenſum autẽ eſt neque eſſe æqualem. ergo maior ſit neceſſe eſt. conſtituatur à puncto X circuli LMN plano ad rectos angulos XR, & exceſſui, quo quadratum ex AB ſuperat quadratum ex LX, ponatur æquale quadratum quod fit ex RX, & RL RM RN iungantur. Quoniam igitur RX perpendicularis eſt ad planum LMN circuli, & ad vnamquamque ipſarum LX MX NX erit perpendicularis. Et quoniam LX eſt æqualis
4.primi. XM, communis autem & ad rectos angulos XR, erit baſis LR æqualis baſi RM. Eadem ratione & RN vtrique ipſarum RL RM eſt æqualis. Tres igitur rectæ lineæ R L RM RN inter ſe æquales ſunt. Et quoniam quadratum XR ponitur æquale exceſſui, quo quadratum ex AB ſuperat quadratum ex LX; erit quadratum ex AB quadratis ex LX XR æquale. quadratis autem ex LX XR æquale eſt quadratũ ex RL;
47.primi. rectus enim angulus eſt LXR. ergo quadratum ex AB quadrato ex RL æquale erit; ideoq; AB ipſi RL eſt æqualis. ſed ipſi quidem AB æqualis eſt vnaquæque ipſarum BC DE EF GH HK; ipſi vero RL æqualis vtraque ipſarum RM RN. vnaquæque igitur ipſarum AB BC DE EF GH HK vnicuique ipſarum RL RM RN eſt æqualis. Quòd cum duæ LR RM duabus AB BC æquales ſint, & baſis LM ponatur
8.primi. æqualis baſi AC; erit angulus LRM æqualis angulo ABC. Eadem ratione & angulus quidem MRN angulo DEF, angulus autem LRN angulo GHK eſt æqualis. ex tribus igitur angulis planis LRM MRN LRN, qui æquales ſunt tribus datis ABC DEF GHK ſolidus angulus conſtitutus eſt ad R, qui angulis LRM MRN LRN cõtinetur.


Sed ſit centrum circuli in vno laterum trianguli, videlicet in MN, quod ſit X, & X L iungatur. Dico rurſus AB maiorem eſſe ipſa LX. Si enim non ita ſit, vel AB eſt æqualis L, X vel ipſa minor. ſit primum æqualis. duæ igitur AB BC, hoc eſt DE EF




duabus MX XL, hoc eſt ipſi M N æquales ſunt. ſed MN ponitur æqualis DF. ergo DE EF
20.primi. ipſi DF ſunt æquales. quod fieri non poteſt. non igitur AB eſt æqualis LX. ſimiliter neq; minor. multo enim magis id quod fieri non poteſt, ſequeretur. ergo AB ipſa LX maior eſt. & ſimiliter ſi exceſſui quo quadratũ ex AB ſuperat quadratũ ex LX æquale ponatur, vt quadratum ex RX, & ipſa R X circuli plano ad rectos angulos conſtituatur, fiet problema.




Sed ſit centrum circuli extra triangulum LMN, quod ſit X, & LX MX NX iũgantur. Dico & ſic AB ipſa LX maiorem eſſe. ſi enim non ita ſit, vel æqualis eſt, vel minor. ſit primum æqualis. ergo duæ AB BC duabus MX XL æquales ſunt, altera alteri; & baſis AC eſt æqualis baſi ML. angulus igitur ABC æqualis eſt angulo MXL. Eadem
8.primi.




dem ratione & GHK angulus ipſi LXN eſt æqualis; ac propterea totus MXN æqualis duobus ABC GHK. ſed & anguli ABC GHK angulo DEF maiores ſunt. & angulus igitur MXN ipſo DEF eſt maior. Et quoniam duæ DE EF duabus MX XN æquales ſunt, & baſis DF æqualis baſi MN, erit MXN angulus angulo DEF æqualis. oſtenſus autem eſt maior, quod eſt abſurdum. non igitur AB eſt æqualis LX. deinceps vero oſtendemus neque minorem eſſe. quare maior neceſſario erit. & ſi rurſus circuli plano ad rectos angulos cõſtituamus XR, & ipſi æqualẽ ponamus lateri quadrati eius, quo quadratum ex AB ſuperat quadratum ex LX, problema conſtituetur. Itaque dico neque minorem eſſe AB ipſa LX. ſi enim fieri poteſt, ſit minor; & ipſi quidem AB æqualis ponatur XO, ipſi vero BC æqualis XP, & OP iungatur. Quoniam igitur AB ipſi BC eſt æqualis, erit ex XO æqualis XP. ergo & reliqua OL reliquæ PM æqualis. parallela igitur eſt LM ipſi PO, & triangulum LMX triangulo PXO æquiangulum. quare vt XL ad LM, ita XO ad OP: & permutando vt LX ad XO, ita LM ad OP. maior autem eſt LX quàm XO. ergo LM quàm OP eſt maior. ſed LM eſt æqualis AC. & AC igitur quàm OP maior erit. Itaque quoniam duæ AB BC duabus OX XP ſunt æquales, altera alteri; & baſis AC maior eſt baſi OP; erit angulus ABC angulo OXP maior. ſimiliter & ſi XR ſumatur æqualis vtriq; ipſarum XO XP, & iungatur OR, oſtendemus angulum GHK angulo OXR maiorem. conſtituatur ad rectam lineam LX, & ad punctum in ipſa X angulo quidem ABC æqualis angulus LXS, angulo autem GHK æqualis LXT, & ponatur vtraque XS XT ipſi OX æqualis: iunganturq; OS OT ST. Et quoniam duæ AB BC duabus OX XS æquales ſunt, & angulus ABC æqualis angulo OXS, erit baſis AC, hoc eſt LM baſi OS æqualis. Eadem ratione & LN eſt æqualis ipſi OT. Quòd cum duæ ML LN duabus OS ST ſint æquales, & angulus MLN maior angulo SOT; erit et baſis MN baſi ST maior. ſed MN eſt æqualis DF. ergo et DF quam ST maior erit. Quoniam igitur duæ DE EF duabus SX XT æquales ſunt, et baſis DF maior baſi ST; erit angulus DEF angulo SXT maior. æqualis autẽ eſt angulus SXT angulis ABC GHK. ergo DEF angulus angulis ABC GHK maior eſt. ſed et minor. quod fieri non poteſt.





2. corol. 4. huius



31. primi


4 primi

42. primi

25. primi

LEMMA.

Quo autem modo ſumatur quadratum ex RX æquale ei, quo quadratum ex AB ſuperat quadratum ex LX, ita oſtendemus.




Exponãtur rectę lineæ AB LX, ſitq; maior AB, & in ipſa deſcribatur ſemicirculus A C B; in quo aptetur recta linea AC ipſi LX æqualis, & BC iungatur. Itaque quoniam in ſemicirculo ABC angulus eſt AGB, erit A C B rectus. quadratum igitur quod fit ex AB ęquale eſt, & quadrato quod ex A C, & ei, quod ex C B. ergo quadratum ex A B ſuperat quadratum ex AC, quadrato ex CB. æqualis autem eſt AC ipſi L X. quadratum igitur ex AB ſuperat quadratum ex LX, quadrato ex C B. Quare ſi ipſi C B æqualem ſumamus XR, quadratum ex AB ſuperabit quadratum ex L X, eo quod fit ex R X quadrato.

31. tertii.
47. primi.

SCHOLIVM.

PROPOSITIO I.


Si fuerint quotlibet anguli plani, quorũ vno reliqui ſint maiores quo modocunque ſumpti, contineant autem ipſos recta linę æquales. Dico & rectarum linearum angulos ſubtendentium, vna reliquas maiores eſſe quomodocũque ſumptas: hoc eſt fieri poſſe, vt ex ijs, quæ rectas lineas coniungunt multorum laterum figura conſtituatur.




Vt ſi dati fuerint quattuor anguli ad puncta A D G L, quorum tres reliquo ſint maiores quomodocumq; ſumpti: æquales autem ſint rectæ lineæ BA AC ED DF HG GK ML LN: & iungantur BC EF HK MN. Dico ipſarum BC EF HK MN tres reliqua maiores eſſe, quomodocumque ſumptas. ſi enim æquales ſint anguli ad puncta A D G L, & latera BC EF HK MN ęqualia erunt. & manifeſtum eſt tres vna reliqua eſſe maiores, quomodocumque accipiãtur. ſi vero inęquales ſint, ſit maior qui ad A. baſis igitur BC ſingulis ipſarum EF HK MN maior eſt. quare BC cũ vna earum reliquis quibuslibet eſt maior: & cum duabus reliqua multo maior erit. Dico etiam EF HK MN ipſa BC maiores eſſe. Quoniam enim angulus ad A maior eſt ſingulis ipſorum D G L, conſtituatur ad BA rectam lineam, & ad pũctum in ipſa A angulo, qui ad D æqualis angulus BAX, & ad rectam lineam AX, & ad pũctũ in ipſa A angulo, qui ad G æquali cõſtituto angulo XAO, vel AO cadet intra lineã AC, vel in ipſam, vel extra ipſam. Cadat primũ intra, & ad rectam lineam OA, & ad

24. primi.
25. primi.

& ad punctum in ipſa A angulo qui ad L æqualis fiat angulus OAP. cadet AP extra lineam AC, propterea quòd tres anguli D G L reliquo ſunt maiores. & ipſis AB AC æquales ponatur AX AO AP: iungāturq́; BX XO BO OP BP. Qm̃ igitur duę BA AP duabus BA AC ſunt æquales, angulus aũt BAP maior eſt angulo BAC; erit & BP baſis baſi AC maior. Sed ipſa BP maiores ſunt BO OP. quare BO OP ipſa 24. primi.
BC ſunt multo maiores. ſuntq́; BX XO maiores, quàm BO. ergo BX XO OP mul-



to maiores ſunt ipſa BC. atque eſt BX quidem æqualis ipſi EF, quoniam & angulus 4. primi.
BAX æqualis eſt angulo EDF; XO vero eſt æqualis HK, & OP ipſi MN. quare EF HK MN ipſa BC multo maiores erunt. Sed recta linea, quæ cum AX continet angulum æqualem angulo G cadat in ipſam AC, vt in ſecunda figura: & BX XC CP iungantur. Itaque quoniam BX XC ipſa BC maiores ſunt, & ſunt BX XC CP æquales ipſis EF HK MN, erunt EF HK MN ipſa BC multo maiores. Denique recta linea AO, quæ cum AX continet angulum angulo G æqualem, cadat extra AC, ut in tertia figura: ponaturq́; æqualis ipſi AP: & iungantur BP BO OP BX XO. Quoniam




UNIVERSIDAD CENTRAL
BIBLIOTECA
DERECHO

igitur duæ BA AP duabus BA AC æquales ſunt, angulus autem BAP maior eſt angulo BAC; erit BP quàm BC maior. Rurſus quoniam BO OP maiores ſunt quã 24. primi.
BP; & BX XO maiores quàm BO; erunt BX XO OP quàm BP multo maiores. Sed BP eſt maior BC. quare BX XO OP multo maiores ſunt ipſa BC: ſũtq́; BX XO OP ipſis EF HK MN æquales. ergo EF HK MN ipſa BC multo maiores ſunt. Et quoniam tres reliqua maiores ſunt, quomodocumque ſumptæ, fieri poteſt, vt ex ipſis quadrilaterum ipſam conſtituatur.

PROPOSITIO II.

Si in aliquod planũ à quodam ſublimi puncto æquales rectę lineę cadant, in circuli erunt circumferentia, & quæ à dicto puncto ad centrum circuli ducitur ad circulum perpendicularis erit.

A punctoenim A in ſubiectum planum equales rectæ lineę cadãt AB AC AD AE ad puncta B C D E, Dico ea puncta in circuli circumferentia eſſe. Iungantur enim in ſubiecto plano BC CD DE EB, & circa BCD triãgulum circulus deſcribatur BCDF. ergo puncta BCD in circũli circumferentia ſunt. Dico etiam ipſum E in circumferẽtia eſſe. non enim, ſed ſi fieri poteſt, vel extra vel intra cadat. & primum cadat extra, & ſumpto circuli centro G, ab eo ad puncta B C D E rectę lineæ ducantur GB GC GD GE, vt GE circulum in puncto F ſecet, & iungantur AE AG. Quoniã igitur AB ipſi AC eſt æqualis, eſt autem & BG æqualis CG: duæ AB BG duabus AC CG æquales ſunt. & baſis AG eſt vtrique communis.




8. primi. angulus igitur ABG angulo ACG eſt æqualis, triangulumq́; triangulo, & reliqui anguli reliquis angulis æquales. ergo angulus AGB æqualis eſt angulo AGC. Eadem ratione & angulus AGC angulo AGD æqualis erit. Quòd cum AG ad plures quàm duas rectas lineas in eodem exiſtentes
4. huius. plano rectos angulos efficiat, ad planum quod per ipſas ducitur perpendicularis erit. quare ad circulum ipſum. Itaque quoniam GD ipſi GF eſt æqualis, communis
4. primi: autem & ad rectos angulos GA; erit baſis AD baſi AF æqualis. ergo & vnaqueque
16. primi: ipſarum AB AC AE æqualis eſt ipſi AF. Et quoniam angulus AFE maior eſt recto AGF, quòd exterior ſit, erit angulus AEF recto minor. trianguli igitur AEF an-
19. primi. gulus qui eſt ad F maior eſt angulo qui ad E. quare & latus AE maius eſt latere AF. ſed & oſtenſum eſt æquale. quod eſt abſurdum. non igitur punctum E extra circuli circumferentiam cadit. ſimiliter oſtendemus neque cadere intra. ducentes enim ad ipſum rectam lineam, & ad circumferentiam protendentes, rurſuſq́; ab A ad dictũ punctum rectam lineam iungentes, oſtẽdemus ipſam & æqualem eſſe, & minorem. quod eſt abſurdum. At ſi neque extra cadit, neq; intra; relinquitur vt in ipſam circumferentiam cadat. ergo AB AC AD AE in circuli ſunt circumferentia, & AG ad ipſum circulum eſt perpendicularis. quod demonſtrare oportebat.

COROLLARIVM.

Ex hoc manifeſtum eſt omnis anguli ſolidi, qui æquicruribus planis continetur, baſim ipſam in circulo deſcribi.

PROPOSITIO III.


Ex planis quotlibet datis angulis, quorum vno reliqui ſint maiores quomodocũq; ſumpti, ſolidũ angulũ cõſtituere. oportet aũt datos angulos quatuor rectis eſſe minores.




Sint dicti anguli BAC ED F HGK MLN. oportet ex angulis qui ſunt ad puncta A D G L ſolidum angulum conſtituere. ſumantur æquales rectæ

lineæ

lineæ, quę ipſos angulos continent,& iungantur BC EF HK MN. æquicruria igitur ſunt triangula, quæ vno quouis angulo reliquos maiores habent, quomodocumque ſumptos. ergo BC EF HK MN quadrilaterum efficiēt. ſi at & ſit X O P R. Et quoniā oportet ex æquicruribus triangulis B AC EDF HGK MLN ſolidum angulum conſtituere: omnis autem ſolidi



Ex coral. 24 antecedenti.




anguli, qui æquicruribus triangulis continetur baſim circumſcribit circulus; & anguli ſolidi contenti triangulis BAC EDF HGK MLN, baſim circulus circumſcribet. dicti vero anguli baſis conſtat ex baſibus ipſorum triangulorum, videlicet XO PR. ergo quadrilaterum XOPR circulus circūſcribit. Et deinceps eadem conſtruentes ijs, quę dicta ſunt in angulo ſolido pro baſi triangulum habente propoſitum efficiemus.

THEOREMA XXI. PROPOSITIO XXIIII.

Si ſolidum parallelis planis contineatur, oppoſita ipſius plana, & æqualia & parallelogramma erunt.

Solidum enim CDGH parallelis planis AC GF AH DF FB AE contineatur. Dico oppoſita eius plana, & æqualia & parallelogramma eſſe. Quoniam enim duo plana parallela BG CE, à plano AC ſecantur, communes ipſorum ſectiones parallelæ ſunt. ergo AB ipſi CD eſt parallela. Rurſus quoniā duo plana parallela BF AE ſecantur à plano AC, cōmunes ipſorum ſectiones parallelæ ſunt. parallela igitur eſt AD ipſi BC: oſtēſa autem eſt & AB parallela CD. ergo AC parallelogrammum erit. ſimiliter demonſtrabimus, & vnumquodque ipſorum DF FG GB BF AE parallelogrammum eſſe. Iūgantur AH DF. Et quoniam parallela eſt AB quidem ipſi DC; BH vero ipſi CF, erunt duę AB BC ſe ſe tangentes duabus DC CF ſe ſe tangentibus parallelæ, & non in eodem plano. quare æquales angulos continebunt. anguſus igitur ABH an-




16. huius.

10. huius.

gulo DCF eſt ęqualis. Et quoniam duę AB BH duabus DC CF ęquales ſunt, & angulus ABH æqualis angulo DCF, erit baſis AH baſi DF ęqualis: & ABH triāgulum æquale triangulo DCF. Quòd cum ipſius quidem ABH triāguli duplū ſit BG parallelogrāmū, ipſius vero DCF trianguli duplum parallelogrāmū CE: erit BG parallelogrāmū æquale parallelogrāmo CE. ſimiliter demonſtrabimus & AC parallelogrammum parallelogrammo GF, & parallelogrammum AE parallelogrammo BF æquale eſſe. Si igitur ſolidum parallelis planis contineatur, oppoſita ipſius plana, & æqualia & parallelogramma ſunt, quod oportebat demonſtrare.

34. primi.
4. primi.
41. primi.



F. C. COMMENTARIVS.

COROLLARIVM.

Ex iam demonſtratis conſtat, ſi ſolidum parallelis planis contineatur oppoſitæ ipſius plana, & æqualia eſſe, & ſimilia, quippe quę & ſingulos angulos ęquales, & circa æquales angulos latera proportionalia habeant.


e. diffi. ſexti.

THEOREMA XXII. PROPOSITIO XXV.

Si ſolidum parallelepipedum plano ſecetur oppoſitis planis parallelo, erit vt baſis ad baſim, ita ſolidum ad ſolidum.

Solidū enim parallelepipedum AB CD plano YE ſecetur, oppoſitis planis RA DH parallelo. Dico vt AEFΦ baſis ad baſim EH CF, ita eſſe ABFY ſolidum ad ſolidū EGCD. producatur enim AH ex vtraq; parte, & ponantur ipſi quidem EH æquales quotcumque HM MN; ipſi uero AE æquales quotcumque AK KL, & compleantur parallelogramma LO KΦ HX MS, & ſolida LP KR DM MT. Quoniã igitur æquales inter ſe ſunt LK KA AE rectæ lineæ; erunt & parallelogramma LO KΦ AF inter ſe æqualia: itemq; æqualia inter ſe parallelogramma KX KB AG, & adhuc parallelogramma LT KP AR inter ſe æqualia; oppoſita enim ſunt. Eadem ratione & parallelogramma EC HX MS ęqualia inter ſe; itemq; parallelogrāma HG HI IN inter ſe æqualia: & inſuper parallelogramma DH MΩ NT. tria igitur plana ſolidorum LP KR AY tribus planis æqualia ſunt. ſed tria tribus oppoſitis ſunt æqualia. ergo tria ſolida LP KR AY inter ſe æqualia erunt. Eadem ratione & tria ſolida ED DM MT ſunt æqualia inter ſe. quotuplex igitur eſt baſis LF ipſius AF baſis, totuplex eſt & LY ſolidum ſolidi AY. Et eadem ratione quotuplex eſt NF baſis ipſius baſis HF, totuplex eſt & ſolidum NY ipſius HY ſolidi: & ſi baſis LF

1. ſexti. Ex antecedente.



eſt

eſt æqualis baſi NF, & ſolidum LY ſolido NY æquale erit. & ſi baſis LF ſuperat NF baſim, & LY ſolidum ſolidum NY ſuperabit, & ſi minor, minus. quattuor igitur magnitudinibus exiſtentibus, duabus ſcilicet baſibus AF FH, & duobus ſolidis AY YH ſumpta ſunt æque multiplicia, baſis quidem AF, & AY ſolidi, videlicet baſis LF, & ſolidum LY: baſis vero HF, & HY ſolidi, nempe baſis NF & ſolidum NY. & demõſtratum eſt ſi baſis LF ſuperat baſim NF, & LY ſolidum ſolidum NY ſuperare, & ſi æqualis æquale, & ſi minor minus. eſt igitur vt AF baſis ad baſim FH, ita AY ſolidũ ad ſolidum YH. Quare ſi ſolidum parallelepipedum plano ſecetur, oppoſitis planis parallelo; erit vt baſis ad baſim, ita ſolidũ ad ſolidũ. quod oportebat demonſtrare.


F. C. COMMENTARIVS.

Quod ſi ſolidum parallelepipedum ſecetur plano baſibus parallelo; erit ſolidum ad ſolidum, vt altitudo ad altitudinem.

Hoc enim nos demonſtrauimus in libro de centro grauitatis ſolidorum propoſitione XVIII.

PROBLEMA IIII. PROPOSITIO. XXVI.

Ad datam rectam lineam, & ad datum in ipſa punctum dato angulo ſolido æqualem ſolidum angulum conſtituere.




Sit data quidem recta linea AB, datum autem in ipſa pũctum A, & datus ſolidus angulus ad D, qui EDC EDF FDC angulis planis cõtineatur. oportet ad datam rectam lineã AB, & ad datum in ipſa punctum A, dato angulo ſolido ad D æqualẽ ſolidum angulum conſtituere. ſumatur enim in linea DF quod vis punctum F, à quo ad planum per ED DC tranſiens ducatur perpendicularis FG, & plano in puncto G occurrat; iungaturq; DG, & ad rectam lineam AB, & ad datum in ipſa punctum A, angulo quidem EDC æqualis angulus conſtituatur BAL, angulo autem EDG conſtituatur æqualis BAK. deinde ipſi DG ponatur æqualis AK, & à puncto K plano per BAL ad rectos angulos erigatur KH; ponaturq; ipſi GF æqualis KH, & HA iungatur. Dico angulum ſolidum ad A, qui angulis BAL BAH HAL continetur, æqualem eſſe ſolido angulo ad D angulis EDC EDF FDC contẽto. ſumantur enim æquales rectæ lineæ AB DE, & iungantur HB KB FE GE. Quoniam igitur FG perpendicularis eſt ad ſubiectũ planum; & ad omnes rectas lineas, quæ ipſam contingunt, ſuntq; in ſubiecto plano rectos faciet angulos. Vterque igitur angulorũ FGA FGD FGE rectus eſt. Eadẽ ratione, & vterq; ipſorum HKA HKB eſt rectus. Et quoniam duæ KA AB duabus GD DE æquales ſunt altera alteri, & angulos æquales continent; erit baſis BK baſi EG æqualis. eſt autem & KH æqualis GF, atque angulos rectos continent. æqualis igitur et HB ipſi FE. Rurſus quoniam duæ AK KH duabus DG GF æquales ſunt, et rectos continent angulos; erit baſis AH baſi DF æqualis: eſtq; AB æqualis DE. duæ igitur HA AB duabus FD DE ſunt æquales; et baſis HB eſt æqualis baſi FE. ergo angulus BAH angulo EDF æqualis erit. Eadem ratione et angulus HAL angulo FDC eſt æqualis, quandoquidem ſi aſſumamus æquales AL DC, et iungamus KL HL GC FC, quoniam totus BAL eſt

11. huius.
23. primi.
12. huius.
3. huius.
4. primi.
4. primi.
8. primi.

æqualis

æqualis toti EDC, quorum BAK ipſi EDG ponatur æqualis; erit reliquus KAL æqualis reliquo GDC. Et quoniã duæ KA AL duabus GD DC æquales ſunt, et angulos æquales continent; baſis KL baſi GC æqualis erit. eſt autem et KH æqualis GF. duæ igitur LK KH duabus DC GF ſunt æquales; angulosq; rectos continent. ergo baſis HL æqualis eſt baſi FC. Rurſus quoniam duæ HA AL duabus FD DC æquales ſunt, & baſis HL æqualis baſi FC; erit angulus HAL æqualis angulo FDC. atque eſt angulus BAL angulo EDC æqualis. Ad datam igitur rectam lineam, & ad datum in ipſa punctum dato angulo ſolido æqualis angulus ſolidus conſtitutus eſt. quod facere oportebat.




4. primi.

8 primi.

PROBLEMA V. PROPOSITIO XXVII.

A data recta linea dato ſolido parallelepipedo ſimile & ſimiliter poſitum ſolidum parallelepipedum deſcribere.

Sit recta quidẽ linea AB; datum vero ſolidũ parallelepipedum CD. oportet à data recta linea AB dato ſolido parallelepipedo CD ſimile, & ſimiliter poſitũ ſolidum parallelepipedum deſcribere. conſtituatur enim ad rectam lineam AB, & ad datum in ipſa punctum A angulo ſolido ad C æqualis angulus, qui angulis BAH HAK KAB contineatur, ita vt angulus quidem BAH æqualis ſit angulo ECF, angulus vero BAK angulo ECG, & adhuc angulus KAH angulo GCF, & fiat vt EC ad CG, ita BA ad AK; vt autem GC ad CF, ita KA ad AH. ergo ex æquali vt EC ad CF, ita erit BA ad AH. compleatur parallelogrammum BH, & AL ſolidum. Quoniam igitur eſt vt EC ad CG, ita BA ad AK, & circa æquales angulos ECG BAK latera ſunt proportionalia; erit parallelogrammum KB parallelogrammo GE ſimile. Eadem quoque ratione parallelogrammum KH ſimile eſt parallelogrammo GF, & parallelogrammum HB parallelogrammo FE. tria igitur parallelogramma ſolidi AL tribus parallelogrãmis ſolidi CD ſimilia ſunt. ſed tria tribus oppoſitis ſunt æqualia, & ſimilia: Ergo totũ AL ſolidum toti ſolido CD ſimile erit. A data igitur recta linea AB dato ſolido parallelepipedo CD ſimile, & ſimiliter poſitum ſolidum parallelepipedum AL deſcriptum eſt. quod facere oportebat.



Ex antecedente.

11. ſexti.

1. diffi. ſexti.


24. huius.

THEOREMA XXIII. PROPOSITIO XXVIII.

Si ſolidum parallelepipedum plano ſecetur per diagonales oppoſitorum

positorum planorum ab ipso plano bifariam secabitur.


Solidum enim parallelepipedum AB plano CDEF secetur per diagonales oppositorũ planorum, videlicet CF DE. Dico solidum AB à plano CDEF bifariam secari. Quoniam enim æquale est CGF triangulum triangulo CBF, triangulum vero ADE triangulo DEH; est autem & CA parallelogrammum parallelogrammo BE æquale, oppositum enim est, & parallelogrammum GE æquale parallelogrammo CH: erit prisma contentum duobus triangulis CGF ADE, & tribus parallelogrammis GE AC CE æquale prismati, quod continetur duobus triangulis CFB DEH, & tribus parallelogrammis CH BE CE; etenim æqualibus planis, & numero & magnitudine continentur. ergo totum AB solidum à plano CDEF bifariã secatur. quod demonstrare oportebat.



THEOREMA XXIIII. PROPOSITIO XXIX.

Solida parallelepipeda, quę in eadem sunt basi, & eadem altitudine, quorum stantes sunt in eisdem rectis lineis, inter se sunt æqualia.

Sint enim in eadem basi AB solida parallelepipeda CM CN & eadem altitudine, quorum stãtes AF AG LM LN CD CE BH BK sint in eisdem rectis lineis FN DK. Dico solidum CM solido CN æquale esse. Quoniam enim parallelogrammum est vtrumque ipsorum CH CK; erit CB vtrique ipsarum DH EK æqualis, ergo & DH est æqualis EK. communis auferatur EH. reliqua igitur DE æqualis est reliquæ HK. quare & DEC triangulum est æquale triangulo HKB. parallelogrammum autẽ DG est æquale parallelogrammo HN. Eadem ratione & AFG triangulum æquale est triangulo LMN. est autem parallelogrammum CF parallelogrammo BM, & parallelogrammũ CG parallelogrammo BN æquale: opposita enim sunt. ergo & prisma contentum duobus triangulis AFG DEC, & tribus parallelogrammis AD DG GC est æquale prismati, quod duobus triangulis LMN HBK, & tribus parallelogrammis BM NH BN continetur. commune apponatur solidum, cuius basis quidem parallelogrammum AB, oppositum autem ipsi GEHM. ergo totum CM solidum parallelepipedum toti solido parallelepipedo CN est æquale. solida igitur parallelepipeda, quæ in eadem sunt basi, & eadem altitudine, quorum stantes sunt in eisdem rectis lineis, inter se sunt æqualia. quod demonstrare oportebat.



34. primi.

1. sexti.


34. huius.

THEOREMA XXV. PROPOSITIO XXX.

Solida parallelepipeda, quæ in eadem sunt basi, & eadem altitudine, quorum stantes non sunt in eisdem rectis lineis, inter se sunt æqualia.

Sint


Sint in eadem baſi AB ſolida parallelepipeda CM CN,& eadem altitudine, quorum ſtantes AF AG LM LN CD CE BH BK non ſint in eiſdem rectis lineis. Dico ſolidũ CM ſolido CN ęquale eſſe. producãtur enim NK DH & GE FM,cõueniantq; inter ſe in punctis RX: & adhuc producantur FM GE ad O P puncta: & AX LO CP BR iungantur. ſolidum CM, cuius baſis quidẽ ACBL parallelogrammum,oppoſitum autem ipſi FDHM eſt æquale ſolido CO,cuius baſis parallelogrammum ACBL, & ei oppoſitũ X P R O; in eadem enim ſunt baſi ACBL,& ipſorum ſtantes AF AX LM LO CD CP BH BR ſunt in eiſdem rectis lineis IO DR. Sed ſolidum CO, cuius baſis quidem parallelogrãmum ACBL, oppoſitum autem ipſi XPRO eſt æquale ſolido CN, cuius baſis ACBL parallelogrãmum, & ipſi oppoſitum GE KN. etenim in eadem ſunt baſi ACBL, & eorum ſtantes AG AX CẽCP LN LO BK BR ſunt in eiſdem rectis lineis GP NR. quare & CM ſolidum ſolido CN æquale erit. Solida igitur parallelepipeda,quæ in eadẽ ſunt baſi,& eadem altitudine,quorum ſtantes non ſunt in eiſdẽ rectis lineis,inter ſe ſunt ęqualia.quod demonſtrare oportebat.



Ex antecedente.

THEOREMA XXVI. PROPOSITIO. XXXI.

Solida parallelepipeda,quæ in æqualibus ſunt baſibus,& eadẽ altitudine inter ſe ſunt æqualia.




Sint in æqualibus baſibus AB CD ſolida parallelepipeda AE CF,& eadẽ altitudine. Dico ſolidum AE ſolido CF æquale eſſe. ſint autem primum ſtantes HK BE AG LM OP DF CΞ RS ad rectos angulos baſibus AB CD: angulus autem ALB angulo CRD ſit inæqualis,& producatur ipſi CR in directum RT: conſtituaturq; ad rectam lineam RT, & ad punctum in ipſa R, angulo ALB æqualis angulus RTY: & ponatur ipſi quidem AL æqualis RT, ipſi vero LB æqualis RY, & ad punctum Y ipſi RT parallela ducatur XY, compleaturq; baſis RX, & ϒY ſolidum. quoniam igitur duæ TR RY duabus AL LB æquales ſunt, & angulos continent æquales; erit parallelogrammum RX ęquale & ſimile parallelogrammo HL. Et quoniam rurſus AL eſt æqualis RT, & LM ipſi RS, angulosq; ęquales continẽt, parallelogrammum Rϒ parallelogrammo AM æquale & ſimile erit. Eadem ratione LE parallelogrammum ipſi SY ęquale eſt & ſimile. tria igitur parallelogrãma ſolidi AE tribus parallelogrammis ſolidi ϒY æqualia & ſimilia ſunt. Sed & tria trĩ

bus


23.primi.

1.diffi. ſexti.

bus oppoſitis æqualia ſunt & ſimilia, totum igitur AE ſolidum parallelepipedũ toti ſolido parallelepipedo τ Y eſt æquale. producantur DR XY, conueniantq; inter ſe in pũcto Ω, & per T ipſi D Ω parallela ducatur TQ; & producãtur TQ OD, & cõueniant in V, compleanturq; ſolida Ωτ R I. ſolidum igitur Φ Ω cuius baſis eſt Rτ parallelogrammum, oppoſitum autem ipſi Ωτ eſt æquale ſolido τ Y, cuius baſis eſt Rτ parallelogrammum, & oppoſitum ipſi γΦ, in eadem enim ſunt baſi Rτ, & eadem altitudine, & eorum ſtantes RΩ RY TQ TX SZ SN Φτ τΦ in eiſdẽ ſunt rectis lineis ΩXZΦ. Sed ſolidum τγ æquale eſt ſolido AE. ergo & τΩ ſolido AE eſt 24. huius. 29. huius.




æquale. præterea quoniam parallelogrammum RYXT eſt æquale parallelogrammo ΩT, etenim in eadem eſt baſi RT, & in eiſdem parallelis RT ΩX. Sed parallelogrammum RYXT parallelogrammo CD eſt æquale, quoniam & ipſi AB; parallelogrammumq; ΩT æquale parallelogrammo CD: aliud autem parallelogrammum DT eſt igitur vt CD baſis ad baſim DT, ita ΩT ad ipſam DT. Et quoniam ſolidum parallelepipedum CI plano RF ſecatur planis oppoſitis parallelo; erit vt CD baſis ad baſim DT, ita ſolidum CF ad RI ſolidum. Eadem ratione quoniam ſolidum parallelepipedum ΩI ſecatur plano Rτ oppoſitis planis parallelo, vt ΩT baſis ad baſim CD, ita erit ſolidum Ωτ ad RI ſolidum. ſed vt CD baſis ad baſim DT, ita baſis ΩT ad ipſam TD. Vt igitur ſolidum CF ad RI ſolidum, ita ſolidum Ωτ ad ſolidum RI. Quòd cum utrumque ſolidorum CF Ωτ ad ſolidum RI eandẽm habeat proportionem, ſolidum CF ſolido Ωτ eſt æquale. ſolidum autem Ωτ oſtenſum eſt æquale ſolido AE. ergo & AE ipſi CF æquale erit. ſed non ſint ſtantes AG HK BE LM CN OP DF RS ad rectos angulos ipſis AB CD baſibus. Dico rurſus ſolidum AE æquale eſſe ſolido CF. Ducãtur à punctis K E G M P F N S ad ſubiectum planum perpendiculares K Ξ ET GY MΦ PX Fτ NΩ SI, & plano in punctis Ξ T Y Φ X τ Ω I occurãt, & iungantur Ξ T YΦ XY TΦ Xτ XΩ ΩI τI. æquale igitur eſt KΦ ſolidum ſolido PI; in æqualibus enim ſunt baſibus KM PS, & eadem altitudine; quorum ſtantes ad rectos angulos ſunt baſibus. ſed KΦ ſolidum ſolido AE eſt æquale: ſolidum vero PI æquale ſolido CF. ſi quidem in eadem ſunt baſi, & eadem altitudine, quorum ſtantes non ſunt in eiſdem rectis lineis. ergo & ſolidum AE ſolido CF æquale erit. Solida igitur parallelepipeda, quę in æqualibus ſunt baſibus, & eadem altitudine, inter ſe ſunt æqualia. quod demonſtrare oportebat. 9. quint. 4. huius. Ex proxime demõſtratis. 30. huius.



THEOREMA XXVII. PROPOSITIO. XXXII.

Solida parallelepipeda, quę eandem habent altitudinem inter ſe ſunt vt baſes.



Sint ſolida parallelepipeda AB CD, quæ eádem altitudinem habeant. Dico inter ſe eſſe vt baſes. hoc eſt vt AE baſis ad baſim CF, ita ſolidum AB ad CD ſolidum. applicetur enim ad rectam lineam FG parallelogrammo AE ęquale FH, & à baſi FH eadem altitudine ipſi CD ſolidum parallelepipedum GK compleatur. ſolidum igitur AB ſolido GK eſt æquale; in ęqualibus enim ſunt baſibus AE FH, & eadem altitudine. Itaque quoniam ſolidum parallelepipedum CK plano DG ſecatur, oppoſitis planis parallelo; erit vt HF baſis ad baſim FC, ita ſolidum HD ad DC ſolidum, atque eſt baſis quidem FH baſi AE æqualis: ſolidum vero GK æquale ſolido AB. eſt igitur & vt AE baſis ad baſim CF, ita ſolidum AB ad ſolidum CD. Quare ſolida parallelepipeda, quæ eandem habent altitudinem inter ſe ſunt vt baſes. quod demonſtrare oportebat.

Ex antecedente 25. huius.

F. C. COMMENTARIVS.

Conſtat etiam ſolida parallelepipeda in eadem baſi, vel in ęqualibus baſibus conſtituta eam inter ſe proportionem habere, quam altitudines.

Quod nos demonſtrauimus in libro de centro grauitatis ſolidorum, propoſitione XIX.

COROLLARIVM.


Ex his igitur & iam demonſtratis ſequitur priſmata triãgulares baſes habentia, quę vel in eiſdem, vel æqualibus baſibus conſtituũtur, & eadem altitudine inter ſe æqualia eſſe. Et inſuper quæ eandem habent altitudinem inter ſe eſſe, vt baſes. Et quę vel in eiſdem vel æqualibus baſibus conſtituuntur, inter ſe eſſe, vt altitudines.

28. huius. *Sunt enim ea ſolidorum parallelepipedorum dimidia. per baſes autem priſmatis intelligimus non quaſcunque, ſed alterum duntaxat oppoſitorum planorum ſimilium & parallelorum, vt nũc in priſmate triangularem baſim habente, alterum triangulum, alioquin obſtarent, quae in vltima propoſitione huius traduntur.*

THEOREMA XXVIII. PROPOSITIO XXXIII.

Similia ſolida parallelepipeda inter ſe ſunt in tripla proportione homologorum laterum.

Sint ſimilia ſolida parallelepipeda AB CD; latus autem AE homologum ſit lateri CF. Dico ſolidum AB ad CD ſolidum triplam proportionem habere eius, quã habet AE ad CF. producantur enim EK EL EM in directum ipſis AE GE HE: & ipſi quidem CF æqualis ponatur EK, ipſi vero FN ęqualis EL; & adhuc ipſi FR ęqualis EM, & KL parallelogrammum, & KO ſolidum compleatur. Quoniam igitur duę KE EL duabus CF FN æquales ſunt; ſed & angulus KEL angulo CFN eſt ęqualis; quod & angulus AEG ipſi CFN ob ſimilitudinem ſolidorum AB CD: erit & KL parallelogrammum ſimile parallelogrammo CN. Eadem ratione & parallelogrammum



mum KM æquale eſt & ſimile parallelogrammo CR, & adhuc parallelogrammum OE ipſi DF parallelogrammo. tria igitur parallelegramma ſolidi KO tribus parallelogrammis CD ſolidi æqualia & ſimilia ſunt. Sed tria tribus oppoſitis æqualia ſũt & ſimilia. totum igitur KO ſolidum æquale eſt & ſimile toti ſolido CD. compleatur GK parallelogrãmũ; & à baſibus quidẽ GK KL parallelogrãmis, altitudine vero eadẽ ipſi AB ſolida cõpleãtur AX LP. Et qm̃ ob ſimilitudinẽ ſolidorũ AB CD eſt vt AE ad CF, ita EG ad FN, & EH ad FR; æqualis aũt EC ipſi EK, & FN ipſi EL, & FR ipſi EM: erit vt AE ad EK, ita GE ad EL, & HE ad EM. ſed vt AE quidẽ ad EK, ita AG parallelogrammum ad parallelogrammum GK: vt autem GE ad EL, ita GK ad KL: & vt HE ad EM, ita PE ad KM. & vt igitur AG parallelogrammum ad parallelogrammum GK, ita GK ad KL, & PE ad KM. ſed vt AG quidem ad GK, ita AB ſolidum ad ſolidũ EX: vt autem GK ad KL, ita ſolidum XE ad PL ſolidum: & vt PE ad KM, ita PL ſolidum ad ſolidum KO. & vt igitur ſolidum AB ad ſolidum EX, ita EX ad PL, & PL ad KO. ſi autem quattuor ſint magnitudines deinceps proportionales prima ad quartam triplam proportionem habet eius, quàm ad ſecundam. ergo & AB ſolidum ad ſolidum KO triplam habet proportionem eius, quam AB ad EX. ſed vt AB ad EX, ita AG parallelogrammum ad parallelogrammum GK; & AE recta linea ad ipſam EK. quare & AB ſolidum ad ſolidum KO triplam proportionem habebit eius, quã AE habet ad EK. æquale autem eſt ſolidum KO ſolido CD, & recta linea EK rectæ CF eſt æqualis. ergo & AB ſolidum ad ſolidum CD triplam habet proportionẽ eius, quam latus ipſius homologum AE habet ad CF homologum latus. quod demonſtrare oportebat.

14 huius.

1. ſexti.

Ex antecedente.

11. quinti.

11. diffi quinti.

Ex antecedente.

1. ſexti.

COROLLARIVM.

Ex hoc manifeſtum eſt, ſi quattuor rectæ lineæ proportionales fuerint, vt prima ad quartam, ita eſſe ſolidum parallelepipedum, quod fit à prima ad ſolidum, quod à ſecunda ſimile, & ſimiliter deſcriptum; quoniam & prima ad quartam triplam proportionẽ habet eius, quam ad ſecundam.


F. C. COMMENTARIVS.

Ex proxime demonſtratis, ſequitur priſmata ſimilia, quę triangulares baſes habent in tripla eſſe proportione homologorum laterum.

Sint ſimilia priſmata triangulares baſes habentia, & ſimiliter poſita AF GN, & priſmatis quidem AF baſis ſit triangulum ABC, & quod ipſi oppoſitum DEF: priſmatis uero GN baſis ſit triangulum GHK, & ipſi oppoſitum LMN. Sit autem latus AB homologum lateri GH. Dico priſma AF ad priſma GN triplam habere proportionem eius, quam habet AB ad GH. Com-


pleantur enim ſolida parallelepipeda, & ſit ſolidi quidē parallelepipedi AF baſis quadrilaterum ABCO, & ipſi oppoſitum quadrilaterū DEFP ſolidi vero parallelepipedi GN baſis ſit quadrilaterū GHKQ, & quod ipſi opponitur LM NR. Itaque qm̄ priſma AF ponitur ſimile priſmati GN, erit parallelogrāmum AEED ſimile parallelogrammo GHML. quare & ipſi oppoſitum parallelogrāmum OCFP ſimile erit parallelogrammo QKNR. & eadem ratione demonſtrabitur parallelogrammum AOPD ſimile ipſi GQRL. ſolidum igitur parallelepipedum AF ſimile eſt ſolido parallelepipedo GN. ſimilia autem ſolida parallelepipeda in tripla ſunt proportione homologorū laterū. quare & ipſorum dimidia in eadē proportione erūt. priſma igitur AF ad priſma GN triplā proportionē habebit eius, quam habet AB ad GH. quod oportebat demonſtrare.

9.diff.huius
24.huius.



THEOREMA XXIX. PROPOSITIO XXXIIII.


Aequalium ſolidorum parallelepipedorum baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent: & quorum ſolidorum parallelepipedorum baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent, ea inter ſe ſunt æqualia.



Sint æqualia ſolida parallelepipeda AB CD. Dico ipſorum baſes ex contraria parte altitudinibus reſpōdere: hoc eſt vt EH baſis ad baſim NP, ita eſſe altitudinem ſolidi CD ad ſolidi AB altitudinem. Sint enim primū ſtantes AG EF LB HK CM NX OD FR ad rectos angulos baſibus ipſ rū. Dico ut EH baſis ad baſim NP, ita eſſe CM ad AG. Si igitur baſis EH baſi NP ſit ęqualis, eſt autem & AB ſolidum æquale ſolido CD; erit & CM æqualis ipſi AG. ſi enim baſibus EH NP æqualibus exiſtentibus non ſint AG CM altitudines ęquales, neque AB ſolidum ſolido CD æquale erit. ponitur autem æquale. non igitur inæqualis eſt altitudo CM altitudini AG. ergo æqualis ſit neceſſe eſt; ac propterea vt EH baſis ad baſim NP, ita erit CM ad AG. ex quibus conſtat ſolidorum parallelepipedorum AB CD baſes ex contraria parte altitudinibus reſponderе. At vero non ſit baſis EH æqualis baſi NP. Sed EH ſit maior. eſt autem & AB ſolidum ſolido CD æquale. ergo maior eſt CM ipſa AG; alioqui rurſus ſequeretur ſolida AB CD æqualia non eſſe, quæ ponuntur ęqualia. Itaque ponatur CT æqualis ipſi AG: & à baſi quidem NP, altitudine autem CT ſolidum parallelepipedum VC compleatur. Quoniam igitur ſolidum AB ſolido CD eſt æquale, aliud autem aliquod eſt VC, & æqualia ad idem eandem habēt proportionem; erit vt AB ſolidum ad ſolidum CV, ita CD ſolidum ad ſolidum CV. ſed vt AB ſolidum ad ſolidum CV, ita baſis EH ad NP baſim ęquealta enim ſunt AB CV ſolida. Vt autem ſolidum CD ad ipſum CV, ita MP baſis ad baſim PT, & MC ad CT. & vt igitur baſis EH ad NP baſim, ita MC ad CT. eſt autem CT æqualis AG. ergo & vt EH baſis ad baſim NP, ita


7.quinti.
32.huius.
25 huius.
1.ſexti.

NP, ita MC ad AG. quare ſolidorum parallelepipedorum AG CD baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent. Rurſus ſolidorum parallelepipedorum AB CD baſes ex contraria parte reſpondeant altitudinibus: ſitq; vt EH baſis ad baſim MP, ita ſolidi CD altitudo ad altitudinẽ ſolidi AB. Dico ſolidum AB ſolido CD æquale eſſe. Sint enim rurſus ſtãtes ad rectos angulos baſibus. & ſi quidem baſis EH ſit æqualis baſi NP, eſtq; vt EH baſis ad baſim NP, ita altitudo ſolidi CD ad ſolidi AB altitudinem: erit ſolidi CD altitudo altitudini ſolidi AB æqualis. ſolida autem parallelepepida, quæ ſunt in æqualibus baſibus, & eadem altitudine inter ſe æqualia ſunt. ergo ſolidum AB ſolido CD eſt æquale. ſed nõ ſit EH baſis æqualis baſi NP, & ſit EH maior. maior igitur eſt & ſolidi CD altitudo altitudine ſolidi AB, hoc eſt CM ipſa AG. ponatur ipſi AG æqualis rurſus CT, & ſimiliter ſolidum CV compleatur. Itaque quoniam eſt vt EH baſis ad baſim NP, ita MC ad ipſam AC; æqualis autem eſt AG ipſi CT: erit vt baſis EH ad NP baſim, ita MC ad CT. ſed vt baſis EH ad NP baſim, ita AB ſolidum ad ſolidum CV; æquealta enim ſunt ſolida AB CA. vt autem MC ad CT, ita & MP baſis ad baſim PT, & ſolidum CD ad CV ſolidum & vt igitur ſolidum AB ad ſolidum CV, ita CD ſolidum ad ſolidum CV. Quòd cum vtrumque ſolidorum AB CD ad ipſum CV eandẽ proportionẽ habeat; erit AB ſolidũ ſolido CD æquale. quod demonſtrare oportebat.



30. huius.


Non ſint autem ſtãtes FE BL GA KH XN DO MC RP ad rectos angulos baſibus ipſorum: & à punctis F G B K X M D R ad plana baſium EH NP ducantur perpẽdiculares, quę planis in punctis S T Y V Q Z Ω Φ occurant & cõpleantur ſolida FVXΩ. Dico & ſic æqualibus exiſtentibus ſolidis AB CD, baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondere, & vt EH baſis ad baſim NP, ita eſſe altitudinem ſolidi CD ad ſolidi AB altitudinem. Quoniam enim ſolidum AB ſolido CD eſt æquale; ſolido autem AB æquale eſt ſolidum BT; in eadem namq; ſunt baſi FK, & eadem altitudine; quorum ſtantes non ſunt in eiſdem rectis lineis: & ſolidum DC eſt æquale ſolido D Z, quòd in eadem ſint baſi XR, & eadem altitudine, quorum ſtantes non ſunt in eiſdem rectis lineis; erit & ſolidum BT ſolido D Z æquale. æqualium autem ſolidorum parallelepipedorum, quorum altitudines baſibus ipſorum ſunt ad rectos angulos; baſes altitudinibus ex contraria parte reſpondent. eſt igitur vt FK baſis ad baſim XR, ita ſolidi DZ altitudo ad altitudinem ſolidi BT. atque eſt baſis quidem FK baſi EH æqualis, baſis vero XR æqualis baſi NP. quare vt EH baſis ad baſim NP, ita eſt altitudo ſolidi D Z ad ſolidi BT altitudinem. eędem autem ſunt altitudines ſolidorum DZ BT, itemq; ſolidorum DC BA. eſt igitur vt EH baſis ad baſim NP, ita ſolidi DC altitudo ad altitudinem ſolidi AB: ergo ſolidorum parallelepipedorum AB CD baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent. Rurſus ſolidorum parallelepipedorum AB CD baſes ex cõtraria parte reſpõdeant altitudinibus: ſitq; vt EH baſis ad baſim NP, ita altitudo ſolidi CD ad ſolidi AB altitudinem. Dico ſolidum AB ſolido CD æquale eſſe. Iiſdem namque conſtruc-



31. huius.

Ex ante demonſtratis.

ctis,




&is, quoniam vt EH basis ad basim NP, ita solidi CD altitudo ad altitudinẽ solidi AB; & basis quidem EH est æqualis basi FK; NP vero ipsi XR: erit vt FK basis ad basim XR, ita altitudo solidi CD ad solidi AB altitudinem. eædẽ autem sunt altitudines solidorum AB CD, & ipsorũ BT DZ. est igitur vt FK basis ad basim XR, ita solidi DZ altitudo ad altitudinem solidi BT. quare solidorũ BT DZ parallelepipedorũ bases ex contraria parte respondent altitudinibus; quorum autem solidorum parallelepipedorum altitudines sunt ad rectos angulos basibus ipsorum, & bases ex contraria parte altitudinibus respondent, ea inter se sunt æqualia. ergo BT solidum solido DZ est æquale. sed solidũ quidem BT æquale est solido BA, etenim in eadem sunt basi FK, & eadem altitudine, quorum stantes non sunt in eisdem rectis lineis: solidum vero DZ est æquale solido DC, si quidem in eadem sunt basi XR, & eadem altitudiue, & non in eisdem rectis lineis. ergo & solidũ AB solido CD est æquale. quod demonstrare oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

Ex ijs, quę ante dictâ sunt, illud etiam demonstrari potest.

Aequalium prismatum & triangulares bases habentium bases ex cõtraria parte altitudinibus respondent: & quorum prismatum triangulares bases habentium, bases ex contraria parte altitudinibus respondent, ea inter se sunt æqualia.




Sint prismata, quae triangulares bases habent AF GN inter se aequalia. Dico bases ex contraria parte altitudinibus respondere, hoc est vt triangulum ABC ad triangulum GHK, ita esse prismatis GN altitudinem ad altitudinem prismatis AF. Compleantur enim solida parallelepipeda, quę etiam inter se æqualia erũt, cum sint prismatum dupla: æqualium autem solidorum parallelepipedorum bases ex contraria parte altitudinibus respondent. ergo vt solidi parallelepipedi AF basis ad basim solidi parallelepipedi GN, hoc est vt quadrilaterum ABCO ad quadrilaterum GHKQ, ita est solidi parallelepipedi GN altitudo ad altitudinem. solidi parallelepipedi AF. sed vt quadrilaterum ABCO ad quadrilaterum GHKQ, ita triangulum ABC ad triangulum GHK. Vt igitur triangulum ABC ad triangulum GHK, ita altitudo solidi parallelepipedi GN ad altitudinẽ solidi parallelepipedi AF, hoc est ita prismatis GN altitudo ad altitudinẽ prismatis AF. Rursus prismatum AF GN bases ex cõtraria parte respondeant altitudinibus, hoc est vt triangulũ ABC ad triangulũ GHK, ita sit prismatis GN altitudo ad altitudinem prismatis AF. Dico prismata AF GN inter se aequalia esse. compleantur enim rursus solida parallelepipeda, erit quadrilaterum ABCO ad quadrilaterum GHKQ, vt triangulum ABC ad

15. quinti.

ad triãgulum GHK. quare vt ſolidi parallelepipedi AF baſis ad baſim ſolidi parallelepipedi GN, ita erit priſmatis GN altitudo ad altitudinẽ priſmatis AF, hoc eſt, ita ſolidi parallelepipedi GN altitudo ad altitudinem ſolidi parallelepipedi AF. quorum autem ſolidorum parallelepipedorum baſes ex cõtraria parte altitudinibus reſpondent, ea inter ſe ſunt æqualia. ergo et æqualia erunt eorum dimidia. priſma igitur AE priſmati GN eſt æquale. quod demonſtrare oportebat.

THEOREMA XXX. PROPOSITIO XXXV.

Si ſint duo anguli plani æquales, & in verticibus ipſorum ſublimes rectæ lineæ conſtituantur, quæ cum rectis lineis à principio poſitis angulos contineant æquales, alterum alteri; in ſublimibus autem ſumantur quæuis puncta, atque ab ipſis ad plana in quibus ſunt anguli primi perpendiculares ducantur; & à punctis, quæ à perpendicularibus fiunt in planis ad primos angulos iungantur rectæ lineæ: cum ſublimibus æquales angulos continebunt.



Sint duo anguli rectilinei æquales BAC EDF: & à punctis AD ſublimes rectæ lineæ AG DM conſtituantur, quæ cum rectis lineis à principio poſitis æquales angulos contineãt, alterum alteri: angulum quidem MDE æqualem angulo GAB, angulum vero MDF angulo GAC æqualem: & ſumantur in ipſis AG DM quæuis puncta G M, à quibus ad plana per BAC EDF ducantur perpendiculares GL MN, occurrentes planis in punctis L N; & L A ND iungantur. Dico angulum GAL angulo MDN æqualem eſſe. ponatur ipſi DM æqualis AH, & per H ipſi GL parallela ducatur HK. eſt autem GL perpendicularis ad planum per BAC. ergo & HK ad planum per BAC perpendicularis erit. Ducantur à punctis K N ad rectas lineas AB AC DF DE perpendiculares KC NF KB NE, & HC CB MF FE iungantur. Quoniam igitur quadratum ex HA æquale eſt quadratis ex HK KA; quadrato autem ex HA æqualia ſunt ex KC CA quadrata; erit quadratum ex HA quadratis ex HK KC CA æquale. quadratis autem ex HK KC æquale eſt quadratum ex HC. quadratum igitur ex HA quadratis ex HC CA æquale erit: & idcirco angulus H C A eſt rectus. Eadem ratione & angulus D F M rectus eſt. ergo angulus A C H ipſi D F M eſt æqualis. eſt autem & H A C angulus æqualis angulo M D F. duo igitur triangula ſunt MDF HAC duos angulos duobus angulis æquales habentia, alterum alteri, & vnum latus vni lateri æquale, quod vni æqualium angulorum ſubtenditur; uidelicet HA ipſi DM. ergo & reliqua latera reliquis lateribus æqualia habebunt, alterum alteri. quare A C eſt æqualis D F. Similiter demonſtrabimus & AB ipſi DE æquale eſſe. iungantur HB ME. Et quoniam quadratum ex AH eſt æquale quadratis ex AK KH; quadrato autem ex AK æqualia ſunt quadrata ex AB BK: erunt quadrata ex AB BK KH quadrato ex AH æqualia. Sed quadratis

8. huius.


47. primi.

47. primi.

48. primi.

26. primi.

dratis ex BK KH æquale est ex BH quadratum; rectus enim angulus est HKB, propterea quòd & HK perpendicularis est ad subiectum planum. quadratũ igitur ex
48.primi. AH æquale est quadratis ex AB BH. quare angulus ABH rectus est. Eadem ratione & angulus DEM est rectus. est autem & BAH angulus æqualis angulo EDM, ita
26.primi. enim ponitur: atque est AH æqualis DM. ergo & AB ipsi DE est æqualis. Quoniam igitur AC quidem est æqualis DF, AB vero ipsi DE; erunt duæ CA AB duabus FD DE æquales. Sed & angulus BAC angulo FDE
4.primi. est æqualis. basis igitur BC basi EF, & triangulum triangulo, & reliqui anguli reliquis æquales sũt. ergo angulus ACB angulo DFE. est autem & rectus ACK æqualis recto DFN. quare & reliquus BCK reliquo EFN æqualis. Eadem ratione & CBK angulus est æqualis angulo FEN. Itaque duo triangula sunt BCK EFN duos angulos duobus angulis æquales habentia, alterum alteri, & vnum latus vni lateri æquale, quod est ad æquales angu-



26.primi. los, videlicet BC ipsi EF. ergo & reliqua latera reliquis lateribus æqualia habebũt. æqualis igitur est CK ipsi FN. est autem & AC ipsi DF æqualis. quare duæ AC CK
4.primi. duabus DF FN æquales sunt, & rectos continent angulos. basis igitur AK est æqualis basi DN. Et cum AH sit æqualis DM, erit & quod fit ex AH quadratum quà-
47.primi. drato ex DM æquale. Sed quadrato ex AH æqualia sunt ex AK KH quadrata; etenim rectus est angulus AKH. quadrato autem ex DM æqualia sunt quadrata ex DN NM, quòd angulus DNM rectus sit. quadrata igitur ex AK KH quadratis ex DN NM sunt æqualia; quorum quadratum ex AK æquale est quadrato ex DN. ergo reliquum ex KH quadratum reliquo quadrato ex NM est æquale. & ideo recta linea HK ipsi MN æqualis. quòd cum duæ HA AK duabus MD DN æquales sint, altera
8.primi. alteri, & basis HK basi NM ostensa sit æqualis; angulus HAK angulo MDN æqualis erit. quod oportebat demonstrare.

COROLLARIVM.


Ex hoc manifestum est, si sint duo anguli plani rectilinei æquales, ab ipsis autem constituantur sublimes rectæ lineæ æquales, quę cum rectis lineis à principio positis æquales contineant angulos, alterum alteri; perpendiculares, quę ab ipsis ad plana in quibus sunt primi anguli ducantur, inter se æquales esse.

THEOREMA XXXI. PROPOSITIO XXXVI.

Si tres rectę lineę proportionales sint, solidum parallelepipedũ, quod à tribus fit æquale est solido parallelepipedo, quod fit à media, æquilatero quidem, æquiangulo autem antedicto.

Sint

Sint tres rectæ lineæ proportionales A B C, sitq; vt A ad B, ita B ad C. Dico solidum, quod fit ex ipsis ABC æquale esse solido, quod fit ex B, æquilatero quidem, æquiangulo autem antedicto. Exponatur solidus angulus ad E contentus tribus an-



gulis planis DEG GEF FED; & ipsi quidem B ponatur æqualis vnaquæque ipsarum DE GE EF, & solidum parallelepipedum EK compleatur: ipsi vero A ponatur æqualis LM; & ad rectam lineam LM, & ad punctum in ipsa L constituatur angulo solido ad E æqualis angulus contentus NLX XLM MLN, & ponatur ipsi quidem B æqualis LX, ipsi vero C æqualis LN. Quoniam igitur est vt A ad B, ita B ad C, æqualis autem est A ipsi LM, & B vnicuique ipsarum LX EF EG ED, & C ipsi LN; erit vt LM ad EF, ita DE ad LN: & circum æquales angulos MLN DEF, latera ex cõtraria parte sibi ipsis respondent. ergo MN parallelogrammum parallelogrammo DF est æquale. Et quoniam duo anguli plani rectilinei æquales sunt DEF NLM, & in ipsis sublimes rectæ lineæ constituuntur LX EG æquales inter se, & cum rectis lineis à principio positis æquales, continentes angulos, alterum alteri; erunt perpendiculares, quæ à punctis G X ad plana per NLM DEF ducuntur, inter se æquales. ergo solida LH EK eadem sunt altitudine. Quæ vero in æqualibus basibus sunt solida parallelepipeda, & eadem altitudine inter se sunt æqualia. ergo solidum HL æquale est solido EK: atque est solidum quidem HL, quod fit à tribus ABC, solidum vero EK quod fit ex B. Si igitur tres rectæ lineæ proportionales sint, solidum parallelepipedum, quod à tribus fit æquale est solido parallelepipedo, quod fit à media, æquilatero quidem, æquiangulo autem antedicto: quod demonstrare oportebat.

26. huius.


14. vnde.

Ex antecedenti.

31. huius.


THEOREMA XXXII. PROPOSITIO XXXVII.

Si quattuor rectæ lineæ proportionales sint, & quæ ab ipsis fiũt solida parallelepipeda similia & similiter descripta proportionalia erunt. Et si quæ ab ipsis fiunt solida parallelepipeda similia & similiter descripta pportionalia sint; & ipsæ rectæ lineæ proportionales erunt.



Sint quattuor rectæ lineæ proportionales A B C D E F G H, sitque vt A B ad C D, ita E F G H, & describãtur ab ipsis AB CD EF GH similia & similiter posita solida parallelepipeda K A L C M E N G. Dico vt K A ad L C, ita esse M E ad N G. Quo-

33. huius. niam enim ſolidum parallelepipedum KA ſimile eſt ipſi LC, habebit KA ad LC triplam proportionem eius, quam AB habet ad CD. Eadé ratione & ſolidum ME ad ipſum NG triplam proportionem habebit eius, quam habet EF ad GH: atque eſt vt AB ad CD, ita EF ad GH. Vt igitur AK ad LC, ita ME ad NG. Sed ſit vt ſolidum AK ad ſolidum LC, ita ME ſolidum ad ſolidum NG. Dico vt recta linea AB ad rectam CD, ita eſſe rectam EF ad ipſam GH. Quoniam enim rurſus AK ad LC triplam proportionem habet eius, quam AB habet ad CD; habet autem & ME ad NG triplam proportionem eius, quam EF ad GH; atque vt AK ad LC, ita ME ad NG: erit vt AB ad CD, ita EF ad GH. Si igitur quattuor rectæ lineæ proportionales ſint & reliqua. quod oportebat demonſtrare.




THEOREMA XXXIII. PROPOSITIO XXXVIII.

Si planum ad planum rectum ſit, & ab aliquo puncto eorum, quæ ſunt in vno plano ad alterum planum perpendicularis ducatur, ea in communem planorum ſectionem cadet.


Planum enim CD ad planum AB rectum ſit; cõis aũt eorum ſectio ſit AD; & in ipſo CD plano quod uis punctum E ſumatur. Dico perpendicularem, quæ à puncto E ad planum AB ducitur, cadere in ipſam AD. Non enim, ſed ſi fieri poteſt, cadat extra, ut EF; & plano AB in puncto F occurrat: à puncto autem F ad DA in plano AB perpendicularis ducatur FG, quæ quidem & plano CD ad rectos angulos erit; & EG iũgatur. qm igitur FG plano CD eſt ad rectos angulos; contingit autem ipſam rectam lineam EG, quæ eſt in eodem CD plano: erit angulus FGE rectus. ſed & EF plano AB ad rectos angulos eſt. rectus igitur eſt angulus EFG. quare trianguli EFG duo anguli duobus rectis ſunt æquales; quod eſt abſurdum. non igitur à puncto E ad AB planum perpendicularis ducta extra rectam lineam DA cadet. ergo in ipſam eadat neceſſe eſt. Si igitur planum ad planum rectum ſit, & reliqua. quod oportebat demonſtrare.

11. primi.



F. C. COMMENTARIVS.

Poſſumus & recta demõſtratione vti hoc modo. Sit rurſus CD planum ad planum AB rectum: communis autem ipſorum ſectio ſit AD; & in plano CD quod vis punctum E ſumatur. Dico perpendicularem, quę à puncto E ad planum AB ducitur cadere in rectam lineam AD. Ducatur à puncto E ad ipſam AD perpendicularis EF. Quoniam igitur planum CD ad planum AB rectum eſt, & commu-




ni planorum

ni planorum ſectioni ad rectos angulos in vno plano CD ducta eſt EF; erit EF reliquo plano AB ad rectos angulos. Quare à puncto E ad AB perpendicularis ducta in communem planorum ſectionem AD cadit. quod oportebat demonſtrare.

THEOREMA XXXIIII. PROPOSITIO XXXIX.

Si in ſolido parallelepipedo oppoſitorum planorum latera ſecẽtur bifariam, per ſectiones vero plana ducantur, cõis planorum ſectio, & ſolidi parallelepipedi diameter ſeſe bifariam ſecabunt.





In ſolido enim parallelepipedo AF oppoſitorum planorum CF AH latera bifariã ſecentur in punctis KLMNXPOR. & per ſectiones plana ducantur KN XR communis autem planorum ſectio YS, & ſolidi parallelepipedi diameter ſit DG. Dico YS DG ſeſe bifariam ſecare, hoc eſt YT quidem ipſi TS DT vero ipſi TG æqualem eſſe. Iungantur enim DY YE BS SG. Quoniam igitur DX parallela eſt ipſi OE, alterni anguli DXY YOE inter ſe æquales ſunt. Et quoniam DX quidem eſt æqualis OE XY vero ipſi YO, & angulos æquales continent; erit baſis DY æqualis baſi YE, & triangulum DXY triangulo YOE, & reliqui anguli reliquis angulis æquales. angulus igitur XYD eſt æqualis angulo OYE, & ob id recta linea eſt DYE. Eadem ratione & BSG recta eſt. atque eſt BS æqualis SG. Et quoniã CA ipſi DB æqualis eſt & parallela, ſed CA eſt æqualis & parallela ipſi EG; erit & DB ipſi EG æqualis & parallela & ipſas coniungũt rectæ lineæ DE GB. parallela igitur eſt DE ipſi BG. & ſumpta ſunt in vtraque ipſarum quæuis puncta DYGS, & iunctæ ſunt DG YS. ergo DG YS in vno ſunt plano. Quod cum DE ſit parallela BG, erit & EDT angulus angulo BGT æqualis, alterni enim ſunt. eſt autem & DTY angulus æqualis ipſi GTS. duo igitur ſunt triangula DTY GTS duos angulos duobus angulis æquales habentia, & unum latus uni lateri æquale, quod uni æqualium angulorum ſubtenditur, uidelicet DY ipſi GS: dimidia enim ſunt ipſorum DE BG. ergo & reliquos angulos reliquis angulis æquales habebunt. quare DT quidem eſt æqualis TG, YT uero ipſi TS. Si igitur in ſolido parallelepipedo, & reliqua. quod oportebat demonſtrare.

29 primi.
4. primi.
14. primi.
9. huius.
33 primi.
7. huius.
29 primi.
15. primi.
26. primi.

THEOREMA XXXV. PROPOSITIO. XL.


Si ſint duo priſmata æquealta, quorũ vnũ quidẽ baſim habeat parallelogrãmũ; alterum vero triangulũ, & parallelogrammũ duplum ſit trianguli; ea inter ſe æqualia erunt.





Sint priſmata æquealta ABCDEF GHKLMN, &

unum quidem baſim habeat parallelogrammum AF, alterum uero GHK triangulum, & duplum ſit AF parallelogrammũ triãguli GHK. Dico priſma ABCDEF priſmati GHKLMN æquale eſſe. compleãtur enim AX GO ſolida. Et quoniam parallelogrãmum AF trianguli GHK



eſt duplum; eſt autem & HK parallelogrammum duplum triãguli GHK; erit AF parallelogrammum parallelogrammo HK æquale. Quæ uero in æqualibus ſunt baſibus ſolida parallelepipeda, & eadem altitudine inter ſe æqualia ſunt. æquale igitur AX ſolidum ſolido GO. atque eſt ſolidi quidem AX dimidium ABCDEF priſma, ſolidi uero GO dimidium priſma GHKLMN. ergo ABCDEF priſma priſmati GHKLMN eſt æquale. ſi igitur ſint duo priſmata æquealta, & reliqua. quod demonſtrare oportebat.

7. huius.

VNDECIMI LIBRI FINIS.

EVCLIDIS ELEMENTORVM

LIBER DVODECIMVS

ET SOLIDORVM SECVNDVS.

CVM SCHOLIIS ANTIQVIS ET COMMENTARIIS.


Federici Commandini Vrbinatis.


THEOREMA I. PROPOSITIO I.



SIMILIA polygona, quæ in circulis deſcribuntur, inter ſe ſunt, vt diametrorum quadrata.

Sint circuli ABCDE FGHKL, & in ipſis ſimilia polygona ABCDE FGHKL; diametri autem circulorum ſint BM GN. Dico vt quadratum ex BM ad quadratum ex GN, ita eſſe ABCDE polygonum ad polygonum FGHKL. Iungantur enim BE AM GL FN. Et quoniam polygonum ABCDE ſimile eſt polygono FGHKL; & BAE angulus angulo GFL eſt æqualis: atque eſt ut BA ad AE, ita GF ad FL. duo igitur triangula ſunt BAE GFL vnum angulum vni angulo æqualem habentia, videlicet angulum BAE angulo GFL: circa æquales autẽ angulos latera proportionalia. quare triangulum ABE triangulo FGL æquiangulum eſt; ac propterea angulus AEB æqualis eſt angulo FLG. Sed angulus quidem AEB angulo AMB eſt æqualis; in eadem enim circumferentia conſiſtũt. angulus autem FLG æqualis eſt angulo FNG. ergo & AMB angulus eſt æqualis angulo FNG. eſt autem & rectus angulus BAM æqualis recto GFN. quare & reliquus reliquo æqualis. æquiangulum igitur eſt triãgulum AMB triangulo FGN. ergo vt BM ad GN ita BA ad GF. Sed proportionis quidem BM ad GN dupla eſt proportio quadrati ex BM ad quadratũ ex GN; proportionis vero BA ad GF dupla eſt proportio ABCDE polygoni ad polygonum FGHKL: & vt igitur quadratum ex BM ad quadratum ex GN, ita polygonum ABCDE ad FGHKL polygonum. Quare ſimilia polygona, quæ in circulis deſcribuntur, inter ſe ſunt, vt diametrum quadrata.






21. tertii.

31. tertii.

THEOREMA II. PROPOSITIO. II.

Circuli inter ſe ſunt vt diametrorum quadrata.



Sint circuli ABCD EFGH : diametri autem ipſorũ ſint BD FH. Dico vt quadratum ex BD ad quadratum ex FH, ita eſſe circulum ABCD ad EFGH circulum. Si enim non ita eſt; erit vt quadratum ex BD ad quadratum ex FH, ita circulus ABCD vel ad ſpacium aliquod minus circulo EFGH, vel ad maius. Sit primum ad minus quod ſit S: & in circulo EFGH deſcribatur quadratum EFGH. Itaque deſcriptum in circulo quadratum maius eſt dimidio circuli EFGH; quoniam ſi per puncta EFGH contingentes circulum ducamus; erit deſcripti circa circulum quadrati dimidium quadratum EFGH. deſcripto autem circa circulum quadrato minor eſt circulus. ergo quadratum EFGH maius eſt dimidio circuli EFGH. ſecentur bifariam circumferentiæ EF, FG GH HE in punctis KLMN: & EK KF FL LG GM MH HN NE iungantur. Vnum quodque igitur triangulorum EKF FLG GMH HNE maius eſt dimidio portionis circuli in qua conſiſtit, quoniam ſi per puncta KLMN contingentes circulum ducamus, & parallelogramma, quę ſunt in rectis lineis EF FG GH HE cõpleamus; erit vnumquodque triãgulorum EKF FLG GMH HNE dimidium parallelogrammi, quod adipſum eſt: ſed portio minor eſt parallelogrammo. quare vnumquodque triangulorum EKF FLG GMH HNE maius eſt dimidio portionis circuli, in qua conſiſtit. reliquas igitur circumferentias bifariam ſecantes, & iungentes rectas lineas: atque hoc ſemper facientes relinquemus tandẽ quaſdã circuli portiones, quę minores erũt exceſſu, quo circulus EFGH ipſum S ſpacium ſuperat. etenim oſtenſum eſt in primo theoremate decimi libri, duabus magnitudinibus inæqualibus expoſitis ſi à maiori auferatur maiuſquã dimidium, & ab eo, quod relinquitur, rurſus maiuſquàm dimidium, & hoc ſemper fiat; reliqui tandem magnitudinem aliquam, quę minori magnitudine expoſita ſit minor. Itaque relictæ ſint portiones circuli EFGH in rectis lineis EK KF FL LG GM MH HN NE, quæ maiores ſint exceſſu, quo circulus EFGH ipſum S ſpacium ſuperat. ergo reliquum EKFLGMHN polygonum maius erit ſpacio S. Deſcribatur etiam in circulo ABCD polygono EKFLGMHN ſimile polygonum AXBOCPDR. eſt igitur vt quadratum ex BD ad quadratum ex FH, ita polygonum AXBOCPDR ad EKFLGMHN polygonum. ſed & vt quadratum ex BD ad quadratum ex FH, ita ABCD circulus ad ſpacium S. ergo & vt circulus ABCD ad ſpacium S, ita polygonum AXBOCPDE ad EKFLGMHN polygonum; & permutando vt circulus ABCD ad polygonum, quod in ipſo eſt, ita ſpacium S ad polygonum EKFLGMHN. maior autem eſt circulus ABCD eo, quod in ipſo eſt polygono. quare & ſpacium S maius eſt polygono EKFLGMHN. ſed & minus, quod fieri non poteſt. Non igitur eſt vt quadratum ex BD ad quadratum ex FH, ita ABCD circulus ad ſpacium aliquod minus circulo EFGH. ſimiliter oſtendemus neque eſſe vt quadratum ex FH ad quadratum ex BD, ita circulum EFGH ad aliquod ſpacium minus circulo ABCD. Dico igitur neque eſſe vt quadratum ex BD ad quadratum ex FH, ita circulum ABCD ad aliquod ſpacium maius circulo EFGH. ſi enim fieri poteſt, ſit ad maius ſpaciũ S. erit igitur conuertendo ut quadratum ex FH ad quadratum eſt BD, ita ſpacium S ad ABCD circulum. ſed vt ſpacium S ad ABCD circulum, ita circulus EFGH ad aliquod ſpacium minus circulo ABCD, vt demonſtrabitur. ergo & vt quadratum


A Ex antecedenti.

B 11. quinti.

C

ex

ex FH ad quadratum ex BD, ita EFGH circulus ad aliquod ſpacium minus circulo ABCD, quod fieri non poſſe oſtenſum eſt. Nō igitur vt quadratum ex BD ad quadratū ex FH, ita eſt circulus ABCD ad ſpacium aliquod maius EFGH circulo. oſtenſum autem eſt neque ad minus. quare vt quadratum ex BD ad quadratum ex FH, ita erit ABCD circulus ad circulum EFGH. Circuli igitur inter ſe ſunt, vt diametrorum quadrata. quod oſtendere oportebat.



LEMMA


Itaque dico ſi ſpacium S ſit maius circulo EFGH, eſſe vt ſpacium S ad circulum ABCD, ita circulum EFGH ad ſpacium aliquod circulo ABCD minus.

Fiat enim, vt ſpacium S ad circulum ABCD, ita EFGH circulus ad ſpacium T. Dico ſpacium T circulo ABCD minus eſſe. Quoniam enim eſt vt ſpacium S ad circulum ABCD, ita EFGH circulus ad ſpacium T; erit permutando vt ſpacium S ad circulum EFGH, ita ABCD circulus ad ſpacium T. maius autem eſt ſpacium S circulo EFGH. ergo & ABCD circulus ſpacio T eſt maior; ac propterea vt ſpaciū S ad circulum ABCD, ita eſt EFGH circulus ad ſpacium aliquod circulo ABCD minus.

F. C. COMMENTARIVS.

Erit deſcripti circa circulum quadrati dimidium quadratum EFGH. A

Deſcribatur circa circulum EFGH quadratum TVZY, nempe ductis per EFGH puncta rectis lineis, quae circulum contingant, vt ex 9. quarti libri apparet. erit TV ipſius TE dupla. Iungantur enim EG FH ſeſe in puncto Q ſecantes, quae circuli diametri erunt: atque erit Q circuli cētrum. angulus igitur QEV eſt rectus. 18. tertij. *ſed & rectus EQH; ſi quidē duae FQ QE aequales ſunt duabus HQ QE; & baſis EF aequalis baſi EH. ergo angulus FQE angulo HQE eſt aequalis: & ob id vterque rectus. ex quibus ſequitur* 8. primi: 28. primi. *rectam lineam TEV ipſi FQH parallelam eſſe. & eadem ratione oſtendentur TFY, VHZ parallelae ipſi EQG: & inter ſeſe. parallelogramma igitur ſunt FV VG FE EH. Quòd cum FQ ſit aequalis QH, erit ēt TE ipſi EV aequalis: ideoq; TV eſt dupla ipſius TE. ſimiliter demonſtrabimus & TY ipſius TF duplam. cumq; TY TV aequales ſint, erunt & earum dimidiae FT TE aequales. Et quoniam TV dupla eſt ipſius TE, quadratum ex TV quadrati ex TE quadruplū erit. ſimiles enim rectilineae figurae in duplā ſunt proportione homologorū laterū. ſed quadratū ex EF eſt aequale quadratis ex FT TE, quae quidem ſunt dupla quadrati ex TE. ergo quadratum ex EF, hoc eſt quadratum EFGH quadrati TVZY dimidium erit. quod oportebat demonſtrare.* 34. primi. Cor. 20 ſexti. 47. primi. B




Erit vnum quodque triangulorum CKF FLG GMH HNE dimidium parallelogrammi, quod ad ipſum eſt [*Ex 41 primi.*

SCHOLIVM.

Deſcribatur etiam in circulo ABCD polygono EKFLGMHN ſimile polygonum AXBOCPDR. C

In

In dato circulo, deſcripto in circulo polygono ſimile polygonum deſcribere.




Sint duo circuli, quorũ centra FG, & in circulo A B C D E polygonũ quoduis deſcribatur ABCDE, iũgãturq́; AF BF CF DF EF: in altero autem circulo ducatur à cẽtro G quędam recta linea vtcunque GH: & angulo quidem A FB cõſtituatur æqualis angulus HGK; angulo autem BFC angulus KGL, & angulo CFD angulus LGM, denique angulo DFE æqualis angulus MGN cõſtituatur. ergo reliquus AFE reliquo HGN eſt æqualis, & iungantur HK KL LM MN NH. eſt autem vt AF ad FB, ita HG ad GK; ſimilia enim ſunt AFB LGK triangula, quod oſtenſum eſt in theoremate ſexto ſexti libri elementorum. Vt igitur ſemidiameter circuli ad circuli ſemidiametrum, ita BA ad HK. ſimiliter oſtendemus & vnamquamque ipſarũ BC CD DE EA ad vnamquamque KL, LM MN NH eandem habere proportionem. & sũt æquales anguli polygonorum, quoniam & triangulorum anguli æquales ſunt. polygona igitur ABCDE HKLMN ſingulos angulos ſingulis angulis æquales habẽt: & circa æquales angulos latera proportionalia. ergo polygonũ ABCDE ſimile eſt polygono HKLMN. In dato igitur circulo HKLMN polygono ABCDE ſimile polygonum deſcriptum eſt. quod facere oportebat.

23. primi.
4. ſexti.
1. diffi. tertia

THEOREMA III. PROPOSITIO III.

Omnis pyramis triangularem habens baſim diuiditur in duas pyramides, æquales & ſimiles inter ſe, quæ triangulares baſes habent, ſimilesq́; toti; & in duo priſmata æqualia, quæ quidem priſmata dimidio totius pyramidis ſunt maiora.

Sit pyramis, cuius baſis quidem ABC triangulum; vertex autem punctum D. Dico pyramidem ABCD diuidi in duas pyramides æquales & ſimiles inter ſe, triangulares q́; baſes habentes, & ſimiles toti, & in duo priſmata æqualia; & duo priſmata dimidio totius pyramidis eſſe maiora. ſecentur enim AB BC CA AD DB DC bifariam in punctis E F G H K L, & EH EG GH HK KL LH. EK KF FG iungantur. Quoniam igitur AE quidem eſt æqualis EB, AH vero ipſi HD; erit EH ipſi DB parallela. Eadem ratione & HK eſt parallela ipſi AB. parallelogrammum igitur eſt HEBK. quare HK eſt æqualis EB. Sed EB ipſi A E eſt æqualis. ergo & A E ipſi H K æqualis erit. eſt autẽ & AH æqualis HD. duę igitur AE AH duabus KH HD æquales ſunt, altera alteri, & angulus E A H æqualis angulo KHD. baſis igitur E H baſi K D eſt æqualis. quare triangulum AEH æquale eſt & ſimile triangulo HKD. Eadem ratione & triangulum AHG triangulo HLD æquale eſt & ſimile. Et quoniam duæ rectæ lineæ ſe ſe tangentes EH HG duabus rectis lineis ſeſe tangentibus KD DL parallelæ ſunt, non autem in eodẽ plano, æquales angulos continebunt. ergo angulus EHG eſt æqualis angulo KDL.



2. ſexti.
34. primi.
29. primi.
4. primi.
10. undecimi

KDL. Rursus quoniam duæ rectæ lineæ EH HG duabus KD DL æquales sunt, altera alteri, & angulus EHG est æqualis angulo KDL; erit basis EG basi KL æqualis: æquale igitur est & simile triangulum EHG triangulo KDL. Eadem ratione & AEG triangulum est æquale & simile triangulo HKL, quare pyramis, cuius basis quidē est AEG triangulum, vertex autem punctum H æqualis & similis est pyramidi, cuius basis est triangulum HKL & vertex D punctum. Et quoniam vni laterum trianguli ADB, videlicet ipsi AB parallela ducta est HK, erit triangulū ADB triāgulo DHK æquiāgulū, & latera habēt proportionalia. Simile igitur est ADB triāgulū triāgulo DHK. & eadē ratione triangulū quidē DBC simile est triangulo DKL; triangulū vero ADC triangulo DHL. quòd cùm duæ rectæ lineæ se se tangentes BA AC duabus rectis lineis se se tangentibus KH HL parallelæ sint, non existentes in eodem plano, æquales angulos continebunt: angulus igitur BAC angulo KHL est æqualis: atque est ut BA ad AG, ita KH ad HL. ergo ABC triangulum simile est triāgulo HKL; ideoq; pyramis, cuius basis quidem triangulum ABC, uertex autem punctum D, similis est pyramidi cuius basis triangulum HKL, & uertex punctum D, sed pyramis cuius basis quidem HKL triangulum, uertex autem punctum D, ostensa est similis pyramidi, cuius basis triangulum AEG, & uertex H punctum. Quare & pyramis cuius basis triangulum ABC & uertex punctum D similis est pyramidi cuius basis AEG triangulum, & uertex punctum H. Vtraque igitur ipsarum AEG H HKLD pyramidum similis est toti pyramidi ABCD. Et quoniam BF est æqualis FC, erit EBFG parallelogrammum duplum triāguli GFC. & quoniam duo prismata æquealta sunt, quorum vnum quidem basim habet parallelogrammum, alterum vero triangulum, estq; parallelogrammum duplum trianguli; erunt ea prismata inter se æqualia. ergo prisma contentum duobus triangulis BKF EHG, & tribus parallelogrāmis EBFG EBKH KHFG est æquale prismati, quod duobus triangulis GFC HKL, & tribus parallelogrammis KFCL LCGH HKFG continetur. & manifestum est vtrumque ipsorum prismatum, & cuius basis est EBGF parallelogrammum, opposita autem ipsi HK recta linea: & cuius basis est GFC triangulum, & oppositum ipsi triangulum KLH, maius esse vtraque pyramidum, quarum bases quidem AEG HKL triangula, uertices autem puncta H D; quoniam si iungamus EF EH rectas lineas, prisma quidem, cuius basis est EBFG parallelogrammum, & opposita ipsi recta linea HK maius est pyramide, cuius basis EBF triangulum, uertex autem punctum K. sed pyramis, cuius basis triangulum EBF, & uertex K punctū est æqualis pyramidi, cuius basis AEG triangulum, & uertex punctum H; æqualibus enim & similibus planis cōtinentur. quare & prisma, cuius basis parallelogrammū EBFG, oppositaq; autē ipsi recta linea HK maius est pyramide, cuius basis AEG triāgulum, & uertex punctum H. prisma verò cuius basis parallelogrammum EBFG & opposita ipsi recta linea HK est æquale prismati, cuius basis GFC triangulum, & ipsi oppositum triangulum HKL. & pyramis cuius basis triangulum AEG, vertex autem H punctum, est æqualis pyramidi, cuius basis HKL triangulum & uertex punctū D. ergo duo prismata de quibus dictū est, sunt maiora duabus dictis pyramidibus quorū bases triāgula AEG HKL, uertices autem H D puncta. tota igitur pyramis cuius basis ABC triangulum, uertex autem punctum D, diuisa est in duas pyramides æquales, & similes inter se, & similes toti: & in duo prismata æqualia: suntq; duo prismata dimidio totius pyramidis maiora. quod ostendere oportebat.

4. primi.

10. undecimi.

A

B

C

10 diffi. undecimi.

F. C. COMMENTARIVS.

Et quoniam BF est æqualis FC, erit EBFG parallelogrammum duplum trianguli GFC] *Iuncta enim EF quoniam BF est aequalis FC, & LG parallela ipsi EC, erit triangulum BEF aequales triāgulo FGC. sed parallelogrammum EBFC duplum est trianguli BEF. ergo & ipsius FGC trianguli duplum erit.*

A

28. primi.

41. primi.


Erunt in prismata inter se æqualia] *Ex vlt. vndecimi libri.*

B

C. Priſma quidē cuius baſis eſt EBFG parallelogrāmū. & oppoſita ipſi rectilinea H K, maius eſt pyramide, cuius baſis EBF triangulum, vertex autem pūctum K]*Euclides totum eſt ſua parte maius; eſt enim pyramis ipſius priſmatis pars quędam. ſed inferius ex ijs, quae in 7. huius demonſtrantur, apparebit tertiam partē eſſe, cum ſit tertia pars priſmatis, cuius baſis G FC triangulum, & oppoſitum ipſi triangulum KLH.*

THEOREMA IIII. PROPOSITIO IIII.

Si ſint duę pyramides æquealtæ, quæ triangulares baſes habeant, diuidatur autem vtraque ipſarum, & in duas pyramides æquales inter ſe, ſimileſq; toti, & in duo priſmata æqualia, & factarum pyramidum vtraque eodem modo diuidatur, atque hoc ſemper fiat; erit vt vnius pyramidis baſis ad baſim alterius, ita & in vna pyramidē priſmata omnia ad priſmata omnia in altera pyramidem, altitudine æqualia.



Sint duæ pyramides æquealtæ, quæ triangulares baſes habeāt A BC DEF, uertices autem ſint pūcta GH, & diuidatur vtraque ipſarum in duas pyramides æquales inter ſe, ſimileſq; toti, & in duo priſmata æqualia, & factarum pyramidum vtraque eodem modo diuiſa intelligatur: atq; hoc ſēper fiat. Dico vt ABC baſis ad baſim DEF ita eſſe priſmata oia, quę ſunt in pyramide A B C ad priſmata omnia, quæ in pyramide DEF multitudine æqualia. Quoniam enim BX quidem eſt æqualis XC, AL vero æqualis LC; erit XL ipſi AB parallela, & triangulum ABC triangulo LXC ſimile. Eadem ratione & triangulum DEF ſimile eſt triangulo RQF. Et quoniam BC quidem eſt dupla CX; EF vero dupla ipſius FQ, vt BC ad CX, ita erit EF ad FQ. & deſcripta ſunt ab ipſis BC CX ſimilia & ſimiliter poſita rectilinea ABC LXC; ab ipſis vero EF FQ ſimilia & ſimiliter poſita rectilinea DEF RQF. eſt igitur ut BAC triangulum ad triangulum LXC, ita triangulum DEF ad RQF triangulum; & permutando ut triangulum ABC ad triangulum DEF, ita LXC triangulum ad triangulum RQF. ſed ut LXC triangulum ad triangulum RQF, ita priſma cuius baſis eſt triangulum LXC, oppoſitum autem ipſi OMN ad priſma cuius baſis RQF triangulum, & oppoſitum ipſi STY. & ut igitur ABC triangulum ad triangulum DEF, ita priſma, cuius baſis eſt triangulum LXC, oppoſitum autem ipſi OMN ad priſma, cuius baſis RQF triangulum, & oppoſitum ipſi STY. Et quoniam duo priſmata, quæ in pyramide ABCG inter ſe æqualia ſunt, ſed & quæ in pyramide DEFH priſmata inter ſe ſunt æqualia; erit ut priſma, cuius baſis parallelogrammum KLXB, oppoſita uero ipſi recta linea MO ad priſma cuius baſis LXC triangulum, & oppoſitum ipſi OMN, ita priſma cuius baſis parallelogrammum EPRQ & oppoſita ipſi recta liuea ST ad priſma cuius baſis RQF triangulum, oppoſitum uero ipſi STY. quare cōponēdo vt priſmata KBXLMO LXCMNO ad priſma LXCMNO, ita priſmata PEQRST RQFSTY ad priſma RQFSTY. & permutando ut priſmata KBXLOMN LXCOMN ad priſmata PEQRST RQFSTY; ita priſma LXC MNO

1. ſexti.

2. ſexti.

11. quinti.

MNO ad prisma RQFSTY. Vt autem prisma LXCMNO ad prisma RQFSTY, ita ostensa est basis LXC ad RQF basim, & ABC basis ad basim DEF. ergo & ut triangulum ABC ad triangulum DEF, ita quę in pyramide ABCG duo prismata ad duo prismata, quæ in pyramide DEFH. similiter autē & si factas pyramides diuidamus eodem modo velut OMNG STYH, erit ut OMN basis ad basim STY, ita quæ in pyramide OMNG duo prismata ad duo prismata, quæ in pyramide STYH. sed ut OMN basis ad basim STY, ita basis ABC ad DEF basim. & ut igitur ABC basis ad basim DEF, ita quę in pyramide ABCG duo prismata ad duo prismata quæ in pyramide DEFH; & quæ in pyramide OMNG duo prismata ad duo prismata, quę in pyramide STYH; & quattuor ad quattuor. eadem autem ostendentur & in factis prismatibus ex diuisione pyramidum AKLO, & DPRS & omnium simpliciter multitudine æqualium.

LEMMA.

At vero vt LXC triangulum ad triangulum RQF, ita esse prisma, cuius basis triangulum LXC, oppositum autem ipsi OMN ad prisma, cuius basis RQF triangulum, & oppositum ipsi STY, hoc modo ostendemus.

In eadē enim figura intelligātur ab ipsis G H punctis perpendiculares ductæ ad ABC DEF triangulorū plana, quę inter se ęqnales erunt; propterea quod pyramides ipsæ ęquealtę ponuntur. Et quoniam duę rectæ lineæ GC, & perpendicularis à puncto G ducta secantur à parallelis planis ABC OMN, in easdem proportiones secabuntur. & secatur GC bifariam à plano OMN in puncto N. ergo & à puncto G ducta perpendicularis ad ABC planum bifariam secabitur à plano OMN. Eadē ratione & quæ à puncto H ducitur perpendicularis ad DEF planum à plano STY bifariam secabitur. & sunt æquales perpendiculares, quę ab ipsis GH ducuntur ad plana ABC DEF. ergo & æquales quę à triangulis OMN STY ad ipsa ABC DEF perpendiculares ducuntur. ęquealta igitur sunt prismata, quorum bases triangula LXC RQF. opposita autem ipsis OMN STY. quare & solida parallelepipeda, quæ à dictis prismatibus describuntur ęquealta, inter se sunt ut bases, & eorū dimidia ut LXC basis ad basim RQF, ita inter se dicta prismata erūt. quod demonstrare oportebat. 15. quinti.

F. C. COMMENTARIVS.


Sed ut LXC triangulum ad triangulum RQF, ita prisma cuius basis est triangulum LXC, oppositum autem ipsi OMN ad prisma cuius basis RQF triangulum & oppositum ipsi STY] *Hoc ēt cōstare pōt ex corollario, quod nos ad 32 vndecimi conscripsimus.*

THEOREMA V. PROPOSITIO. V.

Pyramides, quæ eadem sunt altitudine, & triangulares bases habent, inter se sunt vt bases.

Sint enim eadem altitudine pyramides, quarum bases quidem triāgula ABC DEF, uertices autem puncta G H. Dico ut ABC basis ad basim DEF, sic esse pyramidem ABCG ad DEFH pyramidem. Si enim non ita sit, erit ut ABC basis ad basim DEF, sic ABCG pyramis, uel ad solidum minus pyramide DEFH, uel ad maius. Sit primum ad solidum minus, sitq; Z: & diuidatur pyramis DEFH in duas pyramides æquales inter se, & similes toti, & in duo prismata æqualia. sunt igitur duo prismata dimidio totius pyramidis maiora. & rursus pyramides ex diuisione factæ similiter diuidantur, atque hoc semper fiat, quo ad sumantur quædam pyramides à pyrami

de DEFH,quæ ſint minores exceſſu,quo pyramis DEFH ſolidum Z ſuperat. Itaque ſumantur,& ſint exempli cauſſa pyramides DPRS STYH. erunt igitur reliqua in



pyramide DEFH priſmata ſolido Z maiora.Diuidatur etiam ABCG pyramis in totidem partes ſimiliter pyramidi DEFH. ergo vt ABC baſis ad baſim DEF, ita quæ in pyramide ABCG priſmata ad priſmata quæ in pyramide DEFH; ſed vt ABC baſis ad baſim DEF,ita pyramis ABCG ad ſolidum Z. & ut igitur ABCG pyramis ad ſolidum Z,ita quæ in pyramide ABCG priſmata ad priſmata,quæ in pyramide DEFH:& permutando ut ABCG pyramis ad priſmata, quæ in ipſa ſunt, ita ſolidum Z ad priſmata, quę in pyramide DEFH. maior autem eſt pyramis ABCG priſmatibus,quæ in ipſa ſunt.ergo & ſolidum Z priſmatibus, quæ ſunt in pyramide DEFH eſt maius.ſed & minus,quod fieri non poteſt. Non igitur vt ABC baſis ad baſim DEF,ita eſt pyramis ABCG ad ſolidum aliquod minus pyramide DEFH. ſimiliter oſtendemus neque ut DEF baſis ad baſim ABC,ita eſſe pyramidem DEFH ad ſolidum aliquod pyramide ABCG minus. Dico igitur neque eſſe vt ABC baſis ad baſim DEF,ita ABCG pyramidem ad aliquod ſolidũ maius pyramide DEFH.ſi enim fieri poteſt,ſit ad maius,uidelicet ad ſolidum I.erit igitur conuertendo vt DEF baſis ad baſim ABC,ita ſolidum I ad ABCG pyramidem. Vt autem ſolidum I ad ABCG pyramidem, ita DEFH pyramis ad ſolidum aliquod minus pyramide ABCG, vt proxime oſtenſum fuit.& ut igitur DEF baſis ad baſim ABC,ita pyramis DEFH ad ſolidum aliquod pyramide ABCG minus. quod eſt abſurdum. non igitur ut ABC baſis ad baſim DEF,ita eſt ABCG pyramis ad ſolidum aliquod maius pyramide DEFH.oſtenſum autem eſt,neque ad minus. quare vt ABC baſis ad baſim DEF, ita eſt pyramis ABCG ad DEFH pyramidem. Pyramides igitur,quæ eadem ſunt altitudine,& triangulares baſes habent inter ſe ſunt vt baſes.quod demonſtrare oportebat.

Ex'antecedenti.


THEOREMA VI. PROPOSITIO VI.

Pyramides,quæ eadem ſunt altitudinę, & multiangulas baſes habent,inter ſe ſunt, vt baſes.

Sint eadem altitudine pyramides, quæ multiangulas baſes habeant ABCDE FGHKL:uertices autem MN puncta.Dico vt ABCDE baſis ad baſim FGHKL, ita eſſe ABCDEM pyramidem ad pyramidem FGHKLM.Diuidatur enim baſis quidem ABCDE in triangula ABC ACD ADE; baſis uero FGHKL diuidatur in triangula FGH FHK FKL.et in uno quoque triangulo intelligantur pyramides æqualtę; ac pyramides,quę à principio. Quoniam igitur eſt ut triangulum ABC ad triangulum

lum ACD, ita ABCM pyramis ad pyramidē ACDM: & componendo ut ABCD trapeziū ad triangulum ACD, ita ABCDM pyramis ad pyramidē ACDM. ſed & ut ACD triangulum ad triangulum ADE, ita pyramis ACDM ad ADEM pyramidem. ergo ex æquali ut ABCD baſis ad baſim ADE, ita ABCDM pyramis ad pyramidem ADEM: & rurſus componendo ut ABCDE baſis ad baſim ADE, ita ABCDEM pyramis ad pyramidem ADEM. Eadem ratione & ut FGHKL baſis ad baſim FKL, ita & FGHKLN pyramis ad FKLN pyramidem. & quoniam duæ pyramides ſunt ADEM FKLN, quæ triangulares baſes habent & eadem ſunt altitudine; erit ut ADE baſis ad baſim FKL, ita ADEM pyramides ad pyramidem FKLN. Quòd cū ſit ut ABCDE baſis ad baſim ADE, ita ABCDEM pyramis ad pyramidē ADEM; ut aūt ADE baſis ad baſim FKL, ita ADEM pyramis ad pyramidē FKLN: erit ex æquali ut baſis ABCDE ad FKL baſim, ita ABCDEM pyramis ad pyramidem FKLN. ſed et ut FKL baſis ad baſim FGHKL, ita erat et FKLN pyramis ad pyramidem FGHKLN. quare rurſus ex æquali ut ABCDE baſis ad baſim FGHKL, ita eſt ABCDEM pyramis ad pyramidē FGHKLN. Pyramides igitur, quæ eadem ſunt altitudine, et multiangulas baſes habent inter ſe ſunt, ut baſes. quod oportebat demonſtrare.

Ex antecedente.




F. C. COMMENTARIVS.

Idem etiam demonſtrabitur, ſi baſes inæqualibus numero lateribus contineantur. Sint enim pyramides aequealtae ABCDLEFGHKM, ſitq; pyramidis ABCDL baſis quadrilaterum ABCD, & vertex L; pyramidis vero EFGHKM baſis ſit pentagonum EEGHK, & vertex L. Dico vt quadrilaterum ABCD ad pentagonum EFGHK, ita eſſe ABCDL pyramidem ad pyramidem EFGHKM. Iungantur AC EG EH. erit quadrilaterum ABCD diuiſum in duo triangula ABC ACD, & pentagonum diuiſum in tria triangula EFG EGH EHK. Itaque intelligentur ab vnoquoque triangulo pyramides aequealtę primis pyramidibus. Et quoniam eſt ut triangulum ABC ad triangulum ACD, ita pyramis ABCL ad pyramidem ACDL; erit componendo vt quadrilaterum ABCD ad triangulum ACD, ita pyramis ABCDL ad pyramidem ACDL. Eadem ratione demonſtrabimus in altera pyramide ut quadrilaterum EFGH ad triangulum EGH, ita eſſe pyramidem EFGHM ad pyramidem EGHM: vt autem triangulum EGH ad triangulum EHK, ita eſt pyramis EGHM ad pyramidem EHKM. quare ex æquali vt quadrilaterum EFGH ad triangulum EHK, ita eſt pyramis EFGHM ad piramidem EHKM: & rurſus componendo vt pentagonum EFGHK ad triangulum EHK, ita tota pyramis EFGHKM ad pyramidem EHKM: conuertendoq; vt triangulum EHK ad pentagonum EFGHK, ita pyramis EHKM ad totam pyramidem EFGHKM. Sed vt triangulum ACD ad triangulum EHK, ita eſt pyramis ACDL ad pyramidem EHKM. erat autem ut quadrilaterum ABCD ad triangulū ACD ita pyramis ABCDL ad pyramidem ACDL. Quare rurſus ex æquali vt quadrilaterum ABCD ad pentagonum EFGHK, ita erit pyramis ABCDL

Ex antecedente.

Ex antecedenti.




BCDL ad pyramidem EFGH KM. Et eodem modo in alijs demonſtrabitur, quotcunque lateribus baſes earum contineantur.

THEOREMA VII. PROPOSITIO. VII.

Omne priſma triangularem habens baſim diuiditur in tres pyramides æquales inter ſe, quę triangulares baſes habent.

Sit priſma cuius baſis quidem triangulum ABC, oppoſitũ autem ipſi DEF. Dico priſma ABCDEF diuidi in tres pyramides æquales inter ſe, quæ triangulares habent baſes. Iungantur enim BD EC CD. Et quoniam parallelogrammum eſt A BED, cuius diameter BD, erit ABD triangulum triangulo E BD æquale. ergo pyramis cuius baſis triangulum ABD, vertex autem punctum C æqualis eſt pyramidi, cuius baſis E D B triangulum & vertex punctum C. Sed pyramis cuius baſis ED B triangulum & vertex punctum C, eadem eſt pyramidi, cuius baſis triangulum EBC, & vertex D punctum, ijſdem enim planis continentur. Ergo & pyramis cuius baſis triangulũ ABD, vertex autem punctũ C æqualis eſt pyramidi, cuius baſis EBC triangulum, & vertex pũctum D. Rurſus quoniam FCBE parallelogrammum eſt, cuius diameter CE, triangulum ECF triangulo CBE eſt æquale. ergo & pyramis, cuius baſis BEC triangulum, vertex autem punctum D æqualis eſt pyramidi, cuius baſis triãgulum ECF, & vertex punctum D. Sed pyramis, cuius baſis quidem BCE triangulum, vertex autem punctum D oſtenſa eſt æqualis pyramidi, cuius baſis triã gulum ABD, & vertex C punctum. quare & pyramis cuius baſis triangulum CEF, & vertex punctum D, æqualis eſt pyramidi cuius baſis triangulum ABD, & vertex C punctum. Priſma igitur ABCDEF diuiditur in tres pyramides inter ſe æquales, quæ triangulares baſes habent. Et quoniam pyramis, cuius baſis ABD triangulum, vertex autem punctum C, eadem eſt pyramidi, cuius baſis triangulum CAB, & vertex D punctum, ijſdem namque planis continentur: pyramis aũt, cuius baſis triangulum ABD, & vertex punctum C, tertia pars oſtenſa eſt priſmatis, cuius baſis AB C triangulum, & oppoſitum ipſi DEF. & pyramis igitur, cuius baſis triangulum A BC, vertex autem D punctum tertia pars eſt priſmatis eandem baſim habentis, videlicet ABC triangulum, & oppoſitum ipſi triangulum DEF.



34 primi.

4. huius.

COROLLARIVM.

Ex hoc manifeſtum eſt omnem pyramidem tertiam partem eſſe priſmatis baſim habentis eandem, & altitudinem æqualẽ; quoniam etiam ſi baſis priſmatis aliam quandam figuram rectilineam obtineat, & oppoſitam ipſi eandẽ, diuiditur in priſmata, quę triangulares baſes habent, & quę ipſis opponuntur.

F. C. COMMENTARIVS.

Ex hoc corollario, & antecedentibus ſequitur priſmata omnia, quę eadem ſunt altitudine inter ſe eſſe, vt baſes: ſunt enim ea pyramidum eiuſdẽ altitudinis tripla.

Sed & hęc uera ſunt, quę nos demonſtrauimus in libro de centro grauitatis ſolidorum propoſitione. XX. & XXI.

Priſmata omnia, & pyramides, quę in eiſdem, vel æqualibus baſibus conſtituuntur eam inter ſe proportionem habent, quam altitudines.


Et

Et insuper prismata omnia & pyramides inter se proportionem habent composi tam ex proportione basium & proportione altitudinum.

THEOREMA VIII. PROPOSITIO VIII.

Similes pyramides, quę triangulares bases habent in tripla sũt proportione homologorum laterum.

Sint similes, & similiter po sitæ pyramides, quarum ba ses quidem triangula ABC DEF, vertices autem GH puncta. Dico ABCG pyramidẽ ad pyramidem DEFH triplam proportionem habere eius, quam BC habet ad EF. compleatur enim BGML EHPO solida parallelepipeda. Et quoniam pyramis AB CG similis est pyramidi DEFH, erit angulus ABC angulo DEF æqualis, angulusq; GBC æqualis angulo HEF, & angulus ABG angulo DEH. atque est vt AB ad DE, ita BC ad EF, & BG ad EH. Quoniam igitur est vt AB ad DE, ita BC ad EF, & circum æquales angulos latera sunt proportionalia, parallelogrammum BM parallelogrammo EP simile erit. Eadem ratione & parallelogrammum BN simile est parallelogrammo ER, & parallelogrammum BK ipsi EX parallelogrāmo. Tria igitur parallelogramma BM KB BN, tribus EP EX ER sunt similia. Sed tria quidem MB BK BN tribus oppositis æqualia, & similia sunt, tria vero EP EX ER tribus oppositis æqualia, & similia. quare solida BGML EHPO similibus planis & numero æqualibus continentur; ac propterea simile est BGML solidum solido EHPO. Similia autem solida parallelepipeda in tripla sunt proportione homologorum laterum. ergo solidum BGML ad solidum EHPO triplã habet proportionem eius, quam habet latus homologum BC ad EF homologum latus. sed vt BGML solidum ad solidum EHPO, ita ABCG pyramis ad pyramidem DEFH; pyramis enim sexta pars est ipsius solidi, cum prisma quod est dimidium solidi parallelepipedi, sit pyramidis triplum. quare & pyramis ABCG ad pyramidem DEFH triplam proportionem habebit eius, quam BC habet ad EF.



9. diffi. Vndecimi.
1. diffi. sexti.
14. Vndecimi.


COROLLARIVM.

Ex hoc perspicuum est, & similes pyramides, quæ multiangulas bases habent inter se esse in tripla proportione homologorum laterum. ipsis enim diuisis in pyramides triangulares bases habẽtes, quoniam & similia polygona, quæ sunt in basibus in similia triangula diuiduntur, & numero æqualia, & homologa totis; erit vt vna pyramis in altera pyramide triangularem habens basim ad pyramidem in altera triangularem basim habentem, ita & omnes pyramides in pyramide altera triãgulares habentes bases ad omnes in altera triangulares bases habentes; hoc est ita pyramis ipsa multiangulam habens basim ad pyramidem, quæ multiangulam basim habet. Sed pyramis triangularem habens basim ad py-

ramidem

ramidem, quæ triangularem baſim habet eſt in tripla proportione homologorum laterum. & pyramis igitur multiangulam habes baſim ad pyramidem ſimilem baſim habentem, triplam proportionem habebit eius, quam latus homologum habet ad homologum latus.

F. C. COMMENTARIVS.



Sint enim pyramides ſimiles & ſimiliter poſitae, quae pro baſibus pentagona habeant ABCDEM FGHKLN, ſitq; pyramidis quidem ABCDEM baſis pentagonum ABCDE, & uertex punctum M, pyramidis vero FGHKLN baſis pentagonum FGHKL, & vertex N punctum, & ſit latus AB homologum lateri FG. Dico pyramidē ABCDEM ad pyramidem FGHKLN triplam proportionem habere eius, quam habet AB ad FG. Iungantur enim AC C. 12. sexti. *E FH HL. & quoniam polygona ſimilia in ſimilia triangula diuiduntur, numeroq; aequalia, & homologa totis; erit triangulum ABC ſimile triangulo FGH, triangulum ACE triangulo FHL ſimile, & triangulum CDE triangulo HKL. eſt autem ob* 9. diff. und. *pyramidum ſimilitudinem triangulum AMB ſimile triangulo FNG. quare vt MA ad AB, ita NF ad FG, vt autem BA ad AC, ita GF ad FH. ex aequali igitur vt MA ad AC, ita LF ad FH. non aliter demonſtrabitur vt MC ad CA, ita NH ad HF. ergo triangulum MAC ſimile eſt triangulo NFH. eſt autem & triangulum MBC ſimle triangulo NGH ob ſimilitudinem pyramidum. pyramis igitur, cuius baſis triangulum ABC & vertex M punctum, ſimilis eſt pyramidi, cuius baſis triangulum FGH, & vertex punctum N: quippe quod ſimilibus triangulis continentur. Eadem ratione demonſtrabitur pyramis ACEM ſimilis pyramidi FHLN, & pyramis CDEM pyramidi HKLN. ſed pyramis quidem ABCM ad pyramidem FGHN triplam habet proportionem eius, quam habet AB ad FG, & pyramis ACEM ad pyramidem FHLN triplam proportionem habet eius, quam AE habet ad FL, hoc eſt quam AB habet ad FG, eſt enim vt BA ad AE, ita GF ad FL, & permutādo vt BA ad GF, ita AE ad FL. pyramis autem CDEM ad pyramidem HKLN triplam proportionem habet eius, quam CD ad HK, hoc eſt quam AB ad FG. Quoniā enim vt AB ad BC, ita eſt FG ad GH, vt autem BC ad CD, ita GH ad HK; erit ex aequali vt AB ad CD, ita FG ad HK, & permutando vt AE ad FG, ita CD ad HK. Vt igitur vna antecedentium ad vnam conſequentium, hoc eſt pyramis ABCM ad pyramidem FGHN, ita omnes antecedentes ad omnes conſequentes, hoc eſt ita tota pyramis ABCDEM ad totam pyramidem FGHKLN. ergo & pyramis ABCDEM ad pyramidem FGHKLN triplam habebit proportionem eius, quam habet AB ad FG. quod demonſtrare oportebat.*

COROLLARIVM.


Ex his colligitur pyramides ſimiles, quæ multiangulas baſes habent diuidi in pyramides triangulares baſes habentes ſimiles, & numero æquales & homologas totis.

Sed

Sed quod Euclides demonſtrauit in pyramidibus ſimilibus, nos etiam in ſimilibus priſmatibus demonſtrare aggrediemur. & quamquam in antecedente libro à nobis demonſtratū ſit priſmata ſimilia, quae triangulares baſes habent in tripla eſſe proportione homologorum laterum, tamen hoc loco placuit illud etiam aliter demonſtrare in hunc modum.

THEOREMA. I.

Priſmata ſimilia, quæ triangulares baſes habẽt in pyramides ſimiles, numeroq; æquales diuiduntur, & priſma ad priſma triplam habet proportionem eius, quam latus homologum habet ad homologum latus.



Sint priſmata ſimilia, & ſimiliter poſita AEGM & priſmatis quidem AE baſis ſit triangulum ABC, & quod ipſi opponitur triangulum DEF: priſmatis vero GM baſis ſit GHK triangulum & oppoſitum ipſi LMN: ſitq; latus AB lateri GH homologum. Dico priſmata AE GM diuidi in pyramides ſimiles, numeroq; aequales, & priſma AE ad priſma GM triplã habere proportionem eius, quam habet AB ad GH. Iungantur enim BD EC CD HL MK KL. erit ex iam demonſtratis priſma AE diuiſum in tres pyramides æquales inter ſe, & priſma GM ſimiliter diuiſum in totidem pyramides aequales, quae pyramidibus priſmatis AE ſimiles erunt. Quoniam enim ob priſmatum ſimilitudinem parallelogrammum ABED ſimile eſt parallelogrammo GHML, erit vt DA ad AB, ita LG ad GH: atque eſt angulus DAB æqualis angulo LGH. triangulum igitur DAB triangulo LHG eſt ſimile. Eadem ratione & triangulum DEB triangulo LMH, & alia triangula, quae ſunt parallelogrammorum dimidia alijs triangulis, quibus reſpondent ſimilia demonſtrabuntur. Et quoniam vt DC ad CA, ita eſt LK ad KG; vt autem AC ad CB, ita GK ad KH: erit ex aequali ut DC ad CB, ita LK ad LH. Et ſimiliter demonſtrabitur vt DB ad BC, ita eſſe LH ad HK. quare triangulum DBC ſimile eſt triangulo LHK. Quòd cum triangulum DAB ſimile ſit triangulo LGH, triangulumq; DBC ſimile triangulo LHK, & triangulum DAC ipſi LGK; erit pyramis, cuius baſis triangulum AEC, vertex autem D punctum ſimilis pyramidi, cuius baſis triangulum GHK, & uertex punctum L. Eandem ob cauſſam erit pyramis cuius baſis triangulum EBC, & vertex D punctum, ſimilis pyramidi cuius baſis MHK triangulum, uertex autem punctum L, & adhuc pyramis, cuius baſis triangulum ECF, & uertex punctum D ſimilis pyramidi, cuius baſis triangulum MKN, & uertex L punctum. Quoniam igitur pyramis ABCD ſimilis eſt pyramidi GHKL, ſimiles autem pyramides ſunt in tripla proportione homologorum laterum; habebit pyramis ABCD ad pyramidem GHKL triplam proportionem eius, quam habet AB ad GH. Pyramis autem EBCD ad pyramidem MHKL triplam habet proportionem eius, quam BC habet ad HK, hoc eſt quam AB habet ad GH; eſt enim vt AB ad BC, ita GH ad HK: & permutando vt AB ad GH, ita BC ad HK. & ſimiliter pyramis ECFD ad pyramidem MKNL proportionem habet triplam eius, quam EF habet ad MN, hoc eſt BC ad HK, hoc eſt AB ad GH. Vt igitur vnum antecedentium ad vnum conſequentium, ita omnia antecedentia ad omnia conſequentia. Quare vt pyramis AECD ad pyramidem GHKL, ita totum priſma AE ad totum priſma GN. ſed pyramis ABCD ad pyramidem GHKL triplam habet proportionem eius, quam habet AB ad GH. Ergo & priſma AE ad priſma GM triplam proportionem habebit eius, quam AB ad GH.

9. diff. unde cimi.

6. ſexti.

9. diff. unde cimi.


15. quinti.

ALITER. Quoniã igitur pyramis ABCD ſimilis eſt pyramidi GHKL; ſimiles autem pyramides ſunt in tripla proportione homologorum laterum: habebit pyramis ABCD ad pyramidẽ GHKL triplam proportionẽ eius, quam AB habet ad GH. ſed vt pyramis ABCD ad pyramidem GHKL, ita priſma AE ad priſma GM, ſunt enim priſmata pyramidum tripla. ergo & priſma AE

ad prisma GM triplum proportionem habebit eius, quam habet AB ad GH. Prismata igitur similia, quae triangulares bases habent, diuiduntur in pyramides similes, numeroq; aequales, & prisma ad prisma triplum habet proportionem eius, quam latus homologum habet ad homologum latus, quod demonstrare oportebat.

THEOREMA. II.

Prismata similia, quę multāgulas habent bases in similia prismata triangulares bases habentia diuiduntur, numeroq; æqualia, & homologa totis: & prisma ad prisma triplam proportionem habet eius, quam latus homologum habet ad homologum latus.



Sint duo prismata similia, & similiter posita AK MV, & prismatis quidem AK basis sit pentagonum ABCDE, & ipsi oppositum FGHKL; prismatis uero MV basis sit pentagonum MNOPQ, & oppositum ipsi RSTVX: sitq; latus AB lateri MV homologum. Dico prismata AK MV diuidi in prismata, quae triangulares bases habent, similia & numero aequalia, & homologa totis; & prisma AK ad prisma MV triplam proportionem habere eius, quam habet AB ad MN. Iungantur EB EC LG LH QN QO XS XT. pētagonū igitur ABCDE diuisum erit in tria triangula ABE EBC ECD; pentagonumq; FGHKL diuisum in tria triangula FGL LGH LHK: & similiter pentagonum MNOPQ diuisum erit in tria triangula MNQ QNO QOP: & pentagonum RSTVX in totidem triangula RSX XST XTV. Intelligatur unumquodque prisma tū AK MV diuisū in tria prismata triangulares bases habentia ductis planis per LG GB, perq; LH HC, & per XS SN, & per XT TO. Quoniam igitur similia polygona in similia triangula diuiduntur, numeroq; aequalia, & homologa totis; erunt triangula ABE FGL similia triangulis MNQ RSX, & triangula EBC LGH triangulis QNO XST, triangulaq; ECD LHK ipsis QOP XTV similia. Et qm prisma AK ponitur simile prismati MV, parallelogrāmū ABGF simile erit parallelogrāmo MNSR, & parallelogrāmū AELF simile ipsi MQXR. quare ut LE ad EA, ita XQ ad QM: ut aūt AE ad EB, ita MQ ad QN. ex æquali igitur ut LE ad EB, ita XQ ad QN; ideoq; ut BG ad GL, ita NS ad SX, angulus autem LEB est aequalis angulo XQN ob similitudinē prismatum. si enim similibus existentibus prismatibus AK MV, angulus LEB non est aequalis angulo XQN, alter eorum maior erit. sit maior XQN, & ad rectam lineam BE, & ad punctum in ipsa E angulo NQX constituatur aequalis angulus BET, ut recta linea ET terminetur à plano pentagoni FGHKB in puncto T; & iungantur FT TK. erit pentagonum FGHKT simile pentagono RSTVX. sed & pentagonum FGHKL ponitur eidem simile. pentagonum igitur FGHKL simile est pentagono FGHKT. quare angulus FLK aequalis est angulo FTK. sed & maior. quod fieri nō potest. Non igitur similibus existentibus prismatibus angulus LEB inæqualis est angulo XQN. quare necessario est aequalis; & ob id angulus EBG aequalis est angulo QNS. ergo & qui ipsis opponuntur LGB GLE angulis XSN SXQ sunt aequales. parallelogrammum igitur BELG simile est parallelogrammo NQXS. Eadem ratione demonstrabitur parallelogrammum LECH simile parallelogrammo XQOT. ergo prisma AL, cuius basis triangulum ABE, & ipsi oppositum FGL simile est prismati MX, cuius basis triangulum MNQ, & oppositum ipsi RSX; similibus enim planis continentur. est autem ob prismatum similitudinem, & parallelogrammum BCHG simile parallelogrammo NOTS, & parallelogrammum EDKL simile ipsi QPVX. ergo & prisma BH, cuius basis triangulum EBC, & ipsi oppositum LGH est simile prismati NT, cuius basis triangulum QNO, & ipsi oppositum XST, & denique prisma CL cuius basis triangulum ECD, & oppositum ipsi LSK, simile est prismati OX, cuius basis triangulum QOP, & quod ipsi opponitur XTV. similia autem

10. sexti.

9. diffi. unde cimi.

1. diffi. sexti.


14. primi.

prismata

priſmata, quæ triangulares baſes habent ſunt in tripla proportione homologorum laterum, quod nos & ad 34. propoſitionem antecedentis libri, & proxime aliter demonſtrauimus. priſma igitur AL ad priſma MX triplam proportionem habet eius, quam habet AB ad MN, & priſma BH ad priſma NT triplam habet proportionem eius, quam BC habet ad NO, hoc eſt AB ad MN. priſma autem CL ad priſma OX triplam proportionem habet eius, quàm habet CD ad OP, hoc eſt AB ad MN ut ſupra demonſtrauimus. homologa enim latera omnia inter ſe eandem habent proportionem. Quare vt vnum antecedentium ad vnum conſequentium, ita omnia antecedentia ad omnia conſequentia. Vt igitur priſma AL ad priſma MX, ita omnia priſmata ad omnia priſmata, hoc eſt totum priſma AK ad totum priſma MV. priſma autem AL ad priſma MX triplam habet proportionem eius, quam habet AB ad MN, ergo & priſma AK ad priſma MV triplam proportionem habebit eius, quam AB ad MN. Similia igitur priſmata, quæ multiangulas habent baſes in ſimilia priſmata triangulares baſes habentia diuiduntur, numeroq; æqualia, & homologa totis; & priſmo ad priſma triplam proportionem habet eius, quam habet latus homologum ad homologum latus. quod oportebat demonſtrare.

THEOREMA IX. PROPOSITIO. IX.


Æqualium pyramidum, & triangulares baſes habentium baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent: & quarum pyramidum triangulares baſes habentium baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent, illæ ſunt æquales.




Sint enim pyramides æquales, quæ triangulares baſes habeant ABC DEF, vertices vero G H puncta. Dico pyramidum ABCG DEFH baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondere, & vt ABC baſis ad baſim DEF, ita eſſe pyramidis DEFH altitudinem ad altitudinem pyramidis ABCG. Cõpleantur enim BG ML EHPO ſolida parallelepipeda. Et quoniam pyramis ABCG eſt æqualis pyramidi DEFH, atque eſt pyramidis quidem ABCG ſextuplum BGML ſolidum, pyramidis vero DEFH ſextuplum ſolidum EHPO; erit ſolidum BGML. ſolido EHPO æquale. æqualium autem ſolidorum parallelepipedorum baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent. eſt igitur ut BM baſis ad baſim EP, ita EHPO ſolidi altitudo ad altitudinem ſolidi BGML. Sed ut BM baſis ad baſim EP, ita ABC triangulum ad triangulum DEF. ergo & vt ABC triangulum ad triangulum DEF, ita ſolidi EHPO altitudo ad altitudinem ſolidi BGML. Sed ſolidi quidem EHPO altitudo eadem eſt altitudini pyramidis DEFH; ſolidi vero BGML altitudo eadem eſt altitudini pyramidis ABCG. eſt igitur vt ABC baſis ad baſim DEF, ita pyramidis DEFH altitudo ad altitudinem pyramidis ABCG. quare pyramidum ABCG DEFH baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent. Sed pyramidum ABCG DEFH baſes ex contraria parte reſpondeant altitudinibus, ſitq; vt ABC baſis ad baſim DEF, ita pyramidis DEFH altitudo ad altitudinem pyramidis ABCG. Dico ABCG pyramidem pyramidi DEFH æqualem eſſe. iiſdem enim conſtructis, quoniam vt ABC baſis ad baſim DEF, ita eſt DEFH pyramidis altitudo ad altitudinem pyramimidis ABCG; vt autem ABC baſis ad baſim DEF, ita BM parallelogrãmũ ad parallelogrãmũ EP: erit & vt parallelogrãmũ BM ad EP parallelogrãmũ, ita pyramidis DEFG altitudo ad altitudinẽ pyramidis

15. quint.
34. undecimi.
15. quinti.
15. quinti.

midis ABCG. Sed pyramidis quidē DEFH altitudo eadē eſt altitudini ſolidi parallelepipedi EHPO; pyramidis vero ABCG altitudo eadem eſt altitudini ſolidi parallelepipedi BGML. eſt igitur vt BM baſis ad baſim EP, ita EHPO ſolidi parallelepipedi altitudo ad altitudinem ſolidi parallelepipedi BGML. Quorum autem ſolidorum parallelepipedorum baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent, ea ſunt æqualia. ſolidum igitur parallelepipedum BGML æquale eſt ſolido parallelepipedo EHPO atque eſt ſolidi quidem BGML ſexta pars pyramis ABCG; ſolidi vero EHPO itidem ſexta pars pyramis DEFH. ergo pyramis ABCG pyramidi DEFK eſt æqualis. Aequalium igitur pyramidum, & triangulares baſes habentium, baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent, & quarum pyramidum triangulares baſes habentium baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent illæ ſunt æquales. quod oportebat demonſtrare.






F. C. COMMENTARIVS.

Sed & in pyramidibus, quae multiangulas baſes habent idem demonſtrabitur hoc modo.

Aequalium pyramidum & multiangulas baſes habentium, baſes ex cōtraria parte altitudinibus reſpondent: & quarum pyramidum multiangulas baſes habentiū baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent, illæ ſunt æquales.

Sint pyramides aequales ABCDL EFGHKM, & pyramidis quidem ABCDL baſis ſit quadrilaterum ABCD, & vertex punctum L; pyramidis vero EFGHKM ſit baſis pentagonum EFGHK, & vertex M. Dico baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondere; hoc eſt quadrilaterum ABCD ad pentagonum EFGHK, ita eſſe vt pyramidis EFGHKM altitudo ad altitudinē pyramidis ABCDL. Fiat enim ex xxv. ſexti triangulum in quo N aequale quadrilatero ABCD: & rurſus fiat aliud triangulum in quo O aequale pentagono EFGHK, et à triangulo N erigatur pyramis æquealta pyramidi ABCDL: à triangulo autem O eriga tur alia pyramis aequealta pyramidi EFGHKM. erit igitur pyramis N aequalis pyramidi ABCDL: ſunt enim in baſibus aequalibus, & æqualem habent altitu

6. huius.



dinem


dinem: & ſimili ratione pyramis O æqualis erit pyramidi EFGHKM. ergo pyramis N pyramidi O eſt æqualis. æqualium autem pyramidum, & triangulares baſes habentium, baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent. Vt igitur triangulum N ad triangulum O, ita pyramidis O altitudo ad altitudinem pyramidis N. Sed vt triangulum N ad O triangulum, ita quadrilaterum ABCD ad pentagonum EFGHK, vtrumque enim vtrique eſt æquale. ergo vt quadrilaterum ABCD ad pentagonum EFGHK, ita pyramidis O altitudo ad altitudinem pyramidis N; hoc eſt altitudo pyramidis EFGHKM ad pyramidis ABCDL altitudinem. Sed iiſdem ſtantibus ſit ut quadrilaterum ABCD ad pentagonum EFGHK, ita pyramis EFGHKM altitudo ad altitudinem pyramidis ABCDL. Dico pyramidem ABCDL pyramidi EFGHKM æqualem eſſe. eſt enim ut quadrilaterum ABCD ad pentagonum EFGHK, ita triangulum N ad O triangulum. quare vt triangulum N ad triangulum O, ita pyramidis EFGHKM altitudo ad altitudinem pyramidis ABCDL, hoc eſt ita pyramidis O altitudo ad altitudinem pyramidis N. quarum autem pyramidum triangulares baſes habentium, baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent, illæ ſunt æquales. æqualis igitur eſt pyramis N pyramidi O; ac propterea pyramis ABCDL pyramidi EFGHKM eſt æqualis. Æqualium igitur pyramidum & multiangulas baſes habentium, & reliqua. quod demonſtrare oportebat.

COROLLARIVM.

Ex prædictis colligitur priſmatum omnium æqualium baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondere: & quorum priſmatum baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent, ea eſſe æqualia; priſmata enim in eiſdem baſibus conſtituta, & eadem altitudine ſunt pyramidum tripla.

THEOREMA X. PROPOSITIO X.


Omnis conus tertia pars eſt cylindri, qui eandem baſim habet & altitudinem æqualem.




Habeat enim conus eandem baſim, quam cylindrus, videlicet circulum ABCD, & altitudinem æqualem. Dico conum tertiam partem eſſe cylindri, hoc eſt cylindrum coni triplum eſſe. Si enim cylindrus nõ ſit triplus coni, vel maior erit, quàm triplus, uel minor. Sit primũ maior quàm triplus; & deſcribatur in ABCD circulo quadratum ABCD. ergo quadratum ABCD maius eſt, quàm dimidium A B C D circuli. & à quadrato ABCD erigatur priſma æquealtũ cylindro, quod quidem priſma maius erit, quàm cylindri dimidium; quoniam ſi circa circulum ABCD quadratum deſcribatur, erit inſcriptum quadratum dimidium circumſcripti: & ſunt ab eiſdem baſibus erecta ſolida parallelepipeda æquealta, nimirum priſmata ipſa, quare priſmata inter ſe ſunt vt baſes, & priſma igitur erectum à quadrato A B C D dimidium eſt priſmatis erecti à quadrato quod circa circulũ ABCD deſcribitur, atq; eſt cylindrus minor priſmate erecto à quadrato quod deſcribitur circa circulũ ABCD. priſma igitur erectũ à quadrato ABCD æquealtũ cylindro dimidio cylindri eſt maius. ſecentur circũferentiæ AB BC CD DA bifariã in punctis E F G H, & AE EB BF FC CG GD DH HA iungantur. Vnũquodq; igitur triangulorũ AEB BFC CGD DHA maius eſt dimidio portionis circuli ABCD, in qua cõſiſtit, vt ſuperius demonſtratũ eſt. erigantur ab vnoquoq; triangulorũ AEB BFC CGD DHA priſmata æquealta cylindro. ergo & vnumquodque erectorum priſmatum maius eſt dimidio portionis cylindri quæ ad ipſum eſt, quoniam ſi per puncta E F G H parallelę ipſis AB BC CD DA ducãtur, & compleatur in ipſis AB BC CD DA parallelogramma: à quibus ſolida parallele-

Ex coroll 7. huius.

parallelepipeda æqualta cylindro erigantur: erunt vniuſcuiuſque erectorum dimidia priſmata ea, quæ ſunt in triangulis AEB BFC CGD DHA. & ſunt cylindri portiones erectis ſolidis parallelepipedis minores. ergo & priſmata quæ in triangulis AEB BFC CGD DHA maiora ſunt dimidio portionum cylindri, qui ad ipſa ſunt. Itaque reliquas circumferentias ſecantes bifariam, iungentesq; rectas lineas, & ab vnoquoque triangulorum erigentes priſmata æqualta cylindro, & hoc ſemper faEx 1. decimi. cientes quoad tandem relinquantur quædam portiones cylindri, quæ ſint minores exceſſu; quo cylindrus ipſius coni triplum ſuperat. reliquantur iam & ſint AE EB BF FC CG GD DH HA. reliquum igitur priſma, cuius baſis quidem polygonũ AEBFCGDH, altitudo autem eadem, quę



Ex corol. 7. huius. cylindri, maius eſt, quàm triplum coni. Sed priſma cuius baſis AEBFCGDH polygonum, & altitudo eadem, quæ cylindri triplum eſt pyramidis, cuius baſis polygonum AEBFCGDH, uertex autem idem, qui coni. & pyramis igitur, cuius baſis polygonum AEBFCGDH, uertex autem idẽ qui coni, maior eſt cono, qui baſim habet ABCD circulum. Sed & minor; ab ipſo enim comprehenditur, quod fieri non poteſt. Non igitur cylindrus maior erit, quàm triplus coni. Dico inſuper neq; cylindrum minorem eſſe, quàm triplum coni, ſi enim fieri poteſt, ſit cylindrus minor, quàm triplus coni. erit conuertendo conus maior, quàm tertia pars cylindri. Deſcribatur in ABCD circulo quadratum ABCD, ergo quadratum ABCD maius eſt quã dimidiũ ABCD circuli; & à quadrato ABCD erigatur pyramis, uerticẽ habẽs eundẽ quẽ conus. pyramis igitur erecta maior eſt quàm coni dimidium: quoniam, vt ante demonſtrauimus, ſi circa circulum quadratum deſcribatur, erit quadratum ABCD dimidium eius, quod circa circulum deſcriptum eſt: & ſi à quadratis erigantur ſolida parallelepipeda æqualta cono, quæ & priſmata appellantur, erit quod à quadrato ABCD erigitur dimidium eius, quod erectum eſt à quadrato circa circulum



5. quinti. deſcripto, etenim inter ſe ſunt vt baſes. quare & tertiæ partes ipſarum. pyramis igitur, cuius baſis quadratum ABCD, dimidia eſt eius pyramidis, quæ à quadrato circa circulum deſcripto erigitur. Sed pyramis erecta à quadrato deſcripto circa circulum, maior eſt cono, ipſum namque comprehendit. ergo pyramis cuius baſis ABCD quadratum, vertex autem idẽ qui coni, maior eſt, quàm coni dimidium. ſecentur circumferentię AB BC CD DA bifariã in punctis EFGH. & iungãtur AE EB BF FC CG GD DH HA. & vnum quodque igitur triangulorum AEB BFC CGD DHA maius eſt, quàm dimidium portionis circuli ABCD, in qua conſiſtit. erigantur ab vnoquoque triangulorum AEB BFC CGD DHA pyramides verticem habentes eundem, quem conus. ergo & vnaquæque pyramidum eodem modo erectarum, maior eſt, quàm dimidium coni portionis, quæ eſt ad ipſam. Itaque reliquas circumferentias ſecantes bifariam, iungentesq; rectas lineas, & ab vnoquoque triangulorum erigentes pyramidem verticem habentem eundem, quem conus, & hoc ſemper facientes, relinquemus tandẽ quaſdam coni portiones, quę maiores erunt exceſſu, quo conus tertiam cylindri partem ſuperat. Relinquantur & ſint, quę in ipſis AE EB BF FC CG DH HA. reliqua igitur pyramis cuius baſis polygonum AEBFCGH, & uertex idem qui coni, maior eſt, quàm tertia cylindri pars. ſed pyramis cuius baſis polygonum AEBFCDH, uertex autem idem qui coni, tertia pars eſt priſmatis, cuius baſis polygonũ AEBFCDH, altitudo autem eadem quę cylindri. priſma igitur, cuius baſis AEBFCGH polygonum, & altitudo eadem, quę cylindri, maius eſt cylindro, cuius baſis

eſt

eſt circulus ABCD.ſed & minus,ab ipſo enim comprehenditur, quod fieri non poteſt.Non igitur cylindrus minor eſt,quàm triplus coni. oſtenſum autem eſt neque maiorem eſſe,quàm triplum.ergo cylindrus coni triplus ſit neceſſe eſt; ac propterea conus eſt tertia pars cylindri. Omnis igitur conus tertia pars eſt cylindri,eâdē, quam ipſe baſim habentis,& altitudinem æqualem. quod demonſtrare oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.


Eodem modo illud etiam demonſtrabitur in conis & cylindris ſcalenis.

COROLLARIVM.


Ex quibus conſtat omnem conum ſiue rectum,ſiue ſcalenum tertiam partem eſſe cylindri ſiue recti ſiue ſcaleni,qui eandem baſim habet, & æqualem altitudinem.


THEOREMA XI. PROPOSITIO XI.

Coni & cylindri, qui eandem habent altitudinem inter ſe ſunt vt baſes.




Sint eadem altitudine coni, & cylindri,quorum baſes circuli ABCD EFGH axes autem KL MN, & diametri baſiū AC EG.Dico vt ABCD circulus ad circulum EFGH,ita eſſe conum AL ad EN conum.ſi enim non ita ſit;erit vt ABCD circulus ad circulum EFGH, ita conus AL ad aliquod ſolidū minus cono EN, vel ad maius. ſit primū ad minus,quod ſit X,& quo minus eſt ſolidum X cono E N,ei æquale ſit I ſolidum.conus igitur E N,ipſis ſolidis X I eſt æqualis.Deſcribatur in EFGH circulo quadratū EFGH. ergo quadratum maius eſt, quàm dimidium circuli.erigatur à quadrato EFGH pyramis æquealta cono. pyramis igitur erecta maior eſt,quàm coni dimidium; nam ſi circa circulum quadratum deſcribamus,& ab ipſo erigamus pyramidem æquealtam cono ; erit inſcripta pyramis pyramidis circumſcriptę dimidia; etenim inter ſe ſunt vt baſes: conus autem circumſcripta pyramide eſt minor.ergo pyramis, cuius baſis quadratum EFGH, uertex autem





autem idem qui coni, maior eſt quàm coni dimidium. ſecentur circumferentiæ EF FG GH HE bifariam in punctis OPRS; & OE EP PF FR RG GS SH iungantur. Vnumquodque igitur triangulorum HOE EPF FRG GSH maius eſt, quàm dimidiũ porrionis circuli, in qua conſiſtit. erigatur ab vnoquoque triangulorum HOE EPF FEG GSH pyramis æquealta cono. ergo & vnaquæque erecta rum pyramidum maior eſt, quàm dimidium portionis coni, quæ eſt ad ipſam. Itaque reliquas circumferentias ſecantes bifariam; & iũgentes rectas lineas, & ab vnoquoque triãgulorum erigentes pyramides æquealtas cono,



atque hoc ſemper facientes, relinquemus tandem aliquas portiones coni, quæ ſolido I minores erunt. relinquantur & ſint quę in ipſis HO OE EP PF FR RG GS SH. reliqua igitur pyramis, cuius baſis polygonũ HOEPFRGS, altitudo autẽ eadẽ, quę coni, maior eſt ſolido X. Deſcribatur in circulo ABCD polygono HOEPFRGS ſimile & ſimiliter poſitum polygonum DTAYBQCV, & ab ipſo erigatur pyramis æquealta cono AL. Quoniam igitur eſt vt quadratum ex AC ad quadratum ex EG ita DTAYBQCV polygonum ad polygonum HOEPFRGS; vt autem quadratum ex AC ad quadratũ ex EG, ita ABCD circulus ad circulũ EFGH: erit vt ABCD circulus ad circulum EFGH, ita polygonum DTAYBQCV ad polygonum HOEPFRGS. ſed ut ABCD circulus ad circulum EFGH, ita conus AL ad X ſolidum: & vt polygonũ DTAYBQCV ad polygonũ HOEPFRGS, ita pyramis cuius baſis DTAYBQCV polygonũ, uertex autem punctum L ad pyramidem, cuius baſis polygonum HOEPFRGS, & uertex punctum N. Vt igitur conus AL ad X ſolidum, ita pyramis, cuius baſis polygonum DTAYBQCV, & vertex punctum L ad pyramidem, cuius baſis polygonum HOEPFRGS, & uertex N punctum. quare permutando vt conus AL ad pyramidem, quæ in ipſo eſt, ita ſolidum X ad pyramidẽ, quę in cono EN. conus autem AL maior eſt pyramide, quæ in ipſo. maius igitur eſt ſolidum X pyramide, quæ in cono EN. ſed & minus, quod fieri non poteſt. Non igitur vt ABCD circulus ad circulum EFGH, ita eſt AL conus ad ſolidum aliquod minus cono EN. Similiter demonſtrabitur neque vt EFGH circulus ad circulum ABGD, ita eſſe conum EN ad aliquod ſolidum minus cono AL. Dico præterea neque eſſe vt ABCD circulus ad circulum EFGH, ita AL conum ad aliquod ſolidum maius cono EN. Si enim fieri poteſt, ſit ad ſolidum maius, quod ſit Z. ergo conuertendo vt EFGH circulus ad circulum ABCD, ita erit ſolidum Z ad AL conum. ſed ut ſolidum Z ad AL conum, ita conus EN ad aliquod ſolidum minus cono AL. & ut igitur EFGH circulus ad circulũ ABCD, ita conus EN ad aliquod ſolidum minus

1 huius.
2 huius.


minus cono AL, quod fieri non posse ostensum est. Non igitur vt ABCD circulus ad circulum EFGH, ita conus AL ad aliquod solidum maius cono EN. ostensum autem est neque esse ad minus. ergo vt ABCD circulus ad circulum EFGH, ita est conus AL ad EN conum. sed vt conus ad conum, ita est cylindrus ad cylindrum, est enim vterque utriusque triplus. & ut igitur ABCD circulus ad circulum EFGH, ita in ipsis cylindri æquealti conis. ergo coni & cylindri qui eandem habent altitudinẽ inter se sunt ut bases. quod demonstrare oportebat. 11. quinti. Ex antecedente.

F. C. COMMENTARIVS.


Et hoc in conis & cylindris scalenis similiter demonstrabitur.

THEOREMA XII. PROPOSITIO. XII.


Similes coni & cylindri inter se sunt in tripla proportione diametrorum, quæ sunt in basibus.





Sint similes coni & cylindri, quorum bases quidem circuli ABCD EFGH; diametri vero basium BD FH: & axes conorum, vel cylindorum HK MN. Dico conũ cuius basis ABCD circulus, vertex autẽ punctum L ad conũ, cuius basis circulus EFGH, vertex autem N punctum, triplam habere proportionẽ eius, quã habet BD ad FH. Si enim non habet conus ABCDL ad conum EFGHN triplam proportionem eius, quam BD habet ad FH, habebit ABCDL conus ad aliquod solidum minus cono EFGHN triplam proportionem, uel ad maius. habeat primum ad minus, quod sit X; & describatur in EFGH circulo quadratum EFGH. quadratum igitur EFGH maius est, quàm dimidium EFCH circuli. & erigatur à quadrato EFGH pyramis æquealta cono. ergo erecta pyramis maior est, quàm coni dimidia. Itaque secẽtur EF FG GH HE circumferentiæ bifariam in punctis OPRS & iungãtur EO OF FP PG GR RH HS SE. Vnumquodque igitur triangulorũ EOF FPG GRH HSE maius est quàm dimidium portionis circuli EFGH, in qua cõsistit. & erigatur ab vnoquoque triangulorum EOF FPG GRH HSE pyramis eundem uerticẽ habẽs, quem conus. ergo & vnaquæque erectarum pyramidum maior est quàm dimidia portionis coni, quæ est ad ipsam. secantes igitur reliquas circumferentias bifariam, iũgentesq; rectas lineas, & ab vnoquoque triangulorum erigentes pyramides eundem habentes verticem, quem conus; atque hoc semper facientes tãdem relinquemus quasdam coni portiones, quę minores erũt excessu, quo conus EFGHN ipsum X solidum superat. Relinquãtur & sint quę in ipsis EO OF FP PG GR RH HS SE.




PROP. XI. Reliqua igitur pyramis, cuius basis quidem polygonum EOFPGRHS, uertex autem N punctum, maior est solido X. Describatur etiam in circulo ABCD polygono EOFPGRHS simile, & similiter positum polygonum ATBYCVDQ: à quo erigatur pyramis eundem verticem habens, quem conus; & triangulorum continẽtium pyramidem, cuius basis quidem est polygonum ATBYCVDQ, vertex autem punctum L, vnũ sit LBT; triangulorũ vero continentiũ pyramidem, cuius basis EOFPGRHS polygonũ, & vertex punctũ N, vnum sit NFO, & iũgatur KT MO. Qm̃ igitur conus ABCD similis est cono EFGH, erit vt BD ad FH, ita KL axis adaxẽ MN. vt aũt BD ad FH, ita BK ad FM. ergo & vt BK ad FM, ita KL ad MN, & permutando vt BK ad KL, ita FM ad MN. perpẽdicularis enim vtraque est, & circa æquales angulos BKLFMN latera sũt proportionalia. Simile igitur est BKL triangulum triangulo FMN. Rursus quoniam est vt BK ad KT, ita FM ad MO, & circa æquales angulos BKT FMO latera sunt proportionalia; etenim quę pars est angulus BKT quattuor rectorum, qui sunt ad K centrũ, eadem est pars & angulus FMO quattuor rectorum, qui sunt ad centrum M: erit triangulum BKT triãgulo FMO simile. Et quoniã ostensum est vt BK ad KL ita esse FM ad MN; æqualis aũt est BK ipsi KT, & FM ipsi MO: erit vt TK ad KL, ita OM ad MN: & circa æquales angulos TKL OMN latera sunt proportionalia; recta enim sunt. triangulum igitur LKT simile est triangulo NMO. Quòd autem ob similitudinem triangulorum BKL FMN, sit vt LB ad BK, ita NF ad FM; ob similitudinem uero triangulorum BKT FMO, vt KB ad BT, ita MF ad FO: erit ex æquali vt LB ad BT, ita NF ad FO. Rursus cum ob similitudinem triangulorum LTK NOM, sit vt LT ad TK, ita NO ad OM; & ob similitudinem triangulorum KBT OMF, vt KT ad TB, ita MO ad OF: ex æquali erit vt LT ad TB, ita NO ad OF. ostensum autem est & vt TB ad BL, ita OF ad FN. quare rursus ex æquali vt TL ad LB, ita QN ad NF. triangulorum igitur LTB NOF proportionalia sunt latera, ideoque æquiangula sunt LTB NOF triangula, & inter se similia. quare & pyramis, cuius basis triangulum BKT, uertex autem L punctum, similis est pyramidi, cuius basis FMO triangulum, & uertex punctum N; similibus enim planis continentur, & multitudine æqualibus. pyramides autem similes, & quę triangulares bases habent in tripla sunt proportione homologorum laterum. ergo pyramis BKTL ad pyramidem FMON triplam habet proportionem eius, quam BK habet ad FM. Similiter à punctis quidem AQDVCY ad K, à punctis uero ESHRGP ad M ducentes rectas lineas, & à triangulis erigentes pyramides, vertices eosdẽ habentes, quos coni, ostendemus & vnãquamque pyramidẽ eiusdẽ ordinis ad vnaquãq; alterius ordinis triplã proportionẽ habere eius, quã habet BK latus homologũ ad homologũ latus FM, hoc est quã BD ad FH. Sed vt vnũ antecedentium ad unum consequentium, ita omnia antecedentia ad omnia consequentia










quentia. est igitur & vt BKTL pyramis ad pyramidem FMON, ita tota pyramis, cuius basis ATBYCVDQ polygonum, uertex autem punctum L ad totam pyramidē cuius basis polygonum EOFPGRHS & uertex punctum N. quare & pyramis, cuius basis ATBYCVDQ polygonum, uertex autem pūctum L ad pyramidem cuius basis polygonum EOFPGRHS & uertex punctum N, triplam proportionem habet eius, quam BD habet ad FH. ponitur autem conus, cuius basis circulus ABCD uertex autem punctum L ad solidum X triplam proportionem habere eius, quam BD ad FH. Vt igitur conus, cuius basis circulus ABCD, uertex autem punctum L ad solidum X, ita est pyramis, cuius basis ATBYCVDQ polygonum, uertex autem punctum L ad pyramidem, cuius basis polygonum EOFPRHS & uertex punctum N, & permutando, ut conus cuius basis circulus ABCD, uertex autem punctum L ad pyramidem, quę in ipso est, cuius basis ATBYCVDQ polygonū, uertex aūt punctū L; ita solidum X ad pyramidem cuius basis polygonum EOFPGRHS, & uertex punctum N. dictus autem conus maior est pyramide, quę in ipso; etenim eam comprehendit. maius igitur est & solidum X pyramide, cuius basis polygonum EOFPGRHS, uertex autem punctum N. sed & minus, quod fieri non potest. non igitur conus, cuius basis ABCD circulus, & uertex punctum L ad aliquod solidum minus cono, cuius basis circulus EFGH & uertex N punctum, triplam proportionē habet eius quam BD habet ad FH. similiter demonstrabimus neque conum EFGHN ad aliquod solidum minus cono ABCDL triplam proportionem habere eius, quam habet FH ad BD. Itaque dico neque ABCDL conum ad solidum maius cono EFGHN triplam habere proportionem eius, quam BD habet ad FH. si enim fieri potest habeat ad aliquod solidum maius, quod sit Z. conuertendo igitur solidum Z ad conum ABCDL triplam proportionem habet eius, quam FH ad BD. ut autem solidum Z ad conum ABCDL, ita EFGHN conus ad aliquod solidum minus cono ABCDL. ergo & conus EFGHN ad solidum aliquod minus cono ABCDL triplā proportionem habebit eius, quam FH habet ad BD, quod fieri non posse demonstratum est. non igitur ABCDL conus ad solidum aliquod maius cono EFGHN triplam proportionem habet eius, quam BD ad FH. ostensum autem est neque ad minus. quare conus ABCDL ad EFGHN conum triplam proportionem habet eius, quam BD ad FH. Vt autem conus ad conum, ita cylindrus ad cylindrum. cylindrus enim in eadem existēs basi, in qua conus, & ipsi æqualtus coni triplus est. cum ostē sum sit omnem conum tertiam partem esse cylindri, eandem quam ipse balim habē tis, & æqualem altitudinem. ergo & cylindrus ad cylindrum triplam proportionē habebit eius, quam BD habet ad FH. similes igitur coni, & cylindri inter se sunt in tripla proportione diametrorū, quæ sunt in basibus. quod demonstrare oportebat. 15. quint. 10. huius.

P. C. COMMENTARIVS.


Precedens demonstratio In conis & cylindris tantum recti; congruit, quam nos uniuerse ad omnes tam rectos quam scalenos accōmodabimus hoc pacto.

Similes coni & cylindri omnes interse in tripla sunt proportionem diametrorū, quę sunt in basibus.

Sint similes coni & cylindri, quorum bases quidem circuli ABCD EFGH, et axes KL MN: & per axes ducantur plana ad rectos angulos basibus, quae bases secent, sintq; eorum planorum & basium communes sectiones BD FH, quae circulorū diametri erunt. Dico conum cuius basis ABCD circulus, et vertex punctum L ad conum cuius basis circulus EFGH, vertex autem N punctum triplam proportionem habere eius, quam habet BD ad FH. si enim non ita sit, habebit conus ABCDL ad aliquod solidum minus cono EFGHN triplam proportionem eius, quam BD habet ad FH, vel ad maius. Habeat primum ad solidum minus, quod sit X, & describatur in EFGH circulo quadratum EFGH. erit igitur quadratum EFGH maius, quàm dimidium EFGH circuli. Erigatur à quadrato EFGH pyramis aequealta cono, quae maior erit, quàm coni dimidia, & secentur EF FG GH HE circumferentiae bifariam in punctis OPRS, iunganturq; EO OF FP PG GR RH HS SE. Vnumquodque igitur triangulorum EOF FPG GRH HSE maius est, quàm



dimidiũ portionis circuli EFGH, in qua cõſiſtit: & erigatur ab vnoquoque triangulorũ EOF FPG GRH HSE pyramis eundem, quem conus vertirem habens. ergo et vnaquęque erectarũ pyramidũ maior eſt, quã dimidia coni portionis, q ae eſt ad ipſam. ſecãtes igitur reliquas circũferentias bifariam, inngẽteſq; rectas lineas, & ab vnoquoq; triangulorum erigẽtes pyramides, eundem habentes verticem, quem conus: atque hoc ſemper facientes tandem relinquemus quaſdã coni portiones, quę minores erunt exceſſu, quo conus. EFGHN ipſum X ſolidum ſuperat. relinquantur, & ſint quae in ipſis EO OF FP PG GR RH HS SR. reliqua igitur pyramis, cuius baſis polygonum EOFPGRHS, vertex autem pũctum N ſolido X eſt maior.



Deſcribatur etiam in circulo ABCD ipſi EOFPGRHS polygono ſimile & ſimiliter poſitum polygonum ATBTCVDQ. atque ab eo erigatur pyramis eundem, quem conus verticem habens: & triangulorum quidem continentium pyramidem, cuius baſis polygonum ATBTCVDQ; & vertex punctum L, vnum aliquod ſit LBT: triangulorũ vero continentium pyramidem, cuius baſis EOFPGRHS polygonum, & vertex punctum N, vnum ſit NFO: & KT MO iungantur. Quoniã igitur conus ABCD ſimilis eſt cono EFGH, erit ex diffinitione conorum ſimilium, quã nos in principio antecedentis libri attulimus, vt diameter BD ad diametrum FH, ita axis KL ad MN axẽ: vt autem BD ad FH, ita BK ad FM. ergo & vt BK ad FM, ita KL ad MN; & permutando vt BK ad KL, ita FM ad MN. atque eſt angulus BKL aequalis angulo FMN ex eadem diffinitione conorum ſimilium. cum igitur circa aequales angulos BKL FMN latera ſint proportionalia; erit BKL triangulum ſimile triangulo FMN. Et quoniam vt BK ad KT, ita eſt FM ad MO; angulus autem BKT eſt aequalis angulo FMO: etenim quę pars eſt angulus BHT quattuor rectorũ, qui ſunt ad centrum K, eadem eſt pars angulus FMO quattuor rectorum, quã ſunt ad M centrum. rurſus erunt circa aequales angulos BKT FMO latera proportionalia. triangulum igitur BKT triangulo FMO eſt ſimile. Itaque quoniam oſtenſum eſt vt BK ad KL, ita FM ad MN; aequalis autem eſt BK ipſi KT, & FM ipſi MO: erit vt TK ad KL, ita OM ad MN. & ſunt in conis rectis anguli TKL QMN inter ſe aequales, quòd recti ſint. ergo in ipſis cum circa aequales angulos TKL OMN latera ſint proportionalia; erit triangulum LKT ſimile triangulo NMO. At in conis ſcalenis hoc modo demonſtrabitur. Ducantur à verticibus eorum LN ad rectos angulos planis baſium rectae lineae LΦ NΥ, quae cadent in communes planorum & baſium ſectiones BD FH ex 38. antecedentis libri. & iungantur TΦ OΥ. Cum igitur ex diffinitione conorum ſimilium angulus LKΦ ſit æqualis angulo NMΥ, & anguli LΦK NΥM utrique recti: erit & reliquus KLΦ reliquo MNΥ aequalis, & triangulum LΦK ſimile triangulo NΥM. rurſus cum angulus BKT ſit æqualis angulo FMO; & reliquus ex duobus rectis TKΦ aequalis erit reliquo OMΥ. eſt autem ob ſimilitudinem triangulorum LΦK NΥM, ut ΦK ad KL, ita ΦM ad MN, & ob ſimilitudinem triangulorũ BKL FMN, ut LK ad KB, hoc eſt ad KT ipſi aequalem, ita NM ad MF, hoc eſt ad MO. ergo ex aequali vt ΦK ad KT, ita ΥM ad MO. & cum circa aequales angulos TKΦ OMΥ latera ſint proportionalia, erit & triangulum KTΦ triangulo MOΥ ſimile. ergo vt LΦ ad ΦK, ita NΥ ad ΥM: & vt ΦK ad ΦT, ita ΥM ad MO. quare ex aequali vt LΦ ad ΦT, ita NΥ ad ΥO. & ſunt anguli LΦT NΥO

6. huius.


inter

inter ſe aequales, quòd vtrique recti ex diffinitione rectae lineae, quae ad planum recta eſt cum igitur circa aequales angulos LΦT NΥO latera ſint proportionalia, ſequitur triãgula quoq; LTΦ NOΥ inter ſe ſimilia eſſe. ideoq; vt LT ad TΦ, ita NO ad OΥ: & vt TΦ ad TK, ita OΥ ad OM. ex aequali igitur vt LT ad TK, ita eſt NO ad OM. demonſtratum autem eſt vt LK ad KT, ita eſſe NM ad MO. quare conuertendo vt TK ad KL, ita OM ad MN. rurſus igitur ex aequali vt TL ad LK, ita eſt ON ad NM. quòd cum triangula LKT NMO latera habeant proportionalia, aequiangula ſunt, & ob inter ſe ſimilia. Itaq; quoniam ob ſimilitudinem triangulorum BKL FMN eſt vt LB ad BK. ita NF ad FM, & ob ſimilitudinem triangulorum BKT FMO, vt KB ad BT, ita MF ad FO, erit ex aequali vt LB ad BT, ita NF ad FO: & conuertendo vt TB ad BL, ita OF ad FN. Rurſus quoniam ob ſimilitudinem triangulorum LKT NMO, vt LT ad TK, ita eſt NO ad OM, & ob ſimilitudinem triangulorum KET MFO, vt KT ad TB, ita MO ad OF; ex aequali erit vt LT ad TB, ita NO ad OF. oſtenſum autem eſt & vt TB ad BL, ita OF ad FN. rurſus igitur ex aequali vt TL ad LB, ita erit ON ad NF. quare triangulorum LTB NOF latera ſunt proportionalia, ob eamq; cauſſam & aequiangula & inter ſe ſimilia erunt. pyramis igitur, cuius baſis triangulum BKT, vertex autem punctum L ſimilis eſt pyramidi, cuius baſis triangulum FMO, & vertex N punctum, ſimilibus enim planis continentur & numero aequalibus. pyramides autem ſimiles in tripla ſunt proportione homologorum laterum. ergo pyramis BKTL ad pyramidem FMON triplam habet proportionem eius, quam BK habet ad FM. Reliqua ſimiliter vt in antecedente demonſtrabimus. 6. ſexti.

THEOREMA XIII. PROPOSITIO. XIII.

Si cylindrus plano ſecetur oppoſitis planis parallelo, erit vt cylindrus ad cylindrum, ita axis ad axem.

Cylindrus enim AD plano GH ſecetur oppoſitis planis AB CD parallelo, & occurat axi EF in K puncto. Dico vt BG cylindrus ad cylindrum GD, ita eſſe EK axem ad axem KF. producatur enim EF axis ex vtraque parte ad puncta LM: & ipſi quidē EK axi exponantur æquales quotcumq; EN NL; ipſi vero FK æquales quotcumque FX XM: & per puncta LNXM ducantur plana ipſis AB CD parallela; atque in planis per LNXM circa centra LNXM intelligantur circuli OP RS TY VQ æquales ipſis AB CD; & cylindri PR RB DT TQ intelligãtur. Quoniam igitur axes LN NE EK inter ſe ſunt æquales, erunt cylindri PR RB BG inter ſe vt baſes: baſes autem æquales ſunt. ergo & cylindri PR RB BG ſunt æquales. Quòd cum axes LN NE EK inter ſe æquales ſint, itēq; cylindri PR RB BG inter ſe æquales; ſitq; ipſorum LN NE EK multitudo æqualis multitudini ipſorum PR RB BG: quotuplex eſt axis KL ipſius EK axis, totuplex erit & PG cylindrus cylindri GB. Eadem ratione & quotuplex eſt MK axis ipſius axis KF, totuplex eſt & QG cylindrus cylindri GD. & ſi quidem axis LK ſit æqualis axi KM, erit & PG cylindrus cylindro GQ æqualis. Si autem axis LK maior ſit axe KM, & cylindrus PG maior erit cylindro GQ, & ſi minor minor. quattuor igitur exiſtentibus magnitudinibus, uidelicet axibus EK KF, & cylindris BG GD ſumpta ſunt æquemultiplicia, axis quidem EK & BG cylindri, nēpe axis KL, & cylindrus PG; axis uero KF, & cylindri GD æquemultiplicia, axis ſcilicet KM, & GQ cylindrus, & demonſtratum eſt ſi LK axis ſuperat axem KM & PG cylindrum ſuperare cylindrum GQ, & ſi æqualis æqualis, & ſi minor minor eſt igitur axis EK ad axem KF, ut BG cylindrus ad cylindrum GD. Quare ſi cylindrus plano ſecetur oppoſitis planis parallelo, erit ut cylindrus ad cylindrum, ita axis ad axem. quod demonſtrare oportebat.



11. huius.


F. C.

F. C. COMMENTARIVS.

Illud etiam contingit in cylindro ſcaleno; quod eadem ratione demonſtrabitur.

Ex quibus conſtat ſi quilibet cylindrus ſecetur plano baſibus parallelo, ut cylindrus ad cylindrum, ita eſſe altitudinem cylindri ad cylindri altitudinem.

In cylindris enim rectis illud perſpicuum eſt, cum eorum altitudines ab axibus determinentur. in ſcalenis vero facile apparebit ducta recta linea EL a puncto E ad baſis planum perpendicularis, quae plano per GH ducto in M occurrat. Quoniam enim duę rectę lineę EF EL ſecantur à planis parallelis, in eaſdem proportiones ſecabuntur. 15. undecimi *quare vt EK ad KF, ita erit EM ad ML; ac propterea ut B G cylindrus ad cylindrum G D, ita cylindri B G altitudo F M ad M L altitudinem cylindri G D, quod propoſitum fuerat demonſtrandum.*



THEOREMA XIIII. PROPOSITIO. XIIII.


In æqualibus baſibus exiſtentes coni, & cylindri inter ſe ſunt vt altitudines.

Sint enim in æqualibus baſibus AB CD cylindri EB FD. Dico vt EB cylindrus ad cylindrum FD, ita eſſe G H axem ad axem K L. producatur enim KL axis ad punctum N; ponaturq; ipſi GH axi æqualis LN; & circa axem LN intelligatur cylindrus C M. Quoniam igitur cylindri EB CM eandem habent altitudinem, inter ſe ſunt vt baſes: baſes autem ſunt æquales. ergo & cylindri EB CM inter ſe æquales erunt. Et quoniam cylindrus FM plano ſecatur CD, oppoſitis planis parallelo, erit ut CM cylindrus ad cylindrum FD, ita axis LN ad KL axem. æqualis autem eſt cylindrus quidem CM cylindro EB; axis vero LN axi G H. eſt igitur vt EB cylindrus ad cylindrũ F D, ita axis GH ad KL axem: vt autem EB cylindrus ad cylindrum FD, ita ABG conus ad conũ CDK; cylindri enim ſunt conorum tripli. ergo & vt GH axis ad axem KL, ita eſt ABG conus ad conum C D K, & cylindrus EB ad F D cylindrum. In baſibus igitur æqualibus exiſtentes coni & cylindri inter ſe ſunt, ut altitudines. quod oportebat demonſtrare.

11. huius. — I

Ex antecedente.

15. quinti. 11. huius.



F. C. COMMENTARIVS.


Dico vt EB cylindrus ad cylindrum FD, ita eſſe G H axem ad axem KL] *Hoc eſt ita eſſe altitudinem GH ad KL altitudinem. in rectis enim conis, de quibus Euclides loquitur, altitudo ipſa axis eſt, ſiue ab axe determinatur; in ſcalenis uero non item. ſed tamen nihilominus demonſtrabitur conos & cylindros in aequalibus baſibus conſtitutos inter ſe eſſe vt axes, & ob id, vt eorum altitudines ex iis, quae nos proxime diximus.*

THEOREMA XV. PROPOSITIO XV.

Aequalium conorum, & cylindrorum baſes ex contraria parte altitudinibus

altitudinibus reſpondent, & quorum conorum & cylindrorũ baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent, illi inter ſe ſunt æquales.

Sint æquales coni & cylindti, quorum baſes quidem ABCD EFGH circuli, & diametri ipſorum AC EG; axes autem KL MN; qui quidem & conorum vel cylindrorum ſunt altitudines. & compleantur cylindri AX EO. Dico cylindrorum AX EO baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondere, hoc eſt vt ABCD baſis ad baſim EFGH, ita eſſe altitudinẽ MN ad altitudinem KL. altitudo enim KL vel æqualis eſt altitudini MN, vel non æqualis. Sit primum æqualis: atque eſt AX cylindrus æqualis cylindro EO. qui autem eandem habent altitudinem coni, & cylindri inter ſe ſunt vt baſes. æqualis igitur eſt baſis ABCD baſi EFGH, ac propterea ex contraria parte ſibi ipſis reſpondent. eſtq; vt baſis ABCD ad EFGH baſim, ita MN altitudo ad altitudinem KL. Non ſit autem altitudo KL altitudini MN æqualis, ſed maior ſit MN, & auferatur ab ipſa MN altitudini LK æqualis PM, & per P ſecetur EO cylindrus plano TYS oppoſitis planis circulorum EFGH RO parallelo, intelligaturq; cylindrus ES, cuius baſis quidem, EFGH circulus, altitudo autem PM. Quoniam igitur AX cylindrus æqualis eſt cylindro EO, alius autem aliquis eſt cylindrus ES; erit vt AX cylindrus ad cylindrũ ES, ita cylindrus EO ad ES cylindrũ. Sed ut AX cylindrus ad cylindrum ES, ita baſis ABCD ad EFGH baſim; cylindri enim AX ES eandem habent altitudinem. vt autem cylindrus EO ad ES cylindrũ, ita MN altitudo ad altitudinẽ MP. nam cylindrus EO ſecatur plano TYS oppoſitis planis parallelo. eſt igitur vt ABCD baſis ad baſim EFGH, ita altitudo MN ad MP altitudinem. æqualis autẽ eſt MP altitudo altitudini KL. quare vt baſis ABCD ad EFGH baſim, ita MN altitudo ad altitudinem KL. æqualium igitur cylindrorum AX EO baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent.



11. huius.

Sed cyiindrorũ AX EO baſes ex contraria parte reſpondeant altitudinibus: ſitq; ut ABCD baſis ad baſim EFGH, ita altitudo MN ad KL altitudinẽ. Dico AX cylindrũ cylindro EO æqualẽ eſſe. ijſdẽ enim cõſtructis quoniã vt ABCD baſis ad baſim EFGH, ita altitudo MN ad KL altitudinem; altitudo autem KL æqualis eſt altitudini MP: erit vt ABCD baſis ad baſim EFGH, ita MN altitudo ad altitudinem MP. Sed vt ABCD baſis ad baſim EFGH, ita AX cylindrus ad cylindrum ES; eandem enim habent altitudinem. ut autem MN altitudo ad altitudinem MP, ita cylindrus EO ad ES cylindrum. eſt igitur vt AX cylindrus ad cylindrũ ES, ita cylindrus EO ad ES cylindrum. cylindrus igitur AX cylindro EO eſt æqualis. ſimiliter autem & in conis. quod demonſtrare oportebat.


F. C. COMMENTARIVS.

Hoc in conis, & cylindris rectis tantum Euclides demonſtrauit. Sed & in omnibus demonſtratur hoc modo.

Sint aequales coni, & cylindri ſiue recti ſiue ſcaleni, quorum baſes circuli ABCD EFGH: altitudines autem LK NM; & compleantur AX EO cylindri. Dico cylindrorum AX EO baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondere; hoc eſt vt ABCD baſis ad baſim EFGH, ita eſſe altitudinem NM ad LK altitudinem. Nam vel altitudines LK NM ſunt aequales vel inaequales; ſi aequales, cum aequales ſint cylindri, erunt & baſes aequales inter ſe: cylindri enim & coni qui

eandem

eandem habẽt altitudinẽ, inter ſe ſunt vt baſes. quare baſes ex contraria parte altitudinibus reſpõdẽt. Si vero altitudines nõ ſint æquales, Sit maior NM altitudo; à qua auferatur PM æqualis altitudini LK, & per P ducatur planum cylindrum ſecans, oppoſitis planis parallelum TTS, intelligaturq́, cylindrus ES, cuius baſis circulus EFGH; & altitudo PM. Itaque quoniam cylindrus AX eſt æqualis cylindro EO, & alius cylindrus eſt ES; erit ut AX cylindrus ad cylindrum ES, ita cylindrus EO ad ES cylindrum. Sed



vt AX cylindrus ad cylindrum ES, ita baſis ABCD ad EFCH baſim, cum eandem habeant altitudinem. Vt autem cylindrus EO ad ES cylindrum, ita NM altitudo ad altitudinem MP; cylindrus enim EO ſecatur plano TTS oppoſitis planis parallelo. quare vt cylindrus RS ad cylindrum SE, ita eſt NP altitudo ad altitudinem PM: & componendo vt cylindrus EO ad ES cylindrum, ita NM altitudo ad altitudinem MP. Vt igitur baſis ABCD ad EFGH baſim, ita NM altitudo ad altitudinem MP. æqualis autem eſt altitudo MP altitudini LK. ergo ut ABCD baſis ad baſim EFGH, ita eſt altitudo NM ad LK altitudinem.

Sed cylindrorum AX EO baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondeant, ſitq́, vt ABCD baſis ad baſim EFGH, ita altitudo NM ad LK altitudinem. Dico cylindrum AX cylindro EO æqualem eſſe. ijſdem enim conſtructis quoniam vt ABCD baſis ad baſim EFGH, ita altitudo NM ad LK altitudinem, altitudo autem LK eſt æqualis ipſi PM altitudini; erit vt ABCD baſis ad baſim EFGH, ita NM altitudo ad altitudinem MP. Sed vt ABCD baſis ad baſim EFGH, ita cylindrus AX ad ES cylindrum, quòd eandem altitudinem habeat: & ut NM altitudo ad altitudinem MP, ita EO cylindrus ad cylindrum ES. Vt igitur cylindrus AX ad ES cylindrum, ita cylindrus EO ad cylindrum ES. quare AX cylindrus cylindro EO eſt æqualis. ſimiliter autem & in conis. Æqualium igitur conorum, & cylindrorum baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent, & quorum conorum, & cylindrorum baſes ex contraria parte altitudinibus reſpondent, illi inter ſe ſunt æquales. quod demonſtrare oportebat.

Sed & illud uerum eſt, quod nos demonſtrauimus in commentarijs in librum Archimedis de conoidibus, & ſphæroidibus ad propoſitionem XI.


Cylindri omnes, et coni inter ſe proportionem habent compoſitam ex proportione baſium & ex proportione altitudinum.

PROBLEMA I. PROPOSITIO. XVI.

Duobus circulis circa idem centrum exiſtẽtibus in maiori polygonum æqualium, & numero parium laterum deſcribere, quod minorem circulum non tangat.

Sint dati duo circuli ABCD EFGH circa idem centrum K. oportet in maiori circulo ABCD polygonum æqualium, & numero parium laterum deſcribere, non tangens minorem circulum EFGH. Ducatur enim per K centrum recta linea BD: atque à puncto G ipſi BD ad rectos angulos ducatur AG: & ad C producatur. ergo AC circulum EFGH tangit. Itaque circumferentiam BAD bifariam ſecantes, & eius dimidium rurſus bifariam, & hoc ſemper facientes tandem relinquemus circumferentiam

circumferentiam minorem ipſa AB. Relinquatur, ſitq; LD, & à puncto L ad BD perpendicularis agatur LM, & ad N producatur, iunganturq; LD DN LN. ergo LD ipſi DN eſt æqualis. Et quoniam LN parallela eſt AC, & AC tangit circulum EFGH; ipſa LN circulum EFGH non tanget, & multo minus tangent circulum EFGH rectæ lineæ LD DN. Quòd ſi ipſi LD æquales deinceps circulo ABCD aptabimus, deſcribetur in eo polygonũ æqualium & numero parium laterum non tangens minorem circulum EFGH. quod facere oportebat.




F. C. COMMENTARIVS.

Ergo LD ipſi DN eſt æqualis] *Recta enim linea BD per centrum ducta rectam lineam quandam LN, non ductam per centrum ad rectos angulos ſecat, quare & biſariam ipſam ſecabit. atque erit LM aequalis MN. cum igitur duæ LM MD duabus NM MD aequales ſint & angulos aequales contineant, nempe rectos: erit baſis LD baſi LN aequalis.* 3. 3. primi. 4 primi.

PROBLEMA II. PROPOSITIO XVII.

Duabus ſphæris circa idem centrum exiſtentibus in maiori ſolidum polyhedrum deſcribere, quod minoris ſphæræ ſuperficiem non tangat.



Intelligantur duæ ſphæræ circa idem centrum A. oportet in maiori ſphæra deſcribere ſolidum polyhedrum minoris ſphæræ ſuperficiem non tangens. ſecentur ſphæræ plano aliquo per centrum ducto. erunt ſectiones circuli, quoniam diametro manẽte, & ſemicirculo circumducto, ſphæra facta eſt. ergo in quacumque poſitione ſemicirculum intelligamus, quod per ipſum producitur planũ in ſuperficie ſphęræ circulum efficiet, & conſtat circulum maximum eſſe, cum diame-



14. tertij.

ter ſphæræ,quæ & ſemicirculi,& circuli diameter eſt, maior ſit omnibus rectis lineis,quæ in circulo vel ſphæra ducũtur.ſit igitur in maiori quidem ſphęra circulus BCDE;in minori autem circulus FGH:& ducantur ipſorum duæ dimetri ad rectos inter ſe angulos BD CE: & duobus circulis circa idem centrum exiſtentibus B CDE FGH, in maiori BCDE polygonum æqualium & parium numero laterum deſcribatur,nõ tãgẽs minorẽ circulũ FGH;cuius latera ſint in BE circuli quadrãte BK KL LM ME: & iuncta KA producatur ad N:& à puncto A plano circuli BCD E ad rectos angulos cõſtituatur AX; quæ ſuperficiei ſphærę in puncto X occurrat: & per AX,& vtramque ipſarum BD KN plana ducantur, quæ ex iam dictis efficiẽt in ſuperficie ſphæræ maximos circulos.Itaque efficiant, & ſint in diametris BD K N eorum ſemicirculi BXD KXN.Quoniam igitur XA recta eſt ad planum circuli B CDE,erunt omnia plana,quæ per ipſam XA tranſeunt ad planum circuli BCDE re cta.quare & ſemicirculi BXD KXN recti ſunt ad idem planum. Et quoniam ſemicirculi; BED BXD KXN æquales ſunt,in æqualibus enim cõſiſtũt BD KN diametris;erũt & eorũ quadrantes BE BX KX inter ſe æquales.quot igitur latera polygoni ſunt in quadrante BE,tot erunt & in quadrantibus BX KX æqualia ipſis BK KL LM ME. Deſcribantur & ſint BO OP PR RX KS ST TY YX: iunganturq; SO TP YR,& ab ipſis QS ad planum circuli BCDE perpendiculares ducantur. cadẽt hæ in communes planorum ſectiones BD KN,quoniam & plana ſemicirculorum BXD KXN ad planum circuli BCDE recta ſunt.Itaque cadant,ſintque OVSQ:& V Q iungatur.Cum igitur in æqualibus ſemicirculis BXD KXN æquales circumferẽ tiæ ſumptę ſint BO KS,& ductę perpendiculares OV SQ: erit OV quidem ipſi SQ æqualis,BV vero æqualis KQ.eſt autem & tota BA æqualis toti KA. ergo & reliqua VA reliquæ QA eſt æqualis.Vt igitur BV ad VA,ita KQ ad QA,ideoq; VQ ipſi BK parallela eſt.Quod cum vtraque ipſarum OV SQ recta ſit ad circuli BCDE planũ, erit OV ipſi SQ parallela. oſtenſa autem eſt & ipſi æqualis. ergo QV SQ æquales

Ex antecedente.


18.undecimi

28.undecimi.

B

2.ſexti.

6.undecimi. 33.primi.



ſunt & parallelæ. Et quoniam QV parallelaeſt ipſi SO,ſed & parallela ipſi KB; erit & SO ipſi KB parallela:& ipſas coniungunt BO KS.ergo & KBOS quadrilaterũ eſt in vno plano:nã ſi duæ rectæ lineæ parallelæ ſint, & in vtraque ipſarum quæuis pũcta ſumantur,quæ dicta puncta coniungit recta linea in eodem eſt plano, in quo parallelę. Et eadem ratione vtraque ipſorum quadrilaterorum SOPT TPRY in vno ſunt plano.eſt autem in vno plano & triangulum YRX.Si igitur à pũctis OSPTRYad A ductas rectas lineas intelligamus, conſtituetur quædam figura ſolida

9.undecimi. C

3.undecimi.



ſolida polyhedra inter circumferentias BX KX, ex pyramidibus compoſita, quarũ baſes quidem KBOS SOPT TPRY quadrilatera, & triangulum YRX; vertex autẽ punctum A. quòd ſi in vno quoque laterum KL LM ME, quemadmodum in K B eadem conſtruamus, & in reliquis tribus quadrãtibus, & in reliquo hemiſphęrio conſtituetur figura quædam polyhedra in ſphęra deſcripta, & compoſita ex pyramidibus, quarum baſes ſunt quadrilatera iam dicta, & YRX triãgulum; & quæ eiuſdem ordinis ſunt; vertex autem A punctum. Dico dictam figuram polyhedram non tagere ſuperficiem minoris ſphæræ, in qua eſt circulus FGH. Ducatur à puncto A ad planum quadrilateri KBSO perpendicularis AZ, cui in puncto Z occurrat, & BZ ZK iungantur. Itaque quoniam AZ recta eſt ad quadrilateri KBSO planum, et ad omnes rectas lineas, quę ipſam contingunt, & in eodem ſunt plano rectos angulos faciet. ergo AZ ad utramque ipſarum BZ ZK eſt perpendicularis. et quoniam AB eſt æqualis AK, erit et quadratum ex AB quadrato ex AK æquale, et ſunt quadrato quidem ex AB æqualia quadrata ex AZ ZB; etenim angulus ad Z rectus eſt: quadrato autem ex AK æqualia ex AZ ZK quadrata. ergo quadrata ex AZ ZB quadratis ex AZ ZK æqualia ſunt. commune auferatur quadratum ex AZ. reliquum igitur quod ex BZ reliquo quod ex ZK eſt æquale; ideoq; recta linea BZ rectę ZK æqualis. Similiter oſtendemus, & quæ à puncto Z ad OS ducuntur vtrique ipſarum BZ ZK æquales eſſe. circulus igitur centro Z & interuallo vna ipſarum ZB ZK deſcriptus, etiam per puncta OS trãſibit, atque erit in circulo KBOS quadrilaterum. Et quoniã KB maior eſt, quàm QV, æqualis autem QV ipſi SO; erit & KB, quàm SO maior. Sed KB eſt æqualis vtrique ipſarũ KS BO. ergo vtraque KS BO, quàm SO eſt maior. cum igitur in circulo quadrilaterum ſit KBOS, & æquales ſint KB BO KS, & minor OS; ſitq; ex centro circuli BZ: erit quadratum ex KB maius, quàm duplum quadrati ex BZ. Ducatur à puncto K ad BV perpendicularis KΩ. Et quoniam BD minor eſt, quã dupla ipſius DΩ; atq; eſt vt BD ad DΩ, ita rectãgulũ cõtẽtũ DB BΩ ad rectangulum, quod DΩ ΩB cõtinetur, nempe deſcripto ex BΩ quadrato, & completo parallelogrãmo in ipſo ΩD. quare & rectangulũ contẽtũ DB BΩ minus eſt, quã duplum eius, quod DΩ ΩB continetur: & iuncta KD, quod DB BΩ continetur eſt æquale quadrato ex KB; & quod continetur DΩ ΩB æquale quadrato ex KΩ. quadratum igitur ex KB minus eſt, quàm duplum quadrati ex KΩ. ſed quadratum ex KB maius eſt, quàm duplum quadrati ex BZ. ergo quadratum ex KΩ quadrato ex BZ eſt maius. Et quoniam BA eſt æqualis AK, erit quadratum ex BA quadrato ex AK æquale. & ſunt quadrato quidem ex BA æqualia quadrata ex BZ ZA; quadrato autem ex AK æqualia quadrata ex KΩ ΩA. quadrata igitur ex BZ ZA quadratis ex KΩ ΩA ſunt æqualia; quorum quadratum ex KΩ maius eſt quadrato ex BZ. ergo reliquum ex ΩA quadratum quadrato ex ZA eſt minus; ac propterea recta linea AΣ maior, quàm recta AΩ. multo igitur maior eſt AZ, quàm AG: atque eſt AZ quidem ad vnam polyhedri baſim, AG vero ad ſuperficiem minoris ſphęræ. quare polyhedrum minoris ſphæræ ſuperficiem non tangit.

Oſtendendum autem aliter & expeditius, maiorem eſſe AZ, quàm AG. Ducatur à puncto G ipſi AG ad rectos angulos GL, & AL iungatur. Itaque circumferentiã EB bifariam ſecantes, & dimidiam ipſius bifariam, atque hoc ſemper facientes tandem relinquemus quandam circumferentiam minorem circumferentia circuli BCD, quæ ſubtenditur æquali ipſi GL. relinquatur, ſitq; circumferentia KB. minor igitur eſt recta linea KB, quàm GL. Et quoniã in circulo eſt BKSO quadrilaterum, & ſunt æquales OB BK KS, & minor OS; erit angulus BZK obtuſus: ideoq; BK maior, quàm BZ. ſed GL quàm BK eſt maior. multo igitur maior eſt GL, quàm BZ, & quadratum ex GL quadrato ex BZ maius. & cum æqualis ſit AL ipſi AB, erit & quadratum ex AL quadrato ex AB æquale. ſed quadrato quidem ex AL æqualia ſunt quadrata ex AG GL; quadrato autem ex AB æqualia quadrata ex BZ ZA. quadrata igitur ex AG GL quadratis ex BZ ZA æqualia ſunt; quorum quadratum ex BZ minus eſt quadrato ex GL. ergo reliquum ex ZA quadratum maius eſt quadrato ex AG: & ob id recta linea ZA, quã recta AG eſt maior. Duabus igitur ſphæris circa idẽ

A. diffi. unde cimi.
49. primi.
D
E
F
G
H
K

centrum existentibus, in maiori solidum polyhedrum descriptum est, minoris sphæræ superficiem non tangens. quod facere oportebat.


COROLLARIVM.

Quod si etiam in altera sphæra, solido polyhedro descripto in sphæra ABCDE simile solidũ polyhedrum describatur, habebit solidũ polyhedrum in sphæra BCDE ad solidum polyhedrum in altera sphæra triplam proportionem eius, quam diameter sphæræ BCDE habet ad alterius sphęrę diametrũ. diuisis enim solidis in pyramides numero ęquales, & eiusdem ordinis; erunt pyramides similes. similes autem pyramides inter se in tripla sunt proportione homologorum laterum. ergo pyramis, cuius basis est KBOS quadrilaterum, vertex autem punctum A ad pyramidem in altera sphæra eiusdem ordinis triplam proportionem habet eius, quam latus homologum habet ad homologum latus; hoc est, quam habet AB ex centro sphærę circa centrum A existentis ad eam, quę est ex centro alterius sphęræ. Similiter & vnaquæque pyramis earum, quæ sunt in sphæra circa centrum A ad vnamquamque pyramidem eiusdem ordinis, quę sunt in altera sphæra, triplam proportionem habebit eius, quam habet AB ad eam, quę est ex cẽtro alterius sphærę. Et vt vnũ antecedentium ad vnũ consequentium, ita antecedentia omnia ad omnia consequentia. quare totum solidum polyhedrum, quod est in sphæra circa centrum A ad totum solidum polyhedrum, quod in altera sphæra triplam proportionem habebit eius, quam habet AB ad eam, quæ est ex centro alterius sphęrę, hoc est quam habet BD diameter ad alterius sphærę diametrum.

F. C. COMMENTARIVS.

A Erunt sectiones circuli.] *Hoc vniuerse à Theodosio demonstratur in prima propositione sphæricorum, nempe quomodocunque plano sphæra secetur, semper sectiones fieri circulos.*


B Erit OV quidem ipsi SQ æqualis. BV vero ęqualis KQ.] *Sint enim duo semicirculi aequales ABC DEF, sumanturq; aequales circumferentiae AB DE: & à punctis B E perpendiculares ducantur BG EH. Dico BG ipsi EH, & AG ipsi DH aequalem esse. Quoniam enim circumferentia AB est aequalis circumferentiae DE, quae sunt aequalium circulorum, erunt rectae lineae AB DE inter se aequales. & eadem ratione aequales BC EF. ergo & vt AB ad BC, ita DE ad EF: atque est angulus ABC in semicirculo rectus aequalis recto DEF. cum igitur circa aequales angulos latera sint proportionalia*



29. tertij.

lia, erit triangulum ABC ſimile triangulo DEF. ſed triangulum ABG eſt ſimile triangulo ABC, ergo & ipſi DEF. triangulum autem DEH eſt ſimile triangulo DEF. triangulum igitur ABG triangulo DEH eſt ſimile. ergo vt AB ad BG, ita DE ad EH, & permutando vt AB ad DE, ita BG ad EH. aequalis autem eſt AB ipſi DE. ergo & BG ipſi EH eſt aequalis. & eodem modo demonſtrabitur AG aequalis ipſi DH, quod demonſtrare oportebat. ſed & illud vniuerſe in omnibus portionibus demonſtratur ſequenti lemmate. 6.ſexti. 8.ſexti. 9.ſexti. 14.quinti.

Sint ęquales portiones ęqualiū circulorū ABC DEF; ſumanturq; circumferętiæ ęquales AB DE: & à pūctis BE ad AC DF perpendiculares ducantur BG EH. Dico BG quidem ipſi EH æqualem eſſe; AC vero ipſi DH.



Iungantur AB DE. & quoniam aequales ſunt circumferentiae AB DE, erunt & reliquae BC EF inter ſe aequales. ergo & aequales anguli, qui in ipſis conſiſtunt. quare angulus BAC eſt aequalis angulo EDF. ſed & recti ſunt anguli, qui ad G H. duo igitur triangula ſunt ABG DEH, quae duos angulos duobus angulis aequales habent, alterum alteri, & vnum latus BA vni lateri DE aequale, quod vni aequalium angulorum ſubtenditur. ergo omnia omnibus ſunt aequalia. aequalis igitur eſt AG ipſi DH, & BG ipſi EH. quod demonſtrare oportebat. 27.tertij. 26.primi.

C

Nam ſi duæ rectæ lineæ parallelę ſint, & in vtraque ipſarum quæuis puncta ſumatur, quæ dicta puncta coniungit in eodem eſt plano in quo parallelæ] *Ex XI. vndecimi.*


D

Et quoniam KB maior eſt, quàm QV] *Eſt enim triangulum AQV triangulo AKB ſimile, cum angulus ad A ſit vtrique communis, angulusq; AQV angulo AKB, & angulus AVQ angulo ABK aequalis. vt igitur AK ad KB, ita AQ ad QV, & permutando vt AK ad AQ, ita KB ad QV. eſt autem AK maior, quàm AQ. ergo & KB, quàm QV maior erit.* 29.primi. 4.ſexti.

Erit quadratum ex KB maius, quàm duplum quadrati ex BZ.] *Nam cum rectae lineae KB BO KS aequales ſint, & minor ipſis OS; erunt circumferentiae, quas auferunt KB BO KS inter ſe aequales, & reliqua circumferentia QS maiores. quare & anguli KZS KZB BZO ęquales, & maiores angulo OZS. ſunt autem quattuor anguli quattuor rectis aequales. ergo OZS eſt minor recto, videlicet acutus; & vnuſquiſque reliquorum trium obtuſus; ac propterea quadratum quod fit ex KB maius eſt duobus quadratis, quae ex KZ ZB, hoc eſt maius, quàm duplū quadrati, quod ex BZ. ſunt enim KZ ZB inter ſe aequales, vt demonſtratum eſt. ſed & hoc ſequenti lemmate planius demonſtratur.*

E

Sit in circulo quadrilaterum KBOS, cuius trium latera SK KB BO, inter ſe ſint ęqualia: ſitq; BO maior, quàm OS; & ſumpto circuli centro Z, iungatur BZ. Dico quadratum ex KB quadrati ex BZ maius eſſe, quàm duplum.




Iungantur enim OZ SZ KZ. Quoniam igitur BZ eſt aequalis ZS, & communis ZO; erunt duae BZ ZO duabus SZ ZO aequales, altera alteri, & baſis BO baſi OS maior. angulus igitur BZO angulo OZS eſt maior. & quoniam angulus OZB vnicuique ipſorum BZK KZS eſt ęqualis; in aequalibus namque circumferentijs conſiſtunt OB BK KS; quòd rectae lineę ęquales ſint: erit & vterque angulorum BZK KZS maior angulo OZS. ſed quattuor anguli OZS SZK KZB BZO quattuor rectis ſunt aequales; etenim circa vnum punctum Z conſiſtunt. vnuſquiſque igitur angulorum OZB BZK KZS eſt obtuſus. ideoq; obtuſiangulum eſt triangulum BZO. At in obtuſiangulis triangulis, quod à latere obtuſum angulum ſubtendente fit quadratum maius eſt quadratis, quae à lateribus obtuſum angulum continentibus fiunt. ergo quadratum, quod ex BK maius eſt quadratis, quae ex KZ ZB. ſed quadrata ex KZ ZB dupla ſunt quadrati Coroll. 15. primi.

drati ex BZ; aequalis enim est KZ ipsi ZB. quadratũ igitur ex KB, maius est, quàm duplum quadrati ex BZ. quod oportebat demonstrare.

F Et quoniam BD minor est quàm dupla ipsius DΩ.] *Perpendicularis enim à puncto K ducta ad BD, cadit inter G & B, quod circulum FGH non tangit, vt ex antecedente constat: & cum BD dupla sit ipsius DA, erit ipsius DΩ minor, quàm dupla.*

G Atque est vt BD ad DΩ, ita rectangulum contentum DB BΩ ad rectãgulum quod DΩ ΩB continetur.] *Describatur ex ΩB quadratum quod sit ΩBΥΞ, & compleatur DΞ parallelogrammum. erit ut BD ad DΩ, ita rectangulum DΥ ad rectangulum DΞ. ex prima sexti, hoc est ita rectangulum, quod continetur DB BΩ ad rectangulum contentum DΩ ΩB.*



H Et iuncta KD, quod DB BΩ continetur est æquale quadrato KB.] *Est enim angulus in semicirculo DKB rectus, & ab eo ad basim perpendicularis ducitur KΩ. quare ex corollario octauæ sexti libri KB est proportionalis media inter DB BΩ: & KΩ media inter DΩ ΩB: & ob id quadratum quidem ex KB æquale est rectangulo contento DB BΩ; quadratum uero ex KΩ æquale ei, quod DΩ ΩB continetur.*

K Multo igitur maior est AZ quàm AG] *Quoniam enim polygonum BKLME in maiori circulo BCDE descriptum est, non tangens minorem circulum FGH, perpendicularis à puncto K ducta ad BD, videlicet KΩ circumferentiam eius non tanget ex ijs, quae in antecedente demonstrata sunt. quare AΩ maior erit, quàm AG; & idcirco AZ longe maior, quàm quae à centro minoris sphæræ ad eius superficiem pertinet.*


L Et quoniam in circulo est BKSO quadrilaterum] *Intelligatur enim descriptum quadrilaterum BKSO, vt in antecedentibus.*

M Et sunt æquales OB BK KS, & minor OS] *Hæc proxime demonstrata sunt.*

N Et cum æqualis sit AL ipsi AB.] *Sunt enim à centro ad circumferentiam maioris circuli BCDE.*

THEOREMA XVI. PROPOSITIO. XVIII.

Sphæræ inter se in tripla sunt proportione suarum diametrorũ.



Intelligantur sphæræ ABC DEF; quarum diametri BC EF. Dico ABC sphærã ad sphæram DEF triplam proportionem habere eius, quã habet BC ad EF. Si enim non ita est, sphæra ABC ad sphæram minorem ipsa DEF, vel ad maiorem triplam proportionem habebit eius, quam habet BC ad EF. Habeat primo ad minorem, videlicet ad GHK. & intelligatur sphæra DEF circa idem centrũ, circa quod est sphæra GHK; describaturq; in maiori sphæra DEF solidum polyhedrum non tangẽs minorem sphæram GHK in superficie; & in sphæra ABC describatur solidum polyhedrum simile ei, quod in sphæra DEF descriptum est. solidum igitur polyhedrum, quod in sphæra ABC ad solidum polyhedrum, quod in sphæra DEF triplam proportionem habet eius, quam BC ad EF. habet autem ABC sphæra ad sphæram GHK triplam proportionem eius, quam BC ad EF. ergo vt ABC sphæra ad sphæram GHK,

Ex antecedente.

Ex corol. antecedente.

HK, ita ſolidum polyhedrum in ſphęra ABC ad ſolidum polyhedrum in ſphæra DEF; & permutando, vt ABC ſphęra ad ſolidum polyhedrum, quod in ipſa eſt, ita GHK ſphæra ad ſolidum polyhedrum, quod in ſphæra DEF. maior autem eſt ſphæra ABC ſolido polyhedro, quod eſt in ipſa. ergo & GHK ſphærę polyhedro, quod in ſphęra DEF eſt maior. ſed & minor, ab ipſo enim comprehenditur, quod fieri non poteſt. non igitur ABC ſphæra ad ſphæram minorem ipſa DEF triplam proportionem habet eius, quam BC ad EF. ſimiliter oſtendemus neque DEF ſphærā ad ſphæram minorem ipſa ABC triplam habere proportionem eius, quam habet EF ad BC. Dico inſuper ſphæram ABC neque ad maiorem ſphæram ipſa DEF triplam proportionem habere eius, quā BC ad EF. Si enim fieri poteſt, habeat ad maiorem LMN. conuertendo igitur ſphęra LMN ad ABC ſphæram triplam proportionē habet eius, quam diameter EF ad BC diametrum. Vt autem ſphæra LMN ad ABC ſphęram, ita ſphæra DEF ad ſphæram quādam minorem ipſa ABC, vt ante demonſtratum fuit; quoniam ſphæra LMN maior eſt ipſa DEF. ergo & DEF ſphæra ad ſphęram minorem ipſa ABC triplam proportionem habet eius, quam EF ad BC, quod fieri non poſſe oſtenſum eſt. non igitur ABC ſphæra ad ſphęram maiorē ipſa DEF triplam proportionem habet eius, quam BE ad EF. oſtenſum autem eſt neque ad minorem. ergo ABC ſphæra ad ſphęram DEF triplam proportionem habebit eius, quam BC ad EF. quod demonſtrare oportebat.

DVODECIMI LIBRI FINIS.

EVCLIDIS ELEMENTORVM

LIBER TERTIVSDECIMVS ET SOLIDORVM TERTIVS.

CVM SCHOLIIS ANTIQVIS ET COMMENTARIIS.

Federici Commandini Vrbinatis.

THEOREMA I. PROPOSITIO I.



SI recta linea extrema, ac media ratione secta fuerit, maior portio assumens dimidiã totius, quintuplum potest eius, quod à dimidia fit, quadrati.


A Recta enim linea AB extrema, ac media ratione secetur in puncto C; & sit AC maior portio: producaturq; in directum ipsi CA recta linea AD; & ponatur AD ipsius AB dimidia. Dico quadratum ex CD quadrati ex DA quintuplum esse. describantur ex AB DC quadrata AE DF, & in DF describatur figura, & FC ad G producatur. Itaque quoniam AB extrema, ac media ratione secatur in C, erit quod AB BC continetur æquale quadrato ex AC. atque est rectãgulum quidem CE quod continetur AB BC: quadratum vero ex AC est FH. ergo rectangulum CE quadrato FH est æquale. & quoniam BA dupla est ipsius AD; æqualis autem BA ipsi AK; & DA ipsi AH: erit & KA ipsius AH dupla. ut autem KA ad AH, ita est rectangulum KC ad ipsum CH. duplum igitur est KC rectangulum rectanguli CH:

B

coroll.

C & sunt rectangula LH HC ipsius CH dupla. ergo rectangulum KC rectãgulis LH HC est æquale. ostensum autem autem est & rectangulum CE æquale quadrato FH. totum igitur AE quadratũ est æquale gnomoni MNX. Rursus quoniam BA

D dupla est ipsius AD, erit quadratum ex BA quadrati ex ad quadruplum, hoc est quadratum AE quadrati DH. æquale autem est quadratum AE gnomoni MNX. ergo & MNX gnomon quadruplus est quadrati DH. & ob id totum DF ipsius DH est quintuplum. atque est DF quidem quadratum ex CD, DH vero quadratum ex DA. quadratum igitur ex CD quadrati ex DA quintuplũ erit. ergo si recta linea extrema, ac media ratione secta fuerit, maior portio assumens totius dimidiam quintuplum potest eius, quòd à dimidia fit quadrati. quod demonstrare oportebat.




SCHOLIVM.

SCHOLIVM.

Resolutio est sumptio quæsiti tãquam concessi per ea, quæ consequuntur in aliquod uerum conceſſum.

Compositio est sumptio concessi per ea, quę consequuntur in quæsiti conclusionem, seu deprehensionem.

Antecedentis theorematis resolutio.



Recta enim linea quædam AB extrema, ac media ratione secetur in C, sitque maior portio AC, & ponatur AD ipsius AB dimidia æqualis. Dico quadratum ex CD quadrati ex DA quintuplũ esse. Quoniam enim quintuplum est quadratum ex CD quadrati ex DA; quadrato autem ex CD æqualia sunt quadrata ex CA AD vnà cum eo, quod bis CA AD continetur: erunt quadrata ex CA AD vnà cum eo, quod bis CA AD continetur, quadrati ex AD quintupla. ergo diuidendo quadratum ex CA vnà cum eo, quod bis continetur CA AD quadruplum est quadrati ex AD. Sed ei quidem, quod bis CA AD continetur æquale est rectangulum BAC. est enim BA ipsius AD dupla. quadrato autem ex AC est æquale rectangulum ABC; namque AB extrema, ac media ratione secta est in C. rectangulum igitur BAC vnà cum rectangulo ABC quadruplum est quadrati ex AD. sed rectangulum BAC vnà cum rectangulo ABC est id, quod fit ex AB quadratum. ergo quadratum ex BA quadruplum est quadrati ex AD. quod quidem ita se habet. est enim BA ipsius AD dupla. 4. secundi. 2. secundi. Cor. 10. sexti

Compositio.

Quoniam igitur quadruplum est quadratum ex BA quadrati ex AD; quadratũ autem ex AB est rectangulum BAC: vnà cum rectangulo ABC: erit rectangulum BAC vnà cum rectangulo ABC quadrati ex AD quadruplum. sed rectangulum quidem BAC est æquale ei, quod bis DA AC continentur; rectangulum autem ABC est æquale quadrato ex AC. ergo quadratum ex AC vnà cum eo, quod bis continetur DA AC quadruplum est quadrati ex DA; & ob id quadrata ex DA AC vnà cũ eo, quod bis DA AC continetur quintuplum est quadrati ex DA. sed quadrata ex DA AC vnà cum eo, quod bis continetur DA AC est id, quod fit ex DC quadratum. quadratum igitur ex CD quadrati ex DA quintuplum erit. quod oportebat demonstrare.

F. C. COMMENTARIVS.

Recta enim linea AB extrema, ac media ratione secetur in pũcto C] *Quomodo hoc fiat, docuit in vndecima propositione secundi libri, & in 30 sexti.* A


Describantur ex AB BC quadrata AE DF, & in DF describatur figura] *Sit ex AB quadratum AKEB, & ex DC quadratum DLFC; & iuncta DF, ducatur per A recta linea AH parallela alterutri ipsarum DL CF, quae diametrum DF in puncto H secet. rursus per H ducatur recta linea alterutri ipsarum LF DC parallela.* B

Et sunt rectangula LH HC ipsius HC dupla] *Supplementa enim LH HC inter se sunt aequalia ex 43 primi libri.* C

Erit quadratum ex BA quadrati ex AD quadruplum] *Ex 20 sexti.* D

Quadratum igitur ex CD quadrati ex DA quintuplum erit] *Possimus etiam aliter, & fortasse expeditius idem demonstrare in hunc modum.* E


Sit recta linea AC, quae extrema, ac media ratione secetur in C, & ex AB fiat quadratũ ADEB; sectaq; AD bifariã in F, & iuncta FB, producatur FA in G, ita vt FG ipsi FB sit aequalis, erit AG æqualis AC ex demõstratis i vndecima secũdi libri. quare FG cõstat ex maiori portione, et ex dimidia totius AB. Dico quadratũ ex FG quin



10. sexti. *tuplũ esse quadrati ex FA. Quoniam enim AB dupla est ipsius AF, erit quadratũ ex AB quadrati ex AF quadruplũ. sed quadratum ex FB est aequale quadratis ipsarum FA AB, ex 47 primi. quadratũ igitur ex FB, hoc est quadratum ex FG quadrati ex FA quintuplũ erit. quod oportebat demonstrare. sed & alia nonnulla demonstranda sunt, quae ad hanc sectionem attinent.*

PROPOSITIO I.

Data recta linea extrema, ac media ratione secta, & vtraque ipsius portio data erit.



Sit data recta linea AB 10, quae extrema, ac media ratione secetur in C. Dico ipsas AC CB datas esse. Construantur enim eadem, quę supra. & quoniam AB est 10, erit eius dimidia AF 5, cuius quadratũ est 25: quadratũ aũt ipsius AB est 100. ergo quadratũ ex FB est 125, & ipsa FB, hoc est FG ℞ 125. sed FA est 5. erit igitur AG, hoc est AC ℞ 125 minus. Quòd cũ 5. sit vt BA ad AC, ita AC ad CB, re-

17. sexti. *ctangulum contentum AB BC, videlicet rectangulum CE aequale erit quadrato ex AC. quadratum autem ex AC, hoc est quadratum ℞ 125 minus 5 est 150 minus ℞ 12500. si igitur ad CH applicetur 150 minus ℞ 12500 latitudinem faciẽs CB, erit CB 15 minus ℞ 125. ergo AC CB datae sunt, vt oportebat.*

Ex quibus manifestum est si recta linea rationalis, expositæ rationali longitudine commẽsurabilis extrema ac media ratione secta fuerit, maiorem eius portionẽ apotomen esse quintam, & minorem esse apotomen primam.


Est enim quadratum ex AB quadrati ex AF quadruplum. ergo quadratum ex FB ad quadratum ex BA proportionem habet, quam 5 ad 4. & quoniam quadratum ex FB ad quadratum ex

9. decimi. *BA proportionem non habet, quam quadratus numerus ad quadratum numerum; erit FB ipsi BA longitudine incommensurabilis; ac propterea FB plus potest, quàm FA quadrato rectae lineae sibi incommensurabilis longitudine. est autem AF, quae ipsi AG congruit, expositae rationali longi-*

5. diffi. ter- tiarum. *tudine commensurabilis. quare AC est apotome quinta. At vero CB esse apotomen primam, manifesto constat; quadratum enim apotomes ad rationalem applicatum latitudinem facit apotomen primam ex 98 decimi libri.*

PROPOSITIO. II.

Data maiori portione, totam rectam lineam, quæ extrema, ac media ratione secta sit, inuenire.



Sit maior portio AB, & exponantur rectae lineae CD E, ita vt CD sit ipsius E quintupla: inter CD vero, & E media proportionalis sit F: & ex CD abscindatur DG ipsi F aequalis; fiatq; vt CG ad GD, ita AB ad BH. erit igitur componendo vt CD ad DG hoc est ad F, ita AH ad HB. et

Cor. 10. sexti *quoniam tres rectae lineae CD F E deinceps proportionales sunt, erit vt CD ad E, ita quadratum ex CD ad quadratum ex F. est autem CD quintupla ipsius E. quadratũ igitur ex CD quintuplum est quadrati ex F. ergo quadratum ex AH quadrati ex HB est quintuplũ. estq; AB ma-*

ior portio

ior portio rectae lineae, quae extrema, ac media ratione secatur. quare BH est totius dimidia, & dupla ipsius BH est tota recta linea, quam nobis inueniendam proposuimus.


Itaque constat, Datæ maiori portione rectæ lineæ, quæ extrema, ac media ratione secetur, & maiorem portionem, & totam lineam datam esse.

Sit enim maior portio AB 4, sitq; CD 5, & E 1. erit F, hoc est GD ℞ 5, & CG 5 minus ℞ 5. fiat vt 5 minus ℞ 5 ad ℞ 5, ita 4 ad aliam. multiplicabimus igitur primum ℞ 5 per 4, producetur ℞ 80. deinde multiplicabimus 5 minus ℞ 5 per eam, quae ex binis nominibus ipsi respondet, videlicet per 5 plus ℞ 5, producetur 20. & per eandem multiplicabimus ℞ 80 fiet ℞ 2000 plus ℞ 400. quare si ad 20 applicabimus ℞ 2000 plus ℞ 400, latitudinem faciet ℞ 5 plus 1, cuius duplum est ℞ 20 plus 2. tota igitur recta linea est ℞ 20 plus 2, & minor portio ℞ 20 minus 2.

THEOREMA II. PROPOSITIO. II.

Si recta linea partis ipsius quintuplum possit, dupla dictæ partis extrema, ac media ratione secta, maior portio reliqua pars est eius, quæ à principio rectæ lineæ.

Recta enim linea AB partis ipsius AC quintuplum possit: & ipsius AC dupla sit CD. Dico si CD extrema, ac media ratione secetur, CB maiorem esse portionem. Describatur enim ex vtraque ipsarum AB CD quadrata AF CG: & in AF figura descripta, producatur FB in E. Quoniam igitur quadratum AF quintuplum est ipsius AH, erit MNX gnomō ipsius AH quadruplus. & quoniam DC dupla est CA, quadratum ex DC quadrati ex CA quadruplum est, videlicet quadratum CG quadruplum quadrati AH. ostensus est autem MNX gnomon quadruplus ipsius AH quadrati, ergo gnomon MNX quadrato CG est æqualis. Rursus quoniam DC dupla est CA, æqualis autem est DC ipsi CK, & AC ipsi CH; erit KC ipsius CH dupla. parallelogrammum igitur KB duplum est parallelogrammi BH. & sunt parallelogramma LH, HB ipsius HB dupla. ergo KB æquale est ipsis LH HB. sed & totus MNX gnomō toti CG est æqualis. & reliquum igitur HF æquale est reliquo BG. atque est BG quidem quod CD DB cōtinetur; etenim CD est æqualis DG: ipsum vero HF est quadratum ipsius BC. ergo quod continetur CD DB quadrato ex CB est æquale. vt igitur DC ad CB, ita est CB ad BD. maior autem est DC, quàm CB. ergo & CB quàm BD est maior. Itaque recta linea CD extrema, ac media ratione secta, maior portio est CB. si igitur recta linea partis ipsius quintuplum possit, dupla dictæ partis extrema, ac media ratione secta, maior portio reliqua pars est eius, quæ à principio rectæ lineæ. quod demonstrare oportebat.



A 10. secti.


B 14. secti.

At verò duplam ipsius AC maiorem esse, quàm CB, sic demonstrabitur.

Si enim nō, sit, si fieri potest, BC ipsius CA dupla. quadratum igitur ex BC quadruplum est quadrati ex CA; & ob id vtrumque quadratorum, quæ fiunt ex BC CA quadrati ex CA quintuplum est. sed & quadratum ex BA quadrati ex AC quintuplum ponitur. ergo quadratum ex BA æquale est quadratis ex BC CA. quod fieri non potest. non igitur BC dupla est ipsius CA. similiter demonstrabimus neque minorem BC ipsius CA duplam esse. multo enim maius absurdum sequetur. ergo ipsius AC dupla maior est quàm BC. quod demonstrandum fuit.

SCHOLIVM.

Antecedentis theorematis reſolutio.



Recta enim linea quædam CD partis ipſius DA quintuplũ poſſit,& ipſius DA dupla ponatur AB.Dico AB extrema, ac media ratione ſectam eſſe in puncto C,& maiorem portionem eſſe AC, quæ quidem eſt reliqua pars eius,quę à principio rectæ lineę.Quoniam enim AB extrema,ac media ratione ſecta eſt in C,& AC eſt maior portio; erit rectangulum ABC quadrato ex AC ęquale.eſt aũtem & rectangulum BAC ęquale ei, quod bis DA AC continetur. etenim BA ipſius AD eſt dupla.ergo rectangulum ABC vnà cum rectangulo BAC,quod quidem eſt ipſius AB quadratũ,æquale eſt ei,quod bis DA AC continetur vnà cum quadrato ex AC. quadratum autem ex AB quadruplum eſt quadrati ex AD.ergo quod bis DA AC continetur vnà quadrato ex AC quadruplum eſt eius, quod fit ex AD quadrati.ergo & quadrata ex DA AC vnà cum eo, quod bis continetur DA AC;hoc eſt quadratũ ex CD,quintupla ſunt quadrati ex AD. quod quidem ita ſe habet.

2.ſecundi.
2o. ſexti.
4.ſecundi.

Compoſitio.

Qm̃ igitur quadratũ ex CD quintuplũ eſt quadrati ex DA; quadrato aũt ex CD ęqualia ſunt quadrata ex DA AC vnà cũ eo,quod bis DA AC cõtinetur; erũt quadrata ex DA, AC vnà cũ eo,quod bis cõtinetur DA AC quintupla ipſius quadrati ex DA.& diuidendo quod bis DA AC cõtinetur vnà cũ quadrato ex AC quadrupla sũt quadrati ex AD.eſt aũt &quadratũ ex AB quadrati ex AD quadruplũ.ergo quod bis cõtinetur DA AC,quod eſt rectãgulũ BAC vnà cũ quadrato ex AC eſt ęquale quadrato ex AB.ſed quadratũ ex AB eſt rectãgulũ ABC unà cũ rectãgulo BAC.rectãgulũ igitur BAC vnà cũ rectãgulo ABC eſt æquale rectangulo BAC vnà cũ quadrato ex AC. & ablato communi rectangulo BAC, erit reliquũ rectangulũ ABC quadrato ex AC æquale.eſt igitur vt BA ad AC,ita AC ad CB. maior autem eſt BA, quam AC.ergo & AC quam CB eſt maior.quare AB extrema, ac media ratione ſecta eſt in C,& AC eſt maior portio.quod demonſtrare oportebat.


2.ſecundi.
14.ſexti.

F. C. COMMENTARIVS.

A Recta enim linea AB partis ipſius AC quintuplum poſsit] *Hoc eſt quadratum rectę lineę AB quintuplum ſit quadrati partis ipſius AC.*

B Maior autem eſt DC,quam CB] *Hoc eſt dupla ipſius AC maior eſt, quam BC, illud uero ipſe mox demonſtrabit.ſed & aliter idẽ demõſtrari poteſt hoc pacto.*

Recta enim linea AB partis ipſius BC quintuplum poſsit, & producatur AB ad D,ita vt DC ipſius CB ſit dupla. Dico ſi CD extrema,ac media ratione ſecetur,maiorem eius portionem eſſe AC. fiãt enim ex AC CD quadrata ACEF CDGH, & BH iungatur itaq; quoniam DC,hoc eſt HC dupla eſt ipſius CB, erit quadratum ex HC quadrati ex CB quadruplum.ſed quadratum ex BH eſt aequale duobus quadratis,quae fiunt ex HC CB.quadratum igitur ex BH quintuplum eſt quadrati ex CB; ideoq; BH ipſi BA eſt aequalis.ergo ex iis,quae demonſtrata ſunt in vndecima ſecundi libri recta linea CH extrema,ac media ratione ſecatus in E, & CE eſt maior portio. eſt autem CH ipſi CD aequalis, & CE aequalis ipſi CA.ſi igitur recta linea partis ipſius quintuplum poſsit, & reliqua. quod oportebat demonſtrare.




THEO-

THEOREMA III. PROPOSITIO. III.

Si recta linea extrema, ac media ratione secta fuerit, portio minor assumens dimidiam maioris portionis quintuplũ potest eius, quod à dimidia maioris portionis fit, quadrati.


Recta enim linea quædã AB extrema, ac media ratione secetur in C; sitq; AC maior portio, & secetur bifariam in D. Dico quadratum ex BD quadrati ex DC quintuplũ esse. Describatur enim ex AB quadratum AE, & figura compleatur. Quoniam igitur AC dupla est CD, erit quadratum ex AC quadrati ex CD quadruplum, hoc est quadratum RS quadrati FG. & quoniã rectangulum, quod AB BC continetur est æquale quadrato ex AC; atque est rectangulum quidem contẽtũ AB BC ipsum CE; quadratum vero ex AC est RS: erit rectangulum CE quadrato RS æquale. quadruplum autem est quadratũ RS quadrati FG. ergo & CE rectangulum quadrati FG quadruplum est. rursus quoniam AD. æqualis est DC, erit & HK ipi KF æqualis. ideoq; quadratum GF est æquale quadrato HL. æqualis igitur est GK ipsi KL, hoc est MN ipsi NE. ergo & parallelogrammum MF parallelogrammo FE est æquale. sed MF est æquale CG. quare & CG ipsi FE æquale erit. commune apponatur CN. gnomon igitur XOP est æqualis parallelogrammo CE. ostensum autem est CE quadruplum GF quadrati. & gnomon igitur XOP ipsius GF est quadruplus. & ob id quadratum DN quintuplũ est ipsius GF. est autem quadratum quidem DN, quod fit ex DB; GF vero, quod ex DC. quadratum igitur ex BD quadrati ex DC est quintuplum. quod demonstrare oportebat.



SCHOLIVM.

Antecedentis theorematis resolutio.

Recta enim linea AB extrema, ac media ratione secetur in C: & sit AC maior portio, cuius dimidia CD. Dico quadratum ex BD quadrati ex DC quintuplum esse. Quoniam enim quadratum ex BD quintuplum est quadrati ex DC; quadratum autem ex BD est quod continetur AB BC vna cum quadrato ex DC. ergo quod AB BC continetur vnà cum quadrato ex DC quintuplũ est quadrati ex DC: & diuidendo quod AB BC continetur quadrati ex DC quadruplum est. Ei vero, quod continetur AB BC est æquale quadratum ex AC; etenim AB extrema, ac media ratione secta est in C. ergo quadratum ex AC quadrati ex CD quadruplum est. quod quidem ita se habet est enim AC ipsius CD dupla.



6. secundi.


Compositio.

Quoniam dupla est AC ipsius CD, erit quadratũ ex AC quadrati ex CD quadruplum. sed quadratum ex AC est æquale ei, quod AB BC continetur. quod igitur AB BC continetur quadruplum est quadrati ex CD. & componendo quod continetur AB BC vnà cum quadrato ex CD, quod quidem est quadratum ex BD, quintuplum est quadrati, quod fit ex DC. atque hoc est, quod demonstrare oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

Ex iam dictis & alia constare possunt.

Data minori portione totam rectam lineam, quæ extrema, ac media ratione secta sit, inuenire.




Sit minor portio AB: & exponantur rectae lineae CD E; sitq; CD ipsius E quintupla: & inter CD E media proportionalis sumatur F, & alia construuntur, quemadmodum superius dictum est in propositione secunda earum, quas nos ad primam huius apposuimus. similiter demonstrabitur quadratum ex AH quadrati ex HB quintuplum esse. atque est AB minor portio rectas lineae, quae extrema, ac media ratione secatur. ergo BH est maioris portionis dimidia, & eius dupla BK portio maior. tota igitur linea est AK, cuius maior portio KB, & minor BA.

Patet igitur data minori portione rectæ lineę, quæ extrema ac media ratione secatur, & maiorem portionem & totam lineam datam esse.

Sit enim minor portio AB 4, & sit CD 5, & E 1. similiter, vt supra eodem in loco, demonstrabimus, maiorem portionem esse Ɛ 20 plus 2 quare tota recta linea erit 6 plus Ɛ 20.

THEOREMA IIII. PROPOSITIO IIII.

Si recta linea extrema, ac media ratione secta fuerit, totius & minoris portionis vtraq; quadrata tripla sunt quadrati eius, quod à maiori fit portione.




Sit recta linea AB, quę extrema, ac media ratione secetur in C, & sit AC maior portio. Dico quadrata ex AB BC quadrati ex AC tripla esse. Describatur enim ex AB quadratū ADEB, & figura compleatur. itaque quoniam AB extrema, ac media ratione secta est in C, & maior portio est AC; erit rectangulum contentū AB BC quadrato ex AC æquale. atque est rectangulum quidem AK, quod AB BC continetur: quadratum vero HG est quod fit ex A. C. æquale igitur est AK ipsi HG. & quoniam rectangulum AF est æquale FE, commune apponatur CK, erit totum AK toti CE æquale. ergo rectāgula CE AK ipsius AK sunt dupla. sed rectāgula AK CE sunt gnomon LMN, & quadratum CK. gnomon igitur LMN, & quadratum CK dupla sunt ipsius AK. rectangulum autem AK ostensum est æquale quadrato HG. ergo gnomon LMN, & quadratum CK ipsius HG sunt dupla; ac propterea gnomon LMN, & quadrata CK HG tripla sunt quadrati HG. & gnomon quidem LMN, & quadrata CK HG sunt totum AE quadratum, & quadratum CK, quę quidem sunt quadrata ex AB BC. quadratum autem GH est quod fit ex AC. quadrata igitur ex AB BC quadrati ex AC sunt tripla. quod demonstrare oportebat.

SCHOLIVM.

Antecedentis theorematis resolutio.

Recta enim linea AB extrema, ac media ratione secetur in C, & sit AC maior portio

portio. Dico quadrata ex AB BC tripla esse quadrati ex AC. Quoniam enim quadrata ex AB BC tripla sunt quadrati ex AC; sunt que quadrata ex AB BC æqualia rectãgulo, quod bis AB BC continetur vnà cum quadrato ex AC: erit rectangulum, quod bis continetur AB BC vnà cum quadrato ex AC triplum quadrati ex AC: & diuidendo quod bis cõtinetur AB BC duplũ quadrati ex AC. ergo quod semel AB BC continetur quadrato ex AC est æquale. quod quidem ita se habet. recta enim linea AB extrema, ac media ratione secta est in puncto C.




Compositio.

Itaque quoniam AB extrema, ac media ratione secta est in C, atque est AC maior portio; erit rectangulum, quod AB BC continetur quadrato ex AC æquale: ergo quod bis continetur AB BC duplum est quadrati ex AC: & cõponendo quod bis continetur AB BC vnà cum quadrato ex AC triplum est quadrati ex AC. sed quod bis AB BC continetur vnà cum quadrato ex AC est æquale quadratis, quæ ex AB BC fiunt. quadrata igitur ex AB BC quadrati ex AC sunt tripla.

THEOREMA V. PROPOSITIO. V.

Si recta linea extrema, ac media ratione secetur, adijciatur que ipsi æqualis maiori portioni; erit tota linea extrema, ac media ratione secta, & maior portio erit ea, quæ à principio posita est recta linea.

Recta enim linea AB extrema, ac media ratione secetur in C, & sit AC portio maior: ponaturq; ipsi CA æqualis AD. Dico rectam lineam DB extrema, ac media ratione secari in puncto A: & maiorem portionem esse AB, quę à principio posita est. Describatur enim ex AB quadratum AE, & figura compleatur. Quoniam igitur AB extrema, ac media ratione secta est in C, erit rectangulum quod continetur AB BC quadrato ex AC æquale. & rectangulum quidem quod continetur AB BC est CE: quadratum vero ex AC est CH. ergo EC ipsi CH est æquale. sed CE est æquale EH, & CH ipsi HD. quare & DH ipsi HE æquale erit. cõmune apponatur HB. totum igitur DK toti AE est æquale. atque est DK quidem, quod BD DA continnetur; est enim AD æqualis DL: quadratũ aũt AE est quod fit ex AB. ergo quod BD DA cõtinetur est æquale quadrato ex AB. & ob id vt DB ad BA, ita est BA ad AD. sed BD est maior, quam BA. maior igitur est BA quàm AD. ergo DB extrema, ac media ratione secta est in A, & AB est maior portio. quod demonstrare oportebat.



SCHOLIUM.

Antecedentis theorematis resolutio.

Recta. n. linea AB extrema, ac media ratione secetur in C: & sit maior portio AC: pona-

C:ponaturq; AD ipsi AC æqualis.
Dico DB extrema ac media ratione secari in puncto A: & BA maiorem esse portionem. Quoniã enim



DB extrema,ac media ratione secta est in A, & maior portio est AB;erit vt DB ad BA,ita BA ad AD.æqualis autem est DA ipsi AC.vt igitur DB ad BA,ita BA ad AC:& per conuersionem rationis vt BD ad DA,ita AB ad BC. quare diuidendo ut BA ad AD,ita AC ad CB.æqualis autem est DA ipsi AC. est igitur vt BA ad AC, ita AC ad CB. quod quidem ita se habet,etenim AB extrema, ac media ratione secatur in C puncto.


Compositio.

Itaque quoniam AB extrema,ac media ratione secatur in C, erit vt BA ad AC ita AC ad CB,æqualis autem est CA ipsi AD.ergo ut BA ad AD,ita AC ad CB: cõponendoque vt BD ad DA, ita AB ad BC; & per conuersionem rationis vt DB ad BA,ita BA ad AC.atque est CA æqualis AD. est igitur vt DB ad BA, ita BA ad AD.quare DB extrema,ac media ratione secatur in pũcto A,& BA est portio *maior*

F. C. COMMENTARIVS.

Sed non inutile uisum est hoc loco demonstrare theorema aliud quo utitur Pappus in quinto libro,quamquam eius demonstrationem nullam afferat.

Si recta linea extrema,ac media ratione secetur,abscindaturque à maiori portione linea,quę minori sit ęqualis;erit etiam ea extrema, ac media ratione secta,& maior portio erit quæ abscissa est recta linea




Sit recta linea AB, quae extrema,ac media rõne secetur in C, sitq; AC maior portio:& ab ipsa AC abscindatur CD, quae ipsi CB sit aequalis. Dico AC extrema, & media rõne secari in D:& CD maiorem esse portiorẽ.fiat enim ex AB quadratũ AE: & iuncta AE ducantur per CD rectae lineae CFK DL ipsi BE parallelae, quae diametrum AE secent in punctis FL: & per FL ducantur GFH ML parallelae ipsi AB.Itaque quoniam AB extrema,ac media ratione secatur in C; rectangulũ, quod AB BC continetur, hoc est rectangulum CE est aequale quadrato AF.sed ipsi CE aequale est rectangulum GE; etenim supplementa CH GK inter se ęqualia sunt;& quadratum FE est commune vtrique.ergo rectangulum GE quadrato AF est aequale.si igitur à rectangulo GE auferatur FE quadratum;& à quadrato AF auferatur quadratum LF, quod quidem est aequale quadrato FE,cum DE CB sint aequales, reliquum GK rectangulum,hoc est rectangulum MF,hoc est ipsum DF gnomoni NXO aequale erit, à quibus sublato communi LC,erit reliquum DG rectangulum aequale quadrato LF. at rectangulum quidem DG est quod CA AD continetur:quadratum vero LF est quod fit ex DC. vt igitur AC ad CD,ita CD ad DA.sed AC maior est,quàm CD.ergo & CD quàm DA maior erit. recta igitur linea AC extrema,ac media rõne secta est in D,& maior eius portio est CD. quod demõstrare oportebat.

14. sexti.

THEOREMA VI. PROPOSITIO. VI.

Si recta linea rationalis extrema,ac media ratione secta fuerit, vtraque portio irrationalis est,quæ apotome appellatur.

Sit recta linea rationalis AB;& secetur extrema,ac media ratione in C, sitque AC maior portio.Dico vtramque portionem AC CB irrationalẽ



esse,

esse, quæ apotome appellatur. producatur enim BA in D, & sit ipsius BA dimidia AD. Itaque quoniam recta linea AB extrema, ac media ratione secatur in C, & maiori portioni CA adijcitur AD, quę est ipsius AB dimidia; erit quadratum ex CD quadrati ex DA quintuplum. quadratum igitur ex CD ad quadratum ex DA proportionem habet, quam numerus ad numerum; ideoq; quadratum ex CD commensurabile est quadrato ex DA. rationale autem est quadratum ex DA; etenim DA est rationalis, cum sit ipsius AB rationalis dimidia. ergo & quadratum ex CD est rationale; ac propterea ipsa CD rationalis. & quoniam quadratum ex CD ad quadratum ex DA proportionem non habet, quam quadratus numerus ad quadratum numerum, recta linea CD ipsi DA incommensurabilis est longitudine. quare CD DA rationales sunt potentia solum commensurabiles; & idcirco AC apotome est. Rursus quoniam AB extrema, ac media ratione secta est, & maior portio est AC; erit ABC rectangulum æquale quadrato ex AC. quod igitur fit ex apotoma AC ad rationalem AB applicatum latitudinem facit BC. sed quadratum apotomes ad rationalem applicatum latitudinem facit apotomen primam. ergo BC est apotome prima. ostensa est autem & AC apotome. si igitur recta linea rationalis extrema, ac media ratione secta fuerit, vtraque portio irrationalis est, quæ apotome appellatur. atque illud est, quod demonstrare oportebat.

ex 1. huius
6. decimi
6. dif. decimi
9. decimi
74. decimi
98. decimi


F. C. COMMENTARIVS.

Hoc nos supra etiam aliter demonstrauimus. sed & alia ab his non abhorrentia demonstrare aggrediemur, quæ eiusmodi sunt.

PROPOSITIO I.

Si maior portio rectæ lineæ extrema, ac media ratione sectæ sit rationalis, expositę rationali longitudine commensurabilis, erit minor portio apotome quinta, & tota ex binis nominibus quinta.

Sit recta linea AB, quae extrema, ac media ratione secetur in C, & sit maior portio AC rationalis, expositae rationali longitudine commensurabilis. Dico minorem portionē CB esse apotomen quintam, & totam ex binis nominibus quintam.




Diuidatur enim AC bifariam in D. & quoniam AB extrema, ac media ratione secatur in C, & minori portioni BC adijcitur CD, quae est dimidia portionis maioris; quadratum ex BD quintuplum est quadrati ex DC; ac propterea ad ipsum proportionem habebit, quam numerus ad numerum, atque ipsi commensurabile erit. rationale autem est quadratum ex DC, quòd ipsa AC rationalis ponitur. ergo & quadratum ex BD est rationale, & ipsa BD rationalis. cum igitur quadratum ex BD ad quadratum ex DC proportionem non habeat, quam numerus quadratus ad quadratum numerum, recta linea BD ipsi DC incommensurabilis erit longitudine. quare BD DC rationales sunt potentia solum commensurabiles: ideoque CB apotome est. Dico & quintam esse. sit enim quadratum ex EF, quo quadratum ex BD superat quadratum ex DC. habebit quadratum ex BD ad quadratum ex EF proportionem eam, quam 5 ad 4. & cum proportionem non habeat, quam numerus quadratus ad quadratum numerum, recta linea BD ipsi EF longitudine est incommensurabilis. quare BD plus potest, quàm DC quadrato rectae lineae sibi incommensurabilis longitudine. atque est DC longitudine commensurabilis expositae rationali AC. ergo CB est apotome quinta. rursus quoniam AB extrema, ac media ratione secatur in C; & AC est maior portio, erit rectangulum ABC aequale quadrato ex AC. quadratū igitur ex AC ad CB applicatum latitudinem faciet AB. sed quadratum rationalis ad apotomen applicatum latitudinem facit eā, quę ex binis nominibus; & eundem ordinem habet, quem ipsa apotome ex 114 decimi. ergo AB ex binis nominibus est quinta. si igitur maior portio rectae lineae extrema, ac media ratione sectae sit rationalis, expositae rationali longitudine commen-

9. huius:
6. decimi
6. dif. decimi
9. decimi
9. decimi
5. dif. tertiarum.

mensurabilis, erit maior portio apotome quinta, & tota ex binis nominibus quinta. quod demonstrare oportebat.

PROPOSITIO II.

Si minor portio rectæ lineæ extrema ac media ratione sectæ sit rationalis, expositæq; rationali longitudine commensurabilis, erit maior portio ex binis nominibus quinta, & tota ex binis nominibus prima.




Sit recta linea AB, quæ extrema, ac media ratione secetur in C, & sit minor portio CB rationalis, expositæq; rationali longitudine commensurabilis. Dico maiorem portionem AC esse ex binis nominibus quintam; & totam AB ex binis nominibus primam. Secetur enim AC bifariam in D. Eadem ratione, qua supra, demonstrabitur quadratum ex BD quadrati ex DC quintuplum esse. itaque secetur DC in E, ita ut DE ad EC eandem proportionem habeat, quam BD ad DC. erit quadratum ex DE quadrati ex EC quintuplum, & ipsi commen-
19.quinti *surabile. & quoniam est vt tota BD ad totam DC, ita pars DE ad partem EC, erit & reliqua BE ad reliquam ED; vt BD ad DC, hoc est ut DE ad EC. ergo cum tres rectæ lineæ proportio-*
Cor.20.sexti *nales sint BE ED EC; erit BE ad EC, vt quadratum ex BE ad quadratum ex ED. sed quadra-*
6.dif.decimi *tum ex BE quintuplum est quadrati ex ED: est enim BE ad ED, ut BD ad DC. quare BE ipsius EC quintupla est; & idcirco BC est quadrupla ipsius CE; estq; BC rationalis. ergo & rationalis CE, & ipsi CB longitudine commensurabilis. & quoniam quadratum ex DE commensurabile est*
9.dif.decimi *quadrato ex EC, atque est quadratum ex EC rationale; erit etiam rationale quadratũ ex DE, ipsaq; DE rationalis. quòd cum quadratum ex DE ad quadratũ ex EC proportionem non habeat,*
9.decimi *quam quadratus numerus ad quadratum numerum; erit DE ipsi EC incõmensurabilis longitudine.*
87.decimi *sunt igitur DE EC rationales, & inter se potentia solum commensurabiles; & ob id DC ex binis nominibus est, cuius maius nomen DE. Dico & quintam esse. sit enim quadratum ex FG, quo*
6.decimi *quadratum ex DE superat quadratum ex EC, habebit quadratum ex DE ad quadratum ex FG proportionem eam, quam habet 5 ad 4. ergo FG ipsi DE longitudine est incommensurabilis. itaque quoniam DE plus potest quàm EC quadrato rectæ lineæ sibi incommensurabilis longitudine; estq; EC expositæ rationali CB longitudine cõmensurabilis: erit DC ex bis nominibus quinta. est autem AC ipsius CD dupla. ergo & AE est quinta ex binis nominibus. recta enim linea commensurabilis ei, quæ est ex binis nominibus, & ipsa ex binis nominibus est, atque ordine eadem ex 67 decimi libri. Et cum quadratum ex AC sit æquale rectangulo ABC, si ad rationalem BC applicetur, latitudinem faciet ipsam AB. ergo AB ex binis nominibus est prima. quadratum namque eius, quæ ex binis nominibus ad rationalem applicatum latitudinem facit ex binis nominibus primam ex 98 decimi. si igitur minor portio rectæ lineæ extrema, ac media ratione sectæ sit rationalis, expositæ rationali longitudine commensurabilis, erit maior portio ex binis nominibus quinta, & tota ex binis nominibus prima. quod demonstrare oportebat.*

THEOREMA VII. PROPOSITIO VII.

Si pentagoni æquilateri tres anguli siue continuati, siue non cõtinuati fuerint æquales, æquiangulum erit pentagonum.

Pentagoni enim æquilateri ABCDE tres anguli primum cõtinuati, qui ad puncta ABC æquales inter se sint. Dico pẽtagonum ABCDE æquiãgulum esse. Iungantur enim AC BE FD. & quoniam duæ CB BA duabus BA AE æquales sunt, altera alteri, & angulus CBA est æqualis angulo BAE,
4.primi *erit basis AC æqualis basi BE, & triangulum ABC triangulo ABE æquale, & reliqui anguli reliquis angulis æquales, quibus æqualia latera*




subtenduntur.

ſubtenduntur. angulus quidem BCA angulo BEA, angulus vero ABE angulo CAB. quare & latus AF eſt æquale lateri BF. oſtenſa autem eſt & tota AC toti IE æqualis. ergo & reliqua FC eſt æqualis reliquæ FE. atque eſt CD æqualis DE. duæ igitur FC CD duabus FE ED æquales ſunt, & baſis ipſorum eſt communis FD. quare angulus FCD angulo FED eſt æqualis. oſtenſus autem eſt & angulus BCA æqualis angulo AEB. totus igitur BCD æqualis eſt toti AED. ſed angulus BCD poſitus eſt æqualis angulis, qui ſunt ad puncta AB. ergo & AED angulus angulis, qui ſunt ad AB æqualis erit. ſimiliter demonſtrabimus & angulum CDE angulis, qui ſunt ad AB eſſe æqualem. æquiangulum igitur eſt ABCDE pentagonum. ſed non ſint anguli continuati ſibi ipſis æquales, ſed qui ſunt ad puncta ACD. Dico & ſic aquiangulum eſſe ABCDE pentagonum. Iungatur enim BD. & quoniam duæ BA AE duabus BC CD æquales ſunt, & angulos equales continent; erit baſis BE æqualis baſi BD, & ABE triangulum triãgulo BCD, & reliqui anguli reliquis angulis æquales, quibus æqualia latera ſubtenduntur. æqualis igitur eſt angulus AEB angulo CDB. eſt autem & BED angulus angulo BDE æqualis, quoniam & latus BE eſt æquale lateri BD. totus igitur angulus AED toti CDE eſt æqualis. Sed angulus CDE angulis, qui ſunt ad puncta AC æqualis ponitur. ergo & AED angulus angulis, qui ſunt ad AC eſt aqualis. Eadem ratione & angulus ABC æqualis eſt angulis, qui ſunt ad ACD puncta. æquiangulum igitur eſt ABCDE pentagonum. quod demonſtrare oportebat. 8. primi

THEOREMA VIII. PROPOSITIO VIII.

Si pentagoni æquilateri, & æquianguli duos continuatos angulos ſubtendant rectæ lineæ, extrema, ac media ratione ſe mutuo ſecant, & maiores ipſarum portiones pentagoni lateri ſunt æquales.




Pentagoni enim æquilateri, & æquianguli ABCDE duos continuatos angulos, qui ſunt ad puncta AB ſubtendant rectæ lineæ AC BE, quæ ſeſe in pũcto H ſecent. Dico vtramque ipſarũ extrema, ac media ratione ſecari in puncto H: & maiores earũ portiones pentagoni lateri æquales eſſe. deſcribatur enim circa ABCDE pentagonũ circulus ABCDE. & quoniã duæ rectæ lineæ EA AB duabus AB BC æquales ſunt, & angulos æquales continent; erit baſis BE baſi AC æqualis, & ABE triangulum æquale triangulo ABC, & reliqui anguli reliquis angulis æquales, alter alteri, quibus æqualia latera ſubtenduntur. æqualis igitur eſt BAC angulus angulo ABE. ergo AHE angulus anguli BAH eſt duplus; etenim extra triãgulum eſt ABH. eſt autem & angulus EAC duplus anguli BAC, quòd & circumferentia EDC circumferentiæ CB eſt dupla. ergo HAE angulus æqualis eſt angulo AHE; & ob id recta linea HE eſt æqualis ipſi EA, hoc eſt ipſi AB. et quoniam BA eſt æqualis AE, erit & angulus ABE angulo AEB æqualis. ſed angulus ABE oſtenſus eſt æqualis angulo BAH, ergo & BEA angulus æqualis eſt angulo BAH. & communis duobus triangulis, videlicet triangulo ABE, & triangulo ABH eſt angulus ABE. reliquus igitur BAE reliquo AHB eſt æqualis. ergo triangulum ABE æquiangulum eſt triangulo ABH; idcoque vt EB ad BA, ita eſt AB ad BH. æqualis autem eſt BA ipſi EH. vt igitur BE ad EH, ita EH ad HB. Sed BE maior eſt quàm EH. ergo & EH quàm HB eſt maior. recta igitur linea BE extrema, ac media ratione ſecta eſt in H, & maior portio HE pentagoni lateri eſt 4. primi 32. primi 33 ſexti. 6. primi 21. tertij

æqualis. Similiter demonſtrabimus & A C extrema, ac media ratione ſecari in H, & maiorem eius portionem C H pentagoni lateri æqualem eſſe. quod demonſtrare oportebat.

THEOREMA IX. PROPOSITIO. IX.

Si hexagoni & decagoni latera in circulo deſcripta componantur, erit tota recta linea extrema, ac media ratione ſecta, & maior ipſius portio erit hexagoni latus.



Sit circulus ABC, & deſcriptis in dicto circulo figuris, ſit decagoni quidem latus BC, hexagoni vero CD, & in directum ſibi ipſis conſtituantur. Dico totam rectam lineam BD extrema, ac media ratione ſecari in C, & maiorem eius portionem eſſe CD. Sumatur enim centrum circuli, quod ſit E; iungantúrq; EB EC ED, & BE ad A producatur. quoniã igitur decagoni æquilateri latus eſt BC, erit ACB circumferentia circumferentiæ BC quintupla; & ob id circumferentia AC. quadrupla eſt circumferentiæ CB. vt autem circumferentia A C ad ipſam C B, ita A E C angulus ad angulum CEB. angulus igitur AEC anguli CEB quadruplus eſt. & quoniã EBC angulus eſt æqualis angulo E CB, erit angulus AEC. anguli ECB duplus. eſt autem recta linea EC æqualis ipſi C D; vtraque enim eſt æqualis lateri hexagoni, quòd in circulo A B C deſcribitur. quare & angulus C E D æqualis eſt angulo CDE. eſt igitur angulus ECB anguli EDC duplus. ſed & angulus AEC duplus oſtenſus eſt anguli ECB. angulus igitur AEC anguli EDC eſt quadruplus. oſtenſus autem eſt & angulus AEC quadruplus anguli BEC. ergo EDC angulus angulo BEC æqualis erit. atque eſt angulus E B D communis duobus triangulis BEC BED. & reliquus igitur BED reliquo ECB eſt æqualis. ideoq; triangulum E B D triangulo EBC æquiangulum. ergo vt DB ad BE, ita EB ad BC. æqualis autẽ eſt E B ipſi CD. vt igitur BD ad DC, ita DC ad CB. atq; eſt BD maior quàm DC. ergo & DC quã CB eſt maior; ac propterea recta linea B D extrema, ac media ratione ſecta eſt in C, & CD eſt maior ipſius portio. quod demonſtrare oportebat.


Vlt. ſexti.
5. primi. 32. primi.
5. primi. 32. primi.
32. primi. 4. ſexti.

F. C. COMMENTARIVS.

Ex iam demonſtratis & alia demonſtrare licet, nempe hęc.

PROPOSITIO I.

Si latus hexagoni extrema, ac media ratione ſecetur, erit maior eius portio decagoni latus.




Sit recta linea AB, quae ſecetur in C, ita vt AC ſit hexagoni latus, & CB latus decagoni in eodem circulo deſcripti. ergo AB extrema, ac media ratione ſecatur in C: atque eſt AC maior portio. abſcindatur ab AC linea CD ipſi CB aequalis. erit AC quoq; extrema, ac media ratione ſecta in D: atque erit CD portio maior ex iis, quae à nobis demonſtrata ſunt ad quintam huius. eſt autem A C hexagoni latus, & CD latus decagoni. ſi igitur hexagoni latus extrema, ac media ratione ſecetur, erit maior eius portio decagoni latus. quod demonſtrare oportebat.

Ex antecedente.

PROPOSITIO II.

Si in circulo rationalem diametrum habente decagonum æquilaterum describatur, erit decagoni latus apotome quinta.



Maneant enim eadem, quae supra; & sit diameter AB rationalis. Dico decagoni latus BC esse apotomen quintam. Quoniam enim diameter AB est rationalis, erit quoque eius dimidia EC, hoc est CD rationalis. atq; est DC maior portio rectae lineae DB extrema, ac media ratione sectae; & CB minor portio eiusdem. Quando autem maior portio rectę lineę, quae extrema, ac media ratione secatur sit rationalis, minor portio est apotome quinta. quod à nobis supra demonstratum fuit. ergo latus decagoni BC est apotome quinta. quod oportebat demonstrare.

ad 8. huius Prop. 1.

PROPOSITIO. III.


Si latus decagoni æquilateri in circulo descripti, sit rationale, erit circuli diameter ex binis nominibus quinta.

Iisdem enim manentibus sit latus decagoni BC rationale. Dico diametrum AB esse ex binis nominibus, quintam. Quoniam enim BC, videlicet minor portio rectae lineae extrema, ac media ratione sectae est rationalis, erit maior portio CD ex binis nominibus quinta. quod etiam à nobis demonstratum est: ipsius autem CD dupla est AB; & quae longitudine commensurabilis est ei, quae ex binis nominibus, & ipsa ex binis nominibus est, atque ordine eadem ex 67 decimi libri. ergo et AB ex binis nominibus est quinta, quod demonstrare oportebat.

ad 6. huius Prop. 2.

THEOREMA X. PROPOSITIO. X.


Si in circulo pentagonum æquilaterum describatur, latus pentagoni potest, & hexagoni & decagoni latus in eodem circulo descriptorum.



Sit circulus ABCDE, & in ipso pentagonum æquilaterum ABCDE describatur. Dico pentagoni ABCDE latus posse latus, & hexagoni, & decagoni in eodem circulo descriptorum. Sumatur enim centrum circuli F, iunctaq; AF ad G producatur, & iugatur FB; deinde à puncto F ad AB perpendicularis agatur FH, & ad K producatur; iunganturque AK KB. & rursus à pũcto F ad AK perpendicularis agatur FB, & producatur ad M, & KN iungatur. Quoniam igitur circumferentia ABCG est æqualis circumferẽtiæ AEDG, quarum ABC æqualis est ipsi AED, erit reliqua CG reliquæ CD æqualis. Sed CD est pentagoni. ergo CG decagoni erit, quòd cum AF sit æqualis FB & FH perpendicularis, erit & angulus AFK æqualis angulo KFB. quare & circũferẽtia AK circũferẽtiæ KB est æqualis. dupla igitur est circũferẽtia AB circũferẽtię BK; & ob id recta linea AK est decagoni latus. Eadẽ rõne & AK est dupla KM. & quoniã circumferentia AB dupla est circumferentię BK, æqualis autem CD circumferentia circumferentiæ AB, erit circumferentia CD circumferentiæ BK dupla. estque DC dupla ipsius CG. ergo CG est æqualis BK, sed BK ipsius KM est dupla, quoniam & AK

8. primi. 26. tertij.

AK.& CG igitur ipſius KM dupla erit. eſt autem & CB circumferentia circumferentiæ B K dupla: etenim CB eſt æqualis BA. ergo & tota GB dupla eſt ipſius BM,& angulus GF B anguli BFM duplus. ſed & angulus CFB eſt duplus anguli FAB: quandoquidem FA B angulus æqualis eſt angulo ABF. ergo & angulus BFN angulo FAB eſt æqualis.communis autem duobus triangulis ABF BFN eſt KBF angulus.reliquus igitur AFB eſt æqualis reliquo BNF, & triãgulum ABF triãgulo BFN æquiangulum.ergo vt AB ad BF, ita FB ad BN.rectangulum igitur ABN eſt æquale quadrato ex FB. Rurſus quoniam A L eſt æqualis LK,communis autem, & ad rectos angulos LN; erit baſis KN *æqualis* baſi NA.ergo & angulus LKN angulo LAN eſt æqualis.ſed angulus LAN eſt *æqualis* angulo KBN. & angulus igitur LKN eſt æqualis angulo KBN. angulus *autem* NAK eſt communis duobus triangulis AKB,& AKN.ergo reliquus AKB *reliquo* K NA eſt æqualis;& triangulum KAB triangulo KNA æquiangulum.*vt igitur* BA *ad* AK,ita KA ad AN; ac propterea rectãgulum BAN eſt æquale quadrato ex AK. oſtẽſum eſt aũt & rectãgulũ ABN quadrato ex BF æquale.r &tãgulũ igitur ABN vnà cum rectangulo BAN,quod eſt quadratum ex AB eſt æquale quadraro ex BF vnà cum quadrato ex AK.atque eſt AB quidem pentagoni latus,BF vero latus hexagoni,& AK decagoni.ergo pentagoni latus poteſt & latus hexagoni & decagoni in eodem circulo deſcriptorum.quod demonſtrare oportebat.




Vltime sexti ꝟ 1 primi,uel 20 tertij.
4.sexti.
4 primi.
5.primi.
4 sexti.
17.sexti.
2. secundi.

THEOREMA XI. PROPOSITIO. XL

Si in circulo rationalem diametrum habente pentagonum æquilaterum deſcribatur,pentagoni latus eſt linea irrationalis,quę minor appellatur.

In circulo enim ABCDE rationalẽ diametrũ habẽte pentagonũ æquilaterum deſcribatur A BCDE.Dico pentagoni ABCDE latus irrationalem eſſe lineam, quę minor appellatur.ſumatur enim circuli centrum F;& iunctæ AF BF ad puncta GH producantur,& iungatur AC;ponaturq; FK ipſius AF pars quarta.rationalis autem eſt AF.ergo & FK eſt rationalis.ſed & rationalis BF.tota igitur BK rationalis erit. & quoniam circumferentia ACG æqualis eſt circumferentiæ A DG,quarum ABC eſt æqualis ipſi AED;erit reliqua CG reliquę GD æqualis. quòd ſi iungamus AG,fient anguli ad L recti,& DC dupla ipſius CL.Eadem ratione & anguli ad M recti ſunt,& AC dupla CM. Quoniam igitur angulus ALC eſt æqualis angulo AME, communis autem duobus triangulis ALC, & AMF eſt angulus LAC;reliquus AC L reliquo MFA æqualis erit;ideoq; triangulum ACL triangulo AMF æquiangulũ. ergo ut LC ad CA,ita MF ad FA;& antecedentium dupla. quare vt dupla ipſius L C ad CA,ita ipſius MF dupla ad FA.ſed vt ipſius MF dupla ad FA, ita eſt MF ad dimidiã ipſius FA.& vt igitur dupla ipſius LC ad CA, ita MF ad ipſius FA dimidiã: & conſequentium dimidia. quare ut dupla LC ad dimidiam ipſius CA, ita MF ad quartam partem ipſius FA.atque eſt ipſius quidem LC dupla CD; ipſius vero CA dimidia



6.diffi.decimi.
A
4.sexti.
B

dimidia CM; & ipsius FA quarta pars FK. est igitur vt DC ad CM, ita MF ad FK: & componendo vt vtraque DCM ad CM, ita MK ad KF. ergo ut quadratum, quod fit ex vtraque DCM ad quadratum ex CM, ita quadratum ex MK ad id, quod fit ex KF quadratum. & quoniam recta linea, quæ duo pentagoni latera subtendit, vt AC extrema, ac media ratione secta, maior portio est æqualis lateri pentagoni, hoc est ipsi DC; & maior portio assumens dimidium totius quintuplum potest eius, quod fit à totius dimidia; atq; est totius AC dimidia CM: erit quadratum ex DCM tanquam ex vna linea, quintuplum eius, quod fit ex CM. vt autem quadratum ex DCM tanquam ex vna linea ad quadratum ex CM, ita ostendimus esse quadratum ex MK ad quadratum ex KF. quintuplum igitur est quadratum ex MK quadrati ex KF: estque quadratũ ex KF rationale; quippe cum diameter rationalis sit. ergo & rationale est quadratum ex MK; & ipsa MK rationalis. quadratum enim ex MK ad quadratum ex KF proportionem habet, quam numerus ad numerum. & quoniam BF quadrupla est ipsius FK, erit BK ipsius KF quintupla. & quadratum ex BK viginti quintuplum quadrati ex KF. quadratum autem ex MK quintuplum est quadrati ex KF. ergo quadratum ex BK quadrati ex KM est quintuplum; ac propterea ad illud proportionẽ non habet, quam numerus quadratus ad quadratum numerum. incommensurabilis igitur est BK ipsi KM longitudine. atque est vtraque ipsarum rationalis. ergo BK KM rationales sunt potentia solum commensurabiles. si autem à rationali rationalis auferatur potentia solum commensurabilis existens toti, reliqua irrationalis est, quę apotome appellatur. quare MB est apotome, & ipsi congruẽs MK. Dico & quartam esse. quo enim quadratum ex BK superat quadratum ex KM, illi sit æquale quadratum ex N. ergo BK plus potest, quàm KM quadrato ex N. & quoniam commensurabilis est KF ipsi FB, & componendo KB commensurabilis ipsi BF; sed & BF cõmensurabilis ipsi BH longitudine, erit & KB ipsi BH commensurabilis. quòd cum quadratum ex BK quintuplum sit quadrati ex KM, habebit quadratum ex BK ad quadratum ex KM proportionem eam, quam habet quinque ad vnum. Ergo per cõuersionem rationis quadratum ex BK ad quadratum ex N proportionem habet, quam quinque ad quattuor, & non eam, quam quadratus numerus ad quadratum numerum. incommensurabilis igitur est BK ipsi N: idcircoq; BK plus potest, quàm KN quadrato rectę lineæ sibi incommensurabilis. itaque quoniam tota BK plus potest, quàm congruens MK, quadrato rectę lineæ sibi incommensurabilis, & tota BK commensurabilis est expositæ rationali BH, erit MB apotome quarta. quod autem rationali, & apotome quarta continetur rectangulum irrationale est, & ipsum potens est irrationalis, quæ minor appellatur. sed AB potest id, quod continetur HB BM, propterea quòd iuncta AH triangulum ABH est æquiangulum triangulo ABM: atque est vt HB ad BA, ita AB ad BM. ergo AB pentagoni latus est linea irrationalis, quę minor appellatur. quod oportebat demonstrare.

C D E F G H K L M N O P Q R S T

9. undecimi.

F. C. COMMENTARIVS.

Quòd si iungamus AG, fient anguli ad L recti, & DC dupla ipsius CL] *Iunctis enim AC ALG, si etiam intelligatur iuncta AD, quoniam circumferentia CG est æqualis circumferentiæ GD, erit angulus CAG æqualis angulo GAD. duæ igitur CA AL duabus DA AL æquales sunt, & angulus CAL est æqualis angulo DAL. ergo & basis CL basi LD est æqualis, & reliqui anguli reliquis angulis æquales, quibus æqualia latera subtenduntur. anguli igitur ALC est æqualis angulo ALD. & ob id vterque rectus est. & cum CL sit æqualis LD, erit DC ipsius CL dupla.* A 27. tertij. 4. primi. Diff. 10. primi.

Et antecedentium dupla] *Quoniam enim est vt LC ad CA ita MF ad FA, vt autem dupla ipsius LC ad LC, ita dupla ipsius MF ad MF; erit ex æquali vt dupla ipsius LC ad CA, ita dupla ipsius MF ad FA.* B

Ergo vt quadratum, quod fit ex vtraque DCM ad quadratum ex CM] *Ex 22. sexti libri.* C

Maior portio est æqualis lateri pentagoni, hoc est ipsi DC] *Ex 8. huius.* D E

totius

E Et maior portio assumens dimidiam totius quintuplum potest eius, quod fit à totius dimidia] *Ex 1. huius.*

F Ergo & rationale est quadratum ex MK] *Rationali enim commensurabile, & ipsum rationale est ex nona diffinitione decimi libri.*

G Et ipsa MK rationalis] *Ex 8. diffinitione eiusdem libri.*

H Et quadratum ex BK vigintiquintuplum quadrati ex KF] *Ex 20 sexti libri, est enim 25 ad 5, vt 5 ad 1. quare 25 ad 1. proportionem duplam habet eius, quam 5 habet ad 1. ex 10 diffinitione quinti libri.*

K Ergo quadratum ex BK quadrati ex KM est quintuplum] *Nam cum quadratum ex BK ad quadratum ex KF sit vt 25 ad 1, quadratum vero ex MK ad idem quadratum ex KF sit vt 5 ad 1; erit quadratum ex BK ad quadratum ex MK, vt 25 ad 5, hoc est vt 5 ad 1.*

L Incommensurabilis igitur est BK ipsi KM longitudine] *Ex nona decimi libri.*

M Si autem à rationali rationalis auferatur potentia solum commensurabilis existens toti, reliqua irrationalis est, quę apotome appellatur] *Ex 74 decimi libri.*

N Et quoniam commensurabilis est KF ipsi FB] *Intellige commensurabilis longitudine, quemadmodum & inferius; posita est enim KF quarta pars ipsius FA, hoc est ipsius FB.*

O Et componendo KB commensurabilis ipsi BF] *Ex 16 decimi.*

P Sed & BF commensurabilis ipsi BH longitudine] *Est enim BF ipsius BH dimidia.*

Q Erit & BK ipsi BH commensurabilis] *Ex 12 decimi.*

R Erit MB apotome quarta] *Ex quarta tertiarum diffinitionum.*


S Quod autem rationali, & apotoma quarta continetur rectangulum irrationale est & ipsum potens est irrationalis, quæ minor appellatur] *Ex 95 decimi.*

T Sed AB potest id, quod continetur HB BM] *Ex corollario 8 sexti, & 17 eiusdem.*

THEOREMA XII. PROPOSITIO. XII.

Si in circulo triangulum æquilaterum describatur, trianguli latus potentia triplum est eius, quę ex circuli centro.

Sit circulus ABC, & in ipso triangulum æquilaterum describatur ABC. Dico trianguli ABC latus potentia triplũ esse eius, quę est ex circuli ABC cẽtro. sumatur enim circuli cẽtrum D, & iuncta AD producatur ad E, & BE iũgatur. Itaque quoniam æquilaterum est ABC triangulum, erit BEC circumferentia tertia pars circumferentiæ circuli ABC. ergo circumferentia BE est sexta pars circuli circumferentiæ; idcoq; recta linea BE est latus hexagoni, & æqualis ipsi DE, quę est ex circuli centro. & quoniam AE est dupla ipsius ED, erit quadratũ ex AE quadrati ex ED; hoc est quadrati ex EB quadruplũ. quadratũ autem ex AE est æquale quadratis ex AB BE. ergo quadrata ex AB BE quadrupla sunt quadrati ex BE. & diuidendo quadratum ex AB quadrati ex BE triplum: atque est BE æqualis ED. quadratum igitur ex AB triplum est quadrati ex DE. ergo trianguli latus est potentia triplum eius, quæ ex circuli centro. quod demonstrare oportebat.



Corol. 15. quarti. 20. sexti. 47 primi.


F. C. COMMENTARIVS.

Constat etiam latus trianguli æquilateri ad rectam lineam, quæ ab angulo ad basim perdendicularis ducitur, eam potentia proportionem habere, quam habet 4 ad 3.

Sit enim triangulum aequilaterum ABC, cuius basis EC bifariam secetur in D, & AD iungatur. erit AD ad ipsam AC perpendicularis; sunt enim duo latera AD DB duobus lateribus AD

DC

DC aequalia, & baſis AB eſt aequalis baſi AC. angulus igitur ADB eſt aequalis angulo ADC. & ideo vterque ipſorum rectus, & AD ad BC eſt perpendicularis. Dico quadratum ex BA ad quadratum ex AD proportionem habere eandem, quam 4 ad 3. Quoniam enim AB dupla eſt ipſius BD, erit quadratum ex AB quadrati ex BD quadruplum: atque eſt quadratum ex AE aequale quadratis ex AD DE. quadratum igitur ex EA ad quadratum ex AD eam proportionem habet, quã 4 ad 3. quod oportebat demonſtrare.





20. ſexti.
47. primi.

PROBLEMA I. PROPOSITIO. XIII.

Pyramidem conſtituere, & ſphęrę comprehendere data, ac demonſtrare ſphærę diametrum potentia ſeſquialteram eſſe lateris ipſius pyramidis.

Exponatur enim datæ ſphærę diameter AB, & ſecetur in C, ita vt AC ipſius CB ſit dupla: deſcribaturque in AB ſemicirculus ADB: & à puncto C ipſi AB ad rectos angulos ducatur CD, & DA iungatur. exponatur præterea circulus EFG æqualem habens eam, quæ ex centro ipſi DC, in quo deſcribatur triangulum æquilaterum EFG: ſumaturque centrum circuli H, & iungantur EH HF HG: atque à puncto H ipſi plano circuli EFG ad rectos angulos erigatur HK, ità vt HK ipſi AC ſit æqualis, & KE KF KG iungantur. Quoniam igitur HK recta eſt ad planum circuli EFG, & ad omnes rectas lineas, quæ in eodem circuli plano exiſtentes ipſam cõtingunt, rectos angulos faciet. contingit autem ipſam vnaquæque linearum HE HF HG. ergo HK ad vnamquamque ipſarum HE HF HG eſt perpendicularis. & quoniam AC quidem eſt æqualis HK, CD vero ipſi HE, & rectos angulos continent; erit baſis DA æqualis baſi KE. Eadem ratione & vtrãque KF KG ipſi DA eſt æqualis. tres igitur KE KF KG inter ſe æquales ſunt. quòd cum AC ſit dupla CB, erit AB ipſius BC tripla. vt autem AB ad BC, ita quadratum ex AD ad quadratum ex DC, vt deinceps demonſtrabitur. triplum igitur eſt quadratum ex AD quadrati ex DC. eſt autem & quadratum ex FE quadrati ex EH triplum. atque eſt DC æqualis EH. ergo & AD ipſi EF eſt æqualis. ſed AD oſtenſa eſt æqualis vnicuique ipſarum KE KF KG. & vnaquęque igitur ipſarum EF FG GE vnicuique KE KF KG eſt æqualis. & ob id æquilatera ſunt quattuor triangula EFG KEF KFG KGE. pyramis igitur cõſtituta eſt ex quattuor triangulis æqualibus & æquilateris, cuius baſis quidem eſt triangulum EFG, uertex autem K pũctum. Itaq; oportet ipſam & ſphæra data comprehẽdere, & oſtẽdere ſphęræ diametrum potentia ſeſquialterã eſſe lateris pyramidis. producatur enim recta linea HL in directum ipſi HK; ponaturque HL






5 diffinit. vndecimi.


4. primi.


A
B
C




ipſi BC æqualis. & quoniam eſt vt AC ad CD, ita DC ad CB; æqualis autem AC quidem ipſi KH, CD vero ipſi HE, & CB ipſi KL: erit vt KH ad HE, ita EH ad HL. rectangulum igitur KHL eſt æquale quadrato ex EH. atque eſt rectus vterque angulorum KHE EHL. ergo in KL deſcriptus ſemicirculus & per punctum E tranſibit. nam ſi coniungamus EL, angulus LEK fiet rectus, cum triangulum ELK æquiangulum ſit vnicuiq; triangulorum ELH EKH. ſi igitur manente KL ſemicirculus cõuerſus in eundem rurſus locum reſtituatur, à quo cœpit moueri, etiã per puncta FG tranſibit, iunctis FL LG; & rectis ſimiliter factis ad puncta FG angulis atque erit pyramis comprehenſa data ſphæra; etenim KL ſphæræ diameter eſt æqualis diametro datæ ſphæræ AB, quoniam ipſi quidem AC ponitur æqualis KH; ipſi vero CB æqualis HL. Dico igitur ſphæræ diametrum potentia ſeſquialteram eſſe lateris pyramidis. Quoniam enim AC dupla eſt ipſius CB, erit AB ipſius BC tripla. ergo per *conuerſionem rationis* BA ſeſquialtera eſt ipſius AC. vt autem BA ad AC, ita eſt quadratum ex BA ad quadratum ex AD, quoniam iuncta BD, eſt vt BA ad AD, ita DA ad AC ob ſimilitudinem triangulorum DAB DAC, & quòd vt prima ad tertiam, ita quadratum ex prima ad quadratum ex ſecunda. ergo quadratum ex BA ſeſquialterum eſt quadrati ex AD. atque eſt BA quidem datæ ſphæræ diameter, AD vero æqualis lateri pyramidis. ſphæræ igitur diameter ſeſquialtera eſt lateris pyramidis. quod demonſtrare oportebat.

17. ſexti.
8. ſexti.
Cor. 8 ſexti.
Cor. 20. ſexti.








Itaque demonſtrandum eſt vt AB ad BC, ita eſſe quadratum ex AD ad quadratum ex DC.

Exponatur enim ſemicirculi figura; iungaturq; DB: & ex AC deſcribatur quadratum EC, & parallelogrammum FB compleatur. Quoniã igitur eſt vt BA ad AD, ita DA ad AC, propterea quòd triãgulum DAB æquiangulum eſt triãgulo DAC; erit rectangulum contentum BAC quadrato ex AD æquale. & quoniam eſt vt AB ad BC, ita parallelogrammum EB ad parallelogrammum BF; atque eſt parallelogrammũ quidem EB, quod continetur BA AC, eſt enim EA æqualis AC; parallelogrammum uero BF æquale eſt ei, quod AC CB continetur: erit ut AB ad BC, ita rectangulum contentum BA AC ad cõtentum AC CB. eſt autem contentum BA AC æquale quadrato ex AD: & contentum AC CB quadrato ex DC. æquale: perpendicularis enim DC media eſt proportionalis inter baſis portio-

Cor. 8. ſexti.
17. ſexti.
8. ſexti.
17. ſexti.
Cor. 8. ſexti



nes

nes AC CB, cum angulus ADB ſit rectus. ex quibus ſequitur vt AB ad BC, ita eſſe quadratum ex AD ad quadratum ex DC. quod demonſtrare oportebat.

F. C. COMMENTARIVS.

Vt autem AB ad BC, ita quadratum ex AD ad quadratum ex DC] *Quod deinceps demonſtrabitur, videlicet ad finem huius, ſed in ſcholio aliter demonſtratur, hoc modo.* A


Quoniam enim eſt ut BA ad AC, ita quadratum ex DA ad quadratum ex AC, erit per conuerſionem rationis vt AB ad BC, ita quadratum ex AD ad quadratum ex DC] *Nam tres rectae lineae BA AD AC deinceps proportionales ſunt ex corollario 8. ſexti, & quadratum ex AD ſuperat quadratum ex AC, quadrato ex DC, ex 47 primi.*

Eſt autem & quadratum ex FE quadrati ex EH triplum] *ex antecedente.* B


Ergo & DA ipſi EF eſt æqualis] *Quoniam enim quadratum ex AD triplũ eſt quadrati ex DC, et quadratũ DC ex FE triplum quadrati ex EH; eſtq; quadratũ ex DC æquale quadrato ex EH, quod DC ipſi EH ſit aequalis: erit quadratũ ex AD æquale quadrato ex EF: ideoq; AD ipſi EF æqualis.* C

PROBLEMA II. PROPOSITIO. XIIII.


Octaedrum conſtituere, & ſphæra comprehendere, qua & pyramidem: demonſtrareq; ſphæræ diametrum potentia duplam eſſe lateris octaedri.




Exponatur datæ ſphæræ diameter AB: & in C biſariam ſecetur; deſcribaturq; in AB ſemicirculus ADB; & à puncto C ipſi AB ad rectos angulos ducatur CD: & DB iungatur. exponatur præterea quadratum EFGH habens vnumquodque latus æquale ipſi BD: & iunctis HF EG, erigatur à puncto K ipſi EF GH quadrati plano ad rectos angulos KL; producaturq; ad alteras partes plani, vt KM: & auferatur ab vtraque rectarum linearum KL KM vni ipſarum KE KF KG KH æqualis vtraque KL KM: & iungantur LE LF LG LH ME MF MG MH. quũ igitur KE eſt æqualis KH, atq; eſt rectus angulus EKH; erit quadratũ ex HE quadrati ex EK duplum: Rurſus quoniam LK eſt æqualis KE, & rectus LKE angulus; erit quadratum ex EL duplum quadrati ex EK. oſtenſum eſt autem & quadratum ex HE quadrati ex EK duplum. ergo quadratum ex LE æquale eſt quadrato ex EH, & LE ipſi EH æqualis. Eadẽ ratione & LH eſt æqualis HE. æquilaterũ igitur eſt LEH triangulum. ſimiliter oſtendemus & vnumquodque reliquorum triangulorum, quorum baſes ſunt latera quadrati EFGH, vertices autem LM puncta, æquilaterum eſſe. octaedrum igitur conſtitutum eſt, quod octo triãgulis æquilateris continetur. itaq; oportet ipſum & data ſphæra comprehendere: demonſtrareq; ſphęrę diametrum potentia duplam eſſe lateris octahedri. quoniam enim tres rectę lineæ LK KM KE inter ſe æquales ſunt, ſemicirculus in LM deſcriptus, & per punctum E tranſibit. & ob eandem cauſſam ſi manente LM conuerſus ſemicirculus in eundem locum reſtituatur, à quo cœpit



47. primi




moueri, transibit etiam per puncta FGH: atque erit octaedrum sphæra comprehensum. Dico etiam comprehensum esse data sphæra. quoniam enim LK est æqualis KM, communis autem KE, & angulos æquales cõtinent; erit basis LE basi EM æqualis. & quoniam rectus est LEM angulus, in semicirculo enim, erit quadratum ex LM quadrati ex LE duplum. rursus quoniam AC est æqualis CB, erit AB dupla ipsius BC. vt autem AB ad BC, ita quadratum ex AB ad quadratum ex BD. duplum igitur est quadratum ex AB quadrati ex BD. ostensum est autem & quadratum ex LM quadrati ex LE duplum. atque est quadratum ex BD æquale quadrato ex LE; posita est enim EH ipsi DB æqualis. ergo quadratum ex AB est æquale quadrato ex LM; ac propterea ipsa AB est æqualis LM. est autem AB diameter datæ sphæræ. quare LM est æqualis datæ sphæræ diametro. octaedrum igitur comprehensum est data sphæra: & simul demonstratum est sphæræ diametrum lateris octaedri potentia duplam esse.




47. primi.

Cor. 8. & 20. sexti.




PROBLEMA III. PROPOSITIO. XV.

Cubum constituere, & sphæra comprehendere, qua & priores, demonstrareque sphæræ diametrum lateris cubi potentia triplam esse.



Exponatur enim datæ sphæræ diameter AB: & secetur in C, ita ut AC ipsius CB sit dupla: describaturq; in AB semicirculus ADB, & à puncto C ipsi AB ad rectos angulos ducatur CD, & DB iungatur. deinde exponatur quadratum EFGH, habens unumquodque latus æquale ipsi DB: & à punctis EFGH quadrati EFGH plano ad rectos angulos ducantur EK FL GM HN, & auferatur ab unaquaque rectarum linearum EK FL GM HN uni ipsarum EF FG GH HE æqualis unaquæque EK FL GM HN: & KL LM MN NK iungantur. cubus igitur constitutus est FN, qui sex quadratis æqualibus continetur. Itaque oportet ipsum & sphæra data comprehendere, demonstrareque sphæræ diametrum potentia triplam esse lateris cubi. Iungantur enim KG EG. & quoniam rectus est KEG angulus, propterea quòd & KE perpẽdicularis sit ad EG planũ uidelicet, & ad rectam lineam EG: semicirculus in KG descriptus & per pũctum E transibit. Rursus quoniam FG perpẽdicularis ad utramque ipsarum FL FE, & ad FK planum est perpendicularis, quare si iungamus FK ipsa FG & ad FK perpendicularis erit; ac propterea rursus in KG descriptus semicirculus transibit & per punctum F. similiter autem & per reliqua cubi puncta transibit. si igitur manente KG conuersus semicirculus in eũdem rursus locum restituatur, à quo cœpit moueri, erit cubus sphæ-




8. diff. unde cimi.

4. Vndecimi

ra

re comprehenſus. Dico & data ſphæra. Quoniam enim GF eſt æqualis FE, atque eſt rectus qui ad F angulus; erit quadratum ex EG quadrati ex EF duplum. æqualis autem eſt EF ipſi EK. quadratum igitur ex EG duplum eſt quadrati ex EK. ergo quadrata ex GE EK, hoc eſt quadratum ex GK triplum eſt quadrati ex KE. & quoniam AB eſt ipſius BC tripla: & ut AB ad BC, ita quadratũ ex AB ad quadratum ex BD; erit quadratum ex AB quadrati ex BD triplum. oſtenſum eſt autem & quadratum ex GK triplum quadrati ex KE: & poſita eſt KE ipſi BD æqualis. ergo & KG eſt æqualis AB. atque eſt AB data ſphæræ diameter. quare & KG æqualis erit diametro datæ ſphæræ. cubus igitur data ſphæra eſt comprehenſus. & ſimul demonſtratum eſt ſphæræ diametrum lateris cubi potentia triplam eſſe. quod demonſtrare oportebat.




47. primi.


Coroll. 20 unii.

PROBLEMA V. PROPOSITIO XVI.

Icoſaedrum conſtituere & ſphæra comprehendere, qua & prædictas figuras; demonſtrareque icoſaedri latus irrationalem eſſe lineam, quæ minor appellatur.


Exponatur datæ ſphæræ diameter AB; ſeceturque in C, ita ut AC ipſius DB ſit quadrupla: & in AB deſcripto ſemicirculo ADB, ducatur à puncto C ipſi AB ad rectos angulos recta linea CD. & DB iungatur. deinde exponatur circulus EFGHK, cuius ea, quæ ea centro ſit æqualis ipſi DB: deſcribaturq; in circulo EFGHK pentagonum æquilaterũ & æquiangulum EFGHK: & circumferentiæ EF FG GH HK KE bifariam ſecentur in LMNXO punctis; & iungantur EL LF FM MG GN NH HX XK KO OE: & ſimiliter LM MN NX XO OL. æquilaterum igitur eſt LMNXO pentagonum; & recta linea EO eſt decagoni latus. deinde à punctis EFGHK ipſi plano circuli ad rectos angulos erigantur EP FR GS HT KY æquales exiſtentes ei, quæ ex centro circuli EFGHK, & iungãtur PR RS ST TY YP PL LR RM MS SN NT TX XY YO OP. Quoniam igitur utraque ipſarum EP KY eidem plano eſt ad rectos angulos, erit EP ipſi KY






parallela

parallela; atque eſt ipſi æqualis. quę autem æquales, & parallelas ad eaſdem partes
33. primi. coniungunt rectæ linræ, & ipſæ æquales, & parallelæ ſunt. ergo PY ipſi EK & æqua-
lis eſt, & parallela. ſed EK eſt latus pentagoni æquilateri. ergo & PY eſt pentagoni
æquilateri latus, in circulo EFGHK deſcripti. Eadem ratione & unaquæque ipſarũ
PR RS ST TY eſt latus pentagoni æquilateri in eodem circulo deſcripti. æquilate
rum igitur eſt PRSTY pentagonum. & quoniam hexagoni quidem latus eſt PE, de
B goni uero EO, atque eſt rectus PEO angulus; erit PO latus pentagoni. etenim la-
tus pentagoni poteſt & hexagoni, &
decagoni latus in eodem circulo de
ſcriptorum. Eadem ratione & QY
eſt pentagoni latus; eſt autem & PY
latus pentagoni. ergo æquilaterum
eſt triangulum POY. & ob eandem
cauſſam vnumquodque triangulo-
rum PLR RMS SNT TXY eſt æ-
quilaterum. & quoniam pentagoni
oſtenſa eſt vtraque ipſarum PL PO,
atque eſt LO pentagoni; erit PLO
æquilaterum triangulum. Ea-
dem ratione & vnumquoq; triã
gulorum LRM MSN NTX X
YO æquilaterum eſt. ſumatur cẽ
trum circuli EFGHK, quod ſit
punctum V; & à puncto V ipſi
circuli plano ad rectos angulos
erigatur VΩ, & ad alteras partes
producatur, vt Vτ: & auferatur
hexagoni quidem latus VQ: de-
cagoni vero vtraque ipſarum V
τ QΩ, & iungantur PΩ PQ Y
Ω EV LV Lτ τM. & quoniam
vtraque ipſarum VQ PE circu-
li plano eſt ad rectos angulos,
6 undecimi erit VQ ipſi PE parallela. ſunt
autem & æquales. ergo EV PQ
& æquales ſũt, & parallelæ: eſtq;
EV hexagoni latus. hexagoni
igitur & PQ quòd cum hexagoni quidem latus ſit PQ, decagoni vero QΩ, & rectus
10. huius. PQΩ angulus; erit PΩ latus pentagoni. Eadem ratione & YΩ pentagoni eſt latus;
quoniam ſi iungamus VK QY & æquales, & ex oppoſito erunt. atque eſt VK ex cen
tro circuli, uidelicet hexagoni latus. ergo & QY eſt latus hexagoni. decagoni autẽ
QΩ, & rectus angulus eſt YQΩ. pentagoni igitur eſt YΩ: eſtque PY pentagoni. qua
re æquilaterum eſt PYΩ triangulum. Eadem ratione & æquilaterum eſt vnumquod
que reliquorum triangulorum, quorum baſes ſunt PR RS ST TY rectæ lineę, uer
tex autem Ω punctum. Rurſus quoniam hexagoni eſt VL, decagoni vero Vτ, & an-
gulus LVτ rectus; erit Lτ pentagoni. Eadem ratione ſi iungamus MV, quæ eſt hexa-
goni, concludetur & Mτ pentagoni eſſe. eſt autem & LM pentagoni. æquilaterum
igitur eſt LMτ triangulũ. ſimiliter oſtendetur & æquilaterum eſſe unumquodque
reliquorũ triãgulorũ quorũ baſes ſunt MN NX XO OL, uertex aũt τ punctũ, cõſti
tutum igitur eſt icoſaedrum, uiginti triangulis æquilateris contentum. Itaq; opor
tet ipſum ſphęra data comprehendere, demonſtrareque icoſaedri latus lineam irra
C tionalem eſſe, quæ minor appellatur. Quoniam enim hexagoni latus eſt VQ, decа-
goni vero QΩ; recta linea VΩ extrema, ac media ratione ſecta eſt in Q, & VQ eſt ma
ior portio. eſt igitur ut ΩV ad VQ, ita VQ ad QΩ. atque eſt VQ ipſi VL æqualis, &





QΩ

QΩ ipsi Vϒ. quare ut ΩV ad VL, ita LV ad Vϒ. & sunt anguli ΩVL LVϒ recti. si igitur iungamus rectam lineam LΩ, erit ϒLΩ rectus angulus, ob similitudinem triangulorum ϒLΩ VLΩ. ergo semicirculus in ϒΩ descriptus etiam per L transibit. Eadem ratione quoniam est ut ΩV ad VQ, ita VQ ad QΩ; & æqualis est ΩV quidem ipsi ϒQ. VQ uero ipsi QP: erit vt ϒQ ad QP, ita PQ ad QΩ: ideoque si rursus iungamus Pϒ, erit angulus, qui ad P rectus. semicirculus igitur descriptus in ϒΩ transibit & per P. Quòd si manente ϒΩ conuersus semicirculus in eundem rursus locum restituatur, à quo cœpit moueri, etiam per P, & per reliqua icosaedri puncta transibit: atque erit icosaedrum sphæra comprehensum. Dico & data. secetur enim VQ bifariam in Z & quoniam recta linea VΩ extrema, ac media ratione secta est in Q, & ΩQ est minor ipsius portio, ipsa ΩQ assumens dimidiam maioris portionis, videlicet QZ quintuplum poterit quadrati eius, quod à dimidia maioris portionis describitur. quadratum igitur ex ΩZ quadrati ex ZQ quintuplum est. & ipsius quidē ZΩ dupla est Ωϒ; ipsius vero AQ dupla QV. ergo quadratum ea Ωϒ quintuplum est quadrati ex VQ. & quoniam AC quadrupla est ipsius CB, erit AB ipsius BC quintupla. ut autem AB ad BC, ita quadratum ex AB ad quaratum ex BD. quadratum igitur ex AB quadrati ex BD est quintuplum. ostensum autem est & quadratum ex Ωϒ quintuplum quadrati ex VQ: atque est DB æqualis VQ: vtraque enim ipsarum est æqualis ei quæ ex centro circuli EFGHK. quare & AB est æqualis ϒΩ, estq; AB data sphęræ diameter. & ϒΩ igitur erit diameter datę sphęrę. ergo icosaedrum est data sphæra comprehensum. Dico icosaedri latus irrationlem esse lineam, quæ minor appellatur. Quoniā enim rationalis est sphærę diameter, atque est potētia quintupla eius, quæ ex centro EFGHK circuli; erit & quæ ex centro circuli EFGHK rationalis. quare & diameter ipsius rōnalis erit. si aūt in circulo rationalē diametrū habente pentagonū æquilaterū describatur, erit latus pētagoni linea irrationalis, quæ minor appellatur. sed pentagoni EFGHK latus est icosaedri. ergo icosaedri latus est linea irrationalis, quę minor appellatur.

6. sext.

E F G H K L

COROLLARIVM.

Ex hoc manifestum est sphæræ diametrum potentia quintuplā esse eius, quæ ex centro circuli, à quo icosaedrum describitur: & sphærę diametrum compositam esse ex latere hexagoni, & duobus decagoni lateribus, quę in eodem circulo describuntur.

F. C. COMMENTARIVS.

Quoniam igitur utraq; ipsarum EP KY eidem plano est ad angulos rectos, erit EP ipsi KY parallela.] *Ex 6 vndecimi.* A

Erit PO latus pentagoni] *Ex 10 huius.* B

Quoniam enim hexagoni est VQ, decagoni uero QΩ, recta linea VΩ extrema, ac media ratione secta est in Q] *Ex 9 huius.* C


Quare ut ΩV ad VL, ita LV ad Vϒ: & sunt anguli ΩVL LVϒ recti. si igitur iungamus rectam lineam LΩ, erit ϒLΩ angulus rectus ob similitudinem triangulorum ϒLΩ VLΩ] *Quoniam enim est vt ΩV ad VL, ita LV ad Vϒ, erit vt ΩV ad Vϒ, videlicet vt prima ad tertiam, ita quadratum primae ΩV ad quadratum VL secundae: componendoq; vt Ωϒ ad ϒV, ita quadrata ex ΩV VL, hoc est quadratum ex ΩL ad quadratum ex LV: & per conuersionem rationis vt ϒΩ ad ΩV, ita quadratum ex LΩ ad quadratum ex ΩV, quare LΩ est media proportionalis inter ϒΩ ΩV, quod deinceps demonstrabimus. vt igitur ϒΩ ad ΩL, ita LΩ ad ΩV. atque est angulus LΩϒ vtrique communis. ergo triangulum ϒΩL simile est triangulo LΩV, & angulus LVΩ rectus est aequalis angulo ϒLΩ. angulus igitur ϒLΩ rectus erit. At vero LΩ inter ϒΩ ΩV mediam esse proportionalem ex his apparebit.* D

Si sint tres rectæ lineæ, sitq; vt prima ad tertiam, ita quadratum secundæ ad quadratum tertiæ, erunt dictæ lineæ deinceps proportionales.

Sint tres rectae lineae A B C; sitq; vt A ad C, ita quadratum ex B ad quadratum ex C. Dico

ABC

ABC deinceps proportionales esse. Sumatur enim inter AC media proportionalis D, erit vt A ad C, ita quadratũ ex A ad quadratum ex D, hoc est quadratum ex D ad quadratum ex C. sed vt A ad C, ita positum est quadratum ex B ad quadratum ex C. ergo quadratum ex D aequale est quadrato ex B; ac propterea D ipsi B est aequalis. tres igitur rectae lineae ABC deinceps proportionales sunt. sed licet expeditius demonstrare angulum ϒLΩ rectum, esse hoc modo. Quoniã enim est vt ΩV ad VL, ita LV ad Vϒ; suntq; anguli ΩVL LVϒ recti, erit triangulum ΩVL triangulo LVϒ simile, & angulus LΩV æqualis angulo VLϒ. sunt autem anguli VLΩ LΩV aequales vni recto, cum rectus sit LVΩ: ergo & anguli ΩLV VLϒ vni recto sunt aequales: & ob id angulus ϒLΩ est rectus. quod oportebat demonstrare.



E Ipsa ΩQ assumens dimidiam maioris portionis videlicet QZ quintuplum poterit quadrati eius, quod à dimidia maioris portionis describitur] *Ex 3. huius.*

F Ergo quadratum ex Ωϒ quintuplum est quadrati ex VQ] *Ex 15. quinti.*

G Vt autem AB ad BC, ita quadratum ex AB ad quadratum ex BD] *Ex corollario 20 sexti. est enim vt AB ad BD, ita DB ad BC ex 8. eiusdem.*

H Erit & quæ ex centro circuli EFGHK rationalis. quare & diameter ipsius rationalis erit] *Quoniam enim sphęræ diameter est potentia quintupla eius, quae ex centro circuli, habebit quadratum diametri sphęræ ad quadratum eius, quae ex centro circuli proportionem eam, quã numerus habet ad numerum: & idcirco ipsi commensurabile erit. rationale autem est quadratum diametri sphęræ, cum ipsa sit rationalis. ergo & quadratum eius, quae ex centro circuli, est rationale: ideoq; ea, quae ex centro circuli, & eius diameter rationalis erit; nam quae rationali commensurabilis est, & ipsa est rationalis.*

6. decimi.

6. diffi. dec.


K Si autem in circulo rationalem diametrum habente pentagonum æquilaterum describatur, erit latus pentagoni linea irrationalis, quæ minor appellatur] *Ex 11. huius.*

L Sed pentagoni EFGHK latus est icosaedri] *Illud vero ex iis dictis manifestissime cõstat.*

PROBLEMA VI. PROPOSITIO XVII.


Dodecahedrum constituere, & sphæra comprehendere, qua & A prędictas figuras; demonstrare quę dodecahedri latus esse irrationalem lineam, quæ apotome appellatur.

Exponãtur prędicti cubi duo plana ad rectos angulos inter se se AB CD CBEF: & secetur vnumquodq; ipsorum laterum AB BC CD DA EF EB FC bifariam in punctis GH KLMNX, & GK HL MH NX iungantur. deinde secentur rectæ lineæ NO OX HP extrema, ac media ratione in RST punctis: sintque ipsorũ maiores portiones RO OS TP: & à punctis RST ad rectos angulos cubi planis erigantur RY SV TQ ad exteriores partes cubi, quæ ipsis RO OS TP æquales ponantur; iunganturq; YB BQ QC CV VY. Dico pẽtagonum YBQCV æquilaterũ es-




se, &

se,& in uno plano,& præterea æquiangulum. Iungantur enim RB SB VB.& quoniam recta linea NO extrema, ac media ratione secta est in R, & OR est maior ipsius portio, erunt quadrata ex ON NR tripla quadrati ex OR. æqualis autem est ON ipsi NB,& OR ipsi RY. quadrata igitur ex BN NR quadrati ex RY sunt tripla.sed quadratis ex BN NR æquale est quadratum ex BR. ergo quadratum ex BR triplum est quadrati ex RY:ac propterea quadrata ex BR RY quadrati ex RY sunt quadrupla. quadratis aũt ex BR RY æquale est quadratũ exBY.ergo quadratũ ex BY quadruplũ est quadrati ex YR. & ob id BY estdupla ipsius YR.atq;est VY ipsius YR dupla,qm̃ & RS est dupla ipsius RO,hoc est ipsius RY.ergoBY est æqualis YV.similiter demõstrabitur & unaquæq; ipsarũ BQ QC CV utriq;BY YV æqualis.æquilaterũ igitur est BYVCQ pentagonũ. Dico & in vno esse plano. ducatur.n.à puncto O ipsa OZ utriq; ipsarũ RY SV parallela ad exteriores cubi partes:& iungantur ZH HQ. Dico ZHQ rectã lineam esse. nã cum HP extrema,ac media ratione secetur in T, & PT sit maior ipsius portio, erit ut HP ad PT, ita PT ad TH.æqualis autem est HP quidem ipsi HO, PT vero utrique ipsarum TQ OZ.est igitur vt HO ad OZ, ita QT ad TH.atque est HO parallela ipsi TQ;utraque enim ipsarum plano BD est ad rectos angulos: TH uero est parallela OZ,quòd vtraque ipsarum sit ad rectos angulos plano BF. si autẽ duo triangula componantur ad unum angulum,ut ZOH, HTQ, quæ duo latera duobus lateribus proportionalia habeant,ita ut homologa latera etiam sint parallela,reliqua ipsorum latera in directum sibi ipsis constituta erunt. ergo ZH est in directum ipsi HQ.omnis autem recta linea est in uno plano.In uno igitur plano est YBQCV pentagonum.Dico & æquiangulum.Quoniam enim recta linea NO extrema,ac media ratione secta est in R,& OR est maior portio,erit vt utraque NO OR ad ON,ita NO ad OR.æqualis autem est RO ipsi OS.quare ut SN ad NO,ita NO ad OS.& ob id NS extrema, ac media ratione secta est in O; & maior portio est NO. quadrata igitur ex NS SO quadrati ex ON sunt tripla.æqualis autem est ON ipsi NB,& OS ipsi SV.ergo quadrata ex NS SV tripla sunt quadrati ex NB; ac propterea quadrata ex NS SV NB quadrati ex NB sunt quadrupla. sed quadratis ex SN NB est æquale quadratum ex BS.quadrata igitur ex BS SV,hoc est quadratum ex VB, quòd angulus VSB sit rectus, quadruplum est quadrati ex NB: ideoq; ipsa VB ipsius BN est dupla.est autem & BC dupla BN.ergo VB est æqualis BC. & quoniam duæ BY YV duabus BQ QC æquales sunt. & basis VB æqualis basi BC, erit angulus BYV angulo BQC æqualis.similiter ostendemus & YVC angulum æqualem angulo BQC.tres igitur anguli BQC BYV YVC inter se æquales sunt. si autem pentagoni æquilateri tres anguli sint æquales,pentagonum æquiangulum erit.æquiangulum igitur est pentagonum BYVCQ. ostensum est autem & æquilaterum. ergo pentagonum BYVCQ æquilaterum est,& æquiangulum.atque est in uno cubi latere BC.si igitur in unoquoque duodecim cubi laterum eadem constituamus, figura solida constituetur duodecim pentagonis æquilateris,& æquiangulis contenta.Itaque oportet ipsum & data sphæra comprehendere; demonstrareque dodecahedri latus esse irrationalem lineam,quæ apotome appellatur:producatur enim ZO,& sit ZΩ. occurrit igitur ZΩ diametro cubi,& bifariam se mutuo secant.hoc enim ostensum est in penultimo theoremate undecimi libri. secent in Ω. ergo Ω est centrum



B
C
D
E
F
A

ſphæræ,quæ cubum comprehendit,& OΩ dimidium lateris cubi. iungatur YΩ. & quoniam recta libea NS extrema, ac media ratione ſecta eſt in O, & NO eſt ipſius portio maior,erũt quadrata ex NS SO,tripla eius quod fit ex NO.ęqualis aũt eſt N S ipſi ZΩ, quoniam & NO ipſi OΩ eſt æqualis,& ZO ipſi OS. ſed & OS eſt æqualis Z Y, quoniã & RO. quadrata igitur ex ΩZ ZY tripla ſunt quadrati, quod fit ex NO. ſed quadratis ex ΩZ ZY æquale eſt quadratum ex YΩ. ergo quadratum ex YΩ triplum eſt quadrati ex NO. eſt autem quę ex cẽtro ſphæræ cubũ cõprehendentis potentia tripla dimidij lateris cubi. prius enim oſtenſum eſt cubum conſtituere,& ſphæra comprehendere,demõſtrareq; ſphęrę diametrum potentia triplam eſſe lateris cubi.ſi autem tota totius,& dimidia dimidiæ. atque eſt NO dimidia lateris cubi. ergo Y Ω eſt æqualis ei, quæ ex centro ſphæræ cubum comprehendentis: eſtque Ω centrum ſphæræ comprehendentis cubum. quare punctum Y eſt ad ſphęrę ſuperficiem. ſimiliter demonſtrabimus & unumquemque reliquorum angulorum dodecaedri eſſe ad ſuperficiẽ ſphæræ.dodecaedrum igitur eſt data ſphęra comprehenſum. Dico dodecaedri latus irrationalem eſſe lineam,quæ apotome appellatur. Quoniam enim recta linea NO extrema,ac media ratione ſecta,maior portio eſt RO;erit tota NX extrema, ac media ratione ſecta,maior portio RS.nam cum ſit ut NO ad OR, ita OR ad RN: & earum duplæ:partes enim eodem modo multiplicium eandem habent proportionem,erit vt NX ad RS,ita RS ad vtramque NR SX. maior autem eſt NX,quàm RS. ergo & RS eſt maior,quàm vtraque NR SX.eſt igitur NX extrema,ac media ratione ſecta;& RS eſt ipſius maior portio.æqualis autem eſt RS ipſi YV.ergo NX extrema,ac media ratione ſecta,maior portio eſt YV. & quoniam rationalis eſt ſphæræ diameter,atque eſt potentia tripla lateris cubi;erit NX rationalis,quę eſt cubi latus. ſi autem recta linea rationalis extrema, ac media ratione ſecta fuerit, vtraque portio irrationalis eſt,quæ apotome appellatur.ergo YV,quæ eſt latus dodecaedri,irrationalis eſt,quæ apotome appellatur.



G

H

K

2.quinti.

COROLLARIVM.

Ex hoc manifeſtum eſt latere cubi extrema,ac media ratione ſecto maiorem portionem eſſe dodecaedri latus.

F. C. COMMENTARIVS.

A Erunt quadrata ex ON NR tripla quadrati ex OR]*Ex 4. huius.*

B Atque eſt HO parallela ipſi TQ: vtraque enim ipſarum plano BD eſt ad rectos angulos]*Ex 6. vndecimi.*

C Reliqua ipſorum latera in directum ſibi ipſis conſtituta erunt]*Ex 32 ſexti.*

D Quoniam enim recta linea NO extrema, ac media ratione ſecta eſt in R, & OR eſt maior portio,erit vt vtraque NO OR ad ON,ita NO ad OR]*Ex 5. huius.ſi enim recta linea extrema,ac media ratione ſecetur,adijciaturq; ipſi aequalis maiori portioni,erit tota extrema,ac media ratione ſecta,& maior portio erit ea,quae à principio recta linea.quare vt vtraque*

que

que NO OR, hoc eſt ut tota NO unà cum maiori portione OR ad totam NO, ita eſt NO ad OR; ſit enim tota NO maior portio, & OR minor.

Quadrata igitur ex NS SO quadrati ex ON ſunt tripla] *Ex 4. huius.* E

Si autem pentagoni æquilateri tres anguli ſint æquales pentagonum æquiangulum erit] *Ex 7. huius.* F

Prius enim oſtenſum eſt cubum conſtituere, & ſphæra comprehendere] *In quinta decima huius.* G


Erit NX rationalis, quę eſt cubi latus] *Nam cum ſphęrae diameter ſit potentia tripla lateris cubi, habebit ad ipſum proportionem, quam numerus habet ad numerum, & ipſi commenſurabile erit. quae autem rationali ſunt commenſurabiles ſiue longitudine & potentia, ſiue potentia ſolum, rationales ſunt, per ſextam diffinitionem decimi libri.* H

Si autem recta linea rationalis extrema, ac media ratione ſecta fuerit, vtraque portio irrationalis eſt, quæ apotome appellatur] *Ex 6. huius.* K

PROBLEMA VII. PROPOSITIO. XVIII.

Latera quinque figurarum exponere, & inter ſe comparare.

Exponatur datæ ſphęrę diameter A B, & ſecetur in C quidem, ita vt AC ſit æqualis CB; in D vero ita, vt A D ipſius D B ſit dupla: deſcribaturq; in AB ſemicirculus AEB: & à punctis CD ipſi AD ad rectos angulos ducãtur CE DF: & A F FB EB iungantur. Itaq; quoniam A D dupla eſt ipſius DB, erit AB ipſius BD tripla: & per cõuerſionem rationis B A ſeſquialtera ipſius A D. vt autem B A ad A D, ita quadratum ex B A ad quadratum ex A F. eſt enim triangulum A F B triangulo AFD æquiangulum. ergo quadratum ex BA ſeſquialterum eſt quadrati ex AF. eſt autem & ſphærę diameter potentia ſeſquialtera lateris pyramidis; eſtque A B ſphæræ diãmeter. ergo A F pyramidis lateri eſt æqualis. Rurſus quoniam AD dupla eſt DB, erit AB ipſius BD tripla. Sed ut AB ad BD, ita quadratum ex A B ad quadratum ex FB. quadratum igitur ex AB triplum eſt quadrati ex BF. eſt autem & ſphæræ diameter potentia tripla lateris cubi: atque eſt AB ſphæræ diameter. ergo BF eſt cubi latus. & quoniam AC eſt æqualis CB, erit AB ipſius BC dupla. ut autem AB ad BC, ita quadratum ex AB ad quadratum ex BE. quadratum igitur ex AB quadrati ex BE eſt duplum. atque eſt ſphęræ diameter potentia dupla lateris octaedri: & AB eſt diameter datę ſphæræ. quare BE eſt octaedri latus. ducatur à puncto A ipſi AB ad rectos angulos AG: ponaturq; AG æqualis AB: & iuncta GC à puncto H ad AB perpendicularis ducatur HK. quoniam igitur AG dupla eſt ipſius AC; etenim GA eſt æqualis AB; ut autem GA ad AC, ita HK ad KC: erit HK ipſius KC dupla. ergo quadratum ex HK quadruplum eſt quadrati ex KC. quadrata igitur ex HK KC, quod eſt quadratum ex HC quintuplum eſt quadrati ex KC. æqualis autem eſt HC ipſi CB. ergo quadratum ex BC quintuplum eſt quadrati ex CK. & quoniam A B eſt dupla ipſius BC, quarum AD dupla eſt DB; erit reliqua B D dupla ipſius D C: idcoque BC ipſius CD eſt tripla. nonuplum igitur eſt quadratum ex BC quadrati ex CD. ſed quadratum ex B C quadrati ex C K eſt quintuplum. ergo quadratum ex KC maius eſt quadrato ex CD. & KC ipſa CD maior. ponatur ipſi KC æqualis CL; & à puncto L ipſi A B ad rectos angulos ducatur LM, & MB iungatur. & quoniam quadratum ex B C quintuplum eſt quadrati ex KC; atque eſt ipſius quidem CB dupla BA; ipſius uero CK dupla KL: erit quadratum ex A B quadrati



8 ſecundi.

15. huius.

15. huius.

14. huius.

4. ſexti.

20. ſexti.

19 quinti.


20. ſexti.

15. quinti.

Corol.16.huius. drati ex KL quintuplum. ſed & ſphęrę diameter potentia quintupla eſt eius, quæ ex centro circuli, à quo icoſaedrum deſcribitur. atque eſt AB diameter ſphęræ. ergo
Corol.16.huius. KL eſt hexagoni latus dicti circuli. Præterea quoniam ſphærę diameter compoſita eſt ex latere hexagoni, & duobus lateribus decagoni in dicto circulo deſcriptorũ; atque eſt AB quidem diameter ſphæræ, KL vero hexagoni latus, & AK eſt æqualis LB: erit vtraque ipſarum AK LB latus decagoni deſcripti in eodem circulo, à quo
14.tertij. icoſaedrum deſcribitur. & quoniam decagoni eſt L B, hexagoni vero M L; eſt enim æqualis ipſi KL, quòd & ipſi HK; namque æqualiter à centro diſtant; & eſt vtraque
10.huius. HK KL dupla ipſius HC: erit MB latus pentagoni. quod autem pentagoni idẽ eſt,
16.huius. & icoſaedri. ergo MB eſt icoſaedri latus. & quoniam FB eſt latus cubi, ſecetur extrema, ac media ratione in N, & BN ſit maior portio; erit NB dodecaedri latus. quòd
Ex corol. antecedentis. cum ſphæræ diameter oſtenſa ſit ipſius quidem A F lateris pyramidis potentia ſeſquialtera; ipſius vero BE octaedri potẽtia dupla, & ipſius FB cubi potentia tripla, quarum partium ſphæræ diameter potentia eſt ſex, earum pyramidis quidem latus erit quattuor; octaedri vero trium, & cubi duarũ. ergo latus pyramidis octaedri qui dem lateris potentia eſt ſeſquitertium, cubi vero potentia duplum: & octaedri latus lateris cubi potentia eſt ſeſquialterum. latera igitur trium figurarum iam *dicta*, videlicet pyramidis, octaedri, & cubi inter ſe ſunt in proportionibus *rationalibus*: reliqua vero duo, dico autem icoſaedri, & dodecaedri, neque inter ſe, neque ad iam dicta ſunt in rationalibus proportionibus, nempe minor, & apotome.

At vero M B latus icoſaedri maius eſſe dodecaedri latere B N, ita demonſtrabimus.

8.ſexti Quoniam enim triangulum FDB æquiangulum eſt triangulo FAB, erit vt D B ad B F, ita FB ad BA: & cum tres rectæ lineæ proportio-
Cor.20. ſexti. nales ſint, vt prima ad tertiam, ita erit quadratum primæ ad quadratum ſecundę. eſt igitur vt DB ad BA, ita quadratum ex DB ad quadratum ex BF: & conuertendo vt A B ad B D, ita quadratum ex FB ad quadratum ex BD. tripla autem eſt AB ipſius BD. ergo quadratum ex
20.ſexti. FB quadrati ex BD eſt triplum. atque eſt quadratum ex AD quadruplum quadrati ex DB; eſt. n. AD ipſius DB dupla. ergo quadratũ ex AD maius eſt quadrato ex FB; propterea quòd AD quàm FB eſt maior. multo igitur maior eſt



9. huius. AL quàm FB. & ipſa quidem AL extrema, ac media ratione ſecta, maior portio eſt LK, quoniam KL eſt hexagoni latus, & KA decagoni. ipſa uero FB extrema, ac media ratione ſecta, maior portio eſt BN. maior igitur eſt KL quàm BN, eſt autem KL
19.primi ipſi LM æqualis. ergo L M quàm B N eſt maior. ſed B M eſt maior quàm ML. ergo MB, quę eſt latus icoſaedri maior erit ipſa BN, dodecaedri latere.

ALITER. Quoniam enim AD dupla eſt DB, erit AB ipſius BD tripla. ut au-
Cor.20.ſex: 8.ſexti. tem AB ad BD, ita quadratum ex AB ad quadratum ex BF, propterea quod triangulum FAB triangulo FBD æquiangulum eſt. triplum igitur eſt quadratum ex AB quadrati ex BF. Oſtenſum eſt autem quadratum ex AB quadrati ex KL quintuplũ. ergo quinque quadrata ex KL tribus quadratis ex BF ſunt æqualia. ſed tria ex FB maiora ſunt quàm ſex eorum, quæ fiunt ex BN. & quinque igitur ex K L, quàm ſex eorum, quæ ex BN ſunt maiora. ergo & unum ex KL maius eſt vno ex BN; ac propterea KL quàm BN maior: æqualis autem KL ipſi LM. maior igitur eſt LM, quam BN; multo igitur MB quàm BN eſt maior. quod demonſtrare oportebat.

Tria vero, ex FB maiora eſſe, quàm ſex earum, quæ ex BN, hoc modo oſtendemus.


Quoniam

Quoniam enim maior est BN quàm NF, erit rectangulum, quod continetur FB BN maius contento BF FN. quod igitur continetur FB BN vnà cum contento BF FN maius est, quàm duplum eius, quod BF FN continetur. sed quod quidem continetur FB BN vnà cum contento BF FN est quadratum ex FB. contentum autem BF FN est æquale quadrato ex BN; etenim FB extrema, ac media ratione secta est in N, & quod extremis continetur est æquale ei, quod fit à media. quadratum igitur ex FB maius est, quàm duplum quadrari ex BN. quare vnum ex FB duobus ex BN est maius; & idcirco tria, quæ ex FB maiora sunt, quàm sex eorum, quæ fiunt ex BN. quod demonstrare oportebat. 2. secundi. 17. sexti.

Dico præter iam dictas quinque figuras non constitui aliam figuram, quæ æquilateris, & æquiangulis inter se æqualibus contineatur.

Ex duobus enim triangulis, vel ex alijs duobus planis non constituetur angulus solidus. ex tribus autem triangulis cõstituitur angulus pyramidis, ex quattuor octa edri, ex quinque icosaedri: at ex sex triangulis æquilateris, & æquiãgulis ad vnum punctum constitutis, non est angulus solidus. cum enim trianguli æquilateri angulus sit duæ tertiæ recti, erunt sex quattor rectis æquales. quod fieri non potest. omnis enim solidus angulus minoribus, quàm quattuor rectis continetur. Eadem ratione neque ex pluribus, quàm sex angulis planis constituitur solidus angulus. itaque quadratis tribus angulus cubi continetur. ut autem quattuor contineatur fieri non potest; essent enim rursus quattuor recti. pentagonis autẽ æquilateris, & æquiãgulis, tribus quidem continetur angulus dodecaedri, sed vt quattuor contineatur fieri non potest. nam cum pentagoni æquilateri angulus constet ex recto, & quinta recti parte, erunt quattuor anguli quattuor rectis maiores. quod fieri non potest. neque uero alijs polygonis figuris constituetur angulus solidus propter absurda, quæ consequuntur. non igitur præter iam dictas figuras alia figura solida constituitur æquilateris, & æquiangulis contenta. quod oportebat demonstrare. 21. undecimi

Verum enim vero pentagoni æquilateri, & æquianguli angulũ constare ex recto, & recti quinta parte hoc modo ostendemus.



Sit enim pentagonum æquilaterum, & æquiangulum ABCDE, & circa ipsum circulus ABCDE describatur: sumaturque ipsius centrum, quod sit F; & iungantur F A FB FC FD FE, quæ pẽtagoni ABCDE angulos bifariam secabunt. & quoniam quinque anguli, qui ad F quattuor rectis æquales sunt, & inter se sũt æquales, erit unus ipsorum, ut AFB unius recti, dempta quinta recti parte. ergo reliqui FAB ABF sunt unius recti, & quintæ partis. æqualis aũt est angulus FBA angulo FBC. & totus igitur ABC pentagoni angulus constat ex recto, & quinta recti parte. quod oportebat demonstrare.

TERTII DECIMI LIBRI FINIS.

EVCLIDIS ELEMENTORVM LIBER QVARTVSDECIMVS ET SOLIDORVM QVARTVS.

vt quidam arbitrantur.

VT VERO ALII HYPSICLIS ALEXANDRINI DE QVINQVE CORPORIBVS LIBER PRIMVS.

Cum Commentarijs Federici Commandini Vrbinatis.




BASILIDES tyrius, Protarche, cum alexandriam veniſſet, patriq́ue noſtro ob mathematicarum diſciplinarum ſocietatem commendatus fuiſſet, ipſo peregrinationis tempore, cum eo diu, multumq́ue uerſatus eſt. & aliquando expendentes id quod ab Apollonio ſcriptum eſt de dodecaedri, & icoſaedri in eadem ſphæra deſcriptorum comparatione, quam ſcilicet hęc inter ſe proportionem habeant, arbitrati ſunt ea non recte tradidiſſe Apollonium; quæ à ſe emendata, ut pater meus dicebat, memoriæ, ac litteris prodiderunt. Ego vero poſtea incidi in aliũ librum ab Apollonio editum, qui propoſitę rei demonſtrationem recte complectebatur; atque ex eius problematis indagatione magnam cœpi voluptatem. Illud quidem, quod ab Apollonio editũ eſt, quilibet facile perſpicere poteſt, cũ in omnium manibus verſetur. quod autem nos poſtea ſummo, quantum conijci licet, ſtudio lucubraſſe videmur, id litteris mandatum tibi dedicandũ cenſuimus, vtpote qui ob excellentem in omnibus diſciplinis mathematicis, & præſertim in geometria cognitionem prudenter iudices ea, quę dicturi ſumus: ob eam uero, quę tibi cum patre meo fuit conſuetudinem, & ob beneuolentiam, qua nos complecteris, tractationem ipſam libenter audias. ſed iam tempus eſt ut proœmio finem imponentes id, quod propoſitum eſt, aggrediamur.

THEO-

THEOREMA I. PROPOSITIO I.

Quæ à centro circuli alicuius ad pentagoni latus in eodem circulo descripti, perpendicularis ducitur, dimidia est vtriusque & hexagoni lateris, & decagoni, quæ in eodem circulo describuntur.



Sit circulus ABC, & in eo describatur pentagoui æqui lateri latus BC; sumaturque circuli centrum D: & ad BC ducta DE perpendiculari, producatur in directum ipsi DE recta linea EF. Dico DE dimidiam esse vtriusque & hexagoni lateris, & decagoni in eodem circulo descriptorum. Iungantur enim DC CF: ponaturque EG ipsi EF æqualis: & à puncto G ad C ducatur GC. Quoniam igitur circumferentia totius circuli quintupla est circumferentiæ BFC: atque est totius quidem circuli circumferentiæ dimidia ACF, ipsius vero BFC dimidia FC, erit & circumferentia ACF quintupla circumferentiæ FC. ideoque, circumferentia AC ipsius CF est quadrupla. vt autem AC ad CF, ita est ADC angulus ad angulum CDF. angulus igitur ADC quadruplus est anguli CDF. duplus autem est angulus ADC anguli EFC. ergo & angulus EFC. anguli GDC est duplus. est autem & EFC angulus æqualis angulo EGC. duplus igitur est angulus EGC anguli GDC: & idcirco DG ipsi GC est æqualis. sed GC æqualis est CF. ergo & DG ipsi CF. est autem & GE æqualis EF. æqualis igitur est DE utrique EF FC. communis apponatur DE. vtraque igitur DF FC ipsius DE est dupla: atque est DF quidem hexagoni lateri æqualis; FC vero æqualis lateri decagoni. ergo DE est dimidia & lateris hexagoni, & decagoni in eodem circulo descriptorum. A B C D E

Itaque manifestum est ex theorematibus tertij decimi libri eã, quæ à centro circuli ad latus trianguli æquilateri perpendicularis ducitur, dimidiam esse eius, quæ ex centro circuli. F

F. COMMENTARIVS.

A Erit & circumferentia ACF quintupla circumferentiæ FC] *Ex 15 quinti.*

B Vt autem AC ad CF, ita est ADC angulus ad angulum CDF] *Ex ultima sexti.*

C Duplus autem est angulus ADC anguli EFC] *Ex 20 tertij.*

D Est autem & EFC angulus æqualis angulo EGC] *Posita enim est FE aequalis EG · & EC est vtrique communis: angulique, ad E recti. basis igitur FC est aequalis basi CG, & triangulum triangulo aequale; & reliqui anguli reliquis angulis aequales, quibus aequalia latera subtendun-tur ex 4. primi.*


E Et idcirco DG ipsi GC est æqualis] *Nam cum angulus EGC exterior sit aequalis duobus interioribus, & oppositis GDC GCD, sitque duplus ipsius GDC; erit angulus GCD aequalis angulo GDC: & ob id latus DG lateri GC aequale.* 32. primi. 6. primi.

F Itaque manifestum est ex theorematibus tertij decimi libri eam, quæ à centro circuli ad latus trianguli æquilateri perpendicularis ducitur, dimidiam esse eius, quæ ex centro circuli.

Sit circulus ABC, & in ipso describatur triangulum aequilaterum ABC; sumptoque circuli centro D, ab eo ad BC agatur perpendicularis DF, & ad E producatur. Dico DF dimidiam esse ipsius DE. iungantur enim DB BE. & quoniam BE est latus hexagoni, quod ex 12 tertij decimi libri apparet: & ideo aequalis ei, quae ex centro: erunt DB BE inter se aequales, & ipsarum quadra-

ta

47. primi *ta aequalia. ſed quadratum quidem ex DB eſt aequale quadratis ex EF FD. quadratum vero ex BE aequale quadratis ex BF FE. ergo quadrata ex BF FD quadratis ex BF FE ſunt aequalia; & dempto communi quadrato ex BF, erit quadratum ex DF aequale quadrato ex FE: ac propterea recta linea DF ipſi FE eſt æqualis, & DF ipſius DE dimidia. quod demonſtrare oportebat.*



THEOREMA II. PROPOSITIO. II.

Idem circulus comprehendit dodecaedri pentagonum, & icoſaedri triangulum in eadẽ ſphæra deſcriptorum.


Hoc autem conſcribitur ab Ariſtero in libro de quinque figurarum comparatione; & ab Apollonio in ſecunda editione comparationis dodecaedri cum icoſaedro, videlicet vt dodecaedri ſuperficies eſt ad ſuperficiem icoſaedri, ita eſſe & ipſum dodecaedrum ad icoſaedrum, quòd perpendicularis ducta à centro ſphæræ ad dodecaedri pentagonum eadem ſit, quæ ad icoſaedri triangulum ducitur. Itaque demõſtrandum eſt eundem circulum comprehendere, & dodecaedri pentagonum, & icoſaedri triangulum in eadem ſphæra deſcriptorum, hoc præmiſſo.

Si in circulo pentagonum æquilaterum deſcribatur, quod fit ex latere pentagoni, & ex recta linea, quæ duobus pentagoni lateribus ſubtenditur, quintuplum erit eius, quod fit ab ea, quę ex circuli centro.

Sit ABC circulus, & in eo pentagoni latus AC: ſumatur que circuli centrum D, & ad AC perpendicularis ducta DF in puncta BE producatur, & iungatur AB. Dico quadrata ex BA AC quadrati ex DE quintupla eſſe. iuncta enim AE eſt decagoni latus. & quoniã BE dupla eſt ipſius ED; erit quadratum ex BE quadrati ex ED quadruplum. quadrato autem ex BE æqualia ſunt quadrata ex BA AE. ergo quadrata ex BA AE quadrupla ſunt quadrati ex ED: & ob id quadrata ex EA AE & ED ſunt quintupla quadrati ex ED. ſed quadrata ex DE EA æqualia ſunt quadrato ex AC. quadrata igitur ex BA AC quadrati ex ED ſunt quintupla.

47. primi


A




Hoc demonſtrato, demonſtrandum eſt eundem circulum comprehendere & dodecaedri pentagonum, & icoſaedri triangulum in eadem ſphæra deſcriptorum.

Exponatur ſphæræ diameter AB, & in ipſa ſphęra deſcribatur dodecaedrum, & icoſaedrũ: ſitque unum quidem dodecaedri pentagonum CDEFG: icoſaedri uero triangulum KLH. Dico eundem circulum comprehendere pentagonum CDEFG, & KLH triangulum. Iungatur DG. ergo DG eſt cubi latus. & exponatur recta linea quædam MN, ita ut quadratum ex AB quadrati ex MN ſit quintuplum. eſt autem & ſphæ-

B



ræ diameter potentia quintupla eius, quæ est ex centro circuli, à quo icosaedrum describitur, secetur MN extrema, ac media ratione in X: & sit MX portio maior. ergo MX est decagoni latus. & quoniam quadratum ex AB quintuplum est quadrati ex MN, & triplũ quadrati ex DG; erunt tria quadrata ex DG quadratis quinque ex MN æqualia. ut autem tria quadrata ex DG ad quadrata quinque ex MN, ita tria quadrata ex CG ad quinque quadrata ex MX. tria igitur quadrata ex CG quinque quadratis ex MX sunt æqualia. quinque autẽ quadrata ex KL æqualia sũt quinq; quadratis ex MN, & quinque quadratis ex MX. ergo quinq; quadrata ex KL tribus quadratis ex DG, & tribus quadratis ex GC sunt æqualia. sed tria quadrata ex DG, & tria quadrata ex GC æqualia sunt quindecim quadratis eius, quæ ex centro circuli descripti circa pentagonum CDEFG. antea enim demõstratum est quadratã ex DG GC quintupla esse quadrati eius, quæ est ex centro circuli circa pentagonum CDEFG descripti. quinque autem quadrata ex KL sunt æqualia quindecim quadratis eius, quę est ex centro circuli, descripti circa triangulũ KLH. etenim demonstratum est quadratum ex KL triplum esse quadrati eius, quæ est ex centro circuli circa triangulum KLH descripti. quindecim igitur quadrata eius, quę est ex centro circuli quindecim quadratis eius, quæ est ex centro circuli sunt æqualia; ac propterea diameter diametro est æqualis. ergo idem circulus comprehendit & dodecaedri pentagonum, & icosaedri triangulum in eadem sphæra descriptorum.



C
D
A
B
E
F
G
H

F. C. COMMENTARIVS.

Sed quadrata ex DE EA æqualia sunt quadrato ex AC] *Ex decima tertij decimi.* A

Ergo DG est cubi latus] *Secta enim DG extrema, ac media ratione, maior portio erit æqualis lateri pentagoni CD ex 8 tertij decimi. si aũt latus cubi extrema, ac media rõne secetur, maior portio erit dodecaedri latus, ex corollario 17 tertij decimi. sed CD ponitur latus dodecaedri. ergo DG est cubi latus. nam si duę rectę lineę extrema, ac media ratione secentur, erit tota ad totam, vt portio maior ad maiorem portionem. quod ad finem huius libri demonstrabitur.* B

Secetur MN extrema, ac media ratione in X, & sit MX portio maior. ergo MX est decagoni latus] *Ex ante dictis sequitur MN esse eam, quae ex centro circuli, à quo icosaedrum describitur, hoc est hexagoni latus. si autem hexagoni latus extrema, ac media ratione secetur, erit maior portio latus decagoni. quod nos supra ad nonam tertij decimi demonstrauimus.* C

Et triplum quadrati ex DG] *Ex 15 tertij decimi libri.* D

Vt autem tria quadrata ex DG ad quadrata quinque ex MN, ita tria quadrata ex CG ad quinque quadrata ex MX] *Est enim CG maior portio ipsius DG extrema, ac media ratione sectae. & similiter MX maior portio ipsius MN: & vt tota DG ad totam MN, ita est ipsius DG maior portio ad maiorem portionem ipsius MN. quod deinceps demonstrabitur.* E

Quinque autem quadrata ex KL æqualia sunt & quinq; quadratis ex MN, & quinque quadratis ex MX] *Ex 10 tertij decimi. est enim KL latus pentagoni descripti in circulo, à quo icosaedrum describitur, & cuius ea, quae ex centro est MN.* F


Antea enim demonstratum est] *Videlicet proxime ad principium huius theorematis.* G

Etenim demonstratum est quadratum ex KL triplum esse quadrati eius, quę ex centro circuli] *In duodecima tertij decimi libri.* H

THEORBEMA III. PROPOSITIO. III.


Si fuerit pentagonum æquilaterum, & æquiangulum, & circa ipsum circulus; à centro autem ad vnum latus perpendicularis ducta fuerit: quod tricies vno latere, & perpendiculari continetur superficiei dodecaedri est æquale.

Sit pentagonum æquilaterum, & æquiangulum ABCDE, & circa ipsum circulus: sumatur autem centrum F, & ab F ad CD perpendicularis ducatur FG. Dico quod tricies CD FG continetur duodecim pentagonis ABCDE æquale esse. Iungatur enim CF FD. & quoniam quod CD FG continetur duplum est trianguli FCD, erit quod quinquies continetur CD FG decem triangulis æquale: decem autem triangula duo pentagona sunt, & eorum sextupla æqualia: ergo quod tricies CD FG continetur est æquale duodecim pentagonis. sed duodecim pentagona sunt dodecaedri superficies. ergo quod tricies cõtinetur CD FG superficiei dodecaedri æquale erit.



Similiter demonstrabimus, si fuerit triangulum æquilaterum, vt ABC, & circa ipsum circulus, cuius centrum D, & ab eo perpendicularis DE; quod tricies BC DE continetur superficiei icosaedri æquale esse.

Quoniam enim rursus, quod BC DE continetur duplum est trianguli DBC, erunt duo triangula æqualia ei, quod cõtinetur BC DE, & eorum tripla. sex igitur triangula DBC æqualia sunt tribus, quæ BC DE continentur. at sex triangula vt DBC sunt æqualia duobus ABC triangulis. & eorum decupla. ergo quod tricies BC DE continetur est æquale viginti triangulis ABC, hoc est icosaedri superficiei. erit igitur vt dodecaedri superficies ad superficiem icosaedri, ita quod continetur CD FG ad id, quod BC DE continetur.



COROLLARIVM.

Ex hoc perspicuum est vt dodecaedri superficies ad superficiem icosaedri, ita esse quod continetur latere pentagoni, & recta linea, quæ à centro circuli circa pentagonum descripti, in ipsum latus perpendicularis ducitur, ad id, quod continetur latere icosaedri, & perpendiculari, quæ à centro circuli circa triangulum descripti in ipsum latus ducta fuerit, nimirum dodecaedro, & icosaedro in eadem sphæra descriptis.

P. C. COMMENTARIVS.

A Et quoniam quod CD FG continetur duplum est trianguli FCD] *Ex 41 primi, ex quo sequitur duo triangula FCD æqualia esse ei, quod CD FG continetur.*

B Decem autem triangula duo pentagona sunt] *Vnumquodque enim pentagonum quinque eiusmodi triangula continet.*


C At sex triangula vt DBC sunt æqualia duobus ABC triangulis] *Nam triangulum ABC ex tribus triangulis DBC constat.*

D Erit igitur vt dodecaedri superficies ad superficiem icosaedri, ita quod continetur CD FG ad id, quod BC DE continetur] *Quoniam enim quod tricies cõtinetur CD FG est æquale superficiei dodecaedri; & quod tricies continetur BC DE æquale superficiei icosaedri,*

ſaedri, erit vt ſuperficies dodecaedri ad id, quod tricies continetur CD FG, ita ſuperficies icoſaedri ad id, quod tricies continetur BC DE: & permutando vt dodecaedri ſuperficies ad ſuperficiem icoſaedri, ita quod tricies continetur CD FG ad id, quod tricies BC DE continetur. ſed vt quod tricies continetur CD FG ad id, quod tricies BC DE continetur, ita quod ſemel continetur CD FG ad id, quod ſemel BC DE continetur ex 15 quinti. vt igitur dodecaedri ſuperficies ad ſuperficiem icoſaedri, ita quod continetur CD FG ad id, quod BC DE continetur.

THEOREMA IIII. PROPOSITIO. IIII.


Hoc probato demonſtrandum erit, vt dodecaedri ſuperficies ad ſuperficiem icoſaedri, ita eſſe latus cubi ad icoſaedri latus.



Exponatur circulus ABC comprehendens & dodecaedri pentagonum, & icoſaedri triangulum in eadem ſphæra deſcriptorum: & in ipſo deſcribatur trianguli quidem æquilateri latus CD: pentagoni vero AC: ſumptoq; circuli centro E, ab eo ad DC CA perpendiculares ducantur EF EG, & producatur in directum ipſi EG recta linea GB: iungaturq; BC, & exponatur cubi latus H. Dico vt dodecaedri ſuperficies ad ſuperficiem icoſaedri, ita eſſe H ad ipſam CD. quoniam enim vtraque ſimul EB BC extrema, ac media ratione ſecta, maior portio eſt EB, & eſt vtriuſque quidem dimidia EG, ipſius vero BE dimidia EF: erit & ipſius EG extrema, ac media ratione ſectæ maior portio EF. eſt autem & ipſius H extrema, ac media ratione ſectæ maior portio CA, vt in dodecaedro oſtenſum fuit. ut igitur H ad CA, ita eſt GE ad EF; ideòque contentum H FE eſt æquale ei, quod CA EG continetur. & quoniam eſt vt H ad CD, ita quod continetur H EF ad contentum CD EF; ei uero, quod H EF continetur eſt æquale contentum CA EG: erit vt H ad CD, ita contentum CA EG ad id, quod CD EF continetur, hoc eſt vt dodecaedri ſuperficies ad ſuperficiem icoſaedri, ita H ad CD.

Aliter demonſtrare ut dodecaedri ſuperficies ad ſuperficiem icoſaedri, ita eſſe latus cubi ad icoſaedri latus, hoc præmiſſo.


Sit circulus A B C, & in eo deſcribantur æquilateri pentagoni latera AB AC: & iungatur B C; ſumatur autem circuli centrum D, & iuncta AD producatur ad E: ponaturq; ipſius A D dimidia DF, & GC ipſius CH tripla. Dico quod AF BH continetur pentagono æquale eſſe.



Iungatur enim BD. & quoniam AD dupla eſt ipſius DF, erit F A ipſius AD ſeſquialtera. rurſus quoniam C C tripla eſt ipſius C H, erit G H ipſius H C dupla. ſeſquialtera igitur eſt CG ipſius GH. quare vt FA ad AD, ita CG ad GH. ideoq; contentũ AF GH eſt æquale ei, quod AD CG cõtinetur: ſed CG eſt æqualis GB. ergo contentum AD BG eſt æquale ei, quod AF G H continetur. contentum autem AD BG eſt duo triangula, ut A B D. quod igitur AF G H continetur & duo triangula A B D. ergo quinque rectangula contenta AF GH decem ſunt triangula. decem autem triangula duo pentagona ſunt. quinque igitur rectangula

contenta AF GH duobus pentagonis ſunt æqualia. & quoniam GH eſt dupla HC, erit contentum AF GH duplum eius, quod AF HC continetur. ergo duo rectangula contenta AF HC ſunt æqualia vni, quod continetur AF GH, & eorum quintupla. decem igitur rectangula contenta AF HC ſunt æqualia quinque, quę AF GH continentur, hoc eſt duobus pentagonis. ergo quinque contenta AF HC vni pentagono ſunt æqualia. quinque autem contenta AF HC ſunt æqualia ei, quod continetur AF BH, quoniam B H quintupla eſt ipſius H C, & communis altitudo eſt AF. quod igitur AF BH continetur uni pentagono eſt æquale.

Hoc demonſtrato nunc exponatur circulus cõprehendens & dodecaedri pentagonum, & icoſaedri triangulum in eadem ſphęra deſcriptorum; & in circulo ABC deſcribantur æquilateri pentagoni latera BA AC: & iungatur BC. ſumatur præterea circuli centrum E, & iuncta A E ad F producatur: ſitq; AE quidem dupla ipſius EG; KC vero ipſius CH tripla: & per G ipſi AF ad rectos angulos ducatur DM. ergo DM eſt latus trianguli æquilateri; & æquilaterum eſt ADM triangulum. & quoniam rectangulum quidem contentum AG BH eſt æquale pentagono, contentum vero AGD æquale triangulo ADM; erit vt rectangulum contentum AG BH ad rectangulum AGD, ita pentagonum ad triangulum. vt autem rectangulum contentum AG BH ad rectangulum AGD, ita BH ad DG. & vt igitur duodecim BH ad viginti DG, ita duodecim pentagona ad viginti triangula, hoc eſt dodecaedri ſuperficies ad ſuperficiem icoſaedri. & duodecim quidē BH ſunt decem B C: etenim BH quintupla eſt ipſius H C; & B C ipſius C H ſextupla: ideoq; duodecim BH ſunt æquales decem BC: viginti autem DG ſunt decem DM; dupla enim eſt D M ipſius D G. vt igitur decem BC ad decem DM, hoc eſt vt BC ad DM, ita dodecaedri ſuperficies ad ſuperficiem icoſaedri. atque eſt BC quidem cubi latus, DM vero latus icoſaedri. & vt igitur dodecaedri ſuperficies ad ſuperficiem icoſaedri, ita BC ad DM, hoc eſt cubi latus ad latus icoſaedri.



F. C. COMMENTARIVS.

A Quoniam enim vtraque ſimul EB BC extrema, ac media ratione ſecta maior portio eſt EB] *Ex nona tertijdecimi.*

B Et eſt vtriuſque dimidia EG] *Ex prima huius.*

C Ipſius vero BE dimidia EF] *Ex ijs, quae nos demonſtrauimus ad finem primae huius.*

D Erit & ipſius EF extrema, ac media ratione ſectæ maior portio EF] *Ex 15 quinti.*

E Eſt autem & ipſius H extrema, ac media ratione ſectæ maior portio CA, vt in dodecaedro oſtenſum fuit] *In 17 tertijdecimi.*

F Vt igitur H ad CA, ita eſt GE ad EF.] *Hoc autem ita eſſe ad finem huius libri demonſtrabitur.*

G Ideoque contentum H FE eſt æquale ei, quod CA EG continetur] *Ex 16 ſexti.*

H Et quoniam eſt vt H ad CD, ita quod continetur H EF ad contentum CD EF] *Ex prima ſexti.*

K Ei vero quod H EF continetur eſt æquale contentum CA EG] *Quod proxime demonſtratum fuit.*

L Hoc eſt vt dodecaedri ſuperficies ad ſuperficiem icoſaedri, ita H ad CD] *Superius enim demonſtratum eſt vt dodecaedri ſuperficies ad ſuperficiem icoſaedri, ita eſſe quod continetur CA EG ad id, quod CD EF continetur.*

M Contentum autem AD BG eſt duo triangula vt ABD] *Hoc eſt contentum AD BG eſt aequale duobus triangulis ABD. eſt enim triangulo ABD duplum ex 41 primi libri.*

N Quinque autem contenta AF HC ſunt æqualia ei, quod continetur AF BH, quoniam BH eſt quintupla ipſius HC: & communis altitudo eſt AF] *Ex prima ſexti.*

Ergo

Ergo DM eſt latus trianguli æquilateri] *Perpendicularis enim ducta à centro circuli ad trianguli aequilateri latus eſt dimidia eius, quae ex circuli centro, ut nos demonſtrabimus ad finem primae huius.* O

Et quoniam rectangulum quidem contentum AG BH eſt æquale pentagono] *Ex iis, quae proxime demonſtrauit.* P

Contentum vero AGD æquale triangulo ADM] *Ex demonſtratis in 42 primi.* Q

Vt autem rectangulum contentum AG BH ad rectangulum AGD, ita BH ad DG] *Parallelogramma enim, quae eandem habent altitudinem inter ſe ſunt vt baſes, ex prima ſexti.* R

Et vt igitur duodecim BH ad uiginti DG, ita duodecim pentagona ad uiginti triangula] *Sequitur enim ex antedictis vt BH ad DG, ita eſſe pentagonum ad triangulum.* S


Et duodecim quidem BH ſunt decem BC, etenim BH quintupla eſt ipſius HC, & BC ipſius CH ſextupla] *Quoniam enim BH eſt quintupla ipſius HC, & BC eſt eiuſdem H C ſextupla, habebit HB ad BC peoportionem eam, quam habet quinque ad ſex. ſed quinque multiplicans duodecim producit 60, & ſex multiplicans decem producit ſimiliter 60. ergo duodecim BH ſunt aequales decem BC.* T

Hoc eſt vt BC ad DM] *Ex 15 quinti.* V

Atque eſt BC quidem cubi latus] *Hoc à nobis ſuperius demonſtratũ eſt in ſecundã huius.* X

THEOREMA V. PROPOSITIO V.

Oſtendendum eſt & qualibet recta linea extrema, ac media ratione ſecta, quam proportionem habet potens quadratum totius & quadratum maioris portionis ad eam, quę poteſt quadratum totius & minoris portionis, eandem habere cubi latus ad latus icoſaedri.



A
B
G
D

Sit circulus AB comprehendens & dodecaedri pentagonum & icoſaedri triangulum in eadẽ ſphæra deſcriptorum: ſumaturque circuli centrum C; & & ab eo producatur recta linea vtcumque CB: & ſecetur extrema, ac media ratione in D, ita vt CD ſit maior portio. quare CD eſt latus decagoni in eodẽ circulo deſcripti. exponatur icoſaedri latus E, dodecaedri F, & cubi G. ergo E eſt trianguli æquilateri latus, F pentagoni in eodem circulo deſcripti: atque eſt F ipſius G maior portio. & quoniam E eſt æqualis lateri trianguli æquilateri: trianguli autem æquilateri latus eſt potentia triplum ipſius BC. ergo quadratum ex E quadrati ex BC eſt triplum: ſuntq; quadrata ex CB BD quadrati ex CD tripla, & permutãdo. vt igitur quadratum ex E ad quadrata ex CB BD, ita quadratum ex BC ad quadratum ex CD. ſed vt quadratum ex BC ad quadratum ex CD, ita eſt quadratum ex G ad quadratum ex F; eſt enim F maior portio ipſius G. & ut igitur quadratum ex E, ad quadrata ex CB BD, ita quadratum ex G ad quadratum ex F: & permutando; conuertendoque. ergo vt quadratum ex G ad quadratum ex E, ita quadratum ex F ad quadrata ex CB BD. quadrato autem ex F æqualia ſunt quæ ex BC CD quadrata; etenim latus pentagoni poteſt & hexagoni, & decagoni latus. ut igitur quadratum ex G ad quadratum ex E, ita quadrata ex BC CD ad quadrata ex CB BD. ſed vt quadrata ex BC CD ad quadrata ex CB BD, ita qualibet recta linea extrema, ac media ratione ſecta, quadratum totius, & maioris portionis ad quadratum totius, & minoris portionis. & ut igitur quadratum ex G ad quadratum ex E, ita qualibet recta linea extrema

E

F

extrema, ac media ratione secta quadratum totius & maioris portionis ad quadratum totius, & minoris portionis. atque est G quidem cubi latus, E vero icosaedri. si igitur recta linea extrema, ac media ratione secetur, erit vt potens totam & maiorem portionem ad eam, quæ potest totam & minorem portionem, ita cubi latus ad latus icosaestri, in eadem sphæra descriptorum.

F. C. COMMENTARIVS.

A Quare CD est latus decagoni] *Si enim latus hexagoni extrema, ac media ratione secetur maior portio est decagoni latus, in eodem circulo descripti, vt nos supra demonstrauimus ad nonam tertij decimi.*

B Atque est F ipsius G maior portio] *Ex corollario 17 tertij decimi, nimirum ipsa G extrema, ac media ratione secta.*

C Trianguli autem æquilateri latus est potentia triplum ipsius BC] *Ex duodecima tertij decimi.*

D Suntque quadrata ex CB BD quadrati ex CD tripla] *Ex 4. tertij decimi.*

E Etenim latus pentagoni pot & hexagoni & decagoni latus] *Ex decima tertij decimi.*

F Sed vt quadrata ex BC CD ad quadrata ex CB BD, ita qualibet recta linea extrema, ac media ratione secta quadratum totius, & maioris portionis ad quadratum totius & minoris portionis] *Græcus codex corruptus est qui sic hēt* ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ ἡ πρὸς τὸ ἀπὸ ἐ, οὕτω τὰ ἀπὸ βγ γδ πρὸς τὰ ἀπὸ γδ. ὡς δὲ τὸ ἀπὸ βγδ πρός τὰ ἀπὸ γδβ, οὕτως εὐθείας ἧς δύναται᾽ ὢν ἄκρον καὶ μέσον λόγον τεμνομένης, ἡ δυναμένη τὸ ἀπὸ τῆς ὅ-λης, καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ μείζονος τμήματος πρός τὴν δυναμένην τὸ ἀπὸ τῆς ὅλης καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ ἐλάσσονος τμήματος. corrige ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ ἡ πρὸς τὸ ἀπὸ ἐ, οὕτω τὰ ἀπὸ βγ γδ πρὸς τὰ ἀπὸ γβ βδ. ὡς δὲ τὰ ἀπὸ βγ γδ πρὸς τὰ ἀπὸ γβ βδ, οὕτως εὐθείας ἧς δύναται᾽ ἶσον ἄκρον καὶ μέσον λόγον τεμνομένης τὸ ἀπὸ τῆς ὅλης καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ μείζονος τμήματος πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ὅλης, καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ ἐλάσσονος τμήματος. & ita corrige paulo post. etenim hæ voces ἡ δυναμένη. & τὴν δυναμένην hoc loco superuacaneæ sunt.

THEOREMA VI. PROPOSITIO. VI.

Ostendendum nunc est vt latus cubi ad icosaedri latus, ita esse
A dodecaedri solidum ad solidum icosaedri.

2 huius. Quoniam enim æquales circuli comprehendunt & dodecaedri pentagonum, &
A icosaedri triangulum in eadem sphæra descriptorum; in sphæris autem æquales circuli æqualiter à centro distant. nam quę à centro sphæræ ad plana circulorum per-
B pendiculares ducuntur & æquales sunt, & in centra circulorum cadunt. ergo quæ à
D centro sphæræ ducuntur ad centrum circuli comprehendentis & dodecaedri pentagonum & icosaedri triangulum æquales sunt, videlicet perpendiculares ipsæ: & ob id pyramides, quę bases habent dodecaedri pentagona, & icosaedri triangula æ-
C que altę sunt. pyramides autem æque altæ inter se sunt vti bases. vt igitur pentagonum ad triangulum ita pyramis, cuius basis est dodecaedri pentagonum, & vertex centrum sphęræ ad pyramidem, cuius basis est icosaedri triangulum, vertex autem sphæræ centrum. ergo & vt duodecim pentagona ad viginti triangula, ita duodecim pyramides pentagonales bases habentes ad viginti pyramides, quæ triangulares habent bases. sed duodecim pentagona sunt dodecaedri superficies, & viginti triangula superficies icosaedri. est igitur vt dodecaedri superficies ad superficiem
M icosaedri, ita duodecim pyramides pentagonales bases habentes ad viginti pyramides, quę triangulares bases habent. & duodecim pyramides pentagonales bases habentes sunt dodecaedri solidum: viginti autem pyramides, quę triangulares habēt bases sunt solidum icosaedri. quare & vt dodecaedri superficies ad superficiem icosaedri, ita solidum dodecaedri ad icosaedri solidum. ut autem dodecaedri superficies ad superficiem icosaedri, ita ostensum est esse latus cubi ad icosaedri latus. & vt

igitur

igitur latus cubi ad icosaedri latus, ita dodecaedri solidum ad solidum icosaedri.

F. C. COMMENTARIVS.

In sphæris autem æquales circuli æqualiter à centro distant] *Ex 6. propositione primi libri sphæricorum Theodosii.* A


Et in centra circulorum cadunt] *Ex 1. corollario primae eiusdē libri sphæricorū Theodosii.* B

Pyramides autem æque altæ sunt inter se, vti bases] *Ex quinta & sexta duodecimi.* C

THEOREMA VII. PROPOSITIO VII.

A

At vero duas rectas lineas si extrema, ac media ratione sectæ fuerint, in subiecta esse analogia, ita demonstrabimus.



Secetur enim AB extrema, ac media ratione in C, cuius maior portio sit AC: & similiter DE extrema, ac media ratione secetur in F, vt DF sit portio maior. Dico vt tota AB ad maiorem portionem AC, ita esse totam DE ad DF maiorem portionem. Quoniam enim rectangulum quidem ABC est æquale quadrato ex AC; rectangulum vero DEF æquale quadrato ex DF: erit vt rectangulum ABC ad quadratum ex AC, ita rectangulum DEF ad quadratum ex DF; & ut rectāgulum, quod quater cōtinetur AB BC ad quadratum ex AC, ita quod quater continetur DE EF ad quadratū ex DF: componendoque vt quod quater cōtinetur AB BC vnà cum quadrato ex AC ad quadratum ex AC, ita quod quater continetur DE EF vnà cū quadrato ex DF ad quadratum ex DF. ergo & vt quadratum ex vtraque AB BC ad quadratum ex AC, ita quadratum ex vtraque DE EF ad quadratum ex DF: & longitudine vt vtraque AB BC ad AC, ita vtraque DE EF ad DF: & componendo vt vtraque AB BC vnà cum AC ad AC, hoc est duę AB ad AC, ita utraque DE EF vnà cum DF ad DF, hoc est duę DE ad DF. & antecedēntium dimidia, videlicet vt AB ad AC, ita DE ad DF. A B

COROLLARIVM.

Itaque hoc demonstrato videlicet qualibet recta linea extrema, ac media ratione secta, quam proportionem habet potens quadratum totius, & maioris portionis ad eam, quæ potest quadratum totius & minoris portionis, eandem habere cubi latus ad latus icosaedri. atque hoc demonstrato vt latus cubi ad icosaedri latus, ita esse dodecaedri superficiem ad superficiem icosaedri in eadem sphæra descriptorum. & insuper hoc cognito vt dodecaedri superficies ad superficiem icosaedri, ita esse dodecaedrum ad ipsum icosaedrum, propterea quòd idem circulus comprehendit, & dodecaedri pentagonum, & icosahedri triangulū: constat, si in ipsa sphęra describatur & dodecaedrum, & icosaedrum, eandem inter se proportionem habere, quam si recta linea extrema, ac media ratione secetur, habet potens quadratum totius & maioris portionis ad eam, quæ potest quadratum totius, ac minoris portionis. C D E

Quoniam

Quoniam enim eſt vt dodecaedrum ad icoſaedrum, ita dodecaedri ſuperficies ad ſuperficiem icoſaedri, hoc eſt latus cubi ad icoſaedri latus. vt autem latus cubi ad icoſaedri latus, ita qualibet recta linea extrema, ac media ratione ſecta, potens quadratum totius & maioris portionis ad eam, quæ poteſt quadratum totius & minoris portionis. ergo vt dodecaedrum ad icoſaedrum, quæ in eadem ſphæra deſcribuntur, ita qualibet recta linea extrema, ac media ratione ſecta, potens quadratum totius, & maioris portionis ad eã, quę poteſt quadratũ totius & minoris portionis.

F. C. COMMENTARIVS.

A Ergo & ut quadratum ex utraq; AB BC ad quadratum ex AC, ita quadratum ex utraque DE EF ad quadratũ ex DF] *Ex 8 ſecundi, eſt enim quod quater continetur AB BC vnà cum quadrato ex AC æquale quadrato ex AB BC tamquam ex vna linea. & ſimiliter quod quater continetur DE EF vnà cũ quadrato ex DF æquale quadrato ex DE EF tamquam ex vna linea.*

B Et longitudine ut utraque AB BC ad AC, ita utraque DE EF ad DF] *Ex 22 ſexti.*

C Eãdem habere cubi latus ad latus icoſaedri] *Ex 5 huius.*

D Ita eſſe dodecaedri ſuperficiem ad ſuperficiem icoſaedri in eadem ſphæra deſcriptorum] *Ex quarta huius.*

E Ita eſſe dodecaedrum ad ipſum icoſaedrum] *Ex 6 huius.*

QVARTIDECIMI LIBRI FINIS.

EVCLIDIS ELEMENTORVM

LIBER QVINTVSDECIMVS

ET SOLIDORVM QVINTVS.

vt quidam arbitrantur.

VT AVTEM ALII HYPSICLIS ALEXANDRINI

DE QVINQVE CORPORIBVS LIBER SECVNDVS.


Cum Scholijs antiquis, & Commentarijs Federici Commandini Vrbinatis.

PROBLEMA I. PROPOSITIO. I.



IN dato cubo pyramidem deſcribere.


Sit datus cubus ABCDEFGH, in quo oporteat pyramidem deſcribere. iungantur AC AE CE AH EH HC. itaque perſpicuum eſt triangula AEC AHE AHC CHE æquilatera eſſe. quadratorum enim diametri ſunt latera. pyramis igitur eſt AECH, & deſcripta eſt in dato cubo.



PROBLEMA II. PROPOSITIO II.

In data pyramide octaedrum deſcribere.

Sit data pyramis ABCD, cuius latera ſecentur bifariã in pũctis EFGHKL, & HK HL EF FG iungantur, & reliquæ. quoniam igitur AB dupla eſt vtriuſque HK FG, erit HK ipſi GF æqualis, & parallela. Similiter & HG æqualis, & parallela ipſi FK. æquilaterum igitur eſt HKFG. Dico & rectangulum eſſe. ſi enim ab ipſa KL perpendiculares ducantur ad plana EFBG FCEG EFHG HKFG ſimiliter demonſtrabimus quæ in quadrato HKFG æquilatera eſſe



[illegible] COMMENTARII.

Quoniam igitur AB dupla eſt vtriuſque HK GF, erit HK ipſi GF æqualis & parallela] *Eſt enim HK ipſi AB parallela; namque ut DH ad HA, ita eſt DK ad KB. & eadem ratione*


A 2. ſexti

9.undecimi. tione demonſtrabitur GF parallela ipſi AB. quae autem uni, & eidem ſunt parallelę, & inter ſe parallelae ſunt. ergo HK ipſi GF eſt parallela. triangula autem DAB DHK aequiangula ſunt.
29.primi & namque anguius quidem DHK eſt aequalis angulo DAB; angulus vero DKH aequalis ipſi DBA,
4.ſexti. & BAD vtrique communis. vt igitur AD ad DH, ita AB ad HK. eſtq; AD dupla ipſius DH.
9.quinti. ergo & AB ipſius HK eſt dupla. & eadem ratione erit AB dupla ipſius GF. quare HK ipſi GF
32.primi. eſt aequalis, atque eſt parallela, vt demonſtratum ſuit. quae autem aequales & parallelas coniungunt & ipſae aequales ſunt, & parallelae. aequalis igitur & parallela eſt HG ipſi KF. ſuntq; HK KF inter ſe aequales, cum aequalium ſint dimidiae. ergo HKFG aequilaterum eſt.

Dico & rectangulum eſſe] Vt hoc facile demonſtretur duo lemmata premittenda ſunt.

LEMMA PRIMVM.


Si à vertice pyramidis ad baſim perpendicularis ducatur, cadet ea in centrum circuli, qui circa baſis triangulum deſcribitur.



Sit pyramis ABCD, cuius baſis triangulum ABC, & vertex D punctum: ducaturq; à puncto D ad baſim perdendicularis DE. Dico E centrum eſſe circuli circa triangulum ABC deſcripti. Iungantur enim AE BE CE. & quoniam DE perpendicularis eſt ad planum trianguli ABC, & ad omnes rectas lineas, quae ipſam contingunt, quęq; in eodem ſunt plano rectos angulos faciet. recti igitur
47.primi *anguli ſunt DEA DEB DEC; ac propterea quadratum ex AD eſt aequale quadratis ex AE ED. & quadratum ex BD aequale quadratis ex BE ED. ſunt autem quadrata ex AD DB aequalia, quòd aequales ſint AD DB. ergo quadrata ex AE ED aequalia ſunt quadratis ex BE ED. & dempto cõmuni quadrato ex ED, relinquentur quadrata ex AE EB inter ſe aequalia. ideoq; rectae lineae AE EB*
9.tertij. *aequales ſunt. ſimiliter demonſtrabimus CE aequalem eſſe ipſis AE EB. quare punctum E centrum eſt circuli circa triangulum ABC deſcripti. quod demonſtrare oportebat.*

LEMMA SECVNDVM.

Recta linea ab angulo trianguli æquilateri ducta per centrum circuli, qui circa triangulum deſcribitur, baſim bifariam ſecat.




Sit triangulum aequilaterum ABC, & circa ipſum circulus ABC, cuius centrum D: & ducta AD ſecet baſim in puncto E. Dico BE ipſi EC aequalem eſſe: producatur enim AE vſque ad circuli circumferentiam in F. quoniam igitur AF per centrum tranſit, circuli erit diameter: ideoq; circumferentia ABF circumferentiae ACF eſt aequa-
28.tertij. *lis. circumferentia autem AB aequalis eſt circumferentiae AC, quòd*
27.tertij. *recta linea AB ſit aequalis ipſi AC. ergo & reliqua circumferentia BF reliquae circumferentiae FC, & angulus BAE angulo EAC aequalis erit. itaque triãguli ABE duo latera BA AE aequalia ſunt duobus lateribus CA AE trianguli AEC; & angulus BAE aequa-*
8.primi. *lis eſt angulo EAC. ergo & baſis BE baſi EC eſt aequalis. quod oportebat demonſtrare.*

Poteſt etiam hoc probari ex tertia ſexti libri, cum BA ſit æqualis ipſi AC.

COROLLARIVM.

Ex quibus, & ex tertia tertij conſtat rectam lineam ab angulo trianguli æquilateri ductam per centrum circuli, qui circa triangulum deſcribitur, ad baſim perpendicularem eſſe.




His demonſtratis ducatur à vertice pyramidis ABCD ad baſis planũ perpẽdicularis, quae ſit DO. erit O centrum circuli circa triangulum ABC deſcripti, ex primo lemmate eorum, quae nos prę miſimus. Itaque per latus pyramidis BD, et per DO ducatur planum pyramidem ſecans. erit illud rectum ad planum baſis ABC, atque erit eius, & trianguli ABC communis ſectio BO, quae vlterius protracta cadet in G ex ſecũdo lemmate prę miſſorum; & erit ad ipſam AC perpendicularis. Eadem ratione ſi per latus pyramidis AD, & per DO intelligatur ductum aliud planum, ad baſim rectum erit, & communis ipſorum ſectio erit recta linea AOF ad ipſam BC perpendicularis. ducantur à punctis KH ad planum trianguli ABC perpendiculares KM HN. cadent hae in communes planorum ſectiones ex 38 vndecimi, hoc eſt KM cadet in BO, & HN in ipſam AO: & BO AO in punctis MN bifariam diuidentur. Quoniam enim DO KM perpendiculares ſunt ad idem planum inter ſe parallelę erunt. quare vt BK ad KD, ita eſt BM ad MO. ſed BK eſt aequalis KD. ergo & BM ipſi MO aequalis erit. Eadem ratione demonſtrabitur AN aequalis NO. & quoniam perpendicularis à circuli centro ducta ad latus trianguli aequilateri dimidia eſt eius, quae ex centro circuli, vt ad primam quartidecimi libri demonſtrauimus; erit OF dimidia ipſius OA, & OG dimidia ipſius OB. & cum FO OG ſint aequales, quoniã et ipſae AO OB quę ex circuli cẽtro; omnes AN NO OF BM MO OG inter ſe aequales erunt. centro igitur O, & interuallo vnà ipſarum FO OG circulus deſcriptus etiam per puncta MN tranſibit. deſcribatur, & NM MF iungantur. quòd cum triangula BDO BKM ſint aequiangula, propterea quòd linea KM parallela eſt ipſi DO; erit vt DB ad BK, ita DO ad KM: eſtq; DB dupla ipſius BK. ergo & DO ipſius KM dupla erit. & ita demonſtrabitur DO dupla ipſius HN. quare KM HN inter ſe aequales ſunt. & ſunt parallelae, quippe quòd ad idem planum ſint perpendiculares. quae autem aequales, & parallelas coniungunt, & ipſae aequales, & parallelae ſunt. aequalis igitur eſt & parallela MN ipſi KH. ſed FG demonſtrata eſt aequalis, & parallela eidem KH, ergo MN, FG aequales ſunt, & parallelae. angulus autem NMK eſt rectus: & ſimiliter rectus NMF, quod in ſemicirculo. quare cũ NM duabus rectis lineis KM MF ſe inuicẽ ſecantibus in cõi ſectione ad rectos angulos inſiſtat, ẽt ducto per ipſas plano ad rectos angulos erit. ergo NM perpẽdicularis eſt ad planũ trianguli KMF. Sed demonſtrata eſt FG parallela ipſi MN. quare & FG ad idem planũ perpendicularis erit. ideoq; angulus GFK eſt rectus. ſunt autem anguli GFK FQH duobus rectis aequales. ergo & rectus eſt FGH: & ſimiliter recti, qui ipſis opponũtur. ex quibus ſequitur HK FG & aequilaterum eſſe, & rectangulum. quod oportebat demonſtrare.

18. undecimi

6. undecimi. 2. ſexti.

4. ſexti.

9. quinti. 4. undecimi. 33. primi.



4. undecimi


8. undecimi

29. primi.

34. primi.

ALITER. Ductis KM HN perpendicularibus, ut in antecedẽti figura, iungantur HF KG. & quoniam perpendicularis BG eſt aequalis ipſi AF; eſt enim AB ad vtramq; ipſarũ, vt 4 ad 3, quod nos demonſtrauimus ad 12


tertijdecimi libri. ſed & BM eſt æqualis AN: erit & reliqua MG reliquæ NF æqualis: atque eſt KM æqualis HN. trianguli igitur KMG duo latera GM MK æqualia ſunt duobus lateribus FN NH trianguli HNF: & angulus GMK rectus eſt æqualis recto FNH. ergo et baſis KG baſi FH eſt æqualis. rurſus. quoniam duo latera FK KH æqualia ſunt duobus lateribus GH HK, & baſis FH eſt æqualis baſi GK; erit angulus FKH æqualis angulo GHK. & ſunt duobus rectis æquales. vterque igitur ipſorum eſt rectus, itemq; recti, qui ipſis opponuntur. ergo HKFG rectangulum eſt. quod oportebat demonſtrare.



PROBLEMA III. PROPOSITIO. III.

In dato cubo octaedrum deſcribere.

A Sit datus cubus ABCDEFGH: & ſumantur centra inſiſtentium quadratorum KLMN. Dico KLMN quadratum eſſe. ducantur per KLMN parallelæ PO OX XT TP. Quoniam igitur PO quidem dupla eſt ipſius OK, XO autem dupla ipſius OL, ſuntque æquales PO OX; erunt & KO OL inter ſe æquales. quadratum igitur ex KL duplum eſt quadrati ex OL. eadem ratione & quadratum ex ML duplum eſt quadrati ex LX. ergo quadratum ex KL quadrato ex LM eſt æquale. æquilaterum igitur eſt KLMN, & cõſtat rectangulum eſſe. ſumantur duo quadrata BD EG; ipſorumque centra R, S, & iungantur RK RL RM RN SK SL SM SN. perſpicuum eſt triangula, quæ octaedrum efficiunt æquilatera eſſe. quod eadem ratione demonſtrabimus.




P. C. COMMENTARIVS.

A Et ſumãtur centra inſiſtentium quadratorum] *videlicet quadratorum CA AE EC CG; centra autem quadratorum dicit centra circulorum, qui circa quadrata deſcribuntur.*

B Ducãtur per KLMN parallelę PO OX XT TP] *Hoc eſt ducatur PO parallela alterutri ipſarum DA GH: & OX parallela alteruteri ipſarum AB HE, & ſic in alijs.*

C Quoniam igitur PO quidem dupla eſt ipſius OK, XO autem dupla ipſius OL] *Centrum enim eas bifariam ſecat, vt monſtrabitur.*

Sit quadratum ABCD, & ducantur diametri AC BD conuenientes in puncto E: perq; E ducatur FG alterutri ipſarum AD BC parallela. Dico FE ipſi EG æqualem eſſe.



29. primi 34. primi. *Angulus enim FAE eſt æqualis angulo GCE, et angulus AEF angulo CEG: ad verticem enim ſunt. reliquus igitur reliquo æqualis, & triangulum triangulo ſimile. quare ut AE ad EF, ita eſt CE, ad EG: & permutando ut AE ad EC, ita FE ad EG.*

atque

æque eſt AE aequalis EC, quòd AE ſit circuli diameter, & E centrum eiuſdem. ergo FE ipſi EG æqualis erit. centrum autem non ſolum ipſam FG bifariam ſecat, ſed & alias omnes, quae in quadrato per ipſum ducuntur. quod eodem modo demonſtrabimus.

Suntq; æquales PO OX] *Eſt enim PO aequalis DA, & OX aequalis AB ex 34 primi. quare PO ad OX eſt vt DA ad AB: & ſunt DA AB inter ſe aequales. ergo & PO OX aequales erunt.* D

Quadratum igitur ex KL duplum eſt quadrati ex OL] *Eſt enim quadratum ex KL æquale quadratis ex KO OL ex 47 primi.* E

Ergo quadratum ex KL quadrato ex LM eſt æquale] *Ex quo ſequitur & rectam lineã KL ipſi LM aequalem eſſe. ſed & aliter demonſtrare poſſumus. Quoniam enim duo latera KO OL ſunt aequalia duobus lateribus LX XM, & angulus ad O rectus eſt aequalis recto ad X; erit & baſis KL baſi LM aequalis ex 4 primi. et eodem modo demonſtrabitur LM aequalis MN, et OK aequalis KN. quare omnes inter ſe aequales ſint neceſſe eſt.* F


Et conſtat rectangulum eſſe] *Quoniam enim KO eſt aequalis OL, & angulus KOL eſt rectus, erit angulus KLO recti dimidius; & ob eandem cauſſam angulus MLX eſt dimidius recti. reliquus igitur K L M rectus eſt. ſunt enim tres anguli duobus rectis aequales. Eadem ratione & vnuſquiſque aliorum angulorum LMN MNK NKL rectus demonſtrabitur.* G

Perſpicuum eſt triangula, quæ octaedrum efficiunt æquilatera eſſe. quod eadem ratione demonſtrabimus] *Iiſdem enim argumentis probabimus KSMR NSLR aequilatera eſſe, & latera eorum ipſis KLMN aequalia.* H

PROBLEMA IIII. PROPOSITIO. IIII.

In dato octaedro cubum deſcribere.

Sumantur centra circulorum, quæ ſunt circa triangula ABE ABC ACD ADE, quæ ſint G HKL, & GH GK LK LH iungantur. Dico GH KL quadratum eſſe. ducantur per GHKL ipſis EB BC CD DE parallelæ OM MN NX XO. quoniam igitur æquilaterum eſt ABC triangulum, recta linea, quæ à pũcto A ducitur ad H cẽtrum circuli circa triangulum ABC deſcripti bifariam ſecat trianguli angulum, qui eſt ad A, æqualis igitur eſt MH ipſi HN. Eadem ratione & MG eſt æqualis GO. quoniam autem MN eſt æqualis MO, & MO ipſi OX; erit & HM æqualis MG, & GO ipſi OK; ſuntq; anguli HMG GOK recti. ergo HG ipſi GK eſt æqualis. Eadem ratione & reliquæ æquales erunt. cum igitur parallelogrammum ſit GHKL in uno erit plano. & cũ vterque angulorum MGH OGK ſit dimidius recti, reliquus HGK rectus erit. ſimiliter & reliqui. quadratum igitur eſt GHKL. poſſumus autem à principio ſumentes centra GHKL, ducentesq; parallelas MN NX XO OM iungere GH HL LK KG, & dicere GHKL quadratum eſſe. quòd ſi ſumentes reliquorum triangulorum centra, ipſa iungamus, oſtendentur & reliqua quadrata eſſe, habebimusq; in dato octaedro deſcriptum cubum. quod facere oportebat.



A B C D E F

F. C. COMMENTARIVS.

Quoniam igitur æquilaterum eſt ABC triangulum, recta linea, quæ à puncto A ducitur ad H centrum circuli circa triangulum ABC deſcripti bifariam ſecat trianguli angulum, qui eſt ad A, æqualis igitur eſt MH ipſi HN] *Superius enim demonſtratũ eſt rectam lineam ab angulo trianguli æquilateri ductam per centrum circuli, qui circa triangulum deſcribitur* A

deſcribitur baſim bifariam ſecare. ſequitur etiam hoc ex demonſtratis in decima primi libri. quòd ſi per centrum H ducatur MN ipſi BC parallela, demonſtrabitur eadem ratione MH aequalem eſſe ipſi HN, cum MA ipſi AN ſit aequalis, fiunt enim triangula BAC MAN inter ſe ſimilia.


B Quoniam autem NM eſt æqualis MO, & MO ipſi OX, erit & HM æqualis MG, & GO ipſi OK] *Cum enim rectae lineae NM MO parallelae ſint ipſis CB BE, erit triangulum AMN triangulo ABC ſimile, & triangulum AMO ſimile triangulo ABE. vt igitur CB ad BA, ita eſt NM ad MA. & vt AB ad BE, ita AM ad MO. quare ex aequali vt CB ad BE, ita NM ad MO. ſed CB eſt aequalis ipſi BE; ponitur enim BCDE quadratum. ergo & MN ipſi MO eſt æqualis. & eadem ratione MO ipſi OX aequalis demonſtrabitur. eſt autem HM dimidia ipſius MN, & MG dimidia ipſius MO. quare ſequitur HM ipſi MG aequalem eſſe, & ita GO æqualem ipſi OK.*

C Sunt q; anguli HMG GOK recti] *Quoniam enim rectae lineae NM MO parallelae ſunt ipſis CB BE, atque eſt angulus CBE rectus; & NMO angulus rectus erit, ex 10 vndecimi.*

D Ergo HG ipſi GK eſt æqualis [*Ex 4 primi.*

E Cum igitur parallelogrammum ſit GHKL in vno erit plano] Omne enim parallelogrammum eſt in vno plano.

Sit parallelogrammum ABCD, & iungantur AC BD, quae ſe ſe in puncto E ſecent. erit triangulum ABC in vno plano ex 2 undecimi. itemq; in vno plano. triangulum ACD. ſed et triangulum BCD eſt in vno plano. quare triangulum DEC, hoc eſt totum triangulum ACD eſt in eodem plano, in quo triangulum BEC, hoc eſt ipſum ABC. totum igitur parallelogrammum ABCD in vno plano erit. quod oportebat demonſtrare.




F Et cum vterque angulorum MGH OGK ſit dimidius recti, reliquus HGK rectus erit] *Sunt enim triangula HMG GOK aequicruria, et anguli ad M, et O recti; ut demonſtratum iam eſt.*

Ex iam demonſtratis apparet quomodo in dato octaedro pyramis deſcribatur. *Si enim in dato octaedro cubum, et rurſus in cubo pyramidem deſtribamus, et pyramis in dato octaedro deſcripta erit.*

PROBLEMA V. PROPOSITIO V.

In dato icoſaedro dodecaedrum deſcribere.



A Exponatur pentagonum icoſaedri ABCDE, & ſumantur centra circulorũ, qui ſunt circa triãgula AFE AFB BFC CFD DFE, uidelicet GHKLM, iungantur q; GH HK KL LM MG. & rurſus iũctæ FG FH FK producãtur ad pũcta XNO, quæ rectas lineas EA AB BC in XNO punctis biſariam ſecabũt: atq; erit vt XN ad NO, ita GH ad HK. æqualis igitur eſt & HN ipſi KO. ſimiliter autem & reli-


B

C

D

qua

qua pentagoni GHKLM latera æqualia oſtendentur. Dico & æquiangulum eſſe. Quoniam enim duæ XN NO parallelæ duabus GH HK æquales angulos continent, & reliqua manifeſta ſunt. Intelligatur à puncto F ad planum pẽtagoni ABCDE ducta perpẽdicularis, quæ cadet in centrũ circuli circa pẽtagonũ deſcripti. ſi igitur à pũcto N ad punctum, in quod dicta perpendicularis cadit, rectam lineã ducamus, & per H ducamus ipſi parallelam, perſpicuum eſt eam perpendiculari occurrere, & cum ipſa rectum angulum continere. Rurſus ſi à punctis XO ad cẽtrum circuli circa pentagonum deſcripti rectas lineas iungamus, & à puncto, in quo linea per H ducta perpendiculari occurit ad G K rectas lineas ducamus, manifeſtũ eſt ipſas cum eadem perpendiculari rectos angulos continere. Ex quo perſpicue cõſtat pentagonum GHKLM in vno eſſe plano.



E
F
G
H
K

F. C. COMMENTARIVS.

Exponatur pentagonum icoſaedri ABCDE] *Hoc eſt pentagonum deſcriptum in circulo, à quo icoſaedrum ortum habet, vt in 16 tertij decimi.* A

Quę rectas lineas EA AB BC in X N O punctis bifariam ſecabunt] *Ex ijs, quae nos in antecedente demonſtrauimus.* B

Atque erit vt XN ad NO, ita GH ad HK] *Quoniam enim triangula AFE AFB BFC aequilatera ſunt, & aequalia; erunt perpendiculares, quae ab angulo F ad baſim ducuntur, videlicet FX FN FO inter ſe aequales. latus enim trianguli aequilateri ad perpendicularem, quae ab angulo ad baſim ducitur, eam proportionem habet, quam 4 ad 3, vt nos demonſtrauimus ad 12 tertij decimi. Rurſus quoniam GHK ſunt centra circulorum, qui circa triangula deſcribuntur, erũt & ipſae, quae ex centris FG FH FK aequales. ergo & reliquae aequales ſunt, nempe GX HN KO. ſunt autem aequales EA AB BC: & earum dimidiae EX XA AN NB BO OC. cũ igitur duo latera trianguli ANX, videlicet XA AN aequalia ſint duobus lateribus NB BO trianguli BON; & anguli ad AB ſint aequales, ponitur enim pentagonum ABCDE aequilaterum, & aequiangulum: erit & baſis XN baſi NO aequalis. ſed vt FG ad GX, ita eſt FH ad HN: eſt enim vtraque vtriuſque dupla, vt ad primam quartidecimi demonſtratum eſt. ergo GH parallela eſt ipſi XN. & eadem ratione HK ipſi NO eſt parallela. triangulum igitur FGH ſimile eſt triangulo FXN, & triangulum FHK ſimile ipſi FNO: ideoq; vt NX ad HG, ita eſt NF ad FH. vt autem NF ad FH, ita NO ad HK. quare vt NX ad HG, ita NO ad HK: & permutando vt XN ad NO, ita GH ad HK. ſunt autem aequales XN NO. ergo & GH HK aequales ſint neceſſe eſt.* C

Aequalis igitur eſt & HN ipſi KO] *Vide ne potius legendum ſit aequalis igitur eſt & GH ipſi HK propter ea, quae ſequuntur.* D

Quoniam enim duæ XN NO parallelæ duabus GH HK æquales angulos continent: & reliqua manifeſta ſunt] *Nam cum duae XN, NO ſeſe contingentes duabus GH HK ſeſe contingentibus ſint parallelae, non autem in eodem plano; aequales angulos continebunt. ergo angulus GHK eſt aequalis angulo XNO. & ſimiliter bifariam ſecta CD in T, & iũcta OT, erit angulus HKL aequalis angulo NOT. ſed anguli XNO NOT ſunt aequales, ut monſtrabitur. ergo & GHK HKL anguli aequales erunt. & ſimiliter reliqui. Quoniam enim triangula AXN BON CTO aequicrura ſunt ſimilia, & aequalia, erũt anguli AXN ANX BNO BON COT inter ſe aequales. ergo reliquus ex duobus rectis XNO eſt aequalis reliquo NOT. item reliqui aequales oſtendentur.* E

10. undecimi

Quæ cadet in centrum circuli circa pentagonũ deſcripti] *Cadat enim in punctum V;* F

&

& intelligatur iunctae AV BV CV. Quoniã igitur FV perpẽdicularis eſt ad planũ pentagoni,
9. dif. undecimi. *erunt anguli AVF BVF CVF recti; & ob id quadratum ex AF aequale duobus quadratis ex*
47. primi. *AV VF: & quadratum ex BF æquale duobus ex BV VF. ſed quadratum ex AF eſt aequale*
quadrato ex BF, quòd AF ipſi FB ſit aequalis. ergo quadrata ex AV VF quadratis ex BV VF
ſunt aequalia, & dempto communi quadrato ex FV, erit reliquum quadratum ex AV aequale
reliquo ex VB, & recta linea AV ipſi VB aequalis. Eadem ratione & recta linea CV aequalis
9. tertij. *oſtendetur ipſis AV VB. ergo V eſt centrum circuli circa pentagonum deſcripti. quod demonſtra-*
re oportebat.

G Perſpicuum eſt eam perpendiculari occurrere, & cum ipſa rectum angulum con-
2. undecimi. tinere] *Nam cum triangulum FNV ſit in vno plano, ſi recta linea à puncto H ducta non occurreret perpendiculari, parallela non eſſet ipſi NV, quod non ponitur. ſunt enim parallelæ in eodem plano ex 35 diffinitione primi libri. Occurrat autem perpendiculari in puncto Z. cum igitur angulus NVF ſit rectus ex 3. diffinitione vndecimi, erit ex 29 primi & HZF rectus.*

H Manifeſtum eſt ipſas cum eadem perpendiculari rectos angulos continere] *Quo-*
2. ſexti. *niam n. HZ eſt parallela ipſi NV; erit vt FZ ad ZV, ita FH ad HN. ſed vt FH ad HN, ita FG ad*
11. quinti. *GX. vt igitur FZ ad ZV, ita FG ad GX. quare GZ eſt parallela ipſi XV; angulusq; GZF eſt rectus,*
nempe ipſi recto XVF aequalis. & eadem ratione angulus KZF rectus erit: iunctiſq; LZ MZ ſi-
militer demonſtrabitur angulos LZF MZF eſſe rectos.

K Ex quo perſpicue conſtat pentagonum GHKLM in vno eſſe plano] *Ex quinta undecimi. nã recta linea FZ tribus rectis lineis ſe ſe tangentibus ZG ZH ZK ad rectos angulos inſiſtit. Si igitur reliquis icoſaedri angulis eodem modo pentagona ſubtendemus in dato icoſaedro dodecaedrum deſcriptum erit.*

De quinquè figurarum lateribus, & angulis.

Oportet autem ſcire, ſi quis interroget nos, quot latera icoſaedrum habeat, ita reſpondendum eſſe. Patet icoſaedrum contineri viginti triangulis, & vnumquodque triangulum ex tribus rectis lineis conſtare. multiplicabimus igitur viginti triangula per numerum laterum trianguli, fient ſexaginta; cuius dimidium triginta. ſimiliter autem & in dodecaedro. quoniam enim duodecim pentagona dodecaedrum continent, & vnumquodque pentagonum habet quinque rectas lineas, multiplicabimus decies quinque, & erunt ſexaginta, cuius rurſus dimidium triginta. dimidium autem idcirco accipimus, quòd ſingula latera ſiue ſit triangulum, ſiue pẽtagonum, ſiue quadratum, vt in cubo, bis ſumuntur. Eadem via, & ratione vtentes & in cubo, & in pyramide, & in octaedro latera inueniemus. ſi vero ſingularum quinque figurarum anguli inueniendi ſint, rurſus eadem facientes partiemur per numerum planorum, quæ vnum ſolidi angulum continent; vt quoniam icoſaedri angulum continent quinque triangula, partiemur per quinque. erunt duodecim anguli in icoſaedro. quoniam autem tria pentagona dodecaedri continent angulum, partiemnr per tria, & habebimus angulos viginti in dodecaedro. ſimiliter in reliquis figuris anguli inuenientur.

De

De inclinatione planorum, quæ ſingulas quinque figuras continent.

Quęſitum eſt quo modo in vnaquaque ſolidarum quinque figurarum quolibet plano dato eorum, quæ ipſam continent, inclinatio inueniatur. Inuentio autem, vt narrauit Iſidorus magnus præceptor noſter, hoc modo ſe habet. In cubo quidem plana, quæ ipſum continent, ad rectos inter ſe angulos inclinari manifeſtum eſt. In pyramide vero expoſito vno triangulo centris quidem terminis vnius lateris, interuallo autem recta linea, quę à vertice trianguli ad baſim perpendicularis ducitur, circumferentiæ deſcriptæ ſe mutuo ſecent; & à ſectione ad centra iunctę rectæ lineæ continebunt inclinationem planorum, quę pyramidem comprehendunt. At in octaedro à latere trianguli deſcripto quadrato, & centris quidem terminis diametri, inreruallo autem ſimiliter perpendiculari, quæ à uertice trianguli ad baſim ducitur; deſcribantur circumferentiæ; & rurſus rectæ lineę à communi ſectione ad centra iunctæ continebunt angulum, qui ex duobus rectis relinquitur, inclinationis eius, quam inquirimus. In icoſaedro autem à latere trianguli deſcripto pentagono, iungatur recta linea, quę duobus lateribus ſubtenditur: & centris quidē terminis eius, interualloq; perpendiculari ipſius trianguli deſcriptis circumferentijs rectæ lineę à communi ſectione ad centra iunctę continebunt ſimiliter angulum, qui ex duobus rectis relinquitur, inclinationis planorum ipſius icoſaedri. Denique in dodecaedro expoſito vno pentagono, & iuncta ſimiliter recta linea, quę duobus lateribus ſubtenditur, centris quidem terminis ipſius, interuallo autem perpendiculari, quæ à bipartita ſectione ad latus pē tagoni ipſi parallelum ducitur; deſcribantur citcumferentiæ; & à puncto, in quo conueniunt ad centra ſimiliter iunctæ rectæ lineę continebunt reliquum ex duobus rectis, inclinationis planorum dodecaedri.

Cubi planorum inclinatio.

Pyramidis.


Octaedri planorum inclinatio.

Icosaedri planorum inclinatio.

Dodecaedri planorum inclinatio.


Hunc quidem vir ille clariſsimus de prędictis ſermonem habuit, cum demonſtratio eorum ſibi manifeſta videretur. ſed vt contemplatio demonſtratiua perſpicue appareat, ſermonem in vnoquoque explicabo, & primum in pyramide.

Intelligatur pyramis quattuor triangulis æquilateris contenta ABCD, cuius baſis ABC, & vertex D punctum. ſecto autem latere AD bifariam in E, iungantur BE EC. Et quoniam æquilatera ſunt ADB ADC triangula, & bifariam ſecta eſt AD, erunt BE EC ad ipſam AD perpendiculares. Dico angulum BEC acutum eſſe.





A

Quoniam enim AC dupla est ipsius AE, erit quadratum ex AC quadrati ex AE quadruplum. Sed quadratum ex AC æquale est quadratis ex AE EC, quorum
47. primi. B quadratum ex AC ad quadratũ ex CE proportionem
C habet, quam 4 ad 3: atque est CE ipsi EB æqualis. quadratum igitur ex BC minus est quadratis ex BE EC; ideoque angulus BEC est acutus. quòd cum duorum planorum ABD ADC communis sectio sit AD; & communi sectioni ad rectos angulos occurrant in vtroque planorum rectę lineæ BE EC, quæ acutum angu-
D lum continent: erit angulus BEC planorum inclinatio, atque est data; datur enim BC latus existens trian-
E guli, & utraque ipsarum BE EC est perpendicularis trianguli æquilateri. centris igitur BC, hoc est terminis vnius lateris, & interuallo trianguli perpendiculari de scriptę circumferentiæ se inuicem secent in puncto E: & ab eo ad BC iunctæ rectæ lineæ planorum inclinationem continebunt. hoc autem est, quod dicebatur. atque illud (centris quidem BC, interuallo autem trianguli perpendiculari descripti circuli se mutuo secent,) manifestum est. vtraque enim BE EC maior est, quàm dimidia ipsius BC. & centris BC, & interuallo ipsius BC dimidia descripti circuli se se tangunt. si autem minor sit, neque se tangunt, neque secant: quòd si maior omnino secant; & ita de pyramide sermo & manifestus, & demonstrationibus congruens apparet.



Intelligatur rursus in quadrato ABCD pyramis verticem habens punctum E, & continentia ipsam præter basim triangula æquilatera. erit autem ABCDE pyramis dimidia octaedri. secerur latus vnius trianguli AE bifariam in F: & BF FD iungantur. sunt igitur BF FD & æquales inter se, & ad ipsam AE perpendiculares. Dico angulum BFD obtusum esse. iungatur enim BD; & quoniam quadratum est AC, cuius diameter BD, erit quadratum ex BD quadrari ex DA duplum. quadratum autem ex DA ad quadratum ex DF proportionem habet, vt proxime dictum est, quam 4 ad 3. ergo & quadratum ex BD ad quadratum ex DF proportioуem habebit, quam 8 ad 3. est autem DF æqualis FB. quadratum igitur ex BD maius est quadratis ex BF FD; ac propterea angulus BFD est obtusus. & quoniam duorum planorum ABE ADE se inuicem secantium communis sectio est AE, & ipsi ad rectos angulos in vtroque plano ductæ sunt BF FD, angulum obtusum continentes; erit an
G gulus BFD reliquus ex duobus rectis, inclinationis planorum ABE ADE. si igitur angulus BFD datus sit, & dicta inclinatio dabitur. Itaque quoniam triangulũ octae
H dri datum est, & unum eius latus est AD, à quo quadratum AC describitur; datur & BD diameter existens quadrati. sed & BF FD trianguli perpendiculares datæ sunt. ergo & angulus BFE dabitur. descripto igitur quadrato à latere trianguli, ut AC, & iuncta diametro BD, si centris quidem BD; interuallo autem perpendiculari trianguli circulos describamus, se mutuo secabunt in F: & rectę lineæ à puncto F ad centra ductæ continebunt inclinationem BFD, quæ quidem est reliqua ex duobus rectis, vt dictum est, inclinationis planorum. & hoc loco patet vtramque ipsarum BF FD maiorem esse, quàm ipsius BD dimidiam. ideoque in constructione organica necesse est circulos se mutuo secare. constat etiam ex demonstratione ipsam BD ad DF potentia proportionem habere. quam habet 8 ad 3, & dimidiæ eius potentia esse quadruplam. ergo utraque ipsarum BF FD maior







ior eſt quàm dimidia ipſius BD. & hęc quidem de octaedro dicta ſint.


In icoſaedro autem intelligatur pentagonum ęquilaterum ABCDE, & in hoc pyramis uerticē habens punctum F, ita vt continentia ipſam triangula ſint ęquilatera. erit ABCDE pyramis figuræ icoſaedri pars. ſecetur latus unius trianguli FC biſariam in G, & BG GD iungantur. erunt utique & æquales, & ad ipſam FC perpendiculares. Dico angulum BGD obtuſum eſſe, quod per ſe ſe manifeſto conſtat. Iuncta enim BD obtuſum angulum BCD pentagoni ſubtēdit: hoc autem maior eſt angulus BGD: nam BG GD ipſis BC CD ſunt minores. ſimiliter ijs, quę proxime dicta ſunt, patet angulum BGD eſſe eum, qui relinquitur ex duobus rectis inclinationis BFC CFD triangulorum. hoc autem dato, dabitur & planorum icoſaedri inclinatio. à latere enim trianguli icoſaedri deſcripto pentagono, & recta linea, quæ duobus pentagoni lateribus ſubtenditur, vt in figura eſt BD data: & ſimiliter datis BG GC perpendicularibus triangulorum, dabitur & BGD angulus. nam ſi centris quidem terminis ipſius BD, quę duobus pentagoni lateribus ſubtenditur, interuallo autem perpendiculari trianguli circuli deſcribantur, ſe inuicem ſecabunt, vt in G: & rectæ lineę à puncto G ad centra BD ductæ continebunt angulum, qui ex duobus rectis relinquitur, inclinationis planorum. & hoc loco ex figura manifeſtum eſt vtramque BG GD maiorem eſſe, quàm dimidiam ipſius BD. quamquam ita eſſe ex conſtructione organica demonſtrari poteſt. intelligatur enim ſeor ſum triangulum ęquilaterum HKL, & ab ipſa KL pentagonum deſcribatur KMNXL: iunctaque ML ducatur HO perpendicularis trianguli HKL. Dico HO maiorem eſſe dimidia ipſius ML, quæ inclinationē planorum ſubtendit. ducta enim à puncto K ad ML perpendicularī KP, quoniā angulus KLP maior eſt tertia parte recti, hoc eſt maior angulo KHO; conſtituatur angulo KHO æqualis angulus PLR. ergo PL eſt perpendicularis æquilateri trianguli, cuius latus eſt RL; ac propterea quadratum ex RL ad quadratum ex LP proportionem habet, quam 4 ad 3. ſed maior eſt KL quàm LR. ergo quadratum ex KL ad quadratū ex LP maiorem habet proportionem, quam 4 ad 3. habet autem & ad quadratum ex HO proportionem eam, quam 4 ad 3. ergo KL ad LP maiorem proportionem habet, quā ad HO: maior igitur eſt HO quàm LP.

In dodecaedro autem hoc modo. intelligatur unum cubi quadratum, à quo dodecaedrum deſcribitur ABCD, & duo plana dodecaedri AEBFG GDHCF. Dico & ſic datam eſſe duorum pentagonorum inclinationem. ſecetur FG biſariam in K; & à puncto K ipſi FG ad rectos angulos ducantur in vtroque planorum KL KM: & ML iungatur. Itaque primum dico angulum MKL obtuſum eſſe. oſtenſum enim eſt in tertiodecimo libro elementorum, & in conſtitutione do





K
L





M
N
O
P





decaedri, rectam lineam, quæ à puncto K ad quadratum ABCD perpendicularis ducitur, dimidiam esse lateris pentagoni. quare minor est quàm dimidia ipsius ML. ideoque angulus MKL est obtusus. simul autem demonstratum est in eodem theoremate, quadratum quidē ex KL æquale esse & dimidij lateris cubi quadrato, & quadrato dimidij lateris pētagoni, ita vt KL, & KM inter se æquales maiores sint, quàm dimidia ipsius ML. angulo igitur MKL dato reliquus ex duobus rectis, hoc est inclinatio planorum data erit. Itaque quoniam latus quadrati ABCD duobus lateribus pentagoni subtenditur, & datū est pentagonum; erit & ML data. data autem est & vtraque ipsarum MK KL; perpendiculares enim sunt à bipartita sectione rectæ lineæ AB, quæ duobus lateribus subtenditur ad latus pentagoni ipsi paralleinm, ut ad FG. ergo angulus LKM datus est, nempe reliquus ex duobus rectis, vt dictū est, inclinationis eius, quā inquirimus. pulchre igitur in constructione organica dixit, oportere dato pentagono iungere rectam lineam duobus lateribus subtensam, quæ lateri cubi est æqualis: & centris quidem terminis ipsius, interuallo autem perpendiculari, quę à bipartita sectione ad latus pentagoni parallelum agitur, vt in figura sunt KL KM, describere circumferentias, atque à pūcto, in quo conueniunt ad centra rectas lineas ducere, quę continent angulum reliquum ex duobus rectis, inclinationis planorum. at uero perpendicularem KM maiorem esse dimidia ipsius ML iam dictum est, vt in elemētis simul est demonstratū.

F. C. COMMENTARIVS.

A Et quoniam æquilatera sunt ADB ADC triangula, & bifariam secta est AD, erūt BE EC ad ipsam AD perpendiculares] *Ex ijs, quae nos ad 12 tertijdecimi libri demonstrauimus.*

B Quorum quadratum ex AC ad quadratum ex CE proportionem habet, quam 4 ad 3] *Ex demonstratis in eodem loco.*

C Quadratum igitur ex BC minus est quadratis ex BE EC] *Est enim quadratum ex BC ad quadrata ex BE EC, vt 4 ad 6.*

D Erit angulus BEC planorum inclinatio] *Ex 6. diffinitione vndecimi libri.*

E Et vtraque ipsarum BE EC est perpendicularis trianguli æquilateri] *Dato autem latere trianguli aequilateri, & perpendicularis dabitur ex secunda libri datorum. est enim latus trianguli aequilateri ad perpendicularem, vt 4 ad 3.*

F Quadratum igitur ex BD maius est quadratis ex BF FD] *Est enim quadratum ex BD ad quadrata ex BF FD, vt 8 ad 6.*

G Erit angulus BFD reliquus ex duobus rectis inclinationis planorum ABE ADE] *Est enim plani ad planum inclinatio acutus angulus rectis lineis contentus, quae ad rectos angulos communi planorum sectioni ad vnum ipsius punctum in vtroque planorum ducuntur. quare dempto BFD angulo obtuso ex duobus rectis relinquetur acutus angulus, qui est inclinationis planorum ABE ADE. & cum angulus BFD datus sit, & inclinatio planorum detur necesse est ex quarta libri datorum.*

H Datur & BD diameter existens quadrati] *Ex 26 libri datorum.*

K Iuncta enim BD obtusum angulum BCD pentagoni subtendit] *Angulus namque pentagoni constat ex recto, & quinta recti parte.*

L Hoc autem maior est angulus BGD, nam BG GD ipsis BC CD sunt minores] *Ex 21 primi. sunt enim BG GD minores, sed maiorem angulum continent.*

M Quoniam angulus KLP maior est tertia parte recti] *Angulus enim pentagoni MKL continet rectum, & recti quintam, vt dictum est, ergo anguli KML KLM sunt quattuor quin-*

tae

tae recti, & ipsc KLM duae quintae. duae autem quintae ad tertiam recti proportionem habent eam, quam 6 ad 5.

Sed maior est KL quàm LR] *Iunctа enim MR, erunt duae MK KL maiores MR RL ex* N *21 primi. ergo & dimidia KL quàm dimidia LR maior erit.*

Maior igitur est HO quàm LP] *Ex 10 quinti.* O


Intelligatur unum cubi quadratum, à quo dodecaedrum describitur] *Ad constitu* P *tionem enim dodecaedri vtitur ipsius cubi quadratis, vt in 17 tertiidecimi apparet.*

Ex ijs aũt quæ proxime tradita sunt, & ex demonstratis in 17 tertjdecimi libri cõ stat, quomodo in dato dodecaedro cubus describatur.

Quoniam enim in dodecaedri constitutione cubi planis vtimur, & ad singula eius latera singula pentagona dodecaedri describimus, si in dodecaedro iam facto apposite ducamus rectas lineas, quae duobus cuiusque pentagoni lateribus subtendantur, cubus ipse constitutus erit, vt in sequenti figura apparere potest.

Ex quibus iam perspicuum est quomodo in dato dodecaedro tum pyramis ipsa, tum octaedrum describatur.

Nam si in dodecaedro cubum, & rursus in cubo pyramidem vel octaedrum describamus, & pyramis, & octaedrum in dato dodecaedro descripta sint necesse est.



In dato icosaedro cubum describere.


Primum in icosahedro dodecaedrum describemus, vt in 5 huius dictum est; deinde in dodecaedro cubum, & ita cubus in dato icosaedro descriptus erit.

In dato icosaedro pyramidem describere.

Si enim describamus ex antecedenti in icosaedro cubum, & in cubo pyramidem ex prima huius, erit pyramis quoque in icosaedro descripta.

In dato dodecaedro icosaedrum describere.


Exponatur dodecaedri angulus aliquis A, contentus tribus pentagonis ABCDE AFGHE, AFKLB: sumanturq; centra circulorum, qui circa pentagona describuntur MNO, & ab ipsis ad latera pentagonorum perpendiculares ducantur MP OP NQ OQ MR NR: & MN NO OM iungantur. erunt ex iam demonstratis MPO OQN NRM anguli inclinationis planorum ipsius dodecaedri, & idcirco inter se aequales:



item

item ſ. aequales perpendiculares ipſae. quare trianguli MOP duo latera MP PO aequalia ſunt duobus lateribus MR RN trianguli MNR: & angulus MPO eſt aequalis angulo MRN. baſis igitur OM eſt aequalis baſi MN. & ita demonſtrabitur baſis ON ipſi NM aequalis. ex quibus conſtat triangulum MNO aequiangulum eſſe. ergo ſi reliquis dodecaedri angulis triangula aequilatera eodem modo ſubtendantur, deſcriptum erit icoſaedrum. ſunt enim omnes anguli ipſius dodecaedri numero viginti, quot ſunt icoſaedri triangula. In dato igitur dodecaedro icoſaedrum deſcriptum eſt. quod facere oportebat.

4. primi.



EVCLIDIS ELEMENTORVM FINIS.

PISAVRI.

CVM LICENTIA SVPERIORVM.

APVD CAMILLVM FRANCISCHINVM.

M. D. LXXII.

UNIVERSIDAD CENTRAL
BIBLIOTECA
DERECHO