

Notes du mont Royal

www.notesdumontroyal.com

Cette œuvre est hébergée sur « *Notes du mont Royal* » dans le cadre d'un exposé gratuit sur la littérature.

SOURCE DES IMAGES
Google Livres

EUCLIDIS ELEMENTORUM

LIBRI PRIORES SEX,

ITEM

UNDECIMUS & DUODECIMUS.

Ex Versione Latina

FREDERICI COMMANDINI.

QUIBUS ACCEDUNT.

Trigonometriæ Planæ & Sphæricæ Elementa.

Item Tractatus de Natura & Arithmetica Logarithmorum.

In usum Juventutis Academicæ.

EDITIO QUINTA, Auctior & Emendatio.



O X O N I Æ,

E THEATRO SHELDONIANO, MDCCXLVII.

Impensis Ric. Clements Bibliop. Oxon.


Prostat apud J. & J. Knapton, S. Birt, & J. & J. Rivington,
Bibliop. London.

Imprimatur,

BER. GARDINER,

Vic. Can. *OXON.*

March 25. 1715.



PRÆFATIO.

POST tot nova Geometriæ Elementa, non ita pridem in lucem emissa, est fortasse quod miretur Tyro Mathematicus, annosa hæc, & (ut quibusdam videntur) obsoleta Euclidis *εὐκλείης* è prelo denuo prodire: præsertim cum non pauca in illis vitia detexisse sibi visi sint, qui Geometriam Elementarem novâ quadam methodo excolendam proponunt. Hi enim Lyncei Philosophi Euclidis Definitiones parum perspicuas, demonstrationes vix evidentes, res omnes malo ordine dispositas, aliasque mendas innumeras, per omnem antiquitatem ad sua usque tempora latentes, se invenisse jactant.

At tantorum virorum pace, audacter asserto, Euclidem ab iis immerito reprehensum esse, ejusque Definitiones distinctas & claras, è primis & simplicioribus principiis petitas esse, & conceptibus nostris faciliores; demonstrationes Elegantes perspicuas & concinnas; ratiocinandi vim adeo evidentem & nervosam, ut facile inducar credere obscuritatem istam à sciolis illis toties insinulatam, confusis potius & perplexis eorum ideis, quam demonstrationibus ipsis imputandum esse. Et utcumque nonnulli quærantur de malâ rerum dispositione, & iniquo ordine, quem tenet Euclides; aliam tamen methodum magis idoneam, & discipulis faciliorem inter omnia hoc genus scripta invenio nullam.

Non meum est hic loci hypercriticis Horum captiunculis figillatim respondere: sed in his Elementis vel mediocriter versato, statim patebit, Calumniatores hos suam potius oscitantiam monstrare, quam veros in nostro authore lapsus arguere; imo ne hoc quidem dicere vereor, quod vix, & ne vix quidem unum, aut alterum è tot novis systematibus inveniri potest, in quibus plures non sunt lăbes, imo fœdiores paralogismi, quam in Euclidem vel fingere potuerunt.

Post tot infelices in Geometriâ reformatandâ conatus, quidam non infimi Geometræ Elementa de novo construere non ausi, ipsum Euclidem omnibus aliis Elementorum Scriptoribus merito præluterunt, eique edendo suas curas impenderunt; hi tamen ipsi nescio quibus opinionibus ducti, alias propositiones prorsus omittunt, aliarumque demonstrationes in pejus mutant. Inter illos eminent Tacquetus & Deschalles, quorum utrique malo quodam fato contigit, ut elegantes quasdam & in Elementis optimo jure ponendas propositiones quasi ineptas & inutiles rejecerint, quales sunt propositiones 27, 28, 29. libri sexti, cum aliis nonnullis quarum usus fortasse illos latebat. Insuper quandocunque ipsas Euclidis demonstrationes deserunt, multum in argumentando peccant, & à concinnitate Veterum recedunt.

In libro quinto demonstrationes Euclidis in totum repudierunt, & Proportionis definitionem aliis terminis conceptam attulerunt; at quæ unam tantum è duabus proportionalium speciebus comprehendit, & quantitativis commensurabilibus solummodo competit: nihilominus suas, quæ sunt de proportionē, demonstrationes omni quantitati tam incom-

incommensurabili quam commensurabili in sequentibus libris applicant. Hunc tam turpem lapsum nec Logici nec Geometrae facile condonassent, nisi hi authores in aliis suis scriptis de Scientiis Mathematicis bene meruissent. Hoc quidem commune est iis vitium cum omnibus hodiernis Elementorum Scriptoribus, qui in eundem impingunt scopulum, & ut suam in hac materia ostentent peritiam, authorem nostrum in re minime culpandâ imo laudandâ reprehendunt; Quantitatum proportionalium definitionem intelligo: in quâ intellectu facilem proportionalium proprietatem exponit, quæ quantitatis omnibus tam incommensurabilibus quam commensurabilibus æque convenit, & à quâ cæteræ omnes proportionalium proprietates facile consequuntur.

Hujus proprietatis demonstrationem in Euclide desiderant Egregii hi Geometrae, atque defectum demonstratione suâ supplendum suscipiunt. Hic iterum contemplari licet insignem eorum in Logicâ peritiam, qui definitionis nominis demonstrationem expectant: talis enim est hæc Euclidis definitio; qui illas quantitates proportionales vocat, quæ conditiones in definitione suâ allatas obtinent. Quidni primo Elementorum auctori licebat, quælibet nomina quantitatis hæc requisita habentibus, arbitrio suo affigere? Licebat proculdubio; suo igitur utitur jure, & eas proportionales vocat.

Sed operæ pretium erit, methodum, quâ hanc proprietatem demonstrare conantur, perpendere. Affectionem quandam uni tantum proportionalium generi, viz. commensurabilium, congruentem assument; & exinde multis ambagibus longâque conclusionum

clufionum ferie univerſalem, quam Euclides poſuit, proportionalium proprietatem deducunt; quod certe tam methodo quam argumentationis regulis ſatis alienum eſſe videtur. At longe rectius feciſſent, ſi proprietatem univerſalem ab Euclide assignatam primo poſuiſſent, & exinde particularem illam & uni tantum proportionalium ſpeciei congruentem deduxiſſent. Quoniam vero hanc reſpuerunt methodum, talem demonſtrationem ad definitiones libri quinti attexere libuit. Qui Euclidem ulterius deſenſum videre cupiunt, conſulant eruditas & ſummo iudicio conſcriptas Lectiones Mathematicas Cl. Barovii an. 1666.

Cum vero tanti Geometrae incidit mentio, præterire non poſſum Elementa ab eo edita, in quibus plerumque ipſius Euclidis conſtructiones & demonſtrationes retinet, ne unâ quidem omiſſa propoſitione. Hinc oritur major in demonſtrando vis, pulchrior conſtruendi methodus, & ubique Veterum Geometrarum genius clarius elucet, quam in libris iſtius generis fieri ſolet. Plura præterea Corollaria & Scholia adjecit, non modo breviori ſequentium demonſtrationi inſervientia, verum etiam aliis in rebus perutilia.

Nihilominus, demonſtrationes ejus eâ brevitate laborant, tot ſymbolis notisque implicantur, ut in Geometriâ parum verſato difficiles & obſcuræ fiant. Multæ propoſitiones quæ ipſum Euclidem legenti perſpicuæ viderentur, Algebraicâ hac demonſtrandi methodo tyronibus nodoſæ & vix intelligibiles redduntur; qualis eſt V. G. 13. primi Elementi. Demonſtrationum, quas in Elemento ſecundo attulit, difficilis admodum tyronibus eſt intelligentia; re-
ſtius

Alius multo Euclides ipse earum evidentiam (ut in re Geometricâ fieri debet) à figurarum contemplatione petit. Scientiarum omnium Elementa simplicissimâ methodo tradenda sunt, nec symbolis nec notis nec obscuris principiis aliunde petitis involvenda.

Ut Elementa Barovii nimîâ brevitate, sic ea, quæ à Clavio traduntur, molestâ prolixitate peccant. Scholiis enim Commentariisque abundat nimis & luxuriat. Vix equidem arbitror Euclidem tam obscuram esse, ut tantâ farragine notarum indigeat; nec dubito quin tyrones omnes Euclidem ipsum omnibus suis Commentatoribus faciliorem inventuri sint. In demonstrationibus Geometricis ut nimia brevitâs tenebras parit, sic nimia verborum plus tædii & confusionis quam lucis affert.

Hiscæ præcipue inductus rationibus, prima sex Euclidis Elementa cum undecimo & duodecimo, ex versione Frederici Commandini in usum Juventutis Celeberrimæ hujus Academiæ per se edenda curavi; à cæteris abstinui tum quia hæc, quæ jam damus, ad alias plerasque Matheseos partes, quæ nunc vulgo traduntur, intelligendas, sufficiant, tum etiam quia omnia Euclidis opera, Græcè & Latine nitidissimis Characteribus adornata summaque cura & fide emendata nuper è prælo Academico prodire.

Porro in gratiam eorum, qui Geometriam Elementarem ad Praxes vitæ commodis inservientes applicare desiderant, Trigonometriæ Planæ & Sphæricæ compendium adjunxi, cujus Artis ope, magnitudines Geometricæ mensurantur, ipsarumque dimensiones numeris subjiuntur.

EUCLIDIS

ELEMENTORUM

LIBER PRIMUS.

DEFINITIONES.

I.

Punctum est, cujus nulla est pars, vel quod magnitudinem nullam habet.

II.

Linea vero est longitudo latitudinis expers.

III.

Lineæ termini sunt puncta.

IV.

Recta linea est, quæ ex æquo suis interjicitur punctis.

V.

Superficies est id, quod longitudinem, & latitudinem tantum habet.

VI.

Superficiei termini sunt lineæ.

VII.

Plana superficies est quæ ex æquo suis interjicitur lineis.

VIII.

Planus angulus est duarum linearum in plano sese contingentium, & non in directum jacentium, alterius ad alteram inclinatio.

IX.

Quando autem quæ angulum continent rectæ lineæ fuerint, rectilineus angulus appellatur.

A


X.

X

Cum vero recta linea super rectâ lineâ insistens, eos, qui deinceps sunt angulos, æquales inter se fecerit, rectus est uterque æqualium angulorum: & quæ insistit recta linea perpendicularis vocatur ad eam, cui insistit.

XI.

Obtusus angulus est, qui major est recto.



XII.

Acutus autem, qui recto est minor.

XIII.

Terminus est, quod alicujus extremum est.

XIV.

Figura est, quæ aliquo, vel aliquibus terminis continetur.

XV.

Circulus est figura plana, una linea contenta, quæ circumferentia appellatur: ad quam ab uno puncto intra figuram existente omnes rectæ lineæ pertingentes sunt æquales.

XVI.

Hoc autem punctum centrum circuli nuncupatur.

XVII.


Diameter circuli est recta quædam linea per centrum ducta, & ex utraque parte à circumferentia circuli terminata, quæ quidem, & bifariam circulum secat.

XVIII.

Semicirculus est figura, quæ continetur diametro, & ea quæ ex ipsa circuli circumferentia intercipitur.

XIX.

Segmentum circuli est figura, quæ recta linea, & circuli circumferentia continetur.



XX.

XX.

Rectilinez figuræ sunt, quæ rectis continentur lineis.

XXI.

Trilateræ quidem, quæ tribus.

XXII.

Quadrilateræ, quæ quatuor.

XXIII.

Multilateræ vero, quæ pluribus, quam quatuor rectis lineis comprehenduntur.

XXIV.

Trilaterarum figurarum æquilaterum est triangulum, quod tria latera habet æqualia.

XXV.

Isoſceles, five æquicrure, quod duo tantum æqualia latera habet.



XXVI.

Scalenum vero est, quod tria inæqualia habet latera.

XXVII.

Ad hæc, trilaterarum figurarum, rectangulum quidem est triangulum, quod rectum angulum habet.



XXVIII.

Obtusangulum est, quod obtusum habet angulum.


XXIX.

Acutangulum vero, quod tres acutos angulos habet.

EUCLIDIS ELEMENTORUM

XXX.

Quadrilaterarum figurarum quadratum est, quod & æquilaterum est, & rectangulum.



XXXI.

Altera parte longior figura est, quæ rectangula quidem æquilatera vero non est.

XXXII.

Rhombus, quæ æquilatera quidem, sed rectangula non est.

XXXIII.

Rhomboides, quæ, & opposita latera, & oppositos angulos inter se æquales habens, neque æquilatera est, neque rectangula.



XXXIV.

Præter has autem reliquæ quadrilateræ figuræ trapezia vocentur.

XXXV.

Parallelæ, seu æquidistantes rectæ lineæ sunt, quæ cum in eodem sint plano, & ex utraque parte in infinitum producantur, in neutram partem inter se conveniunt.

POSTULATA.

I.

Postuletur à quovis puncto ad quodvis punctum rectam lineam ducere.

II.

Rectam lineam terminatam, in continuum & directum producere.

III.

Quovis centro, & intervallo circulum describere.

AXIOMATA.

AXIOMATA.

I.

Quæ eidem æqualia, & inter se sunt æqualia.

II.

Et si æqualibus æqualia adjiciantur tota sunt æqualia.

III.

Et si ab æqualibus æqualia auferantur, reliqua sunt æqualia.

IV.

Et si inæqualibus æqualia adjiciantur, tota sunt inæqualia.

V.

Et si ab inæqualibus æqualia auferantur, reliqua sunt inæqualia.

VI.

Et quæ ejusdem duplicia sunt, inter se sunt æqualia.

VII.

Et quæ ejusdem dimidia sunt, inter se sunt æqualia.

VIII.

Et quæ sibi mutuo congruunt, inter se sunt æqualia.

IX.

Totum est sua parte majus.

X.


Duæ rectæ lineæ spatium non comprehendunt.

XI.

Omnes anguli recti inter se æquales sunt.

XII.

Et si in duas rectas lineas recta linea incidens, interiores, & ex eadem parte angulos duobus rectis minores fecerit, rectæ lineæ illæ in infinitum productæ, inter se conveniunt ex ea parte, in qua sunt anguli duobus rectis minores.



Not. Cum plures anguli ad unum punctum existunt designantur quilibet tribus literis, quarum illa quæ est ad verticem anguli, in medio ponitur. V. G. in figura Prop. 13. libri primi angulus à rectis AB, BC comprehensus dicitur angulus ABC, & angulus à rectis AB, BE contentus dicitur angulus ABE.

PROPOSITIO I. PROBLEMA.


Super datâ rectâ lineâ terminatâ, triangulum æquilaterum constituere.

Sit data recta linea terminata AB , oportet super ipsa AB triangulum æquilaterum constituere. Centro quidem A intervallo autem AB circulus describatur BCD^a . Et rursus

a 3. Post. scribatur circulus ACE^a , & a puncto C , in quo circuli se invicem secant, ad AB ducantur

b 1. Post. rectæ lineæ CA CB^b . Quoniam igitur A centrum est circuli DBC , erit AC ipsi AB æ-

c 15. Def. culi DBC , erit AC ipsi AB æqualis, rursus quoniam B circuli CAE est centrum, erit BC æqualis BA : ostensa est autem & CA æqualis AB : utraque igitur ipsarum CA CB ipsi AB est æqualis. Quæ autem eidem sunt æqualia, & inter se æqualia sunt. Ergo CA ipsi CB est æqualis tres igitur CA AB , BC inter se sunt æquales; ac propterea triangulum æquilaterum est ABC , & constitutum est super data recta linea terminata AB . quod fecisse oportebat.



PROP. II. PROBL.

Ad datum punctum, data recta linea æqualem rectam lineam ponere

Sit datum quidem punctum A , data vero recta linea BC . oportet ad A punctum, ipsi BC rectæ lineæ æqualem rectam lineam ponere. Ducatur à puncto A ad C recta linea AC^a :

a Postul. 1. & super ipsâ constituatur triangulum æquilaterum DAC^b .
 b Prima hujus.

producanturque in directum

ipsis DA DC rectæ lineæ AE

c Postul. 2. CG^c . & centro quidem C , intervallo autem BC circulus

d 3. Post. BGH describatur d . Rursusque

centro D , & intervallo DG describatur circulus GKL .

Quoniam igitur punctum C


centrum est BGH circuli, erit

e Def. 15. BC ipsi CG æqualis e . Et rursus quoniam D centrum est

circuli GKL , erit DL æqualis DG : quarum DA est æqualis

f Axiom. 3. DC , reliqua igitur AL reliquæ GC est æqualis f . Ostensa

autem




autem est BC æqualis CG . Quare utraque ipsarum AL BC est æqualis ipsi CG . Quæ autem eidem æqualia sunt & inter se sunt æqualia. Ergo, & AL est æqualis BC . Ad datum igitur punctum A datæ rectæ lineæ BC æqualis posita est AL . Quod facere oportebat.

PROP. III. PROBL.

Duabus datis rectis lineis inæqualibus à majore minori æqualem abscindere.

Sint datæ duæ rectæ lineæ inæquales AB & C ; quarum major sit AB . oportet à majore AB minori C æqualem rectam lineam abscindere. Ponatur ad A punctum ipsi C æqualis recta linea AD ^a, & centro quidem A , intervallo autem AD circulus describatur DEF ^b. Et quoniam A centrum est DEF circuli, erit AE ipsi AD æqualis. Sed & C æqualis AD . Utraque igitur ipsarum AE , C ipsi AD æqualis erit. Quare & AE ipsi C est æqualis^c. Duabus igitur datis rectis lineis inæqualibus AB & C à majore AB minori C æqualis Abcissa est: Quod fecisse oportebat.




^a Per antecedentem.
^b Post. 3.

^c Axiom. 1.

PROP. IV. THEOR.

Si duo triangula duo latera duobus lateribus equalia habeant, alterum alteri; habeant autem, & angulum angulo æqualem, qui æqualibus rectis lineis continetur: Et basim basi æqualem habebunt; & triangulum triangulo æquale erit; & reliqui anguli reliquis angulis æquales, alter alteri, quibus æqualia latera subtenduntur.

Sint duo triangula ABC DEF , quæ duo latera AB AC duobus lateribus DE DF æqualia habeant, alterum alteri, videlicet latus quidem AB lateri DE æquale, latus vero AC ipsi DF ; & angulum BAC angulo EDF æqualem. Dico, & basim BC basi EF æqualem esse, & triangulum ABC æquale triangulo DEF , & reliquos angulos reliquis angulis æ-



A 4


quales,

quales, alterum alteri, quibus æqualia latera subtenduntur; nempe angulum ABC angulo DEF : & angulum ACB angulo DFE . Triangulo enim ABC applicato ipsi DEF , & puncto quidem A posito in D , recta vero linea AB in ipsa DE : & punctum B puncto E congruet; quod AB ipsi DE sit æqualis. Congruente autem AB ipsi DE ; congruet & AC recta linea rectæ lineæ DF cum angulus BAC sit æqualis angulo EDF . Quare, & C congruet ipsi F ; est enim recta linea AC æqualis rectæ DF . Sed, & punctum B congruebat puncto E . Ergo, & basis BC basi EF congruet. Nam si puncto quidem B congruente ipsi E , C vero ipsi F ; basis BC basi EF non congruit; duæ rectæ lineæ spatium comprehendunt: quod fieri non potest. Congruet igitur BC basis, basi EF , & ipsi æqualis erit. Quare & totum ABC triangulum congruet toti triangulo DEF , & ipsi erit æquale; & reliqui anguli reliquis angulis congruent, & ipsis æquales erunt. Videlicet angulus ABC angulo DEF , & angulus ACB angulo DFE . Si igitur duo triangula duo latera duobus lateribus æqualia habeant, alterum alteri, habeant autem & angulum angulo æqualem, qui æqualibus rectis lineis continetur: & basim basi æqualem habebunt; & triangulum triangulo æquale erit; & reliqui anguli reliquis angulis æquales, alter alteri, quibus æqualia latera subtenduntur: quod ostendere oportebat.

PROP. V. THEOR.

Isoſcelium triangulorum qui ad basim sunt anguli inter se sunt æquales, & productis æqualibus rectis lineis anguli qui sunt sub basi inter se æquales erunt.

Sit isosceles triangulum ABC ; habens AB latus lateri AC æquale, & producantur in directum ipsis AB AC rectæ lineæ BD CE . Dico angulum quidem ABC angulo ACB , angulum vero CBD angulo BCE æqualem esse. Sumatur enim in linea BD , quodvis punctum F ; atque à
 3. hujus. majore AE minori AF æqualis auferatur AG ; junganturque FC , GB . Quoniam igitur AF est æqualis AG ; AB vero ipsi AC ; duæ FA AC , duabus GA AB æquales sunt, altera alteri; & angulum FAG communem continent, basis igitur FC
 4. hujus. basi GB est æqualis, & triangulum AFC æquale triangulo AGB ; & reliqui anguli, reliquis angulis æquales erunt, alter alteri; quibus æqualia latera



latera subtenduntur: Videlicet angulus quidem $\angle ACF$ æqualis angulo $\angle ABG$; angulus vero $\angle AFC$ angulo $\angle AGB$. Et quoniam tota AF toti AG est æqualis; quarum AB est æqualis AC ; erit & reliqua BF reliquæ CG æqualis. *Ostenſa eſt Axiom. 3.* autem FC æqualis GB . duæ igitur BF , FC duabus CG GB æquales ſunt, altera alteri; & angulus BFC æqualis angulo CBG : eſtque baſis ipſorum BC communis. Ergo & triangulum BFC triangulo CBG æquale erit; & reliqui anguli reliquis angulis æquales, alter alteri; quibus æqualia latera ſubtenduntur. Angulus igitur FBC eſt æqualis angulo BCG ; & angulus BCF angulo CBG . Itaque quoniam totus $\angle ABG$ angulus toto angulo $\angle ACF$ æqualis oſtenſus eſt, quorum angulus CBG eſt æqualis ipſi BCF : erit reliquus $\angle ABC$ reliquo $\angle ACB$ æqualis; & ſunt ad baſim ABC trianguli: oſtenſus autem eſt & FBC angulus æqualis angulo BCG ; qui ſunt ſub baſi. Iſoſcelium igitur triangulorum, qui ad baſim ſunt anguli inter ſe ſunt æquales, & productis æqualibus rectis lineis anguli, qui ſunt ſub baſi, inter ſe æquales erunt. Quod oſtendiſſe oportebat.


Cor. Hinc omne triangulum æquilaterum eſt quoque æquiangulum.

PROP. VI. THEOR.

Si trianguli duo anguli inter ſe ſint æquales, & æquales angulos ſubtendentia latera inter ſe æqualia erunt.

Sit triangulum ABC , habens angulum $\angle ABC$ angulo $\angle ACB$ æqualem. Dico & AB latus lateri AC æquale eſſe: Si enim inæqualis eſt AB ipſi AC ; altera ipſarum eſt maior. Sit maior AB ; atque à majori AB minori AC æqualis auferatur DB ; & DC jungatur. Quoniam igitur DB eſt æqualis ipſi AC ; communis autem BC : erunt duæ DB BC duabus AC CB æquales, altera alteri; & angulus DBC æqualis angulo $\angle ACB$ ex hyp. Baſis igitur DC baſi AB eſt æqualis, & triangulum DBC æquale triangulo ACB , minus majori; quod eſt abſurdum. Non igitur inæqualis eſt AB ipſi AC . Ergo æqualis erit. Si igitur trianguli duo anguli inter ſe ſint æquales, & æquales angulos ſubtendentia latera inter ſe æqualia erunt: quod monſtraſſe oportuit.

Cor. Hinc omne triangulum æquiangulum eſt quoque æquilaterum.



a 3. hujus.


b 4. hujus.

PROP.

PROP. VII. THEOR.

In eadem recta linea, duabus eisdem rectis lineis, alia dua recta linea aequalis, altera alteri non constituentur ad aliud atque aliud punctum, ad easdem partes, eosdem quos prima recta linea, terminos habentes.


Si enim fieri potest, in eadem recta linea AB duabus eisdem rectis lineis AC CB , alia dua rectae lineae AD DB æquales, altera alteri constituentur ad aliud atque aliud punctum C & D , ad easdem partes ut ad C & D , eosdem habentes terminos A & B quos primæ rectæ lineæ, ita ut CA quidem sit æqualis DA , eundem, quem ipsa terminum, habens A ; CB vero sit æqualis DB , eundem habens B terminum; & CD jungatur. Itaque quoniam AC est æqualis AD ; erit, & angulus ACD angulo ADC æqualis ^a. Major igitur est ADC angulus angulo BCD . Quare angulus BDC angulo BCD multo major erit. Rursus quoniam CB est æqualis DB & angulus BDC æqualis erit angulo BCD : ostensus autem est ipso multo major; quod fieri non potest. Non igitur in eadem recta linea duabus eisdem rectis lineis alia dua rectæ lineæ æquales, altera alteri constituentur ad aliud atque aliud punctum, ad easdem partes, eosdem, quos primæ rectæ lineæ, terminos habentes; quod ostendisse oportebat.



PROP. VIII. THEOR.

Si duo triangula duo latera duobus lateribus aequalia habeant, alterum alteri; habeant autem & basim basi æqualem; angulum quoque, qui aequalibus lateribus continetur; angulo æqualem habebunt.

Sint duo triangula ABC , DEF , quæ duo latera AB , AC , duobus lateribus DE DF æqualia habeant alterum alteri; ut sit AB quidem æquale DE ; AC vero ipsi DF ; habeant autem, & basim BC basi EF æqualem.




Dico

Dico angulum quoque BAC angulo EDF æqualem esse. Triangulo enim ABC applicato ipsi DEF triangulo, & puncto quidem B posito in E ; recta vero linea BC in EF : congruet & C punctum puncto F , quoniam BC ipsi EF est æqualis. Itaque congruente BC ipsi EF ; congruent & BA AC ipsis ED DF . si enim basis quidem BC basi EF congruit; latera autem BA AC lateribus ED DF non congruunt, sed situm mutant; ut EG GF : constituentur in eadem recta linea, duabus eisdem rectis lineis, aliæ duæ rectæ lineæ æquales, altera alteri, ad aliud atque aliud punctum; ad easdem partes; eosdem habentes terminos. non constituuntur autem; ut demonstratum est. non igitur, si basis BC congruit basi EF , non congruent & BA AC latera lateribus ED DF . congruent igitur. Quare & angulus BAC angulo EDF congruet, & ipsi erit æqualis. Si igitur duo triangula, duo latera, duobus lateribus æqualia habeant, alterum alteri; habeant autem & basim basi æqualem: angulum quoque æqualibus lateribus contentum angulo æqualem habebunt: quod demonstrare oportebat.

PROP. IX. PROBL.

Datum angulum rectilineum bifariam secare.

Sit datus angulus rectilineus BAC ; itaque oportet ipsum bifariam secare. Sumatur in linea AB quodvis punctum D ; & à linea AC ipsi AD æqualis ^a auferatur AE ; junctæque DE constituatur super ea ^b triangulum æquilaterum DEF ; & AF jungatur. Dico angulum BAC à recta linea AF bifariam secari. Quoniam enim AD est æqualis AE : communis autem AF . duæ DA AF duabus EA AF æquales sunt, altera alteri; & basis DF æqualis basi EF . angulus igitur DAF angulo EAF est æqualis. quare datus angulus rectilineus BAC à recta linea AF bifariam sectus est; quod facere oportebat.



^a 3. hujus.

^b 1. hujus.


^c 8. hujus.

PROP. X. PROBL.

Datam rectam lineam terminatam bifariam secare.

Sit data recta linea terminata AB ; oportet ipsam AB bifariam secare. constituatur super ea ^a triangulum æquilaterum ABC ;


- 6 9. hujus. ABC ; & secetur ACB angulus ^b bifariam recta linea CD . Dico AB rectam lineam in puncto D bifariam secari. Quoniam enim AC est æqualis CB ; communis autem CD ; duæ AC CD duabus BC CD æquales sunt; altera alteri; & angulus ACD æqualis angulo BCD . basis igitur AD basi BD est æqualis.
- Et ob id recta linea terminata AB bifariam secta est in puncto D : quod facere oportebat.



PROP. XI. PROBL.

Data recta linea à puncto in ipsa dato ad rectos angulos rectam lineam ducere.

- Sit data recta linea AB , & datum in ipsa punctum C . oportet à puncto C ipsi AB ad rectos angulos rectam lineam ducere. Sumatur in AC quodvis punctum D : ipsique C D
- æ 3. hujus. æqualis ^a ponatur CE , & super
- 6 1. hujus. DE constituatur ^b triangulum æqualilaterum FDE , & FC jungatur. Dico datæ rectæ lineæ AB à puncto C in ipsa dato, ad rectos angulos ductam esse FC . Quoniam enim DC est æqualis CE , & FC communis; erunt duæ DC CF duabus EC CF æquales, altera alteri; & basis DF est æqualis basi FE , angulus igitur DCF angulo ECF
- æ 8. hujus. est æqualis, & sunt deinceps. Quando autem recta linea super rectam lineam insistens, eos qui deinceps sunt angulos æquales inter se fecerit; rectus ^d est uterque æqualium angularum. ergo uterque ipsorum DCF FCE est rectus. Datæ igitur rectæ lineæ AB à puncto in ipsa dato C ad rectos angulos ducta est FC recta linea. Quod fecisse oportuit.




PROP. XII. PROBL.

Super data recta linea infinita, à dato puncto, quod in ea non est, perpendicularem rectam lineam ducere.

Sit data quidem recta linea infinita AB , datum vero punctum C , quod in ea non est. Oportet super data recta linea

linea infinita AB , à dato puncto C , quod in ea non est, perpendicularem rectam lineam ducere. Sumatur enim ad alteras partes ipsius AB rectæ lineæ quodvis punctum D : & centro quidem C , intervallo autem CD circulus a describatur EDG : & EG in H bifariam secetur: junganturque CG CH



Postul. 3.

6 10. hujus.

CE . Dico super data recta linea infinita AB , à dato puncto C , quod in ea non est, perpendicularem CH ductam esse. Quoniam enim æqualis est CH ipsi HE , communis autem HC , duæ GH HC , duabus EH HC æquales sunt, altera alteri; & basis CG est æqualis basi CE . Angulus igitur CHG angulo CHE est æqualis, & sunt deinceps. cum autem recta linea super rectam lineam insistens, eos qui deinceps sunt angulos, æquales inter se fecerit; rectus d est uterque d Def. 10. æqualium angularum & quæ insistit recta linea perpendicularis appellatur ad eam, cui insistit. ergo super data recta linea infinita AB à dato puncto C , quod in ea non est, perpendicularis ducta est CH . Quod facere oportebat.

3. hujus.


PROP. XIII. THEOR.

Cum recta linea super rectam consistens lineam angulos fecerit, vel duos rectos, vel duobus rectis æquales efficiet.

Recta enim linea quædam AB super rectam CD consistens angulos faciat CBA ABD . Dico CBA ABD angulos vel duos rectos esse, vel duobus rectis æquales; si enim CBA est æqualis ipsi ABD ; duo recti a sunt; sin minus, ducatur à puncto B ipsi CD ad rectos b angulos BE . anguli igitur CBE EBD sunt duo recti. Et quoniam CBE , duobus CBA ABE est æqualis, communis apponatur EBD : ergo anguli CBE

^d Def. 10.

6 11. hujus.




EBD tribus angulis CBA ABE EBD sunt æquales. Rursus c Axiom. 1. quoniam DBA angulus est æqualis duobus DBE EBA , communis apponatur ABC . anguli igitur DBA ABC tribus DBE EBA ABC æquales sunt. At ostensum est angulos quoque CBE EBD eisdem tribus æquales esse: quæ vero eidem sunt æqualia, d & inter se æqualia sunt: ergo & anguli CBE EBD d Axiom. 1. ipsis DBA ABC sunt æquales, suntque CBE EBD duo recti anguli

anguli, igitur $\angle DBA$ $\angle ABC$ duobus rectis æquales erunt. ergo cum recta linea super rectam lineam consistens angulos fecerit, vel duos rectos, vel duobus rectis æquales efficiet. Quod oportebat demonstrare

PROP. XIV. THEOR.

Si ad aliquam rectam lineam, atque ad punctum in ea duæ rectæ lineæ non ad easdem partes posite, angulos qui deinceps sunt, duobus rectis æquales fecerint; ipsæ rectæ lineæ in directum sibi invicem erunt.


Ad aliquam enim rectam lineam AB , atque ad punctum in ea B , duæ rectæ lineæ BC BD non ad easdem partes posite angulos, qui deinceps sunt, $\angle ABC$ $\angle ABD$ duobus rectis æquales faciant. Dico BD ipsi CB in directum esse. si enim BD non est in directum ipsi CB , sit ipsi CB in directum BE . Quoniam igitur recta linea AB super rectam CBE consistit; anguli $\angle ABC$ $\angle ABE$ duobus rectis sunt æquales. Sed & anguli $\angle ABC$ $\angle ABD$ sunt æquales duobus rectis. Anguli igitur $\angle CBA$ $\angle ABE$ ipsis $\angle CBA$ $\angle ABD$ æquales erunt. Communis auferatur $\angle ABC$. Ergo reliquus $\angle ABE$ reliquo $\angle ABD$ est æqualis, minor majori quodd fieri non potest. Non igitur BE est in directum ipsi BC . Similiter ostendemus neque aliam quampiam esse, præter BD . Ergo CB ipsi BD in directum erit. Si igitur ad aliquam rectam lineam, atque ad punctum in ea duæ rectæ lineæ non ad easdem partes posite angulos, qui deinceps sunt, duobus rectis æquales fecerint, ipsæ rectæ lineæ in directum sibi invicem erunt. Quod demonstrare oportebat.



PROP. XV. THEOR.

Si duæ rectæ lineæ se invicem secuerint, angulos qui ad verticem sunt, inter se æquales efficient.

Duæ enim rectæ lineæ AB CD se invicem secant in puncto E . Dico angulum quidem $\angle AEC$ angulo $\angle DEB$; angulum vero $\angle CEB$ angulo $\angle AED$ æqualem esse. Quoniam enim recta linea AE super rectam CD consistens angulos facit $\angle CEA$ $\angle AED$; erunt hi duobus rectis æquales



æquales. Rursus quoniam recta linea DE super rectam AB consistens facit angulos AED DEB; erunt AED DEB anguli æquales a duobus rectis. Ostensum autem est angulos quoque CEA AED duobus rectis esse æquales. Anguli igitur CEA AED DEB æquales sunt. Communis auferatur AED. Ergo reliquus CEA reliquo BED est æ-6 Axiom.3. qualis. Simili ratione, & anguli CEB DEA æquales ostenduntur. Si igitur duæ rectæ lineæ se invicem secuerint, angulos, qui ad verticem sunt, æquales efficient. Quod ostendere oportebat.

Cor. 1. Ex hoc manifeste constat duas rectas lineas se invicem secantes, facere angulos ad sectionem quatuor rectis æquales.

Cor. 2. Omnes anguli circa unum punctum constituti conficiunt angulos quatuor rectis æquales.


PROP. XVI. THEOR.

Omnis trianguli uno latere producto exterior angulus utrovis interiore, & opposito est major.

Sit triangulum ABC, & unum ipsius latus BC ad D producat. Dico exteriorem angulum ACD utrovis interiore, & opposito, videlicet CBA, & BAC majorem esse.

Secetur enim AC bifariam in E, & juncta BE producat ad F; ponaturque ipsi BE æqualis EF. Jungatur præterea FC & AC ad G producat. Quoniam igitur AE quidem est æqualis EC, BE vero ipsi EF, duæ AE EB duabus CE EF æquales sunt, altera alteri: & angulus AEB angulo FEC est æqualis, ad verticem enim sunt. Basis igitur AB æqualis est basi FC; & AEB triangulum triangulo FEC & reliqui anguli reliquis angulis æquales, alter alteri, quibus æqualia latera subtenduntur. Ergo angulus BAE est æqualis angulo ECF.

Sed ECD angulus major est ipso ECF. Major igitur est angulus ACD angulo BAE. Similiter recta linea BC bifariam secta, ostendetur etiam BCG angulus, hoc est ACD angulus angulo ABC major. Omnis igitur trianguli uno latere producto exterior angulus utrovis interiore, & opposito major est. Quod oportebat demonstrare.




PROP.

PROP. XVII. THEOR.

Omnis trianguli duo anguli duobus rectis minores sunt, quomodocunque sumpti.

Sit triangulum ABC . Dico ipsius ABC trianguli duos angulos quomodocunque sumptos duobus rectis minores esse. Producatur enim BC ad D . Et quoniam trianguli ABC exterior angulus ACD major est interiore, & opposito ABC ; communis apponatur ACB . Anguli igitur ACD ACB angulis ABC ACB majores sunt.

• 16. hujus. Sed ACD ACB sunt & æquales duobus rectis. Ergo ABC BCA duobus rectis sunt minores. Similiter demonstrabimus angulos quoque BAC ACB itemque CAB ABC duobus rectis minores esse. Omnis igitur trianguli duo anguli duobus rectis minores sunt; quomodocunque sumpti. Quod demonstrare oportebat.




PROP. XVIII. THEOR.

Omnis trianguli majus latus majorem angulum subtendit.

Sit triangulum ABC habens latus AC latere AB majus. Dico, & ABC angulum angulo BCA majorem esse. Quoniam enim AC major est, quam AB , ponatur ipsi AB æqualis AD ; & BD jungatur. Et quoniam trianguli BDC exterior angulus est ADB , erit is major & interiore, & opposito DCB .

• 16. hujus. Sed ADB æqualis est ipsi ABD , quod & latus AB lateri AD sit æquale, major igitur est & ABD angulus angulo ACB , quare ABC ipso ACB multo major erit. Omnis igitur trianguli majus latus majorem angulum subtendit: quod oportebat demonstrare.




PROP. XIX. THEOR.

Omnis trianguli major angulus majus latus subtendit.

Sit triangulum ABC majorem habens ABC angulum angulo BCA . Dico & latus AC latere AB majus esse. Si enim non

non est majus, vel AC est æquale ipsi AB , vel ipso minus, æquale igitur non est, nam & angulus ABC angulo ACB æqualis ^a esset; non est autem. Non igitur AC ipsi AB est æquale. Sed neque minus. esset enim & angulus ABC angulo ACB minor ^b. atqui non est, non igitur AC minus est ipso AB . *Ostenſum autem est neque æquale eſſe: ergo AC ipſo AB eſt majus.* Omnis igitur trianguli major angulus majus latus ſubtendit. Quod oportebat demonſtrare



a 5. hujus.


b 18. hujus.

PROP. XX. THEOR.

Omnis trianguli duo latera reliquo majora ſunt, quomodocunque ſumpta.

Sit enim triangulum ABC . Dico ipſius ABC trianguli duo latera reliquo majora eſſe, quomodocunque ſumpta: videlicet latera quidem BA AC majora latere BC ; latera vero AB BC majora latere AC ; & latera BC CA majora ipſo AB . Producatur enim BA ad punctum D ; ponaturque ipſi CA æqualis AD ^a; & DC jungatur. Quoniam igitur DA eſt æqualis AC erit & angulus ADC angulo ACD æqualis ^b.

Sed BCD angulus major eſt angulo ACD . Angulus igitur BCD angulo ADC eſt major; Et quoniam triangulum eſt BCD . habens BCD angulum majorem angulo BDC ; majorem autem angulum majus latus ſubtendit: erit latus DB latere BC majus. ſed DB eſt æquale ipſis BA AC . quare latera BA AC ipſo BC majora ſunt. ſimiliter oſtendemus, & latera quidem AB BC majora eſſe latere CA : latera vero BC CA ipſo AB majora. Omnis igitur trianguli duo latera reliquo majora ſunt, quomodocunque ſumpta. Quod oſtendere oportebat.



a 3. hujus.

b 5. hujus.

PROP. XXI. THEOR.

Si à terminis unius lateris trianguli dua recta linea intra conſtituantur, hæ reliquis duobus trianguli lateribus minores quidem erunt; majorem vero angulum continebunt.

B

Trian-

Trianguli enim ABC in uno latere BC à terminis B, C duæ rectæ lineæ intra constituentur BD, DC . Dico BD, DC reliquis duobus trianguli lateribus BA, AC minores quidem esse, vero continere angulum

BDC majorem angulo BAC .

Producatur enim BD ad E . & quoniam omnis trianguli duo latera reliquo sunt majora, erunt trianguli ABE duo latera BA, AE majora latere BE . communis apponatur EC . ergo


a 20. hujus.

b Axiom. 4.

BA, AC ipsis BE, EC majora sunt. rursus quoniam CED trianguli duo latera CE, ED sunt majora latere CD , communis apponatur DB . quare CE, EB ipsis CD, DB sunt majora. Sed ostensum est BA, AC majora esse BE, EC . multo igitur BA, AC ipsis BD, DC majora sunt. rursus quoniam omnis trianguli exterior angulus interiore & opposito est major: erit trianguli CDE exterior angulus BDC major ipso CED . Eadem ratione & trianguli ABE exterior angulus CEB ipso

c 16. hujus.


BAC est major: sed angulus BDC ostensus est major angulo CEB . multo igitur BDC angulus angulo BAC major erit. Quare si à terminis unius lateris trianguli duæ rectæ lineæ intra constituentur, hæ reliquis duobus trianguli lateribus minores quidem erunt, majorem vero angulum continebunt. Quod demonstrare oportebat.



PROP. XXII. PROBL.

Ex tribus rectis lineis, quæ tribus rectis lineis datis æquales sunt, triangulum constituere. Oportet autem duas reliqua majores esse, quomodocunque sumptas; quoniam omnis trianguli duo latera reliquo majora sunt, quomodocunque sumpta.

Sint tres datæ rectæ lineæ A, B, C , quarum duæ reliqua majores sint, quomodocunque sumptæ, ut scil. A, B , quidem sint majores quam C , A, C , vero majores quam B , & præterea B, C , majores quam A . Itaque oportet ex rectis lineis æqualibus ipsis A, B, C , triangulum constituere. Exponatur aliqua




recta linea DE , terminata quidem ad D , infinita vero ad E , & ponatur

ponatur ipsi quidem A æqualis DF , ipsi vero B æqualis FG , ^{3. hujus.}
 & ipsi C æqualis GH : & centro F , intervallo autem FD
 circulus ^b describatur DKL . rursusque centro G , & inter- ^{3. Postul.}
 vallo GH alius circulus KLH , describatur, & jungantur KF
 KG . Dico ex tribus rectis lineis æqualibus ipsis A, B, C , tri-
 angulum KFG constitutum esse, quoniam enim punctum F
 centrum est DKL circuli; erit FD æqualis FK . sed FD est ^{Def. 15.}
 æqualis A . Ergo & FK ipsi A est æqualis. rursus quoniam
 punctum G centrum est circuli LKH , erit GH æqualis GK .
 sed GH est æqualis C . ergo & GK ipsi C æqualis erit. est
 autem & FG æqualis B : tres igitur rectæ lineæ KF FG
 GK tribus A, B, C , æquales sunt. Quare ex tribus rectis li-
 neis KF FG GK , quæ sunt æquales tribus datis rectis lineis
 A, B, C , triangulum constitutum est KFG . Quod facere o-
 portebat.

PROP. XXIII. PROBL.

*Ad datam rectam lineam, & ad datum in ea punctum, dato
 angulo rectilineo aequalem angulum rectilineum constituere.*

Sit data quidem recta linea AB , datum vero in ipsa pun-
 ctum A ; & datus angulus rectilineus DCE . Oportet igitur
 ad datam rectam lineam AB , & ad datum in ea punctum A ,
 dato angulo rectilineo



rectilineum constituere.
 Sumantur in utraque ip-
 sarum CD CE quævis
 puncta D, E , ducaturque
 DE , & ex tribus rectis
 lineis, quæ æquales sint
 tribus CD DE EC trian-
 gulum ^a constituatur AFG ,


ita ut CD sit æqualis AF , & CE ipsi AG , & DE ipsi FG . ^{4. 22. hujus.}
 Itaque quoniam duæ DC CE duabus FA AG æquales sunt,
 altera alteri, & basis DE est æqualis basi FG : erit & an-
 gulus DCE angulo FAG æqualis ^b. Ad datam igitur rectam,
 lineam AB , & ad datum in ea punctum A , dato angulo
 rectilineo DCE æqualis angulus rectilineus constitutus est
 FAG . Quod facere oportebat. ^{3. hujus.}

PROP. XXIV. THEOR.

*Si duo triangu-
 la duo latera duobus lateribus aequalia ha-
 beant, alterum alteri, angulum autem angulo majorem,*

qui aequalibus rectis lineis continetur: & basim basi majorem habebunt.

- Sint duo triangula ABC DEF , quæ duo latera AB AC duobus lateribus DE DF æqualia habeant, alterum alteri, videlicet latus quidem AB æquale lateri DE ; latus vero AC æquale DF : At angulus BAC angulo EDF fit major. Dico, & basim BC basi EF majorem esse. Quoniam enim angulus BAC major est angulo
- a 23. hujus. EDF , constituatur α ad rectam lineam DE , & ad punctum in ea D , angulo BAC æqualis an-
- b 3. hujus. gulus EDG , ponaturque alterutri ipsarum AC DF æqualis β DG , & GE FG jungantur. itaque quoniam AB quidem est æqualis DE , AC vero ipsi DG , duæ BA AC duabus ED DG æquales sunt, altera alteri; & angulus BAC est æqualis an-
- c 4. hujus. gulo EDG . ergo basis BC basi EG est α æqualis. rursus quoniam æqualis est DG ipsi DF ; est angulus DFG angulo DGF
- d 5. hujus. α æqualis: erit itaque DFG angulus angulo EGF major. multo igitur major est DFG angulus ipso EGF . & quoniam triangulum est DFG , angulum DFG majorem habens angulo EGF ;
- e 19. hujus. majori autem angulo latus majus subtenditur α ; erit & latus EG latere EF majus. sed EG latus est æquale lateri BC . Ergo, & BC ipso EF majus erit. Si igitur duo triangula duo latera duobus lateribus æqualia habeant, alterum alteri, angulum autem angulo majorem, qui æqualibus rectis lineis continetur: & basim basi majorem habebunt. Quod oportebat demonstrare.




PROP. XXV. THEOR.

Si duo triangula duo latera duobus lateribus æqualia habeant, alterum alteri, basim vero basi majorem: & angulum angulo, qui æqualibus lateribus continetur, majorem habebunt.

Sint duo triangula ABC DEF , quæ duo latera AB AC duobus lateribus DE DF æqualia habeant, alterum alteri, videlicet latus AB æquale lateri DE , & latus AC lateri DF ; basis autem BC basi EF sit major. Dico, & angulum

BAC

$\angle BAC$ angulo EDF majorem esse. Si enim non est major, vel æqualis est, vel minor. Æqualis autem non est angulus BAC angulo EDF : esset enim & basis BC basi EF æqualis. Non est autem. Non igitur æqualis est BAC angulus angulo EDF . Sed neque minor. minor enim esset & basis BC basi EF . Atqui non est. Non igitur angulus BAC angulo EDF est minor. ostensum autem est neque esse æqualem. Ergo angulus BAC angulo EDF necessario major erit. Si igitur duo triangula duo latera duobus lateribus æqualia habeant, alterum alteri, basim vero basi majorem; & angulum angulo qui æqualibus lateribus continetur, majorem habebunt. Quod demonstrare oportebat.




PROP. XXVI. THEOR.

Si duo triangula duos angulos duobus angulis æquales habeant, alterum alteri, unumque latus uni lateri æquale, vel quod æqualibus adjacet angulis, vel quod uni æqualium angulorum subtenditur; & reliqua latera reliquis lateribus æqualia, alterum alteri, & reliquum angulum reliquo angulo æqualem habebunt.

Sint duo triangula ABC DEF , quæ duos angulos ABC BCA duobus angulis DEF EFD æquales habeant, alterum alteri, videlicet angulum quidem ABC æqualem angulo DEF ; angulum vero BCA angulo EFD . Habeant autem,


& unum latus uni lateri æquale, & primo quod æqualibus adjacet angulis; nempe latus BC lateri EF . Dico, & reliqua latera reliquis lateribus æqualia habere, alterum alteri, latus sc. AB lateri DE ; & latus AC ipsi DF , & reliquum



angulum BAC reliquo angulo EDF æqualem. Si enim inæqualis est AB ipsi DE , una ipsarum major est. Sit major AB , ponaturque GF æqualis DE ; & GC jungatur. Quoniam igitur BG quidem est æqualis DE , BC vero ipsi EF , duæ GB BC duabus DE EF æquales sunt, altera alteri; & angulus GBC æqualis angulo DEF . basis igitur GC basi DF est æqualis: & GBC triangulum triangulo DEF , & re-

liqui anguli reliquis angulis æquales, alter alteri, quibus æqualia latera subtenduntur. ergo $\angle GCB$ angulus est æqualis angulo $\angle DFE$. sed angulus $\angle DFE$ angulo $\angle BCA$ æqualis ponitur. quare, & $\angle BCG$ angulus angulo $\angle BCA$ est æqualis, minor majori, quod fieri non potest. non igitur inæqualis est AB ipsi DE . ergo æqualis erit. est autem, & BC æqualis EF . Itaque duæ AB BC duabus DE EF æquales sunt, altera alteri, & angulus $\angle ABC$, æqualis angulo $\angle DEF$. Basis

4. hujus. igitur AC basi DF , & reliquus angulus $\angle BAC$ reliquo angulo $\angle EDF$ est æqualis. Sed rursus sint latera, quæ æqualibus angulis subtenduntur æqualia, ut AB ipsi DE . Dico rursus, & reliqua latera reliquis lateribus æqualia esse; AC quidem ipsi DF , BC vero ipsi EF : & adhuc reliquum angulum $\angle BAC$ reliquo angulo $\angle EDF$ æqualem. Si enim inæqualis est BC ipsi EF , una ipsarum major est. Sit major BC , si fieri



potest, ponaturque BH æqualis EF , & AH jungatur. Quoniam igitur BH quidem est æqualis EF , AB vero ipsi DE ; duæ AB BH duabus DE EF æquales sunt, altera alteri, & angulos æquales continent; ergo AC basi DF est æqualis: & $\triangle ABH$ triangulum triangulo $\triangle DEF$ & reliqui anguli reliquis angulis æquales erunt, alter alteri, quibus æqualia latera subtenduntur. Æqualis igitur est angulus $\angle BHA$

ex hyp. angulo $\angle EFD$. sed $\angle EFD$ est æqualis $\angle BCA$. Ergo, & $\angle BHA$ angulus angulo $\angle BCA$ est æqualis. trianguli igitur $\triangle AHC$ exterior angulus $\angle BHA$ æqualis est interiori & op-


16. hujus. posito $\angle BCA$, quod fieri non potest. quare non inæqualis est BC ipsi EF . æqualis igitur. est autem & AB æqualis DE . duæ igitur AB BC duabus DE EF æquales sunt, altera alteri; angulosque æquales continent. quare basis AC æqualis est basi DF , & $\triangle ABC$ triangulum triangulo $\triangle DEF$, & reliquus angulus $\angle BAC$ reliquo angulo $\angle EDF$ est æqualis. Si igitur duo triangula duos angulos duobus angulis æquales habeant, alterum alteri, unumque latus uni lateri æquale, vel quod æqualibus adjacet angulis, vel quod uni æqualium angulorum subtenditur; & reliqua latera reliquis lateribus æqualia, alterum alteri, & reliquum angulum reliquo angulo æqualem habebunt. Quod oportebat demonstrare.

PROP. XXVII. THEOR.

Si in duas rectas lineas recta linea incidens alternos angulos inter se æquales fecerit, parallela erunt recta linea.

In duas enim rectas lineas AB CD , recta linea EF incidens alternos angulos AEF EFD æquales inter se faciat. Dico rectam lineam AB ipsi CD parallelam esse. Si enim non est parallela, productæ

AB , CD , vel ad partes B D convenient, vel ad partes A C . producantur, convenientque ad partes B D in puncto G . itaque GEF trianguli exterior angulus AEF major ^a est interiore & opposito EFG . sed &



^a 16. hujus.


æqualis ^b, quod fieri non potest. non igitur AB CD productæ ^b ex hyp. ad partes BD convenient. similiter demonstrabitur neque convenire ad partes AC . quæ vero in neutras partes conveniunt, parallelæ ^c inter se sunt. parallela igitur est AB ipsi ^c CD . Quare si in duas rectas lineas recta linea incidens alternos angulos inter se æquales fecerit, parallelæ inter se erunt rectæ lineæ. Quod ostendere oportebat. Def. 35.

PROP. XXVIII. THEOR.

Si in duas rectas lineas recta linea incidens exteriorem angulum interiori, & opposito, & ad easdem partes æqualem fecerit, vel interiores, & ad easdem partes duobus rectis æquales; parallela erunt inter se recta linea.

In duas enim rectas lineas AB CD recta linea EF incidens exteriorem angulum EGB interiori, & opposito GHD æqualem faciat; vel interiores & ad easdem partes BGH GHD , duobus rectis æquales.

Dico rectam lineam AB rectæ CD parallelam esse. Quoniam enim EGB angulus æqualis est ^a angulo GHD , angulus autem EGB angulo AGH ^b, erit & angulus AGH angulo GHD æqualis: & sunt alterni. paral-



^a Ex hyp.
^b 15. hujus.


lela igitur est AB ipsi CD . rursus quoniam anguli BGH ^c GHD duobus rectis sunt æquales ^c, & sunt AGH BGH æ-
quales

d 13. hujus. quales duobus rectis ^d: erunt anguli AGH BGH angulis BGH GHD æquales. communis auferatur BGH. reliquus igitur AGH est æqualis reliquo GHD: & sunt alterni. ergo AB ipsi CD parallela erit ^e. Si igitur in duas rectas lineas recta linea incidens exteriorem angulum interiori, & opposito, & ad easdem partes æqualem fecerit, vel interiores, & ad easdem partes duobus rectis æquales; parallelæ erunt inter se rectæ lineæ. Quod demonstrare oportebat.

PROP. XXIX. THEOR.

In parallelas rectas lineas recta linea incidens, & alternos angulos inter se aequales, & exteriorem interiori & opposito & ad easdem partes æqualem, & interiores, & ad easdem partes duobus rectis æquales efficiet.

In parallelas enim rectas lineas AB CD recta linea incidat EF. Dico alternos angulos AGH GHD inter se æquales efficere, & exteriorem EGB interiori, & opposito, & ad easdem partes GHD æqualem: & interiores, & ad easdem partes BGH GHD duobus rectis æquales. Si enim inæqualis est AGH ipsi GHD, unus ipsorum major est. fit major AGH. & quoniam AGH angulus major est angulo GHD; communis apponatur BGH. anguli igitur AGH BGH angulis BGH GHD majores sunt.



d 13. hujus. sed anguli AGH BGH sunt æquales duobus rectis ^d. ergo BGH GHD anguli sunt duobus rectis minores. quæ vero à minoribus, quam sunt duo recti, in infinitum producantur

Axiom. 12. rectæ lineæ, inter se conveniunt ^b. ergo rectæ lineæ AB CD in infinitum productæ convenient inter se. atqui non conveniunt cum parallelæ ponantur. non igitur inæqualis est AGH angulus angulo GHD. quare necessario est æqualis.


d 15. hujus. angulus autem AGH æqualis est angulo EGB ^c. ergo, & EGB ipsi GHD æqualis erit. communis apponatur BGH. anguli igitur EGB BGH sunt æquales angulis BGH GHD. sed EGB BGH æquales sunt duobus rectis: Ergo, & BGH GHD duobus rectis æquales erunt. In parallelas igitur rectas lineas recta linea incidens, & alternos angulos inter se æquales & exteriorem interiori, & opposito, & ad easdem partes æqualem; & interiores, & ad easdem partes duobus rectis æquales efficiet. Quod oportebat demonstrare.

PROP.

PROP. XXX. THEOR.

Quæ eidem rectæ lineæ sunt parallela, & inter se parallela erunt.


Sit utraque ipsarum AB CD ipsi EF parallela. Dico & AB ipsi CD parallelam esse. Incidat enim in ipsas rectæ lineæ GK . & quoniam in parallelas rectas lineas AB EF , recta linea GK incidit, angulus AGH angulo GHE est æqualis ^a. rursus quoniam in parallelas rectas lineas EF CD , recta linea incidit GK , æqualis est GHE angulus angulo GKD ^a. ostensus autem est, & angulus AGK angulo GHE æqualis. ergo, & AGK ipsi GKD æqualis erit. & sunt alterni. parallela igitur est AB ipsi CD ^b. ergo quæ eidem ^b 27. hujus. rectæ lineæ sunt parallela, & inter se parallela erunt. Quod oportebat demonstrare.



PROP. XXXI. PROBL.

Per datum punctum data rectæ lineæ parallelam rectam lineam ducere.

Sit datum quidem punctum A , data vero recta linea BC oportet per A punctum ipsi BC rectæ lineæ parallelam rectam lineam ducere. Sumatur in BC quodvis punctum D , & jungatur AD : constituaturque ^a ad rectam lineam DA , & ad punctum in ipsa A , angulo ADC æqualis angulus DAE : & in directum ipsi EA recta linea AF producat. Quoniam igitur in duas rectas lineas BC EF recta linea AD incidens alternos angulos EAD ADC inter se æquales efficit, EF ipsi BC parallela erit ^b. Per datum igitur punctum A datæ rectæ ^b 27. hujus. lineæ BC parallela ducta est recta linea EAF . Quod facere oportebat.




PROP. XXXII. THEOR.

Omnis trianguli uno latere producto exterior angulus duobus interioribus, & oppositis est æqualis, & trianguli tres interiores anguli duobus rectis æquales sunt.

Sit

Sit triangulum ABC : & unum ipsius latus BC in D producat. Dico angulum exteriorem ACD duobus interioribus, & oppositis CAB ABC æqualem esse; & trianguli tres interiores angulos ABC BCA CAB duobus rectis esse æqua-

les. *a* 13. hujus. Ducatur enim per punctum C ipsi AB rectæ lineæ parallela CE . & quoniam AB ipsi CE parallela est, & in ipsas incidit AC , alterni anguli BAC ACE inter se æquales sunt^b. rursus quoniam AB parallela est CE & in ipsas incidit recta linea BD , exterior angulus ECD interiori &



b 29. hujus. opposito ABC est æqualis^b. ostensus autem est angulus ACE æqualis angulo BAC . quare totus ACD exterior angulus æqualis est duobus interioribus, & oppositis BAC ABC . communis apponatur ACB . anguli igitur ACD ACB tribus ABC BAC ACB æquales sunt. sed anguli ACD ACB sunt *c* 13. hujus. æquales duobus rectis. ergo & ACB CBA CAB duobus rectis æquales erunt. Omnis igitur trianguli uno latere producto exterior angulus duobus interioribus, & oppositis est æqualis; & trianguli tres interiores anguli duobus rectis æquales sunt. Quod demonstrare oportebat.

COROLLARIA.

1. Omnes tres anguli cujusque trianguli simul sumpti æquales sunt tribus angulis cujusque alterius trianguli simul sumptis.

2. Si in uno triangulo duo anguli aut singuli aut simul æquales sint duobus angulis alterius trianguli, erit reliquus angulus reliquo æqualis.

3. In triangulo si unus angulus rectus sit, reliqui simul unum rectum faciunt.

4. In triangulo Isoscele si angulus æquis cruribus contentus rectus sit, reliqui ad basim sunt semirecti.


5. In triangulo æquilatelo angulus quilibet æqualis est $\frac{2}{3}$ duorum rectorum vel $\frac{2}{3}$ unius recti.

THEOREMA.

Omnes simul interiores anguli cujusunque figura recti-linea conficiunt bis tot rectos demptis quatuor quot sunt latera figura.

Nam figura unaquæque rectilinea resolvi potest in triangula binario pauciora quam sunt ipsius figura latera, V. G. si quatuor latera habeat resolvitur in duo triangula, si quinque in tria

tria triangula, si sex in quatuor, & sic deinceps; quare per præcedentem omnes horum triangulorum anguli æquantur bis tot rectis quot sunt triangula, sed omnes horum triangulorum



anguli æquales sunt angulis figuræ interioribus; quare omnes anguli interiores figuræ æquales sunt bis tot rectis quot sunt triangula, hoc est bis tot rectis demptis quatuor quot sunt latera figuræ. Q. E. D.

THEOR. II.


Omnes simul exteriores anguli cujusque figuræ rectilineæ conficiunt quatuor rectos.

Nam exteriores simul cum interioribus conficiunt bis tot rectos quot sunt latera figuræ; vero ex precedente Theor. omnes interiores soli conficiunt bis tot rectos demptis quatuor quot sunt latera figuræ, quare exteriores conficiunt quatuor rectos. Q. E. D.

PROP. XXXIII. THEOR.

Quæ æquales, & parallelas ad easdem partes conjungunt recta lineæ, & ipsa æquales, & parallela sunt.

Sint æquales, & parallelæ AB CD : & ipsas conjungant ad easdem partes rectæ lineæ AC BD . Dico AC BD æquales, & parallelas esse. Ducatur enim BC , & quoniam AB paral-



429. hujus.

lela est CD , in ipsaque incidit BC ; alterni anguli ABC BCD æquales sunt ^a. rursus quoniam AB est æqualis CD , communis autem BC , duæ AB BC duabus BC CD sunt æquales; & angulus ABC æqualis angulo BCD ; basis igitur AC

basis BD est æqualis ^b: triangulumque ABC triangulo BCD : ^b 4. hujus. & reliqui anguli reliquis angulis æquales erunt, alter alteri, quibus æqualia latera subtenduntur. ergo angulus ACB angulo CBD est æqualis. & quoniam in duas rectas lineas AC BD recta lineæ BC incidens, alternos angulos ACB CBD æquales


27. hujus. les inter se efficit, parallela est AC ipsi BD; Ostensa autem est & ipsi æqualis. Quæ igitur æquales, & parallelas ad easdem partes conjungunt rectæ lineæ, & ipsæ æquales, & parallelae sunt. Quod oportebat demonstrare.

Defin. *Parallelogrammum est figura quadrilatera cujus bina opposita latera sunt parallela.*

PROP. XXXIV. THEOR.

Parallelogrammorum spatiorum latera, quæ ex opposito, & anguli, inter se æqualia sunt; & diameter ea bifariam secat.

Sit parallelogrammum ABDC, cujus diameter BC. Dico ACDB parallelogrammi latera, quæ ex opposito, & angulos inter se æqualia esse; & diametrum BC ipsum bifariam secare. Quoniam enim parallela est AB ipsi CD, & in ipsas incidit recta linea BC; anguli alterni ABC BCD inter se æquales sunt 4. rursus quoniam AC ipsi BD parallela est, & in ipsas incidit BC; alterni anguli ACB CBD æquales sunt 29. hujus. inter se 4. duo igitur triangula sunt ABC CBD, quæ duos angulos ABC BCA duobus angulis BCD CBD æquales habent, alterum alteri; & unum latus uni lateri æquale, scil. quod 26. hujus. est ad æquales angulos, utrique commune BC. ergo, & reliqua latera reliquis lateribus æqualia habebunt alterum alteri, & reliquum angulum reliquo angulo æqualem, æquale igitur est latus quidem AB lateri CD: latus vero AC ipsi BD, & angulus BAC angulo BDC æqualis. & quoniam angulus ABC est æqualis angulo BCD; & angulus CBD, angulo ACB; erit totus angulus ABD æqualis toti ACD. ostensus autem est, & angulus BAC angulo BDC æqualis. parallelogrammorum igitur spatiorum latera, quæ ex opposito, & anguli, inter se æqualia sunt. Dico etiam diametrum ea bifariam secare. Quoniam enim æqualis est AB ipsi CD communis autem BC. duæ AB BC duabus DC CB æquales sunt, altera alteri, & angulus ABC æqualis est angulo BCD: basis igitur AC basi DB æqualis. quare, & triangulum ABC triangulo BCD æquale erit. ergo diameter BC parallelogrammum ACDB bifariam secat. Quod oportebat demonstrare.




PROP.

PROP. XXXV. THEOR.

Parallelogramma super eadem basi, & in iisdem parallelis constituta, inter se aequalia sunt.

Sint parallelogramma $ABCD$, $EBCF$ super eadem basi BC , & in eisdem parallelis AF BC constituta. Dico parallelogrammum $ABCD$ parallelogrammo $EBCF$ æquale esse.

Quoniam enim parallelogrammum est $ABCD$, æqualis est AD ipsi BC . eadem quoque ratione, & EF est æqualis BC . quare &, AD ipsi EF æqualis erit ^b: & communis DE . tota igitur AE toti DF est æqualis. est autem, & AB æqualis DC . ergo duæ EA



^a 34. hujus.

^b Axiom. 1.


^c Axiom. 2.

AB duabus FD DC æquales sunt, altera alteri, & angulus FDC æqualis angulo EAB , exterior interiori ^d, basis igitur EB basi FC est æqualis, & EAB triangulum æquale triangulo FDC . commune auferatur DGE . reliquum igitur trapezium $ABGD$ reliquo trapezio $EGCF$ est æquale ^e. commune apponatur GBC triangulum. ergo totum parallelogrammum $ABCD$ toti parallelogrammo $EBCF$ æquale erit. Parallelogramma igitur super eadem basi, & in eisdem parallelis constituta inter se aequalia sunt. Quod oportebat demonstrare.

PROP. XXXVI. THEOR.

Parallelogramma super æqualibus basibus, & in eisdem parallelis constituta inter se aequalia sunt.

Sint parallelogramma $ABCD$ $EFGH$ super æqualibus basibus BC FG , & in eisdem parallelis AH BG constituta. Dico parallelogrammum $ABCD$ parallelogrammo $EFGH$ æquale esse. Conjungantur enim BE CH . & quoniam æqualis est BC ipsi FG , & FG æqualis ipsi EH ; erit & BC ipsi EH æqualis. suntque parallelæ, & ipsas conjungunt BE CH ; quæ autem æquales, & parallelas ad easdem partes conjungunt, æ-



^a Hyp.

quales, & parallelæ sunt ^b. ergo EB , CH & æquales sunt, & parallelæ: quare $EBCH$ parallelogrammum est, & æquale parallelogrammo $ABCD$; basim enim eandem habet BC ,

^c 33. hujus.


^d 35. hujus.

& in eisdem parallelis BC, AD constituitur. simili ratione, & EFGH parallelogrammum eidem parallelogrammo EBCH est æquale. ergo parallelogrammum ABCD parallelogrammo EFGH æquale erit. Parallelogramma igitur super æqualibus basibus, & in eisdem parallelis constituta inter se sunt æqualia. Quod oportebat demonstrare.

PROP. XXXVII. THEOR.

Triangula super eadem basi, & in eisdem parallelis constituta inter se æqualia sunt.


Sint triangula ABC, DBC super eadem basi BC, & in eisdem parallelis AD BC constituta. Dico ABC triangulum triangulo DBC æquale esse. Producat AD ex utraque parte in E, F puncta: & per B quidem ipsi CA parallela ducatur BE, ^{a 31. hujus.} & per C vero ipsi BD parallela CF. parallelogrammum igitur est utrumque ipsorum EBCA DBCF, & parallelogrammum EBCA est æquale ^{c 35. hujus.} parallelogrammo DBCF, etenim super eadem sunt basi BC, & in eisdem parallelis BC EF: estque parallelogrammi quidem EBCA dimidium ^{b 34. hujus.} ABC triangulum, cum diameter AB ipsum bifariam secet: parallelogrammi vero DBCF dimidium ^{c Axiom. 7.} triangulum DBC; diameter enim DC ipsum bifariam secat. quæ autem æqualium dimidia sunt inter se æqualia sunt. ergo triangulum ABC triangulo DBC est æquale. Triangula igitur super eadem basi, & in eisdem parallelis constituta inter se æqualia sunt. Quod oportebat demonstrare.



PROP. XXXVIII. THEOR.

Triangula super basibus æqualibus, & in eisdem parallelis constituta inter se sunt æqualia.

Sint triangula ABC DCE super æqualibus basibus, BC CE & in eisdem parallelis BE AD constituta. Dico ABC triangulum DCE triangulo æquale esse. Producat AD ex utraque parte in G, H puncta: & per B quidem ipsi CA parallela ducatur BG, ^{a 31. hujus.} per E vero ducatur EH parallela ipsi DC. parallelogrammum igitur est utrumque ipsorum GECA DCEH. atque




atque est parallelogrammum $GBCA$ æquale b parallelo- ^{36. hujus.}
grammo $DCEH$: in æqualibus enim sunt basibus BC CE , &
in eisdem BE GH parallelis. parallelogrammi vero $GBCA$
dimidium c est ABC triangulum, nam diameter AB ipsum ^{34. hujus.}
bifariam secat. & parallelogrammi $DCEH$ dimidium c est
triangulum DCE , diameter enim DE ipsum secat bifariam.
quæ autem æqualium dimidia sunt d , inter se æqualia sunt. ^{d Axiom. 7.}
ergo ABC triangulum triangulo DCE est æquale. Triangula
igitur super æqualibus basibus, & in eisdem parallelis con-
stituta, inter se sunt æqualia. Quod demonstrare oportebat.

PROP. XXXIX. THEOR.

*Triangula æqualia super eadem basi, & ad easdem partes
constituta, in eisdem quoque sunt parallelis.*

Sint æqualia triangula ABC DBC super eadem basi BC
constituta, & ad easdem partes. Dico, & in eisdem paral-
lelis esse. Ducatur enim AD . Dico AD parallelam esse ipsi

BC . Si enim non est parallela,
ducatur a per A punctum ipsi
 BC parallela recta linea AE , &
 EC ducatur. æquale igitur
est ABC triangulum triangulo
 EBC b , super eadem enim est
basi BC , & in eisdem BC , AE
parallelis. sed ABC triangu-
lum triangulo DBC c est æquale. ergo & triangulum DBC ^{Ex hyp.}
æquale est ipsi EBC triangulo, majus minori, quod fieri non
potest. non igitur AE ipsi BC parallela est. similiter osten-
demus neque aliam quampiam parallelam esse, præter ip-
sam AD , ergo AD ipsi est parallela. Triangula igitur æqualia
super eadem basi, & ad easdem partes constituta in eisdem
quoque sunt parallelis. Quod oportebat demonstrare.



^a 31. hujus.

^b 37. hujus.


^c Ex hyp.

PROP. XL. THEOR.

*Triangula æqualia super basibus æqualibus, & ad easdem
partes constituta in eisdem quoque sunt parallelis.*

Sint æqualia triangula ABC CDE super æqualibus basibus
 BC CE constituta. Dico etiam in eisdem esse parallelis. Du-
catur enim AD . Dico AD ipsi BE parallelam esse. Nam
si non est, ducatur per A ipsi BE parallela AF , a & FE du- ^{a 31. hujus.}
catur.


38. hujus. catur. triangulum igitur ABC triangulo FCE est æquale ⁴, cum super æqualibus basibus & in eisdem parallelis BE AF constituentur. sed triangulum ABC æquale est triangulo DCE . ergo & triangulum DCE triangulo FCE æquale erit, majus minori, quod fieri non potest. non igitur AF ipsi BE est parallela. similiter demonstrabimus neque aliam quampiam parallelam esse, præter AD . ergo AD ipsi BE parallela erit. Æqualia igitur triangula super basibus æqualibus, & ad easdem partes constituta, etiam in eisdem sunt parallelis. Quod demonstrare oportebat.



PROP. XLI. THEOR.

Si parallelogrammum, & triangulum eandem basim habeant in eisdemque sint parallelis; parallelogrammum ipsius trianguli duplum erit.

Parallelogrammum enim $ABCD$, & triangulum EBC , basim habeant eandem BC , & in eisdem sint parallelis AB AE . Dico parallelogrammum $ABCD$ trianguli EBC duplum esse. Jungatur enim AC . triangulum igitur ABC triangulo EBC est æquale ^a; namque super eadem basi BC , & in eisdem BC AE parallelis constituentur. sed $ABCD$ parallelogrammum duplum est trianguli ABC ^b, cum diameter AC ipsum bifariam secet. quare & ipsius EBC trianguli duplum erit. Si igitur parallelogrammum, & triangulum eandem basim habeant, & in eisdem sint parallelis; duplum erit parallelogrammum ipsius trianguli. Quod demonstrare oportebat.




PROP. XLII. PROBL.

Dato triangulo æquale parallelogrammum constituere in dato angulo rectilineo.

Sit datum triangulum ABC , datus autem rectilineus angulus D . Itaque oportet, dato triangulo ABC æquale parallelogrammum constituere in angulo rectilineo ipsi D æquali. Secetur


Secetur BC bifariam ^a in E, & juncta AE, ad rectam lineam ^a 10. hujus. EC, atque ad punctum in ea E, constituatur angulus ^b CEF æqualis ipsi D: & per A quidem ipsi EC parallela ducatur ^c AG; per C vero ipsi FE ducatur parallela ^c CG. parallelogrammum igitur est FECC. & quoniam BE est æqualis EC, erit & ABE triangulum ^d triangulo AEC æquale, super æqua- ^d 38. hujus. libus enim sunt basibus BE EC, & in eisdem BC AG parallelis. ergo triangulum AEC trianguli ABC est duplum. est autem, & parallelogrammum FECC duplum ^e trianguli ^e 41. hujus. AEC; basim enim eandem habet, & in eisdem est parallelis. æquale igitur est FECC parallelogrammum triangulo ABC habetque CEF angulum æqualem angulo D dato. Dato igitur triangulo ABC æquale parallelogrammum FECC constitutum est, in angulo CEF, qui angulo D est æqualis. Quod quidem facere oportebat.



PROP. XLIII. THEOR.

Omnis parallelogrammi spatii, eorum, quæ circa diametrum sunt, parallelogrammorum complementa inter se sunt æqualia.

Sit parallelogrammum ABCD, cujus diameter BD, & circa ipsam BD parallelogramma quidem sint FH EG, quæ vero complementa dicuntur AK KC. Dico AK complementum complemento KC æquale esse. Quoniam enim parallelogrammum est ABCD, & ejus diameter BD, æquale ^a est ABD triangulum triangulo BDC. rursus quoniam HKFD parallelogrammum est, cujus diameter DK, triangulum HDK triangulo DFK æquale ^a erit. eadem ratione, & triangulum KGB triangulo KEB est æquale. cum igitur triangulum quidem BEK æquale sit triangulo BGK triangulum vero HDK ipsi DFK; erit triangulum BEK una cum triangulo HDK æquale triangulo BGK una cum DFK triangulo. est autem & totum triangulum ABD æquale toti BDC. reliquum igitur AK complementum reliquo complemento KC est æquale. Ergo omnis parallelogrammi spatii, eorum, quæ



^a 34. hujus.

C


circa

circa diametrum sunt, parallelogrammorum complementa inter se æqualia sunt. Quod oportebat demonstrare.

PROP. XLIV. PROBL.

Ad datam rectam lineam dato triangulo æquale parallelogrammum applicare in dato angulo rectilineo.

Sit data quidem recta linea AB ; datum vero triangulum c , & datus angulus rectilineus D . Oportet igitur ad datam rectam lineam, AB dato triangulo c æquale parallelogrammum applicare in angulo ipsi D æquali. Constituitur trian-
^{a 42} hujus. gulo c æquale ^a parallelogrammum $BEFG$, in angulo EBG qui est æqualis D . & ponatur BE in directum ipsi AB , producat^rque FG ad H : & per A alterutri ipsarum BG EF
^{b 31} hujus. parallela ^b ducatur AH , & HB jungatur. Quoniam igitur in parallelas AH EF recta linea HF incidit, anguli AHF HFE
^{c 29} hujus. duobus rectis æquales ^c sunt. quare BHF HFE duobus rectis sunt minores. quæ vero à minoribus, quam sunt duo recti, in infinitum producantur, conveniunt ^d inter se. ergo HB FE productæ convenient. producantur, & convenient in K ; perque K alterutri ipsarum EA FH parallela ^b ducatur KL , & AH GB ad L , M puncta producantur. parallelogrammum igitur est $HLKF$, cujus diameter HK , & circa HK parallelogramma quidem sunt AG ME ; ea vero quæ comple-
^{e 43} hujus. menta dicuntur LB BF : ergo LB ipsi BF est ^e æquale. sed,
^{f 15} hujus. & BF æquale est triangulo c . quare, & LB triangulo c æquale erit. & quoniam GBE angulus æqualis ^f est angulo ABM , sed & æqualis angulo D , erit & angulus ABM angulo D æqualis. Ad datam igitur rectam lineam AB , dato triangulo c æquale parallelogrammum constitutum est LB , in angulo ABM , qui est æqualis angulo D . Quod facere oportebat.




PROP. XLV. PROBL.

Rectilineo dato æquale parallelogrammum constituere in dato angulo rectilineo.

Sit datum rectilineum $ABCD$, datus vero angulus rectilineus E . Oportet rectilineo $ABCD$ æquale parallelogrammum

num constituere in angulo ipsi E æquali. Conjungantur enim DB , & constituatur triangulo ADB æquale ^{42. hujus.} parallelogrammum FH : in angulo HKF , qui est æqualis angulo E . deinde ad rectam lineam GH applicetur triangulo DBC æquale ^{44. hujus.} parallelogrammum GM , in angulo GHM qui angulo E est æqualis. & quoniam angulus E æqualis est utrique ipsorum HKF GHM , erit & HKF angulo GHM æqualis. communis apponatur KHG , anguli igitur HKF KHG angulis KHG GHM æquales sunt. sed HKF KHG sunt æquales ^{29. hujus.} duobus rectis. ergo,

& KHG GHM duobus rectis æquales erunt. itaque ad aliquam rectam lineam GH , & ad datum in ea punctum H duæ rectæ lineæ KH HM non ad easdem partes positæ angulos deinceps duobus rectis æquales efficiunt;



in directum igitur ^{14. hujus.} est KH ipsi HM . & quoniam in parallelas KM FG recta linea HG incidit, alterni anguli MHG HGF æquales ^{30. hujus.} sunt. communis apponatur HGL . anguli igitur MHG HGL , angulis HGF HGL sunt æquales. at anguli MHG HGL æquales ^{33. hujus.} sunt duobus rectis. quare & anguli HGF HGL duobus rectis æquales erunt; in directum igitur est FG ipsi GL . & quoniam KF ipsi HG & æqualis est, & parallela, sed & HG ipsi ML ; erit KF ipsi ML & æqualis, & parallela. ipsasque conjungunt rectæ lineæ KM FL . ergo & KM FL æquales ^{33. hujus.} & parallelae sunt. parallelogrammum igitur est $KFLM$. at cum triangulum quidem ABD æquale sit parallelogrammo HF : triangulum vero DBC parallelogrammo GM ; erit totum $ABCD$ rectilineum toti parallelogrammo $KFLM$ æquale. Dato igitur rectilineo $ABCD$ æquale parallelogrammum constitutum est $KFLM$ in angulo FKM , qui est æqualis angulo E dato. Quod facere oportebat.


Cor. Ex jam dictis manifestum est, quomodo ad datam rectam lineam, dato rectilineo æquale parallelogrammum applicari possit in dato angulo rectilineo.

PROP. XLVI. PROBL.

Super data recta linea quadratum describere.

Sit data recta linea AB . Oportet super ipsa AB quadratum descri-

11. hujus. describere. Ducatur α rectæ lineæ AB à puncto in ea dato
 3. hujus. A ad rectos angulos AC; & ipsi AB æqualis β ponatur AD:
 perque punctum D ducatur γ DE ipsi AB parallela, & per B
 33. hujus. ipsi AD parallela δ ducatur BE. parallelogrammum igitur est
 ADEB. & AB quidem est α æqualis DE,
 34. hujus. AD vero ipsi δ BE. sed BA ipsi AD est
 æqualis. quatuor igitur BA AD DE EB inter se æquales sunt, ideoque æquilaterum
 est ADEB parallelogrammum. Dico etiam
 rectangulum esse. Quoniam enim in
 29. hujus. parallelas AB DE recta linea incidit AD,
 anguli BAD ADE duobus rectis sunt α æ-
 quales. rectus autem est BAD, ergo, &
 ADE rectus erit. parallelogrammorum
 vero spatiorum, quæ ex opposito sunt la-
 34. hujus. tera, & anguli inter se æqualia sunt. re-
 ctus igitur est uterque oppositorum ABE BED angulorum:
 & ob id rectangulum est ADEB. Ostensum autem est æ-
 quilaterum esse. Quadratum igitur sit necesse est, atque est
 super recta linea AB descriptum. Quod ipsum facere oportebat.




Cor. Hinc omne parallelogrammum habens unum angulum rectum est rectangulum.

PROP. XLVII. THEOR.

In rectangulis triangulis, quod à latere rectum angulum subtendente describitur quadratum, æquale est quadratis, quæ à lateribus rectum angulum continentibus describuntur.

- Sit triangulum rectangulum ABC, rectum habens BAC angulum. Dico quadratum descriptum à recta BC æquale esse quadratis, quæ ab ipsis BA AC describuntur. Describatur α enim à BC quidem quadratum BDEC, ab ipsis
 46. hujus. BA AC quadrata β GB HC, perque A
 alterutri ipsarum BD CE parallela ducatur AL; & AD FC jungantur. Quoniam igitur uterque angulorum BAC
 Def. 30. BAG rectus β est, ad aliquam rectam lineam BA, & ad datum in ea punctum A duæ rectæ lineæ AC AG non ad easdem partes positæ, angulos qui deinceps sunt duobus rectis æquales
 14. hujus. efficiunt; in directum igitur γ est CA ipsi AG. eadem ratione,




tionem, & AB ipsi AH est in directum. & quoniam angulus DBC est æqualis angulo FBA, rectus enim uterque est, communis apponatur ABC, totus igitur DBA angulus toti FBC est æqualis. quod cum duæ AB BD duabus FB BC æquales sint, altera alteri, & angulus DBA æqualis angulo FBC; erit & basis AD basi FC æqualis, & ABD triangulum æquale triangulo FBC. estque trianguli quidem ABD duplum BL parallelogrammum, basim enim eandem habent BD, & in eisdem BD AL sunt parallelis: trianguli vero FBC duplum est GB quadratum, rursus enim basim habent eandem FB, & in eisdem sunt parallelis FB GC. quæ autem æqualium duplicia inter se æqualia sunt. ergo æquale est parallelogrammum BL ipsi GB quadrato. Similiter junctis AE BK, ostendetur etiam CL parallelogrammum æquale quadrato HC. totum igitur BDEC quadratum duobus quadratis GB HC est æquale. & describitur quidem BDEC quadratum à recta linea BC, quadrata vero GB HC ab ipsis BA AC. quadratum igitur BE, à latere BC descriptum æquale est quadratis, quæ describuntur à lateribus BA AC. Ergo in re-ctangulis triangulis, quadratum, quod describitur à latere rectum angulum subtendente, æquale est quadratis, quæ à lateribus rectum angulum continentibus describuntur. Quod oportebat demonstrare.

PROP. XLVIII. THEOR.

Si quadratum, quod describitur ab uno laterum trianguli, æquale sit quadratis, quæ à reliquis trianguli lateribus describuntur; angulus reliquis duobus trianguli lateribus contentus rectus erit.

Si trianguli ABC, quod ab uno latere BC describitur quadratum æquale sit quadratis, quæ à reliquis trianguli lateribus BA AC describuntur, Dico angulum BAC rectum esse. Ducatur enim à puncto A ipsi AC ad rectos angulos AD; ponaturque AD ipsi BA æqualis, & DC jungatur. Quoniam igitur DA est æqualis AB, erit & quadratum quod describitur ex DA æquale quadrato ex AB. commune apponatur quadratum, quod ex AC. ergo quadrata, quæ ex DA AC æqualia sunt quadratis quæ ex BA AC describuntur. sed quadratis quidem, quæ ex DA AC æquale est quod ex DC quadratum; rectus enim angulus est DAC: quadratis



dratis vero, quæ ex BA AC æquale ponitur quadratum, quod ex BC : quadratum igitur, quod ex DC æquale est ei, quod ex BC quadrato. ergo & latus DC lateri CB est æquale. & quoniam DA est æqualis AB , communis autem AC , duæ DA AC æquales sunt duabus BA AC ; & basis DC est æ-

6 8. hujus, qualis basi CB : angulus igitur DAC angulo BAC est æqualis. rectus autem est DAC . ergo & BAC rectus erit. Si igitur quadratum quod describitur ab uno laterum trianguli, æquale sit quadratis quæ à reliquis trianguli lateribus describuntur, angulus reliquis duobus trianguli lateribus contentus rectus erit. Quod oportebat demonstrare.

EUCLIDIS

EUCLIDIS

ELEMENTORUM

LIBER SECUNDUS.

DEFINITIONES.

I.

OMNE parallelogrammum rectangulum contineri dicitur sub duabus rectis lineis, quæ rectum angulum comprehendunt.


II.

Omnis parallelogrammi spatii, unumquodvis eorum quæ circa diametrum ipsius sunt parallelogrammorum, cum duobus complementis, gnomon vocetur.

PROPOSITIO I. THEOREMA.


Si sint dua recta linea, altera autem ipsarum secta fuerit in quocunque partes; rectangulum sub duabus rectis lineis contentum aequale est eis rectangulis, quæ sub recta linea infecta, & singulis partibus continentur.

Sint duæ rectæ lineæ A, BC; & secta sit BC utcunque in punctis D, E. Dico rectangulum rectis lineis A, BC contentum æquale esse rectangulo quod continetur sub A & BD, & rectangulo quod sub A & DE, & ei quod sub A & EC continetur. Ducatur enim à puncto B ipsi BC ad rectos^a angulos BF: atque ipsi A ponatur^b æqualis BG: & per G^a 11. primi.



quidem^b 3. primi.

- e 31. primi. quidem ipsi BC parallela ducatur GH: per D, E, c vero ducantur DK EL CH parallelæ c ipsi BG. rectangulum igitur BH est æquale rectangulis BK DL EH: atque est BH quidem quod sub A & BC continetur; etenim continetur sub GB BC; & BG ipsi A est æqualis; rectangulum autem BK est quod continetur sub ipsis A & BD; continetur enim sub GB BD, quarum GB est æqualis A; & rectangulum DL est quod continetur sub A & DE, quoniam DK, hoc est d BG ipsi A est æqualis; & similiter rectangulum EH est quod sub A & EC continetur. ergo rectangulum contentum sub A & BC est æquale rectangulo contento sub A & BD, & contento sub A & DE, & adhuc contento sub A & EC. Si igitur sint duæ rectæ lineæ, altera autem ipsarum secta fuerit in quocunque partes; rectangulum sub duabus rectis lineis contentum est æquale eis, quæ sub recta linea insecta, & singulis partibus, continentur. Quod oportebat demonstrare,




PROP. II. THEOR.

Si recta linea secta fuerit utcumque; rectangula qua sub tota, & singulis partibus continentur, aequalia sunt ei quod à tota fit quadrato.

Recta enim linea AB secta fit utcumque in puncto c, Dico rectangulum quod sub AB BC continetur, unà cum contento sub AB AC æquale esse quadrato, quod fit ex AB.

- a 46. primi. Describatur enim ex AB quadratum ADEB, & per c ducatur b alterutri ipsarum AD BE parallela CF. æquale igitur est AE rectangulis AF CE. atque est AE quidem quadratum, quod ex AB; AF vero rectangulum contentum sub BA




AC; etenim sub DA AC continetur, quarum AD ipsi AB est æqualis; & rectangulum CE continetur sub AE BC, cum BE sit æqualis AB. ergo rectangulum sub AB & AC unà cum rectangulo sub AB & BC æquale est quadrato ex AB. Si igitur recta linea utcumque secta fuerit, rectangula, quæ sub tota & singulis partibus continentur, æqualia sunt ei, quod à tota fit quadrato. Quod demonstrare oportebat.

PROP.

PROP. III. THEOR.

Si recta linea utcumque secta fuerit; rectangulum sub tota, & una ejus parte contentum æquale est & rectangulo, quod sub partibus continetur, & ei quod à prædicta parte fit quadrato.


Recta enim linea AB secta fit utcumque in puncto c. Dico sub AB & BC rectangulum æquale esse rectangulo sub AC BC unà cum quadrato, quod fit ex BC. Describatur enim ^{a 46. primi.} ex BC quadratum CDEB; producatque ED in F: & per A alterutri ipsarum CD BE parallela ^{b 31. primi.} ducatur AF. æquale utique erit rectangulum AE ipsi AD CE: & est AE quidem rectangulum contentum sub AB BC; etenim sub AB BE continetur, quarum BE est æqualis BC: rectangulum vero AD est quod continetur sub AC CB, cum DC ipsi CB sit æqualis: & DB est quadratum, quod fit ex BC. ergo rectangulum sub AB BC est æquale rectangulo sub AC CB unà cum quadrato quod ex BC. Si igitur recta linea utcumque secta fuerit; rectangulum sub tota, & una ejus parte contentum æquale est rectangulo, quod sub partibus continetur, & ei quod à prædicta parte fit quadrato.




PROP. IV. THEOR.

Si recta linea secta fuerit utcumque; quadratum quod fit à tota æquale erit, & quadratis quæ à partibus fiunt, & ei quod bis sub partibus continetur rectangulo.

Recta enim linea AB secta fit utcumque in c. Dico quadratum quod fit ex AB æquale esse, & quadratis ex AC CB & ei rectangulo quod bis sub AC CB continetur. Describatur enim ex AB quadratum ADEB, jungaturque BD, & per c quidem alterutri ipsarum AD BE parallela ^{a 46. primi.} ducatur CGF; per G vero alterutri ipsarum AB DE ducatur ^{b 41. primi.} parallela HK. & quoniam CF est parallela ipsi AD, & in ipsas incidit BD: erit exterior angulus BGC interiori & opposito ADB æqualis: ^{c 29. primi.} angulus



- d 5. primi. angulus autem ADB est æqualis 4 angulo ABD, quod & latus BA æquale est lateri AD. quare CGB angulus angulo
 e 6. primi. GBC est æqualis: ac propterea latus BC lateri CG æquale.
 f 34. primi. sed & latus CB æquale f est lateri GK & CG ipsi BK. ergo &



g 43. primi.

GK est æquale KB, & CGKB æquilaterum est. Dico insuper etiam rectangulum esse. Quoniam enim CG est parallela ipsi BK & in ipsas incidit CB; anguli KBC GCB duobus rectis sunt æquales. rectus autem est KBC angulus. ergo & rectus GCB, & anguli oppositi CGK GKB recti erunt. rectangulum igitur est CGKB. sed ostensum fuit & æquilaterum esse; quadratum igitur est CGKB, quod quidem fit ex BC. eadem ratione & HF est quadratum quod fit ex HG, hoc est ex AC. ergo HF CK ex ipsis AC CB quadrata sunt. & quoniam rectangulum AG est æquale s rectangulo GE; atque est AG quod sub AC CB continetur, est enim GC ipsi CB æqualis: erit & GE æquale ei quod continetur sub AC CB, quare rectangula AG GE æqualia sunt ei quod bis sub AC CB continetur. sunt autem & HF CK quadrata ex AC CB. quatuor igitur HF CK AG GE, & quadratis ex AC CB, & ei quod bis sub AC CB continetur rectangulo, sunt æqualia; sed HF CK AG GE componunt totum ADEB quadratum quod fit ex AB. quadratum igitur ex AB æquale est & quadratis ex AC CB, & ei quod bis sub AC CB continetur rectangulo. Quare si recta linea utcumque secta fuerit; quadratum quod fit à tota æquale erit & quadratis quæ à partibus fiunt, & ei rectangulo quod bis sub partibus continetur. Atque illud est quod demonstrare oportebat.


Cor. Ex hoc perspicue constat, in quadratis spatiis parallelogramma quæ sunt circa diametrum, quadrata esse.

PROP. V. THEOR.

Si recta linea secta fuerit in partes æquales, & in partes inæquales; rectangulum sub inæqualibus totius partibus contentum unà cum quadrato linea quæ inter sectiones interjicitur, æquale est ei quod à dimidia fit quadrato.

Recta enim linea quævis AB secta sit in partes æquales ad punctum C, & in partes inæquales ad D. Dico rectangulum contentum sub AD BD, unà cum quadrato quod fit ex

CD æquale esse ei quod ex CB fit quadrato. Describatur enim ^{a 46 primi.}
 ex BC quadratum CEFB: ducaturque BE: & per D qui-
 dem alterutri ipsarum CE BF parallela ^b ducatur DHG; per ^{b 31. primi.}
 H vero ducatur KLO parallela ^b alterutri ipsarum CB EF:
 & rursus per A ducatur alterutri CL BO parallela ^b AK. &
 quoniam CH complementum æquale ^c est complemento HF, ^{c 43. primi.}
 commune apponatur DO, totum igitur CO toti DF est æ-
 quale. sed CO est æquale ^d AL, ^{d 36. primi.}
 quoniam & AC ipsi CB. ergo
 & AL æquale est DF. com-
 mune apponatur CH. totum
 igitur AH ipsis FD DL æquale
 erit. sed AH quidem est quod
 sub AD DB continetur, etenim
 DH ipsi DB est æqualis ^e; FD
 DL vero est gnomon MNX. igitur MNX æqualis est ei
 quod sub AD DB continetur, commune apponatur LG, æ-
 quale ^e scilicet quadrato quod ex CD, ergo MNX gnomon,
 & LG æqualia sunt rectangulo, quod continetur sub AD DB,
 & ei, quod fit ex CD quadrato. sed MNX gnomon, & LG
 sunt totum quadratum CEFB, quod quidem fit ex CB. ergo
 rectangulum sub AD DB, una cum quadrato quod ex CD,
 æquale est ei quod ex CB fit quadrato. Si igitur recta linea
 secta fuerit in partes æquales, & in partes inæquales; re-
 ctangulum sub inæqualibus totius partibus contentum unà
 cum quadrato linæ quæ inter sectiones interjicitur, æ-
 quale est ei quod à dimidia fit quadrato. Quod demonstra-
 re oportebat. ^{e Cor. 4. hujus.}




e Cor. 4-
hujus.

PROP. VI. THEOR.

*Si recta linea bifariam secetur, atque ipsi in directum ad-
jiciatur quaedam recta linea; rectangulum sub tota cum
adjecta, & adjecta contentum, unà cum quadrato dimi-
dia, aequale est quadrato quod ab ea, qua ex dimidia, &
adjecta constat, tanquam ab una linea, describitur.*

Recta enim linea quævis AB secetur bifariam in puncto c, & adiciatur ipsi in directum BD. Dico rectangulum sub AD DB unâ cum quadrato ex BC æquale esse ei quod fit ex CD quadrato. Describatur enim ex CD quadratum CEF D, ^{a 46. primi.} & jungatur DE; per B alterutri ipsarum CE DF parallela ^b ducatur BHG; & per H ducatur KLM parallela ^{b b 31. primi.} alterutri ipsarum AD EF; & adhuc per A alterutri CL DM pa-

rectangula BN KC GR RN inter se æqualia; ideoque quadrupla sunt rectanguli CK. rursus quoniam CB est æqualis BD, & BD quidem ipsi BK, hoc est ipsi CG æqualis; CB vero ipsi GK, hoc est GP: erit & CG æqualis GP. est autem & PR ipsi RO æqualis. rectangulum igitur AG rectangulo MP, & rectangulum PL ipsi RF æquale erit. sed MP^d est æquale PL, complementa enim sunt ML parallelogrammi; quare & AG ipsi RF est æquale. quatuor igitur AG MP PL RF inter se æqualia sunt, ac propterea ipsius AG quadrupla. ostensum autem est, & quatuor CK BN GR RN quadrupla esse CK. quare octo continentia gnomonem STY ipsius AK quadrupla sunt, & quoniam AK est quod sub AB BC continetur; etenim BK est æqualis BC; erit contentum quater sub AB BC ipsius AK quadruplum. at demonstratus est gnomon STY quadruplus ipsius AK. quod igitur quater sub AB BC continetur æquale est gnomoni STY. commune apponatur XH, quod quidem quadrato ex AC est æquale. ergo quod quater sub AB BC continetur una cum quadrato ex AC æquale est ipsi STY gnomoni, & quadrato XH. sed STY gnomon, & XH totum sunt AEFD quadratum, quod describitur ex AD. rectangulum igitur quater sub AB BC contentum unà cum quadrato ex AC æquale est ei, quod ex AD, hoc est ex AB BC tanquam ex una linea describitur, quadrato. Ergo si recta linea utcumque secta fuerit; quod quater sub toto, & una parte continetur rectangulum, unà cum quadrato reliquæ partis, æquale est quadrato, quod ex tota & dicta parte, tanquam ex una linea describitur. Quod ostendendum fuerat.



e Cor. 4.
hujus.

PROP. IX. THEOR.


Si recta linea in partes aequales, & in partes inaequales secta fuerit; quadrata qua ab inaequalibus totius partibus describuntur, dupla sunt & quadrati dimidia, & quadrati linea ejus qua inter sectiones interjicitur.

Recta enim linea quævis AB secta sit in partes æquales ad C, & in partes inæquales ad D. Dico quadrata ex AD DB, quadratorum ex AC CD dupla esse. Ducatur enim à puncto C ipsi AB ad rectos angulos CE, & utrivis ipsarum

AC

AC CB æqualis ponatur, junganturque EA EB. ac per D quidem ipsi CE parallela^b ducatur DF; per F vero ipsi AB^b 31. primi parallela^b FG; & AF ducatur. Itaque quoniam AC est æqualis CE; erit^c & angulus EAC angulo AEC æqualis.^c 5. primi. & cum rectus sit angulus ad C, reliqui AEC EAC uni recto æquales^d erunt. & sunt æquales inter sese. utervis^d 3. Cor. 32. primi.

igitur ipsorum AEC EAC recti est dimidium. eadem ratione, & recti dimidium est utervis ipsorum CEB EBC. ergo totus angulus AEB rectus est. & quoniam angulus GEF dimidium est recti, rectus autem EGF, æqualis enim^e est interiori &




opposito ECB, erit, & reliquus EFG recti dimidium: æqualis igitur est GEF angulus ipsi EFG. quare & latus EG lateri GF est^f æquale. rursus quoniam angulus ad B dimidium est recti, rectus autem FDB, quod sit æqualis interiori & opposito ECB; reliquus BFD recti erit dimidium. angulus igitur ad B æqualis est angulo BFD; ideoque latus DF lateri DB æquale. & quoniam AC est æqualis CE, erit & ex AC quadratum æquale quadrato ex CE. quadrata igitur ex AC CE dupla sunt quadrati ex AC; quadratis autem ex AC CE æquale^g est quadratum ex EA, siquidem rectus^g 47. primi est angulus ACE. ergo quadratum ex EA quadrati ex AC est duplum. rursus quoniam EG æqualis est GF, & quadratum ex EG quadrato ex GF est æquale. quadrata igitur ex EG & GF dupla sunt quadrati ex GF. at quadratis ex EG GF æquale^g est quod ex EF quadratum. ergo quadratum ex EF quadrati ex GF duplum erit. æqualis^h autem est GF ipsi CD.^h 34. primi. quadratum igitur ex EF duplum est quadrati CD. sed & quadratum ex AE quadrati ex AC est duplum. ergo quadrata ex AE EF dupla sunt quadratorum ex AC CD. quadratis vero ex AE EF æquale^g est ex AF quadratum; quoniam angulus AEF rectus est. quadratum igitur ex AF quadratorum ex AC CD est duplum. sed quadrato ex AF æqualia sunt ex AD DF quadrata. rectus enim est angulus qui ad D. ergo ex AD DF quadrata dupla sunt quadratorum ex AC CD. est autem DF ipsi DB æqualis. quadrata igitur ex AD DB quadratorum ex AC CD dupla erunt. Quare si recta linea in partes æquales, & in partes inæquales, secta fuerit; quæ ab inæqualibus totius partibus describuntur quadrata, dupla sunt & quadrati dimidiæ, & quadrati lineæ ejus quæ inter sectiones interjicitur. Quod ostendere oportebat.

est $\triangle$ quod ex EG quadratum. ergo quadratum ex EG duplum est quadrati ex EF. $\triangle$ qualis autem est EF ipsi CD. quadratum igitur ex EG quadrati ex CD duplum erit. sed ostensum est quadratum ex EA duplum quadrati ex AC. ergo ex AE EG quadrata, quadratorum ex AC CD sunt dupla. quadratis vero ex AE EG $\triangle$ quale est $\triangle$ quod ex AG quadratum. quadratum igitur ex AG duplum est quadratorum ex AC CD. at quadrato ex AG $\triangle$ qualia $\triangle$ sunt ex AD DG quadrata. ergo quadrata ex AD DG sunt dupla quadratorum ex AC CD. sed DG est $\triangle$ qualis DB. quadrata igitur ex AD DB quadratorum ex AC CD sunt dupla. Ergo si recta linea bifariam secetur, & ipsi in directum quædam recta linea adjiciatur; quæ à tota cum adjuncta, & adjuncta sunt utraque quadrata, dupla sunt & quadrati dimidiæ, & quadrati quod ab ea quæ ex dimidia & adjuncta constat tanquam ab una linea describitur. Quod ostendere oportebat. 47. primi.

PROP. XI. PROBL.

Datam rectam lineam secare, ita ut quod sub tota, & altera parte continetur rectangulum æquale sit ei, quod à reliqua parte fit, quadrato.

Sit data recta linea AB. Oportet ipsam AB ita secare, ut quod sub tota, & altera parte continetur rectangulum æquale sit ei, quod à reliqua parte fit, quadrato. Describatur enim 46. primi. ex AB quadratum ABCD, seceturque AC bifariam in E, & BE ducatur: deinde producta CA in F, ponatur ipsi BE $\triangle$ qualis EF: describaturque ex AF quadratum FGHA, & GH ad K producatur. Dico AB sectam esse in H, ita ut sub AB BH rectangulum æquale sit quadrato ex AH. Quoniam enim recta linea AC bifariam secatur in E, adjiciturque ipsi in directum AF, rectangulum sub CF FA, una cum quadrato ex AE, $\triangle$ quale $\triangle$ erit quadrato ex EF. sed EF est $\triangle$ qualis EB. rectangulum igitur sub CF FA, una cum quadrato ex AE $\triangle$ quale est ei, quod fit ex EB, quadrato. quadrato autem ex EB $\triangle$ qualia sunt quadrata ex BA AE: etenim angulus ad A rectus est. 47. primi. ergo rectangulum sub CF FA, una cum quadrato ex AE $\triangle$ quale est quadratis ex AB AE; commune auferatur quod ex AE fit quadratum; reliquum igitur rectangulum sub CF FA $\triangle$ quale est quadrato ex AB. est autem rectangulum FK sub



$\triangle$ 6. hujus.

D

CF FA


CF FA; siquidem AF est æqualis FG; quadratum autem ex AB est ipsum AD. rectangulum igitur FK æquale est quadrato AD. commune auferatur AK. ergo reliquum FH reliquo HD est æquale. atque est HD rectangulum sub AB BH, cum AB sit æqualis BD, & FH est quadratum ex AH. rectangulum igitur sub AB BH quadrato ex AH æquale erit. Quare data recta linea AB secta est in H, ita ut sub AB BH rectangulum quadrato ex AH sit æquale. Quod facere oportebat.

PROP. XII. THEOR.

In obtusangulis triangulis, quod à latere obtusum angulum subtendente fit quadratum, majus est quam quadrata, quæ sunt à lateribus obtusum angulum continentibus, rectangulo contento bis sub uno laterum, quæ sunt circa obtusum angulum, in quod scilicet protractum perpendicularis cadit, & linea assumpta exterius à perpendiculari ad angulum obtusum.

Sit obtusangulum triangulum ABC, obtusum angulum
 12. primi. habens BAC: & ducatur * à puncto B ad CA protractum perpendicularis BD. Dico quadratum ex BC majus esse, quam quadrata ex BA AC, rectangulo quod bis sub CA AD continetur. Quoniam enim recta linea CD secta est utcumque in puncto A, erit quadratum ex

4. hujus. CD æquale^b, & quadratis ex CA AD, & ei, quod bis sub CA AD continetur, rectangulo. commune apponatur ex DB quadratum. quadrata igitur ex CD DB æqualia sunt & quadratis ex CA AD DB, & rectangulo quod




bis sub CA AD continetur. sed quadratis ex CD DB æquale est * quadratum ex CB, rectus enim est angulus ad D, cum sit BD perpendicularis. quadratis vero ex AD DB æquale est * quadratum ex AB. Quadratum igitur ex CB æquale est, & quadratis ex CA AB, & rectangulo bis sub CA AD contento. ergo quadratum ex CB majus est quam quadrata ex CA AB, rectangulo, quod bis sub CA AD continetur. In obtusangulis igitur triangulis, quadratum, quod fit à latere obtusum angulum subtendente, majus est quam quadrata, quæ sunt à lateribus obtusum angulum continentibus, rectangulo contento bis sub uno laterum, quæ sunt circa obtusum

sum angulum, in quod protractum perpendicularis cadit, & linea assumpta exterius à perpendiculari ad angulum obtusum. Quod demonstrare oportebat.

PROP. XIII. THEOR.

In acutangulis triangulis, quod à latere acutum angulum subtendente fit quadratum, minus est quam quadrata quæ fiunt à lateribus acutum angulum continentibus, rectangulo contento bis sub uno laterum, quæ sunt circa acutum angulum, in quod perpendicularis cadit, & linea à perpendiculari intus assumpta ad angulum acutum.

Sit acutangulum triangulum ABC , acutum habens angulum ad B : ducatur à puncto A ad BC perpendicularis AD . * 12. primi.
 Dico quadratum quod fit ex AC minus esse quam quadrata quæ ex CB BA fiunt, rectangulo quod bis sub CB BD continetur. Quoniam enim recta linea CB secta est utcumque in D , erunt quadrata ex CB BD æqualia b , & rectangulo quod bis sub CB BD continetur, & quadrato ex DC . commune apponatur ex AD quadratum. quadrata igitur ex CB BD DA æqualia sunt, & rectangulo bis sub CB BD contento, & quadratis ex AD DC . sed quadratis ex BD DA æquale est c ex AB quadratum; rectus enim angulus est qui ad D . quadratis vero ex AD DC æquale c est quadratum ex AC , quadrata * 47. primi.
 igitur ex CB BA sunt æqualia quadrato ex AC , & ei quod bis sub CB BD continetur rectangulo. quare solum quadratum ex AC minus est quam quadrata ex CB BA , rectangulo quod bis sub CB BD continetur. In acutangulis igitur triangulis quadratum quod à latere acutum angulum subtendente fit, minus est quam quadrata quæ fiunt à lateribus acutum angulum continentibus, rectangulo contento bis sub uno laterum quæ sunt circa acutum angulum, in quod perpendicularis cadit, & linea à perpendiculari intus assumpta ad angulum acutum. Quod demonstrare oportebat.




b 7. hujus.

PROP. XIV. PROBL.

Dato rectilineo æquale quadratum constituere.

- Sit datum rectilineum A. Oportet ipsi A rectilineo æquale quadratum constituere. Constituatur ^a rectilineo A æquale parallelogrammum rectangulum BC DE, si igitur BE est æqualis ED, factum jam erit quod proponebatur, etenim rectilineo A æquale quadratum constitutum est BD: sin minus, una ipsarum BE ED major est. sit BE major; & producat ad F, ponaturque ipsi ED æqualis EF. deinde secta FB bisectetur in G: centro quidem G, intervallo autem unius ipsarum GB GF semicirculus describatur BHF; producaturque DE in H, & GH ducatur. Quoniam igitur recta linea BF secta est in partes æquales ad G, inæquales ad E; erit rectangulum sub BE EF, una cum quadrato quod fit ex EG, æquale quadrato ex GF. est autem GF æqualis GH. rectangulum igitur sub BE EF una cum quadrato ex EG, æquale est quadrato ex GH. sed quadrato ex GH æqualia ^d sunt ex HE EG quadrata. ergo rectangulum sub BE EF una cum quadrato ex EG æquale est quadratis ex HE EG. commune auferatur ex EG quadratum. reliquum igitur rectangulum sub BE EF est æquale quadrato ex EH. sed rectangulum sub BE EF est ipsum BD parallelogrammum, quoniam EF est æqualis ED. ergo BD parallelogrammum quadrato ex EH est æquale. parallelogrammum autem BD est æquale rectilineo A. rectilineum igitur A quadrato ex EH descripto æquale erit. Quare dato rectilineo A æquale quadratum constitutum est, quod videlicet ex ipsa EH describitur. Quod facere oportebat.



EUCLIDIS

ELEMENTORUM

LIBER TERTIUS.

DEFINITIONES.

I.


ÆQUALES circuli sunt, quorum diametri sunt æquales, vel quorum quæ ex centris sunt æquales.

II

Recta linea circulum contingere dicitur, quæ contingens circulum, & producta, ipsum non fecat.


III.

Circuli contingere se dicuntur, qui contingentes, se ipsos non secant.



IV.

In circulo æqualiter distare à centro rectæ lineæ dicuntur, quando à centro ad ipsas perpendiculares ductæ sunt æquales.




V.

Magis autem distare à centro dicitur ea, in quam major perpendicularis cadit.


VI.

Segmentum circuli est figura, quæ recta linea, & circuli circumferentia continetur.



VII.

Segmenti autem angulus est, qui recta linea, & circuli circumferentia comprehenditur.



VIII.

In segmento angulus est, quando in circumferentia segmenti sumatur aliquod punctum, atque ab ipso ad terminos lineæ ejus, quæ basis est segmenti, rectæ lineæ ducantur, angulus ductis lineis contentus.



IX.

Quando autem continentes angulum rectæ lineæ assumunt circumferentiam, in illa consistere angulus dicitur.

X.

Sector circuli est, quando angulus ad centrum constituitur, figura contenta rectis lineis angulum comprehendentibus, & circumferentia ab ipsis assumpta.

XI.

Similia circulorum segmenta sunt, quæ angulos suscipiunt æquales, vel in quibus anguli æquales consistunt.




PROP.

PROPOSITIO I. PROBLEMA.

Dati circuli centrum invenire.

Sit datus circulus ABC, oportet circuli ABC centrum invenire. Ducatur in ipso quædam recta linea AB utcumque, & in puncto D bifariam ^asecetur, à puncto autem D ipsi ^{10. primi.} AB ad rectos angulos ^bducta DC in E producat; & secetur CE bifariam ^cin F. Dico punctum F circuli ABC centrum esse.

Non enim; sed si fieri potest, sit G centrum, & GA GD GB ducantur. itaque quoniam DA est æqualis DB, communis autem DG, erunt duæ AD DG duabus GD DB æquales, altera



alteri: & basis GA æqualis ^cest basi GB; sunt enim ex ^{Def.} centro G. angulus igitur ADG angulo GDB est ^dæqualis ^{15. primi.} cum autem recta linea super rectam lineam insitens, angulos qui deinceps sunt, æquales inter se fecerit, ^erectus est ^{Def.} uterque æqualium angulorum. ergo angulus GDB est rectus. ^{10. primi.} sed & rectus FDB. æqualis igitur est angulus FDB angulo GDB, major minori, quod fieri non potest. quare G non est circuli ABC centrum. similiter ostendemus neque aliud esse, præter ipsum F. ergo F centrum est circuli ABC. Quod invenire oportebat.


Cor. Si in circulo quævis recta linea, lineam quandam bifariam & ad angulos rectos secet, in secante erit centrum circuli.

PROP. II. THEOR.

Si in circumferentia circuli duo quævis puncta sumantur, quæ ipsa conjungit recta linea intra circulum cadet.

Sit circulus ABC; in circumferentia ipsius sumantur duo quævis puncta A B. Dico rectam lineam quæ à puncto A ad B ducitur, intra circulum cadere.

Sumatur enim in recta A B punctum quodvis E, & jungantur DA DE DB. Quoniam DA est æqualis DB, erit ^aangulus DAB æqualis angulo DBA, & quoniam trianguli DAE latus AE producit, erit ^bangulus DEB angulo DAE major, angulus autem DAE

^a 5. primi.^b 16. primi.

æqualis est angulo DBE, ergo ^{D 4} DEB angulus angulo DBE est


e 19. primi. est major. sed majori angulo majus latus subtenditur. major igitur est DB ipsa DE. sed DB ad circumferentiam tantum pertingit. ergo DE non eo usque protenditur. adeoque punctum E cadet intra circulum. Si igitur in circumferentia &c. Quod oportebat demonstrare.

Cor. Hinc si recta circulum tangat, in unico puncto eum tangit.

PROP. III. THEOR.

Si in circulo recta linea per centrum ducta, rectam lineam quandam non ductam per centrum bifariam secet, & ad angulos rectos ipsam secabit; quod si ad angulos rectos ipsam secet, & bifariam secabit.

Sit circulus ABC, & in ipso recta linea per centrum ducta CD rectam lineam quandam AB non ductam per centrum bifariam secet in puncto F. Dico ad angulos rectos ipsam secare. Sumatur enim circuli ABC centrum quod sit E, & EA EB jungantur. Quoniam igitur AF est æqualis FB, communis autem FE, duæ AF FE duabus BF FE æquales sunt, & basis EA basi EB est æqualis. ergo & angulus AFE angulo BFE



e 1. hujus.

e 8. primi.
e Def. 10.
primi.

e 5. primi.

e 26. primi.


æqualis erit. cum autem recta linea super rectam insistens angulos, qui deinceps sunt, æquales inter se fecerit, rectus est uterque æqualium angulorum. uterque igitur AFE BFE est rectus. quare recta linea CD per centrum ducta rectam lineam AB non ductam per centrum bifariam secans, & ad angulos rectos ipsam secabit. Si vero CD secet AB ad rectos angulos, dico & bifariam ipsam secare, hoc est AF ipsi FB æqualem esse. Iisdem enim constructis, quoniam EA, quæ ex centro, est æqualis EB, & angulus EAF angulo EBF æqualis erit; est autem & AFE rectus æqualis recto BFE. duo igitur triangula EAF EBF duos angulos duobus angulis æquales habent, unumque latus uni lateri æquale, EF commune scilicet utrique, quod uni angulorum æqualium subtenditur. ergo & reliqua latera reliquis lateribus æqualia habebunt, atque erit AF ipsi FB æqualis. Si igitur in circulo recta linea per centrum ducta rectam lineam quandam non ductam per centrum bifariam secet, & ad angulos rectos ipsam secabit. quod si ipsam secet ad rectos angulos, & bifariam secabit. Quod oportebat demonstrare.

PROP.

PROP. IV. THEOR.

Si in circulo dua recta linea se invicem secant non ducta per centrum, sese bifariam non secabunt.

Sit circulus $ABCD$; & in ipso duæ rectæ lineæ AC & BD se invicem secant in puncto E , non ductæ per centrum. Dico eas sese bifariam non secare. Si enim fieri potest, secant sese bifariam, ita ut AE sit æqualis EC & BE ipsi ED : sumaturque a centrum $ABCD$ circuli, quod sit F , & EF jungatur. Quoniam igitur recta linea FE per centrum ducta rectam lineam quandam AC non ductam per centrum bifariam secat, & ad rectos angulos ipsam secabit b . quare rectus est FEA angulus. rursus quoniam recta linea FE rectam lineam quandam BD non ductam per centrum bifariam secat, & ad angulos rectos ipsam b secabit. rectus igitur angulus est FEB . ostensus autem est rectus & FEA . ergo FEA angulus ipsi FEB æqualis erit, minor majori, quod fieri non potest. non igitur AC & BD sese bifariam secant. Quare si in circulo duæ rectæ lineæ se invicem secant non ductæ per centrum, sese bifariam non secabunt. Quod ostendere oportebat.




a 1. hujus.

b 3. hujus.

PROP. V. THEOR.

Si duo circuli se invicem secant, non erit ipsorum idem centrum.

Duo enim circuli se invicem secant ABC & CDG in punctis B, C . Dico ipsorum idem centrum non esse. Si enim fieri potest, sit centrum E ; jungaturque EC , & EF utcumque ductatur. Quoniam E centrum est circuli ABC , erit CE ipsi EF æqualis. rursus quoniam E centrum est CDG circuli, æqualis est CE ipsi EG . sed ostensa est CE æqualis EF . ergo EF ipsi EG æqualis erit, minor majori, quod fieri non potest. non igitur punctum E centrum est circulorum ABC & CDG . Quare si duo circuli se invicem secant, non erit ipsorum idem centrum. Quod ostendendum fuit.




PROP.

PROP. VI. THEOR.

Si duo circuli sese intra contingant, ipsorum idem centrum non erit.


Duo enim circuli ABC CDE contingant sese intra in puncto c. Dico ipsorum non esse idem centrum. Si enim fieri potest, sit F, jungaturque FC, & FEB utcumque ducatur. Quoniam igitur F centrum est circuli ABC, æqualis est CF ipsi FB. rursus quoniam F centrum est circuli CDE, erit CF æqualis FE. ostensa autem est CF æqualis FB. ergo & FE ipsi FB est æqualis, minor majori, quod fieri non potest. non igitur F punctum centrum est circulorum ABC CDE. Quare si duo circuli sese intra contingant, ipsorum idem centrum non erit. Quod demonstrare oportebat.



PROP. VII. THEOR.

Si in circuli diametro aliquod punctum sumatur, quod non sit centrum circuli, & ab eo in circulum cadant quævis rectæ lineæ; maxima quidem erit in qua centrum: minima vero reliquæ: aliarum autem propinquior ei quæ per centrum transit, semper remotiore major est. at duæ tantum æquales ab eodem puncto in circulum cadent ad utraque partes minima.

Sit circulus ABCD, cujus diameter AD, & in ipsa AD sumatur aliquod punctum F, quod non sit centrum circuli. Sit autem circuli centrum E: & à puncto F in circulum ABCD cadant quædam rectæ lineæ FB FC FG. Dico FA maximam esse, & FD minimam: aliarum vero, FB quidem majorem quam FC, & FC majorem quam FG. jungantur enim BE CE GE. Et quoniam omnis trianguli duo latera reliquo sunt majora; erunt BE EF majores quam BF. est autem AE æqualis BE. ergo. BE EF ipsi AF sunt æquales. major igitur est AF quam FB. rursus quoniam BE est æqualis CE, communis autem FE, duæ BE EF duabus CE EF æquales



20. primi.


quales sunt. sed $\angle BEF$ angulus major est angulo $\angle CEF$: basis igitur BF basi FC est $\angle$ major. eadem ratione & CF major ^{24. primi.} est quam FG . rursus quoniam GF FE majores $\angle$ sunt quam ^{20. primi.} GE , æqualis autem GE ipsi ED ; erunt GF FE majores quam ED . communis auferatur FE . ergo reliqua GF major est quam reliqua FD . maxima igitur est FA , & FD minima: major vero BF quam FC , & FC quam FG major. Dico & à puncto F duas tantum rectas lineas æquales cadere in circum-
 lum $ABCD$ ad utraq; partes minimæ FD . constituatur $\angle$ ^{23. primi.} enim ad lineam EF atque ad datum in ea punctum E , angulo GEF æqualis angulus FEH : & FH jungatur. Quoniam igitur GE est æqualis EH , communis autem EF , duæ GE EF duabus HE EF æquales sunt: & angulus GEF est æqualis angulo HEF . basis igitur FG basi FH æqualis $\angle$ erit. Dico à puncto $\angle$ ^{4. primi.} F in circum-
 lum non cadere aliam ipsi FG æqualem. si enim fieri potest, cadat FK & quoniam FK est æqualis FG , est-
 que ipsi FG æqualis FH ; erit & FK ipsi FH æqualis, vide-
 licet propinquior ei, quæ per centrum transit æqualis re-
 motiori, quod fieri non potest. Si igitur in circuli diame-
 tro aliquod punctum sumatur, quod non sit centrum circu-
 li, &c. Quod demonstrare oportebat.

PROP. VIII. THEOR.

*Si extra circum-
 lum aliquod punctum sumatur, atque ab eo
 ad circum-
 lum ducantur quedam rectæ lineæ quarum una
 per centrum transeat, alia vero utcunque: earum qui-
 dem, quæ in concavam circumferentiam cadunt, maxi-
 ma est quæ per centrum transit; aliarum autem propin-
 quior ei, quæ per centrum, semper remotiore major est.
 at earum, quæ in convexam circumferentiam cadunt, mi-
 nima est quæ inter punctum & diametrum interjicitur:
 aliarum vero quæ propinquior minima, semper remotiore
 est minor. duæ autem tantum æquales à puncto in circu-
 lum cadunt ad utraq; partes minima.*

Sit circum-
 lus ABC , & extra circum-
 lum sumatur aliquod
 punctum D : ab eo autem in circum-
 lum ducantur rectæ lineæ
 quædam DA DE DF DC : sitque DA per centrum. Dico
 earum quidem, quæ in concavam AEC circumferentiam
 cadunt, maximam esse DA , quæ per centrum transit; &
 minimam, quæ inter punctum D & diametrum AG inter-
 jicitur, videlicet DG ; majorem autem DE quam DF ; & DF
 majorem

- maorem quam DC: earum vero quæ in convexam circumferentiam HLKG cadunt, quæ propinquior est minimæ DG semper remotiore esse minorem; hoc est DK minorem quam DL, & DL minorem quam DH. Sumatur enim centrum circuli ABC, quod sit M, & jungantur ME MF MC MH ML. & quoniam AM est æqualis ME, communis apponatur MD. ergo AD est æqualis ipsis EM MD. sed EM MD sunt majores^b quam ED. ergo & AD quam ED est major. rursus quoniam æqualis est ME ipsi MF, communis apponatur MD. erunt EM MD ipsi MF MD æquales; at angulus EMD major est angulo FMD. basis igitur ED basi FD major^c erit. similiter demonstrabimus, & FD majorem esse quam CD. ergo maxima est DA; major autem DE quam DF, & DF quam DC major. Præterea quoniam MK KD sunt majores^b quam MD, & MG est æqualis MK; erit reliqua KD quam reliqua^d GD major. quare GD minor quam KD, & idcirco GD minima est. & quoniam trianguli MLD in uno latere MD, duæ rectæ lineæ MK KD intra constituentur, erunt^e MK KD minores ipsis ML LD, quarum MK est æqualis ML. reliqua igitur DK minor est quam reliqua DL. similiter ostendemus, & DL quam DH minorem esse. ergo DG minima est. minor vero DK quam DL, & DL minor quam DH. Dico etiam duas tantum æquales à puncto D in circulum cadere ad utrasque minimæ partes. constituatur ad rectam lineam MD, ad datumque in ea punctum M, angulo KMD æqualis / angulus DMB, & DB jungatur. itaque quoniam MK est æqualis MB, communis autem MD, duæ KM MD duabus BM MD æquales sunt, altera alteri, & angulus KMD æqualis angulo BMD, basis igitur DK basi DB est æqualis. Dico à puncto D aliam ipsi DK æqualem in circulum non cadere. si enim fieri potest, cadat DN. & quoniam DK est æqualis DN, & DK ipsi DB est æqualis; erit & DB æqualis DN, propinquior scilicet minimæ æqualis remotiori, quod fieri non posse ostensum est. Si igitur extra circulum aliquod punctum sumatur, &c. quod ostendere oportebat.




PROP. IX. THEOR.

Si intra circulum sumatur aliquod punctum, atque ab eo in circulum cadant plures quam duæ rectæ lineæ æquales; punctum, quod sumitur, circuli centrum erit.

Sumatur enim intra circulum ABC punctum aliquod D : atque à puncto D in circulum ABC cadant plures quam duæ rectæ lineæ æquales DA DB DC . Dico punctum D , quod

sumitur, circuli ABC esse centrum. Non enim; sed, si fieri potest, sit E centrum, & juncta DE in FG producat. ergo FG diameter est ABC circuli. itaque quoniam in FG diametro circuli ABC sumptum est aliquod punctum D quod non est centrum circuli, maxima quidem erit DG , major autem 7 . hujus. tem DC quam DB , & DB quam DA . sed & æquales, quod ex hyp. fieri non potest. non igitur E centrum est circuli ABC . similiter ostendemus neque aliud punctum centrum esse præter ipsum D . ergo D circuli ABC centrum erit. Quod oportebat demonstrare.




¶ Def. 17. primi.

PROP. X. THEOR.

Circulus circulum in pluribus, quam duobus punctis non secat.

Si enim fieri potest circulus ABC circulum DEF secet in pluribus punctis, quam duobus; nempe in B , G , F , & circuli ABC centrum sumatur, quod sit K , & KB KG KF jungantur. Quoniam igitur intra circulum DEF sumptum est aliquod punctum K , à quo in circulum DEF incident plures quam duæ rectæ lineæ KB KG KF æquales, erit punctum K circuli DEF centrum. est autem & circuli ABC centrum K duorum igitur circulorum, qui sese secant, idem erit K centrum, quod fieri non potest. Quare circulus circulum in pluribus,



¶ 9. hujus.


Ex hyp.

pluribus quam duobus punctis non secatur. Quod oportebat demonstrare.

PROP. XI. THEOR.

Si duo circuli sese intus contingant, & sumantur centra ipsorum: recta linea ipsorum centra conjungens producta in circulorum contactum cadet.


Duo enim circuli ABC ADE sese intus contingant in puncto A , & sumatur circuli quidem ABC centrum quod sit F ; circuli vero ADE centrum G . Dico rectam lineam à puncto G ad F ductam, si producat, in punctum A cadere. Non enim; sed si fieri potest, cadat ut $FGDH$. & AF AG jungantur. Itaque quoniam AG GF majores sunt quam FA , hoc est quam FH , communis auferatur FG . reliqua igitur AG major est quam reliqua GH . sed AG est æqualis GD , ergo GD ipsa GH est major, minor majore, quod fieri non potest. non igitur à puncto F ad G ducta recta linea extra contactum A cadet. quare in ipsum cadat necesse est. Si igitur duo circuli sese intus contingant, recta linea ipsorum centra conjungens, si producat, in contactum circulorum cadet. Quod oportebat demonstrare.



PROP. XII. THEOR.

Si duo circuli sese extra contingant, recta linea ipsorum centra conjungens per contactum transibit.

Duo enim circuli ABC ADE sese extra contingant in puncto A ; & sumatur circuli quidem ABC centrum quod sit F ; circuli vero ADE centrum G . Dico rectam lineam, quæ à puncto F ad G ducitur, per contactum A transire. Non enim; sed, si fieri potest, cadat ut $FCDG$: & FA AG jungantur. Quoniam igitur F centrum est circuli ABC , erit AF æqualis FC . rursus quoniam G centrum est ADE circuli, erit AG ipsi GD æqualis. ostensa est autem, & AF æqualis FC . sunt igitur FA AG ipsis FC DG æquales, ergo tota FG major est quam FA AG , sed & minor,




minor ^a, quod fieri non potest. non igitur à puncto F ad C ^{a 20. primi}. ducta recta linea per contactum A non transibit. quare per ipsum transeat necesse est. Si igitur duo circuli sese extra contingant, recta linea ipsorum centra conjungens per contactum transibit. Quod oportebat demonstrare.

PROP. XIII. THEOR.

Circulus circum non contingit in pluribus punctis quàm uno, sive intus sive extra contingat.

Si enim fieri potest, circum ABCD circum EBF D contingat, primum intus, in pluribus punctis quàm uno, videlicet in B, D: & sumatur circuli quidem ABDC centrum G, circuli vero EBF D centrum H. ergo recta linea quæ à puncto G ad H ducitur, in puncta ^a B, D cadet. cadat ut BGHD. Et quoniam G centrum est circuli ABDC, erit BG ipsi GD æqualis. major igitur est BG quàm HD: & BH quàm HD multo major. rursus quoniam H centrum est EBF D circuli, æqualis est BH ipsi HD. atqui ostensa est ipsa multo major, quod fieri non potest. non igitur circum circum intus contingit in pluribus punctis, quàm uno. Dico etiam neque extra contingere. si enim fieri potest, circum ACK circum ABDC extra contingat in pluribus punctis quàm uno, videlicet in AC, & AC jungatur. itaque quoniam in circumferentia utrorumque circumulorum ABCD ACK sumpta sunt duo puncta A, C; recta linea, quæ ipsa conjungit intra utrumque ipsorum cadet ^b. sed intra circum quidem ABDC cadit, extra circum vero ACK, quod est absurdum. Non igitur circum circum extra contingit in pluribus punctis quàm uno. ostensum autem est neque intus contingere. Circulus igitur circum non contingit in pluribus punctis quàm uno, sive intus, sive extra contingat. Quod oportebat demonstrare.

^a 11. hujus.



^b 2. hujus.

PROP. XIV. THEOR.


In circulo aequales recta linea aequaliter à centro distant: & quæ aequaliter à centro distant, inter se sunt aequales.

Sit circum ABCD, & in ipso æquales rectæ lineæ AB CD. Dico eas à centro æqualiter distare. Sumatur enim circuli

ABDC

ABDC centrum quod sit E, & ab ipso ad AB CD perpendiculares ducantur EF EG, & AE EC jungantur. Quoniam igitur recta linea quædam per centrum ducta EF rectam lineam quandam AB non ductam per centrum ad rectos

- * 3. hujus. angulos secat, & bifariam ipsam secabit*. quare AF est æqualis FB, ideoque AB ipsius AF dupla. eadem ratione, & CD dupla est CG. atque est AB ipsi CD æqualis. æqualis igitur & AF ipsi CG. & quoniam AE est æqualis EC, erit & quadratum ex AE quadrato ex EC æquale. sed quadrato




- b 47. primi. quidem ex AE æqualia sunt ex AF FE quadrata^b; rectus enim angulus est ad F: quadrato autem ex EC æqualia sunt quadrata ex EG GC, cum angulus ad G sit rectus. quadrata igitur ex AF FE æqualia sunt quadratis ex CG GE, quorum quadratum ex AF quadrato ex CG æquale, etenim æqualis est AF ipsi CG. reliquum igitur quod fit ex FE quadratum æquale est reliquo quod ex EG; ac propterea FE ipsi EG est æqualis. in circulo autem æqualiter distare à centro rectæ lineæ dicuntur, quando à centro ad ipsas perpendiculares ductæ æquales sunt. ergo AB CD à centro æqualiter distant. Sed si AB CD æqualiter distent à centro, hoc est, æqualis sit FE ipsi EG; dico AB ipsi CD æqualem esse. hisdem enim constructis, similiter ostendemus AB duplam esse ipsius AF, CD duplam ipsius CG. & quoniam æqualis est AE ipsi EC, erit & ex AE quadratum quadrato ex EC æquale. sed quadrato quidem ex AE æqualia^b sunt quadrata ex EF FA: quadrato autem ex EC æqualia^b quadrata ex EG GC. quadrata igitur ex EF FA quadratis ex EG GC æqualia sunt; quorum quadratum ex EG æquale est quadrato ex EF, est enim EG ipsi EF æqualis: reliquum igitur ex AF quadratum æquale est reliquo ex CG. ergo AF ipsi CG est æqualis. atque est AB ipsius AF dupla, & CD dupla ipsius CG. In circulo igitur æquales rectæ lineæ æqualiter à centro distant. Et quæ æqualiter à centro distant, inter se sunt æquales. Quod oportebat demonstrare.

PROP. XV. THEOR.

In circulo maxima quidem est diameter: aliarum vero semper propinquior ei quæ per centrum transit, remotiore major est.

Sit circulus ABCD, cujus diameter AD, centrum E; & propinquior quidem diametro AD sit BC; remotior vero FG. Dico AD maximam esse, & BC majorem quam FG. Ducantur enim à centro E ad BC FG perpendiculares EH EK. & quoniam BC propinquior est ei quæ per centrum transit, remotior autem FG; erit

EK quam EH major. ponatur ipsi EH æqualis EL, & per L ipsi EK ad rectos angulos ducta LM in N producat, & jungatur EM EN EF EG. quoniam igitur EH est æqualis EL, erit & BC ipsi MN æqualis^a. rursus quoniam



æqualis est AE ipsi EM, & DE ipsi EN, erit & AD ipsis ME EN æqualis. sed ME EN^b majores sunt quam MN; ergo & AD major est quam MN: & MN est æqualis BC, erit igitur AD quam BC major. quod cum duæ EM EN duabus FE EG æquales sint, angulusque MEN major angulo FEG, & basis MN basi FG major erit. ostensa autem est MN æqualis BC, ergo & BC quam FG est major. maxima igitur est AD diameter, & BC major quam FG. Quare in circulo maxima est diameter, aliarum vero semper propinquior ei, quæ per centrum transit, remotiore est major. Quod demonstrare oportebat.

^a 14. hujus.

^b 20. primi.

^c 24. primi.

PROP. XVI. THEOR.

Quæ diametro circuli ad rectos angulos ab extremitate ducitur, cadit extra circulum: & in locum qui inter rectam lineam, & circumferentiam interjicitur altera recta linea non cadet: & semicirculi angulus omni angulo acuto rectilineo major est; reliquus autem minor.

Sit circulus ABC circa centrum D, & diametrum AB. Dico rectam lineam, quæ à puncto A ipsi AB ad rectos angulos ducitur extra circulum cadere. Non enim; sed, si fieri potest,

E

potest,

- potest, cadat intus, ut AC, & DC jungatur. itaque quoniam
^a 5. primi. æqualis est DA ipsi DC, erit & angulus DAC angulo ACD
^b ex hyp. æqualis ^a. rectus autem est DAC ^b; ergo & ACD est rectus;
^c 17. primi. ac propterea anguli DAC ACD duabus rectis æquales sunt.



quod fieri non potest ^c. non igitur à
 puncto A ipsi BA ad rectos angulos
 ducta cadet intra circumulum. simili-
 ter ostendemus neque in circumfer-
 entiam cadere. Extra igitur cadat
 necesse est. cadat ut AE. Dico in lo-
 cum qui inter rectam lineam AE &
 circumferentiam CHA interjicitur,
 alteram rectam lineam non cadere.
 Si enim fieri potest, cadat ut FA,
 & à puncto D ad FA perpendicula-

^d 12. primi. ris ^d ducatur DG. & quoniam rectus
 est angulus AGD, minor autem recto

^e 19. primi. DAG, erit DA quàm DG major ^e.
 æqualis autem est DA ipsi DH. ma-
 jor igitur est DH ipsa DG, minor
 majore, quod fieri non potest. non
 igitur in locum qui inter rectam li-

neam & circumferentiam interjicitur, altera recta linea
 cadet. Dico præterea angulum semicirculi, qui recta linea
 BA, & circumferentia CHA continetur, omni angulo acuto
 rectilineo majorem esse; reliquum vero contentum circum-
 ferentia CHA, & recta linea AE omni angulo rectili-
 lineo esse minorem. Si enim est aliquis angulus rectilineus
 acutus major quidem contento recta linea BA, & CHA cir-
 cumferentia, aut aliquis minor contento CHA circumferentia,
 & recta linea AE, in locum qui inter circumferentiam CHA,
 & rectam lineam AE interjicitur, cadet aliqua recta linea
 quæ faciet angulum majorem quidem contento recta linea
 BA & CHA circumferentia, qui scilicet rectis lineis con-
 tinetur, minorem vero contento circumferentia CHA, & AE
 recta linea, non cadit autem ^f: non igitur erit angulus acu-
 tus qui rectis lineis continetur, major angulo contento
 recta linea BA, & CHA circumferentia; neque minor con-
 tento circumferentia CHA, & AE recta linea.

^f ex prius
 demon-
 stratis.




Cor. Ex hoc manifestum est rectam lineam quæ ab ex-
 tremitate diametri circuli ad rectos angulos ducitur, circu-
 lum contingere, & rectam lineam contingere circumulum in
 uno tantum puncto, quoniam quæ occurrit in duobus pun-
 ctis intra ipsum cadit, ut ostensum est.

PROP.

PROP. XVII. PROBL.

A dato puncto rectam lineam ducere quæ datum circum-
contingat.

Sit datum quidem punctum A, datus autem circulus BCD. Oportet à puncto A rectam lineam ducere, quæ circulum BCD contingat. Sumatur enim centrum circuli E; & juncta AE, centro quidem E, intervallo autem EA circulus AFG describatur: & à puncto D ipsi EA ad rectos angulos a ducatur DF: junganturque EBF AB. Dico à puncto A ductam esse AB quæ circulum BCD contingit. Quoniam enim E centrum est circulo-
rum BCD AFG, erit EA æ-
qualis EF, & ED ipsi EB. duæ igitur AE EB duabus FE
ED æquales sunt, & angulum communem continent, qui est
ad E. ergo basis DF basi AB est b æqualis, triangulumque b 4. hujus.
DEF æquale triangulo EBA, & reliqui anguli reliquis an-
gulis. æqualis igitur est angulus EBA angulo EDF. & EDF
rectus est. quare & rectus EBA: atque est EB ex centro.
quæ autem diametro circuli ab extremitate ad rectos angu-
los ducitur, circulum contingit c. ergo AB contingit circu- c Cor. 16.
lum. A dato igitur puncto A ducta est recta linea AB quæ hujus.
circulum BCD contingit. Quod facere oportebat.



• 11. primi.

26 4. hujus.


2. **Cor. 16.**

hujus.

PROP. XVIII. THEOR.

Si circulum contingat quadam recta linea, à centro autem in contactum recta linea ducatur, ea ad contingentem perpendicularis erit.

Circulum enim ABC contingat quædam recta linea DE in puncto C : & circuli ABC centrum fumatur F , à quo ad C ducatur FC . Dico FC ad i-



4 12. primi.

6 32. primi.

pſam DE perpendiculararem
 eſſe. Si enim non ita fit, du-
 catur à puncto F ad DE per-
 pendicularis * FG. Quoniam
 igitur angulus FGC reſtus eſt,
 erit GCF acutus^b, ac propte-
 rea FGC angulus maior angu-
 lo FCG. majorem autem angulum majus latus * ſubtendit. * 19.primi.
 major igitur eſt FC quàm FG. æqualis autem FC ipſi FB
 E 2 ergo

 E_2

ergo

ergo FB ipsa FG est major, minor majore, quod fieri non potest. non igitur FG est perpendicularis ad DE . similiter ostendemus neque aliam quampiam esse præter ipsam FC . ergo FC ad DE est perpendicularis. Si igitur circulum contingat quædam recta linea, à centro autem in contactum recta linea ducatur, ea ad contingentem perpendicularis erit. Quod oportebat demonstrare.

PROP. XIX. THEOR.

Si circulum contingat quædam recta linea, à contactu autem ad rectos angulos contingenti recta linea ducatur: in ea circuli centrum erit.

Circulum enim ABC contingat quædam recta linea DE in C , & à puncto C ipsi DE ad rectos angulos ducatur CA . Dico in ipsa AC circuli centrum esse. Non enim; sed, si fieri potest, sit F centrum, & jungatur CF .


Quoniam igitur circulum ABC contingit quædam recta linea DE , & à centro ad contactum ducta est FC ; erit FC ad ipsam DE perpendicularis.

* 18. hujus.

* Ex hyp.

rectus igitur angulus est FCE . est autem & ACE re-

ctus^b. ergo FCE angulus est æqualis angulo ACE , minor majori, quod fieri non potest. non igitur F centrum est ABC circuli. similiter ostendemus neque aliud aliquod esse præterquam in ipsa AC . Quare si circulum contingat quædam recta linea, à contactu autem ad rectos angulos contingenti recta linea ducatur; in ea circuli erit centrum. Quod demonstrare oportebat.



PROP. XX. THEOR.


In circulo angulus, qui ad centrum, duplex est ejus qui ad circumferentiam est, quando circumferentiam eandem pro basi habeant.

Sit circulus ABC , ac cujus centrum quidem angulus sit BEC , ad circumferentiam vero BAC , & eandem circumferentiam BC pro basi habeant. Dico BEC angulum anguli BAC duplum esse. Jungatur enim AE , & ad F producat. itaque quoniam EA est æqualis EB , erit & angulus EAB angulo EBA æqualis. anguli igitur EAB EBA duplices sunt

* 1. primi.

ipsum


ipſius anguli EAB ; ſed angulus BEF eſt æqualis $\hat{b}$ angulis $\hat{b}$ 32. primi. EAB EBA ; ergo BEF angulus anguli EAB eſt duplex. eadem ratione & angulus FEC duplex eſt ipſius EAC . totus igitur BEC totius BAC duplex erit. rurfus inflectatur, & ſit alter angulus BDC , junc-taque DE ad G producat. ſimiliter oſtendemus angulum GEC anguli GDC duplum eſſe; quorum GEB duplus eſt ipſius GDB . ergo reliquus BEC reliqui BDC eſt duplus. In circulo igitur angulus qui ad centrum, duplex eſt ejus qui ad circumferentiam eſt, quando circumferentiam eandem pro baſi habeant. Quod oportebat demonſtrare.




PROP. XXI. THEOR.

In circulo, qui in eodem ſegmento ſunt, anguli inter ſe æquales ſunt.

Sit circulus $ABCDE$, & in eodem ſegmento $BAED$ anguli ſint BAD BED . Dico eos inter ſe æquales eſſe. Sumatur enim circuli $ABCDE$ centrum quod ſit F : junganturque BF FD . Quoniam angulus quidem BFD eſt ad centrum, angulus vero BAD ad circumferentiam, & circumferentiam eandem BCD pro baſi habent; erit BFD angulus $\hat{a}$ anguli BAD duplus. eadem ratione angulus BFD duplus eſt etiam anguli BED . ergo angulus BAD angulo BED æqualis erit. Si anguli BAD BED ſunt in ſegmento minore ſemicirculo, ducatur AE , eruntque omnes anguli trianguli ABG æquales $\hat{b}$ omnibus angulis trianguli DEG . & anguli ABE ADE ſunt æquales per hæcenus demonſtrata, & anguli AGB DGE ſunt etiam æquales $\hat{c}$, ad



$\hat{a}$ 20. hujus.



$\hat{b}$ 32. primi.


$\hat{c}$ 15. primi.

verticem enim ſunt: quare & reliquus BAG reliquo GED æqualis erit. In circulo, igitur qui in eodem ſegmento ſunt anguli inter ſe æquales ſunt. Quod oportebat demonſtrare.

PROP. XXII. THEOR.

Quadrilaterorum quæ in circulis describuntur, anguli oppositi duobus rectis æquales sunt.


Sit circulus $ABDC$, & in ipso quadrilaterum $ABDC$. Dico angulos ipsius oppositos duobus rectis æquales esse. Jungantur AD BC : quoniam igitur omnis trianguli tres anguli duobus rectis sunt æquales ^a, erunt trianguli ABC tres anguli CAB ABC BCA æquales duobus rectis. sed angulus ABC est æqualis ^b angulo ADC , in eodem enim sunt segmento $ABDC$. & angulus ACB æqualis ^b ipsi ADB , quod sunt in eodem $ACDB$ segmento: totus igitur angulus BDC angulis ABC ACB æqualis est. communis apponatur BAC angulus; erunt anguli BAC ABC ACB angulis BAC BDC æquales. sed BAC ABC ACB sunt æquales ^a duobus rectis. ergo & anguli BAC BDC duobus rectis æquales erunt. similiter ostendamus angulos quoque ABD ACD duobus rectis esse æquales. Quadrilaterorum igitur, quæ in circulis describuntur, anguli oppositi duobus rectis æquales sunt. Quod oportebat demonstrare.



PROP. XXIII. THEOR.

Super eadem recta linea duo circulorum segmenta similia, & inæqualia ex eadem parte non constituentur.

Si enim fieri potest, super eadem recta linea AB duo circulorum segmenta similia, & inæqualia constituentur ex eadem parte ACB ADB ; ducaturque ACD , & CB BD jungantur. Itaque quoniam segmentum ACB simile est segmento ADB , similia autem circulorum segmenta sunt quæ angulos suscipiunt ^a æquales; erit ACB angulus æqualis angulo ADB , exterior interiori, quod fieri non potest ^b. Non igitur super eadem recta linea, duo circulorum segmenta similia, & inæqualia ex eadem parte constituentur. Quod demonstrare oportebat.




PROP.

PROP. XXIV. THEOR.

Super æqualibus rectis lineis similia circularum segmenta inter se æqualia sunt.

Sint enim super æqualibus rectis lineis AB CD similia circularum segmenta AEB CFD . Dico segmentum AEB segmento CFD æquale esse. Applicato enim AEB segmento segmento CFD , & posito puncto quidem A in C , recta vero linea AB in CD ; congruet & B punctum puncto D , propterea quod AB ipsi CD sit æqualis. congruente autem recta linea AB rectæ CD ; congruet & AEB seg-




mentum segmento CFD . si enim AB congruet ipsi CD , segmentum autem AEB segmento CFD non congruet, sed permutabitur ut CGD , circulus circulum in pluribus quàm duobus punctis secabit. etenim circulus CGD circulum CFD secat in pluribus punctis quàm duobus, videlicet in punctis C , G , D , quod fieri non potest. non igitur congruente recta ^{10. hujus.} linea AB rectæ CD , non congruet & AEB segmentum segmento CFD . quare congruet, & ipsi æquale erit. Super æqualibus igitur rectis lineis similia circularum segmenta inter se æqualia sunt. Quod oportebat demonstrare.

PROP. XXV. PROBL.

Circuli segmento dato describere circulum cujus est segmentum.

Sit datum circuli segmentum ABC . Oportet describere circulum cujus ABC est segmentum. Secetur AC bifariam ^a in D ; & à puncto D ipsi AC ad rectos ^{a 10. primi.} angulos ducatur ^b DB , & AB jungatur. ^{b 11. primi.}



Vel igitur angulus ABD major est angulo BAD , vel minor, vel ipsi æqualis. Sit primum major, & ad rectam


lineam BA , atque ad datum in ea punctum A constituatur ^{c 23. primi.} angulus BAE æqualis ^c angulo ABD ; & DB ad E producat; jungaturque EC . Quoniam igitur angulus ABE est æqualis

E 4

angulo

d 6. primi. angulo BAE , d erit & BE recta linea ipsi EA æqualis: & quoniam AD est æqualis DC , communis autem DE , duæ AD DE duabus CD DE æquales sunt, altera alteri; & angulus ADE æqualis angulo CDE , rectus enim uterque est. ergo & basis AE basi

e 4. primi. EC est æqualis: sed ostensa est AE æqualis EB . quare & BE ipsi EC est æqualis, ac propterea tres rectæ lineæ AE EB EC inter se æquales sunt.



centro igitur E , intervallo autem unâ ipsarum AE EB EC circulus descriptus etiam per reliqua transibit puncta, & circulus descriptus erit. quare circuli segmento dato descriptus est circulus cujus segmentum est. sed & illud constat, segmentum ABC semicirculo minus esse; propterea quod centrum ipsius extra cadit. ϵ Similiter, & si angulus ABD sit æqualis angulo BAD , facta AD æquali utrique ipsarum BD DC , erunt tres rectæ lineæ AD DB DC inter se æquales, atque erit D circuli descripti centrum, & segmentum ABC semicirculus. h Si vero angulus ABD minor sit angulo BAD ; constituatur ad rectam lineam BA , & ad punctum in ea datum A , angulo ABD æqualis angulus BAE intra segmentum ABC . erit E centrum in ipsa DB , atque erit ABC segmentum semicirculo majus. Circuli igitur segmento dato descriptus est circulus cujus segmentum est. Quod facere oportebat.


ϵ Caf. 3.
fig. 3.

h Caf. 2.
fig. 2.

PROP. XXVI. THEOR

In æqualibus circulis æquales anguli æqualibus insunt circumferentiis, sive ad centra, sive ad circumferentias insistant.

Sint æquales circuli ABC DEF , & in ipsis æquales anguli ad centra quidem BGC EHF , ad circumferentias vero BAC EDF . Dico BKC circumferentiam circumferentiæ ELF æqualem esse. Juntantur enim BC EF . Quoniam æquales sunt ABC DEF circuli, erunt & quæ ex centrâs æquales, duæ igitur BG GC duabus EH HF æquales sunt; & angulus ad G æqualis angulo ad H . ergo &



basis


basis BC basi EF est a æqualis. rursus quoniam æqualis est a 4. primi. angulus ad A angulo ad D , segmentum BAC simile b erit b Def. 11. segmento EDF : & sunt super æqualibus rectis lineis BC EF . ^{hujus.} quæ autem super æqualibus rectis lineis similia sunt circum-
lorum segmenta, inter se æqualia c sunt. segmentum igitur a 24. ^{hujus.} BAC segmento EDF est æquale. sed & totus A BC circulus æqualis est toti DEF . ergo & reliqua circumferentia BKC reliquæ ELF æqualis erit. In æqualibus igitur circulis æ-
quales anguli æqualibus insunt circumferentiis, sive ad centra, sive ad circumferentias insistant. Quod oportebat demonstrare.

PROP. XXVII. THEOR.

In æqualibus circulis anguli qui æqualibus insunt circumferentiis inter se æquales sunt, sive ad centra, sive ad circumferentias insistant.

In æqualibus enim circulis ABC DEF , æqualibus circumferentiis BC EF insistant anguli ad centra quidem BGC EHF , ad circumferentias vero BAC EDF . Dico angulum BGC angulo EHF , & angulum BAC angulo EDF æqualem esse.

Si quidem igitur angulus BGC æqualis sit angulo EHF , manifestum est angulum quoque BAC angulo EDF a esse æqualem. sin minus, unus ipsorum est major. sit




major BGC , & constituatur ad rectam lineam BG , & ad punctum in ipsa G , angulo EHF æqualis b angulus BGK . a - b 23. primi. quales autem anguli æqualibus insunt c circumferentiis, c 26. ^{hujus.} quando ad centra fuerint. ergo circumferentia BK æqualis est circumferentiæ EF . sed circumferentia EF æqualis est ipsi BC . ergo & BK ipsi BC est æqualis. minor majori, quod fieri non potest. non igitur inæqualis est angulus BGC angulo EHF : ergo est æqualis. atque est anguli quidem BGC dimidium angulus qui ad A ; anguli vero EHF dimidium qui ad D . angulus igitur qui ad A angulo qui ad D est æqualis. In æqualibus igitur circulis, anguli qui æqualibus insunt circumferentiis inter se æquales sunt, sive ad centra, sive ad circumferentias insistant. Quod oportebat demonstrare.

PROP.

PROP. XXVIII. THEOR.

In æqualibus circulis æquales rectæ lineæ circumferentias æquales auferunt, majorem quidem majori, minorem vero minori.

- Sint æquales circuli $ABCDEF$; & in ipsis æquales rectæ lineæ BC EF , quæ circumferentias quidem BAC EDF majores auferant, circumferentias vero BGC EHF minores. Dico circumferentiam BAC majorem majori circumferentiæ EDF , & minorem circumferentiam BGC minori EHF æqualem esse. Sumantur enim centra a circulorum K , L , junganturque BK KC EL LF . Quoniam circuli æquales sunt, erunt & quæ ex centris æquales b . duæ igitur BK KC sunt æquales duabus EL LF : & basis BC æqualis est basi EF , ergo angulus BKC angulo ELF est æqualis: æquales autem anguli æqualibus insunt circumferentiis, quando ad centra fuerint d . quare circumferentia BGC æqualis est circumferentiæ EHF , sed & totus ABC circulus toti DEF est æqualis. reliqua igitur circumferentia BAC reliquæ EDF æqualis erit. Ergo in æqualibus circulis æquales rectæ lineæ circumferentias æquales auferunt, majorem quidem majori, minorem vero minori. Quod demonstrare oportebat.



PROP. XXIX. THEOR.

In æqualibus circulis, æquales circumferentias æquales rectæ lineæ subtendunt.

- Vide figur. Prop. præcedentis.* Sint æquales circuli $ABCDEF$: & in ipsis æquales assumantur circumferentiæ BGC EHF , & BC EF jungantur. Dico rectam lineam BC rectæ EF æqualem esse. Sumantur enim centra a circulorum K , L , & jungantur BK KC EL LF . Quoniam igitur circumferentia BGC est æqualis circumferentiæ EHF , erit & angulus BKC angulo ELF æqualis b . & quoniam circuli $ABCDEF$ sunt æquales, & quæ ex centris æquales erunt c . duæ igitur BK KC sunt æquales duabus EL LF ; & æquales angulos continent. quare basis BC basi EF est d æqualis. In æqualibus igitur circulis æquales circumferentias æquales rectæ lineæ subtendunt. Quod oportebat demonstrare.


PROP.

PROP. XXX. PROBL.

Datam circumferentiam bifariam secare.

Sit data circumferentia ADB. oportet ADB circumferentiam bifariam secare. Jungatur AB, & in c bifariam ^asece- ^{10. primi.} tur: à puncto autem c ipsi AB ad rectos angulos ducatur CD.

& jungantur AD DB. quoniam igitur AC est æqualis CB, communis autem CD, duæ AC CD duabus EC CD æquales sunt: & angulus ACD æqualis angulo BCD, rectus enim uterque est: ergo basis AD basi BD est ^bæqualis. æ-




quales autem rectæ lineæ c circumferentias æquales auferunt, quare circumferentia AD circumferentiæ BD æqualis erit. Data igitur circumferentia bifariam secta est. Quod facere oportebat. ^b 4. primi. ^c 28. hujus.

PROP. XXXI. THEOR.

In circulo angulus, qui in semicirculo, rectus est, qui vero in majori segmento, minor est recto, & qui in minori, major recto; & insuper majoris quidem segmenti angulus recto major est, minoris vero segmenti angulus recto minor.

Sit circulus ABCD cujus diameter BC, centrum autem E; & jungantur EA AC AD DC. Dico angulum quidem qui est in semicirculo BAC rectum esse, qui vero in segmento ABC majore semicirculo, videlicet angulum ABC, minorem esse recto, & qui est in segmento ADC minore semicirculo, hoc est angulum ADC, recto majorem. Jungatur AE,




& BA ad F producat. Itaque quoniam BE est æqualis EA, erit & angulus EAB, angulo EBA æqualis^a. rursus quoniam AE est æqualis EC, & angulus ACE angulo CAE æqualis^a erit. totus igitur angulus BAC est æqualis duobus ABC ACB angulis, est autem, & angulus FAC extra tri-

angulum ABC, duobus ABC ACB æqualis^b. angulus igitur ^b 32. primi BAC est æqualis angulo FAC; ac propterea uterque ipso-^c rum rectus^c. quare in semicirculo BAC angulus CAB rectus est. ^a 5. primi. ^c Def. 10. primi.

est. & quoniam trianguli ABC duo anguli ABC BAC duobus rectis sunt ^d minores, rectus autem BAC , erit ABC angulus recto minor, atque est in segmento ABC majore semicirculo. quod cum in circulo quadrilaterum sit $ABCD$, quadrilaterorum vero qui in circulis describuntur, anguli

e 22. hujus. oppositi duobus rectis sunt æquales: erunt ABC ADC anguli æquales duobus rectis, & angulus ABC minor est recto,



reliquus igitur ADC recto major erit, atque est in segmento ADC minore semicirculo. Dico præterea majoris segmenti angulum qui continetur ABC circumferentia, & recta linea AC recto majorem esse; angulum vero minoris segmenti, contentum circumferentia ADC , & recta linea AC recto minorem. quod quidem perspicue apparet. Quoniam angulus qui rectis lineis BA AC continetur rectus est, erit & contentus ABC circumferentia, & recta linea AC recto major. rursus quoniam angulus contentus rectis lineis CA AF rectus est, erit qui continetur recta linea CA , & ADC circumferentia, minor recto. In circulo igitur angulus qui in semicirculo, rectus est, qui vero in majore segmento, minor est recto, & qui in minori, major recto: & insuper majoris quidem segmenti angulus recto major est, minoris vero recto minor. Quod demonstrare oportebat.

Cor. Ex hoc manifestum est, si trianguli unus angulus sit æqualis duobus, eum rectum esse; propterea quod & qui deinceps est, iisdem est æqualis. quando autem anguli deinceps sunt æquales, necessario recti sunt *f*.


f Def. 10. primi.

PROP. XXXII. THEOR.

Si circumulum contingat quædam recta linea, à contactu autem in circumulum ducatur recta linea ipsum secans; anguli quos ad contingentem facit, æquales erunt iis qui in alternis circuli segmentis consistunt.

Circulum enim $ABCD$ contingat quædam recta linea EF in B , & à puncto B ad circumulum $ABCD$ ducatur recta linea BD ipsum utcumque secans. Dico angulos quos BD cum EF contingente facit, æquales esse iis qui in alternis circuli segmentis consistunt. hoc est angulum FBD esse æqualem angulo qui constituitur in DAB segmento, videlicet ipsi DAB ;

DAB; angulum vero DBE æqualem angulo DCB qui in segmento BCD constituitur. Ducatur enim à puncto B ipsi EF ad rectos ^a angulos BA: & in circumferentia BD sumatur quodvis punctum c; junganturque AD DC CB. Quoniam igitur circulum ABCD contingit quædam recta linea EF in puncto B, & à contactu B ad rectos angulos contingenti ducta est BA; erit in ipsa BA centrum ^b ABCD circuli; quare BA ejusdem circuli ^c diameter est, & angulus



ADB in semicirculo est ^d rectus. reliqui igitur anguli BAD ^e primi. ABD uni recto ^f æquales sunt. sed & ABF ^g est rectus. ^h ergo angulus ABF æqualis est angulis BAD ABD. communis auferatur ABD. reliquus igitur DBF ei, qui in alterno circuli segmento consistit, videlicet angulo BAD, est æqualis. & quoniam in circulo quadrilaterum est ABCD, & anguli ejus oppositi æquales ⁱ sunt duobus rectis; erunt DBF ^j DBE anguli angulis BAD BCD æquales. quorum BAD ostensus est æqualis ipsi DBF; ergo reliquus DBE ei, qui in alterno circuli segmento DCB constituitur, videlicet ipsi DCB, æqualis erit. Si igitur circulum contingat quædam recta linea, à contactu vero in circulum ducatur recta linea ipsum secans; anguli quos facit ad contingentem, æquales erunt iis qui in alternis circuli segmentis consistunt. Quod oportebat demonstrare.


^b 19. hujus.
^c Def. 17.
^d 31. hujus.
^e 32. primi.
^f ex constr.

^h 22. hujus.

PROP. XXXIII. PROBL.

Super data recta linea describere segmentum circuli, quod suscipiat angulum dato angulo rectilineo æqualem.


Sit data recta linea AB, datus autem angulus rectilineus, qui ad c. Itaque oportet super data recta linea AB describere segmentum circuli, quod suscipiat angulum æqualem angulo qui est ad c. Ad rectam lineam AB, & ad punctum in ea datum A, constituatur angulus BAD angulo qui est ad c æqualis ^a. & à puncto A ipsi AD ad rectos angulos ^b ducatur AE; secetur autem AB bifariam ^c in



^a 23. primi.
^b 11. primi.
^c 10. primi.

F, atque à puncto F ducatur FG ad rectos angulos ipsi AB; & GB jungatur. Quoniam igitur AF est æqualis FB, communis


- munis autem FG , duæ AF FG duabus BF FG æquales sunt :
 & angulus AFG æqualis angulo BFG . ergo basis AG basi
 d 4. hujus. GB est æqualis. itaque centro G , intervallo autem AG cir-
 culus descriptus transibit et-
 tiam per B . describatur, & fit
 ABE , jungaturque EB . Quo-
 niam igitur ab extremitate
 diametri AB , & à puncto A ,
 ipsi AE ad rectos angulos
 ducta est AD ; ipsa AD cir-
 e Cor. 16. culum continget. & quo-
 hujus. niam circulum ABE contingit quædam recta linea AD , &
 à contactu qui est ad A , in circulum ABE ducta est recta
 f 32. hujus. linea AB : erit angulus DAB æqualis angulo qui in alterno
 circuli segmento constituitur, videlicet ipsi AEB . sed ang-
 ulus DAB , angulo ad C est æqualis. ergo & angulus ad
 C angulo AEB æqualis erit. Super data igitur recta linea AB ,
 segmentum circuli descriptum est AEB fuscipiens angulum
 AEB , dato angulo qui est ad C , æqualem. Quod facere
 oportebat.



PROP. XXXIV. PROBL.

A dato circulo segmentum abscindere quod fuscipiat angulum dato rectilineo æqualem.

- Sit datus circulus ABC , datus autem angulus rectilineus
 qui ad D . Oportet à circulo ABC segmentum abscindere,
 a 17. hujus. quod fuscipiat angulum angulo ad D æqualem. Ducatur
 recta linea EF circulum ABC
 in puncto B contingens: &
 ad rectam lineam BF , & ad
 punctum in ea B , constituatur
 angulus FBC angulo qui est
 b 23. primi. ad D æqualis. Quoniam igitur
 circulum ABC contingit
 quædam recta linea EF in B
 puncto, & à contactu B ducta est BC , erit angulus FBC æ-
 c 32. hujus. qualis ei qui in alterno circuli segmento constituitur. sed
 FBC angulus angulo qui ad D est æqualis. ergo & angulus
 in segmento BAC angulo ad D æqualis erit. A dato igitur
 circulo ABC , abscissum est segmentum quoddam BAC ,
 fuscipiens angulum dato angulo rectilineo qui est ad D , æ-
 qualem. Quod facere oportebat.





PROP. XXXV. THEOR.

Si in circulo duæ rectæ lineæ sese mutuo secant, rectangulum sub segmentis unius contentum, æquale est ei, quod sub alterius segmentis continetur, rectangulo.

In circulo enim $ABCD$, duæ rectæ lineæ AC BD sese mutuo in puncto E secant. Dico rectangulum contentum sub AE EC æquale esse ei quod sub DE EB continetur. Si AC BD per centrum transeant, ita ut E sit centrum $ABCD$ circuli; manifestum est æqualibus existentibus AE EC DE EB , & rectangulum contentum sub AE EC æquale esse ei quod sub DE EB continetur. Si AC DB non transeant per centrum, sumatur centrum circuli $ABCD$ quod sit F : & ab F ad rectas lineas AC DB perpendiculares ducantur FG FH : junganturque FB FC FE . Quoniam igitur recta quædam linea GF per centrum ducta rectam lineam quandam AC non ductam per centrum ad rectos angulos secat, & bifariam ipsam fecabit ^a. quare AG ipsi GC est

^a 3. hujus.

æqualis. & quoniam recta linea AC secta est in partes æquales in puncto G , & in partes inæquales in E , erit rectangulum sub AE EC contentum, una cum ipsius EG quadrato ^b, æquale qua-



^b 5. secundi.

drato ex G C . commune addatur ex G F quadratum. ergo rectangulum sub AE EC , una cum iis quæ ex EG GF quadratis, æquale est quadratis ex CG GF . sed quadratis quæ ex EG GF æquale est quadratum ex FE : quadratis vero ex CG GF æquale est quod ex FC fit quadratum. rectangulum igitur sub AE EC , una cum quadrato ex FE , æquale est quadrato ex FC . est autem CF æqualis FB . ergo rectangulum sub AE EC , unà cum quadrato ex EF , æquale est ei quod ex FB fit quadrato. eadem ratione & rectangulum sub DE EB unà cum quadrato ex FE , æquale est quadrato ex FB . ostensum autem est & rectangulum sub AE EC , unà cum quadrato ex FE , æquale ei quod fit ex FB quadrato. ergo rectangulum sub AE EC , unà cum quadrato ex FE , æquale est rectangulo sub DE EB , unà cum quadrato ex FE . commune auferatur FE quadratum. reliquum igitur rectangulum sub AE EC , reliquo sub DE EB rectangulo æquale erit. Quare si in circulo duæ rectæ lineæ sese mutuo secant, rectangulum sub segmentis unius contentum æquale est ei quod sub alterius segmentis continetur. Quod demonstrare oportebat.



^c 47. primi.

PROP.

PROP. XXXVI. THEOR.


Si extra circulum aliquod punctum sumatur, & ab eo in circulum cadant duæ rectæ lineæ, quarum altera quidem circulum secat, altera vero contingat; rectangulum quod sub tota secante, & exterius assumpta inter punctum & curvam circumferentiam continetur, æquale erit ei, quod à contingente fit, quadrato.

Extra circulum enim ABC sumatur aliquod punctum D, & ab eo ad dictum circulum cadant duæ rectæ lineæ DCA DB: & DCA quidem circulum ABC secet; DB vero contingat. Dico rectangulum sub AD DC, quadrato, quod fit ex DB, æquale esse. Vel igitur DCA per centrum transit, vel non transit. Primum transeat per centrum circuli ABC, quod fit E, & EB jungatur. erit *a* angulus EBD rectus *a*, itaque quoniam recta linea AC bifariam secta est in E, & ipsi adjicitur CD, rectangulum sub AD DC, una cum quadrato ex EC, æquale *b* erit ei quod fit ex ED quadrato. æqualis autem est CE ipsi EB, ergo rectangulum sub AD DC, una cum quadrato quod ex EB, æquale est quadrato ex ED. sed quadratum ex ED est æquale quadratis *c* ipsarum EB BD, rectus enim angulus est EBD. rectangulum igitur sub AD DC, una cum quadrato ex EB, æquale est ipsarum EB, BD quadratis. commune auferatur quadratum quod ex EB; ergo reliquum sub AD DC rectangulum, quadrato quod fit à contingente DB æquale erit. Secundo DCA non transeat per centrum ABC circuli: sumaturque *d* centrum E, & ad AC perpendicularis agatur EF, & jungantur EB EC ED, rectus igitur est EFD angulus. & quoniam recta linea quædam EF per centrum ducta, rectam lineam quandam AC non ductam per centrum ad rectos angulos secat, & bifariam ipsam secabit *e*. quare AF ipsi FC est æqualis. rursus quoniam recta linea AC bifariam secta est in F, atque ipsi adjicitur CD, erit rectangulum sub AD DC, una cum quadrato ex FC, æquale *b* quadrato quod ex FD. commune apponatur quod ex FE quadratum. rectangulum igitur sub AD DC



AD DC unà cum quadratis ex FC FE est æquale quadratis ex DF FE. sed quadratis quidem ex DE FE æquale est ex DE quadratum; etenim rectus est angulus EFD: quadratis vero ex CF FE æquale est quadratum ex CE. 47. primi. ergo rectangulum sub AD DC, una cum quadrato quod ex CE, est æquale quadrato ex ED; æqualis autem est CE ipsi EB; rectangulum igitur sub AD DC, una cum quadrato ex EB, æquale est ex ED quadrato. sed quadrato ex ED æqualia sunt quadrata ex EB BD, siquidem rectus est angulus EBD. ergo rectangulum sub AD DC, una cum quadrato ex EB æquale est eis quæ ex EB BD fiunt quadratis. commune auferatur quadratum ex EB. reliquum igitur sub AD DC rectangulum quadrato quod fit ex DB æquale erit. Si igitur extra circumulum aliquod punctum sumatur, &c. Quod oportebat demonstrare.

Cor. Hinc si à puncto quovis extra circumulum assumpto, plures lineæ rectæ AB AC circumulum secantes ducantur; rectangula comprehensa sub totis lineis AB AC, & partibus externis AE AF, inter se sunt æqualia. Nam si ducatur tangens AD, erit rectangulum sub BA AE æquale quadrato ex AD; & rectangulum sub CA AF eidem quadrato ex AD erit æquale. unde rectangula hæc æqualia erunt.



PROP. XXXVII. THEOR.


Si extra circumulum sumatur aliquod punctum, atque ab eo in circumulum cadant duæ rectæ lineæ, quarum altera quidem circumulum secet, altera vero incidat: fit autem, quod sub tota secante, & exterius assumpta inter punctum, & curvam circumferentiam continetur rectangulum, æquale ei quod ab incidente fit quadrato; incidens lineæ circumulum continget.

Extra circumulum enim ABC sumatur aliquod punctum D, atque ab ipso in circumulum cadant duæ rectæ lineæ DCA, DB;

F

DB;

- DB; DCA quidem circulum secet, DB vero incidat; sitque rectangulum sub AD DC æquale quadrato quod fit ex DB. Dico ipsam DB circulum ABC contingere. Ducatur enim
- a 17. hujus. recta linea DE, contingens circulum ABC, & sumatur circuli ABC centrum, quod sit F, junganturque FE FB FD. ergo angulus FED rectus est ^b. & quoniam DE circulum ABC contingit, secat autem DCA; rectangulum sub AD DC æquale erit ^c quadrato ex DE. sed rectangulum sub AD DC ponitur æquale quadrato ex DB. quadratum igitur quod ex DE quadrato ex DB æquale erit. ac propterea linea DE erit ipsi DB æqualis. est autem & FE æqualis FB. duæ igitur DE EF duabus DB BF æquales
- d 8. primi. sunt; & basis communis FD; angulus igitur DEF est ^d æqualis angulo DBF; rectus autem est DEF, ergo & DBF est rectus. atque est FB producta diameter. quæ vero ab extremitate diametri circuli ad rectos angulos ducitur, circulum contingit ^e. ergo DB circulum ABC contingat necesse est. similiter demonstrabitur & si centrum sit in ipsa AC. Si igitur extra circulum sumatur aliquod punctum, &c. Quod demonstrare oportebat.
- e ex antecedente.



EUCLIDIS


ELEMENTORUM

LIBER QUARTUS.

DEFINITIONES.

I.

FIGURA rectilinea in figura rectilinea describi dicitur, quando unusquisque figuræ descriptæ angulus, unumquodque latus ejus in qua describitur, contingit.




II.

Figura similiter circa figuram describi dicitur, quando unumquodque latus descriptæ, unumquemque angulum ejus circa quam describitur, contingit.


III.

Figura rectilinea in circulo describi dicitur, quando unusquisque descriptæ figuræ angulus circuli circumferentiam contingit.



IV.

Figura rectilinea circa circulum describi dicitur, quando unumquodque latus descriptæ, circuli circumferentiam contingit.



F 2

V.

V.

Circulus similiter in figura rectilinea describi dicitur, quando circuli circumferentia unumquodque latus ejus in qua describitur, contingit.

VI.

Circulus circa figuram rectilineam describi dicitur, quando circuli circumferentia unumquemque angulum ejus circa quam describitur, contingit.

VII.


Recta linea in circulo aptari dicitur, quando ejus extrema in circuli circumferentia fuerint.

PROPOSITIO I. PROBLEMA.

In dato circulo, data recta linea qua diametro ejus major non sit, aequalem rectam lineam aptare.

Sit datus circulus ABC , data autem recta linea non major circuli diametro D . Oportet in circulo ABC rectæ lineæ D æqualem rectam lineam aptare. Ducatur circuli ABC diameter BC . Siquidem igitur BC sit æqualis ipsi D , factum jam erit quod proponebatur. etenim in circulo ABC aptata est BC rectæ lineæ D æqualis. sin minus, major est BC quam D , ponaturque

• 3. primi. • ipsi D æqualis CE : & centro quidem C intervallo autem CE circulus describatur AEF : & CA jungatur. itaque quoniam punctum C centrum est AEF circuli; erit CA ipsi CE æqualis. sed D est æqualis CE . ergo & D ipsi AC æqualis erit. In dato igitur circulo ABC datæ rectæ lineæ D , non majori circuli diametro, æqualis aptata est AC . Quod facere oportebat.




PROP. II. PROBL.

In circulo dato, dato triangulo aquiangulum triangulum describere.

Sit datus circulus ABC , datum autem triangulum DEF . Oportet in ABC circulo describere triangulum triangulo DEF æquiangulum. Ducatur recta linea GAH contingens circulum

lum ABC in puncto A : & ad rectam lineam AH , & ad punctum in ea A , angulo DEF æqualis $\angle$ angulus constituitur HAC . rursus ad rectam lineam AG , & ad punctum in ipsa A , angulo DEF æqualis $\angle$ constituitur angulus GAB ; & BC jungatur. Quoniam igitur circulum ABC contingit quædam recta HAG ; à contactu autem in circulum ducta est AC : erit HAC angulus æqualis $\angle$ ei qui, in al- $\angle$ 32. tertii. terno circuli segmento confitit, videlicet ipsi ABC . sed HAC angulus æqualis est angulo DEF , ergo & angulus ABC angulo DEF est æqualis. eadem ratione & angulus ACB est æqualis angulo DCE . reliquis igitur BAC angulus reliquo EDF æqualis $\angle$ erit. ergo triangulum ABC triangulo $\angle$ 2. Cor. DEF est æquiangulum, & descriptum est in circulo ABC . 32. primi. In dato igitur circulo dato triangulo æquiangulum triangulum descriptum est. Quod facere oportebat.




$\angle$ 23. primi.

PROP. III. PROBL.

Circa datum circulum triangulo dato æquiangulum triangulum describere.

Sit datus circulus ABC , datum autem triangulum DEF . Oportet circa circulum ABC describere triangulum triangulo DEF æquiangulum. Protrahatur ex utraque parte EF ad puncta H , G , & sumatur circuli ABC centrum K : & recta linea KB utcumque ducatur: constituiturque ad rectam lineam KB , & ad punctum in ea K , angulo quidem DEG æqualis $\angle$ angulus BKA , angulo autem DFH æqualis $\angle$ angulus BKC , & per A , B , C , puncta ducantur rectæ lineæ LAM MBN MCL circulum ABC contingentes $\angle$. Quoniam igitur circulum ABC contingunt LM MN NL in punctis A , B , C , à centro autem K ad A B C puncta ducuntur KA KB KC ; erunt anguli ad puncta A B C recti $\angle$, $\angle$ 18. tertii. & quoniam quadrilateri $AMBK$ anguli quatuor quatuor rectis æquales sunt; etenim in duo triangula dividitur, quorum anguli KAM KBM sunt recti; erunt reliqui AKB AMB duobus rectis æquales. sunt autem & DEG DEF æquales duobus rectis. anguli igitur AKB AMB angulis DEG DEF æquales



$\angle$ 23. primi.

$\angle$ 17. tertii.

F 3

æquales

α 2. Cor. æquales sunt, quorum AKB ipsi DEG est æqualis. ergo reliquus AMB reliquo DEF æqualis erit. similiter demonstrabitur angulus LNB ipsi DNE æqualis. ergo & reliquus MLN est æqualis α reliquo EDF . æquiangulum igitur est LMN triangulum triangulo DEF ; & descriptum est circa circulum ABC . Quare circa datum circulum triangulo dato æquiangulum triangulum descriptum est. Quod facere oportebat.

α 2. Cor.
32. primi.

PROP. IV. PROBL.

In dato triangulo circulum describere.


Sit datum triangulum ABC ; Oportet in triangulo ABC circulum describere. Secentur α anguli ABC BCA bifariam rectis lineis BD CD quæ convenient inter se in D puncto: & à puncto D ad rectas lineas AB BC CA perpendiculares b 12. primi. b ducantur DE DF DG . Quoniam angulus EBD est æqualis angulo FBD , est autem & rectus BED recto BFD æqualis: erunt duo triangula EBD DBF , duos angulos duobus angulis æquales habentia, & unum latus uni lateri æquale utrique commune BD , quod scilicet uni æqualium angulorum subtenditur. ergo & reliqua latera reliquis lateribus æqualia c habebunt, atque erit DE æqualis DF . & eadem ratione DG æqualis DF . ergo & DE ipsi DG est æqualis. tres igitur rectæ lineæ DE DF DG inter se æquales sunt; quare centro D intervallo autem unius ipsarum DE DF DG circulus descriptus etiam per reliqua transibit puncta; & rectas lineas AB BC CA continget; propterea quod recti sunt ad E F G anguli. si enim ipsas fecet, quæ ab extremitate diametri circuli ad rectos angulos ducitur intra circulum cadet, quod est absurdum d . non igitur centro D , intervallo autem unius ipsarum DE DF DG circulus descriptus secabit rectas lineas AB BC CA , quare ipsas continget; atque erit circulus descriptus in triangulo ABC . In dato igitur triangulo ABC circulus EFG descriptus est. Quod facere oportebat.

α 9. primi.

b 12. primi.

c 16. primi.

d 16. tertii.






PROP.

PROP. V. PROBL.

Circa datum triangulum circulum describere.

Sit datum triangulum ABC . Oportet circa datum triangulum ABC circulum describere. Secentur AB AC bifariam ^{a 10. primi.} in D , E punctis: & à punctis D E ipsis AB AC ad rectos angulos ^{b 11. primi.} ducantur DF EF quæ quidem vel intra triangulum ABC convenient, vel in recta linea BC , vel extra ipsam. Convenient primo intra triangulum in puncto F : &




BF FC FA jungantur. Quoniam igitur AD est æqualis DB , communis autem & ad rectos angulos DF ; erit basis AF basi FB æqualis ^c. similiter ostendetur & CF æqualis FA . ^{d 4. primi.} ergo & DF est æqualis FC . tres igitur FA FB FC inter se æquales sunt. quare centro F , intervallo autem unius ipsarum FA FB FC circulus descriptus etiam per reliqua puncta transibit: atque erit circulus descriptus circa triangulum ABC . & describatur ut ABC . Secundo DF EF convenient in recta linea BC , in puncto F , ut in secunda figura, & AF jungatur. similiter demonstrabimus punctum F centrum esse circuli circa triangulum ABC descripti. Postremo DF EF convenient extra triangulum ABC rursus in F puncto, ut in tertia figura: & jungantur AF FB FC . & quoniam rursus AD est æqualis DB , communis autem & ad rectos angulos DF , basis AF basi FB æqualis erit. similiter demonstrabimus & CF ipsi FA æqualem esse. quare & BF est æqualis FC . rursus igitur centro F , intervallo autem unius ipsarum FA FB FC circulus descriptus & per reliqua transibit puncta; atque erit circa triangulum ABC descriptus. Circa datum igitur triangulum circulus descriptus est. Quod facere oportebat.

Cor. Si triangulum sit rectangulum centrum circuli cadet in latus angulo recto oppositum. si acutangulum cadet centrum intra triangulum. si obtusangulum cadet extra ^{a 31. tertii.}

PROP. VI. PROBL.

In dato circulo quadratum describere.


Sit datus circulus $ABCD$. Oportet in $ABCD$ circulo quadratum describere. Ducantur circuli $ABCD$ diametri ad rectos angulos inter se AC BD : & AB BC CD DA jungantur. Quoniam igitur BE est æqualis ED , etenim centrum est E , communis autem, & ad rectos angulos EA ; erit basis BA æqualis ED basi AD . & eadem ratione utraque ipsarum BC CD utriq; BA AD est æqualis; æquilaterum igitur est $ABCD$ quadrilaterum. Dico & rectangulum esse. Quoniam enim recta linea BD diameter est $ABCD$ circuli, erit BAD semicirculus. quare angulus BAD rectus^b est. & eadem ratione unusquisque ipsorum ABC BCD CDA est rectus. rectangulum igitur est $ABCD$ quadrilaterum. ostensum autem est, & æquilaterum esse. ergo quadratum necessario erit, & descriptum est in circulo $ABCD$. In dato igitur $ABCD$ circulo quadratum $ABCD$ descriptum est. Quod facere oportebat.



PROP. VII. PROBL.

Circa datum circulum quadratum describere.

Sit datus circulus $ABCD$. Oportet circa $ABCD$ circulum quadratum describere. Ducantur circuli $ABCD$ duæ diametri AC BD ad rectos inter se angulos, & per puncta A , B , C , D ducantur circulum $ABCD$ contingentes^a FG GH HK KF . Quoniam igitur FG contingit circulum $ABCD$, à centro autem E ad contactum qui est ad A ducitur EA ; erunt^b anguli ad A recti. eadem ratione, & anguli ad puncta B , C , D recti sunt. & quoniam angulus AEB rectus est, est autem & rectus EBG ; erit GH ipsi AC parallela^c. eadem ratione, & AC parallela est FK . similiter demonstrabimus & utramque ipsarum GF HK ipsi BD parallelam esse. quare & GF est parallela HK . ^dparallelogramma igitur sunt GK GC AK FB , ^e BK , ac propterea GF quidem est æqualis HK , GH vero ipsi FK . & quoniam AC æqualis est BD ; sed AC quidem utrique ipsa-




ipſarum GH FK eſt æqualis ; BD vero æqualis utrique GF HK , & utraque GH FK utrique GF HK æqualis erit. æquilaterum igitur eſt $FGHK$ quadrilaterum. Dico & rectangulum eſſe. Quoniam enim parallelogrammum eſt $GBEA$, atque eſt rectus AEB angulus, & ipſe AGB rectus erit c . Similiter demonſtrabimus angulos etiam ad puncta H K F rectos eſſe. rectangulum igitur eſt quadrilaterum $FGHK$. demonſtratum autem eſt & æquilaterum . ergo quadratum ſit neceſſe eſt, & deſcriptum eſt circa circulum $ABCD$. Circa datum igitur circulum quadratum deſcriptum eſt. Quod facere oportebat.

PROP. VIII. PROBL.

In dato quadrato circulum deſcribere.

Sit datum quadratum $ABCD$. Oportet in quadrato $ABCD$ circulum deſcribere. Secetur utraque ipſarum AB AD bifariam a in punctis F , E . & per E quidem alterutri ipſarum a 10. primi. AB CD parallela b ducatur EH : per F vero ducatur FK parallela b alterutri AD BC . parallelogrammum igitur eſt unumquodque ipſorum AK KB AH HD AG GC BG GD : & latera ipſorum quæ ex oppoſito, ſunt æqualia c . Et quoniam DA eſt æqualis AB ; & ipſus quidem AD dimidium eſt AE ; ipſius vero AB dimidium AF ; erit AE ipſi AF æqualis . quare & oppoſita latera æqualia ſunt. ergo FG eſt æqualis GE . ſimiliter demonſtrabimus, & utramque ipſarum GH GK utrique FG GE æqualem eſſe. quatuor igitur GE GF GH GK inter ſe ſunt æquales . itaque centro quidem G , intervallo autem unius ipſarum GE GF GH GK circulus deſcriptus etiam per reliqua tranſibit puncta, & rectas lineas AB BC CD DA continget; propterea quod anguli ad E , F , H , K , recti ſunt: ſi enim circulus ſecabit rectas lineas AB BC CD DA , quæ ab extremitate diametri circuli ad rectos angulos ducitur intra circulum cadet; quod d eſt abſurdum. non d 16. tertii. igitur centro quidem G intervallo autem unius ipſarum GE GF GH GK circulus deſcriptus rectas lineas AB BC CD DA ſecabit. quare ipſas neceſſario continget; atque erit deſcriptus in quadrato $ABCD$. In dato igitur quadrato circulus deſcriptus eſt. Quod facere oportebat.




PROP.

PROP. IX. PROBL.

Circa datum quadratum circulum describere.


- Sit datum quadratum $ABCD$. Oportet circa $ABCD$ quadratum circulum describere. Jungantur AC BD , quæ se invicem in puncto E fecerint. Et quoniam DA est æqualis AB , communis autem AC ; duæ DA AC duabus BA AC æquales sunt; & basis DC æqualis basi BC ; erit angulus DAC angulo BAC æqualis. angulus igitur DAB bifariam sectus est recta linea AC . similiter demonstrabimus unumquemque angulorum ABC BCD CDA rectis lineis AC DB bifariam sectum esse. quoniam igitur angulus DAB angulo ABC est æqualis, atque est anguli quidem DAB dimidium angulus EAB , anguli vero ABC dimidium EBA ; & EAB angulus angulo EBA æqualis erit. quare & latus EA lateri EB est æquale. similiter demonstrabimus & utramque rectarum linearum EC ED utrique EA EB æqualem esse. ergo quatuor rectæ lineæ EA EB EC ED inter se sunt æquales. centro igitur E , intervallo autem unius ipsarum EA EB EC ED circulus descriptus etiam per reliqua puncta transibit; atque erit descriptus circa $ABCD$ quadratum. describatur ut $ABCD$. Circa datum igitur quadratum circulus descriptus est. Quod facere oportebat.



PROP. X. PROBL.

Isoceles triangulum constituere, habens utrumque angulorum qui sunt ad basim, duplum reliqui.

- Exponatur recta quædam linea AB , & secetur in C puncto, ita ut rectangulum contentum sub AB BC æquale sit ei, quod ex CA describitur, quadrato: & centro quidem A , intervallo autem AB circulus describatur BDE ; apteturque in BDE circulo recta linea BD æqualis ipsi AC quæ non est major diametro circuli BDE : & junctis DA DC , circa ADC triangulum circulus ACD describatur. itaque quoniam rectangulum AB BC æquale est quadrato quod fit ex AC ;




AC; æqualis autem est AC ipsi BD; erit sub AB BC rectangulum quadrato ex BD æquale. & quoniam extra circulum ACD sumptum est aliquod punctum B, & à puncto B in circulum ACD cadunt duæ rectæ lineæ BCA BD, quarum altera quidem fecat, altera vero incidit; atque est re-
ctangulum sub AB BC æquale quadrato ex BD: recta li-
nea BD circulum ACD ^d continget. quoniam igitur BD con- ^d 37. tertii.
tingit, & à contacta ad D ducta est DC; erit BDC angu-
lus æqualis ^e ei qui in alterno circuli segmento consti- ^e 32. tertii.
tuitur, videlicet angulo DAC. quod cum angulus BDC æ-
qualis sit ipsi DAC, communis apponatur CDA; totus igitur
BDA est æqualis duobus angulis CDA DAC. sed ipsis CDA
DAC exterior angulus BCD est ^f æqualis. ergo & BDA æ- ^f 32. primi.
qualis est ipsi BCD. sed BDA angulus est ^g æqualis angulo ^g 5. primi.
CBD, quoniam & latus AD lateri AB est æquale. ergo &
DBA ipsi BCD æqualis erit. tres igitur anguli BDA DBA
BCD inter se æquales sunt. & quoniam angulus DBC æqua-
lis est angulo BCD, & latus BD lateri DC est ^h æquale. sed BD ^h 6 primi.
ponitur æqualis ipsi CA. ergo & CA est æqualis CD. quare
& angulus CDA æqualis est angulo DAC. anguli igitur CDA
DAC simul sumpti ipsius anguli DAC duplices sunt. est autem
& BCD angulus angulis CDA DAC æqualis; ergo & BCD
duplex est ipsius DAC. sed BCD est æqualis alterutri ipso-
rum BDA DBA. quare & uterque BDA DBA ipsius DAB
est duplex. Isoceles igitur triangulum constitutum est ADB
habens utrumque eorum angulorum qui sunt ad basim, du-
plum reliqui. Quod facere oportebat.

PROP. XI. PROBL.

In dato circulo pentagonum æquilaterum & æquiangulum describere.

Sit datus circulus ABCDE. Oportet in ABCDE circulo pentagonum æquilaterum & æquiangulum describere. Ex-

ponatur triangulum isosceles FGH habens utrumque eorum qui sunt ad basim GH angulorum, duplum ^a anguli qui est ad F: & describatur in circulo ABCDE triangu-
lo FGH æquiangulum ^b tri-
angulum ACD, ita ut angulo



quidem qui est ad F æqualis sit angulus CAD; utrique vero ipsorum qui ad G H, sit æqualis uterque ACD CDA. & uterque


uterque igitur ACD CDA anguli CAD est duplus. secetur
 e 9. primi. uterque ipsorum ACD CDA bifariam rectis lineis CE DB :
 & AB BC DE EA jungantur. Quoniam igitur uterque
 ipsorum ACD CDA duplus
 est ipsius CAD , & secti sunt
 bifariam rectis lineis CE DB ,
 quinque anguli DAC ACE
 ECD CDB BDA inter se sunt
 æquales. æquales autem an-
 guli in æqualibus circumfe-
 rentiis insistant.

d 26. tertii. insistant d . quinque

igitur circumferentiæ AB BC CD DE EA æquales sunt in-
 ter se. sed æquales circumferentias æquales rectæ lineæ

e 29. tertii. subtendunt. ergo & quinque rectæ lineæ AB BC CD DE
 EA inter se æquales sunt. æquilaterum igitur est $ABCDE$
 pentagonum. Dico & æquiangulum esse. Quoniam enim
 circumferentia AB æqualis est circumferentiæ DE , commu-
 nis apponatur BCD . tota igitur $ABCD$ circumferentia toti cir-
 cumferentiæ $EDCB$ est æqualis, & in circumferentia qui-
 dem $ABCD$ insitit angulus AED , in circumferentia vero
 $EDCB$ insitit BAE . ergo & BAE angulus est æqualis an-
 gulo AED .

f 27. tertii. eadem ratione & unusquisque angulorum ABC
 BCD CDE unicuique ipsorum BAE AED est æqualis. æ-
 quiangulum igitur est $ABCDE$ pentagonum: ostensum au-
 tem est & æquilaterum esse. Quare in dato circulo penta-
 gonum æquilaterum, & æquiangulum descriptum est. Quod
 facere oportebat.




PROP. XII. PROBL.

*Circa datum circulum pentagonum æquilaterum & æqui-
 angulum describere.*

Sit datus circulus $ABCDE$. Oportet circa circulum $ABCDE$
 pentagonum æquilaterum & æquiangulum describere. In-
 telligantur pentagoni in circulo descripti a angulorum pun-
 cta esse $ABCDE$, ita ut circumferentiæ AB BC CD DE EA sint
 a per 11. hujus. æquales; & per puncta A, B, C, D, E , ducantur b circulum con-
 tingentes GH HK KL LM MG , & sumpto circuli $ABCDE$
 centro F , jungantur FB FK FC FL FD . Quoniam igitur
 recta linea KL contingit circulum $ABCDE$ in puncto c ,
 & à centro F ad contactum qui est ad c ducta est FC , erit
 e 18. tertii. FC ad ipsam KL perpendicularis. rectus igitur est uterque
 angulorum qui sunt ad c . eadem ratione & anguli qui ad
 puncta B D recti sunt. & quoniam rectus angulus est FCK , quadra-

quadratum quod fit ex FK æquale est quadratis ex FC 47. primi.
 CK . & ob eandem causam quadratis ex FB BK æqua-
 le est ex FK quadratum. G

quadrata igitur ex FC CK
quadratis ex FB BK æqualia
sunt, quorum quod ex FC
ei quod ex FB est æquale.
ergo reliquum quod ex CK
reliquo quod ex BK æquale
erit. æqualis igitur est BK



ipsi CK. & quoniam FB est æqualis FC, communis autem FK, duæ BF FK duabus CF FK æquales sunt; & basis BK est æqualis basi KC: erit angulus & itaque BEK angulo 8. primi.


est æqualis angulo BFC , est angulus BFC angulo BKC duplus
 BKC æqualis, angulus vero BKC angulo BFC duplus
 igitur est angulus BFC anguli BKC , & angulus BKC du-
 plus ipsius BFC . eadem ratione, & angulus CFD anguli
 CFL est duplus: angulus vero CLD duplus anguli CLF .
 & quoniam circumferentia BC circumferentiæ CD est æqua-
 lis, & angulus BFC angulo CFD æqualis ferit. atque est *f* 27. *tertiū*.

angulus quidem BFC anguli KFC duplus: angulus vero DFC duplus ipsius LFC. æqualis igitur est angulus KFC angulo CFL. itaque duo triangula sunt FKC FLC, duos angulos duobus angulis æquales habentia, alterum alteri, & unum latius uni lateri æquale quod ipsis commune est FC: ergo & reliqua latera reliquis lateribus æqualia habebuntur, g 26. primi.

PROP. XIII. PROBL.

In dato pentagono, quod æquilaterum & æquiangulum fit, circulum describere.

- Sit datum pentagonum æquilaterum & æquiangulum ABCDE. Oportet in ABCDE pentagono circulum describere. Secetur uterque angulorum BCD CDE bifariam rectis lineis CF DF; & à puncto F in quo conveniunt inter se CF DF ducantur rectæ lineæ FB FA FE. Quoniam igitur BC est æqualis CD, communis autem CF, duæ BC CF, duabus DC CF æquales sunt, & angulus BCF est æqualis angulo DCF. basis igitur BF basi FD est æqualis, & BFC triangulum æquale triangulo DCF, & reliqui anguli reliquis angulis æquales, quibus æqualia latera subtenduntur; angulus igitur CBF angulo CDF æqualis erit. & quoniam angulus CDE angulo CDF est duplus, & angulus quidem CDE angulo ABC æqualis, angulus vero CDF angulo CBF æqualis; erit & CBA angulus duplus anguli CBF; ac propterea angulus ABF angulo CBF æqualis. angulus igitur ABC bifariam sectus est recta linea BF. similiter demonstrabitur unumquemque angulorum BAE AED rectis lineis AF FE bifariam sectum esse. à puncto F ad rectas lineas AB BC CD DE EA ducantur perpendiculares FG FH FK FL FM. & quoniam angulus HCF est æqualis angulo KCF; est autem & rectus FHC recto FKC æqualis: erunt duo triangula FHC FKC, duos angulos duobus angulis æquales habentia, & unum latus uni lateri æquale, commune scilicet utrisque FC, quod uni æqualium angulorum subtenditur. ergo & reliqua latera reliquis lateribus æqualia habebunt, atque erit perpendicularis FH perpendiculari FK æqualis. similiter ostendetur & unaquæque ipsarum FL FM FG æqualis utrique FH FK. quinque igitur rectæ lineæ FG FH FK FL FM inter se æquales sunt. quare centro F intervallo autem unius ipsarum FG FH FK FL FM, circulus descriptus etiam per reliqua transibit puncta, & rectas lineas AB BC CD DE EA continget; propterea quod anguli ad GHKLM recti sunt. si enim non continget, sed ipsas secet, quæ ab extremitate diametri circuli ad rectos angulos ducitur, intra circulum cadet, quod absurdum esse ostensum est. non igitur centro F, & inter-



intervallo uno ipsorum punctorum GHKLM circulus descriptus rectas lineas AB BC CD DE EA secabit. quare ipsas contingat necesse est. describatur ut GHKLM. In dato igitur pentagono quod est æquilaterum, & æquiangulum circulus descriptus est. Quod facere oportebat.


Cor. Si duo anguli proximi figuræ æquilateræ & æquiangularæ bisecentur, & à puncto in quo cecunt lineæ angulum bisecantes, ducantur rectæ lineæ ad reliquos figuræ angulos, omnes anguli figuræ erunt bisecti.

PROP. XIV. PROBL.

Circa datum pentagonum quod æquilaterum & æquiangulum sit, circulum describere.

Sit datum pentagonum æquilaterum & æquiangulum ABCDE. Oportet circa pentagonum ABCDE circulum describere. Secetur uterque ipsorum BCD CDE angulorum bifariam ^a rectis lineis CF FD:

& à puncto F in quo conveniunt rectæ lineæ, ad puncta B A E ducantur FB FA FE. & unusquisque angulorum CBA BAE AED rectis lineis BF FA FE bifariam ^b sectus erit. Et quoniam angulus BCD angulo



^a 9. primi.

CDE est æqualis; atque est anguli quidem BCD dimidium angulus FCD, anguli vero CDE dimidium CDF; erit & FCD angulus æqualis angulo FDC, quare & latus CF lateri FD est æquale ^c. similiter demonstrabitur & unaquæque ipsarum FB FA FE æqualis unicuique FC FD. quinque igitur rectæ lineæ FA FB FC FD FE inter se æquales sunt. ergo centro F, & intervallo unius ipsorum FA FB FC FD FE, circulus descriptus etiam per reliqua transibit puncta: atque erit descriptus circa pentagonum ABCDE quod æquilaterum est & æquiangulum. describatur, & sit ABCDE. Circa datum igitur pentagonum æquilaterum & æquiangulum circulus descriptus est. Quod facere oportebat.

^b Cor. præcedente.


^c 6. primi.

PROP. XV. PROBL.

In dato circulo hexagonum æquilaterum, & æquiangulum describere.

Sit datus circulus ABCDEF. Oportet in circuli ABCDEF hexagonum æquilaterum & æquiangulum describere. Ducatur

catur circuli $ABCDEF$ diameter AD , sumaturque centrum circuli G ; & centro quidem D , intervallo autem DG circulus describatur $EGCH$, junctæ EG CG ad puncta E F producantur, & jungantur AB BC CD DE EF FA . Dico hexagonum $ABCDEF$ æquilaterum & æquiangulum esse. Quoniam enim G punctum centrum est $ABCDEF$ circuli, erit GE ipsi GD æqualis. rursus quoniam D centrum est circuli $EGCH$, erit DE æqualis DG : sed GE ipsi GD æqualis ostensa est. ergo GE ipsi ED est æqualis. æquilaterum igitur est EGD triangulum, ideoque tres ipsius anguli EGD GDE DGE inter se æquales sunt; & sunt trianguli tres anguli æquales ^b duobus rectis. angulus igitur EGD



^a Cor. 5. primi.

^b 32. primi.

^c 13. primi.

^d 15. primi.

^e 26. tertii.

^f 29. tertii.

^g 27. tertii.

duorum rectorum tertia pars est. similiter ostendetur & DGC duorum rectorum tertia pars. & quoniam recta linea CG super rectam EB insistens, angulos qui deinceps sunt EGC GCB duobus rectis æquales ^c efficit; erit & reliquus CGB tertia pars duorum rectorum. anguli igitur EGD DGC CGB inter se sunt æquales. & qui ipsis ad verticem sunt anguli BGA AGF FGE æquales ^d sunt angulis EGD DGC CGB . quare sex anguli EGD DGC CGB BGA AGF FGE inter se æquales sunt. sed æquales anguli æqualibus circumferentiis insistant. sex igitur circumferentiæ AB BC CD DE EF FA inter se sunt æquales: æquales autem circumferentias æquales ^e rectæ lineæ subtendunt. ergo & sex rectæ lineæ inter se æquales sint necesse est. ac propterea æquilaterum est $ABCDEF$ hexagonum. Dico & æquiangulum esse. Quoniam enim circumferentiæ AF circumferentiæ ED est æqualis, communis apponatur circumferentiæ $ABCD$: tota igitur $FABCD$ circumferentiæ æqualis est toti circumferentiæ $EDCBA$. & circumferentiæ quidem $FABCD$ angulus FED insistit, circumferentiæ vero $EDCBA$ insistit angulus AFE . angulus igitur AFE angulo DEF est ^g æqualis. similiter ostenduntur & reliqui anguli hexagoni $ABCD$ EF figillatim æquales utrique ipsorum AFE FED . ergo æquiangulum est $ABCDEF$ hexagonum. ostensum autem est & æquilaterum esse: & descriptum est circulo $ABCDEF$. In dato igitur circulo hexagonum æquilaterum, & æquiangulum descriptum est. Quod facere oportebat.

Ex hoc manifestum est hexagoni latus, ei quæ est ex centro circuli æquale esse. & si per puncta $ABCDEF$ contingentes circumulum ducamus, circa circumulum describetur hexa-


hexagonum æquilaterum & æquiangulum, consequenter iis quæ in pentagono dicta sunt: & præterea similiter in dato hexagono circulum inscribemus, & circumscribemus. Quod facere oportebat.

PROP. XVI. PROBL.

In dato circulo quindecagonum æquilaterum & æquiangulum describere.

Sit datus circulus ABCD. Oportet in ABCD circulo quindecagonum æquilaterum & æquiangulum describere. Sit AC latus trianguli ^a quidem æquilateri in ipso circulo ABCD ^a 2. hujus. *descripti, pentagoni ^b vero æquilateri latus AB, quarum igitur ^b 11. hujus.

tur partium est ABCDF circulus quindecim, earum circumferentia quidem ABC, tertia existens circuli, erit quinque; circumferentia vero AB, quæ quinta est circuli, erit trium, ergo reliqua BC est duarum. fecetur BC bifariam



in puncto E. quare utraque ipsarum BE EC circumferentia-^c 30. tertii. rum quintadecima pars est ABCD circuli. si igitur jungentes BE EC, æquales ipsis in continuum rectas lineas in circulo ^d ABCD aptemus, in ipso quindecagonum æquilaterum & æquiangulum descriptum erit. Quod facere oportebat. ^d 1. hujus.

Similiter autem iis quæ dicta sunt in pentagono, si per circuli divisiones, contingentes circulum ducamus, circa ipsum describetur quindecagonum æquilaterum & æquiangulum, & insuper dato quindecagono æquilatero & æquiangulo circulum inscribemus, & circumscribemus.

* Facilime describitur latus AC per prop. præced. si enim duo latera hexagoni circulo inscribantur ab A versus C, horum opposita extrema incident in puncta A, C extrema lateris trianguli questii.

EUCLIDIS

ELEMENTORUM

LIBER QUINTUS.

DEFINITIONES.

I.

PARS est magnitudo magnitudinis, minor majoris, quando minor maiorem metitur.

II.

Multiplex est major minoris, quando maiorem minor metitur.

III.

Proportio seu ratio est duarum magnitudinum ejusdem generis, secundum quantitatem, mutua quædam habitudo.

IV.

Proportionem habere inter se magnitudines dicuntur, quæ multiplicatæ se invicem superare possunt.

V.

In eadem proportionem magnitudines esse dicuntur, prima ad secundam & tertia ad quartam, quando primæ & tertiæ æque multiplices, secundæ & quartæ æque multiplices, juxta quamvis multiplicationem, utraque utramque, vel unâ superant, vel unâ æquales sunt, vel unâ deficiunt, inter se comparatæ.

VI.

Magnitudines quæ eandem proportionem habent, proportionales vocentur.

Et

Ea magnitudinum Proportionalium definitio vulgo apud Interpretes traditur, quam Euclides in Elemento septimo, pro numeris solum posuit. scil.

Magnitudines dicuntur esse proportionales, quando Prima Secundæ & Tertia Quartæ æquemultiplex est, vel eadem pars, vel eadem partes.

Sed hæc definitio Numeris & quantitativibus commensurabilibus tantum competit; Adeoque cum Universalis non sit, recte ab Euclide in hoc elemento omnium Proportionalium proprietates tradituro rejicitur; & alia generalis substituitur cuius magnitudinum speciei congruens. Interim multum laborant Interpretes ut Definitionem hinc loci ab Euclide expositam, ex vulgo recepta numerorum Proportionalium definitione demonstrent; sed facilius multo hæc ab illa fluit quam illa ab hac. Quod sic ostendetur.

Primo Sint ABCD quatuor magnitudines quæ sunt in eadem ratione; prout in definitione 5^{ta} magnitudines in eadem ratione esse exponuntur. Sitque Prima multiplex secundæ, dico & tertiam eandem esse multiplicem Quartæ. Sit ex. gr. A æqualis 5 B, erit C æqualis 5 D. Capiatur numerus quilibet v. gr. 2. per quem multiplicetur 5

& productus sit 10: Et magnitudinum A & C Primæ & Tertiæ capiantur æque multiplices

A: B:: C: D

2A 10B 2C 10D

2A 2C. Item magnitudinum B & D Secundæ & Quartæ capiantur æque multiplices 10B, & 10D. Et perdefn. quintam, si 2A sint æquales 10B, erunt 2C æquales 10D. at quia A est quintuplex ex hypothesi ipsius B, erunt 2A æquales 10B. unde & 2C æquales 10D. & C æqualis 5D, hoc est erit C quintuplex ipsius D. q. e. d.

Secundo. Si A sit pars quævis ipsius B , erit C eadem pars ipsius D . Nam quia est A ad B , sicut C ad D . cumque A sit pars quædam ipsius B , erit B multiplex ipsius A ; adeoque per priorem casum D erit eadem multiplex ipsius C , & proinde C eadem pars erit magnitudinis D , ac est A ipsius B .
q. e. d.

Tertio. Sit A æqualis quotlibet quarumvis partium ipsius B . dico & C esse æqualem totidem similium partium ipsius D . v. gr. A in se contineat quartam partem ipsius B quinquies; hoc est, sit A æqualis $\frac{1}{4}B$, dico & C esse æqualem $\frac{1}{4}D$. Nam quoniam A est æqualis $\frac{1}{4}B$; multiplicando utramque per 4, erunt $4A$ æquales $5B$. Capiantur itaque æque multiplices Primæ & Tertiæ scil. $4A$ & $4C$; item æquæ æque multiplices Secundæ & Quartæ scil. $5B$ & $5D$. & per definitionem, si $4A$ sint æquales $5B$, erunt $4C$ æquales $5D$. at ostensum est $4A$ æquales esse $5B$. adeoque & $4C$ æquales erunt $5D$, & C æqualis $\frac{1}{4}D$.
q. e. d.

Universaliter sit A æqualis $\frac{n}{m}B$, erit C æqualis $\frac{n}{m}D$. multiplicentur enim A & C per m . Et B & D per n . Et quoniam est A æqualis $\frac{n}{m}B$, erit mA æqualis nB ; unde per def. 5 tam erit mC æqualis nD ; & C æqualis $\frac{n}{m}D$.
q. e. d.

VII.

Quando autem æque multiplicium, multiplex quidem primæ superaverit multiplicem secundæ, multiplex vero tertiæ non superaverit multiplicem quartæ, tunc prima ad secundam majorem proportionem habere dicitur quam tertia ad quartam.

VIII.

Analogia est proportionum similitudo.

IX.

Analogia vero in tribus terminis ad minimum consistit.

X

Quando tres magnitudines proportionales sunt, prima ad tertiam, duplicatam proportionem habere dicitur ejus quàm habet ad secundam.

XI.

Quando autem quatuor magnitudines sunt proportionales, prima ad quartam, triplicatam habere proportionem dicitur ejus quam habet ad secundam, & semper deinceps, una amplius, quoad analogia processerit.

XII.

Homologæ, vel similis rationis magnitudines, dicuntur antecedentes quidem antecedentibus, consequentes vero consequentibus.

XIII.

Alterna seu permutata ratio est sumptio antecedentis ad antecedentem, & consequentis ad consequentem.

XIV.

Inversa ratio est sumptio consequentis ut antecedentis, ad antecedentem, ut ad consequentem.

XV.

Compositio rationis est sumptio antecedentis unà cum consequente, tanquam unius, ad ipsam consequentem.

XVI.

Divisio rationis est sumptio excessus quo antecedens superat consequentem, ad ipsam consequentem.

XVII.

Conversio rationis est sumptio antecedentis ad excessum quo antecedens ipsam consequentem superat.

XVIII.

Ex æquo sive ex æqualitate ratio est, cum plures magnitudines extiterint, & aliæ ipsis numero æquales, quæ binæ fumantur & in eadem proportionem, fueritque ut in primis magnitudinibus prima ad ultimam, ita in secundis magnitudinibus prima ad ultimam: vel aliter, est sumptio extremarum per subtractionem mediarum.

XIX.

Ordinata proportio est, quando fuerit ut antecedens ad consequentem, ita antecedens ad consequentem; ut autem consequens ad aliam quampiam, ita consequens ad aliam quampiam.

XX.

Perturbata vero proportio est, quando tribus existentibus magnitudinibus, & aliis ipsis numero æqualibus, fuerit ut in primis magnitudinibus antecedens ad consequentem, ita in secundis magnitudinibus antecedens ad consequentem, ut autem in primis magnitudinibus consequens ad aliam quampiam, ita in secundis alia quæpiam ad antecedentem.

A X I O M A T A.

I.

Eiusdem sive æqualium æque multiplices inter se æquales sunt.

II.


Quarum eadem æque multiplex est, vel quarum æquales sunt æque multiplices, & ipsæ inter se sunt æquales.

P R O P O S I T I O I. T H E O R E M A.

Si fuerint quotcunque magnitudines quotcunque magnitudinum, æqualium numero, singula singularum æque multiplices; quotuplex est una magnitudo unius, totuplices erunt & omnes omnium.

Sint quotcunque magnitudines AB CD , quotcunque magnitudinum E F , æqualium numero, singulæ singularum æque

multiplices. Dico quotuplex est AB ipfius E, totuplices esse & AB CD simul ipfarum E F simul. Quoniam enim AB æque multiplex est ipfius E, ac CD ipfius F; quot magnitudines sunt in AB æquales ipfi E, tot erunt & in CD æquales ipfi F. Dividatur AB quidem in partes ipfi E æquales, quæ sint AG GB; & CD dividatur in partes æquales ipfi F, videlicet CH HD. erit igitur multitudo partium CH HD æqualis multitudini ipfarum AG GB. & quoniam AG est æqualis E, & CH æqualis F; erunt & AG CH æquales * ipfis E F. eadem ratione quoniam GB est æqualis E, & HD ipfi F; erunt GB HD æquale * ipfis E F. quot sunt itaque in AB æquales ipfi E, tot sunt & in AB CD æquales ipfis E F. ergo quotuplex est AB ipfius E, totuplices erunt & AB CD simul ipfarum E F simul. Si igitur fuerint quotcunque magnitudines quotcunque magnitudinum, æqualium numero, singulæ singularum æque multiplices; quotuplex est una magnitudo unius, totuplices erunt & omnes omnium. Quod demonstrare oportebat.




* Axiom. 2.
primi.

PROP. II. THEOR.

Si prima secunda æque multiplex fuerit ac tertia quarta, fuerit autem & quinta secunda æque multiplex ac sexta quarta; erit etiam composita prima cum quinta secunda æque multiplex ac tertia cum sexta quarta.

Sit prima AB secundæ C æque multiplex, ac tertia DE quartæ F. Sit autem & quinta BG secundæ C æque multiplex, ac sexta BH quartæ F. Dico & compositam primam cum quinta scil. AG secundæ C æque multiplicem esse, ac tertiam cum sexta sc. DH quartæ F. Quoniam enim AB æque multiplex est C, ac DE ipfius F; quot magnitudines sunt in AB æquales C, tot erunt & in DE æquales F. eadem ratione & quot sunt in BG æquales C, tot & in BH erunt æquales F. quot igitur sunt in tota AG æquales C, tot erunt & in tota DH æquales F. ergo quotuplex ex AG ipfius C, totuplex est &




DH ipsius F. & composita igitur prima cum quinta AG secundæ c æque multiplex erit, ac tertiam cum sexta DH quartæ F. Quare si prima secundæ æque multiplex fuerit, ac tertia quartæ, fuerit autem & quinta secundæ æque multiplex, ac sexta quartæ; erit composita quoque prima cum quinta æque multiplex secundæ, ac tertia cum sexta quartæ. Quod oportebat demonstrare.

PROP. III. THEOR.

Si prima secunda æque multiplex fuerit ac tertia quarta; sumantur autem æque multiplices prima & tertia; erit & ex æquali, sumptarum utraque utriusque æque multiplex, altera quidem secunda, altera vero quarta.

Sit prima A secundæ B æque multiplex ac tertia C quartæ D: & sumantur ipsarum A C æque multiplices EF GH. Dico EF æque multiplicem esse ipsius B, ac GH ipsius D. Quoniam enim EF æque multiplex est ipsius A, ac GH ipsius C; quot magnitudines sunt in EF æquales A, tot erunt & in GH æquales C. dividatur EF quidem in magnitudines ipsi A æquales EK KF; GH vero dividatur in magnitudines æquales C, videlicet GL LH. erit igitur ipsarum EK KF multitudo æqualis multitudini ipsarum GL LH. & quoniam æque multiplex est A ipsius B ac C ipsius D; æqualis autem EK ipsi A, & GL ipsi C; erit EK æque multiplex ipsius B, ac GL ipsius D. eadem ratione æque multiplex erit KF ipsius B, ac LH ipsius D. quoniam igitur prima EK secundæ B æque multiplex est, ac tertia GL quartæ D; est autem & quinta KF secundæ B æque multiplex ac sexta LH quartæ D: erit & composita prima cum quinta EF, secundæ B æque multiplex, ac tertia cum sexta GH, quartæ D. Si igitur prima secundæ æque fuerit multiplex ac tertia quartæ, sumantur autem primæ & tertiæ æque multiplices: erit & ex æquali, sumptarum utraque utriusque æque multiplex, altera quidem secunda, altera vero quarta. Quod ostendisse oportuit.



• s. hujus.

PROP.

PROP. IV. THEOR.

Si prima ad secundam eandem habet proportionem quam tertia ad quartam: & æque multiplices prima & tertia ad æque multiplices secunda & quarta, juxta quamvis multiplicationem, eandem proportionem habebunt, inter se comparata.

Prima A ad secundam B eandem proportionem habeat quam tertia C ad quartam D: & sumantur ipsarum quidem

A C utcumque æque multiplices E F; ipsarum vero B D aliæ utcumque æque multiplices G H.

Dico E ad G ita esse ut F ad H.

Sumantur rursus ipsarum E F æque multiplices K L, & ipsarum

G H æque multiplices M N. Quoniam igitur E æque multiplex est

ipsius A, atque F ipsius C; sumuntur autem ipsarum E F æque

multiplices K L: erit K æque multiplex ipsius A, atque L ipsius

C. eadem ratione M æque multiplex erit ipsius B, atque N ipsius

D. & quoniam est ut A ad B ita C ad D. sumptæ autem sunt ipsarum

A C æque multiplices K L; & ipsarum B D aliæ utcumque æque

multiplices M N: si K superat M, superabit & L ipsam N;

& si æqualis æqualis; & si minor minor. suntque K L quidem ipsarum

E F æque multiplices; M N vero ipsarum G H aliæ utcumque æque


multiplices. ut igitur E ad G ita erit F ad H. Quare si prima ad secundam eandem habeat

proportionem quam tertia ad quartam; & æque multiplices primæ ac tertiæ ad æque

multiplices secundæ ac quartæ, juxta quamvis multiplicationem, eandem proportionem habebunt, inter se comparatæ. Quod demonstrare oportebat.

Quoniam igitur demonstratum est si K superat M, & L ipsam N superare; & si æqualis, æqualem esse, & si minor,

minorem:




minorem; constat etiam si M superat K , & N superare ipsam L ; & si æqualis, æqualem esse; & si minor, minorem; ac
 * 5. Defin. hujus. propterea ut G ad E ita esse H ad F .

Cor. Ex hoc manifestum est, si quatuor magnitudines sint proportionales, & inverse proportionales esse.

PROP. V. THEOR.

Si magnitudo magnitudinis æque multiplex sit atque ablata ablata: & reliqua reliqua æque multiplex erit ac tota totius.

Magnitudo AB magnitudinis CD æque multiplex sit atque ablata AE ablata CF . Dico & reliquam EB reliquæ FD æque multiplicem esse atque totam AB totius CD . Quotuplex enim est AE ipsius CF , totuplex fiat & EB ipsius CG . & quoniam AE æque multiplex est CF atque EB ipsius CG ; erit AE æque multiplex CF , ac AB ipsius GF ; ponitur autem æque multiplex AE ipsius CF , ac AB ipsius CD . æque multiplex igitur est AB utriusque GF CD ; ac propterea GF ipsi CD est æqualis. communis auferatur CF . reliqua igitur GC æqualis est reliquæ DF . itaque quoniam AE æque multiplex est CF , ac EB ipsius CG , estque CG æqualis DF ; erit AE æque multiplex CF , ac EB ipsius FD . æque multiplex autem ponitur AE ipsius CF , ac AB ipsius CD . ergo EB est æque multiplex FD , ac AB ipsius CD . & reliqua igitur EB reliquæ FD æque multiplex est, atque tota AB totius CD . Quare si magnitudo magnitudinis æque multiplex sit atque ablata ablata: & reliqua reliquæ æque erit multiplex, ac tota totius. Quod oportebat demonstrare.



* 1. hujus.

* 2. Axiom. hujus.


PROP. VI. THEOR.

Si duæ magnitudines duarum magnitudinum æque multiplices sint, & ablata quadam sint earundem æque multiplices: erunt & reliqua vel eisdem æquales, vel ipsarum æque multiplices.

Duæ magnitudines AB CD duarum magnitudinum E F æque multiplices sint, & ablata AG CH earundem sint æque multiplices. Dico & reliquas GB HD vel ipsis E F æquales esse,

esse, vel ipsarum æque multiplices. Sit enim primo GB

æqualis E . Dico & HD ipsi F esse æ-
qualem. Ponatur ipsi F æqualis CK . &
quoniam AG æque multiplex est E ac
 CH ipsius F ; estque GB quidem æqua-
lis E ; CK vero æqualis F ; erit AB
æque multiplex E , ac KH ipsius F .
æque autem multiplex ponitur AB
ipsius E , ac CD ipsius F . ergo KH æ-
que multiplex est F , ac CD ipsius F .
quoniam igitur utraque ipsarum KH
 CD est æque multiplex F , erit KH æ-
qualis CD . communis auferatur CH .
ergo reliqua KC reliquæ HD est æ-
qualis. sed KC est æqualis F . & HD
igitur ipsi F est æqualis; ideoque GB
ipsi E , & HD ipsi F æqualis erit. Si-
militer demonstrabimus si GB multi-
plex fuerit ipsius E ; & HD ipsius F
æque multiplicem esse. Si igitur duæ
magnitudines duarum magnitudinum
æque multiplices sint, & ablatæ quæ-
dam sint earundem æque multiplices;
erunt & reliquæ, vel eisdem æquales,
vel ipsarum æque multiplices. Quod
demonstrare oportebat.




PROP. VII. THEOR.

*Æquales ad eandem, eandem habent proportionem, & ea-
dem ad æquales.*

Sint æquales magnitudines A B , alia autem quævis magni-
tudo C . Dico utramque ipsarum A B

ad C eandem proportionem habere:
& C ad utramque A B similiter ean-
dem habere proportionem. Suman-
tur ipsarum A B æque multiplices
 D E , & ipsius C alia utcunque mul-
tiplex F . Quoniam igitur æque mul-
tiplex est D ipsius A , ac E ipsius B ,
estque A ipsi B æqualis; erit & D
æqualis E ; alia autem utcunque
multiplex ipsius C est F . ergo
si D superat F , & E ipsam F supe-
rabit, & si æqualis, æqualis; &
si minor, minor. & sunt D E qui-




dem ipsarum $A B$ æque multiplices: F vero alia utcunque
 5. Defin. multiplex ipsius C . erit igitur ^b ut A ad C , ita B ad C . Dico
 hujus. insuper C ad utramque ipsarum $A B$ eandem habere pro-
 portionem. Iisdem enim constructis similiter ostendemus D
 ipsi E æqualem esse, si igitur F superat D , ipsam quoque E
 superabit; & si æqualis, æqualis; & si minor, minor. at-
 que est F quidem ipsius C multiplex; $D E$ vero aliæ utcun-
 que æque multiplices ipsarum $A B$. ergo ^b ut C ad A , ita
 erit C ad B . Æquales igitur ad eandem, eandem habent
 proportionem, & eadem ad æquales. Quod ostendere o-
 portebar.

PROP. VIII. THEOR.

*Inæqualium magnitudinum major ad eandem, majorem ha-
 bet proportionem, quam minor: & eadem ad minorem,
 majorem proportionem habet, quam ad majorem.*

Sint inæquales magnitudines, AB, C , & sit AB major. sit
 alia vero utcunque D . Dico AB ad D majorem habere pro-
 portionem quam C ad D . & D ad C majorem habere pro-
 portionem quam ad AB . Quoniam AB major est quam C ,
 ponatur ipsi C æqualis $B E$, hoc
 est AB excedat C per AE . itaque
 4. Def. AE aliquoties multiplicata ma-
 hujus. jor erit quam D . multiplicetur
 AE quoad fiat major quam D .
 fitque ipsius multiplex FG ipsa D
 major. quotuplex autem est FG
 ipsius AE , totuplex fiat GH ipsius
 EB , & K ipsius C . sumatur etiam
 ipsius D dupla quidem L , tripla P ,
 & sic deinceps una amplius, quo-
 ad ea quæ sumitur multiplex ip-
 sius D , fiat prima quæ sit major
 quam K ; sit illa N . sitque M mul-
 tiplex ipsius D proxime minor
 quam N . quoniam itaque N pri-
 ma multiplex est ipsius D quæ
 major est quam K ; erit M non ma-
 jor quam K , hoc est K non erit minor quam M . & cum
 æque multiplex sit FG ipsius AE ac GH ipsius EB . erit FG
 7. hujus. æque multiplex AE ac FH ipsius AB . æque autem multi-
 plex est FG ipsius AE ac K ipsius C , ergo FH æque multi-
 plex est AB , ac K ipsius C ; hoc est FH, K ipsarum AB & C
 sunt




sunt æque multiplices. rursus quoniam GH æque multiplex est ipsius EB ac K ipsius C , estque EB æqualis C , erit & GH ipsi K æqualis. sed K non minor est quam M . non igitur GH minor erit quam M , sed est FG major quam D , ergo tota ^{hujus.} FH major erit quam M & D . sed M & D simul sunt æquales ipsi N , quia M est multiplex ipsius D ipsi N proxime minor, quare FH major erit quam N . unde cum FH superat N , K vero ipsam N non superat, & sunt FH & K æque multiplices ipsarum AB & C , & est N ipsius D alia multiplex, ergo dAB ^{7. Defin.} ad D majorem rationem habebit quam C ad D . Dico præ-^{hujus.} terea & D ad C majorem habere proportionem, quam D ad AB . iisdem enim constructis similiter ostendemus N superare K , ipsam vero FH non superare. atque est N multiplex ipsius D , & FH K aliæ utcunque ipsarum AB C æque multiplices. ergo D ad C majorem proportionem habet ^{4.} quam D ad AB . Inæqualium igitur magnitudinum major ad eandem majorem habet proportionem, quam minor: & eadem ad minorem, majorem proportionem habet, quam ad majorem. Quod ostendere oportebat.

PROP. IX. THEOR.

Quæ eandem proportionem habent ad eandem, inter se sunt æquales; & ad quas eadem, eandem habet proportionem, ipsæ etiam inter se sunt æquales.

Habeat enim utraque ipsarum A B ad C eandem proportionem. Dico A ipsi B æqualem esse. Nam si non esset æqualis, non haberet ^a utraque ipsarum A B ad eandem, eandem proportionem. habet autem. æqualis igitur est A ipsi B . Habeat rursus C ad utramque ipsarum A B eandem proportionem. Dico A æqualem esse ipsi B . nisi enim ita sit, non ^a habebit C ad utramque A B eandem proportionem. habet autem. ergo A ipsi B necessario est æqualis. Quæ igitur ad eandem, eandem proportionem habent, æquales inter se sunt: & ad quas eadem, eandem habet proportionem, ipsæ inter se sunt æquales. Quod demonstrare oportebat.




PROP.

PROP. X. THEOR.

Magnitudinum proportionem habentium ad eandem, quæ majorem proportionem habet, illa major est; ad quam vero eadem majorem habet proportionem, illa minor est.


Habeat enim A ad C majorem proportionem, quam B ad C. Dico A quam B majorem esse. Si enim non est major, vel æqualis est, vel minor. æqualis autem non est A ipsi B utraque enim ipsarum A B ad C eandem haberet ^a proportionem. atqui eandem non habet. non est igitur A ipsi B æqualis. sed neque minor est quam B, haberet ^b enim A ad C minorem proportionem, quam B. atqui non habet minorem. non igitur A minor est, quam B. ostensum autem est neque esse æqualem. ergo A quam B major erit. Habeat rursus C ad B majorem proportionem quam C ad A. Dico B minorem esse quam A. Si enim non est minor, vel æqualis est, vel major. æqualis utique non est A ipsi A, etenim C ad utramque ipsarum A B eandem proportionem ^a haberet. non habet autem. ergo A ipsi B non est æqualis. sed neque major est B quam A, haberet enim C ad B minorem ^b proportionem quam ad A. atqui non habet. non est igitur B major quam A. ostensum autem est neque æqualem esse. ergo B minor erit quam A. Ad eandem igitur proportionem habentium, quæ majorem proportionem habet, illa major est; & ad quam eadem majorem habet proportionem, illa minor est. Quod oportebat demonstrare.



PROP. XI. THEOR.

Quæ eidem eadem sunt proportionēs, & inter se eadem sunt.

Sint enim ut A ad B ita C ad D: ut autem C ad D ita E ad F. Dico ut A ad B, ita esse E ad F. Sumantur enim ipsa-




rum quidem A C E æque multiplices G H K; ipsarum vero B D F aliæ utcunque æque multiplices L M N. Quoniam igitur

tur est ut A ad B, ita C ad D, & sumptæ sunt ipsarum A C æque multiples G H, & ipsarum B D aliæ utcumque æque multiples L M; si ^a G superat L, & H ipsam M superabit; & si æqualis, æqualis; & si minor minor. rursus quoniam est ut C ad D, ita E ad F, & sumptæ sunt ipsarum C E æque multiples H K, ipsarum vero D F aliæ utcumque æque multiples M N; si ^a H superat M, & K ipsam N superabit; & si æqualis, æqualis; & si minor, minor. sed si H superat M, & G superabit L; & si æqualis, æqualis; & si minor, minor; quare si G superat L, & K ipsam N superabit; & si æqualis, æqualis; & si minor, minor. & sunt G K quidem ipsarum A E æque multiples; L N vero ipsarum B F aliæ utcumque æque multiples. ergo ^a ut A ad B, ita erit E ad F. Quæ igitur eidem eadem sunt proportionales, & inter se eadem sunt. Quod ostendisse oportuit.

PROP. XII. THEOR.

Si quotcunque magnitudines proportionales fuerint; ut una antecedentium ad unam consequentium, ita erunt antecedentes omnes ad omnes consequentes.

Sint quotcunque magnitudines proportionales A B C D E F, & ut A ad B, ita sit C ad D, & E ad F. Dico ut A ad B, ita esse A C E ad B D F. Sumantur enim ipsarum A C E æ-




que multiples G H K, & ipsarum B D F aliæ utcumque æque multiples L M N. Quoniam igitur ut A ad B, ita est C ad D, & E ad F, & sumptæ sunt ipsarum quidem A C E æque multiples G H K, ipsarum vero B D F aliæ utcumque æque multiples L M N; si ^a G superat L, & H ipsam M superabit, & K ipsam N; & si æqualis, æqualis; & si minor, minor. quare & si G superat L, superabunt & G H K ipsas L M N; & si æqualis, æquales; & si minor, minores. suntque G, & G H K ipsarum A, & A C E æque multiples; quoniam si fuerint quotcunque magnitudines quotcunque magnitudinum, æqualium numero, singulæ singularum æque multiples; quotuplex est una magnitudo unius, totuplex ^b e-^b i. hujus. rant & omnes omnium. Et eadem ratione L & L M N ipsarum B, & B D F sunt æque multiples. est igitur ^a ut A ad B,

A C E ad B D F. Quare si quotcunque magnitudines proportionales fuerint, ut una antecedentium ad unam consequentium, ita erunt antecedentes omnes ad omnes consequentes. Quod demonstrare oportebat.

PROP. XIII. THEOR.

Si prima ad secundam eandem habeat proportionem quam tertia ad quartam, tertia autem ad quartam maiorem proportionem habet quam quinta ad sextam; & prima ad secundam maiorem habebit proportionem quam quinta ad sextam.

Prima enim A ad secundam B eandem proportionem habeat quam tertia C ad quartam D, tertia autem C ad quartam D maiorem habeat proportionem quam quinta E ad sextam F. Dico & primam A ad secundam B maiorem proportionem



habere, quam quinta E ad sextam F. Quoniam enim C ad D maiorem proportionem habet quam E ad F, sunt quædam ipsarum C & E æque multiples, & ipsarum D & F aliæ utcunque æque multiples; & multiplex quidem C superat multiplicem D; multiplex vero E non superat multiplicem F. Sumantur; & sint ipsarum C & E æque multiples G H, & ipsarum D & F aliæ utcunque æque multiples K L, ita ut G quidem superet K, H vero ipsam L non superet: & quotuplex est G ipsius C, totuplex sit & M ipsius A; quotuplex autem K ipsius D, totuplex sit & N ipsius B. & quoniam est ut A ad B ita C ad D, & sumptæ sunt ipsarum A C æque multiples M G, & ipsarum B D aliæ utcunque æque multiples N K: si ^b M superat N, & G ipsam K superabit; & si æqualis, æqualis; & si minor, minor. sed G superat K. ergo & M ipsam N superabit. H vero non superat L. suntque M H ipsarum A E æque multiples, & N L ipsarum B F aliæ utcunque æque multiples. ergo A ad B maiorem proportionem habebit quam E ad F. Si igitur prima ad secundam eandem habeat proportionem quam tertia ad quartam; tertia vero ad quartam maiorem proportionem habeat quam quinta ad sextam: & prima ad secundam maiorem habebit proportionem quam quinta ad sextam. Quod ostendere oportebat.

a 7. Def. hujus.


b 5. Def. hujus.

PROP.

PROP. XIV. THEOR.

Si prima ad secundam eandem habeat proportionem quam tertia ad quartam; prima autem major sit quam tertia; & secunda quam quarta major erit; & si æqualis, æqualis; & si minor, minor.


Prima enim A ad secundam B eandem proportionem habeat quam tertia C ad quartam D: major autem sit A quàm C. Dico & B quam D majorem esse. Quoniam enim A major est quam C, & alia est utcunque magnitudo B, habebit A ad B majorem proportionem quàm C ad B; sed ut A ad B ita C ad D. ergo & C ad D majorem habebit proportionem quàm C ad B. ad quam vero eadem majorem proportionem habet, illa minor est. quare D est minor quàm B, ac propterea B quam D major erit. similiter demonstrabimus & si A æqualis sit ipsi C, & B ipsi D esse æqualem; & si A sit minor quam C, & B quàm D minorem esse. Si igitur prima ad secundam eandem habeat proportionem quam tertia ad quartam; prima autem major sit quàm tertia, & secunda quàm quarta major erit; & si æqualis, æqualis; & si minor, minor. Quod demonstrare oportebat.



PROP. XV. THEOR.

Partes inter se comparata eandem habent proportionem, quam habent earum aque multiplices.

Sit enim AB æque multiplex C, ac DE ipsius F. Dico ut C ad F, ita esse AB ad DE. Quoniam enim æque multiplex est AB ipsius C, ac DE ipsius F; quot magnitudines sunt in AB æquales ipsi C, totidem erunt & in DE æquales F. Dividatur AB in magnitudines ipsi C æquales, quæ sint AG GH HB; & DE dividatur in magnitudines æquales F, videlicet in DK KL LE; erit igitur ipsarum AG GH HB multitudo æqualis multitudini DK KL LE. & quoniam æquales sunt AG GH HB, suntque DK KL LE.



- ^a 7. hujus. LE inter se æquales; ut AG ad DK, ita ^a erit GH ad KL, &
^b 12. hujus. HB ad LE. atque erit ^b ut una antecedentium ad unam
 consequentium, ita omnes antecedentes ad omnes conse-
 quentes: est igitur ut AG ad DK, ita AB ad DE. sed AG
 ipsi C est æqualis, & DK ipsi F. ergo ut C ad F, ita erit AB
 ad DE. Partes igitur inter se comparatæ eandem habent
 proportionem quam habent earum æquæ multiples. Quod
 ostendendum fuit.

PROP. XVI. THEOR.

Si quatuor magnitudines proportionales fuerint, & permutata proportionales erunt.

Sint quatuor magnitudines proportionales A B C D, sit-
 que ut A ad B, ita C ad D. Dico & permutatas proportio-
 nales esse, videlicet ut A ad C, ita esse B ad D. Sumantu
 enim ipsarum qui- **E** ————— **G** —————
 dem A B æque mul- **A** ————— **C** —————
 tiplices E F, ipsarum **B** ————— **D** —————
 vero C D aliæ utcun- **F** ————— **H** —————
 que æque multipli-
 ces G H. Et quoniam


- æque multiplex est E ipsius A, ac F ipsius B: partes autem
^a 15. hujus. inter se comparatæ eandem habent ^a proportionem quam
 habent earum æque multiples; erit ut A ad B ita E ad F.
^b 11. hujus. ut autem A ad B ita C ad D. ergo & ut C ad D ita ^b E ad F.
 rursus quoniam G H sunt ipsarum C D æque multiples,
 partes autem inter se comparatæ eandem habent proportio-
 nem, quam habent earum æque multiples; erit ^a ut C ad D
 ita G ad H. sed ut C ad D ita E ad F. ergo ^b & ut E ad F
 ita G ad H. quod si quatuor magnitudines proportionales
^c 14. hujus. sint, prima autem major sit quàm tertia; ^c & secunda quam
 quarta major erit; & si æqualis, æqualis; & si minor, mi-
 nor. si igitur E superat G, & F ipsam H superabit; & si æ-
 qualis, æqualis; & si minor, minor; suntque E F ipsarum
 A B æque multiples, & G H ipsarum C D aliæ utcunque
^d 5. Def. hujus. æque multiples, ergo ^d ut A ad C ita B ad D. Si igitur qua-
 tuor magnitudines proportionales fuerint, & permutatæ
 proportionales erunt. Quod ostendere oportebat.

PROP. XVII. THEOR.

Si compositæ magnitudines sint proportionales, & divisæ proportionales erunt.

Sint compositæ magnitudines proportionales AB BE CD DF. Hoc est ut AB ad BE, ita sit CD ad DF. Dico etiam divisas proportionales esse, videlicet ut AE ad EB ita esse CF ad FD. Sumantur enim ipsarum quidem AE EB CF FD

æque multiples GH HK LM MN, ipsarum vero EB FD aliæ utcumque æque multiples KX NP. Quoniam æque multiplex est GH ipsius AE, ac HK ipsius EB; erit æ GH ipsius AE æque multiplex, ac GK ipsius AB. æque autem multiplex est GH ipsius AE, ac LM ipsius CF. ergo GK æque multiplex est AB, ac LM ipsius CF. rursus quoniam æque multiplex est LM ipsius CF, ac MN ipsius FD; erit æ LM æque multiplex CF, ac LN ipsius CD. sed æque multiplex erat LM ipsius CF, ac GK ipsius AB. æque igitur multiplex est GK ipsius AB, ac LN ipsius CD. quare GK LN ipsarum AB CD æque multiples erunt. rursus quoniam æque multiplex est HK ipsius EB, ac MN ipsius FD: est autem & KX ipsius EB æque multiplex, ac NP ipsius FD; & composita HX ipsius EB æque multiplex est ac MP ipsius FD. quare cum sit



a. 1. hujus.

ut AB ad BE, ita CD ad DF; & sumptæ sint ipsarum quidem AB CD æque multiples GK LN, ipsarum vero EB FD aliæ utcumque æque multiples HX MP: si GK superat HX, & LN superabit MP; & si æqualis, æqualis; & si minor, minor. superet igitur GK ipsam HX, communique ablata HK, & GH ipsam KX superabit. sed si GK superat HX, & LN superat MP: itaque superat LN ipsam MP: communique MN ablata, & LM superabit NP. quare si GH superat KX, & LM ipsam NP superabit. similiter demonstrabimus & si GH sit æqualis KX, & LM ipsi NP esse æqualem; & si minor, minorem. sunt autem GH LM ipsarum AE CF æque multiples, & ipsarum EB FD aliæ utcumque æque multiples KX NP. ergo ut AE ad EB ita erit CF ad FD. Si igitur compositæ magnitudines sint proportionales, & divisæ proportionales erunt. Quod demonstrare oportebat.

b. 2. hujus.
c. 3. Def. hujus.

PROP. XVIII. THEOR.

Si divisæ magnitudines sint proportionales, & compositæ proportionales erunt.


Sint divisæ magnitudines proportionales AE EB CF FD : hoc est ut AE ad EB , ita CF ad FD . Dico etiam compositas proportionales esse, videlicet ut AB ad BE , ita esse CD ad DF . Si enim non est ut AB ad BE , ita CD ad DF ; erit ut AB ad BE , ita CD vel ad minorem quàm FD , vel ad majorem. sit primo ad minorem, nempe ad DG . & quoniam est ut AB ad BE , ita CD ad DG , compositæ magnitudines sunt proportionales; ergo & divisæ proportionales erunt ^a. est igitur ut AE ad EB , ita CG ad GD . ponitur autem ut AE ad EB , ita CF ad FD . quare & ^b ut CG ad GD , ita CF ad FD . at CG prima major est quam tertia CF . ergo & secunda DG quàm quarta DF major ^c erit. sed & minor, quod fieri non potest. Non igitur est ut AB ad BE , ita CD ad DG . similiter ostendemus neque esse ad majorem quàm DF . ad ipsam igitur DF sit necesse est. Quare si divisæ magnitudines sint proportionales, & compositæ proportionales erunt. Quod oportebat demonstrare.



PROP. XIX. THEOR.

Si fuerit ut tota ad totam, ita ablata ad ablatam: & reliqua ad reliquam erit ut tota ad totam.

Sit enim ut tota AB ad totam CD , ita ablata AE ad ablatam CF . Dico & reliquam EB ad reliquam FD ita esse ut tota AB ad totam CD . Quoniam enim est ut tota AB ad totam CD , ita ^a AE ad CF . & permutando erit ut AB ad AE , ita CD ad CF . quoniam vero compositæ magnitudines sunt proportionales, & divisæ proportionales erunt ^b, ut igitur BE ad EA , ita DF ad FC : rursusque permutando ut ^c BE ad DF , ita EA ad FC . sed ut AE ad CF , ita posita est AB ad CD . & reliqua ^a igitur EB erit ad reliquam FD , ut tota AB ad totam CD . Quare si fuerit ut tota ad totam, ita ablata ad ablatam: & reliqua ad reliquam erit ut tota ad totam. Quod demonstrare oportebat.



Cor. Si quatuor magnitudines proportionales sint, per conversionem rationis proportionales erunt. Sit enim ut AB ad BE, ita CD ad DF, erit permutando AB ad CD, ita BE ad DF. quare cum est tota AB ad totam CD, ut ablata BE ad ablatam DF, erit & reliqua AE ad reliquam CF, ut tota AB ad totam CD. quare rursus permutando & invertendo erit ut AB ad AE, ita CD ad CF. quod est per conversionem rationis ^d *.

d 17. Def.
hujus,

PROP. XX. THEOR.

Si sint tres magnitudines, & alia ipsis numero æquales, quæ binæ sumantur in eadem proportionē; ex æquali autem prima major sit, quam tertia; & quarta quàm sexta major erit; & si æqualis, æqualis; & si minor, minor.

Sint tres magnitudines A B C, & aliæ ipsis numero æquales D E F binæ sumptæ sint in eadem proportionē; sitque

ut A ad B, ita D ad E, & ut B ad C, ita E ad F; ex æquali autem major sit A quàm C.

Dico & D quàm F majorem esse; & si æqualis, æqualem; & si minor, minorem.

Quoniam enim A major est quàm C, alia vero est utcunque B, & major ad eandem majorem habet ^a proportionem quàm minor; habebit A ad B majorem proportionem

quàm C ad B. fed ut A ad B, ita D ad E; & invertendo ut C ad B, ita F ad E. ergo &


D ad E majorem habet proportionem quàm F ad E. ad eandem vero proportionem habentium, quæ majorem habet proportionem,

illa major ^b est. major igitur est D quàm F.

similiter ostendemus & si A sit æqualis C, & D ipsi F æqualem esse; & si minor, minorem.

Si igitur tres magnitudines fuerint, & aliæ ipsis numero æquales, quæ binæ sumantur, & in eadem

proportionē: ex æquali autem prima major sit quàm tertia; & quarta quàm sexta major erit; & si æqualis, æqualis; & si minor, minor. Quod ostendere oportebat.




* Hæc est magis legitima Demonstratio Conversionis rationis. Si sit AB ad BE ut CD ad DF, erit, dividendo, AE ad BE ut CF ad DF: & invertendo, ut BE ad AE ita DF ad CF: & componendo, erit AB ad AE ut CD ad CF: quod est per Conversionem Rationis.

PROP. XXI. THEOR.

Si sint tres magnitudines, & alia ipsis numero æquales, quæ bina sumantur & in eadem proportionē; sit autem perturbata earum analogia, & ex æquali prima major sit quam tertia: & quarta quam sexta major erit; & si æqualis, æqualis; & si minor, minor.

Sint tres magnitudines $A B C$, & aliæ ipsis numero æquales $D E F$, binæ sumptæ & in eadem proportionē. Sit autem perturbata earum analogia, videlicet ut A quidem ad B , ita E ad F ; ut vero B ad C , ita D ad E ; & ex æquali A major sit quam C . Dico & D quam F majorem esse; & si æqualis, æqualem; & si minor, minorem. Quoniam enim major est A quam C , alia vero est B ; habebit A ad B majorem proportionem quam C ad B . sed ut A ad B , ita E ad F : & invertendo ut C ad B , ita E ad D . quare & E ad F majorem habebit proportionem quam E ad D . ad quam vero eadem majorem proportionem habet illa minor est F . minor igitur est F quam D ; ac propterea D quam F major erit. similiter ostendemus & si A sit æqualis C , & D ipsi F esse æqualem; & si minor, minorem. Si igitur sint tres magnitudines, & aliæ ipsis æquales numero, quæ binæ sumantur & in eadem proportionē; sit autem perturbata earum analogia, & ex æquali autem prima major sit quam tertia: & quarta quam sexta major erit; & si æqualis, æqualis; & si minor, minor. Quod demonstrare oportebat.




PROP. XXII. THEOR.

Si sint quotcunque magnitudines, & alia ipsis numero æquales, quæ bina sumantur in eadem proportionē: & ex æquali in eadem proportionē erunt.

Sint quotcunque magnitudines $A B C$, & aliæ ipsis numero æquales $D E F$, binæ sumptæ in eadem proportionē, hoc est ut A quidem ad B , ita D ad E , ut autem B ad C , ita E ad F . Dico & ex æquali in eadem proportionē esse, ut A ad C , ita D ad F . Sumantur enim ipsarum quidem $A D$ æque multiplices $G H$; ipsarum vero $B E$ aliæ utcunque æque multi-
plices

plices KL, & ipsarum CF aliæ utcumque æque multiples

MN. Quoniam igitur est ut A ad B, ita D ad E, & sumptæ sunt ipsarum A D æque multiples G H, & ipsarum B E aliæ utcumque æque multiples K L; erit ut ^a G ad K, ita H ad L. eadem quoque ratione erit ut K ad M, ita L ad N. & cum sint tres magnitudines G K M, & aliæ ipsis numero æquales H L N, binæ sumptæ & in eadem proportionē; ex æquali ^b si G superat M, & H ipsam N superabit; & si æqualis, æqualis; & si minor, minor. suntque G H ipsarum A D æque multiples, & M N ipsarum C F aliæ utcumque æque multiples. ut igitur A ad C, ita erit ^c D ad F.



^a 4. hujus.

^b 20. hujus.


^c 5. Defin. hujus.

Quare si sint quotcumque magnitudines, & aliæ ipsis numero æquales, quæ binæ sumantur in eadem proportionē: & ex æquali in eadem proportionē erunt. Quod demonstrare oportebat.

PROP. XXIII. THEOR.

Si sint tres magnitudines, & alia ipsis numero æquales, quæ binæ sumantur in eadem proportionē; sit autem perturbata earum analogia: & ex æquali in eadem proportionē erunt.

Sint tres magnitudines A B C, & aliæ ipsis numero æquales, binæ sumptæ in eadem proportionē, D E F, sit autem perturbata earum analogia, hoc est sit ut A ad B, ita E ad F, & ut B ad C, ita D ad E. Dico ut A ad C, ita esse D ad F. Sumantur ipsarum quidem A B D æque multiples G H L: ipsarum vero C E F aliæ utcumque æque multiples K M N. Et quoniam G H æque multiples sunt ipsarum A B, partes autem eandem habent proportionem quam habent æque



H 4

ipsa-


- a 15. hujus. ipsarum multiples: erit ^a ut A ad B, ita G ad H. & simili ratione ut E ad F, ita M ad N. atque est ut A ad B, ita E ad F.
 b 11. hujus. F. ut ^b igitur G ad H, ita M ad N. rursus quoniam est ut B ad C ita D ad E, & sumptæ sunt ipsarum B D æque multiples H L, ipsarum vero C E aliæ utcumque æque multiples K M: erit
 c 4. hujus. ut H ad K, ita L ad M. ostensum autem est & ut G ad H, ita esse M ad N. quoniam igitur tres magnitudines proportionales sunt G H K, & aliæ ipsis numero æquales L M N, binæ sumptæ in eadem proportionem, estque ipsarum perturbata analogia; ex æquali, si ^a G superat K, & L ipsam N superabit; & si æqualis, æqualis; & si minor, minor. sunt autem G L ipsarum A D æque multiples: & K N æque multiples ipsarum C F. ut igitur ^a A ad C, ita erit D ad F. Quare si fuerint tres magnitudines, & aliæ ipsis numero æquales, quæ binæ sumantur in eadem proportionem, sit autem perturbata earum analogia: & ex æquali in eadem proportionem erunt. Quod demonstrare oportebat.

PROP. XXIV. THEOR.

Si prima ad secundam eandem habeat proportionem, quam tertia ad quartam; habeat autem & quinta ad secundam proportionem eandem, quam sexta ad quartam: & composita prima cum quinta ad secundam eandem proportionem habebit, quam tertia cum sexta ad quartam.

Prima AB ad secundam C eandem habeat proportionem, quam tertia DE ad quartam F; habeat autem & quinta BG ad secundam C proportionem eandem quam sexta EH ad quartam F: Dico & compositam primam cum quinta AG ad secundam C eandem proportionem habere, quam tertiam cum sexta DH ad quartam F. Quoniam enim est ut BG ad C, ita EH ad F; erit invertendo ut C ad BG, ita F ad EH. & quoniam ut AB ad C, ita est DE ad F: ut autem C ad BG, ita

- a 22. hujus. F ad EH; erit ^a ex æquali ut AB ad BG, ita DE ad EH. quod cum divisæ magnitudines sint proportionales, & compositæ proportionales ^b erunt. ut igitur AG ad GB, ita est DH ad HE. sed &
 c hypoth. ut ^c GB ad C, ita HE ad F. ergo, ex ^a æquali, ut AG ad C, ita erit




erit DH ad F . Si igitur prima ad secundam eandem habeat proportionem quàm tertia ad quartam: habeat autem & quinta ad secundam proportionem eandem quam sexta ad quartam: & composita prima cum quinta ad secundam eandem proportionem habebit quam tertia cum sexta ad quartam. Quod ostendere oportebat.

PROP. XXV. THEOR.

Si quatuor magnitudines fuerint proportionales, maxima ipsarum & minima, duabus reliquis majores erunt.

Sint quatuor magnitudines proportionales AB, CD, E, F ; & sit ut AB ad CD , ita E ad F . sit autem maxima ipsarum AB , & F minima. Dico AB & F ipsis CD & E majores esse. Ponatur enim ipsi quidem E æqualis AG , ipsi vero F æqualis CH . Quoniam igitur est ut AB ad CD , ita E ad F : estque AG æqualis E , & CH æqualis F ; erit ut AB ad DC , ita AG ad CH . & quoniam est ut tota AB ad totam CD , ita ablata AG ad ablatam erit CH ; & reliqua GB ad reliquam HD * ut tota AB ad CD totam. major autem est AB quam CD . ergo & GB quam HD major erit. quod cum AG sit æqualis ipsi E , & CH ipsi F ; erunt AG & F ipsi CH & E æquales. † si autem inæqualibus æqualia addantur, tota inæqualia erunt. ergo GB HD inæqualibus existentibus, quippe cum GB sit major, si ipsi quidem GB addantur AG & F , ipsi vero HD addantur CH & E : fient AB & F , ipsis CD & E necessario majores. Si igitur quatuor magnitudines fuerint proportionales, maxima ipsarum & minima, duabus reliquis majores erunt. Quod demonstrare oportebat.



* 19. hujus;

† 4. Ax. primi.

EUCLIDIS

ELEMENTORUM

LIBER SEXTUS.

DEFINITIONES.


I.

Similes figuræ rectilineæ sunt quæ & singulos angulos æquales habent, & circa æquales angulos latera proportionalia.



II.

Reciprocae figuræ sunt quando in utraque figura antecedentes, & consequentes rationum fuerint termini.




III.

Extrema ac media ratione secari recta linea dicitur, quando fit ut tota ad majus segmentum, ita majus segmentum ad minus.

IV.

IV.

Altitudo cuiusque figuræ est linea perpendicularis, quæ à vertice ad basim ducitur.



V.


Ratio ex rationibus componi dicitur, quando rationum quantitates inter se multiplicatæ, aliquam efficiunt rationem.

PROPOSITIO I.

THEOREMA.


Triangula, & parallelogramma quæ eandem habent altitudinem, inter se sunt ut bases.

Sint triangula quidem ABC ACD , parallelogramma vero EC CF , quæ eandem habent altitudinem, videlicet perpendicularem à puncto A ad BD ductam. Dico ut basis BC ad CD basim, ita esse triangulum ABC ad triangulum ACD , & parallelogrammum EC ad CF parallelogrammum. Producat BD ex utraque parte ad puncta HL , & ipsi quidem BC basi æquales quotcunque ponantur BG GH , ipsi vero basi CD ponantur quotcunque æquales DK KL , & AG AH AK jungantur. Quoniam igitur CB BG GH inter se æquales sunt, erunt & triangula AHG AGB ABC inter se æqualia. ergo quotuplex est basis HC ipsius BC ^{38. primi.} basis, totuplex est AHC triangulum trianguli ABC . eadem ratione quotuplex est LC basis ipsius basis CD , totuplex est & triangulum ALC ipsius ACD trianguli: & si æqualis est HC basis basi CL , & triangulum AHC triangulo ALC est æquale: & si basis HC basim CL superat, & triangulum AHC superabit triangulum ALC : & si minor, minus. quatuor igitur magnitudinibus existentibus, videlicet duabus basibus BC CD , & duobus triangulis ABC ACD , sumpta sunt æque multiplicia basis quidem BC , & ABC , trianguli



vide-

videlicet basis HC , & AHC triangulum: basis vero CD & trianguli ACD , alia utcumque æque multiplicia, nempe CL basis, & ALC triangulum; atque ostensum est si HC basis basim CL superat, & triangulum AHC superare triangulum ALC ; & si æqualis, æquale; & si minor, minus. est igitur ut BC basis ad basim CD , ita triangulum ABC ad ACD triangulum. Et quoniam trianguli



6 Def. 5.
quinti.

e 41. primi.

d 15. quinti.

e 11. quinti.

ABC duplum est e parallelogrammum EC , & trianguli ACD parallelogrammum FC duplum e, partes d autem cum pariter multiplicibus eandem inter se proportionem habent: igitur ut ABC triangulum ad triangulum ACD , ita parallelogrammum EC ad CF parallelogrammum. quoniam igitur ostensum est ut basis BC ad CD basim, ita esse ABC triangulum ad triangulum ACD ; ut autem ABC triangulum ad triangulum ACD , ita parallelogrammum EC ad CF parallelogrammum; erit e ut BC basis ad basim CD , ita parallelogrammum EC ad FC parallelogrammum. Quare triangula & parallelogramma quæ eandem habent altitudinem, inter se sunt ut bases. Quod demonstrare oportebat.

PROP. II. THEOR.

Si uni laterum trianguli parallela quadam recta linea ducta fuerit, proportionaliter secabit ipsius trianguli latera. & si trianguli latera proportionaliter secta fuerint, quæ sectiones conjungit recta linea, reliquo trianguli lateri parallela erit.

Trianguli enim ABC uni laterum BC , parallela ducatur DE . Dico ut BD ad DA , ita esse CE ad EA . Jungantur BE CD .

e 37. primi.

b 7. quinti.


e 1. hujus.

d 11. quinti.

Triangulum igitur BDE triangulo CDE est e æquale, in eadem enim sunt basi DE , & in eisdem DE & BC parallelis; aliud autem triangulum est ADE : sed æqualia ad idem eandem habent b proportionem; ergo ut triangulum BDE ad triangulum ADE , ita est CDE triangulum ad triangulum ADE . ut autem triangulum BDE ad triangulum ADE , ita e est BD ad DA ; nam cum eandem altitudinem habent, videlicet perpendiculararem à puncto E ad AB ductam, inter se sunt ut bases. & ob eandem causam ut CDE triangulum ad triangulum ADE , ita CE ad EA . & igitur ut BD ad DA , ita est d CE ad EA . Et si trianguli ABC latera AB AC pro-

proportionaliter secta sunt, *i. e.* ut BD ad DA, ita sit CE ad EA; jungatur DE. Dico DE ipsi BC parallelam esse. Iisdem constructis, quoniam est

ut BD ad DA, ita CE ad EA; ut autem BD ad DA, ita est BDE triangulum ad triangulum ADE; & ut CE ad EA, ita CDE triangulum ad triangulum ADE, erit ut triangulum BDE ad triangulum ADE, ita CDE triangulum ad triangulum ADE. quod cum utrumque triangulorum BDE CDE ad triangulum ADE eandem habeat proportionem; erit BDE triangulum / triangulo CDE æquale; & sunt in eadem basi



• 11. quinti.

f 9. quinti.


DE. æqualia autem triangula, & in eadem basi constituta, etiam in eisdem sunt parallelis. ergo 39. primi. DE ipsi BC parallela est. Si igitur uni laterum trianguli parallela quædam recta linea ducta fuerit, proportionaliter secabit ipsius trianguli latera. & si trianguli latera proportionaliter secta fuerint, quæ sectiones conjungit recta linea reliquo trianguli lateri parallela erit. Quod oportebat demonstrare.

PROP. III. THEOR.

Si trianguli angulus bifariam secetur, secans autem angulum recta linea secet etiam basim; basis partes eandem proportionem habebunt, quam reliqua trianguli latera. & si basis partes eandem proportionem habeant, quam reliqua trianguli latera; qua à vertice ad sectionem ducitur recta linea, trianguli angulum bifariam secabit.

Sit triangulum ABC, & secetur angulus BAC bifariam 44 9. primi. recta linea AD. Dico ut BD ad CD, ita esse BA ad AC. Du-

catur per C ipsi DA parallela CE, & producta BA conveniat cum ipsa in E puncto. Quoniam igitur in parallelas AD EC incidit recta linea quædam AC, erit ACE angulus angulo CAD æqualis. sed CAD angulus ponitur æqualis angulo BAD. ergo & BAD ipsi ACE angulo æqualis erit. rursus quoniam in parallelas AD EC recta




• 31. primi.

• 29. primi.

linea

- linea BAE incidit, exterior angulus BAD æqualis est interiori AEC. ostensus autem est & angulus ACE angulo BAD æqualis. ergo & ACE ipsi AEC æqualis erit: ac propterea
 d 6. primi. latus AE æquale lateri AC. & quoniam uni laterum trianguli BCE, videlicet ipsi EC
 e 2. hujus. parallela ducta est AD; erit
 ut BD ad DC, ita BA ad AE;
 æqualis autem est AE ipsi AC.
 f 7. quinti. est igitur sicut BD ad DC, ita BA ad AC. Et si sit ut BD ad DC, ita BA ad AC, & AD jungatur. Dico angulum BAC bifariam sectum esse recta linea AD. Iisdem enim constructis, quoniam est ut BD ad DC, ita AB ad AC; sed & ut
 g 2. hujus. BD ad DC, ita g BA ad AE, etenim uni laterum trianguli
 h 11. quinti. BCE, videlicet ipsi EC parallela ducta est AD, erit h & ut
 i 9. quinti. BA ad AC, ita BA ad AE. ergo AC est i æqualis AE, ac
 k 5. primi. propterea & angulus AEC angulo ACE æqualis. sed angulus quidem AEC est æqualis angulo exteriori BAD; angulus vero ACE æqualis l alterno CAD. quare & BAD angulus ipsi CAD æqualis erit. angulus igitur BAC bifariam sectus est recta linea AD. Ergo si trianguli angulum bifariam secetur, secans autem angulum recta linea etiam basim secet; basis partes eandem proportionem habebunt, quam reliqua trianguli latera. & si basis partes eandem proportionem habent, quam reliqua trianguli latera; quæ à vertice ad sectionem ducitur recta linea, trianguli angulum bifariam secabit. Quod oportebat demonstrare.




PROP. IV. THEOR.

Æquiangulorum triangulorum latera quæ circum æquales angulos sunt, proportionalia sunt. & homologa, sive ejusdem rationis sunt latera quæ æqualibus angulis subtenduntur.

- Sint æquiangula triangula ABC DCE, quæ angulum quidem ABC angulo DCE, angulum vero ACB angulo DEC æqualem habeant, & præterea angulum BAC angulo CDE. Dico triangulorum ABC DCE proportionalia esse latera quæ sunt circa æquales angulos; & homologa, sive ejusdem rationis latera esse quæ æqualibus angulis subtenduntur. Ponatur BC in directum ipsi CE. Et quoniam
 a 17. primi. anguli ABC ACB duobus rectis minores sunt, æqualis autem est angulus ACB angulo DEC; erunt ABC DEC anguli

guli duobus rectis minores. quare BA ED productæ inter se convenient^b; producantur, & convenient in puncto F . ^{b 12. axio.}
& quoniam angulus DCE est æqualis angulo ABC ; erit ^{primi.}


BF ipsi DC parallela. rursus quoniam æqualis est angulus ACB angulo DEC , parallela erit AC ipsi FE . parallelogrammum igitur est $FACD$; ac propterea FA quidem ipsi CD , AC vero ipsi FD est ^{d æqualis.} & quoniam uni laterum trianguli FBE , videlicet ipsi FE , parallela ducta est AC ; erit ^e ut BA ad AF , ita BC ad CE . æqualis ^{e 2. hujus.} autem est AF ipsi CD . ut igitur f BA ad CD ita BC ad CE . & permutando ut BA ad BC ita CD ad CE . rursus quoniam CD parallela est BF , erit ^e ut BC ad CE , ita FD ad DE . sed FD est æqualis AC . ergo ut f BC ad CE , ita AC ad DE . per- ^{f 7. quinti.} mutando igitur, ut BC ad CA ita CE ad ED . itaque quoniam ostensum est, ut AB ad BC ita DC ad CE , ut autem BC ad g ^{22. quinti.} CA ita CE ad ED : erit g ex æquali; ut BA ad AC ita CD ad DE . *Æquiangulorum igitur triangulorum proportionalia sunt latera quæ circum æquales angulos. & homologa, five ejusdem rationis, latera sunt quæ æqualibus angulis subtenduntur. Quod demonstrare oportebat.*



PROP. V. THEOR.

Si duo triangula latera proportionalia habeant, æquiangula erunt triangula, & æquales habebunt angulos quibus homologa latera subtenduntur.

Sint duo triangula ABC DEF , quæ latera proportionalia habeant, hoc est, sit ut AB quidem ad BC , ita DE ad EF : ut autem BC ad CA , ita EF ad FD : & adhuc ut BA ad AC , ita ED ad DF . Dico triangulum ABC triangulo DEF æquiangulum esse, & æquales habere angulos quibus homologa latera subtenduntur, angulum quidem ABC angulo DEF , angulum vero BCA angulo EFD , & præterea angulum BAC angulo EDF . Constituatur enim ^{a 23. primi.} ad rectam lineam EF , & ad puncta in ipsa EF , angulo quidem ABC æqualis angulus FEG ; angulo autem BCA angulus



b 2. Cor. 32. *gulus EFG. quare reliquus BAC angulus b reliquo EGF est æqualis. ideoque æquiangulum est triangulum ABC triangulo EGF. triangulorum igitur ABC EGF proportionalia sunt latera quæ æqualibus angulis subtenduntur. ergo ut AB ad BC, ita GE ad EF. sed ut AB ad BC, ita DE ad EF. ut*


e 4. hujus.
d 11. quinti.

igitur DE ad EF, ita d GE ad EF. quod cum utraque ipsarum DE EG ad EF eandem

e 9. quinti. proportionem habeat, erit e DE ipse EG æqualis. Eadem ratione & DF æqualis FG. itaque quoniam DE est æqualis EG, communis autem EF;

f 8. primi.

duæ DE EF duabus GE EF æquales sunt, & basis DF basi FG æqualis. angulus igitur DEF est æqualis f angulo GEF, & DEF triangulum æquale triangulo GEF, & reliqui anguli reliquis angulis æqualis, quibus æqualia latera subtenduntur. ergo angulus quidem DEF est æqualis angulo GEF, angulus vero EDF æqualis angulo EGF; & quoniam angulus DEF est æqualis angulo GEF, & angulus GEF angulo ABC, erit & angulus ABC angulo FED æqualis. eadem ratione & angulus ACB æqualis est angulo DFE, & adhuc angulus ad A angulo ad D. ergo ABC triangulum triangulo DEF æquiangulum erit. Si igitur duo triangu-
la latera proportionalia habeant, æquiangula erunt triangu-
la; & æquales habebunt angulos quibus homologa latera subtenduntur. Quod oportebat demonstrare.




PROP. VI. THEOR.

*Si duo triangu-
la unum angulum uni angulo æqualem ha-
beant, circa æquales autem angulos latera proportiona-
lia; æquiangula erunt triangu-
la, & æquales habebunt
angulos quibus homologa latera subtenduntur.*

Sint duo triangu-
la ABC DEF, unum angulum BAC uni
angulo EDF æqualem habentia, circa æquales autem angu-
los latera proportionalia, hoc est, sit ut BA ad AC, ita
ED ad FD. Dico triangulum ABC triangulo DEF æ-
quiangulum esse, & angulum quidem ABC habere æ-
qualem angulo DEF; angulum vero ACB angulo DFE.
e 23. primi. Constituitur e enim ad rectam lineam DF, & ad pun-
cta in ipsa DF, alterutri angulorum BAC EDF æqualis
angulus FDG, angulo autem ACB æqualis DFG. reliquus
igitur

igitur ad B reliquo ad G est $\hat{b}$ æqualis. ergo triangu- $\hat{b}$ 2. Cor. 32.
 lum ABC triangulo DGF æquiangulum est; ac propterea ^{Primi.}
 ut BA ad AC ita $\hat{c}$ est GD ad DF: ponitur autem & ut BA $\hat{c}$ 4. hujus.
 ad AC, ita ED ad DF. ut
 igitur $\hat{d}$ ED ad DF, ita GD
 ad DF. quare ED æqualis
 est $\hat{e}$ ipsi DG, & communis
 DF. ergo duæ ED DF dua-
 bus GD DF æquales sunt
 & angulus EDF angulo
 GDF est æqualis; basis igitur
 EF est $\hat{f}$ æqualis basi FG, triangulumque DEF æquale trian- $\hat{f}$ 4. primi.
 gulo GDF, & reliqui anguli reliquis angulis æquales, alter
 alteri, quibus æqualia latera subtenduntur. ergo angulus
 quidem DFG est æqualis angulo DFE; angulus vero ad G
 angulo ad E. sed angulus DFG æqualis est angulo ACB: &
 angulus igitur ACB angulo DFE est æqualis. ponitur autem
 & BAC angulus æqualis angulo EDF, ergo & reliquus qui
 ad B æqualis $\hat{b}$ est reliquo ad E. æquiangulum igitur est tri-
 angulum ABC triangulo DEF. Quare si duo triangu-
 la unum angulum uni angulo æqualem habeant, circa æquales
 autem angulos latera proportionalia; æquiangula erunt tri-
 angula, & æquales habebunt angulos quibus homologa la-
 tera subtenduntur. Quod ostendere oportebat.



d 11. quinti.

e 9. quinti.

PROP. VII. THEOR.


*Si duo triangu-
 la unum angulum uni angulo æqualem ha-
 beant, circa alios autem angulos latera proportionalia,
 & reliquorum utrumque simul, vel minorem, vel non
 minorem recto: æquiangula erunt triangu-
 la, & æquales
 habebunt angulos circa quos latera sunt proportionalia.*

Sint duo triangu-
 la ABC DEF, unum angulum uni angulo
 æqualem habentia, videlicet angulum BAC angulo EDF
 æqualem, circa alios autem angulos ABC DEF latera pro-
 portionalia, ut sit DE ad EF, sicut AB ad BC: & reliquorum
 qui ad C F utrumque simul minorem vel non minorem
 recto. Dico triangulum ABC triangulo DEF æquiangulum
 esse; angulumque ABC æqualem angulo DEF, & reliquum
 videlicet qui ad C reliquo qui ad F æqualem. Si inæqualis
 est angulus ABC angulo DEF, unus ipsorum major erit; sit
 major ABC: & constituatur $\hat{a}$ ad rectam lineam AB, & ad $\hat{a}$ 23. primi.
 punctum in ipsa B, angulo DEF æqualis angulus ABG. &

I

quo-

quoniam angulus quidem A est æqualis angulo D, angulus vero ABG angulo DEF: erit reliquus AGB reliquo DFE æqualis ^b. æquiangulum igitur est ABG triangulum triangulo DEF. quare ut ^c AB ad GB, sic DE ad EF: utque DE ad EF, sic ponitur AB ad BC. ut igitur AB ad BC, sic AB ad BG. quod cum AB ad utramque BC BG eandem habeat proportionem, erit BC ipsi BG æqualis ^d: ac propterea angulus ad




^e 9 quinti. C est æqualis angulo BGC. quare uterque angulorum BGC BGC minor est recto, igitur qui ei deinceps est AGB major est recto. atque ostensus est angulus AGB æqualis angulo qui ad F. angulus igitur qui ad F recto major est. atqui ponitur non major: cum C non est major recto, quod est absurdum. non igitur inæqualis est angulus ABC angulo DEF. ergo ipsi est æqualis. est autem & angulus ad A æqualis ei qui ad D. quare & reliquus qui ad C æqualis ^b reliquo qui ad F. æquiangulum igitur est ABC triangulum triangulo DEF. Si igitur duo triacula unum angulum uni angulo æqualem habeant, circa alios autem angulos latera proportionalia, & reliquorum utrumque simul, vel minorem, vel non minorem recto: æquiangula erunt triacula, & æquales habebunt angulos circa quos proportionalia sunt latera. Quod oportebat demonstrare.

PROP. VIII. THEOR.

Si in triangulo rectangulo, ab angulo recto ad basim perpendicularis ducatur: quæ ad perpendicularem sunt triacula, & toti, & inter se similia sunt.


Sit triangulum rectangulum ABC, rectum habens angulum BAC: & à puncto A ad BC perpendicularis ducatur AD. Dico triacula ABD ADC toti triangulo ABC, & inter se similia esse. Quoniam enim angulus BAC est æqualis angulo ADB, rectus enim uterque est, & angulus ad B communis duobus



^a 2 Cor. 32. triaculis ABC ABD; erit ^a reliquus ACB reliquo BAD æqualis. æquiangulum igitur est ^b 4. hujus. triangulum ABC triangulo ABD. quare ut BC quæ subtendit angulum rectum trianguli ABC, ad BA subtenden-

tem

tem angulum rectum trianguli ABD, sic ipsa AB subtendens angulum ad C trianguli ABC, ad DB subtendentem angulum æqualem angulo ad C, videlicet BAD ipsius ABD trianguli; & adhuc AC ad AD subtendentem angulum ad B communem duobus triangulis. ergo triangulum ABC triangulo ABD æquiangulum est; & circa æquales angulos latera habet proportionalia. simile igitur est triangulum ABC triangulo ABD. eadem ratione demonstrabimus etiam ADC triangulum triangulo ABC simile esse. quare.



c. 1. Def. hujus.

utrumque ipsorum ABD ADC toti ABC triangulo est simile. Dico insuper triacula ABD ADC etiam inter se similia esse. Quoniam enim angulus BDA rectus est æqualis recto ADC; sed & BAD ostensus est æqualis angulo ad C; erit reliquus ad B reliquo DAC æqualis. æquiangulum igitur est triangulum ABD triangulo ADC. ergo ut BD trianguli ABD subtendens BAD angulum, ad DA trianguli ADC subtendentem angulum qui est ad C, æqualem angulo BAD, sic ipsa AD trianguli ABD subtendens angulum ad B, ad DC subtendentem angulum DAC ei qui est ad B æqualem; & adhuc BA ad AC subtendentem angulum rectum ADC. simile igitur est ABD triangulum triangulo ADC. Quare si in triangulo rectangulo ab angulo recto ad basim perpendicularis ducatur; quæ ad perpendicularem sunt triacula, & toti, & inter se similia sunt. Quod oportebat demonstrare.


Cor. Ex hoc manifestum est, in triangulo rectangulo, ab angulo recto ad basim perpendicularem ductam, mediam proportionalem esse inter segmenta basis: & præterea inter basim & basis segmentum utrumlibet, latus segmento terminum medium esse proportionale.

PROP. IX. PROBL.

A data recta linea imperatam partem abscindere.

Sit data recta linea AB. Oportet ab ipsa AB imperatam partem abscindere. Imperetur pars tertia; & ducatur à puncto A quædam recta linea AC, quæ cum ipsa AB angulum quemlibet contineat; sumaturque in AC quodvis punctum D, & ipsi AD æquales ponantur DE EC, deinde 3. primi. junga-


31. primi. jungatur BC; per D ipsi BC parallela ducatur DF. Itaque quoniam uni laterum trianguli ABC, videlicet ipsi BC, parallela ducta est FD; erit ut CD ad DA, ita BF ad FA; dupla autem est CD ipsius DA; ergo & BF ipsius FA dupla erit. tripla igitur est BA ipsius AF. quare à data recta linea AB imperata tertia pars AF abscissa est. Quod facere oportebat.



PROP. X. PROBL.

Datam rectam lineam infectam, data recta linea secta similiter secare.

- Sit data quidem recta linea infecta AB, secta vero AC oportet rectam lineam AB infectam ipsi AC sectæ similiter secare. Sit secta AC in punctis D & E, & ponantur ita, ut angulum quemvis contineant, junctaque BC per puncta quidem D & E ipsi BC parallelæ ducantur DF EG: per D vero ipsi AB ducatur parallela DHK. parallelogrammum igitur est utrumque ipsorum FH HB: ac propterea DH quidem est æqualis FG, HK, vero ipsi GB. & quoniam uni laterum trianguli DKC, ipsi scilicet KC, parallela ducta est HE; erit ut CE ad ED, ita KH ad HD. æqualis autem est KH quidem ipsi BG, HD vero ipsi GF. est igitur ut CE ad ED, ita BG ad GF. rursus quoniam uni laterum trianguli AGE, nimirum ipsi EG, parallela ducta est FD, ut ED ad DA, ita erit GF ad FA. sed ostensum est ut CE ad ED, ita esse BG ad GF. ut igitur CE ad ED, ita est BG ad GF, & ut ED ad DA, ita GF ad FA. ergo data recta linea infecta AB, datæ rectæ lineæ sectæ AC similiter secta est. Quod facere oportebat.




PROP. XI. PROBL.

Duabus datis rectis lineis tertiam proportionalem invenire.

Sint datæ duæ rectæ lineæ AB AC, & ponantur ita ut angulum quemvis contineant. Oportet ipsis AB AC tertiam

tertiam proportionalem invenire. Producantur AB AC ad puncta DE: ponaturque ipsi AC æqualis BD; & juncta BC, ducatur ^a per D ipsi BC parallela DE. quoniam igitur uni laterum trianguli ADE, videlicet ipsi DE parallela ducta est BC, erit ^b ut AB ad BD, ita AC ad CE. æqualis autem est BD ipsi AC, ut igitur AB ad AC, ita est AC ad CE. quare datis rectis lineis AB AC tertia proportionalis inventa est CE. Quod facere oportebat.



^a 31. primi.



^b 2. hujus.

PROP. XII. PROBL.

Tribus datis rectis lineis quartam proportionalem invenire.

Sint datæ tres rectæ lineæ ABC. Oportet ipsis ABC quartam proportionalem invenire. Exponantur duæ rectæ lineæ DE DF angulum

quemvis EDF continentes: & ponatur ipsi quidem A æqualis DG, ipsi vero B æqualis GE, & ipsi C æqualis DH: junctaque GH, per E ipsi parallela ^a ducatur EF.



^a 31. primi.

itaque quoniam uni laterum trianguli DEF, nimirum ipsi EF, parallela ducta est GH, erit ut DG ad GE ita ^b DH ad HF. est autem DG ipsi A æqualis; GE vero æqualis B, & DH æqualis C, ut igitur A ad B, ita C ad HF. quare datis tribus rectis lineis ABC quarta proportionalis inventa est HF. Quod facere oportebat.

^b 2. hujus.

PROP. XIII. PROBL.


Duabus datis rectis lineis mediam proportionalem invenire.

Sint datæ duæ rectæ lineæ ABC. Oportet inter ipsas AB BC mediam proportionalem invenire. Ponantur in directum, & super ipsa AC describatur semicirculus ADC, ducaturque ^a à puncto B ipsi AC ad rectos angulos BD, & ^a 11. primi. AD DC jungantur. Quoniam igitur angulus ADC est in semicirculo, is rectus ^b est. & quoniam in triangulo rectan-

^b 31. tertii.

• Cor. 8.
hujus.


gulo ADC, ab angulo recto ad basim perpendicularis ducta est DB, erit DB media proportionalis inter segmenta basis AB BC. duabus igitur datis rectis lineis AB BC media proportionalis inventa est. Quod facere oportebat.



PROP. XIV. THEOR.

Æqualium, & unum uni æqualem habentium angulum, parallelogrammorum latera quæ sunt circum æquales angulos, reciproca sunt: Et quorum parallelogrammorum unum uni æqualem habentium angulum, latera quæ sunt circum æquales angulos, sunt reciproca; ea inter se sunt æqualia.

Sint æqualia parallelogramma AB BC, æquales habentia angulos ad B, & ponantur in directum DB BE. ergo & in directum • erunt FB BG. Dico parallelogrammorum AB BC latera quæ sunt circum æquales angulos reciproca esse: hoc est ut DB ad BE ita esse GB ad BF. Compleatur enim parallelogrammum FE. & quoniam parallelogrammum AB æquale est parallelogrammo BC, aliud autem aliquod est FE parallelogrammum, erit ut AB ad FE, ita BC ad FE. sed ut AB quidem ad FE, ita • est DB ad BE; ut autem BC ad FE, ita • GB ad BF; ut igitur DB ad BE, ita GB ad BF. ergo parallelogrammorum AB BC latera, quæ sunt circum æquales angulos, ex contraria parte sibi ipsius respondent. Et si reciproca sunt seu ex contraria parte sibi ipsis respondeant latera quæ sunt circum æquales angulos, sit nempe ut DB ad BE, ita GB ad BF. Dico parallelogrammum AB parallelogrammo BC æquale esse. Quoniam enim est ut DB ad BE, ita GB ad BF; ut autem DB ad BE, ita • AB parallelogrammum ad parallelogrammum FE, & ut GB ad BF, ita • BC parallelogrammum ad parallelogrammum FE; erit & ut AB ad FE, ita BC ad FE. æquale igitur est AB parallelogrammum parallelogrammo BC. Ergo æqualium & unum uni




uni æqualem habentium angulum parallelogrammorum latera, quæ circum æquales angulos, reciproca sunt, seu ex contraria parte sibi ipsis respondent: & quorum parallelogrammorum unum uni æqualem habentium angulum latera, quæ circum æquales angulos, reciproca sunt, ea inter se sunt æqualia. Quod oportebat demonstrare.

PROP. XV. THEOR.

Æqualium, & unum uni æqualem habentium angulum triangulorum latera, quæ circum æquales angulos, sunt reciproca: Et quorum triangulorum unum uni æqualem habentium angulum latera, quæ circum æquales angulos reciproca sunt, ea inter se sunt æqualia.

Sint æqualia triacula ABC ADE unum angulum uni angulo æqualem habentia, angulum scilicet BAC angulo DAE. Dico triangulorum ABC ADE latera quæ circum æquales angulos reciproca esse, hoc est ut CA ad AD, ita esse EA ad AB. ponantur enim ita ut in directum sit CA ipsi AD. ergo & EA ipsi AB in directum erit; & 4 14 primi.

jungatur BD. Quoniam igitur triangulum ABC æquale est triangulo ADE, aliud autem est ABD; erit ut CAB triangulum ad triangulum BAD, ita triangulum ADE ad triangulum BAD. sed ut triangulum quidem CAB ad



BAD triangulum, ita CA ad AD; ut autem triangulum EAD ad ipsum BAD, ita EA ad AB. ut igitur CA ad AD, ita EA ad AB. quare triangulorum ABC ADE latera, quæ circum æquales angulos, reciproca sunt. Et si reciproca sunt latera triangulorum ABC ADE, scilicet sit ut CA ad AD, ita EA ad AB. Dico triangulum ABC triangulo ADE æquale esse. juncta enim rursus BD, quoniam ut CA ad AD, ita est EA ad AB, ut autem CA ad AD, ita ABC triangulum ad triangulum BAD; & ut EA ad AB, ita EAD triangulum ad BAD triangulum, erit ut ABC triangulum ad triangulum BAD, ita triangulum EAD ad BAD triangulum. utrumque igitur triangulorum ABC ADE ad triangulum BAD eandem habet proportionem; ac propterea æquale est ABC trian-

6 7. quinti.

1. hujus.

11. quinti


9. quinti.

gulum triangulo ADE. Æqualium igitur, & unum uni æqualem habentium angulum triangulorum latera quæ circum æquales angulos, reciproca sunt: & quorum triangulorum unum uni æqualem habentium angulum latera, quæ circum æquales angulos reciproca sunt, ea inter se sunt æqualia. Quod demonstrare oportebat.

PROP. XVI. THEOR.

Si quatuor rectæ lineæ proportionales fuerint, rectangulum sub extremis contentum æquale est ei rectangulo quod sub mediis continetur: Et si rectangulum sub extremis contentum æquale fuerit ei quod sub mediis continetur, quatuor rectæ lineæ proportionales erunt.

Sint quatuor rectæ lineæ proportionales AB CD E F, sitque ut AB ad CD, ita E ad F. Dico rectangulum contentum sub rectis lineis AB F æquale esse ei quod sub ipsis CD E continetur. Ducantur enim ^a à punctis A C ipsis AB CD ad rectos angulos AG CH; ponaturque ipsi quidem F æqualis AG, ipsi vero E æqualis CH, & compleantur BG DH parallelogramma. Quoniam igitur est ut AB ad CD, ita E ad F; est autem E æqualis CH, & F ipsi AG: erit ^b ut AB ad CD, ita CH ad AG. parallelogrammorum igitur BG DH latera, quæ sunt circum æquales angulos, reciproca sunt; quoniam autem æquiangulorum parallelogrammorum latera, quæ sunt circum æquales angulos, reciproca sunt, ea inter se sunt æqualia. ergo parallelogrammum BG æquale est parallelogrammo DH. atque est parallelogrammum quidem BG, quod sub rectis lineis AB F continetur, etenim AG est æqualis F; parallelogrammum vero DH, quod continetur sub ipsis CD E, cum CH ipsi E sit æqualis. rectangulum igitur contentum sub AB & F est æquale ei quod sub ipsis CD & E continetur. Et si rectangulum contentum sub AB F sit æquale ei quod sub CD & E continetur. Dico quatuor rectas lineas proportionales esse, videlicet ut AB ad CD, ita E ad F. iisdem enim constructis quoniam rectangulum contentum sub AB & F est æquale ei quod sub CD & E continetur, atque est contentum quidem sub A B F rectangulum BG, etenim AG est




est æqualis F; contentum vero sub CD E est rectangulum DH, quod CH ipsi E sit æqualis. erit parallelogrammum BG æquale parallelogrammo DH; & sunt æquiangula. æqualium autem & æquiangulorum parallelogrammorum latera, quæ circum æquales angulos, reciproca sunt. quare ut AB ad CD, ita CH ad AG, æqualis autem est CH ipsi E, & AG ipsi F. ut igitur AB ad CD, ita E ad F. Ergo si quatuor rectæ lineæ proportionales fuerint, rectangulum sub extremis contentum æquale est ei quod sub mediis continetur: & si rectangulum sub extremis contentum æquale fuerit ei quod sub mediis continetur, quatuor rectæ lineæ proportionales erunt. Quod oportebat demonstrare.

PROP. XVII. THEOR.

Si tres rectæ lineæ proportionales fuerint, rectangulum sub extremis contentum æquale est ei quod à media fit quadrato: Et si rectangulum sub extremis contentum æquale fuerit ei quod à media fit quadrato, tres rectæ lineæ proportionales erunt.

Sint tres rectæ lineæ proportionales A B C; & sit ut A ad B, ita B ad C. Dico rectangulum contentum sub AC æquale esse ei quod à media B fit quadrato. Ponatur ipsi B æqualis D. Et quoniam ut A ad B, ita B ad C, æqualis autem

B ipsi D; erit ut A ad B, ita D ad C. si autem quatuor rectæ lineæ proportionales fuerint rectangulum sub extremis contentum est æquale ei quod sub mediis continetur. ergo rectangulum sub AC contentum est



æquale ei quod continetur sub B D. sed rectangulum contentum sub B D est æquale quadrato quod fit ex ipsa B; etenim B est æqualis D. rectangulum igitur contentum sub AC est æquale ei quod ex B fit quadrato. Et si rectangulum contentum sub A C æquale fit quadrato quod fit ex B. Dico ut A ad B, ita esse B ad C. Iisdem enim constructis, quoniam rectangulum contentum sub A C æquale est quadrato quod fit ex B; at quadratum quod fit ex B est rectangulum quod sub ipsis B D continetur, est enim B æqualis ipsi D; erit rectangulum contentum sub A C æquale ei quod sub B D continetur. si autem rectangulum sub extremis contentum æquale fuerit ei quod sub mediis continetur, quatuor rectæ lineæ

a 7. quinti.




b 16. hujus.

lineæ proportionales ^b erunt. est igitur ut A ad B , ita D ad C ; æqualis autem B ipsi D . ergo ut A ad B , ita B ad C . Si igitur tres rectæ lineæ proportionales fuerint, rectangulum sub extremis contentum est æquale ei quod à media fit quadrato. Et si rectangulum sub extremis contentum æquale fuerit ei quod à media fit quadrato, tres rectæ lineæ proportionales erunt. Quod oportebat demonstrare.

PROP. XVIII. PROBL.

A data recta linea dato rectilineo simile & similiter positum rectilineum describere.

- Sit data recta linea AB , datum autem rectilineum CE . Oportet à recta linea AB rectilineo CE simile, & similiter positum rectilineum describere. Jungatur DE , & ad rectam lineam AB , & ad puncta in ipsa A , B , angulo quidem c æ-
- ^a 23. primi. qualis angulus ^a constituatur GAB , angulo autem CDF angulus ABG . reliquus igitur CFD angulus reliquo AGB est ^b æqualis. ergo æquiangulum est FCD triangulum triangulo GAB ; ac propte-
- ^b 2. Cor. 32. primi. rea ^c ut FD ad GB , ita FC ad GA , & CD ad AB . rursus constituatur ad rectam lineam BG , & ad puncta in ipsa B , G , angulo quidem DFE æqualis angulus BGH , angulo quidem FDE æqualis GBH . ergo reliquus ^b ad E reliquo ad H est æqualis. æquiangulum igitur est triangulum FDE triangulo GBH . quare ut ^c FD ad GB , ita FE ad GH , & ED ad HB . ostensum autem est & ut FD ad GB , ita FC ad GA , & CD ad AB : & ut igitur ^b FC ad AG , ita CD ad AB , & FE ad GH , & adhuc ED ad HB . itaque quoniam angulus quidem CFD est æqualis angulo AGB ; angulus autem DFE angulo BGH . erit totus CFE angulus toti AGH æqualis. eadem ratione & CDE est æqualis ipsi ABH , & præterea angulus quidem ad C angulo ad A æqualis, angulus vero ad E angulo ad H . æquiangulum igitur est AH ipsi CE , & latera circum æquales ipsis angulos habet proportionalia. ergo rectilineum AH rectilineo CE simile ^a erit: A data igitur recta linea AB dato rectilineo CE simile, & similiter positum rectilineum AH descriptum est. Quod facere oportebat.



PROP. XIX. THEOR.

Similia triacula inter se sunt in duplicata proportione laterum homologorum.

Sint similia triacula ABC DEF habentia angulum ad B æqualem angulo ad E , & sit ut AB ad BC , ita DE ad EF , ita ut latus BC homologum sit lateri EF . Dico ABC triaculum ad triaculum DEF duplicatam proportionem habere ejus quam habet BC ad EF . Sumatur enim ipsis BC EF ter-^{11. hujus.} tia proportionalis BG , ut sit BC ad EF ita EF ad BG . & jungatur GA . Quoniam igitur ut AB ad BC , ita est DE ad EF ; erit permutando ut AB ad DE , ita BC ad EF . sed ut BC ad EF , ita EF ad BG . ut igitur AB ad DE , ita EF ad BG . quare triaculorum ABG DEF ^{11. quinti.} latera, quæ sunt circum æquales angulos, reciproca sunt. quorum autem triaculorum unum uni æqualem habentium angulum latera, quæ circum æquales angulos, reciproca sunt, ea inter se æqualia sunt. æquale igitur^{15. hujus.} est ABG triaculum triaculo DEF . & quoniam est ut BC ad EF , ita EF ad BG ; si autem tres rectæ lineæ proportionales sint, prima ad tertiam duplicatam proportionem^{10. Def.} habet ejus quam habet ad secundam: habebit igitur BC ad BG duplicatam proportionem ejus quam habet BC ad EF . ut autem BC ad BG , ita ABC triaculum ad triaculum ABG . ergo & ABC triaculum ad triaculum ABG dupli-^{1. hujus.} catam proportionem habet ejus quam BC habet ad EF . est autem ABG triaculum triaculo DEF æquale. & triaculum igitur ABC ad triaculum DEF duplicatam proportio-^{7. quinti.} nem habebit ejus quam habet BC ad EF . Quare similia triacula inter se sunt in duplicata proportione laterum homologorum. Quod ostendere oportebat.

Cor. Ex hoc manifestum est, si tres rectæ lineæ proportionales fuerint, ut prima ad tertiam, ita esse triaculum, quod sit à prima ad triaculum quod à secunda simile, & similiter descriptum; quoniam ostensum est ut CB ad BG , ita ABC triaculum ad triaculum ABG , hoc est ad triaculum DEF . Quod ostendere oportebat.

PROP.

PROP. XX. THEOR.

Similia polygona in similia triangula dividuntur, & numero æqualia, & homologa totis; & polygonum ad polygonum duplicatam proportionem habet ejus quam latus homologum habet ad homologum latus.

^a 1. Def. hujus.

^b 6. hujus.


^c 4. hujus.

^d 22. quinti.

^e 19. hujus.

^f 11. quinti.

Sint similia polygona $ABCDEFGHKL$, & sit AB homologum ipsi FG . Dico polygona $ABCDEFGHKL$ in similia triangula dividi, & numero æqualia, & homologa totis; & polygonum $ABCDE$ ad polygonum $FGHKL$ duplicatam proportionem habere ejus quam habet AB ad FG . Jungantur BE EC GL LH . Et quoniam simile est $ABCDE$ polygonum polygono $FGHKL$, angulus BAE angulo GFL est ^a æqualis, atque est ut BA ad AE , ita GF ad FL . quoniam igitur duo triangula sunt ABE FGL unum angulum uni angulo æqualem habentia, circum æquales autem angulos latera proportionalia.




erit ^b triangulum ABE triangulo FGL æquiangulum; ergo ^c & simile. angulus igitur ABE æqualis est angulo FGL . est autem & totus ABC angulus æqualis ^d toti FGH , propter similitudinem polygonorum. ergo reliquus EBC reliquo LGH est æqualis. & quoniam ob similitudinem triangulorum ABE FGL , est ^e ut EB ad BA , ita LG ad GF . sed & propter similitudinem polygonorum ^f, ut AB ad BC , ita est FG ad GH ; erit ex æquali ut ^d EB ad BC , ita LG ad GH . hoc est circum æquales angulos EBC LGH latera sunt proportionalia; æquiangulum igitur ^b est EBC triangulum triangulo LGH . quare & ^c simile. eadem ratione & ECD triangulum simile est triangulo LHK . similia igitur polygona $ABCDE$ $FGHKL$ in similia triangula dividuntur, & numero æqualia. Dico & homologa totis: hoc est ut proportionalia sint triangula, & antecedentia quidem sunt ABE EBC ECD , consequentia autem ipsorum FGL LGH LHK ; & $ABCDE$ polygonum ad polygonum $FGHKL$ duplicatam proportionem habere ejus quam latus homologum habet ad homologum latus, hoc est AB ad FG . quoniam enim simile est ABE triangulum triangulo FGL , habebit ABE triangulum ad triangulum FGL duplicatam proportionem ^e ejus quam habet BE ad GL . eadem ratione, & triangulum EBC ad GLH triangulum duplicatam ^f proportionem habet ejus quam BE ad GL . est igitur ut ABE trian-

triangulum ad triangulum FGL , ita triangulum BEC ad GLH triangulum. rursus quoniam simile est triangulum BEC triangulo LGH , habebit BEC triangulum ad triangulum LGH duplicatam proportionem ^a ejus quam recta CE habet ad rectam HL . eadem ratione & ECD triangulum ad triangulum LHK duplicatam proportionem habet ejus quam CE ad HL . est igitur ut triangulum BEC ad triangulum LGH , ita CED triangulum ad triangulum LHK . ostensum autem est & ut BEC triangulum ad triangulum LGH , ita triangulum ABE ad triangulum FGL . ergo ut triangulum ABE ad triangulum FGL , ita triangulum BEC ad GLH triangulum, & triangulum ECD ad ipsum LHK . & igitur ut unum antecedentium ad unum consequentium ^{g 12. quinti.} sic omnia antecedentia ad omnia consequentia. ergo ut triangulum ABE ad triangulum FGL , ita $ABCDE$ polygonum ad polygonum $FGHKL$: sed ABE triangulum ad triangulum FGL duplicatam proportionem habet ejus quam latus homologum AB habet ad homologum latus FG , similia enim triangula in duplicata ^b sunt proportionem laterum homologorum. ergo & $ABCDE$ polygonum ad polygonum $FGHKL$ duplicatam proportionem habet ejus quam AB latus homologum habet ad FG homologum latus. Similia igitur polygona in similia triangula dividuntur, & numero æqualia, & homologa totis; & polygonum ad polygonum duplicatam habet proportionem ejus quam habet latus homologum ad homologum latus. Quod demonstrare oportebat.

Eodem modo & in similibus quadrilateris ostendetur ea esse in duplicata proportionem laterum homologorum. ostensum autem est in triangulis.

COROLL.

1. Ergo universæ similes figuræ rectilineæ inter se sunt in duplicata proportionem homologorum laterum. & si ipsis AB FG tertiam proportionalem sumamus, quæ sit x ; habebit AB ad x duplicatam proportionem ejus quam habet AB ad FG . habet autem & polygonum ad polygonum, & quadrilaterum ad quadrilaterum duplicatam proportionem ejus quam latus homologum habet ad homologum latus, hoc est AB ad FG . atque ostensum est hoc in triangulis.




2. Universe igitur manifestum est, si tres rectæ lineæ proportionales fuerint, ut prima ad tertiam, ita esse figuram quæ sit à prima, ad eam quæ à secunda, similem & similiter descriptam. Quod ostendere oportebat.

PROP. XXI. THEOR.

Quæ eidem rectilineo sunt similia, & inter se similia sunt.

a 1. Def.
hujus.

Sit enim utrumque rectilineorum A B simile rectilineo c. Dico & rectilineum A rectilineo B simile esse. Quoniam enim simile est A rectilineum rectilineo c, & ipsi æquiangulum a erit, & circum æquales angulos latera habebit proportionalia. rursus quoniam simile est rectilineum B rectilineo c, æquiangulum ipsi erit, & circum æquales angulos latera proportionalia habebit a. utrumque igitur rectilineorum A B ipsi c æquiangulum est & circum æquales angulos latera habet proportionalia. quare & rectilineum A ipsi B est æquiangulum, lateraque circum æquales angulos proportionalia habet; ac propterea a A ipsi B est simile. Quod demonstrare oportebat.



PROP. XXII. THEOR.

Si quatuor rectæ lineæ proportionales fuerint, & rectilinea qua ab ipsi sunt, similia, & similiter descripta proportionalia erunt. & si rectilinea qua ab ipsis fiant, similia, & similiter descripta, proportionalia fuerint, & ipsa rectæ lineæ proportionales erunt.

Sint quatuor rectæ lineæ proportionales AB CD EF GH, a 8. hujus & ut AB ad CD, ita sit EF ad GH. Describanturque a ab ipsis quidem AB CD similia, & similiter posita rectilinea K A B L C D: ab ipsis vero EF GH describantur rectilinea similia, & similiter posita M F N H. Dico ut K A B rectilineum ad rectilineum L C D, ita esse rectilineum M F ad ipsam N H b 11. hujus. rectilineum. Sumatur ipsis b quidem AB CD tertia proportionalis x; ipsis vero EF GH tertia proportionalis o. Et quoniam est ut AB ad CD, ita EF ad GH: ut autem CD ad x, c 23. quinti. ita GH ad o; erit ex æquali c ut AB ad x, ita EF ad o. sed d 2. Cor. 20. ut AB quidem ad x, ita est d rectilineum K A B ad L C D rectilineum hujus.

lineum, ut autem EF ad O, ita ^d rectilineum MF ad rectilineum NH. ut igitur KAB rectilineum ad rectilineum LCD, ita est ^e rectilineum MF ad

^e 11. quinti.

NH rectilineum. Et si sit ut KAB rectilineum ad rectilineum LCD, ita rectilineum MF ad rectilineum NH. Dico ut AB ad CD, ita esse

EF ad GH. fiat enim ut AB ad CD, ita EF ad ^f PR, & describatur ^a ab ipsa PR alterutri rectilineorum MF NH simile, & similiter positum rectilineum SR. quoniam igitur est

ut AB ad CD, ita EF ad PR, & descripta sunt ab ipsis quidem AB CD similia, & similiter posita KAB LCD rectilinea, ab ipsis vero EF PR similia & similiter posita rectilinea MF SR, erit ^g ut KAB rectilineum ad rectilineum LCD, ita rectilineum MF ad SR

rectilineum: ponitur autem & ut rectilineum KAB ad rectilineum LCD, ita MF rectilineum ad rectilineum NH. ergo ut rectilineum MF ad rectilineum NH, ita MF rectilineum ad rectilineum SR. quod cum rectilineum MF ad utrumque ipsorum NH SR eandem habeat proportionem, erit ^h rectilineum NH ipsi SR æquale. est autem ipsi simile, ^b 9. quinti.


& similiter positum. ergo GH est æqualis PR. & quoniam ut AB ad CD, ita est EF ad PR: æqualis autem PR ipsi GH; erit ut AB ad CD, ita EF ad GH. Si igitur quatuor rectæ lineæ proportionales fuerint, & rectilinea quæ ab ipsis fiunt, similia, & similiter descripta proportionalia erunt: & si rectilinea quæ ab ipsis fiunt, similia, & similiter descripta proportionalia fuerint, & ipsæ rectæ lineæ proportionales erunt. Quod oportebat demonstrare.

^g ex prius demon- stratis.

LEMMA.

Positis tribus rectis quibuscunque A, B & C; ratio prima A ad tertiam C, æqualis est rationi composita ex ratione prima A ad secundam B, & ratione secunda B ad tertiam C.

Sit V. G. numerus ternarius exponens seu denominator rationis A ad B, hoc est sit A tripla ipsius B, & sit numerus quaternarius exponens rationis B ad C, erit numerus duodenarius ex numeri ternarii & quaternarii multiplicatione compo-



f 12. hujus.

^b 9. quinti.

compositus exponens rationis A ad C; nam quia A continet B ter, & B continet C quater, continebit A ipsum C ter quater, seu duodecies. idem de aliis multiplicibus vel submultiplicibus verum est. Universalis vero hujus Theorematis demonstratio talis est; Quantitas rationis A ad B est numerus $\frac{A}{B}$,

scil. qui multiplicans consequentem producit antecedentem. Et similiter quantitas rationis B ad

C est $\frac{B}{C}$ Atque hæc duæ quanti-

A —————

B ———

C —

A X B

tates inter se multiplicatæ efficiunt numerum $\frac{A}{B} \times \frac{B}{C}$ qui est quantitas rationis quam rectangulum comprehensum sub rectis A & B habet ad rectangulum sub B & C rectis. Adeoque dicta ratio rectanguli sub A & B, ad rectangulum sub B & C ea est quæ in sensu def. 5. hujus, componitur ex rationibus A ad B & B ad C. sed per 1. 6. rectangulum sub A & B, est ad rectangulum sub B & C, ut A ad C. & igitur ratio A ad C æqualis est rationi compositæ ex rationibus A ad B, & B ad C.

Positis vero quatuor rectis quibuscunque A, B, C, & D; Ratio primæ A ad quartam D æqualis est rationi compositæ ex ratione primæ A ad secundam B, & ratione secundæ B ad tertiam C, & ratione tertiæ C ad quartam D.

Nam in tribus rectis A, C, & D, ratio A ad D æqualis est rationi compositæ ex rationibus A ad C, & C ad D. Et hætenus est ostensum rationem A ad C æqualem esse rationi compositæ ex rationibus A ad B & B ad C. Et igitur

A —————

B —————

C —————

D ———

ratio A ad D æqualis est rationi compositæ ex rationibus A ad B, B ad C & C ad D. Similiter ostendetur, in quocunque rectis, rationem primæ ad ultimam æqualem esse rationi compositæ ex rationibus primæ ad secundam, secundæ ad tertiam, tertiæ ad quartam, & ita deinceps usque ad ultimam.


Si exponantur aliæ magnitudines qualibet, præter rectas, idem obtinebit. Quod constabit si concipiantur tot rectæ A, B, C &c. ordine positæ quot sunt magnitudines, & in eadem ratione: ita videlicet ut recta A sit ad rectam B ut prima magnitudo ad secundam, & recta B ad rectam C ut secunda magnitudo ad tertiam, & ita porro. Manifestum est per 22. 5. esse ex æquo rectam A ad ultimam rectam sicut prima magnitudo ad ultimam. Sed ratio rectæ A ad ultimam rectam æqualis est rationi compositæ ex rationibus A ad B, B ad C, & ita

ita porro usque ad ultimam rectam. Et, ex hypothesis, ratio cujuslibet rectæ ad sibi proximam, eadem est cum ratione magnitudinis ejusdem ordinis ad sibi proximam. Et igitur ratio primæ magnitudinis ad ultimam, aqualis est rationi compositæ ex rationibus primæ magnitudinis ad secundam, secundæ ad tertiam, & ita deinceps usque ad ultimam. Quod demonstrare oportebat.

PROP. XXIII. THEOR.

Æquiangula parallelogramma inter se proportionem habent ex lateribus compositam.

Sint æquiangula parallelogramma AC CF æqualem habentia BCD angulum angulo ECG. Dico parallelogrammum AC ad parallelogrammum CF proportionem habere compositam ex lateribus, videlicet compositam ex proportionem quam habet BC ad CG, & ex proportionem quam DC habet ad CE. Ponatur enim ut BC sit in directum ipsi CG. ergo & DC ipsi CE in directum erit: & compleatur DG parallelogrammum: exponaturque recta linea quædam K, & fiat ut BC ad CG, ita K ad L, ut autem DC ad CE, ita L ad M. proportionem igitur ipsius K ad L, & L ad M eadem sunt quæ proportionem laterum videlicet BC ad CG, & DC ad CE. sed proportio K ad M composita est ex proportione K ad L, & proportionem L ad M. quare & K ad M proportionem habet ex lateribus compositam.



& quoniam est ut BC ad CG^a, ita AC parallelogrammum ad parallelogrammum CH; sed ut BC ad CG, ita K ad L: erit ut K ad L, ita parallelogrammum AC ad parallelogrammum CH. rursus quoniam est ut DC ad CE, ita CH parallelogrammum ad parallelogrammum CF: ut autem DC ad CE, ita L ad M. ergo ut L ad M, ita erit parallelogrammum CH ad CF parallelogrammum. itaque cum ostensum sit ut K quidem ad L ita AC parallelogrammum ad parallelogrammum CH: ut autem L ad M, ita parallelogrammum CH ad CF parallelogrammum; erit ex æquali ut K ad M, ita AC parallelogrammum ad ipsum CF. habet autem K ad M proportionem ex lateribus compositam. ergo & AC parallelogrammum ad parallelogrammum CF proportionem habebit compositam ex lateribus. Æquiangula igitur parallelogramma

lelogramma inter se proportionem habent ex lateribus compositam. Quod oportebat demonstrare.

PROP. XXIV. THEOR.

Omnis parallelogrammi, quæ circa diametrum sunt parallelogramma, & toti, & inter se similia sunt.

Sit parallelogrammum $ABCD$, cujus diameter AC : circa diametrum vero AC parallelogramma sint EG HK . Dico parallelogramma EG HK & toti $ABCD$, & inter se similia esse. Quoniam enim uni laterum trianguli ABC , videlicet ipsi BC parallela ducta est EF , erit a ut BE ad EA , ita CF ad FA . quoniam rursus uni laterum trianguli ACD , nempe ipsi CD ducta est parallela

a 2. hujus. FG , ut CF ad FA , ita e erit DG ad GA . sed ut CF ad FA ita ostensa est & BE ad EA . ergo & ut BE ad

b 11. quinti. EA , ita b DG ad GA , componendoque c ut BA ad AE , ita DA ad AG . & permu-

c 18. quinti. tando ut BA ad AD , ita EA ad AG . parallelogrammorum igitur $ABCD$ & EG latera, quæ circa communem angulum BAD , proportionalia sunt. & quoniam parallela est GF ipsi


d 29. primi. DC , angulus quidem AGF est d æqualis angulo ADC , angulus vero GFA æqualis angulo DCA , & angulus DAC est communis duobus triangulis ADC AGF ; erit igitur triangulum ADC triangulo AGF æquiangulum. eadem ratione & triangulum ACB æquiangulum est triangulo AFE . totum igitur parallelogrammum $ABCD$ parallelogrammo EG est æ-

e 4. hujus. quiangulum. ergo ut AD ad DC , ita e AG ad GF , ut autem DC ad CA , ita GF ad FA , & ut AC ad CB , ita AF ad FE , & præterea ut CB ad BA , ita FE ad EA . itaque quoniam ostensum est ut DC ad CA , ita esse GF ad FA , ut autem

f 22. quinti. AC ad CB , ita AF ad FE ; erit f ex æquali ut DC ad CB , ita GF ad FE . ergo parallelogrammorum $ABCD$ & EG proportionalia sunt latera quæ circum æquales angulos, ac propterea g parallelogrammum $ABCD$ parallelogrammo EG est si-

g 1. Def. hujus. mile. eadem ratione, & parallelogrammum $ABCD$ simile est parallelogrammo HK . utrumque igitur ipsorum EG HK parallelogrammorum, parallelogrammo $ABCD$ est simile. quæ autem eidem rectilineo sunt similia, & inter se similia

b 11. hujus. b sunt. parallelogrammum igitur EG simile est parallelogrammo HK . Quare omnis parallelogrammi, quæ circa diametrum




metrum sunt parallelogramma, & toti, & inter se sunt similia. Quod ostendere oportebat.

PROP. XXV. PROBL.

Dato rectilineo, simile, & alteri dato æquale idem constituere.

Sit datum quidem rectilineum cui oportet simile constituere ABC, cui autem æquale sit D. Oportet ipsi ABC simile, & ipsi D æquale idem constituere. Applicetur ^a ad ^a 44. primi. rectam quidem lineam BC rectilineo ABC æquale parallelogrammum BE. ad rectam vero CE applicetur ^b parallelo- ^b 45. primi. grammum CM æquale

ipsi D, in angulo FCE, qui CBL angulo est æqualis. in directum igitur ^c est BC ipsi CF, & LE ipsi EM. sumantur ^d inter BC CF media proportionalis GH, & ^e ab ipsa GH describatur rectilineum KGH si-



^c 14. primi.

^d 13. hujus.

^e 18. hujus.

mile & similiter positum rectilineo ABC. Et quoniam est ut BC ad GH, ita GH ad CF, si autem tres rectæ lineæ proportionales sint, ut prima ad tertiam ^f, ita est figura quæ ^f 2. Cor. 10. fit à prima, ad eam quæ à secunda, similem & similiter de- ^{hujus.}

scriptam: erit ut BC ad CF. ita ABC rectilineum ad rectilineum KGH. sed & ut BC ad CF, ita ^g parallelogrammum ^g 1. hujus. BE ad EF parallelogrammum, ut ^h igitur rectilineum ABC ^h 11. quinti.


ad rectilineum KGH, ita BE parallelogrammum ad parallelogrammum EF. quare ⁱ permutando ut ABC rectilineum ⁱ 16. quinti. ad parallelogrammum BE, ita rectilineum KGH ad FE parallelogrammum.

est autem rectilineum ABC æquale parallelogrammo BE. æquale igitur est & KGH rectilineum parallelogrammo EF. sed EF parallelogrammum æquale est rectilineo D. ergo & rectilineum KGH ipsi D est æquale: est autem KGH simile rectilineo ABC. Dato igitur rectilineo ABC simile, & alteri dato D æquale idem constitutum est KGH. Quod facere oportebat.

PROP. XXVI. THEOR.

Si à parallelogrammo parallelogrammum auferatur simile toti, & similiter positum, communem ipsi angulum habens, circa eandem diametrum est toti.

A parallelogrammo enim ABCD parallelogrammum AF auferatur, simile ipsi ABCD, & similiter positum communemque ipsi angulum habens DAB. Dico parallelogrammum ABCD circa eandem esse diametrum parallelogrammo AF. Non enim, sed si fieri potest, sit parallelogrammi BD diameter AHC, & producaturs GF usque ad H; ducaturque per H alterutri ipsarum AD BC parallela HK. Quoniam igitur circa eandem diametrum est ABCD parallelogrammum



a 24. hujus parallelogrammo KG; & erit a parallelogrammum ABCD
b 1. Def. parallelogrammo KG simile. ergo ut b DA ad AB, ita GA ad
hujus. AK. est autem & propter similitudinem parallelogrammo-
c 11. quinti. rum ABCD EG, ut DA ad AB, ita GA ad AE. & c igitur
ut GA ad AE, ita GA ad AK. quod cum GA ad utramque
d 9. quinti. ipsarum AK AE eandem proportionem habeat; erit d AE
ipsi AK æqualis, minor majori, quod fieri non potest. non
igitur circa eandem diametrum est ABCD parallelogram-
mum parallelogrammo AH. quare circa eandem diametrum
erit ipsi AF. Si igitur à parallelogrammo parallelogrammum
auferatur simile toti, & similiter positum, communem ipsi
angulum habens, circa eandem diametrum est toti. Quod
demonstrare oportebat.

PROP. XXVII. THEOR.

Omnium parallelogrammorum secundum eandem rectam lineam applicatorum, & deficientium figuris parallelogrammis, similibus & similiter positis ei quæ à dimidia describitur, maximum est quod ad dimidiam est applicatum, simile existens defectui.

Sit recta linea AB; seceturque bifariam in c; & ad AB rectam lineam applicetur parallelogrammum AD deficiens figura parallelogramma CE, simili & similiter posita ei quæ à dimidia ipsius AB descripta est. Dico omnium
paralle-

figura parallelogramma simili D. Secetur AB bifariam in E, atque ex EB ipsi D simile, & similiter positum parallelogrammum describatur EL. & utriusque quidem EL & C æquale, ipsi vero D simile, & similiter positum idem constitutatur GH. simile igitur est GH ipsi EL. sitque KH quidem latus homologum lateri FL, KG vero ipsi FE. & quoniam parallelogrammum GH majus est ipso EL, erit recta linea KH major quàm FL, & KG major quàm FE. producantur FL FE, & ipsi quidem KH æqualis sit FLM, ipsi vero KG æqualis FEN, & compleatur MN parallelogrammum. ergo MN æquale est & simile ipsi GH. sed GH est simile EL; MN igitur ipsi EL simile erit; ac propterea circa eandem diametrum est EL ipsi MN. ducatur ipsorum diameter FX, & figura describatur. itaque quoniam GH ipsi EL & C est æquale, sed GH est æquale MN; erit & MN æquale ipsi EL & C. commune auferatur EL. reliquus igitur ΦY gnomon ipsi C est æqualis. sed quoniam AE est æqualis EB, æquale erit & AN parallelogrammum parallelogrammo EP, hoc est ipsi FLO. commune apponatur EX. totum igitur AX æquale est gnomoni ΦY . sed ΦY gnomon est æqualis C. ergo & AX ipsi C erit æquale. Ad datam igitur rectam lineam AB dato rectilineo C æquale parallelogrammum applicatum est AX, excedens figura parallelogramma PO, ipsi D simili, quoniam & ipsi EL simile est OP. Quod fecisse oportebat.

18. hujus.

25. hujus.


21. hujus.

26. hujus.

36. primi.

43. primi.

24. hujus.




PROP. XXX. PROBL.

Datam rectam lineam terminatam extrema ac media ratione secare.

Sit data recta linea terminata AB oportet ipsum AB extrema ac media ratione secare. Describatur ex AB quadratum BC, & ad AC ipsi BC æquale parallelogrammum applicetur CD, excedens figura AD ipsi BC simili. quadratum autem est BC, ergo & AD quadratum erit. & quoniam BC est æquale CD; commune auferatur CE. reliquum igitur BF reliquo AD est æquale. est autem & ipsi æquiangulum. ergo ipsorum BF AD latera, quæ circum æquales angulos

• 14. hujus. angulos, reciproce sunt • proportionalia. ut igitur FE ad ED, ita est AE ad EB. est
 d 34. primi. autem FE æqualis d AC, hoc est ipsi AB; & ED ipsi AE. quare ut BA ad AE, ita AE ad EB. sed AB major est quam AE. ergo AE quam EB est • major. recta igitur linea AB extrema, ac media ratione secta est in E. & majus ipsius segmentum est AE. Quod facere oportebat.




Aliter. Sit data recta linea AB. Oportet ipsam AB extrema ac media ratione secare. Secetur enim AB in C, ita ut
 f 11. secundi. rectangulum f quod continetur sub AB BC æquale sit quadrato ex AC. Quoniam igitur rectangulum sub AB BC æ-
 g 17. hujus. quale est quadrato ex AC, erit s ut BA ad AC ita AC ad CB. ergo AB recta linea extrema ac media ratione secta est. Quod facere oportebat.

PROP. XXXI. THEOR.

In rectangulis triangulis figura quæ fit à latere rectum angulum subtendente, æqualis est eis quæ à lateribus rectum angulum contentibus fiunt, similibus, & similiter descriptis.

Sit triangulum rectangulum ABC, rectum habens angulum BAC. Dico figuram, quæ fit ex BC æqualem esse eis quæ ex BA AC fiunt similibus, & similiter descriptis. Ducatur perpendicularis AD.

Quoniam igitur in triangulo recto angulo ACB ab angulo recto, qui est ad A, ad BC basim perpendicularis ducta
 a 8. hujus. est AD, erunt a triacula ABD ADC quæ sunt ad perpendicularem similia toti ABC, & inter se. & quoniam simile est ABC triangulum triangulo ABD, erit ut a CB ad BA, ita BA ad BD. quod cum tres rectæ lineæ proportionales sint, ut prima ad tertiam, ita erit b figura quæ fit ex prima ad eam quæ ex secunda, similem, & similiter descriptam. ut igitur CB ad BD, ita figura quæ fit ex CB ad eam quæ ex BA, similem & similiter descriptam. eadem ratione, & ut BC ad CD, ita figura quæ fit ex BC ad eam quæ ex CA. quare & ut BC ad ipsas,




ipsas BD DC , ita ϵ figura quæ ex BC ad eas quæ ex BA AC , ϵ 24. quinti. similes, & similiter descriptas. æqualis autem est BC ipsis BD DC . ergo figura quæ fit ex BC æqualis est eis quæ ex BA AC fiunt, similibus, & similiter descriptis. In rectangulis igitur triangulis, figura quæ fit à latere rectum angulum subtendente, æqualis est eis quæ à lateribus rectum angulum continentibus fiunt, similibus, & similiter descriptis. Quod ostendere oportebat.

PROP. XXXII. THEOR.

Si duo triacula componantur ad unum angulum, quæ duo latera duobus lateribus proportionalia habeant, ita ut homologa latera ipsorum etiam sint parallela, reliqua triangulorum latera in directum sibi ipsis constituta erunt.

Sint duo triacula ABC DCE quæ duo latera BA AC duobus lateribus CD DE proportionalia habeant, scil. sit sicut BA ad AC , ita CD ad DE ; parallela autem sit AB ipsi DC & AC ipsi DE . Dico BC ipsi CE in directum esse. Quoniam enim AB parallela est DC , & in ipsas incidit recta linea AC ; erunt ϵ anguli alterni BAC ACD æquales inter se. eadem ratione, & angulus CDE æqualis est angulo ACD . quare & BAC ipsi CDE est æqualis. & quoniam duo triacula sunt ABC DCE , unum angulum ad A , uni angulo ad D æqualem habentia, circum æquales autem angulos latera proportionalia, quod sit ut BA ad AC , ita CD ad DE ; erit ϵ triangulum ABC triangulo DCE ϵ 6. hujus. æquiangulum. ergo ABC angulus est æqualis angulo DCE . ostensus autem est & angulus ACD æqualis angulo BAC . totus igitur ACE duobus ABC BAC est æqualis. communis apponatur ACB . ergo anguli ACE ACB angulis BAC ACB CBA æquales sunt. sed BAC ACB CBA anguli duobus rectis ϵ sunt æquales. & anguli igitur ACE ACB duobus rectis æquales erunt. itaque ad quandam rectam lineam AC , & ad punctum in ipsa C , duæ rectæ lineæ BC CE non ad easdem partes positæ, angulos qui deinceps sunt ACE ACB duobus rectis æquales efficiunt. ergo BC ipsi CE in directum ϵ erit. Si igitur duo triacula componantur ad unum angulum quæ duo latera duobus lateribus proportionalia habeant



ϵ 29. primi.

ϵ 6. hujus.

ϵ 32. primi.


ϵ 14. primi.

beant, ita ut homologa latera ipsorum etiam sunt parallela; reliqua triangulorum latera in directum sibi ipsis constituta erunt. Quod demonstrare oportebat.

PROP. XXXIII. THEOR.

In circulis aequalibus anguli eandem habent proportionem, quam circumferentia quibus insistant, sive ad centra, sive ad circumferentias insistant: adhuc autem & sectores, quippe qui ad centra sunt constituti.

Sint æquales circuli ABC DEF ; & ad centra quidem ipsorum G H sint anguli BGC EHF , ad circumferentias vero anguli BAC EDF . Dico ut circumferentia BC ad EF circumferentiam, ita esse & BGC angulum ad angulum EHF , & angulum BAC ad angulum EDF : & adhuc sectorem BGC ad EHF sectorem. Ponantur enim circumferentiæ quidem BC æquales quocunque deinceps CK KL ; circumferentiæ vero EF , rursus æquales quocunque FM MN . & jungantur GK GL , HM HN . Quoniam igitur circumferentiæ BC CK KL inter se sunt æquales, & anguli





27. tertii.

BGC CGK KGL inter se æquales ^a erunt. quotuplex igitur est circumferentia BL circumferentiæ BC , totuplex est & BGL angulus anguli BGC . eadem ratione & quotuplex est circumferentia NE circumferentiæ EF , totuplex & EHN angulus anguli EHF . si vero æqualis est BL circumferentia circumferentiæ EN ; & angulus BGL angulo EHN erit æqualis; & si circumferentia BL major est circumferentia EN , major erit & BGL angulus angulo EHN ; & si minor, minor. quatuor igitur existentibus magnitudinibus, duabus nimirum circumferentiis BC EF , & duobus angulis BGC EHF ; sumptæ sunt circumferentiæ quidem BC , & BGC anguli, æque multiplicia, videlicet circumferentia BL & BGL angulus; circumferentiæ vero EF , & EHF anguli, æque multiplicia, nempe circumferentia EN , & angulus EHN . atque ostensum est si circumferentia BL superat circumferentiam EN , & BGL angulum superare angulum EHN ; & si æqualis, æqualem; & si minor, minorem esse. ut igitur circumferentia BC ad EF circumferentiam, ita angulus BGC ad angulum EHF . sed ut BGC angulus ad angulum EHF , ita angulus

^b Def. 5. quinti.

• angulus BAC ad EDF angulum, uterque enim utriusque est duplex. & ut igitur BC circumferentia ad circumferentiam EF, ita & angulus BGC ad angulum EHF, & angulus BAC ad EDF angulum. Quare in circulis æqualibus anguli eandem habent proportionem quàm circumferentiæ quibus insunt, five ad centra, five ad circumferentias insistant. Dico insuper & ut BC circumferentia ad circumferentiam EF, ita esse sectorem GBC ad HEF sectorem. Jungantur enim BC CK, & sumptis in circumferentiis BC CK punctis XO, jungantur & BX XC CO OK. itaque quoniam duæ BG GC duabus CG GK æquales sunt, & angulos æquales continent; erit & basis BC basi CK æqualis. æquale igitur est GBC triangulum triangulo GCK. & quoniam circumferentia BC circumferentiæ CK est æqualis, & reliqua circumferentia quæ complet totum circumulum ABC



e 4. primi.

æqualis est reliquæ quæ eundem circumulum complet. quare & angulus BXC angulo COK est æqualis. simile igitur est BXC segmentum segmento COK: & sunt in æqualibus rectis lineis BC CK. quæ autem in æqualibus rectis lineis similia circumulorum segmenta, & inter se æqualia sunt. ergo segmentum BXC est æquale segmento COK. est autem & BGC triangulum triangulo GCK æquale. & totus igitur sector BGC sectori CGK æqualis erit. Eadem ratione & GKL sector utrique ipsorum GBC GCK est æqualis. tres igitur sectores BGC CGK KGL æquales sunt inter se. similiter & sectores HEF HFM HMN inter se sunt æquales. quoduplex igitur est LB circumferentia circumferentiæ BC, totuplex est & GBL sector sectoris GBC. eadem ratione & quoduplex est circumferentia NE circumferentiæ EF, totuplex est & HEN sector sectoris HEF. Sed si circumferentia BL circumferentiæ EN est æqualis, & sector BGL æqualis est sectori EHN; & si circumferentia BL superat circumferentiam EN, superat & BGL sector sectorem EHN; & si minor, minor. quatuor igitur existentibus magnitudinibus, duabus quidem BC EF circumferentiis, duobus vero sectoribus GBC EHF, sumpta, sunt æque multiplicia circumferentiæ quidem BC & GBC sectoris, circumferentia BL, & GBL sector. circumferentiæ vero EF, & sectoris HEF, æque multiplicia, circumferentia EN, & HEN sector, atque ostensum est si BL circumferentia superat circumferentiam EN, & sectorem BGL superare sectorem EHN; & si æqualis, æqualem esse; & si minor, minorem,

f 27. tertii.
g 11. Def. tertii.
h 24. tertii.


Def. 5.
quinti.

minorem. est igitur ut BC circumferentia ad circumferentiam EF, ita sector GBC ad HEF sectorem. Quod ostendere oportebat.

COROLL.

1. Angulus ad centrum est ad quatuor rectos, ut arcus cui infistit ad totam circumferentiam: nam ut angulus BAC ad rectum, ita BC arcus ad circuli quadrantem; quare quadruplicando consequentes, erit angulus BAC ad quatuor rectos, ut arcus BC ad totam circumferentiam.

2. Inæqualium circulorum arcus IL BC qui æquales subtendunt angulos, five ad centra, five ad peripherias, sunt similes. Nam est IL ad totam peripheriam ILE, ut angulus IAL ad quatuor rectos: est vero ut IAL seu BAC ad quatuor rectos, ita arcus BC ad totam peripheriam BCF. quare ut IL ad totam peripheriam ILE, ita BC ad totam peripheriam BCF. ac proinde arcus IL BC sunt similes.



3. Duæ semidiametri AB AC à concentricis peripheriis arcus auferunt similes IL BC.

EUCLIDIS

ELEMENTORUM

LIBER UNDECIMUS.

DEFINITIONES.

I.

Solidum est, quod longitudinem, latitudinem & crassitudinem habet.

II.

Solidi terminus est superficies.

III.

Recta linea ad planum recta est, quando ad omnes rectas lineas quæ ipsam contingunt, & in subiecto sunt plano, rectos angulos efficit.

IV.

Planum ad Planum rectum est, cum rectæ lineæ quæ communi planorum sectioni ad rectos angulos in uno plano ducuntur, alteri plano ad rectos sunt angulos.

V.

Rectæ lineæ ad planum inclinatio est, cum à sublimi termino rectæ illius lineæ ad planum deducta fuerit perpendicularis; atque à puncto quod perpendicularis in ipso plano effecerit, ad propositæ illius lineæ extremum, quod in eodem est plano, altera recta linea fuerit adjuncta; est, inquam, angulus acutus insistente linea, & adjuncta comprehensus.

VI.

VI.

Plani ad planum inclinatio est, angulus acutus rectis lineis contentus, quæ in utroque planorum ad idem communis sectionis punctum ductæ, rectos cum sectione angulos efficiunt.

VII.

Planum ad planum similiter inclinari dicitur, atque alterum ad alterum, cum dicti inclinationum anguli inter se fuerint æquales.

VIII.

Parallela plana sunt, quæ inter se non conveniunt.

IX.

Similes solidæ figuræ sunt, quæ similibus planis continentur, multitudine æqualibus.

X

Æquales & similes solidæ figuræ sunt, quæ similibus planis multitudine & magnitudine æqualibus continentur.

XI.

Solidus angulus est, plurium quàm duarum linearum quæ se mutuo contingunt, nec in eadem sunt superficie, ad omnes lineas inclinatio. Vel solidus angulus est, qui pluribus quàm duobus planis angulis in eodem non consistentibus plano, sed ad unum punctum constitutis continetur.

XII.

Pyramis est figura solida planis comprehensa, quæ ab uno plano ad unum punctum constituuntur.

XIII.

Prisma est figura solida quæ planis continetur, quorum adversa duo sunt & æqualia & similia, & parallela; alia vero parallelogramma.

XIV.

Sphæra est, quando semicirculi manente diametro, circumductus semicirculus in seipsum rursus revolvitur unde moveri cœperat.

XV.

XV.

Axis autem sphaeræ est quiescens illa recta linea, circum quam semicirculus convertitur.

XVI.

Centrum sphaeræ est idem quod & semicirculi.

XVII.

Diameter autem sphaeræ est recta quædam linea per centrum ducta, & utrinque à sphaeræ superficie terminata.

XVIII.

Conus est, quando rectanguli trianguli manente uno latere eorum quæ circa rectum angulum, circumductum triangulum in seipsum rursus revolvitur, unde moveri cœperat. Atque si quiescens recta linea æqualis sit reliquæ quæ circa rectum angulum continetur, orthogonius erit conus: si vero minor, amblygonius: si vero major, oxygonius.

XIX.

Axis autem conici est quiescens illa linea, circa quam triangulum vertitur.

XX.

Basis vero conici est circulus qui à circumducta recta linea describitur.

XXI.

Cylindrus est, quando rectanguli parallelogrammi manente uno latere eorum quæ circa rectum angulum, circumductum parallelogrammum in seipsum rursus revolvitur, unde cœperat moveri.

XXII.

Axis autem cylindri est quiescens illa recta linea, circum quam parallelogrammum convertitur.

XXIII.

Bases vero cylindri sunt circuli à duobus adversis lateribus, quæ circumaguntur, descripti.

XXIV.

Similes conici & cylindri sunt, quorum & axes, & basium diametri proportionales sunt.

XXV.

XXV.

Cubus est figura solida sub sex quadratis æqualibus contenta.

XXVI.

Tetraedrum est figura solida sub quatuor triangulis æqualibus & æquilateris contenta.

XXVII.

Octaedrum est figura solida sub octo triangulis æqualibus & æquilateris contenta.

XXVIII.

Dodecaedrum est figura solida sub duodecim pentagonis æqualibus, & æquilateris, & æquiangulis contenta.

XXIX.

Icoaedrum est figura solida sub viginti triangulis æqualibus, & æquilateris contenta.


XXX.

Parallelipipedum est figura solida sex figuris quadrilateralis, quarum quæ ex adverso parallelæ sunt, contenta.

PROPOSITIO I. THEOREMA.

Recta linea pars quædam non est in subjecto plano, quædam vero in sublimi.

Si enim fieri potest, rectæ lineæ AB pars quidem AB sit in subjecto plano, pars vero BC in sublimi. erit recta linea quædam ipsi AB in directum continuata in subjecto plano. sitque DB. duabus igitur datis rectis lineis ABC ABD commune segmentum est AB, quod fieri non potest: recta enim linea cum recta linea non convenit in pluribus punctis, quàm uno. Non igitur rectæ lineæ pars quædam est in subjecto plano, quædam vero in sublimi. Quod demonstrare oportebat.




PROP.

PROP. II. THEOR.

Si dua recta linea se invicem secant, in uno sunt plano, & omne triangulum in uno plano consistit.

Duæ enim rectæ lineæ AB CD se invicem in puncto E secant. Dico ipsas AB CD in uno esse plano, & omne triangulum in uno plano consistere. Sumantur enim in ipsis EB EC quævis puncta FG ; junganturque CB FG , & FH GK ducantur. Dico primum EBC triangulum consistere in uno plano. si enim trianguli EBC pars quædam FHC , vel GBK in subiecto plano est, reliqua vero in alio plano; erit & linearum EB EC pars in subiecto plano, & pars in alio. quod si trianguli EBC pars $FCBG$ sit in subiecto plano, reliqua vero in alio, utrarumque rectarum linearum EC EB quædam pars erit in subiecto plano, quædam vero in alio. quod absurdum esse ostendimus. *triangulum igitur EBC in uno est plano. in quo autem plano est BCE triangulum, in hoc est utraque ipsarum EC EB : in quo autem utraque ipsarum EC EB , in hoc sunt & AB CD . Ergo rectæ lineæ AB CD in uno sunt plano, & omne triangulum in uno plano consistit. Quod erat demonstrandum.*




PROP. III. THEOR.

Si duo plana se invicem secant, communis ipsorum sectio recta linea erit.

Duo plana AB BC se invicem secant, communis autem ipsorum sectio sit DB linea. Dico lineam DB rectam esse.

Si enim non ita sit, ducatur à puncto D ad B in plano quidem AB recta linea DEB ; in plano autem BC recta linea DFB . erunt utique duarum rectarum linearum DEB DFB iidem termini, & ipsæ spatium continebunt, quod est absurdum. non igitur DEB DFB rectæ lineæ sunt. si-⁴ Axio. 10. militer ostendemus neque aliam quampiam, quæ à puncto ^{Primi.} D ab B ducitur rectam esse, præter ipsam DB communem scilicet planorum AB BC sectionem. Si igitur duo plana se invicem secant, communis ipsorum sectio recta linea erit. Quod ostendere oportebat.




L

PROP.

PROP. IV. THEOR.

Si recta linea duabus rectis lineis se invicem secantibus in communi sectione ad rectos angulos insistat; etiam ducto per ipsas plano ad rectos angulos erit.

Recta linea quædam EF duabus rectis lineis AB CD se invicem secantibus in E puncto, ab ipso E ad rectos angulos insistat. Dico EF etiam plano per AB CD ducto ad rectos angulos esse. Sumantur rectæ lineæ EA EB CE DE inter se æquales: perque E ducatur recta linea GEH utcunque: & jungantur AD CB; deinde à quovis puncto F ducantur FA FG FD FC FH FB. & quoniam duæ rectæ lineæ AE ED duabus rectis lineis CE EB æquales sunt, &




angulos æquales AED CEB continent, erit ^a AD basis basi
^a 15. primi. CB æqualis, & triangulum AED triangulo CEB æquale.
^b 4. primi. ergo & angulus DAE æqualis est angulo EBC. est autem
 & angulus AEG æqualis angulo BEH. duo igitur triangula
 sunt AGE BEH, duos angulos duobus angulis æquales habentia,
 alterum alteri, & unum latus AE uni lateri EB æquale
 quod est ad æquales angulos. quare & reliqua latera
^c 26. primi. reliquis lateribus æqualia habebunt. ergo GE quidem est
 æqualis EH; AG vero ipsi BH. quod cum AE sit æqualis
 EB, communis autem, & ad rectos angulos FE; erit ^b basis
 AF basi FB æqualis; eadem quoque ratione & CF æqualis
 erit FD. præterea quoniam AD est æqualis CB, & AF ipsi
 FB, erunt duæ FA AD duabus FB BC æquales, altera al-
^d 8. primi. teri; & ostensa est basis DF æqualis basi FC. angulus ^d igitur
 FAD angulo FBC est æqualis. rursus ostensa est AG æqualis
 BH, sed & AF ipsi FB est æqualis. duæ igitur FA AG
 duabus FB BH æquales sunt, & angulus FAG æqualis est
 angulo FBH; ut demonstratum fuit, basis igitur GF basi FH
 est ^b æqualis. rursus quoniam GE ostensa est æqualis EH,
 communis autem EF; erunt duæ GE EF æquales duabus
 HE EF; & basis HF est æqualis basi FG. angulus ^d igitur
 GEF angulo HEF est æqualis, & idcirco rectus est uterque
 angulorum GEF HEF. ergo FE ad GH utcunque per E ductam
 rectos efficit angulos. similiter ostendemus FE etiam ad
 omnes rectas lineas, quæ ipsam contingunt, & in sub-
 jecto sunt plano, rectos angulos efficere. recta autem ad
^e 3. Def. hujus. planum recta est ^c quando ad omnes rectas lineas ipsam
 contingentes,

tingentes, & eodem existentes plano rectos efficit angulos. quare FE subiecto plano ad rectos angulos insistit. at subiectum planum est quod per AB CD rectas lineas ducitur. ergo FE ad rectos angulos erit ducto per AB CD plano. Si igitur recta linea duabus rectis lineis se invicem secantibus in communi sectione ad rectos angulos insistat, etiam ducto per ipsas plano ad rectos angulos erit. Quod demonstrare oportebat.

PROP. V. THEOR.

Si recta linea tribus rectis lineis sese tangentibus, in communi sectione, ad rectos angulos insistat, tres illa recta linea in uno plano erunt.

Recta linea quædam AB tribus rectis lineis BC BD BE, in contactu B, ad rectos angulos insistat. Dico BC BD BE in uno plano esse. Non enim, sed si fieri potest, sint BD BE quidem in subiecto plano; BC vero in sublimi, & planum per



a 3. hujus.

AB BC producat. communem utique sectionem in subiecto plano faciet a rectam lineam; faciat BF. in uno igitur sunt plano per AB BC ducto, tres rectæ lineæ AB BC BF. & quoniam AB utrique ipsarum BD BE ad rectos angulos insistit, & ducto per ipsas DB BE plano b ad rectos angulos erit. planum autem per DB BE est b 4. hujus. subiectum planum. ergo AB ad subiectum planum recta est. quare & ad omnes rectas lineas ipsam contingentes, quæ c 3. Def. in eodem plano sunt, rectos faciet angulos; sed ipsam tan- hujus. git BF in subiecto existens plano. ergo angulus ABF rectus est. ponitur autem & ABC angulus rectus. æqualis igitur est angulus ABF angulo ABC, & in eodem sunt plano; quod fieri non potest. recta igitur linea BC non est in sublimi; quare tres rectæ lineæ BC BD BE in uno sunt plano. Si igitur recta linea tribus rectis lineis sese tangentibus, in communi sectione, ad rectos angulos insistat, tres illæ rectæ lineæ in uno plano erunt. Quod demonstrare oportebat.

PROP. VI. THEOR.

Si dua recta linea eidem plano ad rectos angulos fuerint, illa inter sese parallela erunt.

Dux enim rectæ lineæ AB CD subiecto plano sint ad rectos angulos. Dico AB ipsi CD parallelam esse. Occurrant

a 3. Def.
hujus.

b 4. primi.


c 8. primi.

d 5. hujus.

e 2. hujus.

f 28. primi.


enim subjecto plano in punctis B D, jungaturque BD recta linea, cui ad rectos angulos in subjecto plano ducatur DE, & posita DE ipsi AB æquali, jungantur BE AE AD. Quoniam igitur AB recta est ad subjectum planum, & ad omnes rectas lineas quæ ipsam contingunt, & in subjecto sunt plano, rectos angulos efficiet. contingit autem AB utraque ipsarum BD BE existens in subjecto plano. ergo uterque angulorum ABD ABE rectus est. eadem ratione rectus etiam est uterque ipsorum CDB CDE. & quoniam AB æqualis est ipsi DE, communis autem BD. erunt duæ AB BD duabus ED DE æquales, & rectos angulos continent; basis igitur AD basi BE est æqualis. rursus quoniam AB est æqualis DE, & AD ipsi BE, duæ AB BE duabus ED DA æquales sunt, & basis ipsarum AE communis; ergo angulus ABE angulo EDA est æqualis. sed ABE rectus est. rectus igitur & EDA; & idcirco ED ad DA est perpendicularis. sed & perpendicularis est ad utramque ipsarum BD DC. quare ED tribus rectis lineis BD DA DC in contactu ad rectos insistit angulos. tres igitur rectæ lineæ BD DA DC in uno sunt plano. in quo autem sunt BD DA, in eo est AB, omne enim triangulum in uno est plano. ergo AB BD DC in uno plano sunt necesse est; atque est uterque angulorum ABD BDC rectus. parallela igitur fuit AB ipsi CD. Quare si duæ rectæ lineæ eidem plano ad rectos angulos fuerint, illæ inter se parallelæ erunt. Q.E.D.



PROP. VII. THEOR.

Si dua recta linea parallela sint, sumantur autem in utraque ipsarum qualibet puncta; qua dicta puncta conjungit recta in eodem erit plano, in quo & parallela.

Sint duæ rectæ lineæ parallelæ AB CD, & in utraque ipsarum sumantur quælibet puncta EF. Dico rectam lineam quæ puncta E F conjungit, in eodem plano esse, in quo sunt parallelæ. Non enim, sed si fieri potest, sit in sublimi, ut EGF, & per EGF, planum ducatur quod



a 3. hujus. in subjecto plano sectionem faciet rectam lineam; faciat ut

ut EF. ergo duæ rectæ lineæ EGF EF spatium continebunt, quod fieri non potest. non igitur quæ à puncto E ad F ducitur recta linea in sublimi est plano, quare erit in eo quod per AB CD parallelas transit. Si igitur duæ rectæ lineæ parallelæ sint, &c. Quod oportebat demonstrare.

PROP. VIII. THEOR.


Si dua recta linea parallela sint, altera autem ipsarum plano alicui sit ad rectos angulos, & reliqua eidem plano ad rectos angulos erit.

Sint duæ rectæ lineæ parallelæ AB CD, & altera ipsarum AB subjecto plano sit ad rectos angulos. Dico & reliquam CD eidem plano ad rectos angulos esse. Occurrant enim AB CD subjecto plano in punctis B D, & BD jungatur. ergo AB CD BD in uno sunt plano. ducatur ipsi BD ad rectos angulos in subjecto plano DE: & ponatur DE ipsi AB æqualis: junganturque BE AE AD. & quoniam AB perpendicularis est ad subjectum planum, & ad omnes rectas lineas quæ ipsam contingunt suntque in subjecto plano, perpendicularis erit. rectus igitur est uterque angulorum ABD ABE. quod cum in parallelas rectas lineas AB CD recta incidit BD, erunt anguli ABD CDB duobus rectis æquales. rectus autem est ABD. ergo & CDB est rectus; ac propterea CD perpendicularis est ad BD. & quoniam AB est æqualis DE, communis autem BD, duæ AB BD duabus ED DB æquales sunt; & angulus ABD est æqualis angulo EDB, rectus enim uterque est, basis igitur AD basi BE est æqualis. rursus quoniam AB æqualis est DE, & BE ipsi AD; erunt duæ AB BE duabus ED DA æquales, altera alteri; & basis earum communis AE. quare angulus ABE est æqualis angulo EDA. rectus autem est ABE. ergo & EDA est rectus, & ED ad DA perpendicularis. sed & perpendicularis est ad BD. ergo ED etiam ad planum per BD DA perpendicularis erit, & ad omnes rectas lineas quæ in eodem existentes plano ipsam contingunt, rectos faciet angulos. at in plano per BD DA est DC, quoniam in plano per BD DA sunt AB BD: in quo autem sunt AB BD in eodem est ipsa DC. quare ED ipsi CD est ad rectos angulos: ideoque CD ad rectos angulos est ipsi DE; sed & etiam ipsi DB. ergo CD duabus rectis lineis DE DB se mutuo secantibus in communi sectione D ad rectos angulos insistit; ac propterea plano per DE DB est ad rectos angulos. planum autem per DE DB est subjectum planum. Ergo CD subjecto plano ad rectos angulos erit. Quod demonstrare oportebat.

PROP. IX. THEOR.

Quæ eidem rectæ lineæ sunt parallela, non existentes in eodem in quo ipsa plano, etiam inter se parallela erunt.

Sit utraque ipsarum AB CD parallela ipsi EF , non existentes in eodem, in quo ipsa plano. Dico AB ipsi CD parallelam esse. Sumatur in EF quodvis punctum G , à quo ipsi EF , in plano quidem per EF AB transeunte, ad rectos angulos ducatur GH ; in plano autem transeunti per EF CD , rursus ducatur ipsi EF ad rectos angulos GK . & quoniam EF ad utramque ipsarum GH GK est perpendi-




- a 4. hujus. cularis, erit EF etiam ad rectos α angulos plano per GH GK transeunte. atque est EF ipsi AB parallela. ergo & AB plano per HGK ad rectos angulos β est. eadem ratione & CD plano per HGK est ad rectos angulos. utraque igitur ipsarum AB CD plano per HGK ad rectos angulos erit. Si autem duæ rectæ lineæ eidem plano ad rectos angulos fuerint, parallelæ ϵ erunt inter se. Ergo AB ipsi CD est parallela. Quod demonstrare oportebat.
- b 8. hujus.
- c 6. hujus.

PROP. X. THEOR.

Si duæ rectæ lineæ sese contingentes, duabus rectis lineis sese contingentibus sint parallela, non autem in eodem plano; æquales angulos continebunt.

Duæ rectæ lineæ sese contingentes AB BC , duabus rectis lineis DE EF sese contingentibus sint parallelæ, non autem in eodem plano. Dico angulum ABC angulo DEF æqualem esse. Assumantur enim BA BC ED EF inter se æquales; & jungantur AD CF BE AC DF . quoniam igitur BA ipsi ED æqualis est & parallela, erit & α AD æqualis & parallela ipsi BE . eadem ratione & CF ipsi BE æqualis & parallela erit. utraque igitur ipsarum AD CF ipsi BE æqualis est & parallela. quæ autem eidem rectæ lineæ sunt parallelæ, non existentes in eodem plano; & in-



a 33. primi.


ter

ter se parallelæ^b erunt. ergo AD parallela est ipsi CF &^b 9. hujus.
 æqualis. atque ipsas conjungunt AC DF; & AC igitur ipsi
 DF æqualis est & c parallela. & quoniam duæ rectæ lineæ c 33. primi.
 AB BC duabus DE EF æquales sunt, & basis AC est æqualis
 basi DF; erit^d angulus ABC angulo DEF æqualis. Si igitur^d 8. primi.
 duæ rectæ lineæ sese contingentes, duabus rectis lineis sese
 contingentibus sint parallelæ, non autem in eodem plano;
 æquales angulos continebunt. Quod oportebat demon-
 strare.

PROP. XI. PROBL.

*A dato puncto in sublimi, ad subiectum planum, perpendi-
 cularem rectam lineam ducere.*

Sit datum quidem punctum in sublimi A, datum autem
 subiectum planum BH. Oportet à puncto A ad subiectum
 planum perpendicularem rectam lineam ducere. In subje-
 cto plano ducatur quædam recta linea utcunque BC, & à
 puncto A ad BC perpendicu-
 laris agatur^a AD. siquidem
 igitur AD perpendiculis
 sit etiam ad subiectum pla-
 num; factum jam erit, quod
 proponebatur: sin minus;
 ducatur à puncto D ipsi BC,
 in subiecto plano, ad rectos
 angulos DE: & à puncto A ad DE perpendiculis^a du-^b 11. primi.
 catur AF. denique per F ducatur GH ipsi BC c parallela. c 31. primi.
 Quoniam BC utrique ipsarum DA DE est ad rectos angulos,
 erit^d & BC ad rectos angulos plano per DA DE transeunti.^d 4. hujus.
 quin ipsi BC parallela est GH; si autem sint duæ rectæ lineæ
 parallelæ, quarum una plano alicui sit ad rectos angulos;
 & reliqua eodem plano ad rectos angulos erit. quare & c 8. hujus.
 GH plano per ED DA transeunti ad rectos angulos est: ac
 propterea ad omnes rectas lineas, quæ in eodem plano ex-
 istentes ipsam contingunt est^f perpendiculis. contingit^f 3. Def.
 autem ipsam AF existens in plano per ED DA. ergo GH^{hujus}.
 perpendiculis est ad AF. & ob id AF est perpendiculis
 ad GH: est autem AF ad DE perpendiculis. ergo AF
 perpendiculis est ad utramque ipsarum HG DE. si autem
 recta linea duabus rectis lineis sese contingentibus, in com-
 muni sectione, ad rectos angulos insistat, etiam plano per
 ipsas ducto ad rectos angulos^d erit. quare AF plano per
 ED GH ducto est ad rectos angulos. planum autem per
 ED GH est subiectum planum. ergo AF ad subiectum pla-
 num est perpendiculis. A dato igitur puncto sublimi A, ad



a 11. primi.

subjectum planum, perpendicularis recta linea ducta est AF.
Quod facere oportebat.

PROP. XII. PROBL.


Dato plano, à puncto quod in ipso datum est, ad rectos angulos rectam lineam constituere.

Sit datum quidem planum subjectum, punctum autem quod in ipso sit A. Oportet à puncto A subjecto plano ad rectos angulos rectam lineam constituere. Intelligatur aliquod punctum sublime B, à quo ad subjectum planum a-

a 11. hujus. gatur a perpendicularis BC;

b 31. primi & per A ipsi BC parallela

ducatur AD. quoniam igitur duæ rectæ lineæ parallelæ sunt AD CB, una autem ipsarum BC subjecto plano est ad rectos angulos; & reliqua a AD subjecto plano ad rectos angulos erit. Dato igitur plano à puncto quod in ipso est datum, ad rectos angulos recta linea constituta est. Quod facere oportebat.



PROP. XIII. THEOR.

Dato plano, à puncto quod in ipso est, duæ rectæ lineæ ad rectos angulos non constituentur ex eadem parte.

Si enim fieri potest, dato plano, à puncto quod in ipso est A, duæ rectæ lineæ AB AC ad rectos angulos constituentur ex eadem parte: & ducatur

planum per BA AC, quod faciet sectionem per A in

a 3. hujus. subjecto plano a rectam line-

am. faciat DAE. ergo rectæ

lineæ AB AC DAE in uno


sunt plano. & quoniam ca

subjecto plano ad rectos an-

b 3. Def. hujus.

gulos est, & ad b omnes rectas lineas, quæ in subjecto plano existentes ipsam contingunt, rectos faciet angulos. contingit autem ipsam DAE, quæ est in subjecto plano. angulus igitur CAE rectus est. eadem ratione & rectus est BAE. ergo angulus CAE ipsi BAE est æqualis. & in uno sunt plano, quod fieri non potest. Non igitur dato plano, à puncto, quod in ipso est, duæ rectæ lineæ ad rectos angulos constituentur ex eadem parte. Quod oportebat demonstrare.

c 9. axiom. primi.




PROP.

PROP. XIV. THEOR.

Ad quæ plana, eadem recta linea est perpendicularis, ea parallela sunt.

Recta quædam linea AB ad utrumque ipsorum planorum CD EF sit perpendicularis. Dico ea plana parallela esse. Si enim non ita sit, producta convenient inter se: convenient, & communem sectionem faciant rectam lineam GH; & in ipsa GH sumpto quovis puncto K, jungatur AK BK. Quoniam igitur AB perpendicularis est ad EF planum; erit & perpendicularis ad ipsam BK^a rectam lineam in plano EF producto existentem. quare angulus ABK rectus est. eadem ratione & BAK est rectus: ideoque trianguli ABK duo anguli ABK BAK duobus rectis sunt æquales, quod fieri non^b potest. non igitur plana CD EF^b 17. primi producta inter se convenient. quare CD EF parallela sint necesse est. Ad quæ igitur plana, eadem recta linea est perpendicularis, ea parallela sunt. Quod demonstrare oportebat.




^a 3. Def. hujus.

PROP. XV. THEOR.

Si dua recta linea sese tangentes duabus rectis lineis sese tangentibus sint parallela, non autem in eodem plano; & qua per ipsas transeunt plana parallela erunt.

Duæ rectæ lineæ sese tangentes AB BC, duabus rectis lineis sese tangentibus DE EF parallelæ sint, & non in eodem plano. Dico plana quæ per AB BC, DE EF transeunt, si producantur, inter se non convenire. Ducatur à puncto B ad planum, quod per DE EF transit, perpendicularis BG, quæ plano in puncto G occurrat, & per G ducatur ipsi quidem ED parallela GH; ipsi vero EF parallela GK. itaque quoniam BG perpendicularis est ad planum per DE EF; & ad omnes rectas lineas quæ ipsam contingunt, & in eodem sunt plano, rectos faciet^a angulos. ^a 3. Def. contingit autem ipsam utraque earum GH GK, quæ sunt in eodem




eodem plano. rectus igitur est uterque angulorum BGH
 BGK. & quoniam BA parallela est ipsi GH, anguli GBA
 b 29. primi. BGH duobus rectis sunt ^b æquales. rectus autem est BGH.
 ergo & GBA rectus erit, ideoque GB ad BA est perpendi-
 cularis. eadem ratione & GB est perpendicularis ad BC.
 cum igitur recta linea BG duabus rectis lineis BA BC se
 invicem secantibus ad rectos angulos infistat; erit BG etiam
 c 4. hujus. ad planum per BA BC ductum ^c perpendicularis. atque est
 ad planum per DE EF perpendicularis. ergo BG perpendi-
 cularis est ad utrumque planorum quæ per AB BC, DE EF
 transeunt. Ad quæ vero plana eadem recta linea est per-
 d 14. hujus. pendicularis, ea parallela ^d sunt. parallelum igitur est pla-
 num per AB BC plano per DE EF. Quare si duæ rectæ lineæ
 sese tangentes duabus rectis lineis sese tangentibus sint pa-
 rallæ, non autem in eodem plano, & quæ per ipsas tran-
 seunt plana parallela erunt. Quod demonstrare oportebat.

PROP. XVI. THEOR.

*Si duo plana parallela ab aliquo plano secantur, communes
 ipsorum sectiones parallela erunt.*

Duo plana parallela AB CD à plano aliquo EFGH se-
 centur; communes autem ipsorum sectiones sint EF GH.
 Dico EF ipsi GH parallelam esse. Si enim non est parallela,
 productæ EF GH inter se convenient, vel ad partes FH, vel
 ad partes EG. producantur prius ut ad
 partes FH, & convenient in K. quoniam
 igitur EFK est in plano AB, & omnia
 quæ in EFK sumuntur puncta in eo-
 dem plano erunt: unum autem puncto-
 rum quæ sunt in EFK, est ipsum K
 punctum. ergo K est in plano AB. ea-
 dem ratione & K est in CD plano. ergo
 plana AB CD producta inter se con-
 venient. non convenient autem, cum pa-
 rallæ ponantur. non igitur EF GH
 rectæ lineæ productæ convenient ad
 partes FH. similiter demonstrabimus
 neque ad partes EG convenire, si producantur. quæ autem
 neutra ex parte convenient parallela sunt. ergo EF ipsi
 GH est parallela. Si igitur duo plana parallela ab aliquo
 plano secantur, communes ipsorum sectiones parallela e-
 runt. Quod demonstrare oportebat.




PROP.

PROP. XVII. THEOR.

Si duæ rectæ lineæ à parallelis secantur planis, in easdem proportionibus secabuntur.

Duæ rectæ lineæ AB CD à parallelis planis GH KL MN secantur in punctis A, E, B, C, F, D . Dico ut AE recta linea ad ipsam EB , ita esse CF ad FD . Jungantur enim AC BD AD : & occurrat AD plano KL in puncto X : & EX XF jungantur. Quoniam igitur duo plana parallela KL MN à plano $EBDX$ secantur, communes ipsorum sectiones EX BD parallelae sunt. eadem ratione quoniam duo plana parallela GH KL à plano $AXFC$ secantur, communes ipsorum sectiones AC FX sunt parallelae. & quoniam uni laterum trianguli ABD , videlicet ipsi BD parallela ducta est EX , ut AE ad EB ita erit AX ad XD . rursus quoniam uni laterum trianguli ADC , nempe ipsi AC parallela ducta est XF , erit ut AX ad XD , ita CF ad FD . ostensum autem est ut AX ad XD , ita esse AE ad EB . ut igitur AE ad EB , ita est CF ad FD . Quare si duæ rectæ lineæ à parallelis secantur planis, in easdem proportionibus secabuntur. Quod demonstrare oportebat.




a 16. hujus.

b 2. sexti.

PROP. XVIII. THEOR.


Si recta linea plano alicui sit ad rectos angulos, & omnia quæ per ipsam transeunt plana eidem plano ad rectos angulos erunt.

Recta linea quædam AB subjecto plano sit ad rectos angulos. Dico & omnia plana quæ per ipsam AB transeunt, subjecto plano ad rectos angulos esse. Producat enim per AB planum DE , sitque plani DE , & subjecti plani communis sectio CE : & sumatur in CE quodvis punctum F ; à quo ipsi CE ad rectos angulos, in DE plano, ducatur FG . quoniam igitur AB ad subjectum planum est perpendicularis; & ad omnes rectas lineas, quæ ipsam contingunt & in eodem sunt plano perpendicularis erit. quare etiam



a 3. Def. hujus.


- etiam ad CE est perpendicularis. angulus igitur ABF rectus
 b 28. primi. est: sed & GFB est rectus. ergo AB parallela b est ipsi FG .
 est autem AB subiecto plano ad rectos angulos, & FG
 igitur eidem plano ad rectos
 c 8. hujus. angulos c erit. at planum
 ad planum rectum est, quan-
 do communi planorum sec-
 tioni ad rectos angulos
 ductæ rectæ lineæ in uno
 d 4. Def. planorum, reliquo plano ad rectos angulos d sunt: commu-
 hujus. vi vero planorum sectioni CE in uno plano DE ad rectos an-
 gulos ducta FG , ostensa est subiecto plano ad rectos esse
 angulos. ergo planum DE rectum est ad subiectum planum.
 similiter demonstrabuntur & omnia quæ per AB transeunt
 plana subiecto plano recta esse. Si igitur recta linea plano
 alicui sit ad rectos angulos, & omnia quæ per ipsam tran-
 seunt plana eidem plano ad rectos angulos erunt. Quod
 oportebat demonstrare.



PROP. XIX. THEOR.

Si duo plana se invicem secantia plano alicui sint ad rectos angulos; & communis ipforum sectio eidem plano ad rectos angulos erit.

- Duo plana se invicem secantia AB BC subiecto plano
 sint ad rectos angulos: communis autem ipforum sectio sit
 BD . Dico BD subiecto plano ad rectos angulos esse. Non
 enim, sed si fieri potest; non sit BD ad
 rectos angulos subiecto plano; & à
 puncto D ducatur in plano quidem AB ,
 rectæ lineæ AD ad rectos angulos ipsa
 DE : in plano autem BC ducatur ipsi
 CD ad rectos angulos DF . Et quoniam
 planum AB ad subiectum planum rectum
 est, & communi ipforum sectioni AD
 ad rectos angulos in plano AB ducta est
 DE , erit d 4. Def. DE ad subiectum planum per-
 hujus. pendicularis. similiter ostendemus & DF
 perpendicularem esse ad subiectum pla-
 num. quare ab eodem puncto D sub-
 jecto plano duæ rectæ lineæ ad rectos angulos constitutæ
 b 13. hujus. sunt ex eadem parte, quod fieri non b potest. non igitur
 subiecto plano à puncto D ad rectos angulos constituentur
 aliæ rectæ lineæ, præter ipsam DB , communem planorum




AB BC

AB BC sectionem. quare DB subjecto plano est perpendicularis. Ergo si duo plana se invicem secantia plano alicui sint ad rectos angulos; & communis ipsorum sectio eidem plano ad rectos angulos erit. Quod oportebat demonstrare.

PROP. XX. THEOR.

Si solidus angulus tribus angulis planis contineatur, duo quilibet reliquo majores sunt, quomodocunque sumpti.

Solidus angulus ad A tribus angulis planis BAC CAD DAB contineatur. Dico angulorum BAC CAD DAB duos quolibet reliquo majores esse, quomodocunque sumptos. Si enim BAC CAD DAB anguli inter se æquales sint, perspicuum est duos quolibet reliquo majores esse, quomodocunque sumptos. sin minus, sit major BAC. & ad rectam lineam AB, & ad punctum in ipsa A, constituitur ^a angulo DAB, in plano per BA AC transeunte, ^a 23. primi. æqualis angulus BAE; ponaturque ipsi AD æqualis AE; & per E ducta BEC fecet rectas lineas AB AC in punctis BC, & DB DC jungantur. itaque quoniam DA est æqualis AE, communis autem AB, duæ DA AB æquales sunt duabus AE AB; & angulus DAB æqualis est angulo BAE. basis igitur DB basi BE est ^b æqualis. & quoniam duæ DB DC ipsa BC majores ^b 4. primi. sunt ^c, quarum DB æqualis ostensa est ipsi BE; erit reliqua ^c 20. primi. DC quam reliqua EC major. quod cum DA sit æqualis AE, communis autem AC & basis DC major basi EC; erit ^d angulus DAC angulo EAC major. sed ex constructione est DAB angulus æqualis ipsi BAE. quare DAB DAC anguli, angulo BAC majores sunt. similiter demonstrabimus, & si duo quilibet alii sumantur, eos reliquo esse majores. Si igitur solidus angulus tribus angulis planis contineatur; duo quilibet reliquo majores sunt, quomodocunque sumpti. Quod demonstrare oportebat.



PROP. XXI. THEOR.


Omnis solidus angulus, minoribus quam quatuor rectis angulis planis continetur.

Sit solidus angulus ad A, planis angulis BAC CAD DAB con-

contentus. Dico angulos BAC CAD DAB quatuor rectis esse minores. Sumantur enim in unaquaque ipsarum AB AC AD quævis puncta B C D , & BC CD DB jungantur. Quo-

20. hujus.

nam igitur solidus angulus ad B , tribus angulis planis continetur CBA ABD CBD , duo quilibet reliquo majores sunt: anguli igitur CBA ABD , angulo CBD sunt majores. eadem ratione, & anguli quidem BCA ACD majores sunt



angulo BCD ; anguli vero CDA ADB majores angulo CDB . quare sex anguli CBA ABD BCA ACD CDA ADB tribus angulis CBD BCD CDB sunt majores. sed tres anguli CBD

32. primi.

BDC DCB sunt æquales duobus rectis. sex igitur anguli CBA ABD BCA ACD CDA ADB duobus rectis majores sunt. quod cum singulorum triangulorum ABC ACD ADB tres anguli sint æquales duobus rectis, erunt trium triangulorum novem anguli CBA ACB BAC ACD DAC CDA ADB DBA BAD æquales sex rectis. quorum sex anguli ABC BCA ACD CDA ADB DBA duobus rectis sunt majores. reliqui igitur BAC CAD DAB tres anguli, qui solidum continent angulum, quatuor rectis minores erunt. Quare omnis solidus angulus, minoribus quam quatuor rectis angulis planis continetur. Quod oportebat demonstrare.

PROP. XXII. THEOR.

Si sint tres anguli plani, quorum duo reliquo sint majores, quomodocunque sumpti, contineant autem ipsos rectæ lineæ æquales; fieri potest, ut ex iis quæ rectas æquales conjungunt, triangulum constituatur.

Sint dati tres anguli plani ABC DEF GHK , quorum duo reliquo sint majores, quomodocunque sumpti: contineant autem ipsos æquales rectæ lineæ AB BC , DE EF , GH HK , & AC DF GK jungantur. Dico fieri posse ut ex æqualibus ipsis AC DF GK triangulum constituatur: hoc est duas reliqua majores esse quomodocunque sumptas. Si igitur anguli


4. primi.

ad B E H sint æquales, & AC DF GK æquales erunt, & duæ reliqua majores. sin minus, sint inæquales anguli ad B E H , & major sit angulus ad B utrovis ipsorum qui sunt

24. primi.

ad E H . major igitur est & recta linea AC utraque ipsarum DF GK . & manifestum est ipsam AC unâ cum altera ipsarum DF GK , reliqua esse majorem. Dico & DF GK ipsa AC majores

maiores esse. constituatur ϵ ad rectam lineam AB, & ad pun-^{c 23. primi.}
ctum in ea B, angulo GHK æqualis angulus ABL, & uni




ipsarum AB BC, DE EF, GH HK ponatur æqualis BL, &
AL CL jungantur. Quoniam igitur duæ AB BL duabus GH
HK æquales sunt, altera alteri, & angulos æquales conti-
nent; erit basis AL basi GK æqualis. & quoniam anguli
ad E H, angulo ABC majores sunt, quorum angulus GHK est
æqualis ipsi ABL; erit reliquus qui ad E, angulo LBC ma-
jor. quod cum duæ LB BC duabus DE EF æquales sunt,
altera alteri; & angulus DEF angulo LBC major; basis DF
basi LC major^d erit. ostensa est autem GK æqualis AL.^{d 24. primi.}
ergo DF GK ipsis AL LC sunt majores; sed AL LC ma-
jores ϵ sunt ipsa AC. multo igitur DF GK, ipsa AC majores ϵ 20. primi.
erunt. Quare rectarum linearum AC DF GK duæ reliqua
majores sunt, quomodocunque sumptæ; ac propterea^f fieri^{f 22. primi.}
potest ut ex æqualibus ipsis AC DF GK triangulum consti-
tuatur. Quod oportebat demonstrare.

PROP. XXIII. PROBL.

*Ex tribus angulis planis, quorum duo reliquo sunt majores,
quomodocunque sumpti, solidum angulum constituere. o-
portet autem tres angulos quatuor rectis esse minores.*



Sint dati tres anguli plani ABC DEF GHK, quorum duo
reliquo sint majores, quomodocunque sumpti, sintque tres



anguli quatuor rectis minores. Oportet ex æqualibus ipsis
ABC DEF GHK solidum angulum constituere. abscindantur
æquales AB BC, DE EF, GH HK; & AC DF GK jungantur.
fieri

fieri igitur potest ut ex æqualibus ipsis AC DF GK consti-
 a 22. huius. tuatur ^a triangulum. Itaque ^b constituatur LMN, ita ut AC
 b 22. primi. quidem sit æqualis LM, DF vero ipsi MN: & præterea GK
 c 5. quarti. ipsi LN, & circa LMN triangulum circulus LMN ^c descri-
 batur: sumaturque ipsius centrum X, quod vel erit in-
 tra triangulum LMN, vel in uno ejus latere, vel extra.
 sit primo intra: & LX MX NX jungantur. Dico AB

majorem esse ipsa LX.
 Si enim non ita sit, vel
 AB erit æqualis LX,
 vel ea minor. sit pri-
 mo æqualis. quoni-
 am igitur AB est æ-
 qualis LX, atque est
 AB ipsi BC æqualis;
 erit LX æqualis BC,
 est autem LX æqualis



XM. duæ igitur AB BC duabus LX XM æquales sunt, al-
 tera alteri; & AC basis basi LM æqualis ponitur. quare

d 8. primi. ^d angulus ABC angulo LXM est æqualis: eadem ratione &
 angulus quidem DEF est æqualis angulo MXN, angulus
 vero GHK angulo NXL. tres igitur anguli ABC DEF GHK
 tribus LXM MXN NXL æquales sunt. sed tres LXM MXN

e 2. Cor. 15. NXL quatuor rectis sunt ^e æquales. ergo & tres ABC DEF
 primi. GHK æquales erunt quatuor rectis. atqui ponuntur quatuor
 rectis minores, quod est absurdum. non igitur AB ipsi LX

est æqualis. Dico præterea neque AB minorem esse ipsa LX.
 si enim fieri potest, sit minor, & ponatur ipsi quidem AB
 æqualis XO, ipsi vero BC æqualis XP, & OP jungatur. quo-
 niam igitur AB est æqualis BC, & XO ipsi XP æqualis erit.
 ergo & reliqua OL reliquæ PM est æqualis; ac propterea

f 2. sexti. LM parallela ^f est ipsi OP; & LMX triangulum triangulo
 g 4. sexti. OPX æquiangulum. est ^g igitur ut XL ad LM, ita XO ad
 OP; & permutando ut XL ad XO, ita LM ad OP. major
 autem est LX, quam XO. ergo & LM quam OP est major.
 sed LM posita est æqualis AC. & AC igitur quam OP ma-
 jor erit. itaque quoniam duæ rectæ lineæ AB BC duabus

h 25. primi. OX XP æquales sunt, & basis AC major basi OP; erit ^h an-
 gulus ABC angulo OXP major. similiter demonstrabimus
 & DEF angulum majorem esse angulo MXN, & angulum
 GHK angulo NXL; tres igitur anguli ABC DEF GHK tri-
 bus LXM MXN NXL sunt majores. at anguli ABC DEF
 GHK quatuor rectis minores ponuntur. multo igitur anguli


i 2. Cor. 15. LXM MXN NXL minores erunt quatuor rectis. sed & ⁱ æ-
 primi. quales. quod est absurdum. non igitur AB minor est, quam

LX.

LX. ostensum autem est neque esse æqualem. ergo major sit
 necesse est. constituatur à puncto x circuli LMN plano ad $12.$ hujus.
 rectos angulos XR . & excessui quo quadratum ex AB su-
 perat quadratum ex LX , ponatur æquale quadratum quod
 fit ex RX , & RL RM RN jungantur. quoniam igitur RX
 perpendicularis est ad planum DMN circuli, & ad unam-
 quamque ipsarum LX MX NX erit 1 perpendicularis. & $3.$ Def.
 quoniam LX est æqualis XM , communis autem & ad rectos $hujus.$
 angulos XR , erit basis LR æqualis RM . eadem ratione $4.$ primi.
 & RN utrique ipsarum RL RM est æqualis. tres igitur
 rectæ linæ RL RM RN inter se æquales sunt. & quoniam
 quadratum XR ponitur æquale excessui, quo quadratum ex
 AB superat quadratum ex LX ; erit quadratum ex AB qua-
 dratis ex LX XR æquale. quadratis autem ex LX XR
 æquale est 2 quadratum ex RL ; rectus enim angulus est $47.$ primi.
 LXR . ergo quadratum ex AB quadrao ex RL æquale erit;
 ideoque AB ipsi RL est æqualis. sed ipsi quidem AB æqua-
 lis est unaquæque ipsarum BC DE EF GH HK : ipsi vero
 RL æqualis utraque ipsarum RM RN . unaquæque igitur
 ipsarum AB BC DE EF GH HK unicuique ipsarum RL RM
 RN est æqualis. quod cum duæ RL RM duabus AB BC
 æquales sint, & basis LM ponatur æqualis basi AC : erit
 • angulus LRM æqualis angulo ABC . eadem ratione & an- $8.$ primi.
 gulus quidem MRN angulo DEF , angulus autem LRN an-
 gulo GHK est æqualis. Ex tribus igitur angulis planis LRM
 MRN LRN , qui æquales sunt tribus datis ABC DEF GHK
 solidus angulus constitutus est ad R .

Sed sit centrum circuli in uno laterum trianguli, vide-
 licet in MN , quod sit x , & xL jungatur. Dico rursus AB
 majorem esse ipsa Lx .

Si enim non ita sit,
 vel AB est æqualis
 Lx vel ipsa minor. sit
 primo æqualis. duæ
 igitur AB BC , hoc
 est DE EF duabus MX
 xL , hoc est ipsi MN
 æquales sunt. sed MN
 ponitur æqualis DF .



ergo DE EF ipsi DF sunt æquales. quod fieri non potest $20.$ primi.
 non igitur AB est æqualis Lx . similiter neque minor. multo
 enim majus id, quod fieri non potest, sequeretur. ergo AB
 ipsa Lx major est. & similiter si excessui quo quadratum ex
 AB superat quadratum ex Lx æquale ponatur quadratum

M

ex

ex rx , & ipsa rx circuli plano ad rectos angulos constituitur, fiet problema.





Sed sit centrum circuli extra triangulum LMN , quod sit x , & Lx Mx Nx jungantur. Dico & sic AB ipsa Lx maiorem esse. Si enim non ita sit, vel æqualis est, vel minor. sit primo æqualis. ergo duæ AB BC duabus Mx Nx æquales sunt, altera alteri; & basis AC est æqualis basi ML , angulus igitur ABC æqualis est angulo MXL . eadem ratione & GHK angulus ipsi LxN est æqualis; ac propterea totus MxN æqualis duobus ABC GHK . sed & anguli

ABC GHK angulo DEF majores sunt. & angulus igitur MxN ipso

DEF est major. at quoniam duæ DE EF duabus Mx Nx æquales sunt, & basis DF æqualis basi MN , erit MxN angulus angulo DEF æqualis. ostensus autem est major, quod est absurdum.

non igitur AB est æqualis Lx : deinceps vero ostendemus neque minorem esse. quare major necessario erit. & si rursus circuli plano ad rectos angulos constituamus xR , & ipsam æqualem ponamus lateri quadrati ejus, quo quadratum ex AB superat quadratum ex Lx , problema constituetur. Dico vero neque minorem esse AB ipsa Lx . Si enim fieri potest, sit minor; & ipsi quidem AB æqualis ponatur xO , ipsi vero BC æqualis xP , & OP jungatur. quoniam igitur AB ipsi BC est æqualis, erit ox æqualis xP . ergo & reliqua OL reliquæ PM æqualis. parallela igitur est LM ipsi ro , & triangulum LMx triangulo Pxo æquiangulum est:

quare ut xL ad LM , ita xO ad OP : & permutando ut Lx ad xO ita LM ad OP . major autem est Lx quam xO . ergo LM quam OP est major. sed LM est æqualis AC . & AC igitur quam OP major erit



q 2. sexti.

r 4. sexti.


rit. itaque quoniam duæ AB BC duabus OX XP sunt æquales altera alteri; & basis AC major est basi OP; erit *s* angulus ABC angulo OXP major. similiter & si XR su-*s* 25. primi. matur æqualis utrivis ipfarum XO XP, & jungatur OR, ostendemus angulum GHK angulo OXR majorem. constituatur ad rectam lineam LX, & punctum in ipsa x angulo quidem ABC æqualis angulus LXS, angulo autem GHK æqualis LXT, & ponatur utraque xs XT ipsi OX æqualis: junganturque OS OT ST. & quoniam duæ AB BC duabus OX XS æquales sunt, & angulus ABC æqualis angulo OXS erit basis AC, hoc est LM, basi OS æqualis. eadem ratione, & LN est æqualis ipsi OT. quod cum duæ ML LN duabus OS OT sint æquales, & angulus MLN major angulo SOT; erit: & basis MN basi ST major. sed MN est æqualis DF. *s* 24. primi. ergo & DF quam ST major erit. quoniam igitur duæ DE EF duabus SX XT æquales sunt, & basis DF major basi ST; erit angulus DEF angulo SXT major. æqualis autem est angulus SXT angulis ABC GHK. ergo DEF angulus angulis ABC GHK major est: sed & minor. Quod fieri non potest. Quod demonstrare oportebat.

PROP. XXIV. THEOR.

Si solidum parallelis planis contineatur, opposita ipsius plana, & aequalia, & parallelogramma erunt.

Solidum enim CDGH parallelis planis AC GF BG CE FB AE contineatur. Dico opposita ejus plana, & aequalia, & parallelogramma esse. Quoniam enim duo plana parallela BG CE, à plano AC secantur, communes ipsorum sectiones *a* parallelæ sunt: ergo AB ipsi CD est parallela. rursus *a* 16. hujus.

quoniam duo plana parallela BF AE secantur à plano AC, communes ipsorum sectiones parallelæ *a* sunt: parallela igitur est AD ipsi BC. ostensa autem est & AB parallela CD. ergo AC parallelogrammum erit. similiter demon-



strabimus, & unumquodque ipsorum CE FG GB BF AE parallelogrammum esse. jungantur AH DF. & quoniam parallela est AB quidem ipsi DC; BH vero ipsi CF, erunt AB BH sese tangentibus, duabus DC CF sese tangentibus parallelæ, & non in eodem plano: quare æquales *b* angulos *b* 10. hujus. continebunt. angulus igitur ABH angulo DCF est æqualis. Et quoniam duæ AB BH duabus DC CF æquales *a* sunt, & *c* 34. primi.


d 4. primi. angulus ABG æqualis angulo DCF , erit d basis AH basi DF æqualis: & ABH triangulum æquale triangulo DCF . quod
e 34. primi. cum ipsius quidem ABH trianguli duplum sit BC parallelogrammum: ipsius vero DCF trianguli duplum parallelogrammum CE : erit BC parallelogrammum æquale parallelogrammo CE . similiter demonstrabimus & AC parallelogrammum parallelogrammo GF , & parallelogrammum AE parallelogrammo BF æquale esse. Si igitur solidum parallelis planis contineatur, opposita ipsius plana, & æqualia, & parallelogramma sunt. Quod oportebat demonstrare.

Cor. Ex jam demonstratis constat, si solidum parallelis contineatur planis, opposita ipsius plana, & æqualia esse, & similia, quippe quæ & singulos angulos æquales, & circa æquales angulos latera proportionalia habeant.

PROP. XXV. THEOR.

Si solidum parallelepipedum plano secetur oppositis planis parallelo, erit ut basis ad basim, ita solidum ad solidum.

Solidum enim parallelepipedum $ABCD$ plano YE secetur, oppositis planis RA DH parallelo. Dico ut EFA basis ad basim $EHCF$, ita esse $ABFY$ solidum ad solidum $EGCD$. Producat enim AH ex utraque parte: & ponantur ipsi



quidem EH æquales quotcunque HM MN ; ipsi vero AE æquales quotcunque AK KL , & compleantur parallelogramma LO $K\Phi$ HX MS , & solida LP KR $H\Omega$ MT . quoniam igitur æquales inter se sunt LK KA AE rectæ lineæ;
e 36. primi. erunt & parallelogramma LO $K\Phi$ AF inter se æqualia: itemque æqualia inter se parallelogramma $K\Phi$ KB AG , & adhuc
e 24. hujus. parallelogramma $L\Phi$ KP AR inter se æqualia; opposita enim sunt. eadem ratione & parallelogramma EC HX MS æqualia inter se sunt; itemque parallelogramma $H\Omega$ HI IN inter se æqualia: & insuper parallelogramma DH $M\Omega$ NT . tria igitur plana solidi LP æqualia sunt tribus planis solidi
e 29. primi. KR , atque etiam solidi AY , & similia quoque sunt: sed tria
tribus


tribus oppositis sunt similia & æqualia. ergo tria solida ^{d Cor. antecedent.} LP KR AY inter se æqualia erunt. eadem ratione & tria ^{e 10. Def. hujus.} solida ED HQ MT sunt æqualia inter se. quotuplex igitur est basis LF ipsius AF basis, totuplex est & LY solidum solidi AY. eadem ratione quotuplex est NF basis ipsius basis HF, totuplex est & solidum NY ipsius ED solidi: & si basis LF est æqualis basi NF, & solidum LY solido NY æquale erit; & si basis LF superat NF basim, & LY solidum NY superabit; & si minor, minus. quatuor igitur magnitudinibus existentibus, duabus scilicet basibus AF FH, & duobus solidis AY ED; sumpta sunt æque multiplicia, basis quidem AF, & AY solidi, videlicet basis LF, & solidum LY: basis vero HF, & ED solidi, nempe basis NF, & solidum NY. & demonstratum est si basis LF superat basim NF, & LY solidum solidum NY superare; & si æqualis æquale; & si minor minus. est igitur ^{f s. Def. quinz.} ut AF basis ad basim FH, ita AY solidum ad solidum ED. Quare si solidum parallelepipedum plano secetur, oppositis planis parallelo; erit ut basis ad basim, ita solidum ad solidum. Quod oportebat demonstrare.

PROP. XXVI. PROBL.

Ad datam rectam lineam, & ad datum in ipsa punctum dato angulo solido æqualem solidum angulum constituere.

Sit data quidem recta linea AB, datum autem in ipsa punctum A, & datus solidus angulus ad D qui EDC EDF FDC angulis planis continetur. Oportet ad datam rectam lineam AB, & ad datum in ipsa punctum A, dato angulo solido ad D æqualem solidum angulum constituere.

Sumatur in linea DF quodvis punctum F, à quo ad planum per ED DC transfrens ducatur perpendicularis FG, & plano in puncto G occurrat; jungaturque DG, & ad rectam lineam AB, & ad datum in ipsa punctum A, angulo quidem EDC æqualis angulus ^{b 23. primi.} constituatur BAL; angulo autem EDG constituatur æqualis BAK. deinde ipsi DG ponatur æqualis AK, & à puncto K plano per BAL ad rectos angulos erigatur HK; ponaturque ipsi ^{c 12. hujus.} GF æqualis KH, & HA jungatur. Dico angulum solidum ad A qui angulis BAL BAH HAL, continetur, æqualem esse solido angulo ad D, angulis EDC EDF FDC contento. Sumantur




a 11. hujus.

d 3. Def.
hujus.

e 4. primi.

f 8. primi.

mantur enim æquales rectæ lineæ AB, DE, & jungantur HB
KB FE GE. quoniam igitur FG perpendicularis est ad sub-
jectum planum, & ad omnes rectas lineas quæ ipsam con-
tingunt, suntque in subjecto plano, rectos faciet 4 angulos.
uterque igitur angulorum FGD FGE rectus est. eadem ra-
tione, & uterque ipsorum HKA HKB est rectus. & quo-
niam duæ KA AB duabus
GD DE æquales sunt altera
alteri, & angulos æquales
continent; erit • basis BK
basi EG æqualis. est autem
& KH æqualis GF, atque
angulos rectos continent.
æqualis • igitur erit HB ipsi
FE. rursus quoniam duæ AK KH duabus DG GF æquales
sunt, & rectos continent angulos; erit basis AH basi DF
æqualis: estque AB æqualis DE. duæ igitur HA AB dua-
bus FD DE sunt æquales; & basis HB est æqualis basi FE,
ergo angulus BAH angulo EDF æqualis erit. eadem ra-
tione, & angulus HAL angulo FDC est æqualis, quando-
quidem si assumamus æquales AL DC, & jungamus KL HL
GC FC, quoniam totus BAL est æqualis toti EDC, quorum
BAK ipsi EDG ponitur æqualis; erit reliquus KAL æqua-
lis reliquo GDC. & quoniam duæ KA AL duabus GD DC
æquales sunt, & angulos æquales continent; basis KL basi
GC æqualis erit. est autem & KH æqualis GF, duæ igitur
LK KH, duabus CG GF sunt æquales; angulosque rectos
continent: ergo basis HL æqualis est basi CF. rursus quo-
niam duæ HA AL, duabus FD DC æquales sunt, & basis HL
æqualis basi FC; erit angulus HAL æqualis angulo FDC. at-
que factus est angulus BAL angulo EDC æqualis. Ad datam
igitur rectam lineam, & ad datum in ipsa punctum, dato an-
gulo solido æqualis angulus solidus constitutus est. Quod
facere oportebat.





PROP. XXVII. PROBL.

*Ad datam rectam lineam dato solido parallelepipedo simile,
& similiter positum solidum parallelepipedum describere.*

Sit recta quidem linea AB; datum vero solidum parallele-
pipedum CD. Oportet ad datam rectam lineam AB dato soli-
do parallelepipedo CD simile, & similiter positum solidum
parallelepipedum describere. Constituatur ad rectam li-
neam

neam AB, & ad datum in ipsa punctum A angulo solido ad c æqualis æ angulus, qui angulis BAH HAK KAB contineatur, ita ^a 26. hujus.

ut angulus quidem BAH æqualis sit angulo ECF, angulus vero BAK angulo ECG, & adhuc angulus HAK angulo GCF, & fiat ^b ut EC ad CG, ita BA ad AK, ut autem GC ad CF, ita KA ad AH. ergo ex æquali ut EC ad CF, ita erit BA ad AH.



^b 12. sexti.


compleatur parallelogrammum BH, & AL solidum. quoniam igitur est ut EC ad CG, ita BA ad AK, nempe, circa æquales angulos ECG BAK latera sunt proportionalia; erit parallelogrammum KB parallelogrammo GE simile. eadem quoque ratione parallelogrammum KH simile est parallelogrammo GF, & parallelogrammum HB parallelogrammo FE. tria igitur parallelogramma solidi AL tribus parallelogrammis solidi CD similia sunt: sed tria tribus oppositis sunt æqualia, & similia. ^c Cor. 24. hujus. ergo totum AL solidum toti solido CD simile erit. Ad datam igitur rectam lineam AB dato solilo parallelepipedo CD simile, & similiter positum solidum parallelepipedum AL descriptum est. Quod facere oportebat.

PROP. XXVIII. THEOR.

Si solidum parallelepipedum plano secetur per diagonales oppositorum planorum, ab ipso plano bifariam secabitur.

Solidum enim parallelepipedum AB plano CDEF secetur per diagonales oppositorum planorum, videlicet CF DE. Dico solidum AB à plano CDEF bifariam secari.

Quoniam enim æquale ^a est CGF triangulum triangulo CBF, triangulum vero ADE triangulo DEH; est autem & CA parallelogrammum parallelogrammo BE æquale ^b, oppositum enim est; & parallelogrammum GE æquale parallelogrammo CH; erit prisma contentum duobus triangulis CGF ADE, & tribus parallelogrammis GE AC CE æquale prismati, quod continetur duobus triangulis CFB DEH, & tribus parallelogrammis CH & BE CE: etenim planis, & numero & magnitudine æqualibus continentur. Ergo totum AB soli-



^a 34. primi.


^b 24. hujus.

dum à plano CDEF bifariam secatur. Quod demonstrare oportebat.

PROP. XXIX. THEOR.

Solida parallelepipeda qua in eadem sunt basi, & eadem altitudine, quorum stantes linea sunt in eisdem rectis lineis, inter se sunt aequalia.

Sint enim in eadem basi AB solida parallelepipeda CM CN, eadem altitudine, quorum stantes AF AG LM LN CD CE BH BK sint in eisdem rectis lineis FN DK. Dico solidum CM solido CN æquale esse. Quoniam enim parallelogrammum est utrumque ipsorum CH CK; erit CB, utrique ipsarum DH EK æqualis, ergo & DH est æqualis EK. communis auferatur EH. reliqua igitur DE æqualis est reliquæ HK. quare & DEC triangulum est æquale triangulo HKB. parallelogrammum autem DG est æquale parallelogrammo HN. eadem ratione & AFG triangulum æquale est triangulo LMN. est autem parallelogrammum CF parallelogrammo BM, & parallelogrammum CG parallelogrammo BN æquale: opposita enim sunt. ergo & prisma contentum duobus triangulis AFG DEC, & tribus parallelogrammis AD DG GC est æquale prismati, quod duobus triangulis LMN HKB, & tribus parallelogrammis BM NH BN continetur. commune apponatur solidum, cuius basis quidem parallelogrammum AB, oppositum autem ipsi GEHM. ergo totum CM solidum parallelepipedum toti solido parallelepipedo CN est æquale. Solida igitur parallelepipeda quæ in eadem sunt basi, & eadem altitudine, quorum stantes lineæ sunt in eisdem rectis lineis, inter se sunt æqualia. Quod demonstrare oportebat.




PROP. XXX. THEOR.

Solida parallelepipeda qua in eadem sunt basi, & eadem altitudine, quorum stantes linea non sunt in iisdem rectis lineis, inter se sunt aequalia.

Sint in eadem basi AB solida parallelepipeda CM CN & eadem altitudine, quorum stantes AF AG LM LN CD CE

BH

BH BK non sint in eisdem rectis lineis. Dico solidum CM solido CN æquale esse. Producantur enim NK DH, & GE FM, convenientque inter se punctis RX; & adhuc producantur FM GE ad O P puncta: & AX LO CP BR jungantur. solidum CM, cujus basis quidem ACBL parallelogrammum, oppositum autem ipsi FDHM est




æquale solido CO, cujus basis parallelogrammum ACBL æ 29. hujus. & ei oppositum XPRO, in eadem enim sunt basi ACBL, & ipsorum stantes AF AX LM LO CD CP BH BR sunt in eisdem rectis lineis FO DR. sed solidum CO, cujus basis quidem parallelogrammum ACBL, oppositum autem ipsi XPRO est æquale solido CN, cujus basis ACBL parallelogrammum, & ipsi oppositum GEKN. etenim in eadem sunt basi ACBL, & eorum stantes AG AX CE CP LN LO BK BR sunt in eisdem rectis lineis GP NR. quare & CM solidum solido CN æquale erit. Solida igitur parallelepipeda quæ in eadem sunt basi, & eadem altitudine, quorum stantes lineæ non sunt in eisdem rectis lineis, inter se sunt æqualia. Quod demonstrare oportebat.

PROP. XXXI. THEOR.

Solida parallelepipeda qua in aequalibus sunt basibus, & eadem altitudine, inter se sunt æqualia.

Sint in æqualibus basibus AB CD solida parallelepipeda AE CF, & eadem altitudine. Dico solidum AE solido CF æquale esse. Sint primo stantes HK BE AG LM OP DF CE RS ad rectos angulos basibus AB CD: angulus autem ALB angulo CRD fit inæqualis, & producat ipsi CR in directum RT: constituaturque ad rectam lineam RT, & ad punctum in ipsa R, angulo ALB æqualis æ angulus TRY. & ponatur ipsi quidem AL æqualis æ 23. primi.




RT,

RT, ipsi vero LB æqualis RY, & ad punctum Y ipsi RT parallela ducatur XY, compleaturque parallelogrammum RX, & Ψ Y solidum. quoniam igitur duæ TR RY duabus AL LB æquales sunt, & angulos continent æquales; erit parallelogrammum RX æquale & simile parallelogrammo HL: & quoniam rursus AL est æqualis RT, & LM ipsi RS, angulosque æquales continent, parallelogrammum R Ψ parallelogrammo AM æquale & simile erit. eadem ratione LE parallelogrammum ipsi SY æquale est & simile. tria igitur parallelogramma solidi AE tribus parallelogrammis solidi Ψ Y æqualia & similia sunt. sed & tria tribus opposita & æqualia sunt & similia. totum igitur AE solidum parallelepipedum toti solido parallelepipedo Ψ Y est æquale. producantur DR XY, convenientque inter se in puncto Ω , & per T ipsi D Ω parallela ducatur TQ, & producantur TQ OD, & convenient in V, compleaturque solida $\Omega\Psi$ RI. solidum igitur $\Psi\Omega$ cujus basis est R Ψ parallelogrammum, oppositum autem ipsi $\Omega\Gamma$, est æquale solido Ψ Y, cujus basis est R Ψ parallelogrammum, & oppositum ipsi Y Φ , in eadem enim

6 Cor. 24.
hujus.



29. hujus.



sunt basi R Ψ , & eadem altitudine, & eorum stantes R Ω RY TQ TX SZ SN $\Psi\Gamma$ $\Psi\Phi$ in eisdem sunt rectis lineis ΩX Z Φ . sed solidum Ψ Y æquale est solido AE. ergo & $\Psi\Omega$ solido AE est æquale. præterea quoniam parallelogrammum RYXT est æquale parallelogrammo ΩT , etenim in eadem est basi RT, & in eisdem parallelis RT ΩX . & parallelogrammum RYXT parallelogrammo CD est æquale, quoniam & ipsi AB est æquale; parallelogrammum ΩT æquale est parallelogrammo CD: aliud autem est parallelogrammum DT. est igitur ut CD basis ad basim DT, ita ΩT ad ipsam DT. & quoniam solidum parallelepipedum CI secatur plano RF planis oppositis parallelo; erit ut CD basis ad basim DT, ita solidum CF ad RI solidum. eadem ratione quoniam solidum parallelepipedum ΩI secatur plano R Ψ oppositis planis parallelo, ut ΩT basis ad basim DT, ita erit solidum $\Omega\Psi$ ad RI solidum. sed ut CD basis ad basim DT, ita basis ΩT ad ipsam TD. ut igitur solidum CF ad RI solidum ita solidum

25. hujus.

solidum $\Omega\Upsilon$ ad solidum RI . quod cum utrumque solidorum CF $\Omega\Upsilon$ ad solidum RI eandem habet proportionem, solidum CF solido $\Omega\Upsilon$ est æquale. solidum autem $\Omega\Upsilon$ ostensum est æquale solido AE . ergo & AE ipsi CF æquale erit. * 9. quinti.





Sed non sint stantes AG HK BE LM CN OP DF RS ad rectos angulos ipsis AB CD basibus. Dico rursus solidum AE æquale esse solido CF . Ducantur $\therefore$ à punctis KE GM , PFN $\therefore$ ad subiectum planum perpendiculares KZ ET GY $M\Phi$, SI $F\Upsilon$ $N\Omega$ PX , & plano in punctis ZT $Y\Phi$, ΥX ΩI occurrant, & jungantur ZT $Y\Phi$ ZY $T\Phi$ $X\Upsilon$ $X\Omega$ ΩI ΥI . æquale igitur est $K\Phi$ solidum solido PI ; in æqualibus enim sunt basibus KM PS , & eandem altitudine, quorum stantes ad rectos angulos sunt basibus. sed $K\Phi$ solidum solido AE est æquale: solidum vero PI æquale $\therefore$ solido CF . si quidem $\therefore$ in eadem sunt basi, & eadem altitudine, quorum stantes non sunt in eisdem rectis lineis. ergo & solidum AE solido CF æquale erit. Solida igitur parallelepipeda quæ in æqualibus sunt basibus & eadem altitudine, inter se sunt æqualia. Quod demonstrare oportebat.

PROP. XXXII. THEOR.

Solida parallelepipeda quæ eandem habent altitudinem, inter se sunt ut bases.

Sint solida parallelepipeda AB CD , quæ eandem altitudinem habeant. Dico inter se esse ut bases; hoc est ut AE basis ad basim CF ita solidum AB ad CD solidum. applicetur enim ad rectam lineam FG parallelogrammo AE æquale FH , & à basi FH eadem A





altitudine ipsi CD solidum parallelepipedum GK compleatur. solidum igitur AB solido GK est æquale; in æqualibus enim

enim sunt basibus AE FH , & eadem altitudine. itaque quoniam solidum parallelepipedum CK plano DG secatur oppositis planis parallelo; erit ut HF basis ad basim FC , ita solidum HD ad DC solidum; atque est basis quidem FH basi AE æqualis, solidum vero GK æquale solido AB . est igitur & ut AE basis ad basim CF , ita solidum AB ad solidum CD . Quare solida parallelepipeda quæ eandem habent altitudinem, inter se sunt ut basès. Quod demonstrare oportebat.

PROP. XXXIII. THEOR.

Similia solida parallelepipeda inter se sunt in triplicata proportionè homologorum laterum.

Sint similia solida parallelepipeda AB CD . latus autem AE homologum sit lateri CF . Dico solidum AB ad CD solidum triplicatam proportionem habere ejus, quam habet AE ad CF . Producantur enim EK EL EM in directum ipsis AE GE HE : & ipsi quidem CF æqualis ponatur EK , ipsi vero FN æqualis EL ; & adhuc ipsi FR æqualis EM , & KL parallelogrammum, & KO solidum compleantur. quoniam igitur duæ KE EL duabus CF FN æquales sunt: sed & angulus KEL angulo CFN est æqualis; quia &



angulus AEC ipsi CFN ob similitudinem solidorum AB CD : erit & KL parallelogrammum simile & æquale parallelogrammo CN . eadem ratione, & parallelogrammum KM æquale est & simile parallelogrammo CA , & adhuc parallelogrammum OE ipsi DF parallelogrammo. tria igitur parallelogramma solidi KO tribus parallelogrammis CD solidi æqualia & similia sunt. sed tria tribus oppositis æqualia sunt & similia. totum igitur KO solidum æquale est & simile toti solido CD . compleatur GK parallelogrammum; & à basibus quidem GK KL parallelogrammis, altitudine vero eadem ipsi AB , solida compleantur EX LP . & quoniam ob similitudinem solidorum AB CD est ut AE ad CF , ita EG ad FN ; & EH ad FR : æqualis autem FC ipsi EK , & FN ipsi EL , &

Cor. 24.
hujus.

FR

FR ipsi EM. erit ut AE ad EK, ita GE ad EL, & HE ad EM. sed ut AE quidem ad EK, ita AG parallelogrammum ad parallelogrammum GK: ut autem GE ad EL, ita GK ad KL: & ut HE ad EM, ita PE ad KM. & ut igitur AG parallelogrammum ad parallelogrammum GK, ita GK ad KL, & PE ad KM. sed ut AG quidem ad GK, ita AB solidum ad solidum EX: ut autem GK ad KL, ita solidum EX ad PL solidum: & ut PE ad KM, ita PL solidum ad solidum KO. & ut igitur solidum AB ad solidum EX, ita EX ad PL, & PL ad KO. si autem quatuor sint magnitudines deinceps proportionales, prima ad quartam triplicatam proportionem habet ejus, quam habet ad secundam. ergo & AB solidum ad solidum KO triplicatam habet proportionem ejus, quam AB ad EX. sed ut AB ad EX, ita AG parallelogrammum ad parallelogrammum GK; & AE recta linea ad ipsam EK. quare & AB solidum ad solidum KO triplicatam proportionem habebit ejus, quam AE habet ad EK. æquale autem est solidum KO solido CD, & recta linea EK rectæ CF est æqualis. Ergo & AB solidum ad solidum CD triplicatam habet proportionem ejus, quam latus ipsius homologum AE habet ad CF homologum latus. Quod demonstrare oportebat.


Cor. Ex hoc manifestum est, si quatuor rectæ lineæ proportionales fuerint, ut prima ad quartam, ita esse solidum parallelepipedum quod fit à prima ad solidum quod à secunda, simile, & similiter descriptum; quoniam & prima ad quartam triplicatam proportionem habet ejus, quam habet ad secundam.

PROP. XXXIV. THEOR.

Æqualium solidorum parallelepipedorum recipiuntur bases & altitudines; & quorum solidorum parallelepipedorum recipiuntur bases & altitudines, ea inter se sunt æqualia.

Sint æqualia solida parallelepipeda AB CD. Dico ipsorum bases & altitudines recipro-
cari, hoc est ut EH basis ad
basim NP, ita esse altitudi-
nem solidi CD ad solidi AB
altitudinem. Sint enim pri-
mo stantes AG EFLB HK
CM NX OD PR ad rectos
angulos basibus ipsorum.



Dico ut EH basis ad basim NP, ita esse CM ad AG. Si igitur



basis

basis EH basi NP sit æqualis, est autem & AB solidum æquale solido CD ; erit & CM æqualis ipsi AG . si enim basibus EH NP æqualibus existentibus non sint AG CM altitudines æquales, neque AB solidum solido CD æquale erit. ponitur autem æquale. non igitur inæqualis est altitudo CM altitudini AG . ergo æqualis sit necesse est; ac propterea ut EH basis ad basim NP , ita erit CM ad AG .

At vero non fit basis EH æqualis basi NP . sed EH sit major. est autem & AB solidum solido CD æquale. ergo major est CM ipsa AG ; alioqui rursus sequeretur solida AB CD æqualia non esse, quæ ponuntur æqualia. itaque ponatur CT æqualis ipsi AG : & à basi quidem NP , altitudine autem CT solidum parallelepipedum VC compleatur. quoniam igitur solidum AB solido CD est æquale, aliud




- autem aliquod est VC , & æqualia ad idem eandem habent proportionem; erit ut AB solidum ad solidum CV , ita CD solidum ad solidum CV . sed ut AB solidum ad solidum CV , ita b basis EH ad NP basim; æque alta enim sunt AB CV solida. ut autem solidum CD ad ipsum CV , ita c MP basis ad basim NP . PT , & MC d ad CT . & igitur ut basis EH ad NP basim, ita MC ad CT . est autem CT æqualis AG . ergo & ut EH basis ad basim NP , ita MC ad AG . quare solidorum parallelepipedorum AB CD bases & altitudines reciprocantur. Rursus solidorum parallelepipedorum AB CD bases & altitudines reciprocantur: sitque ut EH basis ad basim NP , ita solidi CD altitudo ad altitudinem solidi AB . Dico solidum AB solido CD æquale esse. sint enim rursus stantes ad rectos angulos basibus. & si quidem basis EH sit æqualis basi NP , estque ut EH basis ad basim NP , ita altitudo solidi CD ad solidi AB altitudinem: erit solidi CD altitudo altitudini solidi AB æqualis. solida autem parallelepipeda, quæ sunt in æqualibus basibus & eadem altitudine inter se æqualia sunt ergo solidum AB solido CD est æquale. Sed non fit EH basis æqualis basi NP , & fit EH major. major igitur est & solidi CD altitudo altitudine solidi AB , hoc est CM ipsa AG . ponatur ipsi AG æqualis rursus CT , & similiter solidum CV compleatur. itaque quoniam est ut EH basis ad basim NP , ita MC ad ipsam AG ; æqualis autem est AG ipsi CT : erit ut basis EH ad NP basim, ita MC ad CT . sed ut basis EH ad NP

NP basim, ita AB solidum ad solidum CV; æque alta enim sunt solida AB CV. ut autem MC ad CT, ita & MP basis ad basim PT, & solidum CD ad CV solidum. & igitur ut solidum AB ad solidum CV, ita CD solidum ad solidum CV. quodd cum utrumque solidorum AB CD ad ipsum CV eandem proportionem habeat; erit AB solidum solido CD æquale. Quod demonstrare oportebat.

Non sint autem stantes FE BL GA KH, XN DO MC RP ad rectos angulos basibus ipsorum: & à punctis F G B K, X M D R ad plana basium EH NP ducantur perpendiculares, quæ planis in punctis S T Y V, Q Z Ω Φ occurrant & compleantur solida FV XΩ. Dico & sic æqualibus existentibus solidis AB CD, bases & altitudines reciprocari, scil. ut EH

basis ad basim NP, ita esse altitudinem solidi CD ad solidi AB altitudinem. quoniam enim solidum AB solido CD est æquale; solido autem AB æquale est solidum BT; in eadem namque sunt basi FK, & eadem altitudine;



f 30. hujus.

stantes non sunt in eisdem rectis lineis: & solidum DC est æquale solido DZ, quodd in eadem sint basi XR, & eadem altitudine, quorum stantes non sunt in eisdem rectis lineis; erit & solidum BT solido DZ æquale. æqualium autem solidorum parallelepipedorum, quorum altitudines basibus ipsorum sunt ad rectos angulos, bases & altitudines reciprocantur. est igitur ut FK basis ad basim XR, ita solidi DZ altitudo ad altitudinem solidi BT. atque est basis quidem FK basi EH æqualis, basis vero XR æqualis basi NP. quare ut EH basis ad basim NP. ita est altitudo solidi DZ ad solidi BT altitudinem. eadem autem sunt altitudines solidorum DZ DC, itemque solidorum BT BA. est igitur ut EH basis ad basim NP, ita solidi DC altitudo ad altitudinem solidi AB. ergo solidorum parallelepipedorum AB CD bases & altitudines reciprocantur. Rursus solidorum parallelepipedorum AB CD bases & altitudines reciprocantur, sitque ut EH basis ad basim NP, ita altitudo solidi CD ad solidi AB altitudinem. Dico solidum AB solido CD æquale esse. Iisdem namque constructis, quoniam ut EH basis ad basim NP, ita solidi CD altitudo ad altitudinem solidi AB; & basis quidem EH est æqualis basi FK; NP vero ipsi XR: erit ut FK basis ad basim XR, ita altitudo

Ex ante demonstratis.


b Ex ante
demonstra-
tis.
i 30. hujus.

altitudo solidi CD ad solidi AB altitudinem. eadem autem sunt altitudines solidorum AB BT , & ipsorum CD DZ . est igitur ut FK basis ad basim XR , ita solidi DZ altitudo ad altitudinem solidi BT . quare solidorum BT DZ parallelepipedorum bases & altitudines reciprocantur, quorum autem solidorum parallelepipedorum altitudines sunt ad rectos angulos basibus ipsorum, & bases & altitudines reciprocantur, ea inter se sunt æqualia^b. ergo BT solidum solido DZ est æquale. sed solidum quidem BT æquale est solido BA ⁱ, etenim in eadem sunt basi FK , & eadem altitudine, quorum stantes non sunt in eisdem rectis lineis: solidum vero DZ est æquale solido DC , si quidem in eadem sunt basi XR , & eadem altitudine, & non in eisdem rectis lineis. ergo & solidum AB solido CD est æquale. Quod demonstrare oportebat.

PROP. XXXV. THEOR.

Si sint duo anguli plani aequales, quorum verticibus sublimes recta linea insistant, qua cum rectis lineis à principio positis angulos contineant aequales, alterum alteri; in sublimibus autem sumantur quævis puncta, atque ab ipsis ad plana, in quibus sunt anguli, perpendiculares ducantur; & à punctis, qua à perpendicularibus sunt in planis ad primos angulos jungantur recta linea: cum sublimibus aequales angulos continebunt.

Sint duo anguli rectilinei æquales BAC EDF : & à punctis A D sublimes rectæ lineæ AG DM constituentur, quæ cum rectis lineis à principio positis æquales angulos contineant, alterum alteri: angulum quidem MDE æqualem angulo GAB , angulum vero MDF angulo GAC æqualem: & sumantur in ipsis AG DM quævis puncta G , M , à quibus ad plana per BAC EDF ducantur perpendiculares GL MN occurrentes planis in punctis L N ; & LA ND jungantur. Dico angulum GAL angulo MDN æqualem esse. Ponatur ipsi DM æqualis AH , & per H ipsi GL parallela ducatur HK . est autem GL perpendicularis ad planum per



per BAC. ergo & HK ad ^a planum per BAC perpendicularis ^a 8. hujus.
 erit. ducantur à punctis K N ad rectas lineas AB AC DF DE
 perpendiculares KC NF KB NE, & HC CB MF FE jungan-
 tur. Quoniam igitur quadratum ex HA æquale ^b est quadra-
 tis ex HK KA; quadrato autem ex KA æqualia ^b sunt ex ^b 47. primi.
 KC CA quadrata: erit quadratum ex HA quadratis ex HK
 KC CA æquale. quadratis autem ex HK KC æquale est qua-
 dratum est HC. quadratum igitur ex HA quadratis ex HC CA
 æquale erit: & idcirco angulus HCA ^c est rectus. eadem ^c 48. primi.
 ratione & angulus DFM rectus est. ergo angulus ACH ipsi
 DFM est æqualis. est autem & HAC angulus æqualis an-
 gulo MDF. duo igitur triangula sunt MDF HAC duos an-
 gulos duobus angulis æquales habentia, alterum alteri, &
 unum latus uni lateri æquale, quod uni æqualium angulo-
 rum subtingitur; videlicet HA ipsi DM. ergo & reliqua
 latera reliquis lateribus ^d æqualia habebunt, alterum alteri. ^d 26. primi.
 quare AC est æqualis DF. similiter demonstrabimus & AB ipsi
 DE æquale esse. jungantur enim HB ME. & quoniam quadra-
 tum ex AH est æquale quadratis ex AK KH; quadrato au-
 tem ex AK æqualia sunt quadrata ex AB BK: erunt qua-
 drata ex AB BK KH quadrato ex AH æqualia. sed quadra-
 tis ex BK KH æquale est ex BH quadratum; rectus enim
 angulus est HKB, propterea quod & HK perpendicularis est
 ad subiectum planum. quadratum igitur ex AH æquale est
 quadratis ex AB BH. quare angulus ABH ^e rectus est. eadem
 ratione & angulus DEM est rectus. est autem & BAH an-
 gulus æqualis angulo EDM, ita enim ponitur: atque est AH
 æqualis DM. ergo & AB ipsi DE ^d est æqualis. quoniam
 igitur AC quidem est æqualis DF, AB vero ipsi DE; erunt
 duæ CA AB duabus FD DE æquales. sed & angulus BAC
 angulo FDE est æqualis. basis ^e igitur BC basi EF, & trian-
 gulum triangulo, & reliqui anguli reliquis angulis æquales
 sunt. ergo angulus ACB angulo DFE est æqualis. est autem &
 rectus ACK æqualis recto DFN. quare & reliquis BCK reliquo
 EFN æqualis. eadem ratione, & CBK angulus est æqualis
 angulo FEN. itaque duo triangula sunt BCK EFN, duos an-
 gulos duobus angulis æquales habentia, alterum alteri, &
 unum latus uni lateri æquale, quod est ad æquales angulos,
 videlicet BC ipsi EF. ergo & ^d reliqua latera reliquis late-
 ribus æqualia habebunt. æqualis igitur est CK ipsi FN. est
 autem & AC ipsi DF æqualis. quare duæ AC CK duabus
 DF FN æquales sunt: & rectos continent angulos. basis igitur
 AK est æqualis basi DN. & cum AH sit æqualis DM,
 erit & quod fit ex AH quadratum quadrato ex DM æquale.
 sed quadrato ex AH æqualia sunt ex AK KH quadrata; ^e ete-
 nim


nim rectus est angulus AKH. quadrato autem ex DM æqualia sunt quadrata ex DN NM, quod angulus DNM rectus fit. quadrata igitur ex AK KH quadratis ex DN NM sunt æqualia. quorum quadratum ex AK æquale est quadrato ex DN. ergo reliquum ex KH quadratum reliquo quadrato ex NM est æquale. & ideo recta linea HK ipsi MN æqualis. quod cum duæ HA AK duabus MD DN æquales sint, altera alteri, & basis HK basi NM ostensa fit æqualis; angulus HAK
f 8. primi. angulo MDN æqualis *f* erit. Quod oportebat demonstrare.

Cor. Ex hoc manifestum est, si sint duo anguli plani rectilinei æquales, ab ipsis autem constituentur sublimes rectæ lineæ æquales, quæ cum rectis lineis à principio positis æquales contineant angulos, alterum alteri, perpendiculares, quæ ab ipsis ad plana, in quibus sunt primi anguli, ducantur, inter se æquales esse.

PROP. XXXVI. THEOR.

Si tres rectæ lineæ proportionales sint, solidum parallelepipedum quod à tribus fit, æquale est solido parallelepipedo quod fit à media, æquilatERO quidem, æquiangulo autem antedicto.

Sint tres rectæ lineæ proportionales A B C, fit scil. ut A ad B ita B ad C. Dico solidum quod fit ex ipsis A B C, æquale esse solido quod fit ex B, æquilatERO quidem, æquiangulo autem antedicto. Exponatur solidus angulus ad E contentus tribus angulis planis DEG GEF FED; & ipsi quidem B ponatur æqualis unaquæque ipsarum DE GE EF; & solidum




parallelepipedum EK compleatur: ipsi vero A ponatur æqualis LM; & ad rectam lineam LM, & ad punctum in
a 26. hujus. ipsa L, constituatur angulo solido ad E æqualis angulus contentus NLX XLM MLN; & ponatur ipsi quidem B æqualis LN, ipsi vero C æqualis LX. quoniam igitur est ut A ad B ita B ad C, æqualis autem est A ipsi LM, & B unicuique ipsarum LN EF EG ED, & C ipsi LX; erit ut LM ad EF
 ita

ita GE ad LX. & circum æquales angulos MLX GEF, latera sunt reciproca. ergo MX parallelogrammum parallelogrammo GF est æquale. & quoniam duo anguli plani rectilinei æquales sunt GEF XLM, & in ipsis sublimes rectæ lineæ constituuntur LN ED æquales inter se, & cum rectis lineis à principio positis æquales continentes angulos, alterum alteri; erunt perpendicularares quæ à punctis N D ad plana per XLM GEF ducuntur, inter se æquales. ergo solida LH EK eadem sunt altitudine. quæ vero in æqualibus basibus sunt solida parallelepipedæ, & eadem altitudine, inter se sunt æqualia. ergo solidum HL æquale est solido EK. atque est solidum quidem HL quod fit à tribus A B C, solidum vero EK quod fit ex B. Si igitur tres rectæ lineæ proportionales sint, solidum parallelepipedum quod fit à tribus, æquale est solido parallelepipedo quod fit, &c. Quod demonstrare oportebat.

PROP. XXXVII. THEOR.

Si quatuor rectæ lineæ proportionales sint, & quæ ab ipsis sunt solida parallelepipedæ similia & similiter descripta proportionalia erunt. Et si quæ ab ipsis sunt solida parallelepipedæ similia & similiter descripta proportionalia sint; & ipsæ rectæ lineæ proportionales erunt.

Sint quatuor rectæ lineæ proportionales AB CD EF GH, sit scil. ut AB ad CD, ita EF ad GH, & describantur ab ipsis AB CD EF GH similia & similiter posita solida parallelepipedæ KA LC ME NG. Dico ut KA ad LC, ita esse ME ad NG. Quoniam enim solidum parallelepipedum KA simile est ipsi LC, habebit KA ad LC triplicatam proportionem ejus




quam AB habet ad CD. eadem ratione & solidum ME ad ipsum NG triplicatam proportionem habebit ejus quam EF ad GH. atque est ut AB ad CD, ita EF ad GH. ut igitur AK ad LC, ita ME ad NG. Sed sit ut solidum AK ad solidum LC, ita ME solidum ad solidum NG. Dico, ut

recta linea AB ad rectam CD, ita esse rectam EF ad ipsam
 33. hujus. GH. quoniam enim rursus AK ad LC triplicatam^b propor-
 tionem habet ejus quam AB habet ad CD; habet autem
 & ME ad NG triplicatam proportionem ejus quam EF ad
 GH; atque ut AK ad LC, ita ME ad NG: erit ut AB ad
 CD, ita EF ad GH. Si igitur quatuor rectæ lineæ propor-
 tionales sint, &c. Quod oportebat demonstrare.

PROP. XXXVIII. THEOR.

*Si planum ad planum rectum sit; & ab aliquo puncto eo-
 rum quæ sunt in uno plano, ad alterum planum perpen-
 dicularis ducatur: ea in communem planorum sectionem
 cadet.*

Planum nempe CD ad planum AB rectum sit, communis
 autem eorum sectio sit AD, & in ipso CD plano, quodvis
 punctum E sumatur. Dico perpendicularem quæ à puncto
 E ad planum AB ducitur,
 cadere in ipsam AD. Non
 enim; sed si fieri potest, ca-
 dat extra, ut EF; & plano
 AB in puncto F occurrat:
 à puncto autem F ad DA
 in plano AB perpendicu-
 ris^a ducatur FG, quæ quidem



^a 10. primi.

^b 4. Def.
hujus.

^c 3. Def.
hujus.

^d 17. primi.

& plano CD ad^b rectos angulos erit; & EG jungatur. quo-
 niam igitur FG plano CD est ad rectos angulos; contingit
 autem ipsam recta linea EG quæ est in eodem CD plano:
 erit angulus FGE^c rectus. sed & EF plano AB ad rectos
 angulos est: rectus igitur est angulus EFG. quare trianguli
 EFG duo anguli duobus rectis sunt æquales; quod est^d ab-
 surdum. non igitur à puncto E ad AB planum perpendicu-
 laris ducta extra rectam lineam DA cadet. ergo in ipsam
 cadat necesse est. Si igitur planum ad planum rectum sit,
 &c. Quod oportebat demonstrare.


PROP. XXXIX. THEOR.

*Si in solido parallelepipedo oppositorum planorum latera se-
 centur bifariam, per sectiones vero plana ducantur;
 communis planorum sectio, & solidi parallelepipedi dia-
 meter, sese bifariam secabunt.*

In solido enim parallelepipedo AF, oppositorum plano-
 rum CF AH latera bifariam secantur in punctis KLMN XO RP.

&c

& per sectiones plana ducantur KN XR ; communis autem planorum sectio sit YS , & solidi parallelepipedī diameter sit DG . Dico YS DG sese bifariam secare, hoc est YT quidem ipsi TS , DT vero ipsi TG æqualem esse. Jungantur enim DY YE BS SG . quoniam igitur DX parallela est ipsi OE , alterni anguli DXY YOE inter se æquales ^a sunt. & quoniam ^a 29. primi. DX quidem est æqualis OE , XY vero ipsi YO , & angulos æquales continent; erit ^b basis DY æqualis basi YE . & triangulum DXY triangulo YOE , & reliqui anguli reliquis angulis æquales, angulus igitur XYD est æqualis angulo OYE , & ob id ^c recta linea est DYE . eadem ratione, & BSG recta est, atque est BS æqualis SG . & quoniam CA ipsi DB æqualis est & parallela, & CA est æqualis & parallela ipsi EG ; erit & DB ipsi EG æqualis & parallela; & ipsas conjungunt rectæ lineæ DE GB : parallela igitur ^d est DE ipsi EG . & sumpta sunt in utraque ipsa ^d 33. primi. quævis puncta $DYGS$, & junctæ sunt DG YS . ergo DG YS in uno ^e sunt plano. quod cum DE sit parallela BG , ^e 7. hujus. erit & EDT angulus angulo BGT æqualis ^f, alterni enim sunt. est autem & DTY angulus æqualis ^f ipsi GTS . duo ^f 15. primi. igitur sunt triacula DTY GTS duos angulos duobus angulis æquales habentia, & unum latus uni lateri æquale, quod uni æqualium angulorum subtenditur, videlicet DY ipsi GS : dimidia enim sunt ipsorum DE BG . ergo & reliqua latera reliquis lateribus æqualia habebunt. & quare DTG ^g 26. primi. quidem est æqualis TG , YT vero ipsi TS . Si igitur in solido parallelepipedo, &c. Quod oportebat demonstrare.




PROP. XL. THEOR.

Si sint duo prismata aque alta, quorum unum quidem basim habeat parallelogrammum, alterum vero triangulum, & parallelogrammum duplum sit trianguli; ea inter se æqualia erunt.

Sint prismata æquæ alta $ABCDEF$ $GHKLMN$. & unum quidem basim habeat parallelogrammum AF , alterum vero

GHK triangulum, & duplum fit AF parallelogrammum trianguli GHK. Dico prisma ABCDEF prismati GHKLMN æquale esse. Compleantur enim AX GO solida. & quoniam parallelogrammum AF trianguli GHK est duplum; est autem & HK parallelogrammum duplum * trianguli GHK: erit AF parallelogrammum parallelogrammo HK æquale. quæ vero in æqualibus sunt basibus solida pa-

* 41. primi.



- b 31. hujus. rallelepipedæ, & eadem altitudine, inter se æqualia b sunt. æquale igitur AX solidum solido GO. atque est solidi quidem AX dimidium * ABCDEF prisma, solidi vero GO dimidium * est prisma GHKLMN. ergo ABCDEF prisma prismati GHKLMN est æquale. Si igitur sint duo prismata æque alta, &c. Quod demonstrare oportebat.

* 28. hujus.

EUCLIDIS


ELEMENTORUM

LIBER DUODECIMUS.

PROPOSITIO I. THEOREMA.

Similia polygona circulis inscripta inter se sunt ut diametrorum quadrata.

Sint circuli $ABCDE$ $FGHKL$, & in ipsis similia polygona $ABCDE$ $FGHKL$; diametri autem circulorum sint BM GN . Dico ut quadratum ex BM ad quadratum ex GN , ita esse $ABCDE$ polygonum ad polygonum $FGHKL$. Jungantur enim BE AM GL FN . & quoniam polygonum $ABCDE$ simile est polygono $FGHKL$; & $\angle BAE$ angulus angulo GFL 1. Def. sexti. est æqualis: atque est ut BA ad AE , ita GF ad FL . duo igitur triacula sunt BAE GFL unum angulum uni angulo æqualem habentia, videlicet angulum BAE angulo GFL , circa æquales autem angulos latera proportionalia: quare triangulum ABE triangulo FGL æqui-angulum ^b est; ac propterea angulus AEB æqualis est angulo FLG . sed angulus quidem AEB angulo AMB est ^c æ- ^c 21. terti. qualis; in eadem enim circumferentia consistunt. angulus autem FLG æqualis ^c est angulo FNG . ergo & AMB angulus est æqualis angulo FNG . est autem & rectus ^d angulus ^d 31. terti. BAM æqualis recto GFN . quare & reliquus reliquo æqualis. æquiangulum igitur est triangulum AMB triangulo FGN . ergo ^e ut BM ad GN ita BA ad GF . sed proportionis quidem ^e 4. sexti. BM ad GN duplicata est proportio quadrati ex BM ad quadratum




20. sexti. quadratum ex GN ; proportionis vero AB ad GF duplicata est proportio $ABCDE$ polygoni ad polygonum $FGHKL$:
 21. quinti. & ut igitur quadratum ex BM ad quadratum ex GN , ita polygonum $ABCDE$ ad $FGHKL$ polygonum. Quare similia polygona quæ in circulis describuntur, inter se sunt ut diametrorum quadrata. Quod demonstrare oportebat.

L E M M A.

Duabus magnitudinibus inæqualibus expofitis, fi à majori auferatur majus quàm dimidium, & ab eo quod reliquum est, rursus auferatur majus quàm dimidium; & hoc semper fiat; relinquetur tandem quædam magnitudo quæ minori magnitudine expofitâ minor erit.

Sint duæ magnitudines inæquales AB , C , quarum major AB . Dico si ab ipsa AB auferatur majus quàm dimidium, & ab eo quod reliquum est, rursus auferatur majus quàm dimidium, atque hoc semper fiat, relinqui tandem magnitudinem quandam, quæ magnitudine C minor erit. Etenim C multiplicata, fiet aliquando major magnitudine AB . multiplicetur, & fit DE ipsius quidem C multiplex, major autem quam AB : dividaturque DE in partes ipsi C æquales DF FG GE . & ab ipsa AB auferatur majus quam dimidium BH , ab ipsa vero AH rursus majus quam dimidium auferatur HK , atque hoc semper fiat, quoad divisiones, quæ sunt in AB , multitudine æquales sunt divisionibus quæ in DE : sint igitur divisiones AK KH HB , divisionibus DF FG GE multitudine æquales. & quoniam major est DE quam AB , & ablatum est ab ipsa quidem DE minus quam dimidium EG : ab ipsa vero AB majus quam dimidium BH : erit reliquum GD reliquo HA majus. rursus quoniam major est GD , quam HA : & ablatum est ab ipsa quidem GD dimidium GF : ab ipsa vero HA majus quam dimidium HK : reliquum FD reliquo AK majus erit. estque FD æqualis ipsi C ergo C quam AK est major. minus igitur est AK quam C . ergo ex magnitudine AB relicta est magnitudo AK , expofita minori magnitudine




tudine c minor. Quod demonstrare oportebat. Similiter autem demonstrabitur, etiam si dimidia ablata fuerint. *Est prima decimi.*


PROP. II. THEOR.

Circuli inter se sunt ut diametrorum quadrata.

Sint circuli ABCD EFGH, diametri autem ipsorum sint BD FH. Dico ut quadratum ex BD ad quadratum ex FH, ita esse circulum ABCD ad EFGH circulum. Si enim non ita fit; erit ut quadratum ex BD ad quadratum ex FH, ita circulus ABCD vel ad spatium aliquod minus circulo EFGH, vel ad majus. Sit primum ad minus quod sit s. & in circulo EFGH describatur quadratum EFGH. itaque descriptum in circulo quadratum majus est dimidio circuli EFGH, quoniam si per puncta E F G H contingentes circulum ducamus, erit descripti circa circulum quadrati dimidium EFGH. descripto autem circa circulum quadrato minor est circulus. ergo quadratum EFGH majus est dimidio circuli EFGH. secantur bifariam circumferentiæ EF FG GH HE in punctis K L M N: & EK KF FL LG GM MH HN NE jungantur. unumquodque igitur triangulorum EKF FLG GMH HNE majus est dimidio segmenti circuli in quo consistit: quoniam si per puncta K L M N contingentes circulum ducamus, & parallelogramma, quæ sunt in rectas lineas EF FG GH HE compleamus; erit unumquodque triangulorum EKF FLG GMH HNE dimidium parallelogrammi, quod ad ipsum est. sed segmentum minus est parallelogrammo. quare unumquodque triangulorum EKF FLG GMH HNE majus est dimidio segmenti circuli, in quo consistit. Hasce igitur circumferentias bifariam secantes, & jungentes rectas lineas, atque hoc semper facientes, relinuemus tandem quædam circuli segmenta. quæ minora erunt excessu, quo circulus EFGH ipsum s spatium superat. etenim ostensum est in præcedenti Lemmate, duabus magnitudinibus inæqualibus expositis, si à majori auferatur majus quam dimidium, & ab eo quod relinquitur, rursus majus quam dimidium,



a 47. primi.
& 31. tertii.




b 41. primi.

dium, & hoc semper fiat; relinqui tandem magnitudinem aliquam, quæ minori magnitudine exposita sit minor. itaque relicta sint segmenta circuli EFGH in rectas lineas EK KF FL LG GM MH HN NE, quæ minora sint excessu, quo circulus EFGH ipsum s spatium superat. ergo reliquum EKFLGMHN polygonum majus erit spatium s. Describatur etiam in circulo ABCD, polygono EKFLGMHN simile polygonum AXBOCPDR. est igitur ut quadratum ex BD ad quadratum ex FH, ita polygonum AXBOCPDR ad EKFLGMHN polygonum. sed & ut quadratum ex BD ad quadratum ex FH, ita ABCD circulus ad spatium s. ergo & ut circulus ABCD ad spatium s, ita polygonum AXBOCPDR ad EKFLGMHN polygonum. major autem est circulus ABCD eo quod in ipso est polygono. quare & spatium s majus est polygono EKFLGMHN. sed & f minus. quod fieri non potest. Non igitur est ut quadratum ex BD

e 14. quinti.
f Ex hypo-
thesi.

ad quadratum ex FH ita ABCD circulus ad spatium aliquod minus circulo EFGH. Similiter ostendemus neque esse ut quadratum ex FH ad quadratum ex BD, ita circulum EFGH ad aliquod spatium minus circulo




ABCD. Dico igitur neque esse ut quadratum ex BD ad quadratum ex FH, ita circulum ABCD ad aliquod spatium majus circulo EFGH. si enim fieri potest, sit ad majus spatium s. erit igitur invertendo ut quadratum ex FH ad quadratum ex BD, ita spatium s ad ABCD circulum. sed quoniam s majus est EFGH circulo; erit ut spatium s ad ABCD circulum, ita circulus EFGH ad aliquod spatium minus circulo ABCD. ergo & ut quadratum ex FH ad quadratum ex BD, ita EFGH circulus ad aliquod spatium minus circulo ABCD, quod fieri non posse ostensum est. non igitur ut quadratum ex BD ad quadratum ex FH, ita est circulus ABCD ad spatium aliquod majus EFGH circulo. ostensum autem est neque ad minus. quare ut quadratum ex BD ad quadratum ex FH, ita erit ABCD circulus ad circulum EFGH. Circuli igitur inter se sunt ut diametrorum quadrata. Quod ostendere oportebat.

PROP. III. THEOR.

Omnis pyramis triangularem habens basim dividitur in duas pyramides æquales & similes inter se, qua triangulares bases habent, similesque toti, & in duo prismata æqualia, que quidem prismata dimidio totius pyramidis sunt majora.


Sit pyramis, cujus basis quidem ABC triangulum; vertex autem punctum D . Dico pyramidem $ABCD$ dividi in duas pyramides æquales & similes inter se, triangulares bases habentes, & similes toti, & in duo prismata æqualia; & duo prismata dimidio totius pyramidis esse majora. Secentur enim $AB BC CA AD DB DC$ bifariam in punctis $E F G H K L$, & $EH EG GH HK KL LH EK KF FG$ jungantur. quoniam igitur AE quidem est æqualis EB , AH vero ipsi HD ; erit HE ipsi DB parallela. eadem ratione & HK est parallela ipsi AB . parallelogrammum igitur est $HEBK$.

quare HK est æqualis EB . sed EB ipsi AE est æqualis. ergo & AE ipsi HK æqualis erit. est autem & AH æqualis HD . duæ igitur $AE AH$ duabus $KH HD$ æquales sunt, altera alteri, & angulus EAH æqualis angulo KHD ; basis igitur EH basi KD est æqualis: quare triangulum AEH æquale est & simile triangulo HKD . eadem ratione & triangulum AHG triangulo $HL D$ æquale est & simile. & quoniam duæ rectæ lineæ sese tangentes $EH HG$ duabus rectis lineis sese tangentibus $KD DL$ parallelæ sunt, non autem in eodem plano, æquales



angulos continebunt. ergo angulus EHG est æqualis angulo KDL . rursus quoniam duæ rectæ lineæ $EH HG$ duabus $KD DL$ æquales sunt, altera alteri, & angulus EHG est æqualis angulo KDL ; erit basis EG basi KL æqualis: æquale igitur est & simile triangulum EHG triangulo KDL . eadem ratione & $AE G$ triangulum est æquale & simile triangulo HKL . quare pyramis cujus basis quidem est $AE G$ triangulum, vertex autem punctum H , æqualis & similis est pyramidi cujus basis est triangulum KHL , & vertex D punctum. & quoniam uni laterum trianguli ADB , videlicet ipsi AB , parallela ducta est HK ; erit triangulum ADB triangulo DKH æquiangulum,

angulum, & latera habent proportionalia. simile igitur est $\triangle ADB$ triangulum triangulo $\triangle DHK$. & eadem ratione triangulum quidem $\triangle DBC$ simile est triangulo $\triangle DKL$; triangulum vero $\triangle ADC$ triangulo $\triangle DHL$. & cum duæ rectæ lineæ sese tangentes BA AC duabus rectis lineis sese tangentibus KH HL parallelæ sint, non existentes in eodem plano, hæ æquales angulos $\angle$ continebunt. angulus igitur $\angle BAC$ angulo $\angle HKL$ est æqualis. atque est ut BA ad AC , ita KH ad HL , ergo $\triangle ABC$ triangulum simile est triangulo $\triangle HKL$; ideoque pyramis, cujus basis quidem triangulum $\triangle ABC$, vertex autem punctum D , similis est pyramidi, cujus basis triangulum $\triangle HKL$, & vertex punctum D . sed pyramis cujus basis quidem $\triangle HKL$ triangulum, vertex autem punctum D , ostensa est similis pyramidi, cujus basis triangulum $\triangle AEG$, & vertex H punctum. quare & pyramis cujus basis triangulum $\triangle ABC$ & vertex punctum D , similis est pyramidi cujus basis $\triangle AEG$ triangulum, & vertex punctum H . utraque igitur ipsarum $\triangle AEGH$ $\triangle HKLD$ pyramidum similis est toti pyramidi $\triangle ABCD$. & quoniam BF est æqualis FC , erit $EBFG$ parallelogrammum, & duplum trianguli $\triangle GFC$. & quoniam duo prismata æque alta sunt, quorum unum quidem basim habet parallelogrammum, alterum vero triangulum. estque parallelogrammum duplum trianguli; erunt ea prismata inter se æqualia. ergo prisma contentum duobus triangulis $\triangle BKF$ $\triangle EHG$, & tribus parallelogrammis $EBFG$ $EBKH$ $KHGF$, est æquale prismati quod duobus triangulis $\triangle GFC$ $\triangle HKL$, & tribus parallelogrammis $KFCL$ $LCGH$ $HKFG$ continetur. & manifestum est utrumque ipsorum prismatum, & cujus basis est $EBFG$ parallelogrammum, opposita autem ipsi HK recta linea, & cujus basis est $\triangle GFC$ triangulum, & oppositum ipsi triangulum $\triangle K LH$, majus esse utraque pyramidum, quarum bases quidem $\triangle AEG$ $\triangle HKL$ triangu-
la, vertices autem puncta H D : quoniam si jungamus EF EH rectas lineas, prisma quidem, cujus basis est $EBFG$ parallelogrammum, & opposita ipsi recta linea KH , majus est pyramide cujus basis $\triangle EBF$ triangulum, vertex autem punctum K . sed pyramis, cujus basis triangulum $\triangle EBF$, & vertex K punctum, est æqualis pyramidi cujus basis $\triangle AEG$ triangulum, & vertex punctum H ; æqualibus enim & similibus planis continentur. quare & prisma cujus basis parallelogrammum $EBFG$, opposita autem




ipſi recta linea HK, majus eſt pyramide cujus baſis AEG triangulum & vertex punctum H. priſma vero cujus baſis parallelogrammum ECFG, & oppoſita ipſi recta linea HK eſt æquale priſmati cujus baſis GFC triangulum, & ipſi oppoſitum triangulum HKL; & pyramis cujus baſis triangulum AEG, vertex autem H punctum, eſt æqualis pyramidi cujus baſis HKL triangulum, & vertex punctum D. ergo duo priſmata de quibus dictum eſt, ſunt majora duabus dictis pyramidibus quarum baſes trianguſa AEG HKL, vertices autem H D puncta. Tota igitur pyramis cujus baſis ABC triangulum, vertex autem punctum D, diviſa eſt in duas pyramides æquales, & ſimiles inter ſe, & ſimiles toti: & in duo priſmata æqualia: ſuntque duo priſmata dimidio totius pyramidis majora. Quæ oftendere oportebat.

PROP. IV. THEOR.

Si ſint due pyramides æque altæ, quæ triangulares baſes habeant, dividatur autem utraque ipſarum, & in duas pyramides æquales inter ſe, ſimilesque toti, & in dua priſmata æqualia; & factarum pyramidum utraque eodem modo dividatur, atque hoc ſemper fiat: erit ut unius pyramidis baſis ad baſim alterius, ita & in una pyramide priſmata omnia ad priſmata omnia in altera pyramide multitudine æqualia.

Sint duæ pyramides æque altæ quæ triangulares baſes habeant ABC DEF, vertices autem ſint puncta G H, & dividatur utraque ipſarum in duas pyramides æquales inter ſe, ſimilesque toti, & in duo priſmata æqualia; & factarum pyramidum utraque eodem modo diviſa intelligatur: atque hoc ſemper fiat. Dico ut ABC baſis ad baſim DEF, ita eſſe priſmata omnia quæ ſunt in pyramide ABCG ad priſmata omnia quæ in pyramide DEFH multitudine æqualia. Quoniam enim BX quidem eſt æqualis XC, AL vero æqualis LC; erit & XL ipſi AB parallela, & trian-




gulum ABC triangulo LXC ſimile. eadem ratione & trian-
gulum 2. ſexti.

gulum DEF simile est triangulo RQF. & quoniam BC quidem est dupla CX, EF vero dupla ipsius FQ, ut BC ad CX, ita erit EF ad FQ. & descripta sunt ab ipsis BC CX similia & similiter posita rectilinea ABC LXC; ab ipsis vero EF FQ similia & similiter posita rectilinea DEF RQF. est igitur ^{b 22. sexti.} ut ABC triangulum ad triangulum LXC, ita triangulum DEF ad RQF triangulum; & permutando ut triangulum ABC ad triangulum DEF, ita LXC triangulum ad triangulum RQF. sed ut LXC triangulum ad triangulum RQF, ita ^{c 28. & 31. undecimi.} prismata cuius basis est triangulum LXC, oppositum autem ipsi OMN, ad prismata cuius basis RQF triangulum & ^{d 11. quinti.} oppositum ipsi STY. ut igitur ^d ABC triangulum ad triangulum DEF, ita prismata cuius basis est triangulum LXC, oppositum autem ipsi OMN, ad prismata cuius basis RQF triangulum, & oppositum ipsi STY. & quoniam duo prismata quæ in pyramide ABCG inter se æqualia sunt, sed & quæ in pyramide DEFH prismata inter se sunt æqualia; erit ut prismata cuius basis parallelogrammum KLXB, opposita vero ipsi recta linea MO, ad prismata cuius basis LXC triangulum, & oppositum ipsi OMN, ita prismata cuius basis parallelogrammum EPRQ, & opposita recta linea ST, ad prismata cuius basis RQF triangulum, oppositum vero ipsi STY. quare componendo, ut prismata KBXLMO LXC MN O ad prismata LXC MN O, ita prismata PEQRST RQFSTY ad prismata RQFSTY. & permutando, ut prismata KBXLMO LXCOMN ad prismata PEQRST RQFSTY, ita prismata LXC MN O ad prismata RQFSTY. ut autem prismata LXC MN O ad prismata RQFSTY, ita ostensa est basis LXC ad RQF basim, & ABC basis ad basim DEF. ergo & ut triangulum ABC ad triangulum DEF, ita quæ in pyramide ABCG duo prismata ad duo prismata quæ in pyramide DEFH. similiter autem, & si factas pyramides dividamus eodem modo velut OMNG STYH, erit ut OMN basis ad basim STY, ita quæ in pyramide OMNG duo prismata ad duo prismata quæ in pyramide STYH. sed ut OMN basis ad basim STY, ita basis ABC ad DEF basim. & ut igitur ABC basis ad basim DEF, ita quæ in pyramide ABCG duo prismata ad duo prismata quæ in pyramide DEFH; & quæ in pyramide OMNG duo prismata ad duo prismata quæ in pyramide STYH; & quatuor ad quatuor. eadem autem ostendentur & in factis prismatibus ex divisione pyramidum AKLO, & DPRS, & omnium simpliciter multitudine æqualium. Quod demonstrare oportebat.

PROP. V. THEOR.

Pyramides quæ eadem sunt altitudine, & triangulares bases habent, inter se sunt ut bases.

Sint eadem altitudine pyramides, quarum bases quidem triangula ABC DEF , vertices autem puncta G H . Dico ut ABC basis ad basim DEF , sic esse pyramidem $ABCG$ ad $DEFH$ pyramidem. Si enim non ita sit, erit ut ABC basis ad basim DEF , sic $ABCG$ pyramis, vel ad solidum minus pyramide $DEFH$, vel ad majus. Sit primum ad solidum minus, sitque Z . & dividatur pyramis $DEFH$ in duas pyramides æquales inter se, & similes toti, & in duo prismata æqualia. sunt duo igitur prismata a dimidio totius pyramidis 3. hujus; majora. & rursus pyramides ex divisione factæ similiter dividantur, atque hoc semper fiat, quoad sumantur quædam pyramides à pyramide $DEFH$, quæ sint minores excessu quo pyramis $DEFH$ solidum Z superat. itaque sumantur, &





sint exempli causa, pyramides $DPRS$ $STYH$. erunt igitur reliqua in pyramide $DEFH$ prismata solido Z majora. dividatur etiam $ABCD$ pyramis in totidem partes similes pyramidi $DEFH$. ergo ut ABC basis ad basim DEF , ita quæ in pyramide $ABCG$ prismata ad prismata quæ in pyramide $DEFH$. sed ut ABC basis ad basim DEF , ita pyramis $ABCG$ ad solidum Z . & igitur ut $ABCG$ pyramis ad solidum Z . ita quæ in pyramide $ABCG$ prismata ad prismata quæ in pyramide $DEFH$. major autem est pyramis $ABCG$ prismatibus quæ in ipsa sunt. ergo & solidum Z prismatibus, quæ sunt in pyramide $DEFH$, est majus. sed & minus. Ex prius quod fieri non potest. non igitur ut ABC basis ad basim DEF , ita est pyramis $ABCG$ ad solidum aliquot minus pyramide $DEFH$. similiter ostendemus neque ut DEF basis ad basim

basim ABC , ita esse pyramidem $DEFH$ ad solidum aliquod pyramide $ABCG$ minus. Dico igitur neque esse ut ABC basis ad basim DEF , ita $ABCG$ pyramidem ad aliquod solidum majus pyramide $DEFH$. Si enim fieri potest, sit ad majus, videlicet ad solidum I . erit igitur invertendo ut DEF basis ad basim ABC , ita solidum I ad $ABCG$ pyramidem. cum autem solidum I majus est pyramide $EDFH$, erit ut solidum I ad $ABCG$ pyramidem, ita $DEFH$ pyramis ad solidum aliquod minus pyramide $ABCG$, ut proxime ostensum fuit. & ut igitur DEF basis ad basim ABC , ita pyramis $DEFH$ ad solidum aliquod pyramide $ABCG$ minus, quod est absurdum non igitur ut ABC basis ad basim DEF , ita est $ABCG$ pyramis ad solidum aliquod majus pyramide $DEFH$. ostensum autem est, neque ad minus. quare ut ABC basis ad basim DEF , ita est pyramis $ABCG$ ad $DEFH$ pyramidem. Pyramides igitur quæ eadem sunt altitudine, & triangulares bases habent, inter se sunt ut bases. Quod demonstrare oportebat.

PROP. VI. THEOR.

Pyramides, quæ eadem sunt altitudine, & polygonas bases habent, inter se sunt ut bases.

Sint eadem altitudine pyramides, quæ polygonas bases habeant $ABCDE$ $FGHKL$: vertices autem M N puncta. Dico ut $ABCDE$ basis ad basim $FGHKL$, ita esse $ABCD$ pyramidem ad pyramidem $FGHKL$. Dividatur enim basis quidem $ABCDE$ in triacula ABC ACD ADE ; basis vero



$FGHKL$ dividatur in triacula FGH FHK FKL . & in uno quoque triangulo intelligantur pyramides æque altæ atque pyramides quæ à principio. quoniam igitur est ut triangulum ABC ad triangulum ACD , ita $ABCM$ pyramis ad pyramidem $ACDM$: & componendo ut $ABCD$ trapezium ad triangulum ACD , ita $ABCD$ pyramis ad pyramidem $ACDM$. sed & ut ACD triangulum ad ADE , ita $ACDM$ pyramis ad $ADEM$ pyramidem. ergo ex æquali, ut $ABCD$ basis ad basim ADE , ita $ABCD$ pyramis ad pyramidem $ADEM$.

&c


a 5. hujus.

& rursus componendo ut $ABCDE$ basis ad basim ADE , ita $ABCDEM$ pyramis ad pyramidem $ADEM$. eadem ratione, & ut $FGHKL$ basis ad basim FKL , ita & $FGHKLN$ pyramis ad $FKLN$ pyramidem. & quoniam duæ pyramides sunt $ADEM$ $FKLN$, quæ triangulares bases habent, & eadem sunt altitudine; erit ^a ut ADE basis ad basim FKL , ita $ADEM$ pyramis ad pyramidem $FKLN$. quod cum sit ut $ABCDE$ basis ad basim ADE , ita $ABCDEM$ pyramis ad pyramidem $ADEM$; ut autem ADE basis ad basim FKL , ita $ADEM$ pyramis ad pyramidem $FKLN$: erit ex æquali, ut basis $ABCDE$ ad FKL basim, ita $ABCDEM$ pyramis ad pyramidem $FKLN$. sed & ut FKL basis ad basim $FGHKL$, ita erat & $FKLN$ pyramis ad pyramidem $FGHKLN$. quare rursus ex æquali, ut $ABCDE$ basis ad basim $FGHKL$, ita est $ABCDEM$ pyramis ad pyramidem $FGHKLN$. Pyramides igitur quæ eadem sunt altitudine, & polygonas bases habent, inter se sunt ut bases. Quod demonstrare oportebat.

PROP. VII. THEOR.

Omne prisma triangularem habens basim, dividatur in tres pyramides æquales inter se, quæ triangulares bases habent.


Sit prisma cujus basis quidem triangulum ABC , oppositum autem ipsi DEF . Dico prisma $ABCDEF$ dividi in tres pyramides æquales inter se, quæ triangulares habent bases. Jungantur enim BD EC CD . & quoniam parallelogrammum est $ABED$ cujus diameter BD , erit ABD triangulum triangulo EBD ^a æquale. ergo pyramis cujus basis triangulum ABD , vertex autem punctum C , æqualis ^b est pyramidi, cujus basis EDB triangulum, & vertex punctum C . sed pyramis cujus basis EDB triangulum, & vertex punctum C , eadem est cum pyramide cujus basis triangulum EBC , & vertex D punctum: iisdem enim planis continentur. ergo & pyramis cujus basis triangulum ABD , vertex autem punctum C , æqualis est pyramidi cujus basis EBC triangulum, & vertex punctum D . rursus quoniam $FCBE$ parallelogrammum est cujus diameter CE , triangulum ECF triangulo CBE est ^a æquale. ergo & pyramis cujus basis EBC triangulum, vertex autem punctum D , æqualis est ^b pyramidi cujus basis triangulum ECF , & vertex punctum D . sed pyramis cujus



^a 34. primi.

^b 5. hujus.

basis quidem BCE triangulum, vertex autem punctum D ostensa est æqualis pyramidi cujus basis triangulum ABD , & vertex C punctum. quare & pyramis cujus basis triangulum CEF , & vertex punctum D , æqualis est pyramidi cujus basis triangulum ABD , & vertex C punctum. prisma igitur $ABCDEF$ dividitur in tres pyramides inter se æquales, quæ triangulares bases habent. Et quoniam pyramis cujus basis ABD triangulum, vertex autem punctum C , eadem est cum pyramide, cujus basis triangulum CAB , & vertex D punctum, iisdem namque planis continetur: pyramis autem, cujus basis triangulum ABD , & vertex punctum C , tertia pars ostensa est prismatis cujus basis ABC triangulum, & oppositum ipsi DEF : & pyramis igitur, cujus basis triangulum ABC , vertex autem D punctum, tertia pars est prismatis eandem basim habentis, videlicet ABC triangulum, & oppositum ipsi triangulum DEF . Quod demonstrare oportebat.



C O R O L L.

1. Ex hoc manifestum est omnem pyramidem tertiam partem esse prismatis basim habentis eandem, & altitudinem æqualem; quoniam si basis prismatis aliam quandam figuram rectilineam obtineat, & oppositam ipsi eandem; dividitur in prismata quæ triangulares bases habent, basi-
busque opposita etiam triangula.
2. Prismata æque alta sunt inter se ut bases.

P R O P. VIII. T H E O R.



Similes pyramides quæ triangulares bases habent, in triplicata sunt proportionem homologorum laterum.

Sint similes & similiter positæ pyramides, quarum bases quidem triangula ABC DEF , vertices autem G H puncta. Dico $ABCG$ pyramidem ad pyramidem $DEFG$, triplicatam proportionem habere ejus quam BC habet ad EF . Compleantur enim $BGML$ $EHPO$ solida parallelepipeda. & quoniam pyramis $ABCG$ similis est pyramidi $DEFG$, erit $\angle$ ABC angulo DEF æqualis, angulusque GBC æqualis angulo HEF , & angulus ABG angulo DEH . atque $\angle$ est ut AB ad DE , ita BC ad EF , & BG ad EH . quoniam igitur est
ut

a 9. Def. undecimi.

b 1. Def. sexti.

ut AB ad DE, ita BC ad EF, & circum æquales angulos latera sunt proportionalia, parallelogrammum BM parallelogrammo EP simile erit. eadem ratione, & parallelogrammum NB simile est parallelogrammo ER, & parallelogrammum BK ipfi EX parallelogrammo. tria igitur parallelogramma BM KB BN. tribus EP EX ER sunt similia. sed tria quidem MB BK BN tribus oppositis æqualia



& similia sunt, tria vero EP EX ER tribus oppositis æqualia & similia. quare solida BGML EHPO similibus planis & numero æqualibus continentur; ac propterea ^d simile est ^d 9. Def. BGML solidum solido EHPO. similia autem solida parallelepipeda in ^e triplicata sunt proportionem homologorum laterum. ergo solidum BGML ad solidum EHPO triplicatam habet proportionem ejus quam habet latus homologum BC ad EF homologum latus. sed ^f ut BGML solidum ad solidum EHPO, ita ABCG pyramis ad pyramidem DEFH; pyramis enim sexta pars est ipsius solidi, cum prisma quod est dimidium solidi parallelepipedi, sit pyramidis ^g triplum. quare & pyramis ABCG ad pyramidem DEFH triplicatam proportionem habebit ejus quam BC habet ad EF. Quod demonstrare oportebat.


Cor. Ex hoc perspicuum est, & similes pyramides quæ multangulas bases habent, inter se esse in triplicata proportionem homologorum laterum. ipsis enim divis in pyramides triangulares bases habentes: quoniam & similia polygonæ quæ sunt in basibus, in similia triangula dividuntur, ^h & ^h 20. sexti. numero æqualia & homologa totis; erit ut una pyramis in una pyramide triangularem habens basim ad pyramidem in altera triangularem basim habentem, ita & omnes pyramides in una pyramide triangulares habentes bases ad omnes in altera triangulares bases habentes; hoc est, ita pyramis ipsa multangulam habens basim ad pyramidem quæ multangulam basim habet. sed pyramis triangularem habens basim ad pyramidem quæ triangularem basim habet, est in triplicata proportionem homologorum laterum. & pyramis igitur polygonam habens basim ad pyramidem similem basim habentem, triplicatam proportionem habebit ejus quam latus homologum habet ad homologum latus.

PROP. IX. THEOR.

Æqualium pyramidum, & triangulares bases habentium, bases & altitudines reciproce sunt proportionales: & quarum pyramidum triangulares bases habentium, bases & altitudines reciproce sunt proportionales, illa sunt æquales.

Sint nempe pyramides æquales, quæ triangulares bases habeant $ABC DEF$, vertex vero $G H$ puncta. Dico pyramidum $ABCG DEFH$ bases & altitudines reciprocari; scilicet ut ABC basis ad basim DEF , ita esse pyramidis $DEFH$ altitudinem ad altitudinem pyramidis $ABCG$. Compleantur enim $BGML EHPO$ solida parallelepipeda. & quoniam pyramis $ABCG$ est æqualis pyramidi $DEFH$, atque est pyramidis quidem $ABCG$ sextuplum $BGML$ solidum, pyramidis vero $DEFH$ sextuplum solidum $EHPO$; erit & solidum $BGML$ solido $EHPO$ æquale. æqualium autem solidorum parallelepipedorum bases & altitudines reciprocantur *b.* est igitur ut BM basis ad basim EP , ita $EHPO$ solidi altitudo ad altitudinem solidi $BGML$. sed ut BM basis ad basim EP , ita & ABC triangulum ad triangulum DEF . ergo

a 15. quinti. b 34. undecimi.




& ut ABC triangulum ad triangulum DEF , ita solidi $EHPO$ altitudo ad altitudinem solidi $BGML$. sed solidi quidem $EHPO$ altitudo eadem est cum altitudine pyramidis $DEFH$; solidi vero $BGML$ altitudo eadem est cum altitudine pyramidis $ABCG$: est igitur ut ABC basis ad basim DEF , ita pyramidis $DEFH$ altitudo ad altitudinem pyramidis $ABCG$. quare pyramidum $ABCG DEFH$ bases & altitudines reciproce sunt proportionales. Et si pyramidum $ABCG DEFH$ bases & altitudines reciproce sunt proportionales, sitque ut ABC basis ad basim DEF , ita pyramidis $DEFH$ altitudo ad altitudinem pyramidis $ABCG$. Dico $ABCG$ pyramidem pyramidi $DEFH$ æqualem esse. Iisdem enim constructis, quoniam ut ABC basis ad basim DEF , ita est $DEFH$ pyramidis altitudo ad altitudinem pyramidis $ABCG$; ut autem ABC basis ad basim DEF , ita BM parallelogrammum ad parallelogrammum EP : erit & ut parallelogrammum BM ad EP parallelogrammum, ita pyramidis $DEFH$ altitudo ad altitudinem

nem pyramidis $ABCG$. sed pyramidis quidem $DEFH$ altitudo eadem est cum altitudine solidi parallelepipedum $EHPO$; pyramidis vero $ABCG$ altitudo eadem est cum altitudine solidi parallelepipedum $BGML$: est igitur ut BM basis ad basim EP , ita $EHPO$ solidi parallelepipedum altitudo ad altitudinem solidi parallelepipedum $BGML$. quorum autem solidorum parallelepipedorum bases & altitudines reciprocantur, ea sunt ^{34. unde-} æqualia. solidum igitur parallelepipedum $BGML$ æquale ^{cimi.} est solido parallelepipedo $EHPO$. atque est solidi quidem $BGML$ sexta pars pyramis $ABCG$: solidi vero $EHPO$ itidem sexta pars pyramis $DEFH$. ergo pyramis $ABCG$ pyramidi $DEFH$ est æqualis. Æqualium igitur pyramidum, & triangulares bases habentium, bases & altitudines reciproce sunt proportionales: & quarum pyramidum triangulares bases habentium bases & altitudines reciproce sunt proportionales, illæ sunt æquales. Quod oportebat demonstrare.

PROP. X. THEOR.


Omnis conus tertia pars est cylindri, qui eandem basim habet & altitudinem æqualem.

Habeat conus eandem basim quam cylindrus, videlicet circulum $ABCD$, & altitudinem æqualem. Dico conum tertiam partem esse cylindri, hoc est cylindrum coni triplum esse. Si enim cylindrus non sit triplus coni, vel maior erit quam triplus, vel minor. sit primo maior quam triplus. & describatur in $ABCD$ circulo quadratum $ABCD$. ergo quadratum $ABCD$ majus est quam dimidium $ABCD$ circuli. & à quadrato $ABCD$ erigatur prisma æque altum cylindro. quod quidem prisma majus erit quam cylindri dimidium; quoniam si circa circulum $ABCD$ quadratum describatur, erit inscriptum quadratum dimidium circumscripti. & sint ab eisdem basibus erecta solida parallelepipeda æque alta, nimirum prismata ipsa. quare prismata inter se sunt aut bases. & ^{2. Cor. 7.} prisma igitur erectum à quadrato $ABCD$ dimidium est prismatis erecti à quadrato quod circa circulum $ABCD$ describitur. atque est cylindrus minor prismate erecto à quadrato quod describitur circa circulum $ABCD$. prisma igitur erectum à quadrato $ABCD$ æque altum cylindro, dimidio cylindri est majus. secentur circumferentiæ AB BC CD DA bifariam in punctis E F G H , & AE EB BF FC CG GD DH HA



b ostenditur. ad 2. hujus.

HA jungantur. unumquodque igitur triangulorum AEB BFC CGD DHA majus ^b est dimidio portionis circuli $ABCD$, in qua consistit. erigantur ab unoquoque triangulorum AEB BFC CGD DHA prismata æque alta cylindro. ergo & unumquodque erectorum prismatum majus est dimidio portionis cylindri quæ ad ipsum est. quoniam si per puncta $EFGH$ parallelæ ipsi AB BC CD DA ducantur, & compleantur in ipsis AB BC CD DA parallelogramma, à quibus solida parallelepipedæ æque alta cylindro erigantur: erunt uniuscujusque erectorum dimidia prismata ea ^a quæ sunt in triangulis AEB BFC CGD DHA . & sunt cylindri portiones erectis solidis parallelepipedis minores. ergo & prismata quæ in triangulis AEB BFC CGD DHA majora sunt dimidio portionum cylindri quæ ad ipsa sunt. itaque reliquas circumferentias secantes bifariam, jungentesque rectas lineas, & ab unoquoque triangulorum erigentes prismata æque alta cylindro, &




^c Lemma hujus.

^d 1. Cor. 7. hujus.

hoc semper facientes, tandem relinquemus quasdam portiones cylindri quæ ^c minores erunt excessu, quo cylindrus conici triplum superat. relinquantur jam, & sint AE EB BF FC CG GD DH HA . reliquum igitur prisma, cujus basis quidem polygonum $AEBFCGDH$, altitudo autem eadem quæ cylindri, majus est quam triplum conici. sed prisma cujus basis $AEBFCGDH$ polygonum, & altitudo eadem quæ cylindri, triplum ^d est pyramidis, cujus basis polygonum $AEBFCGDH$, vertex autem idem qui conici. & pyramis igitur cujus basis polygonum $AEBFCGDH$, vertex autem idem qui conici, major est cono qui basim habet $ABCD$ circulum. sed & minor: (ab ipso enim comprehenditur.) quod fieri non potest. non igitur cylindrus major erit quam triplus conici. Dico insuper neque cylindrum minorem esse quam triplum conici. Si enim fieri potest, sit cylindrus minor quam triplus conici. erit invertendo conus major quam tertia pars cylindri. describatur in $ABCD$ circulo quadratum $ABCD$. ergo quadratum $ABCD$ majus est quam dimidium $ABCD$ circuli. & à quadrato $ABCD$ erigatur pyramis, verticem habens eundem quem conus; pyramis igitur erecta major est quam conici dimidium: quoniam, ut ante demonstravimus, si circa circulum quadratum describatur, erit quadratum $ABCD$ dimidium ejus quod circa circulum descriptum est: & si à quadratis erigantur solida parallelepipedæ æque alta cono, quæ & prismata appellantur


pellantur erit quod à quadrato ABCD erigitur, dimidium ejus, quod erectum est à quadrato circa circulum descripto; etenim inter se sunt ut bases. quare & tertiæ partes ipsarum. pyramis igitur cujus basis quadratum ABCD, dimidia est ejus pyramidis quæ à quadrato circa circulum descripto erigitur. Ad pyramis erecta à quadrato descripto circa circulum, major est cono; ipsum namque comprehendit. ergo pyramis cujus basis ABCD quadratum, vertex autem idem qui cono, major est quam cono dimidium. secentur circumferentiæ AB BC CD DA bifariam in punctis EFGH. & jungantur AE EB BF FC CG GD DH HA. & unumquodque igitur triangulorum AEB BFC CGD DHA majus est quam dimidium portionis circuli ABCD, in qua consistit. erigantur ab unoquoque triangulorum AEB BFC CGD DHA pyramides verticem habentes eundem quem conus. ergo & unaquæque pyramidum eodem modo erectarum major est quam dimidium portionis cono quæ est ad ipsam. itaque reliquas circumferentias secantes bifariam, jungentesque rectas lineas, & ab unoquoque triangulorum erigentes pyramides verticem habentes eundem quem conus, & hoc semper facientes, relinquemus tandem quasdam cono portiones quæ minores erunt excessu quo conus tertiam cylindri partem superat. relinquantur; & sint quæ in ipsis AE EB BF FC CG GD DH HA. reliqua igitur pyramis cujus basis polygonum AEBFCGDH, & vertex idem qui cono, major est quam tertia cylindri pars. sed pyramis cujus basis polygonum AEBFCGDH, vertex autem idem qui cono, tertia pars est prismatis cujus basis polygonum AEBFCGDH, altitudo autem eadem quæ cylindri. prisma igitur cujus basis AEBFCGDH polygonum, & altitudo eadem quæ cylindri, majus est cylindro cujus basis est circulus ABCD. sed & minus: (ab ipso enim comprehenditur.) quod fieri non potest. non igitur cylindrus minor est quam triplus cono. ostensum autem est neque majorem esse quam triplum. ergo cylindrus cono triplus sit necesse est; ac propterea conus tertia pars cylindri. Omnis igitur conus tertia pars est cylindri, eandem quam ipse basim habentis, & altitudinem æqualem. Quod demonstrare oportebat.





PROP. XI. THEOR.

Coni & cylindri qui eandem habent altitudinem, inter se sunt ut bases.

Sint in eadem altitudine coni & cylindri, quorum bases circuli $ABCD$ $EFGH$, axes autem KL MN , & diametri basium AC EG . Dico ut $ABCD$ circulus ad circulum $EFGH$, ita esse conum AL ad EN conum. Si enim non ita sit; erit ut $ABCD$ circulus ad circulum $EFGH$, ita conus AL ad aliquod solidum minus cono EN , vel ad majus. sit primo ad minus quod sit X . & quo minus est solidum X cono EN , ei æquale sit I solidum. conus igitur EN ipsis solidis X I est æqualis. describatur in $EFGH$ circulo quadratum $EFGH$, quod majus est dimidio circulo. erigatur à quadrato $EFGH$ pyramis æque alta cono. pyramis igitur erecta major est coni dimidio. nam si circa circulum quadratum describamus, & ab ipso erigamus pyramidem



æque altam cono; erit inscripta pyramis pyramidis circumscriptæ dimidium: etenim inter se sunt ut bases. conus autem circumscripta pyramide est minor. ergo pyramis cujus basis quadratum $EFGH$, vertex autem idem qui coni, major est coni dimidio. secentur circumferentiæ EF FG GH HE bifariam in punctis P R S O ; & OE EP PF FR RG GS SH HO jungantur. unumquodque igitur triangulorum HOE EPF FRG GSH majus est quam dimidium segmenti circuli in quo consistit. erigatur ab unoquoque triangulorum HOE EPF FRG GSH pyramis æque alta cono. ergo & unaquæque erectarum pyramidum major est dimidio portionis coni, quæ est ad ipsam. itaque reliquas circumferentias secantes bifariam, & jungentes rectas lineas, & ab unoquoque triangulorum erigentes pyramides æque altas cono, atque hoc semper facientes, relinuemus tandem aliquas portiones coni, quæ solido I minores erunt. relinquantur, & sint quæ in ipsis HO OE EP PF FR RG GS SH .



Lemma hujus.




SH. reliqua igitur pyramis cujus basis polygonum HOEPFRGS, altitudo autem eadem quæ coni, major est solido x. describatur in circulo ABCD polygono HOEPFRGS simile & similiter positum polygonum DTAYBQCV, & ab ipso erigatur pyramis æque alta cono AL. quoniam igitur est ut quadratum ex AC ad quadratum ex EG, ita DTAY- 1. hujus.
 BQCV polygonum ad polygonum HOEPFRGS; ut autem quadratum ex AC ad quadratum ex EG, ita ABCD circulus ad circulum EFGH: erit ut ABCD circulus ad circulum 2. hujus.
 EFGH, ita polygonum DTAYBQCV ad polygonum HO- 11. quinti.
 EPFRGS. sed ut ABCD circulus ad circulum EFGH, ita conus AL ad x solidum: & ut polygonum DTAYBQCV ad polygonum HOEPFRGS, ita pyramis cujus basis DTAYBQCV polygonum, vertex autem punctum L, ad pyramidem cujus basis polygonum HOEPFRGS, & vertex punctum N. ut igitur conus AL ad x solidum, ita pyramis, cujus basis polygonum DTAYBQCV, & vertex punctum L, ad pyramidem cujus basis polygonum HOEPFRGS, & vertex N punctum. conus autem AL major est pyramide quæ est in ipso. majus igitur est solidum x pyramide quæ est in cono EN. sed & ostensum est minus. quod fieri non potest. non igitur ut ABCD circulus ad circulum EFGH, ita est AL conus ad solidum aliquod minus cono EN. similiter demonstrabitur neque ut EFGH circulus ad circulum ABCD, ita esse conum EN ad aliquod solidum minus cono AL. Dico præterea neque esse ut ABCD circulus ad circulum EFGH, ita AL conum ad aliquod solidum majus cono EN. Si enim fieri potest, sit ad solidum majus, quod sit Z. ergo invertendo ut EFGH circulus ad circulum ABCD ita erit solidum Z ad AL conum. sed cum sit solidum Z majus cono EN; erit ut solidum Z ad AL conum, ita conus EN ad aliquod solidum minus cono AL. & igitur ut EFGH circulus ad circulum ABCD, ita conus EN ad aliquod solidum minus cono AL, quod fieri non posse ostensum est. non igitur ut ABCD circulus ad circulum EFGH, ita conus AL ad aliquod solidum majus cono EN. ostensum autem est neque esse ad minus. ergo ut ABCD circulus ad circulum EFGH, ita est conus AL ad EN conum. sed ut conus ad conum, ita est cylindrus ad cylindrum; est enim uterque 15. quinti.
 utriusque triplus. & igitur ut ABCD circulus ad circulum 10. hujus.
 EFGH, ita in ipsis cylindri æque alti conis. Ergo coni & cylindri qui eandem habent altitudinem, inter se sunt ut bases. Quod demonstrare oportebat.

PROP. XII. THEOR.

Similes conī & cylindri inter se sunt in triplicata proportionē diametrorum quæ sunt in basibus.

Sint similes conī & cylindri, quorum bases quidem circuli ABCD EFGH, diametri vero basium BD FH, & axes conorum vel cylindrorum KL MN. Dico conum cujus basis ABCD circulus, vertex autem punctum L, ad conum cujus basis circulus EFGH, vertex autem N punctum, triplicatam habere proportionem ejus quam habet BD ad FH. Si enim non habet conus ABCDL ad conum EFGHN triplicatam proportionem ejus quam BD habet ad FH, habebit ABCDL conus ad aliquod solidum minus cono EFGHN triplicatam proportionem, vel, ad majus. Habeat primo ad minus, quod sit X. & describatur in EFGH. circulo quadratum EFGH.

quadratum igitur EFGH majus est dimidio EFGH circuli. & erigatur à quadrato EFGH pyramis æque alta cono. ergo erecta pyramis major est quam conī dimidium. itaque secentur EF FG GH HE circumferentiæ bifariam in punctis O P R S, & jungantur EO OF FP PG GR RH HS SE. unumquodque igitur triangulorum EOF FPG GRH HSE majus est dimidio segmenti circuli EFGH, in quo consistit. & erigatur ab unoquoque triangulorum EOF FPG GRH HSE pyramis eundem verticem habens quem conus. ergo & unaquæque erectarum pyramidum major est quam dimidium portionis conī, quæ est ad ipsam. secantes igitur reliquas circumferentias bifariam, jungentesque rectas lineas, & ab unoquoque triangulorum erigentes pyramides eundem habentes verticem quem conus, atque hoc semper facientes, tandem relinquemus quasdam conī portiones quæ minores erunt excessu quo conus EFGHN ipsum X solidum superat. relinquatur, & sint quæ in ipsis EO OF FP PG GR RH HS SE. reliqua igitur pyramis cujus basis quidem poly-




Lemma
hujus.

quæ minores erunt excessu quo conus EFGHN ipsum X solidum superat. relinquatur, & sint quæ in ipsis EO OF FP PG GR RH HS SE. reliqua igitur pyramis cujus basis quidem polygonum



gonum EOFGRHS, vertex autem N punctum, major est solido x. describatur etiam in circulo ABCD, polygono EOFGRHS simile & similiter positum polygonum ATBYCVDQ: à quo erigatur pyramis eundem verticem habens quem conus: & triangulorum continentium pyramidem cujus basis quidem est polygonum ATBYCVDQ, vertex autem punctum L, unum fit LBT; triangulorum vero continentium pyramidem cujus basis EOFGRHS polygonum, & vertex punctum N, unum fit NFO: & jungantur KT MO. quoniam igitur conus ABCDL similis est cono EFGHN, erit ^b ut BD ad FH, ita KL axis ad ^b 24. Def. axem MN, ut autem BD ad FH, ita BK ad FM. itaque ut BK ad FM ita KL ad MN: & permutando ut BK ad KL, ita FM ad MN. & cum perpendicularis utraque est, & circa æquales angulos BKL FMN latera sunt proportionalia: simile igitur ^d est BKL triangulum triangulo FMN. Rursus quoniam ^d 15. quinti. est ut BK ad KT, ita FM ad MO, & circa æquales angulos BKT FMO latera sunt proportionalia; etenim quæ pars est angulus BKT quatuor rectorum qui sunt ad K centrum, eadem est pars & angulus FMO quatuor rectorum qui sunt ad centrum M; erit ^b triangulum BKT triangulo FMO simile. & quoniam ostensum est ut BK ad KL, ita esse FM ad MN; æqualis autem est BK ipsi KT, & FM ipsi MO: erit ut TK ad KL, ita OM ad MN: & circa æquales angulos TKL OMN latera sunt proportionalia; recti enim sunt: triangulum igitur LKT simile est triangulo MNO. quod cum ob similitudinem triangulorum BKL FMN, sit ut LB ad BK, ita NF ad FM; ob similitudinem vero triangulorum BKT FMO, ut KB ad BT, ita MF ad FO: erit ex æquali ut LB ad BT, ita NF ad FO. rursus cum ob similitudinem triangulorum LTK NOM, sit ut LT ad TK, ita NO ad OM; & ob similitudinem triangulorum KBT OMF, ut KT ad TB, ita MO ad OF: ex æquali erit ut LT ad TB, ita NO ad OF, ostensum autem est & ut TB ad BL, ita OF ad FN. quare rursus ex æquali ut TL ad LB, ita ON ad NF. triangulorum igitur LTB NOF proportionalia sunt latera, ideoque æquiangula sunt LTB NOF triangu- ^e 5. sexci. la, & inter se ^e similia. quare & pyramis cujus basis triangulum BKT, vertex autem L punctum, similis est pyramidi cujus basis FMO triangulum, & vertex punctum N; similibus enim planis continentur, & multitudine æqualibus. pyramides autem similes, & quæ triangulares bases habent, in triplicata sunt ^f 8. hujus. proportionem homologorum laterum. ergo pyramis BCTL ad pyramidem FMON triplicatam habet proportionem ejus quam BK habet ad FM. similiter à punctis quidem A Q D V C Y ad K, à punctis vero E S H R G P ad M ducentes rectas
lineas

lineas, & à triangulis erigentes pyramides vertices eisdem habentes quos coni, ostendemus & unamquamque pyramidum ejusdem ordinis ad unamquamque alterius ordinis triplicatam proportionem habere ejus quam habet BK latus ad homologum latus MF, hoc est quam BD ad

§ 12. quinti. FH. sed ut unum antecedentium ad unum consequentium, ita omnia antecedentia ad omnia consequentia. est igitur & ut BKTL pyramis ad pyramidem FMON, ita tota pyramis cujus basis ATBYCVDQ polygonum, vertex autem punctum L, ad totam pyramidem cujus basis polygonum EOFPG-RHS, & vertex punctum N. quare & pyramis cujus basis ATBYCVDQ polygonum, vertex autem punctum L, ad pyramidem cujus basis polygonum, EOFPG-RHS, & vertex punctum N, triplicatam proportionem habet ejus quam BD habet ad FH. ponitur autem conus cujus basis circulus AB



CD vertex autem punctum L, ad solidum x triplicatam proportionem habere ejus quam BD ad FH. ut igitur conus cujus basis circulus ABCD, vertex autem punctum L, ad solidum x, ita est



pyramis cujus basis ATBYCVDQ polygonum, vertex autem punctum L, ad pyramidem cujus basis polygonum EOFPG-RHS, & vertex punctum N. dictus autem conus major est pyramide quæ in ipso; etenim eam comprehendit. majus igitur est & solidum x pyramide cujus basis polygonum EOFPG-RHS, vertex autem punctum N. sed & minus. quod fieri non potest. non igitur conus cujus basis ABCD circulus, & vertex punctum L, ad aliquod solidum minus cono cujus basis circulus EFGH, & vertex N punctum, triplicatam proportionem habet ejus quam BD habet ad FH. Similiter demonstrabimus neque conum EFGHN ad aliquod solidum minus cono ABCDL triplicatam proportionem habere ejus quam habet FH ad BD. Itaque dico neque ABCDL conum ad solidum majus cono EFGHN triplicatam habere proportionem ejus quam BD habet ad FH. Si enim fieri potest, habeat ad aliquod solidum majus, quod fit z. in-


vertendo

vertendo igitur, solidum Z ad conum $ABCDL$ triplicatam proportionem habet ejus quam FH ad BD . cum autem est iolium Z majus cono $EFGHN$; erit ut solidum Z ad conum $ABCDL$, ita $EFGHN$ conus ad aliquod solidum minus cono $ABCDL$. ergo & conus $EFGHN$ ad solidum aliquod minus cono $ABCDL$ triplicatam proportionem habebit ejus quam FH habet ad BD , quod fieri non posse demonstratum est. non igitur $ABCDL$ conus ad solidum aliquod majus cono $EFGHN$, triplicatam proportionem habet ejus quam BD ad FH . ostensum autem est neque ad minus. Quare conus $ABCDL$ ad $EFGHN$ conum triplicatam proportionem habet ejus quam BD ad FH . ut autem conus ad conum, ita ^b cy-^h 15. quinti. lindrus ad cylindrum. cylindrus enim in eadem existens basi in qua conus, & ipsi æque altus, coni ⁱ triplus est, cum ⁱ 10. hujus. ostensum sit, omnem conum tertiam partem esse cylindri eandem quam ipse basim habentis, & æqualem altitudinem. ergo & cylindrus ad cylindrum triplicatam proportionem habebit ejus quam BD habet ad FH . Similes igitur coni & cylindri inter se sunt in triplicata proportione diametrorum quæ sunt in basibus. Quod demonstrare oportebat.

PROP. XIII. THEOR.


Si cylindrus plano secetur oppositis planis parallelo, erit ut cylindrus ad cylindrum, ita axis ad axem.

Cylindrus enim AD plano GH secetur oppositis planis AB CD parallelo, & occurrat axi EF in K puncto. Dico ut BG cylindrus ad cylindrum GD , ita esse EK axem ad axem KF . Producatur enim EF axis ex utraque parte ad puncta L , M ; & ipsi quidem EK axi ponantur æquales quotcunque EN NL ; ipsi vero FK æquales quotcunque FX XM : & per puncta L N X M ducantur plana ipsis AB , CD parallela: atque in planis per L N X M circa centra L N X M intelligantur circuli OP RS TY VQ æquales ipsis AB CD ; & cylindri PR RB DT TQ intelligantur. quoniam igitur axes LN NE EK inter se sunt æquales, erunt cylindri PR RB BG inter se æquales ut bases. æquales autem sunt bases. ergo & cylindri PR RB BG sunt æquales. quod cum axes LN NE EK inter se



a 11. hujus.

se æquales sint, itemque cylindri PR RB BG inter se æquales; sitque ipsorum LN NE EK multitudo æqualis multitudini ipsorum PR RB BG: quotuplex est axis KL ipsius EK axis, totuplex erit & PG cylindrus cylindri GB. eadem ratione & quotuplex est MK axis ipsius axis KF, totuplex est & GQ cylindrus cylindri GD. & si quidem axis KL sit æqualis axi KM, erit & PG cylindrus cylindro GQ æqualis; si autem axis LX major sit axe KM, & cylindrus PG major erit cylindro GQ; & si minor, minor. quatuor igitur existentibus magnitudinibus, videlicet axibus EK KF, & cylindris BG GD, sumpta sunt æque multiplicia, axis quidem EK, & BG cylindri, nempe axis KL, & cylindrus PG; axis vero KF, & cylindri GD æque multiplicia, axis scilicet KM, & GQ cylindrus: & demonstratum est si LK axis superat autem KM, & PG cylindrum superare cylindrum GQ; & si æqualis æqualem; & si minor minorem. est igitur axis EK ad axem KF, ut BG cylindrus ad cylindrum GD. Quare si cylindrus plano secetur oppositis planis parallelo, erit ut cylindrus ad cylindrum, ita axis ad axem. Quod demonstrare oportebat.




6 5. Def.
quinti.

PROP. XIV. THEOR.

In aequalibus basibus existentes coni & cylindri, inter se sunt ut altitudines.

Sint enim in æqualibus basibus AB CD, cylindri EB FD. Dico ut EB cylindrus ad cylindrum FD, ita esse GH axem ad axem KL. Producatur enim KL axis ad punctum N, ponaturque ipsi GH axi æqualis LN; & circa axem LN intelligatur cylindrus CM. quoniam igitur cylindri EB CM eandem habent altitudinem, inter se sunt ut bases. bases autem sunt æquales. ergo & cylindri EB CM inter se æquales erunt. & quoniam cylindrus FM secatur plano CD,



11. hujus.

13. hujus. oppositis planis parallelo, erit ut CM


cylindrus

cylindrus ad cylindrum FD, ita axis LN ad KL axem. æqualis autem est cylindrus quidem CM cylindro EB; axis vero LN axi GH. est igitur ut EB cylindrus ad cylindrum FD, ita axis GH ad KL axem. ut autem EB cylindrus ad cylindrum FD, ita ^{c 15. quinti.} $\frac{ABG \text{ conus ad conum CDK}}{\text{cylindri sunt enim conorum } 4 \text{ tripli.}}$ ergo & ut GH axis ad axem KL, ita ^{d 10. hujus.} est ABG conus ad conum CDK, & cylindrus EB ad FD cylindrum. In basibus igitur æqualibus existentes coni & cylindri, inter se sunt ut altitudines. Quod demonstrare oportebat.

PROP. XV. THEOR.


Æqualium conorum & cylindrorum bases & altitudines reciproce sunt proportionales; & quorum conorum & cylindrorum bases & altitudines reciproce sunt proportionales, illi inter se sunt æquales.

Sint æquales coni & cylindri, quorum bases quidem ABCD EFGH circuli, & diametri ipsorum AC EG; axes autem KL MN; qui quidem & conorum vel cylindrorum sunt altitudines: & compleantur cylindri AX EO. Dico cylindrorum AX EO bases & altitudines reciproce proportionales esse, hoc est, ut ABCD basis ad basim EFGH, ita esse altitudinem MN ad altitudinem KL. altitudo enim KL vel æqualis est altitudini MN, vel non æqualis. Sit primo æqualis. atque est AX cylindrus æqualis cylindro EG. qui autem eandem habent altitudinem coni & cylindri inter se sunt ^a ut bases. æqualis igitur est basis ABCD basi EFGH. est igitur ut basis ABCD ad EFGH basim, ita MN altitudo ad altitudinem KL. Non sit autem altitudo KL altitudini MN æqualis, sed major sit MN, & auferatur, ab ipsa MN altitudini LK æqualis PM, & per P secetur EO cylindrus plano TYS oppositis planis circulorum EFGH RO parallelo, intelligaturque cylindrus ES cujus basis quidem EFGH circulus, altitudo autem PM. quoniam igitur AX cylindrus æqualis est cylindro EO, alius autem aliquis est cylindrus ES; erit ut AX cylindrus ad cylindrum ES, ^b ita cylindrus EO ad ES cylindrum. sed ut AX cylindrus ad cylindrum ES, ^c ita basis ABCD ad EFGH basim; cylindri enim AX ES eandem habent altitudinem: ut autem cylindrus EO ad ES cylindrum



13. hujus. drum c , ita MN altitudo ad altitudinem MP ; nam cylindrus EO secatur plano TY , oppositis planis parallelo. est igitur ut $ABCD$ basis ad basim $EFGH$, ita altitudo MN ad MP altitudinem. æqualis autem est MP altitudo altitudini KL . quare ut basis $ABCD$ ad $EFGH$ basim, ita MN altitudo ad altitudinem KL . æqualium igitur cylindrorum AX EO bases & altitudines reciproce sunt proportionales.


Sed si cylindrorum AX EO bases & altitudines sunt reciproce proportionales: hoc est, ut $ABCD$ basis ad basim $EFGH$, ita altitudo MN ad KL altitudinem. Dico AX cylindrum cylindro EO æqualem esse. Iisdem enim constructis; quoniam ut $ABCD$ basis ad basim $EFGH$, ita altitudo MN ad KL altitudinem; altitudo autem KL æqualis est altitudini MP : erit ut $ABCD$ basis ad basim $EFGH$, ita MN altitudo ad altitudinem MP .
 11. hujus. sed ut $ABCD$ basis ad basim $EFGH$, ita AX cylindrus ad cylindrum ES ; eandem enim habent altitudinem: ut autem MN altitudo ad altitudinem MP , ita cylindrus EO ad ES cylindrum. est igitur ut AX cylindrus ad cylindrum ES , ita cylindrus EO ad ES cylindrum. cylindrus igitur AX cylindro EO est æqualis. similiter autem & in conis. Quod demonstrare oportebat.



PROP. XVI. PROBL.

Duobus circulis circa idem centrum existentibus, in majori polygonum æqualium & numero parium laterum describere, quod minorem circulum non tangat.

Sint dati duo circuli $ABCD$ $EFGH$ circa idem centrum K . Oportet in majori circulo $ABCD$ polygonum æqualium & numero parium laterum describere, non tangens minorem circulum $EFGH$. Ducatur per K centrum recta linea BD , atque à puncto G ipsi BD ad rectos angulos ducatur AG , & ad c producatur, quæ
 16. tertii. AC circulum $EFGH$ tanget.



Itaque circumferentiam BAD bifariam secantes, & ejus diametrum rursus bifariam, & hoc semper facientes, tandem relinquemus

6 Lemma hujus.

relinquemus circumferentiam minorem ipsa AD. relinqua-
tur sitque LD : & à puncto L ad BD perpendicularis ^{12. prim.} aga-
tur LM, & ad N producat; junganturque LD DN. ergo LD
ipsi DN est ¹ æqualis, & quoniam LN parallela est AC, & AC ^{3. & 29.}
tangit circumulum EFGH; ipsa LN circumulum EFGH non tan-
get. & multo minus tangent circumulum EFGH rectæ lineæ
LD DN. quod si ipsi LD æquales deinceps circulo ABCD
aptabimus, describetur in eo polygonum æqualium & nu-
mero parium laterum non tangens minorem circumulum EFGH.
Quod facere oportebat.

PROP. XVII. PROBL.


*Duabus sphaeris circa idem centrum existentibus, in majori
solidum polyhedrum describere, quod minoris sphaera su-
perficiem non tangat.*

Intelligentur duæ sphaeræ circa idem centrum A. Opor-
tet in majori sphaera describere solidum polyhedrum mino-
ris sphaeræ superficiem non tangens. Secentur sphaeræ pla-
no aliquo per centrum ducto: sectiones erunt circuli; quo-
niam diametro manente & semicirculo circumducto sphæ-
ra facta ¹ est: ergo in quacunque positione semicirculum in-
telligamus, quod per ipsum producit planum in superficie ^{Def. 14. undecimi.}
sphæeræ circumulum efficiet; & constat circumulum esse maxi-
mum, cum diameter sphæeræ, quæ & semicirculi diameter
est; major ⁶ sit omnibus rectis lineis quæ in circulo vel ^{15. tertii.}
sphæra ducuntur. sit igitur in majori quidem sphæra cir-
culus BCDE, in minori autem circulus FGH; & ducantur
ipforum duæ diametri ad rectos inter se angulos BD CE.
occurrat BD minori circulo in G; ducatur à puncto G ipsi
AC ad rectos angulos GL, & jungatur AL. Itaque circum-
ferentiam EB bifariam secantes, & dimidium ipsius bifa-
riam, atque hoc semper facientes, tandem relinquemus
quandam circumferentiam minorem ea parte circumferen-
tiæ circuli BCD, quæ subtenditur à recta æquali ipsi GL.
relinquatur, sitque circumferentia BK. minor igitur est
recta BK quam GL; eritque BK latus polygoni æqualium
& parium numero laterum non tangentis minorem cir-
culum. sint igitur polygoni latera in quadrante circuli
BE, rectæ BK KL LM ME; & juncta K A producat ad
N: & à puncto A plano circuli BCDE ad rectos angulos
¹ constituatur AX, quæ superficiæ sphaeræ in puncto X oc-
currat, & per AX & utramque ipsarum BD KN plana du-
cantur, quæ ex jam dictis efficient in superficie sphaeræ

d 18. unde-
cimi.

e 38. unde-
cimi.

maximes circulos. itaque efficiant, & sint in diametris BD KN eorum semicirculi BXD KXN . quoniam igitur XA recta est ad planum circuli $BCDE$, erunt omnia plana quæ per ipsam XA transeunt, ad idem circuli planum recta: quare & semicirculi BXD KXN recti sunt ad idem planum. & quoniam semicirculi BED BXD KXN æquales sunt in æqualibus enim consistunt BD KN diametris; erunt & eorum quadrantes BE BX KX inter se æquales. quot igitur latera polygoni sunt in quadrante BE , tot erunt & in quadrantibus BX KX , æqualia ipsis BK KL LM ME . describantur, & sint BO OP PR RX , KS ST TY YX : junganturque SO TP YR ; & ab ipsis OS ad planum circuli $BCDE$ perpendiculares ducantur. cadent hæc in communes plano-



rum sectiones BD KN , quoniam & plana semicirculorum BXD KXN ad planum circuli $BCDE$ recta sunt. itaque cadant, sintque OV SQ , & VQ jungatur. cum igitur in æqualibus semicirculis BXD KXN , æquales circumferentiæ sumptæ sint BO KS , & ductæ perpendiculares OV SQ , erit OV quidem ipsi SQ æqualis, BV vero æqualis KQ . est autem & tota BA æqualis toti KA . ergo & reliqua VA reliquæ QA est æqualis. igitur ut BV ad VA , ita

f 2. sexti. KQ ad QA : ideoque VQ ipsi BK parallela est. quod cum
utra-




utraq̃ue ipsarum ov sq̃ recta sit ad circuli BCDE planum, erit ov ipsi sq̃ parallela. ostensa autem est & ipsi æqua-
 lis. ergo qv so æquales^h sunt & parallelae. & quoniam^{g 6. unde-}
 qv parallela est ipsi so, sed & parallela ipsi kb; erit &^{cimi.}
 so ipsi kb parallela; & ipsas conjungunt bo ks. ergo &^{h 33. primi.}
 kbos quadrilaterum est in uno plano; nam si duæ rectæ^{i 9. unde-}
 lineæ parallelae sint, & in utraque ipsarum quævis puncta^{cimi.}
 sumantur, quæ dicta puncta conjungit recta linea in eodem
 est plano, in quo parallelae. & eadem ratione utraque ipso-
 rum quadrilaterorum sopt tpry in uno sunt plano. est
 autem in uno plano & triangulum yrx. si igitur à punctis^{l 2. unde-}
 o s p t r y ad a ductas rectas lineas intelligamus, con-^{cimi.}
 stituetur quædam figura solida polyhedra inter circumfer-
 rentias bx kx, ex pyramidibus, composita, quarum bases
 quidem kbos sopt tpry quadrilatera, & triangulum
 yrx; vertex autem punctum a. quod si in unoquoque la-
 tere kl lm me, quemadmodum in kb eadem construa-
 mus, & in reliquis tribus quadrantibus, & in reliquo he-
 misphærio, constituetur figura quædam polyhedra in sphæ-
 ra descripta, & composita ex pyramidibus, quarum bases
 sunt quadrilatera jam dicta, & yrx triangulum, & quæ e-
 jusdem ordinis sunt, vertex autem a punctum. Dico dictam
 figuram polyhedram non tangere superficiem minoris sphæ-
 ræ, in qua est circulus fgh. Ducatur à puncto a ad pla-^{m 11. unde-}
 num quadrilateri kbso perpendicularis az, cui in puncto^{cimi.}
 z occurrat, & bz zk jungantur. itaque quoniam az recta
 est ad quadrilateri kbso planum, & ad omnes rectas li-
 neas, quæ ipsam contingunt, & in eodem sunt plano rectos
 angulos faciet. ergo az ad utramque ipsarum bz zk est^{3. Def.}
 perpendicularis. & quoniam ab est æqualis ak, erit &^{undecimi.}
 quadratum ex ab quadrato ex ak æquale: & sunt quadrato
 quidem ex ab æqualia quadrata ex az zb, angulus
 enim ad z rectus est; quadrato autem ex ak æqualia ex
 az zk quadrata. ergo quadrata ex az zb quadratis ex
 az zk æqualia sunt. commune auferatur quadratum ex az.
 reliquum igitur quod ex bz reliquo quod ex zk est æqua-
 le: ergo recta bz rectæ zk æqualis. Similiter ostendemus,
 & quæ à puncto z ad puncta o s ducuntur utrique ipsa-
 rum bz zk æquales esse. circulus igitur centro z & inter-
 vallo una ipsarum zb zk descriptus etiam per puncta o s
 transibit. & quoniam in circulo est bkso quadrilaterum, &
 sunt æquales ob bk ks & minor os, erit angulus bz k
 obtusus; ideoque bk major quam bz. sed & gl quam bk
 est major multo. igitur major est gl quam bz. & qua-
 dratum ex gl quadrato ex bz majus. & cum æqualis al

ad pyramidem in altera sphaera ejusdem ordinis triplicatam proportionem habet ejus, quam latus homologum habet ad homologum latus; hoc est, quam habet AB ex centro sphaerae circa centrum A existentis, ad eam, quae est ex centro alterius sphaerae. similiter & unaquæque pyramis earum, quae sunt in sphaera circa centrum A , ad unamquamque pyramidem ejusdem ordinis, quae sunt in altera sphaera, triplicatam proportionem habebit ejus, quam habet AB ad eam, quae est ex centro alterius sphaerae. Et ut unum antecedentium ad unum consequentium, ita antecedentia omnia ad omnia consequentia. quare totum solidum polyhedrum, quod est in sphaera circa centrum A , ad totum solidum polyhedrum, quod in altera sphaera, triplicatam proportionem habebit ejus, quam habet AB ad eam quae est ex centro alterius sphaerae, hoc est, quam habet BD diameter ad alterius sphaerae diametrum.

PROP. XVIII. THEOR.

Sphaera inter se in triplicata sunt proportionem suarum diametrorum.

Intelligentur sphaerae ABC DEF ; quarum diametri BC EF . Dico ABC sphaeram ad sphaeram DEF triplicatam proportionem habere ejus, quam habet BC ad EF . Si enim non ita est, sphaera ABC ad sphaeram minorem ipsa DEF , vel ad majorem, triplicatam proportionem habebit ejus, quam habet BC ad EF . Habeat primo ad minorem, videlicet ad GHK . & intelligatur sphaera DEF circa idem centrum, circa quod sphaera GHK : describaturque in majori sphaera DEF solidum polyhedrum non tangens a minorem sphaeram GHK in superficie; & in sphaera ABC describatur solidum polyhedrum simile ei, quod in sphaera DEF descri-



ptum est. solidum igitur polyhedrum, quod in sphaera ABC , ad solidum polyhedrum, quod in sphaera DEF , triplicatam proportionem habet ejus, quam BC ad EF . habet autem ABC sphaera ad sphaeram GHK triplicatam proportionem ejus, quam BC ad EF . ergo ut ABC sphaera ad sphaeram GHK ,
Cor. antecedente.

GHK, ita solidum polyhedrum in sphæra ABC ad solidum polyhedrum in sphæra DEF; & permutando, ut ABC sphæra ad solidum polyhedrum, quod in ipsa est, ita GHK sphæra ad solidum polyhedrum, quod in sphæra DEF. major autem est sphæra ABC solido polyhedro, quod est in ipsa. ergo & GHK sphæra polyhedro, quod in sphæra DEF, est major. sed & minor, ab ipso enim comprehenditur, quod fieri non potest. non igitur ABC sphæra ad sphæram minorem ipsa DEF triplicatam proportionem habet ejus, quam BC ad EF. similiter ostendemus neque DEF sphæram ad sphæram minorem ipsa ABC triplicatam habere proportionem ejus, quam habet EF ad BC. Dico insuper sphæram ABC neque ad majorem sphæram ipsa DEF triplicatam proportionem habere ejus, quam BC ad EF. Si enim fieri potest, habeat ad majorem LMN. invertendo igitur, sphæra LMN ad ABC sphæram triplicatam proportionem habet ejus, quam diameter EF ad BC diametrum. ut autem sphæra LMN ad ABC sphæram, ita sphæra DEF ad sphæram quandam minorem ipsa ABC, quoniam sphæra LMN major est ipsa DEF. ergo & DEF sphæra ad sphæram minorem ipsa ABC triplicatam proportionem habet ejus, quam EF ad BC; quod fieri non posse ostensum est. non igitur ABC sphæra ad sphæram majorem ipsa DEF triplicatam proportionem habet ejus, quam BC ad EF. ostensum autem est neque ad minorem. ergo ABC sphæra ad sphæram DEF triplicatam proportionem habebit ejus, quam BC ad EF. Quod demonstrare oportebat.

F I N I S.

BOOK

α^{-2}

α^{-1}

F_i

