

Notes du mont Royal

www.notesdumontroyal.com

Cette œuvre est hébergée sur « *Notes du mont Royal* » dans le cadre d'un exposé gratuit sur la littérature.

SOURCE DES IMAGES
Google Livres

EYCLIDIS

ELEMENTORVM

Liber primus.

Item,

HERONIS ALEXANDRINI

vocabula quædam geometrica: ante hac nunquam edita, græcè & latinè

Per M. Cunradum Dasypodium.



Cum gratia & priuilegio Cæsareo, atque
Regis Galliæ, ad sexennium.

ARGENTINÆ,

1571.



Bayrische
Staatsbibliothek
München

Ad Reuerendiss: & Ill.
lustriss: Principem, Dominum,
D. Danielem Archiepiscopum Mo-
guntinensem, Sacri Romani Imperij, per
Germaniam Archicancellarium, atq;
Electorem, &c. Cunradi Dasypodij
Præfatio.

GEOMETRIAM IN
summo apud Græcos
fuisse honore, Reue-
rendiss: Præsul: non
tantum historię te-
stantur: sed & ipsorum confirmant mul-
tiplicia atq; varia volumina: quæ par-
tim extant, partim in priuatis & pu-
blicis reseruantur bibliothecis. Itaq; se-
rè nullus tum temporis erat Philoso-
phus, qui se non in hoc erudito geome-
trarum puluere exercuisset: neque ad
philosophiæ admittebantur penetralia:

P R A E F A T I O.

nisi periti geometriæ essent. atque nihil
 fuit Mathematicis illustrius: nihil ex-
 cellentius: nihil quod ad Regum &
 Principum splendorem & dignitatem
 accederet propius. Verum (quod sanè
 dolendum) hoc nostro sæculo excellen-
 tissima hæc studia: prostrata & abiecta
 iacent: neque vlla ferè spes est relicta: fore
 ut hæc integritati suæ: & honori pristi-
 no restituatur: nisi Reges atque Princi-
 pes sua liberalitate & beneficentia, ex-
 citent homines literatos: literati vero,
 & qui in scholis versantur, ipsi quoque
 met sint *ῥωμαιοι*, non autem *ἀγροικοί*
ῥητοί: denique certo modo rationeque bona,
 studiosis geometrica & his similia pro-
 ponant. quod quidem in omnibus Aca-
 demijs fieri deberet: & in aliquibus in-
 signioribus fit: in cæteris eadem fieri
 opto. in me quod est: pro virili in id in-
 cumbo:

P R Æ F A T I O .

cumbo : vt in nostris scholis Pythagoricos pueros , hoc est , in mathematicorum sine constitutos habeamus.

Ideoque de sententia Ioann. Sturmij Rectoris , non tantum tria volumina mathematica conscribo : sed & hunc primum Elementorum Euclidis librum in lucem nunc edo : cum propter ea quae ante sunt dicta : tum etiam quod hic potissimum liber : in omnibus fere Gymnasijs praelegatur : in nostris verò scholis : us qui in prima sunt curia & proponatur.

Sic enim comparatus & factus est , hic primus Euclidis liber : vt doctrinam contineat principiorum geometriae , & figurarum planarum simplicissimarum : trianguli inquam & parallelogrammi : quibus perceptis , animus adolescentum iam prae paratus videtur , ad assequenda maiora : cum in his disciplinis , tum &

P R Æ F A T I O.

alijs artibus atque scientijs.

Atque ne mea deessent opera omnibus ijs, quibus hæc studia curæ sunt: Et è tenebris antiquos meliorisque notæ, (quorum non paucos habeo) authores grecos in lucem eruerem: Heronis Alexandrini quædam, eiusdem argumenti: ex eius onomastico geometrico, huic libro adiunxi: Ut quæ Græcorum fuerint Gymnasia: Et qualia puerorum exercitia ex ijs appareret. deinde Ut copia rerum geometricarum proposita: nostri adolescentes in campum illum amplissimum mathematicarum scientiarum exirent: imò in puluerem descenderent geometricum: in quo cum viderint tot tamq̃ varias figuras, earumque definitiones, diuisiones, differentias, accidentia, proprietatesq̃ alias: quanti momenti sit hæc cognouisse, quantiq̃ adiuuenti in

PRÆFATIO.

ti in alijs comparandis & percipiendis scientijs: sciant atque intelligant.

Ita enim natura comparatum est: ut plurimum copia, varietateq; rerum afficiamur: animusq; noster se in eorum pascat contemplatione, quæ etsi vulgaria etq; quotidiana videantur: tamen si in ordinem redigantur: si præcepta de ijs fiant bona ratione, modoq; bono, & concinno: dum ea legimus, dum singula accuratius perpendimus: mirificè recreamus vires ingenij nostri: imò cupiditate & amore cognoscendi, incensi: ad investigationem & perscrutationem reconditarum abstrusissimarumq; rerum rapimur.

Statuamus enim puerum quendam à scholis Grammaticorum egressum: linguarum, & orationis puræ cognitione instructum: Dialecticorum etiam

P R Æ F A T I O .

*¶ Rhetoriam præceptis quodammodo
 imbutum : accedere ad Geometricorum
 elementorum auscultationem : is si au-
 diat primum & simplicissimum prin-
 cipium Geometriæ esse punctum : rem
 tenuissimam , minimam , talemq̃ , quæ
 in partes diuidi nequeat : ex quo tamen
 puncto omnes lineæ : vniuersæ superfi-
 cies : atq̃ infinita corpora oriuntur : quæ-
 rit statim cognito puncto , quid sit lineæ ,
 quid superficies : quid corpus . neq̃ con-
 tentus est se lineam cognouisse : sed cum
 plures linearum esse species videt : sin-
 gulas cupit addiscere : à lineis postea ad
 superficies , & quæ in superficiebus de-
 scribuntur , figuras progreditur . in qua
 doctrina maximam rerum geometri-
 carum inueniet varietatem : dum intel-
 ligit quasdam superficies planas esse :
 quasdam minimè planas : in planis su-
 perfi-*

P R Æ F A T I O .

perficiebus delineari omnis generis figurarum, easque numero quodammodo infinitas: affectiones etiam earundem variarum atque multiplices cognoscit: denique in corporum solidorum contemplationem incidit: diffusam per universam rerum naturam.

Quæ & quanta igitur puer ille ex unius puncti, lineæ etiam, atque superficiei, & corporis perceptione cognoscit? quantam rerum copiam & varietatem sibi principiorum cognitione comparat? quæ tandem his instructus rebus, recondita in his scientijs, non perscrutabitur? Magnum certè, magnum lumen præbet Geometriæ cognitio, rebus & cognoscendis, & dijudicandis: atque tam clara & perspicua omnia reddit: ut Sole splendidiora & apertiora fiant. quæ si locus esset dicendi & orandi, pluribus

P R Æ F A T I O.

persequeretur. Hoc tantum ostendere
 votui, nostram mentem studio atq; cupi-
 ditate sciendi incensam: si minimum
 quoddam cognitionis principium nata
 sit: non cessare, neq; quiescere: sed perpe-
 tuo inuentis, alia atq; alia subinde ad-
 dere. itaq; in scholis, in id potissimum in-
 cumbendum est: ut pueri hæc & similia
 Mathematicorum præcepta discant, te-
 neant, & ad inuestigationem rerum se-
 cum adferant: siue in explicatione re-
 rum diuinarum versari: siue officia Rei
 pub. tractare: siue res naturales explica-
 re, et ad vitæ vsum accomodare velint.

Hæc itaq; Reuerēdis. Præsul, mei
 instituti fuit ratio: ut & hunc librum
 primum Euclidis, & Heronis quedam
 geometrica primo atq; secundo meo vo-
 lumini mathematico adiunxerim. quia
 ad veram & solidam eruditionem as-
 sequen-

P R Æ F A T I O.

Sequēdam, hæc studia inprimis sunt necessaria: quod illorum testimonio aſſim dicere: qui cū sint ignari mathematice rerum: si quando incidunt in probatissimi alicuius authoris scripta: quid ipsis desit, sero tandem sentiūt atq; animaduertunt.

Adbortor itaq; subinde omnes adoleſcenteis, quibus ad solidam peruenire eruditionem animus est: vt in his se exerceat studijs: ijs annis quib. hæc conueniunt studia: quibus etiā absq; tædio, vllaq; molestia addiscere singula possūt. Et quòd tot tantiq; viri olim in Græcia fuerint, in omni studiorum genere præstantissimi: hoc ipsum multū adiumenti illis dedit, quòd $\pi\alpha\iota\delta\alpha\varsigma$ $\mu\alpha\theta\eta\mu\alpha\tau\iota\kappa\alpha$ habebant: & in his disciplinis eos erudiebant: priusquam ad studia eos deducerēt altiora. Vnde etiam videmus antiquos
auto-

P R Æ F A T I O .

auctores, plerunq; Mathematicorum vti
 exemplis: tanquam vulgariss. tanquam
 ijs, quæ à pueris iam essent cognita &
 percepta: quæ si nos legimus: plus inter-
 dum in intelligendo exemplo mathe-
 matico laboramus: quo res proposita il-
 lustratur: quàm in rei ipsius cognitione
 assequenda: quod quidem neutiquam
 nobis contingeret: si nostri *παῖδες*, es-
 sent *μαθηματικοί*: neq; tot obstacula, tot
 difficultates in autorum antiquorum le-
 ctione nobis occurrerent, si animi no-
 stri his imbuti essent disciplinis. Nu-
 per itaq; in nostris scholis bene institue-
 re studia mathematica incepimus: quæ
 res. cum tam recenter sit inchoata: fru-
 ctum & utilitatem eius, nondum per-
 spicere possumus. sed aliquot annis per-
 actis: sentient omnes homines, quan-
 tum bona iuuet institutio: quidue sit ra-
 tione

P R Æ F A T I O.

tionē bona modoq̃, facili pueros erudire.

Tibi verò Reuerendiſſ. Præſul,
hanc meam exiguam opellam commen-
dare volui: quòd Amplitudinem tuam
intelligam, non his tantum ſtudijs, ſed
omnibus literis, literatiſq̃ hominibus,
ampliſſimum præbere patrociniū, ne-
que ob hoc tantum: Verum etiam quòd
natura tua talis ſit, vnde prudentiam ſin-
gularem: grauitatem inſignem: & in re-
bus arduis cum ſuſcipiendis dexterita-
tem: tum perficiendis conſtantiam tu-
am omnes mirentur: in controuerſijs e-
tiam difficilioribus dirimendis acu-
men, & æquitatem laudent. Itaq̃, cum
animus A. T. ingenio & virtutibus
excellat: res externas deſpiciat: in ma-
gnis atq̃ vtilibus, vehementerq̃ arduis
gerendis, ſe exerceat: patronum etiam
horum meorum ſtudiorum A. T. eſſe
opta-

P R Æ F A T I O

optabam: cuius eam esse voluntatem in
 defendendis & tuendis studiis prom-
 ptam & paratam video: quæ Principū
 virorū semper fuit: eam etiam dignita-
 tem, & amplitudinem: quæ olim in Re-
 gibus apparebat. qui cum omni studio,
 omnibus viribus, maximis sumptibus,
 incredibili liberalitate, mathematica in-
 uarent, atq; promouerent studia: tanta,
 quanta ea legimus fuisse, effecerunt: &
 ad summum vsque fastigium euexe-
 runt. Quod si hoc nostro seculo plures
 A. T. similes existerent Principes:
 non dubito, quin & nos tandem ad fa-
 stigium harum scientiarum peruenire-
 mus. Etsi verò hic libellus sit exiguo-
 us, & A. T. minimè videatur dignus:
 cum in eo res prima fronte appareant
 spinosæ & steriles: magni tamen sunt
 momenti, & Principibus viris dignis-
 simæ:

P R Æ F A T I O.

Summa: principia inquam excellentissimarum scientiarum Mathematicarum, quas res sanè Reges olim tractarunt: quas singulariter coluerunt: in quibus qui ad sacra & mysteria tractanda admitti volebant, plurimum se exercuerunt. Sint ergo Reuerendiss. Præsul, hæc mea studia T. A. commendata: quæ si clementiam A. T. senserint: maiora his, iuuante Deo, proferam.

Calendis Maij.

Anno

M. D. LXX.



THE

...and the

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

— 10 —

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ, ΕΚ

τῶν ἑθῶν σωσιῶν.

ΟΡΟΙ.

ΣΗΜΕΙΩΝ ἔσιν, ἧ μέρ^ς ἔθεν.

Γραμμὴ δὲ, μῆκος ἁπλάης.

Γραμμῆς δὲ πέρατα σημεία.

Εὐθεῖα γραμμὴ ἔστιν· ἥτις ἐξίσχ

τοῖς ἐφ' ἑαυτῆς σημείοις κεί-

ται.

Επιφάνεια δὲ ἔστιν· ὁ μῆκος καὶ

πλάτος ἁπλῶν ἔχει.

Επιφανείας ὅτ' πέρατα, γραμ-

μαί.

Επίπεδος ἐπιφάνεια ἔστιν· ἥτις

ἐξίσχεται ἐφ' ἑαυτῆς εὐθεῖ-


αις κείται.

Επίπεδον δὲ γωνία ἔστιν· ἥ ἐν

ἐπιπέδῳ δύο γραμμῶν ἀπὸ κορυφῆς ἀλλή-

λων· ἢ μὴ ἐπ' εὐθείας κειμένων· πρὸς ἀλ-

λήλας τῶν γραμμῶν κλίσεις.



π

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ

Οταν ἂι περιέχεται τὴν γωνίαν γραμμαὶ, ὁθεῖαι ὡσιν:
ὁθύγραμμος καλεῖται ἡ γωνία.



Οταν δὲ ὁθεῖα ἐπ' ὁθεῖαν σταθεῖσι: τὰς ἐφεξῆς γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ποιῇ: ὀρθή ἐστιν ἑκατέρω τῶν ἴσων γωνιῶν. Καὶ ἡ ἐφεστηκῆς ὁθεῖα: κάθετος καλεῖται, ἐφ' ἣν ἐφέστηκεν.


Ἀμβλεία γωνία ἐστίν, ἡ μείζων ὀρθῆς.



Ὀξεῖα δὲ ἡ ἐλάσσων ὀρθῆς.

Ὅρος ἐστίν, ὁ πινός ἐστι πέρας.

Σχήμα, ἐστὶ τὸ ὑπὸ πινός, ἡ πινῶν ὁρων περιεχόμενον.



Κύκλος ἐστὶ, σχῆμα ἐπίπεδον: ὑπὸ μιᾶς γραμμῆς περιεχόμενον (ἡ καλεῖται περιφέρεια) πρὸς ἣν ἀφ' ἑνὸς σημείου, τῶν ἐν τῷ σχήματι κειμένων: πᾶσαι αἱ περὶ σπῆσαι ὁθεῖαι: ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶ.


Κέντρον δὲ τῷ κύκλῳ τὸ σημῆον καλεῖται.



Διάμετρος δὲ τῷ κύκλῳ ἐστίν, ὁθεῖα τις διὰ τὸ κέντρον ἡ γὰρ ἡ: ἢ περὶ τὴν μένη

Διάμετρος δὲ τῷ κύκλῳ ἐστίν, ὁθεῖα τις διὰ τὸ κέντρον ἡ γὰρ ἡ: ἢ περὶ τὴν μένη

μήν ἐφ' ἑκάτερα τὰ μέρη,
ὑπὸ τῆς ἑκκύκλῃ περιφερεί-
ας· ἥ τις ἐδύχα τέμνει τὸν
κύκλον.



Ἡμικύκλιον δέ ἐστι, τὸ περιε-
χόμενον σχῆμα, ὑπὸ τῆς
διάμετρος· ἢ τῆς ἀπολαμ-
βανομένης ὑπ' αὐτῆς τῆς ἑκ-
κύκλῃ περιφερείας.



Τμήμα κύκλῃ ἐστὶ, τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τε
ἀρθρίας, καὶ κύκλῃ περιφερείας.

Εἰθύγραμμα σχήματα ἐστὶ, τὰ ὑπὸ ἀθαιῶν
περιεχόμενα.


Τρίπλευρα μὲν τὰ ὑπὸ τριῶν.
Τετράπλευρα δὲ τὰ ὑπὸ τεσσά-
ρων.



Πολύπλευρα ὅ, τὰ ὑπὸ πλει-
όνων, ἢ τεσσάρων ἀθαιῶν πε-
ριεχόμενα.



Τῶν δὲ τριπλῶν σχημά-
των, ἰσόπλευρον μὲν τρίγων-
ον ἐστὶ, τὸ τρεῖς ἰσὰς ἔχον
πλευράς.



Ἰσοσκελές ὅ, τὸ τὰς δύο μόνας ἰσὰς ἔχον πλε-
υράς.


ΕΤΚΛΕΙΔΟΥ

Σκαληνὸν δὲ, τὸ τὰς τρεῖς αἰσίας ἔχον πλά-
 ρας.

Επὶ δὲ τῶν τριπλάρων σχη-
 μάτων. Ὀρθογώνιον μὲν τρι-
 γωνον ἐστὶ, τὸ ἔχον μίαν ὀρθήν
 γωνίαν.



Ἀμβλυγώνιον δὲ, τὸ μίαν ἔχον
 ἀμβλεῖαν γωνίαν.



Ὀξυγώνιον δὲ, τὸ τρεῖς ὀξείας
 ἔχον γωνίας.



Τῶν δὲ τετραπλάρων σχημά-
 μάτων, τετράγωνον μὲν ἐστὶν,
 ὁ ἰσόπλευρόν τε ἐστὶ, καὶ ὀρθογώ-
 νιον.



Ἐπερόμηκες δὲ, ὁ ὀρθογώνιον μὲν, καὶ ἰσό-
 πλευρον δὲ.


Ρόμβος δὲ, ὁ ἰσόπλευρον μὲν, καὶ ὀρθογώνι-
 ον δὲ.

Ρόμβοειδὲς δὲ, τὸ τὰς ἀπεναντίον πλά-
 ρας τε ἔχον γωνίας, ἴσας ἀλλήλαις ἔχον, ὅ ὅτι ὀρθο-
 γώνιον. ὅτι ἰσόπλευρον.

Τὰ δὲ παρὰ ταῦτα τετράπλευρα, Τραπεζί-
 α καλεῖσθω.

Παράλ-

Παράλληλοι εἰσὶν ὁθεῖαι, αἱ π
νες ἐν ταῖς αὐταῖς ἐπιπέδῳ ὁ-
σαι: καὶ ἐκβαλλόμεναι ἐπὶ ἁ-
πειρον ἐφ' ἑκάπερ τὰ μέρη:
ἐπὶ μηδετέρῃ συμπίπτουσιν
ἀλλήλαις.



ΛΙΤΗΜΑΤΑ.

Ἡ ΤΗΣ ΤΩ, ἀπὸ παντός σημείου: ἐπὶ πᾶν ση-
μεῖον ἐνθεῖαν γραμμὴν ἀγαγεῖν.

Καὶ πεπερασμένην ἐνθεῖαν: κατὰ τὸ συνεχές
ἐπὶ ἐνθεῖας ἐκβάλλειν.

Καὶ πάντι κέντρῳ, καὶ ἀξήματι: κύκλον γε-
γεῶται.

ΚΟΙΝΑΙ ΕΝΝΟΙΑΙ.

ΤΑ ΤΩ αὐτὰ ἴσα, καὶ ἀλλήλοις εἰσὶν ἴσα.

Καὶ εἰὰ ἴσοις ἴσα προσεθῇ: τὰ ὅλα εἰσὶν ἴσα.

Καὶ εἰὰ ἀπὸ ἴσων ἴσα ἀφαιρεθῇ: τὰ καταλει-
πούμενά εἰσὶν ἴσα.

Καὶ εἰὰ ἀνίστοις ἴσα προσεθῇ: τὰ ὅλα εἰσὶν ἀνίστα.

Καὶ εἰὰ ἀπὸ ἀνίστων ἴσα ἀφαιρεθῇ: τὰ λοιπὰ
εἰσὶν ἀνίστα.

Καὶ τὰ ὅσα διπλασιαῖα: ἴσα ἀλλήλοις εἰσὶ.

Καὶ τὰ ὅσα ἡμίση: ἴσα ἀλλήλοις εἰσὶ.

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ

Καὶ τὰ ἐφαρμόζοντε ἐπ' ἀλλήλας: ἴσαι ἀλλή-
λοις ἐστί.

Καὶ τὸ ὅλον, ὅ μέρους μᾶζον ἐστί.

Καὶ πάσαι αἱ ὀρθαὶ γωνίαι: ἴσαι ἀλλήλαις
εἰσὶ.

Καὶ ἐὰν εἰς δύο ὀρθαῖς, ὀρθαῖα ἐμπίπῃται,
τὰς ἐντὸς, ἑ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη γωνίας,
δύο ὀρθῶν ἐλάσσονας ποιῇ: ἐκβαλλόμεναι
αἱ δύο αὐταὶ ὀρθαῖαι ἐπ' ἄπειρον, συμπε-
σῇνται ἀλλήλαις, ἐφ' ἃ μέρη εἰσὶν αἱ τῶν
δύο ὀρθῶν ἐλάσσονες γωνίαι.


Καὶ δύο ὀρθαῖαι: χωρίον ἔπεριέχουσιν.

Πρόκειται α. πρόβλημα.

ΕΠΙ ΤΗΣ δοθείσης ὀρθαῖας πεπερασμέ-
νης: τρίγωνον ἰσόπλευρον συστήσασθαι.

Εκθεσις.) Εἰσω ἡ δοθεῖσα πεπερασμένη,
ἡ $\alpha\beta$. (Διορισμός.) Δεῖ δὴ ἐπὶ τῆς $\alpha\beta$ ὀρθαῖ-
ας: τρίγωνον ἰσόπλευρον συστήσασθαι. (Κατα-
σκευὴ.) Κέντρῳ μὲν τῆς α , διαστήματι δὲ, τῆς
 $\alpha\beta$: κύκλῳ γεγραφθῶ, ὁ $\beta\gamma\epsilon$. καὶ πάλιν
κέντρῳ μὲν τῆς β , διαστήματι δὲ τῆς $\beta\alpha$: κύ-
κλῳ γεγραφθῶ, ὁ $\alpha\gamma\delta$. καὶ ἀπὸ τοῦ γ σημείας,
καθ'

καθ' ὃ τέμνουσιν ἀλλήλους
οἱ κύκλοι, ὅππῃ τὰ α , β , ση-
μεῖα! ἐπιζῶχθωσαν δ-
θεῖαι, αἱ γὰρ, $\gamma\beta$. (Ἀπόδει-
ξις.) Ἐπεὶ ἔν τῷ α σημείῳ,
κέντρον ἐστὶ ξ γὰρ κύκλου:



ἴση ἐστὶν ἡ $\alpha\gamma$ τῇ $\alpha\beta$. πάλιν ἐπεὶ τὸ β σημεῖον,
κέντρον ἐστὶ, ξ γὰρ κύκλου: ἴση ἐστὶν ἡ $\beta\gamma$, τῇ
 $\beta\alpha$. εἰδείχθη δὲ καὶ ἡ $\gamma\alpha$, τῇ $\alpha\beta$ ἴση. ἑκατέρω
ἄρα τῶν $\gamma\alpha$, $\gamma\beta$: τῇ $\alpha\beta$ ἐστὶν ἴση. τὰ δὲ τὰ αὐ-
τῷ ἴσα: καὶ ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα, καὶ ἡ γὰρ $\alpha\gamma$ τῇ $\gamma\beta$
ἐστὶν ἴση. αἱ τρεῖς ἄρα αἱ $\gamma\alpha$, $\alpha\beta$, $\beta\gamma$: ἴσαι ἀλλή-
λαις εἰσὶν. Συμπέρασμα.) Ἰσόπλευρον ἄρα
ἐστὶ τὸ $\alpha\beta\gamma$ τρίγωνον: καὶ συνέεται ὅππῃ τῆς δο-
θείσης δθεῖας πεπερασμένης τῆς $\alpha\beta$. ὅπως εἴ-
δει ποιῆσαι.

Πρότεσις β. πρόβλημα.


Πρὸς τῷ δοθέντι σημείῳ: τῇ δοθείσῃ δ-
θεῖα: ἴσην δθεῖαν διέσσει.

Εκθεσις.) Ἐστω τὸ μὲν δοθέν σημεῖον τὸ α :
ἡ δὲ δοθεῖσα δθεῖα ἡ $\beta\gamma$. (Διορισμός. Δεῖ δὲ
πρὸς τῷ α σημείῳ: τῇ $\beta\gamma$ δθεῖα: ἴσην δθεῖαν

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ

γάν?

δίδωται. (Κατασκευή.) Επιζώχθω γ' ἀπὸ τοῦ
 α σημείου, ὅπῃ τὸ β σημεῖον:
 αθεῖα ἡ αβ. καὶ συνεχάτω
 ἐκ αὐτῆς, τρίγωνον ἰσό-
 πλάρον, τὸ δαε καὶ ἐκβε-
 βλήσωσαν ἐκ αθεῖας
 ταῖς δα, δε αθεῖαι, αἱ
 αε, βζ: καὶ κέντρω μὲν τῷ ε, διαστήματι δὲ τῷ
 βγ: κύκλῳ γεγράφθω ὁ γηθ. καὶ πάλιν κέν-
 τρω μὲν τῷ δ, διαστήματι δὲ τῷ δη: κύκλος
 γεγράφθω ὁ ηκλ. (Ἀπόδειξις.) Ἐπεὶ ἔν τῷ
 β σημεῖον, κέντρων ἐστὶ τῷ γηθ κύκλος: ἴση ἐστὶν ἡ
 βγ, τῇ εη. καὶ πάλιν, ἐπεὶ τὸ δ σημεῖον, κέν-
 τρον ἐστὶ τῷ ηκλ κύκλος: ἴση ἐστὶν ἡ δλ, τῇ δη.
 ὦν ἡ δα, τῇ δε ἴση ἐστὶ. λοιπὴ ἄρα ἡ αλ, λοι-
 πὴ τῇ εη ἐστὶν ἴση. εἰδείχθη δὲ ὅτι βγ, τῇ εη
 ἴση. ἐκατέρω ἄρα τῶν αλ, βγ: τῇ βη ἐστὶν ἴση.
 τὰ δὲ τῷ αὐτῷ ἴσα: ὁ ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα. ὁ ἡ
 αλ ἄρα, τῇ βγ, ἐστὶν ἴση. (Συμπέρασμα.)
 Πρὸς ἄρα τῷ δοθέντι σημείῳ τῷ α: τῇ δοθείσῃ
 αθεῖα τῇ βγ: ἴση αθεῖα καὶ παρ ἡ αλ. ὅπως ἐ-
 δεῖ ποιῆσαι.




Πρότερον

Πρότασις γ. πρόβλημα.

Δ ΤΟ δοθέντων ὀρθῶν ἀνίσων: ἀπὸ τῆς μείζονος, τῇ ἐλάσσονι ἴσην ὀρθεῖαν ἀφελεῖν.

Εκθεσις.) Εἰσωσαν αἱ δοθεῖσαι δύο ὀρθαὶ ἀνισοὶ αἱ $\alpha\beta$, γ , ὧν μείζων ἔστω ἡ $\alpha\beta$. (Διορισμός.) Δεῖ δὴ ἀπὸ τῆς μείζονος τῆς $\alpha\beta$, τῇ ἐλάσσονι τῇ γ : ἴσην



σὴν ὀρθεῖαν ἀφελεῖν. (Κατασκευή.) Κείδω πρὸς τῷ α σημείῳ, τῇ γ ὀρθῇ: ἴση ἡ $\alpha\delta$, καὶ κέντρῳ μὲν τῷ α , ἀκτῆματι δὲ τῷ $\alpha\delta$: κύκλῳ γεγραφθῶ δ δεξ. (Απόδειξις.) Καὶ ἐπεὶ τὸ α σημεῖον, κέντρον ἐστὶ δ δεξ κύκλου: ἴση ἐστὶν ἡ $\alpha\epsilon$, τῇ $\alpha\delta$. ἀλλὰ καὶ ἡ γ , τῇ $\alpha\delta$ ἐστὶν ἴση. ἑκατέρω ἄρα τῶν $\alpha\epsilon$, γ : τῇ $\alpha\delta$ ἐστὶν ἴση. ὥστε καὶ ἡ $\alpha\epsilon$, τῇ γ ἐστὶν ἴση. Συμπέρασμα.) Δύο ἄρα δοθέντων ὀρθῶν ἀνίσων τῶν $\alpha\beta$, γ : ἀπὸ τῆς μείζονος τῆς $\alpha\beta$, τῇ ἐλάσσονι τῇ γ : ἴση ἀφήρηται ἡ $\alpha\epsilon$, ὅπως εἶδει ποιῆσαι.

Πρότασις δ. θεώρημα.

ΕΑΝ δύο τρίγωνα, τὰς δύο πλάρας ταῖς

Α γ

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ

δυοσι πλευραῖς ἴσας ἔχη ἐκάπραν ἐκατέρα·
 ἔτι τὴν γωνίαν τῇ γωνίᾳ ἴσην ἔχη· τὴν ὑπὸ
 τῶν ἴσων ὀρθῶν περιεχομένην· καὶ τὴν βάσιν
 τῇ βάσει ἴσην ἔξει· καὶ τὸ τρίγωνον τὸ τρίγώ-
 νῳ ἴσον ἔσται· καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι ταῖς λοιπαῖς
 γωνίαις ἴσαι ἔσονται, ἐκάπρα ἐκατέρα, ὑφ'
 αἱ ἴσαι πλευραὶ ὑποτείνουσιν.

Εἰθεῖς.) Εἰσω δύο τρίγωνα, τὰ $\alpha\beta\gamma$, δὲ ζ ,
 τὰς δύο πλευράς τὰς $\alpha\beta$, $\alpha\gamma$, ταῖς δυοσι
 πλευραῖς ταῖς δὲ, δὲ ζ , ἴσας
 ἔχοντα ἐκάπραν ἐκατέ-
 ρα· τὴν μὲν $\alpha\beta$, τῇ δὲ· τὴν
 δὲ $\alpha\gamma$, τῇ δὲ ζ · καὶ γωνίαν
 τὴν ὑπὸ $\beta\alpha\gamma$, γωνίαν τῇ
 ὑπὸ $\delta\zeta$ ἴσην. (Διορι-
 σμός.) Δέγω ὅτι, καὶ βάσις ἡ $\beta\gamma$, βάσις τῇ $\delta\zeta$ ἴ-
 ση ἔσιν· ἔτι τὸ $\alpha\beta\gamma$ τρίγωνον, τὸ δὲ ζ , τρίγώ-
 νῳ ἴσον ἔσται· καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι, ταῖς λοι-
 παῖς γωνίαις ἴσαι ἔσονται, ἐκάπρα ἐκατέρα,
 ὑφ' αἱ ἴσαι πλευραὶ ὑποτείνουσιν, ἡ μὲν ὑ-
 πὸ $\alpha\beta\gamma$, τῇ ὑπὸ $\delta\zeta$ · ἡ δὲ ὑπὸ $\alpha\gamma\beta$, τῇ ὑπὸ
 $\delta\zeta$. (Ἀπόδειξις.) Εφαρμοζομένη γὰρ ὁ
 $\alpha\beta\gamma$ τρίγωνον ὅτι τὸ δὲ ζ τρίγωνον· καὶ πρὸς αὐτῷ

να ἔμῳ α σημείῳ, ὅτι τὸ δὲ σημείον: τῆς δὲ
 $\alpha\beta$ ὁθείας, ὅτι τὴν δὲ ἐφαρμοσὴν καὶ τὸ β, ἐ-
 πὶ τὸ ε. Διὰ τὸ ἴσην εἶναι τὴν $\alpha\beta$, τῇ δὲ ἐ-
 φαρμοσάσσης δὲ τῆς $\alpha\beta$, διὰ τὴν δὲ ἐφαρ-
 μόσιν καὶ ἡ $\alpha\gamma$ ὁθεῖα, ὅτι τὴν δὲ. ὅτι τὸ ἴσην
 εἶναι, τὴν ὑπὸ βα γ γωνίαν: τῇ ὑπὸ εδ ζ ὡς
 π καὶ τὸ γ σημείον, ὅτι τὸ ζ σημείον ἐφαρμο-
 σί. Διὰ τὸ ἴσην πάλιν εἶναι τὴν $\alpha\gamma$ τῇ δὲ. ἀλ-
 λά μὴν καὶ τὸ β, ὅτι τὸ εἰσηρμόκει. ὥστε βά-
 σις ἢ β γ , ὅτι βάσιν τὴν εἰς ἐφαρμοσί. εἰ γὰρ
 ἔ, μὲν β ὅτι τὸ εἰ ἐφαρμόσαντ Θ , ἔ γ ὅτι
 τὸ ζ : ἢ β γ βάσις ὅτι τὴν εἰς ἐκ ἐφαρμοσί δύο
 ὁθεῖαι χωρίον περιέχουσιν. ὅπερ ἀδυνάτον.
 Ἐφαρμοσί ἄρα ἢ β γ βάσις, ὅτι τὴν εἰς βάσιν.
 ἴση αὐτῇ ἔσται: ὥστε καὶ ὅλον τὸ $\alpha\beta\gamma$ τρίγωνον,
 ἐπὶ ὅλον τὸ δὲ ζ τρίγωνον ἐφαρμοσί: ἔ ἴσην αὐ-
 τῇ ἔσται. Ἐὰν λοιπαὶ γωνίαι, ἐπὶ τὰς λοιπὰς
 γωνίας ἐφαρμοσῶσι. καὶ ἴσαι αὐταῖς ἔσονται. ἢ
 μὲν ὑπὸ $\alpha\beta\gamma$, τῇ ὑπὸ δὲ ζ , ἢ δὲ ὑπὸ $\alpha\gamma\beta$,
 τῇ ὑπὸ δὲ ζ . Συμπέρασμα. Ἐὰν ἄρα δύο τρί-
 γωνα, τὰς δύο πλευρὰς, ταῖς δύοσι πλάρῃς
 ἴσας ἔχη ἐκάπεραν ἐκατέρα: καὶ τὴν γωνίαν
 τῇ γωνίᾳ ἴσην ἔχη, τὴν ὑπὸ τῶν ἴσων ὁθε-
 ῶν περιχομένην: καὶ τὴν βάσιν τῇ βάσιν ἴσην
 ἔξει.


ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ

ἔχει· καὶ τὸ τρίγωνον πρὸς τριγώνῳ ἴσον ἔσται· καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι, ταῖς λοιπαῖς γωνίαις ἴσαι ὦνται· ἐκάτερα ἐκατέρῳ, ὑφ' αἷς αἱ ἴσαι πλευραὶ ὑποτείνουσιν, ὅπερ ἰδεῖν δεῖξαι.

Πρότασις ε. θεώρημα.

Τὸν ἰσοσκελῶν τριγώνων· αἱ πρὸς τῇ βάσει γωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶ, καὶ προσεκβληθῶν τῶν ἴσων ὀρθῶν· αἱ ὑπὸ τῷ βάσει γωνίαι· ἴσαι ἀλλήλαις ἔσονται.

Εκθεσις.) Ἐστω τρίγωνον ἰσοσκελὲς τὸ $\alpha\beta\gamma$, ἴσῳ ἔχον τῷ $\alpha\beta$ πλευρᾷ, τῇ $\alpha\gamma$ πλευρᾷ. Ἐπ' προσεκβεβλήτωσαν ἐπ' ὀθείας ταῖς $\alpha\beta$, $\alpha\gamma$. ὀθείαι αἱ $\beta\delta$, $\gamma\epsilon$. Διορισμός.) Λέγω ὅτι ἡ $\rho\delta$ ὑπὸ $\alpha\beta\gamma$ γωνία, τῇ ὑπὸ $\alpha\gamma\epsilon$ ἴση εἶσιν· ἡ δὲ ὑπὸ $\gamma\beta\delta$, τῇ ὑπὸ $\beta\gamma\epsilon$. Κατασκευὴ.) Εἰλήφθω ρ ἐπὶ $\delta\beta$: τυχὸν σημεῖον τὸ ρ , καὶ ἀφ' ἡγήσθω ὁπὸ τῆς μείζονος τῆς $\alpha\epsilon$: τῇ ἐλάττωσι $\delta\iota$ τῇ $\alpha\zeta$ ἴση ἡ $\alpha\eta$: καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ $\rho\gamma$, $\eta\beta$ ὀθείαι. Απόδειξις.) Ἐπεὶ ὄντι ἴση εἰσὶν ἡ μὲν $\alpha\zeta$, τῇ $\alpha\eta$: ἡ δὲ $\alpha\beta$, τῇ $\alpha\gamma$. δύο δὲ αἱ $\rho\alpha$, $\alpha\gamma$, δι' αἷς ταῖς $\eta\alpha$, $\alpha\beta$, ἴσαι εἰσὶν·



ἐκά-

ἐκάπερα ἑκατέρα. Ἐ γωνίαν περιέχουσιν. τίς
 ὑπὸ ζαη. βάσις ἄρα ἡ ζγ, βάσις τῇ η β ἴση
 ἐστίν· καὶ τὸ αζγ τρίγωνον, τῷ αηβ περιγώνως
 ἴσον ἔσται. καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι, ταῖς λοιπαῖς
 γωνίαις ἴσαι ἔσονται ἑκάπερα ἑκατέρα, ὅφρα
 αἱ ἴσαι πλευραὶ ὑποτείνουσιν. ἡ μὲν ὑπὸ
 αγγ, τῇ ὑπὸ αβη· ἡ δὲ ὑπὸ αζγ, τῇ ὑπὸ
 αηβ. καὶ ἐπεὶ ὅλη ἡ αζ, ὅλη τῇ αη ἐστὶν ἴση, ὡν
 ἡ αβ τῇ αγ ἐστὶν ἴση. λοιπὴ ἄρα ἡ βζ, λοιπὴ
 τῇ γη ἐστὶν ἴση. εἰδείχθη δὲ ἔτι ἡ ζγ, τῇ ηβ ἴση
 δύο δὴ αἱ βζ, ζγ. δυσὶ ταῖς γη, ηβ, ἴσαι εἰσιν,
 ἐκάπερα ἑκατέρα· καὶ γωνία ἡ ὑπὸ βζγ, γω-
 νία τῇ ὑπὸ γηβ ἐστὶν ἴση· καὶ βάσις αὐτῶν κοι-
 νὴ, ἡ βγ. καὶ τὸ βζγ ἄρα τρίγωνον, τῷ ηβγ περι-
 γώνως ἴσον ἔσται· καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι, ταῖς λοι-
 παῖς γωνίαις ἴσαι ἔσονται ἑκάπερα ἑκατέρα,
 ὅφρα αἱ ἴσαι πλευραὶ ὑποτείνουσιν. ἴση ἄρα
 ἐστίν, ἡ μὲν ὑπὸ βγγ, τῇ ὑπὸ ηγβ· ἡ δὲ ὑ-
 πὸ βγγ, τῇ ὑπὸ γβη. ἐπεὶ ἔν ὅλη ἡ ὑπὸ
 αβη γωνία, ὅλη τῇ ὑπὸ αγγ γωνία εἰδείχθη
 ἴση· ὡν ἡ ὑπὸ γβη, τῇ ὑπὸ βγγ ἴση. λοιπὴ
 ἄρα ἡ ὑπὸ αβγ, λοιπὴ τῇ ὑπὸ αγγβ ἐστὶν ἴ-
 ση. καὶ εἰς πρὸς τῇ βάσι, ἡ αβγ περιγώνως. εἰ-
 δείχθη δὲ καὶ ἡ ὑπὸ βγγ, τῇ ὑπὸ ηγβ ἴση· ἔ-
 σιν


ΕΤΚΛΕΙΑΟΤ

είσιν ὑπὸ τὴν βάσιν. Συμπέρασμα.) Τῶν ἰσοσκελῶν τριγώνων, αἱ πρὸς τῇ βάσει γωνίαι· ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶ. καὶ προσεκβληθῶν τῶν ἴσων ὀθειῶν· αἱ ὑπὸ τὴν βάσιν γωνίαι· ἴσαι ἀλλήλαις εἰσονται. ὅπως εἶδει δεῖξαι.

Πρότασις 5. Θεώρημα

Εν τριγώνῳ, αἱ δύο γωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις ὦσι· καὶ αἱ ὑπὸ τὰς ἴσας γωνίας ὑποτείνουσαι πλευραὶ· ἴσαι ἀλλήλαις εἰσονται.

Εκθεσις.) Ἐστω τρίγωνον, τὸ $\alpha\beta\gamma$ · ἴσην ἔχον τὴν ὑπὸ $\alpha\beta\gamma$ γωνίαν, τῇ ὑπὸ $\alpha\gamma\beta$ γωνία. Διορισμός.) Δεῶν ὅτι καὶ πλευρὰ ἢ $\alpha\beta$ · πλευρὰ τῇ $\alpha\gamma$ · εἰς ἴσην. Κατασκευὴ.) Εἰ γὰρ




ἄπιστός ἐστι ἢ $\alpha\beta$, τῇ $\alpha\gamma$ · ἢ ἑτέρα αὐτῶν, μείζων εἶναι. ἔστω μείζων ἢ $\alpha\beta$. καὶ ἀφηρήσθω ἀπὸ τῆς μείζονος τῆς $\alpha\beta$, τῇ ἐλάσσονι τῇ $\alpha\gamma$ · ἴση ἢ $\delta\beta$. καὶ ἐπεξεύχθω ἡ $\delta\gamma$. Απόδειξις.) Ἐπεὶ ἔστι ἴση ἐστὶν ἡ $\delta\beta$, τῇ $\alpha\gamma$ · κοινὴ δὲ ἢ $\beta\gamma$. δύο δὲ αἱ $\delta\beta$, $\beta\gamma$, δύοσι ταῖς $\alpha\gamma$, $\gamma\beta$ · ἴσαι

εἰσὶν, ἐκάτερα ἐκάτερα: Ἐ γωνία ἡ ὑπὸ δ' $\epsilon\gamma$,
γωνία τῇ ὑπὸ $\alpha\gamma\beta$ εἰν ἴση: βάσις ἄρα ἡ
 $\delta\gamma$, βάσις τῇ $\alpha\beta$ ἴση εἰν. καὶ τὸ $\alpha\beta\gamma$ τρίγωνον,
τὸ δ' γ ἑξ ὁρίων ἴσιν ἐστίν. τὴν ἐλάττωσεν
τὸ μείζον, ὅπως ἀτοπον. ὥστε ἄρα ἀνισός ἐστιν ἡ
 $\alpha\beta$, τῇ $\alpha\gamma$ ἴση ἄρα. Συμπέρασμα.) Ἐάν ἄ-
ρα τρίγωνον, αἱ δύο γωνίαι, ἴσιν ἀλλήλαις, ὥστε
καὶ ὑπὸ τὰς ἴσας γωνίας ὑπολείνεσθαι πλευ-
ραί: ἴσιν ἀλλήλαις εἰσινται. ὅπως εἶδει δεῖξαι.

Πρότασις Ζ. Ἰσώρημα.

Ἐπὶ τῆς αὐτῆς ὁθείας: δύοσι ταῖς αὐταῖς
ὁθείαις: ἄλλαι δύο ὁθεῖαι ἴσαι, ἐκάτερα
ἐκάτερα: καὶ συνεσθῆσονται, πρὸς ἄλλω, καὶ ἄλ-
λῳ σημείῳ: ὅτι τὰ αὐτὰ μέρη: τὰ αὐτὰ πέ-
ρατα ἔχουσαι, ταῖς ἐξ ἀρχῆς ὁθείαις.

Εκθεσις.) Εἰ γὰρ δυνα-
τὸν, ὅτι τῆς αὐτῆς ὁθεί-
ας τῆς $\alpha\beta$: δύοσι ταῖς αὐ-
ταῖς ὁθείαις ταῖς $\alpha\gamma$,
 $\gamma\delta$: ἄλλαι δύο ὁθεῖαι, αἱ
 $\alpha\delta$, $\delta\epsilon$, ἴσαι ἐκάτερα ἐκά-
τερα, συνεσθῆσονται, πρὸς ἄλλω, καὶ ἄλλῳ ση-
μείῳ



ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ


μείω, τῷ π γ, καὶ δ: ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη, τὰ γ,
δ: τὰ αὐτὰ πέρατα ἔχουσι, τὰ α, β, ταῖς ἐξ
ἀρχῆς ὁθείαις: ὥτε ἴσην εἶναι, τὴν μὲν γα:
τῇ δ α: τὸ αὐτὸ πέρασ ἔχουσι αὐτῇ, τὸ α:
τὴν δ ε γ β, τῇ δ β: τὸ αὐτὸ πέρασ ἔχουσι
αὐτῇ τὸ β. Κατασκευῇ.) Επεζεύχθω ἡ γ δ.
Απόδειξις.) Επειὶ ἂν ἴση εἰσὶν ἡ α γ, τῇ α δ: ἴ-
ση εἰς καὶ γωνία ἡ ὑπὸ α γ δ, τῇ ὑπὸ α δ γ.
μείζων ἄρα ἡ ὑπὸ α δ γ: τῆς ὑπὸ δ γ β. πολ-
λῷ ἄρα ἡ ὑπὸ γ δ β: μείζων εἰς τῆς ὑπὸ
δ γ β. πάλιν ἐπειὶ ἴση εἰσὶν ἡ γ β, τῇ δ β: ἴση
εἰς, καὶ γωνία ἡ ὑπὸ γ δ α: γωνία τῇ ὑπὸ δ γ β.
εἰδείχθη δὲ αὐτῆς, καὶ πολλῷ μείζων. ὅπερ εἰς
ἀδύνατον. Συμπέρασμα.) ὅτι ἄρα ἐπὶ τῆς
αὐτῆς ὁθείας: δύοσι ταῖς αὐταῖς ὁθείαις, ἅλ-
λαι δύο ὁθεῖαι, ἴσαι ἐκάτερα ἐκατέρα: συστα-
θήσονται, πρὸς ἄλλω, καὶ ἄλλω σημείω: ἐπὶ τὰ
αὐτὰ μέρη: τὰ αὐτὰ πέρατα ἔχουσι, ταῖς
ἐξ ἀρχῆς ὁθείαις. ὅπως εἶδει δέξαι.

Πρότασις η. Γεώρημα.

ΕΑΝ δύο τρίγωνα, τὰς δύο πλευρὰς ταῖς
δυσὶ πλευραῖς ἴσας ἔχη, ἐκάστην ἐκατέ-
ρα: ἔχη δὲ καὶ τὴν βάσιν, τῇ βάσει ἴσην: καὶ
τὴν

τὴν γωνίαν τῇ γωνίᾳ ἴσην ἔξει, τὴν ὑπὸ τῶν
ἴσων ὀρθῶν περιχομένην.

Εκθεσις.) Εἰς δύο τρεῖς
γωνία, τὰ $\alpha\beta\gamma$, δὲ $\epsilon\zeta$: τὰς
δύο πλευράς τὰς $\alpha\beta$,
 $\alpha\gamma$, ταῖς δυσὶ πλευραῖς
ταῖς δὲ, δὲ $\epsilon\zeta$, ἴσας ἔχοντα ἑ-
κάπερ ἐκατέρω: τὴν



μὲν $\alpha\beta$, τῇ δὲ τὴν δὲ $\alpha\gamma$, τῇ δὲ $\epsilon\zeta$ ἔχεται ἡ καὶ
βάσις τὴν $\beta\gamma$, βάσις τῇ $\epsilon\zeta$ ἴσην. Διορισμός.)
Λέγω ὅτι, καὶ γωνία ἡ ὑπὸ $\beta\alpha\gamma$, γωνία τῇ
ὑπὸ $\epsilon\delta\zeta$ ἴσην ἴση. Κατασκευὴ.) Εφαρμοζο-
μένης γὰρ $\epsilon\alpha\beta\gamma$ τριγώνου, ἐπὶ τὸ δὲ $\epsilon\zeta$ τριγώ-
νον: καὶ πηρυμένης $\epsilon\mu\delta$ σημείου, ἐπὶ τὸ ε ση-
μεῖον: τὸ δὲ $\beta\gamma$ ὀθείας, ἐπὶ τὴν $\epsilon\zeta$: ἐφαρμό-
σας, καὶ τὸ γ σημεῖον, ἐπὶ τὸ ζ : Διὰ τὸ ἴσην εἶ-
ναι τὴν $\beta\gamma$, τῇ $\epsilon\zeta$. Απόδειξις.) Εφαρμοσά-
σης δὲ τὸ $\beta\gamma$, ἐπὶ τὴν $\epsilon\zeta$: ἐφαρμόσας, καὶ αἱ
 $\beta\alpha$, $\gamma\alpha$: ἐπὶ τὰς $\epsilon\delta$, δὲ $\epsilon\zeta$: καὶ γὰρ βάσεις μὲν ἡ $\beta\gamma$,
ἐπὶ βάσιν τὴν $\epsilon\zeta$ ἐφαρμόσας: αἱ δὲ $\beta\alpha$, $\alpha\gamma$
πλευραὶ ἐπὶ τὰς $\epsilon\delta$, δὲ $\epsilon\zeta$, ὅς τε ἐφαρμόζουσιν:
ἀλλὰ παραλλάξουσιν, ὡς αἱ $\epsilon\eta$, ἡ ζ : συσταθήσονται
ἐπὶ τὴν αὐτῆς ὀθείας, δύοσι ταῖς αὐταῖς

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ Τ

δοθείας: ἀλλὰ δύο δοθείαι, ἴσαι, ἐκάτερον κα-
 τερά πρὸς ἄλλω καὶ ἄλλω σημείῳ ἐπὶ τὰ αὐ-
 τὰ μέρη τὰ αὐτὰ πέρατα ἐχούσῃ συνίσταν-
 ται δὲ σὺν ἄρᾳ ἐφαρμοζομένης τῆς βῆ βᾶσε-
 ως, ἐπὶ τῇ ἐξ βάσει: σὺν ἐφαρμοσῇσι ἐαί
 βα, αὐ πλευραί: ἐπὶ τὰς ἐδ, δὲ ἐφαρμοσῇ-
 σι ἄρᾳ, ὥστε καὶ γωνία ἡ $\angle$ πα βα γ, ἐπὶ γωνί-
 αν τῇ ἐδ δὲ ἐφαρμοσῇ καὶ ἴση αὐτῇ ἐ-
 στί. Συμπέρασμα.) Ἐάν ἄρᾳ δύο τρίγωνα
 τὰς δύο πλευράς, ταῖς ὀσὶ πλευραῖς, ἴσας
 ἔχῃ ἐκάτερον ἐκάτερον καὶ τὴν βάσιν τῇ βάσει
 ἴσην ἔχῃ: Ἐ τῇ γωνίᾳ τῇ γωνία ἴσην ἔξει,
 τῇ ὑπὸ τῶν ἴσων δὲ ἡ ὀσὶ πρὸς ἄλληλους αὐτῶς
 ἔδει δεῖξαι.

Πρότασις θ. Πρόβλημα.

Τὴν δοθείαν γωνίαν διυγραμμον διχα-
 πτεῖν.

Εκθεσις.) Ἐστω ἡ δοθείσα γωνία διυγραμ-
 μος, ἡ $\angle$ πα βα γ. Διορισμός.) Δεῖ δὴ αὐ-
 τὴν διχαπτεῖν. Κατασκευὴ.) Εἰλήφθω ἐπὶ
 τῆς αβ, τυχόν σημείον τὸ δ. καὶ ἀφῆλθω
 ἀπὸ τῆς α γ, τῇ αδ ἴση ἡ ἀ γ καὶ ἐπέδωχθω
 ἡ δ ε. Ἐ συνεστάτω ἐπὶ τῆς δε τρίγωνον ἴσος
 πλευρον,


πλευρον, τὸ δεξ. καὶ ἐπι-
 ζήχθω ἡ $\alpha\zeta$. Διαρρομός
 τῆς κατὰ σκευῆς.) Λέγω
 ὅτι ἡ $\gamma\alpha\gamma$ βαρὺ γωνία δι-
 χῶ τέτμηται ὑπὸ $\alpha\zeta$ καὶ
 δοθείας. (Απόδειξις.) Ε-
 στω γὰρ ἡ $\alpha\beta$ ἐστὶν ἡ $\alpha\delta$, τῇ
 αὐτῇ καὶ ἡ $\delta\alpha$ $\alpha\zeta$ διὰ δὴ αἰ $\delta\alpha$, καὶ δὴ οὗτοι τὰς
 $\delta\alpha$, $\alpha\zeta$, ἰσὴν πῶν ἐκαστὴν ἐκαστὴν καὶ βάσις
 ἡ $\delta\zeta$ βάσις τῇ $\alpha\zeta$ ἰσὴν ἐστὶ. γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ
 $\delta\alpha\zeta$ γωνία τῇ ὑπὸ $\alpha\alpha\zeta$ ἐστὶν ἰσὴ. Συμπερα-
 σμα.) Ἡ ἄρα δοθεῖσα γωνία $\alpha\beta\gamma$ ἀθύγραμμος
 ἡ ὑπὸ βαρὺ $\gamma\alpha\gamma$ διχῶ τέτμηται ἀπὸ τῆς $\alpha\zeta$ δι-
 δοθείας, ὅπως ἴδεναι πῶς.



Πρότεσις 1. Πράβλημα.

Τὴν δοθεῖσαν $\alpha\beta\gamma$ πεπερασμένην διχῶ
 πμεῖν.

Εκφεύγεις.) Εστω ἡ δοθεῖ-
 σαι $\alpha\beta\gamma$ πεπερασμένη, ἡ
 $\alpha\beta$. Διαρρομός.) Δεῖ δὴ
 τὴν $\alpha\beta$ διχῶ πμεῖν. Κα-
 τὰ σκευῆς.) Σινοεσάτω ἐπ'
 αὐτῆς τρεῖς ἀκρίστοι πλευ-




ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ

ρον τὸ $\alpha\beta\gamma$: καὶ πῆμῶσθε ἡ ὑπὸ $\alpha\beta\gamma$ γωνία
 δίχα, τῇ $\gamma\delta$ ὁθεία. Διορισμὸς τῆς κατα-
 σκευῆς.) λέγω ὅτι ἡ $\alpha\beta$ ὁθεῖα, δίχα τέτμηται,
 κατὰ τὸ δ σημεῖον. Απόδειξις.) Ἐπεὶ ἡ $\gamma\delta$ ἴση
 ἐστὶν ἡ $\alpha\gamma$, τῇ $\gamma\beta$: κοινὴ δὲ $\gamma\delta$: δύο δὲ αἱ $\alpha\gamma$.
 $\gamma\delta$: δύοσι ταῖς $\beta\gamma$. $\gamma\delta$, ἴσαι εἰσὶν ἑκάτερα ἑ-
 κατέρα: καὶ γωνία ἡ ὑπὸ $\alpha\gamma\delta$, γωνία τῇ ὑπὸ
 $\beta\gamma\delta$ ἐστὶν ἴση. Βάσις ἄρα ἡ $\alpha\delta$: βάσις τῇ $\beta\delta$
 ἐστὶν ἴση. Συμπέρασμα.) Ἡ ἄρα δοθεῖσα ὁ-
 θεῖα πεπύρασμένη ἡ $\alpha\beta$: δίχα τέτμηται κα-
 τὰ τὸ δ. ὥστε ἔδει πειῆσαι.

Πρώτης ια. Πρόβλημα.

Τῇ δοθείσῃ ὁθείᾳ, ἀπὸ ξ πρὸς αὐτῇ ὁ-
 θεῖν θ σημεῖα: πρὸς ὀρθὰς γωνίας, ὁθεῖ-
 αν γραμμὴν ἀγαγεῖν.

Εκτίσις.) Ἐσωμὲν δο-
 θεῖσαν ὁθεῖαν, ἡ $\alpha\beta$: τὸ δὲ
 δοθέν σημεῖον ἐπ' αὐτῆς,
 τὸ γ . Διορισμὸς.) Δεῖ δὲ
 ἀπὸ ξ γ σημεῖα, τῇ $\alpha\beta$
 ὁθείᾳ: πρὸς ὀρθὰς γωνί-
 ας ὁθείαν γραμμὴν ἀγαγεῖν. Κατασκευὴ.)



Εἰλή-

Εἰλήφθω ἐπὶ τῆς $\alpha\gamma$: τυχὸν σημείον τὸ δ: ἔ-
 κείσθω τῇ $\gamma\delta$ ἴση, ἢ $\gamma\epsilon$. καὶ σιμωεσάτω ἐπὶ τῇ
 δ: τρεῖς γωνον ἰσόπλευρον τὸ ζδ: καὶ ἐπεξέ-
 χθω ἢ ζγ. Διορισμὸς τῆς καθάσκειυς.) Λέ-
 γω ὅτι τῇ δοθείσῃ διθεία τῇ $\alpha\beta$, ἀπὸ εἰς πρὸς
 αὐτῇ δοθέντ Θ σημεία εἰς γ : πρὸς ὀρθὰς γω-
 νίας διθεία γραμμὴ ἤκται ἢ ζγ. (Απόδειξις.)
 Ἐπεὶ $\gamma\delta$ ἴση ἐστὶν ἢ δγ, τῇ γε: κοινὴ δὲ ἢ ζγ:
 δύο δὲ αἱ δγ, γζ, δυσὶ ταῖς εγ, γζ, ἴσαι εἰ-
 σὶν, ἐκάπτερα ἐκαστέρῃ καὶ βάσις ἢ δζ, βάσις τῇ
 εζ ἴση ἐστὶ. γωνία ἄρα ἢ ὑπὸ δγζ, γωνία τῇ
 ὑπὸ εγζ ἴση ἐστὶ, καὶ εἰσὶν ἐφεξῆς. ὅταν δὲ δι-
 θέα ἐπὶ διθείαν σκεθεῖται: τὰς ἐφεξῆς γωνί-
 ας, ἴσας ἀλλήλαις ποιῇ: ὀρθὴ ἐστὶν ἐκάτερα τῶν
 ἴσων γωνιῶν. ὀρθὴ ἄρα ἐστὶν ἐκάτερα, τῶν ὑπὸ
 δγζ, ζγε. Συμπέρασμα.) Τῇ ἄρα δοθείσῃ
 διθεία τῇ $\alpha\gamma$: ἀπὸ εἰς πρὸς αὐτῇ δοθέντ Θ
 σημεία εἰς γ : πρὸς ὀρθὰς γωνίας διθεία γραμ-
 μὴ ἤκται, ἢ ζγ. ὅπως εἶδει ποιῆσαι.

Πρότασις ιβ. Πρόβλημα.

Ἐπὶ τινὶ δοθείσῃ διθείᾳ ἀπειρον, ἀπὸ εἰς
 δοθέντ Θ σημεία ὁ μὴ ἐστὶν ἐπὶ αὐτῆς: κα-
 θεῖαν διθείαν γραμμὴν ἀγαγεῖν.

ΕΤΚΑΒΙΔΟΥ

Εκθεσις.) Εστω μὲν δοθεῖσα ὀρθία ἄπει-
 ρος, ἡ $\alpha\beta$: τὸ δὲ δοθέν σημεῖον, ὃ μὴ ἐστὶν ἐπ'
 αὐτῆς, τὸ γ . Διορισμός.) Δεῖ δὴ ἐπὶ τῇ δο-
 θεῖσιν ὀρθίαν ἄπειρον τῇ $\alpha\beta$: ἀπὸ γ δο-
 θέντος σημεῖα δ καὶ ϵ , ὃ μὴ ἐστὶν ἐπ' αὐτῆς: κάθε-
 ταν ὀρθίαν γραμμὴν ἀγαγεῖν. Κάτ'ασκευή.)
 Εἰλήφθω γὰρ ἐπὶ τὰς ἐπερα-
 μέρη τῆς $\alpha\beta$ ὀρθίας, τυ-
 χὸν σημεῖον τὸ δ . καὶ κέν-
 τρω μὲν τῷ γ , διαστήμα-
 τι δὲ τῷ $\gamma\delta$: κύκλος γε-
 γραφθὼς ἐξ ἡ. καὶ πηλὴ-
 ὤσῃ ἡ ἐν δίσκῳ κατὰ τὸ θ . καὶ ἐπιζῶχθωσαν
 αἱ $\gamma\eta$, $\gamma\theta$, $\gamma\epsilon$. Διορισμός τῆς κατ'ασκευῆς.)
 Λέγω ὅτι, ἐπὶ τῇ δοθεῖσιν ὀρθίαν ἄπειρον
 τῇ $\alpha\beta$, ἀπὸ γ δοθέντος σημεῖα δ καὶ ϵ , ὃ μὴ
 ἐστὶν ἐπ' αὐτῆς: κάθετος ἡ $\gamma\theta$. Από-
 δαξις.) Επεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν ἡ $\eta\theta$ τῇ $\delta\epsilon$: κοινὴ δὲ
 ἡ $\theta\gamma$. δύο δὲ αἱ $\eta\theta$, $\theta\gamma$: δύοσι ταῖς $\epsilon\theta$, $\theta\gamma$, ἴσαι
 εἰσὶν ἐκάτερά: ἐκατέρα: καὶ βάσις ἡ $\gamma\eta$, βάσις
 τῇ $\gamma\epsilon$, ἐστὶν ἴση. γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ $\gamma\theta\eta$, γω-
 νία τῇ ὑπὸ $\epsilon\theta\gamma$ ἐστὶν ἴση. καὶ εἰσὶν ἐφεξῆς. ὅ-
 ταν δὲ ὀρθία ἐπ' ὀρθίαν σταθεῖσι: τὰς ἐφε-
 ξῆς γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ποιῇ: ὀρθὴ ἐστὶν ἐκά-
 τερα



περὶ τῶν ἰσῶν γωνιῶν. καὶ ἡ ἐφεσηκῆα ὀ-
 θεΐα: καὶ ἡ $\odot$ καλεῖται ἐφ' ἣν ἐφέστηκεν. Συμ-
 πέρασμα.) Ἐπὶ τῷ δὸθεῖσαν ἄρα ὀθεΐαν ἄ-
 πειρον, τῷ αβ: ἀπὸ ξ δοθέντος $\odot$ σημείου $\xi \gamma$,
 ὁμῆσιν ἐπ' αὐτῆς: καθετ $\odot$ ἡ καὶ ἡ $\gamma \theta$. ὁ-
 τῶς εἶδει ποιῆσαι.


Πρότεσις ιγ. Γεώρημα.

Ω Σ ἂν ὀθεΐα ἐπ' ὀθεΐαν σταθεῖσα, γωνί-
 ας ποιῇ: ἥτοι δύο ὀρθὰς, ἢ δυσὶν ὀρθαῖς ἴ-
 σαις, ποιήσῃ.

Εκθεσις.) Ἐὐθεΐα γὰρ
 πρὸς ἡ αβ, ἐπ' ὀθεΐαν τῷ
 $\gamma \delta$ σταθεῖσα: γωνίας ποιή-
 τω, τὰς ὑπὸ $\gamma \beta \alpha$, αβδ.

Διορισμός.) Λέγω ὅτι αἱ
 ὑπὸ $\gamma \beta \alpha$, αβδ, γωνίαι ἢ
 δύο ὀρθαὶ εἰσιν, ἢ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι.

Κατα-
 σκεδὴ.) Εἰ μὲν ἔνισι εἰσιν ἡ ὑπὸ $\gamma \beta \alpha$, τῇ ὑπὸ
 αβδ: δύο ὀρθαὶ εἰσιν. εἰ δὲ ξ . ἡχθῶ ἀπὸ ξ β
 σημείου, τῇ $\gamma \delta$ πρὸς ὀρθὰς, ἡ βε. Α πόδειξις.)
 αἱ ἄρα ὑπὸ $\gamma \beta \epsilon$, εβδ, δύο ὀρθαὶ εἰσι. καὶ ἐπεὶ
 ἡ ὑπὸ $\gamma \beta \epsilon$ δυσὶ ταῖς ὑπὸ $\gamma \beta \alpha$, αβδ ἴση ἐστὶ:
 καὶ ἡ πρὸς κείνῃ ἡ ὑπὸ εβδ. αἱ ἄρα ὑπὸ



ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ


γβι, εβδ: τρεῖς τῆς ὑπὸ γβ̄α, ᾱβι, ε̄βδ, εἰ-
 σὶν ἴσαι. πάλιν ἐπεὶ ἡ ὑπὸ δβ̄α, δυσὶ τῆς ὑ-
 πὸ δβ̄ι, ε̄βα ἴση εἶσι. κοινὴ προσκείμετω, ἡ ὑ-
 πὸ ᾱβγ. αἱ ἄρα γωνίαι, αἱ ὑπὸ δβ̄α, ᾱβγ τρι-
 σὶ τῆς ὑπὸ δβ̄ι, ε̄βα, ᾱβγ ἴσαι εἰσιν. ἰδείχθη-
 σαν δὲ, καὶ αἱ ὑπὸ γβ̄ι, ε̄βδ: τρεῖς τῆς αὐτῆς
 ἴσαι. τὰ δὲ τὰ αὐτῶν ἴσαι: καὶ ἀλλήλοις εἰσιν ἴσαι.
 καὶ αἱ ὑπὸ γβ̄ι, ε̄βδ ἄρα, τῆς ὑπὸ δβ̄α,
 ᾱβγ, ἴσαι εἰσιν. ἀλλὰ αἱ ὑπὸ γβ̄ι, ε̄βδ, δύο
 ὀρθαὶ εἰσὶ. καὶ αἱ ὑπὸ δβ̄α, ᾱβγ ἄρα, δυσὶν ὀρ-
 θαῖς ἴσαι εἰσιν. Συμπέρασμα.) Ὡς ἂν ἄρα
 εὐθεῖα ἐπ' εὐθεῖαν σταθεῖσι γωνίας ποιῇ: ἥτις
 δύο ὀρθὰς, ἢ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ποιῶσι. ὅπως ἔ-
 δεῖ δεῖξαι.

Πρότασις ιδ'. θεώρημα.

Εἰνὰ πρὸς τινὶ εὐθεῖα, καὶ τὰ πρὸς αὐτῇ ση-
 μείω: δύο εὐθεῖαι μὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη
 κείμεναι: τὰς ἐφεξῆς γωνίας, δυσὶν ὀρθαῖς ἴ-
 σους ποιῶσιν: ἐπ' εὐθείας εἰσὶν αἱ, ἀλλήλαις αἱ
 εὐθεῖαι.

Εκθεσις.) Πρὸς γὰρ τινὶ εὐθεῖα τῇ ᾱβ, εἰ τὰ
 πρὸς αὐτῇ σημεῖω τὰ β: δύο εὐθεῖαι αἱ γγ.
 βδ: μὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη κείμεναι: τὰς ἐφε-
 ξῆς

ἕως γωνίας τὰς ὑπὸ $\alpha\beta\gamma$, $\alpha\beta\delta$, δύσιν ὀρθαῖς
 ἴσας ποιήτωσαν. Διορισ-
 μος.) Λέγω ὅτι ἐπ' αὐθεί-
 ας ἐστὶ τῇ $\gamma\beta$ ἢ $\beta\delta$. Κατα-
 σκευή.) Εἰ γὰρ μὴ ἐστὶ τῇ $\beta\gamma$
 ἐπ' αὐθείας ἢ $\beta\delta$: ἔσω τῇ
 $\gamma\beta$ ἐπ' αὐθείας ἢ $\beta\epsilon$. Ἀπὸ
 δεξιῶν.) Ἐπεὶ ἔν αὐθείᾳ ἢ $\alpha\beta$, ἐπ' αὐθείᾳ τῇ
 $\gamma\beta$ ἐφέστηκεν: αἱ ἄρα ὑπὸ $\alpha\beta\gamma$, $\alpha\beta\epsilon$ γωνίαι
 δύσιν ὀρθαῖς ἴσας εἰσιν. εἰσὶ δὲ καὶ ὑπὸ $\alpha\beta\gamma$,
 $\alpha\beta\delta$, δύσιν ὀρθαῖς ἴσας. αἱ ἄρα ὑπὸ $\gamma\beta\alpha$,
 $\alpha\beta\epsilon$: ταῖς ὑπὸ $\gamma\beta\alpha$, $\alpha\beta\delta$ ἴσας εἰσὶ. κοινὴ ἀ-
 φηρέστω, ἢ ὑπὸ $\alpha\beta\gamma$. λοιπὴ ἄρα ἢ ὑπὸ
 $\alpha\beta\epsilon$: λοιπὴ τῇ ὑπὸ $\alpha\beta\delta$ ἐστὶν ἴση, ἢ ἐλάσσων
 τῇ μείζωνι. ὅπως ἐστὶν ἀδύνατον. ὅτι ἄρα ἐπ'
 αὐθείας ἐστὶν ἢ $\beta\epsilon$, τῇ $\beta\gamma$. ὁμοίως δὲ δείξομεν,
 ὅτι καὶ ἄλλῃ τις, πλὴν τῆς $\beta\delta$. Συμπεράσ-
 μα.) Ἐπ' αὐθείας ἄρα ἐστὶν ἢ $\gamma\beta$, τῇ $\beta\delta$. Ἐὰν
 ἄρα πρὸς τινὶ αὐθείᾳ: καὶ τὰ πρὸς αὐτῇ ση-
 μείω: δύο αὐταὶ μὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη κεί-
 αμεναι: τὰς ἐφεξῆς γωνίας δύσιν ὀρθαῖς ἴσας
 ποιῶσιν: ἐπ' αὐθείας ἴσονται ἀλλήλαις αἱ αὐ-
 θεῖαι. ὅπως ἴδει δείξαι.



ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ

Πρώταις ιε. Γεώγημα.

ΕΑν δύο εὐθεῖαι, τέμνωσιν ἀλλήλας: τὰς
κατὰ κορυφῶν γωνίας, ἴσας ἀλλήλαις
ποιήσῃσι.

Εκθεσίς.) Δύο γὰρ εὐθεῖαι αἱ $\alpha\beta$, $\gamma\delta$: τέμ-
νέωσιν ἀλλήλας, κατὰ τὸ εἰς σημεῖον. Διο-
ρισμός.) Λέγω ὅτι ἴση ἐ-
στίν, ἡ ὑπὸ $\alpha\epsilon\gamma$, γω-
νία, τῇ ὑπὸ $\delta\epsilon\beta$: ἡ δὲ ὑπὸ
 $\gamma\epsilon\beta$, τῇ ὑπὸ $\alpha\epsilon\delta$. Αὐτό-
δειξις.) Ἐπεὶ γὰρ εὐθεῖα ἡ
 $\alpha\epsilon$: ἐπ' εὐθείαν, τὴν $\gamma\delta$ ἡ
ἐφ' ἔστηκε, γωνίας ποιῶσαι τὰς ὑπὸ $\gamma\epsilon\alpha$, $\alpha\epsilon\delta$:
αἱ ἄρα ὑπὸ $\gamma\epsilon\alpha$, $\alpha\epsilon\delta$ γωνίαι: δυσὶν ὀρθαῖς ἴ-
σαι εἰσὶ. πάλιν ἐπεὶ εὐθεῖα ἡ $\delta\epsilon$, ἐπ' εὐθείαν
τὴν $\alpha\beta$ ἐφ' ἔστηκε: γωνίας ποιῶσαι τὰς ὑπὸ $\alpha\epsilon\delta$,
 $\delta\epsilon\beta$. αἱ ἄρα ὑπὸ $\alpha\epsilon\delta$, $\delta\epsilon\beta$ γωνίαι: δυσὶν ὀρ-
θαῖς ἴσαι εἰσὶν. εἰδείχθησαν δὲ καὶ αἱ ὑπὸ $\gamma\epsilon\alpha$,
 $\alpha\epsilon\delta$: δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι αἱ ἄρα ὑπὸ $\gamma\epsilon\alpha$, $\alpha\epsilon\delta$:
ταῖς ὑπὸ $\alpha\epsilon\delta$, $\delta\epsilon\beta$, ἴσαι εἰσὶ. κοινὴ ἀφ' ἡρῆ-
σθω ἡ ὑπὸ $\alpha\epsilon\delta$, λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ $\gamma\epsilon\alpha$: λοιπὴ
τῇ ὑπὸ $\beta\epsilon$ δ' ἴση ἐστίν. ὁμοίως δὲ δεῖχθήσεται:
ὅτι καὶ αἱ ὑπὸ $\gamma\epsilon\beta$, $\delta\epsilon\alpha$, ἴσαι εἰσὶν. Σὺμπέ-
ρασμα.) Ἐὰν ἄρα δύο εὐθεῖαι, τέμνωσιν ἀλλή-
λας


λήλας: τὰς κατὰ κορυφὴν γωνίας, ἴσας ἀλλήλαις ποιεῖσιν. ὅπως ἔδει δείξαι.

Πόρισμα. Εκ δὲ τούτου φανερόν, ὅτι καὶ ὅσαυτ' ἔνθεν θῆναι τέμνωσιν ἀλλήλας: τὰς πρὸς τῇ κορυφῇ γωνίας, τετράσιν ὀρθαῖς ἴσας ποιήσασι.

Πρότεσις 15. Γεώρημα.

Παντὸς τριγώνου, μιᾶς τῶν πλευρῶν πρὸς τὴν ἐκβληθείσας: ἡ ἐκτὸς γωνία, ἑκατέρας τῶν ἐντὸς καὶ ἀπ' ἐναντίον μείζων ἐστίν.

Εκθεσις.) Εἰς τὸ τρίγωνον, τὸ $\alpha\beta\gamma$: καὶ προσεκβέβληται αὐτῷ μία πλευρὰ ἢ $\beta\gamma$, ἐπὶ τὸ δ . Διορισμός.) Λέγω ὅτι ἡ ἐκτὸς γωνία ἢ ὑπὸ $\alpha\gamma\delta$: μείζων ἐστίν



ἑκατέρας τῶν ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον: τῶν ὑπὸ $\gamma\beta\alpha$, $\beta\alpha\gamma$ γωνιῶν. Κατασκευὴ.) Τετμήσθω ἡ $\alpha\gamma$ δίχα κατὰ τὸ ϵ : καὶ ἐπιζευχθεῖσαι ἢ $\beta\epsilon$: ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ ζ : καὶ κείσθω τῇ $\beta\epsilon$, ἴση ἢ $\epsilon\zeta$: καὶ ἐπεζεύχθω ἢ $\zeta\gamma$: καὶ διήχθω ἢ $\alpha\gamma$, ἐπὶ τὸ η . Απόδειξις.) Επεὶ ἔνι ἴση ἐστίν ἢ μὲν $\alpha\epsilon$, τῇ $\epsilon\gamma$. ἢ δὲ $\beta\epsilon$, τῇ $\epsilon\zeta$: δύο δὲ αἱ $\alpha\epsilon$ $\epsilon\beta$: ὁμοίᾳ

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ

δυοῖ ταῖς γ ϵ , εἴσαι εἰσὶν ἐκάτερα ἐκείρα·
 καὶ γωνία ἡ ὑπὸ α ϵ β, γωνία τῇ ὑπὸ ζεγ ἴση
 εἰσιν. κατὰ κορυφὴν γὰρ. βάσις ἄρα ἡ αβ,
 βάσις τῇ ζγ ἴση εἰσι· καὶ τὸ αβε τρίγωνον, τὸ
 ζεδ τρίγωνόν εἰσιν ἴσον· καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι,
 ταῖς λοιπαῖς γωνίαις ἴσαι εἰσιν ἐκάτερα ἐκα-
 τέρα ὑφ' ας αἱ ἴσαι πλάραι ὑποτείνουσιν.
 ἴση ἄρα εἰσιν ἡ ὑπὸ βαε, τῇ ὑπὸ εγζ· μείζων
 δ' εἰσιν ἡ ὑπὸ εγδ, τῆς ὑπὸ εγζ. μείζων ἄρα
 ἡ ὑπὸ αγδ, τῆς ὑπὸ βαε. ὁμοίως δὲ τῆς βγ
 πημιμήκης δίχα· δειχθήσεται χ' ἡ ὑπὸ βγη.
 τετέστιν ἡ ὑπὸ αγδ, μείζων χ' τῆς ὑπὸ αβγ.
 Συμπέρασμα.) Παντὸς ἄρα τριγώνου, μιᾶς
 τῶν πλάρῶν προσεκβληθείσης· ἡ ἐκτὸς γωνία,
 ἐκείρας τῶν ἐντὸς χ' ἀπεναντίον μείζων
 εἰσιν. ὅπως ἔδει δεῖξαι.

Πρώτοις ιζ. θεώρημα.


Παντὸς τριγώνου, αἱ δύο γωνίαι· δύο ὀρθῶν
 ἐλάσσονες εἰσι, πάντῃ μεταλαμβανόμε-
 ναι.

Εκθεσις.) Εἰς τριγώνον, τὸ αβγ. Διορισ-
 μος.) Λέγω ὅτι εἰ αβγ, τριγώνου, αἱ δύο γωνίαι·
 δύο ὀρθῶν ἐλάσσονες εἰσι, πάντῃ μετα-
 λαμ-

ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ Α.

15

λαμβάνομαι. Κατα-
σκάη.) Εκβεβλήσθω γάρ
ἡ βγ, ἐπὶ τὸ δ. Απόδει-
ξις.) Καὶ ἐπεὶ τριγώνου $\triangle$
 $\alpha\beta\gamma$ ἑστὶς ἐστὶ γωνία ἡ ὑ-
πὸ $\alpha\gamma\delta$: μείζων ἐστὶ τῇ ὀν. δι γ



πὸς καὶ ἀπ' ἐναντίον, τῆς ὑπὸ $\alpha\beta\gamma$. κοινῇ
περοσκεισθῶ, ἡ ὑπὸ $\alpha\beta\gamma$. αἱ ἄρα ὑπὸ $\alpha\gamma\delta$,
 $\alpha\gamma\beta$, τῶν ὑπὸ $\alpha\beta\gamma$, $\beta\gamma\alpha$ μείζονες εἰσιν. ἀλλ'
αἱ ὑπὸ $\alpha\gamma\delta$, $\alpha\gamma\beta$, δύο ὀρθαῖς ἴσαι εἰσιν. αἱ
ἄρα ὑπὸ $\alpha\beta\gamma$, $\beta\gamma\alpha$, δύο ὀρθῶν ἐλάσσονες εἰ-
σι. ὁμοίως δὲ δεῖξομεν: ὅτι γ αἱ ὑπὸ $\beta\alpha\gamma$,
 $\alpha\gamma\beta$: δύο ὀρθῶν ἐλάσσονες εἰσι: καὶ ἐπ αἱ ὑπὸ
 $\alpha\gamma\delta$, $\alpha\beta\gamma$. Συμπέρασμα.) Πάντος ἄρα τρι-
γώνου, αἱ δύο γωνίαι: δύο ὀρθῶν ἐλάσσονες εἰσι
πάντη μεταλαμβάνομαι. ὅπως εἶδει δεῖξαι.

Πρότασις ιη. ῥηώρημα.

Πάντος τριγώνου, ἡ μείζων πλευρὰ πλὴν μεί-
ζονα γωνίαν ὑποτίθει.

Εκθεσις.) Εἰς τριγώνον, τὸ $\alpha\beta\gamma$, μείζονας
ἔχον πλὴν $\alpha\gamma$ πλευρὰν, τῆς $\alpha\beta$. Διορισμός.)
Λέγω ὅτι ἡ γωνία ἡ ὑπὸ $\alpha\beta\gamma$ μείζων ἐστὶ τῆς
ὑπὸ

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ

ὑποβγα. Κατασκευή.) α

Επειδὴ μείζων ἐστὶν ἡ αὐ.

τῆς αβ: κείσθω τῇ αβ ἴ-

ση ἡ αδ: καὶ ἐπεζεύχθω, ἡ

βδ. Ἀποδείξις.) Καὶ ἐπὶ

τρίγωνον βδγ: ὅτις ἐ-

στὶ γωνία ἡ ὑπὸ αδβ: μείζων ἄρα ἐστὶ τῆς κα-

τῆς, καὶ ἀπ' ἐναντίον, τῆς ὑπὸ δγβ. ἴση δὲ ἡ ὑ-

πὸ αδβ: τῇ ὑπὸ αβδ. ἐπεὶ καὶ πλάτυσται ἡ αβ,


τῇ αδ ἐστὶν ἴση. μείζων ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ βδγ, ὅ-

τι ὑπὸ αβγ, πολλῶν ἄρα ἡ ὑπὸ αβγ μετῶν ἐστὶ,

τῆς ὑπὸ αβγ. Συμπέρασμα.) Πάντος ἄρα

τρίγωνον, ἡ μείζων πλευρὰ: πῶν μείζονα γωνί-

αν ὑποτείνει, ὅπως ἔδειξαι.



Πρότασις ιθ. Γεώρημα.

Πάντος τρίγωνον, ὑποπῶν μείζονα γωνίαν:


ἡ μείζων πλάτυσται, ὑποτείνει.

Εκθεσις.) Εστω τρίγωνον τὸ αβγ, μείζονα ἔχον

πῶν ὑπὸ αβγ γωνίαν τῆς

ὑποβγα. Διορισμός.) Λέ-

γω ὅτι ὁ πλάτυσται ἡ αὐ:



πλάτυσται

πλευρὰς τῆς $\overline{αβ}$ μείζων ἐστίν. Απόδειξις.) Εἰ
 γὼ μὴ, ἡ τοῖσιν ἐστὶν ἡ $\overline{αγ}$, τῇ $\overline{αβ}$, ἡ ἐλάσσων.
 ἴση μὲν ἔν σκ ἐστὶν ἡ $\overline{αγ}$, τῇ $\overline{αβ}$. ἴση γὼ ἂν ἦ
 ἡ γωνία ἡ ὑπὸ $\overline{αβγ}$ τῇ ὑπὸ $\overline{αγβ}$. σκ ἐστὶ δέ,
 σκ ἀρα ἴση ἐστὶν ἡ $\overline{αγ}$, τῇ $\overline{αβ}$. ὁ δὲ μὲν ἐλάσ-
 σων ἐστὶν ἡ $\overline{αγ}$, τῆς $\overline{αβ}$, ἐλάσσων γὼ ἂν ἦ ἡ γωνία
 ἡ ὑπὸ $\overline{αβγ}$ τῆς ὑπὸ $\overline{αγβ}$. σκ ἐστὶ δέ, σκ
 ἀρα ἐλάσσων ἐστὶν ἡ $\overline{αγ}$, τῆς $\overline{αβ}$. ἐδέχθη δὲ
 ὅτι ὁ δὲ ἴση ἐστὶ μείζων ἀρα ἐστὶ ἡ $\overline{αγ}$, τῆς $\overline{αβ}$.
 Συμπέρασμα.) Πάντος ἀρα τριγώνου ὑπὸ τῇ
 μείζονα γωνίᾳ ἡ μείζων πλευρὰ κατατείνεται
 ὅπως εἰδει δεῖξαι.

Πρότασις κ. Θεώρημα.

Πάντος τριγώνου, αἱ δύο πλευραὶ τῆς λοι-
 πῆς μείζονες εἰσι, πάντα μεταλαμβάνου-
 νται.

Εκθεσις.) Εἶπω γὼ τρι-
 γωνον τὸ $\overline{αβγ}$. Διασχί-
 μος.) Ἀεχώρετι ὅτι $\overline{αβγ}$ τρι-
 γωνον αἱ δύο πλευραὶ τῆς
 λοιπῆς μείζονες εἰσι παν-
 τι μεταλαμβανόμεναι, αἱ
 μὲν $\overline{βα}$, $\overline{αγ}$, τῆς $\overline{βγ}$ · αἱ δὲ $\overline{αβ}$, $\overline{βγ}$ τῆς $\overline{αγ}$.



ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ


αἱ δὲ βγ, γα: τῆς αβ. Κατασκευῇ.) Διήχθω
 γὰρ ἡ β̄α ἐπὶ τὸ δ σημεῖον: καὶ κείσθω τῇ γα
 ἴση ἡ δ̄α: καὶ ἐπιζεύχθω ἡ δγ. Αποδείξαις.) Ε-
 πὶ ἂν ἴση εἰν ἡ δ̄α, τῇ αγ. ἴση εἰν καὶ γω-
 νία ἡ ὑπὸ αδγ: τῇ ὑπὸ αγδ. ἀλλ' ἡ ὑπὸ βγδ
 γωνία: τῆς ὑπὸ αγδ μείζων εἰς. μείζων ἄρα
 ἡ ὑπὸ βγδ: τῆς ὑπὸ αδγ. καὶ ἐπὶ τρίγωνον εἰ-
 σὶ τὸ δβγ, μείζονα ἔχον τὴν ὑπὸ βγδ γω-
 νίαν, τῆς ὑπὸ αδγ: ὑπὸ δὲ τὴν μείζονα γωνίαν
 ἡ μείζων πλευρὰ ὑποτείνει. ἡ δὲ ἄρα, τῆς
 βγ εἰν μείζων. ἴση δὲ ἡ δβ, παῖς αβ, αγ. μεί-
 ζονες ἄρα αἱ β̄α, αγ, τῆς βγ ὁμοίως δὴ δεί-
 ξομεν ὅτι καὶ αἱ μὲν αβ, βγ: τῆς γα μείζονες
 εἰσιν. αἱ δὲ βγ, γα: τῆς αβ. Συμπέρασμα.)
 Παντὸς ἄρα τριγώνου, αἱ δύο πλευραὶ: τῆς
 λοιπῆς μείζονες εἰσὶ, πάντα μεταλαμβάνον-
 ται. ὅπως εἶδει δεῖξαι.

Πρότασις καὶ θεώρημα.

Εἰν τριγώνου, ἐπὶ μιᾷ τῶν πλευρῶν: ἀπὸ
 τῶν περάτων δύο εὐθεῖαι ἐντὸς συσθεθῶ-
 σιν: αἱ συσθεθεῖσαι, τῶν λοιπῶν ἑ τριγώνου
 δύο πλευρῶν, ἐλάττωες μὲν ἔσονται: μείζονα
 δὲ γωνίαν περιέξουσιν.

Εκθεσις.

Εκθεσις.) Τριγώνον γὰρ τῷ $\alpha\beta\gamma$, ὅτι μιᾶς
 τῶν πλευρῶν τῆς $\beta\gamma$: ἀπὸ τῶν περάτων τῶν
 β, γ δύο εὐθεῖαι ἐκτός σῶμας ἀθώσασιν αἱ $\beta\delta$.
 $\delta\gamma$. (Διορισμός.) Λέγω ὅτι αἱ $\beta\delta$, $\delta\gamma$: τῶν
 λοιπῶν τῷ τριγώνου δύο πλευρῶν, τῶν $\beta\alpha$
 $\alpha\gamma$: ἐλάσσονες μὴ εἰσὶ:
 μείζονα δὲ γωνίαν περιέ-
 χουσι: πῶς ὑπὸ $\beta\delta\gamma$, τῆς
 ὑπὸ $\beta\alpha\gamma$. (Καίσασκευή.)
 Διήχθω γὰρ ἡ $\beta\delta$, ὅτι τὸ ϵ .
 (Ἀποδείξις.) Καὶ ὅτι



πάντος τριγώνου: αἱ δύο πλευραὶ, τῆς λοιπῆς
 μείζονες εἰσι. τῷ $\alpha\beta\epsilon$ ἄρα τριγώνου, αἱ δύο
 πλευραὶ αἱ $\alpha\beta$, $\alpha\epsilon$: τῆς $\beta\epsilon$ μείζονες εἰσι. και-
 νὴ προσκείσθω ἡ $\epsilon\gamma$. αἱ ἄρα $\beta\alpha$, $\alpha\gamma$: τῶν $\beta\epsilon$,
 $\epsilon\gamma$, μείζονες εἰσι. πάλιν ἐπεὶ τῷ $\gamma\epsilon\delta$ τριγώ-
 νου: αἱ δύο πλευραὶ αἱ $\gamma\epsilon$, $\epsilon\delta$, τῆς $\gamma\delta$ μείζο-
 νες εἰσι. καινὴ προσκείσθω ἡ $\delta\beta$: αἱ $\gamma\epsilon$, $\epsilon\delta$ ἄ-
 ρα, τῶν $\gamma\delta$, $\gamma\beta$ μείζονες εἰσιν. ἀλλὰ τῶν $\beta\epsilon$,
 $\epsilon\gamma$. μείζονες ἐδείχθησαν αἱ $\beta\alpha$, $\alpha\gamma$: πολλῶν ἄ-
 ρα αἱ $\beta\alpha$, $\alpha\gamma$, μείζονες εἰσι. πάλιν ἐπεὶ
 πάντος τριγώνου: ἡ ἐκτός γωνία, τῆς ἐκτός καὶ
 ἀπεναντίον μείζον ἐστὶ. τῷ γὰρ ἄρα τριγώ-
 νου: ἡ ἐκτός γωνία ἡ ὑπὸ $\beta\delta\gamma$, μείζον ἐστὶ τῆς


ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ

ὑπὸ γ' εδ. Διὰ τὰ αὐτὰ ἄρα καὶ τὸ ᾱ βε τρι-
γώνου: ἡ ἐκ τὸς γωνία, ἡ ὑπὸ γ' εβ: μείζων ἐ-
στὶ, τῆς ὑπὸ β' α γ. ἀλλὰ τῆς ὑπὸ γ' εβ, μεί-
ζων ἐδείχθη ἡ ὑπὸ β' δ γ. πολλῶ ἄρα ἡ ὑπὸ
β' δ γ: μείζων ἐστὶ τῆς ὑπὸ β' α γ. (Συμπέρα-
σμα.) Εὰν ἄρα τρίγωνον, ὅπῃ μίας τ' πλευ-
ρῶν ἀπὸ τῶν περάτων: δύο ὀθεῖται ἐν τὸς συ-
σταθῶσιν: αἱ συσταθεῖσαι, τ' λοιπῶν τοῦ τριγώ-
νου δύο πλευρῶν, ἐλάττωες μὲν εἰσι: μείζονα
δὲ γωνίαν περιέχουσιν. ὅπως εἶδει δεῖξαι.

Πρότασις κβ. Πρόβλημα.

Εκ τριῶν ὀθειῶν: αἱ εἰσὶν ἴσαι τρισὶ ταῖς
δοθείσας ὀθείαις: τρίγωνον συστήσασθαι.
Δεῖ δὴ τὰς δύο, τῆς λοιπῆς μείζονας εἶναι:
πάντη μεταλαμβανομένης. Διὰ τὸ ὅτι πα-
ρὸς τριγώνου: τὰς δύο πλευρὰς, τῆς λοιπῆς
μείζονας εἶναι, πάντα μεταλαμβανομένης.

Εκθεσις.) Εἰω-
σαν αἱ δοθεῖσαι
τρεῖς ὀθεῖαι αἱ ᾱ,
β, γ, ὧν αἱ δύο, τ'
λοιπῆς μείζονες ἔ-
ωσαν, πάντα με-



ταλαμ.

παλαμθανούμαι, αἱ μὲν $\bar{a}$, $\bar{b}$, τῆς $\bar{\gamma}$, αἱ δὲ $\bar{a}$,
 $\bar{\gamma}$, $\bar{\epsilon}$ β, καὶ ἐπὶ αἱ β, $\bar{\gamma}$, τῆς $\bar{a}$. (Διορισμός.)
 Δεῖ δὴ ἐκ τῶν ἴσων ταῖς $\bar{a}$, $\bar{b}$, $\bar{\gamma}$, τρίγωνον συ-
 στήσασθαι. (Κατασκευὴ.) Εκκεῖθω τίς ευ-
 θεῖα ἡ δὲ, πεπερασμένη μὲν κατὰ τὸ δ, ἀπὸ
 ς δὲ κατὰ τὸ ε, καὶ κείθω τῇ μὲν $\bar{a}$ ἴση, ἡ
 δὲ, τῇ δὲ β, ἴση ἡ ζῆ, τῇ δὲ εὔ, ἴση ἡ ἠθ. καὶ
 κέντρῳ μὲν τῷ ζ, διαστήματι δὲ τῷ ζδ, κύκλος
 γεγράφθω, ὁ δὲ κλ. καὶ πάλιν κέντρῳ μὲν τῷ
 ἠ, διαστήματι δὲ τῷ ἠθ, κύκλῳ γεγράφθω
 ὁ κλθ. καὶ ἐπεζῶχθωσαν αἱ κη. (Διορισ-
 μὸς τῆς κατασκευῆς.) Λέγω ὅτι ἐκ τριῶν
 ὀθειῶν τῶν ἴσων ταῖς $\bar{a}$, $\bar{b}$, $\bar{\gamma}$, τρίγωνον συνέ-
 τηκε τὸ κζη. (Ἀπόδειξις.) Ἐπεὶ γὰρ τὸ ζ ση-
 μεῖον, κέντρον ἐστὶ δὲ κλ κύκλου, ἴση ἐστὶν ἡ ζδ,
 τῇ ζκ, ἀλλὰ ἡ ζδ τῇ $\bar{a}$ ἐστὶν ἴση. καὶ ἡ κζ ἄρα
 τῇ $\bar{a}$ ἐστὶν ἴση. πάλιν ὅτι τὸ ἠ σημείον, κέ-
 ντρον ἐστὶν τῷ κλθ κύκλου, ἴση ἐστὶν ἡ ἠθ, τῇ ἠκ,
 ἀλλὰ ἡ ἠθ, τῇ $\bar{\gamma}$ ἐστὶν ἴση. καὶ ἡ κη ἄρα, τῇ
 $\bar{\gamma}$ ἐστὶν ἴση. ἐστὶ δὲ καὶ ἡ ζῆ τῇ β ἴση. αἱ τρεῖς
 ἄρα ὀθειῖαι, αἱ κζ, ζῆ, ηκ: τρισηλίαις $\bar{a}$, $\bar{b}$, $\bar{\gamma}$
 ἴσαι εἰσιν. (Συμπερασμα.) Ἐκ τριῶν ἄρα
 ὀθειῶν τῶν κζ, ζῆ, ηκ: αἱ εἰσὶν ἴσαι τρισὶ
 ταῖς δοθείαις ὀθείαις ταῖς $\bar{a}$, β, $\bar{\gamma}$: τρίγωνο-


ΕΙΚΛΕΙΑΟΥ

νον σωίζεται, τὸ κζῆ. ὅπως ἔδει ποιῆσαι.

Πρότασις κγ. πρόβλημα.

Πρὸς τῇ δοθείσῃ ὀθείᾳ: καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ σημείῳ: τῇ δοθείσῃ γωνίᾳ ὀθύγραμμῳ: ἴσην γωνίαν ὀθύγραμμον συστήσασθαι.

Εκθεσις.) Εἰσὼ μὲν δοθεῖσα ὀθεία ἡ $\alpha\beta$: τὸ δὲ πρὸς αὐτῇ σημεῖον τὸ α : ἡ δὲ δοθεῖσα γωνία ὀθύγραμμῳ, ἡ ὑπὸ $\delta\gamma\epsilon$.




(Διορισμός.) Δεῖ δὴ πρὸς τῇ δοθείσῃ ὀθείᾳ τῇ $\alpha\beta$: καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ σημείῳ τῷ α : τῇ δοθείσῃ γωνίᾳ ἐνθύγραμμῳ, τῇ ὑπὸ $\delta\gamma\epsilon$: ἴσην γωνίαν ἐνθύγραμμον συστήσασθαι. Κατασκευὴ.) Εἰλήφθω ἐφ' ἐκάστηρας τῶν $\gamma\delta$, $\gamma\epsilon$: τυχόντα σημεία τὰ δ , ϵ : καὶ ἐπεζεύχθω ἡ $\delta\epsilon$: καὶ ἐκ τριῶν ἐνθεῖων αἱ εἰσιν ἴσαι: τρισὶ ταῖς $\gamma\delta$, $\delta\epsilon$, $\gamma\epsilon$: τρίγωνον συνεστήτω τὸ $\alpha\zeta\eta$: ὥστε ἴσην εἶναι πλὴν μὲν $\gamma\delta$, τῇ $\alpha\zeta$: πλὴν δὲ $\gamma\epsilon$, τῇ $\alpha\eta$: καὶ ἐπὶ πλὴν $\delta\epsilon$, τῇ $\zeta\eta$. (Απόδειξις.) Εὔξει ἔν αἱ δύο αἱ $\delta\gamma$, $\gamma\epsilon$: δύοσι ταῖς $\zeta\alpha$, $\alpha\eta$, ἴσαι εἰσὶν ἐκάτερα ἐκάτερα: καὶ βάσις ἡ $\delta\epsilon$, βάσις τῇ $\zeta\eta$ ἴση. γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ $\delta\gamma\epsilon$, γωνία

γωνία τῇ ὑπὸ ζαῆ ἐστὶν ἴση. (Συμπέρασμα.)
 Πρὸς ἄρα τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ τῇ $\alpha\beta$ καὶ τῷ
 πρὸς αὐτῇ σημείῳ τῷ α τῇ δοθείσῃ γωνίᾳ
 ἐνθυγράμμω: τῇ ὑπὸ δγῆ, ἴση γωνία ἐνθυ-
 γραμμῶσι (συνίστα), ἢ ὑπὸ ζαῆ. ὅπως ἔδει ποι-
 ῆσαι.

Πρότασις κδ: θεώρημα.

ΕΑν δύο τρίγωνα, τὰς δύο πλευρὰς, ταῖς
 δυσὶ πλευραῖς ἴσας ἔχη, ἐκάτερον ἐκτέ-
 ρα: τὴν δὲ γωνίαν τῆς γωνίας μείζονα ἔχη,
 τὴν ὑπὸ τῶν ἴσων εὐθειῶν περιεχομένην: καὶ
 τὴν βάσιν, τῆς βάσεως μείζονα ἔξει.

Εκθεσις.) Εἶω δύο τρίγωνα, τὰ $\alpha\beta\gamma$, δὲ ζ:
 τὰς δύο πλευρὰς τὰς $\alpha\beta$, $\alpha\gamma$: ταῖς δυσὶ
 πλευραῖς, ταῖς δὲ, δζ, ἴσας ἔχοντα ἐκτέ-
 ρα: τὴν μὲν $\alpha\beta$, τῇ
 δὲ: τὴν $\alpha\gamma$, τῇ δζ: γω-
 νία δὲ ἢ ὑπὸ βαγ, γω-
 νίας τῆς ὑπὸ εδζ μείζων
 ἔσω. (Διορισμός.) Λέγω
 ὅτι καὶ βάση ἢ βγ: βά-



σεως τῆς εζ, μείζων ἐστίν. (Κατασκευὴ.) Ε-
 πεί γδ μείζων ἐστὶν ἢ ὑπὸ βαγ γωνία: τῆς
 ὑπὸ εδζ γωνίας: συνεστήτω πρὸς τῇ δὲ δ-

ΕΤΚΛΕΙΔΟΥ


θεία· καὶ πᾶς πρὸς αὐτῇ σημεῖω πᾶς δ'· τῇ ὑπὸ
 βαγγωνία· ἴση ἢ ὑπὸ ἔδῃ, καὶ κείῳ ὁ πῶ-
 ρα τῶν ἀγ, δζ, ἴση ἢ δῇ· καὶ ἐπεξέχθωσαν,
 αἱ ἡε, ζῇ. (Απόδοξις.) Ἐπεὶ ἔν ἴση ἐστὶν ἡ μὲν
 ἀβ, τῇ δὲ ἡ γ, τῇ δῇ· δύο δὲ αἱ βᾶ, ἀγ·
 δυοὶ πᾶς ἔδ, δῇ ἴσαι εἰσὶν ἐκάτερα ἐκείρα,
 ἡ γωνία ἡ ὑπὸ βαγ, γωνία τῇ ὑπὸ ἔδῃ, ἴση
 ἐστὶ. βάσις ἄρα ἡ βγ, βάσις τῇ ἐῃ, ἐστὶν ἴση. πάλιν,
 ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ δῇ, τῇ δζ· ἴση ἐστὶ καὶ γωνία
 ἡ ὑπὸ δζῇ· γωνία τῇ ὑπὸ δῇ ζ. μείζων
 ἄρα ἡ ὑπὸ δζῇ· τῆς ὑπὸ ἐῃ ζ. πολλῶν ἄρα μείζων
 ἐστὶν ἡ ὑπὸ ἐζῇ· τὸ ὑπὸ ἐῃ ζ, καὶ ἐπεὶ τρεῖς
 γωνόν ἐστι, τὸ ἐζῇ· μείζονα ἔχον τὴν ὑπὸ ἐζῇ
 γωνίαν τῆς ὑπὸ ἐῃ ζ· ὑπὸ δὲ τὴν μείζονα γωνίαν,
 ἡ μείζων πλευρὰ ὑποτείνει. μείζων ἄρα
 καὶ πλευρὰ ἡ ἐῃ· τῆς ἐζ. ἴση δὲ ἡ ἐῃ, τῇ
 βγ. μείζων ἄρα καὶ ἡ βγ, τῆς ἐζ. (Συμπέρασμα.)
 Ἐὰν ἄρα δύο τρίγωνα, τὰς δύο πλευρὰς,
 πᾶς δυοὶ πλευραῖς ἴσας ἔχη ἐκαστέραν ἐκείρα·
 τὴν δὲ γωνίαν τῆς γωνίας μείζονα ἔχη· τὴν
 ὑπὸ τῶν ἴσων ὀρθῶν περιεχομένην· καὶ τὴν
 βάσιν τῆς βάσεως μείζονα ἔξει. ὅπως ἔδει δεῖξαι.

Πρότασις κε. Ἰσώρημα.

Εαυ

Εὰν δύο τρίγωνα, τὰς δύο πλευράς, ταῖς
 διὺς πλευραῖς ἴσας ἔχῃ, ἐκτέραν ἐκτέ-
 ρα· τὴν βάσιν δὲ τῆς βάσεως, μείζονα ἔχη· καὶ
 τὴν γωνίαν, τῆς γωνίας μείζονα ἔξει· τὴν ὑ-
 πὸ τῶν ἴσων ὀρθῶν περιχορδῶν.

Εκθεσις, Εἰς δύο τρί-
 γωνα τὰ $\alpha\beta\gamma$, δι᾽ τὰς
 δύο πλευράς· τὰς $\alpha\beta$,
 $\alpha\gamma$, τῆς διὺς πλευραῖς
 ταῖς δὲ, δι᾽ ἴσας ἔχοντα· ἐ-
 κτέραν ἐκτέρα· τὴν μὲν



$\alpha\beta$, τῇ δὲ· τὴν δὲ $\alpha\gamma$, τῇ δὲ· βάσις δὲ ἢ $\beta\gamma$ ·
 βάσεως τῆς $\epsilon\zeta$, μείζων ἔστω. (Διορισμός.) Λέ-
 γω ὅτι καὶ γωνία, ἡ ὑπὸ $\beta\alpha\gamma$ · γωνίας τῆς
 ὑπὸ $\epsilon\alpha\zeta$, μείζων ἐστίν. (Απόδειξις.) Εἰ γὰρ
 μὴ, ἡτοι ἴση ἐστὶν αὐτῇ· ἢ ἐλάττω. ἴση μὲν ἔν
 σὺν ἐστὶν ἡ ὑπὸ $\beta\alpha\gamma$ γωνία· τῇ ὑπὸ $\epsilon\alpha\zeta$ · ἴση
 γὰρ ἢ, καὶ ἡ βάσις ἢ $\beta\gamma$ · βάσις τῇ $\epsilon\zeta$ · σὺν ἐστὶ γ·
 σὺν ἄρα ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ $\beta\alpha\gamma$ γωνία· τῇ ὑπὸ
 $\epsilon\alpha\zeta$. ἀλλ' οὐ δι᾽ ἐλάσσων. ἐλάσσων γὰρ
 ἢ, καὶ βάσις ἢ $\beta\gamma$ · βάσεως τῆς $\epsilon\zeta$ · σὺν ἐστὶ γ·
 σὺν ἄρα ἐλάσσων ἐστὶν ἡ ὑπὸ $\beta\alpha\gamma$ γωνία·
 τῇ ὑπὸ $\epsilon\alpha\zeta$. εἰδείχθη δὲ ὅτι ἔστι ἴση· μείζων
 ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ $\beta\alpha\gamma$ γωνία· τῆς ὑπὸ $\epsilon\alpha\zeta$.


ΕΥΚΛΕΙΔΟΥΤ

(Συμπέρασμα.) Εὰν ἄρα δύο τρίγωνα, τὰς δύο πλευρὰς ταῖς δυοὶ πλευραῖς ἴσας ἔχη ἐκείραν ἐκείρα: τὴν δὲ βάσιν, τῆς βάσεως μείζονα ἔχει: καὶ τὴν γωνίαν, τῆς γωνίας μείζονα ἔξει: τὴν ὑπὸ τῶν ἴσων ὀρθῶν περὶ τοῦ μὲν. ὅπως ἔδειξε δῆξαι.

Πρότασις κς. Θεώρημα.

Εἰαν δύο τρίγωνα, τὰς δύο γωνίας, ταῖς δυοὶ γωνίαις ἴσας ἔχη ἐκείραν ἐκείρα: καὶ μίαν πλευρὰν, μιᾷ πλευρᾷ ἴσην: ἤτοι τὴν πρὸς ταῖς ἴσαις γωνίαις: ἢ τὴν ὑπολείπονταν ὑπὸ μιᾷ τῶν ἴσων γωνιῶν: καὶ τὰς λοιπὰς πλευρὰς, ταῖς λοιπαῖς πλευραῖς ἴσας ἔξει, ἐκείραν ἐκείρα: καὶ τὴν λοιπὴν γωνίαν, τῇ λοιπῇ γωνίᾳ.

Εκθεσις πρώτη. Εξώσαν δύο τρίγωνα, τὰ $\alpha\beta\gamma$ δεξ, τὰς δύο γωνίας: τὰς ὑπὸ $\alpha\beta\gamma$, $\beta\gamma\alpha$, δυοὶ ταῖς ὑπὸ δεξ, $\epsilon\zeta\delta$, ἴσας ἔχοντα, ἐκείραν ἐκείρα: τὴν μὲν ὑπὸ $\alpha\beta\gamma$, τῇ ὑπὸ δεξ: τὴν δὲ ὑπὸ $\beta\gamma\alpha$, τῇ ὑπὸ $\epsilon\zeta\delta$: ἐχέτω δὲ καὶ μίαν



πλευ-

πλευρὰν, μιᾷ πλευρᾷ ἴσην· πρότερον τὴν πρὸς
 ταῖς ἰσῆς γωνίαις, τὴν βγ, τῇ εζ. (Διόρ-
 μος πρῶτ' Θ.) Λέγω ὅτι καὶ τὰς λοιπὰς
 πλευρὰς, ταῖς λοιπαῖς πλευραῖς ἰσῆς· ἔξει
 ἐκείραν ἐκείρα· τὴν μὲν αβ, τῇ δε· τὴν δὲ
 αγ, τῇ δζ· καὶ τὴν λοιπὴν γωνίαν, τῇ λοι-
 πῇ γωνίᾳ, τὴν ὑπὸ βαγ, τῇ ὑπὸ εδζ. (Κα-
 τασκευὴ πρῶτη.) Εἰ γὰρ ἀνισός ἐστιν ἡ αβ, τῇ
 δε· μία αὐτῶν μείζων ἐσται. ἔσω μείζων, ἡ
 αβ, καὶ κείδω τῇ δε, ἴση ἡ βδ· ἐπεξείχθω ἡ
 ηγ. (Αποδείξις πρῶτη.) Επεὶ ἂν ἴση ἐσὶν ἡ
 μὲν βη, τῇ δε· ἡ δὲ βγ, τῇ εζ· δύο δὴ αἱ βη,
 βγ· δυοὶ ταῖς δε, εζ, ἴσαι εἰσὶν ἐκάτερα ἐκα-
 τέρα· καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ηβγ· γωνία τῇ ὑπὸ
 δεζ ἴση ἐστὶ· βάσις ἄρα ἡ ηγ, βάσις τῇ γζ ἴση
 ἐστὶ· καὶ τὸ ηγδ τρίγωνον, τὸ δεζ τρίγωνον, ἴ-
 σον ἐσται· καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι, ταῖς λοιπαῖς
 γωνίαις ἴσαι ἔσονται· ἐκάτερα ἐκείρα, ὅφρα
 αἱ ἴσαι πλευραὶ ὑπολείνουσιν· ἴση ἄρα ἡ ὑπὸ
 ηγδ γωνία, τῇ ὑπὸ δεζ· ἀλλὰ ἡ ὑπὸ δεζ, τῇ
 ὑπὸ βγα ὑπόκειται ἴση· καὶ ἡ ὑπὸ βγη ἄρα,
 τῇ ὑπὸ βγα ἴση ἐστὶν, ἡ ἐλαττων τῇ μείζονι.
 ὅπως ἀδυνάτον. (Συμπέρασμα πρῶτον.) ὅρα
 ἄρα ἀνισός ἐστιν ἡ αβ, τῇ δε· ἴση ἄρα· ἐστὶ δὲ καὶ

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ

$\eta \beta \gamma$, τῇ $\epsilon \zeta$ ἴση. δύο δὲ αἱ $\alpha \beta$, $\beta \gamma$: δύοσι τῆς
 $\delta \epsilon$, $\epsilon \zeta$ ἴσαι εἰσὶν ἐκάτερα ἐκείρα: καὶ γωνία
 η ὑπὸ $\alpha \beta \gamma$: γωνία τῇ ὑπὸ $\delta \epsilon \zeta$ ἐστὶν ἴση. βά-
 σις ἄρα ἡ $\alpha \gamma$: βάσις τῇ $\delta \zeta$, ἴση ἐστὶ: καὶ λοιπὴ
 γωνία ἡ ὑπὸ $\beta \alpha \gamma$: λοιπὴ γωνία, τῇ ὑπὸ $\epsilon \delta \zeta$
 ἴση ἐστὶν. (Εκθεσις δ' αὐτῆρα.) Ἀλλὰ δὲ πάλιν
 ἔστωσαν, αἱ ὑπὸ τὰς ἴσας γωνίας πλευραὶ ὑ-
 πολείνουσαι ἴσαι: ὡς ἡ $\alpha \beta$, τῇ $\delta \epsilon$. (Διορισμὸς
 δ' αὐτῆρ $\odot$.) Λέγω πάλιν, ὅτι καὶ αἱ λοιπαὶ
 πλευραὶ, ταῖς λοιπαῖς πλευραῖς ἴσαι ἔσονται:
 ἡ μὲν $\alpha \gamma$, τῇ $\delta \zeta$: ἡ δὲ $\beta \gamma$, τῇ $\epsilon \zeta$: καὶ ἐπὶ ἡ
 λοιπὴ γωνία, ἡ ὑπὸ $\beta \alpha \gamma$: λοιπὴ τῇ ὑπὸ $\epsilon \delta \zeta$
 ἴση ἐστὶν. (Κατασκευὴ δ' αὐτῆρα.) Εἰ γὰρ αὐ-
 σὸς ἐστὶν ἡ $\beta \gamma$, τῇ $\epsilon \zeta$: μία αὐτῶν μείζων ἐστὶν.
 ἔστω εἰ δυνατὸν μείζων, ἡ $\beta \gamma$: καὶ κείσθω τῇ
 $\epsilon \zeta$, ἴση ἡ $\gamma \theta$: καὶ ἐπέσθω ἡ $\alpha \theta$. (Απόδοξις
 αὐτῆρα. Καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ μὲν $\beta \theta$ τῇ $\epsilon \zeta$: ἡ
 $\delta \epsilon$ $\alpha \beta$ τῇ $\delta \epsilon$: δύο δὲ αἱ $\alpha \beta$, $\beta \theta$: δύοσι τῆς $\delta \epsilon$,
 $\epsilon \zeta$ ἴσαι εἰσὶν ἐκάτερα ἐκείρα: καὶ γωνίας ἱ-
 σαις περιέχουσι. βάσις ἄρα ἡ $\alpha \theta$, βάσις τῇ $\delta \zeta$,
 ἴση ἐστὶ: καὶ τὸ $\alpha \beta \theta$ τρίγωνον, τῷ $\delta \epsilon \zeta$ τριγώνῳ
 ἴσον ἐστὶ: καὶ αἱ λοιπαὶ, γωνίαι, τῆς λοιπῆς
 γωνίας, ἴσαι ἔσονται ἐκάτερα ἐκείρα: ὅφ' ἂν
 αἱ ἴσαι πλευραὶ ὑπολείνουσιν. ἴση ἄρα ἐστὶν
 ἡ ὑπὸ

ἢ ὑπὸ βθᾶ γωνία: τῇ ὑπὸ ἐζδ. ἀλλὰ ἢ ὑπὸ
 ἐζδ, τῇ ὑπὸ βγα γωνία ἐστὶ ἴση: καὶ ἢ ὑπὸ
 βθᾶ ἄρα, τῇ ὑπὸ βγα ἐστὶν ἴση. τριγώνου δὲ
 εἰς αβγ, ἡ ἐκτὸς γωνία ἢ ὑπὸ βθᾶ: ἴση ἐστὶ τῇ
 ἐντὸς καὶ ἀπ' ἐναντίον, τῇ ὑπὸ βγα. ὅπως αὐτὸ
 κατὸν ἐστίν. (Συμπεράσμα δέ τιτον. ὅτι ἄ-
 ρα ἀνισός ἐστιν ἡ βγ, τῇ ἐζ. ἴση ἄρα. ἐστὶ δὲ καὶ
 ἡ αβ, τῇ δε ἴση: δύο δὲ αἱ αβ, βγ, δύοσι πᾶς
 δε, ἐζ, ἴσμεῖσιν ἐκάτερα ἐκείρα: καὶ γωνίας
 ἴσας περὶέχουσι. βάσις ἄρα ἡ αγ, βάσις τῇ δε
 ἴση ἐστὶ, καὶ τὸ αβγ τρίγωνον, τῷ δεζ τριγώ-
 νῳ ἴσον ἐστὶ: καὶ ἡ λοιπὴ γωνία, ἢ ὑπὸ βαγ:
 τῇ λοιπῇ γωνία, τῇ ὑπὸ ἐδζ, ἴση ἐστίν. (Συμ-
 πέρασμα καθόλου.) Εἰ δὲ ἄρα δύο τρίγωνα,
 τὰς δύο γωνίας πᾶς δυσὶ γωνίαις ἴσας ἔχη
 ἐκάτερα ἐκείρα: καὶ μίαν πλευρὰν μιᾷ
 πλευρᾷ ἴση ἔχη: ἥτοι πᾶν πρὸς ταῖς ἴσαις
 γωνίαις: ἢ πᾶν ὑπολείνουσιν ὑπὸ μίαν τῶν ἴ-
 σων γωνιῶν: καὶ τὰς λοιπὰς πλευρὰς, πᾶς
 λοιπᾶς πλευραῖς ἴσας ἔξει: καὶ πᾶν
 λοιπὸν γωνίαν: τῇ λοιπῇ γω-
 νία, ὅπως εἶδει δεῖξαι.

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ του τῆς σιχαίου.

Πρότασις κζ. Γεώρημα.

ΕΑν εἰς δύο ὁθεῖας, ὁθεῖα ἐμπίηται, τὰς ἐναλλάξ γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ποιῇ: πα-
ράλληλοι ἔσονται ἀλλήλαις αἱ ὁθεῖαι.

Εκθεσις.) Εἰς γὰρ δύο ὁ-
θεῖας τὰς $\alpha\beta$, $\gamma\delta$: ὁθεῖα $\alpha\epsilon$
ἐμπίηται ἢ $\epsilon\zeta$: τὰς ἐν-
αλλάξ γωνίας τὰς ὑπὸ
 $\alpha\epsilon\zeta$, $\epsilon\zeta\gamma$: ἴσας ἀλλήλαις
ποιῶ. (Διορισμός.) Λέ-
γω ὅτι παράλληλός ἐστιν ἡ $\alpha\beta$ ὁθεῖα, τῇ $\gamma\delta$
εὐθείᾳ. (Υπόθεσις.) Εἰ γὰρ μὴ, ἐκβαλλόμεναι
αἱ $\alpha\beta$, $\gamma\delta$, συμπεσῶνται: ἢτοι ὅτι τὰ β , δ , μέ-
ρη, ἢ ὅτι τὰ α , γ . (Κατασκευὴ.) Εκβεβλή-
σωσαν, καὶ συμπιπλέτωσαν ὅτι τὰ β , δ , μέ-
ρη: κατὰ τὸ η . (Απόδειξις.) Τριγώνων δὴ $\epsilon\zeta\eta$
 $\eta\epsilon\zeta$: ἡ ἐκτὸς γωνία ἢ ὑπὸ $\alpha\epsilon\zeta$, μείζων ἐστὶ τῆς
ἐκτὸς καὶ ἀπεναντίον γωνίας, τῆς ὑπὸ $\epsilon\zeta\eta$.
ἀλλὰ καὶ ἴση. ὅπως ἐστὶν ἀδυνάτον. ὅτι ἄρα αἱ
 $\alpha\beta$, $\gamma\delta$ ἐκβαλλόμεναι: συμπεσῶνται, ὅτι τὰ
 β , δ ,

β, δ, μέρη. Ομοίως δὴ δειχθήσεται, ὅτι ἔδ' ἐ-
 πι τὰ α γ, αὐτὰ δὲ ἐπὶ μηδέτερά τὰ μέρη συμ-
 πύπτουσι: παράλληλοί εἰσι. παράλληλοι
 ἄρα εἰσιν ἡ αβ, τῇ γδ. (Συμπέρασμα.)
 Εὰν ἄρα εἰς δύο εὐθείας, εὐθεῖα ἐμπέπτουσι
 τὰς ἐναλλὰξ γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ποιῇ: πα-
 ράλληλοι ἔσονται αὐτὲς εὐθεῖαι. ὅπως ἔδει δείξαι.

Πρότασις κή. θεώρημα.

ΕΑΝ εἰς δύο εὐθείας: εὐθεῖα ἐμπέπτουσα,
 τὴν ἐκτὸς γωνίαν, τῇ ἐντὸς ἐ ἀπεναντίον,
 καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη ἴσως ποιῇ: ἢ τὰς ἐ-
 πὶς, καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη, δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας
 ποιῇ: παράλληλοι ἔσονται ἀλλήλαις αὐτὲς εὐ-
 θεῖαι.

Εκθεσις.) Εἰς γδ δύο εὐ-
 θείας τὰς αβ, γδ: εὐθεῖα
 ἐμπέπτουσα ἡ εζ: τὴν ἐκτὸς
 γωνίαν, τὴν ἐπὶ εηβ, τῇ
 ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον γω-
 νία: τῇ ἐπὶ ηθδ, ἴσους ποι-
 εῖτω: ἢ τὰς ἐντὸς, καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη: τὰς
 ὑπὸ βηθ, ηθδ, δυσὶν ὀρθαῖς ἴσους. (Διορισ-
 μός.) Λέγω ὅτι παράλληλός ἐστιν ἡ αβ, τῇ γδ.

(Απ -

ΕΤΚΛΕΙΔΟΥ

(Αποδείξεις.) Επει γὰρ ἴση εἰσὶν ἡ ὑπὸ $\bar{\epsilon}\eta\theta$,
 τῇ ὑπὸ $\eta\theta\delta$: ἀλλὰ ἡ ὑπὸ $\bar{\epsilon}\eta\beta$, τῇ ὑπὸ $\bar{\alpha}\eta\theta$
 εἰσὶν ἴση. καὶ ἡ ὑπὸ $\bar{\alpha}\eta\theta$ ἄρα, τῇ ὑπὸ $\eta\theta\delta$
 εἰσὶν ἴση. καὶ εἰσὶν ἐναλλὰξ. παράλληλῳ ἄ-
 ρα εἰσὶν ἡ $\bar{\alpha}\beta$, τῇ $\gamma\delta$. Πάλιν ἐπεὶ αἱ ὑπὸ $\beta\eta\theta$,
 $\eta\theta\delta$: δύσιν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶν: εἰσὶ δὲ καὶ αἱ ὑπὸ
 $\bar{\alpha}\eta\theta$, $\beta\eta\theta$: δύσιν ὀρθαῖς ἴσαι. αἱ ἄρα ὑπὸ $\bar{\alpha}\eta\theta$,
 $\beta\eta\theta$: πῶς ὑπὸ $\beta\eta\theta$, $\eta\theta\delta$, ἴσαι εἰσὶ. κοινὴ ἀφη-
 ρήσῃ ἡ ὑπὸ $\beta\eta\theta$. λοιπὴ ἄρα, ἡ ὑπὸ $\bar{\alpha}\eta\theta$:
 λοιπῇ τῇ ὑπὸ $\eta\theta\delta$ εἰσὶν ἴση. καὶ εἰσὶν ἐναλ-
 λαξ. παράλληλῳ ἄρα εἰσὶν ἡ $\bar{\alpha}\beta$, τῇ $\gamma\delta$.
 (Συμπεέρασμα.) Εὰν ἄρα εἰς δύο ὀρθείας,
 ὀρθεία ἐμπέπησαι: πῶς ἐκτὸς γωνίαν τῇ ἐν-
 τὸς ἔσται ἀπεναντίον, καὶ ὅτι τὰ αὐτὰ μέρη ἴσην
 ποιῇ: ἢ τὰς ἐντὸς καὶ ὅτι τὰ αὐτὰ μέρη δύ-
 σιν ὀρθαῖς ἴσαι: παράλληλοι ἔσονται αἱ ὀρθεῖαι.
 ὅπως εἶδει δεῖξαι.

Πρότεσις κθ. θεώρημα.

Η εἰς τὰς παραλλήλους ὀρθείας, ὀρθεῖα ἐμ-
 πέπησαι: τὰς τε ἐναλλὰξ γωνίας, ἴσας
 ἀλλήλας ποιῇ: καὶ πῶς ἐκτὸς, τῇ ἐντὸς καὶ ἀ-
 πεναντίον, καὶ ὅτι τὰ αὐτὰ μέρη, ἴσων: καὶ
 τὰς ἐντὸς, ἔσται τὰ αὐτὰ μέρη, δύσιν ὀρθαῖς

Εκθε-

Εκθεσις.) Εἰς γδ' πα-
 ραλλήλους εὐθείας τὰς α
 αβ, γδ: εὐθεῖα ἐμπίπτει-
 τῷ, ἡ εζ. (Διορισμός.) Λέ-
 γω ὅτι τὰς πε ἐναλλάξ
 γωνίας, τὰς ὑπὸ αηθ, ε
 ηθδῖους ποιεῖ: καὶ τῷ ἐκτὸς γωνίαν τῷ ὑ-
 πὸ ἐηβ, τῇ ἐντὸς κ' ἀπεναντίον καὶ ὅπῃ τὰ
 αὐτὰ μέρη τῇ ὑπὸ ηθδῖσιν: καὶ τὰς ἐντὸς,
 καὶ ὅπῃ τὰ αὐτὰ μέρη τὰς ὑπὸ βηθ, ηθδ,
 διυσὶν ὀρθαῖς ἴσας. (Απόδειξις μετὰ τῆς ὑ-
 ποθέσεως.) Εἰ γὰρ ἀνισός ἐστιν ἡ ὑπὸ αηθ,
 τῇ ὑπὸ ηθδ: μία αὐτῶν μείζων ἐστὶν ἑσώμει-
 ζων ἢ ὑπὸ αηθ: καὶ ἑσώμειζων ἐστὶν ἡ ὑ-
 πὸ αηθ, τῆς ὑπὸ ηθδ: κοινὴ προσκείσθω ἡ
 ὑπὸ βηθ. αἱ ἄρα ὑπὸ αηθ, βηθ: τῇ ὑπὸ βηθ,
 ηθδ, μείζονες εἰσιν. ἀλλὰ καὶ αἱ ὑπὸ αηθ,
 βηθ: διυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσιν. καὶ αἱ ἄρα ὑ-
 πὸ βηθ, ηθδ: δύο ὀρθῶν ἐλάσσονες εἰσιν. αἱ δὲ
 ἀπ' ἐλασσόνων ἢ δύο ὀρθῶν, ἐκβαλλόμεναι
 εἰς ἀπείρον: συμπίπτουσιν. αἱ ἄρα αβ, γδ, ἐκ-
 βαλλόμεναι, εἰς ἀπείρον, συμπεσῶν. ἔσ' συμ-
 πίπτουσι γ', διὰ τὸ παραλλήλους αὐτὰς ὑπο-
 κείσθαι. ὅτι ἄρα ἀνισός ἐστιν ἡ ὑπὸ αηθ: τῇ
 ὑπὸ

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ

ὑπὸ $\eta\theta\delta$. ἴση ἄρα, ἀλλὰ ἡ ὑπὸ $\alpha\eta\theta$: τῇ ὑπὸ $\epsilon\eta\beta$ ἐστὶν ἴση. καὶ ἡ ὑπὸ $\epsilon\eta\beta$ ἄρα, τῇ ὑπὸ $\eta\theta\delta$ ἐστὶν ἴση. κοινὴ προσκείσθω, ἡ ὑπὸ $\beta\eta\theta$. αἱ ἄρα ὑπὸ $\epsilon\eta\beta$, $\beta\eta\theta$: ταῖς ὑπὸ $\beta\eta\theta$, $\eta\theta\delta$ ἴσαι εἰσὶν. ἀλλὰ αἱ ὑπὸ $\epsilon\eta\beta$, $\beta\eta\theta$, δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶ. καὶ αἱ ὑπὸ $\beta\eta\theta$, $\eta\theta\delta$ ἄρα, δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶν. (Συμπέρασμα.) Ἡ ἄρα εἰς τὰς παραλλήλους $\delta\theta\epsilon\acute{\iota}\alpha\varsigma$, $\delta\theta\epsilon\acute{\iota}\alpha$ ἐμπίπτουσα, τὰς τε ἐναλλὰξ γωνίας: ἴσας ἀλλήλαις ποιεῖ: καὶ πλὴν ἐκτός, τῇ ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον, καὶ ὅππῃ τὰ αὐτὰ μέρη ἴσην: καὶ τὰς ἐντὸς, καὶ ὅππῃ τὰ αὐτὰ μέρη: δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας. ὁμοῦ εἶδει δεῖξαι.

Πρότασις λ. θεώρημα.

ΑΙ τῇ αὐτῇ $\delta\theta\epsilon\acute{\iota}\alpha$ παράλληλοι: καὶ ἀλλήλαις εἰσὶ παράλληλοι.

Εκθεσις.) Εἰςω ἐκάτερα τῶν $\alpha\beta$, $\gamma\delta$: τῇ $\epsilon\zeta$, παράλληλῳ. Διορισμός.) Λέγω ὅτι καὶ ἡ $\alpha\beta$: τῇ $\gamma\delta$ ἐστὶ παράλληλος. (Κατασκευὴ.) Εμπιπτέτω $\gamma\delta$ εἰς αὐτὰς $\delta\theta\epsilon\acute{\iota}\alpha$ ἡ $\eta\kappa$. (Ἀπέδειξίς.)

Κυ

Καὶ ἐπεὶ εἰς παραλλήλους ὁθείας τὰς $\alpha\beta$,
 $\epsilon\zeta$: ὁθεῖα ἐμπέπιωκεν, ἡ $\eta\kappa$. ἴση ἄρα ἡ ὑπὸ
 $\omega\theta$: τῇ ὑπὸ $\eta\theta\zeta$. πάλιν ἐπεὶ εἰς τὰς πα-
 ρ αλλήλους ὁθείας τὰς $\epsilon\zeta$, $\gamma\delta$: ὁθεῖα ἐμπέ-
 π ιωκεν ἡ $\eta\kappa$. ἴση εἰς ἡ ὑπὸ $\eta\theta\zeta$, τῇ ὑπὸ
 $\eta\kappa\delta$. εἰδείχθη δὲ καὶ ἡ ὑπὸ $\alpha\eta\kappa$: τῇ ὑπὸ $\eta\theta\zeta$
 ι ση. καὶ ἡ ὑπὸ $\alpha\eta\kappa$ ἄρα, τῇ ὑπὸ $\eta\kappa\delta$ εἰς ἴση:
 κ αὶ εἰσὶν ἑναλλαξ. παράλληλῃ Θ ἄρα εἰς ἡ
 $\alpha\beta$, τῇ $\gamma\delta$. (Συμπίερασμα.) Αἱ ἄρα τῇ αὐ-
 τ ῇ ὁθεῖα παράλληλοι: καὶ ἀλλήλαις εἰσὶ πα-
 ρ άλληλοι, ὅπως ἴδει δειξάι.


Πρότεσις λα. Πρόβλημα.

Απὸ τῶν δοθέντων σημείων: τῇ δοθείσῃ ὁ-
 θ εῖα: παράλληλον ὁθεῖαν χαρμινῶ ἀ-
 γ γαγεῖν.

Εκδοσις.) Ἐστω τὸ μὲν
 δ οθεῖν σημεῖον, τὸ α , ἡ δὲ
 δ οθεῖσα ὁθεῖα, ἡ $\beta\gamma$.

(Διορισμός.) Δεῖ δὴ ἀπὸ
 τ ῶν α σημείων: τῇ $\gamma\delta$ ὁ-
 θ εῖα: παράλληλον ἐνθεῖ-

α ν χαρμινῶ ἀγαγεῖν. (Κατασκευὴ.) Εἰλή-
 ϕ θω ὅτι τῆς $\beta\gamma$ τυχὸν σημεῖον τὸ δ : καὶ ἐ-




ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ

πείξω χθω ή αδ: και ουweisάτω προς τη δα
 εθεία: ή τω προς αυτη σημείω τω α: τη υ-
 πο αδ γ γωνία: ίση ή υπό δα ε: ε εκβεβλεί-
 ω επ' εθείας τη αε, εθεία ή αζ. (Από-
 δειξις.) Καί επεί εις δύο ευθείας τας βγ, εζ:
 ευθεία εμπροσθα ή αδ: τας συναλλαξ γωνί-
 ας τας υπό εαδ, αδγ. ίσας αλληλαις πε-
 πήκε: παράλληλ @ άρα εις η ή εζ, τη βγ.
 (Συμπέρασμα.) Διά τω δοθέν @ άρα ση-
 μείου τω α: τη δοθείση ευθεία τη βγ: πα-
 ράλληλ @ ευθεία γραμμή ή κλα ή εαζ. οωφ
 εδει πειήση.

Πρότασις λβ. γεώρημα.

Πάντος τριγώνου, μιās τών πλευρών προ-
 σεκβληθείσης: ή εκτόθ γωνία, δυσί ταίς
 εντός και άπεναντίον ίση εις: ή αι εντός ε τρι-
 γώνου τρεις γωνία: δυσιν ορθαίς ίση εισιν.

Εκθεσις.) Εστω τριγω-
 νον, τω αβγ: και προσεκ-
 βεβλήτω αυτω μία πλευ-
 ρα ή βγ, επι τω δ. (Διο-
 ρισμός.) Λέγω ότι ή εκτός
 γωνία, ή υπό α γ δ: ίση ε
 εις δ: δυσί τής εντός και άπεναντίον, ταίς



υπό

ὑπὸ γαβ, αβγ: καὶ αἱ ἐντὸς τῆς τριγώνου
 τρεῖς γωνίαι, αἱ ὑπὸ αβγ, βγα, γαβ: δυ-
 σὶν ὀρθαῖς ἴσται εἰσιν. (Κατασκευή.) Ηχθῶ
 γὰρ διὰ τῶν σημείων, τῇ αβ ὁθεία: παράλλη-
 λῶς ἢ γε. (Ἀπόδειξις.) Καὶ ἐπεὶ παράλλη-
 λός ἐστιν ἡ αβ, τῇ γε: καὶ εἰς αὐτὰς ἐμπέπιω-
 κεν ἡ αγ. αἱ ἄρα συναλλὰξ γωνίαι αἱ ὑπὸ βαγ,
 αγε: ἴσται ἀλλήλαις εἰσι. πάλιν, ἐπεὶ παράλ-
 ληλός ἐστιν ἡ αβ, τῇ γε: καὶ εἰς αὐτὰς ἐμπέ-
 πιωκεν ὁθεία ἡ βδ: ἡ ἐκτὸς γωνία ἡ ὑπὸ
 εγδ: ἴση ἐστὶ τῇ ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον, τῇ ὑπὸ
 αβγ. εἰδείχθη δὲ καὶ ἡ ὑπὸ αεγ: τῇ ὑπὸ
 βαγ ἴση. ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ αγδ ἐκτὸς γωνία,
 ἴση ἐστὶ δυσὶ ταῖς ἐντὸς, καὶ ἀπεναντίον, ταῖς
 ὑπὸ βαγ, αβγ. κοινὴ προσκείσθω ἡ ὑπὸ
 αγβ. αἱ ἄρα ὑπὸ αγδ, αγβ: τρεῖς ταῖς ὑπὸ
 αβγ, βγα, γαβ, ἴσται εἰσιν. ἀλλ' αἱ ὑπὸ αγδ,
 αγβ: δυσὶν ὀρθαῖς ἴσται εἰσὶ: καὶ αἱ ὑπὸ αγβ,
 γβα, αβγ ἄρα, δυσὶν ὀρθαῖς ἴσται εἰσὶ. (Συμ-
 πέρασμα.) Πάντος ἄρα τριγώνου, μιᾶς τῶν
 πλευρῶν προσεκβληθείσης: ἡ ἐκτὸς γωνία,
 δυσὶ ταῖς ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον ἴση ἐστὶ: καὶ αἱ
 ἐντὸς τῆς τριγώνου τρεῖς γωνίαι: δυσὶν ὀρθαῖς
 ἴσται εἰσιν. ὅπως εἶδε δεῖξαι.


ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ

Πρότασις λγ. Θέωρημα.

Αι τὰς ἴσας τὲ, ἔ παραλλήλας, ὅπῃ τὰ αὐτὰ μέρη ἐπιζῶ γνύσκῃ, ὁθεῖαι: καὶ αὐταὶ ἴσαι τε καὶ παράλληλοι εἰσιν.

Εκθεσις.) Εξωσσω ἴσαι τὲ καὶ παράλληλοι, αἱ $\overline{αβ}$, $\overline{γδ}$: ἔ ἐπιζευγνύτωσαν αὐτάς ὅπῃ τὰ αὐτὰ μέρη ὁθεῖαι, αἱ $\overline{αγ}$, $\overline{βδ}$. (Διορισμός.) Λέγω ὅτι καὶ αἱ $\overline{αγ}$, $\overline{δβ}$: ἴσαι καὶ παράλληλοι εἰσιν.

(Κατασκευὴ.) Ἐπιζῶχθω γδ ἡ $\overline{βγ}$. (Ἀπόδει-




ξις.) καὶ ἐπὶ παράλληλός ἐστιν ἡ $\overline{αβ}$, τῇ $\overline{γδ}$: καὶ εἰς αὐτάς ἐμπέπηκεν ἡ $\overline{βγ}$: αἱ ἐναλλάξ ἄρα γωνίαι, αἱ ὑπὸ $\overline{αβγ}$, $\overline{βγδ}$: ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶ. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ $\overline{αβ}$, τῇ $\overline{γδ}$, καὶ ἡ $\overline{βγ}$: δύο δὲ αἱ $\overline{αβ}$, $\overline{βγ}$ δυσεὶ πᾶς $\overline{βγ}$, $\overline{γδ}$ ἴσαι εἰσὶ: καὶ γωνία ἡ ὑπὸ $\overline{αβγ}$, γωνία τῇ ὑπὸ $\overline{βγδ}$ ἴση ἐστὶν. βάσις ἄρα ἡ $\overline{αγ}$, βάσις τῇ $\overline{βδ}$ ἐστὶν ἴση: καὶ τὸ $\overline{αβγ}$ τρίγωνον, πρὸς $\overline{βγδ}$ τριγώνῳ ἴσον ἐστὶ: καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι, πᾶς λοιπαῖς γωνίαις ἴσαι εἰσινται, ἐκάπερα ἐκατέρα ὑφ' ἃς αἱ ἴσαι πλευραὶ ὑπολείνουσιν. ἴση ἄρα ἡ ὑπὸ $\overline{αγδ}$ γωνία: τῇ ὑπὸ $\overline{γβδ}$: καὶ ἡ ὑπὸ $\overline{βαγ}$: τῇ ὑπὸ $\overline{γδβ}$. καὶ

καὶ ἵπαι εἰς δύο εὐθείας τὰς $\alpha\gamma$, $\beta\delta$: εὐθεῖα
 ἐμπέπηκεν ἡ $\beta\gamma$: τὰς ἐναλλὰξ γωνίας, τὰς
 ὑπὸ $\alpha\gamma\beta$, $\gamma\beta\delta$: ἴσας ἀλλήλαις πεποίηκεν.
 παράλληλῳ ἄρα ἐστὶν ἡ $\alpha\gamma$, τῇ $\beta\delta$: ἰδέει-
 θε δ' αὐτῇ καὶ ἴση. (Συμπέρασμα.) Αἱ ἄρα
 τὰς ἴσας τε καὶ παραλλήλους ἐπὶ τὰ αὐτὰ
 μέρη ἐπιζευγύσκει: καὶ αὐτῇ ἴση τε καὶ πα-
 ράλληλοι εἰσιν. ὅπως ἴδει δειξάμεθα.

Πρότεσις λδ'. θεώρημα.

Τὼν παραλληλογραμμῶν χωρίων, αἱ ἀ-
 πεναντίον πλευραί τε καὶ γωνίαι ἴσαι ἀλλή-
 λαις εἰσὶ. Ἐὰν δὲ διάμετρος, αὐτὰ δίχα τέμνῃ.

Εκθεσις.) Εἰς παραλ-
 ληλόγραμμον, τὸ $\alpha\gamma\delta\epsilon$,
 διάμετρος ᾧ αὐτὸ, ἡ $\beta\gamma$.
 (Διορισμός.) Λέγω ὅτι ἔ-
 α $\alpha\gamma\delta\beta$ παραλληλογραμ-
 μου: αἱ ἀπεναντίον πλευ-



ραί τε καὶ γωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶ. καὶ ἡ $\beta\gamma$,
 διάμετρος, αὐτὸ δίχα τέμνῃ. (Απόδειξις.)
 Ἐπεὶ γὰρ παράλληλός ἐστιν ἡ $\alpha\beta$ τῇ $\gamma\delta$: καὶ
 εἰς αὐτὰς ἐμπέπηκεν εὐθεῖα ἡ $\beta\gamma$, αἱ ἐναλ-
 λαξ ἄρα γωνίαι αἱ ὑπὸ $\alpha\beta\delta$, $\epsilon\gamma\delta$, ἴσαι ἀλλή-

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ

λαις εἰσὶ. πάλιν ἐπεὶ παράλληλός ἐστιν ἡ $\alpha\gamma$,
 τῇ $\beta\delta$, καὶ εἰς αὐτὰς ἐμπέπηωκεν ἡ $\beta\gamma$, αἱ ἐ-
 ἀλλάξ γωνίαι αἱ ὑπὸ $\alpha\gamma\beta$, $\gamma\beta\delta$: ἴσαι ἀλλή-
 λαις εἰσὶ. δύο δὲ τριγωνα εἰσὶ τὰ $\alpha\beta\gamma$, $\beta\delta\gamma$,
 τὰς δύο γωνίας τὰς ὑπὸ $\alpha\beta\gamma$, $\beta\gamma\alpha$: δυσὲ
 ταῖς ὑπὸ $\beta\gamma\delta$, $\gamma\beta\delta$, ἴσας ἔχοντα ἐκάπτεται ἐ-
 κατέρω : καὶ μίαν πλευρὰν τῇ μιᾷ πλευρᾷ
 ἴσην, τὴν πρὸς ταῖς ἴσας γωνίαις κοινὴν αὐ-
 τῶν, τὴν $\beta\gamma$. καὶ τὰς λοιπὰς ἄρα πλευρὰς,
 ταῖς λοιπαῖς ἴσας ἔξει ἐκάπτεται ἐκατέρω : καὶ
 τὴν λοιπὴν γωνίαν, τῇ λοιπῇ γωνίᾳ. ἴση ἄ-
 ρα ἡ μὲν $\alpha\beta$ πλευρὰ, τῇ $\gamma\delta$: ἡ δὲ $\alpha\gamma$, τῇ $\beta\delta$:
 καὶ ἡ ὑπὸ $\beta\alpha\gamma$ γωνία, τῇ ὑπὸ $\beta\delta\gamma$. καὶ ἐπεὶ
 ἴση ἐστὶν ἡ μὲν ὑπὸ $\alpha\beta\gamma$ γωνία, τῇ ὑπὸ $\beta\gamma\delta$:
 ἡ δὲ ὑπὸ $\gamma\beta\delta$, τῇ ὑπὸ $\alpha\gamma\beta$. ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ
 $\alpha\beta\delta$, ὅλη τῇ ὑπὸ $\alpha\gamma\delta$ ἴση ἐστὶν. ἐδείχθη ὅτι καὶ
 ἡ ὑπὸ $\beta\alpha\gamma$, τῇ ὑπὸ $\beta\delta\gamma$ ἴση. (Συμπέρασ-
 μα.) Τῶν ἄρα παραλληλογράμμων χωρίων,
 αἱ ἀπεναντίον πλευραὶ καὶ γωνίαι, ἴσαι ἀλ-
 λήλαις εἰσιν. (Διορισμός δ' ὅτι πρὸς.) Λέγω
 δὲ ὅτι, καὶ ἡ διαμέτρος αὐτὰ διχα τέμνει.
 (Δευτέρα ἀπόδειξις.) Ἐπεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν ἡ $\alpha\beta$,
 τῇ $\gamma\delta$: κοινὴ δὲ ἡ $\beta\gamma$: δύο δὲ αἱ $\alpha\beta$, $\beta\gamma$, δυ-
 σὶ πᾶς $\gamma\delta$, $\beta\gamma$ ἴσαι εἰσὶν ἐκάπτεται ἐκατέρω
 καὶ

καὶ γωνία ἡ ἐπὶ $\alpha\beta\gamma$, γωνία τῇ ἐπὶ $\beta\gamma\delta$
 ἴση ἐστὶ καὶ βάσις ἄρα ἡ $\alpha\gamma$, βάσις τῇ $\delta\beta$ ἴση
 ἐστὶ καὶ τὸ $\alpha\beta\gamma$ τρίγωνον, τὸ $\beta\gamma\delta$ τρίγωνον
 ἴσων ἐστίν. (Συμπέρασμα.) Ἡ ἄρα $\beta\gamma$ δι-
 μετρῶν $\odot$, διχα τέμνει τὸ $\alpha\beta\gamma\delta$ παραλληλό-
 γεγραμμον. ὅπως ἴδει δείξαι.


ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ.

του τοῦ στοιχείου.

Πρόσεταις λε. θεώρημα.

Τὸ παραλληλόγραμμο, τὰ ὅπῃ τῆς αὐ-
 τῆς βάσεως ὄντα : καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς πα-
 ραλλήλοις ἴσων ἀλλήλοις ἐστίν.

Εκθεσις.) Εἰς παραλ- α
 ληλόγραμμο $\Gamma\alpha\beta\gamma\delta$,
 $\epsilon\beta\zeta\gamma$: ὅπῃ τῇ αὐτῆς βά-
 σεως ὄντα τῆς $\beta\alpha$: καὶ ἐν
 ταῖς αὐταῖς παραλλή-
 λοις ταῖς $\alpha\zeta$, $\beta\gamma$. (Διο-



ρισμός.) Λέγω ὅτι ἴσων ἐστὶ τὸ $\alpha\beta\gamma\delta$, τὸ $\epsilon\beta\zeta\gamma$.
 (Απόδειξις.) Επεὶ γὰρ παραλληλόγραμμόν
 ἐστὶ τὸ $\alpha\beta\gamma\delta$: τῇ $\beta\gamma$, ἴση ἐστὶν ἡ $\alpha\delta$. Διὰ ταῦ-
 τα δὲ καὶ ἡ $\epsilon\zeta$ τῇ $\beta\gamma$ ἴση ἐστὶν ὥστε καὶ ἡ $\alpha\delta$:

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ

τῇ ἐξ ἴση ἐστὶ καὶ κοινὴ ἡ δὲ ὅλη ἄρα ἡ αἰ: ὅλη
 τῇ δὲ ἐστὶν ἴση. ἐστὶ δὲ Ἐ ἡ αβ, τῇ δὲ ἴση. δύο
 δὲ αἰα, αβ, δυσεὶ ταῖς ζδ, δγ, ἴσαι εἰσὶν ἐκά-
 στε καθετέρα: καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ζδγ, γωνία
 τῇ ὑπὸ εαβ ἴση ἐστὶν: ἡ ἐκτός τῇ ἔντος. βάσεις
 ἄρα ἡ εβ, βάσις τῇ ζγ ἴση ἐστὶ: καὶ τὸ εαβ
 τρίγωνον τὰ ζβγ τρίγωνῳ ἴσον ἐστὶ. κοινὸν α-
 φηρήσθω τὸ δῆ. λοιπὸν ἄρα τὸ αβηδ τετα-
 πέζιον: λοιπῶν τὰ ἐηγζ τεταπέζιω, ἴσον ἐστὶ. κοι-
 νὸν προσκείσθω τὸ ηβγ τρίγωνον. ὅλον ἄρα
 τὸ αβγδ παραλληλόγραμμον: ἄνω τὰ εβ
 ζγ παραλληλόγραμμω, ἴσον ἐστὶ. (Συμπέ-
 ρασμα.) Τὰ ἄρα παραλληλόγραμμα, τὰ ἐπὶ
 τῆς αὐτῆς βάσεως ὄντα: καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς
 παραλλήλοις: ἴσα ἀλλήλοις ἐστὶν. ὅπως εἶδεν
 δεῖξαι.

Πρώτησις λς, γένημα.

ΤΑ παραλληλόγραμμα, τὰ ἐπὶ τῶν ἴσων
 βάσεων ὄντα: καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλ-
 λήλοις: ἴσα ἀλλήλοις ἐστὶν.


Εκθεσις.) Εξω παραλληλόγραμμα τὰ
 αβγδ, ἐξηθ: ἐπὶ ἴσων βάσεων, τῶν βγ, ζη:
 καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ταῖς αθ, βη.
 (Διορισμός.) Λέγω ὅτι ἴσον ἐστὶ τὰ αβγδ πα-
 ραλ-

παραλληλόγραμμον, τὸ
 $\epsilon\zeta\eta\theta$. (Κατασκευή.)

Επιζωγράψουσιν γὰρ αἱ
 $\beta\epsilon$, $\gamma\theta$. (Απόδοξις.)

Καὶ ἐπὶ ἰσὶ ἐσὶν ἡ $\epsilon\gamma$.

τῇ $\zeta\eta$: ἀλλὰ καὶ ἡ $\zeta\eta$, τῇ
 $\epsilon\theta$ ἐσὶν ἰση. καὶ ἡ $\beta\gamma$



$\alpha\epsilon$, τῇ $\epsilon\theta$ ἐσὶν ἰση. εἰσὶ δὲ παράλληλοι, καὶ
 ἐπιζωγράψουσιν αὐτὰς αἱ $\beta\epsilon$, $\gamma\theta$. αἱ δὲ τὰς ἰ-
 σαις πᾶς παραλλήλας ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη ἐ-
 πιζωγράψουσιν: ἴσαι τὲ καὶ παράλληλοι εἰσι.
 καὶ αἱ $\epsilon\beta$, $\gamma\theta$ ἀραῖσαι τὲ εἰσὶ, ἔ παραλλήλοι.
 παραλληλόγραμμον ἀρα εἰσὶ, τὸ $\epsilon\beta\gamma\delta$: καὶ ἐ-
 σὶν ἴσων τὰ $\alpha\beta\gamma\delta$. βάσιν τὲ γὰρ αὐτὸ τῷ αὐ-
 τῷ ἔχει τῷ $\beta\gamma$, καὶ ἐν ταύτῃ αὐτῇ παραλλή-
 λους εἰσὶ αὐτῷ, ταύτῃ $\beta\gamma$, $\alpha\theta$. Διὰ τὰ αὐτὰ δὲ
 ἔ τὸ $\zeta\eta\theta$: τῷ αὐτῷ, τῷ $\epsilon\beta\gamma\theta$, ἐσὶν ἴσων. ὥστε καὶ
 τὸ $\alpha\beta\gamma\delta$ παραλληλόγραμμον, τὸ $\epsilon\zeta\eta\theta$ ἴσων
 εἰσὶ. (Συμπέρασμα.) Τὰ ἄρα παραλληλό-
 γραμματα τὰ ἐπὶ τῶν ἴσων βάσεων ὄντα, καὶ ἐν
 ταύτῃ αὐτῇ παραλλήλοις ἴσα ἀλλήλοις ἐσὶν.
 ὅπως εἶδει δαΐξαι.


Πρώτησις λζ. Πρώρημα.

D γ

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ

Τὰ τρίγωνα, τὰ ὅτι τῆς αὐτῆς βάσεως ὄν-
τα· καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις· ἴσα
ἀλλήλοις εἰσίν.

Εκθεσις.) Εἰς τρίγωνα
τὰ $\alpha\beta\gamma$, $\delta\epsilon\zeta$, ὅτι τῆς αὐ-
τῆς βάσεως ὄντα τῆς $\beta\gamma$:
καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλ-
λήλοις, ταῖς $\alpha\delta$, $\beta\zeta$. (Διο-
ρισμός.) Λέγω ὅτι ἴσον ἐ-
στὶ τὸ $\alpha\beta\gamma$ τρίγωνον, τὸ $\delta\beta\zeta$ τριγώνω. (Κα-
ποσκευή.) Εκβεβλήσθω ἡ $\alpha\delta$ ἐφ' ἑκάπερα
τὰ μέρη, ὅτι τὰ ϵ , ζ σημεῖα· καὶ διὰ μέν τῶ
 ϵ , τῇ $\gamma\alpha$ παράλληλος ἡχθὼ ἡ $\beta\epsilon$: διὰ δὲ ζ
 γ , τῇ $\epsilon\delta$ παράλληλος ἡχθὼ ἡ $\gamma\zeta$. (Από-
δείξις.) Παραλληλόγραμμον ἄρα· εἰσὶν ἑκά-
περον τῶν $\epsilon\beta\alpha\gamma$, $\delta\beta\zeta$, καὶ ἴσον τὸ $\epsilon\beta\gamma\alpha$, τὸ
 $\delta\beta\gamma\zeta$. ὅτι πρὸς τῇ αὐτῆς βάσει εἰς τὴν $\beta\gamma$:
καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ταῖς $\beta\gamma$, $\epsilon\zeta$. Ἐ-
στὶ τὸ $\epsilon\beta\gamma\alpha$ παραλληλόγραμμου ἡμῶν
τὸ $\alpha\beta\gamma$ τρίγωνον. ἡ γὰρ $\alpha\beta$ διάμετρος αὐτοῦ
δίχα τέμνει. τὸ δὲ $\delta\beta\gamma\zeta$ παραλληλόγραμ-
μου, ἡμῶν τὸ $\delta\beta\gamma$ τρίγωνον. ἡ γὰρ $\delta\gamma$ διάμε-
τρος αὐτοῦ δίχα τέμνει. τὰ δὲ τῶν ἴσων ἡ-
μῶν ἴσα ἀλλήλοις εἰσίν. ἴσον ἄρα εἰς τὸ $\alpha\beta\gamma$
τρίγω-




τρίγωνον, τὰ δὲ $\beta\gamma$ τριγώνω. (Συμπέρασμα.) Τὰ ἄρα τρίγωνα, τὰ ἐπὶ τῆς αὐτῆς βάσεως ὄντα, καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ἴσα ἀλλήλοις εἰσίν. ὅπως εἶδει δείξαι.

Πρότασις λη. θεώρημα.

ΤΑ τρίγωνα, τὰ ἐπὶ τῶν ἴσων βάσεων ὄντα : καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ἴσα ἀλλήλοις εἰσίν.

Εκθεσις.) Εἰς τὸ τρίγωνον, τὰ $\alpha\beta\gamma$, δεῖξαι ὅτι ἴσων βάσεων ὄντα, τῶν $\beta\gamma$, εἰς καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις, πῶς βεβαιῶται. (Διορισμός.) Λέγω ὅτι ἴσον εἰς τὸ $\alpha\beta\gamma$ τρίγωνον, τὰ δὲ $\beta\gamma$ τριγώνω.



(Κατασκευὴ.) Εκβεβλήθω γὰρ ἡ $\alpha\delta$ ἐφ' ἐκάτερα τὰ μέρη, ἐπὶ τὰ η, θ : καὶ διὰ μὲν β , τῇ γὰρ παράλληλῳ ἤχθω, ἡ $\beta\eta$: διὰ δὲ γ , τῇ δὲ παράλληλῳ ἤχθω ἡ $\gamma\theta$. (Απόδειξις.) Παραλληλόγραμμον ἄρα εἰνὶ ἐκάτερον τῶν $\eta\beta\gamma\alpha$, δεῖξθαι : καὶ ἴσον τὸ $\eta\beta\gamma\alpha$, τὰ δὲ $\beta\gamma$, ἐπὶ τῇ $\beta\gamma$, τὰ $\beta\delta$ καὶ $\delta\gamma$ ἴσων βάσεων εἰς τῶν $\beta\gamma$, εἰς καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ταῖς $\beta\delta$, $\gamma\theta$.

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ

ἡθ. καὶ ἔστι τῶν ἡβγα παραλληλογράμμου, ἡμῖν, τὸ αβγ τρίγωνον. ἡ γὰρ αβ διέμετρε, δίχα αὐτὸ τέμνει. τῶν δὲ διζθ, παραλληλογράμμου, ἡμῖν τὸ ζιδ τρίγωνον: ἡ γὰρ ζδ, διέμετρε, δίχα αὐτὸ τέμνει. τὰ δὲ τῶν ἴσων ἡμίσεϊσαι ἀλλήλοις ἐστίν. ἴσων ἄρα ἐστὶ τὸ αβγ τρίγωνον, πρὸς διζθ τριγώνω. (Συμπέρασμα.) Τὰ ἄρα τρίγωνα, τὰ ἐπὶ τῶν ἴσων βάσεων ὄντα: καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλληλοῖς: ἴσα ἀλλήλοις ἐστί. ὅπως ἴδει δεῖξαι.

Πρότερος λθ. θεώρημα.


ΤΑ ἴσα τρίγωνα, τὰ ἐπὶ τῆς αὐτῆς βάσεως ὄντα: ἔστι τὰ αὐτὰ μέρη: ἔστι ἐν ταῖς αὐταῖς παραλληλοῖς ἐστίν.

Εκθεσις.) Εἰς τρίγωνον αβγ, ὁ δβγ, ἐπὶ τῆς αὐτῆς βάσεως ὄντα, τῶν βγ. (Διορισμός.)

Λέγω ὅτι καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλληλοῖς ἐστίν.

(Κατασκευὴ.) Επεξέχθω γὰρ ἡ αδ. (Διορισ-

μός τῆς κατασκευῆς.) Λέγω ὅτι παράλληλόν ἐστιν ἡ αδ, τῇ γβ. (Υπόθεσις.) Εἰ γὰρ μὴ, ἔχθω



ἤχθω Διὰ τῶν σημείων, τῇ βγ ὁθεὶα παράλληληλ Θ ἢ αε: καὶ ἐπεξέχθω ἡ γ. (Απόδειξις.) Ἰσὺν ἄρα εἰς τὸ ἀβγ τρίγωνον, τῷ εβγ τριγώνῳ. ἐπὶ τε γὰρ τῆς αὐτῆς βάσεως εἰσὶν αὐτῷ τῆς βγ: καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ταῖς βγ, αε. ἀλλὰ τὸ ἀβγ, τῷ δβγ εἰσὶν ἴσων. καὶ τὸ δβγ ἄρα τρίγωνον, τῷ εβγ ἴσων εἰσὶν. τὸ μᾶλλον τῷ ἐλάττω, ὅπως ἀδμύατον. ὅσα ἄρα παράλληλός εἰσιν ἡ αε, τῇ βγ. Ομοίως δὲ δείξομεν: ὅτι ἐδὲ ἄλλη τις πηλὴ τῷ αδ. ἡ αδ ἄρα, τῇ βγ εἰσὶν παράλληληλ Θ . (Συμπέρασμα.) Τὰ ἄρα ἴσα τρίγωνα, τὰ ἐπὶ τῇ αὐτῇ βάσει ὄντα: καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις εἰσὶν. ὅπως ἔδει δεῖξαι.


Πρότερος μ. θεώρημα.

ΤΑ ἴσα τρίγωνα, τὰ ἐπὶ τῶν ἴσων βάσεων ὄντα: καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη: καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις εἰσὶν.

Εκθεσις.) Εἰς τὸ τρίγωνον ἴσα, τὰ ἀβγ, γδε, ἐπὶ ἴσων βάσεων ὄντα τῶν βγ, γε. (Διορισμός.) Λέγω ὅτι καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις εἰσὶν. (Κάτασκαδὴ.) Επεξέχθω γὰρ ἡ αδ. (Διορισμός τῆς κατάσκαδης.) Λέγω ὅτι κα-

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ

τι παράλληλῳ εἰν ἡ
 $\overline{αδ}$, τῇ $\overline{βε}$. (Υπόθεσις.)
 Εἰ γὺ μὴ, ἤχθω $\overline{αζ}$ τῇ $\overline{α}$,
 τῇ $\overline{βε}$ παράλληλῳ ἡ
 $\overline{ζα}$. καὶ ἐπεὶ $\overline{δχθω}$ ἡ $\overline{ζε}$.
 (Ἀποδείξις.) Ἴσων ἄρα εἰσι β



τὸ $\overline{αβγ}$ τρίγωνον, πρὸς $\overline{ζγ}$ τριγώνω. ὅτι περὶ γὺ
 ἴσων βάσεων εἰσὶ τῶν $\overline{βγ}$, $\overline{γζ}$: καὶ ἐν ταῖς αὐ-
 ταῖς παραλλήλοις ταῖς $\overline{βε}$, $\overline{αζ}$. ἀλλὰ τὸ $\overline{αβγ}$
 τρίγωνον, ἴσων εἰσι, πρὸς $\overline{δγ}$ τριγώνω. καὶ τὸ
 $\overline{δγ}$ τρίγωνον ἄρα, ἴσων εἰσι τὸ $\overline{ζγ}$ τριγώνω.
 τὸ μείζον, πρὸς ἐλάσσονι: ὅπως ἀδιώκων. ὅθεν ἄ-
 ρα παράλληλῳ εἰν ἡ $\overline{αζ}$, τῇ $\overline{βε}$. Ὁμοίως
 δεῖ δειξομεν, ὅτι καὶ ἄλλη τις πᾶσι τῇς $\overline{αδ}$.
 ἡ $\overline{αδ}$ ἄρα τῇ $\overline{βε}$ παράλληλός ἐστι. (Συμπέ-
 ρασμα.) Τὰ ἄρα ἴσα τρίγωνα: τὰ ἐπὶ τῶν
 ἴσων βάσεων ὄντα: ἔν ταῖς αὐταῖς εἰσι πα-
 ραλλήλοις. ὅπως ἔδει δεῖξαι.


Πρότασις μα. Γεώρημα.

ΕΑν παραλληλόγραμμον, τριγώνω βάσιν
 τε ἔχῃ πῶ αὐτῷ: καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς πα-
 ραλλήλοις ἡ διπλασίον ἐστὶ τὸ παραλλη-
 λόγραμμον τῷ τριγώνω.

(Εκθεσις.) Παραλληλόγραμμον γὰρ τὸ $\overline{αβ}$
 $\overline{γδ}$

$\gamma\delta$, τριγώνω τῷ $\epsilon\beta\gamma$: α

βάσιν τε ἐχέτω τὴν αὐ-
τῇ τὴν $\beta\gamma$, καὶ ἐν ταῖς
αὐταῖς ἔσω παραλλήλοις
ταῖς $\epsilon\gamma$, $\alpha\epsilon$. (Διορισμός.)



Ἀέγω ὅτι διπλάσιον ἐστὶ τὸ

$\alpha\beta\gamma\delta$, παραλληλόγραμμον, τοῦ $\beta\epsilon\gamma$ τρι-
γώνου. (Κατασκευή.) Ἐπεζεύχθω γὰρ ἡ $\alpha\gamma$. (Α-
πόδειξις.) Ἰσὸν δὴ ἐστὶ τὸ $\alpha\beta\gamma$ τρίγωνον, τῷ $\epsilon\beta\gamma$
τρίγωνῳ ἐπὶ τῇ γὰρ αὐτῇ βάσει $\beta\gamma$ ἐστὶν αὐτῷ, καὶ
 $\beta\epsilon$: καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ταῖς $\epsilon\gamma$,
 $\alpha\epsilon$. ἀλλὰ τὸ $\alpha\beta\gamma\delta$ παραλληλόγραμμον: δι-
πλάσιόν ἐστι $\epsilon\beta\gamma$ τριγώνου. ἡ γὰρ $\alpha\gamma$ διάμε-
τρος αὐτοῦ διχαίμενη. ὥστε τὸ $\alpha\beta\gamma\delta$ παραλ-
ληλόγραμμον, καὶ $\epsilon\beta\gamma$ τρίγωνον ἐστὶ διπλά-
σιον. (Συμπέρασμα.) Ἐὰν ἄρα παραλληλόγραμμον
τριγώνῳ βάσιν τε ἐχέῃ τὴν αὐτὴν: καὶ ἐν ταῖς
αὐταῖς παραλλήλοις ἢ διπλάσιόν ἐστι τὸ πα-
ραλληλόγραμμον $\epsilon\beta\gamma$ τριγώνου. ὅπως ἔδει δεῖξαι.


Πρότασις μβ. Πρόβλημα.

Τὸ δοθέν τι τρίγωνον, ἴσον παραλληλό-
γραμμον συστήσασθαι: ἐν τῇ δοθείσῃ ἐν-
δογραμμῇ γωνίᾳ.

(Εκθεσις.) Ἐστω τὸ μὲν δοθέν τρίγωνον, τὸ
 $\alpha\beta\gamma$:

ΕΤΚΛΞΙΔΟΥ

$\alpha\beta\gamma$: ἡ δὲ δοθεῖσα ὀρθό-
 γωνία, ἡ δὲ
 (Διορισμός.) Δεῖ δὴ τῷ
 $\alpha\beta\gamma$ τριγώνῳ ἴσον πα-
 ραλληλόγραμμον συστή-
 σασθαι ἴση τῇ δὲ γωνίᾳ
 ὀρθογώνῳ. (Κατασκευὴ.) Τελμήσθω ἡ
 $\beta\gamma$ δίχα καὶ αὐτὸ εἰς: καὶ ἐπέλθτω ἡ $\alpha\epsilon$: καὶ
 συνεσάτω πρὸς τῇ $\epsilon\gamma$ ὀρθία: καὶ τῷ πρὸς
 αὐτῇ σημείω τῷ εἰς τῇ δὲ γωνίᾳ, ἴση ἡ ὑπὸ
 $\gamma\alpha\epsilon$: καὶ διὰ μέν τῃ α : τῇ $\epsilon\gamma$ παράλληλῳ
 ἤχθω, ἡ $\alpha\eta$: διὰ δὲ τῇ γ , τῇ $\zeta\epsilon$ παράλληλῳ
 ἤχθω ἡ $\gamma\eta$. παραλληλόγραμμον ἄρα ἐστὶ, τὸ
 $\zeta\epsilon\gamma\eta$. (Απόδειξις.) Καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ βε
 τῇ $\epsilon\gamma$: ἴσων ἐστὶ καὶ τὸ $\alpha\beta\epsilon$ τρίγωνον, τῷ $\alpha\epsilon\gamma$
 τριγώνῳ. ἐπὶ τε γὰρ ἴσων βάσεων ἐστὶ τῶν $\beta\epsilon$,
 $\epsilon\gamma$: ὅτι ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ταῖς $\beta\gamma$,
 $\alpha\eta$. διπλάσιον ἄρα ἐστὶ τὸ $\alpha\beta\gamma$ τρίγωνον, ὅ
 $\alpha\epsilon\gamma$ τριγώνῳ. ἐστὶ δὲ καὶ τὸ $\zeta\epsilon\gamma\eta$ παραλληλό-
 γραμμον, διπλάσιον ὅ $\alpha\epsilon\gamma$ τριγώνῳ. βάσιν
 τε γὰρ αὐτῷ τῷ αὐτῷ ἔχει: καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς
 ἐστὶν αὐτῷ παραλλήλοις. ἴσον ἄρα ἐστὶ τὸ $\zeta\epsilon\gamma\eta$
 παραλληλόγραμμον, τῷ $\alpha\beta\gamma$ τριγώνῳ: καὶ
 ἔχει τὴν ὑπὸ $\gamma\alpha\epsilon$ γωνίαν, ἴσην τῇ δὲ. (Συμ-
 πέρα-




πίεσσις.) Τῷ ἄρα δοθέντι τριγώνῳ τῷ
 $\alpha\beta\gamma$: ἴσον παραλληλόγραμμον συνεσάβη
 τὸ ζεγῆ: ἐν γωνίᾳ τῇ ἐπὶ ζεγῆ, ἥ ἐστιν ἰσὴ τῇ
 ἐν ὧν ἐστὶν ἡ πιέσις.

Πρότασις μγ. διώρημα.

Παντὸς παραλληλογράμμου, τῶν περὶ τὴν
 διάμετρον παραλληλογράμμων, τὰ πα-
 ραπληρώματα ἴσα ἀλλήλοις εἶναι.

Εκθεσις.) Ἐσὼ παραλληλόγραμμον, τὸ
 $\alpha\beta\gamma\delta$: διάμετρον Θ δὲ αὐτοῦ, ἡ $\alpha\gamma$. περὶ τὴν
 $\alpha\gamma$, παραλληλόγραμ-
 μα ἡ $\epsilon\theta$ ἔστω τὰ $\epsilon\theta$, ζῆ: τὰ
 δὲ λεγόμενα παραπλη-
 ρώματα, τὰ $\beta\kappa$, $\kappa\delta$. (Διο-
 ρισμός.) Λέγω ὅτι ἴσον εἶ-
 ναι τὸ $\beta\kappa$ παραπληρώ-
 μα: τῷ $\kappa\delta$ παραπληρώματι. (Απόδειξις.)

Επεὶ γὰρ παραλληλόγραμμόν ἐστι τὸ $\alpha\beta\gamma\delta$:
 διάμετρον Θ δὲ αὐτοῦ ἡ $\alpha\gamma$: ἴσον ἐστὶ τὸ $\alpha\beta\gamma$
 τρίγωνον, τῷ $\alpha\delta\gamma$ τριγώνῳ. πάλιν ὅτι τὸ
 $\epsilon\theta$ παραλληλόγραμμόν ἐστι: διάμετρον Θ
 αὐτοῦ ἡ $\alpha\gamma$: ἴσον ἐστὶ τὸ $\epsilon\alpha\gamma$ τρίγωνον: τῷ $\alpha\theta\kappa$
 τριγώνῳ. διὰ τὰ αὐτὰ δὲ ϵ τὸ $\kappa\epsilon\gamma$ τρίγωνον




ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ

τοι, τὰ κηγ ἴσιν ἴσον. ἐπεὶ ἔν τὸ μὲν ἅκ τρεῖς
γωνον, τὰ αβκ τριγώνω ἴσιν ἴσον, τὸ δὲ κζγ,
τὰ κηγ. τὸ αἱκ τριγώνον μετὰ τῷ κηγ, ἴσιν
ἴσον τὰ αβκ τριγώνω, μετὰ τῷ κζγ τριγώ-
νου. ἐστὶ δὲ καὶ ὅλον τὸ αβγ τριγώνον, ὅλω τὰ
αδγ ἴσον. λοιπὸν ἄρα τὰ κδ παραπληρώ-
ματι, ἴσον ἐστὶ τὸ βκ παραπληρώματι. (Συμ-
πέρασμα.) Πάντος ἄρα παραλληλόγραμ-
μου, τῶν τε πρὸς τῷ διάμετρον παραλληλο-
γράμμου. τὰ παραπληρώματα ἴσα ἀλλή-
λοις ἴσιν. ὅπως εἶδει δεῖξαι.

Πρότασις μδ. Πρόβλημα.

Παρά τῷ δοθείσῃ εὐθείᾳ: τὰ δοθέντι
τριγώνω: ἴσον παραλληλόγραμμον πα-
ραβαλεῖν: ἐν τῇ δοθείσῃ γωνίᾳ εὐθυγράμ-
μω.

Εκθεσις. Εἶω ἡ μὲν
δοθεῖσα εὐθεῖα, ἡ αβ: τὸ
δὲ δοθέν τριγώνον, τὸ γ:
ἡ δὲ δοθεῖσα γωνία εὐθύ-
γραμμος, ἡ δ. (Διορισ-
μός.) Δεῖ δὴ παρὰ τῷ



δοθείσῃ εὐθείᾳ τῷ αβ: τὰ δοθέντι τριγώ-
νω τὰς

τῷ τῷ γ: ἴσον παραλληλόγραμμον παράβα-
 λειν, ἐν ἴση τῇ δ γωνία. (Κατασκευὴ.) Συνα-
 γάτω τῷ γ τριγώνω: ἴσον παραλληλόγραμ-
 μον τὸ βε ζη: ἐν γωνία, τῇ ὑπὸ εβη, ἢ ἐστὶν ἴση
 τῇ δ: καὶ κείτω ὡς περ ἐπ' αὐθείας εἶναι τὴν
 βε, τῇ αβ: καὶ διήχθω ἡ ζη, ὅτι τὸ θ: καὶ διὰ τῆς
 α, ὁποτέρᾳ τῶν βη, εζ: παράλληλῳ ἤχθω ἡ
 αβ: καὶ ἐπεξείχθω ἡ θβ. (Αποδείξεις.) Καὶ
 ἐπεὶ εἰς παραλλήλους τὰς αβ, εζ: αὐθεῖα ἐμ-
 πέπηκεν ἡ θζ. αἱ ἄρα ὑπὸ αβζ, θζε γωνίαι
 δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσιν: αἱ ἄρα ὑπὸ βθη, ηζε
 δύο ὀρθῶν ἐλάσσονες εἰσιν. αἱ δὲ ἀπὸ ἐλάσ-
 σόνων, ἡ δύο ὀρθῶν: εἰς ἄπρον ἐκβαλλόμεναι,
 συμπέπυσιν. αἱ θβ, ζε, ἄρα ἐκβαλλόμεναι,
 συμπεσύντη. (Κατασκευὴς τὸ ἔπρον μέρους.)
 Εκβεβλήσθωσαν καὶ συμπιπύτωσαν, καὶ τὸ κ:
 καὶ διὰ τῆς κ σημείω, ὁποτέρᾳ τῶν εα, ζβ: πα-
 ράλληλῳ ἤχθω ἡ κλ: καὶ ἐκβεβλήσθω-
 σαν αἱ θα, ηβ, ὅτι τὰ λ, μ, σημεία. (Αποδεί-
 ξεως τὸ ἔπρον μέρους.) Παραλληλόγραμ-
 μον ἄρα ἐστὶ τὸ θλκζ: διὰ μέρους δὲ αὐτοῦ ἡ
 βκ: πρὶν δὲ θκ, παραλληλόγραμμου ἰδρ, τὰ
 αη, με: τὰ δὲ λεγόμενα παραπληρώματα
 λβ, βζ: ἴσα ἄρα ἐστὶ τὸ λβ, τῷ βζ: ἀλλὰ καὶ


ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ

τὸ βζ, τὰ γ̄ τριγώνω ἴσιν ἴσον. καὶ λβ ἄρα
τὰ γ̄, ἴσιν ἴσον. καὶ ἐπεὶ ἴση ἴσιν ἡ ὑπὸ η̄δε
γωνία: τῇ ὑπὸ ᾱβμ: ἀλλὰ ἡ ὑπὸ η̄δε, τῇ δ̄
ἴσιν ἴση: καὶ ἡ ὑπὸ ᾱβμ, τῇ δ̄ γωνία ἴσιν ἴση.
(Συμπέρασμα.) Παρὰ τὴν δοθεῖσαν ἄρα
δοθεῖσαν τὴν ᾱβ: τὰ δοθέντι τριγώνω τὰ γ̄:
ἴσον παραλληλόγραμμον παραβίβληται τὸ
λβ: ἐν γωνία τῇ ὑπὸ ᾱβμ, ἡ ἴσιν ἴση τῇ δ̄.
ὅπως ἔδει ποιῆσαι.

Πρότεσις με. Πρόβλημα.

ΤΩ δοθέντι ὀρθογώνω, ἴσον παραλλη-
λόγραμμον συστήσασθαι: ἐν τῇ δοθείσῃ
ὀρθογώνω γωνία.

Εκθεσις.) Εἰς τὸ δοθέν
ὀρθογώνω, τὸ ᾱβγδ:
ἡ δὲ δοθεῖσα γωνία ὀρθο-
γώνω, ἡ ε̄. (Διορισ-
μος.) Δεῖ δὴ τὰ ᾱβγδ ὀ-
ρθογώνω: ἴσον παρα-
λληλόγραμμον συστήσασθαι, ἐν ἴσῃ γωνία τῇ ε̄.
(Κατασκευὴ.) Επεζεύχθω γὰρ ἡ δβ: καὶ συ-
νεάτω τὰ ᾱβδ τριγώνω: ἴσον παραλληλό-
γραμμον, τὸ ζθ: ἐν τῇ ὑπὸ θκζ γωνία, ἡ ἴ-



εἰν ἴση τῇ εἰ : καὶ παραβιβλήσθω παρὰ τὴν
 ἡθ δθεῖαν, τὰ δ βγ τριγώνω : ἴσον παράλ-
 ληλόγραμμον, τὸ ἡμ, ἐν τῇ ὑπὸ ἡθμ γωνία.
 ἡ εἰς ἴση τῇ εἰ. (Ἀπόδειξις.) Καὶ ἐπεὶ ἡ εἰ γω-
 νία, ἐκείρα τῶν ὑπὸ θκζ, ηθμ ἴση ἴση : καὶ
 ἡ ὑπὸ ἡθμ ἄρα τῇ ὑπὸ θκζ ἴση ἴση. κοινὴ
 προσκείσθω, ἡ ὑπὸ κθη. αἱ ἄρα ὑπὸ ζκθ,
 κθη : ταῖς ὑπὸ κθη, ηθμ, ἴσαι εἰσιν, ἀλλ' αἱ ὑ-
 πὸ κθη, ἡθμ δύσιν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσιν. πρὸς
 δὴ τινι δθεῖα, τῇ ἡθ : Ἐτὰ πρὸς αὐτῇ σημείω-
 τὰ θ : δύο δθεῖαι αἱ κθ, θμ, μὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ
 μέρη κείμεναι : τὰς ἐφεξῆς γωνίας δύσιν ὀρ-
 θαῖς ἴσας ποιῶσιν. ἐπ' δθεῖας ἄρα εἰς ἡ κθ,
 τῇ θμ. καὶ ἐπεὶ εἰς παραλλήλους κμ, ζη, δ-
 θεῖα ἐνέπεσεν ἡ θη : αἱ ἐναλλαξ ἄρα γωνίαι, αἱ
 ὑπὸ μθη, θκ ζ ἴσαι ἀλλήλας εἰσὶ. κοινὴ προσ-
 κείσθω ἡ ὑπὸ θηλ, αἱ ἄρα ὑπὸ μθη, θηλ,
 ταῖς ὑπὸ θηζ, θηλ, ἴσαι εἰσιν. ἀλλ' αἱ ὑπὸ
 μθη, θηλ, δύσιν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσιν. καὶ αἱ ὑπὸ
 θηζ, θηλ ἄρα δύσιν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσιν. ἐπ' δ-
 θεῖας ἄρα εἰς ἡ ζη, τῇ ηλ. καὶ ἐπεὶ ἡ κζ τῇ
 θη, ἴση τε καὶ παράλληλός ἐστιν, ἀλλὰ ἔη θη
 τῇ μλ. Ἐἡ κζ ἄρα τῇ μλ ἴση τε καὶ παραλ-
 ληλός ἐστιν : καὶ ἐπιζυγνύσθω αὐτὰς δθεῖαι,


ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ

αὶ κμ, ζλ καὶ αὶ κλ, ζμ, ἴσαι τὲ ἐπ' ἀλλή-
 λοι εἰσι. παραλληλόγραμμον ἄρα ἐστὶ τὸ
 κζλμ. καὶ ἐπεὶ ἴσον ἐστὶ τὸ μὲν αβδ τρίγων-
 ον, τὸ δὲ ζβγ παραλληλογράμμω· τὸ δὲ δβγ-
 τὸ ἡμ, ὅλον ἄρα τὸ αβγδ εὐθύγραμμον, ὅ-
 λω τὸ κζλμ παραλληλογράμμω, ἴσον ἐστὶ.
 (Συμπέρασμα.) Τὸ ἄρα δοθέντι εὐθυ-
 γράμμω τὸ αβγδ ἴσον παραλληλόγραμμον
 συνίσταται τὸ κλμ· ἐν γωνία τῇ ἐπὶ ζκμ·
 ἢ εἰς ἴση τῇ δοθείσῃ τῇ ε. ὥς ἴδει ποιήσαι.

Πρότις μς. Πρόβλημα.

Α Πὸ τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ πτεράγωνον ἀνα-
 γράψαι.

Εκθεσις. Εἰω ἡ δοθεῖσα εὐθεία, ἡ αβ. (Διο-
 ρισμός.) Δεῖ δὴ δοτὶ τῇ αβ εὐθείᾳ, πτεράγω-
 νον ἀναγράψαι. (Κατασκευὴ.) Ἡχθὼ τῇ αβ
 εὐθείᾳ· δοτὶ τῇ πρὸς αὐτῇ σημείῃ τῇ α· πρὸς
 ὀρθᾷς ἡ αγ· καὶ κείσθω τῇ
 αβ ἴση, ἡ αδ· καὶ διὰ μὲν
 τῇ δ σημείῃ· τῇ αβ πα-
 ράλληλῃ ἡ χθ, ἡ δὲ·
 διὰ δὲ τῇ β σημείῃ, τῇ
 αδ παράλληλῃ ἡ χθ,



ἡ βε.

ἢ βε. (Απόδειξις.) Παραλληλόγραμμον ἄρα ἐστὶ τὸ ἀδεβ. ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ γωνία $\alpha\beta$, τῇ δὲ ἡ δὲ $\alpha\delta$, τῇ βε. ἀλλὰ καὶ ἡ $\alpha\beta$, τῇ $\alpha\delta$ ἐστὶ ἴση. αἱ τέσσαρες ἄρα αἱ $\beta\alpha$, $\alpha\delta$, $\delta\epsilon$, $\epsilon\beta$ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσιν. ἰσόπλευρον ἄρα ἐστὶ τὸ ἀδεβ παραλληλόγραμμον. (Προβλεπόμενος δ' ὅτι $\alpha\beta$ καὶ $\delta\epsilon$ ὀρθογώνιοι.) (Απόδειξις.) Ἐπεὶ γὰρ εἰς παραλλήλους τὰς $\alpha\beta$, $\delta\epsilon$ διεβήσιν ἐπέπεσον ἡ $\alpha\delta$. αἱ ἄρα ὑπὸ βαδ, $\alpha\delta\epsilon$ γωνίαι. δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσιν. ὀρθὴ δὲ ἡ ὑπὸ βαδ. ὀρθὴ ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ $\alpha\delta\epsilon$. τῶν δὲ παραλληλογράμμων χωρίων, αἱ ἀπ' ἐναντίας ἐν πλευραῖς εἰσὶν γωνίαι. ἴσαι ἀλλήλαις εἰσιν. ὀρθὴ ἄρα καὶ ἐκάτερα τῶν ἀπεναντίων τῶν ὑπὸ $\alpha\delta\epsilon$, $\beta\epsilon\delta$ γωνιῶν. ὀρθογώνιον ἄρα ἐστὶ τὸ ἀδεβ. ἐδείχθη δὲ καὶ ἰσόπλευρον. (Συμπέρασμα.) Τετράγωνον ἄρα ἐστὶ καὶ ἐστὶν διπλὴ τῆς $\alpha\beta$ διθείας ἀναγεγραμμένον. ὅπως ἔδει ποιῆσαι.

Πρόκειται μὲν. Πρώτημα.


ΕΝ τοῖς ὀρθογώνιοις τριγώνοις, τὸ διπλὸ τῆς πλεῦ ὀρθῆς γωνίας ὑποενέμεται πλευρᾶς τετράγωνον. ἴσων ἐστὶ, τοῖς διπλὸ τῶν πλεῦ ὀρθῆς γωνίας ἀπὸ ἐκαστῶν πλευρῶν τήρας γωνίας.

Ε iiiij

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ

Εκθεσις·) Εστω τρίγωνον ὀρθογώνιον, τὸ $\alpha\beta\gamma$, ὀρθὴν ἔχον τιμὴν ὑπὸ $\beta\alpha\gamma$.

(Διασκαμὸς.) Λέγω ὅτι τὸ $\delta\alpha\delta$ τὸ $\beta\gamma$ περὶ αὐτοῦ, ἐκτετασμένον ἐστὶ τὰς $\delta\alpha\delta$ τῶν $\beta\alpha$,



$\alpha\gamma$ τετραγώνιος. (Καὶ σκοπεῖν.) Ἀναγε-

γράφω γὰρ $\delta\alpha\delta$ μὲν τῆς $\beta\gamma$: περὶ αὐτοῦ,

τὸ $\beta\delta\gamma\alpha$: $\delta\alpha\delta$ δὲ τῶν $\beta\alpha$, $\alpha\gamma$ τὰ $\eta\beta$, $\theta\gamma$: καὶ

$\delta\alpha\delta$ τὰ α , ὁποῖα τῶν $\beta\delta$, $\gamma\eta$, παραλλήλας

ἦχθω ἡ $\alpha\delta$: ὅτι ἐπὶ $\delta\alpha\delta$ ἔστιν αἱ $\alpha\delta$, $\beta\gamma$. (Δ-

ποδείξις.) Καὶ ἐπεὶ ὀρθὴ ἐστὶν ἑκάτερα τῶν

ὑπὸ $\beta\alpha\gamma$, $\beta\alpha\eta$ γωνιῶν: πρὸς δὲ ἡ $\alpha\delta$ ἐστὶν ὀρθή,

τῇ $\beta\alpha$: καὶ τὰ πρὸς αὐτῇ σημείω τὰ α : δύο

ὀρθαί: αἱ $\alpha\gamma$, $\alpha\eta$: μὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη κεί-

μεναί: τὰς ἐφεξῆς γωνίας, δύοσιν ὀρθαῖς ἴσας

ποιῶσιν, ἐπὶ ὀρθῆς ἄρα ἐστὶν ἡ $\gamma\alpha$, τῇ $\alpha\eta$. διὰ

τὰ αὐτὰ δὲ καὶ $\alpha\beta$: τῇ $\alpha\delta$, ἐστὶν ἐπὶ ὀρθῆς:

καὶ ἐπὶ ἴσιν ἐστὶν ἡ ὑπὸ $\delta\beta\gamma$ γωνία, τῇ ὑπὸ

$\beta\delta\alpha$. ὀρθὴ γὰρ ἑκάτερα κοινὴ περὶ σκεῖαν ἡ ὑ-

πὸ $\alpha\beta\gamma$. ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ $\delta\beta\alpha$: ὅλη τῇ ὑπὸ

$\beta\delta\gamma$ ἐστὶν ἴση. καὶ ἐπεὶ δύο αἱ $\delta\beta$, $\beta\alpha$: δύοσι τὰς

$\beta\delta$, $\beta\gamma$ ἴσαι εἰσιν, ἑκάτερα ἑκάτερα: καὶ γων-

εῖα.

ἦν. βάσις ἄρα ἡ $\alpha\delta$, βάσις τῇ $\zeta\gamma$ ἴσιν ἴση· καὶ
 ἡ $\alpha\beta\delta$ τρίγωνον, τῷ $\zeta\gamma$ τριγώνῳ ἴσιν ἴση·
 καὶ ἐστὶ τὸ μὲν $\alpha\beta\delta$ τρίγωνον, διπλάσιον τῷ
 $\beta\lambda$ παραλληλόγραμμον· βάσιν τὴν $\gamma\delta$ τὴν
 αὐτὴν ἔχουσι τὴν $\beta\delta$ · καὶ ἐστὶ τῆς αὐτῆς εἰσὶ
 παραλλήλοις, τῆς $\beta\delta$, $\alpha\lambda$. τὰ δὲ $\zeta\beta\gamma$ τρι-
 γώνου διπλάσιον ἐστὶ τὸ ἡ β πετράγωνον. βάσιν
 τὴν $\gamma\delta$ πάλιν τὴν αὐτὴν ἔχουσι, τὴν $\zeta\beta$ · καὶ ἐστὶ
 ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις εἰσὶ, ταῖς $\zeta\beta$, $\eta\gamma$.
 τὰ δὲ τῶν ἴσων διπλάσια· ἴσα ἀλλήλοις ἐστὶ.
 ἴσιν ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ $\beta\lambda$ παραλληλόγραμμον,
 τῷ $\eta\beta$ πετράγῳ. Ομοίως δὲ ὅτι $\zeta\delta\gamma$ γωνι-
 μύων τῶν $\alpha\epsilon$, $\beta\eta$ · δειχθήσεται καὶ τὸ $\gamma\lambda$ πα-
 ραλληλόγραμμον, ἴσιν τῷ $\theta\gamma$ πετράγῳ. ὅ-
 λον ἄρα τὸ $\delta\beta\epsilon\gamma$ πετράγωνον· δυοὶ τοῖς $\eta\delta$,
 $\theta\gamma$ πετράγωνοις, ἴσιν ἐστὶ· καὶ ἐστὶ τὸ μὲν $\delta\delta\epsilon\gamma$
 πετράγωνον· διὰ τῆς $\beta\gamma$ ἀναγραφῆς, τὰ δὲ
 $\eta\beta$, $\theta\gamma$ διὰ τῶν $\beta\alpha$, $\alpha\delta$. τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς $\delta\gamma$
 πλάρας πετράγωνον· ἴσιν ἐστὶ τοῖς, διὰ τῶν
 $\beta\alpha$, $\alpha\eta$, πλάρων πετράγωνοις. Συμπε-
 ρασμα. Ἐν ἄρα τοῖς ὀρθογωνίοις τριγώνοις·
 τὸ διὰ τῆς τὴν ὀρθὴν γωνίαν ὑποκειμένης
 πλάρας πτράγωνον· ἴσιν ἐστὶ, τοῖς διὰ τῶν
 τὴν ὀρθὴν περιεχουσῶν πλάρων πτράγω-
 νοις. ὅπερ ἔδει δεικνύειν.

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ

Πρότασις μη. Γεώμετρον.

Εὰς τριγώνων, τὸ ἀπὸ μίας τῶν πλευρῶν πετράγωνων: ἴσιν ἢ τοῖς ἀπὸ τῶν λοιπῶν τῶν τριγώνων δύο πλευρῶν πετράγωνοις ἢ περὶ εὐκλειδῆς γωνία, ἑκτὸ τῶν λοιπῶν τοῦ τριγώνου δύο πλευρῶν, ὀρθή ἐστι.

Εκθεσις.) Τριγώνον γὰρ τὸ $\alpha\beta\gamma$: τὸ ἀπὸ μίας τῆς $\beta\gamma$ πλευρᾶς πετράγωνον: ἴσιν ἑστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν $\beta\alpha$, $\alpha\gamma$ πλευρῶν πετράγωνοις (Διορισμός.) Λέγω ὅτι ὀρθή ἐστιν ἡ ἑκτὸ $\beta\alpha\gamma$ γωνία. (Κατασκευὴ.) Ἡχθὼ γὰρ ἀπὸ β α σημείον, τῇ $\alpha\beta$ πρὸς ὀρθὰς ὁρθῶν, ἢ $\alpha\delta$: καὶ κείνῳ τῇ $\gamma\alpha$, ἴση $\delta\gamma$ ἢ $\alpha\delta$ καὶ ἐπέζευχθὼ ἡ $\delta\beta$. (Απόδειξις.) Καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ $\delta\alpha$, τῇ $\alpha\gamma$: ἴσιν ἐστὶ, καὶ τὸ ἀπὸ τῆς $\delta\beta$ πετράγωνον: τὸ ἀπὸ τῆς $\alpha\gamma$ πετράγωνον, κοινὸν προσκείσθω, τὸ ἀπὸ τῆς $\alpha\beta$ πετράγωνον. τὰ ἄρα ἀπὸ τῶν $\delta\alpha$, $\alpha\beta$ πετράγωνα: ἴσα ἐστὶ, τοῖς ἀπὸ τῶν $\beta\alpha$, $\alpha\gamma$ πετράγωνοις. ἀλλὰ τοῖς μὲν ἀπὸ τῶν $\delta\alpha$, $\alpha\beta$: ἴσιν ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς $\delta\beta$: ὀρθὴ γὰρ ἐστὶν ἡ ἑκτὸ $\delta\alpha\beta$ γωνία: τοῖς δὲ ἀπὸ τῶν $\alpha\beta$, $\alpha\gamma$: ἴσιν ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς $\alpha\beta$.

πὸ τῆς βγ. ὑποκείται γὰρ. τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς
 δβ τετραγώνου: ἴσιν ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῆς βγ τε-
 τραγώνω. ὥστε καὶ πλευρὰ ἡ δβ: τῇ βγ ἐ-
 σὶν ἴση. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ἀδ τῇ αβ. καὶ ἡ
 ῥῆ αγ: δύο δὲ αἱ δα, αβ: δυοὶ πᾶσι βα, αγ ἴ-
 σαι εἰσὶ: καὶ βάσις ἡ δβ, βάσις τῇ βγ ἐστὶν ἴση.
 γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ δαβ, γωνία τῇ ὑπὸ βαγ
 ἐστὶν ἴση. ὀρθὴ δὲ ἡ ὑπὸ δαβ. ὀρθὴ ἄρα καὶ ἡ ὑ-
 πὸ βαγ. (Συμπέρασμα.) Εἰς ἄρα τριγῶ-
 νος, τὸ ἀπὸ μίας τῶν πλευρῶν τετραγώνου: ἴ-
 σιν ἐστὶ πᾶς ἀπὸ τῶν λοιπῶν ἔτεργων δύο
 πλευρῶν τετραγώνου: ἡ περιεχομένη γωνία
 αὐτῶν τῶν λοιπῶν τοῦ τετράγωνου πλευ-
 ρῶν ὀρθὴ ἐστὶν. ὅπως εἶδει
 δεῖξαι.

Τ Ε Λ Ο Σ



ΟΝΟΜΑΤΑ

ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ ΗΡΩΝΟΣ, ΠΕΡΙ

ΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΟΝΟ-

ΜΑΤΩΝ.

Ονόματα γεωμετρικά.

Σ Ημῶν ἐστὶν ὁ μέρϑ ὕψος: ἡ πείρας ἀ-
 διάσπαστη: ἡ πείρας γραμμῆς. πέφυκε
 δὲ διανοία μόνη ὀπίκλητον εἶναι: ὡς κενὴ
 ἀμερές τε καὶ ἀμεγέθης τυγχάνον. Τοιούτου
 οὐκ αὐτὸ φασὶν εἶναι: οἷον ἐν χρόνῳ τὸ ἐκτετῆς:
 καὶ οἷον μονάδα θεσιν ἔχουσαν. Οἱ μὲν γὰρ τῇ
 ὕσσει, ταυτὸν τῇ μονάδι (ἀδιαίρετα γὰρ ἀμφω,
 καὶ ἀσώματα, ἢ ἀμέμετα) τῇ δὲ ὀπιφανείᾳ,
 καὶ τῇ ὕσει διαφέρει δῆλον, ἡ μὲν γὰρ μονὰς
 δεχὴ δριβμῆ: τὸ δὲ σημεῖον τῆς γεωμετρού-
 μενης ὕσεως ἀρχή. δεχὴ δὲ κατ' ἐκθεσιν, ὡς
 ὡς μέρϑ τῆς γραμμῆς: ὡς τῇ δριβμῇ μέ-
 ρϑ ἢ μονὰς: περὶ σεπτινομήνου δὲ αὐτὸ, κι-
 νηθὲντϑ γὰρ ἡ μάλλον νοηθέντος ἐν ῥῆσιν νοεῖ-
 ται γραμμῆς, ὅτε σημεῖον ἐστὶν γραμμῆς ἀρχὴ
 ὀπιφανείᾳ δὲ στερεῷ σώματιϑ.

Γραμμὴ δὲ ἐστὶ μήκος ἀπλάγης: ἡ τὸ πρῶ-
 τον ἐν μεγέθει, πλὴν ὑπόστασιν λαμβάνον: ἡ τὸ
 ἐν δια-

ἐν Διαιρετὸν τε καὶ διαιρετὸν. γίνεται δὲ ση-
μεῖα ρυέντ $\odot$ ἀνώθεν καὶ ὡ. ἐνοία τῇ κατὰ
τὴν συνέχειαν πείχεται· καὶ περατῆται ση-
μεῖοις· πέρας δὲ πεφασίας αὐτῇ γινομένη. λέ-
γεται δ' ἂν εἶναι γραμμὴ· τὸ διαρῆν δὸτὸ τῆς
σικίας τὴν ἡλιακὴν ἀκτίνα· ἢ δὸτὸ τῆς πεφω-
τισμένης μέρους τὴν σικίαν. καὶ ἐν ἡμετέροις ὡς
ἐν συνεχεῖ νοσημένη, τὸ χωρίζον τὴν πορφύ-
ραν δὸτὸ τῆς ἐρίου καὶ τὸ ἐριον, δὸτὸ τῆς πορφύ-
ρας. ἡ δὲ δὲ, καὶ τῇ συνεθεία τῆς γραμ-
μῆς ἐνοίαν ἔχουσαν· ὡς μήκος μόνον ἔχουσης
ἐκείν δὲ πλάτ $\odot$ ἢ βάθος· λέγουσαν γὰρ τὸ
πῆχος ἐστὶ κατὰ ὑπόθεσιν περὶ τῶν ρ · ἐκείν
δὸτὸ βλέποντες εἰς τὸ πλάτ $\odot$, ἢ τὸ πᾶχος.
ἡ δὲ δὲ δὲ τῶν ρ · τὸ μήκος μόνον, ἐκείν δὲ καὶ
τὸ πλάτ $\odot$ αὐτῶν πελυπταγμονῶντες· ὡς
γραμμικὴν ἡμῖν εἶναι καὶ τὴν ποιᾶν τὴν ἐξαρ-
ρίθμησιν· αὐτῆς καὶ διθυμείας καὶ καλεῖται.

Τῶν γραμμῶν αἰμὴν εἰσὶν ἀθεῖαι· αἱ δὲ
οὐ· καὶ τῶν μὴ ἀθεῖων, αἰμὴν εἰσὶν κυκλικαὶ
περιφερεῖαι ὀνομαζόμεναι, αἱ δὲ καὶ περὶ τὴν
εὐθεῖαν αἰμὴν ὡς γραμμὴ εἰσὶν· ἢ τις ἐξίσως πῆ-
ξιν αὐτῆς σημείοις κατὰ τὴν. ὀρθὴ ἔσται, καὶ οἷον
ἐπ' ἀκρον περὶ αὐτῆς. ὅτι τὰ πέρατα· ἢ πῆ-
ξιν

Ο Ν Ο Μ Α Τ Α

δύο δοθέντων σημείων, ἡ μετὰ ξὺ ἐλαχίστη
 ἔστιν: Ἰὼν τὰ αὐτὰ πέρατα ἔχουσιν γραμμῶν.
 καὶ ἥς πάντα τὰ μέρη, πᾶσι τοῖς μέρεσι,
 παρ' οἷώς ἐφαρμόζεν πέφυκε. καὶ τῶν πε-
 ράτων μόνοντων: καὶ αὐτὴ μόνον: οἷον ἐν τοῖς
 αὐτοῖς ὅππιδω σρεφομένη: καὶ πρὸς τὰ αὐ-
 τὰ πέρατα τὴν αὐτὴν αἰετὸν ἔχουσα. ὅτι δὲ
 μία εὐθεία, ὅτι δύο σχήματα πλάσι. Κυκλικὰ
 γραμμαὶ εἰσὶ, ὅσαι πρὸς ἐν σημείον πρὸς φερῶς
 ἐπ' ἄκρον περὶ μόνον: ἢ κύκλος, ἢ μέρη κύ-
 κλων ὁποῖα πλάσι: μόνον τῶν ἄλλων γραμμῶν
 σχήματ' ὅσαι πηλίκαι. Τῶν δὲ καμπύ-
 λων γραμμῶν ἔστιν μὲν τὸ πλεονέχον ἄπειρον.
 αἱ γὰρ ὅππιδω τὰ αὐτὰ μέρη τὰ κοίλα ἔχουσιν: αἱ
 δὲ ὅππιδω τὰ αὐτὰ μὲν ἔν κοίλῃ γραμμῇ ἔστιν:
 ὅταν δύο σημείων ληφθέντων αὐτῆς, ὁποῖαν
 ἔν: ἢ τὰ σημεία ἐπιζυγύσκει εὐθεία ἢ τοιαύτη
 αὐτὴ πίπτει τῇ γραμμῇ: ἢ ἔντος: ὅστις δὲ μη-
 δέποτε: ὅτι ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη κοίλῃ γραμμῇ
 ἔστιν ἢ ἔχ' ἔστω ἔχουσα. Ἐλξὶ δὲ γραμμῇ
 ἔστιν ἐν ὅππιδω μὲν, ἐὰν εὐθείας, μόνοντ'
 ἔτερες πέρατ'
 καὶ κινουμένης ἐπὶ τῇ ἐπι-
 πιδω ἔως εἰς τὸ αὐτὸ πάλιν ὁποῖα τὰς αὐτῆς
 φέρειται πὶ σημείον, ὁποῖο ἔμνοντ' πέρατ'
 τ'

τῷ αὐτῷ ἀρξικέντρου τῇ ὁθεΐᾳ, καὶ ἡ μὲν ἀπὸ ταύτης τῆς ὁθεΐας γινώσκῃ γραμμὴ: κύκλος ἐστὶν. ἡ δὲ ἀπὸ τῆς ὁθεΐας φερομένη σημεῖα: ἐλίζεσθαι. Εἰς παραλληλογραμμοὺς ὀρθογωνίους, ὑπόθεσις μιᾶς πλευρᾶς, τῶν πρὸς τῷ ὀρθῷ γωνίᾳ: πρὸς ἐνεχθέντι ἀπὸ παραλληλογράμμου: εἰς τὸ αὐτὸ πάλιν ὑποθέσασθαι ὅθεν ἤρξατο φέρεσθαι: ἄρα καὶ τὰ παραλληλογράμμω σημεῖον τι φέρηται καὶ αὐτῆς τῆς μὴ ὑπόθεσις παραλλήλου, δεξιὰ ὡς ἀπὸ ἑτέρου πέρατος: τὸ μὲν ὅθεν ληφθέν γῆμα, ὑπὸ τῆς παραλληλογράμμου κινήσεως: καλεῖται κύκλος ὁ κύκλος. ἡ δὲ ὑπὸ τῆς φερομένης σημεῖου γραμμῆς γίνεται ἐλίζεσθαι πᾶσι μέρους, ἐπὶ παντὶ φαρμόζει: ὅταν ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τὰ κοῖλα ἔχη.

Ἐπιφαίνεσθαι ὁ μῆκος, καὶ πλάτος μόνον ἔχει: ἡ πύξις σώματος καὶ ὅπως, ἡ τὸ ἐπὶ δύο διαστάσεων μέγεθος: ἡ τὸ παντὸς περιεῖν καὶ ἐπιπέδου γῆμα: καὶ δύο διαστάσεις μήκους καὶ πλάτους ἐπιφανοῦς πύξης. γίνεται δὲ ῥύσις ὑπὸ γραμμῆς, καὶ πλάτους, ἀπὸ δεξιᾶς ἐπὶ δεξιᾶς ῥύσεως. Καὶ τοῦτο ἀντιπαρὶ τῆς φαίνεσθαι, πᾶσι σώματι, καὶ

ΟΝΟΜΑΤΑ

πᾶσαι χροῖαι καθ' ὃ καὶ χροῖας ἐκάλουν, οἱ Πυθαγόρειοι τὰς ἐπιφανείας : νοῦτο δὲ καὶ παρ' ὁ μίγνυται ὁ αἶρ τῇ γῇ· ἢ ἄλλω στερεῷ σώματι· ἢ ὁ αἶρ ὑδατι· ἢ τ' ὑδὼρ πετηρίῳ ἢ ἄλλο πνιδοχαίῳ. Επίπεδοι ἐπιφανείαι εἰσιν, ἡ περὶ ἐξ ἴσου τῆς ἐφ' ἑαυτῆς Διθείας καίται. ὀρθὴ ἔσται δασυπλευρμένης· λεῖν ἐπὶ δὲ αὐτῇ δύο σημείων ἀψήται Διθεῖα· καὶ ὅλη αὐτὴ κατὰ πάντα τρόπον πασιόως ἐφαρμόζεται· τῷτ' εἰσιν ἡ κατὰ ὅλην Διθεῖαν ἐφαρμόζουσα· καὶ ἡ ἐλαχίστη πεσὼν τὰ αὐτὰ περὶ αὐτὰ ἐχούσων ἐπιφανείων· καὶ ἡς πάντα τὰ μέρη ἐφαρμόζειν πέφυκε. Οὐκ ἐπίπεδοι ἐπιφανείαι εἰσιν· αἱ μὴ ἔτιως ἐχούσαι· τῷτ' εἰσιν αἱ μὴ πάντῃ κατὰ Διθεῖαν φερόμεναι γραμμαί· ἐχούσῃ δὲ πινὰ ἀνάμεικται· καὶ ἐκ ὀρθαί δι' ὅλου.

Σπεριὸν ἐστὶ σῶμα τὸ μήκος καὶ πλάτος. Ἐκβάθου ἔχον· ἡ τὸ τῆς τρισὶ Διαιτάσεσι κατὰ ἡμῖνον. καλουῦνται δὲ στερεὰ σώματα· καὶ οἱ τόποι. σῶμα μὲν ἔν μαθηματικόν ἐστι τὸ τριχῇ Διαιτάτον. σῶμα δὲ ἀπλῶς τὸ τριχῇ Διαιτάτον μὲν ἀνιτυπίας. περὶ αὐτῆς δὲ πάντῃ σπεριὸν ἐπὶ ἐπιφανείων. γίνεται ἐπιφανείας ἀπὸ τοῦ πρώτου ἐπὶ τὸ ἐπίσω ὀρεχθείσης.

Γωνία

Γωνία ἐστὶ συναγωγή πρὸς ἐν σημεῖον ὑπὸ κεκλασμένης ὀρθογωνίας, ἢ γραμμῆς ἀποπελασμένη. κεκλασμένη δὲ λέγεται γραμμὴ, ἢ τις ἐκβαλλομένη συμπίπτει αὐτῇ καὶ ἐαυτῇ. Τῶν δὲ γωνιῶν αἱ μὲν οἷσιν ὀπίπεδοι αἱ δὲ στερεαί. καὶ τῶν ὀπίπιδων, ἢ στερεῶν αἱ μὲν οἷσιν εὐθύγραμμοι αἱ δὲ ὄ. Ἐπίπεδον μὲν ἐν ἐστὶ κωνὴς γωνία, ἢ ἐν ὀπίπιδῳ δύο γραμμῶν ἀπομονῶν ἀλλήλων, καὶ μὴ ἐκ' ὁμοίας κειμένων πρὸς ἀλλήλας τῶν γραμμῶν κλίσεις. Εἰσὶ δὲ οὐ συνεχεῖς ἀπομονῶν ἀλλήλων αἱ γραμμαί: ὅταν ἡ ἐτέρα πρὸς ἐκβαλλομένη κατὰ τὴν ἐαυτῆς συνέδωσιν: μὴ πίπτει κατὰ τῆς ἐτέρας. Καὶ ἄλλως δὲ. Ἐπίπεδον ἐστὶ γωνία, γραμμῆς ἐν ὀπίπιδῳ πρὸς ἐνὶ σημείῳ κλάσις. ἢ συναγωγή, πρὸς ἐν σημεῖον ὑπὸ κεκλασμένης γραμμῆς. ὀπίπεδον δὲ ὀρθόγραμμον καλεῖται γωνία: ὅταν αἱ περιέχουσι αὐτὴν γραμμαὶ ὁμοίαι ᾖσιν. ὀπίπεδος δὲ γωνία ἢ ἐν ὀπίπιδῳ πρὸς ἀλλήλας συνέδωσις τῶν γραμμῶν. ἢ γραμμῆς ὁμοίας πρὸς ἐνὶ σημείῳ κλάσις. ἔτα γὰρ γλῶσσιναι ἐκάλεον οἱ Πυθαγόρει τὰς γωνίας. Τῶν ἐν τοῖς ὀπίπιδοις ἐκ ὀρθογράμ-

ΟΝΟΜΑΤΑ

μων γωνιῶν πλῆθος ἐστὶν ἄπειρον. τῶν δὲ ἐν τοῖς ὀρθογώνιοις ἐυθυγράμμων γωνιῶν εἶδη ἐστὶ τρία. αἱ μὲν γὰρ ὀρθαί, αἱ δὲ ὀξείαι, αἱ δὲ ἀμβλείαι καλεῦνται. Ὀρθὴ μὲν ἐν ἐστὶ γωνία, ἢ τῇ ἀντικείμενῃ ἴση. ἀντικείμεναι δὲ εἰσὶν αὖτε ποιεῖς ὁθεῖαι ἐπ' ὁθεῖαν σταθεῖσαι. ὅταν γὰρ ὁθεῖαι ἐπ' ὁθεῖαν σταθεῖσαι. τὰς ἐφεξῆς γωνίας, ἴσας ἀλλήλας ποιεῖ. ὀρθὴ ἐστὶν, ἐκτὸς τῶν ἴσων γωνιῶν. Ὀξεία γωνία ἐστὶν ἢ ἐλάσσων ὀρθῆς. Ἀμβλεία δὲ ἢ μείζων ὀρθῆς. Ὅταν γὰρ ὁθεῖαι, ἐπ' ὁθεῖαν σταθεῖσαι γωνίας ἀνίστους ποιῇ ἢ μὲν ἐλάττω καλεῖται ὀξεία, ἢ δὲ μείζων ἀμβλεία. Πᾶσαι μὲν ἐν ὀρθῇ, πάση ὀρθῇ ἐστὶν ἴση. ἔκτε δὲ πᾶσαι ὀξείαι, πάση ὀξείᾳ ἐστὶν ἴση. ἔδὲ πᾶσαι ἀμβλείαι, πάση ἀμβλείᾳ ἐστὶν ἴση. Εὐθείας γὰρ ἐπ' ὁθεῖας σταθεῖσης, καὶ ἐκκλινάσης ἀπὸ τῆς ὀρθῆς μέχρι τῆς ἐλάττωται ἢ ὀξεία: ἕως συνελθίσωσιν αὐτὰς αἱ ὁθεῖαι: καὶ ἐφίκωνται ἀλλήλων. ὁθεῖας δὲ ἐπ' ὁθεῖας σταθεῖσης, καὶ ἀπὸ κλινάσης ἀπὸ τῆς ὀρθῆς γωνίας μέχρι τῆς μείζων γίνεται ἢ ἀμβλεία: ἕως ἂν ἐπιτάσσεται ἢ κάθετος ἐπ' ὁθεῖας: καὶ συνεχῆς γένηται τῇ ἐπὶ ἀντικείμενῃ.

Ἡ γὰρ ὀρθὴ γωνία, καὶ τὸ νῦν, καὶ ἡ μονάς,

ὁμοίως

ὁμοίως ἔχουσιν. ἢ τε γὰρ ὀρθὴ γωνία αὐτὴ ὀρίσκει
ἢ αὐτὴ μένεται: τῆς ὀξείας καὶ ἀμβλείας ἐπ'
ἀπὸρον μετακινήσεως: ἢ τι μονάς μὲν, αὐτὴ ὀ-
ρίσκει: ἀδὲ μερισμὸς πρὸς αὐτὴν, καὶ ἡ συνθέ-
σις: καὶ τὸ νῦν δὲ καὶ αὐτὸ ὥρισκει: ὁ δὲ παρελη-
λυθὼς, καὶ ὁ μέλλων, ἐπ' ἀπὸρον.

Στερεὰ γωνία καὶνῶς μὲν εἰν ὀπιφανείας
ὀπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τὰ κοῖλα ἔχουσης πρὸς ἐ-
κὶ σημείῳ συναγωγῇ. Καὶ ἄλλως δὲ στερεὰ γω-
νία εἰν: ἢ ὑπὸ πλάνων ἢ δύο ὀπιπέδων γω-
νιῶν πρὸς κορυφῇ. ἢ συναγωγῇ στερεῶν, ὑφ' ἐ-
νὸς σημείου κεκλασμένη ὀπιφανεία, πρὸς
γραμμῇ: ἢ πρὸς ἐκβαλλομένῃ, οὐ συμπίπτει
αὐτὴ κατ' ἑαυτῆς. Νοῆται δὲ ἐκβαλλομέ-
νη: ὅταν μὴ φαίνεται μὴ ἐκβαίνουσι ὅλον αὐ-
τῆς τὸ μήκος. ὁμοίως καὶ ὀπίπεδον ἐκβαλλό-
μενον νοεῖται. Ἰδίως δὲ εὐθύγραμμοι στερεὰ
γωνία καλεῖται: αἱ δὲ ὀπιφανεῖαι αἱ πρὸς
τὰς γωνίας, ὑπὸ γωνιῶν εὐθυγράμμων πε-
ριέχονται: ὡς αἱ τῶν πυραμίδων, καὶ αἱ τῶν τε-
ρεῶν πολυέδρων, καὶ αἱ τῆς κύβου. ὅτι εὐθύ-
γραμμοι δὲ, αἱ μὴ ἄτως ἔχουσι, ὡς αἱ τῶν
κῶνων.

Σχημα εἰς τὸ ὑπὸ πρὸς ἢ πρὸς ὀρίων πε-

ΟΝΟΜΑΤΑ

περὶ ὁρίων: ἢ τὸ πέρασι, ἢ πέρασι συγκλειόμε-
 νον τούτῳ μὲν ἔν τῷ ἀσχηματισμῷ. λέγεται
 δὲ ἄλλως. σχῆμα, πέρασι συγκλείειν διὰ τὸ
 σχηματίζοντος. Εἴρηται δὲ τὸ σχῆμα παρὰ τὸ
 σῆμα, ὃ ἐστὶ συγκλειόμενον ἢ συγκλείειν. Δια-
 φέει δὲ τὸ περιέχων, πέρατος: πέρασι μὲν γὰρ
 καὶ τὸ σημειῖον: οὕτω δὲ σχῆμα ὡς ποιητικόν.
 Οροι δὲ σχημάτων εἰσὶν, αἵ τε ὀπίφαναι
 καὶ γραμμαί. κάκλῃται δὲ ὅροι παρὰ τὸ ὀ-
 ρίζειν μέχρι πᾶς τὸ σχῆμα: τῶν ἐστὶ τὰ τέλη
 τῶν σχημάτων καὶ τὰ πέρατα δέκνυνται. Τῶν
 ὅ σχημάτων, ἃ μὲν ἐστὶν ὀπίπεδα, ἃ δὲ στερεά:
 ὀπίπεδα μὲν ἔν ἐστὶ, τὰ ἐν τῷ αὐτῷ ὀπίπεδῳ
 πᾶσιν ἔχοντα τὰς γραμμάς. στερεά δὲ, τὰ μὴ
 ἐν τῷ αὐτῷ ὀπίπεδῳ πᾶσιν ἔχοντα τὰς
 γραμμάς. τῶν ἐν ταῖς ὀπίφαναις σχημά-
 των, ἃ μὲν ἐστὶν ἀσιώθετα: ἃ δὲ σιωθέτα. ἀσιώ-
 θετα μὲν ἔν ἐστὶ τὰ μὴ συγκείμενα ἐκ γραμ-
 μῶν. σιωθετα δὲ τὰ ἐκ γραμμῶν συγκείμενα:
 τῶν σιωθέντων σχημάτων, τῶν ἐν πᾶσι ὀπίφα-
 ναις: ἃ μὲν ἐστὶν ἐξ ὁμογενῶν σιωθετα: ἃ δὲ
 ἐξ ἀνομογενῶν. οἷον οἱ λεγόμενοι τμήεις τῶν
 κύκλων: καὶ τὰ ἡμικύκλια, καὶ αἱ ἀψίδες, καὶ
 τὰ μείζονα τμήματα τῶν κύκλων: λέγουντο

δ' αὖ

δι' αὐτοὶ μινώσκει, καὶ αἰετὶ φάται, καὶ τὰ πε-
ραπλήσια.

Κύκλος ἐστὶ τὸ ὑπὸ μιᾶς γραμμῆς πε-
ριεχόμενον ὀπίπεδον. τὸ μὲν ἂν σχῆμα κα-
λεῖται κύκλος, ἡ δὲ περιέχουσα αὐτὸ γραμ-
μὴ, περιφέρεια: πρὸς αὐτὴν ἀπ' ἐνὸς σημείου
τῶν ἐν τῇ τῷ σχήματι κειμένων: πᾶσαι αἱ
περαπλήσια ὁθεῖαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσιν. Ε-
ὰν μὲν ἂν ἐν τῷ αὐτῷ ὀπίπεδῳ τὸ σημεῖον ᾗ:
κέντρον καλεῖται: ἐὰν δὲ μὴ ᾗ ἐν τῷ αὐτῷ ὀ-
πίπεδῳ πόλος: ὡς ἔχει ὅτι τῶν ἐν ταῖς σφαί-
ραις κύκλων. Λέγεται δὲ καὶ ἄλλος κύκλος
γραμμὴ, ἡ τις πρὸς πάντα τὰ μέρη: ἴσα ποιῶ-
ν διὰ σχήματα. γίνεται δὲ κύκλος ἐπ' ἂν ὁθεῖα
ἐν τῷ αὐτῷ ὀπίπεδῳ ὑπάρχουσα: μόνον τὸ
τῷ ἐνὸς πέρατι τῷ ἑτέρῳ περιεχθεῖσα
εἰς τὸ αὐτὸ πάλιν ἀποκατασταθῇ: ὅθεν ἤρξατο
φέρεισθαι.

Διάμετρος δὲ ἔστω κύκλου ἐστὶν ὁθεῖα τις,
διὰ τὸ κέντρον ἡ γωμνή, καὶ περιγεωμνή ἐφ'
ἐκάπερ τὰ μέρη, ὑπὸ τῆς ἑστω κύκλου περιφε-
ρείας: ἡ τις καὶ διχαὶ τέμνει τὸν κύκλον: ἡ ὁ-
θεῖα διὰ τὸ κέντρον, ἕως τῆς περιφερείας δι-
ηγωμνή. Ημικύκλιον ἐστὶ τὸ περιεχόμενον

ΘΝΟΜΑΤΑ

γῆμα ὑπὸ πηγῆς διαμέτρου, καὶ τῆς ἀπολαμ-
 βανομένης ὑπ' αὐτῆς περιφερείας: ἢ τὸ ὑπὸ
 τῆς διαμέτρου καὶ κύκλου: καὶ περιφερείας
 περιεχόμενον γῆμα. Κοινῶς τμήμα κύκλου
 εἰσιν, ἂν τε μείζον, ἂν τε ἔλαττον ἢ μυκικλίσ, τὸ
 περιεχόμενον γῆμα, ὑπὸ διθείας, καὶ κύκλου
 περιφερείας. Ἐν τμήματι γωνία εἰσιν. ὅταν
 ᾖ τῆς περιφερείας τῶ τμήματι Θ ληφθῇ
 ἡ σημεῖον: ἀπὸ δὲ τῆς σημεῖου, ὅτι τὰ πέρα-
 τα τῆς διθείας ὅτι ζυχθῶσιν διθείαι, ἢ περι-
 εχόμενη γωνία ὑπὸ τῶν ὅτι ζυχθῶσιν εὐ-
 θειῶν. Τομῶς δὲ κύκλου εἰσι τὸ περιεχόμε-
 νον γῆμα, ὑπὸ δύο μὲν διθειῶν, μίας δὲ πε-
 ριφερείας. ἢ τὸ περιεχόμενον γῆμα ὑπὸ τῶν
 τῶν τυχεῶν ἐν κύκλῳ, πρὸς τῷ κέντρῳ γω-
 νίαν περιεχουσῶν: καὶ τῆς ἀπολαμβανομέ-
 νης ὑπ' αὐτῶν περιφερείας. Πᾶσι περι-
 φερεία, καὶ ἂ μὲν τῶ πρὸς τὸ περιεχόμενον
 χωρίον νοήσιν: καὶ ἂ καλεῖται: καὶ ἂ δὲ τῶ
 πρὸς τὸ περιέχον κυρτῇ. Μένισα Θ εἰσι
 τὸ περιεχόμενον γῆμα ὑπὸ δύο περιφερειῶν
 ἢ δύο κύκλων μὴ περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον ὄντων:
 ὑπεροχὴ καὶ κυρτῆς: ἢ τὸ περιεχο-
 μένον ὑπὸ δύο περιφερειῶν ὅτι τὰ αὐτὰ
 μέρη

μέρη τὰ κῆλα ἐχουσῶν. Σπφαίη δ' ἐστὶν
τὸ περιεχόμενον σχῆμα ὑπὸ τῶν δύο κυρτῶν
περιφερειῶν: ἡ δὲ δύο κύκλων περὶ τὸ αὐτὸ κέν-
τρον ὑπεροχῇ. Πέλεκis δ' ἐστὶ τὸ περιεχόμε-
νον ὑπὸ πρῶτων περιφερειῶν: δύο καίλων, καὶ
δύο κυρτῶν. καθόλου ὅτι πᾶν, ἀπεληλητὸν
ἐστὶ τὸ πλῆθος τῶν ἐν τοῖς ὀππιδόis περι-
φερειῶν σχημάτων: εἰ γὰρ μᾶλλον τῶν ἐν ταῖς
ὀππιδόis.

Τῶν ἐν τοῖς ὀππιδόis ὀρθογράμμων σχη-
μάτων: ἀπὸ ἐστὶ τρίγωνον, ἡ τριπλευρον: ἀ δὲ
τετράγωνον, ἡ τετράπλευρον: ἀ δὲ ἐπ' ἀπὸ
πολύγωνον ἡ πολὺπλευρον. Τρίγωνον ἐστὶ σχῆ-
μα ὀππιδόν. ὑπὸ τριῶν ὀρθῶν περιεχο-
μένον: τρεῖς ἔχον γωνίας. Τῶν δὲ τριγώ-
νων ἡ τριπλευρῶν σχημάτων, τὰ ἑρικώτατα
εἶδη ἐστὶν ἑξ: ὑπὸ μὲν γὰρ τῶν πλευρῶν: ἀ μὲν
καλῶνται ἰσόπλευρα, ἀ δὲ ἰσοσκελῆ, ἀ δὲ
σκαληνὰ. ἀπὸ δὲ τῶν γωνιῶν. ἀ μὲν ἐστὶν ὀρ-
θογώνια, ἀ δὲ ὀξυγώνια, ἀ δὲ ἀμβλυγώ-
νια. ὀππὶ μὲν τῶν ὀρθογωνίων, δύο γίνηται
ἰσοσκελες, καὶ τὸ σκαληνόν. ἀ δὲ γὰρ ὀρθογώ-
νιον ἰσόπλευρον: τὰ δὲ ἄλλα τρίγωνα καὶ μὴ
ὀρθογώνια πάλιν τὰ ἰσοπλεύρου οὐ δύο μό-

ΟΝΟΜΑΤΑ

τον ἔχει φύσις: ἀλλὰ καὶ ἐπ' ἄπτερον χωρεῖ.
 Ἰσόπλευρον μὲν ἔστιν ὅταν τρεῖς ἴσας ἔχει
 πλευρὰς, ἢ γωνίας. Ἰσοσκελὲς δὲ, ὅταν τὰς
 δύο μόνας ἴσας ἔχει πλευρὰς. Σκαληνὰ δὲ
 ὅσα τὰς τρεῖς ἀρίστας ἔχει πλευρὰς. Ὀρθο-
 γώνιον δὲ ἐστὶ, τὸ μίαν ἔχον ὀρθὴν γωνίαν.
 Ὄξυγώνιον δὲ τὸ τὰς τρεῖς ὀξείας ἔχον. Ἀμ-
 βλυγώνιον δὲ τὸ μίαν ἔχον ἀμβλυαίαν γω-
 νίαν. τὰ μὲν ἔνι ἰσόπλευρα πάντα ὀξυγώνια
 ἐστὶ τῶν δὲ ἰσοσκελῶν, καὶ σκαληνῶν: ἀ μὲν ἐστὶ
 ὀρθογώνια, ἀ δὲ ὀξυγώνια, ἀ δὲ ἀμβλυγώ-
 νια.

Τετράπλευρον ὅτι πεδον ἐστὶ γῆμα, τὸ
 ἐκ πλάγιων ὀρθῶν περιεχόμενον: ποτά-
 ρας ἔχον γωνίας. Τῶν δὲ τετραπλῶν
 σχημάτων, ἀ μὲν ἐστὶ ἰσόπλευρα: ἀ δὲ ὅ. τῶν
 δὲ ἰσοπλῶν, ἀ μὲν ὀρθογώνια, ἀ δὲ ὅ. τὰ
 μὲν ἔνι ὀρθογώνια ἰσόπλευρα: τετράγωνον
 καλεῖται. τὰ δὲ ὀρθογώνια μὲν μὴ ἰσόπλευ-
 ρα δὲ: ἑτερομήκη καλεῖται. τὰ δὲ ἰσόπλευ-
 ρα μὲν μὴ ὀρθογώνια δὲ: ῥόμβοι. τὰ δὲ μήτε
 ἰσόπλευρα, μήτε ὀρθογώνια, τὰς δὲ ἀπεναν-
 τίον πλευρὰς καὶ γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ἔ-
 χοντα ῥόμβοι δὲ καλεῖται. Ἐπὶ τῶν τετρα-
 πλῶν

πλάγιον, ἀλλ' καλεῖται παραλληλόγραμ-
 μα· ἂν δὲ εἰ παραλληλόγραμμοι. παραλληλό-
 γραμμοι μὲν ἔν τὰ τὰς ἀπεναντίον πλευρὰς
 παραλλήλας ἔχοντα· οὐ παραλληλόγραμμοι
 δὲ τὰ μὴ οὕτως ἔχοντα. Τῶν δὲ παραλλη-
 λογράμμων, ὀρθογώνια ὅσα περιεχέσθαι λέ-
 γεται ὑπὸ τῶν τῷ ὀρθῷ γωνίᾳ περιεχου-
 σῶν ὀρθῶν. ἐστὶ γὰρ μέγιστον τῶν ὑπὸ τῶν ἴ-
 σων πλευρῶν περιεχόμενον παραλληλό-
 γραμμον, τὸ ἐν ὀρθῇ γωνίᾳ. ἀπέρων γὰρ ὀπι-
 νοῦται, παραλληλόγραμμοι δὲ ὅσοι ὑπὸ τῶν
 περιεχομένων πλευρῶν διάφορα κατὰ τὸ
 ἑμβαδὸν τυγχάνοντα, ἐλάττωνα γίνονται· τὸ
 δὲ ἔχον τῷ ὀρθῷ μέγιστον. Ἐπεὶ ἔν ἐλάτ-
 τως αἰεὶ ὀξεῖται ὀρίσκονται· οἱ βουλόμενοι ἀ-
 ραμετρῆν τὰ ποιεῖται σχήματα· ὅρον ὑπό-
 σαισι εἶναι, τὸν περὶ τῷ ὀρθῷ γωνίᾳ λόγον.
 Πάντες δὲ παραλληλογράμμοι, τῶν περὶ τῷ
 διαμέτρῳ αὐτῶν παραλληλογράμμων· ἐν ὁ-
 ποιῶν, σὺν τοῖς δύοσι παραπληρώμασι, γνώ-
 μων καλεῖται. Καθόλου δὲ γνώμων ἐστὶν παῦ-
 ῖ προσλαβὼν ὅποιον ὀρθὸν ἢ σχῆμα ποι-
 οῖ τὸ ὅλον ὁμοιον ὁ προσείληφεν. Τῶν παρὰ
 τὰ ἀρηιμένα τετραπλάριων ἂν μὲν τεταπέζια

ΟΝΟΜΑΤΑ

λέγεται, ἃ ἵ τραπεζοειδῆ. τραπέζια μὲν ἔν-
 τιν' ὅσα μόνον δύο παραλλήλους ἔχει πλευράς·
 τραπεζοειδῆ ὅσα μὴ ἔχει παραλλήλους πλευ-
 ράς. Τῶν δὲ τραπεζίων ἃ μὲν ἔστιν ἰσοσκελῆ,
 ἃ δὲ σκαληνὰ· ἰσοσκελῆ μὲν ἔν τιν', ὅσα ἴσας
 ἔχει τὰς μὴ παραλλήλους. Σκαληνὰ δ' ὅσα
 ἀνίσους ἔχει τὰς μὴ παραλλήλους.

Πολύπλευρα ἑπτάπλευρα σχήματα ἐστὶ τὰ
 ὑπὸ πλόνων, ἢ πιαράων ὀρθῶν περιεχό-
 μενα· οἷον πεντάγωνια, καὶ τὰ ἑξῆς πολύγω-
 να ὑπὸ ἀπύρον περιόντα.

Βάσις λέγεται ἑπτάπλευρον χωρὶς γραμμῆς ἣ
 ὥσκει κάτω νοημένη. πλευρὰ δὲ μία τῶν
 τῶν σχῆμα περιεκλεβασῶν. Διαγώνιος δὲ ἡ ἀπὸ
 γωνίας εἰς γωνίαν ἀγομένη ὀρθῆα. Κά-
 θετ' ὅ δὲ ἐστὶν ἡ ἀπὸ σημείου εὐθεῖα ἐπὶ ὀρθῇ
 ἀνηγμένη. Κάθετ' ὅ δὲ πρὸς ὀρθᾷ λέγε-
 ται, ἡ ὀρθᾷ ποιῶσα τὰς ἐφεξῆς γωνίας τῇ ἐ-
 φεσηκῆα ὀρθῆα. Παράλληλοι δὲ καλεῖνται
 γραμμαὶ ἀσύμπτωτοι· ὅσαι ἐν τῷ αὐτῷ ἑπτά-
 πλῆρω ἔσται, καὶ ἐμβαλλόμεναι ἐφ' ἐκάτερα τὰ
 μέρη, ἑπτά μὴ δετέρα συμπίπτουσιν ἀλλήλαις·
 αἱ μὴ τε συνδύσται, μὴ τε ἀποन्दύσται ἐν ἑπτά-
 πλῆρω· ἴσας δὲ ἔχουσιν τὰς καθέτους πρὸς αὐτὰς.

τὰς

πὰς ἀγομένης ἀπὸ τῶν τῆς ἐτέρας σημείων ἔπι τὴν λοιπὴν. Οὐ παράλληλοι δὲ ὄνθαι εἰσιν, ὅσην συνῶσται μείζους αἰ τὰς καθέτης πιᾷσι. Τριγώνῳ ὅψις καλεῖται, ἡ ἀπὸ τῆς κορυφῆς ἔπι τὴν βάσιν καθέτη ἀγομένη.

Ονόματα στερωμετρικὰ.

Τῶν ἐν τοῖς στερεοῖς σχήμασι ἑπιφανείων αἱ μὲν ἀσιώθετι λέγονται, αἱ δὲ σιώθετι. ἀσιώθετι μὲν ἔν τῶν στερεῶν εἰσιν ὅσην ἐκβαλλόμενα αὐτὰ καὶ ἑαυτὰς πύπλῃσιν αἶον ἢ τῆς σφαῖρας. σιώθετι δὲ ὅσην ἐκβαλλόμενα, τέμνῃσιν ἀλλήλας. τῶν δὲ σιωθέτων, αἱ μὲν ἐξ ἀνομογενῶν εἰσὶ σιώθετι, ὡς αἱ τῶν κωνικῶν, καὶ κυλίνδρων, καὶ τῶν τέτοις ὁμοίων. ἐξ ὁμογενῶν δὲ αἱ τῶν στερεῶν ὀρθογώνιων. καὶ ἐτέραι δὲ διαίρεσιν τῶν ἐν τοῖς στερεοῖς σχήμασι ἑπιφανείων, αἱ μὲν εἰσιν ἀπλαῖ, αἱ δὲ μικταί. ἀπλαῖ μὲν ἔν εἰσιν ἐν τοῖς στερεοῖς ἐπιπέδοις ἢ σφαίρικῃ· μικταὶ δὲ ἢ περικωνικῇ ἢ κυλινδρικῇ, καὶ αἱ ταύτης ὁμοίαι. αὐταὶ μὲν οὖν μικταὶ ἐξ ἐπιπέδου, καὶ περικωνικῆς.

Φερείας:

ΟΝΟΜΑΤΑ

περιφερίας: αἱ δὲ ἀσφραγῆ, μικλαὶ εἰσὶν ἐκ δύο
 περιφερειῶν: καὶ ἄλλαι δὲ πλείους εἰσὶν, ὥ-
 σπερ σιῶθετοι, ἔτω καὶ μικλαὶ ἄπφοι. Τῶν
 ἐν ταῖς περιείοις σχήμασι γραμμῶν, αἱ μὲν ἀ-
 πλάι, αἱ δὲ μικλαὶ. ἀπλάι μὲν ἑναῖτε ὁθῆαι, καὶ
 περιφερεῖς: μικλαὶ δὲ αἱ τε κωνικὴ ὁ ἀσφραγῆ.
 καὶ αὐταὶ μὲν τεταγμένα εἰσὶν: τῶν δὲ ἀπακίων,
 πλῆθος ἄπφρον ἐστὶν ὡς καὶ τῶν σιῶθετων.

Σφαῖρα ἐστὶ σχῆμα περιὸν ὑπὸ μιᾷ ἐπι-
 φανείας περιεχόμενον: πρὸς ἑνὶ ἀφ' ἑνὸς ση-
 μείου, τῶν ἐντὸς καὶ μέσῳ τῷ σχήματι καὶ
 μένων, πᾶσι καὶ περὶ ἀπὸ πᾶσι ὁθῆαι ἴση
 ἀλλήλαις εἰσὶν. ἡ σχῆμα περιὸν ἄκρως ἐρόγ-
 γυλον, ὥστε ἐκ τῶν μέσων πᾶν τὴ ἴσας ἔχον τὰς
 ἀποστάσεις. ὅταν γὰρ ἡμικυκλίς, ἐκδομένη τῇς
 διαμέτρου πρὸς ἐκτείναν τὸ ἡμικύκλιον εἰς τὸ
 αὐτὸ πάλιν ἀποκατασταθῇ: ἡ μὲν γινομένη
 ἐπιφανεία, ὑπὸ τῆς τῇ ἡμικυκλίς περιφε-
 ρείας σφαιρικῇ ἐπιφανείᾳ καλεῖται, τὸ δὲ
 περικυβέν περιὸν σχῆμα, σφαῖρα. τὸ δὲ
 μέσον τῆς σφαῖρας κέντρον αὐτῆς καλεῖται.
 ἐστὶ δὲ ταῦτο τὸ τοῦ τῇ ἡμικυκλίς κέντρον.
 Ἡ δὲ διάμετρος τῆς σφαῖρας ἄξων καλεῖ-
 ται: καὶ εἰς ἑνὶ ὁθῆά τις, διὰ τῶν κέντρων ἡ γόμε-
 νη, καὶ

τη, καὶ περατωμένη ἐφ' ἑκάτερα τὰ μέρη τῆς σφαῖρας ἀμετακίνητος: πρὶν ὡς ἡ σφαῖρα κινεῖται καὶ σφίγγεται. Τὰ τῷ ἄξωνος ἀκροῖ πόλοι καλεῖνται. Εὰν δὲ ἡ σφαῖρα τμηθῇ: ἡ τομὴ κύκλος γίνεται. Κύκλος δὲ πόλος ἐστὶ τῇ σφαίρᾳ λέγεται: σημεῖον δὲ τῆς δριφτανείας τῆς σφαῖρας: ἀφ' οὗ παύσεται αἱ περιστροφῆς ἐνθεῖαι, πρὸς τὴν περιφερείαν, ἴσας ἀλλήλαις εἰσιν. Ὡστερ δὲ τῶν ἐπιπέδων ἴσως μέτρων σχημάτων: μείζων ἐστὶ κύκλος: ὅπως τὸ τῆς σφαῖρας σχῆμα πάντων τῶν στερεῶν ἴσως μέτρων μέγιστον ἐστὶ, διὸ καὶ περιεκτικὸν τῶν ἄλλων ἀπάντων ἐλαττόνων.

Κῶν ἐστὶ σχῆμα στερεὸν βάσιν μὲν ἔχον κύκλον: συναγόμενον δὲ ὑφ' ἐν σημεῖον. εἰ δὲ γὰρ ἀπὸ μείωρου σημείου δὴτὶ κύκλος περιφερείας: ὁθεῖά τις προβληθῇ: καὶ περιεγεχθεῖται εἰς τὸ αὐτὸ πάλιν διπλοῦσθαι: τὸ διπλοῦσθαι δὲν σχῆμα κῶν γίνεται. Καὶ ἄλλως. Εὰν ὀρθογωνίαις τριγώνων, ὁμοῦς μιᾶς τελευτᾶς, τῶν πρὶν τὴν ὀρθὴν γωνίαν, περιεγεχθὲν τρίγωνον σχῆμα: εἰς τὸ αὐτὸ πάλιν διπλοῦσθαι: οὕτως ἢ ἔξωθεν φέρεται τὸ περιεγεχθὲν σχῆμα: ἢ μὲν γινόμενὸν ἀπὸ τῆς ὑποτέλεισης

ΟΝΟΜΑΤΑ

τῷ τριγώνου πλάρᾳ περιχῆ: ἐπιφανεία
 κωνική καλεῖται: τὸ δὲ περιλειφθὲν σχῆμα
 στερεόν, κῶν Θ . Βάσις δὲ κῶν ὁ κύκλ Θ κα-
 λεῖται. Κορυφή δὲ κῶν τὸ σημεῖον. Ἀξὼν δὲ
 κῶν, ἡ ἀπὸ τῆς κορυφῆς, ὅπῃ τὸ κέντρον τοῦ
 κύκλου ἐπιζυγυιδίη δίδεται: τῷτ' ἐστὶ ἡ μέ-
 νουσα. Ἰσοσκελὴς δὲ κῶν Θ λέγεται, ὁ τῷ τρι-
 γώνου ἴσας ἔχων τὰς πλευράς. Σκαληνὸς
 δὲ κῶν Θ ὁ ἄνιστος λέγεται. Ὀρθογώνι Θ δὲ
 κῶνος ἐστίν, ἐὰν ἡ μένουσα πλάρᾳ, ἴση ᾖ τῇ πε-
 ριφερομένη: ἡ δ' ἐτμηθέντ Θ διὰ τῷ ἄξωνος,
 τὸ γρόμιον ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ σχῆμα τριγώ-
 νον ὀρθογώνιον γίνετα. Ὀξυγώνιος δὲ κῶν Θ
 ἐστίν, ὅς ἡ μένουσα μείζων ἐστὶ τῆς περιφερομέ-
 νης: ἡ δ' ἐτμηθέντ Θ τὸ γρόμιον σχῆμα τρι-
 γωνον ὀξυγώνιον γίνετα. Ἀμβλυγώνιος δὲ
 κῶν Θ ἐστίν, ὅς ἡ μένουσα πλάρᾳ, ἐλάττω ἐστὶ
 τῆς περιφερομένης: ἡ δ' ἐτμηθέντ Θ τὸ γρό-
 μιον ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ σχῆμα, τριγωνον ἀμ-
 βλυγώνιον γίνετα. Κόλκρ Θ δὲ κῶνος κα-
 λεῖται, ὁ τῷ κορυφῷ κελοδοθεῖσιν ἐσχηκός:
 ἡ δὲ ἐπιφανεία τῷ κῶν: ἄλλως μὲν κυρτὴ
 καλεῖται: ἄλλως δὲ κοίλη. Τεμνόμι Θ δὲ
 κῶν Θ διὰ τῆς κορυφῆς τριγωνα πειρὶ τῷ
 τομῆ:

πρὸς: παραλλήλως δὲ τῇ βάσει τμηθεὶς, κύκλον: μὴ παραλλήλως δὲ τμηθεὶς ἄλλοτε γένεσθαι γραμμῆς ὃ καλεῖται κώνωσις. Τῶν δὲ τῶν κώνωσις, ἡ μὲν καλεῖται ὀρθογώνιος: ἡ δὲ ἀμβλυγώνιος, ἡ δὲ ὀξυγώνιος. ὀρθογώνιος μὲν ἔνῃ ἑαυτῇ συνάπῃσιν καὶ ποιῶσι σχῆμα θυροειδές: καλεῖται δὲ ὑπὸ τῶν καὶ ἑλλειψίς: ἡ δὲ τῶν ὀρθογώνιος καλεῖται παραβολή: ἡ δὲ τῶν ἀμβλυγώνιος ὑπερβολή.

Κύλινδρος ἐστὶ σχῆμα στερεόν, ὃς νοεῖται ἀποτελεσθαι, παραλληλογράμμου ὀρθογωνίου, περὶ μίαν τῶν πλευρῶν μένουσιν γραφέντος: καὶ ἀποκατασθέντος ὅθεν καὶ ἤρξατο φέρεσθαι. ἡ δὲ μένουσα εὐθεῖα περὶ ᾧ ἡ σφοδρὴ ἄξων λέγεται. οἱ δὲ βάσεις κύκλοι, οἱ γρόμφοι ὑπὸ τῶν ἴσων πλευρῶν τῶν παραλληλογράμμου. Τομαὶ δὲ κύλινδρος, αἱ μὲν παραλληλόγραμμοι, αἱ δὲ ὀξυγωνίων κώνων γραμμαὶ. Τέμνεται δὲ στερεόν μὲν ὑπὸ ἐπιφανείας, ἐπιφανεία δὲ ὑπὸ γραμμῆς, γραμμὴ δὲ ὑπὸ σιγμῆς. ὁμοίως δὲ ὑπὸ γραμμῆς λέγεται τέμνεσθαι: καὶ ἀναφορὰν τῇ ἐπὶ τῇ σιγμῇ, καὶ ἐπιφανεία δὲ ὑπὸ ἐπιφανείας:

ΟΝΟΜΑΤΑ

νίας· καὶ ἀναφορὰ τὴν ἐπὶ τὴν γραμμὴν.

Σπειρα γίνεται ὅταν κύκλος ἐπὶ κύκλῳ τὸ κέντρον ἔχων· ὀρθὸς ὢν πρὸς τῷ κύκλῳ ἐπὶ πῆδον πεινεχθεὶς, εἰς τὸ αὐτὸ πάλιν ἀποκατασταθῇ. τὸ δὲ αὐτὸ τῷ, καὶ κρίκος καλεῖται. Διεχὴς μὲν ἔν ἐστὶ σπειρα ἢ ἔχουσα διάλημμα. συνεχὴς ᾧ ἢ καὶ ἔν σημείον συμπίπτουσι. ἐπιλάττουσα δὲ, καὶ ἡ ὁ περιφερόμενος κύκλος αὐτὸν τέμνει. γίνονται δὲ καὶ τέτων ῥομαὶ γραμμαὶ τινες ἰδιόζουσαι. οἱ δὲ τετράγωνοι κρίκοι, ἐκ πρίσματῶν εἰσι κυλίνδρων. γίνονται δὲ καὶ ἄλλα πινὰ ποικίλα πρίσματῶν, ἔκ τε σφαιρῶν καὶ ἐκ μικτῶν ἐπιφανῶν.

Τῶν δὲ ὀρθογώνων στερεῶν σχημάτων, ἃ μὲν καλεῖται πυραμίδες, ἃ δὲ κύβοι· ἃ δὲ πολύεδρα· ἃ δὲ πρίσματῶν· ἃ δὲ δοκίδες· ἃ δὲ πλινθίδες ἃ δὲ σφηνίσκοι· καὶ τὰ παραπλήσια. Πύραμις μὲν ἔν ἐστὶ σχῆμα στερεῶν ἐπιπέδοις περιεχόμενον· ἅφ' ἑνὸς ἐπιπέδου πρὸς ἐνὶ σημείῳ συνεστατικόν. Καὶ ἄλλως δὲ λέγεσθαι πύραμις τὸ ἀπὸ βάσεως τριπλόρου, ἢ τετραπλόρου, ἢ πολυγώνου τῷ ἐξὶν ἀπλῶς ὀρθογώνῳ καὶ ἀσάυθεσιν τριγώνῳ.

τριγώνων, εἰς ἓν σημεῖον συναγόμενον σχή-
 μα. Ἰδίως δὲ ἰσοπλευρὸς λέγεται πύραμις,
 ἡ ὑπὸ πιαύρων τριγώνων ἰσοπλευρῶν πε-
 ριεχομένη, καὶ γωνιῶν. καλεῖται δὲ τὸ σχή-
 μα τῷτ' ἢ τετραέδρον. Εἰκοσάεδρον ἐστὶ σχή-
 μα σπεῖον ὑπὸ εἰκοσι τριγώνων ἰσοπλευρῶν
 περιεχομένον. Εἰσὶ δὲ πέντε μόνον ταῦτα τὰ
 ὑπὸ ἴσων καὶ ὁμοίων περιεχομένα· ἃ δὴ ὑπὸ
 τῶν ἐλλύων ὕστερον ἐπονομάσθη πλάτων
 σχήματα· τῶν δὲ πέντε τῶτων αἱ πλευραὶ
 λόγον ἔχουσι πρὸς πλὴν σφαῖραν. Εὐκλείδης
 μὲν γὰρ ἐν τῇ γ' ὑποκρίων, ἀπέδειξε, πῶς ἡ
 σφαῖρα τὰ πέντε ταῦτα σχήματα περιλαμ-
 βάνει. μόνον γὰρ τὰ Πλάτων Θ οἶεται· Ἀρχι-
 μήδης δὲ τρεῖς καὶ δέκα ὅλα φησὶν εὐρίσκε-
 ται σχήματα διωάμενα ἐξ ἡραφῆναι τῇ
 σφαῖρα, προστεθεὶς ὀκτώ· μεία τὰ εἰρημένα
 πέντε· ὧν εἶδεναι ἢ πλάτων φασὶν. Τὸ τέσ-
 σαρες ἢ δεκάεδρον εἶναι τῷτ' διπλῶν. τὸ μὲν
 ἐξ ὀκτὼ τριγώνων καὶ τετραγώνων ἐξ. σὺν-
 θετον δὲ ἐκ γῆς καὶ αἰρος. ὅπως καὶ τῶν δε-
 χαίων πινὲς ἠδυσαν. τὸ δὲ ἕτερον πάλιν ἐκ
 τετραγώνων μὲν ὀκτὼ τριγώνων δὲ ἐξ ὀκτὼ καὶ
 χαλεπώτερον εἶναι δοκεῖ. καθόλου δὲ τῶν

ΟΝΟΜΑΤΑ

Ὀρθογράμμων στερεῶν σχημάτων: ἀμφοῖν ἐστὶ
 πυραμίδες: ἀδὲ πρίσματα: ἀγ' ἔτι πυραμί-
 δες, ἔτι πρίσματα: τὸ μὲν οὖν ἐστὶ πύραμις
 περιέρηται. Οκτάεδρον ἐστὶ σχῆμα στερεὸν ὑπὸ
 ὀκτώ τριγώνων ἰσοπλευρῶν περιεχόμενον.
 Δωδεκάεδρον δὲ ἐστὶ σχῆμα ὑπὸ τριῶν πεντα-
 γωνίων ἰσοπλευρῶν τε καὶ ἰσογωνίων περιε-
 χόμενον: τὸ δὲ πεντάγωνον ἐξ ἑξ ἑστὶ γίνεσθαι τὸ
 * δωδεκάεδρον: ἴσον ἐστὶ τριγώνοις τρισὶ πα-
 ρὰ δύο πλευρῶν. Κύβητος ἐστὶ σχῆμα στε-
 ρεὸν ὑπὸ ἑξ τετραγώνων ἰσοπλευρῶν καὶ ἰ-
 σογωνίων περιεχόμενον: καλεῖται δὲ τὸ σχῆ-
 μα τῷ τε καὶ ἑξάεδρον. Πρίσματα δὲ ἐστὶ τὰ
 ἀπὸ βάσεως ὀρθογράμμων συνθεσιν πρὸς
 χωρίον ὀρθόγραμμον συνάπτοντα: οὔτε γὰρ
 πυραμίδες, ἔτι πρίσματα ἐστὶν τὰ ἀπὸ βά-
 σεως ὀρθογράμμου, καὶ ὀρθόγραμμον συν-
 θεσιν πρὸς ὀρθήαν συνάπτοντα. Τῶν δὲ πρίσ-
 μάτων παραλληλόπλευρα καλεῖται: ὅσα ἐ-
 ξάεδρα ὄντα: τὰ ἀπεναντίον ἐπίπεδα πα-
 ράλληλα ἔχει. Παράλληλα δὲ ἐπίπεδα ἐ-
 σὶν: ὅσα ἐκβαλλόμενα οὐ συμπέττει ἀλλήλοις:
 ἢ ἐν οἷς ἰσῶν καὶ ὁμοίων τριγώνων τινῶν γρα-
 φέντων: ἐκάστη πλευρὰ παράλληλος ἐστίν.
 Κάβητος δὲ ὅν στερεῶν λέγεται, ἢ ἀπὸ μειώ-

ρου σημείου, πρὸς ἐπίπεδον ἡ γμένη· ἢ τις πᾶ-
σαις τῶν ἀπιομένων αὐτῆς ἐν τῷ ἐπίπεδῳ
πρὸς ὀρθὰς εἰσιν. Τῶν δὲ παραλληλοπλευ-
ρων πρισμάτων· ἃ μὲν εἰσιν ὀρθογώνια· ἃ δὲ
οὐκ ὀρθογώνια. ὀρθογώνια μὲν ἂν εἰσιν, ὅσα ἐ-
κᾶσιν τῶν ὀρθογωνίων ὑπὸ τριῶν γωνιῶν
περιεχομένῳ ἔχει γραμμὴν. ὅσα ὀρθογώ-
νια δὲ τὰ μὴ οὕτως ἔχοντα. Δοκίς δ' εἰσιν ὅ τ'
μῆκος μείζον ἔχει τῷ πλάτους καὶ τῷ πά-
χους· ἐστὶ δ' ὅτε τὸ πλάτος καὶ τὸ πάχος ἴσαι·
πᾶχος δὲ καὶ βάθος καὶ ὕψος τὸ αὐτὸ λέ-
γεται. Πλυνθίς δ' εἰσὶ τὸ ἔχον τὸ μῆκος ἐλατ-
τον τῷ πλάτους, καὶ βάθους· ἐστὶ δ' ὅτε ταῦτα
ἀλλήλοις ἴσαι. Σφύρισκ δ' εἰσὶ τὸ ἔχον
ἄνισα ἀλλήλοις, τὸ τε μῆκος καὶ τὸ πλάτος,
καὶ τὸ βάθος· πῖνς δὲ καὶ βάμισκον καλεῖται
τὸ τοιοῦτον σχῆμα.

Τὰ πάθη τῆς γεωμετρίας.

Ἐφάπεια δὲ γραμμὴ γραμμῆς, καὶ
ἐπιφανείας, καὶ σφαιρῆς, καὶ ἐπιγυμνῆς, καὶ
κατὰ γραμμῆν· ἐπιγυμνὴ δὲ ἐπιγυμνῆς ἀφανέ-
μια γίνεται. γραμμὴ δὲ γραμμῆς ἀφανέ-
νη· ὅλη ὅλης ὁμοίως μία γίνεται. Εὐθεῖα δὲ
κύκλου ἐφάπτεσθαι λέγεται ἥ τις ἀπιομένη

Ο Ν Ο Μ Α Τ Α

τῷ κύκλου, καὶ ἐκβαλλομένη, ὅπῃ μηδέποτε
τὰ μέρη τέμνει τὸν κύκλον. Κύκλοι δ' ἐφά-
πτεσθαι ἀλλήλων λέγονται: οἱ πινες ἀπὸ μέρους
ἀλλήλων, οὐ τέμνουσι ἀλλήλους. Εὐθεία δ' ἐ-
πὺς ὀπίπεδον ὀρθὴ ἐστὶ, ὅταν πρὸς πάσας
τὰς ἀπὸ μέρους αὐτῆς ἐν τῷ αὐτῷ ὀπίπῃδῳ,
ὀρθὰς ποιῇ τὰς γωνίας. Ἐπίπεδον δ' ἐπὺς
ὀπίπεδον ὀρθὸν ἐστὶν: ὅταν αἱ τῇ κρινῇ αὐτῶν
τομῇ πρὸς ὀρθὰς ἐν ἐνὶ τῶν ἐπιπέδων ἀγώ-
γηται εὐθείαι: καὶ τὰ λοιπὰ πρὸς ὀρθὰς ὡ-
σιν: ἐπίπεδα δ' ἐπαράλληλα ἐστὶ τὰ ἀσύμ-
πλωτα.

Διάφοροι μὲν καὶ ἐν στερεοῖς, καὶ ἐν ἐπι-
πέδοις ἤδη δ' ἐκ καὶ ἐν γραμμαῖς, ὁμοιότης καὶ
ισότης: οὕτω γοῦν καὶ ἐν τῷ ἐκ τῶν τῷ Εὐ-
κλείδου στοιχείων. Δύο δοθέντων ἐκθυγραμ-
μων, ὧ μὴ ὁμοιον, ὧ δ' ἴσων συστήσασθαι πρὸς-
κείμεναι: κακῶς μέσον ἀνάλογον εὐρόντες: Διὰ
ταύτης κατὰ σκοπὸν ἀζομένη τὸ πρὸς βληθὲν ἐπὶ
δὲ τῶν στερεῶν διὰ δύο μεσότητων. Νυνὶ δ' ἐ-
κθόλῃ λέγωμεν περὶ μὴ ἴσων ὅτι ἴσαι γραμ-
μαὶ εἰσιν, καὶ ἐπιφανείαι καὶ στερεά: ὅσα ἀρ-
μόττει ὅλα ὅλοις, ἢ κατὰ γένος, ἢ κατὰ σχη-
ματισμὸν. Λέγεται δ' ἴσων, καὶ τὸ ἴσος πείμε-
τρον

τρον τῇ πειοχῇ, καὶ τὸ ἴσον ταῖς γραμμαῖς·
 ὥστε καὶ τῷ ἐμβαδῷ, καὶ τῷ μόνῳ ἐμβαδῷ·
 ἴση δὲ γωνία εἰσὶν αἱ ἐφαρμόζονται ὅλαι ὅ-
 λοις, ἐν τοῖς ἐπιπέδοις, ἢ ἐν τοῖς σφαιροῖς, κατὰ
 τὴν αὐτὴν συναγωγὴν, ἢ κατὰ γένεσιν, ἢ κα-
 τὰ χρησισμὸν. ἴσοι δὲ κύκλοι εἰσὶν, ὧν αἱ
 διαμέτροι ἴση ἀλλήλαις εἰσὶν: ἀπὸ γὰρ τῶν
 αὐτῶν διαμέτρων ὅσκι ἐστὶν ἑτέρον καὶ ἑτέ-
 ρον κύκλον ἐπινοῆσαι. Δοθείσης δὲ τῆς δια-
 μέτρου: δέδοται καὶ ὁ κύκλος τῷ μεγέθει.
 ἴσον δὲ ἀπέχθαι τὰς σφαιρὰς λέγεται τῷ κέν-
 τρου: ὅταν ἀπὸ τῶν κέντρων, ἐπὶ αὐτὰς κάθε-
 τοὶ ἀγόμεναι ἴση ὦσιν. Μείζον ὅτε ἢ ἡ μεί-
 ζων κάθετος πίπτει. ἴσα δὲ καὶ ὅμοια σφαιρὰ
 σχήματα ἐστὶ: τὰ ὑπὸ ἴσων ἐπιπέδων πειε-
 χόμενα, καὶ ὁμοίως κειμένων, ἴσων τὸ πλῆθος
 καὶ τὸ μέγεθος.

Ὅμοια ἐστὶ σχήματα σφύραγμα τὰ ἔ-
 χοντα κατὰ μίαν τὰς γωνίας ἴσας, καὶ ἄλλως.
 ὅσα τὰς τε γωνίας ἴσας ἔχει κατὰ μίαν: καὶ τὰς
 πρὸς τὰς ἴσας γωνίας πλάγους ἀνάλογον.
 Ἀνιπενοντότα δὲ σχήματα ἐστὶν, ἐν οἷς ἐν ἑ-
 κατέρω τῶν σχημάτων ἡ γένεσις τε καὶ ἐπό-
 μνημοι λόγοι εἰσὶν. Ὅμοια τμήματα κύκλων

ΟΝΟΜΑΤΑ

ἐστὶ, τὰ δεχόμενα γωνίας ἴσας. ἢ ἐν οἷς αἱ γωνίαι ἴσαι εἰσὶ. Παραπλησίως γὰρ καὶ τμήματα σφαιρῶν ὅμοια φερεῖα σχήματα ἐστὶ, τὰ ὑπὸ ὁμρίων ἐπιπέδων περιεχόμενα καὶ ὁμοίως κειμένων. Πᾶς δὲ κύκλος παντὶ κύκλῳ ὁμοῖος ἐστὶ πρὸς εἶδος. μία γὰρ ἡ γένεσις τῶν κύκλου, καὶ ἐν τῷ εἶδος: τῶν δὲ τμημάτων οὐκ ἐστὶν ἡ αὐτὴ ὁμοιότης. ἀλλ' ὅσα μὲν ἔχουσιν ὁμοίαν κλίσιν: τὰ τ' ἐστὶ τὰς ἐν αὐτοῖς γωνίας ἀλλήλαις ἴσας: ταῦτα καλεῖται ὅμοια: οὐχ ὅμοια δὲ τὰ μὴ ἕτως ἔχοντα: παραπλησίως δὲ ἔχει καὶ ὅτι τῶν ἄλλων ἐπιπέδων τε καὶ σφαιρῶν σχημάτων.

Μέγεθος ἐστὶ τὸ αὐξανόμενον, καὶ τὸ τεμνόμενον εἰς ἄπτερον: εἶδη δὲ αὐτῶν τρία γραμμῇ, ἐπιφανείᾳ, σφαιρῶν, ἄπτερον δ' ἐστὶ μέγεθος ἑμείζον ἐθὲν νοεῖται καθ' ὑπόστασιν ἡλικίᾳ δὴ ποτε: ὥστε μηδὲν εἶναι αὐτῶν πέρας. Μέρος ἐστὶ μέγεθος μεγέθους τὸ ἐλαττον τῶν μείζονος: ὅταν καταμετρεῖ τὸ μείζον. εἶρηται δὲ τὸ μέρος νυῦ, ὅτι ὡς κόσμος μέρος ἡ γῆ, ὅτι ὡς ἀνθρώπου κεφαλὴ: ἀλλὰ μὲν ἕδω ὡς τῆς πρὸς ὀρθὰς τῇ διαμέτρῳ τῶν κύκλου ἀπὸ ἀκρας ἀγομένης, λέγων μὲν μέρος εἶναι τὴν ἐκείνου

ἐκτός τῆς ἡμικυκλίας λαμβανομένη γωνία
ὑπὸ τῆς πρὸς ὀρθῆς. ἀδιώατον γὰρ εἶναι ὑπὸ
ταύτης τῆς γωνίας ἢ πρὸς κεραλοειδῆς καλεῖ-
ται κατὰ μετρηθῆναι τὴν ὀρθὴν, πάσης γω-
νίας διθυγράμμου ἐλάττω. ὅς τις τῆς κε-
ραλοειδῆς. Μᾶλλον ἔν τῳ ἐν μεγέθει μέρει
ὅτι τῶν ὁμοιογῶν ληφόμεθα: καὶ ἔτι τῶς ἐ-
ξῆς μὲν τὸ ἐν μεγέθει μέρει, ὡς τὴν τῆς τρί-
της ὀρθῆς γωνίας λέγομεν τῆς ὀρθῆς μέρει
εἶναι. Τὸ γὰρ ποφισμάτιον ἐκείνο παραληπ-
τικὸν τὸ λεγόμενον ὅτι εἰ τὸ μέρος ἐστὶ τὸ κατὰ
μετρηθῆναι καὶ τὸ κατὰ μέρει ἐστὶ μέρος. κατὰ με-
τρηθῆναι δὲ τὸ σῆμα ὑπὸ ποδῶν διθείας.
μέρος ἄρα ἡ ποδῶν διθεία τῆς σῆμα. καὶ σῆ-
μα ἐστὶ ἡ ποδῶν διθεία ὅπως ἄρπον. ποδῶν
διθεία τὸ μῆκος κατὰ μετρηθῆναι τῆς σῆμα, καὶ
τὸ βάθος, καὶ τὸ πλάτος ὅπως εἰσὶν ὁμοιο-
γενεῖ αὐτῇ τῇ διθεία: ὅτι μὲν τὸ σῆμα. Πο-
λά πλάσιον ἐστὶ τὸ μείζον τῆς ἐλάττω, ὅταν
κατὰ μετρηθῆναι ὑπὸ τῆς ἐλάττω.

Τὸ μέρος μὲν ἔν ἐστὶ καὶ λόγος, καὶ τίνα
ὁμογενῆ ἅμα καὶ τὴν ἀναλογίαν εἶρηται μὲν ἀ-
κρηβέστερον ἐν τοῖς πρὸς τῆς ἀριθμητικῆς ποι-
χέωσι. νῦν δὲ λέγομεν: ὅτι ὡς ὅτι τῶν

ΟΝΟΜΑΤΑ

ἄλλων ὁμοιογενῶν ἢ ἀναλογία ἐφαρμόζει· ἔ-
 τω καὶ ὅτι τῶν ἐν τοῖς μεγέθεσιν ὁμοιογε-
 νῶν. λόγον ἔχον πρὸς ἄλληλα τὰ μεγέθη λέ-
 γεται· ἂ δυνάται πολλαπλασιαζόμενα ἀλλή-
 λων ὑπερέχον. πρὸς δὲ οὗ ἀνιθέτως τῷ
 ὄρω τέτω· καὶ λέγοντας· ὅτι μόνον λόγον ἔχει
 πρὸς ἄλληλα, ἂ δυνάται πολλαπλασιαζό-
 μενα ἀλλήλων ὑπερέχειν. ἐστὲν δὲ ἕτως
 ὁμογενές, ὡς σημεῖον σημεῖον· ἀρα ὅτι πολλα-
 πλάσιαζόμενον τὸ σημεῖον, ὑπερέχει τῷ ση-
 μεῖον. πρὸς δὲ τέτους ῥητέον, ὅτι τὸν κατὰ
 μέγεθος πολλαπλασιασμόν οὐκ ὅτι δέχε-
 ται τὸ σημεῖον. ὁ γὰρ ἀτὰρ κτὲρ μεγέθους· τὸ αὖ-
 τευ κτὲρ καὶ τὸ κτὲρ κατὰ μέγεθος πολλαπλασια-
 σθῆναι. μόνως δὲ ὅτι δέχεται πολλαπλασια-
 σμὸν κατὰ ῥυθμὸν ἕτως, ἐπειδὴ ἐν τῇ ἐν-
 θείᾳ ἀπὸ εἰς σημεῖα, τὰ ποσὰ δὲ ποσῶν δὲ ἐ-
 ἰς πολλαπλάσια· ὅλως πῶς πρὸς μεγέθους δι-
 αλέγονται τῷ, ἔχοντός τινα διάσπιν. τῷ εἰς
 χειρὶς ἀνίκρυς· τὸ μὲν σημεῖον ἀμερές· λόγον
 δὲ ἔχειν πρὸς ἄλληλα τὰ μεγέθη εἴποντ·.
 Ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ μεγέθει λέγονται πρῶτον
 πρὸς δεύτερον· καὶ τρίτον πρὸς τέταρτον· ὅταν
 τῷ πρῶτῳ καὶ τῷ τρίτῳ ἰσάκεις πολλαπλά-

σα τῶν τῷ δούτερου καὶ πετάρτε ἄλλων ὡς
 ἔτυχε ἰσάκεις πολλαπλασίων ἢ ἅμα ὑπε-
 ρέχει ἢ ἅμα ἐλλείπει· ἢ ἅμα ἰσα ἢ ληφθέντα
 καὶ ἀλλήλα· τὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον ἔχοντα
 ἀνάλογον καλεῖσθαι. Ἀναλογία δ' ἐν τρισὶν
 ὅροις ἐλαχίστοις ἐστίν. ἐν ταῦθα ὅρων λαμβαν-
 ομεμένων ἤτοι τῶν μεγεθῶν, ἤτοι τῶν ὀπτικει-
 μένων αὐτοῖς ἀριθμῶν. ὡς γὰρ κύκλος ὁρῶν ἐ-
 στίν ἢ περὶ φέρεια, καὶ τριγώνον αἱ πλάγυραι
 ἔτω τῷ θ πρὸς τὸν ε λόγος ὅροι εἰσὶν οἱ αὐτοὶ
 ἀριθμοὶ. Οταν δὲ τρία μεγέθη ἀνάλογον ἦ-
 τὸ πρῶτον πρὸς τὸ τρίτον διπλασίονα λόγον
 ἔχειν λέγεται ἢ πρὸς τὸ δούτερον φησὶ γὰρ
 Εὐκλείδης, ὅτι ὡς περὶ τῶν ἀξιοσημά-
 των ἰσων καὶ καὶ εὐθείαν κημεμένων τὰ ἀξιο-
 σημάτα διπλασιάζεται· ἔτις ἐπὶ τῶν λό-
 γων, ὡς πάλιν καὶ εὐθείαν κημεμένων, τὸ α πρὸς
 τὸ γ διπλασίονα λόγον ἔχει ἢ πρὸς τὸ
 δούτερον, τὰ γὰρ β τῶν ε ἀφύνηκεν ἡμιολίῳ
 καὶ τὰ ε τῶν δ πάλιν αὐτῷ ἡμιολίῳ. τὰ ἄρα θ
 τῶν δ ἀφύνηκεν δύσιν ἡμιολοίοις. καὶ γὰρ αἱ
 ὑπεροχαὶ αἱ δύο τῇ μιᾷ εἰσὶν αὐταί. οἷον ὡς
 ἐπὶ τῶν θ. καὶ τῶν δ. ὑπερέχει γὰρ ὁ θ τοῦ
 ε τοῖς τρισὶν· ὑπερέχει δὲ καὶ ὁ ε τῶν δ.

ΟΝΟΜΑΤΑ

ποῖς δυσὶν. τὰ δὲ τρία καὶ τὰ β' συνελθέντα
 ποιεῖ τὸν πέντε. ὅς ἐστι τῆς θ' καὶ ὑπεροχῆ.
 Ὡστερ δὲ διὰ τῶν μειζόνων ἐπὶ τοῦ ἐλάτ-
 τονας αἱ ὑπεροχαὶ ποιεῖσι διπλασίους λόγους
 καὶ τριπλασίους· ἕτῳς διὰ τῶν ἐλαττόνων αἱ
 ἐλλείψεις. Οταν δὲ τῶν ἰσάκεις πολλαπλα-
 σίων, τὸ μὲν τὸ πρῶτον πολλαπλάσιον· ὑπε-
 ρείχῃ τὸ τε δεύτερον πολλαπλάσιον, τότε τὸ
 πρῶτον πρὸς τὸ δεύτερον, μείζονα λόγον ἔχον
 λέγεται ἢ τὸ τρίτον πρὸς τὸ τέταρτον. Εν δὲ
 ταύτῃ τῇ ὑπογραφῇ τὰ ὅρα, βεβῆλεται δ
 Εὐκλείδης εἰς ὑπόνοιαν ἡμᾶς ἀγαγεῖν καὶ
 παρασηῶσαι ἐν τρισὶν εὐρίσκεισθαι δεῖ μείζονα
 λόγον λόγος· καὶ ἐπεὶ τὰ ἐν ταῖς αὐταῖς λόγῳ κε-
 χαρσκήρηθαι διὰ τῶν ἰσάκεις πολλαπλα-
 σίων ἢ τὰ ἄλλα ὑποτρεχόντων ἢ ἄλλα ἴσων ὄν-
 των, ἢ ἄλλα ἐλλειπόντων· τὰ ἐν μείζονι λόγῳ
 ὄντα· σκεῖνα ἔχειν πῶς ὑπεροχῇ. ὅπως δὲ
 γίνεται ὑπεροχῇ· αὐτὸς ἐν ταῖς πέμπτῃ τῆς
 καθόλου λόγων σιχειώσεως ἐν ταῖς θεωρή-
 μασι τῶν ἀνίσων μεγεθῶν ἐπέδειξεν. Ομόλο-
 γα μεγέθη λέγεται εἶναι· τὰ μὲν ἡ γένεμα ποῖς
 ἡγουμύμοις· τὰ δὲ ἐπὶ ὁμοῖα τοῖς ἐπομύμοις.
 Λόγος μὲν εἴρηται ὅτι δύο ὁμογενῶν ἐστὶν ἡ
 πρὸς

πρὸς ἀλλήλα χείσις· ἐπὶ δὲ τῶν μεγεθῶν λέ-
 ξωμεν ἰδίως, ὅτι λόγος εἰς δύο μεγεθῶν ὁ-
 μογενῶν ἢ κατὰ πληκότητα ποία χείσις· ὡς
 εἶναι καὶ ἐπὶ αὐτῶν ἀναλογίαν τῶν ποικύτων
 λόγων ὁμοιότητά. Ἀνάπελιν λόγος εἰσὶν ὁ τῆς
 ἐπομένης, πρὸς τὸ ἡγεμένον. Συμβέντι λόγος
 εἰσὶν λήψις τῆς ἡγεμένης μετὰ τῆς ἐπομένης ὡς
 ἐνός πρὸς αὐτὸ ἐπόμενον. τὰ δὲ ἄλλα ὅσοι-
 χειωτῆς ἐν τῇ πέμπτῃ τῆς καθόλου στοιχίω-
 σως διορίζει. Ἡ ἄπρος γραμμὴ ἔδε πολ-
 λαπλασιασάσθαι διυαλαί ποτε· ἔδε συγκρίνεσθαι
 ἕτερον πρὸς ἕτερον. τὰ γὰρ μὴ ὁμογενῆ· ἔδου-
 ναίαι λόγον ἔχειν πρὸς ἀλλήλα ποία χείσιν.
 εἶον γραμμὴ πρὸς γραμμῇ, καὶ ὅπτι φάνεια
 πρὸς ἐπιφανείαν, καὶ τὰ λοιπὰ ὁμοίως. Τῶν
 ἀναλογιῶν μὲν, αἱ μὲν εἰσὶ συνεχεῖς· αἱ δὲ
 διεχεῖς· συνεχεῖς μὲν αἱ συνεχεῖς, καὶ ἀδιακό-
 πως ἔχουσαι τὰς χείσεις· διεχεῖς δ' εἰσὶν ὅταν
 μὴ ἔτως ἔχουσιν οἱ λόγοι· ἀλλὰ διηρημένοι
 ἀπ' ἀλλήλων· καὶ μὴ ὑπὸ τῆς μέσης ὁρου συνε-
 πτόμενοι ἀλλήλοις. ὁ γὰρ μέσος ὁρὸς τῆς μὲν
 ἡγεΐται· τῆς δὲ ἐπείαι. συνεχεῖς ὡς ἡ, δ, β,
 διεχεῖς ὡς ἡ πρὸς δ, καὶ ε πρὸς γ λόγος· ἐ-
 σὶ διείρηται τὸ μετὰ τῶν μεγεθῶν τῶν ἐκ-
 κλημένων.

Περὶ

ΟΝΟΜΑΤΑ

Περὶ συμμετρων καὶ ἀσυμμετρων ὁ σοι-
χειωτὴς ἐν τῷ δεκάτῳ τῆς σοιχρῶσεως βι-
βλίῳ πολλὰ παραδίδωσι.

Τὸ ρητὸν καὶ ἄλογον μέγεθος, ἐκάπερον καὶ
ἐστὶ τῶν καθ' ἑαυτὰ νομορμῶν: ἀλλὰ πρὸς ἐπι-
περον συγκρινορμῶν. ὅσα γὰρ ἀλλήλοις σύμμε-
τρα ταῦτα καὶ ῥητὰ πρὸς ἀλλήλα λέγεται. οἱ
μὲν ἀριθμοὶ σύμμετροι τυγχάνουσιν: ἐπεὶ ὡς
ἐκάστος αὐτῶν ὑπὸ τινος ἐλαχίστου μέτρου με-
τρεῖται. ὁμοίως δὲ τῇ χυρῇ, καὶ παλαιστῇ, συμ-
μετρῶν ἔχουσι πρὸς ἀλλήλας. ἐκάπερον γὰρ ὑ-
πὸ ἐλαχίστου μέτρου καταμετρεῖται ὑπὸ δα-
κτύλου. * * τῶν μέτρων ὄντων μο-
νάδος θεσιν ἔχοντες αὐτῶν. ἀπείρου δὲ ἐν
τοῖς μεγέθεσιν ὑπάρχοντες, καὶ μηδενὸς
ὑφ' ἐσηκότητος ἐλαχίστου μέτρου. δῆλον ὅτι τῶν
ρητῶν μεγέθους οὐχ ἔν τι ὠρισμῶν, ὡς ὁ δα-
κτύλος ἐλαχίστον μέτρον: ἀλλ' ἐφ' ἡμῖν ἐστὶν
ὁ πηλίκον ἂν θέλωμεν ἐλαχίστον ὑποθέσθαι
μέτρον γνώριμον: ἐν ᾧ ἡ μονὰς. πάντων γὰρ καθ'
ἑαυτοῦ μέγεθος ὡς ἐλέχθη ἔτε ρητὸν ἔτε ἄλο-
γον. ὅτι καὶ πάντα δοθεῖσα καθ' ἑαυτῶν ἔτε ρη-
τῇ, ἔτε ἄλογος ἐστὶ. συγκρινορμῇ δὲ πρὸς
ὑποθεθεῖσαν ἐν θεσφ' μονάδα: ῥητὴ ἢ ἄλογος
εὐρί-

εὐρίσκεται. ἔτι γὰρ τῆς πετραγώνου πλευ-
 ρᾶς ὑποθέσεως ῥητῆς: ἡ Διάμετρος Θ διωά-
 μερῇ εὐρίσκεται: μήκει γὰρ ἄλογος Θ εὐρί-
 σκεται: καὶ πάλιν ἐν τῆς Διαμέτρου ῥητῆς
 ὑπαρχούσης: ἡ πλάτος διωάμερῇ ῥητῇ ἐκατέ-
 ρας αὐτῶν καὶ ἐαυτῷ ἔτε ῥητῆς, ἔτε ἀρ-
 ρήτη τῆς ἐξ ἄλογου ὑπαρχούσης. Οὕτως
 γὰρ τῶν ὀθειῶν ἐλαχιστόν τι μέτρον ὑποθέ-
 μμοι ὀθείαν μονάδων: οἱ δὲ τῶν μαθημά-
 των ῥητῶν ὀνόμαζον: καὶ τὰς αὐτῆς συμμε-
 τρας ῥητᾶς: ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ἀπὸ αὐτῆς πε-
 τραγώνον ῥητὸν: καὶ τὰ τέτω χωρία σύμμε-
 τρα ῥητὰ ἐκάλεσαν: καὶ ῥητὸν ὁμοίως, τὸν ἀπὸ
 αὐτῆς κύβον, καὶ τέτω σύμμετρα σεριᾶ.
 Ἀρρήτον δ' ἀκρίστον τῆς ἐξ ἄλογου σεριᾶ
 μὲν τὸ ἀσύμμετρον τῷ δὲ ῥητῆς κύβῳ: ἐ-
 πίπεδον δὲ, τὸ ἀσύμμετρον τῷ δὲ τῆς ῥητῆς
 πετραγώνῳ. μήκος δὲ τῆς ἐξ ὀθείαν ῥη-
 τῆς συμμετρου. Ἐπὶ δὲ τῶν ὀθειῶν διττῆς
 νομοῦς τῆς συμμετρίας: μιᾶς μὲν ὅταν αὐ-
 τὰ ὀθείαι συμμετριῶσι: τὰ δὲ ἀπὸ αὐτῶν
 χωρία σύμμετρα ἀλλήλοις: ἑτέρας δὲ, ὅταν
 καὶ τὰ αὐτὰ χωρία ἀσύμμετρα ἀλλήλοις
 εἴη. διττῇ καὶ ἡ πρὸς τῶν ῥητῶν Διαφορά
 καὶ α

ΟΝΟΜΑΤΑ

καὶ τὸ πρὸ παλαιῶς ὑπῆρχε. αἱ μὲν γὰρ λέγονται
 διωάμεν ῥητῇ, αἱ δὲ ἄλογοι· αἱ δὲ λοιπαὶ
 μήκει· διωάμεν μὲν εἰσὶν ῥητῇ ὡς προείπο-
 μεν ὅσαι μὲν εἰσὶν αὐταὶ ἀσύμμετροι τῇ ῥητῇ·
 τὰ δὲ ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων σύμμετρα τῷ
 ἀπὸ ῥητῆς τετραγώνῳ· μήκει δὲ, ὅταν τὰ ἀπ'
 αὐτῶν τετραγώνων ἢ ἐν τετραγώνοις ἀριθμοῖς
 ἢ τὰς πλάτους ἔχῃ συμμέτρους τῇ ῥητῇ μή-
 κει. καὶ καθόλου καλεῖται ἡ τῇ ῥητῇ σύμμετρος,
 ῥητὴ εἴτε μήκει, εἴτε διωάμεν μόνον. Ορίζονται
 γὰρ τὴν ῥητὴν καὶ ὅτως. ῥητὴ ἡ διὰ δεξιμῶν
 γνωρίμη· ὅτι ἐστὶ δὲ ῥητῆς ὅσον ἔστι· ἀλ-
 λά συμβεβηκὸς αὐτῇ· ὅταν γὰρ λόγος χάριν
 ἐκ πᾶσι ῥητάς· τῶν ἀπὸ τῆς πῆχους ῥητῆς·
 οἷον ἀπὸ ἐκάστην ποσῶν ἐστὶ παλαιῶν ἢ δα-
 κτύλων· πόθεν, ὅτι τῶν συμβεβηκότων λέγο-
 μεν ῥητῇ· διὰ δεξιμῶν γνωρίμην. διὰ φέ-
 ρει δὲ ῥητὴ δοθείσης. τὰ τὴν μὲν ῥητὴν δοθεῖ-
 σαι εἶναι πάντως. τὴν δοθεῖσαν ὅσον ἐξ ἀ-
 νάγκης ῥητῇ, ἢ μὲν ῥητῇ καὶ πηλικότητι καὶ ποι-
 ὄτητι γνωρήμη ἐστίν, ἢ δὲ δοθεῖσαι πηλικότητι,
 καὶ μεγέθει μόνον· καὶ γὰρ εἰσὶ πῆκες ἄλογοι δε-
 δόσθαι. ἀπὸ τῆς προτεθείσης δοθείας τετρα-
 γωνον ῥητὸν λέγει ὁ Εὐκλείδης. προτεθεῖσα
 δι' δι-

δὲ δ' αὖθις καλεῖται, ἥ τις δὲ χη μέτρων καὶ οἶον
 καὶ κένων εἰς ἐκμέτρησιν ἡμῖν μηκῶν καὶ
 ὑπόθεσιν εἰληπῆται. οἶον εἰ τις προθείνει ποδὸν
 εἴη τὸ μετὰ ξὺ Διάστημα ὑποκνημίων π-
 νῶν σημείων ἔδεν ἂν ἔδεόντως πιυθαίνοι τὸ
 ποσῶν ἐς ποδῶν ἢ πηχῶν: ἀναγκαῖον ἂν δέοι
 πηχὸς καὶ ποδὸς αἰτεῖν ἡμᾶς παρὰ τῷ παρέ-
 χοντι $\odot$ πηλικότητι $\odot$: καὶ ἐκείνη χρωμῖους
 τῇ προθεήσει καὶ ῥητῇ αὖθις: τὸ προτεθέν
 Διάστημα ἐξετάζωμεν εἰ ἐστὶν ὅλως ῥητῷ μέ-
 τρον.

Τῶν δὲ ἐν τοῖς μεγέθεσι τῶν μετρήσεων:
 κατὰ μέτρῳντα τὰ ὅλα ἐς τὰ δέ. Δάκτυλος,
 παλαιστή, πωθαμή, πῶς, πῆχυς, βῆμα, ὀρ-
 γεία, πάντων δὲ ἐλαχιστότερον ἐστὶ δάκτυ-
 λος $\odot$. Διαρεῖται δὲ καὶ εἰς μέρη ἑαδ' ὅτε μὲν
 ὧ καὶ ἡμῖς, καὶ τρίτα καὶ λοιπὰ μόρια.
 Εἰσὶ δὲ καὶ ἑτέρα μέτρα ὅπνεονημῖα ποῖ
 ταδε. πᾶσον, ἄκαινα, πλέθρον, ἰσχυρον,
 σάδιον, μίλιον, χοῖνος, χοῖνος περ-
 σική, καὶ χοῖν $\odot$ ἑλληνική,
 καὶ λοιπά.

Τ Ε Λ Ο Σ.



EVCLIDIS ELEMEN-
tum primum ex Theonis
Commentarijs.

Definitiones.

- P**unctum est: quod partem non habet.
Linea est: longitudo absq; latitudine.
Termini lineæ, sunt puncta.
Linea recta est: quæ ex æquo posita est inter
sua puncta.
Superficies est: quæ longitudinem & latitudi-
nem tantum habet.
Termini superficiei, sunt lineæ
Plana superficies est: quæ ex æquo posita est
inter suas lineas rectas.
Angulus planus est: duarum linearum: sese in
plano tangentium: & non ex aduerso po-
sitarum: mutua inclinatio.
Rectilineum vocamus angulum: quem lineæ
rectæ continent.
Cum recta super recta stans: angulos vicinos,
inter se fecerit æquales: rectus est vterque
equalium illorum angulorum.
Recta verò lineæ, angulos illos æquales faci-

A

EVLIDIS

ens: perpendicularis dicitur ad eam lineam,
super qua consistit.

Obtus angulus est: qui recto est maior.

Acutus verò: qui recto est minor.

Terminus est, quod alicuius finis est.

Figura est: quæ termino aliquo, aut aliquibus
terminis continetur.

Circulus est figura plana: una linea cōtenta:
(quam vocamus circumferentiam) ad quam
ab vno aliquo ex punctis, quæ intra ipsam
sunt, omnes lineæ rectæ procidentēs: inter
se sunt æquales.

Centrum verò circuli: vocatur hoc in circulo
medium punctum.

Dimetiens circuli est: recta quædam linea, per
centrum circuli ducta: vtrinque ad circum-
ferentiam circuli desinens: ipsumque circulum
in duas partes æquales diuidens.

Semicirculus est: figura, quam dimetiens circuli,
& intercepta à dimetiente circumferen-
tia continet.

Segmentum circuli est: figura, quam linea re-
cta, & circuli circumferentia continet.

Rectilinea figurae sunt: quas rectæ lineæ am-
bunt.

Trila-

*Trilatera quidem: quas ambiunt tres rectæ.
Quadrilatera verò: quas quatuor. Multilatera, quas plures, quàm quatuor rectæ ambiunt.*

Ex trilateris autē figuris. Triangulus æquilaterus est: qui tria habet equalia latera. Equicrurus, qui duo tantum habet equalia latera.

Scalenus triangulus: qui tria habet inæqualia latera.

Item ex triangulis figuris, triangulus rectangulus est: qui angulum habet rectum.

Amblygonius: qui angulum habet obtusum.

Oxygonius: qui angulos tres acutos habet.

Ex quadrilateris figuris: quadratū est, quod æquilaterum est, & rectangulum.

Quadrangulum oblongum: quod rectangulū quidem est, sed non æquilaterum.

Rhombus: quod æquilaterum quidem est, sed non rectangulum.

Rhomboides: quod latera è regione posita habet equalia: ac etiam angulos æquales; nō tamen est æquilaterū, neq; rectangulum.

Omnes reliquæ præter has, quadrilateræ figu-

EVCLIDIS

re: Trapezia vocentur.

Aequedistantes rectae lineae sunt: quae in eodem plano sitae: & in infinitum ex utraque parte extensae: in neutra tamen concurrunt.

POSTULATA.

Petatur. A quovis puncto: ad quodvis punctum: rectam lineam describere.

Item, lineam rectam finitam: in infinitum usque extendere.

Item, quovis centro, & quovis intervallo: describere circulum.

COMMUNES NOTIONES,

seu sententiae.

Quae eidem sunt aequalia: illa inter se sunt aequalia.

Si aequalibus aequalia fuerint adiecta: etiam tota sunt aequalia.

Si ab aequalibus aequalia fuerint ablata: etiam quae relinquuntur, sunt aequalia.

Si inaequalibus aequalia fuerint adiecta: etiam tota sunt inaequalia.

Si ab inaequalibus aequalia fuerint sublata: quae relinquuntur sunt inaequalia.

Quae sunt eiusdem dupla: inter se sunt aequalia.

Quae

Quæ eiusdem sunt dimidia: inter se sunt æqualia.

Quæ applicata inter se conueniunt: sunt æqualia.

Totum, est maius sua parte.

Omnes recti anguli: inter se sunt æquales.

Cum in duas rectas, recta incidens linea: duos internos ex vna parte angulos, duobus rectis facit minores: productæ istæ duæ lineæ rectæ in infinitum: ex ea parte concurrēt: ubi sunt illi duo anguli duobus rectis minores.

Duæ lineæ rectæ, figuram non faciunt.

S Propositio prima. Problema.
Super data linea recta finita: triangulum æquilaterum constituere.

Explicatio dati.) Sit data linea recta finita aβ. (Explicatio quesiti.) Oportet super linea recta aβ: triangulum æquilaterum constituere. (Delineatio.) Centro a, intervallo aβ: describatur circulus βγδ. Item centro β, intervallo βa: describatur circulus aγδ: ducantur deniq; lineæ rectæ aγ, γβ. (Demonstra-

A in

EVCLIDIS

tio) Quoniam punctum a , est centrum circuli
 $\gamma\beta$: idcirco recta $a\gamma$, est equalis recte $a\beta$.
 rursus quoniam punctum β , est centrum circuli
 $\beta\gamma\alpha$: idcirco recta $\beta\gamma$: equalis est recte $\beta\alpha$.
 Verum demonstratum est: quod recta $\gamma\alpha$: etiam
 equalis sit recte $a\beta$. Ergo utraq; rectarum
 $\gamma\alpha$, $\gamma\beta$: est equalis recte $a\beta$. Quae verò eide
 sunt equalia: illa etiam inter se sunt equalia.
 Ergo $\gamma\alpha$ recta: etiam equalis est, recte $\gamma\beta$.
 Tres igitur lineae rectae $\gamma\alpha$, $a\beta$, $a\gamma$: sunt inter
 se aequales. (Conclusio.) Triangulus itaq;
 $a\beta\gamma$, est equilaterus: et consistit super data
 linea recta finita $a\beta$. Quod faciendum erat.

Propositio secunda. Problema.

A D punctum datum: lineae rectae
 datae: equalem lineam rectam po
 nere.

Explicatio dati.) Sit punctum datum a ,
 et data recta linea $\beta\gamma$. (Explicatio quesiti.)
 Ad punctum datum a : datae lineae rectae $\beta\gamma$:
 ponenda est recta linea equalis. (Delineatio.)
 Ab a puncto, ad punctum β : ducatur linea
 recta $a\beta$: et super linea $a\beta$: fiat utriusq; angu
 lus

lus equilaterus $a\delta\beta$. Extendantur etiam linea recta $\delta a, \delta \epsilon$ versus puncta e, ζ : & fiant recta $ae, \beta \zeta$. Centro quoque β , intervallo $\beta \gamma$ describatur circulus $\gamma\eta\theta$. Item Centro δ , intervallo $\delta\eta$: describatur circulus $\eta\kappa\lambda$ (secans lineam rectam $\delta \zeta$ in puncto η .) Demonstratio.) Quoniam punctum β , est centrum circuli $\gamma\eta\theta$: ideo recta $a\gamma$, est aequalis rectae $\beta\eta$. Item quoniam punctum δ , est centrum circuli $\eta\kappa\lambda$, igitur recta $\delta\lambda$, est aequalis rectae $\delta\eta$. Ex quibus δa , fuit aequalis rectae $\delta\beta$: reliqua igitur $a\lambda$: reliqua $\beta\eta$ est aequalis. Vtraque ideo rectarum $a\lambda, \beta\gamma$: est aequalis rectae $\beta\eta$. quae verò eidem sunt equalia: illa inter se sunt equalia. quare recta $a\lambda$, etiam erit aequalis rectae $\beta\gamma$. (Conclusio.) Ad datum igitur punctum a : data linea recta $\beta\gamma$: aequalis posita est recta, linea $a\lambda$. quod faciendum erat.

Propositio tertia. Problema.

D Vabus rectis inaequalibus datiss
ex maiore, minori aequalem rectam
lineam auferre.

Explicatio dati.) Sit data linea recta ma

EVCLIDIS

ior $\alpha\beta$: minor verò γ . (Explicatio quasiri.)
 Ex maiore linea $\alpha\beta$: tollenda est recta equalis lineæ γ . (Delineatio.) Ponatur ad punctum α : lineæ γ : equalis recta linea $\alpha\delta$. deinde centro α , intervallo $\alpha\delta$: describatur circulus $\delta\epsilon\zeta$: (Secans rectam $\alpha\beta$, in puncto ϵ . (Demonstratio.) Quoniam punctum α , centrum est circuli $\delta\epsilon\zeta$. idcirco recta $\alpha\epsilon$, est equalis rectæ $\alpha\delta$. Verum recta γ , etiâ est equalis rectæ $\alpha\delta$. Vtraque igitur rectarum $\alpha\epsilon$, γ , est equalis rectæ $\alpha\delta$. Quare $\alpha\epsilon$, etiam est equalis rectæ γ . (Conclusio.) Duabus igitur rectis datis inequalibus $\alpha\beta$, γ : ex maiore $\alpha\beta$, ablata est $\alpha\epsilon$: equalis minori γ . Quod faciendum erat.

Propositio quarta. Theorema.

SI duo trianguli, duo latera duobus lateribus habuerint æqualia alteri alteri: & angulum angulo æqualē, qui æqualibus rectis lineis continetur: etiam basim basi habebunt æqualem: & triangulus triangulo erit æqualis: et reliqui anguli, reliquis angulis erunt æquales: alter alteri, quos latera subten-
 dunt æqualia.

Expli.

Explicatio dati.) Sint duo trianguli $\alpha\beta\gamma$, $\delta\epsilon\zeta$: habentes duo latera $\alpha\beta$, $\alpha\gamma$, equalia duobus lateribus $\delta\epsilon$, $\delta\zeta$ alterum alteri: latus $\alpha\beta$, equale lateri $\delta\epsilon$: & latus $\alpha\gamma$, equale lateri $\delta\zeta$: & angulum $\beta\alpha\gamma$, equalem angulo $\epsilon\delta\zeta$. (*Explicatio quaesiti.*) Dico quod basis $\beta\gamma$, sit equalis basi $\epsilon\zeta$: & triangulus $\alpha\beta\gamma$: sit equalis triangulo $\delta\epsilon\zeta$: & reliqui anguli, reliquis angulis sint aequales: alter alteri, quos equalia illa latera subtendunt: angulus $\alpha\beta\gamma$, sit equalis angulo $\delta\epsilon\zeta$: angulus denique $\alpha\gamma\beta$, sit equalis angulo $\delta\zeta\epsilon$. (*Demonstratio.*) Quando enim triangulus $\alpha\beta\gamma$, applicatur triangulo $\delta\epsilon\zeta$: punctum α , ponitur super puncto δ : & recta $\alpha\beta$, applicatur rectae $\delta\epsilon$. cadet etiam punctum β , super puncto ϵ . quia $\alpha\beta$, est equalis rectae $\delta\epsilon$. Deinde si recta $\alpha\beta$, applicatur rectae $\delta\epsilon$: etiam recta $\alpha\gamma$, applicabitur rectae $\delta\zeta$. quoniam angulus $\beta\alpha\gamma$, proponitur equalis angulo $\epsilon\delta\zeta$. quare & punctum γ , applicabitur puncto ζ . cum recta $\alpha\gamma$, equalis sit rectae $\delta\zeta$. Verum punctum β applicabitur puncto ϵ . Basis igitur $\beta\gamma$: basi $\epsilon\zeta$ applicabitur. Nam si punctum β applicetur puncto ζ : & basis $\beta\gamma$,

E V C L I D I S

non applicetur basi $\epsilon\zeta$: tum dua recte figura
facient, quod est impossibile. Bases igitur $\beta\gamma$,
basi $\epsilon\zeta$ applicatur: & est ei equalis. Vnde &
totus triangulus $\alpha\beta\gamma$: toti triangulo $\delta\epsilon\zeta$ ap-
plicabitur, & ei erit equalis: & reliqui angu-
li, reliquis angulis applicabuntur, eiq; erunt
equales: angulus $\alpha\beta\gamma$, angulo $\delta\epsilon\zeta$: & angu-
lus $\alpha\gamma\beta$, angulo $\delta\zeta\epsilon$. (Conclusio.) Si igitur
duo trianguli, duo latera duobus lateribus ha-
berint equalia alterum alteri: & angulum
angulo equalem, qui equalibus rectis lineis
continetur: etiam basin basi habebunt equa-
lem: & triangulus triangulo erit equalis: &
reliqui anguli, reliquis angulis erunt equales:
alter alteri, quos equalia illa latera subten-
dunt. quod erat demonstrandum.

Propositio quinta. Theorema.

Triangulorum, qui duo equalia
habent latera: anguli ad basin sunt
equales. Et productis equalibus
illis rectis: etiam qui sub basi sunt anguli
inter se erunt equales.

Explicatio dati.) Sit triangulus equicrus

rus

tus $ab\gamma$, habens latus ab , aequale lateri ay
 & producantur linea ay, ab , in δ & ϵ (hoc
 est, ut continuè extendantur secundum lineam
 rectam) & fiant rectae $\epsilon\delta, \gamma\epsilon$. (Explicatio
 quaesiti.) Dico quod angulus $ab\gamma$, sit equalis
 angulo $ay\beta$. Et quod angulus $\gamma\beta\delta$, sit equa-
 lis angulo $\beta\gamma\epsilon$. (Delineatio.) Sumatur in li-
 nea $\beta\delta$: punctum quoduis ζ . deinde tollatur à
 maiore linea ay , minori $a\zeta$: equalis linea an .
 denique ducantur rectae $\zeta\gamma, n\beta$. (Demonstratio.)
 Quoniam recta $a\zeta$, est equalis rectae an :
 & recta ab , equalis rectae ay : duae igitur re-
 ctae $\zeta a, ay$: duabus rectis na, ab sunt equa-
 les, altera altera: & communem ambiunt ζa
 angulum. quare basis $\zeta\gamma$, basi $n\beta$ est equalis:
 & triangulus $a\zeta\gamma$, triangulo $an\beta$ equalis
 est: reliqui etiam anguli, reliquis angulis equa-
 les sunt: alter alteri, quos equalia illa latera
 subcondunt: angulus $ay\zeta$, angulo abn : & an-
 gulus $a\zeta\gamma$, angulo $an\beta$. Cum verò tota recta
 $a\zeta$, toti rectae an sit equalis: & recta ab abla-
 ta, sit equalis rectae ay ablata. idcirco reli-
 qua linea recta $\beta\zeta$: reliqua rectae γn etiam e-
 rit equalis. Verum recta $\zeta\gamma$, demonstrata est
 equa-

EVCLIDIS

equalis esse rectæ $\eta\beta$. due igitur rectæ $\beta\zeta$,
 $\zeta\gamma$: duabus rectis $\gamma\eta$, $\eta\beta$ sunt æquales alteræ
 alteræ: & angulus $\beta\zeta\gamma$, equalis est angulo
 $\gamma\eta\beta$: basis etiam eorum communis est recta
 $\beta\gamma$. triangulus igitur $\beta\zeta\gamma$: triangulo $\gamma\eta\beta$ e-
 tiam erit equalis: & reliqui anguli, reliquis
 angulis æquales: quos æqualia illa latera sub-
 zendent. angulus $\zeta\beta\gamma$, equalis angulo $\eta\gamma\beta$:
 & angulus $\beta\gamma\zeta$, angulo $\gamma\beta\eta$. Quoniam nunc
 totus angulus $\alpha\beta\eta$, toti angulo $\alpha\gamma\zeta$ demon-
 stratus est equalis: quorum ablati angulus
 $\gamma\eta\beta$, ablato angulo $\beta\gamma\zeta$ est equalis. ergo re-
 liquus $\alpha\beta\gamma$ angulus, reliquo $\alpha\gamma\beta$ angulo est
 equalis: & sunt anguli ad basim trianguli
 $\alpha\beta\gamma$. Angulus verò $\zeta\beta\gamma$, angulo $\eta\gamma\beta$ de-
 monstratus est equalis esse: & sunt sub basi.
 (Conclusio. Triangulorum igitur, qui duo ha-
 bent æqualia latera: anguli ad basim sunt æ-
 quales. & productis æqualibus illis rectis: etiā
 qui sub basi sunt anguli, inter se erunt æqua-
 les. Id quod erat demonstrandum.

Propositio sexta. Theorema.
Si trianguli, duo anguli æquales in-
 ter

ter se fuerint: etiam latera, quæ æqualēs illos angulos subtendunt: erunt inter se æqualia.

Explicatio dati.) Sit triangulus $\alpha\beta\gamma$: habens angulum $\alpha\beta\gamma$, æquale angulo $\alpha\gamma\beta$. *Explicatio quesiti.*) Dico quod latus $\alpha\beta$: sit æquale lateri $\alpha\gamma$. *(Delineatio cum hypothefi.)* Si enim recta $\alpha\beta$, non est æqualis rectæ $\alpha\gamma$: altera illarum erit maior. *Hypothesis.*) Sit recta $\alpha\beta$ maior. *(Delineatio.)* Ex recta $\alpha\beta$ maiore: linea rectæ $\alpha\gamma$ minori auferatur linea recta $\beta\delta$ æqualis: & ducatur recta $\delta\gamma$. *(Demonstratio)* Quoniam latus $\delta\beta$, æquale est lateri $\alpha\gamma$, & commune latus $\beta\gamma$ duobus igitur lateribus $\delta\beta, \beta\gamma$: duobus lateribus $\alpha\gamma, \gamma\beta$ sunt æqualia alterum alteri: & angulus $\delta\beta\gamma$, angulo $\alpha\gamma\beta$ est æqualis. Basis igitur $\delta\gamma$, basi $\alpha\beta$ est æqualis: & triangulus $\alpha\beta\gamma$, triangulo $\delta\gamma\beta$ est æqualis: maior minori. quod est absurdum. Quare recta $\alpha\beta$, non est inæqualis rectæ $\alpha\gamma$, itaq; erit ei æqualis. *(Conclusio.)* Si ergo trianguli, duo anguli æquales inter se fuerint: etiã latera, quæ æquales illos angulos subtendunt: erunt inter se æqualia. Id quod erat demonstrandum.

Pro-

E V C L I D I S

Propositio septima. Theorema.

S Vper eadē linea recta: duabus eisdem rectis: alia duae rectae aequales altera alterae: non stat uentur ad aliud, atque aliud punctum: in easdem partes: eosdē habentes terminos, quos linea primae.

Explicatio dati.) Si enim fieri potest: sit linea recta ab : & super ea duabus rectis $\alpha\gamma$, $\gamma\beta$, constitutis: alia duae linea rectae ad , $\delta\beta$ constituantur aequales altera alterae: ad aliud atque aliud punctum γ , & δ : in easdem partes γ , & δ : eosdem habentes terminos α , & β : quos linea recta primae: ita ut $\gamma\alpha$ equalis sit $\delta\alpha$: & eundem habeat terminum α : recta vero $\gamma\beta$, sit equalis rectae $\delta\beta$: & eundem cum ea habeat terminum β . (Delineatio.) Et ducatur recta $\gamma\delta$. (Demonstratio.) Quoniam $\alpha\gamma$ recta, est equalis rectae ad : etiā angulus $\alpha\gamma\delta$, erit equalis angulo $ad\gamma$. Verum angulus $ad\gamma$, maior est angulo $\delta\gamma\beta$: multo ergo angulus $\gamma\delta\beta$, maior est angulo $\delta\gamma\beta$. Item, quoniam latius $\gamma\beta$, est aequale lateri $\delta\beta$: erit etiam angulus $\gamma\delta\alpha$: angulo $\delta\gamma\beta$ equalis. Verum ille
ipse

ipse angulus $\gamma\delta\alpha$: demonstratus est esse maior
 maior angulo $\delta\gamma\beta$, quod fieri nequit. (Conclu-
 fio.) Super eadem igitur recta: duabus visdem
 rectis: alie due recte aequales altera altere: nō
 statuentur ad aliud atq; aliud punctū: in eas-
 dem partes: eosdem habentes terminos, quos
 linea prima. Id quod erat demonstrandum.

Proposicio octava. Theorema.

SI duo trianguli, duo latera duobus
 lateribus habuerint aequalia alterū
 alteri: habuerint verō basin, æqua-
 lem basi: etiam angulum angulo habe-
 bunt æqualē, quem æquales illę lineę
 rectę continent.

Explicatio dati:) Sint duo trianguli $\alpha\beta\gamma$,
 $\delta\epsilon\zeta$: habentes duo latera $\alpha\beta$, $\alpha\gamma$: duobus late-
 ribus $\delta\epsilon$, $\delta\zeta$, aequalia, alterum alteri: latus sci-
 licet $\alpha\beta$, æquale lateri $\delta\epsilon$: & latus $\alpha\gamma$, æquale
 lateri $\delta\zeta$: item basin $\beta\gamma$, æqualē basi $\epsilon\zeta$. (Ex-
 plicatio quesiti.) Dico quod angulus $\beta\alpha\gamma$, sit
 æqualis angulo $\alpha\delta\zeta$. (Delineatio.) Quando e-
 nim triangulus $\alpha\beta\gamma$, applicatur triangulo
 $\delta\epsilon\zeta$: & punctum β , ponitur super puncto ϵ : li-
 nea

EVCLIDIS

nōa quoq; recta $\beta\gamma$, applicatur recta $\epsilon\zeta$: tum
 punctum γ , etiam applicabitur puncto ζ : quia
 recta $\beta\gamma$: est aequalis rectae $\epsilon\zeta$. (Demonstratio.)
 Quando verò recta $\beta\gamma$, applicatur recta $\epsilon\zeta$:
 applicabuntur etiam rectae $\beta\alpha$, $\alpha\gamma$, rectis $\epsilon\delta$,
 $\delta\zeta$. Si enim basis $\beta\gamma$, applicatur basi $\epsilon\zeta$, & la-
 tera $\beta\alpha$, $\alpha\gamma$, non applicentur lateribus $\epsilon\delta$, $\delta\zeta$:
 verum diuersum habuerint situm, ut rectae
 en, $\eta\zeta$: constituentur super eadem linea recta:
 duabus eisdem rectis: aliae duae rectae aequales
 altera alterae: ad aliud, atq; aliud punctum ad
 easdem partes: eosdē habentes terminos, quos
 lineae primae. sed non statuentur ad diuersum
 punctum. Quare falsum est: quod applicata ba-
 sis $\beta\gamma$, basi $\epsilon\zeta$: nō applicetur $\beta\alpha$, $\beta\gamma$, latera: la-
 teribus $\epsilon\delta$, $\delta\zeta$. applicabūtur ergo. Vnde sequi-
 tur, quod angulus $\beta\alpha\gamma$, applicabitur angulo
 $\epsilon\delta\zeta$, & ei erit aequalis. (Conclusio.) Si igitur
 duo trianguli, duo latera duobus lateribus ha-
 buerint equalia alterum alteri: habuerint ve-
 rò basim basi aequalem: etiam angulum an-
 gulo habebunt aequalem, quem aequales illae
 rectae lineae continent. Id quod erat demon-
 strandum.

Propo-

Propositio nona. Problema.

Datum angulum rectilineum: per medium secare: vel in duas partes æquales secare.

Explicatio dati.) Sit datus angulus rectilineus $\beta\alpha\gamma$. (*Explicatio quesiti.)* Angulus $\beta\alpha\gamma$: secandus est in duas partes æquales. (*Delineatio.)* Sumatur in linea $\alpha\beta$, punctum quoddam d : & tollatur ex linea $\alpha\gamma$: linea ad : æqualis rectæ lineæ αc : postea ducatur linea $d\epsilon$: & statuatur super linea $d\epsilon$: triangulus æquilaterus $d\epsilon\zeta$: denique ducatur linea $\alpha\zeta$. (*Explicatio iam factæ delineationis.)* Dico quod linea $\beta\zeta$: in duas partes æquales secet angulum $\beta\alpha\gamma$. (*Demonstratio.)* Quoniam recta ad : æqualis est rectæ αc : & communis est recta $\alpha\zeta$: idcirco duolatera $d\alpha, \alpha\zeta$: duobus lateribus $\epsilon\alpha, \alpha\zeta$: sunt æqualia alterum alteri: & basis $d\zeta$: æqualis basi $\epsilon\zeta$. Angulus igitur $d\alpha\zeta$: angulo $\epsilon\alpha\zeta$ est æqualis. (*Conclusio.)* Datus igitur angulus rectilineus $\beta\alpha\gamma$: per lineam rectam $\alpha\zeta$: est dissectus in duas partes æquales. Id quod faciendum erat.

EVCLIDIS

Propositio decima. Problema.

DAtam lineam rectam finitam: in
duas partes equales secare.

Explicatio dari.) Sit data linea re-
cta finita ab . *Explicatio quesiti.)* Linea re-
cta finita ab : dissecanda est in duas partes a-
quales. *(Delineatio. Statuatur super recta*
 ab : *triangulus equilaterus* aby : *et secetur*
angulus aby : *in duas partes equales, per li-*
neam rectam $y\beta$. *(Explicatio facta delinea-*
tionis.) Dico quod recta ab : secta sit in duas
partes equales, in puncto d . *(Demonstratio.)*
Quoniam recta ay : est equalis recte $y\beta$: &
communis recta $y\delta$: duo igitur latera ay , $y\delta$:
duobus lateribus βy , $y\delta$ sunt equalia alteru
alteri: & angulus $ay\delta$, est equalis angulo
 $\beta y\delta$. Ergo basis ad : est equalis basi βd . *(Con-*
clusio. Data igitur linea recta finita ab : secta
est in duas partes equales in puncto d . Id quod
faciendum erat.

Propositio undecima. Problema.

DAtæ lineę rectę: a dato in ea pun-
cto: ducere lineam rectam ad an-
gulos

gulos rectos: id est, rectos facientē angulos.

Explicatio dati.) Sit data linea recta ab : & datum in ea punctum γ . (*Explicatio quaesiti.*) Ducenda est à puncto γ : linea recta, rectos faciens angulos cum linea ab . (*Delineatio.*) Sumatur in linea ay , quoduis punctum δ : & fiat linea $\gamma\delta$, aequalis lineae γe . Et statuatur super linea δe : triangulus aequilaterus $\delta\zeta e$: de niq; ducatur recta $\zeta\gamma$. (*Explicatio factae delineationis.*) Dico, quod datae lineae rectae ab : à dato in ea puncto γ : ad angulos rectos, ducta sit recta linea $\gamma\zeta$. (*Demonstratio.*) Quoniam recta $\delta\gamma$: est aequalis rectae γe : communis verò recta $\zeta\gamma$. Duo igitur latera $\delta\gamma$, $\delta\zeta$: duobus lateribus $\epsilon\gamma$, $\gamma\zeta$, sunt aequalia alterum alteri: & basis $\delta\zeta$: aequalis est basi $\epsilon\zeta$. ergo angulus $\delta\gamma\zeta$: aequalis est angulo $\epsilon\gamma\zeta$, (& sunt $i\phi\acute{e}\zeta\eta\delta$. id est, vicini.) Quando verò recta super recta stans: angulos vicinos aequales fecerit inter se: uterq; equalium angulorum est rectus. Ergo uterq; angulorum $\delta\gamma\zeta$, $\zeta\gamma e$, est rectus. *Conclusio.*) Datae igitur lineae rectae ab : à dato quod in ea est puncto γ : ad angulos rectos, du-

EVCLIDIS

Est est recta $\eta\gamma$. Id quod faciendum erat.

Propositio duodecima. Problema.

AD lineam rectam datā infinitam:
à dato puncto: quod in ea nō est:
perpendicularem rectam lineam
ducere.

(Explicatio dati.) Sit data linea recta in
finita $\alpha\beta$: & punctum quod in ea non est, datū
 γ . (Explicatio quesiti.) A puncto dato γ : ad
datam lineam rectam infinitam $\alpha\beta$: ducenda
est linea recta perpendicularis. (Delineatio.)
Sumatur ex altera parte lineæ $\alpha\beta$, punctum
quodvis δ : & centro γ , intervallo $\gamma\delta$: descri-
batur circulus $\epsilon\zeta\eta$: secans lineam $\alpha\beta$, in pun-
ctis ϵ , & η . Postea dissecetur linea recta $\epsilon\eta$: in
duas partes æquales in puncto θ . & ducantur
lineæ rectæ $\gamma\eta$, $\gamma\theta$, $\gamma\epsilon$. (Explicatio iam factæ
delineationis.) Dico quod ad lineam rectam
datam infinitam $\alpha\beta$: à puncto γ dato, quod in
ea non est: perpendicularis ducta sit recta li-
nea $\gamma\theta$. (Demonstratio.) Quoniam recta $\eta\theta$,
æqualis est rectæ $\theta\epsilon$: & communis recta $\theta\gamma$. er-
go duo latera $\eta\theta$, $\theta\gamma$: duobus lateribus $\epsilon\theta$, $\theta\gamma$.
sunt

sunt equalia alterum alteri: & basis $\gamma\eta$, basi $\gamma\epsilon$, est equalis. quare angulus $\gamma\theta\eta$: angulo $\epsilon\theta\delta$ est equalis: & sunt vicini. Quando verò recta super recta stans angulos vicinos equalis inter se fecerit: uterq; equalium illorū angulorum est rectus. & recta super recta stans: perpendicularis ad eam dicitur. (Conclusio.) Ad datam igitur lineam rectam infinitā $\alpha\beta$: à puncto γ dato quod in ea non est: perpendicularis ducta est recta $\gamma\delta$. Id quod faciendum erat.

Propositio decima tertia: Theorema.

Vt recta super recta stans, angulos fecerit: vel duos rectos: vel duobus rectis equales eos faciet.

Explicatio dati.) Recta quedam $\alpha\beta$, stans super recta $\gamma\delta$, faciat angulos $\gamma\beta\alpha$, $\alpha\beta\delta$. Explicatio quesiti.) Dico quod anguli $\gamma\beta\alpha$, $\alpha\beta\delta$: vel sint duo recti: vel duobus rectis equales. Delineatio cum hypothesi.) Si igitur angulus $\gamma\beta\alpha$, equalis est angulo $\alpha\beta\delta$: tum sunt duo recti. quod si verò non: tum ducatur à puncto ϵ , recta linea $\gamma\delta$: ad angulos rectos; linea recta $\beta\alpha$. (Demonstratio.) Anguli igitur $\gamma\beta\epsilon$:

EVCLIDIS

$\angle \beta \delta$: sunt duo recti . & cum angulus $\gamma \beta \epsilon$, sit
 equalis duobus angulis $\gamma \beta \alpha$, $\alpha \beta \epsilon$: communis
 addatur angulus $\epsilon \beta \delta$. quare duo anguli $\gamma \beta \epsilon$,
 $\epsilon \beta \delta$: tribus angulis $\gamma \beta \alpha$, $\alpha \beta \epsilon$, $\epsilon \beta \delta$: sunt æ-
 quales. Rursus quoniam angulus $\delta \beta \alpha$ equa-
 lis est duobus angulis $\delta \beta \epsilon$, $\epsilon \beta \alpha$: communis ad-
 datur angulus $\alpha \beta \gamma$. anguli igitur $\delta \beta \alpha$, $\alpha \beta \gamma$:
 tribus angulis $\delta \beta \epsilon$, $\epsilon \beta \alpha$, $\alpha \beta \gamma$, sunt æquales.
 Verum demonstratum est, angulos $\gamma \beta \epsilon$, $\epsilon \beta \delta$:
 tribus ijsdem angulis, esse æquales. Quæ vero
 eidem sunt æqualia : illa inter se sunt æqualia.
 ergo anguli $\gamma \beta \epsilon$, $\epsilon \beta \delta$: sunt duobus angulis
 $\delta \beta \alpha$, $\alpha \beta \gamma$, æquales, sed anguli $\gamma \beta \epsilon$, $\epsilon \beta \delta$: sunt
 duo recti. ergo $\delta \beta \alpha$, $\alpha \beta \gamma$, anguli : sunt æqua-
 les duobus rectis. Conclusio.) Vt ut igitur re-
 cta super recta stans : fecerit angulos : vel duos
 rectos : vel duobus rectis æquales faciet . Id
 quod erat demonstrandum.

Propositio decima quarta. Theorema.

S I ad lineam quandã rectam : & pun-
 ctum in ea datum : duæ rectæ, nō in
 easdẽ partes sitæ : angulos ($\epsilon \phi \epsilon \eta \epsilon$)
 vicinos, duobus rectis angulis æqua-
 les

les fecerint: duæ istę rectę, et altera alterę erunt.

Explicatio dati.) Nam ad lineam quandam rectam ab : et ad punctum in ea datum β : duæ rectę lineę $\beta\gamma$, $\beta\delta$: non in easdem partes sitę: faciant angulos in° vicinos $\alpha\beta\gamma$, $\alpha\beta\delta$, æquales duobus rectis. *Explicatio quesiti.)* Dico quod rectę $\gamma\epsilon$, sit et in° rectę $\beta\delta$. *Delineatio.)* Si enim rectę $\beta\gamma$, non est et in° rectę $\epsilon\delta$: sit rectę $\beta\epsilon$, rectę $\gamma\beta$, et in° rectę. *Demonstratio.)* Quoniam rectę ab : constituta est super rectę $\gamma\epsilon$, anguli igitur $\alpha\beta\gamma$, $\alpha\beta\epsilon$: sunt æquales duobus rectis. Verum anguli $\alpha\beta\gamma$, $\alpha\beta\delta$: etiam sunt æquales duobus rectis. anguli igitur $\gamma\beta\alpha$, $\alpha\beta\epsilon$: anguli $\gamma\beta\alpha$, $\alpha\beta\delta$ sunt æquales. Communis auferatur angulus $\alpha\beta\gamma$. reliquus igitur angulus $\alpha\beta\epsilon$: reliquo angulo $\alpha\beta\delta$, est æqualis, minor maiori. quod fieri nequit. Quare rectę $\beta\epsilon$: nō est et in° rectę $\beta\gamma$. Similiter etiam demonstrabimus, quod nulla alię præter rectę $\beta\delta$: sit et in° rectę $\gamma\delta$. *Conclusio.)* Ergo rectę $\gamma\beta$, est et in° rectę $\beta\delta$. Si igitur ad lineam quandā rectam: et punctū in ea

EVCLIDIS

datum: duæ rectæ non in easdem partes sitæ:
 angulos $\text{æ}\phi\epsilon\zeta\eta\varsigma$ duobus rectis angulis fece-
 rint æquales: duæ istæ rectæ $\text{æ}\tau\omega$ $\text{æ}\lambda\theta\epsilon\iota\alpha\varsigma$, erunt
 altera altera. Id quod erat demonstrandum.

Propositio decimaquinta. Theorema.

SI duæ lineæ rectæ, sese mutuo secant:
 facient angulos ad verticem, inter
 se æquales.

Explicatio dati.) Duæ enim lineæ rectæ
 ab , $\gamma\delta$ sese mutuo secant in puncto ϵ . (Expli-
 catio quaesiti.) Dico quod angulus $ae\gamma$, angu-
 lo $de\beta$ sit æqualis: & angulus $\gamma e\delta$, angulo
 $ae\delta$ etiam æqualis. (Demonstratio.) Quoniam
 recta ae , super recta $\gamma\delta$, constituta est: & fa-
 cit angulos γea , $ae\delta$. anguli igitur γea , $ae\delta$
 duobus rectis sunt æquales. Item quoniam re-
 ctæ de super recta ab , est constituta, facit
 angulos $ae\delta$, $de\beta$. anguli igitur $ae\delta$, $de\beta$ sunt
 æquales duobus rectis. Verum anguli γea ,
 $ae\delta$ duobus rectis sunt æquales. quare duo an-
 guli γea , $ae\delta$ sunt æquales duobus angulis
 $ae\delta$, $de\beta$. Communis auferatur angulus $ae\delta$.
 reliquus igitur angulus γea : reliquo angulo
 $de\beta$

Red est equalis. Simili demonstratione, probabimus angulum $\gamma\epsilon\beta$: angulo $\delta\epsilon\alpha$ esse equallem. Conclusio.) Si igitur duæ rectæ sese mutuò secant: facient angulos ad verticem inter se aequales. Id quod erat demonstrandum.

Corollarium. Ex hoc est manifestum, quòd quæcunq; lineæ rectæ sese mutuò secant: faciunt angulos ad punctum sectionis: quatuor rectis aequales.

Propositio decimasexta. Theorema.

OMnis trianguli, vno ex lateribus producto: angulus extraneus, viroque eorum, qui intra trigulum sunt, quibus ipse opponitur, est maior.

Explicatio dati.) Sit triangulus $\alpha\beta\gamma$: & protrahatur latus eius $\beta\gamma$, ad punctum δ . Explicatio quesiti.) Dico quòd angulus $\alpha\beta\delta$: est maior angulo $\gamma\beta\alpha$, interno sibi opposito: & maior angulo $\beta\alpha\gamma$, interno sibi opposito. Delineatio.) Diffecetur latus $\alpha\gamma$, in duas partes aequales in puncto ϵ . deinde ducatur linea $\beta\epsilon$: & producat ad punctum ζ . Fiat etiam lineæ

B v

EVCLIDIS

Be, qualis linea eſt: deniq, ducatur linea Zy: & extendatur recta ay, ad punctum vſq, n. Demonſtratio.) Quoniam recta ae, equalis eſt recte ay: & recta Be, equalis recte eſt. duo igitur latera ae, eſt: duobus lateribus ya, eſt ſunt equalia alterum alteri: & angulus aay, equalis eſt angulo Zez. quia ſunt anguli ad verticem. Baſis igitur aB: baſi Zy, erit equalis: & triangulus aBe, equalis erit triangulo Zez: & reliqui anguli, reliquis angulis ſunt equaliter alter alteri. quas equalia illa latera ſubtendunt. itaq, angulus Baar, equalis eſt angulo eZz. Verum angulus ayd, maior eſt angulo eZz. quare angulus ayd, angulo Baar. etiam eſt maior. Similiter demonſtrabitur, quando recta By, diſſecta fuerit in duas partes equaliter: quod angulus Byn, hoc eſt, angulus ayd, maior ſit angulo aBy. Concluſio.) Omnis igitur trianguli, vno ex lateribus protracto: extraneus angulus, vtroq, eorum, qui intra triangulum ſunt, quibus ipſe opponitur eſt maior. Id quod erat demonſtrandum.

Propa-

Propositio decima septima, Theorema.

Omnis trianguli: quivis duo anguli: duobus rectis angulis sunt minores, quovis modo sunt.

Explicatio dati.) Sit triangulus $ab\gamma$.
Explicatio quesiti.) Dico quod trianguli $ab\gamma$: duo anguli sint minores duobus rectis, quovis modo sumpti. *Delineatio.)* Producat^r linea $b\gamma$, ad punctum δ . *Demonstratio.)* Quoniam trianguli $ab\gamma$, angulus extraneus $\alpha\gamma\beta$: maior est angulo $ab\gamma$, interno sibi opposito. Communis addatur angulus $\alpha\gamma\beta$. anguli igitur $\alpha\gamma\delta$, $\alpha\gamma\beta$: sunt maiores angulis $ab\gamma$, $\beta\gamma\alpha$. Verum anguli $\alpha\gamma\delta$, $\alpha\gamma\beta$: sunt duo recti. ergo anguli $ab\gamma$, $\beta\gamma\alpha$, sunt minores duobus rectis. Simili ratione demonstrabimus angulos $\beta\alpha\gamma$, $\alpha\gamma\beta$: duobus rectis esse minores. Item & angulos $\alpha\gamma\beta$, $ab\gamma$: duobus rectis esse minores. *Conclusio.)* Omnis igitur trianguli, quivis duo anguli: minores sunt duobus angulis rectis. Id quod erat demonstrandum.

Propo-

EVCBIDIS

Propositio decima octaua. Theorema.

VT quoduis latus trianguli est maius: ita maiorem subtendit angulum.

Explicatio dati.) Sit triangulus $\alpha\beta\gamma$: habens latus $\alpha\gamma$, maius latere $\alpha\beta$. *Explicatio quesiti.)* Dico quod angulus $\alpha\beta\gamma$: maior sit angulo $\alpha\gamma\beta$. *Delineatio.)* Cum enim latus $\alpha\gamma$, sit maius latere $\alpha\beta$: fiat linea $\alpha\delta$, equalis recta $\alpha\delta$: & ducatur recta $\beta\delta$. *Demonstratio.)* Quoniam trianguli $\beta\delta\gamma$, angulus $\alpha\delta\beta$ externus: maior est angulo $\delta\gamma\beta$, interno sibi opposito: & angulus $\alpha\delta\beta$, sit equalis angulo $\alpha\beta\delta$: cum latus $\alpha\beta$, lateri $\alpha\delta$ sit equale. idcirco angulus $\alpha\beta\delta$: maior est angulo $\alpha\gamma\beta$. Ergo angulus $\alpha\beta\gamma$, multo est maior angulo $\alpha\gamma\beta$. *Conclusio.)* Vt quoduis igitur latus trianguli est maius: ita maiorem subtendit angulum. id quod erat demonstrandum.

Propositio decima nona. Theorema.

VT triangulus aliquis, angulum quemuis habuerit maiorem: ita etiam maiorem habebit eam lineam rectam, quę illum subtendit angulum.

Expli-

Explicatio dati.) Sit triangulus $ab\gamma$: habens angulū $ab\gamma$, maiorem angulo $a\gamma\beta$. *Explicatio quesiti.)* Dico quod trianguli $ab\gamma$: latus $a\gamma$, maius sit latere $a\beta$. *Demonstratio.)* Si enim non fuerit maius: cum vel erit ei æquale: vel erit eo minor. sed recta $a\gamma$, non est æqualis rectæ $a\beta$. nam & angulus $ab\gamma$, angulo $a\gamma\beta$ esset æqualis. id quodd tamen non est. quare neq; latus $a\gamma$. lateri $a\beta$, erit æquale: neque etiam latus $a\gamma$, poterit esse minus latere $a\beta$. quia etiam angulus $ab\gamma$, minor esset angulo $a\gamma\beta$: cum tamen non sit. Quare neq; latus $a\gamma$, minus est latere $a\beta$. antea autem demonstratum est. quod ei non sit æquale. Erit ergo $a\gamma$ latus, maius latere $a\beta$. *Conclusio.)* Omnis igitur trianguli, maiorē angulum maius latus subtendit. Id quod erat demonstrandum.

Propositio vigesima. Theorema.

Omnis trianguli: quævis duo latera, sunt maiora reliquo.

Explicatio dati.) Sit triangulus $ab\gamma$. *Explicatio quesiti.)* Dico quod trianguli $ab\gamma$. quævis duo latera, sint maiora reliquo.

EVCLIDIS

quo. latera $\beta\alpha, \alpha\gamma$, maiora latere $\beta\gamma$: Item latera $\alpha\beta, \beta\gamma$, maiora latere $\alpha\gamma$: deniq, latera $\beta\gamma, \gamma\alpha$, maiora latere $\alpha\beta$. Delineatio.) Producat^rur linea $\beta\alpha$, ad punctum δ : & fiat linea $\alpha\gamma$, equalis linca $\alpha\delta$: deniq, ducatur linea $\gamma\delta$. Demonstratio.) Quoniam latus $\delta\alpha$, equale est lateri $\alpha\gamma$: etiam angulus $\alpha\delta\gamma$, est equalis angulo $\alpha\gamma\delta$. Verum angulus $\alpha\gamma\delta$, maior est angulo $\alpha\delta\gamma$. quare & angulus $\beta\gamma\delta$, angulo $\alpha\delta\gamma$, maior erit. & quia triangulus $\delta\gamma\beta$, angulum $\beta\gamma\delta$ maiorem habet angulo $\alpha\gamma\delta$: atq, maius latus subtendit angulum maiore: idcirco & latus $\delta\beta$, maius est latere $\beta\gamma$. Sed $\delta\beta$ latus, equale est $\alpha\beta$, $\alpha\gamma$ lateribus. quare $\beta\alpha, \alpha\gamma$, duo latera: sunt maiora latere $\beta\gamma$. Similiter demonstrabimus, quod latera $\alpha\beta, \beta\gamma$, sint maiora latere $\alpha\gamma$: & $\beta\gamma, \gamma\alpha$ latera sine maiora latere $\alpha\beta$. Conclusio.) Omnis igitur trianguli, quævis duo latera: sunt maiora reliquo. id quod erat demonstrandum.

Propositio vigesima prima. Theorema.

S I a finibus vnⁱus lateris trianguli scilicet, duæ rectæ lineæ intra triangulum

ad punctū idē statuatur: erunt quidē istæ duæ rectæ lineæ, reliquis duobus trianguli lateribus minores: verūma maiorem angulum comprehendent.

Explicatio dati.) Super latere enim $\beta\gamma$ trianguli $\alpha\beta\gamma$: à finibus β , & γ , duæ lineæ rectæ $\beta\delta$, $\delta\gamma$ statuatur intra triangulum. *Explicatio quesiti.*) Dico quod duæ rectæ $\beta\delta$, $\delta\gamma$: minores quidē sint reliquis duobus trianguli lateribus $\beta\alpha$, $\alpha\gamma$: verum angulum $\beta\delta\gamma$, maiorem angulo $\beta\alpha\gamma$, contineant. *Delineatio.*) Producat̃ur enim linea $\beta\delta$: ad punctum vsq̃ e. *Demonstratio.*) Quoniam omnis trianguli duo latera maiora sunt reliquo: idcirco trianguli $\alpha\beta\epsilon$, duo latera $\alpha\beta$, $\alpha\epsilon$ sunt maiora latere $\beta\epsilon$. Commune addatur latus $\epsilon\gamma$. latera igitur $\beta\alpha$, $\alpha\gamma$, maiora sunt lateribus $\beta\epsilon$, $\epsilon\gamma$. Item quia trianguli $\gamma\epsilon\delta$, duo latera $\gamma\epsilon$, $\epsilon\delta$ maiora sunt latere $\gamma\delta$. Cōmune addatur latus $\delta\beta$. quare latera $\gamma\epsilon$, $\epsilon\beta$: maiora sunt lateribus $\gamma\delta$, $\delta\beta$. Verum latera $\beta\alpha$, $\alpha\gamma$: demonstrata sunt maiora lateribus $\beta\epsilon$, $\epsilon\gamma$. ergo $\beta\alpha$, $\alpha\gamma$ latera, lōge erūt maiora lateribus $\beta\delta$, $\delta\gamma$. Rurſus quoniā omnis triāguli angulus exiſtens,

angulo

EVCLIDIS

angulo intra triangulum sibi opposito est maior: idcirco trianguli $\gamma\delta\epsilon$, angulus $\beta\delta\gamma$ extraneus, angulo $\gamma\delta\epsilon$ interno sibi opposito est maior. Per eadem demonstrabitur, quod trianguli $\alpha\beta\epsilon$, angulus $\gamma\epsilon\beta$: maior sit angulo $\beta\alpha\gamma$. Verum angulo $\gamma\epsilon\beta$, maior est demonstratus angulus $\beta\delta\gamma$. Ergo angulus $\beta\delta\gamma$: multò est maior angulo $\beta\alpha\gamma$. (Conclusio.) Si igitur à finibus unius lateris trianguli cuiusvis, duæ rectæ lineæ intra triangulum, ad puncta eadē statuantur: erūt quidem istæ duæ rectæ lineæ, reliquis duobus trianguli lateribus minores: verum maiorem angulū comprehendent. Id quod erat demonstrandum.

Propositio vigesima secunda. Problema.

EX tribus lineis rectis: quæ sunt æquales tribus rectis lineis datis: triangulum constituere. Oportet verò quasvis duas reliqua esse maiores: propterea quod in omni triangulo quævis duo latera, maiora sint reliquo.

Explicatio dati,) Sint tres lineæ rectæ datæ α, β, γ : & sint quævis duæ maiores quàm
reli-

reliqua: scilicet α & β maiores quàm γ : & α ,
 atq; γ , maiores quàm β : deniq; β , & γ , maio-
 res quàm α . Explicatio quæsitæ.) Oportet igitur
 ex tribus lineis rectis: quæ datis tribus, α ,
 β , γ , sunt æquales: triangulum componere.
 Delineatio.) Sumatur recta aliqua linea $\delta\epsilon$:
 finita quidem ad punctum δ : infinita verò ad
 punctum ϵ . deinde fiat lineæ rectæ α : æqualis
 lineæ rectæ $\delta\zeta$. Item rectæ β : æqualis rectæ $\zeta\eta$.
 præterea rectæ γ : æqualis rectæ $\eta\theta$. Ad hac
 centro ζ , intervallo $\zeta\delta$: describatur circulus
 $\delta\kappa\lambda$. centro etiam η , intervallo $\eta\theta$: describa-
 tur circulus $\kappa\lambda\eta$: secans circulum $\delta\eta\lambda$, in pun-
 cto κ . Denique ducantur lineæ rectæ $\zeta\kappa$, $\kappa\eta$.
 Delineationis factæ explicatio.) Dico quòd ex
 lineis rectis tribus, quæ sunt æquales tribus re-
 ctis datis: compositus sit triangulus $\kappa\zeta\eta$. De-
 monstratio.) Quoniam punctum ζ , centrum est
 circuli $\delta\kappa\lambda$. idcirco recta $\zeta\delta$, æqualis est rectæ
 $\zeta\eta$: verum recta $\zeta\delta$, est æqualis rectæ α : itaq;
 & $\kappa\zeta$ recta, æqualis est rectæ α . Item quoniam
 punctum η , est centrum circuli $\kappa\lambda\eta$: idcirco re-
 ctæ $\eta\theta$, est æqualis rectæ $\eta\kappa$. verum $\eta\theta$ æqua-
 lis est γ rectæ, ergo & $\eta\kappa$ recta, æqualis est re-

EVCLIDIS

*Et γ . Verum $\zeta\eta$, etiam est equalis recte β .
Tres igitur recte $\alpha\zeta$, $\zeta\eta$, $\eta\alpha$: tribus rectis α ,
 β , γ , sunt equales. Conclusio.) Ex tribus igitur
rectis $\alpha\zeta$, $\zeta\eta$, $\eta\alpha$, quæ sunt equales tribus
datis γ , β , γ , rectis: triangulus est factus $\alpha\zeta\eta$.
Quod faciendum erat.*

Propositio vigesima tertia. Problema.

AD datam lineam rectam: & datu
in ea punctum: dato angulo res
ctilineo: æqualem angulum re
ctilineum statuere.

*Explicatio dati.) Sit data linea recta $\alpha\beta$
sit datum in ea punctum α : sit angulus recti
lineus datus $\delta\gamma\epsilon$. Explicatio quaesiti.) Ad li
neam rectam datam $\alpha\beta$ & punctum in ea da
tum α : statuendus est angulus rectilineus: æ
qualis angulo $\delta\gamma\epsilon$ rectilineo dato. Delinea
tio.) Sumantur in lineis rectis $\gamma\delta$, $\gamma\epsilon$, puncta
quævis δ , ϵ . Ducatur etiã linea recta $\delta\epsilon$. Post
ea ex talibus lineis rectis quæ sunt equales tri
bus rectis $\gamma\delta$, $\delta\epsilon$, $\gamma\epsilon$, componatur triangulus
 $\alpha\zeta\eta$: sic ut linea $\gamma\delta$, sit equalis linea $\alpha\zeta$: & li
nea $\gamma\epsilon$, linea $\alpha\eta$, item linea $\delta\epsilon$, equalis linea
 $\zeta\eta$.*

(En. Demonstratio.) Quoniam duo latera $\delta\gamma$, $\gamma\epsilon$, duobus lateribus $\zeta\alpha$, $\alpha\eta$ sunt, equalia alterum alteri: & basis $\delta\epsilon$, equalis sit basi $\zeta\eta$. Erit igitur angulus $\delta\gamma\epsilon$, equalis angulo $\zeta\alpha\eta$. *Conclusio.)* Ad datam igitur lineam rectam $\alpha\beta$: & ad punctum in ea datum α : dato angulo rectilineo $\delta\gamma\epsilon$: constitutus est angulus rectilineus $\zeta\alpha\eta$. Id quod erat faciendum.

Propositio vigesima quarta. Theorema.

SI fuerint trianguli vnus, duo latera equalia duobus lateribus alterius trianguli, alteri alteri: sed angulus vnus maior angulo alterius, quæ æquales rectæ lineæ comprehendunt: etiam basis basi maior erit.

Explicatio dati.) Sint duo trianguli $\alpha\beta\gamma$, $\delta\epsilon\zeta$: quorum duo latera $\alpha\beta$, $\alpha\gamma$, duobus lateribus $\delta\epsilon$, $\delta\zeta$ sint equalia, alterum alteri: latus $\alpha\beta$, lateri $\delta\epsilon$: & latus $\alpha\gamma$, lateri $\delta\zeta$: sed angulus $\beta\alpha\gamma$ sit maior angulo $\epsilon\delta\zeta$. *Explicatio quesiti.)* Dico quod basis $\beta\gamma$, basi $\epsilon\zeta$ sit maior. *Delineatio.)* Quoniā angulus $\beta\alpha\gamma$ maior est angulo $\epsilon\delta\zeta$: statuatur ad lineam rectā $\epsilon\delta$:

EUCLIDIS

Et ad punctum in ea d : angulus $ed\eta$, equalis
 angulo $\beta\alpha\gamma$: & fiat alterutra linearum $\alpha\gamma$,
 $d\zeta$: equalis linea recta $d\eta$. & ducantur linea
 recta $\eta\epsilon$, $\zeta\eta$. Demonstratio.) Quoniam latus
 $\alpha\beta$, equalis est lateri $d\epsilon$: & latus $\alpha\gamma$, equalis
 est lateri $d\eta$: duo igitur latera $\beta\alpha$, $\alpha\gamma$, duobus
 lateribus ed , $d\eta$ sunt equalia, alterum alteri
 & angulus $\beta\alpha\gamma$, equalis est angulo $ed\eta$. Ergo
 basis $\beta\gamma$, basi $\eta\epsilon$ est equalis. Item quoniam
 latus $d\eta$, est equalis lateri $d\zeta$: erit etiam an-
 gulus $d\zeta\eta$, equalis angulo $d\eta\zeta$. ergo angulus
 $d\zeta\eta$ maior est angulo $\eta\epsilon\zeta$. quare angulus $\epsilon\zeta\eta$,
 longè maior est angulo $\eta\epsilon\zeta$. Cum etiam trian-
 gulus $\epsilon\zeta\eta$, habeat angulum $\epsilon\zeta\eta$, maiorem an-
 gulo $\eta\epsilon\zeta$: ac maiorem angulum maius latus
 subcendat. idcirco latus $\eta\epsilon$, maius est latere $\epsilon\zeta$.
 Verum latus $\eta\epsilon$, equalis est lateri $\beta\gamma$. ergo &
 $\beta\gamma$ latus, maius est latere $\epsilon\zeta$. Conclusio.) Si er-
 go duo fuerint trianguli, habentes duo latera,
 duobus lateribus equalia, alterum alteri: an-
 gulum verò angulo maiorem, qui equalibus
 illis lateribus continetur: etiam basin basi ma-
 iorem habebunt. Id quod erat demonstrandū.

Propo-

Propositio vigesima quinta. Theorema.

SI trianguli vnus, duo latera fuerint equalia duobus lateribus trianguli alterius: sed basis vnus fuerit maior basi alterius: erit etiam angulus vnus maior angulo alterius, quem æquales illæ rectæ lineæ comprehendūt.

Explicatio dati.) Si duo trianguli $ab\gamma$, $ed\zeta$: quorum duo latera ab , ay , sint equalia duobus lateribus de , $d\zeta$, alterum alteri: latius ab , æquale lateri de : & latius ay , æquale lateri $d\zeta$: sed basis $\beta\gamma$, sit maior basi $e\zeta$. *Explicatio quæsitæ.)* Dico quod angulus $\beta a \gamma$, maior sit angulo $e d \zeta$. *Demonstratio.)* Quod si enim non fuerit maior: aut erit ei æqualis: aut eo minor. sed angulus $\beta a \gamma$, non est æqualis angulo $e d \zeta$. nam & basis $\beta\gamma$, etiam esset æqualis basi $e\zeta$. Verum non est ei æqualis. quare nec angulus $\beta a \gamma$, est æqualis angulo $e d \zeta$: sic etiā non est eo minor: siquidem & basis $\beta\gamma$, basi $e\zeta$ minor esset: quod tamen non est. quare nec angulus $\beta a \gamma$, angulo $e d \zeta$ minor est. demonstratum verò antea fuit. quod ei non sit æqualis. *Erit igitur angulus $\beta a \gamma$, angulo $e d \zeta$ maior.*

EVCLIDIS

etiam est æquale lateri $\epsilon\zeta$: duo igitur latera
 $a\beta, \beta\delta$: duobus lateribus $\delta\epsilon, \epsilon\zeta$ sunt equalia
 alterum alteri: & angulus $a\beta\gamma$, angulo $\delta\epsilon\zeta$
 æqualis. basis itaq; $a\gamma$, basi $\delta\zeta$ erit æqualis, &
 reliquus angulus $\beta a\gamma$, reliquo angulo $\epsilon\delta\zeta$ æ-
 qualis. Secunda explicatio dati.) Verum ite-
 rum statuuntur latera æquales angulos sub-
 tendentia equalia, ut $a\beta$ latus, æquale lateri
 $\delta\epsilon$. Secunda explicatio quaesiti.) Dico quod
 etiam reliqua latera, reliquis lateribus sint æ-
 qualia, latus $a\gamma$, æquale lateri $\delta\zeta$: & latus
 $\beta\gamma$, æquale lateri $\epsilon\zeta$: deniq; reliquus angulus
 $\beta a\gamma$, reliquo angulo $\epsilon\delta\zeta$ æqualis. Secunda de-
 lineatio.) Si enim latus $\beta\gamma$, non fuerit æquale
 lateri $\epsilon\zeta$: sed alterum ex eis fuerit maius. sit
 latus $\beta\gamma$, si poterit fieri, maius latere $\epsilon\zeta$: &
 fiat lateri $\epsilon\zeta$, æquale latus $\beta\theta$: & ducatur re-
 cta $a\theta$. Secunda demonstratio.) Quoniam la-
 tus $\beta\theta$, æquale est lateri $\epsilon\zeta$, & latus $a\beta$, æqua-
 le lateri $\delta\epsilon$: duo itaq; latera $a\beta, \beta\theta$: duobus la-
 teribus $\delta\epsilon, \delta\zeta$ sunt equalia alterum alteri: &
 angulos comprehendunt æquales: basis igitur
 $a\theta$, est æqualis basi $\delta\zeta$: & triangulus $a\beta\theta$, tri-
 angulo $\delta\epsilon\zeta$ est æqualis: & reliqui anguli, reli-
 quis

quis angulis sunt æquales alter alteri, quos æqualia illa latera subtendūt: angulus $\epsilon\delta\alpha$, æqualis angulo $\epsilon\zeta\delta$. Verum angulus $\epsilon\zeta\delta$, est æqualis angulo $\beta\gamma\alpha$. ergo angulus $\beta\delta\alpha$, est æqualis angulo $\beta\gamma\alpha$. Trianguli igitur $\alpha\beta\gamma$, angulus $\beta\delta\alpha$ externus: angulo $\beta\gamma\alpha$ interno sibi opposito est æqualis, quod fieri nequit. Quare latus $\beta\gamma$: non est inæquale lateri $\epsilon\zeta$. erit igitur ei æquale. sed & $\alpha\beta$ latus, est æquale lateri $\delta\epsilon$: duo igitur latera $\alpha\beta$, $\beta\gamma$: sunt æqualia duobus lateribus $\delta\epsilon$, $\epsilon\zeta$ alterum alteri: & angulos comprehendunt æquales. basis igitur $\alpha\gamma$, basi $\delta\zeta$ est æqualis: & triangulus $\alpha\beta\gamma$, est æqualis triangulo $\delta\epsilon\zeta$: & reliquus angulus $\beta\alpha\gamma$, reliquo angulo $\epsilon\delta\zeta$ est æqualis. Conclusio.) Quorum ergo triangulorum duo anguli unius, fuerint æquales duobus angulis alterius, alter alteri: & latus unum uni lateri æquale, siue illud appositum sit æqualibus illis angulis: siue subtrahat unum ex æqualibus illis angulis, illorum tum reliqua latera inter se erunt æqualia, alterum alteri: tum etiam reliquus angulus, reliquo angulo erit æqualis. Id quod erat demonstrandum.

EVCLIDIS
PARS ALTERA HV-
ius primi elementi.

Propositio vigesima septima. Theorema.

S I in duas lineas rectas, recta incl-
dens linea, angulos alternos æqua-
les inter se fecerit: equedistantes in-
ter se erunt rectæ illæ duæ lineæ.

Explicatio dati.) In lineas duas rectas $\alpha\beta$,
 $\gamma\delta$: incidens linea recta $\epsilon\zeta$: angulos alternos
 $\alpha\epsilon\zeta$, $\epsilon\zeta\delta$: æquales inter se faciat. *Explicatio*
questi.) Dico quod recta $\alpha\beta$, recta $\gamma\delta$, æque-
distet. *Hypothesis.)* Si enim non æquedistant:
cum protracta linea recta $\alpha\beta$, $\gamma\delta$: concurrūt,
vel ex partibus β & δ : vel ex partibus α , &
 γ . *Delineatio.)* Protrahantur & concurrant
ex partibus β , & δ : in puncto η . *Demonstra-*
tio.) Trianguli igitur $\eta\epsilon\zeta$, angulus $\alpha\epsilon\zeta$ exter-
nus, angulo $\epsilon\zeta\eta$ interno opposito est maior: ve-
rum citius est ei æqualis. quod fieri non potest.
quare recta $\alpha\beta$, $\gamma\delta$, si protrahantur: non con-
current ex partibus β , & δ , similiter demon-
strabitur: quod neq; ex partibus α , & γ , con-
currant.

currant. rectæ vero, quæ ex neutra parte concurrunt, si protrahantur: sunt inter se æquedistantes. quare recta ab , æquedistat rectæ $γδ$. *Conclusio.*) Si igitur in duas lineas rectas, recta incidat lineæ: ac faciat angulos alternos inter se æquales: rectæ istæ lineæ inter se sunt æquedistantes. Id quod erat demonstrandum.

Propositio vigesima octava. Theorema.

Si linea recta, in duas rectas incidens lineas: extraneum angulum, interno cui opponitur ex eadem parte fecerit æqualem: vel si duos internos, ex eadem parte: fecerit æquales duobus angulis rectis: æquedistantes inter se erunt, duæ illæ lineæ rectæ.

Explicatio dati.) In lineas duas rectas ab , incidat linea recta $εζ$: angulum extraneum $εηβ$, interno opposito ex eadē parte angulo $ηδβ$: faciat æqualem: & faciat duos angulos internos, ex eadem parte $βηδ$, $ηδβ$: æquales duobus angulis rectis. (*Explicatio quasi-ri.*) Dico quod recta ab , æquedistat rectæ $γδ$. *Demonstratio.* (Cum primus angulus $εηβ$, sit æqualis

EVLIDIS

qualis angulo $\alpha\theta\delta$: idcirco angulus $\alpha\theta\delta$, etiam
 est equalis angulo $\eta\theta\delta$. & sunt anguli alter-
 ni, quare recta $\alpha\beta$, recta $\gamma\delta$, est equedistans.
 Rursus, quoniam anguli $\beta\eta\theta$, $\eta\theta\delta$, duobus re-
 ctis sunt aequales: & duo anguli $\alpha\theta\delta$, $\beta\eta\theta$, etiā
 duobus rectis aequales: idcirco anguli $\alpha\theta\delta$, $\beta\eta\theta$
 sunt duobus angulis $\beta\eta\theta$, $\eta\theta\delta$ aequales. com-
 munitis auferatur angulus $\beta\eta\theta$, reliquus igitur
 angulus $\alpha\theta\delta$: reliquo angulo $\eta\theta\delta$, est equalis,
 & sunt anguli alterni. ergo recta $\alpha\beta$, equedi-
 stat recte $\gamma\delta$. (Cōclusio.) Si igitur linea recta,
 in duas rectas incidens lineas: ex utraque an-
 gulum interno cui opponitur, ex eadem parte
 fecerit equalem; vel si duos angulos internos,
 ex eadem parte, fecerit aequales duobus angu-
 lis rectis: equedistantes inter se erunt, dua il-
 le lineae rectae. Id quod erat demonstrandum.

Propositio vigesima nona. Theorema.

Linea recta, in duas rectas æquedi-
 stantes lineas incidens: facit angu-
 los alternos inter se æquales: & an-
 gulum externum, interno opposito ex
 eadem parte facit æqualem: item duos
 angu-

angulos internos, ex eadem parte facie
æquales duobus rectis.

Explicatio dati.) Sint due linee rectæ æ-
quedistantes ab , $γδ$: & in eas incidat linea
recta $εζ$. *Explicatio quesiti.)* Dico quod fa-
ciat angulos $αηθ$, $ηθδ$: qui sunt alterni, inter-
ior se æquales: & angulum externum $εηβ$, an-
gulo interno opposito ex eadem parte $ηθδ$, æ-
qualem: & angulos internos ex eadem parte
positos $βηθ$, $ηθδ$: duobus rectis æquales. De-
monstratio cum hypothese.) Si enim angulus
 $αηθ$, non est æqualis angulo $ηθδ$: aliter illorum
erit maior. sit angulus $αηθ$ maior. Quoniam
angulus $αηθ$, maior est angulo $ηθδ$: communis
addatur angulus $βηθ$. ergo anguli $αηθ$, $βηθ$,
sunt maiores angulis $βηθ$, $ηθδ$. Verum angu-
li $αηθ$, $βηθ$: duobus rectis sunt æquales. ergo
anguli $βηθ$, $ηθδ$: duobus rectis sunt minores.
lineæ verò rectæ, à duobus angulis, qui sunt
minores duobus angulis rectis: in infinitum
vsq; ductæ concurrunt. quare rectæ ab , $γδ$ in
infinitum productæ concurrent. sed quia æ-
quedistantes proponuntur esse: nō concurrunt
adcirco angulus $αηθ$, non est inequalis angulo
 $ηθδ$.

EVCLIDIS

$\angle \theta \delta$. erit igitur ei equalis. Verū angulus $\alpha \theta$
 angulo $\epsilon \zeta$ est equalis: ideo etiā angulus $\epsilon \zeta \beta$
 est equalis angulo $\eta \theta \delta$. cōmunis addatur an-
 gulus $\zeta \eta \theta$. ergo anguli $\epsilon \zeta \beta$, $\beta \eta \theta$: angulis $\beta \eta \theta$,
 $\eta \theta \delta$ sunt aequales. verū anguli $\epsilon \zeta \beta$, $\beta \eta \theta$: duo-
 bus rectis sunt aequales. idcirco & anguli $\beta \eta \theta$,
 $\eta \theta \delta$: duobus rectis aequales erunt. Conclusio.)
 Linea igitur recta, in duas aequidistantes li-
 neas rectas incidens: facit alternos angulos, in-
 ter se aequales: & angulum externum, interno
 opposito ex eadem parte facit aequalem: item
 duos angulos internos, ex eadem parte, facit
 aequales duobus rectis. Id quod erat demon-
 strandum.

Propositio trigesima. Theorema.

QUæ eidem lineæ rectæ æquedi-
 stant: illæ etiam inter se æque-
 distant.

Explicatio dati.) Sit linea recta $\epsilon \zeta$, cui æ-
 quidistat rectæ lineæ $\alpha \beta$, $\gamma \delta$. Explicatio quas
 fieri.) Dico quod recta $\alpha \zeta$, etiam æquidistet re-
 ctæ $\gamma \delta$. Delineatio.) Incidas in predictas li-
 neas recta quedam linea $\eta \chi$. Demonstratio.)

Quoniam

Quoniam in duas aequedistantes rectas ab , & cd , incidit recta ng : idcirco angulus anb : est equalis angulo ncd . Præterea quoniam in duas rectas aequedistantes cd , & ab , recta incidit nx : angulus ncd erit equalis angulo anx . demonstratum verò est, quod angulus anx : angulo ncd sit equalis. quare & angulus anb : angulo ncd est equalis, & sunt anguli alterni. Quare recta ab , aequedistat rectæ cd . Conclusio.) Quæ igitur rectæ eidem lineæ rectæ aequedistant: illæ etiam inter se aequedistant. Id quod erant demonstrandum.

Propositio trigesima prima. Problema.

A puncto dato: datæ lineæ rectæ: rectam lineam aequedistantem ducere.

Explicatio dati.) Sit datum punctum a : & data lineæ recta by . Explicatio quesiti.) A dato puncto a : ducenda est lineæ recta, aequedistans lineæ rectæ datæ, by . Delineatio.) Sumatur in lineæ recta by : punctum quodvis d : & ducatur lineæ recta ad : ad lineam rectam ad : & punctum in ea c : angulo rectilineo ady : equali.

EVCIDIS

Propositio decima octaua. Theorema.

VT quoduis latus trianguli est maius: ita maiorem subtendit angulum.

Explicatio dati.) Sit triangulus $\alpha\beta\gamma$: habens latus $\alpha\gamma$, maius latere $\alpha\beta$. *Explicatio quesiti.)* Dico quod angulus $\alpha\beta\gamma$: maior sit angulo $\alpha\gamma\beta$. *Delineatio.)* Cum enim latus $\alpha\gamma$, sit maius latere $\alpha\beta$: fiat linea $\alpha\delta$, æqualis rectæ $\alpha\delta$: & ducatur recta $\beta\delta$. *Demonstratio.)* Quoniam trianguli $\beta\delta\gamma$, angulus $\alpha\delta\beta$ externus: maior est angulo $\delta\gamma\beta$, interno sibi opposito: & angulus $\alpha\delta\beta$, sit æqualis angulo $\alpha\beta\delta$: cum latus $\alpha\beta$, lateri $\alpha\delta$ sit æquale. idcirco angulus $\alpha\beta\delta$: maior est angulo $\alpha\gamma\beta$. Ergo angulus $\alpha\beta\gamma$, multo est maior angulo $\alpha\gamma\beta$. *Conclusio.)* Vt quoduis igitur latus trianguli est maius: ita maiorem subtendit angulum. id quod erat demonstrandum.

Propositio decima nona. Theorema.

VT triangulus aliquis, angulum quemuis habuerit maiorem: ita etiam maiorem habebit eam lineam rectam, quæ illum subtendit angulum.

Expli-

Explicatio dati.) Sit triangulus $ab\gamma$: habens angulū $ab\gamma$, maiorem angulo $a\gamma\beta$. *Explicatio quesiti.)* Dico quod trianguli $ab\gamma$: latus $a\gamma$, maius sit latere $a\beta$. *Demonstratio.)* Si enim non fuerit maius: cum vel erit ei æquale: vel erit eo minor. sed recta $a\gamma$, non est æqualis rectæ $a\beta$. nam & angulus $ab\gamma$, angulo $a\gamma\beta$ esset æqualis. id quod tamen non est. quare neq; latus $a\gamma$, lateri $a\beta$, erit æquale: neque etiam latus $a\gamma$, poterit esse minus latere $a\beta$. quia etiam angulus $ab\gamma$, minor esset angulo $a\gamma\beta$: cum tamen non sit. Quare neq; latus $a\gamma$, minus est latere $a\beta$. antea autem demonstratum est. quod ei non sit æquale. Erit ergo $a\gamma$ latus, maius latere $a\beta$. *Conclusio.)* Omnis igitur trianguli, maiorē angulum maius latus subtendit. Id quod eras demonstrandum.

Propositio vigesima. Theorema.

Omnis trianguli: quævis duo latera, sunt maiora reliquo.

Explicatio dati.) Sit triangulus $ab\gamma$. *Explicatio quesiti.)* Dico quod trianguli $ab\gamma$: quævis duo latera, sint maiora reliquo.

EVCLIDIS

quod. latera $\beta\alpha, \alpha\gamma$, maiora latere $\beta\gamma$: Item latera $\alpha\beta, \beta\gamma$, maiora latere $\alpha\gamma$: deniq, latera $\beta\gamma, \gamma\alpha$, maiora latere $\alpha\beta$. Delineatio.) Producaturs linea $\beta\alpha$, ad punctum δ : & fiat linea $\alpha\gamma$, equalis linea $\alpha\delta$: deniq, ducatur linea $\gamma\delta$. Demonstratio.) Quoniam latus $\delta\alpha$, equalis est lateri $\alpha\gamma$: etiam angulus $\alpha\delta\gamma$, est equalis angulo $\alpha\gamma\delta$. Verum angulus $\alpha\gamma\delta$, maior est angulo $\alpha\delta\gamma$. quare & angulus $\beta\gamma\delta$, angulo $\alpha\delta\gamma$, maior erit. & quia triangulus $\delta\gamma\beta$, angulum $\beta\gamma\delta$ maiorem habet angulo $\alpha\gamma\delta$: atq, maius latus subtendit angulum maiorem: idcirco & latus $\delta\beta$, maius est latere $\beta\gamma$. Sed $\delta\beta$ latus, equalis est $\alpha\beta$, $\alpha\gamma$ lateribus. quare $\beta\alpha, \alpha\gamma$, duo latera: sunt maiora latere $\beta\gamma$. Similiter demonstrabimus, quod latera $\alpha\beta, \beta\gamma$, sint maiora latere $\alpha\gamma$: & $\beta\gamma, \gamma\alpha$ latera sint maiora latere $\alpha\beta$. Conclusio.) Omnis igitur trianguli, quacvis duo latera: sunt maiora reliquo, id quod erat demonstrandum.

Propositio vigesima prima. Theorema.

S I a finibus unius lateris trianguli
scilicet, duæ rectæ lineæ intra tri-
angulum

ad punctū idē statuatur: erunt quidē istæ duæ rectæ lineæ, reliquis duobus trianguli lateribus minores: verū maiorem angulum comprehendent.

Explicatio dati.) Super latere enim $\beta\gamma$ trianguli $\alpha\beta\gamma$: à finibus β , & γ , duæ lineæ rectæ $\beta\delta$, $\delta\gamma$ statuatur intra triangulum. *Explicatio quesiti.)* Dico quod duæ rectæ $\beta\delta$, $\delta\gamma$ minores quidē sint reliquis duobus trianguli lateribus $\beta\alpha$, $\alpha\gamma$: verum angulum $\beta\delta\gamma$, maiorem angulo $\beta\alpha\gamma$, contineant. *Delineatio.)* Producat̃ur enim linea $\beta\delta$: ad punctum vsq; ϵ . *Demonstratio.)* Quoniam omnis trianguli duo latera maiora sunt reliquo: idcirco trianguli $\alpha\beta\epsilon$, duo latera $\alpha\beta$, $\alpha\epsilon$ sunt maiora latere $\beta\epsilon$. Commune addatur latus $\epsilon\gamma$. latera igitur $\beta\alpha$, $\alpha\gamma$, maiora sunt lateribus $\beta\epsilon$, $\epsilon\gamma$. Item quia trianguli $\gamma\epsilon\delta$, duo latera $\gamma\epsilon$, $\epsilon\delta$ maiora sunt latere $\gamma\delta$. Cōmune addatur latus $\delta\beta$. quare latera $\gamma\epsilon$, $\epsilon\beta$ maiora sunt lateribus $\gamma\delta$, $\delta\beta$. Verum latera $\beta\alpha$, $\alpha\gamma$: demōstrata sunt maiora lateribus $\beta\epsilon$, $\epsilon\gamma$. ergo $\beta\alpha$, $\alpha\gamma$ latera, lōge erūt maiora lateribus $\beta\delta$, $\delta\gamma$. Rursus quoniā omnis triāguli angulus exiſtens,

angulo

EVCLIDIS

angulo intra triangulum sibi opposito est maior: idcirco trianguli $\gamma\delta\epsilon$, angulus $\beta\delta\gamma$ externus, angulo $\gamma\delta\epsilon$ interno sibi opposito est maior. Per eadem demonstrabitur, quod trianguli $\alpha\beta\epsilon$, angulus $\gamma\epsilon\beta$: maior sit angulo $\beta\alpha\gamma$. Verum angulo $\gamma\epsilon\beta$, maior est demonstratus angulus $\beta\delta\gamma$. Ergo angulus $\beta\delta\gamma$: multò est maior angulo $\beta\alpha\gamma$. (Conclusio.) Si igitur à finibus unius lateris trianguli cuiusvis, duæ rectæ lineæ intra triangulum, ad puncta eadē statuantur: erūt quidem istæ duæ rectæ lineæ, reliquis duobus trianguli lateribus minores: verum maiorem angulū comprehendent. Id quod erat demonstrandum.

Propositio vigesima secunda. Problema.

EX tribus lineis rectis: quæ sunt æquales tribus rectis lineis datis: triangulum constituere. Oportet verò quasvis duas reliqua esse maiores: propterea quod in omni triangulo quasvis duo latera, maiora sint reliquo.

Explicatio dati,) Sint tres lineæ rectæ datæ α, β, γ : & sint quasvis duæ maiores quàm
reli-

reliqua: scilicet α & β maiores quàm γ : & α , atq; γ , maiores quàm β : deniq; β , & γ , maiores quàm α . Explicatio quæsiti.) Oportet igitur ex tribus lineis rectis: quæ datis tribus, α , β , γ , sunt æquales: triangulum componere.

Delineatio.) Sumatur recta aliqua linea de: finita quidem ad punctum δ : infinita verò ad punctum ϵ . deinde fiat lineæ rectæ α : æqualis lineæ rectæ $\delta\zeta$. Item rectæ β : æqualis rectæ $\zeta\eta$. præterea rectæ γ : æqualis rectæ $\eta\theta$. Ad hæc centro ζ , interuallo $\zeta\delta$: describatur circulus $\delta\kappa\lambda$. centro etiam η , interuallo $\eta\theta$: describatur circulus $\kappa\lambda\eta$: secans circulum $\delta\eta\lambda$, in puncto κ . Denique ducantur lineæ rectæ $\zeta\kappa$, $\kappa\eta$.

Delineationis factæ explicatio.) Dico quòd ex lineis rectis tribus, quæ sunt æquales tribus rectis datis: compositus sit triangulus $\kappa\zeta\eta$. Demonstratio.) Quoniam punctum ζ , centrum est circuli $\delta\kappa\lambda$. idcirco recta $\zeta\delta$, æqualis est rectæ $\zeta\eta$: verum recta $\zeta\delta$, est æqualis rectæ α : itaq; & $\kappa\zeta$ recta, æqualis est rectæ α . Item quoniam punctum η , est centrum circuli $\kappa\lambda\eta$: idcirco recta $\eta\theta$, est æqualis rectæ $\eta\kappa$. verum $\eta\theta$ æqualis est γ rectæ, ergo & $\eta\kappa$ recta, æqualis est re-

EVCLIDIS

*Et γ . Verum $\zeta\eta$, etiam est equalis rectæ β .
Tres igitur rectæ $\alpha\zeta$, $\zeta\eta$, $\eta\alpha$: tribus rectis α ,
 β , γ , sunt æquales. Conclusio.) Ex tribus igi-
tur rectis $\alpha\zeta$, $\zeta\eta$, $\eta\alpha$, quæ sunt æquales tribus
datis γ , β , γ , rectis: triangulus est factus $\alpha\zeta\eta$.
Quod faciendum erat.*

Propositio vigesima tertia. Problema.

AD datam lineam rectam: & datū
in ea punctum: dato angulo res-
tilineo: æqualem angulum re-
ctilineum statuere.

Explicatio dati.) Sic data linea recta $\alpha\beta$
sit datum in ea punctum α : sit angulus recti-
lineus datus $\delta\gamma\epsilon$. *Explicatio quaesiti.)* Ad li-
neam rectam datam $\alpha\beta$ & punctum in ea da-
tum α : statuendus est angulus rectilineus: æ-
qualis angulo $\delta\gamma\epsilon$ rectilineo dato. *Delinea-
tio.)* Sumantur in lineis rectis $\gamma\delta$, $\gamma\epsilon$, puncta
quævis δ , ϵ . Ducatur etiā linea recta $\delta\epsilon$. Post-
ea ex talibus lineis rectis quæ sunt æquales tri-
bus rectis $\gamma\delta$, $\delta\epsilon$, $\gamma\epsilon$, componatur triangulus
 $\alpha\zeta\eta$: sic ut linea $\gamma\delta$, sit equalis linea $\alpha\zeta$: & li-
nea $\gamma\epsilon$, linea $\alpha\eta$, item linea $\delta\epsilon$, equalis linea
 $\zeta\eta$.

Quoniam duo latera $\delta\gamma$, $\gamma\epsilon$, duobus lateribus $\zeta\alpha$, $\alpha\eta$, sunt, equalia alterum alteri: & basis $\delta\epsilon$, equalis sit basi $\zeta\eta$. Erit igitur angulus $\delta\gamma\epsilon$, equalis angulo $\zeta\alpha\eta$. Conclusio.) Ad datam igitur lineam rectam ab : & ad punctum in ea datum α : dato angulo rectilineo $\delta\gamma\epsilon$: constitutus est angulus rectilineus $\zeta\alpha\eta$. Id quod erat faciendum.

Propositio vigesima quarta. Theorema.

Si fuerint trianguli unius, duo latera equalia duobus lateribus alterius trianguli, alterum alteri: sed angulus unius maior angulo alterius, quæ æquales rectæ lineæ comprehendunt: etiam basis basi maior erit.

Explicatio dati.) Sint duo trianguli $ab\gamma$, $\delta\epsilon\zeta$: quorum duo latera ab , $\alpha\gamma$, duobus lateribus $\delta\epsilon$, $\delta\zeta$ sint equalia, alterum alteri: latus ab , lateri $\delta\epsilon$: & latus $\alpha\gamma$, lateri $\delta\zeta$: sed angulus $\beta\alpha\gamma$ sit maior angulo $\epsilon\delta\zeta$. Explicatio quesiti.) Dico quod basis $\beta\gamma$, basi $\epsilon\zeta$ sit maior. Delineatio.) Quoniā angulus $\beta\alpha\gamma$ maior est angulo $\epsilon\delta\zeta$: statuatur ad lineam rectā $\epsilon\delta$:

EVCLIDIS

Et ad punctum in ea d : angulus $ed\eta$, equalis angulo βay : & fiat alterutra linearum ay , $d\zeta$: equalis linea recta $d\eta$. & ducantur lineae rectae ne , $\zeta\eta$. Demonstratio.) Quoniam latus ab , aequale est lateri de : & latus ay : aequale est lateri $d\eta$: duo igitur latera βa , ay , duobus lateribus ed , $d\eta$ sunt equalia, alterum alteri: & angulus βay , equalis est angulo $ed\eta$. Ergo basis βy , basi en est equalis. Item quoniam latus $d\eta$, est aequale lateri $d\zeta$: erit etiam angulus $d\zeta\eta$, equalis angulo $d\eta\zeta$. ergo angulus $d\zeta\eta$ maior est angulo $en\zeta$. quare angulus $e\zeta\eta$, longè maior est angulo $en\zeta$. Cum etiam triangulus $e\zeta\eta$, habeat angulum $e\zeta\eta$, maiorem angulo $en\zeta$: ac maiorem angulum maius latus subcendat. idcirco latus en , maius est latere $e\zeta$. Verum latus en , aequale est lateri βy . ergo & βy latus, maius est latere $e\zeta$. Conclusio.) Si ergo duo fuerint trianguli, habentes duo latera, duobus lateribus equalia, alterum alteri: angulum verò angulo maiorem, qui aequalibus illis lateribus continetur: etiam basin basi maiorem habebunt. Id quod erat demonstrandū.

Propo-

Propositio vigesima quinta. Theorema.

SI trianguli vnus, duo latera fuerint equalia duobus lateribus trian-
guli alterius: sed basis vnus fuerit maior basi alterius: erit etiam angulus vnus maior angulo alterius, quem æquales illæ rectæ lineæ comprehendūt.

Explicatio dati.) Sint duo trianguli abc , xyz , quorum duo latera ab , xy , sint equalia duobus lateribus de , dz , alterum alteri: latius ab , equali lateri de : & latius xy , equali lateri dz : sed basis bc , sit maior basi ez . *Explicatio quæstii.)* Dico quod angulus bcx , maior sit angulo edz . *Demonstratio.)* Quod si enim non fuerit maior: aut erit ei equalis: aut eo minor. sed angulus bcx , non est equalis angulo edz . nam & basis bc , etiam esset equalis basi ez . Verum non est ei equalis. quare nec angulus bcx , est equalis angulo edz : sic etiā non est eo minor. siquidem & basis bc , basi ez minor esset: quod tamen non est. quare nec angulus bcx , angulo edz minor est. demonstra-
tum verò antea fuit. quod ei non sit equalis. *Erit igitur angulus bcx , angulo edz maior.*

EVLIDIS

Conclusio.) Si ergo fuerint trianguli vnus duo latera equalia duobus lateribus triangu-
li alterius, alterum alteri: sed basis vnus ma-
ior basi alterius: erit etiā angulus vnus, ma-
ior angulo alterius, quem aequales recte lineæ
comprehendunt. Id quod erat demonstrandū.

Propositio vigesima sexta: Theorema.

Q Vorum triangulorum duo an-
guli vnus, fuerint æquales duo
bus angulis alterius: alter alteri:
et latus vnum, æquale vni siue illud
appositum sit æqualibus illis angulis:
siue subtendat, vnum ex æqualibus il-
lis angulis: illorum tum reliqua latera
inter se erunt æqualia, alterum alteri:
tum etiam reliquus angulus reliquo
angulo erit æqualis.

Prima explicatio dati.) Sint duo triangu-
li $AB\gamma$, $de\zeta$, quorum duo anguli $AB\gamma$, $B\gamma\alpha$
sint æquales duobus angulis $de\zeta$, $e\zeta d$, alter
alteri: angulus $AB\gamma$, æqualis angulo $d\zeta e$: &
angulus $B\gamma\alpha$, angulo $e\zeta d$: habeant etiam v-
num latus vni lateri æquale, & primo loco, la-
tus quod posuitur est ad æquales istos angulos, la-
tus

tus $\Gamma\gamma$, lateri $\epsilon\zeta$. Prima explicatio quasiti.)
 Dico quod & reliqua latera reliquis lateribus
 habebunt equalia, alterū alteri: latus $\alpha\beta$, la-
 teri $\delta\epsilon$: et latus $\alpha\gamma$, equale lateri $\delta\zeta$: et reliquū
 angulū reliquo angulo equalē, nempe angulū
 $\beta\alpha\gamma$, equalē angulo $\epsilon\delta\zeta$. Prima delineatio.)
 Si enim $\alpha\beta$, latus, inaequale fuerit lateri $\delta\epsilon$:
 unum ex istis sit maius, sit igitur latus $\alpha\beta$, ma-
 ius. & fiat recta $\delta\epsilon$, equalis recta $\beta\eta$: & duca-
 tur recta $\eta\gamma$. Prima demonstratio.) Cum itaq;
 latus $\beta\eta$, sit equalē lateri $\delta\epsilon$, & latus $\beta\gamma$ e-
 quale lateri $\epsilon\zeta$, duo igitur latera $\beta\eta$, $\beta\gamma$: duo-
 bus lateribus $\delta\epsilon$, $\epsilon\zeta$, sunt equalia alterum al-
 teri: & angulus $\eta\beta\gamma$, angulo $\delta\epsilon\zeta$ equalis: er-
 go basis $\eta\gamma$, basi $\delta\zeta$ est equalis, & triangulus
 $\alpha\gamma\epsilon$, triangulo $\delta\epsilon\zeta$ est equalis, & reliqui an-
 guli, reliquis angulis sunt æquales, alter alte-
 ri, quos equalia illa latera subtendunt angu-
 lus $\eta\gamma\beta$, equalis angulo $\delta\zeta\epsilon$, sed angulus
 $\delta\zeta\epsilon$, proponitur equalis angulo $\beta\gamma\alpha$. erit
 igitur angulus $\beta\gamma\eta$, etiam equalis angulo
 $\beta\gamma\alpha$, minor maiori, quod fieri nequit. Con-
 clusio prima.) Ergo latus $\alpha\beta$, nō est inaequale
 lateri $\delta\epsilon$, ergo erit ei equalē, verum latus $\beta\gamma$

EVCLIDIS

etiam est æquale lateri $\epsilon\zeta$: duo igitur latera
 $a\beta, \beta\delta$: duobus lateribus $\delta\epsilon, \epsilon\zeta$, sunt equalia
 alterum alteri: & angulus $a\beta\gamma$, angulo $\delta\epsilon\zeta$
 æqualis. basis itaq; $a\gamma$, basi $\delta\zeta$ erit æqualis, &
 reliquus angulus $\beta a\gamma$, reliquo angulo $\epsilon\delta\zeta$ æ-
 qualis. Secunda explicatio dati.) Verum ite-
 rum statuantur latera æquales angulos sub-
 tendentia equalia, ut $a\beta$ latus, æquale lateri
 $\delta\epsilon$. Secunda explicatio quaesiti.) Dico quod
 etiam reliqua latera, reliquis lateribus sint æ-
 qualia, latus $a\gamma$, æquale lateri $\delta\zeta$: & latus
 $\beta\gamma$, æquale lateri $\epsilon\zeta$: deniq; reliquus angulus
 $\beta a\gamma$, reliquo angulo $\epsilon\delta\zeta$ æqualis. Secunda de-
 lineatio.) Si enim latus $\beta\gamma$, non fuerit æquale
 lateri $\epsilon\zeta$: sed alterum ex eis fuerit maius. sit
 latus $\beta\gamma$, si poterit fieri, maius latere $\epsilon\zeta$: &
 fiat lateri $\epsilon\zeta$, æquale latus $\beta\theta$: & ducatur re-
 cta $a\theta$. Secunda demonstratio.) Quoniam la-
 tus $\beta\theta$, æquale est lateri $\epsilon\zeta$, & latus $a\beta$, æqua-
 le lateri $\delta\epsilon$: duo itaq; latera $a\beta, \beta\theta$: duobus la-
 teribus $\delta\epsilon, \delta\zeta$, sunt equalia alterum alteri: &
 angulos comprehendunt æquales: basis igitur
 $a\theta$, est æqualis basi $\delta\zeta$: & triangulus $a\beta\theta$, tri-
 angulo $\delta\epsilon\zeta$ est æqualis: & reliqui anguli, reli-
 quis

quis angulis sunt aequales alter alteri, quos a-
 qualia illa latera subtendunt: angulus $\epsilon\delta\alpha$, a-
 qualis angulo $\epsilon\zeta\delta$. Verum angulus $\epsilon\zeta\delta$, est a-
 qualis angulo $\beta\gamma\alpha$. ergo angulus $\beta\delta\alpha$, est a-
 qualis angulo $\beta\gamma\alpha$. Trianguli igitur $\alpha\beta\gamma$, an-
 gulus $\beta\delta\alpha$ externus: angulo $\beta\gamma\alpha$ interno sibi
 opposito est equalis, quod fieri nequit. Quare
 latus $\beta\gamma$: non est inaequale lateri $\epsilon\zeta$. erit igi-
 tur ei aequale. sed & $\alpha\beta$ latus, est aequale lar-
 teri $\delta\epsilon$: duo igitur latera $\alpha\beta$, $\beta\gamma$: sunt aequa-
 lia duobus lateribus $\delta\epsilon$, $\epsilon\zeta$ alterum alteri: &
 angulos comprehendunt aequales, basis igitur
 $\alpha\gamma$, basi $\delta\zeta$ est equalis: & triangulus $\alpha\beta\gamma$,
 est equalis triangulo $\delta\epsilon\zeta$: & reliquus angu-
 lus $\beta\alpha\gamma$, reliquo angulo $\epsilon\delta\zeta$ est equalis. Con-
 clusio.) Quorum ergo triangulorum duo an-
 guli unius fuerint aequales duobus angulis al-
 terius, alter alteri: & latus unum uni lateri
 aequale, siue illud appositum sit aequalibus il-
 lis angulis: siue subtrahat unum ex aequalibus
 illis angulis, illorum tum reliqua latera inter se
 erunt aequalia, alterum alteri: tum etiam reli-
 quus angulus, reliquo angulo erit equalis. Id
 quod erat demonstrandum.

PARS ALTERA HV-
ius primi elementi.

Propositio vigesima septima. Theorema.

SI in duas lineas rectas, recta inci-
dens linea, angulos alternos æqua-
les inter se fecerit: equedistantes in-
ter se erunt rectæ illæ duæ lineæ.

*Explicatio dati.) In lineas duas rectas $a\beta$,
 $\gamma\delta$: incidens linea recta $\epsilon\zeta$: angulos alternos
 $\alpha\zeta$, $\epsilon\delta$: æquales inter se faciat. Explicatio
questi.) Dico quod recta $a\beta$, recta $\gamma\delta$, æque-
dister. Hypothesis.) Si enim non æquedistant:
cum protracta linea recta $a\beta$, $\gamma\delta$: concurrūt,
vel ex partibus β & δ : vel ex partibus α , &
 γ . Delineatio.) Protrahantur & concurrant
ex partibus β , & δ : in puncto η . Demonstratio.)
Trianguli igitur $\alpha\epsilon\eta$, angulus $\alpha\epsilon\zeta$ exter-
nus, angulo $\epsilon\eta$ interno opposito est maior: ve-
rum etiā est ei æqualis. quod fieri non potest.
quare recta $a\beta$, $\gamma\delta$, si protrahantur: non con-
current ex partibus β , & δ , similiter demon-
strabitur: quod neq; ex partibus α , & γ , con-
currant.*

currant. rectæ vero, quæ ex neutra parte concurrunt, si protrahantur: sunt inter se æquedistantes. quare recta ab , æquedistat rectæ gd . *Conclusio.*) Si igitur in duas lineas rectas, recta incidat lineæ: ac faciat angulos alternos inter se æquales: rectæ istæ lineæ inter se sunt æquedistantes. Id quod erat demonstrandum.

Propositio vigesima octava. Theorema.

Si linea recta, in duas rectas incidens lineas: extraneum angulum, interno cui opponitur ex eadem parte fecerit æqualem: vel si duos internos, ex eadem parte: fecerit æquales duobus angulis rectis: æquedistantes inter se erunt, duæ illæ lineæ rectæ.

Explicatio dari.) In lineas duas rectas ab , incidat linea recta ed : angulum extraneum enb , interno opposito ex eadē parte angulo ngd : faciat æqualem: & faciat duos angulos internos, ex eadem parte bnb , ngd : æquales duobus angulis rectis. (*Explicatio quasi-ri.*) Dico quod recta ab , æquedistat rectæ gd . *Demonstratio.* (Cum primus angulus enb , sit æqualis

EVCLIDIS

qualis angulo $\alpha\eta\theta$: idcirco angulus $\alpha\eta\theta$, etiam
 est equalis angulo $\eta\theta\delta$. & sunt anguli alter-
 ni. quare recta $\alpha\beta$, recta $\gamma\delta$, est aequedistans.
 Rursus, quoniam anguli $\beta\eta\theta$, $\eta\theta\delta$, duobus re-
 ctis sunt aequales: & duo anguli $\alpha\eta\theta$, β , θ , etiā
 duobus rectis aequales: idcirco anguli $\alpha\eta\theta$, $\beta\eta\theta$
 sunt duobus angulis $\epsilon\eta\theta$, $\eta\theta\delta$ aequales. com-
 munis auferatur angulus $\beta\eta\theta$ reliquus igitur
 angulus $\alpha\eta\theta$: reliquus angulo $\eta\theta\delta$, est equalis,
 & sunt anguli alterni. ergo recta $\alpha\beta$, aequedi-
 stat recta $\gamma\delta$. Cōclusio.) Si igitur linea recta,
 in duas rectas incidens lineas; extraneum an-
 gulum interno cui opponitur, ex eadem parte
 fecerit equalem; vel si duos angulos internos,
 ex eadem parte, fecerit aequales duobus angu-
 lis rectis: aequedistantes inter se erunt, dua il-
 lae lineae rectae. Id quod erat demonstrandum.

Propositio vigesima nona. Theorema.

Linea recta, in duas rectas aequedi-
 stantes lineas incidens: facit angu-
 los alternos inter se aequales: & an-
 gulum externum, interno opposito ex
 eadem parte facit equalem: item duos
 angu-

angulos internos, ex eadem parte facie
æquales duobus rectis.

Explicatio dari.) Sint due lineæ rectæ æ-
quedistantes ab , $γδ$: & in eas incidat lineæ
recta $εζ$. *Explicatio quesiti.)* Dico quod fa-
ciat angulos $αηθ$, $ηθδ$: qui sunt alterni, inter
se æquales: & angulum externum $εηβ$, an-
gulo interno opposito ex eadem parte $ηθδ$, æ-
qualem: & angulos internos ex eadem parte
positos $βηθ$, $ηθδ$: duobus rectis æquales. De-
monstratio cum hypothese.) Si enim angulus
 $αηθ$, non est æqualis angulo $ηθδ$: aliter illorum
erit maior. sic angulus $αηθ$ maior. Quoniam
angulus $αηθ$, maior est angulo $ηθδ$: communis
addatur angulus $βηθ$. ergo anguli $αηθ$, $βηθ$,
sunt maiores angulis $βηθ$, $ηθδ$. Verum angu-
li $αηθ$, $βηθ$: duobus rectis sunt æquales. ergo
anguli $βηθ$, $ηθδ$: duobus rectis sunt minores.
lineæ verò rectæ, à duobus angulis, qui sunt
minores duobus angulis rectis: in infinitum
usq. ductæ concurrunt. quare rectæ ab , $γδ$ in
infinitum productæ concurrent. sed quia æ-
quedistantes proponuntur esse: nō concurrunt
sedcirco angulus $αηθ$, non est inequalis angulo
 $ηθδ$.

EVCLIDIS .

$\alpha\theta\delta$, erit igitur ei equalis. Verū angulus $\alpha\eta\theta$ angulo $\epsilon\eta\zeta$ est equalis: ideo etiā angulus $\epsilon\eta\beta$ est equalis angulo $\eta\theta\delta$. cōmunis addatur angulus $\zeta\eta\theta$, ergo anguli $\epsilon\eta\beta$, $\beta\eta\theta$: angulis $\beta\eta\theta$, $\eta\theta\delta$ sunt equales, verū anguli $\epsilon\eta\beta$, $\beta\eta\theta$: duobus rectis sunt equales. idcirco & anguli $\beta\eta\theta$, $\eta\theta\delta$: duobus rectis equales erunt. Conclusio.) Linea igitur recta, in duas equedistantes lineas rectas incidens, facit alternos angulos, inter se equales: & angulum externū, interno opposito ex eadem parte facit equalem: item duos angulos internos, ex eadem parte, facit equales duobus rectis. Id quod erat demonstrandum.

Propositio trigesima. Theorema.

QUæ eidem lineæ rectæ æquedistant: illæ etiam inter se æquedistant.

Explicatio dati.) Sit linea recta $\epsilon\zeta$, cui æquedistēt rectæ lineæ $\alpha\beta$, $\gamma\delta$. Explicatio quas sit.) Dico quod recta $\alpha\zeta$, etiam æquedistet rectæ $\gamma\delta$. Delineatio.) Incidat in predictas lineas recta quedam linea $\eta\kappa$. Demonstratio.)

Quoniam

Quoniam in duas aequedistantes rectas ab , cd incidit recta hg : idcirco angulus anh : est equalis angulo $h\theta$. Præterea quoniam in duas rectas aequedistantes cd , gd recta incidit hx : angulus $h\theta$ erit equalis angulo hxd . demonstratum vero est, quod angulus anh : angulo $h\theta$ sit equalis. quare & angulus anh : angulo hxd est equalis, & sunt anguli alterni. Quare recta ab , aequidistant rectæ gd . Conclusio.) Quæ igitur rectæ eidem lineæ rectæ aequidistant: illæ etiam inter se aequidistant. Id quod erat demonstrandum.

Propositio trigesima prima. Problema.

A puncto dato: datæ lineæ rectæ: rectam lineam aequedistantem ducere.

Explicatio dati.) Sit datum punctum a : & data linea recta $\beta\gamma$. Explicatio quesiti.)

A dato puncto a : ducenda est linea recta, aequidistans lineæ rectæ datæ, $\beta\gamma$. Delineatio.)

Sumatur in linea recta $\beta\gamma$: punctum quodvis d : & ducatur linea recta ad : ad lineam rectam ad : & punctum in ea a : angulo rectæ lineæ $ad\gamma$

equa-

EVCLIDIS

equalis statuatur angulus rectilineus $\delta a\epsilon$: & ducatur linea $a\zeta$, $\epsilon\omega$ & $\delta\epsilon$ ius, linea ϵa . Demonstratio.) Quoniam in duas lineas rectas $\beta\gamma, \epsilon\zeta$: incidens linea recta $a\delta$: angulos alternos $\epsilon a\delta, a\delta\gamma$, aequales inter se fecit. idcirco recta $\epsilon\zeta$, aequidistat rectae $\beta\gamma$. (Conclusio.) A puncto igitur dato a : data linea recta $\beta\gamma$: ducta est linea recta $a\zeta$ aequidistans. Id quod faciendum erat.

Propositio trigesima secunda. Theorema.

OMnis trianguli, vno ϵ lateribus protracto: exterior angulus, duobus angulis interioribus quibus opponitur, est equalis: & trianguli tres interiores anguli: duobus rectis sunt aequales.

Explicatio dati.) Sit triangulus $a\beta\gamma$: & protrahatur latus eius $\beta\gamma$, ad punctum δ . Explicatio quaesiti.) Dico quod angulus $a\gamma\delta$: est equalis duobus angulis $\gamma a\beta, a\beta\gamma$, interioribus quibus opponitur: & quod anguli tres interiores $a\beta\gamma, \beta\gamma a, \gamma a\beta$: sint aequales duobus
angulis

angulis rectis. Delineatio.) Ducatur à puncto γ . linea recta $a\beta$: aequidistans linea recta $\gamma\epsilon$. Demonstratio.) Quoniam recta $a\beta$, aequidistat recta $\gamma\epsilon$: & in eas incidit recta $\alpha\gamma$. Idcirco alterni anguli $\beta\alpha\gamma$, $\alpha\gamma\epsilon$: sunt inter se aequales. Item cum recta $a\beta$, aequidistet recta $\gamma\epsilon$: & in eas incidit recta $\epsilon\delta$: angulus $\epsilon\gamma\delta$ externus, est aequalis angulo $\alpha\beta\gamma$ interno opposito. sed demonstratum est angulum $\alpha\epsilon\gamma$: angulis $\beta\alpha\gamma$ $\alpha\beta\gamma$ esse aequalem. totus igitur angulus $\alpha\gamma\delta$ externus, duobus angulis internis oppositis $\beta\alpha\gamma$, $\alpha\beta\gamma$ est aequalis. Cōmunis addatur angulus $\alpha\gamma\epsilon$. anguli igitur $\alpha\gamma\delta$, $\alpha\gamma\beta$: tribus angulis $\alpha\beta\gamma$, $\beta\gamma\alpha$, $\gamma\alpha\beta$ sunt aequales. sed duo anguli $\alpha\gamma\delta$, $\alpha\gamma\beta$ sunt duobus rectis aequales. quare tres anguli $\alpha\gamma\beta$, $\gamma\beta\alpha$, $\gamma\alpha\beta$, duobus rectis erunt aequales. Conclusio.) Omnis igitur trianguli, vno è lateribus protracto: exterior angulus, duobus angulis interioribus, quibus opponitur, est aequalis: & trianguli, tres interiores anguli: duobus rectis sunt aequales. Id quod erat demonstrandum.

D

EVCLIDIS

Propositio trigesima tertia. Theorema.

Lineæ rectæ, quæ æquales, & æquedistantes inter se lineas rectas ex eadem parte coniungunt: etiam ipsæ æquales, & æquedistantes inter se sunt.

Explicatio dati.) Sint lineæ rectæ ab , $γδ$, æquales, & æquedistantes: easq; ex eadem parte coniungant duæ rectæ, $αγ$, $βδ$. *Explicatio quesiti.*) Dico quod rectæ $αγ$, $βδ$, æquales, & æquedistantes sint. *Delineatio.*) Ducatur linea recta $βγ$. *Demonstratio.*) Quoniam recta ab , æquedistat rectæ $γδ$: & in eas incidit recta $βγ$: idcirco anguli $αβγ$, $βγδ$ alterni: sunt inter se æquales. Et cum recta ab : sit æqualis rectæ $γδ$: communis verò $βγ$: duo igitur latera ab , $βγ$, duobus lateribus $βγ$, $γδ$ sunt æqualia: & angulus $αβγ$, angulo $βγδ$ est æqualis. basis igitur $αγ$, basi $βδ$ est æqualis: & triangulus $αβγ$, triangulo $βγδ$ est æqualis: & reliqui anguli, reliquis angulis sunt æquales alter alteri, quos æqualia illa latera subtendunt. angulus igitur $αγδ$, angulo $γδβ$ est æqualis, & angulus $βαγ$, angulo $γδβ$. & quoniam

nam

niam in duas rectas ay , cd , recta incidens by :
 angulos alternos aBy , yBd , aequales inter se
 fecit, idcirco recta ay , aequidistat rectae Bd .
 Verum demonstrata fuit ei esse aequalis. Con-
 clusio.) Lineae igitur rectae, quae aequales, &
 aequidistantes inter se lineas rectas, ex eadem
 parte coniungunt; etiam ipsae aequales, & a-
 quedistantes inter se sunt. Id quod erat de-
 monstrandum.

Propositio trigesima quarta. Theorema.

A Rectae, quae equidistantibus lineis
 rectis continentur; habent latera
 opposita, & angulos oppositos
 inter se aequales; & dimetiens ipsas me-
 dias secat.

Explicatio dati.) Sit figura aequidistanti-
 bus lineis rectis contenta $aydB$: dimetiens
 eius linea By . *Explicatio quaesiti.)* Dico quod
 area $aByd$, latus aB : sit aequale lateri yd :
 item latus ay , aequale lateri Bd . Praeterea
 dimetiens By , ipsam figuram secet in duas
 partes aequales. *Demonstratio.)* Quoniam
 recta aB , aequidistat rectae yd : & in eas inci-

EVCLIDIS

dit recta $\beta\gamma$: anguli alterni $\alpha\beta\gamma$, $\beta\gamma\delta$ sunt inter se aequales. Item quoniam recta $\alpha\gamma$, aequedistat recta $\beta\delta$: & in eas incidit recta $\beta\gamma$ anguli igitur alterni inter se sunt aequales. Quare cum duo trianguli $\alpha\beta\gamma$, $\gamma\beta\delta$: duos angulos $\alpha\beta\gamma$, $\beta\gamma\delta$, habeant duobus angulis $\gamma\beta\delta$, $\beta\gamma\delta$, aequales, alterum alteri: & unum latus, uni lateri aequale: nempe latus $\beta\gamma$, commune: quod ad angulos aequales est positum. idcirco & reliqua latera, reliquis lateribus habent aequalia, alterum alteri: & reliquum angulum reliquo angulo aequalem. latus $\alpha\beta$, aequale lateri $\gamma\delta$: & latus $\alpha\gamma$, aequale lateri $\beta\delta$: & angulum $\beta\alpha\gamma$, angulo $\beta\delta\gamma$, aequalem. Quia vero angulus $\alpha\beta\gamma$, angulo $\beta\gamma\delta$ est equalis: & angulus $\gamma\beta\delta$, angulo $\alpha\gamma\beta$ etiam equalis. Totus igitur angulus $\alpha\beta\delta$, toti angulo $\alpha\gamma\delta$ est equalis. Verum & angulus $\beta\alpha\gamma$, demonstratus est equalis angulo $\beta\delta\gamma$. Cōclusio.) Area igitur, quae aequedistantibus lineis rectis continetur: habent latera opposita aequalia, & angulos oppositos inter se aequales. Secūda explicatio quaesiti.) Dico quod diameter secet eas in duas partes aequales. Demonstratio secunda.)

Quoni-

Quoniam latus $a\beta$, est aequale lateri $\gamma\delta$: & la-
tus $\beta\gamma$ cōmune. duo igitur latera $a\beta$, $\beta\gamma$: duo
bus lateribus $\gamma\delta$, $\beta\gamma$ sunt equalia alterū alte-
ri: & angulus $a\beta\gamma$, angulo $\beta\gamma\delta$ est equalis.
ergo basis $a\gamma$, basi $\delta\beta$ est equalis: & triangu-
lus $a\beta\gamma$, triangulo $\beta\gamma\delta$ etiam equalis. Con-
clusio.) Ergo diameter $\beta\gamma$, figuram $a\beta\gamma\delta$: se-
cat in duas partes aequales. Id quod demon-
strandum erat.

TERTIA HVIVS ELE- menti pars.

Propositio trigesima quinta. Theorema.

QUæ parallelogramma, eandem
habent basin: & in eisdem æque
distantibus sunt lineis rectis: illa
sunt æqualia inter se.

Explicatio dati.) Sine parallelogramma
 $a\beta\gamma\delta$, $\epsilon\beta\gamma\zeta$: in eadem basi $\beta\gamma$: & eisdem li-
neis rectis æquedistantibus $a\zeta$, $\beta\gamma$. *Explica-
tio quesiti.)* Dico quod parallelogrammon
 $a\beta\gamma\delta$: sit æquale parallelogrammo $\epsilon\beta\gamma\zeta$. De

EVCLIDIS

monstratio.) Quoniam $a\beta\gamma\delta$ figura: est parallelogrammon. idcirco latus $\beta\gamma$, est equale lateri ad . Per eadem demonstrabitur quoque latus $e\zeta$: equale lateri $\beta\gamma$. quare & latus ad , est equale lateri $e\zeta$. communis verò est recta de . totum igitur latus ae : toti lateri $d\zeta$ est equale. Verum latus $a\beta$: est etiam equale lateri $\delta\gamma$. duo itaque latera ea , $a\beta$: duobus lateribus $\zeta\delta$, $\delta\gamma$ sunt equalia alterum alteri: & angulus $\zeta\delta\gamma$, equalis angulo $ea\beta$, externus interno. basis igitur $e\beta$, basi $\zeta\gamma$ est equalis: & triangulus $ea\beta$, triangulo $\zeta\delta\gamma$ equalis. communis auferatur triangulus dne . quare reliquum trapezion $a\beta nd$, reliquo trapezio $en\gamma\zeta$ est equale. Communis addatur triangulus $n\beta\gamma$. totum igitur parallelogrammon $a\beta\gamma\delta$, est equale toti parallelogrammo $e\beta\gamma\zeta$. Conclusio.) Quæ igitur parallelogramma eandem habent basin: & in eisdem æquedistantibus sunt lineis rectis: illa sunt inter se equalia. Id quod erat demonstrandum.

Q Propositio 36. Theorema.
Væ parallelogramma, æquales habent

habent bases: & sunt in eisdem æquedi-
stantibus lineis rectis: illa sunt æqualia
inter se.

Explicatio dati.) Sint parallelogramma
 $aByd$, $eZ\eta\theta$: habentia bases By , $Z\eta$ æquales:
& sint inter easdem æquedistantes rectas li-
neas ad , $\beta\eta$. *Explicatio quasiri.)* Dico quod
parallelogrammon $aByd$, sit æquale paralle-
logrammo $eZ\eta\theta$. *Delineatio.)* Ducantur li-
neæ rectæ βe , $\gamma\theta$. *Demonstratio.)* Quoniam
recta $\beta\gamma$, æqualis est rectæ $Z\eta$: & $Z\eta$ est æqua-
lis rectæ $e\theta$. idcirco. & $\beta\gamma$. est æqualis rectæ
 $e\theta$. verum sunt lineæ rectæ æquedistantes, eas-
que coniungunt rectæ γe , $\gamma\theta$: rectæ verò qua
æquales, & æquedistantes rectas de eadē par-
te coniungunt: & ipsæ æquales, & æquedistan-
tes sunt. quare rectæ $e\beta$, $\gamma\theta$ æquales & æquedi-
stantes sunt. atq; figura $eByd$ est parallelo-
grammon, & est æquale parallelogrammo $aByd$.
quia cum eo eandē habet basim $\beta\gamma$: & in eisdē
est æquedistantibus rectis $\beta\gamma$, ad . Similiter
demonstrabimus quod $Z\eta\theta e$ eidem parallelo-
grammo $eByd$ sit æquale. quare parallelogram-
mon $aByd$. parallelogrammū $eZ\eta\theta$. est æquale.

EVCLIDIS

Conclusio.) Quæ igitur parallelogramma, æquales habent bases: & sunt in eisdem æquedistantibus lineis rectis: illa sunt equalia inter se. Id quod erat demonstrandum.

Propositio trigesima septima. Theorema.

Q Vi trianguli, eandem habent basin: & sunt in eisdem æquedistantibus lineis rectis: illi sunt inter se æquales.

Explicatio dati.) Sint duo trianguli $\alpha\beta\gamma$, $\delta\gamma\beta$, super eadem basi $\beta\gamma$: & in eisdem æquedistantibus lineis rectis $\alpha\delta$, $\beta\gamma$. Explicatio quæsitæ.) Dico quod triangulus $\alpha\beta\gamma$: sit equalis triangulo $\delta\gamma\beta$. Delineatio.) Producaturs linea recta $\alpha\delta$, in utramque partem ad puncta ϵ , & ζ : & ex puncto β , ducatur linea recta $\beta\epsilon$, æquedistans lineæ rectæ $\alpha\gamma$. præterea ex puncto γ , ducatur recta $\epsilon\gamma\zeta$, æquedistans rectæ δ . Demonstratio.) Vtraque igitur figura $\epsilon\beta\alpha\gamma$, & $\delta\beta\gamma\zeta$ est parallelogrammon. & parallelogrammon $\epsilon\beta\alpha\gamma$, est æquale parallelogrammo $\delta\beta\gamma\zeta$. quia super eadem basi $\beta\gamma$ est: & inter easdem æquedistantes lineas rectas $\beta\gamma$, $\epsilon\zeta$: & paralle-

parallelogrammi $\alpha\beta\gamma$ a dimidium est, triangulus $\alpha\beta\gamma$. nam diameter $\alpha\beta$ ipsum per mediū secat. parallelogrammi verò $\delta\epsilon\zeta$, dimidiū est triangulus $\delta\beta\gamma$. nam diameter $\delta\gamma$ ipsum per medium secat. Quæ verò æqualium sunt dimidia: illa inter se sunt equalia. triangulus igitur $\alpha\beta\gamma$, triangulo $\delta\beta\gamma$ est equalis. *Conclusio.*) Qui igitur trianguli, sunt super eadem basi: & inter easdem lineas rectas æquedistantes: illi inter se sunt æquales. Id quod erat demonstrandum.

Propositio trigesima octaua. Theorema.

Qui trianguli, æquales habent bases: & sunt in eisdem æquedistantibus lineis rectis: illi inter se sunt æquales.

Explicatio dati.) Sint trianguli $\alpha\beta\gamma$, $\delta\epsilon\zeta$: super basibus equalibus $\gamma\beta$, $\epsilon\zeta$: in eisdem æquedistantibus lineis rectis ad, $\beta\zeta$. *Explicatio quesiti.*) Dico quod triangulus $\alpha\beta\gamma$, sit æqualis triangulo $\delta\epsilon\zeta$. *Delineatio.*) Produca-
tur linea recta ad, in utramq; partem ad puncta η , & θ . Ex puncto β , ducatur linea recta

EVCLIDIS

B γ , aequidistans linea recta $\alpha\gamma$. Item ex puncto ζ , ducatur linea recta $\zeta\theta$, aequidistans lineae rectae $\delta\epsilon$. Demonstratio.) Vtraque igitur figura $\eta\epsilon\gamma\alpha$, & $\zeta\theta$ est parallelogrammon, & parallelogrammon $\eta\epsilon\gamma\alpha$, est aequale parallelogrammo $\delta\epsilon\zeta\theta$. quia super basibus $\beta\gamma$, & $\zeta\delta$ aequalibus: & in eisdem lineis rectis aequedistantibus $\beta\zeta$, & $\theta\delta$ sunt. praeterea parallelogrammi $\alpha\epsilon\gamma\alpha$ dimidiū: est triangulus $\alpha\beta\gamma$. quoniam diameter $\alpha\beta$, ipsum secat per medium. & parallelogrammi $\delta\epsilon\zeta\theta$ dimidium, est $\zeta\epsilon\delta$ triangulus. quia diameter $\zeta\delta$, ipsum secat medium. Quae verò equalium sunt dimidia: illa inter se sunt aequalia. quare triangulus $\alpha\beta\gamma$, triangulo $\delta\epsilon\zeta$ est equalis. Conclusio.) Qui igitur trianguli, super basibus fuerint aequalibus: & in eisdem lineis aequedistantibus: illi inter se sunt aequales. Id quod erat demonstrandum.

Propositio trigesima nona. Theorema.

Trianguli aequales, eandē habentes basim: & ex eadem parte, & in eisdem aequedistantibus rectis sunt.

Explicatio dati.) Sint trianguli $a\beta\gamma$, $\delta\beta\gamma$ super eadem basi $\beta\gamma$. *Explicatio quesiti.*) Dico quod etiam in eisdem sint lineis rectis aequedistantibus. *Delineatio.*) Ducatur linea recta ad. *Explicatio delineationis.*) Dico quod recta ad, aequidistet rectae $\beta\gamma$. *Hypothesis.*) Si enim ei non aequidistat: ducatur per punctum a, recta lineae $\beta\gamma$, aequidistans rectae ac: & ducatur linea recta $\epsilon\gamma$. *Demonstratio.*) Triangulus igitur $a\beta\gamma$, est equalis triangulo $\epsilon\beta\gamma$: qui super eadem basi $\beta\gamma$ est: et in eisdem lineis rectis aequedistantibus $\beta\gamma$, ac. verum triangulus $a\beta\gamma$: est equalis triangulo $\delta\beta\gamma$: idcirco & triangulus $\delta\beta\gamma$, triangulo $\epsilon\beta\gamma$ est equalis. maior minori. quod fieri nequit. Quare recta ac, non aequidistat rectae $\beta\gamma$. Simili ratione demonstrabimus, quod nulla alia praequam ad recta, aequidistet rectae $\beta\gamma$. recta igitur ad, rectae $\beta\gamma$ aequidistat. *Cöclusio.*) Trianguli igitur aequales: eandem habentes basim: in eisdem sunt aequedistantibus rectis. Id quod erat demonstrandum.

Propo-

EVLIDIS

Propositio quadragesima. Theorema.

Trianguli æquales: super æqualibus constituti basibus: sunt in eisdem lineis rectis equedistantibus.

Explicatio dati.) Sint trianguli æquales, aBy , $γδz$: super basibus By , $γz$ æqualibus.

Explicatio quesiti. Dico quod in eisdem sint equedistantibus lineis rectis. *Delineatio.)* Ducatur recta ad . *Explicatio delineationis.)* Dico quod ad , equedistet recta $βe$. *Hypothesis.)*

Si enim ei non equedistat, ducatur per punctum a , recta $βe$, equedistans recta $γa$: & ducatur recta $γe$. *Demonstratio.)* Triangulus igitur aBy :

est æqualis triangulo $γz$, quia sunt constituti super basibus By , $γz$ æqualibus: & in eisdem lineis rectis equedistantibus $βe$, $aγ$.

sed triangulus aBy , est æqualis triangulo $δyz$. quare triangulus $δyz$: etiam erit æqualis triangulo $γz$. maior minori. quod fieri nequit.

nō igitur recta $aγ$, equedistat recta $βe$. Simili ratione demonstrabimus, quod nulla alia præterquam ad recta: equedistet recta $βe$.

Cōclusio.) Trianguli igitur æquales: super æqualibus constituti basibus: sunt in eisdem li-

neis

lineis rectis aequedistantibus. Id quod erat demonstrandum.

*Propositio quadragesima prima.
Theorema.*

Parallelogrammon, trianguli est duplum: si super eadem consistat basi: & in eisdem fuerit aequedistantibus lineis rectis.

Explicatio dati.) Parallelogrammon $a\beta\gamma\delta$, & triangulus $a\beta\gamma$: sunt super eadem basi $\beta\gamma$, in eisdem aequedistantibus lineis rectis ac , $\epsilon\gamma$.

Explicatio quaesiti.) Dico quod parallelogrammon $a\beta\gamma\delta$: sit duplum trianguli $a\beta\gamma$.

Delineatio.) Ducatur recta ay . Demonstratio.) Triangulus $a\beta\gamma$, est equalis triangulo

$a\beta\gamma$: quia super eadem basi sunt $\beta\gamma$: & in eisdem aequedistantibus lineis rectis $\beta\gamma$, ac .

sed parallelogrammon $a\epsilon\gamma\delta$, est duplum trianguli $a\beta\gamma$. quia ay diameter ipsum medium

secat. quare & parallelogrammon $a\beta\gamma\delta$: trianguli $a\beta\gamma$ duplum erit. Conclusio.) Paralle-

logrammon igitur trianguli est duplum: si super eadem consistat basi: & in eisdem fueris

equ-

EVCLIDIS

aequedistantibus lineis rectis. Id quod erat demonstrandum.

Propositio quadragesima secunda.

Problema.

Dato triangulo, æquale statuere parallelogrammon: in angulo rectilineo dato.

Explicatio dati.) Sic triangulus datus aβγ: & datus angulus rectilineus δ. Explicatio quesiti.) Dato triangulo aβγ, statuendum est parallelogrammon æquale: in angulo qui est æqualis, dato angulo rectilineo δ. De lineatio. Dissecetur linea recta βγ media in puncto ε: & ducatur linea recta αε: atque statuatur ad lineam rectam εγ: & ad punctum eius ε: dato angulo rectilineo δ: æqualis angulus rectilineus γεζ: postea ducatur per punctum α, linea recta γε: æquedistans linea recta αη: & per punctum γ, linea recta εζ, æquedistans linea recta γη. Erit itaq, figura ζεγη parallelogrammon. Demonstratio.) Quoniam βε est æqualis εγ: idcirco & triangulus αβε, triangulo αεγ est æqualis: sunt enim super basibus æquali-

equalibus $\beta\epsilon$, $\epsilon\gamma$: & in eisdē lineis rectis $\beta\gamma$,
 $\alpha\gamma$, æquedistantibus, Quare $\alpha\beta\gamma$ triangulus
 duplus est trianguli $\alpha\epsilon\gamma$. verū parallelogram
 mon $\epsilon\zeta\eta$: etiam est duplum trianguli $\alpha\epsilon\gamma$.
 quia eandem habent basin $\epsilon\gamma$: & in eisdē sunt
 æquedistantibus lineis rectis $\epsilon\gamma$, $\zeta\eta$. Quare
 parallelogrammon $\epsilon\zeta\eta$: est æquale triangu-
 lo $\alpha\beta\gamma$: & habet angulum $\gamma\epsilon\zeta$, æqualem an-
 gulo δ . Cōclusio.) Dato igitur triangulo $\alpha\beta\gamma$:
 statutum est æquale parallelogrammon $\epsilon\zeta\eta$,
 in angulo $\zeta\epsilon\gamma$, qui est æqualis, dato angulo re-
 ctifineo δ . Quod faciendum erat.

Propositio 43. Theorema.

Omnis parallelogrammi, eorum
 quæ circa eandem sunt dimetien-
 tem parallelogrammon supple-
 menta: æqualia inter se sunt.

Explicatio dati.) Sit parallelogrammon
 $\alpha\beta\gamma\delta$: dimetiens eius $\alpha\gamma$: & circa $\alpha\gamma$, sint pa-
 rallelogramma $\epsilon\theta$, $\zeta\eta$, & quæ vocantur sup-
 plementa sint $\beta\kappa$, $\chi\delta$. Explicatio quesiti.)
 Dico quod supplementum $\epsilon\kappa$, sit æquale sup-
 plemento $\gamma\delta$. Demonstratio.) Quoniam $\alpha\beta\gamma\delta$
 paralle-

EVCLIDIS

parallelogrammon, diametrum habet ay : idcirco triangulus $a\beta\gamma$, est æqualis triangulo $ad\gamma$. Rursus quoniam ex θa parallelogrammon: diametrum habet ax lineam rectā: ideo eax triangulus, est æqualis triangulo abx . per eadem demonstrabitur triangulum $x\zeta\gamma$, triangulo xny esse æqualem. Cum igitur triangulus eax , triangulo abx sit æqualis: & triangulus $x\zeta\gamma$, æqualis triangulo xny : erit itaq; triangulus eax cum triangulo $x\theta\gamma$, æqualis triangulo abx , cum triangulo $x\zeta\gamma$. verū totus triangulus $a\beta\gamma$, toti triangulo $ad\gamma$ est æqualis. quare reliquum supplementū βx , reliquo supplemento xd est æquale. Conclusio.) Omnis igitur parallelogrammi, eorum quæ circa eandem sunt dimetientē parallelogrammon supplementa: æqualia sunt inter se. Id quod erat demonstrandum.

Propositio quadragesima quarta.

Problema.

AD datam lineam rectam: dato triangulo: æquale statuere parallelogrammon: in angulo rectilineo dato.

Expli-

Explicatio dati.) Sit data linea recta $\alpha\beta$:
 datus vero triangulus γ : datus angulus recti
 lineus δ . *Explicatio quaesiti.)* Ad datam li-
 neam rectam $\alpha\beta$: statuendum est parallelo-
 grammon, aequale triangulo dato γ , in angu-
 lo, qui est equalis angulo δ dato. *Delineatio.)*
 Fiat triangulo γ , aequale parallelogrammon
 $\zeta\epsilon\eta$: in angulo $\epsilon\beta\eta$, equali angulo δ dato: &
 sit linea recta $\beta\epsilon$, ita $\angle\theta\epsilon\alpha$ recta $\alpha\epsilon$: atq;
 producat^r linea recta $\zeta\eta$, ad punctum θ . per
 punctum etiam α : educatur alterutri linearū
 $\beta\zeta$, & ζ aequedistās linea recta $\alpha\theta$: deniq; duca-
 tur linea recta $\theta\epsilon$. *Demōstratio.)* Quoniam in
 duas rectas aequedistātes $\alpha\theta$, & ζ incidi recta li-
 nea $\theta\zeta$. idcirco anguli $\alpha\theta\zeta$, $\theta\zeta\epsilon$ duobus rectis
 sunt aequales. atq; ideo anguli $\beta\theta\eta$, $\eta\zeta\epsilon$ duobus
 rectis sunt minores, verum lineae rectae, à duo-
 bus angulis, qui sunt minores duobus angulis
 rectis: in infinitum usque ductae concurrunt.
 quare $\theta\beta$, & productae concurrent. *Alterā*
delineationis pars.) Producantur duae lineae
 rectae $\zeta\theta\beta$: & concurrant in puncto κ : & per
 punctum κ , alterutra linearum $\epsilon\alpha$, $\zeta\theta$, ducatur
 $\kappa\lambda$ aequedistans: atque producantur lineae

EVCLIDIS

rectæ $\eta\beta$, $\theta\alpha$, ad puncta $\nu\sigma$, λ , μ . Demonstrationis altera pars.) Est igitur figura $\theta\lambda\mu$ parallelogrammon: eiusque diameter $\theta\kappa$: circa dimetientem verò parallelogramma sunt $\alpha\eta$, $\mu\epsilon$: dicta vero supplementa $\lambda\beta$, $\beta\zeta$. quare $\lambda\zeta$ supplementum, est æquale $\beta\zeta$ supplemento, verum $\beta\zeta$ supplementum, est æquale triangulo γ . ergo & $\lambda\zeta$ supplementum triangulo γ est æquale. præterea quoniam angulus $\eta\beta\epsilon$ est æqualis angulo $\alpha\beta\mu$: & angulus $\eta\beta\epsilon$ etiam est æqualis angulo δ . idcirco & angulus $\alpha\beta\mu$, etiam est æqualis angulo δ . Conclusio.) Ad datam igitur lineam rectam $\alpha\beta$: dato triangulo γ : æquale constitutum est parallelogrammon $\lambda\beta$: in angulo $\alpha\beta\mu$, qui est æqualis angulo δ . Id quod erat faciendum.

Propositio quadragesima quinta.

Problema.

Dato rectilineo: æquale statuerè parallelogrammon: in angulo rectilineo dato.

Explicatio dati.) Sit datum rectilineum $\alpha\beta\gamma\delta$: & datus angulus rectilineus ϵ . Explica-

plicatio quaesiti.) Dato rectilineo $\alpha\beta\gamma\delta$: sta-
 tuendam est aequale parallelogrammon: in an-
 gulo rectilineo, qui est equalis angulo ϵ dato.
 Delineatio.) Ducatur linea recta $\beta\delta$: & con-
 stituatur triangulo $\alpha\epsilon\delta$ aequale parallelo-
 grammon $\zeta\theta$: habens angulum $\theta\alpha\zeta$, aequalem
 angulo ϵ . Statuatur etiam ad lineam rectam
 $\eta\theta$, parallelogrammon $\eta\mu$, aequale triangulo
 $\delta\epsilon\gamma$: habens angulum $\alpha\theta\mu$ aequalem angulo
 ϵ . Demonstratio.) Quonia angulus ϵ alterutri
 angulo $\theta\alpha\zeta$, $\eta\theta\mu$ est equalis: idcirco & angu-
 lus $\eta\theta\mu$, angulo $\theta\alpha\zeta$ est equalis. communis ad-
 datur angulus $\alpha\theta\eta$. ergo duo anguli $\zeta\alpha\theta$, $\alpha\theta\eta$:
 duobus angulis $\alpha\theta\eta$, $\alpha\theta\mu$ sunt aequales. verum
 duo anguli $\zeta\eta\theta$, $\alpha\theta\eta$ duobus rectis sunt equa-
 les. quare & anguli $\alpha\theta\eta$, $\eta\theta\mu$ duobus rectis
 sunt aequales. ad lineam rectam $\eta\theta$, & punctū
 in ea datum θ in diuersas partes ductae sunt
 lineae rectae $\alpha\theta$, $\theta\mu$: atq; faciunt angulos $\epsilon\theta\alpha$,
 $\zeta\eta\alpha$ aequales duobus rectis: quare recta $\alpha\theta$, est
 in θ aduersus recta $\theta\mu$. Et quia in lineas rectas
 aequidistantes $\alpha\mu$, $\zeta\eta$, recta quaedam $\theta\eta$ incidit:
 anguli idcirco alterni sunt inter se aequales:
 angulus $\mu\theta\eta$, equalis angulo $\theta\alpha\zeta$. Communis.

EVCLIDIS

addatur angulus $\theta\eta\lambda$. anguli igitur $\mu\theta\eta$,
 $\theta\eta\lambda$: angulis $\theta\kappa\zeta$, $\theta\eta\lambda$ sunt aequales. verum
 $\lambda\theta\eta$, $\theta\eta\lambda$ anguli sunt aequales duobus rectis.
 quare & anguli $\theta\kappa\zeta$, $\theta\eta\lambda$, duobus rectis sunt
 aequales. quare recta $\zeta\eta$, est $\epsilon\pi'$ $\epsilon\theta\epsilon\iota\alpha$ s, recta
 $\eta\lambda$. Cum vero $\kappa\zeta$ recta, recta $\theta\eta$ sit equalis, &
 equedistans: item $\theta\eta$ recta, recta $\mu\lambda$ equalis
 & equedistans: idcirco & $\kappa\zeta$ recta, recta $\mu\lambda$
 equalis & equedistans est: easq; coniungunt
 rectae $\kappa\mu$, $\zeta\lambda$. quare & $\kappa\lambda$, $\zeta\mu$ aequales & a-
 quedistantes sunt: unde fit, quod figura $\kappa\zeta\lambda\mu$
 sit parallelogrammon. Cum autem triangulus
 $\alpha\epsilon\delta$: sit equalis parallelogrammo $\theta\zeta$: & tri-
 angulus $\delta\beta\gamma$ parallelogrammo $\eta\mu$. totum igitur
 rectilineum $\alpha\beta\gamma\delta$: toti parallelogram-
 mo $\kappa\zeta\lambda\mu$ est aequale. Conclusio.) Dato igitur
 rectilineo $\alpha\beta\gamma\delta$: constitutum est parallelo-
 grammon $\kappa\zeta\lambda\mu$ aequale: in angulo $\zeta\eta\mu$: qui
 est equalis dato angulo ϵ . Id quod faciendum
 erat.

Propositio quadragesima sexta. Problema.

A Data linea recta: describere qua-
 dratum.

Explicatio dati.) Sit data linea re-
 cta

*Et aβ. Explicatio quesiti.) A data linea re-
cta λβ, describendum est quadratū. Delinea-
tio.) Ducatur ex puncto α, linea recta αβ: ad
angulos rectos recta linea αγ: & fiat recta
αβ, equalis recta ad: per punctum etiam δ,
linea recta αβ: ducatur aequidistans linea re-
cta δε: deniq; per punctum β, linea recta δε
ducatur aequidistans linea recta Γε. Demon-
stratio.) Figura igitur αβδε, est parallelo-
grammon: & αΓ, est equalis δε, atq; ad recta
βε: sed & αβ etiam est equalis recte ad. qua-
tuor igitur recte αΓ, ad, δε, Γε, sunt inter se
equales, atq; idcirco parallelogrammon αδεβ
est equilaterum. Secūda explicatio quesiti.)
Dico quod parallelogrammon αδεβ: etiam
sit rectangulum. Demonstratio.) Cum in duas
rectas aequidistantes αΓ, δε, recta quadam ad
inciderit: anguli βad, ade, duobus rectis sunt
equales: verum angulus βαγ, est rectus. id-
circo & angulus αγι, etiā est rectus. paralle-
logrāma vero angulos oppositos equales: & late-
ra opposita habet equalia: quare uterq; angu-
lorum oppositorum αβε, εβδ est rectus: ideoq;
αδεβ parallelogrammon, est rectangulum. sed*

EVCLIDIS

& equilaterum esse, fuit demonstratum. Conclusio.) Quare $a\beta\gamma$ figura, est quadratum: & est descriptū à linea recta data $a\beta$, id quod erat demonstrandum.

Propositio quadragesima septima.

Theorema.

IN triangulis rectangulis, quadratū lateris angulum rectum subtendentis: est æquale quadratis laterum, rectum angulum continentium.

Explicatio dati.) Sit triangulus rectangulus $a\beta\gamma$, habens angulum $\beta\alpha\gamma$ rectum. *Explicatio quesiti.)* Dico quod quadratum lateris $\beta\gamma$: sit æquale quadratis laterum $\beta\alpha$, $\alpha\gamma$. *Delineatio.)* Describatur à linea $\beta\gamma$, quadratum $\beta\delta\epsilon\gamma$: & à linea $\beta\alpha$, quadratum $\beta\eta$. Præterea à linea $\alpha\gamma$ quadratum $\gamma\theta$. Ducatur etiam per punctum α : alterutra linearum $\beta\delta$, $\gamma\theta$ æquedistans rectæ lineæ $a\lambda$. deniq; ducantur duæ lineæ rectæ $a\delta$, $\zeta\gamma$. *Demonstratio.)* Quoniam uterq; angulorum $\beta\alpha\gamma$, $\beta\alpha\eta$ est rectus, idcirco ad rectam quandam $\beta\alpha$: & ad punctum quodam ea est α , duæ rectæ $\alpha\gamma$, $\alpha\eta$

in diuersas partes ducta: faciunt angulos vi-
cinos inter se aequales. quare recta $\gamma\alpha$ est in
Obiectas recta $\alpha\eta$. per eadem ista demonstrabi-
tur: quod recta $\alpha\zeta$, est in π Obiectas recta $\alpha\delta$.
quoniam verò angulus $\delta\gamma\beta$, equalis est angu-
lo $\beta\alpha$ (quia uterq; est rectus) communis ad-
datur angulus $\alpha\beta\gamma$. totus igitur angulus
 $\delta\beta\alpha$: totum angulo $\beta\gamma$ est equalis. cum verò
duo latera $\delta\zeta$, $\beta\alpha$, duobus lateribus $\beta\zeta$, $\zeta\gamma$
sint equalia, alterum alteri: & angulus $\delta\beta\alpha$,
angulo $\beta\gamma$ equalis. basis igitur $\alpha\delta$, basi $\zeta\gamma$.
est equalis. & triangulus $\alpha\beta\gamma$, triangulo
 $\beta\gamma$ equalis. verum trianguli $\alpha\beta\gamma$: paralle-
logrammon $\beta\lambda$ est duplum. quia habent ean-
dem basin $\beta\delta$: & sunt in eisdem lineis rectis
aequedistantibus $\beta\gamma$, $\alpha\delta$. Item trianguli $\zeta\gamma$.
duplum est quadratum $\eta\beta$. quia habent ean-
dem basin $\zeta\beta$: & sunt in eisdem lineis rectis
aequedistantibus $\zeta\gamma$, $\eta\gamma$. Quae vero equalium
sunt dupla: illa inter se sunt equalia, ideoq;
parallelogrammon $\beta\lambda$, aequale est quadrato
 $\eta\beta$. Simili ratione quando $\alpha\alpha$, $\gamma\zeta$, recta con-
iunguntur: demonstrabitur quod parallelo-
grammon $\gamma\lambda$ sit aequale quadrato $\eta\gamma$. totum

EVCLIDIS .

igitur quadratum $\delta\epsilon\gamma$: duobus quadratis
 $\eta\beta, \theta\gamma$, est aequale . sed $\beta\delta\epsilon\gamma$ quadratum : est
 descriptum à latere $\beta\gamma$, & quadrata $\eta\beta, \theta\gamma$
 sunt descripta à lateribus $\epsilon\alpha, \alpha\gamma$. Quadratum
 igitur lateris $\beta\gamma$: est aequale quadratis laterum
 $\epsilon\alpha, \alpha\gamma$. Cōclusio.) In triangulis igitur rectan-
 gulis : quadratum lateris rectum angulū sub-
 tendentis : est aequale quadratis laterum rectū
 angulum cōtinentium. quod erat demonstran-
 dum.

Propositio quadragesima octava.

Theorema.

SI quadratum vnius lateris triangu-
 li : fuerit æquale quadratis reliquo-
 rum duorum laterum : erit angulus,
 quem reliqua illa duo trianguli latera
 continent, rectus.

Explicatio dati.) Sit quadratum lateris
 $\beta\gamma$, trianguli $\alpha\beta\gamma$, æquale quadratis laterum
 $\epsilon\alpha, \alpha\gamma$. Explicatio quesiti.) Dico quod an-
 gulus $\beta\alpha\gamma$ sit rectus. Delineatio.) Ducatur
 à puncto α : linea recta $\alpha\beta$, ad angulos rectos
 linea recta $\alpha\delta$: & fiat linea $\alpha\delta$, æqualis rectæ
 linea $\alpha\delta$: deniq; ducatur linea recta $\delta\beta$. De-
 monstra-

demonstratio.) Quoniam recta da , est equalis re-
 ctæ ay : idcirco & quadratū à recta da descri-
 ptum: erit equale, quadrato à recta ay descri-
 pto. Commune addatur quadratū rectæ ab .
 quare quadrata rectarum da , ab : sunt equa-
 lia quadratis rectæ ba , ay . Verum quadra-
 tis rectarum da , ab : equale est quadratum re-
 ctæ yc : quia angulus dab est rectus. quadra-
 tis vero rectarum ab , ay : equale proponitur
 esse quadratum rectæ db . Quare quadratum
 rectæ db : equale est quadrato rectæ by . unde
 etiam latus db : lateri by , est equale. Quoni-
 am vero latus ad , est equale lateri ab : com-
 mune vero latus ay : duo latera da , ab : duo-
 bus lateribus ba , ay sunt equalia: & basis
 db , est equalis basi by . idcirco & angulus
 dab , angulo bay est equalis. Verum angu-
 lus yab est rectus. quare & angulus cay etiā
 erit rectus. Conclusio.) Si igitur quadratum
 unius lateris trianguli fuerit equale quadra-
 tis reliquorum duorum laterum: erit angulus
 quem reliqua duo trianguli latera continent
 rectus. Id quod erat demonstrandum.

SCHOLIA IN HOC PRIMUM Euclidis elementum, Cun- radi Dasypodij.

De scientijs Mathematicis.

Mathematicas scientias, sic dictas vo-
lunt: quòd cum alias artes etiam absq[ue]
præceptore intelligere, & addiscere
possimus: has tamen non nisi instituti, & edo-
cti: inò in illis exercitati percipere queamus:
ut à discendo disciplina, à μαθησις, ἐπιστήμη
μαθηματικῆ dicantur. Pythagorici autem
mathematica nomē, duabus tantum scientijs
Arithmetica, & Geometria imposuerūt. quor-
um in his potissimum τὸ ἐπιστημονικόν, &
ipsa μαθησις cerni potest. postea tamen non-
nulli latius sumpto vocabulo: alias scientias
hisce cognatas appellarunt Mathematicas,
Astronomiam, Musicam, & quæ huius sunt
generis. Hinc fit, ut Mathematica definitur
scientia contemplationem habens rerum,
non tantum abstractarum, ut sunt numeri, &
figura: sed & sensibus ipsis subiectarum, ut
pote

potē cæli, terræ, stellarum, sonorum, tonorum,
& quæcunq; his sunt similia.

Hanc verò vniuersalem mathesin: in duas potissimum partes diuidunt: altera enim versatur circa res mēte & ratione perceptas: quæ Græcis nūminantur τὰ νοητά, & Ἀλογητά: altera verò τῶν αἰσθητῶν, rerum sensu subiectarum habet perceptionem: illa Geometriam, & Arithmeticam complectitur: hæc verò in sex est diuisa sciencias, Geodasiam, & Opticam: quæ ex Geometria nascuntur: Logisticam & Canonicam, prognatas ex Arithmetica: deniq; Mechanicam, & Astronomiā: quas ad vtramq; referri tradunt. Est & alia Mathematica diuisio: in quatuor partes tantum facta. quoniam μᾶλλον, vel habet perceptionem quantitatis continua, vel quantitatis discreta. Geometria enim, & Astronomia sibi habēt subiectas ipsas magnitudines: Geometria quidem eam, quæ est sine motu: Astronomia eam, quæ mouetur. sic etiam multitudinis & numerorum fit contemplatio, in Arithmetica, & Musica: illa enim numeros per se considerat: eorūq; proprietates investigat.

S H O L I A

*figas: hæc verò numeros tractat relectos, quos
 etiam harmonicos appellant. Itaque vniuer-
 salis quedam mathematica cognitio & do-
 ctрина est statuenda: sub se complectens reli-
 quas disciplinas omnes: suaq; principia, & vni-
 uersales propositiones omnibus communi-
 cans: non quatenus numeris, aut figuris, vel
 deniq; moribus illa insunt: sed quatenus eorū
 vniuersalis est natura: & talis, quæ singulari-
 bus illis disciplinis attribui potest. Sunt autē
 eiusmodi principia τὸ πέρας, & τὸ ἀπέραν, fini-
 tum, & infinitum: quia numerus incipit ab
 unitate, & in infinitum vsq; crescit: is verò
 qui sumitur, finitus semper est: sic etiam ma-
 gnitudines in infinitum vsq; diuidi possunt: cū
 tamen ea quæ diuiduntur, sint finita, & termi-
 nata. Propositiones verò mathematicæ com-
 munes sunt istæ, in quibus contemplamur λό-
 γους, ἀναλογίας, συνθέσεις, ἀναλύσεις, ἀνάστρο-
 φάς, συναλλαγὰς τὰ ἴσα, τὰ ἀνίστα, id est, ratio-
 nes, proportionēs, compositiones, diuisiones, cō-
 uersiones, alternas permutationes, æquale, &
 inæquale. deinde τὸ κάλλος, & τάξις, ipsaq;
 μέθοδος. præterea ὁμοιότης, & ἀνομοιότης, si-
 militudo*

militudo, & dissimilitudo rerum in figuris, numeris, & motibus vniuersaliter considerantur. hæc inquam omnia, & his similia vnaquæque disciplina ad suam accommodat rem subiectam: eaq; ei inesse proprijs confirmat rationibus. Præterea Mathematicarum disciplinarum fastigium & vertex quasi: est ipsa ἀπὸ δεξιᾶν, quia per ipsam hæc scientia perficitur: dum definitionibus, diuisionibus, demonstrationibus, & quicquid harum rerum est, videntur.

De Geometria, & eius elementis.

Proclus Geometriā sic definit: γεωμετρία ἐπὶ ἐπισήμῃ γνωστῇ μεγεθῶν, καὶ σχημάτων, καὶ τῶν τετραγώνων περάτων: ἐπὶ δὲ καὶ τῶν λόγων τῶν αὐτοῖς, ὧν παθῶν τῶν αὐτὰ, καὶ τῶν πηλίκων δόσεων, καὶ κινήσεων. Geometria est scientia, vel cognitio magnitudinum, & figurarum, atq; etiam terminorum quibus illæ clauduntur: quæq; proportionibus & rationibus, atq; etiam passionibus his accidentibus demonstrat: positionum deniq; & motuum varietates explicat. Hæc scientia duplex est: altera nominatur *Γεωμετρία τῶν περὶ τὰς ἐπιφανείων*: altera *στερωμετρία*.

Plano

SCHOLIA.

Planorum contemplatio tanquam simplicior
 praecedit, siquidem ex superficierum contem-
 platione nascitur corporum & solidorum co-
 gnitio. in utraq; verò tria (sicuti in omnibus
 scientijs) considerantur. Primum ὑποκείμενον γένος , res ipsa, de qua doctrina est instituta:
 alterum, $\text{τὸ κατὰ αὐτὸ ὑπάρχον}$: id quod
 rei per se inest: & τὰ πάθη , rerum affectiones
 tertium $\text{ἀξιωματικά, καὶ αἰτιμολογικά}$, propositio-
 nes: per quas rebus subiectis inesse aliquid de-
 monstratur. illa itaq; in Geometria consideran-
 da veniunt: nam ut ex definitione Geometriae
 licet videre: subiecta sunt trianguli, quadra-
 ta, circuli, sphaerae, Cylindri, & ut summam
 dicam, figurae planae corpora solida, deniq; om-
 nes magnitudines immobiles, & harum termi-
 ni, quae verò his per se in sunt, $\text{διακρίσις, ἀ-
 φαι, παραβολαί, ὑπεροχή, ἑλλειψις, ἰσότης
 καὶ ἀνίσότης}$, id est, divisiones contactus, appli-
 cationes, excessus, defectus, aequalitas, & inae-
 qualitas: cum alijs quibusdam huius generis.
 Axiomata, & petitiones, quibus singula re-
 bus subiectis demonstrantur inesse: sunt hu-
 iusmodi: quae eidem sunt aequalia: illa inter se
 sunt

sunt equalia. item à puncto ad punctum: ducere lineam rectam. Hæc verò cum late pateant: & ipsarum rerum subiectarum, atq; propositionum geometricarum magna, variaq; sit copia: necesse est, ut delectus habeatur, & in tradendo, atq; docendo incipiamus à simplicioribus, ac principalioribus: ex quibus tanquam notissimis: extruamus demonstrationes rerum in geometria abstrusarum. quas quidè simpliciores propositiones *συστάματα*, earumq; doctrinam *συστάματα* Greci autè nominant. sunt *συστάματα* seu elementa Geometriae, propositiones simplicissima, in quas compositæ resolvuntur: & à quibus tanquam principijs, omnes Geometricæ demonstrationes egressæ sunt. tales sunt hæc propositiones Euclidis, quibus Archimedes, Apollonius, & cæteri geometra tanquã principijs, & notissimis elementis utuntur. ita tamen hæc prima, & simplicissima Geometriae principia ab Euclide conscripta sunt: ut nemo satis possit hominis & ingenium, & industriam mirari, quæ enim ab antiquis fuerunt inuenta, in optimum redegit ordinem: delectum etiam in tanta copia, & varietate propositionum.

SCHOLIA.

positionum habuit talem : ut non omnia quæ dici poterant, assumeret : sed tantum , quæ elementari institutioni conueniebant. deinde omnes modos, omniaq; genera syllogismorum adhibuit, quæcunq; ab ipsis apodeicticis recipiuntur. Præterea utimur diuisionibus in inueniendis rerum speciebus : item definitionibus in substantiali rerum subiectarum explicatio-
ne : adhuc demonstratione in ijs : quæ à principijs fiunt ad quæsitæ. deniq; resolutione cum à quæsitis ad ipsa principia sit reditus. Taceo de varijs, quibus utimur conuertendi modis, continuatione, & dispositione singulari ipsorum elementorum : ut vnum absq; altero videatur esse non posse. Quæ cum ita sint, merito omnes studiosi philosophiæ, & bonarum artium : sibi hæc Euclidis elementa familiaria reddere debebant : ut ad altiores capescendas scientias fierent paratiores.

De propositionibus Geometriæ.

Solent Geometriæ duo præcipua propositio-
num genera habere : vnum est τῶν ἀρχῶν
principiorum : alterum τῶν μετὰ τὰς ἀρχὰς
μετὰ τὰς ἀρχὰς : id est, propositio num, quæ princi-
pia se-

pia sequuntur. principia ipsa, quia per se ma-
 nifesta, & simplicia sunt: nulla adhibita de-
 monstratione primo explicantur loco: subse-
 quuntur propositiones demonstratione indi-
 gentes: & ex ipsis demanantes principijs. &
 nisi hic ordo teneatur, verum permisceantur
 omnia: tum & ipsa cognitio perturbatur: &
 quæ natura sunt distincta, coniunguntur. Il-
 lud ipsum facit Euclides, & principiorum fa-
 cta enumeratione, absque vlla demõstratione:
 transit ad propositiones demonstrabiles. diui-
 dit verò ipsa in $\epsilon\pi\alpha\gamma\gamma\epsilon\iota\sigma\iota\varsigma$, αὐτῆμαται, καὶ ἀ-
 ξιώμαται, ἢ κοινὰς ἐννοίας. Est autem $\epsilon\pi\alpha\gamma\gamma\epsilon\iota\sigma\iota\varsigma$,
 cum aliquis rei propositæ cognitionem
 nondum habet: quæ per se fidem rei faciat: ve-
 rum concedit assumēti illud verum esse. eius-
 modi sunt ipsæ definitiones Euclidis. Postu-
 latum verò in genere est, cum neq. cognitum
 quid est: neque ab audiente concessum: tamen
 petitur ab alieno, ut assumi concedatur. sicuti
 cum peto mihi concedi: omnes angulos rectos:
 æquales inter se esse. Axioma, vel pronuncia-
 tum est, quando quid cognitum est, & tam
 manifestum; ut per sese fidem habeat. ut quæ

SCHOLIA.

eidem sunt equalia: illa inter se sunt equalia, totum maius est sua parte. Geometrae tamen hypobeseis vocant etiam opus definitiones rerum subiectarum: ut si definiam lineam, angulos, figuras, & similia: quo sciatur, quibus de rebus sermo sit institutus. deinde ἀξίωμα, seu postulatam non sic sumunt ut Philosophi: sed postulatam vocant propositionem immediatam: in qua petitur aliquid quod factum est facile: & nulla indiget varia aut proluxa delineatione: ut si dicam, à puncto ad punctum: ducatur linea recta. Communis denique sententia Geometris dicitur propositio immediata: quae per se manifesta, & cognitu perfacilis est, sine ulla demonstratione recepta: & communi omnium consensu concessa. Itaque tria ista propositionum genera, in eo conveniunt: quod principiorum naturam habeant: ac per se sint manifesta. differunt verò, quòd hypothesis sit rerum subiectarum explicatio: postulatam proponit aliquid, quod factum sit facile: axioma rei per se manifesta sit cognitio. Quidam verò petitiones dicunt tantum ad Geometriam spectare: axiomata verò ad omnes disciplinas.

nas. Alij diuidunt hoc modo ipsas communes sententias: ut quasdam Geometriae, nonnullas Arithmeticae proprias esse dicant: alias deniq; communes. atq; hæc sint paucis dicta de principijs. Propositiones verò, quæ principia sequuntur: & demonstrari possunt ac debent: alie sunt *θεωρήματα*, alie *πρόβληματα*. Problemata dicuntur propositiones, in quibus aliquid nobis ad agendum proponitur. ut quando figurarum ortus, & constitutiones, sectiones, subtractiones, additiones, & similia proponuntur. Theoremata autem sunt, in quibus ad contemplandum quiddam proponitur, ut si ea, quæ rebus per se insunt, aut accidunt, consideramus. cuiusmodi dicuntur esse τὰ καθ' αὐτὰ *ἐπ' ἀρχόντα* ἢ *συμβεβηκότα*: vel etiam *ἀπὸ συντάξεως*, aut deniq; τὰ *παθή*. Differunt itaq; inter se, sed non aliter quàm petitio, & axioma. Euclides viroq; genere utitur: nam interdum tantum habet problemata; ut in quarto libro, interdum verò solum theorematata, sicuti in quinto: nonnunquam deniq; theorematata problematibus commiscet: ut in reliquis facit libris.

SCHOLIA

De primo libro.

Proposuit sibi Euclides in hoc primo elemento: principia figurarum rectilinearum tradere: nam triangulus & parallelogrammon, sunt in figuris rectilineis omnium prima, & simplicissima figura. Diuisit verò librum in partes tres: in prima, post explicationem principiorum: docet quomodo triangulus sit constituendus: quæ sint eius proprietates: cum quoad angulos: tum etiam latera: præterea eosdem comparat inter se: & vnumquodq; accidens per se considerat: in altera de lineis æquedistantibus, & parallelogrammis doctrinam instituit: demonstrans quæ eis per se insint: & quomodo ipsa fiant parallelogramma. in postrema, parallelogramma & triangulos inter se confert. primum seorsim, deinde coniunctim. Atq; hæc breuiter sint dicta, & explicata: de vniuersali illa rerum mathematicarum: & Geometriæ cognitione: nunc subiungemus per breues locorum difficiliorum expositiones: & si quid forsan occurreret: quod latius sit explicandū, & ad vniuersam Geometriam spectare videbitur: id fusius exponemus. cuiusmodi

modi est ille locus $\omega\delta\iota$ & $\pi\acute{o}\tau\iota\sigma\mu\alpha\tau$ Θ , $\epsilon\upsilon\sigma\acute{\alpha}$
 $\sigma\iota\omega\varsigma$ $\alpha\pi\alpha\gamma\omega\gamma\eta\varsigma$, & de ijs, quæ his similia.

$\Sigma\eta\mu\epsilon\acute{\iota}\omega\nu$.) Alij sic definiunt: $\sigma\eta\mu\epsilon\acute{\iota}\omega\nu$ $\epsilon\sigma\tau\acute{\iota}$
 $\mu\omicron\nu\acute{\alpha}\varsigma$ $\theta\epsilon\acute{\iota}\omega\nu$ $\epsilon\chi\theta\omicron\upsilon$. punctum est unitas, quæ
 positionem habet. solum punctum in Geome-
 tria diuidi non potest: sicut in Arithmetica
 unitas non admittit diuisionem. sunt enim v-
 nius, eiusdemq; naturæ: quum duarum scien-
 tiarum omnium prima, & simplicissima sint
 principia: differunt tamen in eo, quod punctū
 dari & poni possit: unitas verò puncto simpli-
 cior existens nō ponatur: cū ab omni inter-
 uallo, omniq; materia, ac loco sit abstracta. V-
 ritur autem definitione negatiua, quoniam
 negationes maximè conueniunt principijs.

$\Gamma\epsilon\alpha\mu\eta\eta$.) Principium omnium magnitu-
 dinum sola negatione definiuit: lineam verò
 nunc describit affirmando, & negando. quia
 affirmatione excedit naturam puncti: & mi-
 nus est simplex puncto: cū sit longitudo diui-
 sionem admittens: negatione verò est princi-
 pium respectu superficiei, & corporis. sunt e-
 nim tres dimensiones: longitudinis quæ attri-
 buitur lineæ, longitudinis & latitudinis simul:

SCHOLIA

que ad superficiem refertur: denique longitudinis, & latitudinis, atque profunditatis coniunctim in corpore. cum itaq; in definitione ponit ἀπλὰς latitudine carens: una cum latitudine adimit quoque profunditatem: atque eam ob causam non addidit καὶ βάθος, cum superfluum esset. Alij sic definiunt lineam: γραμμή ἐστὶ πύσις ἑοικυῖα: id est, linea fit ex fluxu puncti: nonnulli γραμμὴ μέγεθος ὅφ' ἐν ἀγέρτῳ nominant: magnitudinem uno contentam interuallo. Euclidis tamen definitio perfectior est: essentiam & substantiam lineæ explicans. Possumus autem lineam hoc modo cognoscere: si longitudes parietū, aut itinerū spatia dimetiāmur, quia cum neq; latitudinem, neque crassitiem subiungimus: sed unicam consideramus distantiam: sicut cum metimur prata, & campos: videmus ipsam tantum superficiem, id est longitudinem & latitudinē tantum eius loci, vel agri. Cum verò puteos, cum est solidum, quia omnes distantiae, omniaq; interualla ibi coniunguntur, dicimus enim longitudinis, latitudinis, profunditatis ipsius putei, tantum, vel tantum esse

esse spatium. melius tamen cognoscemus lineam, quando observamus quomodo lucidum ab obscuro: illuminatum ab obumbrato distinguatur.

Εὐθεΐα.) Duæ simplicissimæ, ac precipuæ linearum species sunt, recta & circularis: reliquæ omnes sunt mixtæ: & vel in superficiebus planis: vel in corporibus solidis considerantur. Plato lineam rectam definit sic: Ὁθεΐα γραμμὴ ἐστὶν ἥς τὰ μέσα τοῖς ἄκροις ἐπιπροσθῆι: cuius media obumbrant extrema. quod licet videre in Eclipsi solis, quando in una linea recta sunt Sol, Luna, & oculus noster: Luna media inter nos & Solem existente. Archimedes definit lineam rectam sic: Ὁθεΐα γραμμὴ ἐστὶν ἐλαχίστη τῶν τὰ αὐτὰ πέρατα ἐχουσῶν γραμμῶν, est brevissima earum linearum, quæ eosdem habent terminos. atque hæc definitio explicat Euclideam, & vicissim illa declarat hanc.

Επιφανεΐα.) Post punctum & lineam sequitur superficies, quæ duplici intervallo distat lōgitudine, & latitudine: caret vero crassitudine: atq; eam ob causam. addidit particulam μόνον.

SCHOLIA.

Επιφάνειαι δὲ.) Sicut corpus solidū clauditur, & terminatur superficie: sic & superficies linea finitur, & linea puncto. quod quidē est omnium magnitudinum communis, & simplicissimus, atq; extremus terminus.

Επίπεδον & ἐπιφάνεια.) Omnis superficies vel est plana, vel circularis, & spherica. unam igitur Geometra delegit, eamq; definit, nempe planam. possunt ei etiam congruere definitiones lineæ rectæ supra positæ: in hac autē plana superficie nos tanquam in aliquo subiecto contemplamur figuras, & figurarum affectiones. nam in plana superficie nos ducimus lineas rectas, circulares, & figuras omnis generis: item linearum, circulatorum, & figurarum sectiones, contactus, applicationes angulorum, constitutiones, & quicquid harum est rerum. sed planam superficiem idcirco elegit, quoniam in alijs superficiebus ista omnia non possunt ita intelligi, aut describi, quemadmodum in plana. Vocat itaq; hic planū id, quod nobis ante oculos est positum: & in quo mente atque cogitatione omnia describimus, & delineamus, atq; firmis rationibus confirmamus.

Επί-

Επίπεδον & γωνία.) Genus definitionis est
 ἔπιπεδον, inclinatio: locus autem in quo descri-
 bitur angulus, est τὸ ἐπίπεδον, planū ipsum:
 ortus verò eius est, quòd ad minimum duæ de-
 bent esse lineæ rectæ: sicuti in solido angulo, li-
 neæ tres: deinde illæ duæ lineæ rectæ: debent
 sese mutuo tangere: neq; sitæ esse in directo. il-
 lud enim est ἐκ ὁθείας, quando duæ lineæ
 rectæ ita collocatæ sunt: ut protractis istis li-
 neis rectis, & concurrentibus, vna ex duabus
 fiat linea recta.

Ὅταν δὲ.) Enumerat species substantiales
 anguli rectilinei, definitionibus acuti & obtu-
 si anguli: est addendū genus: quod scilicet vs-
 terq; sit rectilineus, alter maior recto, alter ve-
 rò recto minor. Verum nō absolute illud est su-
 mendum, quod omnis angulus recto minor, sit
 acutus: quia sunt anguli nonnulli etiam non
 rectilinei minores recto, & tamen non acuti:
 sicut neq; illud simpliciter sumitur, quod obtu-
 sus sit recto maior, & idcirco omnes recto an-
 gulo maiores sunt obtusi. quoniam sunt angu-
 li recto maiores, qui non sunt obtusi.

Ἐπὶθείστα.) Rectam super recta constituit

SCHOLIA.

in definitione anguli recti : non autem in anguli obtusi aut acuti descriptione . quia angulus rectus, est angulorum non rectorum mensura: sicuti equalitas, est regula & norma inaequalitatis.

Αλλήλων.) Possunt enim aequales esse, sed si inter se aequales sint: necesse est ut sint recti.

Εφεξής.) Indicat causam rectitudinis: quia si anguli contigui inter se sunt aequales, rectus erit uterq; illorum equalium angulorum. nam stans illa recta in neutrum inclinat partem: & idcirco causa est non equalitatis tantum, sed & rectitudinis. Traditur verò hic de angulis, qui sunt in vno eodemq; plano: sicuti & perpendicularis non qualibet hic definitur: sed illa tantum, quae in vno, eodemq; est plano.

Κύκλος.) Prima simplicissima, atq; perfectissima figura plana est circulus, ut in corporibus solidis sphaera.

Σχήμα.) Quia vno comprehenditur termino. ἀπ' ἐνός. sunt enim infinita in circulo puncta: quorum omnium vnum tantum censeri nomen & naturam retinet. Εντός.) ad disse.

differentiam eius puncti, quod extra circulum sumitur: & polus dicitur. omnia enim in vno sunt plano. idcirco etiam statim definitio nem illius puncti subiungit, ut sciamus nō polum, sed centrum intelligi.

Διάμετρος (Θ.) Circulo propriè conuenit: nam ἄξων vel ἄξιν est ipsius sphaerae: Ἀγῶν (Θ) verò figurarum quadrilaterarum.

Ημικύκλιον.) Semicirculū inquit circuli diametro & circumferentia comprehendit: propter τμήματα segmenta circulorum, quorum alterum μείζων maius, alterum ἔλαττον minus dicitur.

Ενθύγραμμα.) à figura quae vno termino, ad eam quae duobus comprehenditur, est progressus: nunc ad alias pergit explicandas: idē iuxta ordinem numerorum, binarium, & ternarium, & ita deinceps, quamuis ultra quadrilateras figuras, quae in elementis locum habent, non progreditur specialiter: verum sub vno vocabulo comprehendit: & eas nominat τὰ πλὺτάδε, multilateras figuras. Omnis igitur figura rectilinea, vel est trilatera: vel quadrilatera: vel gradatim multilatera: sed

SCHOLIA.

*sed non è contra omnis trilatera, quadrilatera
ra, aut multilatera est rectilinea.*

*Τριγωνίων.) Triangulorum duplex est
diuisio: vna per se manifesta, & cognita sum-
pta ab ipsis lateribus: altera quæ eam subse-
quitur est propria ab ipsis angulis facta.*

*Τετραγωνίων.) Præcipua diuisio qua-
drilaterarum figurarū hæc est: aliæ dicuntur
parallelogramma: aliæ nō parallelogramma,
quæ verò parallelogramma dicuntur: aliæ re-
ctangula, & æquilatera sunt: vt τετραγωνον
quadratum: aliæ verò horum neutrum habēt,
vt το ρομβοειδης, Rhombi speciem habens.
nonnulla verò sunt quidem rectangula: sed
nō æquilatera, vt ετερομηκες, parallelogram-
mon altera parte longius: deniq, sunt paral-
lelogramma, quæ æquilatera quidem, sed non
rectangula sunt, vt est ρομβος, Rhombus. Fi-
gura verò quadrilatera, quæ non sunt paral-
lelogramma: aut duo tantum habent paral-
lela latera, & sunt τραπέζια: aut nulla pro-
fus parallela latera, & nominantur τρα-
πεζοειδῆ, speciem trapezij habentia. Verum
Euclides hanc diuisionem facere non potuit,
cum*

cum de parallelis lineis aut figuris hisce lineis contentis nulla sit facta mentio : idcirco simpliciorem illam facit diuisionem τετραπλόου.

Καὶ πᾶσι ὁμοίαι) Quidam iuxta Peripateticos volunt banc propositionē esse αἴτημα, petitionem: alij vero & melius ἀξίωμα, pronuntiatum. Cum nunc paucis absoluerimus principia: restant propositiones demonstrabiles. omnis enim scientia vel versatur in principiorum explicatione: quas sine vlla demonstratione adbibita recipit: vel in doctrina propositionum earum, quæ ex ipsis demanāt principijs: & per ea demonstrantur: quare & nos illas aggrediamur.

De partibus problematis, atq; Theorematis.

Propositiones quæ demonstrationem admittunt, suprā duplices constituiimus esse: vel enim sunt προβλήματα, problemata: in quibus ea, quæ quodammodo nondum existunt comparare, & constituere proponitur: vel θεωρήματα, theoremata, in quibus id quod
iam

SCHOLIA

tam constitutum est, & in rerum natura exi-
 stit, cognoscere, & perspicere statuimus. Geo-
 metria enim, ut & alia scientiæ, habet omnes
 quatuor quæstiones: an sit, quid sit, quale sit,
 & quare sit: de quibus quidem omnibus ser-
 monem instituit ipsa Geometria, ut apud Eu-
 clidem videbimus. Omne verò problema, o-
 mneq; theorema, quod suis perfectum, & abso-
 lutum est partibus, hæc in se habet: πρότασιν,
 ἐκθεσιν, διόρισμόν, καὶ ἀποδείξιν, καὶ
 συμπέρασμα, id est, propositionem, in qua est
 δεδομένον, datū, & ζητούμενον, quæsitum: de-
 inde explicationem dati: tertio explicationem
 quæsitum: quarto delineationem: quinto demon-
 strationem: sexto & postremo conclusionem
 totius. Nam in propositione quid de re subie-
 cta, vel ipso dato quærat, proponitur. perfe-
 cta enim propositio, & datum, & quæsitum ha-
 bet, quamvis nonnulla sint, quæ altero careant:
 postea ἐκθεσις ipsum datum per sese conside-
 rat, & ipso quæsito quasi preparat & struit
 viam. διόρισμός seorsim proponit quid de
 subiecto quærat. Delineatio verò solet ea
 addere, quæ ad inuestigationem quæsitum per-
 tinent:

tinent: ipsa autem demonstratio, adhibitis certis atque firmis, priusq; concessis & affirmatis rationibus: id de subiecto dici, quod proponitur, cōfirmat. tandem facta ipsa demonstratione: conclusio redit ad ipsam propositionem, eamq; confirmatam, & demonstratam iam esse colligit: solet verò interdum duplicem esse, vna specialis in ipsa delineatione, & demonstratione facta: altera generalis, quæ totā confirmationem propositionis datæ colligit vniuersaliter.

Ex his vniuscuiusq; problematis, aut theorematis partibus maxime necessariae sunt istae tres. Propositio, demonstratio, & conclusio: reliquæ interdum adhibentur, & id vbi plurimū interdum non adhibentur, vti in Arithmeticis fit, & in decimo Euclidis libro.

Προς τῇ δοδεκά.) Sunt quædam in Geometria, quæ nobis solent in medio demonstrationis cursu occurrere: qualis etiā in hac propositione est αἰώς, casus. dicitur autē casus nihil aliud esse: quam delineationis transpositio, quæ fit propter diuersas positiones. ab hoc casu quædam propositiones dicuntur Græcis ἀνάγωγεσθαι.
μεσολή-

SCHOLIA

προβλήματα, problemata quæ carent casu,
 quando una tantum est positio, & delineatio:
 siquidem casus respiciunt ipsam delineationē:
 quedam verò nominantur πολύηωτα proble
 mata multos casus habentia: in quibus aliter
 atque aliter fieri possunt delineationes. Hoc
 itaq; secundum problema, multos habet casus:
 varias etiam delineationes. nam cum punctū
 detur positione, illa fieri potest varijs modis:
 vel enim ponitur extra datā lineam rectam,
 vel in ipsa linea recta: & si in ipsa, aut erit al
 terum extremorum: aut inter ipsa extrema:
 & si extra ipsam, aut à latere, ita ut recta
 protracta à puncto ad datam lineam rectam,
 angulum faciat, aut è directo. Euclides sum
 psit casum difficiliorem, & punctum extra li
 neam rectam datam à latere eius ponit.

Δοθείση ὁθεία.) Omne datum vel datur
 θέσις, positione, vel λόγῳ, ratione, vel μεγέ
 θει, magnitudine, vel εἶδει, specie. positione
 tantum datur ipsum punctum: linea verò, &
 reliqua Geometriae subiecta. omnibus modis.
 hoc tamen in loco linea recta datur εἶδει spe
 cie, est enim linea recta & θέσις positione.

Δύο

Δύο ὁμοθεσῶν.) In hac propositione lineæ dantur magnitudine: ipsa delineatio multos habet casus: nam aut distant inter se, ut apud Euclidem: aut in vno puncto coniunguntur: aut sese mutuo secant: aut altera alteram in extremo alterius puncto tantum secat: & vel maior minorem, vel minor maiorem: & quicunque eiusmodi fieri possunt casus. Verumtamen ad omnes huiusmodi casus, Euclidis demonstratio accommodatur.

Ἐὰν δύο τρίγωνα.) Prius docuit trianguli constitutionem, quàm ea explicaret, quæ per se triangulis accidunt: præterea duabus propositionibus ostendit viam et methodum, quæ lineæ rectæ, faciendæ sit alia recta equalis. altera quidem non existentem facit per σύντασιν, constitutionem, & θέσιν, positionem æqualem. altera verò per ἀφαίρεσιν, ablationem, idq; fecit ut latera laterib. posset equalia proponere. dantur in hac propositione duo, æqualitas laterum duorum, & angulus angulo equalis: idq; datum ratione dari dicitur: quærentur tria, basis basi, triangulus triangulo equalis: reliqui denique anguli reliquis angulis æquales.

SCHOLIA

Εκάπτερον ἐκείνου.) Quia aliàs Theorema verum non esset: idcirco nō simpliciter inquit latus lateri æquale, sed alterum alteri. possent enim duo latera simul iuncta duobus simul iunctis esse æqualia: sed non idcirco iri- angulus esset triangulo æqualis.

Τῶ τῶν ἰσῶν.) Hoc addidit ne sumere- mus basin: nam in triangulis duo latera di- cuntur angulum aliquem comprehendere πε- εἶχειν, tertium verò ὑπολείναι subtenderet: nam latera quæ angulis opponuntur è regio- ne sunt ὑπολείναι τῶν ὑποκείνων, latera subtens- dentia, & interdum βάσις bases dicuntur, quod tanquam fundamento figura ipsa hoc nitatur latere.

Τρίγωνον.) Intelligit aream ipsam trian- gularem seu spatium ipsum, quod à trianguli lateribus intercipitur.

Demonstratio tota facta ex his duabus pro- positionibus, quæ inter se applicata conveni- unt: æqualia erunt: & vicissim. Quæ inter se sunt æqualia: si applicentur, convenient e- tiam inter se.

Τῶν γεωμετρικῶν.) Theoremata apud Geo- metras

metras magnam habent varietatem. alia enim sunt ἀπλά, simplicia, in quibus unum est datum, & unum quæsitum: quorum & data, & quæsitæ diuidi & seiungi non possunt. Vt si dicat Euclides, omnis triangulus æquicrurus: habet angulos ad basin æquales. alia composita σύνθετα, quæ ex pluribus vel datis, vel quæsitis constant. vt data sint plura, & unum quæsitum: vel plura quæsitæ, & unum datum, vel denique plura data, & plura quæsitæ. composita sunt duplicia: quædam dicuntur συμπεπλεγμένα, quæ possunt in alia simplicia theoremata diuidi: vt cum dico triæ anguli, & parallelogramma sub eadem altitudine existentia: eam habet rationem, quam basis ad basin. de utroque enim, & triangulo, & parallelogrammo seorsim eadem dici possunt. Quædam verò ἀσύνθετα, quæ cū sint composita, in simplicia tamen theoremata diuidi non possunt: quale est præcedens theorema quartum. Est & alia diuisio theorematum, de qua alibi. Hoc theorema ex utraq; parte, dati nempe, & quæsitæ compositum est: idcirco etiam distinxit, quæ data sunt & quæ quæsitæ.

SLHOLIA.

Εὰν τεργώνη.) In hac propositione duo nobis occurrunt explicanda: primum est ἀνασποφὴ τῶν πωλάσεων: alterum ἀπρυωγὴ εἰς τὸ ἀδυνάτον. Est autem ἀνασποφὴ τῶν πωλάσεων: quando ex dato alicuius propositionis, fit quaesitum: & ex quaesito datum. ut triangulus aequicrurus, id est, habens duo equalia latera: etiam angulos ad basim habet aequales, per ἀνασποφὴν, conuersionem sic. Triangulus qui angulos ad basim habet aequales: etiam est aequicrurus, id est, duo habet equalia latera: nam propositio quinta hic conuertitur iam dicto modo. Est etiam alia conuersionis ratio in propositionibus compositis obseruata: quae fit permutatione partium, et si non omnium, tamē aliquarum: ut fit in octaua propositione: quae conuertitur cum quarta. Quare notemus hic esse duo genera propositionum: vnum est τῶν πωληγυδίων, quando id quod natura subiectum est, datur: quodūc illi per se inest, quaeritur de eodem: alterum τῶν ἀντισποφῶν, cum è contrario σύμπτωμα seu accidens quoddam datur: et id, cui hoc accidit, in quaestionem adhibetur. ut in his duobus li-

bus licet videre propositionibus, quinta, & sexta. Proximum est, ut dicamus de ἀπαγωγὴ εἰς τὸ ἀδύνατον, de reductione ad impossibile. sciendum itaq; est, quod omnis demonstratio mathematica, vel sit ἀπὸ τῶν δεχῶν, quæ ab ipsis principiis ad ea, quæ ex his demanant, progreditur: vel ὑπὸ τὰς δεχάς, dum à re proposita regressus fit ad principia. utraq; verò est duplex: illa enim vel ex principiis rem propositam confirmat: vel ex rebus antea affirmatis, & concessis: hæc autem vel est ὑελική, & nominatur ἀνάλυσις, cui opponitur συνθεσις: vel ἀναγωγική, & dicitur ἀπαγωγὴ εἰς τὸ ἀδύνατον. est autem reductio ad impossibile: quando in aliquod manifestum absurdum, & impossibile definimus: & cuius contrarium omnes fatentur esse verum: eam quoq; faciunt bifariam: vel enim nos deducit ad ea, quæ principiis, ipsisq; axiomatibus manifestè repugnant, ut si quis sua argumentatione eò deueniat, totum esse æquale parti: vel ad id, quod demonstratis, & affirmatis è directo opponitur: sicuti facit in demonstratione propositionis octauæ. sit igitur

SCHOLIA.

sur *reductio ad impossibile*, cum id quod quaesito repugnat, accipimus pro vero: & ita progrediendo tandem in manifestum absurdum incidimus: quo denique sublato, id confirmamus, quod ab initio erat propositum, verum esse. Haec demonstrandi forma syllogismis videtur hypotheticis, quemadmodum in directis demonstrationibus videtur categoricis. Hoc in loco Euclides conuersione est usus in propositionis partibus; deductione vero in ipsa delineatione, ac demonstratione.

Εἰς τῆς αὐτῆς.) In geometria, & Arithmetica, ut plurimum sunt propositiones universales affirmativae: verum Euclides hic posuit negativam, sed omnibus additamentis ita eam muniuit: & tam certam, atque indubitatam reddidit: ut minime conuinci possit: quamuis non magnum in Geometria usum habeat: tamen praecipue posita est ad confirmandam octauam propositionem.

Τὸ ὀρθόγων.) Angulus hic datur specie tantum: potest enim omnibus quatuor modis dari, nempe positione, cum ad certum quoddam punctum constituitur: forma deinde, ut
si po-

si ponatur esse rectilineus: ratione vero, quando duplum triplumue statuo: deniq, magnitudine, si dicam eam esse sortiam recti partem.

Πεπεγοσμεν.) Omnis enim linea recta aut est finita ex utraque parte: aut ex altera tantum finita, et ex altera infinita: aut deniq, ex utraque parte infinita.

Κάθετον ὀρθόν.) Κάθετον ⊥ perpendicularis etiam dicitur γώνιον: & eandem habet naturam cum ea, quæ nominatur ἡ ὀρθὴ γωνία. est autem duplex: una plana; altera solida. plana perpendicularis est: quando à puncto aliquo, ad lineam rectam in eodē plano existentem alia linea recta ducitur: ut anguli contigui sint æquales: quam in hoc loco antea ducere præcepit. Solida, quæ in Stereometria consideratur, dicitur quando punctum in alio fuerit plano: & non ad rectam, sed ad aliud planum ducitur linea quadam ad angulos rectos. differunt igitur inter se: quia perpendicularis est in eodē plano, & ducitur ad lineam rectam: solida verò nō in vno eodemq, plano, nec etiam ad rectam, verum ad planum ducitur: deniq, in solida id const-

S H O L I A

derandum, quòd ad omnes quæ in eo sunt plano rectas, non ad vnam tantum, vt plana, debet esse perpendicularis.

Απρὸν.) Quæ pro nostro sumitur arbitrio satis longa vel brevis, longior vel breuior: vt visum fuerit necessarium esse ad rei demonstrationem.

Κατὰ ῥοϋϕλὺ.) Differunt anguli ἰϕε-
ξῆς, & anguli κτ̃ ῥοϋϕλὺ: quòd anguli ἰϕε-
ξῆς contigui fiunt per lineam, quæ alteram
non secat: sed anguli κατὰ ῥοϋϕλὺ per line-
as duas sese secantes, sic dicti sunt, quod ver-
tices in vno coniungant puncto.

Ex δὴ τῶν.) Locus hic expostulat vt a-
liquid dicamus de corollario. in elementis igitur
ἀξιόμματα, seu corollaria sunt propositio-
nes, quæ dum aliæ demonstrantur, simul ap-
parent, & manifestæ fiunt: nobis etiam non
querentibus, aut inuestigantibus eas. quale
est hoc præsens ἀξιόμ. dum enim propo-
nitur, quod duabus lineis rectis sese secanti-
bus, anguli ad verticem sint inter se æquales:
et firmis demonstratur rationib. in ipsa occur-
rit nobis demonstratio: quatuor illos angu-
los es-

los esse æquales, quatuor rectis. Itaq; lucrificamus per ipsam hanc propositionem, hoc $\pi\delta\epsilon\sigma\mu\gamma$. tripliciter verò diuiduntur: primum enim omne corollarium vel est Geometricū, vel Arithmeticum, vel alterius scientiæ, ut iam dictum, proprium est Geometriæ. In secundo verò Euclidis libro, propositione secunda, est Arithmeticum. deinde quædam corollaria sequuntur ipsa problemata: quædam verò theoremata: nam in hoc loco theorematum corollarium habemus: verum in libro secundo problematis. tertio alia corollaria sunt demonstrationis directæ: alia verò indirectæ, sicuti hoc præfens porisma, natum est ex demonstratione directæ: sed in propositione prima libri tertij: facta demonstratione per reductionem ad impossibile, nascitur corollarium. possunt & alia porismatum discrimina tradi: nobis tamen hæc monstrasse satis est.

Εἰς τοὺς γωνίας.) In definitionibus mentionem fecit diuisionis angulorum substantialis: nunc alia est facienda eorum diuisio per accidens. omnis angulus vel est $\acute{\alpha}\nu\gamma\lambda\omicron\varsigma$, vel $\acute{\alpha}\nu\gamma\lambda\omicron\varsigma$. id est, omnis angulus vel est intra ipsam figu-

SCHOLIA.

ram, vel extra eam. deinde anguli quidam sunt ἐφ' ἑξῆς, quidam ἀπ' ἐκείνων, id est, contigui, aut oppositi. in triangulis igitur fieres habet, quando aliquod trianguli latus extenditur: nascitur angulus qui ad ipsam trianguli substantiam non pertinet, & cum extra figuram existat: nominatur externus. Verum ex illis tribus, qui ad triangulum pertinent: vnus qui ei est proximus, nominatur contiguus, reliqui verò duo oppositi: respectu eius, qui extra triangulum est.

Πᾶσι μετὰ λαμβανόμεναι.) Est Geometrica phrasis, qua vtimur, dū volumus ostendere, quouis modo sumi vel latera, vel aliquod aliud Geometriae subiectū, aut accides per se.

Explicauit Euclides quaecunq; in primis illis elementis poterant dici, de triangulorum constitutione, equalitate, aut inaequalitate eorundem, aut etiam laterum, & angulorum: nunc pergit de quadrilateris figuris enarrare ea, quae ad eorum contemplationem elementarem pertinet. Cum verò ex lineis & quae distantibus fiant eiusmodi figurae: prius earū proprietates docet, & parallelogramma constituit:

fluir: postea persequitur doctrinam de figuris quadrilateris, seu parallelogrammis. est autem $\pi\alpha\rho\alpha\delta\delta\eta\lambda\omicron\gamma\epsilon\alpha\mu\mu\omicron\nu$ figura quæ circumscribitur lineis rectis æquedistantibus, atq; oppositis inter se.

Tria itaq; in lineis parallelis sunt consideranda, quæ eis per se insunt: & ita attribuntur: ut inde cognoscere possimus lineas rectas esse æquedistantes. Primum est, ut anguli $\epsilon\iota\alpha\delta\delta\alpha\gamma$ alterni (qui fiunt per lineam rectam in alias duas rectas incidentem) sint inter se æquales. Alterum, recta linea incidente in duas alias rectas: si anguli interni fuerint duobus rectis æquales: tum propositæ duæ rectæ sunt æquedistantes. Postremum, Recta linea secante alias duas rectas: si externus angulus, angulo interno sibi opposito ex eadem parte, fuerit æqualis; iterum erunt illæ rectæ æquedistantes.

ἢ εἰς τὰς.) Hoc Theorema conuertitur cum ambobus præcedentibus. in demonstratione utitur propositione, quæ inter principia est relata: sed principium non est.

Πᾶσι τοῖς ὑποκρίνουσιν.) Ea quæ decima sexta, & de-

SCHOLIA.

& decima septima propositione erant omiffa: in hac præfenti addit, et quanto minores fint, explicat: nempe tertio, & huius propositionis: maxima eſt utilitas.

Αἱ τὰς ἰσας.) Hæc propositio finit doctrinam linearum æquedistantium: & incipit parallelogrammorum traditionem.

Τῶν παρελλήλογραμμῶν.) Postquam constituit parallelogrammon: inuestigat tria quæ parallelogrammis per se insunt. Primum latera opposita esse æqualia. Secundum, angulos oppositos esse æquales. Tertium, diametrum per medium ipsam secare figuram. Ita fit, ut à lateribus ab angulis, & ab ipsis areis, proprietates inquireat parallelogrammorum.

Παρά τινι δοθεῖσιν.) Tria sunt apud Geometras vocabula: παρεβολή, ὑπερβολή, & ἔλλειψις. cum enim figura applicatur ad lineam rectam: ut neq, excedat, neq, deficiat: eſt cum παρεβολή applicatio. quando vero excedit ὑπερβολή: cum deficit ἔλλειψις, atq, in Conicis figuris maxime considerantur ista.

Απὸ

Ἀπὸ τῆς.) Videtur Euclides voluisse præstantiores figuras rectilneas describere: in triangulis, eum quem æquilaterum nominamus: in quadrilateris figuris ipsum quadratū.

ἈναγέΨαι.) Vitur hoc verbo, quoniam ab uno latere describitur: συστήσασθαι verò est, cum ex multis constituitur.

Εν τῷ ὀρθογωνίῳ.) In hoc, & sequenti theoremate vitur λήμμασι, id est assumptiuis propositionibus, utpote: Quæ ab æqualibus rectis lineis descripta sunt quadrata: illa sunt æqualia inter se. item æqualium quadratorum: æqualia sunt latera.

In quibusdam etiam propositionibus vitur alijs λήμμασι, assumptionibus, quas hic subiungam.

I. Si prima magnitudo fuerit æqualis magnitudini secundæ: & secunda maior sit tertiæ: erit etiam prima maior quàm tertiæ.

II. Si prima magnitudo fuerit maior secundæ: & secunda sit æqualis tertiæ: erit etiam prima maior quàm tertiæ.

III. Si

SCHOLIA.

III. Si prima magnitudo fuerit maior quàm secunda; et secunda maior sit quàm tertia: erit etiam prima longè maior quàm tertia. Sunt & alia huius generis, de quibus aliàs.

EX SCRIPTIS HIERONIS
Alexandrini de Geometricis definitionibus
selecta quædam in vsum Academiæ
Argentinenfis.

Punctum est, cuius nulla est pars: aut terminus sine interuallo: vel terminus lineæ. eius verò natura talis est: ut ratioe tantum percipiatur: quia nullam habet partem, neq; ullam magnitudinem. ideoq; aiunt punctum tale quippiam esse: quale est id quod in temporis consideratione præsens & instans est tempus atq; momentum. imò tanquam unitas quæ positionem habet. Itaq; patet punctum quo ad substantiam idem esse cum unitate. Sunt enim ambo talia, quæ diuidi nequeunt,

queūt, & incorporea atq; partis expertia existant) differunt tamen superficie & habitudine. Vnitas etenim est principium numeri: punctum verò principium substantiæ geometricæ. sed est principium ipsa expositione, non autem vt pars lineæ: sicuti vnitas est pars numeri: simul tamen percipitur. nam quando mouetur, vel potius imaginamur moueri, illud intelligimus in lineæ fluxu. vnde etiam punctum est principium lineæ: superficies verò est principium corporis solidi.

Linea verò est longitudo absque latitudine: vel primum quod in magnitudine habet subsistentiam: aut id quod vnico interuallo constans diuidi potest. Fit autem linea, quando ex superiore loco deorsum fluit punctum: atq; eius notio comprehenditur per continuationem, finiturq; punctis: ipsamet existens superficie terminus. Dicitur itaq; linea esse id ipsum quod distinguit radium solarem ab vmbra: aut vmbra à parte illuminata: quod uè in veste intellecta atq; concepta tanquam concinno separat purpuram à lana: & e contra lanam à purpura. Nunc ergo cum consuetudinis
quadam

GEOMETRIAE

quadam habeamus lineæ notionem : quia longitudinem tantum habet: non autem latitudinem aut profunditatem : ideo dicimus parietem exempli gratia esse centum vlnarum: neque illius respicimus aut latitudinem aut crassitiem. sic quoq; viam quinquaginta stadiorum, ubi longitudinem tantum, non autem latitudinem stadiorum inquirimus. quasi linearis sit hæc ipsa enumeratio : quam & Euthimetricam nominant.

Lineæ aliæ sunt rectæ, aliæ rectæ non sunt: atq; ex ijs quæ rectæ non sunt : nonnulla quidam circulares existunt, quæ & circumferentiæ nominantur. quedam verò speciem habent helicæ, reliquæ sunt curvæ. Est itaque lineæ rectæ quæ ex æquo inter sua est posita puncta, erecta existens, & tanquam ad extremum extensa ad extremitates: eaq; est vicinissima omniū linearū, quæ inter duo puncta ductæ, eadem habent externa puncta: cuius quoq; partes omnibus partibus omni modo applicatæ solent convenire. deniq; recta lineæ est quæ manentibus extremis: ipsa quoque manet immota. tanquam ea quæ vertitur in eodem

eodem plano. atq; circa eadem extrema perpetuo eundem tenet locum. neq; verò una recta, neq; duæ figuram facere possunt. Circulares lineæ sunt, quæcunq; circulariter, vel circa unum punctum ad extremum extensæ, vel circulos, vel circulorum partes absoluunt: solum ex omnibus alijs lineis efficientes figuram. Curvarum atq; flexarum linearum numerus est infinitus. aliæ siquidem in easdem partes habent sua concava: nonnullæ verò non habent. Linea ergo flexa concava in easdem partes est: quando duobus in ea sumptis punctis quibuscunq; recta quæ illa coniungit puncta: vel in ipsam cadit lineam: vel intra eam: nunquam verò extra ipsam. quæ verò hoc modo se non habet: non est flexa concava linea in easdem partes. Helix autem seu helica linea in plano quidem est, quando alicuius lineæ rectæ altero extremo manente, mota ipsa in plano fuerit: donec ad eundem redeat locum: simul punctum aliquod circumfertur: quod cum recta simul moveri cæperat à manente re extremo. linea illa itaque quæ per hanc rectam fit, est circulus: linea verò altera quæ

GEOMETRIÆ

fit per punctum quod circumfertur ad lineam rectam, appellatur helix vel helica.

Quando parallelogrammi alicuius vno latere rectum angulum ambientibus manente: ipsum parallelogrammum quidem circumuoluitur, donec ad eum vnde cœperat moueri locum redeat: atq; simul cum parallelogrammo punctum aliquod circumuoluitur in linea æquidistante non manente: atq; illud ab altero extremo incipiat: tum figura motu parallelogrammi facta nominatur Cylindrus: illa verò quæ fit per punctum quod circumfertur linea: fiet helica: cuius quæuis pars cuius parti applicata conuenit: quando eius concaua in easdem fuerint partes.

Superficies est quæ longitudinem & latitudinem tantum habet: aut terminus atque finis corporis & loci, vel magnitudo duorum interuallorum: vel etiam finis & terminus cuiusuis figuræ solidæ aut planæ apparens in duobus longitudinis scilicet atq; latitudinis interuallis. Fit autem fluxu lineæ secundum latitudinem fluentis à dextris ad sinistra. Intelligitur autem superficies esse omnis vmbra,

lūm, omnisq; color. vnde & Pythagoræi superficies appellarunt colores. Sic intelligetur etiam quando aër terræ miscetur: aut corpori alio solido. vel aër aquæ: aut aqua poculo, vel simili alicui vasi. Superficies plana est, quæ ex æquo inter suas posita est lineas rectas. recta existens explicata: quam cum recta linea in duobus punctis tangit: etiam tota ipsa omni loco omnimode applicata conuenit. hoc est quæ toti lineæ rectæ applicata conuenit. præterea breuissima ex omnibus quæ ijsdem continentur terminis superficiebus: cuius deniq; omnes partes applicatæ conuenire solent. Superficies verò non planæ sunt: quæ hoc modo se non habent: hoc est quæ secundum lineam rectam non sunt explicatæ, sed quandam habent inæqualitatem: neq; per omnia sunt erectæ.

Corpus solidum est: quod longitudinem, latitudinem, & profunditatem habet: vel quod tribus vititur interuallis. Vocantur autem corpora solida: ipsa loca. Corpus itaq; mathematicum est, quod tria habet interualla: sed corpus simpliciter dicitur, quod tribus

GEOMETRIAE

constat intervallis cum repercussione aut duritie atq; reflexione. Omne verò corpus terminatur atq; finitur superficiebus: atq; fit quando superficies ab anterioribus ad posteriora ducitur.

Angulus est ad unum punctum contractio: quæ fit atq; perficitur per superficiem aut lineam refractam. appellatur verò refracta linea: quæ si protrahatur ipsa sibi ipsi concidit. Anguli autem omnes aut sunt plani, aut solidi: atq; hi plani & solidi anguli: alij sunt rectilinei, alij verò rectilinei non sunt. Communiter itaq; planus angulus est, inclinatio duarum linearum in eodem plano sese mutuo tangentium, & non è directo positarum. Sunt autem non continuæ sese mutuo tangentes lineæ: quando altera protracta suo nutu in alteram non incidit. Aliter. Angulus planus est inclinatio lineæ in plano ad unum punctum, vel contractio ad unum punctum per lineam fractam. Angulus verò planus rectilineus nominatur, quando lineæ quæ eum continent fuerint rectæ. vel enim angulus planus est nutus & cunio linearum inter se, in eodem

dem plano, aut lineæ rectæ ad vnum punctum reflexio. atq; sic Pysbagorei angulos hos appellarunt gloebinos, hoc est, cuspidales angulos. Angulorum quidem in planis superficiebus non rectilineorum: est infinita multitudo: rectilineorum verò angulorum species sunt tres. alij siquidem recti, alij acuti, alij deniq; obtusi vocantur. Angulus itaq; rectus est, qui est opposito angulo æqualis. Oppositi verò anguli sunt, quos facit recta super recta stans. Nam si recta super recta fuerit constituta: feceritq; angulos cõtiguos inter se æquales: tum uterq; æqualium angulorum est rectus. Acutus est angulus qui minor est recto: obtusus qui recto maior. Nam si recta super recta constituta fecerit angulos inæquales: tum minor nominatur acutus: maior verò obtusus. Omnis itaq; angulus rectus: omni recto est æqualis, non autem omnis acutus omni acuto æqualis erit: neq; omnis obtusus omni obtuso æqualis, quia cum recta super recta fuerit constituta, atq; ab angulo recto declinauerit: tum eousq; minuitur acutus angulus: donec in vnum coeant duæ lineæ rectæ, & altera alteri

GEOMETRIAE

congregatur: seu altera in alteram incidit. sic etiam recta super alia recta constituta, & ab angulo recto declinante, eousque maior fit angulus obtusus, donec perpendicularis quasi resupinata incumbens rectae: ei quae subiecta est continua fiat. Angulus itaque rectus: et tempus praesens seu instans: denique unitas: eodem se habent modo. nam angulus rectus idem existens consistit. cum tamen acutus & obtusus in infinitum usque mutantur. sic & unitas eadem permanet: diuisio vero & compositio numerorum circa ipsam fit: eodem modo tempus praesens seu instans: & ipsum consistit: praeteritum vero & futurum in infinitum procedit. Angulus solidus communiter est contractio ad unum punctum, quando superficies ex iisdem partibus habuerit concava. Atque aliter: Angulus solidus est qui pluribus quam duobus planis angulis continetur: vel contractio solida ad unum punctum superficiei refractae ad lineam: quae etiam protracta: ipsa sibi ipsi non coincidit. Intelligitur vero protracta esse, quando non apparet totam suam longitudinem egressa esse: sic & planum protractum

tractum esse intelligimus. Propriè tamen anguli rectilinei solidi appellantur, quorum superficies quæ angulos faciunt continentur angulis rectilineis: ut pyramidũ et polyedrorum atq; cuborum. anguli verò solidi non rectilinei sunt, qui hoc modo se non habent, ut anguli conorum.

Figura est, quæ termino vel terminis quibusdam continetur: aut est id quod inclusum est vno vel pluribus finibus atq; terminis. hoc est id quod bene figuratum & efformatum existit. Alio etiam modo dicitur figura ab eo quod est finis & limes includens figuratum, nominatur verò figura à fingendo, hoc est ab eo quod est inclusum, aut quod includit. Differt verò id quod continet à termino atq; fine, quia & punctum est terminus atq; finis, verum non efficit figuram. termini verò figurarum sunt superficies & lineæ. & sic termini scilicet appellantur à distinguendo & terminando aliquousq; ipsam figuram, hoc est, ostendunt figurarum fines & extremitates. Figuræ verò aliæ quidem sunt planæ, aliæ verò solidæ. planæ quæ in eodem plano omnes habent

GEOMETRIÆ

lineas: solidae autem, quæ in eodem plano non omnes habent lineas. Atq; ex figuris quæ in superficiebus existunt, nonnullæ sunt incompositæ: quædam verò compositæ. incompositæ quidem quæ ex lineis factæ non sunt. compositæ autem quæ ex lineis fiunt: figurarum verò compositarum & in superficiebus existentium: aliæ sunt factæ & compositæ ex partibus eiusdem generis: aliæ verò ex partibus alterius generis, ut sectores sicuti vocantur circulorum & semicirculi, & hapsides & maiora circulorum segmenta. eodem nomine appellari possent menisci seu lunulæ & reliquæ huius generis figura.

Circulus est figura plana unica linea cincta, figura ipsa appellatur circulus: linea verò figurâ ipsam continens circumferentia: ad quam omnes rectæ à puncto quod in figura est ductæ: sunt inter se æquales. Si itaq; punctum illud in eodem fuerit plano: appellatur centrum: sed si in eodem plano non fuerit, polus dicitur, ut se res habet in circulis spherarum. Alio modo etiam circulus nominatur: figura quæ ad omnes partes æqualia facit interval-
la: fit

la: fit verò circulus, quando recta quædam linea, in eodem existens plano, vno extremo manente, alterum circumductum ad eundem redit locum, vnde cæperat moueri.

Diameter verò circuli est recta quædam linea per centrum ducta: & ex utraq; parte circumferentia circuli terminata: quæ etiam circulum secat in duas partes æquales: vel est recta per centrum vsq; ad circumferentiã ducta. Semicirculus est figura, diametro & circuli circumferentia intertexta contenta. vel figura diametro & circumferentia circuli contenta. Communi nomine segmentum circuli est, siue sit maius siue minus semicirculo: figura quæ recta & circuli circumferentia continetur. Angulus in segmento circuli est, quando in circumferentia segmenti sumptum fuerit aliquod punctum: à quo puncto ad extremitates lineæ rectæ ductæ fuerint rectæ aliæ: illo inquam angulus duabus hisce rectis contentus.

Sector circuli est figura duabus rectis & vnica circumferentia contenta. vel est figura contenta rectis, quæ quemuis in circulo ad cen

GEOMETRIAE

trum constitutum angulum comprehendunt: et circumferentia circuli illis intercepta. Omnis verò circumferentia iuxta intelligentiam quidem ad figuram comprehensam: nominatur Caua: sed secundum intelligentiam eius quod figuram comprehendit, conuexa.

Meniscus seu Lunula est figura duabus contenta circumferentijs, vel duobus circulis non circa vnum idemq; centrum existentibus, excessus concaua & conuexa superficiei: vel etiam figura quae clauditur duabus circumferentijs habentibus concaua in easdem partes. Corona est figura duabus conuexis circumferentijs contenta: vel excessus duorum circulorum circa vnum idemq; centrum. Pelicis seu securis est figura quatuor comprehensa circumferentijs duabus concauis, & duabus conuexis. Sed vt in vniuersum dicam figurarum planarum circumferentijs contentarum multitudo innumera est: taceo earum, quae in superficiebus existunt. Figurae planae rectilineae, aliae quidem sunt triangulares seu trilatae: aliae quadrangulares aut quadrilaterae: nonnullae deniq; in infinitum
mult

*multangula & multilatera. Triangulus ita
que est figura plana tribus lineis rectis con-
tenta: atque tres habens angulos. Genera-
lissima vero triangulorum aut trilaterarum
figurarum species sunt sex. à lateribus qui-
dem alij trianguli nominantur æquilateri,
alij æquicruri, quidam scaleni. ab angulis ve-
rò denominati quidam rectanguli, nonnulli
oxygonij, reliqui amblygonij. atqui triangu-
lorum rectangulorum duo sunt genera: trian-
gulus æquicrurus, & triangulus scalenus: pro-
pterea quòd non sit triangulus rectangulus
æquilaterus. ceteri omnes trianguli non re-
ctanguli, excepto æquilatero non duas tan-
tum habent naturas: sed in infinitum vsq; egre-
diuntur numerum. Est verò triangulus æ-
quilaterus, quando tria habet equalia late-
ra, & tres æquales angulos. Æquicrurus au-
tem cum duo tantum equalia habet latera.
Scalenus deniq; triangulus, quicumq; tria ha-
bet inæqualia latera. Triangulus rectangu-
lus est, qui unum habet angulum rectum:
oxygonius qui tres habet acutos. Amblygo-
nius qui unum habet angulum obtusum.*

Quare

GEOMETRIÆ

Quare trianguli æquilateri omnes sunt oxygonij: verum æquicruri & scaleni: alij sunt rectanguli, alij oxigonij, quidam amblygonij.

Figura plana quadrilatera est: quæ quatuor continetur lineis rectis: & quatuor habet angulos, quarum aliæ sunt æquilateræ, aliæ verò æquilateræ non sunt: & quæ equalia habent latera: nonnullæ sunt rectangulæ, aliæ verò rectangulæ non sunt. Itaq; figuræ quadrilateræ rectangulæ appellantur quadratæ: rectangulæ verò, sed non æquilateræ: oblongæ seu altera parte lōgiores: sic quoq; quadrilateræ figuræ, quæ æquilateræ quidē sunt: non autem rectangulæ dicuntur Rhombi. denique quæ neq; latera habent equalia, neq; angulos rectos: sed latera tantum opposita equalia, & angulos oppositos æquales: vocantur Rhombocidea. Præterea ex figuris quatuor lateribus contentis quedam nominantur parallelogramma: aliæ verò parallelogramma non sunt. Parallelogramma ergo sunt quæ latera opposita habent æquedistantia: quæ verò hæc sic non habent, neq; parallelogramma vocabuntur. Sed parallelogramma rectangulæ, dicuntur

cuntur rectis angulum rectum comprehendentibus contineri. Nam illud parallelogrammum est maximum eorum, quæ lateribus æqualibus continentur, quod est in angulo recto, quia infinitum intelligimus. Ea verò parallelogramma quæ fiunt diuersa, & inter se differentia lateribus quibus continentur: & aream differentem habentia: fiunt minora: illud autem quod angulum habet rectum, est maximum. ideoq; cum acuti anguli semper minores inueniantur: ij qui metiri volebant hasce figuras: terminum & finem seu modum posuerunt doctrinam de angulo recto aut figura rectangula quadrilatera. Omnis verò parallelogrammi eorum parallelogrammorum quæ circa eius diametrum sunt vnum quodcunq; illud sit: cum duobus complementis appellatur gnomon. In vniuersum verò gnomon est id quod assumit qualecunq; concinnum, vel qualemcunq; numerum (vt Georgius Valla inquit) atq; totam ipsam figuram facit similem ei quod assumpsit. Præter iam numeratas figuras quadrilateras: alia nominantur Trapezia: alia Trapezoeidea.

Sunt.

GEOMETRIÆ

Sunt autem Trapezia quaecunq; duo latera habent æquidistantia. Trapezoridea verò, quæ nulla habent æquidistantia latera. Exs trapezijs verò quedam sunt æquicrura, quedam verò scalena. æquicrura quidem quæ habent latera nō æquidistantia inter se æqualia: Scalena verò quæ latera non æquidistantia habent inæqualia. Figura multilatera planæ sunt, quæ pluribus quàm quatuor rectis lineis continentur. ut sunt pentagona, hexagona, et sic continenter progrediendo in infinitum, æ reliqua polygona.

Basis dicitur figura planæ, linea inferiore intersecta loco: & latus figuræ planæ est linea vna ex ijs quæ figuram claudunt. Diagonius vel diagonalis est recta linea ab angulo in angulum ducta. Kathetus seu perpendicularis est recta linea à puncto aliquo ad rectam aliam ducta. Kathetus verò ad angulos rectos dicitur: quæ angulos contiguos facit rectos in linea recta super qua est erecta. Æquedistantes lineæ vocantur quæ nunquā concurrunt: & quæ in eodem plano existentes: atq; ex utraq; parte protractæ, ex neutra tamen

tamen concurrunt: quæ neq; annuunt neque abnuunt in eodem plano: sed perpendiculares omnes habent æquales, quæ à punctis vnius lineæ, ad alterius lineæ puncta ducuntur. Æquedistantes verò non sunt, quæcunq; annuentes perpendiculares faciunt maiores. Trianguli altitudo nominatur recta perpendicularis, à vertice ad basim ducta.

Stereometriæ nomina.

Superficies in figuris solidis alia quidem dicuntur esse incompositæ: alia verò compositæ. Sunt autem incompositæ, quæcunq; protractæ ipse in seipsas incidunt, vt superficies sphaeræ. Compositæ verò quæcunq; protractæ sese mutuo secant. Ex superficiebus autem compositis: alia factæ sunt ex diuersarum & dissimilium generum: alia ex similium generum partibus. ex dissimilium quidem vt superficies conorum & cylindrorum, atq; aliarum huiusmodi figurarum. ex similium verò sunt superficies solidorum rectilineorum. Quamquam & iuxta aliam diuisionem superfici-

STEREOMETRIAE

*per*ficiēs in figuris solidis quādam sunt simplices, quādam mixtæ. Simples sunt in solidis planis, superficies spherica: mixtæ autem conica atq; cylindrica & his similes. nam hæ sunt mixtæ ex plana & circumferentiali. Speiricæ enim mixtæ sunt ex duabus circumferentijs. sunt etiam aliæ plures, ut compositæ, sic mixtæ infinitæ. Lineæ in solidis figuris aliquæ quidem sunt simplices, nonnullæ verò mixtæ. simplices quidem lineæ rectæ & circumferentiales. mixtæ, ut sunt conicæ & speiricæ, atq; hæ sane sunt ordinatæ: inordinatarum verò linearum infinitus est numerus, sicuti & compositarum.

Sphæra est figura solida vnica superficie contenta, ad quam ab vno puncto in medio sphære posito: omnes lineæ rectæ productæ sunt inter se æquales. vel est figura solida, extremis partibus rotunda, ita ut à medio omnes distantias omnifarie habeat æquales. Nam quando Semicirculi alicuius diametro manente, ipse semicirculus circumducitur: atq; redit in eum vnde cœperat moueri locum: tum superficies, quæ fit per semicirculi circumfe-

circumferentiam appellatur superficies spherica. solidum autem ita comprehensum: sphaera vocatur. medium verò huius figurae solidae seu sphaerae punctum, nominatur centrum. Diameter verò sphaerae appellatur axis, atque est linea recta quadam per centrum ducta, terminata ex utraque parte in sphaerae superficie immutabilis permanens. circa quam sphaera ipsa movetur & vertitur. Extremitates vel extrema puncta axis appellantur Poli, quod si sphaera secetur, tum sectio fiet circulus. Circuli polus in sphaera dicitur punctum, in superficie sphaerae, à quo omnes lineae rectae, ad circumferentiam ductae: sunt inter se aequales. Sicuti verò in figuris planis isoperimetricis: circulus est maxima figura plana: ita in figuris solidis isoperimetricis: maxima est figura sphaerica: ideoque capacissima, & quae in se comprehendit cetera omnia.

Conus est figura solida, habens basin circulum, & ad unum punctum in vertice contractum: quod si enim à puncto sublimiori ad circuli circumferentiam ducta fuerit linea quadam recta, eaque fuerit circumducta, donec

STEREOMETRICA

in eum unde ceperat moueri, locum redeat: figura quæ hoc modo fit, conus erit. *Aliter.* Quando trianguli rectanguli vno latere manente, quæ rectum continent angulum: triangulus iste circumducitur, donec redeat ad eum, unde ceperat moueri locum: figura quæ hoc fit modo, est conus. atq. comprehensio facta per subtendens latus trianguli appellatur conica superficies. figura verò solida comprehensa, Conus. Basis coni, circulus ipse. vertex eius punctum sublime. Axis coni recta à vertice ad centrū circuli ducta: hoc est recta illa immobilis & permanens, circa quam conus vertitur. Equicrurus conus dicitur, qui latera trianguli habet æqualia. Scalenus verò conus, qui est inæqualis. Rectangulus conus est, quando latus immobile, fuerit æquale lateri circumducto. vel quo facto per axem coni angulus qui in superficie fit, fit rectangulus. Oxigonius conus est, cuius latus immobile maius est quàm quod circumducitur: vel quo facto, triangulus qui fit, est oxigonius. Amblygonius conus est, cuius latus immobile minus est, quàm quod circumducitur: vel quo facto.

secto, triangulus qui fit in superficie, est triangulus amblygonius. Colurus conus appellatur, qui habet verticem mutilum & truncatum. Superficies verò conì nunc conuexa, nunc concava dicitur. Si autem conus sectus fuerit, per verticem: efficit triangularem illam sectionem. sed si basi aequedistanter secetur, facit circulum: quod si non aequedistanter sectus sit, efficit aliud quoddam lineæ genus: quod solemus appellare consectionem. Ex quibus sectionibus conì, alia dicitur rectangula, alia verò amblygonia, est quæ oxygonia appellatur. Oxygonia itaq; est quæ sibiipsi coniuncta, & seipsam tangens: efficit figuram arealem: quæ à quibusdam nominatur Elleipsis. Sectio verò rectangula parabole: denique Amblygonia hyperbole dicitur.

Cylindrus est figura solida, quam perficere & absolui intelligimus, quando parallelogrammum rectangulum circumuoluitur circa unum ex lateribus immobile & fixum latus parallelogrammi, quod quidem parallelogrammum si reuertatur vnde ceperat moueri, efficit cylindrum. Atq; recta immobilis

STEREOMETRIAE

circa quam cylindrus vertitur, appellatur *axis*. & eius basis sunt circuli, qui fiunt per æqualia parallelogrammi latera. Sed cylindri sectiones: alie sunt parallelogramma, alie verò oxygoniorum conorum sectiones. Secatur verò solidum corpus per superficiem, superficies per lineam, linea per punctum. Interdum verò dicitur per lineam secari, facto respectu & collatione ad punctum, sic & superficies per superficiem secatur, facto respectu & collatione ad lineam.

Speira fit, quando circulus aliquis in alio circulo centrum suum habens: atq; erectus ad circuli planum: circumductus in eum unde cæperat moveri locum redierit: atq; eadem hæc figura nominatur *orbis*. Est autem dis*iuncta* seu discontinua *speira*, quæ habet dis*iunctionem*: coniuncta aut continua, quæ concidit in vno puncto, atq; minor fit, permutatq; ea, in qua circulus circumductus seipsum secat: sunt autem & harum figurarum sectiones propriæ quædam lineæ. atq; orbis quadrati sunt discisiones cylindrorum. Fiunt autem & alia multa prisinata ex *spis* *ris* &

ris & superficibus mixtis.

Figura solida rectilinea, quædam sunt Pyramides, aliæ cubi, nonnullæ polyedra, sunt quæ prismata docideis & Plintheideis, & sphinisci appellantur: aliæq; his similes. Pyramis est figura solida superficibus planis contenta: atque ab vno plano, ad vnum punctum constituta. Aliter verò sic definitur. Pyramis est figura facta, & in vnum punctum contracta, à basi trilatera, aut quadrilatera, aut polygonæ, hoc est, ut vno dicam verbo, à basi rectilinea per triangulorum compositionem. Propriè tamen pyramis æquilatera dicitur, quæ quatuor triangulis æquilateris continetur: & angulis. vocatur verò hæc figura alio nomine Tetraedrum. Eicosædrum est figura solida, viginti triangulis æquilateris contenta. Sunt autem quinque tantum eiusmodi figuræ solidæ, quæ æqualibus & similibus superficibus continentur: atq; postea à Grecis nominatæ fuerunt figuræ Platonice. hæc autem quinque figurarum latera, rationem habent ad spheram, & Euclides libro 13. elementorum demonstravit, quo-

STEREOMETRIAE

modo has quinque figuras sphaera comprehendat; nam Euclides tantum duas Platonis putat esse figuras. Archimedes vero tredecim aut inueniri tales figuras: quae sphaera inscribi possint: dum his quinque octo adiungit: quas etiam ipse Plato esse sciebat, ut quidam volunt. Tessarecadedra manifestum est constare ex octo triangulis, & sex quadratis: quodue, ut Pythagorae volunt, ex terra & aere factum & compositum est: sicuti illud etiam antiquis quibusdam notum fuit. Aliud quoddam corpus constat ex octo quadratis, & sex triangulis: quod videtur difficilius esse. Vniuersaliter tamen dicemus figuras solidas rectilineas quasdam esse pyramides, alias prismata, nonnullas neque pyramides, neque prismata. quid autem pyramis sit, antea est dictum. Octaedrum est figura solida octo contenta triangulis aequilateris. Dodecaedrum est figura duodecim contenta pentagonis aequilateris, & equiangulis. Verum pentagonum ex quo fit dodecaedrum, est aequale tribus triangulis ad duo latera. Cubus est figura solida sex contenta quadratis aequila-

quilateris & equiangulis. vocatur etiam hæc figura hexædrum. Prismata verò sunt quæ à basi rectilinearum figurarum compositionem connectunt ad figuram rectilineam. Figure verò quæ neq. pyramides, neq. prismata existunt: sunt quæ à basi rectilineæ figura per rectilineam compositionem ad rectam connectunt. Vocantur autem prismata quadam parallelopleura, quæ scilicet hexædru existencia: habent plana opposita æquedistantia. Sunt autem plana æquedistantia, quæ si protracta fuerint, non concurrunt inter se, vel in quibus descriptis equalibus & similibus triangulis aliquibus: unum quodq. latus est æquedistans. Kathetus seu perpendicularis in solido dicitur recta, quæ à puncto sublimi ad planum ducta omnibus rectis eam in eodem plano tangentibus, est ad angulos rectos. Prismata autem parallelopleura quadam sunt rectangula, quadam verò rectangula non sunt. Rectangula quidem quæcunq. habent lineam rectangulorum, tribus angulis contentam. Quæ verò sic se non habent: illa etiam non sunt rectangula. Do-

STEREOMETRIÆ

eis est figura, cuius longitudo latitudine & crassitie maior est. interdum verò habet latitudinem & crassitiem æquales. Crassities autem profunditas & altitudo eadem dicitur esse. Plinthis est figura, quæ habet longitudinem minorem latitudine & profunditate: nonnunquam hæc sunt inter se æqualia. Sphe-
 niscus est figura solida, quæ habet hæc omnia inter se inæqualia, longitudinem, latitudinem, & profunditatem: quidam hanc figuram etiam appellant bomiscum (à specie veterum ararum.)

Affectiones rerum geometricarum &
 stereometricarum.

Tangit autem linea lineam, superficiem, & corpus, in puncto & in linea. punctum verò si alterum tanget punctum, fiet unum punctum. sic & linea lineam tangens, tota totam: similiter fiet una. Recta verò circumulum dicitur tangere: quæ circumulum tangens si producta fuerit: ex neutra tamen parte circumulum secabit. Circuli verò sese mutuo tangere dicuntur: qui cum sese mutuo tangunt; non secant sese. Recta verò ad planum

num

nam erecta est, quando ad omnes lineas rectas quæ ipsam in eodem plano tangunt, fecerit angulos rectos. Planum verò ad alterum planum erectum est: quando linea recta in uno aliquo eorum plano, communi ipsorum sectioni ad angulos rectos ducta: etiam reliquo plano ad angulos rectos fuerint.

Aequidistantia plana sunt: quæ nunquam concurrunt. Differunt in solidis & in planis. atq; etiam lineis, similitudo & æqualitas. Sic enim in sexto Euclidis elementorum. Duabus datis figuris rectilineis, altera similem quidem figuram: altera verò æqualem propositum est constituere. atq; in ea propositione medium proportionale inuenientes: per eam medietatem id quod propositum est, probamus: in solidis verò per duas medietates. Nunc verò dicemus vniuersaliter de æqualibus quidem, quòd æquales lineæ, superficies, corpora sunt: quacumq; tota totis, vel genere vel figuracione conueniunt. dicitur etiam æquale, quod est isoperimetrum ambitu et comprehensione, & æquale lineis: vnde & area atq; sola area. Anguli æquales sunt: qui ap-

STEREOMETRIÆ

plicari toti toti, in planis & solidis eadem contractione vel genere, vel figuracione conveniunt. *Aequales* verò circuli sunt, quorum diametri sunt æquales inter se. quia nequis fieri ut intelligamus ab iisdem diametris alium atq; aliū circulum fieri. sed si diameter fuerit data: etiam circulus datus erit magnitudine. *Equaliter* verò à centro distare dicuntur lineæ rectæ: quando à centro ad ipsas ductæ perpendiculares fuerint æquales. Longius verò distare in quam perpendicularis maior incidit. *Figure* verò solida æquales & similes sunt: quæ continentur planis æqualibus, similiterq; positis, numero, & magnitudine æqualibus.

Similes figure rectilineæ sunt, quæ habent ad unum angulos æquales. & aliter, quæ angulos ad unum habent æquales: & latera æquales angulos continentia æqualia. *Reciproce figure* sunt: in quibus in alterutra figure sunt rationes antecedentes & consequentes. *Similia circulorum segmenta* sunt, quæ angulos recipiunt æquales: vel in quibus anguli sunt æquales. *Simili ratione & spherarum segmenta: similes figure solida* sunt, quæ
simi-

similibus similiterq; positis planis continentur. Omnis verò circulus, omni circulo similis est specie: quia circuli generatio seu procreatio, est una eademq;: sic species eius una. sed segmentorum non eadem est similitudo. sed quacunq; similem habent inclinationem, hoc est angulos in ipsis existentes inter se aequales: illa appellantur similia. dissimilia verò, quæ se ita non habent. Eodem modo se res habet in cæteris planis & solidis figuris.

Magnitudo est quæ crescit & augetur, atq; secatur, diuidiq; potest in infinitum vsq;. sunt autem tres eius species, linea, superficies, corpus. est autem infinita magnitudo, quæ non potest maior intelligi secundum essentiam & subsistentiam quantamsunq;: ita ut nullus finis vel terminus eius inueniri queat. Pars est magnitudo aliqua, alterius magnitudinis, minor maioris: quando minor ex ætate meretur maiorem. Dicitur autem pars in loco non sicuti mundi pars est terra, neq; hominis pars ipsum caput. neq; verò ut rectæ ad angulos rectos diametro circuli ductæ, dicimus partem esse, angulum extra semicirculum interceptum

STEREOMETRIAE

ceptum recta ad angulos rectos ducta. Fieri enim nequit, ut angulus hic qui ceratoides appellatur, metiatur angulum rectum. cum omnis angulus rectilineus, minor sit angulo ceratoide. Itaque in magnitudinibus sumemus partem eam quae est rerum similium generum: atque sic dicemus partem in magnitudinibus: ut tertiam anguli recti dicemus esse partem recti anguli. Neque hoc sophismatum concedendum, quo dicimus, si pars est id quod aliquid metitur: etiam quod metitur, pars erit. sed linea recta pedalis metitur solidum. Ergo linea recta pedalis, est pars solidi: & linea recta pedalis est solidum. Id quod absurdum erit. Nam linea recta pedis unius metitur longitudinem, profunditatem, & latitudinem corporis solidi. quasi ea quae linea rectae sunt similium generum: non autem ipsum solidum.

Multiplex est maior magnitudo minoris: quando minor eam metitur.

Quid sit pars, quid ratio, & quae similium sint generum, & quid proportio: diligentius quidem explicata sunt in Arithmeticae elementis. Nunc vero de his dicemus, quod sicu-

ti in alijs similium generum ipsa applicatur proportio : ita quoq; in rebus similium generum, quæ in magnitudinibus existunt. Magnitudines dicuntur rationem habere inter se: quæ multiplicata sese mutuo excedere possunt. sed respondendum ijs qui hanc oppugnant definitionem, atq; dicunt, illa habere rationem inter se, quæ multiplicata sese mutuo possunt excedere: nihil autem tam est similis generis, quàm sit punctum puncto. itaq; manifestum est, quòd punctum multiplicatum excedet punctum. His, inquam, sic est respondendum, quod punctum non recipiat multiplicationem magnitudinis. quia id quod inter magnitudinem non numeratur: illud etiam neque magnitudinis multiplicationem admittit. solum autem multiplicationem ut numerus recipit. sic enim quoniam in linea recta infinita sunt puncta, hæc illorum sunt multiplicia: ita simpliciter & absolutè de puncto differunt, ac si esset magnitudo interuallum habens, omnino ex aduerso Euclidi, qui docet punctū esse, cuius nulla sit pars: & dicat rationem habere inter se magnitudines.

STEREOMETRIAE

nes. In eadem ratione dicuntur magnitudines esse prima ad secundam, et tertia ad quartam: quando prima & tertia aequemultiplices, secunda & quarta alias quascunq; aequemultiplices, vel simul excedunt, vel simul deficiunt, vel simul illis fuerint aequales, sumptae inter se. Quae verò eandem rationem habent: nominantur proportionales magnitudines. proportio verò in tribus terminis est minima. atq; hoc in loco termini accipiuntur, vel magnitudinum, vel numerorum ipsis impositorum. sicuti enim circuli terminus est circumferentia, & trianguli termini sunt latera: ita 9. ad 6. huius rationis termini sunt hi iidem numeri. Quando verò tres magnitudines fuerint proportionales: tum prima ad tertiã habere rationem dicetur duplam, quam ad secundam. Inquit itaq; Eratosthenes, quòd sicuti in aequalibus intervallis, atq; secundum rectam lineam positis: intervalla dupla fiunt: ita quoq; in rationibus quodammodo secundum rectam lineam propositis. prima ad tertiam dicetur habere duplam rationem, quàm ad secundam. Nam 9. distat à 6. sesquialtera &

m, & 6 à 4 eadem sesquialtera: quare 9 à 4.
 distant, duabus sesquialteris. nam duo isti
 excessus sunt ijdem vni excessui. exempli gra-
 tia. in 9. & 4. nam 9. excedit 6. tribus. &
 6. excedit 4. duobus. verum 3. & 2. compo-
 sita & addita: efficiunt 5. qui merus est ex-
 cessus 9. & 4. Sicuti verò in maioribus con-
 ferendis ad minores: excessus faciunt duplas
 rationes & triplas: ita quoq; à minoribus, fa-
 ciunt defectus. Quando verò aque multipli-
 cium, primæ magnitudinis multiplex excedit
 secundæ magnitudinis multiplicem: cum pri-
 ma ad secundam maiorem dicetur habere ra-
 tionem, quam tertia ad quartam. Atque in
 hac definitione termini, voluit Euclides indi-
 care nobis & proponere: in quibus nam maior
 sit querenda & inuenienda ratio alia ra-
 tione. & cum magnitudines in eadem ratione
 existentes, notis suis designarit per aquemul-
 tiplices simul excedentes, vel simul deficien-
 tes: nunc docet quæ in maiore sint rationes: il-
 le quæ habent excessum. Quomodo verò hic
 fiat excessus ipse exponit. in quinto vniuersa-
 lis rationum doctrina elementaris libro, atq;
 in theo-

STEREOMETRIAE

in theoremate inaequalium magnitudinum demonstrant. Homologae magnitudines dicuntur esse, antecedentes antecedentibus: & consequentes consequentibus. Ratio quidem dicta est esse, duorum similium generum habitudo quaedam inter se: sed in magnitudinibus proprie dicemus, quod ratio sit duarum magnitudinum eiusdem generis, iuxta quantitatem quaedam habitudo & affectio: ita ut in illis sit proportio: talium rationum similitudo. Inversa ratio est consequentis ad antecedentem ratio. Compositio rationis est, sumptio antecedentis cum consequente, ac si unus esset terminus, ad ipsum consequentem. Cetera de his, tradit Euclides in quinto libro elementorum. Linea infinita neq. multiplicari potest unquam: neq. altera ad alteram conferri. quæ enim eiusdem generis non sunt: non possunt ratione inter se habere, & quandam habitudinem ut linea ad lineam, superficies ad superficiem: & reliqua similiter. Proportiones alie quidem sunt continuæ, alie discontinuæ seu separatae. continuæ sunt, quæ coniunctas & non dissectas habent habitudines.

sepa-

separatae vero proportionēs sunt: quando rationes hoc modo se non habent: verum disiunctae inter se sunt: neq; vno medio termino inter se copulatae. quia medius terminus, vnius est antecedens, & alterius consequens. Continua ratio: vt 8. 4. 2. separata. vt 8. 4. 6. 3. est intervallum inter magnitudines propositas. Multa tradit Euclides in decimo elementorum libro de commensurabilibus & incommensurabilibus.

Magnitudo rationalis & irrationalis, vtraq; earum non est ex numero earum rerū, quae per se considerantur, sed collatione facta ad aliquid aliud. Nam quaecunq; magnitudines sunt commensurabiles inter se: ille etiam dicuntur inter se rationales. atque numeri sunt commensurabiles: quia quisq; eorum talis est, vt minimus numerus eum metiri possit. simili modo cubitus & palmus habent commensurabilitatem inter se: nam quicunq; eorum, digitus minima mensura metitur. Cum vero in magnitudinibus existat infinitum, neq; vlla sit minima mensura: idcirco patet, quod magnitudinis ratio

STEREOMETRIÆ

nalis, nulla sit certa & definita minima mensura, ut digitus : sed in nobis est situm quantumcumque volumus proponere notam & cognitam minimam mensuram, in qua sit unitas. quia ut dictum est, quævis magnitudo per se, neque rationalis, neque irrationalis: cum omnis linea recta per se neque rationalis, neque irrationalis sit. Verum si conferatur ad unitatem subiectam in positione: inuenietur vel rationalis, vel irrationalis. itaque latere quadrati proposito rationali: inuenitur diameter potentia rationalis: nam longitudine deprehenditur irrationalis. sic etiam diametro existente rationali: latus potentia erit rationalis: cum tamen veraque per se neque rationalis, neque irrationalis existat. Sic ergo proponentes minimam aliquam mensuram rectarum linearum.

** * mathematici nominarunt rationalem, & quæ ei sunt commensurabiles: simili modo & quadratum ab ea descriptum rationale: & figuras huic quadrato commensurabiles nominarunt rationales. sic cubum ex tali descriptum linea recta, & hinc commensurabilia solida.*

Inex-

Indeplabile, hoc est, irrationale solidum intelligendum est, quod incommensurabile est cubo à rationali descripto. planum verò irrationale, id quod incommensurabile est quadrato à rationali descripto. longitudinem verò, hoc est, rectam rationalem à commensurabili. Sed quia commensurabile in lineis rectis duplex intelligitur esse. vnum quidem quando hæ lineæ rectæ commensurabiles fuerint: & figura ab ipsis descriptæ inter se cõmensurabiles, alterũ verò, quando eadẽ figuræ incommensurabiles inter se fuerint: ideoq; & duplex est differentia ad rationalem iuxta veteres mathematicos. aliæ enim dicuntur potentia rationales, aliæ irrationales potentia, reliquæ longitudine. Potentia itaq; rationales sunt vt dictum est à nobis, quæcunq; ipsæmet sunt incommensurabiles rationali: & quadrata ab ipsis descripta commensurabilia quadrato à rationali descripto. Longitudines verò, quando quadrata ab ipsis descripta, in quadratis numeris fuerint: vel latera habent commensurabilia rationali longitudine, deniq; vniuersaliter nominatur ra-

STEREOMETRIAE

tionali commensurabilis, rationalis siue longitudine, siue potentia tantum. Definiunt etiam rationalem hoc modo. Rationalis est, quae per numeros fit nota: verum hæc non est vera definitio rationalis; sed eius accidentis: nam si exempli gratia rationales proponunt, quadratorum à rationali cubitali descriptorum. nouimus quos palmorum aut digitorum unaquæq; sit: vnde ex accidentibus eam appellamus rationalem, per numeros cognitam. Differt autem rationalis à data, quòd rationalis quidem omnino sit data: data verò non necessario sit rationalis. nam rationalis quantitate & qualitate manifesta est: data verò quantitate & magnitudine tantum: sunt enim quedam irrationales datae, Euclides inquit rationale quadratum à proposita recta descriptum, Vbi nominatur proposita recta ea, quæ principium est mensurarum, & tanquam regula ad dimensionem longitudinis, positione quadam à nobis est assumpta. Vt si quis proponat quantum sit interuallum inter duo proposita puncta: ille nihil ratione dignum quæret, quod sint pedum & cubitorum;

neceſſe

*necesse esset nos petere ab ea, quæ exhiberetur
quantitate cubitum vel pedem, atq; cum vtes
remur illa proposita rationali linea recta in-
quiremus propositum interuallum, an esset
omnino mensura rationalis.*

*Sunt autem dimensionum in magnitudi-
nibus, quæ certas magnitudines exactè me-
riuntur genera ista. digitus, palmus minor,
palmus maior, pes, vlna, seu cubitus, passus,
orgya: mensura minima verò omnium est di-
gitus. Diuiditur verò in partes, dimidiam
scilicet tertias & reliquas. Sunt autem & a-
liæ mensuræ ab aliquibus excogitatæ. istæ sci-
licet: Passus, Acena, seu pertica, Pletbrum,
Iugerum, Stadium, Milliare, Schæ-
nus, Schænus persica, & Schæ-
nus græca, cæteraq;
his similes.*

FINIS.