

Notes du mont Royal

www.notesdumontroyal.com

Cette œuvre est hébergée sur « *Notes du mont Royal* » dans le cadre d'un exposé gratuit sur la littérature.

SOURCE DES IMAGES
Google Livres

EUCLIDIS
OPERA OMNIA.

EDIDERUNT

I. L. HEIBERG ET H. MENGE.



LIPSIAE
IN AEDIBUS B. G. TEUBNERI.
MDCCCLXXXVI.



EUCLIDIS
E L E M E N T A.

EDIDIT ET LATINE INTERPRETATUS EST

I. L. HEIBERG,

DR. PHIL.

UOL. III.

LIBRUM X CONTINENS.



LIPSIAE

IN AEDIBUS B. G. TEUBNERI.

MDCCCLXXXVI.

P. 291



Handwritten scribble

PA

3404

E86

1883

v. 3

Handwritten mark

PRAEFATIO.

Praeter codices solitos PBFVb, quos ipse contuli, nisi quod cod. Bodl. B ab initio usque ad finem definitionum alt. p. 136, 19¹ beneuolenter conferendum suscepit G. A. Stewart, u. d. Oxoniensis, in hoc libro X uti mihi licuit palimpsesto cod. Musei Britannici Add. 17211 (L), de quo cfr. uol. IV p. VI; continet

- X prop. 15 p. 44, 12 μετρήσει ad finem prop.
- X prop. 16 p. 46, 2 (μέγε)θος — p. 46, 8 ὄτι.
p. 46, 17 (με)τρεῖ ad finem prop.
- X, 16 lemma p. 46, 23 -μον ἐλλείπων ad finem.
- X prop. 31 p. 92, 19 (μέ)σαι ad finem prop.
- X prop. 32 totam.
- X prop. 32 lemma ab initio ad p. 96, 20 ὅλη.
- X prop. 80 p. 240, 9 δυνατόν ad finem prop.
- X prop. 81 ab initio ad p. 244, 10 ὑπό.
- X prop. 112 p. 358, 19 ΒΔ ad finem prop.
- X prop. 113 ab initio ad p. 362, 19 οὕτως.

In appendicem hic, ut semper, ea sola recepi, quae in uno saltem meorum codicum in textu legebantur; quare in mea editione quaedam eorum, quae Augustus in app. V habet, frustra quaeras; sunt enim scholia marginalia, quae in uol. V suo ordine edentur. Prolegomena critica quominus uel huic uel quarto uolumini

praemitterem, sicuti constitueram, prohibuit ratio scholariorum, quae quinto volumine comprehenduntur. nam cum inde non pauca subsidia ad codices aestimandos peti posse uiderem, statui iis demum editis ad prolegomena illa adcedere.

Scrib. Hauniae mense Nouembri MDCCCLXXXV.

I. L. Heiberg.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

Όροι.

α'. Σίμμετρα μεγέθη λέγεται τὰ τῷ αὐτῷ μέτρῳ μετρούμενα, ἀσύμμετρα δέ, ὧν μηδὲν ἐνδέχεται κοινὸν μέτρον γενέσθαι.

β'. Εὐθεῖαι δυνάμει σύμμετροί εἰσιν, ὅταν τὰ ἀπ' αὐτῶν τετράγωνα τῷ αὐτῷ χωρίῳ μετρήται, ἀσύμμετροι δέ, ὅταν τοῖς ἀπ' αὐτῶν τετραγώνοις μηδὲν ἐνδέχεται χωρίον κοινὸν μέτρον γενέσθαι.

γ'. Τούτων ὑποκειμένων δείκνυνται, ὅτι τῇ προτεθείσῃ εὐθείᾳ ὑπάρχουσιν εὐθεῖαι πλήθει ἁπλαιοὶ σύμμετροί τε καὶ ἀσύμμετροι αἱ μὲν μήκει μόνον, αἱ δὲ καὶ δυνάμει. καλεῖσθω οὖν ἡ μὲν προτεθεῖσα εὐθεῖα ῥητή, καὶ αἱ ταύτη σύμμετροι εἴτε μήκει καὶ δυνάμει εἴτε δυνάμει μίνον ῥηταί, αἱ δὲ ταύτη ἀσύμμετροι
15 ἄλλοι καλεῖσθωσαν.

δ'. Καὶ τὸ μὲν ἀπὸ τῆς προτεθείσης εὐθείας τετράγωνον ῥητόν, καὶ τὰ τούτῳ σύμμετρα ῥητά, τὰ δὲ τούτῳ ἀσύμμετρα ἄλογα καλεῖσθω, καὶ αἱ δυνάμεναι

Ad deff. cfr. Hero deff. 128—129, Anonymus Hultschii p. 256, Martianus Capella VI, 718.

Εὐκλείδου στοιχείων ι P V, Εὐκλείδου στοιχείων τῆς θέωνος ἐκδόσεως ι F, Εὐκλείδου στοιχείων ι τῆς θέωνος ἐκδόσεως b. 1. ὅροι] om. PFV, ὅροι τοῦ ι b, ὅρος τοῦ ι B. numeros om. codd. 5. Ante σύμμετροι ras. 1 litt P. 8. ἐνδέχεται b φ. 9. προστεθείση b et e corr. F. 10. Post εὐθεῖα add. Theon: τουτέστιν ἀφ' ἧς θέσει τὰ μέτρα τό τε πηχυναῖον καὶ τὸ παλαιαιστιαῖον καὶ τὸ δακτυλιαῖον ἢ τὸ ποδιαῖον λαμβάνεται (BFVb).

Liber X.

Definitiones.

1. Magnitudines commensurabiles uocantur, quas eadem mensura metiri licet, incommensurabiles autem, quarum communis mensura inueniri nequit.

2. Rectae potentia commensurabiles sunt, ubi quadrata earum eadem mensura metiri licet, incommensurabiles autem, ubi nullum spatium communis quadratorum earum mensura inueniri potest.

3. His suppositis demonstratur, rectas numero infinitas esse datae rectae commensurabiles et incommensurabiles partim longitudine tantum, partim potentia quoque. iam data recta rationalis uocetur, et quae ei commensurabiles sunt siue longitudine potentiaque siue potentia tantum, rationales, quae autem ei incommensurabiles sunt, irrationales uocentur.

4. Et quadratum datae rectae rationale uocetur, et quae ei commensurabilia sunt, rationalia, quae autem ei incommensurabilia sunt, irrationalia, et rectae, quae

πλήθει] om. F. σύμμετροί τε καί] supra scr. m. rec. P. 11. μόνον, αὐτὸ δὲ] om. Theon (BFVb). 12. Post δυνάμει add. Theon: αὐτὸ δὲ δυνάμει μόνον (BFVb). προστεθείσα b et e corr. F. 14. σύμμετροι b, corr. m. rec.; deinde add. Theon: κατὰ τὸ συναμφοτέρων (syn- om. b), τουτέστιν (καὶ del. F) μήκει καὶ δυνάμει (BFVb); idem P mg. m. 1 pro scholio. 16. προστεθείσης b et e corr. F. 17. ζητά] om. F. 18. Ante ἄλογα add. κατὰ τὸ συναμφοτέρων F; idem P mg. m. 1 pro scholio. καλείσθωσαν Theon (BFVb).

αὐτὰ ἄλλοι, εἰ μὲν τετράγωνα εἴη, αὐταὶ αἱ πλευραὶ,
εἰ δὲ ἑτερά τινα εὐθύγραμμα, αἱ ἴσα αὐτοῖς τετράγωνα
ἀναγράφουσαι.

α'.

5 Δύο μεγεθῶν ἀνίσων ἐκκειμένων, ἐὰν ἀπὸ
τοῦ μείζονος ἀφαιρεθῇ μείζον ἢ τὸ ἥμισυ καὶ
τοῦ καταλειπομένου μείζον ἢ τὸ ἥμισυ, καὶ
τοῦτο ἀεὶ γίγνηται, λειφθήσεται τι μέγεθος,
ὃ ἔσται ἑλασσον τοῦ ἐκκειμένου ἐλάσσονος με-
10 γέθους.

Ἔστω δύο μεγέθη ἄνισα τὰ AB, Γ , ὧν μείζον τὸ AB .
λέγω, ὅτι, ἐὰν ἀπὸ τοῦ AB ἀφαιρεθῇ μείζον ἢ τὸ ἥμισυ
καὶ τοῦ καταλειπομένου μείζον ἢ τὸ ἥμισυ, καὶ τοῦτο
ἀεὶ γίγνηται, λειφθήσεται τι μέγεθος, ὃ ἔσται ἑλασσον
15 τοῦ Γ μεγέθους.

Τὸ Γ γὰρ πολλαπλασιαζόμενον ἔσται ποτὲ τοῦ AB
μείζον. πεπολλαπλασιάσθω, καὶ ἔστω τὸ ΔE τοῦ μὲν Γ
πολλαπλάσιον, τοῦ δὲ AB μείζον, καὶ διηγήσθω τὸ ΔE
εἰς τὰ τῷ Γ ἴσα τὰ $\Delta Z, ZH, HE$, καὶ ἀφηγήσθω ἀπὸ
20 μὲν τοῦ AB μείζον ἢ τὸ ἥμισυ τὸ $B\Theta$, ἀπὸ δὲ τοῦ $A\Theta$
μείζον ἢ τὸ ἥμισυ τὸ ΘK , καὶ τοῦτο ἀεὶ γιγνέσθω,
ἕως ἂν αἱ ἐν τῷ AB διαιρέσεις ἰσοπληθεῖς γένωνται
ταῖς ἐν τῷ ΔE διαιρέσεσιν.

Ἔστωσαν οὖν αἱ $AK, K\Theta, \Theta B$ διαιρέσεις ἰσοπλη-
25 θεῖς οὖσαι ταῖς $\Delta Z, ZH, HE$ καὶ ἐπεὶ μείζον ἔστι τὸ
 ΔE τοῦ AB , καὶ ἀφήρηται ἀπὸ μὲν τοῦ ΔE ἑλασσον
τοῦ ἡμίσεως τὸ EH , ἀπὸ δὲ τοῦ AB μείζον ἢ τὸ ἥμισυ

1. ἄλογα V, corr. m. 2. Deinde add. καλείσθωσαν Theon (BFVb). 2. ἴσαι φ. 5. ἐκκειμένων] ante ἀνίσων add. B mg. m. 1. 8. αἰεὶ] αἰεὶ F, ἀεὶ ἂν V? γίγνηται V (η e corr.), γίγνεται b. ληφθήσεται Vb. 9. ἔστιν Theon (BFVb).

quadratae iis aequales sunt, irrationales uocentur, in quadratis ipsa latera, in ceteris figuris rectilineis eae, ex quibus quadrata illis aequalia construi possunt.

I.

Propositis duabus magnitudinibus inaequalibus si a maiore plus quam dimidium subtrahitur et a reliqua plus quam dimidium, et hoc semper fit, magnitudo relinquetur, quae minor erit proposita magnitudine minore.

Sint duae magnitudines inaequales AB , Γ , quarum maior sit AB . dico, si ab AB plus quam dimidium subtrahatur et ab reliqua plus quam dimidium, et hoc semper fiat, magnitudinem relictum iri, quae minor sit magnitudine Γ .

Nam Γ multiplicata aliquando magnitudine AB maior erit [cfr. V def. 4]. multiplicetur et ΔE magnitudinis Γ multiplex sit, eadem autem $> AB$, et ΔE in partes magnitudini Γ aequales ΔZ , ZH , HE diuidatur, et ab AB plus quam dimidium subtrahatur $B\Theta$, ab $A\Theta$ autem plus quam dimidium ΘK , et hoc semper fiat, donec in AB totidem diuisiones fiant, quot in ΔE .

$\epsilon\lambda\alpha\tau\tau\omicron\nu$ F. $\tau\omicron\upsilon$] om. V? $\epsilon\gamma\kappa\epsilon\iota\mu\acute{\epsilon}\nu\omicron\nu$ b. $\epsilon\lambda\acute{\alpha}\tau\tau\omicron\nu\omicron\varsigma$ F. 12. $\delta\eta\ \acute{\omicron}\tau\iota$ b. 13. $\kappa\alpha\iota$ — $\eta\mu\iota\sigma\upsilon$] om. P. $\kappa\alpha\iota$] (prius) $\kappa\alpha\iota\ \acute{\alpha}\pi\omicron$ V. 14. $\alpha\iota\epsilon\iota$ F. $\gamma\acute{\iota}\gamma\kappa\epsilon\tau\alpha\iota$ V, $\gamma\acute{\iota}\nu\eta\tau\alpha\iota$ b. $\lambda\eta\phi\theta\eta\sigma\epsilon\tau\alpha\iota$ V. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\nu$ V. $\epsilon\lambda\alpha\tau\tau\omicron\nu$ F. 16. $\gamma\alpha\rho$] $\acute{\alpha}\rho\alpha$ F. AB $\mu\epsilon\gamma\acute{\epsilon}\theta\omicron\nu\varsigma$ Theon (BFVb). 19. $\epsilon\iota\varsigma$] m. rec. B. $\acute{\alpha}\pi\omicron$] om. V. 21. $\gamma\iota\nu\acute{\epsilon}\sigma\theta\omega$ P. 23. $\tau\alpha\iota\varsigma$] corr. ex $\tau\alpha\iota$ m. rec. b. 24. $\omicron\upsilon\acute{\nu}$] om. b. $\delta\iota\alpha\iota\rho\acute{\epsilon}\sigma\iota\varsigma$ P, sed corr. 25. HZ F. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\nu$ F. 26. $\tau\omicron\upsilon$] (alt.) post ins. m. 1 F. 27. $\eta\mu\acute{\iota}\sigma\epsilon\omicron\varsigma$ b, $\eta\mu\acute{\iota}\sigma\omicron\nu\varsigma$ V. $\tau\acute{\omicron}$] corr. ex $\tau\omicron\upsilon$ F. $\eta\ \tau\acute{\omicron}\ \eta\mu\iota\sigma\upsilon$] $\tau\omicron\upsilon\ \eta\mu\acute{\iota}\sigma\epsilon\omega\varsigma$ F, $\tau\omicron\upsilon\ \eta\mu\acute{\iota}\sigma\epsilon\omicron\varsigma$ BVb.

τὸ $B\Theta$, λοιπὸν ἄρα τὸ $H\Delta$ λοιποῦ τοῦ ΘA μείζον
 ἐστίν. καὶ ἐπεὶ μείζον ἐστὶ τὸ $H\Delta$ τοῦ ΘA , καὶ
 ἀφήρηται τοῦ μὲν $H\Delta$ ἡμισυ τὸ HZ , τοῦ δὲ ΘA μείζον
 ἢ τὸ ἡμισυ τὸ ΘK , λοιπὸν ἄρα τὸ ΔZ λοιποῦ τοῦ AK
 5 μείζον ἐστίν. ἴσον δὲ τὸ ΔZ τῷ Γ · καὶ τὸ Γ ἄρα
 τοῦ AK μείζον ἐστίν. ἔλασσον ἄρα τὸ AK τοῦ Γ .

Καταλείπεται ἄρα ἀπὸ τοῦ AB μεγέθους τὸ AK
 μέγεθος ἔλασσον ὃν τοῦ ἐκκειμένου ἐλάσσονος μεγέθους
 τοῦ Γ · ὅπερ ἔδει δεῖξαι. — ὁμοίως δὲ δειχθήσεται,
 10 κἂν ἡμίση ἢ τὰ ἀφαιρούμενα.

β'.

Ἐὰν δύο μεγεθῶν [ἐκκειμένων] ἀνίσων ἀνθ-
 νφαιρουμένου ἀεὶ τοῦ ἐλάσσονος ἀπὸ τοῦ μεί-
 ζονος τὸ καταλειπόμενον μηδέποτε καταμετρῇ
 15 τὸ πρὸ ἑαυτοῦ, ἀσύμμετρα ἔσται τὰ μεγέθη.

Δύο γὰρ μεγεθῶν ὄντων ἀνίσων τῶν AB , $\Gamma\Delta$ καὶ
 ἐλάσσονος τοῦ AB ἀνθυφαιρουμένου ἀεὶ τοῦ ἐλάσσονος
 ἀπὸ τοῦ μείζονος τὸ περιλειπόμενον μηδέποτε κατα-
 μετρεῖται τὸ πρὸ ἑαυτοῦ· λέγω, ὅτι ἀσύμμετρά ἐσσι τὰ
 20 AB , $\Gamma\Delta$ μεγέθη.

Εἰ γὰρ ἐσσι σύμμετρα, μετρήσει τι αὐτὰ μέγεθος.
 μετρεῖται, εἰ δυνατόν, καὶ ἔστω τὸ E · καὶ τὸ μὲν AB
 τὸ $Z\Delta$ καταμετροῦν λειπέται ἑαυτοῦ ἔλασσον τὸ ΓZ ,

2. ἐστιν] comp. Fb, ἐστι BV. ἐστι] om. V. 4. ἡ τὸ
 ἡμισυ] τοῦ ἡμίσεος BVb, τοῦ ἡμίσεως F. 7. καταλείπεται Bb.
 8. ἐγκειμένου b. ἐλάττονος F. 10. ἡμίση P, ἡμίση V.
 Seq. demonstr. altera, u. app. 12. ἐκκειμένων] mg. m.
 1 P. ἀνθυφαιρουμένου V, corr. m. 2. 13. αἰεὶ F. ἐλάτ-
 τονος F. 15. τὰ] τὸ F, corr. m. 2. 16. καὶ ὄντος Theon (BFVb).
 17. ἐλάττονος F. ἀνθυφαιρουμένου V, corr. m. 2. αἰεὶ F.
 19. ἐστιν P. 21. ἐστι] supra scr. -αι V. τι] om. F. 23.

diuisiones igitur AK , $K\Theta$, ΘB numero aequales sint diuisionibus $\angle Z$, ZH , HE . et quoniam $\angle E > AB$, et a $\angle E$ minus quam dimidium subtractum est EH , ab AB autem plus quam dimidium $B\Theta$, erit $H\Delta > \Theta A$. et quoniam $H\Delta > \Theta A$, et ab $H\Delta$ dimidium subtractum est HZ , a ΘA autem plus quam dimidium ΘK , erit $\angle Z > AK$. uerum $\angle Z = \Gamma$. quare etiam $\Gamma > AK$. ergo $AK < \Gamma$.

Ergo ex magnitudine AB relinquitur magnitudo AK minor proposita magnitudine minore Γ ; quod erat demonstrandum.

Similiter autem demonstrabitur, etiam si, quae subtrahuntur, dimidia sunt.

II.

Si ex duabus magnitudinibus inaequalibus minore semper uicissim a maiore subtracta reliquum nunquam praecedentem magnitudinem metitur, magnitudines incommensurabiles erunt.

Datis enim duabus magnitudinibus inaequalibus AB , $\Gamma\Delta$ minor sit AB , et minore semper uicissim a

maiore subtracta reliquum ne unquam praecedentem magnitudinem metiatur. dico,

magnitudines AB , $\Gamma\Delta$ incommensurabiles esse.

Nam si commensurabiles sunt, magnitudo aliqua eas metietur. metiatur, si fieri potest, et sit E . et AB magnitudinem $Z\Delta$ metiens se ipsa minorem relinquat

$Z\Delta$] mut. in $\Gamma\Delta$ m. 2 B, m. rec. b; $\angle Z$ e corr. PV. $\epsilon\lambda\alpha\sigma\sigma\alpha$ P, sed α del.

τὸ δὲ ΓΖ τὸ ΒΗ καταμετροῦν λειπέτω ἑαυτοῦ ἔλασσον
τὸ ΑΗ, καὶ τοῦτο αἰεὶ γινέσθω, ἕως οὐ λειψθῇ τι μέ-
γεθος, ὃ ἐστὶν ἔλασσον τοῦ Ε. γερονέτω, καὶ λελείφθω
τὸ ΑΗ ἔλασσον τοῦ Ε. ἐπεὶ οὖν τὸ Ε τὸ ΑΒ μετρεῖ,
5 ἀλλὰ τὸ ΑΒ τὸ ΑΖ μετρεῖ, καὶ τὸ Ε ἄρα τὸ ΖΔ με-
τρήσει. μετρεῖ δὲ καὶ ὅλον τὸ ΓΔ· καὶ λοιπὸν ἄρα
τὸ ΓΖ μετρήσει. ἀλλὰ τὸ ΓΖ τὸ ΒΗ μετρεῖ· καὶ τὸ Ε
ἄρα τὸ ΒΗ μετρεῖ. μετρεῖ δὲ καὶ ὅλον τὸ ΑΒ· καὶ
λοιπὸν ἄρα τὸ ΑΗ μετρήσει, τὸ μείζον τὸ ἔλασσον·
10 ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ ἄρα τὰ ΑΒ, ΓΔ μεγέθη
μετρήσει τι μέγεθος· ἀσύμμετρα ἄρα ἐστὶ τὰ ΑΒ, ΓΔ
μεγέθη.

Ἐὰν ἄρα δύο μεγεθῶν ἀνίσων, καὶ τὰ ἐξῆς.

γ'.

15 Δύο μεγεθῶν συμμέτρων δοθέντων τὸ μέ-
ριστον αὐτῶν κοινὸν μέτρον εὔρεῖν.

Ἔστω τὰ δοθέντα δύο μεγέθη σύμμετρα τὰ ΑΒ, ΓΔ,
ᾧν ἔλασσον τὸ ΑΒ· δεῖ δὴ τῶν ΑΒ, ΓΔ τὸ μέριστον
κοινὸν μέτρον εὔρεῖν.

20 Τὸ ΑΒ γὰρ μέγεθος ἤτοι μετρεῖ τὸ ΓΔ ἢ οὐ. εἰ
μὲν οὖν μετρεῖ, μετρεῖ δὲ καὶ ἑαυτό, τὸ ΑΒ ἄρα τῶν

1. ΒΗ] in ras. P, mut. in ΒΑ Β m. 2, in ΑΒ m. rec.; H
e corr V. 2. γινέσθω F. ληψθῇ BVb. 3. ἔσται P. ἔλατ-
τον F. ἐλῆφθω V. 4. τό] (pr.) τοῦ F. 5. ΖΔ P. ΖΔ]
mut. in ΑΖ V, ΑΖ BFb. 8. ΒΗ] ΗΒ P. μετρεῖ] (prius)
supra m. 2 F. 10. ἐστίν] om. V. 11. Post τι ras. 1 litt. V.
ἐστίν P. 13. μεγεθῶν ἐκκειμένων F. καὶ τὰ ἐξῆς] ὅπερ

ἔδει δεῖξαι V (post ἐξῆς add. (π) b); ἐκκειμένων ἀνίσων ἀνθ-
υφαιρουμένων αἰεὶ τοῦ ἐλάσσονος ἀπὸ τοῦ μείζονος τὸ καταλει-
πόμενον μηδέποτε καταμετρεῖ τὸ πρὸ ἑαυτοῦ, ἀσύμμετρα ἐστὶ
τὰ μεγέθη m. 2 V, del. ἀνίσων lin. 13. 17. ἔστωσαν F. σύμ-

ΓZ , ΓZ autem BH metiens se ipsa minorem relinquat AH , et hoc semper fiat, donec relinquatur magnitudo minor magnitudine E . fiat et relinquatur $AH < E$. iam quoniam E magnitudinem AB metitur et AB magnitudinem ΔZ , etiam E magnitudinem $Z\Delta$ metitur. uerum etiam totam $\Gamma\Delta$ metitur. itaque etiam reliquam magnitudinem ΓZ metietur. sed ΓZ magnitudinem BH metitur. quare etiam E magnitudinem BH metitur. uerum etiam totam AB metitur. quare etiam reliquam AH metietur, maior minorem; quod fieri non potest. itaque magnitudines AB , $\Gamma\Delta$ nulla magnitudo metietur. ergo magnitudines AB , $\Gamma\Delta$ incommensurabiles erunt [def. 1].

Ergo si ex duabus magnitudinibus inaequalibus, et quae sequuntur.

III.

Datis duabus magnitudinibus commensurabilibus maximam earum mensuram communem inuenire.

Sint duae magnitudines datae commensurabiles AB , $\Gamma\Delta$, quarum minor sit AB . oportet igitur magnitudinum AB , $\Gamma\Delta$ maximam mensuram communem inuenire.

Nam magnitudo AB magnitudinem $\Gamma\Delta$ aut metitur aut non metitur. iam si metitur, et se ipsam quoque


μετρα μετέθῃ V. 18. ἔλαττον F. 20. μέγεθος] om. Theon (BFVb). ἥτοι] m. rec. P. 21. Post οὖν add. τὸ AB τὸ $\Gamma\Delta$ V. μετρεῖ] (prius) supra m. 1 B. αὐτὸ B, corr. m. 2. τῶν AB , $\Gamma\Delta$] om. V.

AB , $\Gamma\Delta$ κοινὸν μέτρον ἐστίν· καὶ φανερόν, ὅτι καὶ μέγιστον. μείζον γὰρ τοῦ AB μεγέθους τὸ AB οὐ μετρήσει.

Μὴ μετρεῖτω δὴ τὸ AB τὸ $\Gamma\Delta$. καὶ ἀνθυφαίρου-
 5 μένου ἀεὶ τοῦ ἐλάσσονος ἀπὸ τοῦ μείζονος, τὸ περι-
 λειπόμενον μετρήσει ποτὲ τὸ πρὸ ἑαυτοῦ διὰ τὸ μὴ
 εἶναι ἀσύμμετρα τὰ AB , $\Gamma\Delta$. καὶ τὸ μὲν AB τὸ $E\Delta$
 καταμετροῦν λειπέτω ἑαυτοῦ ἔλασσον τὸ $ΕΓ$, τὸ δὲ
 $EΓ$ τὸ ZB καταμετροῦν λειπέτω ἑαυτοῦ ἔλασσον τὸ
 10 AZ , τὸ δὲ AZ τὸ ΓE μετρεῖτω.

Ἐπεὶ οὖν τὸ AZ τὸ ΓE μετρεῖ, ἀλλὰ τὸ ΓE τὸ
 ZB μετρεῖ, καὶ τὸ AZ ἄρα τὸ ZB μετρήσει. μετρεῖ
 δὲ καὶ ἑαυτό· καὶ ὅλον ἄρα τὸ AB μετρήσει τὸ AZ .
 ἀλλὰ τὸ AB τὸ ΔE μετρεῖ· καὶ τὸ AZ ἄρα τὸ $E\Delta$
 15 μετρήσει. μετρεῖ δὲ καὶ τὸ ΓE . καὶ ὅλον ἄρα τὸ $\Gamma\Delta$
 μετρεῖ· τὸ AZ ἄρα τῶν AB , $\Gamma\Delta$ κοινὸν μέτρον ἐστίν.
 λέγω δὴ, ὅτι καὶ μέγιστον. εἰ γὰρ μή, ἔσται τι μέ-
 γεθος μείζον τοῦ AZ , ὃ μετρήσει τὰ AB , $\Gamma\Delta$. ἔστω
 τὸ H . ἐπεὶ οὖν τὸ H τὸ AB μετρεῖ, ἀλλὰ τὸ AB
 20 τὸ $E\Delta$ μετρεῖ, καὶ τὸ H ἄρα τὸ $E\Delta$ μετρήσει. μετρεῖ
 δὲ καὶ ὅλον τὸ $\Gamma\Delta$. καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ ΓE μετρήσει
 τὸ H . ἀλλὰ τὸ ΓE τὸ ZB μετρεῖ· καὶ τὸ H ἄρα
 τὸ ZB μετρήσει. μετρεῖ δὲ καὶ ὅλον τὸ AB , καὶ
 λοιπὸν τὸ AZ μετρήσει, τὸ μείζον τὸ ἔλασσον· ὅπερ

1. ἐστίν] comp. F, ἐστί Bb, ἐστὶ τῶν AB , $\Gamma\Delta$ V. καί]
 (alt.) μέτρον ἐστὶ V. 4. καί] om. BFVb. ἀνθυφαίρομενον V,
 sed corr. m. 2; ἀνθυφαίρόμενον F. 5. ἀεὶ] ἄρα ἀεὶ Vb, ἄρα F,
 om. B (ἄρα ἀεὶ m. 2). 8. τὸ $EΓ$ — 9. ἔλασσον] m. 2 B. 10.
 δὲ AZ] AZ δὲ P. 13. μετρήσει — 14. AB] mg. m. 1 P. 14.
 Post AZ ras. 1 litt. V. 16. μετρεῖ] μετρήσει F. Deinde add.
 Theon: τὸ AZ ἄρα τὰ AB , $\Gamma\Delta$ μετρεῖ (BFVb); idem m. rec. P.
 ἄρα] om. φ. ἐστί BV, comp. Fb. 18. τὰ] τό B, corr.
 m. 2. Post $\Gamma\Delta$ add. μετρεῖτω καὶ V, sed punctis del. 20.



metitur, AB magnitudinum AB , $\Gamma\Delta$ communis est mensura. et adparet, eandem maximam esse; nam magnitudo magnitudine AB maior AB non metietur.

itaque ne metiatur AB magnitudinem $\Gamma\Delta$. et minore semper uicissim a maiore subtracta reliquum aliquando magnitudinem praecedentem metietur, quia AB , $\Gamma\Delta$ incommensurabiles non sunt [cfr. prop. II]. et AB magnitudinem $E\Delta$ metiens se ipsa minorem relinquat $E\Gamma$, $E\Gamma$ autem ZB metiens se ipsa minorem relinquat AZ , et AZ magnitudinem ΓE metiatur. iam quoniam AZ magnitudinem ΓE metitur, ΓE autem ZB , etiam AZ magnitudinem ZB metietur. uerum etiam se ipsam metitur. quare etiam totam AB metietur AZ . sed AB magnitudinem ΔE metitur. itaque etiam AZ magnitudinem $E\Delta$ metietur. uerum etiam ΓE metitur. quare etiam totam $\Gamma\Delta$ metitur. itaque AZ magnitudinum AB , $\Gamma\Delta$ communis est mensura. iam dico, eandem maximam esse. nam si minus, magnitudo erit maior magnitudine AZ , quae AB , $\Gamma\Delta$ metiatur. sit H . iam quoniam H magnitudinem AB metitur, et AB magnitudinem $E\Delta$ metitur, etiam H magnitudinem $E\Delta$ metietur. uerum etiam totam $\Gamma\Delta$ metitur. quare etiam reliquam ΓE metitur H . sed ΓE magnitudinem ZB metitur. itaque etiam H magnitudinem ZB metitur. uerum etiam totam AB metitur et reliquam AZ me-

$E\Delta$] (prius) ΔE P. 21. καὶ] (alt.) om. V. 23. τό] (alt.)
τόν P. 24. λοιπὸν ἄρα F.

ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ ἄρα μείζον τι μέγεθος τοῦ AZ
τὰ AB , $\Gamma\Delta$ μετρήσει· τὸ AZ ἄρα τῶν AB , $\Gamma\Delta$ τὸ
μέγιστον κοινὸν μέτρον ἐστίν.

Δύο ἄρα μεγεθῶν συμμέτρων δοθέντων τῶν AB ,
5 $\Gamma\Delta$ τὸ μέγιστον κοινὸν μέτρον ὑψοῖται· ὅπερ ἔδει
δείξαι.

Πόρισμα.

Ἐκ δὴ τούτου φανερόν, ὅτι, ἐὰν μέγεθος δύο με-
γέθη μετρήῃ, καὶ τὸ μέγιστον αὐτῶν κοινὸν μέτρον
10 μετρήσει.

δ'.

Τριῶν μεγεθῶν συμμέτρων δοθέντων το
μέγιστον αὐτῶν κοινὸν μέτρον εὑρεῖν.

Ἔστω τὰ δοθέντα τρία μεγέθη σύμμετρα τὰ A, B, Γ .
15 δεῖ δὴ τῶν A, B, Γ τὸ μέγιστον κοινὸν μέτρον εὑρεῖν.

Εἰλήφθω γὰρ δύο τῶν A, B τὸ μέγιστον κοινὸν
μέτρον, καὶ ἔστω τὸ Δ · τὸ δὴ Δ τὸ Γ ἥτοι μετρεῖ ἢ
οὐ [μετρεῖ]. μετρεῖται πρότερον. ἐπεὶ οὖν τὸ Δ τὸ
 Γ μετρεῖ, μετρεῖ δὲ καὶ τὰ A, B , τὸ Δ ἄρα τὰ A, B, Γ
20 μετρεῖ· τὸ Δ ἄρα τῶν A, B, Γ κοινὸν μέτρον ἐστίν.
καὶ φανερόν, ὅτι καὶ μέγιστον· μείζον γὰρ τοῦ Δ
μεγέθους τὰ A, B οὐ μετρεῖ.

1. ἐστίν] om. F. μείζον] supra scr. m. 1 P. τι μείζον F,
sed corr. 2. μεγέθη μετρήσει Theon (BFVb). τό] (alt.)
m. 2 F. 3. ἐστὶ BVb, comp. F. 5. μέτρο P, sed corr.
εὑρηται P. Deinde add. τὸ AZ V, sed punctis notat. 6.
δείξαι] ποιῆσαι B et b (mg. γρ. δείξαι), δεῖ δεῖξαι F (mg. m. 2:
γρ. ποιῆσαι). 9. μετρή] -η in ras. P. 15. Ante δεῖ ras. 1
litt. P. 16. δύο] om. V. 17. δὴ] m. rec. P. 18. μετρεῖ]
om. P. 19. μετρεῖ δέ — 20. μετρεῖ] mg. m. 1 P. 20. Δ ἄρα]
δὲ Δ P. τῶν] -ν postea add. F. ἐστὶ BV, comp. Fb. 21.
καί] (alt.) om. BVb. 22. μέγεθος Fb. Post B ras. 1 litt. V.
Post μετρεῖ add. εἰ γὰρ δυνατόν, μετρεῖται τὰ A, B, Γ μείζον
τοῦ Δ (μεγέθους add. V) τὸ E· καὶ ἐπεὶ τὰ A, B, Γ μετρεῖ,

tietur, maior minorem; quod fieri non potest. itaque magnitudo maior magnitudine AZ magnitudines AB , ΓA non metietur. ergo AZ magnitudinum AB , ΓA maxima mensura communis est.

Ergo datis duabus magnitudinibus commensurabilibus AB , ΓA maxima mensura communis inuenta est; quod erat demonstrandum.

Corollarium.

Hinc manifestum est, si magnitudo duas magnitudines metiatur, eandem maximam earum mensuram communem metiri.

IV.

Datis tribus magnitudinibus commensurabilibus maximam earum mensuram communem inuenire.

Sint datae tres magnitudines commensurabiles A , B , Γ . oportet igitur magnitudinum A , B , Γ maximam mensuram communem inuenire.

Sumatur enim duarum magnitudinum A , B maxima mensura communis [prop. III] et sit Δ . Δ igitur magnitudinem Γ aut metitur aut non metitur. prius metiatur. iam quoniam Δ magnitudinem Γ metitur, et etiam A , B metitur, Δ magnitudines A , B , Γ metitur. Δ igitur magnitudinum A , B , Γ communis est mensura. et adparet, eandem maximam esse; nam magnitudo maior magnitudine Δ non metitur A , B .

καὶ τὰ A , B μετρήσει καὶ τὸ τῶν A , B μέγιστον κοινὸν (κοινὸν μέγιστον V) μέτρον τὸ Δ μετρήσει (μετρήσει τὸ Δ V) τὸ μείζον τὸ ἐλάττω (ἐλάττω V). ὅπερ ἀποπὼν ἔστιν (ἀδύνατον V) V et mg. m. 2 B.

Μὴ μετρεῖται δὴ τὸ Δ τὸ Γ. λέγω πρῶτον, ὅτι
 σύμμετρά ἐστι τὰ Γ, Δ. ἐπεὶ γὰρ σύμμετρά ἐστι τὰ
 Α, Β, Γ, μετρήσει τι αὐτὰ μέγεθος, ὃ δηλαδὴ καὶ τὰ
 Α, Β μετρήσει· ὥστε καὶ τὸ τῶν Α, Β μέγιστον κοινὸν
 5 μέτρον τὸ Δ μετρήσει. μετρεῖ δὲ καὶ τὸ Γ· ὥστε τὸ
 εἰρημένον μέγεθος μετρήσει τὰ Γ, Δ· σύμμετρα ἄρα
 ἐστὶ τὰ Γ, Δ. εἰλήφθω οὖν αὐτῶν τὸ μέγιστον κοινὸν
 μέτρον, καὶ ἔστω τὸ Ε. ἐπεὶ οὖν τὸ Ε τὸ Δ μετρεῖ,
 ἀλλὰ τὸ Δ τὰ Α, Β μετρεῖ, καὶ τὸ Ε ἄρα τὰ Α, Β με-
 10 τρήσει. μετρεῖ δὲ καὶ τὸ Γ. τὸ Ε ἄρα τὰ Α, Β, Γ
 μετρεῖ· τὸ Ε ἄρα τῶν Α, Β, Γ κοινόν ἐστι μέτρον. λέγω
 δὴ, ὅτι καὶ μέγιστον. εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω τι τοῦ Ε
 μείζον μέγεθος τὸ Ζ, καὶ μετρεῖται τὰ Α, Β, Γ. καὶ
 ἐπεὶ τὸ Ζ τὰ Α, Β, Γ μετρεῖ, καὶ τὰ Α, Β ἄρα μετρήσει
 15 καὶ τὸ τῶν Α, Β μέγιστον κοινὸν μέτρον μετρήσει. τὸ
 δὲ τῶν Α, Β μέγιστον κοινὸν μέτρον ἐστὶ τὸ Δ· τὸ Ζ
 ἄρα τὸ Δ μετρεῖ. μετρεῖ δὲ καὶ τὸ Γ· τὸ Ζ ἄρα
 τὰ Γ, Δ μετρεῖ· καὶ τὸ τῶν Γ, Δ ἄρα μέγιστον κοινὸν
 μέτρον μετρήσει τὸ Ζ. ἐστὶ δὲ τὸ Ε· τὸ Ζ ἄρα τὸ Ε
 20 μετρήσει, τὸ μείζον τὸ ἐλασσον· ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον.
 οὐκ ἄρα μείζον τι τοῦ Ε μεγέθους [μέγεθος] τὰ Α, Β, Γ
 μετρεῖ· τὸ Ε ἄρα τῶν Α, Β, Γ τὸ μέγιστον κοινὸν μέτρον
 ἐστίν, ἐὰν μὴ μετρήῃ τὸ Δ τὸ Γ, ἐὰν δὲ μετρήῃ, αὐτὸ το Δ.

1. ὅτι πρῶτον F. 2. ἐστι] (alt.) ἐστιν P. 4. μετρεῖ V. 5.
 μετρήσει τὸ Δ F. Post ὥστε ras. 2 litt. V. 6. μετρεῖ V.
 7. ἐστὶ] εἰσὶν P. οὖν] om. BFVb. τό] m. rec. P. 8.
 καί] om. F. ἔστω τὸ Ε] mg. m. 2 F. 9. μετρεῖ — Α, Β] om. F.
 μετρήσει] μετρεῖ V. 10. τὸ Ε — 11. μετρεῖ] om. Theon
 (BFVb). 11. μέτρον ἐστὶ V. ἐστιν P. 14. μετρεῖ] supra
 scr. F. ἄρα] om. BFVb. 15. Β] Β ἄρα BFb. 16. μέγιστον]
 m. rec P. 17. μετρεῖ] (prius) corr. ex μετρήσει m. rec. P.
 18. τὰ] τό b. 19. τὸ Ζ. ἐστὶ δὲ τὸ Ε] mg. m. 2 F; τὸ Ζ·
 τὸ δὲ τῶν Γ, Δ μέγιστον κοινὸν μέτρον ἐστὶ τὸ Ε V. 20. μετρεῖ V.

iam ne metiatur Δ magnitudinem Γ . prius dico, Γ , Δ commensurabiles esse. nam quoniam A , B , Γ commensurabiles sunt, magnitudo aliqua eas metietur, quae nimirum etiam A , B metietur. quare etiam maximam earum mensuram communem Δ metietur [prop. III coroll.]. uerum etiam Γ metitur. quare magnitudo illa Γ , Δ metietur. itaque Γ , Δ commensurabiles sunt. sumatur igitur maxima earum mensura communis [prop. III] et sit E . iam quoniam E magnitudinem Δ metitur, et Δ magnitudines A , B metitur, etiam E magnitudines A , B metietur. uerum etiam Γ metitur. E igitur A , B , Γ metitur. E igitur magnitudinum A , B , Γ communis est mensura. iam dico, eandem maximam esse. nam si fieri potest, magnitudo magnitudine E maior sit Z et metiatur A , B , Γ . et quoniam Z magnitudines A , B , Γ metitur, etiam A , B metietur et maximam earum mensuram communem [prop. III coroll.]. maxima autem magnitudinum A , B mensura communis est Δ . Z igitur Δ metitur. uerum etiam Γ metitur. Z igitur Γ , Δ metitur. quare etiam maximam earum mensuram communem metietur [id.]. ea autem est E . Z igitur E metietur, maior minorem; quod fieri non potest. itaque magnitudo magnitudine E maior A , B , Γ non metitur. E igitur magnitudinum A , B , Γ maxima est mensura communis, si Δ magnitudinem Γ non metitur, sin metitur, ipsa Δ .

21. τὰ A , B , Γ μετρεῖ μέγεθος F . μέγεθος] m. rec. P. τὰ
 τό B , sed corr. Γ] Γ , Δ (eras.) μέγεθος V. 22. τό] (alt.)
 m. 2 F. 23. ἐάν] ἄν P.

Τριῶν ἄρα μεγεθῶν συμμέτρων δοθέντων τὸ μέγιστον κοινὸν μέτρον ἡῤῥηται [ὅπερ ἔδει δεῖξαι].

Πόρισμα.

Ἐκ δὴ τούτου φανερόν, ὅτι, ἐὰν μέγεθος τρία με-
5 γέθη μετρῇ, καὶ τὸ μέγιστον αὐτῶν κοινὸν μέτρον μετρήσει.

Ὅμοίως δὴ καὶ ἐπὶ πλειόνων το μέγιστον κοινὸν μέτρον ληφθήσεται, καὶ τὸ πόρισμα προχωρήσει. ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

10

ε'.

Τὰ σύμμετρα μεγέθη πρὸς ἄλληλα λόγον ἔχει, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν.

Ἔστω σύμμετρα μεγέθη τὰ A , B · λέγω, ὅτι τὸ A πρὸς τὸ B λόγον ἔχει, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν.

15 Ἐπεὶ γὰρ σύμμετρά ἐστι τὰ A , B , μετρήσει τι αὐτὰ μέγεθος. μετρεῖτω, καὶ ἔστω τὸ Γ . καὶ ὁσάκις τὸ Γ τὸ A μετρεῖ, τοσαῦται μονάδες ἔστωσαν ἐν τῷ A , ὁσάκις δὲ τὸ Γ τὸ B μετρεῖ, τοσαῦται μονάδες ἔστωσαν ἐν τῷ E .

Ἐπεὶ οὖν τὸ Γ τὸ A μετρεῖ κατὰ τὰς ἐν τῷ A
20 μονάδας, μετρεῖ δὲ καὶ ἡ μονὰς τὸν A κατὰ τὰς ἐν αὐτῷ μονάδας, ἰσάκις ἄρα ἡ μονὰς τὸν A μετρεῖ ἀριθμόν καὶ τὸ Γ μέγεθος τὸ A · ἔστιν ἄρα ὡς τὸ Γ πρὸς τὸ A , οὕτως ἡ μονὰς πρὸς τὸν A · ἀνάπαλιν ἄρα, ὡς τὸ A πρὸς τὸ Γ , οὕτως ὁ A πρὸς τὴν μονάδα. πάλιν
25 ἐπεὶ τὸ Γ τὸ B μετρεῖ κατὰ τὰς ἐν τῷ E μονάδας,

2. εῤῥηται P. ποιῆσαι B et F (supra scr. δεῖξαι). 4. μεγέθη F. 5. μέτρον] supra scr. F. 7. δέ BVb. 8. λειφθήσεται F. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] om. Theon (BFVb). 15. ἐστιν P. B· μεγέθη F. 20. τόν] τό Bb. 21. μετρήσει b. ἀριθμόν] om. V. 22. καί] κατὰ F. 23. τόν] τό B. 25. τῷ E] corr. ex αὐτῷ m. rec. b.

Ergo datis tribus magnitudinibus commensurabilibus maxima mensura communis inuenta est.

Corollarium.

Hinc manifestum est, si magnitudo tres magnitudines metitur, eandem maximam earum mensuram communem metiri.

Iam similiter etiam in pluribus maxima mensura communis sumetur, et corollarium quoque progredietur. — quod erat demonstrandum.

V.


Magnitudines commensurabiles inter se rationem habent, quam numerus ad numerum.

Sint magnitudines commensurabiles A, B . dico, A ad B rationem habere, quam habeat numerus ad numerum.

Nam quoniam A, B commensurabiles sunt, magnitudo aliqua eas metietur. metiatur et sit Γ . et quoties Γ magnitudinem A metitur, totidem unitates sint in A , quoties autem Γ magnitudinem B metitur, totidem unitates sint in E .

iam quoniam Γ magnitudinem A secundum unitates numeri A metitur, sed etiam unitas numerum A secundum unitates eius metitur, unitas numerum A et Γ magnitudinem A aequaliter metitur.

itaque $\Gamma : A = 1 : A$ [VII def. 20]. e contrario igitur [V, 7 coroll.] $A : \Gamma = A : 1$. rursus quoniam Γ magnitudinem B secundum uni-



V. Alexander Aphrod. in Anal. pr. fol. 87.

Euclides, edd. Heiberg et Menge. III.

μετρεῖ δὲ καὶ ἡ μονὰς τὸν E κατὰ τὰς ἐν αὐτῇ μονάδας, ἰσάκεις ἄρα ἡ μονὰς τὸν E μετρεῖ καὶ τὸ Γ τὸ B . ἔστιν ἄρα ὡς τὸ Γ πρὸς τὸ B , οὕτως ἡ μονὰς πρὸς τὸν E . ἐδείχθη δὲ καὶ ὡς τὸ A πρὸς τὸ Γ , ὁ Δ πρὸς τὴν μονάδα· δι' ἴσου ἄρα ἐστὶν ὡς τὸ A πρὸς τὸ B , οὕτως ὁ Δ ἀριθμὸς πρὸς τὸν E .

Τὰ ἄρα σύμμετρα μεγέθη τὰ A , B πρὸς ἄλληλα λόγον ἔχει, ὃν ἀριθμὸς ὁ Δ πρὸς ἀριθμὸν τὸν E . ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

10

ς'.

Ἐὰν δύο μεγέθη πρὸς ἄλληλα λόγον ἔχῃ, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν, σύμμετρα ἔσται τὰ μεγέθη.

Δύο γὰρ μεγέθη τὰ A , B πρὸς ἄλληλα λόγον ἔχέτω, ὃν ἀριθμὸς ὁ Δ πρὸς ἀριθμὸν τὸν E . λέγω, ὅτι σύμμετρά ἐσσι τὰ A , B μεγέθη.

Ὅσαι γάρ εἰσιν ἐν τῷ Δ μονάδες, εἰς τοσαῦτα ἴσα διηρῆσθω τὸ A , καὶ ἐνὶ αὐτῶν ἴσον ἔστω τὸ Γ . ὅσαι δὲ εἰσιν ἐν τῷ E μονάδες, ἐκ τοσούτων μεγεθῶν ἴσων τῷ Γ συγκείσθω τὸ Z .

Ἐπεὶ οὖν, ὅσαι εἰσὶν ἐν τῷ Δ μονάδες, τοσαῦτά εἰσι καὶ ἐν τῷ A μεγέθει ἴσα τῷ Γ , ὃ ἄρα μέρος ἐστὶν ἡ μονὰς τοῦ Δ , τὸ αὐτὸ μέρος ἐστὶ καὶ τὸ Γ τοῦ A . ἔστιν ἄρα ὡς τὸ Γ πρὸς τὸ A , οὕτως ἡ μονὰς πρὸς τὸν Δ . μετρεῖ δὲ ἡ μονὰς τὸν Δ ἀριθμόν· μετρεῖ ἄρα καὶ τὸ Γ τὸ A . καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς τὸ Γ πρὸς τὸ A , οὕτως ἡ μονὰς πρὸς τὸν Δ [ἀριθμόν], ἀνάπαλιν ἄρα ὡς τὸ A πρὸς τὸ Γ , οὕτως ὁ Δ ἀριθμὸς πρὸς

3. τό] (pr.) τόν P. 4. οὕτως ὁ V. 7. πρὸς ἄλληλα] mg. m. 1 P. 11. ἔχει b. 14. δύο γὰρ μεγέθη] mg. m. 1 P.


tates numeri E metitur, sed etiam unitas numerum E secundum unitates eius metitur, unitas numerum E et Γ magnitudinem B aequaliter metitur. itaque [VII def. 20] $\Gamma : B = 1 : E$. demonstrauius autem, esse etiam $A : \Gamma = \Delta : 1$. itaque ex aequo [V, 22] $A : B = \Delta : E$.

Ergo magnitudines commensurabiles A, B inter se rationem habent, quam numerus Δ ad numerum E ; quod erat demonstrandum.

VI.

Si duae magnitudines inter se rationem habent, quam numerus ad numerum, commensurabiles sunt.

Duae enim magnitudines A, B inter se rationem habeant, quam numerus Δ ad numerum E . dico, A, B magnitudines commensurabiles esse.



nam quot sunt in Δ unitates, in totidem partes aequales diuidatur A , et uni earum aequalis

sit Γ . quot autem sunt in E unitates, ex totidem magnitudinibus magnitudini Γ aequalibus componatur Z .

quoniam igitur, quot sunt in Δ unitates, totidem etiam in A magnitudines sunt magnitudini Γ aequales, quae pars est unitas numeri Δ , eadem pars est etiam Γ magnitudinis A . itaque $\Gamma : A = 1 : \Delta$ [VII def. 20]. uerum unitas numerum Δ metitur. quare etiam Γ

πρὸς ἀλλήλα τὰ A, B V. 15. τὸν] τ' (τόν) F, τό φ. 21. τοσαῦται V, ι eras. 22. εἰσι] ἔστιν P. ἴσαι V, ι eras. 23. Δ ἀριθμοῦ F. τό] (alt.) ὁ P, in ras. V. τοῦ] e corr. V. 25. Δ ἀριθμόν F. Post μονάς ras. 4 litt. V. 26. καὶ ἐπεὶ καὶ V. τό] ὁ P. 27. ἀριθμόν] om. P, corr. ex ἀριθμός F.

τὴν μονάδα. πάλιν ἐπεὶ, ὅσαι εἰσὶν ἐν τῷ E μονάδες, τοσαῦτά εἰσι καὶ ἐν τῷ Z ἴσα τῷ Γ , ἔστιν ἄρα ὡς τὸ Γ πρὸς τὸ Z , οὕτως ἡ μονὰς πρὸς τὸν E [ἀριθμόν]. ἐδείχθη δὲ καὶ ὡς τὸ A πρὸς τὸ Γ , οὕτως ὁ Δ πρὸς
 5 τὴν μονάδα· δι' ἴσον ἄρα ἔστιν ὡς τὸ A πρὸς τὸ Z , οὕτως ὁ Δ πρὸς τὸν E . ἀλλ' ὡς ὁ Δ πρὸς τὸν E , οὕτως ἔστι τὸ A πρὸς τὸ B · καὶ ὡς ἄρα τὸ A πρὸς τὸ B , οὕτως καὶ πρὸς τὸ Z . τὸ A ἄρα πρὸς ἐκάτερον τῶν B , Z τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον· ἴσον ἄρα ἔστι τὸ B
 10 τῷ Z . μετρεῖ δὲ τὸ Γ τὸ Z · μετρεῖ ἄρα καὶ τὸ B . ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ A · τὸ Γ ἄρα τὰ A , B μετρεῖ. σύμμετρον ἄρα ἔστι τὸ A τῷ B .

Ἐὰν ἄρα δύο μεγέθη πρὸς ἄλληλα, καὶ τὰ ἐξῆς.

Πόρισμα.

15 Ἐκ δὴ τούτου φανερόν, ὅτι, ἐὰν ᾧσι δύο ἀριθμοί, ὡς οἱ A , E , καὶ εὐθεῖα, ὡς ἡ A , δύνατόν ἐστι ποιῆσαι ὡς ὁ Δ ἀριθμὸς πρὸς τὸν E ἀριθμόν, οὕτως τὴν εὐθεῖαν πρὸς εὐθεῖαν. ἐὰν δὲ καὶ τῶν A , Z μέση ἀνάλογον ληφθῇ, ὡς ἡ B , ἔσται ὡς ἡ A πρὸς τὴν Z ,
 20 οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς A πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς B , τουτέστιν ὡς ἡ πρώτη πρὸς τὴν τρίτην, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς πρώτης πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς δευτέρας τὸ ὅμοιον καὶ ὁμοίως ἀναγραφόμενον. ἀλλ' ὡς ἡ A πρὸς τὴν Z , οὕτως ἔστιν ὁ Δ ἀριθμὸς πρὸς τὸν E ἀριθμόν· γέγονεν ἄρα καὶ
 25 ὡς ὁ Δ ἀριθμὸς πρὸς τὸν E ἀριθμόν, οὕτως τὸ ἀπὸ

1. εἰσίν] εἰσὶ καὶ V. 2. τοσαῦται P, et FV, sed corr. εἰσιν P. Z μεγέθη F. ἴσαι V, sed corr. 3. ἀριθμόν] om. P. 4. τό] (alt.) τὸν b. 5. τό] ὁ B. τό] τὸν Bb. 6. ἀλλ' καὶ V. 7. ἐστὶ] om. V. 8. καὶ] τὸ A F. 9. λόγον P, sed corr. 11. μὴν] μετρεῖ P. τὸ Γ]

magnitudinem A metitur. et quoniam est $\Gamma:A=1:\Delta$, e contrario [V, 7 coroll.] erit $A:\Gamma=\Delta:1$. rursus quoniam, quot sunt in E unitates, totidem etiam in Z magnitudines magnitudini Γ aequales sunt, erit $\Gamma:Z=1:E$ [VII def. 20]. demonstrauius autem, esse etiam $A:\Gamma=\Delta:1$. itaque ex aequo [V, 22] est $A:Z=\Delta:E$. uerum $\Delta:E=A:B$. quare etiam $A:B=A:Z$. A igitur ad utrumque B, Z eandem rationem habet. ergo $B=Z$ [V, 9]. Γ autem Z metitur; quare etiam B metitur. uerum etiam A metitur. Γ igitur A, B metitur. itaque A et B commensurabiles sunt.

Ergo si duae magnitudines inter se, et quae sequuntur.

Corollarium.

Hinc iam manifestum est, si duo numeri sint A, E et recta A , fieri posse, ut faciamus, ut $\Delta:E$, ita rectam ad aliam rectam. sin rectarum A, Z media proportionalis sumitur B , erit $A:Z=A^2:B^2$, h. e. ut prima ad tertiam, ita figura in prima descripta ad figuram in secunda similem et similiter descriptam [VI, 20 coroll. 2, cfr. V def. 9]. sed $A:Z=\Delta:E$.

καὶ τὸ Γ V. 12. ἐστὶν P. B] e corr. V. 13. καὶ τὰ
ἐξῆς] λόγον ἔχει, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμὸν, σύμμετρα ἔσται τὰ
μεγέθη· ὅπερ ἔδει δεῖξαι V. 16. ὥς] m. 2 F. εὐθείαι F.
ἢ A] e corr. V. 17. ὁ] τὸν V, supra scr. m. 2 F. Δ]
om. Bfb. ἀριθμὸν FV. E] om. Bfb; ὥς τὸν Δ ἀριθμὸν
πρὸς τὸν E ἀριθμὸν m. 2 B. τήν] om. V, ἢ P; del. m.
rec. B. 18. εὐθείαν] -αν eras. V, εὐθεῖα P. εὐθείαν] τήν
εὐθείαν V et m. rec. B. 19. Z] B B, sed corr. 21. ὥς]
ὅς ετερ? V. πρώτη] supra add. α F, α PBvb. τρίτην] ξ V,
γ Pb et corr. ex γ B m. 2 (ξ m. rec.); supra add. γ F. πρώτης]
α P. 24. ἀριθμὸν] corr. ex ἀριθμὸς F. γέγονεν ἄρα] supra
scr. m. rec. F.

τῆς *A* εὐθείας πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *B* εὐθείας· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

ζ.

Τὰ ἀσύμμετρα μεγέθη πρὸς ἄλληλα λόγον
οὐκ ἔχει, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν.

Ἐστω ἀσύμμετρα μεγέθη τὰ *A*, *B*· λέγω, ὅτι τὸ *A*
πρὸς τὸ *B* λόγον οὐκ ἔχει, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν.

Εἰ γὰρ ἔχει τὸ *A* πρὸς τὸ *B* λόγον, ὃν ἀριθμὸς
πρὸς ἀριθμόν, σύμμετρον ἔσται τὸ *A* τῷ *B*. οὐκ ἔστι
10 δέ· οὐκ ἄρα τὸ *A* πρὸς τὸ *B* λόγον ἔχει, ὃν ἀριθμὸς
πρὸς ἀριθμόν.

Τὰ ἄρα ἀσύμμετρα μεγέθη πρὸς ἄλληλα λόγον οὐκ
ἔχει, καὶ τὰ ἐξῆς.

η'.

Ἐὰν δύο μεγέθη πρὸς ἄλληλα λόγον μὴ ἔχῃ,
15 ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν, ἀσύμμετρα ἔσται
τὰ μεγέθη.

Δύο γὰρ μεγέθη τὰ *A*, *B* πρὸς ἄλληλα λόγον μὴ
ἔχτω, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν· λέγω, ὅτι ἀσύμμετρά
20 ἔσται τὰ *A*, *B* μεγέθη.

Εἰ γὰρ ἔσται σύμμετρα, τὸ *A* πρὸς τὸ *B* λόγον
ἔξει, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν. οὐκ ἔχει δέ· ἀσύμ-
μετρα ἄρα ἔσσι τὰ *A*, *B* μεγέθη.

Ἐὰν ἄρα δύο μεγέθη πρὸς ἄλληλα, καὶ τὰ ἐξῆς.

1. *A* εὐθείας] in ras. m. 1 b. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] om. Theon (BFVb). Seq. demonstr. alt.; u. app. 5. Post ἀριθμόν ras. 3 litt. V. 7. τό] ins. m. 1 F. 9. Ante ἔσται ras. 1 litt. F. ἔστιν BF. 10. γρ. τὸ *A* ἄρα πρὸς τὸ *B* λόγον οὐκ ἔχει mg. m. 1 b. 12. σύμμετρα b. λόγον οὐκ ἔχει πρὸς ἄλληλα BFb. 13. καὶ τὰ ἐξῆς] om. F (in mg. quaedam erasa), ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν BVb. 20. ἔστιν P, ἔσται V. 21. γὰρ σύμμετρον ἔστι τὸ *A* τῷ *B* Theon (BFVb). 22. ἔχει b. ὅνπερ V.

itaque inuenimus $A : E = A^2 : B^2$. — quod erat demonstrandum.

VII.

Magnitudines incommensurabiles inter se rationem non habent, quam numerus ad numerum.

Sint magnitudines incommensurabiles A, B . dico, A ad B rationem non habere, quam habeat numerus ad numerum.

$\begin{array}{c} \overline{A} \\ \overline{B} \end{array}$ Nam si A ad B rationem habet, quam numerus ad numerum, A et B commensurabiles erunt [prop. VI]. uerum non sunt. itaque A ad B rationem non habet, quam numerus ad numerum.

Ergo magnitudines incommensurabiles inter se rationem non habent, et quae sequuntur.

VIII.

Si duae magnitudines inter se rationem non habent, quam numerus ad numerum, magnitudines incommensurabiles erunt.

$\begin{array}{c} \overline{A} \\ \overline{B} \end{array}$ Duae enim magnitudines A, B inter se rationem ne habeant, quam numerus ad numerum. dico, magnitudines A, B incommensurabiles esse.

Nam si commensurabiles sunt, A ad B rationem habet, quam numerus ad numerum [prop. V]. uerum non habet. itaque magnitudines A, B incommensurabiles sunt.

Ergo si duae magnitudines inter se, et quae sequuntur.

$\alpha\rho\iota\theta\mu\acute{o}\varsigma$] corr. ex $\alpha\rho\iota\theta\mu\acute{o}\varsigma$ m. 1 P. 23. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\nu$ P. 24. $\acute{\epsilon}\acute{\alpha}\nu$ — $\mu\epsilon\gamma\acute{\epsilon}\theta\eta$] om. F. $\pi\rho\acute{o}\varsigma \acute{\alpha}\lambda\lambda\eta\lambda\alpha$] bis b. $\kappa\alpha\iota \tau\acute{\alpha} \acute{\epsilon}\xi\eta\varsigma$] $\lambda\acute{o}\gamma\omicron\nu \mu\grave{\eta} \acute{\epsilon}\chi\eta$, $\delta\upsilon\nu \alpha\rho\iota\theta\mu\acute{o}\varsigma \pi\rho\acute{o}\varsigma \alpha\rho\iota\theta\mu\acute{o}\nu \acute{\alpha}\sigma\acute{\upsilon}\mu\mu\epsilon\tau\rho\alpha \acute{\epsilon}\sigma\tau\alpha\iota$ V.

θ'.

Τὰ ἀπὸ τῶν μήκει συμμετρῶν εὐθειῶν τε-
 τράγωνα πρὸς ἄλληλα λόγον ἔχει, ὃν τετρά-
 γωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· καὶ
 5 τὰ τετράγωνα τὰ πρὸς ἄλληλα λόγον ἔχοντα,
 ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀρι-
 θμόν, καὶ τὰς πλευρὰς ἔξει μήκει συμμετρους.
 τὰ δὲ ἀπὸ τῶν μήκει ἀσυμμετρῶν εὐθειῶν τε-
 τράγωνα πρὸς ἄλληλα λόγον οὐκ ἔχει, ὅνπερ
 10 τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν·
 καὶ τὰ τετράγωνα τὰ πρὸς ἄλληλα λόγον μὴ
 ἔχοντα, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετρά-
 γωνον ἀριθμόν, οὐδὲ τὰς πλευρὰς ἔξει μήκει
 συμμετρους.

15 Ἔστωσαν γὰρ αἱ A, B μήκει σύμμετροι· λέγω, ὅτι
 τὸ ἀπὸ τῆς A τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς B τετρά-
 γωνον λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τε-
 τράγωνον ἀριθμόν.

Ἐπεὶ γὰρ σύμμετρός ἐστιν ἡ A τῇ B μήκει, ἡ A
 20 ἄρα πρὸς τὴν B λόγον ἔχει, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν.
 ἐχέτω, ὃν ὁ Γ πρὸς τὸν Δ . ἐπεὶ οὖν ἐστιν ὡς ἡ A
 πρὸς τὴν B , οὕτως ὁ Γ πρὸς τὸν Δ , ἀλλὰ τοῦ μὲν
 τῆς A πρὸς τὴν B λόγου διπλασίων ἐστὶν ὁ τοῦ ἀπὸ
 τῆς A τετραγώνου πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς B τετράγωνον·
 25 τὰ γὰρ ὅμοια σχήματα ἐν διπλασίονι λόγῳ ἐστὶ τῶν
 ὁμολόγων πλευρῶν· τοῦ δὲ τοῦ Γ [ἀριθμοῦ] πρὸς
 τὸν Δ [ἀριθμόν] λόγου διπλασίων ἐστὶν ὁ τοῦ ἀπὸ τοῦ
 Γ τετραγώνου πρὸς τὸν ἀπὸ τοῦ Δ τετράγωνον· δύο
 γὰρ τετραγώνων ἀριθμῶν εἰς μέσος ἀνάλογόν ἐστιν

8. πρὸς ἄλληλα] supra scr. F. ἔχη V, corr. m. 1. 4.
 ἀριθμός] supra scr. m. 2 B. 5. τετράγωνα τὰ] supra scr. m.

IX.

Quadrata rectarum longitudine commensurabilium inter se rationem habent, quam numerus quadratus ad numerum quadratum; et quadrata, quae inter se rationem habent, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, etiam latera longitudine commensurabilia habebunt. quadrata autem rectarum longitudine incommensurabilium inter se rationem non habent, quam numerus quadratus ad numerum quadratum; et quadrata, quae inter se rationem non habent, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, ne latera quidem longitudine commensurabilia habebunt.

Nam A, B longitudine commensurabiles sint. dico, $A^2:B^2$ rationem habere, quam habeat numerus quadratus ad numerum quadratum.

Quoniam enim A et B longitudine commensurabiles sunt, $A:B$ rationem habet, quam numerus ad numerum [prop. V]. sit $A:B = \Gamma:\Delta$. iam quoniam $A:B = \Gamma:\Delta$, et $A^2:B^2$ duplex est quam ratio $A:B$ (nam figurae similes inter se duplicatam rationem habent

2 B. 8. *συμμέτρων* b (corr. m. rec.), φ; αλ seq. ras. F. 9. *ὅν* BFb. 10. *ἀριθμὸν*] om. V. 11. *μὴ ἔχοντα λόγον* V. 12. *ὅνπερ* V. 15. *γὰρ*] om. V. 16. *τό*] (prius) supra scr. m. 1 P. *τετράγωνον*] (alt.) m. 2 comp. F. 17. *ὅνπερ* V. 21. *ὅν*] *οὖν* ὅν Bb, *οὖν* corr. in *οὖν* ὅν FV. 22. *Γ ἀριθμὸς* BVb et e corr. F. *Δ ἀριθμὸν* BFVb. 23. *τῆς*] e corr. V. *διπλασίον* V, corr. m. 2. 24. *τό*] corr. ex *τόν* V. 26. *τοῦ*] (alt.) om. P, supra scr. F. *ἀριθμοῖ*] om. P. 27. *ἀριθμὸν*] om. P. *ὁ τοῦ*] *τό* F. 28. Post *Γ* del. *πρὸς τὸν Δ* P. *τετραγώνου*] *τετραγων* seq. ras. 1 litt. F. *τόν*] *τό* B. 29. *μέσον* B, corr. m. 2.

ἀριθμός, καὶ ὁ τετράγωνος πρὸς τὸν τετράγωνον [ἀριθμὸν] διπλασίονα λόγον ἔχει, ἥπερ ἡ πλευρὰ πρὸς τὴν πλευράν· ἔστιν ἄρα καὶ ὡς τὸ ἀπὸ τῆς *A* τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *B* τετράγωνον, οὕτως ὁ ἀπὸ
 5 τοῦ *Γ* τετράγωνος [ἀριθμὸς] πρὸς τὸν ἀπὸ τοῦ *Δ* [ἀριθμοῦ] τετράγωνον [ἀριθμὸν].

Ἀλλὰ δὴ ἔστω ὡς τὸ ἀπὸ τῆς *A* τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *B*, οὕτως ὁ ἀπὸ τοῦ *Γ* τετράγωνος πρὸς τὸν ἀπὸ τοῦ *Δ* [τετράγωνον]· λέγω, ὅτι σύμμετρός
 10 ἔστιν ἡ *A* τῇ *B* μήκει.

Ἐπεὶ γάρ ἔστιν ὡς τὸ ἀπὸ τῆς *A* τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *B* [τετράγωνον], οὕτως ὁ ἀπὸ τοῦ *Γ* τετράγωνος πρὸς τὸν ἀπὸ τοῦ *Δ* [τετράγωνον], ἀλλ' ὁ μὲν τοῦ ἀπὸ τῆς *A* τετραγώνου πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *B*
 15 [τετράγωνον] λόγος διπλασίων ἐστὶ τοῦ τῆς *A* πρὸς τὴν *B* λόγου, ὁ δὲ τοῦ ἀπὸ τοῦ *Γ* [ἀριθμοῦ] τετραγώνου [ἀριθμοῦ] πρὸς τὸν ἀπὸ τοῦ *Δ* [ἀριθμοῦ] τετράγωνον [ἀριθμὸν] λόγος διπλασίων ἐστὶ τοῦ τοῦ *Γ* [ἀριθμοῦ] πρὸς τὸν *Δ* [ἀριθμὸν] λόγου, ἔστιν ἄρα
 20 καὶ ὡς ἡ *A* πρὸς τὴν *B*, οὕτως ὁ *Γ* [ἀριθμὸς] πρὸς τὸν *Δ* [ἀριθμὸν]. ἡ *A* ἄρα πρὸς τὴν *B* λόγον ἔχει, ὃν ἀριθμὸς ὁ *Γ* πρὸς ἀριθμὸν τὸν *Δ*· σύμμετρος ἄρα ἔστιν ἡ *A* τῇ *B* μήκει.

Ἀλλὰ δὴ ἀσίμμετρος ἔστω ἡ *A* τῇ *B* μήκει· λέγω,
 25 ὅτι τὸ ἀπὸ τῆς *A* τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *B* [τετράγωνον] λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν.

Εἰ γὰρ ἔχει τὸ ἀπὸ τῆς *A* τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *B* [τετράγωνον] λόγον, ὃν τετράγωνος ἀριθ-

1. ἀριθμὸν] om. B F V b. 5. *Γ*] in ras. F, *Γ* ἀριθμοῦ
 F V b. ἀριθμὸς] om. P. 6. ἀριθμοῦ] om. P. ἀριθμὸν]

quam latera correspondentia [VI, 20 coroll.]), et $\Gamma^2 : \Delta^2$ duplex est quam ratio $\Gamma : \Delta$ (nam inter duos numeros quadratos unus medius est numerus, et numerus quadratus ad numerum quadratum duplicatam rationem habet quam latus ad latus [VIII, 11]), erit $A^2 : B^2 = \Gamma^2 : \Delta^2$.

Iam uero sit $A^2 : B^2 = \Gamma^2 : \Delta^2$. dico, A et B longitudine commensurabiles esse.

nam quoniam est $A^2 : B^2 = \Gamma^2 : \Delta^2$, et $A^2 : B^2$ duplex est quam ratio $A : B$, $\Gamma^2 : \Delta^2$ autem duplex quam $\Gamma : \Delta$, erit $A : B = \Gamma : \Delta$. itaque A ad B rationem habet, quam numerus Γ ad numerum Δ . ergo A et B longitudine commensurabiles sunt [prop. VI].

Iam uero A et B longitudine incommensurabiles sint. dico, $A^2 : B^2$ rationem non habere, quam habeat numerus quadratus ad numerum quadratum.

si enim $A^2 : B^2$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, A et B commen-

om. P. 8. *B τετράγωνον* BVb et e corr. F. *τοῦ*] corr. ex *τῆς* V. 9. *τετράγωνον*] om. P. 11. *A*] in ras. b. 12. *τετράγωνον*] om. P. 13. *τόν*] τό b. *τετράγωνον*] om. P. 14. *τοῦ*] m. 2 F. *τό*] *τόν* B, *τόν τοῦ* F. 15. *τετράγωνον*] om. P. 16. *ἀριθμοῦ*] om. P. *τετράγωνος* BV. 17. *ἀριθμοῦ*] om. P. *ἀριθμός* BV. *ἀριθμοῦ*] om. P. *τετραγώνον* P. 18. *ἀριθμὸν*] om. P. *ἔστιν* P. *τοῦ*] om. V. 19. *ἀριθμοῦ*] om. P. *ἀριθμόν*] om. P. 20. *ἀριθμός*] om. P. 21. *ἀριθμόν*] om. P. 22. *τόν Δ*] m. 2 B. 25. *A*] corr. ex B m. 1 V. *τετράγωνον*] (alt.) om. P. 29. *τετράγωνον*] om. P.

μὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν, σύμμετρος ἔσται ἡ *A* τῇ *B*. οὐκ ἔστι δέ· οὐκ ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς *A* τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *B* [τετράγωνον] λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν.

- 5 Πάλιν δὴ τὸ ἀπὸ τῆς *A* τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *B* [τετράγωνον] λόγον μὴ ἔχεται, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν· λέγω, ὅτι ἀσύμμετρός ἐστιν ἡ *A* τῇ *B* μήκει.

- Εἰ γὰρ ἔστι σύμμετρος ἡ *A* τῇ *B*, ἔξει τὸ ἀπὸ τῆς
10 *A* πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *B* λόγον, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν. οὐκ ἔχει δέ· οὐκ ἄρα σύμμετρός ἐστιν ἡ *A* τῇ *B* μήκει.

Τὰ ἄρα ἀπὸ τῶν μήκει συμμέτρων, καὶ τὰ ἐξῆς.

Πόρισμα.

- 15 Καὶ φανερόν ἐκ τῶν δεδειγμένων ἔσται, ὅτι αἱ μήκει σύμμετροι πάντως καὶ δυνάμει, αἱ δὲ δυνάμει οὐ πάντως καὶ μήκει [εἴπερ τὰ ἀπὸ τῶν μήκει συμμέτρων εὐθειῶν τετράγωνα λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν, τὰ δὲ λόγον ἔχοντα,
20 ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμὸν, σύμμετρά ἐστιν. ὥστε αἱ μήκει σύμμετροι εὐθίεται οὐ μόνον [εἰσὶ] μήκει σύμμετροι, ἀλλὰ καὶ δυνάμει.

- πάλιν ἐπεὶ, ὅσα τετράγωνα πρὸς ἄλληλα λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν, μήκει
25 ἐδείχθη σύμμετρα καὶ δυνάμει ὄντα σύμμετρα τῷ τὰ τετράγωνα λόγον ἔχειν, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμὸν, ὅσα ἄρα τετράγωνα λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν, ἀλλὰ ἀπλῶς, ὃν

2. Post *B* add. μήκει m. 2 V. 3. τετράγωνον] om P. 5. δῆ] om. b, δέ BFV. 6. τετράγωνον] om. P. 8. ἔστιν] e

surabiles erunt. at non sunt. ergo $A^2:B^2$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum.

iam rursus $A^2:B^2$ rationem ne habeat, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. dico, A et B longitudine incommensurabiles esse.

nam si A et B commensurabiles sunt, $A^2:B^2$ rationem habebit, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. at non habet. ergo A et B longitudine commensurabiles non sunt.

Ergo quadrata rectarum longitudine commensurabilem, et quae sequuntur.

Corollarium.

Ex iis, quae demonstraui, manifestum est, rectas longitudine commensurabiles semper etiam potentia

corr. F. 9. εἶ] in ras. P. ἔσται P. 10. A τετράγωνον BFb. B τετράγωνον BFb. 12. Post B add. ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ A τῇ B FVb, B m. 2. 13. Post συμμέτρων add. εὐθειῶν τετράγωνα πρὸς ἀλλήλα λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν V. Post ἐξῆς add. Theon: ὅπερ ἔδει δεῖξαι (BFVb). 15. ἐκ] ἔστω ἐκ BFV. ἔσται] om. b. 17. οὐ] in ras. F, σύμμετροι οὐ V. εἴπερ] corr. ex ἦπερ m. 2 V. τὰ] corr. ex τοῖς m. 1 F. 21. Post μήκει add. αἰ m. 2 B. εἰσὶ] om. P. 23. ὅσα] ὥν P, corr. mg. m. 1. τετράγωνα λόγον ἔχει πρὸς ἀλλήλα F. 26. τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν BFVb. Post ἀριθμὸν add. οἷον ὁ λ καὶ ὁ ξ . ὁ γὰρ ξ πρὸς τὸν λ λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν, σύμμετροι δέ· αἱ δὲ εὐθεῖαι, ἀφ' ὧν ἀνεγράφησαν, ἀσύμμετροί εἰσιν· τὰ γὰρ τετράγωνα ἀλογά εἰσιν· ὥστε οὖν αἱ μήκει σύμμετροι πάντως καὶ δυνάμει, αἱ δὲ δυνάμει οὐ πάντως καὶ μήκει b. 28. ἀλλ' BFV. ἀπλῶς] om. Fb, m. 2 B. ὃν] ὃν ἑτερός τις BFVb.

ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν, σύμμετρα μὲν ἔσται ἀνὰ τὰ τετράγωνα δυνάμει, οὐκέτι δὲ καὶ μήκει· ὥστε τὰ μὲν μήκει σύμμετρα πάντως καὶ δυνάμει, τὰ δὲ δυνάμει οὐ πάντως καὶ μήκει, εἰ μὴ καὶ λόγον ἔχοιεν, ὃν τε-
 5 τράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν.

λέγω δὴ, ὅτι [καὶ] αἱ μήκει ἀσύμμετροι οὐ πάντως καὶ δυνάμει, ἐπειδήπερ αἱ δυνάμει σύμμετροι δύνανται λόγον μὴ ἔχειν, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, καὶ διὰ τοῦτο δυνάμει οὔσαι σύμ-
 10 μετροὶ μήκει εἰσὶν ἀσύμμετροι. ὥστε οὐχ αἱ τῷ μήκει ἀσύμμετροι πάντως καὶ δυνάμει, ἀλλὰ δύνανται μήκει οὔσαι ἀσύμμετροι δυνάμει εἶναι καὶ ἀσύμμετροι καὶ σύμμετροι.

αἱ δὲ δυνάμει ἀσύμμετροι πάντως καὶ μήκει ἀσύμ-
 15 μετροὶ· εἰ γὰρ [εἰσι] μήκει σύμμετροι, ἔσονται καὶ δυνάμει σύμμετροι. ὑπόκεινται δὲ καὶ ἀσύμμετροι· ὅπερ ἄτοπον. αἱ ἄρα δυνάμει ἀσύμμετροι πάντως καὶ μήκει].

Λήμμα.

20 Λέδεικται ἐν τοῖς ἀριθμητικοῖς, ὅτι οἱ ὅμοιοι ἐπίπεδοι ἀριθμοὶ πρὸς ἀλλήλους λόγον ἔχουσιν, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, καὶ ὅτι, ἐάν δύο ἀριθμοὶ πρὸς ἀλλήλους λόγον ἔχωσιν, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, ὅμοιοι
 25 εἰσιν ἐπίπεδοι. καὶ δῆλον ἐκ τούτων, ὅτι οἱ μὴ ὅμοιοι ἐπίπεδοι ἀριθμοί, τουτέστιν οἱ μὴ ἀνάλογον ἔχοντες τὰς πλευράς, πρὸς ἀλλήλους λόγον οὐκ ἔχουσιν, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν. εἰ γὰρ ἔξουσιν, ὅμοιοι ἐπίπεδοι ἔσονται· ὅπερ οὐχ ὑπόκειται.

1. ἀριθμόν τινα V. μὲν] om. V. ἔσται] εἰσιν BF, ἔστιν comp. b; ἔστι V, corr. in μὲν m. 2. αὐτά] om. V;

commensurabiles esse, rectas autem potentia commensurabiles non semper etiam longitudine.¹⁾

Lemma.

In arithmeticiis demonstratum est, similes numeros planos eam inter se rationem habere, quam habeat numerus quadratus ad numerum quadratum [VIII, 26], et si duo numeri inter se rationem habeant, quam habeat numerus quadratus ad numerum quadratum, similes numeros planos eos esse.²⁾ unde adparet, numeros planos non similes (h. e. qui latera proportionalia non habent [cfr. VII def. 22]) inter se rationem non habere, quam habeat numerus quadratus ad numerum quadratum. nam si habebunt, similes erunt plani; quod contra hypothesim est. ergo numeri plani non

1) Quae sequitur p. 28, 17 — 30, 5 demonstratio corollarii et superflua est et a sermone Euclidis abhorret. praeterea offendit, quod plus demonstratur (λέγω δὲ lin. 6), quam positum erat.

2) Hoc nusquam demonstratur; sed est VIII, 26 conuersa, qua etiam in IX, 10 p. 358, 19 utitur.

supra τὰ ras. est. 2. Ante δυνάμει add. τουτέστιν αἱ εὐθεΐαι, ἀφ' ὧν ἀνεγράφησαν BFVb. τὰ] αἱ BFVb. 3. σύμμετροι BFVb. τὰ] αἱ BFVb. 4. Supra ἔχουσιν m. 2: τὰ τετραγωνα V. 6. καί] om. P. 7. Post δυνάμει add. ἀσύμμετροι V. ἐπειδήπερ] ἐπειδὴ γάρ P. 10. τῶ] om. FV. 11. ἀλλὰ καί V. 12. σύμμετροι καὶ ἀσύμμετροι P. 14. μήκει] -η- e corr. P. 15. εἰσὶ] om. P, εἶσιν B, comp. b. 16. ὑπόκειται b. Post καὶ del. δυνάμει F. 19. λήμμα] om. P. 20. δὴ ἐν F. ὅτι] supra scr. m. 1 b. 21. λόγον πρὸς ἀλλήλους ἔχουσιν F. ἔχουσι P, corr. m. rec. 23. δύο] supra scr. m. 1 F. 25. Supra ἐπίπεδοι scr. οἱ ἀριθμοὶ m. 1 b. μή] supra scr. m. 1 V. 29. ὑπόκειται P.

οἱ ἄρα μὴ ὅμοιοι ἐπίπεδοι πρὸς ἀλλήλους λόγον οὐκ ἔχουσιν, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν.

ι'.

6 Τῇ προτεθείσῃ εὐθείᾳ προσευρεῖν δύο εὐ-
θείας ἀσυμμέτρους, τὴν μὲν μήκει μόνον, τὴν
δὲ καὶ δυνάμει.

Ἔστω ἡ προτεθείσα εὐθεῖα ἡ *A*. δεῖ δὴ τῇ *A*
προσευρεῖν δύο εὐθείας ἀσυμμέτρους, τὴν μὲν μήκει
10 μόνον, τὴν δὲ καὶ δυνάμει.

Ἐκκείσθωσαν γὰρ δύο ἀριθμοὶ οἱ *B*, *Γ* πρὸς ἀλ-
λήλους λόγον μὴ ἔχοντες, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς
τετράγωνον ἀριθμόν, τουτέστι μὴ ὅμοιοι ἐπίπεδοι, καὶ
γεγονέτω ὡς ὁ *B* πρὸς τὸν *Γ*, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς *A*
15 τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *Δ* τετράγωνον· ἐμάθομεν
γάρ· σύμμετρον ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς *A* τῷ ἀπὸ τῆς *Δ*.
καὶ ἐπεὶ ὁ *B* πρὸς τὸν *Γ* λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετρά-
γωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, οὐδ' ἄρα
τὸ ἀπὸ τῆς *A* πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *Δ* λόγον ἔχει, ὃν τε-
20 τράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· ἀσύμ-
μετρος ἄρα ἐστὶν ἡ *A* τῇ *Δ* μήκει. εἰλήφθω τῶν
A, *Δ* μέση ἀνάλογον ἡ *E*· ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ *A* πρὸς
τὴν *Δ*, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς *A* τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ
τῆς *E*. ἀσύμμετρος δὲ ἐστὶν ἡ *A* τῇ *Δ* μήκει· ἀσύμ-
25 μετρον ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς *A* τετράγωνον τῷ

1. ἄρα μὴ] in ras. m. 1 P. οὐκ] ins. m. 1 V. 3. Seq.
demonstr. alt., u. app. 6. συμμέτρους B, corr. m. 2. 7. καί] v
ins. postea F. 8. δεῖ] δ- in ras. V. 10. τήν] τῆς P, corr.
m. rec.; τῇ V, sed corr. 13. τουτέστιν P. Post ἐπίπεδοι
add. [F, cui signo in mg. nihil resp.; in b seq. οἱ γὰρ ὅμοιοι
ἐπίπεδοι πρὸς ἀλλήλους λόγον ἔχουσιν, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς

similes inter se rationem non habent, quam numerus quadratus ad numerum quadratum.

X.

Data recta duas alias inuenire ei incommensurabiles, alteram longitudine tantum, alteram etiam potentia.

Data recta sit A . oportet igitur duas alias rectas inuenire rectae A incommensurabiles, alteram longitudine tantum, alteram etiam potentia.

Sumantur enim duo numeri B, Γ , qui inter se rationem non habeant, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, h. e. plani non similes [u. lemma], et fiat $B : \Gamma = A^2 : \Delta^2$ (hoc enim didicimus [prop. VI

coroll.]). itaque A^2 et Δ^2 commensurabilia sunt [prop. VI]. et quoniam $B : \Gamma$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, ne $A^2 : \Delta^2$ quidem rationem habet, quam numerus quadratus ad

numerum quadratum. itaque A et Δ longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. sumatur rectarum A, Δ media proportionalis E . itaque $A : \Delta = A^2 : E^2$ [V def. 9]. sed A et Δ longitudine incommensurabiles

πρὸς τετραγώνον ἀριθμὸν; in V seq. διὰ τοῦτο, punctis del. m. 2. 16. τῆς] τοῦ P. τῆς] τοῦ P. Δ] corr. ex B m. 1 V, B b. 19. Δ] corr. ex Δ m. 1 F. πρὸς] supra m. 1 V. τὸ] corr. ex τῶ V. Δ] B b. 21. ἐστίν] postea ins. F. 24. E τετραγώνον V. 25. ἐστίν P.

ἀπὸ τῆς *E* τετραγώνῳ· ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ *A* τῇ *E* δυνάμει.

Τῇ ἄρα προτεθείσῃ εὐθείᾳ τῇ *A* προσεέρονται δύο εὐθεῖαι ἀσύμμετροι αἱ *Δ*, *E*, μήκει μὲν μόνον ἡ *Δ*,
δ δυνάμει δὲ καὶ μήκει δηλαδὴ ἡ *E* [ὅπερ ἔδει δεῖξαι].

ια'.

Ἐὰν τέσσαρα μεγέθη ἀνάλογον ᾗ, τὸ δὲ πρῶτον τῷ δευτέρῳ σύμμετρον ᾗ, καὶ τὸ τρίτον τῷ τετάρτῳ σύμμετρον ἔσται· καὶ τὸ πρῶτον
10 τῷ δευτέρῳ ἀσύμμετρον ᾗ, καὶ τὸ τρίτον τῷ τετάρτῳ ἀσύμμετρον ἔσται.

Ἔστωσαν τέσσαρα μεγέθη ἀνάλογον τὰ *A*, *B*, *Γ*, *Δ*, ὥς τὸ *A* πρὸς τὸ *B*, οὕτως τὸ *Γ* πρὸς τὸ *Δ*, τὸ *A* δὲ τῷ *B* σύμμετρον ἔστω· λέγω, ὅτι καὶ τὸ *Γ* τῷ *Δ* σύμ-
15 μετρον ἔσται.

Ἐπεὶ γὰρ σύμμετρόν ἐστι τὸ *A* τῷ *B*, τὸ *A* ἄρα πρὸς τὸ *B* λόγον ἔχει, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν. καὶ ἐστὶν ὥς τὸ *A* πρὸς τὸ *B*, οὕτως τὸ *Γ* πρὸς τὸ *Δ*· καὶ τὸ *Γ* ἄρα πρὸς τὸ *Δ* λόγον ἔχει, ὃν ἀριθμὸς πρὸς
20 ἀριθμόν· σύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ *Γ* τῷ *Δ*.

Ἀλλὰ δὴ τὸ *A* τῷ *B* ἀσύμμετρον ἔστω· λέγω, ὅτι καὶ τὸ *Γ* τῷ *Δ* ἀσύμμετρον ἔσται. ἐπεὶ γὰρ ἀσύμμετρόν ἐστι τὸ *A* τῷ *B*, τὸ *A* ἄρα πρὸς τὸ *B* λόγον οἷον ἔχει, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν. καὶ ἐστὶν ὥς

3. προστεθείσῃ Pb. προσεέρονται B F b. 4. ἡ] corr. ex τῇ B. Post *Δ* add. καὶ B et F, sed del. 5. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] om. P B F b. Seq. scholium in P B F b, u. app. 6. ια'] corr. ex ι' m. rec. P, ex ιγ' V. 8. πρῶτον] α P, et sic saepius. τό] ins. postea F. τρίτον] γ P et b (et sic saepius). 15. ἐστὶν B V b. 16. ἐστὶν P. τὸ *Δ*] (alt.) postea ins. F. 17. B] corr. ex *A* m. 1 F. 18. τὸ *Δ*] corr. ex ὁ *A* V. 20. *Γ*] in ras. V. 21. ὅτι ἀσύμμετρόν ἐστι καὶ τὸ *Γ* τῷ *Δ* V. 22.

sunt. itaque etiam A^2 et E^2 incommensurabilia sunt.¹⁾
quare A et E potentia incommensurabiles sunt.²⁾

Ergo data recta A duae aliae inuentae sunt Δ , E
ei incommensurabiles, Δ longitudine tantum, E autem
potentia et longitudine; quod erat demonstrandum.

XI.

Si quattuor magnitudines proportionales sunt, et
prima secundaque commensurabiles sunt, etiam tertia
quartaque commensurabiles erunt. et si prima secunda-
que incommensurabiles sunt, etiam tertia quartaque
incommensurabiles sunt.

A ————— | B ————— | Quattuor magnitudi-
 Γ ————— | Δ ————— | nes proportionales sint
 A , B , Γ , Δ , ita ut sit
 $A:B = \Gamma:\Delta$, et A , B commensurabiles sint. dico,
etiam Γ , Δ commensurabiles esse.

Nam quoniam A , B commensurabiles sunt, $A:B$
rationem habet, quam numerus ad numerum [prop. V].
et $A:B = \Gamma:\Delta$. quare etiam $\Gamma:\Delta$ rationem habet,
quam numerus ad numerum. ergo Γ , Δ commensura-
biles sunt [prop. VI].

Iam uero A et B incommensurabiles sint. dico,
etiam Γ , Δ incommensurabiles fore. nam quoniam A , B
incommensurabiles sunt, $A:B$ rationem non habet,

1) Hoc ex prop. XI concludendum erat (quare Gregorius
propp. X et XI permutauit). omnino tota prop. X cum lem-
mate multis de causis suspecta est, et nix crediderim, eam a
manu Euclidis profectam esse.

2) Quare etiam longitudine (prop. IX coroll.).

ἐσται] ἐστὶν BFb.
supra scr. m. 1 F.

23. A] (alt.) supra scr. m. 1 V.
24. οὐκ] m. rec. b.

ἀφα]

τὸ *A* πρὸς τὸ *B*, οὕτως τὸ *Γ* πρὸς τὸ *Δ*. οὐδὲ τὸ *Γ* ἄρα πρὸς τὸ *Δ* λόγον ἔχει, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν· ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ *Γ* τῷ *Δ*.

Ἐὰν ἄρα τέσσαρα μεγέθη, καὶ τὰ ἐξῆς.

5

ιβ'.

Τὰ τῷ αὐτῷ μεγέθει σύμμετρα καὶ ἀλλήλοις ἐστὶ σύμμετρα.

Ἐκάτερον γὰρ τῶν *A*, *B* τῷ *Γ* ἔστω σύμμετρον. λέγω, ὅτι καὶ τὸ *A* τῷ *B* ἐστὶ σύμμετρον.

10 Ἐπεὶ γὰρ σύμμετρόν ἐστι τὸ *A* τῷ *Γ*, τὸ *A* ἄρα πρὸς τὸ *Γ* λόγον ἔχει, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν. ἐχέτω, ὃν ὁ *Δ* πρὸς τὸν *E*. πάλιν, ἐπεὶ σύμμετρόν ἐστι τὸ *Γ* τῷ *B*, τὸ *Γ* ἄρα πρὸς τὸ *B* λόγον ἔχει, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν. ἐχέτω, ὃν ὁ *Z* πρὸς τὸν *H*.

15 καὶ λόγων δοθέντων ὁποσωνοῦν τοῦ τε, ὃν ἔχει ὁ *Δ* πρὸς τὸν *E*, καὶ ὁ *Z* πρὸς τὸν *H* εἰλήφθωσαν ἀριθμοὶ ἐξῆς ἐν τοῖς δοθεῖσι λόγοις οἱ *Θ*, *K*, *Λ*. ὥστε εἶναι ὡς μὲν τὸν *Δ* πρὸς τὸν *E*, οὕτως τὸν *Θ* πρὸς τὸν *K*, ὡς δὲ τὸν *Z* πρὸς τὸν *H*, οὕτως τὸν *K* πρὸς τὸν *Λ*.

20 Ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς τὸ *A* πρὸς τὸ *Γ*, οὕτως ὁ *Δ* πρὸς τὸν *E*, ἀλλ' ὡς ὁ *Δ* πρὸς τὸν *E*, οὕτως ὁ *Θ* πρὸς τὸν *K*, ἐστὶν ἄρα καὶ ὡς τὸ *A* πρὸς τὸ *Γ*, οὕτως ὁ *Θ* πρὸς τὸν *K*. πάλιν, ἐπεὶ ἐστὶν ὡς τὸ *Γ* πρὸς τὸ *B*, οὕτως ὁ *Z* πρὸς τὸν *H*, ἀλλ' ὡς ὁ *Z* πρὸς τὸν *H*, 25 [οὕτως] ὁ *K* πρὸς τὸν *Λ*, καὶ ὡς ἄρα τὸ *Γ* πρὸς τὸ *B*, οὕτως ὁ *K* πρὸς τὸν *Λ*. ἐστὶ δὲ καὶ ὡς τὸ *A* πρὸς

1. οὐδέ] om. V. 2. ἄρα] om. V. λόγον] ἄρα λόγον, οὐκ V. 4. τέσσαρα] τὰ δ' F. Ante καὶ add. ἀνάλογον ἢ BFB; ἀνάλογον ἢ, τὸ δὲ πρῶτον τῷ δευτέρῳ σύμμετρον ἢ V. Post ἐξῆς add. ὅπερ ἔδει δεῖξαι V. 5. ιβ'] corr. ex ια' m. rec. P. 6. μεγέθη b. 15. ὁπόσων? V (comp.). 17. ἐξῆς]

quam numerus ad numerum [prop. VII]. et $A:B = \Gamma:\Delta$.
quare ne $\Gamma:\Delta$ quidem rationem habet, quam nume-
rus ad numerum. itaque Γ, Δ incommensurabiles sunt
[prop. VIII].

Ergo si quattuor magnitudines, et quae sequuntur.

XII.

Quae eidem magnitudini commensurabilia sunt,
etiam inter se commensurabilia sunt.

Utraque enim A, B magnitudini Γ sit commen-
surabilis. dico, etiam A, B commensurabiles esse.

nam quoniam A, Γ commensurabiles sunt, $A:\Gamma$
rationem habet, quam numerus ad numerum [prop. V].

A ———	Γ ———	B ———	sit $A:\Gamma = \Delta:E$. rursus quoniam Γ, B commensurabiles sunt, $\Gamma:B$ rationem habet, quam numerus ad nu- merum [prop. V]. sit
—————	Δ		
—————	E	————— Θ	
—————	Z	————— K	
—————	H	————— A	

$\Gamma:B = Z:H$. et datis quotlibet rationibus, $\Delta:E$ et
 $Z:H$, numeri sumantur deinceps in rationibus datis,
 Θ, K, A [cfr. VIII, 4], ita ut sit $\Delta:E = \Theta:K$, $Z:H$
 $= K:A$.

iam quoniam est $A:\Gamma = \Delta:E$ et $\Delta:E = \Theta:K$,
erit etiam $A:\Gamma = \Theta:K$ [V, 11]. rursus quoniam est
 $\Gamma:B = Z:H$ et $Z:H = K:A$, erit etiam $\Gamma:B = K:A$.

in ras. V; ἐλάττωτοι ἐξ ἧς F, sed corr. δοθεῖσιν P. 18. τὸν Δ]
τὸν postea ins. F, ὁ Δ P. 20. τὸ] (alt.) corr. ex τὸν V. 22.
ὁ Δ P. τὸν Γ P. 23. ὁ Γ P. τὸ] τὸν P. B] corr.
ex Γ m. 1 b. 25. οὕτως] om. P. καὶ ὡς — 26. Δ] bis F,
sed corr. 25. ὁ Γ P. 26. ἔστιν P. τὸ] ὁ F.

τὸ Γ, οὕτως ὁ Θ πρὸς τὸν Κ· δι' ἴσου ἄρα ἐστὶν ὡς
τὸ Α πρὸς τὸ Β, οὕτως ὁ Θ πρὸς τὸν Α. τὸ Α ἄρα
πρὸς τὸ Β λόγον ἔχει, ὃν ἀριθμὸς ὁ Θ πρὸς ἀριθμὸν
τὸν Α· σύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ Α τῷ Β.

5 Τὰ ἄρα τῷ αὐτῷ μεγέθει σύμμετρα καὶ ἀλλήλοις
ἐστὶ σύμμετρα· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

ιγ'.

Ἐὰν ἡ δύο μεγέθη σύμμετρα, τὸ δὲ ἕτερον
αὐτῶν μεγέθει τινὶ ἀσύμμετρον ἦ, καὶ τὸ λοιπὸν
10 τῷ αὐτῷ ἀσύμμετρον ἔσται.

Ἔστω δύο μεγέθη σύμμετρα τὰ Α, Β, τὸ δὲ ἕτερον
αὐτῶν τὸ Α ἄλλῳ τινὶ τῷ Γ ἀσύμμετρον ἔστω· λέγω,
ὅτι καὶ τὸ λοιπὸν τὸ Β τῷ Γ ἀσύμμετρον ἔστιν.

Εἰ γάρ ἐστι σύμμετρον τὸ Β τῷ Γ, ἀλλὰ καὶ τὸ Α
15 τῷ Β σύμμετρον ἔστιν, καὶ τὸ Α ἄρα τῷ Γ σύμμετρον
ἔστιν. ἀλλὰ καὶ ἀσύμμετρον· ὅπερ ἀδύνατον. οὐκ
ἄρα σύμμετρον ἐστὶ τὸ Β τῷ Γ· ἀσύμμετρον ἄρα.

Ἐὰν ἄρα ἡ δύο μεγέθη σύμμετρα, καὶ τὰ ἐξῆς.

Αἴμμα.

20 Δύο δοθεισῶν εὐθειῶν ἀνίσων εὐρεῖν, τίνι μείζον
δύναται ἢ μείζων τῆς ἐλάσσονος.

Ἔστωσαν αὖ δοθεῖσαι δύο ἄνισοι εὐθεῖαι αὖ ΑΒ, Γ,

2. ὁ Α πρὸς τὸν Β b. 4. ἐστίν P. 6. σύμμετρα] συμ-
supra scr. m. 1 P. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. Bb. Seq.
lemma, u. app. 7. ιγ'] ιβ' corr. in ιγ' m. rec. P, γ in ras. F;
ιδ', δ in ras. m. 1 B, ιγ' mg. 8. ἡ] om. V. μεγέθη] γέ-
supra m. 1 P. ἀσύμμετρα F, sed corr.; σύμμετρα ἡ V. δ' F.
11. δύο] mg. γε. αὐτῷ m. 1. b. 12. ἄλλῳ] ἑτέρῳ BFV.
13. τὸ Β] om. b. τῷ Γ] eras. b. ἐστὶ τὸ Β τῷ Γ b. 14.
εἰ — Γ] supra scr. m. rec. b. Γ τῷ Β P. 15. ἐστὶ B,
comp. Fb, om. V. καὶ — σύμμε-] supra scr. m. 1 F.
τρον — 16. καὶ] in ras. F. 16. ὅπερ ἐστίν F. 17. ἄρα] (alt.)

uerum etiam $A:\Gamma = \Theta:K$. ex aequo igitur $A:B = \Theta:A$ [V, 22]. itaque $A:B$ rationem habet, quam numerus Θ ad numerum A . itaque A, B commensurabiles sunt [prop. VI].

Ergo quae eidem magnitudini commensurabilia sunt, etiam inter se commensurabilia sunt; quod erat demonstrandum.

XIII.

Si duae magnitudines commensurabiles sunt, et alterutra earum magnitudini alicui incommensurabilis est, etiam reliqua eidem incommensurabilis erit.

A |—————| Sint duae magnitudines commensurabiles A, B , et A alii magnitudini Γ incommensurabilis sit. dico, etiam B, Γ incommensurabiles esse.

nam si B, Γ commensurabiles sunt et etiam A, B commensurabiles, etiam A, Γ commensurabiles erunt [prop. XII]. at eadem incommensurabiles sunt; quod fieri non potest. itaque B, Γ commensurabiles non sunt. incommensurabiles igitur.

Ergo si duae magnitudines commensurabiles sunt, et quae sequuntur.

Lemma.

Datis duabus rectis inaequalibus inuenire, quantum maior quadrata minorem excedat.

Sint datae duae rectae inaequales AB, Γ , quarum

postea ins. B. 18. η] om. P. $\alpha\sigma\upsilon\mu\mu\epsilon\tau\alpha$ F, sed corr. $\kappa\alpha\iota$ $\tau\acute{\alpha}$ $\epsilon\acute{\iota}\xi\eta\varsigma$] $\tau\acute{o}$ $\delta\epsilon$ $\epsilon\tau\epsilon\rho\omega\upsilon$ $\alpha\upsilon\tau\acute{\omega}\nu$ $\mu\epsilon\gamma\acute{\iota}\theta\epsilon\iota$ $\tau\iota\nu\iota$ $\alpha\sigma\upsilon\mu\mu\epsilon\tau\rho\omega\upsilon$ η , $\kappa\alpha\iota$ $\tau\acute{o}$ $\lambda\omicron\iota\pi\acute{\omicron}\nu$ $\tau\tilde{\omega}$ $\alpha\upsilon\tau\tilde{\omega}$ $\alpha\sigma\upsilon\mu\mu\epsilon\tau\rho\omega\upsilon$ $\epsilon\varsigma\tau\alpha\iota$ $\delta\pi\epsilon\rho$ $\epsilon\delta\epsilon\iota$ $\delta\epsilon\iota\chi\alpha\iota$ V. 19. $\iota\epsilon'$ B. 20. $\alpha\nu\iota\sigma\omega\nu$ $\epsilon\nu\theta\epsilon\iota\omega\nu$ F. 21. $\epsilon\lambda\acute{\alpha}\tau\tau\omicron\nu\omicron\varsigma$ F.

ὡν μείζων ἔστω ἡ AB . δεῖ δὴ εὐρεῖν, τίνι μείζων δύναται ἡ AB τῆς Γ .

Γεγράφθω ἐπὶ τῆς AB ἡμικύκλιον τὸ $A\Delta B$, καὶ εἰς αὐτὸ ἐνηρμόσθω τῇ Γ ἴση ἡ $A\Delta$, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ ΔB . φανερόν δὴ, ὅτι ὁρθή ἐστὶν ἡ ὑπὸ $A\Delta B$ γωνία, καὶ ὅτι ἡ AB τῆς $A\Delta$, τουτέστι τῆς Γ , μείζων δύναται τῇ ΔB .

Ὅμοίως δὲ καὶ δύο δοθεισῶν εὐθειῶν ἡ δυναμένη αὐτὰς εὐρίσκεται οὕτως.

- 10 Ἐστῶσαν αἱ δοθεῖσαι δύο εὐθεῖαι αἱ $A\Delta$, ΔB , καὶ δέον ἔστω εὐρεῖν τὴν δυναμένην αὐτάς. κείσθωσαν γάρ, ὥστε ὁρθὴν γωνίαν περιέχειν τὴν ὑπὸ $A\Delta$, ΔB , καὶ ἐπεξεύχθω ἡ AB . φανερόν πάλιν, ὅτι ἡ τὰς $A\Delta$, ΔB δυναμένη ἐστὶν ἡ AB . ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

15


ιδ'.

- Ἐὰν τέσσαρες εὐθεῖαι ἀνάλογον ᾧσιν, δύνηται δὲ ἡ πρώτη τῆς δευτέρας μείζων τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ [μήκει], καὶ ἡ τρίτη τῆς τετάρτης μείζων δυνήσεται τῷ ἀπὸ συμμέτρου
20 ἑαυτῇ [μήκει]. καὶ ἐὰν ἡ πρώτη τῆς δευτέρας μείζων δύνηται τῷ ἀπὸ ἀσυσμμέτρου ἑαυτῇ [μήκει], καὶ ἡ τρίτη τῆς τετάρτης μείζων δυνήσεται τῷ ἀπὸ ἀσυσμμέτρου ἑαυτῇ [μήκει].

- Ἐστῶσαν τέσσαρες εὐθεῖαι ἀνάλογον αἱ A , B , Γ , Δ ,
25 ὡς ἡ A πρὸς τὴν B , οὕτως ἡ Γ πρὸς τὴν Δ , καὶ ἡ

1. ἔστω] corr. ex ἔστιν m. 2 B. 3. $AB\Delta$ P. 4. αὐτῷ e corr. F. ἡ $A\Delta$ ἴση F. 6. μείζων] corr. ex μείζων m. 1 F. 10. αἱ δοθεῖσαι] om. V. αἱ] αἱ δοθεῖσαι αἱ V. 11. τὴν] ins. postea V. ἐκείσθωσαν BFVb. 13. Ante πάλιν ins. ἐστὶ m. 1 F. ὅτι πάλιν b. ὅτι ἡ] ἡ in ras. F. 14. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. Theon (BFVb). 15. ιδ'] δ in ras. F, corr. ex

maior sit AB . oportet igitur inuenire, quantum AB^2 excedat Γ^2 .



describatur in AB semicirculus $A\Delta B$, et in eum aptetur rectae Γ aequalis $A\Delta$ [IV, 1], et ducatur ΔB . manifestum igitur, $\angle A\Delta B$ rectum esse [III, 31], et $AB^2 = A\Delta^2 + \Delta B^2 = \Gamma^2 + \Delta B^2$ [I, 47].

Similiter etiam datis duabus rectis recta quadrata iis aequalis hoc modo inuenitur.

sint datae duae rectae $A\Delta$, ΔB , et oporteat rectam quadratam iis aequalem inuenire. ponantur enim ita, ut angulum rectum comprehendant $A\Delta B$, et ducatur AB . rursus manifestum est, esse $AB^2 = A\Delta^2 + \Delta B^2$ [I, 47]; quod erat demonstrandum.

XIV.

Si quattuor rectae proportionales sunt, et prima quadrata secundam excedit quadrato rectae sibi commensurabilis, etiam tertia quadrata quartam excedet quadrato rectae sibi commensurabilis. et si prima quadrata secundam excedit quadrato rectae sibi incommensurabilis, etiam tertia quadrata quartam excedet quadrato rectae sibi incommensurabilis.

Sint quattuor rectae proportionales A, B, Γ, Δ , ita ut sit $A : B = \Gamma : \Delta$, et sit $A^2 = B^2 + E^2$, $\Gamma^2 = \Delta^2 + Z^2$

17. m. rec. P, 15. B (mg. 18). 16. ωσι Vb. 17. τω] e corr. V.
 18. μήκει] om. P. 19. ἀπὸ τῆς b. 20. μήκει] om. P. 21.
 δυνήσεται FV, sed corr. συμμέτρων F, et B, corr. m. 2. ἐαντιῶ b.
 μήκει] om. P. 22. δυνήσεται F. 23. συμμέτρων PF, et B,
 corr. m. 2. ἐαντιῶ b. μήκει] om. P. 24. ἐστῶσαν δὲ V.
 25. A] e corr. V.

A μὲν τῆς B μείζον δυνάσθω τῷ ἀπὸ τῆς E , ἡ δὲ Γ τῆς Δ μείζον δυνάσθω τῷ ἀπὸ τῆς Z . λέγω, ὅτι, εἴτε σύμμετρός ἐστιν ἡ A τῇ E , σύμμετρός ἐστι καὶ ἡ Γ τῇ Z , εἴτε ἀσύμμετρός ἐστιν ἡ A τῇ E , ἀσύμμετρός ἐστι καὶ ὁ Γ τῇ Z .

Ἐπεὶ γάρ ἐστιν ὥς ἡ A πρὸς τὴν B , οὕτως ἡ Γ πρὸς τὴν Δ , ἐστιν ἄρα καὶ ὥς τὸ ἀπὸ τῆς A πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς B , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς Γ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Δ . ἀλλὰ τῷ μὲν ἀπο τῆς A ἴσα ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν E , B , τῷ δὲ ἀπὸ τῆς Γ ἴσα ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν Δ , Z . ἐστιν ἄρα ὥς τὰ ἀπὸ τῶν E , B πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς B , οὕτως τὰ ἀπὸ τῶν Δ , Z πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Δ . διελόντι ἄρα ἐστὶν ὥς τὸ ἀπὸ τῆς E πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς B , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς Z πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Δ . ἐστιν ἄρα καὶ ὥς ἡ E πρὸς τὴν B , οὕτως ἡ Z πρὸς τὴν Δ . ἀνάπαλιν ἄρα ἐστὶν ὥς ἡ B πρὸς τὴν E , οὕτως ἡ Δ πρὸς τὴν Z . ἐστὶ δὲ καὶ ὥς ἡ A πρὸς τὴν B , οὕτως ἡ Γ πρὸς τὴν Δ . δι' ἴσου ἄρα ἐστὶν ὥς ἡ A πρὸς τὴν E , οὕτως ἡ Γ πρὸς τὴν Z . εἴτε οὖν σύμμετρός ἐστιν ἡ A τῇ E , σύμμετρός ἐστι καὶ ἡ Γ τῇ Z , εἴτε ἀσύμμετρός ἐστιν ἡ A τῇ E , ἀσύμμετρός ἐστι καὶ ἡ Γ τῇ Z .

Ἐὰν ἄρα, καὶ τὰ ἐξῆς.

ιε'.

Ἐὰν δύο μεγέθη σύμμετρα συντεθῇ, καὶ τὸ ὅλον ἐκατέρῳ αὐτῶν σύμμετρον ἔσται· καὶ τὸ ὅλον ἐνὶ αὐτῶν σύμμετρον ἦ, καὶ τὰ ἐξ ἀρχῆς μεγέθη σύμμετρα ἔσται.


Συγκείσθω γὰρ δύο μεγέθη σύμμετρα τὰ AB , $B\Gamma$.

1. τῆς B] corr. ex τῇ B m. 1 b. Γ δὲ $B\Gamma$ b. 3. ἐστὶν] om. V. τῇ] corr. ex τῆς m. 1 P. ἐστὶν B. 4. Z] e corr.

[u. lemma]. dico, siue A, E commensurabiles sint, etiam Γ, Z commensurabiles esse, siue A, E incommensurabiles sint, etiam Γ, Z incommensurabiles esse.

nam quoniam est $A:B = \Gamma:\Delta$, erit etiam $A^2:B^2 = \Gamma^2:\Delta^2$ [VI, 22]. uerum $A^2 = E^2 + B^2$, $\Gamma^2 = \Delta^2 + Z^2$.

itaque $E^2 + B^2:B^2 = \Delta^2 + Z^2:\Delta^2$.
 subtrahendo igitur [V, 17] $E^2:B^2 = Z^2:\Delta^2$. quare etiam [VI, 22] $E:B = Z:\Delta$. itaque e contrario [V, 7 coroll.] $B:E = \Delta:Z$. uerum etiam $A:B = \Gamma:\Delta$. ex aequo igitur [V, 22] $A:E = \Gamma:Z$. itaque siue A, E com-



mensurabiles sunt, etiam Γ, Z commensurabiles sunt, siue A, E incommensurabiles sunt, etiam Γ, Z incommensurabiles sunt [prop. XI].

Ergo si, et quae sequuntur.

XV.

Si duae magnitudines commensurabiles componuntur, etiam totum utrique earum commensurabile erit; et si totum alterutri earum commensurabile est, etiam magnitudines ab initio positae commensurabiles erunt.

Componantur enim duae magnitudines commensura-

m. 1 b. 5. $\epsilon\sigma\tau\iota\nu$ PB. 7. $\kappa\alpha\iota$] om. V. 9. $\tau\omega$] corr. ex $\tau\acute{o}$ m. rec. P. Δ] in ras. m. 1 P. $\epsilon\sigma\tau\iota\nu$ P. 10. $\epsilon\sigma\tau\iota\nu$ P. Z, Δ P. 11. E, B] Δ, Z B. $\tau\acute{\alpha}$ F. B] Δ B. 12. Δ, Z] $E B$ B. $\tau\acute{\alpha}$ F. Δ] B in ras. m. 2 B. 13. $\alpha\pi\acute{o}$] (alt.) ins. m. 2 F. 14. $\epsilon\sigma\tau\iota\nu$ — 15. Δ] mg. m. 1 P. 14. η] supra scr. m. 2 F. 17. $\epsilon\sigma\tau\iota\nu$ P. 19. $\epsilon\iota\tau'$ P. 20. $\epsilon\sigma\tau\iota$] $\epsilon\sigma\tau\iota\nu$ P. Post $\epsilon\iota\tau'$ del. $\sigma\upsilon\nu$ b. $\epsilon\sigma\tau\iota\nu$] om. V. 21. $\sigma\acute{\upsilon}\mu\mu\epsilon\tau\rho\omicron\varsigma$ b. $\epsilon\sigma\tau\iota\nu$ B. 22. $\alpha\pi\alpha$] om. V. Ante $\kappa\alpha\iota$ add. $\tau\acute{\epsilon}\sigma\sigma\alpha\rho\epsilon\varsigma$ $\epsilon\psi$ - $\theta\epsilon\iota\alpha\iota$ $\alpha\lambda\omicron\gamma\omicron\gamma\omicron\nu$ $\omega\sigma\iota\nu$ ($\omega\sigma\iota$ V) FV. 23. $\epsilon\epsilon'$] e corr. PF; $\epsilon\zeta'$ B, mg. $\epsilon\epsilon'$. 28. $\sigma\upsilon\gamma\kappa\epsilon\iota\sigma\theta\omega\sigma\alpha\nu$ BFb. $B\Gamma$] e corr. F.

λέγω, ὅτι καὶ ὅλον τὸ $ΑΓ$ ἐκατέρω τῶν $ΑΒ, ΒΓ$ ἐστὶ σύμμετρον.

Ἐπεὶ γὰρ σύμμετρά ἐστι τὰ $ΑΒ, ΒΓ$, μετρήσει τι αὐτὰ μέγεθος. μετρεῖτω, καὶ ἔστω τὸ $Δ$. ἐπεὶ οὖν
 5 τὸ $Δ$ τὰ $ΑΒ, ΒΓ$ μετρεῖ, καὶ ὅλον τὸ $ΑΓ$ μετρήσει. μετρεῖ δὲ καὶ τὰ $ΑΒ, ΒΓ$. τὸ $Δ$ ἄρα τὰ $ΑΒ, ΒΓ, ΑΓ$ μετρεῖ· σύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ $ΑΓ$ ἐκατέρω τῶν $ΑΒ, ΒΓ$.

Ἀλλὰ δὴ τὸ $ΑΓ$ ἔστω σύμμετρον τῷ $ΑΒ$ · λέγω δὴ, ὅτι καὶ τὰ $ΑΒ, ΒΓ$ σύμμετρά ἐστίν.

10 Ἐπεὶ γὰρ σύμμετρά ἐστι τὰ $ΑΓ, ΑΒ$, μετρήσει τι αὐτὰ μέγεθος. μετρεῖτω, καὶ ἔστω τὸ $Δ$. ἐπεὶ οὖν τὸ $Δ$ τὰ $ΓΑ, ΑΒ$ μετρεῖ, καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ $ΒΓ$ μετρήσει. μετρεῖ δὲ καὶ τὸ $ΑΒ$ · τὸ $Δ$ ἄρα τὰ $ΑΒ, ΒΓ$ μετρήσει· σύμμετρα ἄρα ἐστὶ τὰ $ΑΒ, ΒΓ$.

15 Ἐὰν ἄρα δύο μεγέθη, καὶ τὰ ἐξῆς.

ις'.

Ἐὰν δύο μεγέθη ἀσύμμετρα συντεθῇ, καὶ τὸ ὅλον ἐκατέρω αὐτῶν ἀσύμμετρον ἔσται· καὶ τὸ ὅλον ἐνὶ αὐτῶν ἀσύμμετρον ἦ, καὶ τὰ ἐξ
 20 ἀρχῆς μεγέθη ἀσύμμετρα ἔσται.

Συνγκείμεθα γὰρ δύο μεγέθη ἀσύμμετρα τὰ $ΑΒ, ΒΓ$ · λέγω, ὅτι καὶ ὅλον τὸ $ΑΓ$ ἐκατέρω τῶν $ΑΒ, ΒΓ$ ἀσύμμετρον ἐστίν.

1. καί] καὶ τό V. τῶν] τῶι P. ἔσται b. σύμμετρον ἐστὶ V. 3. ἐστίν P. 6. τὰ] (prius) corr. ex τῶν F. 7. ἐστίν P. 8. $ΑΓ$] $ΑΒ, ΒΓ$ P; $ΑΓ$ ἐνὶ τῶν $ΑΒ, ΒΓ$ Theon (BFVb). τῷ] τῇ P, ἔστω δὴ τῷ (corr. ex τό V) Theon (BFVb). 9. δὴ] supra scr. F. 10. ἐστίν P. $ΑΓ$] $ΓΑ$ P, $Γ$ e corr. b; mg. γρ. $ΑΒ$ $ΒΓ$ m. 1 b. 12. $ΑΓ$ FV. 13. τὰ] τό? V. 14. ἐστίν LPB. 15. Post μεγέθη add. σύμμετρα συντεθῇ, καὶ τὸ ὅλον ἐκατέρω αὐτῶν ἀσύμμετρον ἔσται V. Post ἐξῆς add. ὅπερ εἰδει δεῖξαι V. 16. ις'] corr. ex ιδ' m. rec. P, mut. in ις' m.

biles AB , $B\Gamma$. dico, etiam totum $A\Gamma$ utrique AB , $B\Gamma$ commensurabile esse.

nam quoniam AB , $B\Gamma$ commensurabiles sunt, magnitudo aliqua eas metietur. metiatur et sit Δ . iam

quoniam Δ magnitudines AB , $B\Gamma$ metitur, etiam totum $A\Gamma$ metietur. uerum

etiam AB , $B\Gamma$ metitur. Δ igitur AB , $B\Gamma$, $A\Gamma$ metitur. ergo $A\Gamma$ utrique AB , $B\Gamma$ commensurabilis est [def. 1].

Iam uero $A\Gamma$, AB commensurabiles sint. dico, etiam AB , $B\Gamma$ commensurabiles esse.

nam quoniam $A\Gamma$, AB commensurabiles sunt, magnitudo aliqua eas metietur. metiatur et sit Δ . iam quoniam Δ magnitudines ΓA , AB metitur, etiam reliquam $B\Gamma$ metietur. uerum etiam AB metitur. Δ igitur AB , $B\Gamma$ metietur. itaque AB , $B\Gamma$ commensurabiles erunt.

Ergo si duae magnitudines, et quae sequuntur.

XVI.

Si duae magnitudines incommensurabiles componentur, etiam totum utrique earum incommensurabile est; et si totum alterutri earum incommensurabile est, etiam magnitudines ab initio positae incommensurabiles erunt.

Componantur enim duae magnitudines incommensurabiles AB , $B\Gamma$. dico, etiam totum $A\Gamma$ utrique AB , $B\Gamma$ incommensurabile esse.

2 F; η' B, mg. ϵ' . 19. $\sigma\acute{\upsilon}\mu\mu\epsilon\tau\rho\omicron\nu$ B, corr. m. 2; item lin. 20.

21. $\sigma\upsilon\gamma\kappa\epsilon\lambda\epsilon\theta\omega\sigma\alpha\nu$ V. $B\Gamma$] corr. ex ΓB F.

Εἰ γὰρ μὴ ἔστιν ἀσύμμετρα τὰ ΓA , AB , μετρήσει
 τι [αὐτὰ] μέγεθος. μετρεῖτω, εἰ δυνατόν, καὶ ἔστω
 τὸ Δ . ἐπεὶ οὖν τὸ Δ τὰ ΓA , AB μετρεῖ, καὶ λοιπὸν
 ἄρα τὸ $B\Gamma$ μετρήσει. μετρεῖ δὲ καὶ τὸ AB . τὸ Δ
 5 ἄρα τὰ AB , $B\Gamma$ μετρεῖ. σύμμετρα ἄρα ἐστὶ τὰ AB , $B\Gamma$.
 ὑπέκειντο δὲ καὶ ἀσύμμετρα· ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον.
 οὐκ ἄρα τὰ ΓA , AB μετρήσει τι μέγεθος· ἀσύμμετρα
 ἄρα ἐστὶ τὰ ΓA , AB . ὁμοίως δὲ δείξομεν, ὅτι καὶ
 τὰ $A\Gamma$, ΓB ἀσύμμετρά ἐστιν. τὸ $A\Gamma$ ἄρα ἐκατέρω
 10 τῶν AB , $B\Gamma$ ἀσύμμετρόν ἐστιν.

Ἀλλὰ δὴ τὸ $A\Gamma$ ἐνὶ τῶν AB , $B\Gamma$ ἀσύμμετρον ἔστω.
 ἔστω δὴ πρότερον τῷ AB · λέγω, ὅτι καὶ τὰ AB , $B\Gamma$
 ἀσύμμετρά ἐστιν. εἰ γὰρ ἔσται σύμμετρα, μετρήσει
 τι αὐτὰ μέγεθος. μετρεῖτω, καὶ ἔστω τὸ Δ . ἐπεὶ
 15 οὖν τὸ Δ τὰ AB , $B\Gamma$ μετρεῖ, καὶ ὅλον ἄρα τὸ $A\Gamma$
 μετρήσει. μετρεῖ δὲ καὶ τὸ AB . τὸ Δ ἄρα τὰ ΓA , AB
 μετρεῖ. σύμμετρα ἄρα ἐστὶ τὰ ΓA , AB . ὑπέκειτο δὲ καὶ
 ἀσύμμετρα· ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ ἄρα τὰ AB , $B\Gamma$
 μετρήσει τι μέγεθος· ἀσύμμετρα ἄρα ἐστὶ τὰ AB , $B\Gamma$.
 20 Ἐὰν ἄρα δύο μεγέθη, καὶ τὰ ἐξῆς.

Λήμμα.

Ἐὰν παρὰ τινα εὐθείαν παραβληθῇ παραλληλό-
 γραμμον ἑλλείπον εἶδει τετραγώνῳ, τὸ παραβληθὲν

1. τὰ] τό P. 2. αὐτὰ] om. P. 4. AB] BA V. 5.
 ἐστὶν LP. 6. ὑπόκεινται LBb. ἀδύνατόν ἐστιν V. 8.
 ἐστὶν LP. 9. $\text{Ante } A\Gamma$ del. Γ m. 1 P. σύμμετρα B, corr.
 m. 2. ἐστὶ V, comp. Fb. ΓA F. 10. ἐστὶν] om. B. 11.
 ἔστω] om. P. 12. ἔστω δὴ πρότερον] καὶ πρῶτον Theon (BFVb).
 τῷ] e corr. V. 13. ἐστὶ] ἐστὶ V. σύμμετρα] supra scr.
 ἄ- m. 1 F. 17. ἐστὶ] ἐστὶν P, comp. F, ἐστὶ LBVb. ὑπέ-
 κειντο F. 19. ἐστὶν LP. Post $B\Gamma$ add. ὁμοίως δὲ δειχ-
 θήσεται, ὅτι τὸ $A\Gamma$ καὶ λοιπῷ τῷ $B\Gamma$ ἀσύμμετρόν ἐστιν FVb.

nam si ΓA , AB incommensurabiles non sunt, magnitudo aliqua eas metietur. metiatur, si fieri potest, et sit Δ . iam quoniam Δ magnitudines ΓA , AB metitur, etiam reliquam $B\Gamma$ metietur. uerum etiam AB metitur. Δ igitur AB , $B\Gamma$ metitur. itaque AB , $B\Gamma$ commensurabiles sunt. supposuimus autem, easdem incommensurabiles esse; quod fieri non potest. itaque nulla magnitudo ΓA , AB metietur. ergo ΓA , AB incommensurabiles erunt. similiter demonstrabimus, etiam $A\Gamma$, ΓB incommensurabiles esse. ergo $A\Gamma$ utrique AB , $B\Gamma$ incommensurabilis est.

Iam uero $A\Gamma$ alterutri AB , $B\Gamma$ incommensurabilis sit. sit prius magnitudini AB incommensurabilis. dico, etiam AB , $B\Gamma$ incommensurabiles esse. nam si commensurabiles sunt, magnitudo aliqua eas metietur. metiatur et sit Δ . iam quoniam Δ magnitudines AB , $B\Gamma$ metitur, etiam totum $A\Gamma$ metietur. uerum etiam AB metitur. Δ igitur ΓA , AB metitur. itaque ΓA , AB commensurabiles sunt. supposuimus autem, easdem incommensurabiles esse; quod fieri non potest. itaque nulla magnitudo AB , $B\Gamma$ metietur. itaque AB , $B\Gamma$ incommensurabiles sunt.

Ergo si duae magnitudines, et quae sequuntur.

Lemma.

Si rectae alicui parallelogrammum adplicatur figura quadrata deficiens, adplicatum spatium rectangulo partium rectae adplicatione ortarum aequale est.

28. τετραγώνῳ] corr. ex παραλληλογράμῳ m. rec. b. τό] α F. τὸ παραβληθέν] om. b.

ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν ἐκ τῆς παραβολῆς γενομένων
 τμημάτων τῆς εὐθείας.

Παρά γὰρ εὐθείαν τὴν AB παραβεβλήσθω παρα-
 λληλόγραμμον τὸ AD ἑλλείπον εἶδει τετραγώνῳ τῷ $ΔB$.
 λέγω, ὅτι ἴσον ἐστὶ τὸ AD τῷ ὑπὸ τῶν $ΑΓ, ΓB$.

Καὶ ἐστὶν αὐτόθεν φανερόν· ἐπεὶ γὰρ τετραγώνον
 ἐστὶ τὸ $ΔB$, ἴση ἐστὶν ἡ $ΔΓ$ τῇ $ΓB$, καὶ ἐστὶ τὸ AD
 τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΓ, ΓΔ$, τουτέστι τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΓ, ΓB$.

Ἐὰν ἄρα παρά τινα εὐθείαν, καὶ τὰ ἐξῆς.


10

ιζ'.

Ἐὰν ὧσι δύο εὐθεῖαι ἄνισοι, τῷ δὲ τετάρτῳ
 μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος ἴσον παρὰ τὴν
 μείζονα παραβληθῇ ἑλλείπον εἶδει τετραγώνῳ
 καὶ εἰς σύμμετρα αὐτὴν διαιρῇ μήκει, ἡ μείζων
 τῆς ἐλάσσονος μείζον δυνήσεται τῷ ἀπὸ συμ-
 μέτρου ἑαυτῇ [μήκει]. καὶ ἐὰν ἡ μείζων τῆς
 ἐλάσσονος μείζον δύνηται τῷ ἀπὸ συμμέτρου
 ἑαυτῇ [μήκει], τῷ δὲ τετάρτῳ τοῦ ἀπὸ τῆς ἐλάσ-
 στονος ἴσον παρὰ τὴν μείζονα παραβληθῇ ἑλλεί-
 πον εἶδει τετραγώνῳ, εἰς σύμμετρα αὐτὴν
 διαιρεῖ μήκει.

Ἔστωσαν δύο εὐθεῖαι ἄνισοι αἱ $A, BΓ$, ὧν μείζων
 ἡ $BΓ$, τῷ δὲ τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος
 τῆς A , τουτέστι τῷ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς A , ἴσον
 παρὰ τὴν $BΓ$ παραβεβλήσθω ἑλλείπον εἶδει τετραγώνῳ,

3. τὸ AD παραλληλόγραμμον Theon (BFVb, ante AD eras.
 $ΓΔ F$). 4. τετραγώνῳ] corr. ex παραλληλογράμῳ m. rec. b.
 $ΔB$] $BΔ Fb$. 5. ἐστὶν LB. τῷ] τὸ F. $ΑΓ$] corr. ex
 $ΓA$ m. 1 b. $ΓB$] $Γ$ e corr. V. 7. ἐστὶν LB. $ΓB$] $BΓ$
 BV. ἐστὶν LPB. 8. $ΓΔ$] $ΔP$, $Δ$ e corr. V. τουτέστι — $ΓB$] m. 2 V. τουτέστιν LPBV. 9. Post εὐθείαν add. παρα-



Rectae enim AB parallelogrammum adplicetur AD figura quadrata AB deficiens. dico, esse

$$AD = A\Gamma \times \Gamma B.$$

et per se patet; nam quoniam AB quadratum est, erit $A\Gamma = \Gamma B$. et $AD = A\Gamma \times \Gamma B = A\Gamma \times \Gamma B$.

Ergo si rectae alicui, et quae sequuntur.

XVII.

Si duae rectae inaequales datae sunt, et quartae parti quadrati minoris aequale spatium maiori adplicatur figura quadrata deficiens, quod eam in partes longitudine commensurabiles diuidat, maior quadrata minorem excedet quadrato rectae sibi commensurabilis. et si maior quadrata minorem excedit quadrato rectae sibi commensurabilis, et spatium quartae parti quadrati minoris aequale maiori adplicatur figura quadrata deficiens, eam in partes longitudine commensurabiles diuidet.


Sint duae rectae inaequales $A, B\Gamma$, quarum maior sit $B\Gamma$, et quartae parti quadrati minoris A , hoc est $(\frac{1}{4}A)^2$, aequale spatium rectae $B\Gamma$ adplicetur figura

βληθῆ παραλληλόγραμμον V. Post ἐξῆς add. τῆς προτάσεως
LBVb, F m. 2. 10. ἐγ' B, mg. ιζ'. 11. ὡσιν P.
12. ἐλάττωτος F. 13. τετραγώνῳ] in ras. m. 1 b. 14.
μήκη F. 15. ἐλάττωτος F. συμμέτρῳ F. 16. μήκει] om. P.
αὐ F. ἡ] ἡ b, et F, sed corr. 17. ἐλάττωτος F. μείζον]
mg. m. 2 F, μείζονα b. 18. μήκει] om. P. Post τετάρτῳ
add. μέρει b, F m. 2. ἐλάττωτος F. 20. εἰς] in ras. V,
corr. ex εἰ m. rec. b. αὐτῇ V, sed corr. 21. διελεί B, διέλη
Vb et corr. in διελεί F. μήκη F. 22. μείζον b, μείζων
ἔστω F. 23. ἐλάττωτος F. 24. τῆς] τ' F. τουτέστιν P.
τῷ] τό F, et V, sed corr. m. 1. τοῦ A B; τῇ A V, sed corr.

καὶ ἔστω τὸ ὑπὸ τῶν $B\Delta$, $\Delta\Gamma$, σύμμετρος δὲ ἔστω ἡ $B\Delta$ τῇ $\Delta\Gamma$ μήκει· λέγω, ὅτι ἡ $B\Gamma$ τῆς A μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἐαυτῇ.

Τετμήσθω γὰρ ἡ $B\Gamma$ δίχα κατὰ τὸ E σημεῖον, καὶ
 5 κείσθω τῇ ΔE ἴση ἡ EZ . λοιπὴ ἄρα ἡ $\Delta\Gamma$ ἴση ἐστὶ
 τῇ BZ . καὶ ἐπεὶ εὐθεῖα ἡ $B\Gamma$ τέτμηται εἰς μὲν ἴσα
 κατὰ τὸ E , εἰς δὲ ἄνισα κατὰ τὸ Δ , τὸ ἄρα ὑπὸ $B\Delta$,
 $\Delta\Gamma$ περιεχόμενον ὀρθογώνιον μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς $E\Delta$
 τετραγώνου ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς $E\Gamma$ τετραγώνῳ.
 10 καὶ τὰ τετραπλάσια· τὸ ἄρα τετράκις ὑπὸ τῶν $B\Delta$, $\Delta\Gamma$
 μετὰ τοῦ τετραπλασίου τοῦ ἀπὸ τῆς ΔE ἴσον ἐστὶ τῷ
 τετράκις ἀπὸ τῆς $E\Gamma$ τετραγώνῳ. ἀλλὰ τῷ μὲν τετρα-
 πλασίῳ τοῦ ὑπὸ τῶν $B\Delta$, $\Delta\Gamma$ ἴσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς
 A τετράγωνον, τῷ δὲ τετραπλασίῳ τοῦ ἀπὸ τῆς ΔE
 15 ἴσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΔZ τετράγωνον· διπλασίων γάρ
 ἐστὶν ἡ ΔZ τῆς ΔE . τῷ δὲ τετραπλασίῳ τοῦ ἀπὸ
 τῆς $E\Gamma$ ἴσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς $B\Gamma$ τετράγωνον· διπλα-
 σίων γάρ ἐστι πάλιν ἡ $B\Gamma$ τῆς ΓE . τὰ ἄρα ἀπὸ τῶν
 A , ΔZ τετράγωνα ἴσα ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς $B\Gamma$ τετραγώνῳ.
 20 ὥστε τὸ ἀπὸ τῆς $B\Gamma$ τοῦ ἀπὸ τῆς A μείζον ἐστὶ τῷ
 ἀπὸ τῆς ΔZ · ἡ $B\Gamma$ ἄρα τῆς A μείζον δύναται τῇ ΔZ .
 δεικτέον, ὅτι καὶ σύμμετρός ἐστὶν ἡ $B\Gamma$ τῇ ΔZ . ἐπεὶ
 γὰρ σύμμετρός ἐστὶν ἡ $B\Delta$ τῇ $\Delta\Gamma$ μήκει, σύμμετρος
 ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ $B\Gamma$ τῇ $\Gamma\Delta$ μήκει. ἀλλὰ ἡ $\Gamma\Delta$ ταῖς
 25 $\Gamma\Delta$, BZ ἐστὶ σύμμετρος μήκει· ἴση γάρ ἐστὶν ἡ $\Gamma\Delta$
 τῇ BZ . καὶ ἡ $B\Gamma$ ἄρα σύμμετρός ἐστὶ ταῖς BZ , $\Gamma\Delta$
 μήκει· ὥστε καὶ λοιπῇ τῇ $Z\Delta$ σύμμετρός ἐστὶν ἡ $B\Gamma$

1. $\Delta\Gamma$] Γ in ras. F. 3. Post ἐαυτῇ add. μήκει Vb, F
 m. 2. 5. $\Delta\Gamma$] corr. ex $B\Gamma$ m. rec. b. ἐστὶν P. 7. ὑπὸ
 τῶν BFV. 9. ἐστὶν P. 10. τὰ] m. 2 V. τὸ] τὰ B. $E\Delta$]
 in ras. m. 1 P. 11. τετράκις Theon (BFVb). τοῦ] om.



quadrata deficiens, et sit $BA \times \Delta\Gamma$ [u. lemma], et BA , $\Delta\Gamma$ longitudine commensurabiles sint. dico, $B\Gamma^2$ excedere A^2 quadrato rectae sibi commensurabilis.

nam $B\Gamma$ in puncto E in duas partes aequales secetur, et ponatur $EZ = \Delta E$. itaque $\Delta\Gamma = BZ$. et quoniam recta $B\Gamma$ in E in partes aequales secta est, in Δ autem in inaequales, erit [II, 5]

$$BA \times \Delta\Gamma + EA^2 = E\Gamma^2.$$

et quadrupla eodem modo; quare

$$4 BA \times \Delta\Gamma + 4 \Delta E^2 = 4 E\Gamma^2.$$

verum $A^2 = 4 BA \times \Delta\Gamma$, $\Delta Z^2 = 4 \Delta E^2$ (nam $\Delta Z = 2 \Delta E$), $B\Gamma^2 = 4 E\Gamma^2$ (nam rursus $B\Gamma = 2 \Gamma E$). itaque

$$A^2 + \Delta Z^2 = B\Gamma^2$$

quare $B\Gamma^2$ excedit A^2 quadrato ΔZ^2 . demonstrandum, $B\Gamma$, ΔZ commensurabiles esse. nam quoniam BA , $\Delta\Gamma$ longitudine commensurabiles sunt, $B\Gamma$ et $\Gamma\Delta$ longitudine commensurabiles sunt [prop. XV]. verum $\Gamma\Delta$ rectis $\Gamma\Delta$, BZ longitudine commensurabilis est; nam $\Gamma\Delta = BZ$. quare etiam $B\Gamma$ rectis BZ , $\Gamma\Delta$ longitudine commensurabilis est [prop. XII]. quare $B\Gamma$ etiam

Theon (BFVb). $E\Delta$ FVb. ισα BF. 12. ΓE F. τετρα-
 πλασιον τοῦ τετρανίς Theon (BFVb). 13. τῶν om. b. 14. $\delta\epsilon$
 postea ins. F. τετρανίς , om. τοῦ, Theon (BFVb). 15. τε-
 τραγώνων P, corr. m. 1. 16. $Z\Delta$ P. τετρανίς , om. τοῦ,
 Theon (BFVb). 18. ΓE] $E\Gamma$ V. 19. A , ΔZ] e corr. V.
 τετραγώνων] $\square$ supra scr. m. 1 V. 20. Post ὥστε ras. 2
 litt. V. 21. $\tau\eta$] corr. ex τοῦ F. $Z\Delta$ P. 22. $Z\Delta$ P. 23.
 ἔστι P, corr. m. 2. 24. $\alpha\lambda\lambda'$ F. 25. ZB F. 26. ταῖς BZ ,
 $\Gamma\Delta$ ἔστι σύμμετρος Theon (BFVb). ἔστιν P. 27. μήκει
 τ in ras. m. 1 P. $B\Gamma$] in ras. V.

μήκει· ἡ $B\Gamma$ ἄρα τῆς A μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμετρου ἑαυτῇ.

Ἀλλὰ δὴ ἡ $B\Gamma$ τῆς A μείζον δυνάσθω τῷ ἀπὸ συμμετρου ἑαυτῇ, τῷ δὲ τετάρτῳ τοῦ ἀπὸ τῆς A ἴσον
 5 παρὰ τὴν $B\Gamma$ παραβελήσθω ἐλλείπον εἶδει τετραγώνῳ, καὶ ἔστω τὸ ὑπὸ τῶν $B\Delta$, $\Delta\Gamma$. δεικτέον, ὅτι σύμμετρός ἐστιν ἡ $B\Delta$ τῇ $\Delta\Gamma$ μήκει.

Τῶν γὰρ αὐτῶν κατασκευασθέντων ὁμοίως δεῖξομεν, ὅτι ἡ $B\Gamma$ τῆς A μείζον δύναται τῷ ἀπὸ τῆς $Z\Delta$.
 10 δύναται δὲ ἡ $B\Gamma$ τῆς A μείζον τῷ ἀπὸ συμμετρου ἑαυτῇ. σύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ $B\Gamma$ τῇ $Z\Delta$ μήκει· ὥστε καὶ λοιπῇ συναμφοτέρῳ τῇ BZ , $\Delta\Gamma$ σύμμετρός ἐστιν ἡ $B\Gamma$ μήκει. ἀλλὰ συναμφοτέρος ἡ BZ , $\Delta\Gamma$ σύμμετρός ἐστι τῇ $\Delta\Gamma$ [μήκει]. ὥστε καὶ ἡ $B\Gamma$ τῇ $\Gamma\Delta$
 15 σύμμετρός ἐστι μήκει· καὶ διελόντι ἄρα ἡ $B\Delta$ τῇ $\Delta\Gamma$ ἐστὶ σύμμετρος μήκει.

Ἐὰν ἄρα ὧσι δύο εὐθεῖαι ἄνισοι, καὶ τὰ ἐξῆς.

ιη'.

Ἐὰν ὧσι δύο εὐθεῖαι ἄνισοι, τῷ δὲ τετάρτῳ
 20 μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος ἴσον παρὰ τὴν μείζονα παραβληθῇ ἐλλείπον εἶδει τετραγώνῳ, καὶ εἰς ἀσύμμετρα αὐτὴν διαιρῇ [μήκει], ἡ μείζων τῆς ἐλάσσονος μείζον δυνήσεται τῷ ἀπὸ ἀσυσμ-

2. Post ἑαυτῇ add. μήκει V. 4. τοῦ] in ras. V. 8. ὁμοίως δὴ V. δεῖξομεν] δει- corr. ex δη- F. 9. Post $Z\Delta$ del. m. 2: οὕτω γὰρ ὑπόκειται V. 10. μείζον τῆς A P. 11. ἑαυτῆς P. 12. καί] m. 2 F. συναμφοτέρῳ] -ω e corr. V. τῇ] corr. ex τῷ F. 14. τῇ $\Delta\Gamma$ σύμμετρός ἐστι Theon (BFVb; τῇ $\Delta\Gamma$ postea ins. F). μήκει] om. P. Dein add. Theon: ἴση γὰρ ἐστὶν ἡ BZ τῇ $\Delta\Gamma$ (BFVb; τῇ corr. in τῆς m. 2 F, τῆς b; $\Gamma\Delta$ F). ὥστε] om. Theon (BFVb). $B\Gamma$ ἄρα Theon (BFVb).

reliquae $Z\Delta$ longitudine commensurabilis est. ergo $B\Gamma^2$ excedit A^2 quadrato rectae sibi commensurabilis.

Iam uero $B\Gamma^2$ excedat A^2 quadrato rectae sibi commensurabilis, et quartae parti quadrati A^2 aequale rectae $B\Gamma$ adplicetur spatium figura quadrata deficiens, et sit $B\Delta \times \Delta\Gamma$ [u. lemma]. demonstrandum, $B\Delta$, $\Delta\Gamma$ longitudine commensurabiles esse.

nam iisdem comparatis similiter demonstrabimus, esse $B\Gamma^2 = A^2 + Z\Delta^2$. $B\Gamma^2$ autem quadrato rectae sibi commensurabilis excedit quadratum A^2 . itaque $B\Gamma$, $Z\Delta$ longitudine commensurabiles sunt. quare $B\Gamma$ etiam reliquae $BZ + \Delta\Gamma$ longitudine commensurabilis est [prop. XV]. uerum $BZ + \Delta\Gamma$ rectae $\Delta\Gamma$ commensurabilis est [prop. VI]. quare etiam $B\Gamma$, $\Gamma\Delta$ longitudine commensurabiles sunt [prop. XII]. itaque etiam dirimendo $B\Delta$, $\Delta\Gamma$ longitudine commensurabiles sunt.

Ergo si duae rectae inaequales datae sunt, et quae sequuntur.

XVIII.

Si duae rectae inaequales datae sunt, et quartae parti quadrati minoris aequale spatium maiori adplicatur figura quadrata deficiens, quod eam in partes incommensurabiles diuidat, maior quadrata minorem excedet quadrato rectae sibi incommensurabilis. et si maior quadrata minorem excedit quadrato rectae sibi

σύμμετρος ἐστι τῇ $\Gamma\Delta$ Theon (BFVb; $\Delta\Gamma$ V). 15. μήκει·
καί] om. Theon (BFVb). 17. καὶ τὰ ἐξῆς] τῷ δὲ τετάρτῳ
μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος ἴσον παρὰ τὴν μείζονα παραβληθῶν
ἐλλείπον εἶδει τετραγώνῳ, καὶ τὰ ἐξῆς· ὅπερ εἶδει δεῖξαι V. 18.
κ' B, ιη' mg. 19. ὡς B. 20. ἐλάττωτος F. 22. μήκει]
om. P, μήκη F. 23. ἐλάττωτος F. τό F. συμμέτρου F.

μέτρου ἐαυτῇ. καὶ ἐὰν ἡ μείζων τῆς ἐλάσσονος
 μείζον δύνηται τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἐαυτῇ, τῷ δὲ
 τετάρτῳ τοῦ ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος ἴσον παρὰ τὴν
 μείζονα παραβληθῇ ἐλλείπον εἶδει τετραγώνῳ,
 5 εἰς ἀσύμμετρα αὐτὴν διαιρεῖ [μήκει].

Ἔστωσαν δύο εὐθείαι ἄνισοι αἱ $A, B\Gamma$, ὧν μείζων
 ἡ $B\Gamma$, τῷ δὲ τετάρτῳ [μέρει] τοῦ ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος
 τῆς A ἴσον παρὰ τὴν $B\Gamma$ παραβεβλήσθω ἐλλείπον
 εἶδει τετραγώνῳ, καὶ ἔστω τὸ ὑπὸ τῶν $B\Delta\Gamma$, ἀσύμ-
 10 μετρος δὲ ἔστω ἡ $B\Delta$ τῇ $\Delta\Gamma$ μήκει· λέγω, ὅτι ἡ $B\Gamma$
 τῆς A μείζον δύνатаι τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἐαυτῇ.

Τῶν γὰρ αὐτῶν κατασκευασθέντων τῷ πρότερον
 ὁμοίως δεῖξομεν, ὅτι ἡ $B\Gamma$ τῆς A μείζον δύνатаι τῷ
 ἀπὸ τῆς $Z\Delta$. δεικτέον [οὖν], ὅτι ἀσύμμετρός ἐστιν
 15 ἡ $B\Gamma$ τῇ ΔZ μήκει. ἐπεὶ γὰρ ἀσύμμετρός ἐστιν ἡ
 $B\Delta$ τῇ $\Delta\Gamma$ μήκει, ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ $B\Gamma$
 τῇ $\Gamma\Delta$ μήκει. ἀλλὰ ἡ $\Delta\Gamma$ σύμμετρός ἐστι συναμ-
 φοτέραις ταῖς $BZ, \Delta\Gamma$. καὶ ἡ $B\Gamma$ ἄρα ἀσύμμετρός
 ἐστι συναμφοτέραις ταῖς $BZ, \Delta\Gamma$. ὥστε καὶ λοιπῇ τῇ
 20 $Z\Delta$ ἀσύμμετρός ἐστιν ἡ $B\Gamma$ μήκει. καὶ ἡ $B\Gamma$ τῆς A
 μείζον δύνатаι τῷ ἀπὸ τῆς $Z\Delta$. ἡ $B\Gamma$ ἄρα τῆς A
 μείζον δύνатаι τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἐαυτῇ.

Δυνάσθω δὴ πάλιν ἡ $B\Gamma$ τῆς A μείζον τῷ ἀπὸ
 ἀσυμμέτρου ἐαυτῇ, τῷ δὲ τετάρτῳ τοῦ ἀπὸ τῆς A ἴσον
 25 παρὰ τὴν $B\Gamma$ παραβεβλήσθω ἐλλείπον εἶδει τετραγώνῳ,

1. καὶ — 2. ἐαυτῇ] om. b. 1. μείζον V, sed corr. ἐλάτ-
 τονος F. 2. συμμέτρου F, et B, corr. m. 2. 3. ἐλάττονος F.
 5. διαιρεῖ P. μήκει] om. P, μήκη F. 7. ἐστὶν ἡ F. μέρει]
 mg. m. 1 P. . τοῦ] τῷ F. ἐλάττονος F. 8. τῆς] τῇ F. 9.
 $B\Gamma\Delta$ b; $B\Delta, \Delta\Gamma$ V ($\Delta\Gamma$ in ras.), F, P m. rec. 11. συμ-
 μέτρου B, corr. m. rec. 12. τῷ] m. rec. B; τό P, corr. m. 2.
 προτέρῳ F. 14. ΔZ V. οὖν] om. P. ὅτι καὶ P. 15.

incommensurabilis, et spatium quartae parti quadrati minoris aequale maiori adplicatur figura quadrata deficiens, eam in partes incommensurabiles diuidit.

Sint duae rectae inaequales $A, B\Gamma$, quarum maior sit $B\Gamma$, quartae autem parti quadrati minoris A aequale spatium rectae $B\Gamma$ adplicetur figura quadrata deficiens, et sit $B\Delta \times \Delta\Gamma$ [u. lemma p. 46], et $B\Delta, \Delta\Gamma$ longitudine incommensurabiles sint. dico, $B\Gamma^2$ excedere A^2 quadrato rectae sibi incommensurabilis.

iisdem enim, quae in priore propositione, comparatis similiter demonstrabimus, esse $B\Gamma^2 = A^2 + Z\Delta^2$. demonstrandum, $B\Gamma, \Delta Z$ longitudine incommensurabiles esse. nam quoniam $B\Delta, \Delta\Gamma$ longitudine incommensurabiles sunt, etiam $B\Gamma, \Gamma\Delta$ longitudine incommensurabiles sunt [prop. XVI]. uerum $\Delta\Gamma$ rectae $BZ + \Delta\Gamma$ commensurabilis est [prop. VI]. quare etiam $B\Gamma$ rectae $BZ + \Delta\Gamma$ incommensurabilis est [prop. XIII]. itaque $B\Gamma$ etiam reliquae $Z\Delta$ longitudine incommensurabilis est [prop. XVI]; et $B\Gamma^2 = A^2 + Z\Delta^2$. ergo $B\Gamma^2$ excedit A^2 quadrato rectae sibi incommensurabilis.

Iam rursus $B\Gamma^2$ excedat A^2 quadrato rectae sibi incommensurabilis, et spatium aequale $\frac{1}{4}A^2$ rectae $B\Gamma$ adplicetur figura quadrata deficiens, et sit $B\Delta \times \Delta\Gamma$.

$Z\Delta$ B. 16. μήκει] om. Vb, m. 2 B. ἄρα] om. V. ἐστίν P. comp. F. καί] m. 2 F. 17. $\Gamma\Delta$] in ras. F. ἀλλ' F. ἡ] supra scr. m. 1 V. ἀσύμμετρος F. 18. καί — 19. $\Delta\Gamma$] m. 2 B. 20. $Z\Delta$] " Δ " Z F. $B\Gamma$] (prius) ΓB V. 21. $B\Gamma$] B in ras. m. 1 B. 22. συμμέτρου B, corr. m. 2; item lin. 24. τοῦ] τῷ F.

καὶ ἔστω τὸ ὑπὸ τῶν $ΒΔ$, $ΔΓ$. δεικτέον, ὅτι ἀσύμμετρός ἐστιν ἡ $ΒΔ$ τῇ $ΔΓ$ μήκει.

Τῶν γὰρ αὐτῶν κατασκευασθέντων ὁμοίως δείξομεν, ὅτι ἡ $ΒΓ$ τῆς $Α$ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ τῆς $ΖΔ$. ἀλλὰ
 5 ἡ $ΒΓ$ τῆς $Α$ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἐαυτῇ. ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ $ΒΓ$ τῇ $ΖΔ$ μήκει· ὥστε καὶ λοιπῇ συναμφοτέρῳ τῇ $ΒΖ$, $ΔΓ$ ἀσύμμετρός ἐστιν ἡ $ΒΓ$. ἀλλὰ συναμφοτέρος ἡ $ΒΖ$, $ΔΓ$ τῇ $ΔΓ$ σύμμετρός ἐστι μήκει· καὶ ἡ $ΒΓ$ ἄρα τῇ $ΔΓ$ ἀσύμμετρός
 10 ἐστὶ μήκει· ὥστε καὶ διελόντι ἡ $ΒΔ$ τῇ $ΔΓ$ ἀσύμμετρός ἐστι μήκει.

Ἐὰν ἄρα ὧσι δύο εὐθείαι, καὶ τὰ ἐξῆς.

Λήμμα.

Ἐπεὶ δέδεικται, ὅτι αἱ μήκει σύμμετροι πάντως καὶ
 15 δυνάμει [εἰσὶ σύμμετροι], αἱ δὲ δυνάμει οὐ πάντως καὶ μήκει, ἀλλὰ δὴ δύνανται μήκει καὶ σύμμετροι εἶναι καὶ ἀσύμμετροι, φανερόν, ὅτι, ἐὰν τῇ ἐκκειμένη ῥητῇ σύμμετρός τις ᾗ μήκει, λέγεται ῥητὴ καὶ σύμμετρος αὐτῇ οὐ μόνον μήκει, ἀλλὰ καὶ δυνάμει,
 20 ἐπεὶ αἱ μήκει σύμμετροι πάντως καὶ δυνάμει. ἐὰν δὲ τῇ ἐκκειμένη ῥητῇ σύμμετρός τις ᾗ δυνάμει, εἰ μὲν καὶ μήκει, λέγεται καὶ οὕτως ῥητὴ καὶ σύμμετρος αὐτῇ

1. $ΔΓ$] m. 2 B. 2. ἡ $ΔΒ$ ἐστὶν F. 4. $ΔΖ$ V. ἀλλ' FV. 5. συμμέτρου F, corr. m. 2. 6. ἐαυτῇς P, corr. m. 1. ἀσύμμετρα P, corr. m. 1. $ΔΖ$ V. 8. τῇ $ΔΓ$] m. 2 F. ἀσύμμετρος F, sed corr. 9. ἐστὶν P. καί] om. P. καί — 10. μήκει] mg. F. 10. Ante ὥστε del. ἡ $ΒΓ$ ἄρα τῇ $ΔΓ$ m. 1 P. 12. ὧσιν B. Post εὐθείαι add. ἀνισοί, τῷ δὲ τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος ἴσον παρὰ τὴν μείζονα παραβλήθῃ V. 13. λήμμα] om. PBb. 14. ἐπεὶ δέ V. 15. εἰσὶ σύμμετροι] om. P. οὐ] σύμμετροι οὐ P. 16. ἀλλὰ — μήκει] mg. m. 1 P. δι'] δηλαδὴ BVb, δὴ δηλαδὴ, del. δὴ, F. καὶ μήκει BFVb.

demonstrandum, BA et AG longitudine incommensurabiles esse.

iisdem enim comparatis similiter demonstrabimus, esse $BF^2 = A^2 + Z\Delta^2$. BF^2 autem A^2 excedit quadrato rectae sibi incommensurabilis. itaque BF , $Z\Delta$ longitudine incommensurabiles sunt. quare BF etiam reliquae $BZ + \Delta\Gamma$ incommensurabilis est [prop. XVI]. uerum $BZ + \Delta\Gamma$ rectae $\Delta\Gamma$ longitudine commensurabilis est [prop. VI]. quare etiam BF rectae $\Delta\Gamma$ longitudine incommensurabilis est [prop. XIII]. itaque etiam dirimendo BA et AG longitudine incommensurabiles sunt [prop. XVI].

Ergo si duae rectae, et quae sequuntur.

Lemma.

Quoniam demonstratum est [prop. IX coroll.], rectas longitudine commensurabiles semper etiam potentia commensurabiles esse, rectas autem potentia commensurabiles non semper etiam longitudine, sed posse longitudine tum commensurabiles esse tum incommensurabiles, adparet, si recta aliqua rationali propositae longitudine commensurabilis sit, eam rationalem eique commensurabilem uocari non modo longitudine, sed etiam potentia, quoniam rectae longitudine commensurabiles semper etiam potentia commensurabiles sunt; sin recta rationali propositae potentia commensurabilis sit, si etiam longitudine sit commensurabilis, eam sic quoque rationalem eique longitudine et potentia commensurabilem uocari; sin rursus recta rationali

19. $\alpha\tilde{\nu}\tau\eta$ F. 20. $\epsilon\pi\epsilon\iota\ \alpha\iota$] $\alpha\iota\ \gamma\acute{\alpha}\rho$ Theon (BFVb). 22.
 $\kappa\alpha\iota$] (alt.) m. 2 B. $\alpha\tilde{\nu}\tau\eta$ F.

μήκει καὶ δυνάμει· εἰ δὲ τῇ ἐκκειμένῃ πάλιν ῥητῇ
σύμμετρος τις οὕσα δυνάμει μήκει αὐτῇ ἢ ἀσύμμετρος,
λέγεται καὶ οὕτως ῥητὴ δυνάμει μόνον σύμμετρος.

ιθ'.

5 Τὸ ὑπὸ ῥητῶν μήκει¹ συμμέτρων κατὰ τινα
τῶν προειρημένων τρόπων εὐθειῶν περιεχό-
μενον ὀρθογώνιον ῥητόν ἐστιν.

Ἐπὶ γὰρ ῥητῶν μήκει² συμμέτρων εὐθειῶν τῶν
AB, BG ὀρθογώνιον περιεχέσθω τὸ AG· λέγω, ὅτι
10 ῥητόν ἐστι τὸ AG.

Ἀναγεγράφθω γὰρ ἀπὸ τῆς AB τετραγώνον τὸ AD·
ῥητόν ἄρα ἐστὶ τὸ AD. καὶ ἐπεὶ σύμμετρος ἐστὶν ἡ
AB τῇ BG μήκει, ἴση δὲ ἐστὶν ἡ AB τῇ BD, σύμ-
μετρος ἄρα ἐστὶν ἡ BD τῇ BG μήκει. καὶ ἐστὶν ὥς
15 ἡ BD πρὸς τὴν BG, οὕτως τὸ AD πρὸς τὸ AG. σύμ-
μετρον ἄρα ἐστὶ τὸ AD τῷ AG. ῥητόν δὲ τὸ AD·
ῥητόν ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ AG.

Τὸ ἄρα ὑπὸ ῥητῶν μήκει συμμέτρων, καὶ τὰ ἐξῆς.

κ'.

20 Ἐὰν ῥητόν παρὰ ῥητὴν παραβληθῇ, πλάτος
ποιεῖ ῥητὴν καὶ σύμμετρον τῇ, παρ' ἣν παρὰ-
κεῖται, μήκει.

2. οὕσα τις FV. δυνάμει] -ει e corr., seq. spat. 2 litt. F.
αὐτῇ ἢ] ἡ αὐτῇ BF b, ἢ V. 3. οὕτως] comp. e corr. F. μόνον]
comp. mg. V (euan.). Seq. alt. lemma, u. app. 4. ιθ'] sic F,
sed infra κ'; mg. τμήμα β' Fb. 5. μήκει — 6. προ-] in ras.
m. 2 B. 5. εὐθειῶν κατὰ Theon (BFVb). 6. τρόπων? V. εὐ-
θειῶν] om. Theon (BFVb). 8. εὐθειῶν τῶν] in ras. V. 12.
τὸ AD ἄρα ῥητόν ἐστὶν F. 13. AB] (alt.) BΔB. BΔ] ΔB in
ras. P, BA in ras. B. σύμμετρος — 14. BG] om. B; mg.
m. 2: ἴση lin. 13 — μήκει lin. 14, ut nos. 15. οὕτω V. τό]

propositae commensurabilis potentia, eadem longitudine ei incommensurabilis sit, sic quoque eam rationalem uocari potentia tantum commensurabilem.

XIX.

Rectangulum comprehensum rectis rationalibus longitudineque commensurabilibus secundum aliquem modorum, quos diximus [u. lemma], rationale est.

Rectis enim rationalibus longitudine commensurabilibus AB , $B\Gamma$ rectangulum comprehendatur AG . dico, AG rationale esse.

 nam in AB construatur quadratum AA' . itaque AA' rationale est [def. 4]. et quoniam AB , $B\Gamma$ longitudine commensurabiles sunt, et $AB = B\Delta$, $B\Delta$ et $B\Gamma$ longitudine commensurabiles sunt. et $B\Delta : B\Gamma = AA' : A\Gamma$ [VI, 1]. itaque AA' , $A\Gamma$ commensurabilia sunt [prop. XI]. uerum AA' rationale est. itaque etiam $A\Gamma$ rationale est [def. 4].

Ergo rectangulum comprehensum rectis rationalibus longitudineque commensurabilibus, et quae sequuntur.

XX.

Si spatium rationale rectae rationali adplicatur, latitudinem rationalem facit et ei longitudine commensurabilem, cui adplicatum est.

(alt.) corr. ex τῆν m. rec. P. AG] e corr. P. 16. ἐστίν P, ἐστὶ καὶ V. τό] τῷ b. AA' F. 17. ἐστίν P, om. FV. 18. μῆκει συμμέτρων] om. BVb. Ante καὶ add. εὐθειῶν F. καὶ τὰ ἐξῆς] om. PV. 19. κ'] seq. ras. 1 litt. B, κα' F. 21. ποιεῖ] -εῖ e corr. m. 1 F. τῇ] corr. ex τῇ m. rec. b.

Ῥητὸν γὰρ τὸ $ΑΓ$ παρὰ ρητὴν κατὰ τινα πάλιν τῶν προειρημένων τρόπων τὴν $ΑΒ$ παραβεβλήσθω πλάτος ποιοῦν τὴν $ΒΓ$. λέγω, ὅτι ρητὴ ἐστὶν ἡ $ΒΓ$ καὶ σύμμετρος τῇ $ΒΑ$ μήκει.

- 5 Ἀναγεγράφθω γὰρ ἀπὸ τῆς $ΑΒ$ τετράγωνον τὸ $ΑΔ$. ρητὸν ἄρα ἐστὶ τὸ $ΑΔ$. ρητὸν δὲ καὶ τὸ $ΑΓ$. σύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ $ΑΔ$ τῷ $ΑΓ$. καὶ ἐστὶν ὡς τὸ $ΑΔ$ πρὸς τὸ $ΑΓ$, οὕτως ἡ $ΔΒ$ πρὸς τὴν $ΒΓ$. σύμμετρος ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ $ΔΒ$ τῇ $ΒΓ$. ἴση δὲ ἡ $ΔΒ$ τῇ
10 $ΒΑ$. σύμμετρος ἄρα καὶ ἡ $ΑΒ$ τῇ $ΒΓ$. ρητὴ δὲ ἐστὶν ἡ $ΑΒ$. ρητὴ ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ $ΒΓ$ καὶ σύμμετρος τῇ $ΑΒ$ μήκει.

Ἐὰν ἄρα ρητὸν παρὰ ρητὴν παραβληθῇ, καὶ τὰ ἐξῆς.

κα'.

- 15 Τὸ ὑπὸ ρητῶν δυνάμει μόνον συμμέτρων εὐθειῶν περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἄλογόν ἐστιν, καὶ ἡ δυνάμενὴ αὐτὸ ἄλογός ἐστιν, καλεῖσθω δὲ μέση.

- Τὸ γὰρ ρητῶν δυνάμει μόνον συμμέτρων εὐθειῶν
20 τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$ ὀρθογώνιον περιεχέσθω τὸ $ΑΓ$. λέγω, ὅτι ἄλογόν ἐστὶ τὸ $ΑΓ$, καὶ ἡ δυνάμενὴ αὐτὸ ἄλογός ἐστιν, καλεῖσθω δὲ μέση.

Ἀναγεγράφθω γὰρ ἀπὸ τῆς $ΑΒ$ τετράγωνον τὸ $ΑΔ$. ρητὸν ἄρα ἐστὶ τὸ $ΑΔ$. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρος ἐστὶν

1. ρητὴν τὴν $ΑΒ$ V. 2. εἰρημένων Theon (BFVb). τὴν $ΑΒ$] om. V. 3. πόσῳ P. 4. $ΑΒ$ P. 5. $ΑΒ$] corr. ex $ΑΓ$ m. 2 F. 6. ἐστὶν P. $ΑΓ$] $ΓΑ$ F. 7. ἐστὶν P. $ΑΔ$] $ΑΔ$ V. 8. τὴν] om. BFb. 9. ἐστὶν P. $ΔΒ$] (alt.) post ras. V, $ΒΔ$ F. 10. $ΒΑ$] $Α$ e corr. m. 1 P. ἄρα — τῇ] in ras. m. 1 P. 12. $ΒΑ$ BVb. 13. ἄν F. παρὰ ρητὴν] om. F. παραβληθῇ] om. P. Seq. lemma, u. app. 14.

Rationale enim spatium AI rectae AB rationali rursus secundum aliquem modorum, quos diximus [u. lemma p. 56], adplicetur latitudinem faciens BI . dico, BI rationalem esse et rectae BA longitudine commensurabilem.

construatur enim in AB quadratum AA . AA igitur rationale est [def. 4]. uerum etiam AI rationale est. itaque AA , AI commensurabilia sunt. et $AA:AI = AB:BI$ [VI, 1]. itaque AB , BI commensurabiles sunt [prop. XI]. uerum $AB = BA$. itaque etiam AB , BI commensurabiles sunt. sed AB rationalis est. itaque etiam BI rationalis est et rectae AB longitudine commensurabilis [def. 3].

Ergo si spatium rationale rectae rationali adplicatur, et quae sequuntur.

XXI.

Rectangulum rectis rationalibus potentia tantum commensurabilibus comprehensum irrationale est, et recta ei aequalis quadrata irrationalis est, uocetur autem media.

Rectis enim rationalibus et potentia tantum commensurabilibus AB , BI rectangulum AI comprehendatur. dico, rectangulum AI irrationale esse, et rectam ei aequalem quadratam irrationalem; uocetur autem media.

nam in AB quadratum construatur AA . itaque AA rationale est [def. 4]. et quoniam AB , BI longi-

$\alpha\alpha'$] α in ras. m. 1 B, $\alpha\beta'$ F et sic deinceps. 15. Post $\phi\eta\tau\omega\upsilon\upsilon$ add. $\delta\upsilon\omicron$ B. 16. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ PBV, comp. Fb. 17. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ BV, comp. Fb, $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ P. 22. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ PBV, comp. Fb.

ἡ AB τῇ $BΓ$ μήκει· δυνάμει γὰρ μόνον ὑπόκεινται
 σύμμετροι· ἴση δὲ ἡ AB τῇ $BΔ$, ἀσύμμετρος ἄρα
 ἐστὶ καὶ ἡ $ΔB$ τῇ $BΓ$ μήκει. καὶ ἐστὶν ὡς ἡ $ΔB$
 πρὸς τὴν $BΓ$, οὕτως τὸ $ΔΔ$ πρὸς τὸ $ΑΓ$ · ἀσύμμε-
 5 τρον ἄρα [ἐστὶ] τὸ $ΔΔ$ τῷ $ΑΓ$. φητὸν δὲ τὸ $ΔΑ$ ·
 ἄλογον ἄρα ἐστὶ τὸ $ΑΓ$ · ὥστε καὶ ἡ δυναμένη τὸ
 $ΑΓ$ [τουτέστιν ἡ ἴσον αὐτῷ τετράγωνον δυναμένη]
 ἄλογός ἐστιν, καλείσθω δὲ μέση· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

Λήμμα.


10 Ἐὰν ὧσι δύο εὐθεῖαι, ἐστὶν ὡς ἡ πρώτη πρὸς τὴν
 δευτέραν, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς πρώτης πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν
 δύο εὐθειῶν.

ἔστωσαν δύο εὐθεῖαι αἱ ZE , EH . λέγω, ὅτι ἐστὶν
 ὡς ἡ ZE πρὸς τὴν EH , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ZE πρὸς
 15 τὸ ὑπὸ τῶν ZE , EH .

ἀναγεγράφθω γὰρ ἀπὸ τῆς ZE τετράγωνον τὸ $ΔZ$,
 καὶ συμπληρωσθῶ τὸ $HΔ$. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς ἡ ZE
 πρὸς τὴν EH , οὕτως τὸ $ZΔ$ πρὸς τὸ $ΔH$, καὶ ἐστὶ
 τὸ μὲν $ZΔ$ τὸ ἀπὸ τῆς ZE , τὸ δὲ $ΔH$ τὸ ὑπὸ τῶν
 20 $ΔE$, EH , τουτέστι τὸ ὑπὸ τῶν ZE , EH , ἐστὶν ἄρα
 ὡς ἡ ZE πρὸς τὴν EH , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ZE πρὸς
 τὸ ὑπὸ τῶν ZE , EH . ὁμοίως δὲ καὶ ὡς τὸ ὑπὸ τῶν

1. $BΓ$] $ΓB$ V. γὰρ] comp. F, supra scr. δέ. 3. ἐστὶν B.
 $ΔB$] (alt.) $BΔ$ P. 4. $ΑΓ$] corr. ex AB m. rec. P. 5. ἐστὶν
 B, om P. $ΔΔ$ FV. $ΑΔ$ F. 6. ἐστὶν P. 7. ἡ] supra scr.
 m. 2 V. 8. ἐστὶ PV, comp. Fb. Ante ὅπερ add. P:
 διὰ τὸ (mg. m. 1) τὴν ἴσον ἀναγράφουσιν τετράγωνον τῷ $ΑΓ$
 χωρίῳ, ἣν καλεῖ μέσην, μέσην ἀνάλογον εἶναι τῶν AB , $BΓ$;
 eodem loco Theon: διὰ τὸ τὸ ἀπ' αὐτῆς τετράγωνον ἴσον εἶναι
 τῷ ὑπὸ τῶν AB , $BΓ$ καὶ μέσην ἀνάλογον αὐτὴν γίνεσθαι (γι-
 νέσθαι BV) τῶν AB , $BΓ$ (BFVb). 9. λήμμα γ V (cfr. app.).

10. ὧσιν B. ὧς] δὲ ὧς F. 11. πρὸς] supra scr. m. 1 F.



tudine incommensurabiles sunt (supposuimus enim, eas potentia tantum commensurabiles esse), et $AB = BA$, etiam AB , $BΓ$ longitudine incommensurabiles sunt. et $AB : BΓ = AA : AΓ$ [VI, 1]. itaque AA , $AΓ$ incommensurabilia sunt [prop. XI]. uerum AA rationale est; quare $AΓ$ irrationale est [def. 4]. itaque etiam recta spatio $AΓ$ aequalis quadrata¹⁾ irrationalis est [def. 4]; uocetur autem media; quod erat demonstrandum.

Lemma.

Datis duabus rectis est ut prima ad secundam, ita quadratum primae ad rectangulum duarum illarum rectorum.

Datae sint duae rectae ZE , EH . dico, esse

$$ZE : EH = ZE^2 : ZE \times EH.$$

Z E H describatur enim in ZE quadratum AZ , et expleatur HA . iam quoniam est $ZE : EH = ZA : AH$ [VI, 1], et $ZA = ZE^2$, $AH = AE$

$\times EH = ZE \times EH$, erit

$$ZE : EH = ZE^2 : ZE \times EH.$$

1) Uerba *τουτέστιν* — *δυναμένην* lin. 7, quae nihil explicant, subditiua habeo (pro *δυναμένην* Augustus coni. *ἀναγνώφουσα*). quae adiciuntur lin. 8 (u. not. crit.) in P apertissime scholiastae sunt (*καλεῖ*); quare etiam additamentum simile codd. Theoninorum ipsi Theoni, non Euclidi tribuendum est.

ὑπό] corr. ex *ἀπό* Fb. 14. *πρός* — ZE] mg. m. 2 B. EH] HE F. 17. *τό*] corr. ex *τῆς* F. 18. *τῆν*] om. b. *ἐστίν* P. 19. *τὸ ὑπό* — 20. *τουτέστι*] supra scr. F. 20. *τουτέστιν* P. 22. *καὶ ὡς*] ins. m. 2 F.

HE , EZ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς EZ , τουτέστιν ὡς τὸ $HΔ$ πρὸς τὸ $ZΔ$, οὕτως ἡ HE πρὸς τὴν EZ ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

κβ'.

5 Τὸ ἀπὸ μέσης παρὰ ῥητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ ῥητὴν καὶ ἀσύμμετρον τῇ, παρ' ἣν παρᾶκειται, μήκει.

Ἔστω μέση μὲν ἡ A , ῥητὴ δὲ ἡ $ΓΒ$, καὶ τῷ ἀπὸ τῆς A ἴσον παρὰ τὴν $ΒΓ$ παραβεβλήσθω χωρίου ὀρθο-
10 γώνιον τὸ $ΒΔ$ πλάτος ποιοῦν τὴν $ΓΔ$. λέγω, ὅτι ῥητὴ ἐστὶν ἡ $ΓΔ$ καὶ ἀσύμμετρος τῇ $ΓΒ$ μήκει.

Ἐπεὶ γὰρ μέση ἐστὶν ἡ A , δύναται χωρίου περι-
εχόμενον ὑπὸ ῥητῶν δυνάμει μόνον συμμέτρων.
δυνάσθω τὸ HZ . δύναται δὲ καὶ τὸ $ΒΔ$. ἴσον ἄρα
15 ἐστὶ τὸ $ΒΔ$ τῷ HZ . ἐστὶ δὲ αὐτῷ καὶ ἰσογώνιον·
τῶν δὲ ἴσων τε καὶ ἰσογωνίων παραλληλογράμμων
ἀντιπεπόνθασιν αἱ πλευραὶ αἱ περὶ τὰς ἴσας γωνίας·
ἀνάλογον ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ $ΒΓ$ πρὸς τὴν $ΕΗ$, οὕτως
ἡ EZ πρὸς τὴν $ΓΔ$. ἐστὶν ἄρα καὶ ὡς τὸ ἀπὸ τῆς
20 $ΒΓ$ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $ΕΗ$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς EZ πρὸς
τὸ ἀπὸ τῆς $ΓΔ$. σύμμετρον δὲ ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς $ΓΒ$
τῷ ἀπὸ τῆς $ΕΗ$. ῥητὴ γάρ ἐστιν ἑκατέρα αὐτῶν· σύμ-
μετρον ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς EZ τῷ ἀπὸ τῆς $ΓΔ$.
ῥητὸν δὲ ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς EZ . ῥητὸν ἄρα ἐστὶ καὶ
25 τὸ ἀπὸ τῆς $ΓΔ$. ῥητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ $ΓΔ$. καὶ ἐπεὶ
ἀσύμμετρός ἐστὶν ἡ EZ τῇ $ΕΗ$ μήκει· δυνάμει γὰρ
μόνον εἰσὶ σύμμετροι· ὡς δὲ ἡ EZ πρὸς τὴν $ΕΗ$,

2. $ZΔ$] corr. ex $ΔZ$ V, $ΔZ$ BFb. HE] in ras. V. ὅπερ
ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. Theon (BFVb). 6. σύμμετρον P.
corr. m. 2. τῇ] corr. ex τι m. rec. b. 8. καί — 9. χωρίου]
in ras. F. 9. ὀρθογώνιον] m. rec. V. 13. μόνον] in ras. F.


similiter etiam $HE \times EZ : EZ^2 = HA : ZA = HE : EZ$;
quod erat demonstrandum.

XXII.

Quadratum mediae rationali adplicatum latitudinem facit rationalem et ei, cui adplicatum est, longitudine incommensurabilem.

Sit media A , rationalis autem ΓB , et quadrato A^2 aequale rectae $B\Gamma$ adplicetur spatium rectangulum $B\Delta$ latitudinem faciens $\Gamma\Delta$. dico, $\Gamma\Delta$ rationalem esse et rectae ΓB longitudine incommensurabilem.

nam quoniam media est A , quadrata aequalis est spatio rectis potentia tantum commensurabilibus comprehenso [prop. XXI]. sit quadrata aequalis HZ . uerum quadrata etiam spatio $B\Delta$ aequalis est. itaque $B\Delta = HZ$. uerum idem ei aequiangulum est. parallelogrammorum autem aequalium et aequiangulorum latera aequales angulos comprehendunt in contraria propor-



tione sunt [VI, 14]. itaque $B\Gamma : EH = EZ : \Gamma\Delta$. quare etiam $B\Gamma^2 : EH^2 = EZ^2 : \Gamma\Delta^2$ [VI, 20]. uerum ΓB^2 et EH^2 commensurabilia sunt; nam utraque rationalis est. quare etiam EZ^2 et $\Gamma\Delta^2$ commensurabilia sunt

[prop. XI]. uerum EZ^2 rationale est; quare etiam $\Gamma\Delta^2$ rationale est [def. 4]. itaque $\Gamma\Delta$ rationalis est. et quoniam EZ , EH longitudine incommensurabiles sunt (nam potentia tantum commensurabiles sunt), et est

14. δύναται] δύνασθαι b. ΔB P. 15. ἐστίν P. ΔB P.
ἐστίν PB. αὐτό FV. 16. τε] corr. ex δέ m. 1 P, om.
FV. 21. ΓB] e corr. V, $B\Gamma$ F. 23. ἐστίν P. 24. ἐστίν P.
ἐστίν P. 25. ἐστίν] postea ins. F. 26. HE F.

οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς EZ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ZE , EH ,
 ἀσύμμετρον ἄρα [ἐστὶ] τὸ ἀπὸ τῆς EZ τῷ ὑπὸ τῶν
 ZE , EH . ἀλλὰ τῷ μὲν ἀπὸ τῆς EZ σύμμετρόν ἐστι
 τὸ ἀπὸ τῆς $\Gamma\Delta$ · ῥηταὶ γάρ εἰσι δυνάμει· τῷ δὲ ὑπὸ
 5 τῶν ZE , EH σύμμετρόν ἐστι τὸ ὑπὸ τῶν $\Delta\Gamma$, ΓB .
 ἴσα γάρ ἐστι τῷ ἀπὸ τῆς A · ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ καὶ
 τὸ ἀπὸ τῆς $\Gamma\Delta$ τῷ ὑπὸ τῶν $\Delta\Gamma$, ΓB . ὥς δὲ τὸ ἀπὸ
 τῆς $\Gamma\Delta$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $\Delta\Gamma$, ΓB , οὕτως ἐστὶν ἡ
 $\Delta\Gamma$ πρὸς τὴν ΓB · ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ $\Delta\Gamma$ τῇ
 10 ΓB μήκει. ῥητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ $\Gamma\Delta$ καὶ ἀσύμμετρος τῇ
 ΓB μήκει· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

κγ'.

Ἡ τῇ μέσῃ σύμμετρος μέσῃ ἐστίν.

Ἔστω μέσῃ ἡ A , καὶ τῇ A σύμμετρος ἔστω ἡ B .
 15 λέγω, ὅτι καὶ ἡ B μέσῃ ἐστίν.

Ἐκκείσθω γὰρ ῥητὴ ἡ $\Gamma\Delta$, καὶ τῷ μὲν ἀπὸ τῆς
 A ἴσον παρὰ τὴν $\Gamma\Delta$ παραβεβλήσθω χωρίον ὀρθο-
 γώνιον τὸ ΓE πλάτος ποιῶν τὴν $E\Delta$. ῥητὴ ἄρα
 ἐστὶν ἡ $E\Delta$ καὶ ἀσύμμετρος τῇ $\Gamma\Delta$ μήκει. τῷ δὲ
 20 ἀπὸ τῆς B ἴσον παρὰ τὴν $\Gamma\Delta$ παραβεβλήσθω χωρίον
 ὀρθογώνιον τὸ ΓZ πλάτος ποιῶν τὴν ΔZ . ἐπεὶ
 οὖν σύμμετρός ἐστιν ἡ A τῇ B , σύμμετρόν ἐστι καὶ
 τὸ ἀπὸ τῆς A τῷ ἀπὸ τῆς B . ἀλλὰ τῷ μὲν ἀπὸ
 τῆς A ἴσον ἐστὶ τὸ $E\Gamma$, τῷ δὲ ἀπὸ τῆς B ἴσον ἐστὶ
 25 τὸ ΓZ · σύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ $E\Gamma$ τῷ ΓZ . καὶ

2. ἐστὶν ἄρα FV. ἐστὶ] om. P. 3. τῷ] corr. ex τό V.
 ἐστὶ] om. V. 4. εἰσιν P. δυνάμει] eras. V, dein add. ὥς
 ἄρα δέδεικται. 5. συμμέτρων P, corr. m. 1. ἐστὶ] om.
 BFb. 6. εἰσι BVb. σύμμετρον F, sed corr. ἐστὶν P. 7.
 ΓB περιεχομένη V. 8. $\Gamma\Delta$] $\Delta\Gamma$ F. 9. ΓB] ΓA b. ἐστὶν]
 om. b. 11. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] om. BFb, comp. P. 12. κγ']


$EZ:EH = EZ^2:ZE \times EH$ [u. lemma], EZ^2 et $ZE \times EH$ incommensurabilia erunt [prop. XI]. uerum EZ^2 et ΓA^2 commensurabilia sunt (nam potentia rationales sunt); et $ZE \times EH$, $\Delta \Gamma \times \Gamma B$ commensurabilia sunt (nam quadrato A^2 aequalia sunt). itaque etiam ΓA^2 et $\Delta \Gamma \times \Gamma B$ incommensurabilia sunt [prop. XIII]. uerum $\Gamma A^2: \Delta \Gamma \times \Gamma B = \Delta \Gamma: \Gamma B$ [u. lemma]. itaque $\Delta \Gamma$, ΓB longitudine incommensurabiles sunt [prop. XI]. ergo ΓA rationalis est et rectae ΓB longitudine incommensurabilis; quod erat demonstrandum.

XXIII.

Recta mediae commensurabilis media est.

Sit media A , et rectae A commensurabilis sit B . dico, etiam B mediam esse.

ponatur enim rationalis ΓA , et quadrato A^2 aequale rectae ΓA adplicetur spatium rectangulum ΓE latitudinem faciens $E A$. itaque $E A$ rationalis est et rectae ΓA longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. quadrato autem B^2 aequale rectae ΓA adplicetur spatium rectangulum ΓZ latitudinem faciens $A Z$. iam quoniam A et B commensurabiles sunt, etiam A^2 et B^2 commensurabilia sunt. uerum $A^2 = E \Gamma$, $B^2 = \Gamma Z$. itaque $E \Gamma$, ΓZ commensurabilia sunt. et $E \Gamma: \Gamma Z = E A: A Z$ [VI, 1]. itaque $E A$, $A Z$ longitudine commen-



om. P. 14. $\xi\sigma\omega$ (alt.) om. BFb. 16. $\tau\omega$ $\tau\acute{o}$ F. 20. $\Delta \Gamma$ BVb. 21. ΓZ corr. ex EZ F. Z A P. $\xi\pi\acute{\iota}$ P, corr. m. rec. 22. $\xi\sigma\tau\iota$ postea ins. F, $\xi\sigma\tau\iota\upsilon$ P. 23. A corr. ex AB V, A $\xi\sigma\tau\iota$ F. 24. $\xi\sigma\tau\iota$ (alt.) om. Vb. 25. ΓZ (prius) Z in ras. m. 1 P.

ἐστὶν ὡς τὸ $ΕΓ$ πρὸς τὸ $ΓΖ$, οὕτως ἡ $ΕΔ$ πρὸς τὴν $ΔΖ$: σύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ $ΕΔ$ τῇ $ΔΖ$ μήκει. φητὴ δέ ἐστιν ἡ $ΕΔ$ καὶ ἀσύμμετρος τῇ $ΔΓ$ μήκει· φητὴ ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ $ΔΖ$ καὶ ἀσύμμετρος τῇ $ΔΓ$ μήκει· αἱ
 5 $ΓΔ$, $ΔΖ$ ὅρα φηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι.
 ἡ δὲ τὸ ὑπὸ φητῶν δυνάμει μόνον συμμέτρων δυνα-
 μένη μέση ἐστίν. ἡ ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν $ΓΔ$, $ΔΖ$ δυνα-
 μένη μέση ἐστίν· καὶ δύναται τὸ ὑπὸ τῶν $ΓΔ$, $ΔΖ$
 ἢ B · μέση ἄρα ἐστὶν ἡ B .

Πόρισμα.

10

Ἐκ δὴ τούτου φανερόν, ὅτι τὸ τῷ μέσῳ χωρίῳ
 σύμμετρον μέσον ἐστίν [δύνανται γὰρ αὐτὰ εὐθεῖαι,
 αἱ εἰσι δυνάμει σύμμετροι, ὧν ἡ ἑτέρα μέση· ὥστε καὶ
 ἡ λοιπὴ μέση ἐστίν].

15 Ὡσαύτως δὲ τοῖς ἐπὶ τῶν φητῶν εἰρημένοις καὶ
 ἐπὶ τῶν μέσων ἐξακολουθεῖ, τὴν τῇ μέσῃ μήκει σύμ-
 μετρον λέγεσθαι μέσην καὶ σύμμετρον αὐτῇ μὴ μόνον
 μήκει, ἀλλὰ καὶ δυνάμει, ἐπειδήπερ καθόλου αἱ μήκει
 σύμμετροι πάντως καὶ δυνάμει. ἐὰν δὲ τῇ μέσῃ σύμ-
 20 μετρός τις ᾗ δυνάμει, εἰ μὲν καὶ μήκει, λέγονται καὶ
 οὕτως μέσαι καὶ σύμμετροι μήκει καὶ δυνάμει, εἰ δὲ
 δυνάμει μόνον, λέγονται μέσαι δυνάμει μόνον σύμ-
 μετροι.

4. ἐστίν PB. 5. εἰσιν PB. 6. ἡ δὲ τῷ τὸ δὲ BFBv.
 Post συμμέτρων add. εὐθειῶν περιεχόμενον ὁρθογώνιον ἄλο-
 γόν ἐστι καὶ b, F mg. m. 1, V m. 2; deinde seq. αὐτὸ ἄλογόν
 ἐστὶ, καλεῖσθαι δὲ b, F mg. m. 1; ἡ δυναμένη αὐτὸ ἄλογός ἐστιν,
 καλεῖται δὲ μέση V m. 2. ἡ δυναμένη BFB, et V (del.
 punctis). 7. μέση] supra scr. F. μέση ἐστίν] punctis del. V.
 ἡ] m. 2 B. δυναμένη] δυνάμει ἡ b. 8. ἐστὶ Vb, comp. F.
 9. ἡ B] (prius) HB Bb. 12. ἐστὶ BV, comp. F. αὐτά]
 -τά in ras. V, αὐτῷ F, αὐτό αἱ B, αἱ add. m. 2 V. 13. εἰσιν

surabiles sunt [prop. XI]. uerum EA rationalis est et rectae AF longitudine incommensurabilis. itaque etiam AZ rationalis est [def. 3] et rectae AF longitudine incommensurabilis [prop. XIII]. itaque FA , AZ rationales sunt potentia tantum commensurabiles. recta autem quadrata aequalis spatio rectis potentia tantum commensurabilibus comprehenso media est [prop. XXI]. itaque recta quadrata spatio $FA \times AZ$ aequalis media est. et $B^2 = FA \times AZ$. ergo B media est.

Corollarium.

Hinc manifestum est, spatium spatio medio aequale medium esse.¹⁾

Lemma.

Congruenter iis, quae de rationalibus diximus [prop. XVIII coroll.], etiam in mediis sequitur, rectam mediae longitudine commensurabilem mediam uocari ei non modo longitudine, sed etiam potentia commensurabilem, quoniam omnino rectae longitudine commensurabiles semper etiam potentia commensurabiles sunt. sin recta mediae potentia commensurabilis est, si eadem longitudine est commensurabilis, sic quoque mediae et longitudine potentiaque commensurabiles uocantur, sin potentia tantum, mediae potentia tantum commensurabiles uocantur.

1) Sequentia lin. 12—14 obscura sunt et sine dubio subditina.

PB. 20. $\epsilon\lambda\ \mu\acute{\epsilon}\nu$ — 21. $\delta\epsilon\ \delta\upsilon\nu\acute{\alpha}\mu\epsilon\iota$] om. Fb; post $\sigma\acute{\upsilon}\mu\mu\epsilon\tau\epsilon\omicron\iota$ lin. 22 ea hab. V (punctis del., add. $\tau\omicron\ \delta\epsilon\ \xi\acute{\epsilon}\gamma\eta\varsigma\ \sigma\acute{\upsilon}\chi\ \epsilon\acute{\upsilon}\rho\acute{\epsilon}\theta\eta\ \acute{\epsilon}\nu\ \tau\omicron\ \beta\epsilon\beta\lambda\acute{\iota}\omega\ \tau\omicron\ \acute{\epsilon}\varphi\epsilon\sigma\acute{\iota}\omega\ \kappa\alpha\iota\ \acute{\epsilon}\pi\alpha\tau\acute{\eta}\theta\eta$?) et B mg. m. 2 (add. in fine $\mu\acute{\omicron}\nu\omicron\nu$). 22. $\mu\acute{\omicron}\nu\omicron\nu$] (prius) del. m. 2 B. $\sigma\acute{\upsilon}\mu\mu\epsilon\tau\epsilon\omicron\iota$] m. 2 B. Seq. lemma, u. app.

κδ'.

Τὸ ὑπὸ μέσων μήκει συμμετρων εὐθειῶν
κατὰ τινὰ τῶν εἰρημένων τρόπων περιεχό-
μενον ὀρθογώνιον μέσον ἐστίν.

- 5 Ἐπὶ γὰρ μέσων μήκει συμμετρων εὐθειῶν τῶν
 AB , $BΓ$ περιεχέσθω ὀρθογώνιον τὸ $ΑΓ$. λέγω, ὅτι τὸ
 $ΑΓ$ μέσον ἐστίν.

- Ἀναγεγράφθω γὰρ ἀπὸ τῆς AB τετράγωνον τὸ
 $ΑΔ$. μέσον ἄρα ἐστὶ τὸ $ΑΔ$. καὶ ἐπεὶ σύμμετρός
10 ἐστὶν ἡ AB τῇ $BΓ$ μήκει, ἴση δὲ ἡ AB τῇ $BΔ$,
σύμμετρος ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ $ΔB$ τῇ $BΓ$ μήκει· ὥστε καὶ
τὸ $ΔΑ$ τῷ $ΑΓ$ σύμμετρόν ἐστιν. μέσον δὲ τὸ $ΔΑ$.
μέσον ἄρα καὶ τὸ $ΑΓ$. ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

κε'.

- 15 Τὸ ὑπὸ μέσων δυνάμει μόνον συμμετρων
εὐθειῶν περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἥτοι φητὸν
ἢ μέσον ἐστίν.

- Ἐπὶ γὰρ μέσων δυνάμει μόνον συμμετρων εὐ-
θειῶν τῶν AB , $BΓ$ ὀρθογώνιον περιεχέσθω τὸ $ΑΓ$.
20 λέγω, ὅτι τὸ $ΑΓ$ ἥτοι φητὸν ἢ μέσον ἐστίν.

- Ἀναγεγράφθω γὰρ ἀπὸ τῶν AB , $BΓ$ τετράγωνα
τὰ $ΑΔ$, BE . μέσον ἄρα ἐστὶν ἐκάτερον τῶν $ΑΔ$, BE .
καὶ ἐκκείσθω φητὴ ἡ ZH , καὶ τῷ μὲν $ΑΔ$ ἴσον παρα-
τήν ZH παραβεβλήσθω ὀρθογώνιον παραλληλόγραμ-
25 μον τὸ $HΘ$ πλάτος ποιοῦν τὴν $ZΘ$, τῷ δὲ $ΑΓ$ ἴσον
παρατὴν $ΘΜ$ παραβεβλήσθω ὀρθογώνιον παραλλη-

8. κατὰ — τρόπων] om. B F b, supra scr. m. 2 V (κατὰ τινὰ
τῶν eras.). 6. περιεχέσθαι B, corr. m. 2. 9. $ΑΔ$] (prius)
inter A et $Δ$ ras. 1 litt. V. 11. ἐστίν PB. $ΔB$] e corr.
m. 2 V, $BΔ$ F. 12. ἐστὶ V, comp. F b. $ΔΑ$] e corr. m.
2 V. 16. εὐθειῶν] m. 2 V. 19. περιεχέσθω ὀρθογώνιον P.

XXIV.

Rectangulum rectis mediis comprehensum secundum aliquem modorum, quos diximus [u. lemma], commensurabilibus medium est.

Mediis enim AB , $B\Gamma$ longitudine commensurabilibus comprehendatur rectangulum $A\Gamma$. dico, $A\Gamma$ medium esse.



nam in AB quadratum describatur AA . itaque AA medium est. et quoniam AB , $B\Gamma$ longitudine commensurabiles sunt, et $AB = B\Delta$, etiam ΔB , $B\Gamma$ longitudine commensurabiles sunt. quare etiam ΔA , $A\Gamma$ commensurabilia sunt [VI, 1; prop. XI]. uerum ΔA medium est. ergo etiam $A\Gamma$ medium est [prop. XXIII Δ coroll.]; quod erat demonstrandum.



XXV.

Rectangulum rectis mediis potentia tantum commensurabilibus comprehensum aut rationale aut medium est.

Rectis enim mediis AB , $B\Gamma$ potentia tantum commensurabilibus comprehendatur rectangulum $A\Gamma$. dico, $A\Gamma$ aut rationale aut medium esse.



nam in AB , $B\Gamma$ quadrata describantur AA , BE . itaque utrumque AA , BE medium est. et ponatur rationalis ZH , et quadrato AA aequale rectae ZH adplicetur parallelogrammum rect-

$\pi\alpha\rho\acute{\iota}\chi\epsilon\sigma\theta\alpha\iota$ B, corr. m. 2. 20. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\nu$ η $\mu\acute{\epsilon}\sigma\sigma\alpha\nu$ V. 23.
 $Z E F$, corr. m. 2. $\tau\acute{\omega}$] corr. ex $\tau\acute{o}$ V. 25. $\tau\acute{\eta}\nu$] corr. ex
 $\tau\acute{o}$ m. 2. F

λόγραμμον τὸ MK πλάτος ποιοῦν τὴν ΘK , καὶ ἔτι
 τῷ BE ἴσον ὁμοίως παρὰ τὴν KN παραβεβλήσθω
 τὸ NA πλάτος ποιοῦν τὴν KA . ἐπ' εὐθείας ἄρα
 εἰσὶν αἱ $Z\Theta$, ΘK , KA . ἐπεὶ οὖν μέσον ἐστὶν ἐκά-
 5 τερον τῶν AA , BE , καὶ ἐστὶν ἴσον τὸ μὲν AA τῷ
 $H\Theta$, τὸ δὲ BE τῷ NA , μέσον ἄρα καὶ ἐκάτερον τῶν
 $H\Theta$, NA . καὶ παρὰ ῥητὴν τὴν ZH παραάκειται· ῥητὴ
 ἄρα ἐστὶν ἐκατέρω τῶν $Z\Theta$, KA καὶ ἀσύμμετρος τῇ
 ZH μήκει. καὶ ἐπεὶ σύμμετρόν ἐστι τὸ AA τῷ BE ,
 10 σύμμετρον ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ $H\Theta$ τῷ NA . καὶ ἐστὶν
 ὡς τὸ $H\Theta$ πρὸς τὸ NA , οὕτως ἡ $Z\Theta$ πρὸς τὴν KA .
 σύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ $Z\Theta$ τῇ KA μήκει. αἱ $Z\Theta$, KA
 ἄρα ῥηταὶ εἰσὶ μήκει σύμμετροι· ῥητὸν ἄρα ἐστὶ τὸ
 ὑπὸ τῶν $Z\Theta$, KA . καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ μὲν AB τῇ
 15 BA , ἡ δὲ AB τῇ $B\Gamma$, ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ AB πρὸς τὴν
 $B\Gamma$, οὕτως ἡ AB πρὸς τὴν $B\Xi$. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ AB
 πρὸς τὴν $B\Gamma$, οὕτως τὸ AA πρὸς τὸ AG . ὡς δὲ ἡ
 AB πρὸς τὴν $B\Xi$, οὕτως τὸ AG πρὸς τὸ $ΓΞ$. ἐστὶν
 ἄρα ὡς τὸ AA πρὸς τὸ AG , οὕτως τὸ AG πρὸς τὸ
 20 $ΓΞ$. ἴσον δὲ ἐστὶ τὸ μὲν AA τῷ $H\Theta$, τὸ δὲ AG
 τῷ MK , τὸ δὲ $ΓΞ$ τῷ NA . ἐστὶν ἄρα ὡς τὸ $H\Theta$
 πρὸς τὸ MK , οὕτως τὸ MK πρὸς τὸ NA . ἐστὶν ἄρα
 καὶ ὡς ἡ $Z\Theta$ πρὸς τὴν ΘK , οὕτως ἡ ΘK πρὸς τὴν
 KA . τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν $Z\Theta$, KA ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς
 25 ΘK . ῥητὸν δὲ τὸ ὑπὸ τῶν $Z\Theta$, KA . ῥητὸν ἄρα ἐστὶ
 καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΘK . ῥητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ ΘK . καὶ εἰ
 μὲν σύμμετρος ἐστὶ τῇ ZH μήκει, ῥητὸν ἐστὶ τὸ ΘN .

2. ἴσον — KN] mg. m. 1 F, in textu ἄλλω παρὰ τὴν
 KN . 4. αἱ] corr. ex ταί F m. 1, supra m. 2 P. 6. NA]
 N e corr. V. ἄρα ἐστὶ V. 7. NA] MA b et F (M in ras.).
 Ante ῥητὴ ras. 5 litt. V. 8. ἐστὶν] ἐστὶ καὶ V. 9. καὶ ἐπεὶ]
 ἐπεὶ οὖν Theon (BFVb). 10. ἐστὶν P. τό] m. 2 F. ΘH F.

angulum $H\Theta$ latitudinem faciens $Z\Theta$, rectangulo autem $A\Gamma$ aequale rectae ΘM adplicetur parallelogrammum rectangulum MK latitudinem faciens ΘK , et praeterea quadrato BE aequale similiter rectae KN adplicetur NA latitudinem faciens KA . itaque $Z\Theta$, ΘK , KA in eadem recta sunt. iam quoniam utrumque AA , BE medium est, et $AA = H\Theta$, $BE = NA$, etiam utrumque $H\Theta$, NA medium est. et rationali ZH adplicata sunt. itaque utraque $Z\Theta$, KA rationalis est et rectae ZH longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. et quoniam AA , BE commensurabilia sunt, etiam $H\Theta$, NA commensurabilia sunt. et $H\Theta : NA = Z\Theta : KA$ [VI, 1]. itaque $Z\Theta$, KA longitudine commensurabiles sunt [prop. XI]. itaque $Z\Theta$, KA rationales sunt longitudine commensurabiles. itaque $Z\Theta \times KA$ rationale est [prop. XIX]. et quoniam $AB = BA$, $\Xi B = B\Gamma$, erit $AB : B\Gamma = AB : B\Xi$. uerum $AB : B\Gamma = AA : A\Gamma$ [VI, 1], et $AB : B\Xi = A\Gamma : \Gamma\Xi$ [VI, 1]. quare $AA : A\Gamma = A\Gamma : \Gamma\Xi$. uerum $AA = H\Theta$, $A\Gamma = MK$, $\Gamma\Xi = NA$. ergo $H\Theta : MK = MK : NA$. quare etiam $Z\Theta : \Theta K = \Theta K : KA$ [VI, 1]. itaque $Z\Theta \times KA = \Theta K^2$ [VI, 17]. uerum $Z\Theta \times KA$ rationale est. quare etiam ΘK^2 rationale est. itaque ΘK rationalis est. et si rectae ZH longitudine commensurabilis est, ΘN rationale est [prop. XIX]; sin

$\kappa\alpha\iota$] om. FV. Post $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\nu$ add. $\acute{\alpha}\rho\alpha \kappa\alpha\iota$ V. 11. $\Theta H F$. $\tau\acute{o}\nu$ P, sed corr. AN e corr. m. 2 V. $\tau\eta\eta$] om. Bb. 13. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\nu$ P. 14. ΔB] e corr. Vb. 15. ΞB] corr. ex ZB V. ΔB] $B\Delta$ F. 16. $B\Xi$] corr. ex BZ P. 17. $\tau\eta\eta$] corr. in $\tau\acute{o}$ F, $\tau\acute{o}$ b. 18. ΞB B. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\nu$ — 20. $\Gamma\Xi$] mg. m. 2 B. 19. ΔA] in ras. V. $A\Gamma$] (alt.) ΓA F. 20. $\Gamma\Xi$] in ras. V. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\nu$ P. 24. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\nu$ P. 25. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\nu$ PB. 27. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ P. Post $\tau\eta$ add. $\Theta M \tau\omicron\upsilon\tau\epsilon\sigma\tau\iota \tau\eta$ V, B. m. 2 (del. m. rec.). ΘN] e corr. m. 2 V.

εἰ δὲ ἀσύμμετρός ἐστι τῇ ZH μήκει, αὖ $K\Theta$, ΘM ῥηταί
 εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· μέσον ἄρα τὸ ΘN . τὸ
 ΘN ἄρα ἦτοι ῥητὸν ἢ μέσον ἐστίν. ἴσον δὲ τὸ ΘN
 τῷ $ΑΓ$ · τὸ $ΑΓ$ ἄρα ἦτοι ῥητὸν ἢ μέσον ἐστίν.
 5 Τὸ ἄρα ὑπὸ μέσων δυνάμει μόνον συμμέτρων, καὶ
 τὰ ἐξῆς.

κς'.

Μέσον μέσον οὐχ ὑπερέχει ῥητῶ.

Εἰ γὰρ δυνατόν, μέσον τὸ AB μέσον τοῦ $ΑΓ$
 10 ὑπερέχτω ῥητῶ τῷ AB , καὶ ἐκκείσθω ῥητὴ ἡ EZ ,
 καὶ τῷ AB ἴσον παρὰ τὴν EZ παραβελήσθω παρ-
 αλληλόγραμμον ὀρθογώνιον τὸ $Z\Theta$ πλάτος ποιούν
 τὴν $E\Theta$, τῷ δὲ $ΑΓ$ ἴσον ἀφηγήσθω τὸ ZH · λοιπὸν
 ἄρα τὸ $BΔ$ λοιπῷ τῷ $K\Theta$ ἐστὶν ἴσον. ῥητὸν δὲ ἐστὶ
 15 τὸ AB · ῥητὸν ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ $K\Theta$. ἐπεὶ οὖν μέσον
 ἐστὶν ἑκάτερον τῶν AB , $ΑΓ$, καὶ ἐστὶ τὸ μὲν AB τῷ
 $Z\Theta$ ἴσον, τὸ δὲ $ΑΓ$ τῷ ZH , μέσον ἄρα καὶ ἑκάτερον
 τῶν $Z\Theta$, ZH . καὶ παρὰ ῥητὴν τὴν EZ παράκειται·
 ῥητὴ ἄρα ἐστὶν ἑκατέρα τῶν ΘE , EH καὶ ἀσύμμετρος
 20 τῇ EZ μήκει. καὶ ἐπεὶ ῥητὸν ἐστὶ τὸ AB καὶ ἐστὶν
 ἴσον τῷ $K\Theta$, ῥητὸν ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ $K\Theta$. καὶ παρὰ
 ῥητὴν τὴν EZ παράκειται· ῥητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ $H\Theta$ καὶ
 σύμμετρος τῇ EZ μήκει. ἀλλὰ καὶ ἡ EH ῥητὴ ἐστὶ

1. $K\Theta$] corr. in ΘK m. 2 V. ΘN B, ΘM ἄρα P. 2.
 εἰσιν PB. ΘN] in ras. V. 3. ἦτοι] om. Fb. ἐστὶν ἢ
 μέσον V. 4. ἐστὶ BV, comp. Fb. 5. τὸ ἄρα] τῶν δὲ F.
 μόνων F. καὶ τὰ ἐξῆς] εὐθειῶν περιεχόμενον ὀρθογώνιον
 ἦτοι ῥητὸν ἢ μέσον ἐστίν: ~ P. 6. Post ἐξῆς add. ὅπερ ἔδει
 δεῖξαι V. 7. καὶ P, corr. m. rec. 10. ὑπερέχει F, sed corr.
 11. τῷ] τῷ μὲν B, τὸ μὲν b. 14. ΘK F. 15. AB] in
 ras. V. ἐστὶν P. ΘK b. 16. ἐστὶ] ἐστὶν B. 17. καὶ]
 om. b. 18. παράκειται V. 21. ἐστὶ] ἐστίν P. 22. Post
 καὶ ras. 1 litt. V.

rectae ZH longitudine incommensurabilis est, $K\Theta$, ΘM rationales sunt potentia tantum commensurabiles; quare ΘN medium est [prop. XXI]. ΘN igitur aut rationale aut medium est. uerum $\Theta N = A\Gamma$. $A\Gamma$ igitur aut rationale est aut medium.

Ergo rectangulum mediis potentia tantum commensurabilibus, et quae sequuntur.

XXVI.

Spatium medium non excedit medium spatio rationali.

Si enim fieri potest, medium AB excedat medium $A\Gamma$ rationali $\angle B$, et ponatur rationalis EZ , et spatio AB aequale rectae EZ adplicetur parallelogrammum rectangulum $Z\Theta$ latitudinem faciens $E\Theta$, spatio autem $A\Gamma$ aequale subtrahatur ZH . itaque relinquitur $BA = K\Theta$. uerum $\angle B$ rationale est. itaque etiam $K\Theta$ rationale est. iam quoniam utrumque AB , $A\Gamma$ medium est, et $AB = Z\Theta$, $A\Gamma = ZH$, etiam utrumque $Z\Theta$, ZH medium est. et rectae rationali EZ adplicata sunt. ergo utraque ΘE , EH rationalis est et rectae EZ longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. et quoniam $\angle B$ rationale est et spatio $K\Theta$ aequale, etiam $K\Theta$ rationale est.¹⁾ et rectae rationali EZ adplicatum est; itaque $H\Theta$ rationalis est et rectae EZ longitudine commensurabilis [prop. XX]. uerum etiam

1) Uerba $\tau\acute{o}$ $\angle B$ lin. 20 — $\acute{\epsilon}\sigma\tau\acute{\iota}$ $\kappa\alpha\acute{\iota}$ lin. 21 post lin. 14—15 superuacua sunt et fortasse interpolata. uerba $\xi\eta\rho\acute{o}\nu$ $\delta\acute{\epsilon}$ lin. 14 — $\tau\acute{o}$ $K\Theta$ lin. 15 damnauit August.

καὶ ἀσύμμετρος τῇ EZ μήκει· ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν
 ἢ EH τῇ $H\Theta$ μήκει. καὶ ἐστὶν ὡς ἡ EH πρὸς τὴν
 $H\Theta$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς EH πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν EH ,
 $H\Theta$ · ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς EH τῷ ὑπὸ
 5 τῶν EH , $H\Theta$. ἀλλὰ τῷ μὲν ἀπὸ τῆς EH σύμμετρά
 ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν EH , $H\Theta$ τετράγωνα· ῥητὰ γὰρ ἀμ-
 φότερα· τῷ δὲ ὑπὸ τῶν EH , $H\Theta$ σύμμετρόν ἐστι τὸ
 δις ὑπὸ τῶν EH , $H\Theta$ · διπλάσιον γὰρ ἐστὶν αὐτοῦ·
 ἀσύμμετρα ἄρα ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν EH , $H\Theta$ τῷ δις ὑπὸ
 10 τῶν EH , $H\Theta$ · καὶ συναμφότερα ἄρα τὰ ἀπὸ τῶν
 EH , $H\Theta$ καὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν EH , $H\Theta$, ὅπερ ἐστὶ τὸ
 ἀπὸ τῆς $E\Theta$, ἀσύμμετρόν ἐστι τοῖς ἀπὸ τῶν EH , $H\Theta$.
 ῥητὰ δὲ τὰ ἀπὸ τῶν EH , $H\Theta$ · ἄλογον ἄρα τὸ ἀπὸ
 τῆς $E\Theta$. ἄλογος ἄρα ἐστὶν ἡ $E\Theta$. ἀλλὰ καὶ ῥητὴ·
 15 ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον.

Μέσον ἄρα μέσου οὐχ ὑπερέχει ῥητῷ· ὅπερ ἔδει
 δεῖξαι.

κζ'.

Μέσας εὐρεῖν δυνάμει μόνον συμμέτρους
 20 ῥητὸν περιεχούσας.

Ἐκκείσθωσαν δύο ῥηταὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι
 αὐ A , B , καὶ εἰλήφθω τῶν A , B μέση ἀνάλογον ἡ Γ ,
 καὶ γεγονέτω ὡς ἡ A πρὸς τὴν B , οὕτως ἡ Γ πρὸς
 τὴν Δ .

25 Καὶ ἐπεὶ αὐ A , B ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμ-
 μετροι, τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν A , B , τουτέστι τὸ ἀπὸ τῆς Γ ,
 μέσον ἐστίν. μέση ἄρα ἡ Γ . καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ A
 πρὸς τὴν B , [οὕτως] ἡ Γ πρὸς τὴν Δ , αὐ δὲ A , B

4. ἀσύμμετρον b. τό] e corr. b. 7. τό] corr. ex τῷ B.

8. τῶν om. BF. 9. ἐστίν P. 10. τῶν] (prius) om. B. 11.
 τῶν] m. 2 F, om. B. ἐστίν PB. τὸ ἀπὸ] in ras. m. 1 P,

EH rationalis est et rectae EZ longitudine incommensurabilis. quare EH , $H\Theta$ longitudine incommensurabiles sunt [prop. XIII]. et $EH:H\Theta=EH^2:EH\times H\Theta$ [prop. XXI lemma]. quare EH^2 , $EH\times H\Theta$ incommensurabilia sunt [prop. XI]. uerum quadrato EH^2 commensurabilia sunt $EH^2+H\Theta^2$ (nam utrumque rationale est); et spatio $EH\times H\Theta$ commensurabile est $2EH\times H\Theta$ [prop. VI]; nam eo duplo maius est. itaque $EH^2+H\Theta^2$ et $2EH\times H\Theta$ incommensurabilia sunt [prop. XIII]. itaque etiam $EH^2+H\Theta^2+2EH\times H\Theta$, hoc est $E\Theta^2$ [II, 4], quadratis $EH^2+H\Theta^2$ incommensurabile est [prop. XVI]. uerum $EH^2+H\Theta^2$ rationalia sunt. quare $E\Theta^2$ irrationale est [def. 4]. itaque $E\Theta$ irrationalis est [id.]. uerum eadem rationalis est; quod fieri non potest.

Ergo spatium medium non excedit medium spatium rationali; quod erat demonstrandum.

XXVII.

Medias inuenire potentia tantum commensurabiles spatium rationale comprehendentes.

Ponantur duae rationales potentia tantum commensurabiles A , B , et sumatur earum media proportionalis Γ [VI, 13], et fiat $A:B=\Gamma:A$ [VI, 12]. et quoniam A , B rationales sunt potentia tantum commensurabiles, $A\times B$ medium erit [prop. XXI], hoc est Γ^2 [VI, 17].

τὰ ἀπό b. 13. ῥητά — $H\Theta$] mg. m. 1 P. Seq. ras. 1 litt. V.
 14. ἄλογον b. 15. ἀδύνατον] -ατον in ras. V. 16. μέσον
 — 17. δεῖξαι] om. Bf b; μέσον ἄρα μέσον in ras. m. 2 V;
 μέσον ἄρα μέσον οὐχ ὑπερέχει m. 2 B, καὶ τὰ ἐξῆς add. m.
 rec. 16. ὅπερ εἶδει δεῖξαι] comp. P. 18. κς' P, corr. m.
 rec. 25. εἶσιν PB. 26. τούτεστιν P. 27. ἐστίν] comp. Fb,
 ἐστὶ PBV. 28. οὕτως] om. P.

δυνάμει μόνον [εἰσὶ] σύμμετροι, καὶ αἱ Γ, Δ ἄρα δυνάμει μόνον εἰσὶ σύμμετροι. καὶ ἐστὶ μέση ἡ Γ· μέση ἄρα καὶ ἡ Δ. αἱ Γ, Δ ἄρα μέσαι εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι. λέγω, ὅτι καὶ ρητὸν περιέχουσιν.
 5 ἐπεὶ γάρ ἐστιν ὥς ἡ Α πρὸς τὴν Β, οὕτως ἡ Γ πρὸς τὴν Δ, ἐναλλάξ ἄρα ἐστὶν ὥς ἡ Α πρὸς τὴν Γ, ἡ Β πρὸς τὴν Δ. ἀλλ' ὥς ἡ Α πρὸς τὴν Γ, ἡ Γ πρὸς τὴν Β· καὶ ὥς ἄρα ἡ Γ πρὸς τὴν Β, οὕτως ἡ Β πρὸς τὴν Δ· το ἄρα ὑπὸ τῶν Γ, Δ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς Β. ρη-
 10 τὸν δὲ τὸ ἀπὸ τῆς Β· ρητὸν ἄρα [ἐστὶ] καὶ τὸ ὑπὸ τῶν Γ, Δ.

Εὐρηνται ἄρα μέσαι δυνάμει μόνον σύμμετροι ρητὸν περιέχουσαι· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

κη'.

15 Μέσας εὐρεῖν δυνάμει μόνον συμμέτρους μέσον περιεχούσας.

Ἐκκείσθωσαν [τρεῖς] ρηταὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι αἱ Α, Β, Γ, καὶ εἰλήφθω τῶν Α, Β μέση ἀνάλογον ἡ Δ, καὶ γερονέτω ὥς ἡ Β πρὸς τὴν Γ, ἡ Δ πρὸς
 20 τὴν Ε.

Ἐπεὶ αἱ Α, Β ρηταὶ εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι, τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν Α, Β, τουτέστι τὸ ἀπὸ τῆς Δ, μέσον ἐστίν. μέση ἄρα ἡ Δ. καὶ ἐπεὶ αἱ Β, Γ δυνάμει μόνον εἰσὶ σύμμετροι, καὶ ἐστὶν ὥς ἡ Β πρὸς τὴν Γ,

1. εἰσὶ] om. BFVb. καὶ — 2. σύμμετροι] om. B. 2. ἐστὶν B. 3. εἰσὶν B. 4. καὶ λέγω δὴ F, λέγω δὴ Vb. 10. ἐστὶ] om. BFVb. ὑπό] bis b. 12. ἡρηνται FVb. 13. ρητὸν — δεῖξαι] καὶ τὰ ἐξῆς P. Seq. lemma, v. app. 14. κ' P, corr. m. rec. 17. Ante τρεῖς add. γάρ b, m. 2 FV. τρεῖς] om. P, τρεῖς εὐθεῖαι F. ἀσύμμετροι b. 19. Γ οὕτως V. 21. οὐν αἱ F. εἰσιν B, corr. m. 2. 22. τουτέστι P. 23.

itaque Γ media est [prop. XXI]. et quoniam est $A:B = \Gamma:\Delta$, et A, B potentia tantum commensurabiles sunt, etiam Γ, Δ potentia tantum commensurabiles sunt [prop. XI]. et Γ media est. itaque etiam Δ media est [prop. XXIII]. Γ, Δ igitur mediae sunt potentia tantum commensurabiles. dico, easdem spatium rationale comprehendere. nam quoniam est $A:B = \Gamma:\Delta$, permutando [V, 16] est $A:\Gamma = B:\Delta$. uerum $A:\Gamma = \Gamma:B$. quare etiam $\Gamma:B = B:\Delta$ [V, 11]. itaque $\Gamma \times \Delta = B^2$ [VI, 17]. B^2 autem rationale est. itaque etiam $\Gamma \times \Delta$ rationale est.

Ergo inuentae sunt mediae potentia tantum commensurabiles spatium rationale comprehendentes; quod erat demonstrandum.

XXVIII.

Medias inuenire potentia tantum commensurabiles spatium medium comprehendentes [cfr. prop. XXV].

Ponantur rationales potentia tantum commensurabiles A, B, Γ , et sumatur rectorum A, B media proportionalis Δ [VI, 13], et fiat $B:\Gamma = \Delta:E$ [VI, 12].

quoniam A, B rationales sunt potentia tantum commensurabiles, $A \times B$ medium est [prop. XXI], hoc est Δ^2 [VI, 17]. itaque Δ media est [prop. XXI]. et

XXVIII. Cfr. Proclus p. 205, 10.

ἐστὶ BVb, comp. F. Γ, B, B . 24. Post *σύμμετροι* rep. τὸ *ἄρα* lin. 22 — Δ lin. 23 B, del. m. 2. 24. *τῇ* om. b. Γ οὕτως V.

ἡ Δ πρὸς τὴν E , καὶ αἱ Δ , E ἄρα δυνάμει μόνον εἰσὶ
 σύμμετροι. μέση δὲ ἡ Δ . μέση ἄρα καὶ ἡ E . αἱ Δ , E
 ἄρα μέσαι εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι. λέγω δὴ,
 ὅτι καὶ μέσον περιέχουσιν. ἐπεὶ γάρ ἐστιν ὡς ἡ B
 5 πρὸς τὴν Γ , ἡ Δ πρὸς τὴν E , ἐναλλάξ ἄρα ὡς ἡ B
 πρὸς τὴν Δ , ἡ Γ πρὸς τὴν E . ὡς δὲ ἡ B πρὸς τὴν
 Δ , ἡ Δ πρὸς τὴν A . καὶ ὡς ἄρα ἡ Δ πρὸς τὴν A ,
 ἡ Γ πρὸς τὴν E . τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν A , Γ ἴσον ἐστὶ τῷ
 ὑπὸ τῶν Δ , E . μέσον δὲ τὸ ὑπὸ τῶν A , Γ . μέσον
 10 ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ τῶν Δ , E .

Εὐρηγνται ἄρα μέσαι δυνάμει μόνον σύμμετροι μέ-
 σον περιέχουσαι· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

Λήμμα.

Εὐρεῖν δύο τετραγώνους ἀριθμούς, ὥστε καὶ τὸν
 15 συγκείμενον ἐξ αὐτῶν εἶναι τετράγωνον.

Ἐκκείσθωσαν δύο ἀριθμοὶ οἱ AB , $B\Gamma$, ἐστωσαν
 δὲ ἦτοι ἄρτιοι ἢ περιττοί. καὶ ἐπεὶ, ἐάν τε ἀπὸ ἀρ-
 τίου ἄρτιος ἀφαιρεθῇ, ἐάν τε ἀπὸ περισσοῦ περισσός,
 ὁ λοιπὸς ἄρτιός ἐστιν, ὁ λοιπὸς ἄρα ὁ $ΑΓ$ ἄρτιός
 20 ἐστίν. τετμήσθω ὁ $ΑΓ$ δίχα κατὰ τὸ Δ . ἐστωσαν
 δὲ καὶ οἱ AB , $B\Gamma$ ἦτοι ὁμοιοὶ ἐπίπεδοι ἢ τετράγωνοι,
 οἳ καὶ αὐτοὶ ὁμοιοὶ εἰσιν ἐπίπεδοι· ὁ ἄρα ἐκ τῶν AB ,
 $B\Gamma$ μετὰ τοῦ ἀπὸ [τοῦ] $\Gamma\Delta$ τετραγώνου ἴσος ἐστὶ τῷ
 ἀπὸ τοῦ $B\Delta$ τετραγώνῳ. καὶ ἐστὶ τετράγωνος ὁ ἐκ
 25 τῶν AB , $B\Gamma$, ἐπειδὴ περ ἐδείχθη, ὅτι, ἐάν δύο ὁμοιοὶ
 ἐπίπεδοι πολλαπλασιάσαντες ἀλλήλους ποιῶσί τινα, ὁ
 γενόμενος τετράγωνός ἐστιν. εὐρηγνται ἄρα δύο τετρά-

1. σύμμετροι δυνάμει μόνον εἰσὶ V. μόνον] om. P.
 εἰσίν P. 3. εἰσίν P. 5. οὕτως ἡ Δ V. 6. ἡ Γ — τὴν Δ]
 m. 2 B. 6. ὡς — 7. Δ (prius)] mg. m. 1 F. 8. οὕτως ἡ

quoniam B, Γ potentia tantum commensurabiles sunt, et est $B:\Gamma = \Delta:E$, etiam Δ, E potentia tantum commensurabiles sunt [prop. XI]. uerum Δ media est; itaque etiam E media est [prop. XXIII]. quare Δ, E mediae sunt potentia tantum commensurabiles.

iam dico, easdem spatium medium comprehendere. nam quoniam est $B:\Gamma = \Delta:E$, permutando [V, 16] erit $B:\Delta = \Gamma:E$. uerum $B:\Delta = \Delta:A$. itaque etiam $\Delta:A = \Gamma:E$. quare $A \times \Gamma = \Delta \times E$ [VI, 16]. sed $A \times \Gamma$ medium est. itaque etiam $\Delta \times E$ medium est.

Ergo inuentae sunt mediae potentia tantum commensurabiles medium comprehendentes; quod erat demonstrandum.

Lemma I.

Inuenire duos numeros quadratos eiusmodi, ut etiam numerus ex iis compositus quadratus sit.

ponantur duo numeri $AB, B\Gamma$, et aut pares sint aut impares. et quoniam, siue a numero pari par subtrahitur, siue ab impari impar, reliquus par est [IX, 24, 26], reliquus $A\Gamma$ par est. in duas partes aequales secetur $A\Gamma$ in Δ . sint autem $AB, B\Gamma$ etiam aut similes plani aut quadrati, qui et ipsi similes sunt plani. itaque $AB \times B\Gamma + \Gamma\Delta^2 = B\Delta^2$ [II, 6]. et $AB \times B\Gamma$ quadratus est, quoniam de-

Γ F. 11. ἡὕρηται Vb. μέσαι] om. V. μέσον — 12. δείξαι] καὶ τὰ ἐξῆς P. 12. ὅπερ — δείξαι] om. B F b. 14. ἀριθμούς] m. 2 F. 16. Ante of add. ὅμοιοι ἐπίπεδοι mg. m. 2 B. 17. δὴ V. ἐπεὶ] supra scr. m. 1 F. τε] om. V. 18. περιττοῦ περιττός V et b, sed corr. m. 1. 20. ἐστὶ BV, comp. Fb. ΓA P. 22. οἷ] ἡ b. ἐκ] ὑπὸ V, corr. ex ἀπὸ m. 1 b. 23. τοῦ $\Gamma\Delta$] $\Gamma\Delta$ B (corr. m. rec.) et b, τῆς $\Gamma\Delta$ P. 24. ΔB P. τετραγώνον P, corr. m. 1. ἐστὶν B. 25. ἐδείχθη] om. b. 26. ποιῶσιν B. 27. ἡὕρηται F V b.

γωνοὶ ἀριθμοὶ ὃ τε ἐκ τῶν AB , $BΓ$ καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ $ΓΔ$, οἱ συντεθέντες ποιοῦσι τὸν ἀπὸ τοῦ $BΔ$ τετράγωνον.

Καὶ φανερόν, ὅτι εὗρηται πάλιν δύο τετράγωνοι
 5 ὃ τε ἀπὸ τοῦ $BΔ$ καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ $ΓΔ$, ὥστε τὴν ὑπερ-
 οχλὴν αὐτῶν τὸν ὑπὸ AB , $BΓ$ εἶναι τετράγωνον, ὅταν
 οἱ AB , $BΓ$ ὁμοιοὶ ὥσιν ἐπίπεδοι. ὅταν δὲ μὴ ὥσιν
 ὁμοιοὶ ἐπίπεδοι, εὗρηται δύο τετράγωνοι ὃ τε ἀπὸ
 τοῦ $BΔ$ καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ $ΔΓ$, ὧν ἡ ὑπεροχὴ ὁ ὑπὸ
 10 τῶν AB , $BΓ$ οὐκ ἔστι τετράγωνος· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

Λήμμα.

Εἶρεῖν δύο τετραγώνους ἀριθμούς, ὥστε τὸν ἐξ
 αὐτῶν συγκείμενον μὴ εἶναι τετράγωνον.

Ἔστω γὰρ ὁ ἐκ τῶν AB , $BΓ$, ὡς ἔφαμεν, τετρά-
 15 γωνος, καὶ ἄρτιος ὁ $ΓΔ$, καὶ τετμήσθω ὁ $ΓΔ$ διχα
 τῷ $Δ$. φανερόν δὴ, ὅτι ὁ ἐκ τῶν AB , $BΓ$ τετράγωνος
 μετὰ τοῦ ἀπὸ [τοῦ] $ΓΔ$ τετραγώνου ἴσος ἐστὶ τῷ ἀπὸ
 [τοῦ] $BΔ$ τετραγώνῳ. ἀφηρήσθω μονὰς ἡ $ΔΕ$. ὁ
 ἄρα ἐκ τῶν AB , $BΓ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ [τοῦ] $ΓΕ$ ἐλάσσων
 20 ἐστὶ τοῦ ἀπὸ [τοῦ] $BΔ$ τετραγώνου. λέγω οὖν, ὅτι
 ὁ ἐκ τῶν AB , $BΓ$ τετράγωνος μετὰ τοῦ ἀπὸ [τοῦ] $ΓΕ$
 οὐκ ἔσται τετράγωνος.

Εἰ γὰρ ἔσται τετράγωνος, ἦτοι ἴσος ἐστὶ τῷ ἀπὸ
 [τοῦ] $ΒΕ$ ἢ ἐλάσσων τοῦ ἀπὸ [τοῦ] $ΒΕ$, οὐκ ἐτι δὲ

2. ποιῶσι V, sed corr. $BΔ$] supra scr. m. 1 F. τε-
 τραγώνου F, sed corr. 4. Mg. add. Ξ Bb, m. 2 PFV. πάλιν
 ἠύρηται F. ἠύρηται Vb. τετράγωνον P, corr. m. 1.
 5. ὁ] (alt.) om. P. 6. τόν] τήν FV. ὑπὸ τῶν V. AB] B ins. m. 2 P. τετράγωνον εἶναι B. 8. ἠύρηται Vb, et
 corr. ex εὗρηται m. 2 F. 9. ὁ] om. P. $ΓΔ$ BFV. ἡ]
 om. b. 10. AB] Δ P. Ante ὅπερ add. ὁ ἄρα P. ὅπερ

monstrauimus, si duo numeri plani similes inter se multiplicantes numerum aliquem efficiant, numerum inde productum quadratum esse [IX, 1]. ergo inuenti sunt duo numeri quadrati $AB \times B\Gamma$ et $\Gamma\Delta^2$, qui compositi quadratum $B\Delta$ efficiant. et manifestum est, rursus inuentos esse duos numeros quadratos $B\Delta^2$ et $\Gamma\Delta^2$ eius modi, ut eorum differentia $AB \times B\Gamma$ quadrata sit, si AB , $B\Gamma$ plani sint similes. sin non sunt similes plani, duo numeri quadrati inuenti sunt $B\Delta^2$ et $\Delta\Gamma^2$, quorum differentia $AB \times B\Gamma$ quadrata non sit; quod erat demonstrandum.

Lemma II.

Inuenire duos numeros quadratos eius modi, ut numerus ex iis compositus quadratus non sit.

$\begin{array}{c} A \\ | \\ H \\ | \\ \Theta \\ | \\ \Delta \\ | \\ E \\ | \\ Z \\ | \\ \Gamma \\ | \\ B \end{array}$ Sit enim $AB \times B\Gamma$ quadratus, uti diximus [lemma I], et $\Gamma\Delta$ par sit et in Δ in duas partes aequales secetur. manifestum igitur, esse $AB \times B\Gamma + \Gamma\Delta^2 = B\Delta^2$ [u. lemma I]. subtrahatur unitas ΔE . itaque $AB \times B\Gamma + \Gamma E^2 < B\Delta^2$. dico igitur, numerum quadratum [IX, 1] $AB \times B\Gamma$ addito ΓE^2 quadratum non esse.

Nam si quadratus erit, aut aequalis est quadrato BE^2 aut minor quadrato BE^2 , maior autem non est,

$\xi\delta\epsilon\iota\ \delta\epsilon\iota\chi\alpha\iota$] om. B F V b, comp. P. 16. $\tau\omega$] $\kappa\alpha\tau\grave{\alpha}\ \tau\omega$ F. δ] om. P. 17. $\tau\omega$] (alt.) $\tau\eta\varsigma$ P. 18. $\tau\omega$] om. B F b, $\tau\eta\varsigma$ P, B m. 2. $\delta\mu\acute{o}\iota\omega\varsigma\ \mu\omicron\nu\acute{\alpha}\varsigma$ P. 19. $\acute{\epsilon}\kappa$] $\acute{\alpha}\pi\acute{o}$ b. $\tau\omega\upsilon$] $\tau\omega$ P. $B\Gamma$ $\tau\epsilon\tau\rho\acute{\alpha}\gamma\omega\nu\omicron\varsigma$ V. $\tau\omega$] (alt.) om. B F b, $\tau\eta\varsigma$ P, B m. 2. $\acute{\epsilon}\lambda\acute{\alpha}\sigma\sigma\omega\nu\ \acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\ \tau\omega$] in ras. m. 1 b. 20. $\tau\omega$] om. B F b, $\tau\eta\varsigma$ P, m. 2 B. 21. δ] om. b. $\tau\omega$] (alt.) om. B F b, $\tau\eta\varsigma$ P. 22. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ P. 23. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\alpha\iota$] $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ B F b. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\nu$ B, sed corr. 24. $\tau\omega$] om. B b, $\tau\eta\varsigma$ P. $\acute{\epsilon}\lambda\acute{\alpha}\sigma\sigma\omega\nu$] $\chi\omega\nu$ F, $\acute{\epsilon}\lambda\alpha\sigma\sigma\omega\nu\ \delta\nu$ b; $\acute{\epsilon}\lambda\acute{\alpha}\sigma\sigma\omega\nu$ B, seq. ras. 1 litt., $\acute{\epsilon}\lambda\acute{\alpha}\sigma\sigma\omega\nu$ m. rec. $\tau\omega$ — BE] om. V. $\tau\omega$] om. B F b. $\delta\upsilon\kappa$ $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ b.

καὶ μείζων, ἵνα μὴ τμηθῇ ἡ μονάς. ἔστω, εἰ δυνατόν, πρότερον ὁ ἐκ τῶν AB , $BΓ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $ΓΕ$ ἴσος τῷ ἀπὸ $ΒΕ$, καὶ ἔστω τῆς $ΔΕ$ μονάδος διπλασίων ὁ $ΗΑ$. ἐπεὶ οὖν ὅλος ὁ $ΑΓ$ ὅλου τοῦ $ΓΔ$
 5 ἔστι διπλασίων, ὧν ὁ $ΑΗ$ τοῦ $ΔΕ$ ἔστι διπλασίων, καὶ λοιπὸς ἄρα ὁ $ΗΓ$ λοιποῦ τοῦ $ΕΓ$ ἔστι διπλασίων· διχα ἄρα τέτμηται ὁ $ΗΓ$ τῷ $Ε$. ὁ ἄρα ἐκ τῶν $ΗΒ$, $BΓ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $ΓΕ$ ἴσος ἐστὶ τῷ ἀπὸ $ΒΕ$ τετραγώνῳ. ἀλλὰ καὶ ὁ ἐκ τῶν $ΑΒ$, $BΓ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ
 10 $ΓΕ$ ἴσος ὑπόκειται τῷ ἀπὸ [τοῦ] $ΒΕ$ τετραγώνῳ· ὁ ἄρα ἐκ τῶν $ΗΒ$, $BΓ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $ΓΕ$ ἴσος ἐστὶ τῷ ἐκ τῶν $ΑΒ$, $BΓ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $ΓΕ$. καὶ κοινοῦ ἀφαιρεθέντος τοῦ ἀπὸ $ΓΕ$ συνάγεται ὁ $ΑΒ$ ἴσος τῷ $ΗΒ$ · ὅπερ ἄτοπον. οὐκ ἄρα ὁ ἐκ τῶν $ΑΒ$, $BΓ$ μετὰ τοῦ
 15 ἀπὸ [τοῦ] $ΓΕ$ ἴσος ἐστὶ τῷ ἀπὸ $ΒΕ$. λέγω δὴ, ὅτι οὐδὲ ἐλάσσων τοῦ ἀπὸ $ΒΕ$ εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω τῷ ἀπὸ $ΒΖ$ ἴσος, καὶ τοῦ $ΔΖ$ διπλασίων ὁ $ΘΑ$. καὶ συναχθήσεται πάλιν διπλασίων ὁ $ΘΓ$ τοῦ $ΓΖ$ · ὥστε καὶ τὸν $ΓΘ$ διχα τετμήσθαι κατὰ τὸ $Ζ$, καὶ διὰ τοῦτο
 20 τὸν ἐκ τῶν $ΘΒ$, $BΓ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $ΖΓ$ ἴσον γίνεσθαι τῷ ἀπὸ $ΒΖ$. ὑπόκειται δὲ καὶ ὁ ἐκ τῶν $ΑΒ$, $BΓ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $ΓΕ$ ἴσος τῷ ἀπὸ $ΒΖ$. ὥστε καὶ ὁ ἐκ τῶν $ΘΒ$, $BΓ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $ΓΖ$ ἴσος ἐστὶ τῷ ἐκ τῶν $ΑΒ$, $BΓ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $ΓΕ$ · ὅπερ ἄτοπον. οὐκ ἄρα ὁ ἐκ
 25 τῶν $ΑΒ$, $BΓ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $ΓΕ$ ἴσος ἐστὶ [τῷ] ἐλάσ-

1. μείζονι (ο et i corr.) B; γρ. μείζονι κρείττον ἐστι supra scr. m. 2 V. μῆ] μῆτε Theon (BFVb), P m. 2. Post μονάς add. Theon: μῆτε ὁ ἐκ τῶν $ΑΒ$, $BΓ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ (τοῦ add. V) $ΓΔ$, ὅς ἐστιν ὁ (om. b, mg. B) ἀπὸ (τοῦ add. PVb) $ΒΔ$ (e corr. m. 2 V, $ΔΒ$ PBb), ἴσος ἢ τῷ ἐκ (ὑπό BV) τῶν (om. PB) $ΑΒ$, $BΓ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ (τοῦ add. PV) $ΓΕ$ (BFVb, P m. 2). εἰ] corr. ex ἡ m. 2 P. 2. τῆς $ΓΕ$ P. 3. τῆς $ΒΕ$ P. τῆς $ΔΕ$ μονάδος] om. V. διπλάσιος P. 4. $ΗΑ$

ne unitas diuidatur.¹⁾ prius, si fieri potest, sit $AB \times BG + GE^2 = BE^2$, et sit $HA = 2 AE$. iam quoniam $AG = 2 GA$, $AH = 2 AE$, erit etiam $HG = 2 EG$. itaque HG in E in duas partes aequales diuisus est. ergo $HB \times BG + GE^2 = BE^2$ [II, 6]. supposuimus autem, esse etiam $AB \times BG + GE^2 = BE^2$. quare $HB \times BG + GE^2 = AB \times BG + GE^2$. et subtracto, quod commune est, GE^2 concludimus, esse $AB = HB$; quod absurdum est. ergo $AB \times BG + GE^2$ quadrato BE^2 aequale non est. iam dico, ne minorem quidem esse quadrato BE^2 . nam si fieri potest, sit $AB \times BG + GE^2 = BZ^2$, et $\Theta A = 2 AZ$. et rursus concludemus, esse $\Theta G = 2 GZ$; quare etiam $\Gamma\Theta$ in Z in duas partes aequales diuisus est, et ea de causa $\Theta B \times BG + ZG^2 = BZ^2$ [II, 6]. supposuimus autem, esse etiam

1) Nam $AB \times BG + GE^2 < BZ^2$. sit latus x . ergo habebimus $BE^2 < x^2 < (BE + 1)^2$, h. e. $BE < x < BE + 1$, ita ut x fractio sit, quod fieri non potest.

της ΔE μονάδος V. 5. $\epsilon\sigma\tau\acute{\iota}\nu$ P. $\acute{\alpha}\nu \delta\epsilon$ P. διπλάσιος Bf b. 6. $\kappa\alpha\iota \delta$ Bf b. ΓH V. διπλάσιος Bf b. 7. Ante $\tau\acute{\omega}$ ins. $\acute{\alpha}\nu\theta\acute{\iota}$ m. 2 F. $H B$] B e corr. F. 8. $\tau\acute{\omega}\nu \Gamma E$ V. $\tau\acute{\omega}\nu B E$ V. 10. $\tau\acute{\omega}\nu$] om. Bf b. 11. $H B$] H in ras. V. $B \Gamma$] $B H$ b. $\tau\acute{\omega}\nu \Gamma E$ V. 12. $\acute{\epsilon}\kappa$] $\acute{\upsilon}\pi\acute{o}$ V. $\tau\acute{\omega}\nu$] $\tau\acute{\omega}\nu$ P. $A B$] A in ras. V. $\tau\acute{\omega}\nu \Gamma E$ V. 13. $\tau\acute{\omega}\nu \Gamma E$ V. δ] η P. $\acute{\iota}\sigma\omicron\varsigma \tau\acute{\omega}\nu$] $\acute{\iota}\sigma\eta \tau\eta$ P. 15. $\tau\acute{\omega}\nu \Gamma E$] ΓE Bf b, $\tau\eta\varsigma \Gamma E$ P. $\tau\acute{\omega}\nu B E$ V. δ $\acute{\upsilon}\pi\acute{o}$ $\tau\acute{\omega}\nu H B$, $B \Gamma$ $\acute{\iota}\sigma\omicron\varsigma \tau\acute{\omega}\nu \acute{\epsilon}\kappa \tau\acute{\omega}\nu A B$, $B \Gamma$ mg. F b. $\delta\eta$] om. b. 16. $\acute{\epsilon}\lambda\alpha\sigma\sigma\omicron\nu$ F m. 1, V (sed corr.); $\acute{\epsilon}\lambda\alpha\sigma\sigma\omicron\nu$ F m. 2, b, B in ras. $\tau\acute{\omega}\nu B E$ V. 17. $\tau\acute{\omega}\nu B Z$ V. $\acute{\iota}\sigma\omicron\varsigma$] om. F b, m. 2 BV. $\kappa\epsilon\acute{\iota}\sigma\theta\omega \delta$ V. $\kappa\alpha\acute{\iota}$] om. V. 19. $\tau\acute{\omega}$] $\tau\acute{\omicron}\nu$ F. 20. $\tau\acute{\omicron}\nu$] $\tau\eta\eta$ F. $\acute{\epsilon}\kappa$] $\acute{\upsilon}\pi\acute{o}$ b. $\tau\acute{\omega}\nu Z \Gamma$ V. $\gamma\acute{\iota}\nu\epsilon\sigma\theta\alpha\iota$ F, $\gamma\epsilon\acute{\nu}\epsilon\sigma\theta\alpha\iota$ V b. 21. $B Z$] $Z B$ B et V (supra Z ras. est). 22. $\tau\acute{\omega}\nu \Gamma E$ V, $B E$ b. $B Z$] in ras. V, ΓE b. $\acute{\alpha}\sigma\tau\epsilon$ — 23. $\tau\acute{\omega}\nu$] $\sigma\upsilon\nu\alpha\chi\theta\acute{\eta}\sigma\epsilon\tau\alpha\iota \acute{\alpha}\rho\alpha \acute{\iota}\sigma\omicron\varsigma \delta$ Theon (Bf V b). 24. $\mu\epsilon\tau\acute{\alpha}$] in ras. ϕ . Post ΓE add. Theon: $\tau\acute{\omega} \acute{\epsilon}\kappa \tau\acute{\omega}\nu \Theta B$ (E B b) $B \Gamma$ $\mu\epsilon\tau\acute{\alpha}$ $\tau\acute{\omega}\nu \acute{\alpha}\nu\theta\acute{\iota}$ ΓZ (Bf V b). 25. $\epsilon\sigma\tau\acute{\iota}\nu$ P. $\tau\acute{\omega}\nu$] om. P. $\acute{\epsilon}\lambda\acute{\alpha}\tau\tau\omicron\nu$ V.

soni τοῦ ἀπὸ BE. ἐδείχθη δέ, ὅτι οὐδὲ [αὐτῷ] τῷ
ἀπὸ BE. οὐκ ἄρα ὁ ἐκ τῶν AB, BG μετὰ τοῦ ἀπὸ
ΓΕ τετράγωνός ἐστιν [δυνατοῦ δὲ ὄντος καὶ κατὰ
πλείονας τρόπους τοὺς εἰρημένους ἀριθμοὺς ἐπιδεικ-
5 νύειν, ἀρκεῖσθωσαν ἡμῖν οἱ εἰρημένοι, ἵνα μὴ μακροτέ-
ρας οὔσης τῆς πραγματείας ἐπὶ πλεον αὐτὴν μηκύνωμεν].
ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

κθ'.

Εὕρεῖν δύο ρητὰς δυνάμει μόνον συμμέ-
10 τρους, ὥστε τὴν μείζονα τῆς ἐλάσσονος μείζον
δύνασθαι τῷ ἀπὸ συμμετρου ἐαυτῇ μήκει.

Ἐκκείσθω γάρ τις ρητὴ ἡ AB καὶ δύο τετράγωνοι
ἀριθμοὶ οἱ ΓΑ, ΔΕ, ὥστε τὴν ὑπεροχὴν αὐτῶν τὸν
ΓΕ μὴ εἶναι τετράγωνον, καὶ γεγράφθω ἐπὶ τῆς AB
15 ἡμικύκλιον τὸ AZB, καὶ πεποιήσθω ὡς ὁ ΔΓ πρὸς
τὸν ΓΕ, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ΒΑ τετράγωνον πρὸς τὸ
ἀπὸ τῆς ΑΖ τετράγωνον, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΖΒ.

Ἐπεὶ [οὖν] ἐστὶν ὡς τὸ ἀπὸ τῆς ΒΑ πρὸς τὸ ἀπὸ
τῆς ΑΖ, οὕτως ὁ ΔΓ πρὸς τὸν ΓΕ, τὸ ἀπὸ τῆς ΒΑ
20 ἄρα πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΑΖ λόγον ἔχει, ὃν ἀριθμὸς ὁ
ΔΓ πρὸς ἀριθμὸν τὸν ΓΕ· σύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ
ἐπὶ τῆς ΒΑ τῷ ἀπὸ τῆς ΑΖ. ρητὸν δὲ τὸ ἀπὸ τῆς
ΑΒ· ρητὸν ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΖ· ρητὴ ἄρα καὶ
ἡ ΑΖ. καὶ ἐπεὶ ὁ ΔΓ πρὸς τὸν ΓΕ λόγον οὐκ ἔχει,
25 ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν,

1. τοῦ BE V. αὐτῷ] om. P. 2. τῆς BE P; ΓΕ b.
Dein add. Theon: οὐδὲ (om. b) μείζονι αὐτοῦ (BFVb). 3.
ἐστὶ PBV, comp. Fb. δυνατοῦ] τ in ras. plurium litt. B.
4. τρόπους] bis b. τὸ εἰρημένον Theon (BFVb). ἀριθμούς]
om. Theon (BFVb). ἐπιδεικνύειν] ἐπι- supra scr. F, in ras.
B; ἐπιδεικνύναι V. 5. ἀρκεῖσθω ἡμῖν ὁ εἰρημένος Theon
(BFVb). 7. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] om. Theon (BFVb). 9. εὐ-
ρίσκειν B. 11. τῷ] corr. ex τοῦ m. 2 B. 13. τότε] τὴν V.

$AB \times BF + FE^2 = BZ^2$. quare etiam $\Theta B \times BF + FZ^2 = AB \times BF + FE^2$; quod absurdum est. itaque $AB \times BF + FE^2$ spatio minori, quam est quadratum BE^2 , aequale non est. demonstrauius autem, ne ipsi quidem BE^2 id aequale esse. ergo $AB \times BF + FE^2$ quadratus non est¹⁾; quod erat demonstrandum.

XXIX.

Duas rationales inuenire potentia tantum commensurabiles eius modi, ut maior quadrata minorem excedat quadrato rectae sibi longitudine commensurabilis.

ponantur enim recta rationalis AB et duo numeri quadrati $\Gamma\Delta$, ΔE eius modi, ut eorum differentia ΓE quadrata non sit [lemma I]. et in AB semicirculus describatur AZB , et fiat $\Delta\Gamma : \Gamma E = BA^2 : AZ^2$ [prop. VI coroll.], et ducatur ZB .

quoniam est $BA^2 : AZ^2 = \Delta\Gamma : \Gamma E$, BA^2 ad AZ^2 rationem habet, quam numerus $\Delta\Gamma$ ad numerum ΓE . itaque BA^2 , AZ^2 commensurabilia sunt [prop. VI]. uerum AB^2 rationale est [def. 4]. itaque etiam AZ^2 rationale est [id.]. quare etiam AZ rationalis est. et quoniam $\Delta\Gamma : \Gamma E$ rationem non habet, quam numerus

1) $\delta\eta\lambda\omega\tau\acute{o}\upsilon$ lin. 3 — $\mu\eta\kappa\acute{o}\nu\omega\mu\epsilon\nu$ lin. 6 Euclides non scripsit; uncis ea inclusit August II p. 359. nescio, an idem recte de ambobus lemmatis totis dubitationem iniecerit. sed satis antiquo tempore interpolata sunt.

15. $\acute{\omega}\varsigma$] supra scr. m. 1 V. δ] ras. F. $\Delta\Gamma$] in ras. m. 1 P. 17. $\tau\epsilon\tau\rho\acute{\alpha}\gamma\omega\gamma\omega\nu$] om. V. 18. $\acute{\alpha}\nu\tau\iota$] om. P. 19. $\Delta\Gamma$] $\Gamma\Delta$ V. 21. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\nu$ P. 23. $\kappa\alpha\iota\ \eta$] η P. 24. $\Delta\Gamma$] $\Gamma\Delta$ F. $\acute{\alpha}\nu\tau\iota$] supra scr. m. 1 P. 25. $\delta\eta$ δ V.

- οὐδὲ τὸ ἀπὸ τῆς BA ἄρα πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς AZ λόγον
 ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθ-
 μόν· ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ AB τῇ AZ μήκει· αὖ
 BA , AZ ἄρα ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι.
 5 καὶ ἐπεὶ [ἐστίν] ὥς ὁ $\Delta\Gamma$ πρὸς τὸν ΓE , οὕτως τὸ
 ἀπὸ τῆς BA πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς AZ , ἀναστρέψαντι ἄρα
 ὥς ὁ $\Gamma\Delta$ πρὸς τὸν ΔE , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς AB πρὸς
 τὸ ἀπὸ τῆς BZ . ὁ δὲ $\Gamma\Delta$ πρὸς τὸν ΔE λόγον ἔχει,
 ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν·
 10 καὶ τὸ ἀπὸ τῆς AB ἄρα πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς BZ λόγον
 ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν·
 σύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ AB τῇ BZ μήκει. καὶ ἐστὶ
 τὸ ἀπὸ τῆς AB ἴσον τοῖς ἀπὸ τῶν AZ , ZB · ἡ AB
 ἄρα τῆς AZ μείζον δύναται τῇ BZ συμμέτρῳ ἑαυτῇ.
 15 Εὐρίηται ἄρα δύο ῥηταὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι
 αὖ BA , AZ , ὥστε τὴν μείζονα τὴν AB τῆς ἐλάσσονος
 τῆς AZ μείζον δύνασθαι τῷ ἀπὸ τῆς BZ συμμέτρου
 ἑαυτῇ μήκει· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

λ'.

- 20 Εὐρεῖν δύο ῥητὰς δυνάμει μόνον συμμέ-
 τρους, ὥστε τὴν μείζονα τῆς ἐλάσσονος μείζον
 δύνασθαι τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ μήκει.
 Ἐκκελίσθω ῥητὴ ἡ AB καὶ δύο τετράγωνοι ἀριθμοὶ
 οἱ ΓE , $E\Delta$, ὥστε τὸν συγκείμενον ἐξ αὐτῶν τὸν $\Gamma\Delta$
 25 μὴ εἶναι τετράγωνον, καὶ γεγραφθῶ ἐπὶ τῆς AB ἡμι-


1. AB F. ἄρα] supra scr. m. 1 P. AZ] Z e corr. V.
 3. BA P. 4. AB , AZ B V b; AZ , AB F. εἰσιν B. 5.
 ἐστίν] om. P. τόν] mut. in τό m. 2 F. 10. καὶ τό — 11.
 ἀριθμόν] mg. m. 1 F (partem abstulit reparatio pergam.). 12. +
 σύμμετρος P. ἐστίν P. 14. ἑαυτῇ μήκει V. 15. εὐρίηται
 F b. 17. μείζονα P. ZB B b. συμμέτρῳ F. 18. ὅπερ

quadratus ad numerum quadratum [lemma I], ne BA^2 quidem ad AZ^2 rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. quare AB , AZ longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. itaque BA , AZ rationales sunt potentia tantum commensurabiles. et quoniam $\angle\Gamma : \Gamma E = BA^2 : AZ^2$, conuertendo erit [V, 19 coroll.] $\Gamma\Delta : \Delta E = AB^2 : BZ^2$ [cfr. III, 31. I, 47]. sed $\Gamma\Delta : \Delta E$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. quare etiam $AB^2 : BZ^2$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque AB , BZ longitudine commensurabiles sunt [prop. IX]. et $AB^2 = AZ^2 + BZ^2$ [III, 31. I, 47]. itaque AB^2 excedit AZ^2 quadrato rectae BZ sibi commensurabilis.

Ergo inuentae sunt duae rationales potentia tantum commensurabiles BA , AZ eius modi, ut maior AB quadrata minorem AZ excedat quadrato rectae BZ sibi longitudine commensurabilis; quod erat demonstrandum.

XXX.

Inuenire duas rationales potentia tantum commensurabiles eius modi, ut maior quadrata minorem excedat quadrato rectae sibi longitudine incommensurabilis.



Ponatur rationalis AB et duo numeri quadrati ΓE , $E\Delta$ eius modi, ut numerus ex iis compositus $\Gamma\Delta$ quadratus non

$\xi\delta\epsilon\iota\ \delta\epsilon\iota\zeta\alpha\iota\] : \sim P$, om. B F b. Seq. lemma, u. app. 23. $\acute{\alpha}\rho\iota\theta\text{-}\mu\acute{o}\iota\]$ om. F V. 24. $\tau\acute{o}\nu\]$ (alt.) $\tau\acute{\omega}\nu$ b.

κύκλιον τὸ AZB , καὶ πεποιήσθω ὡς ὁ $\Delta\Gamma$ πρὸς τον ΓE , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς BA πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς AZ , καὶ ἐπεξεύχθω ἡ ZB .

Ὁμοίως δὴ δείξομεν τῷ πρὸς τοῦτου, ὅτι αἱ BA, AZ
 5 ῥηταὶ εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν
 ὡς ὁ $\Delta\Gamma$ πρὸς τὸν ΓE , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς BA πρὸς
 τὸ ἀπὸ τῆς AZ , ἀναστρέψαντι ἄρα ὡς ὁ $\Gamma\Delta$ πρὸς
 τον ΔE , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς AB πρὸς το ἀπὸ τῆς BZ .
 ὁ δὲ $\Gamma\Delta$ πρὸς τον ΔE λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετράγω-
 10 νος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· οὐδ' ἄρα το
 ἀπὸ τῆς AB πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς BZ λόγον ἔχει, δν
 τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· ἀσύμ-
 μετρος ἄρα ἐστὶν ἡ AB τῇ BZ μήκει. καὶ δύνανται
 ἡ AB τῆς AZ μείζον τῷ ἀπὸ τῆς ZB ἀσυμμέτρου
 15 ἑαυτῇ.

Αἱ AB, AZ ἄρα ῥηταὶ εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμ-
 μετροι, καὶ ἡ AB τῆς AZ μείζον δύνανται τῷ ἀπὸ τῆς
 ZB ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ μήκει· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

λα'.

20 $Eὐρεῖν$ δύο μέσας δυνάμει μόνον συμμέ-
 τρους ῥητὸν περιεχούσας, ὥστε τὴν μείζονα
 τῆς ἐλάσσονος μείζον δύνασθαι τῷ ἀπὸ συμ-
 μέτρου ἑαυτῇ μήκει.

Ἐκκείσθωσαν δύο ῥηταὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι
 25 αἱ A, B , ὥστε τὴν A μείζονα οὖσαν τῆς ἐλάσσονος
 τῆς B μείζον δύνασθαι τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ μήκει.

1. Post καὶ del. ἐπεξεύχθω m. 1 P. $\Gamma\Delta$ P. τόν] om. Fb. 2. BA] e corr. m. 2 V. BZ b. 3. BZ P. 4. δέ b, corr. m. 1. ὡς ἐν τῷ Theon (BFVb). BA] e corr. m. 2 V. 5. εἰσιν B. 6. τόν] om. BF. 7. $\Gamma\Delta$] $\Delta\Gamma$ b. 9. $\Gamma\Delta$]

sit [lemma II], et in AB semicirculus AZB describatur. et fiat $\angle \Gamma : \Gamma E = BA^2 : AZ^2$ [prop. VI coroll.], et ducatur ZB .

iam similiter ac in praecedenti [p. 86, 18 sq.] demonstrabimus, BA et AZ rationales esse potentia tantum commensurabiles. et quoniam est $\angle \Gamma : \Gamma E = BA^2 : AZ^2$, conuertendo [V, 19 coroll.] erit $\angle \Delta : \Delta E = BA^2 : BZ^2$ [III, 31. I, 47]. uerum $\angle \Delta : \Delta E$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. quare ne AB^2 quidem ad BZ^2 rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque AB, BZ longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. et $AB^2 = AZ^2 + ZB^2$ [III, 31. I, 47].

Ergo AB, AZ rationales sunt potentia tantum commensurabiles, et AB quadrata excedit AZ quadrato rectae ZB sibi longitudine incommensurabilis; quod erat demonstrandum.

XXXI

Inuenire duas medias potentia tantum commensurabiles spatium rationale comprehendentes eius modi, ut maior quadrata minorem excedat quadrato rectae sibi longitudine commensurabilis.

Ponantur duae rectae rationales potentia tantum commensurabiles A, B eius modi, ut maior A quadrata excedat minorem B quadrato rectae sibi longitu-

in ras. V. οὐκ] postea ins. F. 13. τῇ] corr. ex ἡ V. δυνάμει b. -μει supra scr. F. 14. μείζων b. BZ Fb. ἀσυνμείτρω B F b. 16. AZ] BZ Theon (B F V b). εἶσιν P. 17. τῷ] τῇ P. 18. BZ F. ἀσυνμείτρω F. ὅπερ εἶδει δεῖξαι] comp. P, ὅπερ b. 22. ἀπό] -ό eras. V. ἀσυνμείτρω P. 26. ἀσυνμείτρω P, et F (ἀ del.). μήκει] om. F V b, m. 2 B.

καὶ τῷ ὑπὸ τῶν A, B ἴσον ἔστω τὸ ἀπὸ τῆς Γ . μέ-
 σον δὲ τὸ ὑπὸ τῶν A, B · μέσον ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς
 Γ · μέση ἄρα καὶ ἡ Γ . τῷ δὲ ἀπὸ τῆς B ἴσον ἔστω
 τὸ ὑπὸ τῶν Γ, Δ · ῥητὸν δὲ τὸ ἀπὸ τῆς B · ῥητὸν
 5 ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ τῶν Γ, Δ . καὶ ἐπεὶ ἔστιν ὥς ἡ A
 πρὸς τὴν B , οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν A, B πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς
 B , ἀλλὰ τῷ μὲν ὑπὸ τῶν A, B ἴσον ἔστι τὸ ἀπὸ τῆς
 Γ , τῷ δὲ ἀπὸ τῆς B ἴσον τὸ ὑπὸ τῶν Γ, Δ , ὥς ἄρα
 ἡ A πρὸς τὴν B , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς Γ πρὸς τὸ ὑπὸ
 10 τῶν Γ, Δ . ὥς δὲ τὸ ἀπὸ τῆς Γ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν
 Γ, Δ , οὕτως ἡ Γ πρὸς τὴν Δ · καὶ ὥς ἄρα ἡ A πρὸς
 τὴν B , οὕτως ἡ Γ πρὸς τὴν Δ . σύμμετρος δὲ ἡ A
 τῇ B δυνάμει μόνον· σύμμετρος ἄρα καὶ ἡ Γ τῇ Δ
 δυνάμει μόνον. καὶ ἔστι μέση ἡ Γ · μέση ἄρα καὶ
 15 ἡ Δ . καὶ ἐπεὶ ἔστιν ὥς ἡ A πρὸς τὴν B , ἡ Γ πρὸς
 τὴν Δ , ἡ δὲ A τῆς B μείζον δύνανται τῷ ἀπὸ συμ-
 μέτρου ἑαυτῇ, καὶ ἡ Γ ἄρα τῆς Δ μείζον δύνανται τῷ
 ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ.

Εὐρηνται ἄρα δύο μέσαι δυνάμει μόνον σύμμετροι
 20 αἱ Γ, Δ ῥητὸν περιέχουσιν, καὶ ἡ Γ τῆς Δ μείζον
 δυνάται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ μήκει.

Ὅμοίως δὲ δειχθήσεται καὶ τῷ ἀπὸ ἀσύμμετρου,
 ὅταν ἡ A τῆς B μείζον δύνηται τῷ ἀπὸ ἀσύμμετρου
 ἑαυτῇ.

1. τῷ] corr. ex τῶν m. 1 P. 2. τῆς] corr. ex τοῦ m.

2 F. 3. δέ] δ' F. 4. Δ] corr. ex A m. rec. b, A φ (non F).

5. ἄρα ἔστι P. Ante ἐπεὶ ras. 3 litt. P. 7. ὑπὸ] ὑ- in ras. V. 8. ἔστι τό b. 14. ἔστιν PB. 15. οὕτως ἡ Γ FV.

16. τῆς] τῇ F. τῷ] corr. ex τό F. ἀσύμμετρον P, supra σ ras. 1 litt. B, συμμέτρω φ. 17. δυνήσεται Theon (BFVb).

18. ἀσύμμετρον P, supra σ ras. 1 litt. B, συμμέτρω F. 19.

εὐρηνται V b, F m. 2. ἄρα] supra scr. m. 2 B. 21. ἀσυμ-

μέτρου P, supra σ ras. 1 litt. B. 22. δέ FV. τῷ] τό FV.

dine commensurabilis [prop. XXIX]. et sit $\Gamma^2 = A \times B$.
 uerum $A \times B$ medium est [prop. XXI]. itaque etiam
 Γ^2 medium est; quare Γ est media [id.].
 sit autem $\Gamma \times \Delta = B^2$. uerum B^2 rationale
 est. itaque etiam $\Gamma \times \Delta$ rationale est. et
 quoniam est $A : B = A \times B : B^2$ [cfr. prop.
 XXI lemma], et $\Gamma^2 = A \times B$, $B^2 = \Gamma \times \Delta$,
 erit $A : B = \Gamma^2 : \Gamma \times \Delta$. est autem $\Gamma^2 : \Gamma \times \Delta = \Gamma : \Delta$
 [prop. XXI lemma]. quare etiam $A : B = \Gamma : \Delta$. uerum
 A, B potentia tantum commensurabiles sunt. itaque
 etiam Γ, Δ potentia tantum commensurabiles sunt
 [prop. XI]. et Γ media est. itaque etiam Δ media
 est [prop. XXIII]. et quoniam est $A : B = \Gamma : \Delta$, et
 A^2 excedit B^2 quadrato rectae sibi commensurabilis,
 etiam Γ^2 excedit Δ^2 quadrato rectae sibi commensu-
 rabilis [prop. XIV].

Ergo inuentae sunt duae mediae potentia tantum
 commensurabiles Γ, Δ spatium rationale comprehen-
 dentes, et Γ^2 excedit Δ^2 quadrato rectae sibi commen-
 surabilis.

Similiter demonstrabimus, Γ^2 excedere Δ^2 quadrato
 rectae sibi incommensurabilis, si A^2 excedat B^2 qua-
 drato rectae sibi incommensurabilis [prop. XXX].

συμμέτρον P, et F, corr. m. 1. 23. ἡ A] om. P. δυν-
 νήσεται B, δυνήσεται L, δύνηται ἡ A P. συμμέτρον P. 24.
 Seq. lemma, u. app.

λβ'.

Εὐρεῖν δύο μέσας δυνάμει μόνον συμμε-
τρους μέσον περιεχούσας, ὥστε τὴν μείζονα
τῆς ἐλάσσονος μείζον δύνασθαι τῷ ἀπὸ συμ-
6 μέτρου ἐαυτῇ.

Ἐκκείσθωσαν τρεῖς ῥηταὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι
αἱ *A, B, Γ*, ὥστε τὴν *A* τῆς *Γ* μείζον δύνασθαι τῷ
ἀπὸ συμμετρου ἐαυτῇ, καὶ τῷ μὲν ὑπὸ τῶν *A, B* ἴσον
ἔστω τὸ ἀπὸ τῆς *Δ*. μέσον ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς *Δ*· καὶ
10 ἡ *Δ* ἄρα μέση ἐστίν. τῷ δὲ ὑπὸ τῶν *B, Γ* ἴσον ἔστω
τὸ ὑπὸ τῶν *Δ, Ε*. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς τὸ ὑπὸ τῶν *A, B*
πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν *B, Γ*, οὕτως ἡ *A* πρὸς τὴν *Γ*,
ἀλλὰ τῷ μὲν ὑπὸ τῶν *A, B* ἴσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς *Δ*,
τῷ δὲ ὑπὸ τῶν *B, Γ* ἴσον τὸ ὑπὸ τῶν *Δ, Ε*, ἐστὶν
15 ἄρα ὡς ἡ *A* πρὸς τὴν *Γ*, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς *Δ* πρὸς
τὸ ὑπὸ τῶν *Δ, Ε*. ὡς δὲ τὸ ἀπὸ τῆς *Δ* πρὸς τὸ ὑπὸ
τῶν *Δ, Ε*, οὕτως ἡ *Δ* πρὸς τὴν *Ε*· καὶ ὡς ἄρα ἡ *A*
πρὸς τὴν *Γ*, οὕτως ἡ *Δ* πρὸς τὴν *Ε*. σύμμετρος δὲ
ἡ *A* τῇ *Γ* δυνάμει [μόνον]. σύμμετρος ἄρα καὶ ἡ *Δ*
20 τῇ *Ε* δυνάμει μόνον. μέση δὲ ἡ *Δ*· μέση ἄρα καὶ
ἡ *Ε*. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ *A* πρὸς τὴν *Γ*, ἡ *Δ* πρὸς
τὴν *Ε*, ἡ δὲ *A* τῆς *Γ* μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμε-
τρου ἐαυτῇ, καὶ ἡ *Δ* ἄρα τῆς *Ε* μείζον δυνήσεται τῷ
ἀπὸ συμμετρου ἐαυτῇ. λέγω δὴ, ὅτι καὶ μέσον ἐστὶ
25 τὸ ὑπὸ τῶν *Δ, Ε*. ἐπεὶ γὰρ ἴσον ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν
B, Γ τῷ ὑπὸ τῶν *Δ, Ε*, μέσον δὲ τὸ ὑπὸ τῶν *B, Γ*

4. ἐλάττονος FV. μείζονα L, et B, sed corr. συμμε-
τρου] α'- add. m. rec. b. 5. αὐτῇ L. 6. ῥηταὶ αἱ *A, B, Γ* V.

7. αἱ *A, B, Γ*] om. V, αἱ *A, B* b. μείζονα L, et B, sed
corr. 8. συμμετρου] α'- add. m. rec. b. τῷ] τό L. 10.
ἐστὶ V, comp. Fb. 11. τὸ ὑπὸ τῶν *Δ, Ε*] m. 1 b, supra scr.

XXXII.

Inuenire duas medias potentia tantum commensurabiles medium comprehendentes eius modi, ut maior quadrata minorem excedat quadrato rectae sibi commensurabilis.

Ponantur tres rectae
 A ————— Δ —————
 B ————— E —————
 Γ —————
rationales potentia tantum
commensurabiles A, B, Γ
eius modi, ut A^2 excedat
 Γ^2 quadrato rectae sibi commensurabilis [prop. XXIX],
et sit $\Delta^2 = A \times B$. itaque Δ^2 medium est; quare etiam
 Δ media est [prop. XXI]. sit autem $\Delta \times E = B \times \Gamma$.
et quoniam est $A \times B : B \times \Gamma = A : \Gamma$ [prop. XXI
lemma]¹⁾, et $\Delta^2 = A \times B$, $\Delta \times E = B \times \Gamma$, erit $A : \Gamma$
 $= \Delta^2 : \Delta \times E$. uerum $\Delta^2 : \Delta \times E = \Delta : E$ [prop. XXI
lemma]. quare etiam $A : \Gamma = \Delta : E$. sed A, Γ potentia
tantum commensurabiles sunt. quare etiam Δ, E po-
tentia tantum commensurabiles sunt [prop. XI]. Δ
autem media est. itaque etiam E media est [prop.
XXIII]. et quoniam est $A : \Gamma = \Delta : E$, et A^2 excedit
 Γ^2 quadrato rectae sibi commensurabilis, etiam Δ^2
excedit E^2 quadrato rectae sibi commensurabilis [prop.
XIV]. iam dico, $\Delta \times E$ etiam medium esse. nam

1) Nam $A : B = A \times B : B^2$ (cfr. supra p. 92, 5), $B : \Gamma = B^2 : B \times \Gamma$.

m. rec. $\tau\tilde{\omega}$ ἀπὸ τοῦ E . 13. ἐστίν L. 14. ἴσον ἐστὶ V. τὸ
ἐπὶ τῶν Δ, E] m. 1 b, supra scr. m. rec. $\tau\tilde{\omega}$ ἀπὸ τοῦ E . 16.
τὸ ἐπὶ τῶν Δ, E] m. 1 b, supra scr. τὸ ἀπὸ τοῦ E . ὡς δὲ]
ἀλλ' ὡς V. 19. μόνον] om. P. 22. $\tau\tilde{\omega}$] corr. ex τό m. 2 P.
συμμετρον] ἄ- add. m. rec. b, item lin. 24. 24. ἐστίν L.
25. ἐστίν L. τό] $\tau\tilde{\omega}$ V, et b, sed corr. 26. $\tau\tilde{\omega}$ ἐπὶ τῶν
 Δ, E] m. 1 b, supra scr. m. rec. $\tau\tilde{\omega}$ ἀπὸ τοῦ E . τό] $\tau\tilde{\omega}$ P.

[αί γὰρ B, Γ ῥηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι], μέσον ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ τῶν A, E .

Εὐρηνται ἄρα δύο μέσαι δυνάμει μόνον σύμμετροι αἱ A, E μέσον περιέχουσαι, ὥστε τὴν μέζονα τῆς ἐλάσσονος μείζον δύνασθαι τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ.

Ὅμοιως δὴ πάλιν δειχθήσεται καὶ τῷ ἀπὸ ἀσυνμέτρου, ὅταν ἡ A τῆς Γ μείζον δύνηται τῷ ἀπὸ ἀσυνμέτρου ἑαυτῇ.

Λήμμα.

- 10 Ἐστω τρίγωνον ὀρθογώνιον τὸ $AB\Gamma$ ὀρθὴν ἔχον τὴν A , καὶ ἤχθω κάθετος ἡ AD . λέγω, ὅτι τὸ μὲν ὑπὸ τῶν GBA ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς BA , τὸ δὲ ὑπὸ τῶν BGA ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς GA , καὶ τὸ ὑπὸ τῶν BDA , $AD\Gamma$ ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς AD , καὶ ἐτι τὸ ὑπὸ τῶν $B\Gamma$, AD ἴσον [ἐστὶ] τῷ ὑπὸ τῶν $BA, A\Gamma$.

Καὶ πρῶτον, ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν GBA ἴσον [ἐστὶ] τῷ ἀπὸ τῆς BA .

- Ἐπεὶ γὰρ ἐν ὀρθογωνίῳ τριγώνῳ ἀπὸ τῆς ὀρθῆς γωνίας ἐπὶ τὴν βάσιν κάθετος ἤκται ἡ AD , τὰ ABD , $AD\Gamma$ ἄρα τρίγωνα ὁμοιά ἐστι τῷ τε ὅλῳ τῷ $AB\Gamma$ καὶ ἀλλήλοις. καὶ ἐπεὶ ὁμοίον ἐστὶ τὸ $AB\Gamma$ τρίγωνον τῷ ABD τριγώνῳ, ἔστιν ἄρα ὡς ἡ GB πρὸς τὴν BA , οὕτως ἡ BA πρὸς τὴν BD . τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν GBA ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς AB .

1. αἱ γὰρ — σύμμετροι] om. L F V b, mg. m. 2 B. εἰσιν P.
2. καί] om. LB. τὸ ὑπὸ τῶν A, E] m. 1 b, supra scr. m. rec. τὸ ἀπὸ τοῦ E . 3. ηὐρηνται L F V b. 4. τὴν μέν V. 5. συμμέτρου] ἄ- add. m. rec. b. 6. τῷ τό V. συμμέτρου L, et B F, sed corr. 7. δύνεται Pb. συμμέτρου L, et B F, sed corr. 8. Post ἑαυτῇ add. ὅπερ ἔδει δεῖξαι V. Seq. lemma, u. app. 9. λήμμα] om. L. 10. ἔχων P. 11. A] ὑπὸ $B A \Gamma$ Theon (L B F V b); γρ. τὴν ὑπὸ $B A \Gamma$ mg. P. 12. $\Gamma B A$] supra add. B P V. ἐστὶν L.

quoniam $B \times \Gamma = \Delta \times E$, et $B \times \Gamma$ medium est [prop. XXI], etiam $\Delta \times E$ medium est.


Ergo inuentae sunt duae mediae potentia tantum commensurabiles medium comprehendentes Δ, E eius modi, ut maior quadrata minorem excedat quadrato rectae sibi commensurabilis.

Similiter rursus demonstrabimus, Δ^2 excedere E^2 quadrato rectae sibi incommensurabilis, si A^2 excedat Γ^2 quadrato rectae sibi incommensurabilis [prop. XXX].

Lemma.

Sit $AB\Gamma$ triangulus rectangulus rectum habens angulum A , et ducatur perpendicularis AD . dico, esse $\Gamma B \times B\Delta = BA^2$, $B\Gamma \times \Gamma\Delta = \Gamma A^2$, $B\Delta \times \Delta\Gamma = A\Delta^2$, $B\Gamma \times A\Delta = BA \times A\Gamma$.

et primum, esse $\Gamma B \times B\Delta = BA^2$.



nam quoniam in triangulo rectangulo ab angulo recto ad basim perpendicularis ducta est AD , trianguli $AB\Delta$, $A\Delta\Gamma$ et toti $AB\Gamma$ et inter se similes sunt [VI, 8]. et quoniam $AB\Gamma \sim AB\Delta$, erit $\Gamma B : BA = BA : B\Delta$ [VI, 4]. quare [VI, 17] $\Gamma B \times B\Delta = BA^2$.

13. $B\Gamma\Delta$] supra add. ΓPF ; $B\Gamma$, $\Gamma\Delta$ e corr. V. $\Gamma\sigma\nu$] supra scr. m. 1 P. $\tau\eta\varsigma$] om. Bb. $A\Gamma\varphi$. $B\Delta\Gamma$, supra add. Δ m. rec., P. 14. $B\Gamma$] e corr. V. 15. $\xi\sigma\tau\iota$] om. LBFVb. $\tau\omega\nu$] om. P. 16. $\tau\omega\nu$] om. P. $\Gamma B\Delta$] FVb, B m. 2; ΓB LB; $\Gamma\Delta B$ P; ΓB , $B\Delta$ FV m. 2, P m. rec. $\xi\sigma\tau\iota$] om. LBFVb. 19. $\tau\alpha$] corr. ex $\tau\eta\varsigma$ m. 2 B. $AB\Delta$] Δ in ras. m. 1 P. 20. $\Delta A\Gamma$? L. $\xi\sigma\tau\iota\nu$ LPB. 22. $AB\Delta$] B in ras. V. 23. BA] AB φ . BA] mut. in AB V. 24. ΓB , $B\Delta$ φ , m. rec. P, m. 2 V.

Διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν $BΓΔ$ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς $ΑΓ$.

Καὶ ἐπεὶ, ἐὰν ἐν ὀρθογωνίῳ τριγώνῳ ἀπὸ τῆς ὀρθῆς γωνίας ἐπὶ τὴν βάσιν κάθετος ἀχθῇ, ἡ ἀχθεῖσα
 5 τῶν τῆς βάσεως τμημάτων μέση ἀνάλογόν ἐστιν, ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ $BΔ$ πρὸς τὴν $ΔΑ$, οὕτως ἡ $ΑΔ$ πρὸς τὴν $ΔΓ$. τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν $BΔ, ΔΓ$ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς $ΔΑ$.

Λέγω, ὅτι καὶ τὸ ὑπὸ τῶν $BΓ, ΑΔ$ ἴσον ἐστὶ τῷ
 10 ὑπὸ τῶν $ΒΑ, ΑΓ$. ἐπεὶ γάρ, ὡς ἔφαμεν, ὁμοιόν ἐστι τὸ $ΑΒΓ$ τῷ $ΑΒΔ$, ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ $BΓ$ πρὸς τὴν $ΓΑ$, οὕτως ἡ $ΒΑ$ πρὸς τὴν $ΑΔ$ [ἐὰν δὲ τέσσαρες εὐθεῖαι ἀνάλογον ᾧσιν, τὸ ὑπὸ τῶν ἁκρῶν ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν μέσων]. τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν $BΓ, ΑΔ$ ἴσον
 15 ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν $ΒΑ, ΑΓ$. ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

λγ'.

Εὐρεῖν δύο εὐθείας δυνάμει ἀσυμμέτρους ποιοῦσας τὸ μὲν συγκεκλιμένον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων ῥητόν, τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν μέσον.

20 Ἐκκείσθωσαν δύο ῥηταὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι αἱ $ΑΒ, ΒΓ$, ὥστε τὴν μείζονα τὴν $ΑΒ$ τῆς ἐλάσσονος τῆς $BΓ$ μείζον δύνασθαι τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαντῇ, καὶ τετμήσθω ἡ $BΓ$ δίχα κατὰ τὸ $Δ$, καὶ τῷ ἀφ' ὁποτέρως τῶν $BΔ, ΔΓ$ ἴσον παρὰ τὴν $ΑΒ$ παραβε-
 25 βλήσθω παραλληλόγραμμον ἐλλείπον εἶδει τετραγώνῳ, καὶ ἔστω τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΕΒ$, καὶ γεγραφθῶ ἐπὶ τῆς

1. $BΓ, ΓΔ$ m. rec. P, m. 2 V. ἐστὶ] om. Fb. 3. τριγώνῳ] supra scr. comp. m. 2 B. 6. $ΑΔ$] $ΔΑ$ B. 10. ἐστὶ] postea ins. F. 11. $ΑΒΓ$ τριγώνων F. $ΑΒΔ$] $ΑΓΔ$ BFb, et supra scr. B m. 1 V. 12. $ΓΑ$] $Α$ in ras. V. $ΑΔ$]

eadem de causa etiam $B\Gamma \times \Gamma\Delta = A\Gamma^2$.

et quoniam, si in triangulo rectangulo ab angulo recto ad basim perpendicularis ducitur, recta ducta media est proportionalis partium basis [VI, 8 coroll.], erit $B\Delta : \Delta A = A\Delta : \Delta\Gamma$. quare [VI, 17] $B\Delta \times \Delta\Gamma = \Delta A^2$.

dico, esse etiam $B\Gamma \times A\Delta = BA \times A\Gamma$. nam quoniam, ut diximus, trianguli $AB\Gamma$, $AB\Delta$ similes sunt, erit [VI, 4] $B\Gamma : \Gamma A = BA : A\Delta$. itaque¹⁾ $B\Gamma \times A\Delta = BA \times A\Gamma$ [VI, 16]; quod erat demonstrandum.

XXXIII.

Inuenire duas rectas potentia incommensurabiles, quae summam quadratorum suorum rationalem efficiant, rectangulum autem medium.

Ponantur duae rationales potentia tantum commensurabiles AB , $B\Gamma$ eius modi, ut maior AB quadrata minorem $B\Gamma$ excedat quadrato rectae sibi incommensurabilis [prop. XXX], et $B\Gamma$ in Δ in duas partes aequales secetur, et quadrato $B\Delta^2$ uel $\Delta\Gamma^2$ aequale parallelogrammum rectae AB adplicetur figura quadrata deficiens [VI, 28] et sit $AE \times EB$, et in AB


1) Uerba quae praecedunt damnari, quia non magis est, cur haec propositio omnibus uerbis citetur, quam VI, 17, quae bis in hoc lemmate tacite usus est.

ΔA φ. 13. $\omega\alpha$ V. $\tau\delta$] corr. ex $\tau\tilde{\omega}$ V. 15. $\tau\tilde{\omega}$] corr. ex $\tau\delta$ m. 1 F, $\tau\delta$ φ. $\tau\tilde{\omega}\nu$] om. Bb. Seq. demonstr. alt., u. app. $\delta\pi\epsilon\rho$ $\xi\delta\epsilon\iota$ $\delta\epsilon\iota\chi\alpha\iota$] comp. Pb, om. BFV. Seq. lemmata, u. app. 19. $\delta\acute{\epsilon}$ F. 21. $\acute{\epsilon}\lambda\alpha\tau\tau\omicron\nu\sigma$ b, comp. F. 22. $\mu\epsilon\iota\zeta\omicron\nu\alpha$ P, corr. m. rec. 23. $\tau\tilde{\omega}$] corr. ex $\tau\delta$ m. 1 V. 25. $\pi\alpha\rho\alpha\lambda\lambda\eta\lambda\omicron\gamma\gamma\alpha\mu\omicron\nu$ P. 26. AE , EB V, P m. rec.

AB ημικύκλιον τὸ AZB , καὶ ἤχθω τῇ AB πρὸς ὀρθὰς ἢ EZ , καὶ ἐπεξέχθωσαν αἱ AZ , ZB .

Καὶ ἐπεὶ [δύο] εὐθεῖαι ἄνισοι εἰσιν αἱ AB , $BΓ$, καὶ ἡ AB τῆς $BΓ$ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ ἀσύμμετρου
 5 ἐαυτῇ, τῷ δὲ τετάρτῳ τοῦ ἀπὸ τῆς $BΓ$, τουτέστι τῷ ἀπὸ τῆς ἡμισείας αὐτῆς, ἴσον παρὰ τὴν AB παραβέβληται παραλληλόγραμμον ἐλλεῖπον εἶδει τετραγώνῳ καὶ ποιεῖ τὸ ὑπὸ τῶν AEB , ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ AE τῇ EB . καὶ ἐστὶν ὥς ἡ AE πρὸς EB , οὕτως
 10 τὸ ὑπὸ τῶν BA , AE πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν AB , BE , ἴσον δὲ τὸ μὲν ὑπὸ τῶν BA , AE τῷ ἀπὸ τῆς AZ , τὸ δὲ ὑπὸ τῶν AB , BE τῷ ἀπὸ τῆς BZ . ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς AZ τῷ ἀπὸ τῆς ZB . αἱ AZ , ZB ἄρα δυνάμει εἰδὼν ἀσύμμετροι. καὶ ἐπεὶ ἡ AB ῥητὴ ἐστὶν,
 15 ῥητὸν ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς AB . ὥστε καὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AZ , ZB ῥητόν ἐστιν. καὶ ἐπεὶ πάλιν τὸ ὑπὸ τῶν AE , EB ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς EZ , ὑπόκειται δὲ τὸ ὑπὸ τῶν AE , EB καὶ τῷ ἀπὸ τῆς BA ἴσον, ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ZE τῇ BA .
 20 διπλῇ ἄρα ἡ $BΓ$ τῆς ZE . ὥστε καὶ τὸ ὑπὸ τῶν AB , $BΓ$ σύμμετρόν ἐστι τῷ ὑπὸ τῶν AB , EZ . μέσον δὲ τὸ ὑπὸ τῶν AB , $BΓ$. μέσον ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ τῶν AB , EZ . ἴσον δὲ τὸ ὑπὸ τῶν AB , EZ τῷ ὑπὸ τῶν AZ , ZB . μέσον ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ τῶν AZ , ZB . ἐδείχθη
 25 δὲ καὶ ῥητὸν τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων.

1. AB] AEB b. ABZ P. 3. δύο] om. P, post εὐθεῖαι ins. m. 2. αἱ] m. rec. P. 4. σύμμετρον FV , corr. m. 2. 5. τὸ (τῷ V) δὲ τέταρτον $BfVb$, corr. m. 2 BV (τετάρτῳ m. rec. b). τῆς] τῆς ἐλάσσονος τῆς Theon ($BfVb$). τουτέστιν P. τῷ] τό Fb , corr. ex τό m. 2 B. 6. ἴσον] οἴμ. Fb , m. 2 B. 7. παραλληλόγραμμον] om. Fb , m. 2 B. 8. AE , EB V, m. rec. P. 9. πρὸς τὴν EB V. 10. τῶν] (alt.) om. P.



describatur semicirculus AZB , et ducatur ad AB perpendicularis EZ , et ducantur AZ, ZB .

et quoniam $AB, B\Gamma$ inaequales sunt rectae, et AB^2 excedit $B\Gamma^2$ quadrato rectae sibi incommensurabilis, et quartae parti quadrati $B\Gamma^2$, hoc est $(\frac{1}{4}B\Gamma)^2$, aequale parallelogrammum rectae AB adplicatum est figura quadrata deficiens et efficit $AE \times EB$, AE et EB incommensurabiles erunt [prop. XVIII]. est autem $AE : EB = BA \times AE : AB \times BE$ [u. p. 95 not.]; et $BA \times AE = AZ^2$, $AB \times BE = BZ^2$ [u. lemma]. itaque AZ^2, ZB^2 incommensurabilia sunt [prop. XI]. quare AZ, ZB potentia incommensurabiles sunt. et quoniam AB rationalis est, etiam AB^2 rationale est. itaque summa quadratorum $AZ^2 + ZB^2$ rationale est [I, 47]. et quoniam rursus $AE \times EB = EZ^2$ [u. lemma], et supposuimus, esse etiam $AE \times EB = B\Delta^2$, erit $ZE = B\Delta$. itaque $B\Gamma = 2 ZE$. quare etiam $AB \times B\Gamma$ et $AB \times EZ$ commensurabilia sunt [prop. VI]. uerum $AB \times B\Gamma$ medium est [prop. XXI]. itaque etiam $AB \times EZ$ medium est [prop. XXIII coroll.]. uerum $AB \times EZ = AZ \times ZB$ [u. lemma]. itaque etiam $AZ \times ZB$ medium est. demonstrauius autem, etiam summam quadratorum earum rationalem esse.

12. $ZB P$. 13. $\xi\sigma\tau\acute{\iota}\nu P$. ZB] (prius) $BZ FVb$. 14. $\xi\sigma\tau\acute{\iota}$ BV , comp. Fb . 15. $\phi\eta\tau\acute{o}\nu \acute{\alpha}\rho\alpha \xi\sigma\tau\acute{\iota}$] mg. m. 1 F . 16. $\xi\sigma\tau\acute{\iota}$ BV , comp. Fb . 19. $B\Delta$] (alt.) in ras. m. 1 P . 20. $\tau\eta\varsigma$] corr. ex $\tau\eta$ m. 1 V . 21. $\sigma\acute{\upsilon}\mu\mu\epsilon\tau\rho\acute{o}\nu$] $\delta\iota\pi\lambda\acute{\alpha}\sigma\iota\sigma\iota\omicron\nu$ Theon ($B F V b$); mg. m. 1: $\delta\iota\acute{\alpha} \tau\acute{o} \tau\eta\eta\ \beta\Gamma \delta\iota\pi\lambda\acute{\alpha}\sigma\iota\omicron\nu\alpha \epsilon\iota\eta\alpha\iota \tau\eta\varsigma \beta\Delta$, $\tau\eta\eta\ \delta\epsilon \beta\Delta \iota\sigma\eta\eta\ \epsilon\iota\eta\alpha\iota \tau\eta\ EZ$ pro scholio P . $\tau\acute{\omega}$] τοῦ Theon ($B F V$). 22. $AB\Gamma B F b$, et V , corr. m. 2. 23. $\delta\acute{\epsilon}$] om. b .

Εὗρηται ἄρα δύο εὐθείαι δυνάμει ἀσύμμετροι αἱ AZ , ZB ποιοῦσαι τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων ῥητόν, τὸ δὲ ὑπ' αὐτῶν μέσον· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

5

λδ'.

Εὗρεῖν δύο εὐθείας δυνάμει ἀσυμμέτρους ποιούσας τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων μέσον, τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν ῥητόν.

Ἐκκείσθωσαν δύο μέσαι δυνάμει μόνον σύμμετροι
10 αἱ AB , $BΓ$ ῥητὸν περιέχουσai τὸ ὑπ' αὐτῶν, ὥστε τὴν AB τῆς $BΓ$ μείζον δύνασθαι τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἐναντῇ, καὶ γεγράφθω ἐπὶ τῆς AB τὸ $ΑΔΒ$ ἡμικύκλιον, καὶ τεμήσθω ἡ $BΓ$ δίχα κατὰ τὸ E , καὶ παραβεβλήσθω παρὰ τὴν AB τῷ ἀπὸ τῆς BE ἴσον
15 παραλληλόγραμμον ἐλλείπον εἶδει τετραγώνῳ τὸ ὑπὸ τῶν AZB · ἀσύμμετρος ἄρα [ἐστίν] ἡ AZ τῇ ZB μήκει. καὶ ἤχθω ἀπὸ τοῦ Z τῇ AB πρὸς ὀρθᾶς ἡ $ZΔ$, καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ $ΑΔ$, $ΔB$.

Ἐπεὶ ἀσύμμετρός ἐστίν ἡ AZ τῇ ZB , ἀσύμμετρον
20 ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν BA , AZ τῷ ὑπὸ τῶν AB , BZ . ἴσον δὲ τὸ μὲν ὑπὸ τῶν BA , AZ τῷ ἀπὸ τῆς $ΑΔ$, τὸ δὲ ὑπὸ τῶν AB , BZ τῷ ἀπὸ τῆς $ΔB$ · ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς $ΑΔ$ τῷ ἀπὸ τῆς $ΔB$. καὶ ἐπεὶ μέσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς AB , μέσον ἄρα καὶ
25 τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔB$. καὶ ἐπεὶ


1. ἡῦρηται FV. 3. ῥητῶν b, corr. m. 1. δ' BVb.
ἀπ' F. 4. δεῖξαι] εὗρεῖν b, mg. m. 1: γρ. δεῖξαι; in F
mg. m. 2: γρ. εὗρεῖν. 7. τό] corr. ex τόν P. 8. δέ F. 11.
σύμμετρον F, corr. m. 1. 15. ἐλλείπον εἶδει τετραγώνῳ] om.
Fb, m. 2 B. τό] ποιοῦν τό V. 16. τῶν AZB] non liquet F.
 AZ , ZB V. σύμμετρος φ, et B, corr. m. 2. ἐστίν] om. P.
ἐστai φ. ZB] BZ P. 18. $ZΔ$] $ΔZ$ e corr. m. 2 V. $ΔB$]

Ergo inuentae sunt duae rectae potentia incommensurabiles AZ , ZB , quae summam quadratorum suorum rationalem efficiant, rectangulum autem medium; quod erat demonstrandum.

XXXIV.

Inuenire duas rectas potentia incommensurabiles, quae summam quadratorum suorum mediam efficiant, rectangulum autem rationale.

Ponantur duae mediae potentia tantum commensurabiles spatium rationale comprehendentes AB , $B\Gamma$ eius modi, ut AB^2 excedat $B\Gamma^2$ quadrato rectae sibi incommensurabilis [prop. XXXI], et in AB



describatur $A\Delta B$ semicirculus, et $B\Gamma$ in E in duas partes aequales secetur, et rectae AB quadrato BE^2 aequale parallelogrammum adplicetur $AZ \times ZB$ figura quadrata deficiens [VI, 28]. itaque AZ , ZB longitudine incommensurabiles sunt [prop. XVIII]. et a Z ad rectam AB perpendicularis ducatur $Z\Delta$, et ducantur $A\Delta$, ΔB .

quoniam AZ , ZB incommensurabiles sunt, etiam $BA \times AZ$ et $AB \times BZ$ incommensurabilia sunt [prop. XI]. uerum $BA \times AZ = A\Delta^2$, $AB \times BZ = \Delta B^2$ [prop. XXXII lemma]. ergo $A\Delta^2$, ΔB^2 incommensurabilia sunt.

et quoniam AB^2 medium est, etiam $A\Delta^2 + \Delta B^2$ medium est [III, 31. I, 47].

corr. ex $\Delta \Gamma V$. 19. καὶ ἐπεὶ V , ἐπεὶ οὖν m. rec. P. 23. ἐστὶν P. τῆς] (alt.) om. P. ΓB b, corr. m. 1. 25. ΔB] in ras. V.

διπλῇ ἐστὶν ἡ $B\Gamma$ τῆς ΔZ , διπλασίον ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ τῶν AB , $B\Gamma$ τοῦ ὑπὸ τῶν AB , $Z\Delta$. ῥητὸν δὲ τὸ ὑπὸ τῶν AB , $B\Gamma$ ῥητὸν ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ τῶν AB , $Z\Delta$. τὸ δὲ ὑπὸ τῶν AB , $Z\Delta$ ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν $A\Delta$, ΔB . ὥστε καὶ τὸ ὑπὸ τῶν $A\Delta$, ΔB ῥητὸν ἐστίν.

Εὗρηται ἄρα δύο εὐθείαι δυνάμει ἀσύμμετροι αἱ $A\Delta$, ΔB ποιῶσαι τὸ [μὲν] συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων μέσον, τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν ῥητὸν. ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

10

λε'.

Εὕρεϊν δύο εὐθείας δυνάμει ἀσυμμέτρους ποιούσας τὸ τε συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων μέσον καὶ τὸ ὑπ' αὐτῶν μέσον καὶ ἔτι ἀσύμμετρον τῷ συγκειμένῳ ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων.

Ἐκκείσθωσαν δύο μέσαι δυνάμει μόνον σύμμετροι αἱ AB , $B\Gamma$ μέσον περιέχουσαι, ὥστε τὴν AB τῆς $B\Gamma$ μείζον δύνασθαι τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἐαυτῇ, καὶ γεγράφθω ἐπὶ τῆς AB ἡμικύκλιον τὸ $A\Delta B$, καὶ τὰ λοιπὰ γερονέτω τοῖς ἐπάνω ὁμοίως.

Καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρός ἐστὶν ἡ AZ τῇ ZB μῆκει, ἀσύμμετρός ἐστὶ καὶ ἡ $A\Delta$ τῇ ΔB δυνάμει. καὶ ἐπεὶ μέσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς AB , μέσον ἄρα καὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $A\Delta$, ΔB . καὶ ἐπεὶ τὸ ὑπὸ

1. διπλῇ] διπλασίῳ Theon (BFVb). 2. τοῦ] e corr. F. Post $Z\Delta$ add. ὥστε καὶ σύμμετρον V, B m. 2. 3. Post $B\Gamma$ add. Theon: ὑπόκειται γὰρ (οὕτως add. V) (BFVb). 4. $Z\Delta$] corr. in BZ m. 2 F, corr. ex BZ m. rec. b. τό] τῷ BF, τῷ δὲ τῷ b. τῷ] τό BFb. τῶν] om. Pb. 6. ἡῶρηται Vb. σύμμετροι P, corr. m. 1. 7. μὲν] om. P. 8. τετραγώνων F et V, sed corr. δέ F. 9. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. BFVb. 10. λς' F, corr. m. 1. 13. τετραγώνων b, et F,

- τῶν AZ , ZB ἴσον ἐστὶ τῷ ἀφ' ἑκατέρας τῶν BE , ΔZ , ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ BE τῇ ΔZ · διπλῇ ἄρα ἡ $B\Gamma$ τῆς $Z\Delta$ · ὥστε καὶ τὸ ὑπο τῶν AB , $B\Gamma$ διπλασίον ἐστὶ τοῦ ὑπὸ τῶν AB , $Z\Delta$. μέσον δὲ τὸ ὑπὸ τῶν AB , $B\Gamma$ · μέσον ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ τῶν AB , $Z\Delta$. καὶ ἐστὶν ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν $\Delta\Delta$, ΔB · μέσον ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ τῶν $\Delta\Delta$, ΔB . καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρός ἐστὶν ἡ AB τῇ $B\Gamma$ μήκει, σύμμετρος δὲ ἡ ΓB τῇ BE , ἀσύμμετρος ἄρα καὶ ἡ AB τῇ BE μήκει· ὥστε καὶ τὸ ἀπὸ τῆς AB τῷ ὑπὸ τῶν AB , BE ἀσύμμετρόν ἐστιν. ἀλλὰ τῷ μὲν ἀπὸ τῆς AB ἴσα ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν $\Delta\Delta$, ΔB , τῷ δὲ ὑπὸ τῶν AB , BE ἴσον ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν AB , $Z\Delta$, τουτέστι τὸ ὑπὸ τῶν $\Delta\Delta$, ΔB · ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ το συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $\Delta\Delta$, ΔB τῷ
- 15 ὑπὸ τῶν $\Delta\Delta$, ΔB .

- Εὐρίηται ἄρα δύο εὐθεῖαι αἱ $\Delta\Delta$, ΔB δυνάμει ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τό τε συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν μέσον καὶ τὸ ὑπ' αὐτῶν μέσον καὶ ἔτι ἀσύμμετρον τῷ συγκειμένῳ ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων·
- 20 ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

λς'.

- Ἐὰν δύο ρηταὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι συντεθῶσιν, ἡ ὅλη ἄλογός ἐστίν, καλείσθω δὲ ἐκ δύο ὀνομάτων.
- 25 Συγκείσθωσαν γὰρ δύο ρηταὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι αἱ AB , $B\Gamma$ · λέγω, ὅτι ὅλη ἡ AG ἄλογός ἐστιν.


1. AZ] ΔZ b. τῷ] τῷ ἀπὸ P, corr. m. rec. 3. ΔZ BFb. 4. τοῦ] τό F, corr. ex τό m. rec. P, mut. in τῷ m. 1 b. τὸ ὑπό — 5. ἄρα καί] mg. m. 2 B. 8. $B\Gamma$] ΓB F. ΓB] mut. in $B\Gamma$ V. 9. AB] BA e corr. m. 2 V. τό] ins. m. 2 F. 10. τῷ] corr. ex τό F. σύμμετρον F, corr. m. 1. ἄρα ἐστίν b, ἄρα supra add. F. 11. ἐστίν P. τῶν] ins. m. 2 F. 12. τῷ] corr. ex τά m. 1 F. 13. ΔZ B. τουτέστιν P. 14.

quoniam $AZ \times ZB = BE^2 = AZ^2$, erit $BE = AZ$. itaque $B\Gamma = 2 Z\Delta$. quare etiam $AB \times B\Gamma = 2 AB \times Z\Delta$. uerum $AB \times B\Gamma$ medium est. itaque etiam $AB \times Z\Delta$ medium est. et $AB \times Z\Delta = A\Delta \times \Delta B$ [prop. XXXII lemma]. itaque etiam $A\Delta \times \Delta B$ medium est. et quoniam $AB, B\Gamma$ longitudine incommensurabiles sunt, et $\Gamma B, BE$ commensurabiles, etiam AB, BE longitudine incommensurabiles sunt [prop. XIII]. quare etiam AB^2 et $AB \times BE$ incommensurabilia sunt [prop. XXI lemma; prop. XI]. uerum $A\Delta^2 + \Delta B^2 = AB^2$ [I, 47] et $AB \times Z\Delta = AB \times BE = A\Delta \times \Delta B$. itaque $A\Delta^2 + \Delta B^2$ et $A\Delta \times \Delta B$ incommensurabilia sunt.

Ergo inuentae sunt duae rectae $A\Delta, \Delta B$ potentia incommensurabiles, quae et summam quadratorum suorum mediam efficiant et rectangulum medium et simul summae quadratorum incommensurabile; quod erat demonstrandum.

XXXVI.

Si duae rectae rationales potentia tantum commensurabiles componuntur, tota irrationalis est, uocetur autem ex duobus nominibus.


 Componentur enim duae
rectae rationales potentia tan-

τῶν] (prius) mut. in τῆς m. 1 b. 16. αἱ $A\Delta, \Delta B$] om. V.
18. αὐτῶν τετραγώνων V. μέσον καὶ] mg. V. καὶ τό]
seq. ras. 1 litt. V, τὸ δὲ Fb, τὸ δ' B. 20. ὅπερ ἔδει δεῖξαι]
comp. P, om. BFVb. Seq. ἀρχὴ τῶν κατὰ σύνθεσιν ἐξάδων
BFb, mg. V; et in mg. ἐντεῦθεν ἀρχεται παραδιδόναι κατὰ
σύνθεσιν ἐξ (ἐξῆς V) ἀλόγων BFVb. 21. λς'] mut. in λς' F.
23. ἐστὶ BV, comp. Fb. καλεῖται P. 26. ὁλῆ] om. FVb,
m. 2 B. AB b, corr. m. 1.

Ἐπεὶ γὰρ ἀσύμμετρός ἐστιν ἡ AB τῇ $BΓ$ μήκει·
 δυνάμει γὰρ μόνον εἰσὶ σύμμετροι· ὥς δὲ ἡ AB πρὸς
 τὴν $BΓ$, οὕτως το ὑπὸ τῶν $ABΓ$ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς
 $BΓ$, ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν AB , $BΓ$ τῷ
 5 ἀπὸ τῆς $BΓ$. ἀλλὰ τῷ μὲν ὑπὸ τῶν AB , $BΓ$ σύμ-
 μετρόν ἐστι τὸ δις ὑπὸ τῶν AB , $BΓ$, τῷ δὲ ἀπὸ τῆς
 $BΓ$ σύμμετρά ἐστι τὰ ἀπὸ τῶν AB , $BΓ$ · αἱ γὰρ AB ,
 $BΓ$ ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· ἀσύμμετρον
 ἄρα ἐστὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν AB , $BΓ$ τοῖς ἀπὸ τῶν AB , $BΓ$.
 10 καὶ συνθέντι τὸ δις ὑπὸ τῶν AB , $BΓ$ μετὰ τῶν ἀπὸ
 τῶν AB , $BΓ$, τουτέστι τὸ ἀπὸ τῆς $ΑΓ$, ἀσύμμετρόν
 ἐστὶ τῷ συγκειμένῳ ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AB , $BΓ$. ῥητὸν
 δὲ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AB , $BΓ$ · ἄλογον
 ἄρα [ἐστὶ] τὸ ἀπὸ τῆς $ΑΓ$ · ὥστε καὶ ἡ $ΑΓ$ ἄλογός
 15 ἐστίν, καλείσθω δὲ ἐκ δύο ὀνομάτων· ὅπερ ἔδει
 δεῖξαι.

λξ.

Ἐὰν δύο μέσαι δυνάμει μόνον σύμμετροι
 συντεθῶσι ῥητὸν περιέχουσai, ἡ ὅλη ἄλογός
 20 ἐστίν, καλείσθω δὲ ἐκ δύο μέσων πρώτη.

Συγκεισθῶσαν γὰρ δύο μέσαι δυνάμει μόνον σύμ-
 μετροὶ αἱ AB , $BΓ$ ῥητὸν περιέχουσai· λέγω, ὅτι ὅλη
 ἡ $ΑΓ$ ἄλογός ἐστιν.

1. σύμμετρος P, corr. m. 1. 3. ὑπό] α in ras. in extr.
 lin. F. τῶν] τῆς F. $ABΓ$] $AB F$; AB , $BΓ$ e corr. V, m.
 rec. P. ἀπὸ τῆς $BΓ$] seq. α eras. b, ὑπὸ τῶν AB , $BΓ$ F.

4. ὑπὸ τῶν] ἀπὸ τῆς F. $BΓ$] om. F. 5. ἀπὸ τῆς] ὑπὸ
 τῶν AB F. 7. $BΓ$] (prius) $AB F$, sed corr.? αἱ — 8. σύμ-
 μετροὶ] om. Theon (BFVb). 8. ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ] τὸ
 ἄρα V, ὥστε καὶ τὸ BFb. 9. τοῖς] ἀσύμμετρόν ἐστι τοῖς F.

$BΓ$ ἀσύμμετρόν ἐστι BVb. 10. συντεθέντι P et V, sed corr.;
 συντεθέν F, corr. m. 1 et 2. τῶν] (alt.) corr. ex τοῦ m. 2 F. 11.
 AB] corr. ex $ΑΓ$ V. τουτέστιν P. 12. ἐστίν P. 13. ἄλογος
 F, corr. m. 2. 14. ἐστὶ] om. BFVb. 15. ἐστὶ PBV, comp.

tum commensurabiles AB , $B\Gamma$. dico, totam $A\Gamma$ irrationalem esse.

nam quoniam AB , $B\Gamma$ longitudine incommensurabiles sunt (nam potentia tantum sunt commensurabiles), et $AB : B\Gamma = AB \times B\Gamma : B\Gamma^2$ [prop. XXI lemma], etiam $AB \times B\Gamma$ et $B\Gamma^2$ incommensurabilia sunt [prop. XI]. uerum $AB \times B\Gamma$ et $2 AB \times B\Gamma$ commensurabilia sunt [prop. VI], et $AB^2 + B\Gamma^2$, $B\Gamma^2$ commensurabilia sunt (nam AB , $B\Gamma$ rationales sunt potentia tantum commensurabiles) [prop. XV]. itaque $2 AB \times B\Gamma$ et $AB^2 + B\Gamma^2$ incommensurabilia sunt [prop. XIII]. et componendo

$2 AB \times B\Gamma + AB^2 + B\Gamma^2$, hoc est $A\Gamma^2$ [II, 4], et $AB^2 + B\Gamma^2$ incommensurabilia sunt [prop. XVI]. uerum $AB^2 + B\Gamma^2$ rationale est. itaque $A\Gamma^2$ irrationalis est [def. 4]. quare etiam $A\Gamma$ irrationalis est [def. 4], uocetur autem ex duobus nominibus; quod erat demonstrandum.

XXXVII.

Si duae rectae mediae potentia tantum commensurabiles componuntur spatium rationale comprehendentes, tota irrationalis est, uocetur autem ex duobus mediis prima.

Componantur enim duae mediae potentia tantum commensurabiles AB , $B\Gamma$ spatium rationale comprehendentes [prop. XXVII]. dico, totam $A\Gamma$ irrationalem esse.

Fb. Ante ὅπερ schol. est, u. app. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. BFVb. 17. 17' F. 19. συνεθῶσαν BF. 20. ἐστὶ PBV, comp. Fb. 21. συγκατεσθῶσαν b. 22. καὶ λέγω F. δὲ post ras. 1 litt. P, om. Fb.

Ἐπεὶ γὰρ ἀσύμμετρός ἐστιν ἡ AB τῇ $BΓ$ μήκει,
καὶ τὰ ἀπὸ τῶν $AB, BΓ$ ἄρα ἀσύμμετρά ἐστι τῷ δις
ὑπὸ τῶν $AB, BΓ$ καὶ συνθέντι τὰ ἀπὸ τῶν $AB, BΓ$
μετὰ τοῦ δις ὑπὸ τῶν $AB, BΓ$, ὅπερ ἐστὶ τὸ ἀπὸ
5 τῆς $ΑΓ$, ἀσύμμετρόν ἐστι τῷ ὑπὸ τῶν $AB, BΓ$. φητὸν
δὲ τὸ ὑπὸ τῶν $AB, BΓ$ ὑπόκειται γὰρ αἱ $AB, BΓ$
φητὸν περιέχουσαι ἄλογον ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς $ΑΓ$ ἄλογος
ἄρα ἡ $ΑΓ$, καλείσθω δὲ ἐκ δύο μέσων πρώτη· ὅπερ
ἔδει δεῖξαι.

10

λη'.

Ἐὰν δύο μέσαι δυνάμει μόνον σύμμετροι
συντεθῶσι μέσον περιέχουσαι, ἡ ὅλη ἄλογός
ἐστίν, καλείσθω δὲ ἐκ δύο μέσων δευτέρα.

Συγκείσθωσαν γὰρ δύο μέσαι δυνάμει μόνον σύμ-
15 μετροὶ αἱ $AB, BΓ$ μέσον περιέχουσαι· λέγω, ὅτι ἄλογός
ἐστίν ἡ $ΑΓ$.

Ἐκκείσθω γὰρ φητὴ ἡ $ΔΕ$, καὶ τῷ ἀπὸ τῆς $ΑΓ$
ἴσον παρὰ τὴν $ΔΕ$ παραβελήσθω τὸ $ΔΖ$ πλάτος
ποιοῦν τὴν $ΔΗ$. καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς $ΑΓ$ ἴσον ἐστὶ
20 τοῖς τε ἀπὸ τῶν $AB, BΓ$ καὶ τῷ δις ὑπὸ τῶν $AB,$
 $BΓ$, παραβελήσθω δὴ τοῖς ἀπὸ τῶν $AB, BΓ$ παρὰ
τὴν $ΔΕ$ ἴσον τὸ $ΕΘ$ · λοιπὸν ἄρα τὸ $ΘΖ$ ἴσον ἐστὶ
τῷ δις ὑπὸ τῶν $AB, BΓ$. καὶ ἐπεὶ μέση ἐστὶν ἑκα-
τέρα τῶν $AB, BΓ$, μέσα ἄρα ἐστὶ καὶ τὰ ἀπὸ τῶν


1. τῇ] m. rec. P. $ΑΓ$ b. 2. ἐστὶ τῷ] corr. ex ἔστω
m. 2 B. τῷ] corr. ex τό F. 3. καί] om. Theon (BFVb).
συντεθέντι P. ἄρα τὰ Theon (BFVb). τῷ] τό V. 4.
ἐστίν P. τὸ ἀπὸ] in ras. m. 1 P. 5. σύμμετρα F, sed. corr.
ἐστίν P. $BΓ$] postea ins. F. φητόν — 6. $BΓ$] (prius) om. Fb,
m. 2 B. 6. γὰρ] m. 2 B, δέ Fb, B m. 1. αἱ] αἱ ἀπὸ τῶν b.
7. ἄλογος — 8. $ΑΓ$] mg. m. 1 P. 8. πρώτη] seq. schol.,
u. app. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. BFVb. 10. λθ' F.

nam quoniam AB , $B\Gamma$ longitudine incommensurabiles sunt, etiam $AB^2 + B\Gamma^2$ et $2 AB \times B\Gamma$ incommensurabilia sunt [cfr. p. 108, 1 sq.]. et componendo $AB^2 + B\Gamma^2 + 2 AB \times B\Gamma$, hoc est $A\Gamma^2$ [II, 4], et $AB \times B\Gamma$ incommensurabilia sunt [prop. XVI]. uerum $AB \times B\Gamma$ rationale est; supposuimus enim, AB et $B\Gamma$ spatium rationale comprehendere. itaque $A\Gamma^2$ irrationale est. ergo $A\Gamma$ irrationalis est [def. 4], uocetur autem ex duabus mediis prima; quod erat demonstrandum.

XXXVIII.

Si duae mediae potentia tantum commensurabiles componentur medium comprehendentes, tota irrationalis est, uocetur autem ex duabus mediis secunda.

Componentur enim duae mediae potentia tantum commensurabiles AB , $B\Gamma$ medium comprehendentes [prop. XXVIII]. dico, $A\Gamma$ irrationalem esse.



ponatur enim rationalis ΔE , et quadrato $A\Gamma^2$ aequale rectae ΔE adplicetur ΔZ latitudinem efficiens ΔH [I, 44]. et

quoniam $A\Gamma^2 = AB^2 + B\Gamma^2 + 2 AB \times B\Gamma$ [II, 4],

12. συντεθειμένων PF. 13. ἐστὶ BV, comp. Fb. 17. γὰρ] om. FVb, m. 2 B. ἡ] corr. ex α V. τῶ] corr. ex τὸ m. 2 P. 21. Post BΓ add. Theon: τὸ δὲ ἀπὸ τῆς AΓ ἴσον ἐστὶ τῷ ΔZ, καὶ τὸ ΔZ ἄρα ἴσον ἐστὶ τοῖς (τε add. V) ἀπὸ τῶν AB, BΓ καὶ τῷ δις ὑπὸ τῶν AB, BΓ (BVb, F mg. m. 1). δὴ παρὰ τὴν ΔE V. παρὰ τὴν ΔE] om. V. 22. ἐστὶ] m. 2 F. 24. μέση B, corr. m. 2. ἐστὶ] m. 2 V.

$AB, B\Gamma$. μέσον δὲ ὑπόκειται καὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν
 $AB, B\Gamma$. καὶ ἐστὶ τοῖς μὲν ἀπὸ τῶν $AB, B\Gamma$ ἴσον
τὸ $E\Theta$, τῷ δὲ δις ὑπὸ τῶν $AB, B\Gamma$ ἴσον τὸ $Z\Theta$.
μέσον ἄρα ἐκάτερον τῶν $E\Theta, \Theta Z$. καὶ παρὰ ῥητὴν
5 τὴν ΔE παράκειται· ῥητὴ ἄρα ἐστὶν ἐκατέρω τῶν
 $\Delta\Theta, \Theta H$ καὶ ἀσύμμετρος τῇ ΔE μήκει. ἐπεὶ οὖν
ἀσύμμετρός ἐστιν ἡ AB τῇ $B\Gamma$ μήκει, καὶ ἐστὶν ὡς
ἡ AB πρὸς τὴν $B\Gamma$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς AB πρὸς τὸ
ὑπο τῶν $AB, B\Gamma$, ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς
10 AB τῷ ὑπὸ τῶν $AB, B\Gamma$. ἀλλὰ τῷ μὲν ἀπὸ τῆς
 AB σύμμετρόν ἐστι τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν
 $AB, B\Gamma$ τετραγώνων, τῷ δὲ ὑπὸ τῶν $AB, B\Gamma$ σύμ-
μετρόν ἐστι τὸ δις ὑπὸ τῶν $AB, B\Gamma$. ἀσύμμετρον ἄρα
ἐστὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $AB, B\Gamma$ τῷ δις
15 ὑπὸ τῶν $AB, B\Gamma$. ἀλλὰ τοῖς μὲν ἀπὸ τῶν $AB, B\Gamma$
ἴσον ἐστὶ τὸ $E\Theta$, τῷ δὲ δις ὑπὸ τῶν $AB, B\Gamma$ ἴσον
ἐστὶ τὸ ΘZ . ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ $E\Theta$ τῷ ΘZ .
ὥστε καὶ ἡ $\Delta\Theta$ τῇ ΘH ἐστὶν ἀσύμμετρος μήκει. αἱ
 $\Delta\Theta, \Theta H$ ἄρα ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι.
20 ὥστε ἡ ΔH ἄλογός ἐστιν. ῥητὴ δὲ ἡ ΔE . τὸ δὲ ὑπὸ
ἀλόγου καὶ ῥητῆς περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἄλογόν
ἐστίν· ἄλογον ἄρα ἐστὶ τὸ ΔZ χωρίον, καὶ ἡ δυνα-
μένη [αὐτὸ] ἄλογός ἐστιν. δύναται δὲ τὸ ΔZ ἢ AG .

1. καί] om. BFB; τὸ ὑπὸ τῶν (om. FB) $AB, B\Gamma$. μέσον
ἄρα Bb, postea ins. F; κείμενον· τὸ δις ὑπὸ τῶν $AB, B\Gamma$.
μέσον ἄρα mg. m. rec. B. ὑπὸ τῶν] spat. uac. F. 3. $Z\Theta$
corr. ex ΘZ V. 5. παράκειται V. 6. ἐπεὶ οὖν] καὶ ἐπεὶ
Theon (BFBVb). 7. καί — 9. $B\Gamma$] om. Theon (BFBVb). 9.
ἀσύμμετρον — 10. $B\Gamma$] punctis del. V. 9. ἄρα] om. FVB,
m. rec. B. ἐστὶν P. ἀπὸ τῆς AB τῷ] συγκείμενον ἐκ τῶν
ἀπὸ τῶν $AB, B\Gamma$ τῷ δις Theon (BFBVb). 10. ἀλλὰ — 15.
 $AB, B\Gamma$ (prius)] om. Theon (BFBVb). In mg. καὶ ἐστὶν lin. 7
— $AB, B\Gamma$ lin. 15 addito κείμενον et signis $\times$ $\cup$ ad locum
suum relat. V (lin. 10 ἀπὸ pro ὑπό), eadem B mg. m. 2, nisi

rectae ΔE adplicetur $E\Theta$ quadratis $AB^2 + B\Gamma^2$ aequale. itaque reliquum $\Theta Z = 2 AB \times B\Gamma$. et quoniam media est utraque $AB, B\Gamma$, etiam $AB^2 + B\Gamma^2$ media sunt. supposuimus autem, etiam $2 AB \times B\Gamma$ medium esse. et $E\Theta = AB^2 + B\Gamma^2$, $Z\Theta = 2 AB \times B\Gamma$. itaque utrumque $E\Theta, \Theta Z$ medium est. et rationali ΔE adplicata sunt. itaque utraque $\Delta\Theta, \Theta H$ rationalis est et rectae ΔE longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. iam quoniam $AB, B\Gamma$ longitudine incommensurabiles sunt, et $AB : B\Gamma = AB^2 : AB \times B\Gamma$ [prop. XXI lemma], AB^2 et $AB \times B\Gamma$ incommensurabilia sunt [prop. XI]. uerum AB^2 et $AB^2 + B\Gamma^2$ commensurabilia sunt [prop. XV], et $AB \times B\Gamma, 2 AB \times B\Gamma$ commensurabilia sunt [prop. VI]. itaque $AB^2 + B\Gamma^2$ et $2 AB \times B\Gamma$ incommensurabilia sunt [prop. XIII]. uerum $E\Theta = AB^2 + B\Gamma^2$, $\Theta Z = 2 AB \times B\Gamma$. itaque $E\Theta, \Theta Z$ incommensurabilia sunt. quare etiam $\Delta\Theta, \Theta H$ longitudine incommensurabiles sunt [VI, 1; prop. XI]. ergo $\Delta\Theta, \Theta H$ rationales sunt potentia tantum commensurabiles. quare ΔH irrationalis est [prop. XXXVI]. uerum ΔE rationalis est. rectangulum autem recta irrationali et rationali comprehensum irrationale est [prop. XX]. quare spatium ΔZ irrationale est, et recta ei aequalis quadrata irrationalis est [def. 4]. uerum $A\Gamma^2 = \Delta Z$. ergo $A\Gamma$ irrationalis est; uocetur

quod om. ἀπό lin. 14 — $AB, B\Gamma$ lin. 15 et del. ἀσύμμετρον lin 13 — ἐκ τῶν lin. 14. 17. ΘZ] mut. in $Z\Theta$ V, $Z\Theta$ Bfb. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\acute{\iota}\nu$ P. ΘZ] $Z\Theta$ Bb. 18. ἀσύμμετρος $\acute{\epsilon}\sigma\tau\acute{\iota}$ V. μήκει] om. Fb, m. 2 B. Deinde add. $\acute{\epsilon}\delta\epsilon\lambda\chi\theta\eta\sigma\alpha\nu$ δὲ $\phi\eta\tau\acute{\alpha}\iota$ V, m. 2 B. 19. $\acute{\epsilon}\sigma\iota\nu$ PB. 20. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ BV, comp. Fb. 22. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\acute{\iota}\nu$ P. καὶ ὥστε καὶ V. 23. αὐτό] om. P. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ PBV, comp. Fb. δὲ ἡ ΔZ τὸ $A\Gamma$ ἄρα ἄλογός $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\nu$ F.

ἄλογος ἄρα ἐστὶν ἡ $ΑΓ$, καλείσθω δὲ ἐκ δύο μέσων δευτέρα. ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

λθ'.

Ἐὰν δύο εὐθελαι δυνάμει ἀσύμμετροι συν-
5 τεθῶσι ποιοῦσαι τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν
ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων ῥητόν, τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν
μέσον, ἡ ὅλη εὐθεῖα ἄλογός ἐστιν, καλείσθω δὲ
μείζων.

Συγκείσθωσαν γὰρ δύο εὐθελαι δυνάμει ἀσύμμε-
10 τροι αἱ $ΑΒ$, $ΒΓ$ ποιοῦσαι τὰ προκείμενα· λέγω, ὅτι
ἄλογός ἐστιν ἡ $ΑΓ$.

Ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$ μέσον ἐστίν, καὶ
τὸ δις [ἄρα] ὑπὸ τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$ μέσον ἐστίν. τὸ δὲ
συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$ ῥητόν· ἀσύμ-
15 μετρον ἄρα ἐστὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$ τῷ συγ-
κειμένῳ ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$ · ὥστε καὶ τὰ ἀπὸ
τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$ μετὰ τοῦ δις ὑπὸ τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$, ὅπερ
ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς $ΑΓ$, ἀσύμμετρόν ἐστι τῷ συγκειμένῳ
ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$ [ῥητόν δὲ τὸ συγκείμενον
20 ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$]· ἄλογον ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ
τῆς $ΑΓ$. ὥστε καὶ ἡ $ΑΓ$ ἄλογός ἐστιν, καλείσθω δὲ
μείζων. ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

μ'.

Ἐὰν δύο εὐθελαι δυνάμει ἀσύμμετροι συν-
25 τεθῶσι ποιοῦσαι το μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν
ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων μέσον, το δ' ὑπ' αὐτῶν

2. δευτέρα] seq. schol., u. app. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp.
P, om. B F V b. 3. λθ'] om. b, μ' F. 4. συντεθῶσιν P B F.

autem ex duabus mediis secunda. quod erat demonstrandum.

XXXIX.

Si duae rectae potentia incommensurabiles componuntur, quae summam quadratorum suorum rationalem efficiant, rectangulum autem medium, tota recta irrationalis est, uocetur autem maior.

Componantur enim duae rectae
 $\overline{A} \quad \overline{B} \quad \overline{\Gamma}$ potentia incommensurabiles $AB, B\Gamma$,
 quae proposita efficiant [prop. XXXIII]. dico, $A\Gamma$ ir-
 rationalem esse.

nam quoniam $AB \times B\Gamma$ medium est, etiam $2 AB \times B\Gamma$ medium est [prop. VI, XXIII coroll.]. est autem $AB^2 + B\Gamma^2$ rationale. itaque $2 AB \times B\Gamma$ et $AB^2 + B\Gamma^2$ incommensurabilia sunt [def. 4]. quare etiam $AB^2 + B\Gamma^2 + 2 AB \times B\Gamma$, hoc est $A\Gamma^2$ [II, 4], et $AB^2 + B\Gamma^2$ incommensurabilia sunt [prop. XVI]. ergo $A\Gamma^2$ irrationale est; quare etiam $A\Gamma$ irrationalis est [def. 4]; uocetur autem maior. quod erat demonstrandum.

XL.

Si duae rectae potentia incommensurabiles componuntur, quae summam quadratorum suorum medium efficiant, rectangulum autem rationale, tota recta irra-

5. μέν] τε V. 6. τετράγωνον b. τὸ δὲ BF, δὲ τὸ b. 7. ἐστὶ V, comp. Fb. 12. ἐστὶ PBV, comp. Fb. 13. ἄρα] om. P. ἐστὶ PBV, comp. Fb. 16. τὰ] τὸ B. 18. ἐστὶν P. σύμμετρον b, corr. m. rec. ἐστὶν P. 19. ῥητόν — 20. BΓ] om. P. 20. ἄλογος F, corr. m. 1. 21. ἐστὶ PBV, comp. Fb. 22. μέζων] seq. schol., u. app. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] om. BFb, comp. P. 23. μὰ F. 24. συντεθῶσιν BF. 26. δέ F.

ρήτόν, ἡ ὅλη εὐθεῖα ἄλογός ἐστιν, καλεῖσθω δὲ
ρήτόν καὶ μέσον δυναμένην.

Συγκείσθωσαν γὰρ δύο εὐθεῖαι δυνάμει ἀσύμμετροι
αἱ $AB, B\Gamma$ ποιοῦσαι τὰ προκείμενα· λέγω, ὅτι ἄλογός
5 ἐστὶν ἡ $ΑΓ$.

Ἐπεὶ γὰρ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $AB, B\Gamma$
μέσον ἐστίν, τὸ δὲ δις ὑπὸ τῶν $AB, B\Gamma$ ρητόν, ἀσύμ-
μετρον ἄρα ἐστὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $AB,$
 $B\Gamma$ τῷ δις ὑπὸ τῶν $AB, B\Gamma$ ὥστε καὶ τὸ ἀπὸ τῆς
10 $ΑΓ$ ἀσύμμετρόν ἐστι τῷ δις ὑπὸ τῶν $AB, B\Gamma$. ρητόν
δὲ τὸ δις ὑπὸ τῶν $AB, B\Gamma$ ἄλογον ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς
 $ΑΓ$. ἄλογος ἄρα ἡ $ΑΓ$, καλεῖσθω δὲ ρητόν καὶ μέ-
σον δυναμένην. ὅπερ εἶδει δεῖξαι.

μα'.

15 Ἐὰν δύο εὐθεῖαι δυνάμει ἀσύμμετροι συν-
τεθῶσι ποιοῦσαι τό τε συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ'
αὐτῶν τετραγώνων μέσον καὶ τὸ ὑπ' αὐτῶν μέ-
σον καὶ ἔτι ἀσύμμετρον τῷ συγκειμένῳ ἐκ τῶν
ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων, ἡ ὅλη εὐθεῖα ἄλογός
20 ἐστὶν, καλεῖσθω δὲ δύο μέσα δυναμένην.

Συγκείσθωσαν γὰρ δύο εὐθεῖαι δυνάμει ἀσύμμε-
τροι αἱ $AB, B\Gamma$ ποιοῦσαι τὰ προκείμενα· λέγω, ὅτι
ἡ $ΑΓ$ ἄλογός ἐστιν.

Ἐκείσθω ρητὴ ἡ $ΔΕ$, καὶ παραβεβλήσθω παρὰ

1. ρητόν, ἡ] in ras. V. ἐστι $B\Gamma$, comp. Fb. καλεῖται P.
3. γὰρ] supra scr. m. 1 b. 4. αἱ] supra m. 1 P. προσ-
κείμενα F, sed corr. 5. AB , corr. m. rec., P. 6. ὑπὸ F,
corr. m. 2. 7. μέσον] μέσ- in ras. V. ἐστὶ $PBVb$, comp. F.
δ[ς] supra scr. m. 1 V. ρητόν] corr. ex μέσον m. 2 V. σύμ-
μετρον B, corr. m. rec. 8. ἐστὶν P. 10. τῷ — $B\Gamma$] bis b,
mg. m. 1 P. Post καὶ add. συνθέντι Theon ($B\Gamma Vb$), P m.

tionalis est, uocetur autem spatio rationali et medio aequalis quadrata.

$\left\{ \begin{array}{l} A \\ B \\ \Gamma \end{array} \right.$ Componantur enim duae rectae potentia incommensurabiles, quae proposita efficiant, AB , $B\Gamma$ [prop. XXXIV]. dico, AG irrationalem esse.
nam quoniam $AB^2 + B\Gamma^2$ medium est, $2AB \times B\Gamma$ autem rationale, $AB^2 + B\Gamma^2$ et $2AB \times B\Gamma$ incommensurabilia sunt. quare etiam AG^2 et $2AB \times B\Gamma$ incommensurabilia sunt [prop. XVI]. uerum $2AB \times B\Gamma$ rationale est. itaque AG^2 irrationale est. quare AG irrationalis est [def. 4]; uocetur autem spatio rationali et medio aequalis quadrata. quod erat demonstrandum.

XLI.

Si duae rectae potentia incommensurabiles componuntur, quae summam quadratorum suorum mediam efficiant, et rectangulum medium et simul summae quadratorum incommensurabile, tota recta irrationalis est, uocetur autem duobus spatiis mediis aequalis quadrata.

Componantur enim duae rectae potentia incommensurabiles AB , $B\Gamma$, quae proposita efficiant [prop. XXXV]. dico, AG irrationalem esse.

ponatur rationalis AE , et rectae AE quadratis

rec. 12. ἄλογος — AG] mg. m. 1 P. 13. δυναμένη] seq. schol., u. app. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] om. Bf^b, comp. P. 14. μα'] mut. in μβ' m. 2 F. 15. συντεθῶσιν PBF. 17. καὶ τὸ ὑπ' αὐτῶν μέσον] supra scr. m. 2 V. 19. τετραγώνωι PV. ἡ] m. 2 F. 20. ἐστὶ PBV, comp. Fb. 22. τὰ προκείμενα] τὸ τε συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AB , $B\Gamma$ μέσον καὶ τὸ ὑπὸ τῶν AB , $B\Gamma$ μέσον καὶ ἐστὶ ἀσύμμετρον τῷ συγκείμενῳ ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AB , $B\Gamma$ τετραγώνων Theon (BFV^b, τετραγώνω FV^b).

τὴν ΔE τοῖς μὲν ἀπὸ τῶν AB , $B\Gamma$ ἴσον τὸ ΔZ , τῷ
 δὲ δις ὑπὸ τῶν AB , $B\Gamma$ ἴσον τὸ $H\Theta$. ὅλον ἄρα τὸ
 $\Delta\Theta$ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς AG τετραγώνῳ. καὶ ἐπεὶ
 μέσον ἐστὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AB , $B\Gamma$,
 5 καὶ ἐστὶν ἴσον τῷ ΔZ , μέσον ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ ΔZ .
 καὶ παρὰ ρητὴν τὴν ΔE παράκειται· ρητὴ ἄρα ἐστὶν
 ἢ ΔH καὶ ἀσύμμετρος τῇ ΔE μήκει. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ
 καὶ ἡ HK ρητὴ ἐστὶ καὶ ἀσύμμετρος τῇ HZ , τουτ-
 ἐστὶ τῇ ΔE , μήκει. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρά ἐστι τὰ ἀπὸ
 10 τῶν AB , $B\Gamma$ τῷ δις ὑπὸ τῶν AB , $B\Gamma$, ἀσύμμετρόν
 ἐστὶ τὸ ΔZ τῷ $H\Theta$. ὥστε καὶ ἡ ΔH τῇ HK ἀσύμμε-
 τρός ἐστιν. καὶ εἰσι ρηταί· αἱ ΔH , HK ἄρα ρηταί
 εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· ἄλογος ἄρα ἐστὶν ἡ
 ΔK ἢ καλουμένη ἐκ δύο ὀνομάτων. ρητὴ δὲ ἡ ΔE .
 15 ἄλογον ἄρα ἐστὶ τὸ $\Delta\Theta$ καὶ ἡ δυναμένη αὐτὸ ἄλογός
 ἐστὶν. δύναται δὲ τὸ $\Theta\Delta$ ἢ AG . ἄλογος ἄρα ἐστὶν ἡ
 AG , καλεῖσθω δὲ δύο μέσα δυναμένη. ὅπερ εἶδει
 δεῖξαι.


Λήμμα.

20 Ὅτι δὲ αἱ εἰρημέναι ἄλογοι μοναχῶς διαιροῦνται
 εἰς τὰς εὐθείας, ἐξ ὧν σύγκεινται ποιουσῶν τὰ προ-
 κείμενα εἶδη, δεῖξομεν ἥδη προεκθέμενοι λημμάτων
 τοιοῦτον·

Ἐκκείσθω εὐθεῖα ἡ AB καὶ τετμήσθω ἡ ὅλη εἰς
 25 ἄνισα καθ' ἐκάτερον τῶν Γ , Δ , ὑποκείσθω δὲ μείζων


1. ΔE] corr. ex ΔA m. 2 P. 3. $\Theta\Delta$ P. 6. ΔE] corr.
 ex Δ m. rec. B. 7. διὰ — 9. μήκει] mg. m. 2 F. 8. ἐστὶν B.
 τουτεστιν B. 9. ἀσύμμετρόν ἐστι τὸ BV. 10. τῷ — $B\Gamma$]
 mg. m. 1 P (τῷ corr. ex τό m. rec.). 11. ἄρα ἐστὶ P. ΔH]
 $H\Delta$ b. 12. ἐστὶ Vb, comp. F m. 2. εἰσιν B. Post αἱ
 del. δὲ F. ἄρα] m. 2 F. 13. εἰσιν P. 14. ΔK] K e corr.
 m. 1 b. 16. ἐστὶ V, comp. b et m. 2 F. $\Theta\Delta$] in ras. Vb,
 $\Delta\Theta$ corr. ex ΔH m. 2 B. ἢ AG] m. 2 B. ἄρα] γὰρ B.

$AB^2 + B\Gamma^2$ aequale adplicetur ΔZ , rectangulo autem $2 AB \times B\Gamma$ aequale $H\Theta$. itaque $\Delta\Theta = A\Gamma^2$ [II, 4]. et quoniam $AB^2 + B\Gamma^2$ medium est et $= \Delta Z$, etiam ΔZ medium est. et rectae rationali ΔE adplicatum est. itaque ΔH rationalis est et rectae ΔE longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. eadem de causa etiam HK rationalis est et rectae HZ , hoc est ΔE , longitudine incommensurabilis. et quoniam $AB^2 + B\Gamma^2$ et $2 AB \times B\Gamma$ incommensurabilia sunt, ΔZ et $H\Theta$ incommensurabilia sunt. quare etiam ΔH , HK incommensurabiles sunt [VI, 1; prop. XI]. et sunt rationales; itaque ΔH , HK rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo ΔK irrationalis est, ex duobus nominibus quae uocatur [prop. XXXVI]. ΔE autem rationalis est. itaque $\Delta\Theta$ irrationale est, et recta ei aequalis quadrata irrationalis [def. 4]. est autem $A\Gamma^2 = \Delta\Theta$. ergo $A\Gamma$ irrationalis est; uocetur autem duobus spatiis mediis aequalis quadrata. quod erat demonstrandum.



Lemma.

Rectas autem irrationales, quas nominauimus, uno tantum modo in rectas diuidi, ex quibus compositae sint proposita efficientibus, demonstrabimus huiusmodi lemmate praemisso.



17. *δυναμένη*] seq. schol., u. app. *ὅπερ ἔδει δεῖξαι*] om. BFVb. 19. *λήμμα*] om. BV, m. rec. P. 20. *ὅτι*] *τι* V. 21. *προσκειμένα* F, corr. m. 2. 22. *προθέμενοι* P, *προσκειθέμενοι* B et F, sed corr. 24. Ante *εὐθεία* ras. 3 litt. V. *ἡ ὅλη*] *ὅλη* FVb. 25. *καὶ καθ'* F. *ἐκότερα* BV. *ὑποκείσθω δέ*] *καὶ ὑποκείσθω* P.

ἡ $ΑΓ$ τῆς $ΔΒ$ · λέγω, ὅτι τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ μείζονά ἐστι τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$.

Τετμήσθω γὰρ ἡ $ΑΒ$ δίχα κατὰ τὸ $Ε$. καὶ ἐπει μείζων ἐστὶν ἡ $ΑΓ$ τῆς $ΔΒ$, κοινὴ ἀφηρησθῶ ἡ $ΔΓ$.
 5 λοιπὴ ἄρα ἡ $ΑΔ$ λοιπῆς τῆς $ΓΒ$ μείζων ἐστίν. ἴση δὲ ἡ $ΑΕ$ τῇ $ΕΒ$ · ἐλάττων ἄρα ἡ $ΔΕ$ τῆς $ΕΓ$ · τὰ $Γ$, $Δ$ ἄρα σημεῖα οὐκ ἴσον ἀπέχονσι τῆς διχοτομίας. καὶ ἐπεὶ τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς $ΕΓ$ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς $ΕΒ$, ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ ὑπὸ τῶν
 10 $ΑΔ$, $ΔΒ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $ΔΕ$ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς $ΕΒ$, τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς $ΕΓ$ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς $ΔΕ$ · ὦν τὸ ἀπὸ τῆς $ΔΕ$ ἐλασσόν ἐστι τοῦ ἀπὸ τῆς $ΕΓ$ · καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ ἐλασσόν
 15 ἐστὶ τοῦ ὑπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$. ὥστε καὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ ἐλασσόν ἐστὶ τοῦ δις ὑπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$. καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ μείζον ἐστὶ τοῦ συγκειμένου ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

20

μβ'.

Ἡ ἐκ δύο ὀνομάτων κατὰ ἓν μόνον σημεῖον διαιρεῖται εἰς τὰ ὀνόματα.

Ἔστω ἐκ δύο ὀνομάτων ἡ $ΑΒ$ διηρημένη εἰς τὰ ὀνόματα κατὰ τὸ $Γ$ · αὖ $ΑΓ$, $ΓΒ$ ἄρα ῥηταί εἰσι δυνά-
 25 μει μόνον σύμμετροι. λέγω, ὅτι ἡ $ΑΒ$ κατ' ἄλλο σημεῖον οὐ διαιρεῖται εἰς δύο ῥητὰς δυνάμει μόνον συμμέτρους.

2. $ΑΔ$] $ΑΓ$ corr. in $ΑΒ$ m. rec. b. 4. Post κοινὴ del.
 δέ V. $ΔΓ$] $ΑΓ$ b, $ΔΓ$ καὶ P. 6. ἐλάσσων P. ἄρα ἐστὶν P.

7. $Δ$, $Γ$ P. 9. μὴν] om. P. 10. τῆς $ΔΕ$ V. τῷ] τοῦ b.

Ponatur recta AB et tota in Γ , Δ in partes inaequales secetur, et supponatur $A\Gamma > \Delta B$. dico, esse $A\Gamma^2 + \Gamma B^2 > A\Delta^2 + \Delta B^2$. nam AB in duas partes aequales secetur in E . et quoniam $A\Gamma > \Delta B$, subtrahatur, quae communis est, $\Delta\Gamma$. itaque relinquitur $A\Delta > \Gamma B$. uerum $AE = EB$. itaque $\Delta E < E\Gamma$. itaque puncta Γ , Δ a puncto medio aequaliter non distant. et quoniam $A\Gamma \times \Gamma B + E\Gamma^2 = EB^2$ [II, 5], et $A\Delta \times \Delta B + \Delta E^2 = EB^2$ [id.], erit $A\Gamma \times \Gamma B + E\Gamma^2 = A\Delta \times \Delta B + \Delta E^2$. quorum $\Delta E^2 < E\Gamma^2$. itaque reliquum $A\Gamma \times \Gamma B < A\Delta \times \Delta B$. quare etiam $2 A\Gamma \times \Gamma B < 2 A\Delta \times \Delta B$. ergo etiam reliquum¹⁾ $A\Gamma^2 + \Gamma B^2 > A\Delta^2 + \Delta B^2$; quod erat demonstrandum.

XLII.

Recta ex duobus nominibus in uno tantum puncto in nomina diuiditur.

Ex duobus nominibus sit AB in puncto Γ in nomina diuisa. itaque $A\Gamma$, ΓB rationales sunt potentia tantum commensurabiles [prop. XXXVI]. dico, AB in nullo alio puncto in duas rationales potentia tantum commensurabiles diuidi.

¹⁾ Nam
 $A\Gamma^2 + \Gamma B^2 + 2 A\Gamma \times \Gamma B = AB^2 = A\Delta^2 + \Delta B^2 + 2 A\Delta \times \Delta B$
 (II, 4).

11. ΓB] in ras. F. 12. $\tau\eta\varsigma$] postea ins. F. 13. $\acute{\alpha}\nu - \Delta E$] om F. $\acute{\epsilon}\lambda\alpha\sigma\sigma\upsilon$ V. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$] om. V. 14. $\acute{\epsilon}\lambda\alpha\tau\tau\omega$ BVb, comp. F (in B supra scr. $\mu\epsilon\iota\zeta\omega$ m. rec., sed del.); item lin. 16. 16. $\kappa\alpha\iota$] supra scr. F. 18. $\acute{\alpha}\nu\acute{o}$] corr. ex $\nu\acute{o}$ m. 2 V. 19. Ante $\acute{\omicron}\pi\epsilon\rho$ add. $\epsilon\iota\pi\epsilon\rho$ $\sigma\upsilon\nu\alpha\mu\phi\acute{o}\tau\epsilon\rho\alpha$ $\acute{\iota}\sigma\alpha$ $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ $\tau\acute{o}$ ($\tau\acute{\omega}\nu$ b) $\acute{\alpha}\nu\acute{o}$ $\tau\eta\varsigma$ AB Theon (BFVb), m. rec. P. 21. $\kappa\alpha\theta'$ b. 24. $\kappa\alpha\tau\acute{\alpha}$] supra scr. m. 1 P. $\acute{\epsilon}\acute{\iota}\sigma\iota\nu$ PBF.

Εἰ γὰρ δυνατόν, διηρησθῶ καὶ κατὰ τὸ Δ , ὥστε καὶ τὰς $\Delta\Delta$, ΔB φητὰς εἶναι δυνάμει μόνον συμμέτρους. φανερόν δὴ, ὅτι ἡ $ΑΓ$ τῇ ΔB οὐκ ἔστιν ἡ αὐτή. εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω. ἔσται δὴ καὶ ἡ $\Delta\Delta$ τῇ ΓB ἡ αὐτή· καὶ ἔσται ὡς ἡ $ΑΓ$ πρὸς τὴν ΓB , οὕτως ἡ $B\Delta$ πρὸς τὴν $\Delta\Delta$, καὶ ἔσται ἡ ΔB κατὰ τὸ αὐτὸ τῇ κατὰ τὸ Γ διαιρέσει διαιρεθεῖσα καὶ κατὰ τὸ Δ . ὅπερ οὐχ ὑπόκειται. οὐκ ἄρα ἡ $ΑΓ$ τῇ ΔB ἔστιν ἡ αὐτή. διὰ δὴ τοῦτο καὶ τὰ Γ , Δ σημεῖα οὐκ ἴσον ἀπέχουσι τῆς διχοτομίας. ὅ ἄρα διαφέρει τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, ΓB τῶν ἀπὸ τῶν $\Delta\Delta$, ΔB , τούτῳ διαφέρει καὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν $\Delta\Delta$, ΔB τοῦ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, ΓB διὰ τὸ καὶ τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, ΓB μετὰ τοῦ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, ΓB καὶ τὰ ἀπὸ τῶν $\Delta\Delta$, ΔB μετὰ τοῦ δις ὑπὸ τῶν $\Delta\Delta$, ΔB ἴσα εἶναι τῷ ἀπὸ τῆς $ΑΒ$. ἀλλὰ τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, ΓB τῶν ἀπὸ τῶν $\Delta\Delta$, ΔB διαφέρει φητῶ· φητὰ γὰρ ἀμφοτέρω· καὶ τὸ δις ἄρα ὑπὸ τῶν $\Delta\Delta$, ΔB τοῦ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, ΓB διαφέρει φητῶ μέσα ὄντα· ὅπερ ἄτοπον· μέσον γὰρ μέσον οὐχ ὑπερέχει φητῶ.

Οὐκ ἄρα ἡ ἐκ δύο ὀνομάτων κατ' ἄλλο καὶ ἄλλο σημεῖον διαιρεῖται· καθ' ἓν ἄρα μόνον· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

μγ'.

Ἡ ἐκ δύο μέσων πρώτη καθ' ἓν μόνον σημεῖον διαιρεῖται.

1. διαιρέσθω V. καὶ κατὰ] κατὰ BFVb. 3. ΔB] $B\Delta$ e corr. m. 2 V. 4. δὴ] corr. ex δέ V. $\Delta\Delta$] corr. ex $\Delta\Gamma$ V. 5. ΓB] mut. in $B\Gamma$ V. ὡς ἡ — 6. ἔσται] m. 2 B. 6. τῇ] om. Fb. ἡ] ὡς ἡ b (corr.), ὡς supra scr. m. 1 F. αὐτό] αὐ- e corr. V; αὐτὸ τμήμα P, τμήμα supra scr. m. 2 V. 7. τῇ κατὰ] m. rec. P. Post καὶ add. τῇ supra m. 1 V. 8. ΔB] ΔB φ. 10. ἀπέχουσιν B. τοῦ διχοτομίου P, corr. m. rec. φ] ὡς φ. 12. $\Delta\Gamma$, ΓB P. τοῦ] corr. ex ου

$\begin{array}{l} A \\ \vdots \\ \Delta \\ \vdots \\ \Gamma \\ \vdots \\ B \end{array}$
 Nam, si fieri potest, in Δ diuidatur ita, ut etiam $A\Delta$, ΔB rationales sint potentia tantum commensurabiles. manifestum est igitur, $A\Gamma$ et ΔB easdem non esse. sint enim, si fieri potest. itaque etiam $A\Delta$ et ΓB eadem erunt. et erit $A\Gamma : \Gamma B = B\Delta : \Delta A$, et AB etiam in Δ eodem modo ac in Γ diuisa erit, id quod contra hypothesim est. quare $A\Gamma$, ΔB eadem non sunt. ea de causa Γ , Δ puncta a medio puncto aequaliter non distant [cfr. lemma]. quo igitur $A\Gamma^2 + \Gamma B^2$ ab $A\Delta^2 + \Delta B^2$ differt [u. lemma], eo etiam $2A\Delta \times \Delta B$ a $2A\Gamma \times \Gamma B$ differt, quia $A\Gamma^2 + \Gamma B^2 + 2A\Gamma \times \Gamma B = AB^2 = A\Delta^2 + \Delta B^2 + 2A\Delta \times \Delta B$ [II, 4]. uerum $A\Gamma^2 + \Gamma B^2$ ab $A\Delta^2 + \Delta B^2$ spatio rationali differt; nam utrumque rationale est. itaque etiam $2A\Delta \times \Delta B$ a $2A\Gamma \times \Gamma B$ spatio rationali differt, quamquam media sunt [prop. XXI]; quod absurdum est; nam spatium medium non excedit medium spatio rationali [prop. XXVI].

Ergo recta ex duobus nominibus non diuiditur in punctis diuersis; itaque in uno tantum diuiditur; quod erat demonstrandum.

XLIII.

Recta ex duabus mediis prima in uno tantum puncto diuiditur.

m. rec. P. $\tau\acute{\omega}\nu$] om. P. $A\Gamma$, ΓB] $A\Delta$, ΔB P. 15. AB] supra scr. Δ b. 16. Post ΓB ras. magna V. $\tau\acute{\omega}\nu$] corr. ex $\tau\acute{\omega}$ b. 17. $\alpha\theta\alpha$] supra scr. m. 2 F. $A\Delta B$ P, corr. m. rec. 18. $A\Gamma B$ Pb, corr. m. rec. 19. $\acute{\omicron}\pi\epsilon\rho\ \acute{\alpha}\tau\omicron\pi\omicron\nu$] om. Theon (BFVb). $\chi\acute{\alpha}\rho$] $\delta\acute{\epsilon}$ Theon (BFVb). 21. $\delta\iota\sigma\pi\epsilon\iota\tau\alpha\iota$ P, corr. m. rec. $\acute{\omicron}\pi\epsilon\rho\ \acute{\epsilon}\delta\epsilon\iota\ \delta\epsilon\iota\acute{\xi}\alpha\iota$] comp. P, om. BFVb. 25. $\delta\iota\alpha\iota\sigma\pi\epsilon\iota\tau\alpha\iota\ \epsilon\iota\varsigma\ \tau\grave{\alpha}\ \acute{\omicron}\nu\omicron\mu\alpha\tau\alpha$ Theon (BFVb).

Ἐστω ἐκ δύο μέσων πρώτη ἡ AB διηρημένη κατὰ τὸ Γ , ὥστε τὰς AG , GB μέσας εἶναι δυνάμει μόνον συμμέτρους ῥητὸν περιεχούσας· λέγω, ὅτι ἡ AB κατ' ἄλλο σημεῖον οὐ διαιρεῖται.

5 $Εἰ$ γὰρ δυνατόν, διηρήσθω καὶ κατὰ τὸ Δ , ὥστε καὶ τὰς $A\Delta$, ΔB μέσας εἶναι δυνάμει μόνον συμμέτρους ῥητὸν περιεχούσας. ἐπεὶ οὖν, ᾧ διαφέρει τὸ δις ὑπὸ τῶν $A\Delta$, ΔB τοῦ δις ὑπὸ τῶν AG , GB , τούτῳ διαφέρει τὰ ἀπὸ τῶν AG , GB τῶν ἀπὸ τῶν $A\Delta$, ΔB ,
10 ῥητῷ δὲ διαφέρει τὸ δις ὑπὸ τῶν $A\Delta$, ΔB τοῦ δις ὑπὸ τῶν AG , GB · ῥητὰ γὰρ ἀμφοτέρω· ῥητῷ ἄρα διαφέρει καὶ τὰ ἀπὸ τῶν AG , GB τῶν ἀπὸ τῶν $A\Delta$, ΔB μέσα ὄντα· ὅπερ ἄτοπον.

Οὐκ ἄρα ἡ ἐκ δύο μέσων πρώτη κατ' ἄλλο καὶ
15 ἄλλο σημεῖον διαιρεῖται εἰς τὰ ὀνόματα· καθ' ἓν ἄρα μόνον· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

μδ'.

Ἡ ἐκ δύο μέσων δευτέρα καθ' ἓν μόνον σημεῖον διαιρεῖται.

20 Ἐστω ἐκ δύο μέσων δευτέρα ἡ AB διηρημένη κατὰ τὸ Γ , ὥστε τὰς AG , GB μέσας εἶναι δυνάμει μόνον συμμέτρους μέσον περιεχούσας· φανερόν δὲ, ὅτι τὸ Γ οὐκ ἔστι κατὰ τῆς διχοτομίας, ὅτι οὐκ εἰσὶ μήκει σύμμετροι. λέγω, ὅτι ἡ AB κατ' ἄλλο σημεῖον οὐ διαι-
25 ρεῖται.

$Εἰ$ γὰρ δυνατόν, διηρήσθω καὶ κατὰ τὸ Δ , ὥστε

1. ἡ AB] supra scr. F, corr. ex ἡ $A\Delta$ m. rec. P. 4. οὐ] om. b. 5. κατ'] om. Fb. 9. τῶν ἀπὸ] in ras. m. 1 P. 10. ΔB] supra scr. m. 1 F. 13. Post ὄντα add. μέσον μέσου ὑπερέχει ῥητῷ φ. 16. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. BFVb. 17. μδ'] mut. in με' F. 19. διαιρεῖται εἰς τὰ ὀνόματα

Sit AB ex duabus mediis prima in Γ ita diuisa, ut $A\Gamma$, ΓB mediae sint potentia tantum commensurabiles spatium rationale comprehendentes [prop. XXXVII]. dico, AB in nullo alio puncto diuidi.

nam, si fieri potest, in Δ ita diuidatur, ut etiam $A\Delta$, ΔB mediae sint potentia tantum commensurabiles spatium rationale comprehendentes. iam quoniam, quo differt $2 A\Delta \times \Delta B$ a $2 A\Gamma \times \Gamma B$, eo differt $A\Gamma^2 + \Gamma B^2$ ab $A\Delta^2 + \Delta B^2$ [prop. XLI lemma], et $2 A\Delta \times \Delta B$ a $2 A\Gamma \times \Gamma B$ spatio rationali differt (nam utrumque rationale est), etiam $A\Gamma^2 + \Gamma B^2$ ab $A\Delta^2 + \Delta B^2$ spatio rationali differt, quamquam media sunt; quod absurdum est [prop. XXVI].

Ergo recta ex duabus mediis prima in nomina non diuiditur in punctis diuersis; itaque in uno tantum diuiditur; quod erat demonstrandum.

XLIV.

Recta ex duabus mediis secunda in uno tantum puncto diuiditur.

Sit AB ex duabus mediis secunda in Γ diuisa, ita ut $A\Gamma$, ΓB mediae sint potentia tantum commensurabiles spatium medium comprehendentes [prop. XXXVIII]. manifestum est igitur, Γ punctum medium non esse, quod longitudine commensurabiles non sunt. dico, AB in nullo alio puncto diuidi.


nam, si fieri potest, etiam in Δ diuidatur, ita ut

Theon (BFVb). 23. $\xi\sigma\tau\iota\nu$ B. $\tau\eta\nu$ διχοτομίαν V. $\delta\tau\iota$ $\epsilon\pi\epsilon\iota\delta\eta\pi\epsilon\rho$ Theon (BFVb). $\epsilon\iota\sigma\iota\nu$ PB. 26. $\kappa\alpha\iota$] om. Theon (BFVb).

τὴν $ΑΓ$ τῇ $ΔΒ$ μὴ εἶναι τὴν αὐτήν, ἀλλὰ μείζονα
καθ' ὑπόθεσιν τὴν $ΑΓ$. δῆλον δὴ, ὅτι καὶ τὰ ἀπὸ
τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$, ὡς ἐπάνω ἐδείξαμεν, ἐλάσσονα τῶν ἀπὸ
τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$. καὶ τὰς $ΑΔ$, $ΔΒ$ μέσας εἶναι δυνάμει
5 μόνον συμμετρους μέσον περιεχούσας. καὶ ἐκκείσθω
ῥητὴ ἡ EZ , καὶ τῷ μὲν ἀπὸ τῆς $ΑΒ$ ἴσον παρὰ τὴν
 EZ παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον παραβεβλήσθω τὸ
 EK , τοῖς δὲ ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ ἴσον ἀφηγήσθω τὸ
 $ΕΗ$. λοιπὸν ἄρα τὸ $ΘΚ$ ἴσον ἐστὶ τῷ δις ὑπὸ τῶν
10 $ΑΓ$, $ΓΒ$. πάλιν δὴ τοῖς ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$, ἅπερ
ἐλάσσονα ἐδείχθη τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$, ἴσον ἀφη-
γήσθω τὸ $ΕΛ$ καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ $ΜΚ$ ἴσον τῷ δις
ὑπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$. καὶ ἐπεὶ μέσα ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν
 $ΑΓ$, $ΓΒ$, μέσον ἄρα [καὶ] τὸ $ΕΗ$. καὶ παρὰ ῥητὴν
15 τὴν EZ παράκειται ῥητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ $EΘ$ καὶ ἀσύμ-
μετρος τῇ EZ μήκει. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ $ΘΝ$ ῥητὴ
ἐστὶ καὶ ἀσύμμετρος τῇ EZ μήκει. καὶ ἐπεὶ αἱ $ΑΓ$,
 $ΓΒ$ μέσαι εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι, ἀσύμμετρος
ἄρα ἐστὶν ἡ $ΑΓ$ τῇ $ΓΒ$ μήκει. ὥς δὲ ἡ $ΑΓ$ πρὸς
20 τὴν $ΓΒ$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς $ΑΓ$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν
 $ΑΓ$, $ΓΒ$. ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς $ΑΓ$ τῷ
ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$. ἀλλὰ τῷ μὲν ἀπὸ τῆς $ΑΓ$ σύμμε-
τρά ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$. δυνάμει γάρ εἰσι

1. $ΑΓ$] $Γ$ in ras. F. 2. κατὰ P. δῆλον δὴ, ὅτι] δηλαδὴ
Theon (BFVb); ὅτι add. B m. 2. 3. $ΑΓ$, $ΓΒ$ μείζονα τῶν
ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$, ὡς ἐπάνω ἐδείξαμεν Theon (BFVb). 4. Ante
καὶ add. ἐστω δέ V, et in mg. m. 1 ἐλάσσονα τῶν ἀπὸ $ΑΓ$,
 $ΓΒ$. 5. κείσθω V, corr. m. 1. 6. τῷ corr. ex τό V. 7.
παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον] om. Theon (BFVb). 9. $ΘΚ$]
in ras. V. 10. ἅπερ — 11. $ΓΒ$] om. Fb, mg. m. 2 BV. 11.
ἐλάττονα V. 12. $ΕΛ$] ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ B. Deinde add. πάλιν
δὴ τοῖς ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ ἑλάσσον ἐδείχθη τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$,
 $ΓΒ$ B, ἐπεὶ καὶ (καὶ ἐπεὶ V) τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ ἐλάσσονα
(ἐλάττονα F) ἐδείχθη τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ FVb, in V del.

AG , AB eadem non sint, sed AG maior supponatur (manifestum est igitur, esse etiam $AA^2 + AB^2 < AG^2 + GB^2$, ut supra demonstraui[mus] [prop. XLI lemma]), et ut AA , AB mediae sint potentia tantum commensurabiles spatium medium comprehendentes. et pona-



tur rationalis EZ , et quadrato AB^2 aequale rectae EZ parallelogrammum rectangulum EK adplicetur [I, 44], quadratis autem $AG^2 + GB^2$ aequale auferatur EH . itaque quod relinquitur, $\Theta K = 2 AG \times GB$ [II, 4]. rursus quadratis $AA^2 + AB^2$ (quae minora esse quam $AG^2 + GB^2$, demonstraui[mus]) aequale auferatur EA . itaque $MK = 2 AA \times AB$. et quoniam $AG^2 + GB^2$ media sunt, EH medium est. et rectae rationali EZ adplicatum est. ergo $E\Theta$ rationalis est et rectae EZ longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. eadem de causa etiam ΘN rationalis est et rectae EZ longitudine incommensurabilis. et quoniam AG , GB mediae sunt potentia tantum commensurabiles, AG et GB longitudine incommensurabiles sunt. sed $AG : GB = AG^2 : AG \times GB$ [prop. XXI lemma]. itaque etiam AG^2 et $AG \times GB$ incommensurabilia sunt [prop.

ἐστὶ τῷ P. 13. ἐστὶ] in ras. m. 1 b, ἐστὶν B. 14. καὶ τό] τό BFVb. 16. ΘN] EH b, EN in ras. m. 1 F. 17. ἐστὶν P. 18. ἐστὶν B. 19. GB] BF B. 20. GB] in ras. V. 21. σύμμετρον V, corr. m. 1. AG] A e corr. V. 22. ἀλλά] supra scr. m. 1 V. τῷ] corr. ex τό m. 1 F. τῷ μέν] e corr. V. 23. GB] B eras. B.

σύμμετροι αὐτὰ $ΑΓ, ΓΒ$. τῷ δὲ ὑπὸ τῶν $ΑΓ, ΓΒ$ σύμ-
 μετρόν ἐστι τὸ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ, ΓΒ$. καὶ τὰ ἀπὸ
 τῶν $ΑΓ, ΓΒ$ ἄρα ἀσύμμετρά ἐστι τῷ δις ὑπὸ τῶν
 $ΑΓ, ΓΒ$. ἀλλὰ τοῖς μὲν ἀπὸ τῶν $ΑΓ, ΓΒ$ ἴσον ἐστὶ
 5 τὸ $ΕΗ$, τῷ δὲ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ, ΓΒ$ ἴσον τὸ $ΘΚ$.
 ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ $ΕΗ$ τῷ $ΘΚ$. ὥστε καὶ ἡ $ΕΘ$
 τῇ $ΘΝ$ ἀσύμμετρός ἐστι μήκει. καὶ εἰσι ῥηταί· αὐτὰ
 $ΕΘ, ΘΝ$ ἄρα ῥηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι. ἐὰν
 δὲ δύο ῥηταὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι συντεθῶσιν,
 10 ἡ ὅλη ἀλογός ἐστιν ἡ καλουμένη ἐκ δύο ὀνομάτων·
 ἡ $ΕΝ$ ἄρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ διηρημένη κατὰ τὸ
 $Θ$. κατὰ τὰ αὐτὰ δὴ δειχθήσονται καὶ αὐτὰ $ΕΜ, ΜΝ$
 ῥηταὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι· καὶ ἔσται ἡ $ΕΝ$ ἐκ
 δύο ὀνομάτων κατ' ἄλλο καὶ ἄλλο διηρημένη τό τε $Θ$
 15 καὶ τὸ $Μ$, καὶ οὐκ ἔστιν ἡ $ΕΘ$ τῇ $ΜΝ$ ἡ αὐτή, ὅτι
 τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΓ, ΓΒ$ μείζονά ἐστι τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΔ,$
 $ΔΒ$. ἀλλὰ τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΔ, ΔΒ$ μείζονά ἐστι τοῦ
 δις ὑπὸ $ΑΔ, ΔΒ$ · πολλῷ ἄρα καὶ τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΓ,$
 $ΓΒ$, τουτέστι τὸ $ΕΗ$, μείζον ἐστὶ τοῦ δις ὑπὸ τῶν
 20 $ΑΔ, ΔΒ$, τουτέστι τοῦ $ΜΚ$. ὥστε καὶ ἡ $ΕΘ$ τῆς $ΜΝ$
 μείζων ἐστίν. ἡ ἄρα $ΕΘ$ τῇ $ΜΝ$ οὐκ ἔστιν ἡ αὐτή·
 ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

1. Supra σύμμετροι add. α Fb. τῷ δέ — $ΓΒ$] mg.
 m. 1 P. 2. τό] corr. ex τῷ Vb. τὰ] supra scr. m. 2 F.
 3. σύμμετρα b, et B, corr. m. 2; α- del. F. 4. $ΓΒ$
 μήκει V. $ΓΒ$] (alt.) $Γ$ e corr. V. 5. ἴσον ἐστὶ P. 6.
 ἐστίν P. $ΕΗ$] H in ras. V. 8. $ΕΘ$] "Θ' $Ε$ F. εἰσιν P.
 9. ἐντεθῶσιν B, corr. m. 2. 10. ἐκ] ἐκ τῶν F. 11. ἄρα]
 om. P. ἐστίν P. 12. $ΘΚ$ b. 15. ἔστιν] ἔσται V. ἡ]
 supra scr. m. 1 F. ἡ] postea ins. F. ὅτι] ἐπειδήπερ Theon
 (BFVb). 17. Mg. m. 1: γρ. τὰ δὲ ἀπὸ (τῶν $Α, Δ$ F) Fb.
 18. τῶν $ΑΔ$ FV. 19. τουτέστι P. 20. τουτέστιν P. τοῦ]
 e corr. V. $ΜΚ$] M seq. ras. 1 litt. B. ἡ] supra scr. m.

XI]. uerum AG^2 et $AG^2 + GB^2$ commensurabilia sunt; nam AG , GB potentia commensurabiles sunt. et $AG \times GB$, $2AG \times GB$ commensurabilia sunt [prop. VI]. quare etiam $AG^2 + GB^2$ et $2AG \times GB$ incommensurabilia sunt [prop. XIII]. uerum $EH = AG^2 + GB^2$, $\Theta K = 2AG \times GB$. itaque EH , ΘK incommensurabilia sunt. quare etiam $E\Theta$, ΘN longitudine incommensurabiles sunt [VI, 1; prop. XI]. et sunt rationales. itaque $E\Theta$, ΘN rationales sunt potentia tantum commensurabiles. sin duae rectae rationales potentia tantum commensurabiles componuntur, tota irrationalis est ex duobus nominibus, quae uocatur [prop. XXXVI]. itaque EN ex duobus nominibus est in Θ diuisa. eodem igitur modo demonstrabimus, etiam EM , MN rationales esse potentia tantum commensurabiles. et EN , quae ex duobus nominibus est, in punctis diuersis Θ et M diuisa erit [quod absurdum est; prop. XLII], et $E\Theta$, MN eadem non sunt, quod $AG^2 + GB^2 > AD^2 + DB^2$; uerum $AD^2 + DB^2 > 2AD \times DB$.¹⁾ quare multo magis $AG^2 + GB^2 > 2AG \times GB$, hoc est $EH > MK$. quare etiam $E\Theta > MN$ [VI, 1]. itaque $E\Theta$, MN eadem non sunt; quod erat demonstrandum.

1) U. prop. LIX lemma.

1 b. 21. *μείζον* V, sed corr. *τῇ*] *τῆς* b. Post *αὐτῇ* add. *ἡ EN ἄρα ἐκ δύο ὀνομάτων καλουμένη κατ' ἄλλο καὶ ἄλλο σημείον διαιρεῖται· ὅπερ ἀποκον. οὐκ ἄρα ἐκ δύο μέσων δευτέρα κατ' ἄλλο καὶ ἄλλο σημείον διαιρεῖται ἢ καθ' ἓν μόνον F.* 22. *ὅπερ εἶδει δεῖξαι*] om. BVb.

μέ'.

Ἡ μείζων κατὰ τὸ αὐτὸ μόνον σημεῖον διαι-
ρεῖται.

Ἐστω μείζων ἡ AB διηρημένη κατὰ τὸ Γ , ὥστε
5 τὰς AG , GB δυνάμει ἀσυμμέτρους εἶναι ποιούσας τὸ
μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AG , GB τετραγώνων
ῥητόν, τὸ δ' ὑπὸ τῶν AG , GB μέσον· λέγω, ὅτι ἡ
 AB κατ' ἄλλο σημεῖον οὐ διαιρεῖται.

Εἰ γὰρ δυνατόν, διηρήσθω καὶ κατὰ τὸ Δ , ὥστε
10 καὶ τὰς AD , DB δυνάμει ἀσυμμέτρους εἶναι ποιού-
σας τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AD , DB ῥη-
τόν, τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν μέσον. καὶ ἐπεὶ, ᾧ διαφέρει
τὰ ἀπὸ τῶν AG , GB τῶν ἀπὸ τῶν AD , DB , τοῦτω
διαφέρει καὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν AD , DB τοῦ δις ὑπὸ
15 τῶν AG , GB , ἀλλὰ τὰ ἀπὸ τῶν AG , GB τῶν ἀπὸ
τῶν AD , DB ὑπερέχει ῥητῶ· ῥητὰ γὰρ ἀμφοτέρω·
καὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν AD , DB ἄρα τοῦ δις ὑπὸ τῶν
 AG , GB ὑπερέχει ῥητῶ μέσα ὄντα· ὅπερ ἐστὶν ἀδύ-
νατον. οὐκ ἄρα ἡ μείζων κατ' ἄλλο καὶ ἄλλο σημεῖον
20 διαιρεῖται· κατὰ τὸ αὐτὸ ἄρα μόνον διαιρεῖται· ὅπερ
ἔδει δεῖξαι.

μς'.

Ἡ ῥητόν καὶ μέσον δυναμένη καθ' ἓν μόνον
σημεῖον διαιρεῖται.

25 Ἐστω ῥητόν καὶ μέσον δυναμένη ἡ AB διηρημένη
κατὰ τὸ Γ , ὥστε τὰς AG , GB δυνάμει ἀσυμμέτρους

1. μς' F. 2. Supra τό add. m. 2 καὶ ἔν P. διαιρεῖται
εἰς τὰ ὀνόματα Theon (BFVb). 5. ΓB] supra scr. B. Supra
ποιούσας scr. καὶ m. 1 V. 6. AG] ΓA Fb; mg. m. 1 AB,
B Γ b. [τετραγώνων] supra scr. o b, -ων in ras. V. 7.
ῥητός F. δέ BF. 9. καί] om. Theon (BFVb). 10. δν-

XLV.

Recta maior in uno tantum puncto diuiditur.

Sit AB maior in Γ ita diuisa, ut $A\Gamma$, ΓB potentia incommensurabiles sint efficientes summam $A\Gamma^2 + \Gamma B^2$ rationalem, $A\Gamma \times \Gamma B$ autem medium [prop. XXXIX]. dico, AB in nullo alio puncto diuidi.

$\left[\begin{array}{l} A \\ \Gamma \\ B \end{array} \right.$ nam, si fieri potest, etiam in Δ diuidatur, ita ut $A\Delta$, ΔB potentia incommensurabiles sint efficientes summam $A\Delta^2 + \Delta B^2$ rationalem, $A\Delta \times \Delta B$ autem medium. et quoniam, quo $A\Gamma^2 + \Gamma B^2$ ab $A\Delta^2 + \Delta B^2$ differt [prop. XLI lemma], eo etiam $2 A\Delta \times \Delta B$ a $2 A\Gamma \times \Gamma B$ differt [cfr. p. 122, 10 sq.], et $A\Gamma^2 + \Gamma B^2$ excedit $A\Delta^2 + \Delta B^2$ spatio rationali (nam utrumque rationale est), etiam $2 A\Delta \times \Delta B$ excedit $2 A\Gamma \times \Gamma B$ spatio rationali, quamquam media sunt; quod fieri non potest [prop. XXVI]. itaque maior non diuiditur in punctis diuersis. ergo in uno tantum diuiditur; quod erat demonstrandum.

XLVI.

Recta spatio rationali et medio aequalis quadrata in uno tantum puncto diuiditur.

Sit AB recta spatio rationali et medio aequalis quadrata in Γ ita diuisa, ut $A\Gamma$, ΓB potentia incommensurabiles sint efficientes $A\Gamma^2 + \Gamma B^2$ medium,

$\nu\acute{\alpha}\mu\epsilon\iota\varsigma$ P, corr. m. 1. 11. $\tau\acute{\omega}\nu \acute{\alpha}\pi\acute{o}$] m. 2 V. $\phi\eta\tau\acute{\omega}\nu$ F.
12. $\delta\acute{\epsilon}$ F. $\acute{\alpha}\tau\acute{\omega}\nu$ P, corr. m. 1. 14. $\tau\acute{o}$] corr. ex $\tau\omicron\upsilon$ V.
17. $\tau\acute{o}$] $\tau\acute{\alpha}$ V. 20. $\delta\pi\epsilon\rho \xi\delta\epsilon\iota \delta\epsilon\iota\chi\alpha\iota$] comp. P, om. BFVb.
24. Post $\delta\iota\alpha\iota\rho\epsilon\iota\tau\alpha\iota$ add. $\epsilon\iota\varsigma \tau\acute{\alpha} \acute{o}\nu\omicron\mu\alpha\tau\alpha$ Theon (BFVb), P m. 2.

εἶναι ποιούσας τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ μέσον, τὸ δὲ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ ῥητόν· λέγω, ὅτι ἡ $ΑΒ$ κατ' ἄλλο σημεῖον οὐ διαιρεῖται.

Εἰ γὰρ δυνατόν, διηγήσθω καὶ κατὰ τὸ $Δ$, ὥστε
 5 καὶ τὰς $ΑΔ$, $ΔΒ$ δυνάμει ἀσυμμέτρους εἶναι ποιού-
 σας τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$
 μέσον, τὸ δὲ δις ὑπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ ῥητόν. ἐπεὶ οὖν,
 ᾧ διαφέρει τὸ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ τοῦ δις ὑπὸ τῶν
 $ΑΔ$, $ΔΒ$, τούτῳ διαφέρει καὶ τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$
 10 τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$, τὸ δὲ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$
 τοῦ δις ὑπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ ὑπερέχει ῥητῶ, καὶ τὰ
 ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ ἄρα τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ ὑ-
 περέχει ῥητῶ μέσα ὄντα· ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ ἄρα
 ἡ ῥητόν καὶ μέσον δυναμένη κατ' ἄλλο καὶ ἄλλο ση-
 15 μεῖον διαιρεῖται. κατὰ ἓν ἄρα σημεῖον διαιρεῖται·
 ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

μζ.

Ἡ δύο μέσα δυναμένη καθ' ἓν μόνον ση-
 μεῖον διαιρεῖται.

20 Ἔστω [δύο μέσα δυναμένη] ἡ $ΑΒ$ διηρημένη κατὰ
 τὸ $Γ$, ὥστε τὰς $ΑΓ$, $ΓΒ$ δυνάμει ἀσυμμέτρους εἶναι
 ποιούσας τὸ τε συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$
 μέσον καὶ τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ μέσον καὶ ἐτι ἀσύμ-
 μετρον τῷ συγκειμένῳ ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν. λέγω, ὅτι
 25 ἡ $ΑΒ$ κατ' ἄλλο σημεῖον οὐ διαιρεῖται ποιούσα τὰ
 προκείμενα.

2. $ΓΒ$] in ras. V. δέ] δ' B, συγκείμενον ἐκ τῶν V. δίς] om. Theon (BFVb). ὑπό] corr. ex ἀπό V. 3. Post λέγω ras. 1 litt. F. $ΑΒ$ εὐθεῖα V. 4. καί] om. Bb, postea add. FV. 5. καί] supra scr. V. 6. ἀπό τῶν — 7. ῥητόν] in ras. m. 1 F. 6. $ΔΒ$] $ΔΒ$, KZ b. 7. δέ] δ' BFb, δὲ συγ- κείμενον ἐκ τῶν V. δίς] om. Theon (BFVb). 10. δέ] om.

$2AG \times GB$ autem rationale [prop. XL]. dico, AB in nullo alio puncto diuidi.

nam si fieri potest, etiam in A ita diuidatur, ut AA , AB potentia incommensurabiles sint efficientes $AA^2 + AB^2$ medium, $2AA \times AB$ autem rationale. iam quoniam, quo differt $2AG \times GB$ a $2AA \times AB$, eo etiam $AA^2 + AB^2$ ab $AG^2 + GB^2$ differt, $2AG \times GB$ autem $2AA \times AB$ excedit spatio rationali, etiam $AA^2 + AB^2$ excedit $AG^2 + GB^2$ spatio rationali, quamquam media sunt; quod fieri non potest [prop. XXVI]. itaque recta spatio rationali et medio aequalis quadrata non diuiditur in punctis diuersis. ergo in uno tantum puncto diuiditur; quod erat demonstrandum.

XLVII.

Recta duobus spatiis mediis aequalis quadrata in uno tantum puncto diuiditur.


Sit AB in Γ ita diuisa, ut AG , GB potentia incommensurabiles sint efficientes $AG^2 + GB^2$ medium et $AG \times GB$ medium et simul quadratis $AG^2 + GB^2$ incommensurabile [prop. XLI]. dico, AB in nullo alio puncto diuidi, ita ut proposita efficiat.

BV. δις ἄρα V. 11. τὰ] τό P. 12. τῶν] (alt.) corr. ex τὰ m. 2 F. 14. σημεία P, corr. m. 1. 15. καθ' BFb. κατά — 16. δεῖξαι] m. 2 V. 16. ὅπερ εἶδει δεῖξαι] comp. P, om. BF. 17. μὲν] e corr. F. 18. ἡ δύο μέσα] in ras. m. 1 F. 19. διαιρεῖται εἰς τὰ ὀνόματα Theon (BFVb). 20. δύο μέσα δυναμένη] om. P. 23. καὶ τό — μέσον] mg. m. 1 P. τό] τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν V. 24. τῷ συγκειμένῳ] ego; τὸ συγκείμενον PBFVb. Post αὐτῶν add. τῷ (corr. ex τὸ m. rec. P) συγκειμένῳ (corr. ex -μενον m. rec. P) ἐκ τῶν ὑπ' (corr. ex ἀπ' m. 2 V, ἀπ' b) αὐτῶν (τετραγώνων add. b, F m. 2) BFVb, P mg. m. 1.

Εἰ γὰρ δυνατόν, διηγήσθω κατὰ τὸ Δ , ὥστε πάλιν
 δηλονότι τὴν $ΑΓ$ τῇ $\DeltaΒ$ μὴ εἶναι τὴν αὐτήν, ἀλλὰ
 μείζονα καθ' ὑπόθεσιν τὴν $ΑΓ$, καὶ ἐκκείσθω ῥητὴ
 ἡ $ΕΖ$, καὶ παραβεβλήσθω παρὰ τὴν $ΕΖ$ τοῖς μὲν ἀπὸ
 5 τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ ἴσον τὸ $ΕΗ$, τῷ δὲ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$,
 $ΓΒ$ ἴσον τὸ $\ThetaΚ$. ὅλον ἄρα τὸ $ΕΚ$ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ
 τῆς $ΑΒ$ τετραγώνῳ. πάλιν δὲ παραβεβλήσθω παρὰ
 τὴν $ΕΖ$ τοῖς ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $\DeltaΒ$ ἴσον τὸ $ΕΑ$. λοιπὸν
 ἄρα τὸ δις ὑπὸ τῶν $ΑΔ$, $\DeltaΒ$ λοιπῷ τῷ $ΜΚ$ ἴσον
 10 ἐστίν. καὶ ἐπεὶ μέσον ὑπόκειται τὸ συγκείμενον ἐκ
 τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$, μέσον ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ $ΕΗ$.
 καὶ παρὰ ῥητὴν τὴν $ΕΖ$ παράκειται ῥητὴ ἄρα ἐστὶν
 ἡ $\ThetaΕ$ καὶ ἀσύμμετρος τῇ $ΕΖ$ μήκει. διὰ τὰ αὐτὰ δὲ
 καὶ ἡ $\ThetaΝ$ ῥητὴ ἐστὶ καὶ ἀσύμμετρος τῇ $ΕΖ$ μήκει.
 15 καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρόν ἐστι τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ
 τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ τῷ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$, καὶ τὸ $ΕΗ$
 ἄρα τῷ $ΗΝ$ ἀσύμμετρόν ἐστιν. ὥστε καὶ ἡ $Ε\Theta$ τῇ
 $\ThetaΝ$ ἀσύμμετρός ἐστιν. καὶ εἰσι ῥηταί· αἱ $Ε\Theta$, $\ThetaΝ$
 ἄρα ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· ἡ $ΕΝ$ ἄρα
 20 ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ διηρημένη κατὰ τὸ Θ . ὁμοίως
 δὲ δείξομεν, ὅτι καὶ κατὰ τὸ $Μ$ διήρηται. καὶ οὐκ
 ἐστὶν ἡ $Ε\Theta$ τῇ $ΜΝ$ ἡ αὐτὴ· ἡ ἄρα ἐκ δύο ὀνομά-
 των κατ' ἄλλο καὶ ἄλλο σημεῖον διήρηται· ὅπερ ἐστὶν
 ἄτοπον. οὐκ ἄρα ἡ δύο μέσα δυναμένη κατ' ἄλλο καὶ
 25 ἄλλο σημεῖον διαίρεται· καθ' ἓν ἄρα μόνον [σημεῖον]
 διαίρεται.

1. καὶ κατὰ V. 3. κείσθω P. 6. $ΕΚ$] corr. ex $\ThetaΚ$
 m. 2 P. 10. ἐστὶ BV, comp. Fb. 13. $\ThetaΕ$] $Ε\Theta$ P. 14.
 ἐστὶν P. 15. τό — 16. τῷ] in ras. m. 1 F. 16. τῷ] τῷ
 συγκειμένῳ ἐκ τῶν (τοῦ F) $\Gamma\Delta$ b. δις] supra scr. F. ὑπὸ]
 in ras. F. $ΓΒ$] $ΒΓ$ F. $ΕΝ$ b. 17. ἄρα] om. V. τῷ]
 mut. in τῶν m. 2 V. $ΗΝ$] $\ThetaΚ$ BFb, $\ThetaΚ$ ἄρα V. 18.
 ἐστὶν] comp. Fb, ἐστὶ μήκει V. εἰσιν PB. 19. εἰσιν PB.

nam, si fieri potest, in Δ ita diuidatur, ut scilicet rursus $A\Gamma$, ΔB eadem non sint, sed supponatur maior $A\Gamma$, et ponatur rationalis EZ , et rectae EZ quadratis $A\Gamma^2 + \Gamma B^2$ aequale adplicetur EH , rectangulo autem $2A\Gamma \times \Gamma B$ aequale ΘK . itaque $EK = AB^2$ [II, 4]. iam rursus rectae EZ quadratis $\Delta A^2 + \Delta B^2$ aequale adplicetur EA . itaque quod re-



linquitur, $2\Delta A \times \Delta B = MK$. et quoniam supposuimus, $A\Gamma^2 + \Gamma B^2$ medium esse, etiam EH medium est. et rectae rationali EZ adplicatum est; itaque ΘE rationalis est et rectae EZ longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. eadem de causa etiam ΘN rationalis est et rectae EZ longitudine incommensurabilis. et quoniam $A\Gamma^2 + \Gamma B^2$ et $2A\Gamma \times \Gamma B$ incommensurabilia sunt, etiam EH , HN incommensurabilia sunt. quare etiam $E\Theta$, ΘN incommensurabiles sunt [VI, 1; prop. XI]. et sunt rationales. itaque $E\Theta$, ΘN rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo EN ex duobus nominibus est in Θ diuisa [prop. XXXVI]. similiter demonstrabimus, eandem in M diuisam esse. et $E\Theta$, MN eadem non sunt. itaque recta ex duobus nominibus in punctis diuersis diuisa est; quod fieri non potest [prop. XLII]. itaque recta duobus spatiis mediis aequalis quadrata non diuiditur in punctis diuersis. ergo in uno tantum diuiditur.

21. διαρῆται V. 22. MN ἄρα b. ἐκ τῶν P. 23. ἄτοπὸν ἐστὶν V. 24. ἡ] corr. ex ἐκ V. 25. ἔνα F. σημεῖον] om. P.

Ὅροι δεύτεροι.

α'. Ὑποκειμένης ῥητῆς καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων διηρημένης εἰς τὰ ὀνόματα, ἥς τὸ μείζον ὄνομα τοῦ ἐλάσσονος μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμετρου ἐαυτῇ
5 μήκει, ἐὰν μὲν τὸ μείζον ὄνομα σύμμετρον ᾖ μήκει τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ, καλείσθω [ἡ ὅλη] ἐκ δύο ὀνομάτων πρώτη.

β'. Ἐὰν δὲ τὸ ἐλάσσον ὄνομα σύμμετρον ᾖ μήκει τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ, καλείσθω ἐκ δύο ὀνομάτων
10 δευτέρα.

γ'. Ἐὰν δὲ μηδέτερον τῶν ὀνομάτων σύμμετρον ᾖ μήκει τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ, καλείσθω ἐκ δύο ὀνομάτων
των τρίτη.

δ'. Πάλιν δὴ ἐὰν τὸ μείζον ὄνομα [τοῦ ἐλάσσονος]
15 μείζον δύνηται τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἐαυτῇ μήκει, ἐὰν μὲν τὸ μείζον ὄνομα σύμμετρον ᾖ μήκει τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ, καλείσθω ἐκ δύο ὀνομάτων τετάρτη.

ε'. Ἐὰν δὲ τὸ ἐλάσσον, πέμπτη.

ς'. Ἐὰν δὲ μηδέτερον, ἕκτη.

20

μῆ'.

Εὐρεῖν τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων πρώτην.

Ἐκκείσθωσαν δύο ἀριθμοὶ οἱ ΑΓ, ΓΒ, ὥστε τὸν συγκείμενον ἐξ αὐτῶν τὸν ΑΒ πρὸς μὲν τὸν ΒΓ λόγον ἔχειν, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀρι-
25 θμόν, πρὸς δὲ τὸν ΓΑ λόγον μὴ ἔχειν, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, καὶ ἐκκείσθω

1. ὅροι δεύτεροι] mg. B, m. 2 V, om. F, μῆ' b. numeros om. codd. 4. ἐλάττωνος BFb. αὐτῇ B, corr. m. rec.; et supra scr. φ b; ἐ- e corr. V. 5. μήκει] (alt.) om. V, m. 2 F (eras.). 6. ῥητῇ μήκει F V. ἡ ὅλη] supra scr. m. 2 P, ὅλη B.

Definitiones alterae.

1. Proposita recta rationali et recta ex duobus nominibus in nomina diuisa, cuius nomen maius potentia minus excedit quadrato rectae sibi longitudine commensurabilis, si maius nomen rationali propositae longitudine commensurabile est, uocetur ex duobus nominibus prima.

2. Sin minus nomen rationali propositae longitudine commensurabile est, uocetur ex duobus nominibus secunda.

3. Sin neutrum nomen rationali propositae longitudine commensurabile est, uocetur ex duobus nominibus tertia.

4. Rursus si maius nomen potentia excedit quadrato rectae sibi longitudine incommensurabilis, si maius nomen rationali propositae longitudine commensurabile est, uocetur ex duobus nominibus quarta.

5. Sin minus commensurabile est, quinta.

6. Sin neutrum, sexta.

XLVIII.

Inuenire rectam ex duobus nominibus primam.

Exponentur duo numeri $ΑΓ$, $ΓΒ$ eius modi, ut $ΑΒ : ΒΓ$ rationem habeat, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, $ΑΒ$ autem ad $ΓΑ$ rationem non habeat, quam numerus quadratus ad numerum quadratum [prop. XXVIII lemma], et exponatur ratio-

8. μήκει] om. V. 9. ὅτι μήκει V. ἡ δὲ ἐκ F. 14. τοῦ ἐλάττωτος] m. 2 P, τοῦ ἐλάττωτος V. 15. συμμέτρον BFb, corr. m. 2. ἐαυτῇ] supra scr. ω b. 16. ὄνομα] om. V. 19. Seq. schol., u. app. 20. μδ' F. 23. τό] (prius) corr. ex τῶ V. 25. ΓΑ] ras. V.


τις ῥητὴ ἢ Δ , καὶ τῇ Δ σύμμετρος ἔστω μήκει ἢ EZ .
 ῥητὴ ἄρα ἐστὶ καὶ ἢ EZ . καὶ γερονέτω ὡς ὁ BA
 ἀριθμὸς πρὸς τὸν AG , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς EZ πρὸς
 τὸ ἀπὸ τῆς ZH . ὁ δὲ AB πρὸς τὸν AG λόγον ἔχει,
 5 ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν· καὶ τὸ ἀπὸ τῆς EZ ἄρα
 πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ZH λόγον ἔχει, ὃν ἀριθμὸς πρὸς
 ἀριθμόν· ὥστε σύμμετρόν ἐστι τὸ ἀπὸ τῆς EZ τῷ
 ἀπὸ τῆς ZH . καὶ ἐστὶ ῥητὴ ἢ EZ · ῥητὴ ἄρα καὶ ἢ
 ZH . καὶ ἐπεὶ ὁ BA πρὸς τὸν AG λόγον οὐκ ἔχει,
 10 ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν,
 οὐδὲ τὸ ἀπὸ τῆς EZ ἄρα πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ZH λόγον
 ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν·
 ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἢ EZ τῇ ZH μήκει. αἱ EZ ,
 ZH ἄρα ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· ἐκ δύο
 15 ἄρα ὀνομάτων ἐστὶν ἢ EH .

Λέγω, ὅτι καὶ πρώτη.

Ἐπεὶ γάρ ἐστιν ὡς ὁ BA ἀριθμὸς πρὸς τὸν AG ,
 οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς EZ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ZH , μείζων
 δὲ ὁ BA τοῦ AG , μείζον ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς EZ
 20 τοῦ ἀπὸ τῆς ZH . ἔστω οὖν τῷ ἀπὸ τῆς EZ ἴσα τὰ
 ἀπὸ τῶν ZH , Θ . καὶ ἐπεὶ ἐστιν ὡς ὁ BA πρὸς τὸν
 AG , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς EZ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ZH ,
 ἀναστρέψαντι ἄρα ἐστὶν ὡς ὁ AB πρὸς τὸν BG , οὕτως
 τὸ ἀπὸ τῆς EZ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Θ . ὁ δὲ AB πρὸς
 25 τὸν BG λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετρά-
 γωνον ἀριθμόν· καὶ τὸ ἀπὸ τῆς EZ ἄρα πρὸς τὸ
 ἀπὸ τῆς Θ λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς
 τετράγωνον ἀριθμόν. σύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἢ EZ τῇ

1. τις] supra scr. m. 1 V. 2. ἐστὶ καὶ] ἐστὶν B. 3.
 AG] ΓΑ F Vb. Dein add. ἀριθμόν V. 4. ΖΗ] Η eras. F.
 ὁ δέ — 5. ἀριθμόν] mg. m. 2 B. 5. ὃν ὁ F. 8. ἐστὶν B.

nalis aliqua Δ , et rectae Δ longitudine commensurabilis sit EZ ; itaque EZ rationalis est [def. 3]. et fiat



$BA: \Delta\Gamma = EZ^2: ZH^2$
[prop. VI coroll.]. uerum
 $AB: \Delta\Gamma$ rationem ha-
bet, quam numerus
ad numerum. itaque

etiam $EZ^2: ZH^2$ rationem habet, quam numerus ad numerum. quare EZ^2, ZH^2 commensurabilia sunt [prop. VI]. et EZ rationalis est. itaque etiam ZH rationalis est. et quoniam $BA: \Delta\Gamma$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, ne EZ^2 quidem ad ZH^2 rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque EZ, ZH longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. quare EZ, ZH rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo EH ex duobus nominibus est [prop. XXXVI]. dico, eandem primam esse.

nam quoniam est $BA: \Delta\Gamma = EZ^2: ZH^2$, et $BA > \Delta\Gamma$, erit etiam $EZ^2 > ZH^2$ [V, 14]. sit igitur $ZH^2 + \Theta^2 = EZ^2$. et quoniam est $BA: \Delta\Gamma = EZ^2: ZH^2$, conuertendo [V, 19 coroll.] est $AB: B\Gamma = EZ^2: \Theta^2$. uerum $AB: B\Gamma$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque etiam $EZ^2: \Theta^2$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. quare EZ, Θ longitudine commensurabiles sunt [prop.

9. BA] mut. in AB V. $\Theta\kappa$] postea ins. F. 14. $ZH =$
 $\delta\nu\acute{\alpha}\mu\epsilon\iota$] m. 2 B. $\epsilon\lambda\sigma\iota\nu$ P. 15. $\acute{\alpha}\rho\alpha$] m. rec. b. 17. δ]
in ras. m. 1 P. AB F. 18. $\tau\acute{o}$] (prius) supra scr. m. 1 P.
 $\mu\epsilon\lambda\lambda\acute{o}\nu$ F. 20. $\tau\acute{o}$] corr. ex $\tau\acute{o}$ V. 21. AB P. 25. $\tau\acute{o}\nu$]
om. B F b. $B\Gamma$] Γ supra scr. V. 26. EZ] ZE corr. ex
 ZB F. 27. Θ] seq. ras. 1 litt. F.

Θ μήκει· ἡ EZ ἄρα τῆς ZH μείζον δύναται τῷ ἀπὸ
 συμμετρου ἐαυτῇ. καὶ εἰσι ρηταὶ αἱ EZ, ZH, καὶ
 σύμμετρος ἡ EZ τῇ Δ μήκει.

Ἡ EH ἄρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ πρώτη· ὅπερ
 5 ἐδει δεῖξαι.

μθ'.

Εὕρεϊν τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων δευτέραν.

Ἐκκείσθωσαν δύο ἀριθμοὶ οἱ ΑΓ, ΓΒ, ὥστε τὸν
 συγγεόμενον ἐξ αὐτῶν τὸν ΑΒ πρὸς μὲν τὸν ΒΓ λό-
 10 γον ἔχειν, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον
 ἀριθμόν, πρὸς δὲ τὸν ΑΓ λόγον μὴ ἔχειν, ὃν τετρά-
 γωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, καὶ ἐκκείσ-
 θω ρητὴ ἡ Δ, καὶ τῇ Δ σύμμετρος ἔστω ἡ EZ μήκει·
 ρητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ EZ. γεγονέτω δὴ καὶ ὡς ὁ ΓΑ
 15 ἀριθμὸς πρὸς τὸν ΑΒ, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς EZ πρὸς
 τὸ ἀπὸ τῆς ZH· σύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς EZ
 τῷ ἀπὸ τῆς ZH. ρητὴ ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ ZH. καὶ ἐπεὶ
 ὁ ΓΑ ἀριθμὸς πρὸς τὸν ΑΒ λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετρά-
 γωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, οὐδὲ τὸ
 20 ἀπὸ τῆς EZ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ZH λόγον ἔχει, ὃν τε-
 τράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν. ἀσύμ-
 μετρος ἄρα ἐστὶν ἡ EZ τῇ ZH μήκει· αἱ EZ, ZH
 ἄρα ρηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· ἐκ δύο ἄρα
 ὀνομάτων ἐστὶν ἡ EH.

25 Δεικτέον δὴ, ὅτι καὶ δευτέρα.

2. εἰσιν PB. 3. ἀσύμμετρος F, ἀ- eras.; deinde add.
 μήκει, del. m. 1. Post μήκει del. ἀσύμμετροι m. 1 F. 4.
 ὅπερ ἐδει δεῖξαι] comp. P, om. BFVb. 6. ν' F, et sic deinceps.
 8. τὸν] corr. ex τό m. 2 V. 11. ΓΑ BVb. 12.
 τετράγωνος F. 13. EZ] ZH BVb, in ras. F, m. rec. P. 14.
 ρητὴ — EZ] καὶ ἡ ZH ἄρα ρητὴ ἐστὶν F. EZ] ZH BVb,
 m. rec. P. γεγονέτω δὴ καί] καὶ ἔστω V. δέ F, supra
 scr. δὴ. 15. EZ] HZ F, et corr. ex ZH V, ZH Bb, P m.


IX]. itaque EZ^2 excedit ZH^2 quadrato rectae sibi commensurabilis. et EZ , ZH rationales sunt, et EZ , Δ longitudine commensurabiles.

Ergo EH ex duobus nominibus est prima [def. alt. 1]; quod erat demonstrandum.

XLIX.

Inuenire rectam ex duobus nominibus secundam.

Exponentur duo numeri AG , GB eius modi, ut AB ad BG rationem habeat, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, ad AG autem rationem non habeat, quam numerus quadratus ad numerum quadratum [prop. XXVIII lemma]. et ponatur rationalis Δ , et rectae Δ longitudine commensurabilis sit EZ ; itaque



EZ rationalis est. iam fiat etiam $GA:AB = EZ^2:ZH^2$ [prop. VI coroll.]. itaque EZ^2 , ZH^2 commensurabilia sunt [prop. VI]. quare etiam ZH ratio-

nalis est. et quoniam $GA:AB$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, ne EZ^2 quidem ad ZH^2 rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque EZ , ZH longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. quare EZ , ZH rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo EH ex duobus nominibus est [prop. XXXVI]. iam demonstrandum, eandem secundam esse.

rec. 16. ZH] ZE BFVb, m. rec. P; item lin. 17 bis, 20, 22.

16. EZ] HZ Bb, et corr. ex ZH V, ZH F, P m. rec. 17. θ B.

18. GA] in ras. V. 19. $\theta\theta\theta$ $\alpha\alpha$ Theon (BFVb). 20.

EZ] HZ BFV, et e corr. m. 1 b. 22. EZ] HZ Bb, P m.

rec.; ZH V, ZH F. $\tau\eta\varsigma$ b. 23. $\epsilon\lambda\epsilon\iota\nu$ B. 25. $\delta\epsilon$ P.

Ἐπεὶ γὰρ ἀνάπαλιν ἐστὶν ὡς ὁ BA ἀριθμὸς πρὸς τὸν $ΑΓ$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς HZ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ZE , μείζων δὲ ὁ BA τοῦ $ΑΓ$, μείζων ἄρα [καὶ] τὸ ἀπὸ τῆς HZ τοῦ ἀπὸ τῆς ZE . ἔστω τῷ ἀπὸ τῆς HZ ἴσα
 5 τὰ ἀπὸ τῶν EZ , Θ · ἀναστρέψαντι ἄρα ἐστὶν ὡς ὁ AB πρὸς τὸν $BΓ$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ZH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Θ . ἀλλ' ὁ AB πρὸς τὸν $BΓ$ λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ZH ἄρα πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Θ λόγον ἔχει, ὃν τετρά-
 10 γωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν. σύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ ZH τῇ Θ μήκει· ὥστε ἡ ZH τῆς ZE μείζων δύνатаι τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἐναντῇ. καὶ εἰσι φηται αὖ ZH , ZE δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ τὸ EZ ἑλασσον ὄνομα τῇ ἐκκειμένῃ φητῇ σύμμετρόν ἐστι
 15 τῇ Δ μήκει.
 Ἡ EH ἄρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ δευτέρα· ὅπερ εἶδει δεῖξαι.

ν'.

Εὐρεῖν τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων τρίτην.
 20 Ἐκκείσθωσαν δύο ἀριθμοὶ οἱ $ΑΓ$, $ΓΒ$, ὥστε τὸν συγκαίμενον ἐξ αὐτῶν τὸν AB πρὸς μὲν τὸν $BΓ$ λόγον ἔχειν, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, πρὸς δὲ τὸν $ΑΓ$ λόγον μὴ ἔχειν, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν. ἐκκείσθω
 25 δέ τις καὶ ἄλλος μὴ τετράγωνος ἀριθμὸς ὁ Δ , καὶ πρὸς ἐκάτερον τῶν BA , $ΑΓ$ λόγον μὴ ἔχεται, ὃν τε-

1. AB P. ἀριθμός] om. b. 2. HZ] EZ BFVb, m. rec. P, item lin. 4 bis. ZE] ZH BFVb, m. rec. P, item lin. 4, 11. 3. μείζων — $ΑΓ$] mg. m. 1 P (μείζων, sed corr. m. 1). BA] A e corr. V. καί] om. P. 5. EZ] HZ BFVb, m. rec. P. ὁ] ἡ b φ (non F). 6. ZH] EZ BFVb, m. rec. P, item lin. 9, 11 bis. 8. καί — 10. ἀριθμόν] mg. m.


nam quoniam e contrario est [V, 7 coroll.] $BA:AG = HZ^2:ZE^2$, et $BA > AG$, erit $HZ^2 > ZE^2$ [V, 14]. sit $HZ^2 = ZE^2 + \Theta^2$. conuertendo [V, 19 coroll.] igitur est $AB:BG = ZH^2:\Theta^2$. uerum $AB:BG$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque etiam $ZH^2:\Theta^2$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque ZH, Θ longitudine commensurabiles sunt [prop. IX]. quare ZH^2 excedit ZE^2 quadrato rectae sibi commensurabilis. et rationales sunt ZH, ZE potentia tantum commensurabiles, et minus nomen EZ rationali propositae A commensurabilis est longitudine.

Ergo EH ex duobus nominibus secunda est [def. alt. 2]; quod erat demonstrandum.

L.

Inuenire rectam ex duobus nominibus tertiam.

Exponentur duo numeri AG, GB eius modi, ut AB ad BG rationem habeat, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, ad AG autem rationem non habeat,



quam numerus quadratus ad numerum quadratum. exponatur autem etiam alius aliquis numerus non quadratus A , et ad utrumque BA, AG rationem ne habeat,

1 F. 12. εἶναι B. 13. EZ, ZH B F V b, m. rec. P. 14. EZ] ZH B F V b, m. rec. P. ἔλαττον B V b, comp. F. σύμμετρον ἔστι τῇ Theon (B F V b). σύμμετρον ἔστι] om. Theon (B F V b). 16. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. B F V b. 20. κείσθωσαν, supra scr. ἐκ, V. δύο] corr. ex ol m. rec. P. 25. ἀριθμός] om. V.

τεράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· καὶ ἐκ-
 κείσθω τις ῥητὴ εὐθεΐα ἡ E , καὶ γεγονέτω ὡς ὁ Δ
 πρὸς τὸν AB , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς E πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς
 ZH · σύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς E τῷ ἀπὸ τῆς
 5 ZH . καὶ ἐστὶ ῥητὴ ἡ E · ῥητὴ ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ ZH .
 καὶ ἐπεὶ ὁ Δ πρὸς τὸν AB λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετρά-
 γωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, οὐδὲ τὸ
 ἀπὸ τῆς E πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ZH λόγον ἔχει, ὃν τετρά-
 γωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· ἀσύμμετρος
 10 ἄρα ἐστὶν ἡ E τῇ ZH μήκει. γεγονέτω δὲ πάλιν ὡς
 ἡ BA ἀριθμὸς πρὸς τὸν AG , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ZH
 πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $H\Theta$ · σύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ
 τῆς ZH τῷ ἀπὸ τῆς $H\Theta$. ῥητὴ δὲ ἡ ZH · ῥητὴ ἄρα
 καὶ ἡ $H\Theta$. καὶ ἐπεὶ ὁ BA πρὸς τὸν AG λόγον οὐκ
 15 ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν,
 οὐδὲ τὸ ἀπὸ τῆς ZH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΘH λόγον
 ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀρι-
 θμόν· ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ ZH τῇ $H\Theta$ μήκει.
 αὐτὴ $ZH, H\Theta$ ἄρα ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σίμμετροι·
 20 ἡ $Z\Theta$ ἄρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστίν.

Λέγω δὴ, ὅτι καὶ τρίτη.

Ἐπεὶ γάρ ἐστιν ὡς ὁ Δ πρὸς τὸν AB , οὕτως τὸ
 ἀπὸ τῆς E πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ZH , ὡς δὲ ὁ BA πρὸς
 τὸν AG , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ZH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς
 25 $H\Theta$, δι' ἴσου ἄρα ἐστὶν ὡς ὁ Δ πρὸς τὸν AG , οὕτως
 τὸ ἀπὸ τῆς E πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $H\Theta$. ὁ δὲ Δ πρὸς
 τὸν AG λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς
 τετράγωνον ἀριθμόν· οὐδὲ τὸ ἀπὸ τῆς E ἄρα πρὸς
 τὸ ἀπὸ τῆς $H\Theta$ λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς

2. ῥητῇ] m. 2 F. 3. τῇ ZH b. 4. τό — 5. ZH] (prius) m.
 2 B. 5. καὶ ἐστὶ ῥητῇ] ῥητῇ δὲ B. ἐστίν B. 10. δὲ V.

quam numerus quadratus ad numerum quadratum; et ponatur aliqua recta rationalis E , et fiat $\Delta:AB = E^2:ZH^2$ [prop. VI coroll.]. itaque E^2, ZH^2 commensurabilia sunt [prop. VI]. et E rationalis est; quare etiam ZH rationalis est. et quoniam $\Delta:AB$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, ne E^2 quidem ad ZH^2 rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque E, ZH longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. iam rursus fiat $BA:AG = ZH^2:H\Theta^2$ [prop. VI coroll.]. itaque $ZH^2, H\Theta^2$ commensurabilia sunt [prop. VI]. uerum ZH rationalis est; itaque etiam $H\Theta$ rationalis est. et quoniam $BA:AG$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, ne ZH^2 quidem ad $H\Theta^2$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque $ZH, H\Theta$ longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. quare $ZH, H\Theta$ rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo $Z\Theta$ ex duobus nominibus est [prop. XXXVI]. iam dico, eandem tertiam esse. nam quoniam est $\Delta:AB = E^2:ZH^2$ et $BA:AG = ZH^2:H\Theta^2$, ex aequo [V, 22] erit $\Delta:AG = E^2:H\Theta^2$. uerum $\Delta:AG$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad

11. BA] AB' F. $\tau\acute{o}\nu$] om. B. 14. GA F. 16. ΘH] in ras. V, $H\Theta$ F. 18. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\acute{\iota}\nu$] $\acute{\epsilon}\sigma\tau\acute{\iota}$ καί F. ZH] e corr. m. 2 (ex HZ ?) V. $\tau\eta$] m. rec. P. ΘH F. 19. $H\Theta$] in ras. V. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\acute{\iota}\nu$ B. 20. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\acute{\iota}$ BV, comp. Fb. 22. $\acute{\omega}\varsigma$] supra scr. m. 1 F. 23. ZH] HZ F. BA] AB P, AB' F. 24. $\tau\acute{o}\nu$] om. P. AG] corr. ex AB m. 1 F. 25. $H\Theta$] $Z\Theta$ P, corr. m. rec. (euan.). 28. $\tau\epsilon\tau\rho\acute{\alpha}\gamma\omega\gamma\omicron\varsigma$ F, corr. m. 1.

πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ
 E τῇ $H\Theta$ μήκει. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ὁ BA πρὸς τὸν
 AG , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ZH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $H\Theta$,
 5 μείζον ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς ZH τοῦ ἀπὸ τῆς $H\Theta$. ἔστω
 οὖν τῷ ἀπὸ τῆς ZH ἴσα τὰ ἀπὸ τῶν $H\Theta$, K ἀνα-
 στρέψαντι ἄρα [ἐστὶν] ὡς ὁ AB πρὸς τὸν $B\Gamma$, οὕτως
 τὸ ἀπὸ τῆς ZH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς K . ὁ δὲ AB πρὸς
 τὸν $B\Gamma$ λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τε-
 τράγωνον ἀριθμόν· καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ZH ἄρα πρὸς τὸ
 10 ἀπὸ τῆς K λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς
 τετράγωνον ἀριθμόν· σύμμετρος ἄρα [ἐστὶν] ἡ ZH τῇ
 K μήκει. ἡ ZH ἄρα τῆς $H\Theta$ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ
 συμμέτρου ἐαυτῇ. καὶ εἰσιν αἱ ZH , $H\Theta$ ῥηταὶ δυνά-
 μει μόνον σύμμετροι, καὶ οὐδετέρα αὐτῶν σύμμετρός
 15 ἐστὶ τῇ E μήκει.

Ἡ $Z\Theta$ ἄρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ τρίτη· ὅπερ
 εἶδει δεῖξαι.

να'.

Εὐρεῖν τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων τετάρτην.

20 Ἐκκείσθωσαν δύο ἀριθμοὶ οἱ AG , GB , ὥστε τὸν
 AB πρὸς τὸν $B\Gamma$ λόγον μὴ ἔχειν μήτε μὴν πρὸς τὸν
 AG , ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀρι-
 θμόν. καὶ ἐκκείσθω ῥητὴ ἡ A , καὶ τῇ A σύμμετρος
 ἔστω μήκει ἡ EZ . ῥητὴ ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ EZ . καὶ γε-
 25 γονέτω ὡς ὁ BA ἀριθμὸς πρὸς τὸν AG , οὕτως το
 ἀπὸ τῆς EZ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ZH . σύμμετρον ἄρα

1. ἐστίν] m. 2 F, om. B. 3. τό] (alt.) om. b. 4. τῆς]
 (alt.) om. b. 6. ἐστίν] om. P. τόν] om. Fb. 11. ἐστίν]
 om. BFVb. 12. ἄρα] m. 2 V. δύναται] -να- in ras. P.
 13. ἀσύμμετρον F, corr. m. rec.; ἀ- supra scr. F m. 2. $H\Theta$
 ἄρα V. 15. ἐστίν B. τῇ E ἐστίν F. 16. τρίτη] corr. ex
 ῥητῇ m. rec. b; ῥητῇ F, mg. γρ. τρίτη m. rec. ὅπερ εἶδει

numerus quadratum. itaque ne E^2 quidem ad $H\Theta^2$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. quare E , $H\Theta$ longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. et quoniam est $BA:AG = ZH^2:H\Theta^2$, erit $ZH^2 > H\Theta^2$ [V, 14]. sit igitur $ZH^2 = H\Theta^2 + K^2$. itaque conuertendo [V, 19 coroll.] $AB:B\Gamma = ZH^2:K^2$. uerum $AB:B\Gamma$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. quare etiam $ZH^2:K^2$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque ZH , K longitudine commensurabiles sunt. itaque ZH^2 excedit $H\Theta^2$ quadrato rectae sibi commensurabilis. et ZH , $H\Theta$ rationales sunt potentia tantum commensurabiles, et neutra rectae E longitudine commensurabilis est.

Ergo $Z\Theta$ ex duobus nominibus tertia est [def. alt. 3]; quod erat demonstrandum.

LI.

Inuenire rectam ex duobus nominibus quartam.

Exponentur duo numeri AG , ΓB eius modi, ut AB neque ad $B\Gamma$ neque ad AG rationem habeat, quam numerus quadratus ad numerum quadratum [prop. XXVIII lemma]. et ponatur rationalis A , et rectae A longitudine commensurabilis sit EZ . itaque EZ rationalis est. et fiat $BA:AG = EZ^2:ZH^2$ [prop. VI coroll.]. itaque EZ^2 , ZH^2 commensurabilia sunt [prop. VI]. itaque etiam ZH ra-

δείξαι] comp. P, om. BFVb. 21. τὸν $B\Gamma$] ἐκότερον αὐτῶν
Theon (BFVb). $B\Gamma$] corr. ex AG m. 1 P. μήτε — 22.
 AG] om. Theon (BFVb). 24. ἐστὶν B. 25. BA] $A'B'$ F.
ἀριθμός] om. V. ΓA F. 26. σύμμετρος P, corr. m. 1.

ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς EZ τῷ ἀπὸ τῆς ZH· ῥητὴ ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ ZH. καὶ ἐπεὶ ὁ BA πρὸς τὸν ΑΓ λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, οὐδὲ τὸ ἀπὸ τῆς EZ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ZH
 5 λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ EZ τῇ ZH μήκει. αὖ EZ, ZH ἄρα ῥηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· ὥστε ἡ EH ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστίν.

Λέγω δὴ, ὅτι καὶ τετάρτη.

10 Ἐπεὶ γάρ ἐστιν ὡς ὁ BA πρὸς τὸν ΑΓ, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς EZ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ZH [μελίων δὲ ὁ BA τοῦ ΑΓ], μείζον ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς EZ τοῦ ἀπὸ τῆς ZH. ἔστω οὖν τῷ ἀπὸ τῆς EZ ἴσα τὰ ἀπὸ τῶν ZH, Θ· ἀναστρέψαντι ἄρα ὡς ὁ AB ἀριθμὸς πρὸς τὸν
 15 ΒΓ, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς EZ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Θ. ὁ δὲ AB πρὸς τὸν ΒΓ λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· οὐδ' ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς EZ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Θ λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν. ἀσύμμετρος
 20 ἄρα ἐστὶν ἡ EZ τῇ Θ μήκει· ἡ EZ ἄρα τῆς HZ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ. καὶ εἰσιν αὖ EZ, ZH ῥηταί δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ ἡ EZ τῇ Α σύμμετρός ἐστι μήκει.

Ἡ EH ἄρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ τετάρτη· ὅπερ
 25 ἔδει δεῖξαι.

1. Post ZH add. ῥητὴ δὲ (seq. ras. 1 litt. F) ἡ EZ b, m. 2 F. ῥητὴ ἄρα] ἡ EZ ῥητὴ ἄρα V m. 2, ῥητὴ ἐστὶν ἄρα b. ἐστὶ] om. b, ἐστὶν PB. 2. καί] (prius) om. BFb. BA] AB P. οὐκ] postea add. m. 1 F. 6. τῇ] τῆς b. 7. εἰσιν B. 8. ἐστὶ BV, comp. Fb. 9. δὴ] supra scr. m. 1 P. καί] m. 2 F. 10. BA] corr. ex AB V. τῶν] om. Bb, corr. ex τό m. rec. P. 11. μελίων — 12. ΑΓ] mg. m. 1 in ras. P.

tionalis est. et quoniam $BA:AF$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, ne EZ^2 quidem ad ZH^2 rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque EZ, ZH longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. itaque EZ, ZH rationales sunt potentia tantum commensurabiles. quare EH ex duobus nominibus est [prop. XXXVI].

Iam dico, eandem quartam esse. nam quoniam est $BA:AF = EZ^2:ZH^2$, erit $EZ^2 > ZH^2$ [V, 14]. sit igitur $EZ^2 = ZH^2 + \Theta^2$. itaque conuertendo [V, 19 coroll.] $AB:BF = EZ^2:\Theta^2$. uerum $AB:BF$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque ne EZ^2 quidem ad Θ^2 rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. quare EZ, Θ longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. EZ^2 igitur excedit ZH^2 quadrato rectae sibi incommensurabilis. et EZ, ZH rationales sunt potentia tantum commensurabiles, et EZ, A longitudine commensurabiles sunt.

Ergo EH ex duobus nominibus est quarta [def. alt. 4]; quod erat demonstrandum.

11. BA] A e corr. V. 12. $\tau\eta\varsigma$] (prius) om. P. 13. $\tau\omega$] $\tau\acute{o}$ F. 16. $\tau\acute{o}\nu$] om. BFb. 18. Θ] ΘA b. 20. $\xi\sigma\tau\acute{\iota}\nu$] om. Fb. $\alpha\theta\alpha$] om. F. $\tau\eta\varsigma$] corr. ex $\tau\eta$ V. HZ] corr. ex ZH V, EH F. 21. $\sigma\upsilon\mu\mu\epsilon\tau\rho\omicron\nu$ b, corr. m. rec., et F, corr. m. 2. $\xi\alpha\nu\tau\eta$ $\mu\acute{\iota}\chi\epsilon\iota$ F. 24. $\delta\pi\epsilon\rho$ $\acute{\epsilon}\delta\epsilon\iota$ $\delta\epsilon\acute{\iota}\xi\alpha\iota$] comp. P, om. BFVb.

νβ'.

Εὐρεῖν τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων πέμπτην."

Ἐκκείσθωσαν δύο ἀριθμοὶ οἱ $ΑΓ$, $ΓΒ$, ὥστε τὸν $ΑΒ$ πρὸς ἐκάτερον αὐτῶν λόγον μὴ ἔχειν, ὃν τετρά-
 5 γωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, καὶ ἐκκεί-
 σθω ῥητὴ τις εὐθεῖα $η Δ$, καὶ τῇ $Δ$ σύμμετρος ἔστω
 [μήκει] ἡ $ΕΖ$. ῥητὴ ἄρα ἡ $ΕΖ$. καὶ γερονέτω ὡς ὁ
 $ΓΑ$ πρὸς τὸν $ΑΒ$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς $ΕΖ$ πρὸς τὸ ἀπὸ
 τῆς $ΖΗ$. ὁ δὲ $ΓΑ$ πρὸς τὸν $ΑΒ$ λόγον οὐκ ἔχει, ὃν
 10 τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· οὐδὲ
 τὸ ἀπὸ τῆς $ΕΖ$ ἄρα πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $ΖΗ$ λόγον ἔχει,
 ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν. αὐ
 $ΕΖ$, $ΖΗ$ ἄρα ῥηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι·
 ἐκ δύο ἄρα ὀνομάτων ἔστιν ἡ $ΕΗ$.

15 Λέγω δὴ, ὅτι καὶ πέμπτη.


Ἐπεὶ γάρ ἴστιν ὡς ὁ $ΓΑ$ πρὸς τὸν $ΑΒ$, οὕτως
 το ἀπὸ τῆς $ΕΖ$ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $ΖΗ$, ἀνάπαλιν ὡς ὁ
 $ΒΑ$ πρὸς τὸν $ΑΓ$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς $ΖΗ$ πρὸς τὸ
 ἀπὸ τῆς $ΖΕ$. μετξον ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς $ΗΖ$ τοῦ ἀπὸ
 20 τῆς $ΖΕ$. ἔστω οὖν τῷ ἀπὸ τῆς $ΗΖ$ ἴσα τὰ ἀπὸ τῶν
 $ΕΖ$, $Θ$. ἀναστρέψαντι ἄρα ἔστιν ὡς ὁ $ΑΒ$ ἀριθμὸς
 πρὸς τὸν $ΒΓ$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς $ΗΖ$ πρὸς τὸ ἀπὸ
 τῆς $Θ$. ὁ δὲ $ΑΒ$ πρὸς τὸν $ΒΓ$ λόγον οὐκ ἔχει, ὃν

3. τόν] corr. ex τό V. 7. μήκει] om. P. $ΕΖ$] $ΖΗ$
 Theon (BFVb), $ΗΖ$ m. rec. P. ῥητὴ ἄρα ἡ $ΕΖ$] ῥητὴ ἄρα
 ἡ $ΖΗ$ V, mg. ῥητὴ τῇ ἄρα $ΗΖ$ m. 2. $ΕΖ$] $ΖΗ$ Theon (BFb),
 $ΗΖ$ P m. rec. 8. $ΕΖ$] Z post ras. 1 litt. V, $ΖΗ$ F, $ΗΖ$ Bb,
 P m. rec. 9. $ΖΗ$] $ΖΕ$ Theon (BFVb), m. rec. P. Deinde
 add. σύμμετρον ἄρα ἔστι τὸ ἀπὸ τῆς $ΗΖ$ τῷ ἀπὸ τῆς $ΖΕ$. ῥητὴ
 ἄρα ἔστι καὶ ἡ $ΖΕ$. καὶ ἐπεὶ Theon (BFVb), P m. rec. ($ΖΗ$
 pro $ΗΖ$). δέ] om. Theon (BFVb). τόν] om. BFb. 11.
 τῆς] (prius) m. 2 B. $ΕΖ$] $ΗΖ$ FVb, m. 2 B, m. rec. P.
 ἄρα] om. B. πρὸς τὸ ἀπὸ] m. 2 B. $ΖΗ$] P, $ΖΕ$ BFVb,

LII.

Inuenire rectam ex duobus nominibus quintam.

Exponentur duo numeri AG , GB eius modi, ut AB ad neutrum rationem habeat, quam numerus quadratus ad numerum quadratum [prop. XXVIII lemma], et ponatur recta aliqua rationalis A , et rectae A commensurabilis sit EZ . itaque EZ rationalis est. et fiat



$$GA:AB=EZ^2:ZH^2$$

[prop. VI coroll.]. GA autem ad AB rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque ne EZ^2 quidem ad ZH^2 rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. quare EZ , ZH rationales sunt potentia tantum commensurabiles [prop. IX]. ergo EH ex duobus nominibus est [prop. XXXVI].

iam dico, eandem quintam esse. nam quoniam est $GA:AB=EZ^2:ZH^2$, e contrario [V, 7 coroll.] est $BA:AG=ZH^2:ZE^2$. itaque $HZ^2 > ZE^2$ [V, 14]. sit igitur $HZ^2 = EZ^2 + \Theta^2$. itaque conuertendo [V,

m. rec. P. 12. τετράγωνος F, corr. m. 1. ἀριθμῶν] m. 2 V. Deinde add. ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ HZ τῇ ZE (τῇ ZE om. V) μήκει b, mg. m. 1 F, m. 2 V. 13. εἰσὶν PB. 14. ἄρα] om. P. EH] H e corr. m. 1 b. 15. καὶ] m. 2 F. 17. EZ] P; HZ BVb, P m. rec.; ZH F. ZH] P, ZE BFVb, P m. rec. Ante ὥς add. ἄρα m. rec. P. 18. οὕτως] om. BVb. ZH] P, EZ BFVb, P m. rec. 19. ZE] P, ZH BFVb, P m. rec. Dein add. ὁ δὲ BA τοῦ AG μείζων (corr. ex μείζον] ἐστὶ V; μείζον (μείζων m. rec. b) δὲ τὸ (ὁ m. rec. b) BA τοῦ AG b, in ras. F. μείζον ἄρα] sustulit rep. in F. ἄρα ἐστὶ V. τό] m. 2 F. HZ] P, EZ BFVb, P m. rec.; item lin. 20, 22. 20. τῆς] om. P. ZE] P, ZH BFVb, P m. rec. τῷ] supra scr. m. 1 b, postea add. m. 1 V, corr. ex τό F m. 1. 21. EZ] P, HZ BFb, m. rec. P, in ras. V.

τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· οὐδ' ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς ZH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Θ λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν. ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ ZH τῇ Θ μήκει· ὥστε ἡ
 5 ZH τῆς ZE μείζον δύναται τῷ ἀπὸ ἀσύμμετρου ἑαυ-
 τῇ. καὶ εἰσιν αἱ HZ , ZE ῥηταὶ δυνάμει μόνον σύμ-
 μετροι, καὶ τὸ EZ ἑλάττων ὄνομα σύμμετρόν ἐστι τῇ
 ἐκκειμένη ῥητῇ τῇ Δ μήκει.

Ἡ EH ἄρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ πέμπτη· ὅπερ
 10 ἔδει δεῖξαι.

νγ'.

Εὐρεῖν τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων ἑκτὴν.

Ἐκκείσθωσαν δύο ἀριθμοὶ οἱ $ΑΓ$, $ΓΒ$, ὥστε τὸν
 $ΑΒ$ πρὸς ἑκάτερον αὐτῶν λόγον μὴ ἔχειν, ὃν τετρά-
 15 γωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· ἔστω δὲ
 καὶ ἕτερος ἀριθμὸς ὁ Δ μὴ τετράγωνος ὢν μηδὲ πρὸς
 ἑκάτερον τῶν $ΒΑ$, $ΑΓ$ λόγον ἔχων, ὃν τετράγωνος
 ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· καὶ ἐκκείσθω τις
 ῥητὴ εὐθεῖα ἡ $Ε$, καὶ γεγονέτω ὡς ὁ Δ πρὸς τὸν
 20 $ΑΒ$, οὕτως το ἀπὸ τῆς $Ε$ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ZH · σύμ-
 μετρον ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς $Ε$ τῷ ἀπὸ τῆς ZH . καὶ ἐστὶ
 ῥητὴ ἡ $Ε$ · ῥητὴ ἄρα καὶ ἡ ZH . καὶ ἐπεὶ οὐκ ἔχει

1. τετράγωνον] corr. ex τετράγωνος m. 1 b. 2. ZH] P, EZ BFVb, P m. rec.; item lin. 4, 5. Θ] ras. 1 litt. V.
 4. ἐστίν] om. BVb. 5. τῆς] corr. ex τῇ Vb. ZE] P, ZH BFVb, P m. rec. συμμέτρον F, corr. m. 2. 6. εἶσι V, comp. Fb. αἱ] m. rec. P. αἱ HZ , ZE] om. FVb; αἱ EZ , ZH supra scr. m. 2 B. 7. EZ] P, ZH BFVb, HZ m. rec. P.
 9. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. BFVb. 13. $ΑΓ$] Δ , seq. ras. 1 litt., F. τόν] corr. ex τό m. 2 B. 16. μῆτε P.
 17. $ΒΑ$] supra scr. Γ m. 1 b, $ΑΒ$ F et V, sed corr. ἔχειν V, sed corr. 18. καὶ] m. 2 F. 20. οὕτως καὶ V. σύμμετρος Theon (BFVb), P m. rec. 21. ἄρα ἐστίν FV. τό —

19 coroll.] $AB:BF = HZ^2:\Theta^2$. verum $AB:BF$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque ne ZH^2 quidem ad Θ^2 rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque ZH, Θ longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. quare ZH^2 excedit ZE^2 quadrato rectae sibi incommensurabilis. et HZ, ZE rationales sunt potentia tantum commensurabiles, et minus nomen EZ rectae rationali propositae Δ longitudine commensurabilis est.

Ergo EH ex duobus nominibus est quinta [def. alt. 5]; quod erat demonstrandum.

LIII.

Inuenire rectam ex duobus nominibus sextam.

Exponantur duo numeri AG, GB eius modi, ut AB ad neutrum rationem habeat, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, sit autem etiam alius numerus Δ non quadratus neque ad alterutrum BA, AG rationem habens, quam numerus quadratus ad numerum quadratum [prop. XXVIII lemma]; et ponatur recta rationalis E , et fiat

$$\Delta:AB = E^2:ZH^2$$

[prop. VI coroll.]. itaque E^2, ZH^2 commensurabilia sunt [prop. VI]. et E rationalis est; itaque etiam ZH rationalis est. et quoniam $\Delta:AB$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, ne E^2 quidem ad ZH^2 rationem habet, quam nu-

ZH] ἡ E $\tau\eta$ ($\tau\eta$ ἀπὸ $\tau\etaς$ P) ZH δυνάμει Theon (BFVb), P m. rec. $\epsilon\sigma\tau\iotaν$ B . 22. $\epsilon\pi\epsilon\iota$] m. 2 B , om. F .

ὁ Δ πρὸς τὸν AB λόγον, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς
 πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, οὐδὲ τὸ ἀπὸ τῆς E ἄρα
 πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ZH λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀρι-
 5 θμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· ἀσύμμετρος ἄρα ἡ
 E τῇ ZH μήκει. γεγονέτω δὴ πάλιν ὡς ὁ BA πρὸς
 τὸν AG , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ZH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $H\Theta$.
 σύμμετρον ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς ZH τῷ ἀπὸ τῆς ΘH . φη-
 τὸν ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς ΘH · φητὴ ἄρα ἡ ΘH . καὶ ἐπεὶ
 ὁ BA πρὸς τὸν AG λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετράγωνος
 10 ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, οὐδὲ τὸ ἀπὸ τῆς
 ZH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $H\Theta$ λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος
 ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· ἀσύμμετρος ἄρα
 ἐστὶν ἡ ZH τῇ $H\Theta$ μήκει. αὖ ZH , $H\Theta$ ἄρα φηταὶ
 εἶσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· ἐκ δύο ἄρα ὀνομάτων
 15 ἐστὶν ἡ $Z\Theta$.

Δεικτέον δὴ, ὅτι καὶ ἕκτη.

Ἐπεὶ γάρ ἐστιν ὡς ὁ Δ πρὸς τὸν AB , οὕτως τὸ
 ἀπὸ τῆς E πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ZH , ἔστι δὲ καὶ ὡς ὁ
 BA πρὸς τὸν AG , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ZH πρὸς τὸ
 20 ἀπὸ τῆς $H\Theta$, δι' ἴσου ἄρα ἐστὶν ὡς ὁ Δ πρὸς τὸν AG ,
 οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς E πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $H\Theta$. ὁ δὲ Δ
 πρὸς τὸν AG λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς
 πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· οὐδὲ τὸ ἀπὸ τῆς E ἄρα
 πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $H\Theta$ λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθ-
 25 μὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ
 E τῇ $H\Theta$ μήκει. ἐδείχθη δὲ καὶ τῇ ZH ἀσύμμετρος·
 ἐκατέρω ἄρα τῶν ZH , $H\Theta$ ἀσύμμετρός ἐστι τῇ E μήκει.
 καὶ ἐπεὶ ἐστιν ὡς ὁ BA πρὸς τὸν AG , οὕτως τὸ ἀπὸ
 τῆς ZH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $H\Theta$, μείζον ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς

7. ἀσύμμετρον F, sed corr. ΘH] in ras. V, $H\Theta$ Fb.
 Deinde add. φητόν δὲ τὸ ἀπὸ τῆς ZH Theon (BFVb). 8. ἄρα

merus quadratus ad numerum quadratum. itaque E, ZH longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. iam rursus fiat $BA:AG = ZH^2:H\Theta^2$ [prop. VI coroll.]. itaque $ZH^2, \Theta H^2$ commensurabilia sunt [prop. VI]. itaque ΘH^2 rationale est; quare ΘH est rationalis. et quoniam $BA:AG$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, ne ZH^2 quidem ad $H\Theta^2$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque $ZH, H\Theta$ longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. quare $ZH, H\Theta$ rationales sunt potentia tantum commensurabiles. itaque $Z\Theta$ ex duobus nominibus est.

iam demonstrandum, eandem sextam esse. nam quoniam est $A:AB = E^2:ZH^2$, et $BA:AG = ZH^2:H\Theta^2$, ex aequo erit [V, 22] $A:AG = E^2:H\Theta^2$. uerum $A:AG$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque ne E^2 quidem ad $H\Theta^2$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque $E, H\Theta$ longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. demonstrauius autem, etiam E, ZH incommensurabiles esse. itaque utraque $ZH, H\Theta$ rectae E longitudine incommensurabilis est. et quoniam est $BA:AG = ZH^2:H\Theta^2$, erit $ZH^2 > H\Theta^2$ [V, 14]. iam sit $ZH^2 = H\Theta^2 + K^2$. quare conuertendo [V, 19 coroll.] erit $AB:BG = ZH^2:K^2$. uerum $AB:BG$

καὶ Theon (BFVb). ἐν τῇ — ΘH] mg. V. $H\Theta$ P. 9.
 BA] AB' F. 10. οὐδέ] οὐδ' ἄρα FVb, οὐκ ἄρα B. τό
 τό F. 14. εἶσιν B. 18. ἔστιν B. 19. BA] AB P. 21.
 δέ] m. 2 F. 23. οὐδέ] οὐδ' ἄρα Theon (BFVb). ἄρα]
 om. Theon (BFVb). 26. HZ F. 27. ἐκείνη — E] ἢ E
 ἄρα ἐκείνη τῶν $ZH, H\Theta$ ἔστιν ἀσύμμετρος V. ἄρα] supra
 scr. F. 28. οὕτως] om. b, m. 2 B. 29. Post $H\Theta$ add.
 μέζων δὲ ὁ AB τοῦ AG V. μέζον] bis F.

ZH τοῦ ἀπὸ τῆς $H\Theta$. ἔστω οὖν τῷ ἀπὸ [τῆς] ZH ἴσα τὰ ἀπὸ τῶν $H\Theta$, K . ἀναστρέψαντι ἄρα ὡς ὁ AB πρὸς $B\Gamma$, οὕτως τὸ ἀπὸ ZH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς K . ὁ δὲ AB πρὸς τὸν $B\Gamma$ λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν· ὥστε οὐδὲ τὸ ἀπὸ ZH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς K λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν. ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ ZH τῇ K μήκει· ἡ ZH ἄρα τῆς $H\Theta$ μείζον δύνатаι τῷ ἀπὸ ἀσύμμετρου ἐαυτῇ. καὶ εἰσὶν αἱ ZH , $H\Theta$ φηται δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ οὐδετέρα αὐτῶν σύμμετρός ἐστι μήκει τῇ ἐκκειμένη φητῇ τῇ E .

Ἡ $Z\Theta$ ἄρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶν ἑκτῇ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

15

Λήμμα.

Ἐστω δύο τετράγωνα τὰ AB , $B\Gamma$ καὶ κείσθωσαν ὥστε ἐπ' εὐθείας εἶναι τὴν AB τῇ BE · ἐπ' εὐθείας ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ ZB τῇ BH . καὶ συμπεπληρώσθω τὸ AG παραλληλόγραμμον· λέγω, ὅτι τετράγωνόν ἐστι τὸ AG , καὶ ὅτι τῶν AB , $B\Gamma$ μέσον ἀνάλογόν ἐστι τὸ AH , καὶ ἔτι τῶν AG , GB μέσον ἀνάλογόν ἐστι τὸ AG .

Ἐπεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν ἡ μὲν AB τῇ BZ , ἡ δὲ BE τῇ BH , ὅλη ἄρα ἡ AE ὅλη τῇ ZH ἐστὶν ἴση. ἀλλ' ἡ μὲν AE ἐκατέρω τῶν $A\Theta$, $K\Gamma$ ἐστὶν ἴση, ἡ δὲ ZH ἐκατέρω τῶν AK , $\Theta\Gamma$ ἐστὶν ἴση· καὶ ἐκατέρω ἄρα τῶν $A\Theta$, $K\Gamma$ ἐκατέρω τῶν AK , $\Theta\Gamma$ ἐστὶν ἴση. ἰσόπλευρον ἄρα ἐστὶ τὸ AG παραλληλόγραμμον· ἐστὶ δὲ καὶ ὀρθογώνιον· τετράγωνον ἄρα ἐστὶ τὸ AG .

1. ZH] $Z\Theta$ b. τῆς] om. P. τῆς] om. Pb. 3. τὸν $B\Gamma$ V. τῆς ZH FV. 4. πρὸς τὸν $B\Gamma$] mg. m. 1 P. 6. τῆς ZH FV. 7. ἀσύμμετρα P, corr. m. 1. 9. συμ-

rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. quare ne ZH^2 quidem ad K^2 rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque ZH, K longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. itaque ZH^2 excedit $H\Theta^2$ quadrato rectae sibi incommensurabilis. et $ZH, H\Theta$ rationales sunt potentia tantum commensurabiles, et neutra earum rationali propositae E longitudine commensurabilis est.

Ergo $Z\Theta$ recta ex duobus nominibus est sexta [def. alt. 6]; quod erat demonstrandum.

Lemma.

Sint duo quadrata $AB, B\Gamma$ et ita ponantur, ut AB, BE in eadem recta sint. itaque etiam ZB, BH in eadem sunt recta. et expleatur parallelogrammum AF . dico, AF quadratum esse, et AE medium esse proportionale inter $AB, B\Gamma$, et praeterea AE medium esse proportionale inter AF, FB .

nam quoniam $AB = BZ, BE = BH$, erit $AE = HZ$. uerum $AE = A\Theta = K\Gamma, ZH = AK = \Theta\Gamma$ [I, 34]. quare etiam

$$A\Theta = K\Gamma = AK = \Theta\Gamma.$$

μέτρον F, corr. m. 2. $\epsilon\alpha\upsilon\tau\eta\ \mu\acute{\eta}\kappa\epsilon\iota$ F. 11. $\alpha\upsilon\tau\omega\upsilon$] $\tau\omega\upsilon$
 $ZH, H\Theta$ Theon (BFVb). $\epsilon\sigma\tau\iota\nu$ P. $\epsilon\gamma\kappa\epsilon\iota\mu\acute{\epsilon}\nu\eta$ F. 12.
 E] EH b, H add. m. 2 F. 13. η] om. b. $\delta\pi\epsilon\rho\ \epsilon\delta\epsilon\iota\ \delta\epsilon\iota\chi\alpha\iota$
 comp. P, om. BFVb. 18. $\epsilon\sigma\tau\iota\nu$ B. 19. $\delta\tau\iota\ \tau\omega\ A\Gamma$ V.
 $\epsilon\sigma\tau\iota\nu$ P. 20. $\tau\omega\ A\Gamma$] om. V. $\delta\tau\iota$] $\epsilon\tau\iota$ BF, supra scr.
 $\delta\tau\iota$ m. 2. 21. $\epsilon\sigma\tau\iota\nu$ P. 22. ZB B. 24. Post $\iota\sigma\eta$ del.
 $\alpha\lambda\lambda'\ \eta\ \mu\acute{\epsilon}\nu\ \Delta E$ $\epsilon\kappa\alpha\tau\epsilon\rho\alpha$ m. 1 P. HZ BFV. 25. $\Gamma\Theta$ V.
 $\alpha\phi\alpha$] om. b. 26. $A\Theta$] A postea add. V. 27. $\epsilon\sigma\tau\iota\nu$ P.
 $\epsilon\sigma\tau\iota\nu$ PB. 28. $\epsilon\sigma\tau\iota\nu$ P.

Καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ ZB πρὸς τὴν BH , οὕτως ἡ ΔB πρὸς τὴν BE , ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ZB πρὸς τὴν BH , οὕτως τὸ ΔB πρὸς τὸ ΔH , ὡς δὲ ἡ ΔB πρὸς τὴν BE , οὕτως τὸ ΔH πρὸς τὸ $B\Gamma$, καὶ ὡς ἄρα τὸ ΔB πρὸς τὸ ΔH , οὕτως τὸ ΔH πρὸς τὸ $B\Gamma$. τῶν ΔB , $B\Gamma$ ἄρα μέσον ἀνάλογόν ἐστὶ τὸ ΔH .

Λέγω δὴ, ὅτι καὶ τῶν $\Delta\Gamma$, ΓB μέσον ἀνάλογόν ἐστι τὸ $\Delta\Gamma$.

Ἐπεὶ γάρ ἐστὶν ὡς ἡ $\Delta\Delta$ πρὸς τὴν ΔK , οὕτως ἡ KH πρὸς τὴν $H\Gamma$. ἴση γάρ ἐστιν] ἐκατέρα ἐκατέρᾳ καὶ συνθέντι ὡς ἡ AK πρὸς $K\Delta$, οὕτως ἡ $K\Gamma$ πρὸς ΓH , ἀλλ' ὡς μὲν ἡ AK πρὸς $K\Delta$, οὕτως τὸ $\Delta\Gamma$ πρὸς τὸ $\Gamma\Delta$, ὡς δὲ ἡ $K\Gamma$ πρὸς ΓH , οὕτως τὸ $\Delta\Gamma$ πρὸς ΓB , καὶ ὡς ἄρα τὸ $\Delta\Gamma$ πρὸς $\Delta\Gamma$, οὕτως τὸ $\Delta\Gamma$ πρὸς τὸ $B\Gamma$. τῶν $\Delta\Gamma$, ΓB ἄρα μέσον ἀνάλογόν ἐστι τὸ $\Delta\Gamma$. ἃ προέκειτο δεῖξαι.

νδ'.

Ἐὰν χωρίον περιέχεται ὑπὸ ῥητῆς καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων πρώτης, ἡ τὸ χωρίον δυναμένη ἄλογός ἐστιν ἡ καλουμένη ἐκ δύο ὀνομάτων.

Χωρίον γὰρ τὸ $\Delta\Gamma$ περιεχέσθω ὑπὸ ῥητῆς τῆς ΔB καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων πρώτης τῆς $\Delta\Delta$. λέγω, ὅτι ἡ τὸ $\Delta\Gamma$ χωρίον δυναμένη ἄλογός ἐστιν ἡ καλουμένη ἐκ δύο ὀνομάτων.

3. τὴν BE — 5. $B\Gamma$] postea ins. m. 1 F. 4. οὕτω B. τ'] m. 2 F. τὸ $B\Gamma$] corr. ex τὴν $B\Gamma$ m. 2 B. 5. οὕτω B. 6. ἄρα] om. b. 8. ἐστι] om. P. 10. τὴν] om. BFb. ἐστὶν] om. P. ἐκατέρᾳ] om. P. 11. τὴν $K\Delta$ V. 12. τὴν ΓH V. τὴν $K\Delta$ V. 13. τὴν ΓH V. 14. τὸ ΓB V, seq. ras. 1 litt. $\Delta\Gamma$] τὸ $\Gamma\Delta$ V. 15. $\Delta\Gamma$] $\Gamma\Delta$ V. τὸ $B\Gamma$] $B\Gamma$

itaque parallelogrammum AG aequilaterum est; est autem idem rectangulum. ergo AG quadratum est.


et quoniam est $ZB:BH=AB:BE$, et $ZB:BH=AB:AH$, $AB:BE=AH:BG$ [VI, 1], erit etiam $AB:AH=AH:BG$. ergo AH medium est proportionale inter AB , BG .

Iam dico, AG etiam medium proportionale esse inter AG , GB .

nam quoniam est $AD:AK=KH:HG$ (nam utraque utrique aequalis est), et componendo [V, 18] $AK:KA=KG:GH$, est autem $AK:KA=AG:GA$, $KG:GH=AG:GB$, erit etiam $AG:GA=AG:GB$. ergo AG medium est proportionale inter AG , GB ; quae propositum erat demonstrare.

LIV.

Si spatium recta rationali et recta ex duobus nominibus prima comprehenditur, recta spatio aequalis quadrata irrationalis est ex duobus nominibus, quae uocatur.



Spatium enim AG recta rationali AB et recta ex duobus nominibus prima AD comprehendatur. dico, rectam spatio AG aequalem quadratam irrationalem esse ex duobus nominibus, quae uocatur.

B, ΓB Fb. 16. α] $\delta\pi\epsilon\rho$ Theon (BFVb). Post $\delta\epsilon\iota\chi\alpha\iota$ add. $\sigma>:$ P. 18. $\tau\eta\varsigma$] m. 2 B. 22. $\chi\omega\rho\iota\sigma$ — 25. $\delta\nu\omicron\mu\acute{\alpha}\tau\omega\nu$] mg. 1 F. 22. AG] $AB\Gamma A$ Theon (BFVb). 23. AB] AD F.

Ἐπεὶ γὰρ ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ πρώτη ἡ $ΑΔ$, διη-
 ρήσθω εἰς τὰ ὀνόματα κατὰ τὸ E , καὶ ἔστω τὸ μείζον
 ὄνομα τὸ $ΑΕ$. φανερόν δὴ, ὅτι αἱ $ΑΕ$, $ΕΔ$ ῥηταί
 εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ ἡ $ΑΕ$ τῆς $ΕΔ$
 5 μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ, καὶ ἡ $ΑΕ$
 σύμμετρός ἐστι τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ τῇ $ΑΒ$ μήκει. τε-
 τμήσθω δὴ ἡ $ΕΔ$ δίχα κατὰ τὸ Z σημεῖον. καὶ ἐπεὶ
 ἡ $ΑΕ$ τῆς $ΕΔ$ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου
 ἑαυτῇ, ἐὰν ἄρα τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς ἐλάσ-
 10 σονος, τουτέστι τῷ ἀπὸ τῆς EZ , ἴσον παρὰ τὴν μείζονα
 τὴν $ΑΕ$ παραβληθῇ ἑλλείπον εἶδει τετραγώνῳ, εἰς
 σύμμετρα αὐτὴν διαιρεῖ. παραβεβλήσθω οὖν παρὰ
 τὴν $ΑΕ$ τῷ ἀπὸ τῆς EZ ἴσον τὸ ὑπὸ $ΑΗ$, $ΗΕ$ · σύμ-
 15 μετρος ἄρα ἐστὶν ἡ $ΑΗ$ τῇ $ΕΗ$ μήκει. καὶ ἤχθωσαν
 ἀπὸ τῶν H , E , Z ὁποτέρῃ τῶν $ΑΒ$, $ΓΔ$ παράλληλοι
 αἱ $HΘ$, $EΚ$, $ΖΑ$ · καὶ τῷ μὲν $ΑΘ$ παραλληλογράμμῳ
 ἴσον τετράγωνον συνεστήτω τὸ $ΣΝ$, τῷ δὲ $ΗΚ$ ἴσον
 τὸ $ΝΠ$, καὶ κείσθω ὥστε ἐπ' εὐθείας εἶναι τὴν MN
 τῇ $NΞ$ · ἐπ' εὐθείας ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ PN τῇ NO . καὶ
 20 συμπεπληρώσθω τὸ $ΣΠ$ παραλληλόγραμμον· τετρά-
 γωνον ἄρα ἐστὶ τὸ $ΣΠ$. καὶ ἐπεὶ τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΗ$,
 $ΗΕ$ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς EZ , ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ $ΑΗ$
 πρὸς EZ , οὕτως ἡ ZE πρὸς $ΕΗ$ · καὶ ὡς ἄρα τὸ $ΑΘ$
 πρὸς $ΕΑ$, τὸ $ΕΑ$ πρὸς $ΚΗ$ · τῶν $ΑΘ$, $ΗΚ$ ἄρα μέσον
 25 ἀνάλογόν ἐστι τὸ $ΕΑ$. ἀλλὰ τὸ μὲν $ΑΘ$ ἴσον ἐστὶ

2. E] e corr. m. rec. P. 3. δὴ] corr. ex δέ B. 4.
 εἰσιν P. ἀσύμμετροι F, sed corr. 5. ἀσυμμέτρου b, sed
 corr.; in F supra add. α- m. 2. καὶ] om. F. $ΕΑ$ F. 7.
 δὴ] δέ V. 8. ἀσυμμέτρου b, sed corr. 9. τετάρτῳ] Δ b.
 τοῦ] τῷ B. τῆς] e corr. V. 12. σύμμετρον P. διέλη
 V b, διέλη corr. in διελεί F, διελεί B. Dein add. μήκει V. 13.
 ὑπὸ τῶν FV. $ΗΕ$] $HΘ$ P. 14. $ΑΗ$] H e corr. m. 1 V.

nam quoniam AA ex duobus nominibus prima est, in E in nomina diuidatur, et maius nomen sit AE . manifestum igitur, AE , EA rationales esse potentia tantum commensurabiles, et AE^2 excedere EA^2 quadrato rectae sibi commensurabilis, et AE rationali propositae AB longitudine commensurabilem esse [def. alt. 1]. iam EA in Z puncto in duas partes aequales secetur. et quoniam AE^2 excedit EA^2 quadrato rectae sibi commensurabilis, si quartae parti quadrati minoris, hoc est quadrato EZ^2 , aequale maiori AE adplicatur parallelogrammum figura quadrata deficiens, eam in partes commensurabiles diuidit [prop. XVII]. adplicetur igitur rectae AE quadrato EZ^2 aequale $AH \times HE$. itaque AH , EH longitudine commensurabiles sunt. et ab H , E , Z alterutri AB , GA parallelae ducantur $H\Theta$, EK , ZA . et parallelogrammo $A\Theta$ aequale quadratum ΣN construatur, et $N\Pi = HK$ [II, 14], et ita ponantur, ut MN , $N\Xi$ in eadem recta sint; quare etiam PN , NO in eadem sunt recta. et parallelogrammum $\Sigma\Pi$ expleatur; itaque $\Sigma\Pi$ quadratum est [u. lemma]. et quoniam est $AH \times HE = EZ^2$, erit $AH : EZ = ZE : EH$ [VI, 17]. quare etiam $A\Theta : EA = EA : KH$ [VI, 1].

EH] HE in ras. V. 15. H] m. 2 F. AB] A eras. F. GA] in ras. V, BA F, GA B. 16. EK] E postea ins. m. 1 F. ZA] mut. in AZ V, AZ BFb. παραλληλόγραμμον P, corr. m. 1. 17. ΣN] Σ corr. ex E BFb. 18. κείσθωσαν V. MN] corr. ex N m. 1 F. 19. εἶσιν B. NP P. 20. $\Sigma\Pi$] corr. ex $E\Pi$ B, item lin. 21. 21. τό τῷ V. AHE b, et corr. in AH , EH m. 2 V, AH F, et B, corr. m. 2. 22. τῷ τό V. 23. πρὸς τὴν V. ZE] EZ P. EH] τὴν H, ante H ras. 1 litt. V. 24. πρὸς τό, seq. ras. 1 litt., V. EA] E eras. V. τό KH V. ἄρα] postea add. m. 1 P.

τῷ ΣΝ, τὸ δὲ ΗΚ ἴσον τῷ ΝΠ· τῶν ΣΝ, ΝΠ ἄρα μέσον ἀνάλογόν ἐστι τὸ ΕΛ. ἐστὶ δὲ τῶν αὐτῶν τῶν ΣΝ, ΝΠ μέσον ἀνάλογον καὶ τὸ ΜΡ· ἴσον ἄρα ἐστὶ τὸ ΕΛ τῷ ΜΡ ὥστε καὶ τῷ ΟΞ ἴσον ἐστίν. ἐστὶ δὲ
 5 καὶ τὰ ΑΘ, ΗΚ τοῖς ΣΝ, ΝΠ ἴσα· ὅλον ἄρα τὸ ΑΓ ἴσον ἐστὶν ὅλῳ τῷ ΣΠ, τουτέστι τῷ ἀπὸ τῆς ΜΞ τετραγώνῳ· τὸ ΑΓ ἄρα δύναται ἢ ΜΞ.

Λέγω, ὅτι ἡ ΜΞ ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστίν.

Ἐπεὶ γὰρ σύμμετρός ἐστιν ἡ ΑΗ τῇ ΗΕ, σύμμε-
 10 τρός ἐστὶ καὶ ἡ ΑΕ ἐκατέρᾳ τῶν ΑΗ, ΗΕ. ὑπόκει-
 ται δὲ καὶ ἡ ΑΕ τῇ ΑΒ σύμμετρος· καὶ αἱ ΑΗ, ΗΕ ἄρα τῇ ΑΒ σύμμετροί εισιν. καὶ ἐστὶ ῥητὴ ἡ ΑΒ· ῥητὴ ἄρα ἐστὶ καὶ ἐκάτερά τῶν ΑΗ, ΗΕ· ῥητὸν ἄρα ἐστὶν ἐκάτερον τῶν ΑΘ, ΗΚ, καὶ ἐστὶ σύμμετρον τὸ
 15 ΑΘ τῷ ΗΚ. ἀλλὰ τὸ μὲν ΑΘ τῷ ΣΝ ἴσον ἐστίν, τὸ δὲ ΗΚ τῷ ΝΠ· καὶ τὰ ΣΝ, ΝΠ ἄρα, τουτέστι τὰ ἀπὸ τῶν ΜΝ, ΝΞ, ῥητά ἐστὶ καὶ σύμμετρα. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρός ἐστιν ἡ ΑΕ τῇ ΕΔ μήκει, ἀλλ' ἡ μὲν ΑΕ τῇ ΑΗ ἐστὶ σύμμετρος, ἡ δὲ ΔΕ τῇ ΕΖ
 20 σύμμετρος, ἀσύμμετρος ἄρα καὶ ἡ ΑΗ τῇ ΕΖ· ὥστε καὶ τὸ ΑΘ τῷ ΕΛ ἀσύμμετρόν ἐστιν. ἀλλὰ τὸ μὲν ΑΘ τῷ ΣΝ ἐστὶν ἴσον, τὸ δὲ ΕΛ τῷ ΜΡ· καὶ τὸ ΣΝ ἄρα τῷ ΜΡ ἀσύμμετρόν ἐστιν. ἀλλ' ὥς τὸ ΣΝ

1. ΣΝ] (bis) corr. ex EN B, item lin. 3, 5. 2. ΕΛ] corr. ex A m. 1 F. ἐστὶν PB. 3. ἐστίν P. 4. τὸ] corr. ex τῷ m. 1 P. ΜΡ τῷ ΕΛ Theon (BFVb). ὥστε καὶ τῷ ἀλλὰ τὸ μὲν ΜΡ τῷ ΟΞ (corr. ex ΞΟ V) ἴσον ἐστὶ (ἐστίν B) τὸ δὲ ΕΛ (ΕΔ F) τῷ ΖΓ, ὅλον ἄρα τὸ ΕΓ τοῖς ΜΡ Theon (BFVb). τῷ] corr. ex τό m. 1 P. ἐστίν] postea ins. m. 1 F. 5. ΕΝ, ΠΝ F. 6. τουτέστιν P. 9. ΑΝ F, corr. m. 1. ΗΕ] corr. ex EH m. 2 V, E'' H' F. 10. ΕΛ ἐκατέρῳ F. 11. σύμμετρος — 12. ΑΒ] (prius) mg. m. 1 F. 11. καὶ] μήκει· καὶ V, B m. 2. αἱ] ἡ EF, in ras. B. EH P. 12. εἶσι V, comp. Fb. ἐστὶν B. 13. ἐστίν PB. 14. ἐστίν] ἐστὶ καὶ V.

itaque EA medium est proportionale inter ΣN , $N\Pi$.
 uerum etiam MP inter eadem ΣN , $N\Pi$ medium est
 proportionale [u. lemma]. quare $EA = MP$. itaque etiam
 $EA = O\Xi$ [I, 43]. uerum etiam $A\Theta + HK = \Sigma N + N\Pi$.
 quare totum¹⁾ $A\Gamma = \Sigma\Pi = M\Xi^2$. ergo $M\Xi$ quadrata
 spatio $A\Gamma$ aequalis est.

dico, $M\Xi$ ex duobus nominibus esse. nam quoniam
 AH rectae HE commensurabilis est, AE utrique rectae
 AH , HE commensurabilis est [prop. XV]. supposui-
 mus autem, etiam AE , AB commensurabiles esse.
 quare etiam AH , HE rectae AB commensurabiles
 sunt [prop. XII]. et AB rationalis est. itaque etiam
 utraque AH , HE rationalis est. quare etiam $A\Theta$,
 HK rationalia sunt [prop. XIX], et $A\Theta$, HK commen-
 surabilia. uerum $A\Theta = \Sigma N$, $HK = N\Pi$. itaque etiam
 ΣN , $N\Pi$, hoc est MN^2 , $N\Xi^2$, rationalia sunt et
 commensurabilia. et quoniam AE , EA longitudine in-
 commensurabiles sunt, et AE , AH commensurabiles,
 et AE , EZ commensurabiles, AH et EZ incommen-
 surabiles sunt [prop. XIII]. quare etiam $A\Theta$ et
 EA incommensurabilia sunt [VI, 1; prop. XI]. uerum
 $A\Theta = \Sigma N$, $EA = MP$. quare etiam ΣN , MP in-
 commensurabilia sunt. est autem $\Sigma N : MP = ON : NP$
 [VI, 1]. itaque ON , NP incommensurabiles sunt

1) Nam $EA = Z\Gamma$.

15. ΣN] corr. ex EN B, item lin. 16. 15. $\xi\sigma\tau\iota\nu$ $\iota\sigma\sigma\upsilon\nu$ V.
 $\xi\sigma\tau\iota$ PBb, comp. F. 16. $\tau\acute{\alpha}$] $\tau\acute{o}$ F. $N\Pi$ $\acute{\alpha}\rho\alpha$] $\tau\acute{\omega}$ $N\Pi$ F.
 17. $\alpha\sigma\acute{\upsilon}\mu\mu\epsilon\tau\rho\alpha$ B. 18. $\acute{\alpha}\lambda\lambda\acute{\alpha}$ Bb. 19. AH] corr. ex
 AB V. EZ] EZ $\xi\sigma\tau\iota$ V. 20. $\kappa\alpha\iota$] $\xi\sigma\tau\iota\nu$ V. Post EZ
 add. $\mu\eta\kappa\epsilon\iota$ Vb, m. 2 B. 21. $\xi\sigma\tau\iota\nu$] om. Bfb. 22. ΣN] $N\Sigma$ F.

πρὸς MP , ἢ ON πρὸς τὴν NP · ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἢ ON τῇ NP . ἴση δὲ ἡ μὲν ON τῇ MN , ἡ δὲ NP τῇ $NΞ$ · ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ MN τῇ $NΞ$. καὶ ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς MN σύμμετρον τῷ ἀπὸ τῆς $NΞ$, καὶ
 5 ῥητὸν ἐκάτερον· αὐτὴν MN , $NΞ$ ἄρα ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι.

Ἡ $MΞ$ ἄρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ καὶ δύνатаι, τὸ $ΑΓ$ · ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

νε'.

10 Ἐὰν χωρίον περιέχῃται ὑπὸ ῥητῆς καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων δευτέρας, ἡ τὸ χωρίον δυναμένη ἀλογός ἐστὶν ἢ καλουμένη ἐκ δύο μέσων πρώτη.

Περιεχέσθω γὰρ χωρίον τὸ $ΑΒΓΔ$ ὑπὸ ῥητῆς
 15 τῆς $ΑΒ$ καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων δευτέρας τῆς $ΑΔ$ · λέγω, ὅτι ἡ τὸ $ΑΓ$ χωρίον δυναμένη ἐκ δύο μέσων πρώτη ἐστίν.

Ἐπεὶ γὰρ ἐκ δύο ὀνομάτων δευτέρα ἐστὶν ἡ $ΑΔ$, διηρησθὼ εἰς τὰ ὀνόματα κατὰ τὸ E , ὥστε τὸ μείζον
 20 ὄνομα εἶναι τὸ $ΑΕ$ · αὐτὴν $ΑΕ$, $ΕΔ$ ἄρα ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ ἡ $ΑΕ$ τῆς $ΕΔ$ μείζον δύνάται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἐναντῇ, καὶ τὸ ἐλάττω ὄνομα ἢ $ΕΔ$ σύμμετρόν ἐστι τῇ $ΑΒ$ μήκει. τετμήσθω ἡ $ΕΔ$ δίχα κατὰ τὸ Z , καὶ τῷ ἀπὸ τῆς EZ ἴσον παρὰ τὴν
 25 $ΑΕ$ παραβεβλήσθω ἐλλείπον εἶδει τετραγώνῳ τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΗΕ$ · σύμμετρος ἄρα ἡ $ΑΗ$ τῇ $ΗΕ$ μήκει. καὶ

1. τὸ MP V. οὕτως ἢ V. τήν] om. BFb. MP F. ἐστὶν ἄρα F. 2. PN P. NM P. 4. τῆς] (prius) om. Fb, m. 2 B. $NΞ$] $MΞ$ F. 5. εἰσιν B. 6. μονονον P. 7. ἐκ] ἢ ἐκ Pb. 12. ἐκ] ἢ ἐκ b. 14. Post γὰρ del. τό B. 18. γάρ] om. Fb, m. 2 B. 20. $ΑΕ$] (alt.) $ΕΑ$ P, corr. in A

[prop. XI]. uerum $ON = MN$, $NP = N\Xi$. quare MN , $N\Xi$ incommensurabiles sunt. et MN^2 , $N\Xi^2$ commensurabilia sunt, et utrumque rationale. MN , $N\Xi$ igitur rationales sunt potentia tantum commensurabiles.

Ergo $M\Xi$ ex duobus nominibus est [prop. XXXVI], et $M\Xi^2 = A\Gamma$; quod erat demonstrandum.

LV.

Si spatium recta rationali et recta ex duobus nominibus secunda comprehenditur, recta spatio aequalis quadrata irrationalis est ex duobus mediis prima, quae uocatur.

Spatium enim $AB\Gamma\Delta$ rationali AB et recta ex duobus nominibus secunda $A\Delta$ comprehendatur. dico, rectam spatio $A\Gamma$ aequalem quadratam ex duobus mediis primam esse.

nam quoniam $A\Delta$ ex duobus nominibus secunda est, in E in nomina diuidatur ita, ut AE maius nomen sit. itaque AE , $E\Delta$ rationales sunt potentia tantum commensurabiles, et AE^2 excedit $E\Delta^2$ quadrato rectae sibi commensurabilis, et minus nomen $E\Delta$ rectae AB longitudine commensurabile est [def. alt. 2]. iam $E\Delta$ in Z in duas partes aequales secetur, et quadrato EZ^2 aequale rectae AE adplicetur $AH \times HE$ figura quadrata deficiens. itaque AH , HE longitudine commensurabiles sunt [prop. XVII]. et per H , E , Z rectis AB , $\Gamma\Delta$ parallelae ducantur $H\Theta$, EK , $Z\Lambda$, et paral-

m. rec. $\epsilon\iota\sigma\tau$ PB. 21. $\tau\eta\varsigma E\Delta$] mg. m. 1 P. 22. $\xi\lambda\alpha\sigma\sigma\omega$
P, comp. F. 23. AB] A ins. m. 1 F. 24. $\tau\phi$] corr. ex
 $\tau\phi$ m. 1 F. 25. $\tau\phi$] $\tau\phi$ V. 26. AH , HE V e corr.

διὰ τῶν H, E, Z παράλληλοι ἤχθωσαν ταῖς $AB, ΓΔ$
 αἱ $HΘ, EK, ΖΑ$, καὶ τῷ μὲν $AΘ$ παραλληλογράμμῳ
 ἴσον τετράγωνον συνεστήτω τὸ $ΣΝ$, τῷ δὲ $ΗΚ$ ἴσον
 τετράγωνον τὸ $ΝΠ$, καὶ κείσθω ὥστε ἐπ' εὐθείας εἶναι
 5 τὴν MN τῇ $NΞ$ · ἐπ' εὐθείας ἄρα [ἐστὶ] καὶ ἡ PN
 τῇ NO . καὶ συμπληρώσθω τὸ $ΣΠ$ τετράγωνον·
 φανερόν δὲ ἐκ τοῦ προδεδειγμένου, ὅτι τὸ MP μέσον
 ἀνάλογόν ἐστι τῶν $ΣΝ, ΝΠ$, καὶ ἴσον τῷ $ΕΑ$, καὶ
 10 ὅτι τὸ $ΑΓ$ χωρίον δύναται ἡ $MΞ$. δεικτέον δὲ, ὅτι
 ἡ $MΞ$ ἐκ δύο μέσων ἐστὶ πρώτη. ἐπεὶ ἀσύμμετρός
 ἐστὶν ἡ $ΑΕ$ τῇ $ΕΔ$ μήκει, σύμμετρος δὲ ἡ $ΕΔ$ τῇ
 AB , ἀσύμμετρος ἄρα ἡ $ΑΕ$ τῇ AB . καὶ ἐπεὶ σύμμε-
 τρός ἐστὶν ἡ $ΑΗ$ τῇ $ΕΗ$, σύμμετρός ἐστι καὶ ἡ $ΑΕ$
 15 ἐκάτερα τῶν $ΑΗ, ΗΕ$. ἀλλὰ ἡ $ΑΕ$ ἀσύμμετρος τῇ
 AB μήκει· καὶ αἱ $ΑΗ, ΗΕ$ ἄρα ἀσύμμετροί εἰσι τῇ
 AB . αἱ $ΒΑ, ΑΗ, ΗΕ$ ἄρα ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον
 σύμμετροι· ὥστε μέσον ἐστὶν ἐκάτερον τῶν $AΘ, ΗΚ$.
 ὥστε καὶ ἐκάτερον τῶν $ΣΝ, ΝΠ$ μέσον ἐστίν. καὶ
 αἱ $MN, NΞ$ ἄρα μέσαι εἰσίν. καὶ ἐπεὶ σύμμετρος ἡ
 20 $ΑΗ$ τῇ $ΗΕ$ μήκει, σύμμετρόν ἐστι καὶ τὸ $AΘ$ τῷ $ΗΚ$,
 τουτέστι τὸ $ΣΝ$ τῷ $ΝΠ$, τουτέστι τὸ ἀπὸ τῆς MN

1. $ΓΔ$] $ΒΓ, ΓΔ$ P, corr. m. 1; $ΔΓ$ Bb. 2. $ΖΑ$] mut. in AZ V, AZ Fb.

3. Post τετράγωνον del. τὸ $ΝΠ$ m. 1 P.

EN B, sed corr. 5. $NΞ$] mut. in NZ V. ἐστὶ] om. P.

ἐστίν B. 8. $ΝΠ$] $ΠΝ$ F et in ras. V. 9. $MΞ$] $MN, NΞ$

corr. ex $MNΞ$ V; mg. m. 1 γρ. $MN, NΞ$ b. δὲ V. 10.

μέσον F, corr. m. 1. ἐπεὶ γάρ F. 12. ἄρα] ἄρα καὶ V.

ἄρα ἐστίν F. Post AB add. μήκει V, m. 2 B. ἐπεὶ] om. P.

13. $ΕΗ$] $ΗΕ$ F. ἐστίν B. 14. ἀλλὰ — 15. καὶ] καὶ ἐστι

(ἐστίν B) ῥητὴ ἡ $ΑΕ$ · ῥητὴ ἄρα καὶ ἐκάτερα τῶν $ΑΗ (ΑΕ F),$


$ΗΕ$. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρός ἐστὶν ἡ $ΑΕ$ τῇ AB , σύμμετρος δὲ

ἡ $ΑΕ$ ἐκάτερα τῶν $ΑΗ, ΗΕ$, καὶ (om. B) Theon (BF Vb). 15.

ἄρα] m. 2 F. σύμμετροι BF, sed corr. εἰσιν PB. 16.

Post AB add. μήκει m. 2 B. $ΒΑ$] om. P. εἰσιν B. 18.

ἐστὶ PV, comp. Fb. 19. εἰσὶ V, comp. Fb. Ante ἡ add.



lelogrammo $A\Theta$ aequale construatur quadratum ΣN , parallelogrammo HK autem $N\Pi$, et ponantur ita, ut MN , $N\Xi$ in eadem recta sint; itaque etiam PN , NO in eadem sunt recta. expleatur quadratum $\Sigma\Pi$. tum ex iis, quae antea demonstrata sunt [prop. LIII lemma], adparet,

MP medium esse proportionale inter ΣN , $N\Pi$ et $= EA$ [p. 162, 1], et esse $M\Xi^2 = A\Gamma$ [p. 162, 5]. iam demonstrandum est, $M\Xi$ ex duabus mediis primam esse. quoniam AE , $E\Delta$ longitudine incommensurabiles sunt, et $E\Delta$, AB commensurabiles, AE , AB incommensurabiles erunt [prop. XIII]. et quoniam AH , EH commensurabiles sunt, etiam AE utrique AH , HE commensurabilis est [prop. XV]. uerum AE , AB longitudine incommensurabiles sunt. quare etiam AH , HE rectae AB incommensurabiles sunt [prop. XIII]. itaque BA et AH , HE rationales sunt potentia tantum commensurabiles. quare utrumque $A\Theta$, HK medium est [prop. XXI]. quare etiam utrumque ΣN , $N\Pi$ medium est. itaque etiam MN , $N\Xi$ mediae sunt. et quoniam AH , HE longitudine commensurabiles sunt, etiam $A\Theta$, HK , hoc est ΣN , $N\Pi$ siue MN^2 , $N\Xi^2$ commensurabilia sunt [VI, 1; prop. XI]. et quoniam AE , $E\Delta$ longitudine incommensurabiles sunt, et AE , AH commensurabiles, et $E\Delta$, EZ com-

ἔστιν BVb , m. 2 F.
 $MK F$, corr. m. 2.

20. καὶ τὸ $A\Theta$] eras. V. τῶ] τῇ P.

τῷ ἀπο τῆς $NΞ$ [ὥστε δυνάμει εἰσὶ σύμμετροι αἱ MN , $NΞ$]. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρός ἐστιν ἡ AE τῇ $EΔ$ μήκει, ἀλλ' ἡ μὲν AE σύμμετρός ἐστι τῇ AH , ἡ δὲ $EΔ$ τῇ EZ σύμμετρος, ἀσύμμετρος ἄρα ἡ AH τῇ EZ . ὥστε
 5 καὶ τὸ $ΑΘ$ τῷ $EΔ$ ἀσύμμετρόν ἐστιν, τουτέστι τὸ $ΣΝ$ τῷ MP , τουτέστιν ἡ ON τῇ NP , τουτέστιν ἡ MN τῇ $NΞ$ ἀσύμμετρός ἐστι μήκει. ἐδείχθησαν δὲ αἱ MN , $NΞ$ καὶ μέσαι οὐσαι καὶ δυνάμει σύμμετροι· αἱ MN , $NΞ$ ἄρα μέσαι εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι. λέγω
 10 δὴ, ὅτι καὶ ῥητὸν περιέχουσιν. ἐπεὶ γὰρ ἡ $ΔE$ ὑπόκειται ἐκατέρᾳ τῶν AB , EZ σύμμετρος, σύμμετρος ἄρα καὶ ἡ EZ τῇ EK . καὶ ῥητὴ ἐκατέρα αὐτῶν ῥητὸν ἄρα τὸ $EΔ$, τουτέστι τὸ MP . τὸ δὲ MP ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν $MNΞ$. ἐὰν δὲ δύο μέσαι δυνάμει μόνον
 15 σύμμετροι συντεθῶσι ῥητὸν περιέχουσαι, ἡ ὅλη ἀλογός ἐστιν, καλεῖται δὲ ἐκ δύο μέσων πρώτη.
 Ἡ ἄρα $MΞ$ ἐκ δύο μέσων ἐστὶ πρώτη· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

νς'.

20 Ἐὰν χωρίον περιέχεται ὑπὸ ῥητῆς καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων τρίτης, ἡ τὸ χωρίον δυναμένη ἀλογός ἐστιν ἡ καλουμένη ἐκ δύο μέσων δευτέρα.

Χωρίον γὰρ τὸ $ABΓΔ$ περιεχέσθω ὑπὸ ῥητῆς τῆς
 25 AB καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων τρίτης τῆς $ΑΔ$ διηρημένης εἰς δύο ὀνόματα κατὰ τὸ E , ὧν μείζον ἐστὶ τὸ

1. ὥστε — 2. $NΞ$] om. P. ὥστε καὶ F, sed corr. 3. ἀλλὰ V. 4. σύμμετρος] om. FVb. ἀσύμμετρος] corr. ex σύμμετρος m. 2 F. 5. ἀσύμμετρος F, corr. m. 2. ἐστὶ BV, comp. Fb. $ΣΝ$] corr. ex $ΕΝ$ B. 6. NP] in ras. V. 7. ἐστὶν P. 8. δυνάμει μόνον V. αἱ — 9. σύμμετροι] mg. m. 2 V. 9. εἰσὶν B. 10. $ΔE$] in ras. V. 11. AB] corr.

mensurabiles, AH et EZ incommensurabiles sunt [prop. XIII]. quare AO , EA , hoc est EN , MP , incommensurabilia sunt, siue ON , NP , hoc est MN , $N\Xi$, longitudine incommensurabiles [VI, 1; prop. XI]. demonstrauius autem, MN , $N\Xi$ et medias esse et potentia commensurabiles. itaque MN , $N\Xi$ mediae sunt potentia tantum commensurabiles. iam dico, easdem spatium rationale comprehendere. nam quoniam supposuimus, AE utrique AB , EZ commensurabilem esse, etiam EZ , EK commensurabiles sunt. et utraque rationalis est. quare EA , hoc est MP , rationale est [prop. XIX]. uerum $MP = MN \times N\Xi$. sin duae mediae potentia tantum commensurabiles componuntur spatium rationale comprehendentes, tota irrationalis est, uocatur autem ex duabus mediis prima [prop. XXXVII].

Ergo $M\Xi$ ex duabus mediis prima est; quod erat demonstrandum.

LVI.

Si spatium recta rationali et recta ex duobus nominibus tertia comprehenditur, recta spatio aequalis quadrata irrationalis est ex duabus mediis secunda, quae uocatur.

Spatium enim $AB\Gamma A$ comprehendatur rationali AB et recta ex duobus nominibus tertia AA in nomina in E diuisa, quorum maius est AE . dico, rectam

ex EB m. rec. F. EZ] in ras. V. $\sigma\acute{\upsilon}\mu\mu\epsilon\tau\rho\omicron\varsigma$] om. F. 12. $\acute{\alpha}\rho\alpha$ $\acute{\epsilon}\sigma\tau\acute{\iota}$ P. EZ] mut. in ZE V, ZE P. 13. $\tau\omicron\upsilon\tau\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\upsilon$ P. 14. MN , $N\Xi$ V. $\mu\acute{o}\nu\omicron\nu$] om. BFV. 15. $\sigma\upsilon\nu\tau\epsilon\theta\acute{\omega}\sigma\iota\upsilon$ P B. η] m. 2 F. 16. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ V, comp. Fb. 17. $M\Xi$] MHZ , del. Z, F. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\acute{\iota}$] m. 2 F. 24. $\acute{\epsilon}\eta\tau\eta\varsigma$] supra scr. F. 25. $\tau\acute{\epsilon}\lambda\epsilon\tau\eta\varsigma$] supra scr. F. 26. $\acute{\omega}\nu$] $\acute{\omega}\nu$ $\tau\acute{o}$ P. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\alpha$ BFb.

ΑΕ· λέγω, ὅτι ἡ τὸ *ΑΓ* χωρίον δυναμένη ἄλογός ἐστιν ἡ καλουμένη ἐκ δύο μέσων δευτέρα.

Κατεσκευάσθω γὰρ τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον. καὶ ἐπεὶ ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ τρίτη ἡ *ΑΔ*, αἱ *ΑΕ*, *ΕΔ*
 5 ἄρα ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ ἡ *ΑΕ* τῆς *ΕΔ* μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ, καὶ οὐδετέρα τῶν *ΑΕ*, *ΕΔ* σύμμετρός [ἐστὶ] τῇ *ΑΒ* μήκει. ὁμοίως δὴ τοῖς προδεδειγμένοις δείξομεν, ὅτι ἡ *ΜΞ* ἐστὶν ἡ τὸ *ΑΓ* χωρίον δυναμένη, καὶ αἱ *ΜΝ*, *ΝΞ*
 10 μέσαι εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι· ὥστε ἡ *ΜΞ* ἐκ δύο μέσων ἐστίν.

Δεικτέον δὴ, ὅτι καὶ δευτέρα.


[Καὶ] ἐπεὶ ἀσύμμετρός ἐστιν ἡ *ΔΕ* τῇ *ΑΒ* μήκει, τουτέστι τῇ *ΕΚ*, σύμμετρός δὲ ἡ *ΔΕ* τῇ *ΕΖ*, ἀσύμ-
 15 μετρός ἄρα ἐστὶν ἡ *ΕΖ* τῇ *ΕΚ* μήκει. καὶ εἰσι ῥηταὶ· αἱ *ΖΕ*, *ΕΚ* ἄρα ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι. μέσον ἄρα [ἐστὶ] τὸ *ΕΑ*, τουτέστι τὸ *ΜΡ*· καὶ περιέχεται ὑπὸ τῶν *ΜΝΞ*· μέσον ἄρα ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν *ΜΝΞ*.

20 Ἡ *ΜΞ* ἄρα ἐκ δύο μέσων ἐστὶ δευτέρα· ὅπερ ἔδει δείξαι.

1. ἡ] supra scr. m. 1 b. 3. κατασκευάσθω Vb. γάρ] δέ V. 5. εἰσιν P. Post *ΑΕ* del. *ΕΔ* ἄρα ῥηταὶ εἰσιν m. 1 P. 7. ἐστὶ] om. P. 8. τοῖς πρότερον δεδειγμένοις Theon (BFVb). ἡ] m. rec. P. 9. ἡ] postea ins. F. καὶ ὅτι αἱ BFV. 10. εἰσιν B. *ΜΞ*] *ΜΖ* FV. 11. ἐστὶ BV, comp. Fb. 13. καὶ] m. 2 BF, om. Vb. ἐπεὶ οὖν V. 15. *ΕΖ*] *ΖΕ* P. *ΕΚ*] *ΕΗ* P. 16. εἰσιν PB. 17. ἐστὶ] om. BFVb. τουτέστιν P. 18. *ΜΝ*, *ΝΞ* b. μέσον — 19. *ΜΝΞ*] mg. m. 2 F. 20. *ΜΞ*] *ΜΝ*, add. Ξ m. 2 B; *ΜΝΞ* FVb. ἄρα] supra scr. m. 1 F. ἐστὶ] om. P. ὅπερ ἔδει δείξαι] om. BFVb.

spatio AG aequalem quadratam irrationalem esse ex duabus mediis secundam, quae uocatur.

Comparentur enim eadem, quae antea. et quoniam AA ex duobus nominibus tertia est, AE , EA



rationales sunt potentia tantum commensurabiles, et AE^2 excedit EA^2 quadrato rectae sibi commensurabilis, et neutra rectarum AE , EA rectae AB longitudine commensurabilis est [def. alt. 3]. iam eodem modo quo antea demonstrabimus, esse

$$MΞ^2 = AG$$

[cfr. p. 162, 5], et MN , $NΞ$ medias esse potentia tantum commensurabiles [cfr. p. 166, 10 sq.]. quare $MΞ$ ex duabus mediis est.

iam demonstrandum est, eandem secundam esse. quoniam AE , AB , hoc est AE , EK , longitudine incommensurabiles sunt, et AE , EZ commensurabiles, EZ et EK longitudine incommensurabiles sunt [prop. XIII]. et rationales sunt; itaque ZE , EK rationales sunt potentia tantum commensurabiles. quare EA , hoc est MP , medium est [prop. XXI]. et rectis MN , $NΞ$ comprehenditur. itaque $MN \times NΞ$ medium est.

Ergo $MΞ$ ex duabus mediis secunda est [prop. XXXVIII]; quod erat demonstrandum.

νζ.

Ἐὰν χωρίον περιέχεται ὑπὸ ῥητῆς καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων τετάρτης, ἡ τὸ χωρίον δυναμένη ἄλογός ἐστιν ἢ καλουμένη μείζων.

- 5 Χωρίον γὰρ τὸ $ΑΓ$ περιεχέσθω ὑπὸ ῥητῆς τῆς $ΑΒ$ καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων τετάρτης τῆς $ΑΔ$ διηρημένης εἰς τὰ ὀνόματα κατὰ τὸ $Ε$, ὧν μείζων ἔστω τὸ $ΑΕ$. λέγω, ὅτι ἡ τὸ $ΑΓ$ χωρίον δυναμένη ἄλογός ἐστιν ἢ καλουμένη μείζων.
- 10 Ἐπεὶ γὰρ ἡ $ΑΔ$ ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ τετάρτη, αἱ $ΑΕ$, $ΕΔ$ ἄρα ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ ἡ $ΑΕ$ τῆς $ΕΔ$ μείζων δύναται τῷ ἀπὸ ἀσύμμετρου ἑαυτῇ, καὶ ἡ $ΑΕ$ τῇ $ΑΒ$ σύμμετρός [ἐστὶ] μήκει. τετμήσθω ἡ $ΔΕ$ δίχα κατὰ τὸ $Ζ$, καὶ τῷ ἀπὸ τῆς $ΕΖ$
- 15 ἴσον παρὰ τὴν $ΑΕ$ παραβεβλήσθω παραλληλόγραμμον τὸ ὑπὸ $ΑΗ$, $ΗΕ$. ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ $ΑΗ$ τῇ $ΗΕ$ μήκει. ἤχθωσαν παράλληλοι τῇ $ΑΒ$ αἱ $ΗΘ$, $ΕΚ$, $ΖΑ$, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ αὐτὰ τοῖς πρὸ τούτου γεγονέτω· φανερόν δὴ, ὅτι ἡ τὸ $ΑΓ$ χωρίον δυναμένη ἐστὶν ἢ
- 20 $ΜΞ$. δεικτέον δὴ, ὅτι ἡ $ΜΞ$ ἄλογός ἐστιν ἢ καλουμένη μείζων. ἐπεὶ ἀσύμμετρός ἐστιν ἡ $ΑΗ$ τῇ $ΕΗ$ μήκει, ἀσύμμετρόν ἐστι καὶ τὸ $ΑΘ$ τῷ $ΗΚ$, τουτέστι τὸ $ΣΝ$ τῷ $ΝΠ$. αἱ $ΜΝ$, $ΝΞ$ ἄρα δυνάμει εἰσὶν


2. περιέχεται P. 4. μείζων V, sed corr. 8. ἢ] om. Fb.
 ΑΕ P. χωρίον ἢ Fb. 10. ἐστὶν P. 11. εἰσὶν P. 12.
 τῆς] τῇ b. τῷ] corr. ex τό V. συμμέτρου, ἀ- add. m. 2,
 BFb. 13. ἐστὶ] om. P. 15. ΑΕ] supra Α scr. Δ b, E in
 ras. V. 16. ὑπὸ τῶν V. ΑΗ] corr. ex ΑΕ m. 1 F. 17.
 ΕΗ V. 18. ΖΑ] in ras., seq. ras. 3 litt. V, Z in ras. m. 1 B.
 λοιπὰ] supra scr. V. τὰ] om. FV. αὐτὰ] om. F. 21.
 σύμμετρος F, corr. m. 2. ἐστὶν] om. B. 22. τουτέστιτεστι P,
 corr. m. 1. 23. τῷ] corr. ex τό FV. ἄρα] om. b. εἰσὶ
 σύμμετροι V, corr. m. 2.

LVII.

Si spatium recta rationali et recta ex duobus nominibus quarta comprehenditur, recta spatio aequalis quadrata irrationalis est maior, quae uocatur.

Spatium enim AG rationali AB comprehendatur et AD recta ex duobus nominibus quarta in E in nomina diuisa, quorum maius sit AE . dico, rectam spatio AG aequalem quadratam irrationalem esse maiorem, quae uocatur.

nam quoniam AD ex duobus nominibus quarta est, AE , ED rationales sunt potentia tantum commensurabiles, et AE^2 excedit ED^2



quadrato rectae sibi incommensurabilis, et AE , AB longitudine commensurabiles sunt [deff. alt. 4]. secetur AE in Z in duas partes aequales, et quadrato EZ^2 aequale rectae AE adplicetur parallelogrammum

$$AH \times HE.$$

itaque AH , HE longitudine incommensurabiles sunt [prop. XVIII]. rectae AB parallelae ducantur $HΘ$, EK , ZA , et reliqua eodem modo, quo antea [p. 166, 1 sq.], fiant. manifestum igitur est, esse $MΞ^2 = AG$. iam demonstrandum, $MΞ$ irrationalem esse maiorem, quae uocatur. quoniam AH , EH longitudine incommensurabiles sunt, etiam $AΘ$, HK , hoc est $ΣN$, $NΠ$, incommensurabilia sunt [VI, 1; prop. XI]. itaque MN , $NΞ$ potentia incommensurabiles sunt. et quoniam AE , AB longitudine commensurabiles sunt, AK rationale est [prop.

ἀσύμμετροι. καὶ ἐπεὶ σύμμετρός ἐστιν ἡ AE τῇ AB
 μήκει, φητόν ἐστι τὸ AK . καὶ ἐστιν ἴσον τοῖς ἀπὸ
 τῶν MN , $NΞ$. φητόν ἄρα [ἐστὶ] καὶ τὸ συγκείμενον
 ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν MN , $NΞ$. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρός
 5 [ἐστὶν] ἡ AE τῇ AB μήκει, τουτέστι τῇ EK , ἀλλὰ
 ἡ AE σύμμετρός ἐστι τῇ EZ , ἀσύμμετρος ἄρα ἡ EZ
 τῇ EK μήκει. αἱ EK , EZ ἄρα φηταὶ εἰσι δυνάμει
 μόνον σύμμετροι· μέσον ἄρα τὸ AE , τουτέστι τὸ MP .
 καὶ περιέχεται ὑπὸ τῶν MN , $NΞ$. μέσον ἄρα ἐστὶ
 10 τὸ ὑπὸ τῶν MN , $NΞ$. καὶ φητόν τὸ [συγκείμενον]
 ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν MN , $NΞ$, καὶ εἰσιν ἀσύμμετροι αἱ
 MN , $NΞ$ δυνάμει. ἐὰν δὲ δύο εὐθεῖαι δυνάμει ἀσύμ-
 μετροὶ συντεθῶσι ποιοῦσαι τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν
 ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων φητόν, τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν μέσον,
 15 ἡ ὅλη ἄλογός ἐστιν, καλεῖται δὲ μείζων.

Ἡ $MΞ$ ἄρα ἄλογός ἐστιν ἡ καλουμένη μείζων,
 καὶ δύναται τὸ AG χωρίον· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

νῆ'.

Ἐὰν χωρίον περιέχεται ὑπὸ φητῆς καὶ τῆς
 20 ἐκ δύο ὀνομάτων πέμπτῃς, ἡ τὸ χωρίον δυνα-
 μένη ἄλογός ἐστιν ἡ καλουμένη φητόν καὶ μέ-
 σον δυναμένη.

Χωρίον γὰρ τὸ AG περιεχέσθω ὑπὸ φητῆς τῆς
 AB καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων πέμπτῃς τῆς AD διη-
 25 ρημένης εἰς τὰ ὀνόματα κατὰ τὸ E , ὥστε τὸ μείζον
 ὄνομα εἶναι τὸ AE . λέγω [δή], ὅτι ἡ τὸ AG χωρίον

1. EAP . 2. ἐστὶ] ἐστὶν P, dein del. ἡ AE τῇ AB m. 1. τὸ]
 e corr. m. 1 V. 3. MN] NM P. ἐστὶ] om. B F V b. καί]
 om. b. 5. ἐστὶν] om. P. τουτέστιν P. ἀλλ' F. 6.
 ἐστὶν P. τῇ] τῆς P. 7. εἰσιν P. 8. τουτέστιν b. τὸ]
 corr. ex τῷ m. 1 F. 9. μέσον — 10. $NΞ$] mg. m. 1 P. 10.

XIX]. et $AK = MN^2 + NΞ^2$. quare etiam $MN^2 + NΞ^2$ rationale est. et quoniam AE, AB , hoc est AE, EK , longitudine incommensurabiles sunt [prop. XIII], et AE, EZ commensurabiles, EZ, EK longitudine incommensurabiles sunt [prop. XIII]. itaque EK, EZ rationales sunt potentia tantum commensurabiles. quare AE , hoc est MP , medium est [prop. XXI]. et rectis $MN, NΞ$ comprehenditur. itaque $MN \times NΞ$ medium est. et $MN^2 + NΞ^2$ rationale est, et $MN, NΞ$ potentia incommensurabiles sunt. sin duae rectae potentia incommensurabiles componuntur efficientes summam quadratorum suorum rationalem, rectangulum autem medium, tota irrationalis est, uocatur autem maior [prop. XXXIX].

Ergo $MΞ$ irrationalis est maior, quae uocatur, et $MΞ^2 = AΓ$; quod erat demonstrandum.

LVIII.

Si spatium recta rationali et recta ex duobus nominibus quinta comprehenditur, recta spatio aequalis quadrata irrationalis est spatio rationali et medio aequalis quadrata, quae uocatur.

Spatium enim $AΓ$ comprehendatur rationali AB et AD recta ex duobus nominibus quinta in E in nomina diuisa, ita ut AE maius nomen sit. dico, rectam spatio $AΓ$ aequalem quadratam irrationalem esse.

ὅπό] συγκεῖμενον ἐκ V. συγκεῖμενον] om. P. 11. ἐκ τῶν] supra scr. F. καὶ ἔστιν ἀσύμμετρος ἡ MN τῇ NΞ Theon (BFVb). 13. συντεθῶσιν PB. 14. δέ comp. F. 15. ἔστι BV, comp. Fb. 19. καὶ τῆς] bis b. 26. δῆ] om. P. ἡ] supra scr. m. 1 P.


δυναμένη ἄλογός ἐστιν ἢ καλουμένη ῥητὸν καὶ μέσον δυναμένη.

Κατεσκευάσθω γὰρ τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον δεδειγμένοις· φανερόν δὴ, ὅτι ἡ τὸ $ΑΓ$ χωρίον δυναμένη ἐστὶν
 5 ἢ $MΞ$. δεικτέον δὴ, ὅτι ἡ $MΞ$ ἐστὶν ἢ ῥητὸν καὶ μέσον δυναμένη. ἐπεὶ γὰρ ἀσύμμετρός ἐστιν ἡ $ΑΗ$ τῇ $ΗΕ$, ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ $ΑΘ$ τῷ $ΘΕ$, τουτέστι τὸ ἀπὸ τῆς MN τῷ ἀπὸ τῆς $NΞ$. αἱ MN , $NΞ$ ἄρα δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι. καὶ ἐπεὶ ἡ $ΑΔ$ ἐκ
 10 δύο ὀνομάτων ἐστὶ πέμπτη, καὶ [ἐστὶν] ἑλασσον αὐτῆς τμήμα τὸ $ΕΔ$, σύμμετρος ἄρα ἡ $ΕΔ$ τῇ $ΑΒ$ μήκει. ἀλλὰ ἡ $ΑΕ$ τῇ $ΕΔ$ ἐστὶν ἀσύμμετρος· καὶ ἡ $ΑΒ$ ἄρα τῇ $ΑΕ$ ἐστὶν ἀσύμμετρος μήκει [αἱ $ΒΑ$, $ΑΕ$ ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι]· μέσον ἄρα ἐστὶ
 15 τὸ $ΑΚ$, τουτέστι τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν MN , $NΞ$. καὶ ἐπεὶ σύμμετρός ἐστιν ἡ $ΔΕ$ τῇ $ΑΒ$ μήκει, τουτέστι τῇ $ΕΚ$, ἀλλὰ ἡ $ΔΕ$ τῇ $ΕΖ$ σύμμετρός ἐστιν, καὶ ἡ $ΕΖ$ ἄρα τῇ $ΕΚ$ σύμμετρός ἐστιν. καὶ ῥητὴ ἡ $ΕΚ$ · ῥητὸν ἄρα καὶ τὸ $ΕΑ$, τουτέστι τὸ $ΜΡ$, τουτέστι
 20 τὸ ὑπὸ $MNΞ$. αἱ MN , $NΞ$ ἄρα δυνάμει ἀσύμμετροί εἰσι ποιῶσαι τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων μέσον, τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν ῥητόν.

3. κατασκευάσθω V, sed corr. γὰρ] οὖν V. τοῖς προ-
 δεδειγμένοις Theon (BFVb). 5. δέ F. 7. ΗΕ] corr. ex
 ΕΗ V. ἐστὶν PB. 8. τῆς $NΞ$] τῶν $NΞ$ P. 9. σύμ-
 μετροι V, corr. m. 2. $ΑΔ$] $Δ$ e corr. V. 10. ἐστὶν] om. P.
 12. ἀλλ' F. 13. $ΒΑ$] mut. in $ΑΒ$ m. 2 V, $ΑΒ$ F. 14.
 εἰσιν B. 16. ἀσύμμετρος B, corr. m. 2. 17. ἀλλ' F. $ΔΕ$]
 corr. ex $ΒΓ$, ut uidetur, V. ἐστὶ PBV, comp. Fb. 18.
 Ante σύμμετρος ras. 1 litt. V. καὶ ῥητῇ] ῥητῇ δέ BFVb.
 19. Post $ΕΚ$ add. ῥητῇ ἄρα καὶ ἡ $ΕΖ$ V. $ΕΑ$] supra add.
 $Δ$ m. 1 b. τουτέστιν P. τουτέστιν P. 20. ὑπὸ τῶν FV.
 MN , $NΞ$ B. 21. εἰσιν PB. 22. δέ F.

spatio rationali et medio aequalem quadratam, quae uocatur.

comparentur enim eadem, quae in superioribus demonstrationibus. manifestum igitur est, esse $M\Xi^2 = A\Gamma$



[p. 162, 1 sq.]. iam demonstrandum est, $M\Xi$ esse rectam spatio rationali et medio aequalem quadratam. nam quoniam AH , HE incommensurabiles sunt [prop. XVIII], $A\Theta$, ΘE , hoc est MN^2 , $N\Xi^2$, incommensurabilia sunt [VI, 1; prop. XI]. itaque MN , $N\Xi$ potentia

incommensurabiles sunt. et quoniam $A\Delta$ ex duobus nominibus est quinta, et minor pars eius est $E\Delta$, $E\Delta$ et AB longitudine commensurabiles sunt [deff. alt. 5]. uerum AE , $E\Delta$ incommensurabiles sunt. quare etiam AB , AE longitudine incommensurabiles sunt [prop. XIII].¹⁾ itaque AK , hoc est $MN^2 + N\Xi^2$, medium est [prop. XXI]. et quoniam ΔE , AB , hoc est ΔE , EK , longitudine commensurabiles sunt, et ΔE , EZ commensurabiles, etiam EZ , EK commensurabiles sunt [prop. XII]. et EK rationalis est. itaque etiam $E\Delta$, hoc est MP siue $MN \times N\Xi$, rationale est [prop. XIX]. itaque MN , $N\Xi$ potentia incommensurabiles sunt summam quadratorum suorum mediam efficientes, rectangulum autem rationale.

1) Cum lin. 13 $\alpha\theta\alpha$, quod edd. post ΔE habent, in codd. omittatur, malui delere $\alpha\theta$ BA — lin. 14 $\sigma\upsilon\mu\mu\epsilon\tau\rho\omicron\iota$.

Ἡ $MΞ$ ἄρα ῥητὸν καὶ μέσον δυναμένη ἐστὶ καὶ
δύναται τὸ $ΑΓ$ χωρίον· ὕπερ ἔδει δεῖξαι.

νθ'.

Ἐὰν χωρίον περιέχεται ὑπὸ ῥητῆς καὶ τῆς
ἐκ δύο ὀνομάτων ἑκτῆς, ἡ τὸ χωρίον δυναμένη
ἄλογός ἐστιν ἢ καλουμένη δύο μέσα δυναμένη.

Χωρίον γὰρ τὸ $ΑΒΓΔ$ περιεχέσθω ὑπὸ ῥητῆς τῆς
 $ΑΒ$ καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων ἑκτῆς τῆς $ΑΔ$ διηρη-
μένης εἰς τὰ ὀνόματα κατὰ τὸ $Ε$, ὥστε τὸ μείζον
ὄνομα εἶναι τὸ $ΑΕ$ · λέγω, ὅτι ἡ τὸ $ΑΓ$ δυναμένη ἡ
δύο μέσα δυναμένη ἐστίν.

Κατεσκευάσθω [γὰρ] τὰ αὐτὰ τοῖς προδεδειγμένοις.
φανερὸν δὴ, ὅτι [ἡ] τὸ $ΑΓ$ δυναμένη ἐστίν ἡ $MΞ$,
καὶ ὅτι ἀσύμμετρός ἐστιν ἡ MN τῇ $NΞ$ δυνάμει. καὶ
ἐπεὶ ἀσύμμετρός ἐστιν ἡ $ΕΑ$ τῇ $ΑΒ$ μήκει, αἱ $ΕΑ$,
 $ΑΒ$ ἄρα ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· μέσον
ἄρα ἐστὶ τὸ $ΑΚ$, τουτέστι τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ
τῶν MN , $NΞ$. πάλιν, ἐπεὶ ἀσύμμετρός ἐστιν ἡ $ΕΑ$
τῇ $ΑΒ$ μήκει, ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ $ΖΕ$ τῇ $ΕΚ$.
αἱ $ΖΕ$, $ΕΚ$ ἄρα ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι·
μέσον ἄρα ἐστὶ τὸ $ΕΑ$, τουτέστι τὸ $ΜΡ$, τουτέστι τὸ
ὑπὸ τῶν $MNΞ$. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρος ἡ $ΑΕ$ τῇ $ΕΖ$,
καὶ τὸ $ΑΚ$ τῷ $ΕΑ$ ἀσύμμετρόν ἐστιν. ἀλλὰ τὸ μὲν

1. ἐστίν PB. 6. ἡ] postea ins. F. μέσας P, corr. m. 1.
7. ῥητῆς] om. F. 10. ἡ — δυναμένη] mg. m. 1 P. ἡ]
(alt.) ἄλογός ἐστιν ἢ καλουμένη Vb, e corr. F. 11. ἐστίν] del.
F, om. Vb. 12. κατασκευάσθω V. γὰρ] om. P. 13. ἡ]
om. PF. 15. $ΕΑ$] $ΑΕ$ FVb. $ΕΑ$] $ΑΕ$ F, in ras. V. 16.
εἰσιν B. 17. ἐστίν P. "ἀπὸ τῶν ἐκ τῶν F. 18. $NΞ$]
mut. in $ΞN$ V. 19. Post $ΑΒ$ add. τουτέστι τῇ $ΕΚ$ V. ἐστίν B.
 $ΖΕ$] $ΕΖ$ P. 20. αἱ] καὶ αἱ BFb. εἰσιν P. 21. $ΜΡ$]
corr. ex $ΜΕ$ m. rec. b. τουτέστιν P. 22. ἡ] ἐστίν ἢ FV.
23. ἀσύμμετρος F.


Ergo $M\Xi$ recta spatio rationali et medio aequalis quadrata est [prop. XL], et $M\Xi^2 = A\Gamma$; quod erat demonstrandum.

LIX.

Si spatium recta rationali et recta ex duobus nominibus sexta comprehenditur, recta spatio quadrata aequalis irrationalis est duobus spatiis mediis aequalis quadrata, quae uocatur.

Spatium enim $AB\Gamma A$ comprehendatur recta rationali AB et recta ex duobus nominibus sexta $A\Gamma$ in E in nomina diuisa, ita ut maius nomen sit AE . dico, rectam spatio $A\Gamma$ aequalem quadratam rectam esse duobus spatiis mediis aequalem quadratam.

comparentur eadem, quae in superioribus demonstrationibus. manifestum est igitur, esse $M\Xi^2 = A\Gamma$,



et MN , $N\Xi$ potentia incommensurabiles esse [p. 176, 6 sq.]. et quoniam EA , AB longitudine incommensurabiles sunt [deff. alt. 6], EA et AB rationales sunt potentia tantum commensurabiles. itaque AK , hoc est $MN^2 + N\Xi^2$, medium est [prop. XXI]. rursus quoniam

EA , AB longitudine incommensurabiles sunt [deff. alt. 6], ZE et EK incommensurabiles sunt [prop. XIII]. quare ZE , EK rationales sunt potentia tantum commensurabiles. itaque EA , hoc est MP siue $MN \times N\Xi$, medium est [prop. XXI]. et quoniam AE , EZ incommensurabiles sunt, etiam AK , EA

AK ἐστὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπο τῶν MN , $NΞ$,
τὸ δὲ EA ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν $MNΞ$ · ἀσύμμετρον ἄρα
ἐστὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $MNΞ$ τῷ ὑπὸ
τῶν $MNΞ$. καὶ ἐστὶ μέσον ἐκότερον αὐτῶν, καὶ αἱ
5 MN , $NΞ$ δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι.

Ἡ $MΞ$ ἄρα δύο μέσα δυναμένη ἐστὶ καὶ δύναται
τὸ $ΑΓ$ · ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

[Λήμμα.

Ἐὰν εὐθεῖα γραμμὴ τμηθῇ εἰς ἄνισα, τὰ ἀπὸ τῶν
10 ἀνίσων τετράγωνα μείζονά ἐστὶ τοῦ δις ὑπὸ τῶν ἀνί-
σων περιεχομένου ὀρθογωνίου.

Ἐστω εὐθεῖα ἡ AB καὶ τετμήσθω εἰς ἄνισα
κατὰ τὸ Γ , καὶ ἔστω μείζων ἡ $ΑΓ$ · λέγω, ὅτι τὰ
ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, ΓB μείζονά ἐστὶ τοῦ δις ὑπὸ τῶν
15 $ΑΓ$, ΓB .

Τετμήσθω γὰρ ἡ AB δίχα κατὰ τὸ Δ . ἐπεὶ οὖν
εὐθεῖα γραμμὴ τέτμηται εἰς μὲν ἴσα κατὰ τὸ Δ , εἰς
δὲ ἄνισα κατὰ τὸ Γ , τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, ΓB μετὰ
τοῦ ἀπὸ $\Gamma\Delta$ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ $A\Delta$ · ὥστε τὸ ὑπὸ
20 τῶν $ΑΓ$, ΓB ἑλαττόν ἐστὶ τοῦ ἀπὸ $A\Delta$ · τὸ ἄρα δις
ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, ΓB ἑλαττόν ἢ διπλάσιόν ἐστὶ τοῦ ἀπὸ
 $A\Delta$. ἀλλὰ τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, ΓB διπλάσιά [ἐστὶ] τῶν
ἀπὸ τῶν $A\Delta$, $\Delta\Gamma$ · τὰ ἄρα ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, ΓB μείζονά
ἐστὶ τοῦ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, ΓB · ὅπερ ἔδει δεῖξαι.]

25

ξ'.

Τὸ ἀπὸ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων παρὰ ῥητὴν

2. ἐστὶ] m. 2 F. τῶν] om. BFb. 3. MN , $NΞ$ V. τῷ]
τό FV. 4. MN , $NΞ$ m. 2 V. ἐστὶ P. μέσον] μὲν V.
6. δυνάμει V. 8. λήμμα] m. 2 P. 10. ἴσων V, sed corr.

incommensurabilia sunt [VI, 1; prop. XI]. uerum $AK = MN^2 + N\Xi^2$, $EA = MN \times N\Xi$. itaque $MN^2 + N\Xi^2$ et $MN \times N\Xi$ incommensurabilia sunt. et utrumque medium est, et MN , $N\Xi$ potentia incommensurabiles sunt.

Ergo $M\Xi$ recta est duobus spatiis mediis aequalis quadrata [prop. XLI], et $M\Xi^2 = A\Gamma$; quod erat demonstrandum.

[Lemma.

Si recta linea in partes inaequales secatur, quadrata partium inaequalium maiora sunt duplo rectangulo partibus inaequalibus comprehenso.

Sit recta AB et in Γ in partes inaequales secetur, et maior sit $A\Gamma$. dico, esse

$$A\Gamma^2 + \Gamma B^2 > 2 A\Gamma \times \Gamma B.$$

nam AB in Δ in duas partes aequales secetur. iam quoniam recta linea in Δ in partes aequales secta est, in Γ autem in inaequales, erit $A\Gamma \times \Gamma B + \Gamma \Delta^2 = A\Delta^2$ [II, 5]. quare $A\Gamma \times \Gamma B < A\Delta^2$. itaque $2 A\Gamma \times \Gamma B < 2 A\Delta^2$. est autem $A\Gamma^2 + \Gamma B^2 = 2(A\Delta^2 + \Delta\Gamma^2)$ [II, 9]. ergo $A\Gamma^2 + \Gamma B^2 > 2 A\Gamma \times \Gamma B$; quod erat demonstrandum.¹⁾

LX.

Quadratum rectae ex duobus nominibus rectae ra-

1) Cum Euclides iam prop. XLIV p. 128, 17 hoc lemmate tacite usus sit, parum credibile est, id ab eo ipso hic demum additum esse. quare puto, lemma ab interpolatore adiectum esse, quem fugerit, id iam antea usurpatum esse. facile adparet res ipsa ex II, 7.

εἶσι V. ἀνίστων τῆς ὅλης τμημάτων V. 12. ἔστω γάρ F. 13. μείζον τὸ $A\Gamma$ P. 16. Δ] corr. ex B F. 17. γραμμὴ ἡ AB V. 19. ἀπὸ τῆς Vb. $\Gamma\Delta$] in ras. V, $\Delta\Gamma$ P. τῆς $A\Delta$ V. 20. ἔλασσον P, comp. Fb. τῆς $A\Delta$ V. 22. τῆς $A\Delta$ V. ἔστι] om. P. 24. τῶν] om. P. 25. $\nu\theta'$, corr. m. 2, F.

παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων πρώτην.


Ἔστω ἐκ δύο ὀνομάτων ἡ AB διηρημένη εἰς τὰ ὀνόματα κατὰ τὸ Γ , ὥστε τὸ μείζον ὄνομα εἶναι τὸ 5 $ΑΓ$, καὶ ἐκλείσθω ῥητὶ ἡ ΔE , καὶ τῷ ἀπὸ τῆς AB ἴσον παρὰ τὴν ΔE παραβεβλήσθω τὸ ΔEZH πλάτος ποιοῦν τὴν ΔH · λέγω, ὅτι ἡ ΔH ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ πρώτη.

Παραβεβλήσθω γάρ παρὰ τὴν ΔE τῷ μὲν ἀπὸ 10 τῆς $ΑΓ$ ἴσον τὸ $\Delta \Theta$, τῷ δὲ ἀπὸ τῆς $BΓ$ ἴσον τὸ $K\Lambda$ · λοιπὸν ἄρα τὸ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $BΓ$ ἴσον ἐστὶ τῷ MZ . τετμήσθω ἡ MH δίχα κατὰ τὸ N , καὶ παράλληλος ἦχθω ἡ $NΞ$ [ἐκατέρω τῶν $ΜΑ$, HZ]. ἐκάτερον ἄρα τῶν $MΞ$, NZ ἴσον ἐστὶ τῷ ἁπαξ ὑπὸ τῶν 15 $ΑΓΒ$. καὶ ἐπεὶ ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶν ἡ AB διηρημένη εἰς τὰ ὀνόματα κατὰ τὸ Γ , αἱ $ΑΓ$, $BΓ$ ἄρα ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· τὰ ἄρα ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $BΓ$ ῥητά ἐστι καὶ σύμμετρα ἀλλήλοις· ὥστε καὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $BΓ$ [σύμμετρόν 20 ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $BΓ$ · ῥητὸν ἄρα ἐστὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $BΓ$]. καὶ ἐστὶν ἴσον τῷ ΔA · ῥητὸν ἄρα ἐστὶ τὸ ΔA . καὶ παρὰ ῥητὴν τὴν ΔE παράκειται· ῥητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ ΔM καὶ σύμμετρος τῇ ΔE μήκει. πάλιν, ἐπεὶ αἱ $ΑΓ$, $BΓ$ ῥηταὶ εἰσι 25 δυνάμει μόνον σύμμετροι, μέσον ἄρα ἐστὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $BΓ$, τουτέστι τὸ MZ . καὶ παρὰ ῥητὴν τὴν $ΜΑ$ παράκειται· ῥητὴ ἄρα καὶ ἡ MH ἐστὶ καὶ ἀσύμ-

5. τῷ] corr. ex τό m. 1 F. AB] A e corr. B. 9. τῷ] corr. ex τό m. 1 F. 10. τό] mut. in τῷ m. 1 F. $\Delta \Theta$] Θ e corr. V. τῷ] corr. ex τό m. 1 F. 11. ἐστὶ] m. 2 F. 12. δίχα] m. 2 V. 13. $NΞ$] N eras. F, Ξ b. ἐκατέρω — HZ] om. P. 14. Post ἄρα del. τῶν AH V. NZ] corr. ex $NΞ$

tionali adplicatum latitudinem efficit rectam ex duobus nominibus primam.

Sit AB recta ex duobus nominibus in Γ in nomina diuisa, ita ut maius nomen sit $A\Gamma$, et ponatur ratio-



nalis ΔE , et quadrato AB^2 aequale rectae ΔE adplicetur ΔEZH latitudinem efficiens ΔH . dico, ΔH rectam esse ex duobus nominibus primam.

nam rectae ΔE adplicetur $\Delta\Theta = A\Gamma^2$ et $KA = B\Gamma^2$. itaque reliquum [II, 4] $2A\Gamma \times \Gamma B = MZ$. iam MH in N in duas partes aequales secetur, et $N\Xi$ parallela ducatur. itaque $M\Xi = NZ = A\Gamma \times \Gamma B$. et quoniam AB ex duobus nominibus est in Γ in nomina diuisa, $A\Gamma$, ΓB rationales sunt potentia tantum commensurabiles [prop. XXXVI]. itaque $A\Gamma^2$, ΓB^2 rationalia sunt et commensurabilia. quare etiam $A\Gamma^2 + \Gamma B^2$ [prop. XV]. et $A\Gamma^2 + \Gamma B^2 = \Delta A$. itaque etiam ΔA rationale est. et rectae rationali ΔE adplicatum est; quare ΔM rationalis est et rectae ΔE longitudine commensurabilis [prop. XX]. rursus quoniam $A\Gamma$, ΓB rationales sunt potentia tantum commensurabiles, $2A\Gamma \times \Gamma B$, hoc est MZ , medium est [prop. XXI]. et rectae rationali MA adplicatum est. itaque MH rationalis est et rectae MA , hoc est ΔE , longitudine

m. 1 F. 15. $A\Gamma$, ΓB in ras. V. 16. $\alpha\Gamma$] $\kappa\alpha\iota$ $\alpha\Gamma$ V. 18. $\xi\sigma\tau\iota$] $\xi\sigma\tau\iota$ BFb. $\kappa\alpha\iota$] (alt.) om. V. 19. Post ΓB del. $\kappa\alpha\iota$ $\xi\sigma\tau\iota\nu$ $\xi\sigma\sigma\iota\nu$ F. $\sigma\acute{\upsilon}\mu\mu\epsilon\tau\rho\omicron\varsigma$ — 20. ΓB] mg. m. 1 P. 20. $\phi\eta\tau\acute{o}\nu$ — 21. ΓB] om. P. 22. ΔA] A e corr. FV, ΔA P. $\tau\acute{o}$] $\tau\acute{o}$ F. ΔA] corr. ex ΔA m. rec. P. 23. ΔM] corr. ex ΔH m. 2 F. 27. $\acute{\alpha}\rho\alpha$ $\xi\sigma\tau\iota$ BFVb. $\kappa\alpha\iota$] om. V. $\xi\sigma\tau\iota$] om. BFVb. $\sigma\acute{\upsilon}\mu\mu\epsilon\tau\rho\omicron\varsigma$ F, corr. m. 2.

μετρος τῇ $ΜΑ$, τουτέστι τῇ $ΔΕ$, μήκει. ἔστι δὲ καὶ ἡ $ΜΔ$ ῥητὴ καὶ τῇ $ΔΕ$ μήκει σύμμετρος· ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ $ΔΜ$ τῇ $ΜΗ$ μήκει· καὶ εἰσι ῥηταὶ αἱ $ΔΜ$, $ΜΗ$ ἄρα ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι·
 5 ἐκ δύο ἄρα ὀνομάτων ἐστὶν ἡ $ΔΗ$.

Δεικτέον δὴ, ὅτι καὶ πρώτη.

Ἐπεὶ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ μέσον ἀνάλογόν ἐστι τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΓΒ$, καὶ τῶν $ΔΘ$, $ΚΑ$ ἄρα μέσον ἀνάλογόν ἐστι τὸ $ΜΞ$. ἔστιν ἄρα ὡς τὸ $ΔΘ$ πρὸς τὸ
 10 $ΜΞ$, οὕτως τὸ $ΜΞ$ πρὸς τὸ $ΚΑ$, τουτέστιν ὡς ἡ $ΔΚ$ πρὸς τὴν $ΜΝ$, ἡ $ΜΝ$ πρὸς τὴν $ΜΚ$. τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν $ΔΚ$, $ΚΜ$ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς $ΜΝ$. καὶ ἐπεὶ σύμμετρόν ἐστι τὸ ἀπὸ τῆς $ΑΓ$ τῷ ἀπὸ τῆς $ΓΒ$, σύμμετρόν ἐστι καὶ τὸ $ΔΘ$ τῷ $ΚΑ$. ὥστε καὶ ἡ $ΔΚ$ τῇ
 15 $ΚΜ$ σύμμετρός ἐστιν. καὶ ἐπεὶ μείζονά ἐστι τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ τοῦ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$, μείζον ἄρα καὶ τὸ $ΔΑ$ τοῦ $ΜΖ$. ὥστε καὶ ἡ $ΔΜ$ τῆς $ΜΗ$ μείζων ἐστίν. καὶ ἐστὶν ἴσον τὸ ὑπὸ τῶν $ΔΚ$, $ΚΜ$ τῷ ἀπὸ τῆς $ΜΝ$, τουτέστι τῷ τετάρτῳ τοῦ ἀπὸ τῆς $ΜΗ$, καὶ
 20 σύμμετρος ἡ $ΔΚ$ τῇ $ΚΜ$. ἐὰν δὲ ὥσι δύο εὐθεταὶ ἄνιστοι, τῷ δὲ τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος ἴσον παρὰ τὴν μείζονα παραβληθῇ ἐλλείπον εἶδει τετραγώνῳ καὶ εἰς σύμμετρα αὐτὴν διαιρῇ, ἡ μείζων τῆς ἐλάσσονος μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ· ἡ $ΔΜ$ ἄρα
 25 τῆς $ΜΗ$ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ. καὶ εἰσι ῥηταὶ αἱ $ΔΜ$, $ΜΗ$, καὶ ἡ $ΔΜ$ μείζον ὄνομα οὕσα σύμμετρός ἐστι τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ τῇ $ΔΕ$ μήκει.

1. $ΜΑ$] $ΑΜ$ in ras. V. ἔστιν PB. 3. $ΔΜ$] $ΜΔ$ P. καὶ εἰσι] e corr. V. εἰσιν B. 4. $ΔΜ$, $ΜΗ$ ἄρα] e corr. V. 5. ἄρα] supra scr. F, om. P. 7. Post ἐπεὶ add. γὰρ BVb, F m. 2. 8. $ΑΓ$, $ΓΒ$ m. 2 V. 10. $ΔΚ$] $Κ$ in ras. V. 13. $ΓΒ$] $ΒΓ$ in ras. V. 15. $ΚΜ$ μήκει σύμ-

incommensurabilis [prop. XXII]. uerum MA rationalis est et rectae AE longitudine commensurabilis. itaque AM , MH longitudine incommensurabiles sunt [prop. XIII]. et sunt rationales. itaque AM , MH rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo AH ex duobus nominibus est [prop. XXXVI]. iam demonstrandum, eandem primam esse. quoniam $AI \times \Gamma B$ medium est proportionale inter AI^2 , ΓB^2 [cfr. prop. XXI lemma], etiam $M\Xi$ medium est proportionale inter $A\Theta$, KA . itaque $A\Theta : M\Xi = M\Xi : KA$, hoc est [VI, 1] $AK : MN = MN : MK$. itaque $AK \times KM = MN^2$ [VI, 17]. et quoniam AI^2 , ΓB^2 commensurabilia sunt, etiam $A\Theta$, KA commensurabilia sunt. quare etiam AK , KM commensurabiles sunt [VI, 1; prop. XI]. et quoniam est $AI^2 + \Gamma B^2 > 2AI \times \Gamma B$ [u. ad lemma], erit $AA > MZ$. quare etiam $AM > MH$ [VI, 1; V, 14]. et

$$AK \times KM = MN^2 = \frac{1}{4} MH^2,$$

et AK , KM commensurabiles sunt. sin datae sunt duae rectae inaequales, et quartae parti quadrati minoris aequale spatium maiori adplicatur figura quadrata deficiens et eam in partes commensurabiles diuidit, maior quadrata minorem excedit quadrato rectae sibi commensurabilis [prop. XVII]. itaque AM^2 excedit MH^2 quadrato rectae sibi commensurabilis. et AM , MH rationales sunt, et maius nomen AM rectae rationali propositae AE longitudine commensurabilis est.

μετρώς ἐστι V. Post ἐστίν add. μήκει m. 2 B. 16. τοῦ — ΓB] supra scr. F. 18. ἐστὶ PVb, comp. F. 20. Post KM add. μήκει V, m. 2 B. ὧσιν PB. 23. διατετὶ b. 24. Ante μείζον ras. 1 litt. F. 25. τοῦ τό V. 26. καὶ ἡ — 27. ἐστι] in ras. F. 26. AM] MH P, HM Fb.

Ἡ ΔH ἄρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ πρώτη· ὅπερ
 εἶδει δεῖξαι.

ξά'.

Τὸ ἀπὸ τῆς ἐκ δύο μέσων πρώτης παρὰ ῥη-
 5 τὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ τὴν ἐκ δύο
 ὀνομάτων δευτέραν.

Ἐστω ἐκ δύο μέσων πρώτη ἡ AB διηρημένη εἰς
 τὰς μέσας κατὰ τὸ Γ , ὧν μείζων ἡ AG , καὶ ἐκκείσθω
 ῥητὴ ἡ ΔE , καὶ παραβεβλήσθω παρὰ τὴν ΔE τῷ ἀπὸ
 10 τῆς AB ἴσον παραλληλόγραμμον τὸ ΔZ πλάτος ποιοῦν
 τὴν ΔH . λέγω, ὅτι ἡ ΔH ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ δευτέρα.

Κατεσκευάσθω γὰρ τὰ αὐτὰ τοῖς πρὸ τούτου. καὶ
 ἐπεὶ ἡ AB ἐκ δύο μέσων ἐστὶ πρώτη διηρημένη κατὰ
 τὸ Γ , αἱ AG , GB ἄρα μέσαι εἰσὶ δυνάμει μόνον
 15 σύμμετροι ῥητὸν περιέχουσai· ὥστε καὶ τὰ ἀπὸ τῶν
 AG , GB μέσα ἐστίν. μέσον ἄρα ἐστὶ τὸ ΔA . καὶ παρὰ
 ῥητὴν τὴν ΔE παραβέβληται· ῥητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ $M\Delta$
 καὶ ἀσύμμετρος τῇ ΔE μήκει. πάλιν, ἐπεὶ ῥητόν ἐστι
 τὸ δις ὑπὸ τῶν AG , GB , ῥητόν ἐστι καὶ τὸ MZ . καὶ
 20 παρὰ ῥητὴν τὴν $M\Delta$ παράκειται· ῥητὴ ἄρα [ἐστὶ] καὶ
 ἡ MH καὶ μήκει σύμμετρος τῇ $M\Delta$, τουτέστι τῇ ΔE .
 ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ ΔM τῇ MH μήκει. καὶ εἰσι
 ῥηταί· αἱ ΔM , MH ἄρα ῥηταί· εἰσι δυνάμει μόνον
 σύμμετροι· ἐκ δύο ἄρα ὀνομάτων ἐστὶν ἡ ΔH .


1. ὀνομάτω b. ὅπερ εἶδει δεῖξαι] om. B F V b, comp. P. 3. ξβ' F. 4. ῥητῆς B, sed corr. 7. ἐστω] e corr. m. 2 F. 9. παρὰ τὴν ΔE παραβεβλήσθω P. 10. AB] corr. ex $\Delta\Delta$ m. 1 b. ἴσον τό P. 12. κατασκευάσθω V. 14. αἱ] in ras. m. 2 B. εἰσίν B. 16. ἐστίν] ἐστὶ P B, comp. F b, εἰσὶ V. 17. παράκειται Theon (B F V b). 19. ἐστὶ] om. B. 20. ῥη, supra scr. τὴν P. ἐστὶ] om. B F V b. 21. σύμμετρος μήκει V. $M\Delta$] M e corr. V. 22. ἐστίν] om. V. μήκει τῇ MH V. εἰσιν B.

Ergo $\angle H$ ex duobus nominibus prima est [deff. alt. 1]; quod erat demonstrandum.

LXI.

Quadratum rectae ex duabus mediis primae rectae rationali adplicatum latitudinem efficit rectam ex duobus nominibus secundam.

Sit AB recta ex duabus mediis prima in Γ in medias diuisa, quarum maior sit $A\Gamma$, et ponatur rationalis $\angle E$, et rectae $\angle E$ adpli-



cetetur quadrato AB^2 aequale parallelogrammum $\angle Z$ latitudinem efficiens $\angle H$. dico, $\angle H$ ex duobus nominibus secundam esse.

nam comparentur eadem, quae in priore propositione. et quoniam AB ex duabus mediis prima est in Γ diuisa, $A\Gamma$, ΓB mediae sunt potentia tantum commensurabiles spatium rationale comprehendentes [prop. XXXVII]. quare etiam $A\Gamma^2$, ΓB^2 media sunt [prop. XXI]. itaque $\angle A$ medium est. et rectae rationali $\angle E$ adplicatum est. itaque $M\angle$ rationalis est et rectae $\angle E$ longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. rursus quoniam $2A\Gamma \times \Gamma B$ rationale est, etiam MZ rationale est. et rectae rationali $M\angle$ adplicatum est. itaque etiam MH rationalis est et rectae $M\angle$ longitudine commensurabilis [prop. XX], hoc est rectae $\angle E$. itaque $\angle M$, MH longitudine incommensurabiles sunt [prop. XIII]. et sunt rationales. itaque $\angle M$, MH rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo $\angle H$ ex duobus nominibus est [prop. XXXVI].

Δεικτέον δὴ, ὅτι καὶ δευτέρα.

Ἐπεὶ γὰρ τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ μείζονά ἐστι τοῦ
 δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$, μείζον ἄρα καὶ τὸ $ΔΑ$ τοῦ
 $ΜΖ$. ὥστε καὶ ἡ $ΔΜ$ τῆς $ΜΗ$. καὶ ἐπεὶ σύμμετρόν
 5 ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς $ΑΓ$ τῷ ἀπὸ τῆς $ΓΒ$, σύμμετρόν ἐστι
 καὶ τὸ $ΔΘ$ τῷ $ΚΑ$. ὥστε καὶ ἡ $ΔΚ$ τῇ $ΚΜ$ σύμμε-
 τρός ἐστιν. καὶ ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν $ΔΚΜ$ ἴσον τῷ ἀπὸ
 τῆς $ΜΝ$. ἡ $ΔΜ$ ἄρα τῆς $ΜΗ$ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ
 συμμέτρου ἑαυτῇ. καὶ ἐστὶν ἡ $ΜΗ$ σύμμετρος τῇ $ΔΕ$
 10 μήκει.

Ἡ $ΔΗ$ ἄρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ δευτέρα.

ξβ΄.

Τὸ ἀπὸ τῆς ἐκ δύο μέσων δευτέρας παρὰ
 ῥητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ τὴν ἐκ
 15 δύο ὀνομάτων τρίτην.

Ἐστω ἐκ δύο μέσων δευτέρα ἡ $ΑΒ$ διηρημένη εἰς
 τὰς μέσας κατὰ τὸ $Γ$, ὥστε τὸ μείζον τμήμα εἶναι τὸ
 $ΑΓ$, ῥητὴ δέ τις ἔστω ἡ $ΔΕ$, καὶ παρὰ τὴν $ΔΕ$ τῷ
 ἀπὸ τῆς $ΑΒ$ ἴσον παραλληλόγραμμον παραβεβλήσθω
 20 τὸ $ΔΖ$ πλάτος ποιοῦν τὴν $ΔΗ$. λέγω, ὅτι ἡ $ΔΗ$ ἐκ
 δύο ὀνομάτων ἐστὶ τρίτη.

Κατεσκευάσθω τὰ αὐτὰ τοῖς προδεδειγμένοις. καὶ
 ἐπεὶ ἐκ δύο μέσων δευτέρα ἐστὶν ἡ $ΑΒ$ διηρημένη
 κατὰ τὸ $Γ$, αἱ $ΑΓ$, $ΓΒ$ ἄρα μέσαι εἰσὶ δυνάμει μόνον,
 25 σύμμετροι μέσον περιέχουσai. ὥστε καὶ τὸ συγκείμενον

3. $ΑΓ$] $Γ$ in ras. m. 1 P. 7. ἐστίν] ἐστὶ BV, comp. Fb.
 ἐστὶ] ἐστὶν P. $ΔΚΜ$] $Κ$ corr. ex $Μ$ m. 1 P; $ΔΚ$, $ΚΜ$ corr. ex
 $ΔΚ$, $ΝΜ$ V. 8. $ΜΗ$] corr. ex $ΜΝ$ m. 1 b. δύναται
 μείζον V. 12. ξβ'] corr. ex ξγ' F. 15. ὀνομάτων] corr. ex
 μέσων m. 2 B. τρίτην] in ras. m. 1 B. 16. ἔστω] in ras.
 m. 1 B. 18. ἔστω] γεγόνεω V. $ΔΕ$] in ras. m. 1 B. τήν]

iam demonstrandum est, eandem secundam esse.


nam quoniam $AG^2 + GB^2 > 2AG \times GB$ [prop. LIX lemma], erit etiam $AA > MZ$. quare etiam $AM > MH$. et quoniam AG^2, GB^2 commensurabilia sunt, etiam AO, KA commensurabilia sunt. quare etiam AK, KM commensurabiles sunt [VI, 1; prop. XI]. et $AK \times KM = MN^2$ [cfr. p. 184, 7 sq.]. itaque AM^2 excedit MH^2 quadrato rectae sibi commensurabilis [prop. XVII]; et MH, AE longitudine commensurabiles sunt.

Ergo AH ex duobus nominibus secunda est [deff. alt. 2].

LXII.

Quadratum rectae ex duabus mediis secundae rectae rationali adplicatum latitudinem efficit rectam ex duobus nominibus tertiam.

Sit AB ex duabus mediis secunda in Γ in medias diuisa, ita ut maior pars sit AG , rationalis autem sit AE , et rectae AE quadrato AB^2 aequale parallelogrammum AZ adplicetur latitudinem efficiens AH . dico, AH ex duobus nominibus tertiam esse.



comparentur eadem, quae in superioribus demonstrationibus. et quoniam AB ex duabus mediis secunda est in Γ diuisa, AG, GB mediae sunt potentia tantum commensurabiles spatium medium comprehen-

$\phi\eta\tau\eta\nu\ \tau\eta\nu$ F. $\tau\tilde{\omega}$] corr. ex $\tau\acute{o}$ m. 1 F. 20. $\tau\eta\nu$] corr. ex $\tau\acute{o}$ m. 1 B, $\tau\acute{o}$ F. 22. $\kappa\alpha\iota\ \kappa\alpha\tau\epsilon\sigma\kappa\epsilon\nu\acute{\alpha}\sigma\theta\omega$, del. $\kappa\alpha\iota$, F; $\kappa\alpha\tau\epsilon\sigma\kappa\epsilon\nu\acute{\alpha}\sigma\theta\omega\ \gamma\acute{\alpha}\rho$ V. $\kappa\alpha\iota$] postea ins. F. 23. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\ \delta\epsilon\nu\tau\acute{\epsilon}\rho\alpha$ P. 24. ΓB] Γ in ras. V. $\mu\acute{\epsilon}\sigma\alpha\iota\ \acute{\alpha}\rho\alpha$ V. $\acute{\epsilon}\lambda\acute{\iota}\sigma\iota\varsigma$ PB.

ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ μέσον ἐστίν. καὶ ἐστὶν ἴσον τῷ $ΔΑ$ · μέσον ἄρα καὶ τὸ $ΔΑ$. καὶ παράκειται παρὰ ῥητὴν τὴν $ΔΕ$ · ῥητὴ ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ $ΜΔ$ καὶ ἀσύμμετρος τῇ $ΔΕ$ μήκει. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ
 5 $ΜΗ$ ῥητὴ ἐστὶ καὶ ἀσύμμετρος τῇ $ΜΑ$, τουτέστι τῇ $ΔΕ$, μήκει· ῥητὴ ἄρα ἐστὶν ἑκατέρω τῶν $ΔΜ$, $ΜΗ$ καὶ ἀσύμμετρος τῇ $ΔΕ$ μήκει. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρός ἐστὶν ἡ $ΑΓ$ τῇ $ΓΒ$ μήκει, ὥς δὲ ἡ $ΑΓ$ πρὸς τὴν $ΓΒ$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς $ΑΓ$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΓΒ$, ἀσύμ-
 10 μετρον ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς $ΑΓ$ τῷ ὑπο τῶν $ΑΓΒ$. ὥστε καὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ τῷ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓΒ$ ἀσύμμετρόν ἐστὶν, τουτέστι τὸ $ΔΑ$ τῷ $ΜΖ$ · ὥστε καὶ ἡ $ΔΜ$ τῇ $ΜΗ$ ἀσύμμετρός ἐστὶν. καὶ εἰσι ῥηταί· ἐκ δύο ἄρα ὀνομάτων ἐστὶν
 15 ἡ $ΔΗ$.

Δεικτέον [δὴ], ὅτι καὶ τρίτη.

Ὅμοιως δὴ τοῖς προτέροις ἐπιλογιούμεθα, ὅτι μείζων ἐστὶν ἡ $ΔΜ$ τῆς $ΜΗ$, καὶ σύμμετρος ἡ $ΔΚ$ τῇ $ΚΜ$. καὶ ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν $ΔΚΜ$ ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς
 20 $ΜΝ$ · ἡ $ΔΜ$ ἄρα τῆς $ΜΗ$ μείζων δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἐαυτῇ. καὶ οὐδετέρα τῶν $ΔΜ$, $ΜΗ$ σύμμετρός ἐστὶ τῇ $ΔΕ$ μήκει.

Ἡ $ΔΗ$ ἄρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ τρίτη· ὅπερ εἶδει δεῖξαι.

1. ἐκ τῶν] om. Fb, m. 2 B. ἐστίν] ἐστὶ PVBb, comp. F.
 2. παράκειται] om. V. 3. τὴν $ΔΕ$ ῥητὴν P. ἐστὶν B. καὶ]
 om. B. $ΔΜ$ P. 4. διὰ] καὶ διὰ F. 6. ῥητὴ — 7. μήκει]
 mg. m. 2 V. 6. $ΜΝ$ V. 8. τῇ $ΓΒ$ — ἡ $ΑΓ$] supra scr.
 m. 2 F. 9. τῆς] τῶν B. $ΑΓ$, $ΒΑ$ B. σύμμετρον B, corr.
 m. 2. 10. τό] corr. ex τῷ V. τῷ] corr. ex τό m. 2 P.
 $ΑΓ$, $ΓΒ$ V. 11. $ΓΒ$] om. P. 12. $ΑΒΓ$ P. ἐστὶ PBFV,
 comp. b. τό] τῷ F. 13. $ΔΑ$] $ΔΑ$ F et, eras. A, b. καὶ]
 om. B. 14. ἐστὶ PVB, comp. Fb. 16. δὴ] om. P. 17.

dentes [prop. XXXVIII]. quare etiam $AG^2 + GB^2$ medium est. est autem $AG^2 + GB^2 = AA$. itaque etiam AA medium est. et rectae rationali AE applicatum est. itaque MA rationalis est et rectae AE longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. eadem de causa etiam MH rationalis est et rectae MA , hoc est AE , longitudine incommensurabilis. itaque utraque AM , MH rationalis est et rectae AE longitudine incommensurabilis. et quoniam AG , GB longitudine incommensurabiles sunt, et $AG:GB = AG^2:AG \times GB$ [prop. XXI lemma], etiam AG^2 et $AG \times GB$ incommensurabilia sunt [prop. XI]. quare etiam $AG^2 + GB^2$ et $2AG \times GB$, hoc est AA et MZ , incommensurabilia sunt. quare etiam AM , MH incommensurabiles sunt [VI, 1; prop. XI]. et sunt rationales. ergo AH ex duobus nominibus est [prop. XXXVI].

demonstrandum, eandem tertiam esse.

eodem igitur modo, quo antea [p. 188, 2 seq.], concludemus, esse $AM > MH$, et AK , KM commensurabiles esse. et $AK \times KM = MN^2$. itaque AM^2 excedit MH^2 quadrato rectae sibi commensurabilis [prop. XVII]. et neutra rectarum AM , MH rectae AE longitudine commensurabilis est.

Ergo AH ex duobus nominibus tertia est [def. alt. 3]; quod erat demonstrandum.

δη] δέ V. πρότερον BFb. ὅτι] corr. ex τι m. rec. P. 19. AKM] A e corr. V, corr. ex A m. rec. P. 21. συμμετρων] σ in ras. V. 22. ἐστίν PV. 23. ὁπερ ἐδείξει] comp. P, om. BFVb.

ξγ'.

Τὸ ἀπὸ τῆς μείζονος παρὰ ῥητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων τετάρτην.

- 5 Ἐστω μείζων ἡ AB διηρημένη κατὰ τὸ Γ , ὥστε μείζονα εἶναι τὴν AG τῆς GB , ῥητὴ δὲ ἡ AE , καὶ τῷ ἀπὸ τῆς AB ἴσον παρὰ τὴν AE παραβεβλήσθω τὸ AZ παραλληλόγραμμον πλάτος ποιῶν τὴν AH λέγω, ὅτι ἡ AH ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ τετάρτη.
- 10 Κατεσκευάσθω τὰ αὐτὰ τοῖς προδεδειγμένοις. καὶ ἐπεὶ μείζων ἐστὶν ἡ AB διηρημένη κατὰ τὸ Γ , αἱ AG , GB δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων ῥητόν, τὸ δὲ ὑπ' αὐτῶν μέσον. ἐπεὶ οὖν ῥητόν ἐστι τὸ συγκείμενον
- 15 ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AG , GB , ῥητόν ἄρα ἐστὶ τὸ AA' ῥητὴ ἄρα καὶ ἡ AM καὶ σύμμετρος τῇ AE μήκει. πάλιν, ἐπεὶ μέσον ἐστὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν AG , GB , τουτέστι τὸ MZ , καὶ παρὰ ῥητὴν ἐστὶ τὴν MA , ῥητὴ ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ MH καὶ ἀσύμμετρος τῇ AE μήκει.
- 20 ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ AM τῇ MH μήκει. αἱ AM , MH ἄρα ῥηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· ἐκ δύο ἄρα ὀνομάτων ἐστὶν ἡ AH .

Δεικτέον [δὴ], ὅτι καὶ τετάρτη.


Ὁμοίως δὴ δεῖξομεν τοῖς πρότερον, ὅτι μείζων ἐστὶν

1. ξδ' F, et sic deinceps. 6. ῥη supra scr. τῇ V. δέ τις V. 7. παρὰ — 8. AZ] mg. m. 1 F. 8. AH] corr. ex AE m. 1 F. 9. ἡ AH] corr. ex AH F. 10. κατασκευάσθω V. Dein add. γάρ FV. προδεδειμένοις F, corr. m. 2; προδεδιδαγμένοις P, mg. m. 1 γρ. προδεδειγμένοις. 12. GB ἄρα V. εἰσὶ σύμμετροι B, corr. m. 2. μὲν] supra scr. m. 1 F. 13. δ' BFV. 15. AA'] corr. ex AA m. rec. P. 16. AM] MA BVb, " AM " F. 17. AGB P. 18. ἐστὶ] om.

LXIII.

Quadratum maioris rectae rationali adplicatum latitudinem efficit rectam ex duobus nominibus quartam.

Sit maior AB in Γ diuisa, ita ut sit $A\Gamma > \Gamma B$, et rationalis sit ΔE , et quadrato AB^2 aequale rectae



ΔE adplicetur parallelogrammum ΔZ latitudinem efficiens ΔH . dico, ΔH ex duobus nominibus quartam esse.

comparentur eadem, quae in superioribus demonstrationibus. et quoniam AB maior est in Γ diuisa, $A\Gamma$, ΓB potentia sunt incommensurabiles efficientes summam quadratorum rationalem, rectangulum autem medium [prop. XXXIX]. iam quoniam $A\Gamma^2 + \Gamma B^2$ rationale est, ΔA rationale est. quare ΔM rationalis est et rectae ΔE longitudine commensurabilis [prop. XX]. rursus quoniam $2A\Gamma < \Gamma B$ medium est, hoc est MZ , et rectae rationali MA adplicatum est, etiam MH rationalis est et rectae ΔE longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. itaque ΔM , MH longitudine incommensurabiles sunt [prop. XIII]. quare ΔM , MH rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo ΔH ex duobus nominibus est [prop. XXXVI].

demonstrandum, eandem quartam esse.

iam eodem modo, quo antea, demonstrabimus, esse

Theon (BFVb). MA] corr. ex MA m. rec. b, MA BF. Deinde add. *παράκειται* Theon (BFVb). 19. *ἐστίν* V. 20. *ἐστίν* P. ΔM] M e corr. m. 1 F. Ante *αί* del. καί F. 21. *ἄρα*] om. P. 23. *δὴ*] om. P. 24. *δὴ τοῖς πρότερον ἐπιλογισμέθα*, ὅτι Theon (BFVb).

ἡ ΔM τῆς MH , καὶ ὅτι τὸ ὑπὸ ΔKM ἴσον ἐστὶ τῷ
 ἀπὸ τῆς MN . ἐπεὶ οὖν ἀσύμμετρόν ἐστι τὸ ἀπὸ τῆς
 $ΑΓ$ τῷ ἀπὸ τῆς $ΓΒ$, ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ
 $\Delta\Theta$ τῷ $ΚΑ$. ὥστε ἀσύμμετρος καὶ ἡ ΔK τῇ KM
 5 ἐστίν. ἐὰν δὲ ᾧσι δύο εὐθεῖαι ἄνισοι, τῷ δὲ τετάρτῳ
 μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος ἴσον παραλληλόγραμμον
 παρὰ τὴν μείζονα παραβληθῇ ἑλλεῖπον εἶδει τετρα-
 γώνῳ καὶ εἰς ἀσύμμετρα αὐτὴν διαιρῇ, ἡ μείζων τῆς
 ἐλάσσονος μείζον δυνήσεται τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ
 10 μήκει· ἡ ΔM ἄρα τῆς MH μείζον δύναται τῷ ἀπὸ
 ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ. καὶ εἰσιν αἱ ΔM , MH ῥηταὶ δυ-
 νάμει μόνον σύμμετροι, καὶ ἡ ΔM σύμμετρός ἐστι
 τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ τῇ ΔE .

Ἡ ΔH ἄρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ τετάρτη· ὅπερ
 15 ἔδει δεῖξαι.

ξδ'.

Τὸ ἀπο τῆς ῥητὸν καὶ μέσον δυναμένης πα-
 ρὰ ῥητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ τὴν ἐκ
 δύο ὀνομάτων πέμπτην.

20 Ἔστω ῥητὸν καὶ μέσον δυναμένη ἡ $ΑΒ$ διηρημένη
 εἰς τὰς εὐθείας κατὰ τὸ $Γ$, ὥστε μείζονα εἶναι τὴν
 $ΑΓ$, καὶ ἐκκείσθω ῥητὴ ἡ ΔE , καὶ τῷ ἀπὸ τῆς $ΑΒ$
 ἴσον παρὰ τὴν ΔE παραβεβλήσθω τὸ ΔZ πλάτος
 ποιοῦν τὴν ΔH . λέγω, ὅτι ἡ ΔH ἐκ δύο ὀνομάτων
 25 ἐστὶ πέμπτη.

1. τῆς] τῇ V? MN BV. ὑπὸ τῶν V. ΔKM] supra
 add. K V. 3. τό] corr. ex τά? F. 4. ἀσύμμετρος] om.
 Theon (BFVb). KM ἀσύμμετρός ἐστιν Theon (BFVb).
 5. ᾧσιν BF. 6. Post ἴσον del. παρὰ τὴν μείζονα F. παρ-
 αλληλόγραμμον] om. V. 7. παρὰ τὴν μείζονα] om. Fb, m.
 2 B. 8. διαιρεῖ F, διαιρεῖ μήκει V. 10. ΔM] corr. ex
 ΔH F. 11. συμμέτρου F. 13. ΔE] corr. ex ΔH F. 14.


$\Delta M > MH$, et $\Delta K \times KM = MN^2$. iam quoniam $\Delta \Gamma^2$, ΓB^2 incommensurabilia sunt, etiam $\Delta \Theta$, KA incommensurabilia sunt. quare ΔK , KM incommensurabiles sunt [VI, 1; prop. XI]. sin datae sunt duae rectae inaequales, et quartae parti quadrati minoris aequale parallelogrammum maiori adplicatur figura quadrata deficiens et eam in partes incommensurabiles diuidit, maior quadrata minorem excedit quadrato rectae sibi incommensurabilis [prop. XVIII]. itaque ΔM^2 excedit MH^2 quadrato rectae sibi incommensurabilis. et ΔM , MH rationales sunt potentia tantum commensurabiles, et ΔM rationali propositae ΔE commensurabilis est.

Ergo ΔH ex duobus nominibus quarta est [def. alt. 4]; quod erat demonstrandum.

LXIV.

Quadratum rectae spatio rationali et medio aequalis quadratae rectae rationali adplicatum latitudinem efficit rectam ex duobus nominibus quintam.

Sit AB recta spatio rationali et medio aequalis quadrata in Γ in rectas diuisa, ita ut $\Delta \Gamma$ maior sit,



et ponatur ΔE rationalis, et quadrato AB^2 aequale rectae ΔE adplicetur ΔZ latitudinem efficiens ΔH . dico, ΔH ex duobus nominibus quintam esse.

$\sigma\pi\epsilon\theta \xi\delta\epsilon\iota \delta\epsilon\iota\xi\alpha\iota$] comp. P, om. BFVb. 17. $\kappa\alpha\iota$] postea ins. m. 1 F. 20. $\phi\eta\tau\eta$ F, sed corr. η AB] m. 2 V.

Κατεσκευάσθω τα αὐτα τοῖς πρὸ τούτου. ἐπεὶ οὖν
 ῥητόν καὶ μέσον δυναμένη ἐστὶν ἡ AB διηρημένη
 κατὰ το Γ , αἱ AG , GB ἄρα δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι
 ποιοῦσαι τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετρα-
 5 γώνων μέσον, τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν ῥητόν. ἐπεὶ οὖν μέ-
 σον ἐστὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AG , GB ,
 μέσον ἄρα ἐστὶ τὸ AA . ὥστε ῥητὴ ἐστὶν ἡ AM καὶ
 μήκει ἀσύμμετρος τῇ AE . πάλιν, ἐπεὶ ῥητόν ἐστὶ τὸ
 δις ὑπὸ τῶν AGB , τουτέστι τὸ MZ , ῥητὴ ἄρα ἡ MH
 10 καὶ σύμμετρος τῇ AE . ἀσύμμετρος ἄρα ἡ AM τῇ
 MH . αἱ AM , MH ἄρα ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον
 σύμμετροι· ἐκ δύο ἄρα ὀνομάτων ἐστὶν ἡ AH .

Λέγω δὴ, ὅτι καὶ πέμπτη.

Ὅμοιως γὰρ δειχθήσεται, ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν AKM
 15 ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς MN , καὶ ἀσύμμετρος ἡ AK τῇ
 KM μήκει· ἡ AM ἄρα τῆς MH μείζον δύνатаι τῷ
 ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ. καὶ εἰσιν αἱ AM , MH [ῥη-
 ται] δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ ἡ ἐλάσσων ἡ MH
 σύμμετρος τῇ AE μήκει.

20 Ἡ AH ἄρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ πέμπτη· ὅπερ
 ἔδει δεῖξαι.

ξε'.

Τὸ ἀπὸ τῆς δύο μέσα δυναμένης παρὰ ῥη-
 τὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ τὴν ἐκ δύο
 25 ὀνομάτων ἕκτην.

Ἔστω δύο μέσα δυναμένη ἡ AB διηρημένη κατὰ
 τὸ Γ , ῥητὴ δὲ ἔστω ἡ AE , καὶ παρὰ τὴν AE τῷ

1. κατασκευάσθω V. Deinde add. γάρ FV. πρὸ τούτου] >
 πρότερον, corr. m. 2, F. 4. τετραγώνων F, corr. m. 2. 5.
 δέ F. 7. καὶ τό b. 8. τῇ] ἡ b. 9. AG , GB B et corr.
 in $AB\Gamma$ V. 10. Post AE add. μήκει m. 2 B. 11. AM
 in ras. V. 17. συμμέτρον, sed corr., BFb. ῥηταί] om. P,

comparentur eadem, quae antea. iam quoniam AB recta est spatio rationali et medio aequalis quadrata in Γ diuisa, AG , GB potentia incommensurabiles sunt efficientes summam quadratorum mediam, rectangulum autem rationale [prop. XL]. iam quoniam $AG^2 + GB^2$ medium est, AA medium est. itaque AM rationalis est et rectae AE longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. rursus quoniam $2AG \times GB$, hoc est MZ , rationale est, MH rationalis est et rectae AE commensurabilis [prop. XX]. itaque AM , MH incommensurabiles sunt [prop. XIII]. quare AM , MH rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo AH ex duobus nominibus est [prop. XXXVI].

iam dico, eandem quintam esse.

nam similiter demonstrabimus, esse $AK \times KM = MN^2$ et AK , KM longitudine incommensurabiles. itaque AM^2 excedit MH^2 quadrato rectae sibi commensurabilis [prop. XVIII]. et AM , MH potentia tantum commensurabiles sunt, et minor MH rectae AE longitudine commensurabilis est.

Ergo AH ex duobus nominibus est quinta [deff. alt. 5]; quod erat demonstrandum.

LXV.

Quadratum rectae duobus spatiis mediis aequalis quadratae rectae rationali adplicatum latitudinem efficit rectam ex duobus nominibus sextam.

Sit AB recta duobus spatiis mediis aequalis qua-

m. 2 F. 20. $\angle H$] $\angle M$ PBb, $\angle H$ in ras. V, mut. in $\angle M$
m. 2 F. $\delta\pi\epsilon\rho$ $\xi\delta\epsilon\iota$ $\delta\epsilon\iota\xi\alpha\iota$] comp. P, om. BVb. 27. δ' b.
 $\tau\eta\nu$] $\phi\eta\tau\iota\nu$ $\tau\eta\nu$ F. $\tau\eta$] corr. ex $\tau\acute{o}$ m. 1 F.


ἀπὸ τῆς AB ἴσον παραβεβλήσθω τὸ ΔZ πλάτος
 ποιοῦν τὴν ΔH . λέγω, ὅτι ἡ ΔH ἐκ δύο ὀνομάτων
 ἐστὶν ἕκτη.

Κατεσκευάσθω γὰρ τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον. καὶ
 5 ἐπεὶ ἡ AB δύο μέσα δυναμένη ἐστὶ διηρημένη κατὰ
 τὸ Γ , αὐτὰ $ΑΓ$, ΓB ἄρα δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι
 ποιοῦσαι τό τε συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετρα-
 γώνων μέσον καὶ τὸ ὑπ' αὐτῶν μέσον καὶ ἔτι ἀσύμ-
 μετρον τὸ ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων συγκείμενον
 10 τῷ ὑπ' αὐτῶν. ὥστε κατὰ τὰ προδεδειγμένα μέσον
 ἐστὶν ἐκάτερον τῶν ΔA , MZ . καὶ παρὰ ῥητὴν τὴν
 ΔE παράκειται· ῥητὴ ἄρα ἐστὶν ἐκάτερα τῶν ΔM ,
 MH καὶ ἀσύμμετρος τῇ ΔE μήκει. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμε-
 τρόν ἐστι τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, ΓB
 15 τῷ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, ΓB , ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ
 ΔA τῷ MZ . ἀσύμμετρος ἄρα καὶ ἡ ΔM τῇ MH .
 αὐτὰ ΔM , MH ἄρα ῥηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμε-
 τροι· ἐκ δύο ἄρα ὀνομάτων ἐστὶν ἡ ΔH .

Λέγω δὴ, ὅτι καὶ ἕκτη.

20 Ὅμοίως δὴ πάλιν δείξομεν, ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν ΔKM
 ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς MN , καὶ ὅτι ἡ ΔK τῇ KM
 μήκει ἐστὶν ἀσύμμετρος· καὶ διὰ τὰ αὐτὰ δὴ ἡ ΔM
 τῆς MH μείζον δύναται τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ
 μήκει. καὶ οὐδετέρα τῶν ΔM , MH σύμμετρος ἐστὶ
 25 τῇ ἐκκειμένη ῥητῇ τῇ ΔE μήκει.

1. ἴσον] ἴσον παραλληλόγραμμον V. 4. κατασκευάσθω V,
 sed corr. 5. δύο] δ corr. ex μ F. 6. $ΑΓ$] ΓA F. 9.
 τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων Theon (BFVb).
 10. τῷ] τῷ ἐκ τῶν P. τὰ] om. b. προδεδειγμένα P,
 corr. m. 1. 12. παράκειται P. ἐστίν] ἐστὶ καὶ BFVb.
 15. ἐστίν P. 16. MZ] corr. ex $M\Gamma$ m. 1 F. 17. ΔM]
 corr. ex ΔM m. rec. P. 19. δὴ] om. BV. 20. δὴ] γὰρ



drata in Γ diuisa, ΔE autem rationalis sit, et rectae ΔE quadrato AB^2 aequale adplicetur ΔZ latitudinem efficiens ΔH . dico, ΔH ex duobus nominibus sextam esse.

comparentur enim eadem, quae antea. et quoniam AB recta est duobus spatiis mediis aequalis quadrata in Γ diuisa, $A\Gamma$, ΓB potentia incommensurabiles sunt efficientes summam quadratorum mediam et rectangulum medium et praeterea summam quadratorum rectangulo incommensurabilem [prop. XLI]. quare ex iis, quae antea demonstrata sunt, ΔA et MZ media sunt. et rectae rationali ΔE adplicata sunt. quare utraque ΔM , MH rationalis est et rectae ΔE longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. et quoniam $A\Gamma^2 + \Gamma B^2$ et $2A\Gamma \times \Gamma B$ incommensurabilia sunt, ΔA et MZ incommensurabilia sunt. quare etiam ΔM , MH incommensurabiles sunt [VI, 1; prop. XI]. itaque ΔM , MH rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo ΔH ex duobus nominibus est [prop. XXXVI].

iam dico, eandem sextam esse.

iam rursus similiter demonstrabimus, esse $\Delta K \times KM = MN^2$, et ΔK , KM longitudine incommensurabiles esse. eadem igitur de causa ΔM^2 excedit MH^2 quadrato rectae sibi longitudine incommensurabilis [prop. XVIII]. et neutra rectarum ΔM , MH rectae rationali propositae ΔE longitudine commensurabilis est.

Theon (BFVb).
Theon (BFVb).
in KMH m. 2.
sed corr.

$\piάλιν$] om. V. Deinde add. τοῖς πρὸ τούτου
ᾧ τε] supra scr. F. 21. KM] MH F, corr.
22. διὰ ταῦτα BV. 23. συμμέτρου BF,

Ἡ ΔΗ ἄρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶν ἕκτη· ὅπερ
ἔδει δεῖξαι.

ξς'.

Ἡ τῇ ἐκ δύο ὀνομάτων μήκει σύμμετρος καὶ
5 αὐτῇ ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ καὶ τῇ τάξει ἡ
αὐτῇ.

Ἐστω ἐκ δύο ὀνομάτων ἡ ΑΒ, καὶ τῇ ΑΒ μήκει
σύμμετρος ἔστω ἡ ΓΔ· λέγω, ὅτι ἡ ΓΔ ἐκ δύο ὀνο-
μάτων ἐστὶ καὶ τῇ τάξει ἡ αὐτῇ τῇ ΑΒ.

Ἐπεὶ γὰρ ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶν ἡ ΑΒ, διηρησθῶ
10 εἰς τὰ ὀνόματα κατὰ τὸ Ε, καὶ ἔστω μείζον ὄνομα το
ΑΕ· αἱ ΑΕ, ΕΒ ἄρα ρηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμ-
μετροι. γεγονέντω ὡς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΓΔ, οὕτως ἡ
ΑΕ πρὸς τὴν ΓΖ· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΕΒ πρὸς λοιπὴν
15 τὴν ΖΔ ἐστίν, ὡς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΓΔ. σύμμετρος
δὲ ἡ ΑΒ τῇ ΓΔ μήκει· σύμμετρος ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ μὲν
ΑΕ τῇ ΓΖ, ἡ δὲ ΕΒ τῇ ΖΔ. καὶ εἰσι ρηταὶ αἱ ΑΕ,
ΕΒ· ρητὰ ἄρα εἰσὶ καὶ αἱ ΓΖ, ΖΔ. καὶ [ἐπεὶ] ἐστίν
ὡς ἡ ΑΕ πρὸς ΓΖ, ἡ ΕΒ πρὸς ΖΔ. ἐναλλάξ ἄρα
20 ἐστὶν ὡς ἡ ΑΕ πρὸς ΕΒ, ἡ ΓΖ πρὸς ΖΔ. αἱ δὲ
ΑΕ, ΕΒ δυνάμει μόνον [εἰσὶ] σύμμετροι· καὶ αἱ ΓΖ,
ΖΔ ἄρα δυνάμει μόνον εἰσὶ σύμμετροι. καὶ εἰσι ρηταί·
ἐκ δύο ἄρα ὀνομάτων ἐστὶν ἡ ΓΔ.

Λέγω δὴ, ὅτι τῇ τάξει ἐστὶν ἡ αὐτῇ τῇ ΑΒ.

1. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. B F V b. 5. ἐστίν P.
ἡ] m. 2 B. 7. ἡ — 8. ὀνομάτων] mg. m. 2 B. 11. ὄνομα]
om. V. 14. ΓΖ] mut. in B Z b. καί] in ras. V. 15.
ΖΔ] ΔΖ F V. ΓΔ] corr. ex E Δ F. σύμμετρος — 16.
μήκει] m. 2 B. 16. ἐστὶ] om. b, m. 2 B. 17. ΖΔ] corr.
ex Δ Ζ V. αἱ ΑΕ, ΕΒ] mg. m. 2 V. 18. εἰσὶν B. ἐπεὶ]
om. P. 19. πρὸς ΓΖ — 20. ΑΕ] mg. m. 2 B. 19. τὴν ΓΖ
B V. ΓΖ — πρὸς] supra scr. F. τὴν ΖΔ V. ἄρα] om. F.

Ergo ΔH ex duobus nominibus sexta est [deff. alt. 6]; quod erat demonstrandum.

LXVI.

Recta rectae ex duobus nominibus longitudine commensurabilis et ipsa ex duobus nominibus est et ordine eadem.

Sit AB ex duobus nominibus, et $\Gamma\Delta$ rectae AB longitudine commensurabilis sit. dico, $\Gamma\Delta$ ex duobus nominibus esse et ordine eandem ac AB .

nam quoniam AB ex duobus nominibus est, in E in nomina diuidatur, et maius nomen sit AE . itaque AE , EB rationales sunt potentia tantum commensurabiles [prop. XXXVI]. fiat [VI, 12] $AB:\Gamma\Delta = AE:\Gamma Z$. itaque etiam $EB:Z\Delta = AB:\Gamma\Delta$ [V, 16; V, 19 coroll.]. uerum AB , $\Gamma\Delta$ longitudine commensurabiles sunt. itaque etiam AE , ΓZ et EB , $Z\Delta$ longitudine commensurabiles sunt [prop. XI]. et AE , EB rationales sunt. itaque etiam ΓZ , $Z\Delta$ rationales sunt. est autem $AE:\Gamma Z = EB:Z\Delta$ [V, 11]. itaque permutando [V, 16] $AE:EB = \Gamma Z:Z\Delta$. uerum AE , EB potentia tantum commensurabiles sunt. itaque etiam ΓZ , $Z\Delta$ potentia tantum commensurabiles sunt [prop. XI]. et sunt rationales. ergo $\Gamma\Delta$ ex duobus nominibus est [prop. XXXVI].

iam dico, eam ordine eandem esse ac AB .

20. οὐτως ἡ ΓZ V. 21. εἰς Γ om. P. 23. $\Gamma\Delta$ Δ in ras. V. 24. $\delta\eta$ om. V. $\delta\tau\iota$ $\delta\tau\iota$ καὶ BFV.

Ἡ γὰρ AE τῆς EB μείζον δύναται ἥτοι τῷ ἀπὸ
 συμμετρου ἑαυτῇ ἢ τῷ ἀπὸ ἀσυμμετρου. εἰ μὲν οὖν
 ἡ AE τῆς EB μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμετρου
 ἑαυτῇ, καὶ ἡ ΓZ τῆς $Z\Delta$ μείζον δυνήσεται τῷ ἀπὸ
 5 συμμετρου ἑαυτῇ. καὶ εἰ μὲν σύμμετρός ἐστιν ἡ AE
 τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ, καὶ ἡ ΓZ σύμμετρος αὐτῇ ἐσται,
 καὶ δια τοῦτο ἑκατέρα τῶν $AB, \Gamma\Delta$ ἐκ δύο ὀνομάτων
 ἐστὶ πρώτη, τουτέστι τῇ τάξει ἡ αὐτή. εἰ δὲ ἡ EB
 σύμμετρός ἐστι τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ, καὶ ἡ $Z\Delta$ σύμ-
 10 μετρός ἐστιν αὐτῇ, καὶ διὰ τοῦτο πάλιν τῇ τάξει ἡ
 αὐτὴ ἐσται τῇ AB . ἑκατέρα γὰρ αὐτῶν ἐσται ἐκ δύο
 ὀνομάτων δευτέρα. εἰ δὲ οὐδετέρα τῶν AE, EB σύμ-
 μετρός ἐστι τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ, οὐδετέρα τῶν $\Gamma Z, Z\Delta$
 σύμμετρος αὐτῇ ἐσται, καὶ ἐστιν ἑκατέρα τρίτη. εἰ δὲ
 15 ἡ AE τῆς EB μείζον δύναται τῷ ἀπὸ ἀσυμμετρου
 ἑαυτῇ, καὶ ἡ ΓZ τῆς $Z\Delta$ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ ἀσυμ-
 μετρου ἑαυτῇ. καὶ εἰ μὲν ἡ AE σύμμετρός ἐστι τῇ
 ἐκκειμένῃ ῥητῇ, καὶ ἡ ΓZ σύμμετρός ἐστιν αὐτῇ, καὶ
 ἐστιν ἑκατέρα τετάρτη. εἰ δὲ ἡ EB , καὶ ἡ $Z\Delta$, καὶ
 20 ἐσται ἑκατέρα πέμπτη. εἰ δὲ οὐδετέρα τῶν AE, EB ,
 καὶ τῶν $\Gamma Z, Z\Delta$ οὐδετέρα σύμμετρός ἐστι τῇ ἐκκει-
 μένῃ ῥητῇ, καὶ ἐσται ἑκατέρα ἕκτη.

Ὡστε ἡ τῇ ἐκ δύο ὀνομάτων μήκει σύμμετρος ἐκ

1. AE] corr. ex AB m. 2 F. τῆς] corr. ex τῇ m. 2 F.
 2. ἀσυμμετρου] corr. ex συμμετρου m. 2 B. εἰ] corr. ex
 η V. 3. τῆς] corr. ex τῇ m. 2 F. ἀσυμμετρου b, ἀ- supra
 add. m. 2 F. 4. τῆς] corr. ex τῇ m. 2 V. ΔZ V. δυν-
 νήσεται b. 5. ἀσυμμετρου Fb. 7. $\Gamma\Delta$] postea add. F, dein
 del. BF. 8. εἰ] postea ins. F. 9. ΔZ Fb. 10. Post
 ἐστιν del. ἡ m. 1 P. τοῦτο] corr. ex τοῦ m. 2 F. 11. ἐσται]
 (alt.) ἐστι b, om. V. 12. ἐστι δευτέρα V. δ' F. 13. οὐδὲ
 οὐδετέρα BF. 14. τρίτῃ] ῥητῇ b. εἰ δὲ ἡ] ἡ δὲ b. 15.
 τῆς] corr. ex τῇ m. 2 F. συμμετρου BF, sed corr. 16. $Z\Delta$]

nam AE^2 excedit EB^2 aut quadrato rectae sibi commensurabilis aut incommensurabilis. iam si AE^2 excedit EB^2 quadrato rectae sibi commensurabilis, etiam ΓZ^2 excedet $Z\Delta^2$ quadrato rectae sibi commensurabilis [prop. XIV]. et siue AE rationali propositae commensurabilis est, etiam ΓZ ei commensurabilis erit [prop. XII]; quare utraque AB , $\Gamma\Delta$ ex duobus nominibus prima est [deff. alt. 1], hoc est ordine eadem. siue EB rationali propositae commensurabilis est, etiam $Z\Delta$ ei commensurabilis est [prop. XII]; quare rursus ordine eadem erit ac AB ; nam utraque earum ex duobus nominibus secunda erit [deff. alt. 2]. siue neutra rectarum AE , EB rationali propositae commensurabilis est, neutra rectarum ΓZ , $Z\Delta$ ei commensurabilis est [prop. XIII], et utraque tertia est [deff. alt. 3]. sin AE^2 excedit EB^2 quadrato rectae sibi incommensurabilis, etiam ΓZ^2 excedit $Z\Delta^2$ quadrato rectae sibi incommensurabilis [prop. XIV]. et siue AE rationali propositae commensurabilis est, etiam ΓZ ei commensurabilis est [prop. XII], et utraque quarta est [deff. alt. 4]. siue EB , etiam $Z\Delta$ commensurabilis est, et utraque quinta est [deff. alt. 5]. siue neutra rectarum AE , EB , etiam neutra rectarum ΓZ , $Z\Delta$ rectae rationali propositae commensurabilis est, et utraque sexta est [deff. alt. 6].

Quare recta rectae ex duobus nominibus longitu-

ΔZ F. $\deltaυνήσεται$ Theon (BFVb). $\sigmaυμμέτρον$ BF, sed corr. 17. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ — 18. $\acute{\epsilon}\eta\tau\eta$] e corr. F. 19. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\nu$] supra scr. m. 1 P, $\acute{\epsilon}\sigma\tau\alpha\iota$ FVb. η] (prius) m. 2 P. $\kappa\alpha\iota \acute{\epsilon}\sigma\tau\alpha\iota \acute{\epsilon}\kappa\alpha\tau\acute{\epsilon}\rho\alpha \pi\acute{\epsilon}\mu\pi\tau\eta$] mg. m. 1 P.

δύο ὀνομάτων ἐστὶ καὶ τῇ τάξει ἢ αὐτῇ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

ξξ'.

Ἡ τῇ ἐκ δύο μέσων μήκει σύμμετρος καὶ
5 αὐτῇ ἐκ δύο μέσων ἐστὶ καὶ τῇ τάξει ἢ αὐτῇ.

Ἐστω ἐκ δύο μέσων ἡ AB , καὶ τῇ AB σύμμετρος
ἔστω μήκει ἡ $\Gamma\Delta$. λέγω, ὅτι ἡ $\Gamma\Delta$ ἐκ δύο μέσων ἐστὶ
καὶ τῇ τάξει ἢ αὐτῇ τῇ AB .

Ἐπεὶ γὰρ ἐκ δύο μέσων ἐστὶν ἡ AB , διηρησθῶ
10 εἰς τὰς μέσας κατὰ τὸ E . αὐτὴ AE , EB ἄρα μέσαι εἰσὶ
δυνάμει μόνον σύμμετροι. καὶ γεγονέντω ὥς ἡ AB
πρὸς $\Gamma\Delta$, ἡ AE πρὸς ΓZ . καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ EB
πρὸς λοιπὴν τὴν $Z\Delta$ ἐστὶν, ὥς ἡ AB πρὸς $\Gamma\Delta$.
σύμμετρος δὲ ἡ AB τῇ $\Gamma\Delta$ μήκει· σύμμετρος ἄρα
15 καὶ ἑκατέρω τῶν AE , EB ἑκατέρω τῶν ΓZ , $Z\Delta$.
μέσαι δὲ αὐτὴν AE , EB μέσαι ἄρα καὶ αὐτὴν ΓZ , $Z\Delta$. καὶ
ἐπεὶ ἐστὶν ὥς ἡ AE πρὸς EB , ἡ ΓZ πρὸς $Z\Delta$, αὐτὴν
δὲ AE , EB δυνάμει μόνον σύμμετροί εἰσιν, καὶ αὐτὴν
 ΓZ , $Z\Delta$ [ἄρα] δυνάμει μόνον σύμμετροί εἰσιν. ἐδείχ-
20 θησαν δὲ καὶ μέσαι· ἡ $\Gamma\Delta$ ἄρα ἐκ δύο μέσων ἐστὶν.

Λέγω δὴ, ὅτι καὶ τῇ τάξει ἢ αὐτῇ ἐστὶ τῇ AB .

Ἐπεὶ γὰρ ἐστὶν ὥς ἡ AE πρὸς EB , ἡ ΓZ πρὸς
 $Z\Delta$, καὶ ὥς ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς AE πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν
 AE , EB , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ΓZ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΓZ , $Z\Delta$.
25 ἐναλλάξ ὥς τὸ ἀπὸ τῆς AE πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΓZ ,

1. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] om. B F V b. 3. ξξ'] ξ' in ras. F. 4.
τῇ] m. 2 B. καὶ αὐτῇ] om. Theon (B F V b). 7. ἡ $\Gamma\Delta$
μήκει V. 8. AB] $B\Delta$ P. 9. διηρημένη Theon (B F V b).
10. εἰς] ἐς V. AE] EA P. εἰσὶν P. 12. τὴν $\Gamma\Delta$ V.
τὴν ΓZ V. 13. $Z\Delta$] in ras. V, ΔZ B. τὴν $\Gamma\Delta$ V. 14.
ἀσύμμετρος δὲ b, sed corr. 15. καὶ ἡ μὲν AE τῇ ΓZ ($Z\Gamma F$),
ἡ δὲ EB τῇ $Z\Delta$ (corr. ex ΔZ V) Theon (B F V b). 16. μέσαι
δε] καὶ εἰσι μέσαι Theon (B F V b). καὶ αὐτὴν] καὶ b. 17. AE]

dine commensurabilis ex duobus nominibus est et ordine eadem; quod erat demonstrandum.

LXVII.

Recta rectae ex duabus mediis longitudine commensurabilis et ipsa ex duabus mediis est et ordine eadem.

Sit AB ex duabus mediis, et rectae AB longitudine commensurabilis sit $\Gamma\Delta$. dico, $\Gamma\Delta$ ex duabus mediis esse et ordine eandem ac AB .

$\begin{array}{c} A \quad E \quad B \\ \hline \Gamma \quad Z \quad \Delta \end{array}$ nam quoniam AB ex duabus mediis est, in E in medias diuidatur. AE, EB igitur mediae sunt potentia tantum commensurabiles. et fiat $AB : \Gamma\Delta = AE : \Gamma Z$ [VI, 12]. itaque etiam [V, 19 coroll.; V, 16] $EB : Z\Delta = AB : \Gamma\Delta$. uerum $AB, \Gamma\Delta$ longitudine commensurabiles sunt; itaque etiam utraque AE, EB utrique $\Gamma Z, Z\Delta$ commensurabilis est [prop. XI]. uerum AE, EB mediae sunt. itaque etiam $\Gamma Z, Z\Delta$ mediae sunt [prop. XXIII]. et quoniam est $AE : EB = \Gamma Z : Z\Delta$, et AE, EB potentia tantum commensurabiles sunt, etiam $\Gamma Z, Z\Delta$ potentia tantum commensurabiles sunt [prop. XI]. demonstrauius autem, easdem medias esse. ergo $\Gamma\Delta$ ex duabus mediis est.

iam dico, etiam ordine eam eandem esse ac AB .

nam quoniam est $AE : EB = \Gamma Z : Z\Delta$, erit etiam [prop. XXI lemma] $AE^2 : AE \times EB = \Gamma Z^2 : \Gamma Z \times Z\Delta$.

AB B. $\tau\eta\upsilon$ EB V. $\tau\eta\upsilon$ $Z\Delta$ V. 18. $\epsilon\lambda\iota\sigma\iota$ $\sigma\acute{\upsilon}\mu\mu\epsilon\tau\epsilon\rho\omicron\iota$ $BFVb$.
 19. $\acute{\alpha}\rho\alpha$] om. P. $\epsilon\lambda\iota\sigma\iota$ $\sigma\acute{\upsilon}\mu\mu\epsilon\tau\epsilon\rho\omicron\iota$ $BFVb$. 20. $\Delta\Gamma F$. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$
 BVb , comp. F. 22. $\tau\eta\upsilon$ EB BV. $\omicron\upsilon\tau\omega\varsigma$ η F. ΓZ
 $\Gamma\Delta$ F. 23. $\tau\eta\upsilon$ $Z\Delta$ V, $Z\Delta$ F. 24. ΓZ] $Z\Gamma$ F. $\Gamma Z\Delta$
 supra scr. Z m. 2 V. 25. $\acute{\omega}\varsigma$] $\acute{\alpha}\rho\alpha$ $\acute{\omega}\varsigma$ F.

οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΕΒ$ πρὸς τὸ ὑπο τῶν $ΓΖΔ$.
 σύμμετρον δὲ τὸ ἀπὸ τῆς $ΑΕ$ τῷ ἀπὸ τῆς $ΓΖ$ · σύμ-
 μετρον ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΕΒ$ τῷ ὑπὸ τῶν $ΓΖΔ$.
 εἴτε οὖν ῥητόν ἐστι τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΕΒ$, καὶ τὸ ὑπο
 5 τῶν $ΓΖΔ$ ῥητόν ἐστιν [καὶ διὰ τοῦτό ἐστιν ἐκ δύο
 μέσων πρώτη]. εἴτε μέσον, μέσον, καὶ ἐστιν ἑκατέρα
 δευτέρα.

Καὶ διὰ τοῦτο ἔσται ἡ $ΓΔ$ τῇ $ΑΒ$ τῇ τάξει ἡ
 αὐτή· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

10

ξη'.

Ἡ τῇ μείζονι σύμμετρος καὶ αὐτὴ μείζων
 ἐστίν.

Ἔστω μείζων ἡ $ΑΒ$, καὶ τῇ $ΑΒ$ σύμμετρος ἔστω
 ἡ $ΓΔ$ · λέγω, ὅτι ἡ $ΓΔ$ μείζων ἐστίν.

15 Διηγήσθω ἡ $ΑΒ$ κατὰ τὸ $Ε$ · αἱ $ΑΕ$, $ΕΒ$ ἄρα
 δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τὸ μὲν συγκείμενον
 ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων ῥητόν, τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν
 μέσον· καὶ γερονέτω τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον. καὶ ἐπεὶ
 ἐστὶν ὡς ἡ $ΑΒ$ πρὸς τὴν $ΓΔ$, οὕτως ἡ τε $ΑΕ$ πρὸς
 20 τὴν $ΓΖ$ καὶ ἡ $ΕΒ$ πρὸς τὴν $ΖΔ$, καὶ ὡς ἄρα ἡ $ΑΕ$
 πρὸς τὴν $ΓΖ$, οὕτως ἡ $ΕΒ$ πρὸς τὴν $ΖΔ$. σύμμετρος
 δὲ ἡ $ΑΒ$ τῇ $ΓΔ$ · σύμμετρος ἄρα καὶ ἑκατέρα τῶν
 $ΑΕ$, $ΕΒ$ ἑκατέρα τῶν $ΓΖ$, $ΖΔ$. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ
 $ΑΕ$ πρὸς τὴν $ΓΖ$, οὕτως ἡ $ΕΒ$ πρὸς τὴν $ΖΔ$, καὶ
 25 ἐναλλάξ ὡς ἡ $ΑΕ$ πρὸς $ΕΒ$, οὕτως ἡ $ΓΖ$ πρὸς $ΖΔ$,
 καὶ συνθέντι ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ $ΑΒ$ πρὸς τὴν $ΒΕ$, οὕτως

1. $ΓΖΔ$] $Δ$ in ras. m. 1 b; $ΓΔΖ$ P, γρ. $ΓΖΔ$ mg. m. 1.

2. δέ] corr. ex ἄρα m. 2 F. τό — 3. ἄρα] mg. m. 2 F. 4.
 ἐστὶν B. 5. ἔσται B F b. καί — 6. πρώτη] om. P. 5. ἐστὶν]
 comp. post ras. 1 litt. F, ἔσται V. 6. εἴτε μέσον τὸ ὑπὸ τῶν
 $ΑΕΒ$, μέσον καὶ τὸ ὑπὸ τῶν $ΓΖΔ$ Theon (B F V b). 8. ἔσται]

permutando [V, 16] erit $AE^2: \Gamma Z^2 = AE \times EB: \Gamma Z \times ZA$.
 uerum AE^2 , ΓZ^2 commensurabilia sunt. itaque etiam
 $AE \times EB$, $\Gamma Z \times ZA$ commensurabilia sunt [prop.
 XI]. itaque siue $AE \times EB$ rationale est, etiam
 $\Gamma Z \times ZA$ rationale est; siue medium, medium est
 [prop. XXIII coroll.], et utraque secunda est [prop.
 XXXVII—XXXVIII].

Ea de causa ΓA ordine eadem erit ac AB ; quod
 erat demonstrandum.


LXVIII.

Recta maiori commensurabilis et ipsa maior erit.

Sit AB maior, et rectae AB commensurabilis sit
 ΓA . dico, ΓA maiorem esse.

diuidatur AB in E . itaque AE , EB potentia in-
 commensurabiles sunt efficientes summam quadratorum
 rationalem, rectangulum autem medium [prop. XXXIX],

et fiant eadem, quae antea. et quoniam est
 $AB: \Gamma A = AE: \Gamma Z$ et $AB: \Gamma A = EB: ZA$
 [cfr. p. 204, 11 sq.], erit etiam $AE: \Gamma Z = EB: ZA$
 [V, 11]. uerum AB , ΓA commensurabiles
 sunt. quare etiam utraque AE , EB utrique
 ΓZ , ZA commensurabilis est [prop. XI]. et



om. Vb. καὶ ἡ BFVb. ΓA AA b. 9. ὅπερ ἔδει δεῖξαι]
 comp. P, om. BFVb. 10. ξη'] ξ seq. ras. 1 litt. F. 11.
 μετ' ὧν] o eras. b. 14. ὅτι καὶ BFb. ΓA Δ post ras. 1
 litt. b. ἐστὶ PV, comp. Fb; ἐστὶ καὶ B. 15. AE] corr. ex
 AB F. EB] m. rec. P. ἄρα] m. 2 F. 17. δ'] δέ F.
 ὑπ' αὐτῶν] corr. ex ὑπὸ τῶν m. 1 P. 18. καὶ γεγνηται]
 γεγνηται γάρ P. 19. τε] om. F. 20. EB] BE' F. τήν]
 om. P. καὶ ὡς ἄρα] ἐστὶν ἄρα καὶ ὡς in ras. V. ἡ AE —21.
 ZA] in ras. V. 21. ΓZ] EB V. EB] ΓZ V. τήν] om.
 Bb. 22. AB] corr. ex EB m. 2 F. 24. τήν] (alt.) om. P.
 25. τήν EB V. τήν ZA V.

ἡ $\Gamma\Delta$ πρὸς τὴν ΔZ · καὶ ὥς ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς AB
 πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς BE , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς $\Gamma\Delta$ πρὸς τὸ
 ἀπὸ τῆς ΔZ . ὁμοίως δὴ δείξομεν, ὅτι καὶ ὥς τὸ ἀπὸ
 τῆς AB πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς AE , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς $\Gamma\Delta$
 5 πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΓZ . καὶ ὥς ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς AB
 πρὸς τὰ ἀπὸ τῶν AE, EB , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς $\Gamma\Delta$
 πρὸς τὰ ἀπὸ τῶν $\Gamma Z, Z\Delta$ · καὶ ἐναλλάξ ἄρα ἐστὶν
 ὡς τὸ ἀπὸ τῆς AB πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $\Gamma\Delta$, οὕτως τὰ
 ἀπὸ τῶν AE, EB πρὸς τὰ ἀπὸ τῶν $\Gamma Z, Z\Delta$. σύμ-
 10 μετρον δὲ τὸ ἀπὸ τῆς AB τῷ ἀπὸ τῆς $\Gamma\Delta$ · σύμμετρα
 ἄρα καὶ τὰ ἀπὸ τῶν AE, EB τοῖς ἀπὸ τῶν $\Gamma Z, Z\Delta$.
 καὶ ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν AE, EB ἅμα ῥητόν, καὶ τὰ ἀπὸ
 τῶν $\Gamma Z, Z\Delta$ ἅμα ῥητόν ἐστίν. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ δις
 ὑπὸ τῶν AE, EB σύμμετρόν ἐστι τῷ δις ὑπὸ τῶν
 15 $\Gamma Z, Z\Delta$. καὶ ἐστὶ μέσον τὸ δις ὑπὸ τῶν AE, EB .
 μέσον ἄρα καὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν $\Gamma Z, Z\Delta$. αἱ $\Gamma Z, Z\Delta$
 ἄρα δυνάμει ἀσύμμετροί εἰσι ποιοῦσαι τὸ μὲν συγκεί-
 μενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων ἅμα ῥητόν, τὸ
 δὲ δις ὑπ' αὐτῶν μέσον· ὅλη ἄρα ἡ $\Gamma\Delta$ ἄλογός ἐστιν
 20 ἡ καλουμένη μεῖζων.

Ἡ ἄρα τῇ μεῖζονι σύμμετρος μεῖζων ἐστίν· ὅπερ
 εἶδει δεῖξαι.

ξθ'.

Ἡ τῇ ῥητόν καὶ μέσον δυναμένη σύμμετρος
 25 [καὶ αὐτῇ] ῥητόν καὶ μέσον δυναμένη ἐστίν.

1. τὴν ΔZ] ΔB mut. in ΔZ m. rec. P; τὴν $Z\Delta$ FV. 3.
 ΔZ] $Z\Delta$ F. 4. τὸ ἀπὸ τῆς $\Gamma\Delta$ πρὸς] m. rec. P. 5. τό] (alt.)
 e corr. V. 6. τὰ] τό Fb, et B, corr. m. 2. 7. τὰ] τό PFb,
 et B, sed corr. ΓZ] $\Gamma\Delta$ F. 8. τὰ] τό F, et B, sed corr.
 9. τὰ] τό F, et B, sed corr. ΓZ] $\bar{E}Z$ b, et F, sed. corr.;
 Γ in ras. B. 11. AE] A e corr. b. ΓZ] EZ b, et F, sed
 corr. 12. τὰ] τό F. τὰ] τό PF. 13. ἐστὶν V. 15. καί

quoniam est $AE: \Gamma Z = EB: Z\Delta$ et permutando [V, 16]
 $AE: EB = \Gamma Z: Z\Delta$, etiam componendo erit [V, 18]
 $AB: BE = \Gamma\Delta: \Delta Z$. quare etiam $AB^2: BE^2 = \Gamma\Delta^2: \Delta Z^2$
 [VI, 20]. iam similiter demonstrabimus, esse etiam

$$AB^2: AE^2 = \Gamma\Delta^2: \Gamma Z^2.$$

quare etiam $AB^2: AE^2 + EB^2 = \Gamma\Delta^2: \Gamma Z^2 + Z\Delta^2$.
 permutando igitur [V, 16]

$$AB^2: \Gamma\Delta^2 = AE^2 + EB^2: \Gamma Z^2 + Z\Delta^2.$$

uerum $AB^2, \Gamma\Delta^2$ commensurabilia sunt. itaque etiam
 $AE^2 + EB^2$ et $\Gamma Z^2 + Z\Delta^2$ commensurabilia sunt
 [prop. XI]. et $AE^2 + EB^2$ rationale est, et¹⁾ ΓZ^2
 $+ Z\Delta^2$ rationale. eodem modo etiam $2AE \times EB$
 et $2\Gamma Z \times Z\Delta$ commensurabilia sunt. et $2AE \times EB$
 medium est. itaque etiam $2\Gamma Z \times Z\Delta$ medium est
 [prop. XXIII coroll.]. itaque $\Gamma Z, Z\Delta$ potentia incom-
 mensurabiles sunt [prop. XIII; cfr. p. 206, 15 et 22] effi-
 cientes summam quadratorum rationalem, rectangulum
 autem medium. itaque tota $\Gamma\Delta$ irrationalis est maior,
 quae uocatur [prop. XXXIX].

Ergo recta maiori commensurabilis maior est; quod
 erat demonstrandum.

LXIX.

Recta rectae spatio rationali et medio aequali qua-
 dratae commensurabilis ipsa spatio rationali et medio
 quadrata aequalis est.

1) Post $Z\Delta$ lin. 18 Augustus non male addidit $\alpha\epsilon\alpha$.

$\epsilon\sigma\tau\iota \mu\epsilon\sigma\sigma\upsilon\eta\eta$] $\mu\epsilon\sigma\sigma\upsilon\eta\eta$ $\delta\epsilon$ V. 16. ΓZ] supra add. E b. ΓZ] Γ in ras. m. 2 P. supra scr. E b. 17. $\epsilon\lambda\epsilon\iota\eta\eta \alpha\sigma\upsilon\mu\mu\epsilon\tau\epsilon\tau\alpha\iota$ BFVb. $\epsilon\lambda\epsilon\iota\eta\eta$ P. 19. $\eta \delta\lambda\eta$ Vb. 21. $\delta\pi\epsilon\tau\epsilon \epsilon\delta\epsilon\iota \delta\epsilon\iota\chi\alpha\iota$] comp. P. om. BFVb. 24. $\phi\eta\tau\omicron\upsilon\eta$] - $\sigma\upsilon$ in ras. B. 25. $\kappa\alpha\iota \alpha\upsilon\tau\eta$] om. P.

Ἐστω ῥητὸν καὶ μέσον δυναμένη ἡ AB , καὶ τῇ AB σύμμετρος ἔστω ἡ $\Gamma\Delta$. δεικτέον, ὅτι καὶ ἡ $\Gamma\Delta$ ῥητὸν καὶ μέσον δυναμένη ἐστίν.

Διηγήσθω ἡ AB εἰς τὰς εὐθείας κατὰ τὸ E . αἱ
 5 AE , EB ἄρα δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τὸ
 μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγ' ὧν μέσον,
 τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν ῥητόν· καὶ τὰ αὐτὰ κατασκευάσθω
 τοῖς πρότερον. ὁμοίως δὲ δέξομεν, ὅτι καὶ αἱ ΓZ ,
 $Z\Delta$ δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι, καὶ σύμμετρον τὸ μὲν
 10 συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AE , EB τῷ συγκειμένῳ
 ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΓZ , $Z\Delta$, τὸ δὲ ὑπὸ AE , EB τῷ ὑπὸ
 ΓZ , $Z\Delta$. ὥστε καὶ τὸ [μὲν] συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ
 τῶν ΓZ , $Z\Delta$ τετραγώνων ἐστὶ μέσον, τὸ δ' ὑπὸ τῶν
 ΓZ , $Z\Delta$ ῥητόν.
 15 ῥητὸν ἄρα καὶ μέσον δυναμένη ἐστὶν ἡ $\Gamma\Delta$. ὅπερ
 εἰδει δεῖξαι.

ο'.

Ἡ τῇ δύο μέσα δυναμένη σύμμετρος δύο
 μέσα δυναμένη ἐστίν.

20 Ἐστω δύο μέσα δυναμένη ἡ AB , καὶ τῇ AB
 σύμμετρος ἡ $\Gamma\Delta$. δεικτέον, ὅτι καὶ ἡ $\Gamma\Delta$ δύο μέσα
 δυναμένη ἐστίν.

Ἐπεὶ γὰρ δύο μέσα δυναμένη ἐστὶν ἡ AB , διη-
 25 γήσθω εἰς τὰς εὐθείας κατὰ τὸ E . αἱ AE , EB ἄρα
 δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τὸ τε συγκείμενον

1. καὶ τῇ AB] supra scr. m. 1 F. 2. δεικτέον] λέγω V.
 3. ἐστὶ B, comp. Fb. 7. δέ F. κατασκευάσθω b. 8.
 αἱ] ἡ V. 11. δ' P. τῶν AE V. 12. τῶν ΓZ (corr. ex
 ΓH) V. μὲν] om. P. 13. τετραγώνων P. δέ F. 15.
 ὅπερ εἰδει δεῖξαι] comp. P, om. BFVb. 17. ο'] seq. ras. 1
 litt. F. 18. καὶ αὐτῇ δύο V. 21. ἡ] ἔστω ἡ V. δεικτέον]
 λέγω V. δὴ ὅτι B. 24. κατὰ τὸ E εἰς τὰς εὐθείας V. εὐ-
 θείας] m. 2 B.

Sit AB spatio rationali et medio aequalis quadrata, et rectae AB commensurabilis sit ΓA . demonstrandum, etiam ΓA spatio rationali et medio aequalem esse quadratam.

$\begin{array}{c} A \\ | \\ \Gamma \\ | \\ Z \\ | \\ E \\ | \\ B \end{array}$ $\begin{array}{c} \Gamma \\ | \\ Z \\ | \\ A \end{array}$ diuidatur AB in rectas in E ; itaque AE , EB potentia incommensurabiles sunt efficientes summam quadratorum mediam, rectangulum autem rationale [prop. XI]; et comparentur eadem, quae antea. iam similiter demonstrabimus, ΓZ , $Z A$ potentia incommensurabiles esse et $AE^2 + EB^2$, $\Gamma Z^2 + Z A^2$ commensurabilia et $AE \times EB$, $\Gamma Z \times Z A$ commensurabilia. quare etiam $\Gamma Z^2 + Z A^2$ medium est, $\Gamma Z \times Z A$ autem rationale.

Ergo ΓA spatio rationali et medio aequalis est quadrata; quod erat demonstrandum.

LXX.

Recta rectae duobus spatiis mediis aequali quadratae commensurabilis ipsa duobus spatiis mediis quadrata est aequalis.

Sit AB duobus spatiis mediis aequalis quadrata, et rectae AB commensurabilis ΓA . demonstrandum, etiam ΓA duobus spatiis mediis aequalem esse quadratam.

$\begin{array}{c} A \\ | \\ \Gamma \\ | \\ Z \\ | \\ E \\ | \\ B \end{array}$ $\begin{array}{c} \Gamma \\ | \\ Z \\ | \\ A \end{array}$ nam quoniam AB duobus spatiis mediis aequalis est quadrata, in E in rectas diuidatur. itaque AE , EB potentia incommensurabiles sunt efficientes summam quadratorum mediam et rectangulum medium et praeterea $AE^2 + EB^2$, $AE \times EB$ incommensurabilia [prop. XLI];

ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν [τετραγώνων] μέσον καὶ τὸ ὑπ'
αὐτῶν μέσον καὶ ἔτι ἀσύμμετρον τὸ συγκείμενον ἐκ
τῶν ἀπὸ τῶν AE , EB τετραγώνων τῷ ὑπὸ τῶν AE ,
 EB · καὶ κατεσκευάσθω τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον. ὁμοίως
5 δὴ δείξομεν, ὅτι καὶ αἱ ΓZ , $Z\Delta$ δυνάμει εἰσὶν ἀσύμ-
μετροὶ καὶ σύμμετρον τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ
τῶν AE , EB τῷ συγκειμένῳ ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΓZ ,
 $Z\Delta$, τὸ δὲ ὑπὸ τῶν AE , EB τῷ ὑπὸ τῶν ΓZ , $Z\Delta$.
ὥστε καὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΓZ , $Z\Delta$
10 τετραγώνων μέσον ἐστὶ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΓZ , $Z\Delta$ μέσον
καὶ ἔτι ἀσύμμετρον τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν
 ΓZ , $Z\Delta$ τετραγώνων τῷ ὑπὸ τῶν ΓZ , $Z\Delta$.
' H ἄρα $\Gamma\Delta$ δύο μέσα δυναμένη ἐστίν· ὅπερ ἔδει
δείξαι.

15

οα'.

'Ρητοῦ καὶ μέσου συντιθεμένου τέσσαρες
ἄλλοι γίνονται ἥτοι ἐκ δύο ὀνομάτων ἢ ἐκ
δύο μέσων πρώτη ἢ μεῖζων ἢ ῥητὸν καὶ μέσον
δυναμένη.

20 Ἔστω ῥητὸν μὲν τὸ AB , μέσον δὲ τὸ $\Gamma\Delta$ · λέγω,
ὅτι ἢ τὸ $\Delta\Delta$ χωρίον δυναμένη ἦτοι ἐκ δύο ὀνομάτων
ἐστὶν ἢ ἐκ δύο μέσων πρώτη ἢ μεῖζων ἢ ῥητὸν καὶ
μέσον δυναμένη.

Τὸ γὰρ AB τοῦ $\Gamma\Delta$ ἦτοι μεῖζόν ἐστίν ἢ ἔλασσον.
25 ἔστω πρότερον μεῖζον· καὶ ἐκκείσθω ῥητὴ ἢ EZ , καὶ
παραβελλήσθω παρὰ τὴν EZ τῷ AB ἴσον τὸ EH
πλάτος ποιοῦν τὴν $E\Theta$ · τῷ δὲ $\Delta\Gamma$ ἴσον παρὰ τὴν EZ


1. τετραγώνων] om. P. ὑπ'] mut. in ἀπ' m. 2 F, ἀπ' b. 3. AE] (prius) corr. ex AB m. 2 F. 5. ΓZ] in ras. m. 1 P. 8. τὸ δὲ] ὥστε καὶ τό P. 9. ΓΔ, ΔZ P. 12. τῷ] τό V. 13. ΓΔ ἄρα B. ΓΔ] Δ postea ins. V. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. B F V b. 15. οβ', β eras. F. 17. γίνονται] γίνονται B F V b et,

et comparentur eadem, quae antea. iam similiter demonstrabimus, ΓZ , $Z\Delta$ potentia incommensurabiles esse, et $AE^2 + EB^2$, $\Gamma Z^2 + Z\Delta^2$ commensurabilia, et $AE \times EB$, $\Gamma Z \times Z\Delta$ commensurabilia. quare etiam $\Gamma Z^2 + Z\Delta^2$ medium est et $\Gamma Z \times Z\Delta$ medium et praeterea $\Gamma Z^2 + Z\Delta^2$, $\Gamma Z \times Z\Delta$ incommensurabilia.

Ergo $\Gamma\Delta$ duobus spatiis mediis aequalis est quadrata; quod erat demonstrandum.

LXXI.

Spatiis rationali et medio compositis quattuor irrationales oriuntur, aut recta ex duobus nominibus aut ex duabus mediis prima aut maior aut spatio rationali et medio aequalis quadrata.



Sit AB rationale, $\Gamma\Delta$ autem medium. dico, rectam spatio $\Delta\Delta$ aequalem quadratam aut ex duobus nominibus esse aut ex duabus mediis primam aut maiorem aut spatio rationali et medio

aequalem quadratam.

est enim aut $AB > \Gamma\Delta$ aut $AB < \Gamma\Delta$. sit prius $AB > \Gamma\Delta$. et ponatur rationalis EZ , et rectae EZ spatio AB aequale adplicetur EH latitudinem efficiens $E\Theta$; spatio autem $\Delta\Gamma$ aequale rectae EZ adplicetur ΘI latitudinem efficiens ΘK . et quoniam AB rationale est

supra add. γ m. 1, P. ἡτοι] corr. in ἡ τε m. rec. P, corr. ex δ τῇ V, ex ἡ F; ἡ τε B. 21. ἡ] m. 2 F. $\Delta\Delta$] Δ e corr. V. ἡτοι] ἡ V. 27. τῶ] corr. ex τό m. 1 F. Post EZ add. Theon: τούτεστι τῇ ΘH (BFVb).

παραβεβλήσθω τὸ ΘI πλάτος ποιοῦν τὴν ΘK . καὶ
 ἐπεὶ ῥητόν ἐστι τὸ AB καὶ ἐστὶν ἴσον τῷ EH , ῥητόν
 ἄρα καὶ τὸ EH . καὶ παρὰ [ῥητήν] τὴν EZ παραβέ-
 βληται πλάτος ποιοῦν τὴν $E\Theta$. ἡ $E\Theta$ ἄρα ῥητὴ ἐστι
 5 καὶ σύμμετρος τῇ EZ μήκει. πάλιν, ἐπεὶ μέσον ἐστὶ
 τὸ ΓA καὶ ἐστὶν ἴσον τῷ ΘI , μέσον ἄρα ἐστὶ καὶ
 τὸ ΘI . καὶ παρὰ ῥητὴν τὴν EZ παράκειται πλάτος
 ποιοῦν τὴν ΘK . ῥητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ ΘK καὶ ἀσύμμετρος
 τῇ EZ μήκει. καὶ ἐπεὶ μέσον ἐστὶ τὸ ΓA , ῥητόν δὲ
 10 τὸ AB , ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ AB τῷ ΓA . ὥστε
 καὶ τὸ EH ἀσύμμετρόν ἐστι τῷ ΘI . ὥς δὲ τὸ EH
 πρὸς τὸ ΘI , οὕτως ἐστὶν ἡ $E\Theta$ πρὸς τὴν ΘK . ἀσύμ-
 μετρος ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ $E\Theta$ τῇ ΘK μήκει. καὶ εἰσιν
 ἀμφοτέραι ῥηταί· αἱ $E\Theta$, ΘK ἄρα ῥηταὶ εἰσι δυνάμει
 15 μόνον σύμμετροι· ἐκ δύο ἄρα ὀνομάτων ἐστὶν ἡ EK
 διηρημένη κατὰ τὸ Θ . καὶ ἐπεὶ μετξόν ἐστι τὸ AB
 τοῦ ΓA , ἴσον δὲ τὸ μὲν AB τῷ EH , τὸ δὲ ΓA τῷ
 ΘI , μεῖζον ἄρα καὶ τὸ EH τοῦ ΘI . καὶ ἡ $E\Theta$ ἄρα
 μεῖζον ἐστὶ τῆς ΘK . ἥτοι οὖν ἡ $E\Theta$ τῆς ΘK μεῖζον
 20 δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἐαυτῇ μήκει ἢ τῷ ἀπὸ
 ἀσυμμέτρου. δυνάσθω πρότερον τῷ ἀπὸ συμμέτρου
 ἐαυτῇ· καὶ ἐστὶν ἡ μεῖζων ἡ ΘE σύμμετρος τῇ ἐκκει-
 μένῃ ῥητῇ τῇ EZ . ἡ ἄρα EK ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ

1. ΘI] mut. in ΘH F, I eras. V. 3. καί] (prius) m. 2 F.
 ῥητήν] om. P. 4. $E\Theta$] (prius) ΘE F. ῥητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ
 $E\Theta$ Theon (BFVb). ἐστὶν P. 6. ΘI] I in ras. F. 7.
 ΘI] I in ras. F. Post παράκειται add. Theon: τουτέστι
 (-in V) τὴν ΘH (BFVb). 8. ἄρα] corr. ex ἔσται F. 9.
 EZ] Z postea ins. m. 1 V. ΓA] eras. V. 11. EH] ZH
 e corr. V. ΘI] corr. ex $\Theta \Gamma$ P, I in ras. F. 12. ΘI] I
 in ras. F. 13. ἐστὶν B. 15. EK] corr. ex $E\Theta$ m. rec. b.
 16. Post Θ ras. 1 litt. B. μεῖζων V, sed corr. 18. ΘI]
 I e corr. F. καί] m. 2 F. ΘI] I in ras. F. 20. ἐαυτῇ μήκει]
 om. V. 21. ἀσυμμέτρου] συμμέτρω F, corr. m. 2; συμμέτρου B,

et $AB = EH$, etiam EH rationale est. et rectae EZ adplicatum est latitudinem efficiens $E\Theta$. itaque $E\Theta$ rationalis est et rectae EZ longitudine commensurabilis [prop. XX]. rursus quoniam $\Gamma\Delta$ medium est et $\Gamma\Delta = \Theta I$, etiam ΘI medium est. et rectae rationali EZ adplicatum est latitudinem efficiens ΘK . itaque ΘK rationalis est et rectae EZ longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. et quoniam $\Gamma\Delta$ medium est, AB autem rationale, AB et $\Gamma\Delta$ incommensurabilia sunt. quare etiam EH , ΘI incommensurabilia sunt. uerum $EH : \Theta I = E\Theta : \Theta K$ [VI, 1]. quare etiam $E\Theta$, ΘK longitudine incommensurabiles sunt [prop. XI]. et utraque rationalis est. itaque $E\Theta$, ΘK rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo EK ex duobus nominibus est in Θ diuisa [prop. XXXVI]. et quoniam $AB > \Gamma\Delta$ et $AB = EH$, $\Gamma\Delta = \Theta I$, erit etiam $EH > \Theta I$. itaque etiam $E\Theta > \Theta K$ [V, 14]. iam $E\Theta^2$ excedit ΘK^2 quadrato rectae aut sibi commensurabilis aut incommensurabilis. prius excedat quadrato rectae sibi commensurabilis; et maior ΘE rationali propositae EZ commensurabilis est. ergo EK ex duobus nominibus est prima [deff. alt. 1]. EZ autem rationalis est. sin spatium recta rationali et recta ex duobus nominibus prima comprehenditur, recta spatio aequalis quadrata ex duobus nominibus est [prop. LIV]. itaque recta spatio EI aequalis quadrata ex duobus nominibus est; quare etiam recta spatio $A\Delta$ aequalis quadrata ex duobus nominibus est. iam uero $E\Theta^2$ excedat ΘK^2 quadrato rectae sibi incommensurabilis; et maior $E\Theta$

corr. m. 2. 22. $\epsilon\sigma\tau\iota\upsilon \eta]$ $\epsilon\sigma\tau\iota$ B. $E\Theta$ F. 23. $\eta]$ m. 2 P.
 $\epsilon\kappa]$ supra scr. b.


πρώτη. ῥητὴ δὲ ἡ EZ · ἐὰν δὲ χωρίον περιέχεται ὑπὸ
 ῥητῆς καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων πρώτης, ἡ τὸ χωρίον
 δυναμένη ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστίν. ἡ ἄρα το EI δυνα-
 μένη ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστίν· ὥστε καὶ ἡ το $ΑΔ$
 5 δυναμένη ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστίν. ἀλλὰ δη δυνάσθω
 ἡ $EΘ$ τῆς $ΘΚ$ μείζον τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ· καὶ
 ἐστὶν ἡ μείζων ἡ $EΘ$ σύμμετρος τῇ ἐκκειμένη ῥητῇ
 τῇ EZ μήκει· ἡ ἄρα $EΚ$ ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ τε-
 τάρτη. ῥητὴ δὲ ἡ EZ · ἐὰν δὲ χωρίον περιέχεται ὑπὸ
 10 ῥητῆς καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων τετάρτης, ἡ τὸ χωρίον
 δυναμένη ἄλογός ἐστιν ἡ καλουμένη μείζων. ἡ ἄρα τὸ
 EI χωρίον δυναμένη μείζων ἐστίν· ὥστε καὶ ἡ τὸ $ΑΔ$
 δυναμένη μείζων ἐστίν.

Ἀλλὰ δη ἔστω ἔλασσον τὸ $ΑΒ$ τοῦ $ΓΔ$ · καὶ τὸ
 15 $ΕΗ$ ἄρα ἔλασσόν ἐστι τοῦ $ΘΙ$ · ὥστε καὶ ἡ $EΘ$ ἐλάσσων
 ἐστὶ τῆς $ΘΚ$. ἥτοι δὲ ἡ $ΘΚ$ τῆς $EΘ$ μείζον δύνανται
 τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ ἢ τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου. δυ-
 νάσθω πρότερον τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ μήκει· καὶ
 ἐστὶν ἡ ἐλάσσων ἡ $EΘ$ σύμμετρος τῇ ἐκκειμένη ῥητῇ
 20 τῇ EZ μήκει· ἡ ἄρα $EΚ$ ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ δευ-
 τέρα. ῥητὴ δὲ ἡ EZ · ἐὰν δὲ χωρίον περιέχεται ὑπὸ
 ῥητῆς καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων δευτέρας, ἡ τὸ χωρίον
 δυναμένη ἐκ δύο μέσων ἐστὶ πρώτη. ἡ ἄρα τὸ EI
 χωρίον δυναμένη ἐκ δύο μέσων ἐστὶ πρώτη· ὥστε καὶ
 25 ἡ τὸ $ΑΔ$ δυναμένη ἐκ δύο μέσων ἐστὶ πρώτη. ἀλλὰ

2. ῥητῶν V. 3. ἐκ] ἢ ἐκ F. ἐστὶ P. ἡ ἄρα] corr.
 ex παρα m. 2 P. EI] I in ras. F. 5. δυναμένη] corr. ex
 ἀδυναμένη V. 6. Ante ἡ ras. 3 litt. F. $ΘΚ$] corr. ex $ΟΞ$
 m. 2 F. μείζων b. συμμέτρου B, sed corr. 7. ἐστὶν]
 ἐστι, supra scr. ω, B; ἔστω P. ἡ] (prius) om. B. 11. μείζον
 V, sed corr. 12. EI] I in ras. F. 15. $ΘΙ$] $ΘΚ$ b et corr.
 ex $ΘΓ$ F. $EΘ$ ἄρα b. ἔλασσον b. 17. συμμέτρου — ἀπό] mg.
 m. 1 P. συμμέτρου] ἀσυμμέτρου V, sed α eras. ἀσυμμέτρου]

rationali propositae EZ longitudine commensurabilis est. itaque EK ex duobus nominibus est quarta [deff. alt. 4]. EZ autem rationalis est. sin spatium recta rationali et recta ex duobus nominibus quarta comprehenditur, recta spatio aequalis quadrata irrationalis est maior, quae uocatur [prop. LVII]. itaque recta spatio EI aequalis quadrata maior est. ergo etiam recta spatio AA aequalis quadrata maior est.

iam uero sit $AB < \Gamma A$. quare etiam $EH < \Theta I$. itaque etiam $E\Theta < \Theta K$ [VI, 1; V, 14]. uerum ΘK^2 excedit $E\Theta^2$ quadrato rectae aut sibi commensurabilis aut incommensurabilis. prius excedat quadrato rectae sibi longitudine commensurabilis. et minor $E\Theta$ rationali propositae EZ longitudine commensurabilis est. itaque EK ex duobus nominibus est secunda [deff. alt. 2]. EZ autem rationalis est. sin spatium recta rationali et recta ex duobus nominibus secunda comprehenditur, recta spatio aequalis quadrata ex duobus



mediis est prima [prop. LV]. itaque recta spatio EI aequalis quadrata ex duobus mediis est prima. ergo etiam recta spatio AA aequalis quadrata ex duobus mediis prima est. iam uero ΘK^2 excedat ΘE^2 quadrato rectae

sibi incommensurabilis; et minor $E\Theta$ rationali propositae EZ commensurabilis est. itaque EK ex duobus nominibus est quinta [deff. alt. 5]. EZ autem ratio-

$\sigma\mu\mu\epsilon\tau\rho\omicron\nu$ BV, sed corr. 19. η] (prius) m. 2 F, om. B. 21.
 $\delta\epsilon$] (alt.) m. 2 F. περιέχεται P. 23. EI] I in ras. F. 24.
 $\chi\omega\rho\iota\omicron\nu$] om. V. 25. AA $\chi\omega\rho\iota\omicron\nu$ BF b.

- δὴ ἡ ΘK τῆς ΘE μείζον δυνάσθω τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου
 ἑαυτῇ. καὶ ἐστὶν ἡ ἐλάσσων ἡ $E\Theta$ σύμμετρος τῇ ἐκ-
 κειμένη φητῇ τῇ EZ . ἡ ἄρα EK ἐκ δύο ὀνομάτων
 ἐστὶ πέμπτη. φητὴ δὲ ἡ EZ . ἐὰν δὲ χωρίον περιέχεται
 5 ὑπὸ φητῆς καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων πέμπτης, ἡ τὸ
 χωρίον δυναμένη φητον καὶ μέσον δυναμένη ἐστίν.
 ἡ ἄρα τὸ EI χωρίον δυναμένη φητὸν καὶ μέσον δυ-
 ναμένη ἐστίν· ὥστε καὶ ἡ τὸ AA χωρίον δυναμένη
 φητὸν καὶ μέσον δυναμένη ἐστίν.
- 10 Ῥητοῦ ἄρα καὶ μέσον συντιθεμένου τέσσαρες ἄλλοι
 γίνονται ἥτοι ἐκ δύο ὀνομάτων ἢ ἐκ δύο μέσων πρώτῃ
 ἢ μείζων ἢ φητὸν καὶ μέσον δυναμένη· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

οβ'.

- Δύο μέσων ἀσυμμέτρων ἀλλήλοις συντιθε-
 15 μένων αἱ λοιπαὶ δύο ἄλλοι γίνονται ἥτοι ἐκ
 δύο μέσων δευτέρα ἢ [ἡ] δύο μέσα δυναμένη.

Συγκείσθω γὰρ δύο μέσα ἀσύμμετρα ἀλλήλοις τὰ
 $AB, \Gamma A$. λέγω, ὅτι ἡ τὸ AA χωρίον δυναμένη ἥτοι
 ἐκ δύο μέσων ἐστὶ δευτέρα ἢ δύο μέσα δυναμένη.

- 20 Τὸ γὰρ AB τοῦ ΓA ἥτοι μείζον ἐστὶν ἢ ἕλασσον.
 ἔστω, εἰ τύχοι, πρότερον μείζον τὸ AB τοῦ ΓA . καὶ

1. ΘE] supra scr. η b, ΘH e corr. F, $E\Theta$ V (E in ras.).
 συμμέτρου F, et B, sed corr. m. 2. 2. ἡ] (prius) om. B. 4.
 ἐστὶ] postea ins. F, ἐστίν P. 7. δυναμένη — 8. χωρίον] in
 ras. F. 9. φητόν — δυναμένη] mg. m. 2 B. ἐστὶ P B b.

10. ἀνάλογοι P, sed corr. m. rec. 11. γίνονται F V b. ἥτοι
 ἡ V. 12. ἡ φητόν] m. 2 V. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P,
 om. B F V b. 13. ογ', sed corr. m. 2, F. 14. συμμέτρων,
 corr. m. 2, F. συντιθέμενων Theon (B F V b); συντιθεμένων
 supra scr. m. 2 B. 15. Post δύο ras. 2 litt. V. γίνονται
 F b, et supra scr. γ, V. ἐκ] ἢ ἐκ V. 16. ἡ] deleo. 17.
 συγκείσθω F V. τὰ] τό b. 18. AA] corr. ex ΓA m. 2 F.
 19. ἡ] ἡ ἡ P. 21. εἰ τύχοι] om. Theon (B F V b).

nalis est. sin spatium recta rationali et recta ex duobus nominibus quinta comprehenditur, recta spatio aequalis quadrata recta spatio rationali et medio aequalis quadrata est [prop. LVIII]. itaque recta spatio EI aequalis quadrata recta spatio rationali et medio aequalis quadrata est. quare etiam recta spatio AA aequalis quadrata recta spatio rationali et medio aequalis quadrata est.


Ergo spatiis rationali et medio compositis quattuor irrationales oriuntur, aut recta ex duobus nominibus aut ex duobus mediis prima aut maior aut spatio rationali et medio aequalis quadrata; quod erat demonstrandum.

LXXII.

Duobus mediis sibi incommensurabilibus compositis reliquae duae irrationales oriuntur, aut recta ex duobus mediis secunda aut duobus spatiis mediis aequalis quadrata.

Componantur enim duo media sibi incommensurabilia AB , ΓA . dico, rectam spatio AA aequalem quadratam aut ex duobus mediis secundam esse aut duobus spatiis mediis aequalem quadratam.

nam aut $AB > \Gamma A$ aut $AB < \Gamma A$. sit uerbi gratia prius $AB > \Gamma A$, et ponatur recta rationalis EZ , et



spatio AB aequale rectae EZ adplicetur EH latitudinem efficiens $E\Theta$, spatio autem ΓA aequale ΘI latitudinem efficiens ΘK . et quoniam utrumque AB , ΓA medium est, etiam utrumque EH , ΘI medium est. et rectae

ἐκκείσθω ῥητὴ ἡ EZ , καὶ τῷ μὲν AB ἴσον παρὰ τὴν
 EZ παραβεβλήσθω τὸ EH πλάτος ποιοῦν τὴν $E\Theta$,
 τῷ δὲ ΓA ἴσον τὸ ΘI πλάτος ποιοῦν τὴν ΘK . καὶ
 ἐπεὶ μέσον ἐστὶν ἐκάτερον τῶν AB , ΓA , μέσον ἄρα
 5 καὶ ἐκάτερον τῶν EH , ΘI . καὶ παρὰ ῥητὴν τὴν ZE
 παράκειται πλάτος ποιοῦν τὰς $E\Theta$, ΘK . ἐκατέρα ἄρα τῶν
 $E\Theta$, ΘK ῥητὴ ἐστὶ καὶ ἀσύμμετρος τῇ EZ μήκει. καὶ ἐπεὶ
 ἀσύμμετρόν ἐστὶ τὸ AB τῷ ΓA , καὶ ἐστὶν ἴσον το
 μὲν AB τῷ EH , τὸ δὲ ΓA τῷ ΘI , ἀσύμμετρον ἄρα
 10 ἐστὶ καὶ τὸ EH τῷ ΘI . ὥς δὲ τὸ EH πρὸς τὸ ΘI ,
 οὕτως ἐστὶν ἡ $E\Theta$ πρὸς ΘK . ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ
 $E\Theta$ τῇ ΘK μήκει. αἱ $E\Theta$, ΘK ἄρα ῥηταὶ εἰσι δυνάμει
 μόνον σύμμετροι. ἐκ δύο ἄρα ὀνομάτων ἐστὶν ἡ EK .
 ἥτοι δὲ ἡ $E\Theta$ τῆς ΘK μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμ-
 15 μέτρου ἐαυτῇ ἢ τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου. δυνάσθω πρό-
 τερον τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἐαυτῇ μήκει. καὶ οὐδετέρα
 τῶν $E\Theta$, ΘK σύμμετρός ἐστὶ τῇ ἐκκειμένη ῥητῇ τῇ
 EZ μήκει. ἡ EK ἄρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ τρίτης.
 ῥητὴ δὲ ἡ EZ . ἐὰν δὲ χωρίον περιέχεται ὑπὸ ῥητῆς
 20 καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων τρίτης, ἡ τὸ χωρίον δυνα-
 μένη ἐκ δύο μέσων ἐστὶ δευτέρα. ἡ ἄρα τὸ EI , τουτ-
 ἐστὶ τὸ $A\Delta$, δυναμένη ἐκ δύο μέσων ἐστὶ δευτέρα.
 ἀλλὰ δὴ ἡ $E\Theta$ τῆς ΘK μείζον δυνάσθω τῷ ἀπο
 ἀσυμμέτρου ἐαυτῇ μήκει. καὶ ἀσύμμετρός ἐστὶν ἐκα-
 25 τέρα τῶν $E\Theta$, ΘK τῇ EZ μήκει. ἡ ἄρα EK ἐκ δύο
 ὀνομάτων ἐστὶν ἑκτη. ἐὰν δὲ χωρίον περιέχεται ὑπὸ
 ῥητῆς καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων ἑκτης, ἡ τὸ χωρίον

1. τις ῥητὴ F. τῷ] corr. ex τό m. 2 P. 2. EH] EZ b.
 3. Post ἴσον add. παρὰ τὴν ΘH V, del. m. 2. 4. ἐπεὶ —
 ἄρα καὶ] om. b. 5. τῶν] corr. ex τό m. 2 b. EH] supra
 add. Θ b. ΘI] $\Theta \Gamma$, supra add. H, b. καὶ] m. 2 F. 6.

rationali EZ adplicata sunt latitudines efficientia $E\Theta$, ΘK . itaque utraque $E\Theta$, ΘK rationalis est et rectae EZ longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. et quoniam AB , ΓA incommensurabilia sunt, et $AB = EH$, $\Gamma A = \Theta I$, etiam EH , ΘI incommensurabilia sunt. uerum $EH : \Theta I = E\Theta : \Theta K$ [VI, 1]. itaque etiam $E\Theta$, ΘK longitudine incommensurabiles sunt [prop. XI]. quare $E\Theta$, ΘK rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo EK ex duobus nominibus est [prop. XXXVI]. uerum $E\Theta^2$ excedit ΘK^2 quadrato rectae aut sibi commensurabilis aut incommensurabilis. prius excedat quadrato rectae longitudine commensurabilis. et neutra rectarum $E\Theta$, ΘK rectae rationali propositae EZ longitudine commensurabilis est. itaque EK ex duobus nominibus est tertia [deff. alt. 3]. uerum EZ rationalis est. sin spatium recta rationali et recta ex duobus nominibus tertia comprehenditur, recta spatio aequalis quadrata ex duabus mediis est secunda [prop. LVI]. itaque recta spatio EI , hoc est AA , aequalis quadrata ex duabus mediis est secunda. iam uero $E\Theta^2$ excedat ΘK^2 quadrato rectae sibi incommensurabilis; et utraque $E\Theta$, ΘK rectae EZ longitudine incommensurabilis est. itaque EK ex duobus nominibus est sexta [deff. alt. 6]. sin spatium recta rationali et recta ex duobus nominibus sexta comprehenditur, recta

$\pi α ρ ά ν η ι τ α$ P, $\pi α ρ ά ν η ι τ α ι$ V. $\pi ο ι ο θ ύ τ α$ Vb. 7. ΘK ἄρα V. $\acute{\epsilon} σ τ ι ν$ P. 8. $\acute{\alpha} σ ύ μ μ ε τ ρ ο ς$ P, corr. m. rec. $\acute{\epsilon} σ τ ι ν$ P. AB] supra add. H V. $\acute{\epsilon} σ τ ι ν$] m. 2 F. 10. $\pi ρ ό ς$] m. 2 F. $\tau ό$] τῷ F. 11. $\pi ρ ό ς τήν$ V. 12. $\acute{\epsilon} λ ί ν$ P. 14. $\acute{\alpha} σ υ μ μ έ τ ρ ο ν$ V, sed corr. 15. $\sigma υ μ μ έ τ ρ ο ν$ BV, corr. m. 2. 16. $\acute{\alpha} σ υ μ μ έ τ ρ ο ν$ V, sed corr.; $\acute{\alpha}$ - supra add. b m. 1. 17. $\acute{\epsilon} σ τ ι ν$ P. 18. $\tau ρ ί τ η$] corr. ex $\phi \eta \tau \eta$ m. rec. b. 25. $\tau \eta$] corr. ex $\tau \eta \varsigma$ B. $\acute{\epsilon} \tau \eta$] m. rec. P.

δυναμένη ἢ δύο μέσα δυναμένη ἐστίν· ὥστε καὶ ἡ τὸ
 $ΑΔ$ χωρίον δυναμένη ἢ δύο μέσα δυναμένη ἐστίν.

[Ὁμοίως δὲ δείξομεν, ὅτι καὶ ἔλαττον ἢ τὸ $ΑΒ$
 τοῦ $ΓΔ$, ἢ τὸ $ΑΔ$ χωρίον δυναμένη ἢ ἐκ δύο μέσων
 5 δευτέρα ἐστίν ἥτοι δύο μέσα δυναμένη].

Δύο ἄρα μέσων ἀσυμμέτρων ἀλλήλοις συντιθεμένων
 αἱ λοιπαὶ δύο ἄλογοι γίνονται ἥτοι ἐκ δύο μέσων
 δευτέρα ἢ δύο μέσα δυναμένη.

Ἡ ἐκ δύο ὀνομάτων καὶ αἱ μετ' αὐτὴν ἄλογοι οὔτε
 10 τῇ μέσῃ οὔτε ἀλλήλαις εἰσὶν αἱ αὐταί. τὸ μὲν γὰρ
 ἀπὸ μέσης παρα φητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ
 φητὴν καὶ ἀσύμμετρον τῇ παρ' ἣν παρὰκεῖται μήκει.
 τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων παρα φητὴν παρα-
 βαλλόμενον πλάτος ποιεῖ τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων πρώτην.
 15 τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ἐκ δύο μέσων πρώτης παρὰ φητὴν παρα-
 βαλλόμενον πλάτος ποιεῖ τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων δευ-
 τέραν. τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ἐκ δύο μέσων δευτέρας παρὰ
 φητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ τὴν ἐκ δύο ὀνο-
 μάτων τρίτην. τὸ δὲ ἀπὸ τῆς μετρίονος παρὰ φητὴν
 20 παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων
 τετάρτην. τὸ δὲ ἀπὸ τῆς φητὸν καὶ μέσον δυναμένης
 παρὰ φητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ τὴν ἐκ δύο
 ὀνομάτων πέμπτην. τὸ δὲ ἀπὸ τῆς δύο μέσα δυνα-
 μένης παρὰ φητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ τὴν

1. ἢ δύο] δύο B V. ὥστε καὶ ἡ] ἡ ἄρα V. 2. $ΑΒ$ b. χω-
 ρίον] om. V. ἢ] om. B F V. δύο] β P, δύο m. rec. μέσας F.
 3. ὁμοίως — 5. δυναμένη] om. P. 4. τὸ $ΑΔ$ χωρίον] τὸ
 χωρίον τὸ $ΑΔ$ V. ἢ] om. F. 5. ἥτοι δύο μέσα] ἡ φητὸν
 καὶ μέσον B. 6. ἡ δύο F. 7. γίνονται P F V b. ἥτοι ἡ V.
 8. ἢ] ἡ ἢ V. δύο] in ras. m. 1 P. 9. οὐγ', γ in ras., F.
 αἱ] supra scr. b. 11. ἀπὸ τῆς F. 12. τῇ] corr. ex

spatio aequalis quadrata recta est duobus spatiis mediis aequalis quadrata [prop. LIX]. quare recta spatio $\mathcal{A}\mathcal{A}$ aequalis quadrata recta duobus spatiis mediis aequalis quadrata est.

Ergo duobus spatiis mediis sibi incommensurabilibus compositis reliquae duae irrationales oriuntur, aut recta ex duabus mediis secunda aut duobus spatiis mediis aequalis quadrata.

Recta ex duobus nominibus et irrationales ab ea deriuatae neque mediae neque inter se eadem sunt. nam quadratum mediae rectae rationali adplicatum latitudinem efficit rationalem et rectae, cui adplicatum est, longitudine incommensurabilem [prop. XXII]. quadratum autem rectae ex duobus nominibus rationali adplicatum latitudinem efficit rectam ex duobus nominibus primam [prop. LX]. quadratum autem rectae ex duabus mediis primae rationali adplicatum latitudinem efficit rectam ex duobus nominibus secundam [prop. LXI]. quadratum autem rectae ex duabus mediis secundae rationali adplicatum latitudinem efficit rectam ex duobus nominibus tertiam [prop. LXII]. quadratum autem maioris rationali adplicatum latitudinem efficit rectam ex duobus nominibus quartam [prop. LXIII]. quadratum autem rectae spatio rationali et medio aequalis quadratae rationali adplicatum latitudinem efficit rectam ex duobus nominibus quintam [prop. LXIV].

τήν V. ἥν] corr. ex ἥ F. 13. δέ] δ' P. παραβαλό-
μενον P. 15. τὸ δέ — 19. τρέτην] mg. m. 2 V. 16. ποιεῖ]
om. V. 17. δέ] δ' P. 19. δέ] δ' P. 21. δέ] δ' P. 23.
τό] e corr. V. δέ] δ' P. 24. πλάτος] corr. ex πάτος m. 1 P.

ἐκ δύο ὀνομάτων ἕκτην. τὰ δ' εἰρημένα πλάτη διαφέρει τοῦ τε πρώτου καὶ ἀλλήλων, τοῦ μὲν πρώτου, ὅτι ῥητὴ ἐστίν, ἀλλήλων δέ, ὅτι τῇ τάξει οὐκ εἰσὶν αἱ αὐταί· ὥστε καὶ αὐταὶ αἱ ἄλλοι διαφέρουσιν ἀλλήλων.

5

ογ'.

Ἐὰν ἀπὸ ῥητῆς ῥητὴ ἀφαιρεθῇ δυνάμει μόνον σύμμετρος οὕσα τῇ ὅλῃ, ἡ λοιπὴ ἄλογός ἐστιν· καλεῖσθω δὲ ἀποτομή.

Ἀπὸ γὰρ ῥητῆς τῆς AB ῥητὴ ἀφαιρεθῶ ἡ $BΓ$ 10 δυνάμει μόνον σύμμετρος οὕσα τῇ ὅλῃ· λέγω, ὅτι ἡ λοιπὴ ἡ $ΑΓ$ ἄλογός ἐστιν ἡ καλουμένη ἀποτομή.

Ἐπεὶ γὰρ ἀσύμμετρός ἐστιν ἡ AB τῇ $BΓ$ μήκει, καὶ ἐστίν ὥς ἡ AB πρὸς τὴν $BΓ$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς AB πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $AB, BΓ$, ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ 15 τὸ ἀπὸ τῆς AB τῷ ὑπὸ τῶν $AB, BΓ$. ἀλλὰ τῷ μὲν ἀπὸ τῆς AB σύμμετρά ἐστι τὰ ἀπὸ τῶν $AB, BΓ$ τετραγωνα, τῷ δὲ ὑπὸ τῶν $AB, BΓ$ σύμμετρόν ἐστι τὸ δις ὑπὸ τῶν $AB, BΓ$. καὶ ἐπειδήπερ τὰ ἀπὸ τῶν $AB, BΓ$ ἴσα ἐστὶ τῷ δις ὑπὸ τῶν $AB, BΓ$ μετὰ τοῦ 20 ἀπὸ $ΓΑ$, καὶ λοιπὸν ἄρα τῷ ἀπὸ τῆς $ΑΓ$ ἀσύμμετρά ἐστι τὰ ἀπὸ τῶν $AB, BΓ$. ῥητὰ δὲ τὰ ἀπὸ τῶν $AB,$

1. τὰ δ'] ἐπεὶ οὖν τὰ Theon (BFVb). εἰρημένα] εἰ- e corr. V. 3. τῇ] om. F. 4. ὥστε] δῆλον ὥς Theon (BFVb).

5. Seq. δευτέρῃ τάξει ἑτέρων λόγων (om. b) τῶν κατὰ ἀφαίρεσιν PBVb (videtur fuisse in F, sed sust. reparatio); ἀρχὴ τῶν κατ' ἀφαιρέσιν ἐξάδων m. 2 B. ογ'] postea add. F (ab initio haec prop. a praecedentibus dirempta non erat). 7. τῇ] om. b. ἡ λοιπὴ] λοιπῇ F. 8. ἐστὶ BV, comp. Fb. δέ] δὴ B. 9. ῥητῆς] διττῆς F. BΓ] ΓΒ F. 11. ἡ καλουμένη] καλεῖσθω δέ V. 12. ἀσύμμετρός] corr. ex ἄρα σύμμετρός m. rec. P, ex σύμμετρος m. 2 B. ἡ AB τῇ $BΓ$ ἀσύμμετρός ἐστι V. 13. τὴν] τὰς F. 14. ἀσύμμετρον] -ον e corr. V, corr. ex -ος m. rec. P. 16. σύμμετρα — τῶν]

quadratum autem rectae duobus spatiis mediis aequalis quadratae rationali adplicatum latitudinem efficit rectam ex duobus nominibus sextam [prop. LXV]. latitudines autem, quas significauimus, differunt et a prima et inter se, a prima, quia ea rationalis est, inter se autem, quia ordine non sunt eadem. ergo etiam ipsae rectae irrationales inter se differunt.

LXXIII.

Si a recta rationali rationalis aufertur potentia tantum toti commensurabilis, reliqua irrationalis est, uocetur autem apotome.

A rationali enim AB rationalis auferatur $B\Gamma$ potentia tantum toti commensurabilis. dico, reliquam $A\Gamma$ irrationalem esse apotomen, quae uocatur.

nam quoniam AB , $B\Gamma$ longitudine incommensurabiles sunt, et est $AB : B\Gamma = AB^2 : AB \times B\Gamma$ [prop. XXI lemma], etiam AB^2 , $AB \times B\Gamma$ incommensurabilia sunt [prop. XI]. uerum AB^2 et $AB^2 + B\Gamma^2$ commensurabilia sunt [prop. XV], et $AB \times B\Gamma$, $2 AB \times B\Gamma$ commensurabilia [prop. VI]. et quoniam est [II, 7]

$$AB^2 + B\Gamma^2 = 2 AB \times B\Gamma + \Gamma A^2,$$

etiam $A\Gamma^2$, $AB^2 + B\Gamma^2$ incommensurabilia sunt [prop. XIII, XVI]. uerum $AB^2 + B\Gamma^2$ rationale est. ergo

mg. m. 2 B. 17. τῶ] τό corr. ex τὰ m. 1 b. τό] τῶ b.
18. BΓ] e corr. V. καὶ ἐπειδήπερ τὰ] τὰ ἄρα Theon (BFVb). 19. ἴσα] ἀσύμμετρα Theon (BFVb). μετὰ τοῦ
ἀπὸ ΓΑ] om. Theon (BFVb). 20. καὶ] in ras. V. σύμ-
μετρα B, corr. m. 2. 21. Post BΓ add. Theon: ἐπεὶ καὶ τὰ
ἀπὸ τῶν AB, BΓ ἴσα ἐστὶ τῶ δις ὑπὸ τῶν AB, BΓ μετὰ τοῦ
ἀπὸ τοῦ add. V) ΓΑ (BFVb).

ΒΓ· ἄλογος ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΓ· καλείσθω δὲ ἀποτομή.
ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

οδ'.

Ἐὰν ἀπὸ μέσης μέση ἀφαιρεθῇ δυνάμει
5 μόνον σύμμετρος οὖσα τῇ ὅλῃ, μετὰ δὲ τῆς
ὅλης ῥητὸν περιέχουσα, ἡ λοιπὴ ἄλογός ἐστιν·
καλείσθω δὲ μέσης ἀποτομὴ πρώτη.

Ἀπὸ γὰρ τῆς ΑΒ μέση ἀφηρησθῶ ἡ ΒΓ
δυνάμει μόνον σύμμετρος οὖσα τῇ ΑΒ, μετὰ δὲ τῆς
10 ΑΒ ῥητὸν ποιούσα τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ· λέγω, ὅτι
ἡ λοιπὴ ἡ ΑΓ ἄλογός ἐστιν· καλείσθω δὲ μέσης ἀπο-
τομὴ πρώτη.

Ἐπεὶ γὰρ αἱ ΑΒ, ΒΓ μέσαι εἰσὶν, μέσα ἐστὶ καὶ
τὰ ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ· ῥητὸν δὲ τὸ δις ὑπὸ τῶν ΑΒ,
15 ΒΓ· ἀσύμμετρα ἄρα τὰ ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ τῷ δις ὑπο
τῶν ΑΒ, ΒΓ· καὶ λοιπῷ ἄρα τῷ ἀπὸ τῆς ΑΓ ἀσύμ-
μετρόν ἐστι τὸ δις ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ, ἐπεὶ καὶ τὸ
ὅλον ἐνὶ αὐτῶν ἀσύμμετρον ἦ, καὶ τὰ ἐξ ἀρχῆς μεγέθη
ἀσύμμετρα ἐσται. ῥητὸν δὲ τὸ δις ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ·
20 ἄλογον ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς ΑΓ· ἄλογος ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΓ·
καλείσθω δὲ μέσης ἀποτομὴ πρώτη.

οε'.

Ἐὰν ἀπὸ μέσης μέση ἀφαιρεθῇ δυνάμει
μόνον σύμμετρος οὖσα τῇ ὅλῃ, μετὰ δὲ τῆς

1. ἄλογον in ras. V. ἐστὶν ἄρα b. ἐστὶν ἡ ΑΓ] καὶ
τὸ ἀπὸ τῶν ΑΓ· ὥστε καὶ ἡ ΑΓ in ras. m. 2 V. 2. ὅπερ
ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. B F V b. 3. οδ'] corr. ex οε' F.
6. περιέχῃ Theon (B V b, περιέχει F). ἐστὶ P B V, comp.
F b. 7. μέση V (seq. ras. 1 litt.) et P, corr. m. rec. 10.
ποιούσα] P F V b, περιέχουσα B et mg. m. 1 F b, add. γε. Post
ὅτι add. καὶ b, m. 2 F. 11. ἐστὶ B V, comp. F. καλεῖται P.

AG irrationalis est [def. 4]; uocetur autem apotome; quod erat demonstrandum.

LXXIV.

Si a recta media aufertur media potentia tantum commensurabilis toti, cum tota autem spatium rationale comprehendens, reliqua irrationalis est; uocetur autem prima apotome mediae.

A media enim AB media auferatur $B\Gamma$ potentia tantum rectae AB commensurabilis, cum AB autem spatium rationale comprehendens $AB \times B\Gamma$ [prop. XXVII]. dico, reliquam AG irrationalem esse, uocetur autem prima apotome mediae.

nam quoniam AB , $B\Gamma$ mediae sunt, etiam AB^2 , $B\Gamma^2$ media sunt. uerum $2AB \times B\Gamma$ rationale est. itaque $AB^2 + B\Gamma^2$ et $2AB \times B\Gamma$ incommensurabilia sunt. quare etiam $2AB \times B\Gamma$ reliquo [cfr. II, 7] AG^2 incommensurabile est, quoniam, si totum alterutri incommensurabile est, etiam magnitudines ab initio sumptae incommensurabiles erunt [prop. XVI]. uerum $2AB \times B\Gamma$ rationale est. quare AG^2 irrationale est. ergo AG irrationalis est [def. 4]; uocetur autem prima apotome mediae.

LXXV.

Si a media media aufertur potentia tantum toti commensurabilis, cum tota autem spatium medium

$\mu\epsilon\sigma\eta$ seq. ras. 1 litt. V, supra scr. ς F. 13. $\sigma\iota\sigma\iota$ V, comp. Fb. $\epsilon\sigma\tau\iota$ m. 2 F. 14. Ante $\delta\epsilon$ del. $\tau\acute{o}$ P. 15. $\alpha\varrho\alpha$ $\epsilon\sigma\tau\iota$ b. $\tau\omega$ — 16. $B\Gamma$ mg. m. 1 P. 17. $\epsilon\sigma\tau\iota$ corr. ex $\alpha\varrho\alpha$ F. $\tau\omega\upsilon$ om. P. 21. $\delta\epsilon$] $\delta\eta$ P. $\mu\epsilon\sigma\eta$ Fb. 22. $\alpha\varsigma$ F, sed corr.

ὅλης μέσον περιέχουσα, ἡ λοιπὴ ἄλογός ἐστιν·
καλείσθω δὲ μέσης ἀποτομὴ δευτέρα.

Ἀπὸ γὰρ μέσης τῆς AB μέση ἀφηρήσθω ἡ GB
δυνάμει μόνον σύμμετρος οὖσα τῇ ὅλῃ τῇ AB , μετὰ
5 δὲ τῆς ὅλης τῆς AB μέσον περιέχουσα τὸ ὑπὸ τῶν
 AB, BG · λέγω, ὅτι ἡ λοιπὴ ἡ AG ἄλογός ἐστιν· κα-
λείσθω δὲ μέσης ἀποτομὴ δευτέρα.

Ἐκκείσθω γὰρ ῥητὴ ἡ AI , καὶ τοῖς μὲν ἀπὸ τῶν
 AB, BG ἴσον παρὰ τὴν AI παραβεβλήσθω τὸ $\triangle E$
10 πλάτος ποιοῦν τὴν $\triangle H$, τῷ δὲ δις ὑπὸ τῶν AB, BG
ἴσον παρὰ τὴν AI παραβεβλήσθω τὸ $\triangle \Theta$ πλάτος
ποιοῦν τὴν $\triangle Z$ · λοιπὸν ἄρα τὸ ZE ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ
τῆς AG . καὶ ἐπεὶ μέσα καὶ σύμμετρά ἐστι τὰ ἀπὸ τῶν
 AB, BG , μέσον ἄρα καὶ τὸ $\triangle E$. καὶ παρὰ ῥητὴν τὴν
15 AI παρὰκείται πλάτος ποιοῦν τὴν $\triangle H$ · ῥητὴ ἄρα ἐστὶν
ἡ $\triangle H$ καὶ ἀσύμμετρος τῇ AI μήκει. πάλιν, ἐπεὶ μέσον
ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν AB, BG , καὶ τὸ δις ἄρα ὑπὸ τῶν
 AB, BG μέσον ἐστίν. καὶ ἐστὶν ἴσον τῷ $\triangle \Theta$ · καὶ
τὸ $\triangle \Theta$ ἄρα μέσον ἐστίν. καὶ παρὰ ῥητὴν τὴν AI
20 παραβέβληται πλάτος ποιοῦν τὴν $\triangle Z$ · ῥητὴ ἄρα ἐστὶν
ἡ $\triangle Z$ καὶ ἀσύμμετρος τῇ AI μήκει. καὶ ἐπεὶ αἱ $AB,$

1. περιέχῃ Theon (BFb, περιέχει F). ἐστὶ BV, comp. Fb. 2. μέση V, P (corr. m. rec.), F (supra scr. σ m. 2). 3. μέση] supra scr. m. 1 V. ΓB] e corr. V. 5. δὲ τῆς] δὲ P. 6. ὅτι ἡ] ὅτι καὶ V. ἐστὶ PBV, comp. b. 7. μέση P (corr. m. rec.), F (corr. m. 2), e corr. V. 8. $\triangle K$ b, et FV, sed corr. 9. $\triangle I$] I in ras. B, $\triangle K$ FVb (in V corr.). $\triangle E$] E in ras. B. 10. $\triangle H$] corr. ex $H\Delta$ m. 2 F. 11. $\triangle K$ FVb, sed corr. Ante $\triangle \Theta$ del. $\triangle E$ πλάτος ποιοῦν τὴν $\triangle H$ (corr. ex $H\Delta$ m. 2), τῷ δὲ δις ὑπὸ τῶν AB, BG (supra scr. m. 2) ἴσον παρὰ τὴν $\triangle K$ (corr. ex $\triangle I$) παραβεβλήσθω F. 12. $\triangle Z$] Z in ras. F. ZE] ZΘ F. ἐστὶ] om. F. 13. καὶ σύμμετρα] om. Theon (BFVb). ἐστὶν P. 14. καὶ] (alt.) postea ins. m. 1 F. 15. $\triangle I$] $\triangle K$ FVb, sed corr. παρὰκείται] om. b. Ante $\triangle H$ del. Z F. 16. Post $\triangle H$ del. Z F. $\triangle I$]

comprehendens, reliqua irrationalis est; uocetur autem mediae apotome secunda.

A media enim AB media auferatur ΓB potentia tantum toti AB commensurabilis, cum tota autem AB medium comprehendens $AB \times B\Gamma$ [prop. XXVIII]. dico, reliquam $A\Gamma$ irrationalem esse, uocetur autem mediae apotome secunda.

ponatur enim rationalis ΔI , et quadratis $AB^2 + B\Gamma^2$ aequale rectae ΔI adplicetur ΔE latitudinem efficiens

ΔH , spatio autem $2 AB \times B\Gamma$ aequale rectae ΔI adplicetur $\Delta \Theta$ latitudinem efficiens ΔZ . itaque reliquum $ZE = A\Gamma^2$ [II, 7]. et quoniam $AB^2, B\Gamma^2$ media sunt et commensurabilia, etiam ΔE medium est.¹⁾

et rectae rationali ΔI adplicatum est latitudinem efficiens ΔH . itaque ΔH rationalis est et rectae ΔI longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. rursus quoniam $AB \times B\Gamma$ medium est, etiam $2 AB \times B\Gamma$ medium est [prop. XXIII coroll.]. et est $= \Delta \Theta$. itaque etiam $\Delta \Theta$ medium est. et rationali ΔI adplicatum est latitudinem efficiens ΔZ . -quare ΔZ rationalis est et rectae ΔI longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. et quoniam $AB, B\Gamma$ potentia tantum com-

1) Sequitur ex prop. XV et prop. XXIII coroll. ceterum idem tacite usurpatur p. 226, 13 sq.

ΔK FVb, sed corr. 17. καὶ τό — 18. $B\Gamma$] in ras. F. 18. $\epsilon\sigma\tau\iota$] $\epsilon\sigma\tau\iota$ PBV, comp. b; cum proximis sustulit rep. in F. 19. $\epsilon\sigma\tau\iota$ PBV, comp. Fb. ΔK FVb, sed corr. 20. παρὰ $\kappa\epsilon\iota\tau\alpha\iota$ F. ΔH F, corr. m. 2. 21. ΔH F. ΔI] ΔK b, et V, sed corr.; corr. ex ΔI m. 2 F.

$B\Gamma$ δυνάμει μόνον σύμμετροί εἰσιν, ἀσύμμετρος ἄρα
 ἐστὶν ἡ AB τῇ $B\Gamma$ μήκει· ἀσύμμετρον ἄρα καὶ τὸ
 ἀπὸ τῆς AB τετράγωνον τῷ ὑπὸ τῶν $AB, B\Gamma$. ἀλλὰ
 τῷ μὲν ἀπὸ τῆς AB σύμμετρά ἐστι τὰ ἀπὸ τῶν AB ,
 5 $B\Gamma$, τῷ δὲ ὑπὸ τῶν $AB, B\Gamma$ σύμμετρόν ἐστι τὸ δις
 ὑπὸ τῶν $AB, B\Gamma$ · ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ δις
 ὑπὸ τῶν $AB, B\Gamma$ τοῖς ἀπὸ τῶν $AB, B\Gamma$. ἴσον δὲ
 τοῖς μὲν ἀπὸ τῶν $AB, B\Gamma$ τὸ ΔE , τῷ δὲ δις ὑπὸ τῶν
 $AB, B\Gamma$ τὸ $\Delta\Theta$ · ἀσύμμετρον ἄρα [ἐστὶ] τὸ ΔE τῷ
 10 $\Delta\Theta$. ὥς δὲ τὸ ΔE πρὸς τὸ $\Delta\Theta$, οὕτως ἡ $H\Delta$ πρὸς
 τὴν ΔZ · ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ $H\Delta$ τῇ ΔZ . καὶ
 εἰσιν ἀμφοτέραι ρηταί· αἱ ἄρα $H\Delta, \Delta Z$ ρηταί εἰσι
 δυνάμει μόνον σύμμετροι· ἡ ZH ἄρα ἀποτομή ἐστίν.
 ρητὴ δὲ ἡ ΔI · τὸ δὲ ὑπὸ ρητῆς καὶ ἀλόγου περι-
 15 εχόμενον ἄλογόν ἐστίν, καὶ ἡ δυναμένη αὐτὸ ἄλογός
 ἐστίν. καὶ δύναται τὸ ZE ἢ AG · ἡ AG ἄρα ἄλογός
 ἐστίν· καλεῖσθω δὲ μέσης ἀποτομῇ δευτέρᾳ. ὅπερ
 εἶδει δεῖξαι.

ος'.

- 20 Ἐὰν ἀπὸ εὐθείας εὐθεῖα ἀφαιρεθῇ δυνάμει
 ἀσύμμετρος οὕσα τῇ ὅλῃ, μετὰ δὲ τῆς ὅλης
 ποιοῦσα τὰ μὲν ἀπ' αὐτῶν ἅμα ρητόν, τὸ δ' ὑπ'
 αὐτῶν μέσον, ἡ λοιπὴ ἄλογός ἐστίν· καλεῖσθω
 δὲ ἐλάσσων.
 25 Ἀπὸ γὰρ εὐθείας τῆς AB εὐθεῖα ἀφηρήσθω ἡ $B\Gamma$

1. $B\Gamma$] ΓB F. ἀσύμμετρος] σύμμετρος b. 2. καὶ
 τῇ P. 3. τῆς AB] om. b. 4. ἐστίν P. 5. τῷ] corr. ex
 το m. 1 F. 6. ἀσύμμετρα ἄρα ἐστὶ (om. V) τὰ ἀπὸ τῶν $AB, B\Gamma$
 τῷ δις ὑπὸ τῶν $AB, B\Gamma$ Theon (BFVb). 7. ὑπὸ] ὑ- in ras. m.
 1 P. ἴσον — 8. $B\Gamma$] mg. m. 2 B. 8. τό] τῷ F. 9. ἐστὶ]
 om. BFVb. 11. $H\Delta$] ΔH P. ΔZ] corr. ex $Z\Delta$ V. 12.
 εἰσι] εἰσιν B. 13. ἐστὶ BV, comp. Fb. 14. ΔI] ΔK FVb,

mensurabiles sunt, AB , $B\Gamma$ longitudine incommensurabiles sunt. itaque etiam AB^2 , $AB \times B\Gamma$ incommensurabilia sunt [prop. XXI lemma, prop. XI]. uerum AB^2 , $AB^2 + B\Gamma^2$ commensurabilia sunt [prop. XV] et $AB \times B\Gamma$, $2 AB \times B\Gamma$ commensurabilia [prop. VI]. itaque $2 AB \times B\Gamma$ et $AB^2 + B\Gamma^2$ incommensurabilia sunt [prop. XIII]. est autem $\Delta E = AB^2 + B\Gamma^2$, $\Delta\Theta = 2 AB \times B\Gamma$. itaque ΔE , $\Delta\Theta$ incommensurabilia sunt. uerum $\Delta E : \Delta\Theta = H\Delta : \Delta Z$ [VI, 1]. itaque $H\Delta$, ΔZ incommensurabiles sunt [prop. XI]. et utraque rationalis est. itaque $H\Delta$, ΔZ rationales sunt potentia tantum commensurabiles. quare ZH apotome est [prop. LXXIII]. uerum ΔI rationalis est. spatium autem recta rationali et irrationali comprehensum irrationale est [prop. XX], et recta ei aequalis quadrata irrationalis est. et $\Delta\Gamma^2 = ZE$. ergo $\Delta\Gamma$ irrationalis est [def. 4]; uocetur autem mediae apotome secunda; quod erat demonstrandum.

LXXVI.

Si a recta aufertur recta potentia incommensurabilis toti et cum tota efficiens summam quadratorum rationalem, rectangulum autem medium, reliqua irrationalis est; uocetur autem minor.

A recta enim AB recta auferatur $B\Gamma$ potentia toti incom-

sed corr. 15. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ PV, comp. Fb. $\acute{\alpha}\rho\alpha$ $\alpha\upsilon\tau\acute{o}$ Theon (BFVb).

16. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\nu$] $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ PBV, comp. Fb. η $\Delta\Gamma$] (alt.) m. 2 F.

17. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ PBV, comp. Fb. $\delta\acute{\epsilon}$] $\delta\acute{\epsilon}$ $\acute{\epsilon}\kappa$ F. $\mu\acute{\epsilon}\sigma\eta$ P, et V, corr. m. 2. $\acute{\omicron}\pi\epsilon\rho$ $\acute{\epsilon}\delta\epsilon\iota$ $\delta\epsilon\iota\chi\alpha\iota$] comp. P, om. BFVb. 22. $\delta\acute{\epsilon}$ F. 23. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ BV, comp. Fb.

δυνάμει ἀσύμμετρος οὕσα τῇ ὅλῃ ποιοῦσα τὰ προκείμενα. λέγω, ὅτι ἡ λοιπὴ ἢ $ΑΓ$ ἄλογός ἐστιν ἡ καλουμένη ἐλάσσων.

Ἐπεὶ γὰρ τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΒ$,
 5 $ΒΓ$ τετραγώνων ῥητόν ἐστιν, τὸ δὲ δις ὑπὸ τῶν $ΑΒ$,
 $ΒΓ$ μέσον, ἀσύμμετρα ἄρα ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$
 τῷ δις ὑπὸ τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$ καὶ ἀναστρέψαντι λοιπῷ
 τῷ ἀπὸ τῆς $ΑΓ$ ἀσύμμετρά ἐστι τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$.
 ῥητὰ δὲ τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$ ἄλογον ἄρα τὸ ἀπὸ
 10 τῆς $ΑΓ$ ἄλογος ἄρα ἡ $ΑΓ$ καλείσθω δὲ ἐλάσσων.
 ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

οξ'.

Ἐὰν ἀπὸ εὐθείας εὐθεία ἀφαιρεθῇ δυνάμει
 ἀσύμμετρος οὕσα τῇ ὅλῃ, μετὰ δὲ τῆς ὅλης
 15 ποιοῦσα τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν
 τετραγώνων μέσον, τὸ δὲ δις ὑπ' αὐτῶν ῥητόν,
 ἡ λοιπὴ ἄλογός ἐστιν· καλείσθω δὲ ἡ μετὰ ῥητοῦ
 μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα.

Ἀπὸ γὰρ εὐθείας τῆς $ΑΒ$ εὐθεῖα ἀφηρήσθω ἡ $ΒΓ$
 20 δυνάμει ἀσύμμετρος οὕσα τῇ $ΑΒ$ ποιοῦσα τὰ προκείμενα· λέγω, ὅτι ἡ λοιπὴ ἢ $ΑΓ$ ἄλογός ἐστιν ἡ προειρημένη.

Ἐπεὶ γὰρ τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν
 $ΑΒ$, $ΒΓ$ τετραγώνων μέσον ἐστίν, τὸ δὲ δις ὑπὸ τῶν

1. οὕσα ἀσύμμετρος V. τὰ προκείμενα] μετὰ τῆς ὅλης
 τῆς $ΑΒ$ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$ ἅμα ῥητόν,
 τὸ δὲ δις ὑπὸ τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$ ἅμα μέσον Theon (BFVb). 4.
 μέν] m. 2 V. $ΑΒ$] B in ras. m. 2 P. 5. $ΒΓ$] ΓB P.
 τετραγώνων] □ eras. V. ἐστὶ PBV, comp. Fb. δὲ δις]
 δ' V. 6. τῶν] m. rec. P. $ΑΒ$] in ras. m. 1 P. 8.
 ἀσύμμετρά ἐστι τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$ (m. 2 F) τῷ ἀπὸ τῆς $ΑΓ$
 (haec 4 uerba om. F) Theon (BFVb). 9. Mg. γρ. ῥητόν δὲ

mensurabilis et proposita efficiens [prop. XXXIII]. dico, reliquam AG irrationalem esse minorem, quae uocatur.

nam quoniam $AB^2 + BG^2$ rationale est, et $2AB \times BG$ medium, incommensurabilia sunt $AB^2 + BG^2$ et $2AB \times BG$. et e contrario reliquo [II, 7] AG^2 incommensurabile est $AB^2 + BG^2$ [prop. XVI]. uerum $AB^2 + BG^2$ rationale est. itaque AG^2 irrationale est. ergo AG irrationalis est [def. 4]; uocetur autem minor; quod erat demonstrandum.

LXXVII.

Si a recta aufertur recta potentia incommensurabilis toti, cum tota autem efficiens summam quadratorum mediam, duplum autem rectangulum rationale, reliqua irrationalis est; uocetur autem recta cum rationali totum medium efficiens.

A recta enim AB auferatur recta BG potentia rectae AB incommensurabilis proposita efficiens [prop. XXXIV]. dico, reliquam AG irrationalem esse, quam significauimus.

nam quoniam $AB^2 + BG^2$ medium est, $2AB \times BG$

τὸ συγκείμενον Fb. ἄρα] ἐστὶ P. 10. ἄλογος — AG] om. P.

11. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. BFVb. 12. οἷ F. 17. ἐστὶ PBV, comp. Fb. δὲ ἡ] δὲ BFVb. Supra μετὰ scr. ἀπό comp. m. 1 b. 19. AB] corr. ex AG m. 2 F. 20. ἀσύμμετρος οὕσα δύναμει V. τῇ ὅλη τῇ Theon (BFVb). τὰ προκείμενα] τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AB , BG τετραγώνων μέσον, τὸ δὲ δις ὑπὸ τῶν AB , BG ῥητόν Theon (BFVb). 21. ἐστὶ BV, comp. F. ἡ προειρημένη] καλεῖσθω (καλεῖται B) δὲ ἡ (om. Vb) μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα Theon (BFVb). 24. ἐστὶ PBV, comp. Fb.

AB , $B\Gamma$ ῥητόν, ἀσύμμετρα ἄρα ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν AB , $B\Gamma$ τῷ δις ὑπὸ τῶν AB , $B\Gamma$ καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς AG ἀσύμμετρον ἐστὶ τῷ δις ὑπὸ τῶν AB , $B\Gamma$. καὶ ἐστὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν AB , $B\Gamma$ ῥητόν· τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς AG ἄλογόν ἐστιν· ἄλογος ἄρα ἐστὶν ἡ AG . κα-
 5 λείσθω δὲ ἡ μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα.
 ὅπερ εἶδει δεῖξαι.

οἷ.

Ἐὰν ἀπὸ εὐθείας εὐθεῖα ἀφαιρεθῇ δυνάμει
 10 ἀσύμμετρος οὖσα τῇ ὅλῃ, μετὰ δὲ τῆς ὅλης
 ποιοῦσα τό τε συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν
 τετραγώνων μέσον τό τε δις ὑπ' αὐτῶν μέσον
 καὶ ἔτι τὰ ἀπ' αὐτῶν τετράγωνα ἀσίμμετρα
 τῷ δις ὑπ' αὐτῶν, ἡ λοιπὴ ἄλογός ἐστιν· κα-
 15 λείσθω δὲ ἡ μετὰ μέσου μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα.

Ἀπὸ γὰρ εὐθείας τῆς AB εὐθεῖα ἀφηρησθῶ ἡ
 $B\Gamma$ δυνάμει ἀσύμμετρος οὖσα τῇ AB ποιοῦσα τὰ προ-
 κείμενα· λέγω, ὅτι ἡ λοιπὴ ἡ AG ἄλογός ἐστιν ἡ κα-
 λουμένη ἡ μετὰ μέσου μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα.

Ἐκκείσθω γὰρ ῥητὴ ἡ AI , καὶ τοῖς μὲν ἀπὸ τῶν
 20 AB , $B\Gamma$ ἴσον παρὰ τὴν AI παραβεβλήσθω τὸ AE
 πλάτος ποιοῦν τὴν AH , τῷ δὲ δις ὑπὸ τῶν AB , $B\Gamma$
 ἴσον ἀφηρησθῶ τὸ $A\Theta$ [πλάτος ποιοῦν τὴν AZ].
 λοιπὸν ἄρα τὸ ZE ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς AG ὥστε

2. $B\Gamma$ τετράγωνα Bfb. $B\Gamma$] B m. 2 V. καί] om. P.

3. σύμμετρον F. 4. καὶ — δις] ῥητόν δὲ τό V. ῥητόν]

om. V. 6. δὲ ἡ] δέ b. 7. ὅπερ εἶδει δεῖξαι] om. BfVb,

comp. P. 8. οὐ F. 10. δέ] om. P. 11. τε] in ras. V,

μὲν Bfb. ἀπ'] ἀπὸ τῶν V. 12. τε] in ras. V, δέ Bfb.

13. καὶ ἔτι] ἔτι τε Theon (BfVb). 14. ἡ] λέγω ὅτι ἡ V.

ἐστὶ BV, comp. Fb. 15. ἡ] om. FVb. 17. τὰ προκεί-

μενα] τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AB , $B\Gamma$ τετραγώνων

μέσον, τὸ δὲ δις ὑπὸ τῶν AB , $B\Gamma$ μέσον ἔτι τε (om. V, m. 2 F)


$\overline{A}$ autem rationale, $AB^2 + B\Gamma^2$ et $2AB \times B\Gamma$ incommensurabilia sunt. itaque etiam reliquum [II, 7] $A\Gamma^2$ et $2AB \times B\Gamma$ incommensurabilia sunt [prop. XVI]. et $2AB \times B\Gamma$ rationale est. itaque $A\Gamma^2$
 $\overline{\Gamma}$ irrationale est. ergo $A\Gamma$ irrationalis est [def. 4];
 $\overline{B}$ nocetur autem recta cum rationali totum medium efficiens; quod erat demonstrandum.

LXXVIII.

Si a recta aufertur recta potentia incommensurabilis toti, cum tota autem efficiens et summam quadratorum mediam et duplum rectangulum medium praetereaque summam quadratorum duplo rectangulo incommensurabilem, reliqua irrationalis est; uocetur autem recta cum medio totum medium efficiens.

A recta enim AB recta auferatur $B\Gamma$ potentia rectae AB incommensurabilis proposita efficiens [prop. XXXV]. dico, reliquam $A\Gamma$ irrationalem esse, quae uocetur recta cum medio totum medium efficiens.

ponatur enim rationalis ΔI , et quadratis $AB^2 + B\Gamma^2$ aequale rectae ΔI adplicetur ΔE latitudinem efficiens



ΔH , spatio autem $2AB \times B\Gamma$ aequale auferatur $\Delta\Theta$. itaque reliquum $ZE = A\Gamma^2$ [II, 7]. quare $A\Gamma$ spatio ZE quadrata aequalis est. et quoniam AB^2

τὰ ἀπὸ τῶν $AB, B\Gamma$ ἀσύμμετρα τῷ δις ὑπὸ τῶν $AB, B\Gamma$ Theon (BFVb). 18. ἐστὶ BV, comp. F. ἡ καλουμένη] καλείσθω δὲ Theon (BFVb). 19. μέσον] supra scr. F. 20. ΔI] ΔK in ras. V, item lin. 21. 21. ἴσον] ἴσον τὸ ΔE V. τήν] corr. ex φητὴν m. 1 P, φητὴν τήν V, m. 2 B. τὸ ΔE] om. V. 23. πλάτος — ΔZ] om. P.

ἡ $ΑΓ$ δύναται τὸ $ΖΕ$. καὶ ἐπεὶ το συγκείμενον ἐκ
 τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$ τετραγώνων μέσον ἐστὶ καὶ
 ἐστὶν ἴσον τῷ $ΔΕ$, μέσον ἄρα [ἐστὶ] τὸ $ΔΕ$. καὶ
 παρὰ ῥητὴν τὴν $ΔΙ$ παράκειται πλάτος ποιοῦν τὴν $ΔΗ$.
 5 ῥητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ $ΔΗ$ καὶ ἀσύμμετρος τῇ $ΔΙ$ μήκει.
 πάλιν, ἐπεὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$ μέσον ἐστὶ καὶ
 ἐστὶν ἴσον τῷ $ΔΘ$, τὸ ἄρα $ΔΘ$ μέσον ἐστίν. καὶ παρὰ
 ῥητὴν τὴν $ΔΙ$ παράκειται πλάτος ποιοῦν τὴν $ΔΖ$.
 ῥητὴ ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ $ΔΖ$ καὶ ἀσύμμετρος τῇ $ΔΙ$ μήκει.
 10 καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρά ἐστι τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$ τῷ δις
 ὑπὸ τῶν $ΑΒ$, $ΒΓ$, ἀσύμμετρον ἄρα καὶ τὸ $ΔΕ$ τῷ
 $ΔΘ$. ὥς δὲ τὸ $ΔΕ$ πρὸς τὸ $ΔΘ$, οὕτως ἐστὶ καὶ ἡ
 $ΔΗ$ πρὸς τὴν $ΔΖ$. ἀσύμμετρος ἄρα ἡ $ΔΗ$ τῇ $ΔΖ$.
 καὶ εἰσὶν ἀμφοτέραι ῥηταί· αἱ $ΗΔ$, $ΔΖ$ ἄρα ῥηταί
 15 εἰς δύναμει μόνον σύμμετροι. ἀποτομὴ ἄρα ἐστὶν ἡ
 $ΖΗ$. ῥητὴ δὲ ἡ $ΖΘ$. τὸ δὲ ὑπὸ ῥητῆς καὶ ἀποτομῆς
 περιεχόμενον [ὀρθογώνιον] ἄλογόν ἐστίν, καὶ ἡ δυνα-
 μένη αὐτὸ ἄλογός ἐστιν. καὶ δύναται τὸ $ΖΕ$ ἡ $ΑΓ$.
 ἡ $ΑΓ$ ἄρα ἄλογός ἐστιν· καλεῖσθω δὲ ἡ μετὰ μέσου
 20 μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα. ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

οθ'.

Τῇ ἀποτομῇ μία [μόνον] προσαρμόζει εὐθεῖα
 ῥητὴ δύναμει μόνον σύμμετρος οὖσα τῇ ὅλῃ.

1. $ΑΓ$] $ΑΓ$ μεῖζον b. καί] m. 2 F. 3. ἐστὶ] om. P.
 4. $ΔΙ$] $ΔΚ$ in ras. V, item lin. 5, 8, 9; $ΔΗ$ P. 5. σύμμετρος
 B, corr. m. 2. 7. τῷ] corr. ex τό m. 1 F. ἐστίν] ἐστί PBV,
 comp. Fb. 9. ἐστίν PB. καί] (prius) om. B. 10. ἀσύμμετρος F.
 ἐστίν P. 11. τό] corr. ex τῷ m. 2 F. τῷ] corr. ex τό m.
 2 F. 12. $ΔΘ$] (alt.) Θ, add. Z m. 2, F. ἐστίν PB. καί]
 om. P. 13. τήν] om. P. $ΔΗ$] $Δ$ in ras. V, $ΗΔ$ Fb. 14.
 ἄρα] m. 2 F. 15. εἰσιν P. 16. $ΖΘ$] $ΔΚ$ in ras. V. δέ] δ' P.

+ $B\Gamma^2$ medium est et = ΔE , ΔE medium est. et rationali ΔI adplicatum est latitudinem efficiens ΔH . itaque ΔH rationalis est et rectae ΔI longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. rursus quoniam $2AB \times B\Gamma$ medium est et = $\Delta\Theta$, $\Delta\Theta$ medium est. et rationali ΔI adplicatum est latitudinem efficiens ΔZ . itaque ΔZ rationalis est et rectae ΔI longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. et quoniam $AB^2 + B\Gamma^2$ et $2AB \times B\Gamma$ incommensurabilia sunt, etiam ΔE , $\Delta\Theta$ incommensurabilia sunt. uerum $\Delta E : \Delta\Theta = \Delta H : \Delta Z$ [VI, 1]. itaque ΔH , ΔZ incommensurabiles sunt [prop. XI]. et utraque rationalis est. itaque $H\Delta$, ΔZ rationales sunt potentia tantum commensurabiles. quare ZH apotome est [prop. LXXIII]. $Z\Theta$ autem rationalis est. spatium autem recta rationali et apotome comprehensum irrationale est [prop. XX], et recta ei potentia aequalis irrationalis est. est autem $A\Gamma^2 = ZE$. ergo $A\Gamma$ irrationalis est; uocetur autem recta cum medio totum medium efficiens. quod erat demonstrandum.

LXXIX.

Apotomae una tantum congruit recta rationalis potentia tantum toti commensurabilis.

17. $\delta\epsilon\theta\theta\omicron\gamma\acute{\alpha}\nu\iota\omicron\nu$] om. P. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ PBV, comp. Fb. 18. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ PBV, comp. Fb. 19. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ BV, comp. Fb. η] om. P.
 20. $\delta\pi\epsilon\rho$ $\acute{\epsilon}\delta\epsilon\iota$ $\delta\epsilon\acute{\iota}\xi\alpha\iota$] comp. P, om. BFVb. 21. $\sigma\theta'$] corr. ex π' m. 2 F. 22. $\mu\acute{o}\nu\omicron\nu$] om. P, $\mu\acute{o}\nu\eta$ V et F supra scr. $\omicron\nu$ m. 1.

Ἐστω ἀποτομή ἡ AB , προσαρμόζουσα δὲ αὐτῇ ἡ $BΓ$. αὖ $ΑΓ$, $ΓΒ$ ἄρα φηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· λέγω, ὅτι τῇ AB ἑτέρα οὐ προσαρμόζει φητὴ δυνάμει μόνον σύμμετρος οὕσα τῇ ὅλῃ.

- 5 $Εἰ$ γὰρ δυνατόν, προσαρμόξέτω ἡ $ΒΔ$ · καὶ αὖ $ΑΔ$, $ΔΒ$ ἄρα φηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι. καὶ ἐπεὶ, ὥς ὑπερέχει τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ τοῦ δις ὑπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$, τούτῳ ὑπερέχει καὶ τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ τοῦ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ · τῷ γὰρ αὐτῷ τῷ
10 ἀπὸ τῆς AB ἀμφοτέρω ὑπερέχει· ἐναλλάξ ἄρα, ὥς ὑπερέχει τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$, τούτῳ ὑπερέχει [καὶ] τὸ δις ὑπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ τοῦ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$. τὰ δὲ ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ ὑπερέχει φητῶ· φητὰ γὰρ ἀμφοτέρω.
15 καὶ τὸ δις ἄρα ὑπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ τοῦ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ ὑπερέχει φητῶ· ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον· μέσα γὰρ ἀμφοτέρω, μέσον δὲ μέσον οὐχ ὑπερέχει φητῶ.
τῇ ἄρα AB ἑτέρα οὐ προσαρμόζει φητὴ δυνάμει μόνον σύμμετρος οὕσα τῇ ὅλῃ.
- 20 $Μία$ ἄρα μόνῃ τῇ ἀποτομῇ προσαρμόζει φητὴ δυνάμει μόνον σύμμετρος οὕσα τῇ ὅλῃ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

π'.

Τῇ μέσης ἀποτομῇ πρώτη μία μόνον προσαρμόζει ἐνθεῖα μέση δυνάμει μόνον σύμμετρος

3. φητῇ] m. 2 F. 5. προσαρμόξεσθω b. καί] om. B.
6. $ΔΒ$] $ΒΔ$ F. 9. τῷ ἀπὸ τῆς] τό F. 10. AB — ὑπερέχει] ἀπ' ἀμφοτέρων ὑπεροχῆς τῷ ἀπὸ τῆς AB BFb; in B del. m. 2, mg. τῷ γὰρ αὐτῷ — ὑπερέχει m. 2. ὥς] ὡς b. 11. $ΑΔ$, $ΔΒ$] $ΑΓ$, $ΓΒ$ F, corr. m. 2. ἀπό — 12. ὑπερέχει] in ras. F. 12. καί] om. P. $ΔΒ$] m. 2 F. 14. φητῇ] corr. ex φητῇ V et m. rec. B. Post γὰρ add. εἰσιν FVb, ἐστὶν B. 15. τό] corr. ex τῷ m. 1 F. ἄρα] om. V. 17. Post γὰρ add. εἰσιν Vb,

Sit AB apotome, ei autem congruens BI .
 itaque AI , IB rationales sunt potentia tantum
 commensurabiles [prop. LXXIII]. dico, nullam
 aliam rationalem potentia tantum toti commensurabilem rectae AB congruere.

nam si fieri potest, congruat BA . itaque etiam
 AA , AB rationales sunt potentia tantum commensurabiles [prop. LXXIII]. et quoniam
 $(AA^2 + AB^2) \div 2AA \times AB = (AI^2 + IB^2) \div 2AI \times IB$
 (nam utrumque excedit eodem spatio AB^2 [II, 7]), permutando erit

$(AA^2 + AB^2) \div (AI^2 + IB^2) = 2AA \times AB \div 2AI \times IB$.
 uerum $AA^2 + AB^2$ excedit $AI^2 + IB^2$ spatio rationali;
 nam utraque rationalia sunt. itaque etiam $2AA \times AB$
 excedit $2AI \times IB$ spatio rationali; quod fieri non
 potest; nam utrumque medium est [prop. XXI], medium
 autem non excedit medium spatio rationali [prop. XXVI].
 itaque rectae AB nulla alia rationalis potentia tantum
 toti commensurabilis congruit.

Ergo una tantum recta rationalis potentia tantum
 toti commensurabilis apotomae congruit; quod erat
 demonstrandum.

LXXX.

Mediae apotomae primae una tantum congruit recta
 media potentia tantum toti commensurabilis, cum tota
 autem spatium rationale comprehendens.

ἔστιν BF. 18. τῇ] corr. ex τὰ m. 2 F. ὁπῇ V. 20.
 μία — 21. ὅλῃ] bis F, sed corr. 20. μόνον BFb. προσ-
 αρμόσει BFVb. 21. ὅπερ ἐδει δεῖξαι] comp. P, om. BFVb.
 22. πα' F, et sic deinceps. 23. μέσης] corr. ex μέση m.
 rec. P, μέση BFV, μέση b. μία] om. b.

οὕσα τῇ ὅλῃ, μετὰ δὲ τῆς ὅλης ῥητὸν περιέχουσα.

Ἔστω γὰρ μέσης ἀποτομῇ πρώτη ἡ AB , καὶ τῇ AB προσαρμοζέτω ἡ $BΓ$. αἱ $ΑΓ$, $ΓΒ$ ἄρα μέσαι εἰσὶ
 5 δυνάμει μόνον σύμμετροι ῥητὸν περιέχουσai τὸ ὑπὸ
 τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$. λέγω, ὅτι τῇ AB ἑτέρα οὐ προσαρμόζει
 μέση δυνάμει μόνον σύμμετρος οὕσα τῇ ὅλῃ, μετὰ δὲ
 τῆς ὅλης ῥητὸν περιέχουσα.

Εἰ γὰρ δυνατόν, προσαρμοζέτω καὶ ἡ $ΔΒ$. αἱ ἄρα
 10 $ΑΔ$, $ΔΒ$ μέσαι εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι ῥητὸν
 περιέχουσai τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$. καὶ ἐπεὶ, ὃ ὑπερέχει
 τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ τοῦ δις ὑπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$,
 τούτῳ ὑπερέχει καὶ τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ τοῦ δις ὑπὸ
 τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$. τῷ γὰρ αὐτῷ [πάλιν] ὑπερέχουσι τῷ
 15 ἀπὸ τῆς AB . ἐναλλάξ ἄρα, ὃ ὑπερέχει τὰ ἀπὸ τῶν
 $ΑΔ$, $ΔΒ$ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$, τούτῳ ὑπερέχει καὶ
 τὸ δις ὑπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ τοῦ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$.
 τὸ δὲ δις ὑπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ τοῦ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$,
 $ΓΒ$ ὑπερέχει ῥητῷ· ῥητὰ γὰρ ἀμφοτέρω. καὶ τὰ ἀπὸ
 20 τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ ἄρα τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ [τετραγώνων]
 ὑπερέχει ῥητῷ· ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον· μέσα γὰρ ἐστὶν
 ἀμφοτέρω, μέσον δὲ μέσον οὐχ ὑπερέχει ῥητῷ.

Τῇ ἄρα μέσης ἀποτομῇ πρώτῃ μίᾳ μόνον προσαρμόζει
 εὐθεΐα μέση δυνάμει μόνον σύμμετρος οὕσα
 25 τῇ ὅλῃ, μετὰ δὲ τῆς ὅλης ῥητὸν περιέχουσα· ὅπερ ἔδει
 δεῖξαι.

3. μέση BVB, om. F. 4. προσαρμόζει F, corr. m. 2. αἱ] corr. ex εἰ m. 1 F. ἄρα $ΑΓ$, $ΓΒ$ BFVB. εἰσὶν B. 5. σύμμετρος V, corr. m. 1. 6. προσαρμόσει V. 8. περιέχουσai V, corr. m. 1. 10. $ΑΔ$] m. 2 F. εἰσιν LB. 12. τὰ] corr. ex τό m. 2 F. τοῦ] τῷ F. $ΑΓ$, $ΓΒ$ F. 13. ὑπερέχει b, corr. m. 1. 14. τῷ] corr. ex τό V. πάλιν] om. P. ὑπερ-

$\begin{array}{l} A \\ | \\ B \\ | \\ \Gamma \\ | \\ \Delta \end{array}$
 Sit enim AB mediae apotome prima, et rectae AB congruat $B\Gamma$. itaque $A\Gamma$, ΓB mediae sunt potentia tantum commensurabiles spatium rationale comprehendentes $A\Gamma \times \Gamma B$ [prop. LXXIV]. dico, rectae AB nullam aliam mediam potentia tantum Γ toti commensurabilem congruere cum tota spatium Δ rationale comprehendentem.

nam si fieri potest, etiam ΔB congruat. $\Delta\Delta$, ΔB igitur mediae sunt potentia tantum commensurabiles spatium rationale comprehendentes $\Delta\Delta \times \Delta B$ [prop. LXXIV]. et quoniam est
 $(\Delta\Delta^2 + \Delta B^2) \div 2 \Delta\Delta \times \Delta B = (A\Gamma^2 + \Gamma B^2) \div 2 A\Gamma \times \Gamma B$
 (nam eodem spatio ΔB^2 excedunt [II, 7]), permutando erit

$(\Delta\Delta^2 + \Delta B^2) \div (A\Gamma^2 + \Gamma B^2) = 2 \Delta\Delta \times \Delta B \div 2 A\Gamma \times \Gamma B$.
 uerum $2 \Delta\Delta \times \Delta B$ excedit $2 A\Gamma \times \Gamma B$ spatio rationali; nam utrumque rationale est. itaque etiam $\Delta\Delta^2 + \Delta B^2$ excedit $A\Gamma^2 + \Gamma B^2$ spatio rationali; quod fieri non potest; nam utraque media sunt [prop. XXIV], medium autem non excedit medium spatio rationali [prop. XXVI].

Ergo mediae apotomae primae una tantum recta media congruit potentia tantum toti commensurabilis, cum tota autem spatium rationale comprehendens; quod erat demonstrandum.

έχουσιν LBF. τῶ] τὰ b. 15. τὰ] καὶ τὰ LB. 17. τό]
 τὰ P. 18. τὸ δέ — 19. ΓB] καὶ V. 20. τετραγώνων] om. P.
 21. ὑπερέξει P, ξ supra scr. B. 22. δέ] γὰρ L. 23. μέση
 uel μέση LBFVb. 25. ὁπερ εἰδει δεῖξαι] comp. P, om.
 LBFVb.

πα'.

Τῇ μέσῃς ἀποτομῇ δευτέρᾳ μίᾳ μόνον προσ-
αρμοζέει εὐθεῖα μέση δυνάμει μόνον σύμμετρος
τῇ ὅλῃ, μετὰ δὲ τῆς ὅλης μέσον περιέχουσα.


- 5 Ἔστω μέσῃς ἀποτομῇ δευτέρᾳ ἡ AB καὶ τῇ AB
προσαρμόζουσα ἡ $BΓ$. αἱ ἄρα $ΑΓ$, $ΓΒ$ μέσαι εἰσὶ
δυνάμει μόνον σύμμετροι μέσον περιέχουσαι τὸ ὑπὸ
τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$. λέγω, ὅτι τῇ AB ἑτέρα οὐ προσαρμόσει
εὐθεῖα μέση δυνάμει μόνον σύμμετρος οὕσα τῇ ὅλῃ,
10 μετὰ δὲ τῆς ὅλης μέσον περιέχουσα.

- Εἰ γὰρ δυνατόν, προσαρμοζέτω ἡ $ΒΔ$ καὶ αἱ $ΑΔ$,
 $ΔΒ$ ἄρα μέσαι εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι μέσον
περιέχουσαι τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$. καὶ ἐκκείσθω ῥητὴ
ἡ EZ , καὶ τοῖς μὲν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ ἴσον παρὰ τὴν
15 EZ παραβελήσθω τὸ $ΕΗ$ πλάτος ποιοῦν τὴν $ΕΜ$.
τῷ δὲ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ ἴσον ἀφηρησθῶ τὸ $ΘΗ$
πλάτος ποιοῦν τὴν $ΘΜ$. λοιπὸν ἄρα τὸ $ΕΑ$ ἴσον ἐστὶ
τῷ ἀπὸ τῆς AB . ὥστε ἡ AB δύναται τὸ $ΕΑ$. πάλιν
δὴ τοῖς ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ ἴσον παρὰ τὴν EZ παρα-
20 βελήσθω τὸ $ΕΙ$ πλάτος ποιοῦν τὴν $ΕΝ$. ἔστι δὲ καὶ
τὸ $ΕΑ$ ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς AB τετραγώνῳ. λοιπὸν ἄρα
τὸ $ΘΙ$ ἴσον ἐστὶ τῷ δις ὑπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$. καὶ ἐπεὶ
μέσαι εἰσὶν αἱ $ΑΓ$, $ΓΒ$, μέσα ἄρα ἐστὶ καὶ τὰ ἀπὸ τῶν
 $ΑΓ$, $ΓΒ$. καὶ ἐστὶν ἴσα τῷ $ΕΗ$ μέσον ἄρα καὶ τὸ
25 $ΕΗ$. καὶ παρὰ ῥητὴν τὴν EZ παράκειται πλάτος ποιοῦν

2. μέση uel μέση LBFVb. μόνη V. 5. μέση uel
μέση LBFb, e corr. V. δευτέρᾳ] om. b. AB] B in ras.
m. 1 P. καὶ τῇ AB] om. V. 6. ἡ] δὲ ἡ V. αἱ] supra
scr. m. rec. b. εἰσὶν LBP. 7. τῷ] τὰ L? 8. τῶν] om. b.
προσαρμόζει Lbb. 11. $ΔΒ$ F. καί] om. B. 12. εἰσὶν
LB. 16. AB , $BΓ$ b. 20. EI] supra scr. Z F. ἐστὶν L.
21. καὶ λοιπὸν V. 22. ἴσον — 24. τῷ $ΕΗ$] mg. m. 1 F.

LXXXI.

Mediae apotomae secundae una tantum recta media congruit potentia tantum toti commensurabilis, cum tota autem spatium medium comprehendens.



Sit AB mediae apotome secunda et rectae AB congruens $B\Gamma$. itaque $A\Gamma$, ΓB mediae sunt potentia tantum commensurabiles medium comprehendentes $A\Gamma \times \Gamma B$ [prop. LXXV]. dico, rectae AB nullam aliam rectam mediam congruere potentia tantum toti commensurabilem, cum tota autem medium comprehendentem.

nam si fieri potest, congruat $B\Delta$. itaque etiam $A\Delta$, ΔB mediae sunt potentia tantum commensurabiles medium comprehendentes $A\Delta \times \Delta B$ [prop. LXXV]. et ponatur rationalis EZ , et quadratis $A\Gamma^2 + \Gamma B^2$ aequale rectae EZ adplicetur EH latitudinem efficiens EM ; spatio autem $2 A\Gamma \times \Gamma B$ aequale auferatur ΘH latitudinem efficiens ΘM . itaque reliquum $E\Lambda = AB^2$ [II, 7]. itaque AB spatio $E\Lambda$ aequalis est quadrata. iam rursus quadratis $A\Delta^2 + \Delta B^2$ aequale rectae EZ adplicetur EI latitudinem efficiens EN . est autem $E\Lambda = AB^2$. itaque reliquum $\Theta I = 2 A\Delta \times \Delta B$ [II, 7]. et quoniam $A\Gamma$, ΓB mediae sunt, etiam $A\Gamma^2 + \Gamma B^2$ media sunt. et $A\Gamma^2 + \Gamma B^2 = EH$. quare etiam EH medium est. et rectae rationali EZ adplicatum est latitudinem efficiens EM . itaque EM rationalis est

22. ἐστὶν L. Post ἐπεὶ del. m. 1: ἴσον ἐστὶ τῷ δὲ P. 23. ἐστὶν L, εἰσὶ Fb. 24. EH] seq. ἴσον ἐστὶ τῷ EH F.

τὴν $ΕΜ$ · ῥητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ $ΕΜ$ καὶ ἀσύμμετρος τῇ $ΕΖ$ μήκει. πάλιν, ἐπεὶ μέσον ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$, καὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ μέσον ἐστίν. καὶ ἐστὶν ἴσον τῷ $ΘΗ$ · καὶ τὸ $ΘΗ$ ἄρα μέσον ἐστίν. καὶ
 5 παρὰ ῥητὴν τὴν $ΕΖ$ παράκειται πλάτος ποιοῦν τὴν $ΘΜ$ · ῥητὴ ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ $ΘΜ$ καὶ ἀσύμμετρος τῇ $ΕΖ$ μήκει. καὶ ἐπεὶ αἱ $ΑΓ$, $ΓΒ$ δυνάμει μόνον σύμμετροί εἰσιν, ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ $ΑΓ$ τῇ $ΓΒ$ μήκει. ὥς δὲ ἡ $ΑΓ$ πρὸς τὴν $ΓΒ$, οὕτως ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς $ΑΓ$
 10 πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ · ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς $ΑΓ$ τῷ ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$. ἀλλὰ τῷ μὲν ἀπὸ τῆς $ΑΓ$ σύμμετρά ἐστι τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$, τῷ δὲ ἰπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ σύμμετρόν ἐστι τὸ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ · ἀσύμμετρα ἄρα ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$
 15 τῷ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$. καὶ ἐστὶ τοῖς μὲν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ ἴσον τὸ $ΕΗ$, τῷ δὲ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ ἴσον τὸ $ΗΘ$ · ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ $ΕΗ$ τῷ $ΘΗ$. ὥς δὲ τὸ $ΕΗ$ πρὸς τὸ $ΘΗ$, οὕτως ἐστὶν ἡ $ΕΜ$ πρὸς τὴν $ΘΜ$ · ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ $ΕΜ$ τῇ $ΜΘ$ μήκει.
 20 καὶ εἰσιν ἀμφοτέραι ῥηταί· αἱ $ΕΜ$, $ΜΘ$ ἄρα ῥηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· ἀποτομὴ ἄρα ἐστὶν ἡ $ΕΘ$, προσαρμόζουσα δὲ αὐτῇ ἡ $ΘΜ$. ὁμοίως δὲ δεῖξομεν, ὅτι καὶ ἡ $ΘΝ$ αὐτῇ προσαρμόζει· τῇ ἄρα ἀποτομῇ ἄλλη καὶ ἄλλη προσαρμόζει εὐθείᾳ δυνάμει μόνον
 25 σύμμετρος οὕσα τῇ ὀλῇ· ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον.

Τῇ ἄρα μέσῃς ἀποτομῇ δευτέρᾳ μία μόνον προσ-

1. $ΕΜ$] (alt.) $ΕΝ$ L?, $ΜΕ$ b. 2. ἐστίν L. 3. δις ἄρα V. ἐστίν] L, comp. Fb, ἐστὶ PBV. 4. τῷ $ΘΗ$] om. L, m. 2 B. ἐστίν] L, comp. Fb, ἐστὶ PBV. 6. ἐστίν L. 7. $ΓΒ$] in ras. V. ἀσύμμετροί F, sed corr. 9. ἐστίν L, ἄρα ἐστὶ B. 10. ἀσύμμετρον — 11. $ΓΒ$] m. 2 V. 10. ἐστὶ καὶ B. 11. $ΑΓ$] (prius) φ (non F, habuit B). 12. ἐστὶν P.

et rectae EZ longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. rursus quoniam $AG \times GB$ medium est, etiam $2AG \times GB$ medium est [prop. XXIII coroll.]. et $\Theta H = 2AG \times GB$. itaque etiam ΘH medium est. et rectae rationali EZ adplicatum est latitudinem efficiens ΘM . itaque ΘM rationalis est et rectae EZ longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. et quoniam AG , GB potentia tantum commensurabiles sunt AG et GB longitudine incommensurabiles sunt. uerum $AG:GB = AG^2:AG \times GB$ [prop. XXI coroll.]. quare AG^2 et $AG \times GB$ incommensurabilia sunt [prop. XI]. uerum AG^2 , $AG^2 + GB^2$ commensurabilia, et $AG \times GB$, $2AG \times GB$ commensurabilia. quare $AG^2 + GB^2$, $2AG \times GB$ incommensurabilia sunt [prop. XIII]. est autem $EH = AG^2 + GB^2$, $H\Theta = 2AG \times GB$. itaque EH , ΘH incommensurabilia sunt. est autem $EH:\Theta H = EM:\Theta M$ [VI, 1]. itaque EM , $M\Theta$ longitudine incommensurabiles sunt [prop. XI]. et utraque rationalis est. quare EM , $M\Theta$ rationales sunt potentia tantum commensurabiles. itaque $E\Theta$ apotome est [prop. LXXIII], ei autem congruens ΘM . iam similiter demonstrabimus, etiam ΘN ei congruere. itaque apotomae rectae diuersae congruunt potentia tantum toti commensurabiles; quod fieri non potest [prop. LXXIX].

Ergo mediae apotomae secundae una tantum recta

15. $\epsilon\sigma\tau\iota\nu$ P. 17. $H\Theta$] in ras. V. EH] mut. in HE m. 1 V, HE Bb. 18. $\tau\acute{o}$] (alt.) om. b. 19. $M\Theta$] in ras. m. 1 B, ΘM P. 20. $\acute{\alpha}\rho\alpha$] postea ins. m. 1 V. 21. $\epsilon\lambda\iota\sigma\iota$] om. φ . $\sigma\ddot{\upsilon}\mu\mu\epsilon\tau\rho\omicron\iota$] -οι e corr. P. 23. ΘN] N in ras. V. $\pi\rho\omicron\sigma\alpha\rho\mu\acute{o}\tau\tau\epsilon\iota$ V. $\acute{\alpha}\pi\omicron\tau\omicron\mu\eta\ \tau\eta\ E\Theta$ V. 24. $\mu\acute{o}\nu\omicron\nu$] supra scr. m. 1 F. 25. $\delta\pi\epsilon\rho\ \epsilon\sigma\tau\iota\nu\ \acute{\alpha}\delta\upsilon\nu\alpha\tau\omicron\nu$] om. V. 26. $\mu\acute{\epsilon}\iota\sigma\eta$ BFVb.

αρμόζει εὐθεία μέση δυνάμει μόνον σύμμετρος οὕσα
τῇ ὅλῃ, μετὰ δὲ τῆς ὅλης μέσον περιέχουσα· ὅπερ ἔδει
δειξαι.

πβ'.

5 Τῇ ἐλάσσονι μία μόνον προσαρμόζει εὐθεία
δυνάμει ἀσύμμετρος οὕσα τῇ ὅλῃ ποιοῦσα μετὰ
τῆς ὅλης τὸ μὲν ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων
ῥητόν, τὸ δὲ δις ὑπ' αὐτῶν μέσον.

Ἔστω ἡ ἐλάσσων ἡ AB , καὶ τῇ AB προσαρμόζουσα
10 ἔστω ἡ $BΓ$. αἱ ἄρα $ΑΓ$, $ΓΒ$ δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι
ποιοῦσαι τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετρα-
γώνων ῥητόν, τὸ δὲ δις ὑπ' αὐτῶν μέσον· λέγω, ὅτι
τῇ AB ἑτέρα εὐθεία οὐ προσαρμόσει τὰ αὐτὰ ποιοῦσα.

Εἰ γὰρ δυνατόν, προσαρμοζέτω ἡ $ΒΔ$ · καὶ αἱ $ΑΔ$,
15 $ΔΒ$ ἄρα δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τὰ προ-
ειρημένα. καὶ ἐπεὶ, ὅ ὑπερέχει τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$
τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$, τούτῳ ὑπερέχει καὶ τὸ δις
ὑπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ τοῦ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$, τὰ δὲ
ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ τετράγωνα τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$
20 τετραγώνων ὑπερέχει ῥητῶ· ῥητὰ γὰρ ἐστὶν ἀμφοτέρα·
καὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ ἄρα τοῦ δις ὑπὸ τῶν
 $ΑΓ$, $ΓΒ$ ὑπερέχει ῥητῶ· ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον· μέσα
γὰρ ἐστὶν ἀμφοτέρα.

Τῇ ἄρα ἐλάσσονι μία μόνον προσαρμόζει εὐθεία
25 δυνάμει ἀσύμμετρος οὕσα τῇ ὅλῃ καὶ ποιοῦσα τὰ μὲν

1. εὐθεία — μόνον] om. P. 2. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp.
P, om. B F V b. 4. πβ'] corr. ex πγ' F. 5. μόνη V, μόν' η F.
9. ἡ] (prius) ins. m. 2 F. 10. ἄρα] supra scr. m. 1 V.
σύμμετροι F. 13. τῇ] corr. ex ἡ m. 2 F. ἑτέρα εὐ-
θεία F. προσαρμόζει b. 14. καί] om. B. αἱ] om. b.
15. Ἀντὶ εἰσὶν ras. 4 litt. V. τὰ] τό V, et F, corr. m. 2.
προειρημένα] μὲν ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ (m. 2 F) τετράγωνα
(-γώνων F V) ἅμα ῥητόν, τὸ δὲ δις ὑπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ μέσον

media congruit potentia tantum toti commensurabilis, cum tota autem spatium medium comprehendens; quod erat demonstrandum.

LXXXII.

Rectae minori una tantum recta potentia toti incommensurabilis congruit cum tota efficiens summam quadratorum rationalem, rectangulum autem duplum medium.

Sit AB minor, et rectae AB congruat $B\Gamma$. itaque $A\Gamma$, ΓB potentia incommensurabiles sunt efficientes summam quadratorum rationalem, rectangulum autem duplum medium [prop. LXXVI]. dico, rectae AB nullam aliam rectam congruere eadem efficientem.

nam si fieri potest, congruat $B\Delta$. itaque etiam $A\Delta$, ΔB potentia incommensurabiles sunt efficientes, quae diximus [prop. LXXVI]. et quoniam est [II, 7; cfr. p. 238, 7 sq.]

$(A\Delta^2 + \Delta B^2) \div (A\Gamma^2 + \Gamma B^2) = 2A\Delta \times \Delta B \div 2A\Gamma \times \Gamma B$,
et $A\Delta^2 + \Delta B^2$ excedit $A\Gamma^2 + \Gamma B^2$ spatio rationali (nam utraque rationalia sunt), etiam $2A\Delta \times \Delta B$ excedit $2A\Gamma \times \Gamma B$ spatio rationali; quod fieri non potest [prop. XXVI]; nam utrumque medium est.

Ergo rectae minori una tantum recta congruit potentia toti incommensurabilis et cum tota efficiens

Theon (BFVb). 16. $\tau\alpha$] in ras. m. 1 P. 17. $\tau\acute{o}$] $\tau\acute{\alpha}$ B; $\tau\acute{\omega}$ F, sed corr. m. 1. 18. $\acute{\epsilon}\pi\acute{o}$ — $\delta\acute{\epsilon}$] mg. m. 2 B. $\tau\acute{o}\upsilon$ — 19. ΔB] e corr. m. 1 F. 19. $A\Delta$] Δ e corr. m. 1 V. 20. $\acute{\epsilon}\pi\epsilon\rho\acute{\epsilon}\chi\epsilon\iota$] m. 2 B. $\acute{\epsilon}\lambda\epsilon\upsilon\eta$ b. 21. $\acute{\alpha}\rho\alpha$] m. 2 B, om. FVb. 23. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\eta$] m. 2 F. 24. $\acute{\alpha}\rho\alpha$] om. P. Ante $\mu\acute{\iota}\alpha$ del. $\tau\eta$ AB m. 2 V. $\mu\acute{o}\nu\eta$ V. 25. $\delta\upsilon\nu\acute{\alpha}\mu\epsilon\iota$ $\mu\acute{o}\nu\eta$ FVb. $\sigma\acute{\upsilon}\mu\mu\epsilon\tau\rho\acute{o}\varsigma$ FVb, et B, corr. m. 2. $\kappa\alpha\iota$] om. V. $\tau\acute{\alpha}$] $\tau\acute{o}$ PFV.

ἀπ' αὐτῶν τετράγωνα ἅμα ῥητόν, τὸ δὲ δις ὑπ' αὐτῶν μέσον· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

πγ'.

Τῇ μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιούσῃ μία
5 μόνον προσαρμόζει εὐθεῖα δυνάμει ἀσύμμετρος
οὐσα τῇ ὅλῃ, μετὰ δὲ τῆς ὅλης ποιοῦσα τὸ μὲν
συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων
μέσον, τὸ δὲ δις ὑπ' αὐτῶν ῥητόν.

Ἐστω ἡ μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα ἡ AB ,
10 καὶ τῇ AB προσαρμοζέτω ἡ $BΓ$. αἱ ἄρα $ΑΓ$, $ΓΒ$
δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τὰ προκείμενα·
λέγω, ὅτι τῇ AB ἑτέρα οὐ προσαρμόσει τὰ αὐτὰ
ποιοῦσα.

Εἰ γὰρ δυνατόν, προσαρμοζέτω ἡ $BΔ$ · καὶ αἱ $ΑΔ$,
15 $ΔΒ$ ἄρα εὐθεῖαι δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι
τὰ προκείμενα. ἐπεὶ οὖν, ὃ ὑπερέχει τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΔ$,
 $ΔΒ$ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$, τούτῳ ὑπερέχει καὶ τὸ
δις ὑπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ τοῦ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$
ἀκολούθως τοῖς πρὸ αὐτοῦ, τὸ δὲ δις ὑπὸ τῶν $ΑΔ$,
20 $ΔΒ$ τοῦ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ ὑπερέχει ῥητῶ· ῥητὰ
γάρ ἐστιν ἀμφοτέρω· καὶ τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ ἄρα
τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ ὑπερέχει ῥητῶ· ὅπερ ἐστὶν
ἀδύνατον· μέσα γάρ ἐστιν ἀμφοτέρω. οὐκ ἄρα τῇ AB
ἑτέρα προσαρμόσει εὐθεῖα δυνάμει ἀσύμμετρος οὐσα

1. τετράγωνον P, τετραγώνων V, et F, corr. m. 2. Post ῥητόν add. μετὰ τῆς ὅλης V. 2. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. B F V b. 3. πδ' F. 4. μετὰ τοῦ V. Post ῥητοῦ add. καὶ m. 2 F. 5. μόνη V. 10. καὶ τῇ AB] om. B. προσαρμόζουσα V b, προσαρμόζουσα δὲ B, ἀρμόζουσα F. 11. τὰ προκείμενα] τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ τετραγώνων μέσον, τὸ δὲ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ ῥητόν Theon

summam quadratorum rationalem, rectangulum autem duplum medium; quod erat demonstrandum.

LXXXIII.

Rectae cum rationali totum medium efficienti una tantum recta congruit potentia toti incommensurabilis, cum tota autem summam quadratorum mediam efficiens, rectangulum autem duplum rationale.

Sit AB recta cum rationali totum medium efficiens, et rectae AB congruat $B\Gamma$. itaque $A\Gamma$, ΓB potentia incommensurabiles sunt proposita efficientes [prop. LXXVII]. dico, rectae AB nullam aliam congruere eadem efficientem.

nam si fieri potest, congruat $B\Delta$. itaque etiam $A\Delta$, ΔB rectae potentia incommensurabiles sunt proposita efficientes [prop. LXXVII]. iam quoniam, sicut in priore propositione [p. 246, 16 sq.]

$(A\Delta^2 + \Delta B^2) \div (A\Gamma^2 + \Gamma B^2) = 2A\Delta \times \Delta B \div 2A\Gamma \times \Gamma B$,
et $2A\Delta \times \Delta B$ excedit $2A\Gamma \times \Gamma B$ spatio rationali (nam utrumque rationale est), etiam $A\Delta^2 + \Delta B^2$ excedit $A\Gamma^2 + \Gamma B^2$ spatio rationali; quod fieri non potest; nam utraque media sunt [prop. XXVI]. itaque rectae AB nulla alia recta congruet potentia toti incommensurabilis, cum tota autem efficiens, quae dixi-

(BFVb). 12. λέγω — 16. προκειμένα] om. P. 12. ταῦτα V.
14. $A\Delta$] Δ e corr. m. 1 b. 16. τὰ προκειμένα] τὸ μὲν συγ-
κείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $A\Delta$, ΔB τετραγώνων μέσον, τὸ δὲ
δις ἐπὶ τῶν $A\Delta$, ΔB (AB , $B\Delta$ φ) ῥητόν Theon (BFVb). τὰ]
corr. ex τὸ F. 18. Post ΓB uacat una linea et spat. 6 litt. b.
21. εἶσιν] om. V, m. 2 F. 23. γὰρ εἶσιν V.

τῇ ὅλῃ, μετὰ δὲ τῆς ὅλης ποιοῦσα τὰ προειρημένα· μία ἄρα μόνον προσαρμόσει· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

πδ'.

Τῇ μετὰ μέσον μέσον τὸ ὅλον ποιούσῃ μία
δ μόνη προσαρμόζει εὐθεῖα δυνάμει ἀσύμμετρος
οὔσα τῇ ὅλῃ, μετὰ δὲ τῆς ὅλης ποιοῦσα τὸ τε
συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων
μέσον τὸ τε δις ὑπ' αὐτῶν μέσον καὶ ἔτι ἀσύμ-
μετρον τῷ συγκειμένῳ ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν.

10 Ἔστω ἡ μετὰ μέσον μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα ἡ AB ,
προσαρμόζουσα δὲ αὐτῇ ἡ $BΓ$. αἱ ἄρα $ΑΓ$, $ΓΒ$ δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τὰ προειρημένα. λέγω,
ὅτι τῇ AB ἑτέρα οὐ προσαρμόσει ποιοῦσα τὰ προει-
ρημένα.

15 Εἰ γὰρ δυνατόν, προσαρμοζέτω ἡ $ΒΔ$, ὥστε καὶ
τὰς $ΑΔ$, $ΔΒ$ δυνάμει ἀσυμμέτρους εἶναι ποιούσας τὰ
τε ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ τετράγωνα ἅμα μέσον καὶ τὸ
δις ὑπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ μέσον καὶ ἔτι τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΔ$,
 $ΔΒ$ ἀσύμμετρα τῷ δις ὑπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ · καὶ ἐκκείσθω
20 ῥητὴ ἡ EZ , καὶ τοῖς μὲν ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ ἴσον παρὰ
τὴν EZ παραβεβλήσθω τὸ $ΕΗ$ πλάτος ποιούν τὴν


1. τὰ προειρημένα] τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων μέσον, τὸ δὲ δις ὑπ' αὐτῶν ῥητόν Theon (BFVb).

2. μία ἄρα] τῇ ἄρα μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιούσῃ μία BVb et F, om. μία. προσαρμόζει Vb, καὶ τὰ ἐξῆς F. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. BFVb. 3. πδ'] sic m. 2 F. 5. μόνον BFb. Post δυνάμει del. μόνον m. 1 P. 8. τὸ τε] καὶ τὸ Theon (BFVb). ὑπὸ τῶν b. ἀσύμμετρος F, sed corr. 9. τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τῷ δις ὑπ' αὐτῶν Theon (BFVb). 11. αὐτῇ] om. Theon (BFVb). 12. τὰ προειρημένα] τὸ τε (μέν F) συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων μέσον καὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ (ὑπ' αὐτῶν V) μέσον, ἔτι (corr. ex ἔστι F) δὲ τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ τετράγωνα (τά add. F) ἀσύμμετρα τῷ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ Theon (BFVb).

mus. ergo una tantum congruet; quod erat demonstrandum.

LXXXIV.

Rectae cum medio totum medium efficienti una tantum congruit recta potentia toti incommensurabilis, cum tota autem efficiens summam quadratorum mediam et duplum rectangulum medium praetereaue summae quadratorum incommensurable.



Sit AB recta cum medio totum medium efficiens, ei autem congruens BF . itaque AG , GB potentia incommensurabiles sunt efficientes, quae diximus [prop. LXXVIII]. dico, rectae AB

nullam aliam congruere efficientem, quae diximus.

nam si fieri potest, congruat BA , ita ut etiam AA , AB potentia incommensurabiles sint efficientes $AA^2 + AB^2$ medium et $2AA \times AB$ medium et praeterea $AA^2 + AB^2$, $2AA \times AB$ incommensurabilia [prop. LXXVIII]. et ponatur rationalis EZ , et quadratis $AG^2 + GB^2$ aequale rectae EZ adplicetur EH latitudinem efficiens EM , spatio autem $2AG \times GB$ aequale rectae EZ adplicetur ΘH latitudinem efficiens ΘM .

13. Post προσαρμόσει add. Theon: *δυνάμει ἀσύμμετρος οὕσα τῇ ὅλῃ, μετὰ δὲ τῆς ὅλης* (BFVb). *προειρημένα*] -ει- in ras. m. 1 P, *προειρημένα* Theon (BFVb). 16. *εἶναι ἀσύμμετρος* BFV, *εἶναι ἀσύμμ.* b. *τὰ τε*] *τό τε* P, *τὰ μὲν* BFb, *τό τε συγκείμενον* e corr. V. 17. *ἀπό*] *ἐκ* V. AA , AB] in ras. V. *τετραγώνων* P et V (supra -ων ras. est). *ἀμα*] supra scr. V. *τό*] supra scr. V. 18. *ὑπό* — AB] *ὑπ'* αὐτῶν V. *τὰ*] om. P. 19. Post AB del. m. 2 *τετράγωνα* V. *ἀσύμμετρον* P. 20. *τοῖς*] corr. ex *τούς* m. 1 V.

$ΕΜ$, τῷ δὲ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ ἴσον παρὰ τὴν $ΕΖ$
 παραβεβλήσθω τὸ $ΘΗ$ πλάτος ποιοῦν τὴν $ΘΜ$. λοιπὸν
 ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς $ΑΒ$ ἴσον ἐστὶ τῷ $ΕΑ$. ἡ ἄρα $ΑΒ$
 δύναται τὸ $ΕΑ$. πάλιν τοῖς ἀπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ ἴσον
 5 παρὰ τὴν $ΕΖ$ παραβεβλήσθω τὸ $ΕΙ$ πλάτος ποιοῦν
 τὴν $ΕΝ$. ἐστὶ δὲ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς $ΑΒ$ ἴσον τῷ $ΕΑ$.
 λοιπὸν ἄρα τὸ δις ὑπὸ τῶν $ΑΔ$, $ΔΒ$ ἴσον [ἐστὶ] τῷ
 $ΘΙ$. καὶ ἐπεὶ μέσον ἐστὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ
 τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ καὶ ἐστὶν ἴσον τῷ $ΕΗ$, μέσον ἄρα ἐστὶ
 10 καὶ τὸ $ΕΗ$. καὶ παρὰ ῥητὴν τὴν $ΕΖ$ παράκειται πλάτος
 ποιοῦν τὴν $ΕΜ$. ῥητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ $ΕΜ$ καὶ ἀσύμ-
 μετρος τῇ $ΕΖ$ μήκει. πάλιν, ἐπεὶ μέσον ἐστὶ τὸ δις
 ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ καὶ ἐστὶν ἴσον τῷ $ΘΗ$, μέσον ἄρα
 καὶ τὸ $ΘΗ$. καὶ παρὰ ῥητὴν τὴν $ΕΖ$ παράκειται
 15 πλάτος ποιοῦν τὴν $ΘΜ$. ῥητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ $ΘΜ$ καὶ
 ἀσύμμετρος τῇ $ΕΖ$ μήκει. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρά ἐστι
 τὰ ἀπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$ τῷ δις ὑπὸ τῶν $ΑΓ$, $ΓΒ$, ἀσύμ-
 μετρόν ἐστὶ καὶ τὸ $ΕΗ$ τῷ $ΘΗ$. ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶ
 καὶ ἡ $ΕΜ$ τῇ $ΜΘ$ μήκει. καὶ εἰσιν ἀμφοτέραι ῥηταί.
 20 αἱ ἄρα $ΕΜ$, $ΜΘ$ ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι.
 ἀποτομὴ ἄρα ἐστὶν ἡ $ΕΘ$, προσαρμόζουσα δὲ αὐτῇ ἡ
 $ΘΜ$. ὁμοίως δὴ δείξομεν, ὅτι ἡ $ΕΘ$ πάλιν ἀποτομὴ
 ἐστὶν, προσαρμόζουσα δὲ αὐτῇ ἡ $ΘΝ$. τῇ ἄρα ἀποτομῇ
 ἄλλη καὶ ἄλλη προσαρμόζει ῥητὴ δυνάμει μόνον σύμ-
 25 μετρος οὕσα τῇ ὀλῃ· ὅπερ ἐδείχθη ἀδύνατον. οὐκ ἄρα
 τῇ $ΑΒ$ ἐτέρα προσαρμόσει εὐθεία.

1. παρὰ — 2. παραβεβλήσθω] ἀφηρήσθω V. 2. $ΗΘ Β$.
 $ΜΘ$ in ras. V, $ΘΝ$ F. λοιπόν — 6. $ΕΝ$] mg. m. 1 F. 4.
 τοῖς μὲν P. 6. τήν] bis V. 7. ἐστὶ] ἐστίν P, om. FVb,
 m. 2 B. 9. τῷ] τό F. μέσον — 10. $ΕΗ$] mg. m. 2 V,
 om. καί. 13. τῷ] corr. ex τό V, τό F. $ΘΗ$] $ΗΘ$ F. 15.
 ῥητὴ — $ΘΜ$] mg. m. 1 P (ἐστὶ τῇ). 17. ἀσύμμετρον — 18.

itaque reliquum [II, 7] $AB^2 = EA$. quare AB spatio EA aequalis est quadrata. rursus quadratis $AA^2 + AB^2$ aequale rectae EZ adplicetur EI latitudinem efficiens EN . uerum etiam $AB^2 = EA$. itaque reliquum [II, 7]

$$2AA \times AB = \Theta I.$$

et quoniam $A\Gamma^2 + \Gamma B^2$ medium est, et $A\Gamma^2 + \Gamma B^2 = EH$, etiam EH medium est. et rectae rationali EZ adplicatum est latitudinem efficiens EM . itaque EM rationalis est et rectae EZ longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. rursus quoniam medium est $2A\Gamma \times \Gamma B$, et $2A\Gamma \times \Gamma B = \Theta H$, etiam ΘH medium est. et rationali EZ adplicatum est latitudinem efficiens ΘM . itaque ΘM rationalis est et rectae EZ longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. et quoniam $A\Gamma^2 + \Gamma B^2$ et $2A\Gamma \times \Gamma B$ incommensurabilia sunt, etiam $EH, \Theta H$ incommensurabilia sunt. itaque etiam $EM, M\Theta$ longitudine incommensurabiles sunt [VI, 1; prop. XI]. et utraque rationalis est. itaque $EM, M\Theta$ rationales sunt potentia tantum commensurabiles. quare $E\Theta$ apotome est [prop. LXXIII] et ΘM ei congruens. iam similiter demonstrabimus, rursus $E\Theta$ apotomen esse, ei autem congruentem ΘN . itaque apotomae diuersae rectae congruunt potentia tantum toti commensurabiles; quod demonstratum est fieri non posse [prop. LXXIX]. itaque rectae AB nulla alia recta congruet.

ΘH] mg. m. 1 V. 18. ἄρα ἐστὶ B F b. ΘH] $H\Theta'$ F. ἐστὶν P B. 19. μήκει] om. b. 21. προσαφμόττονσα V. 22. ΘM] $H\Theta$ b, et F, corr. ex $M\Theta$. 23. ἐστὶ P B V, comp. F b. 24. καὶ ἄλλη ὁμότη B. ὁμότη] m. 2 B. 25. ἀδύνατον ἐδείχθη V. 26. Post AB del. εὐθεία m. 1 V. προσαφμόζει b.

Τῇ ἄρα AB μία μόνον προσαρμόζει εὐθεΐα δυνάμει
 ἄσυμμετρος οὖσα τῇ ὅλῃ, μετὰ δὲ τῆς ὅλης ποιοῦσα
 τὰ τε ἀπ' αὐτῶν τετράγωνα ἅμα μέσον καὶ τὸ δις ὑπ'
 αὐτῶν μέσον καὶ ἔτι τὰ ἀπ' αὐτῶν τετράγωνα ἄσυμ-
 5 μετρα τῷ δις ὑπ' αὐτῶν ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

Ὅροι τρίτοι.

α'. Ὑποκειμένης ῥητῆς καὶ ἀποτομῆς, ἐὰν μὲν ἡ ὅλη
 τῆς προσαρμοζούσης μείζον δύνηται τῷ ἀπὸ συμμετρου
 ἑαυτῇ μήκει, καὶ ἡ ὅλη σύμμετρος ἢ τῇ ἐκκειμένη
 10 ῥητῇ μήκει, καλεῖσθω ἀποτομὴ πρώτη.

β'. Ἐὰν δὲ ἡ προσαρμοζούσα σύμμετρος ἢ τῇ ἐκ-
 κειμένῃ ῥητῇ μήκει, καὶ ἡ ὅλη τῆς προσαρμοζούσης
 μείζον δύνηται τῷ ἀπὸ συμμετρου ἑαυτῇ, καλεῖσθω
 ἀποτομὴ δευτέρα.

15 γ'. Ἐὰν δὲ μηδετέρα σύμμετρος ἢ τῇ ἐκκειμένη
 ῥητῇ μήκει, ἡ δὲ ὅλη τῆς προσαρμοζούσης μείζον δύν-
 ηται τῷ ἀπὸ συμμετρου ἑαυτῇ, καλεῖσθω ἀποτομὴ
 τρίτη.

δ'. Πάλιν, ἐὰν ἡ ὅλη τῆς προσαρμοζούσης μείζον
 20 δύνηται τῷ ἀπὸ ἄσυμμετρου ἑαυτῇ [μήκει], ἐὰν μὲν
 ἡ ὅλη σύμμετρος ἢ τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ μήκει, καλεῖσθω
 ἀποτομὴ τετάρτη.

ε'. Ἐὰν δὲ ἡ προσαρμόζουσα, πέμπτη.

ς'. Ἐὰν δὲ μηδετέρα, ἕκτη.

1 μόνῃ V. προσαρμόσει BFV. 3. τὰ] om. b, τό P.
 τετράγωνον P. μέσα V. 4. καὶ ἔτι] ἔτι τε BFVb. 5.
 δις] om. b. αὐτῶν] eras. B. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] om. BV.
 6. ὅροι τρίτοι] PV, mg. m. 2 B. om. F; πε' b, mg. m. 2 B.
 numeros om. codd. 7. ἡ] om. B. 8. δύνεται φ. ἄσυμ-
 μέτρον BV, sed corr. 9. ἡ] supra scr. m. 1 b, om. V. 11.
 εἰ V. 12. καὶ ἡ — 13. ἑαυτῇ] om. Fb, mg. m. 2 B. 12.

Ergo rectae AB una tantum congruit recta potentia toti incommensurabilis, cum tota autem efficiens summam quadratorum mediam et duplum rectangulum medium praetereaue summam quadratorum duplo rectangulo incommensurabilem; quod erat demonstrandum.

Definitiones tertiae.

1. Datis recta rationali et apotome, si tota quadrata congruentem excedit quadrato rectae sibi commensurabilis, et tota rationali propositae longitudine commensurabilis est, uocetur apotome prima.

2. Sin congruens rationali propositae longitudine commensurabilis est, et tota quadrata congruentem excedit quadrato rectae sibi commensurabilis, uocetur apotome secunda.

3. Sin neutra rationali propositae longitudine commensurabilis est, et tota quadrata congruentem excedit quadrato rectae sibi commensurabilis, uocetur apotome tertia.

4. Rursus si tota quadrata congruentem excedit quadrato rectae sibi incommensurabilis, si tota rationali propositae longitudine commensurabilis est, uocetur apotome quarta.

5. Sin congruens ei commensurabilis est, quinta.

6. Sin neutra, sexta.

καί] supra scr. m. 1 V. 13. δύναται PV. Post καλείσθω ras. 2 litt. V. 15. εἰ V. 16. ἡ δὲ δὴ — 17. ἐαντῇ] om. Fb, m. 2 B. 18. δύναται V. 19. ἡ] m. 2 B. τῇ προσ- αμοζούση B, sed corr. (ante τῇ ras. 1 litt.). 20. συμμετρου B, corr. m. 2. μήκει] om. P. μέν] supra scr. m. 1 F. 21. ἡ] m. 2 B. 24. -ρα ᾧ- in ras. m. 1 P.

πε'.

Εὐρεῖν τὴν πρώτην ἀποτομήν.

Ἐκκείσθω ῥητὴ ἡ A , καὶ τῇ A μήκει σύμμετρος
 ἔστω ἡ BH . ῥητὴ ἄρα ἔστι καὶ ἡ BH . καὶ ἐκκείσθωσαν
 5 δύο τετράγωνοι ἀριθμοὶ οἱ AE , EZ , ὧν ἡ ὑπεροχὴ ὁ
 $ZΔ$ μὴ ἔστω τετράγωνος· οὐδ' ἄρα ὁ $EΔ$ πρὸς τὸν
 $ΔZ$ λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετρά-
 γωνον ἀριθμόν. καὶ πεποιήσθω ὡς ὁ $EΔ$ πρὸς τὸν
 $ΔZ$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς BH τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ
 10 τῆς $HΓ$ τετράγωνον· σύμμετρον ἄρα ἔστι τὸ ἀπὸ τῆς
 BH τῷ ἀπὸ τῆς $HΓ$. ῥητὸν δὲ τὸ ἀπὸ τῆς BH .
 ῥητὸν ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς $HΓ$. ῥητὴ ἄρα ἔστι καὶ ἡ
 $HΓ$. καὶ ἐπεὶ ὁ $EΔ$ πρὸς τὸν $ΔZ$ λόγον οὐκ ἔχει,
 ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, οὐδ'
 15 ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς BH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $HΓ$ λόγον ἔχει,
 ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν·
 ἀσύμμετρος ἄρα ἔστιν ἡ BH τῇ $HΓ$ μήκει. καὶ εἰσιν
 ἀμφοτέραι ῥηταί· αἱ BH , $HΓ$ ἄρα ῥηταὶ εἰσι δυνάμει
 μόνον σύμμετροι· ἡ ἄρα $BΓ$ ἀποτομὴ ἔστιν.

20 Λέγω δὴ, ὅτι καὶ πρώτη.

Ὡς γὰρ μεῖζόν ἐστι τὸ ἀπὸ τῆς BH τοῦ ἀπὸ τῆς
 $HΓ$, ἔστω τὸ ἀπὸ τῆς $Θ$. καὶ ἐπεὶ ἔστιν ὡς ὁ $EΔ$
 πρὸς τὸν $ZΔ$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς BH πρὸς τὸ ἀπὸ
 τῆς $HΓ$, καὶ ἀναστρέψαντι ἄρα ἔστιν ὡς ὁ $ΔE$ πρὸς
 25 τὸν EZ , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς HB πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $Θ$.

1. πε'] om. B.Fb. 3. ῥητὴ] m. 2 B. μήκει] om. V. 4.
 ἔστω] ἔσται F, corr. m. 1; ἔστω μήκει V. ἔστιν P. BH]
 corr. ex HB V. 5. ἡ] m. 2 F. 6. ΔZ BVb. οὐκ FV.
 7. ΔZ] "ZΔ" F. 8. πεποιήσθω F. ὁ] m. 2 F. 10.
 τετράγωνον] om. V. σύμμετρος V, corr. m. 1. ἔστιν V.
 11. HB F. HΓ] supra scr. Θ b; ΘΓ F, sed corr. (?).
 ῥητόν — BH] m. 2 B. 13. HΓ] in ras. V, corr. ex ΓΔ
 m. 1 b. 14. ἀριθμὸς] om. V. ἀριθμόν] om. V. οὐδέ

LXXXV.

Inuenire apotomen primam.

Ponatur rationalis A , et rectae A longitudine commensurabilis sit BH . itaque etiam BH rationalis est. et ponantur duo numeri quadrati ΔE , EZ , quorum

A ————— B Γ H differentia $Z\Delta$ quadratus
 Θ ————— E Z Δ numerus ne sit [prop. XXVIII lemma I]. itaque

$E\Delta : \Delta Z$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. et fiat $E\Delta : \Delta Z = BH^2 : H\Gamma^2$ [prop. VI coroll.]. itaque BH^2 , $H\Gamma^2$ commensurabilia sunt [prop. VI]. uerum BH^2 rationale est. itaque etiam $H\Gamma^2$ rationale est. quare etiam $H\Gamma$ rationalis est. et quoniam $E\Delta : \Delta Z$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, ne BH^2 quidem ad $H\Gamma^2$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque BH , $H\Gamma$ longitudine incommensurabiles sunt. et utraque rationalis est. itaque BH , $H\Gamma$ rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo $B\Gamma$ apotome est [prop. LXXIII].

Iam dico, eandem primam esse.

sit enim $\Theta^2 = BH^2 \div H\Gamma^2$ [prop. XIII lemma]. et quoniam est

$$E\Delta : Z\Delta = BH^2 : H\Gamma^2,$$

etiam conuertendo [V, 19 coroll.] est

$$\Delta E : EZ = HB^2 : \Theta^2.$$

uerum $\Delta E : EZ$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum; nam uterque quadratus

FVb. 15. ἀρα] supra scr. m. 1 V. HΓ] e corr. V. 17. BH] HB φ. 18. εἰς P. 19. ἐστὶ V, comp. b, εἴσθ comp. φ. 22. Θ] in spat. 2 litt. φ. EΔ] ΔE V. 23. τόν] τό b. ΔZ BVb. 24. ΔE] in ras. m. 1 P.

ὁ δὲ ΔE πρὸς τὸν EZ λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· ἐκάτερος γὰρ τετράγωνός ἐστιν· καὶ τὸ ἀπὸ τῆς HB ἄρα πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Θ λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς
 5 τετράγωνον ἀριθμόν· σύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ BH τῇ Θ μήκει. καὶ δύναται ἡ BH τῆς $H\Gamma$ μείζον τῷ ἀπὸ τῆς Θ · ἡ BH ἄρα τῆς $H\Gamma$ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἐαυτῇ μήκει. καὶ ἐστὶν ἡ ὅλη ἡ BH σύμμετρος τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ μήκει τῇ A . ἡ $B\Gamma$ ἄρα
 10 ἀποτομή ἐστὶ πρώτη.

Εὗρηται ἄρα ἡ πρώτη ἀποτομή ἡ $B\Gamma$ · ὅπερ ἔδει εὐρεῖν.

πς'.

Εὐρεῖν τὴν δευτέραν ἀποτομήν.

15 Ἐκκείσθω ῥητὴ ἡ A καὶ τῇ A σύμμετρος μήκει ἡ $H\Gamma$. ῥητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ $H\Gamma$. καὶ ἐκκείσθωσαν δύο τετράγωνοι ἀριθμοὶ οἱ ΔE , EZ , ὧν ἡ ὑπεροχὴ ὁ ΔZ μὴ ἔστω τετράγωνος. καὶ πεποιήσθω ὡς ὁ $Z\Delta$ πρὸς τὸν ΔE , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ΓH τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς
 20 HB τετράγωνον. σύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΓH τετράγωνον τῷ ἀπὸ τῆς HB τετραγώνῳ. ῥητὸν δὲ τὸ ἀπὸ τῆς ΓH . ῥητὸν ἄρα [ἐστὶ] καὶ τὸ ἀπὸ τῆς HB · ῥητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ BH . καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς $H\Gamma$ τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς HB λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς
 25 τετράγωνον ἀριθμόν, ἀσύμμετρός ἐστὶν ἡ ΓH τῇ HB μήκει. καὶ εἰδὸν ἀμφότεραι ῥηταί· αἱ ΓH , HB ἄρα

1. EZ] in ras. V. Post λόγον del. σύκ F. 2. τετράγωνος] τετράγωνον F, sed corr. 3. ἐστὶ PBV, comp. Fb. ἄρα] om. φ.
 4. Θ] $H\Theta$ b. 5. BH] HB P. 6. τῆς] τῇ b. 7. Θ . ἡ] ΘH b; $H\Theta$. ἡ F. 8. ἀσύμμετρον P, et eras. ἀ- V. ἡ] (prins) om. BVb. 9. μήκει] om. F. τῇ A μήκει BV. 13. πς'] om. F, in figura πς'. 14. τῇ] supra scr. m. 1 P. 15. ἀσύμμετρος P, corr. m. rec.; σύμμετρος ἔστω V. 16. ἐστὶν

est. itaque etiam $HB^2 : \Theta^2$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. quare BH, Θ longitudine commensurabiles sunt [prop. IX]. est autem $BH^2 \div H\Gamma^2 = \Theta^2$. itaque BH quadrata excedit $H\Gamma$ quadrato rectae sibi longitudine commensurabilis. et tota BH rationali propositae A commensurabilis est. itaque $B\Gamma$ apotome prima est [deff. tert. 1].


Ergo inuenta est $B\Gamma$ apotome prima; quod erat inueniendum.

LXXXVI.

Inuenire apotomen secundam.

Ponatur rationalis A et rectae A longitudine commensurabilis $H\Gamma$. itaque $H\Gamma$ rationalis est. et ponantur duo numeri quadrati AE, EZ , quorum differentia AZ numerus quadratus ne sit [prop. XXVIII lemma I]. et fiat $ZA : AE = \Gamma H^2 : HB^2$ [prop. VI coroll.]. itaque $\Gamma H^2, HB^2$ commensurabilia sunt [prop. VI]. uerum ΓH^2 rationale est. quare etiam HB^2 rationale est. itaque etiam BH rationalis est. et quoniam $H\Gamma^2 : HB^2$

rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, ΓH et HB longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. et utraque rationalis est. itaque $\Gamma H, HB$



καὶ ἡ P. 17. τετραγώνου] om. F, ins. m. 2 ante δύο. δ] ἡ V. 18. πεποιεῖσθω F. ΔZ FVb. 20. σύμμετρος P, corr. m. rec. 21. τετραγώνου] om. V. 22. ἐστὶ] om. BFVb. 25. ἐστὶν] ἄρα ≠ ἐστὶν (sic) V, ἄρα ἐστὶν V; ἄρα add. m. 2 F. HB] B H BF. 26. μὴκει] e corr. V. HB] B e corr. V. ἄρα] om. Pφ.

ῥηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· ἡ ΒΓ ἄρα ἀποτομή ἐστίν.

Λέγω δὴ, ὅτι καὶ δευτέρα.

Οἱ γὰρ μείζον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΗ τοῦ ἀπὸ τῆς
 5 ΗΓ, ἔστω τὸ ἀπὸ τῆς Θ. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς τὸ ἀπὸ
 τῆς ΒΗ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΗΓ, οὕτως ὁ ΕΔ ἀριθμὸς
 πρὸς τὸν ΔΖ ἀριθμόν, ἀναστρέψαντι ἄρα ἐστὶν ὡς
 τὸ ἀπὸ τῆς ΒΗ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Θ, οὕτως ὁ ΔΕ
 πρὸς τὸν ΕΖ. καὶ ἐστὶν ἐκάτερος τῶν ΔΕ, ΕΖ τε-
 10 τράγωνος· τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς ΒΗ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Θ
 λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον
 ἀριθμόν· σύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ ΒΗ τῇ Θ μήκει. καὶ
 δύναται ἡ ΒΗ τῆς ΗΓ μείζον τῷ ἀπὸ τῆς Θ· ἡ ΒΗ
 ἄρα τῆς ΗΓ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμέτρου ἐαυτῇ
 15 μήκει. καὶ ἐστὶν ἡ προσαρμόζουσα ἡ ΓΗ τῇ ἐκκειμένῃ
 ῥητῇ σύμμετρος τῇ Α. ἡ ΒΓ ἄρα ἀποτομή ἐστὶ δευτέρα.

Εὗρεται ἄρα δευτέρα ἀποτομή ἡ ΒΓ· ὅπερ ἔδει
 δεῖξαι.

πξ'.

20 Εὕρεται τὴν τρίτην ἀποτομήν.

Ἐκκείσθω ῥητὴ ἡ Α, καὶ ἐκκείσθωσαν τρεῖς ἀριθμοὶ
 οἱ Ε, ΒΓ, ΓΔ λόγον μὴ ἔχοντες πρὸς ἀλλήλους, ὃν
 τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, ὁ δὲ
 ΓΒ πρὸς τὸν ΒΔ λόγον ἔχέτω, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς

2. ἐστὶ PBV, comp. Fb. 3. δὴ] om. V. 6. ἀριθμὸς]
 om. V. 7. ἀριθμόν] om. V. 8. οὕτως] s τῶν (corr. ex
 τῷ) F. ὁ] supra scr. F. ΔΕ] ΕΔ F. 12. ἐστίν] ἐστὶ
 μήκει V. μήκει] om. FVb, m. 2 B. καὶ δύναται] m. 2
 supra scr. B, -ύνα- in ras. V, καὶ ἐστὶν Fb, Bm. 1. 13. μείζων
 Fb et B, sed corr. m. 2; seq. ras. 6 litt. V. τῷ] in ras. m.
 1 B, τοῦ b. τῆς] om. V. ἡ ΒΗ — 14. συμέτρου] mg.
 m. 1 V (συμέτρου etiam in textu). 14. ἀσυμέτρου b, corr.
 m. rec. 15. σύμμετρος τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ Theon (BFVb).

rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo $B\Gamma$ apotome est [prop. LXXIII].

Iam dico, eandem secundam esse.

sit enim $\Theta^2 = B\Gamma^2 \div H\Gamma^2$ [prop. XIII lemma]. iam quoniam est $BH^2 : H\Gamma^2 = EA : AZ$,


conuertendo [V, 19 coroll.] erit $BH^2 : \Theta^2 = AE : EZ$. et uterque AE , EZ quadratus est. itaque $BH^2 : \Theta^2$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque BH , Θ longitudine commensurabiles sunt [prop. IX]. et $BH^2 \div H\Gamma^2 = \Theta^2$. quare BH quadrata excedit $H\Gamma$ quadrato rectae sibi longitudine commensurabilis. et congruens ΓH rationali propositae A commensurabilis est. itaque $B\Gamma$ apotome est secunda [deff. tert. 2].

Ergo inuenta est apotome secunda $B\Gamma$; quod erat demonstrandum.

LXXXVII.

Inuenire apotomen tertiam.

Ponatur rationalis A , et ponantur tres numeri E , $B\Gamma$, ΓA rationem inter se non habentes, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, ΓB autem ad $B A$ rationem habeat, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, et fiat $E : B\Gamma = A^2 : ZH^2$ [prop. XXVIII lemma I], et $B\Gamma : \Gamma A = ZH^2 : H\Theta^2$. iam quon-



16. μήκει τῇ A Bb, τῇ A μήκει V. ἄρα] ἄρα ἐκ τῆς F. ἔστιν PB. 17. ἄρα ἡ V. $B\Gamma$] φ (de F non liquet). ὅπερ ἔδει δεῖξαι] φ et comp. P, ὅπερ ἔδει εὐρεῖν V, om. Bb. 19. πς F (euan.). 21. ἡ ἐκ τῆς ἡ P. 22. ΓA] corr. ex Δ m. 2 F. 24. ΓB] corr. ex ΓA m. rec. b.

πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, καὶ πεποιήσθω ὥς μὲν ὁ E
 πρὸς τὸν $BΓ$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς A τετράγωνον πρὸς
 τὸ ἀπὸ τῆς ZH τετράγωνον, ὥς δὲ ὁ $BΓ$ πρὸς τὸν
 $ΓΔ$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ZH τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ
 5 τῆς $HΘ$. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὥς ὁ E πρὸς τὸν $BΓ$, οὕτως
 τὸ ἀπὸ τῆς A τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ZH τε-
 τράγωνον, σύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς A τετρά-
 γωνον τῷ ἀπὸ τῆς ZH τετράγωνῳ. ῥητὸν δὲ τὸ ἀπὸ
 τῆς A τετράγωνον. ῥητὸν ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ZH .
 10 ῥητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ ZH . καὶ ἐπεὶ ὁ E πρὸς τὸν $BΓ$
 λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον
 ἀριθμόν, οὐδ' ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς A τετράγωνον πρὸς τὸ
 ἀπὸ τῆς ZH [τετράγωνον] λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος
 ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· ἀσύμμετρος ἄρα
 15 ἐστὶν ἡ A τῇ ZH μήκει. πάλιν, ἐπεὶ ἐστὶν ὥς ὁ $BΓ$
 πρὸς τὸν $ΓΔ$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ZH τετράγωνον πρὸς
 τὸ ἀπὸ τῆς $HΘ$, σύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ZH
 τῷ ἀπὸ τῆς $HΘ$. ῥητὸν δὲ τὸ ἀπὸ τῆς ZH . ῥητὸν
 ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς $HΘ$. ῥητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ $HΘ$. καὶ
 20 ἐπεὶ ὁ $BΓ$ πρὸς τὸν $ΓΔ$ λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετρά-
 γωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, οὐδ' ἄρα
 τὸ ἀπὸ τῆς ZH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $HΘ$ λόγον ἔχει, ὃν
 τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· ἀσύμ-
 μετρος ἄρα ἐστὶν ἡ ZH τῇ $HΘ$ μήκει. καὶ εἰσιν ἀμ-
 25 φότεραι ῥηταί· αἱ ZH , $HΘ$ ἄρα ῥηταί· εἰσι δυνάμει
 μόνον σύμμετροι· ἀποτομὴ ἄρα ἐστὶν ἡ $ZΘ$.

Λέγω δὴ, ὅτι καὶ τρίτη.

Ἐπεὶ γάρ ἐστὶν ὥς μὲν ὁ E πρὸς τὸν $BΓ$, οὕτως
 τὸ ἀπὸ τῆς A τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ZH , ὥς

1. πεποιήσθω F. 4. ZH] corr. ex AH F. 6. A τετρά-
 γωνον] A V. 7. ἐστὶ] om. V. . τετράγωνον] om. V. 8. τε-

iam est $E:BG = A^2:ZH^2$, A^2 et ZH^2 commensurabilia sunt [prop. VI]. uerum A^2 rationale est. itaque etiam ZH^2 rationale est. quare ZH rationalis est. et quoniam $E:BG$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, ne A^2 quidem ad ZH^2 rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque A , ZH longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. rursus quoniam est

$$BG:GA = ZH^2:H\Theta^2,$$

ZH^2 et $H\Theta^2$ commensurabilia sunt [prop. VI]. uerum ZH^2 rationale est; itaque etiam $H\Theta^2$ rationale est. quare $H\Theta$ rationalis est. et quoniam $BG:GA$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, ne ZH^2 quidem ad $H\Theta^2$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. quare ZH , $H\Theta$ longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. et utraque rationalis est. itaque ZH , $H\Theta$ rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo $Z\Theta$ apotome est [prop. LXXIII].

Iam dico, eandem tertiam esse.

nam quoniam est $E:BG = A^2:ZH^2$, $BG:GA = ZH^2:\Theta H^2$, ex aequo [V, 22] $E:GA = A^2:\Theta H^2$.

τετραγώνου] om. V. δέ] ἐστι, add. δέ m. 2, V. 9. τετραγώνου] om. V. 12. οὐδέ b. 13. τετραγώνου] om. P. 15. τῇ] corr. ex τῆς B, τῆς F. 16. τό] om. B. 17. HΘ] e corr. F. 18. τῷ] πρὸς τό Fb. ῥητόν — ZH] mg. m. 1 V. 19. ἄρα καί] in ras. V. ῥητή — HΘ] mg. m. 1 F. ἐστίν] om. b. 21. οὐδέ b. 22. τό] (alt.) supra scr. m. 1 F. HΘ] H eras. V. 24. ZH] HZ F. 25. αὖ — ἐστὶ] mg. m. 2 B. in textu αὖ ἐστὶ. ἐστὶν P. 27. τετ[ε]ρ] corr. ex ῥητή m. 1 P. 28. οὕτω B.

δὲ ὁ $BΓ$ πρὸς τὸν $ΓΔ$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ZH πρὸς
τὸ ἀπὸ τῆς $ΘH$, δι' ἴσου ἄρα ἐστὶν ὡς ὁ E πρὸς τὸν
 $ΓΔ$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς A πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $ΘH$. ὁ
δὲ E πρὸς τὸν $ΓΔ$ λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετράγωνος
6 ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν· οὐδ' ἄρα τὸ ἀπὸ
τῆς A πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $HΘ$ λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος
ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν· ἀσύμμετρος ἄρα
ἡ A τῇ $HΘ$ μήκει. οὐδετέρᾳ ἄρα τῶν ZH , $HΘ$ σύμ-
μετρός ἐστι τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ τῇ A μήκει. ᾧ οὖν
10 μείζον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ZH τοῦ ἀπὸ τῆς $HΘ$, ἔστω
τὸ ἀπὸ τῆς K . ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς ὁ $BΓ$ πρὸς τὸν $ΓΔ$,
οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ZH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $HΘ$, ἀναστρέ-
ψαντι ἄρα ἐστὶν ὡς ὁ $BΓ$ πρὸς τὸν $ΒΔ$, οὕτως τὸ
ἀπὸ τῆς ZH τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς K . ὁ δὲ
15 $BΓ$ πρὸς τὸν $ΒΔ$ λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς
πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν· καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ZH ἄρα
πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς K λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς
πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν. σύμμετρός ἄρα ἐστὶν ἡ ZH
τῇ K μήκει, καὶ δύναται ἡ ZH τῆς $HΘ$ μείζον τῷ
20 ἀπὸ συμμέτρου ἐαντῇ. καὶ οὐδετέρᾳ τῶν ZH , $HΘ$
σύμμετρός ἐστι τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ τῇ A μήκει· ἡ $ZΘ$
ἄρα ἀποτομή ἐστὶ τρίτη.

Εὗρηται ἄρα ἡ τρίτη ἀποτομή ἡ $ZΘ$. ὅπερ εἶδει
δεῖξαι.

25

πη'.

Εὐρεῖν τὴν τετάρτην ἀποτομήν.

Ἐκκείσθω ῥητὴ ἡ A καὶ τῇ A μήκει σύμμετρος
ἡ BH . ῥητὴ ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ BH . καὶ ἐκκείσθωσαν

1. τόν] om. P. οὕτω B. 3. $ΘH$] corr. ex $HΘ$ V. 4.
τὸν $ΓΔ$] corr. ex $Γ$ m. 2 F. 9. ἐστὶν V. 11. $BΓ$] ras. 2

uerum $E: \Gamma A$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum; itaque ne A^2 quidem ad $H\Theta^2$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. quare $A, H\Theta$ longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. itaque neutra rectarum $ZH, H\Theta$ rationali propositae A commensurabilis est longitudine. iam sit $ZH^2 \div H\Theta^2 = K^2$ [prop. XIII lemma]. quoniam igitur est $B\Gamma: \Gamma A = ZH^2: H\Theta^2$, conuertendo [V, 19 coroll.] est $B\Gamma: B A = ZH^2: K^2$. uerum $B\Gamma: B A$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque etiam $ZH^2: K^2$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. quare ZH, K longitudine commensurabiles sunt [prop. IX], et ZH quadrata excedit $H\Theta$ quadrato rectae sibi commensurabilis. et neutra rectarum $ZH, H\Theta$ rationali propositae A longitudine commensurabilis est. itaque $Z\Theta$ apotome est tertia [deff. tert. 3].

Ergo inuenta est apotome tertia $Z\Theta$; quod erat demonstrandum.

LXXXVIII.

Inuenire apotomen quartam.

Ponatur rationalis A et rectae A longitudine commensurabilis BH . itaque etiam BH rationalis est.

litt. V, corr. ex BE F. $\tau\acute{o}\nu$] om. P. ΓA] eras. V, corr. ex $\Gamma\Gamma$ m. 1 b. 12. $\tau\acute{o}$] (alt.) supra scr. m. 1 b. 13. $B\Gamma$] corr. ex ΓB V. 15. $\pi\rho\acute{o}\varsigma$] $\pi\rho\acute{o}\nu$ P. 16. $\acute{\alpha}\rho\alpha$] supra scr. F. 19. $\tau\eta\ K - \eta\ ZH$] mg. m. 1 P. Post $\mu\epsilon\iota\zeta\omicron\nu$ add. Theon: $\tau\acute{o}\ \acute{\alpha}\pi\omicron\ \tau\eta\varsigma\ K$. $\eta\ \acute{\alpha}\rho\alpha\ ZH\ \tau\eta\varsigma\ H\Theta\ \mu\epsilon\iota\zeta\omicron\nu\ \delta\acute{\upsilon}\nu\alpha\tau\alpha\iota$ (BVb, F mg. m. 1). 23. η] om. FV. $\tau\rho\acute{\iota}\tau\eta$] om. F. $\delta\pi\epsilon\rho\ \acute{\epsilon}\delta\epsilon\iota\ \delta\epsilon\iota\chi\alpha\iota$] comp. P, om. Bb. 24. $\delta\epsilon\iota\chi\alpha\iota$] $\acute{\epsilon}\nu\theta\rho\epsilon\iota\nu$ Vφ. 25. $\pi\zeta'$ F, et sic deinceps. 27. $\mu\eta^{\ast}\epsilon\iota$ b. 28. $\acute{\alpha}\rho$ P, corr. m. 2. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\acute{\iota}\nu$ PBV. $\kappa\alpha\acute{\iota}$] (prius) corr. ex $\kappa\alpha$ P, om. FV.

δύο ἀριθμοὶ οἱ ΔZ , $Z E$, ὥστε τὸν ΔE ὅλον πρὸς
 ἑκάτερον τῶν ΔZ , $E Z$ λόγον μὴ ἔχειν, ὃν τετράγωνος
 ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν. καὶ πεποιήσθω
 ὡς ὁ ΔE πρὸς τὸν $E Z$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς $B H$ τε-
 5 τράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $H \Gamma$ · σύμμετρον ἄρα ἐστὶ
 τὸ ἀπὸ τῆς $B H$ τῷ ἀπὸ τῆς $H \Gamma$. ῥητὸν δὲ τὸ ἀπὸ
 τῆς $B H$ · ῥητὸν ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς $H \Gamma$ · ῥητὴ ἄρα
 ἐστὶν ἡ $H \Gamma$. καὶ ἐπεὶ ὁ ΔE πρὸς τὸν $E Z$ λόγον οὐκ
 ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν,
 10 οὐδ' ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς $B H$ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $H \Gamma$ λόγον
 ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν·
 ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ $B H$ τῇ $H \Gamma$ μήκει. καὶ εἰσιν
 ἀμφοτέραι ῥηταί· αἱ $B H$, $H \Gamma$ ἄρα ῥηταὶ εἰσι δυνάμει
 μόνον σύμμετροι· ἀποτομὴ ἄρα ἐστὶν ἡ $B \Gamma$.

15 [Λέγω δὴ, ὅτι καὶ τετάρτη].

Ῥι οὖν μείζον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς $B H$ τοῦ ἀπὸ τῆς
 $H \Gamma$, ἔστω τὸ ἀπὸ τῆς Θ . ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς ὁ ΔE
 πρὸς τὸν $E Z$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς $B H$ πρὸς τὸ ἀπὸ
 τῆς $H \Gamma$, καὶ ἀναστρέψαντι ἄρα ἐστὶν ὡς ὁ $E \Delta$ πρὸς
 20 τὸν ΔZ , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς $H B$ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Θ .
 ὁ δὲ $E \Delta$ πρὸς τὸν ΔZ λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετράγωνος
 ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· οὐδ' ἄρα τὸ ἀπὸ
 τῆς $H B$ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Θ λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος
 ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· ἀσύμμετρος ἄρα
 25 ἐστὶν ἡ $B H$ τῇ Θ μήκει. καὶ δύναται ἡ $B H$ τῆς $H \Gamma$
 μείζον τῷ ἀπὸ τῆς Θ · ἡ ἄρα $B H$ τῆς $H \Gamma$ μείζον δύ-
 νатаι τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ. καὶ ἐστὶν ὅλη ἡ $B H$

2. $E Z$] eras. V. μῆ] om. φ. 4. τόν] mg. m. 1 P. 5.
 πρὸς] om. φ. $H \Gamma$] $B \Gamma$ supra scr. H b. ἐστὶν P, et V
 del. v. 8. ἐστὶν] ἐστὶ καὶ FV. 9. πρὸς — 10. τῆς (prius)]
 om. φ lacuna relicta. 9. ἀριθμόν] om. V. 10. οὐδέ b.
 11. ἀριθμός] om. V. ἀριθμός] om. V. 12. ἐστὶν] om. FV.

Δ ———— | ———— B ———— Γ ———— H et ponantur duo numeri ΔZ ,
 Θ ———— | ———— Δ ———— Z ———— E ZE , ita ut totus ΔE ad
 utrumque ΔZ , EZ rationem

non habeat, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. et fiat $\Delta E: EZ = BH^2: H\Gamma^2$ [prop. VI coroll.]. itaque BH^2 , $H\Gamma^2$ commensurabilia sunt [prop. VI]. uerum BH^2 rationale est. itaque etiam $H\Gamma^2$ rationale est. quare $H\Gamma$ rationalis est. et quoniam $\Delta E: EZ$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, ne BH^2 quidem ad $H\Gamma^2$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. quare BH , $H\Gamma$ longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. et utraque rationalis est. itaque BH , $H\Gamma$ rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo $B\Gamma$ apotome est [prop. LXXIII]. iam sit $\Theta^2 = BH^2 \div H\Gamma^2$ [prop. XIII lemma]. quoniam igitur est $\Delta E: EZ = BH^2: H\Gamma^2$, etiam conuertendo [V, 19 coroll.] est $E\Delta: \Delta Z = BH^2: \Theta^2$. uerum $E\Delta: \Delta Z$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque ne BH^2 quidem ad Θ^2 rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. quare BH , Θ longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. est autem $BH^2 \div H\Gamma^2 = \Theta^2$. itaque BH quadrata excedit $H\Gamma$ quadrato rectae sibi

BH] $\mu\eta$ φ . $\mu\eta\kappa\epsilon\iota$] om. FV. $\kappa\alpha\iota$ — 13. $\delta\eta\tau\alpha\iota$] mg. m. 1 V. 13. $\epsilon\iota\sigma\iota\nu$ P. 14. $\sigma\acute{\upsilon}\mu\mu\epsilon\tau\rho\omicron\nu$ $\omicron\upsilon\kappa$ φ . $B\Gamma$] B e corr. φ . BH P. 15. $\lambda\acute{\epsilon}\gamma\omega$ — $\tau\epsilon\tau\acute{\alpha}\rho\tau\eta$] om. PB, $\kappa\alpha\iota$ φ . $\delta\eta$] om. V. 17. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\nu$] om. V. 18. $\pi\rho\acute{o}\varsigma$ $\tau\acute{o}\nu$ EZ] $\tau\acute{o}\nu$ $\acute{\alpha}\pi\omicron$ $\tau\eta\varsigma$ EZ b, corr. mg. m. 1. $\pi\rho\acute{o}\varsigma$ $\tau\acute{o}$] $\tau\acute{o}\nu$ b. 19. $H\Gamma$] H in ras. m. 1 B. $\acute{\alpha}\nu\alpha\sigma\tau\rho\acute{\epsilon}\psi\alpha\iota$ φ . 20. $\tau\acute{o}\nu$] om. P, $\tau\acute{o}$ b. BH V. 21. $E\Delta$] Δ in ras. m. 1 B. 22. $\omicron\upsilon\delta\acute{\epsilon}$ Vb. 24. $\acute{\alpha}\rho\iota\theta\mu\acute{o}\nu$] om. V. $\acute{\alpha}\rho\alpha$] in ras. V. 25. BH] (alt.) mut. in HB V, HB Bfb. 27. $\sigma\acute{\upsilon}\mu\mu\epsilon\tau\rho\omicron\nu$ b, corr. m. rec. $\acute{\epsilon}\alpha\nu\tau\eta$ $\mu\eta\kappa\epsilon\iota$ B. η $\delta\lambda\eta$ η V.

σύμμετρος τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ μήκει τῇ A . ἡ ἄρα $BΓ$ ἀποτομή ἐστὶ τετάρτη.

Εὐρηται ἄρα ἡ τετάρτη ἀποτομή· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

πθ'.

5 Εὐρεῖν τὴν πέμπτην ἀποτομήν.

Ἐκκείσθω ῥητὴ ἡ A , καὶ τῇ A μήκει σύμμετρος ἔστω ἡ $ΓΗ$. ῥητὴ ἄρα [ἐστὶν] ἡ $ΓΗ$. καὶ ἐκκείσθωσαν δύο ἀριθμοὶ οἱ $ΔΖ$, $ΖΕ$, ὥστε τὸν $ΔΕ$ πρὸς ἐκάτερον τῶν $ΔΖ$, $ΖΕ$ λόγον πάλιν μὴ ἔχειν, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· καὶ πεποιήσθω
10 ὥς ὁ $ΖΕ$ πρὸς τὸν $ΕΔ$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς $ΓΗ$ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $ΗΒ$. ῥητὸν ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς $ΗΒ$. ῥητὴ ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ $ΒΗ$. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὥς ὁ $ΔΕ$ πρὸς τὸν $ΕΖ$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς $ΒΗ$ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς
15 $ΗΓ$, ὁ δὲ $ΔΕ$ πρὸς τὸν $ΕΖ$ λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, οὐδ' ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς $ΒΗ$ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $ΗΓ$ λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ $ΒΗ$ τῇ $ΗΓ$ μήκει. καὶ εἰσιν
20 ἀμφότεραι ῥηταί· αἱ $ΒΗ$, $ΗΓ$ ἄρα ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· ἡ $ΒΓ$ ἄρα ἀποτομή ἐστὶν.

Λέγω δὴ, ὅτι καὶ πέμπτη.

Ὡς γὰρ μεῖζόν ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς $ΒΗ$ τοῦ ἀπὸ τῆς
 $ΗΓ$, ἔστω τὸ ἀπὸ τῆς $Θ$. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὥς τὸ ἀπὸ
25 τῆς $ΒΗ$ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $ΗΓ$, οὕτως ὁ $ΔΕ$ πρὸς τὸν

1. $BΓ$ ἄρα B . 2. ἐστὶν P . 3. ἡ] καὶ ἡ F , ἡ $BΓ$ B . ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P , om. $BFVb$. 7. ἐστὶν] om. P . 8. ZE] EZ F . $ΔΕ$] $ΔΕ$ in ras. V . 9. τῶν] τὸν $φ$. πάλιν] om. Fb . 10. πεποιήσθω F . 11. τὸν] om. P . 12. Post HB add. σύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς $ΗΓ$ ($ΓΗ$ V) τῷ ἀπὸ


incommensurabilis. et tota BH rationali propositae A commensurabilis est longitudine. itaque $B\Gamma$ apotome est quarta [deff. tert. 4].

Ergo inuenta est quarta apotome; quod erat demonstrandum.

LXXXIX.

Inuenire apotomen quintam.

Ponatur rationalis A , et rectae A longitudine commensurabilis sit ΓH . itaque ΓH rationalis est. et



ponantur duo numeri ΔZ , ZE , ita ut ΔE rursus ad neutrum numerorum ΔZ , ZE rationem habeat, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. et fiat $ZE:EA = \Gamma H^2:HB^2$. itaque etiam HB^2 rationale est [prop. VI]. quare etiam BH rationalis est. et quoniam est $\Delta E:EZ = BH^2:H\Gamma^2$, et $\Delta E:EZ$ rationem

non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, ne BH^2 quidem ad $H\Gamma^2$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque BH , $H\Gamma$ longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. et utraque rationalis est. quare BH , $H\Gamma$ rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo $B\Gamma$ apotome est [prop. LXXIII].

Iam dico, eandem quintam esse.

sit enim $\Theta^2 = BH^2 \div H\Gamma^2$ [prop. XIII lemma]. quoniam igitur est

$$BH^2 : H\Gamma^2 = \Delta E : EZ,$$

$\tau\eta\varsigma BH$. $\phi\eta\tau\acute{o}\nu$ δὲ τὸ ἀπὸ $\tau\eta\varsigma \Gamma H$ b, mg. FV. $\phi\eta\tau\acute{o}\nu - HB$ mg. V. $\acute{\alpha}\rho\alpha - 13$. $\phi\eta\tau\acute{\eta}$] om. P. 15. $H\Gamma$] Γ in ras. V.

16. οὐδ' $\acute{\alpha}\rho\alpha$] οὐδ' P. 18. $\tau\epsilon\tau\rho\acute{\alpha}\gamma\omega\gamma\omega\upsilon\upsilon\upsilon$] $\tau\epsilon\tau\rho\acute{\alpha}\gamma\omega\gamma\omega\varsigma$ b, sed corr. 21. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ BV, comp. Fb. 25. $H\Gamma - p. 270, 1. EZ$] in ras. F.

EZ , ἀναστρέψαντι ἄρα ἐστὶν ὡς ὁ $EΔ$ πρὸς τὸν $ΔΖ$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς BH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $Θ$. ὁ δὲ $EΔ$ πρὸς τὸν $ΔΖ$ λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· οὐδ' ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς BH
 5 πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $Θ$ λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ BH τῇ $Θ$ μήκει. καὶ δύναται ἡ BH τῆς $HΓ$ μείζον τῷ ἀπὸ τῆς $Θ$ · ἡ HB ἄρα τῆς $HΓ$ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ μήκει. καὶ ἐστὶν ἡ προσ-
 10 αρμόζουσα ἡ $ΓH$ σύμμετρος τῇ ἐκκειμένην ῥητῇ τῇ $Α$ μήκει· ἡ ἄρα $BΓ$ ἀποτομή ἐστὶ πέμπτη.

Εὐρηται ἄρα ἡ πέμπτη ἀποτομή ἡ $BΓ$ · ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

α'.

15 Εὐρεῖν τὴν ἑκτὴν ἀποτομήν.

Ἐκκείσθω ῥητὴ ἡ $Α$ καὶ τρεῖς ἀριθμοὶ οἱ $E, BΓ, ΓΔ$ λόγον μὴ ἔχοντες πρὸς ἀλλήλους, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· ἔτι δὲ καὶ ὁ $ΓB$ πρὸς τὸν $BΔ$ λόγον μὴ ἔχέτω, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς
 20 πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· καὶ πεποιήσθω ὡς μὲν ὁ E πρὸς τὸν $BΓ$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς $Α$ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ZH , ὡς δὲ ὁ $BΓ$ πρὸς τὸν $ΓΔ$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ZH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $HΘ$.

Ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς ὁ E πρὸς τὸν $BΓ$, οὕτως τὸ
 25 ἀπὸ τῆς $Α$ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ZH , σύμμετρον ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς $Α$ τῷ ἀπὸ τῆς ZH . ῥητὸν δὲ τὸ ἀπὸ τῆς $Α$ · ῥητὸν ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ZH · ῥητὴ ἄρα ἐστὶ καὶ

1. ἀναστρέψαντι — 2. $EΔ$] e corr. F. 1. ἐστίν] om. Bf. EΔ] ΔE P. 4. HB F. 7. Θ] HΘ F. BH] HB BFV. μείζον] om. P. 8. ἄρα HB V. BH P. δύναται] om. V. 9. ἀσυμμέτρου] ἀ- in ras. V, m. 2 B. ἑαυτῇ δύναται V. 10. Post ΓH eras. καὶ ἀ- V. 11. BΓ ἄρα b.

conuertendo [V, 19 coroll.] est $E\Delta : \Delta Z = BH^2 : \Theta^2$.
 uerum $E\Delta : \Delta Z$ rationem non habet, quam numerus
 quadratus ad numerum quadratum. itaque ne BH^2
 quidem ad Θ^2 rationem habet, quam numerus quadratus
 ad numerum quadratum. quare BH , Θ longitudine
 incommensurabiles sunt [prop. IX]. est autem

$$BH^2 + H\Gamma^2 = \Theta^2.$$


itaque HB quadrata excedit $H\Gamma$ quadrato rectae sibi
 incommensurabilis. et congruens ΓH rationali pro-
 positae A longitudine commensurabilis est. itaque
 $B\Gamma$ apotome est quinta [def. tert. 5].

Ergo inuenta est apotome quinta $B\Gamma$; quod erat
 demonstrandum.

XC.

Inuenire apotomen sextam.

Ponatur rationalis A et tres numeri E , $B\Gamma$, $\Gamma\Delta$
 inter se rationem non habentes, quam numerus qua-



dratus ad numerum quadratum; et
 praeterea ne ΓB quidem ad $B\Delta$
 rationem habeat, quam numerus
 quadratus ad numerum quadra-
 tum. et fiat $E : B\Gamma = A^2 : ZH^2$,
 $B\Gamma : \Gamma\Delta = ZH^2 : H\Theta^2$.

iam quoniam est $E : B\Gamma = A^2 : ZH^2$, erunt A^2 ,
 ZH^2 commensurabilia [prop. VI]. uerum A^2 rationale
 est. itaque etiam ZH^2 rationale est. quare etiam

12. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. BFVb. 16. συγκρίσθω
 B, corr. m. 2. Post E eras. B F. 18. ΓB] supra add.
 $\Gamma\Delta$ B; $B\Gamma$ V. 19. $B\Delta$] corr. ex $B\Gamma$ m. rec. P. 20. πε-
 ποιήσθω P, sed corr.; πεποιεῖσθω F. μὲν ὁ] ὁ μὲν V. 22.
 τόν] om. B. 23. $H\Theta$] ΘH b. 26. ῥητόν — 27. ZH]
 mg. V. 27. καί] ἐστὶ καὶ BFb. ἐστὶν PB.

ἡ ZH . καὶ ἐπεὶ ὁ E πρὸς τὸν $BΓ$ λόγον οὐκ ἔχει,
 ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν,
 οὐδ' ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς A πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ZH λόγον
 ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν.
 5 ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ A τῇ ZH μήκει. πάλιν, ἐπεὶ
 ἐστὶν ὡς ὁ $BΓ$ πρὸς τὸν $ΓΔ$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ZH
 πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $HΘ$, σύμμετρον ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς ZH
 τῷ ἀπὸ τῆς $HΘ$. ῥητὸν δὲ τὸ ἀπὸ τῆς ZH . ῥητὸν
 ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς $HΘ$. ῥητὴ ἄρα καὶ ἡ $HΘ$. καὶ
 10 ἐπεὶ ὁ $BΓ$ πρὸς τὸν $ΓΔ$ λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετράγωνος
 ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, οὐδ' ἄρα τὸ ἀπὸ
 τῆς ZH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $HΘ$ λόγον ἔχει, ὃν τετρά-
 γωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· ἀσύμμετρος
 ἄρα ἐστὶν ἡ ZH τῇ $HΘ$ μήκει. καὶ εἰσιν ἀμφοτέραι
 15 ῥηταί· αἱ ZH , $HΘ$ ἄρα ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμ-
 μετροι· ἡ ἄρα $ZΘ$ ἀποτομή ἐστίν.

Λέγω δὴ, ὅτι καὶ ἔκτε.

Ἐπεὶ γάρ ἐστὶν ὡς μὲν ὁ E πρὸς τὸν $BΓ$, οὕτως
 τὸ ἀπὸ τῆς A πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ZH , ὡς δὲ ὁ $BΓ$
 20 πρὸς τὸν $ΓΔ$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ZH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς
 $HΘ$, δι' ἴσου ἄρα ἐστὶν ὡς ὁ E πρὸς τὸν $ΓΔ$, οὕτως
 τὸ ἀπὸ τῆς A πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $HΘ$. ὁ δὲ E πρὸς
 τὸν $ΓΔ$ λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς
 τετράγωνον ἀριθμόν· οὐδ' ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς A πρὸς
 25 τὸ ἀπὸ τῆς $HΘ$ λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς
 πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ
 A τῇ $HΘ$ μήκει· οὐδετέρα ἄρα τῶν ZH , $HΘ$ σύμ-
 μετρός ἐστι τῇ A ῥητῇ μήκει. ᾧ οὖν μεῖζόν ἐστι

1. HZ P. 3. οὐδέ Vb. 5. ἐστὶ V. A] K φ. τῇ]
 τῆς F. 6. ἡ $BΓ$ πρὸς τὴν B. 7. ἄρα ἐστὶ V. 11. οὐδέ V.
 15. σύμμετροι μόνον V. 16. ἐστὶ BV, comp. Fb. 17. δῆ]

ZH rationalis est. et quoniam $E:BF$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, ne A^2 quidem ad ZH^2 rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque A, ZH longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. rursus quoniam est

$$BF:FA = ZH^2:HO^2,$$

ZH^2 et HO^2 commensurabilia sunt [prop. VI]. uerum ZH^2 rationale est; quare etiam HO^2 rationale est. itaque HO rationalis est. et quoniam $BF:FA$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum, ne ZH^2 quidem ad HO^2 rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque ZH, HO longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. et utraque rationalis est. itaque ZH, HO rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo ZO apotome est [prop. LXXIII].

Iam dico, eandem sextam esse. nam quoniam est $E:BF = A^2:ZH^2$, $BF:FA = ZH^2:HO^2$, ex aequo [V, 22] est $E:FA = A^2:HO^2$. uerum $E:FA$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque ne A^2 quidem ad HO^2 rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. quare A, HO longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. ergo neutra rectarum ZH, HO rationali A commensurabilis est longitudine. iam sit $K^2 = ZH^2 \div HO^2$ [prop.

supra scr. m. 1 P. 21. $\epsilon\sigma\tau\iota\nu \alpha\beta\alpha$ F. 24. $\sigma\upsilon\delta'$ — 26. $\alpha\rho\iota\theta\mu\acute{o}\nu$] mg. m. 2 B. 24. $\sigma\upsilon\delta' \alpha\beta\alpha$] $\sigma\upsilon\delta\epsilon$ b. A] A $\alpha\beta\alpha$ b. 25. HO] mut. in ΘH m. 2 V, ΘH b. 27. $\sigma\upsilon\delta\epsilon\tau\epsilon\beta\alpha \alpha\beta\alpha$] $\kappa\alpha\iota \sigma\upsilon\delta\epsilon\tau\epsilon\beta\alpha$ BVb. 28. $\tau\eta A \phi\eta\tau\eta$] $\tau\eta \epsilon\kappa\kappa\epsilon\iota\mu\acute{\epsilon}\nu\eta \phi\eta\tau\eta \tau\eta A$ b et e corr. F (post A del. $\phi\eta\tau\eta$). ϕ] $\acute{\omega}\varsigma$ b. $\sigma\upsilon\nu$] $\sigma\upsilon$ P, corr. m. 2.

τὸ ἀπὸ τῆς ZH τοῦ ἀπὸ τῆς $H\Theta$, ἔστω τὸ ἀπὸ τῆς K .
 ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς ὁ $B\Gamma$ πρὸς τὸν $\Gamma\Delta$, οὕτως τὸ ἀπὸ
 τῆς ZH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $H\Theta$, ἀναστρέψαντι ἄρα ἐστὶν
 ὡς ὁ ΓB πρὸς τὸν $B\Delta$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ZH πρὸς
 5 τὸ ἀπὸ τῆς K . ὁ δὲ ΓB πρὸς τὸν $B\Delta$ λόγον οὐκ
 ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν·
 οὐδ' ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς ZH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς K λόγον
 ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν·
 ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ ZH τῇ K μήκει. καὶ δύνатаι
 10 ἡ ZH τῆς $H\Theta$ μείζον τῷ ἀπὸ τῆς K . ἡ ZH ἄρα τῆς
 $H\Theta$ μείζον δύνатаι τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἐαυτῇ μήκει.
 καὶ οὐδετέρᾳ τῶν ZH , $H\Theta$ σύμμετρός ἐστι τῇ ἐκκει-
 μένῃ φητὶ μήκει τῇ A . ἡ ἄρα $Z\Theta$ ἀποτομή ἐστὶν ἕκτη.
 Εὐρηται ἄρα ἡ ἕκτη ἀποτομή ἡ $Z\Theta$. ὅπερ ἔδει
 15 δεῖξαι.

qa'.

Ἐὰν χωρίον περιέχεται ὑπὸ φητῆς καὶ ἀπο-
 τομῆς πρώτης, ἡ τὸ χωρίον δυναμένη ἀποτομή
 ἐστὶν.

20 Περιεχέσθω γὰρ χωρίον τὸ AB ὑπὸ φητῆς τῆς AG
 καὶ ἀποτομῆς πρώτης τῆς AD . λέγω, ὅτι ἡ τὸ AB
 χωρίον δυναμένη ἀποτομή ἐστὶν.

Ἐπεὶ γὰρ ἀποτομή ἐστὶ πρώτη ἡ AD , ἔστω αὐτῇ
 προσαρμόζουσα ἡ AH . αἱ AH , HA ἄρα φηταὶ εἰσι
 25 δυνάμει μόνον σύμμετροι. καὶ ὅλη ἡ AH σύμμετρός
 ἐστὶ τῇ ἐκκειμένῃ φητὶ τῇ AG , καὶ ἡ AH τῆς HA
 μείζον δύνатаι τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἐαυτῇ μήκει· ἐὰν

3. ἄρα] om. F. 4. ΓB] $B\Gamma$ FB. $B\Delta$] supra add. F
 m. 1 b. ΔB corr. ex $B\Delta$ uel $B\Gamma$ V. 5. τῆς] τοῦ φ. 8.
 ἔχει] οὐκ ἔχει P. 10. τῷ] corr. ex τό m. 1 F. ἡ] in ras.
 m. 1 P. 11. συμμέτρου B, corr. m. 2. 13. τῇ A μήκει V.
 14. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. BFV b. Seq. demonstr.

XIII lemma]. quoniam igitur est $B\Gamma : \Gamma\Delta = ZH^2 : H\Theta^2$, conuertendo [V, 19 coroll.] est



$$\Gamma B : B\Delta = ZH^2 : K^2.$$

uerum $\Gamma B : B\Delta$ rationem non habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. itaque ne ZH^2 quidem ad K^2 rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum. quare ZH, K longitudine incommensurabiles sunt [prop. IX]. est autem $ZH^2 \div H\Theta^2 = K^2$. itaque ZH quadrata excedit $H\Theta$ quadrato rectae sibi incommensurabilis. et neutra rectarum $ZH, H\Theta$ rationali propositae Δ commensurabilis est longitudine. itaque $Z\Theta$ apotome est sexta [def. tert. 6].

Ergo inuenta est apotome sexta $Z\Theta$; quod erat demonstrandum.

XCI.

Si spatium comprehenditur recta rationali et apotome prima, recta spatio aequalis quadrata apotome est.



Spatium enim AB rationali $A\Gamma$ et apotome prima $A\Delta$ comprehendatur. dico, rectam spatio AB aequalem quadratam apotomen esse.

nam quoniam $A\Delta$ apotome est prima, ei congruens sit ΔH . itaque $AH, H\Delta$ rationales sunt potentia tantum commensurabiles [prop.

alt., u. app. 16. $q' F, q\theta' BVb$, et sic deinceps. 19. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota BV$, comp. Fb. 20. $\tau\acute{o}] \tau\acute{\omega} V$. 21. $\eta]$ m. 2 F. 23. $\gamma\acute{\alpha}\rho]$ om. b, m. 2 B. $\pi\rho\acute{\omega}\tau\eta \acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\nu BFV$. 24. $AH, H\Delta]$ in ras. m. 2 V. 27. $\acute{\alpha}\sigma\upsilon\mu\mu\acute{\epsilon}\tau\rho\omicron\nu F$, et V, sed corr.

ἄρα τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς ΔH ἴσον παρὰ τὴν AH παραβληθῇ ἔλλειπον εἶδει τετραγώνῳ, εἰς σύμμετρα αὐτὴν διαιρεῖ. τετμήσθω ἡ ΔH δίχα κατὰ τὸ E , καὶ τῷ ἀπὸ τῆς EH ἴσον παρὰ τὴν AH παραβελήσθω ἔλλειπον εἶδει τετραγώνῳ, καὶ ἔστω τὸ ὑπὸ τῶν AZ, ZH · σύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ AZ τῇ ZH . καὶ διὰ τῶν E, Z, H σημείων τῇ AG παράλληλοι ἤχθωσαν αἱ $E\Theta, ZI, HK$.

- Καὶ ἐπεὶ σύμμετρός ἐστὶν ἡ AZ τῇ ZH μήκει,
 10 καὶ ἡ AH ἄρα ἐκατέρᾳ τῶν AZ, ZH σύμμετρός ἐστι μήκει. ἀλλὰ ἡ AH σύμμετρός ἐστι τῇ AG · καὶ ἐκατέρᾳ ἄρα τῶν AZ, ZH σύμμετρός ἐστι τῇ AG μήκει. καὶ ἐστὶ φητὴ ἡ AG · φητὴ ἄρα καὶ ἐκατέρᾳ τῶν AZ, ZH · ὥστε καὶ ἐκάτερον τῶν AI, ZK φητόν ἐστιν.
 15 καὶ ἐπεὶ σύμμετρός ἐστὶν ἡ ΔE τῇ EH μήκει, καὶ ἡ ΔH ἄρα ἐκατέρᾳ τῶν $\Delta E, EH$ σύμμετρός ἐστι μήκει. φητὴ δὲ ἡ ΔH καὶ ἀσύμμετρος τῇ AG μήκει· φητὴ ἄρα καὶ ἐκατέρᾳ τῶν $\Delta E, EH$ καὶ ἀσύμμετρος τῇ AG μήκει· ἐκάτερον ἄρα τῶν $\Delta\Theta, EK$ μέσον ἐστίν.
 20 Κεῖσθω δὲ τῷ μὲν AI ἴσον τετράγωνον τὸ AM , τῷ δὲ ZK ἴσον τετράγωνον ἀφηρήσθω κοινὴν γωνίαν ἔχον αὐτῷ τὴν ὑπὸ ΛOM τὸ $N\Xi$ · περὶ τὴν αὐτὴν ἄρα διάμετρόν ἐστι τὰ $AM, N\Xi$ τετράγωνα. ἔστω αὐτῶν διάμετρος ἡ OP , καὶ καταγεγράφθω τὸ σχῆμα.
 25 ἐπεὶ οὖν ἴσον ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν AZ, ZH περιεχόμενον

1. μέρει] -ερ- in ras. B. τοῦ ἀπό] m. 2 F. 2. τὴν] corr. ex τῆς m. 2 F. AH] A in ras. F. 3. διαιρεῖ] supra add. μήκει m. 2 V, διελεί BF, διέλη b. 4. τῷ] τὸ F. 6. ZH] (alt.) HZ F. 8. ἤχθωσαν] ἤχθω- in ras. m. 1 P. ZI] mut. in ZH m. 2 F. 9. τῇ] τῆς F. 11. ἀλλ' F. AG] Γe corr. m. 1 F. 13. ἐστὶν P. 14. AI] AG P, I in ras. V. ἐστὶν] ἐστι BV, comp. Fb. 15. καί] (alt.) om. V. 19. ἐστὶ PBV, comp. Fb. 20. καὶ κεῖσθω V. 22. $\Lambda O, OM$

LXXIII]. et tota AH rationali propositae AF commensurabilis est, et AH quadrata excedit HA quadrato rectae sibi longitudine commensurabilis [deff. tert. 1]. itaque si quartae parti quadrati AH^2 aequale rectae AH adplicatur spatium figura quadrata deficiens, in partes commensurabiles eam diuidit [prop. XVII]. secetur AH in duas partes aequales in E , et quadrato EH^2 aequale rectae AH adplicetur spatium figura quadrata deficiens, et sit $AZ < ZH$. itaque AZ , ZH commensurabiles sunt. et per puncta E , Z , H rectae AF parallelae ducantur $E\Theta$, ZI , HK .

et quoniam AZ , ZH longitudine commensurabiles sunt, etiam AH utrique AZ , ZH commensurabilis est [prop. XV]. uerum AH , AF commensurabiles sunt. quare etiam utraque AZ , ZH rectae AF longitudine commensurabilis est [prop. XII]. et AF rationalis est. quare etiam utraque AZ , ZH rationalis est. itaque etiam utrumque AI , ZK rationale est [VI, 1; prop. XI]. et quoniam AE , EH longitudine commensurabiles sunt, etiam AH utrique AE , EH longitudine commensurabilis est [prop. XV]. uerum AH rationalis est et rectae AF longitudine incommensurabilis. quare etiam utraque AE , EH rationalis est et rectae AF longitudine incommensurabilis [prop. XIII]. ergo utrumque $A\Theta$, EK medium est [prop. XX].

ponatur igitur quadratum $AM = AI$, et spatio ZK aequale auferatur quadratum $N\Xi$ communem angulum habens AOM . itaque quadrata AM , $N\Xi$

PF, τῶν AO , OM Bb. 23. ἐστὶ εἶναι V. τετράγωνον] om. V.
 25. τό] in ras. V. τῶν] m. 2 F. περιεχόμενον] -ον in ras. V.

ὁρθογώνιον τῷ ἀπὸ τῆς EH τετραγώνῳ, ἔστιν ἄρα
ὡς ἡ AZ πρὸς τὴν EH , οὕτως ἡ EH πρὸς τὴν ZH .
ἀλλ' ὡς μὲν ἡ AZ πρὸς τὴν EH , οὕτως τὸ AI πρὸς
τὸ EK , ὡς δὲ ἡ EH πρὸς τὴν ZH , οὕτως ἐστὶ τὸ
5 EK πρὸς τὸ KZ . τῶν ἄρα AI , KZ μέσον ἀνάλογόν
ἐστὶ τὸ EK . ἔστι δὲ καὶ τῶν AM , $NΞ$ μέσον ἀνά-
λογον τὸ MN , ὡς ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἐδείχθη, καὶ
ἐστὶ τὸ [μὲν] AI τῷ AM τετραγώνῳ ἴσον, τὸ δὲ KZ
τῷ $NΞ$. καὶ τὸ MN ἄρα τῷ EK ἴσον ἐστίν. ἀλλὰ
10 τὸ μὲν EK τῷ $ΔΘ$ ἐστὶν ἴσον, τὸ δὲ MN τῷ $ΑΞ$.
τοῦ ἄρα $ΔK$ ἴσον ἐστὶ τῷ $ΓΦX$ γνώμονι καὶ τῷ $NΞ$.
ἔστι δὲ καὶ τὸ AK ἴσον τοῖς AM , $NΞ$ τετραγώνοις.
λοιπὸν ἄρα τὸ AB ἴσον ἐστὶ τῷ $ΣΤ$. τὸ δὲ $ΣΤ$ τὸ
ἀπὸ τῆς AN ἐστὶ τετράγωνον. τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς AN ,
15 τετράγωνον ἴσον ἐστὶ τῷ AB . ἡ AN ἄρα δύναται
τὸ AB .

Λέγω δὴ, ὅτι ἡ AN ἀποτομή ἐστίν.

Ἐπεὶ γὰρ ῥητόν ἐστὶν ἐκάτερον τῶν AI , ZK , καὶ
ἐστὶν ἴσον τοῖς AM , $NΞ$, καὶ ἐκάτερον ἄρα τῶν AM ,
20 $NΞ$ ῥητόν ἐστίν, τουτέστι τὸ ἀπὸ ἐκατέρας τῶν AO ,
 ON . καὶ ἐκάτερα ἄρα τῶν AO , ON ῥητὰ ἐστίν.
πάλιν, ἐπεὶ μέσον ἐστὶ τὸ $ΔΘ$ καὶ ἐστὶν ἴσον τῷ $ΑΞ$,
μέσον ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ $ΑΞ$. ἐπεὶ οὖν τὸ μὲν $ΑΞ$
μέσον ἐστίν, τὸ δὲ $NΞ$ ῥητόν, ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ
25 τὸ $ΑΞ$ τῷ $NΞ$. ὡς δὲ τὸ $ΑΞ$ πρὸς τὸ $NΞ$, οὕτως
ἐστὶν ἡ AO πρὸς τὴν ON . ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ

2. τῇ] (prius) om. P. 6. Post ἀνάλογον ras. 3 litt. V. 7. NM B. 8. μὲν] om. BFVb. 9. τό] τῷ b. MN] EK in ras. V. EK] MN in ras. V. ἐστὶν ἴσον V. 10. τό] (prius) τῷ V. τῷ] ἴσον ἐστὶ τό V. τῷ $ΔΘ$] in ras. m. 1 P. ἐστὶν ἴσον] om. V, ἴσον ἐστίν F. τῷ δὲ MN ἴσον ἐστὶ τὸ $ΑΞ$. ἴσον ἄρα τὸ $ΔK$ τῷ V. 12. ἴσον] om. V (supra

circum eandem diametrum posita sunt [VI, 26]. sit OP diametrus eorum, et describatur figura [cfr. uol. I p. 137 not.]. iam quoniam est $AZ \times ZH = EH^2$, erit [VI, 17] $AZ:EH = EH:ZH$. uerum $AZ:EH = AI:EK$ et $EH:ZH = EK:KZ$ [VI, 1]. itaque EK medium proportionale est inter AI , KZ . est autem etiam MN medium proportionale inter AM , $NΞ$, sicuti supra [prop. LIII lemma] demonstratum est, et $AI = AM$, $KZ = NΞ$. itaque etiam $MN = EK$. est autem $EK = AO$, $MN = AΞ$ [I, 43]. itaque $AK = TOX + NΞ$. uerum etiam $AK = AM + NΞ$. itaque reliquum $AB = ΣT$. est autem $ΣT = AN^2$. quare $AN^2 = AB$. ergo AN quadrata spatio AB aequalis est.

Iam dico, AN apotomen esse.

nam quoniam utrumque AI , ZK rationale est, et

$$AI = AM, ZK = NΞ,$$

etiam utrumque AM , $NΞ$, hoc est AO^2 , ON^2 , rationale est. quare etiam utraque AO , ON rationalis est. rursus quoniam AO medium est, et $AO = AΞ$, etiam $AΞ$ medium est. iam quoniam $AΞ$ medium est, $NΞ$ autem rationale, $AΞ$ et $NΞ$ incommensurabilia sunt. uerum $AΞ:NΞ = AO:NO$ [VI, 1]. itaque AO , ON longitudine incommensurabiles sunt [prop. XI]. et utraque rationalis est; itaque AO , ON ra-

est ras.). 13. $ΣT$] corr. ex $BΓ$ V. τὸ δὲ $ΣT$] supra scr. m. 1 P. τὸ] corr. ex. τῶ FV. 15. ἐστὶ] postea ins. F. τῶ] τό F. 17. καὶ ἡ P. 19. ἐστὶ V. [τοῦ] τὰ Bb, om. V. $NΞ$ τὰ V. 20. ἐστὶ BV, comp. Fb. 21. ἐστὶ PBV, comp. Fb. 23. ἐστὶ] ἐστὶν P, om. V. 24. ἐστὶν] ἐστὶ PBVb, comp. F. 25. $NΞ$] (prius) corr. ex NK m. 1 b. τὸ] (tert.) in ras. m. 1 P.

ΑΟ τῇ ΟΝ μήκει. καὶ εἰσιν ἀμφοτέραι ρηταί· αἱ ΑΟ, ΟΝ ἄρα ρηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· ἀποτομή ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΝ. καὶ δύναται τὸ ΑΒ χωρίον· ἡ ἄρα τὸ ΑΒ χωρίον δυναμένη ἀποτομή ἐστίν.

5 Ἐὰν ἄρα χωρίον περιέχεται ὑπὸ ρητῆς καὶ τὰ ἐξῆς.

αβ'.

Ἐὰν χωρίον περιέχεται ὑπὸ ρητῆς καὶ ἀποτομῆς δευτέρας, ἡ τὸ χωρίον δυναμένη μέσης ἀποτομή ἐστὶ πρώτη.

10 Χωρίον γὰρ τὸ ΑΒ περιεχέσθω ὑπὸ ρητῆς τῆς ΑΓ καὶ ἀποτομῆς δευτέρας τῆς ΑΔ· λέγω, ὅτι ἡ τὸ ΑΒ χωρίον δυναμένη μέσης ἀποτομή ἐστὶ πρώτη.

Ἔστω γὰρ τῇ ΑΔ προσαρμόζουσα ἡ ΔΗ· αἱ ἄρα ΑΗ, ΗΔ ρηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ ἡ
15 προσαρμόζουσα ἡ ΔΗ σύμμετρός ἐστὶ τῇ ἐκκειμένῃ ρητῇ τῇ ΑΓ, ἡ δὲ ὅλη ἡ ΑΗ τῆς προσαρμοζούσης τῆς ΗΔ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἐαυτῇ μήκει. ἐπεὶ οὖν ἡ ΑΗ τῆς ΗΔ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἐαυτῇ, ἔαν ἄρα τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς
20 ΗΔ ἴσον παρὰ τὴν ΑΗ παραβληθῇ ἔλλειπον εἶδει τετραγώνῳ, εἰς σύμμετρα αὐτὴν διαιρεῖ. τετμήσθω οὖν ἡ ΔΗ δίχα κατὰ τὸ Ε· καὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΕΗ ἴσον παρὰ τὴν ΑΗ παραβελήσθω ἔλλειπον εἶδει τετραγώνῳ,

2. ΟΝ] NO e corr. V. εἰσιν V, sed v del. 4. τὸ ΑΒ ἄρα V. 5. καὶ τὰ ἐξῆς] καὶ ἀποτομῆς πρώτης, ἡ τὸ χωρίον δυναμένη ἀποτομή ἐστίν Theon (BFVb). 8. μέση BFVb et P, sed corr. m. 1. 11. ΑΔ] AB b; δὲ ΑΔ P, corr. m. 1. 12. ΑΒ] corr. ex ΑΔ V. μέση BFb, et V, corr. m. 2. 14. ΗΔ] ΔΗ F. δυναμένη V, corr. m. 2. 16. τῆς] om. F. 17. ΗΔ] eras. V. Ante συμμέτρου ras. 1 litt. V. 18. ΑΗ] H in ras. V. τῆς] corr. ex τῇ m. 2 V. 19. τοῦ]

tionales sunt potentia tantum commensurabiles. quare AN apotome est [prop. LXXIII]. et quadrata spatio AB est aequalis. itaque recta spatio AB aequalis quadrata apotome est.


Ergo si spatium comprehenditur recta rationali, et quae sequuntur.

XCII.

Si spatium recta rationali et apotome secunda comprehenditur, recta spatio aequalis quadrata mediae apotome est prima.

Spatium enim AB recta rationali AG et apotome secunda AD comprehendatur. dico, rectam spatio AB aequalem quadratam mediae apotomen primam esse.

nam ADH rectae AD congruens sit. itaque AH , HD rationales sunt potentia tantum commensurabiles [prop. LXXIII], et congruens ADH rationali propositae AG commensurabilis est, tota autem AH quadrata excedit congruentem HD quadrato rectae sibi commensurabilis longitudine [def. tert. 2]. iam quoniam AH^2 excedit HD^2 quadrato rectae sibi commen-



surabilis, si $\frac{1}{4}HD^2$ aequale rectae AH adplicatur spatium figura quadrata deficiens, in partes commensurabiles eam diuidit [prop. XVII]. iam ADH in puncto E in duas partes aequales secetur. et quadrato EH^2 aequale

τὸ β. 20. ADH] H e corr. V. 21. $\delta\epsilon\lambda\epsilon\iota$ Theon (BFVb).
Dein add. $\mu\eta\chi\epsilon\iota$ V. 22. ADH] e corr. m. 2 V. EH] $\Theta H P$.

καὶ ἔστω τὸ ὑπὸ τῶν AZ, ZH σύμμετρος ἄρα ἐστὶν
 ἢ AZ τῇ ZH μήκει. καὶ ἡ AH ἄρα ἐκάτερά τῶν $AZ,$
 ZH σύμμετρός ἐστι μήκει. ῥητὴ δὲ ἡ AH καὶ ἀσύμ-
 5 μετρος τῇ AG μήκει· καὶ ἐκάτερα ἄρα τῶν AZ, ZH
 ῥητὴ ἐστὶ καὶ ἀσύμμετρος τῇ AG μήκει· ἐκάτερον ἄρα
 τῶν AI, ZK μέσον ἐστίν. πάλιν, ἐπεὶ σύμμετρός
 ἐστὶν ἡ AE τῇ EH , καὶ ἡ AH ἄρα ἐκάτερά τῶν $AE,$
 EH σύμμετρός ἐστιν. ἀλλ' ἡ AH σύμμετρός ἐστὶ τῇ
 AG μήκει [ῥητὴ ἄρα καὶ ἐκάτερα τῶν AE, EH καὶ
 10 σύμμετρος τῇ AG μήκει]. ἐκάτερον ἄρα τῶν AE, EK
 ῥητόν ἐστιν.

Συνεσιτάτω οὖν τῷ μὲν AI ἴσον τετράγωνον τὸ
 AM , τῷ δὲ ZK ἴσον ἀφρορήσθω τὸ $NΞ$ περὶ τὴν
 αὐτὴν γωνίαν ὅν τῷ AM τὴν ὑπὸ τῶν AO, M · περὶ
 15 τὴν αὐτὴν ἄρα ἐστὶ διάμετρον τὰ $AM, NΞ$ τετράγωνα.
 ἔστω αὐτῶν διάμετρος ἡ OP , καὶ καταγεγράφθω τὸ
 σχῆμα. ἐπεὶ οὖν τὰ AI, ZK μέσα ἐστὶ καὶ ἐστὶν ἴσα
 τοῖς ἀπὸ τῶν AO, ON , καὶ τὰ ἀπὸ τῶν AO, ON
 [ἄρα] μέσα ἐστίν· καὶ αἱ AO, ON ἄρα μέσαι εἰσὶ
 20 δυνάμει μόνον σύμμετροι. καὶ ἐπεὶ τὸ ὑπὸ τῶν $AZ,$
 ZH ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς EH , ἔστιν ἄρα ὥς ἡ AZ
 πρὸς τὴν EH , οὕτως ἡ EH πρὸς τὴν ZH · ἀλλ' ὥς
 μὲν ἡ AZ πρὸς τὴν EH , οὕτως τὸ AI πρὸς τὸ EK ·
 ὥς δὲ ἡ EH πρὸς τὴν ZH , οὕτως [ἐστὶ] τὸ EK πρὸς
 25 τὸ ZK · τῶν ἄρα AI, ZK μέσον ἀνάλογόν ἐστὶ τὸ

1. ἀσύμμετρος b, sed corr. 2. Post μήκει add. καὶ διὰ
 τῶν E, Z, H σημείων τῇ AG παράλληλοι ἤχθωσαν αἱ EΘ, ZI,
 HK (corr. ex ZK V). καὶ ἐπεὶ σύμμετρός ἐστὶν ἡ AZ τῇ ZH
 μήκει b, V mg. m. 1, F mg., sed euan. 4. ἄρα] om. FV. 6.
 AI] mut. in AZ F, AZ b. ZH b, et e corr. F. ἐστὶ BV,
 comp. Fb. 7. ἡ AH] HΔ F. 8. ἐστὶ] m. 2 B. 9. ῥητὴ
 — 10. μήκει] om. P. 9. AE, EH] E bis in ras. V. 10.
 καὶ ἐκάτερον b. 11. ἐστὶ PBV, comp. Fb. 12. τῷ] corr.

rectae AH spatium adplicetur figura quadrata deficiens, et sit $AZ \times ZH$. itaque AZ , ZH longitudine commensurabiles sunt. itaque etiam AH utrique AZ , ZH longitudine commensurabilis est [prop. XV]. uerum AH rationalis est et rectae AF longitudine incommensurabilis. itaque etiam utraque AZ , ZH rationalis est et rectae AF longitudine incommensurabilis [prop. XIII]. quare utrumque AI , ZK medium est [prop. XX]. rursus quoniam AE , EH commensurabiles sunt, etiam AH utrique AE , EH commensurabilis est [prop. XV].¹⁾ uerum AH , AF longitudine commensurabiles sunt. ergo utrumque AE , EK rationale est.

iam construatur quadratum $AM = AI$, et spatio ZK aequale auferatur $N\mathcal{E}$ in eodem angulo AOM positum, quo AM . itaque quadrata AM , $N\mathcal{E}$ circum eandem diametrum posita sunt [VI, 26]. sit OP eorum diametrus, et describatur figura [cfr. uol. I p. 137 not.]. iam quoniam AI , ZK media sunt et $AI = AO^2$, $ZK = ON^2$, etiam AO^2 , ON^2 media sunt. quare etiam AO , ON mediae sunt potentia tantum commensurabiles. et quoniam $AZ \times ZH = EH^2$, erit [VI, 17] $AZ:EH = EH:ZH$. uerum $AZ:EH = AI:EK$

1) Hoc promptius ex prop. VI concludi poterat; nam $AH = 2 AE = 2 EH$.

ex ó V, τό F. 14. δν τῷ AM] e corr. F. τήν] τῷ P. τῶν] om. V. 15. ἐστὶν ἄρα V. 17. Post ἐστὶ add. Theon: καὶ σύμμετρα ἀλλήλοις (BFVb; in V post καὶ ras. 1 litt.). ἴσον F.

19. ἄρα] om. P. μέσαι εἰσὶ V, sed corr. ἐστὶ PB, comp. Fb. καὶ] corr. ex δν- V. αὶ — 20. δν-] mg. m. 2 V.

19. εἰσὶ] εἰσὶν λέγω δτι καὶ P. 20. μόνον] eras. V. σύμμετρα V, corr. m. 2. καὶ ἐπεὶ] ἐπεὶ γάρ P. 21. ἐστὶ] supra scr. m. 1 F. ἐστὶν] corr. ex ἴσον m. 1 F. 23. AI] AH P. 24.

ἐστὶ] om. P. 25. ZK] (alt.) Z corr. ex K m. 1 V.

ΕΚ. ἔστι δὲ καὶ τῶν ΑΜ, ΝΞ τετραγώνων μέσον
 ἀνάλογον τὸ ΜΝ· καὶ ἔστιν ἴσον τὸ μὲν ΑΙ τῷ ΑΜ,
 τὸ δὲ ΖΚ τῷ ΝΞ· καὶ τὸ ΜΝ ἄρα ἴσον ἔστι τῷ ΕΚ.
 ἀλλὰ τῷ μὲν ΕΚ ἴσον [ἔστι] τὸ ΑΘ, τῷ δὲ ΜΝ ἴσον
 5 τὸ ΑΞ· ὅλον ἄρα τὸ ΑΚ ἴσον ἔστι τῷ ΤΦΧ γινώμονι
 καὶ τῷ ΝΞ. ἐπεὶ οὖν ὅλον τὸ ΑΚ ἴσον ἔστι τοῖς
 ΑΜ, ΝΞ, ὧν τὸ ΑΚ ἴσον ἔστι τῷ ΤΦΧ γινώμονι
 καὶ τῷ ΝΞ, λοιπὸν ἄρα τὸ ΑΒ ἴσον ἔστι τῷ ΤΣ.
 τὸ δὲ ΤΣ ἔστι τὸ ἀπὸ τῆς ΑΝ· τὸ ἀπὸ τῆς ΑΝ ἄρα
 10 ἴσον ἔστι τῷ ΑΒ χωρίῳ· ἡ ΑΝ ἄρα δύναται τὸ ΑΒ
 χωρίον.

Λέγω [δὴ], ὅτι ἡ ΑΝ μέσης ἀποτομῆς ἔστι πρώτη.
 Ἐπεὶ γὰρ φητόν ἔστι τὸ ΕΚ καὶ ἔστιν ἴσον τῷ
 ΑΞ, φητόν ἄρα ἔστι τὸ ΑΞ, τουτέστι τὸ ὑπὸ τῶν
 15 ΑΟ, ΟΝ. μέσον δὲ ἐδείχθη τὸ ΝΞ· ἀσύμμετρον ἄρα
 ἔστι τὸ ΑΞ τῷ ΝΞ· ὥς δὲ τὸ ΑΞ πρὸς τὸ ΝΞ,
 οὕτως ἔστιν ἡ ΑΟ πρὸς ΟΝ· αὖ ΑΟ, ΟΝ ἄρα ἀσύμ-
 μετροὶ εἰσι μήκει. αὖ ἄρα ΑΟ, ΟΝ μέσαι εἰσι δυνάμει
 μόνον σύμμετροι φητόν περιέχουσai· ἡ ΑΝ ἄρα μέσης
 20 ἀποτομῆς ἔστι πρώτη· καὶ δύναται τὸ ΑΒ χωρίον.

Ἡ ἄρα τὸ ΑΒ χωρίον δυναμένη μέσης ἀποτομῆς
 ἔστι πρώτη· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

αγ'.

Ἐὰν χωρίον περιέχεται ὑπὸ φητῆς καὶ ἀπο-

1. ΕΚ] ΕΙ F. ΝΞ] ΜΝ F, sed corr. 3. ΖΚ] corr. ex
 KZ m. 1 V. 4. τῷ] τό V. ἔστι] om. P. τό] τῷ V. τῷ] τό V.
 ἴσον ἔστι Bb. 5. τό] (prius) τῷ V φ. 7. ὧν] ὧν φ. ἔστι]
 m. 2 F. 8. ΤΣ] in ras. V. 9. τὸ δὲ ΤΣ ἔστι] τουτέστι B.
 10. ἐστίν P. τό] τὸ ἀπὸ τῆς P; τὸ ἀπὸ τῆς ΑΝ mg. m.
 1 b. 12. δὴ] om. P. μέση PBFb, μέσης φ, e corr. m. 2 V.
 ἔστιν P. 13. τὸ ΕΚ — 14. τῷ ΑΞ] in ras. F. 13. ἐστίν]
 ἔστι b. Post ἴσον add. τῷ (τό F) ΝΜ τουτέστι Fb, m. 2 V.

[VI, 1] et [id.] $EH:ZH=EK:ZK$. quare EK medium est proportionale inter AI , ZK . uerum etiam MN medium est proportionale inter AM , $NΞ$ [prop. LIII lemma]. et $AI=AM$, $ZK=NΞ$. quare etiam $MN=EK$. uerum $AO=EK$, $AΞ=MN$ [I, 43]. quare $AK=TOX+NΞ$. iam quoniam $AK=AM+NΞ$, quorum $AK=TOX+NΞ$, erit reliquum $AB=TΣ$. sed $TΣ=AN^2$. itaque $AN^2=AB$. ergo AN quadrata spatium AB aequalis est.

Iam dico, AN mediae esse apotomen primam. nam quoniam EK rationale est, et $EK=AΞ$, etiam $AΞ$ rationale est, hoc est $AO \times ON$. demonstrauius autem, $NΞ$ medium esse [u. p. 282, 18]. quare $AΞ$, $NΞ$ incommensurabilia sunt. est autem

$$AΞ:NΞ=AO:ON$$

[VI, 1]. quare AO , ON longitudine incommensurabiles sunt [prop. XI]. itaque AO , ON mediae sunt potentia tantum commensurabiles spatium rationale comprehendentes. itaque AN mediae apotome est prima [prop. LXXIV]. et est $AN^2=AB$.

Ergo recta spatium AB aequalis quadrata mediae apotome est prima; quod erat demonstrandum.

XCIII.

Si spatium recta rationali et apotome tertia com-

16. ἐστίν P. τῷ $NΞ$] m. 2 B. ὡς δέ] καὶ ὡς ἄρα B.
 17. ἐστίν] om. V. πρὸς τήν FV. ἄρα — 18. μήκει] δύναμει εἰσὶ μόνον σύμμετροι in ras. V, mg. add. m. rec.: ἄρα μήκει εἰσὶν ἀσύμμετροι· τὰ δὲ ἀπ' αὐτῶν τετράγωνα σύμμετρα· αἱ AO , ON ἄρα. 17. σύμμετροι F. 19. AN] ON b, AH F. μέση BFVb. 21. ἡ — χωρίον] om. φ. δύνα-]
 in spatio 9 litt. F. μέση BFb. 22. ὅπερ εἶδει δεῖξαι] comp. P, om. BFVb.

τομῆς τρίτης, ἡ τὸ χωρίον δυναμένη μέσης ἀποτομή ἐστι δευτέρα.

Χωρίον γὰρ τὸ AB περιχέσθω ὑπὸ ρητῆς τῆς AG καὶ ἀποτομῆς τρίτης τῆς AD . λέγω, ὅτι ἡ τὸ AB χωρίον δυναμένη μέσης ἀποτομή ἐστι δευτέρα.



Ἔστω γὰρ τῇ AD προσαρμόζουσα ἡ $ΔΗ$. αἱ $ΑΗ$, $ΗΔ$ ἄρα ῥηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ οὐδέτερα τῶν $ΑΗ$, $ΗΔ$ σύμμετρός ἐστι μήκει τῇ ἐκκειμένη ρητῇ τῇ AG , ἡ δὲ ὅλη ἡ $ΑΗ$ τῆς προσαρμολούσης τῆς $ΔΗ$ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ. ἐπεὶ οὖν ἡ $ΑΗ$ τῆς $ΗΔ$ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ, ἐὰν ἄρα τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς $ΔΗ$ ἴσον παρὰ τὴν $ΑΗ$ παραβληθῇ ἐλλείπον εἶδει τετραγώνῳ, εἰς σύμμετρα αὐτὴν διελεί. τετμησθῶ οὖν ἡ $ΔΗ$ δίχα κατὰ τὸ E , καὶ τῷ ἀπὸ τῆς $ΕΗ$ ἴσον παρὰ τὴν $ΑΗ$ παραβεβλήσθω ἐλλείπον εἶδει τετραγώνῳ, καὶ ἔστω τὸ ὑπὸ τῶν AZ , ZH . καὶ ἤχθωσαν διὰ τῶν E , Z , H σημείων τῇ AG παράλληλοι αἱ $EΘ$, ZI , HK . σύμμετροι ἄρα εἰσὶν αἱ AZ , ZH . σύμμετρον ἄρα καὶ τὸ AI τῷ ZK . καὶ ἐπεὶ αἱ AZ , ZH σύμμετροί εἰσι μήκει, καὶ ἡ $ΑΗ$ ἄρα ἑκατέρᾳ τῶν AZ , ZH σύμμετρός ἐστι μήκει. ρητὴ δὲ ἡ $ΑΗ$ καὶ ἀσύμμετρος τῇ AG μήκει· ὥστε καὶ αἱ AZ , ZH . ἑκάτερον ἄρα τῶν

1. μέση B F V b. 5. μέση B F b, et V, corr. m. 2. ἔστιν P.
9. -αρμοζ-] in ras. V. 10. ἀσυνμέτρον b. 11. ἐπεὶ — 12. ἑαυτῇ] punctis notat. V. 11. $ΗΔ$] $ΔΗ$ P. 12. τοῦ] corr. ex τῷ m. 1 b. 14. διελεί μήκει V. 15. τῷ] τό φ. 18. H] $om.$ V. ZI] mut. in IZ V. 19. εἰσὶν] εἰ- e corr. V.
20. εἰσιν P. 23. ὥστε καὶ αἱ AZ , ZH] καὶ ἑκατέρᾳ ἄρα (supra scr. m. 1 V) τῶν AZ , ZH ρητὴ ἐστι καὶ ἀσύμμετρος τῇ AG μήκει· καὶ Theon (B F V b).

prehenditur, recta spatio aequalis quadrata mediae apotome est secunda.

Spatium enim AB recta rationali AF et apotome tertia AD comprehendatur. dico, rectam spatio AB aequalem quadratam mediae apotomen esse secundam.

nam $\triangle H$ rectae AD congruens sit. itaque AH , HA rationales sunt potentia tantum commensurabiles,



et neutra rectarum AH , HA rationali propositae AF longitudine commensurabilis est, tota autem AH congruentem $\triangle H$ excedit quadrato rectae sibi commensurabilis [def. tert. 3]. quoniam igitur AH^2 excedit $\triangle H^2$ quadrato rectae sibi commensurabilis, si $\frac{1}{4}AH^2$ aequale rectae AH adplicatur

spatium figura quadrata deficiens, in partes commensurabiles eam diuidet [prop. XVII]. iam $\triangle H$ in E in duas partes aequales secetur, et quadrato EH^2 aequale rectae AH adplicetur spatium figura quadrata deficiens, et sit $AZ \times ZH$. et per puncta E , Z , H rectae AF parallelae ducantur $E\Theta$, ZI , HK . itaque AZ , ZH commensurabiles sunt. quare AI , ZK commensurabilia sunt [VI, 1; prop. XI]. et quoniam AZ , ZH longitudine commensurabiles sunt, etiam AH utrique AZ , ZH longitudine commensurabilis est [prop. XV]. uerum AH rationalis est et rectae AF longitudine incommensurabilis. quare etiam AZ , ZH [prop. XIII]. itaque utrumque AI , ZK medium est [prop. XX]. rursus quoniam AE , EH longitudine commen-

AI , ZK μέσον ἐστίν. πάλιν, ἐπεὶ σύμμετρος ἐστὶν ἡ ΔE τῇ EH μήκει, καὶ ἡ ΔH ἄρα ἐκατέρω τῶν ΔE , EH σύμμετρος ἐστὶ μήκει. φητὴ δὲ ἡ $H\Delta$ καὶ ἀσύμμετρος τῇ AG μήκει· φητὴ ἄρα καὶ ἐκατέρω τῶν ΔE , EH καὶ ἀσύμμετρος τῇ AG μήκει· ἐκάτερον ἄρα τῶν $\Delta\Theta$, EK μέσον ἐστίν. καὶ ἐπεὶ αἱ AH , $H\Delta$ δυνάμει μόνον σύμμετροί εἰσιν, ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶ μήκει ἡ AH τῇ $H\Delta$. ἀλλ' ἡ μὲν AH τῇ AZ σύμμετρος ἐστὶ μήκει, ἡ δὲ ΔH τῇ EH · ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ AZ τῇ EH μήκει. ὥς δὲ ἡ AZ πρὸς τὴν EH , οὕτως ἐστὶ τὸ AI πρὸς τὸ EK · ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ AI τῷ EK .

Συνεσιτάτω οὖν τῷ μὲν AI ἴσον τετράγωνον τὸ AM , τῷ δὲ ZK ἴσον ἀφηγήσθω τὸ $N\Xi$ περὶ τὴν αὐτὴν γωνίαν ὅν τῷ AM · περὶ τὴν αὐτὴν ἄρα διάμετρον ἐστὶ τὰ AM , $N\Xi$. ἔστω αὐτῶν διάμετρος ἡ OP , καὶ καταγεγράφθω τὸ σχῆμα. ἐπεὶ οὖν τὸ ὑπὸ τῶν AZ , ZH ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς EH , ἔστιν ἄρα ὥς ἡ AZ πρὸς τὴν EH , οὕτως ἡ EH πρὸς τὴν ZH . ἀλλ' ὥς μὲν ἡ AZ πρὸς τὴν EH , οὕτως ἐστὶ τὸ AI πρὸς τὸ EK · ὥς δὲ ἡ EH πρὸς τὴν ZH , οὕτως ἐστὶ τὸ EK πρὸς τὸ ZK · καὶ ὥς ἄρα τὸ AI πρὸς τὸ EK , οὕτως τὸ EK πρὸς τὸ ZK · τῶν ἄρα AI , ZK μέσον ἀνάλογόν ἐστὶ τὸ EK . ἐστὶ δὲ καὶ τῶν AM , $N\Xi$ τετραγώνων μέσον ἀνάλογον τὸ MN · καὶ ἐστὶν ἴσον το μὲν AI τῷ AM , τὸ δὲ ZK τῷ $N\Xi$ · καὶ τὸ EK ἄρα

1. ἐστίν] ἐστί P B V, comp. F b. ἐστίν] ἐστὶ V. 3. μήκει] om. B. ΔH F, $H\Delta$ in ras. V. 4. φητὴ — 5. μήκει] m. 2 B. 5. καὶ ἐκάτερον V. 6. EK] ΘK P. ἐστί B V, comp. F b. δυνάμεις, c enan., V. 7. εἰσὶ σύμμετροι V. ἐστίν V. μήκει] om. V. 8. AH] H in ras. V, deinde add. μήκει m. 2. $H\Delta$] ΔH P. ἀλλ' — 9. τῇ EH] mg.

surabiles sunt, etiam ΔH utrique ΔE , EH longitudine commensurabilis est [prop. XV; cfr. p. 283 not.]. uerum HA rationalis est et rectae AF longitudine incommensurabilis. quare etiam utraque ΔE , EH rationalis est et rectae AF longitudine incommensurabilis [prop. XIII]. itaque utrumque $\Delta\Theta$, EK medium est [prop. XX]. et quoniam AH , HA potentia tantum commensurabiles sunt, AH et HA longitudine incommensurabiles sunt; uerum AH , AZ et ΔH , EH longitudine commensurabiles sunt. quare AZ , EH longitudine incommensurabiles sunt [prop. XIII]. est autem $AZ:EH = AI:EK$ [VI, 1]. ergo AI , EK incommensurabilia sunt [prop. XI].

construatur igitur quadratum $AM = AI$, et auferatur spatio ZK aequale $N\Xi$ in eodem angulo positum, quo AM . itaque AM , $N\Xi$ circum eandem diametrum posita sunt [VI, 26]. sit OP eorum diametrus, et figura describatur [cfr. uol. I p. 137 not.]. iam quoniam est $AZ \times ZH = EH^2$, erit $AZ:EH = EH:ZH$ [VI, 17]. est autem $AZ:EH = AI:EK$ [VI, 1], et $EH:ZH = EK:ZK$ [id.]. quare etiam $AI:EK = EK:ZK$. itaque EK medium est proportionale inter AI , ZK . uerum etiam MN medium est proportionale inter quadrata AM , $N\Xi$ [prop. LIII lemma]. et $AI = AM$,

m. 1 P. 8. Post μέν ras. 1 litt. V. AZ μήκει V. $\epsilon\sigma\tau\iota\nu$ V. 9. μήκει] om. V. $\alpha\phi\alpha$] supra scr. m. 1 F. 10. AZ] supra scr. Δ b. EH] in ras. V. 11. τό] (pr.) τό ἀπό τῆς F. τό] τῆς b. EK] EA supra scr. K b. $\alpha\sigma\sigma\mu\mu\epsilon\tau\epsilon\rho\omicron\nu$ — 12. EK] om. P. 11. $\epsilon\sigma\tau\iota$ τό] m. 2 F. 13. τῶ] corr. ex τό m. 1 F. $\tau\epsilon\tau\rho\alpha\gamma\omega\gamma\omega\nu$ P, sed corr. 15. $\delta\upsilon$] supra scr. m. 1 F. τῶ] τό F. 17. $\alpha\pi\acute{o}$] ἀπό b. 22. καί ὥς — 23. τό ZK] mg. m. 2 B. 23. τό ZK] ZK PB.

ἴσον ἐστὶ τῷ MN . ἀλλὰ τὸ μὲν MN ἴσον ἐστὶ τῷ $A\Xi$,
τὸ δὲ EK ἴσον [ἐστὶ] τῷ $A\Theta$ · καὶ ὅλον ἄρα τὸ AK
ἴσον ἐστὶ τῷ $\Gamma\Phi X$ γνώμονι καὶ τῷ $N\Xi$. ἐστὶ δὲ καὶ
τὸ AK ἴσον τοῖς AM , $N\Xi$ · λοιπὸν ἄρα τὸ AB ἴσον
5 ἐστὶ τῷ ΣT , τουτέστι τῷ ἀπὸ τῆς AN τετραγώνῳ·
ἡ AN ἄρα δύναται τὸ AB χωρίον.

Λέγω, ὅτι ἡ AN μέσης ἀποτομῆς ἐστὶ δευτέρα.

Ἐπεὶ γὰρ μέσαι ἐδείχθη τὰ AI , ZK καὶ ἐστὶν ἴσα
τοῖς ἀπὸ τῶν AO , ON , μέσον ἄρα καὶ ἑκάτερον τῶν
10 ἀπὸ τῶν AO , ON · μέση ἄρα ἑκατέρα τῶν AO , ON .
καὶ ἐπεὶ σύμμετρόν ἐστὶ τὸ AI τῷ ZK , σύμμετρον ἄρα
καὶ τὸ ἀπὸ τῆς AO τῷ ἀπὸ τῆς ON . πάλιν, ἐπεὶ
ἀσύμμετρον ἐδείχθη τὸ AI τῷ EK , ἀσύμμετρον ἄρα
ἐστὶ καὶ τὸ AM τῷ MN , τουτέστι τὸ ἀπὸ τῆς AO ,
15 τῷ ὑπὸ τῶν AO , ON · ὥστε καὶ ἡ AO ἀσύμμετρός
ἐστὶ μήκει τῇ ON · αἱ AO , ON ἄρα μέσαι εἰσὶ δυνάμει
μίνον σύμμετροι.

Λέγω δὴ, ὅτι καὶ μέσον περιέχουσιν.

Ἐπεὶ γὰρ μέσον ἐδείχθη τὸ EK καὶ ἐστὶν ἴσον
20 τῷ ὑπὸ τῶν AO , ON , μέσον ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ ὑπὸ
τῶν AO , ON · ὥστε αἱ AO , ON μέσαι εἰσὶ δυνάμει
μόνον σύμμετροι μέσον περιέχουσαι. ἡ AN ἄρα μέσης
ἀποτομῆς ἐστὶ δευτέρα· καὶ δύναται τὸ AB χωρίον.

Ἡ ἄρα τὸ AB χωρίον δυναμένη μέσης ἀποτομῆς
25 ἐστὶ δευτέρα· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

1. τό] corr. ex τῷ m. rec. P. τῷ] corr. ex τό m. rec. P.
2. $A\Xi$] $A\Xi$ F. τό] corr. ex τῷ m. rec. P. ἐστὶ] P, om.
BFVb. τῷ] corr. ex τό m. rec. P. Post $A\Theta$ in b adp. :~,
deinde spatium 1 lin. uacat. 3. $N\Xi$] mut. in NZ m. rec. B.
4. ἴσον] (prius) m. 2 FV. 5. AN] AM P; AN F, corr.
m. 2. 6. AN] A eras. V. 7. μέση BFVb. ἐστὶν P. 11.
σύμμετρον] (prius) σύμμετρος F. 12. τῆς] corr. ex τῶν F.
Post AO add. ON B et supra m. 1 P. τῆς] corr. ex

$ZK = NΞ$. itaque etiam $EK = MN$. uerum $MN = AΞ$ [I, 43], $EK = AΘ$. quare etiam $AK = TΦX + NΞ$. est autem etiam

$$AK = AM + NΞ.$$

itaque reliquum $AB = ΣT = AN^2$. ergo AN quadrata spatio AB aequalis est.

dico, AN mediae apotomen esse secundam. nam quoniam demonstrauius, AI , ZK media esse, et $AI = AO^2$, $ZK = ON^2$, etiam utrumque AO^2 , ON^2 medium est. quare utraque AO , ON media est. et quoniam AI , ZK commensurabilia sunt [VI, 1; prop. XI], etiam AO^2 , ON^2 commensurabilia sunt. rursus quoniam demonstrauius, AI et EK incommensurabilia esse, etiam AM et MN , hoc est AO^2 et $AO \times ON$, incommensurabilia sunt. quare etiam AO , ON longitudine incommensurabiles sunt [VI, 1; prop. XI]. ergo AO , ON mediae sunt potentia tantum commensurabiles. iam dico, easdem spatium medium comprehendere. nam quoniam demonstrauius, EK medium esse, et $EK = AO \times ON$, etiam $AO \times ON$ medium est. quare AO , ON mediae sunt potentia tantum commensurabiles medium comprehendentes. itaque AN mediae apotome est secunda [prop. LXXV]. et spatio AB aequalis est quadrata.

Ergo recta spatio AB aequalis quadrata mediae apotome est secunda; quod erat demonstrandum.

τῶν F. 14. ἐστίν P. MN] NM P. 15. τῶ] corr. ex τό m. 1 F. 16. εἰσίν P. 18. περιέχουσai V. 19. γὰρ] om. Fb, m. 2 B. 20. μέσον — 21. ON (prius)] mg. V. 22. σύμμετροι P. AN b. μέση BFVb. 23. ἐστίν P. χωρίον] om. Theon (BFVb). 24. μέση BFVb. 25. ὅπερ ἐδει δεῖξαι] comp. P, om. BFVb.

90'.

Ἐὰν χωρίον περιέχεται ὑπὸ ῥητῆς καὶ ἀποτομῆς τετάρτης, ἢ τὸ χωρίον δυναμένη ἐλάσσων ἐστίν.

5 Χωρίον γὰρ τὸ AB περιεχέσθω ὑπὸ ῥητῆς τῆς AG καὶ ἀποτομῆς τετάρτης τῆς AD . λέγω, ὅτι ἡ τὸ AB χωρίον δυναμένη ἐλάσσων ἐστίν.

Ἔστω γὰρ τῇ AD προσαρμόζουσα ἡ $ΔΗ$. αἱ ἄρα AH, HD ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ ἡ 10 AH σύμμετρός ἐστι τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ τῇ AG μήκει, ἢ δὲ ὅλη ἡ AH τῆς προσαρμοζούσης τῆς $ΔΗ$ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ ἀσύμμετρου ἐναντῇ μήκει. ἐπεὶ οὖν ἡ AH τῆς HD μείζον δύναται τῷ ἀπὸ ἀσύμμετρου ἐναντῇ μήκει, ἐὰν ἄρα τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς 15 $ΔΗ$ ἴσον παρὰ τὴν AH παραβληθῇ ἔλλειπον εἶδει τετραγώνῳ, εἰς ἀσύμμετρα αὐτὴν διελεί. τεμησθῶ οὖν ἡ $ΔΗ$ δίχα κατὰ τὸ E , καὶ τῷ ἀπὸ τῆς EH ἴσον παρὰ τὴν AH παραβεβλήσθω ἔλλειπον εἶδει τετραγώνῳ, καὶ ἔστω τὸ ὑπὸ τῶν AZ, ZH ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶ 20 μήκει ἡ AZ τῇ ZH . ἤχθωσαν οὖν διὰ τῶν E, Z, H παράλληλοι ταῖς AG, BD αἱ $EΘ, ZI, HK$. ἐπεὶ οὖν ῥητὴ ἐστὶν ἡ AH καὶ σύμμετρος τῇ AG μήκει, ῥητὸν ἄρα ἐστὶν ὅλον τὸ AK . πάλιν, ἐπεὶ ἀσύμμετρός ἐστὶν ἡ $ΔΗ$ τῇ AG μήκει, καὶ εἰσιν ἀμφοτέραι ῥηταί, μέσον 25 ἄρα ἐστὶ τὸ $ΔΚ$. πάλιν, ἐπεὶ ἀσύμμετρός ἐστὶν ἡ AZ τῇ ZH μήκει, ἀσύμμετρον ἄρα καὶ τὸ AI τῷ ZK .



2. τετάρτης ἀποτομῆς V. 4. ἐστὶ BV, comp. Fb. 5. ῥητῆς τῆς] corr. ex τῆς m. 2 F, ῥητῆς V. 6. AD] $ABΔ$ b, $Δ$ in ras. m. 1 B. ἢ] supra scr. P. 7. AB] om. Bb, m. 2 V. 8. AD] mut. in AB m. 2 F, AB b. 11. $ΔΗ$] HD V. 12. δυναμένη P. συμμέτρου B, corr. m. 2. 15. ἴσον] μέσον φ. 16. ἀσύμμετρον P, σύμμετρα b. διελεί μήκει V.

XCIV.

Si spatium recta rationali et apotome quarta comprehenditur, recta spatio aequalis quadrata minor est.

Spatium enim AB rationali AG et apotome quarta AD comprehendatur. dico, rectam spatio AB aequalem quadratam minorem esse.

sit enim AH rectae AD congruens. itaque AH , HA rationales sunt potentia tantum commensurabiles,



et AH rationali propositae AG longitudine commensurabilis est, tota autem AH quadrata congruentem AD excedit quadrato rectae sibi longitudine incommensurabilis [deff. tert. 4]. iam quoniam AH^2 excedit HA^2 quadrato rectae sibi longitudine incommensurabilis, si $\frac{1}{4}AH^2$

aequale rectae AH adplicetur spatium figura quadrata deficiens, in partes incommensurabiles eam diuidet [prop. XVIII]. AH igitur in E in duas partes aequales secetur, et quadrato EH^2 aequale rectae AH adplicetur spatium figura quadrata deficiens, et sit $AZ \times ZH$. itaque AZ , ZH incommensurabiles sunt. iam per E , Z , H rectis AG , BD parallelae ducantur $EΘ$, ZI , HK . quoniam igitur AH rationalis est et rectae AG longitudine commensurabilis, AK rationale est. rursus

17. EH] E e corr. V. 19. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\acute{\iota}\nu$ PV. 20. $\mu\acute{\eta}\kappa\epsilon\iota$] om. V. ZH] HZ F. $\delta\epsilon\alpha$ P. E, Z] Z, E PFb, in ras. m. 2 B. 21. BD] eras. V, ΓB b. 23. $\acute{\epsilon}\lambda\omicron\nu$] supra scr. m. 1 b. 52. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\acute{\iota}\nu$ P. 26. $\acute{\alpha}\sigma\acute{\upsilon}\mu\mu\epsilon\tau\omicron\nu$] $\acute{\alpha}$ - del. F. $\acute{\alpha}\rho\alpha$ $\acute{\epsilon}\sigma\tau\acute{\iota}$ F.

συνεστιάτω οὖν τῷ μὲν AI ἴσον τετράγωνον τὸ AM ,
 τῷ δὲ ZK ἴσον ἀφηγήσθω περὶ τὴν αὐτὴν γωνίαν
 τὴν ὑπὸ τῶν $ΛΟΜ$ τὸ $NΞ$. περὶ τὴν αὐτὴν ἄρα διά-
 μετρόν ἐστι τὰ AM , $NΞ$ τετράγωνα. ἔστω αὐτῶν
 5 διάμετρος ἡ OP , καὶ καταγεγράφθω τὸ σχῆμα. ἐπεὶ
 οὖν τὸ ὑπὸ τῶν AZ , ZH ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς EH ,
 ἀνάλογον ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ AZ πρὸς τὴν EH , οὕτως
 ἡ EH πρὸς τὴν ZH . ἀλλ' ὡς μὲν ἡ AZ πρὸς τὴν
 EH , οὕτως ἐστὶ τὸ AI πρὸς τὸ EK , ὡς δὲ ἡ EH
 10 πρὸς τὴν ZH , οὕτως ἐστὶ τὸ EK πρὸς τὸ ZK . τῶν
 ἄρα AI , ZK μέσον ἀνάλογόν ἐστι τὸ EK . ἐστι δὲ
 καὶ τῶν AM , $NΞ$ τετραγώνων μέσον ἀνάλογον τὸ MN ,
 καὶ ἐστὶν ἴσον τὸ μὲν AI τῷ AM , τὸ δὲ ZK τῷ $NΞ$.
 καὶ τὸ EK ἄρα ἴσον ἐστὶ τῷ MN . ἀλλὰ τῷ μὲν EK
 15 ἴσον ἐστὶ τὸ $ΔΘ$, τῷ δὲ MN ἴσον ἐστὶ τὸ $ΔΞ$. ὅλον
 ἄρα τὸ $ΔΚ$ ἴσον ἐστὶ τῷ $ΤΦΧ$ γινώμονι καὶ τῷ $NΞ$.
 ἐπεὶ οὖν ὅλον τὸ $ΔΚ$ ἴσον ἐστὶ τοῖς AM , $NΞ$ τετρα-
 γώνοις, ὧν τὸ $ΔΚ$ ἴσον ἐστὶ τῷ $ΤΦΧ$ γινώμονι καὶ
 τῷ $NΞ$ τετραγώνῳ, λοιπὸν ἄρα τὸ AB ἴσον ἐστὶ τῷ
 20 $ΣΤ$, τουτέστι τῷ ἀπὸ τῆς AN τετραγώνῳ· ἡ AN ἄρα
 δύναται τὸ AB χωρίον.

Λέγω, ὅτι ἡ AN ἄλογός ἐστιν ἡ καλουμένη ἐλάσσων.

Ἐπεὶ γὰρ ῥητόν ἐστι τὸ AK καὶ ἐστὶν ἴσον τοῖς
 ἀπὸ τῶν AO , ON τετράγωνοις, τὸ ἄρα συγκεείμενον
 25 ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AO , ON ῥητόν ἐστιν. πάλιν, ἐπεὶ
 τὸ $ΔΚ$ μέσον ἐστίν, καὶ ἐστὶν ἴσον τὸ $ΔΚ$ τῷ δις
 ὑπὸ τῶν AO , ON , τὸ ἄρα δις ὑπὸ τῶν AO , ON μέσον

2. Post ZK ras. 1 litt. F. 3. τῶν] om. BFV. $ΛΟΝ$
 φ et, supra scr. M , b. τό] e corr. m. rec. b. 4. ἐστὶ] εἶσι P.
 5. ἡ] m. rec. P. 7. AZ] AH , supra scr. Z , b. τήν]
 om. P. 8. AZ] Z in ras. F. 9. οὕτως] οὕτως ἐστὶν ἡ EH
 πρὸς τὴν ZH . ἀλλ' ὡς μὲν ἡ AZ πρὸς τὴν EH , οὕτως b.

quoniam $\angle H$, $\angle \Gamma$ longitudine incommensurabiles sunt, et utraque rationalis est, $\angle K$ medium est [prop. XXI]. rursus quoniam $\angle Z$, $\angle H$ longitudine incommensurabiles sunt, $\angle I$ et $\angle K$ incommensurabilia sunt [VI, 1; prop. XI]. iam construatur quadratum $\angle M = \angle I$, et spatio $\angle K$ aequale auferatur $\angle \Xi$ in eodem angulo positum $\angle OM$. itaque quadrata $\angle M$, $\angle \Xi$ circum eandem diametrum posita sunt [VI, 26]. sit OP eorum diametrus, et describatur figura [cfr. uol. I p. 137 not.]. iam quoniam $\angle Z \times \angle H = \angle H^2$, erit $\angle Z : \angle H = \angle H : \angle Z$ [VI, 17]. est autem $\angle Z : \angle H = \angle I : \angle K$, $\angle H : \angle Z = \angle K : \angle K$ [VI, 1]. quare $\angle K$ medium est proportionale inter $\angle I$, $\angle K$. uerum etiam $\angle N$ medium est proportionale inter quadrata $\angle M$, $\angle \Xi$ [prop. LIII lemma], et $\angle I = \angle M$, $\angle K = \angle \Xi$. quare etiam $\angle K = \angle N$. uerum $\angle \Theta = \angle K$, $\angle \Xi = \angle N$ [I, 43]. itaque $\angle K = \angle \Phi + \angle \Xi$. iam quoniam est $\angle K = \angle M + \angle \Xi$, quorum $\angle K = \angle \Phi + \angle \Xi$, erit $\angle B = \angle T = \angle N^2$. ergo $\angle N$ quadrata spatio $\angle B$ aequalis est.

dico, $\angle N$ irrationalem esse minorem, quae uocatur. nam quoniam $\angle K$ rationale est, et $\angle K = \angle O^2 + \angle N^2$, $\angle O^2 + \angle N^2$ rationale est. rursus quoniam $\angle K$ medium est, et $\angle K = 2 \angle O \times \angle N$, $2 \angle O \times \angle N$ medium est.

$\angle \Gamma$] om. V. $\angle I$] supra scr. Γ b. $\angle H$] E e corr. P, ras. 2 litt. V. 10. $\angle \Gamma$] om. V. 11. $\angle \Gamma$ P. 12. τετραγώνων] om. V. 13. $\angle I$] $\angle \Gamma$ P. $\angle \Xi$] N in ras. V. 14. $\angle \Gamma$ $\angle \Gamma$] $\angle \Gamma$ $\angle \Gamma$ F, $\angle \Gamma$ V. $\angle \Gamma$] (alt.) $\angle \Gamma$ corr. in $\angle \Gamma$ (?) V. 15. $\angle \Gamma$] om. V. $\angle \Gamma$] $\angle \Gamma$ V. $\angle \Gamma$] $\angle \Gamma$ B. $\angle \Gamma$] corr. ex $\angle \Gamma$ m. 1 V, $\angle \Gamma$ P. $\angle \Gamma$] om. V. $\angle \Gamma$] $\angle \Gamma$ P. 20. τετραγώνων] om. V. 22. $\angle H$ F. $\angle \Gamma$ $\angle \Gamma$ Fb. 24. $\angle \Gamma$] $\angle \Gamma$ P. 25. $\angle \Gamma$ τετραγώνων V. $\angle \Gamma$ BVb, comp. F. 26. $\angle \Gamma$] comp. F, $\angle \Gamma$ PB Vb. $\angle \Gamma$] om. V. $\angle \Gamma$] e corr. V.

ἐστίν. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρον ἐδείχθη τὸ AI τῷ ZK ,
 ἀσύμμετρον ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς AO τετραγώνου τῷ
 ἀπὸ τῆς ON τετραγώνῳ. αἱ AO , ON ἄρα δυνάμει
 εἰσὶν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν
 5 ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων φητόν, τὸ δὲ δις ὑπ' αὐτῶν
 μέσον. ἡ AN ἄρα ἄλογός ἐστιν ἡ καλουμένη ἐλάσσων·
 καὶ δύνатаι τὸ AB χωρίον.

Ἡ ἄρα τὸ AB χωρίον δυναμένη ἐλάσσων ἐστίν·
 ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

10

9ε'.

Ἐὰν χωρίον περιέχεται ὑπὸ φητῆς καὶ ἀπο-
 τομῆς πέμπτης, ἡ τὸ χωρίον δυναμένη [ἡ] μετὰ
 φητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσά ἐστιν.

Χωρίον γὰρ τὸ AB περιεχέσθω ὑπὸ φητῆς τῆς
 15 AG καὶ ἀποτομῆς πέμπτης τῆς AD . λέγω, ὅτι ἡ τὸ
 AB χωρίον δυναμένη [ἡ] μετὰ φητοῦ μέσον τὸ ὅλον
 ποιοῦσά ἐστιν.

Ἐστω γὰρ τῇ AD προσαρμόζουσα ἡ AH . αἱ ἄρα
 AH , HA φηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ ἡ
 20 προσαρμόζουσα ἡ HA σύμμετρός ἐστι μήκει τῇ ἐκκει-
 μένῃ φητῇ τῇ AG , ἡ δὲ ὅλη ἡ AH τῆς προσαρμο-
 ζούσης τῆς AH μείζον δύνатаι τῷ ἀπὸ ἀσύμμετρου
 ἐαυτῇ. ἐὰν ἄρα τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς AD
 ἴσον παρὰ τὴν AH παραβληθῇ ἑλλείπον εἶδει τετρα-

1. ἐστὶ BVb, comp. F. 2. σύμμετρον B, corr. m. 2. ἄρα
 ἐστὶ V. τετραγώνον] om. V. 3. ἀσύμμετροί εἰσι δυνάμει V,
 deinde del. m. 2: διὰ τὸ δεύτερον θεώρημα τοῦ βιβλίου. 6.
 AH F. ἀνάλογος P, sed corr. 7. AB] B corr. ex Γ m. 2 F.
 8. ἐστὶ B. 9. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. B F V b. 12.
 ἡ] (alt.) om. F V b, m. 2 B. 13. ἐστὶ BV, comp. F b. 16.
 ἡ] om. F V b, m. 2 B. 20. HA] in ras. m. 1 b, AD P.
 μήκει] om. V. 21. AG μήκει V. 22. συμμέτρου B, corr. m. 2.

et quoniam demonstrauiamus, AI et ZK incommensurabilia esse, etiam AO^2 , ON^2 incommensurabilia sunt. itaque AO , ON potentia incommensurabiles sunt efficientes summam quadratorum rationalem, duplum autem rectangulum medium. quare AN irrationalis est minor, quae uocatur [prop. LXXVI]. et $AN^2 = AB$.



Ergo recta spatio AB aequalis quadrata minor est; quod erat demonstrandum.

XCV.

Si spatium recta rationali et apotome quinta comprehenditur, recta spatio aequalis quadrata recta est cum rationali totum medium efficiens.

Spatium enim AB recta rationali AI et apotome quinta AD comprehendatur. dico, rectam spatio AB aequalem quadratam rectam esse cum rationali totum medium efficientem.

nam ΔH rectae AD congruens sit. itaque AH , $H\Delta$ rationales sunt potentia tantum commensurabiles,



et congruens $H\Delta$ rationali propositae AI longitudine commensurabilis est, tota autem AH quadrata excedit congruentem ΔH quadrato rectae sibi incommensurabilis [def. tert. 5]. itaque si $\frac{1}{4} \Delta H^2$ aequale rectae AH adplicatur spatium figura quadrata deficiens, in partes incommensurabiles eam diuidet [prop.

XVIII]. ΔH igitur in puncto E in duas partes aequales

γώνω, εἰς ἀσύμμετρα αὐτὴν διελεί. τετμήσθω οὖν ἡ
 ΔΗ δίχα κατὰ τὸ Ε σημείον, καὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΕΗ
 ἴσον παρὰ τὴν ΑΗ παραβεβλήσθω ἐλλείπον εἶδει τε-
 τραγώνω καὶ ἔστω τὸ ὑπὸ τῶν ΑΖ, ΖΗ· ἀσύμμετρος
 5 ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΖ τῇ ΖΗ μήκει. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρός
 ἐστὶν ἡ ΑΗ τῇ ΓΑ μήκει, καὶ εἰσὶν ἀμφοτέραι ρηταί,
 μέσον ἄρα ἐστὶ τὸ ΑΚ. πάλιν, ἐπεὶ ρητὴ ἐστὶν ἡ
 ΔΗ καὶ σύμμετρος τῇ ΑΓ μήκει, ρητόν ἐστι τὸ ΔΚ.
 συνεστάτω οὖν τῷ μὲν ΑΙ ἴσον τετράγωνον τὸ ΑΜ,
 10 τῷ δὲ ΖΚ ἴσον τετράγωνον ἀφηρήσθω τὸ ΝΞ περὶ
 τὴν αὐτὴν γωνίαν τὴν ὑπὸ ΑΟΜ· περὶ τὴν αὐτὴν
 ἄρα διάμετρόν ἐστι τὰ ΑΜ, ΝΞ τετράγωνα. ἔστω
 αὐτῶν διάμετρος ἡ ΟΡ, καὶ καταγεγράφθω τὸ σχῆμα.
 ὁμοίως δὲ δεῖξομεν, ὅτι ἡ ΑΝ δύναται τὸ ΑΒ χωρίον.
 15 Λέγω, ὅτι ἡ ΑΝ ἡ μετὰ ρητοῦ μέσον τὸ ὅλον
 ποιούσά ἐστιν.

Ἐπεὶ γὰρ μέσον ἐδείχθη τὸ ΑΚ καὶ ἐστὶν ἴσον
 τοῖς ἀπὸ τῶν ΑΟ, ΟΝ, τὸ ἄρα συγκείμενον ἐκ τῶν
 ἀπὸ τῶν ΑΟ, ΟΝ μέσον ἐστίν. πάλιν, ἐπεὶ ρητόν
 20 ἐστὶ τὸ ΔΚ καὶ ἐστὶν ἴσον τῷ δις ὑπὸ τῶν ΑΟ, ΟΝ,
 καὶ αὐτὸ ρητόν ἐστιν. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρόν ἐστι τὸ
 ΑΙ τῷ ΖΚ, ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΟ
 τῷ ἀπὸ τῆς ΟΝ· αἱ ΑΟ, ΟΝ ἄρα δυνάμει εἰσὶν ἀσύμ-
 μετροὶ ποιούσαι τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν
 25 τετραγώνων μέσον, τὸ δὲ δις ὑπ' αὐτῶν ρητόν. ἡ
 λοιπὴ ἄρα ἡ ΑΝ ἄλογός ἐστιν ἡ καλουμένη μετὰ

1. Post διελεί del. μήκει V. 3. ΑΗ] H e corr. m. 1 V.

4. τό] corr. ex τῷ P. 5. τῇ] supra scr. m. 1 b. Post μήκει add. καὶ ἡχθῶσαν διὰ τῶν Ε, Ζ. Η τῇ ΑΓ (A b) παράλληλοι αἱ ΕΘ, ΖΙ, ΗΚ b, mg. FV. 6. ΓΑ] in ras. V, ΑΓ P.

8. Ante σύμμετρος ras. 1 litt. V. ἄρα ἐστὶ Vb, m. 2 F. 9. ἐστάτω b, ἔστω V. 10. τετράγωνον] supra scr. F. τὸ ΝΞ]

secetur, et quadrato EH^2 aequale rectae AH adplicetur spatium figura quadrata deficiens et sit $AZ \times ZH$. itaque AZ , ZH longitudine incommensurabiles sunt. et quoniam AH , ΓA longitudine incommensurabiles, et utraque rationalis est, AK medium est [prop. XXI]. rursus quoniam ΔH rationalis est et rectae $A\Gamma$ longitudine commensurabilis, ΔK rationale est [prop. XIX]. construatur igitur quadratum $AM = AI$, et spatio ZK aequale auferatur quadratum $N\Xi$ in eodem angulo ΔOM positum. itaque quadrata AM , $N\Xi$ circum eandem diametrum posita sunt [VI, 26]. sit OP eorum diametrus, et describatur figura [uol. I p. 137 not.]. eodem igitur modo demonstrabimus, esse $AN^2 = AB$.

dico, AN rectam esse cum rationali totum medium efficientem. quoniam enim demonstrauius, AK medium esse, et $AK = AO^2 + ON^2$, $AO^2 + ON^2$ medium est. rursus quoniam ΔK rationale est, et

$$\Delta K = 2 AO \times ON,$$

hoc et ipsum rationale est. et quoniam AI , ZK incommensurabilia sunt, etiam AO^2 , ON^2 incommensurabilia sunt. quare AO , ON potentia incommensurabiles sunt efficientes summam quadratorum mediam, duplum autem rectangulum rationale. itaque reliqua

om. Theon (BFVb). 11. ὑπὸ τῶν BFb. ΔOM τὸ $N\Xi$ ($M\Xi$ φ) Theon (BFVb). 12. ἐστὶ] εἶναι in ras. m. 2 V. τὰ] in ras. m. 2 V. AM] A in ras. m. 2 V. 18. συγκεκμημένον] om. V. 19. ἐστὶ BV, comp. Fb. 21. αὐτό] τὸ δις ἄρα ὑπὸ τῶν AO , ON Theon (BFVb). ἐστὶ PBV, comp. Fb. 22. AI] mut. in AE m. 2 F, AE b. 23. ON] (prius) e corr. V. 25. ἡ] om. B. 26. καλουμένη] κα- supra scr. m. 1 b. ἡ μετὰ b.

ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα· καὶ δύναται τὸ AB χωρίον.

Ἦ τὸ AB ἄρα χωρίον δυναμένη μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσά ἐστιν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

5

95'.

Ἐὰν χωρίον περιέχεται ὑπὸ ῥητῆς καὶ ἀποτομῆς ἑκτης, ἡ τὸ χωρίον δυναμένη μετὰ μέσου μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσά ἐστιν.

Χωρίον γὰρ τὸ AB περιεχέσθω ὑπὸ ῥητῆς τῆς AG
10 καὶ ἀποτομῆς ἑκτης τῆς AD · λέγω, ὅτι ἡ τὸ AB χωρίον δυναμένη [ἡ] μετὰ μέσου μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσά ἐστιν.

Ἔστω γὰρ τῇ AD προσαρμόζουσα ἡ $ΔΗ$ · αἱ ἄρα
 AH , HD ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ
15 οὐδετέρα αὐτῶν σύμμετρός ἐστι τῇ ἐκκειμένη ῥητῇ τῇ
 AG μήκει, ἡ δὲ ὅλη ἡ AH τῆς προσαρμοζούσης τῆς
 $ΔH$ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ ἀσύμμετρου ἑαυτῇ μήκει.
ἐπεὶ οὖν ἡ AH τῆς HD μείζον δύναται τῷ ἀπὸ ἀσύμμετρου ἑαυτῇ μήκει, ἂν ἄρα τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ
20 ἀπὸ τῆς $ΔH$ ἴσον παρὰ τὴν AH παραβληθῇ ἑλλείπον
εἶδει τετραγώνῳ, εἰς ἀσύμμετρα αὐτὴν διελεί. τετμήσθω
οὖν ἡ $ΔH$ διῆχα κατὰ τὸ E [σημεῖον], καὶ τῷ ἀπὸ τῆς
 EH ἴσον παρὰ τὴν AH παραβεβλήσθω ἑλλείπον εἶδει

3. ἄρα τὸ AB V. ἄρα] om. PB, m. 2 F. χωρίον
ἄρα B. 4. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. B F V b. 6.
ὅπ' P. 8. ἐστι BV, comp. F b. 9. AB] $ABΓ$ P. 10. ἑκτης
τῆς] corr. ex ἑκτης m. rec. P. 11. ἡ] om. B F V b. 14.
καὶ οὐδετέρα] in ras. F. 15. αὐτῶν] τῶν AH , HD B V b, e
corr. F. 16. τῆς] (alt.) τῇ F. 17. σύμμετρου P. ἑαυτοῦ F.
18. ἐπεὶ — 19. μήκει] mg. m. 2 B. 19. ἑαυτῆς B, ἑαυτοῦ F.
τοῦ] τῷ b. 20. AH] $ΔH$ B. παραβέβλωμεν B, παρα-

AN irrationalis est cum rationali totum medium efficiens, quae uocatur [prop. LXXVII]. et $AN^2 = AB$.



Ergo recta spatio AB aequalis quadrata recta cum rationali totum medium efficiens est; quod erat demonstrandum.

XCVI.

Si spatium recta rationali et sexta apotome comprehenditur, recta spatio aequalis quadrata recta est cum medio totum medium efficiens.

Spatium enim AB rationali AG et sexta apotome AD comprehendatur. dico, rectam spatio AB aequalem quadratam rectam esse cum medio totum medium efficientem.

nam ΔH rectae AD congruens sit. itaque AH , $H\Delta$ rationales sunt potentia tantum commensurabiles,



et neutra earum rationali propositae AG longitudine commensurabilis est, tota autem AH congruentem ΔH quadrata excedit quadrato rectae sibi longitudine incommensurabilis [deff. tert. 6]. iam quoniam AH^2 excedit $H\Delta^2$ quadrato rectae sibi incommensurabilis longitudine, si $\frac{1}{4} \Delta H^2$ aequale

rectae AH adplicatur spatium figura quadrata deficiens, in partes incommensurabiles eam diuidet [prop. XVIII]. ΔH igitur in puncto E in duas partes aequales secetur, et quadrato EH^2 aequale rectae AH adplicetur

βαλλόμενον F. παραβάλλωμεν Vb. 22. σημείον] om. P. τῶ] τό F. 23. ἴσον] om. V. ἴσον ἐλλείπον V.

τετραγώνῳ, καὶ ἔστω τὸ ὑπὸ τῶν AZ, ZH · ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ AZ τῇ ZH μήκει. ὥς δὲ ἡ AZ πρὸς τὴν ZH , οὕτως ἐστὶ τὸ AI πρὸς τὸ ZK · ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ AI τῷ ZK . καὶ ἐπεὶ αἱ AH, AG ῥηταὶ
 5 εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι, μέσον ἐστὶ τὸ AK .
 πάλιν, ἐπεὶ αἱ AG, AH ῥηταὶ εἰσι καὶ ἀσύμμετροι μήκει, μέσον ἐστὶ καὶ τὸ AK . ἐπεὶ οὖν αἱ AH, HD δυνάμει μόνον σύμμετροί εἰσιν, ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ AH τῇ HD μήκει. ὥς δὲ ἡ AH πρὸς τὴν HD ,
 10 οὕτως ἐστὶ τὸ AK πρὸς τὸ KA · ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ AK τῷ KA . συνεστήτω οὖν τῷ μὲν AI ἴσον τετράγωνον τὸ AM , τῷ δὲ ZK ἴσον ἀφηγήσθω περὶ τὴν αὐτὴν γωνίαν τὸ $NΞ$ · περὶ τὴν αὐτὴν ἄρα διάμετρον ἐστὶ τὰ $AM, NΞ$ τετράγωνα. ἔστω αὐτῶν
 15 διάμετρος ἡ OP , καὶ καταγεγράφθω τὸ σχῆμα. ὁμοίως δὲ τοῖς ἐπάνω δεξιόμεν, ὅτι ἡ AN δύνανται τὸ AB χωρίον.

Λέγω, ὅτι ἡ AN [ῥ] μετὰ μέσου μέσον τὸ ὅλον ποιούσά ἐστιν.

20 Ἐπεὶ γὰρ μέσον ἐδείχθη τὸ AK καὶ ἐστὶν ἴσον τοῖς ἀπὸ τῶν AO, ON , τὸ ἄρα συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AO, ON μέσον ἐστίν. πάλιν, ἐπεὶ μέσον ἐδείχθη τὸ AK καὶ ἐστὶν ἴσον τῷ δις ὑπὸ τῶν AO, ON , καὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν AO, ON μέσον ἐστίν. καὶ
 25 ἐπεὶ ἀσύμμετρον ἐδείχθη τὸ AK τῷ AK , ἀσύμμετρα [ἄρα] ἐστὶ καὶ τὰ ἀπὸ τῶν AO, ON τετράγωνα τῷ δις ὑπὸ τῶν AO, ON . καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρόν ἐστι τὸ

1. ἀσύμμετρον P, corr. m. 1. 2. ZH] HZ F. 3. AI] ἀπὸ AI F. 4. ἐστίν P. AI] corr. ex AG m. rec. P. 5. AK] corr. ex AK m. rec. P. 6. πάλιν — 7. AK] om. P. 10. KA] AK V. 11. KA] corr. ex AK V. 12. ἀφηγήσθω

spatium figura quadrata deficiens, et sit $AZ \times ZH$. itaque AZ , ZH longitudine incommensurabiles sunt. est autem $AZ : ZH = AI : ZK$ [VI, 1]. itaque AI , ZK incommensurabilia sunt [prop. XI]. et quoniam AH , AG rationales sunt potentia tantum commensurabiles, AK medium est [prop. XXI]. rursus quoniam AG , AD rationales sunt et longitudine incommensurabiles, etiam AK medium est [id.]. quoniam igitur AH , HA potentia tantum commensurabiles sunt, AH et HA longitudine incommensurabiles sunt. est autem $AH : HA = AK : KA$ [VI, 1]. itaque AK , KA incommensurabilia sunt [prop. XI]. construatur igitur quadratum $AM = AI$, et spatio ZK aequale auferatur $N\Xi$ in eodem angulo positum. itaque quadrata AM , $N\Xi$ circum eandem diametrum posita sunt [VI, 26]. sit OP eorum diametrus, et describatur figura [uol. I p. 137 not.]. eodem igitur modo, quo supra, demonstrabimus, esse $AN^2 = AB$.

dico, AN rectam esse cum medio totum medium efficientem. nam quoniam demonstrauius, AK medium esse, et $AK = AO^2 + ON^2$, $AO^2 + ON^2$ medium est. rursus quoniam demonstrauius AK medium esse, et $AK = 2AO \times ON$, etiam $2AO \times ON$ medium est. et quoniam demonstrauius, AK et AK incommensurabilia esse, etiam $AO^2 + ON^2$ et $2AO \times ON$ incommensurabilia sunt. et quoniam AI , ZK incom-

$\tau\acute{o}$ $N\Xi$ V. 13. $\pi\epsilon\rho\acute{\iota}$ — $\gamma\omega\nu\lambda\alpha\nu$] om. Fb, mg. m. 2 B. $\alpha\upsilon\tau\eta\eta\eta$] (prius) $\alpha\upsilon\tau\eta\eta\eta$ $\tau\eta\eta\eta$ $\epsilon\pi\acute{o}$ AO V. $\tau\acute{o}$ $N\Xi$] om. V. 14. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$] $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ V. $\tau\epsilon\tau\rho\acute{\alpha}\gamma\omega\nu\alpha$] om. V. 16. $\delta\upsilon\nu\alpha\tau\alpha\iota$ — 18. AN] mg. m. 2 V. 18. $\acute{\eta}$] (alt.) om. P. 20. $\acute{\iota}\sigma\omicron\nu$] m. 2 F. 22. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ PBVb, comp. F. 24. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ PBV, comp. Fb. 26. $\acute{\alpha}\rho\epsilon\alpha$] om. BFVb.

AI τῷ ZK , ἀσύμμετρον ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς AO τῷ
ἀπὸ τῆς ON . αἱ AO , ON ἄρα δυνάμει εἰσὶν ἀσύμ-
μετροὶ ποιοῦσαι τό τε συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν
τετραγώνων μέσον καὶ τὸ δις ὑπ' αὐτῶν μέσον ἔτι τε
5 τὰ ἀπ' αὐτῶν τετράγωνα ἀσύμμετρα τῷ δις ὑπ' αὐτῶν.
ἡ ἄρα AN ἄλογός ἐστιν ἡ καλουμένη μετὰ μέσου
μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα· καὶ δύναιται τὸ AB χωρίον.
Ἡ ἄρα τὸ χωρίον δυναμένη μετὰ μέσου μέσον τὸ
ὅλον ποιοῦσά ἐστιν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

10

96'.

Το ἀπὸ ἀποτομῆς παρὰ φητὴν παραβαλλό-
μενον πλάτος ποιεῖ ἀποτομὴν πρώτην.

Ἔστω ἀποτομή ἡ AB , φητὴ δὲ ἡ $ΓΔ$, καὶ τῷ ἀπὸ
τῆς AB ἴσον παρὰ τὴν $ΓΔ$ παραβεβλήσθω τὸ $ΓΕ$
15 πλάτος ποιοῦν τὴν $ΓΖ$. λέγω, ὅτι ἡ $ΓΖ$ ἀποτομή ἐστὶ
πρώτη.

Ἔστω γὰρ τῇ AB προσαρμόζουσα ἡ BH . αἱ ἄρα
 AH , HB φηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι. καὶ
τῷ μὲν ἀπὸ τῆς AH ἴσον παρὰ τὴν $ΓΔ$ παραβεβλήσθω
20 τὸ $ΓΘ$, τῷ δὲ ἀπὸ τῆς BH τὸ $ΚΛ$. ὅλον ἄρα τὸ $ΓΑ$
ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν AH , HB . ὧν τὸ $ΓΕ$ ἴσον
ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς AB . λοιπὸν ἄρα τὸ $ΖΑ$ ἴσον ἐστὶ
τῷ δις ὑπὸ τῶν AH , HB . τετμήσθω ἡ ZM δίχα
κατὰ τὸ N σημεῖον, καὶ ἤχθω διὰ τοῦ N τῇ $ΓΔ$
25 παράλληλος ἡ $NΞ$. ἐκάτερον ἄρα τῶν $ZΞ$, AN
ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν AH , HB . καὶ ἐπεὶ τὰ ἀπὸ

2. ON] (prius) $NO P$. 3. τε] μέν $B F V b$. συγκείμενον]
m. 2 V . 4. καί] ins. m. 1 V . ἐτι] ε- in ras. V . 6. AN]
corr. ex $AN B$. 7. ποιοῦσαι φ. 8. χωρίον] $AB B F b$, AB
χωρίον V . 9. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] : ~ P . 11. ἀπό] om. b .


mensurabilia sunt, etiam AO^2 , ON^2 incommensurabilia sunt. itaque AO , ON potentia incommensurabiles sunt efficientes summam quadratorum mediam et duplum rectangulum medium et praeterea quadrata et duplum rectangulum incommensurabilia. itaque AN irrationalis est cum medio totum medium efficiens, quae uocatur [prop. LXXVIII]. et $AN^2 = AB$.

Ergo recta spatio illo aequalis quadrata recta est cum medio totum medium efficiens; quod erat demonstrandum.

XCVII.

Quadratum apotomes rectae rationali adplicatum latitudinem efficit apotomen primam.

Sit AB apotome, ΓA autem rationalis, et quadrato AB^2 aequale rectae ΓA adplicetur ΓE latitudinem efficiens ΓZ . dico, ΓZ primam esse apotomen.



nam BH rectae AB congruens sit. itaque AH , HB rationales sunt potentia tantum commensurabiles [prop. LXXIII]. et rectae ΓA adplicetur $\Gamma \Theta = AH^2$, $KA = BH^2$. itaque totum $\Gamma A = AH^2 + HB^2$.

quorum $\Gamma E = AB^2$. itaque reliquum $ZA = 2AH \times HB$ [II, 7]. iam ZM in puncto N in duas partes aequales secetur, et per N rectae ΓA parallela ducatur $NΞ$. itaque $ZΞ = AN = AH \times HB$. et quoniam $AH^2 + HB^2$

12. $\kappa\omega\epsilon\iota$ P, corr. m. 1. 17. AB] B in ras. V. BH] HB
e corr. V. 19. AH] corr. ex AJ m. 1 F. 22. ZA] AZ P.
23. $\tau\acute{\omega}\nu$] om. P. 25. $ZΞ$] $ΞZ$ F. AN] corr. ex NA V.
26. $\tau\acute{\omega}$ $\alpha\pi\alpha\xi$ $\acute{\upsilon}\pi\acute{o}$ V.

τῶν AH , HB ῥητά ἐστίν, καὶ ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν AH ,
 HB ἴσον τὸ ΔM , ῥητόν ἄρα ἐστὶ τὸ ΔM . καὶ παρὰ
ῥητὴν τὴν ΓA παραβέβληται πλάτος ποιοῦν τὴν ΓM .
ῥητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ ΓM καὶ σύμμετρος τῇ ΓA μήκει.
6 πάλιν, ἐπεὶ μέσον ἐστὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν AH , HB , καὶ
τῷ δις ὑπὸ τῶν AH , HB ἴσον τὸ $Z A$, μέσον ἄρα τὸ
 $Z A$. καὶ παρὰ ῥητὴν τὴν ΓA παράκειται πλάτος ποιοῦν
τὴν $Z M$. ῥητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ $Z M$ καὶ ἀσύμμετρος τῇ
 ΓA μήκει. καὶ ἐπεὶ τὰ μὲν ἀπὸ τῶν AH , HB ῥητά
10 ἐστίν, τὸ δὲ δις ὑπὸ τῶν AH , HB μέσον, ἀσύμμετρον
ἄρα ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν AH , HB τῷ δις ὑπὸ τῶν AH ,
 HB . καὶ τοῖς μὲν ἀπὸ τῶν AH , HB ἴσον ἐστὶ τὸ
 ΓA , τῷ δὲ δις ὑπὸ τῶν AH , HB τὸ $Z A$. ἀσύμμετρον
ἄρα ἐστὶ τὸ ΔM τῷ $Z A$. ὥς δὲ τὸ ΔM πρὸς τὸ
15 $Z A$, οὕτως ἐστὶν ἡ ΓM πρὸς τὴν $Z M$. ἀσύμμετρος
ἄρα ἐστὶν ἡ ΓM τῇ $Z M$ μήκει. καὶ εἰσὶν ἀμφοτέραι
ῥηταί· αἱ ἄρα ΓM , MZ ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον
σύμμετροι· ἡ ΓZ ἄρα ἀποτομή ἐστίν.

Λέγω δὴ, ὅτι καὶ πρώτη.

20 Ἐπεὶ γάρ τῶν ἀπὸ τῶν AH , HB μέσον ἀνάλογόν
ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν AH , HB , καὶ ἐστὶ τῷ μὲν ἀπὸ τῆς
 AH ἴσον τὸ $\Gamma \Theta$, τῷ δὲ ἀπὸ τῆς BH ἴσον τὸ $K A$,
τῷ δὲ ὑπὸ τῶν AH , HB τὸ $N A$, καὶ τῶν $\Gamma \Theta$, $K A$
ἄρα μέσον ἀνάλογόν ἐστὶ τὸ $N A$. ἐστίν ἄρα ὥς τὸ
25 $\Gamma \Theta$ πρὸς τὸ $N A$, οὕτως τὸ $N A$ πρὸς τὸ $K A$. ἀλλ'
ὥς μὲν τὸ $\Gamma \Theta$ πρὸς τὸ $N A$, οὕτως ἐστὶν ἡ ΓK πρὸς

1. ῥητά — 2. HB] mg. m. 2 B. 1. ἐστίν] ἐστὶ PBVB,
comp. F. καὶ ἐστὶ τοῖς] τοῖς δὲ V. 3. παράκειται Theon
(BFVB); παραβέβληται supra add. m. 2 B. 6. τῷ] corr. ex
τό FV. 8. ἐστίν] ἐστὶ καὶ F. καὶ ἀσύμμετρος] bis b. 10.
ἐστὶ BV, comp. b, εἰσι F? μέσα P, et F, corr. m. 1. 11.
ἄρα] om. B. ἐστίν P. 12. καὶ] καὶ ἐστὶ BFVB. ἐστὶ]

rationale est, et $\Delta M = AH^2 + HB^2$, ΔM rationale est. et rectae rationali $\Gamma\Delta$ adplicatum est latitudinem efficiens ΓM . itaque ΓM rationalis est et rectae $\Gamma\Delta$ longitudine commensurabilis [prop. XX]. rursus quoniam medium est $2 AH \times HB$, et $ZA = 2 AH \times HB$, ZA medium est. et rectae rationali $\Gamma\Delta$ adplicatum est latitudinem efficiens ZM . itaque ZM rationalis est et rectae $\Gamma\Delta$ longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. et quoniam $AH^2 + HB^2$ rationale est, $2 AH \times HB$ autem medium, $AH^2 + HB^2$ et $2 AH \times HB$ incommensurabilia sunt. et

$$\Gamma A = AH^2 + HB^2, ZA = 2 AH \times HB.$$

itaque ΔM , ZA incommensurabilia sunt. est autem $\Delta M : ZA = \Gamma M : ZM$ [VI, 1]. itaque ΓM , ZM longitudine incommensurabiles sunt [prop. XI]. et utraque rationalis est. itaque ΓM , MZ rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo ΓZ apotome est [prop. LXXIII].

iam dico, eandem primam esse. quoniam enim $AH \times HB$ medium est proportionale inter AH^2 et HB^2 [prop. XXI lemma], et $\Gamma\Theta = AH^2$, $K\Lambda = BH^2$, $N\Lambda = AH \times HB$, erit etiam $N\Lambda$ medium proportionale inter $\Gamma\Theta$, $K\Lambda$. quare $\Gamma\Theta : N\Lambda = N\Lambda : K\Lambda$. est autem $\Gamma\Theta : N\Lambda = \Gamma K : NM$ et $N\Lambda : K\Lambda = NM : KM$ [VI, 1]. itaque $\Gamma K \times KM = MN^2$ [VI, 17] = $\frac{1}{2} ZM^2$.

om. BFVb. 18. HB] corr. ex AB m. 1 b, HB ἴσον V. 15. τήν] om. B. 18. ἔστι BVb, comp. F. 21. ἔστι] (alt.) ἔστιν P. τῶ] corr. ex τό m. 1 F. 22. τῶ δὲ ὑπὸ τῶν AH, HB ἴσον τὸ NΛ, τῶ δὲ ὑπὸ τῆς BH ἴσον τὸ KΛ· καὶ κτλ. Theon (BFVb). 24. NΛ] e corr. V. ἔστιν — 25. πρὸς τὸ NΛ] mg. m. 1 P. 25. NΛ] corr. ex AN V. οὕτως — 26. NΛ] mg. m. 2 B. 26. NΛ] corr. ex AN V. ἔστιν] m. 2 F. ἦ] ras. 1 litt. b.

τὴν NM · ὥς δὲ τὸ NA πρὸς τὸ KA , οὕτως ἐστὶν ἡ NM πρὸς τὴν KM · τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν $ΓΚ$, KM ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς NM , τουτέστι τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς ZM . καὶ ἐπεὶ σύμμετρόν ἐστι τὸ ἀπὸ τῆς AH τῷ ἀπὸ τῆς HB , σύμμετρόν [ἐστὶ] καὶ τὸ $ΓΘ$ τῷ KA . ὥς δὲ τὸ $ΓΘ$ πρὸς τὸ KA , οὕτως ἡ $ΓΚ$ πρὸς τὴν KM · σύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ $ΓΚ$ τῇ KM . ἐπεὶ οὖν δύο εὐθεῖαι ἄνισοι εἰσιν αἱ $ΓΜ$, MZ , καὶ τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς ZM ἴσον παρὰ τὴν $ΓΜ$ παραβέβληται ἐλλείπον εἶδει τετραγώνῳ τὸ ὑπὸ τῶν $ΓΚ$, KM , καὶ ἐστὶ σύμμετρος ἡ $ΓΚ$ τῇ KM , ἡ ἄρα $ΓΜ$ τῆς MZ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ μήκει. καὶ ἐστὶν ἡ $ΓΜ$ σύμμετρος τῇ ἐκκειμένη φητῇ τῇ $ΓΔ$ μήκει· ἡ ἄρα $ΓΖ$ ἀποτομή ἐστὶ πρώτη.

15 Τὸ ἄρα ἀπὸ ἀποτομῆς παρὰ φητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ ἀποτομὴν πρώτην· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

9η'.

Τὸ ἀπὸ μέσης ἀποτομῆς πρώτης παρὰ φητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ ἀποτομὴν δευ-
20 τέραν.

Ἔστω μέσης ἀποτομῆς πρώτη ἡ AB , φητὴ δὲ ἡ $ΓΔ$, καὶ τῷ ἀπὸ τῆς AB ἴσον παρὰ τὴν $ΓΔ$ παραβελήσθω τὸ $ΓΕ$ πλάτος ποιοῦν τὴν $ΓΖ$ · λέγω, ὅτι ἡ $ΓΖ$ ἀποτομή ἐστὶ δευτέρα.

25 Ἔστω γὰρ τῇ AB προσαρμόζουσα ἡ BH · αἱ ἄρα AH , HB μέσαι εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι φητὸν περιέχουσαι. καὶ τῷ μὲν ἀπὸ τῆς AH ἴσον παρὰ τὴν

1. ὥς δέ — 2. KM] om. F, uidetur fuisse in mg. 2. Post prius KM add. καὶ ὥς ἄρα ἡ $ΓΚ$ πρὸς τὴν NM (MN F), οὕτως ἡ

et quoniam AH^2 , HB^2 commensurabilia sunt, etiam $\Gamma\Theta$, $K\Lambda$ commensurabilia sunt. est autem

$$\Gamma\Theta : K\Lambda = \Gamma K : KM$$

[VI, 1]. itaque ΓK , KM commensurabiles sunt [prop. XI]. iam quoniam sunt duae rectae inaequales ΓM , MZ , et $\frac{1}{4} ZM^2$ aequale spatium rectae ΓM adplicatum est $\Gamma K \times KM$ figura quadrata deficiens, et ΓK , KM commensurabiles sunt, ΓM^2 excedit MZ^2 quadrato rectae sibi commensurabilis longitudine [prop. XVII]. et ΓM rationali propositae $\Gamma\Delta$ longitudine commensurabilis est. itaque ΓZ apotome est prima [def. tert. 1].

Ergo quadratum apotomes rectae rationali adplicatum latitudinem efficit apotomen primam; quod erat demonstrandum.

XCVIII.

Quadratum mediae apotomes primae rectae rationali adplicatum latitudinem efficit apotomen secundam.

Sit AB mediae apotome prima, $\Gamma\Delta$ autem rationalis, et quadrato AB^2 aequale rectae $\Gamma\Delta$ adplicetur ΓE latitudinem efficiens ΓZ . dico, ΓZ apotomen esse secundam.


nam BH rectae AB congruens sit. itaque AH , HB mediae sunt potentia tantum commensurabiles

NM πρὸς τὴν *KM* FVb. 3. *τοῦτίστιν* P. 4. *σύμμετρος* P, corr. m. rec. *ἔστιν* P. 5. *ἔστι*] om. P. 11. *ἔστιν* P. *ἀσύμμετρος* F. 12. ΓM] $M\Gamma$ e corr. V; KM supra scr. Γ b. MZ] ZM F. *ἀσύμμετρον* b, *ἀ-* add. m. 2 F. 15. *παρὰ ῥητὴν*] om. V. 16. *ὅπερ ἔδει δεῖξαι*] comp. P, om. BFVb. 21. *μέση* BFVb. 22. Post *παρὰ* del. $\phi\eta$ m. 1 P. $\Gamma\Delta$] ΓM F. 23. ΓE] corr. ex $\Gamma\Theta$ m. rec. P. 25. BH] corr. ex ZH m. 2 V. *αὶ ἄρα*] *ἄρα ἡ* F. 26. *εἰσὶν* B.

- $\Gamma\Delta$ παραβεβλήσθω τὸ $\Gamma\Theta$ πλάτος ποιοῦν τὴν ΓK ,
 τῷ δὲ ἀπὸ τῆς HB ἴσον τὸ $K\Lambda$ πλάτος ποιοῦν τὴν
 KM . ὅλον ἄρα τὸ $\Gamma\Delta$ ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν AH ,
 HB μέσον ἄρα καὶ τὸ $\Gamma\Lambda$. καὶ παρὰ ρητὴν τὴν $\Gamma\Delta$
 5 παράκειται πλάτος ποιοῦν τὴν ΓM . ρητὴ ἄρα ἐστὶν
 ἡ ΓM καὶ ἀσύμμετρος τῇ $\Gamma\Delta$ μήκει. καὶ ἐπεὶ τὸ $\Gamma\Lambda$
 ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν AH , HB , ὧν τὸ ἀπὸ τῆς AB
 ἴσον ἐστὶ τῷ ΓE , λοιπὸν ἄρα τὸ δις ὑπὸ τῶν AH ,
 HB ἴσον ἐστὶ τῷ $Z\Lambda$. ρητὸν δὲ [ἐστὶ] τὸ δις ὑπὸ
 10 τῶν AH , HB . ρητὸν ἄρα τὸ $Z\Lambda$. καὶ παρὰ ρητὴν
 τὴν ZE παράκειται πλάτος ποιοῦν τὴν ZM . ρητὴ ἄρα
 ἐστὶ καὶ ἡ ZM καὶ σύμμετρος τῇ $\Gamma\Delta$ μήκει. ἐπεὶ οὖν
 τὰ μὲν ἀπὸ τῶν AH , HB , τουτέστι τὸ $\Gamma\Lambda$, μέσον
 ἐστίν, τὸ δὲ δις ὑπὸ τῶν AH , HB , τουτέστι τὸ $Z\Lambda$,
 15 ρητόν, ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ $\Gamma\Lambda$ τῷ $Z\Lambda$. ὥς δὲ τὸ
 $\Gamma\Lambda$ πρὸς τὸ $Z\Lambda$, οὕτως ἐστὶν ἡ ΓM πρὸς τὴν ZM .
 ἀσύμμετρος ἄρα ἡ ΓM τῇ ZM μήκει. καὶ εἰσιν ἀμ-
 φότεραι ρηταί· αἱ ἄρα ΓM , MZ ρηταὶ εἰσι δυνάμει
 μόνον σύμμετροι· ἡ ΓZ ἄρα ἀποτομὴ ἐστίν.
- 20 *Λέγω δὴ, ὅτι καὶ δευτέρα.*

Τετμήσθω γὰρ ἡ ZM δίχα κατὰ τὸ N , καὶ ἦχθω
 διὰ τοῦ N τῇ $\Gamma\Delta$ παράλληλος ἡ $N\Xi$. ἐκότερον ἄρα
 τῶν $Z\Xi$, NA ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν AH , HB . καὶ
 ἐπεὶ τῶν ἀπὸ τῶν AH , HB τετραγώνων μέσον ἀνά-

1. τὸ ἄρα βεβλήσθω φ. τὸ $\Gamma\Theta$] om. V, supra est ras.
 ΓK] ΓK τὸ $\Gamma\Theta$ V. 3. $\Gamma\Lambda$] $\Gamma\Delta$ b. 4. Post HB add.
 καὶ ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν AH , HB μέσα καὶ ἴσα τῷ $\Gamma\Lambda$ V. 5.
 ρητὴ] -τὴ in ras. P. 6. ἡ ΓM καί] m. 2 F. 8. ἐστὶ τῷ
 ΓE] τῷ ΓE ὧν φ. 9. ἐστὶ] om. P. 10. ἄρα] ἐστὶ καὶ V,
 supra add. ἄρα m. 2; ἄρα καὶ F? (καὶ φ). 12. ἐστὶν B. 14.
 ἐστὶ PBFV, comp. b. HB ρητόν V. $Z\Lambda$] $\Gamma\Lambda$, supra scr.
 Z, b. 15. ρητόν] om. V. ἄρα] m. 2 F. 16. πρὸς τὸ]
 τῷ B, corr. m. 2. ἐστίν] om. V. 17. ἀσύμμετρος — ZM]



spatium rationale comprehen-
dentes [prop. LXXIV]. et qua-
drato AH^2 aequale rectae ΓA
adplicetur $\Gamma \Theta$ latitudinem efficiens
 ΓK , quadrato autem HB^2 aequale
 KA latitudinem efficiens KM .

quare totum $\Gamma A = AH^2 + HB^2$. quare etiam ΓA
medium est. et rectae rationali ΓA adplicatum est
latitudinem efficiens ΓM . itaque ΓM rationalis est
et rectae ΓA longitudine incommensurabilis [prop.
XXII]. et quoniam est

$$\Gamma A = AH^2 + HB^2,$$

quorum $AB^2 = \Gamma E$, erit reliquum $2 AH \times HB = ZA$
[II, 7]. uerum $2 AH \times HB$ rationale est. itaque ZA
rationale est. et rectae rationali ZE adplicatum est
latitudinem efficiens ZM . itaque etiam ZM rationalis
est et rectae ΓA longitudine commensurabilis [prop.
XX]. quoniam igitur $AH^2 + HB^2$, hoc est ΓA , me-
dium est, et $2 AH \times HB$, hoc est ZA , rationale, ΓA
et ZA incommensurabilia sunt. est autem

$$\Gamma A : ZA = \Gamma M : ZM$$

[VI, 1]. itaque ΓM , ZM longitudine incommensura-
biles sunt [prop. XI]. et utraque rationalis est. itaque
 ΓM , MZ rationales sunt potentia tantum commen-
surabiles. ergo ΓZ apotome est [prop. LXXIII].

iam dico, eandem secundam esse. ZM enim in N
in duas partes aequales secetur, et per N rectae ΓA
parallela ducatur $N\Xi$. itaque $Z\Xi = NA = AH \times HB$.

mg. m. 2 B. 18. ἀρα] φ, post MZ hab. F. 19. ἐστὶ BVb,
comp. F. 20. ὅτι ἐστὶ Vb. δευτέρᾳ ἐστὶν B. 23. ZΞ]
Z in ras. B. 24. ἐπεὶ] ἐστὶ B (supra est ras.).

λογόν ἐστι τὸ ὑπὸ τῶν AH , HB , καὶ ἐστὶν ἴσον τὸ
 μὲν ἀπὸ τῆς AH τῷ $\Gamma\Theta$, τὸ δὲ ὑπὸ τῶν AH , HB
 τῷ NA , τὸ δὲ ἀπὸ τῆς BH τῷ KA , καὶ τῶν $\Gamma\Theta$,
 KA ἄρα μέσον ἀνάλογόν ἐστι τὸ NA . ἐστὶν ἄρα ὡς
 5 τὸ $\Gamma\Theta$ πρὸς τὸ NA , οὕτως τὸ NA πρὸς τὸ KA .
 ἀλλ' ὡς μὲν τὸ $\Gamma\Theta$ πρὸς τὸ NA , οὕτως ἐστὶν ἡ ΓK
 πρὸς τὴν NM , ὡς δὲ τὸ NA πρὸς τὸ KA , οὕτως
 ἐστὶν ἡ NM πρὸς τὴν MK . ὡς ἄρα ἡ ΓK πρὸς τὴν
 NM , οὕτως ἐστὶν ἡ NM πρὸς τὴν KM . τὸ ἄρα ὑπὸ
 10 τῶν ΓK , KM ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς NM , τουτέστι
 τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς ZM [καὶ ἐπεὶ σύμ-
 μετρόν ἐστι τὸ ἀπὸ τῆς AH τῷ ἀπὸ τῆς BH , σύμμε-
 τρόν ἐστι καὶ τὸ $\Gamma\Theta$ τῷ KA , τουτέστιν ἡ ΓK τῇ KM].
 ἐπεὶ οὖν δύο εὐθεῖαι ἄνισοί εἰσιν αἱ ΓM , MZ , καὶ
 15 τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς MZ ἴσον παρὰ τὴν
 μείζονα τὴν ΓM παραβέβληται ἐλλείπον εἰδει τετρα-
 γώνῳ τὸ ὑπὸ τῶν ΓK , KM καὶ εἰς σύμμετρα αὐτὴν
 διαιρεῖ, ἡ ἄρα ΓM τῆς MZ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ
 συμμέτρου ἐαυτῇ μήκει. καὶ ἐστὶν ἡ προσαρμόζουσα
 20 ἡ ZM σύμμετρος μήκει τῇ ἐκκειμένη φητῇ τῇ ΓA . ἡ
 ἄρα ΓZ ἀποτομή ἐστὶ δευτέρα.

Τὸ ἄρα ἀπὸ μέσης ἀποτομῆς πρώτης παρὰ φητὴν
 παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ ἀποτομὴν δευτέραν.
 ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

25

εθ'.

Τὸ ἀπὸ μέσης ἀποτομῆς δευτέρας παρὰ
 φητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ ἀποτομὴν
 τρίτην.

1. ἐστὶν] ἐστι V. ἴσον] supra scr. m. 1 V. 2. τῷ] in
 ras. V. 3. τῷ] τῶν mut. in τό m. 1 V. τό] τῷ P. τῷ]
 τό PV. τῶν] τῷ b. 5. τὸ NA] (alt.) mg. m. 2 F. πρὸς
 τὸ KA] τὸ NA φ. Deinde del. m. 1: ἀλλ' ὡς μὲν τὸ $\Gamma\Theta$ πρὸς

et quoniam $AH \times HB$ medium est proportionale inter AH^2 et BH^2 [prop. XXI lemma], et $AH^2 = \Gamma\Theta$, $AH \times HB = NA$, $BH^2 = KA$, etiam NA medium est proportionale inter $\Gamma\Theta$, KA . itaque erit $\Gamma\Theta : NA = NA : KA$. uerum $\Gamma\Theta : NA = \Gamma K : NM$, $NA : KA = NM : MK$ [VI, 1]. quare $\Gamma K : NM = NM : KM$. itaque $\Gamma K \times KM = NM^2$ [VI, 17], hoc est $= \frac{1}{4} ZM^2$. iam quoniam sunt duae rectae inaequales ΓM , MZ , et $\frac{1}{4} ZM^2$ aequale maiori ΓM adplicatum est spatium $\Gamma K \times KM$ figura quadrata deficiens et eam in partes commensurabiles¹⁾ diuidit, ΓM^2 excedit MZ^2 quadrato rectae sibi commensurabilis longitudine [prop. XVII]. et congruens ZM rationali propositae ΓA longitudine commensurabilis est. itaque ΓZ apotome est secunda [deff. tert. 2].

Ergo quadratum mediae apotomes primae rectae rationali adplicatum latitudinem efficit apotomen secundam; quod erat demonstrandum.

IC.

Quadratum mediae apotomes secundae rectae rationali adplicatum latitudinem efficit apotomen tertiam.

1) Nam AH^2 et BH^2 commensurabilia sunt, et
 $AH^2 : BH^2 = \Gamma\Theta : KA = \Gamma K : KM$
 [VI, 1]; tum u. prop. XI.

$\tau\acute{o}$ NA , οὕτως $\tau\acute{o}$ NA πρὸς $\tau\acute{o}$ KA V. 8. NM] N in ras. V.
 9. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\acute{\iota}\nu$] om. V. 11. $\tau\acute{o}\nu$] $\tau\acute{\omega}$ F. $\kappa\alpha\iota$ $\acute{\epsilon}\pi\epsilon\iota$ — 13.
 KM] om. P. 12. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\acute{\iota}$] om. Fb. Post BH del. οὕτως
 m. 1 V. 13. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\acute{\iota}$] supra scr. m. 1 FV. 14. $\delta\upsilon\sigma$ $\epsilon\upsilon\theta\epsilon\iota\alpha\iota$] supra scr. m. 1 F. $\kappa\alpha\iota$ $\tau\acute{\omega}$] $\tau\acute{\omega}$ $\delta\acute{\epsilon}$ BFVb. 15. $\tau\eta\varsigma$] e corr. V.
 MZ] corr. ex ZM V. 17. $\tau\acute{o}$] mut. in $\tau\acute{\omega}$ m. 2 P. 18.
 $\tau\eta\varsigma$] corr. ex $\tau\eta$ m. rec. V. 20. Mg. γρ. $\acute{\alpha}\sigma\upsilon\mu\mu\epsilon\tau\rho\omicron\varsigma$ m. 1 P.
 ΓA] ΓA $\mu\eta\kappa\epsilon\iota$ φ. 22. $\pi\rho\acute{o}\tau\eta\varsigma$] om. P. 24. $\acute{o}\pi\epsilon\rho$ $\acute{\epsilon}\delta\epsilon\iota$
 $\delta\epsilon\iota\chi\epsilon\iota$] : — P, om. BFVb.


"Εστω μέσης ἀποτομή δευτέρα ἡ AB , φητὴ δὲ ἡ ΓA , καὶ τῷ ἀπὸ τῆς AB ἴσον παρὰ τὴν ΓA παραβεβλήσθω τὸ ΓE πλάτος ποιοῦν τὴν ΓZ . λέγω, ὅτι ἡ ΓZ ἀποτομή ἐστὶ τρίτη.

- 5 "Εστω γὰρ τῇ AB προσαρμόζουσα ἡ BH . αἱ ἄρα AH , HB μέσαι εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι μέσον περιέχουσai. καὶ τῷ μὲν ἀπὸ τῆς AH ἴσον παρὰ τὴν ΓA παραβεβλήσθω τὸ $\Gamma \Theta$ πλάτος ποιοῦν τὴν ΓK , τῷ δὲ ἀπὸ τῆς BH ἴσον παρὰ τὴν $K \Theta$ παραβεβλήσθω
 10 τὸ $K A$ πλάτος ποιοῦν τὴν $K M$. ὅλον ἄρα τὸ ΓA ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν AH , HB [καὶ ἐστὶ μέσα τὰ ἀπὸ τῶν AH , HB]. μέσον ἄρα καὶ τὸ ΓA . καὶ παρὰ φητὴν τὴν ΓA παραβέβληται πλάτος ποιοῦν τὴν ΓM . φητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ ΓM καὶ ἀσύμμετρος τῇ ΓA μήκει. καὶ
 15 ἐπεὶ ὅλον τὸ ΓA ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν AH , HB , ὧν τὸ ΓE ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς AB , λοιπὸν ἄρα τὸ AZ ἴσον ἐστὶ τῷ δις ὑπὸ τῶν AH , HB . τετμήσθω οὖν ἡ ZM διχα κατὰ τὸ N σημεῖον, καὶ τῇ ΓA παράλληλος ἤχθω ἡ $N \Xi$. ἐκότερον ἄρα τῶν $Z \Xi$, $N A$ ἴσον
 20 ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν AH , HB . μέσον δὲ τὸ ὑπὸ τῶν AH , HB . μέσον ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ $Z A$. καὶ παρὰ φητὴν τὴν EZ παράκειται πλάτος ποιοῦν τὴν ZM . φητὴ ἄρα καὶ ἡ ZM καὶ ἀσύμμετρος τῇ ΓA μήκει. καὶ
 25 ἐπεὶ αἱ AH , HB δυνάμει μόνον εἰσὶ σύμμετροι, ἀσύμμετρος ἄρα [ἐστὶ] μήκει ἡ AH τῇ HB . ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς AH τῷ ὑπὸ τῶν AH , HB . ἀλλὰ τῷ μὲν ἀπὸ τῆς AH σύμμετρά ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν

1. μέση BV . δευτέρα] in ras. V. 4. τρίτη ἐστὶν BVb . 9. $K \Theta$] corr. ex $\Gamma \Theta$ V. 10. KM] corr. ex $K A$ m. 1 F. ΓA] corr. ex $K A$ V. 11. καὶ — 12. HB] om. FVb , m. 2 B. 13. φητόν P. 17. AZ] corr. ex $Z A$ V. 21.

Sit AB mediae apotome secunda, ΓA autem rationalis, et quadrato AB^2 aequale rectae ΓA adplicetur ΓE latitudinem efficiens ΓZ . dico, ΓZ apotomen tertiam esse.

nam BH rectae AB congruens sit. itaque AH, HB mediae sunt potentia tantum commensurabiles spatium



medium comprehendentes [prop. LXXV]. et quadrato AH^2 aequale rectae ΓA adplicetur $\Gamma \Theta$ latitudinem efficiens ΓK , quadrato autem BH^2 aequale rectae $K \Theta$ adplicetur $K A$ latitudinem efficiens $K M$. itaque totum $\Gamma A = AH^2 + HB^2$. et $AH^2 + HB^2$ medium est. itaque etiam ΓA medium est. et rationali ΓA adplicatum est latitudinem efficiens ΓM . quare ΓM rationalis est et rectae ΓA longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. et quoniam est $\Gamma A = AH^2 + HB^2$, quorum $\Gamma E = AB^2$, erit reliquum $AZ = 2 AH \times HB$ [II, 7]. iam ZM in puncto N in duas partes aequales secetur, et rectae ΓA parallela ducatur $N \Xi$. itaque $Z \Xi = NA = AH \times HB$. uerum $AH \times HB$ medium est. itaque etiam ZA medium est. et rectae rationali EZ adplicatum est latitudinem efficiens ZM . quare ZM rationalis est et rectae ΓA longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. et quoniam AH, HB potentia tantum commensurabiles sunt, AH et HB longitudine incommensurabiles sunt. quare etiam AH^2 et $AH \times HB$ incommensurabilia sunt [prop. XXI lemma, prop. XI].

ZA] corr. ex $Z\Lambda$ m. rec. P, mut. in AZ V. 23. κατ'] (primum) $\xi\sigma\tau\iota$ V. 25. $\xi\sigma\tau\iota$] om. P. AH] H in ras. V. $\tau\eta$] om. b.

AH, HB , τῷ δὲ ὑπὸ τῶν AH, HB τὸ δις ὑπὸ τῶν AH, HB ἀσύμμετρα ἄρα ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν AH, HB τῷ δις ὑπὸ τῶν AH, HB . ἀλλὰ τοῖς μὲν ἀπὸ τῶν AH, HB ἴσον ἐστὶ τὸ $ΓΑ$, τῷ δὲ δις ὑπὸ τῶν AH ,
 5 HB ἴσον ἐστὶ τὸ $ΖΑ$. ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ $ΓΑ$ τῷ $ΖΑ$. ὥς δὲ τὸ $ΓΑ$ πρὸς τὸ $ΖΑ$, οὕτως ἐστὶν ἡ $ΓΜ$ πρὸς τὴν $ΖΜ$. ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ $ΓΜ$ τῇ $ΖΜ$ μήκει. καὶ εἰσιν ἀμφοτέραι ρηταί· αἱ ἄρα $ΓΜ, ΜΖ$ ρηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· ἀποτομῇ
 10 ἄρα ἐστὶν ἡ $ΓΖ$.

Λέγω δὴ, ὅτι καὶ τρίτη.

Ἐπεὶ γὰρ σύμμετρόν ἐστι τὸ ἀπὸ τῆς AH τῷ ἀπὸ τῆς HB , σύμμετρον ἄρα καὶ τὸ $ΓΘ$ τῷ $ΚΑ$. ὥστε καὶ ἡ $ΓΚ$ τῇ $ΚΜ$. καὶ ἐπεὶ τῶν ἀπὸ τῶν AH, HB
 15 μέσον ἀνάλογόν ἐστι τὸ ὑπὸ τῶν AH, HB , καὶ ἐστὶ τῷ μὲν ἀπὸ τῆς AH ἴσον τὸ $ΓΘ$, τῷ δὲ ἀπὸ τῆς HB ἴσον τὸ $ΚΑ$, τῷ δὲ ὑπὸ τῶν AH, HB ἴσον τὸ $ΝΑ$, καὶ τῶν $ΓΘ, ΚΑ$ ἄρα μέσον ἀνάλογόν ἐστι τὸ $ΝΑ$.
 20 ἐστὶν ἄρα ὥς τὸ $ΓΘ$ πρὸς τὸ $ΝΑ$, οὕτως τὸ $ΝΑ$ πρὸς τὸ $ΚΑ$. ἀλλ' ὥς μὲν τὸ $ΓΘ$ πρὸς τὸ $ΝΑ$, οὕτως ἐστὶν ἡ $ΓΚ$ πρὸς τὴν $ΝΜ$, ὥς δὲ τὸ $ΝΑ$ πρὸς τὸ $ΚΑ$, οὕτως ἐστὶν ἡ $ΝΜ$ πρὸς τὴν $ΚΜ$. ὥς ἄρα ἡ $ΓΚ$ πρὸς τὴν $ΜΝ$, οὕτως ἐστὶν ἡ $ΜΝ$ πρὸς τὴν $ΚΜ$. τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν $ΓΚ, ΚΜ$ ἴσον ἐστὶ τῷ [ἀπὸ
 25 τῆς $ΜΝ$, τουτέστι τῷ] τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς $ΖΜ$. ἐπεὶ οὖν δύο εὐθεῖαι ἄνισοι εἰσιν αἱ $ΓΜ, ΜΖ$, καὶ τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς $ΖΜ$ ἴσον παρὰ τὴν $ΓΜ$ παραβέβληται ἐλλείπον εἶδει τετραγώνῳ καὶ εἰς

1. τό] σύμμετρόν ἐστι τό Theon (BFVb). 2. Post HB del. τὸ $ΖΑ$ V. ἀσύμμετρα — 3. HB] om. P. 2. ἀσύμμετρα — 5. $ΖΑ$] mg. m. 1 V. 2. ἄρα] om. b. ἐστὶν ἄρα V. ἀπό]

uerum AH^2 et $AH^2 + HB^2$, $AH \times HB$ et $2AH \times HB$ commensurabilia sunt. itaque $AH^2 + HB^2$ et $2AH \times HB$ incommensurabilia sunt [prop. XIII]. est autem

$$\Gamma A = AH^2 + HB^2, ZA = 2AH \times HB.$$

quare ΓA , ZA incommensurabilia sunt. est autem $\Gamma A : ZA = \Gamma M : ZM$ [VI, 1]. quare ΓM , ZM longitudine incommensurabiles sunt [prop. XI]. et utraque rationalis est. itaque ΓM , MZ rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo ΓZ apotome est [prop. LXXIII].

Iam dico, eandem tertiam esse. nam quoniam AH^2 , HB^2 commensurabilia sunt, etiam $\Gamma\Theta$, KA commensurabilia sunt. quare etiam ΓK , KM commensurabiles sunt [VI, 1; prop. XI]. et quoniam $AH \times HB$ medium est proportionale inter AH^2 et HB^2 [prop. XXI lemma], et $\Gamma\Theta = AH^2$, $KA = HB^2$, $NA = AH \times HB$, etiam NA medium est proportionale inter $\Gamma\Theta$, KA . itaque $\Gamma\Theta : NA = NA : KA$. est autem

$$\Gamma\Theta : NA = \Gamma K : NM, NA : KA = NM : KM$$

[VI, 1]. quare $\Gamma K : MN = MN : KM$. itaque [VI, 17] $\Gamma K \times KM = MN^2 = \frac{1}{4} ZM^2$. quoniam igitur duae rectae inaequales sunt ΓM , MZ , et $\frac{1}{4} ZM^2$ aequale rectae ΓM spatium adplicatum est figura quadrata deficiens et eam in partes commensurabiles diuidit,

ὅπό B. 4. ΓA] corr. ex ΓJ m. rec. P. $\tau\omega$] τό V. 5. τό] (prius) mut. in $\tau\phi$ V. 7. ΓM] $H\Gamma$ b. ZM] MZ P, ΓM b.
8. Post ZM eras. $\mu\eta$ V. 9. MZ] ZM F. 12. $\sigma\upsilon\mu\mu\epsilon\tau\rho\omicron\varsigma$ P, corr. m. rec. 13. $\acute{\alpha}\rho\alpha$ $\acute{\epsilon}\sigma\tau\acute{\iota}$ V. KA] ΓA P. 14. KM $\sigma\upsilon\mu\mu\epsilon\tau\rho\omicron\varsigma$ $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ V. $\tau\omega\upsilon$] (alt.) om. b. 15. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$] (prius) $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\nu$ P.
17. ὅπό] ἀπό F. 20. τὸν KA P. 21. NM] MN bφ. 22. KA] NK ? P. MN F. ὡς — 23. τὴν KM] punctis del. V.
23. MN] NM V. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\nu$] om. V. MN] NM V. 24. ἀπό — 25. $\tau\phi$] mg. m. 1 P.

σύμμετρα αὐτὴν διαιρεῖ, ἡ $ΓΜ$ ἄρα τῆς $ΜΖ$ μείζον
δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ. καὶ οὐδετέρω τῶν
 $ΓΜ$, $ΜΖ$ σύμμετρός ἐστι μήκει τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ τῇ
 $ΓΔ$ · ἡ ἄρα $ΓΖ$ ἀποτομή ἐστὶ τρίτη.

- 5 Τὸ ἄρα ἀπὸ μέσης ἀποτομῆς δευτέρας παρὰ ῥητὴν
παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ ἀποτομὴν τρίτην· ὅπερ
ἔδει δεῖξαι.

Θ'.

Τὸ ἀπὸ ἐλάσσονος παρὰ ῥητὴν παραβαλλό-
10 μενον πλάτος ποιεῖ ἀποτομὴν τετάρτην.

Ἔστω ἐλάσσων ἡ $ΑΒ$, ῥητὴ δὲ ἡ $ΓΔ$, καὶ τῷ ἀπὸ
τῆς $ΑΒ$ ἴσον παρὰ ῥητὴν τὴν $ΓΔ$ παραβεβλήσθω τὸ
 $ΓΕ$ πλάτος ποιοῦν τὴν $ΓΖ$ · λέγω, ὅτι ἡ $ΓΖ$ ἀποτομή
ἐστὶ τετάρτη.

- 15 Ἔστω γάρ τῇ $ΑΒ$ προσαρμόζουσα ἡ $ΒΗ$ · αἱ ἄρα
 $ΑΗ$, $ΗΒ$ δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τὸ μὲν
συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΗ$, $ΗΒ$ τετραγώνων
ῥητόν, τὸ δὲ δις ὑπὸ τῶν $ΑΗ$, $ΗΒ$ μέσον. καὶ τῷ
μὲν ἀπὸ τῆς $ΑΗ$ ἴσον παρὰ τὴν $ΓΔ$ παραβεβλήσθω
20 τὸ $ΓΘ$ πλάτος ποιοῦν τὴν $ΓΚ$, τῷ δὲ ἀπὸ τῆς $ΒΗ$
ἴσον τὸ $ΚΑ$ πλάτος ποιοῦν τὴν $ΚΜ$ · ὅλον ἄρα τὸ
 $ΓΑ$ ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν $ΑΗ$, $ΗΒ$. καὶ ἐστὶ τὸ
συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $ΑΗ$, $ΗΒ$ ῥητόν· ῥητόν
ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ $ΓΑ$. καὶ παρὰ ῥητὴν τὴν $ΓΔ$ παρὰ-
25 κείται πλάτος ποιοῦν τὴν $ΓΜ$ · ῥητὴ ἄρα καὶ ἡ $ΓΜ$
καὶ σύμμετρος τῇ $ΓΔ$ μήκει. καὶ ἐπεὶ ὅλον τὸ $ΓΑ$
ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν $ΑΗ$, $ΗΒ$, ὧν τὸ $ΓΕ$ ἴσον ἐστὶ

1. σύμμετρον P. $ΜΖ$] ZM P. 3. μήκει] om. b. 4.
ἐστὶν P. 5. τό] corr. ex τῷ m. 2 F. ἀπό] m. 2 F. παρὰ
ῥητὴν] mg. m. 2 V. 6. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] om. B F V b, comp. P.

ΓM^2 excedit MZ^2 quadrato rectae sibi commensurabilis. et neutra rectarum ΓM , MZ rationali propositae ΓA longitudine commensurabilis est. itaque ΓZ apotome est tertia [deff. tert. 3].


Ergo quadratum mediae apotomes secundae rectae rationali adplicatum latitudinem efficit apotomen secundam; quod erat demonstrandum.

C.

Quadratum minoris rectae rationali adplicatum latitudinem efficit apotomen quartam.

Sit AB minor, ΓA autem rationalis, et quadrato AB^2 aequale rationali ΓA adplicetur ΓE latitudinem efficiens ΓZ . dico, ΓZ apotomen quartam esse.

nam BH rectae AB congruens sit. itaque AH , HB potentia incommensurabiles sunt efficientes $AH^2 + HB^2$



rationalis, $2AH \times HB$ autem medium [prop. LXXVI]. et quadrato AH^2 aequale rectae ΓA adplicetur $\Gamma \Theta$ latitudinem efficiens ΓK , et $KA = BH^2$ latitudinem efficiens KM . itaque totum

$\Gamma A = AH^2 + HB^2$. et $AH^2 + HB^2$ rationale est. quare etiam ΓA rationale est. et rationali ΓA adplicatum est latitudinem efficiens ΓM . itaque ΓM rationalis est et rectae ΓA longitudine commensurabilis [prop. XX]. et quoniam totum $\Gamma A = AH^2 + HB^2$,

11. ἐλάσσων] ἐ- in ras. m. 1 P. 14. ἐστὶν P. τετάρτη
ἐστὶν V. 16. γὰρ] m. 2 F. 16. HB] supra scr. m. 1 P.
19. μὲν] om. V. 21. KM] ΓK b. 25. καὶ] om. Fb,
ἐστὶν V.

τῷ ἀπὸ τῆς AB , λοιπὸν ἄρα τὸ ZA ἴσον ἐστὶ τῷ δις ὑπὸ τῶν AH, HB . τετμήσθω οὖν ἡ ZM δίχα κατὰ τὸ N σημειον, καὶ ἤχθω διὰ τοῦ N ὁποτέρῃ τῶν GA, MA παράλληλος ἡ $NΞ$. ἐκότερον ἄρα τῶν $ZΞ, NA$
 5 ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν AH, HB . καὶ ἐπεὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν AH, HB μέσον ἐστὶ καὶ ἐστὶν ἴσον τῷ ZA , καὶ τὸ ZA ἄρα μέσον ἐστίν. καὶ παρὰ φητὴν τὴν ZE παράκειται πλάτος ποιοῦν τὴν ZM . φητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ ZM καὶ ἀσύμμετρος τῇ GA μήκει. καὶ ἐπεὶ το μὲν
 10 συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AH, HB φητόν ἐστιν, τὸ δὲ δις ὑπὸ τῶν AH, HB μέσον, ἀσύμμετρα [ἄρα] ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν AH, HB τῷ δις ὑπὸ τῶν AH, HB . ἴσον δέ [ἐστι] τὸ GA τοῖς ἀπὸ τῶν AH, HB , τῷ δὲ δις ὑπὸ τῶν AH, HB ἴσον τὸ ZA . ἀσύμμετρον ἄρα
 15 [ἐστὶ] τὸ GA τῷ ZA . ὥς δὲ τὸ GA πρὸς τὸ ZA , οὕτως ἐστὶν ἡ GM πρὸς τὴν MZ . ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ GM τῇ MZ μήκει. καὶ εἰσὶν ἀμφοτέραι φηταί· αἱ ἄρα GM, MZ φηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· ἀποτομὴ ἄρα ἐστὶν ἡ GZ .

20 Λέγω [δη], ὅτι καὶ τετάρτη.

Ἐπεὶ γὰρ αἱ AH, HB δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι, ἀσύμμετρον ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς AH τῷ ἀπὸ τῆς HB . καὶ ἐστὶ τῷ μὲν ἀπὸ τῆς AH ἴσον τὸ $ΓΘ$, τῷ δὲ ἀπὸ τῆς HB ἴσον τὸ $ΚΑ$. ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ $ΓΘ$ τῷ
 25 $ΚΑ$. ὥς δὲ τὸ $ΓΘ$ πρὸς τὸ $ΚΑ$, οὕτως ἐστὶν ἡ $ΓΚ$ πρὸς τὴν $ΚΜ$. ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ $ΓΚ$ τῇ $ΚΜ$ μήκει. καὶ ἐπεὶ τῶν ἀπὸ τῶν AH, HB μέσον ἀνάλογόν ἐστι τὸ ὑπὸ τῶν AH, HB , καὶ ἐστὶν ἴσον τὸ μὲν ἀπὸ τῆς AH τῷ $ΓΘ$, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς HB τῷ $ΚΑ$,

1. τῷ] (alt.) τῶν P. 2. οὖν] οὖν καὶ P. 3. τοῦ N σημείου V. 5. τῶν] om. P. 6. τῷ] corr. ex τό m. 1 B.

quorum $\Gamma E = AB^2$, erit reliquum $ZA = 2AH \times HB$ [II, 7]. iam ZM in puncto N in duas partes aequales secetur, et per N utrique ΓA , MA parallela ducatur NZ . itaque $ZN = NA = AH \times HB$. et quoniam $2AH \times HB$ medium est et $2AH \times HB = ZA$, etiam ZA medium est. et rectae rationali ZE adplicatum est latitudinem efficiens ZM . itaque ZM rationalis est et rectae ΓA longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. et quoniam $AH^2 + HB^2$ rationale est, $2AH \times HB$ autem medium, $AH^2 + HB^2$ et $2AH \times HB$ incommensurabilia sunt. uerum $\Gamma A = AH^2 + HB^2$ et $ZA = 2AH \times HB$. quare ΓA , ZA incommensurabilia sunt. est autem $\Gamma A : ZA = \Gamma M : MZ$ [VI, 1]. quare ΓM , MZ longitudine incommensurabiles sunt [prop. XI]. et utraque rationalis est. itaque ΓM , MZ rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo ΓZ apotome est [prop. LXXIII].

Iam dico, eandem quartam esse. nam quoniam AH , HB potentia incommensurabiles sunt, etiam AH^2 et HB^2 incommensurabilia sunt. et $\Gamma\Theta = AH^2$, $K\Lambda = HB^2$. quare $\Gamma\Theta$, $K\Lambda$ incommensurabilia sunt. uerum $\Gamma\Theta : K\Lambda = \Gamma K : KM$ [VI, 1]. itaque ΓK , KM longitudine incommensurabiles sunt [prop. XI]. et

7. ἐστὶ PBV, comp. Fb. 10. ἐστὶ PBV, comp. Fb. 11. ἀρα] om. P. 13. δ' b. ἐστὶ] om. P. 14. τό] corr. ex τῷ m. 1 F. 15. ἐστὶ] om. P. τό] in ras. m. 1 P. Supra ΓA τῷ ras. est in V. ΓA] ZA P. ZA] ΓA P. 16. πρὸς τῇν] τῇ P. ZM F. ἀσύμμετρος — 17. MZ] om. P. 20. δῆ] om. FVb, m. 2 B. 22. ἀρα] ἐστὶ V. HB] corr. ex BH m. 2 V. 23. τό] corr. ex τῷ m. 1 F. 26. ΓK] $K\Gamma$ P. 27. μῆκει] mg. m. 2 V. 28. τό] (alt.) τῷ PV. 29. μέν] om. V. τῷ] τό P et V, corr. m. 1. τό] τῷ P. τῷ] τό P. Supra $K\Lambda$ add. N m. 1 b.

τὸ δὲ ὑπὸ τῶν AH , HB τῷ NA , τῶν ἄρα $\Gamma\Theta$, KA
 μέσον ἀνάλογόν ἐστι τὸ NA . ἔστιν ἄρα ὡς τὸ $\Gamma\Theta$
 πρὸς τὸ NA , οὕτως τὸ NA πρὸς τὸ KA . ἀλλ' ὡς
 μὲν τὸ $\Gamma\Theta$ πρὸς τὸ NA , οὕτως ἐστὶν ἡ ΓK πρὸς τὴν
 5 NM , ὡς δὲ τὸ NA πρὸς τὸ KA , οὕτως ἐστὶν ἡ NM
 πρὸς τὴν KM . ὡς ἄρα ἡ ΓK πρὸς τὴν MN , οὕτως
 ἐστὶν ἡ MN πρὸς τὴν KM . τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν ΓK ,
 KM ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς MN , τουτέστι τῷ τετάρτῳ
 μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς ZM . ἐπεὶ οὖν δύο εὐθεῖαι ἄνισοί
 10 εἰσιν αἱ ΓM , MZ , καὶ τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς
 MZ ἴσον παρὰ τὴν ΓM παραβέβληται ἐλλείπον εἶδει
 τετραγώνῳ τὸ ὑπὸ τῶν ΓK , KM καὶ εἰς ἀσύμμετρα
 αὐτὴν διαιρεῖ, ἡ ἄρα ΓM τῆς MZ μείζον δύναται τῷ
 ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ. καὶ ἐστὶν ὅλη ἡ ΓM σύμ-
 15 μετρος μήκει τῇ ἐκκειμένῃ φητῇ τῇ ΓA . ἡ ἄρα ΓZ
 ἀποτομή ἐστὶ τετάρτη.*

Τὸ ἄρα ἀπὸ ἐλάσσονος καὶ τὰ ἐξῆς.

ρα'.

Τὸ ἀπὸ τῆς μετὰ φητοῦ μέσον τὸ ὅλον
 20 ποιούσης παρὰ φητὴν παραβαλλόμενον πλάτος
 ποιεῖ ἀποτομὴν πέμπτην.

Ἔστω ἡ μετὰ φητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιούσα ἡ AB ,
 φητὴ δὲ ἡ ΓA , καὶ τῷ ἀπὸ τῆς AB ἴσον παρὰ τὴν
 ΓA παραβεβλήσθω τὸ ΓE πλάτος ποιούν τὴν ΓZ .
 25 λέγω, ὅτι ἡ ΓZ ἀποτομή ἐστὶ πέμπτη.

Ἔστω γὰρ τῇ AB προσαρμόζουσα ἡ BH . αἱ ἄρα

1. ὑπό] corr. ex ἀπό V. τῶν] (alt.) τῷ b. 3. NA] AN F. οὕτως — 4. NA] mg. m. 2 B. 3. KA] KA' F.
 4. μέν] om. V. ἐστίν] m. 2 F. 6. ὡς] καὶ ὡς b, mg. V.
 ἄρα — 7. τὴν KM] mg. V. 6. τήν] (alt.) τό φ. 8. NM P.

quoniam $AH \times HB$ inter AH^2 , HB^2 medium est proportionale [prop. XXI lemma], et $AH^2 = \Gamma\Theta$, $HB^2 = KA$, $AH \times HB = NA$, inter $\Gamma\Theta$, KA medium proportionale est NA . itaque $\Gamma\Theta : NA = NA : KA$. uerum $\Gamma\Theta : NA = \Gamma K : NM$, $NA : KA = NM : KM$ [VI, 1]. itaque $\Gamma K : MN = MN : KM$. quare $\Gamma K \times KM = MN^2$ [VI, 17] $= \frac{1}{4} ZM^2$. iam quoniam sunt duae rectae inaequales ΓM , MZ , et $\frac{1}{4} MZ^2$ aequale rectae ΓM adplicatum est $\Gamma K \times KM$ figura quadrata deficiens et eam in partes incommensurabiles diuidit, ΓM^2 excedit MZ^2 quadrato rectae sibi incommensurabilis [prop. XVIII]. et tota ΓM rationali propositae ΓA commensurabilis est longitudine. itaque ΓZ apotome est quarta [deff. tert. 4].

Ergo quadratum minoris, et quae sequuntur.

CI.

Quadratum rectae cum rationali totum medium efficientis rectae rationali adplicatum latitudinem efficit apotomen quintam.

Sit AB recta cum rationali totum medium efficiens, ΓA autem rationalis, et quadrato AB^2 aequale rectae ΓA adplicetur ΓE latitudinem efficiens ΓZ . dico, ΓZ apotomen quintam esse.


nam BH rectae AB congruens sit. itaque rectae

10. καὶ τῶ] τῶ δὲ FV. τῶ] m. 2 F. 12. τό] τῶ b. 14. συμμέτρον P b et V, sed corr. ἔστιν] om. V φ. 15. μήκει] ἔστι V. 17. καὶ τὰ ἐξῆς] παρὰ ὁπερὶ παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ ἀποτομήν τετάρτην Theon (BFVb). 22. ἡ] (prius) om. V. 23. ὁπερ — AB] mg. m. 1 P. τῶ] e corr. P. 24. ΓA] ΔΓ F. ΓZ] corr. ex ΓA P. 25. ΓZ] ZΓ e corr. V, AΓ φ. 26. γὰρ] m. 2 F.

AH, HB εὐθεῖαι δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι
 τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων
 μέσον, τὸ δὲ δις ὑπ' αὐτῶν ῥητόν. καὶ τῷ μὲν ἀπὸ
 τῆς AH ἴσον παρὰ τὴν $ΓΔ$ παραβεβλήσθω τὸ $ΓΘ$,
 5 τῷ δὲ ἀπὸ τῆς HB ἴσον τὸ $ΚΑ$. ὅλον ἄρα τὸ $ΓΑ$
 ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν AH, HB . τὸ δὲ συγκείμενον
 ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AH, HB ἅμα μέσον ἐστίν· μέσον
 ἄρα ἐστὶ τὸ $ΓΑ$. καὶ παρὰ ῥητὴν τὴν $ΓΔ$ παράκειται
 πλάτος ποιοῦν τὴν $ΓΜ$. ῥητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ $ΓΜ$ καὶ
 10 ἀσύμμετρος τῇ $ΓΔ$. καὶ ἐπεὶ ὅλον τὸ $ΓΑ$ ἴσον ἐστὶ
 τοῖς ἀπὸ τῶν AH, HB , ὧν τὸ $ΓΕ$ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ
 τῆς AB , λοιπὸν ἄρα τὸ $ΖΑ$ ἴσον ἐστὶ τῷ δις ὑπὸ
 τῶν AH, HB . τετμήσθω οὖν ἡ ZM διῆχα κατὰ τὸ N ,
 καὶ ἦχθω διὰ τοῦ N ὁποτέρῃ τῶν $ΓΔ, ΜΑ$ παράλ-
 15 ληλος ἡ $NΞ$. ἐκάτερον ἄρα τῶν $ZΞ, ΝΑ$ ἴσον ἐστὶ
 τῷ ὑπὸ τῶν AH, HB . καὶ ἐπεὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν $AH,$
 HB ῥητόν ἐστι καὶ [ἐστίν] ἴσον τῷ $ΖΑ$, ῥητόν ἄρα
 ἐστὶ τὸ $ΖΑ$. καὶ παρὰ ῥητὴν τὴν EZ παράκειται
 πλάτος ποιοῦν τὴν ZM . ῥητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ ZM καὶ
 20 σύμμετρος τῇ $ΓΔ$ μήκει. καὶ ἐπεὶ τὸ μὲν $ΓΑ$ μέσον
 ἐστίν, τὸ δὲ $ΖΑ$ ῥητόν, ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ $ΓΑ$
 τῷ $ΖΑ$. ὥς δὲ τὸ $ΓΑ$ πρὸς τὸ $ΖΑ$, οὕτως ἡ $ΓΜ$
 πρὸς τὴν MZ . ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ $ΓΜ$ τῇ MZ
 μήκει. καὶ εἰσὶν ἀμφοτέραι ῥηταί· αἱ ἄρα $ΓΜ, ΜΖ$
 25 ῥηταί· εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· ἀποτομὴ ἄρα
 ἐστὶν ἡ $ΓΖ$.

3. μέν] om. V. 5. Post δέ ras. 2 litt. V. HB] mut.
 in AB m. 2 F, in ras. V. ΓΑ] Α in ras. m. 1 P, corr. ex
 A B. 6. τὸ δέ — 7. ἀπὸ τῶν] τὰ δὲ ἀπὸ τῆς V. 7. ἐστίν]
 ἐστὶ PB, comp. FV; εἶναι V, supra scr. ἐστὶ m. 1. 8. ΓΑ]
 mut. in ΑΓ m. 1 F. 9. ΓΜ] ΓΗ φ. ῥητή] ῥη- om. φ.
 11. ΓΕ] ΒΑ B. 13. οὖν] om. V φ. 14. καὶ — Ν] supra

AH , HB potentia incommensurabiles sunt efficientes summam quadratorum mediam, duplum autem rectangulum rationale [prop. LXXVII]. et rectae ΓA adplicetur $\Gamma\Theta = AH^2$, $KA = HB^2$. itaque totum $\Gamma A = AH^2 + HB^2$.



uerum $AH^2 + HB^2$ medium est; itaque etiam ΓA medium est. et

rationali ΓA adplicatum est latitudinem efficiens ΓM . itaque ΓM rationalis est et rectae ΓA incommensurabilis [prop. XXII]. et quoniam $\Gamma A = AH^2 + HB^2$, quorum $\Gamma E = AB^2$, erit reliquum $ZA = 2AH \times HB$ [II, 7]. iam ZM in N in duas partes aequales secetur, et per N utrique ΓA , MA parallela ducatur $NΞ$. quare $ZΞ = NA = AH \times HB$. et quoniam $2AH \times HB$ rationale est, et $2AH \times HB = ZA$, ZA rationale est. et rationali EZ adplicatum est latitudinem efficiens ZM . itaque ZM rationalis est et rectae ΓA longitudine commensurabilis [prop. XX]. et quoniam ΓA medium est, ZA autem rationale, ΓA et ZA incommensurabilia sunt. est autem $\Gamma A : ZA = \Gamma M : MZ$ [VI, 1]. quare ΓM , MZ longitudine incommensurabiles sunt [prop. XI]. et utraque rationalis est. itaque ΓM , MZ rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo ΓZ apotome est [prop. LXXIII].

scr. m. 1 P. 17. $\xi\sigma\tau\iota\nu$] om. P. ZA] Z (uel Ξ) corr. ex N V, item lin. 18. 18. EZ] e corr. m. 1 V. 19. ZM] (alt.) ZH b. 20. $\alpha\sigma\upsilon\mu\epsilon\tau\rho\omicron\varsigma$ B, supra σ ras. est in V. ΓA] corr. ex ΓZ b; ΓZ V, Z eras. 21. $\xi\sigma\tau\iota\nu$] $\xi\sigma\tau\iota$ PBFV, comp. b. 23. $\tau\eta\nu$] $\tau\acute{o}$ V. $\xi\sigma\tau\iota\nu$] $\xi\sigma\tau\iota$ καί Vφ. 24. ΓM , MZ $\alpha\pi\alpha$ V.

Λέγω δὴ, ὅτι καὶ πέμπτη.

Ὅμοιως γὰρ δεῖξομεν, ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν $\Gamma K M$ ἴσον
 ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς $N M$, τουτέστι τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ
 ἀπὸ τῆς $Z M$. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρόν ἐστι τὸ ἀπὸ τῆς
 5 $A H$ τῷ ἀπὸ τῆς $H B$, ἴσον δὲ τὸ μὲν ἀπὸ τῆς $A H$
 τῷ $\Gamma \Theta$, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς $H B$ τῷ $K A$, ἀσύμμετρον ἄρα
 το $\Gamma \Theta$ τῷ $K A$. ὥς δὲ τὸ $\Gamma \Theta$ πρὸς τὸ $K A$, οὕτως ἡ
 ΓK πρὸς τὴν $K M$. ἀσύμμετρος ἄρα ἡ ΓK τῇ $K M$
 μήκει. ἐπεὶ οὖν δύο εὐθεῖαι ἄνισοι εἰσιν αἱ ΓM , $M Z$,
 10 καὶ τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς $Z M$ ἴσον παρὰ τὴν
 ΓM παραβέβληται ἐλλείπον εἶδει τετραγώνῳ καὶ εἰς
 ἀσύμμετρα αὐτὴν διαιρεῖ, ἡ ἄρα ΓM τῆς $M Z$ μετixon
 δύνатаι τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρον ἑαυτῇ. καὶ ἐστὶν ἡ προσ-
 αρμόζουσα ἡ $Z M$ σύμμετρος τῇ ἐκκειμένη ῥητῇ τῇ ΓA .
 15 ἡ ἄρα ΓZ ἀποτομή ἐστὶ πέμπτη· ὅπερ εἶδει δεῖξαι.

ρβ'.

Τὸ ἀπὸ τῆς μετὰ μέσου μέσον τὸ ὅλον
 ποιούσης παρὰ ῥητὴν παραβαλλόμενον πλάτος
 ποιεῖ ἀποτομὴν ἕκτην.

20 Ἔστω ἡ μετὰ μέσου μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα ἡ $A B$,
 ῥητὴ δὲ ἡ ΓA , καὶ τῷ ἀπὸ τῆς $A B$ ἴσον παρὰ τὴν
 ΓA παραβέβλησθω τὸ ΓE πλάτος ποιοῦν τὴν ΓZ .
 λέγω, ὅτι ἡ ΓZ ἀποτομή ἐστὶν ἕκτη.

Ἔστω γὰρ τῇ $A B$ προσαρμόζουσα ἡ $B H$. αἱ ἄρα
 25 $A H$, $H B$ δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τὸ τε
 συγκεκριμένον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων μέσον καὶ

1. δῆ] m. 2 F. 2. ΓK , $K M$ F V. 4. ἐστι] om. V φ. 5.
 $A H$] (alt.) A e corr. F. 6. $\Gamma \Theta$] Θ in ras. m. 1 P. 8. τὴν]
 m. P. $K M$] ΓM P et B in ras. ἄρα ἐστίν V φ. $K M$] ΓM P et in ras. B. 9. εἶσι P, corr. m. 1. 10. $Z M$] $M Z$

Iam dico, eandem quintam esse. nam similiter demonstrabimus, esse $\Gamma K \times KM = NM^2 = \frac{1}{4} ZM^2$. et quoniam AH^2 , HB^2 incommensurabilia sunt, et $AH^2 = \Gamma\Theta$, $HB^2 = KA$, $\Gamma\Theta$ et KA incommensurabilia sunt. est autem $\Gamma\Theta:KA = \Gamma K:KM$ [VI, 1]. quare ΓK , KM longitudine incommensurabiles sunt [prop. XI]. iam quoniam sunt duae rectae inaequales ΓM , MZ , et $\frac{1}{4} ZM^2$ aequale rectae ΓM adplicatum est spatium figura quadrata deficiens et eam in partes incommensurabiles diuidit, ΓM^2 excedit MZ^2 quadrato rectae sibi incommensurabilis [prop. XVIII]. et congruens ZM rationali propositae ΓA commensurabilis est.

Ergo ΓZ apotome est quinta [def. tert. 5]; quod erat demonstrandum.

CII.

Quadratum rectae cum medio totum medium efficientis rectae rationali adplicatum latitudinem efficit apotomen sextam.

Sit AB recta cum medio totum medium efficiens, ΓA autem rationalis, et quadrato AB^2 aequale rectae ΓA adplicetur ΓE latitudinem efficiens ΓZ . dico, ΓZ apotomen sextam esse.

nam BH rectae AB congruens sit. itaque AH , HB potentia incommensurabiles sunt efficientes sum-


P, et V (?), sed corr. m. 1. 13. $\xi\alpha\nu\tau\eta\ \mu\eta\kappa\epsilon\iota$ V. 14. ZM MZ P. 15. $\delta\pi\epsilon\rho\ \xi\delta\epsilon\iota\ \delta\epsilon\iota\zeta\alpha\iota$] om. BF V b. In hac pag. et sequenti multi loci euan. in F. 21. $\pi\alpha\rho\alpha$] $\pi\alpha\rho\alpha\ \xi\eta\tau\eta\nu$ V φ. $\tau\eta\nu$] supra scr. m. 1 V. 22. $\tau\eta\nu$] $\tau\eta$ b. 24. $\alpha\rho\mu\acute{o}\zeta\omicron\upsilon\sigma\sigma\alpha$, supra scr. $\pi\rho\omicron\sigma$ m. 1, F. HB P. 25. Post HB ras. 5 litt. V. Supra $\tau\epsilon$ scr. $\mu\acute{\epsilon}\nu$ m. 1 b.

τὸ δις ὑπὸ τῶν AH, HB μέσον καὶ ἀσύμμετρον τα
ἀπὸ τῶν AH, HB τῷ δις ὑπὸ τῶν AH, HB . παρα-
βεβλήσθω οὖν παρὰ τὴν GA τῷ μὲν ἀπὸ τῆς AH
ἴσον τὴν $ΓΘ$ πλάτος ποιοῦν τὴν GK , τῷ δὲ ἀπὸ τῆς
5 BH τὸ KA . ὅλον ἄρα τὸ GA ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν
 AH, HB . μέσον ἄρα [ἐστὶ] καὶ τὸ GA . καὶ παρὰ
ῥητὴν τὴν GA παράκειται πλάτος ποιοῦν τὴν GM .
ῥητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ GM καὶ ἀσύμμετρος τῇ GA μήκει.
ἐπεὶ οὖν τὸ GA ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν AH, HB ,
10 ὧν τὸ GE ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς AB , λοιπὸν ἄρα τὸ ZA
ἴσον ἐστὶ τῷ δις ὑπὸ τῶν AH, HB . καὶ ἐστὶ τὸ δις
ὑπὸ τῶν AH, HB μέσον· καὶ τὸ ZA ἄρα μέσον ἐστίν.
καὶ παρὰ ῥητὴν τὴν ZE παράκειται πλάτος ποιοῦν
τὴν ZM . ῥητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ ZM καὶ ἀσύμμετρος τῇ
15 GA μήκει. καὶ ἐπεὶ τὰ ἀπὸ τῶν AH, HB ἀσύμμετρά
ἐστὶ τῷ δις ὑπὸ τῶν AH, HB , καὶ ἐστὶ τοῖς μὲν ἀπὸ
τῶν AH, HB ἴσον τὸ GA , τῷ δὲ δις ὑπὸ τῶν AH ,
 HB ἴσον τὸ ZA , ἀσύμμετρον ἄρα [ἐστὶ] τὸ GA τῷ
 ZA . ὥς δὲ τὸ GA πρὸς τὸ ZA , οὕτως ἐστὶν ἡ GM
20 πρὸς τὴν MZ . ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ GM τῇ MZ
μήκει. καὶ εἰσιν ἀμφοτέραι ῥηταί. αἱ GM, MZ ἄρα
ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· ἀποτομὴ ἄρα
ἐστὶν ἡ GZ .

Λέγω δὴ, ὅτι καὶ ἔκτε.

25 Ἐπεὶ γὰρ τὸ ZA ἴσον ἐστὶ τῷ δις ὑπὸ τῶν AH ,
 HB , τετυμῆσθω δίχα ἡ ZM κατὰ τὸ N , καὶ ἦχθω διὰ
τοῦ N τῇ GA παράλληλος ἡ $NΞ$. ἐκάτερον ἄρα τῶν

1. μέσον] ῥητόν F. καί] καὶ ἔτι V, ἔτι δὲ BFb. ἀσύμ-
μετρα BFVb. τὰ] τό P. 5. Post KA add. πλάτος ποιοῦν
τὴν KM mg. m. 2 V. 6. ἐστὶ] om. P. 8. ἐστίν] ἐστὶ καὶ V.
10. ἴσον ἐστὶ Vφ. τῷ] τό φ. 11. ἐστὶ] γίνεται V. δις]
corr. ex δι m. 2 P. 12. ἐστὶ PBV, comp. Fb. 16. τοῖς]



mam quadratorum mediam et $2AH \times HB$ medium et $AH^2 + HB^2$, $2AH \times HB$ incommensurabilia [prop. LXXVIII]. iam rectae $\Gamma\Delta$ adplicetur $\Gamma\Theta = AH^2$ latitudinem efficiens ΓK et $KA = BH^2$. itaque totum $\Gamma A = AH^2 + HB^2$. quare etiam ΓA medium est. et rationali $\Gamma\Delta$ adplicatum est latitudinem efficiens ΓM . itaque ΓM rationalis est et rectae $\Gamma\Delta$ longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. iam quoniam $\Gamma A = AH^2 + HB^2$, quorum $\Gamma E = AB^2$, erit reliquum $ZA = 2AH \times HB$ [II, 7]. et $2AH \times HB$ medium est. quare etiam ZA medium est. et rationali ZE adplicatum est latitudinem efficiens ZM . quare ZM rationalis est et rectae $\Gamma\Delta$ longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. et quoniam $AH^2 + HB^2$, $2AH \times HB$ incommensurabilia sunt, et

$\Gamma A = AH^2 + HB^2$, $ZA = 2AH \times HB$,
 ΓA et ZA incommensurabilia sunt. est autem [VI, 1]
 $\Gamma A : ZA = \Gamma M : MZ$. quare ΓM , MZ longitudine
incommensurabiles sunt [prop. XI]. et utraque ratio-
nalis est. itaque ΓM , MZ rationales sunt potentia
tantum commensurabiles. ergo ΓZ apotome est [prop.
LXXIII].

Iam dico, eandem sextam esse. nam quoniam est
 $ZA = 2AH \times HB$, recta ZM in N in duas partes
aequales secetur, et per N rectae $\Gamma\Delta$ parallela du-

$\tau\phi$ V. ἀπὸ τῶν] om. P. 17. ΓA — 18. ἴσον τό] om. B.
18. ἴσκι] om. P. 19. τό] (alt.) om. P. ZA] corr. ex
 $Z\Delta$? F. 20. τῇν] om. P. MZ] in ras. V. MZ] corr.
ex ZM V. 21. ἀρε] om. V. 22. εἰσιν P. εἰσιν ἀρε B.

$Z\Xi$, NA ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν AH , HB . καὶ ἐπεὶ
αἱ AH , HB δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι, ἀσύμμετρον
ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς AH τῷ ἀπὸ τῆς HB . ἀλλὰ τῷ
μὲν ἀπὸ τῆς AH ἴσον ἐστὶ τὸ $\Gamma\Theta$, τῷ δὲ ἀπὸ
5 τῆς HB ἴσον ἐστὶ τὸ KA . ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ
 $\Gamma\Theta$ τῷ KA . ὥς δὲ τὸ $\Gamma\Theta$ πρὸς τὸ KA , οὕτως ἐστὶν
ἡ ΓK πρὸς τὴν KM . ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ ΓK
τῇ KM . καὶ ἐπεὶ τῶν ἀπὸ τῶν AH , HB μέσον ἀνά-
λογόν ἐστι τὸ ὑπὸ τῶν AH , HB , καὶ ἐστὶ τῷ μὲν ἀπὸ
10 τῆς AH ἴσον τὸ $\Gamma\Theta$, τῷ δὲ ἀπὸ τῆς HB ἴσον τὸ KA ,
τῷ δὲ ὑπὸ τῶν AH , HB ἴσον τὸ NA , καὶ τῶν ἄρα
 $\Gamma\Theta$, KA μέσον ἀνάλογόν ἐστι τὸ NA . ἐστὶν ἄρα ὥς
τὸ $\Gamma\Theta$ πρὸς τὸ NA , οὕτως τὸ NA πρὸς τὸ KA . καὶ
διὰ τὰ αὐτὰ ἡ ΓM τῆς MZ μεῖζον δύνатаι τῷ ἀπὸ
15 ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ. καὶ οὐδετέρα αὐτῶν σύμμετρος
ἐστὶ τῇ ἐκκειμένη ῥητῇ τῇ ΓA . ἡ ΓZ ἄρα ἀποτομή
ἐστὶν ἑκτη. ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

ργ'.

Ἡ τῇ ἀποτομῇ μήκει σύμμετρος ἀποτομή
20 ἐστὶ καὶ τῇ τάξει ἡ αὐτή.

Ἐστω ἀποτομή ἡ AB , καὶ τῇ AB μήκει σύμμετρος
ἔστω ἡ ΓA . λέγω, ὅτι καὶ ἡ ΓA ἀποτομή ἐστὶ καὶ
τῇ τάξει ἡ αὐτὴ τῇ AB .

Ἐπεὶ γὰρ ἀποτομή ἐστὶν ἡ AB , ἔστω αὐτῇ προσ-

2. εἰσὶ σύμμετροι b. 4. τὸ ἀπὸ τῆς $\Gamma\Theta$ P. 5. ἐστὶ]
om. V. 6. τῷ] corr. ex τό m. 2 P. 8. ἀπὸ τῶν] om. P;
ὑπὸ τῶν supra scr. α m. 1 b; ὑπὸ τῶν ins. m. 2 F. 11. τῷ
δὲ ὑπὸ — NA] mg. m. 2 V. τῷ] τό V. AH] H e corr. V.
ἴσον ἐστὶ P. 12. NA] N b. 13. NA] (prius) A , supra
add. N m. 2, F. 14. τὰ αὐτὰ] corr. ex ταῦτα V. MZ] corr.
ex ZM V. 15. ἀσυμμέτρου] corr. ex συμμέτρου m. 2 B.

catur $N\Xi$. itaque $Z\Xi = NA = AH \times HB$. et quoniam AH , HB potentia incommensurabiles sunt, AH^2 et HB^2 incommensurabilia sunt. est autem $\Gamma\Theta = AH^2$, $KA = HB^2$. quare $\Gamma\Theta$, KA incommensurabilia sunt. est autem $\Gamma\Theta : KA = \Gamma K : KM$ [VI, 1]. itaque ΓK , KM incommensurabiles sunt [prop. XI]. et quoniam $AH \times HB$ medium est proportionale inter AH^2 et HB^2 [prop. XXI lemma], et $\Gamma\Theta = AH^2$, $KA = HB^2$, $NA = AH \times HB$, etiam NA medium est proportionale inter $\Gamma\Theta$, KA . itaque $\Gamma\Theta : NA = NA : KA$. et eadem de causa [cfr. p. 326, 9 sq.] ΓM^2 excedit MZ^2 quadrato rectae sibi incommensurabilis [prop. XVIII]. et neutra earum rationali propositae ΓA commensurabilis est.

Ergo ΓZ apotome est sexta [deff. tert. 6]; quod erat demonstrandum.¹⁾

CIII.

Recta apotomae longitudine commensurabilis apotome est et ordine eadem.

Sit AB apotome, et rectae AB longitudine commensurabilis sit ΓA . dico, ΓA quoque apotomen esse et ordine eandem ac AB .

nam quoniam AB apotome est, BE ei congruens

1) In B figura haec est . deinde in mg. adicitur uera addito $\epsilon\upsilon$ ἄλλω.

16. ΓA] A in ras. m. 1 F. 17. $\delta\pi\epsilon\rho$ $\xi\delta\epsilon\iota$ $\delta\epsilon\iota\chi\alpha\iota$] comp. P, om. BFVb. 21. $\sigma\acute{\upsilon}\mu\mu\epsilon\tau\rho\omicron\varsigma$ $\xi\sigma\tau\omega$ $\mu\acute{\eta}\kappa\epsilon\iota$ BFb. 23. η] m. 2 P. 24. $\pi\rho\omicron\sigma\alpha\rho\mu\acute{o}\zeta\omicron\upsilon\sigma\alpha$ $\xi\sigma\tau\omega$ $\alpha\upsilon\tau\eta$ V. $\alpha\upsilon\tau\eta$ η Fb.

αρμοζουσα ἡ BE · αἱ AE , EB ἄρα ῥηταὶ εἰσι δυνάμει
μόνον σύμμετροι. καὶ τῷ τῆς AB πρὸς τὴν $\Gamma\Delta$ λόγῳ
ὁ αὐτὸς γεγονέτω ὁ τῆς BE πρὸς τὴν ΔZ · καὶ ὥς
ἐν ἄρα πρὸς ἐν, πάντα [ἐστὶ] πρὸς πάντα· ἐστὶν ἄρα
5 καὶ ὥς ὅλη ἡ AE πρὸς ὅλην τὴν ΓZ , οὕτως ἡ AB
πρὸς τὴν $\Gamma\Delta$. σύμμετρος δὲ ἡ AB τῇ $\Gamma\Delta$ μήκει.
σύμμετρος ἄρα καὶ ἡ AE μὲν τῇ ΓZ , ἡ δὲ BE τῇ
 ΔZ . καὶ αἱ AE , EB ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμ-
μετροι· καὶ αἱ ΓZ , $Z\Delta$ ἄρα ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον
10 σύμμετροι [ἀποτομὴ ἄρα ἐστὶν ἡ $\Gamma\Delta$].

Λέγω δὴ, ὅτι καὶ τῇ τάξει ἡ αὐτὴ τῇ AB].

Ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὥς ἡ AE πρὸς τὴν ΓZ , οὕτως ἡ
 BE πρὸς τὴν ΔZ , ἐναλλάξ ἄρα ἐστὶν ὥς ἡ AE πρὸς
τὴν EB , οὕτως ἡ ΓZ πρὸς τὴν $Z\Delta$. ἤτοι δὴ ἡ AE
15 τῆς EB μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ ἢ
τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου. εἰ μὲν οὖν ἡ AE τῆς EB μείζον
δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ, καὶ ἡ ΓZ τῆς $Z\Delta$
μείζον δυνήσεται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ. καὶ εἰ
μὲν σύμμετρός ἐστὶν ἡ AE τῇ ἐκκειμένη ῥητῇ μήκει,
20 καὶ ἡ ΓZ , εἰ δὲ ἡ BE , καὶ ἡ ΔZ , εἰ δὲ οὐδετέρα
τῶν AE , EB , καὶ οὐδετέρα τῶν ΓZ , $Z\Delta$. εἰ δὲ ἡ
 AE [τῆς EB] μείζον δύναται τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου
ἑαυτῇ, καὶ ἡ ΓZ τῆς $Z\Delta$ μείζον δυνήσεται τῷ ἀπὸ
ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ. καὶ εἰ μὲν σύμμετρός ἐστὶν ἡ AE
25 τῇ ἐκκειμένη ῥητῇ μήκει, καὶ ἡ ΓZ , εἰ δὲ ἡ BE , καὶ

1. ἡ BE] αὐτῇ ἡ EB φ. AE] om. φ, $A B$. 3. ὁ] (prius)
om. φ. ΔZ] $Z\Delta$ B. 4. ἐστὶ] om. P. ἐστὶν ἄρα] om.
V φ. 5. ὅλη ἄρα V. 7. ἄρα] ἄρα ἐστὶ V φ (del. V). καὶ]
om. φ. μὲν AE V φ (post AE hab. μὲν F). BE δὲ B F b.
τῇ] supra scr. V m. 1. 8. ΔZ] $Z\Delta$ B F. καὶ αἱ] καὶ
εἰσιν αἱ V, αἱ δὲ B. εἰσι] om. V. 10. ἀποτομὴ — 11.
 AB] om. P. 12. οὖν] γὰρ Theon (B F V b). AE] corr. ex
 EA V. 13. τῇ] om. B, m. 2 F. $Z\Delta$ F. ἄρα] om. V.

sit. itaque AE , EB rationales sunt potentia tantum

commensurabiles [prop. LXXIII].
 $\begin{array}{c} A \quad B \quad E \\ | \quad | \quad | \\ \hline \Gamma \quad \Delta \quad Z \end{array}$ fiat $BE:AZ = AB:GA$ [VI, 12].
 quare etiam ut unum ad unum,

ita omnia ad omnia [V, 12]. itaque $AE:\Gamma Z = AB:GA$.
 uerum AB , GA longitudine commensurabiles sunt.
 itaque etiam AE , ΓZ et BE , AZ commensurabiles
 sunt [prop. XI]. uerum AE , EB rationales sunt po-
 tentia tantum commensurabiles. itaque etiam ΓZ ,
 $Z\Delta$ rationales sunt potentia tantum commensurabiles
 [prop. XIII].

Iam quoniam est $AE:\Gamma Z = BE:AZ$, permutando
 [V, 16] est $AE:EB = \Gamma Z:Z\Delta$. AE^2 igitur EB^2 ex-
 cedit quadrato rectae aut sibi commensurabilis aut
 incommensurabilis. iam si AE^2 excedit EB^2 quadrato
 rectae sibi commensurabilis, etiam ΓZ^2 excedet $Z\Delta^2$
 quadrato rectae sibi commensurabilis [prop. XIV]. et
 siue AE rationali propositae longitudine commensu-
 rabilis est, etiam ΓZ ei commensurabilis est [prop.
 XII], siue BE , etiam AZ [id.], siue neutra rectarum
 AE , EB , etiam neutra rectarum ΓZ , $Z\Delta$ [prop. XIII].
 sin AE^2 excedit quadrato rectae sibi incommensura-
 bilis, etiam ΓZ^2 excedet $Z\Delta^2$ quadrato rectae sibi
 incommensurabilis [prop. XIV]. et siue AE rationali
 propositae longitudine commensurabilis est, etiam ΓZ

14. $\delta\eta$] om. P, $\delta\epsilon$ BV. 15. $\tau\omega$] corr. ex $\tau\omicron\upsilon$ m. 2 P. 16.
 Ante $\epsilon\lambda$ ins. $\kappa\alpha\iota$ (?) m. 2 F. $\epsilon\lambda$] e corr. V. 17. $\acute{\alpha}\sigma\upsilon\mu\mu\epsilon\tau\rho\omicron\nu$
 B, corr. m. 2; $\acute{\alpha}$ - supra add. m. 2 F. $\tau\eta\varsigma$] $\tau\eta$ F. 18.
 $\acute{\alpha}\sigma\upsilon\mu\mu\epsilon\tau\rho\omicron\nu$ B, et F, sed corr. 19. AE] $A\Theta$ e corr. F. 20.
 ΓZ] $Z\Gamma$ F. 21. $\omicron\upsilon\delta\epsilon\tau\epsilon\rho\alpha$] $\omicron\upsilon\delta\epsilon\tau\epsilon\rho\alpha$ P. 22. $\tau\eta\varsigma EB$] mg. m.
 1 P. $\delta\upsilon\upsilon\alpha\tau\alpha\iota$] supra add. $\eta\sigma\epsilon$ m. 2 F, $\delta\upsilon\nu\eta\sigma\tau\alpha\iota$ b. $\sigma\upsilon\mu$ -
 $\mu\epsilon\tau\rho\omicron\nu$ P, corr. m. 1. 23. $\tau\eta\varsigma$] corr. ex $\tau\eta$ V.

ἡ ΔZ , εἰ δὲ οὐδετέρα τῶν AE , EB , οὐδετέρα τῶν ΓZ , $Z\Delta$.

Ἀποτομὴ ἄρα ἐστὶν ἡ $\Gamma\Delta$ καὶ τῇ τάξει ἡ αὐτὴ τῇ AB ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

5

ρδ'.

Ἡ τῇ μέσης ἀποτομῇ σύμμετρος μέσης ἀποτομὴ ἐστὶ καὶ τῇ τάξει ἡ αὐτή.

Ἔστω μέσης ἀποτομὴ ἡ AB , καὶ τῇ AB μήκει σύμμετρος ἔστω ἡ $\Gamma\Delta$. λέγω, ὅτι καὶ ἡ $\Gamma\Delta$ μέσης
10 ἀποτομὴ ἐστὶ καὶ τῇ τάξει ἡ αὐτὴ τῇ AB .

Ἐπεὶ γὰρ μέσης ἀποτομὴ ἐστὶν ἡ AB , ἔστω αὐτῇ προσαρμόζουσα ἡ EB . αἱ AE , EB ἄρα μέσαι εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι. καὶ γεγονέντω ὡς ἡ AB πρὸς τὴν $\Gamma\Delta$, οὕτως ἡ BE πρὸς τὴν ΔZ . σύμμετρος
15 ἄρα [ἐστὶ] καὶ ἡ AE τῇ ΓZ , ἡ δὲ BE τῇ ΔZ . αἱ δὲ AE , EB μέσαι εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι· καὶ αἱ ΓZ , $Z\Delta$ ἄρα μέσαι εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι· μέσης ἄρα ἀποτομὴ ἐστὶν ἡ $\Gamma\Delta$.

Λέγω δὴ, ὅτι καὶ τῇ τάξει ἐστὶν ἡ αὐτὴ τῇ AB .

20 Ἐπεὶ [γάρ] ἐστὶν ὡς ἡ AE πρὸς τὴν EB , οὕτως ἡ ΓZ πρὸς τὴν $Z\Delta$ [ἀλλ' ὡς μὲν ἡ AE πρὸς τὴν EB , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς AE πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν AE , EB ,

1. οὐδετέρα] (alt.) οὐδὲ οὐδετέρα B V b; οὐδέ m. 2 add. F, sed euan. 3. τῇ AB] om. F. 4. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P b, om. B V. 6. μέση B F V b. μέση B V, et F, corr. m. 2. ἀποτομῆς b (σ supra add. F m. 2). 7. ἐστὶν P. 8. μέση B F b, et V (σ fuit add. m. 2, sed eras.). μήκει] m. 2 B, om. F V b. 9. λέγω δὴ V. μέση B, et F supra add. σ m. 2; in V add. σ m. 2, sed eras. 10. ἐστὶ P. 11. μέση B. αὐτῇ] ἡ V, αὐτῇ ἡ F b. 12. ἡ] αὐτῇ ἡ V. AE] EA B F b. εἰσὶν B.

ei commensurabilis est, siue BE , etiam $\angle Z$ [prop. XII], siue neutra rectarum AE , EB , neutra rectarum ΓZ , $Z\angle$ [prop. XIII].

Ergo $\Gamma\angle$ apotome est [prop. LXXIII] et ordine eadem ac AB [deff. tert. 1—6]; quod erat demonstrandum.

CIV.

Recta mediae apotomae commensurabilis mediae apotome est et ordine eadem.

Sit AB mediae apotome, et rectae AB longitudine commensurabilis sit $\Gamma\angle$. dico, etiam $\Gamma\angle$ mediae apotomen esse et ordine eandem ac AB .
 nam quoniam AB mediae apotome est, sit EB ei congruens. itaque AE , EB mediae sunt potentia tantum commensurabiles [prop. LXXIV—LXXV]. et fiat [VI, 12] $AB:\Gamma\angle = BE:\angle Z$. itaque etiam AE , ΓZ et BE , $\angle Z$ commensurabiles sunt [V, 12; prop. XI]. uerum AE , EB mediae sunt potentia tantum commensurabiles. itaque etiam ΓZ , $Z\angle$ mediae sunt [prop. XXIII] potentia tantum commensurabiles [prop. XIII]. ergo $\Gamma\angle$ mediae est apotome [prop. LXXIV—LXXV].

Iam dico, eam ordine quoque eandem esse ac AB .

14. οὕτως — $\angle Z$] mg. m. 1 P. ἡ] corr. ex δ m. 2 V. 15. ἐστίν] om. P, ἐστίν B. AE] AE μέν BFb. 16. καί — 17. σύμμετροι] mg. m. 2 B. 17. ΓZ] Z e corr. V. 18. μέση B. ἀποτομῆς V. 19. λέγω] δείκτεον Theon (BFVb). δὴ] corr. ex δὲ δει m. 1 F; δέ V. ἐστίν] om. Theon (BFVb). 20. γὰρ] om. P. οὕτως ἐστίν F. 21. τήν] om. BFb. ἀλλ' — p. 386, 2. $Z\angle$] om. P.

ὥς δὲ ἡ ΓΖ πρὸς τὴν ΖΔ, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ΓΖ
 πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΓΖ, ΖΔ], ἔστιν ἄρα καὶ ὥς τὸ ἀπὸ
 τῆς ΑΕ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕ, ΕΒ, οὕτως τὸ ἀπὸ
 τῆς ΓΖ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΓΖ, ΖΔ [καὶ ἐναλλάξ ὥς
 5 τὸ ἀπὸ τῆς ΑΕ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΓΖ, οὕτως τὸ ὑπὸ
 τῶν ΑΕ, ΕΒ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΓΖ, ΖΔ]. σύμμετρον
 δὲ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΕ τῷ ἀπὸ τῆς ΓΖ· σύμμετρον ἄρα
 ἐστὶ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕ, ΕΒ τῷ ὑπὸ τῶν ΓΖ, ΖΔ.
 εἴτε οὖν ῥητόν ἐστι τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕ, ΕΒ, ῥητὸν ἐστὶ
 10 καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΓΖ, ΖΔ, εἴτε μέσον [ἐστὶ] τὸ ὑπὸ
 τῶν ΑΕ, ΕΒ, μέσον [ἐστὶ] καὶ τοῦ ὑπὸ τῶν ΓΖ, ΖΔ.
 Μέσης ἄρα ἀποτομή ἐστὶν ἡ ΓΔ καὶ τῇ τάξει ἡ
 αὐτὴ τῇ ΑΒ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

ρε'.

- 15 Ἡ τῇ ἐλάσσονι σύμμετρος ἐλάσσων ἐστίν.
 Ἐστω γὰρ ἐλάσσων ἡ ΑΒ καὶ τῇ ΑΒ σύμμετρος
 ἡ ΓΔ· λέγω, ὅτι καὶ ἡ ΓΔ ἐλάσσων ἐστίν.
 Γεγονέντω γὰρ τὰ αὐτά· καὶ ἐπεὶ αἱ ΑΕ, ΕΒ δυ-
 νάμει εἶσιν ἀσύμμετροι, καὶ αἱ ΓΖ, ΖΔ ἄρα δυνάμει
 20 εἶσιν ἀσύμμετροι. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὥς ἡ ΑΕ πρὸς τὴν
 ΕΒ, οὕτως ἡ ΓΖ πρὸς τὴν ΖΔ, ἔστιν ἄρα καὶ ὥς τὸ
 ἀπὸ τῆς ΑΕ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΕΒ, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς
 ΓΖ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΖΔ. συνθέντι ἄρα ἐστὶν ὥς τὰ
 ἀπὸ τῶν ΑΕ, ΕΒ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΕΒ, οὕτως τὰ
 25 ἀπὸ τῶν ΓΖ, ΖΔ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΖΔ [καὶ ἐναλλάξ].

1. ΓΖ] (alt.) ΖΓ F. 2. ὥς] om. φ. 4. καὶ — 6. ΖΔ]
 om. P. 6. τῶν] (alt.) om. b. 9. ΕΒ] B in ras. m. 1 P.
 ἐστὶ] ἐστὶ Theon (BFVb). 10. ἐστὶ] om. P 11. ἐστὶ]
 om. P. 12. μέση BVb. 13. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om.
 BFVb. 15. τῇ] corr. in τῆς m. 2 F, τῆς b. ἐλάσσονι] ἐλάσσον
 F m. 1, ἐλάσσονος b, F m. 2. Deinde del. μήκει F. 16. γὰρ]

quoniam est $AE:EB = \Gamma Z:Z\Delta$ [V, 12; V, 16], erit etiam [prop. XXI lemma]

$$AE^2:AE \times EB = \Gamma Z^2:\Gamma Z \times Z\Delta.$$

uerum $AE^2, \Gamma Z^2$ commensurabilia sunt. itaque etiam $AE \times EB, \Gamma Z \times Z\Delta$ commensurabilia sunt [V, 16; prop. XI]. siue igitur $AE \times EB$ rationale est, etiam $\Gamma Z \times Z\Delta$ rationale est [def. 4], siue $AE \times EB$ medium est, etiam $\Gamma Z \times Z\Delta$ medium est [prop. XXIII coroll.].

Ergo $\Gamma\Delta$ apotome est et ordine eadem ac AB [prop. LXXIV—LXXV]; quod erat demonstrandum.

CV.

Recta minori commensurabilis minor est.

Sit enim AB minor et rectae AB commensurabilis $\Gamma\Delta$. dico, etiam $\Gamma\Delta$ minorem esse.

nam fiant eadem. et quoniam AE, EB potentia sunt incommensurabiles [prop. LXXVI], etiam $\Gamma Z, Z\Delta$ potentia incommensurabiles sunt [prop. XIII]. iam quoniam est $AE:EB = \Gamma Z:Z\Delta$ [V, 12; V, 16], erit etiam $AE^2:EB^2 = \Gamma Z^2:Z\Delta^2$ [VI, 20 coroll.]. itaque etiam componendo [V, 18] est

$$AE^2 + EB^2:EB^2 = \Gamma Z^2 + Z\Delta^2:Z\Delta^2.$$

om. Theon (BFVb). 17. $\Gamma\Delta$] (prius) Γ e corr. m. 1 F. $\xi\sigma\iota$ PBV, comp. Fb. 18. $\alpha\upsilon\tau\alpha$ τοῖς πρώτοις V. 19. ΓZ] Z e corr. m. 1 b. 20. $\tau\eta\nu$] om. Bb. 21. $\tau\eta\nu$] m. 2 F. 23. $Z\Delta$] ΔZ B. $\xi\sigma\iota\nu$] supra scr. m. 1 V. $\tau\acute{\alpha}$] corr. ex τό m. 1 V. 24. $\tau\omega\nu$] $\tau\eta\varsigma$ P. οὕτω Bb. 25. $Z\Delta$] (prius) supra scr. m. 2 F (Z incertum est). $\kappa\alpha\iota$ ἐναλλάξ] om. P. Dein del. ὡς τὸ ἀπὸ τῆς BE πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ZΔ, οὕτως τὰ ἀπὸ τῶν AE, EB πρὸς τὰ ἀπὸ τῶν ΓZ, ZΔ V.

σύμμετρον δέ ἐστι τὸ ἀπὸ τῆς BE τῷ ἀπὸ τῆς ΔZ ·
 σύμμετρον ἄρα καὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν
 AE, EB τετραγώνων τῷ συγκειμένῳ ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν
 $\Gamma Z, Z\Delta$ τετραγώνων. ῥητὸν δέ ἐστι τὸ συγκείμενον
 5 ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AE, EB τετραγώνων· ῥητὸν ἄρα
 ἐστὶ καὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν $\Gamma Z, Z\Delta$
 τετραγώνων. πάλιν, ἐπεὶ ἐστὶν ὥς τὸ ἀπὸ τῆς AE
 πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν AE, EB , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ΓZ
 πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $\Gamma Z, Z\Delta$, σύμμετρον δὲ τὸ ἀπὸ τῆς
 10 AE τετραγώνων τῷ ἀπὸ τῆς ΓZ τετραγώνου, σύμ-
 μετρον ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν AE, EB τῷ ὑπὸ τῶν
 $\Gamma Z, Z\Delta$. μέσον δὲ τὸ ὑπὸ τῶν AE, EB · μέσον
 ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ τῶν $\Gamma Z, Z\Delta$ · αἱ $\Gamma Z, Z\Delta$ ἄρα δυ-
 νάμει εἶδιν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι το μὲν συγκείμενον
 15 ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων ῥητόν, τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν
 μέσον.

Ἐλάσσων ἄρα ἐστὶν ἡ $\Gamma\Delta$ · ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

ρς'.

Ἡ τῇ μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιούση
 20 σύμμετρος μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιούσά
 ἐστίν.

Ἐστω μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιούσα ἡ AB
 καὶ τῇ AB σύμμετρος ἡ $\Gamma\Delta$ · λέγω, ὅτι καὶ ἡ $\Gamma\Delta$
 μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιούσά ἐστίν.

25 Ἐστω γὰρ τῇ AB προσαρμόζουσα ἡ BE · αἱ $AE,$
 EB ἄρα δυνάμει εἶδιν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τὸ μὲν
 συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AE, EB τετραγώνων

1. ἐστίν P. τό] corr. ex τῷ m. 1 F, ex τὰ (?) V. ΔZ
 $Z\Delta$ P. 3. τετραγώνων Pb et comp. ins. m. 1 V. 4. $\Gamma\Delta$,
 ΔZ b. 5. ῥηταί F, sed corr. 6. ἐστί] εἰσί F. 7. τό]

uerum BE^2 , ΔZ^2 commensurabilia sunt. itaque etiam $AE^2 + EB^2$ et $\Gamma Z^2 + Z\Delta^2$ commensurabilia sunt [V, 16; prop. XI]. uerum $AE^2 + EB^2$ rationale est [prop. LXXVI]. itaque etiam $\Gamma Z^2 + Z\Delta^2$ rationale est [def. 4]. rursus quoniam est

$$AE^2 : AE \times EB = \Gamma Z^2 : \Gamma Z \times Z\Delta$$

[prop. XXI lemma], et AE^2 , ΓZ^2 commensurabilia sunt, etiam $AE \times EB$, $\Gamma Z \times Z\Delta$ commensurabilia sunt. $AE \times EB$ autem medium est [prop. LXXVI]. quare etiam $\Gamma Z \times Z\Delta$ medium est [prop. XXIII coroll.]. itaque ΓZ , $Z\Delta$ potentia incommensurabiles sunt efficientes summam quadratorum rationalem, rectangulum autem medium.

Ergo $\Gamma\Delta$ minor est [prop. LXXVI]; quod erat demonstrandum.

CVI.

Recta rectae cum rationali totum medium efficienti commensurabilis recta est cum rationali totum medium efficiens.

Sit AB recta cum rationali totum medium efficiens et rectae AB commensurabilis $\Gamma\Delta$. dico, etiam $\Gamma\Delta$ rectam esse cum rationali totum medium efficientem.

nam BE rectae AB congruens sit. itaque AE , EB potentia incommensurabiles sunt efficientes $AE^2 + EB^2$

om. V. 9. Post $Z\Delta$ add. $\kappa\alpha\iota \epsilon\upsilon\alpha\lambda\lambda\acute{\alpha}\xi$ BFb. 13. $\acute{\alpha}\rho\alpha \epsilon\sigma\tau\iota$
 $\kappa\alpha\iota$ BFb. $Z\Delta$] (alt.) Z in ras. m. 1 B. 17. $\acute{\omicron}\pi\epsilon\rho \epsilon\delta\epsilon\iota$
 $\delta\epsilon\iota\chi\epsilon\iota$] comp. P, om. BFb. De additamento in V n. app.
 nr. 24. 19. $\kappa\omicron\iota\omicron\upsilon\sigma\eta \mu\eta\kappa\omicron\varsigma$ F. 20. Ante $\mu\epsilon\tau\acute{\alpha}$ add. $\kappa\alpha\iota$
 $\alpha\upsilon\tau\eta$ BFb, m. 2 V. $\kappa\omicron\iota\omicron\upsilon\sigma\alpha \tau\omicron \delta\iota\omicron\nu$ b. 22. $\kappa\omicron\iota\omicron\upsilon\sigma\alpha \tau\omicron$
 $\delta\iota\omicron\nu$ V. 24. $\tau\omicron \delta\iota\omicron\nu \mu\acute{\epsilon}\sigma\sigma\omicron\nu$ b. 25. BE] E e corr. m. 1 P.

μέσον, τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν φητόν. καὶ τὰ αὐτὰ κατεσκευάσθω. ὁμοίως δὴ δείξομεν τοῖς πρότερον, ὅτι αἱ ΓZ , $Z\Delta$ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ εἰσὶ ταῖς AE , EB , καὶ σύμμετρόν ἐστι τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AE , EB τετραγώνων τῷ συγκειμένῳ ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΓZ , $Z\Delta$ τετραγώνων, τὸ δὲ ὑπὸ τῶν AE , EB τῷ ὑπὸ τῶν ΓZ , $Z\Delta$ ὥστε καὶ αἱ ΓZ , $Z\Delta$ δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΓZ , $Z\Delta$ τετραγώνων μέσον, τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν φητόν.

Ἡ $\Gamma\Delta$ ἄρα μετὰ φητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσά ἐστιν· ὅπερ ἔδει δείξαι.

ρζ'.

Ἡ τῇ μετὰ μέσου μέσον τὸ ὅλον ποιούσῃ
15 σύμμετρος καὶ αὐτῇ μετὰ μέσου μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσά ἐστιν.

Ἐστω μετὰ μέσου μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα ἡ AB , καὶ τῇ AB ἔστω σύμμετρος ἡ $\Gamma\Delta$. λέγω, ὅτι καὶ ἡ $\Gamma\Delta$ μετὰ μέσου μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσά ἐστιν.

Ἐστω γάρ τῇ AB προσαρμόζουσα ἡ BE , καὶ τὰ αὐτὰ κατεσκευάσθω· αἱ AE , EB ἄρα δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τὸ τε συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων μέσον καὶ τὸ ὑπ' αὐτῶν μέσον καὶ ἔτι ἀσύμμετρον το συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν
25 τετραγώνων τῷ ὑπ' αὐτῶν. καὶ εἰσιν, ὥς ἐδείχθη, αἱ AE , EB σύμμετροι ταῖς ΓZ , $Z\Delta$, καὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AE , EB τετραγώνων τῷ συγ-

3. τῷ] e corr. V. εἰσὶν B. 4. τό] τὸ μὲν Bb, μὲν supra scr. m. 2 F. 5. τῶν ΓZ — 6. EB] mg. m. 2 B (τῶν AE , EB etiam in textu sunt a m. 1). 6. δ' Fb. 12. ὅπερ

$\begin{array}{l} A \\ B \\ E \end{array} \left| \begin{array}{l} \Gamma \\ \Delta \\ Z \end{array} \right.$ medium, $AE \times EB$ autem rationale [prop. LXXVII]. et eadem comparentur. similiter igitur atque antea [p. 336, 20 sq.] demonstrabimus, esse $\Gamma Z : ZA = AE : EB$, et $AE^2 + EB^2, \Gamma Z^2 + ZA^2$ ac $AE \times EB, \Gamma Z \times ZA$ commensurabilia esse. quare etiam $\Gamma Z, ZA$ potentia incommensurabiles sunt efficientes $\Gamma Z^2 + ZA^2$ medium, $\Gamma Z \times ZA$ autem rationale.

Ergo ΓA recta est cum rationali totum medium efficiens [prop. LXXVII]; quod erat demonstrandum.

CVII.

Recta rectae cum medio totum medium efficienti commensurabilis et ipsa recta cum medio totum medium efficiens est.

Sit AB recta cum medio totum medium efficiens, et rectae AB commensurabilis sit ΓA . dico, etiam ΓA rectam esse cum medio totum medium efficientem.

$\begin{array}{l} A \\ B \\ E \end{array} \left| \begin{array}{l} \Gamma \\ \Delta \\ Z \end{array} \right.$ nam BE rectae AB congruens sit, et eadem comparentur. itaque AE, EB potentia incommensurabiles sunt efficientes summam quadratorum mediam et rectangulum medium praetereaue summam quadratorum rectangulo incommensurabilem [prop. LXXVIII]. sunt autem, ut demonstratum est [p. 334, 14 sq.], AE, EB rectis $\Gamma Z, ZA$ commensurabiles, et $AE^2 + EB^2, \Gamma Z^2 + ZA^2$ ac $AE \times EB, \Gamma Z \times ZA$

$\epsilon\delta\epsilon\iota\ \delta\epsilon\iota\kappa\tau\alpha\iota$] comp. P, om. BFb. De V n. app. nr. 25. 14.
 $\kappa\omicron\iota\omicron\upsilon\sigma\eta\ \mu\eta\mu\epsilon\iota$ F. 18. $\xi\sigma\tau\omega$] om. BFb. 21. $\alpha\upsilon\tau\omicron\omicron\upsilon\sigma\eta$] m. 2
 euan. F. 25. $\alpha\upsilon\tau\omicron\omicron\upsilon\sigma\eta$ F.

κειμένῳ ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΓΖ, ΖΔ, τὸ δὲ ὑπο τῶν
 ΑΕ, ΕΒ τῷ ὑπὸ τῶν ΓΖ, ΖΔ· καὶ αἱ ΓΖ, ΖΔ ἄρα
 δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τό τε συγκείμενον
 ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων μέσον καὶ τὸ ὑπ' αὐτῶν
 5 μέσον καὶ ἐστὶ ἀσύμμετρον τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ'
 αὐτῶν [τετραγώνων] τῷ ὑπ' αὐτῶν.

Ἡ ΓΔ ἄρα μετὰ μέσου μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσά
 ἐστίν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

ρη'.

10 Ἀπὸ ῥητοῦ μέσου ἀφαιρουμένου ἢ τὸ λοιπὸν
 χωρίον δυναμένη μία δύο ἀλόγων γίνεται ἥτοι
 ἀποτομή ἢ ἐλάσσων.

Ἀπὸ γὰρ ῥητοῦ τοῦ ΒΓ μέσον ἀφηρήσθω τὸ ΒΔ·
 λέγω, ὅτι ἢ τὸ λοιπὸν δυναμένη τὸ ΕΓ μία δύο
 15 ἀλόγων γίνεται ἥτοι ἀποτομή ἢ ἐλάσσων.

Ἐκκείσθω γὰρ ῥητὴ ἢ ΖΗ, καὶ τῷ μὲν ΒΓ ἴσον
 παρὰ τὴν ΖΗ παραβεβλήσθω ὀρθογώνιον παραλληλό-
 γραμμον τὸ ΗΘ, τῷ δὲ ΔΒ ἴσον ἀφηρήσθω τὸ ΗΚ·
 λοιπὸν ἄρα τὸ ΕΓ ἴσον ἐστὶ τῷ ΑΘ. ἐπεὶ οὖν ῥητὸν
 20 μὲν ἐστὶ τὸ ΒΓ, μέσον δὲ τὸ ΒΔ, ἴσον δὲ τὸ μὲν ΒΓ
 τῷ ΗΘ, τὸ δὲ ΒΔ τῷ ΗΚ, ῥητὸν μὲν ἄρα ἐστὶ τὸ
 ΗΘ, μέσον δὲ τὸ ΗΚ. καὶ παρὰ ῥητὴν τὴν ΖΗ
 παράκειται ῥητὴ μὲν ἄρα ἢ ΖΘ καὶ σύμμετρος τῇ

1. τὸ δέ — 2. καί] mg. m. 2 F. 3. τε] om. P. 6. τε-
 τραγώνων] om. P. 8. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. BfB.
 10. Post ῥητοῦ del. καί F. 11. γίνεται BfB. 12. ἐλάτ-
 των PVb. 13. ΒΓ] in ras. V. 14. λοιπὸν χωρίον BfB.
 τὸ ΕΓ δυναμένη BfB. 15. λόγων F, corr. m. 2. γί-
 νεται BfB. ἐλάττων B. 17. Post παραβεβλήσθω del. τὸ
 ΗΒ m. 1 P, ras. 4 litt. V. 18. ΔΒ] e corr. V, ΒΔ P. 19.
 ΕΓ] ΓΕ B. ΑΘ] ΘΑ F. 20. μὲν] (prius) om. b. 21.
 ῥητὸν] bis b. 23. παράκειται Bf. ἄρα ἐστίν BfB.

commensurabilia. quare etiam ΓZ , $Z\Delta$ potentia incommensurabiles sunt efficientes summam quadratorum mediam et rectangulum medium praetereaue summam quadratorum rectangulo incommensurabilem.


Ergo $\Gamma\Delta$ recta est cum medio totum medium efficiens [prop. LXXVIII]; quod erat demonstrandum.

CVIII.

Spatio medio a rationali ablato recta reliquo spatio aequalis quadrata alterutra rectarum irrationalium est aut apotome aut minor.

nam a spatio rationali $B\Gamma$ medium auferatur $B\Delta$. dico, rectam reliquo $E\Gamma$ aequalem quadratam alterutra rectarum irrationalium esse aut apotomen aut minorem.

ponatur enim rationalis ZH , et spatio $B\Gamma$ aequale rectae ZH adplicetur rectangulum $H\Theta$, spatio autem ΔB aequale auferatur HK . itaque reliquum $E\Gamma = \Delta\Theta$.



iam quoniam $B\Gamma$ rationale est, $B\Delta$ autem medium, et $B\Gamma = H\Theta$, $B\Delta = HK$, $H\Theta$ rationale est, HK autem medium. et rationali ZH adplicata sunt. itaque $Z\Theta$ rationalis est et rectae ZH longitudine commensura-

bilis [prop. XX], ZK autem rationalis et rectae ZH longitudine incommensurabilis [prop. XXII]. quare $Z\Theta$, ZK longitudine incommensurabiles sunt [prop.

ZH μήκει, ῥητὴ δὲ ἡ ZK καὶ ἀσύμμετρος τῇ ZH μήκει· ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ $Z\Theta$ τῇ ZK μήκει. αὖ $Z\Theta$, ZK ἄρα ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· ἀποτομὴ ἄρα ἐστὶν ἡ $K\Theta$, προσαρμόζουσα δὲ αὐτῇ ἡ
 5 KZ . ἦτοι δὴ ἡ ΘZ τῆς ZK μείζον δύναται τῷ ἀπὸ
 συμμέτρου ἢ οὐ.

Δυνάσθω πρότερον τῷ ἀπὸ συμμέτρου. καὶ ἐστὶν ὅλη ἡ ΘZ σύμμετρος τῇ ἐκκειμένη ῥητῇ μήκει τῇ ZH · ἀποτομὴ ἄρα πρώτη ἐστὶν ἡ $K\Theta$. τὸ δ' ὑπὸ ῥητῆς
 10 καὶ ἀποτομῆς πρώτης περιεχόμενον ἡ δυναμένη ἀποτομὴ ἐστὶν. ἡ ἄρα τὸ $A\Theta$, τουτέστι το $E\Gamma$, δυναμένη ἀποτομὴ ἐστὶν.

Εἰ δὲ ἡ ΘZ τῆς ZK μείζον δύναται τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ, καὶ ἐστὶν ὅλη ἡ $Z\Theta$ σύμμετρος τῇ ἐκ-
 15 κειμένη ῥητῇ μήκει τῇ ZH , ἀποτομὴ τετάρτη ἐστὶν ἡ $K\Theta$. τὸ δ' ὑπὸ ῥητῆς καὶ ἀποτομῆς τετάρτης περιεχόμενον ἡ δυναμένη ἐλάσσων ἐστίν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

ρθ'.

Ἀπὸ μέσου ῥητοῦ ἀφαιρουμένου ἄλλαι δύο
 20 ἄλογοι γίνονται ἦτοι μέσης ἀποτομὴ πρώτη ἡ μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιούσα.

Ἀπὸ γὰρ μέσου τοῦ $B\Gamma$ ῥητὸν ἀφηρήσθω τὸ BA . λέγω, ὅτι ἡ τὸ λοιπὸν τὸ $E\Gamma$ δυναμένη μία δύο ἀλόγων

1. ZH] (prius) HZ F. 2. Post μήκει (alt.) add. καὶ εἰσιν ἀμφοτέραι ῥηταὶ b. 3. $Z\Theta$] ΘZ BF. εἰσιν P. 4. δέ] δ' P. 5. ZK φ. δῆ] P, δέ BFb, et supra scr. m. 2 V. 6. ΘZ] $Z\Theta$ b. 6. ἀσύμμετρον P. ἢ οὐ] ἑαυτῇ ἢ τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου BFb. ἢ — 7. συμμέτρου] mg. m. 1 P. 7. τῷ corr. ex τό m. 1 b, m. rec. P. ἀσύμμετρον P. 8. ΘZ] corr. ex $Z\Theta$ V, $Z\Theta$ F. 9. δέ BFb. 10. περιεχόμενον] om. BFb. 11. ἡ] ins. m. 1 B. τό] (prius) ins. m. 2 V. 13. ΘZ] in ras. b, $Z\Theta$ F. τῆς] τῇ b. συμμέτρου V, corr.

XIII]. itaque $Z\Theta$, ZK rationales sunt potentia tantum commensurabiles. quare $K\Theta$ apotome est [prop. LXXIII], KZ autem ei congruens. iam ΘZ^2 excedit ZK^2 quadrato rectae aut commensurabilis aut incommensurabilis.

Prius excedat quadrato commensurabilis. et tota ΘZ rationali propositae ZH longitudine commensurabilis est. quare $K\Theta$ apotome est prima [def. tert. 1]. recta autem spatio comprehenso recta rationali et apotome prima aequalis quadrata apotome est [prop. XCI]. ergo recta spatio $A\Theta$, hoc est $E\Gamma$, aequalis quadrata apotome est.

sin ΘZ^2 excedit ZK^2 quadrato rectae sibi incommensurabilis, et tota $Z\Theta$ rationali propositae ZH longitudine commensurabilis est, $K\Theta$ apotome est quarta [def. tert. 4]. recta autem spatio comprehenso recta rationali et apotome quarta aequalis quadrata minor est [prop. XCIV]; quod erat demonstrandum.

CIX.

Spatio rationali a medio ablato aliae duae rectae irrationales oriuntur aut mediae apotome prima aut recta cum rationali totum medium efficiens.

A medio enim $B\Gamma$ rationale auferatur $B\Delta$. dico, rectam spatio reliquo $E\Gamma$ aequalem quadratam alterutram rectarum irrationalium esse aut mediae apotomen

m. 2. 14. ΘZ BF. 15. ZH] corr. ex $Z\Theta$ m. 1 F. ἀποτομή ἄρα BFb. 16. δέ B. 17. Post ἐστίν add. ἡ ἄρα τὸ (om. b) $A\Theta$, τούτῳ ἐστὶν $E\Gamma$, δυναμένη ἐλάσσων ἐστὶν BF, mg. m. 1 b. ὅπερ εἶδει δεῖξαι] comp. P, om. BFb. 19. Post ἀπό add. τοῦ b, m. 2 F. 20. γίνονται B. μέση B. 22. ἀπό] corr. ex ὑπό V. ἀπό — $B\Delta$] bis b. 23. μία] om. b. λόγων b.

γίνεται ἥτοι μέσης ἀποτομή πρώτη ἢ μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιούσα.

Ἐκκείσθω γὰρ ῥητὴ ἡ ZH , καὶ παραβελήσθω ὁμοίως τὰ χωρία. ἔστι δὲ ἀκολουθῶς ῥητὴ μὲν ἡ $Z\Theta$ καὶ ἀσύμμετρος τῇ ZH μήκει, ῥητὴ δὲ ἡ KZ καὶ σύμμετρος τῇ ZH μήκει· αἱ $Z\Theta$, ZK ἄρα ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· ἀποτομὴ ἄρα ἔστιν ἡ $K\Theta$, προσαρμόζουσα δὲ ταύτῃ ἡ ZK . ἥτοι δὲ ἡ ΘZ τῆς ZK μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ ἢ τῷ ἀπὸ ἀσύμμετρου.

Εἰ μὲν οὖν ἡ ΘZ τῆς ZK μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ, καὶ ἔστιν ἡ προσαρμόζουσα ἡ ZK σύμμετρος τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ μήκει τῇ ZH , ἀποτομὴ δευτέρα ἔστιν ἡ $K\Theta$. ῥητὴ δὲ ἡ ZH ὥστε ἡ τὸ $\Lambda\Theta$, 15 τουτέστι τὸ $E\Gamma$, δυναμένη μέσης ἀποτομὴ πρώτη ἐστίν.

Εἰ δὲ ἡ ΘZ τῆς ZK μείζον δύναται τῷ ἀπὸ ἀσύμμετρου, καὶ ἔστιν ἡ προσαρμόζουσα ἡ ZK σύμμετρος τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ μήκει τῇ ZH , ἀποτομὴ πέμπτη ἐστίν ἡ $K\Theta$. ὥστε ἡ τὸ $E\Gamma$ δυναμένη μετὰ ῥητοῦ μέσον 20 τὸ ὅλον ποιούσά ἐστιν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.


ρι'.

Ἀπὸ μέσου μέσου ἀφαιρουμένου ἀσύμμε-

1. γίνεταί Bb. μέση Bb. 4. ἔστιν P. δὴ] corr. ex δέ m. 2 B, δέ Fb. 5. καί] om. φ. ZH] ZI b. ZK B. 6. $Z\Theta$] ΘZ P. εἰσιν P. 8. αὐτῇ Bfb. δὴ] δέ BV. ΘZ] in ras. m. 1 b. 10. συμμέτρου V, corr. m. 1. 11. ΘZ] $Z\Theta$ V. 14. Post ZH add. τὸ δὲ ὑπὸ ῥητῆς καὶ ἀποτομῆς δευτέρας ἡ δυναμένη μέσης ἀποτομὴ ἐστὶ πρώτη b, F mg. m. 2. 15. τουτέστιν P. μέση BF. ἐστὶ πρώτη V. 16. ΘZ] in ras. V, $Z\Theta$ P. 17. καί] ἑαυτῇ, καὶ Bfb. 18. μήκει] om. b. 19. $K\Theta$] ΘK F. Post $E\Gamma$ del. χωρίον m. 1 P. 20. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. Bfb. 22. μέσον] (alt.) supra scr. m. 1 P, μέσον supra scr. m. 2 F.

primam aut rectam cum rationali totum medium effici-
cientem.

ponatur enim rationalis ZH , et spatia similiter
adplicentur. itaque eodem modo [p. 342, 19 sq.] se-



quitur, $Z\Theta$ rationalem esse
et rectae ZH longitudine in-
commensurabilem, KZ autem
rationalem et rectae ZH lon-
gitudine commensurabilem.
itaque $Z\Theta$, ZK rationales
sunt potentia tantum com-
mensurabiles [prop. XIII].
ergo $K\Theta$ apotome est [prop.
LXXIII], ei autem congruens

ZK . iam ΘZ^2 excedit ZK^2 quadrato rectae aut sibi
commensurabilis aut incommensurabilis.

iam si ΘZ^2 excedit ZK^2 quadrato rectae sibi com-
mensurabilis, et congruens ZK rationali propositae
 ZH longitudine commensurabilis est, $K\Theta$ apotome est
secunda [diff. tert. 2]. ZH autem rationalis est. quare
recta spatio $A\Theta$, hoc est $E\Gamma$, aequalis quadrata mediae
apotome est prima [prop. XCII]. sin ΘZ^2 excedit ZK^2
quadrato rectae incommensurabilis, et congruens ZK
rationali propositae ZH longitudine commensurabilis
est, $K\Theta$ apotome est quinta [diff. tert. 5]. quare recta
spatio $E\Gamma$ aequalis quadrata recta est cum rationali
totum medium efficiens [prop. XCV]; quod erat de-
monstrandum.

CX.

Spatio medio a medio ablato toti incommensurabili
reliquae duae irrationales oriuntur aut mediae apo-

τρον τῷ ὄλῳ αἱ λοιπαὶ δύο ἄλλοι γίνονται
ἤτοι μέσης ἀποτομῇ δευτέρα ἢ μετὰ μέσου
μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα.

Ἀφηρήσθω γὰρ ὡς ἐπὶ τῶν προκειμένων κατα-
5 γραφῶν ἀπὸ μέσου τοῦ ΒΓ μέσον τὸ ΒΔ ἀσύμμετρον
τῷ ὄλῳ· λέγω, ὅτι ἢ τὸ ΕΓ δυναμένη μία ἐστὶ δύο
ἀλόγων ἤτοι μέσης ἀποτομῇ δευτέρα ἢ μετὰ μέσου
μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα.

Ἐπεὶ γὰρ μέσον ἐστὶν ἑκάτερον τῶν ΒΓ, ΒΔ, καὶ
10 ἀσύμμετρον τὸ ΒΓ τῷ ΒΔ, ἔσται ἀκολουθῶς ῥητὴ
ἑκατέρα τῶν ΖΘ, ΖΚ καὶ ἀσύμμετρος τῇ ΖΗ μήκει.
καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρόν ἐστι τὸ ΒΓ τῷ ΒΔ, τοντέστι τὸ
ΗΘ τῷ ΗΚ, ἀσύμμετρος καὶ ἡ ΘΖ τῇ ΖΚ· αἱ ΖΘ,
ΖΚ ἄρα ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι· ἀπο-
15 τομῇ ἄρα ἐστὶν ἡ ΚΘ [προσαρμόζουσα δὲ ἡ ΖΚ. ἤτοι
δὴ ἡ ΖΘ τῆς ΖΚ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου
ἢ τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ].

Εἰ μὲν δὴ ἡ ΖΘ τῆς ΖΚ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ
συμμέτρου ἑαυτῇ, καὶ οὐδετέρα τῶν ΖΘ, ΖΚ σύμ-
20 μετρός ἐστι τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ μήκει τῇ ΖΗ, ἀποτομῇ
τρίτῃ ἐστὶν ἡ ΚΘ. ῥητὴ δὲ ἡ ΚΑ, τὸ δ' ὑπὸ ῥητῆς
καὶ ἀποτομῆς τρίτης περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἄλογόν
ἐστίν, καὶ ἡ δυναμένη αὐτὸ ἄλογός ἐστιν, καλεῖται δὲ


1. γίνονται B. 2. μέση Bb. 5. ΒΔ] B e corr. V. 6.
ἐστίν B. 7. μέση Bb. μετὰ τοῦ P. 12. ἐστίν P.
Deinde add. ὑπόκειται P, et V, sed del. 13. καὶ] ἐστι καὶ b,
ἐστίν καὶ B. αἱ] καὶ ἡ b. ΖΘ] ΘΖ FV. 14. ΖΚ]
ΘΚ P. 15. ἐστίν] om. Bb. προσαρμόζουσα — 17. ἑαυτῇ]
om. P, mg. V. 16. δὴ] δέ BV. 18. δὴ] οὖν BFb. ΖΘ]
ΘΖ B. ΖΚ] Ζ postea ins. V. 19. οὐδετέρα V. τῶν]
corr. ex τῷ m. 2 V. ΖΘ] ΘΖ Bb et in ras. V. 20. ἐστίν]
om. Fb. 21. ΚΑ] corr. ex ΚΑ m. 2 F. δ'] δέ BFb. 23.
ἐστίν PBV, comp. Fb; item alt.

tome secunda aut recta cum medio totum medium efficiens.

Auferatur enim ut in figuris iam propositis [p. 347] a medio $B\Gamma$ spatium medium $B\Delta$ toti incommensurabile. dico, rectam spatio $E\Gamma$ aequalem quadratam alterutram esse rectarum irrationalium aut mediae apotomen secundam aut rectam cum medio totum medium efficientem.

nam quoniam utrumque $B\Gamma$, $B\Delta$ medium est, et $B\Gamma$, $B\Delta$ incommensurabilia¹⁾, similiter concludemus [p. 342, 19 sq.], utramque $Z\Theta$, ZK rationalem esse et rectae ZH longitudine incommensurabilem [prop. XXII]. et quoniam $B\Gamma$, $B\Delta$, hoc est $H\Theta$, HK , incommensurabilia sunt, etiam ΘZ , ZK incommensurabiles sunt [VI, 1; prop. XI]. itaque $Z\Theta$, ZK rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo $K\Theta$ apotome est [prop. LXXIII].

iam si $Z\Theta^2$ excedit ZK^2 quadrato rectae sibi commensurabilis, et neutra rectarum $Z\Theta$, ZK rationali propositae ZH longitudine commensurabilis est, $K\Theta$ apotome est tertia [deff. tert. 3]. uerum $K\Delta$ rationalis est, rectangulum autem recta rationali et apotome tertia comprehensum irrationale est, et recta ei aequalis quadrata irrationalis est, uocatur autem mediae apotome se-



1) Cum uerba καὶ ἀσύμμετρον τὸ $B\Gamma$ τῷ $B\Delta$ lin. 9—10 nihil faciant ad demonstrandum id, quod sequitur, non immerito ab Augusto omittuntur. Gregorius omisit *foras* lin. 10 — τῷ $B\Delta$ lin. 12.

μέσης ἀποτομή δευτέρα· ὥστε ἡ τὸ $\Lambda\Theta$, τουτέστι τὸ $E\Gamma$, δυναμένη μέσης ἀποτομή ἐστὶ δευτέρα.

Εἰ δὲ ἡ $Z\Theta$ τῆς ZK μείζον δύναται τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἐαυτῇ [μήκει], καὶ οὐδετέρα τῶν ΘZ , ZK 5 σύμμετρός ἐστι τῇ ZH μήκει, ἀποτομή ἕκτη ἐστὶν ἡ $K\Theta$. τὸ δ' ὑπὸ φητῆς καὶ ἀποτομῆς ἕκτης ἡ δυναμένη ἐστὶ μετὰ μέσου μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα. ἡ τὸ $\Lambda\Theta$ ἄρα, τουτέστι τὸ $E\Gamma$, δυναμένη μετὰ μέσου μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσά ἐστιν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

10

ρια'.

Ἡ ἀποτομή οὐκ ἐστὶν ἡ αὐτὴ τῇ ἐκ δύο ὀνομάτων.

Ἐστω ἀποτομή ἡ AB · λέγω, ὅτι ἡ AB οὐκ ἐστὶν ἡ αὐτὴ τῇ ἐκ δύο ὀνομάτων.

15

Εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω· καὶ ἐκκείσθω φητὴ ἡ $\Delta\Gamma$, καὶ τῷ ἀπὸ τῆς AB ἴσον παρὰ τὴν $\Gamma\Delta$ παραβεβλήσθω ὀρθογώνιον τὸ ΓE πλάτος ποιοῦν τὴν ΔE . ἐπεὶ οὖν ἀποτομή ἐστὶν ἡ AB , ἀποτομή πρώτη ἐστὶν ἡ ΔE . ἔστω αὐτῇ προσαρμόζουσα ἡ EZ · αἱ ΔZ , ZE ἄρα 20 φηταί· εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ ἡ ΔZ τῆς ZE μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἐαυτῇ, καὶ ἡ ΔZ σύμμετρός ἐστι τῇ ἐκκειμένη φητῇ μήκει τῇ $\Delta\Gamma$. πάλιν, ἐπεὶ ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶν ἡ AB , ἐκ δύο ἄρα

1. ἀποτομή μέση B. ὥπερ FV. τό] om. b. τουτέστιν B. τό] ἢ τό Bb. 2. μέση B. ἐστὶν ἀποτομή Fb.

3. $Z\Theta$] ΘZ Bb et in ras. V. συμμέτρου V, corr. m. 1. 4. μήκει] om. PV. οὐδετέρα FV. 5. ἐστι] om. Bbφ. 6. δὲ Bb.

7. ἐστὶ] ἐστὶν ἡ Bfb. ἡ] ὥστε ἡ Bfb, et e corr. V. 8. ἄρα] del. V, om. Bfb. τουτέστιν PB. Ante τό add.

ἡ m. 2 F. ἡ μετὰ F. 9. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. B. 11. τῇ] supra scr. m. 1 b. 13. ἡ AB] (alt.) om. φ. 15. $\Delta\Gamma$] in ras. m. 1 P. 16. φητὴν τὴν Bfb. In sequentibus multa renouata et euan. in F. 18. ἄρα πρώτη b. 19. αὐτῇ] αὐτῇ ἡ b. 21. ἀσυμμέτρου B, sed ἀ- eras. 23. ἄρα] om. Bb.

cunda [prop. XCIII]. ergo recta spatio AO , hoc est EG , aequalis quadrata mediae apotome est secunda.

sin ZO^2 excedit ZK^2 quadrato rectae sibi incommensurabilis, et neutra rectarum OZ , ZK rectae ZH commensurabilis est longitudine, KO sexta est apotome [deff. tert. 6]. recta autem spatio comprehenso recta rationali et apotome sexta aequalis quadrata recta est cum medio totum medium efficiens [prop. XCVI]. ergo recta spatio AO , hoc est EG , aequalis quadrata recta est cum medio totum medium efficiens; quod erat demonstrandum.


CXI.

Apotome eadem non est ac recta ex duobus nominibus.

Sit AB apotome. dico, AB eandem non esse ac rectam ex duobus nominibus.

nam, si fieri potest, sit. et ponatur rationalis AG et quadrato AB^2 aequale rectae GA adplicetur rectangulum GE latitudinem efficiens AE . quoniam igitur

AB apotome est, AE apotome est prima [prop. XCVII]. sit EZ ei congruens. itaque AG , ZE rationales sunt potentia tantum commensurabiles, et AG^2 excedit ZE^2 quadrato rectae sibi commensurabilis, et AG rationali propositae AG longitudine commensurabilis est [deff. tert. 1]. rursus quoniam AB ex duobus nominibus est, AE ex duobus nominibus est prima [prop. LX]. in H in nomina diuidatur, et AG maius



ὀνομάτων πρώτη ἐστὶν ἡ ΔE . διηρησθῶ εἰς τὰ ὀνόματα κατὰ τὸ H , καὶ ἔστω μείζον ὄνομα τὸ ΔH . αὶ ΔH , HE ἄρα φηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ ἡ ΔH τῆς HE μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου
 5 ἑαυτῇ, καὶ τὸ μείζον ἡ ΔH σύμμετρός ἐστι τῇ ἐκκειμένη φητῇ μήκει τῇ $\Delta \Gamma$. καὶ ἡ ΔZ ἄρα τῇ ΔH σύμμετρός ἐστι μήκει· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ HZ σύμμετρός ἐστι τῇ ΔZ μήκει. [ἐπεὶ οὖν σύμμετρός ἐστιν ἡ ΔZ τῇ HZ , φητὴ δέ ἐστιν ἡ ΔZ , φητὴ ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ
 10 HZ . ἐπεὶ οὖν σύμμετρός ἐστιν ἡ ΔZ τῇ HZ μήκει] ἀσύμμετρος δὲ ἡ ΔZ τῇ EZ μήκει· ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ ZH τῇ EZ μήκει. αὶ HZ , ZE ἄρα φηταί [εἰσι] δυνάμει μόνον σύμμετροι· ἀποτομὴ ἄρα ἐστὶν ἡ EH . ἀλλὰ καὶ φητὴ· ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον.
 15 Ἡ ἄρα ἀποτομὴ οὐκ ἐστὶν ἡ αὐτὴ τῇ ἐκ δύο ὀνομάτων· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

[Πόρισμα].

Ἡ ἀποτομὴ καὶ αὖ μετ' αὐτὴν ἄλλοι οὔτε τῇ μέσῃ οὔτε ἀλλήλαις εἰσὶν αὐταί.
 20 Τὸ μὲν γὰρ ἀπὸ μέσης παρὰ φητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ φητὴν καὶ ἀσύμμετρον τῇ, παρ' ἣν παράκειται, μήκει, τὸ δὲ ἀπὸ ἀποτομῆς παρὰ φητὴν

1. ὀνομάτων ἄρα Bb. ἐστὶ πρώτη F?, πρώτη supra scr. m. 2 V. διηρημένη b, mg. m. 1: γε. διηρησθῶ. 4. HE] EH F. τῷ] τό φ. 5. τὸ μείζον] P, et V, supra scr. ἡ; om. b, ἡ μείζων B; om. φ, sed post ΔH lacuna est 6 litt.

7. Ante μήκει del. τῇ ἐκκειμένη φητῇ μήκει τῇ $\Delta \Gamma$ m. 1 b. λοιπὴ ἄρα τῇ BFV. HZ] in ras. m. 1 b; ZH F, seq. ras. 1 litt. 8. ἐστὶ τῇ] ἐστὶν ἡ BVb et supra scr. ἡ φ. ἐπεὶ —

10. HZ (prius)] om. P, mg. V. 9. HZ] Z ante ras. 1 litt. V. ἐστὶν] om. V. Post φητὴ in mg. m. 1 add. μήκει ἀσύμμετρος m. 1 b. ἐστὶν B, om. V. 10. ἐπεὶ — μήκει] om.

nomen sit. itaque ΔH , HE rationales sunt potentia tantum commensurabiles, et ΔH^2 excedit HE^2 quadrato rectae sibi commensurabilis, et maius nomen ΔH rationali propositae $\Delta \Gamma$ longitudine commensurabile est [deff. alt. 1]. itaque etiam ΔZ rectae ΔH longitudine commensurabilis est [prop. XII]. quare etiam reliqua HZ rectae ΔZ longitudine commensurabilis est [prop. XV]. uerum ΔZ , EZ longitudine incommensurabiles sunt. quare etiam ZH , EZ longitudine incommensurabiles sunt [prop. XIII]. itaque HZ , ZE rationales sunt potentia tantum commensurabiles. EH igitur apotome est [prop. LXXIII]. uerum eadem rationalis est; quod fieri non potest.

Ergo apotome eadem non est ac recta ex duobus nominibus; quod erat demonstrandum.

Apotome et irrationales eam sequentes neque mediae neque inter se eadem sunt. nam quadratum mediae rectae rationali adplicatum latitudinem efficit rationalem et rectae, cui adplicatum est, longitudine incommensurabilem [prop. XXII], quadratum autem apotomes rationali adplicatum latitudinem efficit apotomen primam [prop. XCVII], quadratum autem mediae apotomes primae rationali adplicatum latitudinem efficit apotomen secundam [prop. XCVIII], quadratum autem

PV. 11. EZ] mut. in ZE V. $\alpha\theta\alpha \epsilon\sigma\tau\iota$] $\delta\epsilon$ in ras. 4 litt. ϕ . 12. $\epsilon\sigma\tau\iota\nu$ P. Post $\mu\eta\kappa\epsilon\iota$ add. $\kappa\alpha\iota \epsilon\lambda\epsilon\iota \theta\eta\tau\alpha\iota$ mg. m. 2 B. 13. $\epsilon\lambda\epsilon\iota$] om. PV. 14. EH] corr. ex HE V, HE P, EN ϕ . 15. η] (alt.) om. b. 16. $\acute{o}\pi\epsilon\rho \epsilon\delta\epsilon\iota \delta\epsilon\iota\chi\alpha\iota$] comp. P, om. B Fb. 17. $\pi\acute{o}\tau\iota\sigma\mu\alpha$] om. P, $\rho\iota\gamma'$ BVb, $\rho\iota\alpha'$ F. 21. $\tau\eta$] $\tau\iota$ b. 22. $\acute{\alpha}\pi\acute{o}$] om. F.

παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ ἀποτομὴν πρώτην, το
 δὲ ἀπὸ μέσης ἀποτομῆς πρώτης παρὰ ῥητὴν παραβαλ-
 λόμενον πλάτος ποιεῖ ἀποτομὴν δευτέραν, τὸ δὲ ἀπὸ
 μέσης ἀποτομῆς δευτέρας παρὰ ῥητὴν παραβαλλόμενον
 5 πλάτος ποιεῖ ἀποτομὴν τρίτην, τὸ δὲ ἀπὸ ἐλάσσονος
 παρὰ ῥητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ ἀποτομὴν
 τετάρτην, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον
 ποιούσης παρὰ ῥητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ
 ἀποτομὴν πέμπτην, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς μετὰ μέσον μέσον
 10 τὸ ὅλον ποιούσης παρὰ ῥητὴν παραβαλλόμενον πλάτος
 ποιεῖ ἀποτομὴν ἕκτην. ἐπεὶ οὖν τὰ εἰρημένα πλάτη
 διαφέρει τοῦ τε πρώτου καὶ ἀλλήλων, τοῦ μὲν πρώτου,
 ὅτι ῥητὴ ἐστίν, ἀλλήλων δὲ, ἐπεὶ τῇ τάξει οὐκ εἰσὶν
 αἱ αὐταί, δῆλον, ὥς καὶ αὐταὶ αἱ ἄλλοι διαφέρουσιν
 15 ἀλλήλων. καὶ ἐπεὶ δέδεικται ἡ ἀποτομὴ οὐκ οὔσα ἡ
 αὐτὴ τῇ ἐκ δύο ὀνομάτων, ποιοῦσι δὲ πλάτη παρὰ
 ῥητὴν παραβαλλόμενα αἱ μετὰ τὴν ἀποτομὴν ἀποτομὰς
 ἀκολουθῶς ἐκάστη τῇ τάξει τῇ καθ' αὐτήν, αἱ δὲ
 μετὰ τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων τὰς ἐκ δύο ὀνομάτων καὶ
 20 αὐταὶ τῇ τάξει ἀκολουθῶς, ἔτεραι ἄρα εἰσὶν αἱ μετὰ
 τὴν ἀποτομὴν καὶ ἔτεραι αἱ μετὰ τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων,
 ὥς εἶναι τῇ τάξει πάσας ἀλόγους ἰγ,

Μέσην,

Ἐκ δύο ὀνομάτων,

25 Ἐκ δύο μέσων πρώτην,

Ἐκ δύο μέσων δευτέραν,

Μείζονα,

Ῥητὸν καὶ μέσον δυναμένην,

1. τὸ δέ — 3. δευτέραν] mg. m. 1 V. 5. ἐλάττονος Bb,
 comp. F. 9. μετά] om. F. 11. οὖν] corr. ex οὐ m. 1 P.
 12. πρώτου] (prius) in ras. V. 13. ἐπεὶ] ὅτι B. 17.
 παραβαλλόμενα F, corr. m. 2. αἱ] om. P, supra scr. m. 1 V,

mediae apotomes secundae rationali adplicatum latitudinem efficit apotomen tertiam [prop. XCIX], quadratum autem minoris rationali adplicatum latitudinem efficit apotomen quartam [prop. C], quadratum autem rectae cum rationali totum medium efficientis rationali adplicatum latitudinem efficit apotomen quintam [prop. CI], quadratum autem rectae cum medio totum medium efficientis rationali adplicatum latitudinem efficit apotomen sextam [prop. CII]. iam quoniam latitudines, quas diximus, et a prima et inter se differunt, a prima, quia rationalis est, inter se autem, quia ordine eadem non sunt, adparet, ipsas quoque irrationales inter se differre. Et quoniam demonstrauius, apotomen eandem non esse ac rectam ex duobus nominibus [prop. CXI], et rationali adplicatae rectae irrationales apotomen sequentes latitudines efficiunt apotomas secundum suum quaeque ordinem, irrationales autem rectam ex duobus nominibus sequentes rectas ex duobus nominibus et ipsae secundum suum quaeque ordinem, aliae sunt irrationales apotomen sequentes, aliae irrationales rectam ex duobus nominibus sequentes, ita ut omnes XIII irrationales ordine hae sint:

1. Media.
2. Recta ex duobus nominibus.
3. Ex duobus mediis prima.
4. Ex duobus mediis secunda.
5. Maior.
6. Recta spatio rationali et medio aequalis quadrata.

μέν B, αὐ μέν b, μέν supra add. m. 2 F. 19. τὰς ἐκ δύο
 ὀνομάτων] om. V. 20. αὐτὰς b. εἰσιν ἄρα V. 21. αὐ]
 om. F. μετὰ] κατὰ P.

- Δύο μέσα δυναμένην,
 Ἀποτομήν,
 Μέσης ἀποτομήν πρώτην,
 Μέσης ἀποτομήν δευτέραν,
 5 Ἐλάσσονα,
 Μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιούσαν,
 Μετὰ μέσου μέσον τὸ ὅλον ποιούσαν.

[ριβ'.

Τὸ ἀπὸ ῥητῆς παρὰ τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων
 10 παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ ἀποτομήν, ἥς
 τὰ ὀνόματα σύμμετρά ἐστι τοῖς τῆς ἐκ δύο ὀνο-
 μάτων ὀνόμασι καὶ ἐτι ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, καὶ
 ἐτι ἡ γινομένη ἀποτομή τὴν αὐτὴν ἔξει τάξιν
 τῇ ἐκ δύο ὀνομάτων.

15 Ἔστω ῥητὴ μὲν ἡ A , ἐκ δύο ὀνομάτων δὲ ἡ $B\Gamma$,
 ἥς μείζον ὄνομα ἔστω ἡ $\Delta\Gamma$, καὶ τῷ ἀπὸ τῆς A ἴσον
 ἔστω τὸ ὑπὸ τῶν $B\Gamma$, EZ · λέγω, ὅτι ἡ EZ ἀποτομή
 ἐστίν, ἥς τὰ ὀνόματα σύμμετρά ἐστι τοῖς $\Gamma\Delta$, ΔB ,
 καὶ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, καὶ ἐτι ἡ EZ τὴν αὐτὴν ἔξει
 20 τάξιν τῇ $B\Gamma$.

Ἔστω γὰρ πάλιν τῷ ἀπὸ τῆς A ἴσον τὸ ὑπὸ τῶν
 $B\Delta$, H . ἐπεὶ οὖν τὸ ὑπὸ τῶν $B\Gamma$, EZ ἴσον ἐστὶ τῷ
 ὑπὸ τῶν $B\Delta$, H , ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ ΓB πρὸς τὴν $B\Delta$,

De his 13 irrationalibus cfr. Martianus Capella VI, 720.

5. ἐλάττονα BFb. 8. ριβ'] om. b, ρια' F, ριδ' BV. 11.
 τέ ἐστι F. 12. ὀνόμασιν PBF. 15. δὲ ὀνομάτων V. 16.
 $\Delta\Gamma$] $\Gamma\Delta$ F. 17. $B\Gamma$] ΓB F. 18. ἐστι] ἐστίν P. $\Gamma\Delta$] Γ
 e corr. V. ΔB] Δ supra scr. m. 2 V. 19. τάξιν ἔξει V.
 ἔξει] ἔχει BFb, in B supra scr. ξ m. 2. 22. $B\Delta$] Δ e
 corr. V. ΔB F. τό] τῷ PV. τῷ] mut. in τό m. 1 P, τό V.
 23. Post τῶν ras. 1 litt. P. ΓB] $B\Gamma$ F.


7. Recta duobus spatiis mediis aequalis quadrata.
8. Apotome.
9. Mediae apotome prima.
10. Mediae apotome secunda.
11. Minor.
12. Recta cum rationali totum medium efficiens.
13. Recta cum medio totum medium efficiens.

CXII.¹⁾

Quadratum rectae rationalis rectae ex duobus nominibus adplicatum latitudinem efficit apotomen, cuius nomina nominibus rectae ex duobus nominibus commensurabilia sunt praetereaue in eadem proportionem, et praeterea apotome ita orta eundem ordinem habebit ac recta ex duobus nominibus.

Sit A rationalis, $B\Gamma$ autem ex duobus nominibus, cuius maius nomen sit $A\Gamma$, et sit $B\Gamma \times EZ = A^2$. dico, EZ apotomen esse, cuius nomina rectis ΓA , $A B$ commensurabilia et in eadem proportionem sint, et praeterea rectam EZ eundem ordinem habere ac $B\Gamma$.

nam rursus sit $B A \times H = A^2$. iam quoniam est $B\Gamma \times EZ = B A \times H$, erit $\Gamma B : B A = H : EZ$ [VI, 16].



uerum $\Gamma B > B A$. itaque etiam $H > EZ$ [V, 16; V, 14].

1) Dubito, an haec propositio et sequentes Euclidis non sint. sed de hac re alibi uiderimus.

οὕτως ἡ H πρὸς τὴν EZ . μείζων δὲ ἡ ΓB τῆς $B\Delta$.
 μείζων ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ H τῆς EZ . ἔστω τῇ H ἴση
 ἡ $E\Theta$. ἐστὶν ἄρα ὥς ἡ ΓB πρὸς τὴν $B\Delta$, οὕτως ἡ
 ΘE πρὸς τὴν EZ . διελόντι ἄρα ἐστὶν ὥς ἡ $\Gamma\Delta$ πρὸς
 5 τὴν $B\Delta$, οὕτως ἡ ΘZ πρὸς τὴν ZE . γεγονέντω ὥς
 ἡ ΘZ πρὸς τὴν ZE , οὕτως ἡ ZK πρὸς τὴν KE . καὶ
 ὅλη ἄρα ἡ ΘK πρὸς ὅλην τὴν KZ ἐστὶν, ὥς ἡ ZK
 πρὸς KE . ὥς γὰρ ἐν τῶν ἡγούμενων πρὸς ἐν τῶν
 ἐπομένων, οὕτως ἅπαντα τὰ ἡγούμενα πρὸς ἅπαντα
 10 τὰ ἐπόμενα. ὥς δὲ ἡ ZK πρὸς KE , οὕτως ἐστὶν ἡ
 $\Gamma\Delta$ πρὸς τὴν ΔB . καὶ ὥς ἄρα ἡ ΘK πρὸς KZ , οὕτως ἡ
 $\Gamma\Delta$ πρὸς τὴν ΔB . σύμμετρον δὲ τὸ ἀπὸ τῆς $\Gamma\Delta$ τῷ
 ἀπὸ τῆς ΔB . σύμμετρον ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΘK
 τῷ ἀπὸ τῆς KZ . καὶ ἐστὶν ὥς τὸ ἀπὸ τῆς ΘK πρὸς
 15 τὸ ἀπὸ τῆς KZ , οὕτως ἡ ΘK πρὸς τὴν KE , ἐπεὶ αἱ
 τρεῖς αἱ ΘK , KZ , KE ἀνάλογόν εἰσιν. σύμμετρος
 ἄρα ἡ ΘK τῇ KE μήκει. ὥστε καὶ ἡ ΘE τῇ EK
 σύμμετρος ἐστὶ μήκει. καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς A ἴσον
 ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν $E\Theta$, $B\Delta$, ῥητὸν δὲ ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς
 20 A , ῥητὸν ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν $E\Theta$, $B\Delta$. καὶ
 παρὰ ῥητὴν τὴν $B\Delta$ παράκειται. ῥητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ
 $E\Theta$ καὶ σύμμετρος τῇ $B\Delta$ μήκει. ὥστε καὶ ἡ σύμ-
 μετρος αὐτῇ ἡ EK ῥητὴ ἐστὶ καὶ σύμμετρος τῇ $B\Delta$
 μήκει. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὥς ἡ $\Gamma\Delta$ πρὸς ΔB , οὕτως ἡ
 25 ZK πρὸς KE , αἱ δὲ $\Gamma\Delta$, ΔB δυνάμει μόνον εἰσι

1. μείζων — 2. ἔστω] in ras. V. 1. ΓB] $B\Gamma P$. 2.
 ἐστὶ] om. V. 3. ΓB] $B\Gamma PV$. 4. τήν] om. Bb. 5. τήν]
 om. Bb. ΔB FVb. τήν] om. BFb. γεγονέντω — 6.
 ZE] om. b. 6. τήν] om. BF. ZK] $KZ B$. τήν] om.
 BFb. 7. πρὸς] bis φ. 8. τήν KE FV. ὥς γάρ] om. P,
 supra scr. V. τῶν] om. P. ἡγούμενον P. 10. τήν KE V.
 11. ΔB] $B\Delta F$. τήν KZ BFb. 12. ΔB] e corr. V,

sit $E\Theta = H$. itaque $\Gamma B : B\Delta = \Theta E : EZ$. quare dirimendo [V, 17] $\Gamma\Delta : B\Delta = \Theta Z : ZE$. fiat $\Theta Z : ZE = ZK : KE$. quare etiam $\Theta K : KZ = ZK : KE$; nam ut unum praecedentium ad unum sequentium, ita omnia praecedentia ad omnia sequentia [V, 12]. est autem $ZK : KE = \Gamma\Delta : \Delta B$. quare etiam $\Theta K : KZ = \Gamma\Delta : \Delta B$. uerum $\Gamma\Delta^2$, ΔB^2 commensurabilia sunt [prop. XXXVI]. itaque etiam ΘK^2 , KZ^2 commensurabilia sunt [VI, 20 coroll.; prop. XI]. est autem $\Theta K^2 : KZ^2 = \Theta K : KE$, quoniam tres rectae ΘK , KZ , KE proportionales sunt [V def. 9]. itaque ΘK , KE longitudine commensurabiles sunt [prop. XI]. quare etiam ΘE , EK longitudine commensurabiles sunt [prop. XV]. et quoniam $A^2 = E\Theta \times B\Delta$, et A^2 rationale est, etiam $E\Theta \times B\Delta$ rationale est. et rationali $B\Delta$ adplicatum est. itaque $E\Theta$ rationalis est et rectae $B\Delta$ longitudine commensurabilis [prop. XX]. quare etiam EK , quae ei commensurabilis est, rationalis est [def. 3] et rectae $B\Delta$ longitudine commensurabilis [prop. XII]. iam quoniam est $\Gamma\Delta : \Delta B = ZK : KE$, et $\Gamma\Delta$, ΔB potentia tantum commensurabiles sunt, etiam ZK , KE potentia tantum

$B\Delta$ F. 13. ΘK] $\Gamma\Delta$ φ. 14. KZ] ZK in ras. V. 15. Post KZ add. *ἐδείχθη γὰρ ὡς ἡ $\Gamma\Delta$ πρὸς ΔB , οὕτως ἡ ZK πρὸς $K\Theta$. ἀλλὰ καὶ ὡς ἡ $\Gamma\Delta$ πρὸς ΔB , οὕτως ἡ ΘK πρὸς KE . τρεῖς οὖν εὐθείαι εἰσιν ἀνάλογον πρώτῃ μὲν ἡ ΘK , δευτέρᾳ δὲ ἡ KZ , τρίτῃ ἡ KE . ἔστιν οὖν ὡς τὸ ἀπὸ τῆς πρώτης πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς δευτέρας εἶδος, οὕτως ἡ πρώτη πρὸς τὴν τρίτην, τοιούστιν ὡς τὸ ἀπὸ ΘK πρὸς τὸ ἀπὸ KZ b. τὴν] om. b. 16. εἰσι BVb , comp. F. 17. ἄρα ἐστὶν Bfb . ΘK] K e corr. V. Post *μήκει* add. καὶ διελόντι b, m. 2 F. ὥστε] τε e corr. V. EK] $E\Theta$ b. 19. $E\Theta$] ΘE V. ἐστὶν L. 20. ἐστὶν L. ΔB] Bfb , e corr. V. 21. ΔB BF. 22. Post ὥστε ras. 1 litt. V. 23. ἐστὶν L. ΔB F. 24. ὡς] om. L, supra scr. m. 2 B. 25. ZK] corr. ex ZH m. 2 F. $\delta\epsilon$] m. 2 F. $\Gamma\Delta$] $\Delta\Gamma$ F. εἰσὶν L.*

σύμμετροι, καὶ αὐτὰ ZK , KE δυνάμει μόνον εἰσὶ σύμμετροι. ῥητὴ δὲ ἐστὶν ἡ KE . ῥητὴ ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ ZK . αὐτὰ ZK , KE ἄρα ῥηταὶ δυνάμει μόνον εἰσὶ σύμμετροι· ἀποτομὴ ἄρα ἐστὶν ἡ EZ .

5 Ἦτοι δὲ ἡ ΓA τῆς ΔB μείζον δύνатаι τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ ἢ τῷ ἀπὸ ἀσυνμέτρου.

Εἰ μὲν οὖν ἡ ΓA τῆς ΔB μείζον δύνатаι τῷ ἀπὸ συμμέτρου [ἑαυτῇ], καὶ ἡ ZK τῆς KE μείζον δυνήσεται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ. καὶ εἰ μὲν σύμμετρός
10 ἐστὶν ἡ ΓA τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ μήκει, καὶ ἡ ZK εἰ δὲ ἡ $B A$, καὶ ἡ KE εἰ δὲ οὐδετέρᾳ τῶν ΓA , ΔB , καὶ οὐδετέρᾳ τῶν ZK , KE .

Εἰ δὲ ἡ ΓA τῆς ΔB μείζον δύνатаι τῷ ἀπὸ ἀσυνμέτρου ἑαυτῇ, καὶ ἡ ZK τῆς KE μείζον δυνήσεται
15 τῷ ἀπὸ ἀσυνμέτρου ἑαυτῇ. καὶ εἰ μὲν ἡ ΓA σύμμετρός ἐστι τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ μήκει, καὶ ἡ ZK εἰ δὲ ἡ $B A$, καὶ ἡ KE εἰ δὲ οὐδετέρᾳ τῶν ΓA , ΔB , καὶ οὐδετέρᾳ τῶν ZK , KE ὥστε ἀποτομὴ ἐστὶν ἡ
20 ZE , ἣς τὰ ὀνόματα τὰ ZK , KE σύμμετρά ἐστι τοῖς τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων ὀνόμασι τοῖς ΓA , ΔB καὶ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, καὶ τὴν αὐτὴν τάξιν ἔχει τῇ $B \Gamma$. ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

ριγ'.

Τὸ ἀπὸ ῥητῆς παρὰ ἀποτομὴν παραβαλλό-
25 μενον πλάτος ποιεῖ τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων, ἣς

1. KE ἄρα LBF. 2. Post KE add. καὶ σύμμετρός τῇ $B A$ μήκει LBFb. ἐστὶν ἄρα V. ἐστὶν LPB. 3. ZK] (prius) KZ BFB (de L non liquet). Deinde add. καὶ σύμμετρός τῇ ΓA μήκει LBFb. ῥηταὶ εἰσὶν L, ῥηταὶ εἰσὶ BFB. εἰσὶ] om. LBFb. 4. EZ] ZE in ras. V. 6. τῷ] supra scr. m. rec. V. συμμέτρου V, sed corr. 8. ἀσυνμέτρου L, et V, sed ἀ-eras. ἑαυτῇ] om. P. ZK] KZ B. 11. $B A$] mut. in ΔB V, ΔB b. οὐδετέρᾳ P. 12. καὶ — 13. ΔB] mg. m. 2 F. 12. οὐδετέρᾳ P. KE] E in ras. m. 1 P. 13.

commensurabiles sunt [prop. XI]. uerum KE rationalis est; itaque etiam ZK rationalis est. itaque ZK , KE rationales sunt potentia tantum commensurabiles. ergo EZ apotome est [prop. LXXIII].

Iam ΓA^2 excedit ΔB^2 quadrato rectae aut sibi commensurabilis aut incommensurabilis.

si igitur ΓA^2 excedit ΔB^2 quadrato rectae commensurabilis, etiam ZK^2 excedit KE^2 quadrato rectae sibi commensurabilis [prop. XIV]. et siue ΓA rationali propositae longitudine commensurabilis est, etiam ZK ei commensurabilis est [prop. XI, XII], siue $B\Delta$, etiam KE [prop. XII], siue neutra rectarum ΓA , ΔB , neutra rectarum ZK , KE . sin ΓA^2 excedit ΔB^2 quadrato rectae sibi incommensurabilis, etiam ZK^2 excedit KE^2 quadrato rectae sibi incommensurabilis [prop. XIV]. et siue ΓA rationali propositae longitudine commensurabilis est, etiam ZK ei commensurabilis est, siue $B\Delta$, etiam KE , siue neutra rectarum ΓA , ΔB , neutra rectarum ZK , KE . ergo ZE apotome est, cuius nomina ZK , KE nominibus ΓA , ΔB rectae ex duobus nominibus commensurabilia sunt et in eadem proportionem, et eundem ordinem habet ac $B\Gamma$ [deff. alt. et tert.]; quod erat demonstrandum.

CXIII.

Quadratum rectae rationalis apotomae adplicatum latitudinem efficit rectam ex duobus nominibus, cuius

ΔB] $B\Delta$? L. 14. καί — 15. ἐαντι] om. P, mg. m. 2 V.
 16. ἐστιν L. Ante ZK eras. H V. 17. οὐδετέρα V. 18.
 οὐδετέρα PVφ (non F). ὥστε] -ε in ras. V. 19. τὰ] (alt.)
 om. P, m. 2 V. ἐστιν L. 20. ἐκ] ἐκ τῶν V. ὀνόμασιν
 LPBF. 21. ἔχει τὰξιν LBFb. $B\Gamma$] BB P. 23. ἐγ']
 PL, εἰβ' F, εἰδ' b, εἰε' BV. 24. παρὰ] ἀρὰ L.


τὰ ὀνόματα σύμμετρά ἐστι τοῖς τῆς ἀποτομῆς ὀνόμασι καὶ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, ἐτι δὲ ἡ γινομένη ἐκ δύο ὀνομάτων τὴν αὐτὴν τάξιν ἔχει τῇ ἀποτομῇ.

5 Ἐστω φητὴ μὲν ἡ A , ἀποτομὴ δὲ ἡ $B\Delta$, καὶ τῷ ἀπὸ τῆς A ἴσον ἔστω τὸ ὑπὸ τῶν $B\Delta$, $K\Theta$, ὥστε τὸ ἀπὸ τῆς A φητῆς παρὰ τὴν $B\Delta$ ἀποτομὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ τὴν $K\Theta$. λέγω, ὅτι ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶν ἡ $K\Theta$, ἥς τὰ ὀνόματα σύμμετρά ἐστι
10 τοῖς τῆς $B\Delta$ ὀνόμασι καὶ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, καὶ ἐτι ἡ $K\Theta$ τὴν αὐτὴν ἔχει τάξιν τῇ $B\Delta$.

Ἐστω γὰρ τῇ $B\Delta$ προσαρμόζουσα ἡ $\Delta\Gamma$. αἱ $B\Gamma$, $\Gamma\Delta$ ἄρα φηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι. καὶ τῷ ἀπὸ τῆς A ἴσον ἔστω καὶ τὸ ὑπὸ τῶν $B\Gamma$, H . φητὸν
15 δὲ τὸ ἀπὸ τῆς A φητὸν ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ τῶν $B\Gamma$, H . καὶ παρὰ φητὴν τὴν $B\Gamma$ παραβέβληται· φητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ H καὶ σύμμετρος τῇ $B\Gamma$ μήκει. ἐπεὶ οὖν τὸ ὑπὸ τῶν $B\Gamma$, H ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν $B\Delta$, $K\Theta$, ἀνάλογον ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ ΓB πρὸς $B\Delta$, οὕτως ἡ $K\Theta$ πρὸς H .
20 μείζων δὲ ἡ $B\Gamma$ τῆς $B\Delta$ · μείζων ἄρα καὶ ἡ $K\Theta$ τῆς H . κείσθω τῇ H ἴση ἡ KE . σύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ KE τῇ $B\Gamma$ μήκει. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ ΓB πρὸς $B\Delta$, οὕτως ἡ ΘK πρὸς KE , ἀναστρέψαντι ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ $B\Gamma$ πρὸς τὴν $\Gamma\Delta$, οὕτως ἡ $K\Theta$ πρὸς ΘE . γερονέτω
25 ὡς ἡ $K\Theta$ πρὸς ΘE , οὕτως ἡ ΘZ πρὸς ZE . καὶ λοιπὴ

1. ἐστὶν L. 2. ὀνόμασιν PLBF. γιγνομένη LBb, γε-
νομένη PVφ. 3. ἔχει] supra add. ξ m. 2 B. 6. A] AB b.
ὥστε] -ε in ras. V. 7. $B\Delta$] ΔB φ. 8. ποιεῖν LFB, e
corr. m. 1 B. 9. ἐτι] ἐστὶν L. 10. ὀνό-
μασιν PLBF. ἐτι] ὅτι LBFb. 11. ἔξει LB. 13. εἰσιν L.
14. καί] om. LBFVb. 15. H] m. 2 F. 18. ἐστὶν PV,
om. LBFb. 19. ΓB] $B\Gamma$ PV. 20. τῆς] (prius) πρὸς b.

nomina nominibus apotomes commensurabilia sunt et in eadem proportionem, et praeterea recta ex duobus nominibus ita orta eundem ordinem habet atque apotome.



Sit A rationalis, $B\Delta$ autem apotome, et sit $B\Delta \times K\Theta = A^2$, ita ut quadratum rectae rationalis A apotomae $B\Delta$ adplicatum latitudinem efficiat $K\Theta$. dico, $K\Theta$ ex duobus nominibus esse, cuius nomina nominibus rectae $B\Delta$ commensurabilia sint et in eadem proportionem, et praeterea $K\Theta$ eundem ordinem habere ac $B\Delta$.

nam $\Delta\Gamma$ rectae $B\Delta$ congruens sit. itaque $B\Gamma$, $\Gamma\Delta$ rationales sunt potentia tantum commensurabiles [prop. LXXIII]. sit etiam $B\Gamma \times H = A^2$. uerum A^2 rationale est. itaque etiam $B\Gamma \times H$ rationale est. et rationali $B\Gamma$ adplicatum est. itaque H rationalis est et rectae $B\Gamma$ longitudine commensurabilis [prop. XX]. iam quoniam est $B\Gamma \times H = B\Delta \times K\Theta$, erit [VI, 16] $\Gamma B : B\Delta = K\Theta : H$. est autem $B\Gamma > B\Delta$. itaque etiam $K\Theta > H$ [V, 16; V, 14]. ponatur $KE = H$. itaque KE , $B\Gamma$ longitudine commensurabiles sunt. et quoniam est $\Gamma B : B\Delta = \Theta K : KE$, conuertendo [V, 19 coroll.] est $B\Gamma : \Gamma\Delta = K\Theta : \Theta E$. fiat $K\Theta : \Theta E = \Theta Z : ZE$. itaque etiam $KZ : Z\Theta = K\Theta : \Theta E = B\Gamma : \Gamma\Delta$ [V, 19]. uerum $B\Gamma$, $\Gamma\Delta$ potentia tantum commensurabiles sunt. itaque etiam KZ , $Z\Theta$ potentia tantum commensura-

$\alpha\alpha$ $\delta\epsilon\tau\iota$ BFb. 21. KE] e corr. V, EK P. 22. $\tau\eta\upsilon$ $B\Delta$ BFb. 23. $\tau\eta\upsilon$ KE BFb. 25. $K\Theta$] corr. ex. KH m. 2 F.

ἄρα ἡ KZ πρὸς $Z\Theta$ ἐστίν, ὥς ἡ $K\Theta$ πρὸς ΘE , τουτ-
 ἐστίν [ὥς] ἡ $B\Gamma$ πρὸς $\Gamma\Delta$. αἱ δὲ $B\Gamma$, $\Gamma\Delta$ δυνάμει
 μόνον [εἰσὶ] σύμμετροι· καὶ αἱ KZ , $Z\Theta$ ἄρα δυνάμει
 μόνον εἰσὶ σύμμετροι. καὶ ἐπεὶ ἐστίν ὥς ἡ $K\Theta$ πρὸς
 5 ΘE , ἡ KZ πρὸς $Z\Theta$, ἀλλ' ὥς ἡ $K\Theta$ πρὸς ΘE , ἡ ΘZ
 πρὸς ZE , καὶ ὥς ἄρα ἡ KZ πρὸς $Z\Theta$, ἡ ΘZ πρὸς
 ZE . ὥστε καὶ ὥς ἡ πρώτη πρὸς τὴν τρίτην, τὸ ἀπὸ
 τῆς πρώτης πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς δευτέρας· καὶ ὥς ἄρα ἡ
 KZ πρὸς ZE , οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς KZ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς
 10 $Z\Theta$. σύμμετρον δὲ ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς KZ τῷ ἀπὸ τῆς
 $Z\Theta$. αἱ γὰρ KZ , $Z\Theta$ δυνάμει εἰσὶ σύμμετροι· σύμ-
 μετρος ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ KZ τῇ ZE μήκει· ὥστε ἡ KZ
 καὶ τῇ KE σύμμετρος [ἐστὶ] μήκει. ῥητὴ δὲ ἐστίν ἡ
 KE καὶ σύμμετρος τῇ $B\Gamma$ μήκει· ῥητὴ ἄρα καὶ ἡ
 15 KZ καὶ σύμμετρος τῇ $B\Gamma$ μήκει. καὶ ἐπεὶ ἐστίν ὥς
 ἡ $B\Gamma$ πρὸς $\Gamma\Delta$, οὕτως ἡ KZ πρὸς $Z\Theta$, ἐναλλάξ ὥς
 ἡ $B\Gamma$ πρὸς KZ , οὕτως ἡ $\Delta\Gamma$ πρὸς $Z\Theta$. σύμμετρος
 δὲ ἡ $B\Gamma$ τῇ KZ · σύμμετρος ἄρα καὶ ἡ $Z\Theta$ τῇ $\Gamma\Delta$
 μήκει. αἱ $B\Gamma$, $\Gamma\Delta$ δὲ ῥηταὶ εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμ-
 20 μετροι· καὶ αἱ KZ , $Z\Theta$ ἄρα ῥηταὶ εἰσὶ δυνάμει μόνον
 σύμμετροι· ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶν ἄρα ἡ $K\Theta$.

Εἰ μὲν οὖν ἡ $B\Gamma$ τῆς $\Gamma\Delta$ μείζον δύνανται τῷ ἀπὸ
 συμμέτρου ἐαυτῇ, καὶ ἡ KZ τῆς $Z\Theta$ μείζον δυνήσεται
 τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἐαυτῇ. καὶ εἰ μὲν σύμμετρος ἐστίν
 25 ἡ $B\Gamma$ τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ μήκει, καὶ ἡ KZ , εἰ δὲ ἡ

1. $Z\Theta$] ΘZ F et in ras. V. ΘE] corr. ex ZE V. τουτ-
 ἐστίν — 2. πρὸς] in ras. V. 2. ὥς] om. P, supra scr. V.
 δέ] om. BF. $\Gamma\Delta$] $\Gamma\Delta$, ΔE BF. 3. εἰσὶ] om. PV. σύμ-
 μετροι — 4. εἰσὶ] mg. m. 2 B. 3. KZ] ZK P. 5. $Z\Theta$] ΘZ in ras. V. ΘZ] in ras. m. rec. B. 6. $Z\Theta$] in ras. m.
 rec. B, " ΘZ b. οὕτως ἡ B. ΘZ] $Z\Theta$ b. 7. ZE] EZ F.
 ὥστε] -ε in ras. V. ὥς] m. 2 F. οὕτως τὸ BFb. 8.
 πρώτης] eras. F. πρὸς — δευτέρας] mg. m. 2 F. 9. ZE]

biles sunt [prop. XI]. et quoniam est $K\Theta:\Theta E = KZ:ZE$,
 $K\Theta:\Theta E = \Theta Z:ZE$, erit etiam

$$KZ:Z\Theta = \Theta Z:ZE.$$

quare etiam ut primum ad tertium, ita quadratum
 primi ad quadratum secundi [V def. 9]. itaque etiam
 $KZ:ZE = KZ^2:Z\Theta^2$. uerum KZ^2 , $Z\Theta^2$ commensu-
 rabilia sunt; nam KZ , $Z\Theta$ potentia commensurabiles
 sunt. itaque etiam KZ , ZE longitudine commensu-
 rabiles sunt [prop. XI]. quare etiam KZ , KE longi-
 tudine commensurabiles sunt [prop. XV]. KE autem
 rationalis est et rectae $B\Gamma$ longitudine commensura-
 bilis. itaque etiam KZ rationalis est et rectae $B\Gamma$
 longitudine commensurabilis [prop. XII]. et quoniam
 est $B\Gamma:\Gamma\Delta = KZ:Z\Theta$, permutando [V, 16] est
 $B\Gamma:KZ = \Delta\Gamma:Z\Theta$. uerum $B\Gamma$, KZ commensura-
 biles sunt. itaque etiam $Z\Theta$, $\Delta\Gamma$ longitudine com-
 mensurabiles sunt [prop. XI]. $B\Gamma$, $\Gamma\Delta$ autem ratio-
 nales sunt potentia tantum commensurabiles. itaque
 etiam KZ , $Z\Theta$ rationales sunt [def. 3] potentia tantum
 commensurabiles [prop. XIII]. ergo $K\Theta$ ex duobus
 nominibus est [prop. XXXVI].

Iam si $B\Gamma^2$ excedit $\Gamma\Delta^2$ quadrato rectae sibi com-
 mensurabilis, etiam KZ^2 excedit $Z\Theta^2$ quadrato rectae
 sibi commensurabilis [prop. XIV]. et siue $B\Gamma$ rationali
 propositae longitudine commensurabilis est, etiam KZ

corr. ex $Z\Theta$ P. 11. γάρ] ἄρα B. 12. τῇ] τῆς Vb. ὥστε]
 -e in ras. V, ὥστε καὶ b. 13. ἐστὶ] om. PV. 14. ἀσύμ-
 μετρος b. 16. πρόσ] (prius) bis b. 17. οὕτως — 18. KZ]
 bis F. 17. $\Delta\Gamma$] $\Gamma\Delta$ P. 18. $Z\Theta$] in ras. V, ΘZ P. $\Gamma\Delta$]
 in ras. V, $\Delta\Gamma$ P. 19. αὐ] αὐ δέ V. δέ] om. FV, ΔE Bb.
 20. καὶ — 21. $K\Theta$] mg. m. 1 V. 20. KZ] $K\Theta$ B. 21.
 δύο ἄρα Bfb. ἄρα] om. Bfb. 22. $\Gamma\Delta$] $B\Delta$ Pfb et B
 eras. V. 23. ἀσύμμετρον F, sed corr. 24. ἀσύμμετρον P.

$\Gamma\Delta$ σύμμετρός ἐστι τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ μήκει, καὶ ἡ $Z\Theta$, εἰ δὲ οὐδετέρα τῶν $B\Gamma$, $\Gamma\Delta$, οὐδετέρα τῶν KZ , $Z\Theta$.

Εἰ δὲ ἡ $B\Gamma$ τῆς $\Gamma\Delta$ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ
 5 ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ, καὶ ἡ KZ τῆς $Z\Theta$ μείζον δυνή-
 σεται τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ. καὶ εἰ μὲν σύμμετρός
 ἐστὶν ἡ $B\Gamma$ τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ μήκει, καὶ ἡ KZ , εἰ
 δὲ ἡ $\Gamma\Delta$, καὶ ἡ $Z\Theta$, εἰ δὲ οὐδετέρα τῶν $B\Gamma$, $\Gamma\Delta$,
 οὐδετέρα τῶν KZ , $Z\Theta$.

10 Ἐκ δύο ἄρα ὀνομάτων ἐστὶν ἡ $K\Theta$, ἥς τὰ ὀνόματα
 τὰ KZ , $Z\Theta$ σύμμετρά [ἐστι] τοῖς τῆς ἀποτομῆς ὀνό-
 μασι τοῖς $B\Gamma$, $\Gamma\Delta$ καὶ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, καὶ ἔτι ἡ
 $K\Theta$ τῇ $B\Gamma$ τὴν αὐτὴν ἔξει τάξιν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

ριδ'.

15 Ἐὰν χωρίον περιέχεται ὑπὸ ἀποτομῆς καὶ
 τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων, ἥς τὰ ὀνόματα σύμ-
 μετρά τέ ἐστι τοῖς τῆς ἀποτομῆς ὀνόμασι καὶ
 ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, ἡ τὸ χωρίον δυναμένη ῥητὴ
 ἐστὶν.

20 Περιεχέσθω γὰρ χωρίον τὸ ὑπὸ τῶν AB , $\Gamma\Delta$ ὑπὸ
 ἀποτομῆς τῆς AB καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων τῆς $\Gamma\Delta$,
 ἥς μείζον ὄνομα ἔστω τὸ ΓE , καὶ ἔστω τὰ ὀνόματα
 τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων τὰ ΓE , $E\Delta$ σύμμετρά τε τοῖς
 τῆς ἀποτομῆς ὀνόμασι τοῖς AZ , ZB καὶ ἐν τῷ αὐτῷ

1. $\Gamma\Delta$] $\Delta\Gamma B$ et e corr. V. 2. $B\Gamma$ — τῶν] postea add.
 m. 1 P. Post $\Gamma\Delta$ add. καὶ b, m. 2 F. 4. δύνηται Bb.
 5. συμμέτρου V, sed. corr. KZ] Z e corr. V, $K\Delta$ P. $Z\Theta$]
 ΘZ in ras. V. 6. συμμέτρου V, sed corr. 7. ἐστὶν] m.
 2 F. 8. $Z\Theta$] ΘZ F. $\Gamma\Delta$ καὶ b. 11. σύμμετα B. ἐστι]
 om. P, supra scr. V. ὀνόμασιν B. 13. $B\Gamma$] $B\Delta$ P Fb.
 ὅπερ ἔδει δεῖξαι] om. B Fb. 14. ριε' b et e corr. F,
 ρις' BV. 17. τε] om. B FV. ὀνόμασιν P Fb. 19. ἐστι

ei commensurabilis est [prop. XII], siue ΓA rationali propositae longitudine commensurabilis est, etiam $Z\Theta$ ei commensurabilis est [id.], siue neutra rectarum $B\Gamma$, ΓA , etiam neutra rectarum KZ , $Z\Theta$ [prop. XIII]. sin $B\Gamma^2$ excedit ΓA^2 quadrato rectae sibi incommensurabilis, etiam KZ^2 excedit $Z\Theta^2$ quadrato rectae sibi incommensurabilis [prop. XIV]. et siue $B\Gamma$ rationali propositae longitudine commensurabilis est, etiam KZ ei commensurabilis est, siue ΓA , etiam $Z\Theta$ [prop. XII], siue neutra rectarum $B\Gamma$, ΓA , neutra rectarum KZ , $Z\Theta$.

Ergo $K\Theta$ ex duobus nominibus est, cuius nomina KZ , $Z\Theta$ nominibus apotomes $B\Gamma$, ΓA commensurabilia sunt et in eadem proportionem, et praeterea $K\Theta$ eundem ordinem habet ac $B\Gamma$ [cfr. deff. alt. et tert.]; quod erat demonstrandum.

CXIV.

Si spatium comprehenditur apotome et recta ex duobus nominibus, cuius nomina nominibus apotomes et commensurabilia sunt et in eadem proportionem,

recta spatio aequalis quadrata rationalis est.

Spatium enim $AB \times \Gamma A$ comprehendatur apotome AB et recta ex duobus nominibus ΓA , cuius nomen maius sit ΓE , et ΓE , $E A$ nomina rectae ex duobus nominibus nominibus

apotomes AZ , ZB et commensurabilia sint et in eadem

B, comp. FVb.

(prius) $\xi\sigma\tau\iota$ BFb.

24. $\acute{o}\nu\acute{o}\mu\alpha\sigma\iota\nu$ B.

20. $\gamma\acute{\alpha}\rho$] corr. ex $\tau\acute{o}$ m. 1 V.

23. $E A$] A e corr. m. 1 b.

22. $\xi\sigma\tau\omega$]

$\tau\epsilon$] m. 2 B.

λόγῳ, καὶ ἔστω ἡ τὸ ὑπὸ τῶν $AB, \Gamma A$ δυναμένη ἡ H · λέγω, ὅτι ῥητὴ ἔστιν ἡ H .

Ἐκκείσθω γὰρ ῥητὴ ἡ Θ , καὶ τῷ ἀπὸ τῆς Θ ἴσον παρὰ τὴν ΓA παραβεβλήσθω πλάτος ποιοῦν τὴν KA .
 5 ἀποτομὴ ἄρα ἐστὶν ἡ KA , ἥς τὰ ὀνόματα ἔστω τὰ KM, MA σύμμετρα τοῖς τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων ὀνόμασι τοῖς GE, EA καὶ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ· ἀλλὰ καὶ αἱ GE, EA σύμμετροί τε εἰσι ταῖς AZ, ZB καὶ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ AZ πρὸς τὴν ZB ,
 10 οὕτως ἡ KM πρὸς MA . ἐναλλάξ ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ AZ πρὸς τὴν KM , οὕτως ἡ BZ πρὸς τὴν AM · καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ AB πρὸς λοιπὴν τὴν KA ἐστὶν ὡς ἡ AZ πρὸς KM . σύμμετρος δὲ ἡ AZ τῇ KM · σύμμετρος ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ AB τῇ KA . καὶ ἐστὶν ὡς ἡ AB πρὸς
 15 KA , οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν $\Gamma A, AB$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $\Gamma A, KA$ · σύμμετρον ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ ὑπο τῶν $\Gamma A, AB$ τῷ ὑπὸ τῶν $\Gamma A, KA$. ἴσον δὲ τὸ ὑπὸ τῶν $\Gamma A, KA$ τῷ ἀπὸ τῆς Θ · σύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν $\Gamma A, AB$ τῷ ἀπὸ τῆς Θ . τῷ δὲ ὑπὸ τῶν $\Gamma A, AB$ ἴσον ἐστὶ τὸ
 20 ἀπὸ τῆς H · σύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς H τῷ ἀπὸ τῆς Θ .] ῥητὸν δὲ τὸ ἀπὸ τῆς Θ · ῥητὸν ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς H · ῥητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ H . καὶ δύναται τὸ ὑπὸ τῶν $\Gamma A, AB$.

Ἐὰν ἄρα χωρίον περιέχῃται ὑπὸ ἀποτομῆς καὶ τῆς
 25 ἐκ δύο ὀνομάτων, ἥς τὰ ὀνόματα σύμμετρά ἐστι τοῖς τῆς ἀποτομῆς ὀνόμασι καὶ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, ἡ τὸ χωρίον δυναμένη ῥητὴ ἔστιν.

1. ἡ] om. BFb. ἡ] e corr. V. H] HA b. 3. Θ] (prius) B Θ F. 4. τῇν] (prius) m. 2 F. 6. τῆς ἐκ] ἐκ τῶν V. 7. ἀλλά — 9. λόγῳ] mg. m. 1 F. 8. τοῖς b. 9. AZ] corr. ex AG V. 11. BZ] ZB B. 12. ἡ] (prius) post ras. 1 litt. F. 13. πρὸς — AZ] om. F. τὴν KM BFb.

proportione, et sit $H^2 = AB \times \Gamma A$. dico, H rationalem esse.

ponatur enim rationalis Θ , et spatium quadrato Θ^2 aequale rectae ΓA adplicetur latitudinem efficiens KA . itaque KA apotome est, cuius nomina sint KM , MA commensurabilia ΓE , EA nominibus rectae ex duobus nominibus et in eadem proportionem [prop. XCII]. uerum ΓE , EA etiam rectis AZ , ZB et commensurabilia sunt et in eadem proportionem. itaque $AZ:ZB = KM:MA$. quare permutando [V, 16] $AZ:KM = BZ:AM$. itaque etiam $AB:KA = AZ:KM$ [V, 19]. uerum AZ , KM commensurabiles sunt [prop. XII]. itaque etiam AB , KA commensurabiles sunt [prop. XI]. est autem $AB:KA = \Gamma A \times AB:\Gamma A \times KA$ [VI, 1]. itaque etiam $\Gamma A \times AB$ et $\Gamma A \times KA$ commensurabilia sunt [prop. IX]. uerum $\Gamma A \times KA = \Theta^2$. itaque $\Gamma A \times AB$ et Θ^2 commensurabilia sunt. est autem $H^2 = \Gamma A \times AB$. quare H^2 , Θ^2 commensurabilia sunt. uerum Θ^2 rationale est. itaque etiam H^2 rationale est. quare H rationalis est; et spatio $\Gamma A \times AB$ aequalis est quadrata.

Ergo si spatium comprehenditur apotome et recta ex duobus nominibus, cuius nomina nominibus apotomes et commensurabilia sunt et in eadem proportionem, recta spatio aequalis quadrata rationalis est.

14. *ἐστίν* B. *AB*] *KM* σύμμετρος ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ *AB* φ (et F?). 15. *τὴν KA* BFb. *οὕτω* B. *ΓA*] ante lacunam 2 litt. F. *AΓ* b. *AB*] *AB* b. *πρὸς τὸ*] om. φ. 16. *τό*] m. 2 V. 17. *τῶν*] (prius) om. P. 18. *Θ*] *ΘZ* B, sed corr. 19. *ἀπό*] corr. ex *ὀπό* m. 2 F. *τῶ*] corr. ex *τό* m. 1 F. *τό*] corr. ex *τῶ* m. 1 F. 20. *τό*] καὶ *τό* BFb. 22. *φῆτῇ*] corr. ex *φῆτόν* V. 25. *ἐστίν* P. 26. *ὀνόμασιν* PB. 27. *ἐστι* BV, comp. Fb. Deinde add. *ὅπερ εἶδει δεῖξαι* F.

Πόρισμα.

Καὶ γέρονεν ἡμῖν καὶ διὰ τούτου φανερόν, ὅτι
δυνατόν ἐστι ρητὸν χωρίον ὑπὸ ἀλόγων εὐθειῶν περι-
έχεσθαι. ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

5

ριε'.

Ἀπὸ μέσης ἄπειροι ἄλογοι γίνονται, καὶ
οὐδεμία οὐδεμιᾶ τῶν πρότερον ἢ αὐτή.

Ἔστω μέση ἢ *A*. λέγω, ὅτι ἀπὸ τῆς *A* ἄπειροι
ἄλογοι γίνονται, καὶ οὐδεμία οὐδεμιᾶ τῶν πρότερον
10 ἢ αὐτή.

Ἐκκείσθω ρητὴ ἢ *B*, καὶ τῷ ὑπὸ τῶν *B*, *A* ἴσον
ἔστω τὸ ἀπὸ τῆς *Γ* ἄλογος ἄρα ἐστὶν ἢ *Γ*. τὸ γὰρ
ὑπὸ ἀλόγου καὶ ρητῆς ἄλογόν ἐστίν. καὶ οὐδεμιᾶ τῶν
πρότερον ἢ αὐτή· τὸ γὰρ ἀπ' οὐδεμιᾶς τῶν πρότερον
15 παρὰ ρητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ μέσην. πάλιν
δὴ τῷ ὑπὸ τῶν *B*, *Γ* ἴσον ἔστω τὸ ἀπὸ τῆς *Δ*. ἄλογον
ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς *Δ*. ἄλογος ἄρα ἐστὶν ἢ *Δ*. καὶ
οὐδεμιᾶ τῶν πρότερον ἢ αὐτή· τὸ γὰρ ἀπ' οὐδεμιᾶς
τῶν πρότερον παρὰ ρητὴν παραβαλλόμενον πλάτος
20 ποιεῖ τὴν *Γ*. ὁμοίως δὴ τῆς τοιαύτης τάξεως ἐπ' ἄπειρον
προβαινούσης φανερόν, ὅτι ἀπὸ τῆς μέσης ἄπειροι
ἄλογοι γίνονται, καὶ οὐδεμία οὐδεμιᾶ τῶν πρότερον
ἢ αὐτή· ὅπερ ἔδει δεῖξαι].

1. πόρισμα] mg. PV, om. BFb. 4. ὅπερ ἔδει δεῖξαι]
om. BFb. 5. ριε'] om. V, ρις' b et corr. ex ριδ' F, ριζ' B.

6. γίνονται B, γ supra add. m. 1 P. 7. οὐδεμία] om.
PFVb. Post πρότερον add. δεκατριῶν ἀλόγων m. rec. F.

9. γίνονται PFB. οὐδεμία] om. PFVb. 10. ἢ] ἐστίν ἢ BF.

11. Ante B ras. 1 litt. B. B, A] A, B F. 12. ἔστω] m. 2 F.
τό] (prius) τῷ F. 13. ἐστὶ PFB, comp. FVb. 14. ἀπὸ B.

16. ἄλογον — 17. Δ (prius)] om. FV. 17. ἐστὶν P. τό — ἐστὶν]
om. P. ἄλογος — 18. αὐτή] in ras. m. 1 F. 18. ἀπὸ B.

Corollarium.

Et hinc quoque nobis adparuit, fieri posse, ut spatium rationale rectis irrationalibus comprehendatur. — quod erat demonstrandum.

CXV.

A media irrationales infinitae multitudinis oriuntur, et nulla eadem est atque ulla priorum.

Sit A media. dico, ab A irrationales infinitae multitudinis oriri et nullam eandem esse atque ullam priorum.

ponatur rationalis B , et sit $\Gamma^2 = B \times A$. itaque Γ irrationalis est [def. 4]; nam spatium recta irrationali et rationali comprehensum
 A —————
 B —————
 Γ —————
 A —————
 irrationalis est [prop. XX]. nec eadem est atque ulla priorum; neque enim ullius priorum quadratum rectae rationali adplicatum latitudinem efficit mediam. rursus sit $\Delta^2 = B \times \Gamma$. itaque Δ irrationale est [prop. XX]. quare Δ irrationalis est [def. 4]. nec eadem est atque ulla priorum; neque enim ullius priorum quadratum rectae rationali adplicatum latitudinem efficit Γ . iam hac ordinatione similiter in infinitum progrediente adparet, a media irrationales infinitae multitudinis oriri, et nullam eandem esse atque ullam priorum; quod erat demonstrandum.

20. τῆς τοιαύτης τοῖς τῆς αὐτῆς φ. 21. προβαίνουσαι B, corr. m. 2. 22. γίνονται B. οὐδεμία] om. PFVb. 23. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] om. BFb, comp. P. Seq. additamenta quaedam, u. app. In fine libri Εὐκλείδου στοιχείων ἰ P, τέλος τοῦ ἰ τῶν Εὐκλείδου στοιχείων m. 2 B, τέλος τοῦ ἰ τῶν Εὐκλείδου στοιχείων τῆς Θέωνος ἐκδόσεως F, Εὐκλείδου λόγος ἰ τῆς Θέωνος ἐκδόσεως b.

APPENDIX.

1.

Ad libr. X prop. 1.

Ἄλλως τὸ α' θεώρημα.

Ἐκκείσθω δύο μεγέθη ἄνισα τὰ AB , Γ · καὶ ἐπεὶ
 ἐλασσὸν ἐστὶ τὸ Γ , πολλαπλασιαζόμενον ἐστὶ ποτὲ τοῦ
 AB μεγέθους μείζον. γερονέτω ὥς τὸ ZM καὶ διη-
 5 ρήσθω εἰς [τὰ] ἴσα τῷ Γ , καὶ ἔστω τὰ $M\Theta$, ΘH , HZ ,
 καὶ ἀπὸ τοῦ AB ἀφρηρήσθω μείζον ἢ τὸ ἥμισυ τὸ
 BE , καὶ ἀπὸ τοῦ EA μείζον ἢ τὸ ἥμισυ τὸ EA , καὶ
 τοῦτο αὖτε γινέσθω, ἕως αἱ ἐν τῷ ZM διαιρέσεις ἴσαι
 γένωνται ταῖς ἐν τῷ AB διαιρέσεσιν. γερονέτωσαν
 10 ὥς αἱ BE , EA , AA , καὶ τῷ AA ἕκαστον τῶν KA ,
 AN , $N\Xi$ ἔστω ἴσον, καὶ τοῦτο γινέσθω, ἕως αἱ διαι-
 ρέσεις τοῦ $K\Xi$ ἴσαι γένωνται ταῖς τοῦ ZM .

Καὶ ἐπεὶ τὸ BE μείζον ἢ τὸ ἥμισυ ἐστὶ τοῦ BA ,
 τὸ BE μείζον ἐστὶ τοῦ EA · πολλῷ ἄρα μείζον ἐστὶ
 15 τοῦ AA . ἀλλὰ τὸ AA ἴσον ἐστὶ τῷ ΞN · τὸ BE ἄρα
 μείζον ἐστὶ τοῦ $N\Xi$. πάλιν, ἐπεὶ τὸ EA μείζον ἢ τὸ
 ἥμισυ ἐστὶ τοῦ EA , μείζον ἐστὶ τοῦ AA . ἀλλὰ τὸ
 AA ἐστὶν ἴσον τῷ NA · τὸ EA ἄρα μείζον ἐστὶ τοῦ

1. Post ἀφαιρούμενα p. 6, 10 habent B F V b, mg. m. 1
 postea add. P.

1. τὸ α' θεώρημα] om. V, τὸ αὐτό B F b (mg. α B). 2.
 κείσθω V. 3. ἔλαττον F. 5. τὰ] (prius) om. P. Γ] corr.
 ex $A B$. καὶ ἔστω] om. F V b. HZ] $I Z$ F. 6. ἦ] m.
 2 P. 7. BE] in ras. V. καί — EA] mg. m. 2 V. EA]

1.

Ad libr. X prop. 1.

Aliter primum theorema.

Ponantur duae magnitudines inaequales AB , Γ .
et quoniam est $\Gamma < AB$, multiplicata aliquando Γ

maior erit magnitudine AB . fiat
 ZM et in partes magnitudini Γ
aequales diuidatur, et sint $M\Theta$,
 ΘH , HZ , et ab AB auferatur
 BE maior dimidia et ab EA

maior dimidia EA , et hoc semper deinceps fiat, donec
diuisiones rectae ZM diuisionibus rectae AB numero
aequales sint. sint BE , EA , AA , et sit

$$KA = AN = N\Xi = AA,$$

et hoc fiat, donec diuisiones magnitudinis $K\Xi$ diui-
sionibus rectae ZM numero aequales sint.

et quoniam $BE > \frac{1}{2}BA$, erit $BE > EA$. itaque
multo magis $BE > AA$. uerum $AA = \Xi N$. itaque
 $BE > N\Xi$. rursus quoniam $EA > \frac{1}{2}EA$, erit $EA > AA$.
uerum $AA = NA$. itaque $EA > NA$. itaque tota

AE P. 8. $\acute{\alpha}\epsilon\iota$] om. BFVb. $\gamma\iota\gamma\nu\acute{\epsilon}\sigma\theta\omega$ F. 9. $\delta\iota\alpha\iota\rho\acute{\iota}\sigma\epsilon\sigma\iota$
BFVb. 10. $\tau\acute{\omega}$] corr. ex $\tau\acute{o}$ m. 2 V. 11. $\gamma\iota\gamma\nu\acute{\epsilon}\sigma\theta\omega$ φ . $\xi\omega\varsigma$] $\xi\omega\varsigma$ $\acute{\alpha}\nu$ V φ . $\acute{\alpha}\iota$] om. φ . 12. $\gamma\acute{\epsilon}\nu\omicron\upsilon\tau\alpha\iota$ P φ . $\tau\alpha\iota\varsigma$] $\epsilon\iota\varsigma$
 $\tau\acute{\alpha}\varsigma$ φ . 13. BA] corr. ex AB m. 2 V. 14. $\tau\acute{o}$] $\tau\acute{o}$ $\delta\acute{\epsilon}$ B,
 $\tau\acute{o}\upsilon$ φ . $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$] (prius) om. F. 16. $\tau\acute{o}\upsilon$ — $\mu\epsilon\iota\zeta\omicron\nu$] om. B.
17. $\tau\acute{o}\upsilon$ AA — 18. $\acute{\iota}\sigma\omicron\nu$] $\tau\acute{o}$ EA — $\mu\epsilon\iota\zeta\omicron\nu$ $\delta\acute{\epsilon}$ $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ $\tau\acute{o}$ AA φ .
18. $\acute{\iota}\sigma\omicron\nu$ $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota$ Vb. EA] in ras. V.

NA . ὅλον ἄρα τὸ AB μείζον ἐστὶ τοῦ ΞA . ἴσον
 δὲ τὸ AA τῷ AK . ὅλον ἄρα τὸ BA μείζον ἐστὶ
 τοῦ ΞK . ἀλλὰ τοῦ BA μείζον ἐστὶ τὸ MZ . πολλῶ
 ἄρα τὸ MZ μείζον ἐστὶ τοῦ ΞK . καὶ ἐπεὶ τὰ ΞN ,
 5 NA , AK ἴσα ἀλλήλοις ἐστίν, ἐστὶ δὲ καὶ τὰ $M\Theta$, ΘH ,
 HZ ἴσα ἀλλήλοις, καὶ ἐστὶν ἴσον το πλῆθος τῶν ἐν
 τῷ MZ τῷ πλῆθει τῶν ἐν τῷ ΞK , ἐστὶν ἄρα ὡς τὸ
 KA πρὸς τὸ ZH , οὕτως τὸ $K\Xi$ πρὸς τὸ ZM . μείζον
 δὲ τὸ ZM τοῦ $K\Xi$. μείζον ἄρα καὶ τὸ HZ τοῦ AK .
 10 καὶ ἐστὶ τὸ μὲν ZH ἴσον τῷ Γ , τὸ δὲ KA τῷ AD .
 τὸ Γ ἄρα μείζον ἐστὶ τοῦ AD . ὁπερ ἔδει δεῖξαι.

2.

Ad libr. X prop. 6.

"Ἀλλως τὸ 5'.

Δύο γὰρ μεγέθη τὰ A , B πρὸς ἄλληλα λόγον ἔχτω,
 ὃν ἀριθμὸς ὁ Γ πρὸς ἀριθμὸν τὸν Δ . λέγω, ὅτι σύμ-
 15 μετρά ἐστὶ τὰ μεγέθη.

Ὅσαι γὰρ εἰσὶν ἐν τῷ Γ μονάδες, εἰς τοσαῦτα ἴσα
 διηρήσθω τὸ A , καὶ ἐνὶ αὐτῶν ἴσον ἔστω τὸ E . ἐστὶν
 ἄρα ὡς ἡ μονὰς πρὸς τὸν Γ ἀριθμὸν, τὸ E πρὸς τὸ A .
 ἐστὶ δὲ καὶ ὡς ὁ Γ πρὸς τὸν Δ , τὸ A πρὸς τὸ B .
 20 δι' ἴσον ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ μονὰς πρὸς τὸν Δ , τὸ E
 πρὸς τὸ B . μετρεῖ δὲ καὶ ἡ μονὰς τὸν Δ . μετρεῖ
 ἄρα καὶ τὸ E τὸ B . μετρεῖ δὲ καὶ τὸ E τὸ A , ἐπεὶ
 καὶ ἡ μονὰς τὸν Γ . τὸ E ἄρα ἐκάτερον τῶν A , B

2. Post δεῖξαι p. 22, 2 BFVb, mg. m. 1 P.

1. AB] $B\Delta$ P. 2. τό] (prius) τῷ B. τῷ] τοῦ b. 3.
 τό] corr. ex τοῦ m. 1 F. 4. μείζον ἐστὶ τὸ MZ b. 5. AK]
 KA in ras. V. 6. HZ] ZH F. τῶν ἐν τῷ MZ] m. 2 V.
 7. τῷ] (alt.) ἴσον τῷ PBFb. ΞK] Ξ in ras. V. 8. τό]

$\angle B > \angle A$. est autem $\angle A = \angle K$. itaque tota $BA > \angle K$. uerum $MZ > BA$. itaque multo magis $MZ > \angle K$. et quoniam $\angle N = NA = \angle K$, et $M\Theta = \Theta H = HZ$, et numerus partium rectae MZ numero partium rectae $\angle K$ aequalis est, erit

$$KA : ZH = K\Xi : ZM$$

[V, 15]. est autem $ZM > K\Xi$. itaque etiam $HZ > \angle K$ [V, 14]. et $ZH = \Gamma$, $KA = AA$. ergo $\Gamma > AA$; quod erat demonstrandum.

2.

Ad libr. X prop. 6.

Aliter propositio VI.

Duae enim magnitudines A , B rationem inter se habeant, quam numerus Γ ad numerum A . dico, magnitudines commensurabiles esse.

nam quot sunt in Γ unitates, in totidem partes aequales diuidatur A , et unitates earum aequalis sit E . itaque $1 : \Gamma = E : A$ [V, 15]. uerum etiam $\Gamma : A = A : B$. itaque ex aequo est [V, 22] $1 : A = E : B$. unitas autem A metitur. itaque etiam E magnitudinem B metitur. uerum etiam magnitudinem A metitur E , quoniam unitas numerum Γ metitur. itaque E utramque A , B metitur. ergo A , B commensurabiles sunt, et

(primum) om. F. $K\Xi$ corr. ex $\angle K$ m. 2 V. 10. AA A V e corr. 12. $\tau\acute{o}$ $\tau\acute{o}$ $\alpha\upsilon\tau\acute{o}$ F. 15. $\epsilon\iota\varsigma$ F. 18. $\tau\acute{o}\nu$ A PB. 19. $\tau\acute{o}\nu$ $\tau\acute{o}$ FV, om. b. A B φ . $\tau\acute{o}$ $\tau\acute{o}\nu$ B. B A F. 21. $\tau\acute{o}\nu$ B B. $\kappa\alpha\iota$ om. FV b. A m. 2 F, seq. $\acute{\alpha}\rho\iota\theta\mu\acute{o}\nu$ corr. ex $\acute{\alpha}\rho\iota\theta\mu\acute{o}\varsigma$. 22. $\mu\epsilon\tau\tau\epsilon\iota\delta\acute{\epsilon}$ — $\epsilon\pi\epsilon\iota$ om. PB, $\epsilon\mu\acute{\epsilon}\tau\tau\epsilon\iota$ $\delta\acute{\epsilon}$ $\kappa\alpha\iota$ $\tau\acute{o}$ A , $\epsilon\pi\epsilon\iota$ $\kappa\alpha\iota$ η $\mu\omicron\nu\acute{\alpha}\varsigma$ $\tau\acute{o}\nu$ Γ mg. m. 2 B.

μετρεῖ· τὰ A, B ἄρα σύμμετρά ἐστιν, καὶ ἐστὶν αὐτῶν κοινὸν μέτρον τὸ E · ὅπερ ἔδει δεῖξαι

3.

Ad libr. X prop. 9.

Ἄλλως τὸ Θ' .

Ἐπεὶ γὰρ σύμμετρός ἐστιν ἡ A τῇ B , λόγον ἔχει,
 5 ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν. ἐχέτω, ὃν ὁ Γ πρὸς τὸν
 Δ , καὶ ὁ Γ ἑαυτὸν μὲν πολλαπλασιάσας τὸν E ποιεῖτω,
 ὁ δὲ Γ τὸν Δ πολλαπλασιάσας τὸν Z ποιεῖτω, ὁ δὲ
 Δ ἑαυτὸν πολλαπλασιάσας τὸν H ποιεῖτω. ἐπεὶ οὖν
 ὁ Γ ἑαυτὸν μὲν πολλαπλασιάσας τὸν E πεποίηκεν,
 10 τὸν δὲ Δ πολλαπλασιάσας τὸν Z πεποίηκεν, ἔστιν ἄρα
 ὡς ὁ Γ πρὸς τὸν Δ , τουτέστιν ὡς ἡ A πρὸς τὴν B ,
 [οὕτως] ὁ E πρὸς τὸν Z . ἀλλ' ὡς ἡ A πρὸς τὴν B ,
 οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς A πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν A, B · ἔστιν
 ἄρα ὡς τὸ ἀπὸ τῆς A πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν A, B , οὕτως
 15 ὁ E πρὸς τὸν Z . πάλιν, ἐπεὶ ὁ Δ ἑαυτὸν πολλα-
 πλασιάσας τὸν H πεποίηκεν, ὁ δὲ Γ τὸν Δ πολλα-
 πλασιάσας τὸν Z πεποίηκεν, ἔστιν ἄρα ὡς ὁ Γ πρὸς
 τὸν Δ , τουτέστιν ὡς ἡ A πρὸς τὴν B , οὕτως ὁ Z
 πρὸς τὸν H . ἀλλ' ὡς ἡ A πρὸς τὴν B , οὕτως τὸ
 20 ὑπὸ τῶν A, B πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς B · ἔστιν ἄρα ὡς τὸ
 ὑπὸ τῶν A, B πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς B , οὕτως ὁ Z πρὸς
 τὸν H . ἀλλ' ὡς τὸ ἀπὸ τῆς A πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν A, B ,
 οὕτως ἦν ὁ E πρὸς τὸν Z · δι' ἴσου ἄρα ὡς τὸ ἀπὸ
 τῆς A πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς B , οὕτως ὁ E πρὸς τὸν H .
 25 ἔστι δὲ ἐκάτερος τῶν E, H τετράγωνος· ὁ μὲν γὰρ E

3. Post ἀριθμὸν p. 32, 3 BFVb, mg. m. 1 P.

1. ἐστὶν] (prius) ἐστὶ BV, comp. Fb. 2. ὅπερ ἔδει δεῖξαι]
 comp. F?, om. BVb. 3. τὸ Θ'] om. B. 5. Γ πρὸς τὸν Δ]

communis earum mensura est E ; quod erat demonstrandum.

3.

Ad libr. X prop. 9.

Aliter propositio IX.

Nam quoniam A, B commensurabiles sunt, rationem habent, quam numerus ad numerum [prop. VI]. sit

A -----	$A : B = \Gamma : \Delta$, et Γ se ipsum
B -----	multiplicans efficiat E , Γ autem
Γ -----	numerum Δ multiplicans Z , Δ
Δ -----	autem se ipsum multiplicans H .
E -----	iam quoniam est $\Gamma \times \Gamma = E$,
Z -----	$\Gamma \times \Delta = Z$, erit $\Gamma : \Delta = E : Z$
H -----	[VII, 17], hoc est $E : Z = A : B$.

uerum $A : B = A^2 : A \times B$. itaque
 $A^2 : A \times B = E : Z$. rursus quoniam est $\Delta \times \Delta = H$,
 $\Gamma \times \Delta = Z$, erit $\Gamma : \Delta = Z : H$ [VII, 17], hoc est
 $A : B = Z : H$. uerum $A : B = A \times B : B^2$. itaque
 $A \times B : B^2 = Z : H$. erat autem $A^2 : A \times B = E : Z$.
 itaque ex aequo [V, 22] $A^2 : B^2 = E : H$. uerum uterque

τρία πρὸς τὸν Δ τέσσαρα F , sed corr. m. 1. 7. ὁ δὲ Γ τὸν
 τὸν δὲ $BFVb$. ποιεῖτω] om. BFb . 9. πεποίηκε b . 10.
 τὸν] (prius) corr. ex ὅν m. 1 V . 12. οὕτως] om. P . οὕτως
 — τὴν B] om. B . 20. ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ τῶν A, B πρὸς
 τὸ ἀπὸ τῆς B mg. b . 22. ἀπὸ τῆς A πρὸς τὸ] m. 2 V (τοῦ pro
 τῆς). B'' , $A' F$. Deinde del. m. 2 πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς B V .
 23. Z] mut. in H F . Post ἄρα add. ἔστιν b , m. 2 F . 25.
 ἔστιν B .

ἀπὸ τοῦ Γ ἐστίν, ὁ δὲ H ἀπὸ τοῦ Δ · τὸ ἀπὸ τῆς A ἄρα πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς B λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν. ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

Ἀλλὰ δὴ ἔχεται τὸ ἀπὸ τῆς A πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς B λόγον, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς ὁ E πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν τὸν H · λέγω, ὅτι σύμμετρός ἐστιν ἡ A τῇ B .

Ἐστω γὰρ τοῦ μὲν E πλευρὰ ὁ Γ , τοῦ δὲ H ὁ Δ , καὶ ὁ Γ τὸν Δ πολλαπλασιάσας τὸν Z ποιεῖται· οἱ E , Z , H ἄρα ἐξῆς εἰσιν ἀνάλογον ἐν τῷ τοῦ Γ πρὸς τὸν Δ λόγῳ. καὶ ἐπεὶ τῶν ἀπὸ τῶν A , B μέσον ἀνάλογόν ἐστι τὸ ὑπὸ τῶν A , B , τῶν δὲ E , H ὁ Z , ἐστίν ἄρα ὡς τὸ ἀπὸ τῆς A πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν A , B , οὕτως ὁ E πρὸς τὸν Z . ὡς δὲ τὸ ὑπὸ τῶν A , B πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς B , οὕτως ὁ Z πρὸς τὸν H , ἀλλ' ὡς τὸ ἀπὸ τῆς A πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν A , B , οὕτως ἡ A πρὸς τὴν B . αἱ A , B ἄρα σύμμετροί εἰσιν· λόγον γὰρ ἔχουσιν, ὃν ἀριθμὸς ὁ E πρὸς ἀριθμόν τὸν Z , τουτέστιν ὃν ὁ Γ πρὸς τὸν Δ · ὡς γὰρ ὁ Γ πρὸς τὸν Δ , ὁ E πρὸς τὸν Z · ὁ γὰρ Γ ἑαυτὸν μὲν πολλαπλασιάσας τὸν E πεποίηκεν, τὸν δὲ Δ πολλαπλασιάσας τὸν Z πεποίηκεν· ἐστίν ἄρα ὡς ὁ Γ πρὸς τὸν Δ , ὁ E πρὸς τὸν Z .

4.

Ad libr. X prop. 10.

Τῇ ἄρα προτεθείσῃ εὐθείᾳ τῇ ῥητῇ, ἀφ' ἧς ἔφαμιν τὰ μέτρα λαμβάνεσθαι, οἷον τῇ A , προσεῖρηται δυνάμει μὲν σύμμετρος ἡ Δ , τουτέστι ῥητὴ δυνάμει μόνον

4. Post ἡ E p. 34, 5 PBFb; mg. m. 1 V, add. κείμενον.

3. ἀριθμός] comp. corr. ex comp. πρὸς m. 1 F. 6. Post B add. μήκει V, m. 2 B. 7. μέν] om. b. ὁ] (prius) ἡ corr. ex ὁ, supra scr. ὁ F; ἡ b. 10. τῶν] corr. ex τὸ B.

E, H numerus quadratus est; est enim $E = \Gamma^2, H = \Delta^2$. ergo $A^2 : B^2$ rationem habet, quam numerus quadratus ad numerum quadratum; quod erat demonstrandum.

Iam uero $A^2 : B^2$ rationem habeat, quam numerus quadratus E ad numerum quadratum H . dico, A et B commensurabiles esse.

sit enim Γ latus numeri E, Δ autem numeri H . et sit $\Gamma \times \Delta = Z$. itaque E, Z, H deinceps proportionales sunt in ratione $\Gamma : \Delta$ [VIII, 11]. et quoniam est $A^2 : A \times B = A \times B : B^2$ et $E : Z = Z : H$, erit $A^2 : A \times B = E : Z$. est autem $A \times B : B^2 = Z : H$ et $A^2 : A \times B = A : B$. ergo A, B commensurabiles sunt; rationem enim habent, quam numerus E ad numerum Z [prop. VI], hoc est $\Gamma : \Delta$. nam $\Gamma : \Delta = E : Z$; est enim $\Gamma \times \Gamma = E, \Gamma \times \Delta = Z$ [VII, 17]; quare $\Gamma : \Delta = E : Z$.¹⁾

4.

Ad libr. X prop. 10.

Ergo ad rectam propositam rationalem, unde diximus mensuras sumi [cfr. p. 2, 10 not. crit.], uelut A , inuenta est Δ potentia commensurabilis, hoc est rationalis potentia tantum commensurabilis, irrationalis

1) Hae ambages, *ὡς δέ* lin. 13 — H lin. 14 et *ὡς γάρ* lin. 18 — *τὸν* Z lin. 21, a Gregorio in codd. deesse dicuntur; in meis tamen omnibus leguntur.

11. *ἐστι*] *εἶσιν* P. 16. *εἶσι* V, comp. Fb. *γάρ*] m. 2 F. 17. *ὅν*] om. F. 18. *Z*] e corr. m. 1 b. 19. Post Γ ras. 1 litt. F. *πεποίηκε* V. 21. *οὕτως ὁ* E V. Post Z add. *ὅπερ* *ἔδει* *δειξαι* FV. 22. *προσθετίσθη* PV. *ἔτη*] *ἔτη* eras., deinde mg. m. rec. *κείμενον. προσεῦχθηται* p. 34, 3 — *ἡ* E p. 34, 5 B addito *ὅπερ* *ἔδει* *δειξαι* et deleta reliqua parte propositionis. 23. *οἷον* B Vb, γρ. *οἷον* *ἐστίν* *ἡ* A mg. Fb. *προσηύχεται* B Fb. 24. *μὲν*] *μόνον* B, *μὲν* *ἡ* F.

σύμμετρος, ἄλογος δὲ ἡ *E*. ἀλόγους γὰρ καθόλου
καλεῖ τὰς καὶ μήκει καὶ δυνάμει ἀσύμμετρους τῇ ρητῇ.

5.

Uulgo X, 13.

Εἰς τὸ *ιγ'* λῆμμα ἐκ τῆς εἰς ἄτοπον ἀπαγωγῆς.

Ἐὰν ἡ δύο μεγέθη, καὶ τὸ μὲν σύμμετρον ἢ τῷ
5 αὐτῷ, τὸ δὲ ἕτερον ἀσύμμετρον, ἀσύμμετρα ἔσται τὰ
μεγέθη!

Ἔστω γὰρ δύο μεγέθη τὰ *A*, *B*, ἄλλο δὲ τὸ *Γ*,
καὶ τὸ μὲν *A* τῷ *Γ* σύμμετρον ἔστω, τὸ δὲ *B* τῷ *Γ*
ἀσύμμετρον. λέγω, ὅτι καὶ τὸ *A* τῷ *B* ἀσύμμετρον
10 ἔστιν.

Εἰ γὰρ ἔστι σύμμετρον τὸ *A* τῷ *B*, ἔστι δὲ καὶ
τὸ *Γ* τῷ *A*, καὶ τὸ *Γ* ἄρα τῷ *B* σύμμετρον ἔστιν.
ὅπερ οὐχ ὑπόκειται.

6.

Ad libr. X prop. 18.

Ῥητὰς γὰρ καλεῖ τὰς τῇ ἐκκειμένη ρητῇ ἦτοι μήκει
15 καὶ δυνάμει συμμέτρους ἢ καὶ δυνάμει μόνον. εἰσὶ
δὲ καὶ ἄλλαι εὐθεῖαι, αἱ μήκει μὲν ἀσύμμετροί εἰσι τῇ
ἐκκειμένη ρητῇ, δυνάμει δὲ μόνον σύμμετροι, καὶ δια
τοῦτο πάλιν λέγονται ρηταὶ καὶ σύμμετροι πρὸς ἀλ-
λήλας, καθ' ὃ ρηταί, ἀλλὰ σύμμετροι πρὸς ἀλλήλας

5. Post δεῖξαι p. 38, 6 BFVb, mg. m. 2 P. 6. Post
σύμμετρος p. 58, 3 PBFVb.

1. σύμμετρος] om. V, m. rec. P. δέ] γάρ F. 2. Post ρητῇ
eras. οὕτως P. 3. εἰς τὸ *ιγ'*] om. FVb. εἰς — ἀπαγωγῆς]
mg. F, *ιγ'* in ras. B, mg. ἐν ἄλλῳ λῆμμα; in F numerus eras.
4. δύο μεγέθη ἢ F. τῷ αὐτῷ] postea add. F m. 1. 5.
δ' B Fb. 8. *Γ*] (prius) γάμμα F. 11. ἀσύμμετρον F, sed
ἀ- eras. 12. *Γ*] (prius) corr. ex *A* V. *A*] corr. ex *Γ* V.

autem E ; irrationales enim omnino uocat rectas rationali incommensurabiles et longitudine et potentia.

5.

Uulgo X, 13.

Ad prop. XIII lemma ex reductione in absurdum.

Si duae magnitudines sunt, et altera commensurabilis, altera incommensurabilis eidem magnitudini est, magnitudines incommensurabiles erunt.

$\begin{array}{|l|} \hline \text{---} \\ \hline \end{array}$
 $\begin{array}{|l|} \hline \text{---} \\ \hline \end{array}$
 $\begin{array}{|l|} \hline \text{---} \\ \hline \end{array}$
 sint enim A, B duae magnitudines,
 alia autem Γ , et A, Γ commensurabiles
 sint, B, Γ autem incommensurabiles. dico,
 etiam A, B incommensurabiles esse.

nam si A, B commensurabiles sunt, et etiam Γ, A commensurabiles sunt, etiam Γ, B commensurabiles sunt [prop. XII]; quod contra hypothesin est.

6.

Ad libr. X prop. 18.

Rationales enim uocat rectas rationali propositae commensurabiles aut longitudine et potentia aut potentia tantum. sunt autem aliae¹⁾ quoque rectae, quae rationali propositae longitudine incommensurabiles sunt, potentia autem tantum commensurabiles; quare rursus uocantur rationales et inter se commensurabiles, quatenus rationales sunt, commensurabiles autem inter se aut longitudine et potentia aut po-

1) Hoc quid sibi uelit, non intellego.

B] A ? P. ἀσύμμετρον F, sed corr. 15. καί] (alt.) om. b.
 16. εἶναι ἀσύμμετροι F. εἶναι B.

ἦτοι μήκει δηλαδὴ καὶ δυνάμει ἢ δυνάμει μόνον. καὶ εἰ μὲν μήκει, λέγονται καὶ αὐταὶ ῥηταὶ μήκει σύμμετροι ἐπακουμένον, ὅτι καὶ δυνάμει· εἰ δὲ δυνάμει μόνον πρὸς ἀλλήλας εἰσὶ σύμμετροι, λέγονται καὶ
 5 αὐταὶ οὕτως ῥηταὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι. ὅτι δὲ αἱ ῥηταὶ σύμμετροί εἰσιν, ἐντεῦθεν δῆλον· ἐπεὶ γὰρ ῥηταὶ εἰσιν αἱ τῇ ἐκκειμένη ῥητῇ σύμμετροι, τὰ δὲ τῶ αὐτῶ σύμμετρα καὶ ἀλλήλοις ἐστὶ σύμμετρα, αἱ ἄρα ῥηταὶ σύμμετροί εἰσιν.

7.

Ad libr. X prop. 20.

10

Λῆμμα.

Ἡ δυνάμεν ἄλογον χωρίον ἄλογός ἐστιν.

Δυνάσθω γὰρ ἡ *A* ἄλογον χωρίον, τουτέστι τὸ ἀπὸ τῆς *A* τετράγωνον ἴσον ἔστω ἀλόγῳ χωρίῳ. λέγω, ὅτι ἡ *A* ἄλογός ἐστιν.

15 Εἰ γὰρ ἔσται ῥητὴ ἡ *A*, ῥητὸν ἔσται καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς τετράγωνον· οὕτως γὰρ [ἐστίν] ἐν τοῖς ὅροις. οὐκ ἔστι δέ· ἄλογος ἄρα ἐστὶν ἡ *A*. ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

8.

Ad libr. X prop. 23 corollarium.

Εἰσὶ δὲ πάλιν καὶ ἄλλαι εὐθεταί, αἱ μήκει μὲν

7. Post ἐξῆς p. 60, 13 PBFVb. 8. Post σύμμετροι p. 68, 22 PV, mg. m 2 B.

1. καί] (alt.) om. b. 2. ῥηταί] om. V. 3. εἰ] om. b.
 5. οὕτως] om. B F V b. Post σύμμετροι del. εἰσιν m. 1 P.
 ὅτι — 6. εἰσιν] mg. m. 1 P. 6. ἐντεῦθεν] ἐν- in ras. m.
 1 P. δῆλον ἐντεῦθεν F. ἐπεὶ] ὅτι b, mg. m. 1 γρ. ἐπεὶ
 γὰρ διὰ τὸ βι' τοῦ ι'. 9. εἰσιν] εἰσι b, εἰσιν ὅπερ ἔδει
 δεῖξαι V. 11. H] om. V, add. num. β'. ἔστι BV, comp.
 Fb. 13. ἴσον ἔστω] supra scr. m. 2 V; om. B F b. ἀλόγῳ
 χωρίῳ] corr. ex ἄλογον ἔστω V, ἄλογον ἔστω Bb, ἔστω ἄλογον F.

tentia tantum. et si longitudine commensurabiles sunt, et ipsae rationales longitudine commensurabiles uocantur, subaudito, eas potentia quoque commensurabiles esse; sin potentia tantum inter se commensurabiles sunt, et ipsae sic rationales potentia tantum commensurabiles uocantur. rationales autem commensurabiles esse, hinc manifestum est: quoniam enim rationales sunt, quae rationali propositae commensurabiles sunt, et quae eidem commensurabilia sunt, etiam inter se commensurabilia sunt [prop. XII], rectae rationales commensurabiles sunt.

7.

Ad libr. X prop. 20.

Lemma.

Recta spatio irrationali aequalis quadrata irrationalis est.

nam A^2 spatio irrationali sit aequale. dico, A irrationalem esse.

A |—————| nam si A rationalis est, etiam A^2
 B |————| rationale erit; ita enim in definitio-
 Γ |————| nibus est [def. 4]. at non est. ergo
 A irrationalis est; quod erat demonstrandum.

8.

Ad libr. X prop. 23 coroll.

Sunt autem rursus aliae¹⁾ quoque rectae, quae

1) Sc. praeter rationales, de quibus u. app. nr. 6.

15. $\xi\sigma\tau\alpha\iota$] $\xi\sigma\tau\iota$ V. 16. $\xi\sigma\tau\iota\nu$] om. BFVb. 17. $\xi\sigma\tau\iota\nu$ B.
 $\alpha\rho\alpha$] m. 2 F. η A $\xi\sigma\tau\iota\nu$ BFVb. $\delta\pi\epsilon\rho$ $\xi\theta\epsilon\iota$ $\delta\epsilon\iota\chi\alpha\iota$] om. B.
 18. $\epsilon\lambda\epsilon\lambda\iota\nu$ P. $\epsilon\lambda\epsilon\iota$ $\delta\epsilon$ — p. 386, 7. $\delta\upsilon\nu\acute{\alpha}\mu\epsilon\iota$ (prius)] punctis del. V (cfr. p. 69 not. crit.).

ἄσύμμετροί εἰσι τῇ μέσῃ, δυνάμει δὲ μόνον σύμμετροι,
καὶ λέγονται πάλιν μέσαι διὰ τὸ σύμμετροι εἶναι δυ-
νάμει τῇ μέσῃ καὶ σύμμετροι πρὸς ἀλλήλας, καθὸ
μέσαι, ἀλλὰ σύμμετροι πρὸς ἀλλήλας ἦτοι μήκει δηλαδὴ
5 καὶ δυνάμει ἢ δυνάμει μόνον. καὶ εἰ μὲν μήκει, λέ-
γονται καὶ αὗται μέσαι μήκει σύμμετροι ἐπομένῃ τοῦ,
ὅτι καὶ δυνάμει· εἰ δὲ δυνάμει μόνον εἰσὶ σύμμετροι,
λέγονται καὶ οὕτως μέσαι δυνάμει μόνον σύμμετροι.

Ὅτι δὲ αἱ μέσαι σύμμετροί εἰσιν, οὕτως δεικτέον.
10 ἐπεὶ αἱ μέσαι μέσῃ τινὶ σύμμετροί εἰσιν, τὰ δὲ τῷ
αὐτῷ σύμμετρα καὶ ἀλλήλοις ἐστὶ σύμμετρα, αἱ ἄρα
μέσαι σύμμετροί εἰσιν.

9.

Ad libr. X prop. 27.

Λήμμα.

Δύο ἀριθμῶν δοθέντων ἐν λόγῳ ὁποιουῶν καὶ
15 ἄλλον τινὸς δέον ποιῆσαι ὥς τὸν ἀριθμὸν πρὸς τὸν
ἀριθμὸν οὕτως τοῦτον πρὸς ἄλλον τινά.

Ἐστῶσαν οἱ δοθέντες δύο ἀριθμοὶ οἱ AB , $ΓΔ$
λόγον ἔχοντες πρὸς ἀλλήλους ὁποιοιουῶν, ἄλλος δὲ τις
ὁ $ΓΕ$. δεῖ ποιῆσαι τὸ προκείμενον.

20 Ἀναγεγράφθω γὰρ ὑπὸ τῶν $ΔΓ$, $ΓΕ$ παραλληλό-
γραμμον ὀρθογώνιον τὸ $ΔΕ$, καὶ τῷ $ΔΕ$ ἴσον παρὰ
τὸν AB παραβεβλήσθω παραλληλόγραμμον τὸ BZ
πλάτος ποιοῦν τὴν AZ . ἐπεὶ οὖν ἴσον ἐστὶ τὸ $ΔΕ$

9. Post δεῖξαι p. 78, 13 V.

1. εἰσιν P. 9. ὅτι — 12. εἰσιν] etiam in mg. sup. m.
rec. B. 10. εἰσι BV. 13 λήμμα] m. 2 V.

mediae longitudine incommensurabiles sunt, potentia autem tantum commensurabiles, et rursus mediae uocantur, quia mediae commensurabiles sunt potentia, et inter se commensurabiles, quatenus mediae sunt, commensurabiles autem inter se aut longitudine et potentia aut potentia tantum. et si longitudine commensurabiles sunt, et ipsae mediae longitudine commensurabiles uocantur, cum per se sequatur, eas potentia quoque commensurabiles esse; sin potentia tantum commensurabiles sunt, sic quoque mediae uocantur potentia tantum commensurabiles.

Medias autem commensurabiles esse, sic demonstrandum: quoniam mediae alicui mediae commensurabiles sunt, et quae eidem commensurabilia sunt, inter se quoque commensurabilia sunt [prop. XII], mediae sunt commensurabiles.


9.

Ad libr. X prop. 27.

Lemma.

Datis duobus numeris in quavis ratione et alio quodam numero oportet efficere, ut sit, ut numerus ad numerum, ita hic ad alium quendam.

Sint AB , $\Gamma\Delta$ numeri dati rationem quamvis inter se habentes, alius autem aliquis ΓE . oportet efficere, quod propositum est.



describatur enim parallelogrammum rectangulum $\Delta E = \Delta \Gamma \times \Gamma E$, et spatio ΔE aequale rectae AB adplicetur parallelogrammum BZ latitudinem efficiens AZ . iam

παράλληλόγραμμον τῷ BZ παράλληλογράμμῳ, ἔστι δὲ αὐτῷ καὶ ἰσογώνιον, τῶν δὲ ἰσων καὶ ἰσογωνίων παράλληλογράμμων ἀντιπεπόνθασιν αἱ πλευραὶ αἱ περὶ τὰς ἰσας γωνίας, ἀνάλογον ἄρα ἐστὶν ὡς ὁ AB πρὸς τὸν $ΓΔ$, οὕτως ὁ $ΓΕ$ πρὸς τὸν AZ . ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

10.

Ad libr. X prop. 29.

Ἀῆμμα εἰς τὸ κθ'.

Δύο ἀριθμῶν δοθέντων καὶ εὐθείας δέον ποιῆσαι ὡς τὸν ἀριθμὸν πρὸς τὸν ἀριθμὸν, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς εὐθείας τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπ' ἄλλης τινός.

10 Ἔστωσαν οἱ δοθέντες δύο ἀριθμοὶ οἱ A, B , εὐθεῖα δὲ ἡ $Γ$, καὶ δέον ἐστὶ ποιῆσαι τὸ προκείμενον. πεποιθήσθω γὰρ ὡς ὁ A πρὸς τὸν B , ἡ $Γ$ εὐθεῖα πρὸς ἄλλην τινὰ τὴν $Δ$, καὶ εἰλήφθω τῶν $Γ, Δ$ μέση ἀνάλογον ἡ E . ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς ὁ A πρὸς τὸν B ,
15 ἡ $Γ$ εὐθεῖα πρὸς τὴν $Δ$, ἀλλ' ὡς ἡ $Γ$ πρὸς τὴν $Δ$, τὸ ἀπὸ τῆς $Γ$ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς E , ὡς ἄρα ὁ A πρὸς τὸν B , τὸ ἀπὸ τῆς $Γ$ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς E τετράγωνον.

11.

Ad libr. X prop. 31.

Ἀῆμμα εἰς τὸ λα'.

Ἐὰν ὧσι δύο εὐθεῖαι ἐν λόγῳ τινί, ἔσται ὡς ἡ
20 εὐθεῖα πρὸς τὴν εὐθεῖαν, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν δύο πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ἐλαχίστης.

Ἔστωσαν δὴ δύο εὐθεῖαι αἱ $AB, BΓ$ ἐν λόγῳ τινί· λέγω, ὅτι ἐστὶν ὡς ἡ AB πρὸς τὴν $BΓ$, οὕτως τὸ

10. Post prop. XXIX p. 88, 18 V. 11. Post prop. XXXI p. 92, 24 V.

4. AB] e corr. V.

quoniam $\angle E = \angle Z$, et eadem aequiangula sunt, et parallelogrammorum aequalium et aequiangulorum latera angulos aequales comprehendunt in contraria proportionem sunt [VI, 14], erit $AB : \Gamma A = \Gamma E : AZ$; quod erat demonstrandum.

10.

Ad libr. X prop. 29.

Lemma ad prop. XXIX.

Datis duobus numeris et recta oportet efficere, ut sit, ut numerus ad numerum, ita quadratum rectae ad quadratum alius alicuius rectae.

Sint duo numeri dati A, B , recta autem Γ ; et oportet efficere, quod propositum est. fiat enim $A : B = \Gamma : \Delta$ [prop. VI coroll.], et rectarum Γ, Δ media proportionalis sumatur E [VI, 13]. iam quoniam est $A : B = \Gamma : \Delta$, $\Gamma : \Delta = \Gamma^2 : E^2$ [V def. 9], erit $A : B = \Gamma^2 : E^2$.

11.

Ad libr. X prop. 31.

Lemma ad prop. XXXI.

Si duae rectae in ratione aliqua sunt, erit ut recta ad rectam, ita rectangulum duarum rectarum ad quadratum minimae.

Duae igitur rectae $AB, B\Gamma$ in ratione aliqua sint. dico, esse $AB : B\Gamma = AB \times B\Gamma : B\Gamma^2$. describatur

ὑπὸ τῶν AB, BG πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $BΓ$. ἀναγεγράφθω γὰρ ἀπὸ τῆς $BΓ$ τετράγωνον τὸ $BΔΕΓ$, καὶ συμπληρώσθω τὸ $ΑΔ$ παραλληλόγραμμον. φανερόν δὴ, ὅτι ἐστὶν ὡς $η AB$ πρὸς τὴν $BΓ$, οὕτως τὸ $ΑΔ$
 5 παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ BE παραλληλόγραμμον. καὶ ἐστὶ τὸ μὲν $ΑΔ$ τὸ ὑπὸ τῶν AB, BG . ἴση γὰρ ὁ $BΓ$ τῇ $BΔ$. τὸ δὲ BE τὸ ἀπὸ τῆς $BΓ$. ὡς ἄρα ἡ AB πρὸς τὴν $BΓ$, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν AB, BG πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $BΓ$. ὅπερ εἶδει δεῖξαι.

12.

Ad libr. X prop. 32.

10

Ἀῆμμα εἰς τὸ λβ'.


Ἐὰν ὧσι τρεῖς εὐθεῖαι ἐν λόγῳ τινί, ἐστὶ ὡς ἡ πρώτη πρὸς τὴν τρίτην, οὕτως τὸ ὑπὸ τῆς πρώτης καὶ μέσης πρὸς τὸ ὑπὸ τῆς μέσης καὶ ἐλαχίστης.

Ἔστωσαν τρεῖς εὐθεῖαι ἐν λόγῳ τινὶ αἱ AB, BG ,
 15 $ΓΔ$. λέγω, ὅτι ἐστὶν ὡς ἡ AB πρὸς τὴν $ΓΔ$, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν AB, BG πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $BΓ, ΓΔ$.

Ἦχθω γὰρ ἀπὸ τοῦ A σημείου τῇ AB πρὸς ὀρθὰς ἡ AE , καὶ κείσθω τῇ $BΓ$ ἴση ἡ AE , καὶ διὰ τοῦ E σημείου τῇ $ΑΔ$ εὐθείᾳ παράλληλος ἤχθω ἡ $EΚ$,
 20 διὰ δὲ τῶν $B, Γ, Δ$ σημείων τῇ AE παράλληλοι ἤχθωσαν αἱ $ZB, ΓΘ, ΔΚ$. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ AB πρὸς τὴν $BΓ$, οὕτως τὸ AZ παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ $BΘ$ παραλληλόγραμμον, ὡς δὲ ἡ $BΓ$ πρὸς τὴν $ΓΔ$, οὕτως τὸ $BΘ$ πρὸς τὸ $ΓΚ$, δι' ἴσου ἄρα ὡς ἡ AB
 25 πρὸς τὴν $ΓΔ$, οὕτως τὸ AZ παραλληλόγραμμον πρὸς

12. Post prop. XXXII p. 96, 8 V, mg. m. rec. B.

3. Post $ΑΔ$ ins. $Γ$ m. 1 V. 4. $ΑΔ$] A eras. V. 7. τῆς] in ras. V. $BΓ$] $Γ$ e corr. V. 12. τὸ ὑπὸ] in ras. V.



enim in $B\Gamma$ quadratum $B\Delta E\Gamma$, et expleatur parallelogrammum $A\Delta$. manifestum igitur est, esse

$$AB : B\Gamma = A\Delta : BE \text{ [VI, 1].}$$

et est $A\Delta = AB \times B\Gamma$ (nam $B\Gamma = B\Delta$), $BE = B\Gamma^2$. itaque erit $AB : B\Gamma = AB \times B\Gamma : B\Gamma^2$; quod erat demonstrandum.

12.

Ad libr. X prop. 32.


Lemma ad prop. XXXII.

Si tres rectae in ratione aliqua sunt, erit ut prima ad tertiam, ita rectangulum primae ac mediae ad rectangulum mediae ac minimae.

Tres rectae AB , $B\Gamma$, $\Gamma\Delta$ in ratione aliqua sunt. dico, esse

$$AB : \Gamma\Delta = AB \times B\Gamma : B\Gamma \times \Gamma\Delta.$$

ducatur enim ab A puncto ad AB perpendicularis AE , et ponatur $AE = B\Gamma$, et per E punctum rectae



$A\Delta$ parallela ducatur EK , per puncta autem B , Γ , Δ rectae AE parallelae ducantur ZB , $\Gamma\Theta$, ΔK .

et quoniam est $AB : B\Gamma = AZ : B\Theta$ [VI, 1], et $B\Gamma : \Gamma\Delta = B\Theta : \Gamma K$ [VI, 1], ex aequo erit

τὸ ΓΚ παραλληλόγραμμον. καὶ ἐστὶ τὸ μὲν ΑΖ τὸ
ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ· ἴση γὰρ ἡ ΑΕ τῇ ΒΓ· τὸ δὲ ΓΚ
τὸ ὑπὸ τῶν ΒΓ, ΓΔ· ἴση γὰρ ἡ ΒΓ τῇ ΓΘ.

Ἐὰν ἄρα τρεῖς ὥσιν εὐθεῖαι ἐν λόγῳ τινί, ἐστὶ
ὡς ἡ πρώτη πρὸς τὴν τρίτην, οὕτως τὸ ὑπὸ τῆς πρώτης
καὶ μέσης πρὸς τὸ ὑπὸ τῆς μέσης καὶ τρίτης· ὅπερ
εἶδει δεῖξαι.

13.

Ad libr. X prop. 32 lemma.

Ἡ καὶ ὅτι, ἐὰν ἀναγράψωμεν τὸ ΕΓ ὀρθογώνιον
παραλληλόγραμμον καὶ συμπληρώσωμεν τὸ ΑΖ, ἴσον
10 ἐστὶ τὸ ΕΓ τῷ ΑΖ· ἐκότερον γὰρ αὐτῶν διπλάσιόν
ἐστὶ τοῦ ΑΒΓ τριγώνου. καὶ ἐστὶ τὸ μὲν ΕΓ τὸ ὑπὸ
τῶν ΒΓ, ΑΔ, τὸ δὲ ΑΖ τὸ ὑπὸ τῶν ΒΑ, ΑΓ. τὸ
ἄρα ὑπὸ τῶν ΒΓ, ΑΔ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν ΒΑ, ΑΓ.

14.

Ad libr. X prop. 33.

Ἀῆμμα εἰς τὸ λγ'.

15 Ἐὰν εὐθεῖα γραμμὴ τμηθῇ εἰς ἄνισα, ἐστὶ ὡς ἡ
εὐθεῖα πρὸς τὴν εὐθείαν, οὕτως τὸ ὑπὸ τῆς ὅλης καὶ
τῆς μείζονος πρὸς τὸ ὑπὸ τῆς ὅλης καὶ τῆς ἐλάττονος.

Εὐθεῖα γάρ τις ἡ ΑΒ τετμήσθω εἰς ἄνισα κατὰ
τὸ Ε· λέγω, ὅτι ὡς ἡ ΑΕ πρὸς τὴν ΕΒ, οὕτως τὸ
20 ὑπὸ τῶν ΒΑ, ΑΕ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΕ.

Ἀναγεγράφθω γὰρ ἀπὸ τῆς ΑΒ τετράγωνον τὸ
ΑΓΔΒ, καὶ διὰ τοῦ Ε σημείου ὁποτέρῃ τῶν ΑΓ, ΒΔ

13. Inter ΑΓ et ὅπερ p. 98, 15 PBFVb. 14. Post
prop. XXXIII p. 102, 4 V, mg. m. rec. B.

3. ΓΔ] Δ in ras. V. 5. πρὸς — 7. δεῖξαι] καὶ ἐξῆς B.
8. ἡ] om. FV. καί] καὶ ἡκται b. 9. συμπληρώσωμεν P,
corr. m. 2. 10. τό] corr. ex. τῷ V. 11. ΕΓ] e corr. V.

$AB: \Gamma A = AZ: \Gamma K$ [V, 22]. et $AZ = AB \times B\Gamma$ (nam $AE = B\Gamma$), $\Gamma K = B\Gamma \times \Gamma A$ (nam $B\Gamma = \Gamma\Theta$). ergo si tres rectae in ratione aliqua sunt, erit ut prima ad tertiam, ita rectangulum primae ac mediae ad rectangulum mediae ac tertiae; quod erat demonstrandum.¹⁾

13.

Ad libr. X prop. 32 lemma.

Uel etiam quod, si rectangulum $E\Gamma$ descriperimus, et AZ expleuerimus [u. fig. p. 97], erit $E\Gamma = AZ$; nam utrumque $= 2 AB\Gamma$ [I, 41]. et $E\Gamma = B\Gamma \times A\Delta$, $AZ = BA \times A\Gamma$. ergo est

$$B\Gamma \times A\Delta = BA \times A\Gamma.$$

14.

Ad libr. X prop. 33.

Lemma ad prop. XXXIII.

Si recta in partes inaequales secatur, erit ut recta ad rectam, ita rectangulum totius ac maioris ad rectangulum totius ac minoris.

Recta enim AB in E in partes inaequales secetur. dico, esse

$$AE: EB = BA \times AE: AB \times BE.$$

describatur enim in AB quadratum $A\Gamma\Delta B$, et per punctum E alterutri rectarum $A\Gamma$, $B\Delta$ paral-

1) In B in pag. seq. figura est nostrae similis, nisi quod litterae A , E omissae sunt, et pro B est Θ ; adduntur numeri quidam et σχῆμα τοῦ λήμματος τοῦ προγραφέντος, omnia m. rec. in textu prop. 32 (ad καὶ ἐπεὶ p. 94, 11) signo quodam ad hoc lemma renocamur.

τό] τῷ b. 12. τῶν] (prius) om. P. τό] (sec.) τῷ b. 14.
εἰς τὸ λγ'] πρὸ τοῦ λδ' postea add. B. 15. ἔσται] in ras. V.
18. τις ἦ] e corr. V m. 2.

παράλληλος ἤχθω ἡ EZ . φανερόν οὖν, ὅτι ὡς ἡ AE
 πρὸς τὴν EB , οὕτως τὸ AZ παραλληλόγραμμον πρὸς
 τὸ ZB παραλληλόγραμμον. καὶ ἐστὶ τὸ μὲν AZ τὸ
 ὑπὸ τῶν BA, AE . ἴση γὰρ ἡ AG τῇ AB . τὸ δὲ ZB
 5 τὸ ὑπὸ τῶν AB, BE . ἴση γὰρ ἡ BA τῇ AB . ὡς ἄρα
 ἡ AE πρὸς τὴν EB , οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν BA, AE
 πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν AB, BE . ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

15.

Ad libr. X prop. 34.

Λῆμμα.


Ἐὰν ὧσι δύο εὐθεῖαι ἄνισοι, τμηθῇ δὲ ἡ ἐλαχίστη
 10 αὐτῶν εἰς ἴσα, τὸ ὑπὸ τῶν δύο εὐθειῶν διπλάσιον
 ἐστὶ τοῦ τῆς μείζονος καὶ τῆς ἡμισείας τῆς ἐλαχίστης.

Ἔστωσαν δύο εὐθεῖαι ἄνισοι αἱ AB, BG , ὧν μείζων
 ἔστω ἡ AB , καὶ τετμήσθω ἡ BG δίχα κατὰ τὸ Δ .
 λέγω, ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν AB, BG διπλάσιόν ἐστὶ τοῦ
 15 ὑπὸ τῶν AB, BA .

Ἦχθω γὰρ ἀπὸ τοῦ B σημείου τῇ BG πρὸς ὀρθὰς
 ἡ BE , καὶ κείσθω τῇ BA ἴση ἡ BE , καὶ κατα-
 γεγράφθω τὸ σχῆμα. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς ἡ AB πρὸς
 τὴν AG , οὕτως τὸ BZ πρὸς τὸ ΔH , συνθέντι ἄρα
 20 ὡς ἡ BG πρὸς τὴν AG , οὕτως τὸ BH πρὸς τὸ ΔH .
 διπλασίων δὲ ἐστὶν ἡ BG τῆς AG . διπλάσιον ἄρα
 ἐστὶ καὶ τὸ BH τοῦ ΔH . καὶ ἐστὶ το μὲν BH τὸ
 ὑπὸ τῶν AB, BG . ἴση γὰρ ἡ AB τῇ BE . τὸ δὲ
 ΔH τὸ ὑπὸ τῶν AB, BA . ἴση γὰρ τῇ μὲν BA ἡ AG ,
 25 τῇ δὲ AB ἡ AZ . ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

15. Post prop. XXXIV p. 104, 9 V, mg. m. rec. B (uix
 legi potest).

4. ZB] BZ B. 5. τῶν] om. V. AB] (prius) e corr. V.
 8. λῆμμα προγραφόμενον B. 19. τήν] om. V. 21. ΔG] $\Gamma\Delta$ B.




lela ducatur EZ . manifestum igitur est, esse $AE:EB = AZ:ZB$ [VI, 1]. et $AZ = BA \times AE$ (nam $A\Gamma = AB$), $ZB = AB \times BE$ (nam $\Delta B = AB$). itaque erit $AE:EB = BA \times AE:AB \times BE$; quod erat demonstrandum.

15.

Ad libr. X prop. 34.

Lemma.

Si sunt duae rectae inaequales, et minor in partes aequales secatur, rectangulum duarum rectarum duplo maius erit rectangulo maioris et dimidia minoris.



Sint duae rectae inaequales AB , $B\Gamma$, quarum maior sit AB , et $B\Gamma$ in duas partes aequales secetur in Δ . dico, esse $AB \times B\Gamma = 2 AB \times B\Delta$.

ducatur enim a puncto B ad $B\Gamma$ perpendicularis BE , et ponatur $BE = BA$, et describatur figura. iam quoniam est $\Delta B:\Delta\Gamma = BZ:\Delta H$ [VI, 1], componendo [V, 18] erit $B\Gamma:\Delta\Gamma = BH:\Delta H$. verum $B\Gamma = 2\Delta\Gamma$. itaque etiam $BH = 2\Delta H$. et $BH = AB \times B\Gamma$ (nam $AB = BE$), $\Delta H = AB \times B\Delta$ (nam $B\Delta = \Delta\Gamma$, $AB = \Delta Z$); quod erat demonstrandum.

16.

Ad libr. X prop. 36.

Ἐκάλεσε δὲ αὐτὴν ἐκ δύο ὀνομάτων διὰ τὸ ἐκ
 δύο ρητῶν αὐτὴν συγκεῖσθαι κύριον ὄνομα καλῶν
 τὸ ρητόν, καθ' ὃ ρητόν.

17.

Ad libr. X prop. 37.

Ἐκάλεσε δὲ αὐτὴν ἐκ δύο μέσων πρώτην διὰ τὸ
 5 ρητόν περιέχειν καὶ προτερεῖν τὸ ρητόν.

18.

Ad libr. X prop. 38.

Ἐκάλεσε δὲ αὐτὴν ἐκ δύο μέσων δευτέραν διὰ το
 μέσον περιέχειν τὸ ὑπ' αὐτῶν καὶ μὴ ρητόν, δευ-
 τερεῦν δὲ τὸ μέσον τοῦ ρητοῦ. ὅτι δὲ τὸ ὑπὸ ρητῆς
 καὶ ἀλόγου περιεχόμενον ἄλογόν ἐστιν, δῆλον. εἰ γὰρ
 10 ἐστὶ ρητόν καὶ παραβέβληται παρὰ ρητὴν, εἴη αὖ καὶ
 ἡ ἐτέρα αὐτοῦ πλευρὰ ρητὴ. ἀλλὰ καὶ ἄλογος· ὅπερ
 ἄτοπον. τὸ ἄρα ὑπὸ ρητῆς καὶ ἀλόγου ἄλογόν ἐστιν.

19.

Ad libr. X prop. 39.

Ἐκάλεσε δὲ αὐτὴν μείζονα διὰ το τὰ ἀπὸ τῶν AB,
 BΓ ρητὰ μείζονα εἶναι τοῦ δις ὑπὸ τῶν AB, BΓ
 15 μέσου, καὶ δέον εἶναι ἀπὸ τῆς τῶν ρητῶν οἰκειότητος

16. Inter ὀνομάτων et ὅπερ p. 108, 15 PBFb. 17. Inter
 πρώτη et ὅπερ p. 110, 8 PBFb. 18. Inter δευτέρα et ὅπερ
 p. 114, 2 PBFb, pro scholio V m. 1. 19. Inter μείζων et
 ὅπερ p. 114, 22 PBFb, mg. V.

1. ἐκάλεσεν PBF. 2. ρητῶν] ὀνομάτων F. συγκεῖσθαι]
 καλεῖσθαι F (sed corr. mg.). 4. ἐκάλεσεν PBF. 5. προ-

16.

Ad libr. X prop. 36.

Uocauit autem eam ex duobus nominibus, quia ex duabus rationalibus composita est, proprie rationale, quatenus rationale est, nomen uocans.

17.

Ad libr. X prop. 37.

Uocauit autem eam ex duabus mediis primam, quia spatium rationale comprehendunt, et rationale principatum habet.

18.

Ad libr. X prop. 38.

Uocauit autem eam ex duabus mediis secundam, quia medium comprehendunt rectangulum, et medium rationali postponitur.

Spatium autem rectis rationali et irrationali comprehensum irrationale esse, adparet. nam si rationale est et rectae rationali adplicatum est, etiam alterum eius latus rationale est [prop. XX]. at idem irrationale est; quod absurdum est. ergo spatium rectis rationali et irrationali comprehensum irrationale est.

19.

Ad libr. X prop. 39.

Uocauit autem eam maiorem, quia rationalia $AB^2 + B\Gamma^2$ maiora sunt medio $2AB \times B\Gamma$, et

τερεύειν F. 6. ἐκάλεισεν PBF. τό] τὸ τὸ FV. 8. δέ] (prius) om. V. 9. ἐστὶ BV, comp. Fb. 11. πλεονᾶ αὐτοῦ F. 13. ἐκάλεισεν PBF. 15. μέσων PBFb.

τὴν ὀνομασίαν τάττεσθαι. ὅτι δὲ μείζονά ἐστι τὰ ἀπο
τῶν $AB, B\Gamma$ τοῦ δις ὑπὸ τῶν $AB, B\Gamma$, οὕτως δεικτέον.

Φανερόν μὲν οὖν, ὅτι ἄνισοί εἰσιν αἱ $AB, B\Gamma$.
εἰ γὰρ ἦσαν ἴσαι, ἴσα ἂν ἦν καὶ τὰ ἀπὸ τῶν $AB, B\Gamma$
5 τῷ δις ὑπὸ τῶν $AB, B\Gamma$, καὶ ἦν ἂν καὶ τὸ ὑπὸ τῶν
 $AB, B\Gamma$ ῥητόν· ὅπερ οὐχ ὑπόκειται· ἄνισοι ἄρα εἰσὶν
αἱ $AB, B\Gamma$. ὑποκείσθω μείζων ἡ AB , καὶ κείσθω
τῇ $B\Gamma$ ἴση ἡ $B\Delta$. τὰ ἄρα ἀπὸ τῶν $AB, B\Delta$ ἴσα ἐστὶ
τῷ τε δις ὑπὸ τῶν $AB, B\Delta$ καὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΔA .
10 ἴση δὲ ἡ ΔB τῇ $B\Gamma$. τὰ ἄρα ἀπὸ τῶν $AB, B\Gamma$ ἴσα
ἐστὶ τῷ τε δις ὑπὸ τῶν $AB, B\Gamma$ καὶ τῷ ἀπὸ τῆς
 ΔA . ὥστε τὰ ἀπὸ τῶν $AB, B\Gamma$ μείζονα εἶναι τοῦ
δις ὑπὸ τῶν $AB, B\Gamma$ τῷ ἀπὸ ΔA .

20.

Ad libr. X prop. 40.

Ῥητον δὲ καὶ μέσον δυναμένη καλεῖται αὕτη διὰ
15 τὸ δύνασθαι δύο χωρία, τὸ μὲν ῥητόν, τὸ δὲ μέσον·
καὶ διὰ τὴν τοῦ ῥητοῦ προύπαρξιν πρῶτον ἐκάλεσεν.

21.


Ad libr. X prop. 41.

Καλεῖ δὲ αὐτὴν δύο μέσα δυναμένην διὰ το δύ-
νασθαι αὐτὴν δύο μέσα χωρία τὸ τε συγκείμενον ἐκ
τῶν ἀπὸ τῶν $AB, B\Gamma$ καὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν $AB, B\Gamma$.

20. Inter δυναμένη et ὅπερ p. 116, 13 PBFb, mg. V.
21. Inter δυναμένη et ὅπερ p. 118, 17 PBFVb.

1. δε] δὲ καὶ P. ἀπό] corr. ex ὑπό m. 2 F. 2. οὕτω
BVb. 3. οὖν] οὖν ἐστὶν F. 8. ἀπό] ὑπό V. BΔ] corr.
ex BΓ V. 9. ἀπό] ὑπό F. τῆς] τῶν F, om. Bb. ΔA]

oportet nomen a proprietate rationalium dari. esse autem $AB^2 + B\Gamma^2 > 2AB \times B\Gamma$, sic demonstrandum est.

iam manifestum est, AB , $B\Gamma$ inaequales esse. nam si aequales essent, esset etiam $AB^2 + B\Gamma^2 = 2AB \times B\Gamma$, et $AB \times B\Gamma$ et ipsum rationale esset; quod contra hypothesin est. supponatur $AB > B\Gamma$, et ponatur $B\Delta = B\Gamma$. itaque $AB^2 + B\Delta^2 = 2AB \times B\Delta + \Delta A^2$ [II, 7].

 nerum $\Delta B = B\Gamma$. itaque

$$AB^2 + B\Gamma^2 = 2AB \times B\Gamma + \Delta A^2.$$

ergo $AB^2 + B\Gamma^2$ excedit $2AB \times B\Gamma$ quadrato ΔA^2 .

20.

Ad libr. X prop. 40.

Spatio autem rationali ac medio aequalis quadrata uocatur haec, quia quadrata duobus spatiis aequalis est, alteri rationali, alteri medio, et propter principatum rationalis primum hoc nominavit.

21.

Ad libr. X prop. 41.

Uocat autem eam duobus spatiis mediis aequalem quadratam, quia duobus spatiis mediis quadrata est aequalis, $AB^2 + B\Gamma^2$ et $2AB \times B\Gamma$ [u. fig. p. 119].

ΔA P. 10. ἀπό] ὑπό F. ἴσα — 12. ΔA] m. 2 V. 11. ἀπό] corr. ex ὑπό m. 2 F. 12. τά] τό F. εἶναι] ἐστὶ BFVb. 13. ἀπό] corr. ex ὑπό m. 2 F. ΔA] τῆς ΔA b et corr. ex τῶν ΔA F. 14. ῥητόν — αὐτῇ] καλεῖται δὲ αὐτῇ? V. δυναμένην BFb, et P, corr. m. 2. καλεῖται αὐτῇ] αὐτὴν καλεῖ BFb. 16. τῇ] τόν V. Post πρῶτον add. τὸ ῥητόν BFb, m. rec. P. ἐκάλεσε V. 17. καλεῖ — δυναμένην] om. V. 19. ἀπὸ τῶν] om. V. τό] τοῦ P.

22.

Ad libr. X deff. alt.

Ἐξ οὖν οὐσῶν τῶν οὕτως καταλαμβανομένων εὐ-
 θειῶν τάττει πρώτας τῇ τάξει τρεῖς, ἐφ' ὧν ἡ μείζων
 τῆς ἐλάσσονος μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμετρου ἑαυτῇ,
 δευτέρας δὲ τῇ τάξει τὰς λοιπὰς τρεῖς, ἐφ' ὧν τῷ ἀπὸ
 5 ἀσυμμέτρου, διὰ τὸ προτερεῖν τὸ σύμμετρον τοῦ ἀσυμ-
 μέτρου· καὶ ἔτι πρώτην μέν, ἐφ' ἧς τὸ μείζον ὄνομα
 σύμμετρόν ἐστι τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ, δευτέραν δέ, ἐφ'
 ἧς τὸ ἐλάσσον, διὰ τὸ πάλιν προτερεῖν τὸ μείζον τοῦ
 ἐλάσσονος τῷ ἐμπεριέχειν τὸ ἐλάσσον, τρίτην δέ, ἐφ'
 10 ὧν μηδέτερον τῶν ὀνομάτων σύμμετρόν ἐστι τῇ ἐκ-
 κειμένῃ ῥητῇ. καὶ ἐπὶ τῶν ἐξῆς τριῶν ὁμοίως τὴν
 πρώτην τῆς εἰρημένης δευτέρας τάξεως τετάρτην καλῶν
 καὶ τὴν δευτέραν πέμπτην καὶ τὴν τρίτην ἕκτην.

23.

Ad libr. X prop. 90.

Ἔστι δὲ καὶ συντομώτερον δεῖξαι τὴν εὐρεσιν τῶν
 15 εἰρημένων ἐξ ἀποτομῶν. καὶ δὴ ἔστω εὐρεῖν τὴν
 πρώτην. ἐκκείσθω ἡ ἐκ δύο ὀνομάτων πρώτη ἡ $ΑΓ$,
 ἧς μείζον ὄνομα ἡ $ΑΒ$, καὶ τῇ $ΒΓ$ ἴση κείσθω ἡ $ΒΔ$.
 αἱ $ΑΒ$, $ΒΓ$ ἄρα, τουτέστιν αἱ $ΑΒ$, $ΒΔ$, ῥηταί εἰσι
 δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ ἡ $ΑΒ$ τῆς $ΒΓ$, τουτ-
 20 ἐστι τῆς $ΒΔ$, μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμετρου ἑαυτῇ,

22. Post ἕκτη p. 136, 19 PBFb; mg. V, sed add. κείμενον.

23. Post δεῖξαι p. 274, 15 PBFVb.

1. οὖν] m. 2 F. οὕτω Bf. 3. Ante συμμετρου ras.
 1 litt. B. 4. τῷ] mut. in τό m. rec. P, corr. ex τό F, τό b.
 5. ἀσυμμέτρου] ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ V. ἀσυμμέτρου] συμμετρου V.
 6. πρώτη B, sed corr. m. 1. 7. δεύτερον P, corr. m. rec. 8.
 ἑλαττον Bb, comp. F. 9. ἐλάττονος Bb, comp. F. τῷ] e corr. V.

22.

Ad libr. X deff. alt.

Cum igitur rectae ita inuentae sex sint, ordine primas tres ponit, in quibus maior quadrata minorem excedit quadrato rectae sibi commensurabilis, secundas autem ordine tres reliquas, in quibus quadrato rectae sibi incommensurabilis excedit, quia commensurabile antecedit incommensurabile; et praeterea primam, in qua maius nomen rationali propositae commensurabile est, secundam autem, in qua minus, quia rursus maius antecedit minus, quia minus comprehendit; tertiam autem, in qua neutrum nomen rationali propositae commensurabile est. et in sequentibus tribus similiter, primam secundae classis, quam nominauimus, quartam uocans, secundam quintam, tertiam sextam.

23.

Ad libr. X prop. 90.

Licet autem breuius quoque inuentionem sex apotomiarum, quas diximus, demonstrare. sit enim propositum primam inuenire. ponatur AG recta ex duobus nominibus prima, cuius maius nomen sit AB , et ponatur $BA = BG$. itaque AB , BG , hoc est AB , BA , rationales sunt potentia tantum commensurabiles [prop. XXXVI], et AB^2 excedit BG^2 , hoc est BA^2 , quadrato rectae sibi commensurabilis, et AB rationali propositae commensu-

10. ἐστὶ σύμμετρον BFb.

γα' BVb.

ἐστὶν B.

16. ἡ] (prius) om. PV.

11. ἐπὶ] corr. ex ἐπεὶ V.

εὐρησιν FV?

17. ἐκκείσθω V.

14. 15. ξξ] om. b.

18. εἶσιν B.

καὶ ἡ AB σύμμετρος ἐστὶ τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ μήκει· ἀποτομὴ ἄρα πρώτη ἐστὶν ἡ AD . ὁμοίως δὲ καὶ τὰς λοιπὰς ἀποτομὰς εὐρήσομεν ἐκθέμενοι τὰς ἰσαριθμούς ἐκ δύο ὀνομάτων· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

24.

Ad libr. X prop. 115.

5

Ἄλλως.

Ἐστω μέση ἡ AG · λέγω, ὅτι ἀπὸ τῆς AG ἄπειροι ἄλογοι γίνονται, καὶ οὐδεμία οὐδεμιᾶ τῶν πρότερον ἡ αὐτή.

- Ἦχθω τῇ AG πρὸς ὀρθὰς ἡ AB , καὶ ἔστω ῥητὴ
 10 ἡ AB , καὶ συμπεπληρώσθω τὸ $BΓ$ · ἄλογον ἄρα ἐστὶ τὸ $BΓ$, καὶ ἡ δυναμένη αὐτὸ ἄλογός ἐστιν. δυνάσθω αὐτὸ ἡ $ΓΔ$ · ἄλογος ἄρα ἐστὶν ἡ $ΓΔ$. καὶ οὐδεμιᾶ τῶν πρότερον ἡ αὐτή· τὸ γὰρ ἀπ' οὐδεμιᾶς τῶν πρότερον παρὰ ῥητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ μέσην.
 15 πάλιν συμπεπληρώσθω τὸ $ΕΔ$ · ἄλογον ἄρα ἐστὶ τὸ $ΕΔ$, καὶ ἡ δυναμένη αὐτὸ ἄλογός ἐστιν. δυνάσθω αὐτὸ ἡ $ΔΖ$ · ἄλογος ἄρα ἐστὶν ἡ $ΔΖ$. καὶ οὐδεμιᾶ τῶν πρότερον ἡ αὐτή· τὸ γὰρ ἀπ' οὐδεμιᾶς τῶν πρότερον παρὰ ῥητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ τὴν $ΓΔ$.
 20 Ἀπὸ μέσης ἄρα ἄπειροι ἄλογοι γίνονται, καὶ οὐδεμία οὐδεμιᾶ τῶν πρότερον ἡ αὐτή ἐστίν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

24. Post δεῖξαι p. 370, 23 PBFVb.

3. ἐκθέμενοι] *v* e corr. P. τὰς] om. V. εἰσαριθμούς B.
 4. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] om. B F V b, comp. P. 7. γίνονται V.
 οὐδεμία] om. P F V. 8. ἡ] ἐστὶν ἡ B. 10. ἄλογον] in
 ras. φ. ἄλογον — 11. B Γ] mg. m. 1 P. 11. ἐστὶ P B V,

rabilis est [def. alt. 1]. ergo AA apotome est prima. similiter igitur reliquas quoque apotomas inueniemus expositis rectis ex duobus nominibus eiusdem numeri; quod erat demonstrandum.

24.

Ad libr. X prop. 115.

Aliter.

Sit AF media. dico, ab AF irrationales infinitas numero oriri, et nullam ulli priorum similem esse.

Ducatur AB ad AF perpendicularis, et rationalis sit AB , et expleatur BF . itaque BF irrationale est [prop. XX], et recta ei aequalis quadrata irrationalis

$A \quad F \quad A \quad Z$ est. sit $FA^2 = BF$. itaque FA irrationalis est. nec ulli priorum similis est. neque enim ullius priorum quadratum rectae rationali ad-

plicatum latitudinem efficit mediam. rursus expleatur EA . itaque EA irrationale est [prop. XX], et recta ei aequalis quadrata irrationalis est. sit $AZ^2 = EA$. itaque AZ irrationalis est. nec ulli priorum similis est. neque enim ullius priorum quadratum rationali adplicatum latitudinem efficit FA .

Ergo a media irrationales numero infinitae oriuntur, et nulla ulli priorum similis est; quod erat demonstrandum.

comp. Fb. 16. $\epsilon\sigma\tau\iota\nu$] comp. Fb, $\epsilon\sigma\tau\iota$ PBV. 20. $\alpha\pi\theta\ \tau\eta\varsigma$
Bb, $\tau\eta\varsigma$ add. m. 2 F. $\gamma\acute{\iota}\gamma\nu\nu\nu\alpha\iota$ B. $\sigma\acute{\upsilon}\delta\epsilon\mu\acute{\iota}\alpha$] om. PFVb.
21. $\sigma\acute{\upsilon}\delta\epsilon\mu\acute{\iota}\alpha\nu$ φ . $\epsilon\sigma\tau\iota\nu$ $\delta\pi\epsilon\rho$ $\xi\delta\epsilon\iota$ $\delta\epsilon\iota\chi\alpha\iota$] om. BFb.

25.

Ἡ τῇ ἐλάσσονι σύμμετρος ἐλάσσων ἐστίν.

Ἐστω ἐλάσσων ἡ A , καὶ τῇ A σύμμετρος [ἔστω]
ἡ B · λέγω, ὅτι ἡ B ἐλάσσων ἐστίν.

Κείσθω ῥητὴ ἡ $\Gamma\Delta$ καὶ τῷ ἀπὸ τῆς A ἴσον παρὰ
5 τὴν $\Gamma\Delta$ παραβεβλήσθω τὸ ΓE πλάτος ποιοῦν τὴν
 ΓZ · ἀποτομὴ ἄρα ἐστὶ τετάρτη ἡ ΓZ . τῷ δὲ ἀπὸ τῆς
 B ἴσον παρὰ τὴν ZE παραβεβλήσθω τὸ ZH πλάτος
ποιοῦν τὴν $Z\Theta$. ἐπεὶ οὖν σύμμετρός ἐστιν ἡ A τῇ B ,
σύμμετρον ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς A τῷ ἀπὸ τῆς B .
10 ἀλλὰ τῷ μὲν ἀπὸ τῆς A ἴσον ἐστὶ τὸ ΓE , τῷ δὲ
ἀπὸ τῆς B ἴσον ἐστὶ τὸ ZH · σύμμετρον ἄρα ἐστὶ
τὸ ΓE τῷ ZH . ὥς δὲ τὸ ΓE πρὸς τὸ ZH , οὕτως
ἐστὶν ἡ ΓZ πρὸς τὴν $Z\Theta$ · σύμμετρος ἄρα ἐστὶν
ἡ ΓZ τῇ $Z\Theta$ μήκει. ἀποτομὴ δὲ ἐστὶ τετάρτη ἡ ΓZ .
15 ἀποτομὴ ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ $Z\Theta$ τετάρτη· τὸ HZ ἄρα
περιέχεται ὑπὸ ῥητῆς τῆς ZE καὶ ἀποτομῆς τετάρτης
τῆς $Z\Theta$. εἰάν δὲ χωρίον περιέχεται ὑπὸ ῥητῆς καὶ
ἀποτομῆς τετάρτης, ἵ τὸ χωρίον δυναμένη ἐλάσσων
ἐστίν. δύναται δε τὸ ZH ἡ B · ἐλάσσων ἄρα ἐστίν
20 ἡ B . ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

25. Alia demonstr. prop. 105, post nr. 24 PFV, mg. m.
1 b, m. 2 B, in V etiam ad prop. 105 mg. m. 1 (V_2).

1. ἄλλως τὸ ρς' V_2 , ριζ' b, ριη' B; ριε' F, ριζ' m. 2.
ἐλάττων F. 2. ἐλάττων F. [ἔστω] om. PV. 3. ἐστὶ P,
comp. V, et postea ins. φ. 4. ἐκκείσθω BbV₂. ῥητὴ ἡ
 $\Gamma\Delta$] γάρ ἡ $\Gamma\Delta$ ῥητὴ BV₂, ἡ $\Gamma\Delta$ ῥητὴ b, ἡ $\Gamma\Delta$ F. A] Δ φ.
6. τῷ τὸ PB. 7. Post ZE add. $\Gamma\Delta$ P, et V, sed del. 8.
τῇ B] corr. ex BHB m. 1 V. 9. ἐστὶ] om. BFbV₂. τῷ
corr. ex τὸ B, mut. in τὸ V₂. 10. ἐστίν P, om. V₂. τὸ
τῷ V₂ et B, sed corr. 11. ἐστὶ] om. BFbV₂. τὸ] corr.
ex τῷ V₂. ZH] in ras. m. 1 P. 13. ἐστίν] om. FV₂.
 ΓZ] in ras. m. 1 P. ἐστίν] om. V₂. 14. ἡ ΓZ] postea

25.

Recta minori commensurabilis minor est.

Sit minor A , et rectae A commensurabilis B . dico,
 B minorem esse.

ponatur ΓA rationalis, et quadrato A^2 aequale
rectae ΓA adplicetur ΓE latitudinem efficiens ΓZ .

Γ Z Θ itaque ΓZ apotome est quarta
[prop. C]. et quadrato B^2 aequale
rectae ZE adplicetur ZH latitudinem
efficiens $Z\Theta$. iam quoniam A, B
 A B Γ E H commensurabiles sunt, etiam A^2, B^2

commensurabilia sunt. est autem $\Gamma E = A^2$, $ZH = B^2$.
itaque $\Gamma E, ZH$ commensurabilia sunt. est autem
 $\Gamma E : ZH = \Gamma Z : Z\Theta$. itaque $\Gamma Z, Z\Theta$ longitudine com-
mensurabiles sunt [prop. XI]. ΓZ autem apotome
est quarta. itaque etiam $Z\Theta$ apotome est quarta
[prop. CIII]. itaque HZ rationali ZE et apotome
quarta $Z\Theta$ comprehenditur. sin spatium recta rationali
et apotome quarta comprehenditur, recta spatio ae-
qualis quadrata minor est [prop. XCIV]. et $B^2 = ZH$.
ergo B minor est; quod erat demonstrandum.

add. V₂. 15. ἐστὶ ἐστὶν P. $Z\Theta$ ΘZ P. τό HZ — 16.
 ZE] mg. m. 2 B, ὁρητὴ δὲ ἡ ZE Bb, ὁρητὴ ὁρητὴ δὲ ἡ ZE F.
18. ἐλάττων B. 19. ἐστὶ PVV₂, comp. BFb. ἐλάσσων
— 20. δεῖξαι] om. F. 19. ἀρα] om. P. 20. ὅπερ εἶδει δεῖξαι]
comp. P, om. BbV₂. In b add. ἵστέον, ὅτι ἡ τούτου τοῦ θεω-
ρήματος πρότασις ἡ αὐτὴ ἐστὶ τῇ τοῦ ρς', ὅθεν καὶ ἐν τοῖς
ἑσῶ παραλείπεται, ἡ δὲ καταγραφὴ καὶ τὸ σχῆμα οὐ τὰ αὐτὰ
εἶσιν· γέγραπται δὲ ἐν ἄλλῳ καὶ ριζ', διὸ καὶ ἡμεῖς τοῦτο παρα-
τεθεῖκαμεν.

26.

Ἡ τῇ μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιούση
σύμμετρος μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιούσα
ἐστίν.

Ἐστω μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιούσα ἡ *A*,
5 σύμμετρος δὲ αὐτῇ ἡ *B*. λέγω, ὅτι ἡ *B* μετὰ ῥητοῦ
μέσον τὸ ὅλον ποιούσα ἐστίν.

Ἐκκείσθω ῥητὴ ἡ *ΓΔ*, καὶ τῷ μὲν ἀπὸ τῆς *A* ἴσον
παρὰ τὴν *ΓΔ* παραβελήσθω τὸ *ΓΕ* πλάτος ποιούν
τὴν *ΓΖ*. ἀποτομὴ ἄρα ἐστὶ πέμπτῃ ἡ *ΓΖ*. τῷ δὲ ἀπὸ
10 τῆς *B* ἴσον παρὰ τὴν *ΖΕ* παραβελήσθω τὸ *ΖΗ* πλάτος
ποιούν τὴν *ΖΘ*. ἐπεὶ οὖν σύμμετρός ἐστιν ἡ *A* τῇ *B*,
σύμμετρόν ἐστι καὶ τὸ ἀπὸ τῆς *A* τῷ ἀπὸ τῆς *B*. ἀλλὰ
τῷ μὲν ἀπὸ τῆς *A* ἴσον τὸ *ΓΕ*, τῷ δὲ ἀπὸ τῆς *B*
ἴσον τὸ *ΖΗ*. σύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ *ΓΕ* τῷ *ΖΗ*.
15 σύμμετρος ἄρα καὶ ἡ *ΓΖ* τῇ *ΖΘ* μήκει. ἀποτομὴ δὲ
πέμπτῃ ἡ *ΓΖ*. ἀποτομὴ ἄρα ἐστὶ πέμπτῃ καὶ ἡ *ΖΘ*.
ῥητὴ δὲ ἡ *ΖΕ*. ἐὰν δὲ χωρίον περιέχεται ὑπὸ ῥητῆς
καὶ ἀποτομῆς πέμπτῃς, ἡ τὸ χωρίον δυναμένη μετὰ
ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιούσα ἐστίν. δύναται δὲ τὸ
20 *ΖΗ* ἡ *B*. ἡ *B* ἄρα ἡ μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποι-
οῦσα ἐστίν. ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

26. Alia demonstr. prop. 106, post nr. 25 PFV, mg. m.
1 b, m. 2 B, in V etiam ad prop. 106 mg. m. 1 (V₁).

1. ἄλλως τὸ ρζ' V₂, ριη' Fb, ριθ' B. ἡ — 3. ἐστίν]
om. V₁. 2. Ante μετὰ add. καὶ αὐτῇ m. 2 F, καὶ αὐτῇ ἡ b,
ἡ F. 4. ἔστω ἡ Bfb V₂. 5. καὶ τῇ *A* σύμμετρος ἡ *B* V₁.
λέγω — 6. ἐστίν] mg. V₂. 5. ἡ *B*] supra scr. m. 1 F.
9. ἐστίν P. πέμπτῃ ἐστίν F. 12. B] BΔ φ. 13. ΓΕ]
corr. ex ZE V, ZE b. 15. καὶ] ἐστὶ καὶ V₂. ΖΘ] corr. ex
ΓΘ V, ΓΘ P. 16. πέμπτῃ] (prius) om. b. ἡ] ἐστίν ἡ b V₂.
17. ῥητόν P. ῥητὴ δὲ ἡ ZE] om. V₁. 19. ἐστὶ Vb V₂,

26.

Recta rectae cum rationali totum medium efficienti commensurabilis cum rationali totum medium efficiens est.

Sit A recta cum rationali totum medium efficiens, ei autem commensurabilis B . dico, B rectam esse cum rationali totum medium efficientem.

ponatur rationalis ΓA , et quadrato A^2 aequale rectae ΓA adplicetur ΓE latitudinem efficiens ΓZ .

itaque ΓZ apotome est quinta [prop. CI]. quadrato autem B^2 aequale rectae $Z E$ adplicetur $Z H$ latitudinem efficiens $Z \Theta$. iam quoniam A, B commensurabiles sunt, etiam A^2, B^2 commensurabilia sunt. est autem $\Gamma E = A^2$, $Z H = B^2$. itaque $\Gamma E, Z H$ commensurabilia sunt. quare etiam $\Gamma Z, Z \Theta$ longitudine commensurabiles sunt [VI, 1; prop. XI]. ΓZ autem apotome est quinta. itaque etiam $Z \Theta$ apotome est quinta [prop. CIII]; $Z E$ autem rationalis est. sin spatium recta rationali et apotome quinta comprehenditur, recta spatio aequalis quadrata recta est cum rationali totum medium efficiens [prop. XCV]. est autem $B^2 = Z H$. ergo B recta est cum rationali totum medium efficiens; quod erat demonstrandum.

comp. BF. δέ] om. V. 20. ή] (tert.) P V V₂, om. BFb.

21. έστιν] supra scr. V₂. όπερ έδει δείξαι] comp. P, om. BFb V₂. In b add. m. 1: ώσαντως και τούτου του θεωρήματος ή πρότασις ή αυτή έστι τη του ρζ', ου μήν ή καταγραφή και το σχήμα ένείνω τά αότα ελαιν. έστι δέ έν έτέρω και ρη', διό και ήμιν παραγέγραπται. είτα το ένδον ριζ' έν ένείνω έστι ριθ' και εξής τά λοιπά.

27.

Προκείσθω ἡμῖν δεῖξαι, ὅτι ἐπὶ τῶν τετραγώνων σχημάτων ἀσύμμετρός ἐστιν ἡ διάμετρος τῇ πλευρᾷ μήκει.

Ἐστω τετράγωνον τὸ $ABΓΔ$, διάμετρος δὲ αὐτοῦ ἡ $ΑΓ$. λέγω, ὅτι ἡ $ΓΑ$ ἀσύμμετρός ἐστι τῇ $ΑΒ$ μήκει.

Εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω σύμμετρος· λέγω, ὅτι συμβήσεται τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν ἄρτιον εἶναι καὶ περισσόν. φανερόν μὲν οὖν, ὅτι τὸ ἀπὸ τῆς $ΑΓ$ διπλάσιον τοῦ ἀπὸ τῆς $ΑΒ$. καὶ ἐπεὶ σύμμετρός ἐστιν ἡ $ΓΑ$ τῇ $ΑΒ$, ἡ $ΓΑ$ ἄρα πρὸς τὴν $ΑΒ$ λόγον ἔχει, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμὸν. ἐχέτω, ὃν ὁ EZ πρὸς H , καὶ ἔστωσαν οἱ EZ , H ἐλάχιστοι τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐχόντων αὐτοῖς· οὐκ ἄρα μονὰς ἐστὶν ὁ EZ . εἰ γὰρ ἔσται μονὰς ὁ EZ , ἔχει δὲ λόγον πρὸς τὸν H , ὃν ἔχει ἡ $ΑΓ$ πρὸς τὴν $ΑΒ$, καὶ μείζων ἡ $ΑΓ$ τῆς $ΑΒ$, μείζων ἄρα καὶ ἡ EZ τοῦ H ἀριθμοῦ· ὅπερ ἄτοπον. οὐκ ἄρα μονὰς ἐστὶν ὁ EZ · ἀριθμὸς ἄρα. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ $ΓΑ$ πρὸς τὴν $ΑΒ$, οὕτως ὁ EZ πρὸς τὸν H , καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς $ΓΑ$ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $ΑΒ$, οὕτως ὁ ἀπὸ τοῦ EZ πρὸς τὸν ἀπὸ τοῦ H . διπλάσιον δὲ τὸ ἀπὸ τῆς $ΓΑ$ τοῦ ἀπὸ τῆς $ΑΒ$ · διπλασίων ἄρα καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ EZ τοῦ ἀπὸ τοῦ H · ἄρτιος ἄρα ἐστὶν ὁ ἀπὸ τοῦ EZ · ὥστε καὶ αὐτὸς ὁ EZ ἄρτιός ἐστιν. εἰ γὰρ ἦν περισσός, καὶ ὁ ἀπ' αὐτοῦ τετράγωνος περισσός ἦν,

Post. nr. 26 PBFVb.


ρῖξ' b, ρκ' B; ρις' corr. in ριθ' m. 2 F. 1. ὅτι] m. 2 B.
2. σύμμετρος F, corr. m. 2. 5. $ΓΑ$] $ΑΓ$ FV. σύμμετρος
F, corr. m. 2. 7. περιτόν V. 8. ἐστι τοῦ Bb, ἐστι add.
m. 2 F. 9. τῆς] corr. ex. τοῦ m. 1 b. $ΓΑ$] $ΑΓ$ F. 10.
 $ΓΑ$] in ras. V, $ΑΓ$ F. ἄρα] om. V. 11. ὃν] in ras. B.

27.

Propositum sit nobis demonstrare, in figuris quadratis diametrum latusque longitudine incommensurabilia esse.

Sit $AB\Gamma A$ quadratum, diametrus autem eius $A\Gamma$. dico, ΓA , AB longitudine incommensurabiles esse.

nam si fieri potest, commensurabiles sint. dico, fore, ut idem numerus et par et impar sit. manifestum igitur, esse $A\Gamma^2 = 2 AB^2$ [I, 47]. et quoniam ΓA , AB commensurabiles sunt, $\Gamma A : AB$ rationem habet,



quam numerus ad numerum [prop. VI]. sit

$$\Gamma A : AB = EZ : H,$$

et EZ , H minimi sint eorum, qui eandem rationem habent

[cfr. VII, 33]. itaque EZ unitas non est. si enim est unitas, et $EZ : H = A\Gamma : AB$, et $A\Gamma > AB$, erit etiam $EZ > H$, unitas numero [V, 14]; quod absurdum est. quare EZ unitas non est. ergo numerus est. et quoniam est $\Gamma A : AB = EZ : H$, erit etiam $\Gamma A^2 : AB^2 = EZ^2 : H^2$ [VI, 20 coroll.; VIII, 11]. uerum $\Gamma A^2 = 2 AB^2$. itaque etiam $EZ^2 = 2 H^2$. quare EZ^2 par est. itaque etiam ipse EZ par est. nam si impar esset, etiam quadratum eius impar esset,

EZ] E in ras. m. 1 P. $\tau\acute{o}\nu H$ BFb. 12. H] om. b.
 14. $\xi\chi\epsilon\iota \delta\acute{\epsilon}]$ καὶ $\xi\chi\epsilon\iota$ BFb. $\pi\rho\acute{o}\varsigma$] (prius) comp. corr. ex
 comp. καὶ m. 1 F. 16. Post EZ add. $\mu\omicron\nu\acute{\alpha}\varsigma$ Bb, m. rec. V.
 17. $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\nu$] (prius) m. 2 F. ΓA] $A\Gamma$ B. 18. $\tau\acute{o}\nu$] σ in
 ras. B. 19. ΓA] Γ in ras. V. AB] B in ras. m. 1 P. 21.
 $\tau\eta\varsigma$] τοῦ PFV. ἀπὸ $\tau\eta\varsigma$] m. rec. V. $\tau\eta\varsigma$] τοῦ P. δι-
 $\pi\lambda\acute{\alpha}\sigma\iota\omicron\nu$ F, διπλάσιος V. $\acute{o}]$ τό Fb. 22. $\tau\omicron\upsilon$] (primum)
 $\tau\eta\varsigma$ F. 23. $\acute{\omega}\sigma\tau\epsilon$] -ε e corr. V. 24. $\eta\gamma$] $\acute{\alpha}\nu \eta\gamma$ V.

ἐπειδήπερ, ἐὰν περισσοὶ ἀριθμοὶ ὅποσοιοῦν συντεθῶσιν,
 τὸ δὲ πλήθος αὐτῶν περισσὸν ἦ, ὁ ὅλος περισσὸς ἐστίν·
 ὁ EZ ἄρα ἄρτιός ἐστιν. τετμήσθω δίχα κατὰ τὸ Θ.
 καὶ ἐπεὶ οἱ EZ, H ἐλάχιστοι εἰσι τῶν τὸν αὐτὸν λόγον
 5 ἐχόντων [αὐτοῖς], πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους εἰσίν. καὶ
 ὁ EZ ἄρτιος· περισσὸς ἄρα ἐστὶν ὁ H. εἰ γὰρ ἦν
 ἄρτιος, τοὺς EZ, H δυὰς ἐμέτρει· πᾶς γὰρ ἄρτιος
 ἔχει μέρος ἡμισυ· πρώτους ὄντας πρὸς ἀλλήλους· ὅπερ
 ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ ἄρα ἄρτιός ἐστιν ὁ H· περισσὸς
 10 ἄρα. καὶ ἐπεὶ διπλάσιος ὁ EZ τοῦ EΘ, τετραπλάσιος
 ἄρα ὁ ἀπὸ EZ τοῦ ἀπὸ EΘ. διπλάσιος δὲ ὁ ἀπὸ τοῦ
 EZ τοῦ ἀπὸ τοῦ H· διπλάσιος ἄρα ὁ ἀπὸ τοῦ H τοῦ
 ἀπὸ EΘ· ἄρτιος ἄρα ἐστὶν ὁ ἀπὸ τοῦ H. ἄρτιος ἄρα
 διὰ τὰ εἰρημένα ὁ H· ἀλλὰ καὶ περισσὸς· ὅπερ ἐστὶν
 15 ἀδύνατον. οὐκ ἄρα σύμμετρός ἐστὶν ἡ ΓΑ τῇ AB
 μήκει· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

Ἄλλως.

[Δεικτέον καὶ ἐτέρως, ὅτι ἀσύμμετρός ἐστιν ἡ τοῦ
 τετραγώνου διάμετρος τῇ πλευρᾷ].
 20 Ἔστω ἀντὶ μὲν τῆς διαμέτρου ἡ A, ἀντὶ δὲ τῆς
 πλευρᾶς ἡ B· λέγω, ὅτι ἀσύμμετρός ἐστιν ἡ A τῇ B
 μήκει. εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω [σύμμετρός· καὶ γενοίτω]
 πάλιν ὡς ἡ A πρὸς τὴν B, οὕτως ὁ EZ ἀριθμὸς πρὸς
 τὸν H, καὶ ἔστωσαν ἐλάχιστοι τῶν τὸν αὐτὸν λόγον
 25 ἐχόντων αὐτοῖς οἱ EZ, H· οἱ EZ, H ἄρα πρῶτοι πρὸς

1. συντεθῶσι PFV. 2. ὁ] om. B, καὶ ὁ FV. 3. ἐστίν]
 comp. Fb, ἐστὶ PBV. Θ] e corr. B. 4. H ἀριθμοὶ BFb.
 5. αὐτοῖς] om. P. εἰσι PVb, comp. F. καί] καὶ ἐστὶν
 BFb. 7. μετρεῖ F, corr. m. 2; ἀν ἐμέτρει bene edd. 10.
 διπλάσιος] διπλάσιός ἐστιν F, διπλασίῳ ἐστίν Bb. 11. ἀπὸ]

quoniam, si numeri impares componuntur, et multitudo eorum impar est, totus impar est [IX, 23]. ergo EZ par est. in Θ in duas partes aequales secetur. et quoniam EZ , H minimi sunt eorum, qui eandem rationem habent, inter se primi sunt [VII, 21]. et EZ par est. itaque H impar est. nam si par esset, binas numeros EZ , H metiretur (omnis enim numerus par partem dimidiam habet [VII def. 6]), qui inter se primi sunt; quod fieri non potest. ergo H par non est. impar igitur est. et quoniam $EZ = 2E\Theta$, erit [VIII, 11] $EZ^2 = 4E\Theta^2$. est autem $EZ^2 = 2H^2$. itaque $H^2 = 2E\Theta^2$. quare H^2 par est. itaque propter ea, quae diximus [p. 408, 23 sq.], H par est. at idem impar est; quod fieri non potest. ergo ΓA , AB longitudine commensurabiles non sunt; quod erat demonstrandum.

Aliter.

Sit pro diametro A , pro latere autem B . dico, A et B longitudine incommensurabiles esse. nam si fieri potest, sit rursus ut $A:B$, ita numerus EZ ad H [cfr. prop. VI], et EZ , H minimi sint eorum, qui eandem rationem habent [cfr. VII, 33]. itaque EZ , H primi sunt inter se [VII, 21]. primum dico, H unitatem

m. 2 F. EZ] τοῦ EZ Bb, m. 2 F. $E\Theta$] τοῦ $E\Theta$ Bbφ.
 12. H] (prius) H ἢ b. 13. $E\Theta$] ΘE in ras. V, τοῦ $E\Theta$ BFb.
 14. ἐστίν] om. V. 15. ΓA] in ras. V, supra scr. Δ b.
 16. Post μήκει add. ἀσύμμετρος ἄρα (ἄρα m. 2 F) BFb.
 ὅπερ εἶδει δεῖξαι] comp. P, om. b, οἷ : ~ B. 17. ἄλλως]
 om. BFVb, ριζ' mg. F. 18. δεικτέον — 19. πλευρῶ] om. P,
 mg. V. 20. ἔστω γὰρ BFb. 22. σύμμετρος· καὶ γεγονέντω]
 om. PV, m. 2 F. 25. αὐτοῖς] om. Fb, m. 2 B. of] (prius)
 e corr. V. πρῶτοι] supra scr. m. 1 F.

ἀλλήλους εἰσίν. λέγω πρῶτον, ὅτι ὁ *H* οὐκ ἔστι μονάς.
 εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω μονάς. καὶ ἐπεὶ ἔστιν ὥς ἡ *A*
 πρὸς τὴν *B*, οὕτως ὁ *EZ* πρὸς τὸν *H*, καὶ ὥς ἄρα
 τὸ ἀπὸ τῆς *A* πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *B*, οὕτως ὁ ἀπὸ τοῦ
 5 *EZ* πρὸς τὸν ἀπὸ τοῦ *H*. διπλάσιον δὲ τὸ ἀπὸ τῆς
A τοῦ ἀπὸ τῆς *B*· διπλάσιος ἄρα καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ *EZ*
 τοῦ ἀπὸ τοῦ *H*. καὶ ἔστι μονάς ὁ *H*· δύνας ἄρα ὁ
 ἀπὸ *EZ* τετράγωνος· ὅπερ ἔστιν ἀδύνατον. οὐκ ἄρα
 μονάς ἔστιν ὁ *H*· ἀριθμὸς ἄρα. καὶ ἐπεὶ ἔστιν ὥς
 10 τὸ ἀπὸ τῆς *A* πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *B*, οὕτως ὁ ἀπὸ *EZ*
 πρὸς τὸν ἀπὸ τοῦ *H*, καὶ ἀνάπαλιν ὥς τὸ ἀπὸ τῆς
B πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *A*, οὕτως ὁ ἀπὸ τοῦ *H* πρὸς τὸν
 ἀπὸ τοῦ *EZ*, μετρεῖ δὲ τὸ ἀπὸ τῆς *B* τὸ ἀπὸ τῆς *A*,
 μετρεῖ ἄρα καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ *H* τετράγωνος τὸν ἀπὸ τοῦ
 15 *EZ*· ὥστε καὶ ἡ πλευρὰ αὐτὴ ὁ *H* τὸν *EZ* μετρεῖ.
 μετρεῖ δὲ καὶ ἑαυτὸν ὁ *H*· ὁ *H* ἄρα τοὺς *EZ*, *H*
 μετρεῖ πρῶτους ὄντας πρὸς ἀλλήλους· ὅπερ ἔστιν
 ἀδύνατον. οὐκ ἄρα σύμμετρος ἔστιν ἡ *A* τῇ *B* μήκει·
 ἀσύμμετρος ἄρα ἔστιν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

28.

Σχόλιον.

20 Εὐρημένων δὴ τῶν μήκει ἀσυμμέτρων εὐθειῶν,
 ὡς τῶν *A*, *B*, εὐρίσκεται καὶ ἄλλα πλεῖστα μεγέθη ἐκ
 δύο διαστάσεων, λέγω δὴ ἐπίπεδα, ἀσύμμετρα ἀλλήλοις.
 ἐὰν γὰρ τῶν *A*, *B* εὐθειῶν μέσην ἀνάλογον λάβωμεν
 25 τὴν *Γ*, ἔσται ὥς ἡ *A* πρὸς τὴν *B*, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς

28. Post. nr. 27 PBFVb.

1. εἰσί PVb, comp. F. 2. ὅτι" πρῶτον b. 3. ὁ] ἡ F.
 τόν] τὴν Fb. 4. τό] ὁ P. 5. τό] τόν P. 6. τοῦ] τῆς PV.

$\left[\begin{array}{c} A \\ B \\ Z \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} E \\ H \end{array} \right]'$ non esse. nam si fieri potest, sit unitas. et quoniam est $A:B = EZ:H$, erit etiam $A^2:B^2 = EZ^2:H^2$ [VI, 20 coroll.; VIII, 11]. uerum $A^2 = 2B^2$ [I, 47]. itaque etiam $EZ^2 = 2H^2$. et H unitas est. itaque numerus quadratus EZ^2 binas est; quod fieri non potest. quare H unitas non est; ergo numerus est. et quoniam est $A^2:B^2 = EZ^2:H^2$, et e contrario [V, 7 coroll.] $B^2:A^2 = H^2:EZ^2$, et B^2 metitur A^2 , etiam H^2 metitur EZ^2 . quare etiam latus ipsum H numerum EZ metitur. uerum H etiam se ipsum metitur. itaque H numeros EZ , H metitur inter se primos; quod fieri non potest. quare A , B longitudine commensurabiles non sunt. ergo incommensurabiles sunt; quod erat demonstrandum.

28.

Scholium.

Inuentis igitur rectis longitudine incommensurabilibus, uelut A , B , etiam plurimae aliae magnitudines duarum dimensionum, scilicet planae, inter se incommensurabiles inueniuntur. nam si inter rectas A , B mediam proportionalem sumpserimus Γ , erit ut $A:B$, ita figura plana in A descripta ad figuram in Γ si-

6. διπλάσιον P. 7. ὁ ἀπὸ] ἔστιν ὁ Fb, ἔστιν ὁ ἀπὸ τοῦ B.
 10. τό] (prius) supra m. 1 V. ἀπὸ] (tert.) om. BFb. 11.
 ἀπὸ τοῦ] om. BFb. 13. τό] (alt.) corr. ex τῷ m. 1 F. 14.
 ὁ] τό F. 15. αὐτῆς B. 18. ἡ A] e corr. V. 19. ἔστιν]
 om. BFb. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. BFb. 20. σχόλιον]
 om. FVb (in fig. ριγ' F), ρκα' B. 22. εὐρίσκονται B (corr.
 m. 2) Fb. 23. δῆ] δῆ ὅτι F. ἐπίπεδον F. σύμμετρα B,
 sed corr. 24. εὐθείων] om. BF.

Ἄ ἐπίπεδον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Γ τὸ ὁμοιον καὶ ὁμοίως ἀναγραφόμενον, εἴτε τετράγωνον εἴη τὰ ἀναγραφόμενα εἴτε ἕτερα εὐθύγραμμα ὁμοια εἴτε κύκλοι περὶ διαμέτρους τὰς Α, Γ, ἐπεὶπερ οἱ κύκλοι πρὸς ἀλλήλους εἰσὶν ὡς τὰ ἀπὸ τῶν διαμέτρων τετράγωνον. εὐρηνται ἄρα καὶ ἐπίπεδα χωρία ἀσύμμετρα ἀλλήλοις· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

Δεδειγμένων δὴ καὶ τῶν ἐκ δύο διαστάσεων διαφόρων ἀσυμμέτρων χωρίων δεῖξομεν τοῖς ἀπὸ τῆς τῶν στερεῶν θεωρίας, ὡς ἔστι καὶ στερεὰ σύμμετρά τε καὶ ἀσύμμετρα ἀλλήλοις. ἐὰν γὰρ ἐπὶ τῶν ἀπὸ τῶν Α, Β τετραγώνων ἢ τῶν ἴσων αὐτοῖς εὐθυγράμμων ἀναστήσωμεν ἰσοῦσῃ στερεὰ παραλληλεπίπεδα ἢ πυραμίδας ἢ πρίσματα, ἔσται τὰ ἀνασταθέντα πρὸς ἀλλήλα ὡς αἱ βάσεις. καὶ εἰ μὲν σύμμετροί εἰσιν αἱ βάσεις, σύμμετρα ἔσται καὶ τὰ στερεά, εἰ δὲ ἀσύμμετροι, ἀσύμμετρα. ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

Ἀλλὰ μὲν καὶ δύο κύκλων ὄντων τῶν Α, Β ἐὰν ἀπ' αὐτῶν ἰσοῦσφεις κῶνους ἢ κυλίνδρους ἀναγράψωμεν, ἔσονται πρὸς ἀλλήλους ὡς αἱ βάσεις, τουτέστιν ὡς οἱ Α, Β κύκλοι. καὶ εἰ μὲν σύμμετροί εἰσιν οἱ κύκλοι, σύμμετροι ἔσονται καὶ οἱ τε κῶνοι πρὸς ἀλλήλους καὶ

1. ἐπίπεδον] εἶδος BFb. τῆς] om. P. καί] τε καὶ V.
2. ἀναγεγραμμένον BF, mg. b. ἀναγεγραμμένα BFb. 3. εἴτε] (prius) εἴτε καὶ P. 4. ἐπεὶ γάρ, supra scr. περ m. 1 F. Mg. μαθήσῃ τοῦτο ἐν τῷ β' τοῦ ιβ' ἐν τοῖς στερεοῖς m. rec. B. 6. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] :~ BFb, et P, sed supra scr. m. 1 comp. 8. ἔκβ' B. 9. χωρίων ἀσυμμέτρων B. τοῖς] ἐν τοῖς Vb. 11. ἀπὸ τῶν] om. F. 12. ἀναστήσω V, deinde supra scr. αὐτοῖς m. 1. 13. ἰσοῦσῃ] l- in ras. m. 1 B. ἰσοῦσῃ στερεὰ παραλληλεπίπεδα] mg. V, in textu del. ἰσοῦσῃ γραμμὰς ἢ παραλληλεπίπεδα. παραλληλοεπίπεδα F, παραλλήλα ἐπίπεδα b. ἢ] e corr. F; οἶον, supra scr. ἢ m. 1 b. 14. ὡς] postea ins. m.

milem et similiter descriptam [VI, 19 coroll.], siue quadrata sunt figurae descriptae siue aliae rectilineae
 $A \quad \Gamma \quad B$ similes siue circuli circum diametros A, Γ ,
 quoniam circuli eam inter se rationem habent,
 quam quadrata diametrorum [XII, 2]. ergo
 etiam plana spatia inter se incommensurabilia inuenta sunt; quod erat demon-
 strandum.

Inuentis iam spatiis quoque diuersis duarum dimensionum incommensurabilibus per ea, quae ad theoriam solidorum pertinent, demonstrabimus, solida quoque esse inter se commensurabilia et incommensurabilia. si enim in quadratis rectarum A, B uel figuris rectilineis iis aequalibus solida construxerimus eiusdem altitudinis uel parallelepipeda uel pyramidas uel prismata, solida constructa eam inter se rationem habebunt, quam bases [XI, 32. XII, 5; 6]. et si bases commensurabiles sunt, etiam solida commensurabilia erunt, sin incommensurabiles, incommensurabilia [prop. XI]; quod erat demonstrandum.

praeterea si A, B duo circuli sunt, si in iis conos uel cylindros eiusdem altitudinis construxerimus, eam inter se rationem habebunt, quam bases, hoc est quam circuli A, B [XII, 11]. et si circuli commensurabiles sunt, etiam coni cylindrique inter se commensurabiles

1 V. 16. ἀσύμμετροί εἰσιν αἱ βάσεις V. 17. ὅπερ ἔδει δεῖξαι]
 om. BFb. 18. ὅγ' B. κύκλων] in ras. V. 20. ὥς]
 om. P, m. 2 V. Post alt. ὥς ras. 3 litt. V. 21. εἰσιν]
 εἰεν V. 22. καὶ] om. B. τε] om. b. πρὸς ἀλλήλους]
 ἀλλήλοις BFb.

οἱ κύλινδροι, εἰ δὲ ἀσύμμετροί εἰσιν οἱ κύκλοι, ἀσύμμετροι ἔσονται καὶ οἱ κῶνοι καὶ οἱ κύλινδροι. καὶ φανερόν ἡμῖν γέγονεν, ὅτι οὐ μόνον ἐπὶ γραμμῶν καὶ ἐπιφανειῶν ἐστὶ συμμετρία τε καὶ ἀσυμμετρία,
 5 ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν στερεῶν σχημάτων.

1. δέ] δ' F. εἰσιν] εἶεν b. 8. γέγονε V. ὅτι] δι' ὃ P V. ἐπὶ] ἐπὶ τε P. 4. καὶ] ἢ P. ἐστὶν σύμμετρα P. ἀσύμμετρα P. Mg. γρ. σύμμετρα καὶ ἀσύμμετρα m. 1 b. 5. στερεῶν] ἐτέρων F.

erunt, sin incommensurabiles sunt circuli, etiam coni cylindrique incommensurabiles erunt [prop. XI]. et nobis adparuit, commensurabilitatem incommensurabilitatemque non solum in lineis planisque esse, sed etiam in corporibus solidis.
