

Notes du mont Royal

www.notesdumontroyal.com

Cette œuvre est hébergée sur « *Notes du mont Royal* » dans le cadre d'un exposé gratuit sur la littérature.

SOURCE DES IMAGES
Google Livres

navis precibus fortuna, repugnat

EUCLIDIS ELEMENTORUM

**LIBRI PRIORES SEX,
ITEM**

UNDECIMUS & DUODECIMUS.

Ex Versione Latina


FREDERICI COMMANDINI.

QUIBUS ACCEDUNT .

Trigonometriæ Planæ & Sphæricæ Elementa.

Item Tractatus de Natura & Arithmetica Logarithmorum.

In usum Juventutis Academicæ



OXONIÆ,

E THEATRO SHELDONIANO.

Impensis Henr. Clements Bibliopolæ Oxoniensis. MDCCXV.

Hist. of science
Heller
7.21.31
2.45.03

Imprimatur,

BER. GARDINER

Vic. Can. OXON.

March. 25. 1715.

T. 22

PRÆFATIO.

POST tot nova Geometriæ Elementa, non ita pridem in lucem emissæ, est fortasse quod miretur Tyro Mathematicus, annosa hæc, & (ut quibusdam videntur) obsoleta Euclidis συχία è prelo denuo prodire: præsertim cum non pauca in illis vitia detexisse sibi visi sint, qui Geometriam Elementarem novâ quadam methodo excolendam proponunt. Hi enim Lyncei Philosophi Euclidis Definitiones parum perspicuas, demonstrationes vix evidentes, res omnes malo ordine dispositas, aliasque mendas innumeras, per omnem antiquitatem ad sua usque tempora latentes, se invenisse jactant.

At tantorum virorum pace, audacter asserto, Euclidem ab iis immerito reprehensum esse, ejusque Definitiones distinctas & claras, è primis principiis & conceptibus nostris facillioribus & simplicioribus petitas esse; demonstrationes Elegantes perspicuas & concinnas; ratiocinandi vim adeo evidentem & nervosam, ut facile inducar credere obscuritatem istam à sciolis illis toties insimulatam, confusis potius & perplexis eorum ideis, quam demonstrationibus ipsis imputandam esse. Et utcumque nonnulli querantur de malâ rerum dispositione, & iniquo ordine, quem tenet Euclides, aliam tamen methodum magis idoneam, & discantibus faciliorem inter omnia hoc genus scripta invenio nullam.

*Non meum est hic loci hypercriticis Horum capti-
unculis figillatim respondere: sed in his Elementis
vel mediocriter versato, statim patebat, Calumniat-
ores hos suam potius oscitantiam monstrare, quam
veros in nostro authore lapsus arguere; imo ne hoc
quidem dicere vereor, quod vix, & ne vix quidem
unum, aut alterum è tot novis systematibus inveniri
potest, in quibus plures non sunt labe, imo fœdiores
paralogismi, quam in Euclidem vel fingere potuerunt.*

*Post tot infelices in Geometriâ reformandâ cona-
tus, quidam non infimi Geometræ Elementa de
novo construere non ausi, ipsum Euclidem omnibus
aliis Elementorum Scriptoribus merito prætulerunt,
eique edendo suas curas impenderunt; hi tamen
ipsi nescio quibus opinionibus ducti, alias propo-
sitiones prorsus omittunt, aliarumque demonstrationes
in pejus mutant. Inter illos eminent Tacquetus &
Deschalles, quorum utrique malo quodam fato con-
tigit, ut elegantes quasdam & in Elementis optimo
jure ponendas propositiones quasi ineptas & inutiles
rejecerint, quales sunt propositiones 27, 28, 29. li-
bri sexti, cum aliis nonnullis quarum usus fortasse
illos latebat. Insuper quandocunque ipsas Euclidis
demonstrationes deserunt, multum in argumentando
peccant, & à concinnitate Veterum recedunt.*

*In libro quinto demonstrationes Euclidis in to-
tum repudierunt, & Proportionis definitionem aliis
terminis conceptam attulerunt; at quæ unam tan-
tum è duabus proportionalium speciebus comprehen-
dit, & quantitatis commensurabilibus solummodo
competit: nihilominus suas, quæ sunt de proportione,
demonstrationes omni quantitati tam incommensu-
rabili quam commensurabili in sequentibus libris ap-
plicant,*

plicant. Hunc tam turpem lapsum nec Logici nec Geometrae facile condonassent, nisi hi authores in aliis suis scriptis de Scientiis Mathematicis bene meruissent. Hoc quidem commune est iis vitium cum omnibus hodiernis Elementorum Scriptoribus, qui in eundem impingunt scopulum, & ut suam in hac materia ostendent peritiam, authorem nostrum in re minime culpandâ imo laudandâ reprehendunt. Quantitatum proportionalium definitionem intelligo, in quâ intellectu facilem proportionalium proprietatem exponit, quæ quantitatibus omnibus tam incommensurabilibus quam commensurabilibus æque convenit, & à quâ cæteræ omnes proportionalium proprietates facile consequuntur.

Hujus proprietatis demonstrationem in Euclide desiderant Egregii hi Geometrae, atque defectum demonstratione suâ supplendum suscipiunt. Hic iterum contemplari licet insignem eorum in Logicâ peritiam, qui definitionis nominis demonstrationem expectant: talis enim est hæc Euclidis definitio, qui illas quantitates proportionales vocat, quæ conditiones in definitione suâ allatas obtinent. Quidni primo Elementorum auctori licebat, quælibet nomina quantitatibus hæc requisita habentibus, arbitrio suo affigere? Licebat proculdubio, suo igitur utitur jure, & eas proportionales vocat.

Sed operæ pretium erit, methodum, quâ hanc proprietatem demonstrare conantur, perpendere. Affectionem quandam uni tantum proportionalium generi, viz. commensurabilium, congruentem assumunt; & exinde multis ambagibus longâque conclusionum serie universalem, quam Euclidis posuit, proportionalium proprietatem deducunt; quod certe tam methodo
quam

quam argumentationis regulis satis alienum esse videtur. At longe rectius fecissent, si proprietatem universalem ab Euclide assignatam primo posuissent, & exinde particularem illam & uni tantum proportionalium speciei congruentem deduxissent. Quoniam vero hanc respuerunt methodum, talem demonstrationem ad definitiones libri quinti attexere libuit. Qui Euclidem ulterius defensum videre cupiunt, consulant eruditas & summo judicio conscriptas Lectiones Mathematicas Cl. Barovii an. 1666.

Cum vero tanti Geometra incidit mentio, praterire non possum Elementa ab eo edita, in quibus plerumque ipsas Euclidis constructiones & demonstrationes retinet, ne unâ quidem omisâ propositione. Hinc oritur major in demonstrando vis, pulchrior construendi methodus, & ubique Veterum Geometrarum genius clarius elusset, quam in libris istius generis fieri solet. Plura præterea Corollaria & Scholia adiecit, non modo breviori sequentium demonstrationi inservientia, verum etiam aliis in rebus perutilia.


Nihilominus, demonstrationes ejus eâ brevitate laborant, tot symbolis notisque implicantur, ut in Geometriâ parum versato difficiles & obscuræ fiant. Multa propositiones quæ ipsum Euclidem legenti perspicuæ viderentur, Algebraicâ hac demonstrandi methodo tyronibus nodosa & vix intelligibiles redduntur, qualis est V. G. 13. primi Elementi. Demonstrationum, quas in Elemento secundo attulit, difficilis admodum tyronibus est intelligentia; rectius multo Euclides ipse earum evidentiam (ut in re Geometricâ fieri debet) à figurarum contemplatione petiit. Scientiarum omnium Elementa simplicissima
methodo

methodo tradenda sunt, nec symbolis nec notis nec obscuris principis aliunde petitis involvenda.

Ut Elementa Barovii nimia brevitate, sic ea, quæ à Clavio traduntur, molestâ prolixitate peccant. Scholiis enim Commentariisque abundat nimis & luxuriat. Vix equidem arbitror Euclidem tam obscuram esse, ut tantâ farragine notarum indigeat; nec dubito quin tyrones omnes Euclidem ipsum omnibus suis Commentatoribus faciliorem inventuri sint. In demonstrationibus Geometricis ut nimia brevitâs tenebras parit, sic nimia verboritas plus tædii & confusionis quam lucis affert.

Hisce præcipue inductus rationibus, prima sex Euclidis Elementa cum undecimo & duodecimo, ex versione Frederici Commandini in usum Juventutis Celeberrimæ hujus Academiæ per se edenda curavi, à cæteris abstinui, tum quia hæc, quæ jam damus, ad alias plerasque Matheseos partes, quæ nunc vulgo traduntur, intelligendas, sufficiant, tum etiam quia omnia Euclidis opera, Græce & Latine nitidissimis Characteribus adornata summaque cura & fide emendata nuper è prælo Academico prodire.

Porro in gratiam eorum, qui Geometriam Elementarem ad Praxes vitæ commodis inservientes, applicare desiderant, Trigonometriæ Planæ & Sphæricæ compendium adjunxi, cujus Artis ope, magnitudines Geometricæ mensuratur, ipsarumque dimensiones numeris subjiciuntur.



EUCLIDIS

ELEMENTORUM

LIBER PRIMUS.

DEFINITIONES.

I.

Punctum est, cujus nulla est pars, vel quod magnitudinem nullam habet.

II.

Linea vero est longitudo latitudinis expers.

III.

Lineæ termini sunt puncta.

IV.

Recta linea est, quæ ex æquo suis interjicitur punctis.

V.

Superficies est id, quod longitudinem, & latudinem tantum habet.

VI.

Superficiei termini sunt lineæ.

VII.

Plana superficies est quæ ex æquo suis interjicitur lineis.

VIII.

Planus angulus est duarum linearum in plano sese contingentium, & non in directum jacentium, alterius ad alteram inclinatio,

IX.

Quando autem quæ angulum continent rectæ lineæ fuerint, rectilineus angulus appellatur.

A


X.

X.

Cum vero recta linea super rectâ lineâ insitens, eos, qui deinceps sunt angulos, æquales inter se fecerit, rectus est uterque æqualium angulorum: & quæ insitit recta linea perpendicularis vocatur ad eam, cui insitit.

XI.

Obtusus angulus est, qui major est recto.



XII.

Acutus autem, qui recto est minor.

XIII.

Terminus est, quod alicujus extremum est.

XIV.

Figura est, quæ aliquo, vel aliquibus terminis continetur

XV.

Circulus est figura plana, una linea contenta, quæ circumferentia appellatur: ad quam ab uno puncto intra figuram existente omnes rectæ lineæ pertingentes sunt æquales.

XVI.

Hoc autem punctum centrum circuli nuncupatur.

XVII.


Diameter circuli est recta quædam linea per centrum ducta, & ex utraque parte à circumferentia circuli terminata, quæ quidem, & bifariam circulum secat.

XVIII.

Semicirculus est figura, quæ continetur diametro, & ea quæ ex ipsa circuli circumferentia intercipitur.

XIX.

Segmentum circuli est figura, quæ recta linea, & circuli circumferentia continetur.



XX.

XX.

Rectilineæ figuræ sunt, quæ rectis continentur lineis.

XXI.

Trilateræ quidem, quæ tribus.

XXII.

Quadrilateræ, quæ quatuor.

XXIII.

Multilateræ vero, quæ pluribus, quam quatuor rectis lineis comprehenduntur.

XXIV.

Trilaterarum figurarum æquilaterum est triangulum, quod tria latera habet æqualia.

XXV.

Isoceles, five æquicrura, quod duo tantum æqualia latera habet.




XXVI.

Scalenum vero est, quod tria inæqualia habet latera.

XXVII.

Ad hæc, trilaterarum figurarum, rectangulum quidem est triangulum, quod rectum angulum habet.



XXVIII.


Obtusangulum est, quod obtusum habet angulum.

XXIX.

Acutangulum vero, quod tres acutos angulos habet.

XXX.

Quadrilaterarum figurarum quadratum est quod, & æquilaterum est, & rectangulum.



XXXI.

Altera parte longior figura est, quæ rectangula quidem æquilatera vero non est.

XXXII.

Rhombus, quæ æquilatera quidem, sed rectangula non est.

XXXIII.

Rhomboides, quæ, & opposita latera, & oppositos angulos inter se æquales habens, neque æqualatera est, neque rectangula.



XXXIV.

Præter has autem reliquæ quadrilateræ figuræ trapezia vocentur.

XXXV.

Parallelæ, seu æquidistantes rectæ lineæ sunt, quæ cum in eodem sint plano, & ex utraque parte in infinitum producuntur, in neutram partem inter se conveniunt.

POSTULATA.

I.

Postuletur à quovis puncto ad quodvis punctum rectam lineam ducere.

II.

Rectam lineam terminatam, in continuum & directum producere.

III.

Quovis centro, & intervallo circulum describere.

AXIOMATA.

LIBER .I. AXIOMATA.

5

I.

Quæ eidem æqualia, & inter se sunt æqualia.

II.

Et si æqualibus æqualia adjiciantur tota sunt æqualia.

III.

Et si ab æqualibus æqualia auferantur, reliqua sunt æqualia.

IV.

Et si inæqualibus æqualia adjiciantur, tota sunt inæqualia.

V.

Et si ab inæqualibus æqualia auferantur, reliqua sunt inæqualia.

VI.

Et quæ ejusdem duplicia sunt, inter se sunt æqualia.

VII.

Et quæ ejusdem dimidia sunt, inter se sunt æqualia.

VIII.

Et quæ sibi mutuo congruunt, inter se sunt æqualia.

IX.

Totum est sua parte majus.

X.


Duæ rectæ lineæ spatium non comprehendunt.

XI.

Omnes anguli recti inter se æquales sunt.

XII.

Et si in duas rectas lineas recta linea incidens, interiores, & ex eadem parte angulos duobus rectis minores fecerit, rectæ lineæ illæ in infinitum productæ, inter se conveniunt ex ea parte, in qua sunt anguli duobus rectis minores.




Not. Cum plures anguli ad unum punctum existunt, designatur quilibet tribus literis quarum illa quæ est ad verticem anguli, in medio ponitur, V.G. in figura Prop. 13. libri primi angulus à rectis AB, BC comprehensus dicitur angulus ABC & angulus à rectis AB, BE contentus dicitur angulus ABE.

EUCLIDIS ELEMENTORUM

PROPOSITIO I. PROBLEMA.

Super data rectâ lineâ terminatâ, triangulum æquilaterum constituere.


Sit data recta linea terminata AB , oportet super ipsa triangulum æquilaterum constituere. Centro quidem A intervallo autem AB circulus describatur BCD . Et rursum centro B , intervalloque BA describatur circulus ACE , & à puncto C , in quo circuli se invicem secant, ad AB ducantur rectæ lineæ CA CB . Quoniam igitur A centrum est circuli DBC , erit AC ipsi AB æqualis, rursus quoniam B circuli CAE est centrum, erit BC æqualis BA : ostensa est autem & CA æqualis AB . utraque igitur ipsarum CA CB ipsi AB est æqualis. Quæ autem eidem sunt æqualia, & inter æqualia sunt. Ergo CA ipsi CB est æqualis. tres igitur CA AB BC inter se sunt æquales; ac propterea triangulum æquilaterum est ABC , & constitutum est super data recta linea terminata AB , quod fecisse oportebat.



PROP. II. PROBL.

Ad datum punctum, datæ rectæ lineæ æqualem rectæ lineam ponere.

Sit datum quidem punctum A , data vero recta linea BC , oportet ad A punctum, ipsi BC rectæ lineæ æqualem rectæ lineam ponere. Ducatur à puncto A ad C recta linea AC & super ipsâ constituatur triangulum æquilaterum DAC producanturque in directum ipsi DA DC rectæ lineæ AE CG . & centro quidem C , intervallo autem BC circulus K BGH describatur. Rursusque centro D , & intervallo DG describatur circulus GKL . Quoniam igitur punctum C centrum est BGH circuli, erit BC ipsi CG æqualis. Et rursus quoniam D centrum est circuli GKL , erit DL æqualis DG : quarum DA est æqualis DC . reliqua igitur AL reliquæ GC est æqualis. Ostensum autem




autem est BC æqualis CG . Quare utraque ipsarum AL BC est æqualis ipsi C G . Quæ autem eidem æqualia sunt, & inter se sunt æqualia. Ergo, & AL est æqualis BC . Ad datum igitur punctum A datæ rectæ lineæ BC æqualis posita est AL . Quod facere oportebat.

PROP. III. PROBL.

Duabus datis rectis lineis inæqualibus à majore minori æqualem abscindere.

Sint datæ duæ rectæ lineæ inæquales AB & C ; quarum major sit AB . oportet à majore AB minori C æqualem rectam lineam abscindere. Ponatur ad A punctum ipsi C æqualis recta linea AD , & centro quidem A , intervallo autem AD circulus describatur DEF . Et quoniam A centrum est DEF circuli, erit AE ipsi AD æqualis. Sed & C æqualis AD . Utraque igitur ipsarum AEC ipsi AD æqualis erit. Quare & AE ipsi C est æqualis. Duabus igitur datis rectis lineis inæqualibus AB & C à majore AB minori C æqualis Abscissa est. Quod fecisse oportebat.




a Per antecedentem,
b post 3.

c Axiom. 1.

PROP. IV. THEOR.

Si duo triangula duo latera duobus lateribus æqualia habeant, alterum alteri; habeant autem, & angulum angulo æqualem, qui æqualibus rectis lineis continentur: Et basim basi æqualem habebunt; & triangulum triangulo æquale erit; & reliqui anguli reliquis angulis æquales, alter alteri; quibus æqualia latera subtenduntur.

Sint duo triangula ABC DEF , quæ duo latera AB AC duobus lateribus DE DF æqualia habeant, alterum alteri, videlicet latus quidem AB lateri DE æquale, latus vero AC ipsi DF ; & angulum BAC angulo EDF æqualem. Dico, & basim BC basi EF æqualem esse, & triangulum ABC æquale triangulo DEF , & reliquos angulos reliquis angulis æ-




æquales, alterum alteri, quibus æqualia latera subtenduntur, nempe angulum ABC angulo DEF : & angulum ACB angulo DCE . Triangulo enim ABC applicato ipsi DEF , & puncto quidem A posito in D , recta vero linea AB in ipsa DE : & punctum B puncto E congruet; quod AB ipsi DE sit æqualis. Congruente autem AB ipsi DE ; congruet & AC recta linea rectæ lineæ DF cum angulus BAC sit æqualis angulo EDF . Quare, & C congruet ipsi F : est enim recta linea AC æqualis rectæ DF . Sed, & punctum B congruebat puncto E . Ergo, & basis BC basi EF congruet. Nam si puncto quidem B congruente ipsi E , C vero ipsi F ; basis BC basi EF non congruit; duæ rectæ lineæ spatium comprehendunt: quod fieri non potest. Congruet igitur BC basi, basi EF , & ipsi æqualis erit. Quare, & totum ABC triangulum congruet toti triangulo DEF , & ipsi erit æquale; & reliqui anguli reliquis angulis congruent, & ipsis æquales ^b erunt. Videlicet angulus ABC angulo DEF , & angulus ACB angulo DCE . Si igitur duo triangula duo latera duobus lateribus æqualia habeant, alterum alteri, habeant autem & angulum angulo æqualem, qui æqualibus rectis lineis continentur: & basim basi æqualem habebunt; & triangulum triangulo æquale erit; & reliqui anguli reliquis angulis æquales, alter alteri, quibus æqualia latera subtenduntur: quod ostendere oportebat.

PROP. V. THEOR.

Isosceles triangulorum qui ad basim sunt anguli inter se sunt æquales, & productis æqualibus rectis lineis, anguli qui sunt sub basi inter se æquales erunt.

Sit isosceles triangulum ABC ; habens AB latus lateri AC æquale, & producantur in directum ipsis AB AC rectæ lineæ BD CE . Dico angulum quidem ABC angulo ACB , angulum vero CBD angulo BCE æqualem esse. Sumatur enim in linea BD , quodvis punctum F : atque à majore AE minori AF æqualis ^a auferatur AG : junganturque FC , GB . Quoniam igitur AF est æqualis AG ; AB vero ipsi AC ; duæ FA AC , duabus GA AB æquales sunt, altera alteri; & angulum FAG communem continent, basis igitur FC basi GB est ^b æqualis, & triangulum AFC æquale triangulo AGB ; & reliqui anguli, reliquis angulis æquales erunt, alter alteri; quibus æqualia latera



^a 3. hujus.

^b 4. hujus.

latera subtenduntur: Videlicet angulus quidem ACF æqualis angulo ABG ; angulus vero AFC ; angulo AGB . Et quoniam tota AF , toti AG est æqualis; quarum AB est æqualis AC ; erit & reliqua BF reliquæ CG æqualis. Oſtenſa eſt *Axiom. 3.* autem FC æqualis GB . duæ igitur BF , FC duabus CG GB æquales ſunt, altera alteri; & angulus BFC æqualis angulo CGB : eſtque baſis ipſorum BC communis. Ergo & triangulum BFC triangulo CGB æquale erit; & reliqui anguli reliquis angulis æquales, alter alteri; quibus æqualia latera ſubtenduntur. Angulus igitur FBC eſt æqualis angulo GCB ; & angulus BCF angulo CBG . Itaque quoniam totus ABG angulus toti angulo ACF æqualis oſtenſus eſt, quorum angulus CBG eſt æqualis ipſi BCF : erit reliquus ABC reliquo ACB æqualis: & ſunt ad baſim ABC trianguli: oſtenſus autem eſt & FBC angulus æqualis angulo GCB ; qui ſunt ſub baſi. Iſoſcelium igitur triangulorum, qui ad baſim ſunt anguli inter ſe ſunt æquales, & productis æqualibus rectis lineis anguli, qui ſunt ſub baſi inter ſe æquales erunt. Quod oſtendiſſe oportebat.


Cor. Hinc omne triangulum æquilaterum eſt quoque æquiangulum.

PROP. VI. THEOR.

Si trianguli duo anguli inter ſe ſint æquales, & æquales angulos ſubtendentia latera inter ſe æqualia erunt.

Sit triangulum ABC , habens angulum ABC angulo ACB æqualem. Dico & AB latus lateri AC æquale eſſe: Si enim inæqualis eſt AB ipſi AC ; altera ipſarum eſt maior. Sit maior AB ; atque à majori AB minori AC æqualis *a* auferatur DB ; & DC jungatur. Quoniam igitur DB eſt æqualis ipſi AC ; communis autem BC : erunt duæ DB BC duabus AC CB æquales, altera alteri; & angulus DBC æqualis angulo ACB ex hyp. Baſis igitur DC baſi AB eſt *b* æqualis, & triangulum DBC æquale triangulo ACB , minus majori; quod eſt abſurdum. Non igitur inæqualis eſt AB ipſi AC . Ergo æqualis erit. Si igitur trianguli duo anguli inter ſe ſint æquales & æquales angulos ſubtendentia latera inter ſe æqualia erunt: quod monſtraſſe oportuit.

Cor. Hinc omne triangulum æquiangulum eſt quoque æquilaterum.



a 3. hujus.

b 4. hujus.

PROP. VII. THEOR.

In eadem recta linea, duabus eisdem rectis lineis, a duæ rectæ lineæ æquales, altera alteri non constituentur ad aliud, atque aliud punctum, ad easdem partes, eosdem, quos primæ rectæ lineæ, terminos habentes.


Si enim fieri potest, in eadem recta linea AB duabus dem rectis, lineis AC CB aliæ duæ rectæ lineæ AD DB quales, altera alteri constituentur ad aliud, atque aliud punctum C & D; ad easdem partes ut ad C & D, eosdem habentes terminos A & B, quos primæ rectæ lineæ, ita ut CA quidem sit æqualis DA, eundem, quem ipsa terminum, habens A; CB vero sit æqualis DB, eundem habens B terminum; & CD jungatur. Itaque quoniam AC est æqualis AD; erit, & angulus ACD angulo ADC æqualis. Major igitur est ADC angulus angulo BCD. Quare angulus BDC angulo BCD multo major erit. Rursus quoniam CB est æqualis DB & angulus BDC æqualis erit angulo BCD: ostensus autem est ipso multo major; quod fieri non potest. Non igitur in eadem recta linea duabus dem rectis lineis aliæ duæ rectæ lineæ æquales, altera alteri constituentur ad aliud atque aliud punctum, ad easdem partes, eosdem, quos primæ rectæ lineæ, terminos habentes quod ostendisse oportebat.



PROP. VIII. THEOR.

Si duo triangula duo latera duobus lateribus æqualia habeant, alterum alteri; habeant autem, & basim bæ æqualem; angulum quoque, qui æqualibus lateribus continetur angulo æqualem habebunt.

Sint duo triangula ABC, DEF, quæ duo latera AB, AC, duobus lateribus DE, DF æqualia habeant alterum alteri; ut sit AB quidem æquale DE; AC vero ipsi DF: habeant autem, & basim BC basi EF æqualem.



Dico angulum quoque BAC angulo EDF æqualem esse. Triangulo enim ABC applicato ipsi DEF triangulo, & puncto quidem B posito in E ; recta vero linea BC in EF : congruet, & C punctum puncto F , quoniam BC ipsi EF est æqualis. Itaque congruente BC ipsi EF ; congruent & BA AC ipsi ED DF . si enim basis quidem BC basi EF congruit; latera autem BA AC lateribus ED DF non congruunt, sed situm mutant; ut EG GF : constituentur in eadem recta linea, duabus eisdem rectis lineis, aliæ duæ rectæ lineæ æquales, altera alteri; ad aliud atque aliud punctum; ad easdem partes; eosdem habentes terminos. non constituuntur autem; ut demonstratum est. non igitur, si basis BC congruit basi EF , ^{a per 7. hujus.} non congruent & BA AC latera lateribus ED DF . congruent ^{ius.} igitur. Quare & angulus BAC angulo EDF congruet, & ipsi erit æqualis. Si igitur duo triangula, duo latera, duobus lateribus æqualia habeant, alterum alteri; habeant autem & basim basi æqualem: angulum quoque æqualibus lateribus contentum angulo æqualem habebunt: quod demonstrare oportebat.

PROP. IX. PROBL.

Datum angulum rectilineum bifariam secare.

Sit datus angulus rectilineus BAC . itaque oportet ipsum bifariam secare. Sumatur in linea AB quodvis punctum D ; & à linea AC ipsi AD æqualis ^a auferatur AE ; junctaque DE constituatur super ea triangulum æquilaterum DEF ; & AF jungatur. Dico angulum BAC à recta linea AF bifariam secari. Quoniam enim AD est æqualis AE ; communis autem AF : duæ DA AF duabus EA AF æquales sunt, altera alteri; & basis DF æqualis basi EF . angulus ^c igitur DAF angulo EAF est æqualis. quare datus angulus rectilineus BAC à recta linea AF bifariam sectus est; quod facere oportebat.



^a 3. hujus.

^b 1. hujus.


^c 8. hujus.

PROP. X. PROBL.

Datum rectam lineam terminatam bifariam secare.

Sit data recta linea terminata AB ; oportet ipsam AB bifariam secare. constituatur super ^a ea triangulum æquilaterum ABC ; ^{a 1. hujus.} &


69. hujus. & secetur ACB angulus b bifariam recta linea CD . Dico AB rectam lineam in puncto D bifariam secari. Quoniam enim AC est æqualis CB ; communis autem CD ; duæ AC CD duabus BC CD æquales sunt; altera alteri; & angulus ACD æqualis angulo BCD . basis igitur AD basi BD est c æqualis. Et ob id recta linea terminata AB bifariam secta est in puncto D : quod facere oportebat.



PROP. XI. PROBL.

Data rectæ lineæ à puncto in ipsa dato ad rectos angulos rectam lineam ducere.

- Sit data recta linea AB , & datum in ipsa punctum C . oportet à puncto C ipsi AB ad rectos angulos rectam lineam ducere. Sumatur in AC quodvis punctum D : ipsique CD æqualis a ponatur CE , & super DE constituatur b triangulum æquilaterum FDE , & FC jungatur. Dico datæ rectæ lineæ AB à puncto C in ipsa dato, ad rectos angulos ductam esse FC . Quoniam enim DC est æqualis CE , & FC communis; erunt duæ DC CF duabus EC CF æquales, altera alteri; & basis DE est æqualis basi FE . angulus igitur DCF angulo ECF est æqualis, & sunt deinceps. Quando autem recta linea super rectam lineam insitens, eos qui deinceps sunt, angulos æquales inter se fecerit: rectus c est uterque æqualium angulorum. ergo uterque ipsorum DCF FCE est rectus. Datæ igitur rectæ lineæ AB à puncto in ipsa dato C ad rectos angulos ducta est FC recta linea. Quod fecisse oportuit.




PROP. XII. PROBL.

Super data recta linea infinita, à dato puncto, quod in ea non est, perpendicularem rectam lineam ducere.

Sit data quidem recta linea infinita AB , datum vero punctum C , quod in ea non est. Oportet super data recta linea

linea infinita AB, à dato puncto C, quod in ea non est,

perpendicularem rectam lineam ducere. Sumatur enim ad alteras partes ipsius AB rectæ lineæ quodvis punctum D: & centro quidem C, intervallo autem CD circulus a describatur AEDG: & EG in H bifariam b secetur: junganturque CG CH




a Postul. 3.
b 10. hujus.

CE, Dico super data recta linea infinita AB, à dato puncto C, quod in ea non est, perpendicularem CH ductam esse. Quoniam enim æqualis est GH ipsi HE, communis autem HC, duæ GH HC, duabus EH HC æquales sunt, alter alteri; & basis CG est æqualis basi CE. Angulus igitur CHG angulo CHE est c æqualis, & sunt deinceps, cum autem recta c 8. hujus. linea super rectam lineam insitens, eos qui deinceps sunt angulos, æquales inter se fecerit; rectus d est uterque æqualium d Diffin. 10. angulorum & quæ insitit recta linea perpendicularis appellatur ad eam, cui insitit. ergo super data recta linea infinita AB à dato puncto C, quod in ea non est, perpendicularis ducta est GH. Quod facere oportebat.

PROP. XIII. THEOR.

Cum recta linea super rectam consistens lineam angulos fecerit, vel duos rectos, vel duobus rectis æquales efficiet.

Recta enim linea quædam AB super rectam CD consistens angulos faciat CBA ABD. Dico CBA ABD angulos; vel duos rectos esse, vel duobus rectis æquales, si enim CBA est æqualis ipsi ABD; duo recti a sunt; sin minus, ducatur à puncto B ipsi CD ad rectos b angulos BE. anguli igitur CBE EBD sunt duo recti. Et quoniam CBE, duobus CBA ABE est æqualis, communis apponatur EBD: ergo anguli CBE EBD tribus angulis CBA ABE EBD sunt c æquales. Rursus c Axiom. 2. quoniam DBA angulus est æqualis duobus DBE EBA, communis apponatur ABC. anguli igitur DBA ABC tribus DBE EBA ABC æquales sunt. At ostensum est angulos quoque CBE EBD eisdem tribus æquales esse: quæ vero eidem sunt æqualia, d & inter se æqualia sunt: ergo & anguli CBE EBD d Axiom. 1. ipsis DBA ABC sunt æquales, suntque CBE EBD duo recti anguli



a Diffin. 10.
b 11. hujus.

anguli igitur $\angle DBA$ $\angle ABC$ duobus rectis æquales erunt, ergo cum recta linea super rectam lineam constitens angulos teret, vel duos rectos, vel duobus rectis æquales efficiet. Quod oportebat demonstrare.

PROP. XIV. THEOR.


Si ad aliquam rectam lineam, atque ad punctum in ea duæ rectæ lineæ non ad easdem partes positæ, angulos qui deinceps sunt, duobus rectis æquales fecerint; ipsæ rectæ lineæ in directum sibi invicem erunt.

Ad aliquam enim rectam lineam AB , atque ad punctum in ea B , duæ rectæ lineæ BC BD non ad easdem partes positæ angulos, qui deinceps sunt, $\angle ABC$ $\angle ABD$ duobus rectis æquales faciant. Dico BD ipsi CB in directum esse. si enim BD

non est in directum ipsi CB , sit ipsi CB in directum BE . Quo-

nia igitur recta linea AB super rectam CBE constitit; anguli $\angle ABC$ $\angle ABE$ a duobus rectis sunt æquales. Sed & anguli

$\angle ABC$ $\angle ABD$ sunt æquales duobus rectis. Anguli igitur $\angle CBA$ $\angle ABE$ ipsi $\angle CBA$ $\angle ABD$ æquales erunt. Communis auferatur $\angle ABC$. Ergo reliquus $\angle ABE$ reliquo $\angle ABD$ est æqualis, minor majori quod fieri non potest. Non igitur BE est in directum ipsi BC . Similiter ostendemus neque aliam quampiam esse, præter BD . Ergo CB ipsi BD in directum erit. Si igitur ad aliquam rectam lineam, atque ad punctum in ea duæ rectæ lineæ non ad easdem partes positæ angulos, qui deinceps sunt; duobus rectis æquales fecerint, ipsæ rectæ lineæ in directum sibi invicem erunt. Quod demonstrare oportebat.




a 13. hujus.

PROP. XV. THEOR.

Si duæ rectæ lineæ se invicem secuerint, angulos qui ad verticem sunt, inter se æquales efficient.

Duæ enim rectæ lineæ AB CD se invicem secant in puncto E . Dico angulum quidem $\angle AEC$ angulo $\angle DEB$; angulum vero $\angle CEB$ angulo $\angle AED$ æqualem esse. Quoniam enim recta linea AE super rectam CD con-



a 13. hujus.

sistens angulos facit $\angle CEA$ $\angle AED$; erunt hi a duobus rectis æquales.

æquales. Rursus quoniam recta linea DE super rectam AB consistens facit angulos AED DEB; erunt AED DEB anguli æquales a duobus rectis. Ostensum autem est angulos quoque CEA AED duobus rectis esse æquales. Anguli igitur CEA AED angulis AEC DEB æquales sunt. Communis auferatur AED. Ergo reliquus b CEA reliquo BED est æqua- b Axiom. 3. lis. Simili ratione, & anguli CEB DEA æquales ostenduntur. Si igitur duæ rectæ lineæ se invicem secuerint, angulos, qui ad verticem sunt, æquales efficient. Quod ostendere oportebat.

Cor. 1. Ex hoc manifeste constat duas rectas lineas se invicem secantes, facere angulos ad sectionem quatuor rectis æquales.


Cor. 2. Omnes anguli circa unum punctum constituti conficiunt angulos quatuor rectis æquales.

PROP. XVI. THEOR.

Omnis trianguli uno latere producto exterior angulus utrovis interiore, & opposito est major.

Sit triangulum ABC, & unum ipsius latus BC ad D producat. Dico exteriorem angulum ACD utrovis interiore, & opposito, videlicet CBA, & BAC majorem esse.

Secetur enim AC bifariam a in E, & juncta BE producat ad F; ponaturque ipsi BE æqualis EF. Jungatur præterea FC, & AC ad G producat. Quoniam igitur AE quidem est æqualis EC, BE vero ipsi EF, duæ AEEB duabus CEEF æquales sunt, altera alteri: & angulus AEB angulo FEC est æqualis b, ad verticem enim sunt. Basis igitur AB æqualis c est basi FC; & AEB triangulum triangulo FEC & reliqui anguli reliquis angulis æquales, alter alteri, quibus æqualia latera subtenduntur. Ergo angulus BAE est æqualis angulo ECF. Sed ECD angulus major est ipso ECF. Major igitur est angulus ACD angulo BAE. Similiter recta linea BC bifariam secta, ostendetur etiam BCG angulus, hoc est ACD angulus angulo ABC major. Omnis igitur trianguli uno latere producto exterior angulus utrovis interiore, & opposito major est. Quod oportebat demonstrare.



PROP. XVII. THEOR.

Omnis trianguli duo anguli duobus rectis minores sunt quomodocunque sumpti.

Sit triangulum ABC . Dico ipsius ABC trianguli duos angulos quomodocunque sumptos duobus rectis minores esse.


Producatur enim BC ad D . Et quoniam trianguli ABC exterior

a 16. hujus. ACD major *a* est

interiore, & opposito ABC : communis apponatur ACB . Anguli igitur ACD ACB angulis ABC ACB majores sunt.

b 13. hujus. Sed ACD ACB sunt *b* æquales

duobus rectis. Ergo ABC BCA duobus rectis sunt minores. Similiter demonstrabimus angulos quoque BAC ACB itemque CAB ABC duobus rectis minores esse. Omnis igitur trianguli duo anguli duobus rectis minores sunt; quomodocunque sumpti. Quod demonstrare oportebat.



PROP. XVIII. THEOR.

Omnis trianguli majus latus majorem angulum subtendit.


Sit triangulum ABC habens latus AC latere AB majus. Dico, & ABC angulum angulo BCA majorem esse. Quoniam enim AC major est, quam

AB , ponatur ipsi AB æqualis AD ; & BD jungatur. Et quoniam trianguli BDC exterior angulus est ADB , erit is major *a* interiore, & opposito DCB .

a 16 hujus.

b 5. hujus.

Sed ADB æqualis *b* est ipsi ABD , quod & latus AB lateri AD sit æquale, major igitur est & ABD angulus angulo ACB quare ABC ipso ACB multo major erit. Omnis igitur trianguli majus latus majorem angulum subtendit: quod oportebat demonstrare.




PROP. XIX. THEOR.

Omnis trianguli major angulus majus latus subtendit.

Sit triangulum ABC majorem habens ABC angulum angulo BCA . Dico & latus AC latere AB majus esse. Si enim

non

non est majus, vel AC est æquale ipsi AB , vel ipso minus, æquale igitur non est, nam & angulus ABC angulo ACB æqualis a esset; non est autem. Non igitur AC ipsi AB est æquale. Sed neque minus. esset enim & angulus ABC angulo ACB minor b . atque non est, non igitur AC minus est ipso AB . Ostensum autem est neque æquale esse: ergo AC ipso AB est majus. Omnis igitur trianguli major angulus majus latus subtendit. Quod oportebat demonstrare.




a 5. hujus.

b 18. hujus.

PROP. XX. THEOR.

Omnis trianguli duo latera reliquo majora sunt, quomodocunque sumpta.

Sit enim triangulum ABC . Dico ipsius ABC trianguli duo latera reliquo majora esse, quomodocunque sumpta: videlicet latera quidem BA AC majora latere BC ; latera vero AB BC majora latere AC : & latera BC CA majora ipso AB . producat enim BA ad punctum D ; ponaturque ipsi CA æqualis AD a ; & DC jungatur. quoniam igitur DA est æqualis AC erit & angulus ADC angulo ACD æqualis b .



a 3. hujus.

b 5. hujus.


Sed BCD angulus major est angulo ACD . Angulus igitur BCD angulo ADC est major; Et quoniam triangulum est DCB habens BCD angulum majorem angulo ADC : majorem autem angulum majus latus subtendit c : erit latus DB latere BC majus. sed DB est æquale ipsis BA AC . quare latera BA AC ipso BC majora sunt. similiter ostendemus, & latera quidem AB BC majora esse latere CA : latera vero BC CA ipso AB majora. Omnis igitur trianguli duo latera reliquo majora sunt, quomodocunque sumpta. Quod ostendere oportebat.

PROP. XXI. THEOR.

Si à terminis unius lateris trianguli due rectæ lineæ intra constituentur, hæ reliquis duobus trianguli lateribus minores quidem erunt, majorem vero angulum continebunt.

Trianguli enim ABC in uno latere BC à terminis B C duæ rectæ lineæ intra constituentur BD DC . Dico BD DC reliquis duobus trianguli lateribus BA AC minores quidem

esse, vero continere angulum BDC majorem angulo BAC . producatur enim BD ad E . & quoniam omnis trianguli duo latera reliquo sunt majora ϵ erunt trianguli ABE duo latera BA AE majora latere BE . communis apponatur EC . ergo



ϵ 20. hujus.

ϵ Axiom. 4.


ϵ 16. hujus.

BA AC ipsis BE EC majora ϵ sunt. rursus quoniam CED trianguli duo latera CE ED sunt majora latere CD , communis apponatur DB . quare CE EB ipsis CD DB sunt majora ϵ . Sed ostensum est BA AC majora esse BE EC . multo igitur BA AC ipsis BD DC majora sunt. rursus quoniam omnis trianguli exterior angulus interiore & opposito est major ϵ : erit trianguli CDE exterior angulus BDC major ipso CED . Eadem ratione & trianguli ABE exterior angulus CEB ipso BAC est major ϵ sed angulus BDC ostensus est major angulo CEB . multo igitur BDC angulus angulo BAC major erit. Quare si à terminis unius lateris trianguli duæ rectæ lineæ intra constituentur, hæ reliquis duobus trianguli lateribus minores quidem erunt, majorem vero angulum continebunt. Quod demonstrare oportebat.

PROP. XXII. PROBL.

Ex tribus rectis lineis, quæ tribus rectis lineis datis æquales sint, triangulum constituere. Oportet autem duas reliqua majores esse, quomodocunque sumptas; quoniam omnis trianguli duo latera reliquo majora sunt, quomodocunque sumpta.

Sint tres datæ rectæ lineæ A B C , quarum duæ reliqua majores sint, quomodocunque sumptæ, ut scil. A B quidem sint majores quam C , A C vero majores quam B , & præterea B C majores quam A . Itaque oportet ex rectis lineis æqualibus ipsis A B C triangulum constituere exponatur aliqua recta linea DE , terminata quidem ad D , infinita vero ad E , & ponatur




ponatur ipsi quidem A æqualis DF , ipsi vero B æqualis FG , ^{a 3. hujus.}
 & ipsi C æqualis GH : & centro F , intervallo autem FD
 circulus ^b describatur DKL . rursusque centro G , & intervallo ^{b 3. Postul.}
 GH alius circulus KLH describatur, & jungantur KF KG .
 Dico ex tribus rectis lineis æqualibus ipsis ABC triangulum
 KFG constitutum esse, quoniam enim punctum F centrum
 est DKL circuli; erit FD æqualis FK . sed FD est æqualis ^{c diffn. 15.}
 A . Ergo & FK ipsi A est æqualis. rursus quoniam punctum
 G centrum est circuli LKH , erit GH æqualis GK . sed GH
 est æqualis C . ergo & GK ipsi C æqualis erit. est autem &
 FG æqualis B : tres igitur rectæ lineæ KF FG GK tribus
 ABC æquales sunt. Quare ex tribus rectis lineis KF FG GK ,
 quæ sunt æquales tribus datis rectis lineis ABC , triangulum
 constitutum est KFG . Quod facere oportebat.

PROP. XXIII. PROBL.

*Ad datam rectam lineam, & ad datum in ea punctum,
 dato angulo rectilineo æqualem angulum rectilineum
 constituere.*

Sit data quidem recta linea AB , datum vero in ipsa pun-
 ctum A ; & datus angulus rectilineus DCE . Oportet igitur
 ad datam rectam lineam AB , & ad datum in ea punctum A
 dato angulo rectilineo
 DCE , æqualem angulum
 rectilineum constituere.
 sumantur in utraque ip-
 sarum CD CE quævis
 puncta D E , ducaturque
 DE , & ex tribus rectis
 lineis, quæ æquales sint
 tribus CD DE EC trian-
 gulum ^a constituatur AFG ,
 ita ut CD sit æqualis AF , & CE ipsi AG , & DE ipsi FG .
 Itaque quoniam duæ DC CE duabus FA AG æquales sunt,
 altera alteri, & basis DE est æqualis basi FG : erit & an-
 gulus DCE angulo FAG æqualis ^b. Ad datam igitur rectam ^{b 8. hujus.}
 lineam AB , & ad datum in ea punctum A , dato angulo
 rectilineo DCE æqualis angulus rectilineus constitutus est
 FAG . Quod facere oportebat.




^a 22. hujus.

PROP. XXIV. PROBL.

*Si duo triangula duo latera duobus lateribus æqualia ha-
 beat, alterum alteri, angulum autem angulo mayo-
 rem,*

rem, qui æqualibus rectis lineis continetur: & basim basi majorem habebunt.

Sint duo triângula ABC DEF , quæ duo latera AB AC duobus lateribus DE DF æqualia habeant, alterum alteri, videlicet latus quidem AB æquale lateri DE ; latus vero AC æquale DF : At angulus BAC angulo EDF fit major. Dico, & basim BC basi EF majorem esse. quoniam enim angulus BAC major est angulo



- a* 23. hujus. EDF , constituatur a ad rectam lineam DE ; & ad punctum in ea D , angulo BAC æqualis angulus EDG , ponaturque alterutri ipsarum AC DF æqualis b DG , & GE FG jungantur. itaque quoniam AB quidem est æqualis DE , AC vero ipsi DG ; duæ BA AC duabus ED DG æquales sunt, altera alteri; & angulus BAC est æqualis angulo EDG , ergo basis BC basi EG est c æqualis. rursus quoniam æqualis est DG ipsi DF ; est angulus DFG angulo DGF d æqualis: erit itaque DFG angulus angulo EGF major. multo igitur major est EGF angulus ipso EGF . & quoniam triângulum est EGF , angulum EGF majorem habens angulo EGF ; majiori *e* 19. hujus. autem angulo latus majus subtenditur e ; erit & latus EG latere EF majus. sed EG latus est æquale lateri BC . Ergo, & BC ipso EF majus erit. Si igitur duo triângula duo latera duobus lateribus æqualia habeant, alterum alteri, angulum autem angulo majorem, qui æqualibus rectis lineis continetur: & basim basi majorem habebunt. Quod oportebat demonstrare.


PROP. XXV. THEOR.

Si duo triângula duo latera duobus lateribus æqualia habeant, alterum alteri, basim vero basi majorem: & angulum angulo, qui æqualibus lateribus continetur, majorem habebunt.

Sint duo triângula ABC DEF , quæ duo latera AB AC duobus lateribus DE DF æqualia habeant, alterum alteri, videlicet latus AB æquale lateri DE , & latus AC lateri DF : basis autem BC basi EF sit major. Dico, & angulum

BAC

BAC angulo EDF majorem esse. Si enim non est major, vel æqualis est, vel minor. Æqualis autem non est angulus BAC angulo EDF: esset enim, & basis BC basi EF æqualis ^a. Non est autem. Non igitur æqualis est BAC angulus angulo EDF. Sed neque minor. minor enim esset ^b, & basis BC basi EF. Atqui non est. Non igitur angulus BAC angulo EDF est minor. ostensum autem est neque esse æqualem. Ergo angulus BAC angulo EDF necessario major erit. Si igitur duo triangula duo latera duobus lateribus æqualia habeant, alterum alteri, basim vero basi majorem; & angulum angulo qui æqualibus lateribus continetur, majorem habebunt. Quod demonstrare oportebat.



a 4. hujus.


b 24. hujus.

PROP. XXVI THEOR.

Si duo triangula duos angulos duobus angulis æquales habeant, alterum alteri, unumque latus uni lateri æquale, vel quod æqualibus adjacet angulis, vel quod uni æqualium angulorum subtenditur; & reliqua latera reliquis lateribus æqualia, alterum alteri, & reliquum angulum reliquo angulo æqualem habebunt.

Sint duo triangula ABC DEF, quæ duos angulos ABC BCA duobus angulis DEF EFD æquales habeant, alterum alteri, videlicet angulum quidem ABC æqualem angulo DEF; angulum vero BCA angulo EFD. Habeant autem,

& unum latus uni lateri æquale, & primo quod æqualibus adjacet angulis; nempe latus BC lateri EF. Dico, & reliqua latera reliquis lateribus æqualia habere; alterum alteri, latus. sc. AB lateri DE; & latus AC ipsi DF, & reliquum




angulum BAC, reliquo angulo EDF æqualem. Si enim inæqualis est AB ipsi DE, una ipsarum major est. Sit major AB, ponaturque GB æqualis DE; & GC jungatur. Quoniam igitur BG quidem est æqualis DE, BC vero ipsi EF, duæ GB BC duabus DE EF æquales sunt, altera alteri: & angulus GBC æqualis angulo DEF. basis igitur GC basi DF est ^a æqualis; & GBC triangulum triangulo DEF, & reliquum

a 4. hujus.

liqui anguli reliquis angulis æquales, alter alteri, quibus æqualia latera subtenduntur. ergo $\angle C B A$ angulus est æqualis angulo $\angle D F E$. sed angulus $\angle D F E$ angulo $\angle B C A$ æqualis ponitur. quare, & $\angle B C G$ angulus angulo $\angle B C A$ est æqualis, minor majori, quod fieri non potest. non igitur inæqualis est $A B$ ipsi $D E$. ergo æqualis erit. est autem, & $B C$ æqualis $E F$. Itaque duæ $A B B C$ duabus $D E E F$ æquales sunt, altera alteri, & angulus $\angle A B C$ æqualis angulo $\angle D E F$. Basis igitur $A C$ basi $\angle D F$, & reliquus angulus $\angle B A C$ reliquo angulo $\angle E D F$ est æqualis. Sed rursus sint latera, quæ æqualibus angulis subtenduntur æqualia, ut $A B$ ipsi $D E$. Dico rursus, &

reliqua latera reliquis lateribus æqualia esse; $A C$ quidem ipsi $D F$, $B C$ vero ipsi $E F$: & adhuc reliquum angulum $\angle B A C$ reliquo angulo $\angle E D F$ æqualem. Si enim inæqualis est $B C$ ipsi $E F$, una ipsarum major est. Sit major $B C$, si fieri potest, ponaturque $B H$ æqualis $E F$, & $A H$ jungatur. Quoniam igitur $B H$ quidem est æqualis $E F$, $A B$ vero ipsi $D E$; duæ $A B B H$ duabus $D E E F$ æquales sunt, altera alteri, & angulos æquales continent; ergo $\angle$ basis $A H$ basi $D F$ est æqualis: & $\triangle A B H$ triangulum triangulo $\triangle D E F$ & reliqui anguli reliquis angulis æquales erunt, alter alteri, quibus æqualia latera subtenduntur. Æqualis igitur est angulus $\angle B H A$ angulo $\angle E F D$. sed $\angle E F D$ est æqualis $\angle$ angulo $\angle B C A$. Ergo, & $\angle B H A$ angulus angulo $\angle B C A$ est æqualis. trianguli igitur $\triangle A H C$ exterior angulus $\angle B H A$ æqualis est interiori & opposito $\angle B C A$, quod fieri non potest. quare non inæqualis est $B C$ ipsi $E F$. æqualis igitur. est autem, & $A B$ æqualis $D E$. duæ igitur $A B B C$ duabus $D E E F$ æquales sunt, altera alteri: angulosque æquales continent. quare basis $A C$ æqualis est basi $D F$, & $\triangle B A C$ triangulum triangulo $\triangle D E F$, & reliquus angulus $\angle B A C$ reliquo angulo $\angle E D F$ est æqualis. Si igitur duo triangula duos angulos duobus angulis æquales habeant, alterum alteri, unumque latus uni lateri æquale, vel quod æqualibus adjacet angulis, vel quod uni æqualium angulorum subtenditur; & reliqua latera reliquis lateribus æqualia, alterum alteri, & reliquum angulum reliquo angulo æqualem habebunt, Quod oportebat demonstrare.



ex hyp.


c 16. hujus.

PROP. XXVII. THEOR.

Si in duas rectas lineas recta linea incidens alternos angulos inter se æquales fecerit, parallelæ erunt rectæ lineæ.

In duas enim rectas lineas AB CD , recta linea EF incidens alternos angulos AEF EFD æquales inter se faciat. dico rectam lineam AB ipsi CD parallelam esse. Si enim non est parallela, productæ

AB CD , vel ad partes B D convenient, vel ad partes A C producantur, convenientque ad partes B D in puncto G . itaque GEF trianguli exterior angulus AEF major ^a est interiore & opposito EGF . sed &



^a 16. hujus.


æqualis ^b, quod fieri non potest. non igitur AB CD productæ ^b ex hyp. ad partes BD convenient. similiter demonstrabitur neque convenire ad partes AC . quæ vero in neutras partes conveniunt, parallelæ ^c inter se sunt. parallela igitur est AB ipsi CD . Quare si in duas rectas lineas recta linea incidens alternos angulos inter se æquales fecerit, parallelæ inter se erunt rectæ lineæ, quod ostendere oportebat. Diffin. 35.

PROP. XXVIII. THEOR.

Si in duas rectas lineas recta linea incidens exteriorem angulum interiori, & opposito, & ad easdem partes æqualem fecerit, vel interiores, & ad easdem partes duobus rectis æquales; parallelæ erunt inter se rectæ lineæ.

In duas enim rectas lineas AB CD recta linea EF incidens exteriorem angulum EGB interiori, & opposito GHD æqualem faciat; vel interiores & ad easdem partes BGH GHD , duobus rectis æquales.

dico rectam lineam AB rectæ CD parallelam esse. Quoniam enim EGB angulus æqualis est ^a angulo GHD , angulus autem EGB angulo AGH ^b, erit & angulus AGH angulo GHD æqualis: & sunt alterni. parallela igitur est AB ipsi CD .



^a Ex hyp.

^b 15. hujus.

rursus quoniam anguli BGH GHD ^c Ex antecedente. GHD duobus rectis sunt æquales ^a, & sunt AGH BGH æ-

^c B 4

quales


d 13. hujus. quales duobus rectis $\angle$: erunt anguli AGH BGH angulis BGH GHD æquales. communis auferatur BGH . reliquus igitur AGH est æqualis reliquo GHD : & sunt alterni. ergo AB ipsi CD parallela erit. Si igitur in duas rectas lineas recta linea incidens exteriorem angulum interiori, & opposito, & ad easdem partes æqualem fecerit, vel interiores, & ad easdem partes duobus rectis æquales; parallelæ erunt inter se rectæ lineæ. Quod demonstrare oportebat.

PROP. XXIX. THEOR.

In parallelas rectas lineas recta linea incidens, & alternos angulos inter se æquales, & exteriorem interiori & opposito & ad easdem partes æqualem, & interiores, & ad easdem partes duobus rectis æquales efficiet.

In parallelas enim rectas lineas AB CD recta linea incidat EF . dico alternos angulos AGH GHD inter se æquales efficere, & exteriorem EGB interiori, & ad easdem partes

GHD æqualem: & interiores, & ad easdem partes BGH GHD duobus rectis æquales; si enim inæqualis est AGH ipsi GHD , unus ipsorum major est. sit major AGH . & quoniam AGH angulus major est angulo GHD ; communis apponatur BGH . anguli igitur AGH BGH angulis BGH GHD majores sunt.



a 13. hujus. sed anguli AGH BGH sunt æquales duobus rectis $\angle$. ergo BGH GHD anguli sunt duobus rectis minores. quæ vero à minoribus, quam sint duo recti in infinitum producuntur

b Axiom. 12 rectæ lineæ inter se conveniunt $\therefore$ ergo rectæ lineæ AB CD in infinitum productæ convenient inter se. atqui non conveniunt cum parallelæ ponantur. non igitur inæqualis est AGH angulus angulo GHD . quare necessario est æqualis.


c 15. hujus. angulus autem AGH æqualis est angulo EGB . ergo, & EGB ipsi GHD æqualis erit. communis apponatur BGH . anguli igitur EGB BGH sunt æquales angulis BGH GHD . sed EGB BGH æquales sunt duobus rectis. Ergo, & BGH GHD duobus rectis æquales erunt. In parallelas igitur rectas lineas recta linea incidens, & alternos angulos inter se æquales, & exteriorem interiori, & opposito, & ad easdem partes æqualem; & interiores, & ad easdem partes duobus rectis æquales efficiet. Quod oportebat demonstrare.

PROP.

PROP. XXX. THEOR.

Quæ eidem rectæ lineæ sunt parallelæ, & inter se parallelæ erunt.


Sit utraque ipsarum $ABCD$ ipsi EF parallelæ. dico & AB ipsi CD parallelam esse. Incidat enim in ipsas recta linea GK . & quoniam in parallelas rectas lineas $ABEF$, recta linea GK incidit, angulus AGH angulo GHF est æqualis ^a. rursus quoniam in parallelas rectas lineas $EFGD$, recta linea incidit GK , æqualis est GHF angulus angulo GKD ^a. ostensus autem est, & angulus AGK angulo GHF æqualis. ergo, & AGK ipsi GKD æqualis erit. & sunt alterni. parallelæ igitur est AB ipsi CD ^b. ergo quæ eidem ^b 27. hujus. rectæ lineæ sunt parallelæ, & inter se parallelæ erunt. Quod oportebat demonstrare.



PROP. XXXI. PROBL.

Per datum punctum datæ rectæ lineæ parallelam rectam lineam ducere.

Sit datum quidem punctum A , data vero recta linea BC oportet per A punctum ipsi BC rectæ lineæ parallelam rectam lineam ducere. Sumatur in BC quodvis punctum D , & jungatur AD : constituaturque ^a ad rectam lineam DA , & ad punctum in ipsa A , angulo ADC æqualis angulus DAE : & in directum ipsi EA recta linea AF producat. quoniam igitur in duas rectas lineas BC EF recta linea AD incidens alternos angulos EAD ADC inter se æquales efficit, EF ipsi BC parallelæ erit ^b. per datum igitur punctum A datæ rectæ ^b 27. hujus. lineæ BC parallelæ ducta est recta linea EAF . quod facere oportebat.




PROP. XXXII. THEOR.

Omnis trianguli uno latere producto exterior angulus duobus interioribus, & oppositis est æqualis, & trianguli tres interiores anguli duobus rectis æquales sunt.

Sit

Sit triangulum ABC : & unum ipsius latus BC in D producat. dico angulum exteriorem ACD duobus interioribus, & oppositis CAB ABC æqualem esse; & trianguli tres interiores angulos ABC BCA CAB duobus rectis esse æqua-

31. hujus. les. ducatur enim per punctum C ipsi AB rectæ lineæ parallela CE . & quoniam AB ipsi CE parallela est, & in ipsas incidit AC , alterni anguli BAC ACE inter se æquales sunt^b. rursus quoniam AB parallela est CE & in ipsas



29. hujus. incidit recta linea BD , exterior angulus ECD interiori & opposito ABC est æqualis^b. ostensus autem est angulus ACE æqualis angulo BAC . quare totus ACD exterior angulus æqualis est duobus interioribus, & oppositis BAC ABC . communis apponatur ACB . anguli igitur ACD ACB tribus ABC BAC ACB æquales sunt. sed anguli ACD ACB sunt

13. hujus. æquales^c duobus rectis. ergo & ACB CBA CAB duobus rectis æquales erunt. Omnis igitur trianguli uno latere producto exterior angulus duobus interioribus, & oppositis est æqualis; & trianguli tres interiores anguli duobus rectis æquales sunt. Quod demonstrare oportebat.

COROLLARIA.

1. Omnes tres anguli cujusque trianguli simul sumpti æquales sunt tribus angulis cujusque alterius trianguli simul sumptis.

2. Si in uno triangulo duo anguli aut singuli aut simul æquales sint duobus angulis alterius trianguli erit reliquus angulus reliquo æqualis.

3. In triangulo si unus angulus rectus sit, reliqui simul unum rectum conficiunt.

4. In triangulo Isoscele si angulus æquis cruribus contentus rectus sit reliqui ad basim sunt semirecti.


5. In triangulo æquilatere angulus quilibet æqualis est $\frac{1}{3}$ duorum rectorum vel $\frac{2}{3}$ unius recti.

THEOREMA I.

Omnes simul interiores anguli cujusunque figure rectilineæ conficiunt bis tot rectos demptis quatuor quot sunt latera figure.

Nam figura una quæque rectilinea resolvi potest in triangula binario pauciora quam sunt ipsius figure latera, V. G. si quatuor latera habeat resolvitur in duo triangula si quinque in tria

tria triangula si sex in quatuor & sic deinceps; quare per præcedentem omnes horum triangulorum anguli æquantur bis tot rectis quot sunt triangula, sed omnes horum triangulorum



anguli æquales sunt angulis figuræ interioribus; quare omnes anguli interiores figuræ æquales sunt bis tot rectis quot sunt triangula, hoc est bis tot rectis demptis quatuor quot sunt latera figuræ. Q. E. D.

THEOR. II.


Omnes simul exteriores anguli cujusque figuræ rectilineæ conficiunt quatuor rectos.

Nam exteriores simul cum interioribus conficiunt bis tot rectos quot sunt latera figuræ; vero ex præcedente Theor. omnes interiores soli conficiunt, bis tot rectos demptis quatuor quot sunt latera figuræ quare exteriores conficiunt quatuor rectos. Q. E. D.

PROP. XXXIII. THEOR.

Quæ æquales, & parallelæ ad easdem partes conjungunt rectæ lineæ, & ipsæ æquales, & parallelæ sunt.

Sint æquales, & parallelæ $ABCD$: & ipsas conjungant ad easdem partes rectæ lineæ AC BD . dico AC BD æquales, & parallelas esse. ducatur enim BC , & quoniam AB parallelæ est CD : in ipsasque incidit BC . alterni anguli ABC BCD æquales sunt a . rursus quoniam AB est æqualis CD , communis autem BC , duæ AB BC duabus BC CD sunt æquales; & angulus ABC æqualis angulo BCD . basis igitur AC basi BD est æqualis b : triangulumque ABC triangulo BCD : b & reliqui anguli reliquis angulis æquales erunt, alter alteri, quibus æqualia latera subtenduntur. ergo angulus ACB angulo CBD est æqualis. & quoniam in duas rectas lineas AC BD recta linea BC incidens, alternos angulos ACB CBD æqua-



a 29. hujus.

b 4. hujus.

les


c 27. hujus. les inter se efficiet, parallela est AC ipsi BD; Otenfa autem est & ipsi æqualis. Quæ igitur æquales, & parallelas ad easdem partes conjungunt rectæ lineæ, & ipsæ æquales, & parallele sunt. Quod oportebat demonstrare.

Diffin. *Parallelogrammum est figura quadrilatera cujus bina opposita latera sunt parallela.*

PROP. XXXIV. THEOR.

Parallelogrammorum spatiorum latera, quæ ex opposito, & anguli, inter se æqualia sunt; & diameter ea bifariam secat.

Sit parallelogrammum ABDC, cujus diameter BC. dico ACDB parallelogrammi latera, quæ ex opposito, & angulos inter se æqualia esse; & diametrum BC ipsum bifariam secare. Quoniam enim parallela est AB ipsi CD, & in ipsas incidit recta linea BC; anguli alterni ABC BCD inter se æquales sunt a. rursus quoniam AC ipsi BD parallela est, & in ipsas incidit BC; alterni anguli ACB CBD æquales sunt inter se a. duo igitur triangula sunt ABC CBD, quæ duos angulos ABC BCA duobus angulis BCD CBD æquales habent, alterum alteri: & unum latus uni lateri æquale, scil. quod



a 29. hujus.

b 26. hujus.


est ad æquales angulos, utrique commune BC. ergo, & reliqua latera reliquis lateribus æqualia habebunt alterum alteri, & reliquum angulum reliquo angulo æqualem, æquale igitur est latus quidem AB lateri CD: latus vero AC ipsi BD, & angulus BAC angulo BDC æqualis. & quoniam angulus ABC est æqualis angulo BCD; & angulus CBD; angulo ACB; erit totus angulus ABD æqualis toti ACD. ostensus autem est, & angulus BAC angulo BDC æqualis. parallelogrammorum igitur spatiorum latera, quæ ex opposito, & anguli, inter se æqualia sunt. dico etiam diametrum ea bifariam secare. quoniam enim æqualis est AB ipsi CD communis autem BC. duæ AB BC duabus DC CB æquales sunt, altera alteri & angulus ABC æqualis est angulo BCD. basis igitur AC basi DB æqualis. quare, & triangulum ABC triangulo BCD æquale erit. ergo diameter BC parallelogrammum ACDB bifariam secat. Quod oportebat demonstrare.

c 4. hujus.

PROP. XXXV. THEOR.

Parallelogramma super eadem basi, & in iisdem parallelis constituta, inter se æqualia sunt.

Sint parallelogramma $ABCD$ $EBCF$ super eadem basi BC , & in eisdem parallelis AF BC constituta. dico $ABCD$ parallelogrammo $EBCF$ æquale esse. Quoniam enim parallelogrammum est $ABCD$, æqualis est AD ipsi BC . eadem quoque ratione, & EF est æqualis BC . quare &, AD ipsi EF æqualis erit. & communis DE . tota igitur AE toti DF est æqualis. est autem, & AB æqualis DC . ergo duæ EA AB duabus FD DC æquales sunt, altera alteri, & angulus FDC æqualis angulo EAB , exterior interiori ^d, basis igitur ^d 29. hujus. EB basi FC est æqualis, & EAB triangulum æquale triangulo FDC . commune auferatur DGE . reliquum igitur trapezium $ABGD$ reliquo trapezio $FGCF$ est æquale ^f. commune apponatur GBC triangulum. ergo totum parallelogrammum $ABCD$ toti parallelogrammo $EBCF$ æquale erit. Parallelogramma igitur super eadem basi, & in eisdem parallelis constituta inter se æqualia sunt. Quod oportebat demonstrare.



^a 34. hujus

^b Axiom. 1.


^c Axiom. 2.

^f Axiom. 3.

PROP. XXXVI. THEOR.

Parallelogramma super æqualibus basibus, & in eisdem parallelis constituta inter se æqualia sunt.

Sint parallelogramma $ABCD$ $EFGH$ super æqualibus basibus BC FG , & in eisdem parallelis AH BG constituta. dico parallelogrammum $ABCD$ parallelogrammo $EFGH$ æquale esse. Coniungantur enim BE CH . & quoniam æqualis est BC ipsi FG & FG æqualis ipsi EH ; erit & BC ipsi EH æqualis. suntque parallelæ, & ipsas coniungunt BE CH . quæ autem æquales, & parallelas ad easdem partes coniungunt, æquales, & parallelæ sunt ^b. ergo EB , CH & æquales sunt, & parallelæ: quare $EBCH$ parallelogrammum est, & æquale parallelogrammo $ABCD$; basim enim eandem habet BC , &



^a Hyp.

^b 33. hujus.

^c 35. hujus.


&c

& in eisdem parallelis BC , AD constituitur. simili ratione, & $EFGH$ parallelogrammum eidem parallelogrammo $EBCH$ est æquale. ergo parallelogrammum $ABCD$ parallelogrammo $EFGA$ æquale erit. Parallelogramma igitur super æqualibus basibus, & in eisdem parallelis constituta inter se sunt æqualia. Quod oportebat demonstrare.

PROP. XXXVII. THEOR.

Triangula super eadem basi, & in eisdem parallelis constituta inter se æqualia sunt.

Sint triangula ABC DBC super eadem basi BC , & in eisdem parallelis AD BC constituta. dico ABC triangulum triangulo DBC æquale esse. Producatur AD ex utraque parte in



* 31. hujus.

per B quidem ipsi CA parallela ducatur BE ,

* 35. hujus.

per C vero ipsi BD parallela CF parallelogrammum igitur est utrumque ipforum $EBCA$ $DBCF$, & parallelogrammum

* 34. hujus.

$EBCA$ est æquale c parallelogrammo $DBCF$, etenim super eadem sunt basi BC , & in eisdem parallelis BC EF , estque pa-


* Axiom. 7.

rallelogrammi quidem $EBCA$ dimidium b ABC triangulum, cum diameter AB ipsum bifariam secet: parallelogrammi vero $DBCF$ dimidium b triangulum DBC ; diameter enim DC ipsum bifariam secat quæ autem c æqualium dimidia sunt inter se æqualia sunt. ergo triangulum ABC triangulo DBC est æquale. Triangula igitur super eadem basi, & in eisdem parallelis constituta inter se æqualia sunt. Quod oportebat demonstrare.

PROP. XXXVIII. THEOR.

Triangula super basibus, æqualibus, & in eisdem parallelis constituta inter se sunt æqualia.

Sint triangula ABC DCE super æqualibus basibus, BC CE & in eisdem parallelis BE AD consti-



* 31. hujus.

tuta. dico ABC triangulum DCE triangulo æquale esse. Producatur enim AD ex utraque parte in GH puncta: & per B quidem ipsi CA parallela ducatur BG : per E vero ducatur EH parallela ipsi DC . pa-


rallelogrammum igitur est utrumque ipforum $GBCA$ $DCEH$. atque

atque est parallelogrammum $GBCA$ æquale b parallelo- b 36. hujus.
grammo $DCEH$: in æqualibus enim sunt basibus BC CE , &
in eisdem BE GH parallelis. parallelogrammi vero $GBCA$
dimidium c est ABC triangulum, nam diameter AB ipsum c 34. hujus.
bifariam secat. & parallelogrammi $DCEH$ dimidium c est
triangulum DCE , diameter enim DE ipsum secat bifariam.
quæ autem æqualium dimidia sunt d , inter se æqualia sunt. d Axiom. 7.
ergo ABC triangulum triangulo DCB est æquale. Triangula
igitur super æqualibus basibus, & in eisdem parallelis consti-
tuta, inter se sunt æqualia. Quod demonstrare oportebat.

PROP. XXXIX. THEOR.

*Triangula æqualia super eadem basi, & ad easdem par-
tes constituta, in eisdem quoque sunt parallelis.*

Sint æqualia triangula ABC DBC super eadem basi BC
constituta, & ad easdem partes. dico, & in eisdem paral-
lis esse. ducatur enim AD . dico AD parallelam esse ipsi



a 31. hujus.

b 37. hujus.


BC . Si enim non est parallela,
ducatur a per A punctum ipsi
 BC parallela recta linea AE , &
 EC ducatur. æquale igitur
est ABC triangulum triangulo
 EBC b , super eadem enim est
basi BC , & in eisdem BC , AE
parallelis. sed ABC triangu-
lum triangulo DBC c est æquale. ergo & triangulum DBC c Ex hyp.
æquale est ipsi EBC triangulo, majus minori, quod fieri non
potest. non igitur AE ipsi BC parallela est similiter osten-
demus neque aliam quampiam parallelam esse, præter ipsam
 AD , ergo AD ipsi est parallela. Triangula igitur æqualia
super eadem basi, & ad easdem partes constituta in eisdem
quoque sunt parallelis. Quod oportebat demonstrare.

PROP. XL. THEOR.

*Triangula æqualia super basibus æqualibus, & ad
easdem partes constituta in eisdem quoque sunt pa-
rallelis.*

Sint æqualia triangula ABC CDE super æqualibus basibus
 BC CE constituta. dico etiam in eisdem esse parallelis. du-
catur enim AD . dico AD ipsi BE parallelam esse. Nam
si non est, ducatur per A ipsi BE parallela AF , a & FE du- a 31. hujus.
catur.


38. hujus. catur. triangulum igitur ABC triangulo FCE est æquale ¹, cum super æqualibus basibus & in eisdem parallelis BE AF constituentur. sed triangulum ABC æquale est triangulo DCE . ergo & triangulum DCE triangulo FCE æquale erit, majus minori, quod fieri non potest. non igitur AF ipsi BE est parallela. similiter demonstrabimus neque aliam quampiam parallelam esse, præter AD . ergo AD ipsi BE parallela erit. Æqualia igitur triangula super basibus æqualibus, & ad easdem partes constituta, etiam in eisdem sunt parallelis. Quod demonstrare oportebat.



PROP. XLI. THEOR.

Si parallelogrammum, & triangulum eandem basim habeant in eisdemque sint parallelis; parallelogrammum ipsius trianguli duplum erit.

Parallelogrammum enim $ABCD$, & triangulum EBC , basim habeant eandem BC , & in eisdem sint parallelis BC AE . dico parallelogrammum $ABCD$ trianguli EBC duplum esse. Jungatur enim AC . triangulum igitur ABC triangulo EBC est æquale ²; namque super eadem basi BC , & in eisdem BC AE parallelis constituentur. sed $ABCD$ parallelogrammum duplum est trianguli ABC ³, cum diameter AC ipsum bifariam secet. quare & ipsius EBC trianguli duplum erit. Si igitur parallelogrammum, & triangulum eandem basim habeant, & in eisdem sint parallelis; duplum erit parallelogrammum ipsius trianguli. Quod demonstrare oportebat.




PROP. XLII. PROBL.

Dato triangulo æquale parallelogrammum constituere in dato angulo rectilineo.

Sit datum triangulum ABC , datus autem rectilineus angulus D . Itaque oportet, dato triangulo ABC æquale parallelogrammum constituere in angulo rectilineo ipsi D æquali. secetur


lectetur BC bifariam in E, & juncta AE, ad rectam lineam EC, atque ad punctum in ea E, constituitur angulus CEF æqualis ipsi D: & per A quidem ipsi EC parallela ducatur AG; per C vero ipsi FE ducatur parallela CG. parallelogrammum igitur est FECC. & quoniam BE est æqualis EC, erit & ABE triangulum æquale triangulo AEC æquale, super æqualibus enim sunt basibus BE EC, & in eisdem BC AG parallelis. ergo triangulum ABC trianguli AEC est duplum. est autem, & parallelogrammum FECC duplum trianguli AEC; basim enim eandem habet, & in eisdem est parallelis. æquale igitur est FECC parallelogrammum triangulo ABC habetque CEF angulum æqualem angulo D dato. Dato igitur triangulo ABC æquale parallelogrammum FECC constitutum est, in angulo CEF, qui angulo D est æqualis. Quod quidem facere oportebat.



PROP. XLIII. THEOR.

Omnis parallelogrammi spatii eorum, quæ circa diametrum sunt, parallelogrammorum complementa inter se sunt æqualia.

Sit parallelogrammum ABCD, cujus diameter BD, & circa ipsam BD parallelogramma quidem sint FH EG, quæ vero complementa dicuntur AK KC. dico AK complementum complemento KC æquale esse. Quoniam enim parallelogrammum est ABCD, & ejus diameter BD, æquale est ABD triangulum triangulo BDC. rursus quoniam HKFD parallelogrammum est; cujus diameter DK, triangulum HDK triangulo DFK æquale erit. eadem ratione, & triangulum KGB triangulo KEB est æquale. cum igitur triangulum quidem BEK æquale sit triangulo BGK triangulum vero HDK ipsi DFK; erit triangulum BEK una cum triangulo HDK æquale triangulo BGK una cum DFK triangulo. est autem & totum triangulum ABD æquale toti BDC. reliquum igitur AK complementum reliquo complemento KC est æquale. Ergo omnis parallelogrammi spatii eorum, quæ circa




circa diametrum sunt parallelogrammorum complementa inter se æqualia sunt. Quod oportebat demonstrare.

PROP. XLIV. PROBL.

Ad datam rectam lineam dato triangulo æquale parallelogrammum applicare in dato angulo rectilineo.

Sit data quidem recta linea AB ; datum vero triangulum C , & datus angulus rectilineus D . oportet igitur ad datam rectam lineam AB , dato triangulo C æquale parallelogrammum applicare in angulo ipsi D æquali. Constituitur triangulo C æquale a parallelogrammum $BEFG$, in angulo EBG , qui est æqualis D . & ponatur BE in directum ipsi AB , producaturque FG ad H : & per A alterutri ipsarum BG EF parallela b ducatur AH , & HB jungatur. quoniam igitur in parallelas AH EF recta linea HF incidit, anguli AHF HFE duobus rectis æquales c sunt. quare BHF HFE duobus rectis sunt minores. quæ vero à minoribus, quàm sunt duo recti, si in infinitum producantur, convenient d inter se. ergo HB FE productæ convenient. producantur, & convenient in K : perque K alterutri ipsarum EA FH parallela b ducatur KL , & AH GB ad LM puncta producantur. parallelogrammum igitur est $HLKF$, cujus diameter HK , & circa HK parallelogramma quidem sunt $AGME$; ea vero quæ complementa dicuntur LB BF : ergo LB ipsi BF est e æquale. sed, & BF æquale est triangulo C . quare, & LB triangulo C æquale erit. & quoniam GBE angulus æqualis f est angulo ABM , sed & æqualis angulo D , erit & angulus ABM angulo D æqualis. Ad datam igitur rectam lineam AB , dato triangulo C æquale parallelogrammum constitutum est LB , in angulo ABM , qui est æqualis angulo D . Quod facere oportebat.




PROP. XLV. PROBL.

Rectilineo dato æquale parallelogrammum constituere in dato angulo rectilineo.

Sit datum rectilineum $ABCD$, datus vero angulus rectilineus E . oportet rectilineo $ABCD$ æquale parallelogrammum

mum constituere in angulo ipsi E æquali. Conjungantur enim DB , & constituatur triangulo ADB æquale a parallelogrammum FH : in angulo HKF , qui est æqualis angulo E . deinde ad rectam lineam GH applicetur triangulo DBC æquale b parallelogrammum GM , in angulo GHM qui angulo b $44.$ hujus. E est æqualis. & quoniam angulus E æqualis est utrique ipsorum HKF GHM , erit & HKF angulo GHM æqualis. communis apponatur KHG , anguli igitur HKF KHG angulis KHG GHM æquales sunt. sed HKF KHG sunt æquales c duobus rectis. ergo, & KHG GHM duobus rectis æquales erunt. itaque ad aliquam rectam lineam GH , & ad datum in ea punctum H duæ rectæ lineæ KH HM non ad easdem partes positæ angulos deinceps duobus rectis æquales efficiunt. c 29. hujus.



in directum igitur d est KH ipsi HM . & quoniam in parallelas KM FG recta linea HG incidit, alterni anguli MHG HGF æquales e sunt. communis apponatur HGL , anguli igitur MHG HGL , angulis HGF HGL sunt æquales. at anguli MHG HGL æquales f sunt duobus rectis. quare & anguli HGF HGL duobus rectis æquales erunt. in directum igitur est FG ipsi GL . & quoniam KF ipsi HG & æqualis est, & parallela; sed & HG ipsi ML ; erit KF g ipsi ML $30.$ hujus. & æqualis, & parallela. ipsasque conjungunt rectæ lineæ KM FL . ergo & KM FL æquales f & parallelae sunt. parallelogrammum igitur est $KFLM$. at cum triangulum quidem ABD æquale sit parallelogrammo HF : triangulum vero DBC parallelogrammo GM ; erit totum $ABCD$ rectilineum toti parallelogrammo $KFLM$ æquale. Dato igitur rectilineo $ABCD$ æquale parallelogrammum constitutum est $KFLM$ in angulo FKM , qui est æqualis angulo E dato. Quod facere oportebat. $35.$ hujus.


Cor. Ex jam dictis manifestum est, quomodo ad datam rectam lineam, dato rectilineo æquale parallelogrammum applicari possit in dato angulo rectilineo.

PROP. XLVI. PROBL.

Super data recta linea quadratum describere.

Sit data recta linea AB . oportet super ipsa AB quadratum descri-

- a 11. hujus. describere. Ducatur α rectæ lineæ AB à puncto in ea dato
 b 3. hujus. A ad rectos angulos AC ; & ipsi AB æqualis β ponatur AD ; perque punctum D ducatur γ DE ipsi AB parallela, & per B
 c 31. hujus. ipsi AD parallela δ ducatur BE . parallelogrammum igitur est $ADEB$. & AB quidem est α æqualis DE ,
 d 34. hujus. AD vero ipsi δ BE . sed BA ipsi AD est æqualis. quatuor igitur $BA AD DE EB$ inter se æquales sunt, ideoque æquilaterum est $ADEB$ parallelogrammum. dico etiam rectangulum esse. quoniam enim in parallelas $AB DE$ recta linea incidit AD , anguli $BAD ADE$ duobus rectis sunt ϵ æquales. rectus autem est BAD , ergo, & ADE rectus erit. parallelogrammorum vero spatiorum, quæ ex opposito sunt latera, & anguli f inter se æqualia sunt. rectus igitur est uterque oppositorum $ABE BED$ angulorum: & ob id rectangulum est $ADBE$. Ostensum autem est æquilaterum esse. Quadratum igitur sit necesse est, atque est super recta linea AB descriptum. Quod ipsum facere oportebat.




Cor. Hinc omne parallelogrammum habens unum angulum rectum est rectangulum.

PROP. XLVII. THEOR.

In rectangulis triangulis, quod à latere rectum angulum subtendente describitur, quadratum æquale est quadratis, quæ à lateribus rectum angulum continentibus describuntur.

Sit triangulum rectangulum ABC , rectum habens BAC angulum. dico quadratum descriptum à recta BC æquale esse quadratis, quæ ab ipsis $BA AC$ describuntur. describatur α enim à BC quidem quadratum $BDEC$, ab ipsis $BA AC$ quadrata β $GBHC$, perque A alterutri ipsarum $BD CE$ parallela ducatur AL ; & $AD FC$ jungantur. Quoniam igitur uterque angulorum $BAC BAG$ rectus β est, ad aliquam rectam lineam BA , & ad datum in ea punctum A duæ rectæ lineæ $AC AG$ non ad easdem partes positæ, angulos qui deinceps sunt duobus rectis æquales efficiunt. in directum igitur γ est CA ipsi AG . eadem ratione, & AB ipsi AH est in directum. & quoniam angulus




- c 46. hujus.
 b Diffin. 30.
 a 14. hujus.

$\angle B C$ est æqualis angulo $\angle F B C$ rectus enim uterque est, communis apponatur $A B C$ totus igitur $\angle D B A$ angulus toti $\angle F B C$ est æqualis. quod cum duæ $A B B D$ duabus $F B B C$ æquales sint, altera alteri, & angulus $\angle D B A$ æqualis angulo $\angle F B C$; erit & basis $A D$ basi $F C$ æqualis, & $A B D$ triangulum triangulo $F B C$ æquale. estque $\triangle$ trianguli quidem $A B D$ duplum $B L$ parallelogrammum, basim enim eandem habent $B D$ & in eisdem $B D A L$ sunt parallelis: trianguli $\triangle$ vero $\triangle$ $F B C$ duplum est $G B$ quadratum; rursus enim basim habent eandem $F B$, & in eisdem sunt parallelis $F B G C$. quæ autem æqualium duplicia inter se æqualia sunt. ergo æquale est parallelogrammum $B L$ ipsi $G B$ quadrato. similiter junctis $A E B K$, ostendetur etiam $C L$ parallelogrammum æquale quadrato $H C$. totum igitur $D B E C$ quadratum duobus quadratis $G B H C$ est æquale. & describitur quidem $D B E C$ quadratum à recta linea $B C$, quadrata vero $G B H C$ ab ipsis $B A A C$. quadratum igitur $B E$, à latere $B C$ descriptum æquale est quadratis, quæ describuntur à lateribus $B A A C$. Ergo in rectangulis triangulis, quadratum, quod describitur à latere rectum angulum subtendente æquale est quadratis, quæ à lateribus rectum angulum continentibus describuntur. Quod oportebat demonstrare.

PROP. XLVIII. THEOR.

Si quadratum, quod describitur ab uno laterum trianguli æquale sit quadratis, quæ à reliquis trianguli lateribus describuntur; angulus reliquis duobus trianguli lateribus contentus rectus erit.

Si trianguli $A B C$, quod ab uno latere $B C$ describitur quadratum æquale sit quadratis, quæ à reliquis trianguli lateribus $B A A C$ describuntur, dico angulum $B A C$ rectum esse. ducatur enim à puncto A ipsi $A C$ ad rectos angulos $A D$; ponaturque $A D$ ipsi $B A$ æqualis, & $D C$ jungatur. Quoniam igitur $D A$ est æqualis $A B$, erit & quadratum quod describitur ex $D A$ æquale quadrato ex $A B$. commune apponatur quadratum, quod ex $A C$. ergo quadrata, quæ ex $D A$ B $A C$ æqualia sunt quadratis quæ ex $B A A C$ describuntur. sed quadratis quidem, quæ ex $D A A C$ æquale est quod ex $D C$ quadratum; rectus enim angulus est $\angle D A C$: quadratis



dratis vero, quæ ex BA AC æquale ponitur quadratum, quod ex BC . quadratum igitur, quod ex DC æquale est ei, quod ex BC quadrato. ergo & latus DC lateri CB est æquale. & quoniam DA est æqualis AB communis autem AC , duæ DA AC æquales sunt duabus BA AC ; & basis DC est æqualis basi CB . angulus b igitur DAC angulo BAC est æqualis. rectus autem est DAC . ergo & BAC rectus erit. Si igitur quadratum quod describitur ab uno laterum trianguli, æquale sit quadratis quæ à reliquis trianguli lateribus describuntur, angulus reliquis duobus trianguli lateribus contentus rectus erit. Quod oportebat demonstrare.

EUCLIDIS

ELEMENTORUM

LIBER SECUNDUS.

DEFINITIONES.

I.

Omnis parallelogrammum rectangulum contineri dicitur sub duabus rectis lineis, quæ rectum angulum comprehendunt.


II.

Omnis parallelogrammi spatii, unum quodvis eorum quæ circa diametrum ipsius sunt parallelogrammorum, cum duobus complementis gnomon vocetur.


PROPOSITIO I. THEOREMA.

Si sint duæ rectæ lineæ, altera autem ipsarum secta fuerit in quocunque partes; rectangulum sub duabus rectis lineis contentum æquale est eis rectangulis quæ sub recta linea infecta, & singulis partibus continentur.

Sint duæ rectæ lineæ A, BC ; & secta sit BC utcumque in punctis D, E . dico rectangulum rectis lineis A, BC contentum æquale esse rectangulo quod continetur sub A & BD , & rectangulo quod sub A & DE , & ei quod sub A & EC continetur. Ducatur enim à puncto B ipsi BC ad rectos ^a angulos BF : atque ipsi A ponatur ^b æqualis BG : & per G



31. primi. quidem ipsi BC parallela & ducatur GH : per D & E vero ducantur DK & EL CH parallelæ & ipsi BG . rectangulum igitur BH est æquale rectangulis BK & DL & EH : atque est BH quidem quod sub A & BC continetur; etenim continetur sub GB & BC ; & BG ipsi A est æqualis; rectangulum autem BK est quod continetur sub ipsis A & BD ; continetur enim sub GB & BD , quarum GB est æqualis A : & rectangulum DL est quod continetur sub A & DE , quoniam DK , hoc est BC ipsi A est æqualis; & similiter rectangulum EH est quod sub A & EC continetur. ergo rectangulum contentum sub A & BC est æquale rectangulo contento sub A & BD , & contento sub A & DE , & adhuc contento sub A & EC . Si igitur sint duæ rectæ lineæ, altera autem ipsarum secta fuerit in quocunque partes; rectangulum sub duabus rectis lineis contentum est æquale eis quæ sub recta linea infecta, & singulis partibus continentur. Quod oportebat demonstrare.




PROP. II. THEOR.

Si recta linea secta fuerit utcunque; rectangula quæ sub tota, & singulis partibus continentur æqualia sunt ei quod à tota fit quadrato.

Recta enim linea AB secta sit utcunque in puncto C , dico rectangulum quod sub AB & BC continetur, unà cum contento sub AB & AC æquale esse quadrato, quod fit ex AB .

46. primi. describatur enim ex AB quadratum $ADEB$, & per C ducatur & alterutri ipsarum AD & BE parallela CF . æquale igitur est AE rectangulis AF & CE . atque est AE quidem quadratum, quod ex AB ; AF vero rectangulum contentum sub BA



AC ; etenim sub DA & AC continetur, quarum AD ipsi AB est æqualis, & rectangulum CE continetur sub AB & BC , cum BE sit æqualis AB . ergo rectangulum sub AB & AC unà cum rectangulo sub AB & BC æquale est quadrato ex AB . Si igitur recta linea utcunque secta fuerit, rectangula, quæ sub tota & singulis partibus continentur, æqualia sunt ei, quod à tota fit quadrato. Quod demonstrare oportebat.

PROP.


LIBER II.
PROP. III. THEOR.

41

Si recta linea utcumque secta fuerit; rectangulum sub tota, & una ejus parte contentum æquale est & rectangulo, quod sub partibus continetur, & ei quod à prædicta parte fit quadrato.

Recta enim linea AB secta fit utcumque in puncto C. dico sub AB & BC rectangulum æquale esse rectangulo sub AC BC una cum quadrato, quod fit ex BC. describatur enim ex BC quadratum CDEB; producatursque ED in F: & per

A alterutri ipsarum CD BE parallela ducatur AF. æquale utique erit rectangulum AE ipsis AD CE; & est AE quidem rectangulum contentum sub AB BC; etenim sub AB BE continetur, quarum BE est æqualis BC: rectangulum vero




AD est quod continetur sub AC CB, cum DC ipsi CB sit æqualis: & DB est quadratum, quod fit ex BC. ergo rectangulum sub AB BC est æquale rectangulo sub AC CB una cum quadrato quod ex BC. Si igitur recta linea utcumque secta fuerit; rectangulum sub tota, & una ejus parte contentum æquale est rectangulo quod sub partibus continetur, & ei quod à prædicta parte fit quadrato.

PROP. IV. THEOR.

Si recta linea secta fuerit utcumque, quadratum quod fit à tota æquale erit, & quadratis quæ à partibus fiunt, & ei quod bis sub partibus continetur rectangulo.

Recta enim linea AB secta fit utcumque in C. dico quadratum quod fit ex AB æquale esse, & quadratis ex AC CB & ei rectangulo quod bis sub AC CB continetur. Describatur enim ex AB quadratum ADEB,




jungaturque BD, & per C quidem alterutri ipsarum AD BE parallela ducatur CGF; per G vero alterutri ipsarum AB DE ducatur parallela HK. & quoniam

CF est parallela ipsi AD, & in ipsas incidit BD: erit exterior angulus BGC interiori & opposito ADB æqualis: c. 29. primi. angulus

d 5. primi. angulus autem ADB est æqualis *d* angulo ABD, quod & latus BA æquale est lateri AD. quare CGB angulus angulo GBC est æqualis: ac propterea latus BC lateri CG æquale *e*.
e 6. primi. sed & latus CB æquale *f* est lateri GK & CG ipsi BK. ergo &

GK est æquale KB, & CGKB æquilaterum est. dico insuper etiam rectangulum esse. quoniam enim CG est parallela ipsi BK & in ipsas incidit CB; anguli KBC GCB duobus rectis sunt æquales *e*. rectus autem est KBC angulus. ergo & re-



e 34. primi.

ctus GCB, & anguli oppositi CGK GKB recti erunt. rectangulum igitur est CGKB. sed ostensum fuit & æquilaterum esse, quadratum igitur est CGKB, quod quidem fit ex BC. eadem ratione & HF est quadratum quod fit ex HG, hoc est ex AC. ergo HFCK ex ipsis AC CB quadrata sunt. & quoniam rectangulum AG est æquale *g* rectangulo GE; atque est AG quod sub AC CB continetur, est enim GC ipsi CB æqualis: erit & GE æquale ei quod continetur sub AC CB, quare rectangula AG GE æqualia sunt ei quod bis sub AC CB continetur. sunt autem & HFCK quadrata ex AC CB. quatuor igitur HFCK AG GE, & quadratis ex AC CB, & ei quod bis sub AC CB continetur rectangulo sunt æqualia; sed HFCK AG GE componunt totum ADEB quadratum quod fit ex AB. quadratum igitur ex AB æquale est & quadratis ex AC CB, & ei quod bis sub AC CB continetur rectangulo. Quare si recta linea utcumque secta fuerit; quadratum quod fit à tota æquale erit & quadratis quæ à partibus fiunt, & ei rectangulo quod bis sub partibus continetur. atque illud est quod demonstrare oportebat.

Cor. Ex hoc perspicue constat in quadratis spatiis parallelogramma quæ sunt circa diametrum, quadrata esse.


PROP. V. THEOR.

Si recta linea secta fuerit in partes æquales, & in partes inæquales; rectangulum sub inæqualibus totius partibus contentum una cum quadrato lineæ quæ inter sectiones interjicitur, æquale est ei quod à dimidia fit quadrato.

Recta enim linea quævis AB secta sit in partes æquales ad punctum C, & in partes inæquales ad D dico rectangulum contentum sub AD BD, una cum quadrato quod fit ex

CD

CD æquale esse ei quod ex CB fit quadrato. Describatur a enim 46 . primi.
 ex BC quadratum $CEFB$: ducaturque BE ; & per D qui-
 dem alterutri ipsarum CE BF parallela b ducatur DHG ; per
 H vero ducatur KL parallela b alterutri ipsarum $CBEF$: 31 . primi.
 & rursus per A ducatur alterutri CL BO parallela b AK . &
 quoniam CH complementum æquale c est complemento HF , 43 . primi.
 commune apponatur DO , totum igitur CO toti DF est æ-
 quale. sed CO est æquale d AL ,
 quoniam & AC ipsi CB . ergo
 & AL æquale est DF . com-
 mune apponatur CH . totum
 igitur AH ipsis FD DL æquale
 erit. sed AH quidem est quod
 sub AD DB continetur, etenim
 DH ipsi DB est æqualis e ; FD
 DL vero est gnomon MNX . igitur MNX æqualis est ei $hujus$. e Cor. 4.
 quod sub AD DB continetur, commune apponatur LG , æ-
 quale f scilicet quadrato quod ex CD . ergo MNX gnomon,
 & LG æqualia sunt rectangulo, quod continetur sub AD DB ,
 & ei, quod fit ex CD quadrato. sed MNX gnomon, & LG
 sunt totum quadratum $CEFB$, quod quidem fit ex CB . ergo
 rectangulum sub AD DB , una cum quadrato quod ex CD ,
 æquale est ei quod ex CB fit quadrato. Si igitur recta linea
 secta fuerit in partes æquales, & in partes inæquales, rectan-
 gulum sub inæqualibus totius partibus contentum unà cum
 quadrato linearum quæ inter sectiones interjicitur, æquale est
 ei quod à dimidia fit quadrato. Quod demonstrare oportebat.



PROP. VI. THEOR.

*Si recta linea bifariam secetur, atque ipsi in directum
 adjiciatur quedam recta linea; rectangulum sub tota
 cum adjecta, & adjecta contentum, una cum qua-
 drato dimidiæ, æquale est quadrato quod ab ea quæ
 ex dimidia & adjecta constat, tanquam ab una li-
 nea describitur.*

Recta enim linea quævis AB secetur bifariam in puncto C ,
 & adjiciatur ipsi in directum BD . dico rectangulum sub AD
 DB unà cum quadrato ex BC æquale esse ei quod fit ex CD
 quadrato. Describatur a enim ex CD quadratum $CEFD$,
 & jungatur DE ; per B alterutri ipsarum CE DF pa- a 46 primi.
 rallela b ducatur BHG : & per H ducatur KLM parallela b 31 . primi.
 alterutri


GE, commune apponatur CF; quare totum AF toti CE est æquale. rectangula igitur AF CE dupla sunt rectanguli AF. sed AF CE sunt LKM gnomon, & quadratum CF, ergo KLM gnomon, & quadratum CF dupla erunt rectanguli AF. est autem id quod bis sub AB BC continetur duplum ipsius AF; etenim BF est æqualis BC. gnomon igitur LKM, & quadratum CF æqualia sunt ei quod bis sub AB BC continetur. commune apponatur HF, quod est ex AC quadratum. ergo gnomon KLM, & quadrata CF HF æqualia sunt ei quod bis sub AB BC continetur, & quadrato ex AC. sed gnomon KLM, & quadrata CF HF componunt ADEB, & CF, quæ sunt ex AB BC quadrata. quadrata igitur ex AB BC æqualia sunt rectangulo, quod bis sub AB BC continetur una cum eo quod fit ex AC quadrato. Ergo si recta linea utcunque secta fuerit; quæ à tota, & una parte sunt utraque quadrata æqualia sunt rectangulo quod bis sub tota, ac dicta parte continetur, & ei quod à reliqua parte fit quadrato; quod ostendere oportebat.

PROP. VIII. THEOR.

Si recta linea utcunque secta fuerit; quod quater sub tota, & una parte continetur rectangulum una cum quadrato reliquæ partis æquale est quadrato quod ex tota, & dicta parte tanquam ex una linea describitur.

Recta enim linea AB secta fit utcunque in C. dico rectangulum quater sub AB BC contentum una cum quadrato quod ex AC æquale esse quadrato quod ex AB BC tanquam ex una linea describitur. Producatur enim recta li-

nea AB in D; & ipsi CB ponatur æqualis BD; describatur ex AD quadratum AEFD; & dupla figura construat. quoniam igitur CB est æqualis BD, atque est CB ipsi GK æqualis^b; BD vero ipsi KN: erit & GK æqualis KN. eadem ratione, & PR ipsi RO est æqualis. & quoniam CB est æqualis BD, & GK ipsi KN; erit rectangulum quiddam CK rectangulo BN; rectangulum vero GR ipsi RN æquale^c. sed CK est æquale RN, complementa enim sunt parallelogrammi CO, ergo & BN æquale est GR, & quatuor rectangula




a hyp.
b 34. primi.

c 36. primi.
d 43. primi.

rectangula BN KC GR RN inter se æqualia; ideoque quadrupla sunt rectanguli CK. rursus quoniam CB est æqualis BD, & BD quidem ipsi BK, hoc est ipsi CG æqualis; CB vero ipsi GK, hoc est GP: erit & CG æqualis GP. est autem & PR ipsi RO æqualis, rectangulum igitur AG rectangulo MP, & rectangulum PL ipsi

43. primi.

RF æquale erit. sed MP est æquale PL; complementa enim sunt ML parallelogrammi quare & AG ipsi RF est æquale. quatuor igitur AG MP PL RF inter se æqualia sunt, ac propterea ipsius AC quadrupla. ostensum autem est, & quatuor CK BN GR RN qua-



drupla esse CK. quare octo continentia gnomonem STY ipsius AK quadrupla sunt, & quoniam AK est quod sub AB BC continetur; etenim BK est æqualis BC; erit contentum quater sub AB BC ipsius AK quadruplum. at demonstratus est gnomon STY quadruplus ipsius AK. quod igitur quater sub AB BC continetur æquale est gnomoni STY. commune apponatur XH, quod quidem quadrato ex AC est æquale. ergo quod quater sub AB BC continetur una cum quadrato ex AC æquale est ipsi STY gnomoni, & quadrato XH. sed STY gnomon, & XH totum sunt AEFD quadratum, quod describitur ex AD. rectangulum igitur quater sub AB BC contentum una cum quadrato ex AC æquale est ei, quod ex AD, hoc est ex AB BC tanquam ex una linea describitur, quadrato. Ergo si recta linea utcumque secta fuerit; quod quater sub toto, & una parte continetur rectangulum, una cum quadrato reliquæ partis, æquale est quadrato quod ex tota & dicta parte, tanquam ex una linea describitur. Quod ostendendum fuerat.

Cor. 4.
hujus.


PROP. IX. THEOR.

Si recta linea in partes æquales, & in partes inæquales secta fuerit, quadrata quæ ab inæqualibus totius partibus describuntur, dupla sunt & quadrati dimidiæ, & quadrati lineæ ejus quæ inter sectiones interjicitur.

Recta enim linea quævis AB secta sit in partes æquales ad C, & in partes inæquales ad D. dico quadrata ex AD DB, quadratorum ex AC CD dupla esse. Ducatur enim a puncto C ipsi AB ad rectos angulos CE, & utrivis ipsarum

11. primi.

$ACCB$ æqualis ponatur, junganturque EA EB . ac per D quidem ipsi CE parallela ^b ducatur DF ; per F vero ipsi AB ^b 31. primi. parallela ^b FG , & AF ducatur. Itaque quoniam AC est æqualis CE ; erit ^c & angulus EAC angulo AEC æqualis. ^c 5. primi. & cum rectus sit angulus ad C , reliqui AEC EAC uni recto æquales ^d erunt. & sunt æquales inter sese. utervis ^d 3. Cor. 32. primi.




igitur ipsorum AEC EAC recti est dimidium. eadem ratione, & recti dimidium est utervis ipsorum CEB EBC . ergo totus angulus AEB rectus est. & quoniam angulus GEF dimidium est recti, rectus autem EGF ; æqualis enim ^e est interiori & opposito EGB , erit, & reliquus EFG recti dimidium: ^e 29. primi. **$\angle EGB$** . qualis igitur est GEF angulus ipsi EFG . quare & latus EG lateri GF est ^f æquale. rursus quoniam angulus ad B dimidium est recti, rectus autem FDB , quod sit æqualis interiori & opposito ECB : reliquus BFD recti erit dimidium. angulus igitur ad B æqualis est angulo BFD ; ideoque latus DF lateri DB æquale. & quoniam AC est æqualis CE , erit & ex AC quadratum æquale quadrato ex CE . quadrata igitur ex AC CE dupla sunt quadrati ex AC ; quadratis autem ex AC CE æquale ^g est quadratum ex EA , liquidem rectus est angulus ACE . ergo quadratum ex EA quadrati ex AC est duplum. rursus quoniam EG æqualis est GF , & quadratum ex EG quadrato ex GF est æquale. quadrata igitur ex EG & GF dupla sunt quadrati ex GF . at quadratis ex EG GF æquale ^g est quod ex EF quadratum. ergo quadratum ex EF quadrati ex GF duplum erit. æqualis ^h autem est GF ipsi CD . ^h 34. primi. quadratum igitur ex EF duplum est quadrati CD . sed & quadratum ex AE quadrati ex AC est duplum. ergo quadrata ex AE EF dupla sunt quadratorum ex AC CD . quadratis vero ex AE EF æquale ^g est ex AF quadratum; quoniam angulus AEF rectus est. quadratum igitur ex AF quadratorum ex AC CD est duplum. sed quadrato ex AF æqualia sunt ex ADD DF quadrata. rectus enim est angulus qui ad D . ergo ex ADD DF quadrata dupla sunt quadratorum ex AC CD . est autem DF ipsi DB æqualis. quadrata igitur ex AD DB quadratorum ex AC CD dupla erunt. Quare si recta linea in partes æquales, & in partes inæquales secta fuerit, quæ ab inæqualibus totius partibus describuntur quadrata dupla sunt & quadrati dimidiæ, & quadrati lineæ ejus quæ inter sectiones interjicitur. Quod ostendere oportebat.

PROP. X. THEOR.

Si recta linea secetur bifariam, & ipsi in directum quavis recta linea adjiciatur; quæ à tota cum adjecta, & adjecta sunt utraque quadrata dupla, sunt & quadrati dimidiæ, & quadrati quod ab ea quæ ex dimidia, & adjecta constat, tanquam ab una linea describitur.

Recta enim linea AB secetur bifariam in C , & ipsi in directum adjiciatur quavis recta linea BD . dico quadrata ex AD DB quadratorum ex AC CD dupla esse. Ducatur enim α 11. primi. puncto C ipsi AB ad rectos α angulos CE , & utrique ipsarum AC CB æqualis ponatur; ducaturque AE EB , & per E quidem ipsi AD parallela β ducatur EF ; per D vero ducatur DF β ipsi CE . & quoniam in parallelas EC FD recta α 29. primi. quædam linea EF incidit, anguli CEF EFD æquales α sunt duobus rectis. anguli igitur FEB EFD duobus rectis sunt minores. quæ autem à minoribus, quam sunt duo recti in infinitum producuntur, convenient inter se δ . ergo EB FD productæ ad partes BD convenient. producantur, & convenient in puncto G , & AG ducatur. itaque quoniam AC est æqualis CE , & angulus AEC angulo EAC æqualis α 5. primi. erit: atque est rectus qui ad C . uterque igitur ipsorum CAE AEC est recti dimidium. eadem ratione, & recti dimidium est uterque CEB EBC . ergo AEB est rectus. & β 15. primi. quoniam EBC est dimidium recti, erit & recti β dimidium DBG ; cum sit ad verticem. sed & BDG rectus est; etenim est æqualis ipsi DCE alterno. reliquus igitur DGB dimidium est recti, & ob id ipsi DBG æqualis. ergo & latus BD γ 6. primi. æquale γ lateri DG . rursus quoniam EGF est dimidium recti, rectus autem qui ad F , est enim angulo opposito qui ad C æqualis; erit, & reliquus FEG recti dimidium, & æqualis ipsi EGF . quare & latus GF lateri EF est æquale γ . & cum EC sit æqualis CA ; & quadratum ex EC æquale est ei quod ex CA fit quadrato. ergo quadrata ex EC CA dupla sunt quadrati ex CA . quadratis autem ex EC CA æquale β est quadratum ex EA . quadratum igitur ex EA quadrati ex AC est duplum, rursus quoniam GF est æqualis FE . æquale est, & ex GF quadratum quadrato ex FE . quadrata igitur ex GF FE quadrati ex EF sunt dupla. at quadratis ex GF FE æquale est,




est ^b quod ex EG quadratum. ergo quadratum ex EG duplum est quadrati ex EF. æqualis autem est EF ipsi CD. quadratum igitur ex EG quadrati ex CD duplum erit. sed ostensum est quadratum ex EA duplum quadrati ex AC. ergo ex AE EG quadrata, quadratorum ex AC CD sunt dupla. quadratis vero ex AE EG æquale est ^b quod ex AG quadratum. quadratum igitur ex AG duplum est quadratorum ex AC CD. at quadrato ex AG æqualia ^b sunt ex AD DG quadrata. ergo quadrata ex AD DG sunt dupla quadratorum ex AC CD. sed DG est æqualis DB. quadrata igitur ex AD DB quadratorum ex AC CD sunt dupla. Ergo si recta linea bifariam secetur, & ipsi indirectum quædam recta linea adjiciatur; quæ à tota cum adjecta, & adjecta fiunt utraque quadrata dupla sunt & quadrati dimidiæ, & quadrati quod ab ea quæ ex dimidia, & adjecta constat tanquam ab una linea describitur. Quod ostendere oportebat.

PROP. XI. PROBL.

Datam rectam lineam secare, ita ut quod sub tota, & altera parte continetur rectangulum æquale sit ei quod à reliqua parte fit quadrato.

Sit data recta linea AB. oportet ipsam AB ita secare, ut quod sub tota, & altera parte continetur rectangulum æquale sit ei, quod à reliqua parte fit quadrato. Describatur enim ^a ex AB quadratum ABCD, seceturque AC bifariam in E, & BE ducatur: deinde producta CA in F, ponatur ipsi BE æqualis EF: describaturque ex AF quadratum FGHA, & GH ad K producatur. dico AB sectam esse in H, ita ut sub AB BH rectangulum æquale sit quadrato ex AH. Quoniam enim recta linea AC bifariam secatur in E, adjiciturque ipsi indirectum AF, rectangulum sub CFFA, una cum quadrato ex AE, æquale ^b erit quadrato ex EF. sed EF est æqualis EB. rectangulum igitur sub CF FA, una cum quadrato ex AE æquale est ei, quod fit ex EB, quadrato. quadrato autem ex EB æqualia sunt quadrata ex BA AE: etenim angulus ad A rectus est. ergo rectangulum sub CF FA, una cum quadrato ex AE æquale est quadratis ex BA AE. commune auferatur quod ex AE fit quadratum. reliquum igitur rectangulum sub CF FA æquale est quadrato ex AB. est autem rectangulum FK sub



^b 6. hujus.

^a 47. primi.

D


CF FA

CF FA; siquidem AF est æqualis FG: quadratum autem ex AB est ipsum AD. rectangulum igitur FK æquale est quadrato AD. commune auferatur AK. ergo reliquum FH reliquo HD est æquale. atque est HD rectangulum sub AB BH, cum AB sit æqualis BD, & FH est quadratum ex AH. rectangulum igitur sub AB BH quadrato ex AH æquale erit. Quare data recta linea AB secta est in H, ita ut sub AB BH rectangulum quadrato ex AH sit æquale. Quod facere oportebat.

PROP. XXII. THEOR.

In obtusangulis triangulis, quod à latere obtusum angulum subtendente fit quadratum majus est quam quadrata quæ fiunt à lateribus obtusum angulum continentibus, rectangulo contento bis sub uno laterum quæ sunt circa obtusum angulum, in quod scilicet protractum perpendicularis cadit, & linea assumpta exterius à perpendiculari ad angulum obtusum.

Sit obtusangulum triangulum ABC. obtusum angulum habens BAC: & ducatur ^a à puncto B ad CA protractam perpendicularis BD. dico quadratum ex BC majus esse, quam quadrata ex BA AC, rectangulo quod bis sub CA AD continetur. Quoniam enim recta linea CD secta est utcumque in puncto A, erit quadratum ex CD æquale ^b, & quadratis ex CA AD, & ei quod bis sub CA AD continetur rectangulo. commune apponatur ex DB quadratum. quadrata igitur ex CD DB æqualia sunt & quadratis ex CA AD DB, & rectangulo quod bis sub CA AD continetur. sed quadratis ex CD DB æquale est quadratum ex CB, rectus enim est angulus ad D, cum sit BD perpendicularis. Quadratis vero ex AD DB æquale est ^c quadratum ex AB. quadratum igitur ex CB æquale est, & quadratis ex CA AB, & rectangulo bis sub CA AD contento. ergo quadratum ex CB majus est quam quadrata ex CA AB, rectangulo quod bis sub CA AD continetur. In obtusangulis igitur triangulis, quadratum quod fit à latere obtusum angulum subtendente majus est quam quadrata quæ fiunt à lateribus obtusum angulum continentibus, rectangulo contento bis sub uno laterum quæ sunt circa obtusum




sum angulum, in quod protractum perpendicularis cadit, & linea assumpta exterius à perpendiculari ad angulum obtusum. Quod demonstrare oportebat.

PROP. XIII. THEOR.

In acutangulis triangulis, quod à latere acutum angulum subtendente fit quadratum minus est quam quadrata quæ sunt lateribus acutum angulum continentibus, rectangulo contento bis sub uno laterum quæ sunt circa acutum angulum, in quod perpendicularis cadit, & linea à perpendiculari intus assumpta ad angulum acutum.

Sit acutangulum triangulum ABC acutum habens angulum ad B : ducatur à puncto A ad BC perpendicularis AD . 12. primi. dico quadratum quod fit ex AC minus esse quam quadrata quæ ex CB BA fiunt, rectangulo quod bis sub CB BD continetur. Quoniam enim recta linea CB secta est utcumque in D , erunt

quadrata ex CB BD æqualia, & rectangulo quod bis sub CB BD continetur, & quadrato ex DC . commune apponatur ex AD quadratum. quadrata igitur ex CB BD DA æqualia sunt, & rectangulo bis sub CB BD contento, & quadratis ex




67. hujus,

AD DC . sed quadratis ex BD DA æquale est ex AB quadratum; rectus enim angulus est qui ad D . quadratis vero ex AD DC æquale est quadratum ex AC , quadrata igitur ex CB BA sunt æqualia quadrato ex AC & ei quod bis sub CB BD continetur rectangulo. quare solum quadratum ex AC minus est quam quadrata ex CB BA , rectangulo quod bis sub CB BD continetur. In acutangulis igitur triangulis quadratum quod à latere acutum angulum subtendente fit minus est quam quadrata quæ fiunt à lateribus acutum angulum continentibus, rectangulo contento bis sub uno laterum quæ sunt circa acutum angulum, in quod perpendicularis cadit, & linea à perpendiculari intus assumpta ad angulum acutum. Quod demonstrare oportebat. 47. primi.

PROP. XIV. PROBL.

Dato rectilineo æquale quadratum constituere.

- Sit datum rectilineum A. oportet ipsi A rectilineo æquale quadratum constituere. Constituatur ^a rectilineo A æquale parallelogrammum rectangulum BCDE. si igitur BE est æqualis ED, factum jam erit quod proponebatur, etenim rectilineo A æquale quadratum constitutum est BD: sin minus, una ipsarum BE ED major est. sit BE major; & producat ad F, ponaturque ipsi ED æqualis EF. deinde secta FB bifariam ^b in G: centro quidem C, intervallo autem unius ipsarum GB GF semicirculus describatur BHF; producatque DE in H, & GH ducatur. Quoniam igitur recta linea BF secta est in partes æquales ad G, inæquales ad E; erit rectangulum sub BE EF, una cum quadrato quod fit ex EG, æquale quadrato ex GF. est autem GF æqualis GH. rectangulum igitur sub BE EF una cum quadrato ex GE, æquale est quadrato ex GH. sed quadrato ex GH æqualia ^d sunt ex HE EG quadrata. ergo rectangulum sub BE EF una cum quadrato ex EG æquale est quadratis ex HE EG. commune auferatur ex EG quadratum. reliquum igitur rectangulum sub BE EF est æquale quadrato ex EH. sed rectangulum sub BE EF est ipsum BD parallelogrammum, quoniam EF est æqualis ED. ergo BD parallelogrammum quadrato ex EH est æquale. parallelogrammum autem BD est æquale rectilineo A. rectilineum igitur A quadrato ex EH descripto æquale erit. Quare dato rectilineo A æquale quadratum constitutum est, quod videlicet ex ipsa EH describitur. Quod facere oportebat.



EUCLIDIS

ELEMENTORUM

LIBER TERTIUS.

DEFINITIONES.

I.


Æ Quales circuli sunt quorum diametri sunt æquales
vel quorum quæ ex centris sunt æquales.

II.

Recta linea circulum contingere dicitur, quæ contingens
circulum, & producta ipsum non secat.


III.

Circuli contingere se dicuntur, qui contingentes, se ipsos
non secant.



IV.

In circulo æqualiter distare
à centro rectæ lineæ dicuntur,
quando à centro ad ipsas per-
pendiculares ductæ sunt æ-
quales.




V.

Magis autem distare à centro dicitur ea in quam major
perpendicularis cadit.


VI.

Segmentum circuli est figura quæ recta linea, & circuli circumferentia continetur.




VII.

Segmenti autem angulus est qui recta linea, & circuli circumferentia comprehenditur.



VIII.

In segmento angulus est, quando in circumferentia segmenti sumatur aliquod punctum, atque ab ipso ad terminos lineæ ejus quæ basis est segmenti rectæ lineæ ducantur, angulus ductis lineis contentus.



IX.

Quando autem continentes angulum rectæ lineæ assumunt circumferentiam, in illa consistere angulus dicitur.

X.

Sector circuli est, quando angulus ad centrum consistit, figura contenta rectis lineis angulum comprehendentibus, & circumferentia ab ipsis assumpta.

XI.

Similia circulorum segmenta sunt, quæ angulos suscipiunt æquales, vel in quibus anguli æquales consistunt.




PROP.

PROPOSITIO. I. PROBLEMA.

Dati circuli centrum invenire.

Sit datus circulus ABC . oportet circuli ABC centrum invenire. Ducatur in ipso quædam recta linea AB utcumque, & in puncto D bifariam ^a secetur. à puncto autem D ipsi ^a AB ad rectos angulos ^b ducta DC in E producat; & secetur ^b CE bifariam ^a in F . dico punctum F circuli ABC centrum esse.



Non enim, sed si fieri potest, sit G centrum, & $GA GD GB$ ducantur. itaque quoniam DA est æqualis DB , communis autem DG , erunt duæ $AD DG$ duabus $GD DB$ æquales, altera alteri: & basis GA æqualis ^c est basi GB ; sunt enim ex ^c Def. centro G . angulus igitur ADG angulo GDB est ^d æqualis ^{15. primi.} cum autem recta linea super rectam lineam insitens, angulos qui deinceps sunt, æquales inter se fecerit, ^e rectus est ^{Def.} uterque æqualium angulorum. ergo angulus GDB est rectus. ^{10. primi.} sed & rectus FDB . æqualis igitur est angulus FDB angulo GDB , major minori, quod fieri non potest. quare G non est circuli ABC centrum. similiter ostendemus neque aliud esse, præter ipsum F . ergo F centrum est circuli ABC . Quod invenire oportebat.


Cor. Si in circulo quævis recta linea, lineam quandam bifariam & ad angulos rectos secet, in secante erit centrum circuli.

PROP. II. THEOR.

Si in circumferentia circuli duo quævis puncta sumantur, quæ ipsa conjungit recta linea intra circumulum cadet.

Sit circulus ABC ; in circumferentia ipsius sumantur duo quævis puncta $A B$. dico rectam lineam quæ à puncto A ad B ducitur, intra circumulum cadere.

sumatur in recta AB punctum quodvis E , jungantur $DA DE DB$. Quoniam DA est æqualis DB , erit ^a angulus DAB æqualis angulo DBA , & quoniam tri- anguli DAE latus AE producitur erit ^b angulus DEB angulo DAE major, angulus autem DAE æqualis est angulo DDE , ergo

^a 5. primi.^b 16. primi.

DEB angulus angulo DDE
 D 4 est

est major. sed majori angulo majus latus subtenditur, major igitur est DB ipsa DE . sed DB ad circumferentiam tantum pertingit. ergo DE non eo usque protenditur. adeoque punctum E cadet intra circulum. Si igitur in circumferentia &c. Quod oportebat demonstrare.


Cor. Hinc si recta circulum tangit, in unico puncto eum tangit.

PROP. III. THEOR.

Si in circulo recta linea per centrum ducta, rectam lineam quandam non ductam per centrum bifariam secet, & ad angulos rectos ipsam secabit, quod si ad angulos rectos ipsam secet, & bifariam secabit.

Sit circulus ABC , & in ipso recta linea per centrum ducta CD rectam lineam quandam AB non ductam per centrum bifariam secet in puncto F . dico ad angulos rectos ipsam secare. sumatur enim circuli

a 1. hujus. ABC centrum *a* quod sit E , & EA EB jungantur. Quoniam igitur AF est æqualis FB , communis autem FE , duæ AFE BFE duabus BF FE æquales sunt, & basis EA basi EB est æqualis. ergo & angulus AFE angulo BFE æ-



b 8. primi. qualis *b* erit. cum autem recta linea super rectam insistens angulos, qui deinceps sunt, æquales inter se fecerit, rectus est *c* uterque æqualium angulorum. uterque igitur AFE BFE est rectus, quare recta linea CD per centrum ducta rectam lineam AB non ductam per centrum bifariam secans, & ad angulos rectos ipsam secabit. Si vero CD secet AB ad rectos angulos, dico & bifariam ipsam secare, hoc est AF ipsi FB æqualem esse. iisdem enim constructis, quoniam EA , quæ

c Diffin. 10. primi.

d 5. primi.

ex centro est æqualis EB , & angulus EAF angulo *d* EBF æqualis erit, est autem & AFE rectus æqualis recto BFE . duo igitur triangula EAF EBF duos angulos duobus angulis æquales habent, unumque latus uni lateri æquale EF , commune scilicet utrisque, quod uni angulorum æqualium subtenditur. ergo & reliqua latera reliquis lateribus æqualia

e 26. primi.

e habebunt. atque erit AF ipsi FB æqualis. Si igitur in circulo recta linea per centrum ducta rectam lineam quandam non ductam per centrum bifariam secet, & ad angulos rectos ipsam secabit. quod si ipsam secet ad rectos angulos, & bifariam secabit. Quod oportebat demonstrare.


PROP.

PROP. IV. THEOR.

Si in circulo duæ rectæ lineæ se invicem secant non ductæ per centrum, sese bifariam non secabunt.

Sit circulus $ABCD$; & in ipso duæ rectæ lineæ $ACBD$ se invicem secant in puncto E , non ductæ per centrum. dico eas sese bifariam non secare. si enim fieri potest secant sese.

bifariam, ita ut AE sit æqualis EC , & BE ipsi ED : sumaturque a centrum $ABCD$ circuli, quod sit F , & EF jungatur. quoniam igitur recta linea FE per centrum ducta rectam lineam quandam AC non ductam per centrum bifariam secat, & ad




a 1. hujus.

rectos angulos ipsam secabit b . quare rectus est FEA angulus. rursus quoniam recta linea FE rectam lineam quandam BD non ductam per centrum bifariam secat, & ad angulos rectos ipsam b secabit. rectus igitur angulus est FEB . ostensus autem est rectus & FEA . ergo FEA angulus ipsi FEB æqualis erit, minor majori, quod fieri non potest. non igitur $ACBD$ sese bifariam secant. Quare si in circulo duæ rectæ lineæ se invicem secant non ductæ per centrum, sese bifariam non secabunt. Quod ostendere oportebat.

PROP. V. THEOR.

Si duo circuli se invicem secant, non erit ipsorum idem centrum.

Duo enim circuli se invicem secant ABC CDG in punctis B C . dico ipsorum idem centrum non esse. Si enim fieri potest, sit centrum E ; jungaturque EC , & EFG utcumque ducatur. Quoniam E centrum est circuli ABC erit CE ipsi EF æqualis. rursus quoniam E centrum est CDG circuli, æqualis est CE ipsi EG . sed o-




stensa est CE æqualis EF . ergo EF ipsi EG æqualis erit, minor majori, quod fieri non potest. non igitur punctum E centrum est circulorum ABC CDG . Quare si duo circuli se invicem secant, non erit ipsorum idem centrum. Quod ostendendum fuit.

PROP. VI.

PROP. VI. THEOR.

Si duo circuli sese intra contingant, ipsorum idem centrum non erit.


Duo enim circuli ABC CDE contingant sese intra in puncto C . dico ipsorum non esse idem centrum. si enim fieri potest sit F ; jungaturque FC , & FEB utcumque ducatur. Quoniam igitur F centrum est circuli ABC , æqualis est CF ipsi FB . rursus quoniam F centrum est circuli CDE , erit CF æqualis FE . ostensa autem est CF æqualis FB . ergo & FE ipsi FB est æqualis, minor majori, quod fieri non potest. non igitur F punctum centrum est circulorum ABC CDE . Quare si duo circuli sese intra contingant, ipsorum idem centrum non erit. Quod demonstrare oportebat.



PROP. VII. THEOR.

Si in circuli diametro aliquod punctum sumatur, quod non sit centrum circuli, & ab eo in circulum cadant quævis rectæ lineæ; maxima quidem erit in qua centrum: minima vero reliquæ: aliarum autem propinquior ei quæ per centrum transit, semper remotiore major est. at duæ tantum æquales ab eodem puncto in circulum cadent ad utraq(ue partes) minimæ.

Sit circulus $ABCD$, cujus diameter AD & in ipsa AD sumatur aliquod punctum F , quod non sit centrum circuli. Sit autem circuli centrum E : & à puncto F in circulum $ABCD$ cadant quædam rectæ lineæ FB FC FG . dico FA maximam esse, & FD minimam: aliarum vero, FB quidem majorem quam FC , & FC majorem quam FG . jungantur enim BE CE GE . Et quoniam omnis trianguli duo latera reliquo sunt majora; erunt BE EF majores quam BF . est autem AE æqualis BE . ergo BE EF ipsi AF sunt æquales. major igitur est AF quam FB . rursus quoniam BE est æqualis CE , communis autem FE , duæ BE EF duabus CE EF æ-



quales sunt. sed $\angle BEF$ angulus major est angulo $\angle CEF$: basis igitur BF basi FC est ^b major. eadem ratione & CF major ^{b 24. primi.} est quam FG . rursus quoniam GF & FE majores ^a sunt quam ^{a 20. primi.} GE , æqualis autem GE ipsi ED ; erunt GF & FE majores quam ED . communis auferatur FE . ergo reliqua GF major est quam reliqua FD . maxima igitur est FA , & FD minima: major vero BF quam FC , & FC quam FG major. dico & à puncto F duas tantum rectas lineas æquales cadere in circulum $ABCD$ ad utrasque partes minimæ FD . constituatur enim ad ^{c 23. primi.} lineam EF atque ad datum in ea punctum E , angulo $\angle GEF$ æqualis angulus $\angle FEH$: & FH jungatur. quoniam igitur GE est æqualis EH , communis autem EF , duæ GE & EF duabus HE & EF æquales sunt: & angulus $\angle GEF$ est æqualis angulo $\angle HEF$. basis igitur FG basi FH æqualis ^d erit. dico à puncto ^{d 4. primi.} F in circulum non cadere aliam ipsi FG æqualem. si enim fieri potest, cadat FK & quoniam FK est æqualis FG , estque ipsi FG æqualis FH ; erit & FK ipsi FH æqualis, videlicet propinquior ei, quæ per centrum transit æqualis remotiori, quod fieri non potest. Si igitur in circuli diametro aliquod punctum sumatur quod non sit centrum circuli, &c. Quod demonstrare oportebat.

PROP. VIII. THEOR.

Si extra circulum aliquod punctum sumatur, atque ab eo ad circulum ducantur quædam rectæ lineæ, quarum una per centrum transeat, aliæ vero utunque: earum quidem quæ in concavam circumferentiam cadunt, maxima est quæ per centrum transit; aliarum autem propinquior ei quæ per centrum, semper remotiore major est. at earum quæ in convexam circumferentiam cadunt minima est quæ inter punctum & diametrum interjicitur; aliarum vero quæ propinquior minimæ semper remotiore est minor. duæ autem tantum æquales à puncto in circulum cadunt ad utrasque partes minimæ.

Sit circulus ABC , & extra circulum sumatur aliquod punctum D : ab eo autem in circulum ducantur rectæ lineæ quædam DA DE DF DC : sitque DA per centrum. dico earum quidem quæ in concavam AEC circumferentiam cadunt, maximam esse DA quæ per centrum transit; & minimam quæ inter punctum D , & diametrum AG interjicitur, videlicet DG : majorem autem DE quam DF ; & DF majorem

majorem quam DC : earum vero quæ in convexam circumferentiam $HLKC$ cadunt, quæ propinquior est minimæ DG semper remotiore esse minorem; hoc est DK minorem

1. hujus.


quam DL & DL minorem quam DH . sumatur enim centrum circuli ABC , quod sit M , & jungantur ME MF MC MH ML . & quoniam AM est æqualis ME , communis apponatur MD . ergo AD est æqualis ipsis EM MD . sed EM MD

20. primi.

sunt majores quam ED . ergo & AD quam ED est major. rursus quoniam æqualis est ME ipsi MF , communis apponatur MD . erunt EM MD ipsi MF MD æquales; at angulus EMD major est angulo FMD . basis igitur

24. primi.

ED basi FD major erit. similiter demonstrabimus, & FD majorem esse quam CD . ergo maxima est DA ; major autem DE quam DF , & DF quam DC major. præterea quoniam



Axiom. 4.

MK KD sunt majores quam MD , & MG est æqualis MK ; erit reliqua KD quam reliqua GD major. quare GD minor quam KD , & idcirco GD minima est. & quoniam trianguli MLD in uno latere MD , duæ rectæ lineæ MK KD in-

28. primi.

tra constituentur, erunt MK KD minores ipsis ML LD , quarum MK est æqualis ML . reliqua igitur DK minor est quam reliqua DL . similiter ostendemus, & DL quam DH minorem esse. ergo DG minima est. minor vero DK quam DL , & DL minor quam DH . dico etiam duas tantum æquales à puncto D in circulum cadere ad utrasque minimæ partes. constituatur ad rectam lineam MD , ad datumque in ea

23. primi.

punctum M , angulo KMD æqualis angulus DMB , & DB jungatur. itaque quoniam MK est æqualis MB , communis autem MD , duæ KM MD duabus BM MD æquales sunt, altera alteri, & angulus KMD æqualis angulo BMD , basis igitur


4. primi.

DK basi DB est æqualis. dico à puncto D aliam ipsi DK æqualem in circulum non cadere. si enim fieri potest, cadat DN . & quoniam DK est æqualis DN , & DK ipsi DB est æqualis; erit & DB æqualis DN , propinquior scilicet minimæ æqualis remotiori, quod fieri non posse ostensum est. Si igitur extra circulum aliquod punctum sumatur, &c. quod ostendere oportebat.

PROP. IX. THEOR.

Si intra circulum sumatur aliquod punctum, atque ab eo in circulum cadant plures quam duæ rectæ lineæ æquales; punctum quod sumitur circuli centrum erit.


Sumatur enim intra circulum ABC punctum aliquod D : atque à puncto D in circulum ABC cadant plures quam duæ rectæ lineæ æquales $DA DB DC$. dico punctum D , quod sumitur circuli ABC esse centrum. Non enim sed si, fieri potest, sit E centrum, & iuncta DE in FG producat. ergo FG diameter est ABC circuli. itaque quoniam in FG diametro circuli ABC sumptum est aliquod punctum D quod non est centrum circuli, maxima quidem erit DG , major ^a au ^a 7. hujus. tem DC quam DB , & DB quam DA . sed & æquales ^b, quod ^b ex hyp. fieri non potest. non igitur E centrum est circuli ABC . similiter ostendemus neque aliud punctum centrum esse præter ipsum D . ergo D circuli BC centrum erit. Quod oportebat demonstrare.



PROP. X. THEOR.

Circulus circulum in pluribus, quam duobus punctis non secat.

Si enim fieri potest circulus ABC circulum DEF secet in pluribus punctis, quam duobus; nempe in BGF , & circuli ABC centrum sumatur, quod sit K , & $KB KG KF$ iungantur. Quoniam igitur intra circulum DEF sumptum est aliquod punctum K , à quo in circulum DEF cadant plures quam duæ rectæ lineæ $KB KG KF$ æquales, erit punctum K circuli DEF centrum ^a. est autem & circuli ABC centrum ^b K . duorum igitur circulorum, qui se se secant, idem erit K ^b Ex hyp. centrum, quod fieri non potest. Quare circulus circulum in pluribus,




^a 9. hujus.

pluribus quam duobus punctis non fecat. Quod oportebat demonstrare.

PROP. XI. THEOR.

Si duo circuli sese intus contingant, & sumantur centra ipsorum; recta linea ipsorum centra conjungens producta in circulo contactum cadet.

Duo enim circuli ABC ADE sese intus contingant in puncto A , & sumatur circuli quidem ABC centrum quod sit F , circuli vero ADE centrum G . dico rectam lineam à puncto G ad F ductam, si producat in punctum A cadere. non enim; sed si fieri potest, cadat ut $FGDH$. & AF AG jungantur. Itaque quoniam AG GF majores sunt quam FA , hoc est quam FH , communis auferatur FG . reliqua igitur AG major est quam reliqua GH . sed AG est æqualis GD . ergo GD ipsa GH est major, minor majore, quod fieri non potest. non igitur à puncto F ad G ducta recta linea extra contactum A cadet. quare in ipsum cadat necesse est. Si igitur duo circuli sese intus contingant, recta linea ipsorum centra conjungens, si producat in contactum circulo- rum cadet. Quod oportebat demonstrare.




a 12. primi.

PROP. XII. THEOR.

Si duo circuli se se extra contingant, recta linea ipsorum centra conjungens per contactum transibit.

Duo enim circuli ABC ADE sese extra contingant in puncto A ; & sumatur circuli quidem ABC centrum quod sit F ; circuli vero ADE centrum G . dico rectam lineam, quæ à puncto F ad G ducitur, per contactum A transire. non enim; sed, si fieri potest, cadat ut $FCDG$; & FA AG jungantur. Quoniam igitur F centrum est circuli ABC , erit AF æqualis FC . rursus quoniam G centrum est ADE circuli, erit AG ipsi GD æqualis. ostensa est autem, & AF æqualis FC . sunt igitur FA AG ipsis FC DG æquales, ergo tota FG major est quam FA AG . sed & minor,




minor α , quod fieri non potest non igitur à puncto r ad c α 20. primi. ducta recta linea per contactum a non transibit. quare per ipsum transeat necesse est. Si igitur duo circuli sese extra contingant, recta linea ipsorum centra coniungens per contactum transibit. Quod oportebat demonstrare.

PROP. XIII. THEOR.

Circulus circulum non contingit in pluribus punctis quam uno, siue intus siue extra contingat.

Si enim fieri potest, circulum $ABCD$ circulus $EBFD$ contingat primum intus in pluribus punctis quam uno, videlicet in BD : & sumatur circuli quidem $ABDC$ centrum G , circuli vero $EBFD$ centrum H . ergo recta linea quæ à puncto G ad H ducitur, in puncta α BD cadet. cadat ut $BGHD$. & quoniam G centrum est circuli $ABDC$, erit BG ipsi GD æqualis. major igitur est BG quam HD : & BH quam HD multo major. rursus quoniam H centrum est $EBFD$ circuli, æqualis est BH ipsi HD . atqui ostensa est ipsa multo major, quod fieri non potest. non igitur circulus circulum intus contingit in pluribus punctis, quam uno. dico etiam neque extra contingere. si enim fieri potest, circulus ACK circulum $ABDC$ extra contingat

α 11. hujus.



in pluribus punctis quam uno, videlicet in AC , & AC jungatur. itaque quoniam in circumferentia utrorumque circulorum $ABDC$ ACK sumpta sunt duo puncta AC ; recta linea, quæ ipsa coniungit intra utrumque ipsorum cadet β . sed intra circulum quidem $ABDC$ cadit, extra circulum vero ACK , quod est absurdum. Non igitur circulus circulum extra contingit in pluribus punctis quam uno. ostensum autem est neque intus contingere. circulus igitur circulum non contingit in pluribus punctis quam uno, siue intus, siue extra contingat. Quod oportebat demonstrare.

β 2. hujus.

PROP. XIV. THEOR.


In circulo æquales rectæ lineæ æqualiter à centro distant: & quæ æqualiter à centro distant, inter se sunt æquales.

Sit circulus $ABDC$, & in ipso æquales rectæ lineæ $ABCD$. dico eas à centro æqualiter distare. Sumatur enim circuli

$ABDC$

ABDC centrum quod sit E, & ab ipso ad ABCD perpendiculares ducantur EF EG, & AE EC jungantur. Quoniam igitur recta linea quædam per centrum ducta EF rectam lineam quandam AB non ductam per centrum ad rectos

4. hujus. angulos secat, & bifariam ipsam secabit. quare AF est æqualis FB, ideoque AB ipsius AF dupla. eadem ratione, & CD dupla est CG. atque est AB ipsi CD æqualis. æqualis igitur & AF ipsi CG. & quoniam AE est æqualis EC, erit & quadratum ex AE quadrato ex EC æquale. sed quadrato




47. primi. quidem ex AE æqualia sunt ex AF FE quadrata^b; rectus enim angulus est ad F: quadrato autem ex EC æqualia sunt quadrata ex EG GC, cum angulus ad G sit rectus. quadrata igitur ex AF FE æqualia sunt quadratis ex CG GE, quorum quadratum ex AF quadrato ex CG æquale, etenim æqualis est AF ipsi CG. reliquum igitur quod sit ex FE quadratum æquale est reliquo quod ex EG; ac propterea FE ipsi EG est æqualis. in circulo autem æqualiter distare à centro rectæ lineæ dicuntur, quando à centro ad ipsas perpendiculares ductæ æquales sunt. ergo ABCD à centro æqualiter distant. Sed si ABCD æqualiter distent à centro hoc est, æqualis sit FE ipsi EG; dico AB ipsi CD æqualem esse. iisdem enim constructis, similiter ostendemus AB duplam esse ipsius AF, CD duplam ipsius CG. & quoniam æqualis est AE ipsi EC, erit & ex AE quadratum quadrato ex EC æquale. sed quadrato quidem ex AE æqualia^b sunt quadrata ex EF FA: quadrato autem ex EC æqualia^b quadrata ex EG GC. quadrata igitur ex EF FA quadratis ex EG GC æqualia sunt. quorum quadratum ex EG æquale est quadrato ex EF, est enim EG ipsi EF æqualis: reliquum igitur ex AF quadratum æquale est reliquo ex CG. ergo AF ipsi CG est æqualis. atque est AB ipsius AF dupla, & CD dupla ipsius CG. In circulo igitur æquales rectæ lineæ æqualiter à centro distant. Et quæ æqualiter à centro distant, inter se sunt æquales. Quod oportebat demonstrare.

PROP. XV. THEOR.

In circulo maxima quidem est diameter: aliarum vero semper propinquior ei quæ per centrum transit, remotiore major est.

Sit circulus ABCD, cujus diameter AD, centrum E; & propinquior quidem diametro AD sit BC; remotior vero FG. dico AD maximam esse, & BC majorem quam FG. Ducantur enim à centro B ad BC FG perpendiculares EH EK. & quoniam BC propinquior est ei quæ per centrum tran-

sit, remotior autem FG; erit EK quam EH major. ponatur ipsi EH æqualis EL, & per L ipsi EK ad rectos angulos ducta LM in N producat, & jungatur EM EN EF EG. quoniam igitur EH est æqualis EL, erit & BC ipsi MN æqualis ^a. rursus quoniam



^a 14. hujus.

æqualis est AE ipsi EM, & DE ipsi EN, erit & AD ipsis ME EN æqualis. sed ME EN ^b majores sunt quam MN; ergo & AD major est quam MN: & MN est æqualis BC, erit igitur AD quam BC major. quod cum duæ EM EN duabus FE EG æquales sint, angulusque MEN major angulo FEG, & basis MN basi FG major ^c erit. ostensa autem est MN æ- ^c 24. primi. qualis BC. ergo & BC quam FG est major. maxima igitur est AD diameter, & BC major quam FG. Quare in circulo maxima est diameter, aliarum vero semper propinquior ei quæ per centrum transit remotiore est major. Quod demonstrare oportebat.

PROP. XVI. THEOR.

Quæ diametro circuli ad rectos angulos ab extremitate ducitur, cadit extra circulum: & in locum qui inter rectam lineam, & circumferentiam interjicitur altera recta linea non cadet; & semicirculi angulus omni angulo acuto rectilineo major est; reliquus autem minor.

Sit circulus ABC circa centrum D, & diametrum AB dico rectam lineam, quæ à puncto A ipsi AB ad rectos angulos ducitur extra circulum cadere. non enim; sed, si fieri potest,

potest, cadat intus, ut AC , & DC jungatur. itaque quoniam æqualis est DA ipsi DC , erit & angulus DAC angulo ACD


a 5. primi. æqualis *a*. rectus autem est DAC ; ergo & ACD est rectus; ac propterea anguli DAC ACD duabus rectis æquales sunt.

b 17. primi. quod fieri non potest *b*. non igitur à puncto A ipsi BA ad rectos angulos ducta cadet intra circulum. similiter ostendemus neque in circumferentiam cadere. extra igitur cadat necesse est. cadat ut AE . dico in locum qui inter rectam lineam AE & circumferentiam CHA interjicitur, alteram rectam lineam non cadere. si enim fieri potest, cadat ut FA , & à puncto D ad FA perpendicularis

c 12. primi. ducatur DG . & quoniam rectus est angulus AGD , minor autem recto

d 19. primi. DAG , erit DA quàm DG major *d*. æqualis autem est DA ipsi DH . major igitur est DH ipsa DG , minor majore, quod fieri non potest. non igitur in locum qui inter rectam lineam & circumferentiam interjicitur, altera recta linea cadet. dico præterea angulum semicirculi, qui recta linea BA , & circumferentia CHA continetur, omni angulo acuto rectilineo majorem esse; reliquum vero contentum circumferentia CHA , & recta linea AE omni angulo rectilineo esse minorem. si enim est aliquis angulus rectilineus acutus major quidem contento recta linea BA , & CHA circumferentia, aut aliquis minor contento CHA circumferentia, & recta linea AE , in locum qui inter circumferentiam CHA , & rectam lineam AE interjicitur, cadet aliqua recta linea quæ faciet angulum majorem quidem contento recta linea BA & CHA circumferentia, qui scilicet rectis lineis continetur, minorem vero contento circumferentia CHA , & AE recta linea, non cadit autem *e*: non igitur erit angulus acutus qui rectis lineis continetur, major angulo contento recta linea BA , & CHA circumferentia, neque minor contento circumferentia CHA , & AE recta linea.

e ex prius demonstratis.




Cor. Ex hoc manifestum est rectam lineam quæ ab extremitate diametri circuli ad rectos angulos ducitur, circum contingere, & rectam lineam contingere circum in uno tantum puncto, quoniam quæ occurrit in duobus dunctis intra ipsum cadit, ut ostensum est.

PROP.

PROP. XVII. PROBL.

*A dato puncto rectam lineam ducere quæ datum circum-
culum contingat.*

Sit datum quidem punctum A, datus autem circulus BCD. oportet à puncto A rectam lineam ducere, quæ circum-
culum BCD contingat. sumatur enim centrum circuli E; & juncta
AE, centro quidem E, intervallo autem EA circulus AFG
describatur: & à puncto D
ipfi EA ad rectos angulos
ducatur DF: junganturque
EBF AB. dico à puncto A
ductam esse AB quæ circu-
lum BCD contingit. quoniam
enim E centrum est circulo-
rum BCD AFG, erit EA æ-
qualis EF, & ED ipfi EB. duæ igitur AE EB duabus FE
ED æquales sunt, & angulum communem continent qui est
ad E. ergo basis DF basi AB est æqualis, triangulumque
DEF æquale triangulo EBA, & reliqui anguli reliquis an-
gulis. æqualis igitur est angulus EBA angulo EDF. & EDF
rectus est. quare & rectus EBA: atque est EB ex centro.
quæ autem diametro circuli ab extremitate ad rectos angulos
ducitur circumculum contingit. ergo AB contingit circum-
culum BCD. A dato igitur puncto A ducta est recta linea AB quæ circu-
lum BCD contingit. Quod facere oportebat.



a 11. primi.


b 4. hujus.

c 16. hujus.

PROP. XVIII. THEOR.

*Si circumculum contingat quædam recta linea, à centro au-
tem in contactum recta linea ducatur, ea ad contin-
gentem perpendicularis erit.*

Circulum enim ABC contingat quædam recta linea DE in
puncto C: & circuli ABC centrum sumatur F, à quo ad C
ducatur FC. dico FC ad ip-
sam DE perpendicularem
esse. si enim non ita sit, du-
catur à puncto F ad DE per-
pendicularis F G. quoniam
igitur angulus FGC rectus est,
erit GCF acutus, ac propte-
rea FGC angulus major angu-
lo FCG. majorem autem angulum majus latus subtendit.
major igitur est FC quam FG. æqualis autem FC ipfi FB.



a 12. primi

b 32. primi.

c 19. primi.

E 2


ergo

ergo FB ipsa FG est major, minor majore, quod fieri non potest. non igitur FG est perpendicularis ad DE . similiter ostendemus neque aliam quampiam esse præter ipsam FC . ergo FC ad DE est perpendicularis. Si igitur circulum contingat quædam recta linea, à centro autem in contactum recta linea ducatur, ea ad contingentem perpendicularis erit.

PROP. XIX. THEOR.

Si circulum contingat quædam recta linea, à contactu autem ad rectos angulos contingenti recta linea ducatur: in ea circuli centrum erit.

Circulum enim ABC contingat quædam recta linea DE in C , & à puncto C ipsi DE ad rectos angulos ducatur CA . dico in ipsa AC circuli centrum esse. non enim; sed, si fieri potest, sit F centrum, & jungatur CF . quoniam igitur circulum ABC contingit quædam recta linea DE , & à centro ad contactum ducta est FC ; erit FC ad ipsam DE perpendicularis ^a. rectus igitur angulus est FCE . est autem & ACE re-



^a 18. hujus.

^b Ex hyp.

ctus ^b. ergo FCE angulus est æqualis angulo ACE , minor majori, quod fieri non potest. non igitur F centrum est ABC circuli. similiter ostendemus neque aliud aliquod esse præterquam in ipsa AC . Quare si circulum contingat quædam recta linea, à contactu autem ad rectos angulos contingenti recta linea ducatur; in ea circuli erit centrum. Quod demonstrare oportebat.

PROP. XX. THEOR.

In circulo angulus qui ad centrum duplex est ejus qui ad circumferentiam est, quando circumferentiam eandem pro basi habeant.


Sit circulus ABC , ad cujus centrum quidem angulus sit BEC , ad circumferentiam vero BAC , & eandem circumferentiam BC pro basi habeant. dico BEC angulum anguli BAC duplum esse. jungatur enim AE , & ad F producat. itaque quoniam EA est æqualis EB , erit & angulus EAB angulo EBA ^a æqualis. anguli igitur EAB EBA duplices sunt ipsius

^a 5. primi.

PROP. XXII. THEOR.

Quadrilaterorum quæ in circulis describuntur, anguli oppositi duobus rectis æquales sunt.


Sit circulus $ABDC$, & in ipso quadrilaterum $ABCD$ dico angulos ipsius oppositos duobus rectis æquales esse. Jungantur AD BC : quoniam igitur omnis trianguli tres anguli duobus rectis sunt æquales ^a, erunt trianguli ABC tres anguli CAB ABC BCA æquales duobus rectis. sed angulus ABC est æqualis ^b angulo ADC , in eodem enim sunt segmento AB DC . & angulus ACB æqualis ^b ipsi ADB , quod sint in eodem $ACDB$ segmento: totus igitur angulus BDC angulis ABC ACB æqualis est. communis apponatur BAC angulus, erunt anguli BAC ABC ACB angulis BAC BDC æquales. sed BAC ABC ACB sunt æquales ^a duobus rectis. ergo & anguli BAC BDC duobus rectis æquales erunt. similiter ostendemus angulos quoque ABD ACD duobus rectis esse æquales. Quadrilaterorum igitur quæ in circulis describuntur, anguli oppositi duobus rectis æquales sunt. Quod oportebat demonstrare



PROP. XXIII. THEOR.

Super eadem recta linea duo circulorum segmenta similia, & inæqualia ex eadem parte non constituentur.

Si enim fieri potest, super eadem recta linea AB duo circulorum segmenta similia, & inæqualia constituentur ex eadem parte ACB ADB ; ducaturque ACD , & CB BD jungantur. itaque quoniam segmentum ACB simile est segmento ADB , similia autem circulorum segmenta sunt quæ angulos suscipiunt ^a æquales; erit ACB angulus æqualis angulo ADB , exterior interiori, quod fieri non potest ^b. Non igitur super eadem recta linea, duo circulorum segmenta similia, & inæqualia ex eadem parte constituentur. Quod demonstrare oportebat.




PROP.

PROP. XXIV. THEOR.

Super æqualibus rectis lineis similia circularum segmenta inter se æqualia sunt.

Sint enim super æqualibus rectis lineis AB CD similia circularum segmenta AEB CFD . dico segmentum AEB segmento CFD æquale esse. applicato enim AEB segmento segmento CFD , & posito puncto quidem A in C , recta vero linea AB in CD ; congruet & B punctum puncto D , propterea quod AB ipsi CD sit æqualis. congruente autem recta linea AB rectæ CD ; congruet & AEB segmentum segmento CFD . si enim AB congruet ipsi CD , segmentum autem AEB segmento CFD non congruet, sed permutabitur ut CGD , circulus circulum in pluribus quàm duobus punctis secabit. etenim circulus CGD circulum CFD secat in pluribus punctis quàm duobus, videlicet in punctis C G D , quod fieri non potest. non igitur congruente recta linea AB rectæ CD , non congruet & AEB segmentum segmento CFD . quare congruet, & ipsi æquale erit. Super æqualibus igitur rectis lineis similia circularum segmenta inter se æqualia sunt. Quod oportebat demonstrare.




PROP. XXV. PROBL.

Circuli segmento dato describere circulum cujus est segmentum.

Sit datum circuli segmentum ABC . oportet describere circulum cujus ABC est segmentum. Secetur AC bifariam a in D ; & à puncto D ipsi AC ad rectos a 10. primi.


angulos ducatur b b 11. primi.

DB , & AB jungatur. vel igitur angulus ABD major est angulo BAD , vel minor, vel ipsi æqualis. sit primum major, & ad rectam



lineam BA , atque ad datum in ea punctum A constituitur angulus BAE æqualis angulo ABD ; & DB ad E producat, c 23. primi. jungaturque EC . quoniam igitur angulus ABE est æqualis angulo


46. primi. angulo BAE , & erit & BE recta linea ipsi EA æqualis & quoniam AD est æqualis DC , communis autem DE , duæ AD DE duabus CD DE æquales sunt, altera alteri; & angulus ADE æqualis angulo CDE , rectus enim uterque est. ergo & basis AE basi EC est æqualis. sed ostensa est AE æqualis EB . quare & BE ipsi EC est æqualis, ac propterea tres rectæ lineæ AE EB EC inter se æquales sunt. centro igitur E intervallo autem una ipsarum AE EB EC circulus descriptus etiam per reliqua transibit puncta, & circulus descriptus erit. quare circuli segmento dato descriptus est circulus cujus segmentum est. sed & illud constat, segmentum ABC semicirculo minus esse; propterea quod centrum ipsius extra cadit. similiter, & si angulus ABD sit æqualis angulo BAD , facta AD æquali utrique ipsarum BD DC , erunt tres rectæ lineæ AD DB DC inter se æquales, atque erit D circuli descripti centrum, & segmentum ABC semicirculus. si vero angulus ABD minor sit angulo BAD ; constituatur ad rectam lineam BA , & ad punctum in ea datum A , angulo ABD æqualis angulus BAE intra segmentum ABC . erit E centrum in ipsa DB , atque erit ABC segmentum semicirculo majus. Circuli igitur segmento dato descriptus est circulus cujus segmentum est. Quod facere oportebat.



PROP. XXVI. THEOR.

In æqualibus circulis æquales anguli æqualibus insistant circumferentiis, sive ad centra, sive ad circumferentias insistant.

Sint æquales circuli ABC DEF , & in ipsis æquales anguli ad centra quidem BGC EHF , ad circumferentias vero BAC EDF . dico BKC circumferentiam circumferentiæ ELF æqualem esse. jungantur enim BC EF . Quoniam æquales sunt ABC DEF circuli, erunt & quæ ex centris æquales. duæ igitur BG GC duabus EH HF æquales sunt: & angulus ad G æqualis angulo ad H . ergo &



basis

basis BC basi EF est æqualis. rursus quoniam æqualis est ^a 4. primi. angulus ad A angulo ad D, segmentum BAC simile ^b erit ^b Def. 11. segmento EDF: & sunt super æqualibus rectis lineis BCEF. quæ autem super æqualibus rectis lineis similia sunt circulorum segmenta, inter se æqualia sunt. segmentum igitur BAC segmento EDF est æquale. sed & totus ABC circulus æqualis est toti DEF. ergo & reliqua circumferentia BKC reliquæ ELF æqualis erit. In æqualibus igitur circulis æquales anguli æqualibus insistant circumferentiis, five ad centra, five ad circumferentias insistant. Quod oportebat demonstrare. ^c 24. hujus

PROP. XXVII. THEOR.

In æqualibus circulis anguli qui æqualibus insistant circumferentiis inter se æquales sunt, five ad centra, five ad circumferentias insistant.


In æqualibus enim circulis ABCDEF, æqualibus circumferentiis BC EF insistant anguli ad centra quidem BGC EHF, ad circumferentias vero BAC EDF. dico angulum BGC angulo EHF, & angulum BAC angulo EDF æqualem esse.

si quidem igitur angulus BGC æqualis sit angulo EHF, manifestum est angulum quoque BAC angulo EDF esse æqualem. sin minus,

unus ipsorum est major. sit major BGC, & constitutur ad rectam lineam BG, & ad punctum in ipsa G, angulo EHF æqualis ^a 23. primi.

quales autem anguli æqualibus insistant ^b circumferentiis, ^b 26. hujus.

quando ad centra fuerint. ergo circumferentia BK æqualis est circumferentiæ GP. sed circumferentia GP æqualis est ipsi BC. ergo & BK ipsi BC est æqualis. minor majori, quod fieri non potest. non igitur inæqualis est angulus BGC angulo EHF: ergo est æqualis. atque est anguli quidem BGC dimidium angulus qui ad A; anguli vero EHF dimidium qui ad D. angulus igitur qui ad A angulo qui ad D est æqualis. In æqualibus igitur circulis, anguli qui æqualibus insistant circumferentiis inter se æquales sunt, five ad centra, five ad circumferentias insistant. Quod oportebat demonstrare.




PROP. XXVIII. PROBL.

In æqualibus circulis æquales rectæ lineæ circumferentias æquales auferunt, majorem quidem majori, minorem vero minori.

Sint æquales circuli $ABCDEF$; & in ipsis æquales rectæ lineæ BC EF , quæ circumferentias quidem BAC EDF majores auferant, circumferentias vero BGC EHF minores. dico circumferentiam BAC majorem majori circumferentiæ EDF , & minorem circumferentiam BGC minori EHF æqualem esse. sumantur enim centra a circulorum

a 1. hujus. KL , junganturque BK KC EL , LF . Quoniam circuli æquales sunt, erunt & quæ ex centrīs æquales b .

b Def. 1. duæ igitur BK KC sunt æquales duabus EL LF : & basis BC æqualis est basi EF , ergo angulus BKC angulo ELF est c 8. primi. æqualis: æquales autem anguli æqualibus insunt circumferentiis, quando ad centra fuerint d . quare circumferentia BGC æqualis est circumferentiæ EHF , sed & totus ABC circulus toti DEF est æqualis. reliqua igitur circumferentia BAC reliquæ EDF æqualis erit. Ergo in æqualibus circulis æquales rectæ lineæ circumferentias æquales auferunt, majorem quidem majori, minorem vero minori. Quod demonstrare oportebat.



PROP. XXIX. THEOR.

In æqualibus circulis, æquales circumferentias æquales rectæ lineæ subtendunt.

Vide figur. Prop. præcedentis. Sint æquales circuli $ABCDEF$: & in ipsis æquales assumantur circumferentiæ BGC EHF , & BC EF jungantur. dico rectam lineam BC rectæ EF æqualem esse. sumantur enim centra a circulorum KL , & jungantur BK KC EL LF . quoniam igitur circumferentia BGC est æqualis circumferentiæ EHF , erit & angulus BKC angulo

a 1. hujus. ELF æqualis b . & quoniam circuli $ABCDEF$ sunt æquales

b 27. hujus. & quæ ex centrīs æquales erunt c . duæ igitur BK KC sunt æquales duabus EL LF ; & æquales angulos continent. quare

c Def. 1. basis BC basi EF est d æqualis. In æqualibus igitur circulis æquales circumferentias æquales rectæ lineæ subtendunt.


d 4. primi. Quod oportebat demonstrare.

PROP.

PROP. XXX. PROBL.

Datam circumferentiam bifariam secare.


Sit data circumferentia ADB . oportet ADB circumferentiam bifariam secare. Jungatur AB , & in C bifariam a secetur: a 10. primi. à puncto autem C ipsi AB ad rectos angulos ducatur CD . & jungantur AD DB . quoniam igitur AC est æqualis CB , communis autem CD , duæ ACD BCD duabus BC CD æquales sunt: & angulus ACD æqualis angulo BCD , rectus enim uterque est: ergo basis AD basi BD est b æqualis. æquales autem rectæ lineæ circumferentias æquales auferunt, b 4. primi. quare circumferentia AD circumferentiæ BD æqualis erit. a 8. hujus. Data igitur circumferentia bifariam secta est. Quod facere oportebat.




PROP. XXXI. THEOR.

In circulo angulus qui in semicirculo rectus est, qui vero in majori segmento minor est recto, & qui in minori major recto; & insuper majoris quidem segmenti angulus recto major est, minoris vero segmenti angulus recto minor.

Sit circulus $ABCD$ cujus diameter BC , centrum autem E ; & jungantur BA AC AD DC . dico angulum quidem qui est in semicirculo BAC rectum esse, qui vero in segmento ABC majore semicirculo, videlicet angulum ABC , minorem esse recto, & qui est in segmento ADC minore semicirculo, hoc est angulum ADC , recto majorem. jungatur AE , & BA ad F producat. itaque quoniam BE est æqualis EA , erit & angulus EAB , angulo EBA æqualis a . rursus quoniam AB est æqualis EC , & angulus ACE angulo CAE æqualis a erit. totus igitur angulus BAC est æqualis duobus ABC ACB angulis. est autem, & angulus FAC extra triangulum ABC , duobus ABC ACB æqualis b . angulus igitur b 32. primi. BAC est æqualis angulo FAC ; ac propterea uterque ipsorum rectus c . quare in semicirculo BAC angulus BAC rectus c Def. 10. est. primi.



est. & quoniam trianguli ABC duo anguli ABC BAC duobus rectis sunt ^d minores, rectus autem BAC , erit ABC angulus recto minor, atque est in segmento ABC majore semicirculo. quod cum in circulo quadrilaterum sit $ABCD$, quadrilaterorum vero qui in circulis describuntur, anguli oppositi duobus rectis sint ^e æquales: erunt ABC ADC anguli æquales duobus rectis, & angulus ABC minor est recto, reliquus igitur ADC recto major erit, atque est in segmento ADC minore semicirculo. dico præterea majoris segmenti angulum qui continetur ABC circumferentia, & recta linea AC recto majorem esse; angulum vero minoris segmenti, contentum circumferentia ADC , & recta linea AC recto minorem. quod quidem perspicue apparet. quoniam angulus qui rectis lineis BA AC continetur rectus est, erit & contentus ABC circumferentia, & recta linea AC recto major. rursus quoniam angulus contentus rectis lineis CA AF rectus est, erit qui continetur recta linea CA , & ADC circumferentia minor recto. In circulo igitur angulus qui in semicirculo rectus est, qui vero in majore segmento minor est recto, & qui in minori major recto: & insuper majoris quidem segmenti angulus recto major est, minoris vero recto minor. Quod demonstrare oportebat.



Cor. Ex hoc manifestum est, si trianguli unus angulus sit æqualis duobus, cum rectum esse; propterea quod & qui deinceps est, iisdem est æqualis. quando autem anguli deinceps sunt æquales, necessario recti sunt.


PROP. XXXII. THEOR.

Si circulum contingat quædam recta linea, à contactu autem in circulum ducatur recta linea ipsum secans; anguli quos ad contingentem facit, æquales erunt iis qui in alternis circuli segmentis consistunt.

Circulum enim $ABCD$ contingat quædam recta linea EF in B , & à puncto B ad circulum $ABCD$ ducatur recta linea BD ipsum utcumque secans. (dico angulos quos BD cum EF contingente facit, æquales esse iis qui in alternis circuli segmentis consistunt. hoc est angulum FBD esse æqualem angulo qui constituitur in DAB segmento videlicet ipsi DAB ;

DAB; angulum vero DBE æqualem angulo DCB qui in segmento DCB constituitur. ducatur enim à puncto B ipsi EF ad rectos ^a angulos BA: & in circumferentia BD summa ^a 11. primi.


tur quod vis punctum C; junganturque AD DC CB. Quoniam igitur circulum ABCD contingit quædam recta linea EF in puncto B; & à contactu B ad rectos angulos contingenti ducta est BA, erit in ipsa BA centrum ^b ABCD circuli; quare BA ejusdem circuli diameter est, & angulus ADB in semicirculo est ^c rectus. reliqui igitur anguli BAD ^c 31. hujus. ABD uni recto æquales sunt. sed & ABF est rectus. ergo angulus ABF æqualis ^d est angulis BAD ABD. communis auferatur ABD. reliquus igitur DBF ei qui in alterno circuli segmento consistit videlicet angulo BAD, est æqualis. & quoniam in circulo quadrilaterum est ABCD, & anguli ejus oppositi æquales ^e sunt duobus rectis; erunt DBF DBE anguli angulis BAD BCD æquales. quorum BAD ostensus est æqualis ipsi DBF; ergo reliquus DBE ei qui in alterno circuli segmento DCB constituitur videlicet ipsi DCB, æqualis erit. Si igitur circulum contingat quædam recta linea, à contactu vero in circulum ducatur recta linea ipsum secans; anguli quos facit ad contingentem, æquales erunt iis qui in alternis circuli segmentis consistunt. Quod oportebat demonstrare.




P R O P. XXXIII. P R O B L.

Super data recta linea describere segmentum circuli, quod suscipiat angulum dato angulo rectilineo æqualem.

Sit data recta linea AB datus autem angulus rectilineus, qui ad C. itaque oportet super data recta linea AB describere segmentum circuli, quod suscipiat angulum æqualem angulo qui est ad C. Ad rectam lineam AB, & ad punctum in ea datum A, constitutur angulus BAD angulo qui est ad C æqualis ^a, & à puncto A ipsi AD ad rectos angulos ^b ducatur AE; secetur autem AB bifariam in F, atque à puncto F ducatur FG ad rectos angulos ipsi AB; & GB jungatur. quoniam igitur AF est æqualis FB, communis




- munis autem FG , duæ AF FG duabus BF FG æquales sunt :
 & angulus AFG æqualis angulo BFG . ergo basis AG basi
 GB est æqualis. itaque centro G , intervallo autem AG cir-
 culus descriptus transibit et-
 iam per B . describatur, & fit
 ABE , jungaturque EB . quo-
 niam igitur ab extremitate
 diametri AE , & à puncto A ,
 ipsi AE ad rectos angulos
 ducta est AD ; ipsa AD cir-
 culum continget. & quo-
 niam circulum ABE contingit quædam recta linea AD , &
 à contactu qui est ad A , in circulum ABE ducta est recta
 linea AB : erit angulus DAB æqualis angulo qui in alterno
 circuli segmento constituitur, videlicet ipsi AEB . sed an-
 gulus DAB , angulo ad C est æqualis. ergo & angulus ad
 C angulo AEB æqualis erit. super data igitur recta linea AB ,
 segmentum circuli descriptum est AEB suscipiens angulum
 AEB dato angulo qui est ad C æqualem. Quod facere
 oportebat.



PROP. XXXIV. PROBL.

*A dato circulo segmentum abscindere quod suscipiat
 angulum dato rectilineo æqualem.*

- Sit datus circulus ABC , datus autem angulus rectilineus
 qui ad D . oportet à circulo ABC segmentum abscindere.
 quod suscipiat angulum angulo ad D æqualem. Ducatur
 recta linea EF circulum ABC
 in puncto B contingens: &
 ad rectam lineam BF , & ad
 punctum in ea B , constituatur
 angulus FBC angulo qui est
 ad D æqualis. quoniam igitur
 circulum ABC contingit
 quædam recta linea EF in B
 puncto, & à contactu B ducta est BC , erit angulus FBC æ-
 qualis ei qui in alterno circuli segmento constituitur. sed
 FBC angulus angulo qui ad D est æqualis. ergo & angulus
 in segmento BAC angulo ad D æqualis erit. A dato igitur
 circulo ABC , abscissum est segmentum quoddam BAC
 suscipiens angulum dato angulo rectilineo qui est ad D , æ-
 qualem. Quod facere oportebat.




PROP. XXXV. THEOR.

Si in circulo duæ rectæ lineæ sese mutuo secant, rectangulum sub segmentis unius contentum æquale est ei quod sub alterius segmentis continetur rectangulo.

In circulo enim $ABCD$, duæ rectæ lineæ AC BD sese mutuo in puncto E secant. dico rectangulum contentum sub AE EC æquale esse ei quod sub DE EB continetur. si AC BD per centrum transeant, ita ut E sit centrum $ABCD$ circuli; manifestum est æqualibus existentibus AE EC DE EB , & rectangulum contentum sub AE EC æquale esse ei quod sub DE EB continetur. si AC DB non transeant per centrum, sumatur centrum circuli $ABCD$ quod sit F : & ab F ad rectas lineas AC DB perpendiculares ducantur FG FH : junganturque FB FC FE . quoniam igitur recta quædam linea GF per centrum ducta rectam lineam quandam AC non ductam per centrum ad rectos angulos secat, & bifariam ipsam secabit ^a. quare AG ipsi GC est

æqualis. & quoniam recta linea AC secta est in partes æquales in puncto G , & in partes inæquales in E , erit rectangulum sub AE EC contentum, una cum ipsius

EG quadrato ^b, æquale quadrato ex GC . commune addatur ex GF quadratum. ergo rectangulum sub AE EC , una cum iis quæ ex EG GF quadratis, æquale est quadratis ex CG GF . sed quadratis quæ ex EG GF æquale est quadratum ex FE : quadratis vero ex CG GF æquale est quod ex FC fit quadratum. rectangulum igitur sub AE EC , una cum quadrato ex FE , æquale est quadrato ex FC . est autem CF æqualis FB . ergo rectangulum sub AE EC , una cum quadrato ex FE , æquale est ei quod ex FB fit quadrato. eadem ratione & rectangulum sub DE EB una cum quadrato ex FE , æquale est quadrato ex FB . ostensum autem est & rectangulum sub AE EC , una cum quadrato ex FE , æquale ei quod fit ex FB quadrato. ergo rectangulum sub AE EC , una cum quadrato ex FE , æquale est rectangulo sub DE EB , una cum quadrato ex FE . commune auferatur ex FE quadratum. reliquum igitur rectangulum sub AE EC , reliquo sub DE EB rectangulo æquale erit. Quare si in circulo duæ rectæ lineæ sese mutuo secant, rectangulum sub segmentis unius contentum æquale est ei quod sub alterius segmentis continetur. Quod demonstrare oportebat.



^a 4. hujus.

^b 5. secundi.

^b 47. primi.

PROP.

PROP. XXXVI. THEOR.

Si extra circulum aliquid punctum sumatur, & ab eo in circulum cadant duæ rectæ lineæ, quarum altera quidem circulum secet, altera vero contingat; rectangulum quod sub tota secante, & exterius assumpta inter punctum & curvam circumferentiam continetur, æquale erit ei quod à contingente fit quadrato.

Extra circulum enim ABC sumatur aliquod punctum D , & ab eo ad dictum circulum cadant duæ rectæ lineæ DCA DB : & DCA quidem circulum ABC secet; DB vero contingat. dico rectangulum sub AD DC , quadrato quod fit ex DB æquale esse. vel igitur DCA per centrum transit, vel non transit. primum transeat per centrum circuli ABC , quod fit E , & EB jungatur. erit

18. hujus. angulus EBD rectus.

itaque quoniam recta linea AC bifariam secta est in E , & ipsi adjicitur CD , rectangulum sub AD DC , una cum quadrato ex EC , æ-

6. secundi. quale erit ei quod fit ex ED quadrato. æ-


qualis autem est CE ipsi EB , ergo rectangulum sub AD DC , una cum quadrato quod ex EB , æquale est quadrato ex ED .

47. primi. sed quadratum ex ED est æquale quadratis ipsarum EB BD , rectus enim angulus est EBD . rectangulum igitur sub AD DC , una cum quadrato ex EB , æquale est ipsarum EB , BD quadratis. commune auferatur quadratum quod ex EB ergo reliquum sub AD DC rectangulum, quadrato quod fit à contingente DB æquale erit. secundo DCA non transeat

1. hujus. per centrum ABC circuli: sumaturque centrum E , & ad AC perpendicularis agatur EF , & jungantur EB EC ED , rectus igitur est EFD angulus. & quoniam recta linea quædam EF per centrum ducta, rectam lineam quandam AC non ductam per centrum ad rectos angulos secat, & bifariam ipsam secabit. quare AF ipsi FC est æqualis. rursus

3. hujus. quoniam recta linea AC bifariam secta est in F , atque ipsi adjicitur CD , erit rectangulum sub AD DC , una cum quadrato ex FC , æquale quadrato quod ex FD . commune apponatur quod ex FE quadratum. rectangulum igitur sub

AD DC




AD DC una cum quadratis ex FC FE est æquale quadratis ex DF FE. sed quadratis quidem ex DF FE æquale est ex DE quadratum; etenim rectus est angulus EFD: quadratis vero ex CF FE æquale est quadratum ex CE. c. 47. primi. ergo rectangulum sub AD DC, una cum quadrato quod ex CE, est æquale quadrato ex ED; æqualis autem est CE ipsi EB; rectangulum igitur sub AD DC, una cum quadrato ex EB, æquale est ex ED quadrato. sed quadrato ex ED æqualia sunt quadrata ex EB BD, si quidem rectus est angulus EBD. ergo rectangulum sub AD DC, una cum quadrato ex EB æquale est eis quæ ex EB BD fiunt quadratis. commune auferatur quadratum ex EB. reliquum igitur sub AD DC rectangulum quadrato quod fit ex DB æquale erit. Si igitur extra circumulum aliquod punctum sumatur, &c. Quod oportebat demonstrare.

PROP. XXXVII. THEOR.

Si extra circumulum sumatur aliquod punctum, [atque ab eo in circumulum cadant duæ rectæ lineæ, quarum altera quidem circumulum secet, altera vero incidat: sit autem quod sub tota secante, & exterius assumpta inter punctum, & curvam circumferentiam continetur rectangulum æquale ei quod ab incidente fit quadrato; incidens linea circumulum continget.

Extra circumulum enim ABC sumatur aliquod punctum D, atque ab ipso in circumulum cadant duæ rectæ lineæ DCA, DB; DCA quidem circumulum secet, DB vero incidat: sitque rectangulum sub AD DC æquale quadrato quod fit ex DB. dico ipsam DB circumulum ABC contingere. Ducatur enim recta linea DE contingens circumulum ABC, & sumatur circuli ABC centrum quod sit F, junganturque FE FB FD. ergo angulus FED rectus est. & quoniam DE circumulum ABC contingit, secat autem DCA, rectangulum sub AD DC æquale erit quadrato ex DE. sed rectangulum sub AD DC ponitur æquale quadrato ex DB. quadratum igitur quod ex DE quadrato ex DB æquale erit. ac propterea linea DE erit ipsi DB æqualis. est autem & FE æqualis FB. duæ igitur DE EF duabus DB BF æquales sunt;




c. 17. hujus.

c. 18. primi.

sunt; & basis communis FD ; angulus igitur DEF est æqualis angulo DBF , rectus autem est DEF , ergo & DBF est rectus. atque est FB producta diameter. quæ vero ab extremitate diametri circuli ad rectos angulos ducitur, circulum contingit. ergo DB circulum ABC contingat necesse est. similiter demonstrabitur & si centrum sit in ipsa AC . Si igitur extra circulum sumatur aliquod punctum, &c. Quod demonstrare oportebat.

Cor. Hinc si à puncto quovis extra circulum assumpto, plures lineæ rectæ $ABAC$ circulum secantes ducantur; rectangula comprehensa sub totis lineis $ABAC$, & partibus externis $AEAF$, inter se sunt æqualia. nam si ducatur tangens AD , erit rectangulum sub $BAAE$ æquale quadrato ex AB ; & rectangulum sub $CAAF$ eidem quadrato ex AD erit æquale, unde rectangula hæc æqualia erunt.



EUCLIDIS


ELEMENTORUM

LIBER TERTIUS.

DEFINITIONES.

I.

Figura rectilinea in figura rectilinea describi dicitur, quando unus quisque figuræ descriptæ angulus, unumquodque latus ejus in qua describitur, contingit.




II.

Figura similiter circa figuram describi dicitur, quando unumquodque latus descriptæ, unumquemque angulum ejus circa quam describitur, contingit.


III.

Figura rectilinea in circulo describi dicitur, quando unusquisque descriptæ figuræ angulus circuli circumferentiam contingit.



IV.

Figura rectilinea circa circulum describi dicitur, quando unumquodque latus descriptæ, circuli circumferentiam contingit.



F 2

V.

V.

Circulus similiter in figura rectilinea describi dicitur, quando circuli circumferentia unumquodque latas ejus in qua describitur, contingit.

VI.

Circulus circa figuram rectilineam describi dicitur, quando circuli circumferentia unumquemque angulum ejus circa quam describitur, contingit.


VII.

Recta linea in circulo aptari dicitur, quando ejus extrema in circuli circumferentia fuerint.

PROPOSITIO. I. PROBLEMA.

In dato circulo, datæ rectæ lineæ quæ diametro ejus major non sit, æqualem rectam lineam aptare.

Sit datus circulus ABC , data autem recta linea non major circuli diametro D . oportet in circulo ABC rectæ lineæ D æqualem rectam lineam aptare. Ducatur circuli ABC diameter BC . si quidem igitur BC sit æqualis ipsi D , factum jam erit quod proponebatur. etenim in circulo ABC aptata est BC rectæ lineæ D æqualis. sin minus, major est BC quam D , ponaturque
 a 3. primi. æ ipsi D æqualis CE : & centro quidem C intervallo autem CE circulus describatur AEF : & CA jungatur. itaque quoniam punctum C centrum est AEF circuli; erit CA ipsi CE æqualis. sed D est æqualis CE . ergo & D ipsi AC æqualis erit. in dato igitur circulo ABC datæ rectæ lineæ D , non majori circuli diametro, æqualis aptata est AC . Quod facere oportebat.




PROP. II. PROBL.

In circulo dato, dato triangulo æquiangulum triangulum describere.

Sit datus circulus ABC , datum autem triangulum DEF . oportet in ABC circulo describere triangulum triangulo DEF æquiangulum. ducatur a A linea GAH contingens a circum
 a 17. tertii.

lum ABC in puncto A : & ad rectam lineam AH , & ad punctum in ea A , angulo DEF æqualis $\angle$ angulus constituitur HAC . rursus ad rectam lineam AG , & ad punctum in ipsa A , angulo DFE æqualis $\angle$ constituitur angulus GAB ; & BC jungatur. quoniam igitur circulum ABC contingit quædam recta HAG ; à contactu autem in circulum ducta est AC : erit HAC angulus æqualis $\angle$ ei qui in altero circuli segmento consistit, videlicet ipsi $\angle ABC$. sed HAC angulus æqualis est angulo DEF , ergo & angulus ABC angulo DEF est æqualis. eadem ratione & angulus ACB est æqualis angulo DFE . reliquus igitur BAC angulus reliquo EDF æqualis $\angle$ erit. ergo triangulum ABC triangulo DEF est æquiangulum, & descriptum est in circulo ABC . 32. primi. In dato igitur circulo dato triangulo æquiangulum triangulum descriptum est. Quod facere oportebat,




423. primi.

PROP. III. PROBL.

Circa datum circulum triangulo dato æquiangulum triangulum describere.

Sit datus circulus ABC , datum autem triangulum DEF . oportet circa circulum ABC describere triangulum triangulo DEF æquiangulum. Protrahatur ex utraque parte EF ad puncta HG , & sumatur circuli ABC centrum K : & recta linea KB utcumque ducatur: constituaturque ad rectam lineam KB , & ad punctum in ea K , angulo quidem DEG æqualis $\angle$ angulus BKA , angulo autem DFH æqualis $\angle$ angulus BKC , & per ABC puncta, ducantur rectæ lineæ LAM MBN NCL circulum ABC contingentes.



423. primi.


Quoniam igitur circulum ABC contingunt LM MN NL in punctis A B C , à centro autem K ad A B C puncta ducuntur KA KB KC ; erunt anguli ad puncta A B C recti $\angle$ 18. tertii. & quoniam quadrilateri $AMBK$ anguli quatuor quatuor rectis æquales sunt; etenim in duo triangula dividitur; quorum anguli KAM KBM sunt recti; erunt reliqui AKB AMB duobus rectis æquales. sunt autem & DEG DEF æquales duobus rectis. anguli igitur AKB AMB angulis DEG DEF æquales

c. 2. Cor.
32. primi. æquales sunt, quorum AKB ipsi DEG est æqualis. ergo reliquus AMB reliquo DEF æqualis erit. similiter demonstrabitur angulus LNK ipsi DFE æqualis. ergo & reliquus MLN est æqualis & reliquo EDF . æquiangulum igitur est LMN triangulum triangulo DEF ; & descriptum est circa circulum ABC . Quare circa datum circulum triangulo dato æquiangulum triangulum descriptum est. Quod facere oportebat.

PROP. IV. PROBL.

In dato triangulo circulum describere.




Sit datum triangulum ABC , oportet in triangulo ABC circulum describere. Secentur *a* anguli ABC BCA bifariam rectis lineis BD CD quæ convenient inter se in D puncto: & à puncto D ad rectas lineas AB BC CA perpendiculares
b 12. primi. *b* ducantur DE DF DG . Quoniam angulus EBD est æqualis angulo FBD , est autem & rectus BED recto BFD æqualis: erunt duo triangula EBD DBF , duos angulos, duobus angulis æquales habentia, & unum latus uni lateri æquale utrique commune BD , quod scilicet uni æqualium angulorum subtenditur. ergo & reliqua latera reliquis lateribus æqualia & habebunt, atque erit DE æqualis DF . & eadem ratione DG æqualis DF . ergo & DE ipsi DG est æqualis. tres igitur rectæ lineæ DE DF DG inter se æquales sunt; quare centro D intervallo autem unius ipsarum DE DF DG circulus descriptus etiam per reliqua transibit puncta; & rectas lineas AB BC CA continget; propterea quod recti sunt ad EFG anguli. si enim ipsas secet, quæ ab extremitate diametri circuli ad rectos angulos
c 26. primi. ducitur intra circulum cadet, quod est absurdum *d*. non igitur centro D , intervallo autem unius ipsarum DE DF DG circulus descriptus secabit rectas lineas AB BC CA , quare ipsas continget; atque erit circulus descriptus in triangulo ABC . In dato igitur triangulo ABC circulus EFG descriptus est. Quod facere oportebat.



PROP. V. PROBL.

Circa datum triangulum circulum describere.

Sit datum triangulum ABC . oportet circa datum triangulum ABC . circulum describere. Secentur AB AC bifariam ^{4. 30. primi.} in D E punctis: & à punctis D E ipsis AB AC ad rectos angulos ⁶ ducantur DF EF quæ quidem vel intra triangulum ^{11. primi.} ABC conveniant, vel in recta linea BC , vel extra ipsam. conveniant primo intra triangulum in puncto F : &




BF FC FA jungantur. quoniam igitur AD est æqualis DB , communis autem & ad rectos angulos DF ; erit basis AF basi FB æqualis ^{c.} similiter ostendetur & CF æqualis FA . ^{4. primi.} ergo & BF est æqualis FC . tres igitur FA FB FC inter se æquales sunt. quare centro F , intervallo autem unius ipsarum FA FB FC circulus descriptus etiam per reliqua puncta transibit: atque erit circulus descriptus circa triangulum ABC . & describatur ut ABC . secundo DF EF conveniant in recta linea BC , in puncto F , ut in secunda figura, & AF jungantur. similiter demonstrabimus punctum F centrum esse circuli circa triangulum ABC descripti. postremo DF EF conveniant extra triangulum ABC rursus in F puncto, ut in tertia figura: & jungantur AF FB FC . & quoniam rursus AD est æqualis DB , communis autem & ad rectos angulos DF , basis AF basi FB æqualis erit. similiter demonstrabimus & CF ipsi FA æqualem esse. quare & BF est æqualis FC . rursus igitur centro F , intervallo autem unius ipsarum FA FB FC circulus descriptus & per reliqua transibit puncta; atque erit circa triangulum ABC descriptus. Circa datum igitur triangulum circulus descriptus est. Quod facere oportebat.

Cor. Si triangulum sit rectangulum centrum circuli cadet in latus angulo recto oppositum. si acutangulum cadet centrum intra triangulum, si obtusangulum cadet extra.

PROP. VI. PROBL.

In dato circulo quadratum describere.

Sit datus circulus $ABCD$. oportet in $ABCD$ circulo quadratum describere. Ducantur circuli $ABCD$ diametri ad rectos angulos inter se $ACBD$: & $ABBCD$ CD DA jungantur.



44. primi.

BA æqualis $\angle$ basi AD . & eadem ratione utraque ipsarum BC CD utriq; BA AD est æqualis; æquilaterum igitur est $ABCD$


631. tertii.

quadrilaterum. dico & rectangulum esse. quoniam enim recta linea BD diameter est $ABCD$ circuli, erit BAD semicirculus. quare angulus BAD rectus $\angle$ est. & eadem ratione unusquisque ipsorum ABC BCD CDA est rectus. rectangulum igitur est $ABCD$ quadrilaterum. ostensum autem est, & æquilaterum esse. ergo quadratum necessario erit, & descriptum est in circulo $ABCD$. in dato igitur $ABCD$ circulo quadratum, $ABCD$ descriptum est. Quod facere oportebat.

PROP. VII. PROBL.

Circa datum circulum quadratum describere.

Sit datus circulus $ABCD$. oportet circa $ABCD$ circulum quadratum describere. Ducantur circuli $ABCD$ duæ diametri AC BD ad rectos inter se angulos, & per puncta AB CD ducantur circuli $ABCD$



417. tertii.

contingentes $\angle$ FG GH HK KF .

418. tertii.

Quoniam igitur FG contingit circulum $ABCD$, à centro autem E ad contactum qui est ad A ducitur EA ; erunt $\angle$ anguli ad A recti. eadem ratione, & anguli ad puncta BCD recti sunt. & quoniam angulus AEB rectus est, est autem &

428. primi.

rectus EBG ; erit GH ipsi AC parallela. eadem ratione, & AC parallela est FK . similiter demonstrabimus & utramque ipsarum GF HK ipsi BD parallelam esse. quare & GF est parallela HK . parallelogramma igitur sunt GK GC AK FB

434. primi.


BK , ac propterea GF quidem est $\angle$ æqualis HK , GH , vero ipsi FK . & quoniam AC æqualis est BD ; sed AC quidem utrique ipsarum

ipſarum $GHFK$ eſt $\triangle$ æqualis; BD vero æqualis utrique $GFHK$, & utraque $GHFK$ utrique $GFHK$ æqualis erit. æquilaterum igitur eſt $FGHK$ quadrilaterum. dico & rectangulum eſſe. quoniam etiam parallelogrammum eſt $GBEA$, atque eſt rectus AEB angulus, & ipſe AGB rectus erit. ſimiliter demonſtrabimus angulos etiam ad puncta HKF rectos eſſe. rectangulum igitur eſt quadrilaterum $FGHK$. demonſtratum autem eſt & æquilaterum. ergo quadratum ſit neceſſe eſt, & deſcriptum eſt circa circulum $ABCD$. Circa datum igitur circulum quadratum deſcriptum eſt. Quod facere oportebat.

PROP. VIII. PROBL.

In dato quadrato circulum deſcribere.

Sit datum quadratum $ABCD$. oportet in quadrato $ABCD$ circulum deſcribere. Secetur utraque ipſarum $ABAD$ bifariam $\triangle$ in punctis FE . & per E quidem alterutri ipſarum $\triangle$ 10. primi. $ABCD$ parallela $\triangle$ ducatur EH : per F vero ducatur FK parallela $\triangle$ alterutri $ADBC$. parallelogrammum igitur eſt unumquodque ipſorum $AKKB$ $\triangle$ $AHHD$ $\triangle$ $AGGC$ $\triangle$ $BGGD$: & latera ipſorum quæ ex oppoſito, ſunt æqualia $\triangle$. & quoniam DA eſt æqualis AB ; & ipſius quidem AD dimidium eſt



$\triangle$ 31. primi.

$\triangle$ 34. primi.


AE ; ipſius vero AB dimidium AF ; erit AE ipſi AF æqualis quare & oppoſita latera æqualia ſunt. ergo FG eſt æqualis GE . ſimiliter demonſtrabimus, & utramque ipſarum $GHGK$ utrique $FGGE$ æqualem eſſe. quatuor igitur $GEGF$ $GHGK$ inter ſe ſunt æquales. itaque centro quidem G , intervallo autem unius ipſarum $GEGF$ $GHGK$ circulus deſcriptus etiam per reliqua tranſibit puncta, & rectas lineas $ABBCDDA$ continget; propterea quod anguli ad $EFHK$ recti ſunt. ſi enim circulus ſecabit rectas lineas $ABBCDDA$, quæ ab extremitate diametri circuli ad rectos angulos ducitur intra circulum cadet; quod $\triangle$ eſt abſurdum. non igitur centro quidem G intervallo autem unius ipſarum $GEGF$ $GHGK$ circulus deſcriptus rectas lineas $ABBCDDA$ ſecabit. quare ipſas neceſſario continget; atque erit deſcriptus in quadrato $ABCD$. In dato igitur quadrato circulus deſcriptus eſt. Quod facere oportebat. $\triangle$ 16. tertii.

PROP.

PROP. IX. PROBL.

Circa datum quadratum circulum describere.

Sit datum quadratum $ABCD$. oportet circa $ABCD$ quadratum circulum describere. Jungantur AC BD , quæ se invicem in puncto E secent. & quoniam DA est æqualis AB , communis autem AC ; duæ DA AC duabus BA AC æquales sunt; & basis DC æqualis basi BC ; erit angulus DAC angulo BAC æqualis.



a 8. primi.

angulus igitur DAB bifariam sectus est recta linea AC . similiter demonstrabimus unumquemque angulorum ABC BCD CDA rectis lineis AC DB bifariam sectum esse.

b 6. primi.

quoniam igitur angulus DAB angulo ABC est æqualis, atque est anguli quidem DAB dimidium angulus EAB , anguli vero ABC dimidium EBA ; & EAB angulus angulo EBA æqualis erit. quare & latus EA lateri EB est b æquale. similiter demonstrabimus & utramque rectarum linearum EC ED utrique EA EB æqualem esse. ergo quatuor rectæ lineæ EA EB EC ED inter se sunt æquales. centro igitur E , intervallo autem unius ipsarum EA EB EC ED circulus descriptus etiam per reliqua puncta transibit; atque erit descriptus circa $ABCD$ quadratum. describatur ut $ABCD$. Circa datum igitur quadratum circulus descriptus est. Quod facere oportebat.

PROP. X. PROBL.


Isoceles triangulum constituere, habens utrumque angulorum qui sunt ad basim, duplum reliqui.

a 11. secundum di.

Exponatur recta quædam linea AB , & secetur in puncto, ita ut rectangulum contentum sub AB BC æquale a fit ei quod ex CA describitur quadrato: & centro quidem A , intervallo autem AB circulus describatur BDE ; apteturque in BDE circulo recta linea BD æqualis b ipsi AC quæ non est major diametro circuli BDE : & junctis DA DC , circa ADC triangulum c circulus ACD describatur. itaque quoniam rectangulum ABC æquale est quadrato quod fit ex AC ;

b 1. hujus.

c 5. hujus.




AC; æqualis autem est AC ipsi BD; erit sub AB BC rectan-
 lum quadrato ex BD æquale. & quoniam extra circulum
 ACD sumptum est aliquod punctum B, & à puncto B in
 circulum ACD cadunt duæ rectæ lineæ BCA BD, quarum
 altera quidem secatur, altera vero incidit; atque est re-
 ctangulum sub AB BC æquale quadrato ex BD: recta li-
 nea BD circulum ACD continget. quoniam igitur BD con-
 tingit, & à contactu ad D ducta est DC; erit BDC angu-
 lus æqualis ei qui in alterno circuli segmento consti-
 tuitur, videlicet angulo DAC. quod cum angulus BDC æ-
 qualis sit ipsi DAC, communis apponatur CDA; totus igitur
 BDA est æqualis duobus angulis CDA DAC. sed ipsis CDA
 DAC exterior angulus BCD est æqualis. ergo & BDA æ-
 qualis est ipsi BCD. sed BDA angulus est æqualis angulo
 CBD, quoniam & latus AD lateri AB est æquale. ergo &
 DBA ipsi BCD æqualis erit. tres igitur anguli BDA DBA
 BCD inter se æquales sunt. & quoniam angulus DBC æqua-
 lis est angulo BCD, & latus BD lateri DC est æquale. sed BD
 ponitur æqualis ipsi CA. ergo & CA est æqualis CD. quare &
 angulus CDA æqualis est angulo DAC. anguli igitur CDA
 DAC simul sumpti ipsius anguli DAC duplices sunt. est autem
 & BCD angulus angulis CDA DAC æqualis; ergo & BCD
 duplex est ipsius DAC. sed BCD est æqualis alterutri ipso-
 rum BDA DBA. quare & uterque BDA DBA ipsius DAB
 est duplex. Isosceles igitur triangulum constitutum est ADB
 habens utrumque eorum angulorum qui sunt ad basim, du-
 plum reliqui. Quod facere oportebat.

PROP. XI. PROBL.

*In dato circulo pentagonum æquilaterum & æquiangu-
 lum describere.*

Sit datus circulus ABCDEF. oportet in ABCDE circulo
 pentagonum æquilaterum & æquiangulum describere. Ex-

ponatur triangulum isosceles
 FGH habens utrumque eo-
 rum qui sunt ad basim GH
 angulorum, duplum anguli
 qui est ad F: & describatur
 in circulo ABCDE triangu-
 lo FGH æquiangulum tri-
 angulum ACD, ita ut angulo
 quidem qui est ad F æqualis sit angulus CAD; utrique
 vero ipsorum qui ad G H, sit æqualis uterque ACD CDA. &




10. hujus.

2. hujus.

uterque

uterque igitur ACD CDA anguli CAD est duplus. secetur
 e 9. primi. uterque ipsorum ACD CDA bifariam $\cdot$ rectis lineis CE DB :
 & AB BC DE EA jungantur. quoniam igitur uterque
 ipsorum ACD CDA duplus
 est ipsius CAD , & secti sunt
 bifariam rectis lineis CE DB ,
 quinque anguli DAC ACE
 ECD CDB BDA inter se sunt
 æquales. æquales autem an-
 guli in æqualibus circumfe-
 rentiis insunt d. quinque



d 26. tertii. igitur circumferentiæ AB BC CD DE EA æquales sunt in-
 c 29. tertii. ter se. sed æquales circumferentias $\cdot$ æquales rectæ lineæ
 subtendunt. ergo & quinque rectæ lineæ AB BC CD DE
 EA inter se æquales sunt. æquilaterum igitur est $ABCDE$
 pentagonum. dico & æquiangulum esse. quoniam enim cir-
 cumferentia AB æqualis est circumferentiæ DE , communis
 apponatur BCD . tota igitur $ABCD$ circumferentia toti cir-
 cumferentiæ $EDCB$ est æqualis, & in circumferentia qui-
 dem $ABCD$ insitit ingulus AED , in circumferentia vero
 $EDCB$ insitit BAE . ergo & BAE angulus est æqualis an-
 gulo AED . eadem ratione & unusquisque angulorum ABC
 BCD CDE unicuique ipsorum BAE AED est æqualis. æ-
 quiangulum igitur est $ABCDE$ pentagonum: ostensum au-
 tem est & æquilaterum esse. Quare in dato circulo penta-
 gonum æquilaterum, & æquiangulum descriptum est. Quod
 facere oportebat.


PROP. XII. PROBL.

*Circa datum circulum pentagonum æquilaterum & æ-
 quiangulum describere.*

Sit datus circulus $ABCDE$. oportet circa circulum $ABCDE$
 pentagonum æquilaterum & æquiangulum describere. In-
 telligantur pentagoni in circulo descripti $\cdot$ angulorum puncta
 esse $ABCDE$, ita ut circumferentiæ AB BC CD DE EA sint
 æquales; & per puncta $ABCDE$ ducantur $\cdot$ circulum con-
 tingentes GH HK KL LM MG , & sumpto circuli $ABCDE$
 centro F , jungantur FB FK FC FL FD . quoniam igitur
 recta linea KL contingit circulum $ABCDE$ in puncto C ,
 & à centro F ad contactum qui est ad C ducta est FC , erit
 FC ad ipsam KL perpendicularis $\cdot$ rectus igitur est uterque
 angulorum qui sunt ad C . eadem ratione & anguli qui ad
 puncta B D recti sunt. & quoniam rectus angulus est FC K ,
 quadra-

quadratum quod fit ex FK æquale d est quadratis ex FC d 47. primi.
 CK . & ob eandem causam quadratis ex FB BK æqua-
 le est ex FK quadratum.

quadrata igitur ex FC CK
 quadratis ex FB BK æqualia
 sunt, quorum quod ex FC
 ei quod ex FB est æquale.
 ergo reliquum quod ex CK
 reliquo quod ex BK æquale
 erit. æqualis igitur est BK




ipsi CK . & quoniam FB est æqualis FC , communis autem
 FK , duæ BF FK duabus CF FK æquales sunt, & basis BK
 est æqualis basi KC ; erit angulus $\cdot$ itaque BFK angulo $\cdot$ 5. primi.
 KFC æqualis, angulus vero BKF angulo KFC . duplus
 igitur est angulus BFC anguli KFC , & angulus BKC du-
 plus ipsius FKC . eadem ratione, & angulus CFD anguli
 CFL est duplus: angulus vero CLD duplus anguli CLF .
 & quoniam circumferentia BC circumferentiæ CD est æqua-
 lis, & angulus BFC angulo CFD æqualis f erit. atque est f 27. tertii.
 angulus quidem BFC anguli KFC duplus: angulus vero
 DFC duplus ipsius LFC . æqualis igitur est angulus KFC
 angulo CFL . itaque duo triangula sunt FKC FLC , duos an-
 gulos duobus angulis æquales habentia, alterum alteri, &
 unum latus uni lateri æquale quod ipsis commune est FC :
 ergo & reliqua latera reliquis lateribus æqualia habebunt g, g 26. primi.
 & reliquum angulum reliquo angulo æqualem. recta igitur
 linea KC est æqualis rectæ CL , & angulus FKC angulo FLC .
 & quoniam KC est æqualis CL , erit KL ipsius KC dupla.
 eadem ratione, & HK ipsius BK dupla ostendetur. rursus
 quoniam BK ostensa est æqualis ipsi KC : atque est KL qui-
 dem dupla KC , HK vero ipsius BK dupla: erit HK ipsi
 KL æqualis. similiter & unaquæque ipsarum GH GM ML
 ostendetur æqualis utrique HK KL . æquilaterum igitur est
 $GHKLM$ pentagonum. dico etiam æquiangulum esse. quo-
 niam enim angulus FKC est æqualis angulo FLC : & osten-
 sus est angulus HKL duplus ipsius FKC ; ipsius vero FLC
 duplus KLM : erit & HKL angulus angulo KLM æqualis.
 simili ratione ostendetur & unusquisque ipsorum KHG HGM
 GML utrique HKL KLM æqualis. quinque igitur anguli GHK
 HKL KLM LMG MGH inter se æquales sunt. ergo æqui-
 angulum est $GHKLM$ pentagonum. ostensum autem est
 etiam æquilaterum esse: & descriptum est circa $ABCDE$
 circulum. Quod facere oportebat.

PROP. XIII. PROBL.

In dato pentagono, quod æquilaterum & æquiangulum sit circulum describere.

Sit datum pentagonum æquilaterum & æquiangulum ABCDE. oportet in ABCDE pentagono circulum describere. Secetur uterque angulorum BCD CDE bifariam a rectis lineis CF DF; & à puncto F in quo conveniunt inter se CF DF ducantur rectæ lineæ FB FA FE. Quoniam igitur BC est æqualis CD, communis autem CF, duæ BC CF, duabus DC CF æquales sunt, & angulus BCF est æqualis angulo DCF. basis igitur BF FD est æqualis, & BFC triangulum æquale triangulo DCF, & reliqui anguli reliquis angulis æquales



quibus æqualia latera subtenduntur; angulus igitur CBF angulo CDF æqualis erit. & quoniam angulus CDE anguli CDF est duplus, & angulus quidem CDE angulo ABC æqualis, angulus vero CDF angulo CBF æqualis; erit & CBA angulus duplus anguli CBF; ac propterea angulus ABF angulo CBF æqualis. angulus igitur ABC bifariam sectus est recta linea BF. similiter demonstrabitur unumquemque angulorum BAE AED rectis lineis AF FE bifariam sectum esse. à puncto F ad rectas lineas AB BC CD DE EA ducantur

perpendiculares FG FH FK FL FM. & quoniam angulus HCF est æqualis angulo KCF; est autem & rectus FHC recto FKC æqualis: erunt duo triangula FHC FKC, duos angulos duobus angulis æquales habentia, & unum latus uni lateri æquale, commune scilicet utrique FC, quod uni æqualium angulorum subtenditur. ergo & reliqua latera re-

liquis lateribus æqualia habebunt, atque erit perpendicularis FH perpendiculari FK æqualis. similiter ostendetur & unaquæque ipsarum FL FM FG æqualis utrique FH FK. quinque igitur rectæ lineæ FG FH FK FL FM inter se æquales sunt. quare centro F intervallo autem unius ipsarum FG FH FK FL FM, circulus descriptus etiam per reliqua transibit puncta, & rectas lineas AB BC CD DE EA continget; propterea quod anguli ad GHKLM recti sunt. si enim non continget, sed ipsas secet, quæ ab extremitate diametri circuli ad rectos angulos ducitur, intra circulum cadet, quod absurdum esse ostensum est. non igitur centro F, &

inter-

intervallo uno ipsorum punctorum $CHKLM$ circulus descriptus rectas lineas $ABBCDCDEEA$ secabit. quare ipsas contingat necesse est. describatur ut $GHKLM$. In dato igitur pentagono quod est æquilaterum, & æquiangulum circulus descriptus est. Quod facere oportebat.


Cor. Si duo anguli proximi figuræ æquilateræ & æqui-
angulæ bisecentur, & à puncto in quo coeunt lineæ angulum
bisecantes, ducantur rectæ lineæ ad reliquos figuræ angulos,
omnes anguli figuræ erunt bisecti.

PROP. XIV. PROBL.

*Circa datum pentagonum quod æquilaterum & æqui-
angulum sit, circulum describere.*

Sit datum pentagonum æquilaterum & æquiangulum
 $ABCDE$. oportet circa pentagonum $ABCDE$ circulum de-
scribere. Secetur uterque ipsorum BCD CDE angulorum,
bifariam rectis lineis CF FD :

& à puncto F in quo conve-
niant rectæ lineæ, ad puncta
 B A E ducantur FB FA FE . &
unusquisque angulorum CBA
 BAE AED rectis lineis BF FA
 FE bifariam a sectus erit. &



a Cor. prz-
cedente.

quoniam angulus BCD angulo
 CDE est æqualis; atqui est anguli quidem BCD dimidium
angulus FCD , anguli vero CDE dimidium CDF ; erit &
 FCD angulus æqualis angulo FDC , quare & latus CF lateri
 FD est æquale ^b. similiter demonstrabitur & unaquæque ipsa- ^b 6. primi.
rum FB FA FE æqualis unicuique FC FD . quinque igitur
rectæ lineæ FA FB FC FD FE inter se æquales sunt. ergo
centro F , & intervallo unius ipsarum FA FB FC FD FE , cir-
culus descriptus etiam per reliqua transibit puncta: atque e-
rit descriptus circa pentagonum $ABCDE$ quod æquilaterum
est & æquiangulum. describatur, & sit $ABCDE$. Circa da-
tum igitur pentagonum æquilaterum & æquiangulum cir-
culus descriptus est. Quod facere oportebat.


PROP. XV. PROBL.

*In dato circulo hexagonum æquilaterum, & æquiangu-
lum describere.*

Sit datus circulus $ABCDEF$. oportet in circuli $ABCDEF$
 $ABCDEF$ hexagonum æquilaterum, & æquiangulum describere.
Ducatur

Ducatur circuli $ABCDEF$ diameter AD , sumaturque centrum circuli G ; & centro quidem D , intervallo autem DG circulus describatur $EGCH$, junctæ EG CG ad puncta B F producantur, & jungantur AB BC CD DE EF EA . dico hexagonum $ABCDEF$

æquilaterum & æquiangulum esse. Quoniam enim G punctum centrum est $ABCDEF$ circuli, erit GE ipsi GD æqualis. rursus quoniam D centrum est circuli $EGCH$, erit DE æqualis DG : sed GE ipsi GD æqualis ostensa est. ergo GE ipsi ED est æqualis. æquilaterum igitur est EGD triangulum, ideoque tres ipsius anguli EGD GDE DEG inter se æquales



a Cor. 5. primi.

b 32. primi.

c 13. primi.

d 18. primi.

e 26. tertii.

f 29. tertii.

g 17. tertii.

sunt, & sunt trianguli tres anguli æquales b duobus rectis. angulus igitur EGD duorum rectorum tertia pars est. similiter ostendetur & DGC duorum rectorum tertia pars, & quoniam recta linea CG super rectam EB insistens, angulos qui deinceps sunt EGC CGB duobus rectis æquales c efficit; erit & reliquus CGB tertia pars duorum rectorum. anguli igitur EGD DGC CGB inter se sunt æquales. & qui ipsis ad verticem sunt anguli BGA AGF FGE æquales d sunt angulis EGD DGC CGB . quare sex anguli EGD DGC CGB BGA AGF FGE inter se æquales sunt. sed æquales anguli æqualibus circumferentiis insistant e . sex igitur circumferentiæ AB BC CD DE EF FA inter se sunt æquales. æquales autem circumferentias æquales f rectæ lineæ subtendunt. ergo & sex rectæ lineæ inter se æquales sint necesse est, ac propterea æquilaterum est $ABCDEF$ hexagonum. dico & æquiangulum esse. quoniam enim circumferentia AF circumferentiæ ED est æqualis, communis apponatur circumferentia $ABCD$: tota igitur $FABCD$ circumferentia æqualis est toti circumferentiæ $EDCBA$. & circumferentiæ quidem $FABCD$ angulus FED insistit, circumferentiæ vero $EDCBA$ insistit angulus AFE . angulus igitur AFE angulo DEF est g æqualis. similiter ostendentur & reliqui anguli hexagoni $ABCDEF$, sigillatim æquales utrique ipsorum AFE FED . ergo æquiangulum est $ABCDEF$ hexagonum. ostensum autem est & æquilaterum esse: & descriptum est circulo $ABCDEF$. In dato igitur circulo hexagonum æquilaterum, & æquiangulum descriptum est. Quod facere oportebat.


Ex hoc manifestum est hexagoni latus, ei quæ est ex centro circuli æquale esse. & si per puncta $ABCDEF$ contingentes circulum ducamus, circa circulum describetur hexa-

hexagonum æquilaterum & æquiangulum, consequenter iis quæ in pentagono dicta sunt : & præterea similiter in dato hexagono circulum inscribemus, & circumscribemus. Quod facere oportebat.

PROP. XVI. PROBL.

In dato circulo quindecagonum æquilaterum & æquiangulum describere.

Sit datus circulus $ABCD$. oportet in $ABCD$ circulo quindecagonum æquilaterum & æquiangulum describere. Sit AC latus trianguli quidem æquilateri in ipso circulo $ABCD$ descripti, pentagoni vero æquilateri latus AB . quarum igitur partium est $ABCD$ circulus quindecim, earum circumferentia quidem ABC , tertia existens circuli, erit quinta; circumferentia vero AB , quæ quinta est circuli, erit trium. ergo reliqua BC est duarum. secetur BC bifariam



in puncto E . quare utraque ipsarum BE & EC circumferentiarum quintadecima pars est $ABCD$ circuli. si igitur jungentes BE & EC , æquales ipsis in continuum rectas lineas in circulo $ABCD$ aptemus, in ipso quindecagonum æquilaterum & æquiangulum descriptum erit. Quod facere oportebat.

Similiter autem iis quæ dicta sunt in pentagono, si per circuli divisiones, contingentes circulum ducamus, circa ipsum describetur quindecagonum æquilaterum & æquiangulum. & insuper dato quindecagono æquilatero & æquiangulo circulum inscribemus, & circumscribemus.

EUCLIDIS

ELEMENTORUM

LIBER QUINTUS.

DEFINITIONES.

I.

Pars est magnitudo magnitudinis, minor majoris, quando minor majorem metitur.

II.

Multiplex est major minoris, quando majorem minor metitur.

III.

Proportio seu ratio est duarum magnitudinum ejusdem generis, secundum quantitatem, mutua quædam habitudo.

IV.

Proportionem habere inter se magnitudines dicuntur, quæ multiplicatæ se invicem superare possunt.

V.

In eadem proportionem magnitudines esse dicuntur, prima ad secundam & tertia ad quartam, quando primæ & tertiæ æque multiplices, secundæ & quartæ æque multiplices, juxta quamvis multiplicationem, utraque utramque, vel una superant, vel una æquales sunt, vel una deficiunt, inter se comparatæ.

VI.

Magnitudines quæ eandem proportionem habent, proportionales vocentur.

Ea magnitudinum Proportionalium definitio vulgo apud Interpretes traditur, quam Euclides in Elemento septimo, pro numeris solum posuit. scil.

Magnitudines dicuntur esse proportionales, quando Prima Secundæ & Tertia Quartæ æquemultiplex est, vel eadem partes.

Sed hæc definitio Numeris & quantitativis commensurabilibus tantum competit; Adeoque cum Universalis non sit, recte ab Euclide in hoc elemento omnium Proportionalium proprietates tradituro rejicitur; & alia generalis substituitur cuius magnitudinum speciei congruens. Interim multum laborant Interpretes ut Definitionem hâc loci ab Euclide expositam, ex vulgo recepta numerorum Proportionalium definitione demonstrent; sed facilius multo hæc ab illa fluit quam illa ab hac. Quod sic ostendetur.

Primo Sint A B C D quatuor magnitudines quæ sunt in eadem ratione; prout in definitione 5^{ta} magnitudines in eadem ratione esse exponuntur. Sitque Prima multiplex secunda, dico & tertiam eandem esse multiplicem Quartæ. Sit ex gr. A æqualis 5 B. erit C æqualis 5 D. Capiatur numerus quilibet v. gr. 2 per quem multiplicatur 5 & productus sit 10: Et magnitudinum A & C Primæ & Tertiæ capiantur æquemultiplices 2A 2C. Item magnitudinum B & D Secundæ & Quartæ capiantur æquemultiplices 10B, & 10D. Et per defin. quintam, si 2A sint æquales 10B, erint 2C æquales 10D. at quia A est quintuplex ex hypothesi ipsius B, erunt 2A æquales 10B. unde & 2C æquales 10D. & C æqualis 5D, hoc est erit C quintuplex ipsius D. q. e. d.

$$\begin{array}{l} A: B:: C: D \\ 2A \ 10B \ 2C \ 10D \end{array}$$

Secundo. Si A sit pars quævis ipsius B , erit C eadem pars ipsius D . Nam quia est A ad B , sicut D ad C . cumque A sit pars quadam ipsius B , erit B , multiplex ipsius A ; adeoque per priorem casum D erit eadem multiplex ipsius C & proinde C eadem pars erit magnitudinis D ac est A ipsius B .
q. e. d.

Tertio. Sit A æqualis quolibet quarumvis partium ipsius B . dico & C esse æqualem totidem similium partium ipsius D v. gr. A in se contineat quartam partem ipsius B quinquies; hoc est, sit A æqualis $\frac{1}{4}B$, dico & C esse æqualem $\frac{1}{4}D$. Nam quoniam A est æqualis $\frac{1}{4}B$; multiplicando utramque per 4, erunt $4A$ æqualis $5B$. Capiantur itaque æquimultiples Primæ &

Tertiæ scil. $4A$ & $4C$. item æ- $A : B :: C : D$.
liæ æquimultiples Secundæ & $4A$ $5B$ $4C$ $5D$
Quartæ scil. $5B$ $5D$. & per definitionem, si $4A$ sint æquales $5B$, erunt $4C$ æquales $5D$. at ostensum est esse $4A$ æquales $5B$. adeoque & $4C$ æquales erunt $5D$, & C æqualis $\frac{1}{4}D$.
q. e. d.

Universaliter sit A æqualis $\frac{n}{m}B$ erit C æqualis $\frac{n}{m}D$. multiplicentur enim A &

C per m . Et B & D per n . $A : B :: C : D$

Et quoniam est A æqualis $\frac{n}{m}B$ erit mA æqualis nB mA nB mC nD

nB ; unde per def. 5tam erit mC . æqualis nD ; & C æqualis $\frac{n}{m}D$. q. e. d.

VII.

Quando autem æque multiplicium, multiplex quidem primæ superaverit multiplicem secundæ, multiplex vero tertiæ non superaverit multiplicem quartæ, tunc prima ad secundam majorem proportionem habere dicitur quam tertia ad quartam.

VIII.

Analogia est proportionum similitudo.

IX.

Analogia vero in tribus terminis ad minimum consistit.

X.

Quando tres magnitudines proportionales sunt, prima ad tertiam, duplicatam proportionem habere dicitur ejus quam habet ad secundam.

XI.

Quando autem quatuor magnitudines sunt proportionales, prima ad quartam, triplicatam habere proportionem dicitur ejus quam habet ad secundam, & semper deinceps, una amplius, quoad analogia processerit.

XII.

Homologæ, vel similis rationis magnitudines, dicuntur antecedentes quidem antecedentibus, consequentes vero consequentibus.

XIII.

Alterna seu permutata ratio est sumptio antecedentis ad antecedentem, & consequentis ad consequentem.

XIV.

Inversa ratio est sumptio consequentis ut antecedentis, ad antecedentem, ut ad consequentem.

XV.

Compositio rationis est sumptio antecedentis unâ cum consequente, tanquam unius, ad ipsam consequentem.

XVI.

Divisio rationis est sumptio excessus quo antecedens superat consequentem, ad ipsam consequentem.

XVII.

Conversio rationis est sumptio antecedentis ad excessum quo antecedens ipsam consequentem superat.

XVIII.

Ex æquo five ex æqualitate ratio est, cum plures magnitudines extiterint, & aliæ ipsis numero æquales, quæ binæ sumantur & in eadem proportionem, fueritque ut in primis magnitudinibus prima ad ultimam, ita in secundis magnitudinibus prima ad ultimam: vel aliter, est sumptio extremarum per subtractionem mediarum.

XIX.

Ordinata proportio est, quando fuerit ut antecedens ad consequentem, ita antecedens ad consequentem; ut autem consequens ad aliam quampiam, ita consequens ad aliam quampiam.

XX.

Perturbata vero proportio est, quando tribus existentibus magnitudinibus, & aliis ipsis numero æqualibus, fuerit ut in primis magnitudinibus antecedens ad consequentem, ita in secundis magnitudinibus antecedens ad consequentem, ut autem in primis magnitudinibus consequens ad aliam quampiam, ita in secundis alia quampiam ad antecedentem.

A X I O M A T A.

I.

Ejusdem five æqualium æque multiplices inter se æquales sunt.

II.


Quarum eadem æque multiplex est, vel quarum æquales sunt æque multiplices, & ipsæ inter se sunt æquales.

PROPOSITIO I. THEOREMA.

Si fuerint quotcunque magnitudines quotcunque magnitudinum, æqualium numero, singulæ singularum æque multiplices, quotuplex est una magnitudo unus, totuplices erunt & omnes omnium.

Sint quotcunque magnitudines AB CD , quotcunque magnitudinem E F , æqualium numero, singulæ singularum æque mul-


multiplices. dico quotiuplex est AB ipsius E , totuplices esse & AB CD simul ipsarum E F simul. Quoniam enim AB æque multiplex est ipsius E , ac CD ipsius F ; quot magnitudines sunt in AB æquales ipsi E , tot erunt & in CD æquales ipsi F . dividatur AB quidem in partes ipsi E æquales, quæ sint AG GB ; & CD dividatur in partes æquales ipsi F , videlicet CH HD . erit igitur multitudo partium CH HD æqualis multitudini ipsarum AG GB . & quoniam AG est æqualis E , & CH æqualis F ; erunt & AG CH æquales ipsis E F . eadem ratione quoniam GB est æqualis E , & HD ipsi F ; erunt GB HD æquales ipsis E F . quot igitur sunt in AB æquales ipsi E , tot sunt & in AB CD æquales ipsis E F . ergo quotiuplex est AB ipsius E , totuplices erunt & AB CD simul ipsarum E F simul. Si igitur fuerint quotcunque magnitudines quotcunque magnitudinum, æqualium numero, singulæ singularum æque multiplices, quotiuplex est una magnitudo unius, totuplices erunt & omnes omnium. Quod demonstrare oportebat.



PROP. II. THEOR.

Si prima secundæ æque multiplex fuerit ac tertia quartæ, fuerit autem & quinta secundæ æque multiplex ac sexta quartæ; erit etiam composita prima cum quinta secundæ æque multiplex ac tertia cum sexta quartæ.

Sit prima AB secundæ C æque multiplex, ac tertia DE quartæ F . fit autem & quinta BG secundæ C æque multiplex, ac sexta EH quartæ F . dico & compositam primam cum quinta scil. AG secundæ C æque multiplicem esse, ac tertiam cum sexta sc. DH quartæ F . Quoniam enim AB æque multiplex est C , ac DE ipsius F ; quot magnitudines sunt in AB æquales C , tot erunt & in DE æquales F . eadem ratione & quot sunt in BG æquales C , tot & in EH erunt æquales F . quot igitur sunt in tota AG æquales C , tot erunt & in tota DH æquales F . ergo quotiuplex est AG ipsius C , totuplex est &




PH ipsius F. & composita igitur prima cum quinta AG secundæ C æque multiplex erit, ac tertia cum sexta DH quartæ F: quare si prima secundæ æque multiplex fuerit, ac tertia quartæ, fuerit autem & quinta secundæ æque multiplex, ac sexta quartæ; erit composita quoque prima cum quinta æque multiplex secundæ, ac tertia cum sexta quartæ. Quod oportebat demonstrare.

PROP. VII. THEOR.

Si prima secundæ æque multiplex fuerit ac tertia quartæ; sumantur autem æque multiplices primæ & tertiæ; erit &, ex æquali, sumptarum utraque utriusque æque multiplex, altera quidem secundæ, altera vero quartæ.

Sit prima A secundæ B æque multiplex ac tertia C quartæ D: & sumantur ipsarum A C æque multiplices EF GH. dico

EF æque multiplicem esse ipsius B, ac GH ipsius D. Quoniam enim EF æque multiplex est ipsius A, ac GH ipsius C; quot magnitudines sunt in EF æquales A, tot erunt & in GH æquales C. dividatur EF quidem in magnitudines ipsi A æquales EK KF; GH vero dividatur in



magnitudines æquales C, videlicet GL LH. erit igitur ipsarum EK KF multitudo æqualis multitudini ipsarum GL LH. & quoniam æque multiplex est A ipsius B ac C ipsius D: æqualis autem EK ipsi A, & GL ipsi C; erit EK æque multiplex ipsius B, ac GL ipsius D. eadem ratione æque multiplex erit KF ipsius B, ac LH ipsius D. quoniam igitur prima EK secundæ B æque multiplex est, ac tertia GL quartæ D; est autem & quinta KF secundæ B æque multiplex ac sexta LH quartæ D: erit & composita prima cum quinta EF, secundæ B æque multiplex, ac tertia cum sexta GH, quartæ D. Si igitur prima secundæ æque fuerit multiplex ac tertia quartæ, sumantur autem primæ & tertiæ æque multiplices: erit &, ex æquali, sumptarum utraque utriusque æque multiplex, altera quidem secundæ, altera vero quartæ. Quod ostendisse oportuit.

* 2. hujus.

PROP,

PROP. IV. THEOR.

Si prima ad secundam eandem habet proportionem quam tertia ad quartam: & æque multiples primæ & tertiæ ad æque multiples secundæ & quartæ, juxta quamvis multiplicationem, eandem proportionem habebunt, inter se comparatæ.

Prima A ad secundam B eandem proportionem habeat quam tertia C ad quartam D: & sumantur ipsarum quidem

A C utcunque æque multipli-

ces EF; ipsarum vero B D aliz

utcunque æque multiples G H.

dico E ad G ita esse ut F ad H.

Sumantur rursus ipsarum EF æ-

que multiples KL, & ipsarum

GH æque multiples MN. quo-

niam igitur E æque multiplex est

ipsius A, atque F ipsius C; su-

mantur autem ipsarum EF æque

multiples KL: erit K æque

multiplex ipsius A, atque L ipsi-

us C. eadem ratione M æque mul-

tiplex erit ipsius B, atque N ipsius

D. & quoniam est ut A ad B ita

C ad D. sumptæ autem sunt ipsa-

rum AC æque multiples KL;

& ipsarum BD aliz, ~~ut æque~~ æ-

que multiples MN: si K su-

perat M, superabit & L ipsam N;

& si æqualis æqualis; & si minor

minor. suntque KL quidem ipsa-

rum EF æque multiples; MN

vero ipsarum GH aliz ~~in æque~~

æque multiples. ut igitur E ad

G ita erit F ad H. quare si pri-

ma ad secundam eandem habeat

proportionem quam tertia ad

quartam, & æque multiples primæ ac tertiæ ad æque

multiples secundæ ac quartæ, juxta quamvis multiplicatio-


nem, eandem proportionem habebunt, inter se comparatæ.

Quod demonstrare oportebat.

Quoniam igitur demonstratum est si K superat M, & L

ipsam N superare; & si æqualis, æqualem esse, & si minor,

minorem:



a 3. hujus.

quædam

b 5. Defin. hujus.

c 5. Defin.

minorem : constat etiam si M superarat K , & N superare ipsam L ; & si æqualis, æqualem esse; & si minor, minorem; ac
c. s. Defin. propterea ut G ad E ita esse H ad F .

Cor. Ex hoc manifestum est si quatuor magnitudines sint proportionales, & inverse proportionales esse.

PROP. V. THEOR.

Si magnitudo magnitudinis æque multiplex sit atque ablata ablatæ, & reliqua reliquæ æque multiplex erit ac tota totius.

Magnitudo AB magnitudinis CD æque multiplex sit atque ablata AE ablatæ CF . dico & reliquam EB reliquæ FD æque multiplicem esse atque totam AB totius CD ; Quotuplex enim est AE ipsius CF , totuplex fiat & EB ipsius CG . & quoniam AE æque multiplex est CF atque EB ipsius CG ; erit AE æque multiplex CF , ac AB ipsius GF ; ponitur autem æque multiplex AE ipsius CF , ac AB ipsius CD . æque multiplex igitur est AB utriusque GF *a 1. hujus.* CD ; ac propterea GF ipsi CD est æqualis. communis auferatur CF . reliqua igitur GC æqualis est reliquæ DF . itaque quoniam AE æque multiplex est CF , ac EB ipsius CG , estque CG æqualis DF ; erit AE æque multiplex CF , ac EB ipsius FD . æque multiplex autem ponitur AE ipsius CF , ac AB ipsius CD . ergo EB est æque multiplex FD , ac AB ipsius CD . & reliqua igitur EB reliquæ FD æque multiplex est, atque tota AB totius CD . Quare si magnitudo magnitudinis æque multiplex sit atque ablata ablatæ, & reliqua reliquæ æque erit multiplex, ac tota totius. Quod oportebat demonstrare.




PROP. VI. THEOR.

Si duæ magnitudines duarum magnitudinum æque multiplices sint, & ablata quædam sint earundem æque multiplices, erunt & reliquæ vel eisdem æquales, vel ipsarum æque multiplices.

Duæ magnitudines AB CD duarum magnitudinum E F æque multiplices sint, & ablata AG CH earundem sint æque multiplices. dico & reliquas GB HD vel ipsis E F æquales esse,

esse, vel ipsarum æque multiplices. Sit enim primo $c b$ æqualis e . dico & $h d$ ipsi f esse æqualem. ponatur ipsi f æqualis $c k$. & quoniam $a g$ æque multiplex est e ac $c h$ ipsius f ; estque $g b$ quidem æqualis e ; $c k$ vero æqualis f : erit $a b$ æque multiplex e , ac $k h$ ipsius f . æque autem multiplex ponitur $a b$ ipsius e , ac $c d$ ipsius f . ergo $k h$ æque multiplex est f , ac $c d$ ipsius f . quoniam igitur utraque ipsarum $k h$ $c d$ est æque multiplex f , erit $k h$ æqualis $c d$. communis auferatur $c h$. ergo reliqua $k c$ reliquæ $h d$ est æqualis. sed $k c$ est æqualis f . & $h d$ igitur ipsi f est æqualis; ideoque $g b$ ipsi e , & $h d$ ipsi f æqualis erit. similiter demonstrabimus si $g b$ multiplex fuerit ipsius e , & $h d$ ipsius f æque multiplicem esse. Si igitur duæ magnitudines duarum magnitudinum æque multiplices sint, & ablatæ quædam sint earundem æque multiplices, erunt & reliquæ, vel eisdem æquales, vel ipsarum æque multiplices. Quod demonstrare oportebat.

Sit enim primo $c b$




a. i. hujus.

PROP. VII. THEOR.

Æquales ad eandem eandem habent proportionem, & eadem ad æquales.

Sint æquales magnitudines $a b$, alia autem quævis magnitudo c . dico utramque ipsarum $a b$ ad c eandem proportionem habere: & c ad utramque $a b$ similiter eandem habere proportionem. Sumantur ipsarum $a b$ æque multiplices $d e$, & ipsius c alia utcunque multiplex f . quoniam igitur æque multiplex est d ipsius a , ac e ipsius b , estque a ipsi b æqualis; erit & d æqualis e ; alia autem utcunque est f . ergo si d superat f , & e ipsam f superabit, & si æqualis, æqualis; & si minor, minor. & sunt $d e$. qui-




dem

dem ipsarum AB æque multiples: F vero alia utcumque
 45. Defin. multiplex ipsius C . erit igitur α ut A ad C . ita B ad C . dico
 insuper C ad utramque ipsarum AB eandem habere pro-
 portionem. iisdem enim constructis similiter ostendemus D
 ipsi E æqualem esse, si igitur F superat D , ipsam quoque E su-
 perabit; & si æqualis, æqualis; & si minor, minor. atque
 est F quidem ipsius C multiplex; D E vero alia utcumque
 æque multiples ipsarum AB . ergo α ut C ad A , ita erit C ad
 B . Æquales igitur ad eandem, eandem habent proportio-
 nem, & eadem ad æquales. Quod ostendere oportebat.

PROP. VIII. THEOR.

*Inæqualium magnitudinum major ad eandem, maiorem
 habet proportionem, quam minor: & eadem ad mi-
 norem, maiorem proportionem habet, quam ad ma-
 iorem.*

Sint inæquales magnitudines ABC , & sit AB major. fit
 alia vero utcumque D . dico AB ad D maiorem habere pro-
 portionem quam C ad D . & D ad C maiorem habere pro-
 portionem quam ad AB . Quoniam AB major est quam C ,
 ponatur ipsi C æqualis BE , hoc
 est AB excedat C per AE . itaque
 AE aliquoties multiplicata ma-
 jor erit quam D . multiplicetur
 AE quoad fiat major quam D .
 sitque ipsius multiplex FG ipsa D
 major. quotuplex autem est FG
 ipsius AE , totuplex fiat GH ipsius
 EB , & K ipsius C . sumatur etiam
 ipsius D dupla quidem L , tripla P ,
 & sic deinceps una amplius, quo-
 ad ea quæ sumitur multiplex i-
 pfius D , fiat prima quæ fit major
 quam K ; sit illa N . sitque M mul-
 tiplex ipsius D proxime minor
 quam N . quoniam itaque N pri-
 ma multiplex est ipsius D quæ
 major est quam K ; erit M non ma-
 jor quam K , hoc est K non erit minor quam M . & cum
 æque multiplex sit FG ipsius AE ac GH ipsius EB , erit FG
 æque multiplex AE ac FH ipsius AB , æque autem multi-
 plex est FG ipsius AE ac K ipsius C , ergo FH æque multi-
 plex est AB , ac K ipsius C ; hoc est FH K ipsarum AB & C
 sunt




41. hujus.

sunt æque multiplices. rursus quoniam GH æque multiplex est ipsius EB ac K ipsius C , estque EB æqualis C erit & GH ipsi K æqualis ^{1. Axiom.} ^{hujus.} sed K non minor est quam M non igitur GH minor erit quam M , sed est FG major quam D , ergo tota FH major erit quam M & D . sed M & D simul sunt æquales ipsi N , quia M est multiplex ipsius D ipsi N proxime minor, quare FH major erit quam N . unde cum FH superat N , K vero ipsam N non superat, & sunt FH & K æque multiplices ipsarum AB & C , & est N ipsius D alia multiplex ergo C AB ^{7. Defia.} ^{hujus.} ad D majorem rationem habebit quam C ad D . Dico præterea & D ad C majorem habere proportionem, quam D ad AB . iisdem enim constructis similiter ostendemus N superare K , ipsam vero FH non superare. atque est N multiplex ipsius D , & FH K aliæ utcunque ipsarum AB C æque multiplices. ergo D ad C majorem proportionem habet C , quam D ad B . Inæqualium igitur magnitudinum major ad eandem majorem habet proportionem, quam minor, & eadem ad minorem majorem proportionem habet, quam ad majorem. Quod ostendere oportebat.

PROP. IX. THEOR.

Quæ ad eandem, eandem proportionem habent, inter se æquales sunt; & ad quas eadem, eandem habet proportionem, ipsæ inter se sunt æquales.

Habeat enim utraque ipsarum A B ad C eandem proportionem. dico A ipsi B æqualem esse. nam si non esset æqualis, non haberet A utraque ipsarum A B ad eandem, eandem proportionem. habet autem. æqualis igitur est A ipsi B . Habeat rursus C ad utramque ipsarum A B eandem proportionem. dico A æqualem esse ipsi B . nisi enim ita sit, non A habebit C ad utramque A B eandem proportionem. habet autem. ergo A ipsi B necessario est æqualis. quæ igitur ad eandem, eandem proportionem habent, æquales inter se sunt: & ad quas eadem, eandem habet proportionem, ipsæ inter se sunt æquales. Quod demonstrare oportebat.




PROP.

PROP. X. THEOR.

Ad eandem proportionem habentium quæ majorem proportionem habet, illa major est; ad quam vero eandem majorem habet proportionem, illa minor est.


Habeat enim A ad C majorem proportionem, quam B ad C. dico A quam B majorem esse. si enim non est major, vel æqualis est, vel minor. æqualis autem non est A ipsi B, utraque enim ipsarum A B ad C eandem haberet ^a proportionem. atque eandem non habet. non igitur A ipsi B est æqualis. sed neque minor est quam B; haberet ^b enim A ad C minorem proportionem, quam B. atqui non habet minorem, non igitur A minor est, quam B. ostensum autem est neque esse æqualem. ergo A quam B major erit. habeat rursus C ad B majorem proportionem quam C ad A. dico B minorem esse quam A. si enim non est minor, vel æqualis est, vel major. æqualis utique non est B ipsi A; etenim C ad utramque ipsarum A B eandem proportionem ^a haberet. non habet autem. ergo A ipsi B non est æqualis. sed neque major est B quam A; haberet enim C ad B minorem ^b proportionem quam ad A. atqui non habet. non igitur B quam A est major. ostensum autem est neque æqualem esse. ergo B minor erit quam A. Ad eandem igitur proportionem habentium quæ majorem proportionem habet, illa major est; & ad quam eandem majorem habet proportionem, illa minor est. Quod oportebat demonstrare.



PROP. XI. THEOR.

Quæ eidem eadem sunt proportionēs, & inter se eadem sunt.

Sint enim ut A ad B ita C ad D: ut autem C ad D ita E ad F. dico ut A ad B, ita esse E ad F. sumantur enim ipsa-



rum quidem A C E æque multiplices G H K; ipsarum vero B D F aliz utcumque æque multiplices L M N. Quoniam igitur


tur est ut A ad B, ita C ad D, & sumptæ sunt ipsarum A C æque multiples G H, & ipsarum B D aliæ utcunque æque multiples L M; si G superat L, & H ipsam M superabit; & si æqualis, æqualis; & si minor, minor. rursus quoniam est ut C ad D, ita E ad F, & sumptæ sunt ipsarum C E æque multiples H K, ipsarum vero D F aliæ utcunque æque multiples M N; si A H superat M, & K ipsam N superabit; & si æqualis, æqualis; & si minor, minor. sed si H superat M, & G superabit L; & si æqualis, æqualis; & si minor minor; quare si G superat L, & K ipsam N superabit; & si æqualis, æqualis; & si minor, minor. & sunt G K quidem ipsarum A E æque multiples; L N vero ipsarum B F aliæ utcunque æque multiples. ergo * ut A ad B, ita erit E ad F. Quæ igitur eidem eadem sunt proportionēs, & inter se eadem sunt. Quod ostendisse oportuit.

* 5. Defin. hujus.

PROP. XII. THEOR.

Si quotcunque magnitudines proportionales fuerint; ut una antecedentium ad unam consequentium, ita erunt antecedentes omnes ad omnes consequentes.

Sint quotcunque magnitudines proportionales A B C D E F, & ut A ad B, ita sit C ad D, & E ad F. dico ut A ad B, ita esse A C E ad B D F. sumantur enim ipsarum A C E æ-



que multiples G H K, & ipsarum B D F aliæ utcunque æque multiples L M N. Quoniam igitur ut A ad B, ita est C ad D, & E ad F, & sumptæ sunt ipsarum quidem A C E æque multiples G H K, ipsarum vero B D F aliæ utcunque æque multiples L M N; si A G superat L, & H ipsam M superabit, & K ipsam N; & si æqualis, æqualis; & si minor, minor. quare & si G superat L, superabunt & G H K ipsas L M N; & si æqualis, æquales; & si minor, minores. suntque G, & G H K ipsarum A, & A C E æque multiples, quoniam si fuerint quotcunque magnitudines quotcunque magnitudinum, æqualium numero, singulæ singularum æque multiples; quotuplex est una magnitudo unius, totuplices erunt & omnes omnium. Et eadem ratione L & M N ipsarum B, & B D F sunt æque multiples. est igitur * ut A ad B, ita

* 5. Defin. hujus.

* 1. hujus.


A C E

A C E ad B D F. Quare si quocunque magnitudes proportionales fuerint, ut una antecedentium ad unam consequentium, ita erunt antecedentes omnes ad omnes consequentes. Quod demonstrare oportebat.

PROP. XIII. THEOR.

Si prima ad secundam eandem habeat proportionem quam tertia ad quartam, tertia autem ad quartam maiorem proportionem habeat quam quinta ad sextam: & prima ad secundam maiorem habebit proportionem quam quinta ad sextam.

Prima enim A ad secundam B eandem proportionem habet quam tertia C ad quartam D, tertia autem C ad quartam D maiorem habeat proportionem quam quinta E ad sextam F. dico & primam A ad secundam B maiorem proportionem



habere, quam quintam E ad sextam F. Quoniam enim C ad D maiorem proportionem habet quam E ad F, sunt quædam ipsarum C E æque multiples, & ipsarum D F aliæ utcunque æque multiples: ut multiplex ^a quidem C superet multiplicem D; multiplex vero E non superet multiplicem F. sumantur. & sint ipsarum C E æque multiples G H, & ipsarum D F aliæ utcunque æque multiples K L, ita ut G quidem superet K: H vero ipsam L non superet: & quotuplex est G ipsius C, totuplex sit & M ipsius A; quotuplex autem K ipsius D, totuplex sit & N ipsius B. & quoniam est ut A ad B ita C ad D, & sumptæ sunt ipsarum A C æque multiples M G, & ipsarum B D aliæ utcunque æque multiples N K: si ^b M superat N, & G ipsam K superabit; & si æqualis, æqualis; & si minor, minor. sed G superat K. ergo & M ipsam N superabit. H vero non superat L. suntque M H ipsarum A F æque multiples, & N L ipsarum B F aliæ utcunque æque multiples. ergo A ad B maiorem proportionem habebit ^a quàm E ad F. Si igitur prima ad secundam eandem habeat proportionem quàm tertia ad quartam; tertia vero ad quartam maiorem proportionem habeat quam quinta ad sextam: & prima ad secundam maiorem habebit proportionem quam quinta ad sextam. Quod ostendere oportebat.

PROP.

^a 7. Defin. hujus.

^b 5. Defin. hujus.

PROP. XIV. THEOR.


Si prima ad secundam eandem habeat proportionem quam tertia ad quartam; prima autem major sit quam tertia, & secunda quam quarta major erit; & si æqualis, æqualis; & si minor, minor.

Prima enim A ad secundam B eandem proportionem habeat quam tertia c ad quartam D: major autem sit A quam c. dico & B quam D majorem esse. Quoniam enim A major est quam c, & alia est utcumque magnitudo B, habebit a A ad B majorem proportionem quam c ad B; sed ut A ad B ita c ad D. ergo & c ad D majorem habebit b proportionem quam c ad B. ad quam vero eandem majorem proportionem habet, illa minor c est. quare D est minor quam B, ac propterea B quam D major erit. similiter demonstrabimus & si A æqualis sit ipsi c, & B ipsi D esse æqualem; & si A sit minor quam c, & B quam D minorem esse. Si igitur prima ad secundam eandem habeat proportionem quam tertia ad quartam; prima autem major sit quam tertia, & secunda quam quarta major erit; & si æqualis, æqualis; & si minor, minor. Quod demonstrare oportebat.

a 8. hujus.

b 13. hujus.


c 10. hujus.



PROP. XV. THEOR.

Partes inter se comparatæ eandem habent proportionem quam habent earum æque multiplices.

Sit enim AB æque multiplex c, ac DE ipse f. dico ut c ad f, ita esse AB ad DE. Quoniam enim æque multiplex est AB ipse c, ac DE ipse f; quot magnitudines sunt in AB æquales ipsi c, totidem erunt & in DE æquales f. dividatur AB in magnitudines ipsi c æquales, quæ sunt AG GH HB; & DE dividatur in magnitudines æquales f, videlicet in DK KL LE; erit igitur ipsarum AG GH HB multitudo æqualis multitudinì DK KL LE. & quoniam æquales sunt AG GH HB, suntque DK KL LE



- a 7. hujus. LE inter se æquales; ut AG ad DK, ita a erit GH ad KL, &
 b 12. hujus. HB ad LF. atque erit b ut una antecedentium ad unam
 consequentium, ita omnes antecedentes ad omnes conse-
 quentes: est igitur ut AG ad DK, ita AB ad DE. sed AG
 ipsi c est æqualis, & DK ipsi F. ergo ut c ad F, ita erit AB
 ad DE. Partes igitur inter se comparatæ eandem habent
 proportionem quam habent earum æque multiples; Quod
 ostendendum fuit.

PROP. XVI. THEOR.

*Si quatuor magnitudines proportionales fuerint, &
 permutatæ proportionales erunt.*

Sint quatuor magnitudines proportionales A B C D, fit-
 que ut A ad B, ita c ad D. dico & permutatas proportio-
 nales esse, videlicet ut A ad C, ita esse B ad D. Sumantur e-
 nim ipsarum qui-
 dem A B æque mul-
 tiplices E F, ipsarum
 vero C D aliæ utcun-
 que æque multipli-
 ces G H. & quoniam

E	_____	G	_____
A	_____	C	_____
B	_____	D	_____
F	_____	H	_____


- a 15. hujus. æque multiplex est E ipsius A, ac F ipsius B: partes autem
 inter se comparatæ eandem habent a proportionem quam
 habent earum æque multiples; erit ut A ad B ita E ad F. ut
 b 11. hujus. autem A ad B ita c ad D. ergo & ut c ad D ita b E ad F.
 rursus quoniam G H sunt ipsarum C D æque multiples,
 partes autem eandem proportionem habent, inter se compa-
 ratæ quam habent earum æque multiples; erit a ut c ad D
 ita G ad H. sed ut c ad D ita E ad F. ergo & ut E ad F
 ita G ad H. quod si quatuor magnitudines proportionales
 sint, prima autem major c sit quàm tertia, & secunda quam
 quarta major erit; & si æqualis, æqualis; & si minor, minor.
 si igitur E superat G, & F ipsam H superabit; & si æqualis,
 æqualis; & si minor, minor; suntque E F ipsarum A B æque
 multiples, & c H ipsarum C D aliæ utcunque æque mul-
 tiplices, ergo d ut A ad c ita erit B ad D. Si igitur quatuor
 magnitudines proportionales fuerint, & permutatæ propor-
 tionales erunt. Quod ostendere oportebat.

PROP. XVII. THEOR.

Si compositz magnitudines sint proportionales, & divisæ proportionales erunt.

Sint compositz magnitudines proportionales AB BE CD DF. hoc est ut AB ad BE, ita sit CD ad DF. dico etiam divisas proportionales esse, videlicet ut AE ad EB ita esse CF ad FD. sumantur enim ipsarum quidem AE EB CF FD

æque multiples GH HK LM MN, ipsarum vero EB FD aliæ utcunque æque multiples KX NP. Quoniam æque multiplex est GH ipsius AE, ac HK ipsius EB; erit ^a GH ipsius AE æque multiplex, ac GK ipsius AB. æque autem multiplex est GH ipsius AE, ac LM ipsius CF. ergo GK æque multiplex est AB, ac LM ipsius CF. rursus quoniam æque multiplex est LM ipsius CF, ac MN ipsius FD; erit ^a LM æque mul-



^a 1. hujus.

tiplex CF, ac LN ipsius CD. sed æque multiplex erat LM ipsius CF, ac GK ipsius AB. æque igitur multiplex est GK ipsius AB, ac LN ipsius CD. quare GKLN ipsarum AB CD æque multiples erunt. rursus quoniam æque multiplex est HK ipsius EB, ac MN ipsius FD: est autem & KX ipsius EB æque multiplex, ac NP ipsius FD; & composita HX ipsius EB æque multiplex est ^b ac MP ipsius FD. quare cum sit ^b ut AB ad BE, ita CD ad DF; & sumptæ sint ipsarum quidem AB CD æque multiples GK LN, ipsarum vero EB FD aliæ utcunque æque multiples HX MP: si ^c GK superat HX, & LN superabit MP; & si æqualis, æqualis; & si minor, minor. superet igitur GK ipsam HX, communique ablata HK, & GH ipsam KX superabit. sed si GK superat HX, & LN superat MP; itaque superat LN ipsam MP: communique MN ablata, & LM superabit NP. quare si GH superat KX, & LM ipsam NP superabit. similiter demonstrabimus & si GH sit æqualis KX, & LM ipsi NP esse æqualem; & si minor, minorem. sunt autem GH LM ipsarum AE CF æque multiples, & ipsarum EB FD aliæ utcunque æque multiples KX NP. ergo ^c ut AE ad EB ita erit CF ad FD. Si igitur compositz magnitudines sint proportionales, & divisæ proportionales erunt. Quod demonstrare oportebat.

^b 2. hujus.

^c 5. Def. hujus.

PROP. XVIII. THEOR.

Si divisæ magnitudines sint proportionales, & compositæ proportionales erunt.

Sint divisæ magnitudines proportionales AE EB CF FD : hoc est ut AE ad EB , ita CF ad FD . dico etiam compositas proportionales esse, videlicet ut AB ad BE , ita esse CD ad DF . Si enim non est ut AB ad BE , ita CD ad DF ; erit ut AB ad BE , ita CD vel ad minorem quam FD , vel ad majorem. sit primo ad minorem, nempe ad DG . & quoniam est ut AB ad BE , ita CD ad DG , compositæ magnitudines sunt proportionales; ergo & divisæ proportionales




- a* 17. hujus. erunt *a*. est igitur ut AE ad EB , ita CG ad GD . ponitur autem ut AE ad EB , ita CF ad FD . quare & *b* ut CG ad GD , ita CF ad FD . at CG prima major est quam tertia CF . ergo & secunda DG quam quarta DF major *c* erit. sed & minor, quod fieri non potest. Non igitur est ut AB ad BE , ita CD ad DG . similiter ostendemus neque esse ad majorem quam DF . ad ipsam igitur DF sit necesse est. Quare si divisæ magnitudines sint proportionales, & compositæ proportionales erunt. Quod oportebat demonstrare.

PROP. XIX. THEOR.

Si fuerit ut tota ad totam, ita ablata ad ablatam: & reliqua ad reliquam erit ut tota ad totam.

Sit enim ut tota AB ad totam CD , ita ablata AE ad ablatam CF . dico & reliquam EB ad reliquam FD ita esse ut tota AB ad totam CD . Quoniam enim est ut tota AB ad totam CD , ita




- a* 16. hujus. AE ad CF . & permutando erit *a* ut AB ad AE , ita CD ad CF . quoniam compositæ magnitudines sunt proportionales, & divisæ proportionales erunt *b*, ut igitur BE ad EA , ita DF ad FC : rursusque permutando ut *a* BE ad DF , ita EA ad FC . sed ut EA ad CF , ita posita est AB ad CD . & reliqua *c* igitur EB erit ad reliquam FD , ut tota AB ad totam CD . Quare si fuerit ut tota ad totam, ita ablata ad ablatam; & reliqua ad reliquam erit ut tota ad totam. Quod demonstrare oportebat.

Cor. Si quatuor magnitudines proportionales sint, per conversionem rationis proportionales erunt. Sit enim ut AB ad BE , ita CD ad DF , erit permutando AB ad CD , ita BE ad DF . quare cum est tota AB ad totam CD , ut ablata BE ad ablatam DF , erit & reliqua AE ad reliquam CF , ut tota AB ad totam CD . quare rursus permutando & invertendo erit ut AB ad AE , ita CD ad CF . quod est per conversionem rationis.


PROP. XX. THEOR.

Si sint tres magnitudines, & aliæ ipsis numero æquales, quæ binæ sumantur in eadem proportionē: ex æquali autem prima major sit, quam tertia; & quarta quàm sexta major erit; & si æqualis, æqualis; & si minor, minor.

Sint tres magnitudines $A B C$, & aliæ ipsis numero æquales $D E F$; binæ sumptæ sint in eadem proportionē: fitque ut A ad B , ita D ad E , & ut B ad C , ita E ad F : ex æquali autem major sit A quam C . dico & D quam F majorem esse; & si æqualis, æqualem; & si minor, minorem. Quoniam enim A major est quàm C , alia vero est utcunque B , & major ad eandem majorem habet proportionem quàm minor; habebit A ad B majorem proportionem quàm C ad B . sed ut A ad B , ita D ad E ; & invertendo ut C ad B , ita F ad E . ergo & D ad E majorem habet proportionem quàm F ad E . ad eandem vero proportionem habentium quæ majorem habet proportionem, illa major est. major igitur est D quam F . similiter ostendemus & si A sit æqualis C , & D ipsi F æqualem esse; & si minor, minorem. Si igitur tres magnitudines fuerint, & aliæ ipsis numero æquales, quæ binæ sumantur, & in eadem proportionē: ex æquali autem prima major sit quàm tertia; & quarta quam sexta major erit; & si æqualis, æqualis; & si minor, minor. Quod ostendere oportebat.



a 8. hujus.




b 10. hujus.

PROP. XXI. THEOR.

Si sint tres magnitudines, & aliæ ipsis numero æquales, quæ binæ sumantur & in eadem proportionē; sit autem perturbata earum analogia: & ex æquali prima major sit quam tertia; & quarta quam sexta major erit; & si æqualis, æqualis; & si minor, minor.

Sint tres magnitudines proportionales $A B C$, & aliæ ipsis numero æquales $D E F$, binæ sumptæ & in eadem proportionē. sit autem perturbata earum analogia, videlicet ut A quidem ad B , ita E ad F ; ut vero B ad C , ita D ad E ; & ex æquali A major sit quam C . dico & D quam F majorem esse; & si æqualis, æqualem; & si minor, minorem. Quoniam enim major est A quam C , alia vero est B ; habebit A ad B majorem proportionem quam C ad B . sed ut A ad B , ita E ad F : & invertendo ut C ad B , ita E ad D . quare & E ad F majorem habebit proportionem quam E ad D . ad quā vero eadem majorem proportionem habet illa minor est E . minor igitur est F quā D ; ac propterea D quam F major erit. similiter ostendemus & si A sit æqualis C , & D ipsi F esse æqualem; & si minor, minorem. Si igitur sint tres magnitudines, & aliæ ipsis æquales numero, quæ binæ sumantur & in eadem proportionē; sit autem perturbata earum analogia: & ex æquali autem prima major sit quam tertia; & quarta quam sexta major erit; & si æqualis, æqualis; & si minor, minor. Quod demonstrare oportebat.




PROP. XXII. THEOR.

Si sint quotcunque magnitudines, & aliæ ipsis numero æquales, quæ binæ sumantur in eadem proportionē; & ex æquali in eadem proportionē erunt.

Sint quotcunque magnitudines $A B C$, & aliæ ipsis numero æquales $D E F$, binæ sumptæ in eadem proportionē, hoc est ut A quidem ad B , ita D ad E , ut autem B ad C , ita E ad F . dico & ex æquali in eadem proportionē esse, ut A ad C , ita D ad F . sumantur enim ipsarum quidem $A D$ æque multiples $G H$; ipsarum vero $B E$ aliæ utcunque æque multiples

plices KL, & ipsarum CF aliz utcumque æque multiples MN. Quoniam igitur est ut A ad B, ita D ad E, & sumptæ sunt ipsarum AD æque multiples GH, & ipsarum BE aliz utcumque æque multiples. KL; erit ut G ad K, ita H ad L. eadem quoque ratione erit ut K ad M, ita L ad N. & cum sint tres magnitudines GKM, & aliz ipsis numero æquales HLN, binæ sumptæ & in eadem proportionē; ex æquali si G superat M, & H ipsam N superabit; & si æqualis, æqualis; & si minor, minor. suntque GH ipsarum AD æque multiples, & MN ipsarum CF aliz utcumque æque multiples. ut igitur A ad C, ita erit D ad F. Quare si sint quotcumque magnitudines, & aliz ipsis numero æquales, quæ binæ sumantur in eadem proportionē, & ex æquali in eadem proportionē erunt. Quod demonstrare oportebat.



a 4. hujus.


b 20. hujus.

Def. 5. hujus.

PROP. XXIII. THEOR.

Si sint tres magnitudines, & aliz ipsis numero æquales, quæ binæ sumantur in eadem proportionē; sit autem perturbata earum analogia: & ex æquali in eadem proportionē erunt.

Sint tres magnitudines ABC, & aliz ipsis numero æquales, binæ sumptæ in eadem proportionē, DEF; sit autem perturbata earum analogia, hoc est sit ut A ad B, ita E ad F, & ut B ad C, ita D ad E. dico ut A ad C, ita esse D ad F. Sumantur ipsarum quidem ABD æque multiples GHL: ipsarum vero CEF aliz utcumque æque multiples KMN. & quoniam GH æque multiples sunt ipsarum AB, partes autem eandem habent proportionem quam habent æque



H 4


ipsa-

15. hujus. ipsarum multiples: erit α ut A ad B, ita G ad H. & simili ratione ut E ad F, ita M ad N. atque est ut A ad B, ita E ad F. ut β igitur G ad H, ita M ad N. rursus quoniam est ut B ad C, ita D ad E, & sumptæ sunt ipsarum B D æque multiples H L, ipsarum vero C E aliæ utcumque æque multiples K M: erit ut H ad K, ita L ad M. ostensum autem est & ut G ad H, ita esse M ad N. quoniam igitur tres magnitudines proportionales sunt G H K, & aliæ ipsis numero æquales L M N, binæ sumptæ in eadem proportionem, estque ipsarum perturbata analogia; ex æquali, si ϵ G superat K, & L ipsam N superabit; & si æqualis, æqualis; & si minor, minor. sunt autem G L ipsarum A D æque multiples: & K N æque multiples ipsarum C F. ut igitur A ad C, ita erit D ad F. Quare si fuerint tres magnitudines, & aliæ ipsis numero æquales, quæ binæ sumantur in eadem proportionem, sit autem perturbata earum analogia; & ex æquali in eadem proportionem erunt. Quod demonstrare oportebat.

PROP. XXIV. THEOR.

Si prima ad secundam eandem habeat proportionem, quam tertia ad quartam; habeat autem & quinta ad secundam proportionem eandem, quam, sexta ad quartam: & composita prima cum quinta ad secundam eandem proportionem habebit, quam tertia cum sexta ad quartam.

Prima AB ad secundam C eandem habeat proportionem, quam tertia DE ad quartam F. habeat autem & quinta BG ad secundam C proportionem eandem quam sexta EH ad quartam F. dico & compositam primam cum quinta AG ad secundam C eandem proportionem habere, quam tertiam cum sexta DH ad quartam F. Quoniam enim est ut BG ad C, ita EH ad F; erit invertendo ut C ad BG, ita F ad EH. & quoniam ut AB ad C, ita est DE ad F: ut autem C ad BG, ita F ad EH; erit α ex æquali ut AB ad BG, ita DE ad EH. quod cum divisæ magnitudines sint proportionales, & compositæ proportionales β erunt. ut igitur AG ad GB, ita est DH ad HE. sed & ut ϵ GB ad C, ita HE ad F. ergo, ex α æquali, ut AG ad C, ita




18. hujus. ut ϵ GB ad C, ita HE ad F. ergo, ex α æquali, ut AG ad C, ita erit

erit DH ad F . Si igitur prima ad secundam eandem habeat proportionem quam tertia ad quartam: habeat autem & quinta ad secundam proportionem eandem quam sexta ad quartam: & composita prima cum quinta ad secundam eandem proportionem habebit quam tertia cum sexta ad quartam. Quod ostendere oportebat.

PROX. IV. THEOR.

Si quatuor magnitudines fuerint proportionales, maxima ipsarum & minima, duabus reliquis majores erunt.

Sint quatuor magnitudines proportionales AB CD E F ; & sit ut AB ad CD , ita E ad F . sit autem maxima ipsarum AB & F minima. dico AB & F ipsis CD E majores esse. ponatur enim ipsi quidem E æqualis AG ; ipsi vero F æqualis CH . Quoniam igitur est ut AB ad CD , ita E ad F : estque AG æqualis E , & CH æqualis F ; erit ut AB ad DC , ita AG ad CH . & quoniam ut tota AB ad totam CD , ita ablata AG ad ablatam CH ; & reliqua GB ad reliquam HD erit * ut tota AB ad AD totam. major autem est AB quàm CD . ergo & GB quàm HD major erit. quod cum AG sit æqualis ipsi E , & CH ipsi F ; erunt AG & F ipsis CH & E æquales. si autem inæqualibus æqualia addantur, tota inæqualia erunt. ergo GB HD inæqualibus existentibus, quippe cum GB sit major, si ipsi quidem GB addantur AG & F , ipsi vero HD addantur CH & E : fient AB & F , ipsis CD & E necessario majores. Si igitur quatuor magnitudines fuerint proportionales, maxima ipsarum & minima, duabus reliquis majores erunt. Quod demonstrare oportebat.



* 19. hujus.

EUCLIDIS


ELEMENTORUM

LIBER SEXTUS.

DEFINITIONES.


I.

Similes figuræ rectilineæ sunt quæ & singulos angulos æquales habent, & circa æquales angulos latera proportionalia.



II.

Reciproce figuræ sunt quando in utraque figura antecedentes, & consequentes rationum fuerint termini.




III.

Extrema ac media ratione secari recta linea dicitur, quando fit ut tota ad majus segmentum, ita majus segmentum ad minus,

IV.

IV.

Altitudo cujusque figuræ est linea perpendicularis, quæ à vertice ad basim ducitur.



V.

Ratio ex rationibus componi dicitur, quando rationum quantitates inter se multiplicatæ, aliquam efficiunt rationem.

PROPOSITIO. I.


THEOREMA.

Triangula, & parallelogramma quæ eandem habent altitudinem, inter se sunt ut bases.


Sint triangula quidem ABC ACD , parallelogramma vero EC CF , quæ eandem habeant altitudinem, videlicet perpendicularem à puncto A ad BD ductam. dico ut basis BC ad CD basim, ita esse triangulum ABC ad triangulum ACD , & parallelogrammum EC ad CF parallelogrammum. produca-

tur BD ex utraque parte ad puncta H L , & ipsi quidem BC basi æquales quotcumque ponantur BG GH , ipsi vero basi CD ponantur quotcumque æquales DK KL , & AG AH AK AL jungantur. Quo-

nam igitur CB BG GH inter se æquales sunt, erunt & triangula AHG AGB ABC inter se æqualia. ergo quotuplex est basis HC ipsius BC ^{a 38. primi.} basis, totuplex est AHC triangulum trianguli ABC . eadem ratione quotuplex est LC basis ipsius basis CD , totuplex est & triangulum ALC ipsius ACD trianguli: & si æqualis est HC basis basi CL , & triangulum AHC triangulo ALC est æquale: & si basis HC basim CL superat, & triangulum AHC superabit triangulum ALC : & si minor, minus. quatuor igitur magnitudinibus existentibus, videlicet duabus basibus BC CD , & duobus triangulis ABC ACD , sumpta sunt æque multiplicia basis quidem BC , & ABC trianguli, videlicet



videlicet basis HC , & AHC triangulum: basis vero CD , & trianguli ACD , alia utcumque æque multiplicia, nempe CL basis, & ALC triangulum; atque ostensum est si HC basis basim CL superat, & triangulum AHC superare triangulum ALC ; & si æqualis, æquale; & si minor, minus. est igitur ^b ut BC basis ad basim CD , ita triangulum ABC ad ACD triangulum. & quoniam trianguli



^b Def. 5. quinti.

^c 41. primi. ABC duplum est ^c parallelogrammum EC , & trianguli ACD parallelogrammum FC duplum ^c, partes autem cum pariter multiplicibus eandem inter se proportionem habent: igitur ut ABC triangulum ad triangulum ACD , ita parallelogrammum EC ad CF parallelogrammum. quoniam igitur ostensum est ut basis BC ad CD basim, ita esse ABC triangulum ad triangulum ACD ; ut autem ABC triangulum ad triangulum ACD , ita parallelogrammum EC ad CF parallelogrammum; erit ^d ut BC basis ad basim CD , ita parallelogrammum EC ad FC parallelogrammum. Quare triacula & parallelogramma quæ eandem habent altitudinem, inter se sunt ut bases. Quod demonstrare oportebat.

PROP. II. THEOR.

Si uni laterum trianguli parallela quædam recta linea ducta fuerit, proportionaliter secabit ipsius trianguli latera. & si trianguli latera proportionaliter secta fuerint, quæ sectiones conjungit recta linea, reliquo trianguli lateri parallela erit.

Trianguli enim ABC uni laterum BC , parallela ducatur DE . dico ut DB ad DA , ita esse CE ad EA . jungantur BE , CD .


^a 37. primi. triangulum igitur BDE triangulo CDE est ^a æquale, in eadem enim sunt basi DE , & in eisdem DF & BC parallelis; aliud autem triangulum est ADE : sed æqualia ad idem eandem

^b 7. quinti. habent ^b proportionem; ergo ut triangulum BDE ad triangulum ADE , ita est CDE triangulum ad triangulum ADE .

^c 1. hujus. ut autem triangulum BDE ad triangulum ADE , ita ^c est BD ad DA ; nam cum eandem altitudinem habeant, videlicet perpendicularem à puncto E ad AB ductam, inter se sunt ut bases. & ob eandem causam ut CDE triangulum ad triangulum ADE , ita CE ad EA . & igitur ut BD ad DA ,

^d 11. quinti. ita est ^d CE ad EA . Et si trianguli ABC latera AB , AC pro-

proportionaliter secta sint, *i. e.* ut BD ad DA , ita sit CE ad EA ; & jungatur DE . dico DE ipsi BC parallelam esse. iisdem constructis, quoniam est ut BD ad DA , ita CE ad EA ; ut autem BD ad DA , ita est BDE triangulum ad triangulum ADE ; & ut CE ad EA , ita CDE triangulum est ad triangulum ADE , erit ut triangulum BDE ad triangulum ADE , ita est CDE triangulum ad triangulum ADE . quod cum utrumque triangulorum BDE CDE ad triangulum ADE eandem habeat proportionem; erit BDE triangulum f triangulo CDE æquale; & sunt in eadem basi DE . æqualia autem triacula, & in eadem basi constituta, etiam in eisdem g sunt parallelis. ergo g 39 . primi. DE ipsi BC parallela est. Si igitur uni laterum trianguli parallela quædam recta linea ducta fuerit, proportionaliter secabit ipsius trianguli latera. & si trianguli latera proportionaliter secta fuerint, quæ sectiones conjungit recta linea reliquo trianguli lateri parallela erit. Quod oportebat demonstrare.



h 11. quinti.


f 9. quinti.

g 39. primi.

PROP. III. THEOR.

Si trianguli angulus bifariam secetur, secans autem angulum recta linea secet etiam basim; basis partes eandem proportionem habebunt, quam reliqua trianguli latera. & si basis partes eandem proportionem habeant, quam reliqua trianguli latera; quæ à vertice ad sectionem ducitur recta linea, trianguli angulum bifariam secabit.

Sit triangulum ABC , & secetur angulus BAC bifariam *a* 9 . primi. recta linea AD . dico ut BD ad DC , ita esse BA ad AC . ducatur per C ipsi DA parallela *b* CE , & producta BA conveniat cum ipsa in E puncto. Quoniam igitur in parallelas $ADEC$ incidit recta linea quædam AC , erit C CE angulus angulo CAD æqualis: sed CAD angulus ponitur æqualis angulo BAD . ergo & BAD ipsi ACE angulo æqualis erit. rursus quoniam in parallelas $ADEC$ recta linea



b 31. primi.


c 29. primi.

linea BAE incidit, exterior angulus BAD æqualis est interiori AEC . ostensus autem est & angulus ACE angulo BAD æqualis. ergo & ACE ipsi AEC æqualis erit: ac propterea

46. primi. latus AE æquale lateri AC . & quoniam uni laterum trianguli BCE , videlicet ipsi EC

2. hujus. parallela ducta est AD ; erit ut BD ad DC , ita BA ad AE ; æqualis autem est AE ipsi AC .

7. quinsi. est igitur f ut BD ad DC , ita BA ad AC . Et si sit ut BD ad DC , ita BA ad AC , & AD jungatur. dico angulum BAC



bisariam sectum esse recta linea AD . iisdem enim constructis, quoniam est ut BD ad DC , ita BA ad AC ; sed & ut

2. hujus. BD ad DC , ita & BA ad AE , etenim uni laterum trianguli BCE , videlicet ipsi EC parallela ducta est AD , erit & ut BA ad AC , ita BA ad AE . ergo AC est & æqualis AE , ac propterea & angulus AEC angulo EAC æqualis. sed angulus quidem AEC est æqualis b angulo exteriori BAD ; an-

29. primi. gulus vero ACE æqualis b alterno CAD . quare & BAD angulus ipsi CAD æqualis erit. angulus igitur BAC bisariam sectus est recta linea AD . Ergo si trianguli angulus bisariam secetur, secans autem angulum recta linea etiam basim secet; basis partes eandem proportionem habebunt, quam reliqua trianguli latera. & si basis partes eandem proportionem habeant, quam reliqua trianguli latera; quæ à vertice ad sectionem ducitur recta linea, trianguli angulum bisariam secabit. Quod oportebat demonstrare.


PROP. IV. THEOR.

Æquiangulorum triangulorum latera quæ circum æquales angulos sunt, proportionalia sunt; & homologa, sive ejusdem rationis sunt latera quæ æqualibus angulis subtenduntur.

Sint æquiangula triangula ABC DCE , quæ angulum quidem ABC angulo DCE , angulum vero ACB angulo DEC æqualem habeant, & præterea angulum BAC angulo CDE . dico triangulorum ABC DCE proportionalia esse latera quæ sunt circa æquales angulos; & homologa, sive ejusdem rationis latera esse quæ æqualibus angulis subtenduntur. ponatur BC in directum ipsi CE . Et quoniam anguli ABC ACB duobus rectis minores a sunt, æqualis autem est angulus ACB angulo DEC ; erunt ABC DEC anguli

17. primi.


guli duobus rectis minores. quare $BA \cdot BD$ producte inter
 se convenient; producantur, & convenient in puncto F . ^{12. axio-}
 & quoniam angulus DCE est æqualis angulo ABC ; erit ^{primi.}
 BF ipsi DC parallela. rur-
 sus quoniam æqualis est an-
 gulus ACB angulo DEC , pa-
 rallela erit AC ipsi FE . pa-
 rallelogrammum igitur est
 $FACD$; ac propterea FA
 quidem ipsi CD , AC vero
 ipsi FD est æqualis. & quo-
 niam uni laterum trianguli FBE , videlicet ipsi FE , parallela ^{34. primi.}
 ducta est AC ; erit: ut BA ad AF , ita BC ad CE . æqualis ^{2. hujus.}
 autem est AF ipsi CD . ut igitur BA ad CD . ita BC ad CE ,
 & permutando ut BA ad BC ita CD ad CE . rursus quoniam
 CD parallela est BF , erit: ut BC ad CE , ita FD ad DE . sed ^{7. quinti.}
 FD est æqualis AC . ergo ut BC ad CE , ita AC ad DE . per-
 mutando igitur, ut BC ad CA ita CE ad ED . itaque quoniam
 ostensum est, ut AB ad BC ita DC ad CE , ut autem BC ad
 CA ita CE ad ED : erit g ex æquali; ut BA ad AC ita CD ad g ^{21. quinti.}
 DE . *Æquiangulorum igitur triangulorum proportionalia
 sunt latera quæ circum æquales angulos. & homologa,
 five ejusdem rationis, latera sunt quæ æqualibus angulis sub-
 tenduntur. Quod demonstrare oportebat.*



PROP. V. THEOR.

*Si duo triangula latera proportionalia habeant, æquian-
 gula erunt triangula, & æquales habebunt angulos
 quibus homologa latera subtenduntur.*

Sint duo triangula ABC DEF , quæ latera proportionalia
 habeant, hoc est, sit ut AB quidem ad BC , ita DE ad EF : ut
 autem BC ad CA , ita EF ad FD : & adhuc ut BA ad AC ,
 ita ED ad DF . dico trian-
 gulum ABC triangulo DEF
 æquiangulum esse, & æqua-
 les habere angulos quibus
 homologa latera subtendun-
 tur, angulum quidem ABC
 angulo DEF , angulum ve-
 ro BCA angulo EFD , &



præterea angulum BAC angulo EDF . Constituatur enim ^{23. primi.}
 ad rectam lineam EF , & ad puncta in ipsa EF , angulo qui-
 dem ABC æqualis angulus FEG ; angulo autem BCA an-
 gulus



6 Cor. 32.
primi.

6 4. hujus.
d 11. quinti.

6 9. quinti.

f 8. primi.

gulus EFG . quare reliquus BAC angulus $\wedge$ reliquo EGF est æqualis. ideoque æquiangulum est triangulum ABC triangulo EGF . triangulorum igitur ABC EGF proportionalia sunt latera quæ æqualibus angulis subtenduntur. ergo ut AB ad BC , ita GE ad EF . sed ut AB ad BC , ita DE ad EF . ut igitur DE ad EF , ita GE ad EF . quod cum utraque ipsarum DE EG ad EF eandem proportionem habeat, erit $\wedge$ DE ipsi EG æqualis. Eadem ratione & DF æqualis FG . itaque quoniam DE est æqualis EG , communis autem EF ;



duæ DE EF duabus GE EF æquales sunt, & basis DF basi FG æqualis. angulus igitur DEF est æqualis $\wedge$ angulo GEF , & DEF triangulum æquale triangulo GEF , & reliqui anguli reliquis angulis æquales, quibus æqualia latera subtenduntur. ergo angulus quidem DEF est æqualis angulo GEF , angulus vero EDF æqualis angulo EGF ; & quoniam angulus DEF est æqualis angulo GEF , & angulus GEF angulo ABC , erit & angulus ABC angulo FED æqualis. eadem ratione & angulus ACB æqualis est angulo DFE , & adhuc angulus ad A angulo ad D . ergo ABC triangulum triangulo DEF æquiangulum erit. Si igitur duo triangula latera proportionalia habeant, æquiangula erunt triangula; & æquales habebunt angulos quibus homologa latera subtenduntur. Quod oportebat demonstrare.


PROP. VI. THEOR.

Si duo triangula unum angulum uni angulo æqualem habeant, circa æquales autem angulos latera proportionalia; æquiangula erunt triangula, & æquales habebunt angulos quibus homologa latera subtenduntur.

Sint duo triangula ABC DEF , unum angulum BAC uni angulo EDF æqualem habentia, circa æquales autem angulos latera proportionalia, hoc est, sit ut BA ad AC , ita ED ad DF . dico triangulum ABC triangulo DEF æquiangulum esse, & angulum quidem ABC habere æqualem angulo DEF ; angulum vero ACB angulo DFE . Constituitur $\wedge$ enim ad rectam lineam DF , & ad puncta in ipsa DF , alterutri angulorum BAC EDF æqualis angulus FDG , angulo autem ACB æqualis DFG . reliquus igitur

6 23. primi.

igitur ad B reliquo ad C est æqualis. ergo triangulum ABC triangulo DGF æquiangulum est; ac propterea ut BA ad AC ita est GD ad DF: ponitur autem & ut BA ad AC, ita ED ad DF. ut igitur ED ad DF, ita GD ad DF. quare ED æqualis est ipsi DG, & communis DF. ergo duæ ED DF duabus GD DF æquales sunt & angulus EDF angulo GDF est æqualis; basis igitur EF est æqualis basi FG, triangulumque DEF æquale triangulo GDF, & reliqui anguli reliquis angulis æquales, alteri, quibus æqualia latera subtenduntur. ergo angulus quidem DFG est æqualis angulo DFE; angulus vero ad G angulo ad E. sed angulus DFG æqualis est angulo ACB: & angulus igitur ACB angulo DFE est æqualis. ponitur autem & BAC angulus æqualis angulo EDF. ergo & reliquus qui ad B æqualis est reliquo ad E. æquiangulum igitur est triangulum ABC triangulo DEF. Quare si duo triacula unum angulum uni angulo æqualem habeant, circa æquales autem angulos latera proportionalia; æquiangula erunt triacula, & æquales habebunt angulos quibus homologa latera subtenduntur. Quod ostendere oportebat.



PROP. VII. THEOR.

Si duo triacula unum angulum uni angulo æqualem habeant, circa alios autem angulos latera proportionalia, & reliquorum utrumque simul, vel minorem, vel non minorem recto, æquiangula erunt triacula; & æquales habebunt angulos circa quos latera sunt proportionalia.

Sint duo triacula ABC DEF, unum angulum uni angulo æqualem habentia, videlicet angulum BAC angulo EDF æqualem, circa alios autem angulos ABC DEF latera proportionalia, ut sit DE ad DF, sicut AB ad BC: & reliquorum qui ad C F. utrumque simul minorem vel non minorem recto. dico triangulum ABC triangulo DEF æquiangulum esse; angulumque ABC æqualem angulo DEF, & reliquum videlicet qui ad C reliquo qui ad F æqualem. Si inæqualis est angulus ABC angulo DEF, unus ipsorum major erit; sit major ABC: & constituitur ad rectam lineam AB, & ad punctum in ipsa E, angulo DEF æqualis angulus ABG. & quo-

b Cor. 32.
primi.


c 4. hujus.

d 9. quinti.

e 5. primi.

quoniam angulus quidem A est æqualis angulo D, angulus vero ABG angulo DEF: erit reliquus AGB reliquo DFE æqualis ^b. æquiangulum igitur est ABG triangulum triangulo DEF.

quare ut ^c AB ad BG, sic DE ad EF: utque DE ad EF, sic ponitur AB ad BC. ut igitur AB ad BC, sic AB ad BG. quod cum AB ad utramque BC BG eandem habeat proportionem, erit BC ipsi BG æqualis ^d: ac propterea angulus ad




c est æqualis angulo BGC. quare uterque angulorum BGC BGC minor est recto, igitur qui ei deinceps est AGB major est recto. atque ostensus est angulus AGB æqualis angulo qui ad F. angulus igitur qui ad F recto major est. atqui ponitur non major: cum C non est major recto, quod est absurdum. non igitur inæqualis est angulus ABC angulo DEF. ergo ipsi est æqualis. est autem & angulus ad A æqualis ei qui ad D. quare & reliquus qui ad C æqualis reliquo qui ad F. æquiangulum igitur est ABC triangulum triangulo DEF. Si igitur duo triangula unum angulum uni angulo æqualem habeant, circa alios autem angulos latera proportionalia, & reliquorum utrumque simul, vel minorem, vel non minorem recto: æquiangula erunt triangula, & æquales habebunt angulos circa quos proportionalia sunt latera. Quod oportebat demonstrare.

PROP. VIII. THEOR.

Si in triangulo rectangulo, ab angulo recto ad basim perpendicularis ducatur; quæ ad perpendicularem sunt triangula, & toti, & inter se similia sunt.

Sit triangulum rectangulum ABC, rectum habens angulum BAC: & à puncto A ad BC perpendicularis ducatur AD. dico triangula ABD ADC toti triangulo ABC, & inter se similia esse. Quoniam enim angulus BAC est æqualis angulo ADB, rectus enim uterque est, & angulus ad B communis duobus triangulis ABC ABD; erit ^a



a Cor. 32.
primi.


b 4. hujus.

reliquis ACB reliquo BAD æqualis. æquiangulum igitur est triangulum ABC triangulo ABD. quare ^b ut BC quæ subtendit angulum rectum. trianguli ABC, ad BA subtendentem

tem

tem angulum rectum trianguli ABD , sic ipsa AB subtendens angulum ad C trianguli ABC , ad DB subtendentem angulum æqualem angulo ad C , videlicet BAD ipsius ABD trianguli: & adhuc AC ad AD subtendentem angulum ad B communem duobus triangulis. ergo triangulum ABC triangulo ABD æquiangulum ^c est; & circa æquales angulos latera habet proportionalia. simile igitur ^c est triangulum ABC triangulo ABD . eadem ratione demonstrabimus etiam ADC triangulum triangulo ABC simile esse. quare utrumque ipsorum ABD ADC toti ABC triangulo est simile. Dico insuper triangula ABD ADC etiam inter se similia esse. Quoniam enim angulus BDA rectus est æqualis recto ADC ; sed & BAD ostensus est æqualis angulo ad C ; erit reliquus ad B reliquo DAC æqualis. æquiangulum igitur est. triangulum ABD triangulo ADC . ergo ^b ut

c 1. Def. hujus.



BD trianguli ABD subtendens BAD angulum, ad DA trianguli ADC subtendentem angulum qui est ad C , æqualem angulo BAD , sic ipsa AD trianguli ABD subtendens angulum ad B , ad DC subtendentem angulum DAC ei qui est ad B æqualem; & adhuc BA ad AC subtendentem angulum rectum ADC . simile igitur est ABD triangulum triangulo ADC . Quare si in triangulo rectangulo ab angulo recto ab basim perpendicularis ducatur; quæ ad perpendicularem sunt triangula, & toti, & inter se similia sunt. Quod oportebat demonstrare.


Cor. Ex hoc manifestum est, in triangulo rectangulo, ab angulo recto ad basim perpendicularem ductam, mediam proportionalem esse inter segmenta basis: & præterea inter basim & basis segmentum, latus utrumlibet segmento terminum, medium esse proportionale.

PROP. IX. PROBL.

A data recta linea imperatam partem abscindere.

Sit data recta linea AB . oportet ab ipsa AB imperatam partem abscindere. Imperetur pars tertia; & ducatur à puncto A quædam recta linea AC , quæ cum ipsa AB angulum quemlibet contineat; sumaturque in AC quodvis punctum D , & ipsi AD æquales ^a ponantur DE EC , deinde ^{3. primi.} jungatur


- b* 31. primi. jungatur BC ; per D ipsi BC parallela b ducatur DF . Itaque quoniam uni laterum trianguli ABC , videlicet ipsi BC , parallela ducta est FD ; erit c ut CD ad DA , ita BF ad FA ; dupla autem est CD ipsius DA . ergo & BF ipsius FA dupla erit. tripla igitur est BA ipsius AF . quare à data recta linea AB imperata tertia pars AF abscissa est. Quod facere oportebat.



PROP. X. PROBL.

Datam rectam lineam infectam, data rectæ lineæ sectæ similiter secare.

- Sit data quidem recta linea infecta AB , secta vero AC . oportet rectam lineam AB infectam ipsi AC sectæ similiter secare. sit secta AC in punctis D & E , & ponantur ita, ut angulum quemvis contineant, junctæque BC per puncta quidem D & E ipsi BC parallelæ a ducantur DF EG : per D vero ipsi AB ducatur parallela DHK . parallelogrammum igitur est utrumque ipsorum FH HB : ac propterea DH quidem est b æqualis FG , HK vero ipsi GB . & quoniam uni laterum trianguli DKC , ipsi scilicet KC , parallela ducta est HE ; erit c ut CE ad ED , ita KH ad HD . æqualis autem est KH quidem ipsi BG , HD vero ipsi GF . est igitur ut CE ad ED , ita BG ad GF . rursus quoniam uni laterum trianguli AGE , nimirum ipsi EG , parallela ducta est FD , ut ED ad DA , ita c erit GF ad FA . sed ostensum est ut CE ad ED , ita esse BG ad GF . ut igitur CE ad ED , ita est BG ad GF , & ut ED ad DA , ita GF ad FA . ergo data recta linea infecta AB , datæ rectæ lineæ sectæ AC similiter secta est. Quod facere oportebat.




PROP. XI. PROBL.

Duabus datis rectis lineis tertiam proportionalem invenire.

Sint datæ duæ rectæ lineæ AB AC , & ponantur ita ut angulum quemvis contineant. oportet ipsis AB AC tertiam

tertiam proportionalem invenire. Producantur AB AC ad puncta D E : ponaturque ipsi AC æqualis BD ; & juncta BC , ducatur a per D ipsi BC parallela DE . quoniam igitur uni laterum trianguli ADE , videlicet ipsi DE parallela ducta est BC , erit b ut AB ad BD , ita AC ad CE . æqualis autem est BD ipsi AC , ut igitur AB ad AC , ita est AC ad CE . quare datis rectis lineis AB AC tertia proportionalis inventa est CE . Quod facere oportebat.



a 31. primi.



b 2. hujus.

PROP. XII. PROBL.

Tribus datis rectis lineis quartam proportionalem invenire.

Sint datæ tres rectæ lineæ A B C . oportet ipsis A B C quartam proportionalem invenire. Exponantur duæ rectæ lineæ DE DF angulum quemvis EDF continentes:

& ponatur ipsi quidem A æqualis DG , ipsi vero B æqualis GE , & ipsi C æqualis DH : junctæque GH , per G ipsi parallela a ducatur EF . itaque quoniam uni laterum



a 31. primi.

trianguli DEF , nimirum ipsi EF , parallela ducta est GH , erit ut DG ad GE ita DH ad HF . est autem DG ipsi A æqualis; GE vero æqualis B , & DH æqualis C , ut igitur A ad B , ita C ad HF . quare datis tribus rectis lineis A B C quarta proportionalis inventa est HF . Quod facere oportebat.

PROP. XIII. PROBL.

Duabus datis rectis lineis mediam proportionalem invenire.


Sint datæ duæ rectæ lineæ AB BC . oportet inter ipsas AB BC mediam proportionalem invenire. Ponantur in directum, & super ipsa AC describatur semicirculus ADC , ducaturque a à puncto B ipsi AC ad rectos angulos BD , & AD DC jungantur. Quoniam igitur in semicirculo est angulus ADC , is rectus b est. & quoniam in triangulo rectan-

a 11. primi.

b 31. tertii.

• Cor. 8.
hujus.


gulo ADC , ab angulo recto ad basim perpendicularis ducta est DB , erit DB media proportionalis • inter segmenta basis $ABBC$. duabus igitur datis rectis lineis $ABBC$ media proportionalis inventa est. Quod facere oportebat.



PROP. XIV. THEOR.

Æqualium, & unam uni æqualem habentium angulum, parallelogrammorum latera quæ sunt circum æquales angulos, reciproca sunt: Et quorum parallelogrammorum unum uni æqualem habentium angulum, latera quæ sunt circum æquales angulos, sunt reciproca; ea inter se sunt æqualia.

Sint æqualia parallelogramma $ABBC$, æquales habentia angulos ad B , & ponantur in directum $DBBE$. ergo & indirectum • erunt $FBB C$. dico parallelogrammorum $ABBC$ latera quæ sunt circum æquales angulos reciproca esse: hoc est ut DB ad BE ita esse GB ad BF . Compleatur enim parallelogrammum FE . & quoniam parallelogrammum AB æquale est parallelogrammo BC , aliud autem aliquod est FE parallelogrammum, erit
 • 14. primi. ut AB ad FE , ita BC ad FE .
 • 7. quinti. sed ut AB quidem ad FE , ita • est DB ad BE ; ut autem BC ad FE , ita • GB ad BF ; ut igitur DB ad BE , ita GB ad BF . ergo parallelogrammorum $ABBC$ latera quæ sunt circum æquales angulos ex contraria parte sibi ipsis respondent. Et si reciproca sunt seu ex contraria parte sibi ipsis respondeant latera quæ sunt circum æquales angulos, sit nempe ut BD ad BE , ita GB ad BF , dico parallelogrammum AB parallelogrammo BC æquale esse. quoniam enim est ut DB ad BE , ita GB ad BF , ut autem DB ad BE , ita • AB parallelogrammum ad parallelogrammum FE , & ut GB ad BF , ita • BC parallelogrammum ad parallelogrammum FE ; erit & ut AB ad FE , ita BC ad FE . æquale igitur est AB . parallelogrammum parallelogrammo BC . Ergo æqualium & unum uni



uni æqualem habentium angulum parallelogrammorum latera, quæ circum æquales angulos, reciproca sunt seu ex contraria parte sibi ipsis respondent, & quorum parallelogrammorum unum uni æqualem habentium angulum latera, quæ circum æquales angulos, reciproca sunt; ea inter se sunt æqualia. Quod oportebat demonstrare.

PROP. XV. THEOR.

Æqualium, & unum uni æqualem habentium angulum triangulorum latera quæ circum æquales angulos, sunt reciproca. Et quorum triangulorum unum uni æqualem habentium angulum latera, quæ circum æquales angulos reciproca sunt, ea inter se sunt æqualia.


Sint æqualia triacula ABC ADE unum angulum uni angulo æqualem habentia, angulum scilicet BAC angulo DAE . dico triangulorum ABC ADE latera quæ circum æquales angulos reciproca esse, hoc est ut CA ad AD , ita esse EA ad AB . ponantur enim ita ut indirectum sit CA ^{14. primi.} ipsi AD . ergo & EA ipsi AB indirectum e erit; & jungatur BD . quoniam igitur triangulum ABC æquale est triangulo ADE , aliud autem est ABD ; erit ut CAB triangulum ad triangulum BAD , ita b triangulum ADE ad triangulum BAD . sed ut triangulum quidem CAB ad C ^{7. quinti.} BAD triangulum, ita e CA ad AD , ut autem triangulum EAD ad ipsum BAD , ita e EA ad AB . ut d igitur CA ad AD , ita EA ad AB . quare triangulorum ABC ADE latera quæ circum æquales angulos reciproca sunt. Et si reciproca sunt latera triangulorum ABC ADE , scil. sit ut CA ad AD , ita EA ad AB . dico triangulum ABC triangulo ADE æquale esse. juncta enim rursus BD , quoniam ut CA ad AD , ita est EA ad AB , ut autem CA ad AD , ita e ABC triangulum ad triangulum BAD ; & ut EA ad AB , ita e triangulum EAD ad BAD triangulum, erit ut ABC triangulum ad triangulum BAD , ita triangulum EAD ad BAD triangulum. utrumque igitur triangulorum ABC ADE ad triangulum BAD eandem habet proportionem; ac propterea æquale est ABC triangulum ^{14.}

gulum triangulo ADE . $\text{\AA}$ equalium igitur, & unum uni $\text{\AA}$ -
qualem habentium angulum triangulorum latera quæ cir-
cum $\text{\AA}$ quales angulos, reciproca sunt, & quorum triangulo-
rum unum uni $\text{\AA}$ qualem habentium angulum latera, quæ
circum $\text{\AA}$ quales angulos reciproca sunt, ea inter se sunt $\text{\AA}$ -
qualia. Quod demonstrare oportebat.

PROP. XVI. THEOR.

*Si quatuor rectæ lineæ proportionales fuerint, rectangu-
lum sub extremis contentum æquale est ei rectan-
gulo quod sub mediis continetur: Et si rectangulum
sub extremis contentum æquale fuerit ei quod sub
mediis continetur, quatuor rectæ lineæ proportio-
nales erunt.*

Sint quatuor rectæ lineæ proportionales $AB\ CD\ E\ F$, sit-
que ut AB ad CD , ita E ad F dico rectangulum contentum
sub rectis lineis $AB\ F$ æquale esse ei quod sub ipsis $CD\ E$
continetur. ducantur enim à punctis $A\ C$ ipsis $AB\ CD$ ad
rectos angulos $AG\ CH$; ponaturque ipsi quidem F æqualis
 AG , ipsi vero E æqualis CH , & compleantur $BG\ DH$ paral-
lelogramma. Quoniam igitur est ut AB ad CD , ita E
ad F ; est autem E æqualis
 CH , & F ipsi AG : erit ut
 AB ad CD , ita CH ad AG .
parallelogrammorum igitur
 $BG\ DH$ latera quæ sunt
circum $\text{\AA}$ quales angulos re-



* 14. hujus.

reciproca sunt; quoniam autem $\text{\AA}$ quiangulorum parallelo-
grammorum latera quæ sunt circum $\text{\AA}$ quales angulos
reciproca sunt, ea inter se sunt $\text{\AA}$ qualia. ergo paral-
lelogrammum BG æquale est parallelogrammo DH . at-
que est parallelogrammum quidem BG , quod sub rectis
lineis $AB\ F$ continetur, etenim AG est æqualis F , parallelo-
grammum vero DH quod continetur sub ipsis $CD\ E$, cum
 CH ipsi E sit æqualis. rectangulum igitur contentum sub
 AB & F est æquale ei quod sub ipsis CD & E continetur.
Et si rectangulum contentum sub $AB\ F$ sit æquale ei quod
sub CD & E continetur. dico quatuor rectas lineas propor-
tionales esse, videlicet ut AB ad CD , ita E ad F . iisdem e-
nim constructis quoniam rectangulum contentum sub AB
& F est æquale ei quod sub CD & E continetur, atque est
contentum


Contentum quidem sub ABF est rectangulum BG ; etenim AC est æqualis F : contentum vero sub CDE est rectangulum DH , quod CH ipsi E sit æqualis. erit parallelogrammum BG æquale parallelogrammo DH , & sunt æquiangu. æqualium autem & æquiangulorum parallelogrammorum latera, quæ circum æquales angulos reciproca sunt ^a. quare ut AB ^{a 14. hujus.} ad CD , ita CH ad AG , æqualis autem est CH ipsi E , & AG ipsi F . ut igitur AB ad CD , ita E ad F . Ergo si quatuor rectæ lineæ proportionales fuerint, rectangulum sub extremis contentum æquale est ei quod sub mediis continetur: & si rectangulum sub extremis contentum æquale fuerit ei quod sub mediis continetur, quatuor rectæ lineæ proportionales erunt. Quod oportebat demonstrare.

PROP. XVII. THEOR.


Si tres rectæ lineæ proportionales fuerint, rectangulum sub extremis contentum æquale est ei quod à media fit quadrato, Et si rectangulum sub extremis contentum æquale fuerit ei quod à media fit quadrato, tres rectæ lineæ proportionales erunt.

Sint tres rectæ lineæ proportionales ABC : & sit ut A ad B , ita B ad C . dico rectangulum contentum sub AC æquale esse ei quod à media B fit quadrato. ponatur ipsi B æqualis D . Et quoniam ut A ad B , ita B ad C , æqualis autem B ipsi D ; erit ut A ad B , ita D

ad C . si autem quatuor rectæ lineæ proportionales fuerint rectangulum sub extremis contentum est ^b æquale ei quod sub mediis continetur. ergo rectangulum sub AC contentum est



^a 7. quinti.



^b 16. hujus.

æquale ei quod continetur sub B D . sed rectangulum contentum sub B D est æquale quadrato quod fit ex ipsa B ; etenim B est æqualis D . rectangulum igitur contentum sub AC est æquale ei quod ex B fit quadrato. Et si rectangulum contentum sub AC æquale fit quadrato quod fit ex B . dico ut A ad B , ita esse B ad C . iisdem enim constructis: quoniam rectangulum contentum sub AC æquale est quadrato quod fit ex B ; at quadratum quod fit ex B est rectangulum quod sub ipsis B D continetur, est enim B æqualis ipsi D ; erit rectangulum contentum sub AC æquale ei quod sub B D continetur. si autem rectangulum sub extremis contentum æquale fuerit ei quod sub mediis continetur, quatuor rectæ lineæ proportionales

portiones b erunt. est igitur ut A ad B , ita D ad C ; æqualis autem B ipsi D . ergo ut A ad B , ita B ad C . Si igitur tres rectæ lineæ proportionales fuerint, rectangulum sub extremis contentum est æquale ei quod à media fit quadrato. Et si rectangulum sub extremis contentum æquale fuerit ei quod à media fit quadrato, tres rectæ lineæ proportionales erunt. Quod oportebat demonstrare.

PROP. XVIII. PROBL.

A data recta linea dato rectilineo simile, & similiter positum rectilineum describere.

Sit data recta linea AB , datum autem rectilineum $C E$. oportet à recta linea AB rectilineo $C E$ simile, & similiter positum rectilineum describere. Jungatur $D F$, & ad rectam lineam AB , & ad puncta in ipsa AB , angulo quidem C æ-

α 23. primi. qualis angulus α constituatur

GAB , angulo autem $C D F$ angulus ABG . reliquus igitur $C F D$ angulus reliquo AGB est b æqualis. ergo æqui-

b Cor. 32. primi.

angulum est FCD triangulum triangulo GAB ; ac propterea c ut FD ad GB , ita FC ad

c 4. hujus.


GA , & CD ad AB . rursus constituatur ad rectam lineam BG , & ad puncta in ipsa $B'G$, angulo quidem $D F E$ æqualis angulus BGH , angulo quidem $F D E$ æqualis GBH . ergo reliquus b ad E reliquo ad H est æqualis. æquiangulum igitur est triangulum $F D E$ triangulo GBH . quare ut c FD ad GB , ita FE ad GH , & ED ad HB . ostensum autem est & ut FD

d 11. quinti.

ad GB , ita FC ad GA , & CD ad AB : & ut igitur d FC ad AG , ita CD ad AB ; & FE ad GH , & adhuc ED ad HB . itaque quoniam angulus quidem $C F D$ est æqualis angulo AGB ; angulus autem $D F E$ angulo BGH . erit totus $C F E$ angulus toti AGH æqualis. eadem ratione & $C D E$ est æqualis ipsi ABH , & præterea angulus quidem ad C angulo ad A æqualis, angulus vero ad E angulo ad H . æquiangulum igitur est AH ipsi CE , & latera circum æquales ipsius angulos habet proportionalia. ergo rectilineum AH rectilineo CE si-

e 7. Diſſin. hujus.

mile e erit: A data igitur recta linea AB dato rectilineo CE simile, & similiter positum rectilineum AH descriptum est. Quod facere oportebat.



PROP. XIX. THEOR.

Similia triacula inter se sunt in duplicata proportionem laterum homologorum.

Sint similia triacula ABC DEF habentia angulum ad B æqualem angulo ad E , & sit ut AB ad BC , ita DE ad EF , ita ut latus BC homologum sit lateri EF . Dico ABC triangulum ad triangulum DEF duplicatam proportionem habere ejus quam habet BC ad EF . Sumatur enim ipsis BC EF terminis 11 . hujus. tia proportionalis BG , ut sit BC ad EF ita EF ad BG . & jungatur GA . quoniam igitur ut AB ad BC , ita est DE ad EF ; erit permutando ut AB ad DE , ita BC ad EF . sed ut BC ad EF , ita EF ad BG . ut igitur AB ad DE , ita EF ad BG . quare triangulorum ABG DEF 11 . quinti. latera quæ sunt circum æquales angulos reciproca sunt. quorum autem triangulorum unum uni æqualem habentium angulum latera quæ circum æquales angulos reciproca sunt, ea inter se æqualia sunt. æquale igitur 15 . hujus. est ABG triangulum triangulo DEF . & quoniam est ut BC ad EF , ita EF ad BG ; si autem tres rectæ lineæ proportionales sint, prima ad tertiam duplicatam proportionem 1 habet ejus quam habet ad secundam: habebit igitur BC ad BG duplicatam proportionem ejus quam habet BC ad EF . ut 10 . Def. 10. autem BC ad BG , ita ABC triangulum ad triangulum ABG . ergo & ABC triangulum ad triangulum ABG duplicatam proportionem habet ejus quam BC habet ad EF . est autem ABG triangulum triangulo DEF æquale. & triangulum igitur ABC ad triangulum DEF duplicatam proportionem habebit ejus quam habet BC ad EF . Quare similia triacula inter se in duplicata sunt proportionem laterum homologorum. Quod ostendere oportebat.

Cor. Ex hoc manifestum est, si tres rectæ lineæ proportionales fuerint, ut prima ad tertiam, ita esse triangulum, quod fit à prima ad triangulum quod à secunda simile, & similiter descriptum; quoniam ostensum est ut CB ad BG , ita ABC triangulum ad triangulum ABG , hoc est ad triangulum DEF . Quod ostendere oportebat.

PROP. XX. THEOR.

Similia polygona in similia triangula dividuntur, & numero æqualia, & homologa totis; & polygonum ad polygonum duplicatam proportionem habet ejus quam latus homologum habet ad homologum latus.

Sint similia polygona $ABCDEFGHKL$, & sit AB homologum ipsi FG . dico polygona $ABCDEFGHKL$ in similia triangula dividi, & numero æqualia, & homologa totis; & polygonum $ABCDE$ ad polygonum $FGHKL$ duplicatam proportionem habere ejus quam habet AB ad FG . jungantur BE EC GL LH . Et quoniam simile est $ABCDE$ polygonum polygono $FGHKL$, angulus BAE angulo GFL est æqualis: atque est ut BA ad AE , ita GF ad FL . quoniam igitur duo triangula sunt ABE

FGL unum angulum uni angulo æqualem habentia; circum æquales autem angulos latera proportionalia:

¶ 6. hujus.

erit $\triangle ABE$ triangulo FGL æquiangulum. ergo & simili. angulus igitur ABE æqualis est angulo FGL . est autem & totus ABC

¶ 1. Def. hujus.


angulus æqualis $\triangle$ toti FGH , propter similitudinem polygonorum. ergo reliquus EBC reliquo LGH est æqualis. & quoniam ob similitudinem triangulorum ABE FGL , est ut EB ad BA , ita LG ad GF . sed & propter similitudinem polygonorum $\triangle$, ut AB ad BC , ita est FG ad GH ; erit ex æquali ut $\triangle$ EB ad BC , ita LG ad GH . hoc est circum æquales angulos EBC LGH latera sunt proportionalia; æquiangulum igitur est EBC triangulum triangulo LGH . quare & simile. eadem ratione & ECD triangulum simile est triangulo LHK . similia igitur polygona $ABCDEFGHKL$ in similia triangula dividuntur, & numero æqualia. dico & homologa totis, hoc est ut proportionalia sint triangula, & antecedentia quidem sunt ABE EBC ECD , consequentia autem ipsorum FGL LGH LHK . & $ABCDE$ polygonum ad polygonum $FGHKL$ duplicatam proportionem habere ejus quam latus homologum habet ad homologum latus; hoc est AB ad FG . quoniam enim simile est ABE triangulum triangulo FGL ; habebit ABE triangulum ad triangulum FGL duplicatam proportionem $\triangle$ ejus quam habet BE ad GL . eadem ratione, & triangulum BEC ad GLH triangulum duplicatam $\triangle$ proportionem habet ejus quam BE ad GL . est $\triangle$ igitur ut ABE

¶ 1. quinti.

¶ 19. hujus.

¶ 11. quinti.

trian-




triangulum ad triangulum FGL , ita triangulum BEC ad GLH triangulum. rursus quoniam simile est triangulum BEC triangulo LGH , habebit BEC triangulum ad triangulum LGH duplicatam proportionem ejus quam recta linea CE habet ad rectam HL . eadem ratione & ECD triangulum ad triangulum LHK duplicatam proportionem habet ejus quam CE ad HL . est igitur ut triangulum BEC ad triangulum LGH , ita CED triangulum ad triangulum LHK . ostensum autem est & ut BEC triangulum ad triangulum LGH , ita triangulum ABE ad triangulum FGL . ergo ut triangulum ABE ad triangulum FGL , ita triangulum BEC ad GLH triangulum, & triangulum ECD ad ipsum LHK . & igitur ut unum antecedentium ad unum consequentium $\frac{B}{L}$ sic ^{12. quinti.} omnia antecedentia ad omnia consequentia. ergo ut triangulum ABE ad triangulum FGL , ita $ABCDE$ polygonum ad polygonum $FGHKL$: sed ABE triangulum ad triangulum FGL duplicatam proportionem habet ejus quam latus homologum AB habet ad homologum latus FG : similia enim triangula in duplicata sunt proportione laterum homologorum. ergo & $ABCDE$ polygonum ad polygonum $FGHKL$ duplicatam proportionem habet ejus quam AB latus homologum habet ad FG homologum latus. Similia igitur polygona in similia triangula dividuntur, & numero æqualia, & homologa totis; & polygonum ad polygonum duplicatam habet proportionem ejus quam habet latus homologum ad homologum latus. Quod oportebat demonstrare.

Eodem modo & in similibus quadrilateris ostendetur ea esse in duplicata proportione laterum homologorum. ostensum autem est & triangulis.

C O R O L L.

1. Ergo univérse similes figuræ rectilinéæ inter se sunt in duplicata proportione homologorum laterum. & si ipsis $ABFG$ tertiam proportionalem sumamus, quæ sit X ; habebit AB ad X duplicatam proportionem ejus quam habet AB ad FG . habet autem & polygonum ad polygonum, & quadrilaterum ad quadrilaterum duplicatam proportionem ejus quam latus homologum habet ad homologum latus, hoc est AB ad FG . atque ostensum est hoc in triangulis.



2. Univérse igitur manifestum est, si tres rectæ lineæ propor-


proportionales fuerint, ut prima ad tertiam, ita esse figuram quæ sit à prima, ad eam quæ à secunda, similem & similiter descriptam. Quod ostendere oportebat.

PROP. XXI. THEOR.

Quæ eidem rectilineo sunt similia, & inter se similia sunt.

a 1. Def.
hujus.

Sit enim utrumque rectilineorum A B simile rectilineo c. dico & rectilineum A rectilineo B simile esse. Quoniam enim simile est A rectilineum rectilineo c, & ipsi æquiangulum a erit, & circum æquales angulos latera habebit proportionalia. rursus quoniam simile est rectilineum B rectilineo c, æquiangulum ipsi erit, & circum æquales angulos latera proportionalia habebit a. utrumque igitur rectilineorum A B ipsi c æquiangulum est, & circum æquales angulos latera habet proportionalia. quare & rectilineum A ipsi B est æquiangulum, lateraque circum æquales angulos proportionalia habet; ac propterea A ipsi B est simile. Quod demonstrare oportebat.



PROP. XXII. THEOR.

Si quatuor rectæ lineæ proportionales fuerint, & rectilinea quæ ab ipsis fiunt, similia, & similiter descripta proportionalia erunt. & si rectilinea quæ ab ipsis fiunt, similia, & similiter descripta, proportionalia fuerint, & ipsæ rectæ lineæ proportionales erunt.

Sint quatuor rectæ lineæ proportionales A B C D E F G H, & ut A B ad C D, ita sit E F ad G H. describanturque a ab ipsis quidem A B C D similia, & similiter posita rectilinea K A B L C D: ab ipsis vero E F G H describantur rectilinea similia, & similiter posita M F N H. dico ut K A B rectilineum ad rectilineum L C D, ita esse rectilineum M F ad ipsum N H rectilineum. Sumatur ipsis b quidem A B C D tertia proportionalis x; ipsis vero E F G H tertia proportionalis o. & quoniam est ut A B ad C D, ita E F ad G H: ut autem C D ad x, ita G H ad o; erit ex æquali c ut A B ad x, ita E F ad o. sed ut A B quidem ad x, ita est d rectilineum K A B ad L C D rectilineum,


a 18. hujus.

b 11. hujus.

c 22. quinti.
d Cor. 20.
hujus.

lineum, ut autem EF ad O, ita & rectilineum MF ad rectilineum NH. ut igitur KAB rectilineum ad rectilineum LCD, ita est & rectilineum MF ad NH rectilineum. Et si sit ut KAB rectilineum ad rectilineum LCD, ita rectilineum MF ad rectilineum NH. dico ut AB ad CD, ita esse EF ad GH. fiat enim ut AB ad CD, ita EF ad PR, & describatur ab ipsa PR alterutri rectilineorum MF NH simile, & similiter positum rectilineum SR. quoniam igitur est ut AB ad CD, ita EF ad PR, & descripta sunt ab ipsis quidem AB CD similia, & similiter posita KAB LCD rectilinea, ab ipsis vero EF PR similia & similiter posita rectilinea MF SR, erit & ut KAB rectilineum ad rectilineum LCD, ita rectilineum MF ad RS

e 11. quinti.



f 12. hujus.

g ex prius demonstratio.

rectilineum: ponitur autem & ut rectilineum KAB ad rectilineum LCD, ita MF rectilineum ad rectilineum NH. ergo ut rectilineum MF ad rectilineum NH, ita MF rectilineum ad rectilineum SR. quod cum rectilineum MF ad utrumque ipsorum NH SR eandem habeat proportionem, erit & rectilineum NH ipsi SR æquale. est autem ipsi simile, & similiter positum. ergo GH est æqualis PR. & quoniam ut AB ad CD, ita est EF ad PR: æqualis autem PR ipsi GH; erit ut AB ad CD, ita EF ad GH. Si igitur quatuor rectæ lineæ proportionales fuerint, & rectilinea quæ ab ipsis fiunt, similia, & similiter descripta proportionalia erunt: & si rectilinea quæ ab ipsis fiunt, similia, & similiter descripta proportionalia fuerint, & ipsæ rectæ lineæ proportionales erunt. Quod oportebat demonstrare.

LEMMA.

Positis tribus rectis quibuscunque A, B & C; ratio primæ A ad tertiam C, æqualis est rationi compositæ ex ratione primæ A ad secundam B, & ratione secundæ B ad tertiam C.

Sit V. G. numerus ternarius exponens seu denominator rationis A ad B, hoc est sit A tripla ipsius B, & sit numerus quaternarius exponens rationis B ad C, erit numerus duodenarius ex numeri ternarii & quaternarii multiplicatione compo-

compositus exponens rationis A ad C; nam quia A continet B ter, & B continet C quater, continebit A ipsum C ter quater, seu duodecies. idem de aliis multiplicibus vel submultiplicibus verum est. Universalis vero hujus Theorematis demonstratio talis est, Quantitas rationis A ad B est numerus $\frac{A}{B}$,

scil. qui multiplicans consequentem producit antecedentem. Et

similiter quantitas rationis B ad

est $\frac{B}{C}$. Atque hæc duæ quanti-

A —————

B —————

C —————

tates inter se multiplicatæ efficiunt numerum $\frac{A \times B}{B \times C}$ qui est

quantitas rationis quam rectangulum comprehensum sub rectis A & B habet ad rectangulum sub B & C rectis. Adeoque dicta ratio rectanguli sub A & B, ad rectangulum sub B & C ea est quæ in sensu def. 5. hujus, componitur ex rationibus A ad B & B ad C. sed per I. 6. rectangulum sub A & B, est ad rectangulum sub B & C, ut A ad C. & igitur ratio A ad C æqualis est rationi compositæ ex rationibus A ad B, & B ad C.

Positis vero quatuor rectis quibuscunque A, B, C, & D; Ratio primæ A ad quartam D æqualis est rationi compositæ ex ratione primæ A ad secundam B, & ratione secundæ B ad tertiam C, & ratione tertiæ C ad quartam D.

Nam in tribus rectis A, C, & D,

ratio A ad D æqualis est rationi

compositæ ex rationibus A ad C,

& C ad D. Et hætenus est ostensum rationem A ad C æqualem

esse rationi compositæ ex rationibus A ad B & B ad C. Et igitur

ratio A ad D æqualis est rationi compositæ ex rationibus

A ad B, B ad C & C ad D. Similiter ostendetur, in quocunque

rectis, rationem primæ ad ultimam æqualem esse rationi

compositæ ex rationibus primæ ad secundam, secundæ ad tertiam, tertiæ ad quartam, & ita deinceps usque ad ultimam.

Si exponantur aliæ magnitudines quælibet, præter rectas,

idem obtinebit. Quod constabit si concipiantur tot rectæ A, B,

C &c. ordine positæ quot sunt magnitudines, & in eadem

ratione: ita videlicet ut recta A sit ad rectam B ut prima

magnitudo ad secundam, & recta B ad rectam C ut secunda

magnitudo ad tertiam, & ita porro. Manifestum est per 22.

5. esse ex æquo rectam A ad ultimam rectam sicut prima

magnitudo ad ultimam. Sed ratio rectæ A ad ultimam rectam

æqualis est rationi compositæ ex rationibus A ad B, B ad C, &

A —————

B —————

C —————

D —————


ita porro usque ad ultimam rectam. Et, ex hypothese, ratio cujuslibet rectæ ad sibi proximam eadem est cum ratione magnitudinis ejusdem ordinis ad sibi proximam. Et igitur ratio primæ magnitudinis ad ultimam æqualis est rationi compositæ ex rationibus primæ magnitudinis ad secundam, secundæ ad tertiam, & ita deinceps usque ad ultimam. Quod demonstrare oportebat.

PROP. XXIII. THEOR.

Æquiangula parallelogramma inter se proportionem habent ex lateribus compositam.

*Lateralium
rationibus*

Sint æquiangula parallelogramma AC CF æqualem habentia BCD angulum angulo ECG. dico parallelogrammum AC ad parallelogrammum CF proportionem habere compositam ex lateribus, videlicet compositam ex proportionem quam habet BC ad CG, & ex proportionem quam DC habet ad CE. ponatur enim ut BC sit in directum ipsi CG. ergo & DC ipsi CE in directum erit: & compleatur DG parallelogrammum: exponaturque recta linea quædam K, & fiat ut BC ad CG, ita K ad L, ut autem DC ad CE, ita L ad M. proportionem igitur ipsius K ad L, & L ad M eadem sunt quæ proportionem laterum videlicet BC ad CG, & DC ad CE. sed proportio K ad M composita est ex proportionem K ad L, & proportionem L ad M. quare & K ad M proportionem habet ex lateribus compositam.



c 14. primi.

b 12. hujus.

c per Lemma superius.

& quoniam est ut BC ad CG, ita AC parallelogrammum ad parallelogrammum CH; sed ut BC ad CG, ita K ad L: erit ut K ad L, ita parallelogrammum AC ad CH parallelogrammum. rursus quoniam est ut DC ad CE, ita CH parallelogrammum ad parallelogrammum CF: ut autem DC ad CE, ita L ad M. ergo ut L ad M, ita erit parallelogrammum CH ad CF parallelogrammum. itaque cum ostensum sit ut K quidem ad L ita AC parallelogrammum ad parallelogrammum CH: ut autem L ad M, ita parallelogrammum CH ad CF parallelogrammum; erit ex æquali ut K ad M, ita AC parallelogrammum ad ipsum CF. habet autem K ad M proportionem ex lateribus compositam. ergo & AC parallelogrammum ad parallelogrammum CF proportionem habebit compositam ex lateribus. Æquiangula igitur parallelogramma

lelogramma inter se proportionem habent ex lateribus compositam. Quod oportebat demonstrare.

PROP. XXIV. THEOR.

Omnis parallelogrammi, quæ circa diametrum sunt parallelogramma, & toti, & inter se similia sunt.

Sit parallelogrammum $ABCD$, cujus diameter AC : circa diametrum vero AC parallelogramma sint EG HK . dico parallelogramma EG HK & toti $ABCD$, & inter se similia esse. Quoniam enim uni laterum trianguli ABC , videlicet ipsi BC parallela ducta est EF , erit a ut BE ad EA , ita CF ad FA . quoniam rursus uni laterum trianguli ACD , nempe ipsi CD ducta est parallela

a 2. hujus. FG , ut CF ad FA , ita a erit DG ad GA . sed ut CF ad FA ita ostensa est & BE ad EA . ergo & ut BE ad

b 11. quinti. EA , ita b DG ad GA , componendoque c ut BA ad AE ,

c 18. quinti. ita DA ad AG , & permutando ut BA ad AD , ita EA ad AG . parallelogrammorum


igitur $ABCD$ EG latera quæ circa communem angulum BAD proportionalia sunt. & quoniam parallela est GF ipsi

d 29. primi. DC , angulus quidem AGF est d æqualis angulo ADC , angulus vero GFA æqualis angulo DCA , & angulus DAE est communis duobus triangulis ADC AGF ; erit triangulum ADC triangulo AGF æquiangulum. eadem ratione & triangulum ACB æquiangulum est triangulo AFE . totum igitur parallelogrammum $ABCD$ parallelogrammo EG est æquiangulum. ergo ut AD ad DC , ita e AG ad GF , ut autem

e 4. hujus. DC ad CA , ita GF ad FA , & ut AC ad CB , ita AF ad FE , & præterea ut CB ad BA , ita FE ad EA . itaque quoniam ostensum est ut DC ad CA , ita esse GF ad FA , ut autem AC ad CB , ita AF ad FE ; erit ex æquali ut DC ad CB , ita GF ad FE . ergo parallelogrammorum $ABCD$ EG proportionalia sunt latera quæ circum æquales angulos, ac propterea parallelogrammum $ABCD$ parallelogrammo EG est simile. eadem ratione, & parallelogrammum $ABCD$ simile est parallelogrammo HK . utrumque igitur ipforum EG HK parallelogrammorum, parallelogrammo $ABCD$ est simile. quæ autem eidem rectilineo sunt similia, & inter se similia

f 21. hujus. f sunt. parallelogrammum igitur EG simile est parallelogrammo HK . Quare omnis parallelogrammi quæ circa diame-

trum




trum sunt parallelogramma & toti, & inter se sunt similia. Quod ostendere oportebat.

PROP. XXV. PROBL.

Dato rectilineo, simile, & alteri dato æquale idem constituere.

Sit datum quidem rectilineum cui oportet simile constituere ABC , cui autem æquale sit D . oportet ipsi ABC simile, & ipsi D æquale idem constituere. Applicetur α ad α 44. primi. rectam quidem lineam BC rectilineo ABC æquale parallelogrammum BE . ad rectam vero CE applicetur α parallelogrammum CM æquale

ipsi D , in angulo FGE , qui CBL angulo est æqualis. in directum igitur β est BC ipsi CF , & LE ipsi EM . fumantur γ inter BC CF media proportionalis GH , & δ ab ipsa GH describatur rectilineum KGH si-



β 14. primi.

γ 13. hujus.
 δ 18. hujus.


mile & similiter positum rectilineo ABC . Et quoniam est ut BC ad GH , ita GH ad CF , si autem tres rectæ lineæ proportionales sint, ut prima ad tertiam, ita est figura quæ ϵ Cor. 20. fit à prima, ad eam quæ à secunda, similem & similiter descriptam: erit ut BC ad CF , ita ABC rectilineum ad rectilineum KGH . sed & ut BC ad CF , ita ζ parallelogrammum ζ 1. hujus. BE ad EF parallelogrammum, ut ξ igitur rectilineum ABC ξ 11. quinti. ad rectilineum KGH , ita BE parallelogrammum ad parallelogrammum EF . quare permutando ut ABC rectilineum ad parallelogrammum BE , ita rectilineum KGH ad EF parallelogrammum. est autem rectilineum ABC æquale parallelogrammo BE . æquale igitur est & KGH rectilineum parallelogrammo EF . sed EF parallelogrammum æquale est rectilineo D . ergo & rectilineum KGH ipsi D est æquale: est autem KGH simile rectilineo ABC . Dato igitur rectilineo ABC simile, & alteri dato D æquale idem constitutum est KGH . Quod facere oportebat.

EUCLIDIS ELEMENTORUM

PROP. XXVI. THEOR.

Si à parallelogrammo parallelogrammum auferatur simile toti, & similiter positum, communem ipsi angulum habens, circa eandem diametrum est toti.

A parallelogrammo enim $ABCD$ parallelogrammum AF auferatur, simile ipsi $ABCD$, & similiter positum communemque ipsi angulum habens DAB . dico parallelogrammum $ABCD$ circa eandem esse diametrum parallelogrammo AF . non enim, sed si fieri potest, sit parallelogrammi BD diameter AHC , & producat GF usque ad H ; ducaturque per H alterutri ipsarum $ADBC$ parallela HK . Quoniam igitur circa eandem diametrum est $ABCD$ parallelogrammum




a 24. hujus. parallelogrammo KG ; & erit *a* parallelogrammum $ABCD$
b 1. Def. parallelogrammo KG simile. ergo ut *b* DA ad AB , ita GA ad
 hujus. AK . est autem & propter similitudinem parallelogrammo-
c 11 quinti. rum $ABCD$ EG ; ut DA ad AB , ita GA ad AE . & *c* igitur
 ut GA ad AE , ita GA ad AK . quod cum GA ad utramque
d 9. quinti. ipsarum AK AE eandem proportionem habeat; erit *d* AE
 ipsi AK æqualis, minor majori, quod fieri non potest. non
 igitur circa eandem diametrum est $ABCD$ parallelogram-
 mum parallelogrammo AH . quare circa eandem diametrum
 erit ipsi AF . Si igitur à parallelogrammo parallelogrammum
 auferatur simile toti, & similiter positum, communem ipsi
 angulum habens, circa eandem diametrum, est toti. Quod
 demonstrare oportebat.

PROP. XXVII. THEOR.

Omnium parallelogrammorum secundum eandem rectam lineam applicatorum, & deficientium figuris parallelogrammis similibus, & similiter positis, ei quæ à dimidia describitur, maximum est quod ad dimidiam est applicatum, simile existens defectui.

Sit recta linea AB ; seceturque bifariam in C ; & ad AB rectam lineam applicetur parallelogrammum AD deficiens figura parallelogramma CE , simili & similiter posita ei quæ à dimidia ipsius AB descripta est. dico omnium paralle-

parallelogrammorum ad rectam lineam AB applicatorum, & deficientium figuris parallelogrammis similibus, & similiter positis ipsi CE, maximum esse AD. Applicetur enim ad rectam lineam AB parallelogrammum AF, deficiens figura parallelogramma HK simili, & similiter posita ipsi CE. dico AD parallelogrammum parallelogrammo AF majus esse.



Quoniam enim simile est parallelogrammum CE parallelogrammo HK, circa eandem diametrum ^a sunt. ducatur eorum diameter DB, & describatur figura. quoniam igitur CF ^b est æquale ipsi FE, commune apponatur HK. totum igitur CH toti KE est æquale. sed CH est æquale CG, quoniam ^b & recta linea AC ipsi CB. ergo & GC ipsi EK æquale est ^c commune apponatur CF. totum igitur AF est æquale gnomoni DMN: quare & CE, hoc est AD parallelogrammum parallelogrammo AF est majus. Omnium igitur parallelogrammorum secundum eandem rectam lineam applicatorum, & deficientium figuris parallelogrammis similibus, & similiter positis ei quæ à dimidia describitur, maximum est quod ad dimidium est applicatum. Quod demonstrare oportebat.

^a 26. hujus.

^b 43. primi.

^c 36. primi.

PROP. XXVIII. PROBL.

Ad datam rectam lineam dato rectilineo æquale parallelogrammum applicare, deficiens figura parallelogramma quæ similis sit alteri datæ. oportet autem datum rectilineum, cui æquale applicandum est, non majus esse eo quod ad dimidiam applicatur; similibus existentibus defectibus, & eo quod à dimidia, & eo, cui oportet simile deficere.



Sit data quidem recta linea AB: datum autem rectilineum, cui oportet æquale ad datam rectam lineam AB applicare, sit C non majus existens eo quod ad dimidiam applicatum est, similibus existentibus defectibus; cui autem oportet simile deficere sit D. oportet ad datam rectam lineam AB, dato rectilineo C æquale parallelogrammum applicare, deficiens figura parallelogramma, quæ similis sit ipsi D. Secetur AB bifariam in E, & ab ipsa EB describatur ^a simile, & similiter ^d 18. hujus. positum ipsi D; quod sit EBF G, & compleatur AG parallelogrammum. itaque AG vel æquale est ipsi C, vel eo majus,

ob determinationem: & si quidem AG sit æquale c , factum jam erit quod proponebatur: etenim ad rectam lineam AB dato rectilineo c æquale parallelogrammum AG applicatum est, deficiens figura parallelogramma

EF ipsi D simili. si autem non est æquale, erit HE majus quam c ; atque EF æquale est HE . ergo, & EF quam c est majus. quo autem EF superat c , ei excessui æquale, ipsi vero D simile & similiter positum,

a 25. hujus.

idem α constituitur $KLMN$. sed D est simile EF , quare & KM ipsi EF simile erit, sit igitur recta linea KL homologa ipsi GE , LM vero ipsi GF . & quoniam æquale est EF ipsis c & KM , erit EF ipso KM majus, major igitur est recta linea GE ipsa KL ; & GF ipsa LM . ponatur



GX æqualis KL , & GO æqualis LM , & compleatur XGO parallelogrammum. æquale igitur est & simile XO ipsi KM .

b 21. hujus.

c 26. hujus.

sed KM simile est EF . ergo & XO ipsi EF est simile. circa eandem igitur est: diametrum XO ipsi EF . sit ipsorum diameter GPB , & figura describatur. itaque quoniam EF est æquale ipsis c & KM simul, quorum XO est æquale KM , erit reliquus YOP gnomon æqualis reliquo c . & quoniam OR est æquale XS , commune apponatur SR . totum igitur OB toti XB est æquale. sed XB est æquale TE , quoniam & latus AE lateri EB . quare & TE ipsi OB æquale. commune apponatur XS . ergo totum TS est æquale toti gnomoni YOP . at YOP gnomon ipsi c ostensus est æqualis: & TS igitur ipsi c æquale erit. Quare ad datam rectam lineam AB , dato rectilineo c , æquale parallelogrammum TS applicatum est, deficiens figura parallelogramma SR ipsi D simili, quoniam & SR simile est ipsi GB . Quod facere oportebat.

PROP. XXIX. PROBL.


Ad datam rectam lineam dato rectilineo æquale parallelogrammum applicare, excedens figura parallelogramma, quæ similis sit alteri datæ.

Sit data recta linea AB , datum vero rectilineum, cui oportet æquale ad ipsam AB applicare, sit c ; cui autem oportet simile excedere D . oportet ad rectam lineam dato rectilineo c æquale parallelogrammum applicare, excedens figura

gura parallelogramma simili D. Secetur AB bifariam in E, atque ex EB ipsi D simile, & similiter a positum parallelo- 18. primi.
grammum describatur EL. & utriusque quidem EL & C æ-

quale, ipsi vero D simile, & simili-
ter positum idem b constituatur GH.
simile igitur est GH ipsi EL. sitque
KH quidem latus homologum lateri
FL, KG vero ipsi FE. & quoniam
parallelogrammum GH majus est ip-
so EL, erit recta linea KH major
quàm FL, & KG major quàm FE.
producantur FL FE, & ipsi qui-
dem KH æqualis sit FLM, ipsi vero
KG æqualis FEN, & compleatur
MN parallelogrammum. ergo MN
æquale est & simile ipsi GH. sed GH
est simile EL: MN igitur ipsi EL si-
mile c erit; ac propterea circa ean-
dem diametrum d est EL ipsi MN.

ducatur ipsorum diameter FX, & figura describatur. itaque
quoniam GH ipsi EL & C est æquale, sed GH est æquale
MN; erit & MN æquale ipsi EL & C. commune auferatur
EL. reliquus igitur $\Phi Y \Psi$ gnomon ipsi C est æqualis. &
quoniam AE est æqualis EB, æquale erit & AN parallelo-
grammum parallelogrammo EP, hoc est ipsi LO. commune
apponatur EX. totum igitur AX æquale est gnomoni $\Phi Y \Psi$.
sed $\Phi Y \Psi$ gnomon est æqualis C. ergo & AX ipsi C erit æ-
quale. ad datam igitur rectam lineam AB dato rectilineo
c æquale parallelogrammum applicatum est AX, excedens
figura parallelogramma PO, ipsi P simili, quoniam & ipsi EL
simile est OP. Quod fecisse oportebat.



b 25. hujus.


c 21. hujus.
d 26. hujus.

PROP. XXX. PROBL.

*Datam rectam lineam terminatam extrema ac media
ratione secare.*

Sit data recta linea terminata AB oportet ipsum AB ex-
trema ac media ratione secare. Describatur a ex AB qua- 46. primi.
dratum BC, & ad AC ipsi BC æquale parallelogrammum
b applicetur CD, excedens c figura AD ipsi BC simili. qua- b 29. hujus.
dratum autem est BC, ergo & AD quadratum erit. & quo-
niam BC est æquale CD; commune auferatur CE. reliquum
igitur BF reliquo AD est æquale. est autem & ipsi æqui-
angulum. ergo ipsorum BF AD latera quæ circum æquales
K 4 angulos

c 14. hujus. Angulos reciproce sunt *c* proportionalia. ut igitur FE ad ED, ita est AE ad EB. est
d 34. primi. autem FE æqualis *d* AC, hoc est ipsi AB; & ED ipsi AE. quare ut BA ad AE, ita AE ad EB. sed AB major est quam AE. ergo AE quam EB est *c* major. recta igitur linea AB extrema, ac media ratione secta est in E. & majus ipsius segmentum est AE. Quod facere oportebat.




Aliter. Sit data recta linea AB, oportet ipsam AB extrema ac media ratione secare. Secetur enim AB in C, ita ut
f 11. secundum. rectangulum *f* quod continetur sub AB BC æquale sit quadrato ex AC. quoniam igitur rectangulum sub AB BC æquale *g* est quadrato ex AC, erit ut BA ad AC ita AC ad CB. ergo AB recta linea extrema ac media ratione secta est. Quod facere oportebat.

PROP. XXXI. THEOR.

In rectangulis triangulis figura quæ fit à latere rectum angulum subtendente, æqualis est eis quæ à lateribus rectum angulum continentibus fiunt, similibus, & similiter descriptis.

Sit triangulum rectangulum ABC, rectum habens angulum BAC. dico figuram, quæ fit ex BC æqualem esse eis quæ ex BA AC fiunt similibus, & similiter descriptis. ducatur perpendicularis AD. Quoniam igitur in triangulo rectangulo ACB ab angulo recto, qui est ad A, ad BC basin perpendicularis ducta est AD, erunt *a* triacula ABD ADC quæ sunt ad perpendicularem similia toti ABC, & inter se. & quoniam simile est ABC triangulum triangulo ABD, erit ut *a* CB ad BA, ita BA ad BD. quod cum tres rectæ lineæ proportionales sint, ut prima ad tertiam, ita erit *b* figura quæ fit ex prima ad eam quæ ex secunda, similem, & similiter descriptam. ut igitur CB ad BD, ita figura quæ fit ex CB ad eam quæ ex BA, similem & similiter descriptam. eadem ratione, & ut BC ad CD, ita figura quæ fit ex BC ad eam quæ ex CA. quare & ut BC ad ipsas,



a 8. hujus.


b Cor. 20. hujus.

ipsas BD BC , ita figura quæ ex BC ad eas quæ ex BA AC , ^{c 24. quati.} similes, & similiter descriptas. æqualis autem est BC ipsis BD DC . ergo figura quæ fit ex BC æqualis est eis quæ ex BA AC fiunt, similibus, & similiter descriptis. in rectangulis igitur triangulis, figura quæ fit à latere rectum angulum subtendente, æqualis est eis quæ à lateribus rectum angulum continentibus fiunt, similibus, & similiter descriptis. Quod ostendere oportebat.

PROP. XXXII. THEOR.

Si duo triangula componantur ad unum angulum, quæ duo latera duobus lateribus proportionalia habeant, ita ut homologa latera ipsorum etiam sint parallela, reliqua triangulorum latera in directum sibi ipsis constituta erunt.

Sint duo triangula ABC DCE quæ duo latera BA AC duobus lateribus CD DE proportionalia habeant, scil. sit sicut BA ad AC , ita CD ad DE ; parallela autem sit AB ipsi DC & AC ipsi DE . dico BC ipsi CE in directum esse. Quoniam enim AB parallela est DC , & in ipsas incidit recta linea AC ; erunt ^a anguli alterni BAC ACD æquales inter se. eadem ratione, & angulus CDE æqualis est angulo ACD . quare & BAC ipsi CDE est æqualis. & quoniam duo triangula sunt ABC DCE , unum angulum ad A , uni angulo ad D æqualem habentia, circum æquales autem angulos latera proportionalia, quod sit ut BA ad AC , ita CD ad DE ; erit ^b triangulum ABC triangulo DCE ^{b 6. hujus.} æquiangulum. ergo ABC angulus est æqualis angulo DCE . ostensus autem est & angulus ACD æqualis angulo BAC . totus igitur ACE duobus ABC BAC est æqualis. communis apponatur ACB . ergo anguli ACE ACB angulis BAC ACB CBA æquales sunt. sed BAC ACB CBA anguli duobus rectis sunt æquales. & anguli igitur ACE ACB duobus rectis æquales erunt. itaque ad quandam rectam lineam AC , & ad punctum in ipsa C , duæ rectæ lineæ BC CE non ad easdem partes positæ, angulos qui deinceps sunt ACE ACB duobus rectis æquales efficiunt. ergo BC ipsi CE in directum erit. Si igitur duo triangula componantur ad unum angulum quæ duo latera duobus lateribus proportionalia habeant



^a 29. primi.

^b 6. hujus.


^c 14. primi

ant, ita ut homologa latera ipsorum etiam sint parallela; reliqua triangulorum latera in directum sibi ipsis constituta erunt. Quod demonstrare oportebat.

PROP. XXXIII. THEOR.

In circulis æqualibus anguli eandem habent proportionem, quam circumferentiæ quibus insistant, siue ad centra, siue ad circumferentias insistant: adhuc autem & sectores, quippe qui ad centra sunt constituti.

Sint æquales circuli ABC DEF; & ad centra quidem ipsorum G H sint anguli BGC EHF, ad circumferentias vero anguli BAC EDF. dico ut circumferentia BC ad EF circumferentiam, ita esse & BGC angulum ad angulum EHF, & angulum BAC ad angulum EDF: & adhuc sectorem BGC ad EHF sectorem. ponantur enim circumferentiæ quidem BC æquales quotcumque deinceps CK KL; circumferentiæ vero EF, rursus æquales quotcumque FM MN. & jungantur GK GL HM HN. Quoniam igitur circumferentiæ BC CK KL inter se sunt æquales, & anguli





27. tertii.

BGC CGK KGL inter se æquales erunt. quotuplex igitur est circumferentia BL circumferentiæ BC, totuplex est & BGL angulus anguli BGC. eadem ratione & quotuplex est circumferentia NE circumferentiæ EF, totuplex & EHN angulus anguli EHF. si vero æqualis est BL circumferentia circumferentiæ EN; & angulus BGL angulo EHN erit æqualis; & si circumferentia BL major est circumferentia EN, major erit & BGL angulus angulo EHN; & si minor, minor. quatuor igitur existentibus magnitudinibus, duabus nimirum circumferentiis BC EF, & duobus angulis BGC EHF; sumptæ sunt circumferentiæ quidem BC, & BGC anguli æque multiplicia, videlicet circumferentia BL & BGL angulus; circumferentiæ vero EF, & EHF anguli æque multiplicia, nempe circumferentia EN, & angulus EHN. atque ostensum est si circumferentia BL superat circumferentiam EN, & BGL angulum superare angulum EHN; & si æqualis, æqualem; & si minor, minorem esse. ut igitur circumferentia BC ad EF circumferentiam, ita angulus BGC ad angulum EHF. sed ut BGC angulus ad angulum EHF, ita angulus

6 Def. 5.
quinti.

angulus BAC ad EDF angulum. uterque enim utriusque
est duplex. & ut igitur BC circumferentia ad circumferen-
tiam EF, ita & angulus BGC ad angulum EHF, & angulus
BAC ad EDF angulum. quare in circulis æqualibus anguli
eandem habent proportionem quam circumferentiæ qui-
bus insunt, sive ad centra, sive ad circumferentias in-
sistant. dico insuper & ut BC circumferentia ad circumfe-
rentiam EF, ita esse sectorem GBC ad HFE sectorem. Jun-
gantur enim BC CK, & sumptis in circumferentiis BC CK
punctis XO, jungantur & BX XC CO OK. itaque quoniam
duæ BG GC duabus CG GK æquales sunt, & angulos æqua-
les continent; erit & basis

BC basi CK æqualis. æquale
igitur est GBC triangulum
triangulo GCK. & quoniam
circumferentia BC circum-
ferentiæ CK est æqualis, &
reliqua circumferentia quæ
complet totum circulum AB-



c æqualis est reliquæ quæ eundem circulum complet. quare
& angulus BXC angulo COX est æqualis. similiter igitur est B-
XC segmentum segmento COX; & sunt in æqualibus rectis
lineis BG CK. quæ autem in æqualibus rectis lineis similia cir-
culorum segmenta, & inter se æqualia sunt. ergo segmentum

BXC est æquale segmento COX. est autem & BGC triangu-
lum triangulo CGK æquale. & totus igitur sector BGC sectori
CGK æqualis erit. Eadem ratione & GKL sector utrique ipso-
rum GBC GCK est æqualis. tres igitur sectores BGCCGCKGKL

æquales sunt inter se. similiter & sectores HEF HFH FMH MN
inter se sunt æquales. quoduplex igitur est LB circumferen-
tia circumferentiæ BC, totuplex est & GBL sector sectoris
GBC. eadem ratione & quoduplex est circumferentia NE

circumferentiæ EF, totuplex est & HEN sector sectoris
HEF. Sed si circumferentia BL circumferentiæ EN est æ-
qualis, & sector BGL æqualis est sectori ENH; & si circum-
ferentia BL superat circumferentiam EN, superat & BGL

sector sectorem ENH; & si minor, minor. quatuor igitur
existentibus magnitudinibus, duabus quidem BC EF cir-
cumferentiis, duobus vero sectoribus GBC EHF, sumpta
sunt æque multiplicia circumferentiæ quidem BC & GBC

sectoris, circumferentia BL, & GBL sector. circumferentiæ
vero EF, & sectoris HEF æque multiplicia, circumferentia
EN, & HEN sector, atque ostensum est si BL circumferen-
tia superat circumferentiam EN, & sectorem BGL superare
sectorem ENH; & si æqualis, æqualem esse; & si minor,
minorem.

c 4 primi.

f 24. tertii.


minorem. est igitur ut BC circumferentia ad circumferentiam EF , ita sector GBC ad HEF sectorem. Quod ostendere oportebat.

COROLL.

1. Angulus ad centrum est ad quatuor rectos, ut arcus cui insistit ad totam circumferentiam: nam ut angulus BAC ad rectum, ita BC arcus ad circuli quadrantem; quare quadruplicando consequentes, erit angulus BAC ad quatuor rectos, ut arcus BC ad totam circumferentiam.

2. Inæqualium circularum arcus IL BC qui æquales subtendant angulos, five ad centra, five ad peripherias, sunt similes. Nam est IL ad totam peripheriam ILE , ut angulus IAL ad quatuor rectos: est vero ut IAL seu BAC ad quatuor rectos, ita arcus BC ad totam peripheriam BCF . quare ut IL ad totam peripheriam ILE , ita BC ad totam peripheriam BCF . ac proinde arcus IL BC sunt similes.

3. Dux semidiametri AB AC à concentricis peripheriis arcus auferunt similes IL BC .



EUCLIDIS

ELEMENTORUM

LIBER UNDECIMUS.

DEFINITIONES.

I.

Solidum est, quod longitudinem, latitudinem & crassitudinem habet.

II.

Solidi terminus est superficies.

III.

Recta linea ad planum recta est, quando ad omnes rectas lineas quæ ipsam contingunt, & in subjecto sunt plano, rectos angulos efficit.

IV.

Planum ad Planum rectum est, cum rectæ lineæ quæ communi planorum sectioni ad rectos angulos in uno plano ducuntur, alteri plano ad rectos sunt angulos.

V.

Rectæ lineæ ad planum inclinatio est, cum à sublimi termino rectæ illius lineæ ad planum deducta fuerit perpendicularis; atque à puncto quod perpendicularis in ipso plano effecerit, ad propositæ illius lineæ extremum, quod in eodem est plano, altera recta linea fuerit adjuncta; est, inquam, angulus acutus insistente linea, & adjuncta comprehensus,

VI.

VI.

Plani ad planum inclinatio est, angulus acutus rectis lineis contentus, quæ in utroque planorum ad idem communis sectionis punctum ductæ, rectos cum sectione angulus efficiunt.

VII.

Planum ad planum similiter inclinari dicitur, atque alterum ad alterum, cum dicti inclinationum anguli inter se fuerint æquales.

VIII.

Parallela plana sunt, quæ inter se non conveniunt.

IX.

Similes solidæ figuræ sunt, quæ similibus planis continentur, multitudine æqualibus.

X.

Æquales & similes solidæ figuræ sunt, quæ similibus planis multitudine & magnitudine æqualibus continentur

XI.

Solidus angulus est, plurium quàm duarum linearum quæ se mutuo contingunt, nec in eadem sunt superficie, ad omnes lineas inclinatio. Vel solidus angulus est, qui pluribus quàm duobus planis angulis in eodem non consistentibus plano, sed ad unum punctum constitutis continetur.

XII.

Pyramis est figura solida planis comprehensa, quæ ab uno plano ad unum punctum constituuntur.

XIII.

Prisma est figura solida quæ planis continetur, quorum adversa duo sunt & æqualia & similia, & parallela; alia vero parallelogramma.

XIV.

Sphæra est, quando semicirculi manente diametro, circumductus semicirculus in seipsum rursus revolvitur unde moveri coeperat, circum assumpta figura.

XV.

XV.

Axis autem sphaeræ est quiescens illa recta linea, circum quam semicirculus convertitur.

XVI.

Centrum sphaeræ est idem quod & semicirculi.

XVII.

Diameter autem sphaeræ est recta quædam linea per centrum ducta, & utrinque à sphaeræ superficie terminata.

XVIII.

Conus est, quando rectanguli trianguli manente uno latere eorum quæ circa rectum angulum, circumductum triangulum in seipsum rursus revolvitur, unde moveri coeperat, circum assumpta figura. Atque si quiescens recta linea æqualis sit reliquæ quæ circa rectum angulum continetur, orthogonius erit conus: si vero minor, amblygonius: si vero major, oxygonius.

XIX.

Axis autem conici est quiescens illa linea, circa quam triangulum vertitur.

XX.

Basis vero conici est circulus qui à circumducta recta linea describitur.

XXI.

Cylindrus est, quando rectanguli parallelogrammi manente uno latere eorum quæ circa rectum angulum, circumductum parallelogrammum in seipsum rursus revolvitur, unde coeperat moveri, circum assumpta figura.

XXII.

Axis autem cylindri est quiescens illa recta linea, circum quam parallelogrammum convertitur.

XXIII.

Bases vero cylindri sunt circuli à duobus adversis lateribus, quæ circumaguntur, descripti.

XXIV.

Similes conici & cylindri sunt, quorum & axes, & basium diametri proportionales sunt.

XXV.

XXV.

Cubus est figura solida sub sex quadratis æqualibus contenta.

XXVI.

Tetraedrum est figura solida sub quatuor triangulis æqualibus & æquilateris contenta.

XXVII.

Octaedrum est figura solida sub octo triangulis æqualibus & æquilateris contenta.

XXVIII.

Dodecaedrum est figura solida sub duodecim pentagonis æqualibus, & æquilateris, & æquiangularis contenta.

XXIX.

Icosaedrum est figura solida sub viginti triangulis æqualibus, & æquilateris contenta.


XXX.

Parallelippihedum est figura solida sex figuris quadrilateris, quarum quæ ex adverso parallelæ sunt, contenta.

PROPOSITIO I. THEOREMA.

Rectæ lineæ pars quædam non est in subjecto plano, quædam vero in sublimi.

Si enim fieri potest, rectæ lineæ AB pars quidem AB sit in subjecto plano, pars vero BC in sublimi. erit recta linea quædam ipsi AB in directum continuata in subjecto plano. sitque DB . duabus igitur datis rectis lineis ABC ABD commune segmentum est AB , quod fieri non potest: recta enim linea cum recta linea non convenit in pluribus punctis, quam uno. Non igitur rectæ lineæ pars quædam est in subjecto plano, quædam vero in sublimi. Quod demonstrare oportebat.




PROP.

PROP. II. THEOR.

Si due rectæ lineæ se invicem secant, in uno sunt plano, & omne triangulum in uno plano consistit.

Due enim rectæ lineæ $ABCD$ se invicem in puncto E secant. dico ipsas $ABCD$ in uno esse plano, & omne triangulum in uno plano consistere. Sumentur enim in ipsis $EBEC$ quævis puncta FG ; junganturque $CBFG$, & FH GK ducantur. dico primum EBC triangulum consistere in uno plano. si enim trianguli EBC pars quædam FHC , vel GBK in subiecto plano est, reliqua vero in alio plano; erit & linearum $EBEC$ pars in subiecto plano, & pars in alio. quod si trianguli ECB pars $FCBG$ fit in subiecto plano, reliqua vero in alio, utrarumque rectarum linearum EC EB quædam pars erit in subiecto plano, quædam vero in alio: quod absurdum esse ostendimus. triangulum igitur EBC in uno est plano. in quo autem plano est BCE triangulum, in hoc est utraque ipsarum EC EB : in quo autem utraque ipsarum EC EB , in hoc & $ABCD$. Ergo rectæ lineæ $ABCD$ in uno sunt plano, & omne triangulum in uno plano consistit. Quod erat demonstrandum.




1. hujus.

PROP. III. THEOR.

Si duo plana se invicem secant, communis ipsorum sectio recta linea erit.

Duo plana $ABBC$ se invicem secant, communis autem ipsorum sectio sit DB linea. dico lineam DB rectam esse. si enim non ita sit, ducatur à puncto D ad B in plano quidem AB recta linea DEB ; in plano autem BC recta linea DFB . erunt utique duarum rectarum linearum DEB DFB iidem termini, & ipsæ spatium continebunt, quod est absurdum. non igitur DEB DFB rectæ lineæ sunt. similiter ostendemus neque aliam quampiam, quæ à puncto D ad B ducitur rectam esse, præter ipsam DB communem scilicet planorum AB BC sectionem. Si igitur duo plana se invicem secant, communis ipsorum sectio recta linea erit. Quod ostendere oportebat.



Axi. 10.


L

PROP.

PROP. IV. THEOR.

Si recta linea duabus rectis lineis se invicem secantibus in communi sectione ad rectos angulos insistat, etiam ducto per ipsas plano ad rectos angulos erit.

Recta linea quædam EF duabus rectis lineis AB CD se invicem secantibus in E puncto, ab ipso E ad rectos angulos insistat. dico EF etiam plano per AB CD ducto ad rectos angulos esse. Sumantur rectæ lineæ EA EB CE DE inter se æquales: perque E ducatur recta linea GEH utcunque: & jungantur AD CB; deinde à quovis puncto F ducantur FA FG FD FC FH FB. & quoniam duæ rectæ lineæ AE ED duabus rectis lineis CE EB æquales sunt, &



- a 15. primi. angulos æquales AED CEB continent, erit b AD basis basi
 b 4. primi. CB æqualis, & triangulum AED triangulo CEB æquale. ergo & angulus DAE æqualis est angulo ECB. est autem & angulus AEG æqualis angulo EBH. duo igitur triangula sunt AGE BEH, duos angulos duobus angulis æquales habentia, alterum alteri, & unum latus AE uni lateri EB æquale quod est ad æquales angulos. quare & reliqua latera reliquis lateribus æqualia habebunt c. ergo GE quidem est æqualis EH; AG vero ipsi BH. quod cum AE sit æqualis EB, communis autem, & ad rectos angulos FE; erit b basis AF basi FB æqualis; eadem quoque ratione & CF æqualis erit FD. præterea quoniam AD est æqualis CB, & AF ipsi FB, erunt duæ FA AD duabus FB BC æquales, altera alteri; & ostensa est basis DF æqualis basi FC. angulus d igitur FAD angulo FBC est æqualis. rursus ostensa est AG æqualis BH, sed & AF ipsi FB est æqualis. duæ igitur FA AG duabus FB BH æquales sunt, & angulus FAG æqualis est angulo FBH; ut demonstratum fuit, basis igitur GF basi FH est b æqualis. rursus quoniam GE ostensa est æqualis EH, communis autem EF; erunt duæ GEEF æquales duabus HE EF; & basis HF est æqualis basi FG. angulus d igitur GEF angulo HEF est æqualis, & idcirco rectus est uterque angulorum GEF HGF. ergo FE ad GH utcunque per E ductam rectos efficit angulos. similiter ostendemus FE etiam ad omnes rectas lineas, quæ ipsam contingunt, & in subiecto sunt plano, rectos angulos efficere. recta autem ad planum recta est c quando ad omnes rectas lineas ipsam contingentes,
- c 3. Def.


tingentes, & eodem existentes plano rectos efficit angulos. quare FE subjecto plano ad rectos angulos insistit. at subjectum planum est quod per ABCD rectas lineas ducitur. ergo FE ad rectos angulos erit ducto per ABCD plano. Si igitur recta linea duabus rectis lineis se invicem secantibus in communi sectione ad rectos angulos insistat, etiam ducto per ipsas plano ad rectos angulos erit. Quod demonstrare oportebat.

PROP. V. THEOR.

Si recta linea tribus rectis lineis sese tangentibus, in communi sectione, ad rectos angulos insistat, tres illæ rectæ lineæ in uno plano erunt.

Recta linea quædam AB tribus rectis lineis BC BD BE, in contactu B, ad rectos angulos insistat. dico BC BD BE in uno plano esse. Non enim, sed si fieri potest, sint BD BE quidem in subjecto plano; BC vero in sublimi, & planum per

AB BC producat. communem utique sectionem in subjecto plano faciet rectam lineam; faciat BF. in uno igitur sunt plano per AB BC ducto, tres rectæ lineæ AB BC BF. & quoniam AB utrique ipsarum BD BE ad rectos angulos insistit, & ducto per ipsas DB BE plano ad rectos angulos erit. planum autem per DB BE est subjectum planum. ergo AB ad subjectum planum recta est. quare & ad omnes rectas lineas ipsam contingentes, quæ in eodem plano sunt, rectos faciet angulos; sed ipsam tangit BF in subjecto existens plano. ergo angulus ABF rectus est. ponitur autem & ABC angulus rectus. æqualis igitur est angulus ABF angulo ABC, & in eodem sunt plano; quod fieri non potest. recta igitur linea BC non est in sublimi; quare tres rectæ lineæ BC BD BE in uno sunt plano. Si igitur recta linea tribus rectis lineis sese tangentibus, in communi sectione, ad rectos angulos insistat, tres illæ rectæ lineæ in uno plano erunt. Quod demonstrare oportebat.



a 3. hujus.

b 4. hujus.


c 3. Def.

PROP. VI. THEOR.

Si duæ rectæ lineæ eidem plano ad rectos angulos fuerint, illæ inter sese parallelæ erunt.

Duæ enim rectæ lineæ ABCD subjecto plano sint ad rectos angulos. dico AB ipsi CD parallelam esse. occurrant enim

Enim subiecto plano in punctis B D, jungaturque BD recta linea, cui ad rectos angulos in subiecto plano ducatur DE, & posita DE ipsi AB æquali, jungantur BE AE AD. Quoniam igitur AB recta est ad subiectum planum, & ad omnes rectas lineas quæ ipsam contingunt, & in subiecto sunt plano, rectos angulos efficit: contingit autem AB utraque ipsarum BD BE existens in subiecto plano. ergo uterque angulorum ABD ABE rectus est. eadem ratione rectus etiam est uterque ipsorum CDB CDE. & quoniam AB æqualis est ipsi DE, communis autem BD. erunt duæ AB BD duabus ED DB æquales, & rectos angulos continent; basis igitur AD basi BE est æqualis.




4. 3. Def. hujus. rursus quoniam AB est æqualis DE, & AD ipsi BE, duæ AB BE duabus ED DA æquales sunt, & basis ipsarum AE communis; ergo angulus ABE angulo EDA est æqualis. sed ABE rectus est rectus igitur & EDA; & idcirco ED ad DA est perpendicularis. sed & perpendicularis est ad utramque ipsarum BD DC. quare ED tribus rectis lineis BD DA DC in contactu ad rectos insistit angulos. tres igitur rectæ lineæ BD DA, DC in uno sunt plano. in quo autem sunt BD DA, in eo est AB, omne enim triangulum in uno est plano. ergo AB BD DC in uno plano sint necesse est: atque est uterque angulorum ABD BDC rectus. parallela igitur est AB ipsi CD. quare si duæ rectæ lineæ eidem plano ad rectos angulos fuerint, illæ inter se parallelæ erunt. Q. E. D.
6. 4. primi. 8. primi. 5. hujus. 2. hujus. 28. primi.

PROP. VII. THEOR.

Si duæ rectæ lineæ parallelæ sint, sumantur autem in utraque ipsarum quælibet puncta; quæ dicta puncta coniungit recta in eodem erit plano, in quo & parallelæ.

Sint duæ rectæ lineæ parallelæ AB CD, & in utraque ipsarum sumantur quælibet puncta EF. dico rectam lineam quæ puncta E F coniungit, in eodem plano esse, in quo sunt parallelæ. non enim, sed si fieri potest, sit in sublimi, ut EGF, & per EGF, planum ducatur quod



3. hujus. in subiecto plano sectionem faciet rectam lineam; faciat

ut EF. ergo duæ rectæ lineæ EGF EF spatium contine-
bunt, quod fieri non ^b potest. non igitur quæ à puncto E ad
F ducitur recta linea in sublimi est plano, quare erit in eo
quod per AB CD parallelas transit. Si igitur duæ rectæ li-
neæ parallelæ sint, &c. Quod oportebat demonstrare.

PROP. VIII. THEOR.


*Si duæ rectæ lineæ parallelæ sint, altera autem ipsa-
rum plano alicui sit ad rectos angulos, & reliqua ei-
dem plano ad rectos angulos erit.*

Sint duæ rectæ lineæ parallelæ AB CD, & altera ipsarum
AB subjecto plano sit ad rectos angulos. dico & reliquam
CD eidem plano ad rectos angulos esse. occurrant enim AB
CD subjecto plano in punctis B D, & BD jungatur. ergo AB
CD BD in uno sunt ^b plano. ducatur ipsi BD ad rectos angu-
los in subjecto plano DE: & ponatur DE ipsi AB æqualis:
junganturque BE AE AD. & quoniam AB perpendicularis
est ad subjectum planum, & ad omnes rectas lineas quæ
ipsam contingunt suntque in subjecto plano, perpendicu-
laris a erit. rectus igitur est uterque angulorum ABD ABE. ^a 3. Def.
quod cum in parallelas rectas lineas AB CD recta incidit
BD, erunt anguli ABD CDB duobus rectis ^b æquales. rectus
autem est ABD. ergo & CDB est rectus; ac propterea CD
perpendicularis est ad BD. & quoniam AB est æqualis DE,
communis autem BD, duæ AB BD duabus ED DB æquales
sunt; & angulus ABD est æqualis angulo EDB, rectus enim
uterque est, basis igitur AD basi BE est ^c æqualis. rursus
quoniam AB æqualis est DE, & BE ipsi AD; erunt duæ
AB BE duabus ED DA æquales, altera alteri; & basis ea-
rum communis AE. quare angulus ABE est ^d æqualis angulo
EDA. rectus autem est ABE. ergo & EDA est rectus, & ED
ad DA perpendicularis. sed & perpendicularis est ad BD.
ergo ED etiam ad planum per BD DA perpendicularis erit, ^e 4. hujus.
& ad omnes rectas lineas quæ in eodem existentes plano
ipsam contingunt, rectos f faciet angulos. at in plano per
BD DA est DC, quoniam in plano per BD DA sunt g AB g
BD: in quo autem sunt AB BD in eodem ^e est ipsa DC. quare
ED ipsi DC est ad rectos angulos: ideoque CD ad rectos
angulos est ipsi DE; sed & etiam ipsi DB. ergo CD duabus
rectis lineis DE DB se mutuo secantibus in communi sectio-
ne D ad rectos angulos insistit; ac propterea plano per DE
DB est ^e ad rectos angulos. planum autem per DE DB est
subjectum planum. ergo CD subjecto plano ad rectos angu-
los erit. Quod demonstrare oportebat.

PROP. IX. THEOR.

Quæ eidem rectæ lineæ sunt parallelæ, non existentes in eodem in quo ipsa plano, etiam inter se parallelæ erunt.

Sit utraque ipsarum AB CD parallelæ ipsi EF , non existentes in eodem, in quo ipsa plano. dico AB ipsi CD parallelam esse. sumatur in EF quodvis punctum G , a quo ipsi EF , in plano quidem per EF AB transeunte, ad rectos angulos ducatur GH ; in plano autem transeunti per EF CD , rursus ducatur ipsi EF ad rectos angulos GK . & quoniam EF ad utramque ipsarum GH GK est perpendi-




4. hujus. cularis, erit EF etiam ad rectos α angulos plano per GH GK transeunte. atque est EF ipsi AB parallelæ. ergo & AB plano per HGK ad rectos angulos β est. eadem ratione & CD plano per HGK est ad rectos angulos. utraque igitur ipsarum AB CD plano per HGK ad rectos angulos erit. Si autem duæ rectæ lineæ eidem plano ad rectos angulos fuerint, parallelæ ϵ erunt inter se. ergo AB ipsi CD est parallelæ. Quod demonstrare oportebat,
8. hujus.
6. hujus.

PROP. X. THEOR.

Si duæ rectæ lineæ sese contingentes, duabus rectis lineis sese contingentibus sint parallelæ, non autem in eodem plano; æquales angulos continebunt.

Duæ rectæ lineæ sese contingentes AB BC , duabus rectis lineis DE EF sese contingentibus sint parallelæ, non autem in eodem plano. dico angulum ABC angulo DEF æqualem esse. assumantur enim BA BC ED EF inter se æquales: & jungantur AD CF BE AC DF . quoniam igitur BA ipsi ED æqualis est & parallelæ, erit & AD æqualis & parallelæ ipsi BE . eadem ratione & CF ipsi BE æqualis & parallelæ erit. utraque igitur ipsarum AD CF ipsi BE æqualis est & parallelæ. quæ autem eidem rectæ lineæ sunt parallelæ, non existentes in eodem plano; & in-




33. primi.

ter se parallelæ ^b erunt. ergo AD parallela est ipsi CF & ^b 9. hujus. æqualis. atque ipsas conjungunt AC DF; & AC igitur ipsi DF æqualis est & ^c parallela. & quoniam duæ rectæ lineæ AB ^c 33. primi. BC duabus DE EF æquales sunt, & basis AC est æqualis basi DF; erit ^d angulus ABC angulo DEF æqualis. Si igitur ^d 8. primi. duæ rectæ lineæ sese contingentes, duabus rectis lineis sese contingentibus sint parallelæ, non autem in eodem plano; æquales angulos continebunt. Quod oportebat demonstrare.

PROP. XI. PROBL.

A dato puncto in sublimi, ad subjectum planum, perpendicularem rectam lineam ducere.

Sit datum quidem punctum in sublimi A, datum autem subjectum planum BH. oportet à puncto A ad subjectum planum perpendicularem rectam lineam ducere. In subjecto plano ducatur quædam recta linea utcunque BC, & à puncto A ad BC perpendicularis agatur, ^e AD. siquidem igitur AD perpendicularis sit etiam ad subjectum planum; factum jam erit, quod proponebatur: sin minus; ducatur à puncto D ipsi BC, in subjecto plano, ad rectos ^b angulos DE: & à puncto A ad DE perpendicularis ^e du- ^b 11. primi. catur AF. denique per F ducatur GH ipsi BC parallela. ^c 12. primi. Quoniam BC utrique ipsarum DA DE est ad rectos angulos, erit ^d & BC ad rectos angulos plano per ED DA transeunti. ^d 4. hujus. quin ipsi BG parallela est GH; si autem sint duæ rectæ lineæ parallelæ, quarum una plano alicui sit ad rectos angulos; & reliqua, eidem plano ad rectos angulos erit. quare & ^e 8. hujus. GH plano per ED DA transeunti ad rectos angulos est: ac propterea ad omnes rectas lineas, quæ in eodem plano existentes ipsam contingunt est ^f perpendicularis. contingit ^f 3. Def. autem ipsam AF existens in plano per ED DA. ergo GH perpendicularis est ad AF. & ob id AF. est perpendicularis ad GH: est autem AF ad DE perpendicularis. ergo AF perpendicularis est ad utramque ipsarum HG DE. si autem recta linea duabus rectis lineis sese contingentibus, in comuni sectione, ad rectos angulos insistat, etiam plano per ipsas ducto ad rectos angulos ^d erit. quare AF plano per ED GH ducto est ad rectos angulos. planum autem per ED GH est subjectum planum. ergo AF ad subjectum planum est perpendicularis. A dato igitur puncto sublimi A, ad




subjectum planum, perpendicularis recta linea ducta est AF.
Quod facere oportebat.

PROP. XII. PROBL.

Dato plano, à puncto quod in ipso datum est, ad rectos angulos rectam lineam constituere.


Sit datum quidem planum subjectum, punctum autem quod in ipso sit A. oportet à puncto A subjecto plano ad rectos angulos rectam lineam constituere. Intelligatur aliquod punctum sublime B, à quo ad subjectum planum agatur perpendicularis BC; & per A ipsi BC parallela ducatur AD. quoniam igitur duæ rectæ lineæ parallelæ sunt AD CB, una autem ipsarum BC subjecto plano est ad rectos angulos; & reliqua AD subjecto plano ad rectos angulos erit. Dato igitur plano à puncto quod in ipso est datum, ad rectos angulos recta linea constituta est. Quod facere oportebat.



PROP. XIII. THEOR.

Dato plano, à puncto quod in ipso est, duæ rectæ lineæ ad rectos angulos non constituentur ex eadem parte.

Si enim fieri potest, dato plano, à puncto quod in ipso est A, duæ rectæ lineæ AB AC ad rectos angulos constituentur ex eadem parte: & ducatur planum per BA AC, quod faciet sectionem per A in subjecto plano rectam lineam. faciat DAE. ergo rectæ lineæ AB AC DAE in uno sunt plano. & quoniam CA subjecto plano ad rectos angulos est, & ad omnes rectas lineas, quæ in subjecto plano existentes ipsam contingunt, rectos faciet angulos. contingit autem ipsam DAE, quæ est in subjecto plano. angulus igitur CAE rectus est. eadem ratione & rectus est BAE. ergo angulus CAE ipsi BAE est æqualis. & in uno sunt plano, quod fieri non potest. Non igitur dato plano, à puncto, quod in ipso est, duæ rectæ lineæ ad rectos angulos constituentur ex eadem parte. Quod oportebat demonstrare.




PROR.

PROP. XIV. THEOR.

Ad quæ plana, eadem recta linea est perpendicularis, ea parallela sunt.


Recta quædam linea AB ad utrumque ipsorum planorum CD EF sit perpendicularis. dico ea plana parallela esse. Si enim non ita sit, producta convenient inter se: conveniant, & communem sectionem faciant rectam lineam GH ; & in ipsa GH sumpto quovis puncto K , jungatur AK BK . Quoniam igitur AB perpendicularis est ad EF planum; erit & perpendicularis ad ipsam BK rectam lineam in plano EF producto existentem. quare angulus ABK rectus est, eadem ratione & BAK est rectus: ideoque trianguli ABK duo anguli ABK BAK duobus rectis sunt æquales, quod fieri non potest. non igitur plana CD EF 17. primi. producta inter se convenient. quare CD EF parallela sint necesse est. Ad quæ igitur plana, eadem recta linea est perpendicularis, ea parallela sunt. Quod demonstrare oportebat.



PROP. XV. THEOR.

Si duæ rectæ lineæ sese tangentes duabus rectis lineis sese tangentibus sint parallele, non autem in eodem plano; & quæ per ipsas transeunt plana parallela erunt.

Duæ rectæ lineæ sese tangentes AB BC , duabus rectis lineis sese tangentibus DE EF parallele sint, & non in eodem plano. dico plana quæ per AB BC , DE EF transeunt, si producantur, inter se non convenire. Ducatur à puncto B ad planum, quod per DE EF transit perpendicularis BG , quæ plano in puncto G occurrat, & per G ducatur ipsi quidem ED parallela GH ; ipsi vero EF parallela GK . itaque quoniam BG perpendicularis est ad planum per DE EF ; & ad omnes rectas lineas quæ ipsam contingunt, & in eodem sunt plano, rectos faciet angulos. 3. Def. contingit autem ipsam utraque earum GH GK , quæ sunt in eodem




- b* 19. primi. eodem plano. rectus igitur est uterque angulorum BGH BGK . & quoniam BA parallela est ipsi GH , anguli GBA BGH duobus rectis sunt *b* æquales. rectus autem est BGH . ergo & GBA rectus erit, ideoque GB ad BA est perpendicularis. eadem ratione & GB est perpendicularis ad BC . cum igitur recta linea BG duobus rectis lineis BA BC se invicem secantibus ad rectos angulos insistat; erit BG etiam ad planum per BA BC ductum *d* perpendicularis. atque est ad planum per DE EF perpendicularis. ergo BG perpendicularis est ad utrumque planorum quæ per AB BC , DE EF transeunt. Ad quæ vero plana eadem recta linea est perpendicularis, ea parallela *e* sunt. parallelum igitur est planum per AB BC plano per DE EF . Quare si duæ rectæ lineæ sese tangentes duabus rectis lineis sese tangentes sint parallelæ, non autem in eodem plano, & quæ per ipsas transeunt plana parallela erunt. Quod demonstrare oportebat.
- d* 4. hujus.
- e* 14. hujus.

PROP. XVI. THEOR.

Si duo plana parallela ab aliquo plano secentur, communes ipsorum sectiones parallelæ erunt.

Duo plana parallela $ABCD$ à plano aliquo $EFHG$ secantur; communes autem ipsorum sectiones sint EF GH . dico EF ipsi GH parallelam esse. Si enim non est parallela, productæ EF GH inter se convenient, vel ad partes FH , vel ad partes EG . producantur prius, ut FH , & convenient in K . quoniam igitur EFK est in plano AB , & omnia quæ in EFK sumuntur puncta in eodem plano erunt: unum autem punctum quæ sunt in EFK , est ipsum K punctum. ergo K est in plano AB . eadem ratione & K est in CD plano. ergo plana $ABCD$ producta inter se convenient. non convenient autem, cum parallela ponantur. non igitur EF GH rectæ lineæ productæ convenient ad partes FH . similiter demonstrabimus neque ad partes EG convenire, si producantur. quæ autem neutra ex parte convenient parallelæ sunt. ergo EF ipsi GH est parallela. Si igitur duo plana parallela ab aliquo plano secentur, communes ipsorum sectiones parallelæ erunt. Quod demonstrare oportebat.




PROP.

PROP. XVII. THEOR.

Si duæ rectæ lineæ à parallelis secantur planis, in easdem proportiones secabuntur.

Duæ rectæ lineæ $ABCD$ à parallelis planis $GHKL MN$ secantur in punctis $AEBCFD$. dico ut AE recta linea ad ipsam EB , ita esse CF ad FD . Jungantur enim $ACBDAD$: & occurrat AD plano KL in puncto X : & $EXXF$ jungantur. Quoniam igitur duo plana parallela $KL MN$ à plano $EBDX$ secantur, communes ipsorum sectiones $EXBD$ parallelæ sunt. eadem ratione quoniam duo plana parallela $GHKL$ à plano $AXFC$ secantur, communes ipsorum sectiones $ACFX$ sunt parallelæ. & quoniam unilaterum trianguli ABD , videlicet ipsi BD parallela ducta est EX , ut AE ad EB ita AX ad XD . rursus quoniam unilaterum trianguli ADC , nempe ipsi AC parallela ducta est XF , erit ut AX ad XD , ita CF ad FD . ostensum autem est ut AX ad XD , ita esse AE ad EB . ut igitur AE ad EB , ita est CF ad FD . Quare si duæ rectæ lineæ à parallelis secantur planis, in easdem proportiones secabuntur. Quod demonstrare oportebat.



16. hujus.


2. sexti.

11. quinti.

PROP. XVIII. THEOR.

Si recta linea plano alicui sit ad rectos angulos, & omnia quæ per ipsam transeunt plana eidem plano ad rectos angulos erunt.

Recta linea quædam AB subjecto plano sit ad rectos angulos. dico & omnia plana quæ per ipsam AB transeunt, subjecto plano ad rectos angulos esse. Producat enim per AB planum DE , sitque plani DE , & subjecti plani communis sectio CE : & sumatur in CE quodvis punctum F ; à quo ipsi CE ad rectos angulos, in DE plano, ducatur FG . quoniam igitur AB ad subjectum planum est perpendicularis; & ad omnes rectas lineas, quæ ipsam contingunt & in eodem sunt plano perpendicularis erit. quare




3. Def. etiam

etiam ad CE est perpendicularis. angulus igitur ABF rectus est: sed & GFB est rectus. ergo AB parallela est ipsi FG .

est autem AB subiecto p.^lno ad rectos angulos. & FG igitur eidem plano ad rectos angulos ϵ rit. at planum ad planum rectum est, quando communi planorum sectioni ad rectos angulos ductæ rectæ lineæ in uno planorum, reliquo plano ad rectos angulos ϵ int: at communi planorum sectioni CE in uno plano DE ad rectos angulos ducta FG , ostensa est subiecto p.^lno ad rectos esse angulos ergo planum DE rectum est ad subiectum planum.

similiter demonstrabuntur & omnia quæ per AB transeunt plana subiecto plano recta esse. Si igitur recta linea plano alicui sit ad rectos angulos, & omnia quæ per ipsam transeunt plana eidem plano ad rectos angulos erunt. Quod oportebat demonstrare.



§ 8. hujus.


§ 4. Def. hujus.

PROP. XIX. THEOR.

Si duo plana se invicem secantia plano alicui sint ad rectos angulos, & communis ipsorum sectio eidem plano ad rectos angulos erit.

Duo plana se invicem secantia AB BC subiecto plano sint ad rectos angulos: communis autem ipsorum sectio sit BD . dico BD subiecto plano ad rectos angulos esse. Non enim, sed si fieri potest; non sit BD ad rectos angulos subiecto plano; & à puncto D ducatur in plano quidem AB , ipsi AD rectæ lineæ ad rectos angulos DE : in plano autem BC ducatur ipsi CD ad rectos angulos DF . Et quoniam planum AB ad subiectum planum rectum

est, & communi ipsorum sectioni AD ad rectos angulos in plano AB ducta est DE , erit DE ad subiectum planum perpendicularis. similiter ostendemus & DF perpendicularem esse ad subiectum planum. quare ab eodem puncto D subiecto plano duæ rectæ lineæ ad rectos angulos constitutæ



§ 4. Def.

§ 13. hujus. sunt ex eadem parte, quod fieri non ϵ potest non igitur subiecto plano à puncto D ad rectos angulos constituantur aliæ rectæ lineæ, præter ipsam DB , communem planorum


AB BC

AB BC sectionem. quare DB subjecto plano est perpendicularis. Ergo si duo plana se invicem secantia plano alicui sint ad rectos angulos, & communis ipsorum sectio eidem plano ad rectos angulos erit. Quod oportebat demonstrare.

PROP. XX. THEOR.

Si solidus angulus tribus angulis planis contineatur, duo quilibet reliquo majores sunt, quomodocunque sumpti.

Solidus angulus ad A tribus angulis planis BAC CAD DAB contineatur. dico angulorum BAC CAD DAB duos quolibet reliquo majores esse, quomodocunque sumptos. Si enim BAC CAD DAB anguli inter se æquales sint, perspicuum est duos quolibet reliquo majores esse, quomodocunque sumptos. Sin minus, sit major BAC. & ad rectam lineam AB, & ad punctum in ipsa A, con-



stituatur a angulo DAB, in plano per BA AC transeunte, æqualis angulus BAE; ponaturque ipsi AD æqualis AE; & per E ducta BEC secet rectas lineas AB AC in punctis EC, & DB DC jungantur. itaque quoniam DA est æqualis AE, communis autem AB, duæ DA AB æquales sunt duabus AE AB; & angulus DAB æqualis est angulo BAE. basis igitur DB basi BE est æqualis. & quoniam duæ DB DC ipsa EC majores sunt, quarum DB æqualis ostensa est ipsi BE; erit reliqua DC quam reliqua EC major. quod cum DA sit æqualis AE, communis autem AC & basis DC major basi EC; erit angulus DAC angulo EAC major. sed ex constructione est DAB angulus æqualis ipsi BAE. quare DAB DAC anguli, angulo BAC majores sunt. similiter demonstrabimus, & si duo quilibet alii sumantur, eos reliquo esse majores. Si igitur solidus angulus tribus angulis planis contineatur; duo quilibet reliquo majores sunt, quomodocunque sumpti. Quod demonstrare oportebat.

PROP. XXI. THEOR.

Omnis solidus angulus, minoribus quam quatuor rectis angulis planis continetur.

Sit solidus angulus ad A, planis angulis BAC CAD DAB

con-

contentus. dico angulos BAC CAD DAB quatuor rectis esse minores. Sumantur enim in unaquaque ipsarum AB AC AD quævis puncta B C D , & BC CD DB jungantur. Quo-

* 20. hujus.


nilibet reliquo majores sunt : anguli igitur CBA ABD , an-

gulo CBD sunt majores. eadem ratione, & anguli quidem BCA ACD majores sunt

angulo BCD ; anguli vero CDA ADB majores angulo CDB . quare sex anguli CBA ABD BCA ACD ADC ADB tribus

* 32. primi.

angulis CBD BCD CDB sunt majores. sed tres anguli CBD BDC DCB sunt α æquales duobus rectis. sex igitur anguli CBA ABD BCA ACD ADC ADB duobus rectis majores sunt. quod cum singulorum triangulorum ABC ACD ADB tres anguli sint æquales duobus rectis, erunt trium triangulorum novem anguli CBA ACB BAC ACD DAC CDA ADB DBA BAD æqualis sex rectis. quorum sex anguli ABC BCA ACD CDA ADB DBA duobus rectis sunt majores. reliqui igitur BAC CAD DAB tres anguli, qui solidum continent angulum, quatuor rectis minores erunt. Quare omnis solidus angulus, minoribus quam quatuor rectis angulis planis continetur. Quod oportebat demonstrare.



PROP. XXII. THEOR.

Si sint tres anguli plani, quorum duo reliquo sint majores, quomodocunque sumpti, contineant autem ipsos rectæ lineæ æquales; fieri potest, ut ex iis quæ rectas æquales conjungunt, triangulum constituatur.

Sint dati tres anguli plani ABC DEF GHC , quorum duo reliquo sint majores, quomodocunque sumpti: contineant autem ipsos æquales rectæ lineæ AB BC DE EF GH HK , & AC DF GK jungantur. dico fieri posse ut ex æqualibus ipsis AC DF GK triangulum constituatur: hoc esse duas reliqua majores esse quomodocunque sumptas. Si igitur anguli ad


* 4. primi.

ad B E H sint æquales, & AC DF GK æquales, α erunt, & duæ reliquæ majores. sin minus, sint inæquales anguli ad

* 24. primi.

ad E H . major igitur est & β recta linea AC utraque ipsarum DF GK . & manifestum est ipsam AC unâ cum altera ipsarum DF GK , reliqua esse majorem. dico & DF GK ipsa AG majores

maiores esse. constituatur $\therefore$ ad rectam lineam AB , & ad punctum in ea B , angulo $G HK$ æqualis angulus ABL , & uni




ipsarum $AB BC DE EF GH HK$ ponatur æqualis BL , & $AL CL$ jungantur. Quoniam igitur duæ $AB BL$ duabus $GH HK$ æquales sunt, altera alteri, & angulos æquales continent; erit basis AL basi GK æqualis. & quoniam anguli ad $E H$, angulo ABC majores sunt, quorum angulus $G HK$ est æqualis ipsi ABL ; erit reliquus qui ad E , angulo LBC major. quod cum duæ $LB BC$ duabus $DE EF$ æquales sunt, altera alteri; & angulus DEF angulo KBC major; basis DF basi LC major $\therefore$ erit. ostensa est autem GK æqualis AL . $\therefore$ 24. primi. ergo $DF GK$ ipsis $AL LC$ sunt majores; sed $AL LC$ majores sunt ipsa AC . multo igitur $DF GK$, ipsa AC majores erunt. quare rectarum linearum $AC DF GK$ duæ reliqua majores sunt quomodocunque sumptæ; ac propterea fieri potest ut ex æqualibus ipsis $AC DF GK$ triangulum constituatur. Quod oportebat demonstrare.

PROP. XXIII. PROBL.



Ex tribus angulis planis, quorum duo reliqui sint majores, quomodocunque sumpti, solidum angulum constituere. oportet autem tres angulos quatuor rectis esse minores.

Sint dati tres anguli plani $ABC DEF GHK$, quorum duo reliqui sint majores, quomodocunque sumpti, sintque tres



anguli quatuor rectis minores. oportet ex æqualibus ipsis $ABC DEF GHK$ solidum angulum constituere. abscindantur æquales $AB BC DE EF GH HK$; & $AC DF GK$ jungantur. fieri

fieri igitur potest ut ex æqualibus ipsis $ACDFGK$ consti-
 tuatur α triangulum. Itaque β constituatur LMN , ita ut AC
 quidem sit æqualis LM , DF vero ipsi MN : & præterea GK
 ipsi LN , & circa LMN triangulum circulus LMN ϵ descri-
 batur: sumaturque ipsius centrum X , quod vel erit in-
 tra triangulum LMN , vel in uno ejus latere, vel extra.
 sit primo intra: & $LXMXNX$ jungantur. dico AB
 majorem esse ipsa LX .
 si enim non ita sit, vel
 AB erit æqualis LX ,
 vel ea minor. sit pri-
 mo æqualis. quoni-
 am igitur AB est æ-
 qualis LX , atque est
 AB ipsi BC æqualis;
 erit LX æqualis BC ,
 est autem LX æqualis




XM . duæ igitur $ABBC$ duabus $LXXM$ æquales sunt, al-
 tera alteri; & AC basis basi LM æqualis ponitur. quare
 α angulus ABC angulo LXM est æqualis: eadem ratione &
 angulus quidem DEF est æqualis angulo MXN , angulus
 vero GHK angulo NXL . tres igitur anguli $ABCDEFCHK$
 tribus $LXM MXN NXL$ æquales sunt. sed tres $LXM MXN$
 NXL quatuor rectis sunt: æquales. ergo & tres $ABCDEF$
 CHK æquales erunt quatuor rectis. atqui ponuntur quatuor
 rectis minores, quod est absurdum. non igitur AB ipsi LX
 est æqualis. dico præterea neque AB minorem esse ipsa LX
 si enim fieri potest, sit minor, & ponatur ipsi quidem AB
 æqualis XO , ipsi vero BC æqualis XP , & OP jungatur. quo-
 niam igitur AB est æqualis BC , & XO ipsi XP æqualis erit.
 ergo & reliqua OL reliquæ PM est æqualis; ac propterea
 LM parallela f est ipsi OP ; & LMX triangulum triangulo
 OPX æquiangulum. est g igitur ut XL ad LM , ita XO ad
 OP ; & permutando ut XL ad XO , ita LM ad OP . major
 autem est LX , quam XO . ergo & LM quam OP est major.
 sed LM posita est æqualis AC . & AC igitur quam OP ma-
 jor erit. itaque quoniam duæ rectæ lineæ $ABBC$ duabus
 $OXXP$ æquales sunt, & basis AC major basi OP ; erit β an-
 gulus ABC angulo OPX major. similiter demonstrabimus
 & DEF angulum majorem esse angulo MXN , & angulum
 GHK angulo NXL . tres igitur anguli $ABCDEFCHK$ tri-
 bus $LXM MXN NXL$ sunt majores. at anguli $ABCDEF$
 CHK quatuor rectis minores ponuntur. multo igitur anguli
 $LXM MXN NXL$ minores erunt quatuor rectis. sed & æ-
 quales. quod est absurdum. non igitur AB minor est, quam

LX. ostensum autem est neque esse æqualem. ergo major sit
 necesse est. constituatur κ à puncto X circuli LMN plano ad κ 12. hujus.
 rectos angulos XR. & excessui quo quadratum ex AB su-
 perat quadratum ex LX, ponatur æquale quadratum quod
 sit ex RX, & RL RM RN jungantur. quoniam igitur RX
 perpendicularis est ad planum DMN circuli, & ad unam-
 quamque ipsarum LX MX NX erit perpendicularis. & 13. Def.
 quoniam LX est æqualis XM, communis autem & ad rectos
 angulos XR, erit basis LR æqualis basi RM. eadem ratione 4. primi.
 & RN utrique ipsarum RL RM est æqualis. tres igitur
 rectæ lineæ RL RM RN inter se æquales sunt. & quoniam
 quadratum XR ponitur æquale excessui, quo quadratum ex
 AB superat quadratum ex LX; erit quadratum ex AB qua-
 dratis ex LX XR æquale. quadratis autem ex LX XR
 æquale est quadratum ex RL; rectus enim angulus est
 LXR. ergo quadratum ex AB quadrato ex RL æquale erit;
 ideoque AB ipsi RL est æqualis. sed ipsi quidem AB æqua-
 lis est unaquæque ipsarum BC DE EF GH HK: ipsi vero
 RL æqualis utraque ipsarum RM RN. unaquæque igitur
 ipsarum AB BC DE EF GH HK unicuique ipsarum RL RM
 RN est æqualis. quod cum duæ RL RM duabus AB BC
 æquales sint, & basis LM ponatur æqualis basi AC: erit
 angulus LRM æqualis angulo ABC. eadem ratione & an- 8. primi.
 gulus quidem MRN angulo DEF, angulus autem LRN an-
 gulo GHK est æqualis. ex tribus igitur angulis planis LRM
 MRN LRN, qui æquales sunt tribus datis ABC DEF GHK
 solidus angulus constitutus est ad R.

Sed sit centrum circuli in uno laterum trianguli, vide-
 licet in MN, quod sit X, & XL jungatur. dico rursus AB

majorem esse ipsa LX.
 si enim non ita sit,
 vel AB est æqualis LX
 vel ipsa minor. sit
 primo æqualis. duæ
 igitur AB BC, hoc
 est DE EF duabus MX
 XL, hoc est ipsi MN
 æquales sunt. sed MN
 ponitur æqualis DF.

ergo DE EF ipsi DF sunt æquales. quod fieri non potest,
 non igitur AB est æqualis LX. similiter neque minor. multo
 enim magis id quod fieri non potest sequeretur. ergo AB
 ipsa LX major est. & similiter si excessui quo quadratum ex
 AB superat quadratum ex LX æquale ponatur quadratum







ex RX , & ipsa RX circuli plano ad rectos angulos constituitur, fiet problema.

Sed fit centrum circuli extra triangulum LMN , quod fit X , & LX MX NX jungantur. dico & sic AB ipsa LX maiorem esse. Si enim non ita fit, vel æqualis est, vel minor. fit primo æqualis. ergo duæ AB BC duabus MX XL æquales sunt, altera alteri; & basis AC est æqualis basi ML . angulus igitur ABC æqualis est angulo MXL . eadem ratione & GHK angulus ipsi LXN est æqualis; ac propterea totus MXN æqualis duobus ABC GHK . sed & anguli

ABC GHK angulo DEF majores sunt. & angulus igitur MXN ipso DEF est major. at quoniam duæ DE EF duabus MX XN æquales sunt, & basis DF æqualis basi MN , erit MXN angulus angulo DEF æqualis. ostensus autem est major, quod est absurdum. non igitur AB est æ-

qualis LX : deinceps vero ostendemus neque minorem esse. quare major necessario erit. & si rursus circuli plano ad rectos angulos constituamus XR , & ipsam æqualem ponamus lateri quadrati ejus, quo quadratum ex AB superat quadratum ex LX , problema constituetur. Dico vero neque minorem esse AB ipsa LX . si enim fieri potest, sit minor; & ipsi quidem AB æqualis ponatur XP , ipsi vero BC æqualis XP , & OP jungatur. quoniam igitur AB ipsi BC est æqualis, erit XP æqualis XP . ergo & reliqua OL reliquæ PM æqualis. parallela igitur est LM ipsi PO , & triangulum LMX triangulo PXO æquiangulum est quare ut XL ad LM , ita XP ad OP : & permutando ut LX ad XP , ita LM ad OP . major autem est LX quam XP . ergo LM quam OP est major. sed LM est æqualis AC . & AC igitur quam OP major e-

rit



¶ 2. sexti.

¶ 4. sexti.


rit. itaque quoniam duæ $AB BC$ duabus $OX XP$; sunt æquales altera alteri; & basis AC major est basi OP ; erit $\angle ABC$ angulo $OX P$ major. similiter & si XR su-
f 25. primi.
matur æqualis utrivis ipsarum $XO XP$, & jungatur OR , ostendemus angulum $G HK$ angulo $OX R$ majorem. constituitur ad rectam lineam LX , & punctum in ipsa X angulo quidem ABC æqualis angulus LXS , angulo autem $G HK$ æqualis LXT , & ponatur utraque $XS XT$ ipsi OX æqualis: junganturque $OS OT ST$. & quoniam duæ $AB BC$ duabus $OX XS$ æquales sunt, & angulus ABC æqualis angulo $OX S$ erit basis AC , hoc est LM , basi OS æqualis. eadem ratione, & LN est æqualis ipsi OT . quod cum duæ $ML LN$ duabus $OS OT$ sint æquales, & angulus MLN major angulo SOT ; erit & basis MN basi ST major. sed MN est æqualis DF . ergo & DF quam ST major erit. quoniam igitur duæ $DE EF$ duabus $SX XT$ æquales sunt, & basis DF major basi ST ; erit angulus DEF angulo SXT major. æqualis autem est angulus SXT angulis $ABC G HK$. ergo DEF angulus angulis $ABC G HK$ major est: sed & minor. Quod fieri non potest. Quod demonstrare oportebat.

PROP. XXIV. THEOR.

Si solidum parallelis planis contineatur, opposita ipsius plana, & æqualia, & parallelogramma erunt.

Solidum enim $CDGH$ parallelis planis $ACGF BG CE FBAE$ contineatur. dico opposita ejus plana, & æqualia, & parallelogramma esse. Quoniam enim duo plana parallela $BG CE$, à plano AC secantur, communes ipsorum sectiones æ parallelæ sunt: ergo AB ipsi CD est parallela. rursus 16. hujus.

quoniam duo plana parallela $BF AE$ secantur à plano AC , communes ipsorum sectiones parallelæ sunt: parallela igitur est AD ipsi BC . ostensa autem est & AB parallela CD . ergo AC parallelogrammum erit. similiter demon-



strabimus, & unumquodque ipsorum $CE FG GB BF AE$ parallelogrammum esse. jungantur $AN DF$. & quoniam parallela est AB quidem ipsi DC ; BH vero ipsi CF , erunt $AB BH$ sese tangentes, duabus $DC CF$ sese tangentibus parallelæ, & non in eodem plano: quare æquales 10. hujus. continebunt. angulus igitur ABH angulo DCF est æqualis. Et quoniam duæ $AB BH$ duabus $DC CF$ æquales sunt, & 34. primi.
M 2 angulus


a 4. primi. angulus $\angle ABH$ æqualis angulo $\angle DCF$, erit Δ basis AH basi DF æqualis: & ΔABH triangulum æquale triangulo ΔDCF . quod cum ipsius quidem ΔABH trianguli, duplum sit BC parallelogrammum: ipsius vero ΔDCF trianguli, duplum parallelogrammum CE : erit BC parallelogrammum æquale parallelogrammo CE . similiter demonstrabimus & AC parallelogrammum parallelogrammo GF , & parallelogrammum AE parallelogrammo BF æquale esse. Si igitur solidum parallelis planis contineatur, opposita ipsius plana, & æqualia, & parallelogramma sunt. Quod oportebat demonstrare.

Cor. Ex jam demonstratis constat, si solidum parallelis contineatur planis, opposita ipsius plana, & æqualia esse, & similia, quippe quæ & singulos angulos æquales, & circa æquales angulos latera proportionalia habeant.

PROP. XXV. THEOR.

Si solidum parallelepipedum plano secetur oppositis planis parallelo, erit ut basis ad basim, ita solidum ad solidum.

Solidum enim parallelepipedum $ABCD$ plano YE secetur, oppositis planis RA DH parallelo. dico ut $E\Phi A$ basis ad basim $EHC\Phi$, ita esse $ABFY$ solidum ad solidum $EGCD$. Producatur enim AH ex utraque parte: & ponantur ipsi



quidem EH æquales quotcunque HM MN ; ipsi vero AE æquales quotcunque AK KL , & compleantur parallelogramma $LOK\Phi$ $HXMS$, & solida $LPKR$ $H\Omega MT$. quoniam igitur æquales inter se sunt LK KA AE rectæ lineæ; erunt & parallelogramma $LOK\Phi$ AF inter se æqualia: itemque æqualia inter se parallelogramma $K\Xi$ $KB'AG$, & adhuc parallelogramma $L\Upsilon$ KP AR inter se æqualia; opposita enim sunt. eadem ratione & parallelogramma EC HX MS æqualia inter se sunt; itemque parallelogramma HG HI IN inter se æqualia: & insuper parallelogramma DH $M\Omega$ NT . tria igitur plana solidorum $LPKR$ $A\Upsilon$ tribus planis æqualia sunt: sed tria tribus oppositis sunt æqualia. ergo tria solida



L P K R A Y inter se æqualia erunt. eadem ratione & tria solida ED H Ω MT sunt æqualia inter se. quotuplex igitur est basis LF ipsius AF basis, totuplex est & LY solidum solidi AY. eadem ratione quotuplex est NF basis ipsius basis HF, totuplex est & solidum NY ipsius ED solidi: & si basis LF est æqualis basi NF, & solidum LY solido NY æquale erit; & si basis LF superat NF basim, & LY solidum NY superabit; & si minor, minus. quatuor igitur magnitudinibus existentibus, duabus scilicet basibus AF FH, & duobus solidis AY ED; sumpta sunt æque multiplicia, basis quidem AF, & AY solidi, videlicet basis LF, & solidum LY: basis vero HF, & ED solidi, nempe basis NF, & solidum NY. & demonstratum est si basis LF superat basim NF, & LT solidum solidum NY superare; & si æqualis æquale; & si minor minus. est igitur ut AF basis ad basim FH, ita AY solidum ad solidum ED. Quare si solidum parallelepipedum plano secetur, oppositis planis parallelo; erit ut basis ad basim, ita solidum ad solidum. Quod oportebat demonstrare.

PROP. XXVI. PROBL.

Ad datam rectam lineam, & ad datum in ipsa punctum dato angulo solido æqualem solidum angulum constituere.

Sit. data quidem recta linea AB, datum autem in ipsa punctum A, & datus solidus angulus ad D qui EDC EDF FDC angulis planis continetur. oportet ad datam rectam lineam AB, & ad datum in ipsa punctum A, dato angulo solido ad D æqualem solidum angulum constituere.

Sumatur in linea DF quodvis punctum F, à quo ad planum per ED DC transiens ducatur perpendicularis FG, & plano in puncto G occurrat; jungaturque DG, & ad rectam lineam AB, & ad datum in ipsa punctum A, angulo quidem EDC æqualis angulus constituitur BAL; angulo autem EDG constituitur æqualis BAK. deinde ipsi DG ponatur æqualis AK, & à puncto K plano per BAL ad rectos angulos erigatur HK; ponaturque ipsi GF æqualis KH, & HA jungatur. dico angulum solidum ad A qui angulis BAL BAH HAL continetur, æqualem esse solido angulo ad D, angulis EDC CDF FDC contento. sumantur



11. hujus.

23. primi.


12. hujus.

mantur enim æquales rectæ lineæ AB DE , & jungantur H^B KB FE GE . quoniam igitur FG perpendicularis est ad subiectum planum, & ad omnes rectas lineas quæ ipsam contingunt, suntque in subiecto plano, rectos faciet $\angle$ angulos. uterque igitur angulorum FGD FGF rectus est. eadem ratione, & uterque ipsorum HKA HKB est rectus. & quoniam duæ KA AB duabus

GD DE æqualis sunt altera alteri, & angulos æquales continent; erit $\angle$ basis BK basi EG æqualis. est autem & KH æqualis GF , atque angulos rectos continent. æqualis $\angle$ igitur erit HB ipsi

FE . rursus quoniam duæ AK KH duabus DG GF æquales sunt, & rectos continent angulos; erit basis AH basi DF æqualis: estque AB æqualis DE . duæ igitur HA AB duabus FD DE sunt æquales; & basis HB est æqualis basi FE .

ergo angulus f BAH angulo EDF æqualis erit. eadem ratione, & angulus HAL angulo FDC est æqualis, quandoquidem si assumamus æquales AL DC , & jungamus KL HL GC FC , quoniam totus BAL est æqualis toti EDC , quorum BAK ipsi EDG ponitur æqualis; erit reliquus KAL æqualis reliquo GDC . & quoniam duæ KA AL duabus GD DC æquales sunt, & angulos æquales continent; basis KL basi GC æqualis erit. est autem & KH æqualis GF . duæ igitur LK KH , duabus CG GF sunt æquales; angulosque rectos continent: ergo basis HL æqualis est basi FC . rursus quoniam duæ HA AL , duabus FD DC æquales sunt, & basis HL æqualis basi FB ; erit angulus HAL æqualis angulo FDC . atque est angulus BAL angulo EDC æqualis. Ad datam igitur rectam lineam, & ad datum in ipsa punctum, dato angulo solido æqualis angulus solidus constitutus est. Quod facere oportebat.



PROP. XXVII. PROBL.



Ad datam rectam lineam dato solido parallelepipedo simile, & similiter positum solidum parallelepipedum describere.

Sit recta quidem linea AB ; datum vero solidum parallelepipedum CD . oportet ad datum rectam lineam AB dato solido parallelepipedo CD simile, & similiter positum solidum parallelepipedum describere. Constituatur ad rectam lineam AB , &

& ad datum in ipsa punctum A angulo solido ad c æqualis a angulus, qui angulis BAH HAK KAB contineatur, ita a 26. hujus. ut angulus quidem BAH æqualis sit angulo ECF, angulus

vero BAK angulo ECG, & adhuc angulus HAK angulo GCF, & fiat b ut EC ad CG, ita BA ad AK, ut autem GC ad CF, ita KA ad AH. ergo ex æquali ut EC ad CF, ita erit BA ad AH.

compleatur parallelogrammum BH, & AL solidum. quoniam igitur est ut EC ad CG, ita BA ad AK, nempe, circa æquales angulos ECG BAK latera sunt proportionalia; erit parallelogrammum KB parallelogrammo GE simile. eadem quoque ratione parallelogrammum KH simile est parallelogrammo GF, & parallelogrammum HB parallelogrammo FE. tria igitur parallelogramma solidi AL tribus parallelogrammis solidi CD similia sunt: sed tria tribus oppositis sunt c æqualia, & similia. c Cor. 24. hujus. ergo totum AL solidum toti solido CD simile erit. Ad datam igitur rectam lineam AB dato solido parallelepipedo CD simile, & similiter positum solidum parallelepipedum AL descriptum est. Quod facere oportebat.




b 12. sexti.

PROP. XXVIII. THEOR.

Si solidum parallelepipedum plano secetur per diagonales oppositorum planorum, ab ipso plano bisariam secabitur.

Solidum enim parallelepipedum AB plano CDEF secetur per diagonales oppositorum planorum, videlicet CF DE. dico solidum AB a plano CDEF bisariam secari.

Quoniam enim æquale a est CGF triangulum triangulo CBF, triangulum vero ADE triangulo DEH; est autem & CAG parallelogrammum parallelogrammo BE æquale b, oppositum enim est; & parallelogrammum GE æquale parallelogrammo CH; erit prisma contentum duobus triangulis CGF ADE, & tribus parallelogrammis GE AC CE æquale prismati, quod continetur duobus triangulis CFB DEH, & tribus parallelogrammis CH BE GE; etenim æqualibus planis, & numero & magnitudine continentur. ergo totum AB solidum



a 34. primi.

b 24. hujus.


dum à plano CDEF bifariam secatur. Quod demonstrare oportebat.

PROP. XXIX. THEOR.

Solida parallelepipeda quæ in eadem sunt basi, & eadem altitudine, quorum stantes sunt in eisdem rectis lineis, inter se sunt æqualia.

Sint enim in eadem basi AB solida parallelepipeda CM CN, eadem altitudine, quorum stantes AF AG LM LN CD CE BH BK sint in eisdem rectis lineis FN DK. dico solidum CM solido CN æquale.

a 34. primi. Quoniam enim parallelogrammum est utrumque ipsorum CH CK; erit CB, utrique ipsarum DH EK æqualis, ergo & DH est æqualis EK. communis auferatur EH. reliqua igitur DE æqualis est reliquæ HK. quare & DEC triangulum est æquale triangulo HKB. parallelogrammum autem DG est æquale parallelogrammo HN. eadem ratione & AFG triangulum æquale est triangulo LMN. est autem parallelogrammum CF parallelogrammo BM, & parallelogrammum CG parallelogrammo BN æquale: opposita enim sunt. ergo & prisma contentum duobus triangulis AFG DEC, & tribus parallelogrammis AD DG GC est æquale prismati, quod duobus triangulis LMN HKB, & tribus parallelogrammis BM NA BN continetur. commune opponatur solidum, cuius basis quidem parallelogrammum AB, oppositum autem ipsi GEHM. ergo totum CM solidum parallelepipedum toti solido parallelepipedo CN est æquale. Solida igitur parallelepipeda quæ in eadem sunt basi, & eadem altitudine, quorum stantes sunt in eisdem rectis lineis, inter se sunt æqualia. Quod demonstrare oportebat.




PROP. XXX. THEOR.

Solida parallelepipeda quæ in eadem sunt basi, & eadem altitudine, quorum stantes non sunt in iisdem rectis lineis, inter se sunt æqualia.

Sint in eadem basi AB solida parallelepipeda CM CN & eadem altitudine, quorum stantes AF AG LM LN CD CE

BH BK non sint in eisdem rectis lineis. dico solidum CM solido CN æquale esse. producantur enim NK DH, & GE FM, convenientque inter se punctis RX; & adhuc producantur FM GE ad OP puncta: & AX LO CP BR jungantur. solidum CM, cujus basis quidem ACBL parallelogrammum, oppositum autem ipsi FDHM est.




æquale solido CO, cujus basis parallelogrammum ACBL æ 29. hujus. & ei oppositum XPRO, in eadem enim sunt basi ACBL, & ipsorum stantes AF AX LM LO CD CX BH BR sunt in eisdem rectis lineis FODR. sed solidum CO, cujus basis quidem parallelogrammum ACBL, oppositum autem ipsi XPRO est æquale solido CN, cujus basis ACBL parallelogrammum, & ipsi oppositum GEKN. etenim in eadem sunt basi ACBL, & eorum stantes AG AX CE CP LN LO BK BR sunt in eisdem rectis lineis GPNR. quare & CM solidum solido CN æquale erit. Solida igitur parallelepipeda quæ in eadem sunt basi, & eadem altitudine, quorum stantes non sunt in eisdem rectis lineis, inter se sunt æqualia. Quod demonstrare odortebat.

PROP. XXXI. THEOR.

Solida parallelepipeda quæ in æqualibus sunt basibus, & eadem altitudine, inter se sunt æqualia.


Sint in æqualibus basibus ABCD solida parallelepipeda AE CF, & eadem altitudine. dico solidum AE solido CF æquale esse. sint primo stantes HK BE AG LM OP DF

CZ RS ad rectos angulos basibus ABCD: angulus autem ALB angulo CRD fit inæqualis, & producatur ipsi CR in directum RT: constituaturque ad rectam



lineam RT, & ad punctum in ipsa R, angulo ALB æqualis æ angulus TRY. & ponatur ipsi quidem AL æqualis æ 23. primi. RT;

solidum $\Omega\Upsilon$ ad solidum RI . quod cum utrumque solidorum CF $\Omega\Upsilon$ ad solidum RI eandem habeat proportionem, solidum CF solido $\Omega\Upsilon$ est æquale. solidum autem $\Omega\Upsilon$ ostensum est æquale solido AE . ergo & AE ipsi CF æquale erit. 9. quinti.





Sed non sint stantes AG HK BE LM CN OP DF RS ad rectos angulos ipsis AB CD basibus. dico rursus solidum AE æquale esse solido CF . ducantur f à punctis $KEGMFPFN$ sf 11. hujus. ad subjectum planum perpendiculares KZ ET GY $M\Phi$ RS $F\Upsilon$ $N\Omega$ SI , & plano in punctis $ZTY\Phi\Upsilon\Omega I$ occurrant, & jungantur $ZTY\Phi\Upsilon\Omega I$ $X\Upsilon$ $X\Omega$ ΩI ΥI . æquale igitur est $K\Phi$ solidum solido PI ; in æqualibus enim sunt quibus KM PS , & eadem altitudine, quorum stantes ad rectos angulos sunt basibus. sed $K\Phi$ solidum solido AE est æquale: solidum vero PI æquale g solido CF . si quidem in g 29. hujus. eadem sunt basi, & eadem altitudine, quorum stantes non sunt in eisdem rectis lineis. ergo & solidum AE solido CF æquale erit. Solida igitur parallelepipeda quæ in æqualibus sunt altitudine, inter se sunt æqualia. Quod demonstrare oportebat.

PROP. XXXII. THEOR.

Solida parallelepipeda quæ eandem habent altitudinem inter se sunt ut bases.

Sint solida parallelepipeda AB CD , quæ eandem altitudinem habeant. dico inter se esse ut bases; hoc est ut AE

basis ad basim CF ita solidum AB ad CD solidum. applicetur enim ad rectam lineam FG parallelogrammo AE æquale FH , & à basi FH eadem.





altitudine ipsi CD solidum parallelepipedum CK compleatur. solidum igitur AB solido CK est æquale; in æqualibus enim 31. hujus.

enim sunt basibus AE EH , & eadem altitudine. itaque quoniam
 425. hujus. solidum parallelepipedum CK plano DG secatur oppositis
 planis parallelo; erit ut $basis$ HF ad basim FC , ita solidum
 HD ad DC solidum; atque est basis quidem FH basi AE æ-
 qualis, solidum vero GK æquale solido AB . est igitur &
 ut AE basis ad basim CF , ita solidum AB ad solidum CD .
 Quare solida parallelepipeda quæ eandem habent altitudi-
 nem inter se sunt ut basēs. Quod demonstrare oportebat.

PROP. XXXIII. THEOR.

*Similia solida parallelepipeda inter se sunt in triplicata
 proportionē homologorum laterum.*

Sint similia solida parallelepipeda $ABCD$. latus autem AE
 homologum sit lateri CF . Dico solidum AB ad CD solidum
 triplicatam proportionem habere ejus, quam habet AE
 ad CF . producantur enim EK EL EM in directum ipsis AE
 GE HE : & ipsi quidem CF æqualis ponatur EK , ipsi vero
 FN æqualis EL ;
 & adhuc ipsi FR
 æqualis EM , &
 KL parallelo-
 grammum, & KO
 solidum comple-
 atur. quoniam i-
 gitur duæ KE EL
 duabus CF FN
 æquales sunt; sed
 & angulus KEL
 angulo CFN est
 æqualis; quia &



angulus KEG ipsi CFN ob similitudinem solidorum $ABCD$:
 erit & KL parallelogrammum simile & æquale parallelogram-
 mo CN . eadem ratione, & parallelogrammum KM æquale est
 & simile parallelogrammo CR , & adhuc parallelogrammum
 424. hujus. OE ipsi DF parallelogrammo. tria igitur parallelogramma
 solidi KO tribus parallelogrammis CD solidi æqualia & si-
 milia sunt. sed tria tribus oppositis æqualia sunt & similia.
 totum igitur KO solidum æquale est & simile toti solido
 CD . compleatur GK parallelogrammum; & à basibus qui-
 dem GK KL parallelogrammis, altitudine vero eadem ipsi
 AB , solida compleantur EX LP . & quoniam ob similitudi-
 nem solidorum $ABCD$ est ut AE ad CF , ita EG ad FN ; &
 EH ad FR : æqualis autem FC ipsi EK , & FN ipsi EL , &



FR ipsi EM. erit ut AE ad EK, ita GE ad EL, & HE ad EM. sed ut AE quidem ad EK, ^b ita AG parallelogrammum ^b 1. sexti. ad parallelogrammum GK: ut autem GE ad EL, ita GK ad KL: & ut ^b HE ad EM, ita PE ad KM. & ut igitur AG parallelogrammum ad parallelogrammum GK, ita GK ad KL, & PE ad KM. sed ut AG quidem ad GK, ita ^c AB solidum ^c 32. hujus. ad solidum EX: ut autem GK ad KL, ita solidum EX ad PL solidum: & ut PE ad KM, ita PL solidum ad solidum KO. & ut igitur solidum AB ad solidum EX, ita ^d EX ad PL, ^d 11. quinti. & PL ad KG. si autem quatuor sint magnitudines deinceps proportionales, prima ad quartam triplicatam proportionem habet ejus, quam habet ad secundam. ergo & AB solidum ad ^e 11. Def. solidum KO triplicatam habet proportionem ejus, quam AB quinti. ad EX. sed ut AB ad EX, ita AG parallelogrammum ad parallelogrammum GK; & AE recta linea ad ipsam EK. quare & AB solidum ad solidum KO triplicatam proportionem habebit ejus, quam AE habet ad EK. æquale autem est solidum KO solido CD, & recta linea EK rectæ CF est æqualis. ergo & AB solidum ad solidum CD triplicatam habet proportionem ejus, quam latus ipsius homologum AE habet ad CF homologum latus. Quod demonstrare oportebat.

Cor. Ex hoc manifestum est, si quatuor rectæ lineæ proportionales fuerint, ut prima ad quartam, ita esse solidum parallelepipedum quod fit à prima ad solidum quod à secunda simile, & similiter descriptum; quoniam & prima ad quartam triplicatam proportionem habet ejus, quam habet ad secundam.

PROP. XXXIV. THEOR.



Æquatium solidorum parallelepipedorum reciprocantur bases & altitudines, & quorum solidorum parallelepipedorum reciprocantur bases & altitudines, ea inter se sunt æqualia.

Sint æqualia solida parallelepipeda AB CD. dico ipsorum bases & altitudines reciprocar, hoc est ut EH basis ad basim NP, ita esse altitudinem solidi CD ad solidi AB altitudinem. Sint enim primo stantes AG EFLBHK ^{II} CMNX ODPR ad rectos angulos basibus ipsorum. dico ut EH basis ad basim NP, ita esse CM ad AG. si igitur ^{basis}



basis EH basi NP sit æqualis, est autem & AB solidum æquale solido CD ; erit & CM æqualis ipsi AG . si ^d enim basibus EH NP æqualibus existentibus non sint AG CM altitudines æquales, neque AB solidum solido CD æquale erit. ponitur autem æquale. non igitur inæqualis est altitudo CM altitudini AG . ergo æqualis sit necesse est; ac propterea ut EH basis ad basim NP , ita erit CM ad AG .

At vero non sit basis EH æqualis basi NP . sed EH sit major. est autem & AB solidum solido CD æquale. ergo major est CM ipsa AG ; alioqui rursus sequeretur so-



lida AB CD æqualia non esse, quæ ponuntur æqualia. itaque ponatur CT æqualis ipsi AG : & à basi quidem NP , altitudine autem CT solidum parallelepipedum VC compleatur. quoniam igitur solidum AB solido CD est æquale, aliud

a 7. quinti. autem aliquod est VC , & æqualia ^a ad idem eandem habent proportionem; erit ut AB solidum ad solidum CV , ita CD solidum ad solidum CV .

b 32. hujus. sed ut AB solidum ad solidum CV , ita ^b basis EH ad NP basim; æque alta enim sunt AB CV solida.


c 25. hujus. ut autem solidum CD ad ipsum CV , ita ^c MP basis ad basim PT , & MC ad CT . & igitur ut basis EH ad NP basim, ita MC ad CT . est autem CT æqualis AG . ergo & ut EH basis ad basim NP , ita MC ad AG . quare solidorum parallelepipedorum AB CD bases & altitudines reciprocantur. Rursus solidorum parallelepipedorum AB CD bases & altitudines reciprocentur: sitque ut EH basis ad basim NP , ita solidi CD altitudo ad altitudinem solidi AB . Dico solidum AB solido CD æquale esse. sint enim rursus stantes ad rectos angulos basibus. & si quidem basis EH sit æqualis basi NP , estque ut EH basis ad basim NP , ita altitudo solidi CD ad solidi AB altitudinem: erit solidi CD altitudo altitudini solidi AB æqualis. solida autem parallelepipeda, quæ sunt in

d 30. hujus. æqualibus basibus & eadem altitudine inter se ^d æqualia sunt ergo solidum AB solido CD est æquale. sed non sit EH basis æqualis basi NP , & sit EH major. major igitur est & solidi CD altitudo altitudine solidi AB , hoc est CM ipsa AG . ponatur ipsi AG æqualis rursus CT , & similiter solidum CV compleatur. itaque quoniam est ut EH basis ad basim NP , ita MC ad ipsam AG ; æqualis autem est AG ipsi CT : erit ut basis EH ad NP basim, ita MC ad CT . sed ut basis EH ad

NP basim, ita AB solidum ad solidum VC; æque alta enim sunt solida ABCV. ut autem MC ad CT, ita & MP basis ad basim PT, & solidum CD ad CV solidum. & igitur ut solidum AB ad solidum CV, ita CD solidum ad solidum CV. quod cum utrumque solidorum ABCD ad ipsum CV eandem proportionem habeat; erit AB solidum solido CD æquale. Quod demonstrare oportebat.

Non sunt autem stantes FEBLGA KH XNDOMCRP ad rectos angulos basibus ipsorum: & à punctis FGBK XMDR ad plana basium EH NP ducantur perpendiculares, quæ planis in punctis STYV QZΩΦ occurrant & compleantur solida FVXΩ. dico & sic æqualibus existentibus solidis ABCD, bases & altitudines reciprocari, scilicet ut EH

basis ad basim NP, ita esse altitudinem solidi CD ad solidi AB altitudinem, quoniam enim solidum AB solido CD est æquale; solido autem AB æquale est solidum BT; in eadem namque sunt basi FK, & eadem al-



30. hujus.

titudine; quorum stantes non sunt in eisdem rectis lineis: & solidum DC est æquale solido DZ, quod in eadem sunt basi XR, & eadem altitudine, quorum stantes non sunt in eisdem rectis lineis; erit & solidum BT solido DZ æquale.


æqualium autem solidorum parallelepipedorum, quorum altitudines basibus ipsorum sunt ad rectos angulos, bases & altitudines reciprocantur. est igitur ut FK basis ad basim XR, ita solidi DZ altitudo ad altitudinem solidi BT. atque est basis quidem FK basi EH æqualis, basis vero XR æqualis basi NP. quare ut EH basis ad basim NP. ita est altitudo solidi DZ ad solidi BT altitudinem. eadem autem sunt altitudines solidorum DZ DC, itemque solidorum BEBA. est igitur ut EH basis ad basim NP, ita solidi DC altitudo ad altitudinem solidi AB. ergo solidorum parallelepipedorum ABCD bases & altitudines reciprocantur. Rursus solidorum parallelepipedorum ABCD bases & altitudines reciprocantur, sitque ut EH basis ad basim NP, ita altitudo solidi CD ad solidi AB altitudinem. dico solidum AB solido CD æquale esse. iisdem namque constructis, quoniam ut EH basis ad basim NP, ita solidi CD altitudo ad altitudinem solidi AB; & basis quidem EH est æqualis basi FK; NP vero ipsi XR: erit ut FK basis ad basim XR, ita altitudo

altitudo solidi CD ad solidi AB altitudinem. eadem autem sunt altitudines solidorum AB BT , & ipsorum CD DZ . est igitur ut FK basis ad basim XR , ita solidi DZ altitudo ad altitudinem solidi BT . quare solidorum BT DZ parallelepipedorum bases & altitudines reciprocantur, quorum autem solidorum parallelepipedorum altitudines sunt ad rectos angulos basibus ipsorum, & bases & altitudines reciprocantur, ea inter se sunt æqualia. ergo BT solidum solido DZ est æquale. sed solidum quidem BT æquale est solido BA , etenim in eadem sunt basi FK , & eadem altitudine, quorum stantes non sunt in eisdem rectis lineis: solidum vero DZ est æquale solido DC , si quidem in eadem sunt basi XR , & eadem altitudine, & non in eisdem rectis lineis. ergo & solidum AB solido CD est æquale. Quod demonstrare oportebat.

PROP. XXXV. THEOR.

Si sint duo anguli plani æquales, quorum verticibus sublimes rectæ lineæ insistant, quæ cum rectis lineis à principio positis angulos contineant æquales, alterum alteri; in sublimibus autem sumantur quævis puncta, atque ab ipsis ad plana in quibus sunt anguli perpendiculares ducantur; & à punctis, quæ à perpendicularibus fiunt in planis ad primos angulos jungantur rectæ lineæ: cum sublimibus æquales angulos continebunt.

Sint duo anguli rectilinei æquales BAC EDF : & à punctis A D sublimes rectæ lineæ AG DM constituentur, quæ cum rectis lineis à principio positis æquales angulos contineant, alterum alteri: angulum quidem MDE æqualem angulo GAB , angulum vero MDF angulo GAC æqualem: & sumantur in ipsis AG DM quævis puncta G M , à quibus ad plana per BAC EDF ducantur perpendiculares GL MN , occurrentes planis in punctis L N ; & LA



ND jungantur. dico angulum GAL angulo MDN æqualem esse. ponatur ipsi DM æqualis AH , & per H ipsi GL parallela ducatur HK . est autem GL perpendicularis ad planum per

per BAC. ergo & HK ad α planum per BAC perpendicularis erit. ducantur à punctis KN ad rectas lineas AB AC DF DE perpendiculares KC NF KB NE, & HC CB MF FE jungantur. quoniam igitur quadratum ex HA æquale β est quadratis ex HK KA; quadrato autem ex KA æqualia γ sunt ex β 47. primi. KC CA quadrata: erit quadratum ex HA quadratis ex HK KC CA æquale. quadratis autem ex HK KC æquale est quadratum ex HC. quadratum igitur ex HA quadratis ex HC CA æquale erit: & idcirco angulus HCA α est rectus. eadem γ 48. primi. ratione & angulus DFM rectus est. ergo angulus ACH ipsi DFM est æqualis. est autem & HAC angulus æqualis angulo MDF, duo igitur triangula sunt MDF HAC duos angulos duobus angulis æquales habentia, alterum alteri, & unum latus uni lateri æquale, quod uni æqualium angulorum subtenditur; videlicet HA ipsi DM. ergo & reliqua latera reliquis lateribus δ æqualia habebunt, alterum alteri. δ 26. primi. quare AC est æqualis DF. similiter demonstrabimus & AB ipsi DE æquale esse. jungantur enim HB ME. & quoniam quadratum ex AH est æquale quadratis ex AC KH; quadrato autem ex AK æqualia sunt quadrata ex AB BK: erunt quadrata ex AB BK KH quadrato ex AH æqualia. sed quadratis ex BK KH æquale est ex BH quadratum; rectus enim angulus est HKB, propterea quod & HK perpendicularis est ad subjectum planum. quadratum igitur ex AH æquale est quadratis ex AB BH. quare angulus ABH rectus est. eadem ratione & angulus DEM est rectus. est autem & BAH angulus æqualis angulo EDM, ita enim ponitur: atque est AH æqualis DM. ergo & AB ipsi DE δ est æqualis. quoniam igitur AC quidem est æqualis DF, AB vero ipsi DE; erunt duæ CA AB duabus FD DE æquales. sed & angulus BAC angulo FDE est æqualis. basis α igitur BC basi EF, & triangulum triangulo, & reliqui anguli reliquis æquales sunt. ergo angulus ACB angulo DFE est æqualis. est autem & rectus ACK æqualis recto DFN. quare & reliquus BCK reliquo EFN æqualis. eadem ratione, & CBK angulus est æqualis angulo FEN. itaque duo triangula sunt BCK EFN, duos angulos duobus angulis æquales habentia, alterum alteri, & unum latus uni lateri æquale, quod est ad æquales angulos, videlicet BC ipsi EF. ergo & δ reliqua latera reliquis lateribus æqualia habebunt. æqualis igitur est CK ipsi FN. est autem & AC ipsi DF æqualis. quare duæ AC CK duabus DF FN æquales sunt: & rectos continent angulos. basis igitur AK est æqualis basi DN. & cum AH sit æqualis DM, erit & quod sit ex AH quadratum quadrato ex DM æquale. sed quadrato ex AH æqualia sunt ex AK KH quadrata; ete-


nim rectus est angulus AKH . quadrato autem ex DM æqualia sunt quadrata ex DN NM , quod angulus DNM rectus fit. quadrata igitur ex AK KH quadratis ex DN NM sunt æqualia. quorum quadratum ex AK æquale est quadrato ex DN . ergo reliquum ex KH quadratum reliquo quadrato ex NM est æquale. & ideo recta linea HK ipsi MN æqualis. quod cum duæ HA AK duabus MD DN æquales sint, altera alteri, & basis HK basi NM ostensa fit æqualis; angulus HAK angulo MDN æqualis *f* erit. Quod oportebat demonstrare.

cor. Ex hoc manifestum est, si sint duo anguli plani rectilinei æquales, ab ipsis autem constituentur sublimes rectæ lineæ æquales, quæ cum rectis lineis à principio positis æquales contineant angulos, alterum alteri, perpendiculares, quæ ab ipsis ad plana in quibus sunt primi anguli ducantur, inter se æquales esse.

PROP. XXXVI. THEOR.

Si tres rectæ lineæ proportionales sint, solidum parallelepipedum quod à tribus fit, æquale est solido parallelepipedo quod fit à media, æquilatERO quidem, æquiangulo autem antedicto.

Sint tres rectæ lineæ proportionales A B C , sit scil. ut A ad B ita F ad C . dico solidum quod fit ex ipsis A B C , æquale esse solido quod fit ex B , æquilatERO quidem, æquiangulo autem antedicto. Exponatur solidus angulus ad E contentus tribus angulis planis DEG GEF FED ; & ipsi quidem B ponatur æqualis unaquæque ipsarum DE GE EF ; & solidum




parallelepipedum EK compleatur: ipsi vero A ponatur æqualis DM ; & ad rectam lineam LM , & ad punctum in
 a 26. hujus. ipsa L , constituatur $\angle$ angulo solido ad E æqualis angulus contentus NLX MLN ; & ponatur ipsi quidem B æqualis LN , ipsi vero C æqualis LK . quoniam igitur est ut A ad B ita B ad G , æqualis autem est A ipsi LM , & B unicuique ipsarum LN EF EG ED , & C ipsi LX ; erit ut LM ad EF
 ita

ita GE ad LX. & circum æquales angulos MLX GEF, latera sunt reciproca. ergo MX parallelogrammum parallelogrammo GF est æquale. & quoniam duo anguli plani rectilinei æquales sunt GEF XLM, & in ipsis sublimis rectæ lineæ constituuntur LNE D æquales inter se, & cum rectis lineis à principio positis æquales continentes angulos, alterum alteri; erunt & perpendiculares quæ à punctis N D ad plana per XLM GEF ducuntur, inter se æquales. ergo solida LHEK eadem sunt altitudine. quæ verò in æqualibus basibus sunt solida parallelepipeda, & eadem altitudine, inter se sunt æqualia. ergo solidum HL æquale est solido EK. atque est solidum quidem HL quod fit à tribus ABC, solidum vero EK quod fit ex B. Si igitur tres rectæ lineæ proportionales sint, solidum parallelepipedum quod fit à tribus, æquale est solido parallelepipedo quod fit, &c. Quod demonstrare oportebat.

PROP. XXXVII. THEOR.

Si quatuor rectæ lineæ proportionales sint, & quæ ab ipsis fiunt solida parallelepipeda similia & similiter descripta proportionalia erunt. Et si quæ ab ipsis fiunt solida parallelepipeda similia & similiter descripta proportionalia sint; & ipsæ rectæ lineæ proportionales erunt.

Sint quatuor rectæ lineæ proportionales ABCDEFGH, sit scil. ut AB ad CD, ita EF ad GH, & describantur ab ipsis ABCDEFGH similia & similiter posita solida parallelepipeda KA LCME NG. dico ut KA ad LC, ita esse ME ad NG. Quoniam enim solidum parallelepipedum KA simile est ipsi LC, habebit KA ad LC triplicatam proportionem ejus



quam AB habet ad CD. eadem ratione & solidum ME ad ipsum NG triplicatam proportionem habebit ejus quam EF ad GH. atque est ut AB ad CD, ita EF ad GH. ut igitur AK ad LC, ita ME ad NG. Sed fit ut solidum AK ad solidum LC, ita ME solidum ad solidum NG. dico, ut


4 33. hujus. recta linea AB ad rectam CD , ita esse rectam EF ad ipsam GH . quoniam enim rursus AK ad LC triplicatam $\propto$ proportionem habet ejus quam AB habet ad CD ; habet autem & ME ad NG triplicatam proportionem ejus quam EF ad GH ; atque ut AK ad LC , ita ME ad NG : erit ut AB ad CD , ita EF ad GH . Si igitur quatuor rectae lineae proportionales sint, &c. Quod oportebat demonstrare.

PROP. XXXVIII. THEOR.

Si planum ad planum rectum sit; & ab aliquo puncto eorum quae sunt in uno plano, ad alterum planum perpendicularis ducatur: ea in communem planorum sectionem cadet.

Planum nempe CD ad planum AB rectum sit, communis autem eorum sectio sit AD , & in ipso CD plano, quodvis punctum E sumatur. dico perpendicularem quae à puncto

E ad planum AB ducitur, cadere in ipsam AD . Non enim; sed si fieri potest, cadat extra, ut EF ; & plano AB in puncto F occurrat: à puncto autem F ad DA in plano AB perpendicularis ducatur FG , quae quidem



4. Def. hujus.

3. Def. hujus.

17. primi.

& plano CD ad $\propto$ rectos angulos erit; & EG jungatur. quoniam igitur FG plano CD est ad rectos angulos; contingit autem ipsam recta linea EG quae est in eodem CD plano: erit angulus FGE $\propto$ rectus. sed & EF plano AB ad rectos angulos est; rectus igitur est angulus EFG . quare trianguli EFG duo anguli duobus rectis sunt aequales; quod est $\propto$ absurdum. non igitur à puncto E ad AB planum perpendicularis ducta extra rectam lineam DA cadet. ergo in ipsam cadat necesse est. Si igitur planum ad planum rectum sit, &c. Quod oportebat demonstrare.

PROP. XXXIX. THEOR.

Si in solido perallelepipedo oppositorum planorum latera secantur bifariam, per sectiones vero plana ducantur; communis planorum sectio, & solidi perallelepipedi diameter, sese bifariam secabunt.


In solido enim perallelepipedo AF , oppositorum planorum CF AH latera bifariam secantur in punctis $KLMNXOPR$.

&c

& per sectiones plana ducantur KX XR ; communis autem planorum sectio sit YS , & solidi parallelepipedi diameter sit DG . dico YS DG sese bifariam secare, hoc est YT quidem ipsi TS , DT vero ipsi TG æqualem esse. Jungantur enim DY YE BS SG . quoniam igitur DX parallela est ipsi OE , alterni anguli DXY YOE inter se æquales sunt. & quoniam 29. primi.

DX quidem est æqualis OE , XY vero ipsi YO , & angulos æquales continent; erit b basis DY æqualis basi YE . & triangulum DXY triangulo YOE , & reliqui anguli reliquis angulis æquales, angulus igitur XYD est æqualis angulo OYE , & ob id c recta linea est DYE . eadem ratione, & BSG recta est, atque est BS æqualis SG . &

quoniam CA ipsi DB æqualis est & parallela, & CA est æqualis & parallela ipsi EC ; erit & DB ipsi EG æqualis & parallela; & ipsas conjungunt rectæ linæ DE GB : parallela igitur d est DE ipsi BG . & sumpta sunt in utraque ipsa-
rum quævis puncta $DYGS$, & junctæ sunt DG YS . ergo DG YS in uno e sunt plano. quod cum DE sit parallela BG ,
erit & EDT angulus angulo BGT æqualis f , alterni enim sunt. est autem & DTY angulus æqualis g ipsi GTS . duo
igitur sunt triacula DTY GTS duos angulos duobus angulis æquales habentia, & unum latus uni lateri æquale, quod uni æqualium angulorum subtenditur, videlicet DY ipsi GS : dimidia enim sunt ipsorum DE BG . ergo & reliqua latera reliquis lateribus æqualia habebunt. quare DT quidem est æqualis TG , YT vero ipsi TS . Si igitur in solido parallelepipedo, &c. Quod oportebat demonstrare.



PROP. XL. THEOR.

Si sint duo prismata æque alta, quorum unum quidem basim habeat parallelogrammum, alterum vero triangulum, & parallelogrammum duplum sit trianguli; ea inter se æqualia erunt.


Sint prismata æquæ alta $ABCDEFGH$ $GHKLMN$. & unum quidem basim habeat parallelogrammum AF , alterum vero

GHK triangulum, & duplum sit AF parallelogrammum trianguli GHK. dico prisma ABCDEF prismati GHKLMN æquale esse. Compleantur enim AX GO solida. & quoniam parallelogrammum AF

trianguli GHK est duplum; est autem & HK parallelogrammum duplum æ trianguli GHK: erit AF parallelogrammum parallelogrammo HK æquale. quæ vero in æqualibus

sunt basibus solida parallelepipeda, & eadem altitudine, inter se æqualia ^b sunt.

æquale igitur AX solidum solido GO. atque est solidi quidem AX dimidium æ ABCDEF prisma; solidi vero GO dimidium æ est prisma GHKLMN. ergo ABCDEF prisma prismati GHKLMN est æquale. Si igitur sint duo prismata æque alta, &c. Quod demonstrare oportebat.



EUCLIDIS

ELEMENTORUM


LIBER DUODECIMUS.

PROPOSITIO I. THEOREMA.

Similia polygona circulis inscripta inter se sunt ut diametrorum quadrata.

Sint circuli $ABCDE$ $FGHKL$, & in ipsis similia polygona $ABCDE$ $FGHKL$; diametri autem circulorum sint BM GN . dico ut quadratum ex BM ad quadratum ex GN , ita esse $ABCDE$ polygonum ad polygonum $FGHKL$. jungantur enim BE AM GL FN . & quoniam polygonum $ABCDE$ simile est polygono $FGHKL$; & BAE angulus angulo GFL est æqualis: atque est ut

BA ad AE , ita GF ad FL . duo igitur triacula sunt BAE GFL unum angulum uni angulo æqualem habentia, videlicet angulum BAE angulo GF , circa æquales autem angulos latera pro-



portionalia: quare triangulum ABE triangulo FGL æqui-
angulum ^a est; ac propterea angulus AEB æqualis est an- ^a 6. sexti.
gulo FLG . sed angulus quidem AEB angulo AMB est ^b æ-
qualis; in eadem enim circumferentia consistunt. angulus ^b 21. tertii.
autem FLG æqualis ^c est angulo FNG . ergo & AMB angu-
lus est æqualis angulo FNG . est autem & rectus ^c angulus ^c 31. tertii.
 BAM æqualis recto GFN . quare & reliquus reliquo æqua-
lis. æquiangulum igitur est triangulum AMB triangulo FGN .
ergo ^d ut BM ad GN ita BA ad GF . sed proportionis qui- ^d 4. sexti.
dem BM ad GN duplicata est proportio quadrati ex BM ad
quadratum


20. sexti. quadratum ex GN ; proportionis vero BA ad GF duplicata est proportio $ABCDE$ polygoni ad polygonum $FGHKL$: & ut igitur quadratum ex BM ad quadratum ex GN , ita polygonum $ABCDE$ ad $FGHKL$ polygonum. Quare similia polygona quæ in circulis describuntur, inter se sunt ut diametrorum quadrata. Quod demonstrare oportebat.

L E M M A.

Duabus magnitudinibus inæqualibus expositis, si à majori auferatur majus quàm dimidium, & ab eo quod reliquum est, rursus auferatur majus quàm dimidium; & hoc semper fiat: relinquetur tandem quædam magnitudo quæ minori magnitudine expositâ minor erit.

Sint duæ magnitudines inæquales ABC , quarum major AB . dico si ab ipsa AB auferatur majus quàm dimidium, & ab eo quod reliquum est, rursus auferatur majus quàm dimidium, atque hoc semper fiat, relinqui tandem magnitudinem quandam, quæ magnitudine C minor erit. etenim C

multiplicata fiet aliquando major magnitudine AB . multiplicetur, & sit DE ipsius quidem C multiplex, major autem quam AB : dividaturque DE in partes ipsi C æquales DF FG GE . & ab ipsa AB auferatur majus quam dimidium BH , ab ipsa vero AH rursus majus quam dimidium auferatur HK , atque hoc semper fiat, quoad divisiones, quæ sunt in AB , multitudine æquales fiant divisionibus quæ in DE : sint igitur divisiones AK KH HB , divisionibus DF FG GE multitudine æquales. & quoniam major est DE quàm AB ; & ablatum est ab ipsa quidem DE minus quam dimidium EG , ab ipsa vero AB majus quam dimidium BH : erit reliquum GD reliquo HA majus. rursus quoniam major est GD , quam HA : & ablatum est ab ipsa quidem GD dimidium GF ; ab ipsa vero HA majus quam dimidium HK : reliquum FD reliquo AK majus erit. estque FD æqualis ipsi C . ergo C quam AK est major. minor igitur est AK quam C . ergo ex magnitudine AB relicta est magnitudo AK , exposita minori magnitudine



itudine c minor. Quod demonstrare oportebat. Similiter autem demonstrabitur, etiam si dimidia ablata fuerint. *Est prima decimi.*



PROP. II. THEOR.

Circuli inter se sunt ut diametrorum quadrata.

Sint circuli ABCD EFGH, diametri autem ipsorum sint BD FH. dico ut quadratum ex BD ad quadratum ex FH, ita esse circulum ABCD ad EFGH circulum. Si enim non ita sit; erit ut quadratum ex BD ad quadratum ex FH, ita circulus ABCD vel ad spatium aliquod minus circulo EFGH, vel ad majus. sit primum ad minus

quod sit s. & in circulo EFGH describatur quadratum EFGH. itaque descriptum in circulo quadratum majus est dimidio circuli EFGH; quoniam si per puncta EFGH contingentes circulum ducamus, erit descripti circa circulum quadrati dimidium EFGH. descripto autem circa circulum quadrato minor est circulus. ergo quadratum EFGH majus est dimidio circuli EFGH. secantur bifariam circumferentiae EFGH HE in punctis KLMN: & EK KFFL LG GM MH HN NE jungantur. unum quodque igitur triangulorum EKFFLG GMH HNE majus est dimidio segmenti circuli in quo consistit: quoniam si per puncta KLMN contingentes circulum ducamus, & parallelogramma, quæ sunt in rectas lineas EFGH HE compleamus; erit a unumquodque triangulorum EKFFLG GMH HNE dimidium parallelogrammi, quod ad ipsum est.

sed segmentum minus est parallelogrammo. quare unumquodque triangulorum EKFFLG GMH HNE majus est dimidio segmenti circuli, in quo consistit. Hæc igitur circumferentias bifariam secantes, & jungentes rectas lineas, atque hoc semper facientes, relinquemus tandem quædam circuli segmenta, quæ minora erunt excessu, quo circulus EFGH ipsum s spatium superat. etenim ostensum est in præcedenti Lemmate, duabus magnitudinibus inæqualibus expositis, si à majori auferatur majus quam dimidium, & ab eo quod relinquitur, rursus majus quam dimidium,



a 41. primi.

dium, & hoc semper fiat; relinqui tandem magnitudinem aliquam, quæ minori magnitudine exposita sit minor. itaque relicta sint segmenta circuli EFGH in rectas lineas EK KFFL LG GM MHHNNE, quæ minora sint excessu, quo circulus EFGH ipsum s spatium superat. ergo reliquum EKFLGMHN polygonum majus erit spatium s. Describatur etiam in circulo ABCD, polygono EKFLGMHN simile

§ 1. hujus.

ad quadratum ex BD, ita polygonum. AXBOCPDR ad EKFLGMHN polygonum. sed & ut quadratum ex BD ad quadratum ex FH, ita ABCD circulus ad spatium s. ergo &

§ 11. quinti.

ut circulus ABCD ad spatium s, ita polygonum AXBOCPDR ad EKFLGMHN polygonum. major autem est circulus ABCD eo quod in ipso est polygono. quare & spa-


d Ex hypothesi.

tium s majus est polygono EKFLGMHN. sed & minus. quod fieri non potest. Non igitur est ut quadratum ex BD

§ 14. quinti.

ad quadratum ex FH, ita ABCD circulus ad spatium aliquod minus circulo EFGH. Similiter ostendemus neque esse ut quadratum ex FH ad quadratum ex BD, ita circulum EFGH ad aliquod spatium minus circulo

ABCD. dico igitur neque esse ut quadratum ex BD ad quadratum ex FH, ita circulum ABCD ad aliquod spatium majus circulo EFGH. si enim fieri potest, sit ad majus spatium s. erit igitur invertendo ut quadratum ex FH ad quadratum ex BD, ita spatium s ad ABCD circulum. sed quoniam s majus est EFGH circulo; erit ut spatium s ad ABCD circulum, ita circulus EFGH ad aliquod spatium minus circulo ABCD. ergo & ut quadratum ex FH ad quadratum ex BD, ita EFGH circulus ad aliquod spatium minus circulo ABCD, quod fieri non posse ostensum est. non igitur ut quadratum ex BD ad quadratum ex FH, ita est circulus ABCD ad spatium aliquod majus EFGH circulo. ostensum autem est neque ad minus. quare ut quadratum ex BD ad quadratum ex FH, ita erit ABCD circulus ad circulum EFGH. Circuli igitur inter se sunt ut diametrorum quadrata. Quod ostendere oportebat.




PROP. III. THEOR.

Omnis pyramis triangularem habens basim dividitur in duas pyramides, æquales & similes inter se, quæ triangulares bases habent, similesque toti, & in duo prismata æqualia, quæ quidem prismata dimidio totius pyramidis sunt majora.

Sit pyramis, cujus basis quidem ABC triangulum; vertex autem punctum D . dico pyramidem $ABCD$ dividi in duas pyramides æquales & similes inter se, triangulares bases habentes, & similes toti, & in duo prismata æqualia; & duo prismata dimidio totius pyramidis esse majora. secetur enim AB BC CA AD DB DC bifariam in punctis E F G H K L , & EH FG GH HK KL LH EK KF FG jungantur. quoniam igitur AE quidem est æqualis EB , AH vero ipsi HD ; erit $\angle E$ H ipsi DB parallela. eadem ratione & HK est parallela ipsi AB . parallelogrammum igitur est $HEBK$.

quare HK est æqualis EB . sed EB ipsi AE est æqualis. ergo & AB ipsi HK æqualis erit. est autem & AH æqualis HD . duæ igitur AE AH duabus KH HD æquales sunt, altera alteri, & angulus EAH æqualis angulo KHD ; basis igitur EH basi KD est æqualis: quare triangulum AEH æquale est & simile triangulo HKD . eadem ratione & triangulum AHG triangulo HLD æquale est & simile. & quoniam duæ rectæ lineæ sese tangentes EH HG duabus rectis lineis sese tangentibus KD DL parallelæ sunt, non autem in eodem plano, æquales




b 34. primi.

c 29. primi.
d 4. primi.

angulos continebunt. ergo angulus EHG est æqualis angulo KDL . rursus quoniam duæ rectæ lineæ EH HG duabus KD DL æquales sunt, altera alteri, & angulus EHG est æqualis angulo KDL ; erit $\angle$ basis EG basi KL æqualis: æquale igitur est & simile triangulum EHG triangulo KDL . eadem ratione & AEG triangulum est æquale & simile triangulo HKL . quare pyramis cujus basis quidem est AEG triangulum, vertex autem punctum H , æqualis & similis est pyramidi cujus basis est triangulum HKL , & vertex D punctum. & quoniam uni laterum trianguli ADB , videlicet ipsi AB , parallela ducta est HK ; erit triangulum ADB triangulo DKH æquiangulum,

e 10. undecimi.

angulum, & latera habent proportionalia. simile igitur est ADB triangulum triangulo DHK . & eadem ratione triangulum quidem DBC simile est triangulo DKL ; triangulum vero ADG triangulo DHL . & cum duæ rectæ lineæ sese tangentes BA AC duabus rectis lineis sese tangentibus KH HL parallelæ sint, non existentes in eodem plano, hæ æquales angulos continebunt. angulus igitur BAC angulo HKL est æqualis. atque est ut BA ad AC , ita KH ad HL . ergo ABC triangulum simile est triangulo HKL ; ideoque pyramis, cujus basis quidem triangulum ABC , vertex autem punctum D , similis est pyramidi, cujus basis triangulum HKL , & vertex punctum D . sed pyramis cujus basis quidem HKL triangulum, vertex autem punctum D , ostensa est similis pyramidi, cujus basis triangulum AEG , & vertex H punctum. quare & pyramis cujus basis triangulum ABC & vertex punctum D , similis est pyramidi cujus basis AEG triangulum, & vertex punctum H . utraque igitur ipsarum $AEGH$ $HKLD$ pyramidum similis est toti pyramidi $ABCD$. & quoniam BF est æqualis FC , erit $EBFG$ parallelogrammum duplum trianguli GFC . & quoniam duo prismata æque alta sunt, quorum unum quidem basim habet parallelogrammum, alterum vero triangulum, estque parallelogrammum duplum trianguli; erunt ea prismata inter se æqualia g . ergo prisma contentum duobus triangulis BKF EHG , & tribus parallelogrammis $EBFG$ $EBKH$ $KHGF$, est æquale prismati quod duobus triangulis GFC HKL , & tribus parallelogrammis $KFCL$ $LCGH$ $HKFG$ continetur. & manifestum est utrumque ipsorum prismatum, & cujus basis est $EBGF$ parallelogrammum, opposita autem ipsi HK recta linea, & cujus basis est GFC triangulum, & oppositum ipsi triangulum KLH , majus esse utraque pyramidum quarum bases quidem AEG AKL triangu-
la, vertices autem puncta H D : quoniam si jungamus EF EH rectas lineas, prisma quidem, cujus basis est $EBFG$ parallelogrammum, & opposita ipsi recta linea KG , majus est pyramide cujus basis EBF triangulum, vertex autem punctum K . sed pyramis, cujus basis triangulum EBF , & vertex K punctum, est f æqualis pyramidi cujus basis AEG triangulum, & vertex punctum H ; æqualibus enim & similibus planis continentur. quare & prisma cujus basis parallelogrammum $EBFG$, opposita autem



f 10. def. undecimi.

g 40. undecimi.

ipsi

ipsi recta linea HK, majus est pyramide cujus basis AEG triangulum & vertex punctum H. prisma vero cujus basis parallelogrammum EFG, & opposita ipsi recta linea HK, est æquale prismati cujus basis GFC triangulum, & ipsi oppositum triangulum HKL: & pyramis cujus basis triangulum AEG, vertex autem H punctum, est æqualis pyramidi cujus basis HKL triangulum, & vertex punctum D. ergo duo prismata de quibus dictum est, sunt majora duabus dictis pyramidibus quarum bases triangula AEG, HKL, vertices autem H D puncta. Tota igitur pyramis cujus basis ABC triangulum, vertex autem punctum D, divisa est in duas pyramides æquales, & similes inter se, & similes toti: & in duo prismata æqualia: suntque duo prismata dimidio totius pyramidis majora. Quæ ostendere oportebat.


PROP. IV. THEOR.

Si sint duæ pyramides æque altæ, quæ triangulares bases habeant, dividatur autem utraque ipsarum, & in duas pyramides æquales inter se, similesque toti, & in dua prismata æqualia; & factarum pyramidum utraque eodem modo dividatur, atque hoc semper fiat: erit ut unius pyramidis basis ad basim alterius, ita & in una pyramide prismata omnia ad prismata omnia in altera pyramide multitudine æqualia.

Sint duæ pyramides æque altæ quæ triangulares bases habeant ABC DEF, vertices autem sint puncta G H, & dividatur utraque ipsarum in duas pyramides æquales inter se, similesque toti, & in duo prismata æqualia;

& factarum pyramidum utraque eodem modo divisa intelligatur: atque hoc semper fiat. dico ut ABC basis ad basim DEF, ita esse prismata omnia quæ sunt in pyramide ABCG ad prismata omnia quæ in pyramide DEFH multitudine æqualia.

Quoniam enim BX quidem est æqualis XC, AL vero æqualis LC; erit XL ipsi AB parallela, & triangulum ABC triangulo LXC simile. eadem ratione & triangulum




gulum DEF simile est triangulo RQF. & quoniam BC quidem est dupla CX, EF vero dupla ipsius FQ, ut BC ad CX, ita erit EF ad FQ. & descripta sunt ab ipsis BC CX similia & similiter posita rectilinea ABC LXC; ab ipsis vero EF FQ similia & similiter posita rectilinea DEF RQF. est igitur ^b ut BAC triangulum ad triangulum LXC, ita triangulum DEF ad RQF triangulum; & permutando ut triangulum ABC ad triangulum DEF, ita LXC triangulum ad triangulum RQF. sed ut LXC triangulum ad triangulum RQF, ita ^d prisma cuius basis est triangulum LXC, oppositum autem ipsi OMN, ad prisma cuius basis RQF triangulum & oppositum ipsi STY. ut igitur, ABC triangulum ad triangulum DEF, ita prisma cuius basis est triangulum LXC, oppositum autem ipsi OMN, ad prisma cuius basis RQF triangulum, & oppositum ipsi STY. & quoniam duo prismata quæ in pyramide ABCG inter se æqualia sunt, sed & quæ in pyramide DEFH prismata inter se sunt æqualia; erit ut prisma cuius basis parallelogrammum KLBX, opposita vero ipsi recta linea MO, ad prisma cuius basis LXC triangulum, & oppositum ipsi OMN, ita prisma cuius basis parallelogrammum EPRQ, & opposita recta linea ST, ad prisma cuius basis RQF triangulum, oppositum vero ipsi STY. quare componendo, ut prismata KBXLMO LXC MN O ad prisma LXC MN O, ita prismata PEQRST RQFSTY ad prisma RQFSTY. & permutando, ut prismata KBXLMO LXC MN O ad prismata PEQRST RQFSTY, ita prisma LXC MN O ad prisma RQFSTY. ut autem prisma LXC MN O ad prisma RQFSTY, ita ostensa est basis LXC ad RQF basim, & ABC basis ad basim DEF. ergo & ut triangulum ABC ad triangulum DEF, ita quæ in pyramide ABCG duo prismata ad duo prismata quæ in pyramide DEFH. similiter autem, & si factas pyramides dividamus eodem modo velut OMNG STYH, erit ut OMN basis ad basim STY, ita quæ in pyramide OMNG duo prismata ad duo prismata quæ in pyramide STYH. sed ut OMN basis ad basim STY, ita basis ABC ad DEF basim. & ut igitur ABC basis ad basim DEF, ita quæ in pyramide ABCG duo prismata ad duo prismata quæ in pyramide DEFH; & quæ in pyramide OMNG duo prismata ad duo prismata quæ in pyramide STYH; & quatuor ad quatuor. eadem autem ostendentur & in factis prismatibus ex divisione pyramidum AKLO, & DPRS, & omnium simpliciter multitudine æqualium. Quod demonstrare oportebat.

PROP. V. THEOR.

Pyramides quæ eadem sunt altitudine, & triangulares bases habent, inter se sunt ut bases.

Sint eadem altitudine pyramides, quarum bases quidem triangula ABC DEF , vertices autem puncta G H . dico ut ABC basis ad basim DEF , sic esse pyramidem $ABCG$ ad $DEFH$ pyramidem. Si enim non ita sit, erit ut ABC basis ad basim DEF , sic $ABCG$ pyramis, vel ad solidum minus pyramide $DEFH$, vel ad majus. sit primum ad solidum minus, sitque z . & dividatur pyramis $DEFH$ in duas pyramides æquales inter se, & similes toti, & in duo prismata æqualia. sunt duo igitur prismata dimidio totius pyramidis majora. & rursus pyramides ex divisione factæ similiter dividantur, atque hoc semper fiat, quoad sumantur quædam pyramides à pyramide $DEFH$, quæ sint minores excessu quo pyramis $DEFH$ solidum z superat. itaque sumantur, &



sint exempli causa, pyramides $DPRS$ $STYH$. erunt igitur reliqua in pyramide $DEFH$ prismata solido z majora. dividatur etiam $ABCG$ pyramis in totidem partes similes pyramidi $DEFH$. ergo ^a ut ABC basis ad basim DEF , ita quæ in pyramide $ABCG$ prismata ad prismata quæ in pyramide $DEFH$. sed ut ABC basis ad basim DEF , ita pyramis $ABCG$ ad solidum z . & igitur ut $ABCG$ pyramis ad solidum z , ita quæ in pyramide $ABCG$ prismata ad prismata quæ in pyramide $DEFH$. major autem est pyramis $ABCG$ prismatibus quæ in ipsa sunt. ergo & solidum z prismatibus, quæ sunt in pyramide $DEFH$, est majus. sed & ^b minus. quod fieri non potest. non igitur ut ABC basis ad basim DEF , ita est pyramis $ABCG$ ad solidum aliquod minus pyramide $DEFH$. similiter ostendemus neque ut DEF basis ad basim

^a + hujus.



^b ex prius demonstratis.

basim ABC , ita esse pyramidem $DEFH$ ad solidum aliquod pyramide $ABCG$ minus. dico igitur neque esse ut ABC basis ad basim DEF , ita $ABCG$ pyramidem ad aliquod solidum majus pyramide $DEFH$. si enim fieri potest, sit ad majus, videlicet ad solidum I . erit igitur invertendo ut DEF basis ad basim ABC , ita solidum I ad $ABCG$ pyramidem. cum autem solidum I majus est pyramide $EDFH$, erit ut solidum I ad $ABCG$ pyramidem, ita $DEFH$ pyramis ad solidum aliquod minus pyramide $ABCG$, ut proxime ostensum fuit. & ut igitur DEF basis ad basim ABC , ita pyramis $DEFH$ ad solidum aliquod pyramide $ABCG$ minus, quod est absurdum. non igitur ut ABC basis ad basim DEF , ita est $ABCG$ pyramis ad solidum aliquod majus pyramide $DEFH$. ostensum autem est, neque ad minus. quare ut ABC basis ad basim DEF , ita est pyramis $ABCG$ ad $DEFH$ pyramidem. Pyramides igitur quæ eadem sunt altitudine, & triangulares bases habent, inter se sunt ut bases. Quod demonstrare oportebat.

PROP. VI. THEOR.

Pyramides, quæ eadem sunt altitudine, & polygonas bases habent, inter se sunt ut bases,

Sint eadem altitudine pyramides, quæ polygonas bases habeant $ABCDE$ $FGHKL$: vertices autem M N puncta. dico ut $ABCDE$ basis ad basim $FGHKL$, ita esse $ABCDM$ pyramidem ad pyramidem $FGHKLN$. dividatur enim basis quidem $ABCDE$ in triacula ABC ACD ADE ; basis vero



$FGHKL$ dividatur in triacula FGH FHK FKL . & in uno quoque triangulo intelligantur pyramides æque altæ atque pyramides quæ à principio. quoniam igitur est ut triangulum ABC ad triangulum ACD , ita $ABCM$ pyramis ad pyramidem $ACDM$: & componendo ut $ABCD$ trapezium ad triangulum ACD , ita $ABCDM$ pyramis ad pyramidem $ACDM$. sed & ut ACD triangulum ad ADE , ita $ACDM$ pyramis ad $ADEM$ pyramidem. ergo ex æquali, ut $ABCD$ basis ad basim ADE , ita $ABCDM$ pyramis ad pyramidem $ADEM$. &


45. hujus.

& rursus componendo ut $ABCDE$ basis ad basim ADE , ita $ABCDEM$ pyramis ad pyramidem $ADEM$. eadem ratione, & ut $FGHKL$ basis ad basim FKL , ita & $FGHKLN$ pyramis ad $FKLN$ pyramidem. & quoniam duæ pyramides sunt $ADEM$ $FKLN$, quæ triangulares bases habent, & eadem sunt altitudine; erit α ut ADE basis ad basim FKL , ita $ADEM$ pyramis ad pyramidem $FKLN$. quod cum sit ut $ABCDE$ basis ad basim ADE , ita $ABCDEM$ pyramis ad pyramidem $ADEM$; ut autem ADE basis ad basim FKL , ita $ADEM$ pyramis ad pyramidem $FKLN$: erit ex æquali, ut basis $ABCDE$ ad FKL basim, ita $ABCDEM$ pyramis ad pyramidem $FKLN$. sed & ut FKL basis ad basim $FGHKL$, ita erat & $FKLN$ pyramis ad pyramidem $FGHKLN$. quare rursus ex æquali, ut $ABCDE$ basis ad basim $FGHKL$, ita est $ABCDEM$ pyramis ad pyramidem $FGHKLN$. Pyramides igitur quæ eadem sunt altitudine, & polygonas bases habent, inter se sunt ut bases. Quod oportebat demonstrare.

PROP. VII. THEOR.

Omne prisma triangularem habens basim, dividitur in tres pyramides æquales inter se, quæ triangulares bases habent.


Sit prisma cujus basis quidem triangulum ABC , oppositum autem ipsi DEF . dico prisma $ABCDEF$ dividi in tres pyramides æquales inter se, quæ triangulares habent bases. Jungantur enim $BDEC$ CD . & quoniam parallelogrammum est $ABED$ cujus diameter ED , erit ABD triangulum triangulo EBD α æquale. ergo pyramis cujus basis triangulum ABD , vertex autem punctum C , æqualis β est pyramidi, cujus basis EDB triangulum, & vertex punctum C . sed pyramis cujus basis EDB triangulum, & vertex punctum C , eadem est cum pyramide cujus basis triangulum EBD , & vertex D punctum: iisdem enim planis continentur. ergo & pyramis cujus basis triangulum ABD , vertex autem punctum C , æqualis est pyramidi cujus basis EBD triangulum, & verrex punctum D . rursus quoniam $FCBE$ parallelogrammum est cujus diameter CE , triangulum ECF triangulo CBE est α æquale. ergo & pyramis cujus basis BEC triangulum, vertex autem punctum D , æqualis est β pyramidi cujus basis triangulum ECF , & vertex punctum D . sed pyramis cujus



α 34. p. similit.

β 6. hujus.

basis quidem BCE triangulum, vertex autem punctum D ,
 ostensa est æqualis pyramidi cujus basis triangulum ABD ,
 & vertex C punctum. quare & pyramis cujus basis triangu-
 lum CEF , & vertex punctum D , æqualis est pyramidi cu-
 jus basis triangulum ABD ,
 & vertex C punctum. prisma igitur $ABCDEF$ dividi-
 tur in tres pyramides inter
 se æquales, quæ triangula-
 res bases habent. Et quoni-
 am pyramis cujus basis $A-
 BD$ triangulum, vertex au-
 tem punctum C , eadem est cum pyramide, cujus basis triangu-
 lum CAB , & vertex D punctum, iisdem namque planis con-
 tinetur; pyramis autem, cujus basis triangulum ABD , &
 vertex punctum C , tertia pars ostensa est prismatis cujus
 basis ABC triangulum, & oppositum ipsi DEF : & pyramis
 igitur, cujus basis triangulum ABC , vertex autem D pun-
 ctum, tertia pars est prismatis eandem basim habentis, vide-
 licet ABC triangulum, & oppositum ipsi triangulum DEF .
 Quod demonstrare oportebat.



COROLLARIUM.

1. Ex hoc manifestum est omnem pyramidem tertiam
 partem esse prismatis basim habentis eandem, & altitudi-
 nem æqualem; quoniam si basis prismatis aliam quandam
 figuram rectilineam obrineat, & oppositam ipsi eandem, di-
 viditur in prismata quæ triangulares bases habent, & quæ
 ipsis opponuntur.

2. Prismata æque alta sunt inter se ut bases.

PROP. VIII. THEOR.


*Similes pyramides quæ triangulares bases habent, in
 triplicata sunt proportionem homologorum laterum.*

Sint similes & similiter positæ pyramides, quarum bases
 quidem triangula ABC DEF , vertices autem G H puncta.
 dico $ABCG$ pyramidem ad pyramidem $DEFH$, triplicatam
 proportionem habere ejus quam BC habet ad EF . comple-
 antur enim $BGML$ $EHPO$ solida parallelepipeda. & quo-
 niam pyramis $ABCG$ similis est pyramidi $DEFH$, erit ^a an-
 gulus ABC angulo DEF æqualis, angulusque GBC æqualis
 angulo HEF , & angulus ABC angulo DEH . atque ^b est ut
 AB ad DE , ita BC ad EF , & BG ad EH . quoniam igitur est
 ut

^a 9. Def.
 undecimi.
^b 1. Def.
 sex.

ut AB ad DE , ita BC ad EF , & circum æquales angulos latera sunt proportionalia, parallelogrammum BM parallelogrammo EP simile erit, eadem ratione, & parallelogrammum BN simile est parallelogrammo ER , & parallelogrammum BK simile est parallelogrammo EX .

tria igitur parallelogramma BM KB BN tribus EP EX ER sunt similia. sed tria quidem MB BK BN tribus oppositis æqualia



& similia sunt, tria vero EP EX ER tribus oppositis æqualia & similia. quare solida $BGML$ $EHPO$ similibus planis & numero æqualibus continentur; ac propterea simile est $BGML$ solidum solido $EHPO$. similia autem solida parallelepipeda in triplicata sunt proportionem homologorum laterum. ergo solidum $BGML$ ad solidum $EHPO$ triplicatam habet proportionem ejus quam habet latus homologum BC ad EF homologum latus. sed ut $BGML$ solidum ad solidum $EHPO$, ita $ABCG$ pyramis ad pyramidem $DEFH$; pyramis enim sexta pars est ipsius solidi, cum prisma quod est dimidium solidi parallelepipedi, sit pyramidis triplum. quare & pyramis $ABCG$ ad pyramidem $DEFH$ triplicatam proportionem habebit ejus quam BC habet ad EF . Quod demonstrare oportebat.

c. 33. undecimi.

d. 15. quinti.

Cor. Ex hoc perspicuum est, & similes pyramides quæ multangulas bases habent, inter se esse in triplicata proportionem homologorum laterum. ipsis enim divis in pyramides triangulares bases habentes: quoniam & similia polygonæ, quæ sunt in basibus; in similia triangula dividuntur, & numero æqualia & homologa totis; erit ut una pyramis in una pyramide triangularem habens basim ad pyramidem in altera triangularem basim habentem, ita & omnes pyramides in una pyramide triangulares habentes bases ad omnes in altera triangulares bases habentes; hoc est, ita pyramis ipsa multangulam habens basim ad pyramidem quæ multangulam basim habet. sed pyramis triangularem habens basim ad pyramidem quæ triangularem basim habet, est in triplicata proportionem homologorum laterum. & pyramis igitur polygonam habens basim ad pyramidem similem basim habentem, triplicatam proportionem habebit ejus quam latus homologum habet ad homologum latus.



PROP. IX. THEOR.

Equalium pyramidum, & triangulares bases habentium, bases & altitudines reciproce sunt proportionales: & quarum pyramidum triangulares bases habentium bases & altitudines reciproce sunt proportionales, illæ sunt æquales.

Sint nempe pyramides æquales, quæ triangulares bases habeant $ABC DEF$, vertices vero $G H$ puncta. dico pyramidum $ABGG DEFH$ bases & altitudines reciprocari; scilicet ut ABC basis ad basim DEF , ita esse pyramidis $DEFH$ altitudinem ad altitudinem pyramidis $ABCG$. compleantur enim $BGMK EHPO$ solida parallelepipeda. & quoniam pyramis $ABCG$ est æqualis pyramidi $DEFH$, atque est pyramidis quidem $ABCG$ sextuplum $BGML$ solidum, pyramidis vero $DEFH$ sextuplum solidum $EHPO$; erit & solidum $BGML$ solido $EHPO$ æquale. æqualium autem solidorum parallelepipedorum bases & altitudines reciprocantur.

415. quinti.
634. undecimi.

b. est igitur ut BM basis ad basim EP , ita $EHPO$ solidi altitudo ad altitudinem solidi $BGML$. sed ut BM basis ad basim EP , ita & ABC triangulum ad triangulum DEF . ergo



& ut ABC triangulum ad triangulum DEF , ita solidi $EHPO$ altitudo ad altitudinem solidi $BGML$. sed solidi quidem $EHPO$ altitudo eadem est cum altitudine pyramidis $DEFH$; solidi vero $BGML$ altitudo eadem est cum altitudine pyramidis $ABCG$: est igitur ut ABC basis ad basim DEF , ita pyramidis $DEFH$ altitudo ad altitudinem pyramidis $ABCG$. quare pyramidum $ABCG DEFH$ bases & altitudines reciproce sunt proportionales. Et si pyramidum $ABCG DEFH$ bases & altitudines reciproce sunt proportionales, fitque ut ABC basis ad basim DEF , ita pyramidis $DEFH$ altitudo ad altitudinem pyramidis $ABCG$: dico $ABCG$ pyramidem pyramidi $DEFH$ æqualem esse. iisdem enim constructis, quoniam ut ABC basis ad basim DEF , ita est $DEFH$ pyramidis altitudo ad altitudinem pyramidis $ABCG$; ut autem ABC basis ad basim DEF , ita BM parallelogrammum ad parallelogrammum EP : erit & ut parallelogrammum BM ad EP parallelogrammum, ita pyramidis $DEFH$ altitudo ad altitudinem


nem pyramidis $ABCG$. sed pyramidis quidem $DEFH$ altitudo eadem est cum altitudine solidi parallelepipedum $EHPO$; pyramidis vero $ABCG$ altitudo eadem est cum altitudine solidi parallelepipedum $BGML$: est igitur ut BM basis ad basim EP , ita $EHPO$ solidi parallelepipedum altitudo ad altitudinem solidi parallelepipedum $BGML$. quorum autem solidorum parallelepipedorum bases & altitudines reciprocantur, ea ^{634. unde-} sunt æqualia. solidum igitur parallelepipedum $BGML$ æquale cimi. est solido parallelepipedo $EHPO$. atque est solidi quidem $BGML$ sexta pars pyramidis $ABCG$: solidi vero $EHPO$ itidem sexta pars pyramidis $DEFH$. ergo pyramidis $ABCG$ pyramidis $DEFH$ est æqualis. Æqualium igitur pyramidum, & triangulares bases habentium, bases & altitudines reciproce sunt proportionales: & quarum pyramidum triangulares bases habentium bases & altitudines reciproce sunt proportionales, illæ sunt æquales. Quod oportebat demonstrare.

PROP. X. THEOR.

Omnis conus tertia pars est cylindri, qui eandem basim habet & altitudinem æqualem.

Habeat conus eandem basim quam cylindrus, videlicet circulum $ABCD$, & altitudinem æqualem. dico conum tertiam partem esse cylindri, hoc est cylindrum coni triplum esse. Si enim cylindrus non sit triplus coni, vel major erit quam triplus, vel minor. sit primo major quam triplus. & describatur in $ABCD$ circulo quadratum $ABCD$. ergo quadratum $ABCD$ majus est quam dimidium $ABCD$ circuli. & à quadrato $ABCD$ erigatur prisma æque altum cylindro.


quod quidem prisma majus erit quam cylindri dimidium; quoniam si circa circulum $ABCD$ quadratum describatur, erit inscriptum quadratum dimidium circumscripti. & sint ab eisdem basibus erecta solida parallelepipeda æque alta, nimirum prismata ipsa.



quare prismata inter se sunt æ ut bases. & ^{42. Cor. 7.} prisma igitur erectum à quadrato $ABCD$ dimidium est prismatis erecti à quadrato quod circa circulum $ABCD$ describitur. atque est cylindrus minor prismate erecto à quadrato quod describitur circa circulum $ABCD$. prisma igitur erectum à quadrato $ABCD$ æque altum cylindro, dimidio cylindri est majus. secentur circumferentiæ $ABBCDDA$ bifariam in punctis $EFGH$, & $AE EB BF FC CG GD DH$ ^{hujus.}

¶ sequitur
ex 2. hujus.


HA jungantur. unumquodque igitur triangulorum AEB BFC CGD DHA majus est dimidio portionis circuli $ABCD$, in qua consistit. erigantur ab unoquoque triangulorum AEB BFC CGD DHA prismata æque alta cylindro. ergo & unumquodque erectorum prismatum majus est dimidio portionis cylindri quæ ad ipsum est. quoniam si per puncta $EFGH$ parallelæ ipsis $ABBCDDA$ ducantur, & compleantur in ipsis $ABBCDDA$ parallelogramma, à quibus solida parallelepipeda æque alta cylindro erigantur: erunt uniuscujusque erectorum dimidia prismata ea quæ sunt in triangulis AEB BFC CGD DHA . & sunt cylindri portiones erectis solidis parallelepipedis minores. ergo & prismata quæ in triangulis AEB BFC CGD DHA majora sunt dimidio portionum cylindri quæ ad ipsa sunt. itaque reliquas circumferentias secantes bifariam, jungentesque rectas lineas, & ab unoquoque triangulorum erigentes prismata æque alta cylindro, & hoc semper facientes, tandem relinquemus quasdam portiones cylindri quæ sint minores excessu quo cylindrus coni triplum superat. relinquuntur jam, & sint AEB BFC CGD DH HA . reliquum igitur



¶ 1. Cor.
hujus.

prisma, cujus basis quidem polygonum $AEBFCGDH$, altitudo autem eadem quæ cylindri, majus est quàm triplum coni. sed prisma cujus basis $AEBFCGDH$ polygonum, & altitudo eadem quæ cylindri, triplum est pyramidis, cujus basis polygonum $AEBFCGDH$, vertex autem idem qui coni. & pyramis igitur cujus basis polygonum $AEBFCGDH$, vertex autem idem qui coni, major est cono qui basim habet $ABCD$ circumum. sed & minor; (ab ipso enim comprehenditur.) quod fieri non potest. non igitur cylindrus major erit quàm triplus coni. dico insuper neque cylindrum minorem esse quàm triplum coni. si enim fieri potest, sit cylindrus minor quàm triplus coni. erit invertendo conus major quam tertia pars cylindri. describatur in $ABCD$ circulo quadratum $ABCD$. ergo quadratum $ABCD$ majus est quàm dimidium $ABCD$ circuli. & à quadrato $ABCD$ erigatur pyramis, verticem habens eundem quem conus. pyramis igitur erecta major est quàm coni dimidium: quoniam, ut ante demonstravimus, si circa circumum quadratum describatur, erit quadratum $ABCD$ dimidium ejus quod circa circumum descriptum est: & si à quadratis erigantur solida parallelepipeda æque alta cono, quæ & prismata appellantur,


pellantur, erit quod à quadrato $ABCD$ erigitur, dimidium ejus, quod erectum est à quadrato circa circulum descripto; etenim inter se sunt ut bases. quare & tertiæ partes ipsarum. pyramis igitur cujus basis quadratum $ABCD$, dimidia est ejus pyramidis quæ à quadrato circa circulum descripto erigitur. sed pyramis erecta à quadrato descripto circa circulum, major est cono; ipsum namque comprehendit. ergo pyramis cujus basis $ABCD$ quadratum, vertex autem idem qui cono, major est quàm cono dimidium. secantur circumferentiæ $ABBCDDA$ bifariam in punctis $EFGH$. & jungantur $AE EB BF FC CG GD DH HA$. & unumquodque igitur triangulorum $AEB BFC CGD DHA$ majus est quàm dimidium portionis circuli $ABCD$, in qua consistit. erigantur ab unoquoque triangulorum $AEB BFC CGD DHA$ pyramides verticem habentes eundem quem conus. ergo & unaquæque pyramidem eodem modo erectarum major est quàm dimidium portionis cono quæ est ad ipsam. itaque reliquas circumferentias secantes bifariam, jungentesque rectas lineas, & ab unoquoque triangulorum erigentes pyramides verticem habentes eundem quem conus, & hoc semper facientes, relinquemus tandem quasdam cono portiones quæ minores erunt excessu quo conus tertiam cylindri partem superat. relinquuntur; & sint quæ in ipsis $AE EB BF FC CG GD DH HA$. reliqua igitur pyramis cujus basis polygonum $AEBFCGDH$, & vertex idem qui cono, major est quàm tertia cylindri pars. sed pyramis cujus basis polygonum $AEBFCDH$, vertex autem idem qui cono, tertia pars est prismatis cujus basis polygonum $AEBFCDH$, altitudo autem eadem quæ cylindri. prisma igitur cujus basis $AEBFCGH$ polygonum, & altitudo eadem quæ cylindri, majus est cylindro cujus basis est circulus $ABCD$. sed & minus: (ab ipso enim comprehenditur.) quod fieri non potest. non igitur cylindrus minor est quàm triplus cono. ostensum autem est neque majorem esse quàm triplum. ergo cylindrus cono triplus sit necesse est; ac propterea conus tertia pars cylindri. Omnis igitur conus tertia pars est cylindri, eandem quam ipse basim habentis, & altitudinem æqualem. Quod demonstrare oportebat.



PROP. XI. THEOR.



Coni & cylindri qui eandem habent altitudinem, inter se sunt ut bases.

Sint in eadem altitudine conī & cylindri, quorum bases circuli $ABCD$ $EFGH$, axes autem KL MN , & diametri basium AC EG . dico ut $ABCD$ circulus ad circulum $EFGH$, ita esse conum AL ad EN conum. Si enim non ita sit; erit ut $ABCD$ circulus ad circulum $EFGH$, ita conus AL ad aliquod solidum minus cono EN , vel ad majus. sit primo ad minus quod sit x . & quo minus est solidum x cono EN , ei æquale sit y solidum. conus igitur EN ipsis solidis x y est æqualis. describatur in $EFGH$ circulo quadratum $EFGH$, quod majus est dimidio circuli. erigatur à quadrato $EFGH$ pyramis æque alta cono. pyramis igitur erecta major est conī dimidio. nam si circa circulum quadratum describamus, & ab ipso erigamus pyramidem æque altam cono; erit inscripta pyramis pyramidis circumscriptæ dimidium; etenim inter se sunt ut bases. conus autem



6. hujus.

circumscripta pyramide est minor. ergo pyramis cujus basis quadratum $EFGH$, vertex autem idem qui conī, major est conī dimidio. secentur circumferentiæ EF FG GH HE bifariam in punctis P R S O ; & OE EP PF FR RG GS SH jungantur. unumquodque igitur triangulorum HOE EPF FRG GSH majus est quam dimidium segmenti circuli in quo consistit. erigatur ab unoquoque triangulorum HOE EPF FRG GSH pyramis æque alta cono. ergo & unaquæque erectarum pyramidum major est dimidio portionis conī, quæ est ad ipsam. itaque reliquas circumferentias secantes bifariam, & jungentes rectas lineas, & ab unoquoque triangulorum erigentes pyramides æque altas cono, atque hoc semper facientes, relinquemus tandem aliquas portiones conī, quæ solido i minores erunt. relinquuntur, & sint quæ in ipsis HO OE EP PF FR RG GS SH .



s. H. reliqua igitur pyramis cujus basis polygonum HOEF-
 FRGS, altitudo autem eadem quæ coni, major est solido
 x. describatur in circulo ABCD polygono HOEFPRGS
 simile & similiter positum polygonum DTAYBQCV, & ab
 ipso erigatur pyramis æque alta cono AL. quoniam igitur
 est ut quadratum ex AC ad quadratum ex EG, ita DTAY- 1. hujus.
 BQCV polygonum ad polygonum HOEFPRGS; ut autem
 quadratum ex AC ad quadratum ex EG, ita ABCD circulus
 ad circulum EFGH: erit ut ABGD circulus ad circulum 2. hujus.
 EFGH, ita polygonum DTAYBQCV ad polygonum HO-
 EFPRGS. sed ut ABCD circulus ad circulum EFGH, ita
 conus AL ad x solidum: & ut polygonum DTAYBQCV
 ad polygonum HOEFPRGS, ita pyramis cujus basis DTAY-
 BQCV polygonum, vertex autem punctum L, ad pyrami-
 dem cujus basis polygonum HOEFPRGS, & vertex pun-
 ctum N. ut igitur conus AL ad x solidum, ita pyramis,
 cujus basis polygonum DTAYBQCV, & vertex punctum
 L, ad pyramidem cujus basis polygonum HOEFPRGS, &
 vertex punctum N. conus autem AL major est pyramide
 quæ est in ipso. majus igitur est solidum x pyramide
 quæ est in cono EN. sed & ostensum est minus. quod fieri non
 potest. non igitur ut ABCD circulus ad circulum EFGH,
 ita est AL conus ad solidum aliquod minus cono EN. si-
 militer demonstrabitur neque ut EFGH circulus ad circu-
 lum ABCD, ita esse conum EN ad aliquod solidum minus
 cono AL. dico præterea neque esse ut ABCD circulus ad
 circulum EFGH, ita AL conum ad aliquod solidum majus
 cono EN. si enim fieri potest, sit ad solidum majus, quod
 sit Z. ergo invertendo ut EFGH circulus ad circulum ABCD,
 ita erit solidum Z ad AL conum. sed cum sit solidum Z
 majus cono EN; erit ut solidum Z ad AL conum, ita conus
 EN ad aliquod solidum minus cono AL. & igitur ut EFGH
 circulus ad circulum ABCD, ita conus EN ad aliquod so-
 lidum minus cono AL, quod fieri non posse ostensum est.
 non igitur ut ABCD circulus ad circulum EFGH, ita conus
 AL ad aliquod solidum majus cono EN. ostensum autem est
 neque esse ad minus. ergo ut ABCD circulus ad circulum
 EFGH, ita est conus AL ad EN conum. sed ut conus ad
 conum, ita est cylindrus ad cylindrum; est enim uterque 15. quinti.
 utriusque triplus. & igitur ut ABCD circulus ad circulum
 EFGH, ita in ipsis cylindri æque alti conis. Ergo coni &
 cylindri qui eandem habent altitudinem, inter se sunt ut
 bases. Quod demonstrare oportebat.

PROP. XII. THEOR.

*Similes conī & cylindri inter se sunt in triplicata pō-
portionē diametrorum quæ sunt in basibus.*



Sint similes conī & cylindri, quorum bases quidem cir-
culi ABCD EFGH, diametri vero basium BD FH, & axes
conorum vel cylindrorum KL MN. dico conum cujus ba-
sis ABCD circulus, vertex autem punctum L, ad conum
cujus basis basis circulus EFGH, vertex autem N punctum, tri-
plicatam habere proportionem ejus quam habet BD ad FH.
si enim non habet conus ABCDL ad conum EFGHN tri-
plicatam proportionem ejus quam BD habet ad FH, habe-
bit ABCDL conus ad

aliquod solidum mi-
nus cono EFGHN tri-
plicatam proportio-
nem, vel ad majus. ha-
beat primo ad minus,
quod sit x. & descri-
batur in EFGH. circu-
lo quadratum EFGH.
quadratum igitur EF-
GH majus est dimidio EFGH circuli. & erigatur à qua-
drato EFGH pyramis æque alta cono. ergo erecta pyramis
major est quam conī dimi-
dium. itaque secentur EF

FG GH HE circumferentiæ
bisariam in punctis O P R S,
& jungantur EO OF FPPG
GR RH HS SE. unumquod-
que igitur triangulorum EOF
EPG GRH HSE majus est

dimidio segmenti circuli EFGH, in quo consistit. & eri-
gatur ab unoquoque triangulorum EOF FPG GRH HSE
pyramis eundem verticem habens quem conus. ergo &
unaquæque erectarum pyramidum major est quam dimidium
portionis conī, quæ est ad ipsam. secantes igitur reliquas
circumferentiæ bisariam, jungentesque rectas lineas, & ab uno-
quoque triangulorum erigentes pyramides eundem habentes
verticem quem conus, atque hoc semper facientes, tandem
relinquemus quasdam conī portiones quæ minores erunt
excessu quo conus EFGHN ipsum x solidum superat. re-
linquantur, & sint quæ in ipsis EO OF FPPG GR RH HS
SE. reliqua igitur pyramis cujus basis quidem polygonum

EOFP



$EOFPGRHS$, vertex autem N punctum, major est solido x .
 describatur etiam in circulo $ABCD$, polygono $EOFPGRHS$
 simile & similiter positum polygonum $ATBYCVDQ$: à quo
 erigatur pyramis eundem verticem habens quem conus: &
 triangulorum continentium pyramidem cujus basis quidem
 est polygonum $ATBYCVDQ$, vertex autem punctum L , unum
 sit $LB T$; triangulorum vero continentium pyramidem cujus
 basis $EOFPGRHS$ polygonum, & vertex punctum N , unum
 sit NFO : & jungantur $KT MO$. quoniam igitur conus $ABCDL$
 similis est cono $EFGHN$, erit ut BD ad FH , ita KL axis ad
 axem MN . ut autem BD ad FH , ita BK ad FM . itaque ut
 BK ad FM ita KL ad MN : & permutando ut BK ad KL , ita FM
 ad MN . & cum perpendicularis utraque est, & circa æquales
 angulos $BKL FMN$ latera sunt proportionalia: simile igitur
 est BKL triangulum triangulo FMN . Rursus quoniam
 est ut BK ad KT , ita FM ad MO , & circa æquales angulos
 $BKT FMO$ latera sunt proportionalia; etenim quæ pars est
 angulus BKT quatuor rectorum qui sunt ad K centrum, ea-
 dem est pars & angulus FMO quatuor rectorum qui sunt
 ad centrum M : erit BKT triangulum triangulo FMO simi-
 le. & quoniam ostensum est ut BK ad KL , ita esse FM ad
 MN ; æqualis autem est BK ipsi KT , & FM ipsi MO : erit
 ut TK ad KL , ita OM ad MN : & circa æquales angulos
 $TKL OMN$ latera sunt proportionalia; recti enim sunt: tri-
 angulum igitur LKT simile est triangulo MNO . quod cum
 ob similitudinem triangulorum $BKL FMN$, sit ut LB ad BK ,
 ita NF ad FM ; ob similitudinem vero triangulorum BKT
 FMO , ut KB ad BT , ita MF ad FO : erit ex æquali ut LB
 ad BT , ita NF ad FO . rursus cum ob similitudinem trian-
 gulorum $LTK NOM$, sit ut LT ad TK , ita NO ad OM ; &
 ob similitudinem triangulorum $KBT OMF$, ut KT ad TB ,
 ita MO ad OF : ex æquali erit ut LT ad TB , ita NO ad OF .
 ostensum autem est & ut TB ad BL , ita OF ad FN . quare
 rursus ex æquali ut TL ad LB , ita ON ad NF . triangulo-
 rum igitur $LTB NOF$ proportionalia sunt latera, ideoque
 æquiangula sunt $LTB NOF$ triangula, & inter se similia.
 quare & pyramis cujus basis triangulum BKT , vertex au-
 tem L punctum, similis est pyramidi cujus basis FMO tri-
 angulum, & vertex punctum N ; similibus enim planis con-
 tinentur, & multitudine æqualibus. pyramides autem simi-
 les, & quæ triangulares bases habent, in triplicata sunt pro-
 portione homologorum laterum. ergo pyramis $BKTL$ ad
 pyramidem $FMON$ triplicatam habet proportionem ejus
 quam BK habet ad FM . similiter à punctis quidem $A Q D V$
 $C Y$ ad K , à punctis vero $E S H R G P$ ad M ducentes rectas
 lineas


17. quinti.

6. sexti.

8. hujus.



lineas, & à triangulis erigentes pyramides vertices eisdem habentes quos coni, ostendemus & unamquamque pyramidum ejusdem ordinis ad unamquamque alterius ordinis triplicatam proportionem habere ejus quam habet BK latus ad homologum latus MF, hoc est quam BD ad

¶ 12. quinti. FH. sed ut unum antecedentium ad unum consequentium, ita omnia antecedentia ad omnia consequentia. est igitur & ut BKTL pyramis ad pyramidem FMON, ita tota pyramis cujus basis ATBYCVDQ polygonum, vertex autem punctum L, ad totam pyramidem cujus basis polygonum EOFPGRHS, & vertex punctum N. quare & pyramis cujus basis ATBYCVDQ polygonum, vertex autem punctum L, ad pyramidem cujus basis polygonum



EOFPGRHS, & vertex punctum N, triplicatam proportionem habet ejus quam BD habet ad FH. ponitur autem conus cujus basis circulus AB

CD vertex autem punctum L, ad solidum x triplicatam proportionem habere ejus quam BD ad FH. ut igitur conus cujus basis circulus ABCD, vertex autem punctum L, ad solidum x, ita est



pyramis cujus basis ATBYCVDQ polygonum, vertex autem punctum L, ad pyramidem cujus basis polygonum EOFPGRHS, & vertex punctum N. dictus autem conus major est pyramide quæ in ipso; etenim eam comprehendit. majus igitur est & solidum x pyramide cujus basis polygonum EOFPGRHS, vertex autem punctum N. sed & minus. quod fieri non potest. non igitur conus cujus basis ABCD circulus, & vertex punctum L, ad aliquod solidum minus cono cujus basis circulus EFGH, & vertex N punctum, triplicatam proportionem habet ejus quam BD habet ad FH. similiter demonstrabimus neque conum EFGHN ad aliquod solidum minus cono ABCDL triplicatam proportionem habere ejus quam habet FH ad BD. itaque dico neque ABCDL conum ad solidum majus cono EFGHN triplicatam habere proportionem ejus quam BD habet ad FH. si enim fieri potest, habeat ad aliquod solidum majus, quod fit z. in-


vertendo

vertendo igitur, solidum Z ad conum $ABCDL$ triplicatam proportionem habet ejus quam FH ad BD . cum autem est solidum Z majus cono $EFGHN$; erit ut solidum Z ad conum $ABCDL$, ita $EFGHN$ conus ad aliquod solidum minus cono $ABCDL$. ergo & conus $EFGHN$ ad solidum aliquod minus cono $ABCDL$ triplicatam proportionem habebit ejus quam FH habet ad BD , quod fieri non posse demonstratum est. non igitur $ABCDL$ conus ad solidum aliquod majus cono $EFGHN$, triplicatam proportionem habet ejus quam BD ad FH . ostensum autem est neque ad minus. quare conus $ABCDL$ ad $EFGHN$ conum triplicatam proportionem habet ejus quam BD ad FH . ut autem conus ad conum, ita cy- 15. *quinti.*
lindrus ad cylindrum. cylindrus enim in eadem existens basi in qua conus, & ipsi æque altus, conus f triplus est. cum f 10. *hujus.*
ostensum sit, omnem conum tertiam partem esse cylindri eandem quam ipse basim habentis, & æqualem altitudinem. ergo & cylindrus ad cylindrum triplicatam proportionem habebit ejus quam BD habet ad FH . Similes igitur coni & cylindri inter se sunt in triplicata proportionem diametrorum quæ sunt in basibus. Quod demonstrare oportebat.

PROP. XIII. THEOR.


Si cylindrus plano secetur oppositis planis parallelo, erit ut cylindrus ad cylindrum, ita axis ad axem.

Cylindrus enim AD plano GH secetur oppositis planis AB CD parallelo, & occurrat axi EF in K puncto. dico ut BG cylindrus ad cylindrum GD , ita esse EK axem ad axem KF . producatz enim EF axis ex utraque parte ad puncta LM : & ipsi quidem EK axi ponantur æquales quotcunque EN NL ; ipsi vero FK æquales quotcunque FX XM : & per puncta L N X M ducantur plana ipsis $ABCD$ parallela: atque in planis per L N X M circa centra L N X M intelligantur circuli OP RS TY VQ æquales ipsis AB CD ; & cylindri PR RB DT TQ intelligantur. quoniam igitur axes LN NE EK inter se sunt æquales, erunt cylindri PR RB BG inter se ut bases. æquales autem sunt bases. ergo & cylindri PR RB BG sunt æquales. quod cum axes LN NE EK inter se



22. *hujus.*

se æquales sint, itemque cylindri $PRRB BG$ inter se æquales; sitque ipsorum $LNNE EK$ multitudo æqualis multitudini ipsorum $PRRB BG$: quotuplex est axis KL ipsius EK axis, totuplex erit & PG cylindrus cylindri GB . eadem ratione & quotuplex est MK axis ipsius axis KF , totuplex est & QG cylindrus cylindri GD . & si quidem axis KL sit æqualis axi KM , erit & PF cylindrus cylindro GQ æqualis; si autem axis LK major sit axe KM , & cylindrus PG major erit cylindro GQ ; & si minor minor. quatuor igitur existentibus magnitudinibus, videlicet axibus $EK KF$, & cylindris $BG GD$, sumpta sunt æque multiplicia, axis quidem EK , & BG cylindri, nempe axis KL , & cylindrus PG ; axis vero KF , & cylindri GD æque multiplicia, axis scilicet KM , & GQ cylindrus: & demonstratum est si LK axis superat axem KM , & PG cylindrum superare cylindrum GQ ; & si æqualis æqualem; & si minor minorem. est igitur axis EK ad axem KF , ut BG cylindrus ad cylindrum GD . Quare si cylindrus plano secetur oppositis planis parallelo, erit ut cylindrus ad cylindrum, ita axis ad axem. Quod demonstrare oportebat.




6. Def. quinti.

PROP. XIV. THEOR.

In æqualibus basibus existentes coni & cylindri, inter se sunt ut altitudines.

Sint enim in æqualibus basibus $AB CD$, cylindri $EBFD$. dico ut EB cylindrus ad cylindrum FD , ita esse GH axem ad axem KL . Producatur enim KL axis ad punctum N ; ponaturque ipsi GH axi æqualis LN ; & circa axem LN intelligatur cylindrus CM . quoniam igitur cylindri $EB CM$ eandem habent altitudinem, inter se sunt ut bases. bases autem sunt æquales. ergo & cylindri $EB CM$ inter se æquales erunt. & quoniam cylindrus FM secatur plano CD ,



11. hujus.

13. hujus. oppositis planis parallelo, erit ut CM


cylindrus.

cylindrus ad cylindrum FD , ita axis LN ad KL axem. æqualis autem est cylindrus quidem CM cylindro EB ; axis vero LN axi GH . est igitur ut EB cylindrus ad cylindrum FD , ita axis GH ad KL axem. ut autem EB cylindrus ad cylindrum FD , ita ABG conus ad conum CDK ; cylindri sunt enim conorum $\frac{4}{3}$ tripli. ergo & ut GH axis ad axem KL , ita est ABG conus ad conum CDK , & cylindrus EB ad FD cylindrum. In basibus igitur æqualibus existentes coni & cylindri, inter se sunt ut altitudines. Quod demonstrare oportebat.

PROP. XV. THEOR.


Æqualium conorum & cylindrorum bases & altitudines reciproce sunt proportionales; & quorum conorum & cylindrorum bases & altitudines reciproce sunt proportionales, illi inter se sunt æquales.

Sint æquales coni & cylindri, quorum bases quidem $ABCD$ $EFGH$ circuli, & diametri ipsorum AC EG ; axes autem KL MN ; qui quidem & conorum vel cylindrorum sunt altitudines: & compleantur cylindri AX EO . dico cylindrorum AX EO bases & altitudines reciproce proportionales esse, hoc est, ut $ABCD$ basis ad basim $EFGH$, ita esse altitudinem MN ad altitudinem KL . altitudo enim KL vel æqualis est altitudini MN , vel non æqualis. Sit primo æqualis. atque est AX cylindrus æqualis cylindro EG . qui autem eandem habent altitudinem coni & cylindri inter se sunt ut bases. æqualis igitur est basis $ABCD$ basi $EFGH$. est igitur ut basis $ABCD$ ad $EFGH$ basim, ita MN altitudo ad altitudinem KL . non sit autem altitudo KL altitudini MN æqualis, sed major sit MN , & auferatur ab ipsa MN altitudini LK æqualis PM , & per P secetur EO cylindrus plano TYS , oppositis planis circulorum $EFGH$ RO parallelo, intelligaturque cylindrus ES cujus basis quidem $EFGH$ circulus, altitudo autem PM . quoniam igitur AX cylindrus æqualis est cylindro EO , alius autem aliquis est cylindrus ES ; erit ut AX cylindrus ad cylindrum ES , ita cylindrus EO ad ES cylindrum. Sed ut AX cylindrus ad cylindrum ES , ita basis $ABCD$ ad $EFGH$ basim; cylindri enim AX ES eandem habent altitudinem: ut autem cylindrus EO ad ES cylindrum



¶ 11. hujus.

13. hujus. drum α , ita MN altitudo ad altitudinem MP ; nam cylindrus EO secatur plano TY s, oppositis planis parallelo. est igitur ut $ABCD$ basis ad basim $EFGH$, ita altitudo MN ad MP altitudinem. æqualis autem est MP altitudo altitudini KL . quare ut basis $ABCD$ ad $EFGH$ basim, ita MN altitudo ad altitudinem KL . æqualium igitur cylindrorum AX EO bases & altitudines reciproce sunt proportionales.




Sed si cylindrorum AX EO bases & altitudines sunt reciproce proportionales: hoc est, ut $ABCD$ basis ad basim $EFGH$, ita altitudo MN ad KL altitudinem. dico AX cylindrum cylindro EO æqualem esse. iisdem enim constructis; quoniam ut $ABCD$ basis ad basim $EFGH$, ita altitudo MN ad KL altitudinem; altitudo autem KL æqualis est altitudini MP : erit ut $ABCD$ basis ad basim $EFGH$, ita MN altitudo ad altitudinem MP . sed ut $ABCD$ basis ad basim $EFGH$, ita AX cylindrus ad cylindrum ES ; eandem enim habent altitudinem. ut autem

21. hujus. MN altitudo ad altitudinem MP , ita α cylindrus EO ad ϵ s cylindrum. est igitur ut AX cylindrus ad cylindrum ES , ita cylindrus EO ad ϵ s cylindrum. cylindrus igitur AX cylindro EO est æqualis. similiter autem & in conis. Quod demonstrare oportebat.

PROP. XVI. THEOR.

Duobus circulis circa idem centrum existentibus, in majori polygonum æqualium & numero parium laterum describere, quod minorem circum non tangat.

Sint dati duo circuli $ABCD$ $EFGH$ circa idem centrum K . oportet in majore circulo $ABCD$ polygonum æqualium & numero parium laterum describere, non tangens minorem circumulum $EFGH$. ducatur per K centrum recta linea BD , atque à puncto G ipsi BD ad rectos angulos ducatur AG , & ad C producat, quæ



16. tertii. AC circumulum $EFGH$ æ tanget.

Itaque circumferentiam BAD bifariam secantes, & ejus diamidum rursus bifariam, & hoc semper facientes, tandem relinquemus

linquemus circumferentiam minorem ipsa AD. relinquatur, sitque LD: & à puncto L ad BD perpendicularis agatur LM, & ad N producat; junganturque LD DN. ergo LD ipsi DN est æqualis, & quoniam LN parallela est AC, & AC tangit circumulum EFGH; ipsa LN circumulum EFGH non tanget. & multo minus tangens circumulum EFGH rectæ lineæ LD DN. quod si ipsi LD æquales deinceps circulo ABCD aptabimus, describetur in eo polygonum æqualium & numero parium laterum non tangens minorem circumulum EFGH. Quod facere oportebat.

PROP. XVII. PROBL.


Duabus sphaeris circa idem centrum existentibus, in majori solidum polyhedrum describere, quod minoris sphaeræ superficiem non tangat.

Intelligentur duæ sphaeræ circa idem centrum A. oportet in majori sphaera describere solidum polyhedrum minoris sphaeræ superficiem non tangens. secantur sphaeræ plano aliquo per centrum ducto: sectiones erunt circuli; quoniam diametro manente & semicirculo circumducto sphaera facta est: ergo in quacunque positione semicirculum intelligamus, quod per ipsum producit planum in superficie sphaeræ circumulum efficiet; & constat circumulum esse maximum, cum diameter sphaeræ quæ & semicirculi diameter est, major sit omnibus rectis lineis quæ in circulo vel sphaera ducuntur. sit igitur in majori quidem sphaera circulus BCDE, in minori autem circulus FGH; & ducantur ipsorum duæ diametri ad rectos inter se angulos BD CE. occurrat BD minori circulo in G; ducatur à puncto G ipsi AG ad rectos angulos GL, & jungatur AL. itaque circumferentiam EB bifariam secantes, & dimidium ipsius bifariam, atque hoc semper facientes, tandem relinquemus quandam circumferentiam minorem ea parte circumferentiæ circuli BCD, quæ subtenditur à recta æquali ipsi GL. relinquatur, sitque circumferentia BK. minor igitur est recta BK quam GL; eritque BK latus polygoni æqualium & parium numero laterum non tangentis minorem circumulum. sint igitur polygoni latera in quadrante circuli BE, rectæ BK KL LM ME; & puncta K A producantur ad N: & à puncto A plano circuli BCDE ad rectos angulos constituitur AX, quæ superficiem sphaeræ in puncto X occurrat, & per AX & utramque ipsarum BD KN plana ducantur, quæ ex jam dictis efficient in superficie sphaeræ maximos circulos. itaque efficient, & sint in diametris BD

d 18. undecimi.

e 38. undecimi.

KN eorum semicirculi BxD KxN. quoniam igitur xA recta est ad planum circuli BCDE, erunt omnia plana quae per ipsam xA transeunt, ad idem circuli planum d recta: quare & semicirculi BxD KxN recti sunt ad idem planum. & quoniam semicirculi BED BxD KxN aequales sunt, in aequalibus enim consistunt BD KN diametris; erunt & eorum quadrantes BE BX KX inter se aequales. quot igitur latera polygoni sunt in quadrante BE, tot erunt & in quadrantibus BX KX, aequalia ipsis BK KL LM ME. describantur, & sint BO OP PR RX KS ST TY YX: junganturque SO TAYR; & ab ipsis OS ad planum circuli BCDE perpendiculares ducantur. cadent hae in communes plano-



rum sectiones BD KN, quoniam & plana semicirculorum BxD KxN ad planum circuli BCDE recta sunt. itaque cadant, sintque OV SQ, & VQ jungatur. cum igitur in aequalibus semicirculis BxD KxN, aequales circumferentiae sumptae sint BO KS, & ductae perpendiculares OV SQ, erit OV quidem ipsi SQ aequalis, BV vero aequalis KQ. est autem & tota BA aequalis toti KA. ergo & reliqua VA reliquae QA est aequalis. igitur ut BV ad VA, ita KQ ad QA: ideoque VQ ipsi BK parallela f est. quod cum utraque ipsarum OV SQ recta sit ad circuli BCDE planum, erit



f 2. sexti.


erit ov ipsi sos parallela. ostensa autem est & ipsi $aequa-$
 lis . ergo qv so $aequales$ sunt & parallelae. & quoniam
 qu parallela est ipsi so , sed & parallela ipsi kb ; erit &
 so ipsi kb parallela: & ipsas conjungunt so ks . ergo &
 kbo s quadrilaterum est in uno & plano: nam si duae rectae
lineae parallelae sint, & in utraque ipsarum quaevis puncta
sumantur, quae dicta puncta conjungit recta linea in eodem
est plano, in quo parallelae. & eadem ratione utraque ipso-
rum quadrilaterorum $sOPT$ $TPRY$ in uno sunt plano. est
autem in uno plano & triangulum YRX . si igitur a punctis
 OSP TRY ad A ductas rectas lineas intelligamus, con-
stituetur quaedam figura solida polyhedra inter circumferen-
tias BX KX , ex pyramidibus composita, quarum bases qui-
dem RBO s $sOPT$ $TPRY$ quadrilatera, & triangulum
 YRX ; vertex autem punctum A . quod si in unoquoque la-
terum KL LM ME , quemadmodum in kb eadem construa-
mus, & in reliquis tribus quadrantibus, & in reliquo he-
misphaerio constituetur figura quaedam polyhedra in sphaera
descripta, & composita ex pyramidibus, quarum bases sunt
quadrilatera jam dicta, & YRX triangulum, & quae ejus-
dem ordinis sunt, vertex autem A punctum. dico dictam
figuram polyhedram non tangere superficiem minoris sphae-
rae, in qua est circulus FGH . ducatur a puncto A ad pla-
num quadrilateri $kBSO$ perpendicularis AZ , cui in puncto
 Z occurrat, & BZ ZK jungantur. itaque quoniam AZ recta
est ad quadrilateri $kBSO$ planum, & ad omnes rectas li-
neas, quae ipsam contingunt, & in eodem sunt plano rectos
angulos faciet. ergo AZ ad utramque ipsarum BZ ZK est
perpendicularis. & quoniam AB est aequalis AK , erit &
quadratum ex AB quadrato ex AK aequale: & sunt quadrato
quidem ex AB aequalia quadrata ex AZ ZB , angulus
enim ad Z rectus est; quadrato autem ex AK aequalia ex
 AZ ZK quadrata. ergo quadrata ex AZ ZB quadratis ex
 AZ ZK aequalia sunt. commune auferatur quadratum ex AZ .
reliquum igitur quod ex BZ reliquo quod ex ZK est aequa-
le: ergo recta BZ rectae ZK aequalis. Similiter ostendemus,
& quae a puncto Z ad puncta OS ducuntur utrique ipsa-
rum BZ ZK aequales esse. circulus igitur centro Z & inter-
vallo una ipsarum ZB ZK descriptus etiam per puncta OS
transibit. & quoniam in circulo est BKS quadrilaterum, &
sunt aequales OB BK KS & minor OS , erit angulus BZK
obtusius; ideoque BK major quam BZ . sed & GL quam BK
est major multo. igitur major est GL quam BZ . & qua-
dratum ex GL quadrato ex BZ majus. & cum aequalis AL
ipsi AB , erit quadratum ex AL quadrato ex AB aequale:

analogum latus; hoc est, quam habet AB ex centro sphaerae circa centrum A existentis, ad eam, quae est ex centro alterius sphaerae. similiter & unaquaeque pyramis earum, quae sunt in sphaera circa centrum A , ad unamquamque pyramidum ejusdem ordinis, quae sunt in altera sphaera, triplicatam proportionem habebit ejus, quam habet AB ad eam, quae est ex centro alterius sphaerae. Et ut unum antecedentium ad unum consequentium, ita antecedentia omnia ad omnia consequentia. quare totum solidum polyhedrum, quod est in sphaera circa centrum A , ad totum solidum polyhedrum, quod in altera sphaera, triplicatam proportionem habebit ejus, quam habet AB ad eam quae est ex centro alterius sphaerae, hoc est, quam habet BD diameter ad alterius sphaerae diametrum.

PROP. XVIII. THEOR.

Sphaerae inter se in triplicata sunt proportionem suarum diametrorum.

Intelligentur sphaerae ABC DEF ; quarum diametri BC EF . dico ABC sphaeram ad sphaeram DEF triplicatam proportionem habere ejus, quam habet BC ad EF . Si enim non ita est, sphaera ABC ad sphaeram minorem ipsa DEF , vel ad majorem, triplicatam proportionem habebit ejus, quam habet BC ad EF . Habeat primo ad minorem, videlicet ad GHK . & intelligatur sphaera DEF circa idem centrum, circa quod sphaera GHK : describaturque in majori sphaera DEF solidum polyhedrum non tangens & minorem sphaeram GHK in superficie; & in sphaera ABC describatur solidum polyhedrum simile ei, quod in sphaera DEF descri-



ptum est. solidum igitur polyhedrum, quod in sphaera ABC , ad solidum polyhedrum, quod in sphaera DEF , triplicatam proportionem habet ejus, quam BC ad EF . habet autem ABC sphaera ad sphaeram GHK triplicatam proportionem ejus, quam BC ad BF . ergo ut ABC sphaera ad sphaeram GHK , ita solidum polyhedrum in sphaera ABC ad solidum polyhedrum in sphaera DEF ; & permutando, ut ABC sphaera

sphæra ad solidum polyhedrum, quod in ipsa est, ita $G H K$ sphæra ad solidum polyhedrum, quod in sphæra $D E F$. major autem est sphæra $A B C$ solido polyhedro, quod est in ipsa. ergo & $G H K$ sphæra polyhedro, quod in sphæra $D E F$, est major. sed & minor, ab ipso enim comprehenditur, quod fieri non potest. non igitur $A B C$ sphæra ad sphæram minorem ipsa $D E F$ triplicatam proportionem habet ejus, quam $B C$ ad $E F$. similiter ostendemus neque $D E F$ sphæram ad sphæram minorem ipsa $A B C$ triplicatam habere proportionem ejus, quam habet $E F$ ad $B C$. dico insuper sphæram $A B C$ neque ad majorem sphæram ipsa $D E F$ triplicatam proportionem habere ejus, quam $B C$ ad $E F$. si enim fieri potest, habeat ad majorem $L M N$. invertendo igitur, sphæra $L M N$ ad $A B C$ sphæram triplicatam proportionem habet ejus, quam diameter $E F$ ad $B C$ diametrum. ut autem sphæra $L M N$ ad $A B C$ sphæram, ita sphæra $D E F$ ad sphæram quandam minorem ipsa $A B C$, quoniam sphæra $L M N$ major est ipsa $D E F$. ergo & $D E F$ sphæra ad sphæram minorem ipsa $A B C$ triplicatam proportionem habet ejus, quam $E F$ ad $B C$; quod fieri non posse ostensum est, non igitur $A B C$ sphæra ad sphæram majorem ipsa $D E F$ triplicatam proportionem habet ejus, quam $B C$ ad $E F$. ostensum autem est neque ad minorem. ergo $A B C$ sphæra ad sphæram $D E F$ triplicatam proportionem habebit ejus, quam $B C$ ad $E F$. Quod demonstrare oportebat.

F I N I S.

**LIBRI Venales apud Henricum Clements
Bibliopolam Oxoniensem.**

Rogeri Afchami Epistolarum Libri Quatuor cui accessit Joannis Sturmii aliorumque ad Afchamum Angloſque Eruditos Epistolarum Liber unus 8vo Oxoniæ 1703.

Spicilegium SS. Patrum ut & Hæreticorum Seculi post Christum Natum 1. 2. 3. Cura Joannis Ernesti Grabii Editio Altera Auctior 2 vol. 8vo. Oxon. 1714

M.Fab.Quintilliani Declamationum Liber 8vo 1692

Sophoclis Tragediæ Ajax & Electra vol.1. Antigone & Trachiniæ Vol. 2d. Opera Thomæ Johnson. 1708.

C. Suetonii Tranquilli opera omnia notis Illustrata Oxonii. 1676.

Theodosii Sphæricorum Libri Tres. Gr. Lat. 8vo Oxon. 1707.

Elementa Arithmeticæ Numerosæ & Speciosæ Edwardi Wells Oxoniæ 1698. 8vo.

Græcæ Linguae Dialecti. in usum Scholæ Westmonasteriensis Opera ac studio Mich. Maittaire A. M. Londini 1712. 8vo.

Caspari Bartholini Specimen Philosophiæ Naturalis accedit de Fontium Fluviorumque Origine 12mo. 1713

Smith Aditus ad Logicam, & Elementa Logicæ Oxoniæ 1694.

Liberti Fromondi Meterrologicorum Libri sex Londini. 1670.

Musarum Anglicanarum Analecta 2 vol. 12mo 1714

Du Trieu manu ductio Logicam Oxoniæ 8vo 1678.

Morket de Politia Ecclesiæ Anglicanæ. Londini 1705.