

Notes du mont Royal

www.notesdumontroyal.com

Cette œuvre est hébergée sur « *Notes du mont Royal* » dans le cadre d'un exposé gratuit sur la littérature.

SOURCE DES IMAGES
Google Livres

EVCLIDIS

Catalogo SEX PRIMI Collegij
ELEMENTORUM GEO-
METRICORUM LIBRI CUM
Lothii PARTE UNDECIMI *Lehu*

Ex majoribus Clavij commentarijs
in commodiorem formam contracti

PER P. CHRISTOPHORUM GRIEN-
BERGERUM È SOCIETATE JESU

Præf. Accessit, item ferme ex Clavio Inscripta

BREVIS TRIGONOME-
tria planorum, cum Tabulis Si-
num, Tangentium, & Secan-

tium, ad partes Radij 100000 per
Fit: sex prima scrupula gra- *Phil:*
duum

Annus 1702
PER P. JACOBVM HONORA-
TVM DVRANDVM EIVSDEM
SOCIETATIS.

GRÆCII,

Apud Hæredes ERNESTI WIL-
HELMSTADII.

ANNO M. DC. XXXVI.

Ad Lectorem.

*Hic liber est parvus, spectatâ mole,
sed usum,*

*Si spectes, Lector, maximus
hic liber est.*

Instructio pro Bibliopego

Pagella figurarum eo loco sunt inscribenda,
ubi primo incipit esse illarum usus, pro-
ut ex cuiusq; superscriptione cognoscitur:
ad dextram autem singularum, adheret fo-
lium vacans, ut illud libello ita insuatur,
ut quando debet esse usus figurarum, illa ex-
tra libellum protendantur, & ad sinistram
rotâ pateant, sintq; semper oculis exposita
quacunq; libelli pagina legatur.

IMPRIMATUR

Alphonfus Seidetti So-
cietatis J E S U, Vniversi-
tatis Cancellarius.

REVERENDISSI-
MIS, ET ILLUSTRISSIMIS

PRINCIPIBUS
EPISCOPIS,

AMPLISSIMIS, ET
REVERENDISSIMIS

PRÆLATIS,
Excellentissimis


Illustrissimis, & Generosissimis,
Illustribus, Generosis, ac
strenuis,

PRINCIPIBUS,
COMITIBUS, BA-
RONIBUS, ATQ; EQUI-
TIBUS,

Magnificis, & nobilibus Viris, Ci-
vitatibus, atq; Oppidis,

INCLYTI STYRIÆ
DUCATUS

*Dominis meis gratiosissimis & Ob-
servandissimis.*





VE *M* *A* *D* *M* *O* *D* *V* *M*
sublimiora aedificia,
ita scientia sine soli-
dis fundamentis assurgere non pos-
sunt. Postquam in hac Gracensi
Universitate Philosophiam docui;
quinquennio jam integro, cum a-
lijs occupationibus Mathemati-
cam sum professus: quo tempo-
re, non sine dolore animadverti,
Mathematica facultati de solidis
fundamentis parum esse prospe-
ctum; defuit scilicet copia libro-
rum, quibus continentur Geome-
trica elementa, sine quibus tamen
vanum omnino est, in Mathe-
matica solidos sperare progres-
sus. Prospexere sibi jam multa
Universitates de hujusmodi ele-
mentis & fundamentis; quare
meorum quoq; partium esse putavi

efficere, ut huic etiam Universitati provideretur: quod dum animo voluo, commodum accidit, ut ad manus meas deveniret Euclides in compendium contractus, quem P. CHRISTOPHORVS GRIENBERGERVS Mathematicus emeritus, ut simili Romana indigentia provideret, nuper ediderat; Opusculum quidem mole parvum, utilitate maximum, & in quo vere ex ungue Leonem agnoscas, in quo brevitatis, quam maxime sectatus est, claritati, quantum quidem in rebus abstrusioribus retineri potest, non obfuit; nec sinceritati Geometricarum demonstrationum (in quo alia multa compendia deficiunt) quidquam detraxit. Hoc ergo compendium, adeo numeris omnibus absolutum, ut etiam hac Univer-
sitas

sitas illo gauderet, hic imprimendum judicavi. Adjeci Brevem Instructionem de resolutione triangulorum saltem rectilineorum, quia ea notitia necessaria est ad Astronomiam, Geometriam practicam, Gnomonicam, Architectonicam maxime militarem &c. Cum vero ad resolutionem triangulorum, necessarium sit usum nosse tabularum sinuum, tangentium & secantium, breves etiam hujusmodi tabulas adjeci, ut quacunque pro fundamentis sufficiunt simul haberentur: quae qui Magistro dirigente, & explicante, probe perdidicerit, satis erit instructus, ut sine ulteriori duce, Auditores alios per se legat, & intelligat, & magnos faciat in mathematicis progressus. Cum porro hoc Opusculum solum ideo emit-

tatur

tatur in lucem ut publico hujus Patria bone deserviat : non potuit apud alios sibi querere auxilium & patrocinium, quam apud eos quos Patria PATRIÆ PATRES agnoscit, & veneratur, & quorum publico testimonio omnia eo collimant studia & labores, ut Patria bene sit. Non aspernabuntur spero aut muneris tenuitatem, aut denegabunt Opusculo patrocinium, quibus omne id, & gratum est, & magnum habetur, quod confert ad publicam utilitatem.

INCLYTI STYRIÆ DUCATUS

Servus in Christo

Jacobus Honoratus Durandus.

EVCLIDIS

ELEMENTUM

PRIMUM.

DEFINITIONES.

*Quibus vocabula Artis, & Terminæ
in Elementis usurpati ex-
plicantur.*



DEFINITIO I. Punctum
est, cujus pars nulla est.

2. Linea, unius tantum di-
mensionis secundum lon-
gitudinem capax.

3. Lineæ termini sunt puncta.

4. Linea recta est, quæ ex æquo sua inter-
jacet puncta.

*Secundum Archimedem est minima ca-
rum quæ terminos habent eosdem, hoc
est, brevissima extensio inter duo pun-
cta.*

5. Superficies est duarum dimensionum
secundum longitudinem & latitudinem
capax.

6. Superficieî autem extrema sunt lineæ.

A

7. Pla-

7. Plana superficies est quæ ex æquo suas interjacet lineas.

Secundum Heronem cui omni ex parte congruit linea recta.

8. Planus angulus est duarum linearum in plano concurrentium, & non in directum jacentium (*ita ut una versus concursum* *& secundum naturam suam protracta non continetur cum altera*) alterius ad alteram inclinatio.

9. Rectilineus angulus est, quem constituunt lineæ rectæ.

10. Angulus rectilineus rectus est quando linea alteri lineæ insistens, ad utramque partem æquales angulos facit. Et tales lineæ dicuntur sibi mutuo perpendiculares.

11. Obtusus angulus est qui recto major est.

12. Acutus qui minor recto.

13. Terminus est, id quod alicujus extremum est.

14. Figura est, quæ sub uno vel pluribus terminis continetur vel intelligi comprehenditur.

15. Circulus est figura plana, unica linea comprehensa quæ peripheria appellatur, ad quam omnes rectæ, ex quodam punctoeductæ sunt æquales.

16. Hoc punctum cætrum circuli vocatur.

17. Diameter est, quæ producta per centrum

Liber Primus.

3

trum dividit circulum bifariam.

18. Unde semicirculus, est figura contenta diametro, & semiperipheria.

19. Rectilineæ figuræ sunt, quæ rectis lineis continentur.

20. Trilateræ, quæ sub tribus.

21. Quadrilateræ, quæ sub quatuor.

22. Reliquæ vocantur multilateræ.

23. Equilaterum triangulum est, quod tria habet latera æqualia.

24. Isosceles quod duo æqualia.

25. Scalenum quod omnia tria habet inæqualia.

26. Rectangulum triangulum est, quod habet angulum rectum.

27. Amblygonium quod habet obtusum.

28. Oxygonium quod omnes acutos.

29. Quadratum est quod æquilaterum, & rectangulum est.

30. Altera parte longior figura est rectangula non æquilatera, *quæ dicitur & latera et angula.*
Potest uno nomine vocari Oblonga, & Oblongum.

31. Rhombus æquilatera est, non rectangula.

32. Rhomboides habet latera, & angulos oppositos æquales, & neque æquilatera est. neque rectangula.

33. Reliquæ figuræ quadrilateræ vocantur Trapezia.

A

34. Paral

34. Parallelae rectae lineae sunt, quae cum in eodem sint plano quantumcunq; protractae non possunt concurrere.
35. Parallelogrammum est figura quadrilatera habens latera opposita parallela.
36. In parallelogrammo propositionis 43. duo parallelogramma A H G E, G F D I. dicuntur circa diametrum A D existere, & reliqua duo H C F G, G E B I, vocantur complementa.

PETITIONES seu POSTVLTATA.

Sunt propositiones practicae, & supponuntur ut per se nota.

1. **A** Puncto ad punctum liceat lineam rectam ducere, id quod fit per conceptionem brevissimae extensionis.
2. Et lineam rectam quantumlibet producere.
3. Item quovis centro, & intervallo eodem centro applicato, circulum describere.

AXIOMATA seu PRONUNCIATA.

Sunt Propositiones speculativa, quae non indigent demonstratione.

1. **Q**uae eidem aequalia, inter se sunt aequalia.
2. Si

2. Si æqualibus adijciantur æqualia, sunt æqualia.
3. Si ab æqualibus abijciantur æqualia, remanent æqualia.
4. Inæqualia cum æqualibus, faciunt inæqualia. *probat ibi in exemplis Non.*
5. Æqualia ablata ex inæqualibus, relinquunt inæqualia.
- 6.7. Dupla vel dimidia ejusdem, sunt æqualia *inter se, ut 4 et 2, et 2 et 1, et 2 et 1/2, et 1 et 1/2, et 1 et 1/4, et 1/2 et 1/4.*
8. Quæ sibi mutuo congruunt sunt æqualia. *Debet aut talis congruentia constare intellectui, & quæ sunt æqualia, sibi mutuo congruunt, seu superposita & aduersa.*
9. Totum sua parte majus est.
- 10.11. Duæ rectę concurrentes, & se mutuo secantes, non habent aliquam partem communem, *seu sequenti puncto majus.*
12. Omnes recti anguli sunt æquales.
13. Ex Euclidis 31. ponitur ad propositionem 28. sine qua non potest sufficienter concipi.
14. Duæ lineæ rectæ possunt quidem constituere angulum, sed non clauderè spatium, aut constituere figuram.
- 15.16.17.18. Non sunt usui in Elementis.
19. Omne totum est æquale suis partibus simul sumptis.
20. Si totum totius est duplum, & ablatum ablati, etiam reliquum est duplum reliqui.

1770,
1771
ab

US

vel
an-
cti-
in-
ab-
funt
tri-
un-
qui-

ten-
r se,
qua-
ado
non
viā
ures
is e-
pen-
ubi
ate-
ficit
ad
on-

demonstrationem Theorematum assumuntur, certa esse constet, hoc est sint vel ex principijs, vel ex alijs propositionibus præmonstratis deducta.

Problemata quæ sunt per instrumenta non sunt pure Geometrica; possunt tamen aliquo modo dici mathematica saltem illa, quæ utuntur sola Regula & Circino. Hæc enim duo instrumenta fundantur immediate in postulatis, hoc est in linea recta, & circulari.

Eodem possunt reduci etiam illa instrumenta quæ sunt per Regulam & Circinum. Reliqua vero referantur ad Mechanicam. ex quibus aliqua sunt quidæ vera, sed nondum Geometrice demonstrata, alia falsa, vel saltem dubia, quæ tamen subinde admittuntur, quia videntur satisfacere sensui.

Deniq; tam Problemata, quàm Theoremata proponuntur aliquândo nomine Lemmatum, quæ præmittuntur vel subiiciuntur propositionibus principalibus, quando sunt necessaria, neq; possunt commode cicari.

PROPOSITIO I. PROBLEMA I.

Super data linea A B, triangulum Equilaterum describere.

Centro A, intervallo A B, describatur per 3. postul. circulus C B D; & centro B eodem intervallo B A, alter C A D, secans

rans priorem v. g. in C; & ex C, ad A, B ducantur CA, CB, *per postul. 1.* Dico triangulum ABC esse æquilaterum. Est enim AC, æqualis AB, & BC, æqualis eidem *per def. circuli*; ergo æquales inter se, *per 1. pron.* atque adeo triangulum ABC, est æquilaterum *per def. 23.*

PROPOS. 2. PROBL. 2.

Ad datum punctum A, data BC ponere lineam æqualem, et

PROPOS. 3. PROBL. 3.

Ex majori AH, minori BC æqualem abscindere.

Per Primam describatur supra AC, triangulum æquilaterum ACD, & centro C, intervallo CB, *per postul. 3.* circulus BE secans protractam DC, in E. & rursus centro D, intervallo DE alius EG secans protractam DA in G, & tertius GI, descriptus ex A, intervallo AG, abscindat ex AH, rectam AI. Dico AI, æqualem esse datæ BC. Rectæ enim AI, est æqualis AG *per def. circuli*, AG æqualis CE, quia DE, DG sunt æquales *per eandem def. circuli*, & ablata DA, DC sunt æquales, *per def. trianguli æquilateri*; ergo *per 3. pron.* AG, est æqualis CE. Est autem eidem CE, *per def. 15.* æqualis BC, ergo tam AI, quàm AG, sunt æquales ipsi BC.

PRO-

EC. Dico ABD, translatum in alteram partem, coincidere prorsus cum triangulo ABC.

Eulides præmittit hanc propositionem octavæ, quam Proclus ita demonstrat, ut potius octava præluceat septimæ.

PROPOS. 8. THEOR. 5.

Latius AB, sit æquale DB, & AC, ipsi DC, nec non basis BC, basi BC, Dico angulum, A æqualem esse angulo D.

Intelligentur conjuncta ad communem basim BC ita ut latera æqualia sint etiam contermina, sed ad partes diversas, nectaturque AD, quæ vel transit per C, ut in primo casu; vel cadit inter B, C ut in secundo; vel extra ut in tertio. In primo propter æqualitatem laterum BD, BA, anguli A, D sunt æquales per 5. In 2. & 3. propter æqualitatem laterum AB, BD, sunt æquales anguli BAD, BDA; & propter æqualitatem laterum CD, CA, sunt quoque æquales anguli CDA, CAD. Ergo in secundo casu totus angulus BAC erit æqualis toti BDC; & in tertio reliquus angulus BAC reliquo BDC.

Coroll. Et quia circa angulos æquales BDC, BAC sunt latera lateribus æqualia: erunt per 4. triangula æqualia; & reliqui anguli reliquis angulis, sub quibus æqualia latera subtenduntur.

AD 7. PROPOSIT.

IN septima ponuntur eadem quæ in octava.

va. Ergo in triangulis ABD , ABC erunt anguli DAB , DBA , æquales angulis CAB , CBA . Et ideo in superpositione sibi mutuo congruent, & latus AD , coincidit cum AC , & BD , cum BC , atque adeo punctum D , cum puncto C .

PROPOS. 9. PROBL. 4.

Datum angulum rectilineum BAC , bifariam secare.

A Bscindantur per 3. æquales AD , AE , & supra DE fiat per 1. triangulum æquilaterum DEF . Dico AF satisfacere proposito. Angulus enim FAD , est æqualis angulo FAE , per 8. quia duo latera FA , AD , sunt æqualia duobus FA , AE , & basis FD , basi FE .

PROPOS. 10. PROBL. 5.

Datam rectam AB bifariam secare.

D Escribatur per 1. triangulum æquilaterum ABC , & recta CD secet per 9. angulum C , bifariam. Dico eandem CD , secare quoque bifariam AB . Est enim AD æqualis DB , per 4. quia circa æquales angulos ad C , sunt latera lateribus æqualia.

PROPOS. 11. PROBL. 6.

Ex puncto C , recta AB , erigere perpendicularem.

A Ccipiantur per 3. æquales CD , CE , & DEF , sit per 1. æquilaterum. Dico FC , esse perpendicularem. hoc est angulos ad C ,

ad C, esse æquales, ideoque *per def. 10.* rectos. Sunt enim duo latera CF, CD, æqualia duobus CF, CE, & basis FD, æqualis FE, ergo *per 8.* FCD, æqualis angulo FCE.

PROPOS. 12. PROBL. 7.

Ex puncto C, in datam AB, perpendicularē demittere.

Centro C, describatur *per 3. post.* circulus secans AB utcumque in DE, & DE secetur *per 10.* bifariam in F. Dico CF, esse perpendicularē. quia FC, FD, sunt iterum æqualia lateribus FC, FE, & basis CD æqualis CE *per def. circuli.* ergo.

PROPOS. 13. THEOR. 6.

Recta recta insistens, vel facit duos rectos, vel duobus rectis æquales.

Quando EB insistens, est perpendicularis; certum est angulos EBC, EBD, esse rectos. At AB magis inclinata in unā partem quā in aliam, constituit saltem duos angulos ABC, ABD, æquales duobus EBC, EBD: quia tam isti, quā illi sunt æquales tribus EBC, EBA, ABD.

PROPOS. 14. THEOR. 7.

CD, CE sunt una linea continuata, quando alia AC, facit angulos ACD, ACE, æquales duobus rectis.

Si enim CF, pars protractæ DC, caderet

ret supra, vel infra CE ; essent nihilominus per 13. anguli ACD , ACF , æquales duobus rectis, & æquales duobus ACD , ACE quod est absurdum.

PROPOS. 15. THEOR. 8.

*AB, CD, secant se mutuo ad verticem E,
Dico angulum AEC, æqualem esse DEB,
& AED, ipsi BEC.*

Nam & AE , cum CD , & CE cum AB facit per 13. angulos duobus rectis æquales. & ideo AED , AEC , æquales sunt duobus CEA , CEB ; demptoque communi AEC , remanet AED , æqualis CEB . Similis est ratiocinatio de angulis AEC , BED .

Coroll. 1. Hinc patet omnes quatuor angulos ad punctum E esse æquales quatuor rectis.

Coroll. 2. Immo quocumque fuerint anguli ad E , omnes simul erunt quatuor rectis æquales.

PROPOS. 16. THEOR. 9.

Dico angulum externum CAD, trianguli ABC, maiorem esse utrolibet interno, & opposito, tam ACB, quam ABC.

Sectō latere AC , bisariam in E , & ex A protracta BE , sumptā EF , æquali ipsi BE , & iuncta FA : erunt per 15. æquales anguli BEA , FEA , & duo latera EB , EC , æqualia duobus EF , EA ; & ideo per 4. angulus

gulus EAF , æqualis ECB , est autem externus CAD , major quàm EAF . ergo idem externus est quoque major BCE .

Protracto autè latere CA ad G , fit externus BAG , æqualis priori CAD per 15. & secto bifariam latere AB in H ; factâq; HI , æquali HC , demonstratur ut prius, angulum BAG , maiorem esse ABC , ergo & CAD , erit major eodem,

*Ex Proclo. **

Si AB , AC , sunt æquales, quævis alia AD , non erit eisdem æqualis.

SI enim AD esset æqualis, esset per 5. angulus C , æqualis B , & eidem B , esset æqualis ADB . ideoque æqualis ACD , quod est absurdum, quia ADB est externus, ideoq; maior interno & opposito C .

PROPOS. 17. THEOR. 10.

Duo quilibet anguli trianguli, sunt minores duobus rectis.

Productis BC , BA , in D . E , efficitur per 16. externus ACD major B , & ideo ACD , ACB majores duobus ABC , ACB . Sunt autem illi æquales duobus rectis per 13. ergo isti sunt minores duobus rectis. Eadem est ratio de duobus angulis BAC , BCA . Pro duobus autem CAB , CBA assumendus est externus CAE .

Ex

SI enim latus AB in superiori figura foret æquale AC , essent prædicti anguli æquales, & si AB , esset majus; esset *per præced.* cōtra hypoth. angulus C , major angulo ABC .

Coroll. Omnium rectarum AC , AC , AC , perpendicularis AB , est omnium brevissima; quia AB opponitur acutis, & AC , opponuntur recto.

PROPOS. 20. THEOR. 13.

Duo qualibet latera trianguli, sunt reliquo majora. ~~Id est si duo latera~~

Lateribus CA , AB , sit æqualis CAD , hoc est AD , æqualis AB . Ergo ad basim BD , sunt *per 5.* anguli æquales. Estque ABD , minor DBC : ergo & ADB , seu CD B , est minor eodem, & *per 19.* BC . minor CD , hoc est minor duabus CA , AB , & ita de reliquis.

PROPOS. 21. THEOR. 14.

Duæ rectæ BD , CD , intra triangulum ABC , sunt minores lateribus conterminis AB , AC , & angulus BDC , major A .

Productâ enim BD , in E ; erunt *per 20.* BA , AE , majora reliquo latere BE , adjectaque EC , duæ rectæ AB , AEC , majores duabus BE , EC . Sunt autem & CE , ED , majores CD , & additâ DB , duæ CE , EDB , sunt majores duabus CD , DB . ergo AB , AC , sunt multo majores duabus BD , DC . Porro angulus BDC , major est DEC .
per 16.

o B

22.

22-

2-

s E,

duo

que

D, E

alis

fin

22.

G,

G

gu-

ulo

C,

bas

an-

2-

in

ca-

dit

dit supra, & in 3. infra. In omnibus vero casibus recta EG , est *per* 4. æqualis basi BC . & in primo quidem casu manifestum est EG , ideoque & BC , majorem esse EF . In secundo vero in triangulo isoscelio DFG , anguli ad basim FG . sunt *per* 5. æquales, estque DGF , major sua parte EGF . ergo & DFG , multoque magis totus EFG , major est eodem EGF . Ideoque *per* 19. EG , hoc est BC , major base EF . Denique in tertio in quo æquales DF , DG , sunt protractæ ad H , I , anguli infra basim FG sunt *per* 5. æquales; estque IGF , major sua parte EGF . ergo & HFG , & multo magis EFG , major est eodem EGF . & idcirco EG , seu BC , major quàm EF ut prius.

PROPOS. 25. THEOR. 16.

*Vice Versa angulus A, major est angulo D,
quando basis BC major est base EF, &
reliqua latera reliquis aequalia, ut in
precedenti. //*

E Sset enim *per 4.* basis BC , æqualis EF , si angulus A , posset esse æqualis angulo D , & BC . *per 24.* minor esset quàm EF , si A esset minor D .

PROPOS. 26. THEOR. 17.

*Anguli B, C, sint aequales angulis E, F, &
latus BC, ipsi EF, nimirum adjacent
adjacenti; vel cerse AB ipsi DE, quae a-
dversas huiusmodi corrigi possunt ex aequo; si. Inaequalibus*

qualibus angulis opponuntur: Dico & reliqua reliquis esse aequalia.

SIt primo BC æqualis EF , & DF si fieri
potest sit major AC . Sumptâ igitur FG ,
æquali ipsi AC ; erunt circa æquales angu-
los C, F , latera AC, CF , æqualia lateri-
bus GF, FE ; ideoque per 4. angulus ABC ,
seu DEF , æqualis angulo GFE , quod est
absurdum, quia ABC est æqualis DEF .

Secundo sit AB æqualis DE , & si fieri potest EF , sit major BC . Sumptâ igitur E G , æquali ipsi BC , erit ut prius angulus BCA , hoc est EFD , æqualis EGD , internus externo *contra* 16.

Sunt igitur omnia latera omnibus æqualia, ideoque *per* 8. etiam reliqua æqualia.

PROPOS. 27. THEOR. 18.

Recta $E F$ secet duas $A B, C D$, Ifaciatque
angulum $A G H$ aequalem alterno $D H G$:
Dico $A B, C D$, esse parallelas.

S In minus concurrent in I. Cum igitur
trianguli GHI , latus IG , sit protra-
ctum; erit *per* 16. angulus externus AGF ,
major interno & opposito IHG quod est
absurdum. Idem sequitur si concurrerent
ad K .

PROPOS. 28. THEOR. 19.

*Eadem AB, CD , erunt quoque parallela,
si constet externum AGE aequalem esse*

*si constet externum A G E aequalem esse
+ d g h suprad, ejus abscissitas in hoc quid, qd ad m + n inter-
el + el n, id est d g h + suprad, go ad d + el n*

interno CHG: Vel duos internos AGH, CHG, aequales duobus rectis.

EX utroque enim sequitur alternum B G H, æqualem esse alterno CHG. Externo enim AGE æqualis est per 15. B G H, ad verticem G. & duo AGH, CHG sunt per 13. æquales duobus HGA, HGB, estque HGA, communis. ergo reliquus HGB, æqualis est reliquo CHG, alternus alterno. ergo per 27. AB, CD, sunt parallelæ.

Ex hac posteriore parte constat sufficienter veritas 13. pronunciati.

A X I O M A 13. *

SI in duas rectas incidat recta OI, faciatque duos angulos O, I, minores duobus rectis: duæ rectæ AB. CD, concurrent ad partes angulorum O, I.

PROPOS. 29. THEOR. 20.

Duas parallelas AB, CD secet EF, in G, H.

Dico alternum alterno; externum interno; & duos angulos internos esse duobus rectis aequales, convertendo duas præcedentes.

Nam primo si alternus AGH esset maior alterno DHG, addito communi B G H essent duo DHG, B G H, minores duobus AGH, B G H, hoc est minores duobus rectis, & ideo per 13. axioma. AB, CD, concurrerent ad partes B, D, quod est

est contra hypothesim. Ergo alterni sunt æquales, hoc est, BGH , ipsi CHG . Est autem per 15. BGH , æqualis AGE , ergo etiam externus AGE , erit æqualis interno CHG , & quia BGH , cum AGH , æquipollet per 13. duobus rectis, eruntque duo interni AGH , CHG æquales duobus rectis.

PROPOS. 30. THEOR. 21.

AB, CD, sint parallela eidem IK: Disco etiam ipsas esse parallelas inter se.

Ductâ enim EF erit per 29. BGL , æqualis alterno ILG & CHL , æqualis KLH : sed ILG , KLH , sunt per 15. æquales. ergo & alterni BGL , CHL sunt æquales, & per 27. AB , CD parallelæ.

PROPOS. 31. PROBL. 10.

Per A, ducere parallelam datæ BC.

Ductâ AD utcumque, & facto per 23. angulo DAE , æquali alterno ADC , erit per 27. EAF , ipsi BC , parallela.

PROPOS. 32. THEOR. 22.

Externus angulus ACD, est æqualis duobus internis, & oppositis A, B: & omnes tres anguli cujuscunque trianguli sunt æquales duobus rectis.

Ducatur per A . CE parallela AB ; eritque per 29. ECA , æqualis alterno A , & externus ECD , æqualis interno B , & totus externus ACD , æqualis duobus internis A ,

B. Ad

B. Adjectoq; communi $\triangle ACB$, erunt omnes tres interni A, B, C , æquales duobus ACD , ACB hi autem sunt per 13. æquales duobus rectis. ergo & illi.

Coroll. 1. Ergo omnes tres anguli unius trianguli sunt æquales tribus cujuscunque alterius trianguli simul sumptis: & quando duo sunt æquales duobus, erit & reliqua reliquo æqualis.

Coroll. 2. In triangulo isosceles rectangulo; anguli ad basim sunt semirecti.

Coroll. 3. Angulus trianguli æquilateri est una tertia duorum rectorum, vel duæ tertiæ unius recti.

Ex Scholio. * Videtur. Alth. fol. 8.

Omnis figura rectilinea distribuitur in tot triangula, quod ipsa continet latera demptis duobus; ita ut anguli triangulorum constituent angulos figuræ.

Cumque anguli cujuscunque trianguli sint æquales duobus rectis, erunt omnes anguli figuræ rectilineæ, æquales bis tot rectis; quot ipsa habet latera, demptis duobus lateribus.

Quot autem habet latera, tot habet angulos internos & externos. Ergo interni simul cum externis sunt æquales bis tot rectis quot sunt latera; quia quilibet externus cum suo interno æquivaleret duobus rectis.

¶ quia unus eorum est externus angulus, qui triangulo

Etis per 13. Interni autem soli, sunt equales bis tot rectis quot sunt latera demptis duobus, quibus respondent quatuor recti; demptis igitur omnibus internis, remanebunt externi quatuor rectis equales, & ideo omnium figurarum anguli externi simul sumpti, sunt equales simul sumptis.

7 recti

PROPOS. 33. THEOR. 23.

Sint AB, CD , aequales & parallela. Dico etiam AC, BD , esse aequales, & parallelas.

Uctâ enim BC , erunt per 29. alterni ABC, DCB æquales, & duo latera AB, BC , duobus BC, CD equalia. ergo per 4. etiam basis BD , æqualis basi AC , & angulus ACB , æqualis alterno CBD , ideoque per 27. BD , parallela AC .

PROPOS. 34. THEOR. 24.

In parallelogrammo latera & anguli oppositi sunt æquales; & diameter secat ipsum bisariam.

Cum enim per def. 35. latera AB, DC , nec non AD, BC sint parallela; erit per 29. angulus BAC æqualis DCA ; & ACB , ipsi CAD . estque latus AC , ipsis adjacens commune, ergo per 26. AB , erit æquale CD , & AD , ipsi BC , & angulus B , angulo D , & triangulum ABC , triangulo ADC . Deniq; reliqui anguli A & C , sunt æquales quia constant ex æqualibus.

En

Ex Scholio. †

Omne quadrilaterum habens latera opposita, & angulos oppositos aequales, est parallelogrammum.

Sint primo $AB, CD, \& AD, BC$, æquales. Ducta igitur AC , erunt duo latera AB, BC , æqualia duobus CD, DA , & AC , basis erit communis. Unde *per 8.* non solum $\angle B$, $\angle D$, sed & $\angle BAC$, $\angle DCA$, & $\angle ACB$, æqualis erit $\angle CAD$, nimirum alterni alternis, atq; adeo *per 27.* AB , erit parallela CD , & AD , ipsi BC .

Secundo. $\angle A$, sit æqualis C , & B , ipsi D ; eruntque duo A, B , æquales duobus C, D , & duo A, D , æquales duobus C, B . Sunt autem omnes quatuor æquales quatuor rectis *per Scholium 32.* ergo tam A, B , quàm A, D , erunt duobus rectis æquales, & ideo *per 28.* $AB, CD. \& AD, BC$, erunt parallelae.

Ex priore parte hujus demonstrationis constat Quadratum, Rhombum, & Rhomboidem esse parallelogramma.

Ex posteriore constat idem de Quadrato, figura altera parte longiore, & Rhomboide.

*Item. **

In omni parallelogrammo diametri se mu-

B

120

suo secant bifariam: & in Quadrato & Rhombo secant angulos bifariam; in figura altera parte longiore siue oblonga, & Rhomboide non bifariam: eademq; in quadrato, & oblongo sunt aequales, in Rhombo & Rhomboide inequales.

Dico primo AC , BD , secari bifariam in E . Anguli enim EAD , EDA , sunt æquales angulis ECB , ECB , per 29. & latera adjacentia AD , BC , sunt æqualia per 34. ergo per 26. EA , est æqualis EC , & EB , æqualis ED .

Dico secundo in quadrato, & Rhombo angulos A , C secari bifariam à diametro AC . latera enim CA , AD , æqualia sunt lateribus AC , AB , & basis CD , basi CB . ergo per 8. angulus CAD . angulo CAB .

Dico tertio in oblongo, & Rhomboide angulos A , C , secari à diametro AC non bifariam. Est enim angulus BAC , minor angulo BCA , per 18. & per 29. BCA , est æqualis alterno CAD . ergo BAC , minor est CAD .

Dico quarto in quadrato, & oblongo diametros AC , BD , esse æquales per 4. quia circa æquales angulos nempe rectos latera DA , DC , sunt æqualia lateribus BC , CD .

Dico 5. in Rhombo & Rhomboide diametrum AC , quæ subtendit minorem angulum

gulum D, minorem esse diametro BD, quæ subtendit majorem C. Sunt autem D & C, inæquales, quia simul sunt æquales duobus rectis *per 29. & per def.* neuter est rectus. Cum enim latera DA, DC, sint æqualia lateribus CB, CD, & angulus D minor angulo C, *ex hypothesi*; erit basis AC, minor base BD, *per 24.*

PROPOS. 35. THEOR. 25.

Parallelogramma ACDE, FCDB, super eadem basi CD, & inter easdem parallelas AB, CD, sunt æqualia.

IN primo casu coincidit punctum F cum puncto E; in secundo existit inter puncta A, E; in tertio inter puncta E, B. In omnibus autem tribus casibus angulus CAF æqualis est *per 29.* DEB, & *per 34.* AC æqualis DE, & AE, FB æquales eidem CD, ideoque æquales inter se. & in secundo casu auferendo intermediam FE relinquuntur æquales AF, EB. & in tertio fit idem addendo communem EF. Atque ita circa æquales angulos CAF, DEB, erunt duo latera CA, AF, æqualia duobus lateribus DE, EB, & idcirco *per 4.* triangulum CAF, erit æquale triangulo DEB. & in primo casu addito triangulo CED. in secundo Trapezio CFED. & in tertio abjecto primo triangulo GEF & postea adjecto

C

H

G

r

i

nt

a.

&

a-

B;

ec

est

af

D,

A

ral

c

C

F

fu

uia

Quia sunt semissiles æqualium parallelogrammorum $A C D E$, $F G H B$.

Ex Scholio. †

Recta igitur $F H$, secans basim $G I$, bifariam in H ; secat etiam bifariam triangulum $F G I$.

PROPOS. 39. THEOR. 29.

Triangula $A B C$, $B C D$. sint super communi basi $B C$, æqualia. Dico $A D$, esse parallelam $B C$.

Si minus, sit $A E$ parallela, & secet $C D$, in E ; eritque per 37. triangulum $B C E$ æquale eidem $A B C$: & ideo $B C E$, $B C D$, æqualia; quod est absurdum.

PROPOS. 40. THEOR. 30.

Idem dico quando triangula $A B C$, $D E F$ sunt æqualia, & super æqualibus basibus $B C$, $E F$.

Si enim alia $A G$, esset parallela; triangula $A B C$, $G E F$, essent æqualia per 38, nec non $G E F$, $D E F$.

PROPOS. 41. THEOR. 31.

Parallelogrammum $A B C D$, & triangulum $E B C$, sint inter parallelas $A E$, $B C$: Dico parallelogrammum duplū esse trianguli.

Quia parallelogrammum $A B C D$ est per 34. duplum trianguli $A B C$; & hoc est æquale triangulo $E B C$. per 37. Ergo.

PROPOS. 42. PROBL. II.

Triangulo ABC , constituere parallelogrammum aequale, cum angulo D .

Basis B C, secetur bifariam in E: *per* 10. Deritque *per* 38. triangulum A B C, duplum trianguli A E C: & facto angulo C E F, æquali D, ductâque A F G, parallela B C, & C G, parallela E F; factum erit parallelogrammum E G, duplum ejusdem trianguli A E C, *per* 41. & ideo æquale triangulo A B C.

PROPOS. 43. THEOR. 32.

*Complementa G B, G C, de quibus defn. 36.
sunt aequalia.*

Triangulum enim ACD æquale est tri-
angulo ADB , *per* 34. AGH , ipsi AG
 E ; & GDF , ipsi GDI : Et ablatis AGH ,
 GDF ex ACD , remanet complementum
 GC , & ablatis AGE , GDI ex ADB , re-
manet complementum GB . ergo. †

PROPOS. 44. PROBL. 12.

Ad datam A. dato triangulo B; aequale parallelogrammum applicare, cum dato angulo C.

Per 42. fiat parallelogrammum GE , æquale triangulo B , cum angulo F , æquali C ; & ex DE protracta, sumatur EI , æqualis A , & IF , secet DG , in K , perficianturque reliqua parallelogramma: ex quibus complementum FL , est per 43, æquale

$\dagger$ nam ab aq^{lib} A D C, A D B auferuntur aq^{lia}, sed in comple-
#9. t. el. A G E, et B F G D, et D G H go remanent aq^{lia} C G,
B A = B A.

complemento GE , hoc est triangulo B , & habet latus FH , æquale ipsi EI , hoc est, ipsi A ; & angulum MFH æqualem angulo F , per 15. hoc est angulo C .

PROPOS. 45. PROBL. 13.

Dato rectilinea, A, B, C : æquale parallelogrammum conficere, cum angulo D .

Distribuatür rectilineum in sua triangula A, B, C , ipsique A , fiat per 44. æquale parallelogrammum FH cum angulo F . æquali D : & aliud GI æquale ipsi B applicetur ad GH , cum angulo G , æquali eidem D : denique ad KI applicetur KM æquale ipsi C , & IKL ; sit rursus æqualis angulo D : erunt FH, GI, KM simul æqualia rectilineo A, B, C . Quod autem FM , sit parallelogrammum probatur hoc modo. Angulus F est æqualis HGK , & duo HGK, HGF . sunt æquales duobus HGF, GFE , & hi duo sunt æquales duobus rectis per 29. ergo & illi, & ideo per 14. GF, GK , sunt una linea: & eadem est ratio de KG, KL . immo eadem quoque de tribus EH, HI, IM ; quia angulis F, G, K , sunt per 34. æquales, oppositi H, I, M . Cumque GH , sit æqualis & parallela EF , & KI , æqualis, & parallela GH , & LM , æqualis, & parallela ipsi KI : erunt etiam EF, LM , æquales & parallelae, & per 33. FL, EM , erunt similiter æquales & parallelae.

PROPOS. 46. PROBL. 14.

Super datam AB , quadratum describere.

ERigantur duæ perpendiculares AD , BE , æquales ipsi AB : eritque per 33. etiam DC æqualis & parallela ipsi AB , & angulis rectis A , B , erunt per 34. æquales oppositi C , D . Hoc est figura AC , erit æquilatera, & rectangula.

PROPOS. 47. THEOR. 33.

In triangulo ABC , habente rectum ad A :

Quadratum lateris BC , æquale est quadratis duorum laterum AB , AC .

DEscribantur per 46. quadrata BD , BE , CG : eritque per 14. tam BAI , quàm CAG una linea recta, quia anguli ad A , sunt recti. Et quia ABF , CBE sunt æquales; addito communi ABC , fit totus FBG , æqualis toti ABE ; & ductis rectis FC , AE , & AK , parallela ipsi BE ; erunt circa æquales angulos FBG , ABE duo latera FB , BC æqualia duobus AB , BE . Quare triangulum FBG , æquale erit triangulo ABE , per 4. Trianguli autem FBG duplum est quadratum BG , per 41. quia sunt super eadem basi BF , & inter easdem parallelas BF , CG : & trianguli ABE duplum est parallelogrammum $BLKE$; quia sunt super eadem basi BE , & inter parallelas BE , AK . Ergo parallelogrammum $BLKE$ æquale est quadrato BG . Eodemq; modo demon-

*Pro quo legitur in antiquis lat. subleuatur stratur
angulo facit minus quadratis reliquis lateribus. et in
gonio subleuatur lateribus acutis lateribus subleuatur minus.*

stratur alterum parallelogrammum ZCD
 K , æquale esse quadrato CI . Totum igitur
 quadratum BD , erit æquale duobus qua-
 dratis BG, CI . *+ et in triangulo ACD , et ACB anguli
 BCD et BCA sunt æqualia, et CD et CB sunt æqualia
 et CH et CH sunt æqualia.*
 Ex Scholio. *

Inventio hujus Theorematis tribuitur
 Pythagoræ; qui cum advertisset in qui-
 busdam numeris, quales sunt 3. 4. 5. duo-
 rum 3. & 4. quadratos 9. & 16. facere 25.
 quadratum tertij; voluit idem experiri in
 lineis, & invenit ex tribus lineis ab hujus-
 modi numeris numeratis constitui semper
 triangulum rectangulum.

Inventio autem hujusmodi numerorum *inde*
 ita se habet. Pro minimo sumatur quicum- *min:*
 que numerus impar, v. g. 5. & ex ejus qua- *pag: 11.*
 drato 25. abijciatur 1. Reliqui enim nu- *N. 1.*
 meri 24. medietas 12. erit secundus, & ter-
 tius erit 13. unitate major. Vel sic, pro mi-
 nimo sumatur par v. g. 6. & ex quadrato 36.
 hoc est ex quadrato numeri 3. qui est me-
 dietas numeri 6. abijciatur 1, eidemque
 addatur 1. eritque secundus numerus 8. &
 tertius 10.

PROPOS. 48. THEOR. 34.

*Vice Versa angulus A, est rectus, quando
 quadrata AB, AC sunt æqualia
 quadrato BC.*
 B 5. Eri-

E Rigatur ex puncto A super BA , perpen-
dicularis AD , & æqualis AC ; eritque
per 47. quadratum BD , æquale quadratis
 AB , AD ; hoc est, quadratis AB , AC : atq;
adeo quadrato BC ; & ideo BD , erit æqua-
lis BC . Et quia præterea duo latera AB ,
 AD , sunt æqualia duobus AB , AC ; erit
angulus BAD æqualis BAC , sed ille est
rectus; ergo & iste.

EVCLIDIS

ELEMENTUM

SECUNDUM.

DEFINITIONES.

*Idem vult
esse. Nam sub
alterius.
Sic, et Alii
dixerunt.*

P Arallelogrammum rectangulum
dicitur contineri sub duabus li-
neis rectis, quæ comprehendunt
angulum rectum. *¶ Ex No. 1. quæ
universalia stylis; & quodam h. q. d. d. d. d.*

Ex Scholio.

R Atio est, quia in duabus illis lineis, &
angulo recto, assignantur omnia illa,
quibus datis datur ipsum rectangulum; ni-
mirum longitudo, & latitudo, & angulus
rectus,

rectus, qui est solus ex omnibus angulis invariabilis.

Alia ratio est, quia ex ductu huiusmodi linearum unius in alteram, formatur optime conceptus ipsius rectanguli. Nam si due rectæ AB , AC contineant angulum rectum A , & AC intelligatur moveri per rectam AB . ex A usque ad B , ita ut semper ipsi AB , existat perpendicularis; describet punctum C tertium latus CD , & si eadem recta AC intelligatur aliquid post se relinquere, id erit superficies plana, inter AB , AC , CD , DB , comprehensa.

Habet etiam hæc comprehensio rectanguli sub duabus rectis, nec non hic ductus unius lineæ in alteram, magnam affinitatem cum multiplicatione, vel ductu unius numeri in alium. Sicut enim ex multiplicatione v.g. 3. in 4. producitur numerus 12. cuius unitates possunt disponi in forma rectanguli, diciturque idem numerus 12. contineri sub duobus numeris 3. & 4. eo quod fiat ex ductu 3. in 4. ita quoque si AC , trium partium, ducatur in AB , 4. partium; producuntur 12. quadratula unius partis, quæ constituunt totum rectangulum contentum sub iisdem duabus rectis AC , AB .

Secunda definitio. In parallelogrammo CB diviso in alia quatuor; duo complementa

menta GC , GB , una cum HE ; constituunt Gnomonem $FHEI$, & cum parallelogrammo FI , constituunt Gnomonem $HFIE$.

PROPOS. 1. THEOR. 1.

Rectangulum contentum sub A , & BC . quale est $BCFG$: aequale est ijs, quæ continentur sub eadem A , seu BG , & singulis partibus rectæ BC .

Actis enim per D , E ipsi BG parallélis ADH , EI ; distribuitur rectangulum BF in rectangula BH , DI , EF , quæ continentur sub BG , DH , EI , hoc est sub A , & sub partibus BD , DE , EC . Est autem per 19. pronunc. omne totum æquale suis partibus; ergo.

Applicatio ad numeros.

Sit BC , 10. segmenta BD , DE , EC . sint 5. 1. 4. & recta A vel BG , sit 6. Eritque rectangulum BF , seu numerus productus ex BG , 6. in BC , 10. numerus 60: & BG , 6. in BD , 5. erit 30: & DH 6. in DE , 1. erit 6: & EI , 6. in EC , 4. erit 24. Et hæc omnia tria rectangula numerica collecta in unam summam, faciunt eundem numerum 60. quem facit A , 6. in BC 10. Et hoc modo applicari possunt numeris ferre omnes propositiones sequentes.

PROPOS. 2. THEOR. 2.

BC , secta sit utcumque in D : Dico quadratum

sum B C aequale esse rectangulo contentis sub B C, B D, & sub B C, D C.

HÆc non differt à præcedenti si B G, intelligatur æqualis ipsi B C. Rectangulum enim B E, hoc est quadratum ipsius B C, erit æquale rectangulo B F, contento sub B G, B D, hoc est B C, B D; & rectangulo D E, contento sub D F, D C, hoc est sub B C, D C.

PROPOS. 3. THEOR. 3.

B C, sit secta utcumque in D: Dico rectangulum contentum sub B C, & sub uno segmentorum &c. g. sub B D, aequale esse quadrato B D, & rectangulo sub segmentis B D, D C.

HÆc quoque continetur in prima, estq; manifesta si B G, ponatur æqualis B D. Sic enim B F, est quadratum ipsius B D; & D E, rectangulum sub D F, seu B D, & D C.

PROPOS. 4. THEOR. 4.

A B, secta sit utcumque in C: Dico quadratum totius A B, aequale esse duobus quadratis A C, C B, & duobus rectangulis sub segmentis A C, C B.

Quadratum totius A B, sit A D, diameter B E, C G F, parallela A E; & H G I parallela ipsius A B. Dico primo H F, C I, esse quadrata segmentorum, A C, C B. Nam latera A B, A E, circa rectum A, sunt æqualia; ergo per 2. Coroll. p. B-7. 32. lib. 1. *Eoroll.*

~~Coroll. 32.~~ anguli AEB , ABE sunt semirecti: sed istis sunt æquales CEB , HGE , per 29. ergo omnes quatuor sunt æquales, & per 6. primi HG , HE : & CB , CG , æquales inter se, atque adeo HF , quadratum rectæ HG , quæ per 34. est æqualis AC , & CI , quadratum segmenti CB . Dico secundo rectangula AG , GD contineri sub iisdem segmentis AC , CB . illud enim continetur sub AC , CG ; & CG , est æqualis CB ; & GD , continetur sub GF , GI , & GF , est æqualis GH , hoc est, AC , & GI , segmento CB . Quibus ita demonstratis manifesta est propositio.

Coroll. Hinc patet parallelogramma $HFCI$ circa diametrum quadrati, esse quadrata.

PROPOS. 5. THEOR. 5.

AB secta sit bisariam in C, & non bisariam in D: Dico quadratum CB, æquale esse rectangulo ADB, una cum quadrato CD, seu summe AD, KE, DL

Facto quadrato CF , & ductis reliquis parallelis; erit per coroll. quarta KG quadratum sectionis intermediæ CD , & DI quadratum segmenti DB ; & rectangulum AH , erit illud quod continetur sub inæqualibus segmentis AD , DB , eo quod DH , sit æqualis DB . Dico hoc rectangulum AH , una cum quadrato KG æquale esse

5. cum CG sit quadratum & ergo via cuiuslibet ille quadratus

quadrato C F. Complementum enim H C, est *per* 43. *pr.* æquale complemento H F; adjectoque D I; rectangulum G B, æquale rectangulo B K. Sed B K, est æquale K A *per* 36. *pr.* ergo K A. G B, sunt æqualia, & una cum C H, erit A H æquale Gnomoni G I D K; & rursus addito quadrato K G; erit A H, una cum quadrato G K, æquale toti quadrato C F, quod componitur ex Gnomone, & quadrato K G.

PROPOS. 6. THEOR. 6.

Recta A B, secta bifariam in C, adjecta sit B D : Dico rectangulum A D B, una cum quadrato C B, æquale esse quadrato ipsius C D.

C Onstructio similis est præcedenti. Dico rectangulum A I, quod continetur sub A D, D I, hoc est sub A D, D B, una cum quadrato K G quod est quadratum rectæ C B, æquale esse quadrato C F. Nam C L, C H sunt æqualia *per* 36. *pr.* & C H, H F æqualia *per* 43. ergo C L, æquale est H F; adjectoque communi C I, totum A I, æquale Gnomoni G I B K. Sed hic, una cum quadrato K G, æquivalet quadrato C F: ergo & A I, K G, æquivalent eidem.

PROPOS. 7. THEOR. 7.

A B, secta sit utcumque in C : Dico quadratum totius A B, nimirum A D, una cum

cum quadrato segmenti & g. AC , hoc est una cum quadrato HF , aequale esse rectangulo BAC , bis, hoc est duobus rectangulis AF , HD , una cum quadrato CI , reliqui segmenti CB .

Duo enim rectangula AF , HD sunt æqualia Gnomoni $CHFI$, & quadrato HF : addito ergo quadrato CI , erunt duo rectangula AF , HD , & quadratum CI , æqualia Gnomoni, & duobus quadratis HF , CI . Gnomon autem & quadratum CI , faciunt quadratum AD . Ergo quadrata AD , HF , sunt æqualia duobus rectangulis AF , HD , & quadrato CI .

PROPOS. 8. THEOR. 8.

Recta AB , secta utcumque in C adijciatur BD , æqualis & g. segmento BC . Dico quadratum totius AD , aequale esse quatuor rectangulis ABC , seu ABD , & quadrato reliqui segmenti AC .

Constructio est similis superioribus, & CAE est quadratum totius AD : OI , quadratum segmenti AC ; NQ , BM , sunt quadrata æqualia BC , BD , qualia sunt etiam quadrata CH , HP . Unde constat unum ex quatuor rectangulis esse AH , quia continetur sub AB , BH quæ est æqualis BC . Secundum est LQ : quia continetur sub LH , HQ , quæ sunt iterum æquales ipsis AB , BC : Tertium est HE , contem-

tum

tum sub $H G$, $H M$, quæ etiam sunt æquales eisdem $A B$, $B C$. Quartum denique constituunt $K G$, $B M$, quia $K G$, est æquale $Q E$ per 36. pr. & quadratum $B M$, est æquale quadrato $H P$. Cum igitur hæc quatuor rectangula constituent Gnomonem qui cum quadrato $O I$, facit totum quadratum $A E$; manifestum est totum quadratum $A E$, æquale esse quatuor rectangulis $A B C$, & quadrato segmenti $A C$.

PROPOS. 9. THEOR. 9.

Recta $A B$ secta sit bifariam in C , & non bifariam in D : Dico quadrata inæqualium segmentorum $A D$, $D B$, dupla esse quadratorum ex $A C$, $C D$.

Perpendicularis $C E$ sit æqualis $C A$, vel $C B$: eruntque $A C E$, $E C B$. Isoscelia rectangula, & quatuor anguli ad bases $A B$, $E B$ erunt per 2. coroll. 32. semirecti, & totus $A E B$, rectus. Rursus perpendicularis $D F$, secet $E B$, in F , & $F G$, sit parallela $C D$: eruntque etiam $F D B$, $F G E$, rectangula; & quia anguli $D B F$, $G E F$, sunt semirecti, erunt & reliqui $D F B$, $G F E$ semirecti, & per 6. pr. $D F$, æqualis $D B$, & $E G$ æqualis $G F$, vel $C D$. Unde per 47. pr. quadratum rectæ $A E$, æquale est quadratis $C A$, $C E$, & duplum quadrati $A C$. Et quadratum $E F$ duplum quadrati $G F$, vel $C D$, & duo quadrata $A E$, $E F$, hoc est qua-

quadratum AF , vel loco istius, duo quadrata AD , DF . vel duo AD , DB , dupla quadratorum AC , CD .

PROPOS. 10. THEOR. 10.

A B secta bifariam in C, adijciatur quacunque B D. Dico duo quadrata A D, D B dupla esse duorum A C, C D.

Constructio est eadem cum præcedente, & angulus AEG , rectus, & ACE , EFG , BGD triangula rectangula isoscelia, & ideo quadrata AE , EG , dupla quadratorum AC , EF , hoc est, quadratorum AC , CD . duobus autem quadratis AE , EG , est per 47. pr. æquale quadratum AG ; & quadrato AG ; sunt æqualia AD , DG , hoc est AD , DB . Ergo etiam duo quadrata AD , DB sunt dupla quadratorum AC , CD .

PROPOS. 11. PROBL. 1.

Rectam A B ita secare in C. ut rectangulum A B C, sit æquale quadrato segmenti A C.

Quadratum ipsius AB , sit AD ; & latus AE , bifariam sectum in F ; & recta FG , æqualis ipsi FB , & AC æqualis AG ; perficiaturque quadratum AH ; & HC , sit protracta in I : eritque EH , rectangulum contentum sub EG , GH hoc est, sub EG , GA . Hoc autem rectangulum una cum quadrato AF , æqualia sunt per 6. quadrato FG ,

in *Quæstio facilis est. Si echand a lato & de equalibz perpendicularibz hoc*
est æquali in & de equalibz a foid in f. idem est. Hoc rectangulum & quadratum
sub AF & quadratum sub FG sunt æqualia. In hoc idem fuit & de equalibz

hoc est, quadrato FB : & per 47. pr. quadratis AB , AF , ergo rectangulum EH , cum quadrato AF , æquale est quadratis AB , AF , hoc est, quadrato AD , & quadrato rectæ AF , dempto igitur quadrato communi AF remanebit quadratum AH , hoc est, quadratum segmenti AC , æquale rectangulo CD , hoc est, rectangulo contento sub tota AB , & reliquo segmento CB .

PROPOS. 12. THEOR. 11.

In triangulo ABC , sit angulus B , obtusus; ita ut perpendicularis AD per schol. 17. primi cadat extra triangulū: Dico quadratum lateris AC ; excedere quadrata laterum AB , BC , gemino rectangulo CBD .

Quadratum enim CD , est per 4. æquale quadratis BC , BD . & gemino rectangulo CBD . addito ergo quadrato AD ; erunt duo CD , DA , hoc est, per 47. pr. quadratum AC , æquale geminato rectangulo CBD , & tribus quadratis CB , BD , DA , Quadratis autem BD , DA , æquale est quadratum AB . ergo quadratum AC , æquale est duobus quadratis AB , BC , una cum geminato rectangulo CBD .

PROPOS. 13. THEOR. 12.

In triangulo ABC , sit angulus C , acutus; eritq; saltem alter reliquorum acutus, & g. B ; & ideo perpendicularis AD , cadet intra



in quibuslibet
quadrato, & in
rectangulo

intra triangulum. Dico quadratum la-
teris AB , minus esse quadratis AC , BC ,
geminato rectangulo BCD .

Ex 42. & 45.
pr. & 47. pr.

Quadrata enim BC , CD , sunt per 7. æ-
qualia gemino rectangulo BCD , & in-
super quadrato BD . Ergo addito quadra-
to AD . Erunt tria quadrata BC , CD , A
 D , vel duo BC , AC , æqualia rectangulo
geminato BCD , & duobus quadratis BD ,
 DA , quibus est æquale quadratum AB .
Ergo solum quadratum AB , minus est duo-
bus quadratis BC , AC prædicto gemino
rectangulo BCD . Q.E.D.

PROPOS. 14. PROBL. 2.

*Dato rectilineo A , æquale quadratum
exhibere.*

Per 42. vel 45. primi fiat rectilineo A
æquale rectangulum BD , ipsique CB
sumatur æqualis CF ; & centro G , circa to-
tam DF , describatur semicirculus, eumq;
secet BC in H . Dico quadratum CH , æ-
quale esse rectangulo DB , hoc est, rectili-
neo A . Rectangulum enim DCF , hoc est
 DB , una cum quadrato GC , æquale est, per
5. quadrato GF , hoc est, quadrato GH . Sed
huic sunt per 47. pr. æqualia quadrata CH ,
 CG . Ergo hæc duo quadrata, sunt æqualia
dicto rectangulo DB , & quadrato GC ; de-
ptoq; communi quadrato GC , remanebit
quadratum CH æquale rectangulo DC , hoc
est, rectilineo A .

EU-

Ex 42. & 45. pr. & 47. pr. æqualia quadrata CH , CG . Ergo hæc duo quadrata, sunt æqualia dicto rectangulo DB , & quadrato GC ; deptoq; communi quadrato GC , remanebit quadratum CH æquale rectangulo DC , hoc est, rectilineo A .



7. Angulus in segmento v. g. in segmento $ACBA$, est angulus rectilineus ACB , cum angulus C est ad peripheriam, & latera CA , CB . pertingunt ad terminos basis AB .
8. Tam angulus rectilineus ACB ad peripheriam, quam ADB ad centrum, dicitur insistere peripheriæ AB , quam interceptiunt lineæ rectæ continentes angulos C , D .
9. *Re-
ctis, et
circuli, seu* Figura autem mixta ABD , & contenta peripheria AB , & duabus rectis AD , BD coeuntibus in centro D , appellatur Sector.
10. Similia circuli segmenta sunt, in quibus anguli juxta defin. 7. sunt æquales. & satis est si vel unus ABC , sit æqualis uni DEF , quia per 21. hujus etiam reliqui sunt æquales, quia omnes in eodem segmento sunt æquales.

PROPOSITIO I. PROBLEMA I.

Dati circuli centrum reperire.

Recta BD , secans aliam AC bifariam, & ad angulos rectos in E , secetur bifariam in F . Dico F , esse centrum. Si enim F non est centrum, sit aliud G , extra ipsam BD . recta enim BD , semel tantum secatur bifariam in puncto F . Nectantur GA
 GC

sis AB , basi AD . ergo per 8. pr. angulus AFB æqualis est angulo AFD .

In secunda, præter angulos rectos ad F , erunt per 5. pr. æquales ABD , ADB , & latus AF , istis oppositum commune. ergo per 26. pr. latus FB erit æquale lateri FD .

Coroll. Eodem modo in omni triangulo isosceli ABD ; recta AF secans bifariam basim BD , secat ipsam ad angulos rectos; & secans ad angulos rectos, secat bifariam.

PROPOS. 4. THEOR. 3.

Extra centrum, nulla linea se mutuo secant bifariam.

SI enim AB , CD sectæ essent bifariam in E ; recta FE , ducta ex centro F , esset per 3. perpendicularis ad utramque, & anguli FEA , FEC , essent æquales, quod est absurdum.

PROPOS. 5. THEOR. 4.

Circuli se mutuo secantes non habent idem centrum.

SI fieri potest commune centrum sit C . Ergo CB , erit semidiameter communis, eique erunt æquales aliæ CA , CE ; ideoque æquales inter se, quod est absurdum.

PROPOS. 6. THEOR. 5.

Etiā se mutuo tangentium, non est idem centrum.

Propter eandem causam, quia DB , esset communis.

communis, & D A, D C, æquales essent e-
idem D B, & æquales inter se.

+ bianetti PROPOS. 7. THEOR. 6.

Si ex puncto excentrico I, educantur A I, I B, per centrum F, & alia I C, I D, I E, utcumque: erit I F A omnium maxima, I B, minima; I C major I D, & eide *magis*
g. g. I E una tantum poterit esse aqua- *magis*
lis ex altera parte maxima, vel mini- *ma.*

Primo, F I, F C sunt per 20. pr. majores
I C, sed F I, F C; sunt æquales F I, F A.
ergo I A, major est I C, &c.

Secundo I F, F C, sunt æquales I F, F D;
& angulus I F C, major I F D. ergo per 24.
pr. I C major quàm I D, &c.

Tertio I F, I E, sunt majores F E, hoc est,
F B, dempta igitur communi I F, remanet
I E major I B.

Quarto si angulo B F E, fiat æqualis B F
G: erunt circa ipsos latera I F, F E; æqua-
lia lateribus I F, F G. ergo per 4. pr. & ba-
sis I E, basi I G, & nulla alia; reliquæ enim
omnes sunt majores vel minores ex præ-
missis.

PROPOS. 8. THEOR. 7.

Ex puncto A extra circulum posito, ducan-
tur quocunque rectæ A B, F E per centru
F, A D I, A G H utcumque, tam ad con-
cavam peripheriam quàm ad convexam
C *Dico*

Dico A E esse maximam eductarum ad concavam; A B, minimam eductarum ad convexam; A I, majorem esse A H; & A G majorem A D: ipsique & g. A D, unam tantum aliam posse esse aequalem.

Primo, A F, F I, sunt per 20. pr. majores A I. Ergo & A F E, quæ est æqualis ipsis A F, F I, &c.

Secundo. A D, D F sunt majores A F. ergo demptis æqualibus F D, F B; remanebit A D, major quàm A B &c.

Tertio A F, F I sunt æquales A F, F H; sed angulus A F I, est major quam A F H, ergo per 24. pr. A I, major quàm A H &c.

Quarto. duæ A D, D F, sunt per 21. pr. minores duabus A G, G F; & G F, D F, sunt æquales. ergo A D, minor quàm A G, &c.

Quinto. angulus A F C, sit æqualis A F D. ergo per 4. pr. A D, erit æqualis A C, quia circa æquales angulos latera A F, F D, sunt æqualia lateribus A F, F C.

PROPOS. 9. THEOR. 8.

Tres rectæ A B, A C, A D, sint æquales:

Dico A esse centrum.

Rectæ C B, C D, secantur bifariam in E, F, & ducantur A E, A F; eruntque duo latera A E, E B, æqualia duobus A F, F C, & basis A B, æqualis A C. ergo per 8. pr. anguli

anguli AEB , AEC , sunt æquales, & recti:
& per coroll. prima hujus, in E A , erit cen-
trum circuli; sed propter eandem causam
debet esse in F A . ergo centrum est A .

PROPOS. 10. THEOR. 9.

Circulus circulum secat duntaxat in duobus punctis,

SI enim fieri potest sint tria puncta B , A ,
 C ; & centrum unius sit D . Cum ergo tria puncta B , A , C , sint communia, erunt etiam ad alterius circuli peripheriam tres rectæ DB , DA , DC , æquales; ideoque D centrum erit utriusque, quod est contra 5. hujus.

PROPOS. 11. THEOR. 10.

Recta conjungens centra duorum circulorum se mutuo tangentium interioris, transit per contactum.

Punctum contactus sit A , centrum inte-
rioris circuli G , exterioris F ; & recta FG , si fieri potest non transeat per A , sed
interiorem secet in B , exteriori in E . E-
rantque GA , GB , æquales, adjectaque F
 G , erunt AG , GF æquales FB ; sed AG ,
 GF sunt majores AF , per 20. pr. ergo eti-
am FB , major est quam AF , hoc est, ma-
jor quam FE . quod est absurdum. idem se-
queretur ex altera parte, si F , poneretur
esse centrum interioris, & G exterioris,

etiamsi puncta C, D, vel B, E, ponerentur coincidere in unum.

PROPOS. 12. THEOR. 11.

Recta conjungens centra duorum circularum se mutuo tangentium exterius; transit per contactum.

Si enim F G, conjungens centra F, G, non transit per contactum B, sed secet circulos in C, E. erunt duo latera FB, GB, vel æqualia, vel minora tertio F C E G, quod est contra 20. primi.

PROPOS. 13. THEOR. 12.

Contactus circularum, est unicum punctum.

Si duo essent puncta contactus v. g. A, B; recta C D, conjungens centra C, D, per 11. hujus transiret per utrumque, essetque A C D B, communis diameter, eademque secta bisariam in duobus punctis C, D, quod est absurdum.

Si autem duo circuli se mutuo tangerent in duobus punctis B, F, exterius, una, eademque D E, transiret per utrumque, per 12. vel certe F D, F E, essent æquales ipsi D E, vel B D, B E æquales ipsi D F E, quæ omnia sunt absurda.

PROPOS. 14. THEOR. 13.

Ad æquales A B, C D, cadunt æquales perpendiculares E F, E G. Et A B, C D, sunt æquales;

æquales; quando perpendiculares E F, E G sunt æquales.

Perpendiculares enim E F, E G, secant A B, C D, bifariam per 3. & ideo A F, D G, semisses æqualium, sunt æquales. & quia æqualibus quadratis semidiametrorum E A, E D, æqualia sunt per 47. pr. quadrata A F, F E, & quadrata D G, G E: necesse est hæc duo, illis duobus esse æqualia, & demptis æqualibus A F, D G, remanere æqualia quadrata E F, E G, & rectæ E F, E G æquales.

Vice versa, si ex duobus quadratis E F, F A, quæ sunt æqualia duobus E G, G D, quia sunt æqualia quadratis E A, E D; tollantur æqualia E F, E G, remanent æqualia quadrata F A, G D, ipsæque A F, D G æquales. Est autem per 3. A F medietas totius A B, & D G medietas totius D C: ergo A B, D C sunt æquales.

PROPOS. 15. THEOR. 14.

Applicatarum in circulo maxima est diameter, & g.  F, G H I centro propinquior, major est remotiore C D.

Ducantur perpendiculares G K, G L, quarum illa erit per def. 4. hujus minor ista, & ideo ex G L poterit abscindi G M, æqualis G K; & B E, æquidistans ipsi C D, erit per 14. æqualis I H. Nectantur præterea G B, G C, G D, G E; eruntque per

20. *pr.* duo latera GB , GE , majora, reliquo BE , sed GB , GE sunt æquales diametro AF . ergo.

Quod autem HI , sit major CD ; patet
per 24. pr. quia latera GB , GE , sunt æ-
qualia GC , GD , & angulus BGE , major
 CGD .

PROPOS. 16. THEOR. 15.

Restat $F A E$ diametro $A D C$ perpendicularis in A , tota cadit extra circulum: Et angulus contingentia $E A B$, non potest dividi per lineam rectam: Angulus etiam semicirculi $C A B$ major est, Et reliquus contingentia minor omni angulo rectiliter acuto.

Primo. Ad quodlibet punctum G , rectæ EF , ducatur ex centro D , recta DG . Quoniam igitur rectus A , major est acuto DGA ; erit per 19. pr. DG , major semidiametro DA ; & G , extra circulum &c.

Secundo. Dico rectam AH , eductam ex A , utcunque infra AE , secare circulum. Angulo enim EAH , fieri potest æqualis ADI , ad centrum D , per 23. pr. & DI , concurrat necessario cum AH , v. g. in I , quia duo IAD , IDA , sunt minores duobus rectis, quia sunt æquales recto DAE , & ideo necesse est DI , esse rectum & per 19. pr. DI , minorem esse semidiametro DA , at-

que adeo punctum I, nec non totam A I,
et hinc, sicut et de omnibus aliis, ad A H modum
et hinc, sicut et de omnibus aliis, ad A H modum
et hinc, sicut et de omnibus aliis, ad A H modum

esse intra circulum; & rectam AH nequaquam cadere inter rectam AE . & peripheriam AB .

Tertio. Dico angulum semicirculi CAB , majorem esse acuto CAH . quia præter acutum, continet angulum, segmenti quod abscindit eadem AH ^{angulum ad AH ab AE & AB inter se}

Quarto. Dico angulum contingentiae contentum recta AE , & peripheria AB , minorem esse quolibet acuto EAH . Hic enim continet angulum contingentiae, & simul angulum segmenti abscissi à recta AH .

Coroll. Hinc patet rectam EF , si cum diametro CA , ad punctum A , constituat rectos CAE , CAF ; tangere circulum in puncto A . ^{Ubi videtur quod si tangens ducatur, tunc per A tangens est EF & AE & AF sunt rectae}

PROPOS. 17. PROBL. 2.

Ex A , ducere rectam. qua tangat circulum BC .

Centro D intervallo DA , describatur alius circulus, vel arcus AE , cumque fecet perpendicularis BE , in E ; & DE , fecet circulum in C : dico AC , tangere circulum in C . Est enim per 4. pr. angulus DCA , æqualis recto DBE , quia circa angulum D duo latera DC , DA , sunt æqualia duobus DB , DE ; & perpendicularis ab eodem centro D f. BE & AE cond. tanget circulum, & perpendicularis à C tanget in C

PROPOS. 18. THEOR. 16.

A B tangat circulum in C: Dico semidiametrum EC, esse perpendiculararem ad AB.

NAm si alia ED, esset perpendicularis; esset EDC, rectus, & ECD, acutus, & per 19. pr. ED minor semidiametro EC; punctumque D, intra circulum, quod est contra hypothesein.

PROPOS. 19. THEOR. 17.

Recta CE constituitur cum tangente AB, angulum rectum ACE. Dico CE transire per centrum.

Si enim E, non est centrum sit F. Ergo per antecedentem rectus FCA, æqualis erit recto ECA. quod est absurdum.

PROPOS. 20. THEOR. 18.

Angulus BDC, ad centrum D; duplus est BAC, anguli ad peripheriam; cum fuerit eadem peripheria basis angulorum.

In primo casu anguli EDC, EDB, sunt dupli angulorum DAC, DAB: quia triangula DAC, DAB, sunt Isoscelia; & EDC, EDB, sunt per 32. pr. æquales duobus internis, & oppositis.

In 2. propter eandem causam BDC, duplus est anguli BAC.

In 3. totus EDC, duplus est totius EAC; & ablatas EDB, ablati EAB, ergo reliquus BDC, duplus reliqui BAC.

PRO-

PROPOS. 21. THEOR. 19.

Qui in eodem segmento sunt anguli, quales sunt $\angle ADB$, $\angle ACB$, $\angle AEB$, sunt inter se aequales.

Ratio est, quia unus & idem angulus $\angle AFB$, ad centrum, est duplus angulorum, $\angle ADB$, $\angle ACB$, $\angle AEB$.

Unde sapienter Euclides definit ultima definitione similitudinem segmentorum, per æqualitatem huiusmodi angulorum.

*Ex Scholio. **

Recta AB , subtendat ad easdem partes duos angulos æquales $\angle ADB$, $\angle AEB$: Dico puncta A , B , E , D esse ad peripheriam ejusdem circuli. Si enim peripheria ABE , non transit per D , secet rectam BD , ultra vel citra punctum D , in F ducta igitur AF , erunt *per demonstrata* anguli $\angle AFB$, $\angle AEB$, in eodem segmento $ABFA$, æquales. & consequenter etiam $\angle AFB$, $\angle ADB$ æquales. quod est absurdum, unus enim est altero major *per 16. pr.* quia unus est externus, & alter internus & oppositus.

PROPOS. 22. THEOR. 20.

Quadrilateri $ABCD$ inscripti circulo, anguli oppositi sunt aequales duobus rectis.

Anguli enim $\angle ACB$, $\angle ADB$, sunt æquales *per 21.* & similiter $\angle ABD$, $\angle ACD$.

o-
o,
n-
tis
do
C,

C,
s,
ad

er
a-
c-
m
&
u-
od
n-
u-
or

u-
i-
c-
o;
e-

fietque angulus externus ACB , major interno CDB , quod est contra hypothesin, anguli enim similium segmentorum debent esse æquales.

PROPOS. 24. THEOR 22.

Idem verum est quando bases sunt æquales.

PROPOS. 25. PROBL. 3.

Dati segmenti ABC , centrum reperire.

Dux rectæ AB , AC , quæ non sint parallelæ secantur bifariam in D , E ; & ex D , E erigantur perpendiculares DF , EF , in quibus necessario existit centrum circuli per coroll. prima hujus, nimirum in comuni concursu F .

Eodem modo describitur circulus per quælibet alia tria puncta A , B , C , vel etiam circa triangulum: dummodo puncta non existant in una linea recta.

Quod autem prædictæ perpendiculares EF , DF , concurrant probatur in sequenti lemmate.

Lemma.

Perpendiculares secantes latera trianguli bifariam, concurrunt ad unum punctum.

IN primo triangulo ABC , angulus A est rectus; in secundo obtusus; & in tertio sunt omnes acuti. in omnibus autem, sectum est latus AD , bifariam in D , & DE paral-

Parallela lateris AC , occurrit basi BC , in G ; & GE est parallela AB ; & ex his procreatur parallelogrammum $ADGE$, in quo latera opposita DG , AE , & AD , GE , & DB , sunt æqualia *per. 34. pr.* & *per 29.* angulus EGC , æqualis interno B , & $GE C$, GDB , æquales inter se, quia sunt æquales eidem A . Et quia angulis EGC , $GE C$ adjacet latus GE , & BD , ipsi GE æquales, adjacet duobus GBD , GDB ; erit *per 26, pr.* GC , æqualis GB , & GD , æqualis EC ; atque adeo EC , æqualis ipsi AE . Atq; hæc sunt communia.

Jam vero in prima figura perpendiculares DF , EF , coincidunt cum parallelis DG , GE , eo quod etiam anguli GDB , $GE C$ sint æquales recto A . Unde constat etiam perpendiculares DF , EF concurrere, & concursum F esse punctum G , in quo basis BC , secta est bisariam: ita ut in hoc casu non sit opus ducere tertiam perpendicularem quæ deberet erigi ex puncto G , super BC .

In secundo vero casu perpendiculares DF , EF , concurrant infra BC . Cum enim angulus GDB , æqualis sit obtuso A ; & $BD F$ sit rectus, recta DF , cadit necessario inter DG , & DB , & similiter EF cadit inter EG , & EC . unde concursus non potest non esse infra BC ; concursum autem probat recta

Ita DE , quæ ex duobus rectis ad D , E demit duos ADE , AED . & ideo reliqui FDE , FED , sunt duobus rectis minores; ex quo sequitur concursus *per* 13. *Axioma*.

In tertio casu perpendiculares DF , EF , cadunt inter DA , DG , & inter AE , EG , quia anguli $BD F$, $CE F$ sunt majores angulis $GD B$, $GE C$, qui sunt æquales acuto A , & ideo concursus F est intra triangulum ABC .

Denique in utroque casu tertia perpendicularis coincidit cum recta FG . Nam primo FB , est æqualis FA , *per* 4. *pr.* quia circa rectos FDA , FDB sunt duo latera FD DA , æqualia duobus FD , DB . secundo FC æqualis est eidem FA , eandem ob causam, assumendo triangula FEA , $FE C$. ergo etiam FC , est æqualis FB . sunt autem etiam duo latera FG , GB , æqualia duobus FG , GC . ergo *per* 8. *pr.* anguli FGB , FGC erunt æquales & recti. atque adeo omnes tres perpendiculares concurrent ad commune punctum F . quod erat demonstrandum.

Pro figuris regularibus plurius laterum ponitur aliud Lemma huic simile ad octavam propositionem quarti.

Cæterum in propositione 25. non est necesse ut rectæ AC , AB , habeant punctum A commune, dummodo non sint parallelæ.

parallelæ. Et licet hic concursus perpëndicularium demonstratus sit duntaxat in triangulis; idem tamen sequitur si duæ lineæ ducantur utcunque dummodo non sint parallelæ quales sunt AH , CI . Nam productæ constituunt cum AC , triangulum ACB , & perpendiculares DG , FG concurrunt in G . ergo etiam perpendiculares KM , LM , quæ secant AH , CI , bifariam concurrunt alicubi in M , cum sint parallelæ ipsis DG , FG , &c.

PROPOS. 26. THEOR. 23.

In eodem, vel in aequalibus circulis anguli æquales insistant æqualibus peripherijs, si &c sint constituti ad centrum, si &c ad peripheriam.

SInt primo æquales anguli ad centra G H . Cum igitur circa eosdem sint quatuor semidiametri æquales, erit *per 4. pr.* basis AC , æqualis basi DF . & quia iidem anguli G , H , sunt *per 20.* dupli ABC , DEF : ideoque super æqualibus basibus segmenta ABC , DEF , similia, erunt *per 24.* eadem segmenra æqualia, & peripheria ABC , DEF , nec non reliquæ AC , DF æquales.

Deinde si anguli B , E ponantur æquales; necesse est etiam G , H esse æquales. ergo &c.

PRO-

PROPOS. 27. THEOR. 24.

Quando arcus D F, A C sunt aequales, sunt quoque tam anguli ad cœtra G, H, quàm anguli B, E. ad peripheriam aequales.

SI enim angulus A G C, esset major D H F, ipsique D H F, fieret æqualis A G I, arcus A I, esset æqualis D F, per 26. hoc est, ipsi A C, quod est absurdum. Similis est ratio de angulis B, E.

PROPOS. 28. THEOR. 25.

In eodem, vel aequalibus circulis, aequales rectæ subtendunt aequales peripherias.

ERunt enim per 8. pr. anguli G, H, æquales, quia circa ipsos sunt quatuor semidiametri æquales; & insuper basis A C, ponitur æqualis basi D F. ergo per 26. arcus A C, est æqualis D F, & reliquus ABC, reliquo D E F.

PROPOS. 29. THEOR. 26.

Peripherias aequales subtendunt rectæ aequales.

Quia per 27. erit etiam angulus G, æqualis H, si peripheria A C, sit æqualis D F. & per 4. pr. basis A C, æqualis basi D F, propter quatuor semidiametros æquales.

PROPOS. 30. PROBL. 4.

Datam peripheriam ABC, bisariam secare.

HOc præstat recta B D E, quæ subtendens A C, secat bisariam, & ad angulos rectos

rectos in D. quia circa rectos sunt latera BD, DA, æqualia lateribus BD, DC. Et idcirco *per 4. pr.* basis AB, æqualis BC; & *per 28.* arcus BA, æqualis BC.

PROPOS. 31. THEOR. 27.

Angulus in semicirculo rectus est; in maiore segmento minor; in minore, maior recto. Angulus quoque segmenti maioris maior est recto, & minoris minor.

Dico primo angulum ABC in semicirculo ABC, esse rectum. Angulus enim ADB, duplus est DBC, & CDB, duplus DBA, eo quod triangula ABD, DBC, sint Isoscelia. sed illi dupli sunt æquales duobus rectis, ergo DBA, DBC, constituent rectum ABC.

Dico 2. in maiori segmento CAB, angulos esse acutos. In eodem enim segmento est quoque angulus BAC, qui est acutus, quia ABC, est rectus. huic autem BAC, sunt omnes reliqui in eodem segmento æquales *per 21.* Ergo.

Dico 3: angulum BEC, in minori segmento BEC. esse obtusum. In quadrilatero enim ABEC, oppositi E, A, sunt æquales duobus rectis *per 22.* & A est acutus. ergo E obtusus.

Denique reliquæ duæ partes sunt manifestæ; quia angulus segmenti maioris nempe angulus mixtus CBA, componitur ex
*ang. linc. bari recta DC, & p. p. linc. in mixto recto
 ang. BEC*

recto ABC , & angulo segmenti quod abscindit recta AB . Et protracta AB , in F , fit angulus rectus CBF , major angulo segmenti minoris nempe mixto CBE .

Ex Scholio. *

Vice versa, dico angulum rectum, v. g. ACB , esse ad semicirculum, hoc est, si recta AB , ducta utcumque secetur bisariam in D , & centro D , circa AB describatur semicirculus, ipsum transire per C .

Si enim punctum C esset in alio segmento, angulus ACB , non esset rectus; sed obtusus, vel acutus, ut demonstratum est.

PROPOS. 32. THEOR, 28.

*Recta AB , tangat circulum in C , & CD , secet eundem in C , B : Dico angulo ACD , *Alte. ang.*
aqualet esse angulos in alterno segmento DEC ; & angulo DCB , angulos in alterno segmento CFD . *N. 1.**

Si CD , non transit per centrum H , transeat CH E : eruntque per 18. ECA , ECB , recti, & ipsis erunt æquales CGE , CDE , in alternis segmentis, hoc est, in semicirculis quos abscindit diameter CE .

Deinde quoniam CDE , rectus est: erunt DEC , DCE , uni recto, nempe toti ECA æquales, per 32. pr. demptoque communi DCE reliquus DEC , in alterno segmento, æ-

to, æqualis erit reliquo ACD , ad punctum contactus C .

Denique in quadrilatero $EDFC$, anguli oppositi DFC , CED , sunt *per 22.* æquales duobus rectis, hoc est, duobus DCA , DCB . Sed DCA , æqualis est DEC ergo reliquus DFC , in alterno segmento, est æqualis reliquo DCB , ad contactum C .

PROPOS. 33. PROBL. 5.

Super data recta AB , describere segmentum circuli, capiens angulum dato æqualem.

Primo, quando angulus datus est rectus, certum est segmentum esse semicirculum.

Secundo, quando angulus datus est acutus v. g. C , tunc constituatur ipsi æqualis BAD , & ex A , super AD erigatur perpendicularis AE , & in puncto B fiat angulus ABF , æqualis BAE : eruntque FA , FB æquales, & F , centrum circuli $AGBK$; & angulus AGB , in segmento $ABGA$, erit æqualis angulo BAD , ad punctum contactus A . Nam propter rectum DAE , recta DA , tangit circulum *per 16.* Est autem BAD , æqualis C . ergo etiam AGB , est æqualis C .

Tertio, quando angulus datus v. g. H . est obtusus, accipiaturs ejus loco acutus C . Descripto

scripto enim segmento AGB ; habebitur reliquum AKB , & angulus K , erit æqualis H , quia per 22. G , & K æquivalent duobus rectis, hoc est, duobus C , H . Caeterum est æqualis G , ergo K , æqualis H .

PROPOS. 34. PROBL. 6.

A dato circulo abscindere segmentum, quod capiat angulum æqualem dato & g. D.

Ducatur tangens EAF , & angulus EAC , fiat æqualis D , angulus enim ABC , in alterno segmento CBA , erit per 32. æqualis angulo EAC , hoc est, angulo D .

PROPOS. 35. THEOR. 29.

Si in circulo dua recta se mutuo secant: rectangula sub segmentis erunt æqualia.

Primo quando intersectio fit in centro, omnia segmenta sunt semidiametri, & rectangula sub segmentis sunt quadrata æqualia.

Secundo, quando CD , transit per centrum F , & secat AB , bifariam, atque adeo ad angulos rectos in E , per 3. Tunc recta CD , erit secta bifariam in F , & non bifariam in E ; & per 5. secundi, rectangulum CED , una cum quadrato EF , erit æquale quadrato FD , hoc est quadrato FB , & per Pythagoricam, quadratis BE , EF : ablatoque communi EF , remanebit quadratum BE æquale rectangulo CED . Quadratum

tum autem BE , est idem cum rectangulo AEB . ergo rectangulum sub segmentis AE , EB , est æquale rectangulo contento sub segmentis CE , ED .

Tertio. Quando CD , transiens per centrum F non secat bifariam AB , in E , secabitur bifariam in alio puncto G , & FG , erit ad AB , perpendicularis; & per 5. *secundi* rectangulum AEB , una cum quadrato EG , erit æquale quadrato GB ; adjectoque quadrato GF , erit idem rectangulum AEB , cum quadratis EG , GF , hoc est, cum quadrato EF , æquale quadratis GB , GF , hoc est, quadrato FB . Huic autem quadrato FB , seu FD , ostendimus æquale esse rectangulum CED , una cum eodem quadrato EF , ablato igitur quadrato EF ; remanebunt rectangula CED , AEB , æqualia.

Quarto, & ultimo, neutra transeat per centrum: dico nihilominus rectangula AEB , CED , esse æqualia, quia utrumque debet esse æquale rectangulo GEH , per casus antecedentes, ducendo GEH , per centrum F .

PROPOS. 36. THEOR. 30.

Si ex puncto D , recta DB , tangat circulum; & alia DC A , secet: Rectangulum ADC , erit æquale quadrato DB .

TRanseat primo recta DCA , per centrum F . Quoniam igitur AC , secata est bifa-

bisariam in F , ipsique addita CD ; ergo per 6. *sec.* rectangulum ADC , cum quadrato FC , æquale est quadrato FD , hoc est, per 47. *pr.* quadratis DB , BF . Sunt autem FC , FB , æqualia. ergo & reliqua, nimirum rectangulum ADC , & quadratum DB . sunt æqualia,

Secundo, recta DCA , non transeat per centrum F , sed recta FE , sit ad ipsam perpendicularis, atque adeo per 3. *secet* ejus segmentum CD , bisariam in E . Quare iterum per 5. *sec.* rectangulum ADC , cum quadrato EC , erit æquale quadrato ED : adjectoque quadrato EF ; erit idem rectangulum ADC , cum duobus quadratis EC , EF , hoc est, cum quadrato FC , æquale quadratis ED , EF , hoc est, quadrato FD . Quadrato autem FD , sunt æqualia quadrata DB , BF , & BF , est æquale FC . ergo etiam reliqua erunt æqualia: nempe rectangulum ADC , & quadratum DB .

Coroll. 1. Hinc manifestum est, si à puncto D , ducantur plurimæ rectæ circum secantes; rectangula sub totis^x, & sub segmentis^{ab} inter punctum, & convexam peripheriam interceptis, esse æqualia: quia omnia sunt eidem quadrato^{ac} tangentis æqualia.^{φγδ}

Coroll.

3. huiusmodi Coroll. 2. Constat etiam duas tangentes
hinc inde ex eodem puncto ductas, esse æquales.
superficiem

Coroll. 3. Ex eodem puncto solum duci
 duas tangentes.

et eadem Coroll. 4. Si duæ rectæ æquales circulo
conspiciantur incident, & una tangat, etiam aliam tan-
 gere.

PROPOS. 37. THEOR. 31.

*Quod si constet rectangulum A D C, æquale
 esse quadrato D B: recta D B, incidens
 circulo erit tangens.*

Ducatur tangens DF , & neſtatur EF ;
 quæ ad DF , erit per 18. perpendicu-
 laris; & quia eidem rectangulo ADC , æ-
 qualia sunt quadrata DF, DB , erunt etiam
 ipsa æqualia, & rectæ DF, DB , æquales.
 Cumque duo latera EF, FD , sint æqualia
 duobus EB, BD , & ED , sit basis com-
 munis: erit per 8. pr. angulus EBD , æ-
 qualis recto F . & ideo per 16. huius
 DB , tanget circulum, quod
 erat demonſtran-
 dum.

cum ejus termini fuerint ad circuli peripheriam.

PROPOS. 1. PROBL. 1.

In dato circulo, data recta D, (quando id fieri poterit juxta 15. tertij) coaptare aequalem.

EX diametro BC abscindatur BE, æqualis D, per 3. pr. & centro B, intervallo BE, describatur arcus secans datum circumulum in A. Recta enim BA, erit æqualis BE, per defin. circuli, & æqualis ipsi D, per primum pronunc.

PROPOS. 2. PROBL. 2.

In dato circulo inscribere triangulum, dato triangulo DEF æquiangulum.

AD punctum contactus A, cum tangente GH, fiat angulus GAB. æqualis F; & HAC, æqualis E. Dico triangulum ABC, ipse DEF, esse æquiangulum. Angulus enim C, est per 32. tertij, æqualis GAB, seu F; & angulus B, æqualis HAC, hoc est E. ergo per 32. pr. etiam reliquus reliquo.

Nota. Si hoc modo inscribatur æquilaterum, circumulum dividi in tres partes æquales.

PROPOS. 3. PROBL. 3.

Circulo circumscribere triangulum, cuiusq. DEF æquiangulum.

EXternis G, H, fiant in centro I, æquales

les A I B, B I C : eritque reliquus A I C, æqualis reliquo K, quia *per 15. pr.* omnes anguli ad I, & *per 32. ejusdem* omnes externi G, H, K, sunt æquales quatuor rectis. Demum ducantur per A, B, C, tres tangentes quæ concurrent ad tria puncta L, M, N. Cum enim I A L, I B L, sint recti; erunt B A L, A B L, minores duobus rectis; & ideo *per 13. Axiomâ.* A L, B L, concurrent versus L: & ita de reliquis. Dico angulum L, æqualem esse E. Omnes enim anguli quadrilateri A I B L, sunt *per 32. pr.* æquales quatuor rectis, cum igitur duo ad A, B, sint recti: reliqui I, & L, erunt æquales duobus rectis, hoc est duobus G E. sed A I B, & G, sunt æquales, ergo etiam L & E, &c. eadem enim est ratio de reliquis.

Nota in triangulo æquilatERO, & similiter in omnibus alijs figuris regularibus, omnes externos esse inter se æquales. Atq; ita etiam anguli ad centrum I, erunt æquales, & per ipsos secabitur circulus in partes æquales,

PROPOS. 4. PROBL. 4.

Intra triangulum A B C, circulum describere.

Duo anguli B, C secentur bifariam, & B D, C D, concurrant ad D: Dico tres perpendiculares D E, D F, D G, esse æquales &c. Anguli enim D E B, D B E, sunt æ-

D

quales

quales DFB , DBF ; & DB rectis E , F oppositum, est commune. ergo *per 26. pr.* perpendicularis DE , æqualis est DF . Est autem eidem etiam æqualis DG : eo quod C , sectus sit bifariam, & F , G , sint recti, & CD , communis. ergo omnes tres sunt æquales, & circulus descriptus *per E, F, G*; tanget latera *per 16. tertij.*

PROPOS. 5. PROBL. 5.

Triangulo ABC , circumlunum circumscribere.

Hoc problema re ipsa non differt à *prop. 25. tertij*, ubi docuimus *per tria puncta data*, qualia hic sunt A, B, C . describere circumlunum. perpendiculares enim DF , EF , quæ secant quælibet duo latera AB , AC , bifariam; necessario concurrunt in quæsito centro F .

PROPOS. 6. PROBL. 6.

Dato circulo quadratum inscribere.

Dux diametri AC , BD , sint invicem perpendiculares in centro E : Dico quadrilaterum $ABCD$, esse quadratum. Quatuor enim angulis rectis ad centrum respondent *per 26. ter.* quatuor arcus æquales; & quatuor arcus æquales subtendunt quatuor lineæ æquales AB, BC, CD, DA *per 29. ter.* Denique quatuor anguli ad A, B, C, D , *per 31. ter.* sunt æquales; quia sunt in quatuor semicirculis.

PROPOS. 10. PROBL. 10.

Estque Lemma ad sequentem.

*Triangulum Isosceles constitucere, cuius un-
terq; aequalium angulorum sit duplex
reliqui.*

PER 11. sec. secetur quævis AB , ita, ut
rectangulum ABC , æquale sit quadra-
to AC ; & centro A , intervallo AB descri-
batur circulus, vel arcus, eique applicetur
per 1. BD , æqualis AC ; & per 5. describa-
tur circulus circa triangulum ADC , quem
recta BD , tãget in D , per 37. ter. quia
rectangulum ABC , æquale est quadrato
 BD , eo quod BD æqualis sit AC , & per
32. ter. angulo DBC , ad contactum D , æ-
qualis erit in alterno segmento angulus CAD ;
adjectoque communi CDA , erunt
duo CAD , CDA , æquales toti ADB ; &
quia duobus CAD , CDA , æqualis est per
32. pr. externus DCB ; huic erit æqualis A
 DB , seu ABD . & in triangulo DCB , e-
runt per 6. pr. DB , DC , æquales. estque D
 B , æqualis CA , ergo CA , æqualis CD , &
per 5. pr. anguli CAD , CDA , æquales; &
 DCB , nec non ADB , vel ABD , duplus
ipsius BAD . ergo &c.

PROPOSITIO 11. PROBL. 11.

*Circulo Pentagonum Regulare in-
scribere.*

PER secundam huius inscribatur circulo
pentagonum regulare. hoc autem potest fieri, si in triangulo
equilatero ABC , bisectione CD a C in AB ad punctum D per A & B
bisectionibus.

triangulum EFG , æquiangulum triangulo ABD , pr. oppositionis antecedentis, & GH , FI , secant angulos EFG , EGF , bifariam. Hac enim ratione erunt omnes quinque anguli $FE G$, IFE , IFG , HGE , HGF , æquales; quia EFG , EGF , sunt dupli $FE G$: & ideo per 26. ter. quinque arcus FG , EL , IG , EH , HF , sunt æquales; & quinque rectæ ipsos subtendentes æquales per 29. ter. & omnes quinque anguli æquales per 27. ter. quia sicut HEI , insistit tribus arcibus æqualibus $HFGI$. ita quoque reliqui insistent totidem æqualibus.

PROPOS. 15. PROBL. 15.

Circulo Hexagonum regulare inscribere.

Si mediametro AG , applicentur æquales AB , AC , eruntque AGC , ABG , triangula æquilatera; & tam angulus AGC , quam AGB , erit per 32. pr. una tertia duorum rectorum. Producta autem CG , in E , sunt omnes tres AGC , AGB , EGE æquales duobus rectis, ergo EGE , erit reliqua pars tertia, & omnes tres erunt æquales: & totidem alij erunt eisdem æquales ad verticem G . Et ideo insistent sex arcibus æqualibus, & arcus subtendent sex rectæ æquales; & omnes sex anguli erunt æquales; quia sicut EDF , insistit quatuor arcibus æqualibus $EBA CF$, ita reliqui.

* Sen. Senoniametn. A. G. in brach. manifest. A. A. G. el. C. & C. C. hinc in D. & C. Senoniametn. claud. C. S. PRO-

PROPOS. 18. PROBL. 16.

*Circulo inscribere Quindecagonum
regulare.*

Inscribatur triangulum æquilaterum ABC , per 2. & per 11. pentagonum $ADEFG$. Qualium igitur partium 15. est tota circumferentia, talium 5. erit AB ; & talium trium AG , & AGF , 6. atque adeo talium partium erit una, arcus BF , hoc est una decimaquinta.

PROPOS. & PROBL. 7. & 12.

*Circulo Quadratum, & Pentagonum regu-
lare circumscribere.*

Ut praxis sit omnibus figuris ipsique etiam triangulo communis, Angulus quadrati, vel pentagoni internus sit A . externus B ; quibus in figuris regularibus constat reliquos esse æquales; & externo B , fiant ad centrum D , æquales quatuor pro quadrato, & quinque pro pentagono, id quod potest fieri, quia omnes anguli externi cujuscunque figuræ æquivalent quatuor rectis per 32. pr. & hoc ipso divisus erit circulus in quatuor, vel quinque partes æquales, & lineæ subtendentes arcus æquales, constituent quadratum $EFGH$, vel pentagonum $EFGHI$, regulare, & circulo inscriptum, ut patet ex demonstrationibus 6. & undecima. Inventis autem punctis EFG &c. circumscribitur circulo quadratum,

dratum, vel pentagonum per tangentes, sicut in tertia circumscriptum est triangulum, & sicut ibi ita etiam hic demonstratur omnes angulos KLM &c. esse æquales internis A , quia v.g. in quadrilatero $EDFK$, propter duos rectos E, F , reliqui duo D & K sunt æquales duobus rectis, hoc est duobus A, B , & quia D , factus est æqualis B , sequitur K , æqualem esse A . Latera vero KL, LM , &c. esse æqualia probatur hoc modo. Tangentes KE, KF , & similiter LF, LG , &c. sunt æquales per 2. coroll. 36. tertij. ergo omnia triangula EKF, FLG , &c. sunt isoscelia, & ad æquales bases EF, FG , &c. sunt anguli angulis æquales; eo quod etiā K, L , &c. sint æquales. & ideo per 26. pr. erunt etiam omnia latera EK, KF, FL , &c. æqualia, nec non duo KF, FL , duobus LG, GM , &c. æqualia.

PROPOS. & PROBL. 8. & 13.

In Quadrato, & Pentagono. circulum inscribere.

Triangulo inscriptus est circulus prop. 4. dividendo duos angulos bifariam, id quod etiam habet locum in omnibus figuris regularibus. Rectæ enim BF, CF , dividentes bifariam angulos v. g. B, C , concurrunt necessario intra figuram alicubi in F , per lemma quod sequitur; & perpendiculares FG, FH, FI , &c. ductæ ex puncto

facile est quod si latus & latera KF, KL , &c. intervalla FE, FL, FG, FH , &c. in punctis F & H fuerint anguli & intervalla in M , & punctis H & I fuerint intervalla & intervalla puncta. Et sunt in quadrato.

F, in singula latera sunt æquales: idque demonstratur eodem modo, quo in quarta quod attinet tres perpendiculares FG , FH , FI . pro reliquis vero præmonstrandum est, etiam reliquas FD , FE , FA , secare reliquos angulos D , E , A bifariam.

Dico igitur angulum FDC æqualem esse FBC . Nam circa æquales FCB , FC D , duo CF , CB , sunt æqualia duobus lateribus CF , CD . ergo *per 4. pr.* angulus DCF , æqualis est CBF . hic autem est medietas totius B , ipsique B æqualis est totus D : ergo etiam FD , secat bifariam angulum D . & ita de reliquis, eodem enim modo, & ordine proceditur ad reliquos, & tandem *per 26. pr.* demonstratur reliquas perpendiculares FK , FL , &c. æquales esse tribus FG , FH , FI . quia v. g. in triangulis FDI , FDK , præter rectos ad I , K ; anguli ad D , sunt æquales, & latus FD , rectis oppositum est commune. quare circulus descriptus centro F intervallo FG , transit per reliqua puncta H , I , K , L , & in iisdem tangit latera figuræ datæ.

*Lemma. **

In figura regulari, & primo in figura laterum numero parium v. g. in octogono: Dico primo rectam AE , ductam ad angulos oppositos A , E , utrumque angulum secare bifariam.

Ex hoc habet latus æqualia, et angulos æquales.

EX eodem enim puncto A, ducantur reliquæ rectæ ad reliquos angulos, ita ut fiant ad utramque partem rectæ AE, tria triangula. Erunt primo duo triangula AGH, ACB, penitus æqualia *per 4. pr.* quia circa æquales angulos H, B, latera lateribus sunt æqualia; hoc est basis AG, erit æqualis AC, & angulus HAG, angulo BAC; & HGA, angulo BCA: & isti duo dempti ex totis GC, qui etiam sunt æquales, relinquunt alios duos AGF, ACD, æquales: Et circa istos erunt iterum duo latera duobus æqualia, ideoque *per 4. pr.* & basis AF, æqualis basi AD, & angulus FAG, æqualis DAC, & GFA æqualis CDA. Deniq; eodem modo demonstratur angulum AEF, æqualem esse angulo AED, & EAF, ipsi EAD. Patet igitur rectam AE, secare angulum E bifariam; imo & angulum BAH; quia ad utramq; partem rectæ EA, sunt tres anguli tribus æquales.

Dico 2. rectam EI transire per A, si bifariam secet angulum E. Debet enim coincidere cum recta AE, quam ostendimus eundem angulum E secare bifariam.

Dico 3. si dua rectæ EI, DI, bifariam secant duos angulos E, D, ipsas concurrere intra figuram. Anguli enim figurarum regularium sunt minores duobus rectis. ergo & semisses IED, IDE; & ideo *per 13.*

Axioma

Axioma EI, DI, concurrent: & quia transeunt per angulos oppositos, concurrunt intra figuram.

Dico 4. etiam duas perpendiculares LI, KI, qua bifariam secant latera EF, ED, concurrere in I. Nectantur enim LI, KI. Cum igitur in triangulo IED; anguli sint æquales; erunt IE, ID, æquales. sunt autem etiam IK, KE æqualia duobus lateribus IK, KD. ergo per 8. pr. anguli ad K, sunt recti. Rursus duo latera IE, EL, sunt æqualia duobus IE, EK, & anguli contenti æquales; ergo per 4. pr. angulus L, est æqualis recto K. Quoniam igitur perpendiculares prædictæ necessario coincidunt cum istis LI, KI concurrunt etiam ipsæ in I.

In figura autem laterum imparium V. g. in Heptagono: Dico primo rectam AK, qua secat angulum A, bifariam, secare etiam bifariam latus oppositum ED. *Respondeo* ultimus per. 5. fig. huius figure.

Ducantur AF, AC, AE, AD & secta ED, bifariam in K, nectatur AK. demonstrabitur, ut prius, AE, AD esse æquales. Sunt autem & AK, KE æqualia lateribus AK, KD, ergo per 8. pr. anguli ad K, sunt recti, & KAE. KAD. æquales. sunt autem juxta demonstrationem præcedentem, etiam reliqui duo EAF, FAG, æquales duobus DAC, CAB. ergo & totus

tus $K A G$, toti $K A B$, & ideo recta secans angulum A bifariam, coincidit cum $A K$, secatq; similiter latus $E D$ bifariam, & ad angulos rectos in puncto K ,

Dico 2. Vice versa perpendiculararem $K I$, secare bifariam angulum A . Coincidit enim necessario cum illa quam ostendimus secare bifariam angulum A .

Dico 3. Duas $A I, B I$, secantes bifariam angulos A, B , concurrere intra figuram & g. in I . ratio est, quia debent secare latera opposita bifariam.

Dico 4. Ad idem punctum I coire perpendiculares $L I, K I$, si bifariam secant latera $E F, E D$. Utraque enim coincidit necessario cum illis quæ secant bifariam angulos A, B .

PROPOS. & PROBL. 9. & 14.

Quadrato, & Pentagono regulari circulum circumscribere.

SEcentur duo latera $A B, B C$ bifariam in G, H , sintq; $G F, H F$, perpendiculares, hoc est, idem fiat hic quod in propositione 5. factum est, in descriptione circuli circa triangulum: concurrent dictæ perpendiculares intra figuram ad F , per lemma præmissum. & tres lineæ $F A, F B, F C$, ostenduntur esse æquales sicut in 5. Nam circa æquales angulos ad G , sunt latera lateribus æqualia, & similiter circa rectos ad H . Ex-

H. Ergo *per 4. pr.* FA, FC , sunt æquales eidem FB , atque adeo omnes tres æquales inter se; & triangula ABF, BCF , isoscelia habentia æquales angulos ad bases A, B, BC . Dico easdem FA, FB, FC , imo & reliquas FD, FE , secare bifariam angulos A, B, C, D, E . Sunt enim FB, BC æqualia lateribus FB, BA , & basis FC , æqualis FA . ergo *per 8. pr.* angulus BCF , æqualis est FBA . hoc est uterque erit semissis totius B . Sunt autem iisdem æquales FAB, FCB . ergo etiam isti sunt semisses angulorum A, C . & quia rursus circa æquales FCB, FCD , latera FC, CB , æqualia sunt lateribus FC, CD : erit *per 4. pr.* etiam FD , æqualis FB , & angulus $FD C$, æqualis FBC , hoc est, etiam $FD C$, erit semissis totius D . eodemque modo demonstrabitur FE , esse æqualem FC ; & angulum FED , esse semissem totius E , &c. Cum igitur omnes rectæ FA, FB, FC, FD, FE . &c. sint æquales, si centro F , intervallo FA describatur circulus, transibit per reliqua puncta B, C, D, E , &c.

Scholium.

EX his patet inscriptionem quidem figurarum intra circulum esse plerisque figuris regularibus peculiarem, reliquas vero

inſcriptiones & circumſcriptiones eſſe uni-
verſales.

Peculiares ſunt omnes illæ quas tradit
Euclides nimirum inſcriptio triânguli, qua-
drati, pentagoni, hexagoni & quintideca-
goni intra circulum, hoc eſt diviſio circuli
in 3. 4. 5; 6. & 15. partes æquales: poſſunt
tamen aliquæ eſſe univerſales. Nam ex
prædicta diviſione poſſunt fieri infinitæ a-
liæ, praxi omnibus comuni nimirum per
continuum biſectionem arcuum biſariam.
Beneficio enim quadrati inſcribitur octo-
gonum: figura 16. laterum, 32. laterum,
64. 128. &c. & ſimiliter beneficio Penta-
goni figura 10. laterum 20. 40. 80. &c. &
ita de reliquis.

Inſcriptio vero Heptagoni, Nonagoni,
11. laterum 13. &c. adhuc deſideratur;
quia nondum eſt repertum problema, &
conſtructio trianguli iſoſcelij cuius uterli-
bet angulorum æqualium ſit triplus qua-
druplus &c. reliqui anguli, quorum bene-
ficio inſcriberentur circulo heptagonum
nonagonum &c. eo modo quo deſcriptum
eſt pentagonum. Et beneficio heptagoni &
nonagoni inſcriberetur figura 63. late-
rum, ſicut inſcriptum fuit ab Eu-
clide, quintidecago-
num.

EVCLIDIS

ELEMENTUM

QUINTUM.

DEFINITIONES.

1. **P**ars, scilicet aliquota est, quæ metitur suum totum præcise.
 2. Ipsum vero totum vocatur multiplex suæ partis aliquotæ. *U. g. 3. est pars aliquota numeri 12, & 12. multiplex numeri 3. Ita & in lineis utq. 2, alia in palmis habet.*
 3. Ratio est duarum magnitudinum, ejusdem generis, mutua quædam secundum quantitatem habitudo.
 4. Rationū autē similitudo, est Proportio, vel potius proportionalitas. *Exempli gratia relatio 2. ad 1. Vel 4. ad 2. Vocatur ratio, & quia eadem est relatio 2 ad 1. & 4. ad 2. idcirco inter 2, & 1. & inter 4. & 2 dicitur esse proportio.*
 5. Ejusdem generis magnitudines sunt illæ, quæ multiplicatæ se mutuo possunt superare. *tales non sunt lineæ, & superficies; superficies, & corpus: angulus contingens*
- q. lineæ q. superficies D 7.*

ringentia, & angulus rectilineus. Quid
autē sentiendum sit de angulis segmento-
rum consule Claviū. Neque verum est
quod aliqui dicunt recti ad curvum non
esse proportionem. Sunt enim quadrata
nonnulla lunula, & ab Archimede qua-
drata est Parabola, figura mixta ex cur-
vo & recto.

6. Ut eadem sit ratio A ad B, & C, ad D,
debent æquemultiplices an-
E A B G tecedentium A, C, v.g. E, F,
9 3 6 24 quæcunque illæ sint, duplæ,
F C D H triplæ, quadruplæ, &c. respec-
12 4 8 32 tu quancunque æque-
multiplicium consequentium

B, & D, hoc est respectu G, H; quæ-
etiam possunt esse duplæ, triplæ, &c. ha-
bere hanc conditionem, ut E, F una sint
æquales ipsis G, H, vel una excedant,
vel una deficient, hoc est quando E est
æqualis ipsi G, etiam F, sit æqualis H,
quando E, est major, quàm G, etiam F sit
major quam H, & quando E, est minor
quàm G, etiam F sit minor quàm H.

7. Eandem proportionem habentes ma-
gnitudines vocantur proportionales.

8. Quod si in exemplo defin. 6. deprehen-
deretur aliquam multiplicem E, mayo-
rem quidem esse multiplici G, at æqui-
multiplicem F, non esse majorem H,

* hoc est si E triplicem, G unum, F unum, H unum, &c. &c.

tunc A ad B, dicitur habere maiorem rationem quam C ad D, *ut si A est 9 et B 3, C 6 et D 2, tunc A ad B est 3 ad 1, C ad D est 3 ad 1, sed A ad B est maior.*

9. Termini proportionales ut minimum sunt tres, potest enim consequens terminus prioris rationis, esse antecedens sequentis, ut contingit in proportionibus continuas. In discreta vero requiruntur ut minimum quatuor termini. *10, 6, 12, 18. 12, 6, 18, 9.*
10. Non habet usum in hoc libro, & respondet quintæ definitioni libri sexti.
11. Homologæ magnitudines sunt antecedentes, antecedentibus; & consequentes consequentibus.

In reliquis definitionibus
Sequuntur sex modi argumentandi in Proportionibus, qui inferius suis locis demonstrantur, & ibi ex magis eundem modis.

12. Primus modus. Alternata seu permutata ratio, est sumptio antecedentis ad antecedentem, & consequentis ad consequentem. *Ut quando ex eo quod ut A ad B; ita est C ad D, inferitur, ergo*
- | | | | |
|-----|----|-----|--|
| A 9 | -- | B 3 | permutando, ut A ad C. |
| C 6 | -- | D 2 | antecedens ad antecedentem, ita est B ad D |
- consequens ad consequentem. Demonstratur propositione 16.
13. Secundus modus. Inversa seu conversa ratio, est sumptio consequentis instar ante-

antecedentis, ad antecedentem, velut ad consequentem. *Ut quando ex eo quod ut A ad B ita est C ad D.*

$A \ 9 \ -- \ B \ 3$ inferitur, ergo convergen-
 $C \ 6 \ -- \ D \ 2$ do, & invertendo ut B,
 ad A, ita est D ad C. De-
monstratur in coroll. prop. 4.

14. *Tertius modus.* Compositio rationis, est sumptio antecedentis cum consequente instar unius, ad ipsam consequentem. *Ut quando ex eo*

$A \ 9 \ -- \ B \ 3$ quod ut A ad B, ita est C
 $C \ 6 \ -- \ D \ 2$ ad D; inferitur. Ergo

$A \ B \ 12 \ - \ B \ 3$ componendo ut AB si-
 $C \ D \ 8 \ -- \ D \ 2$ mul, ad eandem B, ita est
 CD simul, ad eandem D.

Demonstratur prop. 18.

15. *Quartus modus.* Divisio rationis, est sumptio excessus, quo antecedens superat consequentem, ad ipsam consequentem. *Ut quando ex eo*

$A \ B \ 9 \ B \ 3$ quod ut AB simul ad
 $C \ D \ 6 \ D \ 2$ partem B; ita sunt CD

$A \ 6 \ B \ 3$ simul ad partem D; infer-
 $C \ 4 \ D \ 2$ tur. Ergo dividendo ut
 pars A, ad eandem par-

tem B, ita reliqua pars C, ad eandem D.

Demonstratur prop. 17.

16. *Quintus modus.* Conversio rationis, est sumptio antecedentis ad excessum, quo

quo antecedens superat consequentem.

Ut quando ex eo quod ut AB , simul ad partem B , ita sunt CD ,

AB 9 B 3 ad partem D ; inferitur.

CD 6 D 2 Ergo per conversionem

AB 9 A 6 rationis ut AB simul,

CD 6 C 4 ad reliquam partem A ,

ita CD simul, ad reli-

quam partem C . Demonstratur prop. 19.

Quinque hi modi argumentandi in Proportio-

tionibus, exhibentur hoc schemate.

Quia est ut 9. ad 3. ita 6. ad 2.

Erit permutando ut 9. -- 6. 3. -- 2.

Convertendo 3. -- 9. 2. -- 6.

Componendo 12. -- 3. 8. -- 2.

Dividendo 6. -- 3. 4. -- 2.

Per convers. rationis 9. -- 6. 6. -- 4.

17. Sextus modus. Ratio ex æqualitate sive

ex æquo est, si sint plures magnitudines

quam duæ, & aliæ his multitudine pares

quæ binæ sumuntur & in eadem ratione;

& inferitur ut in primis magnitudinibus

se habet prima ad ultimā, ita in secundis

magnitudinibus se habet prima ad ulti-

mā. Est autē Ratio ex æqualitate duplex.

18. Ordinata est, cum fuerit quemadmo-

dum antecedens ad consequentem, ita

antecedens ad consequentem: fuerit e-

tiam ut consequens ad aliud quidpiam,

ita consequens ad aliud quidpiam.

¶ Et quædam rationes eadem sunt & quædam non sunt.

1
A 6. 38. Ad 14
C 3. 24. CD 7

2
A 8. 12. 19
C 3. 20. 15

3
A 12. 18. 14
C 3. 14. 14

4
A 9. 12. 12
C 3. 12. 12

5
A 10. 12. 12
C 3. 12. 12

6
A 10. 12. 12
C 3. 12. 12

SI enim in A sunt v. g. tres magnitudines E, F, G, æquales ipsi C; erunt etiā in B, totidem magnitudines H, I, K, æquales ipsi D: & E, H simul æquales, erunt ipsi C, D, semel; & F, I, secundo; & G, K, tertio. atque adeo quoties A, continet C, toties E, F, G, H, I, K, hoc est, A & B simul, continebunt C, D simul.

PROPOS. 2. THEOR. 2.

Sint A & C, æquemultiplices ipsarum B & D; & alia E; & sint earundem B, D, æquemultiplices; Dico A, E simul, & C, F simul, esse earundem B, & D, æquemultiplices.

SI enim æqualibus multitudinibus A, C, addantur æquales multitudines E, F; fiunt A, E, simul, & C, F simul, æquales multitudines earundem B, D.

PROPOS. 3. THEOR. 3.

A, B sint æquemultiplices magnitudinum C, D; & E, F æquemultiplices æquimultiplicium A, B: Dico E, F earundem C, D, esse æquemultiplices.

SI enim in E, sunt v. g. tres partes G, H, I, æquales ipsi A, erunt totidem K, L, M in F, æquales ipsi B. Cumque G, K, sint æquales ipsi A, B, erunt G, K ipsarum C, D, æquemultiplices. sunt autem & H, L, eandem ob causam, earundem æquemultiplices. ergo per præcedentem G, H simul, & K, L

K, L simul, sunt earundem C, D æquemultiplices; & quia etiam I, M, sunt earundem æquemultiplices; erunt *per eandem* omnes G, H, I, & omnes K, L, M, hoc est, E & F, æquemultiplices ipsarum C, D.

PROPOS. 4. THEOR. 4.

Ut A ad B, ita sit C, ad D, & E, F sint æquemultiplices antecedentium A, C; & G, H utcumque æquemultiplices consequentium B, D: Dico esse ut E ad G, ita F ad H.

Ipsarum enim E, F, sumantur quæcunque æquemultiplices I, K, & aliæ quæcunque æquemultiplices L, M, ipsarum G, H. Ergo *per defin. 6.* I, K, erunt æquemultiplices ipsarum A, C; & L, M, æquemultiplices ipsarum B, D, atque adeo *per defin. 6.* I, K, erunt vel una æquales ipsis L, M, vel una excedent, vel una deficient. Sunt autem I, K æquemultiplices ipsarum E, F, & L, M, æquemultiplices ipsarum G, H. Ergo *per eandem 6. defin.* erit quoque ut E ad G, ita F ad H.

Demonstratio rationis Converse. †

Coroll. Ex eadem definitione probatur eadem facilitate ratio Converse. Nam si ut A ad B, ita fuerit C ad D; & ipsarum A, C, sumantur æquemultiplices E, F, & aliæ G, H, æquemultiplices quæcunque ipsarum B, D, erunt *per defin. 6.* E, F vel una æ-

† E.g. A ad B 2 fuerit, ut C ad D, ead. f. g. ut 4 ad 8, ita 2 ad 4. Ita 4 ad 8, ita 2 ad 4. †

quales ipsis G, H, vel una excedent, vel una deficient; imo & vice versa G & H, vel una erunt æquales, vel una excedent, vel una deficient ab E, F. Unde sequitur *per eandem defin.* ut B ad A, ita esse D ad C.

PROPOS. 5. THEOR. 5.

Quam est multiplex magnitudo A B, magnitudinis C D, tam sit ablata A, multiplex ablata C: Dico etiam reliquam B, tam esse multiplicem reliqua D, quam est tota totius, & ablata ablata.

Quam est multiplex tota totius, vel ablata A, ablata C, tam sit B, multiplex alicujus magnitudinis E. Ergo *per 1.* A, B, simul, tam erunt multiplices ipsarum C, E simul, quam est A ipsius C, vel quam est A B simul, ipsarum C D. Atque ita A B, simul, sunt æquemultiplices tam ipsarum C E, quam ipsarum C, D. & ideo C, E, sunt æquales C, D; & ablata communi C, remanebit D, æqualis E; sed B, ita est multiplex ipsius E ut ablata A, ablata C. ergo etiam B, ita erit multiplex ipsius D, ut A ipsius C, vel A B, ipsarum C D.

PROPOS. 6. THEOR. 6.

A B, C D, sint æquemultiplices magnitudinum E & F; & A, C ablata, sint earundem E, F, æquemultiplices; Dico reliquas B, D, & esse æquales ipsis E, F; & earundem æquemultiplices.

His

A; erunt *per primam* D. E, simul, ita multiplices totius A B, ut est E, multiplex minoris A. Capiatur quoque F G multiplex ipsius C. proxime major E. dempta igitur G, quæ intelligitur æqualis C, reliqua F, non erit major quàm E. est autem & D major quàm C, hoc est quàm G, ergo tota D E major est tota F G. Quare cum D E, & E, sint æquemultiplices ipsarum A B majoris, & A minoris, & F G, ipsius C, quæ est instar duarum consequentium, sitq; E D multiplex primæ AB, major quidem multiplice secundæ C, hoc est major quàm F G, sed multiplex tertiæ A, hoc est E, non major F G, multiplice quartæ C: Erit *per 8. defin.* major ratio A B, ad C, quàm A ad eandem C.

Et vice versa C ad A B, habebit minorem quàm ad A, quia vicissim, est quidem F G major quàm E; sed non est major quàm D E.

PROPOS. 9. THEOR. 9.

Sive A, & B, eandem habeant rationem ad C: sive C eandem ad A & B; semper A & B, erunt æquales.

SI enim A, major foret quàm B, non haberent rationem eandem ad C, *per præcedentem*, quod est contra hypothesim. Neque C haberet eandem ad A, & ad B.

PROPOS. 10. THEOR. 10.

Si A ad C maiorem rationem habeat, quàm B, ad eandem C. Erit A, maior quàm B, Et vice versa si C ad A^{} habet maiorem quàm ad B^{*}; erit B, maior quàm A.*

Si enim A esset æqualis B, non haberet proportionem maiorem ad C, & si esset minor haberet minorem *per antecedentes*. Et è contrario C, ad A, & B haberet eandem, si A & B, essent æquales, & si A, esset maior quàm B; haberet C ad A, minorem, quod est absurdum.

PROPOS. 11. THEOR. 11.

Si A ad B, & C ad D, eadem sit ratio, quæ E ad F: erunt etiam ipsa eadem inter se.

Sint G, I, H æquemultiplices A, E, C, & K, M, L æquemultiplices ipsarum B, F, D. Quoniam igitur ut E ad F, ita est tam A ad B, quàm C ad D. ergo *per def. 6.* quando I, est æqualis, maior, vel minor quàm M, erunt quoque G & H æquales ipsis K & L, vel una deficient, vel una excedent; & ideo *per eandem 6. defin.* A, B: C, D. sunt proportionales, hoc est, ut A ad B, ita est C ad D.

PROPOS. 12. THEOR. 12.

Si fuerit ut A ad B, ita C ad D, & ita E ad F, &c. erunt omnes antecedentes ad omnes consequentes, ut una ad unam &c. g. ut A ad B,

Summa-

Sumantur G, H, I, æquemultiplices antecedentium, & K, L, M, utcunque æquemultiplices consequentium: ita ut *per 1.* tam sint multiplices, G, H, I, ipsarū A, C, E simul, quā est G ipſius A: & K, L, M, ipsarū B, D, F, ita multiplices, ut K ipſius B. Deinde quoniam rationes A ad B, C ad D, E ad F, ſint eadem, ergo quando G, eſt æqualis, major, vel minor quā K, erit etiam H, & I æqualis, major, vel minor, quā L & M: Atque adeo quando G major eſt, minor, vel æqualis ipſi K; erunt omnes G, H, I, majores, minores, vel æquales omnibus K, L, M. Sunt autem G, & G, H, I, æquemultiplices A, & A, C, E; & K, & K, L, M, æquemultiplices B; & B, D, F. ergo *per defn. 6.* ut A, ad B, ita ſunt omnes, A, C, E, ad omnes B, D, F.

PROPOS. 13. THEOR. 13.

Si A ad B eandem rationem habuerit quā C ad D; at C ad D, majorem quā E ad F: etiam A ad B, habebit majorem, quā E ad F.

Sumptis enim æquemultiplicibus, ut in præcedenti; erit *per def. 6.* G, ſemper major quā K, quando H, major eſt quā L: at *per 8. defn.* quando H, major eſt quā L, non ſemper I eſt major quā M. Ergo etiam I, poteſt eſſe non major quā M, quādo G major eſt quā K, & ideo *per eandem defn.*

defin. 8. major erit ratio A ad B, quàm E ad F.

PROPOS. 14. THEOR. 14.

Ut A ad B, ita sit C ad D: Dico A & B, & vel una esse aequales ipsis C, D; & vel una excedere, & vel una deficere.

Existente enim A, v.g. majore ipsâ C; ratio A ad B major est, quàm C ad B, *per* 8. Sed ut A ad B, ita est C ad D: Ergo major est ratio C ad D, quàm C ad B; ideoq; *per* 10. major erit B, quàm D. simillima est ratiocinatio in reliquis.

PROPOS. 15. THEOR. 15.

Partes A, B, cum æquemultiplicibus C, D; sunt in eadem ratione.

Sint enim exempli gratia in C, tres partes æquales ipsi A, nimirum E, F, G. Erunt ergo totidem in D, nempe H, I, K, æquales ipsi B, utque A ad B, ita erit E ad H; F ad I, & G ad K; & *per* 12. ut E ad H, hoc est ut A ad B, ita erunt omnes E, F, G, ad omnes H, I, K, hoc est, ita erit C, ad D.

PROPOS. 16. THEOR. 16.

Ratio Alterna.

Ut A, ad B, ita sit C ad D: Dico permutando ut A ad C, ita esse B ad D: & hoc quando omnes quatuor magnitudines sunt ejusdem generis.

Sint E, F, æquemultiplices ipsarum A, B; & G, H, utcumque æquemultiplices ipsarum C, D. Ergo ut A ad B, ita erit, *per antec.*

in C &

D &

reced.

seced. E ad F; & ut C ad D, ita G ad H; & *per* 11. ut E ad F, ita G ad H; & *per* 14. E & F, erunt vel una æquales ipsis G, H, vel una excedent, vel una deficient, *perq; def.* 6. ut A ad C, ita erit B ad D, sunt enim E, F, æquemultiples antecedentium; & G, H, æquemultiples consequentium.

PROPOS. 17. THEOR. 17.

Divisio Rationis.

Ut A B, ad B, ita sit C D, ad D: Dico definiendo esse ut A, ad B, ita C ad D.

Sumantur E, F; G, H, omnes æquemultiples ipsarum A, B, C, D. eritque *per* 1. aggregatum E F, tam multiplex totius A B, quàm est E ipsius A, & G H, tam multiplex totius C D, quàm G, ipsius C: Sed E & G, sunt æquemultiples ipsarum A, C; ergo etiam E F, & G H, sunt æquemultiples totarum A B, C D. Sint quoque aliæ I, K, earundem B, D, æquemultiples. ergo *per secundam*, etiam F, I, & H, K, erunt earundem B, D, æquemultiples cum igitur E F, G H, sint æquemultiples antecedentium A B, C D; & F I, H K consequentium B D. ergo *per def.* 6. E F, & G H, vel una erunt æquales, vel una deficient, vel una excedent multiples F I, H K: quando autem E F, & G H, sunt majores quàm F I, H K; tunc demptis communibus F, H, remanent E, G, majores quàm I & K, & quando

sunt

E 2

$\begin{array}{cc} AB & CD \\ 12 & 4 \\ A & B \\ 12 & 4 \end{array}$

go dividendo ut A ad B; ita erit C ad D; & convertendo ut B ad A; ita D ad C; & componendo ut B A ad A; ita D C ad C. *Est huc est argumentari per conversionem rationis.*

PROPOS. 20. THEOR. 20.

Ut A ad B; ita sit D ad E; Est ut B ad C, ita E ad F. Dico primas A, D, vel esse una aequales extremis C, F; vel majores, vel minores.

Quando enim A, C, sunt æquales, tunc A & C habent eandem proportionem ad B: Sed ut A ad B, ita est D ad E; & ut C ad B, ita est convertendo F ad E: ergo etiā ut D ad E, ita est F ad E; & idcirco per 9. D, & F, sunt æquales. similis est ratio in reliquis casibus.

PROPOS. 21. THEOR. 21.

Ut A ad B, ita sit E ad F; Est ut B ad C, ita D ad E: Dico iterum A & D, vel una esse aequales extremis C, F; vel una majores, vel una minores.

Quando A major est quàm C, tunc A, ad B, habet majorem proportionem quàm C ad B; sed ut A, ad B, ita est E ad F; & ut C ad B, ita est convertendo E ad D: ergo E ad F, habet majorem rationem quàm E ad D; & ideo per 10. D, major est quàm I. & ita de reliquis casibus.

*Ar d. C. 2. D. E. 6. f. 3.
A. C. d. B. E. 3.
D. f. 6. f. 3.*

PRO-

PROPOS. 22. THEOR. 22.

Æqualitas ordinata.

*Sit rursus, ut in 20. ut A ad B, ita D ad E,
 & ut B ad C, ita E ad F, ita ut proportio
 sit ordinata etiam in pluribus terminis.
 Dico ex æqualitate ordinata, ut A ad C,
 ita esse D ad F.*

Ipsarum A, D, sint æquemultiplices G,
 H; ipsarum B, E æquemultiplices I, K; &
 L, M, æquemultiplices ipsarum C F. Ergo
per 4. ut G ad I, ita est H ad K; & ut I ad L,
 ita K ad M; & *per 20. primæ* G, H, erunt u-
 na æquales, vel maiores, vel minores ex-
 tremis L, M: & ideo *per 6. defin.* ut A ad C;
 ita erit D ad F.

Quod si præterea, ut C ad N, ita fuerit
 F ad O; sequeretur primo *per demonstratio-
 nem præmissam* ut A ad C, ita esse D ad F; &
 quia ut A ad C, ita est D ad F; & ut C ad N,
 ita F ad O. ergo *per eandem* erit iterum, ut
 A ad N, ita D ad O, &c.

PROPOS. 23. THEOR. 23.

Æqualitas perturbata.

*Ut A ad B, ita sit E ad F; & ut B ad C, ita
 sit perturbatè D ad E: Dico ex æqualita-
 re perturbatâ, ut A ad C, ita esse D ad F.*

Sint G, H, I, æquemultiplices trium A,
 B, D; & K, L, M, æquemultiplices reli-
 quarum. Ergo *per 15.* ut A ad B, ita est G
 ad H; & ut E ad F, ita L ad M, sed ut A, ad B,
 ita

ita est E ad F: ergo ut G ad H, ita est L ad M. Item *per* 4. ut H ad K, ita est I ad L. Cum ergo ut G ad H, ita sit L ad M; & ut H ad K, ita I ad L: ergo *per* 21. G & I, vel una erunt æquales ipsis K, M, vel majores, vel minores; & *per* def. 6. ut A ad C, ita erit D ad F: & si ut C ad N, ita foret alia O ad D, &c. sequeretur eodem modo, ut A ad N, ita esse O ad F.

PROPOS. 24. THEOR. 24.

Si A ad B, ita sit C ad D: & ut E ad B, ita F ad D: Dico ut A E simul, ad B, ita esse C F simul ad D.

NAm *convertendo*, erit quoque ut B ad E, ita D ad F; & sic A, B, E, & totidem C, D, F, erunt ordinatè proportionales. Quare ut A ad E, ita erit *per* 22. C ad F, & *componendo* ut A E ad E, ita C F ad F: & sic erunt iterum tres A E, E, & B, & tres C F, F, & D; ordinatè proportionales: iterumque *per* 22. ut A E ad B, ita erit C F ad D.

PROPOS. 25. THEOR. 25.

Si quatuor magnitudines A B, C D, A, C, proportionales fuerint & A B maxima, ideoq; C minima: maxima, & minima simul, erunt reliquis majores.

Concipiantur tertia A, & quarta C; ut partes primæ A B, & secundæ C D. Cum igitur sit ut A B ad C D, ita ablata A, ad ablatam C; erit *per* 19. reliqua B, ad reliquam

liquam D, ut tota A B, ad totam C D. sed AB, ponitur major C D: ergo *per* 14. B erit major quam D. Additis ergo A, C; erunt A, B, C, majores quam A, C, D.

Propositiones ab alijs addite.

PROPOS. 26. THEOR. 26.

*Ratio A ad B, sit major ratione C ad D: Di-
co convertendo B ad A, minorem esse
D ad C.*

Nam ut C ad D, ita sit E ad B : eritque
etiam ratio A ad B, major ratione E
ad B, ideoque *per* 10. A major quàm E; &
per 8. ratio B ad A, minor quàm B, ad E,
hoc est, quàm D ad C.

PROPOS. 27. THEOR. 27.

Ratio A ad B, sit major ratione C ad D: Di-
scipso permutando A ad C, majorem esse
B ad D.

SIt iterum ut C ad D, ita E ad B: eritque
Sut in precedente A, major quàm E,
 Quare major erit ratio A ad C, quàm E
 ad C. sed ut E ad C, ita est *permutando* B
 ad D. ergo major est A ad C, quàm B ad D.

PROPOS. 28. THEOR. 28.

*Ratio A ad B, major sit ratione C ad D: Di-
co componendo A B, ad B, majorem es-
se C D, ad D.*

UT Cad D , ita sit E ad B ; eritque iterum A , major quam E ; & AB , major quam





quàm $E B$; & per 8. ratio $A B$, ad B , major ratione $E B$, ad B , hoc est, ratione $C D$, ad D ; quia componendo ut $E B$ ad B , ita est $C D$, ad D .

PROPOS. 29. THEOR. 29.

Ratio $A B$ ad B , sit major ratione $C D$ ad D : Dico dividendo A ad E , maiorem esse C ad D . Ad 29. 4. Dis. 25

UT $C D$ ad D , ita sit $E B$ ad B : eritque $A B$, major quàm $E B$; & dempta communi B , erit A major quàm E & per 8. ratio A ad B major ratione E ad B , hoc est C ad D ; quia dividendo ut C ad D , ita est E ad B .

PROPOS. 30. THEOR. 30.

Ratio $A B$ ad B , sit major ratione $C D$, ad D : Dico per conversionem rationis, $A B$ ad A , minorem esse $C D$, ad E . Sic in 29. 4. 25

NAm dividendo per 29. erit quodque A ad B major, quàm C ad D ; & convertendo per 26. B ad A , minor quàm D , ad C ; & componendo per 28. $A B$, ad A , minor $C D$, ad C .

PROPOS. 31. THEOR. 31.

Ratio A ad B , sit major D ad E , & B ad C , major E ad F : Dico ex æqualitate ordinata, A ad C , maiorem esse, D , ad F .

UT E ad F , ita sit G ad C ; & ut D ad E , ita H , ad G . Quoniam igitur B , ad C , major est quàm E , ad F , seu G , ad C ; erit B , major G ; & ratio A , ad C , major ratione A , ad G .

ad B : est autem A , ad B major ratione D , ad E ; hoc est H , ad G . ergo A , ad G , major est ratione H , ad G ; & A , major quàm H . Quare ratio A , ad C , major est ratione H , ad C ; ut autem H , ad C , ita est *ex aequalitate ordinata* D ad F . ergo etiam A , ad C , major est ratione D , ad F .

Idem verum est in pluribus terminis; possunt enim reduci ad 3. sicut factum est in 22.

PROPOS. 32. THEOR. 32.

Major sit ratio A ad B , quàm E ad F ; & B ad C ; major quàm D ad E : Dico ex æqualitate perturbata, A ad C , majorem esse ratione D ad F .

UT D , ad E , ita sit G , ad C ; & H , ad G ; ut E , ad F : eritque ratio B , ad C , major ratione D , ad E : hoc est, G , ad C ; ideoque B , major quàm G ; & ratio A , ad G , major quàm A , ad B . per 8. Sed hæc major est quàm E , ad F , seu H , ad G : ergo A , ad G : multo est major ratione H , ad G : & A , major quàm H : & ideo ratio A , ad C , major ratione H , ad C . Sed ut H , ad C ; ita est *ex aequalitate* D , ad F : ergo A , ad C , major est ratione D , ad F .

PROPOS. 33. THEOR. 33.

Ratio totius AB ad totam CD , major sit ratione ablata A , ad ablatam C : Dico rationem reliqua B , ad reliquam D ; majorem esse totius ad totam.

Nam

NAm permutando per 27. erit major ratio AB , ad A , quàm CD , ad C ; & per conversione rationis, hoc est per 30. ratio AB , ad B , minor ratione CD , ad D ; iterumq; permutando AB , ad CD , minor ratione B , ad D .

PROROS. 34. THEOR. 34.

Si sint quoruncq; magnitudines A, B, C, D, E, F , ipsis numero aquales, sitq; A major ratio A , ad D , quàm B , ad E ; item C major quàm C , ad F : Dico rationem ABC ad omnes DEF , majorem esse ratione BC , ad EF ; minorem quàm A , ad D ; & majorem quàm C , ad F . X

CUm enim major sit A , ad D , quàm B , ad E ; erit per 27. permutando major A , ad B , quàm D , ad E ; & componendo per 28. AB , ad B , major quàm DE , ad E ; & iterum permutando, major AB , ad DE , quàm ablata B , ad ablatam E . Quare per 33. reliqua A , ad reliquam D , major erit quàm AB , ad DE . Eademque ratione, erit B , ad E , major quàm totius BC , ad totam EF . multo igitur major erit A , ad D , quàm BC totius, ad totam EF ; & permutando A , ad BC , major quàm D , ad EF ; & componendo ABC , ad BC , major quàm DEF , ad EF . & rursus permutando omniũ ABC , ad omnes DEF , major quàm BC , ad EF , quod est primum.

Cumque ABC , ad DEF ; sit major quàm B , ad E ; erit per 33. reliqua A , ad reliquam D , ma-

D , major quàm totius ABC , ad totum DEF , quod est secundum.

Rursus ex eo quod ratio B , ad E , major est quàm C , ad F , sequitur *permutando* B , ad C , esse maiorem E , ad F ; & *componendo* totius BC , ad C , maiorem totius EF , ad F . & rursus *permutando* BC , ad EF , maiorem C , ad F . est autem ratio ABC , ad DEF , major quàm BC , ad EF , ut ostendimus; multo ergo major erit ABC , ad DEF , quàm C ad F quod est tertium.

Jam vero sit quoque C , ad F , major quàm G , ad H . Eritque *per demonstrata* major ratio B , ad E , quàm BCG , ad EFH ; multo igitur major A , ad D , quàm BCG , ad EFH ; & *permutando* A , ad BCG , major quàm D , ad EFH , & *componendo* major $ABCG$, ad BCG , quàm $DEFH$, ad EFH ; & *permutando* $ABCG$, ad $DEFH$, major quàm BCG , ad EFH , quod est primum.

Cumque sit major ratio totius $ABCG$ ad totam $DEFH$, quam. ablatae BCG , ad ablatam EFH ; erit & reliquæ A , ad reliquam D , major totius $ABCG$, ad totam $DEFH$, quod est secundum.

Quoniam vero ut in tribus demonstratum est, major est BCG , ad EFH , quàm G , ad H , & major $ABCG$, ad $DEFH$, quàm BCG , ad EFH : multo major erit $ABCG$, ad $DEFH$, quàm ultimæ G , ad ultimam H , & ita de pluribus.

EUCLI.

EVCLIDIS

ELEMENTUM

SEXTUM.

DEFINITIONES.

1. **S**imiles figuræ rectilineæ sunt, quæ angulos angulis habent æquales, & circa ipsos, latera lateribus proportionalia.

2. Reciproæ sunt, cum in utraque antecedentes, & consequentes rationum termini fuerint.

3. Linea v. g. A B, secta erit media & extrema ratione; cum tota A B cum partibus A C, C B, fuerint continuè tres proportionales.

4. Altitudo figuræ, est linea perpendicularis, à vertice in basim ducta. *Ad in figura sic.*

5. Ratio duarum magnitudinum, dicitur composita ex tot rationibus, quot inter easdem continuantur.

vel $\left\{ \begin{array}{l} 24 \text{ } 12 \text{ } 6 \text{ } 3 \\ A \text{ } B \text{ } C \text{ } D \end{array} \right.$ hoc est, si inter A, C, intercedat B; proportio A, ad C, dicitur composita, ex ratio-

Sub fuerit, ut tota AB ad segmentum majus AC, ne sita AC ad segmentum minus CB. Hoc prout sit capere.

ne A, ad B; & B ad C; five hujusmodi rationes interjectæ sint eadem, five non. Item ratio A, ad D, componi dicitur, ex rationibus, A, ad B; B, ad C; & C, ad D. propterea quod dictæ rationes inter terminos A, D, continentur, per interjectos terminos B, C.

40. 20. 10. Defin. 10. Libri 5.

Vel $\left\{ \begin{array}{l} A \ B \ C \ D \\ 12 \ 9 \ 6 \ 4 \end{array} \right.$ Quando omnes proportionales interjectæ sunt eadem; tunc ratio A, ad C, dicitur per compendium esse duplicata proportionis A, ad B: eo quod eadem ratio, sit his continuata per communem terminum B; & A, ad D, dicitur triplicata ejusdem, quia ter continuatur per terminos B, C. &c.

Scholium.

IN duabus istis definitionibus explicandis Inultus quidem fuit Clavius, non tamen superfluous. Quinta enim quæ definit compositionem rationum, suæ debuit restitui integritati, & quorundam expositiones falsa fuere detegendæ, & rejiciendæ. Nam quod in vulgari definitione habetur, denominatorem rationis compositæ, fieri ex multiplicatione denominatorum rationum componentium, non est Definitio, sed Theorema, neque eo in sensu usurpatur ab Euclide,

elide, alijsque Geometris, ut videre est ad propositionem 23. in qua ostenditur, rationem parallelogrammorum, componi ex rationibus laterum, quæ sunt circa angulos æquales, continuando dictas rationes componentes in tribus terminis, & demonstrando rationem primi ad tertium, quam Euclides *per definitionem 5.* vult esse compositam ex intermedijs, eandem esse cum ratione, quam habet parallelogrammum, ad parallelogrammum. Unde manifestè colligitur, definitionem compositionis vulgarem, non esse ex sententiâ Euclidis positam, sed ab alio aliquo immutatam. Ex sensu enim compositionis vero, non potest aliud inferri nisi quod rationes componentes, positæ inter duos terminos habentes dictam rationem compositam, possint continuari, saltem eo ordine quo pronunciantur. Quod autem interponi possint ad libitum, videtur potius petendum à Theoremate peculiari, quàm à definitione generali. Atque hoc est quod hic peculiari lemmate demonstrandum suscepit.

Lemma.

SI ratio v.g. A ad B dicatur composita, v.g. ex rationibus a. e. i: Dico eandem componi, ex eisdem quocunq; ordine positis.

tis. Hoc est, inter duos terminos A B, licitum esse continuare dictas rationes toties, quoties possunt inter se mutare locum: juxta Regulam ad initium Spheræ positam, ubi Clavius disputat de numero, & ordine Elementorum, estque sequens.

Regula mutationum.

Sumantur tot numeri in serie naturali, quot sunt res propositæ: multiplicati enim invicem, producant summam mutationū: quæ pro duabus rebus est 2. pro tribus 6. pro quatuor 24. pro quinque 120. &c.

	Mutat.	Ser. nat.	Res	ut videre est in calculo hic adjecto; & manife-
		1	A	stius in qua-
pro duabus.	2	2	B	tuor exem-
pro tribus.	6	3	C	plis, ad sin-
pro quatuor.	24	4	D	gulas muta-
pro quinque.	120	5	E	tiones ex-
&c.	&c.	&c.	&c.	tensis, quo-
				rum confi-

deratio, & comparatio plurimum facit ad abbreviandam demonstrationem.

Pri-

Primum exemplum duarum rerum.

a		e	
1	a e	2	e a

Secundum exemplum trium rerum.

a		e		i	
1	a e i	3	e a i	5	i a e
2	a i e	4	e i a	6	i e a

Tertium exemplum quatuor rerum.

a		e		i		o	
1	a e i o	7	e a i o	13	i a e o	19	o a e i
2	a e o i	8	e a o i	14	i a o e	20	o a i e
3	a i e o	9	e i a o	15	i e a o	21	o e a i
4	a i o e	10	e i o a	16	i e o a	22	o e i a
5	a o e i	11	e o a i	17	i o a e	23	o i a e
6	a o i e	12	e o i a	18	i o e a	24	o i e a

Quat-

Quatuordecim quinte regit.

a c i o u

1	a c i o u	25	c a i o u	49	i a e o u	73	o a c i u	97	u a c i o
2	a c i u o	26	c a i u o	50	i a e u o	74	o a e u i	98	u a e o i
3	a c o i u	27	c a o i u	51	i a o e u	75	o a i e u	99	u a i e o
4	a c o u i	28	c a o u i	52	i a o e u	76	o a i u e	100	u a i o e
5	a c u i o	29	c a u i o	53	i a u e o	77	o a u e i	101	u a o e i
6	a c u o i	30	c a u o i	54	i a u o e	78	o a u i e	102	u a o i e
7	a i e o u	31	c i a o u	55	i e u o u	79	o e a i u	103	u e a i o
8	a i e u o	32	c i a u o	56	i e u o u	80	o e a u i	104	u e a o i
9	a i o e u	33	c i o a u	57	i e o u a	81	o e i a u	105	u e i a o
10	a i o u e	34	c i o u a	58	i e o u a	82	o e i u a	106	u e i o a
11	a i u e o	35	c i u a o	59	i e u a o	83	o e u a i	107	u e o a i
12	a i u o e	36	c i u o a	60	i e u o a	84	o e u i a	108	u e o i a

13	a	o	e	i	u	37	e	o	a	i	u	61	i	o	a	e	u	85	o	i	a	e	u	109	u	i	a	e	o
14	a	o	e	e	i	38	e	o	a	u	i	62	i	o	a	e	u	86	o	i	a	e	u	110	u	i	a	e	o
15	a	o	i	e	u	39	e	o	i	a	u	63	i	o	e	a	u	87	o	i	e	a	u	111	u	i	e	a	o
16	a	o	i	e	u	40	e	o	i	a	u	64	i	o	e	a	u	88	o	i	e	a	u	112	u	i	e	a	o
17	a	o	u	e	i	41	e	o	u	a	i	65	i	o	u	a	e	89	o	i	u	a	e	113	u	i	o	a	e
18	a	o	u	i	e	42	e	o	u	i	a	66	i	o	u	e	a	90	o	i	u	e	a	114	u	i	o	e	a
19	a	u	e	i	o	43	e	u	a	i	o	67	i	u	a	e	o	91	o	u	a	e	i	115	u	o	a	e	i
20	a	u	e	o	i	44	e	u	a	o	i	68	i	u	a	o	e	92	o	u	a	i	e	116	u	o	a	i	e
21	a	u	i	e	o	45	e	u	i	a	o	69	i	u	e	a	o	93	o	u	e	a	i	117	u	o	e	a	i
22	a	u	i	o	e	46	e	u	i	o	e	70	i	u	e	o	a	94	o	u	e	i	a	118	u	o	e	i	a
23	a	u	o	e	i	47	e	u	o	a	i	71	i	u	o	a	e	95	o	u	i	a	e	119	u	o	i	a	e
24	a	u	o	i	e	48	e	u	o	i	a	72	i	u	o	e	a	96	o	u	i	e	a	120	u	o	i	e	a

In primo exemplo, videre est duas series in transversum, notatas literis a, e & sub singulis mutationes singulas. & duas in universum, quia singule literæ non possunt occupare primum locum sæpius, quàm semel.

In secundo exemplo, sunt tres series, in transversum, denominatæ à tribus literis a, e, i, & sub singulis sunt duæ mutationes. quia singulæ literæ possunt occupare primum locum bis, hoc est toties, quot in primo exemplo erant mutationes in universum. unde in secundo exemplo sunt mutationes 6.

In 3. exemplo sunt quatuor series transversæ, denominatæ à quatuor literis a, e, i, o, & infra singulas sunt 6. mutationes, & in universum 24.

In 4. exemplo sunt quinque transversæ series, denominatæ à quinque literis a, e, i, o, u, & sub singulis, mutationes 24. quæ multiplicatæ per quinque faciunt 120. &c.

Altera consideratio est, quod in secundo exemplo, primæ duæ literæ serierum, a, e, In tertio, primæ tres serierum a, e, i, & in quarto, primæ quatuor serierum a, e, i, o. sint eadem, licet non eodem ordine positæ. & idem verum est de posterioribus literis ultimarum serierum, quæ in 2. exemplo sunt iterum. duæ a, e, in 3. tres a, e, i, in 4. quatuor a, e, i, o.

Postremo. in omnibus seriebus præter literas quæ primum locum occupant, reliquæ sunt eadem, cum ijs quæ ponuntur in capite.

Ex his generalibus cōsiderationibus, formatur lematis demonstratio, eademq; quo ad præcipuas partes communis, hoc modo.

Pro omnibus exemplis termini rationis compositæ erunt AB, & componentes erūt vel duæ a, e, vel tres a, e, i, vel quatuor, a, e, i, o, vel quinque a, e, i, o, u, &c. ita ut per *def.* 5. inter A, B, possint continuari, vel duæ ra-

	a		e			
A		C		B		
	a		e		i	
A		C		D		B
	a		e		i	o
A		C		D		E
						B
	a		e		i	o
						u
A		C		D		E
						F
						B

tiones a, e, per unum terminū intermedium C, vel tres a, e, i, per duos C, D, vel quatuor a, e, i, o, per tres C, D, E, vel quinque a, e, i, o, u, per quatuor C, D, E, F.

Demonstratio primi exempli.

1		A	a	C	e	B	D	Einde pro primo exemplo præter terminos A CB, quibus continuantur duæ rationes a, e, continentur in alijs tribus terminis
2		G	e	I	a	H		

nis G, I, H, eadem proportionibus ordine mutato, ita ut ratio G ad I, sit e, & ratio I ad H, sit a. Dico rationes A ad B, & G ad H, esse easdem. Cum enim ut A ad C; ita sit I ad H; & sicut C ad B, ita G ad I. ergo per æqualitatem ordinatam, erit quoque ut A ad B, ita G ad H; sed G ad H, componitur per *defm.* 5. ex rationibus e, a. ergo etiam A ad B, componitur ex eisdem. hoc est ratio A ad B, componitur, tam ex rationibus a, e, quàm ex rationibus e, a.

Demonstratio 2. exempli.

	a	c	i			IN secundo
1	A	C	D	B		exemplo præ-
	e	a	i			ter terminos A
3	G	I	K	H		C, D, B, quibus
	i	a	e			cōtinuantur ra-
5	G	I	K	H		tiones a, e, i.
						primi casus se-

cundi exempli superius positi, continuentur in alijs quatuor terminis G, I, K, H, rationes e, a, i, ut habentur in tertio casu, & rationes i, a, e, ut habentur in quinto.

Quoniam igitur in primo & tertio casu; inter A D, & G K, continuantur duæ rationes, a, e, utrunque; ergo per demonstrationem primi exempli, ut A ad D, ita erit G ad K, ut autem D ad B, ita est K ad H; ergo per æqualitatem ut A ad B, ita erit G ad H.

In quinto vero casu quoniam rationes a, e, sunt continuatæ inter posteriores tres terminos I, K, H; ideo ut A ad D, ita erit I ad H, & quia præterea ut D ad B, ita est G ad I, erit rursus per æqualitatem ut A ad B, ita G ad H. Cum igitur G ad H, in tertio casu componatur ex rationibus e, a, i; & in quinto ex rationibus i, a, e, manifestum est eandem rationem A ad B, non solum componi ex a, e, i; sed etiam ex e, a, i; & i, a, e.

Reliqui casus 2. 4. & 6. reducuntur ad tres priores 1. 3. & 5. mediante tertia consideratione, ex qua constat in singulis seri-ebus, primas literas esse easdem, & reliquas quotcunque sint non differre nisi positione. tales sunt in serie a, literæ e, i in serie e, literæ a, i, & in serie i, literæ a, e. Quæ sicut in præcedenti demonstratione, ex eo quod in 1. & 3. casu componentes a, e, e a, sunt similes, & reliqua utrobique est eadem litera i, ostensum est, ut A ad B, ita esse G ad H. ita etiam hic, quoniam in 1. & 2. casu, e i; i e, sunt similes, & reliquæ a, e, eadem, valet eadem consequentia, hoc est, ut A ad B, ita esse G ad H; si inter A, B, per C, D, continentur rationes a, e, i, primi casus; & inter G, H, per I & K, rationes a, e, i, secundi casus.

Similiter si per G, I, K, H, continentur
ratio-

	a	e	i	rationes e, a, i, e, i, a,
1	A	B	C	D tertij & quarti casus; ut
	e	a	i	G ad H, in 3. casu, ita
3	G	I	K	H erit G ad H, in 4. Vt an-
	e	i	a	tem G ad H, in 3. casu,
4	G	I	K	H ita ostendimus esse A
				ad B, in primo casu. Er-
				go etiam ut A ad B, ita erit G ad H, in 4.
				casu.

Denique in 5. & 6. casu omnia sunt similia, & consequenter manet etiam demonstratum totum secundum exemplum. hoc est rationem A ad B, componi ex rationibus a, e, i, quocunque ordine positis.

Demonstratio reliquorum exemplorum.

In reliquis exemplis non est alia differentia, quam quod in ipsis rationes componentes sint plures tribus. Methodus autem demonstrandi est eadem. Rationes enim componentes quæ habentur in capite singularum serierum, reducuntur ad rationes primo loco propositas, & ad has reliquæ, quæ sub iisdem capitalibus, subjiciuntur, non aliter quam factum est in præcedenti exemplo,

Corollarium.

Huic licentiæ permutandi rationes componentes, præ corollariorum titulo annexi

annecti posse non inutiliter nonnulla eodem spectantia.

Primum est. Compositionis campum patere latissime, ut appareant rari, qui ipsum pervagentur. Omnis enim ratio proposita, quamvis non componatur ex quibuslibet, componitur tamen ex quotlibet; imo unam tantum si demas, componitur ex quotlibet & quibusli-

a e i o
A C D E B
tudes A, B, habentes quaecunque rationem, inter quas statuuntur quotcunque, & aliae quaecunque magnitudines ejusdem generis C, D, E. eritque ex vi defin. 5. ratio A ad B composita ex rationibus A ad C, C ad D, D ad E, & E ad B. Neque dubium est, si priores tres fuissent v.g. rationes datæ a, e, i, easdem continuari posse à magnitudine A, per aliquos terminos C, D, E, usque ad E, atque ita solum manere posteriorem rationem o, inter E & B, quæ sola non potest assignari ad arbitrium, sed determinatur eo ipso quod reliquæ sint continuatæ per terminos C, D, E.

2. Coroll. Certum est easdem rationes componere easdem, & easdem componi ex eisdem. hoc enim sequitur ex definitione immediate. Quare si ratio A ad B, & F ad G, est eadem, & prior A ad B. sic
B compo-


	a	e	i	o		composita ex a, e, i, o, erit etiam F ad G,
A	C	D	E	B		ex iisdem compo- sita. & vice versa, nul- la habita ratione or- dinis, quod attinet
u	a					rationes componen- tes.
ALC						
	i	e	a	o		
F	H	I	K	G		

3. *Coroll.* Et hinc deducitur hæc alia consequentia. Si rationes a, e, i, o, per terminos C, D, E, sint continuatæ inter A, B; & inter F, G, per terminos H, I, K, fuerint continuatæ eadem; & hoc modo permutatæ i, e, a, o: ita & constet sicut A ad C, ita esse I ad K, ut C ad D, ita H ad I; ut D ad E, ita F ad H; sequitur etiam reliquas, E ad B, & K ad G, esse easdem.

4. *Coroll.* Si a, e, i, o, component rationes A ad B, & F ad G, ut in præcedenti exemplo, abijciaturque utrinque ratio a, reliquæ non component quidem rationem A ad B, vel F ad G; component tamen aliquam aliam eandem.

5. *Coroll.* In eodem exemplo si ratio v. g. A ad C, hoc est ratio a, dicatur composita ex alijs v. g. ex rationibus u, a, ita ut ratio A ad L, sit ratio u, & L ad C, sit a. sequitur non solum rationem A ad B, componi ex rationibus u, a, e, i, o, sed etiam rationem F ad G. Item si dematur utrinque ratio a, etiam

etiam compositas ex reliquis u, e, i, o, esse easdem. quamvis ita composita non sit eadem cum ratione A ad B, vel F ad G. Huiusmodi argumentationem licet videre apud Pappum *lib. 7. propos. 142.*

6, Parallelogrammum AD, cum non
 E D F occupat totam lineam AB,
 sicut occupat parallelo-
 grammum AF; dicitur de-
 A C B ficere, vel deficiens. Paral-
 lelogrammum vero AF, quod
 occupat AB, maiorem AC; dicitur exce-
 dere, vel excedens, parallelogrammo CE.

PROPOS. II. THEOR. II.

*Triangula ABC, DEF; item parallelogram-
 ma CG, EH, inter easdem parallelas, e-
 iusdemq; altitudinis; sunt inter se, ut ba-
 sis BC, ad basin EE.*

Sint BI, IK, KL, æquales BC, & FM, MN, æquales EF; hoc est BL, FN sint ba-
 sium multiplices; nestanturque AI, AK, AL, DM, DN; Eruntque triangula ABI, A
 IK, AKL per 38. pr. æqualia, ipsi ABC, &
 simul tam multiplicia ejusdem, quàm est BL
 multiplex basis BC, similiter, triangula
 DFM, DMN, tam erunt multiplicia tri-
 anguli DEF, quàm est basis FN, basis EE.

Quando autem BL , æqualis est FN ; semper triangulum ABL , est æquale triangulo DFN ; & quando BL , major est quam FN , etiam triangulum est majus triangulo; & quando minus, minus. Quare per 6. def. 5^a ut BC , ad EF , ita est triangulum ABC , ad triangulum DEF .

Parallelogramma autem CG , EH sunt dupla triangulorum ABC , DEF per 41. pr. ergo per 15. quinti, ut triangulum ad triangulum, hoc est, ut basis BC , ad basim EF , ita est parallelogrammum ad parallelogrammum.

PROPOS. 2. THEOR. 2.

In triangulo ABC , DE , sit parallela BC :
Dico latera AB , AC , secta esse proportionaliter in D , & E : & quando secta sunt proportionaliter, rectam DE , esse parallelam BC .

Uctæ enim BE , CD , faciunt per 37. pr. æqualia triangula DEB , EDC ; & ideo per 7. quinti habent eandem rationem ad triangulum ADE . Sed ratio DEB , ad ADE , est ut basis BD , ad basim DA : quia triangula EBD , EDA , sunt ejusdem altitudinis: & ratio EDC , ad ADE , est ut basis CE , ad AE , ut demonstratum est in precedenti. Ergo per 11. quinti, ut DB , ad DA , ita est CE ad EA .

Vice versa, si ut AD , ad DB , ita sit AE ,
ad

ad $E C$; habebit triangulum $A D E$, ad tri-
angula $D E B$, $E D C$, rationem eandem. &
idcirco eadē triangula $D E B$, EDC , erunt
æqualia. & $D E$, $B C$ parallelæ per 39. pr.

PROPOS. 3. THEOR. 3.

*Recta $A D$, secet angulum $B A C$, bifariam:
Dico ut $A B$, ad $A C$, ita esse segmentum
 $B D$, ad $D C$. Et Vice Versa, si ut $A B$ ad $A C$,
ita sit $B D$, ad $D C$: Dico, $A D$ secare
angulum $B A C$, bifariam.*

S It $B E$ parallela $A D$, & occurrat $C A$ in
 E . Ergo per 29. pr. anguli $A E B$, $A B E$
sunt æquales æqualibus $D A C$, $D A B$: &
ideo per 6. pr. $A B$, $A E$, sunt æquales. Ut
autem $A E$, ad $A C$, ita est per 2. $B D$, ad $D C$.
ergo etiam ut $A B$, ad $A C$, ita est $B D$
ad $D C$.

Deinde supposita eadem constructione,
si sit ut $B D$, ad $D C$, ita $A B$ ad $A C$, cum
per 2. etiam $A E$, ad $A C$, sit ut $B D$, ad $D C$;
erit quoque ut $A B$, ad $A C$, ita $A E$ ad ean-
dem $A C$; & idcirco $A B$, $A E$ sunt æquales, &
anguli ad basim $B E$, æquales. Est autem
propter parallelas $A D$, $E B$, $D A C$, æqua-
lis ipsi $A E B$; & $D A B$, ipsi $A B E$. ergo e-
tiam isti sunt æquales.

PROPOS. 4. THEOR. 4.

*Triangula $A B C$, $D C E$, sint æquiangula:
Dico circa æquales angulos A , D , latera $A B$,
 $A C$, esse proportionalia lateribus $D C$,
 $D E$*

DE Ec. & Homologa, subrendere angulos aequales.

Latera BC , CE adjacentia æqualibus Angulis, continentur in eadem recta BCE ; ita ut BC , sit æqualis DCE , & ACB , ipsi DEC , sic enim erunt AB , DC , & AC , DE parallelæ; & ED , BA protractæ constituent parallelogrammum CF ; eritq; AC æqualis FD , & AF , ipsi CD , per 34. pr. & per 2. hujus erit, ut AB , ad AF , hoc est ad CD : ita BC , ad CE . & permutando ut AB , ad BC , ita CD , ad CE . item ut BC , ad CE , ita est FD , seu CA , ad ED ; & iterum permutando ut BC , ad CA , ita CE ad ED . Denique ex eo quod ut AB ad BC , ita est CD , ad CE ; & ut BC , ad CA , ita CE ad ED ; sequitur ex æqualitate ordinata, ut AB , ad AC , ita esse CD , ad DE . Atque ex hac ipsa demonstratione est manifestum, tam antecedentes terminos, quàm consequentes, hoc est homologos, opponi angulis æqualibus.

Coroll. Constat etiam parallelam CD . vel AC , abscindere ex toto triangulo FBE , triangulum simile. 14

PROPOS. 5. THEOR. 5.

Triangula ABC , DEF , habeant latera lateribus proportionalia: Dico latera homologa opponi angulis æqualibus.

Angulis B , C , fiant æquales G , E , F , G , F , E :
 in triangulo ABC & triangulo DEF , ad eundem
 & in triangulo ABC , illi anguli in toto BC
 & in CD habent

eritque *per 3 2. pr.* reliquus G , æqualis reliquo A , & *per 4. hujus* erunt circa æquales angulos latera lateribus proportionalia, hoc est, ut AB , ad BC , ita erit GE , ad EF . Ut autem AB , ad BC ; ita ponitur esse DE , ad EF . ergo etiam ut GE ad EF ; ita erit DE ad eandem EF . & ideo *per 9. quinti* GE , DE , erunt æquales. neque aliter demonstrabitur GF , æqualis DF , atque ita erunt duo latera GE , GF , æqualia duobus lateribus DE , DF . estque basis EF communis: ergo *per 8. pr.* non solum angulus D , erit æqualis angulo G , sed etiam reliqui reliquis: & quidem illi erunt æquales, quibus homologa latera opponuntur: & quia GEF , est æquiangulum ABC ; erunt etiam ABC , DEF , dicto modo æquiangula.

PROPOS. 6. THEOR. 6.

Circa æquales angulos B , & $D E F$, sint latera proportionalia: Dico triangula esse æquiangula, & angulis æqualibus sub-tendo latera homologa.

Flat iterum triangulum GEF , æquiangulum triangulo ABC , ut in præcedenti; eritque iterum GE , æqualis DE , & quia circa æquales angulos DEF , GEF , latera DE , EF , sunt æqualia lateribus GE , EF . erunt triangula DEF , GEF , penitus æqualia. Sed GEF , est ipsi ABC , æquiangulum; ergo & DEF . & ideo *per 4.* habebunt et-

tiam reliqua latera circa reliquos angulos proportionalia &c.

PROPOS. 7. THEOR 7.

In triangulis ABC, DEF , sint aequales anguli A, D ; & latera AC, CB , proportionalia lateribus DF, FE , & reliqui anguli B, E , sint minores, vel non minores recto: Dico triangula esse aequiangula.

Sint primo anguli F, B minores recto, & si fieri potest angulus ACB , sit major angulo F . Facto igitur angulo ACG , æquali ipsi F ; erunt duo triangula ACG, DFE , æquiangula, & per 4. erit ut DF , ad FE , ita AC , ad CG ; sed ut DF , ad FE , ita ponitur AC , ad CB : ergo ut AC , ad CG , ita est eadem AC , ad CB . & propterea CG, CB , erunt per 9. quinti æquales, & anguli CBG, CGB , æquales per 5. pr. Est autem B acutus, sicut est E ; ergo etiam CGB . reliquus vero CGA , quem ostendimus æqualem acuto E , erit obtusus. quod est absurdum.

Si autem anguli B, E , ponerentur esse non minores recto; essent in triangulo isoscelio CBG , ad basim duo anguli obtusi, quod est similiter absurdum. Quare necesse est angulum ACB , æqualem esse angulo F : & per præcedentem, triangula esse æquiangula, & similia.

PRO-

PROPOS. 8. THEOR. 8.

In triangulo ABC , sit angulus A rectus, & AD , ad basim perpendicularis: Dico triangula ADB , ADC , esse similia toti.

Est enim rectus ADB , æqualis recto BAC ; & B est communis: ergo reliquus æqualis est reliquo. similiter ADC , æqualis est BAC ; & C communis. ergo.

Coroll. Hinc sequitur per quartam hujus, BD , DA , DC , esse continue proportionales, & AB , esse mediam proportionalem inter CB , BD ; & AC , mediam inter BC , CD .

PROPOS. 9. PROBL. 1.

Ad data recta AB , partem imperatam auferre. G.g. duas tertias.

Sumantur in alia AC , tres partes æquales AD , DE , EF ; & duæ partes tertiæ sint ADE . Ductâ igitur FB , & EG , ipsi FB parallela; erit etiam AG duæ tertiæ totius AB , per 2. quia ut AF , ad AE , ita est AB , ad AG .

PROPOS. 10. PROBL. 2.

Secita AB , utcumque in C , D : aliam EF , similiter secare.

Rectæ EH , HI , IG , sumantur æquales partibus AC , CD , DB ; & per H , I , ducantur parallelae ipsi GF : eritque per 2. ut EH , ad HI : ita EM ad ML : & ductâ aliâ HN , parallela ipsi EF , ut HI ad IG , ita

erit HO , ad ON , hoc est ML , ad LF , quia
per 34. pr. HO , ON sunt æquales ML ,
 LF .

PROPOS. 11. PROBL. 3.

Datam rationem AB , ad AC ; continuare.

Ipsi AC , sumatur æqualis BD , ipsique B
 C , agatur parallela DE : eritque CE ,
 tertia proportionalis, quia ut AB , ad BD ,
 hoc est, ad AC , ita est *per 2.* AC , ad CE .

PROPOS. 12. PROBL. 4.

*Tribus datis AB , BC , AD , quartam pro-
 portionalem adjungere.*

Ipsi BD ; agatur parallela CE ; eritque ut
 AB , ad BC , ita AD , ad DE .

PROPOS. 13. PROBL. 5.

*Inter datas AB , BC , mediam proportionalem
 invenire.*

Circa AC , compositam ex AB , BC , de-
 scribatur centro E , semicirculus: Per-
 pendicularis. enim BD ; erit *per corollari-
 um octava*, mediā proportionalis inter AB ,
 BC .

PRO-

PROPOS. 14. THEOR. 9.

Parallelogramma B D, B F, sint aequalia, & anguli ad B, sint aequales: Dico latera esse reciproce proportionalia, ut A B ad B G, ita esse B E ad B C. & si latera circa aequales angulos dicto modo sint proportionalia: parallelogramma aequalia esse.

Conjungantur parallelogramma ad angulum B, ita ut A B, B G, sint una linea continuata, hac enim ratione, erunt etiam B E, B C, una linea continuata per 14. pr. Ex concursu autem D C, F G, in H, fit tertium parallelogrammum B H, ejusdem altitudinis cum parallelogrammis B D, B F: Et idcirco per 1. ut B D, ad B H, ita erit A B, ad B G: utque B F, ad B H. ita B E ad B C. Sed B D, & B F, ad B H, est una eademque proportio per 7. quinti, ergo etiam ut A B, ad B G; ita erit B E, ad B C.

Vice versa, si fuerit ut A B, ad B G, ita B E ad B C; habebunt B D, B F eandem proportionem ad B H; ideoque B F, B D, erunt aequalia per 9. quinti.

PROPOS. 15. THEOR. 10.

Eadem est ratio de triangulis A B C, B G E, si sint aequalia, habeantque aequales angulos ad B.

En bases et altitudes enuel. E. perigonal, ut possunt bases hujus ad altitud. hujus, ita bases hujus ad altitud. hujus

Possunt enim copulari ad angulum B, ut parallelogramma, & referri ad tertium triangulum B G C, ut videre est tam in superiori figura, quam in ista.

PROPOS. 16. THEOR. 11.

Si quatuor lineae proportionales fuerint; aequalia erunt parallelogramma rectangula quae fiunt ab intermedijs, & extremis. Et si haec sint aequalia, quatuor lineae erunt proportionales.

Haec propositio nullo negotio reducitur ad decimamquartam. Si enim A B B G, B E, B C, sint proportionales; jam est demonstratum B D, B F, esse aequalia: & si B D, B F, sint aequalia, quatuor rectas A B, B G, B E, B C; esse proportionales.

$\frac{12}{6}$
 $\frac{6}{3}$
 $\frac{12}{3}$
 $\frac{36}{6}$
 $\frac{6}{6}$
 $\frac{36}{6}$

PROPOS. 17. THEOR. 12.

Si fuerint tres proportionales; rectangulum sub extremis, erit aequale quadrato intermedia. & si hoc illi fuerit aequale, latus quadrati erit medium proportionale, inter latera rectanguli.

Haec non differt à præcedenti, si in præcedenti duæ intermediae intelligantur
Si tres lineae proportionales, ut A B, B C, C E, his rectangulis factis ex lateribus A B & B C, & A C & C E, quod quadrato factis ex C & B, erit

quinti. proportio BC , ad BG , sit duplicata proportionis BC , ad EF . Dico rationem trianguli ABC , ad DEF , esse ut, recta BC , ad BG . *Et si triangula ABC et DEF sunt similia, ut patet per 1. *propositi.**

Quando triangula sunt æqualia, hoc est, quando BC , EF , nec non tertia proportionalis BG , sunt æquales, res est manifesta.

Quando vero latera BC , EF , sunt inæqualia, demonstratur hoc modo. Jungatur AG . Quoniam igitur angulus B , est æqualis E ; & propter similitudinem triangulorum, ut AB , ad BC , ita est DE , ad EF ; & permutando ut AB , ad DE , ita BC ad EF ; hoc est EF , ad BG : erunt circa angulos æquales, BE , latera reciproce proportionalia. Quare per 15. triangula ABG , DEF erunt æqualia; & per 7. *quinti*, ut triangulum ABC , ad ABG , ita erit idem triangulum ABC , ad DEF . ut autem ABC , ad ABG , ita est per 1. BC , ad BG . ergo ABC , ad DEF erit ut BC ad BG .

Corollarium * Hinc sequitur si tres lineæ, A , B , C fuerint proportionales; ut prima ad tertiam, ita esse triangulum A , super primam, ad simile triangulum B , supra secundam erectam.

PROPOS. 20. THEOR. 14.

Similia Polygona $ABCDE$, $FGHIK$, in similia triangula resolvuntur, & unum-

re aequalia, & homologa totius, & polygona
habent rationem duplicatam laterum
homologorum. *homologa q. d. latera q. d. latera anguli q. d. anguli*

NAm eo ipso quo Polygoni ponuntur
esse similia, necesse est & angulos esse
æquales, & latera circa æquales angulos
proportionalia. Quare ut DE ad EA , sic
erit IK ad KF ; ideoque *per 6.* triangula
 ADE , FIK similia, & anguli EAD , EAD ,
 D , æquales angulis KIF , KFI . est autem
totus A , æqualis toti F ; ergo & reliquus D
 AB , æqualis reliquo IFG . Jam sic, ut A
 D , ad AE , ita est IF , ad FK ; & ut AE , ad
 AB , ita FK , ad FG . ergo *ex æqualitate*, e-
rit quoque ut AD , ad AB , ita IF ad FG .
ideoque rursus *per 6.* triangula DAB , IFG ,
similia. Atque in hunc modum procedi-
tur ad reliqua.

Demum quoniam omnium istorum tri-
angulorum latera homologa sunt propor-
tionalia, hoc est ut AE ad FK , ita AB ad F
 G ; & BC ad GH , &c. ipsaque triangula si-
milia habeant *per 19.* rationem duplicatam
laterum homologorum, manifestum est, e-
tiam ipsa triangula esse proportionalia, hoc
est, ut ADE , ad FIK . ita ABD , ad FGI ,
&c. Quare *per 12. quinti.* ut unum trian-
gulum v.g. ADE , ad FIK , ita erunt om-
nia simul ad omnia. & ideo triangulum v.g.

ADE , erit homologum Polygono ACE ,
+ homologum, & ita q. d. simile per hunc triangulum ad polygonum
+ ita q. d. totum hoc ad totum illud, est ita, hoc semel per
ADE ad hoc totum, & polygonum, q. d. &c. homologum.

& triangulum $F I K$, homologum polygono $F H K$.

Tertia deniq; propositionis pars sequitur ex dictis. Polygonum enim ad polygonum est, ut triangulum $A B D$, ad $F G I$: ratio autem trianguli ad triangulum, est duplicata laterum homologorum $A B$, $F G$ per 19. ergo & polygonorum.

Coroll. Ut ergo prima trium proportionalium ad tertiam, ita est polygonum supra primam ad polygonum simile supra secundam: *¶ polygoni sup. 1^a ita ad polygoni sup. 2^a ita.*

PROPOS. 21. THEOR. 15.

Eidem rectilineo similia; sunt inter se similia.

Nam similia eidem, sunt eidem æquiangulara. per 1. def. Ergo A , B æquiangulara ipsi C , sunt æquiangulara inter se; ideoque per 4. similia.

PROPOS. 22. THEOR. 16.

¶ Si $A B$ ad $C D$, ita sit $E F$, ad $G H$; sintque I, K , rectilinea similia: & L, M , similia ut libet: Dico I, K ; L, M , esse proportionalia. & vice versa.

Proportio enim I , ad K , est duplicata proportionis $A B$, ad $C D$, vel $E F$, ad $G H$, per 19. vel 20. Est autem & ratio L , ad M ,

ad M, duplicata ejusdem rationis E F, ad G H. ergo ut I ad K ita est L ad M;

Vice versa si ut I ad K, ita est L ad M erit quoque ut A B, ad C D, ita E F, ad G H: quia rationes I ad K, & L ad M, quæ sunt eadem, sunt duplicatæ rationis A B ad C D, & E F ad G H, quæ proinde debent esse quoque eadem.

PROPOS. 23. THEOR. 17. *lib. 6. the. 17.*

Parallelogramma aquiangula & g. C A, C F: habent rationem compositam ex ratione lateris C B, ad C G; & ratione lateris C D, ad C E.

Parallelogramma C A, C F, componantur ad angulum C ut in 16. Utque B C, ad C G, ita sit quædam I, ad K; & ut C D, ad C E, ita K ad L; hoc est rationes laterum sint continuatæ in tribus terminis I, K, L. Ergo per def. 5. ratio composita ex ratione laterum erit ratio I, ad L. Dico ut I, ad L, ita esse C A, ad C F. Nam ut C B, ad C G; hoc est ut I, ad K; ita est per 1. C A, ad C H; & ut C D, ad C E, hoc est ut K, ad L; ita C H ad C F: ergo ex æqualitate, ut I, ad L, ita est C A, ad C F.

PROPOS. 24. THEOR. 18.

Parallelogramma F G, H E, existentia circa dia-

ca diametrum DB ; sunt similia toti
 AC .

Sunt enim æquiangula, quia habent
 communes angulos ad B , & D . Vide
Schol. 34. primi. Deinde per 4. hujus ut B
 A ad AD , ita est BG , ad GL . item ut BA ,
 ad BD , ita BG ad BL ; ut autem BD , ad
 BC ; ita est BL , ad BF , ergo ex æquo, ut B
 A , ad BC , ita est BG , ad BF . Eodemque
 modo demonstrantur reliqua latera circa
 reliquos angulos, esse proportionalia.

PROPOS. 26. THEOR. 19.

Parallelogramma similia AC , EG ; existant
 ad communem angulum B : Dico eadem
 existere circa communem diametrum
 $BI-D$.

SI enim diameter secaret EI , in alio
 puncto O ; Effet etiam parallelogram-
 mum LE , simile ipsi AC , per præcedentem,
 utque BA , ad AD , hoc est, ut BE , ad EL ;
 ita esset BE , ad EO . & ideo per 9. quinti B
 I , EO ; essent æquales.

PROPOS. 26. PROBL. 7.

Dato rectilineo A ; construere aliud simile,
 & alteri B , æquale.

PER ultimam secundi ipsis A , B , fiant æ-
 qualia quadrata, quorum latera sint E , F ;
 & ut

& ut E, ad F, sic fiat C D, ad G H: *per* 12.
& super G H fiat *per* 18. figura similis A,
dico ipsam æqualem esse figuræ B. Nam
per 22. ut quadratum E, ad quadratum F,
hoc est, ut A, ad B, ita est idem A, ad simile
rectilineum ipsius G H. Ergo *per* 9. *quinti*
G H, & B. sunt æqualia.

PROPOS. 27. THEOR. 20.

*Super A C semissem totius A B, applicatum
sit parallelogrammum A D, ita ut à toto
A E, deficiat parallelogrammo C E, quod
semper est æquale, & simile ipsi A D. De-
inde ad quodvis aliud segmentum A K, sit
applicatum aliud parallelogrammum A G,
ita deficiens, ut deficiens sit parallelo-
grammum K I, simile ipsi C E, hoc est cir-
ca communem diametrum B G D: Dico
A G minus esse parallelogrammo A D.*

Quando punctum K, est inter C, B; tunc
parallelogrammum L H, quod *per* 36.
pr. est æquale L E, majus est quam G C:
quia L E majus est quam G E, & G E, G C,
sunt complementa æqualia *per* 43. *pr.* Ad-
dito ergo L A, erit A D, majus A G.

Quando vero punctum K, est inter A, C;
tunc D F, D I, sunt æqualia, quia sunt su-
per æqualibus basibus, & D I, D K, æqua-
lia.

lia, quia sunt complementa. ergo & D F, D K, sunt æqualia, & G H, minus quam D K; adjectoque communi K H; totum A G, minus toto A D.

PROPOS. 28. PROBL. 8.

Ad datam A B applicare parallelogrammum A I deficiens, & æquale rectilineo C, ita ut defectus P N, sit similis parallelogrammo D. debet autem C, non esse majus parallelogrammo A F; applicato ad A E, semissem totius A B, & defectum E G, habente similem defectus P N, vel D juxta præcedentem.

Differencia inter A F, vel E G, & C sit O, ipsique O, sit æquale L K, & simile ipsi D, vel E G, sintque L K, E G, circa communem angulum E F G. ideoque per 26. circa communem diametrum B I F. Dico A I, cujus defectus est P N, similis D, esse æquale ipsi C.

Quoniam enim C & O, hoc est, C & L K, æquantur ipsi E G, necesse est gnomonem K N P L, æquari ipsi C. Sed gnomoni æquale est A I; ut patet, si æqualibus A L, E N, addantur æqualia complementa E I, I G. ergo A I, est æquale ipsi C.

PRO-

PROPOS. 29. PROBL. 9.

Ad datam rectam AB, dato rectilineo C, applicare parallelogrammum aequale, cum excessu simili ipsi D.

S Ecū AB, bifariam in E, fiant circa communem angulum F, EG, OH, similia ipsi D; & EG, sit applicatum ad EB, & OH, sit æquale ipsi EG, & C; simul, hac enim ratione gnomon ERQG, erit æqualis eidem C. Sed gnomoni æquale est SQ: ut patet si æqualibus AO, OB, seu æqualibus AO, BH, addatur commune OQ. Ergo SQ, excedens parallelogrammo RQ, simili D, est æquale rectilineo C.

PROPOS. 30. PROBL. 10.

Rectam AB. secare ratione media & extrema, Quia si huiusmodi sita sit, in qua sunt gnomonibus huiusmodi.

Ad AD, latus quadrati ABCD, applicetur per 29. eidem quadrato æquale rectangulum DG, ita ut excessus sit quadratum AG. Ablato enim communi AE, remanebit FC, æquale quadrato AG, &

G, & per 14. erit ut B C, seu A B, ad A H, ita A H, hoc est A F, ad F B.

PROPOS. 31. THEOR. 21.

In triangulo A B C sit rectus A; & E, F, G, sint rectilinea similia: Dico E, F, simul, aequalia esse ipsi G.

DEmissa enim perpendiculari A D, fiunt B C, C A, C D; nec non B C, B A, B D continuè proportionales per coroll. octava & per coroll. 19. & vigesima ut C D ad B C, ita erit F ad G. item ut B D, ad eandem B C ita E, ad idem rectilineum G. Ergo per 24. quinti, ut C D, B D simul, ad B C, ita erunt F, E simul, ad G. sed C D, B D, æquantur ipsi B C. ergo etiam E, E, adæquant G.

PROPOS. 32. THEOR. 22.

Vt A B, ad A C, ita sit D C, ad D E; & A B, D C, sint parallela, & similiter A C, D E; & C punctum sit commune: Dico B C, C E, esse in directum.

Quoniam enim circa angulos A, D, qui sunt æquales eidem A C D, per 29. pr. latera sunt proportionalia, sequitur per 6. angu-

angulum B , æqualem esse DCE . Additis ergo A , & ACD , erit ACE , æqualis duobus AB . Sicut ergo A, B cum ACB , sunt æquales duobus rectis *per 32. pr.* ita erunt etiam duo ACE, ACB , & ideo BC, CD , erunt una recta *per 14. ejusdem.*

PROPOS. 33. THEOR. 23.

In equalibus circulis, tam anguli BAC, FEG , ad peripheriam, quam BDC, FHG , ad centra: necnon sectores BDC, FHG eandem habent rationem quam peripheria BC, FG .

Arcus BCI , sit utcumque multiplex ipsius BC , & $FGKL$ multiplex ipsius FG : Cum igitur anguli insistentes æqualibus peripherijs sint æquales; tam erunt multiplices anguli BDC, CDI ipsius BDC quam est arcus BCI , multiplex peripheriæ BC : & similiter anguli FHG, GHK, KHL , & arcus $FGKL$, erunt æquemultiplices anguli FHG , & arcus FG . Et quando arcus BCI , est æqualis, major, vel minor arcu $FGKL$; erunt etiam anguli BDC, CDI , æquales, majores, vel minores angulis FHG, GHK, KHL . & ideo *per 6. defin. quinti*, erit ut arcus BC , ad FG , ita angulus BDC , ad FHG : imo & angulus

angulus BAC , ad angulum FEG ; eo quod sint semisses angulorum BDC , FHG , per 20. *tertij.*

Pro sectoribus fiant anguli BMC , CNT : qui sunt æquales, quia insunt æqualibus peripherijs, quas abscindunt æquales, arcus BC . CI , Unde per 24. *tertij* segmenta BMC , CNI , sunt æqualia. sunt autem & triangula BDC , CDI , æqualia, propter æqualitatem laterum. Ergo & sectores BCM , $CDIN$. Eruntque prædicti sectores, & arcus BCI , æquemultiplices sectoris BCM , & arcus BC . Et eodem modo erunt sectores FHG , GHK , KHL , & arcus $FGKL$, æquemultiplices sectoris FHG , & peripheriæ FG : Et idcirco rursus per 6. *defn. quinti*, ut BC , ad FG , ita erit sector BDC , ad sectorem FHG .

Coroll. 1. Hinc manifestum est, sic esse sectorem ad sectorem, ut est angulus ad angulum.

Coroll. 2. Item ut est angulus ad centrum circuli ad quatuor rectos, ita peripheria subtenens anguli, ad totam circumferentiam.


 // non id est centrum & non q. radii fiant point, a q. rectis angulis
 & duobus diametris se secantibus, quod per q. radiorum est
 angulus in centro, tota pars totius peripheriæ est
 angulus in angulo subtenens DE

DE RELIQUIS LIBRIS.

IN propriis sex libris versata est Euclidis opera circa lineas, angulos, & figuras planas. Aggressurus autem figuras solidas, cum videret earum tractationem indigere lineis commensurabilibus, & incommensurabilibus, & hæc supponerent cognitionem numerorum: idcirco libro 7. 8. & 9. præmittit nonnullas affectiones numerorum, & in 10. agit de lineis commensurabilibus, & incommensurabilibus. & tandem in 11. aggreditur solida. & in 12. & 13. prosequitur quinq; corpora regularia diligentius, & in particulari. De quibus etiam agunt 14. & 15. qui attribuntur Hypsicli Alexandrino, & 16. quem addidit Franciscus Flussata.

Ego hic consulto ommitto corpora regularia, & ea solum ex 11. attingo quæ propriè sunt Elementa Solidorum.

EX LIBRO

UNDECIMO.

DEFINITIONES.

1. **S**olidum est quod trinam dimensionem habet, secundum longitudinem, latitudinem, & profunditatem.

2. Solidi extremum est superficies.

3. Linea recta AB , recta est, seu perpendicularis ad planum CD , cum ad omnes rectas BC , BD ; BE concurrentes in eodem plano ad B , recta est $\wedge$ & perpendicularis. ¶ Sed recta basi facta per planum linea facit ad illa angulos rectos.

4. Planum AB , rectum est ad planum CD ; cum omnes OH , IK , quæ in plano AB , perpendiculares ad communem sectionem BE , rectæ sunt ad planum CD . ¶ Perpendiculares

5. Angulus inclinationis, quo recta AB , inclinatur ad planum CD , est angulus BAE , quem BA , facit cum AE , ductâ perpendicularis BE ¶ unde quæ sit linea BE ut inclinatio obliqui in quod cadit perpendicularis BE .

6. Plani AB , inclinati ad planum CD ; inclinationis angulus est $F GH$, cum GF , GH , sunt perpendiculares ad communem intersectionem EB . 7. Pla-

7. Planum ad planum dicitur inclinatum similiter, cum dicti inclinationum anguli fuerint æquales. *v. g. 2 libri. ut 2 anguli aucti 2 pti*
8. Parallela plana sunt quæ non possunt concurrere.
9. Similes solidæ figuræ sunt, quæ similibus, & multitudine æqualibus planis continentur. *ut cubi, palmarum, et bipalmarum, unde 2 pti 1/2*
10. Similes & æquales sunt, quæ planis similibus, & multitudine, magnitudineq; æqualibus continentur. *ut cubi, et cubi palmarum*
11. Solidus angulus est inclinatio plurium linearum non existentium in eodem plano, ad idem punctum concurrentium, & ideo continetur pluribus angulis planis, quàm duobus. Qualem constituunt tres lineæ AB, AC, AD ad concursum A , & tres anguli plani BAD, DAC, CAB *quæ sunt in rectis pntibus trilatæ*.
12. Pyramis est figura solida, v. g. $ABCD E$, quæ continetur planis $ABCD, DA E, AEB, BEC, CED$, ab uno plano $ABCD$, constituta ad unum punctum E . *v. g. 3, 5, 6 latera planæ, et 4 sunt ad trigonum, pti*
13. Prisma est figura solida planis contenta; quorum duo adversa ABC, DEF , sunt æqualia, similia, & parallela: reliqua vero $BEFC, FCAD, ADEB$; parallelogramma: *p. g. 4, 5, 6 parallelogramma*
14. Sphæra est tale solidum, quale intelli-

gitur formari à semicirculo $\neq$ circa diametrum fixam, integrè revoluto.

15. Axis est illa diameter fixa.

16. Centrum sphære, est idem quod semicirculi circumducti.

17. Diameter sphære, est quævis linea per centrum acta, atque ad sphære superficiem terminata.

18. Conus est figura solida, qualem format triangulum rectangulum ABC , quando circa latus AB manens, integrè circumvoluitur. estque orthogonius quando latera AB , BC , sunt æqualia, amblygonius, quando BC , majus est, quàm AB . & oxygonius, quando minus.

Ab Apollonio in Conicis traditur alia Coni definitio universalior.

19. Basis coni, est circulus quem in revolutione describit BC . Superficies coni, quam describit AC , & A , est vertex coni.

20. Cylindrus est figura solida formata à parallelogrammo rectangulo v. g. $ABCD$, circa AB , integrè revoluto.

21. Axis, est ipsa AB , manens.

22. Bases sunt circuli descripti à lateribus AD , BC , reliquum autem CD , describit superficiem cylindricam.

23. Similes coni, & cylindri, sunt quorum axes, & diametri basium, sunt proportio-

nales. *Id est angulus de tota recta, latus $\times$ 25. Cu-*

latus autem axis, quod angulus de tota recta, latus $\times$ 25. Cu-
latus autem axis, quod angulus de tota recta, latus $\times$ 25. Cu-

25. Cubus est figura solida sub sex ^{planis} quadratis æqualibus contenta. *hinc alia*
26. Tetraedrum, quæ sub quatuor triangulis æquilateris, & æqualibus continetur.
27. Octaedrum, quæ sub octo triangulis æqualibus, & æquilateris.
28. Dodecaedrum, quæ sub 12. pentagonis æqualibus, & æquilateris.
29. Icosaedrum, quæ sub 20. triangulis æqualibus, & æquilateris.
30. Parallelepipedum, est figura solida sex figuris quadrilateris contenta, ita ut aduersæ sint parallelæ.

PROPOS. I. THEOR. 1.

Si linea recta pars G. g. AC existat in plano DF, reliqua CB, non existit in sublimi.

Si enim CB esset in sublimi, tota recta ACB non attingeret superficiem DF; ergo non esset plana. *juxta defn. 7. primo secundum Heronem.*

PROPOS. 2. THEOR. 2.

Rectæ AB, CD, se mutuo secantes in E, & similiter omne triangulum; existens in uno plano.

Ducatur BD, & circa DC, intelligatur circumduci planum; quo transeunte

per B , erunt DB , EB , in eodem plano cum CD . ergo &c.

PROPOS. 3. THEOR. 3.

Quorum planorum AB , CD , communis sectio EF : est linea recta.

Puncta enim E , F , sunt communia, ergo & recta EF . debet enim EF , per defin. 7. primi extendi tam per planum AB , quam CD .

PROPOS. 4. THEOR. 4.

Si recta AB , duabus CD , EF , perpendiculariter insistat ad concursum B : erit AB ad planum $CEDF$, recta.

Fiat BC , æqualis BD , & BF , æqualis BE ; nequanturque FC , ED ; & ducta GB H utcumque per B , nequantur AF , AG , AC , AH , AD . Eritque primo FC , æqualis ED , & angulus BCF , angulo BED per 4. primi: quia circa æquales angulos ad verticem B , latera BC , BF sunt æqualia lateribus BD , BE .

2. Latera BG , GF , sunt æqualia lateribus BH , HE , per 26. primi, quia BF , BE , sunt æquales, & adjacent angulis æqualibus.

3. AC , AD , sunt æquales, per 4. pr. quia circa rectos ad B , AB , BC , sunt æquales AB , BD . & simili argumento sunt æquales AF , AE .

4. Angulus AFC , est æqualis AED , per 8. *primi*; quia AF , FC sunt æquales AE , ED , & basis AC , basi AD .

5. AG , AH , sunt æquales per 4. *pr.* quia circa æquales angulos AFG , AEH , sunt latera lateribus æqualia.

6. Per 8. *pr.* anguli ABG , ABH sunt æquales & recti, quia AB , BG sunt æquales AB , BH , & basis AG , basi AH .

Eodemque modo demonstratur eandem AB perpendicularem esse ad quascunque alias GBH .

PROPOS. 5. THEOR. 5.

Recta AB , insistet tribus BC , BD , BE , ad angulos rectos: Dico omnes tres in uno plano esse.

SI enim BE , non est in plano DE , in quo sunt BD , BC , erit saltem in eodem cum recta AB , nempe in AG , quod cum FD , intelligatur facere communem sectionem BG . Quoniam igitur AB ; recta est ad planum FD , per 4. *hujus*; erit eadem AB , etiam perpendicularis ad BG , per *desin* 3. atque ita anguli ABG , ABE , recti erunt & æquales quod est absurdum.

PROPOS. 6. THEOR. 6.

Rectæ AB , CD , sint rectæ ad planum EF : Dico ipsas esse parallelas.

Iungantur AD , BD , & in plano EF , recta DG , sit perpendicularis ad BD , & æ-

qualis AB ; necstanturque BG , AG , Eritque primo BG , æqualis AD , per 4. primi; quia circa rectos B , D , sunt BD , BA , æquales BD , DG . secundo BG , BA sunt æquales AD , DG , & basis AG est communis; ergo angulus ADG , est æqualis ABG . Sed hic est rectus per defin. 3. ergo & ille, & quia per eandem defin. 3. eadem GD est quoque recta ad CD . Erit igitur eadem DG , recta ad tres BD , AD , DC . & ideo per precedentem eadem tres sunt in uno plano. Sed & AB , est in eodem cum BD , DA plano, ergo etiam $ABCD$, sunt in uno plano, & propter rectos ABD , CD , sunt per 29. pr. parallelæ.

PROPOS. 7. THEOR. 7.

Parallelas AB , CD , necstat utcumq; EF : Dico omnes tres esse in uno plano.

NAm AB , CD , sunt in eodem plano per defin. 34. primi. & EF , in eodem per 7. defin. secundum Heronem.

PROPOS. 8. THEOR. 8.

Recta AB , CD , sint parallelæ, & CD sit recta ad planum EF : Dico etiam AB rectam esse ad planum EF .

Constructio est similis sextæ. hoc est BG sit perpendicularis ad BD , & æqualis

lis CD , &c. Quoniam igitur circa rectos CD , B , G , BD , DC , sunt æquales B , B , B G ; erit basis BC , æqualis GD , *per 4. pr.* & quia rursus DC , D G , sunt æquales CB , B G , & CG , communis; erit *per 8. primi* CBG , æqualis recto CDG . Atque ita GB , erit perpendicularis ad duas BD , BC ; ideoque *per 4.* recta ad planum CBD & quia in eodem existit AB , erit recta AB , perpendicularis ad BG , *per defin. 3.* Est autem eadem AB , etiam recta ad BD ; ergo *per 4.* recta est ad planum GBD . hoc est ad planum EF .

PROPOS. 9. THEOR. 9.

Quæ eidem sunt parallela etiam si sint in diversis planis; sunt nihilominus parallela inter se.

Quando AB , CD , sunt parallelæ eidem EF , & omnes in eodem plano, jam propositio est demonstrata *ad 30. primi*. Hic ergo AB , EF , sint in uno, & CD , EF , in alio plano: & GH , GI , sint perpendiculares ad EF . eritque *per 4.* EF recta ad planum HGI , & quia AB , CD , sunt eidem EF , parallelæ; erunt etiam AB , CD , ad idem planum rectæ, *per 2. & per 6.* parallelæ inter se.

PROPOS. 10. THEOR. 10.

Rectæ A B, A C, concurrentes in A, sint parallelæ rectis D E, D F, concurrentibus in D: Dico angulos B A C, E D F, esse æquales, & æquales valere duobus rectis.

IN priori figura A B, A C, & D E, E F sunt parallelæ, & similiter positæ: item A H, A G, sunt parallelæ eidem D E, E F; sed non similiter positæ, quia A H, A G, sunt sursum, & D E, D F deorsum: Dico in utroque casu angulos B A C, H A G æquales esse angulo E D F. Quando A H, A G non sunt similiter positæ, erunt saltem protractæ similiter positæ, quales sunt A B, A C, quarum illa fiat æqualis D E, & hæc æqualis D F; necnanturque reliquæ lineæ: ex quibus B E, C F, erunt eidem A D parallelæ, & æquales *per 33. pr.* & ideo æquales & parallelæ inter se: & quia easdem conjungunt rectæ B C, E F erunt etiam *per eandem 33.* B C, E F æquales, & parallelæ. Et quia in triangulis B A C, E D F, præter bases B C, E F æqualia sunt latera A B, A C, lateribus D E, D F, erit *per 8. pr.* angulus B A C, nec non H A G, æqualis angulo E D F.

In posteriore figura rectæ A B, A H, sunt iterum parallelæ rectæ D E; & A C, A G, parallelæ rectæ D F, & quidem A B, D E positæ sunt similiter; at A C, D F dissimiliter;

4
10
4

2

3
d

11

1

3

2

3

3

3

3

3

3

3

112

23

2-

15

10

nt

3

E

11

23



ter, est enim DF , deorsum, at AC sursum: item AG , DE sunt positæ similiter, sed AH est ad dexteram puncti A , & DE , ad sinistram puncti D : Dico in hoc casu tam angulum BAC , quàm HAG , constituere angulos duobus rectis æquales cum EDF . Productâ enim CA , quæ non est similiter posita cum DF , sit etiam AG , similiter posita: & ideo *per demonstrata in prioribus casibus* angulus BAG , est æqualis angulo EDF ; adjectoque communi BAC , fiunt duo BAC , BAG æquales duobus BAC , EDF , illi autem duo sunt æquales duobus rectis, *per 13. primi*: ergo etiam isti duo sunt æquales duobus rectis. idemque demonstratur eodem modo de duobus angulis EDF . HAG .

PROPOS. II. PROBL. I.

A puncto A, in sublimi, ad planum BC, perpendiculararem ducere.

IN plano BC , ducatur quævis DE , in quam ex A , demittatur perpendicularis AF , *per 12. primi*; & GFH sit perpendicularis ad eandem DE in plano BC , & in hanc cadat alia perpendicularis ex A , nempe AI : dico ipsam esse rectam ad planum BC . Sit enim KIL parallela DE , sicut ergo DF , recta est ad planum AFI , *per 4.* ita erit quoque KIL . *per 8.* hoc est angulus AIL , erit rectus. Est autem & AIH , rectus.

ergo per 4. AI , est recta ad planum BC , in quo existunt GH , KI .

PROPOS. 12. PROBL. 2.

Ad datum planum BC , à puncto A , perpendicularem excitare.

EX alio puncto D , demittatur perpendicularis per præcedentem nempe DE ; & per E , A , ducatur HA ; & in plano DEA , per 31. pr. ducatur per A , ipsi DE , parallela AF : eritque AF , recta ad BC , per 8.

PROPOS. 13. THEOR. 11.

Ex puncto C , una tantum linea est perpendicularis ad planum AB .

SI enim essent duæ CD , CE , essent parallelae per 6. quod est absurdum, quia concurrunt in C .

PROPOS. 14. THEOR. 12.

Eadem AB sit recta ad duo plana CD , CE : Dico eadem plana esse parallela.

NAm si concurrunt, & in communi sectione FC , sumatur quodvis punctum L , nectanturque AL , BL : erunt in triangulo ABL , duo anguli LAB , LBA , per defin. 3. recti, contra 17. primi.

PROPOS. 15. THEOR. 13.

In plano BC , recta AB , AC , sint parallelae rectis

rectis D E, D F, in alio plano F E: Dico ipsa plana esse parallela.

Ex A, ducatur in planum E F, perpendicularis A G, per 11. & per G ducantur G H, G I, parallelæ D E, D F, quæ per 9, erunt quoque parallelæ A B, A C: & ideo per 29. primi, anguli G A B, A G H erunt duobus rectis æquales: & quia A G H rectus est, erit & G A B, rectus. immo & G A C, A G I, erunt similiter recti; ideoque eadem A G erit ad utrumque planum recta, & per præcedentem B A C, E D F, erunt plana parallela.

PROPOS. 16. THEOR. 14.

Si duo plana parallela A B, C D, secentur plano E F: communes sectiones E H, G F, erunt parallela.

Si enim concurrerent v. g. in I; concurrerent etiam ipsa plana, quod est contra hypothesis.

PROPOS. 17. THEOR. 15.

Si dua linea A B, C D, secentur planis parallelis E F, G H, I K, in L, M, N; & O, P, Q; secabuntur similiter.

Iungatur L Q, occurrens plano G H in I R, à quo ad M, & P, ducantur R M, R P, eritque per præcedentem R M, parallela N Q, & R P parallela L O; & ideo per 2. sex-
xi ut L R, ad R Q, ita erit tam L M, ad M N, quàm O P, ad P Q, &c.

PROPOS. 18. THEOR. 18.

Si AB , recta ad planum CD : Dico omnia plana per AB , ducta esse recta ad planum CD .

Per AB , sit ductum planum EF , faciens cum CD , communem sectionem GBF , & HI , sit parallela AB , in plano ABF ; quæ per 8. erit quoque recta ad planum CD ; & ita de omnibus alijs rectis HI . ergo per defin. 4. planum EF rectum est ad CD .

PROPOS. 19. THEOR. 17.

Si plana AB , CD , sint recta ad planum G H : erit quoque eorundem communis sectio EF , ad idem planum recta.

Quæ enim educitur in plano AB , perpendicularis ad DF , ea est recta ad planum GH per defin. 4. & similiter ea, quæ educitur ex eodem puncto F , perpendiculariter super BF , in plano CD , est recta ad idem planum GH . Ergo per 11. FE , FE sunt una linea, hoc est, communis sectio FE , erit ad GH , recta.

PROPOS. 20. THEOR. 18.

Angulus solidus A , contineatur tribus angulis planis BAC , CAD , DAB : Dico quoslibet duos esse reliquo maiores.

Quando omnes tres sunt æquales, manifesta est propositio. quando duo sunt æqua-

æquales, & tertius minor; similiter. quando vero BAC est maximus probatur reliquos BAD, CAD esse ipso majores hoc modo. Fiat BAE æqualis BAD, & AE æqualis AD; Et ducta utcumque BEC jungantur BD, CD. Eruntque BE, ED, æquales per 4. pr. Duo autem latera DB, DC, sunt per 20. pr. majora reliquo BC; demptis ergo æqualibus BD, BE, remanebit CD, major CE, & angulus DAC, erit major CAE, per 24. pr. quia CA, AD, sunt æquales CA, AE, & basis CD, major basi CE. Quare DAC, DAB, simul sunt majores CAE, EAB; hoc est, toto BAC.

PROPOS. 21. THEOR. 19.

Omnes anguli plani continentes angulum solidum, simul sumpti: sunt minoresque quatuor rectis.

SOLIDUS A, contineatur primo tribus planis angulis BAC, CAD, DAB. Ductis ergo BC, CD, DB; erunt tres anguli solidi ad puncta B, C, D; & duo plani anguli ABC, ABD, erunt per *precedentem* majores tertio CBD; & ita de reliquis: ita ut sex anguli ABC, ABD, ACB, ACD, ADB, ADC, sint majores tribus CBD, BDC, DCB, hoc est, majores duobus rectis. Dicti autem sex anguli una cum tribus ad A, sunt æquales 6. rectis, per 32. pr. demptis ergo 6. illis qui sunt majores

res duobus rectis, remanebunt isti tres ad verticem A , minores quatuor rectis.

Secundo contineatur solidus A quinque angulis planis: eruntque omnes quinque in pentagono $BCDE$ per 32. pr. sex rectis æquales, & 10. anguli ABC , ABF , ACB , ACD , ADC , ADE , &c. erunt sex rectis majores, sicut in precedenti demonstratione. Omnes autem 10. una cum 5. angulis ad A , sunt 10. rectis æquales. sublatis ergo 10. illis, qui sunt majores sex rectis, remanebant 5. ad A , minores quatuor rectis. & ita de alijs.

PROPOS. 38. THEOR. 33.

Planum AB , sit rectum ad planum AC , & ex puncto E plani AB , in planum AC , cadat perpendicularis EG : Dico E , esse ad communem sectionem AD .

SIn minus, sit alia perpendicularis EI , & IG , sit perpendicularis ad AD , ideoque per 4. defn. recta ad planum AB , & perpendicularis ad EG , in triangulo igitur EGI erunt duo recti EGI , EIG : quod est contra 17. primi.

☞ (0) ☞

PROPOSITIONES ALIÆ
ex iisdem Elementis depromptæ, quarum demonstrationes, hoc compendium Clavio relinquit.

EX X.

Propos. 117. In quadratis diameter & latus sunt lineæ incommensurabiles. Hoc est proportio diametri AC , ad latus AB , nulla ratione potest exhiberi numeris; Nulla enim datur earundem rectarum AC , AB , mensura communis.

EX XI.

Propos. 29. 30. & 31. Solida parallelepipeda super eadem, vel super æqualibus basibus constituta, & in eadem altitudine; sunt æqualia.

Talia sunt parallelepipeda AB , CD habentia communem basim AC , & æquales altitudines AE , AF .

Item parallelepipeda AB , HI , habentia æquales bases AC , GH , & æquales altitudines AE , GI .

Propos. 32. Solida parallelepipeda AB , CD , sub eadem vel æquali altitudine BE , CF , in-

ter se similia, erit quoque ut parallelepipedum A ad B , ita C ad D ; & vice versa.

al 101

EX XII.

118

pag. 3.

Propos. 1. Quæ in circulis polygonæ similia, inter se sunt ut à diametris quadrata.

Propos. 2. Circuli inter se sunt ut à diametris quadrata.

Propos. 3. & 6. Eiusdem altitudinis Pyramides tam Triangulares, quam Polygonæ: inter se sunt, ut bases.

Propos. 8. Similes pyramides sunt in triplicata ratione laterum homologorum, *quæ distinetur Prop. 33. in dæmoni de parallelepipedis.*

Propos. 9. Aequalium pyramidum reciprocantur bases & latera. *hinc Prop. 34. in dæmoni.*

Propos. 10. Conus tertia pars est Cylindri eiusdem basis, & altitudinis.

Propos. 11. Tam Coni, quam Cylindri eiusdem altitudinis, inter se sunt ut bases.

Propos. 12. Tam Coni, quam Cylindri similes, sunt in triplicata ratione diametrorum.

Propos. 15. Tam Conorum quam Cylindrorum æqualium, reciprocantur altitudines & bases. *hinc hinc Prop. 34. in dæmoni de parallelepipedis.*

Propos. 18. Sphæræ sunt in triplicata ratione diametrorum: *hinc explicitè de solis & hinc de parallelepipedis Prop. 33. in dæmoni.*

Ex Pappo lib. 5. prop. 17.

Circulorum circumferentia inter se sunt ut Diametri.

*Ex Archimede de dimensione circuli
prop. 1.*

Omnis circulus equalis est triangulo rectangulo, cujus radius est equalis uni lateri eorum quæ sunt, circa rectum angulum; circumferentia vero est equalis alteri lateri circa rectum angulum existenti.

*Ex eodem de Sphæra & Cylindro. lib.
1. prop. 30.*

Cujuscunque Sphære superficies quadrupla est maximi circuli eorum qui sunt in ipsa.

Ex Clavio Geom: practica lib. 5. prop. 7.

Sphære soliditas producitur ex ductu semidiametri, in tertiam partem superficiei.

ELENCHUS PROPOSITION- NUM SEX LIBRO- RUM EUCLIDIS.

Sicut habentur apud
Claviuꝰ.

PROPOSITIONES *Libri Primi.*

1. **S**uper data recta linea terminata, triangulum æquilaterum constituere.
2. Ad datum punctum datæ rectæ lineæ, æqualem rectam lineam ponere.
3. Duabus datis rectis lineis inæqualibus, de maiore æqualem minori rectam lineam detrahere,
4. Si duo triangula duo latera duobus lateribus æqualia habeant, utrumq; utrique, habeant vero & angulum angulo æqualem sub æqualibus rectis lineis contentum: Et basim basi æqualem habebunt.

- bunt; eritq; triangulum triangulo æquale, ac reliqui anguli reliquis angulis æquales erunt, uterq; utrique, sub quibus æqualia latera subtendantur.
5. Iſoſcelium triangulorum, qui ad baſim ſunt, anguli inter ſe ſunt æquales: Et productis æqualibus rectis lineis, qui ſub baſi ſunt anguli, inter ſe æquales erunt.
6. Si trianguli duo anguli æquales inter ſe fuerint: Et ſub æqualibus angulis ſubtenſa latera æqualia inter ſe erunt.
7. Super eadem recta linea, duabus eiſdem rectis lineis; alæ duæ rectæ lineæ æquales, utraq; utrique, non conſtituentur, ad aliud atque aliud punctum, ad eaſdem partes, eoſdemq; terminos cum duabus initio ductis rectis lineis habentes.
8. Si duo triangula, duo latera habuerint duobus lateribus, utrumque utrique æqualia; habuerint vero & baſim baſi æqualem: Angulum quoque ſub æqualibus rectis lineis contentum, angulo æqualem habebunt.
9. Datum angulum rectilineum bifariam ſecare.
10. Datam rectam lineam finitam bifariam ſecare.
11. Data recta linea, à puncto in ea dato, rectam lineam ad angulos rectos excitare.
12. Sa-

12. Super datam rectam lineam infinitam, à dato puncto, quod in ea non est, perpendicularem rectam deducere.
13. Cum recta linea super rectam consistens lineam, angulos facit; Aut duos rectos, aut duobus rectis æquales efficiet.
14. Si ad aliquam rectam lineam, atque ad ejus punctum, duæ rectæ lineæ, non ad easdem partes ductæ, eos qui sunt deinceps, angulos, duobus rectis æquales fecerint; in directum erunt inter se ipsæ rectæ lineæ.
15. Si duæ rectæ lineæ se mutuo secuerint, angulos ad verticem æquales inter se efficiunt.
16. Cujuscunque trianguli uno latere producto, externus angulus utrolibet interno, & opposito major est.
17. Cujuscunque trianguli duo anguli duobus rectis sunt minores, omnifariam sumpti.
18. Omnis trianguli majus latus, majorem angulum subtendit.
19. Omnis trianguli major angulus, majori lateri subtenditur.
20. Omnis trianguli duo latera reliqua sunt majora, quomodocunque assumpta.
21. Si super trianguli uno latere, ab extremitatibus duæ rectæ lineæ interiorius constitutæ fuerint; hæ constitutæ reliquis trian-

trianguli duobus lateribus minores quidem erunt, majorem vero angulum continebunt.

22. Ex tribus rectis lineis, quæ sint tribus datis rectis lineis æquales, triangulum constituere. Oportet autem duas reliqua esse majores omnifariam sumptas: quoniam uniuscujusq; trianguli duo latera omnifariam sumpta, reliquo sunt majora.
23. Ad datam rectam lineam, datumque in ea punctum, dato angulo rectilineo æqualem angulum rectilineum constituere.
24. Si duo triangula, duo latera duobus lateribus æqualia habuerint, utrumque utrique; angulum vero angulo majorem sub æqualibus rectis lineis contentum: Et basim basi majorem habebunt.
25. Si duo triangula, duo latera duobus lateribus æqualia habuerint, utrumque utrique; basim vero basi majorem: Et angulum sub æqualibus rectis lineis contentum, angulo majorem habebunt.
26. Si duo triangula, duos angulos duobus angulis, æquales habuerint, utrumque utrique, unumque latus uni lateri æquale, sive quod æqualibus adjacet angulis, seu quod uni æqualium angulorum sub-tenditur: Et reliqua latera reliquis lateribus

teribus æqualia utrumque utrique, & reliquum angulum reliquo angulo æqualem habebunt.

27. Si in duas rectas lineas, recta incidens linea, alternatim angulos æquales inter se fecerit : Parallelæ erunt inter se illæ rectæ lineæ,
28. Si in duas rectas lineas, recta incidens linea, externum angulum interno, & opposito, & ad easdem partes, æqualem fecerit, aut internos, & ad easdem partes duobus rectis æquales : Parallelæ erunt inter se ipsæ rectæ lineæ.
29. In parallelas rectas lineas, recta incidens linea : Et alternatim angulos inter se æquales efficit; & externum interno, & opposito, & ad easdem partes, æqualem; & internos, & ad easdem partes, duobus rectis æquales facit.
30. Quæ eidem rectæ lineæ parallelæ, & inter se sunt parallæ.
31. A dato puncto, datæ rectæ lineæ parallelam rectam lineam ducere.
32. Cujuscunque trianguli uno latere producto, externus angulus duobus internis, & oppositis est æqualis : Et trianguli tres interni anguli, duobus sunt rectis æquales.
33. Rectæ lineæ quæ æquales, & parallelas lineas ad partes easdem conjungunt: Et
H ipse

ipse equales, & parallele sunt.

34. Parallelogrammorum spatiorum equalia sunt inter se, quæ ex adverso & latera, & anguli : Atque illa bifariam secat diameter.
35. Parallelogramma super eadem basi, & in eisdem parallelis constituta, inter se sunt æqualia.
36. Parallelogramma super equalibus basibus, & in eisdem parallelis constituta, inter se sunt equalia.
37. Triangula super eadem basi constituta, & in eisdem parallelis inter se sunt æqualia.
38. Triangula super equalibus basibus constituta, & in eisdem parallelis, inter se sunt equalia.
39. Triangula æqualia super eadem basi, & ad easdem partes constituta, in eisdem sunt parallelis.
40. Triangula æqualia super equalibus basibus, & ad easdem partes constituta : in eisdem sunt parallelis.
41. Si parallelogrammum cum triangulo eandem basim habuerit, in eisdemq; fuerit parallelis : Duplum erit parallelogrammum ipsius trianguli.
42. Dato triangulo æquale parallelogrammum constituere in dato angulo rectilineo.

43. In omni parallelogrammo, complementa eorum, quę circa diametrum sunt parallelogrammorum, inter se sunt equalia.
44. Ad datam rectam lineam, dato triangulo, æquale parallelogrammum applicare, in dato angulo rectilineo.
45. Ad datam rectam lineam, dato rectilineo æquale parallelogrammum constitutę, in dato angulo rectilineo.
46. A data recta linea, quadratum describere.
47. In triangulis rectangulis, quadratum, quod à latere rectum angulum subtendente describitur, æquale est eis, quę à lateribus rectum angulum continentibus describuntur quadratis.
48. Si quadratum, quod ab uno laterum trianguli describitur, æquale sit eis, quę à reliquis trianguli lateribus describuntur, quadratis: Angulus comprehensus sub reliquis duobus trianguli lateribus, rectus est.

PROPOSITIONES

Libri Secundi.

1. **S**I fuerint duę rectę lineę, seceturque ipsarum altera in quocunq; segmen-

172 *Elenchus libri secundi.*

ta: Rectangulum comprehensum sub illis duabus rectis lineis, æquale est eis, quæ sub insecta, & quolibet segmentorū comprehenduntur, rectangulis.

2. Si recta linea secta sit utcunq; : Rectangula, quæ sub tota, & quolibet segmentorum comprehenduntur, æqualia sunt ei, quod à tota fit, quadrato.
3. Si recta linea secta sit utcunq; : Rectangulum sub tota, & uno segmentorum comprehensum, æquale est & illi, quod sub segmentis comprehenditur, rectangulo, & illi, quod à prædicto segmento describitur, quadrato.
4. Si recta linea secta sit utcunque : Quadratum, quod à tota describitur, æquale est & illis, quæ à segmentis describuntur, quadratis, & ei, quod bis sub segmentis comprehenditur, rectangulo.
5. Si recta linea secetur in equalia, & non æqualia : Rectangulum sub inæqualibus segmentis totius comprehensum, una cum quadrato, quod ab intermedia sectionum, æquale est ei, quod à dimidia describitur, quadrato.
6. Si recta linea bifariam secetur, & illi recta quædam linea in rectum adijciatur : Rectangulum comprehensum sub tota cum adjecta, & adjecta, una cum quadrato à dimidia, æquale est quadrato à linea quæ

que tum ex dimidia, tum ex adjecta componitur, tanquam ab una, descripto.

7. Si recta linea secetur utcumque; Quod à tota, quodq; ab uno segmentorū, utraque simul quadrata, equalia sunt & illi, quod bis sub tota, & dicto segmento comprehenditur rectangulo, & illi, quod à reliquo segmento fit quadrato.
8. Si recta linea secetur utcumque: Rectangulum quater comprehensum sub tota, & uno segmentorum, cum eo, quod à reliquo segmento fit quadrato, equalis est ei, quod à tota, & dicto segmento, tanquam ab una linea describitur quadrato.
9. Si recta linea secetur in equalia, & non æqualia: Quadrata, quæ ab inæqualibus totius segmentis sunt, simul duplicia sunt & ejus, quod à dimidia, & ejus quod ab intermedia sectionum fit, quadrati.
10. Si recta linea secetur bifariam, adijciatur autem ei in rectum quæpiam recta linea: Quod à tota cum adjuncta, & quod ab adjuncta, utraque simul quadrata, duplicia sunt & ejus, quod à dimidia, & ejus, quod à composita ex dimidia & adjuncta, tanquam ab una, descriptum fit, quadrati.
11. Datam rectam lineam secare, ut comprehensum sub tota, & altero segmentorum rectangulum, æquale sit ei, quod

174 *Elenchus libri secundi & tert.*

- à reliquo segmento fit, quadrato.
12. In amblygonijs triangulis, quadratum, quod fit à latere angulum obtusum subtendente, majus est quadratis, quæ fiunt à lateribus, obtusum angulum comprehendētib, rectangulo bis cōprehenso, & ab uno laterum, quæ sunt circa obtusum angulum, in quod, cum protractum fuerit, cadit perpendicularis, & ab assumpta exterius linea sub perpendiculari prope angulum obtusum.
13. In oxygonijs triangulis, quadratum à latere angulum acutum subtendente, minus est quadratis, quæ fiunt à lateribus acutum angulum comprehendētib, rectangulo bis comprehenso & ab uno laterum, quæ sunt circa acutum angulum, in quod perpendicularis cadit, & ab assumpta interius linea sub perpendiculari prope acutum angulum.
14. Dato rectilineo æquale quadratum constituere.

P R O P O S I T I O N E S
Libri Tertij.

1. **D**ati circuli centrum reperire.
2. **S**i in circuli peripheria duo quælibet puncta accepta fuerint: Recta linea, quæ

quæ ad ipsa puncta adjungitur, intra circulum cadit.

3. Si in circulo recta quædam linea per centrum extensa, quandam non per centrum extensam bifariam secet; Et ad angulos rectos ipsam secabit. Et si ad angulos rectos eam secet, bifariam quoque eam secabit.
4. Si in circulo duæ rectæ lineæ, sese mutuo secant non per centrum extensæ: Sese mutuo bifariam non secabunt.
5. Si duo circuli sese mutuo secant, non erit illorum idem centrum.
6. Si duo circuli sese mutuo interiorius tangent, eorum non erit idem centrum.
7. Si in diametro circuli quodpiam sumatur punctum, quod circuli centrum non sit, ab eoq; puncto in circulum quædam rectæ lineæ cadant: Maxima quidem erit ea, in qua cætrum; minima vero reliquæ; aliarum vero propinquior illi, quæ per centrū ducitur, remotiore semper major est: Duæ autem solum rectæ lineæ æquales ab eodem puncto in circulū cadunt, ad utraq; partes minimæ, vel maximæ.
8. Si extra circulum sumatur punctum quodpiam, ab eoq; puncto ad circulum deducantur rectæ quædam lineæ, quarum una quidem per centrum protendatur, reliquæ vero ut libet: In cavam peripheriam

pheriam cadentium rectarum linearum maxima quidem est illa, quæ per centrū ducitur; aliarum autem propinquior ei, quæ per centrū transit, remotiore semper major est: In convexam vero peripheriam cadentium rectarum linearum minima quidem est illa, quæ inter punctum, & diametrum interponitur; aliarum autem ea, quæ propinquior est minimæ, remotiore semper minor est: Dux autem tantum rectæ lineæ æquales, ab eo puncto in ipsum circulum cadunt, ad utrasque partes minimæ, vel maximæ.

9. Si in circulo acceptum fuerit punctum aliquod, & ab eo puncto, ad circulum cadant plures quam duæ rectæ lineæ æquales: Acceptum punctum centrum est ipsius circuli.
10. Circulus circulum in pluribus, quam duobus punctis non secat.
11. Si duo circuli sese intus contingant, atq; accepta fuerint eorum centra: Ad eorū centra adjuncta recta linea, & producta, in contactum circulorum cadet.
12. Si duo circuli sese exterius cōtingant, linea recta, quæ ad centra eorum adjungitur per contactum transibit.
13. Circulus circulum non tangit in pluribus punctis quam uno, sive intus, sive extra tangat.

14. In circulo equales rectæ lineæ æqualiter distant à centro: & quæ æqualiter distant à centro, æquales sunt inter se.
15. In circulo maxima quidem linea est diameter; aliarum autem propinquior centro, remotiore semper major.
16. Quæ ab extremitate diametri cujusq; circuli ad angulos rectos ducitur, extra ipsum circulum cadet; & in locum inter ipsam rectam lineam, & peripheriam comprehensum, altera recta linea non cadet: Et semicirculi quidem angulus, quovis angulo acuto rectilineo major est; reliquus autem minor.
17. A dato puncto rectam lineam ducere, quæ datum tangat circulum.
18. Si circulū tangat recta quæpiam linea, à centro autē ad contactum, adjungatur recta quædā linea: quæ adjuncta fuerit ad ipsam contingentē perpendicularis erit.
19. Si circulum tetigerit recta quæpiam linea, à contactu autem recta linea ad angulos rectos ipsi tangenti excitetur: In excitata erit centrum circuli.
20. In circulo, angulus ad centrum duplex est anguli, ad peripheriam, cum fuerit eadem peripheria basis angulorum.
21. In circulo, qui in eodē segmento sunt, anguli sunt inter se equales.
22. Quadrilaterorū in circulis descripto-

rum anguli, qui ex adverso, duobus rectis sunt æquales.

23. Super eadem recta linea, duo segmenta circulorum similia, & inæqualia, non constituentur ad easdem partes.
24. Super æqualibus rectis lineis, similia circulorū segmenta sunt inter se æqualia.
25. Circuli segmento dato, describere circulum, cujus est segmentum.
26. In æqualibus circulis, æquales anguli æqualibus peripherijs insistant, sive ad cētra, sive ad peripherias cōstituti insistant.
27. In æqualibus circulis, anguli, qui æqualibus peripherijs insistant, sunt inter se æquales, sive ad centra, sive ad peripherias cōstituti insistant.
28. In æqualibus circulis, æquales rectę lineę, æquales peripherias auferunt, majorem quidem majori, minorem autem minori.
29. In æqualibus circulis, æquales peripherias, æquales rectę lineę subtendunt.
30. Datam peripheriam bifariam secare.
31. In circulo angulus, qui in semicirculo, rectus est: qui autem in majore segmento, minor recto: qui vero in minore segmento, major est recto. Et insuper angulus majoris segmenti, recto quidem major est: minoris autem segmenti angulus, minor est recto.

32. Si

32. Si circulum tetigerit aliqua recta linea, à contactu autem producatur quædam recta linea circulum secans: Anguli, quos ad contingentem facit, æquales sunt ijs, qui in alternis circuli segmentis consistunt, angulis.
33. Super data recta linea describere segmentum circuli, quod capiat angulum æqualem dato angulo rectilineo.
34. A dato circulo segmentum abscindere, capiens angulum æqualem dato angulo rectilineo.
35. Si in circulo duæ rectę lineę sese mutuo secuerint, rectangulum comprehensum sub segmentis unius, æqualis erit ei, quod sub segmentis alterius comprehenditur, rectangulo.
36. Si extra circulum sumatur punctum aliquod, ab eoq; in circulum cadant duæ rectę lineę, quarum altera quidem circulum secet, altera vero tangat: Quod sub tota secante, & exterius inter punctum & convexam peripheriam assumpta comprehenditur rectangulum, æquale erit ei, quod à tangente describitur, quadrato.
37. Si extra circulum sumatur punctum aliquod, ab eoq; puncto in circulum cadant duæ rectę lineę, quarum altera circulum secet, altera in eum incidat, sit autem, quod sub tota secante, & exterius

inter punctum & convexam peripheriā assumpta, comprehenditur rectangulū, æquale ei, quod ab incidente describitur quadrata; Incidens ipsa circulum tanget.

P R O P O S I T I O N E S

Libri Quarti.

1. **I**N dato circulo, rectam lineam accom-
modare, æqualem datę rectę lineę, quę
circuli diametro non sit major.
2. In dato circulo triangulum describere
dato triangulo æquiangulum.
3. Circa datum circulum, triangulum de-
scribere dato triangulo æquiangulum.
4. In dato triangulo circulum inscribere.
5. Circa datum triangulum circulum de-
scribere.
6. In dato circulo quadratum describere.
7. Circa datum circulum quadratum de-
scribere.
8. In dato quadrato circulum describere.
9. Circa datū quadratū circulū describere.
10. Isocles triangulum constituere, quod
habeat, utrumque eorum, qui ad basim
sunt angulorum, duplum reliqui.
11. In dato circulo pentagonum æquila-
terum & æquiangulum describere.
12. Circa datum circulum pentagonum æ-
quilaterum, & æquiangulum describere.
13. In dato pentagono æquilatero, & æqui-
angulo circulum inscribere.
14. Cir-

14. Circa datum pentagonum æquilaterū,
& æquiangulum circulum describere.
15. In dato circulo hexagonum, & æquila-
terum, & æquiangulum inscribere.
16. In dato circulo quintidecagonum, & æ-
quilaterum, & æquiangulum describere.

P R O P O S I T I O N E S
Libri Quinti.

1. **S**I sint quotcunq; magnitudines quot-
cunq; magnitudinum æqualium nu-
mero, singule singularum, æquemultipli-
ces quam multiplex est unius una ma-
gnitudo, tam multiplices erunt, & omnes
omnium.
2. Si prima secundæ æque fuerit multi-
plex, atque tertia quartæ; fuerit autem &
quinta secundæ æquemultiplex, atq; sex-
ta quartæ: Erit & composita prima cum
quinta, secundæ æquemultiplex, atque
tertia cum sexta, quartæ.
3. Si sit prima secundæ æquemultiplex, at-
que tertia quartæ; sumantur autem æ-
quemultiplices primæ, & tertiæ: Erit &
ex æquo sumptarum utraq; utriusque æ-
quemultiplex, altera quidem secundæ,
altera autem quartæ.
4. Si prima ad secundam eandem habuerit
rationem, & tertia ad quartam: Etiam æ-
quemul-

quemultiplices primæ & tertiæ, ad æquemultiplices secundæ & quartæ, juxta quamvis multiplicationem, eandem habebunt rationē, si prout inter se respondent, ita sumptæ fuerint.

5. Si magnitudo magnitudinis æque fuerit multiplex, atq; ablata ablatæ: Etiam reliqua reliquæ ita multiplex erit, ut tota totius.
6. Si duę magnitudines duarum magnitudinum sint æquemultiplices, & detractæ quædam sint earundē æquemultiplices. Et reliquæ eisdem aut æquales sunt, aut æque ipsarum multiplices.
7. Æquales ad eandem, eandem habent rationem: Et eadem ad æquales.
8. Inæqualium magnitudinum major ad eandem, majorem rationem habet, quā minor: Et eadem ad minorem, majorem rationem habet, quā ad majorem.
9. Quę ad eandem, eandem habent rationem, æquales sunt inter se: Et ad quas eadem eandem habet rationem, eæ quoque sunt inter se æquales.
10. Ad eandem magnitudinem rationem habentium, quę majorem rationem habet, illa major est; Ad quam autem eadē majorem rationem habet, illa minor est.
11. Quę eidem sunt eadem rationes, & inter se sunt eadem.

12. Si sint magnitudines quotcunq; proportionales:quemadmodum se habuerit una antecedentium ad unam consequentium, ita se habebunt omnes antecedentes ad omnes consequentes.
13. Si prima ad secundam, eandem habuerit rationem, quam tertia ad quartam; tertia vero ad quartam, maiorem rationem habuerit, quam quinta ad sextam. Prima quoq; ad secundam maiorem rationem habebit, quam quinta ad sextam.
14. Si prima ad secundam eandem habuerit rationem quam tertia ad quartam; prima vero, quam tertia, major fuerit; Erit & secunda major, quam quarta. Quod si prima fuerit equalis tertiæ, erit & secunda æqualis quartæ: Si vero minor, & minor erit.
15. Partes cum pariter multiplicibus in eadem sunt ratione, si prout sibi mutuo respondent, ita sumantur.
16. Si quatuor magnitudines proportionales fuerint; Et vicissim proportionales erunt.
17. Si compositæ magnitudines proportionales fuerint; hæ quoq; divisæ proportionales erunt.
18. Si divisæ magnitudines sint proportionales; hæ quoque compositæ proportionales erunt.

19. Si quemadmodum totum ad totum, ita ablatū se habuerit ad ablatū: Et reliquū ad reliquū, ut totum ad totū, se habebit
20. Si sint tres magnitudines, & aliæ ipsis æquales numero, quæ binæ, & in eadem ratione sumantur; ex æquo autem prima quam tertia, major fuerit; Erit & quarta quam sexta, major. Quod si prima tertiæ fuerit æqualis, erit & quarta equalis sextæ: Sin illa minor, hæc quoq; minor erit.
21. Si sint tres magnitudines, & alię ipsis æquales numero, quæ binę, & in eadem ratione sumantur. fueritq; perturbata earum proportio, ex æquo autem prima, quam tertia major fuerit; Erit & quarta, quam sexta major. Quod si prima tertię fuerit æqualis, erit & quarta equalis sextę: sin illa minor, hæc quoq; minor erit.
22. Si sint quotcunq; magnitudines, & alię ipsis æquales numero, quę binæ in eadē ratione sumantur: Et ex equalitate in eadem ratione erunt.
23. Si sint tres magnitudines, alięque ipsis æquales numero, quę binę in eadem ratione sumantur, fuerit autem perturbata earum proportio: Etiam ex equalitate in eadem ratione erunt.
24. Si prima ad secundam, eandem habuerit rationem, quàm tertia ad quartam; habuerit autem & quinta ad secundam,
- can.

eandem rationem, quàm sexta ad quartam: Etiam composita prima cum quinta, ad secundam eandem habebit rationem, quàm tertia cum sexta, ad quartam.

25. Si quatuor magnitudines proportionales fuerint; Maxima & minima reliquis duabus maiores erunt.

26. Si prima ad secundam habuerit maiorem proportionem, quàm tertia ad quartam: habebit convertendo secunda ad primam minorem proportionem, quàm quarta ad tertiam.

27. Si prima ad secundam habuerit maiorem proportionem, quàm tertia ad quartam: Habebit quoque vicissim prima ad tertiam maiorem proportionem, quàm secunda ad quartam.

28. Si prima ad secundam habuerit maiorem proportionem, quàm tertia ad quartam. Habebit quoque composita prima cum secunda, ad secundam, maiorem proportionem, quàm composita tertia cum quarta, ad quartam.

29. Si composita prima cum secunda ad secundam maiorem habuerit proportionem, quàm composita tertia cum quarta, ad quartam: Habebit quoque dividendo prima ad secundam, maiorem proportionem, quàm tertia ad quartam.

30. Si composita prima cum secunda, ad
secun-

secundam habuerit maiorem proportionem, quàm composita tertia cum quarta, ad quartam: Habebit per conversionem rationis, prima cum secunda, ad primam, minorem proportionem, quàm tertia cum quarta, ad tertiam.

31. Si sint tres magnitudines, & alię ipsis æquales numero, sitq; maior proportio primæ priorum, ad secundam; quàm primæ posteriorum, ad secundam: Item secundæ priorum, ad tertiam maior, quàm secundæ posteriorum, ad tertiam: Erit quoque ex æqualitate, maior proportio primæ priorum, ad tertiam, quàm primæ posteriorum ad tertiam.

32. Si sint tres magnitudines, & alię ipsis æquales numero, sitq; maior proportio primæ priorum ad secundam, quàm secundæ posteriorum ad tertiam: Item secundæ priorum ad tertiam maior, quàm primæ posteriorum ad secundam: Erit quoque ex æqualitate, maior proportio primæ priorum ad tertiam, quàm primæ posteriorum ad tertiam.

33. Si fuerit maior proportio totius ad totum, quàm ablati ad ablatum: Erit & reliqui ad reliquum maior proportio, quàm totius ad totum.

34. Si sint quotcunque magnitudines, & alię ipsis æquales numero, sitque maior propor-

proportio primæ priorum , ad primam posteriorum, quàm secundæ ad secundā; & hæc major, quàm tertix ad tertiam, & sic deinceps: Habebunt omnes priores simul, ad omnes posteriores simul, majorem proportionem , quàm omnes priores, relicta prima, ad omnes posteriores, relicta quoque prima; minorem autem, quàm prima priorum ad primam posteriorum , majorem deniq; etiam, quàm ultima priorum ad ultimā posteriorum.

P R O P O S I T I O N E S *Libri Sexti.*

1. **T**riangula & parallelogramma , quorum eadem fuerit altitudo, ita se habent inter se, ut bases.
2. Si ad unum trianguli latus parallela ducta fuerit recta quædam linea: hæc proportionaliter secabit ipsius trianguli latera, Et si trianguli latera proportionaliter secta fuerint; quæ ad sectiones adjuncta fuerit recta linea, erit ad reliquū ipsius trianguli latus parallela.
3. Si trianguli angulus bifariam sectus sit, secans autem angulum recta linea secuerit & basin: Basis segmenta eandem habebunt rationem quàm reliqua ipsius
trian-

trianguli latera. Et si basis segmenta eandem habeant rationem, quam reliqua ipsius trianguli latera: Recta linea, quæ à vertice ad sectionem producitur, bisariam secat trianguli ipsius angulum.

4. *Æquiangulorum triangulorum proportionalia sunt latera, quæ circum æquales angulos, & homologa sunt latera, quæ æqualibus angulis subtenduntur.*

5. Si duo triangula latera proportionalia habeant: æquiangula erunt triangula, & æquales habebunt eos angulos, sub quibus homologa latera subtenduntur.

6. Si duo triangula unum angulum uni angulo æqualem, & circum æquales angulos latera proportionalia habuerint: æquiangula erunt triangula, æqualesque habebunt angulos, sub quibus homologa latera subtenduntur.

7. Si duo triangula unum angulum uni angulo æqualem, circum autem alios angulos latera proportionalia habeant; reliquorum vero simul utrumque aut minorem, aut non minorem recto: *Æquiangula erunt triangula, & æquales habebunt eos angulos, circum quos proportionalia sunt latera.*

8. Si in triangulo rectangulo ab angulo recto in basim perpendicularis ducta sit: Quæ ad perpendicularem triangula, tum
toti

toti triangulo , tum ipsa inter se similia sunt.

9. A data recta linea imperatam partem auferre.

10. Datam rectam lineam insectam similiter secare, ut data altera recta secta fuerit.

11. Duabus datis rectis lineis, tertiam proportionalem adinvenire.

12. Tribus datis rectis lineis, quartam proportionalem invenire.

13. Duabus datis rectis lineis, mediam proportionalem adinvenire.

14. *Æqualium*, & unum uni *æqualem* habentium angulum, parallelogrammorum, reciproca sunt latera, quæ circum *æquales* angulos. Et quorum parallelogrammorum unum angulū uni angulo *æqualem* habentium, reciproca sunt latera, quæ circum *æquales* angulos, illa sunt *æqualia*.

15. *Æqualium*, & unum uni *æqualem* habentium angulum, triangulorum, reciproca sunt latera, quæ circum *æquales* angulos. Et quorum triangulorum unum angulum, uni angulo *æqualem* habentium, reciproca sunt latera, quæ circum *æquales* angulos, illa sunt *æqualia*.

16. Si quatuor rectę lineę proportionales fuerint; quod sub extremis comprehenditur

ditur rectangulum, æquale est ei, quod sub medijs comprehenditur, rectangulo. Et si sub extremis comprehensum rectangulum, æquale fuerit ei, quod sub medijs continetur rectangulo: illæ quatuor rectæ lineæ proportionales erunt.

17. Si tres rectæ lineæ, sint proportionales: quod sub extremis comprehenditur rectangulum, æquale est ei, quod à media describitur, quadrato. Et si sub extremis comprehensum rectangulum æquale sit ei, quod à media describitur, quadrato: illæ tres rectæ lineæ proportionales erunt.

18. A data recta linea dato rectilineo, simile similiterque positum rectilineum describere.

19. Similia triangula inter se sunt in duplicata ratione laterum homologorum.

20. Similia polygona in similia triangula dividuntur, & numero æqualia, & homologa totis: Et polygona duplicatam habent eam inter se rationem, quam latus homologum, ad homologum latus.

21. Quæ eidem rectilineo sunt similia; & inter se sunt similia.

22. Si quatuor rectæ lineæ proportionales fuerint; Et ab eis rectilinea similia similiterq; descripta, proportionalia erunt. Et si à rectis lineis similia similiterque descripta rectilinea, proportionalia fuerint;

rint; ipsæ etiam rectę lineę proportionales erunt.

23. *Æquiangula parallelogramma inter se rationem habent eam, quę ex lateribus componitur.*
24. *In omni parallelogrammo, quę circa diametrum sũnt, parallelogramma & toti, & inter se sũnt similia.*
25. *Dato rectilineo simile similiterq; positum, & alteri dato æquale idem constituere.*
26. *Si à parallelogrammo parallelogrammum ablatum sit, & simile toti, & similiter positum, communem cum eo habens angulum: hoc circum eandem cum toto diametrum consistit.*
27. *Omniũ parallelogrammorum secundum eandem rectam lineam applicatorũ, deficientiumq; figuris parallelogrammis similibus, similiterq; positis ei, quod à dimidia describitur: maximum id est, quod ad dimidiam applicatur, parallelogrammum simile existens defectui.*
28. *Ad datam lineam rectam dato rectilineo æquale parallelogrammum applicare, deficiens figura parallelogrãma, quę similis sit alteri parallelogrammo dato. Oportet autem datum rectilineum, cui æquale applicandum est, non majus esse eo, quod ad dimidiam applicatur, cum*
similes

- similes fuerint defectus, & ejus, quocumque ad dimidiam applicatur, & ejus, cui simile deesse debet.
29. Ad datam rectam lineam, dato rectilineo æquale parallelogrammum applicare, excedens figura parallelogramma, quæ similis sit parallelogrammo alteri dato.
30. Propositam rectam lineam terminatam, extrema ac media ratione secare.
31. In rectangulis triangulis, figura quævis à latere rectum angulum subtendente descripta, æqualis est figuris, quæ priori illi similes, & similiter positæ à lateribus rectum angulum continentibus describuntur.
32. Si duo triangula, quæ duo latera duobus lateribus proportionalia habeant, secundum unum angulum composita fuerint, ita ut homologa eorum latera sint etiam parallela: tum reliqua illorum triangulorum latera, in rectam lineam collocata reperientur.
33. In æqualibus circulis, anguli eandem habent rationem cum peripherijs, quibus insistant, sive ad centra, sive ad peripherias constituti insistant: Insuper vero & sectores, quippe qui ad centra consistunt.

Q101
Q102

Q103

Q104

Q105

Q106

Q107

Q108

Q109

Q110

Q111

Q112

Q113

Q114

Q115

Q116

Q117

Q118

Q119

Q120

Q121

Q122

Q123

Q124

Q125

Q126

Q127

Q128

Q129

Q130

LA 700 + 95 = 795 eggs collected A.



BREVIS

TRIGONOMETRIA

PLANORVM.

PROPOS. 1.

Angulus rectus BAC ad centrum circuli A constitutus; abscindit arcum BC , quartam partem totius peripheria. Producta enim BA , in D , & CA , in E , est CAD , etiam rectus per defin. 10 primi. & eodem modo DAE , & EAB , sunt etiam recti, ergo per axioma 12. æquales: unde per 26. tertij arcus BC , CD , DE , EB , invicem sunt æquales, est ergo BC , quarta pars totius.

PROPOS. 2.

Datus sit angulus quicumq; BAC ; E centro A descriptus circulus BCD , E eodem centro A descriptus quivis alius circulus EFG ; Dico esse Arcum BC , ad totam peripheriam circuli BCD , ut est arcus EF , ad totam peripheriam circuli EFG .

Ducatur enim AD , faciens cum AC angulum rectum, eritq; per præcedentem tam arcus CD , quam arcus FG , quarta pars totius Peripheriæ; sed per 33. sexti tam

arcus BC , est ad arcum CD , quam arcus EF , ad FG , ut angulus BAC , ad angulum CAD : est ergo ut BC , ad CD , ita E
 F , ad FG . ergo per 22. *quinti* erit ex æqua-
 litate, ut BC ad totam circumferentiam,
 ita EF , ad totam circumferentiam.

Quoniam ergo ex *prop. 33. lib. 6.* in æ-
 qualibus circulis, anguli ad invicem ean-
 dem habent rationem, quam habent peri-
 pheriz seu arcus, descripti tanquam cen-
 tro, ex ipso concursu linearum angulum
 constituentium; ideo Mathematici pro
 mensura angulorum, assumunt ipsos arcus,
 qui descripti sunt tanquam centro, ex
 concursu linearum ipsum angulum consti-
 tuentium; & quot partium est huiusmodi
 ens, totidem partium dicitur esse angulus,
 quem idem ille arcus subtendit. quia au-
 tem ex 2. *propos. hujus* constat omnes ar-
 cus quibus æquales anguli insunt, ean-
 dem habere rationem ad totam circumfe-
 rentiam ideo perinde refert ad quan-
 tam distantiam describatur ille arcus qui
 angulū subtendit, & penes quē anguli men-
 sura desumitur. Sic in superiori figura arcus
 EF , totidem est partium, sive graduum,
 quot partium est arcus BC : & idem est, de
 quocunque arcu, descripto ex centro A ,
 & intercepto lateribus AB , AC , quantum-
 libet

libet vel productis, vel rescissis. Dividitur porro omnis circulus apud Mathematicos in 360 partes æquales, quas partes gradus vocant, singuli gradus dividuntur in 60. partes æquales, quæ minuta vocantur, sive scrupula prima: singula minuta, iterum dividuntur in 60 partes æquales, quæ vocantur scrupula 2. Scrupula 2. iterum dividuntur in 60 scrupula 3. & sic consequenter, sexagenaria divisione pergunt, quoad placuerit. Cur autem Mathematici, hunc divisionis modum præ alijs divisionibus elegerint, hic nihil attinet dicere, sufficiat quod in hac divisione, pro operationibus præsertim astronomicis perficiendis, multa commoda insint, quibus aliæ divisiones carent. Operationes præterq; Mathematicæ, ut sunt investigare cælestes motus, mensurare distantiam, sive astrorum à terra, sive in ipsa terra, loci alicujus, vel à nobis, vel ab alio distantis; Horologia, vel munitiones designare, &c. perficiuntur per triangula: ideo Mathematici quasdam lineas ingeniosissime excogitaverunt, per quas & latera triangulorum, & anguli, imo & ipsæ arcus, prout opus fuerit, ex quibusdam datis sive cognitis, investigantur. Has ergo lineas cum ex ad triangulorum resolutionem sint necessariæ, breviter explicare nos oportet.

DEFINITIONES. †

1. **S**inus alicujus arcus, est linea perpendicularis, cadens ab uno extremo arcus cujus dicitur sinus, in diametrum circuli, ab altero extremo ejusdem arcus ductam.

Coroll. 1. Duo quilibet arcus semicirculum constituentes habent unum eundemq; sinum.

2. *Coroll. 2. Definit. 2.* Sinus quadrantis circuli, sive sinus 90 graduum, est circuli ejusdem semidiameter: & vocatur Sinus totus sive Radius.

3. Complementum arcus, est differentia qua differt idem arcus à quadrante. *A-
pud Autores tamen etiam saepe comple-
mentum arcus quadrante majoris acci-
pitur pro residuo quod deest ad duos re-
ctos, sive ad 180. gradus.*

4. Tangens alicujus arcus, est recta linea diametri extremo perpendiculariter insistens, altera vero sui extremitate terminata, lineâ è centro circuli, per extremitatem arcus cujus est tangens, productâ.

5. Secans, est recta linea è centro circuli per extremitatem arcus cujus est secans
produ-

producta, donec cum tangente ejusdem arcus concurrat.

6. Sinus, tangens, secans, alicujus anguli, est eadem, quæ est sinus tangens secans, arcus illius qui propositum angulum subtendit & mensurat.
7. Sinus versus alicujus arcus (*alijs sagittam vocant*) est pars diametri circuli, inter extremum dati arcus, & sinum ejusdem arcus intercepta.
8. Chorda est recta linea arcum quemcumq; circulearem subtendens.

Pro Harum definitionum pleniori explicatione sit Quadrans circuli *A B C* qui intelligatur divisus in 90. gradus, & singuli gradus intelligantur divisi in 60 scrupula 1. & sic consequenter. In hoc quadrante linea *A B*, quæ est latus quadrantis, sive semidiameter circuli vocatur Radius sive Sinus totus. Hæc supponatur divisa in partes aliquot, vel 100. vel 1000. vel 100000. vel plures; deinde ex puncto *B*, intelligatur ducta *B T*. perpendicularis ad lineam *A B*. Intelligaturque *B T* producta in infinitum, vel ut alij loquuntur quantum sufficit: item ex *A* puncto ex quo tanquam circuli centro propositus quadrans descriptus est, per singulos gradus, & per singula minuta 1. 2. &c. intelligantur aliæ lineæ ductæ, quæ producantur donec concurrant

rant cum linea B T; quales in proposita figura sunt lineæ A E, A F, A G, dicenturque eadem lineæ, secantes eorundem graduum per quos transeunt. Sic linea A E, quæ quadrantem secat in gradu 70 vocatur secans 70. graduum, linea A F, quia quadrantem secat in gradu 60. vocatur secans 60. graduum, & sic de reliquis. Tangentes autem accipiuntur in linea B T, incipiendo à puncto B, & reliquam lineam accipiendo usque ad occursum alicujus secantis, vocaturq; tangens totidem graduum, quot graduū dicitur illa secans, cui tangens occurrit. Sic linea B E. vocatur tangens 70. graduum, linea B F est secans 60 graduum, quia hæc occurrit secanti 60 graduum, illa secanti graduum 70, & sic de reliquis. Iterum in eodem quadrante A B C. ex singulis gradibus & scrupulis peripheriæ quadrantis, intelligantur demissæ perpendiculares ad sinum totum, sive ad radium A B, quales in hac figura sunt lineæ I L, M N, K P, vocantur hujusmodi perpendiculares sinus primi, sive sinus recti, sive simpliciter Sinus totidem graduum, quot graduum est ille arcus, ex cuius extremo illæ perpendiculariter dimittuntur; sic linea I L, dicitur sinus 30. grad. quia dimittitur ex extremo arcus 30. graduum, sic linea M N. est sinus 45. graduum, & linea K P. est sinus

Nus 60. grad. & sic de reliquis. Iterum in
 eodem quadrante A B C, ex singulis gra-
 dibus, & minutis, intelligantur ductæ re-
 ctæ lineæ ad angulos rectos, ad sinus rectos
 eorundem graduum & minutorum, quales
 sunt rectæ K D, M R, I H, Vocantur hujus-
 modi lineæ sinus cõplementi eorundem gra-
 duum sic linea K D est sinus cõplementi 60
 graduũ, & linea M K est sinus complementi
 graduum 45. linea I H est sinus comple-
 menti 30. graduum & sic de reliquis. Quod
 si vero numerationem graduum in eodem
 quadrante inchoamus, non in puncto B
 sed in puncto C. tunc gradus qui facto nu-
 merationis initio in B fuit 70, erit 20,
 facto numerationis initio in C; & secun-
 dum hunc modum numerandi, linea K D,
 erit sinus 30. graduum, linea vero K P, e-
 rit sinus complementi graduum 30. unde
 patet quod est idem esse sinum 30. graduum
 sive esse sinum complementi graduum 60.
 numeri scilicet qui deest ad quadrantem,
 sive ad gradus 90. Est enim complemen-
 tum cujusvis arcus, sive anguli, differentia,
 qua arcus semicirculo minor differt à qua-
 drante, *ut habet definitio 3.* sic arcus 80
 graduum complementum, est arcus gra-
 duum 10, quia 80, distat gradibus 10, à
 90. Item arcus 100 graduum comple-
 mentum etiam est 10. quia centum supe-

rat 90 gradus, gradibus 10. & sic de reliquis: rarius autem est usus complementorum superantium quadrantem, sæpissime vero est usus complementi, quod deest ad complendum quadrantem, sive 90 gradus. Valde autem notandum est, duos quosvis arcus, qui simul sumpti, complent medium circulum, sive 180. gradus, habere eundem sinum, *ut dicitur in Coroll. 1. definitionis prima.* sic sinus 30, graduum, est etiam sinus graduum 150, quia 150, cum 30 gradibus, faciunt 180, sive medium circulum. una ergo eademq; linea subit tria munia, & tres denominationes, sic linea L I, est sinus 30 graduū, eadem est sinus graduum 150, eadē est sinus cōplementi 60 graduum. His prænotatis pro intellectu definitionū, sequitur Tabularū explicatio.

Tabulæ sinuum, tangentium, & secantium, nihil aliud sunt quam tabulæ exhibentes in numeris, proportionēs omnium prædictarum linearum ad invicem, sunt enim hoc modo computatæ. Radius sive sinus totus, sive circuli cujuscunque semidiameter, ponitur divisā in partes æquales tot, quot placuerit, & quæritur quot tales partes, æquales partibus radij, contineat quævis sinus, aut secans, aut tangens. Propter facilitatem autem majorem, tam in computu tabularum, quam in usu illarum,

radius semper ponitur divisus in partes quæ exprimentur unitate cum aliquot cifris, ut in 100. in 1000. 10000. 100000. &c.

Tabulæ quas adjungimus computatæ sunt ratione radij divisi in 100000 partes. In superiori ergo figura linea A B. divisa intelligatur in 100000 partes, si quæram quanta sit linea B F, tangens scilicet gradum 60. inveniam eam continere partes 173205. linea vero A F, secans eorundem 60 graduum, continet partes 200000, tales scilicet, quales A B continet 100000: est ergo linea A F, dupla ipsius A B; linea vero K P, sinns 60 graduum, continet 86603. Continet porro unaquæque pagina tabularum quatuor columnas, in prima columna continentur gradus & minuta, quæ per sena progrediuntur, & in pagina quidem sinistra deorsum, in dextra vero pagina sursum crescunt, qua dispositione habetur, ut pagina altera, semper alterius complementum exhibeat, aliz tres columnæ continent sinus, tangentes, & secantes, gradibus & minutis primæ columnæ competentes. Quod si operatio sit hujusmodi, ut non requirat tam magnos numeros, quanti sunt illi qui in tabulis exhibentur; possumus, servata nihilominus inter eos proportionem, eos minuire, quan-

tum placuerit, reiiciendo scilicet aliquot notas posteriores versus dexteram, hoc modo *Exempli gratia* vellem habere sinum, tangentem, & secantem 25 gr. respectu radij solum 1000 partium, quia ergo ex radio 100000 posito in tabulis, reiicio duas notas, scilicet 00. ut remaneat solum 1000, debeo similiter ex sinu, tangente, & secante repertis in tabulis; abijcere duas ultimas notas versus dextram, tunc residuus numerus, dabit sinum, tangentem, & secantem, quas quærebam, respectu radij solum 1000 partium. *In exemplo posito*, sinus 25 gr. in tabulis ponitur 42262, reiicio duas postremas notas scilicet 62, & remanent 422, sinus quæsitus respectu radij mille partium, sic abjectis 31 duabus postremis notis, è tangente, remanet tangens 466 partium; ex secante abjectis 38, remanet secans 1103 partium. Quod si ex radio solum unicam ultimam notam abjecissem, etiam unica ultima nota ex alijs lineis foret reiicienda, si ex radio tres notas abijcerem, etiam ex alijs lineis tres notæ essent abijciendæ, & sic consequenter. Hoc quidem modo operandi exhibentur sinus, tangentes, & secantes semper iusto minores, propter hanc tamen notarum abjectionem, nunquam plus unitate differunt à veris: minus autem different à

veris, hoc modo, si prima nota versus sinistram ex rejectis, major fuerit quam 5, tunc ad numerum relictum addatur unitas; si vero fuerit vel quinque vel minus quam 5, nihil addatur. Sic in exemplo posito, ex sinu rejecimus 62, cujus prima nota est major quam 5, ideo ad numerum relictum 422, addo unitatem, ut sinus fiat 423, quæ quidem erit major verâ, sed ne quidem media unitate. in tangente vero & secante, nihil addendum, quia utrobiq; prima nota abjectarum minor est quam quinque; & sunt quidem tangens & secans, minores veris; a veris tamen non differunt media unitate. est ergo horum numerorum 1000, 423, 466. 1103, eadem proportio, quæ est istorum 100000.42262, 46631, 110338, quantum ea in numeris integris haberi potest. Et eadem est ratio de usu aliarum tabularum, quæ pro multo adhuc majori radio computatæ sunt.

Pro usu porro tabularum, & triangulorum resolutione quædam adhuc propositiones sunt præmittendæ.

PROPOSITIO 3.

Datis casuacunque Trianguli duobus angulis habetur tertium, & dato uno angulo,

lo, habetur aggregatum duorum reliquorum.

Datum esse angulum hic intelligimus, quando habetur quot graduum vel minutorum, sit angulus propositus. In triangulo ergo ABC , dati sint, angulus A $35.40'$, & angulus B $30.15'$: addantur simul duo dati anguli, proveniunt $65.55'$. quoniam autem per 32. primi cujuscunq; trianguli, omnes tres anguli simul sumpti æquivalēt duobus rectis, hoc est simul sumpti tres arcus, subtendētes angulos tres cujuscunq; trianguli, cōficiunt mediū circulū, hoc est 180 grad. si subtrahantur duo anguli dati ex 180 , residuum dabit angulum tertium quæsitum, in hoc ergo casu subtrahis $65.55'$, ex 180 , sive ex $179.60'$, remanent $114.5'$, quantitas anguli tertij. Ob eandem causam, si unus angulus subtrahatur ex 180 , residuum erit aggregatum duorum reliquorum.

Si sciatur quod triangulus propositus est rectangulus, sufficit nosse quemcunq; acutorum, hoc ipso enim noscuntur duo, rectus scilicet, cujus arcus est quadrans, hoc est 90 grad. & alter acutus qui datur.

Hic modus scribendi $30:40'$ usitatus est apud

apud Astronomos, numerus autem ille cui o superponitur vel cui nulla nota superponitur significat gradus, cui vero superponitur 1 significat minuta sive scrupula prima, cui 11 denotat scrupula 2. Et sic consequenter. Sic hic numerus 20: 25'. 30". 40". significat 20. gradus, 25. scrupula prima, 30. scrupula secunda, 40. scrupula tertia.

PROPOSITIO. 4.

In omni triangulo rectilineo latera quodvis duo, se habent ad invicem ut sinu angulorum ipsis oppositorum.

Primo Datum sit triangulum A B C, rectangulum ad A si radius sit C D, quæ est æqualis C B, erit B A sinus arcus B D, sive anguli C per 1. Et 6. def. posita vero B E pro radio, quæ etiam est æqualis B C, erit C A sinus arcus C E, sive anguli C B E, ergo.

Secundò Datum sit triangulum non rectangulum D E F, & centro F intervallo F E, descriptus arcus E G, & ex puncto E demissa perpendicularis E H, erit E H sinus arcus E G, per def. 1. hoc est anguli F per def. 6. sit deinde producta D E in I, ut D I, sit æqualis F G, & centro D, intervallo D I, descriptus arcus I K, & ex puncto I demissa perpendicularis I L, erit I L sinus anguli D, respectu radij D K, qui est

æqualis radio FG , sed est ut DE ad DI , ita EH ad IL per 4. *sextri*: DI autem per constructionem est æqualis FG , sive FE , ergo ut DE latus subtendens angulum F , ad EF latus subtendens angulum D ; ita EH sinus anguli F , ad IL sinum anguli D .

Quod si loco anguli acuti D , demonstrandum sit de angulo obtuso EMF , tunc producat FM & centro E , apertura EM , describatur arcus MD secans productam FM in D , ducaturq; ED eritq; ED æqualis lineæ EM , erit igitur angulus D , æqualis angulo EMD , per 5. *pri.* ac proinde IL quæ est sinus anguli D , erit etiam sinus anguli EMD , respectu scilicet ejusdem radij FE supra positi: sed anguli EMD , EMF , habent eundem sinum per coroll. 1. *def. prima*, ergo erit iterum ut IL sinus anguli EMF , ad EH sinum anguli F , ita EF latus oppositum angulo EMF , ad EM latus oppositum angulo F ergo universim, &c.

Ex his propositionibus deducuntur praxeres resolutionis triangulorum rectilineorum.

Docemus itaque aliquot exemplis ex adjunctis tabulis ipsas lineas aut arcus quorum fuerit usus, invenire.

I.

Dati arcus quadrante minoris sinum invenire.

Arcus

Arcus omnes usq; ad arcum medij quadrantis sive 45. graduum notati habentur in prima columna sinistræ pagellæ cum minutis adjectis, in proxima columna habetur sinus cuiq; gradui & minuto primæ columnæ correspondens sic folio 233. invenio sinum 23, 18'. 39555. Reliqui gradus à 45. ad 90. à fine versus initium redeundo inveniuntur, in prima colūna dextræ pagellæ. Adjecta minuta supra gradū datū accipi debent: & sic etiam in proxima columna, adjacet sinus ipsis cōpetens, sic in prima facie folij 234 invenio sinum correspondentem 66, 42'. esse 91845 sunt autem 66, 42' complementum 23 & 18' qui in opposita pagella è regione reperiuntur gradus enim unius pagellæ, semper sunt complementum graduum in altera pagella sibi oppositorum. 2.

Sinum complementi arcus quadrante minoris reperire.

Cum complementum ut dictum est *defin. 3.* sit differentia qua arcus aliquis differt à quadrante; inveniantur gradus quibus datus arcus differt à quadrante, sinus ipsis competens, erit sinus quæsitus.

3.

Sinus arcus quadrante majoris reperire.

Cum per *Coroll. 1. definitionis 1.* duo quilibet arcus semicirculum confi-

tuentes habeant unum eundemque sinum, quærantur gradus quibus arcus propositus differt à semicirculo, & sinus ipsis competens, erit sinus quæsitus.

4.

Sinum Versum arcus invenire.

Si arcus est quadrante minor, detrahe ejus sinum complementi à sinu toto, residuum erit sinus versus, si verò arcus est quadrante major, sed tamen semicirculo minor adde ejus sinum complementi sinui toti, conflatum ex utroque, erit sinus versus quæsitus. 5.

Ex sinu cognito arcum correspondentem cognoscere.

Quia idem sinus competit duobus arcibus, ut ex ipso sinu cognito, determinetur arcus, oportet præterquam datus sit sinus, etiam datam esse saltem speciem arcus quæsitæ, hoc est, an sit quadrante major, vel minor, si itaque arcus fuerit quadrante minor, quære sinum datum in tabulis & in columna graduum adjacente, indicabitur quantitas arcus quæsitæ. Si verò arcus fuerit quadrante major, gradus jam dicto modo reperti, detrahantur ex semicirculo, residuum erit quantitas arcus quæsitæ.

Quod si sinus datus præter hoc non inveniatur inter sinus tabulæ, signum est neque arcum

arcum præcise quæsitum in ipsa tabula reperiri; sumendus itaq; sinus proximè major, vel minor numero dato, & sic etiam arcus correspondens, erit arcus proximè major vel minor arcu quæsito. Si tamen cupis arcum præcisorem, cape differentiam inter sinum proximè majorem, & proximè minorem, item differentiam inter sinum propositum, & illum in tabula repertum à quo minus differt, & dic si differentia inter duos suos in tabula repertos, dat 6 minuta addenda arcui sinus proximè minoris, ut habeatur arcus sinus proximè majoris; vel subtrahenda ab arcu sinus proximè majoris, ut habeatur arcus sinus proximè minoris: quot minuta postulat differentia inter sinum propositum, & sinum proximè minorem, vel majorem; addenda arcui sinus proximè minoris, vel auferenda ab arcu sinus proximè majoris, ut habeatur arcus sinus propositi. Nam hæc minuta juventa, addita arcui sinus proximè minoris (si propositus sinus paucioribus unitatibus ab hoc differt) vel ablata ab arcu sinus proximè majoris, (si ab hoc minus distat sinus propositus) dabunt arcum sinus propositi magis præcisum. Hac methodo, habitis tabulis plenioribus, in quibus habentur omnia minuta, si quis solis minutis contentus esse nolit,

lit, sed etiam ipsa secunda habere desideret, poterit juxta præscriptum modum operando, etiam ipsa secunda invenire, & ea est causa cur eam hic judicaverim explicandam.

6.

Ex sinu complementi dato, arcum colligere.

O Portet insuper scire, an arcus quæsitus sit quadrante major, vel minor, propter rationem datam in praxi præcedenti. Si itaque arcus quæsitus fuerit quadrante minor, inveniatur in tabula sinus datus, & gradus in opposita pagella, dicto sinui correspondentes, erunt quantitas arcus quæsitus. Si vero arcus quæsitus fuerit quadrante major: juvento sinu proposito in tabella, gradus in eadem pagellâ ipsi correspondentes, detrahantur ex semicirculo, residuum erit arcus quæsitus.

7.

Ex sinu verso cognito, arcum cognoscere.

SI datus sinus versus minor est Radio, datrahe eum ex Radio, residuum erit sinus complementi ipsius arcus quæsitus, quem propterea invenies *per praxim præcedentem*. Si vero sinus versus datus fuerit major Radio, detrahe Radium ex sinu verso dato, remanebit sinus arcus qui quadranti adjectus, arcum quæsitum conficiet.

8. Chor-

8.

Chordam cujuscumq; arcus, & contra arcum chorda cujuscumq; reperire.

Si diuidij arcus propositi sinus accipiat, & duplicetur, habebitur chorda dati arcus. Item si data chorda accipiat diuidium, & per columnam sinuum quæ ratur arcus tali sinui competens, dabit hic arcus duplicatus, arcum data chordæ respondentem.

Ex his facile est colligere modum, ex tabulis Tangentium & secantium, vel Tangentes vel secantes, vel arcus ipsis competentes prout opus fuerit quærendi, & inueniendi.

Sequentes praxes docent ipsam triangulorum resolutionem & primo de Rectangulis.

Nota primo per Basim semper hic intelligi latus angulo majori oppositum.

Nota secundo. Ipsam operationem ut peragi debet secundum regulam proportionis Arithmeticam, diverso caractere impressam esse, ut omilla demonstratione, statim pateat quomodo ipsa operatio sit peragenda, in qua membrum quarto loco positum semper est ipsum quæsitum.

9.

Habentur proportionales laterum; Ex datis omnibus angulis cujusvis trianguli.

Singulis enim lateribus adscribantur sinus angulorum oppositorum, latera enim easdem habent proportionales quam dicti sinus *per 4.*

10.

Invenitur latus quodlibet, ex data base & alterutro angulorum acutorum in triangulo rectangulo ABC.

Data enim sit basis AC, cum angulo A, habebitur ergo etiam angulus C *per 3.* & quia est *per 4.* Ut radius, ad sinum anguli apppositi lateri, quæsito; ita basis AC, ad latus quæsitum, erit *permutando.*

<i>V: radius --</i>	<i>-- ad Basem AC.</i>
<i>Ita sinus alterutrum --</i>	<i>ad latus eidem angulo oppositum.</i>

11.

Invenitur latus ex data base, & altero latere.

Sit in eodem triangulo ABC, data basis AC, & latus AB, quia est ut AC ad AB; ita radius ad sinum anguli C *per 4.* erit *permutando*

Ut AC basis data -- ad Radium

ita

est *AB* latus da-
rum

ad sinum angu-
li *C*.

Invento ergo in numeris sinu anguli *C*,
quærat^{ur} inter sinus dictus numerus, &
habebitur quantitas anguli *C*, & simul an-
gulus *A* per 3. unde reliqua invenientur
per præcedentem.

12.

*Ex uno latere dato, & uno angulo acuto,
ac proinde etiam altero, invenitur alter-
rum latus.*

IN eodem enim triangulo *ABC*, posi-
to quocunque latere pro radio, alte-
rum latus est tangens anguli sibi opposi-
ti per 4. def. latus ergo quæsitum sit. *AB*
quia est ut Radius, ad tangentem anguli
C, ita *CB* latus datum, ad *AB* latus quæ-
situm; erit permutando

*Ut radius -- -- ad CB latus datum
ita tangens an- -- ad AB latus quæsi-
tuli C. rum.*

13.

Ex iisdem datis invenitur basis, quia
posito *CB* pro radio, basis *AC* est se-
cans anguli *C*; posito vero *AB* pro ra-
dio, eadem *AC* est secans anguli *A* per
5. definit. erit ergo permutando ut su-
pra

214 Trigonometria

*Ut Radius -- -- ad CB latu da-
rum
ita secans an- -- -- ad AC basim
guli C. quasitam.*

14.

EX dato utroq; latere, inveniantur an-
guli acuti, & deinde per precedentem
invenitur basis, Erit enim ut supra per-
mutando

*Ut latu AB -- -- ad radium
ita latu BC -- -- ad tangentem an-
guli A*

Quærat ergo tangens sic inventa in-
ter tangentes, & correspondebit ipsi in
gradibus quantitas anguli A, cujus com-
plementum est Angulus C, habitis ergo
angulis, quærat basis AC per preceden-
tem.

15.

EX data Base & uno latere invenian-
tur anguli, & alterum latu, erit enim
ut supra permutando

*Ut Basis -- -- ad Radium
ita latu da -- -- ad sinum anguli
sum dato latere
oppositi*

Invento itaque dicto sinu, ex tabulis in-
venietur

venietur angulus ipsi competens, & complementum erit angulus alter: quibus habitis per 12. proxime invenitur alterum latus.

De Triangulis Rectilineis non reſtan-
gulis.

16.

Sit triangulum LOP , nullum habens angulum rectum, datum sit unum latus, & duo anguli, & notum sit cui angulo latus datum opponatur. tertius angulus innotescit per 3. hujus, reliqua duo latera sic habentur, latus datum sit LP quia est per 4. hujus, ut sinus anguli O , ad sinum anguli P ; ita latus LP , ad latus LO , permutando fiat.

Ut sinus anguli O -- ad latus LP
ita sinus anguli P -- ad latus LO qua-
situm

Eodem modo invenietur latus OP .

17.

Ex duobus lateribus & angulo uni eorum opposito, si constet species anguli, alteri dato lateri oppositi, inveniantur reliqui duo anguli, & tertium latus.

Datum

Datum sit latus $L P$, & latus $L O$; & angulus O oppositus sit lateri $L P$, erit iterum *permutando*

Ut Latus $L P$ -- ad sinum anguli O

ita Latus $L O$ -- ad sinum anguli P

Invento igitur sinu anguli P ex tabulis, habebitur ipse angulus P , & reliqua *per praxim 16.*

18.

Ex datis tribus lateribus inveniantur segmenta à perpendiculari facta.

Trianguli $A B C$ data sint tria latera, inquirendum sit in quod punctum lateris $B C$, cadat $A D$ perpendicularis ex Angulo A , demissa, quæ aliquando cadit intra triangulum, ut in prima figura, aliquando extra ut in 2. fiat

Ut latus $B C$ In -- ad summam duorum
quod cadit per -- aliorum laterum
pendicularis

Ita differentia eorum -- ad quartum alium
dem duorum la -- numerum.
terum.

Si quartus numerus inventus minor est latere in quod cadit perpendicularis, signum est perpendicularem cadere intra ipsum triangulum; auferendus ergo erit dictus quartus numerus inventus ex dicto latere;

latere, semissis enim reliqui numeri, dabit segmentum minus : quod ex toto latere subductum, relinquet segmentum majus. Si verò quartus numerus inventus, major est latere in quod cadit perpendicularis, signum est perpendicularem cadere extra triangulum : auferendum ergo erit illud latus, ex quarto numero invento : semissis enim reliqui numeri, dabit segmentum exterius interjectum inter ipsam perpendicularem, & ipsum triangulum.

Pro Demonstratione, Ex A ad intervallum minoris lateris AB, descriptus sit circulus, secans majus latus AC in F, idemque productum in G : & latus BC, si perpendicularis intra triangulum cadit, vel certe si extra cadit, ipsum productum in E, sectaq; erit recta BE, bifariam in D per 3. tertij. quia verò rectangulum sub BC, CE, æquale est rectangulo sub GC, CF, per coroll. 1. propositionis 36. tertij, erit ut BC latus in quod perpendicularis cadit, ad GC summam aliorum laterum, ita CF differentia eorundem laterum, ad CE : quare quando CE est minor quam BE latus in quod perpendicularis cadit, ut est in prima figura, ablata CE ex BC, residuum est BE, cujus dimidium DB, est segmentum minus &c :

ut dictum est in praxi. Quando vero CE , est major quam latus CB , *ut est in 2 figura*, ablato latere BC , ex CE , residuum est BE , cujus dimidium est DB , segmentum exterius interjectum inter ipsam perpendicularem, & ipsum triangulum, *quod etiam in praxi dictum fuit* $\square$ *erat demonstrandum.*

19.

Ex datis tribus lateribus inveniuntur tres anguli.

Intelligatur ducta perpendicularis ex angulo, maximo lateri opposito, ut scilicet perpendicularis semper cadat intra triangulum *ut fit in prima figura praxis precedentis*, & inveniantur segmenta duo maximi lateris *per eandem praxim precedentem*, hoc est CD , & BD , quare *per praxim 15* invenietur & angulus C trianguli ADC , & angulus B trianguli ADB ; addantur ergo simul anguli B & C , & residuum ad duos rectos dabit angulum BAC *per 3.*

20.

Ex tribus datis lateribus invenitur perpendicularis.

Per

Per *praxim* enim 18. invenitur CD , & AC est latus datum, unde per *praxim* 11 invenitur AD tertium latus trianguli ADC , quod idem est cum perpendiculari quaesita.

21.

Ex datis duobus lateribus, & angulo ab ipsis comprehenso, tertium latus invenitur.

Si data duo latera sint invicem aequalia, res est facilis, subtracto enim angulo dato ex 180, residuum dabit summam reliquorum duorum angulorum per 3 *hujus* sunt autem dicti duo reliqui anguli invicem aequales per 5 *primi*, dimidium ergo dictae summæ dabit nunquamque illorum; quare omnes tres anguli erunt notis quare per *praxim* 16 invenietur latus ignotum. Quod si datus angulus sit rectus erit casus positus in *praxi* 14. Si vero latera sint inaequalia & angulus non rectus fiat.

<i>Ut semissis aggregati duorum laterum dato-</i>	<i>ad tangentem semissis aggregati duorum angulorum ignoto-</i>
<i>rum</i>	<i>rum,</i>

ita differentia in -- ad tangentem differ-
 ter semissem ag- ventia inter se-
 gregati duorum missam aggrega-
 laterum datorum, ri duorum angu-
 Et utrumlibet lorum ignotorum,
 laterum Et alterutrum il-
 lorum.

Unde arcus qui ex tabulis tangentium, invenietur correspondere huic tangenti; hoc modo inventæ, additus ad semissem aggregati duorum angulorum ignotorum, dabit angulum majorem, vel subtractus ex eadem semisse dabit angulum minorem, invento ergo hoc modo alterutro angulorum ignotorum, tertius etiam habetur per 3 hujus, quibus habitis latus quod quærebatur invenietur per prax. 16.

Lemma subserviens demonstrationi hujus praxis.

SI Diameter AC chordam quamlibet BD secuerit in E quomodocunq, ejusq, arcum BAD , in A , vel BCD , in C , Dico segmentum chordæ BE esse ad segmentum ED , ut sinus arcus BC (qui idem est cum sinu arcus BA per coroll. 1. prima def.) ad sinum arcus AD . Ex B enim & D , demittantur BF , DG perpendiculares ad diametrum

metrum AC; eritq; BF sinus arcus BC & DG sinus arcus DA *per 1. def.* & propter similitudinem triangulorum BEF, DEG: erit ut BE ad ED ita BF, ad DG *per 4. sexti.*

Demonstratio praxi precedentis.

IN triangulo LOP, data sint latera, LO partium 10, & LP partium 20, & angulus L graduum 50. aggregatum ergo duorum angulorum O, P, simul, erit 130 *per 3 hujus.* In circulo ABCD cujus centrum sit E, angulus BED sit 130 graduum, hoc est quantum est aggregatum angulorum P & O simul, ductâ chordâ BD, dividatur BD in G, ut sit, ut latus LP, ad latus LO, ita BG ad GD, *per 10 sexti* & ex centro E, educta EG, producta sit in F; Dico angulum BEF æqualem esse angulo O trianguli propositi, & angulum FED, æqualem esse angulo P ejusdem trianguli. Est enim *per lemma præcedens* ut BG ad GD, ita sinus anguli BEF, ad sinum anguli FED; sed ut BG ad GD, ita latus LP, ad latus LO *per constructionem*; ergo ut latus LP ad latus LO ita sinus anguli BEF ad sinum anguli FED; ergo *per 4 hujus* sinus angulorum BEF, & FED sunt etiam sinus an-

gulorum O & P, ac proinde anguli B E F, & F E D, sunt æquales angulis O & P: quare inventis angulis B E F, F E D, etiam inventi erunt anguli O & P, illos autem sic inveniemus, Quoniam data est proportio lateris L P, ad latus L O, ut 20 ad 10, erit etiam proportio B G ad G D ut 20 ad 10, posita ergo B G 20, G D erit 10, & tota B D erit 30, divisa deinde tota B D bifariam in H, productaque E H in A, erit totus arcus B A D, divisus bifariam in A, *ut patet ex demonstratione 30 terrij*, eritque utraque B H, H D 15, & differentia inter semissem totius B D, & utrumlibet segmentum, scilicet, linea H G erit 5; quia autem totus arcus B A D, ponitur 130 erit utraq; semissis B A, B D, 65, ac proinde etiam uterq; angulus B E A, A E D erit quoq; graduum 65 *per dicta ad propositionem 2.* & quoniam, posito E H pro radio, H B est tangens anguli B E H, & H G tangens anguli H E G *per def. 4.* dabitur ex tabulis tangentium ad gradum 65, ipsa B H partium 214451 quare ut tangentem anguli H E G inveniamus, scilicet H G, in partibus homologis cum partibus tangentis B A, fiat.

Ut B H 15. semissis -- ad B H 214451
totius B D, hoc tangentem se-
est aggregati missis aggregati
terminorum angulorum B E F,
proportionis da- F E D.
ta.

Ita H G 5 differen- -- ad H G 71484
sia inter semis- tangentem an-
sem aggregati guli A E F qui
terminorum pro- est differentia
portionis data, & inter angulos
utrumlibet co- B E F, F E D.
rundem termi- norum.

Ex tabula ergo, tangentium elicietur
 angulus A E F 35 gr. 34 min. ferè, qui ad-
 ditus ad 65, semissim scilicet aggregati
 angulorum B E F, F E D dabit angulum
 majorem B E F, qui ostensus est æqualis
 angulo C. & reliqua ut in praxi dictum est,
 & erat demonstrandum.

TABU.

TABULÆ

SINUUM

TANGENTIUM

E T

SECANTIUM

Ad partes radij 100000.
per Sex prima scrupula
graduum.

0	0	0	100000
6	175	175	100000
12	349	349	100001
18	524	524	100001
24	698	698	100002
30	873	873	100004
36	1047	1047	100005
42	1222	1222	100007
48	1396	1396	100010
54	1571	1571	100012
	*	*	*
I	1745	1745	100015
6	1920	1920	100018
12	2094	2095	100022
18	2269	2269	100026
24	2443	2444	100030
30	2618	2619	100034
36	2792	2793	100039
42	2967	2968	100044
48	3141	3143	100049
54	3316	3317	100055
	*	*	*
2	3490	3492	100061
6	3664	3667	100067
12	3839	3842	100074
18	4013	4016	100081
24	4188	4191	100088
30	4362	4366	100095
36	4536	4541	100103
42	4711	4716	100111
48	4885	4891	100120
54	5059	5066	100128

Sinus Tangens Secans

90	0	0	0
54	99999	57295720	57295809
48	99999	28647774	28647948
42	99999	19098419	19098681
36	99998	14323712	14324061
30	99996	11458865	11459301
24	99995	9548948	9549471
18	99993	8184704	8185315
12	99990	7161507	7162205
6	99988	6365674	6366460
89	*	*	*
	99985	5728996	5729869
54	99982	5208067	5209027
48	99978	4773950	4774997
42	99974	4406611	4407746
36	99970	4091741	4092963
30	99966	3818846	3820155
24	99961	3580055	3581452
18	99956	3369351	3370835
12	99951	3182052	3183623
6	99945	3014462	3016120
88	*	*	*
	99939	2863625	2865371
54	99933	2727149	2728981
48	99926	2603074	2604994
42	99919	2489783	2491790
36	99912	2385928	2388022
30	99905	2290377	2292559
24	99897	2202171	2244440
18	99889	2120495	2122852
12	99881	2044649	2047093
6	99872	1974029	1976560

227	<i>Sinus</i>	<i>Tangens</i>	<i>Secans</i>
3	5234	5241	100137
6	5408	5416	100147
12	5582	5591	100156
18	5756	5766	100166
24	5931	5941	100176
30	6105	6116	100187
36	6279	6291	100198
42	6453	6467	100209
48	6627	6642	100220
52	6802	6817	100232
	*	*	*
4	6976	6993	100244
6	7150	7168	100257
12	7324	7344	100269
18	7498	7519	100282
24	7672	7695	100296
30	7846	7870	100309
36	8020	8046	100323
42	8194	8221	100337
48	8368	8397	100352
54	8542	8573	100367
	*	*	*
5	8716	8749	100382
6	8889	8925	100397
12	9063	9101	100413
18	9237	9277	100429
24	9411	9453	100446
30	9585	9629	100463
36	9758	9805	100480
42	9932	9981	100497
48	10106	10158	100515
54	10279	10334	100533

Sinus

Tangens

Secans

87	99863	1908114	1910732
84	99854	1846447	1849153
48	99844	1788631	1791424
42	99834	1734315	1737196
36	99824	1683191	1686159
30	99813	1634986	1638041
24	99803	1589454	1592597
18	99792	1546381	1549611
12	99780	1505572	1508890
6	99768	1466853	1470258
	*	*	*
86	99756	1430067	1433559
84	99744	1395072	1398650
48	99731	1361741	1365408
42	99719	1329957	1333712
36	99705	1299616	1303458
30	99692	1270620	1274549
24	99678	1242883	1246900
18	99664	1216324	1220427
12	99649	1190868	1195060
6	99635	1166450	1170728
	*	*	*
85	99619	1143005	1147371
84	99604	1120478	1124932
48	99588	1098815	1103356
42	99572	1077967	1082596
36	99556	1057890	1062605
30	99540	1038540	1043343
24	99523	1019879	1024770
18	99506	1001871	1006849
12	99488	984482	989547
6	99470	967680	972833

228.	<i>Sinus</i>	<i>Tangens</i>	<i>Secans</i>
6	10453	10510	100551
6	10626	10687	100569
12	10800	10863	100588
18	10973	11040	100608
24	11147	11217	100627
30	11320	11394	100647
36	11494	11570	100667
42	11667	11747	100688
48	11840	11924	100708
54	12014	12101	100730
	*	*	*
7	12187	12278	100751
6	12360	12456	100773
12	12533	12633	100795
18	12706	12810	100817
24	12880	12988	100840
30	13053	13165	100863
36	13226	13343	100886
42	13399	13521	100910
48	13572	13698	100934
54	13744	13876	100958
	*	*	*
8	13917	14054	100983
6	14090	14232	101008
12	14263	14410	101033
18	14436	14588	101059
24	14608	14767	101084
30	14781	14945	101111
36	14954	15124	101137
42	15126	15302	101164
48	15299	15481	101191
54	15471	15660	101219

*Sinus**Tangens**Secans*

84	99452	951436	956677
54	99434	935724	941052
48	99415	920516	925931
42	99396	905789	911292
36	99377	991520	897111
30	99357	877689	883367
24	99337	864275	870041
18	99317	851259	857113
12	99297	838625	844566
6	99276	826355	832384
	*	*	*
83	99255	814435	820551
54	99233	802848	809052
48	99211	791582	797873
42	99189	780622	789001
36	99167	769957	776424
30	99144	759576	766130
24	99122	749465	756107
18	99098	739616	746346
12	99075	730018	736835
6	99051	720661	727566
	*	*	*
82	99027	711537	718530
54	99002	702637	709717
48	98978	693952	701120
42	98953	685475	692731
36	98927	677199	684542
30	98902	669116	676547
24	98876	661219	668738
18	98849	653503	661110
12	98823	645960	653655
6	98796	638587	646369

229	Sinus	Tangens	Secans
9	15643	15838	101247
6	15816	16017	101275
12	15988	16196	101303
18	16160	16376	101332
24	16333	16555	101361
30	16505	16734	101391
36	16677	16914	101420
42	16849	17093	101450
48	17021	17273	101481
54	17193	17453	101512
60	17365	17633	101543
6	17537	17813	101574
12	17708	17993	101606
18	17880	18173	101638
24	18052	18353	101670
30	18224	18534	101703
36	18395	18714	101736
42	18567	18895	101769
48	18738	19076	101803
54	18910	19257	101837
60	19081	19438	101872
6	19252	19619	101906
12	19423	19801	101941
18	19595	19982	101977
24	19766	20164	102013
30	19937	20345	102049
36	20108	20527	102085
42	20279	20709	102122
48	20450	20891	102159
54	20620	21073	102196

*Sinus**Tangens**Secans*

81	98769	631375	639245
54	98741	624321	632279
48	98714	617419	625464
42	98686	610664	618797
36	98657	604051	612273
30	98629	597576	605886
24	98600	591236	599633
18	98570	585024	593509
12	98541	578938	587511
6	98511	572974	581635
	*	*	*
80	98481	567129	575877
54	98450	561397	570234
48	98420	555776	564701
42	98388	550264	559277
36	98357	544857	553958
30	98325	539552	548741
24	98294	534345	543622
18	98261	529235	538600
12	98229	524219	533671
6	98196	519293	528834
	*	*	*
79	98163	514455	524084
54	98129	509704	519421
48	98096	505037	514842
42	98061	500451	510344
36	98027	495945	505926
30	97992	491516	501585
24	97958	487162	497320
18	97922	482882	493128
12	97887	478673	489007
6	97851	474534	484956

230	<i>Sinus</i>	<i>Tangens</i>	<i>Secans</i>
12	20791	21256	102234
6	20962	21438	102272
12	21132	21621	102311
18	21303	21804	102349
24	21474	21986	102388
30	21644	22169	102428
36	21814	22353	102468
42	21985	22536	102508
48	22154	22719	102548
54	22325	22903	102589
	*	*	*
13	22495	23087	102630
6	22665	23271	102672
12	22835	23455	102714
18	23005	23639	102756
24	23174	23823	102799
30	23345	24008	102842
36	23514	24193	102885
42	23684	24377	102928
48	23853	24562	102972
54	24023	24747	103017
	*	*	*
14	24192	24933	103061
6	24361	25118	103106
12	24531	25304	103152
18	24700	25490	103197
24	24869	25676	103244
30	25038	25862	103290
36	25207	26048	103337
42	25376	26235	103384
48	25545	26421	103432
54	25713	26608	103479

*Sinus**Tangens**Secans*

78	97815	470463	480973
54	97778	466458	477057
48	97742	462518	473205
42	97705	458641	469417
36	97667	454826	465690
30	97630	451071	462023
24	97592	447374	458414
18	97553	443735	454863
12	97515	440152	451368
6	97476	436623	447928
	*	*	*
77	97437	433148	444541
54	97398	429724	441206
48	97358	426352	437923
42	97318	423030	434689
36	97278	419756	431503
30	97237	416530	428366
24	97196	413350	425275
18	97155	410216	422229
12	97113	407127	419228
6	97072	404081	416271
	*	*	*
76	97030	401078	413357
54	96987	398117	410484
48	96945	395196	407652
42	96902	392316	404860
36	96858	389474	402107
30	96815	386671	399393
24	96771	383906	396716
18	96727	381177	394076
12	96682	378485	391473
6	96638	375828	388904

231	Sinus	Tangens	Secans
15	25882	26795	103528
6	26050	26982	103576
12	26219	27169	103625
18	26387	27357	103674
24	26556	27545	103724
30	26724	27732	103774
36	26892	27920	103825
42	27060	28109	103875
48	27228	28297	103927
54	27396	28486	103978
	*	*	*
16	27564	28675	104030
6	27731	28863	104082
12	27899	29053	104135
18	28067	29242	104188
24	28234	29432	104241
30	28401	29621	104295
36	28569	29811	104349
42	28736	30001	104403
48	28903	30192	104458
54	29070	30382	104514
	*	*	*
17	29237	30573	104569
6	29404	30764	104625
12	29571	30955	104682
18	29737	31147	104738
24	29904	31338	104795
30	30071	31530	104853
36	30237	31722	104911
42	30403	31914	104969
48	30570	32106	105028
54	30736	32299	105087

Sinus

Tangens

Secans

75	96593	373205	386370
54	96547	370616	383871
48	96502	368061	381404
42	96456	365538	378970
36	96510	363048	376568
30	96463	360588	374198
24	96316	358160	371858
18	96269	355761	369548
12	96222	353393	367269
6	96174	351053	365018
	*	*	*
74	96126	348742	362796
54	96078	346458	360601
48	96029	344202	358435
42	95981	341973	356295
36	95931	339771	354181
30	95882	337594	352094
24	95832	335443	350032
18	95782	333317	347995
12	95732	331216	345983
6	95681	329139	343995
	*	*	*
73	95630	327085	342030
54	95579	325055	340089
48	95528	323048	338170
42	95476	321063	336276
36	95424	319100	334402
30	95372	317159	332551
24	95319	315240	330721
18	95266	313341	328912
12	95213	311464	327123
6	95159	309606	325355

232	Sinus	Tangens	Secans
18	30902	32492	105146
6	31068	32685	105206
12	31233	32878	105266
18	31399	33072	105327
24	31565	33266	105388
30	31730	33460	105449
36	31896	33654	105511
42	32061	33848	105573
48	32227	34043	105636
54	32392	34238	105699
	*	*	*
19	32557	34433	105762
6	32722	34628	105826
12	32887	34824	105890
18	33051	35019	105955
24	33216	35216	106019
30	33381	35412	106085
36	33545	35608	106151
42	33710	35805	106217
48	33874	36002	106287
54	34038	36199	106350
	*	*	*
20	34202	36397	106418
6	34366	36595	106486
12	34530	36793	106554
18	34694	36991	106622
24	34857	37190	106691
30	35021	37388	106761
36	35184	37588	106831
42	35347	37786	106901
48	35511	37986	106972
54	35674	38186	107043

*Sinus**Tangens**Secans*

72	95106	307768	323602
54	95052	305950	321878
48	94997	304152	320169
42	94943	302372	318479
36	94888	300611	316808
30	94832	298868	315154
24	94777	297144	313519
18	94721	295437	311902
12	94665	293748	310303
6	94609	292076	308721
	*	*	*
71	94552	200421	307155
54	94495	288783	305607
48	94438	287161	304075
42	94380	285555	302559
36	94322	283965	301959
30	94264	282391	299574
24	94206	280833	298106
18	94147	279289	296652
12	94088	277761	295213
6	94029	276247	293790
	*	*	*
70	93969	274748	292380
54	93909	273263	290985
48	93849	271792	289605
42	93789	270335	288238
36	93728	268892	286885
30	93667	267462	285545
24	93606	266046	284219
18	93544	264642	282906
12	93483	263252	281605
6	93420	261874	280318

233

Sinus

Tangens

Secans

21

35837

38386

107114

6

36000

38587

107186

12

36162

38787

107259

18

36325

38988

107332

24

36488

39190

107405

30

36650

39391

107479

36

36812

39593

107553

42

36975

39795

107627

48

37137

39997

107702

54

37299

40200

107778

22

37461

40403

107853

6

37622

40606

107930

12

37784

40809

108006

18

37946

41013

108084

24

38107

41217

108161

30

38268

41421

108239

36

38430

41626

108318

42

38591

41831

108397

48

38752

42036

108476

54

38912

42242

108556

23

39073

42447

108636

6

39234

42654

108717

12

39394

42860

108798

18

39555

43067

108880

24

39715

43274

108962

30

39875

43481

109044

36

40035

43689

109127

42

40195

43897

109211

48

40355

44105

109294

54

40514

44314

109379

	<i>Sinus</i>	<i>Tangens</i>	<i>Secans</i>
69	93358	260509	279043
4	93295	259156	177780
8	93232	257815	276530
42	93169	256487	275292
36	93106	255170	274065
30	93042	253865	272850
24	92978	252571	271647
18	92913	251282	270455
12	92849	250018	269275
6	92784	248758	268105
	*	*	*
68	92718	247509	266947
54	92653	246270	265799
48	92587	245043	264662
42	92521	243825	263535
36	92455	242618	262419
30	92388	241421	261313
24	92321	240235	260217
18	92254	239058	259130
12	92186	237891	258054
6	92119	236733	256988
	*	*	*
67	92050	235585	255931
54	91982	234447	254883
48	91914	233317	253844
42	91845	232197	252815
36	91775	231086	251795
30	91706	229984	250784
24	91636	228891	249782
18	91566	227806	248789
12	91496	226730	247804
6	91425	225663	246827

234

Sine

Tangens

Secans

24

40674

44523

109464

6

40833

44732

109549

12

40992

44942

109635

18

41151

45152

109721

24

41310

45362

109808

30

41469

45573

109895

36

41628

45784

109982

42

41787

45995

110071

48

41945

46207

110159

54

42104

46418

110248

*

*

*

25

42262

46631

110338

6

42420

46843

110428

12

42578

47056

110518

18

42736

47270

110609

24

42894

47484

110701

30

43051

47698

110793

36

43209

47912

110885

42

43366

48127

110978

48

43523

48342

111072

54

43680

48557

111166

*

*

*

*

26

43837

48773

111260

6

43994

48989

111355

12

44151

49206

111451

18

44307

49423

111547

24

44464

49640

111643

30

44620

49858

111740

36

44776

50076

111838

42

44932

50295

111936

48

45088

50514

112034

54

45243

50733

112133

Sine

Tangens

Secans

66

91355

224604

245859

4

91283

223553

244900

8

91212

222510

243948

12

91140

221475

243005

16

91068

220449

242070

20

90996

219430

241142

24

90924

218419

240222

28

90851

217416

239311

32

90778

216420

238406

36

90704

215432

237509

*

*

*

65

90631

214451

236621

4

90557

213477

235738

8

90483

212511

234863

12

90408

211552

233996

16

90334

210599

233135

20

90259

209654

232282

24

90183

208716

231436

28

90108

207785

230596

32

90032

206860

229763

36

89956

205942

228937

*

*

*

64

89879

205030

228115

4

89803

204125

227304

8

89726

203227

226498

12

89649

202335

225697

16

89571

201449

224903

20

89493

200569

224116

24

89415

199695

223334

28

89337

198828

222559

32

89259

197966

221790

36

89180

197111

221026

235	<i>Sinus</i>	<i>Tangens</i>	<i>Secans</i>
27	45399	50953	11223 [*]
6	45554	51173	11232
12	45710	51393	11243
18	45865	51614	112534
24	46020	51835	112636
30	46175	52057	112738
36	46330	52279	112841
42	46484	52501	112944
48	46639	52724	113048
54	46793	52947	113152
	*	*	*
28	46947	53171	113257
6	47101	53395	113362
12	47255	53620	113468
18	47409	53844	113575
24	47562	54070	113682
30	47716	54296	113789
36	47869	54522	113897
42	48022	54748	114006
48	48175	54975	114115
54	48328	55203	114225
	*	*	*
29	48481	55431	114335
6	48634	55659	114446
12	48786	55888	114558
18	48938	56117	114670
24	49090	56347	114782
30	49242	56577	114896
36	49394	56808	115009
42	49546	57039	115124
48	49697	57271	115238
54	49849	57503	115354

<i>Secans</i>		<i>Sinus</i>	<i>Tangens</i>	<i>Secans</i>
11234	63	89101	196261	220269
11237	54	89021	195417	219517
11240	48	88942	194579	218771
11243	42	88862	193746	218031
11246	36	88782	192920	217297
11249	30	88701	192098	216568
11252	24	88620	191282	215845
11255	18	88539	190472	215127
11258	12	88458	189667	214414
11261	6	88377	188867	213707
11264		*	*	*
11267	62	88295	188073	213005
11270	54	88213	187283	212309
11273	48	88130	186499	211617
11276	42	88048	185720	210931
11279	36	87965	184946	210250
11282	30	87882	184177	209574
11285	24	87798	183413	208903
11288	18	87715	182654	208236
11291	12	87631	181899	207575
11294	6	87546	181150	206918
11297		*	*	*
11300	61	87462	180405	206267
11303	54	87377	179665	205619
11306	48	87292	178929	204977
11309	42	87207	178198	204339
11312	36	87121	177471	203706
11315	30	87036	176749	203077
11318	24	86949	176032	202453
11321	18	86863	175319	201833
11324	12	86777	174610	201218
11327	6	86690	173905	200607

<i>236</i>	<i>Sinus</i>	<i>Tangens</i>	<i>Secans</i>
30	50000	57735	115470
6	50151	57968	115587
12	50302	58201	115704
18	50453	58435	115822
24	50603	58670	115940
30	50754	58905	116059
36	50904	59140	116179
42	51055	59376	116299
48	51204	59612	116419
54	51354	59849	116541
	*	*	*
21	51504	60086	116663
6	51653	60324	116786
12	51803	60562	116909
18	51952	60801	117033
24	52101	61040	117158
30	52250	61280	117283
36	52399	61520	117409
42	52547	61761	117535
48	52696	62003	117662
54	52844	62245	117790
	*	*	*
22	52992	62487	117918
6	53140	62730	118047
12	53288	62973	118176
18	53435	63217	118307
24	53583	63462	118437
30	53730	63707	118569
36	53877	63953	118701
42	54024	64199	118834
48	54171	64446	118967
54	54317	64693	119102

Sinus

Tangens

Secans

60

86603

173205

200000

54

86515

172509

199397

48

86427

171817

198799

42

86340

171130

198205

36

86251

170446

197615

30

86163

169766

197029

24

86074

169091

196448

18

85985

168419

195870

12

85896

167752

195296

6

85806

167088

194726

*

*

*

59

85717

166428

194160

54

85627

165772

193598

48

85536

165120

193040

42

85446

164471

192486

36

85355

163826

191935

30

85264

163185

191388

24

85173

162548

190845

18

85081

161914

190305

12

84989

161284

189769

6

84897

160657

189237

*

*

*

58

84805

160033

188708

54

84712

159414

188183

48

84619

158797

187661

42

84526

158184

187142

36

84433

157575

186627

30

84339

156969

186116

24

84245

156366

185608

18

84151

155766

185103

12

84057

155170

184601

6

83962

154576

184103

297	Sinus	Tangens	Secans
33	54464	64941	119236
6	54610	65189	119372
12	54756	65438	119508
18	54902	65688	119645
24	55048	65938	119782
30	55194	66189	119920
36	55339	66440	120059
42	55484	66692	120199
48	55630	66944	120339
54	55775	67197	220480
	*	*	*
34	55919	67451	120622
6	56064	67705	120764
12	56208	67960	120907
18	56353	68215	121051
24	56497	68471	121195
30	56641	68728	121341
36	56784	68985	121487
42	56928	69243	121633
48	57071	69502	121781
54	57215	69761	121929
	*	*	*
35	57358	70021	122077
6	57501	70281	122227
12	57643	70542	122377
18	57786	70804	122528
24	57928	71066	122680
30	58070	71329	122833
36	58212	71593	122986
42	58354	71857	123140
48	58406	72122	123295
54	58637	72388	123450

	<i>Sinus</i>	<i>Tangens</i>	<i>Secans</i>	
11				
1236	57	83867	153987	183608
172	54	83772	153400	183116
108	48	83676	152816	182627
108	42	83581	152235	182142
108	36	83485	151658	181659
108	30	83389	151084	181180
108	24	83292	150512	180704
108	18	83195	149944	180231
108	12	83098	149378	179761
108	6	83001	148816	179293
108		*	*	*
108	56	82904	148256	178829
108	54	82806	147699	178368
108	48	82708	147146	177910
108	42	82610	146594	177454
108	36	82511	146046	177002
108	30	82413	145501	176552
108	24	82314	144958	176105
108	18	82214	144418	175661
108	12	82115	143881	175219
108	6	82015	143347	174781
108		*	*	*
108	55	81915	142815	174345
108	54	81815	142286	173911
108	48	81714	141759	173481
108	42	81614	141235	173053
108	36	81513	140714	172628
108	30	81412	140195	172205
108	24	81310	139679	171785
108	18	81208	139165	171367
108	12	81106	138653	170952
108	6	81004	138145	170540

231	Sinus	Tangens	Secans
36	58779	72654	123607
6	58920	72921	123764
12	59061	73189	123922
18	59201	73457	124081
24	59342	73726	124240
30	59482	73996	124400
36	59623	74267	124561
42	59763	74538	124723
48	59902	74810	124886
54	60042	75082	125049
	*	*	*
37	60181	75355	125214
6	60321	75629	125379
12	60460	75904	125545
18	60599	76180	125711
24	60738	76456	125879
30	60876	76733	126047
36	61015	77010	126216
42	61153	77289	126387
48	61291	77568	126557
54	61429	77848	126729
	*	*	*
38	61566	78129	126902
6	61703	78410	127075
12	61841	78692	127250
18	61978	78975	127425
24	62115	79259	127601
30	62251	79544	127778
36	62388	79829	127956
42	62524	80115	128134
48	62660	80402	128314
54	62796	80690	128495

	<i>Sinus</i>	<i>Tangens</i>	<i>Secans</i>
54	80902	137638,	170130
54	80799	137134	169723
48	80696	136633	169318
42	80593	136133	168915
36	80489	135637	168515
30	80386	135142	168117
24	80282	134650	167722
18	80178	134160	167329
12	80073	133673	166938
6	79968	133187	166550
	*	*	*
53	79864	132704	166164
54	79758	132224	165780
48	79653	131745	165399
42	79547	131269	165020
36	79441	130795	164643
30	79335	130323	164268
24	79229	129853	163895
18	79122	129385	163525
12	79015	128919	163157
6	78908	128456	162791
	*	*	*
52	78801	127994	162427
54	78693	127535	162065
48	78586	127077	161705
42	78478	126622	161348
36	78369	126169	160992
30	78261	125717	160639
24	78152	125268	160287
18	78043	124820	159938
12	77934	124375	159590-
6	77824	122391	159245

239	Sinus	Tangens	Secans
39	62932	80978	128676
6	63068	81268	128858
12	63203	81558	129042
18	63338	81849	129226
24	63473	82141	129411
30	63608	82434	129597
36	63742	82727	129784
42	63877	83022	129972
48	64011	83317	130160
54	64145	83613	130350
	*	*	*
40	64279	83910	130541
6	64412	84208	130732
12	64546	84507	130925
18	64679	84806	131119
24	64812	85107	131313
30	64945	85408	131509
36	65077	85710	131705
42	65210	86014	131903
48	65342	86318	132101
54	65474	86623	132301
	*	*	*
41	65606	86929	132501
6	65738	87236	132703
12	65869	87543	132905
18	66000	87852	133109
24	66131	88162	133314
30	66262	88473	133519
36	66393	88784	133726
42	66523	89097	133934
48	66653	89410	134142
54	66783	89725	134352

Sinus

Tangens

Secans

51	77715	123490	158902
54	77605	123050	158560
48	77494	122612	158221
42	77384	122176	157883
36	77273	121742	157547
30	77162	121310	157213
24	77051	120879	156881
18	76940	120451	156551
12	76828	120024	156223
6	76717	119599	155897
	*	*	*
50	76604	119175	155572
54	76492	118754	155250
48	76380	118334	154929
42	76267	117916	154610
36	76154	117500	154292
30	76041	117085	153977
24	75927	116672	153663
18	75813	116261	153351
12	75700	115851	153041
6	75585	115443	152732
	*	*	*
49	75471	115037	152425
54	75356	114632	152120
48	75241	114229	151817
42	75126	113828	151515
36	75011	113428	151215
30	74896	113029	150916
24	74780	112633	150619
18	74664	112238	150324
12	74548	111844	150030
6	74431	111452	149738

240	Sinus	Tangens	Secans
42	66913	90040	134563
6	67043	90357	134775
12	67172	90674	134988
18	67301	90993	135203
24	67430	91313	135418
30	67559	91633	135634
36	67688	91955	135852
42	67816	92277	136070
48	67944	92601	136290
54	68072	92926	136511
43	*	*	*
6	68200	93252	136733
12	68327	93578	136956
18	68455	93906	137180
24	68582	94235	137406
30	68709	94565	137632
36	68835	94896	137860
42	68962	95229	138089
48	69088	95562	138319
54	69214	95897	138550
44	69340	96232	138783
6	*	*	*
12	69466	96569	139016
18	69591	96907	139251
24	69717	97246	139487
30	69842	97586	139725
36	69966	97927	139963
42	70091	98270	140203
48	70215	98613	140444
54	70339	98958	140687
45	70463	99304	140930
6	70587	99652	141175
12	70711	100000	141421

	<i>Sinus</i>	<i>Tangens</i>	<i>Secans</i>
48	74314	111061	149448
54	74198	110672	149159
48	74081	110285	148871
42	73963	109899	148586
36	73846	109514	148301
30	73728	109131	148019
24	73610	108749	147738
18	73491	108369	147458
12	73373	107990	147180
6	73254	107613	146903
	*	*	*
47	73135	107237	146628
54	73016	106862	146354
48	72897	106489	146082
42	72777	106117	145811
36	72657	105747	145542
30	72537	105378	145274
24	72417	105010	145007
18	72297	104644	144742
12	72176	104279	144479
6	72055	103915	144216
	*	*	*
46	71934	103553	143956
54	71813	103192	143696
48	71691	102832	143438
42	71569	102474	143181
36	71447	102117	142926
30	71325	101761	142672
24	71203	101406	142419
18	71080	101053	142168
12	70957	100701	141918
6	70834	100350	141669
45	70711	100000	141421