

Notes du mont Royal

www.notesdumontroyal.com

Cette œuvre est hébergée sur « *Notes du mont Royal* » dans le cadre d'un exposé gratuit sur la littérature.

SOURCE DES IMAGES
Google Livres

Euclidis
ELEMENTORVM
LIBRI SEX
PRIORES.

Quorum demonstrationes tum alibi
sparsim, tum maximè libro quinto ad
faciliorem captum accommodauit

CAROLVS MAL-APERTIVS
Montensis è Societate IESV.

Editio altera emendatioꝝ,




D V A C I;

Typis BALTAZARIS BELLERII,
sub Circinoaurco. Anno 1633.

Cum Privilegio.

INSTITUT FÜR ALTE KUNST

UND ARCHITECTUR



Bayerische
Staatsbibliothek
München



IVVENTVTI
 MATHEMATVM
 STUDIO SÆ
 In Academia Duacensi.

HABETIS ad ma-
 num, Iuvenes orna-
 tissimi, Euclidis E-
 lementa sex priora, hoc est
 Geometrie, atque adeo Ma-
 thematum omnium funda-
 menta: in quibus explicandis
 si cuiquam videbor nonnulla
 subdicendo minus accurate

Mathematicę demonstrationis numeros omnes explere, is velint intelligat non Sophistis reuincendis, qui de industria videntur in luce cęcutire, sed docilibus ingenijs & veritatis amantibus. scribere me instruisse. Quibus profecto nescio an mediocri breuitate obscuriora fiant Mathematica, an molestiora nimia quorundam accuratatione, qui seu lectorum ingenio, seu beneuolentię diffusi satis per sese obuia incubant anxie, & ne quid omissum videatur, tot in unum ratiocinationes congerunt,
quot

quot simul mente complecti sit
difficillimum. Id non alibi
magis quam in libro quinto li-
cebit intueri, si cui fuerit o-
portunum alios passim com-
mentarios cum hoc nostro con-
ferre. Cum enim eius libri
Theorematum in omnem Ma-
thematicæ partem vim habe-
re amplissimam cernerem,
non dubitavi quin proximè
cum primis naturæ pronun-
tatis cohererent, eaque pro-
inde noua methodo ad prima
statim principia reuocaui, à
quibus minimum discessissent.
Quid enim attinebat per

Multiplicium, & probationum flexus Tyronem circumducere, si propositis clare terminorum notionibus ad ipsam quamprimum veritatem magno compendio poterat penetrare? Hoc sane consilium meum ut ut accipiant alij, vobis tamē Auditoribus meis usu ipso facile probaturum esse confido. Satis vero amplum mihi theatrum estis; neque aliud propositum fuit in hoc opere recudendo, quam vestris servire commodis, & eam, quæ mihi obtigit, Spartam ornare pro virili; ad cæ-

te-

7
teros si quid manabit emolu-
menti, ponatur in lucro. Vos
interim, uti spero, laborem
hunc meum, animum certe
vestrae utilitatis studiosissi-
mum equi bonique consuletis.
Valete.



A 4 Pri.

Privilegium.

Ego infra scriptus Societatis IESV Prouincialis in Prouincia Gallo-Belgica iuxta privilegium à Serenissimis Principibus nostris ALBERTO & ISABELLA eidem Societati nostrę concessum, quo omnibus prohibetur ne libros ab eiusdem Societatis hominibus compositos, absque Superiorũ, permissione imprimant; facultatem do BALTAZARO BELLERO Typo-

po-

9
pographo Duacensi, vt li-
brum cui titulus est, Cō-
mentarius in priores sex
libros Elementorum Eu-
clidis, & Institutiones A-
rithmeticæ practicę CA-
ROLI MALAPERTII
è Societate IESV, ad Sex
annos proximos impri-
mere & libere distribue-
re possit, Datum Torna-
ci 9. Nouemb. 1619.

FLORENTIVS DE
MONTMORENCY,

A 3

AP.

APPROBATIO.

Hic liber continens Euclidis
Elementorum libros sex priores:
Item Oratio R. P. CAROLI
NALAPERTII de laudibus
Mathematicæ, nihil habet quod
fidem concernat, eiuè aduersetur.
Datum Duaci 20. Decembris.
1619.

GEORGIUS COLVENERIVS
*S. Theologiæ Doctor & Professor,
& Librorum in Academia Duacena
Censor.*

EV.



EVCLIDIS

Elementorum

LIBER I.

Definitiones.

- 1  Vinctum est cuius pars nulla.
- 2  Linea est longitudo latitudinis expers.
- 3  Lineae extrema sunt puncta.
- 4 Linea recta est quae ex æquo suis punctis, seu extremis interiacer: *Sine cuius extrema obumbrant omnia media. Aut, breuissima earum, quae inter duo puncta duci possunt.*
- 5 Superficies est quae longitudinem & latitudinem tantum habet.
- 6 Superficii extrema sunt lineae.

7 Plana superficies est quæ ex æquo suis extremis interiicitur.

8 Planus angulus est duarum linearum in plana superficie se tangentium, & nō in directū iacentium, aliterius ad alteram inclinatio



Ut planus angulus est $A B C$, quæ cōstitit p̄ lineas $A B$, $A C$, quæ in eodē plano posite nō incēt in directū, siue non efficiūt unicā lineam rectā, & ad se mutuo inclinantur, seq̄ rō: iungunt in puncto B .

9 Rectilineus angulus est qui rectis lineis constituitur.

10 Quando recta super rectā consistens æquales utrimque angulos fecerit, rectus est: vterque angulorum æqualiū:



quæ autem alteri insitit, dicitur linea perpendicularis.

Sit linea $A B$ insititens ipsi $C D$, est eidem perpendicularis, quia angulos qui sunt deinceps, $A B C$, $A B D$, efficit æquales, & uterque angulus idcirco est rectus.

11 Obtusus angulus est, qui maior est recto.

12 Acutus, qui recto minor.

Ut obtusus angulus est $A B C$, maior recto $E B C$, acutus vero & recto minor est $A B D$.

13 Ter-

13 Terminus est quod cuiusque est extremum.

14 Figura est quæ sub aliquo, aut aliquibus terminis continetur.

15 Circulus est figura unica lineæ termino contenta, quæ circumferentiâ dicunt, à qua ad aliquod punctum intra contentum omnes lineæ sunt æquales.



16 Punctum autem illud dicitur centrum. In circulo $ABCF$, contrâ est D , ex quo lineæ DA , DB , DC , ad circumferentiâ ductæ, & omnes alie sunt æquales.

17 Diameter circuli est recta per centrum acta, & ad ambitum utrimque terminata. Cuiusmodi est AC .

18 Semicirculus est figura comprehensa à diametro & parte circumferentiæ, quæ diametro clauditur, ut ABC .

19 Segmentum circuli est, quod à recta lineâ & circumferentiâ continetur, quale est EFG .

20 Rectilineæ figure sunt quæ rectis lineis continentur, Trilateræ quæ tribus, Quadrilateræ quæ quatuor, Multilateræ quæ pluribus.

21 Trilaterarum autem figurarum Triangulum æquilaterum est, quod tria latera habet æqualia. Quale est triangulū ABC .



22 Isosceles seu æquicrus aut æquicrurum triangulum est quod duo tantum latera aut crura habet equalia. *Quale est triangulum D E F, in quo duo tantum latera D E, D F, sunt equalia.*



23 Scalenum triangulum est quod omnia tria latera habet inæqualia; ut G H K.



24 Rectangulum triangulum est quod continet angulum rectum. *Tale est A B C, in quo angulus B, est rectus.*



25 Amblygonium seu obtusangulum, quod angulum habet obtusum. *Tale est D E F, in quo angulus E, est obtusus.*



26 Oxigonium seu acutangulum quod tres acutos habet angulos. *Quale est G H I.*



27 Inter Quadrilateras Quadratum est, quod æquilaterum est & æquiangulum, seu quod & latera & angulos habet æqualia. *Vt A B C D.*



28 Altera parte longius figura est æquiangula quidem, at non æquilatera: *Qualis est figura E F G H.*




29 Rhom.

LIBER I.

29 Rhombus est figura æquilatera non tamen æquiangula :

Qualis est I K L M.



30 Rhomboides quæ opposita latera & angulos æquales habet, non tamen aut omnia latera aut omnes angulos habet æquales. *Vt O P Q R.*



31 Aliæ verò figuræ quæcunque quadrilateræ vocentur Trapezia.

Quæ irregulares sunt & infinitæ. S T Y X, &c.



32 Parallele lineæ sunt quæ *A — B* in eodem plano existentes, *C — D* productæ in infinitum neutram in partem coincident. *Seu quæ pari ubiq; spatio inter se distant, ut linea A B. C D.*

Parallelogrammum verò est figura quadrilatera lineis parallelis descripta. *Vt figura E F G H, est parallelogrammum quia describitur lineis H G, F E, parallelis, & lineis H E, G F, similiter parallelis.*



Postu-

Postulata.

- 1 Petatur à quouis puncto ad aliud quodlibet rectam lineam ducere posse.
- 2 Terminatam & rectam lineam in directum & continuum protendere.
- 3 E quouis centro ad quoduis intervallum circulum describere.

Communes notiones seu Axiomata.

- 1 Quæ eidem sunt æqualia, & inter se sunt æqualia.
- 2 Si æqualibus addas æqualia, tota erunt æqualia.
- 3 Si ab æqualibus demas æqualia, quæ remanent erunt æqualia.
- 4 Si inæqualibus adjiciantur æqualia, tota erunt inæqualia.
- 5 Si ab inæqualibus tollantur æqualia, quæ remanent erunt inæqualia.
- 6 Quæ eiusdem dupla sunt, inter se sunt æqualia.
- 7 Quæ eiusdem sunt dimidia, sunt inter se æqualia.
- 8 Quæ mutuo sibi congruunt, sunt æqualia inter se.

9 Totum est maius sua parte.

10 Omnes anguli recti sunt inter se equales.

11 Si in duas rectas recta incidens angulos interiores & ad easdē partes duobus rectis minores fecerit, coincident duæ illæ linee, protractæ in illam partem, ad quam spectant duo anguli minores rectis. *Ut si in rectas A B, C D, cadens recta E F, faciat angulos internos & ad eandē partē A E F, E F C, minores duobus rectis, coincident illa linea protracta versus partem A C.*



12 Duæ rectæ spatium non comprehendunt,

13 Partes omnes simul sumptæ suo toti sunt æquales, & totum æquale est suis omnibus partibus.

Propositionum alie faciendum aliquid proponunt, & vocantur Problemata; alie in sola contemplatione sistunt, quæ idcirco Theoremata inscribuntur.

Notæ ad marginem.

Post.

Ax.

Def.

Const.

Hyp.

id est

Postulatum.

Axioma.

Definitio.

Constructio.

Hypothesis.

Prior

Prior numerus aliquid ex dictis, posterior librum significat. Vt def. 6. l. hoc est, definitio sexta libri primi, &c.

Quando numerus solitarius apponitur, puta 3. intelligatur propositio tertia, &c.

Item cum numerus libri non additur intelligatur is liber in quo versamur.



PRO-



PROPOSITIONES.

Propositio I. Problema.

Super data recta linea terminata triangulum æquilaterum constituere.




It data recta
A B . Centro
igitur A, spa-
tio A B de-



scribatur circulus B C D , & centro B,
spatio eodẽ ducatur circulus alter A C E ,
priorem secans in puncto C, iunganturq;
rectæ lineæ C A , C B , & factũ est quod
proponitur. Rectè enim A B , A C , (quĩ
sunt semidiametri eiusdẽ circuli B C D ,)
inter se sunt æquales , similiterque ob
eandem causam æquales sunt rectæ B A ,
B C . Nunc vero cum rectæ A C , B C , vni
& eidem A B , æquales sint , erunt etiam
inter se æquales ; & sic triangulũ A B C ,
est æquilaterum . Super data ergo recta
A B , constituimus triangulum æquilate-
rum , quod erat faciendum . *Ita concludi
solent problemata.*

Pro-



Propos. 2. Problem.

*Ad datum punctum data recta linea
æqualem rectam ponere.*

A D pun-
ctū A,
fit cōstituē-
da recta æ-
qualis ipsi



a. 1.

B C. Ductâ ergo rectâ A B, (nisi ante sit
ducta) fiat super ea triangulū æquilatē-
rū A B D, & centro B, spatio B C, du-
catur circulus C E; producta deinde
D B, vsq; ad ambitū in E, centro D, spa-
tio D E, describatur circulus E F, secās
productam D A, in F, & factū erit quod
petitur. Nā quia rectæ A F, B E, addi-
tis æqualibus A D, B D, fiunt æquales,
b inter se & erunt æquales, quare recta
A F, ipsi etiā B C, æqualis est. Ad pun-
ctū ergo A; constituimus rectā A F, ipsi
B C, æqualem, quod erat faciendum.


b def. 15.

c ax. 3.

d 15. def.

*Posset ita constitui punctum A, ut al-
lia quoque sit praxis huius problematis,
sed in refacili & primis initijs morosius
agendum non puto cum Tyronibus; quod
idem deniro seq. probl. & prop. 7.*

Pro-



Propo. 3. Proble.

Datis rectis lineis inaequalibus de maiore minori parem auferre.

VT rectæ A, ex maiore: B C, æqualis auferatur; ad punctum B, ponatur B E, æ ipsi A, æqualis. Mox centro B, spatio B E, fiat circulus D E F, eritque abscissa E D, ipsi A, æqualis; nam utraque ipsi B E, est æqualis; A, quidem ex hypothesi, B D; autē quia est eiusdem circuli b semidiameter.



a 1. 2.

b def. 15.

Proble. 4. Theorema.

Duorum triangularum si latus unum uni, & alterum alteri sit æquale, angulūq; inter illa latera contenti sint etiam pares, erunt & bases æquales; & ipsa tota triangula: sed & reliqui anguli reliquis angulis pares erunt, quibus æqualia latera subtenduntur.

Vt si.

VT si in triāgulis A B C,
D E F latus A B, lateri
D E, & latus A C, lateri D F,
alterum alteri sit æquale (vel



phraſi Græca vtrumque vtrique) ſimal-
que etiam pares anguli A, & D, dictis
lateribus contenti; Dico baſim B C, baſi
E F, eſſe æqualem, & cetera conſequi vt
eſt propoſitum. Nam ſi intelligamus
triangulum triangulo ſuperponi ita vt
angulus A, congruat angulo D, con-
gruent latera A B, A C, lateribus D E,
D F, alterum alteri, cui nempe eſt æqua-
le. Sed congruent etiam baſes, ideoque
erunt æquales, cum enim puncta B, & C,
cadunt in E, & F, recta B C, caderet in E F,
nam ſi ſupra, aut infra caderet, duæ rectæ
b ſpatium comprehenderent. Duorum
ergo triangulorum, &c. Quod erat de-
monſtrandum. Ita concludi ſolent Theo-
remata.


Propo. 5. Theore.

*Trianguli Iſoſcelis anguli ad baſim
ſunt pares; & ſi æqualia latera pro-
ducantur, pares quoque erunt an-
guli infra baſim.*

IN triangulo isoscele
 ABC , latera AB ,
 AC , producantur ut lubet,
 sumptaque utcumque recta
 AD , æqualis illi α capiatur
 AE , iunganturque rectæ, CD , BE .
 Nunc quia triangula ACD , ABE , se
 habent iuxta Prop. 4. est enim AC , ipsi
 AB , æqualis ex suppositione, & AD ,
 ipsi AE , ex constructione, angulusque
 A , lateribus illis contentus est commu-
 nis. Ob hæc b inquam bases DC , & BE , b 4. 12
 sunt pares, itemque angulus D , angulo E ,
 & angulus ACD , angulo ABE . Rur-
 sus triangula BCD , BCE , se habent
 iuxta Prop. 4. Sunt enim anguli D , & E ,
 æquales & æqualibus lateribus contenti;
 erunt igitur anguli infra basim DBC ,
 BCE , æquales; itemque anguli BCD ,
 ECB : & quia totus angulus ACD ,
 ostensus est æqualis toti ABE , ablatis
 paribus CBE , & DCB , qui remanent
 supra basim sunt c æquales. Trianguli c ax. 3.
 igitur isoscelis, &c.



Pro-



Propo. 6. Theore.

*Si trianguli duo anguli fuerint equalēs, erunt & latera angulis subten-
sa equalia.*

IN triangulo $A B C$, si æqua-
les sunt anguli B , & $A C B$,
erūt etiā latera $A B$, $A C$, sub-
tēsa dictis angulis, inter se æqua-
lia. Nam si negas esse æqualia, sit alterum
maius, puta $A B$; ex quo auferatur recta
 $B D$, ipsi $A C$, æqualis, ducaturq; recta
 $D C$. Nunc verò cum duo triangu-
la $A B C$, $C B D$, habeant latus $B C$, com-
mune, & latera $B D$, $a C A$, sint æqualia,
anguliq; contenti B , & $A C B$, *b* æqua-
les erit & triangulum $D B C$, triangulo
 $A B C$, hoc est totum parti, æquale, quod
fieri non potest. Si ergo trianguli, &c.



a const.

b hyp.

c 4. 1.

*Conuertit hac propositio priorem partē
superioris: nam ibi ex æqualitate laty-
rum $A B$, & $A C$, colligebatur equali-
tas angulorum supra basim $B C$, hic ve-
ro vice versa ex æqualitate dictorum
angulorum colligitur æqualitas laterū.
Solet autem Euclides eas tantum pro-
positiones conuertere, cum ad proba-
tio-*

tionem sequentium utraque proposere
est adhibenda, hac est samiconstantis,
quam conuersa.

Propo. 7. Theore.

Super recta linea ductis ad quodvis
punctum duabus rectis non ducen-
tur super eadem ad aliud punctum
versus easdem partes duae aliae, sic
ut quae ab eodem termino incipiunt,
sint aequales.

Super recta AB , ductis ad
punctum C , duabus rectis
 AC, BC , ducantur si fieri potest
aliae duae AD, DB , ad aliud pun-
ctum D , ita ut CA , ipsi DA , (cum quae
habent eundem terminum A) & CB , ipsi
 DB , aequalis sit, ducaturque in superre-
cta CD , quia igitur AC, AD , sunt ae-
quales, erunt & anguli ACD, ADC , in-
ter se aequales; maior erit proinde angu-
lus ADC , angulo BCD , & multo ma-
ior angulus CDB , minor vero quia CB ,
ponitur aequalis ipsi DB , erit angulus
& CDB , angulo BCD , aequalis, qui ta-
men ante erat ostensus multo maior,

B

non



non ergo ductæ sunt binæ æquales prioribus. Quod fuit demonstrandum.

Propositio 8. Theore.

Si duo triangula duo latera duobus lateribus alterum alteri equalia habuerint, & basim basi æqualem, habebunt etiam angulum lateribus contentum æqualem.

IN triangulis ABC, DEF , $AB = DE$, $AC = DF$, ipsi BC, EF , alterum alteri æqualia, itemque basis BC , basi EF . Quod si negas angulos A , & D , lateribus contentos pares esse, intelligatur triangulū ABC , triangulo DEF , superponi, sunt verò necessario punctum A , caderet in D , & sic angulus angulo congrueret ut vult propositio: nam si non caderet in D , sed in G , aut aliud punctum, tunc duæ rectæ duabus rectis æquales ducerentur ad aliud punctum, &c. quod est contra precedentem. *Est conversio primæ partis Propos. 4.*



Pro



Propositio 9. Proble.

*Datum angulum reſtilineum ſecare
biſariam.*

EX lateribus dati anguli BAC , ſumatur recta AB ; ut lubet, & ipſi par AC , nec non ſuper ductam rectam BC , fiat triagulum æquilaterum BCD , ducaturque recta AD , per quam angulus BAC , diuidetur biſariam: nam AB , AC , æquales ſunt ex conſtructione, & AD , communis, eſtque inſuper baſis BD , baſi CD , æqualis, ſunt ergo anguli BAD , CAD , æquales: quare angulus BAC , diuiſus eſt biſariam. Quod erat faciendum.



Propositio 10. Proble.

*Datam rectam finitam ſecare biſa-
riam.*

SVper recta AB , fiat triangu-
lũ æquilaterũ ABC , cuius
angulus ACB , diuidatur bi-
ſariã per rectã CD , & recta AB ,



B 2.

in

in puncto D, bifariam quoque sec-
ta erit. Nam triangula CAD ,
 CBD , se habent iuxta 4. Propo.
Ergo bases AD , DB , sunt æ-
quales.



Propo. 11. Proble.

*Ex dato puncto in linea recta perpen-
dicularem excitare.*

IN recta BC , detur pun-
ctum D , sumanturque ut-
cumque æquales recte DB ,
 DC ; inde super BC , structo
triangulo æquilatere BCA ; ex A , du-
catur recta AD , & hæc erit ad angulos
rectos ipsi BC ; Nam latus DB , æqua-
le est ipsi DC , ex constructione, & la-
tus DA , commune, basis insuper BA ,
basi CA , æqualis; sunt ergo anguli
 ADB , ADC , æquales, ac proinde re-
cti, & ipsa AD , perpendicularis.



Pro-



Propof. 12. Problem.

*A dato extra rectam infinitam pun-
cto perpendiculararem ducere ad
eandem rectam.*

Detur punctum A, quo
centro, spatio quocunq;
ducatur circulus dummodo
secet rectam B C, infinitam
seu quantum opus erit productam, du-
ctisque rectis A B, A C, recta B C, di-
uidatur a bifariam in D, ducaturque re-
cta A D; & hæc eadem erit perpendi-
cularis quaesita. Nam quia in triangulis
A B D, A D C, æquales sunt A B, *b* A C, *b* def. 13,
æquales item *c* B D, D C, & A D com-
munis anguli A D B, *d* A D C, erunt *d* s.
æquales ac proinde recti, ideoque recta
A D, perpendicularis.




... 12

... 12

... **Propo-**

... 12

12



Propositio 13. Theore.

Recta super rectam consistens aut duos rectos aut duobus rectis æquales angulos facit.

- N**am recta AB , consistens super CD , aut facit v. 
- a def. 10. trimque æquales angulos, & a $CB D$ proinde rectos; aut inæquales.
- b 23. & tunc ex puncto B , exciterur b perpendicularis BE , quia igitur in angulo ABC , continebatur vnus rectus $EB C$, & insuper angulus EBA , qui cum angulo ABD , facit alterum rectum, recta AB constituebat angulos ABC, ABD ,
- c 22. 19. æquales & duobus rectis. 1

Propositio 14. Theore.

Si ad punctum in recta linea datum duę recta non ad easdem partes duę angulos efficiant duobus rectis æquales, in directum sunt illa linea.

Nam

Nam si ad punctum B, ducantur duæ rectæ CB, BD, facientes cum recta AB, angulos æquales duobus rectis, & negas rectas CB, BD, iacere in directum, iaceat ergo BE, in directum ipsi CB, erantque anguli ABC, ABE, æquales duobus rectis. At hoc esse non potest; nam anguli ABC, ABD, erant pares duobus rectis: non sunt ergo pares duobus rectis, anguli ABC, & ABE, alias totum & pars essent æqualia: sed neque alia duci potest ipsi CB, iacens in directum nisi BD; ergo, &c.



Propositio 15. Theore.

Si dua rectæ se inuicem secuerint angulos ad verticem oppositos æquales facient.

Rectæ AB, CD secant se in E, eritque angulus CEB, angulo AED (qui dicitur illi esse ad verticem oppositus) æqualis: nam siue AED, siue CEB adiciatur angulo interiecto AEC, constituetur æquales duobus rectis; quare anguli CEB, & AED, sunt æquales. *a* 13. *b* az. 3.



B 4

Simi-

Similis demonstratio procedet in reliquis oppositis angulis ad verticem.

Propo. 16. Theore.

Omnis trianguli quovis latere producto externus angulus utrobique interno & opposito maior est.

VT in triangulo ABC , producto latere BC angulus internus ACB , est externo ACD , valet π duos rectos; idem autem internus ACB , cum angulo B , non valet duos rectos, alias enim rectę BA , CA , non b concurrerent in A , ergo externus ACD , maior est interno & opposito B . Deinde producto latere AC , similiter monstrabitur externum BCE , maiorem esse angulo A : atqui angulus ACD , ad verticem equalis est ϵ ipsi BCE ; ergo angulus ACD , ipso etiam A , est maior. Omnis fitur, &c.

Aliiter Trianguli ABC , latere BC , producto in D , latus AC biseccetur in E , ducaturque BF , ita ut EF , æqualis fiat ipsi



BE .

BA, iungaturque recta **FC**, quæ erit æqualis ipsi **AB**: nam a duo latera **EB**, **EA**, æqualia sunt duobus **EF**, **EC**, & anguli contenti æquales ad verticem; Triangula ergo **AEB**, **FEC**, se habent iuxta 4. Propo. & basis **FC**, basi **AB**, est æqualis, angulus item **BAB**, angulo **ECF**; sed hic est pars anguli externi **ECD**, ideoque minor, quanto & angulus **BAC**, minor est externo **ACD**.

Quod si latus **BC**, biseccetur in **E**, producto latere **AC**, in **G**, & reliqua fiant ut prius eodem modo monstrabitur angulum **BGG**, & proinde angulum **ACD**, qui est huic ad verticem, maiorem esse angulo **ABC**. Omnis igitur, &c.



Propo. 17. Theore.

Omnis trianguli duo anguli quocunque sumpti minores sunt duobus rectis.

Nam si anguli **B**, & **ACB**, non essent minores duobus rectis rectæ **BA**, **CA**, non convergerent in **A**.

B ;

Ali-

Aliter; Angulus C, internus plus requirit quam angulum B, ut fiat æqualis duobus rectis;



6 13.

16. 1.

requirit enim angulum externum C, maiorem interno & opposito e B; sunt ergo anguli B, & C, interni duobus rectis minores. Similiter alio latere producto de alijs quibuscumque duobus angulis idem probabitur. Omnis ergo, &c.

Propositio 18. Theore.

Omnis trianguli maior latus maiorem angulum subtendit.

VT si trianguli ABC,

maius est latus AC, quam AB, maior erit angulus ABC, quam angulus C,



subtensus a latere minore AB: Sumatur enim AD, æqualis ipsi AB. Tunc

verò quia æqualia sunt latera AB, AD, anguli ABD, ADB, supra a basim

sunt pares. Sed angulus ADB, est externus & oppositus angulo C, ac proinde

de, & maior; multo ergo maior est, totus angulus ABC, angulo C. Omnis igitur trianguli, &c.

Pro



Propositio 19. Theore.

Omnis trianguli maior angulus maiori lateri opponitur.

SI angulus B, maior sit ipso A C, erit & latus A C, maius quam A B, non enim est minus aut equale; nam tunc angulus B, esset minor aut æqualis ipsi C, est ergo A C, maior quam A B. Quare omnis trianguli, &c.



Propositio 20. Theore.

Omnis trianguli duo latera quomodoque sumpta, reliquo sunt maiora.

VT in triangulo A B C, dico latera A B, B C, simul sumpta esse maiora ipso A C; producatur enim A B, sic ut B D, æqualis sit ipsi B C, & proinde A D, æqualis sit ipsis A B, & B C, Nunc



Nunc vero quia BD , & BC , sunt æqualia; erunt pares & anguli D , & BCD ; maior ergo utroque erit totus angulus ACD ; sed totum hunc angulum trianguli ADC , subtendit latus AD , maior ergo est recta AD , (quæ æqualis est duabus AB , & BC) quam latus AC . Omnis ergo trianguli, &c.



Propo. 23. Theore.

Si à terminis unius lateris in triangulo duæ rectæ intra triangulum iungantur, erunt hæ lateribus trianguli minores; maiorem vero angulum continebunt.

VT in triangulo ABC , dico latera BA , AC , esse maiora rectis BD , & DC , quæ intra triangulum iunguntur in D . Nam producto latere BD , in E , latera BD , DC , minora sunt ipsis BE , EC ; quandoquidem CE , ED , simul sumptæ maiora sunt latere DC , & DB , sit commune; eandemque ob causam latera BE , EC , minora sunt ipsis BA , AC ;



A C; latera ergo B D, & C, multo mi-
nora sunt ipsis B A, A C. Secundo an-
gulus B D C, externus, maior est in-
terno & opposito D C A. & sic maior
ipso A, interno & opposito; multo ergo
maior est angulus B D C, ipso angulo
A. Si ergo, &c.

Proposi. 22. Proble.

*Triangulum constituere, cuius latera
tribus datis lineis sint equalia, &
oportet autem duas quomodocunque
sumptas reliqua esse maiores.*

Dantur tres rectae
A, B, C, & ipsis
sumantur ordine
quales D E, E F, F G: C B A
tum centro E, spatio E D, ducatur cir-
culus D H, & centro F, intervallo F G,
ducatur circulus alter G H, iungantur-
que rectae E H, F H, & factum est quod
proponitur. Nam in triangulo E H F,
recta E H, aequalis est ipsi D E, hoc est
ipsi A, E F, verò ipsi B, ac denique F H,
ipsi F G, hoc est ipsi C.



Pro.

✠ A ✠ A ✠ A ✠ A ✠ A ✠ A ✠ A

Propositio 23. Proble.

Ad datum in recta punctum, dato angulo aequalem angulum rectilineum ponere.

Detur angulus A, cui ad punctum B, in recta BC, æqualis sit ponendus. Sumptis utcumque in lateribus dati anguli punctis D, & E, iungatur recta DE, constituaturque triangulum BCF, cuius latera sint tribus lateribus ipsius ADE, equalia, ita ut BC, par sit ipsi AD; BF, ipsi AE; CF, ipsi DE: Quo facto triangula se habent iuxta 8. Propo. Quare anguli A, & B, æquales, & sic factum est quod erat propositum.



Pro-



Propositio 24. Theore.

Si duo triangula duo latera aequalia alterum alteri habuerint, & unū triangulum habeat angulum lateribus consentum maiorem, idem quoque habebis basim, basi alterius trianguli maiorem.

VT si latera AB, AC , aequalia sint lateribus DE, DF , & angulus A , maior angulo EDF , maior quoque erit basis BC , basi EF . Nam si fiat angulus GDF , ipsi A , æqualis, & latus DG , ipsi DE , sit æquale, iunganturque rectæ GE, GF , anguli DGE, DEG , pares erunt: quare totus $FE G$, maior erit quam DGE , & multo maior quam FGE , quare recta $b GF$, & huic æqualis BC , maior est quam EF . Si duo ergo triangula, &c.



Pro-



Propositio 15. Theore.

*Si duo triangula duobus lateribus duo
latera equalia habuerint alterum
alteri, basim uero basi maiorem,
angulum etiam maiorem basi apposi-
tum maiorem habebunt.*

Nam si paria sint latera $A B, A C$, ipsis $D E, D F$, & basis $B C$, maior
basi $E F$, angulus A , maior
erit ipso D , si enim put equalis esset aut
minor basis etiam $E F$, ipsi $B C$, equalis
esset, aut minor, contra hypothe-
sim. Si ergo, &c.



Propositio 26. Theore.

*Si duo triangula duos angulos duobus
angulis pares habuerint alterum
alteri, & unum latum uni lateri a-
dijacente, siue quod adiacet angulis a-
qua-*

qualibus, siue quod uni equalium
angulorum subtenditur, erunt &
reliqua latera alterum alteri e-
qualia, & reliqui anguli reliquo
equalis.

Sint in triangulis ABC ,
 DEF , anguli B , &
 ACB , equals angulis E , &
 F , sintq; primo latera BC ,
 EF , (quæ adjacent angulis equalibus)
equalia iam si latus BA , non est æquale
ipsi ED , sit illo maius, & ex eo sumatur
 BG , æqualis ipsi ED , tum vero ducta
 CG , duo latera triangulorum BGC , &
 EDF , equalia sunt, & anguli contenti
 B , & E , equals unde & anguli F , &
 GCB , pares erunt, quod esse non po-
test; nam hic angulus est pars ipsius
 ACB , qui æqualis ponebatur ipsi F , non
est ergo maior BA , quam ED ; sed ne-
que minor, alias lateri ED , eadem quæ
prius applicaretur demonstratio; ergo
æqualis; & tunc triangula BAC , EDF ,
& habent iuxta 4. Prop. & latera lateri-
bus, anguli item angulis correspon-
dentibus sunt æquales. Sint secundo positis,
ut prius, angulis B , & ACB , ipsis E , & F ,
equalibus, latera ED , BA , (subtensa an-
gu-



gulis equalibus $A C B$, A D
 $D F E$ equalia, iam si G $\triangle$ H
 $B C$, non est equalis ipsi $B H C$ $E F$
 $E F$, sit maior, tamatruq;

$B H$, equalis ipsi $E F$, & utraque $A H$,
 probabitur triangula $B A H$, & $E D F$,
 esse iuxta 4. (sunt enim latera $B A$,
 $E D$, item $B H$, $E F$, equalia & anguli
 contenti equales) quare angulum $B H A$,
 parem esse ipsi F , cui eidein equalis est
 $A C B$, quod fieri pequit: nam sic angu-
 lus $A H B$, equalis esset interno & op-
 posito $A C H$; non est ergo $B C$, maior
 quam $E F$, sed equalis; quare rursus
 triangula $B A G$, $E D F$, sunt iuxta 4.
 Propo. & cetera sequuntur ut prius.

Propositio 27. Theore.

*Si in duas rectas recta incidens angu-
 los alternos pares fecerit, parallela
 erunt illa linea.*

S Int duae rectae $A B$, $C D$, in
 quas cadat recta $E F$, fa- $A E$ F
 ciens angulos alternos, $A E F$, $C F D$
 $E F D$, equales; parallelae ergo
 erunt rectae $A B$, $C D$; nam, si concurre-
 rent in G , & fieret triangulum $E G F$, ef-
 fet angulus externus $A E F$, maior & in-
 ter.

terno & opposito EFG, cui ponebatur
 equalis. Eadē fiet demonstratio si dicantur
 cōcursuræ versus A: neutram ergo in
 partem concurrent, sed sunt *b* parallelæ. *b* def. 12.

Propositio 28. Theore.

Si in duas rectas recta incidens angulum externum interno & opposito ad easdem partes equalē fecerit, aut duos internos ad easdem partes equales duobus rectis, parallelae sunt illæ lineæ.

IN duas rectas AB, CD, incidens EF, faciat primò angulum externum EGB, æqualem interno GHD, & opposito ad easdem partes, quia ergo angulus EGB, æqualis est æ angulo adverticem AGH, erūt anguli alterni AGH, GHD, æquales; cum æquales sint vni tertio EGB, ergo lineæ AB, CD, sunt parallelæ. *b* 27. Faciat secundo recta EF, angulos BGH, DHG, internos ad easdem partes, equales duobus rectis; quia ergo angulus EGB, cum angulo BGH, valet duos rectos & cum eodem BGH, angulus GHD, itidem valet duos rectos; sequitur æ angulum *d* ax. 2. ex.



exteriorum EGB , æqualem esse interno GHD , quare per priorem partem huius Propositionis AB , CD , sunt parallelæ. *Q. E. D.*

Propositio 29. Theore.

Si recta in parallelas incidat anguli interni ad easdem partes duobus rectis æquales erunt, anguli item alterni inter se æquales; ac denique angulus externus interno opposito erit æqualis.

V T si in parallelas AB , CD , cadat recta EF , primo anguli interni tam  $\angle A$, quam versus B , pares erunt duobus rectis: nam si versus alterutram partem essent minores, lineæ ex ea parte productæ concurrerent, quare contra hypothesein non essent parallelæ. Secundo quia angulus DHG , tam cum angulo HGB , quam cum angulo CHG , valet duos rectos, sequitur angulos HGB , & CHG , qui sunt alterni, inter se esse æquales.

Tertio eadem ratione quia B G H, li-
ue cum externo E G B, siue cum interno
G H D, valet duos rectos, sequitur ex-
ternum E G B, parum esse interno
G H D. Si ergo recta, &c.

Propositio 30. Theore.

*Quae eadem rectae sunt parallelae, & in-
ter se sunt parallelae.*

Sint rectae A B, C D, paral-
lelae ipsi E F, in quas om-
nes cadat recta G H. Quia
ergo A B, E F, sunt paralle-
lae, anguli alterni A G I, G I F, sunt a 2. a 29.
quales: Sed angulus G I F, equalis est
b interno & opposito I H D, (cum E F, b 29.
C D, ponantur etiam parallelae) sunt
ergo inter se c & aequales anguli, A G H, c an. 1,
G H D, recta ergo G H, cadens in re-
ctas A B, C D, facit angulos alternos
aequales, deoque rectae illae sunt paral-
lelae, d 27.



Pro-

☞ A ☞ A ☞ A ☞ A ☞ A ☞ A ☞ A

Propositio 31. Proble.

Per datum punctum lineam datę rectę parallelam ducere.

Detur recta AB , cui per punctum C , ducenda sit parallela. Ducatur ergo utcumque ad rectam AB , recta



a 23.

b 27.

DC , & angulo $CD B$, constituatur α æqualis $E C D$, eritque recta EC , b ipsi AB , parallela; nam anguli alterni $E C D$, $C D B$, sunt pares.

Propositio 32. Theore.

Omnis trianguli uno latere producto externus angulus duobus internis & oppositis est æqualis, & tres interni duobus rectis sunt æquales.

Trianguli ABC , producat^{ur} latus quodcunque puta BC in D , ducaturque α CE ipsi AB parallela. Quia ergo AC



a 31.

ca-

cadit in parallelas AB, EC , angulus b b 29.
 A , æqualis est alterno ACE . Rursus
quia recta BC , cadit in easdem parallelas,
angulus a ECB , externus æqualis c 29.
est interno B . Totus igitur ACD , æ-
qualis est duobus internis A , & B , &
probata est prior pars propositionis.
Nunc quia angulus ACB , cum externo
 ACD , valet ad duos rectos, idem ACB , d 13.
cum duobus A & B , valebit duos rectos,
cum A , & B , ostensi sint pares ipsi exte-
rno ACD . Omnis igitur trianguli, &c.

Corollarium.

*Hinc manifestum est in omni qua-
drilatero quatuor simul angulos qua-
tuor rectis esse æquales: nam ducta re-
cta ex uno angulo in oppositum, qua-
drilaterum dividetur in duo triangu-
la quæ singula habent angulos pares
duobus rectis, anguli ergo totius qua-
drilateri valent quatuor rectos. Ut
apparet in figura seq. propo.*

Pro-

Propositio 33. Theore.

*Lineę rectę quę æquales & parallelas
ad easdem partes iungunt, sunt &
ipse æquales & parallele.*

Rectas AB , CD , æquales & parallelas iungant ad easdem partes duæ alię AC , BD , ducaturq; recta BC . Quia ergo recta BC , tangit parallelas AB , CD ; anguli alterni ABC , BCD , pares sunt. Nunc vero quia latera AB , CD , sunt æqualia, & latus CB , est commune, anguli que contenti ABC , BCD , sunt æquales, triangula ABC , BCD , sunt iuxta 4. Quare basis AC , basi BD , est equalis (quæ est prior pars propositionis) & insuper angulus CBD , angulo BCA , erit æqualis. Nunc ergo quia in duas rectas AC , BD , cadens recta BC , facit angulos CBD , BCA , alternos æquales, parallelę sunt AC , BD .



Pro-



Propositio 34. Theore.

Parallelogrammorum spatiorum opposita latera & anguli sunt equalia; ipsaq; parallelogramma à diametro secantur bifariam.

N Am in parallelogrammo A D, ducta diametro B C, anguli alterni *a* A B C, B C D,  *a* 29. sunt pares; & rursus æquales sunt anguli C B D, B C A; quia ergo triangula A B C, B C D, habent duos angulos pares, & latus B C, adiacens æqualibus angulis commune, reliqui *b* anguli A, & D, sunt pares, & latera omnia, & anguli correspondentes sunt æquales: tota denique triangula *c* æqualia sunt. *c* 4.
Quare parallelogrammum A D, bifariam secatur à diametro B C. Igitur parallelogram. &c.

C

Pro-



Propositio 35. Theore.

*Parallelogramma super eadem basi,
& in eisdem parallelis constituta,
inter se sunt aequalia.*

Super eadem basi AB , constituta sint duo parallelogramma AD , AF ; sinque AB , CF , lineę parallele. Considerentur deinde duo triangula CAE , DBF , in quibus latus AC , æquale est ipsi DB , & CE , alteri DF : nam CD , EF , æqualia *b* sunt uni & eidem AB , & addito communi DE , lineę CE , DF , sunt pares. Sed & angulus DBF , equalis est ipsi C , cum in rectas CA , DB , cadat CF : sunt ergo triangula CAE , DBF : iuxta 4, & undique æqualia. Quare ablato cõmuni triangulo DEG , trapezia relicta $CDGA$, $FEGB$, sunt æqualia; & addito communi triangulo ABG , parallelogramma $ABCD$, $ABEF$, sunt paria.



Pro-



Propositio 36. Theore.

Parallelogramma super equalibus basibus, & in eisdem parallelis constituta, inter se sunt aequalia.

Sint parallelogramma A C,  ADEH
E G, inter parallelas A H,
B G, super basibus paribus

B C, F G iunganturque rectæ
B E, G H: quæ quia iungunt æquales &
parallelas B C, E H, sunt & ipsæ æqua- a 34.
les, & parallelæ: estque E B C H, paral-
lelogrammum b æquale tam ipsi A C,
cum sit super eadem basi B C, quam al- b 35.
teri E G, cum sit etiam super eadem basi
E H Sunt ergo & extrema parallelogra-
ma A C, E G, c æqualia. c 47. 1.

Propositio 37. Theore.

Triangula super eadem basi & inter parallelas easdem posita, sunt aequalia.

Sint triangu-
la $A B C$,
 $D B C$, super eadem ba-
si $B C$, inter parallelas $B C$,
 $E F$, ducanturque rectæ $E B$,
 $F C$, parallele ipsi $A C$, $D B$.



Quia er-
go parallelogramma $E B C A$, $D B C F$,
sunt super eadem basi $B C$, & inter eas-
dem parallelas, æ erunt æqualia. At trian-
gulum $A B C$, est dimidium b parallelo-
grammi $E C$; cumq; triangulum $D B C$,
alterius parallelogrammi $B F$, sit etiam
dimidium erunt triangu-
la $A B C$, c
 $D B C$, inter se æqualia, quod erat de-
monstrandum.

a 35.

b 34.

c 28. 7.

Propositio 38. Theore.

*Triangula super equalibus basibus &
in eisdem parallelis sunt æqualia.*

Triangula $A B C$, $D E F$,
sint constituta ut propo-


nitur, ducanturq; rectæ $C G$,
 $F H$, ipsi $A B$, $D E$, paral-

lele eruntque parallelogramma $B G$,
 $E H$, iuxta 36. æqualia; unde horum di-
midia, hoc est a triangu-
la $A B C$, $D E F$,
erunt æqualia.



a 34.

Pro-



Propositio 39. Theore.

*Triangula equalia super eadem basi
& ad easdem partes constituta in
eisdem sunt parallelis.*

N Am si triângula $A B C$
 $D B C$, super eadem
 basi $B C$, constituta, sint æ-
 qualia, & negas tamen re-
 ctam ex A , per D , ductam ipsi $B C$, esse
 parallelam; ducatur alia quæ sit paralle-
 la, puta $A E$, cui recta $B D$, occurrat
 in puncto E : ductâ ergo rectâ $C E$, erit
 triângulum $A B C$, æquale a triângulo 37.
 $E B C$, quod fieri non potest: nam trian-
 gulum $D B C$; æquale ponitur eidem
 triângulo $A B C$; ergo totum & pars vni
 & eidem essent æqualia; non ergo erit al-
 lia quam $A D$, parallela ipsi $B C$.





Propositio 40. Theore.

Æqualia triangula & ad easdē partes super equalibus basibus constituta sunt inter easdem parallelas.

Nam si triāgula $A B C$, $D C E$, posita sint æqualia & super æqualibus basibus $B C$, $C E$, ne-



ges tamen rectam $A D$, ipsi $B E$, esse parallelam, sit parallela $A F$, cui occurrat $C D$, in puncto F . Tunc vero ductā $F E$, triangulum $F C E$, erit æquale ipsi $A B C$, cui eidem æquale ponitur triangulum $D C E$; erunt ergo pars & totū eidem æqualia, quod esse nequit. Et hanc manifestum est esse conuersam propo. 38.

Propositio 41. Theore.

Si parallelogrammum & triangulum eandem habuerint basim sintque in iisdem parallelis, erit parallelogrammum duplum trianguli.

Sint

Sint parallelogrammū $ABCD$, & triangulum EBC , super eadem basi BC , & inter parallelas AE , BC ; ducaturque AC .



Quia ergo triangula ABC , & EBC , sunt æqualia, & ABC , est dimidium parallelogrammi BD , sequitur etiam triangulum EBC , eiusdem parallelogrammi esse dimidium.

Propositio 42. Proble.

Dato triangulo aequale parallelogrammum constituere in dato angulo rectilineo.

Sint data triangulū ABC , & angulus D , basi que BC , bifariam secta in E ,



ducatur AE , agaturque per A recta AG , ipsi BC , parallela, mox ad E punctum; facto angulo FEG , ipsi D , equali, educatur ex C , recta CE , ipsi FE , parallela. Quia ergo triangula ABE , AEC , super æqualibus basibus BC , EC , sunt æqualia; &

d 41.

triangulum AEC , parallelogrammi super eadē basi EC , constructi d est dimidium, sequitur totum triangulū ABC , esse æquale parallelogrammo EG . Dato ergo triangulo æquale parallelogrammū constituimus, habens angulum FEC , dato angulo, D , æqualem.



Propositio 43. Theore.

Omnia parallelogrammi eorum quæ circa diametrum sunt parallelogrammorum complementa sunt inter se equalia.

Circa diametrum KN , parallelogrammi LD , consistant parallelogramma FM , EH , complementa vero quæ dicuntur, sint parallelogramma DG , GL , per quæ diameter KN , non transit; quia igitur diameter KN , diuidit bifariam tria parallelogramma DL , FM , EH , erunt triangula KFG , GEN , equalia triangulis KMG , GHN , sed & totū KDN , toti triangulo KLN , æquale est: comple-



a 143

plementa ergo D G , G L , sunt *b* etiam *b* 22. 3.
 æqualia . Omnis ergo parallelogram-
 mi, &c.

Propositio 44. Proble.

*Ad datam rectam parallelogram-
 mum constituere , dato triangulo
 æquale, in dato angulo rectilineo.*

S It data recta A ,
 triangulum B , &
 angulus C : Fiat
 deinde parallelogra-



mū D G , *a* æquale triangulo B , habeatq; *a* 42.
 angulum E G F , angulo C , æqualē . Post
 hæc producto latere F G , in H , ita ut
 G H , sit æqualis rectæ A , per H , agatur
 L N , *b* parallela ipsi E G , & occurrens la- *b* 31. 2.
 teri D E , in puncto N . Rursus producto
 latere D F , ducatur ex N , diameter per
 G , occurrens ipsi D F , in K , ductaque per
 K , recta K L , parallelâ ipsi F H , latus
 E G , producat in M . Quo facto dico
 parallelogrammum G L , esse quod peti-
 tur : nam quia complementa *c* sunt æqua- *c* 34.
 lia , cum complementum *d* G D , sit æ- *d* const.
 quale triangulo B , erit etiam G L , ei-
 dem B , æquale ; sed & angulus M G H ,
 æqualis est angulo F G E , opposito *e* ad *e* 15.

C ;

ver-

verticem, quare & ipsi C, erit æqualis;
estque recta G H, æqualis datæ rectæ
A : Igitur ad datam rectam, &c.

Propositio 45. Proble.

Dato rectilineo æquale parallelogrammum constituere in dato angulo rectilineo.

Sit datus angulus E,
& rectilineum A B
D C, in quo ducta
recta A D, fiat parallelo-



- a 44. grammum F I, a æquale triangulo A C D,
in angulo H, qui sit ipsi E, æqualis : pro-
trahatur deinde latus H I, & ad rectam
G I, in angulo G I L, (qui est æqualis
b 29. ipsi H, b quare & ipsi E,) fiat parallelo-
grammum G L, æquale triangulo A B D,
eritque tota figura F L, parallelogram-
mum; recte enim F H, K L, eidem c G I,
c const. ideoque etiam inter se d sunt parallelæ.
d 30. Et quia tota H L, est vnica recta cuius
partibus partes lineæ F K, sunt e paralle-
e const. læ ipsa etiam F K, erit vnica recta (quod
etiam probari potest quia anguli H, &
34. F G I, itemque anguli L, & K G I, f æ-
quales sunt; Sicut ergo anguli H, & L,

valent g duos rectos ita etiam anguli g 29.
 $F G I$, $K G I$, ideoque $F G K$, est b vni. b 14.
 ea recta) ac propterea figura $F K L H$,
 est parallelogrammum æquale dato re-
 ctilineo, ut patet.

Propositio 46. Proble.

*A data recta linea quadratum de-
 scribere.*

S It data recta $A B$, ad cuius $C D$
 extrema A & B excitentur  11.
 perpendiculares $C A$, $D B$,
 ipsi $A B$, æquales, iungaturque $A B$
 recta $C D$, & constitutum est quadratū.
 Cum enim anguli A & B , sint recti, b 28.
 erunt $A C$, $D B$, parallelæ, suntque etiā
 æquales, quare $C D$, $A B$, sunt quoque c const;
 parallelæ & æquales; atque ita tria reli-
 qua latera ipsi $A B$, sunt equalia, & figu-
 ra est parallelogramma cumque anguli
 A & B ; sint d recti e erunt etiam oppo- d const;
 siti C , & D , recti: quare figura $A D$ est e 34.
 quadratum, ex definit. 27.



Propositio 47. Theore.

In rectangulis triangulis quadratum quod à latere rectum angulum subtendente describitur, æquale est duobus simul quæ à laterib. rectum angulum continentibus describuntur, quadratis.

IN triangulo ABG , angulus BAC , rectus sit, fiantque super $\bullet$ lateribus AB , AC , quadrata BG , GH . Item fiat super latere BC , angulum rectum subtendente quadratum BK , quod dico æquale esse duobus aliorum laterum quadratis simul sumptis: ductâ enim AE , parallêlâ ipsi BD , iungantur etiam rectæ AD , FC . Quo facto triangula ABD , FBC , sunt iuxta 4. nam latera BD , BA , ipsis BC , BF , æqualia sunt, & anguli contenti FBC , ABD , æquales, quandoquidem anguli FBA , CBD , recti sint & angulus ABC , communis: triangula ergo ABD , FBC , ut dixi, $\bullet$ sunt æqualia: sed



triang.

triangulum ABD , est dimidium ϵ parallelogrammi BE , cum sit super eadē basi BD ; interparallelas BD , AE , & eisdem ob causas triangulum FBG , est dimidium quadrati BG ; quadratum ergo BG , æquale est parallelogrammo BE , cum eorum dimidia sint paria. Quod si similiter puncta BI , AK , ductis lineis iungantur, eadem plane methodo probabitur parallelogrammum EC , quadrato CH , esse æquale. Totum igitur quadratum BK , reliquis duobus æquale est. In rectangulis igitur, &c.

Propositio 48. Theore.

Si quadratum ab uno trianguli latere descriptum æquale est duobus reliquorum laterum quadratis, angulus quem reliqua latera continent est rectus.

IN triangulo ABC , sit latus AC , huiusmodi, ut eius quadratum æquale sit quadratis duorum reliquorum laterum AB , BC ; dico angulum ABC , contentum iisdem lateribus esse rectum.



Nam

Nam si ducatur ex B, ipsi A B,
perpendicularis B D, ipsi B C,
æqualis, iungaturque recta



A D, tunc quia angulus A B D,
rectus est, erit quadratum ipsius A D, æ-
quale quadratis æ rectarum A B, & B D,
vel B C; cumque quadratum ipsius
A C, quadratis earundem A B, B C, po-
natur æquale, erunt lineæ A C, A D, æ-
quales inter se. Quia ergo duo triangu-
la A B C, A B D, habent tria latera æ-
qualia, sunt etiam anguli omnes æquales
qui sibi respondent: unde quia angulus
A B D, rectus est, rectus etiam erit
A B C; si ergo quadratum, &c. Est con-
uersa precedentis, ut satis patet.






EVCLIDIS Elementorum

LIBER II.

Definitiones.

1. **P**arallelogrammum rectangulum contineri dicitur sub duabus lineis quæ rectum angulum comprehendunt.

VT parallelogrammū rectangulū $ABDC$, cōtinetur sub rectis AB , AC , continētibus angulū rectū A . Item sub rectis AB , BD , &c.




unde si intelligatur latus AC , duci in totū latus AB , peragatur tota quātitas dati rectāguli. Atq; hinc etiā manavit illa loquēdi formula in Arithmeticiis, qua dicimus unum numerum duci in alium, seu multiplicari per alium; si enim latus AC , sit 4 pedum, & AB , sex pedum ducendo 4 in 6 inueniatur area dati rectanguli pedum quadratorum 24.

2. In

2. In omni parallelogrammo spatium quodlibet eorum quæ circa diametrum sunt parallelogrammorum cum duobus complementis Gnomon vocetur.

V T in parallelogrammo AB , parallelogrammum LM , tum duobus complementis EM , LF , vocatur Gnomon.



Item parallelogrammum FE , cum duobus iisdem complementis est Gnomon. Solet autem Gnomon designari linea curva qua transit per complementa & parallelogrammum intermedium qualis est HIK .

Nomen Gnomon assumptum esse videtur ab instrumento fabrilis quod Normam aut angulum rectum dicimus; gallicè *une Esquarre*, hæc enim figura, puta HIK , applicatur instar illius instrumenti parallelogrammo FE .

Propositiones.

Propositio I. Theore.

Si fuerint due rectæ quarum altera secetur in quotcumque segmenta,

rectangulum sub duabus illis rectis contentum æquale erit omnibus simul rectangulis, quæ sub infecta & partibus lineæ sectæ continentur.

S Vb rectis AB, AC , cōtineatur rectangulum AD , rectâque AB , ut-
 cunque diuisâ in E , & F ,
 ducâtur FH , & EG , ipsi BD , parallelæ;
 eruntq; AG, EH, FD , rectangula; nam
 angulus EGH , ipsi C , a est æqualis, & a 29. 1.
 omnes alios facile est ostendere alicui re-
 cto esse æquales, Manifestum est etiam
 rectangula partialia AG, EH, FD , si-
 mul sumpta toti rectangulo AD , esse
 æqualia, nam b omnes partes simul sum- b 13. 22.
 ptæ toti sunt æquales. Et hoc tantum
 vult propositio. Nam AB, AC , sunt
 duæ rectæ, quarum AB , secta est utcu-
 que in E , & F : ostensum est autem re-
 ctangulum AD , ipsis AB, AC , con-
 tentum, æquale esse rectangulis partiali-
 bus quæ continentur sub infecta AC , &
 partibus lineæ sectæ AB : rectangulum
 enim AG , continetur sub infecta AC ,
 & parte AE ; rectangulum vero EH ,
 continetur sub EG , hoc est sub infe-
 ctâ AC , & sub parte GH , & sic de
 c2.



cæteris . Si ergo fuerint, &c.

Idem videre est in numeris . Si enim dentur duo numeri 4 & 10, & alter eorum puta 10 diuidatur in quotius partes 5, 3, 2, ex ductu seu multiplicatione ipsius 4 in omnes partes 5, 3, 2, fient 40. sicut ex multiplicatione eiusdem 4 in totum numerum 10.

Propositio 2. Theore.

Si recta secta sit utcumque: rectangula sub tota & quolibet segmentorū comprehensa, æqualia sunt ei, quod à tota sit quadrato.

Rectangulum A B, sit quadratum rectę A C, rectęque A C, utcumque diuisâ in E, ducatur E F ipsi C B, parallela & manifestum est, ut prius, a rectangula partialia A F, E B, simul sumpta, toti A B, esse æqualia Neque aliud vult propositio. Nam recta A C, utcumque secta est in E: rectangula autem A F, E B, contenta sub A D, E F, (hoc est sub tota A C) & sub partibus A E, E C, æqualia sunt quadrato totius A C, quod est A B. Si ergo recta, &c.



In numeris : si 10 diuidatur in duas partes 7 & 3, ducendo 10 in 7, & in 3, fient 70 & 30, qua simul equalia sunt numero quadrato ipsius 10 qui est 100: dicimus enim numerum quadratum qui fit ex ductu cuiusvis numeri in seipsum; ut decies decem sunt numerus quadratus centum.

Propositio 3. Theore.

Si recta secta sit utcumque, rectangulū subtota & uno segmentorum comprehensum equale est illi quod subsegmentis comprehenditur rectangulo una cum quadrato, quod à prædicto segmento describitur.

Recta A E, utcumque secetur in C, sitque A B, quadratum segmenti A C, rectangulum vero A D, contineatur sub tota A E, & sub A F, hoc est sub æquali A C; & manifestum est ut prius rectangula A B, C D, simul sumta, toti A D, esse æqualia, Neque aliud vult hæc propositio, Nam



Nam recta A E, utcumque secta est in C, & rectangulum A D, sub tota A E, & A F, hoc est sub parte A C, æquale



est ipsi A B, quadrato partis A C, una cum rectangulo C D, quod continetur sub C B, (hoc est sub parte A C,) & sub reliqua parte C E. Si ergo recta, &c.

In numeris si 6 dividatur in 4 & 2. productum ex 6 in 4 hoc est 24, æquale est ei quod fit ex 4 in 2, hoc est 8, una cum quadrato ipsius 4 quod est 16.

Propositio 4. Theore.

Si recta secta sit utcumque, quadratum quod à tota describitur æquale est segmentorum quadratis, una cum rectangulo quod bis sub segmentis continetur.

Rectangulum A B, sit quadratum ipsius A C, ductaque diametro D C, agatur E F, ipsi C B, parallela, secans diametrum



utcumque in G, per quod idem punctum agatur H I, ipsi A C, parallela: & manifeste.

festum est ut prius quadratū $A B$, totius $A C$, esse æquale omnibus simul rectangulis intra se descriptis. Neque aliud vult propositio. Nam recta $A C$, secta est ut-
 cunque in E , & eius quadratū $A B$, æqua-
 le est ipsis $H F$, $E I$, (quæ sunt quadrata
 segmentorū $A E$, $E C$,) simul cū rectan-
 gulis $A G$, $G B$, quæ sunt rectangulum
 bis cōprehensum sub partibus $A E$, $E C$:
 rectangulum enim $A G$, continetur sub
 $A E$, $E G$, hoc est sub $A E$, $E C$, & re-
 ctangulū $G B$, continetur sub $G F$, $G I$,
 hoc est sub $A E$, $E C$: rectangula enim
 $H F$, $E I$, sunt quadrata partium $A E$,
 $E C$, quod (etsi ex 33. 1. satis poterat
 intelligi,) sic demonstro. Quia rectæ
 $A E$, $G H$, $D F$, iungunt parallelas æqua-
 les, sunt a & ipsæ inter se æquales. Item si
 ab æqualibus $A C$, $B C$, auferantur æqua-
 les $E C$, $I C$, quæ remanent $A E$, $B I$, &
 quæ huic pares sunt $G F$, $H D$, omnes in-
 ter se erunt æquales, omnia igitur latera
 parallelogrammi $H F$, æqualia sunt parti
 $A E$, suntq; omnes anguli recti, nam quia
 $H D F$, rectus est & rectus etiam $G F D$,
 (cum sit æqualis ipsi B) etiam b oppositi
 reliqui erunt recti. Est ergo $H F$, quadra-
 tum ipsius $A E$. Similiterque ostendetur
 $E I$, esse quadratum partis $E C$. Et sic
 demonstrata est tota propositio.

In numeris: Si 6 diuidatur in 4 & 2 quadratum ipsius 6 quod est 36 æquale est quadratis partium 4 & 2 hoc est 16 & 4, una cum numero 8 bis repetito qui fit ex partibus 2 & 4 inter se multiplicatis.

Propositio 5. Theore.

Si recta secetur in equalia & non equalia: rectangulum sub inæqualibus segmentis totius comprehensum, una cum quadrato segmenti intermedij, æquale est ei quod à dimidia describitur; quadrato.

Recta AB, bifariam in C, & non bifariam in D, diuidatur; & super dimidia CB, fiat quadratum CE, ductaque diametro FB, agatur per D, recta DK, ipsi BE, parallela, secans diametrum in G, per quod punctum agatur LH, ipsi AB parallela & adiungatur recta AL, ipsi BH, parallela. Quo facto erit rectangulum AG, sub inæqualibus segmentis AD, DB,



D B, hoc est D G, contentum, vna cum M K, quadrato medij segmenti C D, æquale quadrato dimidiæ C B, quod est C E. Nam rectangulum A M, æquale est ipsi D E, cum utrumque ipsi C H, sit æquale; (A M, quidem ex const. D E autem per 36. 1.) cætera autem nimirum C G, & M K, sunt communia. Quare si recta, &c.

In numeris : Diuidatur numerus 10 æqualiter in 5 & 5, inequaliter in 7 & 3, ita ut numerus medius inter sectiones sit 2; quo dimidius numerus superas partem minorem ex inequalibus : quæ est 3, eritq; numerus 21 ex 7 in 3 vna cū quadrato numeri intermedij 2 quod est 4, æquale quadrato dimidiij 5, hoc est numero 25.

Corollarium.

Ex his manifestum est gnomonem N O P, toti rectangulo A G, esse æquale; quandoquidem C G, sit commune, & D E, reliquo rectangulo A M, sit æquale.

Pro-

BH, gnomon NOP, æqualis fiet toti rectangulo AH, (quod sanè rectangulum continetur sub tota composita AD, & sub DH, hoc est sub parte & adiecta DB) sed gnomon NOP, adiecto LG, quadrato partis dimidiæ CB, vt supra in simili ostendimus, fit æqualis quadrato ipsius CD, quæ est pars dimidia cum adiecta BD. Igitur parallelogrammum AH, adiecto eodem quadrato LG, fiet g æquale eidem quadrato CF, quod erat probandum. const. s. 2. g. 13. ax.

In numeris si 6 diuidatur equaliter in 3 & 3, eiq; addatur 2; numerus 16 (qui fit ex toto 6 cum adiecto, in ipsum adiectum) una cum quadrato dimidiij, quod est 9 æqualis est quadrato ipsius 5 qui quidem numerus 5 componitur ex dimidio 3 & adiecto 2.

Propositio 7. Theore.

Si recta utcumque secetur, quadrata totius & utriusvis segmenti simul sumpta, paria sunt rectangulo biam sumpto sub tota & dicto segmento, una cum adiuncto alterius segmenti quadrato.

D

Ro.

R Ecce A B, secunda sit ut-
cunque in C, & super
A B, fiat quadratū A E, sum-
ptaque B M, æquali ipsi
B C, ducantur C L, M K, ip-
sis B E, A B, parallelæ: producto deinde
L F, æquali ipsi C B, addatur quadratum
L G. Erunt igitur, ut patet, quadratum
totius A B, quod est A E, simul cum
quadrato segmenti C B, quod est L G,
æqualia & rectangulis A M, M F, (quæ
bis sumuntur sub tota A B, & segmento
B C, cum B M, sit ipsi B C, æqualis, &
in rectangulo M F, æqualia latera sint
M G, G F, ipsis A B, B C) una cum
quadrato alterius segmenti A C, quod
est K L, Si igitur recta, &c.



13.22.


*In numeris: si 6 utcunque dividatur
in 4 & 2, quadratum totius 6 una cum
quadrato ipsius 4 æqualia sunt numero
12, qui fit ex numero 6 bis in 4, una cū
quadrato alterius partis 2 quod est 4.*

Propositio 8. Theore.

*Si recta secetur utcunque, rectangulū
quater comprehensum sub tota &
uno segmentorū, una cum alterius
par-*

partis quadrato equalia sunt quadrato quod fit à tota & segmento, tanquam ab una linea.

Recta AB , utcumque secetur in C , cui adjiciatur in rectum linea BD , ipsi BC , æqualis, ac super tota AB , & adiuncto segmento BD , fiat tanquam super una linea quadratum AF , ducanturque BG , CH , IK , LM , lateribus quadrati AF , parallele, sic ut DK , KM , ipsis BD , BC , sint æquales. Erunt ergo in gnomone ORQ , rectangula quatuor contenta sub rectis AB , & BC . Nam circa R , constituta sunt quadrata quatuor, quorum latera omnia ipsi BC , sunt equalia; si igitur unicuique ex quatuor complementis AS , & similibus, adjiciatur suum quadratum, venietur in gnomone ORQ , quatuor ut dixi rectangula equalia ipsi AR , quod continetur sub AB , BR , hoc est BC . Est vero gnomon ORQ , seu quatuor rectangula sub rota AB , & segmento BC , cum adiuncto EN , quadrato alterius partis AC , æqualis quadrato AF , quod sit super AD , ut patet. Si igitur recta, &c.



In numeris si 6 utcumque secetur in 4 & 2 ducendo quater numerum 6 in 4 & addendo quadratum ipsius 2, fiet numerus equalis quadrato ipsius 10 quinumerus componitur ex toto 6 & parte 4.

Propositio 9. Theore.

Si recta secetur per equalia & non equalia, quadrata partium inaequalium dupla sunt quadratorum ab uno dimidio, & ab ea linea quae sectionibus interijcitur, descriptorum.

Recta AB , secetur α -qualiter in C , in α -qualiter in D ; super quam ad C , erigatur CE , perpendicularis, & ipsi CA , vel CB , α -qualis, ducanturque AE , EB , itemque DF , ipsi CE , & FG , ipsi CD , parallela, ac denique iungatur recta AF . Iam vero quia in triangulo ACE , latera CA , CE , α -qualia sunt: anguli α CAE , AEC , pares erunt: est autem angulus ECA , rectus: duo ergo alij sunt semirecti. Similiterque in triangulo ECB , anguli



guli CBE , BEC , semirecti sunt: totus ergo angulus AEB , rectus est. Cumque in triangulo EGF , angulus G , rectus sit & GEF , semirectus, erit etiam angulus GFE , semirectus. Quare latera GE , GF , *b* æquales angulos subtendentia, *b* 6. 1. sunt æqualia. Æqualis etiam utrique *c* est *c* 34. 24 recta CD , cum CF , sit parallelogrammum. Quare si ab æqualibus CE , CB , abferantur æqualia GE , CD , recta CG , hoc est DF , ipsi DB , erit æqualis.

His intellectis sic breuiter colligitur propositio. Quadrata partium inæqualium AD , & DF , siue DB , *d* æquialēt *d* 47. 24 quadrato ipsius AF , & hoc quadratum ex AF , æquiualeat ijs quæ sunt ab AE , EF : Sed harum quadrata duplā sunt quadratis rectarum AC , dimidiæ, & CD , partis sectionibus interiectæ; cum enim AC , CE , sint pares, & AE , det quadratum utriusque quadratis æquale, efficiet duplum quadrato ipsius AC ; similiterque EF , dabit duplum quadrati ipsius GF , seu CD . Quare quadratum ipsius AE , & partium inæqualium AD , & DF , hoc est ipsius DB , duplum sunt quadratorum ex AC , CD ; partis scilicet dimidiæ & lineæ sectionibus interiectæ. Si igitur recta, &c.

In numeris : Numerus 10 diuidatur aequaliter in 5 & 5, inaequaliter in 7 & 3, fitq; intermedia sectio 2, ut propositio nequinta. Quadrata ergo 49 & 9 partium inaequalium 7 & 3, sunt duplum, quadratorum partis dimidia 5 & sectionis intermedia 2.

Propositio 10. Theore.

Si recta secetur bifariam & in rectis alia adyiciatur, quadratum quod fit à tota cum adiecta, simul cum eo quod fit à sola adiuncta, duplum sunt quadrati quod fit à dimidia, & alterius quod à dimidia & adiuncta describitur.

Recta A B, bifariam secetur in C, adiecta ut-
cunque B D, cui ad C, erigatur perpendicularis C F, dimidiae A C, æqualis, perficiaturque parallelogrammum F D, ductaque F B, occurrat lateri E D, producto in G, iunganturque A G, A F, eritque angulus A F B, constans duobus semirectis, ut in simili ostensum est prop. 9. Quare & an-
gu-



gulus $FB C$, semirectus est: semirectus
 b quoque $D B G$, oppositus ad verticem, b 15. 1.
 quare & $D G B$, semirectus erit, & latera c 6. 1.
 c $B D$, $D G$, æqualia. Æqualia item erunt
 latera $E G$, d $F E$, quia anguli $F G E$, d 47. 3.
 $E F G$, sunt semirecti. His positis qua-
 dratum ex $A F$, erit duplum quadrati di-
 midia $A C$, & cum rectæ $E G$, $F E$, ostē-
 sæ sint æquales, erit quadratum ex $G F$,
 duplum quadrati ex $E F$, hoc est ex di-
 midia $C B$, cum adiuncta $B D$. Sed & ip-
 sius $A G$, quadratum æquivalet quadra-
 tis duarum $A F$, $F G$; & quadratum ex
 tota $A B$, cum adiuncta $B D$, vna cum
 quadrato ex $D G$, seu adiuncta $B D$, æ-
 quivalet quadrato ex $A G$. Quare harū
 linearum $A B$, $B D$, quadrata duplum
 quoque sunt quadratorum ex $A C$, &
 $C D$, quod erat demonstrandum.

*In numeris : Diuidatur 6 equaliter
 in 3 & 3, eiq; addatur 2, ut sit numerus
 compositus 8; quadrata igitur ipsius 8
 & adiecti 2. duplum sunt quadratorum
 dimidij 3, & numeri 5 qui constat ex di-
 midio & adiecto.*



Propositio II. Proble.

*Datam rectam ita secare, ut rectangulum sub tota & altero segmento-
rum, æquale sit quadrato quod fit à
reliqua parte.*

S It data recta A B, ita secanda ut rectangulum sub tota & segmento altero, æquale sit quadrato partis alterius. Fiat igitur super A B, quadratum A C, diuisoque latere A D, bifariam in E, ducatur E B, cui æqualis fiat E I, latere D A, producto : fiat insuper quadratum super A I, quod sit G I, producto latere H G, in F : eritque recta A B, diuisa ut oportuit ; siquidem rectangulū C G, sub tota C B, seu A B, & segmento B G, æquale est quadrato G I, quod fit à segmento altero G A : quia enim D A, secta est bifariam in E, ei que in rectum addita est A I, erit rectangulum sub D I, A I, hoc est ipsum D H, una cum quadrato dimidiæ E A, æquale quadrato ipsius E I, seu E B. Est vero quadratū ipsius E B, æquale quadratis ipsarum A B,



• 61

• 47. 1.

A B, A E. Vnde rectangulum D H, cum quadrato ex A E, erit etiam æquale quadratis earundem A B, & A E. Ablato igitur communi quadrato ipsius A E, erit rectangulum D H, æquale quadrato ipsius A B, quod est A B C D : & rursus, ablato ab hoc quadrato & rectangulo D H, communi rectangulo A F, rectangulum C G, relictum ex quadrato, æquale erit quadrato G I, quod reliquum est ex rectangulo. Datam igitur rectam ita secimus vt rectangulum C G, sub tota A B, & altero segmento B G, quadrato partis alterius G A, sit æquale, quod erat faciendum.

Propositio 12. Theore.

In triangulo obtusangulo quadratum lateris angulum obtusum subtendentis tanto maius est quadratis laterum eundem angulum continentium, quantum est rectangulum bis comprehensum sub alterutro latere continente (sub illo nempe in quod, cū fuerit productum, placuerit perpendicularē ex opposito angulo de-

*mittere & sub linea extrinsecus
assumpta ad cuius extremum cadit
ipsa perpendicularis.*

IN triangulo $A B C$, angulus $A C B$, sit obtusus, productoque alterutro latere, puta $B C$, ex A , demittatur $A D$, perpendicularis ipsi $B C$, cadens in D : Dico igitur quadratum lateris $A B$, obtuso angulo subtensi tanto esse maius quadratis laterum continentium $B C$, $C A$, quantum est rectangulum bis comprehensum sub $B C$, & recta $C D$, extrinsecus sumpta, ad cuius extremum ex acuto angulo A cadit perpendicularis $A D$. Quia enim recta $B D$, secta est ut-
 4. cunque in C , erit a quadratum ex $B D$, æquale quadratis ex $B C$, $C D$, & insuper rectangulo bis sub $B C$, $C D$, comprehenso: additoque vtriusque quadrato rectę $A D$, erunt quadrata ipsarum $B D$, $D A$, equalia quadratis trium rectarum $B C$, $C D$, $D A$, vna cum addito rectangulo bis sub $B C$, $C D$, contento. Sed
 47.1. quadratum rectę $A B$, b æquivaleret quadratis rectarum $A D$, $D B$. Igitur idem quadratum rectę $A B$, æquivaleret etiam tribus quadratis rectarum $B C$, $C D$, $D A$.



DA, & rectangulo bis sub BC, CD, contento. Iam vero quia quadratum rectæ AC, æquale est quadratis ipsarum CD, DA, erit quadratum rectæ AB, æquale quadratis rectarum CB, CA, & rectangulo bis contento sub BC, CD. In triangulo igitur obtusangulo, &c.

Propositio 13. Theore.

In triangulis acutangulis quadratum lateris acuto angulo subtensi tantum minus est quadratis laterum continentium eundem angulum, quantum est rectangulum bis comprehensum sub uno laterum continentium & sub assumpta interiori linea prope acutum angulum ad cuius extremum cadit perpendicularis ab opposito angulo ducta.

IN triangulo ABC , sit angulus acutus C , & ex alio quocumque angulo, puta ex A , ducatur recta AD , perpendicularis ipsi BC . Dico igitur quadratum ipsius AB , angulum C , subtendentis, tanto minus esse quadratis ex BC , CA : quantum est rectangulum sub BC , DC , bis contentum. Quia enim recta BC , utcumque secta est in D , quadrata ex BC , CD , paria sunt rectangulo bis sub BC , CD , vna cum quadrato ex BD , sed duobus quadratis rectarum CD , DA , par est quadratum ex CA : duo igitur quadrata ex BC , CA , paria sunt etiam rectangulo bis comprehenso sub BD , DC , & quadrato ex BD . Iam vero quia quadratis ex BD , DA , æquale est e quod fit ex AB ; erunt quadrata ex BC , CA , æqualia rectangulo bis contento sub BC , DC , & quadrato rectæ AB . Quare quadratum ex AB , tanto minus est quadratis ex BC , CA , quantum est rectangulum bis sub BD , DC , contentum. In triangulis igitur, &c.




Pro-



Propositio 14. Proble.

*Dato rectilineo aequale quadratum
describere.*

S It datum recti-
lineum A, cui
fiat α aequale
parallelogrammū
B E; in quo si la-




45. 1.

tera B C, C E, sunt æqualia, ipsum erit
quadratum quale petebatur. Quod si la-
tera non sunt æqualia, eorum alterutrum
puta B C, producat in F, ita ut C F,
ipsi C E, æqualis sit, sectâque bifariam
rectâ B F, in G, centro G, spatio G B,
fiat semicirculus B H F, protracto late-
re E C, usque dum secet circulum in H:
eritque quadratum ipsius C H, æquale
dato rectilineo A. Ductâ enim recta
G H, quia recta B F, bifariam secta est
in G, & non bifariam in C, erit rectan-
gulum sub B C, C F, hoc est b rectangu- b 5.
lum B E, cū quadrato ipsius G C, æqua-
le quadrato ex G F, vel G H, quæ sunt
æ lineæ æquales. At quadrata ex G C, d def. 15, 1.
 d 47. 1.

G H,

CH, valent qua-
dratū ipsius GH,
eadem ergo qua-
drata ex GC, CH.
valent rectāgulum



BE, cum quadrato ipsius GC : relicto
ergo communi quadrato rectæ GC,
quadratum ipsius CH, valebit rectan-
gulum BE, quod ab initio factum est æ-
quale rectilineo A. Quadratum ergo
ipsius CH, æquale erit rectilineo A. Fa-
cto igitur quadrato super CH, consti-
tuerimus quadratum dato rectilineo æ-
quale, quod erat faciendum.





EVCLIDIS

Elementorum

LIBER III.

Definitiones.

1  Quales circuli sunt quorum diametri vel è centris lineæ ad ambitum ductæ, sunt æquales.

2 Linea recta circulum tangere dicitur quæ cum tangat, producta longius circulum non secat. Talis est linea *AB*, quæ cum tangat circulum *CDE*, in pñcto *C*, producta longius eum non secat.



3 Circuli se tangere dicuntur qui cum se tangant, se tamen mutuo non secant. Tales sunt circuli *CDE*, *CFG*.

4 In circulo equaliter distare à centro rectæ lineæ dicuntur cum perpendicularibus à centro ad ipsas ductæ æquales sunt. *Ut lineæ AB, CI, equaliter distant à centro D, quia perpendiculares DE, DF, à centro D, ad ipsas ductæ, sunt æquales.*



5 Segmentum circuli est figura quæ sub recta linea & circuli circumferentia continetur. *Talis est figura contenta recta CI, & circumferentia CGI.*

6 Segmenti angulus est qui recta linea & circuli peripheria consideratur. *Tales sunt anguli A & B.*



7 In segmento autem angulus est cum in segmenti circumferentia sumptum fuerit punctum quodpiam, & ab illo ad lineæ terminos rectæ fuerint adiunctæ. *Sic angulus ABC, est in segmento CBA.*



8 Cum vero comprehenderes angulum datæ lineæ assumunt peripheriam, illi ipsi assumptæ peripheriæ angulus dicitur insistere. *Ut angulus DAB, dicitur insistere circumferentia DCB.*



9 Sector autem circuli est cū ad ipsum circuli centrum angulus fuerit constitutus. *Vi sicut ad centrum A, sit constitutus angulus B A C, figura B A C D, dicetur sector circuli.*



10 Similia circuli segmenta sunt quæ angulos capiunt æquales; aut in quibus anguli sunt æquales.

Propositiones.

Propositio I. Problem.

Dati circuli centrum reperire.

IN circulo A B C, ducatur utcumque recta A C, quā bisectā in *a* D, per idem punctum D, agatur perpendicularis B G, *b* attingens utrimque ambitum. Diuidatur *c* deinde recta B G, bifariam in F, eritque punctum F, centrum circuli. Non enim erit aliud punctum in ipsa B G, cum centrum non possit in vlla linea esse nisi *d* ubi secatur bifariam. Sed neque extra *d* rectam B G. Fac enim esse in E ducanturque E A, E D, E C; probabitur sanè angulum E D A, esse rectum; nam in triangulis A D E, C D E, latera A D, D C,



a 10. 1.

b 1. 1.

c 10. 1.

d def. 15.

1.

e const. D C, & æqualia sunt & D E, commune, æqualis item basis A E, basi E C; cum utraque ducatur ex centro E, ad ambitum. Erunt ergo anguli E D C, E D A, æquales & proinde recti. Hoc autem esse non potest, nam



f 8. 1.

angulus F D A, rectus est. Maior igitur recto est E D A. Non est igitur E centrum; sed neque aliud punctum extra rectam B G; Dati ergo circuli centrum est F.

Propositio 2. Theore.

Si in circuli ambitu duo puncta sumantur, recta ad illa puncta ducta intra circulum cadet.

a 1. S Vmantur puncta A & B, & ex a centro inuento C, ducantur rectæ C A, C B, C D.



Dico punctum D, & quodlibet aliud rectæ A B, cadere intra circulum. Quia enim C A, C B, pares sunt, pares erunt anguli A & B, eritque angulus C D B, maior opposito interno A; quare e maior etiam angulo B; latus

b 5. 1.

c 16. 1.

igi

igitur CB , subtendens $\angle$ angulum maiorem CD , maius est latere CD , subtendente minorem angulum B . Latus tamen CB , tantum pertingit ad ambitum, quare CD , quod est minus, ad ambitum non pertinget. Non est igitur punctum D , extra circulum; quod idem ostendetur de quovis alio in recta AB , si ergo in circuli ambitu, &c,

Propositio 3. Theore.

Si in circulo recta per centrum ducta aliam non ductam per centrum secet bifariam, secabit quoque ad angulos rectos. Et si ad rectos secet, secabit bifariam.

Recta AB , per centrum E , ducta secet CD , bifariam in F , ducanturque ex centro rectæ EC , ED . Quia ergo CE , CF , æqualia sunt lateribus DE , DF , & basis communis, erunt $\angle$ anguli EFD , EFC , æquales, ac proinde recti.



Quod

Quod si anguli ad F recti
sint; cum latera EC, ED,
trianguli ECD, paria sint,
anguli C & D, erunt æqua-
les, & sic erunt in triangulis EFC, EFD,
duo anguli C & EFC, duobus D &
EFD, æquales; sed & latera EC, ED,
angulis æqualibus adiacentia sunt æqua-
lia: æqualis igitur est basis FC, basi
FD. Si igitur in circulo, &c.



Propositio 4. Proble.

*Si in circulo recta se secant non per
centrum ambę ducta, non secabunt
se mutuo bifariam.*

SI enim per centrum tran-
sit una certum est eam bi-
fariam non secari, cum
non nisi in centro possit seca-
ri bifariam, nec altera ex hypothesi per
centrum transeat. Quod si neutrae per
centrum transeant ut sunt rectæ AB, CD,
dicantur tamen se mutuo bifariam secare
in puncto F; tunc ducta à centro E re-
cta EF; erit angulus EFC, rectus cum
altera per centrum ducta alteram ex-
tra centrum secans bifariam secet ad.



rectos: sed ob eandem causam angulus $E F B$, rectus erit pares ergo essent anguli $E F B$, $E F C$, pars & totum, quod fieri nequit.

Propositio 5. Theore.

Si duo circuli se mutuo secant non habebunt idem centrum.

Circulorū $A B C$, $A D C$, se mutuo in A & C , secantium sit idem centrum E si fieri potest: ducanturque $E A$, quidem à centro ad alterutram sectionem, $E D$ vero secans utcumque utrumque circumulum in punctis D & B . Quia igitur circuli $A D C$, centrum ponitur E , erunt $E A$, $E D$, æquales, & quia circuli $A B C$, idem centrum ponitur E , erunt $E B$, $E A$, æquales; ergo & inter se essent æquales $E D$, $E B$, pars & totum, quod esse nequit. Si ergo duo circuli, &c.



Propositio 6. Theore.

Si duo circuli interius se tangant, non erit eorum idem centrum.

Nam

N Am si duo circuli se interiorius tangant in A & putentur habere idem centrum E, ductis rectis E A, quidem ad contactum, altera verò secante utrumque circumulum, puta E B, ostendetur, ut supra, E D & E B, partem scilicet & totum, æquales esse ipsi E A: quod absurdum est. Si duo ergo circuli, &c.



Propositio 7. Theore.

In diametro circuli si aliud à centro punctum accipiatur, à quo rectæ plures in circumferentiam cadant, maxima erit ea quæ per centrum ducitur; minima reliquum eiusdē linea: aliarum vero maior est ea quæ transeunt per centrum est propior, neque plures quam duæ æquales duci possunt in circumulum ad utrinque partes ipsius minima.

IN diametro AB , sumatur punctum C , aliud à centro D , ducanturque, utcumque rectæ CA , CE , CF , CG . Dico maximam



earum esse CA , quæ transit per centrum D . Ductis enim rectis DE , DF , DG , trianguli GDC , duo latera GD , DC , quibus æqualis est AC , maiora erunt GC 20. 1. reliquo GC . Maior ergo est AC , quam GC ; eodemq; modo eadem recta CA , quibusvis alijs ex C , ductis ostendetur esse maior.

2 Deinde quia latera EC , CD , maiora sunt reliquo ED , cui æqualis est BD , si commune auferatur CD , latus CE , maius remanebat quam BC , & pari ratione ostendetur ipsam BC , reliquis ex C , ductis esse minorem.

3 Rursum quia in triangulis GDC , FDG , duo latera GD , DC , duobus DF , DC , paria sunt, & angulus GDC , maior quam FDG , erit basis GC , quæ 24. 1. propior est ipsi CA , maior remotiore CF .

4 Denique si angulo EDB , æqualis ponatur BDH , ducaturque CH , in triangulis EDC , HDC , erunt bases CE , CH , æquales, cum anguli CDE , CDH , & latera CD continentia sint æqualia. Neque 4. 2.

vero plures possunt duci ad partes minimæ B C, æquales prioribus. Si enim cadant intra puncta E H, remotiores erunt à recta C A, ac proinde minores ipsis C E, C H. Si autem ducantur extra puncta E H: erunt propiores ipsi C A, ac proinde maiores. Si igitur in diametro, &c.

Propositio 8. Theore.

Si extra circulum sumatur punctum quodpiam, à quo ad circulum ducantur rectę quaedam lineę, quarum una per centrum transeat, ceterę ut lubet ducantur, rectarum quę ducuntur ad eandem peripheriam maxima erit quę per centrum ducitur, & quę huic propinquior, maior est, remotiore. Extra circulum vero minima quę ab assumpto puncto ad diametrum tendit, & quę huic propior, minor est remotiore, & due tantum lineę æquales cadunt ab eo puncto in circulum ad partes minima vel maxima.

Extra

EXtra circulū A B-
CD, sumatur pū-
ctum E, à quo ducantur
quotuis rectę, quarum
vna EA, per centrum
F, transeat, cæterę vero
EB, &c. ut libet cadant



in circulum. Dico 1. rectarum quę du-
cuntur ad concavum circuli, maximam
esse EA, quę transit per centrum F.
Ductā enim ē centro recta FB, triangu-
li EFB, duo latera EF, FB, equalia ipsi
EA, maiora erunt latere EB, & sic de 20. 1.
reliquis.

2. Maior est etiam EB, quę propior
est ipsi EA, quam EC, aut alia remo-
tior. Nam quia trianguli EFB, latera
EF, EB, æqualia sunt lateribus EF,
FC, trianguli EFC, & angulus EFB,
maior quam EFC, maior erit basis
BE, quam CE. 24. 1.

3. Ductis rectis FH, FI, FK, quia triā-
guli EHF, maiora sunt duo c latera c 20. 1.
FH, HE, reliquo EF, si auferantur æ-
qualia FG, EH, maior manebit EH,
extra circulum, & reliquę EI, EK, quā
sit EG. Minima est ergo EG, quę ad
diametrum GH, ducitur.

4. Quia intra triangulum EIF, ducū-
tur rectę EH, HF, erunt hæ d mi- d 21. 1.
E no-

nores ipsis $E I$, $I F$, ablati ergo æqualibus $H F$, $I F$, adhuc minor remanebit $E H$, quam $E I$, & ob eandem causam minor est $E I$, quàm $E K$, quare minor est semper, quæ minimæ $E G$, est propior.



• 4.1.

Denique angulo $K E G$, si æqualis fiat $G F L$, ducaturque $L E$; quia triangula $E K F$, $E L F$, latus habent commune $E F$, & alterum $K F$, alteri $L F$, æquale, & parem angulum contentum lateribus, erunt bases $E L$, $E K$, æquales. Neque plures his duabus æquales duci possunt ex utraque parte minimæ $E G$: nam aut propiores erunt aut remotiores à minima $E G$, quam sint $E L$, $E K$, quare his aut minores erunt aut maiores. Si ergo extra circulum, &c.

Propositio 9. Theore.

Si ab aliquo intra circulum puncto plures quam duæ rectæ æquales ad ambitum ducantur, id punctum centrum est circuli.

Ex puncto A intra circulum $B C D$, præter rectas $A B$, $A C$, æquales sit ipsæ æqualis $A D$, du-



ctif.

Etisq̃ue rectis B C, C D, diuisisq̃ue bita-
riam in E & F, ducantur ad ambitum
rectæ A E, A F. Quia ergo triangulorum
A B F, A F C, latera omnia sunt æqua-
lia, erunt anguli a ad F, æquales & recti, a 1. r.
sicut etiam ad E. Quia ergo A F, rectam
B C, diuidit bifariam ad rectos, in ea est
centrum circuli, & ob eandem causam est
etiam in recta E A, centrum circuli: Non
potest ergo centrum aliud esse quam A,
quia solum punctum A est vtrique A F,
& A E, commune. Si igitur, &c.

Propositio io. Theore.

*Circulus circulum in pluribus quam
duobus punctis non secat.*

SEcent se si fieri potest,
circuli in tribus punctis
A, B, C, centroq̃ue circuli
A B C, inuēto a quod sit D,
ducantur rectæ D A, D B, D C: quæ quia
æquales sunt, & attingunt etiam ambitū
circuli A B E, sequitur b punctum D, cf. b 9.
se etiam centrum circuli A B E, quod
absurdum c est. Non ergo secabunt se c 5.
circuli in pluribus punctis quā duobus.





Propositio II. Theore.

*Si duo circuli se interius contingant
recta coniungens eorum centra
producta incidet in contactum cir-
culorum,*

Circuli $A B C$, $A D E$,
interius in A , se tangāt:
dicō rectam quæ ducitur per
centra F & G , qualis est $F A$,
cadere in contactum A . Nam si fieri po-
tēst, recta coniungens centra sit $B K$, in
qua centrum circuli $A B C$, sit I , & alte-
rius H , iunganturque rectæ $A H$, $A I$.
Quia ergo $A H$, $H I$, reliquo latere $A I$,
sunt maiora, & proinde maiora quàm
 $I B$, quæ ex eodem centro ducitur, si au-
feratur communis $H I$, manebit $A H$,
maior quàm $B H$. Est ergo $H D$, maior
ipsâ $H B$, pars toto; quod absurdum est.
Eadem demonstratio procedet si centrū
circuli maioris extra minorem cadet. Si
duo ergo, &c,



a 20. I.

Pro-



Propositio 12. Theore.

*Si duo circuli sese exterius contingant,
linea recta centra coniungens per
contactum transibit.*

SI recta FG , iungens
centra F & G , circu-
lorum ABC , BDE , se
tangantium exterius in B ,
non transit per contactum B , sed alibi se-
cet in punctis C & D , iungens centra F
& G ; ducantur rectæ BF , BG , eruntque
duo latera FB , BG , maiora & reliquo FG . 20. 1.
Sed sunt etiam minora, nam FC ,
ipsi FB , æqualis est, ex eodem centro F ,
similiterque GD , ipsi GB , erit æqualis.
Superat ergo latus FG , reliqua duo late-
ra segmento CD , quod est absurdum.
Recta igitur FG , non iungit centra, &
nulla iunget, nisi quæ transibit per con-
tactum B .





Propositio 13. Theore.

Circulus circulum non tangit in pluribus punctis quam uno, sine intus tangat, siue extra.

Nam si circulum AB ; CD , tangat circulus AE , CF , interius in duobus punctis A & C , erunt diuersa



a 6.
b 11.

a circulorum centra, eaque in recta AC , tranfente per contactus b . Sit ergo G centrum ipsius ABC , & H ipsius AEC . Tunc autem quia in recta AC , ponitur centrum circuli ABC , esse G , eſſet c recta AC , bifariam diuiſa in G , & quia alterius circuli centrum eſt H , etiam in H eſſet diuiſa bifariam; quod fieri nequit.

c 3.

Sed neque exterius circuli ſe in pluribus punctis tangunt: Si enim in punctis B & C , ſe tangunt, ducta recta AD , per centra A & D ,
nec



nec non per contactum C, itemque ductis A B, B D, ad alterum contactum B, probaretur ut sup. a prop. latera A B, a 13. B D, & maiora & æqualia esse lateri A D.

Propositio 14. Theore.

In circulo æquales rectæ lineæ æqualiter à centro distant, & quæ distant à centro æqualiter æquales sunt inter se.

IN circulo A B C, sint pares rectæ A D, B C, & ex centro E, agantur E F, E G, ad rectos ipsas A D, B C, ideoque a secantes bifariam, iunganturque E A, E B. Quia ergo anguli ad F & G, sunt recti, quadratum ex E A æquale est quadratis laterum A F, E F: & similiter quadratum ex E B, duobus quadratis ex E G, G B. Nunc quia quadrata rectarum æqualium E A, E B, sunt æqualia, erunt etiam quadrata duo rectarum E F, F A, æqualia duobus quadratis rectarum E G, G B, & ablati quadratis rectarum



α qualium FA, GB , manebunt
quadrata rectorum EF, EG ,
 α qualia, quare EG, EF , sunt
 α quales, ac proinde $ADBC$,




• def. 4. α qualiter à centro e distant.

E conuerso autem si positum sit rectoras
 AD, BC , distare α qualiter à centro E ,
ostendetur ex superiori demonstratione
ablati quadratis rectorum EF, EG , α -
qualium, quadrata reliquarum FA, GB ,
manere α qualia; proinde & ipsas esse α -
quales -

Propositio 15. Theore.

*In circulo maxima est diameter, &
ceterarum ea semper maior, qua
centro est propior.*

Per centrum A
ductâ diametro
 FG , ducatur HK ,
propior centro quâ
 CD , ad quas peipē-
dicularibus è centro



• 4. def. ductis AL, AM , ex AL , quæ a necessa-
rio maior erit, sumatur AN , α qualis ipsi
 AM , & per N agatur BE , ad rectoris ipsi
 AL ,


A L, iunganturque rectæ A B, A C, A D, A E. Nunc vero quia B E, H K, æqualiter à centro & distantes sunt æquales, & b 14. in triangulo A B E, duo latera A B, A E, æqualia diametro F G, maiora sunt c 20. 1. quam B E; erit eadem diameter F G, maior quam B E, vel H K, aut quavis alia.

2 Rursus quia duo latera A B, A E, duobus lateribus A C, A D, sunt paria, & angulus B A E, maior ipso C A D, erit basis B E, seu H K, maior d 24. 2. quam C D, quæ est à centro remotior. In circulo igitur, &c.

Propositio 16. Theore.

Quæ ab extremitate diametri ad rectos angulos linea ducitur extra circulum cadit. Neque alia recta cadere potest in locum inter ipsam rectam & peripheriam comprehensum. Et semicirculi quidem angulus quovis acuto rectilineo maior est, reliquis autem minor.

AD punctum A extremum diametri AC, ducta DE, ipsi AC, perpendiculari. Dico rectam DE, extra circulum cadere. Si enim vis ca-



5. 1. **a** Si enim vis cadere intra, qualis esset DAF, ductâ ex centro rectâ BF, cum trianguli AFB, duo latera BA, BF, paria sint, essent etiam pares anguli BAF, (quem vis esse rectum) & BFA, quod absurdum est, 17. 1. **b** duò enim recti in triangulo esse non possunt. Eandem ob causam AF, in circumferentiam cadere nequit; puta si dicatur quod recta AL, cum circumferentia congruat: nam etiam tunc in triangulo BAL, essent duo recti supra basim AL. Recta ergo DA, necessario extra circulum cadit.

- 2 Sed neque alia recta cadet intra rectam AE, & ambitum FA. Si enim id putas de AG, ducatur ad eam è centro perpendicularis BG; & quia rectus est BGA, minor recto erit BAG: quare maior est BA, quam BG, subtendens minorem recto. At hoc absurdum est; nam BA, ipsi BH, parti totius BG, æqualis est, non ergo maior totâ BG. 19. 1. **c**


3 Angulus semicirculi BAF, quolibet recto est maior: nam quivis acutus cum sit

fit minor recto $B A E$, debet constitui per rectam, puta $G A$, quæ ad punctum A ducta necessario cadit intra circulum. Minorem ergo angulum faciet quam sit angulus semicirculi $B A F$.

4 Angulus reliquus $H A E$, quem contingentiæ dicimus, minor est quovis rectilineo; nam si minor aliquis constitui posset puta $G A E$, duceretur recta $G A$, in locum inter rectam $A E$, & peripheriâ $A H F$, quod absurdum est. Quæ igitur, &c.

Corollarium.

Hinc efficitur rectam ad extremum diametri perpendicularem tangere circulum, & in unico puncto tangere; nam si plura tangeret, caderet a intra circulum.



Propositio 17. Proble.

A dato puncto rectam lineam ducere qua datum circulum tangat.

Dato puncto A, & circulo B D F, ducatur ex centro C recta CA, & eodẽ centro spatio CA, fiat circulus A E G; exciteturque ad D, recta D E, ad rectos ipsi CA. Inde iuncta recta C E, agatur quoque recta A B; quam eandem dico tangerẽ circulum B D F, in puncto B. Quia enim triangulorum A B C, E D C, duo latera A C, C B, duobus E C, C D, sunt paria, & angulus C, communis, hæc triângula se habent iuxta 4. 1. Quare cum angulus E D C, rectus sit, rectus quoque erit C B A, & proinde recta A B, circulum tangit in B. A dato ergo puncto, &c.



• 16.

Pro-



Propositio 18. Theore.

Si circulum tangat recta linea, ducta altera è centro ad contactum ipsi tangenti erit perpendicularis.

VT si recta AB , circulum tangat in C , altera DC , ex centro D , ad contactum C , ducta, ipsi AB , erit perpendicularis. Si enim anguli ACD , DCB , non sunt recti, erit eorum a alteruter a 13. b acutus, puta ACD , sed hic maior est angulo semicirculi ECD , erit ergo angulus semicirculi minor aliquo b acuto, b 16. quod fieri non potest. Anguli ergo ACD , DCB , sunt recti, ac proinde recta DC , tangenti AB , est perpendicularis.



Propositio 19. Theore.

Si recta circulum tangat, & ad punctum contactus tangenti ipsi perpendicularis excitetur, in ea erit circuli centrum.

Recta

Recta AB , tangat in C ,
 circulum CDE , excite-
 turque ad tactum C , recta
 CE . ipsi AB , perpendicu-
 ris, in qua si negas esse centrum circuli,
 sit ergo alibi, puta ubi F , ducaturque
 FC , quæ ipsi AB , erit α perpendicu-
 ris, quare rectus angulus ACE , recto
 angulo ACF erit α qualis, pars videlicet
 toti, quod est absurdum. Non ergo alibi
 erit centrum quam in recta CE .



Propositio 20. Theore.

Ex eadem peripheria portione angulus ad centrum, duplus est eius qui ad ambitum extenditur.

Super segmento AB , ad
 centrum C , fiat angulus
 ACB , & super eodem
 segmento AB , ad ambitum
 extendatur angulus ADB . Quia ergo
 trianguli BCD , latera CB , CD , sunt
 æqualia, sunt α & anguli D , & CBD , ad
 basim æquales: sed his duobus internis
 & oppositis β externus ACB , est æqua-
 lis, idem igitur angulus externus ACB ,
 qui



a 18.

a 5. 8.

b 25. 1.

qui est ad centrum, duplus est ipse
 $\angle ADB$, qui porrigitur ad ambitum. Ex
 eadem ergo, &c.

Eadem demonstratio ad-
 hibebitur si triangula se
 interfecerint. Vt angulus $\angle ACB$
 ad centrum, duplus est ipse
 $\angle ADB$, qui ad ambitum. Nam ductâ re-
 ctâ DCE , erunt anguli $\angle CDA, \angle CAD$,
 æquales, & his duobus æqualis exter- c. 5. 2.
 nus & oppositus $\angle ACE$, cuius anguli d. 32. 1.
 quia pars una angulus $\angle BCE$, e. 32. 2. est
 duplus anguli $\angle BDC$, reliquus $\angle ACB$, du-
 plus etiam erit reliqui $\angle ADB$, quod erat
 probandum est enim angulus $\angle ADB$, an-
 gulus ad ambitum, & $\angle ACB$, ad centrū,
 super eodem arcu AB .



Propositio 21. Theore.

*In circulo qui in eadem portione sunt
 anguli, æquales sunt.*

Sic

- S** It circulus $A B E C$, & 
 def. 7. $\angle A B C$ & $\angle A E C$,
 ducaturque ad centrum an-
 gulus F . Quia ergo tam angulus b B ,
 quam E , est dimidium eiusdem anguli F ,
 sequitur eos inter se esse pares. In circulo ergo, &c.

- Q**uod si anguli
 sint in semicirculo $A B E C$,
 aut in minori portione, tunc quia in triangulis $B G A$,
 $E G C$, anguli $A G B$, $C G E$, sunt æ-
 quales, sicut & anguli $B A E$, $E C B$, qui
 in portione maiore $E C D A$, æquales
 iam sunt ostensi, erit etiã tertius $A B C$,
 tertio $C E A$, & æqualis, quod erat de-
 monstrandum.



Propositio 22. Theore.

*Quadrilaterorum in circulo descri-
 ptorum anguli oppositi duobus re-
 ctis sunt æquales.*

De-

DEscripto quadrilatero $A B C D$, in circulo $A B D$, ducantur rectæ $A D$, $B C$. Tunc vero quia anguli $C A D$, $C B D$, in eadem portione $C A B D$, & similiter anguli $D A B$, $D C B$, in eadem portione $B A C D$, sunt etiam pares; totus angulus $C A B$, duobus $D C B$, $D B C$, æqualis est: sed hi duo addito angulo $C D B$, sunt æquales duobus rectis (constituent enim triangulum $C D B$.) Idem igitur angulus $C D B$, adiunctus opposito $C A B$, efficiet quoque angulos pares duobus rectis.



Propositio 23. Theore.

Super eadem recta due circulorum portiones similes & inæquales ad easdem partes non constituentur.

SInt enim si fieri potest super $A B$, segmenta similia & inæqualia $A C B$, $A D B$, ductisque rectis $A D$, $B C$, $B D$, erunt anguli D , & $A C B$, pares super eadem portione $A B$. At exter-



b 16. 1. nus A C B, interiori & opposito b D, par
esse nequit. Super eadem ergo recta, &c.

Propositio 24. Theore.

*Super equalibus rectis lineis similia
circularum segmenta inter se sunt
equalia.*

Super rectis æqualibus
A B, C D, constituta
sunt similia segmenta
A E B, C F D, quæ si non
sunt equalia; collocetur A B recta super
ipsam C D, cui congruet, cum ponatur
equalis. Quod si non congruerent etiam
segmenta, tunc vel vnum extra alterum
totum caderet & sic similia & inæqualia
segmenta super eadem C D constituerẽ-
tur, vel vnum caderet partim extra, par-
tim intra; & tunc circulus circulum seca-
ret in pluribus punctis, quam duobus
puta in C, F, D, si circuli perficerentur,
quod vetumuis est absurdum, Super æ-
qualibus ergo rectis, &c.



a 23. &
10.

Pro-



Propositio 25. Proble.

Data portione circuli describere circulum cuius est portio,

IN data portione A B C, sumantur vtrunque tria puncta A, B, C, iunganturque duabus rectis A B, B C, quibus in D & E bisectis, ad ea puncta excitentur perpendiculares D F, E F, vbi enim se secabunt puta in F, erit circuli centrum. Centrum enim erit tam in recta D E, & quam in altera E F. Non alibi ergo quam in F, alias duo essent vnus circuli centra. Centro ergo F, spatio F A, describetur circulus cuius portio est A B C.



Propositio 26. Theore.

Anguli aequales ad centra aut ad ambitum circulorum aequalium insistant segmentis aequalibus.

Sint

Sint æquales anguli
 AGC , DHF , ad
 centra G & H , ducā-
 turque rectæ AC , DF .



a 41.
 b 24.

c 10. def.

Quia ergo triangulorum AGC , DHF ,
 duo latera GA , GC , duobus HD , HF ,
 sunt paria, & anguli G & H , ponuntur
 æquales; erit & basis AC , basi DF , æ-
 qualis, quare & arcus ABC , b arcui
 DEF , erit æqualis. Rursus si anguli K &
 I , sint æquales, anguli G & H , qui ad cē-
 tra sunt, erunt e eorum dupli, ac proinde
 arcus æquales: ideoque ut prius ABC ,
 DEF , (quibus tam anguli ad centra
 quam ad ambitum insistant) æquales e-
 runt. Anguli ergo ad centra, &c.

Propositio 27. Theore.

*Anguli ad centra aut ambitum æ-
 qualium circularum insistentes æ-
 qualibus circularum portionibus,
 sunt æquales.*

Si enim angulis BDC ,
 FHG , æqualium cir-
 culorum, æqualibus
 arcibus BKC , FLG , in-



sistent, & anguli ipsi non sunt æquales,
 sit BDC , maior, fiatque angulus C D I ,
 ipsi

ipsi $F H G$, æqualis; æquales ergo erunt arcus $C I$, $F G$, quod est *a* absurdum, *a* 26. cum arcus $B C$ & $F G$, positi sint æquales. Anguli ergo $B D C$, $F H G$, inequales esse non possunt, ac proinde *b* nec anguli A & E , qui sunt dimidij ipsorum D & H . Anguli ergo ad centra, &c. *b* 20.


Propositio 28. Theore.

In æqualibus circulis æquales rectę auferunt & relinquunt æquales peripherias.

Nam si in paribus circulis $A B C$, $D E F$, rectę $B C$, $E F$, sunt æquales; factis angulis ad centra G & H , erunt triangulorum $G B C$, $H E F$, duo latera $G B$, $G C$, duobus $H E$, $H F$, equalia, cumque basis $B C$, basi $E F$, sit etiam æqualis, æquales erunt anguli *a* G & H . Æquales *a* 2. 1. ergo portiones sunt *b* $B K C$, $E L F$; *b* 26. quibus ablati, æquales quoque relinquuntur $B A C$, $E D F$. In æqualibus ergo, &c.



Pro-



Propositio 29. Theore.

In aequalibus circulis aequales peripherias aequales rectę linea subtendunt.

a 27.

b 4. 1.

Nam in figuris superioribus si BKC , ELF , sumptę sint portiones æquales, pares a erunt anguli G , & H : sed & latera continentia sunt æqualia, quare b bases BC , EF , quę subtendunt æquales arcus inter se sunt æquales.

Propositio 30. Proble.

Datam circumferentiam secare bifariam.

DAtę peripherię ABC , subtendatur recta AC , diuisa in D , bifariam, ad quod punctum excitetur DB ipsi AC perpendicularis, eritque peripheria ABC bifariam in B , diuisa. Nam ductis rectis AB , BC , quia triangulorū DAB , DBC latus DA ipsi DC , est æquale, & DB ,



& D B commune, anguli que ad D recti sunt, erunt *a* bases A B, B C æquales, ac *a* 4. r.
proinde æquales *b* etiam peripheriæ *b* 28.
A B, B C. Secta est igitur A B C bifariâ in B; quod erat faciendum.

Propositio 31. Theore.

In circulo angulus qui in semicirculo reclus est: qui in portione maiore, minor recto; & qui in minore, maior: insuper maioris portionis angulus est maior recto; minoris, minor,

IN semicirculo A D C, fiat utcumque angulus C D A, quæ dico esse rectum. Nā ex E centro ductâ rectâ E D, & latere C D producto in F, quia trianguli E C D duo latera E C, E D sunt paria, pares quoq; erunt anguli *a* E C D, *a* 5. r.
E D C, & in triangulo E A D, pares erunt ob eandem causam anguli E D A, E A D; totus ergo angulus A D C, una sui parte angulo C, & altera angulo E A D æqualis est, sed iisdem angulis C & E A D, oppositis & internis æqua-



- 6 32. 1. æqualis est θ externus $F D A$.
Sunt ergo æquales quoque inter se anguli $A D C$, $A D F$;
ac proinde rectus vterque.




- 17. 1. $A D C$, ostensus est rectus, minor ϵ recto
erit angulus $D C A$, qui est in portione
 $D C B A$, maiore quam sit semicirculus.

- Nunc vero sumpto vtcunque puncto
 G , in arcu $D A$, ductisque rectis $D G$,
 $G A$, quia quadrilaterum est $C G$, anguli
• 22. oppositi $d D C A$, $A G D$, valent duos
rectos, sed angulus $D C E$, minor recto
est, recto ergo maior est angulus $D G A$,
qui est in portione $D G A$; minore quam
semicirculus.

Sed & angulus maioris portionis qui
continetur recta $A D$, & circumferentia
 $D A B C$, maior est recto $A D C$, totum
videlicet sua parte. Angulus denique mi-
noris portionis qui continetur recta
 $A D$, & arcu $D G A$, minor est quam re-
ctus $A D F$, pars videlicet quam totum,
In circulo igitur, & c.

Pro-



Propositio 32. Theore.

*Si circulum recta tetigerit, & à tactu
ducatur recta altera secans circu-
lum, anguli quos ad tangentem fa-
cit, æquales erunt ijs qui sunt in al-
ternis circuli portionibus.*

Circulum A B C D, tangat
recta E F, in puncto D, ex
quo ducatur D B, utcumque
circulum secans in B, deinde
excitata D A, ipsi E F, perpendiculari
(quæ erit & diameter) ducatur A B, sum-
proq; quovis puncto in arcu B D, puta
C, ducantur etiam rectæ B C, C D. Quo
facto dico angulos quos facit B D, cum
tangente E F, æquales esse angulis, qui
sunt in alternis circuli portionibus. Hoc
est angulum B D E, parẽ esse ipsi B A D,
qui est in portione A B D; & angulum
B D F, parem esse ipsi B C D, qui est in
portione D C B. Nã quia angulus A B D,
in semicirculo b rectus est, reliqui duo b 31.
B A D, B D A, vni recto c sunt pares; sed c 32. 1.
rectus est angulus A D E, valet ergo
F duos



duos angulos BAD , BDA ;
 ablato ergo communi BDA ,
 reliqui BDE , & BAD , ma-
 nent æquales. Amplius quia



¶ 32.

AC , quadrilaterum est, anguli A , & C ,
 sunt $\angle$ pares duobus rectis, sicut & anguli
 BDF , BDE : cum igitur angulus
 BDE , ipsi A , sit ostensus æqualis, reli-
 qui BDE , BCD , inter se relinquuntur
 æquales; Si igitur circulum, &c.

Propositio 33. Proble.

*Super data recta portionem circuli
 describere qua capiat angulum da-
 to angulo rectilineo æqualem.*

SI angulus datus sit re-
 ctus ut D , & data recta
 sit AB , eâ diuisâ bifa-
 riam in F , centro F , spatio
 FB , ducetur semicirculus AEB , capiens
 ¶ angulum rectum.



¶ 31.

SI vero angulus da-
 tus sit acutus, ut C ,
 & data recta AB ;
 ¶ applicetur ad eius ex-
 tremum A , angulus




¶ 33.1.

DAB ,

D A B ipsi C æqualis ; deinde rectâ A B, diuisâ bifariâ in E, excitetur E F, ad rectos ipsi A B, & ad A, recta A H, ad rectos ipsi A D, iungaturq; G B, eruntque triangulorum E A G, E B G, latera E A, E B, æqualia, & E G, commune, anguli que contenti, æquales, æqualis ergo erit *b* basis G A, basi G B, quare si centro G, *b* 4. n. spatio G A, ducatur circulus, transibit per extremum B; nunc vero ductâ rectâ H B, quia diametro A H, ad extremum A, ducta est ad rectos linea D A, tanget *c* 16. hæc linea circulum ; & quia à contractu dictâ rectâ A B, circulum secat, erit angulus D A B, seu angulus datus C, æqualis *d* angulo A H B, qui est in alterna sectione A F B, hæc ipsa igitur sectio *d* 23. H F B, super data A B, capit angulum dato angulo æqualem.

Similis erit structura si detur angulus obtusus C, & similis item demonstratio, capiet enim arcus A H B, angulum obtusum B H A, ipsi G A I, hoc est dato angulo C, æqualem. Super data ergo, &c.





Propositio 34. Proble.

*A dato circulo portionem auferre
qua angulum capiat parem angulo
dato.*

S It datus angulus F , &
circulus $A B C$, cui ad
quoduis punctum, puta C ,
applicetur a tangens $D E$,
fiatque angulus $B C E$, ipsi F , & equalis e-
ritque angulus quivis in portione $C A B$,
puta $B A C$, b æqualis ipsi $B C E$, seu
dato angulo F , cum angulus $C A B$, sit in
alterna circuli sectione.



Propositio 35. Theore.

*Si in circulo duæ rectæ se interfecerint,
rectangulum sub segmentis unius
aquale erit rectangulo sub segmen-
tis alterius contento.*

In cir-

IN circulo $A B C D$, rectæ
 $A C$, $B D$, se interfecent
 in E ; quæ sectio si sit in cen-
 tro, tunc cum omnia segmē-
 ta sint æqualia, erit rectangulum sub seg-
 mentis vnius, æquale rectangulo sub seg-
 mentis alterius. Quod si in alterutra tan-
 tum puta $A C$, sit centrum circuli, secer-
 que a alteram $B D$, æqualiter & ad re- 3.
 ctos in E , tunc ductâ rectâ $F D$, ex cen-
 tro F , quia recta $A C$, bifariam in F , &
 non bifariam in E , diuisa est, erit rectan-
 gulum b sub $A E$, $E C$, simul cum qua 5. 2.
 drato ipsius $E F$, æquale quadrato ipsius
 $F C$, vel $F D$, seu duobus ex c $F E$, $E D$; 47. 15
 sed quadratum ipsius $E D$, est rectangulū
 sub partibus rectæ $B D$, sectæ æqualiter
 in E ; Igitur rectangulum sub partibus
 $E D$, $E B$, addito quadrato ex $E F$, æqua-
 le est quadrato ipsius $F D$, sicut & rectā-
 gulum sub partibus inæqualibus ipsius
 $A C$, adiuncto eodem quadrato ex $E F$,
 fiebat æquale quadrato ipsius $F D$; Ab-
 lato ergo communi quadrato ex $E F$, re-
 ctangula sub $A E$, $E C$, & sub $B E$, $E D$,
 remanent æqualia.



SI vero in alterutra recta
 puta $A C$, sit cētrum cir-
 culi F , & vtraque linea inæ-
 qualiter in E diuidatur, ductis



F 3

F D,

FD, & perpendiculari FG,
 rectangulum sub partibus
 AE, EC, cum quadrato ip-
 sius EF, par erit quadrato d



d 5. 2.

ex FC, vel FD; Similiter rectangulum
 sub BE, ED, cum quadrato ipsius EG,
 æqualia sunt quadrato ex GD, & hoc tū
 quadrato ipsius GF, æquale est quadra-
 to ipsius DF, quare additis ad rectangulū
 sub DE, EB, quadratis ipsarum EG,
 GF, seu quadrato e ipsius EF, fiet re-
 ctangulum sub DE, EB, æquale qua-
 drato ex DF, cui etiam æquale erat f re-
 ctangulum sub partibus ipsius AC, ad-
 iuncto quadrato ex EF, hoc ergo qua-
 drato ex EF, communi ablato, rectan-
 gula sub AE, EC, & BE, ED, manent
 æqualia.

e 47. 2.

f 5. 2.

D Enique si neutra
 per centrum trá-
 feat, & una ex illis bifa-
 riam secetur, aut neu-



tra: ducatur per centrum F, & sectionem
 E recta GH, tunc vero quia ostensum
 est rectangulum sub AE, EB, æquale esse
 rectangulo sub GE, EH (siue AB, di-
 uisa sit bifariam, siue non) item rectangu-
 lum sub CE, ED, æquale esse eidem sub
 GE, EH, (siue CD, bifariam secta sit si-
 ue non) erit rectangulum sub AE, EB,
 æqua-

æquale rectangulo sub $C E, E D$. Quod erat demonstrandum. Si ergo in circulo, &c.

Propositio 36. Theore.

Si à puncto extra circulum ducantur dua rectæ, secans una, altera tangens circulum, rectangulum sub tota secante & parte qua eidem adiecta est usque ad punctum, æquale erit quadrato tangentis.

EX puncto A ducatur $A B$, circulum secans, quæ primo transeat per centrum C , agaturque a insuper recta $A D$, circulum tangens in D , adiunctâ rectâ $C D$, quæ erit b ad rectos b 18. ipsi $A D$. Quia ergo recta $B E$, bifariam secta est in C , & ei adiunctâ est $E A$, erit rectangulum c sub $A E, A B$, c 6. 3. cum quadrato ipsius $E C$, vel $C D$; æquale quadrato ex $A C$: sed hoc idem quadratum ex $A C$, valet duo simul d 47. 1. quadrata ex $A D, C D$; si igitur auferas quadratum commune ex $D C$, re-



a 17.

ctangulum sub A E, A B, sit æquale quadrato tangentis A D.

Quod si linea A B, non transeat per C centrum, ducatur ad eam



CF, perpendicularis item

aliæ rectæ C D, C E, C A. Cum igitur

rectangulum sub A E, A B, addito qua-

drato ipsius E F, par sit e quadrato ex

A F, addito communi quadrato ex F C,

quadrata ex A F, F C, seu f quadratum ex

A C, æquale erit rectangulo sub A E, A B,

vnâ cum quadratis ex E F, F C, vel cum

quadrato ipsius E C Quia ergo rectan-

gulum sub A E, A B, cum quadrato ipsius

C E, vel C D, æquiualeat quadrato ipsius

A C, vel duarum g A D, D C; si auferatur

commune ex D C, vel C E, rectangulum

sub A E, A B, manebit æquale quadrato

ipsius A D. Quod erat demonstrandum.

Si ergo à puncto, &c.

Propositio 37. Theore.

*Si à puncto extra circulum ducantur
rectæ duæ, quarum altera secet, al-
tera in circulum incidat, sitque re-
ctangulum subsecante, & adiecta
parte*

parte usque ad punctum, a quale incidentis quadrato; recta illa incidens circulum tangit.

EX puncto D extra circulum A B F, ducatur recta D A,



secans circulum in C, sitque rectangulū sub D A, D C, æquale quadrato rectæ D B. Dico rectam D B, tangere circulū. Nam ductā rectā D F, tangente a circulo in F inungantur è centro E rectæ E B, E F. & si recta D A, non transsit per centrum E, addatur etiam D E. Nunc vero quia rectangulo sub D A, D C, æquale est b quadratum tangentis D F, eademque rectangulo sub D A, D C, ponitur æquale quadratum ipsius D B, erunt quadrata rectarum D F, D B, æqualia; ideoque & ipsæ æquales. Quia ergo triangulorum D F E, D B E, duo latera D F, F E, duobus D B, B E, sunt æqualia & basis D E, communis; erunt c anguli d 18. D F E, D B E, æquales; est autem d angulus D F E, rectus, rectus ergo etiam est D B E, ideoque e rectā D B, circulum, 16. tangit. Si ergo extra circulum, &c.

F S

E V



EVCLIDIS Elementorum

LIBER IIII.

Definitiones.

Igura rectilinea in altera rectilinea dicitur inscribi, cum singuli eius quæ inscribitur anguli singula latera attingunt eius in qua dicitur inscribi.

VT triangulū ABC , inscriptum est in triangulo DEE ; at triangulum $G HK$, non inscribitur in triangulo LMN , quia angulus H , non attingit latus ML .



2 Fi.

2 Figura circum figuram describi dicitur cum singula eius quę circumscribitur latera singulos angulos tetigerint figurę, quę intus est descripta.

Vt in superioribus exemplis triangulum DEF, est descriptum circa triangulum ABC, at triangulum LMN, non est descriptum circa GHK.

3 **F**igura rectilinea in circulo inscribi dicitur cum singuli eius anguli circulum tetigerint. *Vt in figura definitionis sexta triangulum ABC, circulo ADB, est inscriptum, non autem triangulum DEF.*

4 **F**igura vero rectilinea circa circulum describi dicitur, cum singula eius latera ambitum circuli tangunt. *Vt triangulum ABC, descriptum est circa circulum DEF.*



5 **S**imiliter & circulus in figura rectilinea inscriptus est, cum eius ambitus tangit singula latera figuræ in qua circulus describi dicitur. *Vt circulus D E F, inscriptus est in triangulo A B C.*



6 **C**irculus autem circa figuram describi dicitur, cum circuli ambitus tangit angulos omnes eius figuræ quæ circumscribit. *Vt circulus A B C D, descriptus est circa triangulum A B C, non autem circa D E F.*



7 **R**ecta linea in circulo accommodari vel aptari dicitur, cum eius extrema in circuli peripheria fuerint. *Vt linea A B, aptata est in circulo A B C, non autem C D.*



Propositiones.

Propositio I. Proble.

In dato circulo rectam accommodare aequalem data rectæ lineæ, quæ circuli diametro maior non sit.

In cir.

IN circulo $A B C$, apta
da sit linea æqualis ipsi
 E ; quæ diametro $A C$, ma-
ior non sit, nam maior



diametro $A C$, nulla aptari potest. Quod si
diametro $A C$, esset æqualis linea E , ipsa
diametèr $A C$, esset accommodata ut
petitur. Si ergo linea E minor sit diame-
tro $A C$, abscindatur æqualis $A D$, ac
centro A spatio $A D$, ducatur circulus
 $B D$, iuncta enim recta $A B$, aptata erit
in circulo $A B C$, & erit æqualis ipsi E ,
cum F , sit æqualis ipsi $A D$, cui æqualis
etiam est $A B$.

Propositio 2. Proble.

*In dato circulo triangulum describe-
re dato triangulo æquiangulum.*

SIt datus circulus $A B C$, & triangulum
 $D E F$; Ducta a tangente
 $G H$, ad punctum B , fiat



angulus $\angle H B C$, æqualis ipsi D , & $\angle G B A$ ipsi E ponatur æqualis, ducatur
que recta $A C$, & erit triangulum $A B C$
quod petitur: nam quia angulus $H B C$
æqualis est ipsi A in alterna & sectione, &
cadem

eadem de causa $G B A$,
 ipsi C ; erit quoque an-
 gulus D ipsi A , & angu-
 lus E ipsi C æqualis;



- α 32. 1. quare & tertius F , ipsi d angulo B æqua-
 lis erit. In dato ergo circulo, &c.

Propositio 3. Proble.

*Circa datũ circulũ triangulũ descri-
 bere dato triangulo æquiangulum.*

Sit datus circulus
 $A B C$, & triangu-
 lum $D E F$, productio-
 que latere $E F$, in G ,



- α 23. 1. & H , angulo $D E G$, æqualis fiat α ad cẽ-
 trum angulus $A I C$, & angulus $B I C$,
 angulo $D F H$; necnon ad singula pun-
 cta A, B, C , ducantur b tangentes $K L$,
 β 16. 3. $L M, M K$: eritque triangulum $K L M$,
 triangulo $D E F$, æquiangulum. Nam
 quia in quadrilatero $A I C L$, anguli ad
 α 18. 3. A & C c sunt recti, reliqui L & $A I C$
 duobus rectis sunt pares: si enim ducatur
 $L I$, duo triangula $A L I, C L I$ ha-
 bent angulos pares d quatuor rectis; cum
 α 32. 1. igitur duo recti sint ad A & C , reliqui
 continebunt rectos alios duos. Si ergo
 anguli $A L C, A I C$, valent duos rectos
 cum angulus $A I C$ sit æqualis ipsi

$D E G$

D E G alter angulus A L C par erit angulo D E F, quandoquidem anguli circa latns D E sint & duobus rectis æquales, c. 15. a. Eodem modo in quadrilatero B I C M ostendetur angulum M esse ipsi D F E æqualem. Quare & tertius D, tertio angulo K erit æqualis. Circa datum ergo, &c.

Propositio 4. Proble.

In dato triangulo circulum describere.

Dati trianguli A B C duo quivis anguli C B A, A C B bisecentur per rectas D B, D C, occurrentes in D, à quo puncto ducantur b b 12, 16 D E, D F, D G, singulæ singulis lateribus triânguli dati perpendiculares. Nunc verò quia triângula D B F, D B E, habent singula ad E, & F, vnum angulum rectum, & alterum D B F, & alteri D B E æqualẽ, laterus insuper D B cõmune; erunt & etiã latera D F, D E æqualia; similiterq. ostendetur rectã D G, rectẽ D F æqualem esse. Si igitur centro D, spatio D F, ducatur circulus F E G, transibit per puncta E & G, tangetq. latera omnia triânguli dati A B C. In dato ergo triangulo, &c.



Prop.



Propositio 5. Proble.

*Circa datum triangulum circulum
describere.*

Trianguli
dati ABC
duo latera AB ,
 AC , diuidan-



tur bifariam in D & E ; ad quæ puncta
excitatis perpendicularibus coibunt illæ
in puncto F , vel intra triangulum, vel in
latere ipso, vel extra, ut in figuris ordine
apparet. Ducantur insuper rectæ AF ,
 BF , CF , si omnes, aut aliquæ earum ante
non sunt ductæ. Quia ergo triangulorū
 ADF , BDF , latera DA , DB , sunt æ-
qualia; & DF commune anguli quæ recti
ad D ; erit & basis AF , ipsi FB æqualis,
pariter quæ ostendetur FC ipsi FA , esse
æqualem. Centro ergo F , spatio FA , du-
cetor circulus ACB , qui transibit per
puncta C & B . Circa datum ergo trian-
gulum.

¶ I.

Pro-



Propositio 6. Proble.

In dato circulo quadratum describere.

IN dato circulo $A B C D$,
 secent se ad rectos in cen-
 tro E diametri $A C$, $B D$,
 ducanturque rectæ $A D$, $A B$,
 $C B$, $C D$; ostenditur ergo omnes has
 lineas esse æquales bases triangulorum
 suorum per 4. 1. & sunt anguli supra illas
 bases, puta super $A B$, æquales, quia æ- 4. 5. 2.
 qualia sunt latera $E A$, $E B$: cum ergo
 omnes anguli ad E sint recti, omnes qui
 sunt supra bases erunt semirecti, totus
 ergo angulus $A B D$, & similes, sunt re-
 cti. figura ergo rectilinea $A B C D$, qua-
 dratum est, descriptum in circulo; quod
 erat faciendum.



Propositio 7. Proble.

*Circa datum circulum quadratum
 describere.*

Ductis

D Vctis diametris se secantibus ad rectos in E centro, per eorum extrema A, B, C, D, ducantur *a* tangentes.



- a* 16. 3. FG & similes, eritque figura rectilinea FGKH quadrata; in qua rectilineum
b 18. 3. AK est parallelogrammum, sunt enim *b*
c 28. 1. anguli ad A & C, recti; ergo latera *c* AG, CK parallela, similiterque parallelae sunt AC, GK propter angulos ad B & E rectos. Cum ergo angulus ACK rectus sit, erit etiam *d* oppositus AGK rectus: similiterque ostendetur angulos ad F, H, K, rectos esse Item GK equale est
d 14. 1. opposito AC, *e* diametro circuli, & omnia alia latera figuræ FK ostendentur diametro circuli æqualia. Sunt ergo omnes anguli recti & latera æqualia in figura FK, & per consequens est quadratum. Circa datum ergo circulum, &c.

Propositio 8. Proble.

In dato quadrato circulum describere.

D Ati quadrati AD, lateribus AB, AC, bifariam sectis in E & F, per E recta EG, parallela ipsi AB,



& per

& per F ducatur. FH ipsi AC similiter parallela; eruntque lateribus quadrati a 13. 1. & inter se æquales. Et quia AK parallelogrammum est, erunt latera opposita FK, AE dimidium lateris & quadrati. æ. b 34. 1. equalia. Similiterque ostendetur omnes rectas KE, KF, KG, KH, æquales esse dimidio lateris quadrati, & inter se. Centro ergo K, spatio KE ducetur circulus EFGH tangens omnia latera quadrati. In dato ergo quadrato, &c.

Propositio 9. Proble.

Circa datum quadratum circulum describere.

IN dato quadrato ABCD, ductis diametris se secantibus in E, quia trianguli ABD latera AB, AD sunt æqualia, erunt & anguli ADB, ABD a 1. 1. æquales & semirecti, cum angulus DAB rectus sit: similiterque ostendetur omnes angulos geminos ad A, B, C, D, esse æquales; quare latera b EA, EB, &c. inter b 6. 1. se esse equalia. Centro ergo E, spatio EA, ducetur circulus ABCD, transiens per omnia




omnia puncta extrema quadrati. Circa datum igitur quadratum, &c.

Propositio 10. Proble.

Triangulum Isosceles constituere in quo uterque angulus ad basim sit duplus reliqui.

Recta AB , secetur in C , iuxta 11. 2. ita ut rectangulum sub $A B$, $B C$, sit æquale quadrato rectæ CA . Deinde facto centro A , spatio AB , du-



- a* 1. catur circulus BDE , in quo aptetur *a* recta BD , ipsi AC , æqualis, iunctis insuper rectis AD , CD ; eritque triangulum ABD , æquicrurum. Quare *b* & anguli supra basim BD sunt æquales. Nunc vero hosce angulos singulos esse duplum tertij anguli A , sic ostendo. Circa triangulum ACD , ducto *c* circulo DCA , quia rectangulum sub AB , BC , æquale *d* quadrato ex CA , seu BD , per constructionem, & AC , circulum secat ipsa *e* BD , tangit *e* circulū DCA ; quare angulus *f* ADB , æqualis est *f* ipsi A in alterno seg.

segmento; & communi CDA addito, duo anguli A & CDA æquales sunt duobus BDC & CDA , hoc est toti ADB , vel ABD . Et quia angulus externus BCD , duobus g internis A & g 32. 2. ADC , æqualis est, erit idem BCD , par ipsi CBD , vel ADB ; & proinde b rectæ DC , DB æquales, cum pares angulos subtendant. Et quia BD , posita est ipsi CA æqualis, pares erunt rectæ CD , CA . Quare i anguli A & CDA æqua- i 5. 2. les. Duplus ergo est angulus externus BCD , ipsius A , & eiusdem dupli quoque anguli sunt CBD , ADB , qui ipsi externo BCD pares ostensi sunt. Triangulū ergo $Isosceles$, &c.

Propositio 11. Proble.

In dato circulo pentagonum equilaterum & equiangularum describere.

Asumpto triangulo $\triangle$ $Isosceles$ EGH , cuius anguli G & H , dupli sint ipsius E , in circulo $ABCD$, b



fiat illi æquiangularum ACD , bifariam-
que

e 9. 1.

quæ diuidantur anguli ϵ A C D, A D G. Iunctis deinde rectis A B, B C, D F, F A, factum erit quod



d 16. 3.

proponitur. Nam quia anguli A D B, B D C sunt pares, pares etiam erunt δ arcus A B, & B C, & eandem ob causam omnes reliqui arcus sunt æquales, & omnes ϵ rectæ A B, B C, &c. æquales, quæ pares arcus subtendunt. Sed & angulus

e 29. 3.

f 27. 3.

A B C, f angulo B C D & reliquis quatuor similibus est æqualis, eo quod in æqualibus segmentis sunt omnes. In dato ergo circulo, &c.

Propositio 12. Proble.

Circa datum circulum pentagonum æquilaterum describere.

IN dato circulo A B C, notetur quinque puncta A, B, C, D, E, signantia quinque angulos pentagoni æquilateri in circulo α descripti, ad quæ puncta ex cen-



e 11.

tro

tro F ducatur totidē rectæ FA , FB , &c.
 rursusque ad earum extrema ducantur
 tangentes quæ concurrent b in angulis b ax. 11.
 G , H , K , &c. factumque erit quod peti-
 tur. Nam quia in quadrilatero BFC K ,
 quatuor anguli quatuor c rectis æquina- c 32. 1.
 lent, similiterq; in quadrilatero CFD L ,
 & anguli ad B & C recti sunt, sequitur
 angulos BKC , BFC duobus rectis æ-
 quivalere: similiterque angulos CLD ,
 CFD . cumque BFC & CFD sint
 anguli æquales d ob pares arcus BC , d 27. 3.
 CD , reliqui BKC & CLD erunt
 æquales; parique methodo ostendetur
 angulos reliquos pentagoni inter se esse
 æquales. Nunc vero esse æquilaterum
 sic ostendo. Ductis rectis FG , FM ,
 erit quadratum ex FG , e æquale qua- e 47. 1.
 dratis tam ipsarum AF , AG , quam ip-
 sarum EF , EG . Quare ablatis quadratis
 æqualium AF , EF , quadrata reliqua-
 rum AG , GE , manent æqualia, ac
 proinde rectæ AG , GE sunt æquales.
 Cumque anguli FAG , $FE G$ & con-
 tinentia latera sint æqualia, erunt trian-
 gula AFG , GFE iuxta 4. 1. & idcirco
 anguli AFG , GFE æquales. Eadem
 methodo ostendetur triangula FEM ,
 $MF D$ esse iuxta 4. 1. ac proinde angu-
 los EFM , $MF D$ esse æquales. Quare an-
 guli,

guli, EFG , cum sint
dimidij æqualium
 EFM , erunt inter se
pares. Quia ergo in
triangulis GFE ,
 EFM , duo anguli



f 26. 1.

circa rectam EF , sunt pares, & latus ad-
iacens EF , commune est, reliqua latera
f & anguli erunt æqualia. Æquales sunt
ergo rectæ GE , & EM , dimidia ipsius
 GM . Eodem modo ostendetur AG
esse dimidiam ipsius GH . Cumque
dimidia GA , GE , ostensæ sint æquales
erunt & tota latera pentagoni GH ,
 GM æqualia, similiterque de cæteris
procedet demonstratio. Ergo, &c.

Propositio 13. Proble.

*In dato pentagono equilatero & æ-
quiangulo circulum inscribere.*

D Ati pentagoni
 $ABCDE$, an-
guli duo proximi
 EAB , ABC bisecen-
tur & per rectas AF ,
 BF , & à puncto F , in
quo concurrunt, ducantur etiam rectæ



FC

FC & ceteræ ad reliquos angulos. Quia
 ergo triangulorum ABF, FBC duo la-
 tera BA, BC æqualia sunt, & BF cō-
 mune, anguliq̃ue contenti ad B sunt pa-
 res, erit & totum toti æquale triangulum;
 anguliq̃ue & latera cōrespondentia æ-
 qualia: pares ergo sunt anguli BAF, b 4. 6
 BCF, Cumque anguli BAE, BCD
 ponantur æquales, sicut BAF est dimi-
 dium totius anguli BAE, ita BCF di-
 midium erit totius BCD. Hic ergo
 angulus & reliqui in orbem, secti sunt
 bifariam. Ducantur deinde FG, FH, &c.
 singulæ singulis lateribus perpendicula-
 res. Et quia triangulorum GFB, BFH
 duo anguli FGB, GBF duobus FHB,
 FBH sunt pares, & latus FB commu-
 ne, æqualia & etiam erunt latera FG, c. 61. 7.
 FH, & his pari modo æquales erunt
 FK, FL, FM. Quare centro F spatio
 FG ductus circulus transibit per pun-
 cta H, K, L, M, & sic in pentagono cir-
 culus erit descriptus.



Propositio 14. Proble.

*Circa datum pentagonum aequilaterū
& equiangularum circulum descri-
bere.*

D Ari pentagoni $A B C D E$, angulis $A B C B C D$ sectis bifariam per rectas $F B, F C$, in F conuenientes, ductisque rectis $F A, F E, F D$ triangulorum $A B F, B F C$ duo latera $B A, B F$ duobus $B C, B F$ æqualia erunt; & anguli ad B contenti æquales. Basis æ ergo $A F$ basi $F C$ æqualis est; ostendeturque ut in sup. prop. reliquas $F A, F D, F E$ diuidere bifariam angulos reliquos, & omnes esse lineas inter se æquales. Centro ergo F spatio $F B$ ductus circulus transibit per reliqua puncta C, D, E, A . Circa datum ergo, &c.



4. 2.

Propositio 15. Proble.

*In dato circulo hexagonum aequilaterum
& equiangularum inscribere.*



IN dato circulo $A B C D$,
 cuius centrum G , ducta
 diametro $A D$ centro D ,
 spatio $D G$ ducatur circulus
 $E G C$, secans priorem
 in punctis E & C , ductisque per centrum
 G ad ambitum rectis $C F$, $E B$, iungantur
 rectæ $D E$, $D C$, &c. eritque triangulū
 $E G D$ æquilaterum (quare cius omnes
 anguli a erunt inter se parēs, & quilibet a 5. 1.
 erit pars tertia b duorum rectorum) cui b 32. 1.
 per omnia æquale est triagulum $D G C$.
 Iam vero quia recta $E G$ cadens c in re- c 13. 1.
 ctam $F C$ facit æquales duobus rectis, cū
 anguli $E G D$, $D G C$, sint duæ tertiæ,
 duorum rectorum sequitur angulum
 $E G F$ esse partem tertiam duorum re-
 ctorum, & æqualem duobus prioribus
 angulis; sunt ergo tria d triangula $E F G$, d 4. 1.
 $E G D$, $D G C$ vndique æqualia; & quia
 anguli $F G A$, $A G B$, $B G C$ sunt ad ver-
 ticem angulis prioribus, omnes sex an-
 guli ad G sunt æquales: quare omnes cir-
 cumferentiæ e $A B$, &c. omnesque fre e 26. 3.
 ctæ illis subtensæ sunt æquales. Est ergo f 23. 1.
 hexagonum $A B C D E F$ æquilaterum;
 quod idem est æquiangulum, nam omnes
 anguli $F E D$, & alij, constant duabus
 tertijs duorum rectorum, vt ostensum est.
 In dato ergo, &c.

Corollarium.

Hinc manifestum est latus hexagoni aequale esse semidiametro circuli; nam latus DE aequale est semidiametro DG .

Propositio 16. Proble.

In dato circulo quindecagonum æquilaterum, & æquiangulum inscribere.

2.

IN dato circulo ADC describatur æquilaterum AEC , & pentagonum æquilaterum $ADBFG$, cuius angulus vnus constitutur ad aliquem angulum trianguli puta ad A . Quia ergo AC subtendit tertiam partem circuli, si totus circulus in quindecim partes æquales diuisus intelligatur, in arcu AGC erunt ex ijs quinque; & cum AG sit quinta pars, in eo arcu erunt partes tres; duæ ergo erunt



In arcu $G C$: quo diuiso. bifariam in H erit $G H$ pars decima quinta circuli totius. Quare ductâ subtensâ $G H$, si aptentur b in circulo quatuordecim alix b 1. æquales, incipiendo à puncto G vel H , descriptum erit in circulo quindecagonum æquilatertum : quod etiam erit c æ. 27. 9. quiangulum, cum eius anguli omnes subtendant arcus æquales tredecim laterum quindecagoni : nam angulus H ab arcu $G H$ & eius subtensâ comprehensus subtendit arcum $G A D H$ & sic de cæteris angulisque plura latera quindecagoni ducta essent. In dato ergo circulo, &c.





EVCLIDIS

Elementorum

LIBER V.

Definitiones.

Pars est magnitudo magnitudinis, minor maioris, cū minor metitur maiorem. *Ut linea duorum pedum, pars est linea sex pedum, quia minor ter repetita metitur, & adæquat maiorem. Strictiore hoc significato accepit Euclides nomen Partis, pro eo sola qua totum metitur, & dici solet. Pars aliquota. Vniuersalius; Pars est quæ aliquoties repetita metitur denique vel superat maiorem: & sic comprehenditur etiam Pars aliquanta, quæ totum suum non metitur, qualis pars est 2. respectu ipsius*

ipsius 5. Sub his porro numerorum exemplis magnitudines intelligantur; puta lineae pedum duorum, & pedum quinque.

2. Multiplex est magnitudo magnitudinis maior minoris, cum minor metitur maiorem. *Vi 6 est multiplex ipsius 2; Minor vero respectu maioris dicitur Submultiplex. Universalis;* Multiplex est magnitudo magnitudinis maior minoris, cum minor repetita metitur, vel excedit maiorem: atque ita Totum non tantum respectu partis Aliquota; sed etiam respectu Aliquantia dicitur multiplex, puta 5. respectu ipsius 2.

3. Ratio est duarum eiusdem generis magnitudinum mutua quædam secundum quantitatem habitudo. Quod Græci λόγος dicunt, Latini reddunt, Ratio, quæ aliud non est quam duarum eiusdem generis magnitudinum (nam quæ generis sunt diuersi, inter se conferri non possunt puta linea cum superficie) comparatio secundum excessum & defectum, siue in ratione totius & partis, aut etiam secundum æqualitatem quæ dicitur Ratio æqualitatis. Sunt ergo in omni ratione duo Termini; & quibus prior, qui in casu nominandi solet efferri, dicitur Antecedens; posterior, vero qui in alio casu subiungitur, dicitur Consequens. *Vi cum dico, linea 4 pedum*

est dupla linea 2. pedum; antecedens huius rationis est linea 4 pedum, consequens vero est linea 2. Excessus autem antecedentis (nam antecedentis loco ponere solemus id quod maius est) supra consequens, dicatur Differentia terminorum,

Rationū vero alia est Rationalis, quæ est inter magnitudines commensurabiles, & numericè exprimi potest, ut ratio dupla, tripla, & alia à numericè denominata, Irrationalis autem est, quæ est inter magnitudines incommensurabiles, & numericè exprimi nequit: qualis est inter latus & diametrum eiusdē Quadrati; quāvis enim diameter sit lateris maior, definiri tamē nō potest; quāto sit maior: neque enim dimidio, neque parte tertia, neque ulla alia numericè designabili, maior est diameter quā latus Quadrati. Dicuntur vero magnitudines illæ incommensurabiles, quibus nulla cōmunis mensura potest adhiberi: nulla enim quantumvis exigua pars sumi potest, quæ latus simul & diametrum quadrati metiatur; nam si metiatur diameter, non metietur latus; aut è cōverso.

4. Rationem dicuntur habere inter se magnitudines, quæ multiplicatę superare se inutuo possunt. Nulla ergo est ratio finiti ad infinitum, linea ad superficiem, cum neque magnitudo finita infinitam,

neque linea superficiem, quacunque multiplicatione facta, possit superare.

5. In eadem ratione esse dicuntur magnitudines, prima ad secundam, & tertia ad quartam, quando auctis quacunque multiplicatione antecedentibus (quæ sũt prima & tertia) auctis etiam eadem vel alia quacunque multiplicatione consequentibus (quæ sunt secunda & quarta) semper euenit vt cum multiplex primæ aut maior est aut æqualis, aut minor quā multiplex secundæ, talis quoque sit multiplex tertiæ ad multiplicem quartæ.

Quatuor magnitudines esse in eadem ratione non est aliud quam primam ita esse maiorem secundæ, sicut tertia maior est quartæ, siue secundam esse talem partem primæ, qualis pars tertiæ est magnitudo quartæ, iuxta def. 3. An vero quatuor datæ magnitudines sint huiusmodi, hoc, quod attulimus, iudicio deprehenditur. Nam in magnitudinibus $ABCD$, si sumatur duplam

G	8.	16.	12.	24.
F	12.	12.	18.	18.
E	8.	6.	12.	9.

4.	2.	6.	3.
A	B	C	D

antecedentiũ, & triplũ consequentiũ, vt

G 5

fa-

factū est in ordine E, tūc sicut multiplex prima superat multiplicem secunda, ita multiplex tertia multiplicē quarta; at in ordine F, cū sumitur triplū antecedentiū, & sextuplū consequentiū, multipla prima & secūda, idē tertia & quarta, pariter sunt equalia; in ordine autē G cū sumitur duplū antecedentiū, & octuplum consequentiū, tūc multipla prima & tertia pariter minora sunt multiplis secūda & quarta; neque aliud unquā eueniet in quibuscumque alijs multiplicationibus; unde colligimus magnitudines A, B, C, D esse in eadē ratione. Quāuis autē hoc exemplum in magnitudinibus cōmensurabilibus, & numeris propositū sit, idē tamen exeniet in ratione etiā irrationali, quod intelligatur in sequentibus etiā exēplis.

Ab hoc indicī iubet Euclides inuestigari an magnitudines in eadem ratione sint; quod quomodo cum natura intima proportionaliū cohareat sic ostēdo. Quia ratio est magnitudinum secundum quantitatem cōparatio; non est aliud magnitudines in eadem ratione esse, quam esse in eadem comparatione seu habitudine maioris & minoris, totius & partis; si nomen partis latius sumatur, ut cōprehendamus etiā proportionē irrationalē. Non potest autem ē quatuor magnitudi-

nibus

nihus primā eandem habere comparationem maioris ad secundam minorem, quā habet tertia ad quartam; nisi secunda & quarta pari numero multiplicata similiter se habeant ad maiores, quo ad excessum & defectum. Si enim exempli gratia cum secunda B ter repetita non excedat primam A, quartatamen D ter accepta superet tertiā C, manifestū erit D non esse ita minus ipso C, sicut B ipso A; aut quod idē est, C nō esse ita maius ipso D, sicut est A ipso B, atq. adeo quatuor illas magnitudines, non esse in eadē ratione. Iā vero perinde est cōferre minores magnitudines B & D, ad maiores singulas A & C, atq. ad easdē A & C pari numero multiplicatas. Nā necesse est quodq. similes partes eodē modo se habere quo ad excessū & defectū ad sua tota aqualiter multiplicata. Si enim cū B sexies superitū, nō excedat A bis repetitū, D tamē sexies deceptū, superet C bis repetitū; manifestū etiā inde erit B nō esse talē partē ipsi^o A, qualis est D ipsi^o C, seu quod idē est, C nō itā esse maius ipso D sicut est A ipso B. Idipsū vero est, quod Euclides docet; iubet enī maiores magnitudines A & C aqualiter multiplicari, seu primā & tertiā sumi equamultiplices, multiplicari etiā

aqualiter minores, seu partes B & D, & si se per eodē modo se habeāt in excessu & defectu ad tota A & C equaliter multiplicata, rectē colligit A, esse in eā ratione ad B, in qua est C ad D. Atq; hac Euclidis definitio quibuscunq; magnitudinibus in eadē ratione positis cōpetit, seu per se & solitarie accipiātur, seu figuris illigata. Que vero magnitudines ex ipsa cui illigata sunt, cōfiguratione eandē proportionē sortiūtur breui⁹ & plani⁹, sic definiētur.

In eadē ratione sunt magnitudines prima ad secundā, & tertia ad quartā, quando qua multiplicatione augetur prima supra secundā, eādē quoq; augetur tertia supra quartā. Exempli causa triangula inter easdem parallelas posita, puta A & B, & eorum bases C & D, sunt in eadē ratione; quia si prima magnitudo A duplo aut triplo maior, sit aut fiat quam secunda B, tertia etiam C, duplo aut triplo maior erit, quā quarta D, ut constat ex prop. 28 1. Est ergo ut A ad B, ita C ad D.



6. Magnitudines quæ in eadē ratione sunt proportionales vocētur. Puta si fuerit ut prima ad secundam ita tertia ad quartā quatuor illæ magnitudines dicētur proportionales. Et quidē si fuerit ut prima ad secundā, ita secundā ad tertiā &

tertia ad quartā, magnitudines illa erūt. Cōtinuē proportionales, quia proportio nullibi interrumpitur, ut videre est in magnitudinibus 16. 8, 4, 2, nam ut 16, ad 8, ita 8, ad 4, & 4, ad 2. Quod si nō sit ut prima ad secundā ita secundā ad tertiam; sed tantū ut prima ad secundam, ita tertia ad quartā, ut fit in magnitudinibus 4. 2. 6. 3. magnitudines illa proportionales quidem, non tamen continuē proportionales erunt, quia proportionis cursus interrumpitur inter secundam & tertiam.

7. Quando vero facta antecedentiū & consequentiū multiplicatione, multiplex primæ excesserit multiplicē secundæ, multiplex autem tertiæ non excesserit multiplicē quartæ, tūc prima ad secundam maiore habet rationē, quā tertia ad quartā. Ut quia in magnitudinibus A, B, C, D, sumpto duplo antecedentiū, & quadruplo consequentiū, multiplex ipsius A superat multiplicem secundæ B, cum tamē,

12. 8. 14. 16.

6. 2. 7. 4.

A. B. C. D.

multiplex tertia C, nō superet multiplicē quarta D; ideo inquā, maiore rationem habet A ad B, quā C ad D. Breuiter, ibi maior est ratio ubi maior est inaequalitas; tibi autē maior est inaequalitas ubi dif-

fe.

ferentia terminorum aut pluries cōtinet cōsequentem, aut est eius pars maior. Vt differentia terminorum A & B est 4, duplum scilicet cōsequentis 2; differentia vero inter C & D , est 3. minor cōsequente D ; maior ergo inæqualitas est, maiorq; ratio ipsius A ad B , quam ipsius C ad D .

8. Analogia seu Proportio est Rationū similitudo. Putsa similitudo qua est inter duas rationes triplas, aut quadruplas dicitur Proportio, & Analogia Sape tamē apud auctores Proportio aliud non est quam simplex ratio, iuxta def. 3.

9. Proportio in tribus minimū terminis cūlstitit: Cū enim sit similitudo duarū rationum & vtraqueque sit inter duos terminos, quatuor terminos requireret Proportio; nisi terminus unus bis repetatur: ut cū dico sicut 8 ad 4 ita 4 ad 2. Et tūc tres termini ad proportionem sufficient.

10. Cum tres magnitudines proportionales fuerint, prima ad tertiam duplicatam rationem habere dicitur eius, quā habet ad secundam. Vt quia proportionales sunt 8, 4, 2, prima 8 ad tertiam 2 dicitur duplicatam habere rationem eius quam habet ad secundam 4.

11. Quando vero quatuor fuerint proportionales magnitudines, prima ad quartā triplicatam habet rationem & ita deinceps.

deinceps vno amplius, quamdiu proportio extiterit.

12. Homologæ dicuntur magnitudines antecedentes antecedentibus, & consequentes consequentibus. *Ut in quatuor proportionalibus cum dico. Ut 6, ad 3, ita 4, ad 2, prima & tertia, quia amba sunt antecedentes, dicuntur inter se homologæ; sicut & secunda homologa est cum quarta; quia amba sunt consequentes.*

13. Alterna seu permutata ratio est quando ex quatuor proportionalibus antecedens cum antecedente seu prima cum tertia, & consequens cum consequente, hoc est secunda cum quarta comparatur.

Quia enim est 9 3 6 2
Vt A ad B ita C ad D

Erit permutando 9 6 3 2
Vt A ad C ita B ad D.

Quod intellige si inter primam & tertiam, & inter secundam & quartam, potest esse proportio, Unde etiam si sit ut triangulum A ad triangulum B, ita basis C ad basim D; non tamen licet permutare ut A ad C, &c. quia inter triangulum & lineam non potest esse proportio. De permutata ratione agitur infra prop. 16.



14. Conuersa ratio est cum consequens instar antecedentis sumitur, & ad antecedens velut ad consequens comparatur. *De qua vide prop. 4. in corollario.*

9 3 6 2
Quia enim est. Vt A ad B ita C ad D
Eris conuertendo. 3 9 2 6
Vt B ad A ita D ad C.

15. Compositio rationis est cum antecedens simul cum consequente instar vnius sumitur, & ad consequens comparatur. *De qua vide prop. 13.*

19 3 6 2
Nam quia est. Vt A ad B ita C ad D
Erit componendo. 12 3 8 2
Vt AB ad B ita CD ad D.

16. Diuisio rationis est cum differentia terminorum loco antecedentis sumitur, & ad consequens comparatur. *De qua vide prop. 17.*

Vt in exemplo sapius proposito inter priores terminos, qui sunt 9 & 3, differentia est E 6. inter posteriores autem, qui sunt 6 & 2, differentia est F 4.

9 3 6 2
Quia ergo est. Vt A ad B ita C ad D
Erit diuidendo. 6 3 4 2
Vt E ad B ita F ad D.

17. Cou-

17. Conuersio rationis est cum antecedens ad differentiam terminorum, velut ad consequens comparatur. De qua vide prop. 18.

Nam quia est. $9 \quad 3 \quad 6 \quad 2$
Vt A B ita C D

Erit conuersio- $9 \quad 6 \quad 6 \quad 4$
ne rationis. Vt A ad E ita C ad F.

18. Proportio ex æquo est cum fuerint plures magnitudines, & alia ipsi numero æquales quæ binæ & binæ in eadem ratione sumantur, fueritque ut in prioribus prima ad ultimam: ita etiam in posterioribus. Vel est sumptio extremarum per subtractionem mediarum. Vt si sint plures magnitudines A, B, C, & alia totidem D, E, F, binæ & binæ in eadem ratione, hoc est ut A ad B ita D ad E, & ut B ad C, ita E ad F, erit ex æquo, ut in prioribus A ad ultimam C, ita etiam in posterioribus prima D, ad F.

$12 \quad 6 \quad 3 \quad | \quad 8 \quad 4 \quad 2$
A B C D E F

Ergo ex æquo. Vt 12 ad : ita 8 ad 2.

19 Ordinata proportio est cum fuerit ut antecedens ad consequentem, ita antecedens ad consequentem, fuerit etiam ut consequens ad aliam quampiam, ita consequens ad aliam quampiam.

De:

Dupliciter institui potest proportio ex aequo: uno modo quando tam in prioribus quam in posterioribus comparantur prima cum secunda, & secunda cum tertia; & hac est ordinata proportio, qua hic definitur, & de qua agitur prop. 20. & 22. cuiusq; exemplum positum est def. 18. Altero modo fit proportio ex aequo, cum ordo perturbatur in posterioribus, ut apparebit definitione sequenti.

20. Perturbata proportio est cum tribus existentibus magnitudinibus & totidem alijs fuerit ut in prioribus antecedens ad consequentem, ita etiam in posterioribus: ut autem in prioribus consequens ad aliam quampiam, ita in posterioribus alia quampiam ad antecedentem

Ut si sit quemadmodum in prioribus A ad B, ita in posterioribus E ad F, ut vero in prioribus B consequens ad aliam quampiam C, ita in posterioribus alia quampiam D ad antecedentem E, erit hac perturbata proportio. de qua agitur prop. 21. & 23.

18	12	4		27	9	6
A	B	C		D	E	F

Ergo ex aequo. Ut 18 ad 4 ita 27 ad 6

Lubet ad extremum breui schemate ponere sub oculos omnes hasce proportionum formas quas animo firmiter com-

comprehendisse plurimum tyronibus proderit.

<i>Quia est</i>	Vt	9	ad	3	ita	6	ad	2
<i>Erit Permutando</i>		9		6		3		2
<i>Conuertendo</i>		3		9		2		6
<i>Componendo</i>		12		3		8		2
<i>Diuidendo</i>		6		3		4		2
<i>Cōuersione rationis</i>		9		6		6		4

<i>Ex aequo ordin.</i>				<i>Ex aequo perturb.</i>			
12. 6. 3.	8. 4. 2.			18. 12. 4.	27. 9. 6		
A B C	D E F			A B C	D E F		
12 ad 3	8 ad 2			18 ad 4	27 ad 6		

Neque vero difficile est adnertere ex ipsis numeris in omnibus hisce ordinibus quatuor magnitudines esse proportionales, seu minores quantitates esse similes maiorum partes: Nam in permutata si cut 6 est pars subsiqui altera ipsius 9, ita 2 ipsius 3. Seu quod idem est, sicut 6 semel continetur in 9 & supersunt 3 pars dimidia ipsius 6; ita 2 semel continetur in 3. & superest 1. pars dimidia ipsius 2. Idem in reliquis ordinibus deprehendes.


Pro-



Propositiones.

Propositio 1. Theore.

*Si fuerint quotcunque magnitudines
quotcunque magnitudinum nume-
ro equalium æquemultiplices sin-
gula singularum; quam multiplex
est una unius, tam multiplices e-
runt omnes omnium.*

HOc est, Æquemulti- **E 10 5 F**
plicium magnitudi-
num quā multiplices sunt 
singulæ singularium, tam **6 3 4 2**
multiplices sunt omnes om- **A B C D**
nium. Vt quia æquemultiplices sunt A ad
B, C ad D; si A & C colligantur in E, si-
militerque B & D colligantur in F, quam
multiplex erat A ipsius B, tam multiplex
erit E ipsius F.


Non enim maiora aut minora sunt
tota quam suæ omnes partes: non potest
proinde totum E pluries vel pauciore nu-
mero continere totum F, quam A & C
par-

partes omnes totius E continerent B & D partes omnes totius F.

Propositio 2. Theore.

Si prima secunda fuerit ita multiplex ut tertia quarta, fuerit autem & quinta multiplex secunda ut sexta quarta; erit composita ex prima & quinta secunda, ita multiplex, ut tertia & sexta primæ.


Sit prima A ita multiplex secunda B, sicut tertia C quarta D: quinta vero E ita multiplex secunda B, ut sexta F quarta D.



Dico compositam ex prima A & quinta E hoc est G, ita multiplicem fore secunde B, sicut composita ex tertia & sexta hoc est H, multiplex est quarta D.

Nam quia B & D secunda & quarta, continentur pari numero in singulis suis multiplicibus, continebuntur quoque a pari numero in multiplicibus collectis, hoc est in G, & H.

Pro-



Propositio 3. Theore.

*Si prima secunda ita est multiplex ut
tertia quartæ, & prima ac tertia
sumantur æquemultiplices; erit
multiplex prima tam multiplex
secunda, quam multiplex est mul-
tiplex tertia ad quartam.*

VT quia A continet B, sicut C ipsam
D; si sumantur E & F æquemulti-
plices ipsarum A & C, B continebitur to-
ties in E, quoties D in F.

Nam sumere multipla
ipsarum A & C non est al-
liud quam sumere plures A
& C; Sicut ergo B & D
æqualiter continebantur in singulis A &
C, continebuntur etiam æqualiter in
ijsdem pari numero multiplicatis in E
& F.

E	8	F	12
	4	2	6
A	B	C	D

Pro-



Propositio 4. Theore.

*Si prima ad secundā eam proportio-
nē habuerit quā tertia ad quartā;
habebunt quoque eandem rationem
æquemultiplices prima & tertia ad
æquemultiplices secundā & quartā
iuxta quamvis multiplicationem, si
sumantur ut inter se respondent.*

V T si A habuerit eam
rationem ad secundā
B, quam habet tertia C ad
quartā D; sumptis E & G
æquemultiplicibus ipsarū
A & C, itemque F & H iisdem vel alijs
æquemultiplicibus ipsarum B & D: erit
E multiplex ipsius A, ad F multiplicem
ipsius B, sicut G multiplex tertiæ C, ad
H multiplicem quartæ D. Nam, ut ex-
plicuimus ad def. 5. in ratione maioris
& minoris, siue in proportionē, perinde
est conferre singulas B & D, ad singulas
A & C, atque B & D æqualiter multi-
plicas, ad A & C per inter se nu-
mero multiplicatas. Si ergo singulæ A &
C, ad singulas B & D eadem ratio-
ne

ne se habent , eadem A & C æqualiter multiplicatæ in E & G , erunt etiam in eadem ratione ad B & D æqualiter multiplicatas in F & H.

Longiore circuitu idem sic concluditur : Sit prima A ad secundam B sicut tertia C ad quartam D. Sumptis deinde E & F , ipsarum A & C æquemultiplicibus & G & H æquemultiplicibus ipsarum B & D . Dico fore etiam E multiplicem primæ A , ad G multiplicem secundæ B , ut est F multiplex tertiæ C, ad H multiplicem quartæ D , Accipiantur enim K, L ipsarum F F, & M, N ipsarum G , H æquemultiplices. Tunc quia æquemultiplex est E ipsius A, ut F ipsius C ; acceptæque sunt ipsarum E F æquemultiplices K L, ita ergo multiplex est K ipsius A sicut & L ipsius C . Eadem de causa ita multiplex est M ipsius B, ut N ipsius D . Et quia est ut A ad B ita C ad D , acceptæque sunt ipsarum A C, æquemultiplices K , L , ip-

A B C D

E G F H

K M N L

sa.

farum vero B, D alia quæcunque M, N :
 ergo si K *b* superat M, superabit & L ip- *b* 6. def. 8
 sam N & si æqualis, æqualis ; & si mi-
 nor, minor suntque K, L ipsarum E, F
 æquemultiplices, M vero & N ipsarum
 G, H. Est ergo ut E ad G ita F ad H. Si *c* def. 5
 ergo prima ad secundam, &c.

*Hæc inquam forma demonstrandi
 per assumptas æquemultiplices in sequen-
 tibus quoque propositionibus potest ad-
 hiberi, in quibus ego utar compendio. Nā
 definitione quinta rite percepta, facile
 assequemur earum propositionum veri-
 satem absque longo illo ambitu æque-
 multiplicium. Quod semel monuisse sit
 satis.*

Corollarium.

*Demonstrarem igitur hoc loco per æ-
 quemultiplices, Proportionem conuersam
 recte procedere, nisi ex terminis nimis
 quam esset manifesta. Nam si A est ita
 maius ipso B sicut C ipso D, nimum est
 evidens B ita minus fore ipso A, sicut D
 minus est ipso C. Neque aliud dicit ratio
 conuersa, de qua def. 14. Quod si A &
 C sumpta essent equalia aut minora ip-
 sis B & D; esset nihilominus æque euidēs*

H

pro-

*proportio Conuersa, quod idem etiam pro-
sequentium propositione exemplis intel-
ligatur, in quibus loco antecedentis solemus
ponere id quod maius est, & iuxta
illud exemplum propositionem declarare.*

Propositio 5. Theore.

*Si magnitudo magnitudinis ita mul-
tiplex fuerit ut ablata ablata; reli-
qua reliqua ita multiplex erit, ut
tota totius.*

VT quia A ita multi-
plex est ipsius B, sicut
ablata C, ablatæ D; erit re-
sidua E, residuæ F ita mul-
tiplex, ut tota A totius B, si enim cum A
sit duplum ipsius B, & pars ablata C,
dupla similiter partis ablatæ D, non esset
residua E duplex residuæ F, non contine-
rentur, omnes partes totius B, in omni-
bus partibus totius A, sicut totum in to-
to; quod patet esse impossibile. Erit ergo
residua residuæ ita multiplex, ut tota to-
tius.

Pro-



Propositio 6. Theore.

Si dua magnitudines duarum magnitudinum æquemultiplices fuerint, & ablatæ quadam earundem æquemultiplices, erunt reliquæ ijsdē vel æquales vel æquemultiplices.

VT quia $G \ 2 \ H \ 3$ | $G \ 8 \ H \ 12$
 duæ ma. $E \ 10 \ F \ 15$ | $E \ 4 \ F \ 6$
 gnitudines A, $A \ 12 \ B \ 18$ | $A \ 12 \ B \ 18$
 B, duarum C, $C \ 2 \ D \ 3$ | $C \ 2 \ D \ 3$
 D, sūt æquemultiplices, si auferantur ex A, B quævis æquemultiplices earundem C, D, puta E & F; residuæ G & H erunt ijsdem C & D aut æquales, aut æquemultiplices. Cū enim C & D in totis A & B, & in eorum aliquibus partibus E & F æqualiter contineantur; æqualiter quoque a continebuntur in reliquis G & H. Quare reliquæ G & H aut ijsdem C, D, sunt æquales, aut æquemultiplices.

H 2 Pro-



Propositio 7. Theore.

*Aequales ad eandem magnitudinem,
& eadem ad aequales eandem ha-
bent rationem.*

VT si A & B sint æquales
magnitudines, quæ erit $\frac{4}{A} \frac{4}{B} \frac{2}{C}$
ratio vnius, puta ipsius A, ad
C; eadem erit alterius B ad eandem C.
Item quam rationem habet C, ad A; ean-
dem habet ad B æqualem ipsi A; quod
manifestum est ex terminis, & ex ratione
conuersa.

Propositio 8. Theore.

*Inæqualium magnitudinum maior
ad eandem, maiorem habet rationē
quam minor. Et eadem ad mino-
rem, maiorem habet rationem
quam ad maiorem magnitudi-
nem.*

VT duarum magnitudinū
 A & B, A maior rationē
 habet maiorem ad C, quam
 habeat B minor ad eandem C. Insuper
 maiorem rationem habet A ad minorem
 magnitudinem C, quam ad maiorem B.
 Vtraque pars patet ex terminis, & ex
 def. 7. & 5.

Propositio 9. Theore.

*Qua ad eandem^{eandem} habent rationem, æ-
 quales sunt magnitudines. Item ad
 quas una aliqua eandem habet ra-
 tionem, illæ sunt æquales.*

VT quia A & B eandem ha-
 bent rationem ad C, sunt
 inter se æquales. Item quia ma-
 gnitudo C eandem habet rationem ad A
 & B, necesse est ipsas A & B inter se æ-
 quales esse *est conversens prop. 7. & per
 se evidens.*

§ § § A X X A § § §

Propositio 10. Theore.

Magnitudinum habentium rationē ad eandem, quæ maiorem habet, ea maior est. Cum vero eadem ad duas habet rationem, ea ad quam maior est ratio, est minor.

V T si A maiorem 6 4 2 | 6 2 4
habet rationem A B C | D E F
ad C, quam B ad ean-
dem C, A maior erit quam B. Item si D
habet maiorem rationem ad E quam ad
F, E minor est quam F. *Est conuersens
prop. 8. & per se manifesta.*

Propositio 11. Theore.

*Quæ eidem eadem sunt rationes, &
inter se sunt eadem.*

V T si rationes 4 2 | 4 2 | 4 2
ipsarum A, B, A B | E F | C D
& ipsarum C, D
sint eadem vni tertiæ, ipsarum E F, erunt
etiam eadem inter se.

Pro-



Propositio 12. Theore.

Si quotcumque magnitudines proportionales fuerint, erit ut una antecedentium ad unam consequentiũ, ita omnes antecedentes ad omnes consequentes.

V T si est A ad B E 10 F 5
 sicut C ad D, erit
 E, hoc est omnes si-
 mul antecedentes, ad
 F omnes simul conse-
 quentes, sicut A ad B
 vel C ad D. Cum enim tota E & F sint
 diuisa in totidem partes. E scilicet in A
 & C, F ~~enim~~ in B & D, quæ singulae ad
 singulas eandem habent rationem; non
 potest illa ratio esse alia quam quæ toto-
 rum inter se; alias omnes partes, omni-
 bus partibus aliter essent maiores & mi-
 nores, quam tota ipsa: quod fieri non po-
 test, cum tota aliud non sint quam omnes
 suæ partes.





Propositio 13. Theore.

Si prima ad secundam eam habuerit rationem, quam tertia ad quartā; tertia vero ad quartam maiorem habeat, quam quinta ad sextam; maior quoque erit ratio prima ad secundam, quam quinta ad sextam.

Hoc est. Earundē duarum proportionū

9	3	6	2	8	4
A	B	C	D	E	F

si una maior est quam aliqua tertia, etiā altera maior erit: ut si sunt duę rationes eadē inter A B & C D, sit autem maior ratio inter C, D, quam inter E, F; erit quoque maior ratio inter A, B, quam inter E F; quod ex terminis notum est.

Pro-



Propositio 14. Theore.

Si prima ad secundam eam habuerit rationem quam tertia ad quartā, sit autem prima magnitudo maior quam tertia, secunda quoque maior erit quam quarta; si minor, minor; si equalis, equalis.

VT si fuerit A ad B sicut
 C ad D, & A maior sit
 quam C, maior quoque erit
 B quam D. Cum enim B & D totorum
 A & C ponantur esse partes similes, si B
 sit pars maioris A, D vero minoris C, ne-
 cessario B maior erit quam D. Quod si
 totum A. toti C, aut æquale esset aut mi-
 nus, talis etiam foret pars B, respectu par-
 tis D, ut satis constat.

H 5 Pro²



Propositio 15. Theore.

Partes cum pariter multiplicibus eandem rationem habent, si sumantur ut sibi respondent.

Hoc est. Partes pari numero contentę in suis totis, eandem servant inter se rationem ac tota ipsa. Ut magnitudines B & D quę sunt eodem numero in totis A & C, eandem inter se habent rationem quā tota A & C. Nam si tota resoluantur in omnes partes similes ipsis B & D, tunc quę erit ratio cuiuslibet ad quamlibet, eadem erit ratio omnium ad omnes, seu totius ad totum; ut per se notū est, & ex prop 4.

12	4	6	2
A	B	C	D


Propositio 16. Theore.

Si quatuor magnitudines proportionales fuerint, etiam permutata proportionales erunt.

Ut

V T si est A ad B, sicut E F G H
 C ad D, erit etiam 18 9 8 4
 permutando ut A ad C, ita 6 3 4 2
 B ad D, quæ est alterna A B C D
 seu permutata ratio de-
 qua def. 13. Nam cum magnitudines B
 & D sint similes partes, & pari modo ac
 numero contentæ in totis A & C (hoc
 enim est esse in eadem *a* ratione) necesse *a* def. 3.
 est ut tota inter se ita se habeant sicut illæ
 partes inter se; cum totorum magnitudo
 & proportio, ex partium magnitudine &
 proportionem confurgat.

Aliter: Sumptis E, F, ipsarum A, B, &
 G, H, ipsarum C, D, quibuscunque æque-
 multiplicibus, erunt multiplices E, F, G,
 H, in eadem ratione cum submultipli-
 cibus *a* A, B, C, D. Quare E, F, G, H erunt *a* 15.
 proportionales, ac proinde si E maior, *b* *b* def. 5.
 minor, aut par sit ipsi G, talis quoque erit
 F ad H: Sed E, F, ipsarum A, B, & G, H,
 ipsarum C, D, sunt utcumque æquemul-
 tiplices. Est ergo ut A *c* ad C, ita B ad D. *c* def. 5.



Propositio 17. Theore.

Si composita magnitudines proportionales fuerint, & diuise proportionales erunt.

Sint compositæ magnitudines A B, C B, D E F E, proportionales, hoc est, ut A B ad C B, ita D E, ad F E; Dico fore etiam diuidendo, ut A C ad C B, ita D F ad F E. Quia enim tota A B, D E, similiter continent partes C B, F E, si eædem illæ partes è suis singulæ totis auferantur, similiter rursus in residuis A C, D F, continebuntur. *Atque ita probata est.* Proportio per diuisionem de qua def. 16.

8	4
A	C B
6	3
D	F E

Propositio 18. Theore.

Si diuise magnitudines proportionales fuerint, & composita proportionales erunt.

Nam

Nam in præcedente exemplo, quia partes A C, D F similiter continent ipsas C B, F E; si hæ illis adiungatur, tota A B, D E rursus similiter continebunt suas partes C B, F E. *Atque ita probata est proportio per compositionem, de qua def. 15.*

Corollarium.

Ex his iam demonstrari potest proportio ex conuersione rationis: Nam in eodem exemplo, est

Vt AB ad CB ita DE ad FE.
 Et diuid. Vt AC ad CB ita DF ad FE.
 Et conue. Vt CB ad AC ita FE ad DF.
 Ergo cōp. Vt AB ad AC ita DE ad DF.
Qua postrema est conuersio rationis iuxta definitionem 16.

Hæc tamen proportio etiam per se probari potest. Nam

Quia est, $\begin{matrix} & 12 & 4 & 9 & 3 \\ \text{Vt } A & \text{ad } B & \text{ita } C & \text{ad } D. \end{matrix}$
Erit conuersio- $\begin{matrix} & 12 & 8 & 9 & 6, \\ \text{ne rationis, Vt } A & \text{ad } E & \text{ita } C & \text{ad } F. \end{matrix}$

Cum enim in hac proportionem iuxta def. 16. antecedens ad differentiam terminorum comparatur, si differentia terminorum addantur consequentibus, antecedens

recedentia cum consequentibus exaqua-
buntur; deinde vero si à consequentibus
ita exaquis auferantur similes partes
B & D, necesse est ut residua, seu diffe-
rentia terminorum, qua sunt E & F, si-
militer contineantur in totis A & C;
quod dicit proportio ex conversione ra-
tionis.

Propositio 19. Theore.

*Si fuerit ut tota ad totam, ita ablata
ad ablatam, & reliqua ad reliquã
erit ut tota ad totam.*

VT si ablatæ C & D E 4 F 2
sint inter se in ea ra- C 8 D 4
tione, qua totæ A & B, erūt A 12 B 6
etiam residuæ E & F, ut to-
tæ A & B. Cum enim ablata C ita ma-
ior sit ablatâ D, ut tota A, totâ B; si E
residua non esset eodem modo maior re-
siduâ F, aliter essent maiores omnes par-
tes omnibus partibus, quam totum toto;
quod fieri non potest.

Proa



Propositio 20. Theore.

Si fuerint tres magnitudines; & alia totidem, bina & bina in eadem ratione, ex aquo autem prima maior fuerit quam tertia; erit & quarta maior quam sexta, & si equalis, equalis; si minor, minor.

HÆc propositio facillime intelligitur ex ijs quæ dicemus ad prop. 22. quæ huic valde est affinis; ex præcedentibus tamen propositionibus sic etiam demonstrabitur.

Sint tres magnitudines A, B, C, & totidem alia D, E, F, binæ & binæ in eadem ratione, hoc est ut A ad B, ita D ad E & ut B ad C ita E ad F. Dico si A maior, minor, aut par sit ipsi C, talem etiam fore D respectu ipsius F. Sit primum A maior quam C: Quia ergo A maior est quam C, & datur alia quædam B, habebit A ad B, maiorem rationem quam C, ad eandem B. Est

Est autem ex positis

ut A ad B, sic D ad

E & ut B ad C, ita E

ad F: ergo conuertendo, est ut C ad B ita

F ad E; quare D ad E maiorem *b* habet

rationem quam F ad E; maior ergo est *c*

D quam F. Similiter procedet demon-

stratio si A ipsi C aut æqualis ponatur,

aut minor. Si ergo fuerint tres magnitu-

dines, &c.

Neque tantum

vera est proposi-

tio si ternæ ma-

gnitudines sumantur, sed etiam si quater-

ternæ & quouis alio numero; semper *e*

nim si prima in prioribus minor, maior,

aut æqualis est vltima, ita etiam erit in

posterioribus. Ut si ternis magnitudini-

bus A, B, C, & D, E, F, addantur G & H,

sitque C ad G, sicut F ad H tunc omissis

B & E erunt A C G, & D, F, H, ternæ &

ternæ magnitudines & de his procedet

demonstratio prius facta.

$$\begin{array}{ccc|ccc} 12 & 9 & 6 & 8 & 6 & 4 \\ A & B & C & D & E & F \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|ccc} 12 & 9 & 6 & 3 & 8 & 6 & 4 & 2 \\ A & B & C & G & D & E & F & H \end{array}$$

Pro-



Propositio 21. Theore.

Si fuerint tres magnitudines, & alia totidem, bina & bina in eadem sed perturbata ratione, ex quo autem prima maior fuerit quam tertia, erit etiam quarta maior quam sexta: si minor, minor; si equalis, equalis.

HÆc propositio planius intelligetur ex 23.

13	12	4	27	9	6
A	B	C	D	E	F

à qua parum differt.

Aliter; Sint tres magnitudines A, B, C, & totidem aliarum D, E, F, binæ & binæ in eadem, sed perturbata ratione, hoc est ut A ad B, sic E ad F & ut B ad C, sic D ad E. Dico, si A maior sit, minor, aut æqualis ipsi C, talem quoque fore D respectu ipsius F. Sit prima A maior, ipsa C. Cum igitur A sit maior quam C, & detur alia quædam B, habebit A ad B maiorem rationem quam C ad eandem B; sed ex positis ut A ad B, ita est E ad F, & ut B ad C ita D ad E, ergo conuertendo

do ut C ad B, ita $\begin{array}{ccc|ccc} 18 & 12 & 4 & 27 & 9 & 6 \\ A & B & C & D & E & F \end{array}$
 E ad D: quare E
 ad F maiorem ha-

b 11.

c 10.

bet rationem, quam b E ad D. Minor
 est ergo F quam D. Similiter ostendetur
 si A minor sit, aut æqualis ipsi C, talem
 quoque fore D respectu ipsius F. Si ergo
 fuerint tres magnitudines, &c.

Propositio 22. Theore.

*Si fuerint quotcunque magnitudines,
 & alia totidem bina & bina in ea-
 dem ratione sumantur, erunt quo-
 que ex aquo in eadem ratione.*

S Int quotcunque $\begin{array}{ccc|ccc} 12 & 9 & 6 & 8 & 6 & 4 \\ A & B & C & D & E & F \end{array}$
 magnitudines A,
 B, C, & alia totidem
 D, E, F, in eadem ratione; hoc est ut A ad
 B, ita D ad E, & ut B ad C, ita E ad F.
 Dico ex æquali fore illas in eadem ra-
 tione: hoc est, fore A ad C, sicut D ad F.
 Nam quia tota A & D similiter conti-
 nent magnitudines B & E. & partes C &
 F similiter continentur in ipsis B & E,
 necesse est ut eadem partes C & F simi-
 liter contineantur in totis A & D. *Atque*
ita

ita probata manet . Proportio ex æquo ordinata de qua def. 19. Manifesta item hinc fit veritas prop. 20. ut ibi polliciti sumus.

Aliter: Quia ostensum *a* est si A superat C, D quoque superare F, & si minus, minus, &c. ita quoque *b* erit in æque- *a* 20; *b* def. 5. multiplicibus : hoc autem est quatuor magnitudines A, C, D, F, esse proportionales .

Propositio 23. Theore.

Si fuerint tres magnitudines, & alia totidem binę & bina in eadem sed perturbata ratione, erunt etiam ex æquo in eadem ratione .

V T si fuerit 18 12 4 | 27 9 6
iuxta def. 20. A B C | D E F
& prop. 21. sicut A
ad B, ita E ad F; & sicut B ad C, ita D ad E ; erit ex æquo ut A ad C, ita D ad F.
Qua enim proportionem C minuitur infra B & per consequens infra A, eadem proportionem D augetur supra E, & per consequens supra F; quare A ita maius erit ipso C sicut D ipso F.

Ali-

Aliter: eum pro- 18 12 4 | 27 9 6
 batum sit; si A su- A B C | D E F
 perat C, D quoque
 superare F, aut minus esse, &c. ita quo-
 que erit in æquemultiplicibus. Quare est
 ex æquo ut A ad C, ita D ad F. *Atque
 hæc est Proportio ex æquo perturbata, de
 qua def. 20.*

Propositio 24. Theore.

*Si prima ad secundam fuerit ut tertia
 ad quartam, quinta autem ad se-
 cundam eam habeat rationem quā
 sexta ad quartam, habebit compo-
 sita ex prima & quinta eam ratio-
 nem ad secundam, quā tertia &
 sexta simul ad quartam.*

Quia enim se- 10 4 2 | 6 3 15
 cunda B est E A B | C D F
 talis pars sin-
 gularum A & E primæ & quintæ, qualis
 est quarta D singularum C & F, erit
 quoque B talis pars collectarum A & E,
 qualis est ipsarum C & F pari numero &
 modo collectarum.


Pr o-



Propositio 25. Theore.


Si quatuor magnitudines proportionales fuerint, maxima cum minima duabus reliquis erunt maiores.

Sint quatuor magnitudines proportionales $A B, C D, E, \& F$. Dico $A B$ maximam, cum minima F , maiores esse duabus simul reliquis $C D \& E$. Sumatur enim $A G$ æqualis ipsi



$E, \& C H$ ipsi F æqualis. Quia ergo est ut $A B$ ad $C D$ ita E ad F , estque $A G$, ipsi E , & $C H$ ipsi F æqualis, erit ut $A B$ ad $C D$, ita $A G$ ad $C H$; hoc est ut tota $A B$ ad totam $C D$, ita ablata $A G$ ad ablatam $C H$ reliqua igitur $G B$ ærit ad reliquam $D H$ ut tota ad totam: Est autem $A B$

AB maior quam
CD, ergo maior
quoque BG quā
DH. Cumque
AG ipsi E, &
CH ipsi F æ-
qualis sit, pares
erunt AG & F,
ipsis CH & E.
Iam vero quia
ipsis AG & F
additur GB, ip-
sis vero CH &



E additur DH minus quam GB, erunt
post additionem AB & F maiores, quam
CD & E. Si igitur quatuor magnitudi-
nes, &c.

*Quæ sequuntur propositiones non sunt
Euclidis, sed ex Pappo Alexandrino, &
alij; adiectæ; quarum certe nō est magna
necessitas si antecedentes rite sint præceptæ.*

Propositio 26. Theore.

*Si prima ad secundam maiorem ha-
buerit rationem quam tertia ad
quartam, habebit conuertendo se-
cunda ad primam minorem ratio-
nem, quam quarta ad tertiam.*

Hoc

Hoc est si A est totum 8 4 | 5 3
 maius respectu ipsius A B | C D
 B, quam C respectu quartæ
 D: erit B minor pars respectu ipsius A,
 quam D respectu ipsius C, quod per se est
 evidens; & continetur in prop. 4.

Propositio 27. Theore.

Si prima ad secundam maiorem rationem habuerit, quam tertia ad quartam; habebit permuando prima ad tertiam maiorem rationem, quam secunda ad quartam.

Quia enim D ponitur 8 4 | 5 3
 pars maior totius A B | C D
 C, quam B totius A; non
 potest pars B supra partem D: tantum
 excessum habere, quantum habet totum
 A supra totum C.

Hanc quoque palam est prop. 16. contineri.

Propositio 28. Theore.

Si prima ad secundam maiorem habuerit rationem, quam tertia ad quartam, habebit prima cum secunda maiorem rationem ad secundam, quam tertia & quarta ad quartam.

Nam

Nam quia B est minor pars ipsius A, quam D ipsius C; si utraq; semel addatur, tam B ipsi A, quam D ipsi C, adhuc B minor pars erit totius E, quam D totius F.

Continetur prop. 18.

Propositio 29. Theore.

Si prima & secunda ad secundam maiorem habeant rationem, quam tertia & quarta ad quartam; habebit etiam diuidendo prima ad secundam maiorem rationem, quā tertia ad quartam.

Nam in exemplo superiore. Quia E est maius totum respectu partis B; quam F respectu ipsius D, si utraque pars ex suo toto tollatur, A residuum ex E, maius erit respectu ipsius B, quam C residuum ex F, respectu ipsius D.

Continetur prop. 17.

Pro-




Propositio 30. Theore.

Si prima & secunda ad secundam maiorem rationem habeant, quam tertia & quarta ad quartam, habebunt per conuersionem rationis prima & secunda ad primam minorem rationem, quam tertia & quarta ad tertiam.

NAm si totum E maius est respectu ipsius B, quam F respectu ipsius D: B minor erit pars ipsius E, quam D totius F, quare residuum A maior erit pars totius E, quam residuum C totius F. Hoc autem idem est ac si dicas totum E minorem habere rationem ad primam A, quam totum F ad tertiam C.

Continetur prop. 19.



Propositio 31. Theore.

Si sint tres magnitudines, & totidem alia, habeatq; prima priorum maiorem rationem ad secundam, quā prima posteriorum ad secundam, secunda item priorum maiorem habeat ad tertiam, quā in posterioribus secunda ad tertiam, etiam ex æquo habebit prima priorum maiorem rationem ad tertiam, quam prima posteriorum ad tertiam.

N Am si magni- 16 8 4 | 9 5 3
tudines illæ A B C | D E F
sint A B C, D E F,

permutando eas proportionēs quæ in propositione ponuntur,

Erit maior A ad D quā B ad E.

Et eadē ratiōe maior B ad E quā C ad F.

Quare multo maior A ad D quā C ad F.

Ergo permut. maior A ad C quā D ad F.

Continetur prop. 20. & 22.

Pro-



Propositio 32. Theore.

Si sint tres magnitudines, & totidem alia, sitq; maior ratio prima priorum ad secundam, quam secunda posteriorum ad tertiam: Item secundę priorum ad tertiam, maior quam prima posteriorum ad secundam: erit etiam ex æquo maior ratio prima priorum ad tertiam, quam prima posteriorum ad tertiam.

Sint illę 16 8 4 | 9 6 4 | 6 9
 magnitudines A B C | D E F | G H

D, E, F, sitque præterea ut D ad E, ita G ad C, & ut E ad F, ita H ad G, collocabunturque ternę & ternę magnitudines D, E, F; H, G, C, in eadem sed perturbata ratione; eritque ex æquo ut D ad F ita H ad C.

Nunc vero quia est ut D ad E, ita G ad C, maior erit ^b ratio ipsius B ad C, ^b hyp. quam G ad C, ideoque B maior est quā G, &

G, & per 16 8 4 | 9 6 4 | 6 9
 cōsequens A B C | D E F | G H
 maior ra-

tio est ipsius A ad G quam ad B : est autem A ad B, maior quam E ad F, multo ergo maior est A ad G quam E ad F. Rursus quia est H ad G, ut E ad F, maior erit A ad G, quam H ad G ; quare A maior est quam H, & per consequens maior est A ad C, quam H ad eandem C. Sed ostensum fuit esse ut H ad C, ita D ad F, maior est ergo ratio ipsius A ad C, quam ipsius D ad F : quod est propositum.

Continetur prop. 21. & 23.

Propositio 33. Theore.

Si tota ad totam maiorem rationem habuerit, quam ablata ad ablatā, habebit & reliqua ad reliquam maiorem rationem quam tota ad totam.

VT si totum A ad totum B maiorem habeat rationem, quam ablatum C, ad ablatum D;

E 8		F 3
C 4		D 1
A 12		B 6

ma-

maiolem habebit residuum E ad residuū F, quam totum A, ad totum B. Nam sicut totum A est maius toto B, ita omnes simul partes, omnibus partibus. Quia ergo pars C minus superat partem D, quam totum A totum B residua pars E debet magis superare residuam F, quam totum A totum B, ut excessu maiore ipsius E compensante defectum ipsius C, partes C & E ita sint maiores partibus D & F, sicut totum A maius est toto B.

Continetur prop. 12.

Propositio 34. Theore.

Si sint quotcunque magnitudines, & alia totidem, sitque maior ratio prima priorum ad primam posteriorum, quam secunda ad secundā, & hac maior quam tertia ad tertiam, & sic deinceps: habebunt omnes simul priores, ad omnes simul posteriores, maiorem rationē, quam omnes priores relicta prima ad posteriores omnes prima similiter relicta; minorem autem quam

prima priorum ad primam posteriorem; maiorem tamen quam ultima priorum ad ultimam posteriorem.

Sint quocunque magnitudines $A B C$, & aliae totidem $D E F$, ita se habentes ut proponitur.

Quia ergo maior est A ad D quā B ad E .
Erit permuta. maior A ad B quā D ad E .
Et cōponen. maior $A B$ ad B quā $D E$ ad E .
Et permut. maior $A B$ ad $D E$ quā B ad E .

Quia ergo maior est tota $A B$ ad totam $D E$; quam ablata B ad ablatam E ,
maior erit & reliqua A ad reliquam D ,
quam tota $A B$ ad totam $D E$.

Eadē ratione maior erit B ad E quā tota $B C$ ad totam $E F$.

Multo ergo maior est A ad D quā $B C$ ad $E F$.
Et permuta. maior A ad $B C$ quam D ad $E F$.
Et cōpo. maior $A B C$ ad $B C$ quā $D E F$ ad $E F$.
Et permut. maior $A B C$ ad $D E F$ quā $B C$ ad $E F$.
quod erat primo loco propositum. Nunc vero quia maior est tota $A B C$, ad totā $D E F$, quam ablata $B C$ ad ablatam $E F$,
erit & maior reliqua A ad reliquam D ,
quam tota $A B C$ ad totam $D E F$;
quod erat secundum,

De-

Deniq; quia maior est B ad E quā C ad F.
 Erit permuta. maior B ad C quā E ad F.
 Et compo. maior BC ad C quā E F ad F.
 Et permut. maior BC ad EF quā C ad F.
 Ostensa est autem maior A B C ad DEF
 quam B C ad EF
 Multo ergo maior est A B C ad DEF
 quam C ad F.

Quod erat tertio loco propositum.

Eadem methodo procedetur si quater-
 nae proponantur magnitudines, aequalis
 plures quocunque numero.





EVCLIDIS Elementorum

LIBER VI.

Definitiones.

1  Imiles figuræ rectilinez sunt, quæ singulos angulos singulis æquales habent, & latera circa æquales angulos proportionalia.

V T triangula ABC , DEF , erunt similia, si singulos angulos singulis habeant pares, hoc est si angulus A , angulo D , anguli vero B & C , angulis E , & F sint æquales, item si latera circa æquales angulos sint proportionalia, hoc est si sit ut AB ad AC , ita DE ad DF hac enim latera sunt circa æqua-



aequales angulos $A \text{ \& } D$, & ut AB ad BC : ita DE , ad EF ; ac denique ut AC ad CB , ita DF ad FE .

2. Reciprocae figurae sunt cum in utraque figura antecedentes & consequentes termini rationum fuerint.

Hoc est figura reciproca sunt cum in una figura repetitur antecedens unius proportionis, cuius consequens est in secunda; & cum è contra antecedens alterius similis proportionis est in secunda figura, cuius consequens est in prima; ut triangula $ABCDEF$, erunt reciproca, si fuerit ut AB ad DF ; ita DE , ad AC , tunc enim antecedens primae proportionis reperitur in triangulo primo ABC & in altero est consequens, at secundae proportionis antecedens est in secundo triangulo, consequens in primo.

3. Extrema ac media ratione recta linea secta esse dicetur, cum est ut tota ad maius segmentum, ita maius segmentum ad minus.

Sic recta AB , erit secta in C , extrema ac media ratione, si fuerit ut tota AB ad maius segmentum AC , ita AC maius, ad CB minus segmentum.



4 Altitudo cuiusque figure est linea perpendicularis à vertice ad basim deducta.

VT trianguli ABC altitudo est AD , ducta perpendiculariter à vertice ad basim BC . Itē trianguli EFG , altitudo est EH , extra triangulum cadens in basim FG , productam in H .



5 Ratio ex rationibus componi dicitur, cum rationum quantitates inter se multiplicatae aliquam rationem effecerint.

Quantitates rationum non sunt aliamquam numeri à quibus denominatur proportio: sit 3. est quantitas proportionis tripla. 2. dupla, &c. Ratio ergo ex rationibus componitur, cum denominatores proportionum inter se multiplicati aliquam proportionem efficiunt; ut ex ratione dupla & tripla componitur sextupla; nam denominator dupla qui est 2. & denominator tripla qui est 3. inter se multiplicati faciunt 6. denominatorem proportionis sextupla composita.

Pro-



Propositiones.

Propositio 1. Theore.

Triangula & parallelogramma, quorum eadem sit altitudo, habent se ut bases.

Sint triangula $A B C$, $A C D$, habentia eandem altitudinem $A C$, item parallelogramma $F C C E$, habentia eandem altitudinem $A C$. Dico illa inter se habere proportionem quam habent bases $B C$, & $C D$. Cum enim triangula sint constructa intra parallelas $B D$, $E F$, (sicut possunt constitui inter parallelas quæcunque alia triangula eiusdem altitudinis (si bases $C B$, & $C D$, sint æquales, erunt & triangula $b b$ 38. 1; super illis basibus æqualia. Quod si basis $C B$, maior esset, aut minor basi $C D$, esset quoque triangulum $A B C$; maius aut minus triangulo $A C D$; & sic quoque erit sumptis æquemultiplicibus tam basium quam triangulorum;



a. def. 4.

nam perinde est conferre singula ad singula, atque pariter multiplicata ad pariter multiplicata, quemadmodum definit. 5. lib. 5. explicatum est. Sunt ergo triangula $A B C$, $A C D$, inter se ut bases $C B$, & $C D$.

- Iam vero si triangula sint ut bases, etiā
 b 34. 1. parallelogramma: b nam hæc sunt dupla
 triangulorum, partes autem æquemultiplicium c in eadem sunt ratione atque
 c 35. 5. ipsa æquemultiplicia.

Propositio 2. Theore.

Si in triangulo ducatur recta lateri parallela; secabit proportionaliter reliqua eiusdem trianguli latera. Et si trianguli latera secta sint proportionaliter recta per sectiones ducta tertio lateri erit parallela.

- I**N triangulo $A B C$, ducatur $D E$, ipsi $B C$, parallela; quo facto dico latera $A B$, $A C$ secta esse proportionaliter; hoc est, esse ut $A D$, ad $D B$; ita $A E$, ad $E C$. Du-
 a 37. 1. ctis enim rectis $B E$, $C D$, a erunt trian-
 gula $B E D$, $D C E$, in eisdem parallelis
 æqua-



æqualis, *b* & habebunt proinde eandem *b* 7. §
 rationem ad triangulum *A D E*. *c* Sed *c* 1.
 quam proportionem habet triangulum
A D E ad *D E B*, eandem habet basis
A D, ad *D B* (cum triacula sint in ea-
 dem altitudine, quam ostenderet perpen-
 dicularis quæ ex *E* duci potest ad *A B*,)
 & quam proportionem habet idem tria-
 gulum *A D E*, ad ipsum *C D E*, eandem
 habet basis *A E*, ad basim *E C*; Cum er-
 go ostensum sit ambo triacula *D B E*,
D E C, eandem habere rationem ad ipsū
A D F; bases quoque *B D*, *E C*, eandem
 habebunt proportionem ad latera *D A*
 & *E A*.

Iam vero si latera *A B*, *A C*, propor-
 tionaliter secta sint, cum sit ob eandem
 altitudinem ut *A D* ad *D B*, ita triangu-
 lum *A D E* *d* ad ipsum *D E B*; & ut *d* 1.
A E ad *E C* ita *A D E* ad ipsum *E D C*;
 sicut in eadem ratione ponitur esse latera:
A D, *D B*, & *A E*, *E C*; erunt etiam
 triacula *D B E*, *D E C* in eadem ratio-
 ne ad triangulum *A D E*; Erunt ergo
e triacula *D B E*, *D E C* inter se æqua- *e* 9. §
 lia: cumque habeant eandem basim
D E, erunt *f* constituta inter parallelas: *f* 39. 1.
 parallelæ ergo sunt *B C* & *D E*. Si er-
 go in triangulo, &c.

Pro-



Propositio 3. Theore.

*Si trianguli angulus secetur bifariā,
& recta angulum secans secet &
basim, habebunt basis partes eandē
rationem quam reliqua trianguli
latera. Et si partes baseos eandem
habeant rationem quam reliqua
inter se latera, recta à vertice ad
sectionem baseos ducta trianguli
angulum secabit bifariam.*

Trianguli ABC , angulus
 BAC , biseccetur per re-
ctam AD ; dico esse ut BD
ad DC , ita BA , ad AC ; per
 C , enim ducatur CE ipsi AD paralle-
la, cui BA producta occurrat in E .
Quia ergo in triangulo BEC , recta DA
ipsi CE , est parallela, erit sicut BD , ad
 DC , ita BA , ad AE , seu ad AC , quæ
ipsi AE æqualis est; Si ergo trianguli
angulus, &c. esse autem rectam AC æ-
qualem ipsi AE , sic ostendo. Quia recta
 AC



$A C$ tangit parallelas $A D, E C$, anguli b & c 29. 1. alterni $C A D, A C E$ sunt æquales, & 29. 1. quia recta $A E$, tangit easdem parallelas, angulus externus $B A D$ interno & opposito $A E C$, est æqualis: sunt ergo anguli $A E C, A C E$, æquales; cum ostensum sint æquales angulis æqualibus $B A D, D A C$; quare latera $A C, A E$, & d & e 6. 1. sunt equalia.

Iam vero si est ut $B D$ ad $D C$, ita $B A$ ad $A C$, & ducta ut prius $C E$, parallelâ ipsi $A D$, erit ut $B D$, ad $D C$, ita $B A$ ad $A E$; f æquales ergo sunt $A E$ & f 9. 5. $A C$, g quare anguli quos subtendunt nimirum $A E C, A C E$ sunt æquales: sed hos ostendemus ut prius esse æquales angulis $B A D, D A C$; sunt ergo anguli $B A D, D A C$, pares inter se; ac proinde angulus $B A C$ sectus est bifariam. Si ergo trianguli angulus, &c.

Propositio 4. Theore.

Equiangulorum triangulorum latera circa æquales angulos sunt proportionalia, & latera equalibus angulis subtensa sunt homologa.

Triang.

Triangula ABC ,
 DEF sint æquian-
 gula, ita ut anguli A & D ,
 B & E , C & F , singuli sin-



gulis æquales sint. Si igitur lateribus
 DE , DF circa angulum D , sumantur
 circa æqualem angulum A æqualia late-
 ra AG , AH , ducaturque HG , triangula
 AGH , DEF erunt iuxta 4. 1. & rectæ
 11. 1. HG , BC , & parallelæ, cum angulus in-
 ternus C , æqualis sit ipsi F hoc est angu-
 2. lo externo HGA . Erit ergo a ut AB ad
 AH seu ad DE . ita AC ad AG seu ad DF .
 Erit, inquā, Ut AB ad DE ita AC ad DF .
 16. 5. Et c permut Ut AB ad AC ita DE ad DF .

Quod est latera circa æquales angu-
 los esse proportionalia. Eodem modo si
 sumantur BK , BL ipsis ED , EF æqua-
 lia erunt triangula BKL , DEF , iuxta 4.
 1. & KL , AC , parallelæ, & eadem me-
 thodo ostenderetur latera circa æquales
 angulos B & E proportionalia; sicut etiā
 circa æquales angulos C & F , si ad angu-
 lum C fieret similiter triangulum æqua-
 le ipsi EFD . Sunt autem in his pro-
 portionibus latera homologa quæ æqua-
 libus angulis subrenduntur, nam AE &
 DE , quæ sunt sub æqualibus angulis C
 & F , ambo sunt antecedentia; & alia si-
 militer. Æquiangulorum igitur, &c.

Pro-

Propositio 5. Theore.

*Si duo triangula latera proportiona-
lia habuerint, erunt æquiangula;
eosque angulos habebunt æquales,
quibus homologa latera subten-
duntur.*

E St conuertens præce-
dentis Vt si triangula
A B C, D E F, habent latera
proportionalia hoc est, si sit
vt A B ad A C, ita D E ad D F, &c.
erit etiam angulus A angulo D, æqua-
lis, &c. vt vult propositio. Constituantur
enim ad rectam B C anguli G B C,
G C B, ipsis E, & F, æquales; vt pro-
inde etiam angulus G, angulo D, sit æ-
qualis, vnde sequetur triangula B G C,
D E F esse æquiangula, & eorum latera
proportionalia. Tunc vero quia D E &
D F habent eandem proportionem ad
A B & A C, quam ad G B & G C, necesse
est A B ipsi G B, & A C, ipsi G C
æqualē esse, cumq. B C sit cōmunis, tota
trian-



210. 1. triangula $\triangle ABC$, $\triangle BGC$
 sunt equalia, & æquales an-
 guli omnes. Cum ergo
 $\triangle ABC$, & $\triangle DEF$ eidem
 tertio $\triangle BGC$, sint æquiangula, inter se
 quoque erunt æquiangula; sunt vero illi
 æquales anguli quibus homologa latera
 subtenduntur: nam anguli A & G æqua-
 les sunt, quibus commune BC subten-
 sum est, &c. Si ergo duo triangula, &c.



Propositio 6. Theore.

*Si duo triangula unum habeant æ-
 qualem angulum, & latera circa
 eum proportionalia, erunt æquian-
 gula, angulosq; habebunt æquales
 quibus æqualia latera subtendun-
 tur.*

IN triangulis $\triangle ABC$, $\triangle DEF$,
 si æquales sint anguli A &
 D , sitque ut AB ad AC ,
 ita DE ad DF , erunt & reli-
 qui anguli æquales, &c. constituentur e-
 nim ad rectam EF , anguli EFB , GFE ,
 æquales ipsis B , & C , ut propositione su-
 periori. Quia ergo æquiangula sunt
 $\triangle ABC$,



A B C, & E F, & erunt A B, A C, & G F, & G E, proportionalia sed sunt etiam proportionalia A B, A C, & D E, D F, & sunt ergo latera D E, D F, ipsis G F, G E æqualia. Cumque & basis E F sit communis, tota triangula D E F, E F G æqualia & equiangula sunt. Quia ergo triangula A B C, D E F, vni tertio E F G sunt æquiangula, inter se quoque erunt æquiangula, &c.

Propositio 7. Theore.

Si duo triangula vnum angulum æqualem, & latera circa alteros angulos habeant proportionalia, vtrūque vero angulorum reliquorum aut minorem recto; aut non minorem; æquiangula erunt triangula, & angulos circa quos latera sunt proportionalia, habebunt æquales.

Hoc est; si duo triangula A B C, D E F habeant vnum angulum, puta, A ipsi D æqualem, circa alteros vero puta B, & E, latera sint proportionalia, ac denique si tertij anguli C & F, sint vterque minor,



aut

aut uterque non minor recto.
erunt & triangula æquian-
gula. *a* primum tertij an-
guli *F* uterque minor



recto, quod si tunc negas angulos
A B C, D E F, circa quos latera sunt pro-
portionalia, esse æquales, sit maior *A B C*
in quo constituatur *A B G*, ipsi *D E F*
æqualis, cumque in triangulis *A B G*,
D E F, duo anguli *D & E*, duobus *A*, &
A G B, sint æquales, tertius *F*, tertio
A B G erit æqualis, ac proinde tota trian-
gula æquiangula. *b* Est ergo ut *D E*, ad
D F, vel ut *A B*, ad *B C*, (nam ex hy-
pothesi eadem est inter utraque ratio)
ita *A B* ad *B G*; esset ergo sicut *A B*,
ad *B C*, ita *A B*, ad *B G*, quare rectæ
B C, B G, essent æquales: & consequenter
pares, erunt anguli *B C G, B G C*; &
cum *B C G* positus sit minor recto, etiā
B G C maior erit recto: si ergo *B G C*,
est minor recto, angulus *B G A* maior
erit recto, quem tamen ostendimus æ-
qualem esse angulo *F*. hoc est, minorem
recto, cum angulus *F* positus sit recto
minor: idem ergo angulus *B G A* esset
maior & minor recto, quod est absurdū.
Non possunt ergo anguli *A B C, B E F*,
esse inæquales, quare & tertius *F*, tertio

A C B

ACB equalis erit, & triangula ABC , DEF , æquiangula.

Quod si tertij anguli C & F , ponantur uterque non minor recto, negetur tamen angulos E & ABC , esse æquales rursus probabitur rectas BC , BG , & angulos BGC , BCG , esse æquales; & cum positum sit hunc non esse minorem recto, nec ille esset minor recto; quod est absurdum nam in triangulo BGC , essent duo anguli recti, aut rectis maiores. Si duo ergo triangula, &c. g 17. 1.

Propositio 8. Theore.

Si in triangulo rectangulo ab angulo recto in basim ducta sit perpendicularis, quæ ad perpendicularem sunt triangula, tum toti triangulo, tum inter se sunt similia.

IN triangulo ABC sit angulus BAC rectus, & ex A ad basim BC ducatur perpendicularis AD . Quia ergo in triangulis ABC , ADC , anguli BAC , ADC recti sunt, & angulus C communis, & tertius ABC ter-



tius ABC ter- g 12. 1.
tio

tio $DA C$ erit æqualis, ac
proinde triangu-
la $A B C$,
 $A D C$ sunt æquiangu-
la, & latera circa æquales an-
gulos habent proportionalia, ideoque
sunt & similia. Non aliter ostendetur tri-
angulum $A D B$ esse etiam simile toti
triangulo $A B C$, ac proinde sunt etiam
similia inter se triangu-
la $A B D$, $A D C$.



Corollarium.

*Ex hoc manifestum est perpendiculari
ab angulo recto ad basim ductam, esse
mediam proportionalem inter duo basis
segmenta: nam per 4. ostendetur esse ut
 CD , ad DA , ita DA ad DB , quod est
rectam DA esse mediam proportionalem
inter partes basis CD , DB .*

Propositio 9. Proble.

*A data recta linea imperatam par-
tem auferre.*

EX recta AB auferenda
sit pars tertia. Ducatur
ergo ex A recta AC , faciens
angulū cum AB utcumque;



finis

rum ex A C sumatur quævis pars puta A D, ac dux aliq addantur æquales D E, E C, iungaturque C B; cui parallela fiat D F. Eritque ablata A F, pars tertia ipsius A B. Nam quia in triangulo A B C ducta est D F, ipsi B C parallela, a erit a 2. sicut A D ad D E, ita A F ad F B, b & b 15. 9. componendo sicut A C ad A D ita A B ad A F; est autem A D pars tertia ipsius A C, ergo A E est etiam pars tertia ipsius A B. A data ergo recta, &c.

Propositio 10. Proble.

Datam rectam in sectam similiter secare, ut secta fuerit data altera recta.

Data recta A B secta sit in C & D oporteatque rectam A E (quæ applicetur ad A ut cū recta A B angulum utcumque constituat) in similes partes secare. Iunctâ rectâ B E ducantur C F, D G; ipsi B E parallele & factum est quod petitur. Nā quia in triangulo A B E ductæ sunt C F, D G, lateri B E parallele, a se- a 2. ctiones laterū A B, A E sunt proportionales. Cōponendo ergo ad diuidendo vt supra, ostendetur omnē eam proportionem,



nem, quæ est inter partes ipsius AB , eandem quoque esse inter partes lineæ AE .
Datam ergo rectam, &c.

Propositio 11. Proble.

Datis duabus rectis tertiam proportionalem invenire.

D Atque rectæ AB, AC angulum quemvis constituent, puta BAC , iungaturque recta CB . Mox productis lateribus AB, AC , sumatur ipsi AC æqualis BD , ducaturque DE ipsi BC parallela; eritque recta CE tertia proportionalis quæ sita. Nam quia BC ipsi DE est parallela, ^a erit ut AB ad BD , ita AC ad CE ; est autem BD ipsi AC æqualis; ^b Est ergo ut AB ad AC , ita AC ad CE ; quod est rectam CE esse tertiam proportionalem.



Propositio 12. Proble.

Tribus datis rectis quartam proportionalem invenire.

Duc

D Vē quælibet ex datis, puta $A B$ & $B C$, in directum collocentur, tertia vero $A D$, cum ipsa $A C$ angulum vtrunque constituat, iunctâque rectâ $B D$, agatur ipsi parallela $C E$, eritque recta $D E$ quarta proportionalis quæsitâ. Nam quia ipsi $C E$ parallela est $D B$, & erit vt $A B$ ad $B C$, ita $A D$ ad $D E$. Tribus ergo datis $A B$, $B C$, $A D$, inuenta est quarta proportionalis $D E$.



Propositio 13. Proble.

Datis duabus rectis mediam proportionalem inuenire.

D Atæ rectæ $A B$, $B C$ in directum collocentur, & super $A C$ constituitur semicirculus $A D C$: nam ad punctum B excitata perpendicularis vsque ad sectionem semicirculi in D , erit media proportionalis quæsitâ. Ductis enim rectis $A D$, $D C$, & erit angulus $A D C$, rectus, & à vertice D , ad basim $A C$ ducta perpendicularis $D B$. Quare inter partes baseos $A C$, media proportionalis est $D B$.



§ 13. 1. § 7. 5.

Propositio 14. Theore.

*Equalium & unum uni angulum
equalem habentium parallelogra-
morum reciproca sunt latera circa
equales angulos: Et quorum latera
circa unum angulum equalem
sunt reciproca, ea parallelogram-
ma sunt equalia.*

Sint AE, EC , parallelo-
gramma equalia, habentia
angulos ad E equal-
es, atque ita collocentur, ut



latus BE , lateri DE iaceat in directum,
ac proinde etiam GE , ipsi EF : nam
quia angulus FEB cum ipso FED va-
let α duos rectos, & anguli BED, BEG
equales ponuntur, angulus FEB cum
 BEG valent duos rectos ideoque GEF
est unica recta. Dico igitur esse ut DE
ad BE , ita GE ad EF . Perfecto enim
parallelogrammo BF , cum parallelo-
gramma AE, EC , sint equalia, sicut
vnum eorum, puta AE se habet ad BF ,
ita alterum EC ad idem BF , sed ut AE
ad

ad FB, ita est latus DE, ad BE, & ut EC, ad FB, ita latus GE ad EF, ergo est ut DE ad BE, ita & GE ad EF. c. 11. §. Quod erat demonstrandum.

E conuerso autem si ponantur latera circa æquales angulos ad E esse reciproca, ostendetur parallelogramma esse æqualia, nam si est ut DE ad BE ita GE ad EF; erit etiam ut DE ad BE, ita AE ad FB; item ut GE ad EF, ita EC ad FB, & quare est etiam ut AE ad FB, ita EC ad idem FB. Parallelogramma igitur AE, EG, sunt æqualia. c. 9. §.

Propositio 15. Theore.

Æqualium & unum uni angulum æqualem habentium triangulorum reciproca sunt latera. Et quorum latera circa æquales angulos sunt reciproca, ea triagula sunt æqualia.

Paret propositio ex præcedente; nam triagula sunt dimidium parallelogrammorum, quæ sub duobus lateribus triangulorum æquales angulos continentibus de-



K 2

feri-


scribi possunt; quæ ergo est ratio parallelogrammorum & laterum, eadem est triangulorum; ut si sint triacula æqualia ABC , BDE , quibus æquales sint anguli ad B ; ponatur BE ipsi AB , in directum, & ex consequenti DB ipsi BC , perficianturque parallelogramma BG , BF . Tunc vero per præced. erunt latera circa angulos ad B . reciproca, quæ eadē sunt latera triangulorum. Eadem methodo demonstrabitur posterior pars propositionis.



Propositio 18. Theore.

Si quatuor lineæ proportionales fuerint, erit quod sub extremis continetur rectangulum, æquale ei quod sub medijs. Et si rectangulum sub extremis æquale est ei quod sub medijs, quatuor illæ lineæ sunt proportionales.

Sint quatuor lineæ AB , CD , CE , AF , proportionales: quæ ita collocentur, ut AE , AB , & CF ,



CD ,


CD, rectos angulos A, & C, contineant, compleanturque parallelogramma BE & DF; quæ dico esse æqualia: nam latera circa æquales angulos A & C, reciprocantur ex hypothesi. Sunt æ ergo parallelogramma æqualia; quorum BE sub extremis lineis, DF sub medijs continetur.

E converso si sub iisdem lineis constituentur parallelogramma angulis A & C existentibus rectis, eaque parallelogramma sint æqualia, æ erunt latera circa angulos A & C, reciproca, hoc est erit ut AB ad CD, ita CF, ad AE; si ergo quatuor lineæ, &c.

Propositio 17. Theore.

Si tres rectæ proportionales, fuerint, quod sub extremis continetur re-ctangulum, æquale est quadrato quod à media describitur. Et si quadratum à mediâ descriptum, re-ctangulo sub extremis est æquale, proportionales sunt tres illæ lineæ.

Sint tres lineę AB CD,
 BE proportionales; id
 est, ut AB ad CD, ita
 CD ad BE, fiatque sub
 extremis AB, BE rectangulum AE. &
 à media DC quadratum CF. Quia ergo
 est ut AB ad CD, ita CD, vel illi æ-
 qualis DF, ad BE; erunt quatuor rectę
 AB, CD, DF, BE proportionales; & re-
 ctangulum ergo CF quod sub medijs
 CD, DF, continetur (hoc est quadratum
 CF) æquale est ipsi AE, quod contine-
 tur sub extremis AB, BE.



4 15.

E conuerso si quadratum medię CD
 rectangulo sub extremis æquale pona-
 tur, ostendetur tres illas lineas esse pro-
 portionales, ut in prop. præc. Si ergo
 tres rectę, &c.

Propositio 18. Proble.

*Super data recta, dato rectilineo simi-
 le, similiterq; positum describe-
 re.*

Sit

Sit data recta AB , datum rectilineum CD , in quo ducatur recta



EF . Deinde ad puncta A

& B rectæ AB constituentur anguli A

& $A B H$ æquales ipsi C & $C F E$; 7. 4. 32. 1.

erit proinde reliquus $A H B$, reliquo

$C E F$ æqualis, & triangula tota $A H B$,

$C E F$ æquiangula, & latera proportio. 6. 4.

nalia. Amplius ad puncta H & B rectæ

$H B$ constituentur $H B G$, $B H G$, ipsi

$E F D$, $E E D$ æquales, & proinde reli-

quus G reliquo D erit æqualis, & trian-

gula, ut prius, æquiangula, lateraque

proportionalia. Et factum est quod peti-

tur. Nam cum triangula partialia rectili-

neorum $A G$, & $C D$ ostensa sunt omni-

bus angulis æqualia, & omnibus lateri-

bus proportionalia, sunt ex figuræ simi-

les, & similiter positæ. Quod si rectili-

neum datum plures angulos quam qua-

tuor contineret, pluries esset repetenda

æqualium angulorum constructio, plu-

ribus quam duobus triangulis constitu-

tis, & demonstratio procederet ut prius.

Super data ergo recta, &c.

XXXXXXXXXX

Propositio 19. Theore.

*Similia triangula sunt in duplicata
ratione suorum laterum homologo-
rum,*

Sint ABC, DEF trian-
gula similia, habentia
tres angulos, singulos
singulis æquales & latera
circa eos proportionalia: ita ut anguli B
 E & alij alij sint æquales. Dico triangu-
lum ABC ad DEF , duplicatam a ha-
 a def. 10. bere eam rationem, quæ est inter quævis
5. latera homologa puta BC, EF . Suma-
 b 11. tur enim ipsarum BC, EF , b tertia pro-
portionalis BG ut sit sicut BC ad EF ,
ita EF ad BG ; ducaturque AG . Sunt
ergo expositis.



Ut AB ad BC , ita DE ad EF .
Permut. Ut AB ad DE , ita BC ad EF .

c const. Sed Ut BC ad EF , ita EF ad BG ;

Triangulorum igitur ABG, DEF
latera circa æquales angulos B & E sunt
 d 15. reciproca, d ac proinde triangula illa
sunt æqualia. Et quia est ut BC ad EF ,
ita EF ad BG , habet BC ad BG dupli-
ca-

catam eam rationem quam habet ad E F.
 Vñ vero B C ad B G, ita est triangulum
 A B C ad triangulum e A B G hoc est
 ad D E F.quare A B C tam ad trian-
 gulum D E F, quam ad A B G duplica-
 tam habet eam proportionem quę est in-
 ter latera homologa, B C & E F. Simi-
 lia ergo triangula, &c.

Corollarium.

*Et his patet si tres lineę proportiona-
 les fuerint, esse ut primam ad tertiam
 ita triangulum super prima descriptum
 ad simile similiterq; positum super secun-
 da. Nam extensum est esse ut B C ad
 B G, ita triangulum A B C super prima
 B C, ad triangulum D E F simile simi-
 literq; positum super secunda E F.*

Propositio 20. Theore.

*Similia polygona in similia triangula
 diuiduntur, numero equalia & to-
 tis homologa. Et polygona duplica-
 tam inter se eam habent rationem,
 quę est inter latera homologa.*

Sint polygona Simi-
lia $A B C D E$,
 $F G H K L$, sintque an-
guli $E A B$, $L F G$ æqua-



les angulus vero G angulo B . & sic ordi-
ne deinceps: singuli singulis sint æqua-
les, sint denique latera circa æquales an-
gulos proportionalia, ut $E A$ ad $A B$ ita
 $L F$ ad $F G$, &c. ideoque latera $A B$,
 $F G$, &c. erunt homologa.

Dico primo, hæc polygonæ ductis re-
ctis $A D$, $A C$, $F K$, $F H$, dividi in trian-
gula similia. Nam quia angulus B æqua-
lis est angulo G , & latera circa hos an-
gulos proportionalia, æquiangula erunt
triangula $A B C$, $F G H$ & similia: eadem
ratione ostēdetur triangula $D A E$, $K F L$
esse similia ob æquales angulos E & L , &
latera circa eos proportionalia. Nunc vero
quia est ut $A C$ ad $C B$, ita $F H$ ad $H G$
(ob similia triangula $A C B$, $F H G$) &
ut $C B$ ad $C D$, ita $H G$ ad $H K$ ob simi-
lia polygonæ; collocabuntur ternæ &
seruæ magnitudines in eadem ratione.

$A C$, $C B$, $C D$. | $F H$, $G H$, $H K$.

Ergo ex æquo ut $A C$ ad $C D$ ita $F H$ ad $H K$
Et quoniam angulus $B C D$, ipsi $G H K$
est æqualis, & ablati $A C B$, ablati
 $F H G$, erunt reliqui $A C D$, $F H K$ etiā
æquales. Quare triângula $A D C$, $F K H$

erunt

erunt æquiangula & similia, cum circa
æquales angulos $A C D, F H K$ habeant
latera proportionalia. Omnia ergo trian-
gula ostensa sunt inter se singula singulis
similia.

Dico secundo esse totis homologa,
hoc est sicut unum triangulum ad trian-
gulum sibi respondens alterius polygo-
ni, ita esse polygona tota inter se. Quia e-
nim similia sunt trianglera $A B C, F G H$,
erunt in duplicata ratione laterum ho- 19.
mologorum $A C, F H$; & ob eandem
causam trianglera $A C D, E H K$, sunt in
duplicata ratione eorundem laterum
 $A C, F H$. Quare ut trianglerum $A B C$
ad $F G H$, ita $A C D$ ad $F H K$, similiter-
que ostendetur trianglera $A E D, F L K$
esse in eadem duplicata ratione laterum
eorundem $A C, F H$: sunt ergo trian-
gula polygonorum proportionalia. Cum
vero quocunque magnitudines f quot- f 12. 5.
cunque magnitudinum sunt proportio-
nales, sicut est una ad unam ita omnes ad
omnes. Est ergo polygonum ad po-
lygonum sicut trianglerum ad triangu-
lum.

Dico tertio, polygona esse in dupli-
cata ratione laterum homologorum $A B$,
 $F G$. Nam quia trianglera sunt g in du- g 9. 5.
plicata ratione laterum, & polygona
K. 6 sunt

sunt vt triangula erunt etiam polygona
in duplicata laterum ratione . Similia
ergo polygona, &c.

Corollarium .

*Eadem methode probabitur omnes fi-
guras rectilineas esse in duplicata ratio-
ne laterum homologorum .*

Propositio 21. Theore.

*Qua eidem rectilineo sunt similia, &
inter se sunt similia.*

SI enim figuræ $A B C$,
 $G H K$ eidem $D E F$
sunt similes; quia anguli
 A & G sunt vni D aqua-



les, erunt & inter se æquales; & ita pro-
babitur omnes angulos, omnibus angu-
lis esse æquales; & latera a circa eos esse
proportionalia, si lateribus eiusdem ter-
tij sint proportionalia, ac propterea
 $A B C$, $G H K$ esse figuras similes.

Pro-



Propositio 22. Theore.

Si quatuor rectæ proportionales fuerint; rectilinea similia & similiter ab ijs descripta erunt proportionalia. Et si à rectis lineis similia similiterq; descripta rectilinea proportionalia fuerint, ipsa rectæ lineæ proportionales erunt.

Sint quatuor rectæ A, B, C, D proportionales; dico descriptis si-

A	_____	
B	_____	E
C	_____	
D	_____	F

milibus rectilineis puta triangulis super A & B, & similibus seu triagulis seu alijs rectilineis super C & D, hæc rectilinea fore proportionalia. Sumatur enim ipsarum A & B tertia proportionalis E, & ipsarum C & D, tertia proportionalis F; eritque ex æquo ut A b ad E, ita Cad b F. Ut autem A ad E, ita est rectilineum e super A ad rectilineum super B; & ut C ad F, ita etiam rectilineum super Cad

C ad rectilineum super D. Ergo ut rectilineum super A ad rectilineum super B, ita rectilineum super C ad rectilineum super D. Et sic probatum est rectilinea esse proportionalia.

E conuerso autem si rectilinea sint proportionalia, & similia similiterque posita, etiam latera erunt proportionalia; nam rectilinea duplicatam *a* habent rationem, illam eandem, quæ est inter latera.

Propositio 23. Theore.

Æquiangula parallelogramma inter se rationem habent ex laterum rationibus compositam.

Sint parallelogramma AB, BC, habentia angulos ad B æquales; & ita disposita ut DB ipsi BG, (& ideo



a 14. FB & ipsi BE ut a'ibi diximus) iaceat in directum, compleaturque parallelogrammum BH. Cum ergo sit ut parallelogrammum AB *b* ad BH ita basis DB ad BG, & ut BH ad BC ita EB ad BF, erit ratio ipsius AB ad BC composita *c* ex rationibus inter AB, BH, & inter

ter B H, B C; cumque hæ rationes eadẽ
sint *d* cum ijs, quæ sunt inter latera D B, *d* 20.
B G, & inter latera E B, B F; erit quoque
ratio ipsius A B ad B C composita ex
rationibus laterum eorundem, quod erat
demonstrandum.

Propositio 24. Theore.

*In omni parallelogrammo, quæ circa
diametrum sunt parallelogram-
ma, & toti, & inter se sunt simi-
lia.*

IN parallelogrammo A B
circa diametrum C D sunt
parallelogramma E F &



G H, quæ dico esse & toti, &
inter se similia. Nam quia parallelo-
grammum G H habet angulum ad D
communem cum toto, & angulus
D H K æqualis est interno & opposito *a* 29. 1.
B; erunt etiam anguli H K G, K G D
æquales reliquis A & A C B totius pa-
rallelogrammi; & eodem modo osten-
detur angulos omnes parallelogram-
mi E F, angulis totius A B esse æqua-
les. Iam vero quia triangu-
la D K G.

D K H

29. 1. $\triangle D K H$ & $\triangle A C$ triangula sunt, &
 similiter triangula $D A C$,
 4. $D B C$; erit ut $D A$ ad $A C$,
 ita $D G$ ad $G K$; latera ergo
 circa α quales angulos A & G sunt pro-
 portionalia. Rursus ut $A C$ ad $C D$, ita
 $G K$ ad $K D$, & ut $C D$ ad $C B$ ita $K D$
 ad $K H$: Ergo.



22. 5. $A C, C D, C B$ | $G K, K D, K H$
 ex α quo ut $A C$ ad $C B$ ita $G K$ ad $K H$
 & sic latera circa α quales angulos $G K H$,
 $A C B$ sunt proportionalia. Neque aliter
 monstrabitur: latera circa alios angulos
 α quales esse proportionalia. Sunt ergo
 parallelogramma $E F, G H$ similia toti
 $A B$, ac proinde etiam d inter se.

Propositio 25. Proble.

*Dato rectilineo simile similiterque
positum, & alteri dato α quale con-
stitueretur.*

44. 1. **S**it constituendum re-
 ctilineum simile ipsi
 A , & α quale alteri B . Fiat
 ergo a super $C D$ paralle-
 logrammum $C F$, α quale ipsi A , & super
 $D F$.



D F, in angulo F D H æquali ipsi
 E G D, fiat parallelogrammum D G, ipsi
 B æquale. Amplius rectarum C D, D H
 inueniatur *b* media proportionalis K L, *b* 13.
 super qua fiat rectilineum M, simile *c* ipsi *c* 18.
 A, eritque rectilineum M factum ut pro-
 ponitur. Est enim simile ipsi A ex hypo-
 thesi; esse autem æquale ipsi B sic osten-
 do. Quia rectæ C D, K L, D H sunt
 proportionales, erit ut prima *d* C D ad *d* 10.
 tertiam D H, ita rectilineum super pri-
 mam, id est A, ad rectilineum super se-
 cundam id est ad M: sed ut C D ad
 D H, ita *e* parallelogrammum C F id *e* 1.
 est A, ad D H, hoc est ad B. Quare erit
 ut A ad B, ita A ad M, ideoque rectilinea
 B & M erunt æqualia. Dato ergo rectili-
 neo, &c.

Propositio 26. Theore.

*Si à parallelogrammo auferatur pa-
 rallelogrammum simile toti, &
 communem unum angulum cum
 eo habens, hoc circa eandem dia-
 metrum cum toto consistit.*

Ex

E X parallelogramo A B
 auferatur simile C D ,
 habens cum eo angulum
 eundem E, ducanturque re-



24.

ctæ E H H G, quæ si non sunt diameter
 totius A B, sit ergo alia diameter, puta
 E F G ducaturque F K ipsi H D paral-
 lela; eruntque C K & A B æ parallelo-
 grammata similia: est ergo ut A E ad
 E B, ita C E ad E K; sed quia similia
 etiam ponuntur C D & A B est ut A E
 ad E B, ita C E ad C D; habet igitur
 C E eandem rationem ad E K & E D;
 quare E K & E D sunt equalia, pars &
 totum, quod fieri nequit. Non est ergo
 diameter E F G, neque alia erit quam
 E H G; quod erat probandum.

Propositio 27. Theore.

*Omniū parallelogrammorum secū-
 dum eandem rectam applicatorū
 & deficientium figuris parallelo-
 grammis similibus ei quod à media
 describitur, maximum id est quod
 ad mediam applicatur, simile exi-
 stens defectui.*


Recta

Recta AB Bifecetur
in C & super dimi-
dia CB fiat utcumque pa-
rallelogrammum CE , cu-



ius diameter BD . Completo ergo pa-
rallelogrammo BH , parallelogrammū
 AD erit super dimidium AC , deficient-
que a toto BH parallelogrammo CE ;
estque AD simile defectui CE . Hoc
igitur parallelogrammum AD dico esse
maximum eorumque super AB posita
deficiunt parallelogrammis similibus &
similiter positis ipsi defectui CE . Su-
matur enim in recta DB quodcumque
punctum, puta G , ducanturque KM &
 FL ipsis AB, BE parallelæ; eritque pa-
rallelogrammum AG positum super
 AB , & deficiens ipso KL quod simile
est, & similiter a positum ipsi CE . Di- 24.
co ergo parallelogrammum AG minus
esse ipso AD . Quia enim æqualia sunt
 FD , & DL ob bases æquales HD , 36. 1.
 DE , & DL maius est quam GE hoc
est quam CG (sunt enim CG & GE
complementa ipsius CE , ideoque æ- 43. 1.
qualia) erit etiam FD maius quam CG ,
eodem excessu IM . Si igitur ipsis FD ,
 CG commune addatur AI erit AD
maius quam AG . Omnium ergo pa-
rallelogrammorum, &c.

Pro;



Propositio 28. Proble.

*Ad datam lineam rectam dato re-
ctilineo æquale parallelogrammum
applicare deficiens figura paralle-
logramma, qua sit similis alteri
data. Oportet autem datum recti-
lineum non esse maius parallelo-
grammo, a quod ad dimidium da-
te recta potest applicari.*

a 27.

R Epetatur
exēplum
superioris pro-
positionis. in
quo ad rectam




a 18.

A B sit applicandum parallelogrammum
æquale rectilineo N & deficiens paralle-
logrammo quod sit simile ipsi O. Super
dimidia ergo ipsius A B fiat parallelo-
grammum a G E, simile & similiter po-
situm ipsi O compleaturque parallelo-
grammum B H. Quod si contingeret
C E vel A D ipsi N esse æquale, factum
esset quod petitur. Si autem A D maius
est

est quam N . (nam minus esse non debet; cum enim AD sit omnium maximum quæ applicari possunt iuxta tenorem prop. precedentis, si esset AD minus ipso N nullum aliud applicari posset ad AB æquale ipsi N) constituatur æquale excessui parallelogrammum IM ; simile & similiterque positum ipsis O & b 35. CE , quodque propterea poni poterit circa eandem diametrum DB . Iam c 26. vero productis rectis YG & MG , erit parallelogrammum AG applicarum rectæ AB deficiens parallelogrammo KL , simili ipsius IM , hoc est ipsius O . Idemque æquale est ipsi N . Nam quia ostentum est AG deficere ab AD , parallelogrammo IM , & rectilineum N ab eodem AD seu CE deficere eodem parallelogrammo IM , sequitur rectilineum N , & parallelogrammum AG esse æqualia. Ad datam ergo rectam.

Pro-



Propositio 29. Proble.

Ad datam rectam dato rectilineo æquale parallelogrammum applicare, excedens datam rectam figura parallelogramma, qua similis sit dato alteri parallelogrammo.

AD datam rectam AB sit applicandum parallelogrammum æquale rectilineo I , & excedens rectam AB



parallelogrammo simili ipsius D . Super recta ergo EB dimidia ipsius AB fiat parallelogrammum cuiusvis magnitudinis, dummodo a simile sit ipsi D similiterq; positum; fiatq; rursus parallelogrammum GH simile eidem D , æquale b vero ipsis EF & I simul sumptis; habeatque angulum EKF communem cum parallelogrammo EF . Completis igitur parallelogrammis OE , GB , NL , cum GH sit positum æquale ipsis EF & I simul sumptis, ablato communi EF , gnomon PCR ipsi I erit æqualis. Et quia

a 18.

b 25.

quia ob bases æquales & æqualia sunt ϵ 36. 7.
 O E & G B, æqualia item & complemen- δ 43. 1.
 ra G B & B H, si loco ipsius B H sub-
 stituatur æquale O E, erit parallelogra-
 mum A M æquale gnomoni P C R;
 ideoque etiam rectilineo I. Quare ad
 rectam A B applicatum est parallelo-
 grammum A M, æquale dato rectilineo
 I, excedens rectam A B figura parallelo-
 grammum N L, quæ similis est dato pa-
 rallelogrammo D, cum sit circa eandem
 diametrum cum ipso E F, quod positum
 est simile ipsi D. Ad datam ergo rectam,
 &c.

Propositio 30. Proble.

*Datam lineam rectam extrema ac
 media ratione secare.*

Recta A B A C B
 ita secetur 

ur in C, ut rectangulum sub a tota A B ϵ 16. 2.
 & segmento B C, sit æquale quadrato al-
 terius segmenti A C; eritque recta A B
 secta extrema & media ratione: nam erit
 b sicut A B, ad A C, ita A C ad C B. δ 17.

Pro-

XXXXXXXXXXXX

Propositio 31. Theore.

In rectangulis triangulis figura quavis super latere rectum angulum subtendente, aequalis est figuris, quae priori illi similes, & similiter posita super lateribus rectum angulum continentibus describuntur.

IN triangulo ABC la-
tus BC subtendat an-
gulum rectum BAC ,
& super BC descripta sit
figura aequiis puta CD ,



a 18.

cui similes & similiter posita sint AE
 AF , super lateribus angulum rectum cō-
tinentibus. Quia ergo tres omnes figurae
sunt similes. erunt in duplicata ratione
lateralum & homologorum i in quastiam
ratione essent quadrata eorundem late-
rum; sed quadrata super AB , AC essent
aequalia & quadrato ipsius BC , ergo etiā
figurae similes super iisdem AB , AC ,
sunt aequales ipsi CD . In rectangulis
ergo triangulis, &c.

b. 201

c. 47. 1.

Pro-



Propositio 32. Theore.

Si duo triangula habentia duo latera duobus lateribus proportionalia ad unum angulum componentur, ita ut latera homologa sint parallela, reliqua latera in directum erunt constituta.

Duo triangula ABC , DCE habentia latera proportionalia, hoc est ut AB ad AC , ita DC ad DE , componentur ad constituendum angulum ACD ; sintque tam antecedentia AB , DC , quam consequentia AC , DE , parallela. Dico reliqua latera BC , CE iacere in directum. Quia enim recta CD cadit in parallelas CA , ED ; erunt $\angle$ anguli alterni D & BCA æquales; & $\angle$ anguli item BAC , & ACD cum etiam recta AC cadat in parallelas AB & DC ; æquales ergo sunt anguli A & D , cum eodem tertio ACD ostensi sint æquales; & cum circa eos latera sint pro-



L

por-

29. 1.

66.

portionalia, æquiangula sunt $\triangle$ triangula
 ABC , DCE ; anguli ergo B & DCE
 sunt æquales; additis ergo æqualibus A
 & ACD , pares erunt duo anguli B &
 A , duobus DCE , ACD , siue toti ACE :
 rursumque addito communi ACB , erunt
 duo anguli ACB , ACE pares tribus
 A , B , & ACB ; sed hi tres æquales sunt
 duobus rectis, ergo & illi duo, idemque
 rectæ BC & CE iacent in directum.
 Si ergo duo triangula.

92. 12.
 14. 1.

Propositio 33. Theore.

*In æqualibus circulis anguli eandem
 habent rationem cum peripheriis
 quibus insistant, siue ad centra siue
 ad peripherias constituti insistant.
 Eandem insuper rationem habent
 sectores, quippe qui ad centra consti-
 stunt.*

Sint æquales circu-
 li ABC , DEF ,
 quorum centra G &
 H ; & arcibus BC ,
 EF insistant ad centra anguli BGC ,



EHF .

E H F. Dico hos angulos esse inter se ut arcus B C & E F. Nam si arcus B G, E F, sunt æquales, & æquales sunt anguli B G C, E H F. Quare si alter arcus esset maior, puta B C, aut minor, maior quoque aut minor esset angulus B G C quam E H F, & sic quoque erit in æquemultiplicibus; sunt ergo anguli B G C, E H F, sicut arcus B C, E F. a 27. 3. b def. 3.

Eodem modo probabitur angulos A & D qui insistant ad ambitum, esse ut sunt iidem arcus.

Denique sector rectis B G, G C & arcu B C comprehensus, est ad sectorem E H F, sicut arcus B C ad arcum E F. Nam si arcus sunt æquales, æquales erunt & ductæ rectæ B C, E F; & anguli ad centra d G & H, & tota triangula B G O, E H F, equalia, equalis item portiones circulorum quas auferunt f rectæ B C, E F, quare & sector B G C par erit ipsi E H F; quod si arcus B C maior esset ipso E F, cætera omnia essent maiora in circulo A B C, si minor, minora; & sic quoque erit in æquemultiplicibus: est ergo sector B G C, ad sectorem E H F, sicut arcus B C ad arcum E F. In æqualibus ergo, &c. c 29. 3. d 27. 3. e 4. 1. f 28. 3. g def. 5. 5

Corollarium.

*Hinc manifestum quoque est sic
esse sectorem ad sectorem, sicut est an-
gulus ad angulum; cum utraque ratio
eadem sit rationi arcus ad arcum;
quare & inter se eadem sunt.*

F I N I S.

**Ad Maiorem Dei glo-
riam.**