

Notes du mont Royal

www.notesdumontroyal.com

Cette œuvre est hébergée sur « *Notes du mont Royal* » dans le cadre d'un exposé gratuit sur la littérature.

SOURCE DES IMAGES
Google Livres

4

**EVCLIDIS
ELEMENTORVM
LIBRI SEX
PRIORES.**

Quorum demõstrationes tum
alibi sparsim, tum maximè
libro quinto ad faciliorem
captum accommodauit

*CAROLVS MALAPERTIVS
Montensis è Societate IESV.*



DVACI,

Typis BALTAZARIS BELLERI
sub Circino Aureo

ANNO 1620.



I V V E N T V T I

MATHEMATVM STUDIO SÆ

In Academia Duacensi.



Abetis ad manum, Iuvenes ornatissimi, Euclidis Elementa sex priora, hoc est Geometria, atque adeo Mathematicum omnium fundamenta: in quibus explicandis si cuiquam videbor nonnulla subtrahendo minus accurate Mathematica demonstrationis numeros omnes explere, is velim intelligat non Sophistis reuincendis, qui de industria velint in luce cæcutire, sed docilibus ingenijs & veritatis amantibus scribere me instituisse. Quibus profecto nescio an mediocri breuitate obscuriora fiant Mathematica, an molestiora nimia quorundam accuratatione, qui seu lectorum ingenio, seu beneuolentia diffusi satis per sese obuia inculcant anxie, & ne quid omissum videatur, tot in unum ratiocinationes congerunt, quot simul mente complecti sit difficillimum. Id non alibi magis quàm in libro quinto licebit intueri, si cui fuerit opportunum alios passim commentarios cum hoc nostro conferre. Cum enim eius libri Theoremata in

omnem Mathematicæ partem vim habere amplissimam cernerem, non dubitavi quin proximè cum primis naturæ pronuntiatæ cohererent, eaque proinde noua methodo ad primâ statim principia reuocaui, à quibus minimum discessissent. Quid enim attinebat per Multiplicium, & probationum flexus Tyronem circumdæcere, si propositis clare terminorum notionibus ad ipsam quamprimum veritatem magno compendio poterat penetrare? Hoc sane consilium meum utut accipiant alij, vobis tamen Auditoribus meis usu ipso facile probaturum esse confido. Satis vero amplum mihi theatrum estis, neque aliud propositum fuit in hoc opere recudendo, quam vestris seruire commodis, & eam, quæ mihi obtigit, Spartam ornare pro virili; ad ceteros si quid manabit emolumenti, ponatur in lucro. Vos interim, uti spero, laborem hunc meum, animum certe vestre utilitatis studiosissimum aquî bonique consuletis. Valete.

Tua intererit, amice Lector, præcipua Typographorum errata ad calcem libri notata præuidisse: leuiora facile emendabis, ceteri nullus moueam.

Ego infra scriptus Societatis I E S V
Prouincialis in Prouincia Gallo-Belgica
iuxta priuilegiū à Serenissimis Principi-
bus nostris ALBERTO & ISABELLA
eidem Societati nostræ concessum, quo
omnibus prohibetur ne libros ab eiusdem
Societatis hominibus compositos, absque
Superiorum permissione imprimant; fa-
cultatem do Baltazaro Bellerio Typogra-
pho Duacensi, vt librum cui titulus est,
Commentarius in priores sex libros Ele-
mentorū Euclidis, & Institutiones Arith-
meticæ practicę CAROLI MALAPERTII
è Societate I E S V, ad Sex annos proximos
imprimere & libere distribuere possit.
Datum Tornaci 9. Nouembris 1619.

FLORENTIUS DE MONTMORENCI,

A 3 APPRO-

APPROBATIO.

Hic liber continens Euclidis Elementorum libros sex priores: Item Oratio R. P. CAROLI MALAPERTII de laudibus Mathematicæ nihil habet quod fidem concernat, eivè aduersetur. Datum Duaci 20 Decembris 1619.


GEORGIUS COLVENERIVS S. Theologia
Doct̃or & Professor, & librorum in Acade.
Duacena censor.

EVCLIDIS ELEMENTORVM LIBER I.

Defini.

Definitiones.

- 1 Punctum est cuius pars nulla.
- 2 Linea longitudo latitudinis expers.
- 3 Lineæ extrema sunt puncta.
- 4 Linea recta est quæ ex æquo suis punctis, seu extremis interiacet: *Sine, cuius extrema obumbrant omnia media.*
- 5 Superficies est quæ longitudinem tantum habet.
- 6 Superficiæ extrema sunt lineæ.
- 7 Plana superficies est quæ ex æquo suis extremis interijcitur.




- 8 Planus angulus est duarum linearum in plana superficie se tangentium, & non in directum iacentium, alterius ad alteram inclinatio.

ut planus angulus est EFG; quia in plana superficie ABCD, lineæ EFGF, se tangent in puncto F, & non iacent in directum sine non efficiunt unam rectam lineam, sed ad se mutuo inclinantur, ut constituent angulum EFG.

B 9 Recti-

LIBER 1.


9 Rectilineus angulus est qui rectis lineis constituitur.



10 Quando certa super certam consistens æquales utrimque angulos fecerit, rectus est uterque angulorum æqualium: quæ autem alteri insitit, dicitur linea perpendicularis.

Sic linea AB insitens ipsi CD est eidem perpendicularis, quia angulos qui sunt deinceps ABC, ABD efficit æquales, & uterque angulus idcirco est rectus,

11 Obtusus angulus est, qui maior est recto.




12 Acutus, qui recto minor. Ut obtusus angulus est ABC maior recto EBC, acutus vero & recto minor est ABD.

13 Terminus est quod cuiusque est extremum.

14 Figura est quæ sub aliquo, aut aliquibus terminis continetur.

15 Cir-



15 Circulus est figura vnicae lineae termino contenta, quam circumferentiam seu ambitum dicunt, & ad quam lineam

ex aliquo puncto intra contento omnes lineae sunt aequales.

16 Punctum autem illud dicitur centrum. In circulo *A B C F* centrum est *D*, ex quo linea *D A*, *D B*, *D C* ad ambitum ductae, & omnes aliae sunt aequales.

17 Diameter circuli est recta per centrum acta, & ad ambitum vtrumque terminata. Cuiusmodi est *A D*.


18 Semicirculus est figura comprehensa à diametro & parte circumferentiae, quae diametro clauditur. ut *A B C*.

19 Segmentum circuli est, quod à recta linea & circumferentia continetur, quale est *E F G*.


20 Rectilineae figurae sunt quae rectis lineis continentur, Trilaterae quae tribus, Quadrilaterae quae quatuor, Multilaterae quae pluribus.



21 Trilaterarum autem figurarum Triangulum æquilaterum est, quod tria latera habet æqualia. *Quale est triangulum ABC.*



22 Isosceles seu æquicrus aut æquicrurum, quod duo tantum latera aut crura habet æqualia. *Quale est triangulum DE F, in quo duo tantum latera DE, DF, sunt æqualia.*




23 Scalenum triángulū est quod omnia tria latera habet inequalia; *ut G H K.*




24 Rectangulum triangulum est quod continet angulum rectum. *Tale est ABC in quo angulus B est rectus.*

25 Am-




25 Ambligoniū
seu obtusangu-
lum, quod angu-
lū habet obtusū.


Tale est DEF in quo angulus E est obtusus.



27 Oxygoniū seu acu-
tangulum quod tres a-
cutos habet angulos,
Quale est GHI.




27 Inter Quadrilate-
ras Quadratū est, quod
equilaterum est, & æ-
quiangulum, seu quod
& latera & angulos ha-
bet æqualia. *ut ABCD.*




28 Altera parte
longius figura est
æquiangula quidē,
at non æquilatera:


EFGH.



29 Rhombus est fi-
gura æquilatera non
tamen æquiangula :
IKLM.



30 Rhōboides quæ opposita latera & angulos æquales habet, non tamen aut omnia latera aut omnes angulos habet æquales OPQR.




31 Aliæ verò figuræ quęcunque quadrilateræ vocētur Trapezia. Quæ irregulares sunt & infinitę.

STYX &c.



32 Parallelæ lineę sunt quę in eodem plano existentes, productę in infinitum neutrá in partem coincident. *Sen quę pari ubique spatio inter se distant, ut lineę AB, CD.*



Parallelogrā-
mum verò est
figura quadrila-
tera lineis pa-
rallelis descrip-
ta. *Ut figura EFGH est parallelogram-
mum quia describitur lineis EF, GH pa-
rallelis, & lineis EG, FH similiter paral-
lelis.*

Postu-

Postulata.

- 1 Petatur à quouis puncto ad aliud quodlibet rectam lineam ducere posse.
- 2 Terminatam & rectam lineam in directum & continuum protendere.
- 3 E quouis centro ad quoduis intervallum circulum describere.

*Communes notiones seu
Axiomata.*


- 1 Quæ eidem sunt æqualia, & inter se sunt æqualia.
- 2 Si æqualibus addas æqualia, tota erunt æqualia.
- 3 Si ab æqualibus demas æqualia, quæ remanent erunt æqualia.
- 4 Si inæqualibus adiiciantur æqualia, tota erunt inæqualia.
- 5 Si ab inæqualibus tollantur æqualia, quæ remanent erunt inæqualia.
- 6 Quæ eiusdem dupla sunt, inter se sunt æqualia.
- 7 Quæ eiusdem sunt diuida sunt inter se æqualia.
- 8 Quæ mutuo sibi congruunt, sunt

B a æqua-

æqualia inter se.

9 Totum est maius sua parte.

10 Omnes anguli recti sunt inter se æquales.



11 Si in duas rectas recta incidēs angulos interiores & ad easdem

partes duabus rectis minores fecerit, coincident duæ illæ lineæ, protractæ in illam partem, ad quam spectant duo anguli minores rectis. *Ut si in rectas A B C D, cadens recta E F faciat angulos internos & ad eandem partem A E F E F C minores duabus rectis, coincident illa lineæ protractæ versus partem A C.*

12 Duæ rectæ spatium non comprehendunt.

13 Partes omnes simul sumptæ suo toti sunt æquales, & totum æquale est suis omnibus partibus.

Propositionum alia faciendum aliud proponunt, & vocantur Problemata; alia considerandum aliquid & contemplandum, quæ Theoremata inscribuntur.

Nota.

Notarum in margine significatio.

*Ax. II. significat axioma undecimum
& sic de reliquis.*

*10 def. I. significat decimam definitionem
libri primi.*


*15 1. hoc est propositio decima quinta li-
bri primi.*

*Const. hoc est ex constructione. hyp. ex
hypothesi.*

Propositiones

Propositio 1. Problema 1.

*Super datā recta linea terminata trian-
gulum æquilaterum constituere.*




Sit data
recta A B.
Centro igi-
tur A, spatio
A B descri-
batur circu-

lus BCD, & centro B spatio eodem du-
catur circulus alter A C E priorem se-
cans in puncto C, iunganturque certæ
lineæ CA, CB, & factum est quod pro-
poni-

eritque res peracta. Nam ad punctum A posita est recta AG æqualis ipsi BC; quandoquidem hæ duæ rectæ additis æqualibus BD & AD fiunt æquales semidiametri b circuli CGH. Sunt ergo rectæ AG & BC æquales. b¹⁵ def

Propo. 3. Proble. 3.

Datis rectis lineis inæqualibus de maiore minori parem auferre.



Vt rectæ A ex maiore BC æqualis auferatur; ad punctum B ponatur BE æ ipsi A æqualis.


a 2.1. Mox centro B.

spatio BE fiat circulus DEF, eritq; abscissa BD ipsi A æqualis; nam vtræque ipsi BE est æqualis, A quidem ex hypothesis, BD autem quia est eiusdem circuli semidiameter.

Pro:

Proble. 4. Theorema 1.

Duorum triangulorum si latus unum uni; & alterum alteri sit æquale, anguliq; inter illa latera contenti sint etiam pares; erunt & bases æquales, & ipsa tota triangu- la: sed & reliqui anguli reliquis angulis pares erunt quibus æqualia latera subtendantur.




Vt si in
triangulis A
B C, D E F
latus A B,
lateri D E, &

AC alteri D E, sit æquale (quod dicere solēt interpretes alterū alteri latus esse æquale, vel vtrumque vtrique) simul-
que etiam pares anguli A & D dictis
lateribus contenti; Dico basim B C, basi
E F esse æqualem, & cætera consequi vt
est propositū. Nam si intelligamus triā-
gulum triangulo superponi ita vt angu-
lus A congruat angulo D, congruent
a latera A B, A C, lateribus D E, D F,
alterum alteri, cui nempe est æquale.
Sed congruent etiam bases, ideoque e-
runt

rūt æquales, cum enim puncta B & C, cadunt in E & F, recta BC, cadet in EF: alias puncta extrema B & C non obumbrarent *b* media, contra definitionē *b* 4. def. 2. lineæ certæ.

Propo. 5. Theore. 2.

Trianguli Isoscelis anguli ad basim sunt pares; si aequalia latera producantur pares quoq; erunt anguli infra basim.



In triangulo isoscele A B C, latera AB, AC, producantur vt lubet, sumpta que recta AD, vtcunque, æqualis illi *a* capiatur AE, iunganturq; rectæ, CD, *a* 1. r. BE. Nunc quia triangula ACD, ABE, (quæ claritatis causa extracta sunt ex media

6 4. 1.

media figura, & ad latus posita) se habēt iuxta prop. 4. est enim AG ipsi AB, æqualis ex suppositione & AD, ipsi AE ex constructione, angulusq; A lateribus illis cōtensus est communis. Ob hæc binquam bases DC, & BE, sunt pares, itēque angulus D angulo E, & angulus ACD angulo ABE. Rursus in mediâ figurâ triangula BCD, BCE, se habent iuxta prop. 4. Sunt enim anguli D, & E, æquales & æqualibus lateribus contenti; erunt igitur anguli infra basim DBC, BCE, æquales; itemque anguli BCD, ECB: & quia totus angulus ACD, ostensus est æqualis toti ABE, ablatis paribus CBE, & DCB, qui remanent supra basim sunt æquales. Trianguli igitur isoscelis &c.


Propo. 6. Theore. 3.

Si trianguli duo anguli fuerint æquales, erunt & latera angulis subtensa æqualia.

In triangulo ABC si æquales sunt anguli B & C, erunt etiam latera AB, AC subtensa dictis angulis inter se æqualia.

Nam

Nam si negas esse æqualia ; sit alterum maius, puta AB ; ex quo auferatur recta BD, ipsi AC æqualis , ducaturque recta DC. Nunc verò cum duo triangula ABC, CBD, habeant latus BC, commune, & altera latera BD, CA, sint æqualia, angulusque B, lateribus contentus, sit communis erit a triagulum DB C, triagulo A B C, hoc est totum parti, equale, quod fieri non potest , Si ergo trianguli &c.



Cōuertit hæc propositio priorem partem superioris nam ibi ex qualitate laterum AB, & AC, colligebatur æqualitas angulorū supra basim BC . hic verò, vice verso ex æqualitate dictorum angulorum colligitur æqualitas laterum. Solet autem Euclides eas tantum propositiones cōuertere, cum ad probationem sequentium vtraque propositio est adhibenda, hoc est tam conuerrens quam conuersa.


Pro-

Propo. 7. Theore. 4

Super certa linea ductis ad quodvis punctum duabus rectis non ducentur super eadem ad aliud punctum versus easdem partes duæ aliæ, sic ut quæ ab eodem termino incipiunt, sint æquales.

Super recta AB, ductis ad punctum C, duabus rectis AC, BC, ducantur si fieri potest aliæ duæ AD, DB, ad aliud punctum D, ita ut CA, ipsi DA, equalis sit, cum qua habet eundem terminum A, & CD, ipsi DB, ducaturque in super, recta CD: quia igitur AC, AD, sunt æquales, erunt α anguli ACD, ADC, inter se æquales; maior erit proinde angulus ADC, angulo BCD, & multo maior

angulus CDB; nunc verò quia CB, ponitur æqualis ipsi DB, erit angulus β CDB angulo BCD, æqualis, qui tamen ante erat ostē-



sus multo maior, non ergo ductæ sunt binæ æquales prioribus. Quod fuit dem-

mon-

es. l.


h. s. l.

monstrandum.

Possset alibi constitui punctum D ad quod ducuntur lineæ posteriores vt intra triangulum ABC, vel in alterutro eius latere; sed eadem demonstratione facile probabitur lineas posteriores numquam posse esse æquales prioribus,

Propo. 8. Theore. 5.

Si duo triangula duo latera duobus lateribus alterum alteri equalia habuerint, & basim basi aequalem; habebunt etiam angulum lateribus contentum aequalem.




In triangulis ABC, DEF, sint latera AB, AC, ipsis DE, DF, æqualia, itemque basis BC, basi EF. Quod si negas angulos A & D, lateribus contentos pares esse, intelligatur triangulum ABC triangulo DEF, superponi, tunc verò neces-

C faciò

fariò punctum A, cadet in D, & sic angulus angulo congruet vt vult propositio: nam si non caderet in D, sed in G, aut aliud punctum, tunc duæ rectæ duabus rectis æquales ducerentur ad aliud punctum, &c. quod est contra precedentem. *Est conuertens primæ partis propos. 4.*

Propo. 9. Proble. 4.

*Datum angulum rectilinum secare
bifariam.*




Sumatur recta AB, vt lubet, & ipsi par AC, ex lateribus dati anguli BAC, nec non super ductam rectam BC, fiat trian-

gulum æquilaterum BDC, ducaturque recta AD, per quam angulus BAC, diuidetur bifariam: nam AB, AC, æquales sunt ex constructione, & AD communis, estque insuper basis BD, basi CD, æqualis, sunt ærgo anguli BAD, CAD,

AD, æquales; quare angulus BAC, diuisus est bifariam. Quod erat faciendum.

Propo. 10. Proble. 5.


Datam rectam finitam secare bifariam.



Super recta AB, fiat triāgulum equilaterum, cuius angulus ACB, diuidatur bifariam per rectam CD, & recta AB, in puncto D bifariam quoque secta erit: Nam triangula CAD, CBD, se habent iuxta 4. propo. Ergo bases AD, DB, sunt æquales.

Propo. 11. Proble. 6.

Ex dato puncto in linea recta perpendicularem excitare.




In recta B C, detur punctum D, sumptaque pro arbitrio DB, sumatur æqualis DC, inde super B C structo triangulo æquilat-

quilater BCA ; ex A , ducatur recta AD ,
 & hæc erit ad angulos rectos ipsi BC ;
 Nā latus DB , æquale est ipsi DC , ex cō-
 structione, & latus DA , cōmune basis
 insuper, BA , basi CA , & qualis; sūt æ ergo
 anguli ADB , ADC , æquales, ac proinde
 recti & p̄sa AD , b perpendicularis.

Propo. 12. Proble. 7.

Adato extra rectam puncto perpendicularẽ ducere ad eandẽ rectam.




Detur pun-
 ctum A , quo
 centro, spatio
 quocunq; du-
 catur circulus
 dummodo se-
 cet rectam BC ,
 & super par-
 tem abscissam BC , facto triangulo
 ABC , eadem BC , diuidatur bifariam,
 ducaturque recta AD ; & hæc eadem
 erit perpendicularis, ducta ex A , ad re-
 ctam BC . Nam quia in triangulis ABD ,
 ADC , æquales sunt AB , AC , eiusdem
 circuli semidiametri æquales item BD ,
 DC , ex constructione & AD comunis,
 angu-

anguli ADB, & ADC, erunt æquales ac
proinde recti, ideoque recta AD, per-
pendicularis. ax. 1.1.

Propositio 13. Theore. 6.

*Recta super rectam consistens aut duos
rectos aut duobus rectis æquales angu-
los facit.*



Nam recta
AB, consistens
super CD, aut
facit utrimque
æquales angu-
los, & proin-
de rectos; aut


inæquales, & tunc ex puncto B, excite-
tur perpédicularis BE, quia igitur in an-
gulo ABC, continebatur vnus rectus E
BC, & in super angulus EBA, qui cū an-
gulo ABD, facit alterū rectum, & re-
cta AB, constituebat angulos ABC, A
BD, æquales duobus rectis.

C ;

Pro-

Propositio 14. Proble. 7.

Si ad punctum in recta linea datum duæ rectæ non ad easdem partes ductæ angulos efficiant duobus rectis æquales, in directum sunt illa linea.




-Nam si ad punctum B, ducantur duæ rectæ CB, BD, facientes cum recta AB, angulos æquales duobus rectis, & negas iacere in directum, iaceat ergo BE, in directum ipsi CB. At hoc esse non potest; nam anguli ABC, ABD, erant pares duobus rectis: non sunt ergo pares duobus rectis anguli ABC, & ABE, alias totum parte non esset maius; sed neque alia duci potest ipsi CB, adiacens in directum nisi BD; ergo &c.

Propositio 15. Theore. 8.

Si duæ rectæ se inuicem secuerint angulos ad verticem oppositos æquales facient.

Rectæ AB, CD, secant se in E, eritq;
angu-

angulus CEB, angulo AED (qui dicitur illi esse ad verticem oppositus).




æqualis: nam siue AED siue CEB addiciatur angulo interiecto AEC, constituet æquales duobus rectis;

quare anguli CEB, & AED, sunt æquales, cum addito eodem, fiant æquales. Similis demonstratio procedet in reliquis oppositis angulis ad verticem.


Propositio 16. Theore. 9.

Omnis trianguli quouis latere producto externus angulus utrolibet interno & opposito maior est.



Trianguli ABC, latere BC, producto in D, erit angulus ACD externus maior

ior interno & opposito CBA, vel BAC; /
 latus enim AC, bisegetur in E, ducatur-
 que BF, ita vt EF æqualis fiat ipsi BE,
 iungaturq; recta FC, quæ erit æqualis
 ipsi AB: nam & duo latera EB, EA, æ-
 qualia sunt duobus EF, EC, & angu-
 li contenti æquales ad verticem; Trian-
 gula ergo AEB, FEC, se habent iuxta
 4. propo. & basis FC, basi AB est æqua-
 lis, angulus item BAE, angulo ECF;
 sed hic est pars anguli externi ECD, i-
 deoque minor, quare & angulus BAC,
 minor est externo ACD.




Quod
 si latus B
 C, bise-
 cetur in
 E, produ-
 cto late-
 re AC; in
 G, & re-
 liqua fiat
 vt prius
 eodẽ mo-

do monstrabitur angulum BCG, &
 proinde angulum ACD, qui est huic ad
 verticem, maiorem esse angulo ABC.
 Om-

Omnis igitur &c.

Propositio 17. Theore. 10.


*Omnis triāguli duo anguli quomodocūq;
sumpti minores sunt duobus rectis.*



Nam angulus C, internus plus requirit quam angulum B, vt fiat equalis duobus rectis; requirit enim angulum C, externum maiorem interno & opposito B; non sunt ergo anguli B, & C, internis pares duobus rectis. a. 16. 1. Similiter alio latere producto de alijs quibusuis duobus angulis idem probabitur. Omnis ergo &c.

Propositio 18. Theore. 11.

Omnis trianguli maius latus maiorem angulum subtendit.




Vt si triāgu-
ABC, maius
est latus AC,
quam AB, ma-
ior erit angulus

lus ABC, quam angulus C, subtensus
à latere minore AB: Sumatur enim AD,
æqualis ipsi AB: Tunc verò quia æqua-
lia sunt latera AB, AD, anguli ABD,
ADB, supra *a* basim sunt pares. Sed an-
gulus ADB, est externus & oppositus
angulo C, ac proinde *b* maior; multo er-
go maior est, totus angulus ABC, angu-
lo C, Omnis igitur triangul. &c.

Propositio 19. Theore. 12.

*Omnis trianguli maior angulus maiore
lateri opponitur.*




Si angulus B, maior sit
ipso C, erit & AC, maior
quam AB, non enim est
minor aut æqualis, nam
tunc angulus B, esset mi-
nor *a* aut æqualis *b* ipsi C, est ergo AC,
maior quam AB, Quare omnis trian-
guli &c:

Propo. 20. Theore. 13.

*Omnis trianguli duo latera quomodo-
cunque sumpta, reliquo sunt maiora.*

Si enim in triangulo ABC, latera A
B, BC, simul sumpta non sunt maiora
ipso

ipſo AC, producatuꝛ AB, ſic ut BD, æ-



qualis ſit ipſi BC,
& proinde AD,
æqualis ſit ip-
ſis AB, & BC;
Nunc vero quia
BD, & BC, ſunt
æqualia; erũt pa-
res $\angle$ anguli D, & $\angle$ 19. 1.


BCD; maior ergo utroq; erit totus an-
gulus ACD; ſed totum hunc angulum
trianguli ADC, ſubtendit latus AD,
maior ergo eſt *b* recta AD (quæ æqualis
eſt duabus AB, & BC,) quam latus AC.
Omnis ergo trianguli &c.

Propo. 21. Theore. 14.

*Si à terminis unius lateris in triangulo
due rectæ intra triangulum iungan-
tur, erunt hæ lateribus trianguli mi-
nores; maiorem verò angulum con-
tinebunt.*

Ut in triangulo ABC, dico latera
BA, AC, eſſe maiora rectis BD, & DC,
quæ intra triangulum iunguntur in D.
Nam producto latere BD, in E, latera
BA, AE, trianguli BAE, maiora $\angle$ ſunt
ipſo $\angle$ 20.

ipso BE; Addito ergo comuni EC, ma-




iora sunt BA, AC, ipsis BE, EC. Et quia in triangulo CDE maiora sunt CD, ED, b ipso CE, addito comuni DB, ma-

iora fient CE, EB, quam CD, DB; Sed CA, AB, maiora ostensa sunt quam BE, EC; erunt ergo AB, AC, multo maiora ipsis BD, DC; Secundo angulus BDC, externus & maior est interno & opposito DEC, & hic maior ipso A interno & opposito; multo ergo maior est angulus BDC, ipso angulo A.

Propositio 22. Proble. 8.

Triangulum constituere cuius latera tribus datis lineis sint equalia; oportet autem duas quomodocunque sumptas reliqua esse maiores:


Dentur tres rectæ A, B, C, & ipsis sumantur ordine æquales DE, EF, FG; tum cetro E, spatio ED, ducatur circulus DG, & cetro F intervallo FG, ducatur circulus alter GH, iungaturq; rectæ EH,



EH, FH, & factū est quod proponitur. Nā in triángulo EHF, recta EH, æqualis a 15. def 1, est ipsi DE, hoc est ipsi A, EF, verò ipsi B, ac deniq; FH, ipsi FG, hoc est ipsi C.

Propositio 23. Proble. 9.

Ad datum in recta punctum dato angulo, æqualem angulum rectilineum ponere.




Detur angulus A, cui ad punctum B, in recta BC, æqualis sit ponendus. Sumptis utcumque in lateribus dati anguli punctis D, & E, iungatur recta DE, constituturque triangulum BCF, cuius latera

tera sint tribus lateribus ipsius ADE, æqualia, ita ut BC par sit ipsi AD; BF, ipsi AE; CF, ipsi DE: Quo facto triangula se habent iuxta 8. propo. Nam latera & bases sunt æqualia; quare anguli A, & B, æquales, & sic factum est quod erat propositum.

Propositio 24. Theore. 15.

Si duo triangula duo latera æqualia alterum alteri habuerint, & unum triangulum habeat angulum lateribus contentum maiorem, idem quoque habebit basim, basi alterius trianguli maiorem.




Vt si latera AB, AC, æqualia sint lateribus DE, DF, & angulus A, maior

angulo EDF, maior quoque erit basis BC, basi EF. Nam si fiat angulus GDF, ipsi A æqualis, & latus DG, ipsi DE, sit æquale, iungaturq; rectæ GE, GF, anguli a DGE, DEG, pares erunt; quare totus FEG, maior erit quam DGE, & mul-

multo maior quam FGE, quare recta
 b GF, & huic æqualis BC, maior est b 19. r.
 quam EF. Si duo ergo triangula &c.

Propositio 25. Theore. 16.

*Si duo triangula duobus lateribus duo
 latera aequalia habuerint alterum al-
 teri, basim verò basi maiorem, habe-
 bunt angulum contentum lateribus
 angulo maiorem.*




Nam si pa-
 ria sint late-
 ra AB, AC,
 ipsis DE, D
 F, & basis B
 C, maior ba-

si EF, angulus A æ maior erit ipso D. a 24. r.
 si enim aut æqualis esset, aut minor, ba-
 sis etiam EF, ipsi BC, æqualis esset, aut
 minor cōtra hypothesim. Si ergo &c.

Propositio 26. Theore. 17.

*Si duo triangula duos angulos duobus
 angulis pares habuerint alterum alte-
 ri, & unum latus uni lateri aequale,
 siue quod adiacet angulis, siue quod
 uni*

*uni equalium angulorum subtendi-
tur, erunt & reliqua latera alterum
alteri equalia, & reliquus angulus
reliquo equalis.*




Sint in
triangulis
ABC, DE
F, anguli B
& ACB,
& E & F, sitq;
primò latus BC, quod
adiacet angulis æqualibus æquale late-
ri EF: iam si latus BA, non est æquale
ipsi ED, sit illo maius, & ex eo sumatur
BG, æqualis ipsi ED, tum vero, ducta
CG, duo latera triangulorū BGC, &
EDF, æqualia sunt, & anguli contenti B
& E, æquales unde æ anguli F, & GCB,
pares erunt; quod esse non potest; nam
hic angulus est pars ipsius ACB, qui æ-
qualis ponebatur ipsi F, non est ergo
maior BA, quam ED; sed neque minor,
alias lateri ED eadem quæ prius appli-
caretur demonstratio; ergo æqualis; &
tunc triângula BAC, EDF, se habēt iuxta
4. prop. & latera lateribus, anguli item
angu-

angulis correspondētibus sunt æquales. Sit secundo positus angulus B, & ACB, ipsis E, & F æqualibus, latus ED quod subtenditur angulo F, æquale lateri BA; iam si BC non est æqualis ipsi EF, sit maior, sumaturque BH æqualis ipsi EF, ductaque AH, probabitur triangula BAH, & EDF, esse iuxta 4. propo. Quare angulum BHA, parem esse ipsi F, cui eidem æqualis est ACB; quod fieri nequit: nam sic angulus AHB, æqualis esset interno & opposito ACH; non est ergo BC, maior quam EF, sed æqualis; quare rursus triangula BAC, EDF, sunt iuxta 4. propo. & cetera sequuntur ut prius.


Propositio 27. Theore. 18.

Si in duas rectas recta incidens angulos alternos pares fecerit, parallela erunt illæ lineæ.



Sint duæ
rectæ AB,
CD, in quas
cadat recta
EF, faciens
angulos al-
ternos

ternos AEF, EFD, equales; parallelæ ergo erunt rectæ AB, CD; nam si con-



currerent in G, & fieret triangulum EGF, esset angulus externus AEF

• 16. 1.

maior • interno & opposito EFG, cui ponebatur æqualis. Eadem fiet demonstratio si dicantur concursuræ versus A; neutram ergo in partem concurrent, sed sunt parallelæ.


Propositio 28. Theore. 19.

Si in duas rectas recta incidens angulum externum interno & opposito ad easdem partes æqualem fecerit, aut duos internos ad easdem partes æquales duobus rectis, parallelæ sũt illa linea.

• 15. 1.

In duas rectas AB, CD, incidens EF, faciat primò angulum externum EGB, æqualem interno GHD, & opposito ad easdem partes; quia ergo angulus EGB, æqualis est angulo • ad verticem AGH, erunt anguli alterni AGH, GHD, æ-

quales




quales; cum
æquales sint
vni tertio EG
B: ergo lineæ
AB, CD, sunt
parallelæ. Fa-
ciat secundo
recta EF, an-
gulos BGH, DHG, internos ad easdem

partes æquales duobus rectis; quia er-
go angulus EGB, cum angulo BGH,
facit æquales duobus rectis & cum eo-
dem BGH, angulus GHD, facit itidem
duobus rectis æquales, sequitur angu-
lum externum EGB, æquale esse inter-
no GHD: quare per priorem partem
huius propo. rectæ AB, CD, sunt pa-
rallæ.

Propos. 29. Theore. 20.

*Si recta in parallelas incidat anguli inter-
ni ad easdem partes duobus rectis æ-
quales erunt, anguli item alterni inter
se æquales; ac denique angulus exter-
nus interno & opposito erit æqua-
lis.*

D 2 Vt



Ut si in paral-
lelas AB, CD,
cadat recta EF,
primo anguli
interni tā ver-
sus A, quā ver-
sus B, pares e-
rūt duobus re-
ctis: nam si ver-

648. 114

sus alterutram partem essent minores,
lineę ex ea parte productę cōcurrerēt,
quare contra hypothesim non essent
parallelę.

Secundo quia angulus DHG, tam
cum angulo HGB, quam cum angulo
CHG, valet duos rectos, sequitur angu-
los HGB, & CHG, qui sunt alterni,
inter se esse æquales.


Tertio eadem ratione quia BGH, si-
ue cum externo EGB, siue cum interno
GHD, valet duos rectos, sequitur ex-
ternum EGB, parē esse interno GHD.
Si ergo recta &c.



Pro-


Propo. 30. Theor. 21.

Quae eidem recta sunt parallela, & inter se sunt parallela.



Sint re-
ctæ AB
CD, paral-
lelæ ipsi
EF, in quas
omnes ca-
dat recta
GH. Quia

ergo AB, EF sunt parallelae, anguli alterni AGI, GIF sunt æquales; Sed angulus GIF, æqualis est interno & opposito IHD (cum EF, CD, ponantur parallelae) sunt ergo inter se æquales anguli AGH, GHD, cum sint pares eidem tertio GIF; sed iidem anguli sunt alterni circa lineam GH, sunt ergo lineæ AB, CD, in quas incidit, parallelae.




D ;

Pro-

Propositio 31. Proble. 10.

*Ex dato puncto data recta parallelam
ducere.*



Detur
recta AB,
cui ex pū-
cto C, du-


cenda sit parallela: sumpto in recta AB,
puncto quouis, puta D, ducatur utcūq;
recta DC, & angulo CDB, constituatur
aequalis ECD, eritque recta EC, b ipsi
AB parallela; nam anguli alterni ECD
CDB, sunt pares.

Propositio 32. Theore. 22.

*Omnis trianguli uno latere producto ex-
ternus angulus duobus internis &
oppositis est equalis, & tres interni
duobus rectis sunt aequales.*

Trianguli ABC producaturs latus
quodcunque, puta BC, in D, ducaturq;
CE ipsi AB parallela. Quia ergo AC
cadit in parallelas AB EC, angulus a A
aequalis est alterno ACE. Rursus quia
recta BC, cadit in easdem parallelas;
angu-

angulus $\angle ECD$, externus æqualis est interno B . Totus igitur ACD æqualis est duobus internis A , & B , & probata est prior pars propositionis. Nunc quia angulus ACB cū externo ACD valet duos



rectos, idē ACB , cum duobus A & B , valebit duos rectos, cū A & B ostēsi sint pares ipsi externo ACD . Omnis igitur trianguli &c.


Corrollarium.

Hinc manifestum est in omni quadrilatero quatuor simul angulos quatuor rectis esse æquales: nam ducta recta ex uno angulo in oppositum, quadrilaterum dividetur in duos triangula quae singula habent angulos pares duobus rectis, anguli ergo totius quadrilateri valent quatuor rectos. ut apparet in figura seq. propo.



Propo. 33. Theore. 23.

Linea recta qua æquales & parallelas ad easdem partes iungunt, sunt & ipsa æquales & parallela.



Rectas AB, CD æquales & parallelas iungāt ad easdem partes duæ alię AC, BD ducaturque recta


BC. Quia ergo recta BC tangit parallelas AB, CD; anguli alterni ABC, BCD pares sunt. Nunc vero quia latera AB, CD sunt æqualia, & latus CB est commune, anguliq; cōtenti ABC BCD sūt æquales, triangula ABC, BCD sunt iuxta 4. Quare basis AC, basi BD, est æqualis: (quæ est prior pars propositionis) & insuper angulus CBD, angulo BCA erit æqualis. Nunc ergo quia in duas rectas AC, BD cadens recta BC facit angulos CBD, BCA alternos æquales, parallelę sunt AC, BD.



Pro-

Propos. 34. Theore. 24.

Parallelogrammorum spatiorum opposita latera & anguli sunt equalia; ipsaque parallelogramma à diametro secantur bifariam.




Nam in parallelogramo AD ducta diametro BC, anguli alterni $\angle ABC, BCD$ sunt pares. & rursus equalles sunt anguli $\angle CBD, BCA$; quia ergo triangula ABC, BCD habent duos angulos pares, & latus BC adiacens angulis commune, reliqui $\angle A$ & $\angle D$ sunt pares, & latera omnia, & anguli correspondentes sunt æquales: tota denique triangula æqualia sunt. Quare parallelogrammum AD bifariam secatur à diametro BC. Igitur parallelogram. &c.

Propo. 35. Theore. 25.

Parallelogramma super eadem basi, & in eisdem parallelis constituta, inter se sunt equalia.

Super



Super eadem
basi AB, consti-
tuta sint duo
parallelogram-
ma AD, AF;
sintque AB, CF


lineæ parallelæ. Considerentur deinde
duo triangula CAE, DBE in quibus la-
tus AC æquale est a ipsi DB, & CE al-
teri DF: nam CD, EF, æqualia b sunt vni
& eidem AB, & addito communi DE
lineæ CE, DF sunt pares. Sed & angulus
BDF æqualis est ipsi C, cū in rectas CA,
DB cadat CF: sunt ergo triangula
CAE, DBF iuxta 4, & vndique æqualia.
Quare ablato cōmuni triangulo DEG
trapezia relictæ CD GA, FEGB sunt
æqualia; & addito communi triangulo
ABG, tota parallelogrāma sunt paria.

Propo. 36. Theore. 26.

*Parallelogramma super æqualibus basi-
bus, & in eisdem parallelis constituta,
inter se sunt æqualia.*

Satis patet ex præc:nā idē facit æqua-
lis basis, & eadē. Sint nihilominus pa-
ral-


rallelogrāma AC, EG inter parallelas
AH, BG super basibus paribus BC, FG,
iūgāturq; rectæ BE, CH: quæ quia iūgūt
æquales & parallelas BC, EH, sūt & ipse
æquales, & parallelæ: estq; e EB CH ^{34. 1.}
parallelogrammum æquale vtrique ^{35. 1.}



tam ipsi AC cum
sit super eadem basi
BC, quā alteri EG,
cum sit etiam super
eadem basi EH.
Sunt ergo & extre-
ma parallelogramma AC, EG æqualia.

Propositio 37. Theore. 27.

*Triangula super eadem basi & inter pa-
rallēlas easdē posita, sunt æqualia.*




Sint triā-
gula, ABC
DBC, su-
per eadem
basi BC in-
ter paralle-

las BC, EF, ducanturque rectæ EB pa-
rallēla in si AC, & FC ipsi DB pa-
rallēla. Quia ergo parallelogrāma EC,
BF sunt super eadem basi, & inter eas-
dem

• 14. 1.

dem parallelas, & erunt equalia. At tri-



• 14. 2.


gulum ABC
est dimidiū
b parallelo-
grammi EC;
cumq; triā-
gulum DBC

alterius parallelogrammi BF sit etiam
dimidium, erunt triangula ABC, DBC
inter se equalia, quod erat demonst-
randum.

Propositio 38. Theore. 28.

*Triangula super equalibus basibus & in
eisdem parallelis sunt equalia.*

Patet ex




proxime ante
cedenti. Triā-
gula enim fu-
perioris pro-
positionis po-
nantur super

equalibus basibus ut sint ABC, DEF,
ducaturque utrique lateri parallelæ, &
demonstratio procedet ut prius.

Propo.

Propositio 39. Theore. 29.

Triangula equalia super eadem basi & ad easdem partes constituta, in eisdem sunt parallelis.



Nam si triangula ABC, DBC super eadem basi BC constituta, sint æqualia, & negas tamen rectam ex A per

D ductam ipsi BC esse parallelam; ducatur alia quæ sit parallela puta AE: iū-
ctâ ergo rectâ CE, erit triângulum ABC, æquale triangulo EBC, quod fieri non potest: nam triangulum DBC æquale ponitur eidem triangulo ABC; ergo EBC quod est pars totius DBC triangulo ABC non potest esse æquale. a 37. 2.


Eadem demonstratio fieret si rectam AE velles cadere extra triângulū ADC: non ergo erit alia parallela quam AD. *Reciprocum est hoc Theore. prop. 37.*



Propo

Propositio 40. Theore. 30.

*Æqualia triangula & ad easdem partes
super aequalibus basibus constituta sūt
inter easdem parallelas.*




Nā si triangu-
la ABC, DCE
posita sint æ-
qualia & super
æqualibus ba-
sibus BC, CE;
neges tamen

rectam AD ipsi BE esse parallelā, sit par-
allela AF. Tunc vero ductā FE, triangu-
lum FCE erit æquale ipsi ABC, cui ei-
dem æquale ponitur triangulum DCE;
erunt ergo pars & totum eidem æqua-
lia, quod esse nequit. Et hanc manifestum
est esse conversam propo. 38.

Propo. 41. Theore. 31.

*Si parallelogrammum & triangulum
eandem habuerint basim sintque in
ijsdem parallelis, erit parallelogram-
mum duplum trianguli.*

Sint parallelogrammum BD, & triā-
gulum EBC, super eadem basi BC, &
inter




inter parallelas
AE, BC; ducatur
que AC. Quia er-
go triāgula ABC,
EBC sunt æqua-
lia, & ABC est di-

437. L

midium parallelogrammi BD, sequitur
etiam triangulum EFC, eiusdem paral-
lelogrammi esse dimidium.

Propo. 42. Proble. II.

*Dato triāgulo æquale parallelogrammū
cōstituere in dato angulo rectilineo.*



Sint da-
ta triangu-
lum ABC,
& angulus
D; basi que
BC, bita-
riāsecta in
E, ducatur


AE, agaturq; a per A, recta AG ipsi BC, 438. L
parallelā, mox ad E punctum, facto an-
gulo FEC, b ipsi D æquali, educatur ex 439. L
C, recta CG, ipsi FE parallelā. Quia er-
go triangula ABE, AEC, super c æqua- 438. L
libus basibus BC, EC sunt æqualia; &
triangu-

42. 1.

triangulum AEC, parallelogrammi super eadem basi EC, constructi est dimidium, sequitur totum triangulum ABC, esse æquale parallelogramo EG. Dato ergo triangulo æquale parallelogramum constituimus, habens angulum FEC dato angulo D æqualem.

Propo. 43. Theore. 32.

Omnis parallelogrammi eorum quæ circa diametrum sunt parallelogrammorum cõplementa sunt inter se æqualia.



Circa diametrum AB, parallelogrammi CD, consistat parallelogramma EF, GH;


complementa vero quæ dicuntur, sint parallelogramma CI, ID, per quæ diameter AB, non transit; quia igitur diameter AB, diuidit bifariam parallelogramma CD, EF, GH, erunt triangula AEI, IGB, æqualia triangulis AFI IHB; sed & totum ABC, toti triangulo ABD, æquale est: complementa ergo CI, ID, sunt etiam æqualia. Omnis ergo parallelogram. &c.

34. 1.

Pro. 44.

Propo, 44. Proble. 12.

*Ad datam rectam parallelogrammum
constituere dato triangulo aequale in
dato angulo rectilineo.*



Sit data recta A, triangulum B, angulus C: Fiat deinde parallelogrammum DG ^a æquale triangulo B, habeatque ^a 42. 1. angulum DFG angulo C æqualem. Posthæc producto latere FG, in in H, ita ut GH sit æqualis rectæ A, per H agatur LN, ^b parallela ipsi EG, & occurrens ^b 31. 1. lateri DE, in puncto N. Rursus producto latere DF, ducatur ex N, diameter per H occurrens ipsi DF, in K, ductâque per K, recta KL, parallelâ ipsi FH, latus EG producat in M. Quo facto dico parallelogrammum GL, esse quod petitur: nam quia complementa ^c sunt æ- ^c 34. 2. qualia, si complementum GD, est æ-


E æqua-

¶ 15. 1.

let triangulo B, erit etiam GL, eidem B, æquale; sed & angulus MGH, æqualis est angulo FGE, opposito ad verticē, quare & ipsi C erit æqualis; estque recta GH, æqualis datæ rectæ A: Igitur ad datam rectam &c.

Propo. 45. Proble. 13.

Dato rectilineo æquale parallelogrammum cōstituire in dato angulo rectilineo.




¶ 44. 1.

Sit datus angulus E, & rectilineum BC, in quo ductâ rectâ AD, fiat parallelogrammum FI, & æquale triangulo ACD in angulo H qui sit ipsi E æqualis: protrahatur deinde latus HI & ad rectam GI in angulo GIL, (qui est æqualis ipsi H, quare & ipsi E) fiat parallelogrammum GL, æquale triangulo ABD, eritque tota figura FL parallelogram-

grammum: nam L K, parallela est ipsi FH, cum vtraque sit ipsi GI parallela, cumque Gk, ipsi IL sit parallela, sicut HL est vna recta ita etiam Fk; sunt vero FG HI parallelæ, quare etiam totæ Fk HL, erunt parallelæ. Dato ergo rectilineo &c.

Proposi. 46. Proble. 14.

A data recta linea quadratum describere.



Sit data recta AB, ad cuius extrema A & B excitentur perpendiculares CA, DB, ipsi AB æquales, iunganturq; recta CD,


& constitutum est quadratum. Cum enim anguli A & B, sint recti, erunt AC, DB parallelæ, suntque etiam æquales, ex constructione quare CD, AB, sunt quoque parallelæ & æquales; ac propterea AD, est parallelogrammum; cumque anguli A & B, sint recti erunt etiam oppositi C, & D, recti; sunt vero tria la-

E 2 tera

tera reliqua sumpta equalia ipsi AB ,
quare figura AD , est quadratum, ex de-
finit. 27.

Propo. 47. Theore. 33.

*In rectangulis triangulis quadratum
quod à latere rectum angulum subtē-
dente describitur, aequale est eis. que
à laterib. rectum angulū continenti-
bus describuntur, quadratis.*




• 46, 3.

In triangulo ABC , angulus BAC ,
rectus sit fiantque super $\bullet$ lateribus AB ,
 AC

AC, quadrata BG, CH. Item fiat super latere BC, angulum rectum subtendente quadratum BK, quod dico equale esse duobus aliorum laterum quadratis simul sumptis; ductâ enim AE, parallela ipsi BD, aut CK, iungantur etiam rectæ AD, FC. Quia igitur angulus DBC, angulo FBA, rectus recto est æqualis, addito comuni ABC, pares erunt anguli DBA, FBC; sunt insuper triangulorū ABD, FBC latera DB, BC, ipsis BA, BF singula singulis equalia: triangu-
 ligitur ABD, FBC, ^b sūt æqualia: sed tri-
 angulū ABD, est dimidiū ^c parallelogrammi ^{b 4. 1.}
^{c 4. 1.} BE, cum sit super eadem basi BD, inter
 parallelas BD, AE, & eadem ob cau-
 sas triangulum FBC, est dimidiū qua-
 drati BG; quadratum ergo BG equale
 est parallelogrammo BE, cum eorum
 dimidia sint paria. Quod si puncta
 BI, AK, coniungantur duabus lineis re-
 ctis, eadem plane methodo probabi-
 tur parallelogrammum EC, quadrato
 CH, esse æqualē. Totum igitur quadra-
 tum Bk, reliquis duobus æquale est.
 In rectangulis igitur &c.

Propo. 48. Theore. 35.

*Si quadratum ab uno trianguli latere
descriptum aequale est duobus reli-
quorum laterum quadratis, angulus
quem reliqua latera continent est
rectus.*



In triangulo
ABC, sit latus AC
huiusmodi, ut eius
quadratum æqua-
le sit quadratis
duorum reliquo-
rum laterum AB,
BC; dico angulum ABC, contentum
ijsdem reliquis lateribus esse rectum.
Nam si ducatur ex B, ipsi AB, perpen-
dicularis BD, ipsi BC æqualis, iun-
gaturque recta AD, tunc quia angulus
ABD, rectus est, erit quadratum ipsius
AD, æquale quadratis α rectarum AB,
& BD, vel BC; cumque quadratum ip-
sius AC, quadratis earundem AB, BC,
ponatur æquale, erunt lineæ AC, AD æ-
quales inter se. Quia ergo duo triangu-
la ABC, ABD, habent tria latera α -
qualia

• 47. 1.

• 2. 1.

qualia, sūt etiam anguli omnes equales
qui sibi respondēt: vnde quia angulus
ABD rectus, est rectus etiam erit ABC;
si ergo quadratum &c. *Est conuersa pra-*
cedentis, ut satis patet.






EVCLIDIS

ELEMENTORVM

LIBER II.

Definitiones.

I Parallelogrammum rectangulum contineri dicitur sub duabus lineis quæ rectum angulum comprehendunt.




Ut parallelogrammū rectangulum FG continetur sub rectis HG, EG cōtinētibz angulū rectū G. Itē sub rectis HF, FE.

Simile aliquid in numeris videre est: sicut enim rectangulum continetur sub duabus lineis, ita figuratus numerus rectangulus continetur sub numeris duobus qui inter se multiplicati producant numerum aptum tali figuræ. Sic numerus rectangulus 12 continetur sub 3 & 4 qui inter se multipli-

$$\begin{array}{ccc} & \cdot & \\ 3 \cdot & 12 & \cdot \\ & \cdot & \\ & 4 & \cdot \end{array}$$

tiplicati efficiunt 12, numerum apertum figura rectangula.

11 In omni parallelogrammo spatio vnum quodlibet eorum quæ circa diametrum sunt parallelogrammorum cum duobus complementis gnomon vocetur.



Vt in parallelogrammo AB, parallelogrammum LM cum duobus complementis EM, LF, vocatur gnomon. Item paral-


lelogrammum FE cum duobus complementis est gnomon. Solet autem gnomon designari linea curua quæ transit per complementa & parallelogrammum intermedium, qualis est HIK.

Propositiones.

Propo. I. Theore. I.

Si fuerint dua recta quarum altera secetur in quotcunque segmenta, rectangulum sub duabus illis rectis contentum aequale erit omnibus simul rectangulis

*gulis, quæ sub infecta & partibus lineæ
secta continentur.*



Sub rectis
AB, AC conti-
neatur rectan-
gulum AD, re-
ctâque AB vtcū-
que diuisâ in E & F, ducantur FH &
EG ipsi BD, parallelæ; eruntque AG,
EH, FD, rectangula; nam angulus EGH
ipsi C best æqualis, & omnes alios facile
est ostendere alicui recto esse æquales,
Manifestum est etiam rectangula par-
tialia AG, EH, FD, simul sumpta toti
rectangulo AD esse æqualia: nam om-
nes partes simul sumptæ toti sunt æ-
quales. Et hoc tantum vult propositio.
Nam AB, AC, sunt duæ rectæ; quarum
AB, secta est vtcunque in E & F: osten-
sum est autem rectangulum AD ipsis
AB, AC cõtentum, æquale esse rectan-
gulis partialibus quæ continentur sub
infecta AC & partibus lineæ sectæ AB:
rectangulū enim AG, continetur sub
infecta AC & parte AE; reliqua vero
EH, FD, continentur sub EG, FH (hoc
est.

b 29. 1.


u. 22.

est sub infecta AC ipsis æquali) & reliquis partibus EF, FB. Si ergo fuerint duæ rectæ.

Idem videre est in numeris. Si enim dētur duo numeri 4 & 10, & alter eorum puta 10 diuidatur in quotuis partes 5, 3, 2, ex multiplicatione ipsius 4 in omnes partes 5, 3, 2, fient 40. sicut ex multiplicatione eiusdem 4 in totum numerum 10.

Propo. 2. Theore. 2.

Si recta secta sit utcumque: rectangula sub tota & quolibet segmentorum comprehensa, equalia sunt ei, quod a tota sit, quadrato.




Rectangulum AB, sit quadratum rectæ AC, rectâque AC utcumque diuisâ in E, ducatur EF ipsi CB parallela, & manifestum est, ut prius, rectangula partialia AF, EB simul sumpta, toti AB esse æqualia. Neque aliud vult propositio. Nam recta AC utcumque secta est in E; rectangula autem AF, EB, con-

contenta sub ADEF (hoc est sub tota AC) & sub partibus AE, EC æqualia sunt quadrato totius AC, quod est AB. Si ergo recta &c.

In numeris: si 10 dividatur in duas partes 7 & 3, ducendo 10 in 7, & 3 fient 70. & 30, quæ simul æqualia, sūt numero quadrato ipsius 10 qui est 100: dicimus enim numerum quadratum qui fit ex ducta cuiusvis numeri in seipsum.

Propos. 3. Theore. 3.

Si recta secta sit utcumque, rectangulum sub tota & uno segmentorum comprehensum æquale est illi quod sub segmentis comprehenditur rectangulo una cum quadrato, quod à prædicto segmento describitur.



Recta AE utcumque secetur in C, sitque AB, quadratum segmenti AC, rectangulum vero AD cōtineatur sub tota AE & sub AF hoc est sub æquali AC; & manifestum est ut prius rectangula AB, CD

CD simul sumpta, toti AD esse equalia,
 Neque aliud vult hæc propositio. Nam
 recta AE utcumque secta est in C, & re-
 ctangulum AD, sub tota AE & AF hoc
 est sub parte AC, æquale est ipsi AB
 quadrato partis AC una cum rectan-
 gulo CD, quod continetur sub CB
 (hoc est sub parte AC) & sub reliqua
 parte CE. Si ergo recta &c.


*In numeris si 6 dividatur in 4 & 2, prod-
 uctum ex 6 in 4, hoc est 24, æquale est ei quod
 fit ex 4 in 2 hoc est 8, una cum quadrato
 ipsius 4 quod est 16.*

Propo. 4. Theore. 4.

*Si recta secta sit utcumque, quadratum
 quod a tota describitur æquale est seg-
 mentorum quadratis, una cum re-
 ctangulo quod bis sub segmentis con-
 tinetur.*

Rectangulum AB sit quadratum ip-
 sius AC; ductâque diametro DC, aga-
 tur EF ipsi CB parallela, secans diame-
 trum utcumque in G, per quod idem
 punctum agatur HI ipsi AC parallela:
 & manifestum est ut prius quadratum
 AB

AB totius AC, esse æquale omnibus simul rectangulis intra se descriptis.



Neque aliud vult propositio. Nam recta AC secta est utcumque in E, & eius quadratum AB æquale est ipsis HF, EI (quæ sūt


quadrata segmentorum AE, EC) simul cum rectangulis AG, GB, quæ sunt rectangulum bis comprehensum sub partibus AE, EC.

Rectangula autem HF, EI, esse quadrata partium AE, EC (etsi ex constructione & definitione quadrati satis poterat colligi) sic demonstro. Quia rectæ AE, GH, DF iungunt parallelas æquales, sunt & ipsæ inter se æquales. Itē si ab æqualibus AC, BC auferantur æquales EC, IC, quæ remanent AE, BI & quæ huic pares sunt GF, HD, omnes inter se erunt æquales. omnia igitur latera parallelogrammi HF, æqualia sunt parti AE, suntque omnes anguli recti; nam quia HDF rectus est & rectus etiam GFD

GFD (cum sit æqualis ipsi B) etiā ^{6 34. 2} b op-
positi reliqui erunt recti. Est ergo HI
quadratum ipsius AE. Similiterque o-
stendetur EI esse quadratum partis EC.
Et sic demonstrata est tota propositio.
In numeris: Si 6 diuidatur in 4 & 2; qua-
dratum ipsius 6 quod est 36 aequale est qua-
dratis partium 4 & 2 hoc est 16 & 4, una
cum numero his repetito qui sit ex parti-
bus 2 & 4 inter se multiplicatis.

Propo. 5. Theor. 5.

Si recta secetur in aequalia & non aequa-
lia: rectangulum sub inaequalibus se-
gmētis totius comprehensum, una cū
quadrato segmenti intermediij, aequale
est ei, quod a dimidia describitur,
quadrato.



Recta
A B bifa-
riam in C,
& non bi-
fariā in D
diuidatur;
& super
dimidia CB fiat quadratū CE ductāq;
diame-


dimidia CB fiat quadratū CE ductāq;

Corrollarium.

*Ex his manifestum est gnomonem NOP
toti rectangulo AG esse aequalem; quando-
quidem CG sit commune, & DE reliquo
rectangulo AM sit aequale.*

Propositio 6. Theore. 6.

*Si recta bifariam secetur etque in rectum
quadam recta adijciatur, erit rectan-
gulum sub tota cum adiecta, & sub adiecta
contentum, una cum quadrato dimidia,
aequale ei, quod à dimidia cum parte
adiecta fit, quadrato.*



Recta AB
bifariam secetur
in C etque
in rectum ad-
ijciatur BD:
inde super re-
cta CD fiat

quadratum * CF & per B agatur BG pa-
rallela ipsi DF, sumptaque DH æquali
ipsi DB agatur per H recta HK ipsi AD
parallela & æqualis, iungaturque recta
Ak: quo facto demonstratur propo.

F sitis

636. 1.

641. 1.

652.

653. an.

fitio. Nam quia rectangula AL, CM, sunt equalia propter δ æquales bases, & eidem CM æquale est alterum complementum, MF, erit etiam MF æquale ipsi AL & additis communibus CM, BH, gnomon NOP toti rectangulo AH æqualis fiet (quod sanè rectangulum continetur sub tota composita AD & parte adiecta DB cui DH æqualis sumpta est) sed gnomon NOP adiecto LG quadrato partis dimidiæ CB, ut supra in simili^d ostendimus, sit æqualis quadrato ipsius CD, quæ est pars dimidia cum adiecta BD. Igitur parallelogrammum AH adiecto eodem quadrato LG fiet æquale eidem quadrato CF, quod erat probandum.


In numeris : si 6 diuidatur equaliter in 3 & 3, eique addatur 2; numerus 16 (qui fit ex toto 6 cum adiecto, in ipsum adiectum) una cum quadrato dimidij, quod est 9 æqualis est quadrato ipsius 5 qui numerus componitur ex dimidio 3 & adiecto 2.



Pro-

Propos. 7. Theore. 7.

Si recta utcumque secetur, quadrata totius & utriusvis segmenti simul sumpta, paria sunt rectangulo bis sumpto sub tota & dicto segmento, una cum adiuncto alterius segmenti quadrato.



Recta AB secuta sit utcumque in C & super AB, fiat quadratum AE, ducanturq; CL, kM; ut in superiori propositione: sumpta deinde LF equali ipsi CB, addatur quadratum LG.

Erunt igitur quadratum totius AB, quod est AE simul cum quadrato segmenti CB, quod est LG, æqualia æ rectangulis AM, MF (quæ sumuntur sub tota AB & segmento BC, cum BM sit ipsi BC æqualis, & in rectangulo MF æqualia latera sint MG, GF, ipsis AB, BC) una cum quadrato alterius segmenti AC quod est kL. Si igitur recta & c.


In numeris: si 6 utcumque dividatur in 4 & 2 quadratum totius 6 una cum quadrato

F 2 drato

drato ipsius 4, equalia sunt numero 52 quod
fit ex numero 6 bis in 4. una cum quadrato
alterius partis 2 quod est 4.

Propo. 8. Theore. 8.

*Si recta secetur utcumque, rectangulum
quater comprehensum sub tota &
uno segmentorum, una cum alterius
partis quadrato, equalia sunt quadra-
to quod fit à tota & segmento, tan-
quam ab una linea.*



Recta AB ut-
cumque secetur
in C cui adiacia-
tur in rectum
BD ipsi BC æ-
qualis, ac super
tota AB & ad-
iuncto segmen-
to BD æquali

ipsi BC fiat tanquam super una linea
quadratum AF, ducanturque BG, CH,
Ik, LM, lateribus quadrati AF paralle-
læ, sic ut DK KM ipsis BD, BC sint æ-
quales. Erunt sane in gnomō OPQ re-
ctangula quatuor contenta sub rectis
AB


AB & BC. Nam circa R constituta sunt quadrata quatuor, quorum latera omnia ipsi BC sunt equalia; si igitur unicuique ex quatuor complementis AS, & similibus, adiciatur suum quadratū, inuenientur in gnomone OPQ quatuor ut dixi rectangula equalia ipsi AR, quod continetur sub AB, BR hoc est BC. Est vero gnomon OPQ seu quatuor rectangula sub tota AB & segmento BC cum adiuncto EN quadrato alterius partis AC, æqualis quadrato AF, quod fit super AD. Si igitur recta &c.

In numeris si 6. utcumque secetur in 4 & 2, ducendo quater numerum 6 in 4, & addendo quadratum ipsius 2, fiet numerus equalis quadrato ipsius 10 qui numerus componitur ex toto 6 & parte 4.

Propositio 9. Theore. 9.

Si recta secetur per equalia & non equalia, quadrata partium inequalium, dupla sunt quadratorum ab uno dimidio, & ab ea linea que sectionibus interijcitur, descriptorum.

F 2 Recta



Recta AB secetur æqualiter in C, inæqualiter in D; super quâ ad C erigatur CE perpendicularis, & ipsi CA vel CB æqualis, ducanturque AE, EB, iteq; DF ipsi CE, & FG ipsi CD parallela, ac denique iungatur recta AF. Iam vero quia in triangulo ACE latera CA CE æqualia sunt: anguli $\angle$ CAE AEC pares erunt: est autem angulus ECA rectus: duo ergo alij sunt semirecti. Similiterque in triangulo ECB anguli CBE, BEC, semirecti sunt: totus ergo angulus AEB rectus est. Cumque in triangulo EGF, angulus $\angle$ G rectus sit & GEF semirectus, erit etiam angulus GFE semirectus. Quare latera GE, GF, & æquales angulos subtendentia, sunt æqualia. Æqualis etiâ utriusque est recta CD, cum CF sit parallelogrammum: Quare si ab æqualibus CE CB auferantur æqualia GE, CD, recta CG, hoc est DF, ipsi DB erit æqualis.

His intellectis sic breuiter colligitur propositio. Quadrata partium inæqualium

lium AD, & DF siue DB, & æquivalent 47. a
 quadrato ipsius AF, & hoc quadratum
 ex AF æquualet ijs quæ fiunt ab AE,
 EF: Sed harum quadrata dupla sunt qua-
 dratis rectarum AC dimidiæ, & CD
 partis sectionibus interiectæ; cum enim
 AC, CE sint pares, & AE det quadra-
 tum vtriusque quadratis æquale, effi-
 ciet duplum quadrato ipsius AC; simi-
 literque EF dabit duplum quadrati ip-
 sius GF seu CD. Quare quadratum ip-
 sius AF, & partium inæqualium AD &
 DF, hoc est DB duplū sunt quadratorū
 ex AC CD; partis scilicet dimidiæ & li-
 neæ sectionibus interiectæ. Si igitur re-
 cta &c.

*In numeris: Numerus 10 dividitur æ-
 qualiter in 5 & 5, inæqualiter in 7 & 3, sit-
 que intermedia sectio 2, ut prop. 5. Quadrata
 ergo 49 & 9 partium inæqualium 7 & 3,
 sunt duplum, quadratorum partis dimidia
 5 & sectionis intermedia 2.*



Propositio 10. Theore. 10.

Si recta secetur bifariam & in rectum alia adiciatur, quadratum quod fit a tota cum adiecta, simul cum eo quod fit a sola adiecta, duplum sunt quadrati quod fit a dimidia, & alterius quod a dimidia & adiuncta describitur.

Recta AB, bifariam secetur in C, adiecta BD, cui ad C erigatur perpendicularis CE, dimidię AC æqualis, perficiaturque parallelogrammum ED, ductaque EB, occurrat lateri FD, producto in G, iunganturque AG, AE, eritque angulus AEB constans duobus semirectis, ut in simili ostensum est prop. prox. Quare & angulus EBC semirectus est: semirectus quoque DBG oppositus ad verticem, quare & DGB semirectus erit, & latera BD, DG æqualia. Æqualia item erunt latera FG, FE, quia anguli ad basim EG sunt pares. His positis quadratum ex AE erit duplum quadrato dimidię AC, & quadratum ex GE, duplum quadrati ex EF, hoc


a 10. 2.

b 15. 1.

c 6. 1.

d 41. 1.

hoc est ex dimidia CB cum adiuncta BD. Sed & ipsius AG quadratum æqui-



ualet quadratis duarum AE, EG; & quadratū ex tota AB cum adiuncta BD una cum quadrato

ex DG, seu adiuncta BD æquualet quadrato ex AG. Quare harum linearum AB, BD quadrata duplū quoque sunt quadratorum ex AC & CD. Si igitur recta &c.

In numeris: Diuidatur 6. æqualiter in 3 & 3, atq; addatur 2, ut sit numerus compositus 8; quadrata igitur ipsius 8 & adiecti 2, duplū sunt quadratorum dimidij 3, & numeri 5 qui constat dimidio & adiecta.




Prop.

sum DH vna cum quadrato dimidiæ EA æquale quadrato ipsius EI, seu EB. Est vero quadratum ipsius EB $\hat{=}$ æquale ⁶ 47. 2. quadratis ipsarum AB AE. Vnde rectangulum DH cum quadrato ex AE erit etiam æquale quadratis earundem AB & AE. Ablato igitur communi quadrato ipsius AE erit rectangulum DH æquale quadrato ipsius AB quod est AC; & rursus ablato ab hoc quadrato & rectangulo DH, communi rectangulo AF, rectangulum CG relictum ex quadrato, æqual^e erit quadrato GI quod reliquum est ex rectangulo. Datam igitur rectam ita secuimus vt rectangulum CG sub tota AB & altero segmento BG, quadrato partis alterius GA esset æquale, quod erat faciendum.

Propositio 12. Theore. II.

*In triangulo obtusangulo quadratum lateris angulum obtusum subtendentis tanto maius est quadratis laterum eundem angulum continentium, quantum est rectangulum bis comprehensum sub vno latere continente, & sub
linea*

*linea extrinsecus assumpta ad cuius
extremum cadit perpendicularis du-
cta ab altero angulorum acutorum.*



In triangulo
ABC angulus
ACB sit obtu-
sus, productoque
latere BC, ex A
demittatur AD
perpendicularis
ipsi BC, cadens

in D: Dico igitur quadratum lateris AB
obtuso angulo subtensi tanto esse ma-
ius quadratis laterum continentium
BC, CA, quantum est rectangulum bis
comprehensum sub BC & recta CD
extrinsecus sumpta, ad cuius extremum
ex acuto angulo A cadit perpendicu-
laris AD, Quia enim recta BD secta est
vtrunque in C erit quadratum ex BD
æquale quadratis ex BC CD, & in super
rectangulo bis sub BC, CD comprehē-
so: additoque vtrisque quadrato re-
ctæ AD erunt quadrata ipsarum BD,
DA equalia quadratis trium rectarum
BC, CD, DA, vnacum addito rectan-
gulo.


gulo bis sub BC, CD, contento. Sed 47. *
 quadratum rectæ AB æquivaler quadratis rectarum AD, DB. Igitur idem quadratum rectæ AB æquivaler etiam tribus quadratis rectarum BC, CD, DA, & rectangulo bis sub BC, CD contento. Iam vero quia quadratum rectæ AC æquale est quadratis, ipsarum CD DA, erit quadratum rectæ AB æquale quadratis rectarum CB, CA & rectangulo bis contento sub BC CD. In triangulo igitur obtusangulo &c.

*Hac & sequens prop. ad eas proportion-
 nes extenditur, quæ numeris exprimi non
 possunt.*

Propo. 13. Theore. 12.

*In triangulis acutangulis quadratum la-
 teris acuto angulo subtensi tanto mi-
 nus est quadratis laterum continen-
 tium eundem angulum, quantum est
 rectangulum bis comprehensum sub
 uno laterum continentium & sub
 assumpta interiori linea prope acutum
 angulum ad cuius extremum cadit
 per-*

perpendicularis ab opposito angulo ducta.



In triangulo
ABC angulus
C sit acutus,
ducaturque ex
A recta AD
perpendicularis
ipsi BC. Dico
igitur quadra-

tum ipsius AB angulum C subtenden-
tis, tanto minus esse quadratis ex BC,
CA: quantum est rectangulum sub BC
DC bis contentum. Quia enim recta
BC utcumque secta est in D quadrata
ex BC, CD paria sunt rectangulo bis sub
BC, CD, una cum α duobus quadratis
ex B D D C; sed duobus quadratis re-
ctarum CD, DA par est β quadratum
ex CA: duo igitur quadrata ex BC, CA,
paria sunt etiam rectangulo bis com-
prehensio sub BD, DC & duobus qua-
dratis ex BD, DA. Iam vero quia qua-
dratis ex BD DA, α quale est ϵ quod fit
ex AB; erunt quadrata ex BC, CA, ϵ qua-
lia rectangulo bis contento sub BC,
DC & quadrato rectae AB. Quare qua-
dra-

α 7. 2.


β 47. 1.

ϵ 47. 1.

dratum ex AB tanto minus est quadra-
tis ex BC, CA, quantum est rectangu-
lum bis sub BDD, C contentum, In triā-
gulis igitur &c.

Propo. 14. Proble. 2.

*Dato rectilineo aequale quadratum de-
scribere.*



Sit datum rectilineum A cui fiat $\alpha\beta$ -
quale parallelogrammum BE; in quo
si latera BC, CE sunt æqualia, ipsum
erit quadratum quale petebatur.
Quod si latera non sunt æqualia alter-
utrum puta BC producat in F, sic
ut CF ipsi CE æqualis sit, sectâque bi-
fariam rectâ BF in G, centro G, spatio
GB fiat semicirculus BHF, protracto
latere EC vsque dum secet circulum in
H: eritque quadratum ipsius CH, æqua-
le

¶ 5. 2.

¶ 47. 1.

le dato rectilineo A. Ducta enim recta GH, quia recta BF bifariam secta est in G & non bifariam in C, erit rectangulum sub BC CF, hoc est *b* rectangulum BE, cum quadrato ipsius GC æquale quadrato ex GF vel GH, quæ sunt lineæ æquales. At quadrata ex GC & CH valent quadratum ipsius GH; eadem ergo quadrata ex GC, CH valent rectangulum BE cum quadrato ipsius GC: relicto ergo communi quadrato rectæ GC, quadratum ipsius CH valebit rectangulum BE quod ab initio factum est æquale rectilineo A. Quadratum ergo ipsius CA, æquale erit rectilineo A. Facto igitur quadrato super CH, constituerimus quadratum dato rectilineo æquale, quod erat faciendum.



EVCLID




EVCLIDIS ELEMENTORVM

LIBER III.

Definitiones.

1 *Aequales circuli sunt quorum diametri vel è centris lineæ ad ambitum ductæ, sunt æquales.*




2 *Linea recta circum tangere dicitur quæ cum tangat, producta longius circum non secat. Talis est linea AB quæ cum tangat*

circulum CDE in puncto C, producta longius eum non secat.

3 *Circuli se tangere dicuntur qui cū se tangant, se tamen mutuo non secant. Tales sunt circuli CDE, CFG.*


4 *In circulo æqualiter distare à cen-*

G tro




tro rectæ lineæ dicuntur cum perpendiculares à centro ad ipsas ductæ sunt æquales, *ut* lineæ *AB, CI*, æqualiter distāt à centro *D*, quia perpendiculares. *DE, DF*, à cētro *D* ad ipsas ductæ, sunt æquales.

5 Segmentum circuli est figura quæ sub recta lineæ & circuli circumferentia continetur. Talis est figura contenta recta *AB* & circumferentia *BC*.





A & B.

6 Segmenti angulus est qui recta lineæ & circuli peripheria continetur. Tales sunt anguli



7 In segmento autem angulus est cum in segmenti circumferentia sumptū fuerit punctum quoddam, & ab illo ad lineæ terminos rectæ fuerint adiunctæ. Sic angulus *ABC* est in segmento *CBA*.

8 Cum vero comprehendentes angulum datæ lineæ assumunt peripheriam



riam, illi ipsi assumptæ peripheriæ angulus indicitur sistere. *ut* *angulus DAB* dicitur *insistere circumferentiæ DCB.*

9 Sector autem circuli est cum ad ipsum circuli cẽtrũ angulus fuerit cõstitutus. *ut* *si* *ad centrum A* *fit* *constitutus angulus*

BAC, figura BACD dicitur *sector circuli.*


10 Similia circuli segmenta sunt quæ angulos capiunt æquales; aut in quibus anguli sunt æquales.

Propositiones.

Propositio 1. Proble. 1.

Dati circuli centrum reperire.

In circulo *ABC* ducatur recta *AC* a 10. 2.
ut *cunque*, quâ bisectâ in *A* *D*, per idem b 1. 1.
 punctum *D* agatur perpendiculatis *BG* c 10. 2.
attingens *utrimque* *ambitum*. *Di-*
uidatur *deinde* *recta BG* *bisariam* in *E*
G 2 *erit-*



eritque punctum E
centrū circuli. Non
enim erit aliud pun-
ctum in ipsa BG,
cum centrum non
possit in vlla linea
esse nisi vbi secatur
bifariam. Sed neque

extra rectam BG. Fac enim esse in F du-
caturque FA, FD, FC; probabitur sanè
angulum FDA esse rectum; nam in triā-
gulo ADF, CDF latera AD, DF sunt
æqualia lateribus DF, DC & basis AF,
basi FC, cum vtrique ducatur ex cen-
tro F ad ambitum. Erunt ergo anguli
FD C, FDA æquales, & proinde recti.
Hoc autem esse non potest; nam angu-
lus EDA rectus est. Maior igitur recto
est FDA. Non est igitur F centrum; sed
neque aliud punctum extra rectā BG:
Dati ergo circuli centrum est E.

Propositio 2. Theore. 1.


*Si in circuli ambitu duo puncta suman-
tur, recta ad illa puncta ducta intra
circulum cadet.*

Sumantur puncta A & B, & ex cen-
tro

tro

pro inuento C ducantur rectæ CA, CB, CD, Dico punctum D & quodlibet aliud rectæ AB cadere intra circulum.

Quia enim CA CB pares sunt, pares erunt anguli *b* A & B eritque angulus *b* 3. 1. CDB maior opposito interno A; quare maior etiā angulo B; latus agitur CB *c* 16. 1. subtendens *d* angulum maiorem CDB, *d* 18. 1. maius est latere CD subtendente minorem angulum B. Latus tamen CB tantum pertingit ad ambitum, quare CB



quod est minus, ad ambitum non pertingeret. Non est igitur punctum D extra circulum; quod idem ostēdetur de


quouis alio in recta AB, si ergo in circuli ambitu &c.

Propo. 3. Theore. 2.

Si in circulo recta per centrum ducta aliam non ductam per centrum secet bifariam, secabit quoque ad angulos rectos. Et si ad rectos secet, secabit bifariam.

Recta AB per centrum E ducta, se-

G 3 cet



cet CD bifariam
in F, ducantur e
centro rectæ EC,
ED. Quia ergo
CE, CF, æqua-
lia sunt lateribus
DE DF, & basis
communis, erunt

q. 2. 1.

anguli EFD, EFC æquales, ac proinde
recti.

b. 2. 1.


Quod si anguli ad F recti sint; cum
latera EC, ED trianguli ECD paria sint,
erunt in triangulis EFC, EFD duo an-
guli C & EFC duobus D & EFD æqua-
les, & latera EC, ED angulis opposi-
ta sunt equalia: æqualis ergo est basis
FC basi FD. Si igitur in circulo &c.

Proposi. 4. Proble. 3.

*Si in circulo recta se secant non per cen-
trum amba ductæ, non secabunt se
mutuo bifariam.*

Si enim per centrum transit vna, cer-
tum est eam bifariam non secari, cum
non nisi in centro possit secari bifaria,
& altera ex hypothesis per centrum non
transeat. Quod si neutra transit per cē-
trum

trum, vt in rectis AB, CD, intra circulum ADB ductâ à centro E rectâ EF, si
vbi in vis, in puncto F secantur AB CD




bifariam erit angulus EFC rectus, cum altera per centrum ducta secans alteram extra centrum bifariam, secet ad rectos: sed

ob eandem causam angulus EFB rectus erit: pares ergo essent anguli EFB, EFC, pars & totum, quod fieri nequit.

Propo. 5. Theore. 4.

Si duo circuli se mutuo secant non habebunt idem centrum.




Circulorū ABC ADC se mutuo in A & B secantium sic idē centrum E si fieri potest; ducanturq; EA à centro ad alterutrā sectionem, & ED se-

cans vtrunque vtrumque circulum in punctis D & B. Quia igitur circuli ADC cētrum ponitur E, erunt EA, ED equa-

les, & quia circuli ABC idem centrum ponitur E, erunt EB EA equales; ergo & inter se esset equales ED, EB pars & totum, quod esse nequit. Si ergo duo circuli &c.

Propositio 6. Theore. 5.

Si duo circuli interius se tangant, non erit eorum idem centrum.




Nam si duo circuli se interius tangant in A & putentur habere idem centrum E, ductis rectis EA, & alia vtruncq; EB ad circulum AB, ostenderetur vt supra

ED & EB, partem scilicet & totum, & quales esse ipsi EA: quod absurdum est. Si duo ergo circuli &c.

Propo. 7. Theor. 6.

In diametro circuli si aliud à centro punctum accipiat, à quo rectae plures in circumferentiam cadant, maxima erit ea quae per centrum ducitur, minima reliquum eiusdem lineae: aliarum vero maior est ea quae transeunt per centrum.

*centrum est propior, neque plures quā
dua aequales duci possunt in circulum
ad utrasque partes ipsius minima.*




In diametro AB
sumatur punctum
C aliud à centro
D, ducanturq; vt-
cūq; rectæ CA CE,
CF, CG. Dico ma-
ximam earum esse

CA quæ transit per centrū D. Ductis e-
nim rectis DE, DF, DG quia trianguli
GDC, duo latera GD DC, quibus equa-
lis est AC, maiora erunt, & reliquo GC. 20. 1.
Maior ergo est AC quam GC; eodemq;
modo quibusvis alijs ex C ductis ostē-
detur esse maior.

2 Deinde quia latera EC, ED, maiora
sunt reliquo ED cui æqualis est BD, si
commune auferatur CD, latus CE ma-
ius remanebit quā BC, & pari ratio-
ne ostendetur BC reliquis ex C esse
minorem.

3 Rursum quia in triangulis GDC,
FDC, duo latera GD, DC, duobus DF,
DC paria sunt, & angulus GDC ma-
ior

624. 1.



ior quam FDC, erit
basis δ GC, quæ
propior est ipsi
CA, maior remo-
tiore CF.


4 Denique si an-
gulo EDB æqualis

ponatur BDH ducaturque CH, in trian-
gulis EDC, HDC erunt bases CE CH
æquales, cum anguli CDE, CDH, &
latera continentia sint æqualia. Neque
vero plures possunt duci ad partes mi-
nimæ BC æquales prioribus. Si enim
cadant intra puncta EH, remotiores
runt à recta CA, ac proinde minores
ipsis CE CH. Si autem ducantur extra
puncta EH: erunt propiores ipsi CA
ac proinde maiores. Si igitur in diame-
tro &c.

Propo. 8. Theore. 7.

*Si extra circumulum sumatur punctum
quodpiam, a quo ad circumulum ducan-
tur rectæ quædam lineæ, quarum una
per centrum transeat, cæteræ ut lubet
ducantur.*

ducantur, rectorum quæ ducuntur ad concavam peripheriam maxima erit quæ per centrum ducitur, & quæ huic propinquior, maior est remotiore. Extra circulũ vero minima quæ ab assumpto puncto ad diametrum tendit, & quæ huic propior, minor est remotiore, & duæ tantum lineæ æquales cadunt ab eo puncto in circulum ad partes minima vel maxima.



Extra circulũ
A B C D sumatur punctum E,
à quo ducantur
quotvis rectæ,
quarũ una EA
per centrum F
transeat, ceteræ
vero EB &c.
ut lubet cadant
in circulum. Di-
co I, rectorum
quæ ducuntur
ad concavũ cir-
culi, maximam
esse

c. 10. l.

esse EA quæ transit centrum F. Ductâ enim è centro recta FB, trianguli EFB duo latera EF, FB æqualia ipsi EA, maiora erunt latere EB, & sic de reliquis.

d. 24. l.

2 Maior est etiam EB quæ propior est ipsi EA quam EC aut alia remotior. Nam quia trianguli EFB latera EF FB æqualia sunt lateribus EF, FC, trianguli EFC, & angulus EFB maior quam EFC, maior erit basis BE, quam CE.

c. 20. l.

3 Ductis rectis FH, FI, FK, quia trianguli EHF maiora sunt duo latera, FH HE reliquo EF, si auferantur æqualia FG FH, maior manebit EH extra circum, & reliquæ EIEK, quam sit EG. Minima est ergo EG, quæ ad diametrum GA ducitur.

d. 21. l.


4 Quia intra triangulum EIF ducuntur rectæ EH, HE erunt hæc minores ipsis EI, IF, ablatis ergo æqualibus HF, IF adhuc minor remanebit EH, quam EI, & ob eandem causam minor est EI quàm EK, quare minor est semper, quæ minimæ est propior.

5 Denique angulo HFG, si æqualis fiat GFL, ducaturque LE; quia trian-
gula

gula EHF, ELF latus habent commune EF, & alterum HF alteri LF æquale, & parem angulum contentum lateribus, erunt bases EL EH æquales. Neque plures his duabus æquales duci possunt ex utraque parte minimæ EF: nam aut propiores erunt aut remotiores à minima EF, quam sint EI, EH, quare his aut minores erunt aut maiores. Si ergo extra circulum &c.

Propositio 9. Theore. 8.

Si ab aliquo intra circulum puncto plures quam duæ rectæ æquales ad ambitum ducantur, id punctum centrum est circuli.



Ex puncto A intra circulum BCD præter rectas AB, AC, æquales, sit iisdem æqualis AD, ductisq; rectis BC, CD, diuisisque bi-


fariam in E & F, ducantur ad ambitum rectæ AE AF. Quia ergo triangulorum ABF AFC latera duo sunt æqualia e-

runt

88. 2. runt anguli ad F æquales & recti, re-
ctus item ad E. Quia ergo AF rectam
BC diuidit bifariam ad rectos, in ea est
centrum circuli, & ob eandem causam
est etiam in recta EA centrum circuli:
Non potest ergo centrum aliud esse
quam A, quia solum punctum A est v-
trique AF & AE commune. Si igitur
&c.

Propo. 10. Theore. 9.

*Circulus circulum in pluribus quā duo-
bus punctis non secat.*




Secent se si
fieri potest, cir-
culi in tribus
punctis A, B, C,
centroque cir-
culi ABC inue-
to quod sit D

ducantur rectæ DA, DB, DC: quæ quia
æquales sunt, & attingunt etiam ambi-
tum circuli ABE, sequitur b punctum
D esse etiā cætrum circuli c ABE, quod
absurdum est. Non ergo secabunt se
circuli in tribus punctis.

Pro-

Propositio II. Theore. 10.

Si duo circuli se interius contingant recta coniungens eorum centra producta incidet in contactum circularum.



Circuli ABC, ADE interius in A se tangant: dico rectam quæ ducitur per centra F & G qualis est FA, cadere in contactum A.


Nam si fieri potest, recta coniungens centra sit IBK, in qua centrum circuli ABC sit I, & alterius H, iunganturque rectæ AH, AI. Quia ergo AH, HI reliquo latere AI sunt ^{a 10. 2.} maiora, & proinde maiora quàm IB quæ ex eodem centro ducitur, si auferatur communis HI manebit AH maior quàm BH. Est ergo HD maior ipsâ HB, pars toto; quod absurdum est. Eadem demonstratio procedet etiam si centrum circuli maioris extra minorem cadat.



Pro-

Propositio 12. Theore. 11.

*Si duo circuli sese exterius contingant,
linea recta centra coniungens per cō-
tactum transibit.*



Si recta cō-
iungens cen-
tra circularū
ABC, BDE
se tangētium


exterius in B non transit per contactum
B, sed alibi secet in punctis C & D, iū-
gens centra F & G; ducantur rectæ BF
BG, eruntque duo latera FB, BG ma-
iora reliquo FG. Sed sunt etiam mino-
ra, nam FC ipsi FB æqualis est, ex eodem
centro F, similiterque GD ipsi GB erit
æqualis. Superat ergo latus FG reliqua
duo latera segmēto CD quod est absur-
dum. Recta igitur FG non iungit cen-
tra, & nulla iunget, nisi quæ transibit
per contactum B.



Prop.


Propo. 13. Theore. 12.

Circulus circulum non tangit in pluribus pñctis siue intus tangat, siue extra.



Nam si circulum ABCD tāgat circulus AECF interius in duobus pñctis A & C erunt diuersa a circulo-
rum centra, ea-

que in recta AC transeunte per conta-
ctus b. Sit ergo G centrum ipsius ABC,
& H ipsius AEC. Tunc autem quia in
recta AC ponitur cētrum circuli ABC
esse G, esset recta AC bifariam diuisa
in G, & quia alterius circuli centrum
est H, etiam in H esset diuisa bifariam;
quod fieri nequit.




Sed ne-
que exte-
rius circuli
se in plu-
ribus pun-
ctis tāgēt:

Sic enim in pñctis B & C se tangunt
H ducta

ductâ rectâ AD per centra A & D nec-
non per contactum C, itemque ductis
AB, BD ad alterum contactum B, pro-
baretur vt sup.^a prop. latera AB BD, &
maiora & æqualia esse lateri AD.

Propos. 14. Theore. 13.

*In circulo æquales rectæ lineæ æqualiter
à centro distant, & quæ distant à cen-
tro æqualiter inter se, sunt æquales.*



In circulo ABC
sint pares rectæ
AD, BC, & ex cē-
tro E agantur EF,
EG ad rectos ipsas
AD, BC, ideoque
secantes bifariam,


iunganturque EA, EB. Quia ergo an-
guli ad F & G sunt recti, quadratum ex
EA æquale est quadratis laterum AF,
EF: & similiter quadratum ex EB duo-
bus quadratis ex EG, GB. Nunc quia
quadrata rectarum æqualium EA, EB,
sunt æqualia, erūt etiam quadrata duo
rectarum EF, FA, æqualia duobus ex
EG, GB, & ablatis quadratis rectarum
æqua-

æqualium FA, GB; manebunt quadrata rectarum EF EG æqualia, quare EG EF sunt æquales, ac proinde AD BC æqualiter à centro distant.

E conuerso autem si positum sit rectas AD, BC distare æqualiter à centro E, ostendetur ex superiori demonstratione ablatis quadratis rectarum EF, EG æqualium, quadrata reliquarum FA, GB manere æqualia; proinde & ipsas esse æquales.

Propos. 15. Theore. 14.

In circulo maxima est diameter, & ceterarum ea semper maior, quæ centro est propior.




Per centrum A ductâ diametro FG, ducatur Hk propior cetro quâ CD, ad quas perpendicularibus è centro ductis AL,

AM, ex AL, quæ necessario maior erit, sumatur AN æqualis ipsi AM, & per N agatur BE ad rectos ipsi AL, iun-

H 2 gan,

ganturque rectæ AB, AC, AD, AE.
Nunc vero quia BE HK æqualiter à
centro distantes sunt æquales, & in
triángulo ABE duo latera AB AE æqua-



lia diametro FG,
maiora sunt quã
BE; erit eadem
diameter FG ma-
ior quam BE, vel
HK, aut quavis

alia.

z Rursus quia duo latera AB, AE,
duobus lateribus AC, AD sunt paria,
& angulus BAE maior ipso CAD, erit
basis BE seu HK maior quam CD, quæ
est à centro remotior. In circulo igitur &c.


Propo. 16. Theore. 15.

*Qua ab extremitate diametri ad rectos
angulos linea ducitur extra circulum
cadit. Neque alia recta cadere potest
in locū inter ipsam rectā & periphe-
riam comprehensum. Et semicirculi
quidem angulus quovis acuto rectili-
neo maior est, reliquus autem minor.*

Ad

nam BA ipsi BH parti totius BG equalis est, non ergo maior tota BG.

3 Angulus semicirculi BAF quolibet acutus est maior: nam quivis acutus cum sit minor recto BAE, debet constitui



per rectam, puta GA, quæ ad punctum A ducta necessario cadit intra circulum. Minorem ergo angulum faciet quam sit an-

gulus semicirculi BAF.

4 Angulus reliquus HAF, quem contingentis dicimus, minor est quovis rectilineo; nam si minor aliquis constitui posset puta GAE duceretur recta GA in locum inter rectam AE & peripheriam BE. Quæ igitur &c.


Corrollarium.

Hinc efficitur rectam ad extremum diametri perpendicularem tangere circulum, & in unico puncto tangere; nam si plura tangeret, caderet intra circulum.

Pro-

Propo. 17. Proble. 2.

*A dato puncto rectam lineam ducere
quæ datum circumulum tangat.*




Dato puncto
A, & circulo
BCD, ducatur
ex centro E re-
cta EA, & eo-
dem cētro spa-
tio EA circulus
AFG; excite-
turque ad D re-

cta DF ad rectos ipsi EA. Inde iuncta re-
cta EF agatur quoque recta AB; quam
eandem dico tangere circumulum BCD
in puncto B. Quia enim triangulorum
ABE, FED, duo latera AE, EB duobus
EF, ED sunt paria, & angulus E com-
munis, hæc triangula se habent iuxta
4.1. Quare cum angulus EDF rectus sit,
rectus quoque erit EBA, & proinde re-
cta AB circumulum tangit in B. A dato
ergo puncto &c.

SS

Propo. 18. Theore. 10.

Si circulum tangat recta linea, ducta altera è centro ad contactum ipsi tangenti erit perpendicularis.



Vt si recta AB circulum tangat in C recta altera DC, ex centro D, ad contactum C, ipsa AB erit perpendicularis. Si enim anguli ACD, DCB non

• 14. 1.


sunt recti, erit eorum alteruter acutus, puta ACD, sed hic maior est angulo semicirculi ECD, erit ergo angulus semicirculi minor aliquo acuto, quod fieri non potest. Anguli ergo ADC DCB sunt recti, ac proinde recta DC tangenti AB est perpendicularis.

• 16. 1.

Propo. 19. Theor. 17.

Si recta circulum tangat, & ad punctum contactus tangenti ipsi perpendicularis excitetur, in ea erit circuli centrum.

Recta AB tangat in C circulum CDE, excitetur-




teturque ad tactū
C, recta CE, ipsi
AB perpendicu-
laris, in qua si ne-
gas esse centrum
circuli, sit ergo a-
libi, puta vbi F
ducaturque FC

quæ ipsi AB erit perpendicularis, qua-
re rectus angulus ACE recto angulo
ACF erit æqualis, pars videlicet toti,
quod est absurdum. Non ergo alibi e-
rit centrum quam in recta CE.

Propo. 20. Theore. 18.

*Ex eadem peripheria portione angulus
ad cētrum, duplus est eius qui ad am-
bitum extenditur.*



Super segmento
AB, ad centrum C,
fiat angulus ACB, &
super eodem segmēto
AB ad ambitum extē-
datur angulus ADB.
Quia ergo trianguli
CBD

o 5. 2.

A 32. 2.


CDB latera CB, CD sunt æqualia; sunt
 & anguli D, & CBD ad basim æquales;
 sed his duobus internis & oppositis ex-
 ternus ACB est æqualis; idē igitur angu-
 lus externus ACB, qui est ad cētrū, du-
 plus est ipsius ADB, qui porrigitur ad
 ambitum. Ex eadem ergo &c.

o 5. 1.

A 32. 1.

Eadem demonstratio, adhibebitur
 si triangula se interfecerint. Vt angulus
 ACB ad cētrum, duplus est ipsius ADB
 qui ad ambitū. Nam ductā rectā DCE
 erant anguli CDA, CAD æquales, &
 his duobus æqualis externus & oppo-
 situs ACE, cuius anguli quia pars vna
 angulus BCE & duplus est anguli BDC,

o 35. 1.




reliquus ACB du-
 plus etiam erit re-
 liqui ADB, quod
 erat probandum:
 est enim angulus
 ADB angulus ad
 ambitum, & ACB
 ad centrum, super eodem arcu AB.

Prop.

Propositio 21. Theore. 19.


In circulo qui in eadem portione sunt anguli, aequales sunt.



Sit circulus AB CD, & in eius portione ABC sint anguli ABC AEC iuxta def. 11. ducaturq; ad centrū angulus F. Quia ergo tam angulus B quam E, est dimidium 20. 3 eiusdem anguli F, sequitur eos inter se esse pares. In circulo ergo &c.

Propositio 22. Theore. 20.

Quadrilaterorum in circulo descriptorum anguli oppositi duobus rectis sunt aequales.




Descripto quadrilatero AB CD in circulo ABD ducantur rectę AD BC. Tunc vero quia anguli CAD CBD in eadem 21. 1 portione CABD, &c

f 11. 1.

& similiter anguli DAB, DCB, in eadem portione B A C D, sunt etiam pares; totus angulus CAB duobus DCB DBC æqualis est: sed hi duo addito angulo CDB fiunt δ æquales duobus rectis (constituent enim triangulū CBD) Idem igitur angulus CDB, adiunctus opposito CAB efficiet quoque angulos pares duobus rectis.

Propositio 23. Theore. 20.

Super eadem recta due circulorum portiones similes & inæquales ad easdem partes non constituentur.



a 21. 3.

b 16. 1.


Sint enim si fieri potest super AB segmenta similia & inæqualia ACB, ADB; ductisque rectis AD, BC, BD, erunt anguli D, & ACB pares super eadē α portione AB. At externus ACB interiori & opposito δ D par esse nequit. Super eadem ergo recta &c.



Prop.

Propositio 24. Theore. 12.

Super aequalibus rectis lineis similia circularum segmenta inter se sunt aequalia.




Super rectis equalibus AB, CD, constituta sunt similia segmenta AEB, CFD, quæ si non sunt æqualia; collocetur AB recta super ipsam CD, cui cōgruet, cum ponatur æqualis. Quod si non cōgruerēt etiam segmenta, tunc vel vnum extra alterum torum caderet & sic similia & inæqualia segmenta super eadē CD constituerentur, vel vnum caderet partim extra; partim intra & tunc circulus circulum secaret in pluribus pūctis, quam duobus puta in C, F, D, si circuli perficerentur, quod verumuis ^{a 29.} est absurdum. Super æqualibus ergo re- & 10. 34
ctis &c.

Pro.

Propo. 25. Proble. 3.

*Data portione circuli describere circuli
cuius est portio.*




In data portione
ABC sumantur
utcumq; tria pun-
cta A, B, C; iun-
gaturque duabus
rectis AB, BC; quibus in D & E bi-
sectis, ad ea puncta excitentur perpen-
diculares DF, EF, ubi enim se secabunt
puta in F erit circuli centrum. Nam per
1.3. tam in recta DF, quam in altera EF,
erit circuli centrū. Non alibi ergo quā
in F, alias duo essent vnus circuli cen-
tra. Centro ergo F, spatio FA descri-
betur circulus cuius portio est ABC.

Propo. 26. Theore. 23.

*Anguli aequales ad centra aut ad ambi-
tum circularum equalium insistant
segmentis equalibus.*

Sint equales anguli AGC, DHF ad
centra G & H, ducanturque rectę AC,
DF. Quia ergo triangulorum AGC,
DHF, duo latera GA, GC duobus HD
HF




HF sunt paria, & anguli G & H ponū-
 tur æquales; erit α basis AC basi DF æ-
 qualis, quare & arcus ABC β arcu DEF
 erit æqualis. Rursus si anguli K & L sint
 æquales, erunt γ portiones AKC, DLF
 similes: quare cum circuli toti ponan-
 tur æquales, similes quoque erunt ar-
 cus ABC DEF.

Propo. 27. Theore. 24.

*Anguli ad centra aut ambitum equalium
 circulorum insistentes equalibus cir-
 culorum portionibus, sunt aequales.*

Sienim anguli BDC, FHG æqualium
 circulorum, equalibus arcubus BKC,
 FLG insistent, & anguli ipsi non sunt
 æquales; sit BDC maior, fiatque angulus




BDI ipsi FHG æqualis; equales ergo e-
 tunt arcus BI, FG, quod est absurdum,
 cum arcus BC & FG positi sint æqua-
 les. Anguli ergo BDC, FHG inequales
 esse non possunt, ac proinde nec angu-
 li A & E qui sunt dimidij ipsorum D &
 H. Anguli ergo ad centra & c.

Propo. 28. Theore. 25.

*In æqualibus circulis æquales rectæ au-
 ferunt & relinquunt æquales periphe-
 rias.*

Nam si in paribus circulis ABC
 DEF rectæ BC, EF sunt æquales; factis
 angulis ad centra G & H, erunt trian-
 gulorū GBC, HEF duo latera GB, GC
 duobus HE, HF æqualia, cumque ba-
 sis BC basi EF sit etiam æqualis, equa-
 les erunt anguli G & H. Similes ergo
 por-



portiones sunt BKC, ELF. Et quia circuli sunt æquales, similes quoque relinquentur BAC, EDF. In æqualibus ergo &c.

Propositio 29. Theore. 26.


In æqualibus circulis æquales peripherias æquales rectæ lineæ subtendunt.

Nam in figuris superioribus si BKC, ELF, sumptæ sint portiones æquales, pares erunt anguli G, & H: sed & latera continentia sunt æqualia, quare bases BC, EF, quæ subtendunt æquales arcus inter se sunt æquales.

Propo. 30. Proble. 4.

Datam circumferentiam secare bifariam.


Datæ peripheriæ ABC, subtendatur recta AC, divisa in D bifariam, ad quod punctum excitetur DB, ipsi AC, perpendicu-



dicularis, eritq; periphēria ABC , bifariā in B , diuīsa. Nam ductis rectis AB , BC quia triangulorum DAB DBC , latus DA ipsi DC , est æquale, & DB commune, angulique ad D recti sunt, erunt ab ases AB , BC , æquales, ac proinde æquales b etiam periphēriæ AB , BC . Secta est igitur ABC , bitariam in B ; quod erat faciendum.

Proposi. 31. Theore. 27.

In circulo angulus qui in semicirculo rectus est: qui in portione maiore, minor; & qui in minore, maior recto: insuper maioris portionis angulus est maior recto; minoris, minor.



In semicirculo ADC , fiat utcūq; angulus CDA , quem dico esse rectum. Nam ex E cētro ductā rectā ED , & latere AD , producto in F , quia

quia trianguli EAD , duo latera EA , ED sunt paria, pares quoque erunt anguli EAD , EDA , & in triangulo ECD , pares erunt ob eandem causam anguli EDC , ECD ; totus ergo angulus ADC , duobus DAC , DCA , æqualis est; sed iisdem duobus oppositis & internis æqualis est b externus FDC , Sunt ergo b 12. 1. æquales quoque inter se anguli ADC , CDF ; ac proinde rectus uterque.

Et quia in triangulo ACD , angulus ADC , ostensus est rectus, minor c recto erit angulus BAC , qui est in portione $DABC$, maiore quam sit semicirculus. c 17. 1.

Nunc vero sumpto utcumque puncto G , in arcu DC , ductisque rectis DG , GC , quia quadrilaterum est AG , anguli oppositi d DAC , CGD , valent duos rectos: sed angulus DAE minor recto est, recto ergo maior est angulus DGC , qui est in portione DGC minore quam semicirculus. d 22. 3.


Sed & angulus maioris portionis qui continetur recta CD , & circumferentia $DABC$ maior est recto ADC , totum videlicet sua parte. Angulus denique minoris portionis qui contine-

I 2 tur

tur recta CD, & arcu DGC, minor est quam rectus CDF, pars videlicet quæ totum. In circulo igitur &c.

Corollarium.

Si in triangulo angulus aliquis duobus reliquis sit equalis is erit rectus. Ut si angulus ABC duobus A & C, equalis est, cum externus a DB (iisdem A & C, sit equalis; æquales etiam erunt DB C, & ABC, ideoque recti.




• 32. 1.

Propo. 32. Theore. 28.

Si circulum recta tetigerit, & à tactu ducatur recta altera secans circulum, anguli quos ad tangentem facit, æquales erunt ijs qui in alternis circuli portionibus consistunt.

Circulum ABCD, tangat recta EF, in puncto D, ex quo ducatur DB, utcumque circulum secans in B, deinde excitata DA, ipsi EF, perpendiculari (quæ erit a diameter) ducatur AB, sup-
toque quouis puncto in arcu BD, puta E, du-

• 18. 3.




C, ducantur etiam rectę BC, CD. Quo facto dico angulos quos facit BD, cum tangente EF, æquales esse angulis, qui sunt


in alternis circuli portionibus. Hoc est angulum BDF, parem esse ipsi BAD, qui est in portione ABD; & angulum BDE, parem esse ipsi BCD, qui in portione DCB cōsistit. Nam quia angulus ABD, in semicirculo *b* rectus est, reliqui duo ^{b 21. 3.} BAD, BDA, vni recto, sunt pares; sed ^{22. 1.} rectus est angulus ADF, valet ergo duos angulos BAD, BDA; ablato ergo communi BDA, reliqui BDF, & BAD, manent æquales. Amplius quia AC quadrilaterum est, anguli A, & C, sunt ^{d 22. 3.]} pares duobus rectis, sicut & anguli BDF, BDE; cum igitur angulus BDF, ipsi A, sit ostensus æqualis, reliqui BDE, BCD, inter se relinquuntur æquales; Si igitur circulum &c.

Propo. 33. Proble. 5.

Super data recta portionem circuli describere qua capiat angulum dato angulo rectilineo equalem.




Si angulus
datus sit rectus
ut D, & data re-
cta sit AB, eâ
diuisâ bifariam
in E; centro E
spatio EB, du-
cetur semicirculus AFB, capiens an-
gulum rectum.



Si vero an-
gulus datus sit
acutus, ut C, &
data recta AB;
applicetur ad
eius extremû
A, angulus D
AB, ipsi C æ-
qualis; deinde
rectâ AB, diuisâ bifariam in E, excite-
tur EF, ad rectos ipsi AB, & ad A, recta
AH, ad rectos ipsi AD, iungaturque
GB, eruntque triangulorû EAG, EBG,
latera

latera EA, EB, æqualia, & EG, commune, angulique contenti, æquales, æqualis ergo erit ^b basis GA, basi GB, quare si centro G, spatio GA, ducatur circulus, transibit per extremum B; nunc vero ductâ rectâ HB, quia diametro AH, ad extremum A, ducta est ad rectos linea DA, tanget hæc linea circulum; & quia à contactu ductâ rectâ AB; circulum secat, erit angulus DAB, seu angulus datus C, æqualis ^d angulo AHB, qui est in alterna sectione AFB, hæc ipsa igitur sectio HFB, super data AB, capit angulum dato angulo æqualem.




Similis erit structura si datur angulus obtusus C, & similis item demonstratio, capiet

enim arcus AHB, angulum obtusum BHA, ipsi GAI, hoc est dato angulo C, æqualem. Super data ergo &c.

Propositio 34. Proble. 6.

A dato circulo portionem auferre quæ angulum capiat parem angulo dato.




Sit datus
angulus F,
& circulus
ABC, cui
ad quod-
uis punctū
puta C, ap-
plicetur tangens DE, fiatque angulus
BCE, ipsi F, æqualis: eritque angulus
quiuvis in portione CAB, puta BAC, æ-
qualis ipsi BCE, seu dato angulo F, cum
angulus CAB, in alterna circuli sectio-
ne consistat.

Propositio 35. Theore. 29.


*Si in circulo dua rectæ se interfecent, re-
ctangulum sub segmentis unius æ-
quale erit rectangulo sub segmentis
alterius contento.*

In circulo ABCD, rectæ AC, BD, se
intersecent in E; quæ sectio si sit in cen-
tro, tunc cum omnia segmenta sint æ-
qualia



qualia, erit rectangulum sub segmentis
 vnus, & quale rectangulo sub segmen-
 tis alterius. Quod si in alterutra tãtum
 puta AC, sit centrum circuli, secetque
 alteram BD, & qualiter & ad rectos in
 E, tunc ductâ rectâ FD ex centro F,
 quia recta AC, bifariam in F, & non bi-
 fariam in E diuisa est, erit rectangulum
 sub AE, EC, simul cum quadrato ip-
 sius EF, & quale quadrato ipsius FC vel
 FD seu duobus ex FE, ED; sed quadra-
 tum ipsius ED, est rectangulum sub
 partibus rectę BD, sectę & qualiter in E;
 Igitur rectangulum sub partibus EC,
 EB addito quadrato ex EF, & quale est
 quadrato ipsius FD, sicut & rectangu-
 lum sub partibus inæqualibus ipsius
 AC, adiuncto eodem quadrato ex EF,
 fiebat & quale quadrato ipsius FD; Ab-
 lato ergo communi quadrato ex EF re-
 ctan-


Rectangula sub AE, EC, & sub BE, ED, remanent æqualia.



Si vero in alterutra recta puta AC, sit centrū circuli F, & vtraque linea inæqualiter in F diuidatur, ductis

FD, & perpendiculari FG, rectangulum sub partibus AF, EC, cum quadrato ipsius EF, par erit quadrato ex FC, vel FD; Similiter rectangulum sub BE, FD, cum quadrato ipsius EG, æqualia sunt quadrato ex GD, & hoc cum quadrato ipsius GF, æquale est quadrato ipsius DF, quare additis ad rectangulū sub DE EB quadratis ipsarum EG, GF, seu quadrato ipsius EF fiet rectangulum sub DE, EB æquale quadrato ex DF, cui etiam æquale erat rectangulum sub partibus ipsius AC, adijcto quadrato ex EF; hoc ergo quadrato ex EF communi ablato, rectangula sub AE, EC, & BE, ED, manent æqualia.

Denique si neutra per centrum transeat & vna ex illis bifariam secetur, aut
neu-




neutra: ducatur per centrum F, & sectionem E recta GH, tunc vero quia ostensum est rectangulum sub AE, EB, æquale esse rectangulo sub GE, EH (siue AB, diuisa sit bifariam siue nō) item rectangulum sub CE, ED, æquale esse eidem sub GE, EH, (siue CD, bifariam secta sit siue non) erit rectangulum sub AE, EB, æquale rectangulo sub CE, ED. Quod erat demonstrandum. Si ergo in circulo &c.

Propo. 36. Theore. 30.

Si à puncto extra circulū ducantur due rectæ, secans una, altera tangens circulum; rectangulum sub tota secante & parte quæ eidem adiecta est usque ad punctum, æquale erit quadrato tangentis.


A pun-



Ex puncto A
ducatur AB, cir-
culū secans, quæ
primo trāseat per
C, centrum, aga-
turque ^a insuper
recta AD, circu-

lum tangens in D, adiunctâ rectâ CD,
quæ erit ^b ad rectos ipsi AD. Quia ergo
recta BE, bifariam secta est in C, & ei
adiuncta est EA, erit rectangulum ^c sub
AE, EB cum quadrato ipsius EC, vel
CD, æquale quadrato ex AC: sed hoc
idem quadratum ex AC valet duo si-
mil ^d quadrata ex AD, CD; si igitur au-
feras quadratum commune ex DC, re-
ctangulum sub AE, EB, sit æquale qua-
drato tangentis AD.

Quod si linea AB, non transeat per
C centrum, ducatur ad eam CF per-
pendicularis, item aliæ rectæ CD, CE,
CA. Cum igitur rectangulum sub AE,
EB, addito quadrato ipsius EF, par sit
^e quadrato ex AF, addito cōmuni qua-
drato ex FC, quadrata ex AF, FC, seu
^f quadratum ex AC, æquale erit rectan-
gulo sub AE, EB, adiectis quadratis ex
EF, FC,




EF, FC, vel cū quadrato ipsius EC. Quia ergo rectangulum sub AE, EB cum quadrato ipsius CE, vel CD, æquivalet quadrato ipsius AC, vel dua-

rum $AD \cdot DC$; si auferatur commune DC , vel CE , rectangulum sub AE, EB, manebit æquale quadrato ipsius AD, Quod erat demonstrandum. Si ergo à puncto &c. § 47. 2.

Propo. 37. Theore. 31.

Si à puncto extra circulum ducantur rectæ duæ, quarum altera secet, altera in circulum incidat, sitque rectangulum sub secante, & adiecta parte usque ad punctum, æquale incidentis quadrato; recta illa incidens circulum tangit.


Ex puncto D extra circulum ABF ducatur recta DA, secans circulum in C, sitque rectangulum sub DA, DC, æquale quadrato rectæ DB. Dico rectam DB tangere-



a 17. 3.

b 16. 2.

tangere circulum. Nam ductâ rectâ DF
 tangente a circulum in F iungantur è
 centro E rectæ EBEF, & si recta DA nō
 transit per centrum E, addatur etiam
 DE. Nunc vero quia rectangulo sub
 DA DC, æquale est b quadratum tan-
 gentis DF, eidemque rectangulo sub
 DA DC ponitur æquale quadratum ip-
 sius DB, erunt quadrata rectarum DF
 DB æqualia, ideoque & ipsæ æquales,
 Quia ergo triangulorum DFE, DBE,
 duo latera DF, FE, duobus DB, BE, sunt
 æqualia, & basis DE communis; erūt
 angu-



anguli DFE, DBE æquales; est autem ^{c. 8. 2.}
 angulus DFE rectus, rectus ergo e- ^{d. 18. 3.}
 tiam, est DBE, ideoque ^{c. 16. 3.} recta DB cir-
 culum tangit. Si ergo extra circum-
 &c.



EVCLI-





EVCLIDIS ELEMENTORVM

LIBER IIII.

Definitiones.

1 Figura rectilinea in altera rectilinea dicitur inscribi, cum singuli eius quæ inscribitur anguli singula latera attingunt eius in qua dicitur inscribi.




Ut triangulum ABC , inscriptum est in triangulo DEF : ut triangulum GHK , non inscribitur in triangulo LMN , quia angulus H , non attingit latus MN .

2 Figura


2 Figura circum figuram describi dicitur cum singula eius quæ circumscribitur latera singulos angulos tetigerint figuræ, quæ intus est descripta.

Ut in superioribus exemplis triangulum DEF; est descriptum circa triangulum ABC, at triangulum LMN, non est descriptum circa GHK.



triangulum DEF.

3 Figura rectilinea in circulo inscribi dicitur cum singuli eius anguli circulum tetigerint. Ut triangulum ABC, circulo ADB est inscriptum, non autem



4 Figura vero rectilinea circa circulum describi dicitur, cum singula eius latera am-


bitum circuli tangunt. Ut triangulum ABC, descriptum est circa circulum DEF.

K

5 Si-

5 Similiter & circulus in figura rectilinea inscriptus est, cum eius ambitus tangit singula latera figure in qua circulus describi dicitur. *Vt circulus DEF, inscriptus est in triangulo ABC def. 4.*

6 Circulus autem circa figuram describi dicitur, cum circuli ambitus tangit angulos omnes eius figure quam circumscribit. *Vt in figura definitionis tertia circulus ACBD, descriptus est circa triangulum ABC, non autem circa DEF.*




7 Recta linea in circulo accommodari vel aptari dicitur, cum eius extrema in circuli peripheria fuerint.

Vt linea AB, aptata est in circulo ABC, non autem CD.

Propositiones.

Propositio 1. Proble. 1.

In dato circulo rectam accommodare æqualem data recta linea, que circuli diametro maior non sit.



E



In circulo
ABC aptanda
sit linea æqua-
lis ipsi E quæ
diametro AC
maior non sit
nā maior dia-
metro a nul- 15. 1.
la aptari po-

test. Quod si diametro AC esset æqualis
linea E, ipsa diameter AC esset accom-
modata vt petitur. Si ergo linea E mi-
nor sit diametro AC, abscindatur æ-
qualis AD, æ centro A spatio AD du-
catur circulus BD; iuncta enim recta
AB aptata erit in circulo ABC, & erit
æqualis ipsi E, cum E sit æqualis ipsi AD,
cui æqualis etiā est AB.

Propositio 2. Proble. 2.

*In dato circulo triangulum describere
dato triangulo æquiangulum.*

Sit datus circulus ABC, & triangu-
lum DEF. Ducta tangente GH ad 16. 3.
pūctum B fiat angulus HBC æqualis 25. 1.
ipsi D, & GBA ipsi E ponatur æqualis,
ducaturque recta AC, & triangulum
K 2 ABC





c 32. 3.

ABC erit quod petitur : nam quia angulus HBC æqualis est ipsi A in alterna, sectione, & eadem de causa GBA ipsi C; erit quoque angulus D, ipsi A, & angulus E ipsi C æqualis; quare & tertius F ipsi angulo B æqualis erit. In dato ergo circulo &c.

Propo. 3. Proble. 3.

Circā datum circulum triangulum describere dato triangulo æquiangulum.




Sit datum circulus ABC, & triangulum DEF, productoque latere EF in G & H

& H, angulo DEG æqualis fiat ^a ad cen- r 23. 1.
 trum angulus AIC, & angulus BIC an-
 gulo DFH; necnon ad singula puncta
 A, B, C, ducantur ^b tangentes KL, LM, 16. 2.
 MK: eritque triangulum KLM dato
 triangulo DEF æquiangulum. Nam
 quia in quadrilatero AICL anguli ad
 A & C sunt recti reliqui L & AIC c 18. 3.
 duobus rectis sunt pares: si enim ducatur
 LI, duo triangula ALI, CLI habent
 angulos pares ^d quatuor rectis; cū igitur 12. 1.
 duo recti sint ad A & C, reliqui con-
 tinebunt rectos alios duos. Si ergo an-
 guli ALC, AIC, valēt duos rectos, cum
 angulus AIC sit æqualis ipsi DEG, al-
 ter angulus L par erit angulo DEF,
 quandoquidem anguli circa latus DE
 sint, duobus rectis æquales. Eodem mo- e 15. 4.
 do per quadrilaterum BICM ostende-
 tur angulum M esse ipsi DFE æqualem.
 Quare & tertius D, tertio angulo K
 erit æqualis. Circa datum ergo &c.



Propo. 4. Proble. 4.

In dato triangulo circulum describere.



Dati trian-
guli ABC
duo quouis
anguli CBA,
ACB bise-
centur, per
rectas DB,
DC, occur-



rentes in D, à quo pūcto ducātur $\perp$ DE,
DF, DG, singulæ singulis lateribus triā-
guli dati perpendiculares. Nunc verò
quia triangula DBF, DBE, habent sin-
gula ad E, & F, vnum angulum rectum,
& alterum DBF, alteri DBE æqualem,
latus insuper DB commune; erunt et-
iam latera DE, DF equalia; similiter
que ostendetur rectam DG, rectæ DF
æqualem esse. Si igitur centro D, spatio
DF, ducatur circulus FEG, transibit per
puncta E & G, tangetque latera omnia
trianguli dati ABC. In dato ergo trian-
gulo &c.



Proq

Propositio 5. Proble. 5.

Circa datum triangulum circulum describere.



Trianguli dati ABC, duo latera AB, AC, diuidantur bifariam in D & E; ad quę puncta excitatis perpendicularibus coibunt illę, vel intra triangulum, vel in latere ipso, vel extra, vt in figuris ordine apparet. Ducantur in super rectę AF, BF, CF, si omnes, aut aliquę earum ante non sunt ductę. Quia ergo triangulorum ADF, BDF, latera DA DB sunt æqualia, & DF commune, angulique recti ad D; erit basis AF ipsi FB æqualis, pariterque ostendetur FC ipsi FA esse æqualem. Centro ergo F, spatio FA ducetur circulus ACB, qui transibit per puncta

K 5 C & B

C & B. Circa datum ergo triangulus
&c.

Propo. 6. Proble. 6.

In dato circulo quadratum describere.



In dato circulo
ABCD, secet se ad
rectos in centro E
diametri AD, BC,
ducanturque rectæ
AC, AB, CD, DB:
ostendetur ergo omnes has lineas esse
æquales bases triangulorum suorum per
4. 1 & sunt anguli supra illas bases, puta
super AB, æquales, quia æqualia sunt
lateralia EA, EB: cum ergo omnes anguli
ad E sint recti, omnes qui sunt supra
bases erunt semirecti, totus ergo angulus
ABD, & similes, sunt recti: figura ergo
rectilinea ABCD, quadratum est, descriptum
in circulo; quod erat faciendum.




Pro-

Propositio 22. Proble. 20.

Circa datum circulum quadratum describere.

Ductis diametris se secantibus ad rectos in E centro, per earum extrema A, B, C, D, ducantur *a* tangentes FG & similes, eritque figura rectilinea FG HK; in qua rectilineum Ak est parallelogrammum, sunt enim *b* anguli ad A & C recti, ergo latera *c* AG, Ck parallela; similiterque parallele sunt AC, Gk propter angulos ad B & E rectos. Cum ergo




go angulus A Ck rectus sit, erit etiam *d* oppositus A G k rectus: similiterque ostendetur angulos ad F, H, k, rectos esse. Item Gk

æquale est opposito AC, *e* diametro circuli, & omnia alia latera figuræ FK ostendentur diametro circuli æqualia. Sunt ergo omnes anguli recti & latera æqualia in figura Fk, & per consequens est

est quadratum. Circa datum ergo circulum. &c.

Propo. 8. Proble. 8.

In dato quadrato circulum describere.




Dati quadrati AD lateribus AB, AC, bifariam sectis in E & F, per E recta EG parallela ipsi AB, & per F ducatur FH ipsi AC si-

militer parallela; eruntque lateribus quadrati & inter se æquales. Et quia AK parallelogrammum est, erunt latera opposita FK AE dimidium lateris quadrati, æqualia: similiterque ostendetur omnes rectas KE, KF, KG, KH, æquales esse dimidio lateris quadrati, & inter se. Centro ergo K, spatio KE ducetur circulus EF GH tangens omnia latera quadrati. In dato ergo quadrato &c.

Pro-

Propositio .9 Proble. 9.

Circa datum quadratum circulum describere.



In dato quadrato ABCD, ductis diagonibus se secantibus in E, quia trianguli ABC latera AB, AC sunt æqualia, erunt anguli ACB ABC æquales, & semi-recti, cum angulus CAB rectus sit; similiterque ostendetur omnes angulos geminos ad A, B, C, D, esse æquales; quare latera EA EB &c. inter se esse æqualia. Centro ergo E, spatio EA, ducatur circulus ABCD, transiens per omnia puncta extrema quadrati. Circa datum igitur quadratum &c.

Propo. 10. Proble. 10.


Triangulum Isosceles constituere in quo uterque angulus ad basim sit duplum reliqui.

Recta AB secetur in C iuxta II. 2. ita ut rectangulum sub AB BC sit æquale qua-

proinde b rectæ DC, DB æquales, cum b 6. 2.
 pares angulos subtendant. Et quia BD
 posita est ipsi CA æqualis, pares erunt
 rectæ CD, CA. Quare k anguli A &
 CDA æquales. Duplus ergo est angu. k 5. 2.
 lus externus BCD ipsius A, & eiusdem
 dupli quoque anguli sunt CBD, ADB,
 qui ipsi externo BCD æpares ostensi
 sunt. Triangulum ergo Isosceles &c.

Proposi. II. Proble. II.

*In dato circulo Pentagonum æquilaterū
 & equiangulum describere.*



Assumpto triangulo α Isoscele FGH, α 10. α
 cuius anguli G & H dupli sint ipsius F,
 in circulo ABCD, fiat illi æquiangulū, α 2. α
 ACD,


ACD, bifariamque diuidantur anguli
 • 9. 1. $\angle$ ACD, ADC. Iunctis deinde rectis AB,
 BC, CD, DE, EA factum erit quod pro-
 • 26. 3. ponitur. Nam quia anguli ADB, BDC
 sunt pares, pares etiam erunt $\angle$ arcus
 AB, & BC; & eandem ob causam om-
 • 29. 3. nes reliqui arcus sunt equales, & om-
 nes $\angle$ rectæ AB, BC, & c, æquales, quæ
 f 27. 1. pares arcus subtendunt. Sed & angulus
 ABC, $\angle$ angulo BCD & reliquis qua-
 tuor similibus est æqualis, eo quod in
 æqualibus segmentis sint omnes. In da-
 to ergo circulo & c.

Propo. 12. Proble. 12.

*Circa datum circulum pentagonum æ-
quilateram describere.*

In dato circulo ABC notentur quin-
 que puncta A, B, C, D, E, signantia quin-
 que angulos pentagoni æquilateri in
 • 11. 4. circulo $\angle$ descripti, ad quæ puncta ex
 centro F ducantur totidem rectæ FA
 FB & c. rursusque ad earum extrema
 • 11. 11. ducantur tangentes quæ concurrēt $\angle$ in
 angulis G, H, K & c. factumque erit
 quod petitur. Nam quia in quadrilate-
 10

ro BFCk, quatuor anguli quatuor re-
ctis æquivalent, similiterque in quadri-
latero CFDL, & anguli ad B & C recti
sunt, sequitur angulos BKC BFC duo-
bus rectis æquivalere: similiterque an-



gulos CLD
CFD: cum-
que BFC &
CFD sint an-
guli æquales
ob pares ar. 47. 3.
cus BC, CD,
M reliqui BKC
& CLD erūt
æquales; pa-
riq; metho-

do ostendetur angulos reliquos penta-
goni inter se esse æquales. Nunc vero
esse æquilaterum sic ostendo. Ductis
rectis FG, FM erit quadratum ex FG æ-
quale quadratis tam ipsarum AF, AG,
quam ipsarum EF EG, Quare ablati
quadratis equalium AF, EF, quadra-
ta reliquarum AG GE manent æ-
qualia, ac proinde rectæ AG GE sunt
pares. Cumque anguli FAG, FEG &
continentia latera sint æqualia, erunt
trian-

b 26. 1.


triangula AFG GFE iuxta 4. 1. & idcirco anguli AFG, GFE æquales. Eadem methodo ostendetur triangula FEM, MFD esse iuxta 4. 1. ac proinde angulos EFM MFD esse æquales. Quare anguli, EFG, cū sint dimidij æqualiū EFM, erunt inter se pares. Quia ergo in triangulis GFE, EFM, duo anguli circa rectam EF sunt pares, & latus adiacens EF commune est, reliqua latera *b* & anguli erunt æqualia. Æquales sunt ergo rectę GE, & EM, dimidię ipsius GM. Eodem modis ostendetur AG esse dimidiam ipsius GH. Cumque dimidię GA GE ostensę sint æquales erunt & tota latera pentagoni GH, GM æqualia, similiterque de cæteris procedet demonstratio. Ergo &c.

Propos. 13. Proble. 13

In dato pentagono æquilatero & æquiangulo circulum inscribere.

Dati pentagoni ABCDE, anguli duo proximi EAB, ABC bisecentur a per rectas AF, BF, & à puncto F; in quo cōcurrunt, ducantur etiam rectę FC & ceterę

cæteræ ad reliquos angulos. Quia ergo
triangulorum ABF, FBC duo latera BA,
BC æqualia sunt, & BF commune, an-
guli quæ contenti ad B sunt pares; erit ^{bb} 4. 1.
totum toti æquale triangulum; anguli-
que & latera correspondentia æqualia:
pares ergo sunt anguli B A F, B C F.
Cumque anguli BAE BCD ponantur
æquales, sicut BAF est dimidium totius
anguli BAE, ita BCF dimidium erit to-
tius BCD. Hic ergo angulus, & reliqui
in orbem, secti sunt bifariam. Ducantur
deinde FG FH &c. singulæ singulis la-
teribus perpendiculares. Et quia trian-
gulorum GFB, BFH duo anguli FGB,
GBF duobus FHB, FBH sunt pares, &




latus FB com-
mune, æqua-
lia & etiam e- ^{c 26. 1.}
runt latera FG,
FH, & his pa-
ri modo æ-
quales erunt
Fk FL, FM.

Quare centro
F spatio FG ductus circulus transibit
ex puncta H, K, L, M, & sic in penta-
L gono

goni circulus erit descriptus.

Propo. 14. Probl. 14.

*Circa datum pentagonum æquilaterum
& æquiangulum circulum descri-
bere.*



Dati penta-
goni ABCDE,
angulis ABC
BCD sectis bi-
tariam per re-
ctas FB, FC, in
F conuenien-
tes, triangulo-


rum ABF, BFC duo latera BA, BF duo-
bus BC, BF æqualia erunt; & anguli ad
B contenti æquales. Basis ærgo AF ba-
si FC æqualis est; ostendeturque vt in
sup. prop. reliquas FD FE diuidere bi-
tariam angulos reliquos, & omnes esse
lineas inter se æquales. Centro ergo F,
spatio FB ductus circulus transibit per
reliqua puncta C, D, E. Circa datum
ergo &c.



Pro-

Propo, 15. Proble. 15.

*In dato circulo hexagonum equilaterum
& equiangulum inscribere.*



In dato circulo ABCD, cuius centrum G, ducta diametro AD centro D, spatio DG ducatur circulus EGC, secans priorem in punctis E & C,

ductisque per centrum G ad ambitum rectis CF, EB, iungantur rectæ DE, DC &c. eritque triangulum EGD æquilaterum; quare eius omnes anguli erunt inter se pares, & quilibet erit pars tertia duorum rectorum, cui per omnia æquale est triangulum DGC. Iam vero quia recta EG cadens in rectam FC facit æquales duobus rectis, cum anguli EGD, DGC, sint duæ tertiæ duorum rectorum sequitur angulum EGF esse partem tertiam duorum rectorum, & æqualem duobus prioribus angulis; sūt ergo tria triangula EFG, EGD, DGC

L 2 vndi-

e 26. 3.
f 23. 1.

vndique æqualia; & quia anguli FGA , AGB , BGC sunt ad verticem angulis prioribus, omnes sex anguli ad G sunt æquales; quare omnes circumferentiæ AB , & c. sunt æquales, omnesque rectę subtensę. Est ergo hexagonum $ABCDEF$ æquilaterum; quod idem est æquiangulum; nam omnes anguli FED , & similes constant duabus tertijs duorum rectorum, vt ostensum est. In dato ergo & c.

Corollarium.


Hinc manifestum est latus hexagoni æquale esse semidiametro circuli, nam latus DE æquale est semidiametro DG .

Propos. 16. Proble. 16.

In dato circulo quindecagonum æquilaterum, & æquiangulum inscribere.

a 2. 4.

In dato circulo ADC describatur æquilaterum ABC , & pentagonum æquilaterum $ADEFG$, cuius angulus vnus constituatur ad aliquem angulum trianguli puta ad A . Quia ergo AB subtendit tertiam partem circuli



li, si totus circulus in quindecim partes æquales diuisus intelligatur, in arcu AGB erunt ex ijs quinque; & cum AG sit quinta pars, in eo arcu erunt partes tres; duæ ergo erunt in arcu GB; quo diuiso bifariam in H erit BH pars decima quinta circuli totius. Quare ductâ subtensâ GH, si aptentur^b in circulo quatuordecim aliz æquales, incipiendo a puncto B vel H, descriptum erit in circulo quindecagonum æquilaterum: quod etiam erit equiangulum, cum eius anguli omnes subtendant arcus æquales tredecim laterum quindecagoni: nam angulus H ab arcu GH & eius subtensa comprehensus subtendit ar-

L 3 cum

cum $G A D H$ & sic de ceteris angulis si
plura latera quindecagoni ducta essent.
In dato ergo circulo &c.



EVCLI-



EVLIDIS

ELEMENTORVM

LIBER V.

Definitiones.

I. Pars est magnitudo magnitudinis minor maioris, cum minor metitur maiorem. Hoc est, Pars est magnitudo minor è maiore sumpta cum minor aliquoties repetita metitur præcisè, & adæquat maiorem: ut 4. est pars ipsius 12. quia repetendo ter 4. adæquamus 12. Vt in hoc libro plerumque numerorum exemplis sub quibus quantitates continuae, cum opus fuerit possunt intelligi.

Partem quæ metitur totum solemus Aliquotam nominare, eamque hic solam videtur Euclidis definire; solet tamen pars dici etiam ea quæ totum non metitur, & vocari potest Pars Aliquanta. Sic 5. est pars

L 4 ipsius

*ius 12. etiam si præcisè non metiatur ipsam
12. Vtraque pars hac definitione compre-
henderetur.*

*Pars est magnitudo magnitudinis mi-
nor maioris, cum minor repetita maiorem
potest excedere.*

2 Multiplex est magnitudo magnitu-
dinis maior minoris, cum minor meti-
tur maiorem. *Vt 12. est multiplex ipsas
4: quia 4. metitur ipsam 12. Minor vero re-
spectu maioris dicitur Submultiplex. Æ-
quemultiplices denique magnitudines sunt
quæ a suis submultiplicibus pari numero
repetitis adæquantur. Sic 4. ad 2; & 6. ad
3. sunt æquemultiplices, quia sicut 2. bis sump-
tum adæquat 4. ita 3. bis sumptum meti-
tur 6.*

*Vniuersalius. Multiplex est magnitudo
magnitudinis maior minoris, cum minor
repetita maiorem potest excedere. Sic 12.
est multiplex ipsius 5. &c.*

3 Ratio est duarum magnitudinum
eiusdem generis mutua quædam secun-
dum quantitatem habitudo. *Quod Gra-
eci λόγος dicunt, Latini reddunt nunc Ra-
tio, nunc Proportio, & his vocibus utemur
promiscuè. Est ergo ratio seu proportio ha-
bitu-*

bitudo quadam secundum quantitatem duarum magnitudinum eiusdem generis. Non enim conferri possunt linea cum superficie, sed linea cum linea, superficies cum superficie.

Magnitudinum vero qua inter se conferuntur potest una alteram superare excessu qui numeris exprimi potest, ut cum excedit una secunda seu dimidio, una tertia, una quarta, aut simili excessu, cuius habitudo numeris concipi potest: & inter huiusmodi magnitudines est Proportio rationalis. Aut magnitudo magnitudinem superat excessu qui numeris exprimi precise non potest; & inter eas est Proportio irrationalis. Sic inter diametrum & costam seu latus quadrati est proportio irrationalis, quia diameter excedit costam excessu qui neque est una secunda costa, neque una tertia neque in ulla alia comparatione, qua numeris possit exacte definiri; siue ad costam compareretur, siue ad ipsam etiam diametrum. Porro quantitatum inter quas exprimitur proportio qua prior in casu nominandi solet efferri, dicitur antecedens posterior qua subijci solet in alio casu, dicitur consequens. Ut cum dico numerus 4. est

est duplum ipsius 2; vel 4. est duplum ad ipsum 2. Antecedens est 4. consequens 2.

4 Rationem seu proportionem dictur habere inter se magnitudines quæ multiplicatæ possunt se mutuo superare. Nulla est igitur proportio finiti ad infinitum, linea ad superficiem, cum nulla multiplicatione possit superare aut finitum infinitum, aut linea superficiem.

5 In eadem proportionem dicuntur esse magnitudines prima ad secundam & tertia ad quartam, cum primæ & tertiæ æquemultiplicia, à secundæ & quartæ æquemultiplicibus (quæcunque sit ea multiplicatio) alterum ab altero vel vna deficiunt, vel vna equalia, vel vna maiora sunt, si sumantur ut inter se respondent.

Hoc est, si dentur quatuor ordine magnitudines & sumpto quouis æquemultiplici primæ & tertiæ, itemque eodem aut alio æquemultiplici secundæ & quartæ, semper eveniat ut cum multiplex prima superat, æquat, aut non attingit multiplex secunda, multiplex etiam tertia superet, æquet, aut non attingat multiplex quarta, tum demum dices e quatuor illis magnitudinibus

dimibus primam in ea proportionem esse ad secundam in qua est tertia ad quartam.

8 16 12 24 Tales sunt magnitudines
12 12 18 18 ABCD: nam si sumatur du-
8 6 12 9 plum ipsarum A & C, tri-
4 2 6 3 plum vero ipsarum B & D.
A B C D tunc ut multipulum prime
quod est 8 superat multipulum

secunda 6, ita multipulum ipsius C, superat multipulum ipsius D. In sequenti vero ordine in quo sumitur triplum prime & tertiae, sextuplum vero secunda & quarta, multipula sunt pariter aequalia; ac denique in supremo ordine sumpto duplo primae & tertiae, octuplo vero secunda & quarta, sicut multipulum primae minus est multiplo secunda, ita multipulum tertiae multiplo quarta; Neque aliud eveniet in alia ulla multiplicatione. Ex quo colligimus primam ad secundam in eadem esse rationem, in qua est tertia ad quartam.

Ab hoc indicio inbet Euclides investigari an magnitudines in eadem proportionem sint; quod quomodo cum natura intima proportionalium cohereat sic ostendo. Quia ratio seu proportio est magnitudinum secundum quantitatem comparatio; non est aliud

aliud magnitudines in eadem ratione esse,
 quam esse in eadem comparatione seu habi-
 tudine maioris & minoris, totius & partis;
 si nomen partis latius sumatur, ut compre-
 hendamus etiam proportionem irrationali-
 lem. Non potest autem e quatuor magni-
 tudinibus prima eandem habere compara-
 tionem maioris ad secundam minorem,
 quam habet tertia ad quartam; nisi secun-
 da & quarta pari numero multiplicata si-
 militer se habeant ad maiores, quo ad ex-
 cessum & defectum. Si enim exempli gra-
 tia cum secunda B ter repetita non exce-
 dat primam A, quarta tamen D ter ac-
 cepta superet tertiam C, ma-
 nifestum erit D non esse ita
 minus ipso C, sicut B ipso A;
 aut quod idē est, C non esse ita maius ipso D,
 sicut est A ipso B, atque adeo quatuor illas
 magnitudines nō esse in eadē ratione. Itā ve-
 ro perinde est cōferre minores magnitudines
 B & D, ad maiores singulas A & C, atq; ad
 easdem A & C pari numero multiplicatas.
 Nam necesse est quoque similes partes eodē
 modo se habere quo ad excessum & defe-
 ctum ad sua tota aqualiter multiplicata.
 Si enim cum B sexies sumptum, non exce-
 dat

dat *A* bis repetitum, *D* tamē sexies accep-
tum, superet *C* bis repetitum; manifestum
etiam inde erit *B* non esse talem partem ip-
sius *A*, qualis est *D* ipsius *C*, seu quod idē est,
C nō ita esse maius ipso *D*, sicut est *A* ipso *B*.
Id ipsum vero est, quod *Euclides* docet, in-
bet enim maiores magnitudines *A* & *C*
aqualiter multiplicari, seu prima & tertiā
sumi aq̃ue multiples, multiplicari etiam
aqualiter minores, seu partes *B* & *D*; & si
semper eodem modo se habeant in excessu &
defectu ad tota *A* & *C* aqualiter multipli-
cata, rectē colligit, *A* esse in ea ratione ad
B, in qua est *C* ad *D*. Atque hoc sane qui pe-
nitius intellexerit, perinde esse in cōparatio-
ne maioris & minoris, seu in proportionē,
conferre unum ad unum, atque plura ad
plura pari numero multiplicata, magno
compendio veritatem omnium prope theo-
rematum huius elemēti penetrabit, eadem-
que sine longo syllogismorum circuitu resol-
uet statim in prima axiomata, Omne totū
esse aequale omnibus simul suis partibus, &
ē contra omnes parti. . tota aequales esse, alia-
que his affinia pronuntiata. Neque vero te
moneat quod in huius definitionis explica-
tione exemplum adhibuerim numerorum,
in

in quibus semper est proportio rationalis, cum tamen indicium ab Euclide allatum valeat etiam in irrationali; perinde enim fuerit si loco numerorum magnitudines substitutas in proportione seu rationali seu irrationali constitutas: quod idem intelligatur in omnibus exemplis huius elementi.

6 Magnitudines quę in eadem ratione seu proportione sunt Proportionales vocantur. Ut magnitudines A, B, C, D ,
 $4 \quad 2 \quad 6 \quad 3$ sunt proportionales quia binę priores, & binę posteriores $A \quad B \quad C \quad D$ sunt in eadem proportione.

7 Quando æquemultiplicium multiplex primę excesserit multiplicem secundę, & multiplex tertię non excesserit multiplicem quartę; maiorem proportionem tum habet prima ad secundam, quam tertia ad quartam. Paret hæc definitio ex quinta. Neque aliud vult, quam si dicas, maiorem esse proportionem primę ad secundam quam tertię ad quartam, cum inter primam maiorem & secundam minorem maior est inequalitas, quam inter tertiã & quartam. Hoc autem investigari iubet eodem quo in quinta definitione usus est indicio. Si enim cum duplum primę

A.

8 6 12 15 *A* excedat triplum secunda
 4 2 6 5 *B*, duplum tamen tertię *C* nõ
A B C D excedat triplum quarię *D*, sa-
 tis patebit maiorem esse exces-
 sum ipsius *A* supra *B*, quam ipsius *C* supra
D: seu primam *A* maiorem habere ratio-
 nem ad secundam *B*, quam tertiam *C* ad
 quartam *D*.

8 Analogia seu proportionalitas est
 rationum seu proportionum similitu-
 do. Quia Latini *Rationem & Propor-*
tionem pro eodem sumunt, quam Græci *A-*
nalogiam dicunt: nos *Proportionalitatem*
 distinctionis gratia nominabimus. Est er-
 go *Proportionalitas* rationum similitudo.
 Ut similitudo quæ est inter proportionem
 duplam quantitatum 6 & 3, & inter aliam
 duplam quantitatum 4 & 2, dicitur *Pro-*
portionalitas.

9 *Proportionalitas* in tribus minimū
 terminis consistit. Cum enim sit similitu-
 do duarum proportionum, & unaquaque
 proportio sit inter duos terminos, quatuor
 terminos requirit *Proportionalitas*; nisi
 terminus unus bis repetatur: ut cum dico
 sicut 8 ad 4 ita 4 ad 2. Et tunc tres termini
 ad *proportionalitatem* sufficient.

10 Cum

10 Cum tres magnitudines proportionales fuerint, prima ad tertiam duplicatam rationem habere dicitur eius, quam habet ad secundam. *Ut quia proportionales sunt 8, 4, 2, prima 8 ad tertiam 2 dicitur duplicatam habere proportionem eius quam habet ad secundam 4.*

11 Quando vero quatuor fuerint proportionales magnitudines, prima ad quartam triplicatam habet proportionem, & ita deinceps vno amplius, quādiu proportio extiterit.

12 Homologæ dicuntur magnitudines, antecedentes quidem antecedentibus, & consequentes consequentibus. *Ut in quatuor magnitudinibus proportionalibus 6, 3, 4, 2, prima 6 & tertia 4 quæ sunt antecedentes dicuntur homologæ, sicut & consequentes 3 & 2.*

13 Alterna seu permutata proportio est sumptio antecedentis ad antecedentem, & cōsequentis ad consequentem. *de qua agitur prop. 16. ut si est, sicut 6 ad 3 ita 4 ad 2, erit antecedens 6 ad antecedentem 4 ut consequens 3 ad consequentem 2.*

14 Conuerſa ratio est sumptio consequen-

quentis ut antecedentis ad antecedentem & ad consequentem. *De qua prop. 4.*
Ut si est, sicut 6 ad 3, ita 4 ad 2, erit con-
uertendo.

Ut 3 ad 6 ita 2 ad 4.

15 Compositio rationis est sumptio antecedentis cum consequente, velut unius, ad consequentem *De qua prop. 18.*
Ut si est, sicut 6 ad 3 ita 4 ad 2: Erit com-
ponendo.

Ut 9 ad 3 ita 6 ad 2.

16 Divisio rationis est sumptio excessus quo consequentem superat antecedens, ad ipsam consequentem. *De qua prop. 17.*

Ut si est, sicut 9 ad 3 ita 6 ad 2 erit dividendo.

Ut 6 ad 3 ita 4 ad 2.

17 Conuersio rationis est sumptio antecedentis, ad excessum quo antecedens superat consequentem. *De qua propo. 19.*

Ut si est 9 ad 3 sicut 6 ad 2. Erit per con-
uersionem rationis.

Ut 9 ad 6 ita 6 ad 4.

18 Ex æqualitate ratio est, cum fuerint plures magnitudines, & alix ipsis numero æquales, quæ binæ & binæ in

M eadem

eadem ratione sumantur, fueritque ut in prioribus prima ad ultimam; ita etiā in posterioribus. Vel est sūptio extremarum per subtractionem mediarum. Ut si sint plures magnitudines *A, B, C, & alia totidem D, E, F, bina & bina bina in eadem ratione, hoc est ut A ad B ita D ad E, & ut B ad C, ita E ad F; erit ex aequo in prioribus A ad ultimam C, ita etiam in posterioribus prima D, ad F.*

$$\left\{ \begin{array}{ccc|ccc} A & B & C & D & E & F \\ 12 & 6 & 3 & 8 & 4 & 2 \end{array} \right\}$$

Ex aequo 12 ad 3 8 ad 2.

19 Ordinata proportio est cum fuerit ut antecedens ad consequentem, ita antecedens ad cōsequentem, fuerit etiā ut consequens ad aliam quampiam, ita consequens ad aliam quampiam.

Dupliciter institui potest proportio ex aequalitate uno modo quando tam in prioribus quam in posterioribus comparantur prima cum secunda, & secunda cum tertia: & hac est ordinata proportio qua hic definitur & de qua agitur prop. 22: eiusque exemplum positum est def. 18. Altero modo

ita sit proportio ex aqno, cum ordo perturbatur in posterioribus, ut apparebit definitione sequenti.

19 Perturbata proportio est cum tribus existentibus magnitudinibus & totidem alijs, fuerit ut in prioribus antecedens ad consequentem, ita etiam in posterioribus: ut autem in prioribus consequens ad aliam quamplam, ita in posterioribus alia quapiam ad antecedentem.

Ut si sit quemadmodum in prioribus *A* ad *B*, ita in posterioribus *E* ad *F*, ut vero in prioribus *B* consequens ad aliam quamplam *C*, ita in posterioribus alia quapiam *D* ad antecedentem *E*, erit hac perturbata proportio. de qua agitur prop. 21. & 23.

$$\left\{ \begin{array}{ccc|ccc} A & B & C & D & E & F \\ 12 & 8 & 4 & 12 & 6 & 4 \end{array} \right\}$$

Ex aqno 12 4 12 4.

Lubet ad extremum breui schemate ponere sub oculos omnes hasce proportionum formas quas animo firmiter comprehendisse plurimum tyronibus proderit.

M 2 Quia

Quia est ut 9 ad 3 ita 6 ad 2
Erit etiam,

Permutando	}	9	}	6	}	3	}	2			
Conuertendo		3		9		1		6			
Componendo		12		ad		3		ita	3	ad	2
Dividendo		6		3		1		2	2		
Per Con.rat											4

Proportio ex æquo.

Ordinata.

Perturbata.

{	A	B	C		D	E	F		A	B	C		D	E	F	}
{	12	6	3		8	4	2		12	8	4		12	6	4	}

Ex æquo 12 ad 3 8 ad 2 12 ad 4 12 ad 4

Neque vero difficile est aduertere ex ipsis numeris in omnibus hisce ordinibus quatuor magnitudines esse proportionales, seu minores quantitates esse similes maiorum partes: Nam in permutata sicut 6 est pars subsesquialtera ipsius 9, ita 2 ipsius 3. Sem quod idem est, sicut 6 semel continetur in 9 & supersunt 3 pars dimidia ipsius 6, ita 2 semel continetur in 3, & superest 1. pars dimidia ipsius 2. Idem in reliquis ordinibus deprehendes.



Pro-

Propositiones.

Propos. 1. Theore. 1.

*Si fuerint quotcunque magnitudines
quotcunque magnitudinum numero
equalium æquemultiplices singula
singularum; quam multiplex est una
vnius, tam multiplices erunt omnes
omnium.*

E 10 5 F



Hoc est, Æquemultiplicium magnitudinum quam multiplices sunt singula singularum, tam multiplices sunt omnes omnium.

Ut quia æquemultiplices sunt A ad B, C ad D; si A & C colligantur in E, similiterque B & D colligantur in F, quam multiplex erat A ipsius B, tam multiplex erit E ipsius F.

Non enim maiora aut minora sunt tota quam suæ omnes partes: non potest proinde totum E pluries vel pauciore numero continere totum F, quæ A & C partes omnes totius E, continerent B & D partes omnes totius F.

M 3


Pro

Propositio 2. Theore. 2.

*Si prima secunda fuerit ita multiplex ut
 tertia quarta, fuerit autem & quinta
 multiplex secunda ut sexta quarta; e-
 rit composita ex prima & quinta se-
 cunda ita multiplex, ut tertia & sex-
 ta prima.*

Sit prima A ita multiplex secundæ
 B, sicut tertia C quartæ D: quinta vero
 E ita multiplex secundæ B, ut sexta F
 quartæ D. Dico compositam ex prima

G 15 H 10



A & quinta E hoc est G, ita multipli-
 cem fore secundæ B, sicut composita
 ex tertia & sexta hoc est H, multiplex
 est quartæ D.

Nam quia B & D secunda & quarta,
 continetur pari numero in singulis suis
 multiplicibus, continebuntur quoque

pa-

¶ pari numero in multiplicibus colle-
ctis hoc est in G, & H.

Propo. 3. Theore. 3.

*Si prima secunda ita est multiplex ut
tertia quarta, & prima ac tertia su-
mantur æquemultiplices; erit multi-
plex prima tam multiplex secunda,
quam multiplex est multiplex tertia
ad quartam*

Vt quia A continet B, sicut C ipsam
D; si sumantur E & F æquemultiplices
ipsarum A & C, B continebitur toties
in E, quoties D in F.

E 8 F 12 Nam sumere multipla ip-
sarum A & C non est aliud
4 2 6 3 quam sumere plures A & C;
A B C D Sicut ergo B & D equaliter
continebantur in singulis A & C, con-
tinebuntur etiam æqualiter in iisdem
A & C pari numero multiplicatis in E
& F.



Propositio 4. Theore. 4.

Si prima ad secundam eam proportionem habuerit quam tertia ad quartā; habebunt quoque eandem rationem æquemultiplices primæ & tertie ad æquemultiplices secundæ & quartæ iuxta quamvis multiplicationem, si sumantur ut inter se respondent.

E F G H Vt si A habuerit eam proportionem ad secundam B; quā habet tertia C ad quartam D; sumptis E & G æquemultiplicibus ipsarum A & C, itemque F & H ipsdem vel alijs æquemultiplicibus ipsarum B & D: erit E multiplex ipsius A, ad F multiplicem ipsius B, sicut G multiplex tertię C, ad H multiplicem quartę D. Nam, vt explicuimus ad def. 5, in ratione maioris & minoris, siue in proportionē, perinde est conferre singulas B & D, ad singulas A & C, atque B & D æqualiter multiplicatas, ad A & C pari inter se numero multiplicatas. Si ergo singulæ A & G, ad singulas B & D eodem modo se

de se habent, eędem A & C æqualiter multiplicatę in E & G, erunt etiā in eadem ratione ad B & D æqualiter multiplicatas in F & H.



Longiore circuitu idem alij sic concludunt : Sit prima A ad secundam B sicut tertia C ad quartam D. Sumptis deinde E & F, ipsarum A & C æquemultiplicibus & G & H æquemultiplicibus ipsarum B & D. Dico fore etiā E multiplicem primę A, ad G multiplicem secundę B, vt est F multiplex tertię C, ad H multiplicem quartę D. Accipiantur enim K & L ipsarum E, F, & M, N ipsarum G, H æquemultiplices. Tunc vero quia æquemultiplex est E ipsius A vt F ipsius C, accept-

187

teq; sūt ipsarū EF æquemultiplices KL,
ita ergo multiplex est k ipsius A sicut
L ipsius C. Eadē de causa ita multiplex
est M ipsius B, vt N ipsius D. Et quia est
vt Aad B ita Cad D, acceptæq; sunt ip-
sarū A, C æquemultiplices K, L, ipsarū
vero B, D alia quęcunque M, N: ergo si
k b superat M, superabit & L ipsam N,
& si æqualis, æqualis; & si minor, mi-
nor: suntque K, L ipsarum E, F æque-
multiplices, M vero & N ipsarum G, H.
Est ergo vt E ad G ita F ad H. Si ergo
prima ad secundam &c.

f. def. 3.3.

Hac inquam forma demonstrandi per assumptas aequemultiplices in sequentibus quoque propositionibus potest adhiberi, in quibus ego utar compendio. Nam definitione quinta rite percepta facile assequatur earum propositionum veritatem absque longo illo ambitu aequemultiplicium. Quod semel hoc loco monuisse sit satis.

Corollarium.

4 2 6 3 *Ex hac propositione demō-*
A B C D *strari potest Propositio cōver-*
sa, quæ tamen exterminis sa-
tis est evidens. Nam si A est ita minus ipso
B. si.

B, sicut C ipso D; satis est evidens B ita minus fore ipso A, sicut D minus est ipso C, quæ sunt unum & idem. Neque aliud est proportio conuersa.

Propo. 5. Theore. 5.

Si magnitudo magnitudinis ita multiplex fuerit ut ablata ablata; reliqua reliqua ita multiplex erit, ut tota totius.

Vt quia A ita multiplex est ipfius B, sicut ablata C, ablatæ D; erit residua E, E 4 F 2 residuæ F ita multiplex, ut tota A totius B. Si enim cū C 8 D 4 A sit duplum ipfius B, & A 12 B 6 pars ablata D, dupla fimiliter partis ablatæ D, non effet residua E duplex residuæ F, non continerentur, omnes partes totius B, in omnibus partibus totius A, sicut totum in toto; quod absurdum est. Erit ergo residua residuæ ita multiplex, ut tota totius.



Propo. 6. Theore. 6.

Si duæ magnitudines duarum magnitudinum æquemultiplices fuerint, & ablata quadam earundem æquemultiplices, erunt reliquæ ijsdem vel æquales vel æquemultiplices.

G 2	H 3		G 8	H 12
E 10	F 15		E 4	F 6
A 12	B 18		A 12	B 18
C 2	D 3		C 2	D 3

Vt quia duæ magnitudines A, B, duarum C, D, sunt æquemultiplices, si auferantur ex A, B quævis æquemultiplices earundem C, D, puta E & F; residuæ G & H erunt ijsdem C & D aut æquales, aut æquemultiplices. Cum enim C & D æqualiter contineantur in totis A & B, & in eorum aliquibus partibus E & F, æqualiter quoque continebuntur in reliquis G & H. Quare reliquæ G & H aut ijsdem C, D, sunt æquales, aut æquemultiplices. In priore exemplo sunt G, H æquales ipsis C, D, in posteriore æquemultiplices.

Pro.

Propo. 7. Theore. 7.

Æquales ad eandem magnitudinem, & eadem ad æquales eandem habent proportionem.

4 4 2 Vt si A & B sint æquales
A B C magnitudines, quæritur propor-
tio vnius, puta ipsius A, ad C;
eadem erit alterius B ad eandem C. Itẽ
quam proportionem habet C, ad A;
eãdem habet ad B & qualem ipsi A; quod
manifestum est ex terminis.

Propositio .8 Theor. 8.

Inæqualium magnitudinum maior ad eandem, maiorem habet rationem quam minor. Et eadem ad minorem, maiorem habet rationem quam ad maiorem magnitudinem.

6 4 2 Vt duarum magnitudinum
A B C A & B, A maior rationem ha-
bet maiorem ad C, quam ha-
beat B maior ad eandem C: maior enim
proportio est, vbi maior est excessus se-
cundum quãtitatẽ. Insuper maiorẽ
rationem habet A ad minorem magni-
tudi-

tudinem B. ob eandem causam.

Propositio 9. Theor. 9.

Quae ad eandem eandem habent rationem, aequales sunt magnitudines. Itē ad quas una eadem habet rationem, sunt aequales.

4 4 2 Vt quia A & B eandem ha-
A B C bent rationem ad C, sunt in-
ter se æquales. Itē quia mag-
nitude C eandem habet proportionem
ad A & B necesse est ipsas A & B inter
se æquales esse. *Est conuersa prop. 7. &
per se euident.*

Propo. 10. Theor. 10.

*Magnitudinum habentium proportio-
nem ad eandem, quae maiorem ha-
bet, ea maior est. Cum vero eandem
ad duas habet rationem, ea ad quam
maior est ratio, est minor.*

6 4 2 | 6 2 4 Vt si A maiorem
A B C | D E F habet rationem ad C
quam B ad eandem C,
A maior erit quam B. Item si D habet
maio-

maiolem rationem ad E quam ad F, E
 minor est quam F. *Conuersa est prop. 8.*
& per se manifesta.

Proposi. 11. Theor. 11.

*Quæ eidem eadem sunt proportionēs, &
 inter se sunt eadem.*

$$\begin{array}{c|c|c} 4 & 2 & 4 & 2 \\ A & B & E & F \end{array} \quad \begin{array}{c|c|c} 4 & 2 & 4 & 2 \\ C & D & E & F \end{array}$$
 Vt si proportio-
 nes ipsarum A, B,
 & ipsarum C, D sint
 eadem vni tertiæ ipsarum E, F, erunt e-
 tiam eadem inter se.

Propo. 12. Theor. 12.

*Si quocunque magnitudines proportio-
 nales fuerint, erit ut una anteceden-
 tium ad vnā consequentium, ita
 omnes antecedentes ad omnes conse-
 quentes.*


Vt si est A ad B sicut C ad D, erit E,
 hoc est omnes simul antecedentes, ad F
 omnes simul consequentes, sicut A ad
 B vel C ad D. Cum enim tota E & F sint
 diuisa in totidem partes, E quidem in
 A & C, F vero in B & D, quæ singulæ
 ad singulas eandem habent rationem;
 non

tera maior erit: ut si sunt duæ rationes eadem inter AB & CD, sit autem maior ratio inter C, D quam inter E, F; erit quoque maior ratio inter AB quàm inter EF: quod ex terminis notum est.

Propo, 14. Theore 14.

Si prima ad secundam eam habuerit rationem quam tertia ad quartam sit autem prima magnitudo maior quàm tertia, secunda quoque maior erit quàm quarta; si minor, minor; si æqualis, æqualis.

6 3 4 2 Ut si fuerit A ad B sicut
A B C D C ad D, & A minor sit quàm
C; maior quoque erit B
quam D. Cum enim B & D totorum
A & C ponantur esse partes similes, si B
sit pars maioris A C vero minoris D,
necessariò B maior erit quam D. Quod
si totum A, toti C, aut æquale esset aut
minus, talis etiam foret pars B, respec-
tu partis D, ut satis constat



N

Pro.

Propositio 15. Theore. 15.

Partes cum pariter multiplicibus eandē proportionē habent, si sumātur ut sibi respondent.

12 4 6 2

A B C D

Hoc est. Partes parinūmero contentæ in suis totis, eandem seruant inter se rationem ac tota ipsa. Vt magnitudines B & D quæ sunt eodem numero in totis A & C, eandem inter se habent rationem quam tota A & C. Nam si tota resoluantur in omnes partes similes ipsis B & D, tunc quæ erit ratio cuiuslibet ad quamlibet, eadem erit ratio omnium ad omnes, seu totius ad totū.

• 4. 3.

Propo. 16. Theore. 16.

Si quatuor magnitudines proportionales fuerint, etiam permutata proportionales erunt.

E F G H

18 9 8 4

6 3 4 2

A B C D

Vt si est A ad B sicut C ad D, erit etiam permutando ut A ad C, ita B ad D, quæ est alterna seu permutata proportio. Sumptis enim E, F, ipsis

sarum

farum A, B, & G, H, ipsarum C, D, quibuscunque æquemultiplicibus, erunt multiplices EF, GH, in eadem ratione cum submultiplicibus A, B, C, D. Quare EF, GH erunt proportionales, ac proinde si E maior, minor, aut par sit ipsi G, talis quoque erit F ad H. Sed E, F, ipsarum A, B, & GH ipsarum C, D sunt utcunque æquemultiplices. Est ergo ut A ad C, ita B ad D.

Propos. 17. Theor. 17.

Si compositæ magnitudines proportionales fuerint, & diuisæ proportionales erunt.

$$\begin{array}{c} A \quad 8 \quad C \quad 4 \quad B \\ \hline D \quad 6 \quad F \quad 3 \quad E \end{array}$$

Sint compositæ magnitudines AB, CB, DE, FE proportionales, hoc est, ut AB ad CB, ita DE ad FE; Dico fore etiam diuidendo, ut AC ad CB, ita DF ad FE. Quia enim CB est talis pars totius AB, qualis FE totius DE, erit CB ad reliquas partes AC, sicut FE ad reliquas compar-

$$\begin{array}{ccc} A & 8 & C & 4 & B \\ \hline D & 6 & F & 3 & E \end{array}$$

tes AC, sicut FE ad reli-
quas compartes DF. Nō
enim possunt esse similes
partes respectu totorum,
nisi etiam sint similes respectu suarum
compartium, vt satis manifestum est.

Corollarium.

*Ex his demonstrari potest proportio ex
conuersione rationis: Nam in eodem exem-
plo, est*

Vt AB ad CB ita DF ad FE.
Et diuid. Vt AC ad CB ita DF ad FE.
Et conue. Vt CB ad AC ita FE ad DF.
Ergo cōp. Vt AB ad AC ita DE ad DF.
*Qua postrema est conuersio rationis iuxta
definitionem 16. 5.*

Propo. 18. Theore. 18.

*Si diuise magnitudines proportionales
fuerint, & composita proportiona-
les erunt.*

Hoc est, in superiore exemplo si par-
tes CB, FE similiter se habeant ad reli-
quas compartes AC & DF; similiter
quoque se habebunt ad tota AB & DE.
Est conuersa precedentis.

Pro-

Propos. 19. Theore. 19.

Si fuerit ut tota ad totam, ita ablata ad ablatam, & reliqua ad reliquam erit ut tota ad totam.

E 4 F 2 Vt si ablatæ C & D sint
C 8 D 4 inter se in ea ratione, qua
A 12 B 6 totæ A & B, erunt etiam
residuæ E & F, ut totæ A
& B. Cum enim ablata C
ita maior sit ablatâ D, ut tota A, totâ
B; si E residua non esset eodem modo
maior residuâ F, aliter essent maiores
omnes partes omnibus partibus, quam
totum toto: quod fieri non potest.

Propos. 20. Theore. 20.

Si fuerint tres magnitudines, & aliæ totidem, binæ & binæ in eadem ratione, ex equo autem prima maior fuerit quam tertia; erit & quarta maior quam sexta, & si æqualis, æqualis; si minor, minor.

Sint tres magnitudines A, B, C, & totidem aliæ D, E, F, binę & binę in eadē ratione, hoc est ut A ad B, ita D ad E, &

N 3 ut

12 9 6 8 6 4 vt B ad C ita E ad

A B C D E F F. Dico si A maior, minor, aut par

sit ipsi C, talem etiam fore D respectu ipsius F. Sit primum A maior quam C: Quia ergo A maior est quam C, & datur alia quedam B, habebit A ad B, maiorem rationem quam C, ad eandem B. Est autem expositis vt A ad B, sic D ad E & vt B ad C ita E ad F: ergo conuertendo, est vt C ad B ita F ad E; quare D ad E maiorem habet rationem quam F ad E; maior ergo est D quam F. Similiter procedet demonstratio si A ipsi C aut equalis ponatur, aut minor. Si ergo fuerint tres magnitudines &c.

12 9 6 3 | 8 6 4 2 Neque tantum
vera est propo-

A B C G | D E F H tio si ternæ magnitudines suman-

tur, sed etiam si quaternæ & quouis alio numero; semper enim si prima in prioribus minor, maior, aut equalis est vltimæ, ita etiam erit in posterioribus. Vt si ternis magnitudinibus ABC, & DEF addantur G & H, sitque C ad G, sicut F ad H, tunc omissis B & E erunt ACG, & DEF

& DFH ternæ & ternæ magnitudines,
& de his procedet demonstratio prius
facta.

Propo. 21. Theore. 21.

*Si fuerint tres magnitudines, & alia
totidem, binæ & binæ in eadem
sed perturbata ratione, ex aquo autē
prima maior fuerit quam tertia, erit
etiam quarta maior quam sexta: si
minor, minor; si æqualis, æqualis.*

Sint tres magnitudines A, B, C, & to-
tidem alię D, E, F, binæ & binæ in eadē,
sed perturbata ratione; hoc est vt A ad
B, sic E ad F & vt B ad C, sic D ad E. Di-
co, si A maior sit, minor, aut æqualis ip-
si C, talem quoque fore D respectu ip-
sius F. Sit prima A maior ipsa C. Cum
igitur A sit maior quam C, & detur a-
lia quędam B, habebit A ad B maio- a. s. s.

12 8 4 12 6 4 rem rationem quā
A B C D E F C ad eandem B;
sed ex positis vt A
ad B, ita est E ad F,
& vt B ad C ita E ad F, ergo conuertē-
do vt C ad B, ita E ad D: quare E ad F

N 4 ma-

4 13. 5.
6 10. 5.

maiolem habet rationem, quam b E ad
D. Minor est ergo F quam D. Simili-
ter ostendetur si A minor sit, aut æqua-
lis ipsi C, talem quoque fore D respectu
ipsius F. Si ergo fuerint tres magnitudi-
nes &c.

Propositio 22. Theor. 22.

*Si fuerint quotcunque magnitudines, &
aliæ totidem binæ & binæ in eadem
ratione sumantur, erunt quoque ex
æquo in eadem ratione.*

12 9 6 8 6 4 Sint quotcunq;
A B C D E F magnitudines, AB
C, & aliæ totidem
DEF in eadem ratione; hoc est ut A ad
B, ita D ad E, & ut B ad C, ita E ad F.
Dico ex æquali fore illas in eadem ra-
tione: hoc est, fore A ad C, sicut D ad
F. Quia enim ostensum est si A superat
C, D quoque superare F, & si minus,
minus &c. ita quoque^a erit in æque-
multiplicibus: hoc autem est quatuor
magnitudines A, C, D, F, esse propor-
tionales.

^a def. 5. 5.

Pro-

Propo. 23. Theore. 23.

Si fuerint tres magnitudines, & alia totidem binæ & binæ in eadem sed perturbata ratione, erunt etiam ex æquo in eadem ratione.

12 8 4 12 6 4 Repetatur pro-
A B C D E F po. 21. cum ex-
 emplo, in quo
cum probatū sit, si A superat C, D quo-
que superare F, aut minus esse, &c. ita
quoque erit in æquemultiplicibus.
Quare est ex æquo ut A ad C, ita D ad F.

Propositio 24. Theore. 24.


Si prima ad secundam fuerit ut tertia ad quartam, quinta autem ad secundam eam habeat rationem quam sexta ad quartam, habebit composita ex prima & quinta eam proportionem ad secundam, quam tertia & sexta simul ad quartam.

10 4 2 6 3 15 Quia enim se-
E A B C D F cunda B est talis
 pars singularum
A & E primæ & quintæ, qualis est quar-
ta

ta D singularum C & F, erit quoque B talis pars collectarum A & E, qualis est D collectarum C & F.

Propo. 25. Theore. 25.

Siquatuor magnitudines proportionales fuerint, maxima cum minima duabus reliquis erunt maiores.



Sint quatuor magnitudines proportionales AB, CD, E, & F. Dico AB maximam; cum minima F, maiores esse duabus simul reliquis CD & E. Sumatur enim AG equalis ipsi E, & CH ipsi F. Quia ergo est ut AB ad CD ita E ad

F, estque AG ipsi E, & CH ipsi F æqualis, erit ut AB ad CD, ita AG ad CH; hoc est ut tota AB ad totam CD, ita ablata AG ad ablatam CH: reliqua igitur GB erit ad reliquam DH ut tota ad totam: est autem AB maior quam CD

CD, ergo maior quoque BG quam DH. Cumq; AG ipsi E, & CH ipsi F æqualis sit; pares erunt AG & F, ipsis CH & E. Iam vero quia ipsis AG & F additur GB, ipsis vero CH & E additur DH minus quam GB, erunt post additionem AB & F maiores, quam CD & E. Si, igitur quatuor magnitudines &c.

Quæ sequuntur propositiones non sunt Euclidis, sed ex Pappo Alexandrino, & alijs adiecta.

Proposi. 26. Theor. 26.

Si prima ad secundam maiorem habuerit rationem quam tertia ad quartam, habebit conuertendo secunda ad primam minorem rationem, quam quarta ad tertiam.

8 4 5 3 Hoc est si A est totum
A B C D maius respectu ipsius B,
 quam C respectu quartæ
D: erit B minor pars respectu ipsius A,
quam D respectu ipsius C. quod per
se est euidens.

Pro-

Propositio 27. Theor. 27.

Si prima ad secundam maiorem rationem habuerit, quam tertia ad quartam; habebit permutando prima ad tertiam maiorem rationem, quam secunda ad quartam.

8 4 5 3 Quia enim D ponitur pars maior totius C, quā B totius A; non potest pars B supra partem D, tantum excessum habere, quantum habet totū A supra totum C.

Propo. 28. Theor. 28.

Si prima ad secundam maiorem habuerit rationem, quam tertia ad quartā, habebit prima cum secunda maiorem rationem ad secundam, quam tertia & quarta ad quartam.



Nam quia B est minor pars ipsius A, quā D ipsius C; si vtraque semel addatur, tam B ipsi A, quam D ipsi C, adhuc B minor pars e-
rit

rit totius E, quam D totius F.

Propo. 29. Theor. 29.

Si prima & secunda ad secundam maiorem habeant rationem, quam tertia & quarta ad quartam; habebit etiam diuidendo prima ad secundam maiorem rationem, quam tertia ad quartam.

Nam in exemplo superiore. Quia E est maius totum respectu partis B, quā F respectu ipsius D, si ytraque pars ex suo toto tollatur, A residuum ex E, maius erit respectu ipsius B, quam C residuum ex F, respectu ipsius D.

Propo. 30. Theor. 30.

Si prima & secunda ad secundam maiorem proportionem habeāt, quam tertia & quarta ad quartam, habebunt per conuerſionem rationis prima & secunda ad primam minorem rationem, quam tertia & quarta ad tertiā.

Nam si totum E maius est respectu ipsius B, quam F respectu ipsius D: B
minor

minor erit pars ipsius E, quam D totius F. Quare residuum A maior erit pars totius E, quam residuum C totius F. Hoc autem idem est ac si dicas totum E minorem habere rationem ad primam A, quam totum F ad tertiam C.

Propo. 31. Thore. 31.

Si sint tres magnitudines, & totidem alia, habeatque prima priorum maiorem rationem ad secundam, quam prima posteriorum ad secundam, secunda item priorum maiorem habeat ad tertiam, quam in posterioribus secunda ad tertiam, etiam ex aequo habebit prima priorum maiorem rationem ad tertiam, quam prima posteriorum ad tertiam.

16 8 4 9 5 3

A B C D E F

Nam si magnitudines illæ sint ABC, DEF, permutando eas proportionem quæ in propositione ponuntur,

Erit

Erit maior A ad D quā B ad E.
 Et eadē ratione maior B ad E quā C ad F.
 Quare multo maior A ad D quā C ad E.
 Ergo permut. maior A ad C quā D ad F.

Propositi. 32. Theore. 32.

Si sint tres magnitudines, & totidem alia, sitque maior proportio prima priorum ad secundam, quam secunda posteriorum ad tertiam: Item secunda priorum ad tertiam, maior quam prima posteriorum ad secundam: erit etiā ex aequo maior ratio prima priorum ad tertiam, quam prima posteriorum ad tertiam.

16 8 4 9 6 4 6 9 Sint illę
 A B C D E F G H magnitudi
 nes A, B, C
 D, E, F, sitq; præterea ut G ad C ita D ad
 E, & ut H ad G, ita E ad F, collocabun-
 turque ternę & ternę magnitudines D,
 E, F; H, G, C, in eadem sed perturbata
 ratione; eritque ex æquo ut D ad F ita
 H ad C. 20. 3.

Nunc vero quia est ut G ad C, ita D
 ad E

6 ex hyp.

ad E maior erit ratio ipsius B ad C, quam G ad C, ideoque B maior est quā G, & per consequens maior ratio est ipsius A ad G quam ad B: est autem A ad B, maior quam E ad F, multo ergo maior est A ad G, quam E ad F. Rursus quia est H ad G, vt E ad F, maior erit A ad G quam H ad G; quare A maior est quam H, & per consequens maior est A ad C, quam H ad eandem C. Sed ostensum fuit esse vt H ad C, ita D ad F, maior est ergo ratio ipsius A ad C, quā ipsius D ad F: quod est propositum.

Propō. 33. Theor. 33.

Si tota ad totā maiorem rationē habuerit, quā ablata ad ablatam, habebit & reliqua ad reliquam maiorem rationem quā tota ad totam.

E 8 F 3 Vt si totum A ad totū
C 4 D 3 B maiorem habeat ratio-
A 12 B 6 nem, quam ablatum C,
ad ablatum D; maiorem
habebit residuum E ad residuum F, quā
totum A, ad totum B. Nam sicut totū
A est maius toto B, ita omnes simul
partes

partes, omnibus partibus. Quia ergo pars C minus superat partem D, quam totum A totum B; residua pars E debet magis superare residuam F, quam totum A totum B, ut excessu maiore ipsius E compensante defectum ipsius C, partes C & E ita sint maiores partibus D & F; sicut totum A maius est toto B.

Proposi. 34. Theore. 34.

Si sint quotcunque magnitudines, & alia totidem, sitque maior ratio prima priorum ad primam posteriorum, quā secunda ad secundam, & haec maior quam tertia ad tertiam, & sic deinceps: habebunt omnes simul priores, ad omnes simul posteriores, maiorem rationem, quam omnes priores relicta prima ad posteriores omnes prima similiter relicta; minorem autem quā prima priorum ad primam posteriorum; maiorem tamen quam ultima priorum ad ultimam posteriorum.

12 8 4 6 5 3 Sint quotcun-
A B C D E F que magnitudines
 O A B C,

ABC, & alia totidem DEF, ita se habentes vt proponitur.

Quia ergo maior est A ad D quam B ad E.
Erit permuta. maior A ad B quam D ad E.
Et componen. maior AB ad B quam DE ad E.
Et permuta. maior AB ad DE quam B ad E.

Quia ergo maior est tota AB ad totam DE, quam ablata B ad ablatam E, maior erit & reliqua A ad reliquam D, quam tota AB ad totam DE.

§ 32. 5.

Eadē ratione maior erit B ad E quā tota BC ad tota EF.
Multo ergo maior est A ad D quam BC ad EF.
Et permutat. maior A ad BC quam D ad EF.
Et compo. maior ABC ad BC quā DEF ad EF.
Et permuta. maior ABC ad DEF quā BC ad EF.
quod erat primo loco propositum.

Nunc vero quia maior est tota ABC, ad totam DEF, quam ablata BC ad ablatam EF, erit & maior reliqua A ad reliquam D, quam tota ABC ad totam DEF; quod erat secundum.

§ 32. 5.

Denique quia maior est B ad E quam C ad F.
Erit permuta. maior B ad C quam E ad F.
Et compo. maior BC ad C quā EF ad F.
Et permutat. maior BC ad EF quam C ad F.
Ostēsa est autē ma. ABC ad DEF quā BC ad EF.
Multo ergo maior est ABC ad DEF quā C ad F.
Quod erat tertio loco propositum.

Eadem methodo procedetur si quaterne proponantur magnitudines, aut alia plures quocunque numero.

EVCLID.




EVCLIDIS ELEMENTORVM

LIBER VI.

Definitiones.

1 Similes figuræ rectilineæ sunt, quæ singulos angulos singulis æquales habent, & latera circa æquales angulos proportionalia.




Ut trian-
gula ABC ,
 DEF , erunt
similia, si sin-
gulos angulos
singulis habeant

pares, hoc est si angulus A , angulo D , an-
guli vero B & C , angulis E , & F sint æ-
quales; item si latera circa æquales angu-
los sint proportionalia, hoc est si sit ut AB
ad AC , ita DE ad DF ; & ut AB ad
 BC , ita DE , ad EF ; ac denique ut AC ad

O 2 CB

CB, ita DF ad FE.

2 Reciproca figure sunt cum in vtraque figura antecedentes & consequentes termini rationum fuerint.



Hoc est figura reciproca sunt cum in una figura reperitur antecedēs unius

proportionis, cuius consequens est in secunda; & cum è contra antecedens alterius similis proportionis est in secunda figura, cuius consequens est in prima; ut triangula ABC, DEF, erunt reciproca, si fuerit ut AB, ad DF; ita DE, ad AC, tunc enim antecedens prima proportionis reperitur in triangulo primo ABC & in altero est consequens; at secunda proportionis antecedēs est in secundo triangulo, consequens in primo.


3 Extrema ac media ratione recta lineae secta esse dicetur, cum est ut tota ad ad maius segmentum, ita maius segmentum ad minus.



Sic recta AB, erit secta in C, extrema

trema ac media ratione, si fuerit ut tota AB ad maius segmentum AC , ita AC maius segmentum ad CB minus.

4 Altitudo cuiusque figuræ est linea perpendicularis à vertice ad basim deducta.



Ut trianguli ABC altitudo est AD , ducta perpendiculariter a vertice ad

basim BC . Item trianguli EFG , altitudo est EH , extra triagulum cadens in basim FG , productam in H .

5 Ratio ex rationibus componi dicitur, cum rationum quantitates inter se multiplicatæ aliquam rationem effecerint.

Quantitates rationum non sunt alia quam numeri à quibus denominatur proportio: sic 3. est quantitas proportionis triplæ, 2. dupla, &c. Ratio ergo ex rationibus componitur, cum denominatores proportionum inter se multiplicati aliquam proportionem efficiunt; ut ex ratione dupla & tripla componitur sextupla; nam denominator dupla quæ est 2. & denominator tri-


0 3 pla

plē qui est 3. inter se multiplicati faciunt 6
denominatorē proportionis sextupla cō-
posita.

Propositiones.

Proposi. i. Theor. i.

*Triangula & parallelogramma, quorū
eadem sit altitudo, habent se ut bases.*



Sint triangula
ABC, ACD, ha-
bentia eandem al-
titudinem AC, i-
tem parallelogrā-
ma EC, CF, ha-
bentia eandem altitudinem AC. Dico
illa inter se habere proportionem quā
habent bases BC, & CD. Cum enim
triangula sint constructa intra paralle-
lelas BD, EF, (sicut possunt constitui
inter parallelas quæcunque alia trian-
gula eiusdem altitudinis) si bases CB,
& CD, sint æquales, erunt & triangu-
la super illis basibus æqualia. Quod si
basis CB, maior esset, aut minor basi
CD, esset quoque triangulum ABC,
maius

naius aut minus triangulo ACD ; & sic quoque erit sumptis æquemultiplicibus tam basium quam triangulorum; tam perinde est conferre singula ad singula, atque pariter multiplicata ad pariter multiplicata, quemadmodum definit. 5. lib. 5. explicatum est. Sunt ergo triangula ABC , ACD , inter se ut bases CB , & CD .

Iam vero si triangula sint ut bases, etiam parallelograma: ^b nam hæc sunt ^{14. 2.} lupta triangulorum partes autem æquemultiplicium ^c in eadem sunt ratione ^{15. 5.} atque ipsa æquemultiplicia.

Propositio 2. Theore. 2..

Si in triangulo ducatur recta lateri parallela; secabit proportionaliter reliqua eiusdem trianguli latera. Et si trianguli latera secta sint proportionaliter, recta per sectiones ducta tertio lateri erit parallela.


In triangulo ABC , ducatur DE , ipsi BC , parallela; quo facto dico latera AB , AC secta esse proportionaliter; hoc est, esse ut AD , ad DB , ita AE , ad ^{O 4} EC .

¶ 37. 2.

¶ 7. 1.

¶ 1. 6.

EC. Ductis enim rectis BE, CD, ^a erunt triangu-
la BED, DCE, in eisdem
parallelis æqualia, ^b & habebunt pro-
inde eandem rationem ad triangulum



ADE. ^c Sed quan-
proportionem ha-
bet triagulum ADE
ad DEB, eandem
habet basis AD, ^d
DB (cum triangi-
la sint in eadem a-

titudine, quam ostenderet perpendic-
laris quæ ex E duci potest ad AB) &
quam proportionem habet idem trian-
gulum ADE, ad ipsum CDE, eandem
habet basis AE, ad basim EC; ^e Cum
ergo ostensum sit ambo triangu-
la DEB, DEC, eandem habere rationem ad ip-
sum ADE, bases quoque BD, EC, ean-
dem habebunt proportionem ad lte-
ra DA & EA.

¶ 11. 6.

Iam vero si latera AB, AC, propor-
tionaliter secta sint, cum sit ob eandem
altitudinem vt AE ad DB, ita triagulum
ADE, ^e ad ipsum DEB; & vt AE, ^d EC
ita ADE ad ipsum EDC; sicut in eadem
ratione ponitur esse latera AD, DB, &
AE, EC;

¶ 1. 6.


A E, E C; erunt etiam triangula DBE, DEC in eadem ratione ad triangulum ADE; Erunt ergo *f* triagula DBE, DEC *f* 9. 5. inter se æqualia: cumque habeant eandem basim DE, erunt *g* constituta inter *g* 19. 1. parallelas: parallelę ergo sūt BC & DE. Si ergo in triangulo &c.

Propo. 3. Theor. 3.

Si trianguli angulus secetur bifariam, & recta angulum secans secet & basim, habebunt basis partes eādem proportionem quam reliqua trianguli latera. Et si basis partes eandem habeant rationem quam reliqua inter se latera, recta à vertice ad sectionem basis ducta trianguli angulum secabit bifariam.

Trianguli ABC, angulus BAC, bise-
cetur per rectam AD; dico in partibus
basis esse vt BD ad DC, ita BA, ad AC:
per C, enim ducatur CE ipsi AD paral-
lela, cui BA producta occurrat in E. *a* 2. 6.
Quia ergo in triangulo BEC, recta DA
ipsi CE, est parallela, erit sicut BD, ad
DC,

ad DC, ita BA, ad AE, seu ad AC, quæ ipsi AE æqualis est; Si ergo trianguli angulus &c. Esse autem rectam AC æqualem ipsi AE, sit ostendo. Quia recta AC tangit parallelas AD, EC, anguli *b* alterni CAD, ACE sunt æquales, *c* & quia recta AE, tangit easdem parallelas, angulus externus BAD interno &



opposito AEC, est æqualis: sūt ergo anguli AEC, ACE, æquales; cum ostensi sint æquales an-


gulis æqualibus BAD, & DAC; quare latera AC, AE, *d* sunt æqualia.

Iam vero si est ut BD ad DC, ita BA, ad AC, *e* ducta ut prius CE, parallelâ ipsi AD, erit ut BD, ad DC, ita BA ad AE; *f* æquales ergo sunt AE & AC, *g* quare anguli quos subtendunt nimirū AEC, ACE sunt æquales: sed hos ostendemus ut prius esse æquales angulis BAD, DAC; sunt ergo anguli BAD, DAC, pares inter se; ac proinde angulus BAC sectus est bisariam. Si ergo trianguli angulus &c.

Pro-

Propo. 4. Theor. 4.

Equiangulorum triangulorum latera circa aequales angulos sunt proportionalia, & latera aequalibus angulis subtensa sunt homologa.



Sint triangu-
la ABC, CDE, æ-
quiangu-
la, habē-
tia singulos an-
gulos æquales, A
ipsi DCE; ABC,
ipsi CDE; ACB,
ipsi E; quę triangu-
la sic constituentur
vt latus AC, lateri CE, iaceat in dire-
ctum, necnon productæ AB, occurrat
ED in puncto F. Quia ergo anguli
ACB, CED sunt pares, rectæ BC, &
FE, erunt parallelæ: parallelæ item AF,
& CD, ob æquales angulos BAC &
DCE; eritque DB, parallelogrammum,
ac proinde latera opposita æqualia.

Nunc vero quia in triangulo AEF
ducta est BC, ipsi FE parallela, erit

vt AB ad BF seu CD, ita AC ad CE.

Et permu. vt AB ad AC ita CD ad CE.

Similiter quia CD ipsi AF est parallela, erit
vt EC

i 21. 6.

vt EC ad CA, ita s ED ad DF seu CB,
Cum ergo sit vt AB ad AC, ita CD ad CE.

f 22. 5.

Et vt AC ad CB, ita CE ad ED,
habetur ternę & ternę magnitudines in
eadē ratione AB, AC, CB, CD, CE, ED.
Quare ex æquo vt AB ad CB ita f CD ad ED.
Sunt ergo latera omnia triangulorum
proportionalia & quæ æqualibus angu-
lis subtenduntur, sunt etiam homolo-
ga, seu eiusdem rationis; nam antece-
dentia & consequentia sub æqualibus
sunt angulis: Æquiāgulorum ergo &c.



Propof. 5. Theor. 5.

*Si duo triangula latera proportionalia
habuerint, erunt equiangula; eosque
angulos habebunt æquales, quibus
homologa latera subtenduntur.*

q 22. 1.

Est conuerſa præcedentis vt ſi trian-
gula ABC, DEF, habent latera propor-
tionalia, hoc eſt, ſi ſit vt AB ad AC, ita
DE ad DF, &c. erit etiam angulus A
angulo D, æqualis, &c. vt vult propo-
ſitio. Conſtituantur enim ad rectam
BC anguli GBC, GCB, iſſis E, & F, æ-
quales; q vt proinde etiā angulus G, an-
gulo D, ſit æqualis, vnde ſequetur trian-
gula

gula BGC, DEF esse æquiangula, *b* & *b* 4. *d*.
eorum latera proportionalia. Tunc ve-




ro quia DE & DF habēt eandem pro-
portionem ad AB & AC, quam ad GB
& GC, necesse est AB ipsi GB, & AC, *c* 12. *d*.
ipsi GC æqualem esse: & cumque BC sit *d* 12. *d*.
communis, tota triangula ABC, BGC
sunt æqualia, & æquales anguli omnes
Cum ergo ABC, & DEF eidem tertio
BGC, sint æquiangula, inter se quoque
erunt æquiangula; sunt vero illi æqua-
les anguli quibus homologa latera sub-
tenduntur: nam anguli A & G æquales
sunt, quibus commune BC subtensum
est, &c. Si ergo due triangula &c.



Pro-

Propo. 6 . Theore. 6.

Si duo triangula unum habeant æqualem angulum, & latera circa eum proportionalia, erunt æquiangula, angulosque habebunt æquales quibus æqualia latera subtenduntur.




In triāgulis A B C, DEF, si æquales sint anguli A & D, sitque ut A B, ad A C, ita D E ad D F, erunt & reliqui

anguli æquales &c: constituentur enim ad rectam EF, anguli EFG, GEF, æquales ipsis B, & C, ut propositione superiori. Quia ergo æquiangula sunt ABC, GEF, erunt AB, AC, & GF, GE, proportionalia: sed sunt etiam proportionalia AB, AC, & DE, DF, sunt ergo latera DE; DF, ipsis GF, GE æqualia. Cumque basis EF sit communis, tota triangula DEF, EFG æqualia & æquiangula sunt. Quia ergo triangula ABC, DEF, uni tertio EFG sunt æquiangula, inter se quoque erunt æquiangula &c.

Pro-

Propo. 7. Theore. 7.

Si duo triangula vnum angulum æquale, & latera circa alteros angulos habeant proportionalia, utrūq; vero angulorū reliquorum aut minorem recto; aut non minorem; æquiangula erunt triangula, & angulos circa quos latera sunt proportionalia, habebunt æquales.



Hoc est; si duo triangula ABC, DEF habeant vnum angulum, puta A, ipsi D æqualem, circa alteros vero puta B, & E, latera sint proportionalia, ac denique si tertij anguli C & F, sint vterque minor, aut vterque non minor recto; erunt hæc triangula æquiangula. Sint primum tertij anguli C & F vterq; minor recto: quod si tunc negas angulos


gulos ABC, DEF, circa quos latera sūt proportionalia, esse æquales, sit maior ABC, in quo constitutur ABG, ipsi DEF æqualis, cūque in triangulis ABG, DEF, duo anguli D & E, duobus A, & AGB, sint æquales, tertius F, tertio ABG erit æqualis, ac proinde tota triāgula æquiangula. Est ergo ut DE, ad DF, vel ut AB, ad BC, (nam ex hypothesi eadem est inter vtraque ratio) ita AB ad BG; esset ergo sicut AB, ad BC, ita AB, ad BC, quare rectæ BC, BG, essent æquales & consequenter pares erunt anguli BGC, BCG; & cum BCG positus sit minor recto, etiam BGC minor erit recto: si ergo BGC, est minor recto, angulus BGA maior erit recto, quem tamen ostendimus æqualem esse angulo F, hoc est, minorem recto, cum angulus F positus sit recto minor: idem ergo angulus BGA esset maior & minor recto, quod est absurdum. Nō possunt ergo anguli ABC, BEF, esse inæquales, quare & tertius F, tertio ACB æqualis erit, & triangula ABC, DEF, æquiangula.

Quod si tertij anguli C & F, ponantur
vter-

utrumque non minor recto, negetur tamē
 angulos E & ABC , esse æquales rursus
 probabitur rectas BC , BG , & angulos
 BCG , esse æquales; & cum positum sit
 hunc non esse minorem recto, nec ille
 esset minor recto, quod est absurdum
 nam in triangulo BGC , essent duo an-
 guli recti, aut rectis maiores. Si duo er-
 go triangu- & c. f. 17. 2.

Propo. 8. Theore. 3.

*Si in triangulo rectangulo ab angulo re-
 cto in basim ducta sit perpendicularis,
 quæ ad perpendicularem sunt triangu-
 la, tum toti triangulo, tum inter se
 sunt similia.*



In triangulo
 ABC sit angulus
 BAC rectus, &
 ex A ad basim BC
 ducatur perpen-
 dicularis AD .
 Quia ergo in triangulis ABC , ADC ,
 anguli BAC , ADC recti sunt, & angu-
 lus C communis, tertius ABC tertio
 DAC erit æqualis; ac proinde triangu-
 la A 32. 1.

b 4. 6.

la ABC, ADC sunt æquiangula, b & similia. Non aliter ostendetur triangulum ADB esse etiam simile toti triangulo ABC, ac proinde sunt etiam similia inter se triangula ABD ADC.

Corollarium.


Ex hoc manifestum est perpendicularē ab angulo recto ad basim ductam, esse mediam proportionalem inter duo basis segmenta: nam per 4. ostendetur esse ut CD, ad DA, ita DA ad DB, quod est rectam DA esse mediam proportionalem inter partes basis CD, DB.

Propositio 9. Proble. i.

Ad data recta linea imperatam partem auferre.

Ex recta AB auferenda sit pars tertia. Ducatur ergo ex A recta AC, faciens angulum cum AB utcumque; tum ex AC sumatur quævis pars puta AD, ac duæ aliz addantur æquales DE, EC, iungaturque CB; cui parallela fiat DF. Eritque ablata AF, pars tertia ipsius AB. Nam quia in triangulo ABC ducta est DF, ipsi BC parallela, erit sicut AD ad


a 2. 6.



ad DC, ita AF ad FB, & componendo sicut AC ad AD ita AB ad AF; est autē AD pars tertia ipsius AC, ergo AF est etiam pars tertia ipsius AB. A data ergo recta &c. 15. 5.

Proposi. 10. Proble. 2.

*Datam rectam in seclam similiter secare,
ut seclata fuerit data altera recta.*




Data recta AB seclata sit in C & D, oporteatque recta AE (quæ applicetur ad A ut cum recta AB angulū vtcunque constituat) in similes partes secare. Iunctâ rectâ BE ducantur CF, DG, ipsi BE parallele. Iam vero quia in triangulo ABE ductæ sunt CF, DG, lateri BE parallele, sectiones laterum AB AE sunt proportionales. Componendo ergo ac diuidendo ostendetur omnem eam proportionem, quæ est in- 2. 6.

ter partes ipsius AB, eandem quoque
esse inter partes lineæ AE. Datam ergo
rectam &c.

Propositio II. Proble. II.


*Datis duabus rectis tertiam proportio-
nalem inuenire*



Datæ rectæ
AB, AC angu-
lūquemuis cō-
stituant, puta
BAC, iunga-
turq; recta CB. Mox productis lateri-
bus AB AC, sumatur ipsi AC æqualis
BD, ducaturque DE ipsi BC parallela;
eritque recta CE tertia proportionalis
quæsitæ. Nam quia BC ipsi DE est pa-
rallela, et it vt AB ad BD, ita AC ad
CE; est autem BD ipsi AC æqualis;
Est ergo vt AB ad AC, ita AC ad CE;
quod est rectam CE esse tertiam pro-
portionalem.

Propo. 12. Probl. 4.

Tribus datis rectis quartam proportionalem inuenire.




Dux quælibet ex datis, puta AB & BC, in directum collocentur, tertia vero AD, cum ipsa AC angulum utcumque constituat, iunctâque rectâ BD, agatur ipsi parallela CE; eritque recta DE quarta proportionalis quæsitâ. Nam quia ipsi CE parallela est DB, erit ut AB ad BC, ita AD, ad DE. Tribus ergo datis AB, BC, AD, inuenta est quarta proportionalis DE.

Propo. 13. Probl. 5.

Datis duabus rectis mediam proportionalem inuenire.

Datæ rectæ AB, BC in directum collocentur, & super AC constitutur se-

P 3 mi-



micirculus AD
C: nam ad pun-
ctum B excitata
perpendicularis
vsque ad sectio-
nem semicircu-


li in D, erit media proportionalis que-
sita. Ductis enim rectis AD, DC, ^a erit
angulus ADC, rectus, & à vertice D, ad
basim AC ducta perpendicularis DB. ^b
^{b corol. 8. 6.} Quare inter partes baseos AC, media
proportionalis est DB.

Propositio 14. Theore. 9.

*Equalium & unum uni angulum æ-
qualem habentium parallelogrammo-
rum reciproca sunt latera circa æqua-
les angulos: Et quorum latera circa
unum angulum æqualem sunt reci-
proca, ea parallelogramma sunt æ-
qualia.*

Sint AB, BC, parallelogramma æ-
qualia, habentia angulos ad B æquales,
atque ita collocentur, ut latus BE, late-
ri DB iaceat in directum, ac proinde e-
tiam

tiam GB, ipsi BF. Dico igitur esse vt DB, ad BE, ita GB, ad BF, Perfecto enim



parallelogrammo EF, cum parallelogramma AB, BC, sint equalia, sicut vnum AB est ad


EF, ita alterum BC ad idem EF; sed vt AB ad FE, ita est latus DB ad BE; & vt BC ad FE, ita latus GB ad BF, ergo est vt DB ad BE, ita GB ad BF. Quod erat demonstrandum.

E conuerso autem si penantur latera circa equales angulos ad B, esse reciproca, ostendetur parallelogramma esse equalia, nam si est vt DB ad BE, ita GB, ad BF; erit etiam vt DB ad BE, ita AB ad FE; item vt GB ad BF, ita BC ad FE, quare est etiam vt AB ad FE, ita BC ad idem FE. Parallelogramma igitur AB, BC, sunt equalia.



Propositio 15. Theor. 10.

Equalium & unum uni angulum æqualem habentium triangulorum reciproca sunt latera. Et quorum latera circa æquales angulos sunt reciproca, ea triacula sunt equalia.



Patet propositio ex præcedente: nam triacula sunt dimidium parallelogrammorum, quæ sub duobus lateribus triangulo-


rum æquales angulos continentibus describi possunt; quæ ergo est ratio parallelogrammorum & laterum, eadem est triangulorum; ut si sint triacula æqualia ABC, BDE, quibus æquales sint anguli ad B; ponatur BE ipsi AB, in directum, & ex consequenti DB ipsi BC, perficianturque parallelogramma BG, BF. Tunc verò per præced. erunt latera circa angulos ad B, reciproca, quæ eadem sunt latera triangulorum. Eadē

me-

methodo demonstrabitur posterior pars propositionis.

Propos. 16. Theore. 17.

Si quatuor lineæ proportionales fuerint, erit quod sub extremis continetur rectangulum, æquale ei quod sub medijs. Et si rectangulum sub extremis contentum æquale est ei quod sub medijs, quatuor illæ lineæ sunt proportionales.



Sint quatuor lineæ AB, CD, CE, AE, proportionales: quæ ita collocentur ut AE, AB, & CE, CD,


rectos angulos A, & C, contineant, cõpleanturq; parallelogramma BE & DF; quæ dico esse æqualia: nam latera circa æquales angulos A & C, recipiuntur ex hypothesis. Sunt ergo parallelogramma æqualia; quorum BE sub extremis lineis, DF sub medijs continetur.

E conuerso si sub ijsdem lineis constituentur parallelogramma, angulis A & C existentibus rectis, eaque parallelogramma sint æqualia, erunt latera circa

circa angulos A & C, reciproca, hoc est erit vt AB ad CD, ita CF, ad AE; si ergo quatuor lineæ &c.

Propo.17 .Theore.12.

Si tres recte proportionales fuerint, quod sub extremis continetur rectangulū, æquale est quadrato quod à media describitur. Et si quadratū à media descriptum, rectangulo sub extremis est æquale, proportionales sunt tres illæ lineæ.




Sint tres lineæ AB, CD, BE proportionales; id est, vt AB ad CD, ita CD ad BE, fiatque sub extremis AB, BE rectangulum AE, & à media D quadratum CF. Quia ergo est vt AB ad CD, ita CD, vel illi æqualis DF, ad BE; erunt quatuor rectæ AB, CD, DF, BE proportionales; rectangulum ergo CF quod sub medijs CD, DF continetur (hoc est quadratum CF) æquale est ipsi AE, quod continetur sub extremis AB, BE.

E con-

E converso si quadratum medix CD rectangulo sub extremis æquale ponatur, ostendetur tres illas lineas esse proportionales, vt in prop. præce. Si ergo tres rectæ &c.

Propositi. 18. Proble. 6.

Super data recta dato rectilineo simile, similiterque positum describere.




Sit data recta AB, datū rectilineum CD, in quo ducatur recta

EF. Deinde ad puncta A & B rectæ AB constituentur anguli A & ABH æquales ipsis C & CFE; & erit proinde reliquus AHB reliquo CEF æqualis, & triangula tota AHB, CEF æquiangula, & latera proportionalia. Amplius ad puncta H & B rectæ HB constituentur HBG, BHG, ipsis EFD, FED æquales, & proinde reliquus G reliquo D erit æqualis, & triangula, vt prius, æquiangula, lateraque proportionalia. Et factum

Etum est quod petitur. Nam cum tria-
gula partialia rectilinea AH & CD
ostensa sint omnibus angulis æqualia,
& omnibus lateribus proportionalia,
sunt ex figuræ similes, & similiter po-
sitæ. Quod si rectilineum datū plures
angulos quam quatuor contineret,
pluries esse repetenda æqualium angu-
lorum constructio, pluribus quā duo-
bus triangulis constitutis, & demon-
stratio procedet vt prius. Super data er-
go recta &c.

Propo. 19. Thore. 3.

*Similia triangula sunt in duplicata ra-
tione suorum laterum homologorum.*



Sint ABC, DEF triangula similia, ha-
bentia angulos B & E æquales. Dico
triangulum ABC ad DEF, duplicatam
habere

habere eam proportionem, quæ est inter latera homologa BC , EF . *a* Sumatur enim ipsarum BC , EF , tertia *11. 6.* proportionalis BG , ut sit sicut BC ad EF , ita EF ad BG ; ducaturque AG . Sunt ergo expositis.

Vt AB ad BC , ita DE ad EF .
Permut. Vt AB ad DE ita BC ad EF .

Sed Vt BC ad EF , ita EF ad BG ;

Triangulorum igitur ABG , DEF latera circa æquales angulos B & E sunt reciproca, *b* ac proinde triangula ABC *15. 6.* DEF sunt æqualia. Et quia est ut BC ad EF , ita EF ad BG , *c* habet BC ad BG duplicatam eam rationem quam habet *d* ad EF . ut vero BC ad BG , *e* ita est triangulum ABC ad triangulum DEF , & illi æquale ABG : quare ABC tam ad triāgulum DEF , quam ad ABG duplicatam habet eam proportionem quæ est inter latera homologa, BC & EF . Similia ergo triangula &c. *11. 5.* *1. 6.*


Corollarium.

Ex his patet si tres linea proportionales fuerint, esse ut primam ad tertiam ita triāgulum super prima descriptum ad simile similiterque posuit super secunda. Nam
osten-

ostensum est esse ut BC ad BG , ita triangulum ABC super prima BC , ad triangulum DEF simile similiterque positum super secunda EF .

Propo. 20. Theor. 14.

Similia polygona in similia triangula diuiduntur, numero equalia & totis homologa. Et polygona duplicatam inter se eam habent rationem, quæ est inter latera homologa.



Sint polygona similia $ABCDE$, $FGHKL$; sintque anguli EAB , LFG æquales angulus vero G angulo B , & sic ordine deinceps: sint denique latera circa æquales angulos proportionalia, ut EA ad AB ita LF ad FG &c; ideoque latera AB , FG , &c; erunt homologa.


Dico primo, hæc polygona ductis rectis rectis AD AC , FK , FH , diuidi in triangula

gula similia. Nam quia angulus B æqualis est angulo G, & latera circa hos angulos proportionalia, æquiangula erunt triângula ABC, FGH & similia: eadem ratione ostendetur triângula DAE, kFL esse similia, ob æquales angulos E & L. Nunc vero quia est vt AC ad CB ita FH ad HG (ob similia triângula ACB, FHG) & vt CB ad CD ita HG ad HK ob similia polygona; collocabuntur iuxta 22. 5. ternæ & ternæ magnitudines.

A C C B C D: F H G H H K.

Ergo ex æquo vt AC ad CD ita FH ad HK 22. 5. Et quoniam angulus B C D, ipsi GHK est æqualis, & ablati ACB, ablato FH G, erunt reliqui ACD, FHk etiam æquales. Quare triângula ADC, FkH erunt æquiangula & similia, cum circa æquales angulos A C D, FHk habeant latera proportionalia. Omnia ergo triângula polygonorum ostensa sunt similia.

Dico secundo esse totis homologa, hoc est sicut vnum triângulum ad triângulum sibi respondens alterius polygoni, ita esse polygona tota inter se. Quia enim



19. 6.

enim similia sunt triagula ABC, FGH, erūt in duplicata ratione laterum homologorum AC, FH; & ob eandem causam triagula ACD FHK, sunt in duplicata ratione eorundem laterum AC, FH. Quare vt triangulum ABC ad FGH, ita ACD ad FHK, similiterque ostendetur triagula AED, FLK esse in eadem duplicata ratione laterum eorundem AC, FH: sunt ergo triagula polygonorum proportionalia. Cum vero quocunque magnitudines quocunque magnitudinum sunt proportionales, sicut est vna ad vnā ita omnes ad omnes. Est ergo polygonum ad polygonum sicut triangulum ad triangulum.

12. 5.

1. 6.

Dico tertio, polygona esse in duplicata ratione laterum homologorum AB, FG. Nam quia triagula sunt in duplicata ratione laterum, & polygona sunt

sunt ut triangula, erunt etiam polygona in duplicata laterum ratione. Similia ergo polygona &c.

Corollarium.

Eadem methodo probabitur omnes figuras rectilineas esse in duplicata ratione laterum homologorum.

Propo. 21. Theor. 15.

Quæ eidem rectilineo sunt similia, & inter se sunt similia.



Si enim
figuræ A
BC, GHK
eidem D
EF sint
similes;

quia anguli A & G sunt vni D æquales, erunt & inter se æquales; & ita probabitur omnes angulos, omnibus angulis esse æquales; & latera circa eos esse proportionalia, si lateribus eiusdem tertij sint proportionalia, ac propterea ABC, GHK esse figuras similes. u. 6.




Q

Pro-

Propositio 22. Theore. 16.

Si quatuor rectæ proportionales fuerint; rectilinea similia & similiter ab ijs descripta erunt proportionalia. Et si à rectis lineis similia similiterque descripta rectilinea proportionalia fuerint, ipsæ rectæ lineæ proportionales erunt.


 Sint quatuor
 rectæ A, B, C,
 D proportionales; dico de-
 scriptis simili-

bus rectilineis puta triangulis super A & B, & similibus seu triangulis seu alijs rectilineis super C & D, hæc rectilinea fore proportionalia. Sumatur enim ipsarum A & B tertia proportionalis E. & ipsarum C & D, tertia proportionalis F; eritque ex equo ut A ad E, ita C ad F. Ut autem A ad E, ita est rectilineum super A ad rectilineum super E; & ut C ad F; ita etiam eorum rectilinea. Ergo ut rectilineum super A ad rectilineum super B, ita rectilineum super C ad

a 11. 6.

b 22. 5.


c 20. 6.

ad rectilineū super D. Et sic probatum est rectilinea esse proportionalia.

E conuerso autem si rectilinea sint proportionalia, & similia similiterque posita; etiam latera erunt proportionalia; nam rectilinea duplicatam & habent rationem illam eandem, quæ est inter latera.

Propo. 23. Theore. 17.

Æquiangula parallelogramma inter se proportionē habent ex laterū proportionibus compositam.



Sint parallelogrāma AB, BC, habentia angulos ad B æquales; & ita disposita vt DB ipsi BG iaceat

in directum, compleaturque parallelogrammum BH. Cum ergo sit vt AB ad BH ita DB ad BG, & vt BH ad BC ita EB ad BF, erit proportio ipsius AB ad BC composita ex proportionibus inter AB, BH, & inter BH, BC; cumque


Q 2 ad

c. 20. 6.

hæ rationes eædem sint e cum ijs quæ sunt inter latera DB, BG, & inter latera EB, BF; erit quoque proportio ipsius AB ad BC composita ex proportionibus laterum eorundem, quod erat demonstrandum.

Propos. 24. Theor. 18.

In omni parallelogrammo, quæ circa diametrum sunt parallelogrāma, & tota, & inter se sunt similia.



In parallelogrammo AB circa diametrum CD sint parallelogrāma EF & GH, quæ dico esse &

toti, & inter se similia. Nam quia parallelogrammum GH habet angulum ad D communem cum toto, & angulus DHK æqualis est interno & opposito B; erunt etiam anguli HKG, KGD æquales reliquis A & ACB totius parallelogrammi; & eodem modo ostendetur angulos omnes parallelogrammi EF, angulis totius AB esse æqua-

quales. Iam vero quia triacula $\Delta K G$, $\Delta K H$ æquiangula sunt, & similiter triacula $\Delta A C$, $\Delta B C$; erit vt $D A$ ad $A C$, ita $D G$ ad $G k$; latera ergo circa æquales angulos A & G sunt proportionalia. Rursus vt $A C$ ad $C D$ ita $G k$ ad $k D$, & vt $C D$ ad $C B$ ita $k D$ ad $K H$; Ergo ex æquo d vt $A C$ ad $C B$, ita $G K$ ad $K H$; & sic latera circa æquales angulos $G K H$, $A B C$ sunt proportionalia. Neque aliter monstrabitur latera circa alios angulos æquales esse proportionalia. Sunt ergo parallelogramma $E F$, $G H$ similia toti $A B$, ac proinde etiam inter se. d 22. 5.

Proposi. 25. Proble. 7.

Dato rectilineo simile similiterque positum, & alteri dato æquale constituere.




Sit constituendum rectilineum simile ipsi A , & æquale alteri B . Fiat ergo super $C D$ parallelogrammum d 44. 1.

$Q 3$

$C F$


CF, æquale ipsi A, & super DF, in angulo FDH equali ipsi ECD, fiat parallelogrammū DG, ipsi B æquale. Amplius rectarum CD, DH inueniatur *b* media proportionalis KL, super qua fiat rectilineum M, simile ipsi A, eritque rectilineum M factum vt proponitur. Est enim simile ipsi A ex hypothesi; esse autem equale ipsi B sic ostendo. Quia rectæ CD, KL, DH sunt proportionales, erit vt prima *d* CD ad tertiam DH, ita rectilineum super primam, id est A, ad



rectilineum super secundam id est ad M: sed vt CD ad DH, ita parallelogrammū CF id est A, ad DH, hoc est ad B. Quare erit vt A ad B, ita A ad M, ideoque rectilinea B & M erunt equalia. Dato ergo rectilineo &c.

Proposi. 26. Theore. 19.

Si à parallelogrammo auferatur parallelogrammū simile toti, & communem unum angulum cum eo habens, hoc circa eandem diametrum cum toto consistit.



Ex parallelogrammo A B, auferatur simile C D, habens angulum eundem ad E cum toto,


ducanturque rectæ EF, FG, quæ si non sunt diametrum totius A B, sit ergo alia diametrum, puta E H G, ducaturque H K ipsi F D parallela; eruntque C K & A B parallelogramma similia: est ergo ut AE ad EB, ita CE ad Ek; sed quia similia etiam ponuntur C D & A B est ut AE ad EB, ita CE ad CD; habet igitur CE eandem rationem ad EK & ED; quare EK & ED sunt æqualia, pars & totum, quod fieri nequit. Non est ergo diametrum E H G, neque alia erit quàm EFG: quod erat probandum.

Q 4

Pro-

Propo. 27. Theore. 20.

Omnium parallelogrammorum secundum eandem rectam applicatorum & deficientium figuris parallelogrammis similibus ei quod à media describitur, maximum id est quod ad mediam applicatur, simile existens defectui.



Recta AB bifecetur in C, & super dimidia CB fiat utcumq; parallelogrammum CE, cuius diameter BD.


Cópleto ergo parallelogrammo BH, parallelogrammum AD erit super dimidium AC, deficientq; à toto BH, parallelogrammo CE; etque AD simile defectui CE. Hoc igitur parallelogrammum AD dico esse maximum eorum quæ super AB posita deficient parallelogrammis similibus & similiter positis ipsi CE. Sumatur enim in recta DB quodcunque punctum, puta G, ducanturque KM & FL ipsis

sis AB, BE parallelæ; eritque parallelogrammum AG positum super AB, & deficiens ipso kL quod simile est, & similiter a positum ipsi CE. Dico ergo parallelogrammum AG minus esse ipso AD. Quia enim æqualia sunt FD, & DL ob bases æquales HD, DE, & DL maius est quam GE hoc est quam CG (sunt enim CG & GE complementa ipsius CE, ideoque æqualia) erit etiam FD maius quam CG, eodem excessu IM. Si igitur ipsis FD, CG commune addatur AI erit AD maius quam AG. Omnium ergo parallelogrammorum &c.

Propositio 28. Proble. 8.

Ad datam lineam rectam dato rectilинеo equale parallelogrammum applicare deficiens figura parallelogramma, quæ sit similis, alteri datæ. Oportet autem datum rectilineum non esse maius parallelogrammo, quod ad dimidium datæ rectæ applicari potest iuxta tenorem præc. prop.

Repetatur exemplum superioris propositionis.



positionis, in quo ad rectam AB sit applicandum parallelogrammum æquale rectilineo N & deficiens parallelogrammo quod sit simile ipsi O. Super dimidia ergo ipsius AB fiat parallelogrammum CE, simile & similiter positum ipsi O. compleaturque parallelogrammum BH. Quod si contingeret CE vel AD ipsi N esse æquale, factum esset quod petitur. Si autem AD minus est quam N (nam minus esse non debet; cum enim AD sit omnium maximum quæ applicari possunt iuxta tenorem prop. præcedentis, si esset AD minus ipso N nullum aliud applicari posset ad AB æquale ipsi N) constituatur æquale excessui parallelogrammum IM, simile & similiterque positum ipsis O & CE, quodque propterea poni poterit circa eandem diametrum DB. Iam vero pro-

18. 6.

19. 6.


20. 6.

productis rectis FL & LM, erit parallelogrammum AG applicatum rectæ AB deficiens parallelogrammo KL, simili ipsius IM, hoc est ipsius O. Idemque æquale est ipsi N. Nam quia ostensum est AG deficere ab AD, parallelogrammo IM, & rectilineum N ab eodẽ AD seu CE deficit eodem parallelogrammo IM, sequitur rectilineum N, & parallelogrammum AG esse equalia. Ad datam ergo rectam &c.

Propo. 29 Proble. 9.

Ad datam rectam dato rectilineo æquale parallelogrammum applicare, excedens datam rectam figura parallelogramma, quæ similis sit dato alteri parallelogrammo.

Ad datam rectam AB sit applicandũ parallelogrammum æquale rectilineo C, & excedens rectam AB parallelogrammo simili ipsius D. Super recta ergo EB dimidia ipsius AB fiat parallelogrammũ cuiusvis magnitudinis, dummodo
 simile sit ipsi D similiterque positum;
 fiatque rursus parallelogrammum GH
 simile eidem D, æquale^b vero ipsis EF
 & C



& C simul sumptis; habeatque angulū
 EKF communem cum parallelogram-
 mo EF. Completis igitur parallelogrā-
 mis OE, GB, NL, cum GH sit positum
 æquale ipsis EF & C simul sumptis, ab-
 lato communi EF, gnomon PQR ipsi
 C erit æqualis. Et quia ob bases æqua-
 les & æqualia sunt OE & GB, æqualia
 item & complementa GB & BH, si loco
 ipsius BH substituatut æquale OE, erit
 parallelogrammum AM æquale gno-
 moni PQR; ideoque etiam rectilineo
 C. Quare ad rectā AB applicatum est
 parallelogrammum AM, æquale dato
 rectilineo C, excedens rectā AB figu-
 ra parallelogramma NL, quæ similis
 est dato parallelogrammo D, cum sit
 circa eandem diametrum cum ipso EF,
 quod

36. 1.

43. 1.

quod positum est simile ipsi D. Ad datā
ergo sectam &c.

Propositio 30. Proble. 10.

*Datam lineam rectam extrema ac me-
diaratione secare.*

 Recta AB ita
secetur in C, ut

rectangulum sub tota AB & segmē-
to BC, sit æquale quadrato alterius seg-
menti AC; eritque recta AB secta ex-
trema & media ratione: nam erit sicut
AB, ad AC, ita AC ad CB.

Propo. 31. Theore. 21.


*In rectangulis triangulis figura quævis
super laterem rectum angulum subtē-
dente, æqualis est figuris, quæ priori
illi similes, & similiter posita super
lateribus rectum angulum continen-
tibus describuntur.*

In triangulo ABC latus BC sul-
tat angulum rectum BAC, & super BC
descripta sit figura quævis puta CD,
cui similes & similiter posita sint AE
AF

b 20. 6.

A.F, super lateribus angulum rectum continentibus. Quia ergo tres omnes figure sunt similes, erunt in duplicata ratione laterum *b* homologorum; in qua etiam ratione essent quadrata eorundem laterum; sed quadrata super

q 47. I.




AB AC essent æqualia *c* quadrato ipsius B C, ergo etiam figure similes super iisdem AB AC, sunt æquales ipsi CD. In

rectangulis ergo triangulis &c.

Proposi. 32. Theor. 22.

Si duo triangula habentia duo latera duobus lateribus proportionalia ad unum angulum componentur, ita ut latera homologa sint parallela, reliqua latera in directum erunt constituta.

Duo triangula ABC, DCE habentia latera proportionalia, hoc est ut AB ad AC




AC, ita DC ad
DE, compo-
nantur ad cō-
stituendum an-
gulum ACD;
sintque tā an-

tecedentia AB, DC, quam consequen-
tia AC, DE parallela. Dico reliqua late-
ra BC, CE iacere in directū. Quia enim
recta CD cadit in parallelas CA, ED;
erunt $\angle$ anguli alterni D & DCA $\approx$ qua- 29. 1.
les; $\approx$ quales item BAC, & ACD cum
etiam recta AC cadat in parallelas AB
& DC; $\approx$ quales ergo sunt anguli A &
D, cum eidem tertio ACD ostensi sint
 $\approx$ quales; & cum circa eos latera sint
proportionalia, $\approx$ quiangula sunt triā- 6. 6.
gula ABC, DCE; anguli ergo B & BCF
sunt $\approx$ quales; additis ergo $\approx$ qualibus
A & ACD, pares erunt duo anguli B &
A, duobus DCE, ACD, siue toti ACE:
rursusque addito communi ACB, erūt
duo anguli ACB, ACE pares tribus A,
B, & ACB; sed hi tres $\approx$ quales sunt duo-
bus rectis, ideoque BC & CE $\approx$ iacent 32. 1.
in directum. Si ergo duo triangula. 14. 2.

Pro-

Propo. 33. Theore. 23.

In æqualibus circulis anguli eandem habent rationem cum peripherijs quibus insistant, siue ad centra siue ad peripherias constituti insistant. Eandem insuper proportionem habent sectores, quippe qui ad centra consistunt.



Sint æquales circuli ABC DEF, quorum centra G & H; & arcibus BC, EF insistant ad centra anguli BGC, EHF. Dico hos angulos esse inter se ut arcus BC & EF. Nam si arcus BC, EF, sunt æquales, ^a æquales sunt anguli BGC, EHF. Quare si alter arcus esset maior, puta BC, aut minor; maior quoque aut minor esset angulus BGC quàm EHF, & sic quoque erit in ^b æquemultiplicibus; sunt ergo anguli BGC, EHF, sicut arcus

^a 27. 3.

^b def. 5. 5.



arcus BC, EF.

Eodem modo probabitur angulos A & D qui insistant ad ambitum, esse ut sunt idem arcus.

Denique sector rectis BG, GC & arcu BC comprehensus, est ad sectorem EHF, sicut arcus BC ad arcum EF. Nam si arcus sunt æquales, æquales etiam erunt ductæ rectæ BC EF; & anguli ad centra G & H, & tota triangu-
la BGC, EHF æqualia, æquales item
portiones circulorum quas auferunt
rectæ BC, EF, quare & sector BGC par-
erit ipsi EHF; quod si arcus BC maior
esset ipso EF, cætera omnia essent ma-
iora in circulo ABC, si minor, minora;
& sic quoque erit, in æquæ multiplici-
bus: est ergo sector BGC, ad se-
ctorem EHF, sicut arcus BC ad arcum
EF. In æqualibus ergo &c.

R

Corol-

Corollarium.

Hinc manifestum quoque est sic esse sectorem ad sectorem, sicut est angulus ad angulum; cum utraque proportio eadem sit proportioni arcus ad arcum; quare & inter se eadem sunt.

FINIS.

AD MAIOREM DEI
GLORIAM.



ERRATA.